OK 369
35
1845-46

FLORAE JAPONICAE

FAMILIAE NATURALES,

**ADJECTIS GENERUM ET SPECIERUM EXEMPLIS
SELECTIS.**

SECTIO PRIMA.

PLANTAE DICOTYLEDONEAE POLYPETALAE.

AUCTORIBUS

Dr. Ph. Fr. de Siebold et Dr. J. G. Zuccarini.

Mo. Bot. Garden,
1897.

From Abhandl. K. Akad. München
math. phys. Cl.
Sectio. prima 4, Abt. 2, pp. 117-204, pls. 1-2. 1843
" altera 4, Abt. 3, pp. 125-246, pl. 3. 1846

FLORAE JAPONICAE

FAMILIAE NATURALES.

SECTIO PRIMA.

PLANTAE DICOTYLEDONEAE POLYPETALAE.

Einleitung.

Ich habe in gegenwärtiger Arbeit es versucht, durch möglichst vollständige Zusammenstellung aller Pflanzenfamilien, welche die Flora von Japan constituiren, so wie durch Hervorhebung charakteristischer Gattungen und Arten aus jeder derselben, so weit mir solche gegenwärtig zur Verfügung stehen, ein Bild jener Vegetation zu entwerfen, welche den äussersten Osten von Asien repräsentirend uns zugleich Nachweis zu geben hat über die Relationen, in welchen die Flora dieses Welttheiles zu der des amerikanischen Continentes steht. Schon früher hatte ich die Ehre, der mathem.-physikalischen Classe in den Sitzungen am 12. Juni 1841 und am 20. Januar 1844 (Gelehrte Anzeigen XIII. Nr. 159—162 und XVIII. Nr. 53—58)

einige Mittheilungen über diese Flora zu machen und darin theils die bisher von Europäern und Japanesen vorliegenden Leistungen aufzuzählen, theils über die Zusammensetzung der japanischen Vegetation und über ihre Verwandtschaften mit andern Floren zu berichten. Auf diese Vorarbeiten muss ich, um Wiederholungen zu vermeiden, mich hier beziehen und der Aufzählung der einzelnen Formen nur noch einige allgemeine Bemerkungen vorsetzen.

Ein Inselreich, welches so viele Breitengrade fast in directer Richtung von Süden nach Norden (vom Südcap auf Kiusiu unter beiläufig $30^{\circ} 30'$ bis Cap Elisabeth auf Krafsto unter 54°) durchzieht, muss in seinen verschiedenen Provinzen auch sehr differente Combinationen der Vegetation und ihrer Beziehungen zu andern Floren darbieten, zumal wenn es wie Japan zugleich eine grosse Mannigfaltigkeit in der Beschaffenheit seiner Oberfläche durch Gebirge und Gewässer aufzuweisen hat. Desshalb finden wir zunächst auf den südlichen Inseln des Reiches, auf Kiusiu, Sikok und dem mittägigen Theile von Nippon eine grosse Uebereinstimmung der Flora mit der des mittleren und wärmeren China's. Eine grosse Anzahl von Arten, darunter fast sämtliche Kulturgewächse, gehört beiden Ländern mit Korea gemeinschaftlich an, und die Entdeckungen, welche wir in Folge der neueren Ereignisse über den südöstlichen Theil von China zu hoffen haben, dürfen grösstentheils wohl auch für den Süden von Japan geltend gemacht werden. In anderen Verhältnissen steht die süd-japanische Flora zu der des nördlichen Indiens und der Himalaya-Abhänge. Hier finden wir zwar eine grosse Analogie, aber keine Identität mehr, indem sehr viele Genera beiden Floren gemeinschaftlich angehören, aber die Arten, wenn auch oft nahe verwandt, doch fast durchgängig verschieden sind. Aehnlich, nur etwas entfernter stellt sich das Verhältniss der süd-japanischen Vegetation zu der Flora der vereinigten Staaten von Nordamerika. Mehrere Gattungen, die man früher als ausschliesslich der neuen Welt angehörig

bezeichnet hatte, wie *Negundo*, *Sassafras*, *Diervilla*, *Torreya*, *Pachysandra*, *Mitchella*, *Maclura*, *Liquidambar* u. s. w., sind durch die japanische Flora beiden Hemisphären gemeinsam geworden. Dass jedoch diese Analogie in der Vegetation viel mehr auf die Küsten des atlantischen Oceans (auf die Staaten von Neu-York bis Georgien) sich beziehe, als auf die des stillen Meeres, ist schon anderweitig erwähnt worden. Der nördliche und rauhe Theil von Japan, die Gebirge von Nippon, dann Yesso und Krafu entsprechen höchst wahrscheinlich eben so den ähnlichen Breiten des nördlichen China's, wie wir dieses von dem Süden wissen. Aber leider fehlen dafür noch ausreichende Belege, denn aus dem nördlichen China kennen wir nur das Wenige, was die eifrigen Bemühungen russischer Gelehrter haben erringen können, und die Flora des Nordens von Japan ist bisher nur durch unvollständige Herbarien japanischer Botaniker documentirt. Diese Mangelhaftigkeit der Materialien aus beiden Ländern macht also die Vergleichung noch unsicher. Mit grösserer Bestimmtheit lassen sich die Analogien mit der Flora des russischen Nordasiens verfolgen. Diese seit einem Jahrhundert so vielfach und von so ausgezeichneten Männern untersuchte Vegetation ist hinreichend bekannt, um alle aus dem Norden von Japan uns bisher gewordenen Thatsachen damit vergleichen zu können. Daraus ergibt sich bereits, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Arten aus den Familien, welche diese Floren vorzugsweise repräsentiren, theils dem südöstlichen Sibirien, theils Kamtschatka mit Nordjapan wirklich gemeinschaftlich angehören. In den Familien der Ranunculaceen, Papaveraceen, Cruciferen, Leguminosen, Rosaceen, Umbelliferen, Scrophularineen u. s. w. tritt diese Verwandtschaft augenfällig hervor. Sie mindert sich dagegen wieder für die entsprechenden Küsten von Amerika am stillen Ocean, z. B. für die russischen Besitzungen auf Sitcha, wo meistens wieder die Gattungen zwar identisch, die Arten aber nur analog erscheinen. So steht also Japan bis an seine Nordgrenze in den nächsten Beziehungen zu der Flora des asiatischen

Continentes, dessen östlichstes Glied es bildet, und scheidet sich scharf genug von den gegenüberliegenden Küsten von Amerika ab. Eine Verwandtschaft der japanischen mit der europäischen Vegetation ist nur in geringem Grade aus der Identität derjenigen Gattungen zu ersehen, welche überhaupt fast alle Längengrade der nördlichen gemässigten Zone durchziehen. Sehr selten aber dehnt sich die Identität auf Arten aus, mit Ausnahme der sogenannten Kosmopoliten wie *Leontodon*, *Taraxacum*, *Capsella Bursa*, *Anagallis phoenicea*, *Ranunc. sceleratus*, *Alsine media* u. s. w. Die Flora von Australien scheint mit der japanischen völlig ausser Zusammenhang zu seyn, und letztere in östlicher Richtung nur bis zu den Bonin Sima Inseln fortzusetzen, auf den Marianen aber schon völlig verschieden zu seyn. Gegen Süden gehen manche japanische Arten zwar noch in die bereits subtropische Vegetation der Liukiu-Inseln ein, aber auf den Philippinen ist keine Spur davon mehr zu finden. Die Standorte japanischer Pflanzen auf Java, wie sie bei mehreren Schriftstellern vorkommen, bedürfen einer sorgfältigen Prüfung. Vermuthlich beziehen sie sich nur auf eine Anzahl von Arten, welche die Holländer absichtlich oder zum Theil auch zufällig übergesiedelt haben, nämlich auf Zier- und Nutzpflanzen und auf Unkräuter. Mit Südamerika scheinen nur in einzelnen Gattungen, wie z. B. *Hisingera*, *Ternstroemia* u. a. entfernte Relationen zu bestehen, mit Afrika jede Verbindung zu fehlen.

Charakteristisch scheint für die Flora von Japan die grosse Anzahl von Pflanzenfamilien und Gattungen bei verhältnissmässig wenig Arten. Bisher steigt die Specieszahl noch bei keinem Genus daselbst bis auf 30 und die verhältnissmässig reichsten Genera gehören fast durchgängig, wie *Carex*, *Lilium*, *Polygonum*, *Quercus*, zu den Typen der gemässigten Zone. Beträchtlich ist dagegen die Zahl der Gattungen, welche bisher überhaupt nur durch eine Art repräsentirt werden, oder in andern Floren als Monotypen aufgestellt, hier ihre

zweite Art zugetheilt erhalten. Unter solchen ist z. B. die Gattung *Humulus* interessant. Bezeichnend ist ferner die verhältnissmässig grosse Anzahl von Bambuseen, Coniferen, Cupuliferen, Laurineen, Euphorbiaceen, Rosaceen, welche, nach früheren Ansichten ein räthselhaftes Gemische von Formen der tropischen und der gemässigten Zone, in ihrer Combination nur als Beweis dienen können, dass viele früher als den Tropen eigenthümlich bezeichnete Familien in Wahrheit die Wendekreise überschreiten, und dass demnach die der Aequatorialzone ausschliesslich angehörigen Familien viel weniger zahlreich sind, als man früher glaubte.

Nicht minder bezeichnend für die japanische Vegetation dürfte die grosse Anzahl von Holzgewächsen im Verhältniss zu den krautartigen Pflanzen seyn, welche überdiess in ihrer Combination sehr an die dendrologische Flora von Nordamerika erinnert. In beiden Floren sind Coniferae, Betulaceae, Cupuliferae, Moreae, Laurineae, Lonicerae, Styraceae, Ericineae, Araliaceae, Hamamelideae, Saxifrageae, Magnoliaceae, Ternstroemiaceae, Acerinae, Celastrineae, Juglandaeae u. s. w. durch zahlreiche Arten oft zugleich in überraschender Identität der Gattungen repräsentirt, aber der asiatische Charakter in der japanischen Flora doch auch wieder durch Lardizabaleen, Schizandraceen, Sapindaceen, Pittosporeen, Alangieen u. s. w. aufrecht gehalten. Die Anzahl der Holzgewächse dürfte in Japan auf ein reichliches Drittheil der Gesamtflora anzuschlagen seyn.

Endlich muss noch in der japanischen Flora auffallend erscheinen die grosse Anzahl von Spielarten oder vielmehr die Mannigfaltigkeit von Formen, welche in vielen Gattungen nicht nur an einer Species, sondern an den einzelnen Individuen derselben vorkommen. Mag immer lange und sorgfältige Gartenkultur daran wesentlich Antheil haben, die dadurch gewonnenen Resultate übertreffen jedenfalls Alles, was in gleicher Beziehung in europäischen Gärten bisher ge-

leistet worden ist, und setzen zugleich einen Grad von Bildsamkeit oder Variabilität bei den einzelnen Arten voraus, welcher unserer europäischen Vegetation fremd ist. Welcher unserer Bäume hätte z. B. so mannigfaltige und so ausgezeichnet verschiedene Blattformen aufzuweisen, als *Acer polymorphum* in Japan oft an *einem* Zweige zeigt. Zugleich ist die Anzahl polymorpher Pflanzen in Japan viel grösser als in unsern Floren, und die Beweglichkeit der Erscheinung dehnt sich bald über den ganzen Habitus, bald nur auf einzelne Organe aus.

Eine vollständige Aufzählung aller bisher in Japan gefundenen Gattungen und Arten zu geben, konnte um so weniger der Zweck der nachfolgenden kleinen Arbeit seyn, als ein grosser Theil des Materials erst der genaueren Bearbeitung entgegen sieht; doch dürfte die getroffene Auswahl ausreichen, um über alle vorkommenden Familien Rechenschaft zu geben, und bei den meisten auch die Formen hervorzuheben, welche den wesentlichen Charakter dieser eigenthümlichen Vegetation ausmachen. Es versteht sich von selbst, dass die aufgezählten Arten alle nach vorliegenden Original-Exemplaren geprüft oder beschrieben worden sind.

A. Dicotyledoneae Polypetalae.

1. (279 Endl.) MIMOSEAE R. Br.

1. *Acacia* Neck.

1. *A. Nemu* Willd. — *Mimosa arborea* Thunbg. Flor. jap. pag. 229. Icon. Kaempferian. tab. 19. — *Mim. speciosa* Thunb. Act. Linn. II. p. 336. — Koquan s. Goquan vulgo Nemu no ki Kämpf. Amoen. exot. p. 840. — *Mim. Julibrissin* Scopoli delic. insubr. I. tab. 8. *Acacia Julibr.* (Willd. spec. plant. IV. p. 1065. De Cand. Prodr. II. 469 et rel. aut.)

Sorgfältigen Vergleichen mit Exemplaren von *Ac. Julibrissin* aus dem Orient und von verschiedenen italienischen Standarten zu Folge ist diese von *A. Nemu* in Japan und China (Bunge Enum. plant. sin. p. 21) durchaus nicht verschieden. Da nun der letztere schon bei Kämpfer vorkommende Name offenbar der ältere ist, und die Pflanze in Japan wild wächst, so muss der orientalische Name (Gul-ebruschim oder Ghul-ibrischim, flos sericeus bei De Candolle) eingehen. Vermuthlich ist die Pflanze über China als Zierbaum nach dem Orient und von da nach Italien gelangt.

2. *Ac. species* inermis foliis bipinnatis multijugis, petiolo uniglanduloso, ramis petiolis foliisque novellis dense ferrugineo-furfuraceis.

2. (277 Endl.) PAPILIONACEAE L.

2. *Caesalpinia* Plum.

3. *Caes. japonica* Sieb. et Zuccar. — *C. aculeata*, pinnis 6—8-jugis, foliolis 8—10-jugis ellipticis obtusis, superne glabris subtus tenuissime pubescentibus pellucide punctatis, petiolo communi aculeis uncinatis armato, racemis terminalibus simplicibus multifloris, floribus horizontaliter patentibus, pedunculis gracilibus ultrapollicaribus, caly-

cis laciniis ovatis acutiusculis, petalis orbicularibus superiori duplo minore, filamentis barbatis, legumine oblongo recte mucronato dorso carinato glabro coriaceo 6—8-spermo, seminibus oblongis laevibus. — *Caes. Crista Thunb. Flor. jap. p. 179?*

3. *Sophora* Linn.

4. *S. angustifolia* Sieb. et Zuccar. — *S. herbacea?* pubescens, foliis 20—30-foliolatis, foliolis lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis pubescentibus breviter pedicellatis, racemis terminalibus laxis, calyce oblique truncato absque dentium rudimento.

Proxima *S. flavescenti* Ait. recedit a specim. sibiricis habitu graciliori, foliolis multo angustioribus et minus pubescentibus, calyce oblique truncato edentulo. Alae in omnibus *Sophorae* speciebus herbaceis totae pulcherrime transversim plicatulae.

4. *Rhynchosia* De Cand.

5. *Rh. volubilis* DC. — Racemi variant foliis longiores et breviores.

5. *Lablab* Adans.

6. *L. vulgaris* Savi.

7. *L. cultratus* DC. — *Dolichos ensiformis* Thunb. *Flor. jap. p. 279.* — *D. cultratus* Id. *Act. Linn. II. pag. 340.*

Adnot. Dolichos hirsutus Thunb. *Act. Linn. l. c.* nec *Dolichos* nec *Mucuna*, fortasse peculiaris generis.

6. *Phaseolus* Linn.

8. *Ph. Mungo* L.

9. *Ph. farinosus* L.? Specimen nimis mancum.

7. *Wisteria* Nutt.

10. *W. chinensis* De Cand. — Sieb. et Zuccar. *Flor. jap. p. 90. tab. 44.* — *Dolichos polystachyus* Thunb. *l. c. p. 281.*

11. *W. brachybotrys* Sieb. et Zuccar. *l. c. p. 92. tab. 45.*

12. *W. japonica* Sieb. et Zuccar. *l. c. p. 88. tab. 43.*

8. *Canavalia* DC.

13. *C. incurva* DC. — *Dolichos incurvus* Thbg. *Fl. jap. p.*

280. Legumen in specc. nostris rectum acumine incurvo, crassum, dorso lineis quinque, quarum tres mediae valde approximatae, laterales remotiores. Semina maxima, transversim elliptica utrinque convexo-plana, fusca, hilo longo lineari.

9. *Glycine* DC.

14. *Gl. Soja* Sieb. et Zuccar. — *Gl. volubilis* retrorsum hirsuta, foliis longe petiolatis ovato-lanceolatis acutis vel acuminatis hirtis, intermedio pedicellato bistipellato, stipulis parvis linearibus, stipellis setaceis, racemis axillaribus 8 — 12-floris petiolo multo brevioribus, floribus parvis, inferioribus 3 — 4 tantum fertilibus, leguminibus linearibus compressis subfalcatis hirsutis 2 — 3-spermis, styli basi uncinata terminatis, seminibus transversim ellipticis compressiusculis. — An hic *Glyc. javanica* Thunb. *Act. Linn. II.* p. 340 excl. Synon?

10. *Soja* Mönch.

15. *S. hispida* Mönch. *Dolichos Soja* L. — *Soja japonica* Savi. — *Daidso vel Mame Kämpf. Amoen* pag. 837 c. ic. opt., ubi et condimenti conditio effuse describitur.

11. *Dumasia* DeCand.

16. *D. truncata* Sieb. et Zuccar. — *D. tota* glabra, volubilis, foliis ternato-pinnatis, foliolis e basi truncata deltoideis rarius subrhombeis acutis, intermedio longius pedicellato bistipellato, racemis axillaribus petiolo brevioribus 6 — 8-floris, petalorum unguibus calycem dimidio superantibus, leguminibus linearibus 3 — 5-spermis basi, longe attenuatis acutis calyce multoties longioribus.

Caulis gracilis, volubilis, uti tota planta glaber. Stipulae parvae, lineares, acutae. Petioli bipollicares; foliola pedicellata, lateralibus uniterminali bistipellatis, pollicaria vel sesquipollicaria, basi truncata vel rarius late cuneata indeque vel deltoidea vel rhombea. Racemi petiolo breviores, floribus breviter pedicellatis, calycibus bibracteolatis. Petala longissime unguiculata. Ovarium basi tubulo obliquo vaginatum. Stylus quam stamina brevior stigmate capitato. Legumen pla-

num sesquipollicare, glabrum, longe attenuatum et calyce persistente cinctum.

12. *Lespedeza* L. C. Rich.

17. *L. argyraea* Sieb. et Zuccar. — *L.* tota sericeo-nitens, dense foliosa, fruticosa, ramis virgatis, foliis breviter petiolatis, foliolis cuneato-linearibus truncatis mucronatis utrinque sericeis, intermedio pedicellato, stipulis setaceis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, calycis laciniis setaceo-acuminatis, legumine calycem superante. — *Hedys. sericeum* Thunb. *Fl. jap.* p. 289.

Recedit a *L. juncea* Pers. foliis multo angustioribus truncatis argenteis, floribus semper solitariis et subsessilibus, calycis laciniis setaceo-acuminatis.

Mit Unrecht zieht demnach De Candolle Thunbergs *Hedys. sericeum* zu *L. juncea*. Bisher ist letztere Art, wiewohl sie nach v. Bunge (*Enum. plant. monghol. chin.* p. 10) auch im nördlichen China vorkommt, in Japan noch nicht gefunden.

18. *L. striata* Hook. et Arn. — *L.* caulibus ramisque patentibus gracilibus decumbentibus? foliis brevissime petiolatis, foliolis lineari-oblongis obtusis mucronatis glabriusculis, nervis parallelis dense lineatis, intermedio vix longius pedicellato, stipulis ovato-lanceolatis acuminatis multinerviis, floribus axillaribus solitariis, laciniis calycis abbreviatis ovatis acutis, fructu calycem aequante. — *Hedys. striatum* Thunb. l. c. p. 290. *L. striata* Hook. et Arn. in *Beechey Voyage* p. 262.

Caulis (sec. cl. Hooker l. c. annuus vix tripollicaris) in spec. nostris suffruticosus uti rami patentes subflexuosus gracilis, pubescens, Stipulae magnae, membranaceae, multinerviae. Petioli vix 2'' longi; foliola omnia subsessilia, lineari-oblonga, obtusa vel nonnunquam retusa, mucronata, 6—10'' longa, 2'' lata, nervis lateralibus parallelis praesertim subtus dense lineata; flores solitarii brevissime pedunculati, calyces campanulati pubescentes, laciniis tubum aequantibus ovatis acutis.

19. *L. virgata* DC. — *Hedys. virgatum* Thunb. l. c. p. 290. Petioli longitudine inter 3—9''' variantes; foliola elliptica vel obovata rotundata mucronulata nervoso-lineata, intermedio longe pedicellato subpollicari, lateralibus minoribus, stipulis lineari-lanceolatis acuminatis, racemis brevibus subcapitatis 6—10floris, calycis laciniis lanceolatis acuminatis, legumine calycem superante reticulato.

20. *L. pilosa* S. et Z. *Hedys. Thbg. Desmodium* DC. — Legumen ovatum glabrum, calyce longius.

13. *Desmodium* DC.

21. *D. racemosum* DC. — *Hedys. racemosum* Thbg. *Fl. jap.* p. 285. — Specimina nostra recedunt foliolis subtus pilis s. setulis adpressis obsitis, floribus in apice ramorum paniculatim racemosis, calycibus hirtis. An distincta species?

14. *Vicia* L.

22. *V. Faba* L.

15. *Pisum* Tournef.

23. *P. sativum* L.

24. *P. maritimum* L.

16. *Astragalus* DC.

25. *A. lotoides* Lam. — *A. sinicus* Thunb. *Fl. jap.* p. 290.

17. *Caragana* Lam.

26. *C. Chamlagu* Lam.

A. planta sinensi nullo modo diversa.

18. *Crotalaria* Linn.

27. *Cr. eriantha* S. et Z. *Cr. annua*, caule herbaceo erecto ramoso uti tota planta hirta, foliis brevissime petiolatis linearibus mucronatis, stipulis setaceis, spica terminali densa subcapitata, calycibus fuscescenti-hirsutissimis, intus glabris, corollam glabram subaequantibus.

Adnotatio: Fagara horrida Thunb. *Act. Linn.* 2. p. 229. *Flor. jap. plant. obscur.* p. 350. n. 3. spinis ramosis *Gleditschiae* species videtur.

3. (275. Endl.) **AMYGDALEAE** Juss.
 19. *Ceraseidos* Sieb. et Zuccar. — *Act. Mathem. Phys. Monac. III.* p. 473. t. 5.

28. *C. apetala* S. et Z.

20. *Prunus* L.

29. *Pr. persica* L.

30. *Pr. Mume* S. et Z. *Fl. jap. I.* p. 29. t. 11. — Variat floribus albis vel roseis et plenis.

31. *Pr. japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 201. Sieb. et Zucc. *Fl. jap. I.* p. 172. tab. 90.

32. *Pr. tomentosa* Thunb. *Fl. jap.* p. 203. Sieb. et Zucc. *l. c. I.* p. 51. tab. 22. — Varietas fructu oblongo est *Pr. trichocarpa* Bunge *Enum. plant. chin.* p. 22.

33. *Pr. spinulosa* S. et Z. — *Pr.* foliis biennibus vel annuis oblongis longe et subfalcato-cuspidatis acumine obtuso, margine undulatis et remote serratis, serraturis superioribus spinuloso-mucronatis spinulis rectis vel incurvis, utrinque glabris superne lucidis coriaceis, racemis axillaribus solitariis folio brevioribus multifloris, floribus polygamis. — An *Pr. serrulata* Lindl.

Folia biennia vel plerumque annua, petiolata, petiolo 4—6" longo, oblonga, 2½—3" longa, 10—12" lata, basi subattenuata, longe et soepe oblique cuspidata acumine integerrimo obtuso mucronulato, margine undulata et remote serrulata serraturis vel muticis vel praesertim superioribus in mucronem s. spinulam rectam vel incurvam terminatis, glabra, lucida. Racemi dimidio fere quam folia breviores, cylindrici, 20—25-flori. Stamina numerosa.

34. *Pr. macrophylla* S. et Z. — *Pr.* foliis biennibus petiolatis oblongis utrinque attenuatis acuminatis argute et uncinato-serratis glabris coriaceis, petiolis biglandulosis, racemis 2—4 axillaribus folio pluries brevioribus, rachi et alabastris magis minusve lanatis.

Folia biennia, petiolata petiolis semipollicaribus ad laminae basin glandulis duabus oppositis crassis munitis, lamina folii 4—6 pollices

et quot excedit longa, 2—2½" lata, utrinque attenuata acuminata, serrata serraturis subdistantibus uncinatis, utrinque glabra vel subtus tenuissime pubescente. Racemi terni quaternive e quavis axilla, pollicares vel sesquipollicares. Alabastra dense imbricata aequae rachis lana derasili magis minusve vestita.

35. *Pr. Pseudo-Cerasus Lindl.*

Pr. floribus coëtaneis e gemmis distinctis ternis quaternisve, primum umbellatis demum in pedunculo communi longo corymbosis bracteatis, calyce cylindrico laciniis deltoideis acutis, petalis obovatis emarginato-bifidis, foliis petiolatis basi rotundatis ovato-ellipticis longe acuminatis in toto margine dense et argute serratis serraturis setaceo-mucronatis apice glandulosis, utrinque glabris, petiolis glandulosis, stipulis elongatis membranaceis simplicibus vel trifidis, glanduloso-pectinatis, ramis verrucosis. — *Pr. floribus plenis, umbellis paniculatis Thunb. Fl. jap. pl. obsc. p. 370.* — *Pr. paniculata Edw. Botan. Register tab. 800. non Thunb. et aut.* — *Cerasus Pseudo-cerasus Lindl.*

α. floribus simplicibus, calycis laciniis vel tubo brevioribus lanceolatis acutis integerrimis vel foliaceis tubum aequantibus vel superantibus subserratis, floribus albis vel roseis.

β. floribus plenis maximis albis, roseis vel virentibus et basi roseis, bracteis magnis spathulatis glanduloso-ciliatis.

Species pulcherrima, per totam Japoniam culta. Rami crassi, lenticellis magnis verrucosi. Gemmae perulis coriaceis nitidis nigrescentibus obductae. Flores e gemmis propriis lateralibus ternis quaternisve, primum umbellati, denique in pedunculo communi excrecente soepius bipollicari corymbosi, pedicellis gracilibus ultrapollicaribus. Bracteae in var. flor. simplic. parvae, in iis flore pleno magnae, spathulatae, glanduloso-ciliatae. Corolla magna, quam in *Pr. Ceraso* amplior. Petala figura varia, in flor. simplicibus semper emarginato-bifida, in flor. plenis soepius rotundata. Folia e gemma terminali, raro unum alterumve infra flores, petiolata petiolo pollicari

glandulis nonnullis obsito; lamina ovata, ovato-oblonga vel oblonga, basi rotundata, longissime acuminata, per totum marginem dense et argute serrata serraturis setaceo - mucronatis mucrone recto apice glandulifero, utrinque glabra, 3—5" longa, 1—5" lata. Stipulae elongatae fere pollicares membranaceae lineares simplices vel trifidae, glandulis stipitatis glanduloso-ciliatae.

Pr. paniculata Thunb., der bisher nur aus der Beschreibung dieses Autors gekannt ist, kann nicht mit unsrer Art vereinigt werden, denn Thunberg sagt ausdrücklich: differt a *Pr. Mahaleb* floribus minoribus et foliis inferne attenuatis. Es ist befremdend, wie Edwards seiner Abbildung unserer Pflanze im Botan. Register diese Thunbergsche Beschreibung beisetzen konnte, ohne auf die Unterschiede aufmerksam zu werden.

4. (274. Endl.) ROSACEAE Endl.

21. Spiraea Lin.

36. *Sp. callosa* Thunb. *Flor. jap. p.* 209. — Folia lanceolata utrinque attenuata acuminata argute et inaequaliter serrata breviter petiolata superne glabriuscula subtus ad venas villosa-hirta; flores pulchre rosei in paniculam corymbosam terminalem congesti.

Sp. expansa Wall., quae proxima, differt foliis latioribus magis ellipticis, inflorescentiae ramis villosa-hirtis, calycis laciniis argute cuspidatis. *Sp. bella* Sims. *Botan. Magaz. t.* 2446 foliis brevioribus subtus tomentosis minusque dentatis satis recedit.

Der callus utrinque ad basin petioli, welchen Thunberg als charakteristisch für diese Art angiebt, umfasst bei unsern Exemplaren die Blattstielbasis halbmondförmig, kommt aber auch bei *Sp. expansa* vor, und scheint nur das durch Eintrocknen des Blattstieles vortretende Blattkissen zu seyn.

37. *Sp. Thunbergii* Sieb. et Zucc. *Fl. jap. I. p.* 130. *tab.* 69.

— *Sp. crenata* Thunb. *Fl. jap. p.* 210.

38. *Sp. prunifolia* S. et Z. *Fl. jap. I. p. 131. tab. 70.* —
Sp. crenata var. *Niwa Sakura* Thunb. *Fl. jap. p. 211.*

39. *Sp. chamaedryfolia* L. Folia in specc. nostris e basi longe cuneata oblongo-lanceolata obtusa, a medio apicem versus grosse serrata, serraturis acutis nec tamen mucronatis margine calvis. Vix tamen species distincta.

De *Hoteia* et *Astilbe* vide *Saxifrageas*.

22. *Rhodotypos* S. et Z.

40. *Rhod. kerrioides* S. et Z. *Fl. jap. I. p. 187. tab. 99.*

23. *Kerria* DC.

41. *K. japonica* DC. S. et Z. *Fl. jap. I. p. 183. tab. 98.* —
Corchorus japon. Thunb. *Fl. jap. p. 227.*

24. *Sieversia* Willd.

42. *S. dryadoides* S. et Z. *S. suffruticosa*, caule basi lignescente ramoso nec tamen stolonifero, foliis pinnatisectis plerumque 7—9foliolatis, foliolis e basi cuneata oblongis argute inciso-serratis utrinque glabris, infimis minimis linearibus, stipulis subulatis, scapis unifloris subnudis, petalis rotundatis quam calycis lacinae acuminatae longioribus, bracteolis linearibus acutis vel nonnunquam apice bidentatis, stylis in fructu longissimis plumosis.

Siev. s. Geo anemonoidi proxima differt caule suffruticoso, stolonibus nullis, petalis quam calyx vix tertia parte longioribus.

25. *Agrimonia* Tourn.

43. *A. viscidula* Bunge *Enum. plant. chin. p. 26. (?)* —
Agrim. Eupatorium Thunb. *Flor. jap. p. 195.* — Foliola in quovis folio majora 5, in caulinis summis 3, lanceolata grosse aequaliter serrata acuta utrinque pilosa sed vix viscidula, Spicae terminales graciles elongatae. Setae calycis erecto-conniventes; tubus urceolatus hispidulus, foveolis ad basin usque productis. Flores parvi, petalis calycem dimidio superantibus.

Antherae in omnibus speciebus utrinque emarginatae loculis connectivo crasso subdilatato disjunctis.

26. *Fragaria* Tourn.

44. *Fr. chilensis* Ehrh. — Specimen unicum, an ex horto?

27. *Rubus* Linn.

45. *R. parvifolius* L. *R.* caule tereti pubescente, aculeis rectis vel recurvis, foliis ternatis vel pinnato-quinatis, foliolis e basi late cuneata obovatis obtusis argute serratis subtus albo-tomentosis, petiolis villosis aculeatis, stipulis subulatis, floribus corymbosis, laciniis calycis ovato-oblongis aristatis tomentosis aculeatis, fructibus globosis. — *R. triphyllus* Thbg. *Fl. jap.* p. 215.

Hooker (ap. Beechey p. 184) vereinigt nach Vergleichung japanischer Exemplare mit dem *R. parvifolius* des Linneischen Herbariums den *R. triphyllus* mit ersterer Art, bemerkt aber, dass das Citat von *R. Moluccus* Rumph. Amboin. V. t. 47 irrig bei De Candolle zugezogen sey und wohl eher zu *R. Tagellus* Schlechtend. et Cham. oder zu unserm *R. Thunbergii* gehöre. Wir bemerken, dass an unsern Exemplaren wenigstens die Aeste aufrecht zu stehen scheinen.

46. *R. Thunbergii* S. et Z. — *R.* suffruticosus, caule parce aculeato aculeis rectis vel recurvis, foliis ternatis vel quinato-pinnatis, foliolis lateralibus breviter, terminali plerumque majore longius pedicellatis, ovato-ellipticis acutis vel acuminatis inaequaliter dense serratis utrinque villosis subtus lineatis, petiolis aculeatis, stipulis lanceolatis acuminatis, floribus solitariis axillaribus, pedunculis longis tenuibus, calycis laciniis anguste lanceolatis longissime acuminatis villosis, petala ovata obtusa superantibus. — *R. idaeus* Thbg. *Fl. jap.* p. 216.

Variet raro foliis tantum trilobis. Flores magni ultra pollicares. Calycis foliola in acumen longissimum subulatum terminata. Torus dense lanatus. Carpella numerosissima.

47. *R. palmatus* Thunb. *R.* fruticosus, aculeis sparsis rectis (nec recurvis), ramis flexuosis, foliis e ramulis lateralibus (abbreviatis) pluribus petiolatis e basi cordata 3—5-lobis, lobo intermedio duplo lon-

giore oblongo-lanceolato acuminato, lateralibus acutis, omnibus et ad basin usque argute inaequaliter serratis utrinque ad venas pilosis ceterum nudis, floribus axillaribus solitariis, pedunculis petiolo multo brevioribus, laciniis calycinis ovatis cuspidatis hirtis quam petala oblongo-elliptica brevioribus. — *R. microphyllus* L. *fil. suppl.* 263 et *De Cand Prodr.* II. p. 566 ?

Caulis pars inferior firma erecta, digiti minoris crassitie. Folia inferne in nervo medio soepius aculeis nonnullis parvis recurvis armata. Pedunculi 3—6" longi, tenues, hirti; petioli plusquam pollicares. Petala oblonga, obtusa, laciniis calycinis duplo longiora. *R. crataegifolio* Bunge affinis videtur.

48. *R. corchorifolius* Linn. *fil.* — *R. fruticosus* caule villosa vel glabriusculo, aculeis rectis, in ramulis et petiolis recurvis armato, foliis e basi cordata vel rotundata ovato-oblongis acuminatis vel raro trilobis lobis lateralibus abbreviatis, dense et argute serrulatis utrinque hirtis et canescentibus, nervo medio subtus aculeolato, pedunculis solitariis unifloris villosis petiolo brevioribus, laciniis calycinis lanceolatis acutis quam petala spathulata dimidio brevioribus vel nonnunquam apice foliaceis serratis petala superantibus. — *R. villosus* Thunb. *Fl. jap.* p. 218.

Variat caule villosa vel glabra, foliis integris vel trilobis lobis lateralibus abbreviatis acutis, basi cordatis vel rotundatis, laciniis calycinis lanceolatis acutis vel apice in laminam foliaceam spathulatam vel linearem serratam extensis. Rami stricti, virgati. Petioli semipollicares. Folia 1—2" longa, 8—12" lata nervo medio subtus (nunquam superne) aculeato. Calyces dense villosa-hirti.

49. *R. ribifolius* S. et Z. *R. fruticosus*, caule glabra aculeis sparsis rectis armato, ramulis petiolis pedunculisque pubescentibus, foliis e basi cordata suborbicularibus quinquelobis lobo terminali majori, infimis soepe obsoletis, omnibus ovatis acutis ad basin usque inaequaliter serratis, ad nervos pilosis ceterum glabris, stipulis lineari-lanceolatis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris quam

petioli brevioribus, lobis calycinis lanceolatis acuminatis utrinque (intus magis) villosis, quam petala ovata obtusa brevioribus. —

R. incisus Thunb. *Fl. jap.* p. 217 ?

A Thunbergii descriptione *R. incisi* differt foliis multo majoribus et petiolum longe superantibus, nec non pedunculis quam petioli brevioribus. Petioli pollicares vel parum longiores aculeolati; lamina folii 2—3" longa et lata, praeter nervos utrinque glabra, lobi infimi soepe obsoleti. Pedunculi 6—8" longi, graciles hirti, aculeolis minutis soepius intermixtis. Flores magni, diametro pollicem et quot excedit metientes. Petala ovata, obtusa.

Reliquae species Thunbergianae aequae ac *R. heterophyllus* Willd. nobis nondum notae.

28. *Rosa* Tournef.

50. *R. sempervirens* L.

51. *R. multiflora* Thbg. et var. β *platyphylla* Rad.

52. *R. Hystrix* Lindl. ? — Specimen nimis mancum.

53. *R. Banksiae* RBr.

54. *R. microphylla* Roxb. — Spinae geminae ad basin foliorum patentes longe decurrentes.

55. *R. rugosa* Thbg. — Sieb. et Zucc. *Flor. jap.* I. p. 66. tab. 28.

56. *R. polyantha* S. et Z. — *R.* aculeis sparsis solitariis falcatis, foliolis 5—7nis obovatis cuspidatis sursum argute serratis, petiolis aculeolatis glanduloso-pubescentibus, stipulis adnatis superne falcato-patentibus glanduloso-fimbriatis, floribus numerosis corymbosis, pedunculis longis filiformibus parce glandulosis, sepalis integris lanceolatis reflexis glanduloso-hirtis, disco calycino conico supra stamina elevato, stylis longe exsertis in columnam glabram congestis nec tamen connatis.

R. multiflorae Thbg. affinis, diversa tamen pedunculis fere filiformibus sesquipollicaribus parce tantum glandulosis et praesertim

calycis disco circa styli basin in conum ultra stamina elevato. Flores parvi, albi, simplices.

57. 58. *R. canina et gallica* Thunb., a specc. Linneanis diversae sed ulterius examinandae.

Genera *Potentilla*, *Geum*, *Sanguisorba* etc. ulteriori examini remanent.

5. (273. Endl.) CALYCANTHEAE Lindl.

29. *Chimonanthus* Lindl.

59. *Chim. fragrans* Lindl. — *Oboi* s. *Roboi* Kämpfer Amoen. V. p. 878. c. icone (mala), qui plantam e China allatam in hortis tantum cultam dicit.

6. (272. Endl.) POMACEAE Juss.

30. *Stranvaisia* Lindl.

60. *Str. digyna* S. et Z. — *Str.* foliis breviter petiolatis ellipticis utrinque attenuatis acuminatis dense at argute serrulatis pubescentibus vel subtus molliter villosis subcoriaceis, corymbis terminalibus multifloris, pedunculis filiformibus villosis, calycibus brevissime urceolatis lanatis, petalis unguiculatis late ovatis obtusis, ovario supero lanato biloculari loculis biovulatis, stylis 2, stigmatibus peltato-incrassatis concavis. — *Crataegus villosa* Thunb. *Flor. japon.* p. 204.

Fructus non observati, at toto habitu planta magis cum *Stranvaisia* quam cum *Photinia* convenit. Ramuli villosi. Folia 2—3-pollicaria, dense et argute serrulata acuminata acumine subfalcato, subtus plerumque molliter villosa. Corymbi terminales 15—20-flori; pedunculi tenues fere filiformes subpollicares; calyces brevissime urceolati extus lanati intus glabri laciniis deltoideis acutis. Petala late ovata obtusa. Ovarium superum, globosum, dense lanatum. Styli stamina aequantes.

31. *Crataegus* Linn.

61. *Cr. cuneata* S. et Z. — *Cr. spinosa*, ramis divaricatis villosis, foliis e basi longe cuneata integerrima obovatis subretusis apice subtrilobis inaequaliter inciso-serratis hirtis vel rameis infimis minoribus ellipticis serratis, stipulis in ramis vegetis foliaceis dimidiato-cordatis inciso-serratis, corymbis paucifloris, calycis villosi laciniis deltoideis acutis eglandulosis, stylis 5, stigmatibus peltato-concavis subinaequilateris.

Flores magnitudine eorum *Cr. oxyacanthae*. Rami laterales horizontaliter patentes, divaricati. Folia ad duas tertias longitudinis usque cuneata integerrima, apice tantum inciso-serrata et soepe subtriloba, pollicaria vel sesquipollicaria. Spinae axillares subulatae. Fructus globosi, quinqueloculares, calycis laciniis foliaceis serratis coronati.

62. *Cr. alnifolia* S. et Z. — *Cr. inermis*, foliis e basi rotundata ovatis acuminatis vel cuspidatis basi simpliciter ceterum in toto margine duplicato-serratis, nervis parallelis superne impressis subtus prominentibus costatis, glabris annuis subcoriaceis, corymbis terminalibus multifloris, laciniis calycis deciduis, fructibus ellipticis disco calycino concavo coronatis bilocularibus, loculis dispermis, seminibus oblongis subtrigonis.

Inermis, tota glabra. Folia petiolata petiolo 8—10" longo; lamina $2\frac{1}{2}$ —3-pollicaris, $1\frac{1}{2}$ —2" lata, basi rotundata crenulata ceterum in apicem usque argute duplicato-serrata. Flores non observati. Fructus magnitudine pisi, elliptici, apice disco calycino parvo concavo coronati.

32. *Rhaphiolepis* Lindl.

63. *Rh. japonica* Sieb. et Zucc. *Fl. jap.* I. p. 162. tab. 85.

64. *Rh. Mertensii* S. et Z. l. c. p. 164. *An Rhaphiolepis?* *integerrima* Hooker ap. Beechey p. 260? In insulis Liu-kiu legit beatus Merteus.

33. *Photinia* Lindl.

65. *Ph. serrulata* Lindl. — *Crataegus glabra* Thunb. *Fl. jap.* p. 205.

34. *Eriobotrya* Lindl.

66. *E. japonica* Lind. *S. et Z. Fl. jap. I. p. 182. tab. 97.*
Mesp. japonica Thunb. *Fl. jap. p. 206.*

35. *Aronia* Pers.

67. *A. asiatica* *S. et Z. Fl. jap. I. p. 87. tab. 42.*

36. *Osteomeles* Lindl.

68. *O. anthyllidifolia* Lindl. Vidi specc. a beato Mertens in insulis Liukiulecta et ab Academia Imp. Petropolitana benevole communicata.

37. *Pyrus* Lindl.

69. *P. Malus.* — *Culta.*

70. *P. spectabilis* Ait. *P. baccata* Thbg. *Fl. jap. p. 207.*

71. *P. communis* L. — *Culta.*

72. *P. (Sorbus) gracilis* *S. et Z.* — *P. ramis gracilibus, foliis pinnatis 4—6jugis, foliolis subsessilibus ellipticis acutis, argute serratis subtus pubescentibus, stipulis summorum foliorum foliaceis inciso-serratis, corymbis paucifloris, calycibus glabris, laciniis deltoideis acutis quam petala ovata unguiculata brevioribus.*

Corymbi 20—30-flori. Flores parvi. Folia circiter 4-pollicaria petiolo hirto. Foliola lateralia brevissime pedicellata basi rotundata integra, sursum serrata, pollicaria, infima minora.

38. *Cydonia* Tourn.

73. *C. sinensis* Thouin.

74. *C. japonica* Pers. — *Pyrus japon. Thunb. Flor. japon. p. 207.* Folia in ramis floriferis soepe obtusa crenata, in ramis vegetis annuis utrinque longe attenuata et acuminata dense et mucronato-serrata, spinam subulatam fere pollicarem soepius ex axillis emittentia. In his praesertim et stipulae foliaceae, breviter petiolatae reniformes mucronatae serratae. Fructus maturus nullo modo, ut Thunbergius voluit, in valvulas dehiscit.

75. *C. vulgaris* Pers.

Fide clar. *Kaempferi* (*Umbatz vulgo Marmaer Amoen. p. 800*)
a Lusitanis introducta.

7. (271. *Endl.*) MYRTACEAE R. Br.39. *Punica* Tourn.76. *P. Granatum* Linn.

Var. *frutescens* ramis lateralibus spinosis, foliis anguste et sub-
lineari-lanceolatis, fructibus nuce Juglandis vix majoribus exacte
globosis.

Vermuthlich die wilde oder verwilderte Pflanze, die auch im
Orient dornig vorkommt. Wahrscheinlich meint auch Thunberg diese
Form, indem er sagt: *crescit vulgaris in Kosido*, während Kämpfer
die kultivirte Pflanze *raram hoc coelo et fructu ingrato* nennt.

40. *Myrtus* Tournef.77. *M. tomentosa* Ait.

Anmerkung. *Myrtus laevis* Thunb. *Fl. jap.* 198 und der spä-
tern Autoren gehört offenbar gar nicht zu den Myrtaceen, sondern
ist vielleicht eine Pomacea, weil Thunberg sagt: *Rami et ramuli*
alterni und folia e gemmis alternis solitaria, bina vel terna.

41. *Metrosideros* R. Br.

78. Species nondum determinata.

8. (270. *Endl.*) MELASTOMACEAE R. Br.42. *Osbeckia* L.

79—82. *O. chinensis* L. cum 3 aliis e familia nondum de-
terminatis.

9. (269. *Endl.*) LYTHRARIEAE Juss.43. *Ammannia* Houst.

83. 84. Species duae nondum determinatae.

44. *Lythrum* L.

85. *L. Salicaria* L. — A planta europaea non diversa.

45. *Lagerstroemia* L.

86. *L. indica* L.

10. (268. *Endl.*) **HALORAGEAE R. Br.**

46. *Myriophyllum* Vaill.

87. Species nondum determinata. — Flores desunt.

47. *Haloragis* Forst.

88. *H. micrantha* R. Br. — *Gonocarpus micranthus* Thunb. *Fl. jap. p. 69. t. 15.*

Herba debilis, uti videtur perennis, stolonifera, caule adscendente ramoso tetragono. Folia opposita brevissime petiolata ovata vel suborbicularia, acuta vel obtusa, serrata serraturis uncinatis margine calloso cinctis, glabra, firma, 2—4" longa, 1½—2" lata. Flores in spicas soepe paniculatim congestas terminales longas laxas filiformes dispositi, subsessiles, secundi, nutantes, bractea minuta lanceolata suffulti. Calycis tubus globosus octangularis, glabra; limbus quadrifidus laciniis ovato-deltaideis acutis extus basi callosis. Petala 4 oblonga cucullata erecto-conniventia. Stamina 8, antheris linearibus longis.

48. *Trapa* Linn.

89. *Tr. bispinosa* Roxb. *Tr.* petiolis medio elliptice inflatis utrinque attenuatis teretibus, foliis e basi truncata integerrima abbreviato-deltaideis cuspidatis dentatis superne glabris subtus tomentosis, fructibus bicornibus cornubus oppositis divaricatis subulato-trigonis acuminatis spinescentibus, styli rudimento conico apice spinescente. — *Roxb. corom. tab. 234. p. 29. De Cand. Prodr. III. p. 64.* — *Tr. natans* Thunb. *Fl. jap. p. 65.*

Specimina nostra ab indicis recedunt foliis minoribus e basi truncata deltaideis nec late cuneatis subquadratis, margine dentatis non serratis; an species distincta? Fructus cornua recta acuminata

apicem versus decorticata et spinulis dense distichis rectis retrorsis pectinata.

90. *Tr. incisa* S. et Z. — *Tr.* petiolis medio elliptice inflatis, lamina folii rhombea acuta argute et inaequaliter incisa superne glabra subtus subtomentosa. — *An Tr. cochinchinensis* Lour. *coch. I. p.* 108?

Folia subtus inter pilos maculis parvis numerosis brunneis notata.

11. (267. *Endl.*) OENOTHEREAE *Endl.*

49. *Epilobium* L.

91. 92. Specimina manca.

50. *Circaea* Tournef.

93. *C. mollis* S. et Z. — *C. erecta* ramosa, caule foliisque oblongis acuminatis denticulatis brevissime molliter pubescentibus, racemis paniculatis, pedicellis fructiferis deflexis fructum aequantibus.

A. C. lutetiana, cui proxima, differre videtur caule magis ramoso, pubescentia in caule et in foliorum venis e pilis brevissimis, decumbentibus in illa e pilis longis rectis patentissimis composita, racemis brevioribus in paniculam foliosam congestis, pedicellis fructum aequantibus in illa duplo longioribus.

12. (266. *Endl.*) PHILADELPHEAE *Don.*

51. *Philadelphus* L.

94. *Ph. coronarius* L.

13. (264. *Endl.*) ALANGIEAE *De Cand.*

52. *Marlea* Roxb.

95. *M. platanifolia* S. et Z. *M.* foliis e basi cordata palmato-tri — quinquelobis, lobis ovatis ellipticis vel oblongis cuspidatis integerrimis, sinubus rotundatis, pagina folii superiore glabra, inferiore

pubescente et in axillis venarum soepe barbulata, pedunculis paucis (2—4) floris.

M. barbatae R. Br. proxima, sed hujus folia acuminata integra vel irregulariter bi-triloba lobis brevibus, pedunculi multiflori, dichotome divaricati, flores duplo minores.

96. *M. macrophylla* S. et Z. M. foliis e basi cordata vel rarius rotundata integris ovatis acuminatis vel retusis trilobis, lobis late deltoideis longe cuspidatis, intermedio parum longiore, lateralibus divergentibus, sinibus rotundatis, lamina folii superne glabra subtus pubescente, pedunculis 1—3-floris.

Petioli teretes superne canaliculati bipollicares; lamina soepe 6" longa et inter lobos lata, tenera, membranacea. Drupa elliptica, disco epigyno coronata, utrinque planiuscula, ossea, abortu unilocularis monosperma.

14. (263. *Endl.*) COMBRETACEAE R. Br.

53. *Quisqualis* Rumph.

97. *Qu. sinensis* Lindl. *Bot. Reg. Mant.* 1844. Qu. ramis petiolisque molliter pubescentibus, foliis oblongo-ellipticis vel ovatis, acuminato-cuspidatis superne glabris subtus pubescentibus, floribus terminalibus spicatis primum corymboso-fastigiatis, bracteis linearibus fugacibus, calycis tubo filiformi glabro, limbi 10-nervati laciniis abbreviatis late deltoideis, petalis oblongis vel ellipticis.

E China allata. Folia basi rotundata, oblongo-elliptica vel ovata, 3—4" longa, $1\frac{1}{2}$ —2" lata, penninervia. Flores spicati sed primum fastigiati, bracteis linearibus ovarii longitudine suffulti, oppositi, sessiles, congenerum longissimi, tripollicares; tubus calycis filiformis, quinquenervius, glaber; limbus dilatatus, 10-nervius, laciniis late deltoideis brevibus. Petala oblonga vel elliptica, obtusa, rosea vel purpurea. Drupa elliptica.

15. (259. *Endl.*) **BALSAMINEAE** *A. Rich.*54. *Impatiens* Linn.98. *I. Balsamina* Thunb. *Fl. jap.* p. 327.

99. 100. Species nondum determinatae.

16. (258. *Endl.*) **OXALIDEAE** *De Cand.*55. *Oxalis* Linn.101. *O. corniculata* L. Thunb. *Fl. jap.* p. 187.102. Species nondum determinata. *O. Acetosella* Thunb. *l. c.*,
sed a planta europaea diversa.17. (257. *Endl.*) **LINEAE** *De Cand.*56. *Linum* L.103. 104. *Lini* species 2.18. (256. *Endl.*) **GERANIACEAE** *De Cand.*57. *Geranium* L'Herit.105. *G. Thunbergii* S. et Z. — *G. palustre* Thunb. *Fl. jap.*
p. 268.

106. 107. Species nondum determinatae.

19. (255. *Endl.*) **ZYGOPHYLLEAE** *R. Br.*58. *Zygophyllum* L.108. *Zyg.* species.20. (254. *Endl.*) **RUTACEAE** *Bartl.*59. *Boenninghausenia* Rchbch.109. *B. albiflora* Rchb.60. *Ruta* Tourn.110. *Rutae* species.

21. (253. *Endl.*) DIOSMEAE *Adr. Juss.*61. *Dictamnus* L.111. *D. vix* a *D. Fraxinella* diversus.22. (252. *Endl.*) ZANTHOXYLEAE *Adr. Juss.*62. *Zanthoxylon* Kunth.

112. *Z. piperitum* DC. — *Z. aculeatum* aculeis conicis geminis infrapetiolaribus, foliis alternis oppositisve imparipinnatis 5—9-jugis, petiolis (novellis superne pubescentibus) subtus soepe spinulosis, foliolis breviter petiolatis lanceolatis vel ovato-lanceolatis basi subinaequalibus glanduloso-serratis vel crenatis, apice plerumque bidentatis glandula inter dentes apicales, primum pubescentibus demum glabris, cymis terminalibus, carpellis solitariis geminisve. — *Fagara piperita* Linn. *Thunb. Flor. jap. p.* 64. — *Seo et Sansjo Kämpfer Amoen. p.* 892. c. ic. Non vero *Fag. piperita* Loureiro *Coch. p.* 101, quae *Zanth. nitidum* DC. Arbuscula 10—12 pedalis. Rami cinereo-fuscescentes, teretes, glabri. Folia plerumque alterna, petiolo communi inter spinas solidas conicas rectas inserto passim spinuloso, cum rachi 3—5" longo. Foliola 8—12" longa, 3—4" lata. Glandulae pellucidae in serraturarum axillis et inter summas apicales. Flores parvi, albi. Carpella piso minora, coriacea, fusca, transversim rugosa. Semina globosa, nigra, nitida.

F. piperita Hook. et Arn. ap. *Beechey l. c. p.* 261 aus den Liu-kiu-Inseln gehört ebenfalls nicht hieher. Sie unterscheidet sich durch (schmal) gerandete Blattstiele und sehr kleine nur 3—4" lange Blättchen.

113. *Z. schinifolium* S. et Z. — *Z. aculeatum* aculeis conicis rectis sparsis, totum glabrum, foliis alternis imparipinnatis 7—9 jugis, petiolis spinulosis, foliolis basi inaequalibus lanceolatis utrinque attenuatis obtuse acuminatis glanduloso-crenatis apice bidentatis, glandulis in axilla crenarum, corymbo terminali convexo multifloro, carpellis geminis ternisve.

Foliola 6—10''' longa, 3—4''' lata, longe attenuata sed glandula terminali inter summas dentes posita obtusa, dense crenata, glandulis pellucidis in crenarum axillis. Flores parvi. Carpella vix magnitudine grani Piperis, gemina vel terna. Seminum epidermis lucida, testa foveolata.

114. *Z. ailanthoides* S. et Z. — *Z. aculeatum* aculeis numerosis sparsis conicis, foliis alternis impari-pinnatis 9—11-jugis, foliolis breviter petiolatis e basi rotundata lanceolatis longe attenuatis et acuminatis crenulatis, crenis eglandulosis, glandulis per totam laminam sparsis, petiolis inermibus, corymbis terminalibus plerumque geminis multifloris, carpellis geminis ternisve rugulosis, seminibus laevibus.

Rami crassitie fere digiti minoris, aculeis crebris conicis rectis armati. Folia pedalia et longiora, 9—11-juga, foliola breviter petiolata, basi rotundata longe attenuata, 3—4'' longa, 6—8''' lata, glabra, per totam paginam glandulis sparsis pellucide punctata. Corymbi terminales, gemini, nudi, foliis breviores. Semina nitida, nigra.

115. *Z. planispinum* S. et Z. *Z. aculeatum* aculeis stipularibus basi dilatatis a lateribus compressis sursum subulatis rectis aliisque minoribus ad foliolorum basin et in nervis mediis, foliis ternatis vel quinato-pinnatis jugo inferiore distante, foliolo terminali sessili, omnibus lanceolatis utrinque attenuatis acutis glabris obsolete crenatis et inter crenas glanduloso-punctatis, petiolis alatis, corymbis axillaribus paucifloris, carpellis solitariis verruculosus.

Spinae basi valde dilatatae ab utroque latere compressae, subulatae, nitidae, fuscae. Folia plerumque ternata, foliolis lanceolatis acutis sessilibus obsolete crenatis margine inter crenas nec in reliqua lamina glanduloso-punctatis 1—1½'' longis; rarius folia pinnata bijuga jugo inferiore remotiusculo; petioli alati, pollicares; spinae minores ad basin foliolorum et in nervo medio praesertim folioli ter-

minalis. Corymbi in axillis foliorum inferiorum pauciflori. Semina grano piperis minora, lucide nigra.

Adnotatio. De *Fagara horrida* Thunb. *Act. Linn. II.* p. 329. et *Flor. jap.* p. 350 vide inter Leguminosas *Gleditschiam*.

63. *Boymia* A. Dr. Juss.

116. *B. rutaecarpa* A. Juss. Sieb. et Zuccar. *Flor. jap. I.* p. 80. tab. 21.

23. (347. *Endl.*) ANACARDIACEAE R. Br.

64. *Rhus* Linn.

117. *Rh. semialata* Murr. β . *Osbeckii* De Cand. — *Rh.* in ramis junioribus, petiolis, pedunculis et foliorum pagina inferiori tenuiter tomentosa, foliis 3—5-jugis, foliolis sessilibus ellipticis acutis dentatis superne glabris, summo longe decurrente, petiolo basi tereti inter juga foliaceo-alato plano, panicula terminali pyramidata valde ramosa, fructibus furfuraceo-tomentosis. — *Rh. javanicum* Linn. *spec. plant.* 380. *Thunb. Fl. jap.* p. 121.

Folia pedalia et quot excedit. Foliola inferiora minora vix pollicaria soepius subfalcata, superiora 2—2½" longa, 1—1½" lata, terminali in petiolum longe decurrente; juga distantia petiolo inter superiora 2—3 foliaceo-alato, basin versus nudo tereti. Panicula terminalis, pyramidata, pedalis, valde ramosa, fructibus furfuraceo-tomentosis. In petiolis soepe gallae occurrunt difformes, vel sessiles tomentosae, vel pedicellatae ramosae, apicem versus clavatae, glabrae.

118. *Rh. succedanea* L. *Rh.* tota glabra, foliis 4—6-jugis, foliolis e basi subinaequilatera lanceolatis acuminatis integerrimis subtus concoloribus vel glaucescentibus, petiolis nudis basi teretibus inter juga canaliculatis, paniculis lateralibus infrafoliaceis ex axillis perularum fugacium, floribus pedunculatis, drupis subrhombeis, epidermide laevi, sarcocarpio crustaceo fibroso-cereo, pyreno osseo laevi. — *Rh. succedanea* Thunb. *Fl. jap.* p. 122 et auct. *Fari no ki Kämpfer Amoen.* p. 794. c. icone bona.

Rami teretes, uti tota planta glabri. Folia 8—12" longa, 5—7-juga; foliola brevissime petiolata basi subinaequilatera, lanceolata acuminata acumine subfalcato, utrinque glabra subtus vel concolora vel glauca, $1\frac{1}{2}$ —2" longa, 6—8" lata. Paniculae plures infra folia ex axillis perularum delapsarum, patentes vel deflexae, ramosae ramis patentibus. Flores pedicellati, parvi, e viridi flavescentes. Drupae subrhombeae, utrinque convexo-planae, glabrae, rugosae, sordide stramineae. Sarcocarpium fibrosum, magna cerae vegetabilis copia fibris intermixta, quae ad fabricandas candelas inservit, tritum camphoram redolens. Pyrenum compressum, osseum, laeve.

119. *Rh. sylvestris* S. et Z. Rh. villosa vel pubescens, foliis 4—7-jugis, foliolis e basi subinaequilatera rotundata oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis, supra pubescentibus subtus villosis vel novellis sericeis costato-venosis, petiolis teretibus inter foliola canaliculatis, paniculis lateralibus infrafoliaceis vel axillaribus, pyramidalis villosis, floribus pedunculatis, drupis subrhombeis laevibus sarcocarpio crustaceo fibroso-cereo, pyreno osseo laevi.

Rh. succedaneae valde affinis recedit indumento villosa omnium partium et foliis subtus venis numerosis parallelis sed ante marginem anastomosantibus costatis. Fructus minores, sicci magis rugosi et sarcocarpium minus cera farctum, tritum camphoram redolens. Folia soepius pedalia et quot excedit, 5—7-juga, rarius in ramis vegetis virgatis bijuga vel ternata; foliola $1\frac{1}{2}$ —2" longa, 8—12" lata. Paniculae erectae vel fructiferae divaricatae. An prioris varietas sylvestris?

120. *Rhus vernicifera* DC. — Rh. foliis 5—6-jugis, foliolis brevissime pedicellatis e basi rotundata ovatis acutis integerrimis superne glabris subtus tenuiter pubescentibus, petiolis basi semiteretibus, inter folia carinato-convexis, paniculis infrafoliaceis vel axillaribus erectis laxis rachi pedunculisque molliter pubescentibus. — *Rhus Vernix* Linn. *Syst. nat.* II. p. 242. *Thunb. Fl. jap.* p. 121. *Sitz vel Sitz dsju Kämpfer Amoen.* p. 791 cum icone.

Folia adulta soepius fere bipedalia, omnia 4—6-juga; foliola breviter pedicellata basi rotundata subinaequilatera, ovata acuta vel acuminata, subtus molliter pubescentia, inter 2—6" longa, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " lata. Petioli basi semiteretes superne plani, inter foliola convexo-carinati. Paniculae rami distantes uti pedunculi villosi. Flores virides, calyces glabri. Stigmata crassa subsessilia.

Adnotatio: Quid *Rhus hirsuta spinosa* et *Rh. foliis subtus glaucis spinosa* Thunb. *Flor. jap.* p. 351? — Vix *Rhois* species!

24. (246. *Endl.*) JUGLANDEAE *De Cand.*

65. *Platycarya* Sieb. et Zuccar.

121. *Pl. strobilacea* S. et Z. *Act. Mathem. Physic. Monac. III.* p. 743. *tab. 5.* *Flor. jap. II.* *tab. 159 ined.*

66. *Pterocarya* Kunth.

122. *Pt. sorbifolia* S. et Z. *Fl. jap. II.* *tab. ined. 161.* P. foliis alternis imparipiinnatis 4—8-jugis, foliolis suboppositis subsessilibus lanceolatis longe acuminatis dense ac argute serrulatis aequae ac petioli et pedunculi molliter pubescentibus, amentis masculis simplicibus laxis infrafoliaceis vel in axillis foliorum inferiorum, foemineo elongato foliis breviori laxo subterminali (infra gemmam terminalem extrafoliaceo), bracteis dense hirtis.

123. *Pt. rhoifolia* S. et Z. *l. c. t. 160.* Pt. foliis alternis imparipiinnatis 8—9-jugis, foliolis sessilibus e basi rotundata inaequali oblongo-lanceolatis acuminatis argute et dense serrulatis superne glabris subtus ad venas aequae ac petioli molliter pubescentibus, amentis foemineis solitariis subterminalibus laxifloris folia aequantibus vel superantibus, bracteis glabris.

Amenta foeminea pedalia et sesquipedalia, singuli flores 3—4" a se invicem distantes.

67. *Juglans* L.

124—26. Species nondum determinatae.

25. (245. *Endl.*) **EUPHORBIACEAE** *Juss.*68. **Pachysandra** Mich.

127. *P. terminalis* *S. et Z.* — *P.* caule adscendente basi nudo, foliis in petiolum longe decurrentibus et e basi cuneata obovatis obtusis vel truncatis raro acutis, a medio sursum grosse et remote serratis serraturis deltoideis acutis, glabris, racemo solitario ex apice caulis.

Caulis semipedalis vel pedalis adscendens herbaceus uti tota planta glaber. Folia versus apicem caulis alterna, in petiolum longe attenuata obovata, obtusa vel subtruncata et serraturis grossis quasi praemorsa, 2—2½" longa, 1" lata, glabra subcoriacea. Racemi terminales, erecti, simplices, multiflori. Flores foeminei inferiores pauci multibracteati, bracteis ovatis acutis coriaceis; masculi tribracteati.

69. **Buxus** Tournef.

128. *B. microphylla* *S. et Z.* — *B.* foliis lineari-oblongis vel subspathulatis obtusis subemarginatis coriaceis nitidis glabris, floribus glomeratis, rudimento ovarii in floribus masculis stipitato calycem aequante.

Frutex ramosissimus; folia vix semipollicaria, 3" lata, coriacea, glaberrima. Flores axillares, 5 vel plures capitati. Ovarii rudimentum in flor. masculis columnare trisulcatum, stigmatibus 3 sessilibus carnosus emarginatis coronatum, calycem aequans. Flores foeminei in medio capituli solitarii soepius deficientes. Calyx 4-phyllus. Ovarium superum, 3-loculare loculis biovulatis. Styli 3 breves crassi planiusculi, stigmatibus carnosus emarginato-bilobis, patentes et alternantes cum squamulis tribus super ovarii verticem inflexis et ei adnatis.

Thunberg Fl. jap. p. 77 führt *B. sempervirens* *L.* als in Japan häufig vorkommend auf und meint damit gewiss zum Theil unsre Art, welche er nicht unterscheidet. Es soll aber auch mit letzterer die europäische Art vorkommen. Nur kann das Citat aus *Kämpfer Amoen. p. 781* *Ojo vulgo Tsuge* nicht dazu gezogen werden, da

die Beschreibung angiebt: folia raris aculeis serrata und baccae atropurpureae succo purpureo sylvestri turgidae, di-tetra-spermae, was offenbar auf einen Ilex hindeutet.

70. *Glochidion* Forst.

129. *Gl. obovatum* S. et Z. — M. foliis alternis brevissime petiolatis e basi longe attenuata cuneata obovatis obtusis vel breviter cuspidatis integerrimis glabris subtus glaucescentibus, floribus monoicis fasciculatis, masculis plerumque ex axillis foliorum inferiorum 5—6 longe pedunculatis, pedunculis laxis filiformibus, foemineis superioribus eodem modo fasciculatis pedunculis stricte erectis quam in masculis duplo brevioribus, stigmatibus simplicibus erecto-conniventibus.

Frutex valde ramosus. Folia sesquipollicaria subsessilia vel in petiolo decurrentia, obovata obtusa vel mucronato-cuspidata, integerrima, margine plana, glabra, subtus glaucescentia sicca nigricantia. Capsula depresso-globosa, 5—6-cocca coccis medio dorso sulco exaratis dispermis.

A *Gl. (Bradleia) sinaico* diversa videtur foliis obovatis non lanceolatis, flor. masculis fasciculatis nec solitariis, seminibus in quo-vis loculo juxta-non super-positis.

71. *Cicca* Linn. (?)

130. *C. (?) flexuosa* S. et Z.

Frutescens, rami subflexuosi. Folia parva, ovato-elliptica acutiuscula, integerrima, glabra. Stipulae membranaceae fimbriatae. Flores masculi fasciculati, pedunculis filiformibus. Calyx 4-partitus, stamina 2. Flores foeminei desunt.

72. *Phyllanthus* Swartz.

131. *Ph. lepidocarpus* S. et Z.

Ph. annuus caule erecto, foliis pinnatis floriferis, foliolis oblongis obtusis mucronatis glabris subtus glaucis, floribus omnibus sessilibus, fructibus squamulis deltoideis echinulatis, seminibus trigonis transverse sulcato-plicatis.

Ph. Niruri Thunb. *Fl. jap.* p. 56? sed flores pedicellati dicuntur. Caulis pedalis subsimplex, stricte erectus. Foliola 7 — 11 in quovis ramulo subsessilia oblonga et apicem versus soepe parum latiora, obtusa, mucronata, subtus glauca, unguicularia. Fructus sessiles, parvi, globosi, sexsulcati, squamulis primum patentibus demum adpressis echinulati.

Den Untersuchungen *Hooker's* (ap. *Beechey* p. 210) zufolge wäre unsere Pflanze zunächst verwandt mit *Ph. urinaria* L., welche ebenfalls schuppige Kapseln und nach der Definition in *Spec. pl.* 1393 flores sessiles haben soll. Aber zugleich wird der Stengel procumbens genannt und Willdenow sagt noch weiter, die weiblichen Blüthen seyen gestielt. Beides passt nicht auf unsre Pflanze. Ebenso ist *Ph. cantoniensis* Hornem. nahe mit unsrer Pflanze verwandt, weicht aber durch die starke Verästelung und breite fast geflügelte Blattstiele ab. Wir haben desshalb die japanische Pflanze als eigne Art gesondert halten wollen, bis eine genaue Revision sämmtlicher in diese Gruppe gehöriger Species erfolgt. Dazu dürften vorzüglich die Samen gute Anhaltspunkte liefern. Sie sind bei einigen durch zahlreiche in Reihen gestellte Wärzchen weichstachlig, bei andern der Länge nach gefurcht, bei *cantoniensis* und *lepidocarpa* mit Querrunzeln besetzt, bei einer Art aus Nubien grubig, bei *Niruri* nach Sprengel glatt. Rechnet man zu diesen Merkmalen noch, dass die Kapseln glatt oder beschuppt, die Blüthen gestielt oder ungestielt seyn können, so fehlt es nicht an brauchbaren Charakteren, sobald nur einmal die Linneischen *Ph. Niruri* und *urinaria* wieder mit Sicherheit ausgemittelt sind.

132. *Ph. species* nondum determinata.

73. *Croton* Linn.

133. *Croton Siraki* S. et Z.

74. *Rottlera* Roxb.

134. *R. japonica* Spreng. Sieb. et Zuccar. *Fl. jap.* p. 147. t. 79. — *Croton japon.* Thunb. *Fl. jap.* p. 270.

75. *Ricinus* Tournef.135. *R. communis* L.76. *Elaeococca* Commers.136. *El. verrucosa* Juss. — *Dryandra cordata* Thunb. *Flor. jap.* p. 267.

Rami crassi, lenticellis oblongis dense verrucosi. Folia petiolata, petiolo 2—3-pollicari tereti, e basi cordata ovata acuta vel triloba lobis late deltoideis acuminatis, glandula vel stipitata vel sessili in fundo sinuum, aliis duabus longe stipitatis peltatis utrinque ad basin folii. Stipulae lanceolatae, foliaceae, persistentes. Panícula terminalis corymbosa.

77. *Acalypha* Linn.

137. Species.

78. *Mercurialis* L.

138. *M. lejocarpa* S. et Z. *M. annua*, monoica, caule erecto ramoso glabro, foliis oppositis e basi rotundata ovato-oblongis acutis crenato-serratis, crenis apice glandula notatis, parce ciliatis superne glabris subtus ad venas passim setosis, spicis masculis inferioribus filiformibus interruptis folia superantibus, foemineis ex axillis foliorum superiorum, floribus singulis pedicellatis, carpellis glabris.

Recedit a *M. annua* cui affinis, foliis glanduloso-serratis, floribus masculis duplo fere majoribus, spicis foemineis longe racemosis, carpellis glabris.

79. *Stillingia* Gard.139. *St. sebifera* Michx.

140. *St. japonica* S. et Z. *St. frutescens*, foliis petiolatis e basi rotundata biglandulosa ovato-oblongis acuminatis integerrimis utrinque glabris, racemis masculis terminalibus cylindricis, florum fasciculis bi- vel trifloris ex axilla brateae subulatae basi biglandulosae, floribus foemineis . . .

Variat aequae ac *St. sebifera* floribus masculis di- vel triandris. Folia 2—4" longa, 2" lata, longe acuminata, glabra. Racemi masculi terminales, pollicares vel bipollicares, erecti, graciles.

80. *Euphorbia* L.

Species 10 nondum determinatae.

26. (243. *Endl.*) **EMPETREAE** Nutt.

81. *Empetrum* Tournef.

140. *E. nigrum* L.

A planta europaea nullo modo recedit nisi foliis parum angustioribus et magis patentibus.

27. (241. *Endl.*) **RHAMNEAE** R. Br.

82. *Rhamnus* Juss.

141. *Rh. globosus* Bunge *Enum. plant. chin.* p. 14.

142. *Rh. crenatus* S. et Z. — *Rh. inermis*, foliis alternis e basi rotundata ovatis longe cuspidatis crenato-serrulatis crenis calloso-mucronulatis, glabris vel novellis fuscescenti-hirtis, costato-venosis, floribus axillaribus subumbellatis, 5—8 e pedunculo communi, pedicellatis hermaphroditis, calycibus aequae ac pedunculi pubescentibus, laciniis deltoideis acutis intus carinatis, petalis stamina aequantibus cucullatis emarginatis, stylo brevi apice breviter trilobo.

Rh. alpino et *caroliniano* affinis. Folia 2—3" longa, 1—1½" lata, novella fuscescenti-hirta demum glabra, longe cuspidata, minutim crenato-serrulata, nervis parallelis utrinque 6—10-costata; stipulae deciduae. Flores in pedunculo brevi subumbellati, petiolo breviores pedicellis et calycibus pubescentibus.

83. *Hovenia* Thunb.

143. *H. dulcis* Thunb. *Fl. jap.* p. 101. Sieb. et Zucc. *Fl. jap.* I. p. 135. tab. 73. 74.

Folia novella subtomentosa, adultiora calva.

84. *Berchemia* Nick.

144. *B. racemosa* S. et Z. *B. inermis*, foliis petiolatis e basi rotundata ovatis acutis integerrimis costato-lineatis glabris, stipulis intrapetiolaribus connatis apice tantum liberis persistentibus, floribus axillaribus fasciculatis vel interrupte racemosis, racemis nudis, calycis segmentis ovato-lanceolatis acutis, drupis obovatis, pyreno osseo dispermo.

B. lineata De Cand. et Hooker ap. Beechey pag. 177. t. 37. recedit foliis subsessilibus obtusis et praesertim calycis segmentis elongatis linearibus. In planta nostra petioli 2—3" longi, folia subpollicaria. Racemi vel axillares breves et fasciculati, vel versus apicem ramorum nudi pollicares interrupti. Flores parvi. Alabastra globosa, argute cuspidata.

85. *Zizyphus* Tournef.

145. *Z. sinensis* Lam.

Specimina nostra omnia subinermia, raro spina una alterave subulata ad basin ramulorum. Ramuli glabri. Folia breviter petiolata e basi rotundata ovata vel ovato-lanceolata acuta repando-serrata, glabra, 1—1½" longa, 8—10" lata. Flores axillares, gemini — quaterni subumbellati, pedunculo communi brevi, pedicellis nudis pubescentibus. Calycis lacinae ovatae acutae in facie interiore ab apice carinatae; petala breviter unguiculata, spathulata, concava, calyce breviora, virentia. Discus 10-crenatus. Stigmata 3 recurva. Drupa ovato-elliptica, rotundata, carnosae, pollicaris. Colitur in horto botanico in insula Dezima.

86. *Paliurus* Tournef.

146. *P. Aubletia* R. S. vel nova species? Folia suborbicularia dense crenato-serrata, sed flores desunt.

28. (240. *Endl.*) *ILICINEAE* Brogn.87. *Ilex* Linn.

147. *I. crenata* Thunb. — I. foliis breviter petiolatis ellipticis

obtusis mucronatis crenatis crenis mucronulatis, glabris coriaceis, ramis tenuissime pubescentibus, pedunculis axillaribus folio brevioribus strictis erectis dichotome 3—7-floris, pedicellis filiformibus florem aequantibus vel superantibus. — *I. crenata* Thb. l. c. p. 78 et Aut.

Rami tenuissime pubescentes. Folia alterna elliptica vel ovato-elliptica indeque spathulata, obtusa, mucronata, crenata crenis mucronulatis, basi breviter attenuata, glabra, superne nitida subtus opaca pallidiora, coriacea, 8—12''' longa, 4—5''' lata; petioli brevissimi lineam longi. Pedunculi axillares stricte erecti tenues, ad lentem pubescentes, dichotome 3—7-flori, folio breviores; flores pedicellati pedicellis filiformibus strictis glabris, 1—2''' longis; calycis lacinae obtusae, petala semiorbicularia. Drupa globosa, magnitudine pisi minoris, plerumque dipyrena.

148. *Il. integra* Thbg. I. foliis petiolatis ovato-oblongis utrinque attenuatis acutis acumine obtuso glandula terminato, integerrimis margine subreflexis glabris coriaceis, florum fasciculis axillaribus multifloris e gemmis propriis perulatis, perulis ciliatis, pedunculis strictis unifloris, calycis laciniis ovatis obtusis, petalis oblongis obtusis calycem superantibus, drupis globosis tetrapyrenis. — *I. integra* Thbg. Fl. jap. p. 77. — *Prinos integra* Hook. et Arn. ap. Beechey p. 261.

Folia alterna; petioli 4—6''' longi, superne plani; lamina ovato-oblonga vel elliptica utrinque attenuata, apice excurrens in acumen breve glandula terminatum indeque obtusum, integerrima, utrinque glabra, coriacea, 1½—2'' longa, 9—12''' lata. Flores e gemmis propriis perulatis, perulis coriaceis ciliatis, umbellato-fasciculati 5—10; pedunculi uniflori, erecti, firmi, 3''' longi. Drupa magnitudine fructus Pruni spinosae minoris, globosa, tetrapyrena.

149. *Il. latifolia* Thbg. I. ramis angulatis, foliis alternis petiolatis, in eodem ramo figura variis, oblongis ovatis vel ellipticis, acuminatis vel obtusis, argute serratis vel leviter crenatis utrinque glabris superne lucidis, petiolis trigonis, floribus axillaribus e gemmis

propriis umbellato-fasciculatis numerosis, pedunculis unifloris. *I. latifolia* Thbg. *Fl. jap.* p. 79. — *I. macrophylla* Blume *Bijdr.* 17. p. 1150.

Rami angulati, crassi. Folia figura et magnitudine varia, petiolata, petiolo semipollicari crasso superne plano canaliculato subtus carinato; lamina 3—8" longa, $1\frac{1}{2}$ —3" lata, oblonga, elliptica vel ovata, acuminata vel obtusa, vario modo serrata, coriacea, lucida. Flores ultra 20 in quovis fasciculo, e viridi flavescentes. Drupa parva, glabosa, coccinea, plerumque tetrapyrena, pyrenis trigonis.

150. *Il. rotunda* Thunb. *I.* tota glabra, foliis petiolatis e basi rotundata ovato-ellipticis acutis integerrimis vel rarius subcrenatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus nudis dichotome subumbellatis multifloris filiformibus strictis, pedicellis longitudine florum, calycis laciniis acutis, petalis obovatis rotundatis, drupis longe pedunculatis globosis 4—5-pyrenis. *I. rotunda* Thunb. *Fl. jap.* p. 77.

Rami angulati. Folia petiolata petiolo semipollicari, e basi late rotundata ovato-elliptica acuta integerrima vel rarius subcrenata, glabra, $1\frac{1}{2}$ —2" longa, 6—10" lata. Pedunculi axillares, basi nudi nec perulati, petiolo parum longiores, stricti, glabri, multiflori. Flores parvi. Drupae magnitudine pisi minoris, globosae, stigmate 4—5-lobo coronatae.

151. *Ilex serrata* Thunb. *Fl. jap.* p. 28.

Flores in specc. nostris desunt.

Accedunt praeterea Ilicis species 5—6 nondum determinatae.

Adnotatio. *Il. japonica* Thbg. est *Mahonia japonica* De Cand. — *Il. Aquifolium* Thbg. et Blume *Bijdr.* 17. p. 1150 pertinet fortasse ad *Oleam Aquifolium* Sieb. et Zuccar.

29. (238. Endl.) CELASTRINEAE R. Br.

88. *Elaeodendron* Jacq.

152. Species nondum determinata.

89. *Celastrus* Kunth.

153. *C. articulata* Thbg. *Fl. jap.* p. 97.

Rami (sicci) angulati, lenticellis albidis soepe adpersi; ramuli laterales vel divaricato-horizontaliter patentes rigidi, vel vegetiores adscendentes subflexuosi. Folia petiolata, petiolo 6—8" longo, ovata vel ovato-elliptica raro suborbicularia, cuspidata basi rotundata vel attenuata, in toto margine crenato-serrulata, glabra, membranacea, $1\frac{1}{2}$ —3" longa, 8—20" lata. Pedunculi axillares petiolo breviores, solitarii gemini ternive, dichotome 3—5-flori. Calycis lacinae ovatae, obtusae; petala plusquam duplo longiora, obtusa. Capsula pisi magnitudine globosa, trivalvis, loculis plerumque monospermis.

154. *C. punctulata* Thbg. l. c. p. 97.

155. *C. Orixia* S. et Z. *C. dioica* tetrandra, foliis in ramis lateralibus abbreviatis alternis subfasciculatis obovato-oblongis vel oblongis utrinque attenuatis acutis integerrimis vel obsolete crenulatis, novellis praesertim in nervis villosis, adultis glabris vel tenuissime pubescentibus aequae ac bracteae et calyces pellucide glanduloso-punctatis, racemis axillaribus solitariis multifloris, pedunculis villosis, bracteis membranaceis late ovatis ciliatis longitudine pedicellorum, calycis laciniis acutis, petalis ellipticis trinerviis obtusis, disco in floribus masculis cruciato. — *Orixia japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 3 et 61.

Folia alterna, breviter petiolata petiolo vix 2" longo, lamina $1\frac{1}{2}$ —2" longa, 8—12" lata. Racemi coëtanei circiter pollicares, laxi, 6—10-flori, rachi pedicellisque villosis; bracteae magnae, membranaceae, ovato-orbiculares utrinque attenuatae, apice ciliatae. Discus in fundo calycis carnosus quadrilobo-cruciatus, lobis truncatis cum staminibus alternantibus. Flores foeminei ignoti.

Die Thunbergsche Gattung *Orixia* wurde von Sprengel mit Unrecht zu *Ilex* gezogen, von Endlicher u. A. unter die plantas incerte sedis gestellt, wozu weniger die Unkenntniss der Frucht als die irrige Deutung der männlichen Blüthe Anlass gab, deren vierlappige Honigscheibe man für ein stigma urceolatum, quadrilobu-

latum in angulis stamina recipiens erklärte, obgleich man darunter kein ovarium fand und Thunberg ausdrücklich sagt: Germen superum, stylus unicus erectus stigmatē capitato obtuso. Wir haben nur männliche Blüthen gesehen, zweifeln aber dennoch nicht, dass die Pflanze ein *Celastrus* sey, wenn auch die durchsichtigen Drüsenpunkte auf Blättern und Deckblättern sonst in der Gattung ungewöhnlich sind.

90. *Evonymus* Tournef.

156. *E. japonicus* Thunb. *Fl. jap.* p. 100. *Blume Bijdr.* 17. p. 1147. *Hook. et Arnott ap. Beechey* p. 261. tab. 54.

157. *E. Sieboldianus* Blume l. c. — *Ev. europaeus* Thunb. l. c. p. 101.

158. *E. Thunbergianus* Blume l. c. — *Celastrus alatus* Thb. *Fl. jap.* p. 98.

Die Zweige stark korkig geflügelt.

159. *E. subtriflorus* Bl. l. c. ?

Die beiden letztern Arten scheinen durch vier oder in Folge der Verkümmernng weniger völlig von einander freie Karpellen wesentlich von *Evonymus* verschieden.

30. (237. Endl.) STAPHYLEACEAE Bartl.

91. *Euscaphis* Sieb. et Zucc.

160. *E. staphyleoides* S. et Z. *Flor. jap.* I. p. 124. t. 67. — *Sambucus japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 125 et *Aut.*

161. ? *Eusc. simplicifolia* S. et Z. *E. foliis simplicibus e basi subcordata vel truncata late ovato-deltoides acuminatis serratis.* — *Banks. Icones Kämpfer.* tab. 57.

Ipsa planta nobis non visa, sed ex icone vix alio generi adscribenda et certe non *Volkameria fragrans* ut voluit beatus Willdenow in *Enum. plant. hort. Berol.*

91½. *Staphylea* L.

162. *St. Bumalda* Sieb. et Zucc. *Fl. jap. I. p.* 108. *t.* 95. —
Bumalda trifolia Thunb. *Fl. jap. p.* 8 et 114.

31. (236. *Endl.*) **PITTOSPOREAE** *R. Br.*

92. *Stachyurus* S. et Z.

163. *St. praecox* S. et Z. *Fl. jap. I. p.* 43. *t.* 18.

93. *Pittosporum* Soland.

164. *P. Tobira* Ait. — *Evon. Tobira* Thunb. *Fl. jap. p.* 99.

32. (234. *Endl.*) **POLYGALEAE** *Juss.*

94. *Salomonina* Lour.

165. *S. stricta* S. et Z. — *S. annua*, glabra, caule erecto ramoso sulcato, ramis strictis subvirgatis, foliis sessilibus lanceolatis vel linerari-lanceolatis acutis, spicis elongatis, bracteis flores subaequantibus vel brevioribus, capsulis margine setoso-cristatis, setis biseriatis.

Planta annua 6—8-pollicaris, caule erecto ramoso. Rami stricti, sulcati; folia alterna sessilia, inferiora ovato-lanceolata utrinque attenuata, superiora sensim angustiora lineari-lancelata vel linearia, omnia acuta integerrima, 3—4'' longa. Spicae elongatae 2—3'' longae; flores sessiles bractea lineari suffulti, vix 2'' longi. Capsulae obcordato-bilobae, margine cristatae, crista e setis s. laciniis subulatis rectis biseriatis composita.

95. *Polygala* L.

166. *P. japonica* Houtt. — *P. vulgaris* Thunb. *Flor. jap. p.* 277.

33. (232. *Endl.*) **SAPINDACEAE** *Juss.*

96. *Sapindus* Linn.

167. *S. Mukorossi* Gaertn. Sieb. et Zuccar. *Fl. jap. II. tab.*

164. *ined.* *S. rachi* aptera inter foliola carinata pubescente, foliolis

vel oppositis 3 — 6-jugis vel alternis, pedicellatis, e basi rotundata oblongis acutis vel acuminatis integerrimis glabris, panícula terminali pyramidata ramis divaricatis pubescentibus, floribus subsessilibus, petalis ciliatis, staminibus basi barbatis, carpellis globosis, duobus semper abortivis. — *S. Mukorossi Gaertn. I. tab. 70. Thunb. Fl. jap. p. 356. n. 37.*

Arbor ramis teretibus crassis. Folia alterna, pedalia et bipedalia; petiolus basi articulatus, inter foliola superne carinatus villosus, apterus; foliola pedicellata, pedicellis 3 — 4" longis, opposita 3 — 6-juga vel alterna, acuta, soepius subfalcata, subtus ad nervos pubescentia, 4 — 7" longa, 1 — 2" lata. Calycis foliola obtusa, petala orbicularia, ciliata. Carpella tria, duobus abortivis brevibus acutis, tertio fertili obovato-globoso carnosio, endospermio tomentoso lapideo.

97. *Koelreuteria* Laxm.

168. *K. paniculata* Laxm.

98. *Meliosma* Blume (*Millingtonia* Roxb.)

169. *M. rigida* S. et Z. — *M.* foliis alternis simplicibus oblongis vel obovato-oblongis utrinque longe attenuatis acuminatis remote spinoso-serratis superne glabris subtus aequae ac petioli et panícula ferrugineo-tomentosis costatis reticulatis coriaceis firmis, panícula terminali ramosissima pyramidalis, floribus subsessilibus.

Rami juniores ferrugineo-tomentosi; folia petiolata petiolo fere pollicari, lamina longe attenuata oblonga vel obovato-oblonga acuminata, a medio apicem versus serraturis remotis spinescentibus munita, superne glabra subevenia, subtus nervis parallelis costata et inter eos reticulata, ferrugineo-tomentosa, 4 — 6" longa, 1 — 2" lata. Panícula semipedalis valde ramosa, dense ferrugineo-tomentosa. — *M. pungenti* Wall. affinis jam foliis subtus costatis distinguitur.

170. *M. myriantha* S. et Z. — *M.* foliis alternis simplicibus ellipticis oblongis vel obovato-oblongis cuspidatis serratis serraturis argutis mucronatis, superne adpresse pilosis, subtus nervis paralle-

lis numerosis costatis et in eis ferrugineo-hirtis, panicula terminali pyramidata, ramis aequae ac rachis ferrugineo-tomentosis patentissimis, floribus numerosissimis pedicellatis.

Petoli 6—10''' longi tomentosi; lamina folii basi attenuata vel subrotundata, elliptica, oblonga vel obovato-oblonga, argute cuspidata, in toto margine argute serrata serraturis (siccis uncinato-) mucronatis, superne ad lentem adpresse pilosa, subtus nervis tenuibus parallelis utrinque 24—30 dense costata et in costis ferrugineo-hirta, membranacea, $2\frac{1}{2}$ —6" longa, 1— $2\frac{1}{2}$ " lata. Panicula erecta 3—4-pollicaris, pyramidata, ramis horizontaliter patentibus tomentosis. Flores numerosissimi, in ramulis ultimis racemosi. Calyx et corolla glabra.

99. *Aesculus* L.

171. *Aesc. chinensis* Bunge Enum. plant. chin. p. 10.

34. (229. Endl.) ACERINEAE De Cand.

100. *Acer* Linn.

a) foliis indivisis.

172. *A. distylum* S. et Z. — *A.* foliis e basi cordata ovatis acuminatis inaequaliter serrulatis penninerviis utrinque pubescentibus, racemis terminalibus subsimplicibus multifloris nutantibus, pedicellis calyce ovariisque villosis, stylis ad basin usque discretis papillois, alis adscendentibus.

Folia in specc. nostris 2— $3\frac{1}{2}$ " longa, 1—2" lata; racemi sesquipollicares cylindrici; flores minuti.

173. *A. carpinifolium* S. et Z. Flor. jap. II. tab. 152. ined. —

A. foliis e basi rotundata ovato-oblongis acuminatis argute duplicato-serratis costato-penninerviis et praesertim subtus ad nervos pilosis, racemis paucifloris subcymosis, fructiferis erectis, calycis lobis ovatis obtusis dense ciliato-barbatis, stylo profunde bifido, pedicellis fructiferis elongatis filiformibus, alis divergentibus cultratis rotundatis glabris.

Folia $2\frac{1}{2}$ —5" longa, 1—2" lata, in apicem usque serrata, membranacea, dense costata. Racemi terminales graciles 3—6-flori; pedicelli praesertim fructiferi elongati filiformes glabri. Calycis lobi late elliptici longe ciliati. Stigmata subulata, papilloso-hirta.

174. *A. crataegifolium* S. et Z. *Fl. jap. II. tab. 157 ined.* — *A.* floribus coëtaneis, foliis e basi cordata vel ovatis acuminatis inaequaliter duplicato-serratis vel trilobis, lobis lateralibus abbreviatis intermedio producto, omnibus deltoideis inaequaliter serratis, novellis pubescentibus adultis glabris et subtus glaucis, racemis simplicibus paucifloris erectis, petalis spathulatis calycem glabrum superantibus, carpellis et alis divaricatis.

Folia $1\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ " longa, integra 10—15", lobata inter lobos 20—25" lata, glabra subtus glauca. Racemi e ramulis lateralibus plerumque diphyllis terminales filiformes erecti sesquipollicares, 5—8-flori; pedicelli floriferi et fructiferi erecto-adpressi, filiformes; calycis lacinae oblongae obtusae glabrae, petalis spathulatis multo breviores. Ovarium glabrum. Carpella et alae glabra divaricata.

b) *foliis lobatis.*

175. *A. rufinerve* S. et Z. *Flor. jap. II. tab. 158 ined.* — *A.* foliis e basi cordata palmato-tri-vel rarius quinquelobis argute duplicato-serratis superne glabris subtus ad nervos lana rufa adpersis, lobis lateralibus brevioribus, omnibus deltoideis acuminatis, racemis simplicibus erectis multifloris, floribus breviter pedicellatis, calycis laciniis oblongis quam petala obovata parum brevioribus ovarioque glabris, alis late cultratis rotundatis adscendentibus.

Flores subcoëtanei. Folia adulta longe petiolata petiolo fere bipollicari, lamina 5" longa et inter lobos lata, firma, subcoriacea. Racemi pollicares vel sesquipollicares, fructiferi 5" longi, erecti; pedicelli breves, firmi. Carpella subglobosa uti alae glabra.

176. *A. micranthum* S. et Z. *Flor. jap. II. tab. 151 ined.* — *A.* foliis e basi cordata palmato-quinquelobis argute duplicato-serratis subincisis utrinque glabris vel subtus in axillis venarum bar-

bulatis, lobis lanceolatis longe acuminatis, petiolis canaliculatis laminam folii superantibus, racemis erectis simplicibus multifloris cylindricis, lobis calycinis rotundatis quam petala obovato-elliptica triplo brevioribus glabris.

Petoli 2—3" longi, graciles, canaliculati; lamina folii circumscriptione suborbicularis, 2" circiter longa et inter lobos lata, 5—7-nervia; lobi longissime acuminati et in apicem usque serrati, basin versus subincisi duplicato-serrati serraturis setaceo-acuminatis. Racemi terminales graciles multiflori, bi- et tripollicares, in specc. nostris tantum masculi. Flores praeter eos *A. distyli* congenerum minimi, serotini; pedicelli horizontaliter patentes, 2" longi. Calycis lacinae minimae rotundatae, petala obovato-spathulata.

177. *A. japonicum* Thunb. — A foliis e basi cordata orbicularibus palmato-9—13-lobis superne glabris vel novellis aequae ac perulae et pedunculi sericeis subtus pubescentibus, lobis anterioribus omnibus aequilongis, posticis abbreviatis oblongis acutis inaequaliter duplicato-serratis, floribus coëtaneis in cymam erectam paucifloram congestis, calycis laciniis coloratis ovatis quam petala orbicularia triplo majoribus, ovariis hirsutissimis, carpellis globosis, alis adscendentibus. — *A. japonicum* Thunb. *Fl. jap.* p. 162. — *S. et Z. Fl. jap. II. tab.* 154 ined.

Petoli pollicares. Lamina folii orbicularis cordaturae lobis conniventibus vel uno altero impositis, adulta 4" longa et lata, novella aequae ac perulae sericea. Pedunculi erecti cymosi, cyma 5—10-flora. Calycis lacinae petaloideae rubrae ovato-ellipticae, quam petala orbicularia triplo longiores, glabrae. Ovarium sericeo-hirsutissimum. Stigmata erecta, arcte sibi apposita. Carpella globosa, hirta, alae oblongae rotundatae adscendentes, glabrae.

178. *A. pictum* Thunb. — A foliis e basi rectilinea (truncata) vel cordata orbicularibus glabris palmato-5—7-lobis oblongo-deltaideis acuminatis integerrimis intermedio parum productione, infimis abbreviatis, cymis coëtaneis erectis multifloris, calycibus glabris

quam petala unguiculata spathulata parum brevioribus, ovariis glabris, carpellis oblongis, alis cultratis oblongis erectis. — *A. pictum* Thbg. *Fl. jap.* 162.

Variat α . petiolis quam lamina folii duplo longioribus vel ea brevioribus.

β . lobis anguste deltoideis acuminatis vel fere ovatis longe cuspidatis dimidio laminae brevioribus.

γ . lobis lineari-lanceolatis longe acuminatis ultra dimidium laminae incisis.

A. laetum C. A. Meyer *Enum. plant. Caucas.* 206 et *A. truncatum* Bunge *Enum. plant. chinens.* p. 10. fide specc. orig. vix nisi floribus majoribus et fructuum aliis divaricatis diversa videntur.

179. *A. trifidum* Thunb. — *A.* foliis glabris subtus glaucescentibus e basi truncata rotundata vel longissime cuneata integris oblongis acutis vel diverso modo tri-aut subquinelobis, lobis integerrimis acutis vel serratis aut angulato-dentatis, aequilongis vel medio productione, petiolis laminam aequantibus vel superantibus, floribus praecocibus vel coëtaneis cymosis, stylis ad basin usque discretis, alis cultratis erectis marginibus sibi invicem impositis. — *A. trifidum* Thunb. *Fl. jap.* p. 163. *Hooker ap. Beechey* p. 174. *Sieb. et Zucc. Fl. jap. II. tab.* 153 *ined.*

Variant folia:

α . basi truncata, rotundata vel longissime cuneata, petioli simul in var. ulteriore laminam superantes, in reliquis aequantes.

β . circumscriptione integra oblonga acuta integerrima vel vario modo triloba, rarius sub-5-loba.

γ . lobis inaequalibus, intermedio longiore lateralibus divergentibus ad dimidium laminae usque incisis vel ex apice folii longe cuneati aequilongis deltoideis abbreviatis.

δ . lobis integerrimis, serratis vel angulato-dentatis.

Sepala lanceolata, petala spathulata aequantia. Ovarium glabrum. Styli ad basin usque disjuncti, divaricati, papilloși. Carpella

elliptico-subrhombea, alae cultratae erectae et marginibus se invicem obtegentes.

180. *A. polymorphum* S. et Z. *Flor. jap. II. tab.* 155. 156. *ined.* — *A.* foliis e basi cordata vel rotundata ad vel ultra dimidium vel in basin laminae usque palmatifidis 5—9-raro 3-lobis, lobis vel basi confluentibus vel discretis, sessilibus aut pedicellatis, lanceolatis brevioribus vel linearibus elongatis, argute simpliciter vel angulato-et duplicato-serratis vel pinnatifidis, laciniis aut integerrimis aut inciso-serratis, floribus coëtaneis cymosis, calycis laciniis ciliatis petala rhombea superantibus, carpellis globosis alis brevibus rotundatis divergentibus.

Ad diversas varietates pertinent *A. dissectum*, *palmatum* et *septemlobum* Thunb. *Fl. jap. p.* 160—162.

Variant folia:

- α. basi rotundata vel cordata,
- β. palmatifida vel ad basin usque palmata,
- γ. palmatifida 5—9 (rarius 3-) loba,
- δ. palmata divisionibus 5—9 basi vel confluentibus vel distinctis sessilibus vel pedicellatis,
- ε. lobis oblongis, lanceolatis vel linearibus elongatis,
- ζ. integerrimis, aequaliter vel inaequaliter et duplicato-serratis, incisis pinnatifidisve, laciniis lanceolatis vel linearibus adscendentibus vel scalatim patentibus, integerrimis vel serratis,
- η. in eodem ramulo conformia vel circumscriptione et divisione diversissima.
- θ. viridia vel rubro-picta.

Folia novella pilosa. Cymae graciles subracemosae. Flores parvi calycis laciniis oblongis obtusis ciliatis quam petala obovato-rhombea longioribus, ovariis glabris, stylis ultra dimidium connatis, alis brevibus rotundatis divergentibus.

181. *A. sessilifolium* S. et Z. — *A.* foliis subsessilibus ternatis vel quinatis, foliolis pedicellatis e basi longe attenuata cuneata

vel rotundata oblongis vel lanceolatis incisis vel pinnatifidis, lobis argute simpliciter vel duplicato-serratis, floribus

Flores desunt sed species distinctissima foliis subsessilibus, petiolis vix 2''' longis, foliolis pedicellatis pedicellis 3''' longis vario modo incisis vel pinnatifidis.

182. 183. Species nondum determinatae.

Die Ahornarten sind seit den ältesten Zeiten Lieblingsbäume der japanischen Gartenkultur und eben desshalb mehrere derselben auch in Form, Färbung, Grösse u. s. w. der Blätter zu einer unendlichen Menge von Varietäten vervielfacht. Ein uns vorliegendes japanisches Herbarium zeigt über 30 verschiedene allmählig in einander übergehende Blattformen allein von *A. polymorphum*, unter welchen auch die scheinbar differentesten oft auf demselben Zweige vorkommen.

101. *Negundo* Mönch.

184. *N. cissifolium* S. et Z. — *N.* foliis trifoliolatis, foliolis pedicellatis ovato-oblongis acuminatis grosse inciso-serratis vel rarius lanceolatis integerrimis glabris, racemis simplicibus erectis, floribus in pedicellis calyce brevioribus villosis, stylis ad basin usque discretis, alis (immaturis) lineari-oblongis apicem versus non dilatatis.

Recedit a specie americana foliolis multo minoribus grosse inciso-serratis serraturis mucronatis, racemis et fructiferis erectis, pedicellis primum vix lineam longis, alis aequilongis in dorso rectilineis anguste cultratis. — Folia 1 — 1½" longa, 6 — 12''' lata, ea Cissi referentia, intermedium plerumque longius pedicellatum. Racemi tripollicares.

35. (227. *Endl.*) MELIACEAE *Juss.*

102. *Melia* Linn.

185. *M. Azedarach* L.

186. *M. Toosendan* S. et Z. — *M.* foliis bipinnatis, 3 — 4-jugis cum impari, pinnis 2 — 4-jugis, foliolis pedicellatis e basi rotun-

data lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque glabris, paniculis axillaribus folio multo brevioribus divaricatis, fructibus globosis, pyreno osseo 6—8-sulcato totidem loculari.

Ex imperio chinensi introducta dicitur. Folia sesquipedalia bipinnata, 3—4-juga cum impari; petiolus communis teres articulatus; pinnae 2—5-jugae cum impari, 3—4" longae; foliola pedicellata pedicello 2—3"', lamina 12—15''' longa et 4—6''' lata. Flores albi tubo stamineo violaceo. Fructus globosi quam in *M. Azedarach* duplo triplove majores, carnosius, sordide flavescentes. Nucleus globosus, longitudinaliter 6—8-sulcatus, 6—8-locularis, seminibus oblongis compressiusculis.

36. (226. *Endl.*) AURANTIACEAE *Juss.*

103. *Aegle* Corr.

186. *Aegl. sepiaria* L. — *Aegl.* ramis flexuosis angulato-compressis spinosis, spinis basi compressis sursum subulatis validis axillaribus, foliis trifoliolatis, petiolo alato, foliolis omnibus sessilibus cuneatis, truncatis vel acutiusculis crenulatis coriaceis, floribus ex axillis spinarum sessilibus solitariis vel geminis, staminibus 20—30 liberis, antheris brevibus ovatis, ovario et stylo brevi cylindrico tomentosis, stigmate crasso clavato glabro. — *Citrus trifolia* Thunb. *Flor. jap.* p. 294. — *Ssi* vulgo *Karatats banna*, aliis *Gees*. *Kämpfer Amoen. V.* p. 801. c. ic.

Rami flexuosi, compressi et subangulati glabri. Folia alterna, petiolata petiolo semipollicari foliaceo-alato, trifoliolata; folia omnia sessilia e basi cuneata spathulata vel elliptica, truncata vel acutiuscula, crenata, glanduloso-punctata, pollicaria, 6''' lata. Spinae axillares, solitariae, persistentes divaricatae, basi compressae sursum teretes, acutissimae, validae, pollicares. Flores solitarii vel gemini, sessiles. Fructus globosus, magnitudine pomi, 6—8-locularis, septis

membranaceis, seminibus in quovis loculo pluribus biseriatis, in pul-
pam ut in Citris *) compositam immersis.

Vix cum *Aegle Marmelos* ejusdem generis.

104. *Citrus* L.

187. *C. japonica* Thunb. *Flor. jap.* p. 192. Sieb. et Zuccar.
Fl. jap. I. p. 35. tab. 15.

188. *C. Aurantium* L. —

189. *C. Decumana* L. — Petioli foliaceo-alati, ultra pollicem
lati. Rami valde angulati tenuissime tomentosi. Semina figura varia,
compressiuscula, marginata.

105. *Skimmia* Thunb.

190. *Sk. japonica* Thunb. *Flor. jap.* p. 4 et 62. Sieb. et Zucc.
Flor. jap. I. p. 127. tab. 68.

37. (225. Endl.) OLACINEAE Mirb.

106. *Tripetaleia* S. et Z.

191. *Tr. paniculata* S. et Z. in *Act. Acad. Monac. Mathem.*
Phys. III. p. 731. tab. 3.

An revera hujus Familiae?

38. (223. Endl.) TAMARISCINEAE Desv.

107. *Tamarix* L.

192. *T. chinensis* Lour. Sieb. et Zucc. *Flor. jap.* I. p. 132.
tab. 71. *Tam. gallica* Thunb. l. c. p. 126.

39. (220. Endl.) HYPERICINEAE Desv.

108. *Hypericum* L.

193. *H. patulum* Thunb. *Fl. jap.* p. 295. — *H. glabrum*, ramis
strictis divaricatis, foliis subsessilibus lanceolatis utrinque attenuatis
acutis margine revolutis subtus glaucis vel ferrugineis, floribus ter-
minalibus plerumque ternis breviter pedunculatis bibracteatis, ca-

lycis foliis rotundatis, staminibus pentadelphis, stylis 5 patentibus obtusis.

Rami teretes, purpurascens, glabri. Folia vix pollicaria, 3—5" lata utrinque attenuata acuta, subtus glauca vel ferruginea, glabra. Capsula sicca, chartacea, 5-locularis, a vertice ad medium usque 5-valvis.

194. *H. salicifolium* S. et Z. — *H.* glabrum, ramis teretibus, foliis subsessilibus lanceolatis vel lineari-lanceolatis utrinque longe attenuatis acutis integerrimis subtus glaucescentibus, corymbo terminali dichotomo multifloro, pedunculis longis medio bibracteolatis, calycis foliolis lineari-lanceolatis acutis integerrimis eglandulosis, petalis dimidiato-obliquis, stylo filiformi, stigmatibus 5. — *Hyp. monogynum* Thunb. *Fl. jap.* p. 297.

Rami graciles. Folia $1\frac{1}{2}$ —3" longa, 4—8" lata, lanceolata vel lineari-lanceolata, utrinque attenuata. Corymbi multiflori flore solitario e dichotomiae angulo praecociori longissime pedunculato. Bractae lineares; pedunculi laterales pollicares, graciles, stricti, medio bibracteolati bracteolis minutis. Calycis foliola aequalia. Corolla ultra pollicem diametro metiens, petalis inaequilateris et quasi dimidiatis. Stamina ima basi pentadelpa. Stylus longus, filiformis, stigmatibus brevibus subulatis. Cum *H. monogyno* L. praeter generis characterem nulla affinitas.

195. *H. erectum* Thunb. *Flor. jap.* p. 296. — *H.* herbaceum, glabrum, caule stricte erecto tereti, foliis sessilibus subamplexicaulibus lanceolatis acutiusculis margine subreflexis glabris subtus nigro-punctatis, floribus terminalibus corymbosis, calycis laciniis lanceolatis acutis integerrimis aequae ac petala nigro-lineatis, staminibus ima basi triadelphis, stylis 3, stigmatibus capitatis.

Caulis herbaceus purpurascens superne tantum ramosus, ramis stricte erectis. Folia sessilia, amplexicaulia, lanceolata, acutiuscula, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ " longa, 3—6" lata, utrinque glabra, subtus nervata et praesertim in margine glandulis nigris punctata. Flores magnitudine

circiter eorum *H. hirsuti*, ex apice caulis ramorumque dichotomi et in corymbum planum congesti; calycis foliola ovato-lanceolata acuta vel obtusa integerrima glabra, aequae ac petala lineolis inaequalibus nigris notata.

196. *H. japonicum* Thunb. *Flor. jap.* p. 295. — *H.* caule herbaceo debili adscendente tetragono ramoso, foliis sessilibus amplexicaulibus ovatis vel suborbicularibus obtusis 3—5-nerviis glabris glaucescentibus, minutim pellucide punctatis, quam internodia brevioribus, floribus in apice caulis ramorumque dichotomis breviter pedicellatis, calycis foliolis lanceolatis acutis integerrimis glabris eglandulosus, stylis 3 brevibus, stigmatibus capitato-truncatis.

Caulis herbaceus circiter pedalis adscendens, basi simplex superne ramosus. Folia amplexicaulia ovata vel suborbicularia obtusa glabra glaucescentia, ad lentem pellucide punctata, 3—4" longa, 2" lata, 3—5-nervia. Flores dichotomi, ramis dichotomiae (abortu) racemosi, singuli breviter pedunculati, bractea lineari pedicello breviori suffulti, magnitudine circiter ut in *H. humifuso*.

40. (217. *Endl.*) **TERNSTROEMIACEAE** *De Cand.*

109. *Ternströmia* Nutt.

197. *T. japonica* S. et Z. *Fl. jap.* p. 148. tab. 80. — *Cleyera japonica* Thunb. *Flor. jap.* p. 224 et *Aut.*

110. *Eurya* Thunb.

198. *E. japonica* Thunb. *Flor. jap.* p. 191.

199. *E. littoralis* Sieb.

200. *E. microphylla* Sieb.

201. *E. uniflora* Sieb.

202. *E. hortensis* Sieb.

203. *E. montana* Sieb.

111. *Cleyera* Thunb.

204. *Cl. japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 12. (non p. 224 et *Act. Linn.*) Sieb. et Zuccar. *Flor. jap.* I. p. 153. tab. 81.

205. *Cl. Mertensiana* Sieb. et Zucc. l. c. p. 154.

112. *Stuartia* Catesb.

206. *St. monadelpha* S. et Z. l. c. p. 181. t. 96.

113. *Camellia* Linn.

207. *C. japonica* L. Sieb. et Zuccar. l. c. p. 155. t. 82.

208. *C. Sasanqua* Thunb. Sieb. et Zuccar. l. c. p. 158. t. 83.

114. *Thea* Linn.

209. *Th. chinensis* L.

115. *Trochostigma* S. et Z.

210. *Tr. rufa* S. et Z. *Act. Acad. Monac. Phys. Mathem.* III. p. 727.

211. *Tr. arguta* S. et Z. l. c.

212. *Tr. repanda* S. et Z. t. c.

213. *Tr. polygama* S. et Z. l. c. p. 724. tab. II. 2.

214. *Tr. volubilis* S. et Z. l. c. p. 728.

An potius Dilleniaceis adscribendum genus?

41. (214. Endl.) **TILIACEAE** Juss.116. *Corchoropsis* S. et Z.

215. *C. crenata* S. et Z. *Act. Acad. Monac. Mathem. Phys.* III. p. 738. tab. IV. 1.

117. *Tilia* Linn.

216. 217. Species ab europaeis certe diversae, sed specimina manca.

118. *Elaeocarpus* Linn.

218. *El. photiniaefolius* Hooker in *Beechey Bot.* p. 259. t. 53.

Antherae totae setulis parvis echinulatae, sed in specc. nostris apice non expresse barbularis.

219. *El. japonica* S. et Z. — *E. polygama*, foliis longe petiolatis ellipticis vel oblongis cuspidatis vel acuminatis acumine obtuso, serrato-crenatis glabris subtus minutim glanduloso-pilosis et in axillis venarum inferiorum glandula pertusa munitis, racemis axillaribus secundis multifloris simplicibus, calycis foliolis lineari-lanceolatis petala oblonga apice bi — trifida aequantibus et cum his hirtis, antheris apice bivalvibus echinulatis, ovario styloque hirtis, stigmate 2—3-crenato, drupa elliptica glabra abortu monosperma.

Petioles pollicares vel sesquipollicares, eglandulosi; lamina elliptica vel oblonga, $1\frac{1}{2}$ —4" longa, 10—15" lata, subtus glandulis minutis nigris piliferis obsita et in axillis venarum inferiorum glandulas sacculiformes apice pervias ferens. Racemi axillares, petiolo longiores; pedicelli pubescentes. Flores masculi nutantes; petala utrinque hirsuta, apice truncata, bi-rarius trifida; stamina 10—15; discus carnosus, 10-crenatus hirtus; ovarii rudimentum brevissimum; in floribus hermaphroditis ovarium globosum 2—3-loculare, hirtum; stylus hirtus stigmate 2—3-dentato. Drupa glabra, elliptica, magn. ejus *Vib. Opuli*, carnosae, abortu monopyrena; pyrenum osseum, uniloculare, monospermum.

Adnotatio. In *Elaeocarpeis* pubescentia simplex, in veris *Tiliaceis* stellata.

42. (213. *Endl.*) BUETTNERIACEAE R. Br.

119. *Pentapetes* L.

220. *P. phoenicea* L.

43. (212. *Endl.*) STERCULIACEAE Vent.

120. *Sterculia* L.

221. *Sterculiae* species.

44. (221. *Endl.*) MALVACEAE Juss.

121. *Malva* L.

222. *M. mauritiana* L. ?

223. *M. ruderalis* *Blume Bijdr. II. p. 64.*
122. *Urena* L.
224. *U. morifolia* *DC. ?*
123. *Hibiscus* L.
225. *H. Hamabo* *S. et Z. Flor. jap. I. p. 176. t. 93.*
226. *H. mutabilis* L. ?
227. *H. syriacus* L.
124. *Gossypium* L.
228. *G. herbaceum* *Thunb. An G. siamense Fisch.*
45. (210. *Endl.*) **PHYTOLACCEAE** *De Cand.*
125. *Phytolacca* *Tournef.*
229. *Ph. octandra* L.
46. (209. *Endl.*) **CARYOPHYLLEAE** *De Cand.*
126. *Stellaria* L.
230. *St. undulata* *Thunb. Flor. jap. p. 185.* — Pedunculi filiformes, folio longiores. Calycis foliola lineari-lanceolata acuminata uninervia; petala dimidio breviora, bifida. — Specimen mancum.
127. *Dianthus* L.
231. *D. japonicus* *Thunb. Flor. jap. p. 183.*
232. *D. chinensis* L.
233. *D. caryophyllus* L. ?
234. Species nondum determinata.
128. *Silene* L.
235. *S. firma* *S. et Z.* — *S.* caule simplici erecto stricto glabro folioso, foliis e basi attenuata oblongis vel lanceolatis acutis margine crenulato-scabriusculis subtrinerviis coriaceis firmis, summis linearibus, floribus racemosis subverticillatis stricte erectis, laciniis calycinis deltoideis acutis margine late membranaceis, tubo glabro tenuiter

15-nervio sed non striato, petalis bifidis calycem aequantibus, seminibus parvis reniformibus echinulatis.

Caules strictissimi, obtuse quadrangulares. Folia internodiis semipollicaribus duplo triplove longiora, basi longe attenuata, oblonga vel lanceolata, acuta coriacea, rigida, erecta. Racemi semipedales, stricti; flores oppositi vel e quavis axilla terni indeque subverticillati, stricte erecti. Flores parvi, albi vel rosei (?); petala calycem aequantia bifida; stamina et pistillum inclusa.

129. *Lychnis* De Cand.

236. *L. grandiflora* Jacq. Sieb. et Zuccar. *Flor. jap. I.* p. 97. tab. 48. — *L. coronata* Thunb. *Fl. jap.* p. 187.

237. *L. Senno* S. et Z. l. c. p. 98. tab. 49. — *L. chalcidonica* Thbg. l. c. p. 188.

47. (208. *Endl.*) **PORTULACACEAE** *Juss.*

130. *Portulaca* Tournef.

238. *P. oleracea* L.

131. *Tetragonia* L.

239. *T. expansa* Ait. — *T. japonica* Thunb. *jap.* p. 208.

48. (260. *Endl.*) **CACTEAE** *De Cand.*

132. *Opuntia* Tournef.

240. *O. species non satis nota.* *Cactus Ficus.* Thunb. *Flor. jap.* p. 198.

49. (205. *Endl.*) **BEGONIACEAE** *R. Br.*

133. *Begonia* L.

241. *B. grandis* Dryand. — *B. obliqua* p. 231.

50. (204. *Endl.*) **CUCURBITACEAE** *Juss.*

134. *Bryonia* L.

242. *Br. japonica* Thunb. *Fl. jap.* 325.

135. *Momordica* L.
 243. *M. Charantia* L.
 136. *Luffa* Tourn.
 244. *L. foetida* Cav.
 137. *Lagenaria* Ser.
 245. *L. vulgaris* Ser.
 138. *Cucumis* L.
 246. *C. Melo* L.
 247. *C. sativus* L.
 248. *C. Conomon* Thbg.
 249. *C. flexuosus* L.
 250. *C. Colocynthis* L.
 139. *Cucurbita* Linn.
 251. *C. Pepo* L.
 252. *C. Citrullus* L.
 253. *C. hispida* Thbg.
 140. *Trichosanthes* L.
 254. *Tr. anguina* L.
 255. *Tr. cucumerina* L.
 141. *Sicyos* L.
 256. *S. angulata* L.

51. (199. *Endl.*) **PASSIFLOREAE** *Juss.*

142. *Passiflora* L.
 257. *P. coerulea* L.

52. (197. *Endl.*) **BIXACEAE** *Lindl.*

143. *Hisingera* Hellen.
 258. *H. japonica* Sieb. et Zucc. *Fl. jap.* I. p. 169. t. 88. 100.

53. (192. *Endl.*) **VIOLARIEAE** *De Cand.*144. *Viola* L.259. *V. canina* L.

Clar. De Candolle folia in specc. japonicis ex herb. Lambert, vidit basi vix cordata, in nostris vero folia sunt profunde cordata et utrinque lineolis daedaleis minutissimis badiis densissime obsita, quae in specc. europaeis pallidiores et minus distinctae observantur.

Praeterea 11 species nondum accuratius examinatae.

54. (191. *Endl.*) **DROSERACEAE** *De Cand.*145. *Drosera* L.

Species duae.

146. *Parnassia* Tournef.

260. *P. mucronata* S. et Z. — *P. appendicibus* 9—13-fidis e basi late cuneata ovario longioribus, calycis foliolis acutis, folio caulino sessili e basi cordata suborbiculari mucronato, radicalibus late cordatis acutis, omnibus dense ferrugineo-punctatis.

Proxima *P. palustri* differt foliolis calycinis acutis, nectarii squamis longioribus et setis ovarium superantibus, foliis omnibus mucronato-acutis.

Adnotatio. Omnes fere *Parnassiae* species in foliis et in calyce punctis lineolisque ferrugineis (in *P. mucronata* et *palustri* optime conspicuis) densissime adpersae sunt.

55. (189. *Endl.*) **NELUMBONEAE** *Bartl.*147. *Nelumbium* Juss.

261. *N. speciosum* Willd. — *Nymph. Nelumb. Thunb. Flor. jap. p. 223.*

56. (187. *Endl.*) **NYMPHAEACEAE** *Salisb.*148. *Euryale* Salisb.262. *E. ferox* Salisb.

149. *Nymphaea* Neck.

Species 2 nondum determinatae.

150. *Nuphar* Smith.263. *N. japonica* DC. — *Nymph. lutea* Thbg. *Fl. jap.* p. 223.Folia ovato-oblonga obtusa, basi sagittata lobis recte descenduntibus acutis vel obtusis, cordaturae angulo acuto. Flores quam in *N. lutea* nostrate minores. Stigmata erecta 12—15.

Species altera nondum determinata.

57. (184. *Endl.*) CAPPARIDEAE *Juss.*151. *Gynandropsis* DC.264. *G. viscida* Bunge *Enum. plant. chin. p.* 7. (?)58. (183. *Endl.*) CRUCIFERAE *Juss.*152. *Nasturtium* DC.265. *N. amphibium* DC. — *Sis. amphibium* Thbg. *Flor. jap.* p. 260 fide cl. De Cand.266. *N. officinale* R. Br. — *Sisymb. Nasturtium* Thbg. *Flor. jap.* p. 260.153. *Cardamine* DC.267. *C. scutata* Thbg. *Act. Linn.* — *Card. trifolia* Thbg. *Fl. jap.* p. 260.154. *Draba* DC.268. *Dr. nemoralis* Ehrh. — *Dr. muralis* Thbg. *Flor. jap.* p. 259 (fide cl. De Cand.)155. *Capsella* Mönch.269. *C. Bursa Pastoris* Mönch.156. *Brassica* DC.270. *Br. chinensis* L. — *Br. orientalis* Thbg. *Flor. jap.* p. 261.

157. *Sinapis* Tourn.

271. *S. cernua* Thbg. *Fl. jap.* 1. c.

272. *S. japonica* Thbg. *Fl. jap.* p. 261.

158. *Raphanus* L.

273. *R. sativus*. L.

Die japanischen Cruciferen, im v. Sieboldschen Herbarium beiläufig 30 an der Zahl, unterliegen noch genauerer Bearbeitung.

59. (182. Endl.) PAPAVERACEAE Juss.

a. *Papavereae*.

159. *Papaver* Linn.

274. *P. somniferum* L.

Specimina prostant tam floribus simplicibus quam plenis.

275. *P. Rhoeas* L. — Fide clar. Thunberg.

160. *Chelidonium* L.

276. *Ch. majus* L.

A planta europaea nullo modo diversum.

277. *Ch. uniflorum* S. et Z. — *Ch.* foliis inferioribus pinnatisectis bijugis cum impari, summis ternatisectis, segmentis subsessilibus ovato-oblongis acutis inaequaliter argute serratis vel rarius incisicis glabris, floribus axillaribus subsolitariis pedunculatis, calycis foliolis aristatis, siliqua polysperma cylindrica, stigmatibus divergentibus. *Chel. japonicum* Thunb. *Fl. jap.* p. 221 et Aut.

Descriptio Thunbergiana in plantam nostram bene quadrat, at serraturae foliorum nunquam ciliatae et segmenta terminalia lateralibus non majora. Folia radicalia non visa. Caulina petiolata imparipinnata bijuga, segmentis lateralibus subsessilibus vel breviter petiolatis, infimis soepius abbreviatis: summa ternatisecta, omnia vel inaequaliter argute serrata vel rarius simul pinnatifida. Flores axillares pedunculati, pedunculo nudo tenni quam folium brevior. Sepala caduca, ovata, aristata, virentia. Corolla pollicaris patens, petalis e

basi cuneata late obovatis rotundatis. Stamina numerosa petalis quadruplo breviora, pistillum aequantia. Siliqua longe pedunculata cylindrica tenuis, sursum attenuata, pollicaris, stigmatibus duobus linearibus divergentibus.

b. Fumarieae. (Fumariaceae DC.)

161. *Pteridophyllum* S. et Z. *Act. Mathem. Physic. Monac. III. p. 719. tab. 1.*

278. *Pt. racemosum* S. et Z. l. c.

162. *Eucapnos* S. et Z. l. c. p. 271. tab. 1.

279. *E. spectabilis* S. et Z. — *Fumaria spect.* Linn. *Amoen. 7. p. 457 et Aut.* — *Corydalis spectabilis* Persoon *Enchir. II. p. 269.* — *Dielytra spectab.* De Cand. *Syst. II. p. 110. Prodr. I. p. 126.*

Recedit a *Dielytra* filamentis cujusvis phalangis exterioribus in basi libera late alatis, intermedio angusto ecalcarato. Caulis foliosus.

163. *Dicentra* Borhh. — *Dielytra* De Cand.

280. *D. pusilla* S. et Z. — *D.* scapo nudo bi—trifloro, calcaribus brevibus rotundatis, pedicellis calyce deltoideo acuto longioribus, foliis pluries ternati-sectis, laciniis ultimis anguste linearibus acutis glaucis.

Proxima *D. lachenaliaeflorae* Ledeb. recedit statura minori, floribus multe majoribus, calcaribus magis prominentibus, foliorum segmentis ultimis angustioribus et dimidio brevioribus.

164. *Corydalis* De Cand.

281. *C. ambigua* Cham. et Schlchtdl.

Specimina japonica cum kamtschaticis, quae ab Eschscholzio lecta vidi in herb. clar. Ledebour, optime conveniunt. Squama in basi caulis folium vel soepius ramum unum duosve floriferos profert.

282. *C. decumbens* Pers. — *C.* radice tuberosa, foliis radicali-

bus pluribus biternatis, segmentis ovatis incisis lobis ovato-oblongis vel oblongis obtusis mucronulatis, caulibus soepius pluribus ex eadem radice decumbentibus vel erectis, simplicibus basi nudis absque squama, superne diphylo foliis alternis quam radicalia minoribus, lobis angustioribus soepe acutis, racemo laxo pauci-(3—6-) floreo, bracteis ovato-rhombeis acutis pedicello duplo brevioribus, calcare recto obtuso tubi partem superiorem aequante. — *Fumaria bulbosa* Thbg. *Fl. jap.* p. 277. — *Fum. decumbens* Thbg. *Nov. Act. Petrop.* 12. p. 102. *tab. A.* * Willd. *Spec. plant.* III. p. 862. — *Corydalis decumbens* Pers. *Enchir.* II. p. 269 et rel. *Aut.*

Caulis soepe erectus, spithameus. Flores in specc. siccis non lutei sed rubri videntur.

283. *C. incisa* Pers. — *C.* caule erecto simplici vel ramoso, foliis inferioribus triternato-sectis vel subdecompositis, segmentis ultimis ovatis vel oblongis inaequaliter inciso-dentatis lobis acutis, racemo multifloro, primum denso fructifero elongato, bracteis inferioribus ovatis incisis, superioribus lineari-oblongis serratis omnibus quam pedicelli brevioribus, calcare recto obtuso, tubi partem superiorem aequante, siliquis linearibus planis, stigmatis lobis orbicularibus, seminibus laevibus. — *Fum. incisa* Thunb. *Act. petrop.* l. c. p. 104. *t. D.* — Willd. *Spec.* II. p. 859. — *Coryd. incisa* Pers. *Enchir.* II. p. 269. *De Cand. Syst. Veget.* II. p. 121. *Prodr.* I. p. 127.

Caulis soepe ramosus ultra pedalis. Folia iis *Petroselinum* sativi similia. Racemi floriferi pollicares vel bipollicares inferne laxi superne densi, bracteis infimis multifidis; pedicelli filiformes, floriferi 6—9" longi, fructiferi soepe ultra pollicares.

284. *C. heterocarpa* S. et Z.

Caule erecto ramoso, foliis bipinnato-sectis, segmentis cuneato-oblongis incisis lobis lineari-oblongis mucronatis, racemis laxifloris, bracteis integris lineari-subulatis quam pedicelli longioribus, calcare quam tubi pars superior multo brevior, siliquis vel late linearibus rectis planis brevioribus vel subarcuatis inter semina lomentaceo-

constrictis, stigmatis lobis oblongis apice callosis, seminibus dense muricatis. — *Fum. racemosa* Thbg. *Act. Petrop. l. c. p. 103. tab. B. ** (?) — *Coryd. racemosa* Pers. et Aut. — Hooker ap. Beechey *l. c. p. 258.*

Brevis Thunbergii descriptio cum planta nostra bene convenit, sed bracteae quamvis pedicellis sub anthesi 3 — 4" metientibus longiores eos vix dimidio nec triplo superant. Siliquae difformes in eodem racemo, aliae lineares rectae breviores, aliae inter semina lomenti in modum constrictae curvatae longiores. Semina dense et tenuiter muricata.

285. *C. pallida* Pers. — Caule erecto vel decumbente ramoso, foliis bipinnati-sectis segmentis oblongis pinnatisectis, lobis lineari-oblongis obtusis mucronulatis glaucescentibus, racemis laxis 10—12-floris, bracteis inferioribus cuneatis incisis, superioribus linearibus dentatis, omnibus quam pedicelli longioribus, siliquis linearibus arcuatis subtorulosis, stigmatis lobis divaricatis linearibus, seminibus dorso tenuiter muricatis ceterum elevato-punctatis. — *Fum. lutea* Thbg. *Flor. jap. p. 277.* *Fum. pallida* Thbg. *Act. Petrop. l. c. p. 103. t. C. ** — *Coryd. pallida* Pers. *Enchir. II. p. 270 et Aut.*

Caulis in specc. robustis pedalis erectus strictus, in debilioribus flaccidus vel decumbens, ramosus. Tota planta glaucescens; foliorum lobi parvi lineari-oblongi obtusi cum mucrone, rarius acuti. Flores pallide flavi, calcar rectum vel subcurvatum rotundatum, tubo corollae brevius.

286. *C. lineariloba* S. et Z. — *C.* radice tuberosa, caule diphylo absque squama, foliis alternis petiolatis triternato-sectis, lobis ultimis linearibus acuminatis integerrimis, racemo pauci- (2—3-) floreo, bracteis late ovatis incisis, quam pedicelli filiformes brevioribus, calcare recto obtuso tubum superante.

Proxima *C. angustifoliae* De Cand. recedit ab hac squama in caule nulla, foliis triternato-sectis lobis angustioribus soepe subfalcatis, floribus minoribus.

287. *C. orthoceras* S. et Z. — *C.* radice tuberosa, caule basi squama munito et ex ejusdem axilla soepe ramoso ceterum simplici diphylo, foliis alternis biternati-sectis, lobis ultimis linearibus (rarius bifidis) sessilibus utrinque attenuatis acutis, bracteis cuneato-obovatis incisis pedicello filiformi parum brevioribus, calcare recto obtuso quam tubus longiore, rudimento secundi calcaris opposito.

Caulis vix spithamaeus, ex axilla squamae plerumque ramo auctus; folia caulina duo, lobis linearibus soepe 1" longis.

Flores e minoribus, calcare stricte retrorsum spectante recto obtuso, rudimento secundi calcaris brevi e basi petali oppositi.

60. (181. *Endl.*) **BERBERIDEAE** *Vent.*

165. *Berberis* Linn.

288. *B. Thunbergii* De Cand. — *B. cretica* Thunb. *Fl. jap.* p. 146.

Pedunculi uni - sexflori. Flores parvi. Folia obovato - spatulata integerrima.

289. *B. sinensis* Desfr.? — *B. vulgaris* Thbg. *Flor. jap.* l. c.

290. *B. japonica* S. et Z. — *Mahonia japonica* De Cand. — *Ilex japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 79 et *Icones* tab. 12.

Folia trijuga; foliola valde spinoso - dentata lanceolata praeter terminale sessilia utrinque glabra. Racemi terminales, simplices.

166. *Nandina* Thunb.

291. *N. domestica* Thunb. *Fl. jap.* p. 9 et 147.

167. *Epimedium* L.

292. *E. Muschianum* De Caisne.

293. *E. macranthum* De Caisne.

294. *E. violaceum* De Caisne.

168. *Aceranthus* De Caisne.

295. *A. diphyllus* De Caisne. — *Epim. diphyllum* Lodd.

296. *A. sagittatus* S. et Z. — *A.* caule stricte erecto, foliis

caulinis duobus suboppositis longe petiolatis ternatis, foliolis pedicellatis e basi acute sagittata deltoideis acuminatis in toto margine setoso-ciliatis, racemo inter folia terminali cylindrico composito multifloro.

Caulis pedalis stricte erectus glaber. Folia duo subopposita, inferioris petiolo superiorum amplexante, longe petiolata erecta, ternata. Foliola pedicellata pedicellis pollicaribus, basi sagittata lobis acutis, deltoidea acuminata setoso-ciliata glabra. Racemus terminalis erectus tripollicaris compositus, pedunculis horizontaliter patentibus trifloris, floribus pedicellatis.

61. (180.) RANUNCULACEAE *De Cand.*

169. *Clematis* DC.

297. *Cl. paniculata* Thbg. *Act. Linn. II. p. 337.* — *Cl. crispa* Thbg. *Flor. jap. p. 239.*

Carpella glabra, caudae plumosae duplo longiores.

298. *Cl. apiifolia* DC. — *Hooker ap. Beechey l. c. p. 258.* — Flores paniculati, parvi, hermaphroditi. Sepala extus sericea intus glabra. Proxima *Cl. brevicaudatae* DC., sed in hac flores minores, in panicula foliosa numerosiores et folia firmiora.

299. *Cl. triternata* DC. — *Cl. virginica* Thbg. *Fl. jap. p. 240.* — Pedunculi folio breviores longioresve, corymboso-paniculati. Foliola trinervia acuta vel obtusa. Folia summa inter flores breviter petiolata integra elliptica, oblonga vel sublinearia.

300. *Cl. japonica* Thbg. *Flor. jap. p. 240.* — Caulis adultus lignescens tenuis sordide stramineus. Petioli soepe cirrhosi. Folia e ramulis lateralibus abbreviatis subfasciculata, pubescentia. Flores solitarii vel gemini, nutantes, pedunculo quam folia breviori, habitu *Atrag. alpinae* sed dimidio minores. Filamenta dense hirsuta.

301. *Cl. florida* Thunb. *Fl. jap. p. 240.* — Variat quam maxime circumscriptione foliolorum, quae basi rotundata vel subcordata, ovata, lanceolata, obtusa, acuta vel acuminata, simplicia vel trifida. Aequo

modo flores variant simplices vel vario modo pleni; numerus sepalorum in floribus simplicibus variat inter 5 et 8. Carpella plurima, sericeo-hirta, caudae longissimae sesquipollicares plumosae. — An *Cl. patens* De Caisne *Bullet. de l'Acad. de Bruxelles* 1836. n. 5. hujus varietas?

302. *Cl. stans* S. et Z. — *Cl. fruticosa* erecta dioica; ramis novellis angulatis, foliis oppositis longe petiolatis ternatis, foliolis lateralibus subsessilibus, terminali longe pedicellato, omnibus e basi rotundata vel late cuneata obovatis repente acuminatis grosse et inaequaliter inciso-serratis, subtrilobis, molliter pubescentibus, floribus terminalibus dichotome racemoso-paniculatis, rachi sepalisque linearibus albido-tomentosis, floribus masculis 12—15-andris, pistillorum rudimento minimo.

Rami adultiores stricte erecti, cortice papyraceo solubili, novelli uti foliola molliter pubescentes; petioli subsemipedales; folia ternata, foliola pro ratione congenerum maxima, $2\frac{1}{2}$ —3'' longa et lata, lateralia subsessilia basi subinaequalia, terminalia in pedicello $1\frac{1}{2}$ —2-pollicari, magnitudine inter se subaequalia, grosse et inaequaliter inciso-serrata, soepius subtriloba lobis et serraturis breviter acuminatis; flores terminales remote et dichotome racemoso-paniculati, extus albido-tomentosi, in specc. nostris nondum aperti.

303. Species nondum determinata.

170. *Thalictrum* L.

304. *Th. rubellum* S. et Z. — *Th.* foliis tripinnatisectis, segmentis e basi rotundata late ovatis inciso-dentatis lobis acutis, stipellis binis rotundatis ad ramificationum basin, panicula corymbosa multiflora, filamentis apice dilatatis anthera latioribus, carpellis 8—10 stipitatis triquetris, stigmatibus sessilibus.

Proximum *Th. aquilegifolio*, sed tota planta glaucescenti-rubens; lobi foliorum acuti, segmenta superiorum anguste lanceolata utrinque attenuata.

305. *Th. acteaefolium* S. et Z. — Cl. stipellis nullis, foliis triternatis, foliolis pedicellatis e basi rotundata vel cordata ovato-suborbicularibus, grosse inciso-dentatis dentibus latis obtusis vel acutiusculis mucronatis, subtus glaucescentibus nervosis, panicula divaricata subcorymbosa nuda, floribus hermaphroditis longe pedunculatis, filamentis filiformibus, antheris muticis, carpellis binis ternisve sessilibus sulcatis stylo recto apice uncinato aristatis.

Planta gracilis; foliola pro ratione magna, subtus glaucescentia et nervosa; rami paniculae corymbosae divaricato-patulae tenues nudi.

306. *Th. hypoleucum* S. et Z. — Th. stipellis nullis, foliis inferioribus bi- vel triternatis, foliolis subsessilibus ellipticis basi attenuatis obtusis mucronatis vel rarius dentato-trilobis, subtus albo-glaucescentibus, glabris, panicula pyramidata patula subfoliosa, staminibus 15—20, antheris mucronatis, carpellis sessilibus, plerumque 5 sulcatis, stigmate sessili crasso coronatis.

Folia iis *Bönninghauseniae* haud dissimilia, subtus rore albido obducta. Rami paniculae tenues, patentes subfoliosi, flores e minoribus.

307. *Th. affine* Ledeb. *Flor. ross. I. p. 10.*

308. 309. Species nondum determinatae. Ex his *Th. flavum* Thunb.

171. *Anemone* DC.

310. *A. cernua* Thbg. *Fl. jap. p. 238.* — Sieb. et Zucc. *Flor. jap. I. pag. 14. tab. 4.*

311. *A. japonica* S. et Z. *Flor. jap. I. pag. 15. tab. 5.* — *Atragene japonica* Thunb. *Fl. jap. p. 239.* — *Clematis? polypetala* De Cand. *Prodr. I. p. 10.*

312. *A. umbrosa* Ledeb.

313. *A. altaica* Fisch.

Planta japonica differt foliorum dentibus obtusis.

314. *A. baikalensis* Turcz.

Recedit involucris foliis magis incis, lobis angustioribus, linearibus. Flores et in spec. sibiricis magnitudine variant.

315. *A. narcissiflora* L.

316. *A. dichotoma* L.

317. *A. Hepatica* Gort.

172. *Adonis* L.

318. *A. sibirica* Patrin. — *A. apennina* β . *sibirica* Aut.

173. *Ranunculus* L.

319. *R. japonicus* Thbg. Act. Linn. II. p. 337. — *R. asiaticus* Thbg. Flor. jap. p. 241.

Nulla cum *R. asiatico* affinitas. Radix fibrosa. Carpella compressa glabra brevissime mucronulata.

320. *R. ternatus* Thbg. Fl. jap. p. 241.

Flores flavi. Carpellorum rostrum uncinatum. Cum *R. aconitifolio* nulla affinitas.

321. *R. auricomus* Thbg. Fl. jap. p. ?

Specimina nostra manca, sed vix species Linneana.

322. *R. sceleratus* L.

A planta europaea nullo modo diversus, nam carpella in spec. nostris japonicis non in spicam oblongam sed in capitulum disposita eodem modo in planta germanica variant.

323. 324. Species nondum determinatae.

174. *Caltha* L.

325. *C. palustris* L.

Var. floribus minoribus.

175. *Trollius* L.

326. Species ob specimen mancum nondum definita.

176. *Coptis* Salisb.

327. *C. trifolia* Salisb.

328. *C. brachypetala* S. et Z. — *C.* foliis biternatim sectis, segmentis pinnatifidis, lobis pinnatifidis vel inciso-serratis, inferioribus saepius pedicellatis, serraturis acutissimis, scapo tri — quadrifloro, floribus longe pedunculatis, sepalis linearibus acutis demum reflexis quam stamina vix dimidio longioribus, petalis unguiculatis breviter cucullatis ellipticis acutis subcanaliculatis exappendiculatis, antheris oblongis vel ellipticis utrinque obtusis.

Habitus omnino ut in *C. asplenifolia* DC., sed segmenta foliorum profundius incisa lobis plerumque angustioribus et minoribus. Scapus 3—4-florus floribus longe pedicellatis erectis vel patentibus. Calycis foliola linearia acuta patentia vel reflexa, staminibus vix dimidio longiora; petala unguiculata, lamina breviter cucullata subcarnosa elliptica mucronata parum canaliculata exappendiculata; staminibus breviora vel ea subaequantia; antherae oblongae vel ellipticae obtusae. In *C. asplenifolia* contra, sepala sunt angustissime linearia stamina plus quam triplo superantia, petala unguiculata in appendicem elongatam filiformem reflexam extensa indeque staminibus plus quam duplo longiora, antherae suborbiculares, emarginato-didymae.

De Candolle zieht *Thalictrum japonicum* Thbg. Act. Linn. II. p. 337. (*Didynamista Salviae similis* Flor. jap. p. 364. nach Thunberg's eigener Angabe) auf Smith's Autorität zu *C. asplenifolia*. Es gehört aber unzweifelhaft zu obenstehender Art.

329. *C. anemonaefolia* S. et Z. — *C.* foliis ternati-sectis, segmentis pedicellatis circumscriptione ovatis vel oblongis pinnatifidis, lobis basi confluentibus vel subdecurrentibus oblongis inaequaliter inciso-serratis, serraturis argute-mucronatis, scapo tri — quadrifloro, floribus breviter pedunculatis, sepalis lineari-lanceolatis acutis demum reflexis quam stamina dimidio longioribus, petalis unguiculatis lamina breviter cucullata lanceolata acutiuscula canaliculata crassa, quam stamina brevioribus, antheris ellipticis obtusis.

Differt a praecedente foliis simpliciter ternati-sectis, segmentis

multo majoribus minus incis, floribus breviter pedunculatis, petalis angustioribus profunde canaliculatis et fere complicatis. Variat foliorum lobis angustioribus vel latioribus basi vel ad rachin usque distinctis et decurrentibus vel latioribus jam $\frac{1}{3}$ a rachi confluentibus.

330. Species nondum determinata.

177. *Isopyrum* Linn.

331. *Is. japonicum* S. et Z. — I. caule herbaceo gracili erecto ramoso folioso, foliis radicalibus petiolatis subbiternatis, segmentis primariis pedicellatis e basi cuneata obovatis profunde tripartitis, lobis cuneato-oblongis vel obovatis inciso-dentatis dentibus obtusis, foliis caulinis sessilibus ceterum conformibus, floribus longe pedunculatis, petalis quam sepala lanceolata dimidio brevioribus cucullatis, labio majore rotundato, brevissime calcaratis, staminibus 12—15, carpellis quatuor erecto-conniventibus, seminibus pluribus biseriatis oblongis granulatis.

Ipsorum adoxoides DC. *Prodr.* I. p. 48. (*Isop. capnoides* Fisch.) gehört vermuthlich zu unserer Pflanze, ist aber so unvollständig beschrieben, dass wir dennoch glaubten, einen andern Namen wählen zu müssen.

178. *Anemonopsis* Sieb. et Zucc. *Tab.* I. A.

Calyx polyphyllus, foliolis sessilibus exterioribus tribus subfoliaceis, reliquis petaloideis ovatis obtusis; *petala* duodecim, late sessilia, basi foveola nectarifera incrassata notata sepalis breviora. *Stamina* hypogyna, indefinita, numerosa (ultra 50), libera; *filamenta* linearia, compresso-plana, uninervia; *antherae* continuae, lineari-oblongae, antice quadriloculares, mucronatae. *Ovaria* in spec. nostris 3—4, sessilia, inter se libera erecta unilocularia, pluri- (8—10) ovulata ovulis biseriatis. *Styli* terminales subulati glabri, hinc sulco a *stigmatibus* truncato decurrente notati, ovario longiores. *Fructus* capsularis.

332. *An. macrophylla* S. et Z. — An. foliis alternis radicalibus et caulinis tri- quadri-ternatosectis, segmentis primariis et secundariis pedicellatis, tertiariis (soepius sessilibus) oblongis acuminatis grosse et inaequaliter inciso-serratis serraturis mucronatis, utrinque glabris; petiolo communi basi vaginante, caule tereti gracili sursum subnudo plurifloro, floribus subracemosis distantibus pedunculatis, pedunculo bractea trifida vel simplici suffulto.

Folia radicalia maxima plus quam bipedalia, longe petiolata, tri- vel in segmentis terminalibus quadri-ternata; segmenta oblonga acuminata, 4" longa, $1\frac{1}{2}$ —2" lata, membranacea, glabra; folia caulina circiter pedalia triternata, segmentis pollicaribus vel sesquipollicaribus, petiolo communi basi vaginante. Caulis gracilis, sursum denudatus subaphyllus. Flores inferiores ex axillis foliorum solitarii longissime pedunculati; superiores in apice caulis subracemosi, distantes, ante anthesin nutantes, pedunculati, pedunculo bractea sessili tripartita vel simplici lineari suffulto, bracteolis 2—3 alternis linearibus munito. Calyx patens, diametro ultra pollicem metiens, in specc. nostris enneaphyllus, foliolis tribus extimis coriaceis subfoliaceis latioribus. Corolla dodecapetala; petala basi late sessilia et foveola nectarifera incrassata munita, spathulata, rotundata, radiato-quinquenervia; quam calyx dimidio fere breviora. Stamina petalis breviora numerosissima. Ovaria glabra, stylis stamina superantibus.

Diese Gattung, welche uns nur in wenigen von einheimischen Botanikern ohne Zweifel im Norden von Japan gesammelten Exemplaren vorliegt, hat in den Blättern grosse Aehnlichkeit mit *Actaea* und *Cimicifuga*, in der Blüthe dagegen für den ersten Anblick mit einer gefüllten Anemone, ohne dass jedoch eine theilweise Füllung statt gefunden zu haben scheint. Der Bau der Fruchtknoten weist ihr ihre Stellung unter den Helleboreen an, von welchen sie aber wieder durch die grossen flachen durchaus nicht tutenförmigen und nur an der Basis mit einer fleischigen Honiggrube versehenen Blumenblätter abweicht. Am nächsten dürfte sie gegen-

wärtig dem Blüthenbau nach zu *Aquilegia* gestellt werden, so sehr übrigens auch der Habitus widerspricht.

179. *Aquilegia* Tournef.

333. *A. Bürgeriana* S. et Z. — *A. foliis radicalibus biternatis, segmentis pedicellatis e basi rotundata obovatis rotundatis inciso-dentatis dentibus obtusis glabris subtus parum glaucescentibus, summis caulinis simpliciter ternatis sessilibus integris linearibus, calcaribus rectis petala truncata aequantibus, sepalis lanceolatis acutis petalis longioribus, staminibus inclusis, ovariis hirtis.*

Proxima *A. canadensi* recedit foliis radicalibus multo majoribus, segmentis pedicellatis, petalis quam sepala brevioribus, genitalibus inclusis. Calcara soepius apice parum curvata. Flores rubri, petala pallidiora.

334. *A. flabellata* S. et Z.

*A. foliis radicalibus ternatis, foliolis longe pedicellatis iterum ternatis vel quaternatis circumscriptione orbiculari-flabellatis, segmentis brevibus sessilibus e basi cuneata obovatis inaequaliter inciso-dentatis dentibus rotundatis subtus intense glaucis, foliis summis caulinis sessilibus ternatis, sepalis unguiculatis ovato-ellipticis obtusis quam petala rotundata breviter cucullata majoribus, calcaribus in annulum involutis, carpellis elongatis (ultra pollicaribus) stricte erectis arcte sibi adpressis. — *A. vulgaris* Thunb. *Flor. japonic.* p. 132.*

Tota planta glaucescens. Folia pollicaria, orbiculari-flabellata, subtus intense glauca. Flores magni, sepala coerulea, petala apice flavescentia, carpella oblongata, stricte erecta vel apice tantum parum recurva, ultra pollicem longa.

180. *Aconitum* Tournef.

335. *A. chinense* Sieb. — *A. japonicum* Hortul. non Thunberg. — *A. Napellus* Thbg. *Fl. jap.* p. 231.

336. *A. japonicum* Thunb. *Fl. jap.* p. 231.

A. *Lycotono* affine sed diversum. Variat foliorum lobis obtusis vel acutis. Flores sulphurei.

181. *Cimicifuga* DC.

Species nondum determinata.

182. *Trautvetteria* Fisch. et Mey.

337. *Tr. japonica* S. et Z.

Specimen mancum, sed folia quam in *Tr. palmata* profundius incisa, lobis latioribus et brevioribus inaequaliter inciso-serratis, serraturis argutis.

183. *Pityrosperma* S. et Z. in *Act. Mathem. Physic. Monac. III.* p. 731. tab. 3.

338. *P. acerinum* S. et Z. l. c.

339. *P. obtusilobum* S. et Z. l. c.

340. *P. biternatum* S. et Z. l. c.

184. *Paeonia* L.

341. *P. Moutan* Sims.

342. *P. albiflora* Pall.

Variat carpellis glabris et sericeo-hirtis.

185. *Glaucidium* S. et Z. Tab. I. B.

Calyx caducus? *Corolla* hypogyna tetrapetala regularis; *petala* obovata rotundata vel acuta. *Stamina* hypogyna, numerosa, multiseriata, libera; *antherae* erectae, ellipticae, loculis adnatis lateralibus, longitudinaliter quadrivalvibus. *Ovarium* superum, sessile, cylindricum, uniloculare, ovulis plurimis in placenta unica parietali multiseriatis horizontalibus. *Stigma* crassum recurvato-adnatum hinc subdecurrens sulco longitudinali exaratum, papillosum. Capsula?

343. *Gl. palmatum* S. et Z. — *Gl.* caule herbaceo unifloro triphylo, foliis alternis, inferioribus duobus petiolatis, summo infra florem sessili, omnibus circumscriptione orbicularibus e basi profunde

cordata palmato-quinquelobis quinquenerviis, lobis obovato-oblongis bi- vel trifidis segmentis acuminatis aequae ac cordatura argute serratis serraturis mucronatis, utrinque tenuiter pubescentibus, flore terminali, petalis ovatis acutis vel obtusis teneris glabris horizontaliter patentibus.

Caulis herbaceus simplicissimus erectus circiter pedalis, basi squamis fuscis membranaceis e collo rhizomatis provenientihus cinctus. Folia 3, inferiora 2 petiolata, petiolo 1 — 2" longo, lamina 3—4" diametro metiente. Calycis in flore aperto vestigium nullum. Corolla ampla, tripollicaris, petalis tenuiter radiatim venosis venis anastomosantibus.

Die wenigen uns vorliegenden und von japanischen Botanikern auf Jesso gesammelten Exemplare sind leider unvollständig. Alle Blüthen sind geöffnet und an keiner eine Spur des abgefallenen Kelches zu sehen. Doch könnte nur die Ansicht der Knospe entscheiden, ob derselbe wirklich fehlt oder vielmehr ob der jetzt als Blumenkrone angesprochene Kreis nicht ein gefärbter Kelch ist und die Corolla fehlt. Der Fruchtknoten verhält sich ganz wie die Karpellen von *Paeonia*. Die fleischige, angewachsene, kammförmige Narbe ist auf dem Scheitel der ganzen Länge nach mit einer Furche durchzogen, welche an der Innenseite des Fruchtknotens herabläuft und die Anheftung der Placenten im Inneren des Faches bezeichnet. Die Gattung gehört demzufolge gewiss auch nicht zu den Papaveraceen, sondern reiht sich unter den Paeonieen an *Paeonia* selbst an.

62. (178. *Endl.*) MAGNOLIACEAE *De Cand.*

186. *Illicium* Linn.

344. *I. religiosum* S. et Z. *Flor. japon. I. p. 5. t. 1. — Ill. anisatum* Thunb. et Aut.

187. *Trochodendron* S. et Z.

345. *Tr. aralioides* S. et Z. *Flor. japon. I. p. 83. t. 39. 40.*

188. *Bürgeria* S. et Z. *Tab. II. A.*

Spatha calycina diphylla, decidua. *Calyx* triphyllus plerumque lanatus. *Corolla* 9 — 18-petala, *petalis* pluriseriatis patentibus lineari-oblongis. *Stamina* numerosa multiseriata, antheris linearibus mucronatis marginalibus. *Ovaria* numerosa, in tori columna imbricato-spicata, sessilia, inter se libera, unilocularia, plerumque biovulata. *Styli* subulati patentis, *stigmatibus* decurrente papilloso. *Capsulae* in axi carnosae cum hac et inter se confluentes, abortu magnae ovariorum partis irregulariter dispositae, corticatae, denique in angulo centrali ab axi pro recipiendis seminibus excavata solutae, plerumque dispermae. *Semina* ex angulo centrali capsulae pendula.

Diximus hoc genus in honorem Doctoris *Bürger*, Sieboldii in Japonia successoris, de flora hujus terrae optime meriti.

Differt a reliquis generibus capsulis corticatis ne apice quidem bivalvibus sed in angulo centrali toto ambitu ab axi carnosae secedentibus.

346. *B. stellata* S. et Z. — *B.* foliis obovato-oblongis basi attenuatis obtusis vel breviter cuspidatis, junioribus subtus pubescentibus, hysterantheis, deciduis, gemmis et alabastris lanatis, calycibus quam petala duplo brevioribus ellipticis obtusis hirsutis, petalis numerosis (9 — 18) lineari-spathulatis glabris, extimis nonnullis soepe abbreviatis.

Rami floriferi laterales soepe abbreviati divaricati, foliiferi steriles virgati. Pedunculi brevissimi, erecti, tomentosi. Sepala ovato-elliptica, obtusa, sericeo-hirta, 8—10''' longa. Petala alba, numerosa, late linearia, sursum parum dilatata indeque subspathulata obtusa, glabra, stellatim patentia, sesquipollicaria, 3—4''' lata, alba. Antherae appendiculatae. Ovaria circiter 50, glabra, viridia, stylis subulatis patentibus. Syncarpium cylindricum, pollicare vel sesquipollicare. Capsulae corticatae, cum axi carnosae primum confluentes, demum ab angulo centrali solutae, dispermae. Folia in specc. nostris

obovato-oblonga, 3 rarius 4" longa, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " lata, nunquam acuminata sed obtusa vel breviter cuspidata.

347. *B. obovata* S. et Z. — *B.* foliis deciduis obovatis repente cuspidatis glabris, gemmis pubescentibus, alabastris terminalibus solitariis.

Fructus ut in priore. Flores expansos non vidi. Planta e China in Japoniam introducta dicitur.

348. *B. salicifolia* S. et Z. — *B.* foliis deciduis oblongo-lanceolatis vel lanceolatis utrinque attenuatis acutis glabris subtus glaucescentibus, gemmis glabris, alabastris hirsutis.

Flores et fructus non visi sed toto habitu planta optime cum praecedentibus convenit.

189. *Magnolia* Linn.

349. *M. hypoleuca* S. et Z. — *M.* foliis biennibus petiolatis alternis vel ad innovationes subverticillatis, e basi rotundata obovato-ellipticis obtusis vel breviter cuspidatis superne glabris subtus dense albido-pruinosis tenuiter pilosis, gemmis albo-sericeis, petalis 6—9 crassis obovato-spathulatis subcuspidatis, antheris anticis obtusis, strobilo maturo elliptico, capsulis parallelopipedis truncatis coriaceis.

Folia pedalia obovato-elliptica petiolis sesquipollicaribus. Flores diametro 4—5" metientes, flavescenti-albi. Filamenta, antherae in dorso et ovaria purpurea. Carpella numerosissima ultra 100.

β . *concolor*. S. et Z. foliis subtus concoloribus vel pallidis tantum virentibus.

350. *M. Kobus* De Cand. — *M. glauca* var. *a.* Thunb. *Flor. jap.* p. 236.

Variat petalis numerosioribus. Filamenta basi incrassata, dilatata; antherae marginales appendiculatae appendice subcarnosa.

351. *M. parviflora* S. et Z. — *M.* foliis deciduis obovatis breviter cuspidatis superne glabris subtus pubescenti-hirtis, pedunculis longis gracilibus ebracteatis, calyce triphylo glabro foliolis

elipticis obtusis, petalis 6 — 9 late ellipticis obtusis, antheris anticis truncato-obtusis, stylis recurvis.

Rami juniores pubescentes. Folia petiolata, petiolis pollicaribus vel longioribus uti folii pagina inferior pubescenti-hirtis. Folia obovata breviter cuspidata annua, superne glabra. Gemmae hirtae. Flores sesqui—bipollicares, numero petalorum variantes, toti glabri. Pedunculi pollicares vel bipollicares, graciles, pubescentes. Ex fructu immaturo manco fortasse *Bürgeriae* species.

190. *Michelia* L.

352. Species nondum determinata.

So grosse Verdienste sich auch De Candolle, Blume, Wallich, Wight u. A. um die Kenntniss der asiatischen Magnoliaceen erworben haben, so sind doch sowohl Gattungen als Arten noch viel zu wenig gekannt. Die Schwierigkeit die meisten derselben zu trocknen und noch mehr die zur Charakteristik so wichtigen Früchte zu erhalten, die Spielarten, welche durch langwierige Kultur entstanden sind und die Seltenheit der meisten in unsern Gärten legen dem europäischen Botaniker bei Bearbeitung dieser Familie Hindernisse in den Weg, welche nur dereinst durch gründliches Studium dieser schönen Pflanzen in ihrer Heimath beseitiget werden können.

63. (177. Endl.) SCHIZANDRACEAE Blume.

191. *Kadsura* Juss.

353. *K. japonica* S. et Z. *Flor. japon. I. p. 40. tab. 17.* — *Uvaria japonica* Thun. *Fl. jap. p. 237.* — *Fute kadsura* s. *Sane Kadsura* Kämpfer *Amoen. p. 476. c. ic. et 785.*

192. *Sphaerostemma* Blume.

354. *Sph. japonica* S. et Z.

64. (174. *Endl.*) **LARDIZABALEAE** *De Caisne.*

193. *Akebia* *De Caisne.*

355. *A. quinata* *De Caisn.* — *S. et Z. Fl. jap. p. 143. t. 77.*

— *Rajania quinata* *Thbg. Fl. jap. 148.*

356. *A. lobata* *De Caisne.* — *S. et Z. l. c. p. 145. t. 78.*

357. *A. clematifolia* *S. et Z. l. c. p. 146.*

358. *A. quercifolia* *S. et Z. l. c. p. 146.*

194. *Stauntonia* *De Cand.*

359. *St. hexaphylla* *De Caisne. Sieb. et Zucc. l. c. p. 140.*

Rajania hexaphylla *Thbg. Fl. jap. p. 149.*

65. (173. *Endl.*) **MENISPERMACEAE** *DC.*

195. *Cocculus* *DC.*

360. *C. japonicus* *DC.* — *Menisp. japonicum* *Thunb. Fl. jap. p. 193.*

361. *C. Thunbergii* *DC.* — *Menisp. orbiculatum* *Thbg. l. c. p. 194.*

β. foliis e basi cordata hastato-trilobis lobis acuminatis. — *M. trilobum* *Thbg. Fl. jap. l. c.* — *Cocc. trilobus* *De Cand. Syst.*

Veget. I. p. 522. Prodr. I. p. 98.

66. (172. *Endl.*) **RIBESIACEAE.**

196. *Ribes* *L.*

362. *R. fasciculatum* *S. et Z.* — *R. inerme* foliis e basi cordata trilobis lobis ovatis inciso-dentatis dentibus ovatis mucronulatis, subtus aequae ac petioli pubescentibus eglandulosis, floribus fasciculatis quaternis quinisve breviter pedunculatis erectis, calycibus eglandulosis glabris, petalis orbicularibus quam calycis lacinae duplo brevioribus, stipulis glabris apice fimbriatis, fimbriis setaceis longe ciliatis.

Rami subflexuosi cortice albido glabro solubili tecti. Folia e basi cordata orbicularia tri- vel obsolete 5-loba, lobis obtusis grosse

serratis serraturis obtusis mucronatis, subtus praesertim ad venas pubescentia, in specc. nostris floriferis pollicem longa et lata; petioli basi cum stipulis connati 6—12'' longi, pubescentes; stipulae membranaceae, pubescentes apice fimbriato-lacinulatae fimbriis setaceis ciliatis. Flores 4—5 fasciculati breviter pedunculati erecti; pedunculi articulati glabri; calyx glaber eglandulosus limbi laciniis ovatis obtusis petala suborbicularia duplo superantibus.

Species duae nondum determinatae.

67. (171. *Endl.*) **SAXIFRAGEAE** *Vent.*

197. *Saxifraga* L.

363. *S. sarmentosa* L.

364. *S. cortusaefolia* S. et Z. — *S. subglabra*, foliis e basi cordata suborbicularibus 5—7-lobis ovatis obtusis grosse et inaequaliter dentatis, ciliatis, ceterum adultis glabris, novellis pilosis, petiolis scapisque basi rufescenti-hirtis, floribus in apice scapi in racemum basi compositum multiflorum dispositis, irregularibus, petalis unguiculatis, duobus quam reliqua tria ovato-spathulata pluries longioribus linearibus acuminatis adscendentibus.

Stolones in specc. nostris nulli. Folia radicalia, petiolata petiolis 6'' longis basi ut scapi hirtis pilis longis articulatis rufis; lamina reniformis, 1½—2'' longa et lata, 5—7-loba, lobis ovato-oblongis obtusis grosse et inaequaliter dentatis ciliatis. Scapi pedales et ultra, erecti; racemus bi — tripollicaris, multiflorus, basi compositus; pedicelli filiformes, longi, glanduloso-pilosi; petala longiora 5—6'' longa anguste linearia utrinque attenuata acuminata, breviora unguiculata spathulata calycis laciniis acutis longiora. Stamina subulata et ovarium glabra.

198. *Mitellopsis* Meisn.

365. *M. japonica* S. et Z. Cum tribus speciebus nondum determinatis.

199. *Hoteia* Morr. et De Caisne.

366. *H. japonica* Morr. et De Caisne. *Annal. des sciences nat.* 1834. c. tab. (excl. synonym. *Thunberg*).

367. *H. Thunbergii* S. et Z. — *H.* foliis tripinnati-sectis, foliolis e basi rotundata vel subcordata rarius attenuata ovato-lanceolatis acuminatis argute duplicato-serratis, foliolo terminali plerumque longe pedicellato, caule infra inflorescentiam longe aphylo, racemo composito, racemis secundariis cylindricis, rachi hirta. *Spiraea Aruncus* Thunb. *Flor. jap.* p. 211.

Herba perennis habitum *Sp. Arunci* multo magis referens quam *H. japonica* De Caisne et cum *Thunbergii* descriptione optime conveniens. Recedit a specie praecedente foliis multo majoribus inferioribus fere bipedalibus, foliolis longioribus et latioribus soepe 3" longis 1" latis teneris membranaceis nec firmis, basi plerumque rotundatis, serraturis secundariis in setam longam subulatam terminatis, folio summo 5—6" ab inflorescentiae basi distante. Florum alabastra tantum obvia, sed certe decandra distyla, stylis brevibus crassis.

Adnotatio. Reliquae generis species praeter *Astilben rivularem* Don nobis notae sunt *Spiraea indica* Reinwardt in litt. et altera a clar. Bar. de Hügel in India superiori prope Massuri lecta, quam *H. bipinnatam* dicimus.

200. *Stephanandra* S. et Z.

368. *St. flexuosa* S. et Z. in *Act. Acad. Monac. Math. Phys.* III. p. 740. tab. IV. 2.

201. *Hydrangea* L.

369. *H. Hortensia* DC.

370. *H. acuminata* S. et Z. *Fl. jap.* I. p. 110. tab. 56. 57.

371. *H. Azisai* Sieb. — S. et Z. l. c. I. p. 104. tab. 51.

372. *H. Belzonii* S. et Z. l. c. p. 109. tab. 55.

373. *H. bracteata* S. et Z. l. c. p. 176. tab. 92. — Vix ab *H. cordifolia* diversa.

374. *H. cordifolia* S. et Z. l. c. p. 113. tab. 59. 2.

375. *H. hirta* S. et Z. l. p. 117. tab. 62.

376. *H. involucrata* S. et Z. l. c. p. 118. tab. 63. 64.

377. *H. japonica* S. et Z. l. c. p. 106. tab. 53.

378. *H. Otaksa* S. et Z. l. c. p. 105. tab. 52.

379. *H. paniculata* S. et Z. l. c. p. 115. tab. 61.

380. *H. petiolaris* S. et Z. l. c. p. 108. tab. 54.

381. *H. stellata* S. et Z. l. c. p. 112. tab. 59. 1.

382. *H. Thunbergii* Sieb. — S. et Z. l. c. p. 111. tab. 58.

383. *H. virens* Sieb. — S. et Z. l. p. 114. tab. 60.

202. *Cardiandra* S. et Z.

384. *C. alternifolia* S. et Z. l. c. p. 121. tab. 65. 66.

203. *Schizophragma* S. et Z.

385. *Sch. hydrangeoides* S. et Z. l. c. p. 60. tab. 26.

204. *Platycrater* S. et Z.

386. *Pl. arguta* S. et Z. l. c. p. 64. tab. 27.

205. *Deutzia* Thunb.

387. *D. crenata* S. et Z. l. c. p. 19. tab. 6.

388. *D. scabra* S. et Z. l. c. p. 20. tab. 7.

389. *D. gracilis* S. et Z. l. c. p. 22. tab. 8.

68. (170. Endl.) CRASSULACEAE DC.

206. *Sedum* L.

390. *S. Sieboldi* Sweet.

Praeterea *Sedi* species 10—12 nondum determinatae et *Sempervivum*.

69. (169 *. *Endl.*) **HELWINGIACEAE** *De Caisne.*207. *Helwingia* Willd.391. *H. rusciflora* Willd. — *Sieb. et Zucc. Flör. jap. p. 164. tab. 86.*70. (168. *Endl.*) **HAMAMELIDEAE** *R. Br.*208. *Hamamelis* L.392. *H. japonica* *S. et Z.* — *H. foliis ovatis vel ovato-suborbicularibus breviter cuspidatis vel obtusis repando-crenatis basi inaequalibus costato-venosis, costis utrinque 7—8, calycibus capsulae imae basi tantum adnatis.*Differt ab *H. virginica* L. foliis densius costatis (costae in illius foliis utrinque tantum 3—4), floribus majoribus, petalis longioribus et capsulis a calyce fere liberis, in illa ultra dimidium calyci adnatis.209. *Corylopsis* *S. et Z.*393. *C. spicata* *S. et Z. Fl. jap. I. p. 47. tab. 19.*394. *C. pauciflora* *S. et Z. l. c. p. 48. tab. 20.*210. *Distylium* *S. et Z.*395. *D. racemosum* *S. et Z. l. c. p. 179. tab. 94.*71. (167. *Endl.*) **LORANTHACEAE** *Lindl.*211. *Viscum* *Tourn.*396. *V. japonicum* *Thunb. ex Steud.* — *V. Opuntia* *Thunb. Fl. jap. p. 64.*397. *V. Kämpferi* *DC.* — *V. album* *Thunb. l. c. p. 63.*212. *Loranthus* L.398. *L. Jodoniki* *Sieb.*72. (166. *Endl.*) **CORNEAE** *DC.*213. *Benthamia* *Lindl.*399. *B. japonica* *S. et Z. l. c. p. 38. tab. 16.*

214. *Cornus* Tournef.400. *C. officinalis* S. et Z. *Fl. jap.* I. p. 100. tab. 50.401. *C. sanguinea* Thbg. *Fl. jap.* p. 62.

A planta europaea differt foliis densius (utrinque 7—9-) costatis acuminatis nec breviter cuspidatis subtus glaucis, cymis majoribus ramis secundis pedicellis brevissimis.

402. *C. alba* Thbg. l. c. p. 63.

A planta sibirica recedit petiolis longioribus, foliolis multo densius (7—9-) costatis superne glabris, pedicellis longioribus filiformibus, petalis linearibus nec lanceolatis.

In utraque fructus expectandi.

C. japonica Thunb. certe non hujus generis, sed vix *Viburnum*.215. *Aucuba* Thunb.403. *A. japonica* Thbg. *Fl. jap.* p. 64.

Flores masculi in paniculam pyramidatam dispositi. Stigma in foemineis crassum oblique truncatum et subdecurrens basin versus sulco exaratum.

216. *Quadriala* S. et Z. Tab. II. B.

Flores dicici. *Calyx* ovario adnatus; *tubus* cylindricus octostriatus; limbi *lacinae* quatuor aequales vel inaequales, basi attenuatae et articulatae, lanceolatae acutae foliaceae reticulatim venosonervosae, demum in fructu persistentes et alarum in modum elongatae. *Corolla* supera, tetrapetala; *petala* cum calyce alternantia deltoidea brevia firma, primum patentia, demum in fructu persistentia inflexa. *Staminum* in flor. foem. rudimentum nullum. *Discus* ovarii verticem tegens carnosus breviter quadrilobus, lobis calycis foliolis oppositis. *Ovarium* uniloculare ovulo unico e vertice pendulo. *Stylus* primum brevissimus, stigmate carnosus oblique peltato umbonato, in fructu excrescens stigmate irregulariter quadrilobo lobis reflexis. *Bacca* infera, calyce, corolla et stylo persistentibus coronata, sicca, globosa, monosperma. *Semen* pendulum, subglobosum. *Testa* cum

no 401 + 402 = *C. glauca*

pericarpio connata. Albumen crassum aequabile, carnosum. Embryo orthotropus, rectus longitudine fere seminis, radicula brevi conica, cotyledonibus linearibus plane sibi incumbentibus.

Nomen generis a fructu quadrialato et simula dispositione quaternaria omnium floris partium.

404. *Qu. lanceolata* S. et Z. — *Qu.* foliis oppositis subsessilibus lanceolatis acuminato-falcatis integerrimis glabris.

Frutex vel arbor. Ramuli oppositi, tenues, novelli tetragoni. Gemmae decussatim perulatae. Folia opposita, exstipulata, subsessilia utrinque attenuata lanceolata, longe acuminata acumine falcato, integerrima utrinque glabra, penninervia tenera membranacea, $1\frac{1}{2}$ —2" longa, 6—8" lata. Flores masculi non observati. Foemineis post foecundationem tubus calycis cylindricus 3—4" longus, glaber, cum ovario connatus; lacinae lineari-lanceolatae utrinque attenuatae semipollicares $1\frac{1}{2}$ —2" latae, foliaceae, in fructu demum pollicares et longiores, 3" latae, nervoso-venosae, basi constrictae et articulatae, glabrae. Corolla tetrapetala petalis deltoideis acutis brevibus persistentibus. Discus carnosus primum concavus, obtuse quadrilobus. Stylus primum brevissimus, demum 1" longus stigmate irregulariter quadrilobo. Bacca sicca magnitudine pisi, globosa, obtuse octangularis. Embryonis radicula brevis appendice filiformi aucta, cotyledones elongatae, semiteretes, plane sibi incumbentes.

73. (165. Endl.) AMPELIDEAE Kunth.

217. *Cissus* L.

405. *C. Thunbergii* S. et Z. — *C.* tota glabra, foliis vel e basi subcordata late ovatis acutis grosse inciso-serratis serraturis deltoideis ovatis mucronatis ciliatis, vel trifoliolatis, foliolis e basi cuneata oblongis serrato-angulatis, lateralibus basi inaequalibus.

Rami debiles angulati. Folia difformia; aliis petioli 6—12" longi tenues, lamina basi truncata vel subcordata, late ovata acuta, grosse et inaequaliter-inciso serrata serraturis deltoideis acutis in

setam terminatis ciliatis, ceterum glabra, pollicem circiter longa et lata, Urticae folium referens; aliis petioli multo longiores et foliola tria sessilia lateralibus basi inaequalibus intermedio attenuato, omnibus oblongis acuminatis grosse angulato-serratis, 1—1½" longis.

406. *C. viticifolia* S. et Z. — C. tota glabra, caule tetragono, foliis ternatis, foliolis difformibus integris grosse serratis acuminatis vel pinnatifidis, basi auriculatis, laciniis lanceolatis integerrimis vel serratis, decurrentibus vel sessilibus, pedicellis inter lacinias alatis; lateralibus plerumque sessilibus intermedio semper pedicellato et in petiolo decurrente, racemis oppositifoliis cymosis, pedunculis rectis vel cirrhosis folio brevioribus.

Folia semper trifoliolata; foliola variant:

α. integra, lateralibus sessilia basi inaequilatera et soepe deorsum auricula foliacea aucta, ovato-oblonga vel lanceolata, acuta vel acuminata, grosse serrata; intermedium longe in pedicellum decurrens, lanceolato-rhombeum acuminatum, serratum vel sub-incisum.

β. pinnatifida, omnia pedicellata; lacinae inferiores oppositae sessiles petiolo inter juga alato, vel decurrentes, lanceolatae, acutae subserratae, superiores confluentes in laciniam terminalem subrhombéo-lanceolatam acuminatam serratam. An *Ampelopsis serianaefolia* Bunge Enum. pl. chin. p. 12. ?

218. *Ampelopsis* Michx.

407. *A. tricuspidata* S. et Z. — A. hermaphrodita, foliis e basi cordata circumscriptione suborbicularibus grosse aristato-serratis trinerviis et apicem versus breviter trilobis, lobis inter se aequalibus vel medio parum longiore, cuspidatis, glabris vel subtus ad venas parce pubescentibus, petiolis longissimis laminam duplo superantibus, cymis bifidis divisionibus racemoso-dichotomis divaricatis.

Petioli tri — quadripollicares, tenues; lamina folii 2—2½" longa et inter lobos lata, e basi cordata orbicularis grosse serrata, serra-

turis in setam terminatis, breviter triloba lobis sursum spectantibus late deltoideis argute cuspidatis serratis. Cymae divaricato-bifidae, divisionibus dichotome racemosis; flores breviter pedicellati; petala lineari-oblonga, libera, demum reflexa; discus basin ovarii cingens quinquecrenatus, stylus brevis stigmatibus capitato.

408. *A. heterophylla* S. et Z. — *A. hermaphrodita*, foliis e basi cordata vel suborbicularibus acutis grosse serratis aut sublobatis serraturis obtusis mucronatis, vel profunde tri — quinquelobis lobis integris ovatis vel eroso-subpinnatifidis acuminatis, sinibus acutis vel rotundatis, glabris vel subtus pubescentibus, cymis bifidis fastigiatis, petalis liberis, disco membranaceo truncato. — *Vitis heterophylla* Thunb. *Fl. jap.* p. 103.

Variant folia:

- α . integra, e basi cordata ovata, acuta, obtusa, serrata vel subtriloba. *Amp. humulifolia* Bunge Enum. pl. chin. p. 12. (!)
- β . profunde tri — quinqueloba, lobis vel integris basi constrictis ovato-rhombeis acuminatis serratis, vel eroso-pinnatifidis, sinibus rotundatis vel acutis.

Petoli pollicares vel sesquipollicares. Folia in ramulis vel inferiora vel superiora magis divisa; lamina $1\frac{1}{2}$ —3" longa et lata; lobi ad vel ultra dimidium incisi medio productioni. Cymae fastigiatæ, flores pedicellati; calyx brevissime quinqueidentatus vel truncatus; petala libera, oblonga; discus membranaceus truncatus.

219. *Vitis* Linn.

409. *V. vinifera* L.

Colitur.

410. *V. flexuosa* Thunb. *Act. Linn.* II. p. 332. — *V. indica* Thbg. *Fl. jap.* p. 103.

411. *V. japonica* S. et Z. Thunb. *Fl. jap.* p. 104. *Cissus japon.* De Cand. *Prodr.* I. p. 632. Hooker in Beechey *Botany* p. 175. — *V. glabra*, foliis pedato-quinquefoliolatis, foliolo intermedio majori et longius pedicellato, omnibus oblongis acutis grosse serratis

serraturis obtusis mucronatis, cymis trifidis fastigiatis, totis furfuraceo-lepidotis, floribus tetrameris, petalis calyptratis disco quadrilobo, lobis emarginatis.

Cissi habitus, sed petala calyptrata.

412. *V. Thunbergii* S. et Z. — *V. polygama*, foliis e basi cordata tri-vel quinquelobis superne pubescentibus glabrisve subtus fuscescenti-tomentosis, lobis vel indivisis oblongis acutiusculis vel eroso-panduraeformibus vel pinnatifidis, semper remote serratis, sinibus acutis vel rotundatis, paniculis divaricatis tomentosis multifloris, floribus tandem umbellatis, masculis minimis absque ovarii rudimento, disco quinquangulati.

Flores congenerum fortasse minimi. Baccae globosae, nigrae, magnitudine pisi minoris.

Vitis ficifolia Bunge l. c. p. 12. secundum spec. ab amicissimo auctore communicata forma hujus speciei videtur foliis minus incisis.

Adsunt praeterea Ampelidearum species sex nondum determinatae.

73. (164. *Endl.*) ARALIACEAE *Juss.*

249. *Panax* L. —

413. *P. innovans* S. et Z. — *P. fruticosum* inerme, ramis stricte erectis ad innovationes incrassatas foliatis ceterum nudis, foliis annuis 3—5 verticillatis rarius binatis vel simplicibus, foliolis ovato-rhombeis acuminatis serrulatis serraturis setaceo-mucronatis, umbellis in pedunculo terminali elongato nudo solitariis vel 3—4 racemosis hemisphaericis 5—15-floris, floribus tetrameris calyce truncato.

Frutex; rami stricte erecti, crassitie pennae anserinae, teretes, inter innovationes 4—8" a se invicem distantes nudi. Folia annua ex innovationibus, in verticillum terminalem disposita, 3—5, petiolata petiolis teretibus superne canaliculatis 2" longis, plerumque tri-rarius bifoliolata vel simplicia; foliola ovato-rhombea acuminata, adpresse serrulata, glabra, tenera, membranacea, $1\frac{1}{2}$ —2" longa, $1-1\frac{1}{2}$ " lata.

Pedunculi terminales stricte erecti nudi, 3—6" longi, glabri; umbellae simplices solitariae vel 3—4 in racemum dispositae, convexae, 1—15-florae; flores parvi, glabri, tetrameri, styli duo.

Die Blätter kommen an Stamm und Seitenzweigen oft 12—18 Jahre nach einander alljährlich nur in einem Wirtel dicht über dem vorjährigen zum Vorschein, so dass jeder Jahrestrieb kaum $\frac{1}{2}$ Linie lang wird. Dann entwickelt sich in einem günstigen Jahrgang einmal ein rascher meistens völlig schuppen- und blattloser Trieb aus der Spitze des vorjährigen Wirtels zu einer Länge von 4—8", der erst an seinem Ende einen einfachen Blattwirtel trägt, dessen Internodium gegen das Vorjahr der Trieb selbst bildet. Darauf folgt wieder mehrere Jahre lang die frühere Verkürzung des Wachstums, so dass die Verlängerung des Stammes im Ganzen sehr langsam und nur in vieljährigen Intervallen rasch erfolgt und ein Zweig kaum von der Dicke einer Schreibfeder und von $1\frac{1}{2}$ Fuss Länge 20 Jahre alt seyn kann. Die Verkürzungsstellen sind immer beträchtlich verdickt und dicht mit den Stielnarben der abgefallenen Blattwirtel besetzt.

414. *P. ricinifolium* S. et Z. — *P. fruticosum*, ramis inter innovationes nodosas aculeatis, foliis alternis longe petiolatis e basi subcordata vel truncata orbicularibus profunde palmato-quinquefidis, lobis oblongis acuminatis argute serratis glabris coriaceis, pedunculis terminalibus numerosis umbellas 5—9 globosas multifloras divaricatas patentibus ferentibus, floribus polygamis, stylo unico.

Rami crassitie digiti minoris innovationibus numerosis, nodosi, aculeati aculeis rectis conicis. Folia annua, alterna; petioli 4—6" longi, teretes; lamina basi subcordata, rotundata vel truncata, orbicularis, ad medium circiter usque palmato-quinqueloba lobis oblongis acuminatis lateralibus parum brevioribus, utrinque glabra subtus dense reticulato-venosa, coriacea, 4—6" longa et lata. Pedunculi terminales fasciculatim congesti, 10—20; singuli 3—6" longi umbellas ferunt 5—9, quarum inferiores alternae, superiores 3—7 umbellatim approximatae, terminali plerumque abortiva; umbellae ipsae in pe-

pedunculi ramis 1—1½" longis divaricatis globosae multiflorae; calyx brevissime 5-dentatus; styli in unum connati stigmate truncato.

415. *P. divaricatum* S. et Z. — *P. fruticosum* aculeatum aculeis plerumque geminis substipularibus basi compressis recurvis, foliis quinato-digitatis, foliolis subsessilibus e basi cuneata obovato-oblongis acutis duplicato-serratis pubescentibus, umbellis nudis vel infimis axillaribus, 5—7 vel pluribus in racemum simplicem vel compositum dispositis terminali multo praecociori, omnibus globosis multifloris in pedunculis longis divaricatis lanatis, stylis in unum connatis stigmatibus duobus.

Rami glabri, cinerei, aculeis armati plerumque geminis et infrafoliaceis basi dilatatis sursum subulatis et acutis deorsum spectantibus; petioli 1½" longi, pilosi; foliola breviter pedicellata, medium 2½" longum, 12—15" latum, lateralia parum minora. Pedunculi sesquibipollicares, aequae ac rachis fuscescenti-lanati, rectangule divaricati; umbellae globosae, 40—60-florae, terminali jam fructifera dum laterales florent; calycis limbus lanatus, tubus glaber, petala glabra; stylus unicus, stigmatibus duobus brevibus patentibus.

221. *Aralia* Linn.

416. *Ar. japonica* Thunb. — *A. fruticosa*, inermis ramis crassis, petiolis basi late vaginantibus, foliis e basi cordata suborbicularibus palmato-septemlobis vel rarius quinquelobis, 7—9-nerviis, lobis oblongis acutis sursum serratis sinibus rotundatis, coriaceis firmis glabris vel novellis tomentosis, panicula terminali composita, umbellis pedunculatis globosis multifloris, ovariis turbinatis, stylis 5 discretis stigmatibus subemarginatis. — *A. japonica* Thbg. *Fl. jap.* p. 128.

Rami crassitie digiti. Folia approximata; petioli basi late vaginantes teretes, 3—8" longi, crassi; lamina e basi leviter cordata suborbicularis, plerumque ad medium usque septemloba, novemnervia, lobis oblongis acutis basi integerrimis sursum serratis penninerviis, utrinque glabra, novella tomentosa, coriacea, 6—8" longa, inter

lobos laterales 7 — 10'' lata. Panicula terminalis erecta, glabra, sesqui — bipedalis, ramosa, primum bracteis deciduis obtecta demum nuda, glabra; umbellae in pedunculis 1—1½'' longis patentibus globosae, 40 — 50-florae, pedicellis pubescentibus, terminales praeciores; calycis limbus truncatus, petala oblonga reflexa, discus carnosus.

Thunberg nennt die Frucht eine Beere; die an unsern Exemplaren befindlichen sind noch nicht reif, scheinen aber Beeren zu werden. Dann müsste die Pflanze zu *Hedera* gezogen werden, wofür auch der Habitus spricht.

417. *Ar. pentaphylla* Thunb. — *A. fruticosa*, aculeis solitariis infrafoliaceis rectis, foliis longe petiolatis quinatis, foliolis e basi longe cuneata obovato-oblongis acutis sursum serratis glabris, umbellis terminalibus simplicibus longe pedunculatis hemisphaericis 20—30-floris, stylis 5—6 basi coalitis, drupa in vertice calyce et disco coronata profunde quinesulcata, sicca, pyrenis osseis monospermis. — *A. pentaphylla* Thunb. *Fl. jap.* p. 128. — *Panax. spinosa* Linn. fide Lamarkii.

Rami cinereo-albidi; aculei solitarii infrafoliacei recti; folia e gemmis hornotinis plura subfasciculata longe petiolata, petiolis tandem 3'' longis laminam superantibus; foliola subsessilia e basi longe cuneata integerrima obovato-oblonga sursum serrata serraturis mucronatis, glabra, membranacea subtus glaucescentia (?), 1—1½'' longa, 4—6''' lata, lateralia minora. Umbellae solitariae subterminales longe pedunculatae pedunculo stricto nudo petiolos superante, 20—30-florae, glabrae. Drupae acute 5—6-sulcatae, siccae, magnitudine grani Piperis. Calyx et discus in vertice drupae infra stylos persistentes; pyrena 5—6 compressa, ossea, monosperma. An distincti generis?

418. *A. edulis* Sieb. et Zuccar. *Fl. jap.* I. p. 57. tab. 25. — *A. cordata* Thunb. *Flor. jap.* 127. — *A. nudicaulis* Blume *Bijdr.* p. 870?

419. *A. canescens* S. et Z. — *A. frutescens*, inermis? foliis 5—6-jugis, jugis distantibus, foliolis lateralibus brevissime, terminali subtrilobo longe pedicellatis, e basi rotundata ovatis acuminatis serrulatis superne glabris subtus canescenti-glaucis ad venas pilosis, panicula terminali elongata, ramis divaricatis, umbellis 9—12 in quovis ramo racemosis, pedicellatis involucratis hemisphaericis uti rachis tomentoso-hirtis, floribus glabris, calyce quinquedentato, stylis 5 patentibus.

Folia pinnata, sesqui — bipedalia, 3—6-juga; juga $1\frac{1}{2}$ —2'' a se invicem distantia; foliola lateralia breviter, terminale soepe subtrilobum longe pedicellata, e basi rotundata ovata acuminata serrulata serraturis uncinato-mucronatis, utrinque ad venas pilosa subtus canescenti-glauca, 3— $3\frac{1}{2}$ longa, $1\frac{1}{2}$ —2'' lata. Paniculae terminales, bipedales tomentoso-hirtae; rami rectangule divaricati, racemosi, umbellis 9—11 in quovis ramo, terminali praecociori, pedicellatis squamis lanceolatis involucratis, semiorbicularibus multifloris, floribus glabris parvis, fructibus globosis quinesulcatis.

222. *Hedera* Linn.

420. *H. Helix* L. *Thunb. l. c. p.* 102.

Folia in ramis floriferis longius petiolata quam in specc. europaeis, elliptica utrinque attenuata cuspidata; umbellae terminales solitariae vel 2—3 subracemosae, globosae, multiflorae, furfuraceo-tomentosae.

421. *H. rhombea* S. et Z.

An prioris varietas?

75. (16 . *Endl.*) UMBELLIFERAE *Juss.*

Inter Umbelliferas hucusque examinatas occurrunt genera: 223. *Hydrocotyle* Tourn., 224. *Sanicula* Tourn., 225. *Apium* Hoffm., 226. *Cryptotaenia* DC., 227. *Sium* L., 228. *Bupleurum* Tourn., 229. *Foeniculum* Adans., 230. *Ligusticum* L.,

231. *Angelica* Hoffm., 232. *Peucedanum* L., 233. *Archemora* DC., 234. *Heracleum* L., 235. *Daucus* Tourn., 236. *Torilis* Adans., 237. *Osmorhiza* Rafin.

E speciebus enumerari possunt:

422. *Hydrocotyle interrupta* Mühlbg. — *H. vulgaris* Thunb. *Fl. jap.* p. 116. et *H. verticillata* Ejusd. *Dissert. Acad.* 2. p. 415, tab. 3.

423. *Sanicula elata* Hamilt. — *S. canadensis* Thbg. *Fl. jap.* p. 116. An hic et *S. chinensis* Bunge *Enum. pl. chin.* p. 32.

424. *Cryptotaenia canadensis* DC. — *Sison canadensis* Thbg. *l. c.* p. 118.

425. *Apium graveolens* L.

426. *Foeniculum vulgare* Gärtn.

427. *Ligusticum scoticum* L.

428. *Lig. acutilobum* S. et Z. — L. glabrum, foliis biternatis. segmentis pedicellatis basi cuneatis profunde tripartitis, laciniis lanceolatis argute inciso-serratis, vaginis longe attenuatis, involucri nullo, involucelli foliolis setaceis, floribus polygamis.

429. *Peucedanum japonicum* Thbg. *l. c.* p. 117. — Fructus in specc. nostris immaturi. An hujus generis?

330. *Torilis japonica* DC. *Hooker ap. Beechey* p. 189. — *Chaeroph. scabrum* Thunb. *l. c.* p. 119.

431. *Osmorhiza japonica* S. et Z. — O. hirta, foliolorum lobis inciso-serratis, serraturis mucronatis, pedicellis fructum superantibus, stylis erectis subulatis latitudinem fructus aequantibus. — *Chaeroph. aristatum* Thunb. *l. c.* p. 119.

O. longistyli affinis, sed foliorum lobis obtusis, in illa acutis et pedicellis fructu longioribus distincta.

Explicatio Tabularum.

Tab. I. A. Fig. 1. Flos *Anemonops. macrophyllae* a facie et magn. nat. — Fig. 2. Idem a dorso. — Fig. 3. Foliolum calycis, auctum. — Fig. 4. Petalum m. n. — Fig. 5. Idem auctum. — Fig. 6. Stamen a facie, a. — Fig. 7. Anthera loculis effoetis, a. — Fig. 8. Pistillum, a. — Fig. 9. Idem dissectum ovula monstrans, m. a.

Tab. 1. B. Fig. 1. Flos *Glaucid. palmati* a facie, m. n. — Fig. 2. Idem a dorso. — Fig. 3. Petalum, m. n. — Fig. 4. Stamen a facie et a dorso, a. — Fig. 5. Pistillum, m. a. — Fig. 6. Idem, transversim dissectum, ovula monstrans, a.

Tab. 2. A. Fig. 1. Flos *Bürgeriae stellatae*, a facie et m. nat. — Fig. 2. Idem a dorso. — Fig. 3. Stamen a facie et a dorso, a. — Fig. 4. Columna pistillaris, m. n. — Fig. 5. Pistillum singulum, m. a. — Fig. 6. Syncarpium, capsulas in axi carnosio ex parte jam apertas monstrans, m. n. — Fig. 7. Syncarpium pars, a.

Tab. 2. B. Fig. 1. *Quadrialae lanceolatae* flos foem. magn. nat. — Fig. 2. Idem auctus. — Fig. 3. Idem a vertice, m. n. — Fig. 4. Ovarium longitudinaliter dissectum, a. — Fig. 5. Fructus maturus m. n. — Fig. 6. Idem auctus, resectis alis majoribus. — Fig. 7. Alae pars, a. — Fig. 8. Fructus longitudinaliter dissectus, albumen et embryonem monstrans, a. — Fig. 9. Embryo, m. a.

FLORAE JAPONICAE

FAMILIAE NATURALES,

ADJECTIS GENERUM ET SPECIERUM EXEMPLIS
SELECTIS.

SÉCTIO ALTERA.

PLANTAE DICOTYLEDONEAE (GAMOPETALAE, MONOCHLA-
MYDEAE) ET MONOCOTYLEDONEAE.

AUCTORIBUS

Dr. Ph. Fr. de Siebold et Dr. J. G. Zuccarini.

From abhandl. K. Akad. München,
math - phys. Cl. 4³: 125 - 240. pl. 3. 1846

FLORAE JAPONICAE

FAMILIAE NATURALES.

SECTIO ALTERA.

PLANTAE DICOTYLEDONEAE (GAMOPETALAE, MONOCHLAMYDEAE) ET MONOCOTYLEDONEAE.

76. (126 Endl.) ERICACEAE R. Br.

238. *Andromeda* L.

432. *Andr. japonica* Thunb. — A foliis obovato-oblongis vel lanceolatis utrinque attenuatis acutis sursum serrulatis coriaceis glabris, racemis terminalibus solitariis simplicibus vel paniculatis multifloris secundis, corollis apice constrictis laciniis brevibus rotundatis, filamentis linearibus ciliatis muticis, antheris dorso biaristatis, ovario squamulis 10 cincto, seminibus linearibus trigonis pendulis. — *Andr. japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 181. *tab.* 22. et *Auct. Gaertn. Carpol. II.* p. 481. *tab.* 187. 2. — *Pieris?* *japonica* De Cand. *Prodr. VII.* p. 599.

A Pieride recedit antherarum loculis nec filamentis cristatis.

Rami innovando-subverticillati, angulati. Folia in apice ramorum fasciculato-approximata, breviter petiolata, coriacea, glabra 1—2" longa, 8—12" lata. Racemi terminales solitarii simplices vel compositi, laxi, saepe nutantes et subsecundi; bracteae lineares pedicellos 2" longos aequantes, bracteolae infra florem 2 lineares. Calycis lobi lanceolati acuti coriacei; corolla ovato-elliptica apice

constricta lobis brevibus rotundatis. Stamina corolla dimidio breviora; filamenta linearia, ciliato-barbata; antherae dorso affixae, ellipticae, apice bifidae, dorso biaristatae, aristis subulatis scabris squarrosis. Squamulae decem, carnosae parvae, ovarii basin cingentes. Stylus corollae longitudine, stigmate truncato. Capsula depressoglobosa, calycem superans; placentae subglobosae ex apice columnae; semina pendula, lineari-trigona subarcuata, utrinque attenuata, laevia, 8—10 in quovis loculo.

Warum geschieht der corona hypogyna, welche bei sehr vielen Andromeden, selbst bei *A. polifolia* und *calyculata* vorkommt, nirgends Erwähnung? Ihr Daseyn oder Mangel und ihre Beschaffenheit könnten gute Merkmale liefern. In der Gattung *Pieris* bildet sie bei *P. formosa* einen deutlichen 10zähligen urceolus, scheint dagegen bei *P. ovalifolia* ganz zu fehlen.

433. *Andr. (Pieris) elliptica* S. & Z. — A tota glabra, foliis e basi rotundata ovato-ellipticis acutis integerrimis annuis, racemis lateralibus basi foliosis simplicibus, bracteis deciduis, calycis laciniis lanceolatis acutis, corolla cylindrica lobis abbreviatis obtusis, filamentis e basi lineari subulatis longe ciliatis infra antheram biaristatis, corona nulla, stylo cylindrico truncato corollam aequante.

Rami alterni, teretes, glabri. Folia annua, alterna, petiolata petiolis 3—6''' longis; lamina e basi rotundata ovata vel elliptica acuta, integerrima vel margine subundulata et obsolete crenulata, utrinque glabra, penninervia, membranacea, 3—4'' longa, 1½—2'' lata. Racemi e gemmis lateralibus in ramulo brevi terminales, subcoëtanei, simplices, bipollicares, basi foliosi, foliis parvis ovatis vel lanceolatis. Bractee deciduae; pedunculi 2'' longi, nudi. Calycis lacinae membranaceae, acutae, corolla cylindrica glabra, fauce vix constricta, 3—4''' longa, stamina duplo superans. Filamenta basi lineari-compressa sursum subulata, pilis albis raris longe ciliata, apice biaristata; antherae breves, ovatae, apice bifidae, dorso

affixae. Corona nulla. Ovarium globoso-subpentagonum, glabrum. Stylus longitudine corollae, truncatus, strictus, glaber.

P. ovalifoliae Don proxima, sed in hac folia basi plerumque cordata, coriacea, racemi longiores, corolla major extus pubescens et styli exserti.

239. *Meisteria* Sieb. et Zuccar. Tab. I.

Calyx 5-partitus, persistens, lobis acutis. *Corolla* campanulata vel urceolata ore ampliato quinquefido, lobis laciniatis plerumque trifidis, laciniis subulatis. *Stamina* 10 inclusa; *filamenta* supra basin dilatato-incrassata sursum subulata, mutica, barbata; *antherae* breves incumbentes, (primum posticae), apice dehiscentes ibique biaristatae, totae pubescentes. *Corona* nulla. *Ovarium* pentagonum loculis multiovulatis, *stylo* pentagono truncato. *Capsula* elliptica, 5-locularis, 5-valvis valvulis loculicidis. *Semina* in quovis loculo pauca, pendula, lineari-oblonga compressa vel trigona, foveolata et in angulis squamuloso-cristata.

Diximus hoc genus in honorem *Georgii Meisteri*, per decennium *Cleyeri* in Java hortulani, qui bis (1682—84 et 1685—87) Japoniam adiit indeque plantas vivas, semina et icones plantarum in Javam turelit. *)

434. *M. cernua* S. et. Z. — *M.* foliis e basi cuneata obovatis vel obovato-spathulatis obtusis vel acutiusculis, totis uncinato-serrulatis serraturis setaceo-mucronatis, subtus basi ad nervum medium barbatis, racemis terminalibus solitariis simplicibus cernuis, pedunculis ebracteatis hirtis, capsulis maturis reflexis.

Rami teretes innovando-subverticillati, novelli pubescentes. Folia in apice ramorum fasciculato-approximata et subrosulata, annua, breviter petiolata et basi cuneata in petiolum decurrentia, obovato-spathulata, obtusa vel acutiuscula, toto margine dense serrulata, ser-

*) Confer. Gel.-Anz. 1844. n. 55. (Bullet. N. 19.)

raturis in setam uncinatam terminatis, superne glabra vel ad venas impressas setulis adspersa, subtus basi ad nervum medium (praesertim juniora) fuscescenti-barbata, 1—1½" longa, 4—6" lata. Racemi terminales, solitarii, simplices, cernui, multi-(10—15-) flori, 1—2" longi; pedunculi ebracteati, tenues, uti rachis ferrugineo-hirti, 3—4" longi. Calyx brevis 5-fidus laciniis lanceolatis acutis. Corolla campanulata fance subampliata, 5-fida; lobi iterum trifidi laciniis linearibus acuminatis. Stamina 10, corolla dimidio breviora; filamenta parum supra basin dilatata et incrassata, sursum subulata, pilis brevibus dense barbata; antherae primum posticae (basi dehiscentes et aristatae), demum introrsum inclinatae indeque apice oblique biporosae et aristatae, totae aequae ac aristae breviter hirtae. Corona nulla. Ovarii locula multiovulata. Capsula calyce triplo longior, obovato-elliptica, matura in pedunculo reflexa. Semina (abortu) in quovis loculo pauca, ex apice columnae pendula, oblonga, compressa vel trigona, dense foveolata et in angulis cristata, crista irregulariter incisa rigida.

240. *Clethra* L.

435. *Cl. barbinervis* S. et Z. — *Cl.* foliis deciduis petiolatis e basi cuneata obovatis vel obovato-ellipticis acutis argute serratis superne glabris subtus in nervo medio venisque primariis setoso-pubescentibus et in axillis venarum barbatis, racemis terminalibus paniculatis elongatis, rachi pedunculis calycibusque ferrugineo-pubescentibus, bracteis caducis, genitalibus exsertis, capsulis nutantibus hirsutis. *Cl. japonica* Thunb. apud Steudel Nomencl. I. p. 383?

Rami alterni vel innovando-subverticillati, novelli hirti. Folia annua alterna, petiolata, petiolo semipollicari; lamina in basi cuneata integerrima ceterum argute serrata, subtus inter venas tenuissime reticulato-venosa, 2—3" longa, 1—1½" lata. Racemi terminales, 5—9 in paniculam congesti, 3—6" longi, stricte erecti; bractee jam ab alabastris caducae; pedunculi 2" longi, horizontaliter patentes una cum rachi et calycibus fuscescenti-hirti. Calycis lacinae

ovatae obtusae. Corolla pentapetala, petalis obovato-oblongis obtusis glabris calycem duplo superantibus. Stamina exserta, filamentis glabris, antheris sagittato-cordatis basi biporosis. Ovarium globosum dense hirtum. Stylus persistens stricte erectus basi hirtus, 2" longus, stigmatе trifido. Capsula globosa, deflexo-nutans.

241. *Gautiera* Kalm.

436. *G. triquetra* S. et Z. — *G.* ramis glabris subalato-triquetris, foliis ellipticis utrinque attenuatis acutis glandula terminatis crenato-serrulatis glabris coriaceis subtus punctatis, racemis compositis vel paniculatis axillaribus et terminalibus erectis multifloris, rachis argute angulata, bracteis lanceolatis acutis quam pedicelli apice bibracteolati brevioribus, calyce post foecundationem excrescente capsulam depresso-globosam pubescentem obtegente carnosissimo-sicco.

Fruticosa, erecta. Rami acute triquetri et subalati. Folia perennia, coriacea, breviter petiolata, elliptica utrinque attenuata, in glandulam callosam terminata, utrinque glabra, subtus glandulis nigricantibus punctata, 3" longa, 12—15" lata. Racemi compositi basi soepe foliosi foliis sessilibus lineari-lanceolatis, stricti, 3—6" longi; rachis acute triangularis glabra. Bractee lanceolatae coriaceae quam pedicelli pubescentes breviores; bracteolae 2 ad basin calycis oppositae ovatae acutae carinatae. Calyx 5-partitus, laciniis ovatis acutis coriaceis glabris. Corolla subglobosa apice constricta breviter 5-fida. Stamina 10 corolla breviora; filamenta basi dilatata pubescentia; antherae breves apice quadriaristatae. Cupula e squamis 10 late ovatis acutis ovarii basin cingens. Stylus cylindricus longitudine corollae. stigmatе obtuso. Semina numerosa, minuta, difformia, testa subfoveolata.

242. *Vaccinium* L.

437. *Vaccinium bracteatum* Thunb. *Flor. jap.* p. 156. — *V.* ramis junioribus angulatis glabris, foliis annuis petiolatis ovatis acutis serrulatis, racemis axillaribus simplicibus secundis, bracteis vel foliaceis lanceolatis acutis persistentibus florem fructumque superan-

tibus vel minutis linearibus caducis, rachi pedicellis basi bibracteolatis calycibusque cano-pubescentibus, corollis cylindricis pubescentibus, filamentis inclusis barbatis, antheris muticis apice longe rostratis, stylo corollam aequante, bacca 10-loculari. *De Cand. Prodr. VII. p. 573. et reliq. auctorum.*

Frutex ramis adultioribus teretibus, novellis angulatis glabris. Folia alterna, petiolata, petiolo 2—3" longo, ovata vel ovato-elliptica acuta, serrulata, adultiora coriacea et (sicca) soepius margine revoluta, glabra, 1—2" longa, 8—10" lata. Racemi axillares 1—2" longi, erecti, simplices secundi; rachis pedunculi et calyces cano-pubescentes. Bracteae ad florum basin vel foliaceae, lanceolatae acutae argute serratae glabrae, florem fructumque superantes et persistentes, vel lineares canescentes pedicello basi bibracteolato breviores, caducae. Corolla cylindrica, extus pubescens, 3" longa. Antherae longe rostratae, rostris locula superantibus. Bacca magnitudine pisi minoris, 10-locularis.

243. *Rhododendron* L.

438. *Rhod. Metternichii* S. et Z. *Flor. japon. I. p. 23. tab. 9.* — *Rhod. maximum* Thunb. *Fl. japon. p. 181.* — *Hymenanthus japonica* Blume *Bijdragen p. 862.*

Capsula matura cylindrico-subpenta — heptagona, extus lana ferruginea derasili adpersa, styli basi coronata, lignescens, 8—10" longa, 6—8-locularis et valvis totidem saepius per paria longitudinaliter cohaerentibus debiscens. Columna centralis crassa per totam longitudinem placentifera placentis 6—8. Semina numerosa pluriseriata, erecta, oblonga, compressa, anguste marginata et apice membranaceo- appendiculata appendice lacera albida, testa tenuissima tenuiter striolata brunnea.

439. *Rhod. indicum* Sweet. — *Azalea indica* Linn. Thunb. *Flor. jap. p. 84.* — *Tecki Tsjocku* vulgo *Tsutsusi* Kaempfer. *Amoen. p. 845. c. icone.* Cum varietat.

440. *Rhod. Burmanni* G. Don et De Cand. Prodr. VII. p. 727. — *Azalea rosmarinifolia* Burm. fl. ind. 43. t. 3. Blume Bijdr. 853.

441. *Rhod. ledifolium* De Cand. Prodr. VII. p. 727. — *Azalea mucronata* Blume Bijdr. p. 853.

442. *Rhod. molle*. *Azalea mollis* Blume l. c. p. 853.

443. *Rhod. linearifolium* S. et Z. Rh. foliis linearibus utrinque attenuatis longe acuminatis ferrugineo-hirsutissimis, floribus terminalibus 1—3, laciniis calycis lineari-setaceis elongatis acuminatis uti tubus glanduloso-hispidis, corollae laciniis linearibus acuminatis glabris, staminibus 5.

Rami innovando-subverticillati. Folia annua fasciculata, linearia, utrinque longe attenuata acuminata margine revoluta pilis rigidis patentibus fuscis praesertim basin versus hirsutissima, 1—1½" longa, 1—2" lata. Flores terminales solitarii — terni. Calycis lacinae subulatae longe acuminatae glanduloso-hispidae, semipollicares. Corollae lacinae lineares acuminatae 8—9" longae, glabrae. Stamina glabra corollam superantia stylo breviora.

Nach Endlichers Vorgang finden wir keinen Grund, die fünf-männigen Arten der Gattung Rhododendron von den zehn- oder mehr-männigen als eigenes genus getrennt zu halten. Im übrigen unterliegen noch mehrere japanische Arten genauerer Bestimmung, welche durch die bei der grossen Menge von Spielarten obwaltende Unsicherheit der Merkmale sehr erschwert wird.

244. *Pyrola* Tournef.

444. *P. media* Sw.

77. (160 Endl.) STYRACEAE Endl.

245. *Styrax* Tournef.

445. *St. japonicum* S. et Z. Fl. jap. I. p. 53. tab. 23.

446. *St. Obassia* S. et Z. Fl. jap. I. p. 92. tab. 46.

246. *Pterostyrax* S. et Z.

447. *Pt. corymbosum* S. et Z. *Fl. jap. I. pag. 92. tab. 47.*

448. *Pt. micranthum* S. et Z. — *Pt.* foliis e basi rotundata ovato-ellipticis acutis repando-glanduloso-serrulatis utrinque pilis stellatis pubescentibus viridibus, paniculis terminalibus pyramidatis, ramis brevibus densifloris, floribus subsessilibus secundis distichis, calyce ovario adnato quinquangulari petalisque albido-tomentosis, staminibus liberis, antheris imberbibus, stylo basi tantum barbato sursum nudo.

Folia bipollicaria. Paniculæ bi — tripollicares, erectae, pyramidatae nec corymbosae, ramis horizontaliter patentibus abbreviatis densifloris. Flores quam in praecedente triplo minores. Calyx ovario adnatus, 5-dentatus dentibus ovatis acutiusculis, pilis brevissimis stellatis aequae ac petala oblonga albido-tomentosus, quinesulcatus. Stamina 10 libera; filamenta filiformia tenuiter barbata; antherae erectae lineari-oblongae, imberbes. Stylus stamina parum superans cylindricus, basi barbatus sursum glaber, stigmate 3—5-dentato.

449. *Pt. hispidum* S. et Z. — *Pt.* foliis e basi rotundata ovatis acutis repando-glanduloso-serrulatis superne pubescentibus subtus pilis stellatis minutissimis canescentibus, paniculis terminalibus pyramidatis, floribus sessilibus, calycis dentibus lanceolatis acuminatis, drupis cylindricis utrinque attenuatis decemnerviis apteris densissime albido-hispidis, stylo basi tomentoso superne nudo.

Die Exemplare der beiden vorstehenden Arten sind leider sehr unvollständig und von der erstern nur Bruchstücke mit Blüthen, von der zweiten ähnliche mit unreifen Früchten vorhanden. Es wäre möglich, dass beide zusammenfielen, doch glaubte ich sie vor der Hand trennen zu müssen, weil bei *Pt. micranthum* der mit dem Fruchtknoten verwachsene Kelch stark 5kantig und von sehr kurzen Sternhaaren filzig, bei *Pt. hispidum* dagegen fast stielrund, zehnnervig und von lang abstehenden Steifhaaren zottig ist. Auch die Gestalt der Kelchzähne und die Pubescenz der Blätter ist verschieden, obgleich letztere bei *Pt. hispidum* zu wechseln scheint.

247. *Symplocos* L.

450. *S. japonica* De Cand. *Prodr.* VIII. p. 255. — *S. lucida*.
S. et Z. Flor. jap. I. p. 55. tab. 21.

Myrtus laevis Thunb., welchen wir in der Flora japonica als Synonym hieher gezogen haben, gehört nicht zu *Symplocos* und ist vielleicht eher eine *Pomacea*.

451. *S. prunifolia* *S. et Z.* — *S.* foliis petiolatis oblongo-ellipticis subfalcato-cuspidatis acumine obtuso, remote crenulatis utrinque glabris biennibus coriaceis, racemis axillaribus simplicibus erectis multifloris cylindricis petiolo plusquam duplo longioribus, rachi pedicellisque calycem aequantibus vel parum superantibus bibracteolatis pilosis, calycis laciniis ovatis rotundatis glabris.

Rami recti stricti. Folia biennia 2—2½" longa, 8—12" lata, coriacea, firma, margine parum revoluta, novella ad serraturas glandulis capitatis munita; petioli semipollicares. Flores coëtanei. Racemi erecti stricti, pollicares vel sesquipollicares. Stamina numerosa.

452. *S. myrtacea* *S. et Z.* — *S.* tota glabra, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis vel lanceolatis longe falcato-acuminatis acumine integerrimo glanduloso-mucronato, ceterum a basi crenato-serrulatis, racemis axillaribus laxe erectis pauci- (3—5) floris subcorymbosis petiolum duplo triplove superantibus, pedicellis calyce multoties longioribus filiformibus, bracteolis deciduis, calycis laciniis ovatis obtusis.

Rami tenues virgati. Folia bipollicaria longe acuminata acumine 6—8" longo, basi rotundata vel parum attenuata, 6—8" lata; petioli 5—6" longi. Racemi dimidium folii circiter aequantes, pauciflori, floribus inferioribus longius pedicellatis indeque subcorymbosi, laxi; pedicelli filiformes, 4—5" longi. Fructus elliptici.

453. *S. lancifolia* *S. et Z.* — *S.* foliis breviter petiolatis lanceolatis utrinque attenuatis acuminatis acumine obtuso, serrulatis glabris vel subtus ad nervos parce pilosis, racemis axillaribus solitariis cylindricis multifloris tertiam vel dimidiam folii partem aequan-

tibus, floribus subsessilibus tribracteatis, rachi bracteis et calycis laciniis ellipticis obtusis ferrugineo-pubescentibus. Rami juniores ferrugineo-pubescentes. Folia basi attenuata, lanceolata, longe acuminata acumine falcato obtuso, 2—2½" longa, 6—9" lata. Racemi semipollicares — pollicares, a basi floriferi, cylindrici. Bracteae ovatae acutae, uti calycis lacinae ellipticae obtusae dorso ferrugineo-pubescentes.

454. *S. leptostachys* S. et Z. — *S.* foliis breviter petiolatis e basi rotundata ovatis vel ovato-lanceolatis acuminatis acumine acuto, serrulatis utrinque glabris, racemis basi nudis gracilibus sparsifloris folium saepius aequantibus, floribus sessilibus tribracteatis, bracteis suborbicularibus obtusis calycisque laciniis ellipticis pubescentibus, petalis lanceolatis, fructibus globosis.

Praecedenti affinis, diversa tamen foliis latioribus basi rotundatis acute acuminatis, racemis basi nudis gracilioribus et laxioribus petalisque lanceolatis. Fructus magnit. grani piperis globosi.

455. *S. theophrastaefolia* S. et Z. — *S.* foliis petiolatis oblongis vel oblongo-ellipticis utrinque attenuatis acuminatis serratis utrinque glabris coriaceis, racemis axillaribus solitariis vel saepius ternis quaternisve basi connatis, erectis strictis filiformibus elongatis, floribus remotiusculis sessilibus tribracteatis, rachi bracteis calycisque laciniis ovatis rotundatis pubescentibus.

Folia 6—8" longa, 1—2½" lata, firma, coriacea, basi in petiolum semipollicarem teretem attenuata, argute serrata, facie fere eorum *Theophrastae*. Racemi plerumque basi compositi, tripollicares, stricti, floribus parvis a se invicem distantibus sessilibus.

456. *S. neriifolia* S. et Z. — *S.* foliis petiolatis oblongo-sublinearibus utrinque attenuatis obtusis vel obtuse acutis integerrimis vel apicem versus remote serratis margine subrevolutis coriaceis glabris subtus glaucescentibus, racemis abbreviatis axillaribus solitariis ternisve glomeratis densis, floribus subsessilibus tribracteatis,

hirac bracteis et calycis laciniis ovatis obtusis dense ferrugineo-tomentosis.

Folia 5—6" longa petiolo pollicari, 10—15" lata, lineari-oblonga, obtusa vel in acumen obtusum terminata, integerrima vel apicem versus remote serrata. Racemi petiolis breviores glomerati, dense ferrugineo-tomentosi. Flores in specc. nostris plerique abortivi. Drupa elliptico-oblonga, calyce coronata, obtusa, glabra.

248. *Schöpfia* Schreb.

457. *Sch. jasminodora* S. et Z. — Sch. foliis e basi rotundata ovatis acuminatis acumine subfalcato, integerrimis, racemis simplicibus axillaribus paucifloris, calycis margine quadridentato, corollae lobis deltoideis acutiusculis.

Rami teretes subflexuosi. Folia alterna, petiolata petiolo 3" longo, e basi rotundata ovata vel rarius ovato-lanceolata, oblique acuminata, integerrima, penninervia, glabra, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " longa, 10—15" lata. Racemi axillares solitarii simplices, tri-quinqueflori pedunculo filiformi glabro pollicari. Flores sessiles, basi bractea minuta suffulti. Calyx cum ovario connatus tubo subcylindrico, limbo brevissime quadridentato. Corolla gamopetala tubulosa tubo cylindrico glabro, limbo quadripartito laciniis deltoideis acutiusculis. Stamina 4 corollae fauci ad locum insertionis barbulatae affixa et ejusdem laciniis opposita; filamenta brevissima, subulata, in corolla decurrentia; antherae parum supra basin affixae ovatae antice quadriloculares. Ovarium calyci innatum triloculare loculis uniovulatis. Discus carnosus ovarii verticem obtegens stylumque rectum trisulcatum inclusum basi ambiens. Stigma trilobum lobis divergentibus carnosus obtusis. Drupa elliptica obtusa sicca crustacea, calycis rudimento coronata, abortu mono-, raro trisperma. Variat floribus pentameris. Odor florum gratus, fortis, Jasminum referens.

De Candolle und auch Endlicher im Enchiridion stellen die Gattung Schöpfiag zu den Loranthaceen; wir möchten sie lieber mit Bentam zu den Olacinen rechnen; da dieselbe uns aber bei Bearbei-

tung jener Familie noch nicht vorlag, so führen wir sie einstweilen hier an der Stelle auf, welche ihr Endlicher in den generibus anwies.

78. (159. Endl.) **EBENACEAE R. Br.**

249. *Diospyros L.*

458. *D. Kaki Lin. fil. Thunb. Flor. jap. p. 158. D. Kaki. De Cand. Prodr. VIII. p. 229. — Si vulgo Kaki. Kämpfer Amoen. p. 805. cum icone.*

459. *D. japonica S. et Z.* *D.* ramis glabris, foliis ovato-ellipticis obtusis vel acutiusculis utrinque glabris subtus glaucis, floribus masculis in pedunculo brevissimo ferrugineo-hirto plerumque ternis subsessilibus, calyce cupulari quadrifido laciniis deltoideis acutis, calvo vel ferrugineo-pubescente, corolla quam calyx triplo longiore cylindrica apice constricta breviter 4loba, staminibus 16 inter se liberis, antheris cristato-acuminatis utrinque inter locula et ad margines valvularum barbatis, fructibus globosis. *D. microcarpa Siebold in Annuaire de la société hortic. des Pays-bas 1844. p. 28.*

Diosp. Kaki β. Sina no Kaki Thumb. Fl. jap. p. 158. — D. Kaki γ. glabra. DeCand. Prodr. VIII. p. 299.

Differt a *D. Kaki* praeter folia glabra subtus glauca praesertim floribus subsessilibus, calyce cupulari non ampliato nec profunde quadripartito sed potius quadridentato dentibus seu lobis abbreviatis deltoideis acutis, corolla quam calyx triplo longiore apice constricta breviter quadriloba.

79. (158. Endl.) **SAPOTACEAE Iuss.**

250. *Achras L.* 182.

460. *A. Sapota L.*

251. *Sideroxylon L.*

461. *Species.*

80. (157 Endl.) MYRSINEAE R. Br.

252. *Myrsine* L.

462. *M. neriifolia* S. et Z. — *M. glabra*, foliis lineari-oblongis utrinque attenuatis integerrimis glabris coriaceis, umbellis e gemmis propriis infra et inter folia sessilibus subquinquefloris, perulis numerosis imbricatis cinctis, calycis laciniis lanceolatis acutis aequae ac corollae lobi ovato-oblongi acutiusculi margine dense papilloso ceterum glabris, staminibus corolla parum brevioribus, drupis subglobosis pedicellos superantibus.

Folia versus apicem ramorum approximata, petiolata petiolis semiteretibus 3''' longis, lineari-oblonga utrinque attenuata obtusa vel acutiuscula integerrima utrinque glabra et adultiora subtus (sicca) fuscescentia, 3—4 poll. longa, 9—12''' lata. Flores in ramis hornis et anni praecedentis e gemmis propriis dense perulatis, 4—5 in umbellas simplices sessiles dispositi; pedicelli 1—2''' longi. Calycis lacinae lineari-lanceolatae acutae coriaceae margine aequae ac corollae lobi oblongi papillis brevibus dense cincti, ceterum glabri. Filamenta brevia, antherae ovato-oblongae acutiusculae antice quadriloculares. Drupa magnitudine pisi minoris ovato-globosa, styli basi coronata.

253. *Ardisia* L.

463. *Ard. crispa* Alph. De Cand. Linn. Transact. XVII. p. 124. et Prodr. VIII. p. 134. — *Bladhia crispa* Thunb. Flor. jap. p. 97. et fide Banks Icon. Kaempfer tab. 7. *Ard. crenulata* Lodd. bot. cab. t. 2. — *A. crenata* Bot. Magaz. tab. 1950. — *A. lentiginosa*. Bot. Reg. tab. 553. — *A. glandulosa* Blume Bijdr. p. 690.

Folia margine crenato-crispa, superne punctis elevatis verruculosa. Corollae lacinae et praesertim antherae dorso glandulis nigris adpersae.

464. *Ard. glabra* Alph. De Cand. Prodr. VIII. p. 135. — *Bladhia glabra* Thunb. Linn. Transact. II. pag. 331. Flor. jap. p. 350. n. 5.

465. *Ard. japonica* Blume *Bijdr.* p. 690. *De Cand. Prodr.* VIII. p. 135. — *Bladhia japonica* Thunb. *Flor. jap.* p. 95. tab. 18. et *Hornst. Dissert. pars 1. pag.* 6. 7. c. ic. Caules semipedales vel pedales tenues simplices adscendentes inferne radicales. Folia venis utrinque prominulis reticulata, pellucide punctata. Calycis lacinae tenuiter glanduloso-ciliatae. Corolla et antherae dorso glandulis nigris adpersae.

466. *Ard. pusilla.* Alph. *De Cand. Linn. Transact.* XVII. p. 137. et *Prodr.* VIII. pag. 137. — *Bladhia villosa* Thunb. *Flor. jap.* pag. 56.

254. *Maesa* Forsk.

467. *M. Doraena* Bl. — *M.* foliis plerumque oblongis vel obovato-oblongis utrinque attenuatis acuminatis, basi cuneata integerrimis ceterum remote et argute serratis, utrinque glabris, rarius linear-oblongis vel quoque ovatis, acutis vel obtusis, margine subintegerimis, racemis axillaribus solitariis geminisve petiolo longioribus secundis multifloris, pedicellis flore longioribus apice bibracteolatis, calycis laciniis ovatis obtusis, corollae tubo cylindrico quam calyx triplo longiore, drupis globosis calyce coronatis multinervio-lineatis, polyspermis. — *Doraena japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 6 et 84 et *Auct.*

Rami virgati teretes glabri. Folia figura varia, petiolata petiolis 3—6" longis; lamina folii $1\frac{1}{2}$ —6 pollicaris, plerumque oblonga vel obovato-oblonga utrinque attenuata acuminata, a medio sursum argute et remote serrata serraturis mucronatis, penninervia, rarius late ovata vel quoque linear-oblonga. Racemi solitarii gemini ternive plerumque supraaxillares, 6—18" longi, erecti secundi multiflori. Bracteae pedicellis triplo breviores ovatae obtusae; bracteolae duae alternae calycis basin amplexantes. Calyx semiinferus, tubo ovario adnato turbinato; limbi lacinae ovatae rotundatae lineolis glandulosis notatae. Corolla cylindrica, limbi laciniis brevibus rotundatis punctis lineolisve glandulosis aurantiacis notata. Stamina in-

clusa, filamentis filiformibus. Ovarii pars libera conica. Stylus subulatus stigmate tridentato. Drupa grano Coriandri parum major globosa, calyce coronata, sicca, membranacea, lineolis numerosis resinosus nigricantibus longitudinaliter striata. Semina numerosa angulata, nigra.

81. (156. Endl.) PRIMULACEAE Vent.

255. *Primula* L.

468. *R. cortusoides* L. Thunb. Flor. jap. p. 82.

256. *Lysimachia* L.

469. *L. japonica* Thunb. L. caule decumbente debili ramoso sursum adscendente villosa, foliis inferioribus oppositis superioribus alternis petiolatis e basi rotundata vel subcordata orbiculari-spathulatis acutiusculis, integerrimis, pubescentibus, floribus axillaribus solitariis geminisve breviter pedunculatis, pedunculis quam petioli brevioribus, et fructiferis erectis, calycis laciniis lanceolatis acuminatis hirtis capsulam dimidio superantibus. *L. jap. Thunb. Fl. jap. p. 83. De Cand. Prodr. VIII. p. 67.*

Specimen nostrum mancum. Corolla subrotata et longitudine calycis videtur; antherae oblongae obtusae. Petioli 3" longi; lamina folii semipollicaris, ad lentem glanduloso-punctata. Pedunculi 1—2" longi, erecti, hirti.

470. *L. clethroides* Duby ap. De Cand. Prodr. VIII. p. 61. *L. Ephemerum* Thunb. Fl. jap. p. 83.

Folia breviter petiolata utrinque longe attenuata acuminata ovato-lanceolata, ad lucem nigro-punctata, tripollicaria, alterna. Racemus terminalis cylindricus densus primum nutans, demum elongatus erectus; pedicelli 2—3" longi, bractea subulato-filiformi breviores. Calycis lacinae ovato-lanceolatae acutiusculae, margine breviter ciliato-fimbriatae, dorso nigro-punctatae. Corollae tubus brevissimus; lacinae oblongae obtusae, calyce duplo longiores. Stamina basi vix

monadelpha, dimidium corollae aequantia. Antherae lineari-oblongae acutae. Stylus brevis cylindricus stigmate truncato.

471. *L. lubinioides* S. et Z. *L.* caule stricte erecto, foliis alternis sessilibus subamplexicaulibus oblongis vel oblongo-lanceolatis acutiusculis uti tota planta glabris nigro-punctatis, racemo laxo folioso foliis floralibus sensim minoribus, pedunculis strictis fructiferis folium subaequantibus, calycis laciniis lineari-oblongis obtusis nigro-punctatis, corolla profunde quinquefida, laciniis oblongo-lanceolatis obtusis, staminibus basi monadelphis corolla dimidio brevioribus, stylo brevi cylindrico, stigmate truncato.

Habitu Lubiniam spathulatam referens, sed omnibus partibus minor. Folia in petiolum brevissimum late decurrentia indeque subamplexicaulia, 2—2½" longa, 6—10" lata, superiora floralia sensim minora. Calycis lacinae anguste albo-marginatae. Tubus corollinus limbo plus quam quadruplo brevior. Stamina basi monadelpha, compresso-plana; antherae lineari-oblongae.

472. *L. lineariloba* Hook. ap. *Beechey Bot.* p. 268. *De Cand. Prodr.* l. c. p. 61.

Radix perennis, oblique descendens, fibrosa. Caules in specc. nostris pedales vel sesquipedales basi stolonibus adscendentibus soepe floriferis, sursum parce ramosi vel simplices. Folia inferiora distincte petiolata et in petiolum decurrentia, spathulata obtusa, superiora oblonga sessilia; omnia glabra, crassiuscula glaucescentia, punctis minutis nigricantibus densissime adpersa, inferiora cum petiolo 6" longo bipollicaria. Racemi terminales stricti erecti cylindrici densi, bipollicares; bractee foliaceae calycem aequantes; pedunculi vix 2" longi. Calycis lacinae lanceolatae acutae, albo-marginatae, ceterum densissime nigro-punctulatae. Corollae tubus cylindricus, laciniis lineari-oblongis obtusis plus quam duplo brevior. Stamina fauci affixa filamentis brevibus inter se liberis, antheris ovatis obtusis. Stylus cylindricus stigmate truncato.

Crescit in insulis Peel et Bonin-Sima (unde specc. a beato Mer-
tens lecta vidi in herb. Acad. Imper. Petropol.), nec non in insulis
Liu-Kiu (Hooker l. c.)

Die Drüsen auf den Blättern sind dicht gestellt, von unregel-
mässiger Gestalt und so klein, dass sie sehr leicht übersehen werden.

257. *Anagallis* Tournef.

473. *A. arvensis* L.

α) floribus phoeniceis Thunb. *Flor. jap.* p. 83.

β) floribus coeruleis Herb. Siebold.

82. (155 Endl.) **UTRICULARIEAE** Link.

258. *Utricularia* L.

474. Species absque floribus.

83. (154 Endl.) **OROBANCHEAE** L. C. Rich.

259. *Boschniakia* C. A. M.

475. Species. Plantam ipsam non vidimus, sed ex icone ad
vivum delineatam genus recognovimus.

260. *Aeginetia* Linn.

476. *Aeg. japonica* S. et Z. *Aeg. indicæ* Roxb. proxima di-
versa videtur flore majore et magis inflato, calycem duplo fere su-
perante nec non stigmate peltato duplo latiore.

261. *Phacellanthus* S. et Z.

Calyx diphyllus foliolis distinctis, exteriori spathaceo florem am-
plectente, interiori multo minori lanceolato acuminato. Corolla longe
tubulosa cylindrica limbo breviter quinquefido (subregulari?). Stamina
4 antheris suberectis oblongis bilocularibus muticis. Ovarium unilo-
culare placentis parietalibus quatuor aequidistantibus multiovulatis.
Stylus simplex stigmate dilatato carnosio oblique decurrente medio
canaliculato. Capsula

477. *Ph. tubiflorus* S. et Z.

Scapus simplex vix tripollicaris carnosus squamis multis oblongis obtusis laxè imbricatis munitus. Flores terminales fasciculati 2—6, brevissime pedicellati. Corolla tubulosa anguste cylindrica basi circa ovarium parum ampliata, pollicaris.

84. (152 Endl.) **GESNERACEAE** *Cyrtandraceae* R. Br
262. *Conandron* S. et Z.

478. *C. ramondioides* Zuccar. in *Act. Mathem. Phys. Acad. Monac. III. p. 729. tab. III. f. 1. De Cand. Prodr. IX. p. 273.*

85. (151 Endl.) **BIGNONIACEAE** R. Br.
263. *Sesamum* L.

479. *S. orientale* L.

264. *Catalpa* Scop.

480. *C. Kaempferi* S. et Z. — *Catalpa bignonioides* β . *Kämpferi* De Cand. *Prodr. IX. p. 226. Bignonia Catalpa* Thunb. *Fl. jap. p. 251. Kakusju, vulgo Kawara fisági Kämpfer Amoen. anot. p. 841 c. icone.*

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die japanische *Catalpa* von der amerikanischen als Art verschieden sey, obgleich leider die im Augenblick uns vorliegenden Exemplare nicht genügen, um die Unterschiede festzustellen.

Indessen sind bei der japanischen Art die Blüthen überhaupt, vorzüglich aber die Kelche mehr als dreimal kleiner als bei der amerikanischen, die Blätter meistens kurz dreilappig, die Schoten nach Kämpfer *spithama longiores et culmum avenaceum crassae*, bei der amerikanischen dagegen $1\frac{1}{2}$ ' lang und fingerdick. Bei Vergleichung vollständiger Exemplare werden sich zuverlässig noch andre genauere Merkmale herausstellen.

265. *Tecoma* Juss.

481. *T. grandiflora* De Cand. *Prodr. IX. p. 223. Bignonia grandiflora* Thunb. *Fl. jap. p. 253. Banks Icones Kaempfer. tab. 21.*

Bign. chinensis Lam. dict. I. p. 423. — *Campsis adrepens* Lour. Flor. cochinch. p. 458. — *Incarvillea grandiflora* Poir. dict. sc. nat. 23. p. 53. Spreng. Syst. 2. p. 836. — *Rjotsjo Kämpf. Amoen.* p. 856.

86. (150 Endl.) **ACANTHACEAE R. Br.**
266. *Justicia* L.

482. *J. japonica* Thunb. Flor. jap. p. 20.

267. *Paulownia* S. et Z.

483. *P. imperialis* S. et Z. Flor. jap. I. p. 25. tab. 10. *Bignonia tomentosa* Thunb. Fl. jap. p. 252. et Auct. — *Incarv. tomentosa* Spreng. Syst. Veget. II. p. 836.

87. (149 Endl.) **SCROPHULARINEAE R. Br.**
268. *Vandellia* L.

484. *V. angustifolia* Benth. Scroph. indicæ p. 37! *Tittmannia angustifolia* Benth. in Wallich Catal. n. 3951.

269. *Gratiola* L.

485. Species.

270. *Veronica* L.

486. *V. Anagallis* L. Thunb. Fl. jap. p. 20.

487. *V. paniculata* L.

488. *V. longifolia* L.

489. *V. japonica* Steud. *V. foliis quinis senisve verticillatis subsessilibus ovato-ellipticis acuminatis argute serratis pubescentibus, spica terminali simplicissima cylindrica elongata, corollae tubulosae laciniis conniventibus lanceolatis, staminibus inclusis, antheris sagittatis.* — *Veronica virginica* Thunb. Fl. jap. p. 20. *V. japonica* Steudel et ejusdem fide *Eustachya japonica* Rafin.

Perennis, caule bi—tripedali tereti herbaceo. Folia 4—6 verticillata verticillis 2—3" a se invicem distantibus, subsessilia, utrinque attenuata ovato-elliptica, acuminata, argute et dense serrulata, pubescentia, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ "

longa, 10—15''' lata. Spica terminalis solitaria erecta 3—8'' longa, cylindrica continua. Flores valde approximati sessiles bractea lineari-subulata suffulti. Calyx 5partitus laciniis lanceolatis acuminatis, duabus superioribus parum majoribus. Corolla tubulosa tubo cylindrico calycem plus quam triplo superante parum incurvo intus basin versus pubescente, laciniis quatuor conniventibus lanceolatis. Stamina inclusa tubum aequantia; filamenta filiformia, antherae a basi ultra medium bifidae loculis divergentibus indeque sagittatae acutae glabrae. Ovarium ovatum, biloculare placentis multiovulatis. Stylus filiformis superne primum subclavatus, inclusus, demum excrescens, 3''' longus, persistens.

Habitus omnino *Veronicae virginicae* L.

Quid. *V. Chamaedrys* et *arvensis* Thunb.?

271. *Paederota* Linn.

490. *P. axillaris* S. et Z. P. caule erecto, foliis alternis brevissime petiolatis e basi rotundata ovatis acuminatis argute serratis glabris, spicis axillaribus solitariis sessilibus cylindricis multifloris densis.

Caulis herbaceus erectus subvirgatus parum ramosus teres glaber. Folia alterna petiolo vix 2—3''' longo affixa, basi rotundata ovata oblique acuminata, argute serrata, 2—5'' longa, 1½—2½'' lata. Spicae in axillis foliorum solitariae, sessiles, vix pollicares, cylindricae, obtusae, multiflorae. Flores subsessiles, bractea minuta lineari suffulti. Calyx ad basin usque quinquepartitus, laciniis linearibus acuminatis glabris aequalibus persistentibus. Corolla rosea, calycem vix dimidio superans, tubo cylindrico limbo quadrifido laciniis lanceolatis argute acutis, superiori parum latiori. Stamina exserta, antheris suborbicularibus utrinque emarginatis loculis parallelis. Ovarium ovatum, biloculare, placentis utrinque in septo multiovulatis. Stylus exsertus, filiformis, emarginato-truncatus, persistens. Capsula calyce brevior, ovata compressiuscula, glabra, bivalvis valvis coriaceis demum bipartitis.

491. *P. bracteata* S. et Z. P. caule erecto ramoso, foliis alternis breviter petiolatis ovatis vel lanceolatis utrinque attenuatis acutis serratis glabris, spicis terminalibus bracteis nonnullis foliaceis suffultis breviter cylindricis obtusis multifloris densis.

Caulis herbaceus erectus ramosus; folia alterna breviter petiolata petiolo vix 2" longo, utrinque attenuata ovata vel superiora lanceolata acuta serrata glabra, pollicaria vel sesquipollicaria 6—12" lata. Spicae in apice caulis et ramorum sessiles bracteis foliaceis 2—3 inaequalibus lanceolatis acutis integerrimis suffultae, breves cylindricae, obtusae. Flores bractea lineari acuminata calycem parum superante suffulti. Calyx ad basin usque 5-partitus, laciniis linearibus acuminatis, una parum breviori. Corolla tubulosa calycem aequans; tubus cylindricus rectus, limbus quadrifidus laciniis lanceolatis acutis summa parum majori. Stamina duo, utrinque ad basin lacinae superioris, exserta. Filamenta subulata glabra, antherae suborbiculares utrinque emarginatae loculis parallelis. Ovarium ovatum biloculare, placentis utrinque septo affixis multiovulatis. Stylus filiformis exsertus, stamina superans, stigma teemarginato-truncato.

Dem Habitus nach weichen die vorstehenden Arten schon durch die folia alterna völlig von den europäischen ab, indessen konnten wir keine ausreichenden Merkmale auffinden um sie als Gattung zu trennen.

272. *Siphonostegia* Benth.

492. *S. chinensis* Benth. *Scrophul. indicæ* p. 51. *Hooker Botany of Capt. Beechey* p. 203 tab. 44. —

Sprengel (Syst. II. p. 803) zieht *Lindernia japonica* Thunb. (Fl. p. 253) zu *Mazus rugosus* Lour. oder *Hornemannia bicolor* Willd. Mit Recht?

88. (148 Endl.) SOLANACEAE Bartl.

273. *Nicotiana* Tourn.493. *N. chinensis* Fisch. *N. Tabacum* Thunb. *Fl. jap.* p. 91.274. *Datura* L.494. *D. Stramonium* L.

Nach Bunge wächst um Peking *D. ferox*. Sollte diess auch die japanische Pflanze seyn?

495. *D. alba* Nees. *Linn. Transact.* XVII. p. 73. Corolla semipedalis; folia basi valde inaequalia.

275. *Physalis* L.

496. *Ph. Alkekengi* L. *Siebold Synops. in Act. Batav.* XII. p. 34. Kömmt nach Bunge auch um Peking vor.

497. *Ph. ciliata* S. et Z. — *Ph. herbacea* erecta caule simplici angulato glabro, foliis longe petiolatis ovatis acutis grosse sinuato-dentatis dense ciliatis ad venas pilosiusculis ceterum glabris, floribus breviter pedunculatis nutantibus, calycis laciniis tubo brevioribus lanceolatis acutis margine dense barbato-ciliatis, tubo parce pubescente, pedunculis fructiferis elongatis stricte deflexis et cauli adpressis. — *Ph. angulata* Thunb. *Fl. jap.* p. 91.

Caules in specc. nostris simplices erecti angulati glabri $1\frac{1}{2}$ —2 pedales. Folia alterna soepeque gemina, remota, longe petiolata, petioli 1 — $1\frac{1}{2}$ " longi; lamina e basi rotundata vel subattenuata ovata acuta grosse sinuato-dentata dentibus utrinque 2—3, margine dense ciliata ceterum praeter pilos sparsos ad venas glabra, 3—4" longa, 2 — $2\frac{1}{2}$ " lata. Flores solitarii extraaxillares, breviter pedunculati pedunculo nutante 3—4" longo. Calyx campanulatus glabriusculus limbo quinquefido, laciniis tubo brevioribus lanceolatis margine dense barbatis ciliatis. Corolla immaculata? Pedunculi fructiferi pollicares stricte deflexi et cauli adpressi glabri; calyces inflati apice ad lacinias conniventes barbati, ceterum glabriusculi.

Da *Ph. Alkekengi* nach v. Siebold in Japan vorkömmt, so gehört das Kämpfersche von Thunberg zu seiner *Ph. angulata* gezo-

gene Citat Sansjo, *Solanum vesicarium* vulgo *Alkekengi* Amoen. p. 785. zu jener Pflanze.

276. *Capsicum* Tournef.

498. *C. longum* Dc. cum variett.

499. *C. annuum*. L. cum variett.

277. *Solanum* L.

500. *S. nigrum* L.

501. *S. tuberosum* L. Rarius cultum.

502. *S. Melongena* L.

503. *S. Dulcamara* L. var. *lyrata*. *S. lyratum* Thunb. Fl. jap. p. 92.

Wir haben bisher die Pflanze zwar nicht selbst gesehen; aber theils weist Thunbergs Beschreibung die nahe Verwandtschaft derselben mit *S. Dulcamara* nach, theils berichtet Blume Bijdr. p. 698, dass er diese Art als *S. lyratum* Thbg. aus Japan erhalten habe.

278. *Lycium* L.

504. *L. chinense* Blume Bijdr. p. 707. non Miller. *L. barbarum* Siebold Synops. l. c. p. 34.

Accuratius examinandum an simul *L. Trewianum* R. S. Syst. IV. p. 693 et Duhamel.

89. (145 Endl.) **POLEMONIACEAE** Vent.

279. *Schizocodon* S. et Z.

505. *Sch. soldanelloides* Zuccar. in Act. Mathem. Phys. Acad. Monac. III. p. 725. tab. II. fig. 1.

280. *Polemonium* L.

506. *P. coeruleum* L. Thunb. Fl. jap. p. 87.

90. (144 Endl.) **CONVOLVULACEAE** R. Br.

281. *Calystegia* R. Br.

507. *C. Soldanella* R. Br. De Cand. Prodr. IX. p. 433. —
Conv. Soldanella Thunb. Fl. jap. p. 86.

282. *Batatas* Chois.

508. *B. edulis* Chois. *Conv.* p. 53. *De Cand. Prodr. IX.* p. 338. — *Conv. edulis* Thunb. *Fl. jap.* p. 84. *J. batatas* Siebold *Synops. l. c.* p. 35. Aus den Liu-Kiu-Inseln eingeführt.

283. *Pharbitis* Chois.

509. *Ph. Nil.* Chois. *Conv.* p. 57. *De Cand. Prodr. IX.* p. 343. ? *Ipomoea triloba* Thunb. *l. c.* p. 86. *Convolvulus Nil* Thunb. *Linn. transact. II.* p. 330.

Wir geben eine Definition der Pflanze, welche wir vorläufig zwar nicht von *Ph. Nil* trennen wollen, die aber durch Wurzel und Kelchbildung verschieden scheint.

Ph. radice tuberosa, caule retrorsum piloso, foliis cordatis trilobis lobo intermedio productione omnibus cuspidatis, pedunculis quam petioli brevioribus, sepalis linearibus hispidis pollicaribus, corolla speciosa violacea.

Tubera radicum nigra vel alba; nigra laxantia (Thunb.). Petioli 4—6" longi; lamina folii basi profunde cordata triloba, lobis lateralibus brevioribus divergentibus, medio productioni basi latiori. Pedunculi 1—3-flori, 2—4" longi. Flores breviter pedicellati. Sepala basi oblonga sursum longe linearia acuminata hispida. Corolla speciosa, fere tripollicaris, violacea.

Ph. Nil hat eine einjährige Faserwurzel und eiförmige oder breitlanzettliche Kelchlappen. Dabei sagt Thunberg ausdrücklich, dass unsre Pflanze um Nangasaki und weiter einwärts sowohl wild wachse als kultivirt werde. Zu derselben scheint auch *Jp. Nil* Bunge *Chin.* p. 46 zu gehören, welche in Hecken bei Peking und nördlich bis an die Gebirge wild wachsen soll, während die eigentliche *Nil* ein Tropengewächs ist.

Conv. trinervius Thunb. *Fl.* p. 85 scheint, wie De Candolle mit Recht bemerkt, der folia opposita wegen nicht zu der Familie zu gehören.

284. *Ipomaea* L.

510. *J. filicaulis* Blume *Bijdr.* p. 721. — *Conv. japonicus* Thunb. *l. c.* p. 85 ? *ex auct. De Cand. Prodr. IX.* p. 353.

285. *Cuscuta* L.

511. *C. major* *C. Bauh.* — *C. europaea* *Thunb. l. c. p. 76.*
ex auct. De Cand. Prodr. IX. p. 452.

91. (143 *Endl.*) **ASPERIFOLIAE L.**

286. *Lithospermum* L.

512. *L. erythrorhizon* *S. et Z.* — *L. annuum*, radice simplici perpendiculari, caule erecto folioso uti omnes plantae partes hispido scabro, foliis brevissime petiolatis utrinque attenuatis, lanceolatis vel oblongo-lanceolatis acutis subtus nervosis, calycis laciniis corollae tubum aequantibus demum excrescentibus fructu triplo longioribus, nuculis dorso laevissimis acutis, ventre foveolatis. — *Lithosp. arvense* *Thunb. l. c. p. 81.* *L. murasaki* *Sieb. Synops. in Act. Batar. XII. p. 32.*

Radix annua, simplex vel parce ramosa perpendicularis crassitie pennae anserinae, intense rubra. Caulis erectus pedalis vel bipedalis teres ramosus ramis erectis. Folia subsessilia utrinque attenuata lanceolata vel oblongo-lanceolata acuta papilloso-scabra et ad venas hispida, $1\frac{1}{2}$ —4" longa, 6—18" lata, subtus nervis prominentibus pinatis notata. Bractee lanceolatae foliaceae. Flores brevissime pedunculati. Calycis lacinae lineares obtusae hispidae tubum corollae aequantes. Corolla breviter tubulosa, fauce ut in *Lith. officinali* squamulis 5 barbatis et in tubi basi fornicibus 5 in annulum positae auctae, ochroleuca. Calycis fructiferi lacinae elongatae lineares fructu triplo longiores. Nuculae ovatae sursum attenuatae acutiusculae, dorso laevissimae ventre lineolis punctisve irregulariter exsculptae.

Differt a *L. arvensi* fructibus laevibus, caule basi simplici sursum ramoso foliis multo majoribus acutis nervosis, a *L. officinali* radice annua, foliis nervosis latioribus, nuculis majoribus sursum attenuatis dorso laevibus ventre irregulariter sulcato-foveolatis, a *L. lineato*, cui fortasse proximum, radice annua, tubo corollae calycem non superante, nuculis duplo majoribus.

Die Wurzel wird häufig zum Rothfärben verwendet und die Pflanze deshalb auch angebaut.

287. *Bothriospermum* Bunge.

513. *B. asperugoides* S. et Z. — *B. canlibus* ramosis decumbentibus, foliis obovato-spathulatis obtusis vel acutiusculis scabris, pedunculis fructiferis extraaxillaribus erectis, calyce patente, nuculis tuberculato-scabris, caruncula in fundo umbilici longitudinaliter elliptica.

Habitis *Asperuginis*. Caules debiles ramosi decumbentes. Folia petiolata et in petiolum attenuata obovato-spathulata acutiuscula pollicaria vel sesquipollicaria. Flores solitarii extraaxillares breviter pedunculati. Corolla parva calycem aequans. Calyces fructiferi ex-crescentes laciniis lanceolatis acutis patentibus.

288. *Cynoglossum* L.

514. *Cynoglossum japonicum* Thunb. *Flor. jap.* p. 81. *Decades plant. jap.* III. tab. 2. *Lehmann Asperifol.* p. 139.

Clariss. Hasskarl in *Catal. hort. Bogoriensis altero* p. 137. *Ehretiam ovalifoliam* enumerat quam e Japonia allatam suspicatur.

92. (142 Endl.) **CORDIACEAE** R. Br.

289. *Cordia* R. Br.

515. *C. thyrsiflora* S. et Z. — *C. glabra*, foliis petiolatis e basi rotundata vel subcuneata ovatis vel ovato-ellipticis acutis serratis, panicula terminali pyramidata densa, floribus breviter pedicellatis, calycibus quinquefidis laciniis ovatis rotundatis ciliolatis, corollae lobis 5 ovato-oblongis acutiusculis, staminibus glabris, stylo bifido, stigmatibus brevissime emarginatis, drupa globosa dipyrena, pyrenis bilocularibus dispermis.

Rami novelli angulati, adultiores teretes. Petioli pollicares vel breviores superne canaliculati; lamina folii basi rotundata vel breviter cuneato-attenuata ovata vel ovato-elliptica acuta serrata, utrinque glabra penninervia, 3—5" longa, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " lata. Panicula ter-

minalis soepe basi foliosa pyramidata densa (fere ut in *Ligustro*); rachis et rami angulati puberuli; pedicelli bractea lineari-oblonga obtusa suffulti lineam longi. Calyx cupularis persistens laciniis ovatis rotundatis brevissime ciliatis. Corolla magnitudine circiter ut in *Olea europaea*, quinquefida, laciniis ovato-oblongis obtusis glabris. Stamina glabra. Ovarium quadriloculare. Stylus basi simplex superne bifidus stigmatibus divergentibus brevissime emarginatis, glaber. Drupa calyce persistente cincta magnitudine grani Piperis, globosa, dipirena pyrenis osseis bilocularibus dorso convexis irregulariter exsculptis ventre planis, loculis monospermis altero plerumque abortivo.

93. (141 Endl.) MYOPORINEAE R. Br.

290. *Pentacoelium* S. et Z. Tab. III. 2.

Calyx hypogynus regularis quinquepartitus persistens, fructifer haud mutatus. Corolla hypogyna, infundibuliformis vel subcampanulata tubo sensim ampliato in limbum aequaliter quinquelobum subbilabiatum. Stamina corollae tubo affixa, exserta, didynama absque quinti postici rudimento; antherae dorso affixae reniformes, anticae. Ovarium superum, quinquangulare, ovulo solitario pendulo in quovis loculo. Stylus cylindricus stigmatibus obtusis subemarginatis. Drupa calyce persistente basi cincta, pentagono-conica, carnosae; pyrenum osseum, pentagonum, quinqueloculare, semine unico pendulo in quovis loculo.

516. *P. bontioides* S. et Z. —

Frutex totus glaber ramis alternis teretibus. Folia alterna breviter petiolata utrinque longe attenuata, oblongo-lanceolata acuta integerrima coriacea, praeter nervum medium evenia, $2\frac{1}{2}$ —4" longa, 10—15" lata. Flores ex axillis foliorum, pedunculis unifloris solitariis vel 2—3 sibi superpositis florem aequantibus ebracteatis. Calyx regularis quinquepartitus laciniis subdeltoideo-lanceolatis acutis coriaceis. Corolla infundibuliformi—campanulata pollicaris, tubo sursum sensim ampliato, limbi subbilabiati laciniis ovatis rotundatis in-

ter se aequalibus. Stamina 4 didynama absque quinti rudimento, tubo corollae affixa, exserta; filamenta glabra; antherae dorso affixae, reniformi-bilobae loculis basi divaricatis. Ovarium superum ovatum quadriloculare. Stylus terminalis staminibus brevior cylindricus persistens, stigmate obtuso vix emarginato. Drupa pentagono-conica, subcarnosa. Pyrenum osseum, pentagonum, quinqueloculare. semine unico pendulo in quovis loculo.

94. (137 Endl.) **VERBENACEAE** *Juss.*

291. *Verbena* L.

517. *V. officinalis* L. *Thunb. Fl. jap. p. 22.*

292. *Priva* Adans.

518. *Pr. species.*

293. *Vitex* L.

519. *V. ovata* *Thunb. Flor. jap. p. 257. et Auct. — Hooker Botany of Capt. Beechey p. 206. tab. 47.*

520. *V. cannabifolia* S. et Z. *V. foliis quinatis, foliolis lanceolatis acuminatis argute serratis superne glabris subtus ad nervos pubescentibus, extimis duobus quam tria intermedia brevius pedicellatis vel subsessilibus, paniculae terminalis ramis elongatis strictis calycis laciniis subulatis, corollis extus lanatis intus glabris.*

Rami juniores tetragoni pubescentes, adultiores teretes glabri. Folia opposita distantia; petioli sesquipollicares pubescentes. Foliola quinata, basi vel rotundata vel parum attenuata lanceolata acuminata argute serrata superne glabra subtus ad venas pubescentia, tria intermedia majora $2\frac{1}{2}$ —3 pollicaria, longius pedicellata pedicellis 3—4" longis, extima subsessilia pollicaria vel sesquipollicaria soepius integerrima. Panicula terminalis ampla, e ramis composita strictis subvirgatis 3—6" longis; cymulae laterales verticillastrae constituentes remotiusculae multiflorae; bracteae foliaceae inferiores ternatae longiores, superiores simplices lineares acuminatae integerrimae cymas aequantes. Flores subsessiles bibracteolati, parvi; calyx campanulatus

pubescens laciniis brevibus e basi lanceolata subulatis. Corolla extus lanata, intus glabra; stamina exserta, filamentis glabris; antherae loculis a basi ad apicem usque fere divergentibus reniformi-bicrures. Stylus filiformis stigmatе bifido laciniis longis subulatis divergentibus.

294. *Clerodendron* R. Br.

521. *Cl. trichotomum* Thunb. *Flor. jap.* p. 256. *Banks Icones Kaempfer. tab.* 22. non vero *Seokuritz Amoen. exot.* p. 827, cui folia alterna tribuuntur.

522. *Cl. squamatum* Vahl *Symbol.* II. p. 74. — *Volkameria japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 255. — *Volk. Kämpferi* Jacq. *icones rar.* III. tab. 500. *Go Too* vulgo *Go too Giri Kämpf. Amoen. exot.* p. 861. *Banks Icones Kämpfer. tab.* 58. *Volk. japonica et Kämpferi* Willd. *Spec.* III. p. 358. Non vero *Volk. fragrans Vent. et reliq. Auct.*

Schon Willdenow bemerkt, (*Spec. plant.* III. p. 385) mit Recht, dass die Thunbergsche *Volk. japonica* nicht mit der in Gärten unter diesem Namen kultivirten Pflanze zusammengezogen werden könne, und nennt in der *Enumeratio hort. berol.* p. 659 letztere *Cler. fragrans*. Persoon führt ebenfalls *V. japonica* und *fragrans* gesondert auf. Erst die neueren Schriftsteller ziehen beide wieder zusammen, lassen dagegen aber *Cl. squamatum* oder *Kämpferi* als eigne Art bestehen. Allerdings scheinen zwar zwischen dieser und *Volk. japonica* Thunb. nach des Letzteren Beschreibung seiner Pflanze einige Verschiedenheiten obzuwalten, aber da Thunberg, Kämpfer a. a. O. zu seiner Pflanze citirt, dessen Beschreibung offenbar auf *Volk. Kämpferi* hinweist (*Fi kiri*, i. e. *ignea kiri*, a colore igneo stylos floridos, perianthia ac flosculos tingente), so dürfte dieses die Abweichungen in der Beschreibung ausgleichen und demnach *Cl. squamatum* Vahl als identisch mit *Volk japonica* Thunb. zu betrachten seyn, *Cler. fragrans* dagegen als eigne Art bestehen, deren Stammform mit einfachen Blüthen jetzt auch schon in Gärten vorkommt. *Cl. squamatum* ist nach Thunberg aus Korea nach Japan

verpflanzt, ob *Cl. fragrans* auch in Japan sich finde, scheint noch zweifelhaft. Im Sieboldtschen Herbarium wenigstens fehlt sie.

523. *Cl. divaricatum* S. et Z. *Cl.* ramis tetragonis glabris, foliis inferioribus petiolatis e basi rotundata ovatis superioribus subsessilibus basi attenuatis lanceolatis, omnibus acutis grosse serrato-dentatis glabris, cymis axillaribus divaricatis dichotomis paucifloris paniculam laxissimam efficientibus, calycis cupularis laciniis brevissimis late deltoideis acutis, corollae tubo anguste cylindrico, staminibus longe exsertis, antherarum loculis divaricatis.

Folia pollicaria vel sesquipollicaria, et inferiorum petioli 6—10" longi. Cymae axillares divaricatae bis trifidae 3—7-florae; pedicelli filiformes 3—4" longi. Corollae tubus semipollicaris. Antherae locula horizontaliter divergentia.

295. *Callicarpa* L.

524. *C. japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 60 et Auct. (excl. *Synon. C. longifoliae* Lam.)

Folia petiolata petiolo 4—9" longo, lamina utrinque longe attenuata acuminata, basi et apice integerrima utrinque serrata, ceterum lanceolata, ovata vel ovato-rhombea, glabra, subtus glandulis minutis globosis citrinis dense adpersa, 3—5" longa, 1—2" lata. Cymae axillares dichotomo-ramosissimae multiflorae, petiolum duplo superantes. Calyx urceolatus truncatus obsolete quadridentatus, uti pedunculi pilis stellatis adpersus. Corolla extus papilloso-pubescens, quadrifida. Stamina exserta; antherae obovato-oblongae, basi emarginatae vertice truncatae, loculis apice poro obliquo dehiscens, connectivo glandulis seriatis citrinis dense obsito.

525. *C. gracilis* S. et Z. *C.* ramis pilis stellatis puberulis, foliis brevissime petiolatis, utrinque attenuatis oblongo-lanceolatis vel oblongis, acuminato-cuspidatis, basi et apice integerrimis a medio sursum serratis, subtus pellucide glanduloso-punctatis, cymis supraaxillaribus petiolo quadruplo longioribus dichotomo-bifidis 12—20-floris, calyce cupulari brevissime 4-dentato, corolla glabra, staminibus ex-

sertis, antheris ovatis truncatis basi emarginatis, loculis rima longitudinali dehiscentibus, connectivo dense glanduloso.

Rami teretes, graciles pilis stellatis scabriusculi. Folia oblonga vel raro obovato-oblonga utrinque attenuata acuminato-cuspidata, a medio sursum serrata basi et apice integerrima, glabra, subtus glandulis minutis pellucide punctata, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " longa, 6—12" lata; petioli 1—2" longi. Cymae supraaxillares, tertiam folii partem aequantes; pedunculus et pedicelli pilis stellatis canescentes. Calyx glaber cupularis. Corolla quam in praecedente multo minor, glabra. Stamina exserta. Antherae per totam longitudinem dehiscentes. Bacca minuta, globosa, disperma.

526. *C. mollis* S. et Z. C. ramis teretibus novellis canescentibus, foliis petiolatis e basi rotundata vel rarius attenuata ovato-oblongis vel oblongo-lanceolatis longe acuminatis, basi et in acumine integerrimis ceterum inaequaliter serratis, superne pilis simplicibus molliter villosis subtus pilis stellatis villosis, glanduloso-punctatis, cymis petiolum triplo superantibus cano-villosis 7—11-floris, calycibus cylindricis profunde quadrifidis laciniis lanceolatis acutis, corollis extus villosis, staminibus exsertis, antheris oblongis obtusis rima dehiscentibus in connectivo glandulosis, stigmate capitato-incrassato.

Rami juniores pilis stellatis furfuraceo-canescentes. Folia petiolata, petiolis circiter 3" longis, e basi rotundata raro attenuata ovato-oblonga, vel superiora nonnunquam oblongo-lanceolata longe acuminata, $1\frac{1}{2}$ —4" longa, 6—18" lata, inaequaliter serrata, superne pilis simplicibus subtus stellatis villosa-canescens, utrinque glandulis pellucidis punctata. Cymae axillares vel supraaxillares strictae vix quartam folii partem aequantes, pilis stellatis dense villosae. Calyx cylindricus laciniis tubum fere superantibus lineari-lanceolatis acutis. Antherae pro ratione magnae basi bifidae, dorso glandulosae. Stylus cylindricus stamina parum superans, stigmate incrassato truncato. Variat floribus pentameris pentandris.

β? microphylla foliis lanceolatis vel ovato-lanceolatis acuminatis basi rotundatis dense et aequaliter serrulatis pollicaribus vel bipollicaribus.

Die Behaarung und allgemeine Form der Blätter stimmt mit der *mollis* überein, nur sind dieselben viel kleiner und am Rande mit Ausnahme der Basis und Spitze gleichmässig feinsägezählig. Die Blüthen sind an unsern Exemplaren nicht vollständig entwickelt.

527. *C. Murasaki* Sieb. *Annuaire de la Soc. hortic. l. c. p. 25.* — *C. mimurasaki* Hasskarl hort. Bogor. p. 136.

Ausser dieser und *C. japonica* erwähnt Hasskarl a. a. O. noch der *C. acuminata* H. B. K. und *C. cuspidata* Roxb. als aus Japan nach Java eingeführt.

Nicht allein die japanischen, sondern alle Arten von *Callicarpa*, deren wir über 20 untersuchten, haben das Connectiv der Antheren dicht mit goldgelben Drüsen besetzt. Aehnliche Drüsen stehen auch immer auf der Rückseite der Blätter und werden nur häufig durch den filzigen Ueberzug (von Sternhaaren) verdeckt.

296. *Mastacanthus* Endl.

528. *M. sinensis* Endl. — *Nepeta incana* Thunb. *Fl. jap. p. 244.* *Barbula sinensis* Lour. *cochin. p. 445.* *Nepeta japonica* Willd. *Spec. plant. III. p. 52. et Auct.*

Suffruticosa, tota pilis simplicibus villosa-canescens. Folia opposita vel abortu alterna breviter petiolata, petiolo 2—4" longo, ovato-elliptica vel angustiora oblonga, basi rotundata, obtusa, grosse inciso-serrata, utrinque sed praesertim subtus venis lateralibus prominentibus lineata, 1—2" longa, 6—12" lata. Cymae axillares pedunculo petiolum aequante, densae, multiflorae. Flores breviter pedunculati. Calyx tubulosus profunde quinquepartitus, laciniis lineari-oblongis aequalibus. Corollae extus pubescentis tubus calycem superans sursum ampliatus; limbus quinquefidus, laciniis quatuor superioribus aequalibus ovatis obtusis, infima quinta duplo longiori orbiculari venosa inciso-laciniata, laciniis plerumque septem basi del-

toideis sursum subulatis lamina subaequantibus. Stamina 4, summo quinto deficiente, exserta; filamenta filiformia, subaequalia, ima basi ad insertionem barbata; antherae ovatae, cordatae loculis sursum parallelis. Stylus filiformis, staminibus brevior, glaber, stigmate bifido laciniis subulatis.

95. (136 Endl.) **LABIATAE** *Iuss.*

297. *Plectranthus* Herit.

529. 530. Species ex sententia clar. Benth. novae.

298. *Perilla* L.

531. *P. arguta* Benth.! — *Ocimum crispum* Thbg. *Flor. jap.* p. 248. Flores albi.

299. *Salvia* L.

532. *S. japonica* Thunb. *Flor. jap.* p. 22. Benth.!

533. *S. plebeia* R. Br. Benth.!

300. *Melissa* Benth.

534. *M. Clinopodium* Benth.! — *Clinopodium vulgare* L. Thunb. *Fl. jap.* p. 247. et aut.

301. *Prunella* L.

535. *Pr. vulgaris* L. Benth.!

302. *Scutellaria* L.

536. *Sc. indica* L. Benth.!

Sc. japonica De Caisne *Annales des Sc. Nat.* Nov. 1843 scheint sehr verwandt und vielleicht nur durch Grösse und mindere Behaarung verschieden. Die Antheren sind auch in unsern Exemplaren, welche Benth. selbst für *Sc. indica* bestimmte, alle 4 gleich stark behartet.

537. *Sc. species nova* *Sc. minori* affinis.

303. *Nepeta* Benth.

538. *N. Glechoma* Benth! β . *hirsuta* W. K.

Von der europäischen Pflanze in nichts verschieden.

304. *Lamium* L.539. *L. amplexicaule* L. Benth.

540. *L. barbatum* S. et Z. — *L.* foliis ovatis vel deltoideis basi cordatis vel superioribus truncatis acuminatis grosse et subinciso-dentatis, dentibus inaequalibus acutis subgeminatis, parce pilosis, dentibus calycinis longe subulatis ciliato-hispidis, corollae tubo amplo intus piloso-annulato, fauce ampliata, galea oblonga emarginata margine villosa-barbata, lobis lateralibus dente longo subulato appendiculatis, antheris hirsutis.

Folia inferiora longe petiolata petiolo bipollicari, floralium semipollicari; lamina $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " longa, 1—2" lata parce pilosa, grosse et profunde dentata, dentibus inaequalibus plerumque bifidis. Verticillastri 6—12-flori. Flores magnitudine fere ut in *L. Orrala*.

305. *Ajuga* L.541. *A. remota* Benth! *Labiatae* p. 694.

542. *A. decumbens* Thbg. *Fl. jap.* p. 243. *Bentham Labiat.* p. 697.

96. (135 Endl.) GENTIANEAE. *Iuss.*306. *Gentiana* Tournef.

543. *G. Thunbergii* Griseb. — *G.* radice annua, caule simplici vel parce ramoso, foliis radicalibus majoribus rosulatis, caulinis ovato-oblongis vel ovatis basi connatis aristatis margine subcallosis papilloso-scabris, floribus 1—5 fastigiatis, calycis laciniis lanceolatis acuminatis carinatis tubo corollae dimidio brevioribus, corolla infundibuliformi, plicis quam lobi brevioribus ovatis acutis, staminibus liberis, stylo cylindrico, stigmatibus oblongo-spathulatis, capsula longe stipitata obovato-oblonga. — *G. Thunbergii* Don *gen. syst. gard.* 4 p. 192. *Griseb. in De Cand. Prodr. IX.* p. 108. — *G. aquatica* Thbg. *Fl. jap.* p. 115.

Radix annua filiformis simplicissima vel parce ramosa. Caulis erectus 3—6-pollicaris tetragonus simplex vel parce ramosus. Folia

radicalia rosulata in specc. nostris delapsa vel soepe nulla; caulina sessilia, basi in tubum brevem connata, ovato-oblonga vel ovata acuta setaceo-aristata margine albo papilloso-scabro cincta, semipollicaria, 3—4''' lata. Flores solitarii vel 2—5 fasciculato-corymbosi sessiles. Calyx ope epidermidis in tubum cylindricum pentagonum connexus, limbi laciniis lanceolatis acuminatis carinatis albo-cinctis. Corolla infundibuliformis 6—9''' longa; limbi lacinae ovatae acutae plicis simplicibus acutis longiores. Antherae inter se liberae lineares. Ovarium stipite crasso longius, obovato-cylindricum. Stylus cylindricus stigmatibus duobus oblongo-spathulatis obtusis papillosis. Semina minuta, numerosissima, aptera?

307. *Pleurogyne* Eschscholz.

544. *Pl. rotata* Griseb. *Gent.* 309. *De Cand. Prodr.* IX. p. 122. *Swertia rotata* Thunb. *Fl. jap.* p. 115. *Siebold Synops.* l. c. p. 37.

Specimina magna fere pedalia, ramosissima. Folia linearia vel lanceolata argute acuminata. Flores in ramis racemosi.

308. *Ophelia* Don.

545. *Oph. bimaculata* S. et Z. — *O.* caule tereti elato, ramis patentibus strictis pyramidatis, foliis subsessilibus ad vaginam interfoliaceam undulato-ciliatis ovato-lanceolatis acuminatis trinerviis glabris, calycis segmentis aequalibus lineari-lanceolatis acutis corolla duplo brevioribus, corollae 5-partitae albae segmentis ellipticis acutiusculis supra medium maculis seu glandulis duabus virentibus et inde apicem versus punctis nigricantibus notatis, fovea inconspicua.

Radix biennis? Caulis sesqui-bipedalis teres, stricte erectus. Rami teretes, brachiato-pyramidati. Folia $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ '' longa, 6—10''' lata, in petiolum brevissimum attenuata ibique et ad vaginulam interfoliaceam undulato-ciliata. Flores in apice ramorum cymosi 3—5, pedunculati pedunculis fructiferis pollicaribus sulcatis. Calycis lacinae breves aequales lineari-lanceolatae acutae, apice reflexae et subcallosae. Corollae rotatae tubus brevissimus, albido-virens, glandulis in specc. siccis inconspicuis; lacinae ellipticae acutiusculae albae,

facie supra medium glandulis seu maculis duabus ellipticis notatae et inde apicem versus punctis nigricantibus adpersae. Filamenta inter se libera imae corollae affixae ibique parum latiora, sursum subulata. Ovarium sessile oblongo-cylindricum, stigmate subsessili bilobo lobis rotundatis. Capsula oblonga corolla persistente duplo longior, unilocularis bivalvis, placentis ad valvularum marginem decurrentibus. Semina numerosa angulato-diformia, reticulata, aptera.

309. *Crawfordia* Wall.

546. *Cr. japonica* S. et Z. — *Cr.* foliis e basi rotundata vel subcordata ovato-oblongis oblongisve acuminatis 3—5-nerviis, floribus axillaribus plerumque ternis subsessilibus, calycis laciniis linearibus longe acuminatis tubum superantibus, corollae infundibuliformis lobis brevibus ovato-deltoides acutis plicis brevibus emarginatis, ovario oblongo stipitem aequante.

Caulis tenuis volubilis teres. Folia petiolata petiolo 3—6" longo canaliculato; lamina basi leviter cordata vel rotundata, ovato-oblonga, oblonga vel lanceolata, acuminata tri-vel quinquenervia nervis in apice confluentibus, margine tenuissime papillosa et sicca subundulata, 1—3½" longa, 1—18" lata. Flores axillares solitarii gemini ternive subsessiles. Calycis tubus cylindrico-pentagonus inter lacinias truncatus; lacinae lineares longe acuminatae subaequales tubum superantes. Corolla pollicaris infundibuliformis, limbi laciniis brevibus ovato-deltoides acutis, plicis brevibus in dentes adscendentibus emarginatis. Filamenta tubo inserta linearia; antherae basi emarginatae oblongae. Discus ovarii stipitem cingens urceolaris breviter quinquelobus. Stipes ovarium oblongum aequans. Stylus cylindricus, stigmatibus duobus linearibus revolutis. Capsula ovato-elliptica stipitem aequans unilocularis, polysperma.

310. *Limnanthemum* Gmel.

547. *L. peltatum* Griseb. *De Cand. Prodr. IX. p. 141.* — *Menyanthes nymphoides* Thbg. *Fl. jap. p. 82.* *M. peltata* Ejusd.

Act. Upsal. 7. p. 142. tab. 4. f. 2. — *Villarsia peltata* Roem. et Schult. *Syst. Veget.* IV. p. 178. Siebold *Synops.* l. c. p. 37.

97. (134 Endl.) ASCLEPIADEAE Iuss.

311. *Metaplexis* R. Br.

548. *M. chinensis* D. C. *Prodr.* VIII. p. 511. *M. Stauntoni* Roem. et Schult. VI. p. 111. *Urostelma sinense* Bunge *Enum. pl. chin.* p. 44. Siebold *Annuaire de la Soc. hort.* l. c. p. 38. *Perularia japonica* Thunb. *Fl. jap.* 111.

Caulis volubilis glaber. Folia petiolata basi cordata lobis rotundatis, ovata vel superiora subdeltoidea, acuta vel cuspidata margine plana utrinque glabra subtus glaucescentia, 3—5" longa, $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ " lata; petioli sesqui — bipollicares. Inflorescentia interpetiolaris; pedunculi $1\frac{1}{2}$ —3 pollicares folio breviores. Flores cymoso-subracemosi 5—10, pedicelli breviter villosi bractea lineari acuminata suffulti. Calycis laciniae lanceolatae longe acuminatae pubescentes ciliatae. Corolla subrotata, limbi laciniis lanceolatis acutis apice reflexis extus glabris intus pilis albis crispis dense barbatis. Corona brevissima. Antherae membrana ovato-lanceolata cordata acuta alba terminatae. Stigma elongatum, filiforme, simplex.

Chinesische von Fortune (plant. exsicc. chin. n. A. 87) gesammelte Exemplare weichen durch länger gestielte und deutlicher in Trauben gestellte Blüthen etwas von den japanischen ab.

312. *Vincetoxicum* Moench.

549. *V. purpurascens* Morr. et De Caisne *Bull. Acad. Brux.* 1836. p. 17. De Cand. *Prodr.* VIII. p. 524.

Caules herbacei, erecti, apice tantum volubiles. Folia breviter petiolata e basi rotundata elliptica, ovata vel rarius obovata, breviter acuta vel cuspidata, ad venas tenuiter pubescentia ciliolata; petioli 3—4" longi; lamina folii bi—quadripollicaris 1—2" lata. Cymae interpetiolares plerumque geminae ramosae multiflorae; pedunculi stricti pubescentes folio breviores 1—3-pollicares, pedicelli filiformes flore

longiores. Flores inter congeneres magni. Calycis lacinae lanceolatae acuminatae pubescentes. Corollae lacinae lanceolatae acutae glabrae. Corona staminea stigmatibus parum brevior.

550. *V. macrophyllum* S. et Z. — *V.* caule herbaceo erecto vel apice volubili, tenuiter bifariam pubescente, foliis petiolatis, inferioribus e basi rotundata late ovatis, summis utrinque attenuatis lanceolatis, omnibus acuminatis ad venas pubescentibus, cymis ramosis laxifloris folio brevioribus, corollae laciniis ovato-lanceolatis acutis intus albido-barbatis, corona staminea pentaphylla, foliolis gynostegium aequantibus, stigmatibus depressis.

V. acuminato De Caisne affine videtur, sed corollis intus albido-barbatis differt. Folia inferiora maxima petiolis soepe duos, lamina 6—8 pollices longa et 4—5" lata; summa lanceolata vel lineari-lanceolata utrinque attenuata acuminata sesqui—bipollicaria. Cymae graciles ramosae, solitariae vel geminae; pedicelli filiformes flores plusquam duplo superantes pubescentes. Flores parvi, albidi? Calycis lacinae lanceolatae acuminatae glabrae. Corollae lacinae ovato-lanceolatae acutae extus glabrae intus pilis albis hirsutae. Folliculi duo bipollicares tenues longe attenuati divaricati.

551. *V. amplexicaule* S. et Z. *V.* herbaceum glaucescens caule erecto glabro, foliis sessilibus e basi cordata subamplexicaulibus obovato-ellipticis vel ellipticis brevissime cuspidatis utrinque glabris, cymis interpetiolaribus bifidis folio brevioribus, pedicellis glabris flores aequantibus, corollae laciniis ovato-lanceolatis acutis introrsum puberulis, corona stam. 5-phylla, foliolis obovato-spathulatis crenatis gynostegium aequantibus.

Caulis erectus simplex vel superne ramosus. Folia sessilia basi cordata et amplexicaulia, elliptica, mucronata vel brevissime cuspidata glabra glaucescentia, 1½—3" longa, 10—18" lata. Cymae solitariae geminae, folio breviores, bifidae, multiflorae. Flores parvi pedicellos aequantes. Calycis lacinae ovato-lanceolatae acutae glabrae.

Folliculi in specc. nostris abortu solitarii, basi cylindrici sursum longe attenuati, subbipollicares, nutantes.

552. *V. japonicum* Morr. et De Caisne *Bullet. Acad. Brux.* 1836. p. 17. *De Cand. Prodr. VIII.* p. 524.

553. *V. acuminatum* De C. *Prodr. l. c.*

554. *V. atratum* Bunge *Enum. plant. chin.* p. 45. *De C. l. c.* p. 523.

555. *V.?* *micranthum* S. et Z.

Die vorliegenden Exemplare sind zu unvollständig zu genauer Untersuchung.

313. *Marsdenia* R. Br.

556. *M. tomentosa* Morr. et De Caisne *l. c.* p. 17. *De Cand. Prodr. VIII.* p. 617. Folia subtus ad venas pubescentia, 3—4" longa et lata. Petioli, pedunculi et calyces tomentosi. Cymae ramosae laxae. Lacinae calycis rotundatae.

98. (133 Endl.) **APOCYNACEAE.** R. Brown.

314. *Vinca* L.

557. *V. rosea* L.

Culta et spontanea facta.

315. *Nerium* L.

558. *N. odorum* Soland.

Cultum.

316. *Malouetia* Alph. De Cand.

559. *M. asiatica* S. et Z. *M.* ramulis villosis, ceterum glabra, foliis oblongo- vel ovato-ellipticis utrinque attenuatis apice obtuse acutis, cymis axillaribus folia aequantibus vel superantibus corymbosis subdichotomis, bracteis parvis lanceolatis acutis, lobis calycinis ovato-lanceolatis acuminatis aequalibus, tubo corollae cylindrico utrinque glabro, laciniis inaequilateris basi angustatis sursum latioribus et oblique truncatis tubum aequantibus, antheris apice exsertis, nectario cupuliformi lobis truncato-emarginatis.

Nerium divaricatum Thunb. Fl. jap. p. 110. non Linn. —
 Uno Fanna Kämpf. Amoen. exot. p. 909.

Frutex ramis teretibus e Thunbergio prostratis vel scandentibus, in specc. nostris subvolubilibus, novellis ferrugineo-villosis. Folia opposita breviter petiolata petiolis vix 3''' longis novellis hirtis; lamina folii oblongo-vel ovato-elliptica, rarius lanceolata utrinque attenuata acuta acumine obtuso, utrinque glabra, penninervia venis ante marginem anastomosantibus, eglandulosa, 2—3½" longa, 10—18" lata. Cymae axillares longe pedunculatae folia aequantes vel superantes pedunculo sursum compresso, trifidae et subdichotomo-multiflorae, corymbosae, divisionibus plerumque trifloris, bractee minutae squamaeformes lanceolatae acutae; pedicelli 3—4''' longi. Calyx profunde 5-fidus laciniis lanceolatis acuminatis glabris. Glandulae 10, intus ad basin laciniarum duae ante quandam laciniam affixae, minutae, truncatae, plerumque tridentatae carnosae. Corollae tubus cylindricus vix dilatatus calyce triplo longior, utrinque glaber fauce nudus. Limbus 5-fidus, hypocrateriformis; lacinae inaequilateres obliquae, basi angustatae sursum dilatatae et oblique truncatae, venosae, albidae. Corona nulla. Stamina tubo faucem versus affixa; filamenta adnata decurrentia; antherae inde sessiles dorso affixae basi sagittatae lobis subaristatis conniventibus, superne acuminatae et semiexsertae, medio stigmati affixae. Nectarium hypogynum cupuliforme subquinquelobum lobis truncato-emarginatis. Ovaria 2 supera ovato-compressa, glabra, multiovulata ovulis imbricatis multiseriatis. Stylus cylindricus vel subangulatus glaber, stamina subaequans, apice subpeltato-dilatatus. Stigma cylindrico-subclavatum, simplex, antheris adhaerens.

Occurrit quoque in insulis Peel et Bonin-sima, unde specc. vidi in herb. Mertensiano.

317. *Amsonia* Walt.

560. *A. elliptica* R. et S. — A herbacea, caule tereti simplici glabro, foliis alternis vel binis ternisque subverticillatis, lanceolatis

utrinque attenuatis acuminatis brevissime petiolatis glabris, racemo terminali, calycis laciniis lanceolatis setaceo-acuminatis, corolla extus glabra. — *Tabernaemontana elliptica* Thbg. *Fl. jap.* p. 385. *excl. synonym.* — *Amsonia?* *elliptica* Roem. et Schult. *Syst. Veget.* IV. p. 432. *De Cand. Prodr.* VIII. p. 385.

Ams. latifoliae Mich. valde affinis et praeter lacinias calycis acuminatas corollasque glabras vix distinguenda.

99. (132 Endl.) LOGANIACEAE R. Br.

318. *Gardneria* Wall.

561. *G. nutans* S. et Z. — *G.* foliis ellipticis utrinque attenuatis acuminatis, pedunculis axillaribus uni-, rarius bi-vel trifloris nutantibus, floribus pentameris pentandris, antheris liberis in connectivo furfuraceo-tomentosis.

Rami novelli tetragoni, serius teretes, glabri. Folia opposita, petiolata, petiolis 3''' longis; lamina elliptica utrinque attenuata acuta vel acuminata utrinque glabra penninervia, 2—2½'' longa, unum circiter lata. Pedunculi axillares solitarii vel nonnumquam gemini sibi superpositi nutantes longitudine petiolum subaequantes apice bibracteati bracteis parvis subulatis, uni—bi-, rarius triflori. Flores pedicellati; pedicelli pedunculum communem aequantes, intermedii et (abortu florum lateralium) solitarii ebracteolati, laterales bracteolis duabus alternis muniti. Calyx minutus quinquepartitus laciniis orbicularibus rotundatis ciliolatis ceterum glabris coriaceis. Corolla rotata ad basin usque quinquepartita; lacinae lanceolatae longe attenuatae, intus marginibus inflexis bicarinatae papillosae, coriaceae. Stamina 5, libera, cum corollae lobis alternantia et eorum basi affixa. Filamenta brevissima compresso-plana; antherae erectae oblongo-attenuatae acutae anticae quadriloculares, ab apice non ultra $\frac{1}{3}$ longitudinis rima dehiscentes; connectivum basi dilatatum papilloso-tenuiter tomentosum. Ovarium superum globosum biloculare ovulo in quovis loculo solitario

pendulo medio septo affixo. Stylus subulatus longitudine staminum stigmatē obsolete emarginato. Bacca.

100. (131 Endl.) OLEACEAE.

319. Olea Tourn.

562. *O. Aquifolium* S. et Z. *O* sempervirens, foliis oppositis breviter petiolatis coriaceis totis glabris difformibus, aliis (plerumque inferioribus) ovato-ellipticis vel ellipticis inciso-dentatis dentibus deltoideis in spinam rigidam terminatis, aliis (superioribus) minoribus oblongo-ellipticis lanceolatisve acutis vel obtusiusculis integerrimis inermibus, floribus in axillis foliorum fasciculatis, pedunculis unifloris ebracteatis.

Ilex Aquifolium Thunb. Flor. jap. p. 79. *Il. Aquif.* var. *heterophylla* Ait? Blume Bijdr. p. 1150. — *Koo Kotz* vulgo *Firaggi* Kämpf. Amoen. p. 781. — *Olea ilicifolia* Hasskarl in Catal. hort. Bogor. p. 118. *Osmanthus Aquifolium* Sieb. in litt.

Rami teretes vel novelli obsolete tetragoni. Folia opposita, per triennium virentia, petiolata petiolis 3—4^{'''} longis, difformia; alia et plerumque inferiora e basi cuneata vel rotundata elliptica vel ovato-elliptica, profunde inciso-dentata sinubus rotundatis, dentibus et apice deltoideis in spinam validam pungentem terminatis, 1½—2½^{''} longa, 10—18^{'''} lata; alia superiora minora lanceolata, elliptica vel oblongo-elliptica integerrima, breviter acuta vel obtusiuscula inermia, 12—15^{'''} circiter longa, 4—8^{'''} lata, omnia coriacea utrinque glabra superne lucida. Flores ex axillis foliorum anni praecedentis e gemmis propriis perulatis, fasciculati; pedunculi uniflori petiolos aequantes vel parum superantes ebracteati glabri. Calycis lacinae parvae, ovatae acutiusculae, coriaceae. Corolla profunde quadripartita, laciniis ovato-ellipticis obtusis. Stamina 2, corollam aequantia; antherae basi cordatae ovatae obtusae. Ovarium ovato-globosum, stylo cylindrico stamina aequante, stigmatē capitato.

563. *O. japonica* Sieb. Hasskarl in *Catal. hort. Bogor.* p. 118.
Osmanthus japon. Siebold *Annuaire l. c.* p. 34.

320. *Osmanthus* Lour.

564. *O. fragrans* Lour. — *Olea fragrans* Thunb. *Fl. jap.* p. 18. *tab. 2. et Auct.* — *Mokksei Kämpf. Amoen. exot.* p. 844.

321. *Ligustrum* Tourn.

565. *L. Ibota* Sieb. *L.* ramis, petiolis et foliis in margine et utrinque in nervo medio pubescentibus, foliis ellipticis lanceolatisve utrinque attenuatis acutis vel basi rotundatis, racemis terminalibus subsimplicibus paucifloris, rarius paniculatis. — *L. Ibota* Sieb. in *Act. Batav.* vol. 12. p. 36. Hasskarl *hort. Bogor.* p. 118. — *Ibutta Kämpf. Amoen. exot.* p. 896.

Rami stricti graciles, laterales subrectangulo-divaricati, (annui) pilis patentibus aequae ac petioli pubescentes. Folia breviter petiolata petiolo 1—2" longo; lamina elliptica vel lanceolata utrinque attenuata acuta vel basi rotundata, utrinque ad nervum medium et in margine pubescens. Flores in ramis primariis paniculati, in laterali-bus simpliciter racemosi, racemis brevibus pauci-(5—9-)floris. Flores breviter pedicellati, pedicelli lineam longi bibracteolati glabri. Calyx cupularis truncatus vel obsolete 4—5-dentatus. Corollae tubus cylindricus utrinque glaber, limbus 4—5-fidus laciniis ovatis obtusis patentibus. Stamina subinclusa; filamenta breviter, corollae tubo affixa, subulata. Antherae lineares, medio dorso affixae anticae, dimidium corollae tubum aequantes, apice subexsertae. Ovarium globosum stylo filiformi stamina subaequante, stigmate bilobo.

Variat floris 4—5-meris.

566. *L. ovalifolium* Hasskarl *Catal. hort. Bogor.* p. 119.
L. ramis teretibus glaberrimis, foliis brevipetiolatis ovalibus aut oblongis utrinque acutis coriaceis glaberrimis, supra atroviridibus subnitidis subtus pallidioribus, panicula terminali contracta subracemosa, floribus bracteatis subsessilibus fragrantibus. *L. vulgare* Thunb. *Fl. jap.* p. 17. ?

567. *L. obtusifolium* S. et Z. L. ramis pedunculis calycibusque hirtis, foliis brevissime petiolatis e basi rotundata ellipticis obtusis vel rotundatis, novellis utrinque, adultis subtus in nervo medio tantum hirtis, ceterum glabris, paniculae terminalis ramis abbreviatis coarctatis strictis, calycibus distincte quadridentatis, corollae laciniis oblongo-lanceolatis obtusiusculis.

Rami teretes hirti, laterales numerosi breves, (in specc. nostris) omnes floriferi. Folia brevissime petiolata petiolo vix lineam longo, lamina elliptica basi rotundata vel rarius subattenuata, apice obtusa vel rotundata, subtus tantum in nervo medio hirta ceterum glabra, 1—2" longa, 6—9" lata. Paniculae terminales pedunculo pedicellisque hirtis, pollicares vel sesquipollicares; rami abbreviati coarctati stricti cymoso-3—5-flori. Flores brevissime pedicellati. Calyx urceolatus hirtus pedicellum superans, quadridentatus dentibus brevibus late deltoideis mucronulatis. Corollae tubus infundibuliformis lacinias oblongo-lanceolatas obtusiusculas dimidio superans.

L. Stauntoni D. C. affine videtur, differt vero panicula contracta ramis simpliciter cymosis nec divaricata ramosissima.

568. *L. japonicum* Thbg. *Flor. jap. p. 17 et Aut. Nysimi motsji, aliis Tanna wattasj Kämpfer Amoen. p. 776.*

Folia in specc. nostris acuminata, acuta vel obtusa. Flores in panicula pyramidata subsessiles. Calyx cupularis truncatus vix quadridentatus. Corollae tubus cylindricus, lacinae oblongo-lanceolatae acutae. Stamina exserta.

569. *L. micranthum* Zuccar. L. totum glabrum, foliis petiolatis e basi attenuata ellipticis vel oblongo-ellipticis obtuse acutis, panicula terminali composita ramis patentibus, calycibus cupularibus obsolete quadridentatis quam pedunculi brevioribus, corollae profunde quadrifidae laciniis oblongo-lanceolatis acutis tubum superantibus.

Rami dichotomi divaricati glabri. Folia petiolata petiolo 3—4" longo; lamina magnitudine varia plerumque utrinque attenuata et apice obtuse acuta, utrinque glabra, coriacea, 1½—3" longa, 9—18" lata.

Panicula terminalis 2—3-pollicaris valde ramosa ramis patentibus; bracteae minutae ovato-oblongae acutae. Pedunculi calycem parvum cupularem obsolete dentatum plus quam duplo superantes. Corolla infundibuliformis tubo brevi, limbo profunde 4-partito, laciniis oblongo-lanceolatis acutis patentibus tubum superantibus.

In insulis Bonin-sima legit beatus Mertens.

322. *Fraxinus* Tournef.

570. *F. longicuspis* S. et Z. — Fr. (Ornus) foliolis bi- vel trijugis petiolatis lanceolatis longe et subfalcato-acuminatis serratis utrinque glabris, ramis petiolisque tetragonis, paniculis lateralibus et terminalibus, samaris in alam linearem, apicem versus parum latiorrem acutam vel obtusam glabram terminatis, gemmis ferrugineo-tomentosis.

Foliola petiolata, longe et subfalcato-acuminata, basi rotundata vel attenuata, serrata, utrinque glabra, 2—3" longa, 6—10"" lata. Paniculae terminales et laterales, erectae. Pedicelli filiformes. Calyx persistens, quadridentatus, dentibus sinibus rotundatis. Corolla? Samarae 12—15"" longae, ala lineari sursum parum latiori obtusa vel acuta terminatae.

Quid *Fr. excelsior* Thunb. *Fl. jap.* p. 23.?

323. *Forsythia* Vahl.

571. *F. suspensa* Vahl. Sieb. et Zuccar. *Flor. jap.* I. p. 11. tab. 3. *Syringa suspensa* Thunb. *Fl. jap.* p. 19. Rengjo Kämpf. *Amoen.* p. 907.

101. (129 Endl.) JASMINEAE R. Br.

324. *Jasminum* Tourn.

572. *J. Sambac.* Act.

Cum tribus aliis cultum. Ex his *J. humile* Hassk. *Catal. hort. Bogor.* idem videtur ac *J. floridum* Bunge *Enum. plant. Chin.* p. 42. et Siebold *Annuaire* l. c. p. 31.

Abhandlungen d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. IV. B. Abthl. III. 22

102. (128 Endl.) LONICEREAE Endl.

325. *Abelia* R. Br.573. *A. serrata* S. et Z. *Flor. jap. I.* p. 76. *tab.* 34.574. *A. spathulata* S. et Z. *l. c.* p. 77. *tab.* 34. *fig.* 2.326. *Diervilla* Tourn. (*Weigela* Thunb., *Weigelia* Pers., *Calysphyrum* Bunge.)575. *D. hortensis* S. et Z. *Flor. jap. I.* p. 70. *tab.* 29. 30 et 33. *II.*576. *D. grandiflora* S. et Z. *l. c.* p. 71. *tab.* 31. — *D. coraeensis* De Cand. *Prodr. IV.* p. 330. *Weigela coraeensis* Thunb. in *Act. Linn. II.* p. 331. *Weigelia coraeensis* Pers. *Enchir. I.* p. 176. et *Aut.* — *Korei* Utsugi Kämpf. *Amoen.* p. 855. *Icones tab.* 45.577. *D. versicolor.* S. et Z. *l. c.* p. 76. *tab.* 33. *Dierv. japonica* De Cand. *Prodr. IV.* p. 330. — *Weigela japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 90. *tab.* 16. *Linn. transact. II.* p. 331. *Act. holm.* 1780. p. 137. *tab.* 5. et *Auct.* —578. *D. floribunda* S. et Z. *l. c.* p. 73. *tab.* 32. — *Nippon* Utsugi Kämpf. *Amoen.* p. 855.327. *Lonicera* Desf.579. *L. japonica* Thunb. *Flor. jap.* p. 89. *Loud. Arbor. britt.* p. 534. *fig.* 985. — *L. chinensis* Wats. *dendr. britt. t.* 117. *De Cand. Prodr. IV.* p. 333. — *L. flexuosa* Bot. *Reg. t.* 912. *Bot. Cabin. t.* 1037. *L. repens* hort. *Bogor.* *Nintooa japonica* Sweet hort. *britt. edit. 2.* — *Nintoo it. Sintoo vulgo Sui Kadsura* Kämpf. *Amoen.* p. 785.580. *L. affinis* Hook. ap. *Beechey l. c.* p. 264.*L. Leschenaultii* proxima, sed glaberrima, glaucescens. Folia omnia petiolata, inferiora late ovata basi truncata vel subcordata breviter acuta vel obtusa, $2\frac{1}{2}$ " longa. 18—20" lata, superiora vel ramorum lateralium minora elliptica acuta vel obtusa; petioli 3—5" longi. Flores axillares vel terminales subcorymbosi; pedunculi petiolis breviores biflori. Bracteae minutae, ovatae, acutae. Calycis lacinae

breves, ovato-delloideae, acutae. Corollae tubus rectus, tenuis, cylindricus, 10—12" longus; limbus 8—10" longus bilabiatus, labio superiore truncato, quadridentato dentibus obtusis, inferiore lineari deflexo.

581. *L. brachypoda* D. C. *Prodr.* IV. p. 335. *L. nigra* Thunb. *Fl. jap.* p. 89. *L. flexuosa* Id. in *Act. Linn.* II. p. 330.

328. *Viburnum* L.

582. *V. plicatum* Thunb. *Act. Linn.* II. p. 332. Sieb. et Zuccar. *Fl. jap.* I. p. 81. tab. 37. *P. dentatum* Thbg. *Fl. jap.* p. 122.

583. *V. tomentosum* Thunb. Sieb. et Zuccar. l. c. p. 81. t. 38.

Verosimiliter praecedentis forma spontanea fertilis.

584. *V. cuspidatum* Thbg. *Fl. jap.* p. 125. Foliis e basi rotundata vel cuneato-attenuata obovatis rotundatis et repente cuspidatis vel acutis, argute serratis subtus dense costatis et inter nervos pilis stellatis adpersos tenuissime reticulatis, cymis terminalibus radiantibus, petiolis pedunculisque pilis stellatis pubescentibus.

Rami laterales numerosi abbreviati subdivaricati, novelli angulati. Folia in specc. nostris duos pollices longitudine et 12—15' latitudine non excedentia, figura varia, e basi cuneata vel rotundata plerumque obovata rarius elliptica, apice vel rotundata et repente cuspidata vel simpliciter acuta, dense et argute serrata, serraturis a medio apicem versus multo majoribus ovatis cuspidatis; venis utrinque 9—11 parallelis dense costata et inter eas tenuissime reticulata, superne pilis simplicibus subtus stellatis adpersa; petioli 4—8" longi pubescentes. Cymae terminales foliis longiores, planae, multiflorae, radiantes; pedunculus strictus angulatus pubescens; radii 5—6 absque involucri. Flores radiantes magnitudine et figura ut in *V. Opulo*. Fertilium lacinae calycis parvae ovatae acutae, corollae tubus brevissimus, lacinae ovatae obtusae. Stylus brevissimus crassus stigmate capitato-tridentato.

585. *V. erosum* Thunb. *Fl. jap.* p. 124. *De Cand. Prodr.* IV. p. 327. *V.* foliis e basi rotundata late ovatis acuminatis inaequali-

ter sinuato-et inde quasi eroso-dentatis utrinque subvillosis, breviter petiolatis, ramis petiolis pedunculis et calycibus pilis stellatis tomentosis, stipulis setaceis hirtis, cymis terminalibus non radiantibus subinvolucratis plerumque quinquefidis, stylo brevi stigmate tridentato.

Rami laterales soepe numerosi abbreviati, novelli tomentosi. Folia breviter petiolata petiolo 3''' longo; lamina plerumque late ovata rarius oblonga, acuminata, dentata dentibus inaequalibus cuspidatis sinibus rotundatis, 2—3''' longa, 12—18''' lata. Stipulae subulatae hirtae, petiolum subaequantes. Cymae strictae pedunculo quam folium breviores. Involucri foliola 4 linearia.

586. *V. dilatatum* Thunb. *Fl. jap.* p. 124. — *V.* foliis petiolatis e basi cuneata vel rotundata obovatis acutis acuminatisve inaequaliter sinuato-dentatis utrinque pilis simplicibus pubescentibus, ramis petiolis pedunculis calycibusque hirtis, stipulis nullis, cymis terminalibus non radiantibus nudis.

Rami novelli tetragoni aequae ac petioli et pedunculi pilis stellatis tomentoso-hirti; petioli 4—6''' longi; lamina folii e basi rotundata vel cuneata obovata acuta vel acuminata, inaequaliter dentata, dentibus brevibus mucronatis sinibus rotundatis, utrinque pilis simplicibus decumbentibus pubescens, 2½—4½''' longa, 1½—2½''' lata. Cymae terminales foliis breviores, plerumque 5-radiatae. Corolla extus pubescens. Stylus brevissimus stigmate tridentato.

587. *V. urceolatum* S. et Z. — *V.* foliis petiolatis e basi rotundata ovato-oblongis acuminatis acumine obtuso, crenatis superne glabris subtus ad nervos pilis stellatis parce adpersis rugosis, stipulis nullis, cymis terminalibus nudis, corollis urceolatis apice subconstrictis, staminibus exsertis.

Rami novelli aequae ac petioli et pedunculi pilis minutis stellatis adpersi; lamina folii ovato-oblonga vel oblonga, basi rotundata, obtuse acuminata, irregulariter crenata, 1½—3''' longa, 10—18''' lata. Cymae terminales foliis breviores, plerumque 5-radiata non involucrata. Flores subsessiles. Calycis lacinae glabrae ova-

tae obtusae. Corolla parva urceolata apice subconstricta laciniis brevibus erectis. Antherae exsertae.

588. *V. phlebotrichum* S. et Z. — V. foliis annuis breviter petiolatis e basi rotundata ovatis acuminatis argute et mucronato-dentatis costatis superne glabris subtus ad costas pilis simplicibus decumbentibus hirsutis ceterum glabris, cymis terminalibus folio longioribus rarifloris non radiantibus, pedunculis strictis tenerrimis pilosis, radiis plerumque quadrifloris, pedicellis longis strictis filiformibus, corolla rotata, staminibus brevissimis, stylo cylindrico stigmate trilobo.

Rami novelli tetragoni, glabri. Petioli brevissimi, 1—2" longi, pilosi; lamina folii 2—2½" longa, 12—15" lata, argute dentata dentibus deltoideis mucronatis, superne praeter nervum medium parce pilosum glabra, subtus venis parallelis utrinque 6—7-costata et in costis pilis longis albis decumbentibus hirta, ceterum glabra. Cymae quam in reliquis speciebus multo graciliores, rariflorae, plerumque 5 radiatae; radii plerumque quadriflori, floribus 3 exterioribus longe pedicellatis, centrali subsessili. Pedicelli stricti, filiformes. Calycis tubus subcylindricus, lacinae parvae oblongae obtusiusculae. Corolla subrotata lobis ovatis obtusis. Filamenta brevissima, corolla multo breviora, antherae ovato-cordatae. Stylus cylindricus brevis stigmate distincte trilobo.

Die langen weissen Haare auf den Rippen der Rückseite der Blätter, die sehr dünnen schlanken Dolden- und Blumenstiele so wie die radförmigen Blumenkronen geben der Art ein von den übrigen abweichendes Ansehen.

589. *V. odoratissimum* Ker *Botan. Reg. tab.* 456. *De Cand. Prodr. IV. p.* 326. — *V. sinense* Zeyh. in *Colla hort. rip. p.* 145. *app.* 2.

329. *Sambucus* Tourn.

590. *S. species*. Specimina haud suppetunt. Folia bijuga. Umbellae trifidae, planae. Medulla ut in *S. racemosa* fuscescens. An hic *S. pubescens* Pers. ap. *Siebold Annuaire l. c. p.* 37.

591. *S. ebuloides* Desv. *De Cand. Prodr. IV. p. 323.* Siebold *Annuaire l. c. p. 37.*

S. japonica Thunb. est *Euscaphis staphyleoides* S. et Z.

103. (127 Endl.) **RUBIACEAE** Iuss.

330. *Galium* L.

592. *G. strigosum* Thunb. *Nor. Act. Upsal 7. p. 141. tab. 4. f. 1—9.* — *G.* (Euaparines) totum scabrum caule decumbente tetragono retrorsum aculeato-aspero, foliis infimis 8—10, superioribus semis lineari-subspathulatis obtusis aristatis, superne, margine et subtus in carina retrorsum aculeato-scabris, pedunculis trifidis glabris, fructibus globoso-didymis setis apice uncinatis hispidis. *G. strigosum* *De Cand. Prodr. IV. p. 611.* *G. uliginosum* Thunb. *Flor. jap. p. 58.*

Caules debiles ramosi. Folia infima octona—dena, superiora sena, basi longe attenuata indeque subpetiolata linearia, apicem versus parum latiora et subspathulata, obtusa sed mucrone setaceo aristata, 15—18^{'''} longa, 2^{'''} lata. Pedunculi breves, solitarii, gemini ternive; pedicelli divaricato-patentes nec reflexi, glabri. Fructus parvi, globoso-didymi setis glochidiatis hispidi.

Quid *G. verum* et *rotundifolium* Thunb.?

331. *Rubia* Tournef.

593. *R. Munjista* Roxb. *De Cand. Prodr. IV. p. 588.* *R. cordata* Thunb. *Fl. jap. p. 60.*

332. *Serissa* Commers.

594. *S. foetida* Comm. *De Cand. Prodr. IV. p. 575.* *Blume Bijdr. p. 969.* — *Lycium japonicum* Thunb. *Flor. jap. p. 93. tab. 17.*

333. *Paederia* Linn.

595. *P. foetida* L. *De Cand. Prodr. IV. p. 471.* Thunb. *Fl. jap. p. 106.* Kämpfer *Icones tab. 9.*

Recedit a specc. indicis foliis subtus ad venas pubescentibus et pedunculis quam petioli brevioribus.

334. *Mitchella* L.

596. *M. undulata* S. et Z. *M.* caulibus filiformibus repentibus, foliis e basi rotundata acutis margine undulatis glabris, floribus terminalibus geminis subsessilibus ovario concretis, calycis laciniis irregulariter trifidis.

Caules filiformes radicales radiculis filiformibus, ramosi. Folia opposita petiolata, petiolis 1—2" longis uti tota planta glabris; lamina e basi rotundata vel subtruncata ovata acuta margine undulata et inde quasi crenata, subtus pallida, 4—5" longa, 2—3" lata. Stipulae connatae minutae lanceolatae acutae. Flores inter summa folia terminales gemini sessiles ovario concreti. Calycis quadrifidi lacinae deltoideae, hinc vel utrinque lacinulis subulatis brevioribus auctae indeque trifidae. Corollae tubus cylindricus, limbus quadrifidus laciniis ovato-oblongis ad faucem intus barbatis superne glabris. Omnibus partibus quam *M. repens* minor et gracilior.

335. *Damnacanthus* Gaertn. (et *De Cand. Prodr.* — *Baumannia* *De Cand. Act. Genev.*)

Calycis tubus urceolatus limbo quadrifido. *Corolla* infundibuliformis tubo cylindrico limbo quadrifido, fauce vel et in laciniis hirsuta, *Stamina* 4, corollae tubo adnata, apice tantum libera; *antherae* oblongae inclusae vel subexsertae. *Ovarium* inferum quadriloculare loculis uniovulatis, vertice nectario urceolato coronatum. *Stylus* filiformis inclusus vel exsertus. *Stigma* quadrifidum lobis linearibus vel oblongis. *Bacca* globosa carnosae, calyce coronata, tetra-vel abortu di-tricocca; cocci cartilaginei, monospermi. *Semen* convexoplanum testa tenuiter membranacea albumini carnosae adnata. Embryo minutus, basilaris, radícula infera, cotyledonibus brevibus.

Frutices humiles ramis dichotomis divaricatis flexuosis. *Folia* sempervirentia, opposita, subsessilia, ovata, mucronata, coriacea. *Sti-*

pulae breves connatae interpetiolares, spinam subulatam in axilla gerentes. *Flores* axillares, gemini, subsessiles.

Genus inter *Nerteram* et *Mitchellam* ponendum. Conf. *Zuccarini* in *Gelehrte Anzeigen der k. Akad.* 1846 n. 39. p. 313.

597. *D. indicus* Gaertn. *D.* ramis divaricato-flexuosis, foliis brevissime petiolatis ovato-suborbicularibus cuspidatis glabris coriaceis rigidis, calycis laciniis lineari-lanceolatis acuminatis, stigmatis laciniis linearibus. Gaertn. *Fil. Carpol.* III. p. 18. tab. 182 et ejusdem fide *Carissa spinarum* Thunb. *Flor. jap.* p. 108. *So no ki aliis* Sirà et *Firasi* Kämpfer *Amoen.* p. 784. *De Cand. Prodr.* IV. p. 473. — *Baumannia geminiflora* De Cand. in *Mém. de Phys. et d'Hist. nat. à Genève* Vol. VI. c. icone.

Frutex humilis ramosissima ramis tenuibus dichotome divaricatis flexuosis, novellis setis seu squamulis adpressis furfuraceis. Folia opposita brevissime petiolata petiolis vix lineam longis; laminae basi rotundata vel subcordata ovato-suborbicularis breviter cuspidata integerrima, subtus in nervo medio pubescens ceterum glabra evenia coriacea, 5—6" longa, 3—4" lata. Stipulae interpetiolares connatae brevissimae late deltoideae. Spina ex axilla cujusvis stipulae simplex subulata recta strictissima, 4—8" longa. Flores in axillis foliorum gemini rarius solitarii, subsessiles. Calyx superus cupularis pubescens; limbus quadrifidus laciniis lineari-lanceolatis acuminatis tubum superantibus sinibus rotundatis. Corollae albae tubus cylindricus tenuis glaber superne parum ampliatus, fauce barbatus, 3—4" longus; limbus quadrifidus laciniis oblongis acutiusculis patentibus basi villosis. Stamina filamenta fundo corollae inserta agglutinata apicem versus libera, filiformia; antherae supra basin affixae, oblongae, semiexsertae. Ovarium globosum, quadriloculare loculis uniovulatis. Stylus simplex filiformis, staminibus subbrevior; stigma quadripartitum, laciniis linearibus papillois. Bacca globosa magnitudine pisi minoris, carnosa, calyce persistente coronata tetra- vel abortu tri-dicocca coccis cartilagineis monospermis.

598. *D. major* S. et Z. *D.* ramis divaricato-flexuosis, foliis brevissime petiolatis ovatis vel ellipticis acutis glabris coriaceis rigidis, calycis laciniis ovato-lanceolatis acutis, stigmatibus laciniis oblongis obtusis.

Praecedenti valde affinis sed omnibus partibus major ac robustior notis supra indicatis certe diversa.

336. *Hedyotis* Gaertn.

599. *H. cordata* Zuccar. *H.* foliis sessilibus e basi cordata late ovatis cuspidatis integerrimis coriaceis utrinque glabris, praeter nervum medium eveniis, stipulis vaginantibus late ovatis mucronatis persistentibus; corymbo terminali folia superante denso, calycis quadridentati dentibus ovatis acutis, fauce nuda, corolla breviter tubulosa fauce barbata profunde quadripartita laciniis linearibus, staminibus exsertis.

Tota glabra. Rami tetragoni. Folia sessilia decussata basi cordata lobis rotundatis, late ovata acuta vel cuspidata integerrima glabra $1\frac{1}{2}$ —2" longa, 10—15''' lata. Corymbi terminales fastigiati multiflori densi plerumque basi foliis duobus suffulti; rami dichotomi tetragoni pubescentes. Calyx campanulatus, 4dentatus, glaber. Corolla brevissime tubulosa tubo calycem aequante, limbo quadripartito aciniis longis linearibus. Stamina imo tubo inserta filiformia, longitudine corollae. Discus ovarium obtegens concavus glaber. Stylus filiformis stigmate bifido, laciniis linearibus.

Crescit in insulis Bonin-sima, unde specc. a beato Mertens lecta vidi in herb. Acad. Imper. Petropolitanae.

337. *Ophiorrhiza* L.

600. *Oph. japonica* Blume *Bijdr.* p. 978. *De Cand. Prodr.* IV. p. 416.

Caulis herbaceus radicans, ramosus, ramis novellis petiolis et pedunculis ferrugineo-hirtis. Folia opposita petiolata petiolis 4—6''' longis; lamina ovata vel ovato-oblonga utrinque attenuata vel basi rotundata, acuta, superne setulis parvis adspersa subtus pallidior vel

soepe rubens, 1—2" longa, 6—12" lata. Stipulae minimae. Corymbi terminales dichotomi multiflori. Bracteae lineares pedicellos aequantes vel superantes. Calycis tubus subvillosus, lacinae lanceolatae acutae soepius subinaequales. Corolla coccinea, longe tubulosa tubo cylindrico sursum parum dilatato pubescente, limbo quinquefido, laciniis ovato-oblongis obtusis intus hirsutis.

338. *Nuclea* L.

601. *N. racemosa* S. et Z. — *N.* foliis longe petiolatis e basi rotundata vel subcordata ovatis acuminatis praeter venas subtus puberulas glabris, stipulis caducis, pedunculis 5—9 in racemos terminales decussatos congestis tenuiter tomentosis capitulo duplo longioribus, calycis tomentosi laciniis abbreviatis ovatis acutiusculis.

Rami obtuse tetragoni, novelli subtomentosi. Folia opposita longe petiolata, petiolis 1—3" longis; lamina folii e basi late rotundata vel subcordata ovato-acuminata, superne glabra lucida, subtus ad venas parce pubescens. Stipulae ovato-oblongae fugaces. Pedunculi 5—9 abortu foliorum in racemos terminales dispositi et inferiores soepius axillares, subtetragoni, stricti, tenuiter tomentosi, circiter pollicares, ad basin capitulorum bibracteolati. Calyces ferrugineo-tomentosi, laciniis brevibus ovatis acutiusculis vel obtusis. Corollae tubus gracillimus, limbus urceolatus laciniis ovatis obtusis pubescentibus. Styli pars exserta corollae tubum aequans.

339. *Gardenia* Ellis.

602. *G. florida* L. Thunb. *Fl. jap.* p. 108 et Auct.

603. *G. Maruba* Sieb. in *Blume Bijdr.* p. 1015. *G.* inermis ramulis novellis pubescentibus, foliis oppositis ternisve subsessilibus utrinque attenuatis, oblongis vel obovato-oblongis, acutis vel acuminatis utrinque glabris subtus pallidis, stipulis connatis ovatis acutis, floribus terminalibus solitariis subsessilibus hexameris, calycis laciniis linearibus mucronatis patentibus, tubo corollae cylindrico brevioribus, limbi laciniis inaequilateris subcultratis obtusis.

Folia 2—3½" longa, 8—15" lata, oblonga, obovato-oblonga vel rarius lanceolata. Calycis laciniae 8" longae; corollae tubus soepius pollicaris. Antherae exsertae lineares. Stigma crassissimum clavatum bilobum.

604. *G. grandiflora* Lour. *fl. cochin.* p. 182. *Siebold Annuaire l. c.* p. 29.

605. *G. radicans* Thunb. *fl. jap.* p. 109.

104. (125 Endl.) CAMPANULACEAE De Cand.

340. *Campanumoea* Blume.

606. *C. lanceolata* S. et Z. *Flor. jap. I.* p. 174. *tab. 91.* Thunb. *Flor. jap. plant. obscur. n. 21.* p. 353.

341. *Platycodon* A. De Cand.

607. *Pl. grandiflorum* Alph. De Cand. *Prodr. VII.* p. 422. — *Wahlenbergia grandiflora* Schrad. — *Campanula grandiflora* Jacq. *hort. Vindob. III.* p. 4. *tab. 2.*

β. *glaucum*, foliis caulinis numerosioribus magis approximatis subtus intensius glaucis vel albicantibus. *Camp. glauca* Thunb.

Flor. jap. p. 88. — *Kekko vulgo kikko et kirukao* Kämpf.

Amoen. p. 822. — *Fortune plant. exsicc. chin. n. 149.*

342. *Wahlenbergia* Schrad.

608. *W. marginata* Alph. De Cand. *Monogr. Campan. p. 144.* *Prodr. VII. p. 433.* *Campan. marginata* Thunb. *Flor. jap. p. 89.* *Decades plant. jap. 3. c. ic.* — *Camp. gracilis var.* Spreng. *Syst. Veget. I. p. 736.*

Radix perennis. Caules plures herbacei vel basi lignescentes decumbentes ramosi, ramis gracilibus erectis sulcatis glabris. Folia sessilia, linearia vel inferiora lineari-lanceolata utrinque attenuata acuta, margine albida, undulata et remote subserrulata, parce pilosa vel glabra, vix pollicaria. Pedunculi ex apice ramulorum elongati, 2—5" longi, nudi, uniflori. Calycis glabri laciniae lanceolatae acutae dimidium corollae campanulatae coeruleae aequantes.

343. *Campanula* L.

609. *C. Trachelium* L. *Thunb. Fl. jap. p. 88.* *A. De Cand. Prodr. VII. p. 469.* A planta europaea nullo modo diversa.

610. *C. remotiflora* S. et Z. *C.* radice perenni, caulibus herbaceis teretibus erectis uti tota planta glabris, foliis inferioribus petiolatis e basi cordata vel rotundata ovatis vel ovato-lanceolatis, superioribus sessilibus, utrinque attenuatis lanceolatis vel lineari-lanceolatis, omnibus acuminatis inaequaliter argute serratis, floribus in racemum terminalem pauci-(6—8) florum dispositis a se invicem remotis pedunculatis, calycis tubo brevissimo, laciniis linearibus vel lineari-lanceolatis glabris vel ciliato-hispidis, corolla glabra, stylo subexserto stigmate trilobo.

Folia caulina remota pauca, summa sessilia linearia. Flores distantes bractea lineari suffulti pedunculati, pedunculo bracteam (soepe plus quam duplo) superante. Calycis lacinae patentes dimidium corollae tubum aequantes, lineares glabrae, vel lineari-lanceolatae et margine pilis longis albidis ciliato-hispidae.

344. *Adenophora* Fisch.

611. *A. verticillata* Fisch. *A. De Cand. Prodr. VII. p. 492.* — *Campan. tetraphylla* Thunb. *Flor. jap. p. 87. et Auct.*

Var. foliis verticillatis et oppositis oblongis vel lineari-lanceolatis, ramis paniculae vel verticillatis brachiatis vel oppositis alternisve adscendentibus.

345. *Isolobus* De Cand.

612. *J. radicans* D. C. *Prodr. VII. p. 353.* — *Lobelia Erinus* Thunb. *Fl. jap. p. 325.* *L. radicans* Thunb. *Act. Linn. II. p. 330.*

613. *J. campanuloides* De Cand. *Prodr. VII. p. 353.* — *Lobelia erinoides* Thunb. *Fl. jap. p. 326.* *L. japonica* Dietrich.

Occurrunt praeterea Lobeliaceae tres nondum determinatae.

106. (120 Endl.) COMPOSITAE *Iuss.*346. *Adenostemma* Forst.

614. *A. viscosum* Torst. — *Verbesina Lavenia* Thunb. *Flor. jap.* p. 321. — *A. erectum* D. C. vel vera *Verb. Lavenia* L. recedit a planta nostra akeniis laevibus.

347. *Nardosmia* Cass.

615. *N. japonica* S. et Z. An *Tussilago Petasites* Thunb. *Fl. jap.* p. 314? Folia radicalia desunt. Squamae scapi oblongae vel inferiores ovatae acutiusculae, involucri lanceolatae acutae vel obtusae discum subaequantes. Capitula in thyrsum fastigiatum disposita, pedunculi bracteis 2—3 linearibus muniti uti scapus subvillosi.

348. *Eupatorium* Tourn.

616. *E. Finlaysonianum* Wall. *De Cand. Prodr. V.* p. 179 et ex ejusdem sententia *Eup. album* Thunb. *Fl. jap.* p. 308.

617. *E. chinense* L. Thunb. *l. c.* Dubitat clar. De Cand. num planta japonica eadem sit ac chinensis.

618. *E. japonicum* Thunb. *l. c.* Quaerit cl. Willdenow an ab *E. cannabino* sit satis diversum.

Quid *E. hyssopifolium* Thunb. *l. c.*, a planta Linneana certe diversum.

349. *Aster* Nees.

619. *A. japonicus* Less. *De Cand. Prodr. V.* p. 228. — *Inula dubia* Thunb. *Flor. jap.* p. 318.

620. *A. tataricus* L. *fl. De Cand. Prodr. V.* p. 230.

Folia in specc. nostris lanceolata utrinque attenuata medio serrata, summa linearia integerrima, utrinque sed praesertim margine et subtus setulis decumbentibus aspera. Flores in corymbum fastigiatum dispositi, ramis bracteis linearibus brevibus obsitis, pedunculis subundis. Involucri squamae lanceolatae acutae apicem versus subserrulatae. Pappus rufescens. Specimina sibirica herbarii Ledebouriani optime cum nostris conveniunt.

350. *Tripolium* Nees.

621. *Tr. vulgare* Nees. *De Cand. Prodr. V. p. 253.* — *Aster Tripolium* L.

351. *Calimeris* Nees.

622. *C. amplexifolia* S. et Z. *C. caule flexuoso uti tota planta pubescenti-scabriusculo, foliis sessilibus, inferioribus basi rotundata subamplexicaulibus oblongis acuminatis grosse serratis serraturis mucronatis, summis lanceolatis integerrimis subpetiolatis, corymbis fastigiatis, invol. squamis biseriatis lineari-lanceolatis obtusis vel acutiusculis pubescentibus, pappo scabro (rufo), in floribus disci corollis brevior.*

Caulis flexuosus subangulatus uti tota planta setulis decumbentibus pubescens et subcanescens. Folia sessilia basi subattenuata rotundata et subamplexicaulia, oblonga vel oblongo-lanceolata, longe acuminata, grosse et remote serrata serraturis mucronatis, 2—3½ longa, 10—18" lata; folia summa soepius brevissime petiolata, lanceolata basi rotundata integerrima. Corymbus terminalis multiflorus. Involucri foliola biseriata, exteriora breviora, lineari lanceolata, obtusa vel acutiuscula, apicem versus pubescenti-hirta. Flores radii circiter 15, coerulescentes. Achenia compressa, pilis albis hirta. Pappus uniserialis setis numerosis inaequalibus scabris rufis.

352. *Döllingeria* Nees.

623. *D. scabra* Nees. *De Cand. Prodr. V. p. 263.* — *Aster scaber* Thunb. *Fl. jap. p. 316.*

Specimina nostra incompleta.

353. *Callistephus* Cass.

624. *C. sinensis* Cass. — *Aster chinensis* Thunb. *l. c. p. 316.* et *Auct.*

354. *Heteropappus* Less.

625. *H. incisus* S. et Z. *H. hispidus* Lessing *Synops. p. 189. De Cand. Prodr. V. p. 297. Aster hispidus* Thunb. *Flor. jap. p. 315 et Banks Icones Kämpfer. tab. 29.* — *Keitsjo vulgo Jomega Fagi Kämpfer Amoen. p. 876. Calimeris hispida* Nees *Aster p. 227.*

Planta sibirica et daurica, a japonica nullo modo diversa, est simul: *Calimeris incisa* De Cand. l. c. p. 258. — *Aster incisus* Fisch. Mem. soc. mosq. III. p. 76 et Lessing Synops. p. 163. — *Grindelia incisa* Spreng. Syst. III. p. 575. *Kalimeris platycephala* Cassin. dict. 24. p. 325.

Nomen mutavimus quum nec japonica nec sibirica planta hispida dici possit. Caulis et folia setulis adpressis brevissimis scabriuscula. Folia inferiora oblonga vel rarius obovata subsessilia utrinque attenuata, grosse inciso-serrata, summa lineari-lanceolata integerrima. Involucri squamae lanceolatae acutae sursum ciliatae et pubescentes vel glabrae. Radius pallide coeruleus. Achenia compresso-plana marginata hirta. Pappus in floribus radii brevissime setosus setis basi in coronulam subconnatis, in floribus disci longior attamen akenium non aequans, uniserialis, rufescens, vel soepius abbreviatus ut in radio setulis nonnullis longioribus intermixtis.

Es ist sonderbar, dass man bei Bestimmung dieser wie vieler anderer japanischer Pflanzen die südöstliche Flora von Sibirien ganz ausser Acht liess und gleichsam a priori immer die vorkommenden Pflanzen als different annahm. Daraus erklärt sich zum Theil, dass Lessing, welcher in seiner Synopsis nach der japanischen Pflanze die Gattung *Heteropappus* aufstellt, von der sibirischen, dem *Aster incisus* Fisch, ebendasselbst p. 163 sagt, es sei kein Grund, sie von *Aster* zu trennen!

626. *H. subserratus* S. et Z.

H. caule tereti scabriusculo, foliis (caulinis) sessilibus linearibus acutiusculis, inferioribus apicem versus remote serratis superioribus integerrimis omnibus utrinque scabris, involucris squamis biserialibus linearibus acuminatis hirtis, acheniis compressis marginatis hispidis, radii pappo abbreviato setoso setis basi connatis albis coroneiformi, disci setoso scabro rufo.

Folia inferiora in specc. nostris desunt. Caulina media linearia utrinque attenuata acutiuscula sesqui—bipollicaria, medio remote serru-

lata, superiora sensim breviora integerrima. Corymbus laxis ramis fastigiatis paucifloris foliosis. Radii flores coerulei.

627. *H. rigens* S. et Z.

H. caule tereti scabro, foliis sessilibus basi attenuatis lineari-subspathulatis obtusis vel acutiusculis integerrimis utrinque scabris firmis rigidiusculis, corymbo laxo fastigiato, ramis uni-vel paucifloris foliosis, involucri squamis biseriatis linearibus acutis vel acuminatis scabris subciliatis, pappo radii coroneiformi abbreviato albo, disci setoso setis scabris ferrugineis.

Habitu cum majoribus *Cal. altaicae* varietatibus bene convenit, sed pappi structura facillime distinguenda. Folia pollicaria vel sesquipollicaria 2—4^{'''} lata acutiuscula vel obtusa et brevissime mucronata, utrinque scabra, ramea superiora multo minora ad capitula usque producta approximata. Rami uni-vel pauciflori. Radius multi-(25—30-) florus, albus?

355. *Conyza* Less.

628. *Conyza japonica* Less. *De Cand. Prodr. V. p. 382.* — *Erigeron japonicum* Thunb. *Fl. jap. p. 312.*

356. *Asteromaea* Blume.

629. *A. indica* Blume. *De Cand. Prodr. V. p. 302.* — *Aster indicus* Thunb. *Flor. jap. p. 316.*

357. *Inula* Gaertn.

630. *J. Helenium* L. Thunb. *Flor. jap. p. 317.*

Planta ab europaea praeter capitula plerumque parum minora nullo modo diversa.

631. *J. japonica* Thunb.

J. caule herbaceo erecto subvillosa ramoso, foliis sessilibus subamplexicanlibus, oblongo-lanceolatis vel lanceolatis, acuminatis, remote denticulatis, superne glabris subtus plus minus sericeo-pubescentibus, ramis uni-vel paucifloris longis in corymbum laxum dispositis, capitulis basi plerumque uno alterove foliolo suffultis, involucri squamis

linearibus acuminatis, exterioribus sericeo-pubescentibus, interioribus ciliato-serrulatis, pappi setis subulatis scabris albidis.

J. japonica Thunb. *Fl. jap.* p. 318. *De Cand. Prodr. V.* p. 471. — *Banks Icon. Kaempfer. tab.* 30. *Sen fuku vulgo Oburuma Kämpf. Amoen.* p. 877.

Descriptio Thunbergiana optime in plantam nostram quadrat, icon Kämpf. foliis latioribus et ramis magis foliosis parum recedit.

358. *Eclipta* L.

632. *E. prostrata* L. Thunb. *Fl. jap.* p. 321. *De Cand. Prodr. V.* p. 490.

359. *Siegesbeckia* Linn.

633. *S. orientalis* L. Thunb. *Fl. jap.* p. 321. *De Cand. Prodr. V.* p. 495.

360. *Xanthium* Tourn.

634. *X. Strumarium* L. *De Cand. Prodr. V.* p. 523.

361. *Helianthus* L.

635. *H. annuus* β . *pumilus* Pers. *De Cand. Prodr. V.* p. 585.

In hortis cultus.

362. *Porophyllum* Vaill.

636. *P. japonicum* *De Cand. Prodr. V.* p. 650. *Sieb. et Zuccar. Fl. jap.* p. 161. *tab.* 84. — *Senecio japonicus* Thunb. *Flor. jap.* p. 315. — *Kleinia japonica* Lessing in *Linnaea* 1831. p. 134.

363. *Bidens* Linn.

637. *B. chinensis* Willd. *Specc. plant. III.* p. 1719. *B. leucantha* *De Cand. Prodr. V.* p. 598. — *B. pilosa* Thunb. *Fl. jap.* p. 307.

364. *Ptarmica* Tourn.

638. *Pt. sibirica* Ledeb! *Flor. ross. II.* p. 528. (*Ind. sem. hort. dorp. 1811*). *Pt. mongolica* *De Cand. Prodr. VI.* p. 22. — *Achillea mongolica* Fischer in litteris.

Specimina japonica a dauuricis in herb. Ledebouriano aliisque a cl. Turczaninof communicatis nullo modo differunt.

Hasskarl (*Catal. hort. Bogor. p. 101*) führt *Achillea squarrosa* Ait. als aus Japan in den Garten zu Buitenzorg übersiedelt auf. Ohne Zweifel ist auch dieses unsre Pflanze, von welcher aber die Willdenow'sche Definition durch pinnas verticales abweicht.

365. *Pyrethrum* Gaertn.

639. *P. sinense* Sabine. *De Cand. Prodr. VI. p. 62. Chrysanth. indicum* Thunb. *Flor. jap. p. 320.* — *Kik, Kikf vel kikku* Kämpfer *Amoen. p. 875. et varietates p. 876, 877.*

640. Species nondum determinata.

366. *Chrysanthemum* D. C.

641. *Chr. coronarium* L. *Thunb. Flor. jap. p. 320.*

Adnotatio. Chrysanth. japonicum Thunb. l. c. fide clar. Lessing (*Linnaea* 1831. p. 218.) delendum, nam specimen in herbario Thunberg. sub hoc nomine asservatum est ramulus folia tantum gerens *Artemisiae japonicae*.

367. *Artemisia* Linn.

642. *A. borealis* Pall. *De Cand. Prodr. VI. p. 98.*

Folia radicalia longe petiolata sericeo-cana pinnatifida laciniis linearibus soepe elongatis planis simplicibus bifidis vel incisis; can-
lina superiora linearia; racemus paniculatus, capitula nutantia.

643. *A. japonica* Thunb. *Fl. jap. p. 310. De Cand. l. c. p. 100.*

Varietatibus procerioribus *A. desertorum* Spreng. similis, sed jam capitulis multo minoribus diversa. Folia inferiora cuneata obovata apice rotundata inciso-trifida, laciniis lineari-oblongis argute serratis, superiora e basi cuneata lineari-oblonga apice tridentata, summa linearia, omnia rigida glabra. Capitula parva, globosa, squamis rotundatis glabris.

644. *A. vulgaris* L. *Thbg. Fl. jap. p. 310.*

Specimina nobis obvia ad varietatem integrifoliam (*A. integrifoliam* L.) pertinent.

645. *A. indica* Willd. *De Cand. Prodr. VI. p. 114.*

646. *A. annua* L. *De Cand. Prodr. VI. p. 119.*

647. 648. Species duae e specc. incompletis nondum determinatae.

Art. minima Thunb. l. c. p. 311. est *Myriogyne minima* Less.
368. *Myriogyne* Less.

649. *M. minima* Less. Linn. 1831. p. 219. *De Cand. Prodr. VI.* p. 139. — *Artemisia minima* Thunb. *Flor. jap.* p. 311. — *Cotula minima* Forst. *Prodr.* 301. *C. minima et cuneifolia* Willd. *sp. plant. III.* p. 2169. — *Grangea minima et cuneifolia* Poir. *Suppl. II.* p. 825.

369. *Gnaphalium* D. Don.

650. *Gn. confusum* D. C. *Prodr. VI.* p. 222. — *Gn. arenarium* Thunb. *Fl. jap.* p. 312. — *Gn. martabanicum* Wall.

Folia caulina inferiora late linearia vel subspathulata obtusa, superiora acuta mucronata mucrone calvo.

651. *Gn. japonicum* Thunb. *Fl. jap.* p. 311?

Dem einzigen vorliegenden Exemplar zu Folge scheint die Pflanze eher zu *Helichrysum* zu gehören. Stengel und Blätter stimmen mit der Thunbergschen Beschreibung überein, aber die Blüthenköpfchen sind nicht röthlich, sondern rein weiss.

370. *Carpesium* Linn.

652. *C. divaricatum* S. et Z.

C. pubescenti-hirtum, ramis divaricatis, foliis breviter petiolatis ovato-oblongis oblongis lanceolatisve utrinque attenuatis acutis remote denticulatis utrinque sed praesertim subtus pubescentibus, capitulis cernuis, bracteis foliaceis petiolatis spathulatis suffultis, invol. squamis exterioribus foliaceis patulis, interioribus obtusis vel acutiusculis apice irregulariter denticulatis, corollae tubo cylindrico. *Carp. cernuum* Thunb. *Flor. jap.* p. 312.

C. cernuo affine differt foliis minutim denticulatis, capitulis duplo minoribus, involucri squamis interioribus acutiusculis nec rotundatis.

653. *C. Thunbergianum* S. et Z. *C. villosopubescens*, foliis caulinis inferioribus breviter petiolatis ovato-ellipticis utrinque atte-

nuatis acutis denticulatis, superioribus subsessilibus lanceolatis, capitulis inferioribus axillaribus solitariis vel spicatis, summis aphyllis sessilibus in spicam laxam dispositis, omnibus erectis, squamis exterioribus parvis foliaceis patentibus, interioribus erectis obtusis ciliato-fimbriatis, corolla fauce campanulata. *C. abrotanoides* Thunb. *Flor. jap.* p. 312.

Caulis stricte erectus. Capitula inferiora axillaria plerumque plura in spicam brevem disposita, superiora solitaria sessilia absque folio fulcrante indeque in spicam laxam erectam nudam congesta. Squamae exteriores foliaceae breves villosae, interiores erectae ovato-oblongae rotundatae margine fimbriato-ciliatae, ceterum glabrae, stramineae. Corollae tubus basi cylindricus, superne campanulato-ampliat. Achenia infra areolam glanduloso-scabra.

371. *Ligularia* Cass.

654. *L. Kämpferi* S. et Z. *Fl. jap.* I. p. 77 tab. 35. — *Senecio Kämpferi* De Cand. *Prodr.* VI. p. 363. — *Tussilago japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 313. — *Tswa Kämpfer* Amoen. p. 827. *Banks Icones Kämpfer.* tab. 27. 28.

655. *L. gigantea* S. et Z. *Flor. jap.* I. p. 79. tab. 36.

Lessing und De Candolle stellen die erstere Art zu *Senecio*. Aber die Narbenschkel sind doch auch unter der Spitze kurz gebartet, der fast borstige nach oben gezähnelte Pappus ist bleibend und der Habitus ist dem der sibirischen *Ligularien* so ähnlich, dass wir beide Arten letzterer Gattung zuzuzählen uns berechtigt glaubten.

372. *Erythrochaete* S. et Z.

Capitulum multiflorum radiatum, fl. radii uniseriatis 12—20 ligulatis foemineis, disci tubulosis 5dentatis hermaphroditis. Involucrum uniseriale, 8—12-phyllum, foliolis margine membranaceis. Receptaculum nudum, planum. Stylus disci ramis linearibus obtusis vel acutiusculis superne calvis subtus in apicem usque pubescentibus. Achenia eroστria, glabra. Pappus pluriserialis, simplex, pilosus, inaequalis, scaber, rubens.

Herba foliis alternis caulinis palmatifidis petiolatis, petiolis basi vaginantibus, capitulis terminalibus subcorymbosis.

656. *E. palmatifida* S. et Z. E. caule tereti, foliis inferioribus petiolatis, petiolo basi late vaginante sursum canaliculato, lamina circumscriptione semiorbiculari tripartita, segmentis lateralibus bi-, intermedio trifidis, laciniis profunde et inaequaliter inciso-serratis vel subpinnatifidis lobis dentibusque acuminatis, racemo terminali fastigiato paucifloro, pedunculis brevibus patentibus tomentoso-fuscescentibus. — *Arnica japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 319. *Icones plant. jap.* dec. 4. — *Ligularia japonica* dec. 4. *Lessing Synops.* p. 319 et ejusdem fide. *De Cand. Prodr.* VI. p. 316.

Caulis herbaceus crassitie pennae anserinae, teres glaber, apice aequae ac pedunculi lanugine floccosa derasili tomentoso-fuscescens. Folia caulina inferiora petiolata, petiolo 3—4" longo, ab insertione ad $\frac{1}{3}$ longitudinis late vaginante inde apicem versus semitereti canaliculato; lamina semiorbicularis basi subtruncata profunde tripartita, segmentis lateralibus bifidis, intermedio trifido, laciniis iterum apice bi-trifidis et grosse inciso-serratis lobis serraturisque acuminatis, subtus ad venas pubescens ceterum glabra, 6—9 pollices longa et lata; folia superiora sensim minora petiolo multo breviora toto vaginante. Capitula 5—10 in apice caulis in racemum brevem fastigiatum basi subramosum dispositi; pedunculi breves subdivaricati lanuginosi. Involucri squamae uniseriatae ovato-lanceolatae acutae margine plus minus membranaceae dorso subvillosae, numero inter 8 et 12 variantes. Flores radii radiantes ligulati foeminei (e Thunbergio rubri), ligula longa apice tridentata tripla longitudine pappi; corollae disci longe tubulosae vel subclavatae, 5-fidae, glabrae, dupla fere longitudine pappi. Antherae corollae longitudine acutae basi muticae. Stylus exsertus cruribus linearibus obtusiusculis superne subcanaliculatis calvis, subtus in apicem usque papillis cylindricis barbatis nec in conum terminatis. Achenium glabrum, sessile, erostre, teretiusculum? Pappus sessilis pluriseriatus simplex pilosus ruber; pili validi

inaequales scabri vel ad lentem denticulati dentibus diametrum pili aequantibus.

Arnica ciliata Thunb. ist nach Lessing eine Cichoracea, *A. palmata* Ejusd. wahrscheinlich unsere *Cacalia delphiniifolia*.

373. *Cacalia* De Cand.

657. *C. delphiniifolia* S. et Z. C. caule erecto uti tota planta glabro, foliis inferioribus petiolatis e basi cordata suborbicularibus 5—9-partitis, laciniis lanceolatis grosse et inaequaliter inciso-serratis acuminatis, superioribus subsessilibus 3—5-lobis lobis subintegerrimis acuminatis, panicula terminali multiflora, capitulis cylindricis subquinquefloris, involucris pentaphyllis, corollae laciniis lineari-lanceolatis apice penicillato-barbatis. — *Arnica palmata* Thunb. *Fl. jap.* p. 319? et inde *Senecio palmatus* Lessing *Synops.* p. 392. — *De Cand. Prodr.* VI. p. 433.

Caulis herbaceus bipedalis basi subflexuosus, sulcatus, erectus. Folia inferiora petiolata petiolo 2—3-pollicari basi non vaginante, lamina e basi cordata suborbiculari palmatifida, 5—9-nervia totidemque lobata, lobis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis acuminatis grosse et inaequaliter sinuato-serratis vel incisis, extimis multo brevioribus, 4—5" longa, 5—6" lata; folia superiora in petiolis vix lineam longis semipollicaria, minora, 3—5-loba lobis deltoideis acuminatis integerrimis. Panicula erecta multiflora; rami erecto-patentes, racemosi. Capitula gracilia cylindrica quinqueflora. Involucrum 5-phyllum, squamis linearibus acutiusculis glabris, basi squamulis minutis auctum. Corollae lacinae lineari-lanceolatae acutae et in ipso apice penicillo e pilis albis brevibus barbatae. Styli crures longi lineares tenuiter pubescentes, apice truncati penicillato-barbati. Pappus candidus.

658. *C. farfaraefolia* S. et Z. C. caule erecto herbaceo inferne flexuoso apicem versus villosa, foliis petiolatis e basi cordata hastato-subdeltoideis acutis sinuato-dentatis dentibus brevibus mucronatis, ad venas pubescentibus vel totis glabris, panicula terminali mul-

tiflora, ramis racemosis, capitulis cylindricis quinquefloris, involucris pentaphyllis, corollae laciniis lanceolatis apice nudis.

Caules bipedales, teretes, basi flexuosi sursum recti et lanugine derasili villosi. Folia inferiora longe petiolata petiolo 2—3-pollicari; lamina basi profunde cordata et lobis angulato-patentibus hastata, late deltoidea acuta, margine remote et sinuato-dentata dentibus brevibus dilatatis, in mucronem subulatum terminatis, 3—4" longa et lata; folia superiora multo minora, brevius petiolata et in petiolum attenuata, inciso-dentata. Panicula erecta multiflora; rami racemosi capitulis breviter pedunculatis subsecundis cylindricis; involucri squamae lineari-oblongae obtusiusculae. Corollae glabrae. Pappus candidus.

659. Tertiae speciei antecedentibus affinis specimina haud suppetunt.

374. *Senecio* Less.

660. *S. subensiformis* D. C. *Prodr.* VI. p. 363. *Senecio Lessing Synops.* p. 392. *Cineraria japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 317.?

Unsre unvollständigen Exemplare gestatten nicht die Identität mit der Thunbergschen Pflanze mit voller Sicherheit zu ermitteln. Die Blätter stimmen allerdings überein, aber die Blüthenköpfchen sind ziemlich zahlreich in einem einfachen Doldenstrausse, die vielblättrigen Hüllen glatt, die Blättchen linealisch, spitzig, die Randblüthen strahlig, die Achenien glatt.

375. *Calendula* Neck.

661. Species a *C. officinali* certe diversa.

376. *Saussurea* De Cand.

662. *S. japonica* De Cand. *Prodr.* VI. p. 536. *Serratula japonica* Thunb. *Flor. jap.* p. 305.

Involucri squamae arachnoideo-villosae praeter extimas omnes appendiculatae; appendices suborbiculares aridae violaceae.

377. *Carthamus* Tourn.663. *C. tinctorius* Linn. Thunb. Fl. jap. p. 307.

Nullo modo a planta europaea diversus.

378. *Spanioptilon* Lessing.664. *Sp. lineare* Less. Synops. p. 10. D. Cand. Prodr. VI. p. 621. — *Carduus linearis* Thunb. Fl. jap. p. 305.

Caulis herbaceus erectus sulcatus ramosus, novellus arachnoideo-lanatus, adultior glaber. Folia caulina sessilia subapproximata linearia pungenti-acuminata, basi spinoso-dentata sursum spinulis subulatis adpressis ciliato-serrulata, superne glabra subtus magis minusve arachnoidea indeque virentia vel albida, inferiora 3—4" longa, 3—4'" lata, superiora sensim minora. Capitula solitaria terminalia erecta (non cernua), hemisphaerica. Involucri squamae multiseriatae dense imbricatae, lineares pungenti-mucronatae dorso arachnoideo-floccosae, intimae apice aride subdilatae glabrae. Flores homogami, tubulosi. Achenia glabra. Pappus uniserialis plumosus, cinerascens.

Variat foliis subtus viridibus vel albicantibus.

De Candolle nennt den pappus uniserialis setis paleaceo-setaceis. Lessing spricht dagegen schon im Namen der Gattung (*σπάνιος* rarus und *πτίλον* pluma) aus, dass er gefiedert sey, wie auch unsere Exemplare zeigen. Im Habitus hat die Pflanze Aehnlichkeit mit *Anca-thia igniaria* De Cand. (*Cirsium igniarium* Spreng.)

379. *Cirsium* Tourn.665. *C. japonicum* De Cand. Prodr. VI. p. 640. — *Carduus eriophorus* Thunb. Flor. jap. p. 305.666. Species *C. kamtschatico* Ledeb. De Cand. Prodr. VI. p. 644. affinis, sed specimina nostra nimis manca.

Carduus acaulis Thunb. l. c. an *Cirsium acaule* γ.? Gmelini
C. A. Meyer?

380. *Lappa* Gaertn.

667. *L. major*. Gaertn. — *Arctium Lappa* Thunb. *Flor. jap.* p. 304.

381. *Atractylodes* D. C.

668. *A. lyrata* S. et Z. *A.* caule herbaceo erecto superne ramoso, follis in petiolum brevem decurrentibus inferioribus lyrato-pinnatifidis, lobis lateralibus 2 vel 4 lineari-oblongis terminali maximo obovato, superioribus simplicibus ovato-ellipticis, omnibus acutis mucronatis setulis spinescentibus dense ciliato-serratis, involucri exterioris squamis setaceo-pinnatifidis, interioribus ovatis arachnoideis imbricatis.

Caulis herbaceus erectus inferne teres sursum angulatus, ramosus, glaber vel apicem versus arachnoideus, ad apicem usque foliosus. Folia alterna; inferiora in petiolum decurrentia lyrato-tri—quinqueloba lobo terminali maximo obovato, superiora subsessilia integra ovata vel ovato-oblonga, omnia acuta mucronata, margine setulis ascendentibus spinescentibus dense ciliato-serrata; utrinque glabra, 2—3½" longa, 1—1½" lata. Capitula terminalia solitaria erecta, foliis seu bracteis numerosis setaceo-pinnatifidis cincta. Capitula ipsa globosa involucri squamis ovatis imbricatis arachnoideis. —

Wir bezeichnen die Pflanze vorläufig als eigne Art, da keine der kurzen Beschreibungen Thunbergs von *Atractylis lancea* und *ovata* genau auf dieselbe passt. Wahrscheinlich beschrieb indessen der Verf. der *Flora japon.* seine *A. ovata* nach einem einblüthigen Aste mit oberen ungetheilten Blättern unserer Pflanze. Leider sind übrigens an den uns vorliegenden Exemplaren die Blüthen noch zu wenig entwickelt, um darnach den Gattungsscharacter genauer feststellen zu können.

Acarna chinensis Bunge *Enum. pl. chin.* p. 36 scheint nach der Beschreibung ähnlich, weicht aber durch lederartige dornig doppelt-sägezähne Blätter ab.

382. *Anandria* Siegesb.

669. *Anandria* Lessing in *Linnaea* 1830. p. 346 et ejusdem fide *Perdicium tomentosum* Thunb. *Fl. jap.* p. 319.

De Candolle Prodr. VII. p. 40. zieht *A. radiata* und *discoidea* als Spielarten von *A. Bellidiastrum* zusammen, citirt aber aus Versehen Thunberg bei *A. discoidea* statt bei *radiata*. Hieher gehört auch *Chaptalia lyrata* Bunge *Enum. plant. Chin.* p. 38.

383. *Cichorium* Linn.

670. *C. Intybus* L. Thunb. *Fl. jap.* p. 304.

Thunberg führt auch *C. Endivia* als wildwachsend bei Yedo auf. Ist sie wirklich identisch mit *C. Cosnia* Ham. welche De Candolle als die wilde indische Form von *Endivia* betrachtet?

384. *Picris* Iuss.

671. *P. japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 299. — *P. kamtschatica* Ledeb. *P. dahurica* Fisch. et De Cand. Prodr. VII. p. 129.

Specimina japonica a kamtschaticis et dahuricis praeter flores parum minores nullo modo differunt.

Quid *Picris flexuosa* Thunb. Act. Linn. II. p. 340.?

385. *Youngia* Cass.

672. *Y. Thunbergiana* De Cand. Prodr. VII. p. 192. *Prenanthes lyrata* Thunb. *Flor. jap.* p. 303.

673. *Y. pygmaea* Ledeb. *Fl. ross.* II. — *Prenanthes debilis* Thunb. *Flor. jap.* p. 300. *Icon. plant. jap. dec.* 4. — *Youngia? debilis* De Cand. Prodr. VII. p. 194 et simul *Barkhausia nana* De Cand. l. c. p. 156. — *Prenanthes pygmaea* Ledeb. Act. Petrop. V. p. 553. *P. polymorpha* Fl. Ejusd. *Flor. alt.* IV. p. 144. var. *a.*

Diese Art scheint durch den ganzen Nordosten von Asien verbreitet zu seyn. Exemplare aus der Gegend von Ochozk und aus dem östlichen Sibirien waren mit den japanischen vollkommen übereinstimmend.

Die übrigen von De Candolle wohl mit Recht grösstentheils zu *Youngia* gezogenen Thunberg'schen *Prenanthes*-Arten unterliegen noch genauerer Untersuchung.

386. *Taraxacum* Hall.

674. *T. Dens Leonis* Desf.—*Leontodon Taraxacum* Linn. *Thbg. Flor. jap.* p. 304. Scapus infra capitulum lanuginosus.

Quid *Sonchus oleraceus*, *Serratula tinctoria*, *Carduus acaulis*, *Eupatorium hyssopifolium*, *Artemisia capillacea*, *Abrotanum*, *Erigeron scandens*, *Solidago Virgaurea*, *Arnica ciliata* Thunb.?

107. (119 Endl.) DIPSACEAE. Vaill.

387. *Scabiosa* Linn.

675. 676. Species duae nondum accuratius examinatae. Ex his *Sc. maritima* Thunb. *Fl. jap.* p. 58 non Linn. nec Thunb. *Fl. cap.* p. 531. An *Knautia*?

108. (118 Endl.) VALERIANEAE De Cand.

388. *Patrinia* Iuss.

677. *P. villosa* Sieb. in *Flora* 1828. p. 759. — *Valeriana villosa* Thunb. *Fl. jap.* p. 32.

Caulis herbaceus stricte erectus villosus-scabriusculus. Folia caulina sessilia lyrato-pinnatifida, laciniis lateralibus 2—3 linearibus vel oblongis acutis integerrimis vel subserratis terminali maxima e basi cuneata ovata grosse serrata; superiora lineari-oblonga integerrima, omnia utrinque pilosa. Corymbus brachiatus patens multiflorus; rami dense bifariam hispidi. Flores sessiles; calyces glabri.

678. *P. parviflora* S. et Z.

P. tota glabra, foliis caulinis pinnatifidis, laciniis lateralibus binquejugis lineari-oblongis vel lanceolatis grosse serratis vel subintegerrimis, terminali ovali, lanceolata vel lineari acuminata saepius elongata, corymbo terminali brachiato multifloro, ramis bifariam hispidulis, bracteis ciliatis.

Folia variant lobo terminali laterales aequante vel iisdem duplo longiore, ovato-oblongo, lanceolato vel lineari et vel grosse serrato vel subintegerrimo. Flores congenerum minimi.

Occurrunt praeterea *Valerianae* species duae (ex his *Val officinalis* Thunb. *Fl. jap.* p. 31 non Linn.) et *Valerianella*.

109. (117. Endl.) **PLUMBAGINEAE R. Br.**

389. *Statice* Willd.

679. *St. japonica* S. et Z. *St.* foliis radicalibus obovato-oblongis obtusis mucronatis in petiolo decurrentibus glabris, scapis pluribus paniculatis basi simplicibus acute tetragonis sursum angulatis, panicula pyramidali ramis elongatis subsecundis, spicis tandem distichis subsecundis multifloris, floribus singulis binisve tribracteatis, bracteis duabus inferioribus abbreviatis ovatis mucronatis tertia late ovata obtusa vel cuspidata calycem subaequante, omnibus coriaceis glabris, calycis dentibus subulatis membranaceo-marginatis, tubo quinquenervio nervis basin versus piloso-barbatis. — *Statice Limonium* Thunb. *Fl. jap.* p. 129.

Folia radicalia rosolata, 4" (cum petiolo) circiter longa, 1" lata. Scapi pedales vel sesquipedales foliorum loco squamulis s. bracteis nonnullis lanceolatis acutis muniti. Rami stricte adscendentes basi nudi apicem versus floriferi.

Statice Fortunei Lindl. (*Fortune pl. exsicc. chin. n.* 130) quamvis toto habitu affinis recedit floribus in quovis paniculae ramo in spicam densam fastigiato-glomeratam congestis, bracteis et calycis laciniis late membranaceis rotundatis irregulariter crenulatis. Flores in utraque aurei.

110. (116 Endl.) **PLANTAGINEAE Iuss.**

390. *Plantago* L.

680. Species 4 nondum determinatae.

111. (114 Endl.) **ARISTOLOCHIEAE Iuss.**

391. *Heterotropa* Morr. et De Caisne.

681. *H. asaroides* Mors. et De Caisne. *Nouv. Annales des Sciences natur.* II. p. 314. tab. 10. — *Asarum virginicum* Thunb. *Flor. jap.* p. 190.

Quid *Asarum canadense* Thunb. l. c.?

392. *Aristolochia* Tourn.

682. *Ar. Kaempferi* Willd. A. caule fruticoso volubili, foliis petiolatis e basi cordata late ovatis vel hastato-trilobis, lobis lateralibus rotundatis abbreviatis, terminali ovato-oblongo acuto, omnibus superne glabris subtus canescenti-hirtis, pedunculis nudis unifloris hirtis, perigonio aequae ac ovario extus dense tomentoso, tubo infracto, limbo bilabiato labio superiore breviora rotundato, inferiore late ovato obtuso. *A. Kämpferi* Willd. *Spec. pl. IV. p. 152.* — *San kakso Kämpfer Amoen. p. 884. et Banks Icones Kämpfer. tab. 49.*

Immensum scandens ac repens (*Kämpfer*). Folia longe petiolata, petiolo 1—2" longo; lamina folii basi cordata et inter cordaturae lobos rotundatos cuneatim in petiolum descendens, late ovata vel hastato-triloba lobis lateralibus brevibus rotundatis terminali oblongo acuto, $2\frac{1}{2}$ —3" longa, 2— $2\frac{1}{2}$ lata. Pedunculi nudi ebracteati longitudine circiter petioli, villosi. Ovarium cylindricum dense tomentosum. Perigonium infractum circiter pollicare, extus dense tomentosum, fide *Kämpferi* striatum et variegatum, tubi parte inferiore elliptico-subinflata superiore coarctata cylindrica; limbus bilabiatus labio inferiore majore ovato obtuso.

683. *A. debilis* S. et Z. A. caule herbaceo volubili uti tota planta glabro, foliis petiolatis e basi cordata deltoideo-oblongis obtusis glabris quinquenerviis, stipulis nullis, floribus pedunculatis solitariis ebracteatis, perianthii glabri tubo basi globoso superne constricto cylindrico subarcuato, limbi labio oblique descendente lanceolato acuminato. —

A. longa Thunb. *Flor. jap. p. 144.*

Caulis debilis prostratus vel scandens. Folia breviter petiolata petiolo 4—6" longo; lamina basi profunde cordata cordaturae angulo lobisque rotundatis, deltoideo-oblonga rotundato-obtusa utrinque glabra, quinquenervia nervis 3 mediis parallelis, exterioribus divergentibus, 2" longa, unum lata. Pedunculi solitarii ebracteati nudi pollicares. Perianthium vix pollicare, glabrum; tubus basi globoso-infla-

tus sursum constrictus cylindricus, labium oblique descendens ovato-lanceolatum acuminatum tubum subaequans.

112. (113 Endl.) **PROTEACEAE R. Br.**

393. **Helicia Lour.**

684. *H. lancifolia S. et Z.*

H. ramis angulatis foliis alternis oblongo-lanceolatis oblongisve utrinque attenuatis acuminatis integerrimis vel a medio apicem versus remote et argute serratis utrinque glabris, racemis axillaribus folia subaequantibus cylindricis, pedunculis bifloris parce pilosis, ovario cylindrico glabro, squamis hypogynis rotundatis semiconnatis glabris.

Rami glabri, novelli angulati. Folia alterna breviter petiolata petiolo vix 6" longo semitereti; lamina oblongo-lanceolata vel anguste oblonga, utrinque attenuata acuminata integerrima vel a medio apicem versus remote et argute serrata serraturis subspinescentibus, utrinque glabra, 3—4½" longa, 12—15" lata. Racemi axillares solitarii folia subaequantes erecti cylindrici, fere a basi floriferi; rachis glabra; pedunculi breves 1—2" longi, bracteam lanceolatam acutam superantes, parce pilosi apice bracteolis 2 linearibus minimis aucti; pedicelli uniflori lineam longi. Perianthium basi globosum sursum tenuiter cylindricum vel subfiliforme utrinque glabrum; limbus quadridus laciniis anguste oblongo-spathulatis obtusis. Stamina fanci affixa, filamentis brevibus; antherae lineares connectivo adnatae ejusque apice ultra locula producta obtuse mucronatae, quadriloculares loculis duobus interioribus brevioribus. Ovarium cylindricum, glabrum. Stylus cylindricus stigmate clavato, stamina subaequans. Squamae hypogynae dimidium ovarium aequantes basi connatae rotundatae glabrae.

113. (111 Endl.) **ELAEAGNEAE R. Br.**

394. **Elaeagnus L.**

685—690. *L. crispa, multiflora, umbellata, glabra, macrophylla, pungens* Thunb. *Fl. jap.* p. 66—68.

114. (109 Endl.) **DAPHNOIDEAE** Vent.

395. *Daphne* L.

691. *D. odora* Thbg. *jap.* p. 159 et Auct.

692. *D. japonica* hort. *Lugd.* *D.* foliis subsessilibus e basi longe attenuata oblongis vel oblongo-lanceolatis obtusis vel acutiusculis coriaceis utrinque glabris superne nitidis, floribus e gemmis propriis lateralibus axillaribus, capitatis, capitulis breviter pedunculatis multi-(8—12-)floris, pedunculis basi perulis involucratis praesertim apicem versus villosis, perianthiis glabris, stigmate capitato subsessili.

Rami teretes glabri innovando-subverticillati. Folia alterna subsessilia e basi longe attenuata oblonga vel oblongo-lanceolata, obtusa vel acuta, glabra, coriacea perennia, $1\frac{1}{2}$ —3" longa, 6—10" lata. Flores in ramis anni praecedentis axillares et terminales e gemmis propriis, in capitulum 8—12-florum pedunculatum dispositi; pedunculi basi perulis interioribus involucrati, bracteati bracteis ovato-lanceolatis acutis membranaceis ciliatis, primum nutantes demum erecti apice incrassati et tomentoso-hirti, 3—4" longi. Perianthii tubus cylindricus glaber, limbo 4partito laciniis ovatis acutiusculis. Antherae lineari-oblongae. Ovarium ovatum glabrum. Stigma capitatum, papillosum.

Habitu et floribus viridibus *D. Laureolam* refert.

Einer japanischen Abbildung zufolge findet sich eine Spielart mit fast stiellosen, nur 3—4 blüthigen Köpfchen. Gehört hieher *D. triflora* Lour. *Cochinch.* p. 291?

693. *D. Genkwa* Sieb. et Zuccar. *Flor. jap.* 137. tab. 75.

396. *Edgeworthia* Meisn.

694. *E. papyrifera* S. et Z. *E.* capitulis multifloris breviter pedunculatis subnutantibus primum involucratis demum nudis, floribus praecocibus extus dense sericeo-tomentosis, foliis petiolatis lanceo-

latis utrinque attenuatis acutis pubescentibus et subtus canescentibus deciduis. *Daphne papyrifera* Sieb. in *Act. Batav. XII.* 24. *Hasskarl Catal. hort. Bogor. p.* 92.

Rami stricti teretes glabri, innovando-subverticillati vel furcati. Folia annua, alterna, in superiore ramorum parte approximata et inde soepius subopposita, petiolata petiolo 3''' longo; lamina oblongo-lanceolata vel lanceolata utrinque attenuata acuta superne pilis adpressis pubescens, subtus canescens. Alabrastra capitulorum ex axillis foliorum summorum jam auctumno anni praecedentis, pedunculata, bracteis 5—6 ellipticis acutis involucrata, una cum pedunculo subnuntante tota sericeo-tomentosa, perhyemantia, primo vere tandem evoluta et tum bractearum lapsu nuda. Capitula ipsa hemisphaerica 30—50-flora, floribus densissime coarctatis sessilibus. Perianthium extus totum dense sericeo-tomentosum basi subglobosum demum cylindricum, limbo quadrifido laciniis ovatis obtusis intus glabris. Squamae hypogynae nullae. Stigma longum, subulatum.

397. *Passerina* L.

695. *P. japonica* S. et Z. *P.* frutescens ramis gracilibus, foliis oppositis breviter petiolatis e basi rotundata ovatis vel ovato-ellipticis acutiusculis vel obtusis utrinque glabris, racemis terminalibus simplicibus vel basi trifidis fastigiatis paucifloris, pedunculo communi stricto filiformi, pedicellis brevissimis, stigmate capitato muricato. *Stellera japonica* Siebold in *Act. Batav. XII. p.* 22.

Rami annui gracillimi divaricato-patentes. Folia semper opposita, magnitudine varia, semi—sesquipollicaria, petiolo 1—2''' longo affixa, basi rotundata, ovata vel ovato-elliptica, breviter acutiuscula vel obtusa, utrinque glabra. Racemi terminales in rachi gracillima stricta, trifidi vel simplices, 8—12 flori, fasciculato-fastigiati; flores decussati, brevissime pedicellati pedicellis apice articulatis. Perianthium gracile glabrum, album, tubo cylindrico sursum clavato, limbi laciniis oblongis obtusis. Ovarium ellipticum basi attenuatum substipitatum apice pilosum. Stylus brevissimus sublateralis, stigmate capitato dense muricato. Nux sicca, elliptica, perigonio inclusa.

Die Pflanze hat im ganzen Habitus, vorzüglich aber im Blütenstande viele Aehnlichkeit mit *Daphne virgata* Wall., doch haben wir keine squamas hypogynas wahrnehmen können, wie C. A. Meyer *Bullet. de l'Acad. de St. Petersb.* 1843. p. 356 für die Gattung *Diplomorpha* angibt.

696. *P. Ganpi* S. et Z.

G. suffruticosa, ramis virgatis simplicibus vel superne ramosis et canescenti-hirtis, foliis alternis subsessilibus ellipticis, oblongo-ellipticis vel superioribus lanceolatis, utrinque attenuatis acutis vel obtusis, subtus ad venas pilosis vel novellis canescenti-hirtis, florum capitulis axillaribus pedunculatis 10—12-floris tandem racemosis, perianthii tubo extus canescenti-hirto, stigmate-depresso-capitato papilloso. — *Stellera japonica* Sieboldt l. c.

Rami recti virgati crassitie pennae corvinae, inferne glabri apicem versus canescenti-hirti. Folia annua, alterna approximata brevissime petiolata, e basi attenuata elliptica, oblongo-elliptica vel lanceolata, acuta vel obtusa et mucronata, superne glabra vel parce et subtus ad venas densius pilosa vel novella canescenti-hirta, 10—15" longa, 4—6" lata. Pedunculi versus apicem ramorum axillares, folio breviores canescentes; flores primum fasciculato-capitati demum brevissime racemosi vel potius ob pedicellos brevissimos subspicati. Perianthii tubus tenuis, cylindricus, canescenti-hirtus, 5—6" longus; limbus breviter quadrifidus lobis obtusis. Ovarium hirtum. Stylus brevissimus; stigma incrassatum depresso-capitatum.

115. (108 Endl.) **SANTALACEAE** R. Br.

398. *Thesium* L.

697. *Species*. Specimen unicum nimis maneum. Folia anguste linearia uninervia, nervo subtus valde prominente carinata et subdecurrentia. Perianthii tubus cylindricus.

116. (106 Endl.) LAURINEAE Vent.

399. *Cinnamomum* Burm.

698. *C. dulce* Nees *Syst. Laurin.* p. 62. — *C. chinense* Blume *Bijdr.* p. 569. — *C. Cassia* Siebold *Synops. in Act. Batar.* XII. p. 23. — *Nikkei Japon.*

699. *C. Loureirii* Nees *Syst. Laurin.* p. 65.

Ramos foliiferos tantum examinare licuit.

700. *C. pedunculatum* Nees *Syst. Laur.* p. 79. *C. japonicum* Siebold *Synops. l. c.* p. 23. — *Laurus pedunculata* Thunb. *Flor. jap.* p. 174.

701. *C. daphnoides* S. et Z. *C.* ramis compresso-tetragonis sericeo-tomentosis, foliis plerumque oppositis petiolatis obovato-ellipticis vel subspathulatis rotundatis coriaceis superne glabris glaucescentibus subtus dense albido-sericeis, trinerviis, pedunculis dichotome 3—5 floris quam folia longioribus vel brevioribus.

702. *C. species.* In insulis Peel et Boninsima legit beatus Mertens.

400. *Camphora* Bauhin.

703. *C. officinarum* Bauhin. Nees *Syst. Laur.* p. 88. *Laurus Camphora* Thunb. *Fl. jap.* p. 172. et *Auct.* — *Cinnamomum Camphora* Siebold *Synops. l. c.*

401. *Machilus* Rumph.

704. *M. Thunbergii* S. et Z. *Laurus indica* Thunb. *Fl. jap.* p. 173. — *Persea japonica* Siebold in litt.

705. *M. japonica* S. et Z. — *Laurus aokari herb.* Sieb.

402. *Benzoin* Nees.

706. *B. trilobum* S. et Z. *B.* foliis deciduis triplinerviis superne glabris subtus molliter pubescentibus, e basi late cuneata ellipticis vel apicem versus dilatatis trilobis, lobis acuminatis subaequilongis, intermedio basi constricto sinubus rotundatis, umbellis breviter pedunculatis pauci- (2—5-) floris, pedunculo glabro pedicellis seri-

ceo-hirtis, fructiferis clavato-incrassatis et pedunculum plus quam duplo superantibus, perianthii laciniis deciduis.

Sassafras officinalis Siebold Synops. in Act. Batav. l. c. p. 23. (excl. Synon.).

Arbor frequens in montibus insulae Nippon. Rami teretes subflexuosi cortice sordide cinerascete. Foliorum cicatrices anguste lunatae. Gemmae oblongae, acutae, perulatae, glabrae. Folia alterna petiolata, petiolo 8—12" longo semitereti canaliculato; lamina e basi late cuneata vel elliptica acuta integerrima, vel sursum dilatata et fere ad medium usque triloba lobis subaequilongis acuminatis, lateralibus lanceolatis, intermedio basi utrinque constricto elliptico; omnia triplinervia, supra glabra, subtus ad venas molliter pilosa, glandulis tenuibus pellucide punctata, 2—3½" longa, inter lobos 1½—3" lata. Umbellae ex inferiore innovationum parte et perula decidua suffultae, pauciflorae; pedunculus glaber, vix 2" superans, serius non excrescens; involucrium e squamis 5 parvis coriaceis glabris longe ante anthesin deciduum; pedicelli 2—6 uniflori, sub anthesi 3" longi, sericeo-hirti, fructiferi elongati. Floribus ♂ perianthium profunde sexpartitum laciniis ellipticis obtusis extus glabris intus sericeo-pubescentibus. Stamina 9 fertilia triplici serie; filamenta basi latiora hirsuta sursum glabra, intima basi utrinque glandula breviter stipitata, adscendente reniformi carnosa aucta; antherae omnes introrsum dehiscentes biloculares valvulis sursum dehiscentibus, dense pellucide glandulosae. Ovarii rudimentum ovato-globosum glabrum. Floribus ♀ perianthium ut in mare, deciduum. Staminum rudimenta novem exterioribus sex linearibus glabris, intimis tribus glandula stipitata carnosa utrinque auctis. Ovarium ovatum, glabrum, uniovulatum. Stylus? Pedunculi fructiferi plerumque solitarii fere pollicares, praesertim apicem versus valde incrassati indeque clavati, sub fructu truncati sine rudimento perianthii. Bacca globosa, magnitudine globi sclopetarii minoris; semen pendulum, globosum, testa crustacea.

707. *B. Thunbergii* S. et Z. B. foliis annuis e basi longe attenuata anguste oblongis vel oblongo-ellipticis obtuse acuminatis, junioribus subtus aequae ac petioli et rami novelli sericeo-hirtis, umbellis coëtaneis pedunculatis multi- (10—15-)floris, pedicellis sericeo-hirtis pedunculum aequantibus, perianthii laciniis deciduis.

Sassafras Thunbergii Siebold *Synops.* l. c. p. 23. — *Lindera umbellata* Thunb. *Flor. jap.* p. 9. et 145. tab. 21 et *Auct.*

Folia basi longe in petiolum attenuata et cum hoc 3—4½" longa, 8—12" lata, penninervia, superne glabra subtus ad venas pilosa vel novella sericeo-hirta. Umbellae ex axillis perularum solitariae hemisphaericae, multiflorae; pedunculus glaber aequae ac pedicelli sericei 3—4" longus. Perianthii lacinae utrinque basi sericeo-pubescentes. Bacca pedunculo incrassato clavato insidens globosa, magnitudine pisi minoris.

Dass Thunberg bei Beschreibung seiner *Lindera* unsere Pflanze vor sich gehabt habe, ergibt sich aus seiner Abbildung auf das deutlichste. Abweichend erscheint im Gattungsscharakter vorzüglich die Angabe einer sechsmännigen Zwitterblüthe und einer zweifächrigen Kapselfrucht. Aber daraus, dass weiter gesagt wird: Stamina corolla multoties breviora und antherae minutae, lässt sich mit Grund vermuthen, dass Thunberg nur weibliche Blüthen untersucht und die kleinen fadenförmigen sterilen Staubfaden übersehen, die sechs gestielten nierenförmigen Staminodien dagegen für fruchtbare Stamina gehalten habe. Die zweifächrige Kapselfrucht hat er wohl nur aus der Zahl der Narben vermuthet, weil er in der Beschreibung nichts Näheres darüber erwähnt, oder vielleicht auch eine andre Frucht mit der unsrer Pflanze verwechselt.

708. *B. sericeum* S. et Z. B. foliis annuis petiolatis e basi cuneata obovato-oblongis acutis penninerviis supra pubescentibus subtus molliter villosis vel novellis albido-sericeis, floribus coëtaneis, umbellis subsessilibus multi- (10—15-)floris, pedicellis gemmisque sericeis, fructibus globosis.

Rami graciles cortice atro-fusco vel nigricante glabro. Folia alterna, petiolata; petiolus 3—4''' longus, semiteres, sericeo-pubescent; lamina e basi late cuneata obovata vel obovato-oblonga, acuta, penninervia, superne ad nervum medium pilosa ceterum pubescens, subtus pilis longis ad venas densius positis tota molliter villosa vel novella albido-sericea, 3—4" longa, 16—20" lata. Umbellae ex axillis perularum solitariae, breviter pedunculatae, pedunculo vix lineam longo uti pedicelli multoties longiores sericeo-hirto. Perianthium medio dorso pubescens, uti antherae dense glanduloso-punctatum. Bacca magnitudine pisi minoris, globosa, mucronulata; pedunculi fructiferi 6—8''' longi, quam in praecedentibus minus incrassati.

Eine Abart oder verwandte Art, welche wir nur in fruchttragenden Exemplaren vor uns haben, unterscheidet sich durch schmälere beiderseits fast völlig kahle auf der Rückseite graugrüne Blätter und längere nach oben fast gar nicht verdickte Fruchtstiele.

709. *B. praecox* S. et Z. B. foliis annuis petiolatis ovato-ellipticis utrinque attenuatis acuminatis glabris subtus glaucescentibus, umbellis praecocibus breviter pedunculatis involucratis pauci-(3—5-) floris, pedunculis involucris gemmisque glabris, pedicellis abbreviatis hirtis, fructiferis longioribus incrassatis calvis.

Rami tennes subflexuosi cortice cinereo. Gemmae oblongae perulis glabris. Umbellae praecoces breviter pedunculatae, squamis plerumque quatuor coriaceis castaneis glabris involucratae, pauciflorae; pedicelli involucro breviores vix lineam longi, hirti. Folia petiolata, petiolo 3''' longo tenui; lamina $1\frac{1}{2}$ —2" longa, 8—12" lata, utrinque glabra, penninervia, subtus glaucescens. Fructus e quavis umbella abortu reliquorum florum solitarii, pedicello insidentes sursum incrassato robusto semipollicari. Bacca magna, globosa.

710. *B. glaucum* S. et Z. B. foliis annuis breviter petiolatis e basi attenuata vel subrotundata oblongo-ellipticis acutis, junioribus subtus aequae ac ramuli sericeo-hirtis, adultis superne glabris subtus magis minusve pilosis et glaucescentibus, umbellis praecocibus sub-

sessilibus paucifloris, pedicellis fructiferis incrassatis pilosis, fructibus globosis parvis, gemmis glabris.

Rami subflexuosi cortice cinereo-fuscescente glabro. Gemmae oblongae acutae perulatae castaneae glabrae. Folia annua in petiolo 1—2" longo oblongo-elliptica, basi breviter attenuata vel subrotundata, acuta, penninervia, novella subtus sericeo-hirta, adulta superne glabra, subtus pilis longis decumbentibus praesertim ad venas magis minusve hirta vel tandem calva, glaucescentia, $1\frac{1}{2}$ —3" longa, 10—15" lata. Umbellae praecoces subsessiles 3—5florae, pedicellis sericeis. Flores masculi non visi. In foemineis stamina sterilia 9 minima, lineari-subulata. Glandulae sex carnosae stipitatae, per paria staminibus interioribus apposita. Ovarium ovatum glabrum; stylus brevis; stigma bilobum lobis ovatis patentibus.

Die bisher beschriebenen Arten weichen von dem Charakter der Gattung Benzoin, wie Nees solchen aufgestellt hat, darin ab, dass das Perianthium der weiblichen Blüthen wenigstens bis auf eine schmale ganzrandige Scheibe um den Rand des verdickten Fruchstieles her abfällt; aber auch bei dem nordamerikanischen *B. odoriferum* gliedern sich die Lappen des Perianthiums dicht über der Basis und die stehenbleibenden Zähnchen werden so klein, dass wir auf den Mangel derselben an unsern Arten keinen Werth legen können. Sollten ferner, abgesehen davon, die so genau mit einander verwandten Gattungen Benzoin und Sassafras nicht wieder vereinigt werden?

711. *B.? citriodorum* S. et Z. *B. foliis annuis petiolatis ovato-oblongis longissime et argute acuminatis penninerviis utrinque glabris subtus glaucescentibus, umbellis glabris pedunculatis involu- cratis pauci-(3—5-)floris, pedicellis fructiferis glabris subincrassatis perianthio persistente sexfido explanato coronatis, bacca globosa.*

Rami teretes, cortice nigricante vestiti, novelli angulati glabri. Folia annua, petiolata, petiolis 6—9" longis semiteretibus superne planis glabris; lamina basi breviter, apicem versus longe attenuata et

in acumen pollicare subfalcatum argutum terminata, penninervia nervis lateralibus utrinque 7—8 intra marginem combinatis, utrinque glabra et subtus praesertim in foliis novellis glaucescens, 4—6" longa, 1—2" lata. Umbellae pedunculatae ex axillis perularum deciduarum gemmae foliiferae anni sequentis jam auctumno provenientes, pedunculo glabro 3—5" longo insidentes et involucro coriaceo inclusae pauciflorae; florentes non observatae. Pedicelli fructiferi 2—3 in quavis umbella, glabri, 3" longi, subincrassati; perianthio explanato vix aucto coronati. Bacca globosa, magnitudine pisi.

Zu der Gattung gehört wahrscheinlich auch *Laurus Sassafra* Lour. Flor. Cochinch. p. 312 und Nees Syst. p. 657.

403. Tetranthera Jacq.

712. *T. japonica* Spreng. Syst. Veget. II. p. 266. Nees Syst. Laurin. p. 524. Sieb. et Zuccar. Flor. jap. I. p. 166 tab. 87. 100. — *Tomex japonica* Iuss. Ann. du Mus. VI. p. 210. et Auct. — *Litsaea Thunbergii* Siebold Synops. in Act. Batav. l. c. p. 24.

404. Actinodaphne Nees.

713. 714. Species duae a beato Mertens in insulis Peel et Boninsima lectae et nondum descriptae, sed propter defectum florum adhuc reponendae.

405. Daphnidium Nees.

715. *D. Myrrha* Nees Syst. Laur. p. 612. Siebold in Annuaire de la Soc. hortic. des Pays-bas 1844 p. 28.

716. *D. strychnifolium* S. et Z.

717. *D. lancifolium* S. et Z.

406. Litsaea Iuss.

718. *L. glauca* Siebold Synops. l. c. p. 24. Nees Syst. Laur. p. 633. *Laurus glauca* Thunb. Fl. jap. p. 173. et Auct.

719. *L. foliosa* Nees Syst. Laurin. p. 622. *Tetradenia foliosa* Nees in Wallich plant. As. rar. II. p. 64.

Specimina japonica ab indicis Wallichianis nullo modo recedunt.

117. (104 Endl.) NYCTAGINEAE Iuss.

407. *Mirabilis* L.

720. *M. Jalapa* L. Thunb. Fl. jap. p. 91.

Wir haben die Pflanze nicht selbst gesehen, aber Thunberg sagt, dass die Japaner aus dem Samenmehl dieser Art eine weisse Schminke bereiten. Da nun dieselbe Art nach Hooker (Beechey p. 207) auch in China, nach Loureiro in Cochinchina und nach andern Angaben in Ostindien vorkommt, so zweifeln wir nicht an der Richtigkeit der Thunbergischen Bestimmung.

118. (103 Endl.) POLYGONEAE Iuss.

408. *Rheum* L.

721. *Rh. palmatum* L. Siebold Synops. plant. oecon.

In hortis cultum.

722. *Rh. tataricum* L. Siebold pl. l. c. p. 19. l. c.

409. *Polygonum* L.

723. *P. chinense* L. Thunb. Fl. jap. p. 166. Siebold l. c. p. 18.

724. *P. orientale* L. Thunb. l. c. Siebold l. c.

725. *P. aviculare* L. Thunb. l. c.

726. *P. barbatum* L. Thunb. l. c. p. 165. Siebold l. c. p. 18.

727. *P. perfoliatum* L. Thunb. l. c. p. 168.

728. *P. Fagopyrum* L. Thunb. l. c. p. 169. Siebold l. c. p. 19.

729. *P. Thunbergii* S. et Z. *P. arifolium* Thunb. l. c. p.

168. non Linn.

Die japanische Pflanze ist von dem amerikanischen *P. arifolium* wesentlich verschieden, aber die uns vorliegenden Exemplare genügen nicht zu ausführlicher Beschreibung.

730. *P. multiflorum* Thunb. l. c. p. 169. Meisner Polygon. p. 64.

731. *P. cuspidatum* S. et Z. *P. caule erecto flexuoso glabro tereti, foliis petiolatis e basi rectilinea vel rotundata late ovatis repente cuspidatis utrinque glabris subtus ad venas scabriusculis, ochreis glabris margine nudis paucinerviis oblique truncatis, paniculis axillaribus divaricatis, rachi flexuosa, ramis tenuibus furfuraceo-villo-*

sis, bracteis ochreaeformibus cupularibus oblique truncatis cuspidatis, floribus geminis ternisve, pedicellis filiformibus infra medium articulatis glabris perianthio duplo longioribus, staminibus octo, ovario triquetro, stylis tribus divaricatis.

Caulis erectus, flexuosus, herbaceus. Petioli 6—8" longi, lamina folii basi rectilineo-truncata vel rotundata late ovata apicem versus rotundata et repente in cuspidem producta vel rarius subattenuata, utrinque glabra, subtus in venis prominulis denticulis vix conspicuis subscabra, 3—4" longa, 2—2½" lata. Paniculae axillares patentes graciles ramis divaricatis solitariis geminisve filiformibus furaceo-villosis. Flores laxe racemosi, pedicellis filiformibus 1½—2" longis glabris. Perianthium exiguum vix ¾" longum, patens, laciniis ellipticis obtusis. Ovarium ellipticum trigonum. Stylus brevissimus, stigmata tria divaricata.

Polygoni species ultra viginti in Japonia occurrunt, quae vero accuratiori examini adhuc remanent.

410. *Rumex* L.

732. *R. crispus* L.? *Thunb. Fl. jap. p. 149.*

Die vorliegenden leider sehr unvollständigen Exemplare sind von den europäischen durch kleinere Blüthen etwas verschieden.

119. (102 Endl.) AMARANTACEAE R. Br.

411. *Gomphrena* L.

733. *G. globosa* L. *Thunb. Fl. jap. p. 114.*

412. *Celosia* L.

734. *C. margaritacea* L. *C. argentea* L. *Thunb. l. c. p. 106.*

735. *C. cristata* L. *Thunb. l. c.*

413. *Achyranthes* L.

736. *A. aspera* L. *Thunb. l. c. p. 105.*

414. *Amarantus* L.

737. *A. Blitum* L. Thunb. l. c. p. 57.

Die japanischen Amarantus-Arten, 6—7 an der Zahl, unterliegen noch genauerer Untersuchung. In der Synopsis Plant. oecon. p. 21 erwähnt v. Siebold *A. tricolor* L. (*A. bicolor* Nocca), *inamoenus* Willd. (*japonicus* Houtt.), *oleraceus* L und *caudatus* L., welche sämmtlich auch als Gemüse verspeist werden.

120. (101 Endl.) **CHENOPODEAE** Bartl.

415. *Spinacia* Tourn.

738. *Sp. oleracea* L. Siebold Synops. pl. oecon. p. 20.

416. *Beta* Tourn.

739. *B. vulgaris* L. Thunb. Flor. jap. p. 113. Siebold l. c.

417. *Kochia* Roth.

740. *K. Scoparia* Schrad. — *Chenop. Scoparia* Thunb. Flor. jap. p. 113.

418. *Chenopodium* L.

741. *Ch. album* L. Thunb. Fl. jap. p. 112. Siebold l. c. p. 19.

742. *Ch. ambrosioides* L. Thunb. Fl. jap. p. 113. Siebold l. c. p. 20.

Vermuthlich eingeführt.

743. *Ch. virgatum* Thunb. Act. Upsal. VII. p. 143. Siebold l. c. p. 20.

419. *Basella* L.

744. *B. rubra* L. Thunb. Fl. jap. p. 127. Siebold l. c. p. 20.

420. *Schoberia* C. A. Meyer.

745. *Sch. maritima* C. A. M. — *Chenop. maritimum* L. Siebold l. c. p. 20.

421. *Salsola* L.

746. *Salsola Soda* L.? Siebold l. c. p. 30.

Fast alle Chenopodiaceen werden in Japan als Gemüse verspeist. Es ist aber ebendesshalb auffallend, dass die Gattung *Atri-*

plex daselbst sich nicht zu finden scheint, während doch in China einige Arten wild und kultivirt vorkommen.

121. (99 Endl.) **SALICINEAE** L. C. Rich.

422. **Salix** L.

747. *S. japonica* Thunb. *Fl. jap.* p. 24. *Icones plant. jap.* dec. 4. *Blume Bijdr.* p. 516.

Folia ea *S. daphnoidis* referunt.

748. *S. Sieboldiana* Blume *Bijdr.* p. 517.

749. *S. integra* Thunb. *Fl. jap.* p. 24.

Amenta coëtanea subsessilia e gemmis basi foliiferis. Foeminea cylindrica obtusa vix pollicaria. Squamae ovatae acutiusculae basi et dorso sericeo-hirtae, fuscae. Ovarium sessile, ovato-globosum, rotundatum, dense albo-lanatum. Stylus longitudine fere ovarii, cylindricus, glaber. Stigmata oblonga, emarginata. Glandula ovata obtusa vel emarginata, vix $\frac{1}{4}$ ovarii aequans. Folia (novella) lineari-oblonga vel lanceolata, obtusa, cuspidata vel breviter acuta, plerumque argute serrulata rarius integerrima, superne glabra, subtus ad nervum medium pilosa et utrinque (sicca) punctis minimis fusciscentibus densissime obsita, pollicaria, 3—4" lata.

Habitu *S. purpuream* L. refert.

Praeter has tres adhuc in Japonia occurrunt Salicis species, e specc. manicis nondum rite determinandae.

423. **Populus** L.

750. 751. Species duae accuratius adhuc examinandae.

122. (98 Endl.) **BALSAMIFLUA** Blume.

424. **Liquidambar** L.

752. Species fide Catal. herb. Siebold. An *L. Altingia* Blume?

123. (96 Endl.) *ANTIDESMEAE* Sweet.

425. *Antidesma* L.

753. *A. japonicum* S. et Z. A foliis oblongo-lanceolatis vel oblongis utrinque attenuatis acuminatis glabris vel subtus ad nervos parce pubescentibus, stipulis caducis linearibus membranaceis, spicis foemineis terminalibus solitariis, calycibus quadrifidis, fructiferis pedunculatis pedunculo filiformi drupae ellipticae dimidium superante, stigmatibus tribus.

Rami teretes nudi vel pilis parcis scabriusculi. Folia alterna breviter petiolata petiolo 2—3" longo pubescente; lamina oblongo-lanceolata vel oblonga utrinque attenuata acuminata et nervo medio ultra telam producto mucronata, penninervia, membranacea, utrinque glabra vel subtus praesertim basin versus in nervis primariis parce pubescens, 2—5" longa, 8—18" lata. Stipulae caducae, membranaceae, lineares, acutae. Flores masculi et foeminei non observati. Racemi fructiferi terminales solitarii simplices vel rarius basi subramosi, laxi, bipollicares; rachis angulata tenuissime strigoso-pubescent; pedicelli uniflori horizontaliter patentes filiformes, bractea minuta lanceolata acuta membranacea suffulti. Calyx sub fructu persistens parvus, quadripartitus laciniis ovatis acutis glabris. Discus carnosus annularis. Drupa elliptica, stigmatibus tribus subulatis reflexis coronata, magnitudine nuculae cannabinae, (sicca) compressiuscula margine acuto faciebus convexis rugosis. Putamen tenue, carnosum. Pyrenum uniloculare, monospermum, durum, ellipticum utrinque acutiusculum, compressum, margine acute carinatum, faciebus convexis lacunoso-rugosis. Semen pendulum, pyreno conforme, rugosum. Testa tenuis membranacea. Albumen carnosum, putaminis processibus scrobiculatum. Embryo axilis, cotyledonibus ellipticis plane sibi incumbens, radícula cylindrica recta.

124. (95 Endl.) CANNABINAE Endl.

426. *Cannabis* L.754. *C. sativa* L. Thunb. *Fl. jap.* p. 113. Siebold *Synops.* p. 29.427. *Humulus* L.755. *H. Lupulus* L. non Thunb.

Culta.

756. *H. japonicus* S. et Z. *H.* caule volubili retrorsum aculeato, foliis e basi cordata suborbicularibus palmato-5—7-lobis, lobis ovato-oblongis vel oblongis acutis acuminatisve dense et acute serratis scaberrimis, petiolis laminam folii superantibus, paniculis masculis terminalibus elongatis subaphyllis, perianthii laciniis acutis hispidis, capitulis foemineis axillaribus et terminalibus pedunculatis solitariis vel subpaniculatis, bracteis floralibus late ovato-deltaideis acutis margine aculeato-ciliatis hispidissimis foliaceis, quam nucula lenticularis vix dimidio longioribus, eglandulosis. *H. Lupulus* Thunb. *Fl. jap.* p. 113.

A. *H. Lupulo* plurimis notis recedit. Petioli quam lamina folii semper longiores 3—4 pollicares; lamina folii densius serrata ejusque lobi in planta foeminea angustiores oblongi, praesertim subtus aculeolis antice versis hispidissimi. Paniculae masculae terminales pedales erectae, axi recta nec ut in *Lupulo* flexuosa. Flores quam in hoc duplo minores, perianthii laciniis acutis dorso hispidis. Capitula foeminea pedunculata, axillaria solitaria aut racemosa, vel terminalia paniculata. Bracteae late ovato-deltaideae, margine aculeis longis albidis dense ciliatae dorso hispidae, acuminatae eglandulosae. Nuculae duas tertias squamae aequantes lenticulares marginatae utrinque convexae eglandulosae.

125. (94 Endl.) URTICACEAE De Cand.

428. *Splitgerberia* Miquel.

757. *Spl. japonica* Miq. *Comment. bot.* 134. tab. 14. ap. Endlicher *gen. plant. Suppl. II.* n. 1884. — *Urtica?* *bifida* Hasskarl

hort. Bogor. p. 79. — *Urt. biloba* Siebold *Annuaire de la Soc. hortic. des Pays-bas* p. 38. et hort. europ.

429. *Urtica* Linn.

758. *U. Thunbergiana* S. et Z. H. caule herbaceo uti tota planta dense pubescente et stimulis longis hispido, foliis oppositis e basi cordata ovatis acuminatis acumine lineari subfalcato, grosse inciso-serratis serraturis subfalcatis integerrimis vel hinc unidentatis, spicis masculis axillaribus plerumque geminis simplicibus vel parce ramosis secundis elongatis laxis, floribus glomeratis tetrandris.

Urtica dioica Thunb. *Fl. jap.* p. 69.

Perennis, herbacea; caules simplices subtetragoni pilis decumbentibus retrorsis aequae ac petioli dense obsiti et stimulis rectis lineam longis hispidi. Folia opposita petiolata petiolo 1—2" longo hispido; lamina $2\frac{1}{2}$ —4" longa, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " lata e basi cordata late ovata grosse inciso-serrata et inter serraturas summas repente in acumen lineare subfalcatum 6—10" longum excurrens; serraturae subfalcatae acutae integerrimae vel hinc unidentatae. Stipulae late lanceolatae acutae foliaceae. Spicae masculae axillares plerumque geminae filiformes laxae 2—4" longae, simplices vel inferne ramosae, interruptae, floribus glomeratis tetrandris.

759. *U. nivea* Thunb. *Fl. jap.* p. 71.

An a planta Linneana diversa?

760. *U. (Laportea Gaud.) bulbifera* S. et Z. U. caule herbaceo glabro vel setulis parvis obsito, foliis alternis longe petiolatis e basi rotundata ovato-ellipticis acuminatis dentatis parce setosis, stipulis membranaceis aridis, floribus monoicis in paniculas cymosas dispositis, cymis masculis axillaribus, inferioribus plerumque bulbillos 1—3 in axilla foventibus divaricatis, floribus pentandris, perianthiis quinquefidis laciniis acutis, cyma foeminea subterminali solitaria, perianthiis diphyllis foliolis obovato-spathulatis, achenio substipitato oblique obovato compresso, stylo basi demum uncinato-deflexo filiformi persistente.

Bulbilli ad basin cymarum mascularum inferiorum solitarii vel 2—3 glomerati ovato-globosi magnitudine nuculae cannabinae vel grani papaveris minoris.

761. *U. petiolaris* S. et Z. U. caule herbaceo glabro, foliis alternis longe petiolatis e basi rotundata oblongis vel oblongo-ellipticis acuminatis grosse crenatis trinerviis parce setulosis utrinque viridibus, stipulis lanceolatis obtusis membranaceo-subhyalinis, floribus dioicis, cymis masculis axillaribus dichotomis divaricatis petiolo pluries brevioribus, perianthii quadrifidi laciniis ovatis acutis, staminibus quatuor.

Petioli longitudine inter 1—3 pollices variantes in foliis superioribus sensim breviores; lamina folii $2\frac{1}{2}$ —5" longa, 15—24" lata. Flores foeminei nobis non obvii.

430. *Boehmeria* Jacq.

762. *B. macrophylla* S. et Z. B. caule herbaceo vel sublig-noso? obsolete tetragono pubescente, foliis oppositis petiolatis, e basi rotundata integerrima suborbicularibus, repente in cuspidem longam linearem falcata basi bidentatam terminatis, ceterum grosse inciso-serratis, serraturis subfalcatis hinc soepe unidentatis inferioribus sensim decrescentibus, trinerviis, superne scabris subtus subvillosis, stipulis lineari-lanceolatis acuminatis membranaceis fuscis, spicis foemineis axillaribus simplicibus vel ramosis elongatis anguste cylindricis strictis, florum glomerulis distinctis bractea solitaria suffultis, perianthio tubuloso-ventricoso apice bidentato hirta.

Urtica macrophylla Thunb. Fl. jap. p. 69. et Auct. *Urt. japonica* Linn. Suppl. 418? *Urt. spicata* Blume Bijdr. p. 492? — *Acalypha japonica* Houtt. Pflanzensyst. X. tab. 72. f. 2. — Fortune plant. chinens. exsiccatae. A. 85.

Caulis stricte erectus atrorubens. Folia opposita petiolata petiolis $1\frac{1}{2}$ —2 pollicaribus adpresse pubescentibus; lamina folii basi rotundata vel cuneato-truncata integerrima suborbicularis sursum inciso-serrata, serraturis superioribus multo majoribus deltoideo-subfal-

Pilea.

catis acuminatis 6—8" longis, in margine deorsum spectante soepe unidentatis, apice repente terminata in acumen lineare falcatum basi bidentatum pollicare, trinervis, 4—5" longa, 3—4" lata. Spicae foemineae axillares solitariae vel geminae, simplices vel basi ramosae elongatae et soepe 6—8" longae, anguste cylindricae. Florum glomeruli distincti, bractea parva arida acuta suffulti, multiflori. Perianthium tubuloso-ventricosum bidentatum hirtum. Stigma elongatum filiforme hirtum.

Thunbergs Beschreibung seiner *Urtica macrophylla* passt vollkommen auf grosse Exemplare unsrer Pflanze mit ästigen Aehren, dagegen die Houttuynsche Abbildung auf schwächere mit einfachen Aehren, wie sie Thunberg vielleicht nicht zur Hand hatte, und deshalb Houttuyn unrichtig bei seiner *Boehmeria spicata* citirt.

763. *B. spicata* Thunb. B. caule herbaceo vel sublignoso tereti glabro, foliis oppositis e basi cuneata ovato-rhombeis acuminatis acumine lineari falcato, grosse et profunde serratis trinerviis glabris, stipulis lineari-lanceolatis acuminatis membranaceis fuscis, spicis foemineis axillaribus solitariis geminisve simplicibus filiformibus erectis strictis, florum glomerulis distinctis, bractea solitaria lanceolata acuta suffultis multifloris, perianthio tubuloso subcylindrico apice bidentata hirta.

Boehm. spicata Thunb. Act. Linn. II. p. 330. et Auct. *Urtica spicata* Id. Fl. jap. p. 69. —

Caulis herbaceus teres crassitie pennae corvinae, inferne ramosus, atrorubens, glaber. Folia opposita petiolata petiolo 1—2" longo, lamina folii e basi cuneata ovato-rhombea acumine lineari subfalcato 9—15" longo terminata, profunde serrata serraturis grossis deltoideis subfalcatis acutis, utrinque glabra vel subtus ad nervos setulis parvis adpressis obsita, rugulosa, trinervis nervis per venas transversas inter se combinatis. Spicae axillares solitariae vel geminae simplices, 2—3-pollicares, erectae, gracillimae, filiformes; rachis inferne vel nuda vel bracteolis alternis lanceolatis acutis membranaceis

superioribus floriferis conformibus obsita. Florum glomeruli distincti alterni multiflori. Perianthium minimum tubuloso-cylindricum apice bidentatum. Stigma filiforme, hirtum, vix lineam longum.

Bei dieser wie bei der vorhergehenden Art werden die Aehren häufig durch Insectenstiche in runde aus dachziegelig gedrängten zottigen Deckblättchen bestehende Köpfchen verändert.

Die Synonymie beider Species lässt sich schwer mit Sicherheit ermitteln. Willdenow's Definition von *Boehm. spicata* in *Spec. plant.* IV. p. 341 ist offenbar mehr auf die Houttuynsche Abbildung als auf die Thunbergsche Beschreibung begründet und passt daher zum Theil auf *B. macrophylla*. Dahin dürften auch *U. japonica* L. und *spicata* Blume gehören.

Boehmeria frutescens so wie *Urtica japonica* und *villosa* Thunb. haben wir noch nicht vergleichen können.

431. *Procris* Commers.

763. *Pr. umbellata* S. et Z. *Pr.* caule herbaceo subflexuoso, foliis alternis sessilibus inaequilateris e basi semicordata oblongis repente acuminatis apicem versus grosse serratis superne parce setosis subtus glabris, stipulis linearibus membranaceis, floribus masculis umbellato-fasciculatis, pedunculo axillari solitario quam folium multo brevior, umbella bracteis lanceolatis 8—10 involucratis 10—15-flora, pedicellis unifloris apice articulatis, perianthiis pentaphyllis [foliolis ovatis acutis, staminibus quinque. *Herb. Göring. n.* 173.

Herbacea caule debili ramoso sursum subflexuoso glabro. Folia alterna subsessilia dimidiato-inaequilatera, hinc basi in lobum rotundatum extensa indeque semicordata oblonga, apice repente in acumen lineare 6—8 lineas longum producta, et a dimidio sursum grosse serrata serraturis utrinque 3—4 deltoideis acutis, penninervia superne setulis adpressis parce adspersa, subtus glabra, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " longa, 6—9" lata. Stipulae parvae lineares acuminatae membranaceae. Floribus masculis: Pedunculi axillares solitarii 6—10 lineas longi umbelliferi. Umbella s. fasciculus simplex, 10—15-florus, bracteis lineari-lanceo-

latis acuminatis membranaceis pubescentibus basi in receptaculi speciem connatis cinctus; pedicelli uniflori 2''' longi teretes apice articulati. Perianthium pentaphyllum foliolis ovatis acutis membranaceis glabris. Flores foem. nobis non obvii.

764. *Pr. radicans* S. et Z. Pr. caule herbaceo prostrato radicante, foliis alternis breviter petiolatis inaequilateris basi semicordatis ovatis vel ellipticis acutis remote serratis; capitulis foemineis axillaribus subsessilibus geminis ternisve hemisphaericis involucretis.

Caules debiles prostrati radicantes. Petioli 1—2''' longi; lamina folii basi inaequilatera et in latere latiore semicordata lobo rotundato, ovata vel ovato-ellectica, acuta, remote serrata, serraturis utrinque 4—5, 8—12''' longa, 4—6''' lata.

432. *Morocarpus* S. et Z.

Dioica. *Masculis*: Perianthium triphyllum, aestivatione valvata. *Stamina* tria; filamenta primum induplicata, elastice desilientia; antherae antice quadriloculares. *Ovarii* rudimentum parvum villosum. *Foemineis*: Perianthium urceolatum ovatum brevissime tridentatum persistens, demum carnosum. *Ovarium* perianthio inclusum. *Stigma* sessile penicillatum. *Fructus* perianthio carnosio baccati, dense in capitula globosa congesti, minuti, pyriformes. *Achenium* . . . — Frutex foliis alternis serratis, stipulis geminis membranaceis, floribus masculis breviter spicatis bracteatis, foemineis in capitula globosa congestis flavis, capitulis subsessilibus fasciculatis vel pedicellatis cymoso-subdichotomis.

765. *M. edulis* S. et Z. — *Boehmeria Janagi-itsigo* Siebold *Synopsis in Act. Batav. l. c. p. 70.* *Herb. Göring n. 108.* *Specimen foemin. n. 176. Spec. masculum.*

Arbor vel frutex ramis alternis teretibus, novellis pubescentibus. Folia alterna breviter petiolata, oblonga, basi breviter attenuata vel rotundata, acuminata, serrata, superne pubescentia subtus hirta, rugosa, penninervia. Stipulae intrapetiolares inter se liberae lanceolatae acuminatae, carinato-uninerviae et in nervo pubescentes, mem-

branaceae, fuscae. Flores coëtanei, dioici, e gemmis propriis perulatis. Masculi in spicas breves subcapitatas congesti, perulis involu-crati, bracteati. Perianthium triphyllum, foliolis late ovatis cuspidatis concavis apicem versus barbatis. Stamina tria primum inflexa. Ovariū rudimentum villosum. Flores foeminei in capitula parva congesti. Capitula in pedunculo communi 4—6 subdichotome disposita, subsessilia bracteata. Perianthium urceolatum apice constrictum tridentatum dentibus acutis barbatis. Ovarium perianthio adhaerens et superne tantum liberum?, uniloculare, uniovulatum. Stigma sessile penicillatum. Capitula fructifera distincte pedunculata magnitudine pisi; baccae parvae pyriformes vel clavatae apice depressae et perigonii rudimento notatae, flavae, edules.

Die vorliegenden Exemplare sind zu unvollständig und übelgehalten, um namentlich die weiblichen Blüthen mit Sicherheit untersuchen zu können und auch die in Japan gefertigte Abbildung gibt nur die Ansicht, nicht aber die Details der weiblichen Blüthe und der reifen Frucht. Doch glaubten wir die Gattung nicht übergehen zu dürfen.

120. (92 Endl.) MOREAE.

433. *Morus* Tourn.

766. *M. alba* L. Thunb. *Fl. jap.* p. 71. (exclus. *Synon. Kämpferi*). Siebold *Synops.* l. c. p. 27.

767. *M. indica* L. Thunb. p. 76. Siebold *Synops.* p. 27.

768. *M. japonica* Sieb. *Synops.* p. 27.

434. *Fatoua* Gaud.

769. *F. aspera* Gaudich. ap. Freycinet *Botan.* p. 510.

770. *F. pilosa* Gaudich. l. c. p. 509.

Zu diesen beiden Arten zieht Gaudichaud fragweise *Urtica japonica* Thunb. l. c. p. 70 nach Exemplaren des Pariser Museums. Wir haben die Pflanze noch nicht gesehen.

435. *Maclura* Nutt.

771. *M. gerontogaea* S. et Z. *M.* foliis oblongo-ellipticis utrinque attenuatis acutis integerrimis glabris subcoriaceis, fructibus subsessilibus geminis.

Rami teretes glabri fusci. Folia alterna, petiolata, oblongo-elliptica utrinque attenuata acuta integerrima penninervia glabra subcoriacea; petioli 3—4''' longi, lamina 2—3''' longa, 10—15''' lata. Flores nobis non obvii. Fructuum capitula axillaria plerumque gemina, brevissime pedunculata, globosa, magnitudine nucis juglandis vel pomi minoris, globosa, aurantiaca. Receptaculum seu pedunculus irregulariter globoso-incrassatus, perianthiis fructiferis densissime obsitus. Perianthia sessilia, tetra-rarius pentaphylla; foliola opposita cuneato-oblonga truncata cucullato-concava, fructifera praesertim apicem versus valde carnosio-incrassata et pressione vario sed plerumque eo modo sibi imposita ut exteriora duo interioribus plane incumbant, hae vero quasi equitantia altero margine se invicem amplexantur et achenium plane includant. Achenium ovato-orbiculare lenticulare lateribus convexis, epidermide carnosia derasili tectum, crustaceo-durum, uniloculare monospermum. Stylus persistens unicruris filiformis superne parum incrassatus, rudimento alterius cruris brevissimo. Semen hinc ad basin pericarpium affixum erectum; testa membranacea albumini tenui arcte adhaerens. Embryo curvatus radícula longa cylindrica micropylen spectante, cotyledonibus magnis plane sibi incumbantibus sed simul inflexis et circa radiculam convolutis.

Mit *M. aurantiaca* am nächsten verwandt liefert diese Pflanze einen neuen Beweis für die nahe Beziehung, in welcher die japanische Flora zu der des atlantischen Nordamerika's sich befindet.

436. *Broussonetia* Vent.

772. *Br. papyrifera* Vent. *Morus papyrifera* Thunb. *Fl. jap.* p. 72 et *Auct. Siebold Synops. l. c. p. 27. Kaadsi Kämpfer Amoen.* p. 471 cum fig. in p. 472.

Folia in specc. japonicis plerumque indivisa rarius subtriloba, quam in planta culta brevius petiolata, ceterum figura varia, basi rotundata vel oblique cordata, acuta, acuminata vel cuspidata.

773. *Br. Kämpferi Sieb.* Br. fruticosa ramis ex parte longissimis volubilibus vel scandentibus, novellis pubescentibus, foliis e basi breviter cordata et soepe obliqua oblongis acuminatis serratis utrinque pubescentibus scabris penninerviis, capitulis foemineis axillaribus solitariis globosis pedunculatis, pedunculis petiolos aequantibus. — *Br. Kämpferi Siebold Synops. l. c. p. 28. Kaadsj Kadsira, it. Kago Kadsira. Papyrus spuria Kämpf. Amoen. p. 474. cum icone in p. 472 et Kaadi Kadsura p. 895. Morus nigra Thunb. Fl. jap. p. 71.?*

Frutex ramis longis simplicibus nudis flexibilibus longe serpens scandensque (*Kämpfer*). In specc. siccis rami alii elongati simplices volubiles, alii stricti subflexuosi ramulosi, cortice badio glabro vestiti. Ramuli novelli pubescenti-hirti. Folia alterna, petiolata petiolo 3—4''' longo; lamina basi cordata vel oblique rotundata, oblonga, acuminata, subaequaliter serrata, superne scabra subtus hirta penninervia, magnitudine valde varians, 1½—4" longa, 7—15''' lata. Stipulae lanceolatae acuminatae, membranaceae, uninerviae, hirtae, fuscae, deciduae. Flores masculi nobis non adsunt. Capitula foeminea axillaria solitaria pedunculata globosa magnitudine pisi; pedunculi petiolos aequantes hirti. Perianthium urceolatum apice breviter 3—4-dentatum hirtum. Stylus sublateralis longus filiformis brevissime barbatus.

Thunberg citirt irrig Kämpfers Papyrus spuria zu seiner Morus alba, gewiss der ächten Linneischen Pflanze, zu welcher dagegen vermuthlich Soo vulgo Kuwa Kämpfer p. 788. gehört, was Thunberg bei seinem Morus nigra anführt. Ob letzterer aber mit unsrer Broussonetia zusammenfalle, wage ich nicht zu entscheiden.

774. *Br. Kazinoki Sieb.* Br. foliis e basi oblique rotundata late ovatis serratis longe acuminato-cuspidatis utrinque scabris. *Siebold Synops. l. c. p. 28.*

Rami teretes badii. Folia petiolata petiolis semipollicaribus, lamina basi oblique rotundata vel rarius subcordata late ovata, repente in acumen longum lineare terminata, serrata serraturis approximatis, penninervia vel nervis lateralibus infimis ultra dimidium folii productis subtrinervia, papilloso-scabra, 4—5" longa, 2—3" lata. Flores nobis non obvii.

437. *Ficus* L.

775. *F. stipulata* Thunb. Siebold Synops. l. c. p. 29.

776. *F. pumila* Thunb. Fl. jap. p. 33. var. α

777. *F. erecta* Thunb. Act. Linn. II. p. 327. *F. pumila* Flor. jap. l. c. var. β . Siebold Synops. p. 29. Inu Itabu. Kämpfer Amoen. p. 803 c. icon. p. 802.

778. *F. japonica* Blume Bijdr. p. 440.

779. *F. pyrifolia* Burm. Spreng. Syst. Veget. III. p. 780.

780. *F. hirta* Vahl. Siebold Synops. l. c. p. 29. — E. China introducta.

781. *F. Carica* L. Thunb. Fl. jap. p. 32.

Thunberg sagt, diese Art sei von den Portugiesen eingeführt und werde um Nangasaki kultiviert, v. Siebold dagegen erwähnt ihrer nicht, sondern sagt, dass *F. hirta* aus China übersiedelt der Früchte wegen angepflanzt werde. Sollte Thunbergs *F. Carica* zu dieser gehören?

Ausser den angeführten kommen in Japan noch wenigstens vier Arten von *Ficus* vor, dessen spätere Beschreibung, so wie die Ausecheidung der Gattung *Plagiostigma* (Zuccar. in Act. Acad. Monac. Mathem. Phys. IV. 1. p. 154), wir uns vorbehalten.

127. (91 Endl.) *CELTIDEAE* Endl.438. *Celtis* Tournef.

782. *C. Willdenowiana* Roem. et Schultes Syst. veget. VI. p.

306. Loudon Arboretum brittan. p. 729. fig. 1410. *C. orientalis* Thbg. Flor. jap. p. 114. Siebold Synops. p. 28.

Celtis sinensis Pers.
comp. illu. Bot. L. B.

Nach v. Siebold ein grosser Baum, der in Japan zur Bezeichnung der Wegstunden an die Strassen gepflanzt wird, und schon durch diese Grösse hinreichend von *C. sinensis* Pers. verschieden. Die ausgewachsenen Blätter der blühenden Zweige sind völlig kahl und häufig ganzrandig, die der raschwüchsigen Lohden sägezähmig, rauh und behaart.

783. *C. muku* Siebold Synops. l. c. p. 28. *Prunus aspera* — *Omaia celtis aspera* DC.,
Thunb. Flor. jap. p. 201. *Muknoki* Kämpfer Amoen. p. 799. — *cauf. ellus. Prof. L. D.*
An Celtis politoria Wallich Catal.?

Folia breviter petiolata basi subaequilatera et rotundata, ovato-elliptica, longe attenuata et argute acuminata, serrata serraturis mucronatis, penninervia nervis lateralibus parallelis utrinque 6—8, setis adpressis utrinque aspera, 2—5" longa, 12—20" lata. Flores subsessiles, masculi plerumque 2—3 glomerati infra folia ex axillis perularum, hermaphroditi vel foeminei ex axillis foliorum subsolitarii. Perianthium plerumque sexpartitum laciniis ovatis basi cohaerentibus. Filamenta brevissima, antherae ad lentem minutissime pubescentes. Stigmata linearia, revoluta.

439. *Sponia* Commers.

784. *Sp. nudiflora* S. et Z. Sp. foliis basi inaequilateris rotundatis vel subcuneatis ovato-ellipticis acuminatis argute mucronato-serratis penninerviis utrinque pubescenti-scabris subtus canescentibus, floribus subserotinis, masculis infra folia ex axillis perularum in cymas laxas paucifloras dispositis, perianthii quinquepartiti laciniis oblongis obtusis cucullatis, floribus foemineis ex axillis foliorum superiorum solitariis sessilibus, perianthii laciniis lanceolatis acuminatis, stigmatibus lineari-oblongis divaricatis. — *Omaia celtis aspera* DC.

An genus proprium? — Folia adulta nobis non obvia, novella sesqui—bipollicaria, setulis adpressis utrinque scabriuscula et subtus canescentia, penninervia nervis lateralibus parallelis utrinque 5—6. Cymae masculae infra folia, rarius axillares pedunculo pedicellisque laxis filiformibus. Perianthium ad basin usque 5-partitum, rotatum,

laciniis oblongis obtusis cucullato-concavis. Stamina 5, filamenta filiformia. Ovarii rudimentum villosum. Flores foeminei solitarii sessiles ex axillis foliorum superiorum. Perianthii lacinae lanceolatae acuminatae.

128. (90 Endl.) **ULMACEAE**.

440. *Euptelea* Sieb. et Zucc.

785. *E. polyandra* S. et Z. *Flor. jap. I. p. 134. tab. 72.*

441. *Ulmus* L.

786. Species 3—4 nondum accuratius examinatae.

442. *Microptelea* Spach.

787. *M. parvifolia* Spach. *Annales des Sc. natur. 1841. p. 359.*

Ulmus parvifolia Jacq. *hort. Schoenbr. III. tab. 262. Ulmus chinensis* Persoon *Synops. I. p. 291.*

Loudon im *Arboretum britt. p. 717* zieht *Ulmus chinensis Pers.* als Varietät zu *Ulmus campestris*. Vermuthlich kannte er, wie auch aus der Abbildung zu erhellen scheint, die ächte Pflanze nicht.

129. (89 Endl.) **CUPULIFERAE** Richard.

443. *Castanea* Tournef.

788. *C. vesca* Gaern. β . *pubinervis Hasskarl hort. Bogor. p. 73. Fagus Castanea Thunb. Flor. jap. p. 195. — Riitz vulgo Kuri fructu majore Kämpfer Amoen. p. 816.*

789. *C. crenata* S. et Z. *C. foliis e basi rotundata vel subcordata oblongis acuminatis crenatis crenis rotundatis vel setaceo-mucronatis, subtus ad venas pubescenti-hirtis ceterum glabris, minutim glanduloso-punctatis, junioribus pilis simul minutissimis stellatis obsitis et novellis canescentibus, amentis elongatis gracilibus laxis, stylis 7—8. Castanea chinensis Hasskarl hort. Bogor. p. 73.?*

Rami quam in *C. vesca* tenuiores. Folia brevius petiolata et ipsa minora, 3—5" longa, 15—24'" lata; crenae in margine brevissimae repandae rotundatae et seta tantum mucronatae nec ipsae in

acumen extensae; pili in petiolis et nervis paginae inferioris simplices, in venulis dense reticulatis minutissimi stellati et glandulis globosis flavescentibus mixti. Spicae 4—6" longae quam in *C. vesca* multo graciliores.

Castanea chinensis Spreng. (*Fagus Castanea* Loureiro) ist durch scharf sägezähnige Blätter von unserer Art verschieden. Bunge vermuthet *Enum. plant. chin. p. 63*, dass die Loureiro'sche Pflanze, welcher eine capsula bivalvis monosperma zugeschrieben wird, mit seiner *Quercus chinensis* zusammenfalle. Aber bei dieser sind die Blätter auf der Rückseite feinwollig und Loureiro beschreibt sie glatt. Desshalb dürfte seine Pflanze doch wohl eine andre Art, aber allerdings eher ein *Quercus* als eine *Castanea* seyn.

790. *C. stricta* S. et Z. *C. ramis ramulisque strictis, foliis breviter petiolatis e basi rotundata oblongis vel oblongo-lanceolatis acuminatis crenatis, crenis repando-rotundatis setaceo-mucronatis, superne glabris subtus pilis minutis stellatis canis et dense glanduloso-punctatis, adultis calvescentibus coriaceis, amentis strictis cylindricis.*

Castanea pumila Catal. hort. Bogor. p. 73.

Rami cortice badio lenticellis albis verrucoso vestiti, novelli villosi. Petioli 3" longi; lamina folii 2—3" longa, 8—12" lata, coriacea. Spicae masculae 2—4" longae strictae.

C. pumila Mich. unterscheidet sich durch grössere und breitere, kürzergestielte oder fast stiellose Blätter und spitzig vorgezogene Sägezähne am Rande derselben.

444. *Fagus* Tourn.

791. Species. *F. ferruginea* Siebold Synops. p. 25, sed a planta americana certe diversa.

445. *Quercus* Linn.

793. *Qu. glabra* Thunb. Flor. jap. p. 175. Siebold et Zuccar.

Flor. jap. I. p. 170. tab. 89.

794. *Qu. acuta* Thunb. Fl. l. c.

Abhandlungen d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. IV. Bd. III. Abth. 29

Folia novella subtus aequae ac rami ferrugineo-tomentosa, superne molliter hirsuta, adulta utrinque glabra, coriacea et non semper integra sed apicem versus plerumque crenulata, petioli pollicares.

794. *Qu. glauca* Thunb. l. c.

Folia novella subtus dense sericeo-hirta, argentea, adulta calva glauca.

795. *Qu. cuspidata* Thunb. l. c. p. 176. Siebold et Zuccar. *Fl. jap.* I. p. 8. tab. 2.

796. *Qu. serrata* Thunb. l. c.

Amenta mascula gracillima filiformia. Flores pentandri filamentis basi monadelphis, antherae imberbes. Folia novella anguste lanceolata longissime acuminata dense costata, superne hirsuta subtus tomentosa; adulta elongato-oblonga acuminata mucronato-serrata utrinque calva vel subtus parce pubescentia.

Ausser dieser kommen in Japan noch mindestens 12 Arten von Eichen vor, welche später beschrieben werden sollen.

446. *Corylus* L.

797. *C. heterophylla* Fisch. Trautvetter *Icones plant. russic.* p. 10. tab. 4. et ejusdem fide *Cor. Avellana* var. *davurica* Pallas *fl. ross. Edit. min.* I. 2. p. 36. — *C. Avellana* Thunb. *Flor. jap.* p. 160. — *Cor. americana* Siebold *Synops.* l. c. p. 26. *Cor. Hasi-bami* Sieb. *Annuaire* l. c. p. 27.

Die japanischen Exemplare stimmen in allen Dingen mit denen vom Argun und mit der Trautvetterschen Abbildung überein.

447. *Distegocarpus* S. et Z. Tab. III. 3.

Flores monoici. Masc. Amenta cylindrica laxa e gemmis propriis. Squamae s. bracteae simplices stipitatae, laxae imbricatae. Perigonium nullum. Stamina 12—15 squamae stipiti inserta; antherae barbatae. Foem. Amenta cylindrica laxa e gemmis simul foliiferis. Bracteae lanceolatae acuminatae biflorae. Involucrum cujusvis floris diphyllum foliolis oppositis, exteriori multo majore. Perigonium adnatum limbo supero brevissimo annulari. Ovarium biloculare. Stylus

brevissimus, *stigmatibus* duobus elongatis filiformibus. *Racemi* fructiferi strobilacei imbricati ex involucris diphyllis geminis monospermis; foliola simplicia nervosa grosse serrata, exteriori multoties majore interius oppositum basi amplexante. *Glans* s. nucula ovata compressa laevis, perigonii margine brevissimo coronata, monosperma, semine pendulo.

Arbores omnino *Carpini* habitu, gemmis perulatis, foliis alternis petiolatis argute inaequaliter serratis acuminatis costato-multinerviis, novellis transversim plicatis adultis lineatis, strobilis ovato-cylindricis crassis, involucris squamis ovatis grosse serratis serraturis mucronatis, palmati-nerviis, reticulatim venosis.

Recedit a *Carpino* amenti masculi squamis stipitatis et fructus involucri diphylo foliolis oppositis.

Etymologia. Nomen e graeco *δῖς* et *στῆγος* tectum, ob foliola involucris duo opposita fructum obtegentia.

Endlicher sagt bei *Carpinus* von den weiblichen Blüthen: involucris biflori foliolis geminis petiolatis trilobis; besser dürfte es heißen squamae amenti biflorae, singulo flore squama triloba involucri. Dieses erhellt deutlich aus unserer vorliegenden Gattung, wo für jedes Blüthchen die zweite innere Involucral-Schuppe hinzukömmt und das Nüsschen auch von der Innenseite bedeckt.

798. *D. Carpinus* S. et Z. *D.* foliis e basi cordata vel rotundata subobliqua oblongo-ellipticis acuminatis dense inaequaliter serratis serraturis macronatis, costatis nervis parallelis rectis superne impressis, junioribus sericeis, amentis masculis laxis, squamis stipitatis ovatis acutis ciliatis multinervio-striatis, foemineis cylindricis erectis, strobilis pedunculatis ovato-cylindricis, involucri foliolis palmatinerviis reticulatis, majori ovato acuto grosse serrato, minori rotundato 4—5-dentato nukulam ovatam compressam glabram aequante.

Rami subtortuosi, cortice glabro badio lenticellis oblongis albidis notato, novelli pubescentes. Gemmae perulatae ovato-oblongae perulis oblongis obtusis dorso sericeis. Folia petiolata petiolo 4—6"

longo, pubescente; lamina 3" circiter longa, unum lata. Stipulae lineari-lanceolatae longe acuminatae nervosae, dorso pilosae deciduae. Amenta mascula pollicaria, laxa, squamis disjunctis patentibus distincte stipitatis dense nervoso-striatis, sericeo-ciliatis castaneis. Strobili pedunculati, pedunculo bi--tribracteato sursum tomentoso, ovato-cylindrici, 2" circiter longi, imbricati; bracteae ovato-lanceolatae acutae aridae biflorae; involucri foliolum exterius 6" longum, 4" latum, interius nuculam aequans ovatam convexo-compressam, glabram, nervis 10 lineatam.

799. *D. laxiflora* S. et Z.

Amenta florentia foeminea filiformia laxa bracteis remotis vix ultra 12 lanceolatis longe acuminatis. Folia novella ovato-elliptica acuminata, dense serrata, costata et in nervis sericea.

130. (88 Endl.) BETULACEAE Rich.

448. *Betula* Tournef.

800. *B. grossa* S. et Z. *B.* ramulis novellis resinoso-punctatis angulatis glabris, foliis e basi rotundata vel subcordata ovato-ellipticis acutis vel acuminatis inaequaliter argute serratis subtus punctulatis et ad nervos pilosis, strobilis solitariis breviter pedunculatis vel subsessilibus erectis, foliis 1—2 suffultis, grossis oblongo-ellipticis, squamis trispermis extus hirtis late cuneatis breviter trilobis, lobis subaequalibus vel medio parum longiore, rotundatis, alis loculamento oblongo angustioribus, sursum latioribus.

Folia $1\frac{1}{2}$ —2" longa, 10—15" lata, subtus nervis parallelis costata resinoso-punctata, nec reticulata, floralia 1—2; petioli semipollicares. Strobili pollicares, grossi, pedunculo quam petioli brevior vel subnullo. Squamae firmae, extus canescenti-hirtae.

801. *B. carpinifolia* S. et Z. *B.* ramulis novellis glabris terebintibus, foliis inferioribus e basi cordata ovatis, superioribus basi rotundatis vel cuneatis oblongis, summis lanceolatis, omnibus longe acuminatis argute et inaequaliter serratis superne glabris subtus ad ner-

vos costatos pilosis glanduloso-punctatis, strobilis solitariis subsessilibus ovato-ellipticis, squamis trispermis late cuneatis glabris breviter trilobis, lobis lateralibus subdivaricatis rotundatis, terminali parum productiori oblongo recto, alis loculo oblongo angustioribus et parum longioribus. — *B. alba* Thunb. *Fl. jap.* p. 76.

Folia $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ " longa, 12—20" lata summis sensim minoribus et angustioribus; subtus inter nervos parallelos tenuiter reticulata; petioli 10—12" longi. Amenta mascula in apice ramorum et ex axillis foliorum summorum 4—6 subracemosa, cylindrica, nuda. Gemmae foliiferae ovato-oblongae perulatae glabrae. Strobili subsessiles semipollicares.

802. *B. ulnifolia* S. et Z. *B.* ramulis novellis angulatis? pubescentibus, foliis e basi inaequaliter cordata ovatis acuminatis inaequaliter et subduplicato-serratis serraturis falcatis, aequae ac petioli utrinque ad venas pilosis subtus tenuiter reticulatis, strobilis solitariis foliis 1—2 suffultis cylindricis breviter pedunculatis pedunculo (quam petioli triplo brevior) hirtis, squamis trispermis profunde trilobis, lobis rectis lineari-oblongis obtusis ciliatis, medio dimidio longiore.

Folia $2\frac{1}{2}$ —3" longa, $1\frac{1}{2}$ " lata, utrinque ad venas pilis longis adpressis aequae ac petioli semipollicares molliter pilosa. Strobili erecti vix pollicaris squamae extus pubescentes intus glabrae.

803. *B. japonica* Sieb. *Synops. l. c.* p. 25.

Die uns vorliegenden blühenden Exemplare genügen nicht zu vollständiger Diagnose.

449. *Alnus* Tournef.

804. *A. firma* S. et Z. *A.* ramulis novellis angulatis verrucosis, ceterum glabris, foliis e basi rotundata ovatis acutis inaequaliter serratis serraturis rectis cuspidatis, superne glabris subtus ad nervos costatos parce pilosis imberbibus dense glanduloso-punctatis firmis, amentis masculis terminalibus plerumque geminis sessilibus cylindricis, foemineis (hyeme gemma inclusis) solitariis—ternis, pedunculatis, stro-

bilis ovatis, squamis lignosis breviter quinquefidis truncatis, samarae obcordatae alis sursum ampliatis.

Gemmae substipitatae glabrae. Folia 2—3" longa, 10—15" lata, coriacea, firma; petioli semipollicares. Amenta mascula pollicaria. Strobili maturi ovati utrinque rotundati grossi semipollicares.

805. *A. japonica* S. et Z. *A.* ramulis novellis angulatis glabris, foliis longe petiolatis, e basi cuneato-attenuata rarius rotundata ovatis, ovato-lanceolatis vel summis lanceolatis, acuminatis inaequaliter et argute serrulatis, utrinque glabris, subtus in axillis venarum barbularis reticulatis impunctatis, amentis foemineis (hyeme nudis) terminalibus racemosis 3—6, strobilis maturis ovatis obtusis, squamis lignosis truncatis breviter quinquefidis resinosis, samaris orbicularibus ala brevissima marginatis.

Betula Alnus Thunb. *Flor. jap.* p. 76. *Alnus harinoki* Siebold *Synops.* p. 25.

Folia 2—4" longa, 1—2½" lata, summa valde angustata vix 6" lata, venis quam in reliquis speciebus remotioribus costata, praeter barbularas in axillis venarum tota glabra; petioli 9—15" longi. Strobili racemosi, pedicellati, ovati, obtusi; squamae cuneato-flabellatae truncatae, quinquefidae laciniis arcte sibi imbricatis, superne glandulis resiniferis dense punctatae.

131. (87 Endl.) MYRICEAE L. C. Richard.

450. *Myrica* L.

806. *M. rubra* S. et Z. *M.* foliis perennibus e basi longe attenuata oblongo-lanceolatis acutiusculis integerrimis vel raro apicem versus remote serratis, utrinque glabris coriaceis, amentis axillaribus fasciculatis vel solitariis cylindricis, drupis globosis dense papillosis.

Rami teretes cortice cinereo vel fuscescente verruculoso tecti. Folia alterna in petiolum brevem longe attenuata, oblongo-lanceolata vel oblonga, acutiuscula vel obtusa, plerumque integerrima, rarius apicem versus remote serrata, utrinque glabra penninervia, nervis intra mar-

ginem arcuatim combinatis reticulatim venosa firma coriacea, 2—4" longa, 6—12'" lata. Amenta axillaria sessilia solitaria vel fasciculata cylindrica pollicaria. Fructus globosi Arbuti in modum papilloso-coccinei.

132. (84 Endl.) **CALLITRICHINAE** *Leveille.*

451. *Callitriche* L.

807. *C. verna* Thunb. *Fl. jap.* p. 16.

133. (83 Endl.) **CERATOPHYLLEAE** *Gay.*

452. *Ceratophyllum* L.

808. *C. demersum* Thunb. *Fl. jap.* p. 190.

Wir führen diese so wie die vorangehende Gattung auf Thunbergs Autorität an, ohne selbst japanische Exemplare gesehen zu haben. Da beide auch im nördlichen Asien, so wie in Ostindien vorkommen, so ist ihre Anwesenheit in Japan wahrscheinlich, obgleich die Species von den europäischen verschieden seyn mögen.

134. (82 Endl.) **SAURUREAE** L. *C. Rich.*

453. *Houttuynia* Thunb.

809. *H. cordata* Thunb. *Fl. jap.* p. 234. tab. 26.

454. *Saururus* L.

810. *S. Loureiri* De Caisne in *Annales des Sc. natur.* 1845. p. 102. *S. cernuus* Thunb. *Fl. jap.* p. 154. An *S. chinensis* hort.?

135. (81 Endl.) **PIPERACEAE** L. *C. Rich.*

455. *Piper* L.

811. *P. futokadsura* Sieb. — An *P.?* *chinense* Miquel *Animadvers. in Piperaceas* (*Bullet. de l. Acad. Bruxelles* 1845)?

136. (80 Endl.) **CHLORANTHACEAE** R. Brown.

456. *Chloranthus* Swartz.

812. *Chl. inconspicuus* Swartz. — *Nigrina spicata* Thunb. *Fl. jap.* p. 5 et 65.

813. *Chl. serratus* Roem. et Schult. *Syst. Veget. III.* p. 461. — *Nigrina serrata* Thunb. *Act. Upsal. VII.* p. 142. *tab. V. f. 1.* — *Chlor. inconspicuus* β . var. *japonica* Siebold. *Annuaire de la Soc. hortic. des Pays-bas* 1844. p. 26.

137. (78 Endl.) **TAXINEAE** L. C. Rich.

457. *Taxus* Tourn.

814. *T. cuspidata* S. et Z. *Flor. jap. II. tab.* 128. — *T. baccata* Thunb. *Fl. jap.* p. 275.

458. *Torreya* Arnott.

815. *T. nucifera* S. et Z. *Fl. jap. II. tab.* 129. (*Caryotaxus* Zuccar. mscpt.) *Taxus nucifera* Thunb. l. c. et Auct. — *Fi vulgo kaja* Kämpfer *Amoen. p.* 814 c. ic. in p. 815.

459. *Cephalotaxus* S. et Z.

816. *C. drupacea* S. et Z. *Flor. jap. II. tab.* 130. 131.

817. *C. pedunculata* S. et Z. *Fl. jap. II. tab.* 132.

460. *Podocarpus* L'Herit.

818. *P. macrophylla* Wall. Sieb. et Zuccar. *Fl. jap. II. tab.* 133. 134. — *Taxus macrophylla* Thunb. *Fl. jap.* p. 276. — *Sin vulgo Maki* Kämpfer *Amoen. p.* 780.

β . *P. Maki* S. et Z. — *Ken Sin it. Sen Bakv vulgo Inu Maki* Kämpfer l. c.

Kultivirte Zwergspielart und als solche zu den Gartenkünsteleien der Japaner sehr beliebt. Das angeführte Citat aus Kämpfer wird von Thunberg mit Unrecht zu seinem *Taxus verticillata* (*Sciadopitys*) gezogen.

819. *P. coraiana* Sieb. *Annuaire de la Société hortic. des Pays-bas.* 1844. p. 35.

820. *P. Nageia* R. Br. *Mém. du Museum XIII.* p. 75. 76. *S. et Z. Fl. jap. II.* tab. 135. — *Myrica Nagi* Thunb. *Fl. jap.* p. 76. — *Nageia japonica* Gaert. *Carpol. I.* p. 491. tab. 39. fig. 8. — *Na vulgo Nagi Kämpfer Amoen.* p. 773. et fig. in p. 874. 468. *Salisburia* Smith.

821. *S. adianthifolia* *S. et Z. l. c.* tab. 136. *Ginkgo biloba* Thunb. *Fl. jap.* p. 358. — *Ginkgo vel Ginan vulgo Itsgò.* *Kämpfer Amoen.* p. 811. c. ic. in p. 813.

469. *Iuniperus* L.

822. *I. rigida* *S. et Z. Fl. jap. II.* tab. 125. *Iun. communis* Thbg. *Flor. jap.* p. 264. (excl. *Synon. et nom. japonicis*). — *Moro, aliis Sonoro maatz. Iuniperus arborescens, baccis Sabinae. Kämpfer Amoen. V.* p. 883.

823. *I. taxifolia* Hook. ap. *Beechey Botan.* p. 272.

Vidimus specimina a beato Mertens in insulis Bonin lecta.

824. *I. chinensis* L. — *I. barbadensis* et *I. virginica* Thunb. *l. c.* p. 264. — *Quai et Ibuki, Tatsj bjakusj, Ssugi bjakkusj Kämpfer Amoen. V.* 884.

Erscheint sowohl wildwachsend als kultivirt in den mannigfachsten Spielarten bald als 15—30' hoher aufrechter Baum mit schlanker pyramidaler Krone, bald als niedriger Strauch mit niedergebogenen Aesten. In der Grösse, Gestalt und Richtung der Nadeln variirt er in ähnlicher Weise, wie *J. lycia*, *virginiana* u. a. Diese verschiedenen Formen scheint Thunberg unter seinen *I. barbadensis* und *virginica* zu meinen, verwechselt dabei aber zugleich in seinen Citaten die in Japan für diese sowohl als für *I. rigida* üblichen Landesnamen. Hooker (ap. *Beechey l. c.*) citirt dagegen die Thunberg'schen *I. virginica* und *barbadensis* zu seinen *I. taxifolia* und *Thunbergii* aus den Bonin-Inseln. Wir besitzen nur von *I. taxifolia* Exemplare, ebendasselbst von Mertens gesammelt, aber diese sind von allen uns vorliegenden *Iuniperus*formen aus Japan selbst we-

sentlich verschieden, und die Thunbergischen Citate möchten deshalb bei den Hookerschen Arten zu tilgen seyn.

825. *I. procumbens* Sieb. in *Annuaire de la Société hortic. des Pays-bas*. 1844. p. 31.

470. *Thuja* Tournef.

826. *Th. orientalis* L. Sieb. et Zuccar. *Fl. jap.* II. p. 31. tab.

118. *Thunb.* *Fl. jap.* p. 266. — *Finoki altera* Kämpf. *Amoen.* V. p. 884.

827. *Th. excelsa* Bongard *Mémoires de l'Acad. de St. Petersburg. Sciences mathem. phys. et natur.* II. 1833.

828. *Th. pendula* Lamb. Sieb. et Zuccar. l. c. p. 30. tab. 117. *Cupressus pendula* Thunb. *Fl. jap.* p. 265. — *Fi moro* Kämpfer *Amoen.* V. p. 883.

471. *Thujopsis* S. et Z.

829. *Th. dolabrata* S. et Z. *Fl. jap.* II. p. 32. tab. 119. 120. — *Thuja dolabrata* Thunb. *Fl. jap.* p. 266. (excl. *Synon. Kämpferi*)

472. *Retinispora* Sieb. et Zucc.

830. *R. obtusa* S. et Z. *Fl. jap.* II. p. 38. tab. 121.

831. *R. pisifera* S. et Z. l. c. p. 39. tab. 122.

832. *R. squarrosa* S. et Z. l. c. p. 40. tab. 123.

473. *Cryptomeria* Don.

833. *Cr. japonica* Don *Linn. Transact.* XVIII. 2. p. 166. Sieb. et Zuccar. *Fl. jap.* II. p. 43. tab. 124. et 124. b. — *Cupressus japonica* Linn. *fil. suppl.* p. 421. *Thunb.* *Fl. jap.* p. 265. — *San vulgo Sugi* Kämpfer *Amoen.* V. p. 883. et *Banks Ic. Kämpfer.* tab. 48.

139. (77 Endl.) **ABIETINAE** L. C. Rich.

a. *Abietinae verae.*

474. *Abies* L. C. Rich.

834. *A. (Larix) leptolepis* S. et Z. *Fl. jap.* II. p. 12. tab.

105. — *Pinus Larix* Thunb. *Fl. jap.* p. 275.

835. *A. Tsuga* S. et Z. *Fl. jap. l. c. p. 14. tab. 106.*
 836. *A. (Picea) firma* S. et Z. *Fl. jap. l. c. p. 15. tab. 107.*
 837. *A. homolepis* S. et Z. *Fl. jap. l. c. p. 17. tab. 108.*
 838. *A. (Picea) bifida* S. et Z. *Fl. jap. l. c. p. 18. tab. 109.*
 839. *A. jezoënsis* S. et Z. *l. c. p. 19. tab. 110.*
 840. *A. polita* S. et Z. *l. c. p. 20. tab. 111. — Pinus Abies Thunb. Fl. jap. p. 275.*

475. *Pinus* L. C. Rich.

841. *P. densiflora* S. et Z. *l. c. p. 22. tab. 112.*
 842. *P. Massoniana* Lamb. Sieb. et Zucc. *l. c. p. 24. tab. 112.*
 114. *P. sylvestris* Thunb. *Fl. jap. p. 247. Pinus rubra Siebold Synops. in Act. Batav. l. c. p. 12. — Sjo vulgo Maats Kämpf. Amoen. p. 883.*

Nach Hooker (Beechey p. 271.) auch auf den Liu-Kiu Inseln. Am Kap der guten Hoffnung kultivirt.

843. *P. parviflora* S. et Z. *l. c. p. 27. tab. 115. — P. Cembra Thunb. Fl. jap. p. 274. (excl. synonym.)*
 844. *P. koraiensis* S. et Z. *l. c. p. 28. tab. 116. — P. Strobilus Thunb. l. c. p. 275.*

b. *Cunninghamieae* Zuccar.

476. *Cunninghamia* R. Br.

845. *C. sinensis* R. Br. S. et Z. *l. c. p. 7. tab. 103. 104. — Pinus lanceolata Lamb. Pin. tab. 34. — Belis jaculifolia Salisbury Act. Linn. VIII. p. 315.*

Wir haben schon früher (*Fl. jap. l. c. p. 9*) die Ansicht ausgesprochen, dass die Gattung *Arthrotaxis*, welche Don nach zwei in Tasmanien gefundenen Arten aufstellte, wohl mit *Cunninghamia* zu vereinigen seyn dürfte, weil der einzige Unterschied zwischen beiden in die Zahl der Antherenfächer beruht, deren bei *Cunninghamia* gewöhnlich 3, bei *Arthrotaxis* nur 2 auf jeder Blüthenschuppe stehen. Seitdem hat Sir W. Hooker im 6. Bande seiner *Icones* tab. 560 und 573 noch zwei *Arthrotaxis*-Arten, *A. tetragona* und *taxifolia*

aus demselben Vaterlande bekannt gemacht, welche aber ebenfalls keine weiter abweichenden Gattungsmerkmale zeigen und uns deshalb noch mehr für die Vereinigung beider Gattungen zu sprechen scheinen.

477. *Sciadopitys* Sieb. et Zuccar.

846. *Sc. verticillata* S. et Z. *Fl. jap. II. p. 1. tab. 101. 102.*

Taxus verticillata Thunb. *jap. p. 276. (excl. synonym. Kämpfer.)*

140. (38 Endl.) CYCADEACEAE R. Br.

478. *Cycas* L.

847. *C. revoluta* L. Thunb. *Fl. jap. p. 229. — Tessio, vulgo Sotits et Sodetz Kämpfer Amoen. p. 897. — Arbor Calappoides sinensis Rumph herb. Amboin. I. p. 92. tab. 24.*

β. prolifera S. et Z. trunco abbreviato elliptico undique prolifero, frondibus abbreviatis circumscriptione oblongis.

Thunberg und Kämpfer beschreiben zwar den Stamm der gewöhnlichen Form von *C. revoluta* ebenfalls als ästig, so wie er denn auch in unsern Gärten Sprossen treibt. Aber bei unsrer angegebenen Spielart ist der keineswegs cylindrische, sondern wie bei manchen *Encephalartus*-Arten elliptische Hauptstamm rings umher mit ähnlichen Sprossen besetzt, die Wedel sind nur 1—1½' lang, fast gleich von der Basis dicht mit Fiederblättchen besetzt und die weiblichen Spadices zur Zeit der Blüthe ebenfalls sehr verkürzt (ungefähr 6" lang). Von einer zweiten Spielart besitzen wir nur einen sehr jungen Wedel, dessen sehr schmale an den Rändern zurückgerollte auf der Rückseite rostbraunwollige Fiederblättchen um mehr als ihre doppelte Breite von einander abstehen. Es ist möglich, dass diese beiden Formen nur Kultur-Spielarten sind, doch glauben wir sie nicht übergehen zu dürfen.

Anmerkung. Die Aufzählung der monocotyledonären Familien müssen wir wegen Mangel an Raum dem nächsten Bande der Denkschriften vorbehalten.

Unter den Leguminosen ist einzuschalten:

5/2. *Pachyrrhizus* Rich.

7/2. *P. Thunbergianus* S. et Z. — *P. radice tuberosa*, caule volubili frutescente canescente, foliis ternato-pinnatis, foliolis lateralibus brevius, terminali longe pedicellatis, omnibus stipellis setaceis bistipellatis, late ovato-suborbicularibus cuspidatis soepe angulato-subbilobis vel terminali trilobo, subtus sericeo-canescens, racemis elongatis densifloris, leguminibus linearibus compressis subtorulosis ferrugineo-hirsutissimis polyspermis. — *Dolichos hirsutus* Thunb. *Linn. Transact. II. p. 339. De Cand. Prodr. II. p. 397 et Auct.* — *Katz vulgo Kudsu, Kudsu Kadsura et Kadsune Kämpfer Amoen. p. 840. Banks Icones Kämpfer tab. 41.*

Radix carnosa cubitalis, brachii crassitie, e qua farina edulis molitur (*Kämpfer l. c.*). Caules volubiles, lignosi in specim. nostris crassitie pennae anserinae, teretes, pilis adpressis sericeo-canescens. Folia longe petiolata petiolo 4—5-pollicari tereti superne canaliculato; foliola lateralibus brevius pedicellata pedicellis 3" longis, lamina e basi inaequilatera, rotundata vel late obovata cuspidata vel angulato-subbiloba, terminali aequali late rhombeo vel trilobo lobis lateralibus brevioribus rotundatis; omnia pilis adpressis subtus sericeo-cana, 3—5" longa, 2½—4" lata; stipulae et stipellae subulatae. Racemi axillares, simplices, cylindrici, densiflori, soepe elongati, 3—9" longi; rachis sericeo-cana; pedicelli 2—3" longi patentes ad calycis basin bracteolis duabus linearibus aucti. Calyx 4-partitus, canescenti-hirtus, lacinia infima longiori lineari subfalcata, reliquis lanceolatis acutis summa quam laterales parum latiore apice integra. Vexillum obovato-emarginatum, carina parum brevius, incumbens, basi ad unguem linearem callosum et utrinque plica parva auriculatum; alae longitudine vexilli oblongae obtusae auricula descendente falcata; carina recta apice adscendente truncata; petala omnia inter se libera. Stamina inclusa; filamenta diadelphica, 9 infer. ultra dimidium connatis rectis apicem versus liberis subulatis adscendentibus, alternis parum brevioribus; antherae omnium aequales oblongae. Ovarium sub-

stipitatum basi vaginula cucullata oblique cinctum, lineare, 8—12-ovulatum, hirtum. Stylus uncinatus, filiformis, stigmate capitato papilloso, stamina parum superans. Legumen lineare 2—3" longum, compressum, stylo coronatum, subtorulosum, 8—10-spermum, pilis longis patentibus ferrugineis dense hirsutum.

Endlich erwähnen wir am Schlusse der Dikotyledonen noch einer merkwürdigen, leider nur in unreifen Fruchtexemplaren uns vorliegenden Gattung, deren Stellung im natürlichen System wir für jetzt noch nicht näher zu bestimmen wagen.

Cercidiphyllum S. et Z.

Calyx tetraphyllus, foliolis quatuor coriaceis, deciduis. *Corolla*? *Stamina*? *Capsulae* quatuor vel abortu 3—2, substipitatae, cylindricae, primum erectae demum divergentes et subarcuatae, in latere exteriori sutura longitudinali percursae ibique dehiscentes, bivalves; placentae in marginibus valvularum decurrentes lineares, seminibus uniseriatis imbricatis pendulis subrhombeis, in alam membranaceam terminatis. Stylus in quavis capsula terminalis, longus, subulatus, in latere exteriori sulco decurrente exaratus, stigmate obtuso, primum persistens, tandem ad $\frac{1}{3}$ longitudinis usque delabens.

Frutex ramis teretibus erectis strictis cortice cinereo glabro vestitis. Folia decussatim opposita vel rarius subalternantia, annua, petiolata, e basi cordata suborbicularia obtusa crenata crenis glandula pellucida macronulatis, utrinque glabra subtus glaucescentia, palmatoquinque-vel septemnervia, nervis tenuibus venoso-ramosis, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ " longa totidemque lata; petioli pollicares vel sesqui-pollicares ima basi articulati. Stipulae intrafoliaceae tenuiter membranaceae, ultra medium connatae caducae. Gemmae oppositae perulatae; perula unica cucullata in dorso (ramo adverso) binervis et sulco profundo exarata, ventre (petiolum spectante) longitudinaliter fissa. Ramuli laterales floriferi abbreviati, vix 3" longi, incrassati, foliorum et perularum cicatricibus dense annulati, in gemmam terminati quae quotan-

nis folium unicum et pedunculum profert oppositifolium uniflorum nudum, 3—6''' longum.

Die dünne Rinde schmeckt gewürzhaft. Die Blätter haben im Umriss und Gefüge Aehnlichkeit mit denen von *Cercis Siliquastrum*. Die blüthentragenden verkürzten Seitenzweige wachsen sehr langsam, so dass sie in einem Alter von 5—6 Jahren kaum 3—4''' lang sind. Die bläulichbereiften 6—8 Linien langen Kapseln springen nach aussen der Länge nach auf und sind durch die bleibende Basis des Griffels geschnabelt.

Tab. III. 3. Fig. 1. Flos *Centrocotis bontioidea* magna, nat. 2. Flos-
dem corolla longitudo distincta et expansa m. n.
3. Stamina pars superior a facie et a dorso, ang. 4. Pi-
stillum in calyce, a. 5. Ovarii sectio transversalis, a. 6. Hupa-
calyce persistente cincta, a. 7. Epistemon sectio transver-
salis, pyrenum quinqueloculare monastrum, a.
Tab. III. 3. Fig. 1. *Distepocarpus caryocarpus* americanum masculinum
magna, nat. 2. Flos singularis, a. 3. Bractea a dorso, a.
4. Strobilus foemineus, m. n. 5. Fructus bracteis inclusis
oppositis tectus, a. Idem reflexa bractea minore et respecto
majoris apice, o. m. n. 7. Nucula a. glans, duplo rocta.

Explicatio Tabularum.

Tab. III. Fig. 1. *Meisteriae cernuae* racemus floriferus, magn. nat. 2. Flos singulus. 3. Corolla dissecta et expansa. 4. Calyx. Omnia auct. 5. Genitalia in calyce. 6. Stamen a facie et a dorso. 7. Pistillum, o. a. — 8. Racemus fructiferus magn. nat. 9. Capsula aperta resectis valvulis anterioribus et ademptis seminibus, a. 10. Valvula a facie, a. 11. Columna centralis cum placentis et stylo persistente, a. 12. Semen valde auctum.

Tab. III. 2. Fig. 1. Flos *Pentacoelii bontioides* magn. nat. 2. Ejusdem corolla longitudinaliter dissecta et expansa m. n. 3. Staminis pars superior a facie et a dorso, aucta. 4. Pistillum in calyce, a. 5. Ovarii sectio transversalis, a. 6. Drupa calyce persistente cincta, a. 7. Ejusdem sectio transversalis, pyrenum quinqueloculare monstrans, a.

Tab. III. 3. Fig. 1. *Distegocarpi carpinoidis* amentum masculum magn. nat. 2. Flos singulus, a. 3. Bractea a dorso, a. 4. Strobilus foemineus, m. n. 5. Fructus bracteis duabus oppositis tectus. 6. Idem reflexa bractea minore et resecto majoris apice, o. m. n. 7. Nucula s. glans, duplo aucta.

A. ANEMONOPSIS. B. GLAUCIDIUM.

A. BÜRGERIA. B. QUADRIALA.

A. MEISTERIA. B. PENTACOELIUM. C. DISTEGOCARPUS.