DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ.

SUPPLEMENTUM I.

AUCTORE

CAROLO FRIDER. NYMAN.

ACOTYLEDONEÆ VASCULARES. CHARACEÆ.
INDEX.

ÖREBRO (SUECIÆ).

TYPIS OFFICINÆ BOHLINIANÆ.

1883—4.

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ.

SUPPLEMENTUM I.

AUCTORE

CAROLO FRIDER. NYMAN.

1883-4.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

1884. (Pages 859-879 were published
separately in advance, separately paged, in 1883.)

QK 281.

.N9

Suppl. 1-2

CONSPECTUS FLORÆ EUROPAE.

SUPPLEMENTUM I.

ALTONA

CAROLO FRIDER. NYMAN.

1863-4

ALTONA

1863-4

AUG 7 - 1923

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ SUPPLEMENTUM.

CI. III. ACOTYLEDONEÆ VASCULARES.

CXL. EUISETACEÆ DC.

1. *Equisetum* L.

a. *Equiseta vernalia* ABr.

1. *E. Telmateia* Ehrh. (1788). *E. maximum* Lam.? (1778). — Exs. Rchb. 2518. Bill. 1790. Rab. 99. 100. Welw. lusit. 298.

Lusit. Hisp. Brit. Dan. Batav. Germ. Belg. Gall. Helv. Ital. Austr. Hung. Slavon. Transs. Croat. Dalm. Maced. Thrac. Græc. Ross. mer. med. *E. fluviatile* Sm. *E. eburneum* Rth (1797). *E. maximum* Lam. certe est nomen omnium antiquissimum sed admodum dubium et ab ipso auctore dein omissum. — *E. ambiguum* Genn. (Parma). — *E. Braunii* Mild. (Scot.). — *E. granatense* Lge. (Hisp., Ital. etc.). — *E. rivulare* Scheele.

2. *E. arvense* L. — Exs. Fr. VIII. 99 (var. *alpestr.*). Bill. 1789. Rab. 46 — 48.

Eur. tota exc. (?) Græc. (ubi tantum ex Sibth.) et p. p. Turc. — *E. nemorosum* Billck. *E. pratense* Rth (non Ehrh.).

* *E. riparium* Fr. *Syll.* 349. Fr. hb. norm. VII. 99. Suec. mer. (etc.).

b. *Equiseta subvernalia* ABr.

3. *E. silvaticum* L. — Exs. Fr. XIV. 98 (var.). Sz. gall. germ. 762. Bill. 1791. Rab. 43.

Hisp. bor. Pyren. Brit. Scand. (s. l.). Batav. Belg. Germ. Helv. Delph. Gallopr. (r.). Pedem. Tyrol. Austr. Hung. Transs. Croat. Ross.; Thrac. et Græc. sec. Sibth. *E. capillare* Hfn.

4. *E. pratense* Ehrh. hannov. mag. IX. 138 (1784) et beitr. III. 7. (1788). *E. umbrosum* FMey. in W. enum. (1809). — Exs. Sz. hb. norm. 182. Fr. VI. 99. Rchb. 1418. Rab. 41, 42.

Hibern. bor. Scot. Island. Scand. (s. l.). Germ. plur. Bohem. Siles. Morav. Austr. Salisb. Tyrol. Vales. Ital. cont. (bor.). Croat. Transs. Hung. (r.). Galic. Ross. *E. amphibolium* Retz. suppl. (1805). *E. Drummondii* Hook. (1834). *E. Ehrharti* Mey. (1836).

c. *Equiseta æstivalia* ABr.

5. *E. fluviatile* L. — Exs. Fr. XI. 97. Bill. 2989. Rab. 74. 75.

Per totum territorium. *E. Heleocharis* Ehrh. *E. striatum* Gilib. *E. lacustre* Op. *E. aquaticum* Hpe. — *E. limosum* L.; Fr. hb. norm. XI. 98.

6. *E. litorale* Kühlew. ap. Rupr. (1845). — Exs. Fr. hb. norm. XIII. 99. Bill. 2781. Rab. 44. 45. 68. Sz. hb. norm. 393.

Germ. bor. Dan. Upland. Ingria. Livon. Siles. Bohem. (r.). Bavar. (r.). Austr. (Wien). Hung. (r.). Galic.; etiam Gall. mer. pr. Arles (Duval-Jouv., Bill. l. c.) et Helv. (lac. Neocom.; ABr.). *E. inundatum* Lasch (1846). *E. Kochianum* Böckel. *E. uliginosum* Heug. *E. arvensi-limosum* Lasch.

7. *E. palustre* L. — Exs. Fr. XIII. 98. Bill. 493. Rab. 69. Lusit. Hisp. Brit. Scand. Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Ital. bor. Austr. Hung. Slav. Transs. Croat. Dalm. Attica. Thrac. Ross. *E. pratense* Rchb. exc. *E. arenarium* Op. — *E. prostratum* Hpe. — *E. nodosum* Hpe. *E. veronense* Poll.

d. *Equiseta hiemalia* ABr.

8. *E. ramosissimum* Dsf. atl. II. 398. (1800). Exs. Bill. 96. Rab. 97. Sz hb. norm. 392. Bourg. telon. 446. pyr. hisp. 667. Welw. lusit. cont. 461, 462. Huet 241. Raul. cret. 39. Orph. 498.

Lusit. Hisp. Gall. Germ. occ., centr., mer. Helv. occ., mer. Ital. Tyrol. Carinth. Sty. Austr. Morav. Bohem. Galic. Hung. Transs. Croat. Istr. Dalm. Græc. Turc. Ross. mer. med. *E. elongatum* W. (1810). *E. ramosum* DC. (1806). *E. illyricum* Hpe. exs. *E. multicaule* Led. — *E. tenue* Pr. — *E. pallidum* Bory. — *E. ephedroides* Bory; Orph. gr. exs. 498. — *E. pannonicum* Kit. ap. W. — *E. cæspitosum* Schur.

9. *E. hiemale* L. — Exs. Sz gall. germ. 761. Bill. 2191. Rchb. 1418. Rab. 49. 50.

Brit. Scand. s. l. Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Ital. bor. Hetr. (Montecarlo). Austr. Hung. Croat. Transs. Thrac. Ross. *E. asperum* Gilib. *E. zonatum* Friv. — *E. fusco-zonatum* Schur. *E. alpinum* Schur. *Suppl.* 60. (Transs.). — *E. Moorei* Newm. *Suppl.* 60. (Hibern.). — *E. Schleicheri* Milde. *E. trachyodon* Bor. et al. non ABr. *E. intermedium* Schur. (Boruss., Saxon., Siles. etc.).

10. *E. trachyodon* ABr. (1838). — Exs. Bill. 494. Sz 1578. Germ. occ. ad ripas Rheni "ab urbe Moguntia usque ad Argentoratam: Mannheim, Carlsruhe" (Milde). — *E. Mackaii* Newm. (1843). *Syll.* 350. *E. elongatum* Hook. brit. fl. (Hibern. bor., Scot.).

11. *E. variegatum* Schleich. (1807). — Exs. Rchb. 1417. Bill. 1792. Rab. 73. 98.

Hisp. bor. (litor.), or. (alp.). Gall. Belg. (r.). Batav. Brit. Dan. (r.). Norv. Suec. bor., med. Gotland. Vestrog. (m. Mösseberg). Germ. occ. Boruss. (r.). Siles. Bohem. (r.). Austr. Sty. Carinth. Salisb. Tyrol. Helv. Pedem. Croat. Hung. Galic. (m. Tatra). Transs. Livon. *E. tenue* Hpe exs. *E. reptans* Whlbn. (1812). *E. serotinum* Schur. — *E. Wilsoni* Newm. (Hibern., Badia). — *E. Rionii* Christ.

12. *E. scirpoides* Mchx. (1803). — Exs. Fr. IV. 100. Norv. Suec. bor., med. Fenn. Lapp. Ross. bor. Spitzb.; indicatur etiam in Carinthia (Wulfen sec. Milde). *E. reptans* Whlbn. p. p. *E. lapponicum* Fisch.

CXLI. POLYPODIACEÆ (Br.).

I. POLYPODIACEÆ VELATÆ.

1. *Struthiopteris* W.

1. *S. germanica* W. — Exs. Rab. 59. Sieb. austr. 568. Scand. (s. l.). Belg. (r.). Germ. Helv. (r.). Pedem. Tyrol. Sicil. (Etna). Austr. Hung. Croat. Transs. Ross.

2. *Allosorus* Brnh.

1. *A. crispus* Brnh. — Exs. Fr. III. 98. Bill. 1396. Rab. 92. Bourg. alp. mar. 364. hisp. 1545 e. 2725. Dur. astur. 159. Ces. ital. bor. 122. Sieb. austr. 563. Lapp. Suec. bor. Norv. bor., occ. Brit. Astur. Castil. Gran. (S. Nev.). Pyren. Ceven. Arvern. (etc.). Voges. (Chiny). Arden. Hercyn. (pr. Goslar). Badia (Schwarzw.). Alpes. Sudeti. Helv. Delph. Cors. Appen. centr. Tyrol. Salisb. Sty. Transs. alp. mont.

3. *Notholæna* Br.

1. *N. Marantæ* Br. — Exs. Bill. 196. Ces. Car. ital. bor. 252. Mab. cors. 300. Rel. Maill. 405 (Aveyr.). Rab. 53.
Lusit. Hisp. (Gran., la Mancha). Gall. (Aveyron, Ardèche, Drôme, Haute-Vienne). Ilva (Elba). Cors. Hetr. Ital. bor. Austr. infer. (rr.). Morav. (rr.). Croat. Slavon. Serb. Maced. (Athos: Sibth.). Creta. Ross. mer. Gymnogramme *Marantæ* Mett. (1856).

2. *N. vellea* Br. pr. nov. holl. 146. *N. lanuginosa et vellea* Desv. — Exs. Bourg. hisp. 1545.h. Huet sic. a. 1855. Heldr. hb. norm. 778.
Bætic. Valenc. Murc. Cors. (Ajaccio). Sard. Sicil. Pantellar. Creta. Græc. *Acrostichum catanense* Cosent. *Cosentinia vellea* Tod.

II. POLYPODIACEÆ INDUSIATÆ.

4. *Pteris* L.

1. *P. aquilina* L. — Exs. Fr. VIII. 98. Bill. 195. Bourg. pyr. hisp. 398. Blanco hisp. 224. Welw. lusit. 291.
In toto territorio. — *P. brevipes* Tsh.

2. *P. arguta* Ait. (1789). *P. palustris* Poir. (1804). — Exs. Welw. lusit. cont. 466.
Lusit. Indicatur etiam in ins. Coreyra (Mazz. ex Milde).

3. *P. cretica* L. — Exs. Ces. et Car. ital. bor. 190. Bourg. cors. 443. Kral. cors. 859. Mab. cors. 84. Rab. 54.
Creta. Sicil. Neap. (urbs). Sard. Cors. Hetr. (Lunigiano, Carrara). Ligur. (Nizza, Portofino: Casaretto). Lomb. (l. Maggiore, l. di Como etc.). Helv. mer. (Ticino). — *P. oligophylla* Viv!.

4. *P. longifolia* L. (Guss.). — Exs. Bourg. hisp. 1545. Huet sic. 243.
Hisp. mer. (Gran.). Sicil. Neap. (Ischia, Vietri). Zacynth. Messen. (sec. Bory). *P. vulcanica* Bert. misc. (1858). *P. ensifolia* Sw. *P. lanceolata* Dsf. — *P. vittata* Sm. *Syll.* 433. (Zacynth.). — *P. Alpini* Spr. *Syll.* 433. (Creta).

5. *Adiantum* L.

1. *A. Capillus Veneris* L. — Exs. Welw. lusit. 315. Bourg. hisp. 1545 g. pyr. hisp. 456. Dur. astur. 162. Bill. 698. Sz hb. norm. 784. Rab. 11. Sieb. austr. 566. Raul. cret. 38.
Angl. Hibern. Lusit. Hisp. Gall. occ. (Char.-Inf., D.-Sevres, Morbih.), mer. (etc.?). Helv. (Jura, ad lac. Neocom. in antris: ABr.). Valtellin. pr. Bormio ad fontem calidum (Meissn. 1869). Ital. Istr. Dalm. Croat. Slavon. Transs. (alp. Hunyad.). Turc. Græc.

6. *Cheilanthes* Sw.

1. *Ch. odora* Sw. — Exs. Welw. lusit. 561. cont. 460. Bourg. hisp. 510 a. cors. 444. Raul. cret. 34. Heldr. hb. norm. 762. Orph. 140.
Lusit. Hisp. Gall. mer. Helv. (ex Milde). Ligur. (Nizza etc.). Pedem. (Susa). Cors. Sard. Hetr. (m. Pisano). Neap. Sicil. Creta. Græc. Maced. Dalm. Herceg. *Ch. fragrans* Hook. *Ch. acrostica* Tod. — *Ch. maderensis* Low. *Suppl.* 75. (Cors. Sicil.).

2. *Ch. Szovitsii* F.M. in bull. soc. mosc. VI. 260 (1833). *Suppl.* 75. *Ch. fimbriata* Vis. dalm. (1842). *Syll.* 433.
Dalm. (ins. Lesina etc.). Herceg. Ital. bor. (m. Baldo, m. Mauro s. Mavore pr. Bononiam, Imola). Pelop. et Creta sec. Milde. *Acrosticum microphyllum* Bert. *Notolæna persica* Bory in Belang. voy. (1838). *Oeosporangium Szovitsii* Vis. 1867. *Oe. persicum* Vis. 1872.

3. *Ch. hispanica* Mett. in abh. senkenb. 1859—1861. 74.

Hisp. rr. (Estremadura: Schousboe 1798). Sicil. pr. Messan. si, ut videtur et observat cl. Milde, huc pertinet *Ch. Tinei* Tod. (exs. 1266).

7. **Woodwardia** Sm.

1. *W. radicans* Sm. (1793). — Exs. Welw. lusit. cont. 475. Dur. astur. 161.

Lusit. Astur. Neap. (Sorrento, Ischia). Sicil. (Etna).

8. **Blechnum** (L.) Sw. (1800).

1. *B. spicant* Rth. germ. III. 44. (1800). — Exs. Bill. 194. Welw. lusit. 303. Dur. astur. 160. Raul. cret. 36. Rab. 91. Rel. Maill. 1922 (Belg.).

Lusit. Hisp. bor. (etc.?). Brit. Færoe. Scand. s. l. (exc. Lapp. plur.). Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Ital. Austr. Hung. Croat. Slavon. Transs. Bosn. Ross. med. Creta (Kissamos: Heldr.). B. boreale Sw.

9. **Scolopendrium** Sm. (1793).

1. *S. vulgare* Symons syn. 193 (1798). — Exs. Fr. X. 99. Rehb. 94. Bill. 193. Rab. 31. Rel. Maill. 1915 (Belg.).

Lusit. Hisp. (præs. bor.). Brit. Norv. (Varald-ö). Gotland. (ins. Lilla Carlsö). Germ. (præs. occ., mer., med.). Batav. Belg. Gall. Helv. Ital. Austr. Hung. Transs. Slavon. Croat. Dalm. Græc. Maced. Ross. mer., med. S. officinarum Sw. (1800). S. officinale DC. 1815. — S. Phyllitis Rth. (1800). Phyllitis Scolopendrium Newm.

2. *S. Hemionitis* Sw. ap. Schrad. (1800). — Exs. Huet sic. 246. Mab. cors. 198. Rab. 52.

Lusit. Hisp. mer., or. Gall. mer. (Toulon, Marseille, Montredon etc.). Ligur. Cors. Sard. Sicil. Ital. mer. (Ital. omn. ex comp. ital.). Græc. (sec. Milde). — *S. sagittatum* DC. (1815). *Syll.* 433. *S. cordatum* Fée. (Gall. mer., Balear. et cum specie). — *S. breve* Bert. *Suppl.* 75. (ins. Caprear. et cum specie).

× *S. hybridum* Mild. in act. soc. zool. - bot. vindob. 1864. - Dalm. ins. Lossin piccolo, ubi specimen unicum legit cl. Reichardt. Forse hybr. a *S. vulgari* et *Ceterach officinarum*.

10. **Asplenium** (L.).

*

1. *A. marinum* L. — Exs. Welw. lusit. 69. cont. 470. Lge eur. mer. S (Gallec.). Dur. astur. 155.

Norv. occ. (ins. Mosterö, rr.). Hebrid. Brit. Gall. ocean. Hisp. bor. Gibralt. (ex Milde). Lusit. (Brot.; Oporto: Sjögren). Balear. Ital. mer. (Taranto). Cors. Sard. Pantellar. Græc. ins. A. trapeziforme Huds.

2. *A. Trichomanes* (L. sp. incl. seq.) Huds. angl. ed. 1. 385. — Exs. Welw. lusit. 313. Bourg. pyr. hisp. 397. Rab. 25.

Lusit. Hisp. Brit. Scand. s. l. (exc. Lapp.). Germ. Belg. Gall. Helv. Ital. Austr. Hung. Banat. Slavon. Transs. Croat. Dalm. Græc. Maced. Thrac. Ross. mer., med. — *A. Harovii* Godr. in bot. z. 1843. (Metz; Tyrol).

* *A. microphyllum* Tin. ap. Guss. - Sicil. Appen.

3. *A. viride* Huds. angl. ed. 1. 385. — Exs. Fr. III. 97. Rehb. 93. Rab. 34. Bill. 897. Bourg. pyr. hisp. 455. Sieb. austr. 565. Sz hb. norm. 783.

Gran. (S. Nev.). Arrag. Catal. Pyren. Alpes. Jurass. Voges. Ardenn. (rr.). Brit. Norv. Vermel. (r.). Smoland. (m. Taberg). Suec. bor. Lapp. Fenn. or. Germ. med., mer. Helv. Sabaud. Ital. (Alpi, alpi Apuane, m. Acuto). Austr. Hung. Banat.

Slavon. Transs. Croat. Dalm. Thessal. (Olympus: Heldr.). Taur. alp. mont. A. umbrosum Vill. A. vogesiacum FSz (exs. 1266).

Obs. A. adulterinum Milde (1865), in Silesia, Bohemia etc. raro proveniens, medium est inter A. Trichomanem et A. viride, sed non hybridum sec. cl. Celakovsky; auctori primum erat proles hybrida, dein (b. z. 1868) probab. forma serpentina A. viridis. — A. dolosum Milde (1864) pr. Meran Tyrol. mer. inter A. Trichoman. et A. Ad. nigrum rr. legit cl. auctor.

4. **A. Petrarchæ** DC. (1815). *Suppl.* 75. — Exs. Bourg. hisp. 1693. telon. 439. Lge eur. mer. 7. Hisp. mer. Gall. mer. (sic in territorio monspel. loco Magnolii Mosson). Ligur. Polypod. Petrarchæ Guer. in descr. vaucl. 124 (1804). A. vallis clausæ Req. in Guer. vaucl. ed. II. (1813). A. glandulosum Lois. (1810). — A. pilosum Guss. (Sicil.).

Obs. Aspl. Petrarchæ est bona et pulchra species, quæ magis diversa ab A. Trichomani quam hoc ab A. viridi, ambobus antiquior et probabiliter moritura (de Saporta in bull. soc. bot. 1868). Indicatur etiam in Hibernia (nec non in Græcia, sed tantum errore schedulæ observ. cl. Boissier).

5. **A. lanceolatum** Huds. — Exs. Welw. lusit. 307. cont. 468. Bourg. hisp. 512. 2577. Dur. astur. 157. Bill. 1797.

Lusit. Hisp. Hibern. mer. (Cork). Angl. Gall. bor.-occ., occ. Paris. (Fontainebl.). Mende. Vogesi (r.); indicatur etiam in Hettrur. (Arcangeli 1882) et in ins. Naxos Græc. A. Billotii FSz (1845). A. cuneatum id. 1844. Athyrium lanceolatum Heufl.

* A. obovatum Viv. (1824). *Syll.* 432. — Exs. Huet sic. 245. Müll. sard. Soleir. cors. - Lusit. Hisp. Gall. mer. (Toulon, Hieres, Frejus). Cors. Sard. Ital. mer. Sicil. Cyclad. Athyr. obovatum Fée.

6. **A. fontanum** Brnh. in Schrad. journ. I. 2 (1799). 314. — Exs. Bill. 896. Rab. 33. Sz hb. norm. 782. Bourg. alp. mar. 362. hisp. 1692. pyr. hisp. 460. Angl. (rr.). Galoec. Valenc. Catal. Arrag. Pyren. Gall. mer., centr. Belg. rr. (St Denis, prov. Hainaut; indig. subdub.). Alsat. Würtemb. (R. Alp. r.). Jurass. Helv. mer. Sabaud. Pedem. Sty. Carinth. Hung. (rr.). Galic. (pr. Lemberg ex Milde). Transs. (etiam Græc. ex Sm. prodr.). A. Halleri Br. Aspid. Halleri W. Athyr. Halleri Rth. — A. fontanum Sm. Aspid. fontanum W. Athyr. fontanum Rth.

7. **A. Adiantum nigrum** L. — Exs. Fr. X. 98. Dur. astur. 158. Bill. 1798. Rab. 36.

Lusit. Hisp. Gall. occ., mer. Arvern. Vogesi. Brit. Norv. occ. Scan. Bornholm. Germ. med., mer. Helv. Ital. Austr. Hung. Banat. Slavon. Transs. Croat. Dalm. Græc. Maced. Lithuan. Polon. A. Heuffelii Wierzb. — A. obtusum Kit. ap. W. (Hung. Siles. Istr.).

* A. Onopteris L. sp. ed. I. A. acutum Bory ap. W. (1810). A. Virgilio Bory exp. mor. (1832). — Exs. Welw. lusit. 306. cont. 473. Blanco hisp. 353. Bourg. cors. 442. Raul. cret. 33. - Eur. mer. et occ. (præs. litoral. et insular.). — A. davallioides Tsh. *Syll.* 432. (Ital. centr. etc.). — A. silesiacum Milde (1855).

* A. Serpentina Tsh (1839). A. serpentinum Pr. (1836). A. incisum Op. A. fissum Wimm. (non Kit.). — Exs. Rab. 35. - Bohem. Siles. Morav. Saxon. Austr. Sty. Hung. Serb. (indicatur etiam Angl., Scot., Cors., Appen. etc.). — A. obtusum Pr. (non Kit.).

8. **A. fissum** Kit. ap. W. (1810). — Exs. Sz hb. norm. 988. Sieb. carinth. 299. Rab. 85.

Bavar. Austr. Sty. Carinth. Carn. Croat. Banat. (rr.). Tyrol. Vicent. Delph. (r.). Pedem. Aprut. (m. Majella, m. Corno). Dalm. Maced. (m. Scardus). Aspid. cuneatum

Schk. krypt. gew. I. (1809). *Asplen. tenuifolium* Guss. rar. (1826); *A. angustifolium* in tab. *Aspid. tenuifolium* Ten. (1831). *Aspl. Trettenerianum* Jan (1835). *Athyrium cuneatum* Heufl. (1856).

9. *A. lepidum* Pr. in verh. vaterl. mus. 1836. 7. (63). *A. brachyphyllum* Gasp. in rendic. d. r. acad. napol. III. 108 (1845).

Banat. Croat. Lucan. Calabr. Sicil. (m. Madon., Busambra), ubique rr. *A. fissum* Heufl.; Tod. enum. (non Kit.).

* 10. *Ruta muraria* L. — Exs. Fr. XIV. 97. Rab. 37. Bill. 1796.

Lusit. Hisp. (pras. bor.). Brit. Dan. Norv. Suec. mer., med. (et bor. r.). Fenn. (exc. bor.). Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Ital. Austr. Hung. Banat. Slavon. Transs. Croat. Dalm. Graec. (mont.). Thrac. Ross. mer., med. — *A. Matthioli* Gasp. (Ital. Austr. Hung. Monten. Herceg.). — *A. zoliense* Kit. — *A. multicaule* Pr. (1836).

11. *A. germanicum* Weis. pl. crypt. fl. gott. 299 (1770). *A. Breynii* Retz. (1774). *Syll.* 432. — Exs. Fr. IX. 99. Rab. 88.

Lusit. (ex Milde). Angl. (r.). Scot. Norv. mer., med. Suec. mer., med. (et bor. r.). Fenn. mer. Germ. Belg. Gall. occ. (D.-Sevres, Vendée). Arvern. Voges. Jurass. Ceven. etc. Delph. Helv. Ital. bor. (Alpes). Austr. Hung. Transs. Croat. (m. Vellebit). *A. alternifolium* Wulf. ap. Jacq. (1781). — Forse hybr. ab *A. Ruta muraria* et *A. septentrionale*; desideratur in Gotlandia et Ölandia ubi hoc deest.

× *A. Heufleri* Reichardt (1859). *A. Trichomanes-germanicum* Milde. — Tyrol. mer., Saxon., Morav., ubique r.

12. *A. septentrionale* Hull.; Šw. ap. Schrad. (1800). — Exs. Bill. 898. Bourg. pyr. hisp. 396. Sz 764. Rab. 61. Rel. Maill. 269 (Belg.).

Hisp. (mont., alp.). Pyren. Alpes. Voges. Belg. Angl. (r.). Scot. (r.). Scand. s. l. (exc. Lapp.). Germ. Gall. or. (H. Rhin etc.). Helv. Sabaud. Ital. (Alpi, Appen.). Cors. Sicil. (Etna). Austr. Hung. Slavon. Transs. Croat. Bosn. Ross. *A. bifurcatum* Op.

13. *A. Seelosii* Leyb. (1855). *Suppl.* 75. *A. tridactylites* Bartl. Tyrol. Carinth. Judicar. (pr. lac. Idro). Brescia (ad lac. Garda).

14. *A. palmatum* Lam. — Exs. Welw. lusit. 297. cont. 464. Rab. 60.

Lusit. occ. (S. de Cintra). Hisp. mer. (sec. Cav.). Sec. cl. Kippist in Hook. bot. mag. 1856 hoc est *A. Hemionitis* L. ex ejus herbario.

11. ***Athyrium*** Rth. tent. III. 58 (excl. sp.).

1. *A. Filix femina* Rth. l. c. 65. — Exs. Bill. 2192. Rab. 24. Rel. Maill. 1923 (Suec.). Bourg. hisp. 1545. b. pyr. hisp. 461. Dur. astur. 152.

Eur. tota sed, ut videtur, raro in Graecia et Turcia insul. (Pelop. mont.: Orph., Sart.; Creta: Heldr.). *Aspidium Filix femina* Sw. *Syll.* 432. *Asplenium Filix femina* Brnh. *Cystopteris F. femina* Coss. Germ. — *A. ovatum* Rth. — *A. trifidum* Rth. — *A. molle* Rth. — *A. rhaticum* Rth. — *A. corseicum* Fée.

2. *A. alpestre* Nyl. ex Moore. *A. polypodioides* Schur in oc. z. 1858. — Exs. Fr. XIV. 95. Bill. 694. Rab. 84. Sieb. sudet. 559. Michal. jur. 144.

Scot. Norv. Suec. bor. Lapp. Fenn. Ross. med. Siles. Bohem. Morav. Germ. (Harz. Schwarzw. etc.). Vogesi. Jurass. (r.). Helv. Arvern. Pyren. Alpes. Pedem. Hetr. Hung. Transs. Lithuan. (indicator etiam in Catal. et Castil.). subalp. mont. *Aspidium alpestre* Hpe (1805). *A. rhaticum* Sz gall. germ. exs. 572. *Polypodium rhaticum* L. sp. p. p. *P. alpestre* Hpe (exs. et) in K. syn. (1845). *Asplenium alpestre* Mett. (1859). — *A. flexile* (Milde). *Suppl.* 75. Scot. Voges. (etc.).

3. *A. crenatum* Rupr. distr. crypt. ross. III. 40. (1845). *Aspidium crenatum* Smf. *Syll.* 431. *Asplen. crenatum* Fr. sum. *Cystopteris crenata* Fr. hb. norm. VIII. 97.

Norv. (vall. Gudbrandsdal.). Lapp. or. Fenn. Ross. med. (Wiätka).

12. *Aspidium* Sw.

a. Aspidium Br.

1. *A. angulare* Kit. ap. W. (1810). — Exs. Fr. XIII. 96. Rab. 20. Bill. 695.

Norv. mer. Scan. (Skärali). Dan. (ins. balt. Christiansö). Siles. Saxon. Badia. Helv. ? Austr. ? Hung. Transs. Croat. Dalm. A. Braunii Spenn. (1825). A. pilosum Schur.

2. *A. aculeatum* Sw. (1800). — Exs. Bill. 695 b. Rel. Maill. 284 (Belg.). Dur. astur. 116. Welw. lusit. cont. 469. Heldr. hb. norm. 362. Orph. 4.

Lusit. Hisp. Hibern. Angl. Belg. Gall. Germ. occ. (r.). Helv. Ital. Cors. Austr. Hung. Transs. Croat. Dalm. Maced. Thrac. Pelop. (r.). A. angulare Sm. *Hypopeltis lobulata* Bory. — A. hastulatum Ten.; Huet neap. exs. 442. *Hypopeltis hastulata* Tod. (Ital. mer. Sicil. Lusit. Hibern.).

3. *A. lobatum* Sw. (1800). — Exs. Rab. 22. Bill. 695 b. Bourg. hisp. 1545 d. Dur. astur. 150. Huet neap. 443.

Lusit. Hisp. Brit. Norv. occ., mer. Gotland. (m. Thorsburg). Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Ital. cont. Austr. Hung. Transs. Polon. (ex Milde). Thessal. (Olympus: Heldr.). A. aculeatum Wimm. — A. Plukenetii (Lois.). A. munitum et intermedium Sadl. (ex Milde).

4. *A. Lonchitis* Sw. (1800). — Exs. Fr. XIII. 95. Bill. 2393. Rehb. 561. Rab. 38. Bourg. hisp. 1545 a. pyr. hisp. 459. sab. 323. Huet neap. 441. Sieb. austr. 561.

Brit. (Scotl., Wales). Norv. Lapp. Ross. arct. Suec. bor. (et med. r.). Siles. Thuring. (rr.). Hassia (m. Vogelberg). Nassauv. (r.). Belg. rr. (pr. Hevremont prov. Liege, ubi a cl. Donckier detect. a. 1864). Badia (m. Feldberg.). Würtemb. (R. Alp). Vogesi. Jurass. Helv. Sabaud. Alpes. Ceven. Pyren. Hisp. bor., or., mer. Ital. Sicil. (Etna ex Milde). Cors. (sec. G. G.). Dalm. Croat. Hung. Transs. Taur. Maced. Græc. (Olymp., Parnass., Tayget.). Creta. alp. mont. etc.

b. Polystichum Rth. (p. p.). *Nephrodium* Rich.

5. *A. Filix mas* Sw. (1800). — Exs. Bill. 1395. Rab. 23. Dur. astur. 151. Bourg. hisp. 1545. c. pyr. hisp. 462.

Lusit. Hisp. (in mer. tantum alp.). Gall. Belg. Brit. Island. (Milde). Scand. (s. l.). Batav. Germ. Helv. Ital. (exc. Sard.?). Austr. Hung. Slavon. Serb. Transs. Croat. Dalm. Zacynth. Creta. Pelop. Parnass. (Heldr.). Ross. *Polystichum Filix mas* Rth. *Nephrodium Filix mas* Rich. *Lastrea Filix mas* Pr. — *Polyst. durum et induratum* Schur. — A. Mildeanum Goepp. (Siles., Moscov. etc.). — A. affine F. M. *Syll.* 431. (Ross. mer. Siles. Badia. Angl.). — A. Borreri (Newm.). Angl. Lusit. (Welw. 706). Hisp. Pyren. Cors. Tyrol. (etc.). — A. abbreviatum (DC.).

* *A. remotum* ABr. (1851). — Germ. (Baden, Aachen, etc.?), Angl. (Westmor.), sed semper rarum et probab. hybr. ab *A. F. mare* et *A. spinuloso*. Cf. Milde, fil. eur. 126.

6. *A. cristatum* Sw. (1800). — Exs. Fr. IX. 98. Bill. 99. Rab. 17. Sz 395.

Angl. Dan. Norv. mer. Suec. mer., med. Fenn. med., mer. Germ. Batav. Belg. Gall. bor., or. Helv. Tyrol. (pr. Kitzbüchl). Biellese (m. di Oropa). Salisb. Carinth. (etc.?). Hung. Croat. Transs. Ross. med., mer. Thrac. (Byz.: Sibth.); indicatur etiam in Hispan. (Del Pozo), Baetia (Sibth.) et Cephalon. (Heufl.). *Polystichum cristatum*

Rth. *Nephrodium cristatum* Mehx. *Lastrea cristata* Pr. L. *Callipteris* Newm. *Lophodium* *Callipteris* Newm. *Polypod. Callipteris* Ehrh. (1778).

* *A. uliginosum* Newm. (sub *Lastrea*). *Lophodium uliginosum* Newm. *A. spinulosum* × *cristatum* Milde (1855). — Exs. Rab. 19. — Fenu. (Imatra). Livon. Germ. bor. Hung. (Liptau). Bohem. Bonna. Paris. Angl. Omn. ex Milde.

7. *A. spinulosum* Sw. — Exs. Fr. XIII. 97. Bill. 1794. Rel. Maill. 439 (Belg.). Rab. 13.

Brit. Scand. (s. l.). Germ. Batav. Belg. Gall. Cors. Helv. Ital. bor. Austr. Hung. Slavon. Croat. Transs. Ross. *Polystichum spinulosum* DC. *P. pseudo-cristatum* Schur. *Lastrea spinulosa* Pr. *Nephrodium spinulosum* Desv. *Lophodium spinulosum* Newm.

* *A. dilatatum* Sw. *A. dumetorum* Sm. *Lophodium collinum* Newm. *Lastrea dilatata* Pr. L. *collina* Moore. L. *glandulosa* Newm. *Lophod. glandulosum* Newm. — Exs. Welw. lusit. 293. Dur. astur. 153. 154. Bill. 1795. Rab. 40. Fr. XVI. 83. — Area geogr. magis ac speciei meridiem versus extensa (sic *A. dilatatum* adest in montibus Lusit., Hisp. bor., or., *Tectaria cristata* Lag. in hb. Sw., Ital. centr., Istr., Dalm., Maced.). — *Lastrea dilatata* Newm. L. *multiflora* Newm. *Lophod. multiflorum* Newm.

8. *A. æmulum* Sw. in Schrad. journ. II. 42 (1800). *Polypodium æmulum* Ait. hort. kew. III. 466 (1789).

Brit. Probabiliter etiam Gall. bor.-occ., cum teste Milde adest in herbario Presliano specimen ad Pontivy in Bretagne collectum. *Lastrea æmula* Brackr. *Nephrod. foeniseeii* Lowe (1832). *Aspidium foeniseeii* Kze. *Syll.* 431. *Lophodium foeniseeii* Newm. — *A. recurvum* Bree (1843). *Lastrea recurva* Newm. (1844). L. *foeniseeii* Wats.; Bab. *Lophod. recurvum* Newm. (1851).

9. *A. rigidum* Sw. (1800). *Polypodium rigidum* Hfn. fl. germ. II. 6. — Exs. Rehb. 100. Rab. 89. Bill. 2780. Bourg. sab. 322. Michal. jur. 146. Rel. Maill. 1925 (Helv.). 1926 (Sab.).

Norv. mer. rr. (?). Angl. Pyren. Jurass. Alpes. Appen. (etc.). Helv. Tyrol. Salisb. Carinth. Styr. Austr. Carn. Slavon. Croat. Istr. Transs. mer. Monten. Herceg. alp. mont. *Polystichum strigosum* Rth (1800). *P. rigidum* DC. *Nephrod. rigidum* Desv. *Lastrea rigida* Pr. *Lophodium rigidum* Newm. — *A. nevadense* Boiss. (S. Nevada Hisp. mer.). — *A. alpestre* Pntek.

10. *A. pallidum* Lk. (1841). — Exs. Heldr. hb. norm. 360. 556. Raul. cret. 31. Huet sic. a. 1855.

Hisp. (Willk. ex Milde). Gall. mer. (dep. Var). Modena (alp. Apuan.). Sard. Sicil. Calabr. Creta. Græc. (mont.). Ins. Jonicæ. Dalm. Herceg. (A. Braunii Pntek). *Nephrodium pallidum* Bory. *Polystich. pallidum* Tod. — *A. affine* Kze 1848. non F. M. (Dalm.). — *A. viscosum* FrMüll. exs. (Sard.). — *A. distans* Viv.? *Nephrod. distans* Ces. (Cors.).

c. *Hemestheum* Newm. *Polystichum* Rth. p. p.

11. *A. Oreopteris* Sw. (1800). — Exs. Fr. XVI. 82. Rehb. 98. Bill. 895. Rab. 39. Rel. Maill. 282 (Belg.). Dur. astur. 148. Bourg. hisp. 2724.

Hisp. bor. Brit. Norv. occ., mer. Dan. Scan. Halland. (r.). Smoland. (Visingsö). Germ. Batav. Belg. Gall. occ. Pyren. Arvern. Voges. Jurass. Helv. Ital. bor., centr. Cors. (Ital. omn. ex comp. fl. ital.). Austr. Hung. Slavon. Croat. Transs. Ross. med. *Polypod. fragrans* L. mant. II. 307 (1771). *P. montanum* Vogl. (1781). *P. Oreopteris* Ehrh. (1789). *Polystichum montanum* Rth. *Lastrea Oreopteris* Bory. *Hemestheum montanum* Newm.

12. *A. Thelypteris* Sw. (1800). — Exs. Bill. 696. Rab. 16. Rel. Maill. 283 (Belg.). Dur. astur. 149. Welw. lusit. cont. 476.

Lusit. bor. Galoec. Catal. Cors. (r.). Gall. Belg. Batav. Brit. Dan. Norv. mer. Suec. mer., med. Fenn. mer. Germ. Helv. Ital. (præs. bor. et centr.). Austr. Hung. Slavon. Transs. Croat. Dalm. Ross. med. Hab. etiam in ins. Cephalonia Græc. sec. Heldr. (fl. cephal. 1883). *Polystichum Thelypteris* Rth. *Lastrea Thelypteris* Bory. *Hemestheum Thelypteris* Newm.

13. **Cystopteris** Brnh. in Schrad. n. journ. I. 2. 26. (1806).

1. *C. montana* Brnh. l. c. *Aspidium montanum* Sw. *Syll.* 431. — Exs. Fr. III. 96. Rab. 62. Bourg. sab. 321. Michal. jur. 148. Pyren. Scot. Norv. Lapp. Suec. bor. Dan. (loco unico Sjælland.). Delph. Jurass. Helv. Pedem. Tyrol. Salisb. Carinth. Styr. Austr. Hung. (r.). Galic. Transs. Croat. Istr. Dalm. (m. Prologh). alp. subalp. *Polypodium montanum* Lam. fl. fr. I. 23. (1778). *Cyathea montana* Sm.

2. *C. sudetica* ABr. Milde in jahresb. schles. ges. 1855. 92. *Aspidium sudeticum* Nym. suppl. syll. 75. — Exs. Rab. 13. Sudet. Galic. Hung. Transs. *C. alpina* et *montana* Wimm. *C. leucospora* et *leucosoria* Schur (1858). *C. Braunii* Milde in litt. *C. silesiaca* ABr. in litt.

3. *C. regia* Pr. pterid. 93. *Aspidium regium* Sw. *Syll.* 432. — Exs. Welw. lusit. 301. Dur. astur. 164. Sieb. austr. 562. Rchb. 99. Rab. 32. Lusit. Hisp. Gall. Angl. (Teesdale). Suec. bor. (Herjed.). Helv. Ital. bor., centr. Sicil. (Nebr.). Tyrol. Carinth. Styr. Dalm. Croat. Maced. Græc. (mont.). *Cyathea regia* Sm. — *C. Dickieana* Sim. 1848. (Aberdeen Scot.) — *C. alpina* Lk. *Aspid. alpinum* Schk. *Polypodium alpinum* Wulf. — *C. taygetensis* Heldr. hb. norm. 35. *Aspid. taygetense* Bory. *Syll.* 432. Orph. fl. gr. exs. 499. (m. *Taygetus*, Parnass., Olympus etc.; Creta).

4. *C. fragilis* Brnh. l. c. *Aspidium fragile* Sw. (1800). *Syll.* 432. — Exs. Welw. lusit. 302. lusit. cont. 465. Bourg. hisp. 511. 1545 f. pyr. hisp. 457. Bill. 697. Rab. 14.

Lusit. Hisp. Gall. Belg. Brit. Færöa. Island. Scand. (s. l.). Batav. Germ. Helv. Ital. Austr. Hung. Slavon. Transs. Croat. Dalm. Alban. Maced. Græc. Creta. Ross. mer., med. *Cyathea fragilis* Sm. *C. anthriscifolia* Rth. — *C. cynapifolia* Rth. — *C. regia* Rth (non Sm.). — *C. dentata* Sm. *C. fragilis* Rth. *Aspid. dentatum* Sw. A. Pontederæ W. *Syll.* 432.

14. **Davallia** Sm.

1. *D. canariensis* Sm. — Exs. Welw. lusit. 308. cont. 467. Bourg. hisp. 510.

Lusit. Galoec. (Lge exs. eur. mer. 6). Bætica.

III. POLYPODIACEÆ. NUDÆ.

15. **Polypodium** (L.).

1. *P. vulgare* L. — Exs. Bill. 98. Rab. 55. Bourg. pyr. hisp. 391. Welw. lusit. 310. 311 (var. serrata). cont. 463.

In toto territorio. — *P. cambricum* L. *P. australe* Fée. (Cambr. Hibern. Lusit. Cors. Sard. etc.). — *P. auriculatum* Schur.

16. **Phegopteris** Fée gen. fil. 242.

1. *Ph. polypodioides* Fée l. c. 243. *Polypodium Phegopteris* L. *Syll.* 431. — Exs. Rchb. 97. Bill. 693. Rab. 56. Rel. Maill. 287 (Belg.). 1916 (Helv.).

Brit. Scand. (s. l.). Germ. Batav. Belg. Gall. (Vosges, Alpes, Ceven.). Cors. Ital. bor. Helv. Austr. Hung. Croat. Transs. Ross. med. *Ph. vulgaris* Mett.

2. *Ph. Dryopteris* Fée l. c. *Polypodium Dryopteris* L. *Syll.* 430. — Exs. Bill. 495. Rab. 57.

Hisp. bor., or. Gall. Belg. Batav. Brit. Scand. (s. l.). Germ. Helv. Ital. Cors. Austr. Hung. Croat. Dalm. Transs. Ross. med. — *Ph. disjuncta* (Schur).

3. *Ph. calcarea* Fée l. c. *Polypod. calcareum* Sm. (1804). *P. Robertianum* Hfm. (1795). *Syll.* 430. — Exs. Fr. XIV. 96. Bill. 192. Rehb. 96. Sieb. bohem. 560. Rab. 58. Sz hb. norm. 989. Rel. Maill. 281, 285 (utr. e Belg.).

Angl. Norv. Dalec. (m. Osmundsberget). Ostrog. Gotland. Öland. Germ. Belg. Gall. mult. Helv. Ital. cont. Austr. Hung. Croat. Slavon. Transs. Maced. Thessal. (Olymp.). Ross. med. *Ph. Robertiana* ABr. — *Ph. conjuncta* (Schur).

17. *Ceterach* W.

1. *C. officinarum* W. — Exs. Welw. lusit. 299. cont. 474. Blanco hisp. 225. Bourg. pyr. hisp. 395. telon. 445. Bill. 97. Rab. 12. Sieb. carn. 564. Orph. 139. Raul. cret. 30.

Lusit. Hisp. Gall. Belg. Brit. Batav. Saxon. (Halle, Jena). Hercyn. Germ. occ. Helv. Ital. Tyrol. Carn. Hung. Banat. Transs. Croat. Dalm. Monten. Alban. Serb. Græc. Creta. Taur. *Grammitis Ceterach* Sw.

2. *C. hispanicum* Mett. fil. h. lips. 80. (1856). *Gymnogramme Pozoi* Desv. *Syll.* 433. — Exs. Bourg. hisp. 513.

Cantabr. (Del Pozo). Gran. (S. Nevada, S. de Ronda). *C. Pozoi* ABr. ap. Milde in bot. zeit. 1866. *Grammitis hispanica* Coss.

18. *Gymnogramme* Desv.

1. *G. leptophylla* Desv. — Exs. Bill. 894. Rab. 81. Sz hb. norm. 397 (Pisa). Welw. lusit. 309. cont. 471. Bourg. algarv. 2048. Dur. astur. 163. Ces. ital. bor. 189. Rost. 2. Huet sic. 244.

Lusit. Hisp. Pyren. Gall. (Brest, Jersey; Vigan, Lozère, Var, l'Herault). Helv. mer.-occ. (Salève). Ligur. Tyrol. mer. Ital. med., mer., ins. Dalm. Ins. Jonic. Creta. Cyclad. Græc. *Grammitis leptophylla* Sw.

19. *Woodsia* Br.

1. *W. ilvensis* Br. — Exs. Fr. XI. 95. Rab. 15.

Scot. Angl. bor. (r.). Cambr. (r.). Norv. Suec. Fenn. Ross. Siles. Bohem. Morav. Lusat. Hassia. Hercyn. (etc.). Styr. Salisb. Tyrol. Hung. Slavon. Transs. Croat.

2. *W. hyperborea* Br. — Exs. Fr. XII. 97. Rab. 82. Bourg. pyr. 514. Laponn. Suec. bor. Norv. Scot. (Pertsh.). Cambr. (Snowd.). Pyren. Delph. Sabaud. Pedem. (m. Cenis, valle d'Aosta). Helv. mer. (m. Simplon, valle d'Ossola, M. Rosa). Tyrol. Salisb. Carinth. Sudeti; etiam Cors. et Sard. ex Milde. *Polypodium arvenicum* With. — *W. pilosella* Rupr. (Norv. r.).

3. *W. glabella* Br. in Richards. bot. app. Frankl. journ. (1823). *W. pulchella* Bert. *Suppl.* 75. — Exs. Rab. 83.

Tyrol. Carinth. (r.). Norv. arct. Laponn. (torn.). *W. Hausmanniana* Milde in litt. *Polypod. hyperboreum* a Whlbn. lapp.

CXLII. HYMENOPHYLLÆ Bory.

1. *Trichomanes* (L.).

1. *T. radicans* Sw. (1806). *T. speciosum* W. (1810).

Hibern. mer., mer.-occ. Scot. occ. (r.). Angl. (r.). Gall. r. (la Rhune). *T. europæum* Sm. *T. hibernicum* Spr. — *T. brevisetum* Br. — *T. Andrewsii* Newm.

2. *Hymenophyllum* Sm.

1. *H. tunbridgense* Sm. — Exs. Rab. 80. Rel. Maill. 16 (Gall. bor.-occ.). 2029 (Hetr.).

Brit. Gall. bor.-occ. Belg. (Ardenn. Hainaut). Luxemb. (detect. a. Dunnortier, relect. 1875). Saxon. (Uttewalde-Grund). Friul. bor. (pr. Artegna). Croat. (Fiumare). Hetr. (valle di Montignoso, pr. Forno alp. apuan., Mte Pisano). Cors. Pyren. occ.

2. *H. unilaterale* Bory in W. sp. V. 521. (1810). *H. Wilsoni* Hook. (1830). *Syll.* 434. — Exs. Fr. XI. 94. Rel. Maill. 209 (Hib.).

Norv. occ. Ins. Færøer. Brit. Gall. occ. (r.).

CXLIII. OSMUNDACEÆ Br.

1. *Osmunda* L.

1. *O. regalis* L. — Exs. Fr. XII. 98. Bill. 191. Rab. 10. Dur. astur. 147. Willk. hisp. II. 583. Bourg. hisp. a. 1863.

Lusit. Hisp. Gall. Belg. Batav. Brit. Dan. Suec. mer. (et med. r.). Germ. Helv. Ital. Austr. Hung. Transs. Croat. Maced. (Sibth.) Cephal. (ex Heufl.) Creta (Heldr.). Thrac. (Byz.). Ross. med. Polon.

CXLIV. OPHIOGLOSSEÆ Br.

1. *Botrychium* Sw. (1800).

a. Osmundopteris Milde.

1. *B. virginianum* Sw. in Schrad. journ. (1800) II. 111. — Exs. Fr. X. 100.

Suec. bor., med. Fenn. bor. Ingria. Lithuan. Ucran. Galic. (pr. Lemberg). Helv. mer. (cant. Graub., r.). *B. charcoviense* Pr. — *B. anthemoides* Pr. *Syll.* 434. Austr. sup. pr. Spital (a solo Preslio lectum nec recenter repertum).

b. Eubotrychium Milde. — *

2. *B. ternatum* Thb. fl. jap. 329. (1784); Sw. *B. rutaceum* Sw. *Syll.* 434. — Exs. Fr. III. 99. Rab. 30. Sieb. bohem. 298.

Dan. (Falstria). Scand. Fenn. Siles. Lusat. Boruss. Megalop. (Mecklenb.). Thuring. Alsat. (Voges). Würtemb. (r.). Sabaud. (Chamoun. ex Milde). Tyrol. mer. Carinth. (r.). Salisb. Styr. Austr. inf. (r.). Bohem. Galic. Hung. Transs. Ross. *B. matricarioides* W. (1810). *B. Matricariæ* Spr. (1825). *B. rutæfolium* ABr. (1843). *B. Breynii* Fr. (1846). *B. silesiacum* Kirschl. (1855).

3. *B. simplex* Hitchc. (1823). *B. Kannenbergii* Klinism. (1852). — Exs. Rab. 8.

Norv. (Dovre). Medelp. (r.). Vermel. Scan. Megapol. (Mecklenb.). March. Siles. (pr. Gräfenberg in montib. morav.). Boruss. (pr. Tilsit: cl. Kannenberg). *B. Lunaria* v. *cordatum* Fr. (1846).

4. *B. lanceolatum* Ångstr. in diar. bot. not. 1854. 68. (non Rupr.). — Exs. Fr. XVI. 86.

Norv. (Dovre etc.). Suec. bor. (et med. rr.). Lapp. Ostrob. Ingr. Curon. *B. palmatum* Pr. (p. p.). *B. matricariæfolium* Fr. sum. (1846).

5. *B. matricariæfolium* ABr. — Exs. Sz hb. norm. 985. Rab. 29. Norv. (pr. Modum). Suec. (exc. Lappon. p. d.). Fenn. Germ. Helv. Valtellina (pr. Bormio). Valdobbiadene. Tyrol. Austr. Hung. Galic. Transs. Ross. med. *B. Luna-*

ria v. rutaceum Fr. nov. B. rutaceum W. (p. p.). B. lanceolatum Rupr. B. ambiguum Reut. B. Reuteri Payot (1860). B. ramosum Aschn. B. tenellum Ångstr. (1854).

6. **B. boreale** Milde in bot. z. 1857. — Exs. Fr. XVI. 85. Norv. (Dovre, Gudbrandsd. etc., Finnm.). Suec. bor. Lapp. Fenn. bor. — B. brevifolium Ångstr. (1866).

7? **B. crassinervium** Rupr. ap. Milde in nov. act. XXVI. 763. (1858). Vestrobothnia Suec. bor. pr. Koddis (Dr. Håkanson 1861).

8. **B. Lunaria** Sw. — Exs. Rehb. 92. Rab. 9. Sieb. austr. 558. Bill. 1989. Sz hb. norm. 984. Bourg. sab. 324. pyr. hisp. 394. Dur. astur. 146. Hisp. bor., centr., or. (mont., alp.). Gall. Belg. Batav. Brit. Scand. Germ. Helv. Ital. (Alpi, Appen.). Sicil. (Etna, Nebr.). Austr. Hung. Transs. Croat. Dalm. Herceg. Bosn. Serb. Maced. (ex Milde). Ross.

2. **Ophioglossum** L.

1. **O. vulgatum** L. — Exs. Bill. 299. Rab. 7. Sz hb. norm. 986. Hisp. bor., centr., or. Gall. Belg. Batav. Brit. Norv. mer. Suec. mer., med. (et bor. rr.). Aland. Fenn. mer.-occ. Germ. Helv. Ital. Sicil. Istr. Austr. Hung. Transs. Croat. Dalm. Bosn. Ross. mer., med. O. ovatum Op. — O. intermedium Vigin. (Gall. bor. Angl.).

2. **O. lusitanicum** L. — Exs. Welw. lusit. 316. cont. 472. Bill. 1990. Mab. cors. 1. Rab. 28. Sz hb. norm. 987. Hibern. (Horn Head). Lusit. Hisp. mer. Gall. mer., occ., bor.-occ. Ital. med., mer., ins. Istr. Dalm. Græc.

CXLV. MARSILIACEÆ (Br.) Bartl.

1. **Marsilia** L. (err. Marsilea).

1. **M. quadrifolia** L. sp. ed. I (quadrifoliata ed. II.). — Exs. Bill. 1991. Sz gall. germ. 575. Rab. 2. Michal. jur. 143. Lusit. Hisp. centr., or. Gall. (occ., centr. etc.). Alsat. Badia. Bavar. Helv. (Villeneuve: Milde). Ital. bor. Hetr. (palud. di Fucechio). Carinth. Styr. Austr. Hung. Slavon. Croat. Transs. (Bmg.). Galic. (Zaw.); indicatur etiam Siles. pr. Rybnik (introd.?).

2. **M. pubescens** Ten. — Exs. Sz gall. germ. 996. Rab. 3. Ital. mer. (Neapol. Terra d'Otranto). Sard. mer. Gall. mer. (dep. Herault, commune de Portiragnes, mares de Roquehaute; detex. cl. Fabre). M. Fabri Dun. (1836). *Syll.* 435. — **M. strigosa** W. *Syll.* 435. Beck. exs. volg. 158. (Ross. mer.-or.).

2. **Pilularia** L.

1. **P. globulifera** L. — Exs. Fr. XV. 98. Rehb. 91. Rel. Maill. 449 (Belg.). Bill. 1992. Rab. 27. Welw. lusit. cont. 459. Lusit. Brit. Norv. occ. (r.). Dan. Suec. mer., med. Germ. mult. Batav. Belg. Gall. bor., occ., centr. Helv. (Pruntrut: Milde). Ital. bor. (Milan., Vercelli). Apulia (l. di Salpi: Rabenh.). Hung. bor. (Hazsl.). Bohem. (rr.). Morav. Transs. (Bmg.). Ross. mer., med.

2. **P. minuta** Dur. ap. ABr. in diar. mens. (monatsbericht) ac. sc. berol. 1863. 435. Sardinia: Pula (de Notaris 1835), Decimo Mannu (Gennari), Cala d'Ostia inter et Domus de Maria (cl. Ascherson 1863). Gall. mer. (dep. Herault, ubi habitat cum *Marsilia pubesc.*: Balansa, Duval-Jouve).

CXLVI. SALVINIACEÆ Bartl.

1. **Salvinia** Mich.

1. **S. natans** All. fl. ped. n. 2419. (1785); Hoffm. (1804). — Exs. Sz hb. norm. 595. Bill. 1793 (Berol.). Rel. Maill. 26 (Burdig.). 2031 (Pisa). Rab. 1. Germ. bor., occ. Gall. (r.). Ital. bor., med. Istr. Croat. Slavon. Transs. (Bmg.). Hung. Morav. Galic. Ross. med., mer. (etiam Maced. ex hb. Kze). **S. vulgaris** Rupr. (1845).

CXLVII. ISOËTEÆ Bartl.

1. **Isoëtes** L.a. *Isoëtes aquaticæ* ABr.

1. **I. lacustris** L. (p. p.); Dur. in bull. soc. bot. 1861, 164. — Exs. Fr. XI. 99. Rehb. 1601. Rab. 5. 77. Sz hb. norm. 394. Bill. 891.

Voges. Mts. Dore. Arvern. (P. de Dôme). Lozère. Pyren. Hibern. Angl. bor. Cambr. Scot. Norv. Dan. (exc. ins.). Suec. mer., med. (et bor. r.). Fenn. Ingria. Germ. bor. Bohem. (r.). Galic. (Cracov.). Sudeti (gr. Teich d. Riesengeb.). Silva nigra (lac. Feldsee, Titi-See etc.). Salisb. **I. atrovirens** Th Fr. (1865). — **J. Morei** DMoor. (Wicklow Hibern.).

2. **I. echinospora** Dur. l. c. — Exs. Rab. 76. Sz hb. norm. 777 (P. de Dôme: Durieu!).

Gall. mult. Belg. (pr. Genck prov. Limburg.). Hibern. (Killarney). Cambr. Scot. Island. Scand. (s. l.). Ingria. Silva nigra (lac. Feldsee etc.) Ital. bor. (l. Maggiore, l. d'Orta). Transs. — ? **I. Braunii** Dur. **I. ambigua** ABr. (Island.).

b. *Isoëtes amphibie* ABr.

3. **I. velata** ABr. (1848). *Suppl.* 76. — Exs. Rab. 78. Sicil. Sard. mer. (pr. Pula). Cors. (Porto Vecchio). Hisp. bor. (pr. Lugo *Galoecia*: Lge exs. eur. mer. 2). **I. setacea** Bert. — **I. longissima** Bory. Dur.

4. **I. dubia** Genn. in comment. critt. ital. no. II. 104 (1861). Ins. della Maddalena (cl. Gennari). — Hæc et sequens **I. velatæ** valde proximæ sunt obs. cl. Baker.

5. **I. tegulensis** Genn. l. c. 106. **I. tiguliana** id. l. c. I. 42. Sard. mer. (Teulada, in aquæductibus; Pula, loco humido). — ? **I. bætica** Willk. *Suppl.* 76. (Hisp. mer.).

6. **I. Boryana** Dur. in bull. soc. bot. VIII. 164. (1861). — Exs. Sz hb. norm. 778 (Landes: Durieu!). Rel. Maill. 1903 (id. loc.).

Gall. mer.-occ. (Landes, bords de l'étang de Cazau: Durieu).

* **I. Chaboissæi** nob. — Gall. occ. (depart. de l'Indre, ejus **I. tenuissima** hoc nomen non meritat et **I. Boryanæ** proxima est observ. cl. Chaboisseau in litt. 1880).

7. **I. tenuissima** Bor. in bull. industr. d'Angers 1850. 259. — Exs. Sz hb. norm. 395 (H. Vienne: Chaboiss.). Rab. 51.

Gall. dep. Haute-Vienne (pr. Montmorillon; cl. Chaboisseau detexit 1847).

8. **I. capillacea** Bory in actis acad. scient. paris. 1846.

Gallopr. pr. Frejus (nec in Corsica). **I. adpersa** ABr. (1852).

9. **I. setacea** Del. in actis mus. hist. nat. XIV. 100. — Exs. Bill. 1600 (Roquehaute). Sz hb. norm. 779 (Agde). Rab. 4.

Gall. mer. (mare de Grammont etc. pr. Mospel.; Agde). Ins. Capraria (Capraja). Cors. (?)

10. **I. Malinverniana** Ces. Dnt. in ind. sem. hort. genuen. 1858. 3. — Exs. Ces. ital. bor. 123. Rab. 26.

Pedem. Vercell. in aquæductibus circa pagos Greggio et Oldenico, sed verosimiliter ex Aegypto vel India advecta cum *Oryza* (cl. Malinverni detex. 1858).

c. *Isoëtes terrestres* ABr.

11. *I. Duriaei* Bory in compt. rend. ac. sc. I. tridentata Dur. in litt. eod. anno (1844). — Exs. Mab. cors. 200. Sz hb. norm. 780 (Agde). Rel. Maill. 30 (Antibes). Rab. 6. 79.

Gall. mer. (Cannes, Antibes, Montpell. etc.). Ligur. (Genova). Hetr. (Pisa). Caprera. Cors. Maddalena. Sard. *Isoëtella Duriaei* Genn. (1862).

12. *I. hystrix* Dur. in litt. 1842 et ap. Bory in compt. rend. ac. sc. (1844). — Exs. Bill. 892. Sz hb. norm. 781 (Landes: Durieu!). 781 b (dep. Vienne). Kral. cors. 861. Mab. cors. 199. Bourg. algarv. 2049.

Lusit. Hisp. Gall. mer.-occ.; occ. (île d'Houat, Belle-Isle); bor.-occ. (Guernsey: G. Wolsey 1860); centr. (dep. Vienne: Deloynes 1865); mer. (Cannes). Ligur. (Nizza). Hetr. (Pisa). Caprera. Cors. Maddalena. Sard. Sicil. Pelop. et Zacynth. (Letourneux ex Boiss.). I setacea Mor. Dnt. fl. caprar. (1839). I. *Delalandei* Lloyd. I. *Duriaei* Hook. (non Bory). *Cephaloceraton hystrix* Genn. (1862). — I. *sicula* Tod. *Cephaloceraton gymnocarpon* Genn.

CXLVIII. LYCOPODIACEÆ DC.

1. *Lycopodium* (L).

a. *Lycopodia heterophylla* Spring.

1. *L. complanatum* L. — Exs. Rchb. 2415.

Scand. (s. l.). Angl. (?). Belg. (r.). Germ. Gall. (?). Helv. Ital. bor., centr. Austr. Hung. Croat. Transs. Ross.

* *L. Chamæcyparissus* ABr. — Exs. Rchb. 2322. Fr. XIII. 100. Bill. 893. Rab. 94. — Dan. Suec. mer., med. occ. Vestrob. (Kengis). Fenn. (?). Ingria. Polon. Germ. bor., occ. Batav. Belg. (r.). Gall. bor., centr. (etc.). Helv. Tyrol. Ital. bor. (Alpi, Appen.). Transs.

2. *L. alpinum* L. — Exs. Rab. 96.

Pyren. Appen. (di Bobbio, di Pistoja e Bologna). Alpes. Voges. Silva nigra (m. Feldberg etc.). Arvern. Hercyn. Guestphal. Belg. (Arden. r.). Brit. Norv. Suec. bor. Lapp. Fenn. bor. Ross. arct. Sudeti. Galic. Hung. Transs. alp. mont. *L. cupressifolium* Op.

b. *Lycopodia homoeophylla* Spring. — *

3. *L. annotinum* L. — Exs. Bill. 1394. Rab. 67.

Scand. (s. l.). Scot. Angl. (N. Wales, Cumberl.). Belg. Gall. (Vosges, Jura, Alpes). Helv. Ital. bor. (m. Baldo, mts Tyrol., Appen. pistoj.). Austr. Hung. Croat. Transs. Ross. *L. juniperifolium* Lam.

4. *L. clavatum* L. — Exs. Bill. 190. Rab. 66. Rel. Maill. 203 (Belg.).

Hisp. centr., or. (mont.). Gall. plur. Belg. Batav. Brit. Scand. (s. l.). Germ. Helv. Ital. bor., centr. Austr. Hung. Croat. Transs. Ross. *L. microstachyum* Op. *L. pseudo-annotinum* Schur.

5. *L. inundatum* L. — Exs. Fr. XV. 97. Rchb. 1513. Bill. 692. R. Maill. 174 (Manche). 174. a (Jura). 202 (Belg.).

Galoec. Hibern. occ. (Connemara). Scot. Angl. Dan. Norv. mer. Suec. (exc. Lapp.). Fenn. mer.-occ. Germ. Batav. Belg. Gall. (bor., centr., occ.; Pyren., Alpes, Jura). Helv. Ital. bor. (Nizza, l. Maggiore, Tyrol.). Austr. Hung. Croat. Transs. Ross. med. *Lepidotis incurva* Op.

6. *L. Selago* L. — Exs. Bill. 691. Rehb. 2145. Rab. 95. Bourg. sab. 353. pyr. hisp. 725. Rel. Maill. 288 (Belg.). Astur. Pyren. Alpes. Jurass. Vogesi. Arvern. Belg. (r). Batav. Brit. Scand. (s. l.). Germ. Helv. Ital. bor., centr. Austr. Hung. Croat. Transs. Ross. med., bor. *Selago vulgaris* Schur. — *L. recurvum* Kit. ap. W.

2. *Selaginella* Spring in Flora 1838. 148.

a. Selaginellæ tetrastichæ ABr.

1. *S. helvetica* Lk fil. h. berol. 159 (1841); Spring ap. Doell (1843). Lycopod. helveticum L. *Syll.* 436. — Exs. Rehb. 561. Rab. 64. Rost. 1. Sieb. austr. 297. Sz hb. norm. 183.

Ital. bor. Helv. Voges. Alpes. Austr. (s. l.). Siles. Hung. Croat. Transs.

2. *S. denticulata* Lk. l. c. Lycopod. denticulatum L. *Syll.* 436. — Exs. Welw. lusit. 314. cont. 458. Bourg. pyr. hisp. 485. telon. 447. Mab. cors. 5. Ces. ital. 696. Sz hb. norm. 396 (Hetr.). Bill. 2394 (item). Orph. 277.

Lusit. Hisp. mer. Gall. mer. Ligur. Ital. med., mer., ins. Creta. Græc. Maced. Dalm. Monten. (*S. helvetica* Pntck).

b. Selaginellæ polystichæ ABr.

3. *S. spinulosa* ABr. in Doell rhein. fl. 38. (1843). *S. spinosa* PB. æthog. 112 (nom. antierius sed vix aptum). Lycopod. selaginoides L. *Syll.* 436. — Exs. Fr. XI. 100. Rehb. 1136. Bill. 298. Rab. 63. Bourg. sab. 354. pyr. hisp. 480.

Arvern. Pyren. Hibern. Angl. bor. Scot. Norv. Jutland. bor.-occ. Bahus. Ostrog. Suec. med., bor. Fenn. bor., or. Germ. bor. (Hamburg, Jena, Harz, Sudet.). Badia (m. Feldberg). Vogesi. Jurass. Alpes. Ital. bor. Helv. Austr. Hung. Croat. (?). Transs. Ross. or. *S. ciliata* Op. (1823).

APPENDIX.

CXLIX. CHARACEÆ Rich.

In elaboranda synopsi, quæ sequitur, Characearum europæarum, maxime usus sum tractatu, quem sub titulo *Fragmente einer Monographie der Characeen* von A. Braun, e manuscriptis divi auctoris edidit cl. O. Nordstedt (in actis ac. sc. berol. 1882). Comparavi etiam libellum cl. Sydow: *Die bisher bekannten europäischen Characeen*, (Berlin 1882), nec non ea quæ de Characeis brittannicis egregie scripsere cl. Groves (in *diar. journal of botany* 1880 et seq.).

1. **Chara** (L.).

a. *Diplostephanæ* ABr. * *Triplostichæ* ABr.

1. **Ch. aspera** (Deth.) W. — Exs. Fr. III. 100. Nordst. Wahlst. 106—114. ABr. char. eur. 11. 12. 50. 98.

Brit. Scand. (s. l.). Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Austr. Ital. (r.). Cors. Gran. (pr. Almeria). Ch. hispida L. suec. (excl. syn.).

* Ch. curta Nlt. - ABr. char. eur. exs. 166. - Holsat. (lac. Ratzeburg.). Bavar. Helv. (præs. lac. Neocom.). Austr. p. d.

2. **Ch. galioides** DC. cat. h. monsp. 93. (1813). Ch. macrosphæra Wallm. *Syll.* 352.

Castil. Balar. Gall. mer. Cors. Sard. Sicil. (ins. Favignana). Ital. mer.

3. **Ch. connivens** (Salzm.) ABr. in Flora 1835. 73. — Exs. ABr. char. eur. 112.

Sard. Gall. occ. (cf. Chaboisseau in bull. soc. bot. 1871). Angl. mer. Boruss. or. (Danzig, Koenigsberg: cl. Bænitz; cum saburra navali advecta dicitur).

4. **Ch. fragifera** Dur. (1859). *Suppl.* 61. — Exs. Bill. 3273. ABr. char. eur. 73.

Gall. mer.-occ., bor.-occ. Angl. mer.-occ. Lusit. (Coimbra: Ch. trichophylla Kütz. 1881).

5. **Ch. tenuispina** ABr. — Exs. ABr. char. eur. 74.

Badil. Helv. Germ. bor. (Mecklenb., Pomeran., Marchia). Hung. (sec. Sydow). Ch. belemnophora CSchimp. in litt. 1857. — ? Ch. Kokeilli ABr. (Carinth. r.).

6. **Ch. fragilis** Desv. in Lois. not. 137 (1810). — Exs. Fr. VI. 100. XII. 99. Nordst. Wahlst. 115—120. ABr. char. eur. 13—15.

Eur. tota exc. (?) Ital. mer., Cyclad. Ch. vulgaris L. (p. p.). — Ch. Hedwigii (Bruz.) Ag. — Ch. globularis Th. — Ch. capillacea Th. — Ch. fulcrata Ganter. (Vindob. etc.). — Ch. pilifera Ag.

* Ch. delicatula Ag. — ABr. char. eur. exs. 75. 100. — Brit. Scand. (s. l.). Germ. bor. Batav. Gall. occ. Helv. Hetr. Styr. — Ch. verrucosa Itz. — Ch. annulata Wallm. *Syll.* 352. (Dan., Suec. mer. Ross. med. etc.).

** *Diplostichæ* ABr. + *Aulacanthæ* ABr.

7. **Ch. hispida** L. (p. p.); Sm. — Exs. Fr. XIV. 100. Nordst. Wahlst. 55—61. ABr. char. eur. 2. 3.

Brit. Dan. Norv. Suec. mer. Ross. med. Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Ital. bor., centr. Austr. Hung. Transs. Croat. Thrac. Ch. spinosa Rupr. — Ch. equisetina Kütz.

* *Ch. rudis* ABr. ap. Leonh.; char. eur. exs. 4. 35. *Ch. subspinosus* Rupr. — Exs. Fr. XVI. 92. Nordst. Wahlst. 62—66. — Angl. Batav. Dan. Suec. mer. Ingria. Germ. Helv. Austr.

8. *Ch. horrida* Wallm. in Wahlst. bidr. 24. (1862). — Exs. Fr. XVI. 93. Nordst. Wahlst. 98—101. ABr. char. eur. 71. 87.

Suec. mer.-or. Pomeran. Fionia. Seeland. (etiam Batav. et Belg. sec. Sydow; Wight Angl. mer. sec. Groves). *Ch. baltica fastigiata* Wallm. monogr.; Fr. hb. norm. XIV. 99.

9. *Ch. vulgaris* L. sp. (p. p.). *Ch. foetida* ABr. in ann. sc. nat. 1834. 354. — Exs. Fr. VI. 100. Nordst. Wahlst. 90—96. ABr. char. eur. 7. 39. 40. 82 etc. FSz fl. gall. germ. 593. Bourg. hisp. a. 1850. cors. 448. Raul. cret. 40.

Lusit. Hisp. Brit. Dan. Norv. mer. Suec. mer., med. Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Austr. Ital. Græc. Creta. Thrac. Ross. mer., med. — *Ch. decipiens* Desv. - *Ch. collabens* Ag. - *Ch. stricta* Kütz. *Syll.* 352. - *Ch. refracta* Kütz. *Syll.* 352. — *Ch. longibracteata* Kütz. *Syll.* 352. - *Ch. batrachosperma* Th. - *Ch. polysperma* Kütz. *Syll.* 352. *Ch. pleiospora* Ganter. — *Ch. atrovirens* Lowe (1838). *Ch. punctata* Lebel. - *Ch. coarctata* Wallm. *Syll.* 351. (Suec., Germ. etc.). — *Ch. crispa* Wallm. *Syll.* 352. (Norv. etc.). — *Ch. sphagnoides* Wallm. *Syll.* 352. (Messina). — ? *Ch. Rabenhorstii* ABr. ap. Rabenh. in Flora 1850. (Lago di S. Egidio prom. Gargani Apulia).

* *Ch. gymnophylla* ABr. in Flora 1835. — Hisp. (Bourg. exs. a. 1850). Gall. mer. Helv. Austr. (r.). Ital. Sard. Sicil. Græc.

* *Ch. Boveana* ABr. char. afr. (1867). Estremadura Lusitaniae pr. Oeiras (Welw. lusit. exs. 94 sec. ABr.).

10. *Ch. crassicaulis* Schleich. cat. helv. (1821). — Exs. ABr. char. 69. Nordst. Wahlst. 97.

Dan. Angl. (r.). Hisp. (mer. etc.?). Gall. Sard. Ital. (r.). Helv. Austr. (Vindob.). Salisb. Badia. Wimar. (etiam Ross. sec. Sydow).

++ *Tylacanthæ* ABr.

11. *Ch. ceratophylla* Wallr. ann. bot. 192. (1815). — Exs. Fr. V. 100. Rebh. 92. ABr. char. eur. 8. 9. 35. 36. Nordst. Wahlst. 30. 31. 50—54. 88. 89.

Hibern. (r.). Angl. (E. Norfolk: Arth. Bennett). Normand. (sec. Breb.). Dan. Suec. mer., med. Fenn. mer.-occ. Germ. Helv. Austr. Hung. (r.). Transs. Ross. mer., med. Thrac. (Byz.: Noë); indicatur etiam Dalm. (ins. Cherso). — *Ch. latifolia* W. (1809). — *Ch. tomentosa* L. 1753. (Mare baltic.). — *Ch. laxa* Rostk. (Mare baltic.).

12. *Ch. contraria* ABr. schweiz. char. 15. — Exs. Fr. XVI. 94. ABr. char. eur. 84. 88. 90. 98. Nordst. Wahlst. 67—77.

Scand. (exc. Lapp.). Dan. Angl. (Surrey). Batav. Belg. Gall. Germ. Helv. Austr. Hung. Ross. med.

* *Ch. dissoluta* ABr. consp. syst. char. eur. (1867). — Helv. (lac. Neocom. r., a cl. Bulnheim detecta). Lomb. (Mantua).

13. *Ch. jubata* ABr. (in litt. 1855) consp. syst. char. eur. 6. (1867). — Exs. ABr. char. eur. 5. Nordst. Wahlst. 102.

Scan. (r.). Pomeran. March. Boruss. Lithuan. (*Ch. Tyzenhausi* Gorski ined.). *Ch. filiformis* Hertsch (1855).

14. *Ch. strigosa* ABr. schweiz. char. 16.; char. eur. exs. 42. 43. 92. Helv. Bayar. Tyrol. Austr. sup. Styr. Scan. (rr.).

15. *Ch. polyacantha* ABr. (char. eur. exs. 48. 1859) in Lge dansk fl. ed. 3. (1864). — Exs. Fr. XIV. 100. ABr. char. eur. 48. 72. 97. Nordst. Wahlst. 78—80.

Brit. (rarius). Gall. bor. Dan. Suec. mer. March. Saxon. Helv. Ital. bor. Hung. Ch. pedunculata Kütz. Ch. hispida pseudoeurinita Coss. Germ. — Ch. spondylophylla Kütz. *Suppl.* 352. (Saxon. etc.).

16. **Ch. intermedia** ABr. (hb. 1836) in Leonh. oester. arml. gew. 80 (1864); consp. char. eur. 6. (1876). — Exs. Fr. XVI. 90. Nordst. Wahlst. 32—34. ABr. char. eur. 45—47. 93—95.

Scand. (exc. Lapp.). Dan. (r.). Germ. Gall. Helv. Austr. Ital. bor. (Mantua). Dalm. (ins. Cherso). Thrac. (Byz.: Noë). Ross. mer.-occ. Ch. papillosa Kütz. *Syll.* 352. Ch. aculeolata Kütz.

* Ch. Agardhiana Wallm. *Syll.* 352. Gall. mer. (Frejus). — Ch. pseudobaltica (ABr.). Hetr. (Lucca). Neap. (lac. Avera). Valenc. (lac. Albufera).

17. **Ch. baltica** Fr. in Bruz. obs. char. 11 et 19. (1824). Ch. hispida var. baltica Htn handb. ed. 1. (1820). — Exs. Fr. IX. 100. Nordst. Wahlst. 35—40. ABr. char. eur. 44.

Dan. Suec. Fenn. Boruss. Pomeran. Mecklenb. Holsat.; indicatur etiam in Angl. mer.-occ. — Ch. Nolteana (ABr.) Kütz. — Ch. firma (Ag.) Kütz.

* Ch. Liljebladii Wallm. Ch. hispida Liljebl. hb. Ch. distans Wallm. ined. — Exs. Nordst. Wahlst. 103—105. ABr. char. eur. 96. — Smoland. Öland. Dan.

*** Haplostichæ ABr.

18. **Ch. crinita** Wallr. ann. bot. 190. (1815). — Exs. Fr. VIII. 100. Nordst. Wahlst. 23—30. ABr. char. eur. 6. 66—68. 80.

Hisp. (r.). Angl. (Falmouth). Norv. mer. Dan. Suec. mer., med. Fenn. mer. Germ. Batav. Belg. (sec. Crep.). Gall. Sard. Apulia. Ital. bor.-or. Austr. Hung. Transs. (sec. Sydow). Ross. (r.). Ch. canescens Lois. (1810), nom. prioritate gaudens sed sæpe incongr. — Ch. condensata Wallm. — Ch. nigricans Nlt. Ch. papulosa Fr. — Ch. pusilla Fl. ap. Kütz. (ABr. char. eur. exs. 65. Nordst. Wahlst. 28).

19. **Ch. imperfecta** ABr. (litt. 1845) in expl. sc. d'Alger. tab. 39; schweiz. char. 19. (1849). Gall. occ. pr. Saint-Jean-d'Angély dep. Charente-Inférieure; detexit cl. De Rochebrune (bull. soc. bot. 1862).

b. Haplostephanæ ABr.

20. **Ch. Braunii** Gm. fl. bad. IV. 646. (1826). Ch. coronata (Ziz. ined.) ABr. in ann. sc. nat. 1834. — Exs. ABr. char. eur. 10. 64. Nordst. Wahlst. 87. Kral. cors. 853.

Hisp. (Madr.). Cors. Ital. bor. Gall. Belg. (Limb.). Germ. occ. Norv. mer. Suec. med. Fenn. mer. Austr. Istr. Hung. Transs. Ch. flexilis Amic. (1827). Ch. Cortiana Bert. ap. Amic. (1827). Ch. eremosperma Rupr. (1846). Charopsis Braunii Kütz. — Ch. Stalii Vis. Charopsis Stalii Menegh. (Dalm.).

21. **Ch. scoparia** Bauer (hb. 1828) in Moessl. handb. (1829?). — Exs. Rchb. 101. ABr. char. eur. 79.

Berol. (Bauer!). Lusat. (Rabenh.). Schwerin (Fiedler). Carinth. (sec. Ganterer); indicatur etiam in Transs. Ch. Baueri ABr. (1849). Ch. Braunii Rchb. ic. Charopsis scoparia Kütz.

2. **Lychnothamnus** (Rupr.) Leonh. (1863).

1. **L. stelliger** (ABr. ms. 1877) Nordst. fragm. 102. Chara stelligera Bauer ap. Moessl. Nitella stelligera Kütz. *Syll.* 351. — Exs. ABr. char. eur. 1. Nordst. Wahlst. 49.

Gall. (præs. occ., bor.). Belg. (r.). Angl. (Norf.). Scan. (r.). Fenn. mer. (r.). Ingr. Lithuan. Boruss. Poson. Pomeran. Mecklenb. March. Siles. Saxon. Bohem. Chara

obtusa Desv. in Lois. not. 36. (1810). Ch. Reichenbachii Gorsk. ined. — L. ulvoides Bert. sub Chara. Nitella Bertolonii Kütz. N. ulvoides Wallm. *Syll.* 351. — ABr. char. eur. exs. 34. — Ital. bor. (Mantua etc.).

2. **L. barbatus** Leonh. in diar. lotos 1863. 57. Chara barbata Meyen. *Syll.* 351. — Exs. Rchb. 97. ABr. char. eur. 16.

Boruss. Pomeran. March. (Berol.: Meyen!); indicatur etiam in Gallia (dep. Isère pr. Charvieux). — L. spinosus nob. Chara spinosa Amici descr. char. 1827. 18. *Syll.* 351. (Mantua; Otranto; Rabenh. 1850).

*

3. **L. alopecuroides** ABr. in monatsb. berl. akad. 1867. 798. Chara alopecuroides (Del. ined.) ABr. schweiz. char. 13 (1847). *Syll.* 351. — Exs. ABr. char. eur. 62.

Cors. (de Pouzols!). Ischia. Monspel. Chara Pouzolsii (Gay ap.) ABr. in Flora 1835. — L. Montagnei nob. Chara Montagnei ABr. in hb. Montagn. 1836. Sz hb. norm. 1200. Huet sic. 475. (Gall. occ., mer. Mallorca Balear. Messina Sicil.).

* L. Wallrothii Wahlst. (1875). Chara papulosa Wallr. (1833). Ch. Wallrothii Rupr. (1845). Ch. barbata Fr. sum. — Exs. Fr. XV. 99. ABr. char. eur. 63. 81. Nordst. Wahlst. 20—22. — Pomeran. Dan. (Fiona, Jutl. bor.). Suec. occ. (r.). Norv. mer.-occ. (r.). Angl. mer. (ins. Wight).

3. **Nitella** Ag.

a. Monarthrodactylæ ABr.

1. **N. syncarpa** Chevall. lutet. fl. gen. II. 125. (1836); Kütz. (p. p.). Chara syncarpa Th. par. ed. 2. 473. (1799). — Exs. Fr. XVI. 99. (1865). Rchb. 95. 96. Nordst. Wahlst. 1. 2. ABr. 76.

Angl. Gall. bor. (et mer. r.). Batav. (Utrecht). Dan. (r.). Norv. mer. (r.). Suec. med. Gotland. (var.). Germ. Bohem. Helv. Ital. centr. (Abruz.). Tyrol. Hung. (sec. Sydow). Ross. (Rupr.).

2. **N. capitata** Ag. syst. alg. 125. — Exs. Bill. 1987. ABr. char. eur. 26—28. Nordst. Wahlst. 3. 4.

Angl. Scand. mer. Dan. Germ. Belg. Gall. Cors. Ital. bor. Helv. Austr. Transs. Rumel. Ross. (Rupr.). Chara capitata Nees (1810). Ch. capillaris Krock. (1809). Ch. elastica Amici (1827). *Suppl.* 61. Ch. gracilis Whlbn. (non Sm.).

3. **N. opaca** Ag. syst. alg. 124. — Exs. ABr. char. eur. 29. 51—53. 77. Nordst. Wahlst. 5—7.

Brit. Scand. (s. l.). Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Austr. Hung. Ital. mer. (T. di Otranto). Dalm. (N. nidifica Vis. ex ipso). Chara flexilis Sm. Ch. syncarpa auct. (non Th.). — N. atrovirens Wallm.

4. **N. flexilis** Ag. syst. alg. 124. Chara flexilis auct. (et L. p. p.). — Exs. ABr. char. eur. 22. 55. Nordst. Wahlst. 11—14.

Angl. Scot. Scand. (s. l.). Ingr. (etc.). Polon. Germ. Batav. Belg. Gall. Helv. Pedem. (r.). Austr. Hung. (?). Croat. Slavon. Transs. N. Brongniartiana Coss. Germ. (1845). Chara furculata Rchb. ap. Moessl. (1834). Ch. commutata Rupr. (1845). — N. nigricans Wallm. — N. nidifica (Wallm.). (N. subcapitata ABr.). Nordst. Wahlst. exs. 9. 10. ABr. char. eur. 23.

b. Diarthrodactylæ ABr. — *

5. **N. translucens** Ag. syst. alg. 124. — Exs. Fr. XVI. 96. ABr. char. eur. 19. Nordst. Wahlst. 81.

Lusit. bor. (Welw. exs. 73). Hibern. Angl. (et Scot. r.). Belg. Batav. Dan. (Jutl.). Suec. mer. (r.). Holsat. Hannov. Colon. Gall. Cors. Pedem. (r.). Sicil. (sec. Balsamo). Austr. (Vindob.).

* *N. procera* Wallm. - Dan. (Grimmerup mose i Angel).

6. *N. brachyteles* ABr. char. afr. 809. -- Cors. (detexit Pouzols).

7. *N. mucronata* Kütz. phyc. germ. (1845); Wallm. — Exs. Fr. XII. 100. ABr. char. eur. 30. 20 (var.).

Angl. (Sussex, olim; Bedford: C. H. Davis 1882). Dan. Suec. mer., med. Fenn. mer. Germ. Belg. Gall. Helv. Ital. bor. Austr. Roman. (Dobr.). Thrac. (Byz.). Ross. mer., med. Chara furcata Barbieri ap. Amici (1827), non Roxb. (1824). Ch. mucronata ABr. (1834). Ch. Barbieri Bals. (1840). Ch. brevicaulis Bert. (1854). - *N. norvegica* Wallm. *Syll.* 351. — *N. flabellata* Kütz. *Syll.* 351. (Suec. Dan. Boruss. Siles. Ross. etc.). —? *N. virgata* Wallm. *Syll.* 351. (Paris).

* *N. Wahlbergiana* Wallm. - Exs. Nordst. Wahlst. 83. ABr. char. eur. 56. - Suec. med. Norv. mer.

8. *N. gracilis* Ag. syst. alg. 125. — Exs. Fr. VII. 100. ABr. char. eur. 24. 25. 57—59. Nordst. Wahlst. 15. 16.

Hibern. (co. Dublin). Angl. (Sussex). Dan. (sec. Wallm.). Norv. mer. Suec. mer., med. Fenn. mer. Germ. Belg. Gall. bor., occ. (etc.?). Helv. Pedem. Lomb. Austr. Hung. (?). Transs. Ross. mer., med. Chara gracilis Sm. (1810). Ch. exilis Barbieri ap. Amici (1827). — *N. contracta* Ag. (Berol. etc.). - *N. stellata* Wolff. (Francon. Berol. Ingr.). — *N. intricata* Wolff. (Francon.). —? *N. borealis* Wallm. *Syll.* 351. (Suec. bor.).

9. *N. confervacea* ABr. consp. char. eur. 2. *N. gracilis* var. *confervacea* Breb. fl. normand. ed. 2. Normand. (Argentan dep. Orne).

10. *N. tenuissima* Kütz. phyc. gen. 319. (1843). — Exs. Bill. 1985. ABr. char. eur. 60. Nordst. Wahlst. 41.

Gotland. (var.). Dan. (sec. Wallm.). Germ. Belg. (r.). Angl. (Cambridgesh., Norf., Anglesea). Gall. Helv. (r.). Hung. (r.). Transs. Dalm. Græc. (r.). Chara tenuissima Desv. (1809). Ch. glomerata Gm.

11. *N. batrachosperma* ABr. schweiz. char. 10 (nomen). — Exs. Fr. XVI. 100. (1865). Nordst. Wahlst. 42. ABr. char. eur. 78 (1870). Suec. mer., med. Fenn. mer. Germ. Gall. occ. (etc.).

**

12. *N. hyalina* (Ag. p. p.) Kütz. phyc. germ. 256. — Exs. ABr. char. eur. 21. 31. Nordst. Wahlst. 18.

Hisp. mer. (Iac. Albufera Valenc.). Gallopr. (r.). Vascon. (Bayonne). Nantes. Hetr. Lomb. Helv. (Iac. Leiman., Bodan. etc.). Austr. Istr. (Triest). Dalm. (Cherso). Fenn. mer.-occ. (r.). Batav. (r.).

c. *Polyarthrodactylæ* ABr.

13. *N. ornithopoda* ABr. char. eur. 3. (1867); char. eur. exs. 102. Gall. occ. (Charente, St. Marc; Bordeaux, la Teste).

4. ***Tolypella*** Leonh. (1863).

1. *T. intricata* Leonh. in diar. lotos 1863. 32. Chara intricata Rth. catal. I. 125. (1797). — Exs. Fr. XVI. 98. ABr. char. eur. 18. 33. Nordst. Wahlst. 46—48.

Hibern. (Dublin). Angl. (r.). Gall. bor., occ. (etc.?). Belg. Batav. (r.). Dan. (Fion.). Suec. mer. (r.). Gotland. Germ. Helv. (?). Ital. bor. (r.). Hung. (r.). Nitella intricata

Ag. (p. p.). *N. polysperma* Kütz. (1843). *Syll.* 351. *N. fasciculata* ABr. (1849). *Chara fasciculata* Amici (1827). *Ch. polysperma* ABr. (1834).

2. *T. prolifera* Leonh. l. c. 57. *Chara prolifera* (Ziz. hb.) ABr. in ann. sc. nat. 1834. 352.

Hibern. (Dublin). Angl. (Sussex). Normand. (r.). Belg. (rr.). Batav. (r.). Germ. occ. (et Berol.). Helv. occ. Austr. (Morav., Vindob.). Apul. (l. di S. Egidio prom. Gargani). *Nitella prolifera* Kütz.; Wallm. *Syll.* 351. *N. Borreri* Wallm. *Syll.* 351. *Chara nidifica* Borr. *Ch. Borreri* Bab. (1850).

3. *T. nidifica* Leonh. l. c. 57. *T. flexilis* Nordst. (1866). *Chara flexilis* L. (*Ch. glabra* ej. ind. itin. gotl. 1745). — Exs. Fr. V. 95. ABr. char. eur. 32. 61. Nordst. Wahlst. 84—86.

Norv. mer.-or. Dan. Suec. mer., med. Fenn. Ross. balt. Germ. balt. *Chara nidifica* Bruz. *Ch. Stenhammariana* Wallm. (1816). *Nitella nidifica* Ag. (1824). *N. Stenhammariana* Wallm. (1852).

* *T. Normaniaua* (Nordst.). Nordst. Wahlst. char. scand. exs. 19. ABr. char. eur. 109. - Norv. bor.-occ. (r.).

4. *T. glomerata* Leonh. l. c. 129. *Chara glomerata* Desv. in Lois. not. 135. (1810). — Exs. Fr. XVI. 97. ABr. char. eur. 17. Nordst. Wahlst. 43—45.

Hibern. Angl. Belg. Batav. Frisland. Seeland. Scan. Gotland. March. (r.). Saxon. (r.). Gall. Cors. Sicil. Parma. Austr. (r.). Daln. (Quarnero). *Nitella glomerata* Chevall. lutet. fl. gen. (1836). *N. glomerulifera* Kütz. *N. Smithii* Wallm. *Syll.* 351. *Chara nidifica* Sm. (1807). *Ch. Smithii* Bab. *Ch. glomerulifera* Rupr.

Index specierum, subspecierum, varietatum etc.,

tum nominum tum synonymorum,

quæ in Conspectu Floræ Europæe ejusque Supplemento occurrunt.

Nomina specierum admissa literis cursivis impressa sunt. Numeri primarii paginam, secundarii locum speciei etc. in genere suo indicant. Numerus generis, ubi indicatur, cursive impressus est.

- Abelicea cretica* 659.
Abies alba 673.
 Apollinis 673. 2.
 baldensis 674. 6.
cephalonica 673.
 chlorocarpa 674. 6.
 erythrocarpa 674. 6.
excelsa 673.
 excelsa 673. 1.
 extrema 674. 6*.
Larix 674. 2. 1.
 Ledebourii 674. 2. 2.
 montana 674. 6.
 obovata 674.
 obovata 674. 1. 6*.
 orientalis 674. 6*.
Omorica 673.
 panachaica 673. 2.
 pectinata 673. 1.
 peloponnesiaca 673. 2.
Picea 673. 6.
Pinsapo 673.
 Regiæ Amaliæ 673. 2.
sibirica 673.
 subarctica 674. 6.
 virescens 673. 1.
 vulgaris 673. 1.
Absinthium officinale 376. 2.
 petrosum 379. 40.
 vulgare 376. 2.
Abutilon Avicennæ 127. 4. 1.
Acalypha virginica 647. 6 obs.
Acantholimon androsaceum 614.
Acanthus hirsutus 563.
longifolius 563.
mollis 563.
 mollis 563. 1.
spinosus 563.
 spinosissimus 563. 3*
 spinulosus 563. 2*
Acer austriacum 135. 6.
campestre 135.
 collinum 135. 6.
 commutatum 135. 8.
 cordifolium 135. 7.
creticum 136.
 creticum? 136. 10.
 Dittrichii 135. 1.
 granatense 135. 5*
Heldreichii 135.
 heterophyllum 136. 10.
 hispanicum 135. 5.
 illyricum 135. 8.
 intermedium 135. 8*.
 leptopterum 135. 5.
 Lobelii 135. 3*.
 macropterum 135. 2.
 marsicum 135. 6.
 Martini 135. 5.
 melliodorum 135. 1.
monspessulanum 135.
 monspessulanum 135. 8.
 neapolitanum 135. 5*.
 obtusatum 135. 5.
 obtusifolium 136. 10.
 Opalus 135. 5.
opulifolium 135.
platanoides 135.
Pseudoplatanus 135.
 regiæ Amaliæ 135.
 tataricum 135.
 tomentosum 135. 6.
 villosum 135. 1.
Visianii 135.
Aceras antropophora 696.
 antrop.-militaris 697. 24.
 1 x.
 densiflora 966. 22. 1.
 Duquesnei 694. 17. 1 x.
 hircina 696. 23. 1.
 intacta 696. 22. 1.
 pyramidalis 694. 17. 1.
 Weddellii 697. 24. 1 x.
Achillea ægyptiaca 368. 16.
 ageratifolia 364. 5.
Ageratum 367.
 alpina 365. 12.
 ambigua 366. 2.
 argentea 375. 27. 3.
 asperula 362. 41.
 asplenifolia 366. 21*
 atrata 365. 16. 17. 18.
 banatica 367. 7.
 capitata 366. 23.
 cartilaginea 364. 8.
chamæmelifolia 367.
chrysocoma 368.
 claudiopolina 365. 11.
 Clavennæ 366. 23.
 Clusiana 365. 17.
clypeolata 367.
 coarctata 368. 17.
 collina 367. 5. 6.
 compacta 368.
 compacta 366. 2.
cretica 368.
crithmifolia 367.
 crustata 367. 5*.
 cuneata 366. 1.
 cuneifolia 364. 10.
 decipiens 367. 10.
 decolorans 367. 12 obs.
 dentifera 366. 2. 5.
 depressa 368.
 distans 366. 2.
 diversifolia 367. 7.
 eridania 467. 10*.
 flabelliformis 367. 13.
 Fraasii 365. 14
 Genipi 365. 19.
Gerberi 368.
 Gerberi 367. 10.
 glomerata 368. 17.
grandifolia 366.
 Gussonii 362. 39.
 Hænkeana 366. 5.
 helvetica 366. 21*.
 Herba-rota 364. 10.

holosericea 367.
hybrida 365. 19 x.
impatiens 365. 11.
incisa 366. 21 *.
intermedia 365. 19 x.
Jacea 368. 25.
Jankæ 366.
lanata 366. 2 *. 367. 5.
latiloba-var. 366. 4.
leptophylla 368.
leptophylla 367. 7.
ligustica 366.
ligustica 367. 10 *.
lingulata 364. 9.
livia 365. 19.
macrophylla 365. 21.
macrophyllodes 366. 1.
inagena 366.
magna 366. 2 *. 3. 5.
micrantha 368.
microphylla 367. 8.
Millefolium 366.
montana 366. 22.
moschata 365. 19.
moschato-Herbarota 364.
 10 *.
multifida 365. 16. 367. 6.
muricata 362. 42.
nana 365. 20.
nano-atrata 365. 20 *.
nano-moschata 365. 19 x.
Neilreichii 367. 10.
nivea 365. 14.
nobilis 367.
nobilis 367. 7.
ochroleuca 367. 10. 368. 21.
odorata 367.
odorata 367. 6. 9.
pallascens 366. 1.
pannonica 367. 5.
pauciflora 373. 15.
pectinata 368.
pectinata 367. 8.
peucedanifolia 366. 1.
polyphylla 367. 6.
pseudopectinata 368.
pseudotanacetifolia 366. 2 *.
Ptarmica 364. 7.
pubescens 367. 14. 36. 19.
punctata 367.
pyrenaica 364. 7 *.
recurvifolia 367. 11.
salina 367. 6.
Santolina 368. 26.
santolinoides 368.
scabra 367. 5 *.
Schkuhrrii 367. 10.
Schurii 364. 4.
Seidlilii 367. 5.

sericea 368. 17 *.
serrata 365. 11 obs.
setacea 367.
sicula 366. 3.
silvatica 365. 3 *. 367. 5.
speciosa 364. 6.
spinulosa 365. 11.
stricta 366. 2 *.
sudetica 366. 5.
tanacetifolia 366. 2.
taurica 368. 20.
tauygetea 368.
tenuis 367. 5 *.
Thomasiana 366. 22.
tomentosa 368.
tomentosa 367. 13. 368. 17.
Tournefortii 368.
umbellata 365. 13.
valesiaca 366. 21 *.
Wolfii 365. 11.
Achnodonton Bellardi 793. 9.
tenuis 793. 9.
Achyranthes argentea 621.
Achyrophorus discolor 470.
helveticus 470. 2.
maculatus 470. 1.
radicatus 470. 132. 4.
serioloides 471. 1.
uniflorus 470. 2.
Acinos acuminatus 589. 11.
adscendens 588. 10.
alpinus 589. 12.
canus 589. 15.
erectus 589. 15.
graveolens 589. 15.
incanus 589. 17.
purpurascens 589. 15 *.
rotundifolius 588. 4. 10.
 589. 16.
thymoides 589. 11.
villosus 589. 14.
vulgaris 589. 14.
Acis autumnalis 714. 7. 4.
hiemalis 714. 7. 9.
longifolia 714. 7. 8.
Aconitum acuminatum 20. 5.
acutum 20. 6 obs.
amoenum 20. 6 obs.
angustifolium 20. 6.
Anthora 20. 7.
aretophonum 19. 1 obs.
australe 19. 1 obs.
Bernhardianum 19. 4. 20.
 6 obs.
Braunii 20. 6 obs.
calibotryon 20. 6 obs.
Cammarum 19.
Cammarum 19. 3 *. 4.
cernuum 20. 5 *.

Clusianum 20. 6 obs.
Clusii 20. 6 obs.
commutatum 20. 6 obs.
cynoctonum 19. 1 obs.
Decandollii 20. 7.
decorum 19. 3.
eminens 20. 6.
exaltatum 19. 3.
excelsum 19. 1 obs.
eulophum 20. 7.
firmum 20. 6 obs.
flexicaule 20. 5.
formosum 20. 6 obs.
Funkianum 20. 6 obs.
galectonum 19. 1 obs.
gracile 19. 4.
hamatum 19. 3.
hebegynum 20. 5.
hians 20. 6 obs.
Hoppeanum 20. 6 obs.
Hoppilii 20. 6 obs.
Hosteanum 19. 2.
intermedium 19. 1 obs. 3 *.
Jacquinii 20. 7.
Koehleri 20. 6 obs.
Koelleianum 20. 6.
lætum 20. 6 obs.
Lamareckii 19. 1 obs.
lasiocarpum 19. 4.
laxiflorum 20. 6 obs.
laxum 20. 6 obs.
Luparia 19. 1 obs.
lycoctonum 19.
lycoctonum 19. 1 obs.
Mielichhoferi 20. 6 obs.
moldavicum 19.
molle 20. 5.
monogynum 21. 10.
multifidum 20. 6.
myrioctonum 19. 1 obs.
napelloides 20. 6 obs.
Napellus 20.
Napellus 20. 6. 6 obs.
neapolitanum 19. 1 *.
neomontanum 19. 3 *. 20.
 6 obs.
neuburgense 20. 6 obs.
ochroleucum 19. 1 *.
oligocarpon 20. 6 obs.
orientale 19. 1 *.
palmatifidum 19. 3.
paniculatum 20.
Phthora 19. 1 obs.
pyramidalis 20. 6.
pyrenaicum 19. 1 *.
ranunculefolium 19. 1 obs.
rectum 19. 1 obs.
reflexum 20. 5.
rhynchanthum 19. 4.

- rigidum 20. 6 obs.
 rostratum 19. 4.
 septentrionale 19. 1*
 Stoerkianum 19. 3*
 strictum 20. 6 obs.
 taurericum 20. 6.
 tauricum 20. 6.
 tenuifolium 20. 6 obs.
 Thelyphonum 19. 1 obs.
 theriophonum 19. 1 obs.
 tragoctonum 19. 1 obs.
 transsilvanicum 19. 2.
 toxicum 20. 5.
 variegatum 19.
 venustum 20. 6 obs.
 versicolor 19. 3.
 virgatum 19. 3. 20. 6 obs.
 vulgare 20. 6.
 Vulparia 19. 1 obs.
 zoocotonum 19. 1 obs.
- Acorus Calamus* 753.
Acroptilon Picris 416.
Acrostichum cataneuse 861.
 3. 2.
microphyllum 861. 6. 2.
Actæa spicata 22.
Adenocarpus anisochilus
 158.
Boissieri 158. 1.
cebennensis 158. 3*
commutatus 158. 3*
complicatus 158. 6.
decorticans 158.
græcus 158. 3*
grandiflorus 158.
hispanicus 158.
intermedius 158.
parvifolius 158.
telonensis 158. 3*. 4.
villosus 158. 6*.
- Adenophora communis* 475. 2.
Lamarckii 475.
liliifolia 475.
Pichleri 479. 43.
suaveolens 475. 2. 2.
stylota 475.
- Adenosella bifolia* 730. 19.
Adenostyles albida 396.
albifrons 396. 61. 2.
alpina 396. 61. 1.
australis 396. 61. 1*
candidissima 396.
glabra 396. 61. 1.
hybrida 396. 61. 1*. 4.
leucophylla 396. 61. 4.
leucophylla hybrida 396.
 61. 3.
macrophylla 396. 61. 1*
orientalis 396.
- Petasites* 396. 61. 2.
pyrenaica 396.
viridis 396.
Adiantum Capillus Veneris 861.
Adonis æstivalis 4. 9.
æstivalis 4.
ambigua 4. 6.
anomala 4. 9.
apennina 4. 3. 4.
autumnalis 4.
bætica 4. 10*
caudata 4. 9.
chærophylla 4. 5.
citriua 4. 6. 9.
Cupaniana 4. 7.
cyllenea 4.
dentata 4.
dentata 4. 6. 9.
distorta 4.
flammea 4.
flava 4. 6.
hybrida 4. 5.
intermedia 4. 7*
maculata 4. 6.
microcarpa 4.
miniata 4. 6.
parviflora 4.
parviflora 4. 4.
perramosa 4. 10.
Preslii 4. 9.
pyrenaica 4.
squarrosa 4. 6*
vernalis 4.
villosa 4. 5.
wolgensis 4.
- Adoxa Moschatellina* 321.
Aegialophila cretica 432.
Aegilops Aucheri 840. 5.
biuncialis 839.
caudata 839.
caudata 839. 6. 840. 5.
comosa 839.
cylindrica 839.
cylindrica 839. 5.
fragilis 839.
macrochaeta 839. 1.
neglecta 839. 3.
ovata 838.
speltæformis 839. 1*.
squarrosa 839. 8. 9.
Tauschii 839.
triaristata 839.
triaristata 839. 4.
triticeoides 839. 1*.
triuncialis 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.
- uniaristata* 839.
ventricosa 839.
- vulgari-triuncialis* 839. 4*.
vulgari-triaristata 839. 3*.
Aegomarthrum siculum 314.
 101. 3.
Aegopodium involueratum
 315. 107. 2.
Podagraria 305.
Aeluropus lævis 819. 1.
litoralis 819.
repens 819. 2.
villosus 819.
Aesculus Hippocastanum 136.
 10 obs.
Aetheorrhiza bulbosa 458. 42.
Aethionema banaticum 63. 2.
Buxbaumii 64.
gracile 63.
græcum 63.
monospermum 64.
ovalifolium 63. 2*
polygaloides 63.
pyrenaicum 64.
saxatile 63.
Thomasianum 63.
Aethusa cynapioides 297. 62.
 1*.
Cynapium 297.
elata 297. 62. 1.
micrantha 297. 62. 1.
segetalis 297. 62. 1.
Agathophyton Bonus Henri-
eus 623. 3. 2.
Agave americana 715. obs. 2.
Agraphis campanulata 731.
 19. 2.
cernua 731. 19. 4.
nutans 731. 19. 3.
patula 730. 19. 1.
Agraulis caninus 802. 13.
Agrimonia Eupatoria 238.
græca 238. 1.
odorata 238.
pilosa 238.
procera 238. 2.
repens 238.
Agropyrum acutum 840. 10.
 841. 13.
affine 840. 10.
campestre 841. 15*
caninum 841. 18.
concinnum 841. 13.
curvifolium 840. 8.
elongatum 841. 12.
elymogenes 840. 7.
glaucum 841. 15. 16.
juncum 840. 6.
ligusticum 840. 4.
panormitanum 842. 20.
Pouzolzii 841. 15.

- pungens* 840. 10. 841. 13.
pycnanthum 841. 14.
repens 841. 16.
Savignoni 841. 11.
strictum 840. 7.
Tournefortii 840. 5.
scirpeum 840. 8.
Agrostemma coeli rosa 85.
 3. 1.
 coronaria 85.
 flos Jovis 85. 2.
 Githago 85. 1. 1.
 nicæensis 85. 1. 1.
Agrostis adscendens 801. 3 *
 alba 800.
 alba 801. 2.
 algida 837. 99. 3.
 alpestris 802. 16.
 alpina 801.
 alpina 802. 16. 17.
 aquatica 801. 3.
 arenaria 800. 48. 1.
 articulata 804. 55. 1.
 borealis 802. 16.
 byzantina 801.
 canina 801.
 capillaris 801. 2. 4. 7. 9.
 802. 13. 20. 21. 22.
 decumbens 800. 1.
 delicatula 802.
 densa 801. 3.
 diffusa 801. 1.
 dubia 801. 4.
 Duriæi 802. 21 *
 elegans 802.
 exilis 802. 22.
 festuoides 802. 15.
 filiformis 802. 15 *
 flavescens 802. 15.
 flavida 800. 1.
 frondosa 801.
 gaditana 800. 48. 1 *
 gigantea 800. 1.
 glaucina 801. 4.
 hispanica 801. 6.
 hispida 802. 21.
 Hornungiana 801. 4.
 hyperborea 802. 16.
 interrupta 803. 51. 2.
 Juressi 801.
 Langei 801. 4 *
 lendigera 803. 53. 1.
 limosa 800. 1.
 litigans 802.
 lusitanica 801. 6.
 maritima 801. 1.
 Mülleri 801. 3 *
 nebulosa 801.
 nebulosa 802. 20.
 nevadensis 802.
 nitens 803. 52. 1.
 nobilis 802. 13 *
 olivetorum 801.
 pallida 802.
 pallida 802. 13
 patula 801. 1.
 pilosa 800. 17.
 pumila 801. 4.
 pungens 800. 48. 1.
 purpurea 803. 51. 1.
 pusilla 802. 13.
 pyrenæa 802. 15 *
 pyrenaica 802. 17.
 Renteri 801.
 rivularis 801. 3.
 rubra 802.
 rubra 801. 4. 802. 13.
 rupestris 802.
 rupestris 802. 15. 16.
 salina 800. 1.
 scabriglumis 801. 2 *
 Schleicheri 802. 15 *
 setacea 801.
 setacea 802. 17.
 setifolia 801. 11.
 signata 800. 1.
 silvatica 801. 1.
 spica venti 803. 51. 1.
 stolonifera 800. 1. 801. 3. 4.
 stricta 801.
 suaveolens 800. 49. 1.
 tenerrima 802. 22.
 trichoclada 801.
 tricuspidata 801. 6 *
 truncatula 802.
 umbrosa 801. 4.
 varians 802. 13.
 ventricosa 803. 53. 1.
 verticillata 801.
 verticillata 801. 3 *
 vinealis 801. 6. 802. 13.
 vulgaris 801.
 Welwitschii 801. 2 *
Ailanthus glandulosa 147. 2.
 4 obs.
Aira aggregata 814. 54 *
 agrostidea 806. 65. 1. 2.
 alpina 808.
 alpina 790. 24. 4. 807. 1.
 808. 6. 7.
 altissima 807. 69. 1.
 Andræi 807. 69. 1.
 arctica 808.
 argentea 808. 8.
 articulata 815. 1. 2.
 arundinacea 807. 68. 1.
 atropurpurea 808. 70. 1.
 bætica 808.
 bottnica 807.
 brigantiaca 830. 6.
 cæspitosa 807.
 capillaris 814. 52. 53. 55.
 caryophyllea 814. 54. 55.
 corsica 808. 8.
 corymbosa 814. 53.
 Cupaniana 814. 55.
 discolor 808. 9.
 divaricata 814. 54.
 Edouardi 814. 53.
 elegans 814. 52.
 elegantissima 814. 52.
 flexuosa 808.
 glabrata 807. 66. 2.
 globosa 807. 67. 1.
 grandis 807. 3.
 grandiflora 816. 2.
 Hartmaniana 807. 69. 1 *
 inflexa 814. 53 *
 intermedia 814. 53.
 involverata 806. 64. 1.
 juncea 808. 4.
 lævigata 808. 6.
 lævis 807. 66. 2.
 Lagascæ 806. 65. 1.
 Legæi 808. 8.
 lendigera 807. 66. 2.
 litoralis 807. 69. 1.
 media 807.
 minuta 807. 66. 1.
 montana 808. 8. 10.
 multiculmis 814. 54 *
 paludosa 807. 69. 2.
 palustris 807. 66. 1 *
 parviflora 807. 1.
 patulipes 814. 54.
 plesiantha 814. 54.
 præcox 814. 56.
 provincialis 814. 52 *. 53.
 pulchella 807. 66. 2. 814.
 53 *
 refracta 808.
 setacea 808.
 setacea 808. 4.
 stolonifera 807. 69. 1.
 stricta 805.
 subaristata 808. 4.
 subtriflora 808. 4 *
 Tenorii 814. 53 *
 Todari 814. 54.
 uliginosa 808. 9.
 Wibliciana 807.
Airochloa caudata 815. 78. 1.
 cristata 816. 3.
 hirsuta 816. 9.
 pubescens 816. 3.
 villosa 816. 11.
Airopsis agrostidea 806. 65. 1.

- caryophyllea 814. 54.
globosa 807.
insularis 806. 65. 2.
involuta 806. 64. 1.
lendigera 807. 66. 2.
minuta 807. 66. 1.
præcox 814. 56.
pulchella 814. 53*
Aizoon hispanicum 266.
Ajæ bicolor 709. 3. 2.
incomparabilis 709. 7.
major 709. 3. 2.
minor 709. 4.
moschatus 709. 3.
odorus 710. 8.
pseudo-narcissus 709. 3. 1.
pygmæus 709. 4.
Ajuga acaulis 567.
alpina 567. 3. 4. 5.
Barrelieri 567. 3. 3.
Chamæpitys 568.
chia 568.
cryptostylon 567. 3. 5.
decumbens 567. 3. 7.
densiflora 567. 3. 3.
genevensis 567.
glabra 568. 11.
intermedia 568. 10.
Iva 568.
Laxmanni 567.
montana 567. 3. 5.
orientalis 567.
pseudo-iva 568. 9.
pyramidalis 567.
reptans 567.
rotundifolia 567.
rugosa 567. 3. 5.
rupestris 567. 3. 4.
salicifolia 568.
Tenorii 567. 3. 7.
Albersia *Blitum* 622. 4. 2.
prostrata 622. 4. 1.
Albucea chlorantha 728. 16. 2.
nutans 728. 16. 1.
Alcea ficifolia 127.
ficifolia 127. 5. 1.
Heldreichii 127.
meonantha 127.
pallida 127.
pontica 127.
rosea 127.
Sibthorpii 127.
Alchemilla acutiloba 238. 14.
 1*
Aphanes 239. 14. 6.
alpina 238.
ambigens 238. 14. 1*
argentea 238. 14. 3.
arvensis 239.
conjuncta 238.
cornucopioides 239.
cuneata 239. 14. 5.
fissa 238.
glaucescens 238. 14. 1.
heptaphylla 239. 14. 5.
hybrida 238. 14. 1*
microcarpa 239.
minor 238. 14. 2.
montana 238. 14. 1*
pentaphylla 238.
pratensis 238. 14. 1.
pubescens 238. 14. 1*. 2*
pyrenaica 238. 14. 2.
silvestris 238. 14. 1.
subsericea 238. 14. 4.
truncata 238. 14. 1.
vilgaris 238.
Aldrovanda vesiculosa 82.
Alectorolophus alpinus 552.
 24. 4.
angustifolius 552. 24. 1.
major 552. 24. 2.
minor 552. 24. 3.
Alhagi camelorum 200.
græcorum 200.
turcorum 200. 45. 2*
Alisma alpestre 679.
arquatum 679. 1. 1*
Bourgæi 679. 2. 2.
Damasonium 679. 2. 1.
lanceolatum 679. 1. 1.
natans 679.
parnassifolium 679.
Plantago 679.
polyspermum 679. 2. 3.
ranunculoides 679.
repens 679. 1. 4.
Alkanna alba 512. 8.
bæotica 517. 13. 2*
calliensis 517. 13. 2.
græca 517.
græca 517. 13. 2*
Lehmani 517. 13. 5*
lutea 517.
nonneiformis 517. 13. 7*
orientalis 517.
primuliflora 517.
Pulmonaria 517.
Sartoriana 517.
scardica 517.
Sieberi 517.
tinctoria 517.
Alliaria officinalis 40.
Allium achaium 740.
acre 741.
acutangulum 739.
acutangulum 739. 45.
acutiflorum 735. 5.
adscendens 735. 1.
æstivum 736. 10*
affine 736.
albescens 735. 1.
albidum 739.
albidum 736. 10. 740. 50.
album 738. 33.
alpinum 741. 72*
ambiguum 737. 26. 739. 42.
amblyopetalum 738. 33.
amethystinum 735. 1*
ammophilum 739. 46.
Ampeloprasum 735.
angulosum 739. 44. 45. 47.
apenninum 740. 51*
appendiculatum 739. 41*
approximatum 736. 9.
arenarium 736. 6. 7.
arvense 736.
asperum 741. 59.
atropurpureum 737.
Babingtonii 736. 6*
bæticum 735.
Bertolonii 735. 1.
Boryanum 740. 52.
bosniacum 735. 4.
Broteri 741. 72.
byzantinum 735. 1*
callimischon 740. 53.
Cambiasii 735. 4.
candidissimum 738. 33.
capillare 742. 77.
carinatum 740.
carinatum 741. 60.
carneum 737. 26.
Chamæmoly 738.
Chamæspathum 736.
chloranthum 741. 62.
ciliatum 737. 20. 27.
circinatum 738.
Clusianum 738. 29. 30.
collinum 740. 50*
coloratum 740. 58.
commutatum 735. 4*
compactum 736. 7.
complanatum 741. 60.
consimile 740. 59.
controversum 736. 6 obs.
Coppolerii 740. 50*
corbariense 737. 27.
cornutum 741.
crininum 736. 9.
cristatum 737.
Cupani 742.
Cyrilli 737.
danubiale 739. 44. 45.
decipiens 737.
deasiflorum 736. 9.
descendens 736.

descendens 736. 7. 14.
Deseglisei 736. 9.
Duriceanum 735. 1.
eminens 736. 12.
ericetorum 739. 42.
erythraeum 742.
erythraeum 742. 74.
exile 740. 54.
fallax 739. 45.
flavescens 739.
flavum 740.
flexifolium 740. 59.
flexum 740. 59. 741. 59.
flexuosum 740. 59. 741.
 64. 65.
foliosum 741. 72.
fragrans 737. 24. 742. 78
 obs.
frigidum 741.
Frivaldszkyanum 736. 13.
fuscum 740.
Gasparrinii 735. 1.
Gherardi 736. 11.
globosum 741.
gomphrenoides 737.
græcum 738. 28.
graminifolium 737. 27.
 739. 42.
grandiflorum 739. 40 et *
Guicciardi 740. 58 *
guttatum 736. 13 et *
Halleri 735. 1 *. 736. 6 *
Heldreichii 737.
hirsutum 737. 27.
holmense 735. 1.
hymettium 741.
illyricum 737. 26.
inequale 742. 77 obs.
insubricum 739. 40 *
intermedium 739. 48.
kermesinum 741. 61.
Kochii 736. 7 *
lacteum 738. 33.
lætum 738. 33.
laxiflorum 736. 7.
leptophyllum 739. 45.
lignaticum 740. 58.
lineare 738.
lineare 736. 13.
longispauthum 740.
lusitanicum 739. 45 *. 741.
 72.
magicum 737. 23. 24.
majale 737. 26.
margaritaceum 736.
margaritaceum 736. 10.
maritimum 742.
microcephalum 738. 39.
Moly 737.

monspessulanum 736. 7 *.
 737. 23.
montanum 739.
montanum 740. 51. 52. 58.
moschatum 742.
moschatum 742. 76.
multibalbosum 737. 24.
multiflorum 735.
multiflorum 735. 4. 736. 12.
narcissiflorum 739.
narcissifolium 739. 44. 45.
neapolitanum 738.
nebrodense 740. 57 *
neglectum 736. 6.
nigrum 737.
nigrum 739. 40.
nitens 736. 7.
niveum 737. 27.
ochroleucum 739.
ochroleucum 741. 62.
odorum 737. 24.
oleraceum 741.
Ophioscorodon 736. 6 obs.
Pallasii 742. 73.
pallens 740.
pallens 739. 48. 740. 49. 58.
paniculatum 739.
paniculatum 740. 49. 51.
 58.
paradoxum 738. 36 obs.
parciflorum 742.
parviflorum 736. 10. 13.
paterfamilias 735. 1.
pauciflorum 742. 76.
pedemontanum 739. 40 et *
pendulinum 738.
permixtum 737. 26 *
phalereum 741.
phthioticum 738.
pilosum 741.
polyanthum 735. 4.
porphyroprasmum 735. 4.
Porrum 735. 2 obs.
Preslianum 735. 4.
pruinatum 736. 7 *
pseudo-ochroleucum 741.
 62.
pulchellum 740.
pusillum 742. 75.
pylium 735. 1 *
reticulatum 739. 39.
riparium 741. 72.
roseum 737.
roseum 739. 40. 741. 71.
rotundum 735.
rotundum 735. 4 *
rubellum 736. 12.
rubrovittatum 737.
rupestre 740. 49 *. 741. 67.

sabulosum 741.
sardoum 736.
sativum 736. 6 obs.
Savii 740. 56.
savranicum 741. 61.
saxatile 741. 61. 67.
scaberrimum 736. 9.
scariosum 735. 4.
schoenoprasoides 741. 72.
Schoenoprasum 741.
Scorodoprasum 735.
segetum 736.
senescens 739.
senescens 739. 44. 45. 46.
serbicum 742. 77 obs.
serotinum 739. 41 *. 45.
setaceum 742. 77.
sibiricum 741.
Sibthorpiannum 740.
sipyleum 740.
speciosum 737. 23.
spectabile 735. 1.
sphærocephalum viridi-al-
bum 736. 10.
sphærocephalum 736.
stamineum 740.
staticiforme 741.
staticiforme 737. 15. 741.
 65.
Steveni 741. 61.
stramineum 737. 25. 739.
 46.
strictum 738.
suaveolens 739.
suaveolens 739. 39. 42.
subhirsutum 737.
subhirsutum 737. 28.
subvillosum 738.
Tenorii 737. 26.
tenue 742. 73.
tenuiflorum 740.
tenuiflorum 736. 10. 740.
 52.
tenuifolium 741. 72.
thessalum 735. 1 *
Tinei 737. 26 *
trachypus 736. 10 *
trifoliatum 737.
triquetrum 738.
tulipæfolium 737. 22.
uliginosum 739. 44.
ursinum 738.
Urvillæi 741. 65.
valdensium 740. 58.
vernale 738. 29.
veronense 736. 9.
Victorialis 738.
vineale 736.
violaceum 741. 59.

- virens* 741. 60.
virescens 736. 13. 741. 60.
volhynicum 739. 39.
Webbii 740. 57 *
Weissii 742.
Welwitschii 737.
Wildii 735.
xanthicum 741.
Allosorus crispus 860.
Alnus autumnalis 671. 3 obs.
barbata 671. 2. 3.
brembana 672. 1. 5.
cordata 672. 1. 4.
cordifolia 672.
elliptica 671. 3 *
fruticosa 672. 1. 5 *
glutinosa 671.
glutinoso-incana 671. 2 obs.
hybrida 671. 2 obs.
incana 671.
incano-glutinosa 671. 2 obs.
intermedia 671. 1.
lobata 671. 1.
macrocarpa 672. 1. 4.
Morisiana 671. 3 *
neapolitana 672. 1. 4.
pubescens 671.
rotundifolia 672. 1. 4.
rugosa 671. 3 obs.
serrulata 671. 3 obs.
suaveolens 672.
suaveolens 671. 3 *
tirolensis 671. 1.
viridis 672.
Alœ arborescens 718.
barbadensis 718.
humilis 718.
purpurascens 718.
vulgaris 718.
Alopecurus agrestis 794.
alpestris 793. 2.
alpinus 794.
altissimus 793. 1.
arundinaceus 793.
brachyglossus 793. 2 obs.
brachystachys 794.
brachystylus 793. 2 obs.
bulbosus 794.
castellanus 794. 4 *
colobachnoides 794. 4.
creticus 794.
crispoides 794.
elongatus 793. 2 obs.
fulvus 794. 9 *
geniculatus 794.
Gerardi 793. 31. 1.
hybridus 793. 2 obs.
laguriformis 794. 4.
nigricans 793. 32. 1. 2.
obscurus 793. 2.
paludosus 794. 9 *
pratensis 793.
pronus 794. 9.
purpurascens 794. 6.
ruthenicus 793. 32. 1.
vaginatus 793. 31. 2.
utriculatus 794.
Alschingera actæefolia 315.
*107. 1 **
verticillata 315. 107. 1.
Alsine apetalâ 111. 4. 3 *
arctica 118.
Arduini 117. 6.
aretoides 119.
arvatica 117. 10.
attica 119. 25 *
austriaca 117.
banatica 117. 8 *
Bartolotti 119. 28.
Bauhinorum 116.
brevicaulis 119. 29.
brevifolia 118. 15.
biflora 118.
cæspitosa 119. 25.
cataractarum 119. 23.
cerastiifolia 119.
Cherleria 119. 10. 1.
Cheveneauxii 119. 23 *
condensata 119. 23 *
conferta 117. 10 *
confusa 118. 16.
diandra 123. 7.
eurytanica 119.
extensa 119. 28.
Fachinii 119. 27.
falcata 117. 8 *. 118. 23.
fasciculata 117. 12.
Funkii 118. 12 *
Gerardi 119. 25.
glandulosa 116. 1.
glomerata 118.
graminifolia 117.
grandiflora 111. 4. 3 *
grineensis 117. 4.
herniarioides 119. 31.
hirsuta 118.
hirta 119. 1.
hispanica 120. 14. 1.
hybrida 117. 9 *
Jacquini 117.
irregularis 118. 14.
juniperina 116.
Kitaibelii 116. 2 *
lanceolata 119.
lancifolia 118. 14.
laricifolia 116.
laricifolia 117. 8.
laxa 117. 9.
liniflora 116. 1.
macrocarpa 116. 2 *
major 111. 4. 3 *
mucronata 117.
mucronata 117. 10. 12. 118.
15.
mutabilis 118. 15.
nodosa 116. 3.
Orphanidis 117. 9.
parnassica 117.
pauciflora 119. 25.
petraea 118. 15.
pinifolia 118.
procumbens 119.
pubescens 117. 9.
radicans 123. 17. 6 *
ramosissima 118. 12 +
recurva 118. 23.
Rosani 117.
rosea 119. 28.
Rossii 118.
rostrata 118.
rostrata 118. 15.
rubella 119. 26.
saxatilis 117. 8. 119. 25.
saxifraga 117. 6 *
sedoides 119. 26 *. 119.
10. 1.
setacea 117.
Smithii 118.
striata 116. 2.
stricta 118.
subulifolia 117. 10.
taurica 117. 4 *
tenella 117. 5 *
tenuifolia 117.
thymifolia 117.
trichocalycina 118.
velutina 118. 13.
verna 119.
Villarsii 116.
viscidula 117. 9 *
viscosa 117. 9 *
Alternanthera Achyrantha
621.
Althæa cannabina 127.
ficifolia 127. 5. 4.
Heldreichii 127. 5. 3.
hirsuta 127.
longiflora 128.
Ludwigii 128.
narbonensis 127. 1 *
officinalis 127.
pallida 127. 5. 2
rosea 127. 5. 1.
silvestris 128. 14 *
taurinensis 127.
Althenia Barrandonii 684.
filiformis 684.

- setacea 684.
Alyssum affine 55. 5.
 alpestre 57.
 alpestre 56. 10. 57. 25.
 alsinefolium 57. 30.
 arenarium 56. 9.
 argenteum 57.
 atlanticum 56. 9 *
 Aucheri 56. 19.
 Bertolonii 57. 23. 24.
 brachystachyum 56. 16.
 calycinum 57.
 calycinum 56. 18.
 campestre 56.
 campestre 56. 9.
 castellanum 57. 26.
 collinum 56. 9. 18.
 compactum 57.
 corsicum 57.
 corsicum 57. 25.
 corymbosum 55.
 creticum 55.
 cuneifolium 56. 9 *
 dasy carpum 57.
 decumbens 56. 8.
 diffusum 56. 10 *. 57. 23.
 edentulum 55. 4.
 Fischerianum 56.
 flexicaule 56. 10 *
 foliosum 56.
 fulvescens 56.
 gemonense 55.
 gemonense 55. 4.
 Gmelini 56. 9.
 granatense 57. 26. 30 *
 halimifolium 54. 51. 2 *
 hirsutum 56.
 hirsutum 56. 14 *
 ideum 56.
 Laperousianum 54. 51. 2 *
 latifolium 57.
 leucadeum 55.
 linifolium 57.
 longicaule 55. 51. 5.
 lusitanicum 56. 18.
 medium 55. 4.
 micranthum 56. 18 *
 microcarpum 55. 3. 4.
 micropetalum 56. 18.
 minimum 56.
 minutum 57.
 montanum 56.
 montanum-hymettium 56.
 9.
 murale 57. 23.
 murcium 57. 26.
 nebrodense 57. 26 *
 obtusifolium 57. 27 *
 orientale 55.
 parviflorum 57. 30.
 Perusianum 54. 51. 2 *
 petraeum 55. 4.
 petrophilum 56. 9.
 phymatocarpum 57. 30.
 porphyreticum 56. 9.
 psammeum 56. 9.
 psilocarpum 57. 30 *
 pyrenaicum 57. 27.
 repens 56.
 Robertianum 57.
 Rochelii 56. 8.
 rostratum 56.
 rostratum 56. 9.
 saxatile 55.
 saxatile 55. 5. 57. 27.
 sawranicum 57. 27 *
 Schlosseri 57. 30.
 serpillifolium 57. 27 *
 serpyllifolium 57.
 sinuatum 55.
 sphacioticum 56.
 Spruneri 56. 9.
 subtunmidum 56. 19.
 tortuosum 57. 27 *
 transsilvanicum 56. 8 *
 umbellatum 56.
 vernale 56. 10.
 Wierzbickii 56. 14 *
 Wulfenianum 56.
 xanthocarpum 56. 8.
Amaracus tomentosus 598. 3.
Amarantus adscendens 622.
 4. 2.
 albus 621.
 Berchtoldi 621. 3. 3.
 Blitum 621. 3. 3. 622. 4. 2.
 chlorostachys 621. 3. 1 obs.
 caudatus 621. 3. 2 obs.
 deflexus 621. 4. 1.
 Delilei 621. 3. 2 *
 flexuosus 622. 4. 2.
 græcizans 621. 3. 3 *. 4.
 hypochondriacus 621. 3. 2
 obs.
 incurvatus 621. 3. 2.
 laxiflorus 621. 3. 2.
 morosus 621. 3. 1 obs.
 patulus 621.
 patulus 621. 3. 2 *
 prostratus 622. 4. 1. 2.
 retroflexus 621.
 silvestris 621. 3. 3.
 spicatus 621. 3. 1. 2.
 strictus 621. 3. 1.
 Timeroiyi 621. 3. 2.
 trivialis 621. 3. 2.
 viridis 621.
 viridis 622. 4. 2.
Amaryllis ætensis 713. 5. 5.
Belladonna 715. 5 obs. 1.
sarniensis 715. 5 obs. 1.
Amberboa lancifolia 432. 171.
Lippii 418.
moschata 418. 94. 2 obs.
muricata 418.
Ambrina ambrosioides 624.
 12.
Botrys 624. 13.
foetida 624. 13 obs.
Ambrosia artemisiæfolia 474.
 1. 1 obs.
maritima 474.
tenuifolia 474. 1. 1 obs.
Ambrosinia Bassii 756.
maculata 756. 8. 1.
reticulata 756. 8. 1.
Amelanchier leiopetala 242.
 4. 1.
mucronata 242. 4. 1.
parviflora 244. 7. 3.
rotundifolia 242. 4. 1.
vulgaris 242. 4. 1.
Amm(o)denia 116. 8. 1 obs.
Ammannia Boræi 252. 2. 4.
verticillata 252.
Ammanthus ageratifolius 370.
 22. 1.
filicaulis 370.
maritimus 370.
Anmi Boeberi 305. 79. 1.
cientæfolium 305. 79. 1.
crinitum 305.
dancifolium 295. 59. 3.
glaucofolium 305. 79. 1 *
intermedium 305. 79. 1 *
majus 305.
pumilum 305.
Visnaga 305.
Ammochloa subacaulis 797.
Ammophila arundinacea 798.
 45. 1.
baltica 798. 45. 2.
Ampelodesmos tenax 798.
Amphigenes carpathica 826.
 15.
Amphoricarpus Neumayeri
 416.
Amygdalus amara 212. 1. 1.
Bessariana 212. 1. 2 *
campestris 212. 1. 2 *
communis 212.
nana 212.
Pallasiana 212. 1. 2 *
Persica 212. 1. 2 obs.
Anabasis aphylla 631.
articulata 631.

Anacamptis Brancifortii 694.
38.

Durandi 694. 17. 1 ×
pyramidalis 694.
quadrupunctata 694. 37.

Anacharis Alsinastrum 678.
canadensis 678.

Anacyclus aristulatus 363.
12. 1.

aureus 363. 12. 2.
Candollei 363. 12. 1 *
clavatus 363.
creticus 362. 40.
officinarum 363. 4 obs.
orientalis 360. 14 *
pallescens 363.
pectinatus 361. 20.
pubescens 363. 12. 1.
pulcher 363. 4 obs.
Pyrethrum 363. 4 obs.
radiatus 363.
valentinus 363.

Anagallis arvensis 601.
carnea 601. 5.
coerulea 601.
collina 600.
crassifolia 601.
fruticosa 600. 6. 2.
latifolia 601.
linifolia 600.
Monelli 600. 6. 1. 601. 4.
parviflora 601.
parviflora 601. 4.
phænicea 601. 5.
tenella 601.
verticillata 601. 4.

Anagyris foetida 148.
neapolitana 148. 1. 1 *

Anarrhinum bellidifolium
543.

corsicum 543. 10. 1.
Duriminium 543. 10. 3.
hirsutum 543.
laxiflorum 543.

Anchusa ægyptiaca 511.
ægyptiaca 511. 6. 1.
aggregata 511.
amplexicaulis 511. 10.
angustifolia 510. 2 *. 6. 9.
angustissima 510. 5. 9.
arvalis 510. 2.
arvensis 510. 2. 511. 6. 2.
azurea 511. 13.
Barrelieri 511.
Baumgarteni 510. 2 *
cæspitosa 511.
calcarea 510.
Capellii 511. 10 *
Cesatiana 513. 8. 6.

crispa 511. 10.
crispata 511. 10 *
Gmelini 510.
granatensis 510.
granatensis 511. 10.
hybrida 511.
italica 511.
leiosperma 512. 2.
leptophylla 510. 2 *. 6.
linearifolia 510. 6.
litorea 511.
lutea 517. 9. 520. 13 *
microcalyx 510.
nigricans 512. 7. 5.
obliqua 510.
ochroleuca 510.
officinalis 511. 13.
orientalis 511. 6. 3.
ovata 511. 6. 3.
paniculata 511. 13.
parnassica 510. 2.
parviflora 511. 18.
procera 510. 3. 5 *
rosea 511. 7. 1.
sempervirens 510.
Spruneri 511. 16 *
strigosa 511.
stylosa 511.
thessala 511.
tinctoria 517. 13. 5.
undulata 510.
undulata 511. 10.
variegata 511. 6. 1.
verrucosa 511. 6. 1.
versicolor 511. 7. 1.

Andrachne telephioides
646.

Andromeda polifolia 491.
Andropogon angustifolium

786. 3. 4.
contortum 786. 7. 1.
distachyum 786. 6. 1.
giganteum 786. 2.
hirtum 786.
Ischæmum 786.
panormitanum 786.
provinciale 786.
pubescens 786.
strictum 786. 2. 2.

Androsace affinis 606. 7 *

alpina 607. 3. 4.
apennina 607. 5 *.
arachnoidea 606. 5 *
aretoides 606. 7.
Bocconi 606. 4 *
brevifolia 606. 3.
bryoides 607. 11.
carnea 607.
Chaixi 606.

Chamaejasme 606.
Chamaejasme 606. 7.
ciliata 607. 2.
cylindrica 607. 1.
diapensioides 607. 7.
elongata 606.
frutescens 607. 1.
glacialis 607. 5.
Hausmanni 607. 6.
hedræantha 607. 15. 9 *
Heerii 607. 6. 10.
helvetica 607. 11.
imbricata 607. 8.
Lachenalii 607. 9.
lactea 606.
Laggeri 607. 9 *
Mathildæ 607. 5 *
maxima 606.
nana 606. 4 *
obtusifolia 606.
Pacheri 607. 15. 9.
pauciflora 607. 8.
pedemontana 606. 7 *
penicillata 606. 5.
pubescens 607. 3.
pyrenaica 607. 7.
septentrionalis 606.
septentrionalis 606. 2.
villosa 606.
villosa 606. 6.
Wulfeniana 607. 15. 9.

Androsæmum Cambessee-
desii 131.
grandifolium 131. 1. 1 obs.
hircinum 131.
officinale 131.
Webbianum 131. 1. 1 obs.

Andryala Agardhii 438.
arenaria 438. 113. 3 *
corymbosa 438. 4.
cossyrensis 438. 113. 3.
dentata 438.
diffusa 438. 4.
incana 438. 113. 1.
integrifolia 438. 4.
lacinata 438. 113. 1.
lanata 438. 4.
laxiflora 438. 4 *
lyrata 438. 113. 1.
macrocephala 438. 113. 1 *
mollis 438. 4.
ragusina 438.
ramosissima 438. 113. 1.
Rothia 438.
sinuata 438.
tenuifolia 438. 113. 3.
undulata 438. 4.

Andrzeiowska Cardamine
36.

Anemagrostis interrupta 803.

2.

spica venti 803. 1.

Anemone alba 3. 4 *

altaica 3.

angulosa 3. 5. 2.

apennina 3.

apennina 3. 12 *

baldensis 3.

blanda 3. 12 *

coccinea 3. 1.

coronaria 2.

coronarioides 3. 1.

cyanea 2. 1.

formosa 3. 12 *

fulgens 3. 2 *

Hepatica 3. 5. 1.

hortensis 3.

Jankæ 2. 5.

intermedia 3. 9 *

narcissiflora 3.

nemorosa 3.

ochotensis 3. 4 *

palmata 3.

pavonina 3. 2 *

pusilla 3. 1.

ranunculoides 3.

ranunculoidi-nemorosa 3.
9 *

rosea 3. 1.

silvestris 3.

sordida 3. 4 *

stellata 3. 2 *

sulphurea 2. 6 *. 3. 9 *

transsilvanica 4. 5. 2.

trifolia 3.

uralensis 7.

variata 3. 2 *

versicolor 3. 1.

Wahlenbergii 2. 3.

Anethum graveolens 288.

piperitum 292. 45. 2.

segetum 308. 90. 1.

Angelica alpina 283. 5 +

Archangelica 282. 19. 1. 1 *

chaerophyllea 293. 52. 1.

ebulifolia 283. 7.

heterocarpa 283.

levis 283.

litoralis 282. 19. 2.

macrophylla 583. 5 *

major 282.

montana 283. 5 *

nemorosa 283. 5 *

pachycarpa 283.

pachyptera 283. 5.

pratensis 283. 5. 21. 1.

pyrenæa 283. 22. 2.

Razulii 283.

Razulii 283. 5 *

Reuteri 283.

scabra 291. 41. 1.

silvestris 283.

silvestris 283. 5 *

villosa 283. 5 *

Anisum vulgare 306. 9.

Anoplangthus Biebersteinii
562.

coccineus 562.

Anosmia idæa 315. 109. 3.

Antennaria alpina 383.

alpina 383. 35. 2. 4.

carpathica 383.

dioica 383.

hyperborea 383. 35. 2.

Leontopodium 383.

margaritacea 383. 35. 4 obs.

nivalis 383. 35. 1.

Anthemum arborea 128. 4.

Anthemum abrotanifolia
362.

abrotanifolia 360. 14.

absinthifolia 360. 14 *

ætnensis 360.

ageratifolia 364. 4.

agrestis 361. 23.

aizoides 364. 5.

Aizoon 364. 5.

alpina 360. 12. 364. 3. 4.

altissima 359. 6. 8.

anglica 361. 23.

arvensis 361.

asperula 362.

aurea 359. 5 *. 375. 11.

auriculata 362.

austriaca 359.

austriaca-virens 359. 8.

Barrelieri 364. 1.

Baumgarteniana 360. 14.

biaristata 363. 12. 1.

Bollei 363. 43 x

Bourgei 363.

Brachmanni 359.

brachycentros 359.

byzantina 360. 14 *

caespitosa 364. 4.

canescens 359.

canescens 359. 3 *. 8.

carpathica 360.

Chamomilla 359. 8.

chia 362.

chronia 360. 14.

chrysanthia 359. 1.

chrysocephala 360. 14. 14 *

clavata 361.

coarctata 359. 1.

collina 360. 14.

concinna 361. 25.

corymbosa 365. 17.

Cossoniana 359. 3.

cossyrensis 362. 30.

Cota 359.

Cota 359. 8. 363. 11. 1. 12. 1.

Cotula 362.

cretica 362.

Cupaniana 360.

diffusa 361. 23 *

discoidea 359. 1.

drepanensis 361. 19 *

dubia 361. 23.

fruticulosa 360.

fuscata 363.

Gemellari 362.

Gerardiana 360. 14.

granatensis 361. 23.

grandiflora 360. 12.

graveolens 360. 12.

Guicciardii 362. 33.

Haynaldi 361. 23.

hemisphærica 359. 2.

heracleotica 362. 33.

hirpina 360. 13.

hispanica 363. 11. 1.

incrassata 361. 23 *. 363.

12. 1.

intermedia 361.

Kitaibelii 360. 12. 14.

Lindleyi 360. 14 *

lithuanica 363. 43. 374. 5.

litoralis 361. 19.

macedonica 362.

macrantha 359.

maritima 360.

maritima 359. 1 *. 361.

23. 26. 362. 30.

melampodina 362.

Micheliiana 360.

misella 361. 28.

monantha 359. 1.

montana 360.

montana 360. 12. 18.

mucronulata 360. 12. 364.

2.

multicaulis 361. 23.

muricata 362.

Neilreichii 361. 26.

niceensis 361. 23 *. 26 *

nobilis 359.

palastina 359.

pallescens 359. 1.

Parnassi 359. 1 *

parnassica 359. 1 *

parnesia 361.

pectinata 361.

pedunculata 363. 1 *

pentelica 360. 14.

peregrina 362.

- peregrina-hirsuta* 362. 34.
petraea 360. 12.
pontica 361. 26.
præcox 363. 45.
pseudoe-atrata 364. 4.
pseudo-cota 359. 8.
psorosperma 363. 43.
pubescens 363. 1.
purpurascens 363. 2.
pyrenaica 359. 3*
pyrethrifomis 360. 12.
ramosa 363. 43.
reflectens 361. 23.
Requienii 361. 26*
retusa 359. 8. 361. 26.
rhodensis 361.
rigescens 359. 2.
ruthenica 361.
saxatilis 360. 14. 18.
secundiramea 362.
segetalis 359. 8.
Sibthorpii 360.
sicula 361. 23*
Sismondæana 362.
sphacelata 361.
sphacelata 361. 28. 363.
 12. 1.
Spruneri 360. 14*
spuria 361. 23.
sterilis 360.
styriaca 360. 12.
sulphurea 363. 43 x
taygetea 361.
tenuifolia 364. 4.
tenuiloba 360. 14*
tinctoria 358.
tomentosa 362.
tomentosa 360. 14. 362.
 33. 363. 12. 1.
Triumfetti 359.
tubæformis 361. 24.
tuberculata 362.
Urvilleana 362. 34.
Urvillei 362. 40.
valentina 363. 12. 2.
Visianii 362. 37*
Anthericum beticum 719.
 bicolor 719. 5. 1.
 Liliago 719.
 planifolium 719. 5. 1.
 ramosum 719.
 trinervium 726. 14. 3.
Anthodendron ponticum 491.
 15. 1.
Anthoxanthum amarum 790.
 aristatum 790.
 aristatum 790. 2.
 Carrenianum 790. 5.
 gracile 790.
- Lloydii* 790. 5.
myrthense 790. 3.
odoratum 790.
ovatum 790.
Puelii 790.
Sommierianum 790. 5*
villosum 790. 2.
Anthriscus abortiva 301. 2.
 alpestris 301.
 alpinus 301. 1*
 Cerefolium 301.
 Cicutaria 301. 2.
 dubius 301. 2.
 elatio 301. 1.
 fumarioides 301.
 gracilis 301. 8.
 heterosantha 301. 2.
 humilis 301. 2.
 intermedia 301. 1.
 levigata 301. 1.
 longirostris 301. 6*
 macrocarpa 301. 3.
 neglectus 301. 7.
 nemorosa 301.
 procerus 301. 1.
 rivularis 301. 3.
 rupicola 301. 2.
 sicula 301.
 sicula 301. 5.
 silvestris 301.
 tenerrima 301.
 torquata 301. 2*
 trachysperma 301. 6.
 trichosperma 301. 6*
 vulgaris 301.
Anthyllis alpestris 164. 13.
 arundana 165. 16*
 Aspalathi 164. 3.
 aurea 164.
 bulearica 164.
 barba Jovis 164.
 calcicola 164. 13.
 cornicina 165.
 cytisoides 164.
 Dillenii 164. 13*
 erinacea 154. 7. 1.
 Genistæ 164.
 genistoides 164. 2.
 Gerardi 165.
 hamosa 165.
 Hermannia 164.
 hispida 165.
 Jacquiniana 164. 10.
 incisa 200. 46. 3.
 lotoides 165.
 maritima 164. 13*
 montana 164.
 onobrychioides 165.
 pallida 164. 13*
 podocephala 164.
 polycephala 164. 8.
 polyphylla 164. 13*
 Ramburei 164.
 rosea 164. 11.
 rubra 164. 13*
 rupestris 164.
 sanguinea 164. 13*
 sericea 164.
 splendens 164. 4.
 Spruneri 164. 13*
 tejedensis 164.
 tetraphylla 165.
 Vulneraria 164.
 vulnerarioides 164.
 Webbiana 165.
 Weldeniana 165. 16.
Antinoria agrostidea 806.
 insularis 806.
Antirrhinum alsinaefolium
 542. 74.
 ambiguum 537.
 angustifolium 536. 8. 4.
 Asarina 536.
 Barrelieri 536.
 calycinum 537. 13*
 Cymbalaria 543. 93.
 elatiniflorum 542. 80*
 elegans 537. 13*
 glaucophyllum 539. 38.
 glaucum 540. 41.
 glutinosum 537.
 glutinosum 539. 28.
 hispanicum 536.
 Huetii 537. 7*. 9*.
 intermedium 537. 7*
 latifolium 537.
 latifolium 536. 8. 2. 537. 7.
 Linkianum 537. 7.
 majus 536.
 maritimum 540. 40.
 meonanthum 537.
 molle 537.
 molle 537. 10.
 nicæense 537. 7.
 Orontium 537.
 rhodium 537. 6.
 romanum 536. 8. 5.
 rupestre 537. 11.
 ruscinonense 536. 8. 3.
 saxatile 541. 57. 58.
 sempervirens 537.
 siculum 536.
 spurium 542. 80.
 striatum 539. 26.
 strictum 538. 10.
 supinum 538. 17.
 tortuosum 536.
 Tournefortii 541. 58.

- triphyllum 538. 12.
 virgatum 538. 20.
 Autochytum alpinum 459. 49.
 Apargia alpina 469. 17.
 angustifolia 468. 11.
 arenaria 468. 12.
 aspera 467. 5. 468. 6.
 aurea 456. 18.
 autumnalis 469. 20.
 Berinii 468. 12.
 Brumati 468. 14.
 canescens 468. 12.
 cichoriacea 467. 1.
 crispa 468. 5*. 14.
 crocea 469. 17. 17*
 dubia 468. 14.
 ericetorum 468. 14.
 fasciculata 467. 1.
 guestphalica 468. 14.
 hispanica 467. 4. 468. 5.
 hispida 468. 14.
 hyoseridiflora 468. 14.
 hyoseroides 469. 23.
 incana 468. 11.
 lucida 468. 14. 469. 18.
 pinnatifida 468. 14.
 pratensis 469. 20.
 saxatilis 468. 8*
 serotina 468. 14.
 Taraxaci 468. 5*. 469.
 19. 20.
 tergestina 468. 8.
 tuberosa 469. 1.
 verna 470. 3.
 Villarsii 468. 13.
 Apera interrumpita 803.
 spica venti 803.
 Aphanes arvensis 239. 14. 6.
 Aphyllanthes monspeliensis 745.
 Apium graveolens 309.
 inundatum 310. 95. 3.
 latifolium 309. 92. 2.
 nodiflorum 309. 95. 1.
 Petroselinum 309. 92. 3.
 repens 309. 95. 2.
 segetum 309. 92. 1.
 Apocynum venetum 497.
 Aposeris foetida 474.
 Apteranthes Gussoneana 497.
 6. 1.
 Aquilegia alpina 18.
 alpina 18. 21. 1. 3. 4*
 Amaliæ 19. 5*
 arbasensis 18. 21. 1 obs.
 atrata 18. 21. 1*
 Bauhini 19.
 Bernardi 18.
 Bertolonii 19. 8*
 confusa 19. 8.
 corsica 18. 21. 2.
 Ebneri 18. 21. 1 obs.
 Einseleana 19. 8.
 glandulosa 18.
 Hænkeana 18. 21. 1.
 Kitaibelii 19.
 Magnolii 19. 6.
 montana 18. 4.
 nigricans 18. 21. 1 et *
 nivea 18. 21. 1.
 Ottonis 19.
 paraplesia 18. 21. 1.
 platysepala 18. 21. 1.
 pyrenaica 19.
 pyrenaica 19. 6. 8 et *
 Reuteri 19. 8.
 Reuteriana 18. 4.
 sibirica 18. 3.
 silvestris 18. 21. 1.
 speciosa 18. 21. 1 obs.
 Sternbergii 18. 4*
 thalictrifolia 19. 8*
 transsilvanica 18. 3.
 viscosa 19. 6.
 vulgaris 18.
 Arabis albida 34.
 alpina 34.
 alpina 34. 23.
 Allionii 33.
 alpestris 33.
 arcuata 33. 13.
 arenosa 34.
 auriculata 33.
 bellidifolia 34.
 Boryi 44. 31. 27.
 brachypoda 34. 20.
 brassicæformis 32.
 bryoides 35.
 canescens 34. 24.
 cebennensis 31.
 cenisia 33. 13.
 ciliaris 34. 28.
 ciliata 33.
 ciliata 33. 13.
 coerulea 34.
 collina 33.
 conferta 32. 7.
 constricta 33. 7*
 contracta 32. 7.
 Crantziana 35. 32.
 crepidipoda 32. 1*
 cretica 33. 13.
 crispata 34. 24.
 croatica 35. 31.
 curtisiliqua 32. 7.
 dacica 34. 29.
 dasycarpa 34. 19.
 declinata 34. 24.
 eriocarpa 32. 4.
 floribunda 35. 32*
 Gerardi 32.
 glareosa 34. 30.
 glastifolia 32. 6. 7*
 Halleri 34.
 hirsuta 32.
 hispida 35. 32.
 hybrida 33. 13.
 incana 32. 7.
 intermedia 34. 26.
 Kochii 32. 6.
 laxa 32.
 Lerchenfeldiana 34. 24*
 longisiliqua 33.
 lucida 34. 26.
 lusitanica 33.
 monticola 34. 24.
 murialis 33.
 muricola 33. 16 obs.
 neglecta 35.
 nemorensis 33. 7*
 nivalis 33. 14*
 obtusifolia 34. 24*
 ochroleuca 33.
 ovirensis 34. 29*. 35. 31.
 parvula 34.
 patula 34. 19.
 pedemontana 34. 22*
 pendula 32.
 petraea 35.
 petraea 35. 32.
 petrogena 35. 30.
 planisiliqua 32. 6.
 præcox 34. 25.
 procera 32. 6.
 procurrens 34.
 pseudoturritis 32.
 pumila 34.
 purpurascens 33. 10.
 recta 34. 19.
 Retziana 33. 7*
 rigida 34. 19.
 rosea 33. 16*
 rosella 33. 16 obs.
 rubricaulis 32. 6.
 sagitta 32. 7*
 sagittata 32. 6.
 saxatilis 33.
 saxeticola 34. 24.
 saxigea 33. 16 obs.
 scabra 33. 14. 34. 28.
 Scopoliana 35.
 segetalis 35. 30.
 serpyllifolia 33.
 sicula 34. 23.
 Soyeri 34. 26*
 stellulata 34. 28*
 stenocarpa 33. 18*

- stolonifera 34. 29.
stricta 33.
 stricta 33. 13.
 subcoriacea 34. 26.
 subnitens 33. 13.
 sudetica 33. 7*
 suecica 44. 30.
 tenella 34. 29.
 Tenorii 34. 23.
 Thaliana 45. 31.
 transsilvanica 35. 32.
Turrita 32.
 umbrosa 32. 4.
 undulata 34. 24.
 verna 34.
 vesula 33. 13.
 vochinensis 35.
Aracium alpinum 433. 106. 1.
 chondrilloides 456. 15.
 paludosum 456. 44.
Arbutus Andrachne 490.
 andrachnoides 490. 7. 1 ×
 hybrida 490. 7. 1.
 integrifolia 490. 7. 2.
 intermedia 490. 7. 1.
 Sieberi 490. 7. 2.
 turbinata 490. 7. 1.
Unedo 490.
Arceuthobium Oxycedri
 320.
Arceuthos drupacea 675.
Archangelica litoralis 282.
 norvegica 282. 19. 1*
 officinalis 282.
 sativa 282. 19. 2.
 slavica 282. 19. 2.
Arctagrostis latifolia 800.
 47. 1.
Arctium Bardana 402. 73. 1.
 carduelis 412. 84. 9.
 conglomeratum 402. 73. 4.
 intermedium 402. 73. 2* 3.
 lanuginosum 416. 89. 1.
 Lappa 402. 73. 2.
 majus 402.
 minus 402.
 nemorosum 402.
 Personata 412. 84. 11.
 pubens 402. 73. 3.
 tomentosum 402.
 tomentosum 402. 73. 2.
Arctophila fulva 830.
Læstadii 830.
 pendulina 830. 1.
Arctostaphylos alpina 490.
 officinalis 490. 8. 1.
 uva ursi 490.
Aremonia agrimonoides
 238.
- Arenaria abietina* 114. 6.
 aggregata 116.
 algarbiensis 115.
 amabilis 116. 41.
 apetala 114. 19.
 arctica 119. 26.
 aretioides 119. 31.
Armeriastrum 116.
 arvatica 117. 10.
 baldensis 113. 6.
 balearica 114.
 biflora 114.
 Bourgaeana 114. 6*
 caespitosa 121. 6.
 capillipes 115.
 capitata 116.
 cephalotes 113.
 cerastiifolia 115. 39.
 cerastoides 115. 27.
 cherleriioides 119. 29.
 ciliata 114.
 ciliata 114. 11. 115. 23.
 cinerea 114.
 clandestina 117. 6.
 conferta 115.
 conica 115. 34.
 conimbricensis 115.
 conimbricensis 115. 30.
 controversa 115.
 cretica 114.
 densa 114. 19.
 diandra 123. 7.
 emarginata 115.
 erinacea 116.
 fasciculata 118. 12* 14.
 filicaulis 114. 22.
 filiformis 117. 5.
 flavida 119. 29.
 frutescens 117. 8.
 glomerata 118. 13.
 gothica 115.
 Gouffeia 115. 30. 119. 11. 1.
 gracilis 114.
 graeca 114. 22.
 graminifolia 113.
 graminifolia 117. 6.
 grandiflora 114.
 grandiflora 117. 5.
 graveolens 114.
 griseensis 113. 8. 117. 4.
 Guicciardii 115.
 hirta 114. 11. 119. 26.
 hispida 114.
 hispida 115. 30.
 humifusa 114. 20*
 hybrida 117. 9*
 imbricata 116. 41.
 incrassata 114.
 intricata 113. 15. 114. 14.
- juniperina 114. 6. 119. 25.
 loricifolia 118. 17.
 leptoclados 115. 24*
 lesurina 114.
 ligeriina 114. 21.
 liniflora 119. 25.
 Lloydii 115. 24.
 longifolia 113. 2.
 macrocarpa 115. 24* 116.
 9. 2*
 macrorrhiza 122. 17. 2. 3.
 marginata 122. 17. 4.
 marina 122. 17. 5.
 Marschlinii 115. 24*
 massiliensis 119. 11. 1.
 media 122. 17. 4.
 mediterranea 117. 10.
 modesta 115.
 montana 114.
 mucronata 117. 10. 118. 15.
 multicaulis 114. 20.
 nana 115.
 nevadensis 115. 25*
 norvegica 114. 20*
 obtusiflora 115.
 orbicularis 114.
 oxypetala 115.
 patula 115. 24.
 pentandra 112. 6. 1*
 Preslii 113. 7. 1.
 procera 113. 7. 1.
 pubescens 114. 22.
 pungens 113.
 purpurascens 115.
 quadrivalvis 119. 26.
 querioides 116. 42.
 racemosa 116.
 radicans 123. 17. 6.
 retusa 115.
 rhodia 115. 38.
 rigida 113.
 Rosani 117. 6.
 rotundifolia 114.
 rubra 122. 17. 5. 6.
 Salzmanni 114.
 saxatilis 113.
 saxatilis 118. 15.
 saxifraga 114.
 saxifraga 117. 6*
 scandinavica 118. 20.
 serpyllifolia 115.
 serpyllifolia 115. 24*
 setacea 117. 8.
 sordida 115. 34.
 sphærocarpa 114. 24.
 stathulata 115.
 stolonifera 114. 6.
 stricta 118. 23.
 stygia 114. 11.

- subulifolia* 117. 10.
tenuis 115.
tetraquetra 116.
tetraquetra 116. 40. 41. 42.
tetraquetra aggregata 116. 40.
thesiifolia 113. 7.
thymifolia 117. 11.
tomentosa 116.
triflora 114. 6.
turfacea 118. 18.
uliginosa 118. 18.
valentina 114.
verna 119. 25.
viscida 115. 24.
Aretia alpina 607.
alpina 607. 3.
argentea 607.
brevis 607.
brutia 607. 5*
Charpentieri 607. 4.
ciliata 607.
cylindrica 607.
glacialis 607. 5.
Hausmanni 607.
Heerii 607.
helvetica 607.
hirtella 607. 3*
pennina 607. 5.
pubescens 607.
pyrenaica 607.
Wulfeniana 607.
Argyrobium argenteum 155. 8. 1.
calycinum 155.
Linneanum 155.
Aria ambigua 242. 9*
Chamaespilus 242. 9.
latifolia 242. 6.
scandica 241. 3. 4.
Arisarum Clusii 756. 7. 1.
proboscideum 756.
Sibthorpii 756. 7. 1.
Veslingii 756. 7. 1.
vulgare 756.
Aristella bromoides 805.
Aristida Adscensionis 804. 57. 1.
coerulescens 804.
clatior 804. 57. 1*
Aristolochia altissima 645.
attica 645. 8.
batica 645.
Clematitis 645.
cretica 645.
fasciculata 646. 12.
hirta 645.
longa 645.
macroGLOSSa 645. 6 et *
microstoma 646.
pallida 645.
parvifolia 646. 13.
Pistolochia 646.
rotunda 645.
sempervirens 645.
sempervirens 645. 2. 2.
sicula 645.
subglauca 645. 2. 1.
Tournefortii 645.
Armeniaca vulgaris 214. 16 obs.
Armeria alliacea 615. 22. 616. 32 et *
allioides 615.
allioides 615. 31.
alpina 616.
alpina 615. 20. 26.
arctica 616. 34*
arcuata 614.
argyrocephala 615.
batica 614.
Boissieriana 614.
Boürgæi 615. 28*
bupleuroides 616. 32 et *
caespitosa 616.
campestris 616. 34.
canescens 615.
cantabrica 616.
cephalotus 614. 4. 615. 29.
cinerea 614.
denticulata 615.
denticulata 615. 24.
Duriæi 615.
Duriæi 615. 28*
duriuscula 616. 35.
elongata 616. 34.
expansa 616. 35*
fasciculata 614.
filicaulis 616.
gaditana 614.
glauca 614. 7.
gracilis 615. 26.
Gussonei 614.
Halleri 616. 37*
heterophylla 615. 26.
hirta 614. 7.
humilis 616. 40.
juncea 616.
juncea 615. 30.
juniperifolia 615. 19. 28. 616. 40.
Kochii 615. 19.
Langei 616.
latifolia 615.
latifolia 614. 16.
leucocephala 614.
litoralis 614.
litoralis 614. 9.
longearistata 615.
longearistata 616. 32.
macrophylla 614.
macropoda 614.
majellensis 615.
maritima 616.
maritima 616. 35.
montana 615. 32.
Morisii 614.
Muelleri 616. 37.
multiceps 615.
nebrodensis 615.
Orphanidis 615. 25*
pinifolia 614.
pinifolia 614. 3.
planifolia 616. 35.
plantaginea 615.
plantaginea 614. 7. 615. 25. 29.
præcox 616. 32.
pubescens 616.
pubescens 616. 35*
pubigera 616.
pubigera 616. 41.
pubinervis 614.
pungens 614.
purpurea 616. 34*
rumelica 615.
ruscinonensis 616.
sabulosa 616. 32.
sardoa 615.
scorzoneraefolia 614. 14. 615. 20. 29. 616. 32.
setacea 616. 44.
seticeps 616. 32.
sibirica 616. 41*
sicula 615. 26.
Soleirolii 614. 18.
splendens 616.
tennis 616. 43.
thessala 615.
Thomasii 615. 18*
undulata 615. 22.
velutina 614.
vestita 615. 31*
villosa 614.
vulgaris 616.
vulgaris 615. 24. 27.
Welwitschii 614.
Armoracia rusticana 51. 45. 1.
Arnica alpina 349.
angustifolia 349. 2. 1. 2.
Clusii 349. 3. 2.
cordata 350. 10.
corsica 349. 4.
Doronicum 349. 3. 2.
floccosa 355. 22.
lanigera 355. 22.
montana 349.

- scorpioides 349. 3. 1 *
 styriaca 349. 3. 2.
 Arnoseris minima 474. 146. 1.
 pusilla 474.
 Aronia Amelanchier 242. 4. 1.
 Aria-Chamænespilus 242.
 9 *
 Chamænespilus 242. 9.
 cretica 242. 4. 1 *
 rotundifolia 242.
 Aronicum carpathicum 349.
 3. 1 *
 Clusii 349. 3. 2.
 corsicum 349. 3. 4.
 Doronicum 349. 3. 2.
 glaciale 349. 3. 3.
 latifolium 349. 3. 1.
 scorpioides 349. 3. 1.
 Arrhenatherum avenaceum
 809.
 bulbosum 809. 1.
 elatius 809. 1.
 erianthum 809.
 pallens 809.
 Thorei 809.
 Artedia muricata 280. 21.
 squamata 278.
 Artemisia Abrotanum 378.
 Absinthium 376.
 absinthoides 376. 2.
 achilleæfolia 376. 3 *
 alba 376. 3.
 Allionii 377. 19.
 alpestris 377. 19.
 alpina 376. 6. 377. 16.
 ambigua 376. 3. 378. 26.
 annua 378.
 arborescens 376.
 arenaria 377.
 argentea 376. 1.
 armeniaca 378.
 arragonensis 379. 45.
 Assoana 376. 5.
 atrata 378.
 austriaca 378.
 austriaco-pontica 378. 29 x
 Barrelieri 379.
 basilica 379. 39.
 Baumgarteni 379.
 Biasolettiiana 376. 3.
 Bocconi 377. 19. 379. 41.
 borealis 377.
 Boschniakiana 379. 46.
 campestris 377.
 campestris 377. 11.
 camphorata 376.
 canescens 378. 33.
 caucasica 376.
 chamæmelifolia 378.
 coarctata 378. 32.
 coerulescens 379.
 collina 377. 16.
 Columnæ 376. 3 *
 corymbosa 376. 3.
 crithmifolia 377.
 crithmifolia 377. 16.
 densiflora 379. 47.
 Dracunculus 377.
 elegans 376. 8.
 eriantha 379. 40 *
 filaginoidea 380. 49.
 fragrans 379.
 gallica 379.
 garganica 376. 3.
 Gayana 377.
 Genipi 379. 41.
 glacialis 376.
 glacialis 376. 9.
 glauca 377.
 globularia 379.
 glutinosa 377.
 granatensis 379.
 helvetica 377. 19.
 Herba alba 379.
 hispanica 378.
 hololeuca 378.
 humilis 376. 3.
 incanescens 376. 3.
 inculata 379. 47.
 inodora 377. 16 *. 21.
 insipida 378.
 insipida 377. 16 *
 Jussiciana 377.
 laciniata 378.
 lanata 376.
 lanata 376. 7.
 lednicensis 377. 16.
 Lercheana 379. 46 *
 Lobelii 376. 3. 378. 26.
 maritima 379.
 maritima 380. 48 *
 Marschalliana 377. 16 *
 monogyna 379. 46 *
 monspeliensis 377. 11.
 Mutellina 376.
 nana 377.
 naronitana 378. 24.
 neapolitana 377. 10.
 nitida 376.
 nivea 378. 29.
 norvegica 379.
 nutans 379. 48.
 occitanica 377. 16.
 oligantha 376. 9.
 ontina 379. 45.
 palmata 379. 43.
 paniculata 378.
 paniculata 377. 10.
 pauciflora 377. 14. 379. 47 *
 pedemontana 376. 5 *. 7.
 pendula 379. 46 *
 petrosa 379. 40.
 pontica 378.
 potentillæfolia 378. 33 *
 procera 376. 10. 378. 24.
 racemosa 379. 41.
 Radewski 377. 2.
 repens 378. 29.
 rupestris 376.
 rupestris 376. 5. 379. 38.
 39. 40. 41.
 sabulosa 378. 24.
 saligna 377. 10.
 salina 379. 46 *. 380. 48 *
 salsoloides 377.
 saxatilis 376. 3.
 scoparia 377.
 sericophylla 377. 20.
 Seriphium 380. 48 *
 sipontina 379. 43 *
 spicata 379.
 spicata 379. 40.
 suavis 378.
 subcanescens 376. 3.
 tanacetifolia 378. 34.
 taurica 379. 46 *
 Tilesii 378. 32 *
 Tscherniewiana 377.
 ucranica 378. 31.
 valentina 379. 45.
 vallesiaca 380.
 variabilis 376.
 Verlotorum 378. 32.
 Villarsii 379. 40.
 vulgaris 378.
 Wulfeni 376. 9.
 Arthrocnemum fruticosum
 629. 17. 1.
 macrostachyum 628.
 Arthrobium durum 186.
 ebracteatum 186.
 glabrum 186. 4.
 litorale 186. 4.
 microphyllum 186. 4.
 repandum 185.
 scorpioides 185.
 Arum albispathum 755. 3 *
 alpinum 755.
 balearicum 755. 8.
 Besserianum 755. 6 *
 byzantinum 755. 5 *
 carratracense 755. 6. 4.
 Colocasias 754. 3. 1.
 coneinnatum 755. 5.
 corsicum 755. 8.
 creticum 755.
 crinitum 754. 4. 2.

- cylindraceum* 755. 5.
Dioscoridis 754. 5. 1.
Dracunculus 754. 4. 1.
elongatum 754. 5. 3.
gracile 755. 7.
gramineum 755. 6. 1.
Heldreichii 755. 6.
immaculatum 755. 6.
intermedium 755. 6 *
italicum 755.
Lieboldii 754. 5. 1.
longispathum 755. 3.
maculatum 755.
Malyi 755. 6 *
marmoratum 755. 5.
muscorum 754. 4. 2.
nigrum 754.
Nordmanni 755. 3.
orientale 754.
orientale 754. 5. 2.
Petteri 754. 5. 2 *
pictum 755.
pictum 754. 5. 2.
proboscideum 756. 8. 1.
pyrenæum 755. 7 *
spectabile 754.
tenuifolium 755. 6. 2. 3.
variolatum 754. 5. 2.
vulgare 755. 6.
Zeilebori 755. 6.
Arundo altissima 798. 43. 1.
ampelodesmos 798. 44. 1.
Clarionis 800. 16.
collina 797. 42. 2.
Donax 797.
Halleriana 800. 16.
isiaca 798. 43. 1.
mauritanica 797. 42. 2 *.
 798. 44. 1.
maxima 798. 43. 1.
Pliniana 797.
Plinii 797. 42. 2.
pseudophragmites 799. 12.
speciosa 804. 59. 1.
subulata 799. 2.
Asarina procumbens 536. 8. 1.
Asarum europæum 645.
Asclepias fruticosa 497. 5. 1.
 Cornuti (syriaca) 497. 6. 1
 obs.
Asparagopsis alba 716. 4.
Asparagus acutifolius 716.
 albus 716.
 amarus 716. 5.
 ambiguus 716. 3.
 aphyllus 716.
 brevifolius 716. 3.
 collinus 716. 6. 7.
 commutatus 716. 3.
 Corruda 716. 3.
 horridus 716. 1.
 inarimensis 716. 3.
 litoralis 716. 5.
 marinus 716. 5.
 officinalis 716.
 phyllacanthus 716. 2.
 polyphyllus 716. 6 *
 prostratus 716. 6.
 scaber 716.
 silvaticus 716. 7.
 stipularis 716.
 tenuifolius 716.
 trichophyllus 716.
 verticillatus 716.
Aspera nutans 331. 87.
Asperugo procumbens 523.
Asperula Allionii 333. 10 *
 alpina 333. 15.
 Aparine 332.
 arcadiensis 334.
 arenicola 333. 15.
 aristata 334.
 aristata 334. 33 *. 34 *
 arundana 334. 29.
 arvensis 335.
 asperrima 334.
 athoa 334. 27.
 Boissieriana 334. 30.
 canescens 334. 34 *
 capitata 333. 10 *
 chlorantha 332.
 ciliata 333.
 commutata 334. 33.
 crassifolia 334. 25.
 cretacea 333.
 cynanchica 333.
 debilis 332. 4.
 denudata 334. 23.
 digyna 334. 34 *
 effusa 334.
 eriocarpa 334. 31.
 fiacida 334. 33 *
 foetida 332. 3.
 galioides 332.
 galioides 326. 27.
 glaberrima 333. 8.
 glabra 333. 8.
 glauca 332. 3.
 graveolens 333.
 Gussonii 334.
 hexaphylla 333.
 hexaphylla 333. 10 *
 hirsuta 334.
 hirta 333.
 humifusa 332.
 incana 333.
 incana 333. 21.
 involucrata 333.
 Jordani 334. 33.
 laevigata 333.
 litoralis 333.
 longiflora 334.
 longiflora 333. 15.
 longifolia 326. 23.
 lutea 334.
 macroclada 333. 15 *
 macrorhiza 334. 34.
 maritima 334. 25.
 mollis 334. 28.
 molluginoides 335.
 montana 333. 15.
 multiflora 333. 15 *
 Mungierii 334. 35.
 muscosa 335.
 neglecta 333.
 neglecta 333. 18.
 nitens 333. 17.
 nitida 334. 26.
 odorata 332.
 palustris 333. 12.
 paniculata 334. 30.
 papillosa 334.
 papillosa 325. 22 *
 pendula 334.
 pulvinaris 334. 35.
 pumila 333.
 pyrenaica 333. 15 *
 rigida 335.
 rotundifolia 333. 9.
 rumelica 333. 14.
 rupestris 332. 1. 334. 23 *
 rupicola 333. 15.
 scabra 333. 18. 334. 34 *
 scutellaris 332.
 setulosa 333. 20.
 Staliana 333.
 stricta var. *tomentosa* 334.
 35.
 strictissima 332. 3 *
 suberosa 334.
 suberosa 334. 26. 35.
 suffruticosa 334.
 taurina 332.
 †aygetea 333.
 tenuiflora 333. 15.
 thessala 334. 33.
 tinctoria 333.
 tomentosa 334.
 Tournefortii 335.
 tyraica 332. 3 *
Asphodeline cretica 720. 7. 3.
 liburnica 720.
 lutea 720.
 taurica 720.
Asphodelus aestivus 719. 6. 2.
 720. 7. 3.
 albus 719.

- approximatus 720. 6.
 Arrondeani 719. 6. 3.
 cerasiferus 719. 6. 1.
 collinus 719. 6. 1*
 corsicus 719. 6. 1.
 creticus 720. 7. 3.
 crinipes 719. 6. 3.
 delphinensis 720. 3*
 fistulosus 720.
 liburnicus 720. 7. 3.
 litoralis 719. 6. 3.
 luteus 720. 7. 1.
 macrocarpus 720.
 microcarpus 719.
 Morisianus 720.
 neglectus 719. 6. 3.
 occidentalis 719. 6. 3.
 pyrenaeicus 720. 3*
 ramosus 719.
 ramosus 719. 6. 2. 3.
 sphaerocarpus 719. 6. 3.
 subalpinus 720. 3*
 tauricus 720. 7. 2.
 tenuifolius 720.
 validus 719. 6. 1.
 Villarsii 719. 6. 1*
 Aspidium abbreviatum 865. 5.
 aculeatum 865.
 aculeatum 865. 12. 3.
 æmulum 866.
 affine 865. 5.
 alpestre 864. 11. 2. 866. 9.
 alpinum 867. 13. 3.
 angulare 865.
 angulare 865. 2.
 Borrei 865. 5.
 Braunii 865. 12. 1.
 crenatum 865. 11. 3.
 cristatum 865.
 cuneatum 863. 8.
 dentatum 867. 13. 4.
 dilatatum 866. 7*
 distans 866. 10.
 dumetorum 866. 7*
 Filix femina 864. 11. 1.
 Filix mas 865.
 foenisecii 866. 8.
 fontanum 863. 6.
 fragile 867. 13. 4.
 Halleri 863. 6.
 hastulatum 865. 2.
 intermedium 865. 3.
 lobatum 865.
 Lonchitis 865.
 Mildeanum 865. 5.
 montanum 867. 13. 1.
 munitum 865. 3.
 nevadense 866. 9.
 Oreopteris 866.
 pallidum 866.
 pilosum 865. 12.. 1.
 Plukenetii 865. 12. 3.
 Pontederæ 867. 13. 4.
 recurvum 866. 8.
 regium 867. 13. 3.
 remotum 865. 5*
 rhæticum 864. 11. 2.
 rigidum 866.
 spinulosum 866.
 spinuloso-cristatum 866. 6*
 sudeticum 867. 13. 2.
 taygetense 867. 13. 3.
 tenuifolium 864. 10. 8.
 Thelypteris 866.
 uliginosum 866. 6*
 viscosum 866. 10.
 Asplenium acutum 863. 7*
 Adiantum nigrum 863.
 adulterinum 863. 3 obs.
 alpestre 864. 11. 2.
 alternifolium 864. 10. 11.
 angustifolium 864. 10. 8.
 Billotii 863. 5.
 bifurcatum 864. 10. 12.
 brachyphyllum 864. 10. 9.
 Breynii 864. 10. 11.
 crenatum 865. 11. 3.
 enneatum 863. 5.
 davallioides 863. 7*
 dolosum 863. 3 obs.
 Filix femina 864. 11. 1.
 fissum 863.
 fissum 864. 10. 9.
 fontanum 863.
 fontanum 863. 6.
 germanicum 864.
 glandulosum 863. 4.
 Halleri 863. 6.
 Harovii 862. 10. 2.
 Heuffelii 863. 7.
 Heuffleri 864. 10. 11 x
 incisum 863. 7*
 lanceolatum 863.
 lepidum 864.
 marinum 862.
 Matthioli 864. 10. 10.
 microphyllum 862. 10. 2*
 multicaule 864. 10. 10.
 obovatum 863. 5 obs.
 obtusum 863. 7.
 Onopteris 863. 7*
 palmatum 864.
 Petrarchæ 863.
 pilosum 863. 4.
 Ruta muraria 864.
 Seelosii 864.
 septentrionale 864.
 Serpentina 863. 7*
 serpentinum 863. 7*
 silesiacum 863. 7*
 tenuifolium 864. 10. 8.
 trapeziforme 862. 10. 1.
 Trettenerianum 864. 10. 8.
 Trichomanes 862.
 trichomane-germanicum
 864. 10. 11 x
 tridactylites 864. 10. 13.
 umbrosum 863. 3.
 vallis clausæ 863. 4.
 Virgilii 863. 7*
 viride 862.
 vogesiaceum 863. 3.
 zoliense 864. 10.
 Asprella nardiformis 846. 115.
 1.
 Aster acris 386. 43. 1.
 alpinus 387.
 alpidoides 387. 4. 4*
 Amellus 387.
 arragonensis 386. 43. 5. 44.
 3.
 auriculatus 387. 8 obs.
 bessarabicus 387. 4.
 brumalis 387. 8 obs.
 canus 386. 43. 6.
 catalaunicus 387.
 cyllenens 387. 2.
 depressus 387. 9.
 discoides 387. 3.
 dracunculoides 386. 43. 2.
 3. 387. 8 obs.
 elegans 387. 4.
 frutetorum 387. 8 obs.
 fugax 386. 43. 5*
 Garibaldi 387. 2.
 heterophyllus 387. 8 obs.
 hirsutus 387. 2.
 hungaricus 387. 8.
 hyssopifolius 386. 43. 1.
 lanceolatus 387. 8 obs.
 leiophyllus 387. 8.
 leucanthemus 387. 8 obs.
 Linosyris 386. 42. 1.
 longicaulis 387. 9*
 lusitanicus 386. 5*
 miser 387. 8 obs.
 Noëanus 387. 4.
 Novæ Angliæ 387. 8 obs.
 Novi Belgii 387. 8 obs.
 pannonicus 387. 9.
 parviflorus 387. 8 obs.
 pseudo-amellus 387. 4*
 punctatus 386. 43. 2.
 pyrenæus 386.
 pyrenæicus 388. 46. 2.
 Richardsonii 387.
 salicifolius 387. 8.

- salignus* 387.
scepusiensis 387. 4.
sedifolius 386. 43. 1.
serotinus 387. 8 obs.
serratifolius 387. 8.
sibiricus 387.
tinctorius 387. 4.
trinervis 386. 43. 4.
Tripolium 387.
Willkommii 387.
Asteriscus aquaticus 391.
brachiatus 391. 53. 1.
litoralis 391. 53. 1.
maritimus 391.
nanus 391. 53. 2.
sessilis 391. 53. 1.
spinosus 391. 54. 1.
Asterocephalus agrestis 344.
 27.
brachiatus 341. 3. 1. 1 *
dentatus 342. 12.
Hladnikianus 344. 31 *
intermedius 341. 2. 6.
pilosus 342. 6.
vestinus 344. 33.
Asterolinum stellatum 600.
Asterothrix hispanica 467.
 130. 4.
Astragalus aduncus 189. 17.
ægicerus 194.
Agranioti 190.
albicaulis 189.
albidus 189. 1.
algarbiensis 195.
alopecuroides 191.
alpinus 193.
alpinus 193. 90.
ambiguus 197. 39. 8.
ampullifer 192. 57.
angustifolius 191.
apollineus 191.
arcticus 193.
arctatus 190.
arenarius b. multijugus 189.
 15.
arenarius 189.
arenarius 194. 95.
argentens 191. 45.
aristatus 192.
aristatus 191. 48. 192. 65.
Arnacantha 192.
asper 189.
asperulus 196. 120 *
atticus 190. 31 *
australis 193.
austriacus 189.
austriacus 189. 9.
bæticus 194.
banaticus 189. 15 *
Barrelieri 190. 36.
bayonensis 189.
Boissieri 192.
Boissieri 192. 70.
Bonanni 194. 93.
Bourgæanus 195.
Bungeanus 189.
byzantinus 192. 69 obs.
calabricus 192.
caprinus 193. 80.
castellanus 195.
caudatus 197. 39. 9.
cephalonicus 192.
Chaubardi 190. 31.
chius 192. 63.
chlorocarpus 189.
chlorocyaneus 190.
christianus 193. 75.
Cicer 194.
Clusii 192.
contortuplicatus 195.
corniculatus 191.
creticus 192.
creticus 192. 69 obs.
Criacantha 192. 68.
cruciatus 195. 109.
cylleneus 192.
cymbæcarpus 195.
dacicus 189.
dalmaticus 190. 32.
danicus 194.
dasyanthus 193.
dealbatus 189. 4.
depressus 194.
depressus 194. 93.
dichopterus 189. 7.
diffusus 190. 25.
dolicophyllus 190.
drupaceus 193.
echinoides 191. 48.
Echinus 192. 69.
epiglottis 195.
epiglottoides 196. 120 *
eriocephalus 193. 86.
exscapus 193.
exscapus 193. 82.
fabaceus 193. 80.
falcatus 189.
Friwaldskyanus 192. 57.
fruticosus 191. 41. 192. 61.
galegiformis 192.
genargenteus 191. 51.
glaucus 189. 1.
Glaux 195.
glycyphylloides 193.
glycyphyllus 193.
græcus 193.
granatensis 195.
Haarbachi 194.
hamatus 195. 108.
hamosus 194.
hellenicus 193.
Helmii 190.
helminthocarpus 194. 92.
Hinkei 191. 45.
hispanicus 189.
Hueti 193.
Hypoglottis 194. 95. 195.
 110. 111. 196. 120 *
idæus 190.
incanus 190.
incanus 190. 31. 37.
incurvus 190.
incurvus 190. 31.
lacteus 190.
leiocarpus 193. 81.
leontinus 189.
leontinus delphinensis 189.
 18 obs.
leucophæus 194.
linearifolius 189. 15.
longiflorus 193.
longipes 191. 46.
lusitanicus 196. 38. 1.
macropus 191.
macrorhizus 190.
majellensis 193. 87 *
maritimus 194.
massiliensis 191.
medius 189.
mesopterus 189.
microphyllus 189. 14. 194.
 94.
mixtus 189. 1.
monspessulanus 190.
monspessulanus 190. 31. 32.
montanus 190. 33 obs. 197.
 11 *
Mülleri 191.
Mülleri 189. 14.
narbonensis 191.
nevadensis 192.
nummularioides 190.
nummularius 193.
numularius 190. 34.
odessanus 191. 41.
Onobrychis 189.
oroboides 193.
oxyglottis 195.
pallescens 191.
Pancivii 189.
panonicus 193. 86.
Parnassi 192.
Parnassi 192. 58. 59.
Pastellianus 189. 1.
penduliflorus 196. 38. 3.
pentaglottis 195.
permiensis 190. 24.

- physocalyx* 191.
physodes 190.
polyactinus 195.
poncticus 191.
Poterium 191.
Poterium 192. 63.
præcox 190. 29.
prusianus 192. 69 obs.
pseudostella 195.
pseudotragacantha 192. 62.
psiloglottis 195. 107.
pubiflorus 193.
pugioniferus 191.
purpureus 195.
Pyramidula 196. 120 *
redunculus 190.
reticulatus 195.
Rochelianus 189. 15. 15 *
rotundifolius 193. 73.
rumelicus 192. 71.
rupifragus 190.
Salvatoris 191. 48.
scopæformis 189. 8.
scorpioides 195.
sempervirens 192. 58.
serbicus 193. 74.
sericophyllus 191.
sesameus 195.
siculus 192.
siculus 192. 59. 64. 69.
sirinicus 191.
Soyeri 190.
sordidus 196. 39. 6.
Sprunneri 190.
Stella 195.
striatellus 194.
subbiflorus 195. 114.
subulatus 191.
subulatus 191. 42. 45.
sulcatus 194.
syriacus 191. 41.
tanaiticus 193.
tauricus 189.
tenuifolius 189.
tenuifolius 189. 8. 15.
testiculatus 190.
thessalus 190. 37.
thracicus 192.
Tragacantha 191. 48.
trimestris 195. 103 obs.
trojanus 192.
tumidus 192. 61.
tymphesteus 191.
tyrolensis 196. 39. 1.
uliginosus 193. 74.
uncinatus 194.
uralensis 196. 39. 2. 6. 197.
8.
utriger 193.
- utriger* 192. 57. 193. 79.
varius 191. 39.
vegliensis 191. 45.
veluchensis 192.
velutinus 196. 39. 2.
verrucosus 194.
vesicarius 188.
vimineus 191.
virgatus 191.
virgatus 191. 45.
vulpinus 191.
wolgensis 193.
Wulfenii 190.
Wulfenii 190. 31 *
Astrantia alpina 318. 113. 3.
bavaria 318. 113. 3.
carinthiaca 318. 113. 1.
carniolica 318.
carniolica 318. 113. 3.
dondiaefolia 318. 113. 3.
elati 318. 113. 1.
gracilis 318.
intermedia 318. 113. 1.
major 318.
minor 318.
minor 318. 113. 2.
nigra 318. 113. 3.
pallida 318. 113. 1.
pauciflora 318.
saniculæfolia 318. 113. 1 *
transilvanica 318. 113. 2 *
Astrocarpus Clusii 70.
cochlearifolius 70.
interruptus 70. 2. 4.
minor 70.
purpurascens 70. 2. 2.
sesamoides 70.
suffruticosus 70.
Athamanta arctica 295. 59. 4.
aurea 294.
chilosciadia 294.
coarctata 296. 60. 11.
cretensis 294.
densa 294.
flavescens 294. 56. 1.
Haynaldi 294. 58. 3 *
hungarica 294. 58. 3.
Libanotis 295. 59. 2.
macedonica 294.
Matthioli 294.
Matthioli 294. 58. 4.
multiflora 307. 85. 1.
mutellinoides 294. 58. 4.
panacifolia 294. 55. 2.
ramosissima 294. 56. 1.
Reichenbachii 295. 59. 2 *
rupestris 294. 58. 3. 4.
sibirica 295. 59. 1.
sicula 294. 57. 1.
- Turbith* 296. 60. 16.
verticillata 294. 56. 1. 307.
85. 4.
Athyrium alpestre 864.
corsicum 864. 11. 1.
crenatum 865.
cuneatum 864. 10. 8.
Filix femina 864.
flexile 864. 11. 2.
fontanum 863. 6.
Halleri 863. 6.
lanceolatum 863. 5.
molle 864. 11. 1.
obovatum 863. 5 obs.
ovatum 864. 11. 1.
polypodioides 864. 11. 2.
rhæticum 864. 11. 1.
tridum 864. 11. 1.
Atractylis cancellata 401.
humilis 401.
Atragene alpina 1.
Atraphaxis Billardieri 632.
lanceolata 632.
spinosa 632.
Atriplex acuminata 627. 1.
agrestis 627. 6.
alba 628. 15.
albicans 628. 15.
angustifolia 627. 6.
arenaria 628.
arenaria 628. 14 *
Babingtonii 627.
Bocconi 628. 13 *
calotheca 627.
campestris 627. 7.
cana 627.
crassifolia 627. 12. 628. 14.
deltoides 627. 9 *
diffusa 628. 13.
elongata 627. 9.
erecta 627. 6.
farinosa 628. 14.
foliosa 628. 15 *
græca 626. 10. 2. 627. 9.
628. 13.
Græci 628. 15 *
Halimus 627.
hastata 627.
hastata 627. 8.
hortensis 627. 1 obs.
laciniata 628.
laciniata 627. 8. 628. 14.
latifolia 627. 9.
litoralis 627.
longipes 627. 8 *
macrodira 627. 6.
marina 627. 5.
microsperma 627. 7. 9.
microtheca 627. 1 obs.

- mollis* 627.
nemorensis 627. 6.
nitens 626.
oblongifolia 627. 7.
obtusata 627.
oppositifolia 627. 9.
patula 627.
patula 627. 9.
platysepala 627. 9.
polysperma 628. 15.
prostrata 627.
prostrata 627. 9.
recurva 628. 13.
rosea 628.
rosea 627. 12. 628. 14.
rosulata 628. 15.
ruderalis 627. 9.
Sackii 627. 9.
salina 627. 6.
serrata 627. 5.
stipitata 627. 8*
tatarica 627.
Tornabeni 628. 14*
triangularis 627. 9.
veneta 628. 13.
Atropa *batica* 525.
Belladonna 524.
Mandragora 525. 6. 1.
physalodes 525. 8 obs.
Atropis *angustata* 831. 12.
convoluta 831. 8.
distans 830. 6.
intermedia 831. 10.
maritima 831. 10.
Aubrietia *Columna* 50.
croatica 50. 43. 2*
deltoidea 50.
erubescens 50.
gracilis 50.
græca 50. 43. 1.
integrifolia 50. 43. 1.
intermedia 50. 43. 4.
italica 50. 43. 1*
Audibertia *parviflora* 597. 13.
Aurinia *corymbosa* 55. 53. 3.
orientalis 55. 53. 5.
Avellinia *Michellii* 815.
scabriuscula 815.
tenuicola 815.
Avena *agraria* 810. 6.
agropyroides 811.
agrostidea 813. 36. 42.
airoides 813.
airoides 813. 49.
albinervis 810.
alpestris 812.
alpina 811. 15*
ambigua 810. 4.
argentea 812.
atherantha 810. 5.
australis 811. 13*
barbata 810.
baregensis 813. 36*
Besseri 812.
Blavii 811. 14*
brevifolia 812. 34.
brevis 810.
bromoides 811.
bromoides 811. 15.
bulbosa 809. 73. 1.
Burnouffii 812.
byzantina 810. 4*
calycina 817. 79. 1.
Candollei 812. 27*
cantabrica 812. 21.
capillaris 814.
carpatica 812.
caryophyllea 814.
caryophyllea 811. 13.
Cavanillesii 814. 51.
clauda 810.
compacta 812. 23.
compressa 811.
condensata 813.
convoluta 812. 21*
corymbosa 814.
Cupaniana 814.
distichophylla 812.
distichophylla 812. 35.
Dufourei 813.
elatior 809. 73. 1.
eriantha 809. 73. 2.
fallax 811. 18*. 20. 812.
21*
fatua 810.
filifolia 812.
flavescens 812.
gallectica 813.
glacialis 813.
glauca 811. 17.
gracilis 813.
Heldreichii 812.
hirsuta 810. 5.
hirtula 810. 5.
hispanica 809. 73. 2.
hispida 812.
Hostii 811. 19.
hybrida 810. 4 et*
intermedia 810. 4*. 814.
53.
laconica 812.
lævigata 811. 11.
latifolia 810. 8.
lendigera 807. 66. 2.
levis 811. 10*
lodunensis 810. 9.
Loeflingiana 813.
Loeflingiana 814. 51.
longifolia 809. 73. 3. 811.
15.
longiglumis 810.
lucida 811. 11.
Ludoviciana 810. 1*
mediolanensis 813. 42.
Michellii 815. 77. 1.
montana 811.
montana 809. 73. 3.
multiculmis 814. 54*
myriantha 813.
neglecta 813. 43.
Neumayeriana 812. 23.
Noëana 813. 46.
Notarisii 811. 18*
nuda 810. 6 obs.
orientalis 810. 6 obs.
ovata 813.
pallens 809. 73. 4.
panicea 813.
Parlatorii 811.
parviflora 813.
pilosa 810. 5.
planiculmis 810.
planiculmis 811. 15.
Pourretii 813.
præcox 814.
præusta 811. 15*
pratensis 811.
pratensis 810. 9. 811. 13.
et*
precatoria 809. 73. 1.
provincialis 814. 52*
puberula 815. 77. 1.
pubescens 811.
pubescens 811. 12.
pumila 813.
pumila 813. 46.
purpurascens 812. 27*. 30.
rigida 812.
Rotæ 812. 35.
Ruprechtii 812.
sativa 810. 6 obs.
scabriuscula 815. 77. 3.
Scheuchzeri 811. 17.
sedensis 811. 20.
segetalis 810. 5.
sempervirens 811.
sempervirens 811. 19. 20.
812. 22. 23.
sesquiertia 811. 12. 812.
30.
setacea 812.
setacea 811. 19. 20.
setifolia 809. 73. 4.
Sibthorpii 811. 13.
siocula 813. 46.
splendens 810. 10. 812. 27.
sterilis 809.

- striata* 811. 18. 812. 21 *
strigosa 810.
subalpestris 813.
subspicata 813. 38.
subulata 812. 24.
sulcata 810.
Tenorii 814. 53 *
tenuis 815. 76. 1.
Thorei 809. 73. 3.
valesiaca 814.
varia 812. 25.
velutina 812.
versicolor 811.
versicolor 810. 9.
villosa 813.
Avenella rubra 808. 8.
Axyris amarantoides 628.
ceratoides 628. 13. 1.
Azalea procumbens 491.
Bæothryon caespitosum 765.
 11.
 nanum 765. 14.
 pauciflorum 765. 12.
Baldellia ranunculoides 679.
 1. 4.
Baldingera arundinacea
 790.
 colorata 791. 26. 1.
Ballota acetabulosa 582.
 alba 581.
 aristata 582. 20. 3.
 borealis 581. 20. 2.
 foetida 581. 20. 2.
 frutescens 581. 20. 1.
 hirsuta 582.
 italica 582. 20. 7.
 nigra 581.
 pseudodictamnus 582.
 ruderalis 581. 20. 3.
 rupestris 582.
 saxatilis 582. 20. 7.
 silvestris 581. 20. 2.
 spinosa 581.
 urticifolia 582. 20. 3.
 vulgaris 582. 20. 3.
Balsamita corymbosa 375. 26.
 2.
 major 375. 27. 7 obs.
 multifida 375. 27. 5.
Banffya petrea 100. 17.
Barbarea affinis 32. 16. 5.
 angustana 32. 16. 7.
 arcuata 32.
 arcuata 31. 16. 3.
 australis 31. 16. 2.
 dracteosa 32.
 brevicaulis 32. 16. 6.
 brevistyla 31. 16. 2.
 hirsuta 31. 16. 3.
 intermedia 32.
 Kayseri 32. 16. 3 *
 longesiliqua 31. 16. 2.
 orthoceras 32.
 parviflora 31. 16. 1.
 patula 31. 16. 2.
 præcox 31.
 prostrata 32. 8.
 pyrenaica 32. 16. 7.
 rivularis 32. 16. 3.
 rupicola 32.
 sicula 32.
 sicula 32. 16. 7.
 silvestris 32. 16. 3.
 stricta 31.
 stricta 32. 16. 3. 4.
 taurica 32. 16. 5.
 vicina 32. 16. 7.
 vulgaris 31.
Barkhausia albida 459. 48.
 alpina 459. 49.
 aspera 460. 3.
 Balbisiiana 459. 56.
 bursifolia 459. 56.
 byzantina 458. 45.
 caespitosa 459. 57.
 Candollei 458. 45.
 cernua 460. 60.
 foetida 458. 45.
 graveolens 458. 45.
 hiemalis 459. 54.
 hispida 460. 58.
 intybacea 459. 53.
 Leontodon 459. 55.
 leontodontoides 459. 55.
 mucronata 455. 5.
 nuda 459. 55.
 pinguis 458. 45.
 præcox 459. 53.
 purpurea 459. 52.
 rhoeadifolia 458. 46.
 rubra 458. 44.
 scariosa 459. 49. 50.
 setosa 460. 58.
 spathulata 459. 51.
 stricta 460. 60.
 Suffreniana 460. 61.
 taraxacifolia 459. 53. 54.
 55.
 tenerrima 459. 55.
 vesicaria 459. 50.
 zacinthia 458. 46.
Barlia longibracteata 690.
Bartsia alpina 549.
 aspera 549.
 bicolor 550. 20. 1.
 Fagonii 549. 19. 2.
 latifolia 550. 20. 3.
 parviflora 549. 19. 1.
 spicata 549.
 Trixago 549. 20. 1.
 versicolor 550. 20. 1.
 viscosa 550. 20. 2.
Bassia hirsuta 625. 7. 8.
Batatas edulis 504. 2. 1 obs.
 litoralis 504.
 sinuata 504.
Batrachium admixtum 15. 6 *
 aspergillifolium 15. 4.
 Bachii 15. 1.
 Baudotii 16.
 bipontinum 15. 4.
 caespitosum 15. 4.
 capillaceum 15. 4 *
 circinatum 15.
 coenosum 16. 16 *
 confervoides 15.
 confusum 16.
 divaricatum 15. 3. 4.
 diversifolium 15.
 Drouetii 15.
 elongatum 15. 8.
 eradicatum 15. 6.
 floribundum 16. 8 *
 fluviatilis 15.
 Friesii 16. 9.
 Gedroni 15. 7.
 hederaceum 16.
 heterophyllum 16.
 hololeucos 16.
 intermedium 16.
 Langei 16. 12.
 Lenormandii 16.
 luteolum 16. 9.
 lutulentum 15. 4.
 marinum 15.
 obtusiflorum 16. 13.
 omoiophyllum 16. 16.
 pantothrix 15. 4 *
 paucistamineum 15. 4.
 pectinatum 15. 4 *
 peltatum 15.
 penicillatum 16. 8 *
 Petiveri 16. 13.
 peucedanifolium 15. 1.
 pseudofluitans 16. 8 *
 pumilum 15. 1.
 radians 15. 7.
 rhizophyllum 15. 7.
 rigidum 15. 4.
 Rionii 15. 4.
 salsugineum 15. 5.
 sceleratum 14. 82.
 trichophyllum 15.
 triphyllus 16. 12.
 trinacrium 16. 12.
 tripartitum 16.

- truncatum* 15. 8.
villosum 15. 4.
Beckmannia erucaeformis 789.
crucoides 789. 23. 1.
Bellevallia appendiculata 732. 4.
Bouviana 733.
Calandriniana 732. 9 obs.
ciliata 732.
Clusiana 732. 9 *
comosa 732.
Cupaniana 733.
curta 733. 11 *
dubia 732.
dubia 732. 6.
Fontanesii 733.
græca 732.
graminifolia 733.
Gussoneana 732. 5.
Hackelii 732.
Holzmanni 733.
maritima 733.
operculata 732. 4.
pharmacosana 733. 12 *
Pinardi 733.
romana 732.
Sartoriana 733.
spicata 732.
tenuiflora 732.
therwa 733.
trifoliata 732.
Webbiana 732.
Weissii 733. 14 *
Bellidiastrum Michelii 389.
Bellidium pappulosum 390. 50. 2.
rotundifolium 390. 50. 1.
Bellis annua 390.
Bernardi 390.
dentata 390. 50. 6.
hybrida 390. 50. 4 *
longifolia 390.
longifolia 390. 50. 2.
microcephala 390. 50. 6 *
pappulosa 390. 50. 2.
perennis 390.
rotundifolia 390.
silvestris 390.
Bellium bellidioides 389.
bellidioides 389. 49. 3.
cordifolium 390. 50. 1.
crassifolium 389.
minutum 389.
nivale 389. 49. 2.
pappulosum 390. 50. 2.
rotundifolium 390. 50. 1.
Berardia subacaulis 416.
Berberis ætnensis 22.
cretica 22.
emarginata 22. 1. 1.
hispanica 22.
vulgaris 22.
Beringeria acetabulosa 582. 20. 4.
frutescens 581. 20. 1.
hirsuta 582. 20. 7.
hispanica 582. 20. 6. 7.
pseudodictamnus 582. 20. 5.
Berinia andryaloides 456. 21.
Berteroa græca 51. 44. 2 *
incana 50.
obliqua 51. 44. 2 *
orbiculata 51.
procumbens 51.
stricta 51. 44. 3.
thessala 51. 44. 3.
viridis 50. 44. 1.
Berula angustifolia 304. 77. 3.
Beta Bourgæi 623.
Cicla 622. 2 obs.
diffusa 623.
macrocarpa 622.
maritima 622.
nana 623.
procumbens 623. 1. 6.
sulcata 622. 2 obs.
trigyna 622.
vulgaris 622. 2 obs.
Betonica alopecuroides 577.
alpestris 577. 15. 3.
alpigena 577. 15. 4 *
annua 579. 26.
divulsa 577. 15. 1.
græca 577.
hirsuta 577.
hirta 577. 15. 4.
Jacquini 577. 15. 1.
Mouneri 577. 15. 3.
officinalis 577.
Orphanidea 577. 15. 1.
pradica 577. 15. 3.
scardica 577. 15. 2 *
serotina 577. 15. 4.
stricta 577. 15. 4.
Betula ætnensis 672. 2. 1.
alba 672. 2. 1. 2.
alpestris 672.
ambigua 672. 2. 2.
carpathica 672. 2. 2.
cordata 672. 1. 4.
cryptocarpa 672. 2. 2.
dalecarlica 672. 2. 1.
davurica 672. 2. 2.
Friesii 672. 2. 2.
fruticosa 673. 6.
glutinosa 672. 2. 2.
gummifera 672. 2. 1.
humilis 673.
humilis 672. 2. 5.
hybrida 672. 2. 1.
intermedia 672.
lobulata 672. 2. 1.
nana 673.
nigricans 672. 2. 2.
odorata 672. 2. 1. 2.
ovata 672. 1. 5.
oycoviensis 671. 2. 1. 6.
pallidescens 672. 2. 5.
pendula 672. 2. 1.
pubescens 672.
reticulata 672. 2. 2 *
subæqualis 672. 2. 2.
subalpina 672. 2. 2. 4.
tiliæfolia 672. 2. 2 *
tortuosa 672. 2. 2 *
urticifolia 672. 2. 3.
verrucosa 672.
virgultosa 672.
Biarum abbreviatum 755.
Anguillaræ 755. 6. 1.
arundanum 755. 6. 1 *
Fraasianum 755.
gramineum 755. 6. 1.
Hanseleri 755.
Spruneri 755.
Spruneri 755. 6. 2.
tenuifolium 755.
tenuifolium 755. 6. 2.
Biasoletia congesta 302.
cretica 303.
divaricata 302.
macrocarpa 302.
nodosa 299. 66. 1.
parnassica 302.
pumila 302.
tuberosa 302.
Bicchia albida 695. 19. 4.
Bidens bipinnata 348. 4 obs.
bullata 348.
cannabina 348. 2.
cervina 348.
fastigiata 348. 3.
frondosa 348. 3. 4 obs.
hirta 348. 4.
hybrida 348. 2.
intermedia 348. 3.
minima 348. 1. 1.
platycephala 348. 3.
radiata 348.
tripartita 348.
Biebersteinia Orphanidis 141.
Bielzia Schwarzenbergiana 420. 5.
Bifora radians 316.
testiculata 316.

- Biforis floseulosa* 316. 110. 2.
Billotia alpina 459. 49.
Birolia paludosa 123. 5.
Biscutella alpestris 59. 6.
 alpicola 59. 6.
 ambigua 59. 5*. 6.
 apula 59. 9*
 auriculata 59.
 bætica 59. 9*
 brevicaulis 59. 5.
 Burseri 59. 2.
 cichoriifolia 59.
 ciliata 59. 9*
 Columnæ 59. 9*
 controversa 59. 6.
 coronopifolia 59.
 coronopifolia 59. 6.
 didyma 59.
 didyma 59. 6.
 dilatata 59. 1.
 erigerifolia 59. 2.
 eriocarpa 59. 9*
 frutescens 59.
 glabra 59. 6.
 granitica 59. 6.
 hispida 59. 1.
 intricata 59. 6.
 lævigata 59.
 lævigata 59. 9*
 Lamarekii 59. 2.
 Lamottei 59. 6.
 lima 59. 5.
 longifolia 59. 6.
 lucida 59. 6.
 lusitanica 59. 6.
 lyrata 59. 9*
 maritima 59. 9*
 megacarpæa 59. 6.
 microcarpa 59.
 montana 59. 6.
 obcordata 59. 6.
 polychladi 59. 5.
 pyrenaica 59. 6.
 raphanifolia 59. 9*
 rosularia 59.
 saxatilis 59. 5*. 6.
 scutulata 59.
 sempervirens 59.
 sinuata 59. 6.
 stenophylla 59. 5.
 tomentosa 59. 6.
 varia 59. 6.
 verna 59. 6.
Biserrula Pelecinus 197.
Bivonæa lutea 66.
 præcox 66. 72. 1.
 Saviana 66.
Blechnum boreale 862. 8. 1.
 Spicant 862.
- Blitum capitatum* 623.
 Bonus Henricus 623. 3. 2.
 crassifolium 623. 3. 1.
 glaucum 624. 9.
 rubrum 623. 3. 1.
 virgatum 623.
Blysmus compressus 763.
 rufus 763.
Blyttia suaveolens 800. 49. 1.
Boelia sphærocarpa 154. 6. 3.
Boerhavia plumbaginea 620.
Bonannia resinifera 285.
Bonaveria Securidaca 186.
Bonjeania cinerascens 181.
 23. 1.
 græca 181. 2.
 hirta 181. 23. 1.
 hirsuta 181. 23. 1.
 italica 181. 23. 1.
 prostrata 181. 23. 1.
 recta 181. 3.
 venusta 181. 23. 1.
Borago cretica 509.
 lawiflora 509.
 officinalis 509.
 orientalis 509.
Botryanthus albo-virens 734.
 3.
 atlanticus 734.
 commutatus 734.
 Heldreichii 734.
 Lelievrii 734.
 Mordioanus 734.
 neglectus 734.
 odorus 734.
 pallens 733.
 parviflorus 734.
 pulchellus 734.
 stereophyllus 733.
 vulgaris 734.
Botrychium ambiguum 870.
 5.
 anthemoides 869. 1.
 boreale 870.
 brevifolium 870. 6.
 Breynii 869. 2.
 charcoviense 869. 1.
 crassinervium 870.
 Kannenbergii 869. 3.
 lanceolatum 869.
 lanceolatum 870. 5.
 Lunaria 870.
 Lunaria 869. 3.
 Matricariæ 869. 2.
 matricariæfolium 869.
 matricariæfolium 869. 4.
 matricarioides 869. 2.
 palmatum 869. 4.
- ramosum* 870. 5.
Reuteri 870. 5.
 rutacem 869. 2.
 rutæfolium 869. 2.
 silesiacum 869. 2.
 simplex 869.
 tenellum 870. 5.
 ternatum 869.
 virginianum 869.
Bourgæa humilis 404.
Tournefortii 403. 76. 5.
Brachiararia eruciformis 787.
 13. 3.
Brachylepis salsa 632.
Brachyderea alpestris 455. 5.
 aurea 456. 18.
 chondrilloides 456. 2.
 grandiflora 455. 4.
 Jacquini 456. 15.
 jubata 455. 7.
 niçæensis 457. 25.
Brachypodium asperum 843.
 7.
Barrelieri 842. 2.
Boissieri 843. 4*
 caespitosum 842. 2.
 contractum 842. 2.
 distachyon 843.
 gracile 842. 1.
 Halleri 843. 2.
 hispanicum 843. 2.
 Hostii 842. 4.
 loliaceum 825. 4 x. 830.
 3*. 845. 4 x
 macropodium 843.
 monostachyum 843. 7.
 montanum 843. 3.
 mucronatum 842.
 obtusifolium 843. 4*
 patens 843. 106. 1.
 pentastachyum 843. 7.
 phoenicoides 842. 2*
 pinnatum 842.
 Plukenetii 842. 4.
 ramosum 842.
 rupestre 842. 2.
 Salzmanni 843. 106. 5.
 sanctum 843.
 silvaticum 842.
 subtile 843. 7.
 tenellum 843. 4.
 tenuiculum 843. 2.
 tenuiflorum 843. 4.
 unilaterale 843. 4.
Brassica adpressa 48. 9.
 arenosa 47. 36. 2.
 asperifolia 46. 14.
 austriaca 42. 30. 2.
 balearica 45.

- balearica* 45. 3. 4. 46. 12.
Blancoana 46.
Botteri 45.
campestris 46.
cheiranthiflora 47. 36. 2.
Cheiranthus 47. 36. 2.
corynoloba 47.
Cossoneana 47.
cretica 45.
cretica 45. 8.
elongata 46.
Erucastrum 47. 2. 48. 6.
fruticulosa 47.
Gravinæ 46.
heterophylla 48. 9.
humilis 46.
humilis 46. 20.
incana 45.
incana 45. 7.
insularis 45.
lævigata 46.
lævigata 47. 29.
lanceolata 47. 31 obs.
latisiliqua 46.
leucantha 45. 2.
longirostris 48. 5.
macrocarpa 45.
mollis 45.
monensis 46.
montana 47. 32 obs.
moriciandoides 49. 39. 3.
Napus 46.
nigra 47. 36. 2.
nivalis 46.
nivea 45.
oleracea 46.
orientalis 42. 30. 2.
oxyrhina 46.
palustris 46. 28.
papillaris 47. 31.
pendula 49. 16.
pinnatifida 46.
polymorpha 43. 3.
præcox 46. 13. 14 *
psenderucastrum 47. 2.
Rapa 46. 14.
rectangularis 45. 8.
repanda 46.
Richerii 46.
Robertiana 45.
rupestris 45.
sabularia 47.
sabularia 46. 22.
taraxacifolia 44. 22.
Tournefortii 46.
valentina 46.
villosa 45.
Brassicaria humilis 46. 19.
Braya ænea 45. 32. 2.
- alpina* 45.
arctica 45. 32. 2.
glabella 45.
purpurascens 45. 32. 2.
rosea 45.
supina 44. 21.
Brea dioica 410. 61.
Brignolia pastinacifolia 292.
 46. 1.
Briza elatior 832. 2.
maxima 832.
media 832.
minor 832.
spicata 832.
virens 832. 3.
Brizopyrum siculum 844. 1.
Bromus abortiflorus 821. 4.
alopecuroides 823.
alopecuros 823. 26.
ambigens 821. 1.
angustifolius 822. 15.
arduennensis 824. 89. 1.
arenarius 823. 23 *
arvensis 823.
asper 821.
asperipes 821. 1.
atticus 823. 23.
auriculatus 824. 89. 1.
avenaceus 821. 5.
badensis 822. 18.
barbatus 819. 87. 1.
Baumgarteni 821. 2.
Billotii 822. 18.
Borœi 821. 1.
brachystachys 823.
brizæformis 824. 29 *
caprinus 822.
Chiapporianus 824. 30.
cincinnatus 811. 13 *
coloratus 824. 29.
commutatus 822.
confertus 821. 5. 823. 24.
 25.
contortus 823. 25.
diandrus 821. 5.
divaricatus 824. 28.
erectus 822.
fascicularis 821. 7.
fasciculatus 821.
Ferronii 823. 23 *
fibrosus 822.
flavescens 821. 7.
geniculatus 820. 6.
giganteus 824. 90. 1.
grossus 822. 18.
Gussonii 821. 1.
hirsutus 822. 8 *
hordeaceus 822. 18. 823.
 23 *
- Hughi* 823. 27.
humilis 823. 24 *
inermis 822.
intermedius 823.
jubatus 821. 3.
lanceolatus 823. 28.
laxus 822. 9.
ligusticus 820. 3.
loliaceus 842. 2.
longiflorus 821. 4. 822. 9 *
longipilus 821. 4.
macrostachys 823.
madritensis 821.
madritensis 821. 1.
maximus 821.
maximus 821. 1.
Michellii 815. 77. 1.
modonensis 823. 27.
molliformis 823.
mollis 823.
multiflorus 822. 9. 823. 21.
 824. 30.
nanus 823. 23.
neglectus 823. 20 *
nemoralis 822. 8.
nitidus 822. 18.
pannonicus 822.
patulus 824.
pendulus 824. 30.
pentastachys 843. 7.
pratensis 822. 19.
propendens 821. 1.
pseudo-asper 822. 8 *
racemosus 823.
racemosus 822. 19.
ramosus 822. 8.
repens 822. 10.
Requieni 823. 27.
rigens 821. 1.
rigidus 821.
rigidus 821. 1.
rubens 821.
rubens 821. 2. 5. 823. 25.
sabulosus 820. 5.
sardous 820. 5.
scaberrimus 821. 5.
scoparius 823.
scoparius 823. 26.
secalinus 822.
segetalis 822. 18.
sericeus 823. 26.
serotinus 822. 8 *
silvaticus 842. 1.
simplicissimus 823. 23.
squarrosus 824.
squarrosus 824. 28.
stenophyllus 822. 9.
sterilis 821.
subrectus 822. 9 *

- tectorum* 821.
tenuis 820. 5.
Thomini 823. 23 *
tomentellus 822.
transsilvanicus 822.
transsilvanicus 822. 14.
triflorus 815. 76. 1. 824.
 90. 1. 825. 7.
variegatus 822.
varius 821. 5.
velutinus 822. 18. 823. 20 *
vernalis 822.
Broussonetia papyrifera 656
 obs.
Bruckenthalia spiculifolia
 489.
Bryonia acuta 246.
 alba 246.
 aspera 246. 3. 2.
 cretica 245.
 dioica 246.
 lutea 246. 3. 2.
 sicula 246. 3. 2 *
 Tinei 246. 3. 4.
Buffonia annua 120. 12. 1. 2.
 brachyphylla 120.
 macropetala 120.
 macrosperma 120.
 Oliveriana 120. 12. 1.
 paniculata 120. 12. 1.
 parviflora 120. 12. 2 *
 perennis 120.
 perennis 120. 12. 3 *
 spicata 120. 12. 1.
 tenuifolia 120.
 tenuifolia 120. 12. 1. 2 *
 Willkommiana 120. 12. 3 *
Buglossites laxiflora 509. 3. 2.
Buglossum Barrelieri 511. 14.
Bugula pyramidalis 567. 3. 4.
 reptans 567. 3. 3.
Bulbocastanum daucoides
 304.
 ferulaceum 303.
 incrassatum 303.
 Linnæi 303.
 mauritanicum 303.
Bulbocodium autumnale 744.
 2. 1.
 balearicum 744. 2. 3.
 Broteroi 744. 2. 2.
 colchicoides 744. 2. 2.
 edentatum 744. 3. 2.
 hastulatum 744. 2. 5.
 ruthenicum 744.
 trigynum 744. 2. 6.
 vernum 744.
Bulliarda aquatica 265.
 Vaillantii 265.
Bunias cochlearioides 67.
 Erucago 67. 76. 1.
 orientalis 67.
 raphanifolia 29. 8. 3.
Bunium alpinum 304.
 arcuatum 304.
 Bulbocastanum 303. 74. 1.
 304. 74. 4.
 Carvi 307. 85. 7.
 carvifolium 307. 85. 3.
 corydalinum 304. 75. 5 *
 denudatum 315. 108. 1.
 divaricatum 304. 75. 3.
 ferulaceum 303. 74. 4.
 ferulæfolium 303. 74. 4.
 flexuosum 303. 71. 1. 3.
 ligusticifolium 307. 85. 1.
 luteum 308. 89. 1.
 Macuca 304.
 minus 303. 74. 1.
 minutifolium 287. 29. 26.
 montanum 304.
 petræum 304. 75. 5.
 pencedanoides 292. 48. 1 *
 pumilum 302. 70. 6.
 rigidulum 307. 85. 6.
 strictum 304.
 subcarneum 303. 71. 2.
 tenuifolium 303. 71. 3.
 tenuisectum 304.
 verticillatum 307. 85. 8.
 virescens 292. 48. 1.
Bupthalmum cordifolium
 390. 51. 1.
 flexile 390.
 grandiflorum 390.
 inuloides 391.
 salicifolium 390.
 speciosum 390. 51. 1.
 succisæfolium 390. 52. 1.
Bupleurum acutifolium 310.
 6.
 affine 313.
 alpinum 311. 16 *
 angulosum 311.
 angulosum 311. 20.
 apiculatum 312.
 apiculatum 312. 29.
 aristatum 312.
 aristatum 312. 32 *
 asperuloides 313.
 aureum 311.
 australe 313. 35.
 badium 312. 33 *
 baldense 311. 18 *. 20. 312.
 32. 33.
 Barceloi 310.
 bicalyculatum 311. 15.
 canalense 311. 20 *
 capillare 312.
 caricifolium 311. 20 *
 caricinum 311. 20.
 cernuum 311. 18 *
 coloratum 311. 13.
 Columnæ 313. 40 *
 commutatum 312.
 coriaceum 310. 2.
 corsicum 311.
 dianthifolium 310.
 dichotomum 313. 35.
 diversifolium 311. 18.
 elatum 310.
 exaltatum 311.
 exaltatum 311. 18.
 falcatum 311.
 filicaule 313.
 flavicans 312.
 foliosum 310.
 Fontanesii 312. 30.
 frutescens 310.
 fruticescens 310. 3.
 fruticosum 310.
 Gerardi 313.
 Gerardi 312. 33. 38.
 Gerardi virgatum 313. 36.
 gibraltarium 310.
 glaucum 313.
 glumaceum 312.
 gracile 313.
 gracile 312. 26.
 gramineum 311.
 graminifolium 311. 21.
 heterophyllum 311. 18.
 incurvum 311. 21.
 Jacquinianum 313. 35.
 juncum 312.
 Kargli 312.
 longepetiolatum 312. 31.
 longifolium 310.
 Marschallianum 313. 43.
 neglectum 311. 18 *
 Odontites 312.
 Odontites 312. 32. 32 *
 olympicum 311. 18 *
 opacum 312. 32 *
 paniculatum 310.
 paniculatum 310. 5.
 petiolare 311. 16.
 petræum 311.
 petræum 311. 15.
 petrogenes 311. 16.
 procumbens 313. 40 *
 protractum 312.
 pyrenæum 311. 14.
 ranunculoides 311.
 repens 311. 20.
 rigidum 310.
 rigidum 311. 18.

- Rissoni 313. 36.
rotundifolium 311.
rotundifolium 312. 24.
Savignoni 312.
Scheffleri 313. 37.
semicompositum 313.
semicompositum 312. 32.
 313. 42.
semidiaphanum 312.
Sibthorpium 311. 18.
spinosum 310.
Sprunerianum 312. 30.
stellatum 311.
subovatum 312. 24.
telonense 311. 20.
tenuifolium 311. 18.
tenuissimum 313.
transsilvanicum 311. 18 *
trichopodium 313.
trifidum 312. 33.
vapincense 311. 12.
verticale 310. 2.
virgatum 313. 35.
Wittmanni 312. 22.
Burgsdorfia montana 585. 29.
rigida 584. 27.
romana 584. 27.
Butinia bunioides 303.
cretica 303. 70. 7.
macrocarpa 302. 70. 4.
parnassica 302. 70. 2.
Butomus umbellatus 678.
Buxus balearica 646.
sempervirens 646.
Cacalia albifrons 396. 61. 2.
alpina 396. 61. 1. 2.
glabra 396. 61. 1.
hastata 358.
hybrida 396. 61. 4.
saracenica 353. 6. 5.
tomentosa 396. 61. 2.
verbascifolia 351. 5. 7.
Cachrys alpina 314.
echinophora 314. 101. 3.
lavigata 314.
Libanotis 314. 101. 3. 102. 1.
panacifolia 294. 55. 2.
pungens 314. 101. 3.
sicula 314. 101. 1. 3.
triquetra 314. 99. 2.
Cactus Opuntia 266. 3.
Cakile aegyptiaca 29. 2. 1 *
edentula 28. 2. 1.
hispanica 29. 2. 1.
litoralis 29. 2. 1.
maritima 28.
monosperma 29.
Calamagrostis acutiflora 799.
 2.
alpina 800. 17.
arenaria 798. 45. 1.
argentea 804. 59. 1.
arundinacea 798.
arundinacea X *epigeios* 799.
 2.
arundinacea-lanceolata 799.
 3.
baltica 798. 45. 2.
borealis 799. 8 *
chalybea 799.
deschampsoides 799.
elata 799. 13.
epigeios 799.
flexuosa 799. 13.
Gaudiniana 800. 15.
glauca 799. 11.
gracilescens 799.
gracilis 800. 15.
Halleriana 800.
Halleriana 799. 9.
Hartmaniana 799.
Hübneriana 799. 11.
intermedia 799. 3.
lanceolata 800.
Langsdorffii 800.
Langsdorffii 799. 13.
lapponica 799.
latifolia 799. 13.
laxa 799. 12.
litorea 799.
montana 798.
montana 798. 1. 799. 4.
neglecta 799.
nutans 800. 16.
phragmitoides 799.
pseudo-phragmitoides 799.
 12. 13. 800. 16.
pulchella 799. 13. 800. 16.
pyramidalis 798. 1.
ramosa 800. 15.
rigens 799. 11 *
rubicunda 799. 13.
silvatica 798. 1. 799. 2.
speciosa 804. 59. 1.
stricta 799. 8.
strigosa 799.
subulata 799. 2.
tenella 800.
varia 799.
varia 798. 2. 800. 16.
villosa 800. 16.
Calamintha acinoides 589. 11.
Acinos 589.
adscendens 588. 3.
aetnensis 589. 12 *
alba 588. 2.
alpina 589.
alpina 589. 12 *
arvensis 589. 14.
bætica 588. 3 *
byzantina 588. 4.
canescens 588. 4. 4 *
Clinopodium 587. 29. 1.
corsica 589.
cretica 588.
croatica 591. 17.
exigua 589. 15.
Fenzlii 588. 6.
glandulosa 588.
granatensis 589. 12 *
grandiflora 587.
graveolens 589.
graveolens 589. 16.
Gussonei 588. 4 *
incana 588.
Langei 589. 11 *
maritima 589.
menthifolia 588.
meridionalis 589. 12 *
montana 588. 3.
nebrodensis 589. 12 *
Nepeta 588.
nepetoides 588. 4.
officinalis 588.
officinalis 588. 3. 3 *
origanifolia 589. 3. 590. 5.
parviflora 588. 4.
patavina 588.
patavina 588. 11.
Piperella 591. 17.
Pulegium 589. 3.
purpurascens 589. 15 *
rotundifolia 589.
rotundifolia 588. 4. 10. 589.
 12 *
silvatica 588. 2.
Spruneri 588. 4 *
stricta 588. 2.
suaveolens 588.
subnuda 588.
subnuda 588. 7.
thymifolia 588.
thymifolia 590. 4.
trichotoma 588. 4.
umbrosa 588. 2.
Caldesia parnassifolia 679. 1.
 2.
Calendula aegyptiaca 398.
algarbiensis 398. 4 *
arvensis 398.
bicolor 398. 8 *
byzantina 398. 8.
fulgida 398.
hispanica 398. 5.
incana 398.
lusitanica 397.
malacitana 398. 9 *

- marginata* 398. 5.
maritima 398.
micrantha 398. 8.
Noëana 398.
officinalis 398. 7 obs.
parviflora 398. 7.
platycarpa 398. 7 *
sicula 398. 6 *
stellata 398.
sublanata 398. 8 *
suffruticosa 398.
tomentosa 398. 5.
undulata 398. 6.
Calepina Corvini 68.
Calla palustris 754.
Callianthemum coriandrifolium 9. 24.
rutae-folium 9. 25.
Calligonum Pallasia 632.
Calliopea aurea 456. 18.
Callipeltis cucullaria 332.
Callistemma brachiatum 341.
Sibthorpium 341. 3. 1 *
Callitriche aestivalis 250. 1. 1.
alpina 250. 1. 3 *
angustifolia 250. 1. 3.
autumnalis 251.
autumnalis 250. 5. 251. 7.
brutia 250. 5.
cæspitosa 250. 1. 3.
cophocarpa 250. 1. 2.
cruciata 251. 7.
decussata 250. 5. 251. 6.
hamulata 250.
intermedia 250. 1. 3.
minima 250. 1. 3.
obtusangula 250.
pedunculata 250. 5 *
platycarpa 250. 1. 1 *
polymorpha 250.
reflexa 250. 5 *
stagnalis 250.
stellata 250. 1. 3.
tenuifolia 250. 5.
transsilvanica 250. 1. 1.
truncata 251.
verna 250.
verna 250. 4.
vernalis 250. 1. 3.
virens 251. 6.
Calluna atlantica 489. 4. 1 *
vulgaris 489.
Calophaca vulgarica 188.
Calotheca bromoidea 824. 89. 1.
Caltha alpina 18. 20. 1.
cornuta 18. 20. 1 obs.
grosseserrata 18. 20. 1 obs.
Guerangerii 18. 20. 1 obs.
palustris 18.
pumila 18. 20. 1.
radicans 18.
ranunculoides 18. 20. 1.
Calycotome cretica 158. 11. 3.
infesta 158.
spinosa 158.
villosa 158.
Calypso borealis 686.
Calystegia sepium 504.
sylvatica 504.
Soldanella 504.
Camelina austriaca 35. 20. 2.
dentata 58. 56. 1.
foetida 58.
macrocarpa 58. 56. 2.
microcarpa 58. 56. 3.
pinnatifida 58. 56. 1.
sativa 58.
sativa 58. 56. 3.
silvestris 58.
silvestris 58. 56. 3.
Campanula abietina 481.
affinis 477.
affinis 480. 64.
aggregata 477. 30.
Aizoon 482.
alburnica 479. 43.
Allionii 477.
alpestris 477. 24.
alpina 477.
alpina 477. 16.
Alpini 479. 43. 475. 2. 2.
anchusiflora 476.
Andrewsii 476. 11.
appendiculata 476. 11.
arcuata 479. 44.
arvatica 486. 8. 1.
athoa 478. 37 *
attica 481. 72 *
baldensis 483. 91.
barbata 477.
Barrelierii 480. 57.
Baumgartenii 479. 44.
Bellardi 480. 51.
bellidifolia 476. 12.
bicaulis 477. 15.
Boissieri 480. 61.
bononiensis 478.
Bourdiniana 476. 1.
cæspitosa 480.
cæspitosa 479. 45 et *
calaminthifolia 477.
calaminthifolia 476. 12.
capitata 476. 13.
carnica 480.
carpathica 482.
caudata 486. 9. 4.
Cavolini 480. 57.
Celsii 476. 11.
cenisia 482.
Cervicaria 477.
cervicarioides 477. 30.
Chaberti 482. 86.
cichoracea 476. 13.
confertifolia 479. 44.
contracta 478. 33.
corymbosa 476. 2. 480. 55 *
Costæ 482. 86 *
crassifolia 480. 57.
crassipes 480.
csepeliensis 482. 86.
dalmatica 477. 27. 486. 9. 4.
dasycarpa 481. 75. 482. 80.
Decloetiana 479. 44.
decumbens 483.
delicatula 479. 45 *
desertorum 477.
dichotoma 477.
dichotoma 477. 20 *
diffusa 480. 57.
dilecta 479. 44 *
divergens 476. 14 *
drabæfolia 481. 72 *. 73.
drabifolia 481.
Dufourei 483. 93.
Duriæi 482. 89 *
elatines 481.
elatines 481. 67. 69.
elatinoides 481.
elatinoides 481. 68.
elatiior 482. 85.
elliptica 477. 30.
eriantha 476. 11.
erinoides 482. 89 *
Erinus 481.
excisa 480.
expansa 482.
farinosa 477. 30.
fastigiata 483.
ficarioides 479. 47 *
filiformis 481. 66.
Firmiana 477. 17.
flexuosa 480. 50.
floribunda 480. 63.
foliosa 478.
Foudrasi 479. 45 *
fragilis 480.
Freyeri 480. 50 *
frutetorum 482. 86.
garbanica 481.
glabra 480. 57.
glareosa 480. 51 *
glaucophylla 478. 30.
glomerata 477.
gracilis 479. 45 *

- graminifolia 486. 9. 1—3.
 grandiflora 476. 1. 15.
Grossekii 477.
hagielia 476.
 Hauryi 479. 44 *
 Haynaldi 477. 18.
Herminii 482.
 Herminii 481. 78.
heterophylla 477.
heterophylla 475. 1. 2.
 hirsuta 483. 91.
hispanica 479.
 hispida 481. 75.
 Hochstetteri 479. 45 *
 Hostii 479. 44.
 inconcessa 479. 48 *
incurva 476.
isophylla 480.
 Jacquini 485. 4.
 Jaubertiana 479. 47 *
 Kremeri 477. 20 *
laciniata 476.
 laciniata 476. 11.
 Lambertiana 482. 85.
 lanata 476.
 lanceolata 478.
 latifolia 478.
 leucanthemifolia 479. 45.
 Leutweinii 476. 8.
 lilifolia 475. 2.
 limoniifolia 484. 3.
 lingulata 476.
 lingulata 477. 27.
linifolia 479.
 linifolia 479. 48. 480. 49.
Loeflingii 482. 89 et *
 longifolia 477. 15. 27.
 longipes 482. 89.
 Loreyi 482. 89. 483. 91.
Lostritti 479.
 lunariæfolia 478. 38.
 lyrata 476.
 macedonica 478. 33. 481.
 73.
 macrocalyx 480. 53.
 macrorrhiza 480.
 macrorrhiza 479. 42.
macrostachya 478.
 Malyi 479. 44 *
 Mathonetii 479. 45 *
 matritensis 482. 89.
Medium 476.
 microphylla 477. 21.
 modesta 479. 45 *
mollis 477.
 mollis 477. 20.
 monantha 479. 48.
Morettiana 481.
 multiflora 478. 33.
 muralis 480. 64. 481. 67.
 musarum 477. 26.
 nana 477. 24.
 napuligera 479. 44 +
 neglecta 478. 38. 482. 86.
 nemorosa 478. 38 *
 nicæensis 480. 58.
 notata 479. 45 *
 nutans 475. 1. 1.
 obliquifolia 478. 39.
 oligosantha 478. 37.
 Olivieri 477. 22.
oreadum 477.
Orphanidea 476.
 pannonica 476. 14 *
parnassica 480.
 parvula 479. 45 *
patula 482.
 patula 481. 77. 78.
 pauciflora 481. 77.
pelviiformis 476.
 pelviiformis 476. 3.
 pennina 479. 44.
 pentagonia 483. 4. 3.
 peregrina 482. 84.
persicifolia 481.
petræa 478.
 petræa 477. 30.
phrygia 482.
 Pichleri 479. 43.
podocarpa 481.
Portenschlagiana 480.
 pratensis 478. 37.
 precatória 478. 41.
primulæfolia 482.
 pseudopulla 480. 53.
 pubescens 479. 44. 45.
 pulchella 479. 45 *
 pulla 480.
 pumila 481. 75.
 pusilla 479.
pyramidalis 480.
 radicata 480.
Rainerii 481.
 ramosissima 483.
 ramosissima 482. 90.
rapunculoides 478.
 rapunculoides 482. 88.
Rapunculus 482.
 redux 479. 48 *
 reflexa 479. 45. 480. 49.
 rhodensis 481. 72.
 Rhodii 479. 47 et *
rhomboidalis 478.
 rhomboidalis 478. 38 *
 rhomboidea 478. 40. 41.
 Rochelii 481. 77.
 Rosani 480. 55 *
rotundifolia 479.
 rotundifolia 479. 47.
 rupestris 476. 11 *. 480. 50.
rupicola 477.
 ruscinonensis 479. 47 *
 ruthenica 478. 39.
Sabatia 480.
Sartorii 481.
saxatilis 476.
Scheuchzeri 479.
 Scheuchzeri 479. 47 *
scutellata 481.
secundiflora 480.
 serpyllifolia 486. 9. 5.
sibirica 476.
 simplex 478. 39. 481. 76.
 spathulæfolia 483. 91.
 spathulata 476. 14 *. 481.
 78 *
speciosa 476.
specularioides 483.
 sphærothrix 482. 88.
spicata 478.
 spicata 478. 33.
Spruneriana 481.
 stenocodon 479. 44 *
 stenosiphon 478. 30 *. 479.
 44 *
Steveni 481.
 Steveni 481. 77.
 stricta 476. 5.
 styriaca 479. 48 *
 suaveolens 475. 2. 2.
 subalpina 481. 68.
 subpyrenaica 481. 75.
 subramulosa 479. 45 *
 tenella 479. 42. 45 *
 Tenorii 480. 55 *
 tenuiflora 476. 13. 478. 39.
 tenuifolia 486. 9. 3.
 Thaliana 478. 39.
 thessala 480. 55.
 thyrsioidea 477. 28.
 thyrsoides 478.
tomentosa 476.
 Tommasiniana 480. 50 *
 trachelioides 478. 38.
Trachelium 478.
 Trachelium 478. 37 *
transsilvanica 477.
trichocalycina 479.
tubulosa 476.
 turbinata 482. 80 *
 tyrolensis 479. 45 *
 ucranica 478. 38.
uniflora 482.
 urticifolia 478. 37.
 valdensis 479. 47 *
 venusta 479. 45.
 verruculosa 482. 85 *

- versicolor* 480.
versicolor 480. 55 *
Visianii 480. 50.
Vlachovæ 478. 30.
Waldsteiniana 480.
Wanneri 475. 1. 2.
Welandii 482. 88.
Zoysii 482.
Camphorosma acuta 626. 8.
 5 obs.
annua 625.
glabra 626. 8. 5 obs.
monspeliaca 625.
ovata 625.
perennis 625.
ruthenica 625.
vigintimilleis 625. 8. 2.
Canna indica 685.
Cannabis sativa 659 obs.
Capnophyllum dichotomum
 291. 39. 1.
peregrinum 291. 39. 1.
Capparis herbacea 68. 2.
ovata 68. 2.
rupestris 68. 1 *
sicula 68.
spinosa 68.
Capsella agrestis 66. 70. 1.
apetala 66. 70. 1.
bursa pastoris 66.
elliptica 66. 69. 3.
gracilis 66. 70. 1.
grandiflora 66.
pauciflora 66. 69. 4.
procumbens 66. 69. 3.
rubella 66.
rubescens 66. 70. 2.
Caramanica taraxacoides 438.
 112 obs.
Cardamine acris 36.
alpina 37.
amara 37.
asarifolia 37.
bellidifolia 37.
bellidifolia 37. 13.
bicolor 37. 5.
Bielzii 37. 5 *
Bocconii 38. 19.
borealis 37. 5.
carnosa 38.
chelidonia 37.
corsica 38. 21.
crassifolia 37. 5 *
cretica 38. 21.
croatica 38. 20.
Cupani 38. 21.
dalmatica 38. 22.
dentata 36. 3 *
feroensis 35. 32.
flexuosa 37. 10.
gelida 37. 13 *
glauca 37.
græca 38.
grandiflora 36. 3 *
grandis 37. 5.
granulosa 36.
granulosa 36. 3 *
hamulosa 37. 13 *
hastulata 35. 32.
hederacea 38. 19.
herbivaga 36. 3.
heterophylla 37. 13.
hirsuta 37.
impatiens 37.
intermedia 37. 11.
kopaonikensis 37. 18.
latifolia 36.
Libertiana 37. 5.
longirostris 38. 23.
maritima 38.
Matthioli 36. 3 *
microphylla 38. 22.
multicaulis 37. 11.
nivalis 37. 13 *
Opicii 37. 5 *
paludosa 36. 3 *
palustris 36. 3 *
parviflora 37.
pectinata 37.
Plumierii 38.
pratensis 36.
praticola 36. 3.
pseudopratenensis 36. 3.
pusilla 37. 11 *
raphanifolia 36. 1.
resedifolia 37.
rivularis 36. 3 *
serbica 38. 20.
silvatica 37.
silvatica 36. 3. 37. 5.
stolonifera 36. 3 *
thalictroides 38. 19. 20.
trichocarpa 38. 21.
trifolia 37.
udicola 36. 3.
uliginosa 37.
umbrosa 37. 5. 10.
Cardaria brachypetala 64. 67.
 6.
Cardiolepis dentata 64. 67. 6.
Cardopatum apulum 400. 68.
 1.
Boryi 400.
corymbosum 399.
orientale 399. 68. 1.
Vrionis 400. 68. 1.
Carduncellus acaulis 418. 97.
 5.
araneosus 418.
coeruleus 418.
dianius 418. 97. 1 *
hispanicus 418. 97. 1 *
mitissimus 418.
monspeliensis 418.
pinnatus 418.
tingitanus 418. 97. 1.
Carduus acanthoides 412.
acanthoides 411. 84. 1 x
acanthoidi-hamulosus 412.
 16 x
acicularis 414.
acuminatus 412. 18.
affinis 413.
agrestis 413. 27.
albidus 414. 38.
alpestris 412. 9 *. 18.
ambiguus 407. 25 x
anglicus 407. 29.
apenninus 411. 84. 1.
arabicus 414. 38 *
arctioides 412.
aretioides 412. 11.
arenarius 413. 31.
Argemone 411. 6. 412. 10 *
argentatus 414. 41 obs.
argiroa 413.
armatus 412. 12.
aurosicus 411.
australis 412. 14 *
beticus 414.
Barrelieri 411.
bicolor 413. 30.
Boujarti 405. 8.
Bourgæanus 413. 26.
brachycephalus 413. 22 *
bulbosus 407. 30.
camporum 413.
candicans 413.
Candollei 413.
carlinæfolius 411.
carlinæfolius 412. 10.
carlinoides 413.
carlinoides 413. 28.
carpetanus 413. 28.
centauroides 412. 9.
cephalanthus 414.
cerinthefolius 417. 9.
chrysacanthus 411.
cirsiioides 412. 10.
collinus 413. 22.
confertus 414.
congestus 414. 33 *
corymbosus 413.
crassifolius 412. 10. 10 *
crispo-nutans 411. 84. 1 x.
 413. 21 x
crispo-Personata 413. 21 x

crispo-vivariensis 412. 14.
crispus 413.
crispus 413. 26.
crispus var. *litigiosus* 413.
 84. 21 ×
cronius 412.
deflorato-*Personata* 412.
 11 ×
defloratus 412.
dubius 413. 21 ×
fasciculiflorus 414.
fastigiatus 413. 30.
Gayanus 413.
glaucus 412. 10 *. 417. 10.
glomeratus 408. 32.
granatensis 411. 84. 2 *
Grenieri 412. 11 ×
hamulosus 412.
hamulosus 411. 84. 1 *
intricatus 413. 31 *
italicus 406. 23.
leptophyllus 412. 10.
leucanthemos 412. 11.
leucographus 414. 85. 1.
macrocephalus 411. 84. 1.
 1 *. 4.
malacitanus 413.
marmoratus 414.
Martrinii 412. 13 *
medius 411.
microcephalus 412.
microcephalus 414. 39.
mollis 407. 26 ×. 415. 10.
 12. 416. 14.
montanus 413. 31.
montosus 412. 10.
Morisii 414. 32.
multiflorus 413. 18 *. 414.
 40.
myriacanthus 413.
myriacanthus 413. 26.
neglectus 414. 41.
nigrescens 412.
nigrescens 412. 9 *. 14.
nitidus 417. 5.
nutans 411.
nutans 411. 84. 2 *
nutanti-acanthoides 412.
 18 ×
nutanti-crispus 411. 84. 1 ×
nutanti-Personata 412. 11 ×
oliganthus 411. 84. 1.
onopordioides var. 412. 18.
orthocephalus 412. 18 ×
palatinus 413. 18 ×
Pancicii 414.
panormitanus 414. 38 *
peregrinus 414. 38 *
Personata 412.

Personato-crispus 412. 11 ×
Personato-defloratus 412.
 11 ×
Personato-nutans 412. 11 ×
platylepis 411. 84. 1 *
platypus 411.
podacanthus 411. 3.
polyacanthos 412. 18. 413.
 21. 22 *
polyanthemos 411. 84. 1 ×.
 413. 18 *
pungens 410. 57.
pycnocephalus 414.
recurvatus 412. 13.
Reuterianus 413.
ruderalis 412. 18.
sanctæ Balmæ 413. 31.
sardous 414.
sardous 414. 33.
serratuloides 409. 51.
spinigerus 412. 16.
spinulosus 412. 10 *
Stangii 411. 84. 1 ×
subdecurrens 411.
summanus 412. 10 *
syncephalus 414. 39.
tataricus 410. 55.
taygeteus 411. 84. 1.
tenuiflorus 414.
tenuifolius 412. 10 *
thessalus 412. 18.
Thoermeri 411. 84. 1.
transalpinus 412. 10.
tuberosus 410. 55.
uncinatus 412.
valentinus 413.
vivariensis 412.
Carex acuta 777.
acuta 768. 3.
acutiformis 768. 3.
æthostachya 776. 83.
agastachys 769. 15.
alba 775.
alpestris 772. 50. 774. 69.
alpigena 771. 41.
alpina 776.
ambigua 773. 52. 777. 95.
 783. 146 *
amblylepis 777. 95.
ammophila 782. 140.
ampullacea 767.
anguillata 777. 97.
anomala 772. 50.
approximata 773. 57.
aquatilis 777.
arctica 782. 143 *
arctophila 776. 88.
Ardoiniana 770. 26.
arenaria 782.

arenaria 779. 115.
argentea 775. 70.
argyroglochin 779. 113.
aristata 769. 14 *
asturica 772. 72.
aterrima 776. 82.
atrata 776.
atrofusca 776. 81.
axillaris 780.
bætica 770. 29.
Balbisi 771. 36.
baldensis 779.
banatica 777. 92.
basilaris 773.
Bastardiana 774. 61.
Bellardi 784. 17. 1.
Bertolonii 782. 140.
bicolor 778.
bicolor 776. 88.
biformis 770. 32. 33.
biligularis 769. 20.
binervis 770.
Blyttii 780. 126 *. 127.
Boeninghauseniana 780.
 123 *
bohémica 779. 110.
borealis 777. 97 *
brachystachys 772. 43.
bracteata 778. 109.
brevicollis 770.
brevifolia 772. 43.
brevistrois 782. 143 *
brizoides 779.
Buekii 777.
bullata lævirostr. 768. 7.
Buxbaumii 776.
caesia 774. 59.
cæspitosa 93.
cæspitosa 777. 91. 98.
campestris 774. 63.
Camposii 769.
canescens 780.
canescens 781. 135.
capillaris 769.
capillipes 775.
capitata 784.
castanea 769. 22. 776. 82.
cenisia 778. 106.
Chaberti 781. 133 *
chætophylla 782. 140 *
chlorocarpa 778. 98 *
chordorrhiza 782.
ciliata 773. 57.
clandestina 773. 53.
clavæformis 774.
colchica 782. 139 *
collina 773. 58.
conglobata 773. 58. 775.
 69.

contigua 781. 133.
corsica 769. 17.
corynephora 777. 95.
crassa 767. 2.
cryptocarpa 776. 87 *
Csetzii 773. 58 *
curta 780. 125. 126.
curvata 779. 116.
curvirostra 775. 73.
curvula 783.
cuspidata 776. 87. 88. 782.
 140.
Custoriana 784. 160.
cyperoides 778.
dacica 777. 93.
Davalliana 784.
decipiens 784. 156.
decolorans 778. 101.
decumbens 774. 61.
Deinbolliana 782. 143 *
Dematrancea 778.
depauperata 771.
depressa 773. 50 *
diandra 782. 136.
digitata 772.
diluta 770. 32.
dioica 784.
discolor 778.
distachya 776. 83.
distans 770.
disticha 782.
diversiflora 773. 50.
divisa 782.
divulsa 781.
Drejeri 777. 93.
drymeja 769. 18.
Duriæi 771. 37.
echinata 780.
echinata 774. 64.
Ehrhartiana 782. 136.
elongata 779.
elytroides 778. 98 *
emarginata 773. 58.
epigeios 776. 88. 777. 97 *
ericetorum 773.
erythrostachys 774. 65. 66.
evoluta 768.
exaltata 767. 2.
extensa 771.
ferruginea 771.
ferruginea 772. 42. 44.
festiva 779.
filifolia 771. 37.
filiformis 768.
filipendula 776. 87 *
fimbriata 772.
firma 772.
flacca 774. 66.
flava 771.

flava 771. 35 *
flavescens 770. 33.
flavicans 776. 88.
flavo-hornschuchiana 770.
 33 et x
foetida 782. 144.
Fontanesiana 783. 152.
Friesii 768. 5 *
frigida 771.
frigida 771. 39 et *
friscia 778. 100.
fuliginosa 771.
fuliginosa 771. 39 *. 40.
fulva 770.
fulva 770. 32. 33 x
fulvo-flava 770. 33 x
furculata 781. 132.
furva 780. 119.
Gasparrinii 784.
Gaudiniana 778. 107 *
Gayana 775. 72.
Gebhardi 779. 112. 780.
 126.
geniculata 771. 40.
genuensis 774. 66.
Gibsoni 777. 94 obs.
glareosa 780.
glauca 774.
globularis 774.
glomerata 782. 141.
Godefrini 769. 23.
Goodenowii 777. 98.
gracilescens 767. 2 *
gracilis 777. 91. 95.
gracillima 775. 74.
Grahami 768. 6 *
Grassmanniana 774. 59.
Grioletii 774. 60.
grisea 774.
Grossekii 783. 152.
grypos 780. 122.
guestphalica 781. 133.
gynobasis 773. 50.
gynocrates 782. 142 *
gynomane 783. 146.
hæmatolepis 776. 89.
Hallstoni 780. 123 *
Halleriana 772.
halophila 776.
halophila 770. 33.
heleonastes 779. 118.
helvetica 770. 30.
helvola 778.
hirta 768.
hirtæformis 769. 14.
hispidula 774. 64.
hispidula 772. 42.
hordeiformis 769. 23.
hordeistichos 769.

Hornschuchiana 770.
Hornschuchiana 770. 33.
Hornschuchiano-flava 770.
 33.
Hosteana 770. 32.
Hübneri 771. 39 *
humilis 773. 53.
hybrida 782. 140. 784. 16.
 1.
hydrophila 780. 122.
hymenocarpa 768. 8 *
hyperborea 776. 88. 777.
 97 *
illegitima 783. 147.
incurva 782. 143.
inflata 768. 5.
intermedia 777. 98. 782.
 137. 139 *
intricata 778. 102 *
irrigua 775.
juncella 778. 98 *
juncifolia 782. 141. 143.
kattegatensis 776. 89 *
Kochiana 768. 3.
Lachenalii 780. 119.
lævigata 769.
lævigata 769. 21.
lævirostris 768. 7.
lævis 772. 44.
Laggeri 782. 138.
lagopina 779.
Langii 775. 74 *
laponica 780. 125.
lappocarpa 768. 12.
lasiochlæna 768.
laxa 775.
laxula 769. 18.
leiocarpa 775. 72.
leiorhyncha 781. 131 obs.
lepidocarpa 771. 34 *
leporina 779.
leptostachys 769. 19.
leucoglochis 783. 153.
levis 784. 160.
ligerica 779.
ligeriana 779. 115.
limosa 775.
limosa 775. 75. 77. 79.
limula 778.
linearis 772. 43.
Linkii 783.
lipsiensis 771. 34 *
litigiosa 781. 133 *
livida 775.
livida 776. 88.
lobata 782. 144. 783. 145.
 148.
loliacea 780.
longearistata 774. 64.

- longifolia 773. 54.
 ludibunda 779. 116 *
 lusitanica 781. 134.
 Lyngbyei 776. 86 *
 macilenta 780.
 macra 777. 91.
 macrolepis 773.
 macrostachys 772. 41.
 macrostyla 784.
 Mairii 770.
 maritima 776. 86.
 Marssoni 771. 34.
 maxima 769. 15.
 melæna 777. 98.
 membranacea 773. 57.
 Metteniana 784. 160.
 Micheliana 774. 66.
 Michellii 770.
 microcarpa 769. 17.
 microglochis 783.
 microstachya 778.
 microstyla 783.
 Mieliichhoferi 772. 41. 775.
 73.
 mirabilis 783. 148.
 misandra 771. 39 *
 modesta 782. 136 *
 Moenchiana 777. 95.
 mollis 773. 55.
 Moniezii 781. 131 obs.
 montana 773.
 montana 773. 55.
 mucronata 778.
 multiflora 781. 131 obs.
 muricata 781.
 muricata × remota 780.
 123.
 nardina 784.
 neglecta 770. 29. 777. 93.
 nemorosa 781. 131. 132.
 nervosa 771. 36.
 nevadensis 771. 35 *
 nigra 776.
 nitida 774.
 norvegica 780.
 nutans 768.
 obæsa 774. 69. 775. 69.
 obtusangula 768. 8. 774.
 64.
 obtusata 783.
 Oederi 771.
 oedipostyla 773.
 oedocarpa 771. 35.
 Ohmülleriana 779. 117 *
 olbiensis 770.
 olyssipouensis 783. 146 *
 ornithopoda 772.
 ornithopodioides 772. 49
 Orsiniana 781. 132 *
 orthostachys 768.
 orthostachys 769. 14 *
 ovalis 779. 113.
 pacifica 777. 93.
 Pairæi 781. 133 *
 pallescens 774.
 pallidior 770. 30.
 paludosa 768.
 panicea 775.
 paniculata 781.
 panormitana 777. 95.
 paradoxa 781.
 parallela 784.
 parviflora 776. 83.
 patula 771. 34.
 pauciflora 783.
 pedata 772.
 pedata 772. 49.
 pediformis 772.
 pelia 775. 74 *
 pendula 769.
 Persoonij 780.
 petræa 783. 151.
 phæostachya 775. 73.
 pharensis 783. 147.
 pilosa 775.
 pilulifera 774.
 platystachya 773. 56.
 polygama 776. 85.
 polyrhiza 773. 54.
 præcox 773.
 præcox 779. 116.
 prætutiana 774. 66 *
 proluxa 777. 95 *
 provincialis 774. 64.
 pseudo-arenaria 779. 115.
 Pseudocyperus 767.
 pseudo-paradoxa 781. 135.
 psilostachya 769. 18.
 psyllophora 784. 155.
 pulicaris 783.
 pulla 768. 6.
 punctata 770.
 pyrenaica 783.
 pyriformis 771. 34 *
 rariflora 775.
 recurva 774. 66.
 reducta 776. 88 *
 reflexa 773. 54.
 refracta 773. 54.
 remota 780.
 remota × brizoides 779.
 117 *
 remota × paniculata 780.
 123 *
 repens 782.
 repens 782. 137.
 retusa 774. 64.
 Reuteriana 778.
 rhynchocarpa 770. 25.
 rhynchophysa 768.
 rigida 778.
 riparia 767.
 riparia-filiformis 768. 11.
 rivalis 782. 140.
 rivularis 782. 140.
 rostrata 768. 8. 770. 27.
 Rotæ 781. 134.
 rotundata 768.
 rufina 778.
 rupestris 783.
 salina 776.
 salinoides 776. 89.
 sarda 783. 146.
 saxatilis 768.
 saxatilis 778. 102.
 scabra 784. 162.
 schoenoides 782. 140.
 Schraderi 769. 20.
 Schreberi 779.
 scirpoides 784.
 Scoplii 772. 41.
 scotica 775. 73.
 secalina 769.
 sempervirens 772.
 serotina 771. 35.
 serrulata 774. 65.
 setifolia 782. 140 *
 sieula 770. 29. 779. 113 *
 sieyocarpa 773. 55.
 Sieberiana 784. 162.
 Siegartiana 769. 14 *
 silvatica 769.
 Soleirolii 774. 64.
 spadicea 768. 3. 771. 40.
 41.
 sparsiflora 775. 73.
 speirostachya 770. 32.
 sphærocarpa 773. 59.
 spicata 781. 132. 783. 150.
 spiculosa 776.
 splendens 782. 140.
 spreta 777. 93.
 stellulata 780. 122.
 stenophylla 782.
 stictocarpa 774. 66.
 stricta 776.
 strictifolia 777. 95 *
 strigosa 769.
 stygia 775. 79 *
 subglobosa 771. 35.
 subsalsa 770. 33.
 subspathacea 776. 88 *
 subvillosa 774. 59 *
 sudetica 775. 73.
 supina 774.
 tenella 781.
 tenella 780. 124.

- Tenorii* 773. 56.
tenuiflora 780.
tenuis 772.
teretiuscula 781.
tetánica 770. 25. 775. 73.
tetrastachya 778. 108.
thuringiaca 774. 66.
tomentosa 773.
tomentosa 773. 59*
Touranginiana 777. 95.
trachyantha 773. 55.
transsilvanica 773. 51.
tricostata 777.
triflora 771. 38.
trinervis 778.
tripartita 783. 148.
tristis 772. 41*
tuberosa 783. 146.
turfosa 777.
umbrosa 771. 34.
umbrosa 773.
undulata 774. 68.
ursina 783.
ustulata 775.
vacillans 776. 89. 777. 96.
vaginata 775.
Vahlil 776. 84.
varia 772. 44.
ventricosa 771. 38.
verna 773. 55. 775. 69.
vesicaria 768.
vesicaria 768. 5*. 6. 8.
vesicaria-hirta 769. 14*
virens 781. 132. 133 et*
virescens 774. 60.
vitalis 780. 126*
vulgaris 777.
vulgaris juncella 778. 98*
vulpina 781.
Welwitschii 769.
Wormsköldiana 784. 163.
xanthocarpa 770. 33x
Carlina acanthifolia 400.
acaulis 400.
aggregata 400. 4*
Biebersteinii 401. 13.
bracteata 401. 10.
caulescens 400. 4.
corymbosa 400.
corymbosa 400. 9*
Curetum 400. 8.
Cynara 400.
discolor 400. 5.
elatiar 400. 4*
frigida 401.
græca 400. 9*
gummifera 400.
hispanica 400. 9.
intermedia 401. 13.
involuta 400.
lanata 400.
Lobeliana 400. 9.
longifolia 401. 13*
macrocephala 400.
nebrodensis 401.
nebrodensis 401. 13*
pyrenaica 413. 24.
racemosa 400.
racemosa 400. 9.
radiata 400. 9.
Rothii 400. 9*
sicula 401.
simplex 400. 4*
subacanthis 400. 4.
sulphurea 400. 7.
transsilvanica 400. 2.
utzka 400. 2.
vulgaris 401.
Caroselinum Chabraci 287.
 29. 28.
 distans 288. 30. 1.
Caroxylon articulatum 630.
tamariscifolium 630.
tamariscinum 631. 23. 12.
Carpesium abrotanoides 380.
 cernuum 380.
 Wulfenianum 380. 32. 2.
Carpinus Betulus 663.
Carpinizza 663. 5. 1.
duinensis 663.
intermedia 663. 5. 1.
orientalis 663. 5. 2.
Carregnoa humilis 709. 2. 1.
 lutea 709.
Carrichtera Vellæ 58.
Carthamus arborescens 419.
 bæticus 419. 98. 3*
 creticus 419. 98. 3. 5.
 dentatus 419.
 elatus 419.
 glaucus 419.
 hircinus 419. 98. 1.
 lanatus 419.
 leucocaulos 419.
 tauricus 419. 98. 3.
 tinctorius 419.
 turbinatus 419.
Caruelia arabica 727. 4.
Carum Carvi 307.
 divaricatum 304. 74. 4.
 ferulæfolium 304. 74. 4.
 flexuosum 307.
 flexuosum 303. 71. 1.
 græcum 307.
 Heldreichii 307.
 incrassatum 303. 74. 2.
 inundatum 308.
 mauritanicum 303. 74. 3.
 multiflorum 307.
 rigidulum 307.
 rupestre 307.
 verticillatum 307.
Cassandra calyculata 491. 9. 1.
Cassiope hypnoides 491.
 tetragona 491.
Castanea sativa 660.
 vesca 660.
 vulgaris 660.
Castellia tuberculata 844.
Castilleja pallida 549.
Catabrosa algida 837.
 aquatica 837.
 concinna 837.
 latifolia 800. 47. 1.
 minuta 807. 66. 1.
 ochroleuca 837. 1*
 vacillans 837. 3.
 vilfoidea 837.
Catanauche carpholepis 472.
 139. 2*
 coerulea 472.
 græca 472. 138. 1.
 lutea 472.
Catapodium Halleri 843. 2.
 loliaceum 844. 2.
 siculum 844. 1.
 tuberculosum 844. 108. 1.
Cataria vulgaris 586. 7.
Catha europæa 144.
Caucalis arvensis 281. 15. 4.
 coerulescens 281.
 daucoides 281.
 elongata 281. 14. 1*
 fallax 281.
 grandiflora 278. 8. 1.
 helvetica 281. 15. 4.
 humilis 281. 14. 1.
 latifolia 281. 13. 1.
 leptophylla 281.
 muricata 281. 14. 5.
 orientalis 280. 9. 24.
 tenella 281.
 xanthotricha 281. 14. 1.
Caulinia alagnensis 685.
 flexilis 685.
 fragilis 685.
 intermedia 685. 2. 1.
 minor 685. 2. 1.
Celastrus europæus 144. 3. 1.
Celsia acaulis 532.
 Arcturus 532.
 Barnadesii 531.
 betonicæfolia 532.
 Boissieri 531.
 bugulifolia 532.

- Cavanillesii* 531.
cretica 531.
cyllenea 532.
Dänzeri 531.
glandulosa 532. 7 *
laciniata 531. 6.
orientalis 532.
pinnatifida 531. 6.
sinuata 531. 5.
speciosa 531.
sublanata 532. 7. 7 *
tomentosa 531. 51.
Celtis aspera 659. 3. 2.
australis 659.
glabrata 659. 3. 2 *
Tournefortii 659.
Cenolophium divaricatum
 294. 54. 1.
Fischeri 294.
lapponicum 294. 54. 1.
Centaurea abrotanifolia 426.
 81.
acaulis 430. 145.
achaia 429.
acicularis 431. 159.
acutifolia 422. 29.
acutiloba 426. 80.
Adami 430. 154 *
adonidifolia 429. 132.
adpressa 424. 54.
adulterina 430. 160 ×
ægyalophila 432. 103. 1.
ægyptiaca 431. 163.
æolica 426. 88.
affinis 425. 59.
Aichingeriana 423. 43.
alba 420.
alba 421. 17.
Alophium 432. 171 obs.
alpestris 424. 49 *
alpina 420.
amara 421.
amara 421. 20 *
ambigua 425.
ambigua 422. 24.
amblensis 430.
anmophila 428. 109.
Amoi 427. 96 *
amplifolia 420.
antennata 423.
apiculata 424. 49.
aplolepa 426.
apula 431. 157.
arachnoidea 429. 132.
arenaria 427.
arenaria 427. 105.
argentea 425.
argentea 429. 132.
aristata 427. 91.
arrectispina 431. 160 ×
aspera 432.
aspero-calcitrapa 431. 160 ×
astrachanica 424. 54.
athoa 429. 132.
atropurpurea 428.
atropurpurea 424. 49.
attica 427. 102.
augustana 427. 89 *
auriculata 432. 166.
australis 426. 76 *
austriaca 422.
austriaca 422. 24. 27. 28 *
axillaris 423.
badensis 424. 49.
baldensis 420. 6.
balearica 428.
banatica 421. 19. 427. 104.
Berinii 422. 24.
Besseriana 427.
Besseriana 427. 103.
Biebersteinii 427. 89 *
Boissieri 427.
Boissieri 427. 102.
bombycina 425.
Bourgæi 426. 83.
Brachtii 427. 89 *
bracteata 421. 17. 20 *
brevipappa 421. 20 *
busambarensis 424.
cæspitosa 432. 166.
calcarea 424. 49 *
calcitrapa 431.
calcitrapo-aspera 431. 160 ×
calcitrapoides 431.
calcitrapoides 431. 160 *.
 160 ×
calocephala 428. 116.
calva 420. 9 *
cana 423. 43 *
caprina 427. 100.
carduncella 430. 150.
carniolica 423. 42.
carpetana 422. 21 *
castellana 426.
Cavanillesiana 429. 135.
Ceccariniana 429.
Centaureum 420.
Centaureum 417. 1.
centauroides 429.
centauroides 429. 140.
cephalariaefolia 424.
ceratophylla 429.
ceratophylla 428. 122.
Chaubardi 427. 89 *
chrysolepis 428. 118.
cichoracea 417. 11.
ciliata 426. 77.
Cineraria 425.
Cineraria 425. 55. 66. 418.
 96. 1.
cinerea 424.
cinerea 425. 59.
cirrata 422. 28 *
Clementei 425.
coerulescens 427.
collina 430.
collina 429. 132. 140 *. 430.
 140 *. 143.
comata 422. 29.
commutata 421. 21.
Comperiana 428. 109.
conglomerata 422.
consimilis 421. 19.
Cordonis 429. 129.
coriacea 424. 49.
corinthiaca 429. 124.
Cornuti 420. 6.
corsica 432. 166 *
corymbosa 427.
Costæ 420.
crassifolia 420.
cretica 432. 103. 1.
cristata 426.
crithmifolia 425.
Crocodylium 430. 150 obs.
Crupina 433. 105. 1. 2.
cuneifolia 425.
cuneifolia 425. 76.
cuspidata 423.
Cyanus 424.
cylindrocarpa 425. 75 *.
 426. 76 *
dealbata 425. 57.
dealbescens 421. 20.
Debeauxii 422. 21 *
decipiens 421. 19 *
declinata 418. 96. 1.
depressa 424.
derventana 422.
Derventana 422. 25.
deusta 420. 9 *
Devauxii 431. 160 ×
dichroantha 428. 119.
diffusa 428.
diluta 430.
diomedea 421.
dissecta 425.
divergens 427.
divergens 426. 83.
dornacina 417. 9.
dracunculifolia 421.
dubia 421. 20 *
Duboisii 421. 19.
dotosensis 429. 137.
ebenoides 429.
Endressi 421. 21.
eriocaulon 421. 19 *

- eriphora* 431.
eryngioides 429. 124. 129.
Escobilla 426. 82.
exarata 426.
exscapa 431.
Ferdinandi 422. 24 *
filiformis 428.
Fischeri 423. 43.
floccosa 423. 42.
flosculosa 422. 24.
Fraasii 429. 127.
fraylensis 420.
Friderici 425.
fruticosa 401. 71. 2.
fuliginosa 424. 49 *
fulva 421. 21.
Funkii 427. 96. 429. 136.
fuscata 422. 29. 431. 158.
garganica 425. 61.
Gaudini 421. 17.
glaberrima 426.
glastifolia 420. 101. 1.
gnaphalodes 426. 81.
gracilior 421. 17.
gracilis 421. 19.
græca 427.
græca 429. 129.
Graëllsii 429.
Grafiana 428.
granatensis 429.
grinensis 424. 49 *
Grisebachii 427. 102 *
Guicciardii 429.
gymnocarpa 425.
Henseleri 430.
Hanrii 427. 91. 428. 111 *
hellenica 430.
Herbichii 426.
heterophylla 429. 127. 432.
 168.
Heuffelii 424. 50.
Hohenackeri 427. 100.
horrida 428.
horrida 431. 160.
hybrida 427. 90 x. 431.
 160 x
hyssopifolia 422.
iberica 431.
idæa 430.
incana 420.
incana 428. 110.
incompta 425.
indurata 422. 21 *
integrifolia 422. 21 *
intermixta 421. 20 *
intybacea 423.
inuloides 418. 95. 1.
Isernii 426.
Isnardi 432. 168.
- Jacca* 421.
Jacobi 431. 165 *
Janerii 423.
Jordaniana 422.
jurineæfolia 425. 66 *
karloviensis 423. 45.
Karstiana 426. 77.
Kartschiuna 426.
Kartschiana 426. 80 *
Kerneriana 422.
kilæa 425.
Kochii 421. 20.
Kotschyana 424.
Kotschyana 424. 49 *
laciniata 425. 60.
laconica 429.
lactuæfolia 421.
Lagascæ 428.
Lagascana 429. 138.
lancifolia 432.
Langeana 426. 83.
Langei 426.
lappacea 430. 154 *
latisquama 429.
leptoloma 426. 89.
leucantha 423. 39.
leucolepis 420. 8. 9. 11.
leucophæa 427.
limbata 428.
linearifolia 423. 34.
lineata 421. 19.
lingulata 423. 43.
linifolia 422. 33.
litorea 431. 165.
lugdunensis 423. 41.
lusitanica 432. 166 *
lyrophylla 425.
macedonica 429.
macroacantha 431. 162.
 163.
macrorrhiza 429.
maculosa 426.
maculosa 425. 56 *. 75 *
malacitana 431. 165 *
margaritacea 420. 8 *
marginata 431. 158.
mariana 429. 136.
maritima 431. 165 *
Marschalliana 423.
melitensis 431.
menteyerica 424. 49 *
micracantha 431.
micrantha 422. 32 *
micranthos 427. 89 *
microptilon 422. 21 *
Mierghii 426. 81.
Minoa 429. 128 *
mixta 430. 149.
mollis 423. 41.
- monacantha* 430.
montana 423.
monticola 427.
Moritziana 422. 27.
Mureti 427. 91 *
musarum 421.
myacantha 431. 160.
myconica 430. 148.
nana 430. 150.
napifolia 432.
napulifera 423.
neapolitana 421. 20 *
neglecta 431. 165.
nemophila 421. 19.
nemoralis 421. 21.
nervosa 422.
nervosa 422. 25.
nevadensis 421. 21.
nicæensis 431.
Niederi 425.
nigra 421. 21.
nigra 422. 25. 28.
nigrescens 421.
nigrescens 421. 19 et *. 20
 et *. 21.
Noëana 431. 163.
obscura 421. 21.
ochrolepis 423. 42.
ochrolopha 427. 95.
Oliveriana 428.
orientalis 428.
ornata 430.
Orphanidea 428.
ovina 427.
pallascens 431. 163.
pallida 426.
pallida 425. 76.
paniculata 426.
paniculata 426. 80. 81 *.
 82. 89 et *. 427. 95. 102.
 106.
pannosa 425.
Parlatoris 425. 59 *
parviflora 428. 109.
pectinata 422.
pelia 428.
Pestalotii 420. 9 *
Petteri 427. 106.
peucedanifolia 426.
phrygia 422.
phrygia 422. 24. 28.
pindicola 323.
pinnatifida 423. 42.
platylepis 421. 19.
podospermifolia 429.
polyacantha 432.
polycephala 426. 81 *
polyclada 427.
polymorpha 428.

Pouzini 431. 160 ×
 prætermissa 432. 168.
 prætorica 427. 95.
 pratensis 421. 20.
 princeps 420. 9 *
procumbens 422.
 procumbens 422. 30.
Prolongoi 428.
prostrata 427.
 prostrata 425. 56 *
 pseudo-phrygia 422. 27.
 pseudo-uniflora 422. 24.
psilacantha 429.
 pubescens 428. 119.
 pullata 419. 100. 1.
 pumila 430. 149. 150. 432.
 103. 1.
 punctata 422. 33. 426. 87.
 pyrenaica 423. 43.
 Rabenhorstiana 426. 80 *
ragusina 425.
 ragusina 425. 69.
raphanina 430.
 raphanina 430. 148. 149.
resupinata 427.
 Reuteri 426. 81 *
 rhætica 422. 27.
 rhenana 426. 89.
 rigidula 426. 81 *
 rivularis 421. 21.
 romana 432.
rubescens 428.
 rufescens 422. 21 *. 29.
rumelica 430.
rupestris 429.
 rupicola 426. 88.
 ruscinonensis 421. 19 *
ruthenica 420.
 ruthenica 417. 1.
rutifolia 425.
 rutifolia 425. 67.
Sadleriana 424.
 salicifolia 422. 21 *. 28.
 salonitana 429. 140 et *
 saxatilis 418. 95. 2. 429.
 132.
saxicola 144.
Scabiosa 424.
 Scabiosa 424. 51.
Schousboei 427.
 Schouwii 430. 153 *
 Schwarzenbergiana 420. 5.
 Scopoli 426. 80.
 scorpiurifolia 432. 168 *
 semidecurrens 423. 42.
sempervirens 423.
Seridis 431.
 serotina 421. 20 *
 seusana 423. 41. 43.

seuseana 423. 43.
 sibirica 423. 37.
 sicula 430.
 sicula 431. 158.
solstitialis 430.
sonchifolia 431.
 sonchifolia 432. 166 *
sordida 428.
 Spachii 427. 96.
 spathulata 420. 1. 421. 21.
 speciosa 418. 122.
sphærocephala 432.
 spina badia 427. 91.
spinosa 428.
 spinosa 428. 109.
 spinoso-ciliata 426. 78. 80.
 spinulosa 424. 49.
splendens 420.
 splendens 420. 8 *. 9.
Spruneri 429.
 Spruneri 429. 128.
 stenolepis 422. 28 *
 stenophylla 432. 168 *
stereophylla 424.
 stereophylla 424. 49.
sterilis 420.
 Stoebe 425. 61.
 stolensis 428. 118 *
 strepens 420. 8.
 stricta 423. 42.
 subalbida 426. 89.
 subalpina 428. 116.
subciliaris 420.
 sublanata 425.
 subtilis 425.
sulphurea 430.
 supina 422. 29.
tagana 420.
 tatarica 430. 140 *
tauromenitana 424.
 Tauscheri 427. 104.
 Tenoreana 420. 13.
tenuiflora 427.
tenuifolia 427.
 tenuisecta 426. 89.
 Timbali 421. 17.
toletana 429.
 Torreana 431. 160 *
 transalpina 421. 20 *
 trichacantha 431. 160.
trichocephala 422.
 trinervia 418. 95. 1.
 trinæfolia 426. 89.
 Triumfetti 423. 43.
 tubulosa 421. 20.
uliginosa 423.
 umbrosa 424. 47.
uniflora 422.
Urvillei 430.

valesiaca 426. 81 *
 variabilis 429. 132.
variegata 423.
 viretorum 421. 19 *
 virgata 426. 87. 427. 91.
 101.
 vochinensis 421. 20 *
 Weldeniana 421. 17.
Willkommii 427.
wolgensis 425.
 xanthina 428. 108.
 Zanonii 432. 170.
Zuccariniana 428.
Centranthus angustifolius
 338.
Calcitrapa 338.
juncus 338.
 latifolius 337. 2. 1.
 Lecoqii 338. 2. 3.
 longiflorus var. 338. 2. 5.
macrosiphon 338.
nervosus 338.
nevadensis 338.
 orbiculatus 338. 2. 8.
ruber 337.
Sibthorpii 338.
Centrophylum vid. *Kentro-*
phyllum
Centunculus minimus 601.
Cepa Schoenoprasum 741. 72.
Cephalanthera comosa 687.
 8. 1.
cucullata 687.
ensifolia 687.
 grandiflora 687. 8. 2.
 lancifolia 687. 8. 2.
 Maravignæ 687. 8. 4.
 ochroleuca 687. 8. 2 *
pollens 687.
rubra 687.
Xiphophyllum 687. 8. 4.
Cephalaria alpina 346.
ambrosioides 346.
 appendiculata 346. 6. 5.
 bætica 346. 4 *
balearica 346.
 centauroides 346. 6.
corniculata 346.
 cretacea 346. 6.
 Fussiana 346. 5.
græca 346.
joppensis 346.
 lævigata 346. 2 *. 6.
leucantha 346.
 leucantha 346. 5.
 linearifolia 346. 4 *
 macrophylla 346. 3 *
 pilosa 346. 6.
 procera 346. 2 *

- radiata* 346.
rupestris 346. 2 *
setulifera 346. 7 *
syriaca 346.
tatarica 346.
transsilvanica 346.
uralensis 346. 6.
virginica 346. 7.
Cephalocroton gymnocarpon
 872. 12.
hystrix 872. 12.
Cephalorhynchus hispidus
 461.
Cerastium acutifolium 108.
 14.
aggregatum 110. 30.
album 107. 7.
alpinum 108.
alpinum 108. 10.
alsinifolium 108. 8. 14.
alsinoides 109.
androsaceum 110. 36.
anomalum 110.
apetalum 109. 21.
apuanum 108. 9.
arenarium 109. 23.
argenteum 107. 4.
arvense 108.
atratum 108. 10.
atrovirens 110. 33.
atticum 109. 22.
banaticum 107. 4.
barbulatum 109. 22.
Biebersteinii 107.
Boissieri 108.
bombycinum 108. 10.
brachycarpum 108. 8.
brachypetalum 109.
caespitosum 108. 8. 10 *
campanulatum 109.
carinthiacum 108. 14.
ciliatum 108. 8.
Columnæ 107. 7.
constantinopolitanum 109.
 21.
corsicum 108. 8.
davuricum 107.
decalvans 107. 6.
densiflorum 110. 30.
dichotomum 110.
diffusum 110. 33.
elatum 107. 4 *
erectum 111. 3. 2.
eriphorum 108. 10.
fallax 110. 32 *
filiforme 108. 15.
fontanum 108. 11 *
Gayanum 110.
gibraltarium 108. 12.
glaberrimum 108. 10.
glabratum 108. 8. 10.
glaciale 108. 15.
glomeratum 109. 21.
glutinosum 109.
glutinosum 110. 27 *. 29.
gnaphalodes 107. 6 *
gracile 109. 22. 110. 34 *
grandiflorum 107.
Grenieri 109. 27.
heterophyllum 108. 14.
 110. 36.
hirsutum 108. 8 *
holosteiforme 110. 32.
illyricum 110.
insubricum 108. 8.
Kablikianum 108. 8.
Lamottei 110. 34.
lanatum 108. 10.
laniferum 108. 10.
lanigerum 107. 6.
lanuginosum 108. 10.
laricifolium 108. 8 *
latifolium 108.
laxum 109.
Lenzei 110. 29.
Lerchenfeldianum 108. 14.
lineare 108. 7 *
litigiosum 110.
longifolium 107. 6. 7.
longirostre 108. 11 *
luridum 109. 22 *
macilentum 110. 32.
macrocarpum 108. 11 *
matrense 108. 8.
moesiaceum 107. 6.
murale 108. 11. 109. 27.
 110. 32.
nemorale 107.
nivale 110. 38.
obscurum 109. 27.
Opizii 109. 27.
ovale 109. 21. 27.
ovatum 108.
Pallasii 108. 8 *
pallens 110. 29.
palustre 109. 17 *
pedunculare 110.
pedunculatum 108. 15 *
pellucidum 110. 32 *
pentandrum 109.
pentandrum 109. 23. 110.
 28. 30.
perfoliatum 107.
petraeum 110. 27 *
petrosum 108. 14.
pilosum 109. 22. 110. 36.
praecox 109. 17.
pumilum 110.
pumilum 109. 27. 110. 29.
 30. 32. 33.
pyrenaicum 108. 15 *
quaternellum 111. 32.
ramosissimum 110. 34.
rectum 109.
repens 107.
repens 107. 6. 108. 12. 109.
 18.
Ricci 110.
Roeseri 109. 22 *
rotundifolium 109. 21.
ruderales 109.
sammianum 107. 4. 7.
saxigenum 109. 27.
scaposum 109.
Scarani 108. 8.
semidecandrum 110.
semidecandrum 109. 22.
siculum 110.
silvaticum 109.
silvaticum 108. 11.
Soleirolii 108. 8.
squidatum 108. 10.
stellarioides 110. 38.
stenopetalum 109.
strictum 108. 8.
strigosum 109. 22.
suffruticosum 108. 8 *
tauricum 109. 22.
Tenoreanum 109. 22.
tenuis 111. 3. 2 *
tuuifolium 108. 8 *
tetrandrum 110.
Thomasianum 108. 8.
Thomasii 108.
tomentosum 107.
transsilvanicum 108.
trigynum 110.
triviale 108. 11.
umbrosus 109. 18.
uniflorum 108. 15.
villosum 108. 10. 109. 21 *
viscidulum 110. 32.
viscosissimum 108. 10.
viscosum 109.
viscosum 108. 11. 110. 32.
vulgatum 108.
vulgatum 109. 21.
Cerasus avium 213. 5.
beroliensis 213. 6.
Caproniana 213. 6.
duracina 213. 5.
Juliana 213. 5.
Mahaleb 213. 4.
Padus 212. 3.
pumila 213. 7.
semperflorans 213. 6.
vulgaris 213. 6.

- Ceratocalyx fimbriata* 557.
macrolepis 557.
Ceratocarpus arenarius 628.
Ceratocephalus falcatus 15.
incurvus 15. 11. 1.
orthoceras 15.
platyceras 15. 11. 1.
Ceratonia Siliqua 147.
Ceratophyllum apiculatum 251. 2.
demersum 251.
gibbum 251. 2 *
granulosum 251. 1.
inermis 251. 1.
muticum 251. 1.
oxyacanthum 251. 2.
platyacanthum 251. 2 *
submersum 251.
tricornis 251. 2.
tricuspidatum 251. 2.
Cercis Siliquastrum 148.
Cerefolium sativum 301. 6.
trichospermum 301. 6 *
Cerintho alpina 513. 9. 4 et *.
5.
aspera 513.
aspera 513. 2.
auriculata 513. 9. 6 *
carthusianorum 513. 9. 6 *
cleiostoma 513. 7.
glabra 513.
glabra 513. 7.
glauca 513. 1.
gymnandra 513. 2.
longiflora 513.
macrophylla 513. 9. 6.
maculata 513.
maculata 513. 7.
major 513.
major 513. 2.
minor 513.
purpurea 513. 3.
quinquemaculata 513. 9. 5.
retorta 513.
Smithiæ 513. 4 *
strigosa 513. 2.
tenuiflora 513. 4.
Cervaria alsatica 286. 10.
rigida 286. 7.
Rivini 286. 7.
Ceterach hispanicum 868.
officinarium 868.
Pozoi 868. 2.
Chænorhinum exile 542. 79.
flexuosum 541. 71.
thymiflorum 542. 79.
Chærophyllum alpestre 300.
7 *
alpinum 301. 1 *
aromaticum 300.
aureum 300.
bulbosum 300.
byzantinum 299.
calabricum 300.
Cicutaria 300. 7. 8.
coloratum 300.
creticum 300.
elegans 300.
Friedrichsthali 301. 8.
Heldreichii 299.
hirsutum 300.
hirsutum 300. 7.
Hladnikianum 301. 5.
lævigatum 300. 10.
maculatum 300. 4 *
magellense 300.
monogonum 300. 4 *
nemorosum 301. 5.
nitidum 301. 2.
nodosum 299. 66. 1.
Prescottii 300. 10 *
rigidum 300. 7 *
sativum 301. 6.
temulum 300.
umbrosum 300. 8 *
Villarsii 300.
Chaetaria coerulescens 804.
57. 1.
Chaetosciadium trichospermum 280.
Chaetospira ferruginea 761.
2. 3.
nigricans 761. 2. 2.
Chaeturus divaricatus 804. 1.
fasciculatus 804.
prostratus 804.
Chaiturus leonnroides 580.
17. 2.
Marrubiastrum 580. 17. 2.
Chamæbuxus alpestris 82.
1. 2.
Chamæcyparissus dalmaticus 155.
Chamædaphne calyculata 491.
Chamædryas flava 565. 24.
glauca 565. 24.
lucida 565. 22.
Marum 565. 28.
officinalis 565. 23.
virescens 565. 24.
Chamæmelum arvense 374. 7.
conoclinium 374. 2.
decipiens 374. 2 obs.
inodorum 374. 5.
oreades 374. 4.
præcox 374. 6.
rosellum 374. 4.
trichophyllum 374. 1.
Triumfetti 359. 3.
uniglandulosum 374. 1.
Chamæmespilus ambigua 242.
9 *
Chamaenerium angustifolium 246.
denticulatum 246.
Dodonæi 246. 2.
latifolium 246.
palustre 246.
Chamaeorchis alpina 699.
Chamaepeuce afra 404.
atropurpurea 404. 6.
Casabonæ 404.
cyuaroideis 406. 24.
echinocephala 405.
fruticosa 404.
gnaphalodes 404.
hispanica 404.
mutica 404.
nivea 405.
polyccephala 404. 3.
stellata 404.
stricta 404.
Chamaepitys vulgaris 568. 11.
Chamaereps alpina 699. 27. 1.
Chamaerops humilis 753.
macrocarpa 753.
Chamaesciadium gracile 307.
85. 2.
Heldreichii 307. 85. 5.
Chamaagrostis minima 795.
35.
Chamitea reticulata 671. 51.
Chamomilla aurea 359. 5 *.
375. 11.
discoidea 375. 10.
meridionalis 375. 25. 8 *
mixta 363. 11. 1.
nobilis 359. 5.
Chara alopecuroides 877. 2. 3.
annulata 874. 6 *
aspera 874.
atrovirens 875. 9.
baltica 876.
baltica 875. 8.
barbata 877. 2. 3 *
Barbieri 878. 7.
batrachosperma 875. 9.
Baueri 876. 21.
belemnophora 874. 5.
Borreri 879. 2.
Boveana 875. 9 *
Braunii 876.
Braunii 876. 21.
brevicaulis 878. 7.
canescens 876. 18.

- capillacea 874. 6.
 capillaris 877. 3. 2.
 capitata 877. 3. 2.
ceratophylla 875.
 coarctata 875. 9.
 collabens 875. 9.
 commutata 877. 3. 4.
 condensata 876. 18.
connivens 874.
contraria 875.
 coronata 876. 20.
 Cortiana 876. 20.
crassicaulis 875.
crinita 876.
 crispa 875. 9. ●
 curta 874. 1*
 decipiens 875. 9.
 delicatula 874. 6*
 elastica 877. 3. 2.
 equisetina 874. 7.
 eremosperma 876. 20.
 exilis 878. 8.
 fasciculata 879. 1.
 flexilis 876. 20.
 foetida 875. 9.
fragifera 874.
fragilis 874.
 fulcrata 874. 6.
 furcata 878. 7.
 furculata 877. 3. 4.
galioides 874.
 globularis 874. 6.
 glomerata 878. 10.
 glomerulifera 879. 4.
 gracilis 877. 3. 2.
 gymnophylla 875. 9*
 Hedwigii 874. 6.
hispida 874.
 hispida 874. 1.
 horrida 875.
 imperfecta 876.
 intermedia 876.
 intricata 878. 4. 1.
jubata 875.
 Kokeilii 874. 5.
 longibracteata 875. 9.
 macrosphæra 874. 2.
 Montagnei 877. 2. 3.
 mucronata 878. 7.
 nidifica 879. 3.
 nigricans 876. 18.
 obtusa 877. 2. 1.
 papulosa 876. 18.
 pilifera 874. 6.
 pleiospora 875. 9.
polyacantha 875.
 polysperma 875. 9.
 prolifera 879. 2.
 Pouzolsii 877. 2. 3.
 punctata 875. 9.
 pusilla 876. 18.
 Rabenhorstii 875. 9.
 refracta 875. 9.
 Reichenbachii 877. 2. 1.
 rudis 875. 7*
scoparia 876.
 Smithii 879. 4.
 sphagnoides 875. 9.
 spinosa 874. 7.
 Stalii 876. 20.
 Stenhammariana 879. 3.
 stricta 875. 9.
strigosa 875.
 subspinosa 875. 7*
 syncarpa 877. 3. 1.
tenuispina 874.
 tenuissima 878. 10.
 trichophylla 874. 4.
 ulvoides 877. 2. 1.
 verrucosa 874. 6*
vulgaris 875.
 vulgaris 874. 6.
 Wallrothii 877. 2. 3*
 Charopsis Braunii 876. 20.
 scoparia 876. 21.
 Stalii 876. 20.
 Chartolepis *intermedia*
 420.
 lancifolia 432. 121.
 Chasmona argentea 155. 8. 1.
 calycina 155. 8. 2.
 Cheilanthes acrostica 861. 6. 1.
 limbiata 861. 6. 2.
 fragrans 861. 6. 1.
 hispanica 862.
 maderensis 861. 6. 1.
 odora 861.
 Szovitzii 861.
 Tinei 862. 6. 3.
 Cheiranthus alpinus 41. 19*
 carniolicus 41. 12*
 Cheiri 31.
 corinthius 31.
 erysimoides 41. 9.
 fruticulosa 31. 9. 15. 1*
 helveticus 41. 19*. 42. 26.
 juncus 43. 3.
 linifolius 31.
 ochroleucus 40. 28. 8.
 pygmæus 39. 8.
 Senoneri 31.
 tomentosus 29. 3. 1.
 tristis 31. 9.
 Chelidonium laciniatum 25.
 5. 1.
 majus 25.
 quercifolium 25. 5. 1.
 Chenopodina acuminata 630.
 20. 6.
 maritima 630. 20. 8.
 salsa 630. 20. 7.
 setigera 629. 20. 5.
 Chenopodium acutifolium
 624. 11.
 album 624.
 ambrosioides 624.
 angulosum 623. 3. 3.
 blitoides 623. 3. 1.
 Bonus Henricus 623.
 botryoides 623. 3. 1.
 Botrys 624.
 candicans 624. 7.
 concatenatum 624. 7.
 crassifolium 623. 3. 1.
 deltoideum 623. 3. 4.
 elatum 624. 7.
 erosum 624. 6.
 ficifolium 624.
 foetidum 624. 10. 13 obs.
 glaucum 624.
 glomerulosum 624. 7.
 hybridum 623.
 intermedium 623. 3. 4.
 leiospermum 624. 7.
 melanospermum 623. 3. 4.
 microspermum 623. 3. 4.
 multifidum 624. 4. 1.
 murale 623.
 olidum 624. 10.
 opulifolium 624.
 paganum 624. 7.
 pedunculare 624. 7.
 polyspermum 624.
 rhombifolium 623. 3. 4.
 rubrum 623.
 serotinum 624. 8.
 urticum 623.
 viride 624. 7. 8.
 Vulvaria 624.
 Cherleria octandra 119. 31.
 sedoides 119.
 stellata 119. 7.
 Chilochoa arenaria 793. 6.
 aspera 793. 8.
 Boehmeri 792. 5.
 cuspidata 792. 4.
 Gerardi 793. 31. 1.
 Michellii 792. 4.
 Chimaphila umbellata 492.
 Chionodoxa cretica 731.
 nana 731.
 Chironia litoralis 502. 6.
 uliginosa 502. 6.
 Chlamydanthus argenteus
 641. 3. 1.
 canescens 641. 3. 2.

- ellipticus 642. 3. 12.
 hirsutus 641. 2. 1.
 Tartonraira 641. 3. 1.
 thesioides 642. 3. 11.
 Thymelæa 642. 3. 10.
 tinctorius 641. 3. 6.
 villosus 641. 3. 3.
 virgatus 642. 3. 9.
 Chlora acuminata 501. 4. 5.
 affinis 501. 4. 4.
 citrina 501.
 grandiflora 501.
 imperfoliata 501.
 intermedia 501. 4. 2*
 lanceolata 501. 4. 4.
 perfoliata 501.
 serotina 501.
 sessilifolia 501. 4. 4.
 sicula 501. 4. 1*
 Chlorocrepis staticifolia 451.
 152.
 Chondrilla acantholepis 436.
 2.
 acanthophylla 436. 2. 2*
 ambigua 436.
 Gandini 436. 2*
 graminea 436.
 intybacea 436. 2.
 juncæa 436.
 lacinata 436. 2.
 latifolia 436. 2*
 prenanthoides 436.
 ramosissima 436.
 rigens 436. 2*
 virgata 436. 2*
 Chorisporea tenella 28.
 Chrysanthemum arragonense
 373. 16.
 atratum 371. 4. 10.
 ceratophylloides 371. 10.
 coronopifolium 371. 11.
 corsicum 371. 11.
 corymbosum 372. 1.
 Halleri 371. 10.
 hybridum 370.
 lacustre 370. 23. 1.
 lanceolatum 371. 4.
 macrophyllum 373. 11.
 macrotus 370.
 maritimum 374. 3.
 monspeliense 371. 8.
 montanum 370. 23. 2. 371.
 5. 13.
 Myconis 370.
 oppositifolium 372. 16.
 pallidum 373. 16.
 pulverulentum 373. 16.
 pusillum 374. 5.
 rigidum 372. 4.
 rotundifolium 372. 6.
 segetum 370.
 serotinum 372. 5.
 setabense 371. 9.
 tanacetifolium 372. 1*
 tenuifolium 374. 1.
 trichophyllum 374. 1.
 Turreanum 372. 4.
 umbrosum 370. 20. 2.
 viscosum 369. 19. 2.
 Welwitschii 370. 20. 1.
 Chrysocoma biflora 386. 43. 3.
 divaricata 386. 42. 3.
 dracunculoides 386. 43. 3.
 liburnica 386. 42. 1*
 Linosyris 386. 42. 1.
 palustris 386. 42. 1*
 saxatilis 395. 57. 2.
 spicata 384. 37. 1.
 verticalis 395. 57. 2.
 villosa 386. 42. 2.
 Chrysopogon Græyllus 785.
 Chrysosplenium alpinum 276.
 2*
 alternifolium 275.
 dubium 276.
 glaciale 276. 2*
 nivale 275. 1.
 oppositifolium 276.
 ovalifolium 276. 3.
 tetrandrum 275. 1*
 Chrysurus aureus 797. 41. 1.
 cynosuroides 797. 41. 1.
 echinatus 797. 40. 1.
 elegans 797. 40. 2.
 Cicendia Candollei 503. 6. 2.
 filiformis 502.
 pusilla 503.
 Cicer Adonidis 200. 3.
 arictinum 200.
 ervoides 200.
 ervoides 211. 51. 6.
 floribundum 200. 46. 2.
 grecum 200.
 Montbretii 200.
 pimpinellifolium 200. 3.
 Cicerbita corymbosa 435. 7.
 muralis 436. 17.
 Cichorium byzantinum 472.
 141. 1.
 divaricatum 472.
 divaricatum 472. 141. 1.
 2 obs.
 Endivia 472. 141. 2 obs.
 glabratum 472. 141. 1.
 hirsutum 472. 141. 1.
 Intybus 472.
 nanum 472. 141. 2.
 pumilum 472. 141. 2.
 spinosum 473.
 Cicuta angustifolia 304. 76. 1.
 tenuifolia 304. 76. 1.
 virosa 304.
 Cimicifuga foetida 22.
 Cineraria alpestris 351.
 alpina 351. 15. 352. 20. 21.
 21*. 22*. 355. 31.
 ambigua 350. 5. 3*
 angustata 351. 14*
 anomala 353. 1.
 anthemoides 357. 47.
 arachnoides 355. 22.
 Aucherii 351.
 aurantiaca 352.
 aurantiaca 352. 21*
 aurea 353. 10.
 Balbistiana 351.
 bicolor 350.
 calvescens 350. 5. 1*
 campestris 352.
 campestris 352. 21*
 candida 350. 5. 2.
 cantabrica 352. 17*
 capitata 351. 12. 352. 20.
 20 x
 ceratophylla 350. 5. 1.
 cernua 349. 2. 1.
 Coderi 352. 17*
 congesta 352. 25*
 cordifolia 352.
 crispa 351.
 crocea 351. 16.
 elodes 351.
 frigida 352.
 Fussii 351. 12*
 gibbosa 350.
 glauca 358. 8. 1.
 gnaphalodes 351.
 Heldreichii 351.
 Helenitis 352. 17*
 heterophylla 357. 46.
 Heuffelii 351. 13*
 integrifolia 351. 16*. 352.
 18.
 lanceolata 352.
 longifolia 352.
 longifolia 351. 10. 13.
 lyrata 352.
 lyratifolia 355. 31.
 maritima 350.
 macrorrhiza 352. 18 +
 nebrodensis 350.
 oviensis 351. 15*
 palustris 352.
 papposa 351.
 papposa 351. 15.
 Parnassii 352.
 pratensis 351.

- procera* 351.
pyrenaica 352. 17 *
revularis 351. 16 *
rupicola 351. 14.
Samnitum 352. 22.
Schkuhrii 351. 16 *
spatulifolia 352. 18.
sudetica 351. 16 *
taygetea 350. 52 *
tenuifolia 352. 18.
thapsoides 351.
transsilvanica 351.
uliginosa 357. 42.
Visianiana 351. 7 *
Wolffii 352. 18.
Zahlbruckneri 355. 31.
Cionura erecta 496. 4. 1.
Cinna Brownii 800. 47. 1.
pendula 800.
Circæa alpina 249.
alpino-lutetiana 249. 4. 2.
intermedia 249.
lutetiana 249.
lutetiano-alpina 249. 4. 2.
Cirsium acaule 407.
acauli-oleraceum 407. 26 ×
acauli-spinosissimum 407.
26 ×
affine 407. 25 ×
albicans 409.
alpestre 407. 26 ×
ambiguum 407. 25 ×. 408.
35 *
amplum 409. 45.
anglico-palustre 407. 29 ×
anglicum 407.
appendiculatum 408.
araricum 407. 26.
arctioides 412. 9.
arvense 410.
arvense-palustre 411. 61 ×
arvensi-palustre 409. 47.
atticum 406. 22.
Ausserdorferi 408. 36 ×
autareticum 408. 39 ×
Bertolonii 408.
bipontinum 407. 26 ×
Boujarti 405. 82. 2.
Bourgoënanum 409.
brachycephalum 409.
bracteatum 405. 80. 1.
Braunii 409. 45 ×
brevispinum 410. 57.
Brunneri 407. 30 ×
bulbosum 407. 30. 410. 53.
bulgaricum 406.
calopodium 410. 61.
Candelabrum 408.
Candolleum 408. 36 ×
cano-acaule 410. 55 ×
cano-oleraceum 410. 55 ×
cano-palustre 409. 46 ×
canum 410.
Caput Medusæ 408. 39.
caniolicum 409.
caniolicum 408. 34.
Carolorum 407. 25.
castellanum 410. 59.
Celakovskianum 411. 61 ×
Cervini 408. 39 ×
Chailleti 409. 46. 47.
chelmeum 408. 38.
chium 410.
ciliatum 405.
controversum 408. 39 ×
creticum 406.
crinitum 406.
curiosum 409. 46.
cynaroides 406.
cynaroides 405. 79. 8.
decipiens 407. 26 ×
decoloratum 407. 26 ×. 409.
45.
decussatum 405.
desertorum 405. 82. 2.
dioicum 410. 61.
dissectum 407. 30.
Dollineri 409. 51 ×
Drejeri 406. 20.
echinatum 406.
elodes 409.
eriocephalum 405. 82. 5.
eriphorum 405.
eriphorum spatulatum
405. 82. 6.
Erisithales 408.
erisithali-acaule 407. 26 ×
erucagineum 408. 34 ×
esculentum 407.
ferox 406.
ferox 405. 82. 2.
filipendulum 407.
fimbriatum 405.
firmum 407. 24.
flavescens 408. 36 ×
Flavispina 410.
Forsteri 407. 29. 409. 46 ×
Frayi 409. 45.
Freyerianum 409. 51 ×
furiens 405. 82. 2.
Gerhardi 406. 20 ×
giganteum 406.
giganteum 406. 13.
glabro-monspeulanum
409. 41 ×
glabrum 408.
glabiferum 405. 82. 5.
glutinosum 408. 36.
Godroni 406. 20 ×
gracile 406. 20 ×
grandiflorum 406. 20 ×
gregarium 407.
Hallerianum 408. 39 ×
Heerianum 408. 34 ×
helenioides 407. 25.
hellenicum 406. 8.
heterophyllo-spinosissimum 408. 39 ×
heterophyllum 407.
hybridum 409. 45 ×
hypoleucum 410.
hypopsilum 406. 8. 10.
incanum 410. 61.
inermis 409. 45 ×
italicum 406.
Kochianum 409. 46 ×
Lachenalii 407. 26 ×. 409.
45 ×
laciniatum 409. 46 ×
lacteum 409. 45 ×
lampophyllum 409.
lanceolatum 406.
laniflorum 405.
lanigerum 406. 20.
leucocephalum 406.
leucophanum 405. 11.
ligulare 405.
Linkii 406. 22.
Lobellii 405.
longespinosum 406. 20.
macrostylon 411. 61 *
matritense 410. 59.
medium 407. 30 ×
microcephalum 406.
microcephalum 410. 51.
Mielichhoferi 407. 25 ×
misilmerense 406.
monspeulanum-glabrum
409. 41 ×
monspeulanum-palustre
410. 53 ×
monspeulanum 410.
monspeulanum 410. 55.
montanum 408.
morinaefolium 406.
Morisianum 406.
memorale 406. 20.
nevadense 410.
ochroleucum 408.
odontolepis 405.
oleraceo-acaule 407. 26 ×
oleraceo-arvense 411. 61 ×
oleraceo-bulbosum 409. 45
×
oleraceo-rivulare 408. 34 ×
oleraceum 409.
palatinum 409. 46 ×

pallens 409. 45 ×
palustre 409.
 palustre 409. 48. 410. 57 *
 palustri-bulbosum 409. 46
 ×
 palustri-canum 409. 46 ×
 palustri-monspessulanum
 410. 53 ×
 palustri-rivulare 409. 46 ×
 pannonico-acaule 409. 51 ×
 pannonico-palustre 409. 47.
pannonicum 409.
 parviflorum 409. 45 × 46 ×
pauciflorum 408.
 pauciflorum 407. 20 ×
polyanthemum 410.
 polyanthos 410. 57 *
polycephalum 406.
 præmorsum 408. 34 ×
 pratense 409. 46 ×. 410.
 53 *
 proponticum 405. 82. 5.
 pseudo-canum 410. 51 ×
 pseudo-oleraceum 409. 51.
 pseudo-palustre 409. 47.
 pungens 410. 55. 57. 58.
 purpureum 408. 39 ×
 pyrenaicum 410. 53.
 Reichenbachianum 411. 61
 ×
 rhodanicum 407. 30.
 rigens 407. 26 ×
rivulare 408.
 rivulari-oleraceum 408. 34
 ×
 rivulari-palustre 409. 46 ×
 Rosani 406. 20.
 Rosenii 407. 26.
 rufescens 409. 44.
 rathenicum 410. 61.
 salisburgense 408. 34.
 Scopolianum 408. 36 ×
 semidecurrens 409. 46 ×
 semipectinatum 408. 34 ×
 serratuloides 409. 51.
serrulatum 405.
 serrulatum 405. 82. 1.
 sessiliflorum 407. 25.
setigerum 409.
 setosum 410. 61.
siculum 410.
 Sigerti 408. 34 ×
 silesiacum 409. 46 ×
 silvaticum 406. 20.
 sordidum 410. 61.
 spathulatum 405. 5 *
 spinosissimo-Erisithales
 408. 36 ×

spinosissimo-heterophyl-
 lum 408. 39 ×
 spinosissimo-oleraceum
 409. 45 ×
 spinosissimo-rivulare 408.
 39.
spinosissimum 408.
 spinosissimum 409. 41.
 Spitzelii 408. 39.
 spurium 407. 29 ×
 streptacanthum 406. 20.
 strictum 404. 79. 6.
 strigosum 406. 15 obs.
 subalatum 409. 45 ×
 subalpinum 409. 46 ×
 tataricum 407. 26 ×. 410.
 55 ×
 Thomasii 409. 45 ×
 transilvanicum 405. 82. 2.
 tricephaloides 408. 34.
 tuberoso-oleraceum 409.
 45 ×
 tuberoso-palustre 409. 46 ×
tuberosum 407.
 ucranicum 405. 82. 3.
 virens 406. 20.
 Wankelii 407. 25 ×
Welwitschii 410.
 Wimmeri 410. 55 ×
 Woodwardii 407. 30.
 Zizianum 407. 30 ×
 Cistanche lutea 556. 1. 2.
 Cistus affinis 71. 10.
albidus 70.
 albedo-crispus 70. 2.
 albedo-monspeliensis 70.
 1 *
 apenninus 74. 33.
Bourgeanus 71.
 canus 75. 50.
Clusii 71.
 complicatus 70. 3 *. 4.
 corbariensis 71. 9 ×
 corsicus 70. 3.
 creticus 70. 3 *
 crispus-albidus 70. 1. 1 *. 2.
crispus 70.
 croceus 74. 28 *
 Cupanianus 70. 3.
 eriocephalus 70. 3.
 fastigiatus 71. 13.
 florentinus 71. 10 ×
 Fumana 76. 59.
 garganicus 70. 3 *
glaucus 71.
 grandiflorus 74. 30 *
hirsutus 71.
 hirtus 74. 28.
 hybridus 71. 9.

incanus 70. 1. 3. 4.
 ladanifero-monspeliensis
 71. 12 ×
ladaniferus 71.
 ladaniferus immaculatus
 71. 12 ×
 lævis 76. 57.
 laurifolio-monspeliensis 71.
 11 ×
laurifolius 71.
 laxus 71. 8.
 Ledon 71. 6. 11 ×
longifolius 71.
 marifolius 75. 50. 50 *. 76.
 53.
 monspeliensi-ladaniferus
 71. 12 ×
monspeliensis 71.
 nigricans 71. 7.
 niloticus 73. 19.
 ocymoides 72. 4.
 oelandicus 75. 51 *
 olbiensis 71. 10.
parviflorus 70.
 pilosus 74. 33. 34.
populifolius 70.
 porquerollensis 71. 10.
 Pouzolzii 70. 1 *
 pulverulentus 70. 1.
 roseus 74. 30.
 rosmarinifolius 71. 13.
 salicifolius 73. 22.
 salvifolio-monspeliensis 71.
 10.
salvifolius 71.
 serpillifolius 74. 30 *
 surreianus 74. 30.
 syriacus 73. 26.
 thymifolius 76. 57 *
 tomentosus 74. 30.
 undulatus 70. 3.
 valentinus 71. 10.
 varius 70. 1 *
villosus 70.
 villosus 70. 3 *
 vinealis 75. 50.
 Cladanthus proliferus 358.
 Cladium germanicum 761.
giganteum 761.
 Mariscus 761. 3. 1.
 Cladestina rectiflora 563.
 Claytonia perfoliata 254 obs.
 Clematis angustifolia 1. 4.
 balearica 1. 1 *
 banatica 1. 6.
 caespitosa 1. 4.
 campaniflora 1.
 canaliculata 1. 4.
 cirrhosa 1.

- crenata 1. 6.
Flammula 1.
 fragrans 1. 4.
integrifolia 2.
 lathyrifolia 1. 7.
 longicaudata 1. 5.
 maritima 1. 4. 7.
orientalis 1.
 polymorpha 1. 1.
 recta 1.
 semitriloba 1. 1 *
 taurica 1. 6.
Vitalba 1.
Viticella 1.
Cleome canescens 68.
violacea 68.
Cleonia lusitana 574.
Clinopodium arundanum 587.
 plumosum 587.
vulgare 587.
Clypeola ambigua 58. 55. 2.
eriocarpa 58.
 eriocarpa 58. 55. 3.
 Gaudini 58. 55. 2 *
 gracilis 58. 55. 2.
 hispidula 58. 55. 2.
Jonthlaspi 58.
 laevigata 58. 55. 2.
 lapidicola 58. 55. 1.
microcarpa 58.
 petraea 58. 55. 1.
 psilocarpa 58. 55. 1.
 pyrenaica 58. 55. 1 *
 spathulæfolia 58. 55. 2.
Cneorum tricoccon 147.
Cnicus acauli-oleraceus 407.
 26 ×
 alsophilus 408. 32.
 ambiguus 407. 25 ×. 408.
 35 *
benedictus 419.
 Boujarti 405. 82. 2.
 ferox 405. 82. 4.
 fimbriatus 405. 82. 1.
 horridus 408. 40.
 italicus 406. 23.
 Lachenalii 409. 45 ×
 lacteus 409. 45 ×
 macrostylus 411. 61.
 misilmerensis 405. 9.
 nudiflorus 409. 45 ×
 paludosus 409. 45 ×
 palustri-rivularis 409. 46 ×
 palustris 410. 57.
 palustri tuberosus 409. 46 ×
 parviflorus 409. 45 ×
 polyanthemus 410. 58.
 pungens 410. 57.
 saanensis 408. 34 ×
 samniticus 406. 23.
 seminudus 408. 34.
 semipectinatus 408. 34 ×
 sculus 410. 57.
 spinosissimus 409. 41.
 strictus 404. 79. 6.
 tuberoso-oleraceus 409. 45
 ×
Cnidium apioides 293.
 athoum 293. 53. 1.
cuneifolium 294.
Monnieri 294.
 palustre 293. 53. 2.
 pyrenæum 293. 50. 1.
 venosum 293.
Coccyganthe pratensis 85. 4.
 2.
Cochlearia anglica 51.
 anglica 51. 4 *
 arctica 51. 4 *
Armoracia 51.
 austriaca 35. 20. 2.
brevicaulis 51.
 danica 51.
 fenestrata 51. 4 *
 foetida 58. 56. 1.
glastifolia 51.
macrocarpa 51.
 oblongifolia 51. 3 *
officinalis 51.
 olisiponensis 66. 72. 2.
 pusilla 66. 72. 2.
 pyrenaica 51. 3.
 Wahlenbergii 51. 4 *
Codonoprasum carinatum 740
 59.
 flavum 740. 57.
 fuscum 740. 56.
 oleraceum 741. 60.
 paniculatum 740. 58.
Coeloglossum cordatum 697.
 25. 1.
 densiflorum 696. 22. 1.
 Erdingeri 696. 21. 1 ×
satyrioides 696.
viride 696.
 viridi-sambucinum 696. 21.
 1 ×
 Coix Lacryma 792. 29 obs.
Colchicum aetnense 743. 17.
 alpinum 744.
 alpinum 742. 1 *
 amabile 743.
 arenarium 744.
 arenarium 743. 18. 20.
 atticum 744. 2. 4.
 autumnale 743.
 Bertolonii 742.
 Bisignani 743. 10.
Bivona 743.
Boissieri 743.
bulbocodioides 742.
bulbocodioides 742. 3. 743.
 10.
byzantinum 743.
 byzantinum 743. 11.
 cretense 743. 18.
 Catacuzenium 742. 3.
 Clementei 742. 3.
 Cupani 742. 1. 1 *
 eubæum 743. 7 *
 Haynaldi 743. 15 *
 hololophum 743. 3.
 Jankæ 743.
Kochii 743.
 lætum 743. 10.
 latifolium 743. 7.
 lingulatum 743.
 longifolium 743.
 lusitanicum 743. 7.
 montanum 742. 1 et *. 3.
 744. 1. 23. 2. 1.
neapolitanum 743.
 neapolitanum 743. 16.
 orientale 743. 10.
 pannonicum 743. 15 *
 Parkinsoni 743.
Parlatoris 743.
 parnassicum 743.
 parviflorum 742. 1 *
 parvulum 744. 23 *
 provinciale 743. 18.
 pusillum 742.
 pyrenaicum 744. 2. 1.
 Sibthorpii 743. 7.
 speciosum 743. 10.
 Steveni 742. 1 *
 Tenorii 743.
 Todarii 743. 10.
 transsilvanicum 743. 15 *
 triphyllum 742. 3.
 turcicum 743.
 umbrosum 744.
 Valery 742. 1 *
 variegatum 743.
 variegatum 743. 7.
 variopictum 743. 9.
 vernale 743. 15.
 Visianii 743.
Coleanthus subtilis 788.
Coleostephus Myconis 370.
 20. 3.
Colladonia angustifolia
 314.
 heptaptera 314.
 triquetra 313.
Collomia grandiflora 504 obs.
Colmeiroa buxifolia 646.

- Colobachne Gerardi* 793.
Colocasias antiquorum 754.
Colpodium fulvum 830. 91. 2.
latifolium 800.
Malmgreni 800.
pendulinum 830. 91. 1.
Colutea arborescens 187.
brevialata 187.
cruenta 187. 31. 2 obs.
melanocalyx 187. 31. 1 *
Comandra elegans 643.
Comaropsis sibirica 230. 10. 2.
Comarum palustre 222.
Conioselinum Fischeri 293.
ingricum 293. 52. 1.
tataricum 293. 52. 1.
Conium croaticum 315. 106. 1.
divaricatum 315. 106. 1 *
maculatum 315.
Conopodium Bourgæi 303.
brachycarpum 303.
butinioides 303. 72. 1.
capillifolium 303.
denudatum 303.
denudatum pyrenæum 303.
71. 1.
mutabile 303. 71. 1.
pumilum 303. 71. 6.
pyrenæum 303. 71. 1.
ramosum 303.
subcarneum 303.
Conringia austriaca 42.
orientalis 42.
planisiliqua 42.
Thaliana 45. 31.
Consolida Aconiti 21. 10.
Convallaria Broteri 717. 4.
dichotoma 717. 3. 1.
latifolia 717. 5.
majalis 717.
multiflora 717. 3. 4.
polyanthema 717. 2.
Polygonatum 717. 6.
verticillata 717. 4. 1.
Convolvulus alceaefolius 506.
20.
althæoides 506.
althæoides 506. 21.
arcuatus 506. 26.
arenarius 504 (Batat.).
argenteus 504. 4. 2. 505. 5.
argyræus 506. 20.
arvensis 506.
atriplicifolius 505. 18.
Besseri 505. 13.
bryoniaefolius 506. 20 *
Calverti 505.
Cantabrica 505.
capitatus 505. 5.
Cherleri 506. 19.
Cneorum 504.
Cneorum 505. 3.
cochlearis 505.
corsicus 506. 19.
Cupanianus 506. 22 *
decumbens 506. 23.
dorycnioides 505.
Dorycnium 505.
evolvuloides 506. 23.
farinosus 506. 19 obs.
Forskahlei 505. 4.
Guicciardii 505. 15.
hirsutus 505.
hirsutus 506. 20 *
holosericeus 505.
humilis 506. 23.
Imperati 504.
intermedius 505. 13.
italicus 506. 20 *
lanatus 505.
lanuginosus 505.
lanuginosus 505. 6.
linearis 505. 5.
lineatus 505.
lineatus 505. 3.
lucanus 504. 3. 2.
meonanthus 506. 22 *
nitidus 505.
oleæfolius 505.
Parnassi 505. 15.
parnassicus 505. 15.
pentapetaloides 506.
persicus 504.
prostratus 506. 19.
pseudo-tricolor 506. 22.
radicosus 505.
sabatus 506.
sagittifolius 505. 18.
saxatilis 505. 5.
Scammonia 505.
sepium 504. 3. 1.
sericeus 505. 4.
Sibthorpii 505. 18.
siculus 506.
silvaticus 504. 3. 2.
sinnatus 504 (Batatas).
Soldanella 504. 3. 3.
stoloniferus 504.
suffruticosus 505.
tenuissimus 506.
Tournefortii 505. 3.
tricolor 506.
undulatus 506.
valentinus 505.
Conyza alata 393. 16 *
ambigua 389.
chrysocomoides 386. 41. 1.
gnaphalodes 351. 5.
Gouani 389.
græca 385. 40. 3.
intermedia 385. 40. 2.
limonifolia 393. 20.
pumila 385. 40. 5.
rupestris 385. 40. 4.
saxatilis 385. 40. 2. 3.
squarrosa 393. 14.
verbascifolia 393. 17. 18.
Coptidium ranunculoides 13.
74.
Coptis trifolia 17.
Corallorhiza ericetorum 686.
3. 1 *
innata 686.
nemoralis 686. 3. 1.
virescens 686. 3. 1.
Corbularia aurea 713. 4. 1 *
Bulbocodium 713.
cantabrica 713.
Graëllsii 713.
hedræantha 713.
monophylla 713. 4. 5.
nivalis 713.
obæsa 713. 4. 1.
tenuifolia 713.
Corema album 646.
Coreopsis Bidens 348. 1. 1.
Coriandrum melphitense
316.
sativum 316.
Coriaria myrtifolia 143.
Coridothymus capitatus 595.
38.
Coris hispanica 608.
monspeliensis 608.
Corispermum bracteatum 626.
9. 5.
canescens 626.
elatum 626. 9. 5.
hyssopifolium 626.
intermedium 626.
intermedium 626. 9. 6.
latifolium 626. 9. 1.
Marschallii 626.
microspermum 626. 9. 4.
nitidum 626.
orientale 626.
Pallasii 626. 9. 1.
purpurascens 626. 9. 4.
squarrosus 626. 9. 2. 5.
tenuis 626. 9. 4.
Coristospermum cuneifolium
294. 53. 4.
Cornicina hamosa 165. 22.
Loeflingii 165. 20.
lotoides 165. 21.
Cornucopie cucullatum
795.

- Cornus australis* 319. 2.
citrifolia 319.
mas 319.
sanguinea 319.
sanguinea 319. 2.
suecica 320.
Coronilla argentea 185. 10.
chia 185. 13.
Clusii 185. 9*
coronata 185.
coronata 185. 9*
cretica 185.
elegans 185. 11 obs.
emeroides 184.
Emerus 184.
Emerus 184. 2.
eriocarpa 187. 6*
extensa 185. 9.
glauca 185.
glauca 185. 7.
globosa 185.
juncea 184.
libanotica 185. 11*
lotoides 185. 9*
minima 185.
minima 185. 8. 9*
montana 185. 7. 8.
pallesces 185. 11.
parviflora 185.
parviflora 185. 12.
pentaphylla 185.
petraea 185. 11.
repanda 185. 26. 2.
rostrata 185. 13.
scorpioides 185. 26. 1.
stipularis 184. 4.
vaginalis 185.
valentina 184.
valentina 185. 9*
varia 185.
varia var. 185. 11*
Coronopus depressus 65. 68. 1.
didymus 65.
procumbens 65.
Ruellii 65. 68. 1.
Corradoria incanescens 609.
 11.
Corrigiola litoralis 256.
telephiifolia 256.
Cortusa Matthioli 602.
pubens 602. 11. 1*
Corvisartia Helenium 391.
 55. 1.
Corydalis acanlis 26. 9*
alpina 26. 7.
blanda 25. 3*
bulbosa 25. 3. 26. 4.
capnoides 26.
capnoides 26. 10 obs.
cava 25.
claviculata 26.
decipiens 26. 6*
densiflora 26. 4.
depauperata 26. 4.
fabacea 26.
Gebleri 26. 10.
Halleri 26. 4.
laxa 26.
Lobelii 26. 6.
lutea 26.
lutea 26. 9. 10.
Marschalliana 25.
ochroleuca 26.
parnassica 25. 3*
pseudocava 25. 3*
pseudopumila 26. 6.
pumila 26.
rutæfolia 25.
solida 26.
tenuis 26. 4*
tuberosa 25. 3.
uniflora 25. 1.
uralensis 26.
Corylus Avellana 663.
byzantina 663. 6. 1.
Colurna 663.
tubulosa 663.
Corynelobus bæticus 47. 32.
Corynephorus ætnensis 815.
 1.
articulatus 815.
canescens 815.
fasciculatus 815.
macrantherus 815. 2*
Cosentinia vellea 861. 3. 2.
Costia cristata 842. 25.
scorpioides 703. 49.
Cota altissima 359. 6.
brachycentros 359. 6.
complanata 361. 21.
tinctoria 359. 1.
Triumfetti 359. 3.
Cotoneaster arvernensis 244.
 5.
granatensis 244.
jurana 244. 5.
melanocarpa 244. 5*
nebrodensis 244.
nigra 244. 5*
obtusipetala 244. 5.
parnassica 244.
pyracantha 244.
tomentosa 244.
vulgaris 244.
Cotula anthemoides 380. 29.
 1 obs.
aurea 375. 25. 11.
coronipifolia 380.
matricarioides 375. 25. 10.
pygmæa 380. 30. 1.
Cousinia wolgensis 402.
Cracca atropurpurea 207. 21.
Bertolonii 207. 25.
calcarata 208. 32.
corsica 211. 3.
disperma 211. 2.
Gerardi 207. 16.
major 206. 14.
minor 211. 7.
monanthos 208. 30.
tenuifolia 206. 11.
varia 207. 23.
Crambe aspera 30. 10. 3.
cordifolia 30. 10. 5.
filiformis 30. 10. 6.
glabrata 30.
hispanica 30.
maritima 30.
pinnatifida 30.
reniformis 30.
tatarica 30.
Crassula andegavensis 265.
 44.
Magnolii 265. 43.
rubens 265. 42.
Cratægus atropurpurea 244.
 9.
Azarella 244. 9.
Azarolus 243.
brevispina 244.
calycina 244. 9.
dentata 242. 6.
dissecta 244. 9.
fennica 241. 3. 3.
flabellata 243. 6. 1.
florentina 242. 8.
granatensis 244.
Heldreichii 243.
heterophylla 244. 9.
hirsuta 244. 9.
hybrida 242. 6.
Insegna 244.
kyrtostyla 244. 9.
laciniata 243.
laciniata 244. 9.
lobata 244. 9 x
macrocarpa 243. 8*
maroccana 244. 11.
maura 244.
melanocarpa 243. 3. 5.
monogyna 244.
monogyna 243. 8.
nigra 243.
orientalis 243.
orientalis 243. 6.
Oxyacantha 243.
oxyacanthoides 243. 8.

- Pallasii* 243. 3.
pentagyna 243.
polycantha 244. 9 *
pseudaria 242. 9 *
pubescens 243. 6.
pyncnoloba 243.
Pyracantha 244. 7. 1.
rosæformis 244. 9.
ruscinenensis 243. 7 *
scandica 241. 3. 4.
Schraderiana 243. 6. 1.
suberrata 243. 8 obs.
tanacetifolia 243. 6. 1. 6.
Tournefortii 243. 6. 1.
triloba 243. 7 *
Crenularia orbiculata 61.
Crepinia Marschalliana 461.
 117. 3.
Crepis adenantha 457. 25.
Adonis 456. 21.
agrestis 457. 24. 25. 27.
albida 458.
albida 457. 31.
alpestris 455.
alpina 459.
amphisbæna 455. 4.
angustifolia 457. 26.
athoa 457.
aurea 456.
auriculæfolia 457.
austriaca 454. 2.
autaretica 456. 16.
bætica 459. 51 *. 473. 142.
 1.
banatica 460. 58.
barbata 473. 1.
Bauhini 457. 25.
Bauhiniana 457. 27.
bellidifolia 460.
bellidifolia 460. 62.
biennis 456.
Bivoniana 459. 52.
blattarioides 454.
bracteolata 457. 32.
bulbosa 458.
bursifolia 459.
byzantina 458. 45.
caespitosa 459.
cernua 460. 60. 60 *
chondrilloides 456.
chondrilloides 456. 15.
chrysantha 455.
chrysantha 455. 7.
Columnæ 456.
corymbosa 460. 60 *
cretica 460.
crocifolia 457.
decumbens 460.
diffusa 457. 27.
divaricata 458.
erucæfolia 460.
erucæfolia 456. 23.
foeniculacea 456. 21.
foetida 458.
foetida 460. 116. 1.
Fraasii 455. 10.
Froelichiana 458. 36.
fuliginosa 460. 60.
Fussii 443. 62.
gaditana 457. 27 *
glandulosa 458. 45.
globifera 460. 116. 1.
grandiflora 455.
grandiflora 455. 4.
Hackelii 459. 54 *
Hænseleri 459. 53 *
heterocarpa 459. 53 *
heterosperma 460. 116. 1.
hiemalis 459.
hieracioides 455. 13.
hispida 459. 58.
hispidissima 466. 129. 1.
hispidula 469. 22.
hyoseridifolia 455.
hyoseroides 460. 60.
Jacquini 456.
incana 457.
incarnata 458.
incarnata 458. 44.
insularis 458.
interrupta 455. 10. 458. 46.
 471. 136. 1.
intybacea 459. 53.
jubata 455.
Kitaibelii 456.
lacera 458.
Lachenalii 457. 26. 459.
 53.
lampsanoides 455.
lappacea 466. 129. 1. 467.
 6.
lapsanifolia 457. 34.
latalis 456. 23.
latifolia 456. 22.
leontodontoides 459.
lodomerienses 457. 24.
lusitanica 457. 27.
macrocephala 459. 48.
maritima 457. 24 *
montana 455.
montana 455. 12.
mucronata 455. 5.
multicaulis 458.
multiflora 460. 2.
Mungieri 455. 10.
muricata 457. 28.
neglecta 460.
neglecta 457. 28.
nemausensis 460. 117. 1.
nicæensis 457.
nudicaulis 461. 117. 2.
oporinoides 458.
paludosa 455.
pannonica 456. 22.
parviflora 457.
Perrieri 455. 4.
pinatifida 457. 27.
polymorpha 457. 27. 460.
 60.
præcox 459. 53.
præmorsa 457.
pulchra 457.
pulmonariæfolia 456.
purpurea 459.
pygmæa 456.
radiata 458. 45 *.
ramosissima 457.
Raulini 458.
recognita 459. 53.
Reuteriana 455.
rhætica 456. 15.
rhagadioloides 467. 7.
rhoeadifolia 458.
rigida 456.
Royi 456. 16.
rubra 458.
rubricaulis 459. 53.
ruderalis 459. 53.
Sartoriana 456. 19.
scabra 457. 25.
scariosa 459. 50.
setosa 459.
sibirica 454.
sibirica 454. 2.
Sibthorpiana 458.
Sieberi 455.
spathulata 459.
spathulata 459. 51 *
Sprengeriana 467. 6.
stricta 457. 26. 27. 460. 60.
subglabrescens 456. 16.
succisæfolia 455.
Suffreniana 460.
taraxacifolia 459.
taraxacifolia 459. 54.
taraxacoides 459. 48. 54.
taurinensis 459. 53.
tectorum 457.
tectorum 457. 27.
tingitana 459. 51.
triangula 459. 55.
Triasii 458.
tuberculata 459. 55.
vesicaria 459.
vesicaria 459. 53.
virens 457.
virens 457. 27.

- virgata* 473. 142. 3.
viscidula 454.
youngiformis 457. 34.
zacinthia 458. 46.
Cressa cretica 506.
 villosa 506.
Crinitaria biflora 386. 43. 3.
 punctata 386. 43. 3.
Critamus agrestis 305. 78. 2.
Crithmum maritimum 292.
Crithodium ægilopoides 840.
 3.
Crociris iridiflora 706. 19.
Crocus acutiflorus 708. 35.
 Adami 705.
 albiflorus 708. 36 *
 asturiensis 706. 16 *
 atticus 708. 40.
 Aucherii 706. 9.
 aureus 705. 4. 5.
 autumnalis 706.
 balkanensis 708. 39 *
 banaticus 706.
 banaticus 708. 36. 39. 41.
 biflorus 705.
 biflorus 705. 1.
 Boryanus 706. 14.
 Boryi 706.
 Boryi 706. 10. 11.
 byzantinus 706. 19.
 Cambessedesii 707.
 campestris 706. 15.
 cancellatus 707.
 carpetanus 708.
 Cartwrightianus 707.
 chrysanthus 705.
 chrysanthus 706. 9.
 Clusianus 706. 17.
 Clusii 706. 17.
 corsicus 707. 23.
 crestensis 707. 20 *
 cretensis 706. 14 *
 Creweii 705.
 dalmaticus 708.
 etruscus 708.
 Fontenayi 706. 11.
 fragrans 706. 20.
 Fussianus 705. 2.
 græcus 707. 32.
 granatensis 706. 17.
 hadriaticus 707.
 Herbertianus 706. 19.
 Heuffelianus 708.
 Heuffelii 708. 36.
 hybernus 706.
 hybernus 707. 28.
 Imperati 707.
 insularis 707. 23.
 iridiflorus 706. 19.
 italicus 705. 2.
 jonicus 706. 14.
 lævigatus 706.
 lævigatus 706. 14.
 lineatus 705. 2.
 longiflorus 707.
 longiflorus 707. 28.
 luteus 705. 5.
 magontanus 707. 31.
 Malysi 708.
 marathonisicus 706.
 Mazziaricus 707. 34.
 medius 707.
 medius 707. 34.
 minimus 707.
 minimus 705. 2 *. 707. 31.
 moesiacus 705.
 multifidus 706. 7. 8. 16.
 nanus 707. 23.
 neapolitanus 707. 21. 708.
 35.
 nivalis 708. 39. 40.
 nivigenus 708.
 nudiflorus 706.
 nudiflorus 706. 17. 19. 707.
 34.
 odorus 707. 24. 32.
 Olivieri 706.
 Orphanidis 706.
 Orsinii 707.
 Pallasianus 707. 27.
 Pallasii 707.
 Pallasii 707. 28. 34.
 peloponnesiacus 707.
 præcox 708. 35.
 pulchellus 706.
 pusillus 705. 2 *
 pyrenæus 706. 16.
 Reinwardtii 707. 20.
 reticulatus 708.
 Salzmanni 706.
 sativus 707. 32. 33.
 Schimperi 707. 34.
 serotinus 706. 17. 707. 24.
 Sibthorpianus 708. 40.
 siculus 708. 35 *
 Sieberi 708.
 speciosus 706.
 speciosus 706. 8. 16. 19.
 Spruneri 707. 34.
 suaveolens 707.
 sublimis 708. 40.
 sulphureus 705. 4. 5.
 Susianus 705.
 tauricus 706. 7.
 thessalus 708. 40.
 Thomasii 707.
 tingitanus 706. 18.
 Tommasinianus 708. 35.
 Tournefortii 706.
 uniflorus 708. 39.
 variegatus 708. 37. 42.
 veluchensis 708.
 vernus 708.
 vernus 707. 20. 708. 35 *.
 36. 39.
 versicolor 706.
 versicolor 707. 31. 708. 43.
 Visianicus 707.
 vittatus 708. 36 *
 Weldenii 705. 2.
Croton patulum 647. 4. 2.
 tinctorium 647. 4. 1.
 verbascifolium 647. 4. 2.
 villosus 647. 4. 2.
Crozophora tinctoria 647.
 verbascifolia 647.
Crucianella angustifolia
 335.
 angustifolia 335. 7. 1.
 Chaberti 335. 7. 4.
 confinis 335. 7. 4.
 græca 335.
 latifolia 335.
 macrostachya 335.
 maritima 335.
 monseliaca 335. 7. 1. 3.
 oxyloba 335. 7. 4 *
 patula 335.
 pentandra 335. 7. 5.
 rupestris 335. 7. 6 *
 Tournefortii 335. 36.
Crupina brachypappa 433.
 105. 1.
 Crupinastrum 433.
 etrusca 433. 105. 2.
 insularis 433. 105. 2.
 Morisii 433. 105. 2.
 villosa 433. 105. 2.
 vulgaris 432.
 Zuccarinii 433. 105. 2.
Crypsis aculeata 794.
 alopecuroides 794.
 macrostachya 794. 1.
 nigricans 794.
 schoenoides 794.
 sicula 794. 2.
Cryptoglochin curvulus 783.
 148.
Cryptotænia Thomasii 309.
 93. 1.
Crypturus loliaceus 845. 10.
Cucubalus alpinus 88. 7 *
 bacciferus 88.
 lugdunensis 88. 10. 1.
 marginatus 88. 11. 7 *
 mollissimus 90. 29.
 polygonoides 99. 14. 3 *

- sphæricus 88. 10. 1.
 Cucumis Citrullus 245. 1.
 obs. 1.
 Colocynthis 245.
 sativus 245. 1. obs. 1.
 Cucurbita Citrullus 245. 1.
 obs. 1.
 maxima 245. obs. 2.
 Melopepo 245. obs. 2.
 Pepo 245. obs. 2.
 Cuminum *hispanicum* 280.
 minutum 308. 86. 1.
 Cupressus horizontalis 675.
 pyramidalis 675.
 sempervirens 675.
 Cupularia viscosa 393. 22.
 Cuscuta acutiflora 507. 6.
 alba 507.
 alba 507. 9.
 approximata 507. 9 *
 astyla 506. 6. 1.
 aurantiaca 508. 12.
 bracteosa 507. 9.
 breviflora 508.
 Calliopes 507. 6 *
 Cesatiana 508. 12 *
 chrysocoma 508. 12.
 corymbosa 508. 11.
 cupulata 507. 9 *
 densiflora 507. 3.
 Epilinum 507.
 epispartos 507. 9 *
 Epithymum 507.
 europæa 507.
 globularis 508.
 Godroni 507. 8.
 Gussonii 507. 8 *
 halophila 507. 5.
 halophyta 507.
 hassiaea 508. 11.
 Kotschyi 507. 8.
 leucosphæra 507. 9 *
 Ligustri 507. 5.
 lupuliformis 507.
 macranthera 507. 6 *
 major 507. 4. 9 *
 micrantha 508. 10.
 microcephala 507. 8 *
 minor 507. 6. 9 *
 monogyna 506.
 monogyna 507. 2.
 Mülleri 507. 7.
 palæstina 508. 10.
 planiflora 507.
 planiflora 507. 8.
 polygonorum 508. 12 *
 racemosa 508. 11.
 Rogovitschiana 508. 12 *
 Schkühriana 507. 4.
 segetum 507. 4.
 sicula 507. 9.
 suaveolens 508.
 subulata 508 *
 Tinei 508. 12.
 Trifolii 507.
 Ulicis 507. 6.
 urceolata 507. 9 *
 Viciæ 507. 4.
 vulgaris 507. 4.
 Cuscutina *suaveolens* 508. 11.
 Cutandia scleropoides 831. 1.
 Cyanopsis radiatissima 418.
 94. 1.
 Cyanus pumilus 422. 27.
 roseus 418. 95. 1.
 Cyathea anthriscifolia 867. 4.
 cynapiifolia 867. 4.
 dentata 867. 4.
 fragilis 867. 4.
 montana 867. 13. 1.
 regia 867. 3. 4.
 Cyathoselinum tomentosum
 295. 60. 1.
 Cyclamen æstivum 602. 5.
 balearicum 602. 4 *
 coum 602.
 coum 602. 5.
 europæum 602.
 europæum 601. 1. 6.
 ficariifolium 601. 1.
 græcum 601.
 hederæfolium 601. 1. 602.
 3. 4.
 latifolium 602.
 neapolitanum 601.
 persicum 601. 2. 602. 3.
 Poli 601. 1 *
 repandum 602.
 romanum 602. 4.
 subhastatum 601. 1.
 vernale 602. 6.
 vernum 602. 4. 6.
 Cycloloma *platyphyllum*
 625.
 Cydonia lusitanica 240. 1. 1.
 vulgaris 240.
 Cyllenium Spruneri 755. 6. 3.
 Cymbalaria muralis 543. 88.
 Cymbaria *borysthenica* 552.
 Cynodocea *æquorea* 680.
 nodosa 680.
 Cynanchum *acutum* 496.
 contiguum 496. 3. 8 *
 fuscum 496. 3. 6.
 glaucum 496. 3. 1.
 laxum 496. 3. 8 *
 minus 496. 3. 7.
 monspeliacum 496. 2. 1.
 nigrum 496. 3. 3.
 nivale 496. 3. 9.
 speciosum 496. 3. 2.
 triste 496. 3. 2.
 Vincetoxicum 496. 3. 8.
 Cynara *alba* 403.
 algarbiensis 403.
 Cardunculus 403.
 corsica 403. 76. 1.
 horrida 403. 76. 1.
 humilis 403. 76. 3. 404.
 77. 1.
 integrifolia 404. 76. 5 obs.
 pygmæa 404. 76. 5 obs.
 Scolymus 403. 76. 1 obs.
 Sibthorpiana 403.
 spinosissima 403. 76. 1.
 Tournefortii 403.
 Cynocrambe prostrata 658.
 5. 1.
 Cynodon *Dactylon* 789.
 Cynoglossum argenteum 522.
 22. 8.
 arundanum 522.
 bicolor 521. 22. 1.
 brassicæfolium 522. 23. 4.
 cheirifolium 522.
 cheirifolium 522. 22. 8.
 clandestinum 522.
 Columnæ 522.
 creticum 521. 22. 5.
 Dioscoridis 521.
 germanicum 521. 22. 2.
 hybridum 521. 22. 1.
 lateriflorum 522. 23. 2.
 lineatum 522. 22. 9.
 Loreyi 521. 22. 5.
 magellense 522.
 montanum 521.
 myosotoides 522. 23. 5.
 nebrodense 521.
 officinale 521.
 officinale 521. 22. 4 *. 522.
 22. 6.
 pictum 521.
 pustulatum 521. 22. 4.
 siculum 521. 22. 5 *
 silvaticum 521. 22. 2.
 sphacioticum 522.
 Tenorii 521. 22. 4 *
 valentinum 521. 22. 3.
 Xatardi 521. 22. 3.
 Cynomorium *coccineum* 644.
 Cynosurus *cristatus* 797.
 echinatus 797.
 elegans 797.
 giganteus 797. 1.
 Lima 819. 85. 1.
 obliquatus 797. 2.

- polybracteatus 797. 2.
Cyperus ægyptiacus 760. 2. 1.
aureus 759.
australis 759. 9.
badius 759.
banaticus 759. 11.
brachystachys 759. 4.
Bubani 760. 16.
calidus 759.
comosus 759. 7.
cossyrensis 760. 20.
cruentus 760. 18.
diandrus 759. 13.
difformis 759.
distachyos 760.
Eragrostis 760.
esulentus 759. 8*
fascicularis 760. 15.
flavescens 760.
fuscus 759.
glaber 759.
globosus 760.
glomeratus 759.
Gussonii 760. 17.
hamulosus 763. 8. 2.
humifusus 760. 16.
Hydra 759. 7.
inconspicuus 759. 7.
intermedius 759. 3*
junciformis 760. 21.
lateralis 760. 20.
longus 758.
melanorhizus 759. 8.
Michelianus 763. 8. 1.
Monti 760.
mucronatus 760.
myriostachys 759.
neglectus 759. 4.
olivaris 759. 7.
pallescens 759.
pannonicus 760.
Papyrus 758.
patulus 759. 11.
pictus 759. 11.
polystachyos 760.
Preslii 759.
pygmæus 763. 8. 1.
radicosus 759. 7.
rotundus 759.
schoenoides 760. 2. 1.
serotinus 760. 14.
syriacus 758. 1.
Tenorii 759. 8.
tenuiflorus 759. 3. 4.
thermalis 759. 4.
vegetus 759. 13 obs.
virescens 759. 13.
vulgaris 760. 16.
Cypripedium Calceolus 686.
guttatum 686.
ventricosum 686.
Cystopteris alpina 867. 2.
Braunii 867. 2.
Dickieana 867. 3.
Filiæ femina 864. 11. 1.
fragilis 867.
leucosoria 867. 2.
leucospora 867. 2.
montana 867.
montana 867. 2.
regia 867.
silesiaca 867. 2.
sudetica 867.
taygetensis 867. 3.
Cytinus Clusii 645.
Hypocistis 645.
Cytisus absinthioides 157.
æolicus 155.
aggregatus 156. 21.
albus 157.
albus 157. 22*
alpestris 157. 26.
alpinus 155.
Alschingeri 155.
ambiguus 157. 22 +
angustifolius 155. 2.
apulus 156. 15.
arboreus 150. 4. 8.
Ardoini 158.
argyreus 156. 15.
atratus 156. 11*
austriaco-capitatus 157. 22.
austriacus 156.
bæticus 150. 4. 8.
banaticus 156. 22.
biflorus 156.
biflorus 156. 20.
bisflorens 156. 21.
candicans 155. 6.
canescens 156. 22.
capitato-austriacus 157. 22.
capitatus 157.
caramanicus 155.
chrysotrichus 157. 23.
ciliatus 157. 25*
cinereus 156. 20.
complicatus 158. 12. 3.
coronensis 157. 26.
creticus 156.
decumbens 158.
demissus 157.
elongatus 156. 18*. 20*
emeriflorus 156. 14.
falcatus 156. 18.
Fontanesii 157.
fragrans 155. 4.
gallicus 157. 26.
glabrescens 156.
græcus 164. 3.
grandiflorus 149. 4. 3.
heterochrous 156.
Heuffelii 157. 22*
hirsutissimus 156. 18*
hirsutus 156.
hirsutus 156. 15. 157. 25.
hirtellus 157. 23.
holopetalus 150. 5. 3.
humifusus 158. 33*
infestus 158. 11. 2.
Kitaibelii 157.
Kunzeanus 155.
Laburnum 155.
Lamarkii 156. 18.
lanigerus 158. 11. 3.
leiocarpus 156. 20*
leucantho-austriacus 156. 22.
leucanthus 157. 22*
linifolius 155.
Lobelii 156. 12.
microphyllus 157. 22*
monspessulanus 155.
myrtifolius 157. 30.
nigricans 156.
obvallatus 157. 22*
obscurus 157. 22*
pallidus 157. 25.
pendulinus 150. 4. 7.
plumosus 157. 28*
polytrichus 156.
potius 156. 18*
Preslii 158. 11. 3.
propinquus 157. 22*
prostratus 156.
prostratus 157. 26. 27.
pumilus 156. 18.
purgans 157.
purpureus 156.
pygmæus 157.
radiatus 150. 5. 3.
ramentaceus 155.
ramosissimus 156. 15.
ratisbonensis 156. 20.
repens 156. 18. 157. 25.
Rochellii 157. 22*
ruthenicus 156. 20.
sagittalis 154. 67.
serotinus 156. 20*. 21.
sessilifolius 156.
spinescens 156.
spinosus 158. 11. 1. 2.
supinus 157.
supinus 156. 18. 20. 21. 157. 23.
telonensis 158. 12. 4.
thessalus 157. 22*
Tommasinii 157. 25*

- tribracteolatus* 157.
triflorus 156.
Villarsii 152. 45.
virgatus 156. 18.
Weldenii 155. 4.
Czackia Liliastrum 719. 3. 1.
Daboecia polifolia 491.
Dactylis ciliata 819. 84. 1.
 cylindracea 817. 13.
 distichophylla 819. 86. 1.
 glomerata 819.
 hispanica 819. 84. 1 *
 juncinella 819. 84. 1.
 litoralis 819. 86. 1.
 repens 819. 86. 2.
 rigida 825. 4.
Dactyloctenium aegyptiacum 789.
Dactylon officinarum 789. 22. 1.
Damasonium Bourgæi 679.
 minimum 679.
 polyspermum 679.
 stellatum 679.
 vulgare 679. 2. 1.
Danthonia alpina 817. 79. 1.
 calycina 817. 79. 1.
 decumbens 817.
 provincialis 817.
Daphne alpina 640.
 argentea 641. 3. 1.
 arvernensis 640. 1.
 australis 640. 7.
 Blagayana 640.
 buxifolia 640. 9.
 Cneorum 640.
 collina 640.
 collina 640. 9.
 glandulosa 640. 9 *
 gnidioides 640.
 Gnidium 641.
 jasminea 640.
 jasminea 640. 9.
 latifolia 640. 1.
 Laureola 640.
 lucida 640. 9 *
 Mezereum 640.
 microphylla 640. 10.
 multiflora 640. 1.
 myrtifolia 641. 3. 5.
 neapolitana 640. 7.
 oleæfolia 640. 7 *
 oleoides 640.
 oleoides 640. 8.
 paniculata 641. 14.
 petraea 641.
 Philippi 640. 1 *
 pontica 640.
 rhodania 641. 11.
 rupestris 641. 13.
 sericea 640. 7 *
 Sophia 640.
 striata 641.
 vellaeoides 641. 3. 5.
 Verloti 641. 11 *
Datsca cannabina 246.
Datura Bertolonii 524. 1. 3 *
 ferox 524.
 lævis 524. 1. 3 *
 Metel 523.
 Stramonium 523.
 Tatula 523. 1. 2 *
Daucus agrestis 279. 4.
 arenicola 280. 16.
 Asturiarum 280. 17.
 aureus 279.
 bessarabicus 280.
 Bocconi 279.
 brachylobus 278. 9. 2.
 Broteri 280.
 Carota 279.
 coadunatus 279.
 crinitus 278.
 dentatus 279.
 Durieu 280. 10. 1.
 foliosus 279.
 gaditanus 280.
 gibbosus 279. 13 *
 Gingidium 279.
 Gingidium 279. 10.
 glaber 279. 4.
 Gouani 280. 17.
 gummifer 279.
 gummifer 279. 7.
 guttatus 279. 10. 280. 16 *
 halophilus 279. 11.
 heterocarpus 280. 21 *
 hispanicus 279. 10.
 hispidus 279.
 hispidus 279. 7. 10.
 involucratus 280.
 lopadusanus 280.
 lucidus 279. 6.
 maritimus 279.
 maritimus 279. 10.
 mauritanicus 279.
 mauritanicus 279. 4. 9.
 maximus 279.
 meifolius 278. 9. 1.
 Michellii 280. 22.
 microsciadus 280. 16 *
 montanus 279. 4.
 muricatus 280.
 muricatus 280. 22.
 nitidus 279. 9.
 parviflorus 279. 13 obs. 15.
 polygamus 280.
 polygamus 279. 4.
 prolifer 278. 13.
 pulcherrimus 280.
 rupestris 279.
 scabrosus 280. 16.
 serratus 279. 5 *
 setifolius 278.
 setulosus 279.
 siculus 280.
 siculus 279. 6.
 speciosus 280. 16.
Davallia canariensis 867.
Deloderium taraxacifolium 471. 136. 1.
Delphinium Aconiti 21.
 Ajacis 21.
 Ajacin 21. 12.
 alpinum 20. 3 *
 brevicornu 21.
 cardiopetalum 21.
 Clusianum 20. 3 *
 Consolida 21.
 Consolida 21. 11.
 cuneatum 20. 3.
 divaricatum 21.
 elatum 20.
 elatum 20. 3 *
 emarginatum 20.
 fissum 21.
 gracile 21. 8.
 halteratum 21.
 hellesponticum 21. 14.
 hirsutum 21. 5.
 hybridum 21.
 hybridum 21. 5.
 intermedium 20. 3.
 juncum 21. 9.
 kioviense 20. 3.
 longipes 21. 7.
 montanum 20. 3 *
 moschatum 20. 2.
 nevadense 20. 4.
 orientale 21.
 ornatum 21. 12.
 pentagynum 20. 4.
 peregrinum 21.
 pictum 20. 2.
 pubescens 21. 11. 17 *
 punicum 21. 6.
 Requienii 20.
 rigidum 21.
 speciosum 20. 3 *
 Staphisagria 20.
 tenuissimum 21.
 tomentosum 21.
 velutinum 21. 5.
 verduense 21. 8.
Dentaria bulbifera 38.
enneaphyllos 38.

- digitata* 38.
glandulosa 38.
hypanica 38. 4.
intermedia 38. 7.
pinnata 38.
polyphylla 38.
quinquefolia 38.
trifolia 38.
Deschampsia aenea 807. 69. 2.
Andræi 807. 69. 1.
atropurpurea 808. 70. 1.
bætica 808. 11.
bottnica 807. 69. 3.
brevifolia 808. 7.
cæspitosa 807. 69. 1.
discolor 808. 9.
flexuosa 808. 8.
involucrata 806. 64. 1.
junceæ 808. 4.
litoralis 807. 69. 1.
media 807. 69. 4.
refracta 808. 5.
stricta 808. 10.
subtriflora 808. 4 *
Thuillieri 808. 9.
Desmazeria castellanæ 844.
loliacea 844.
sicula 844.
Dethawia tenuifolia 292.
Deyeuxia multiflora 799. 2.
neglecta 799. 8.
silvatica 798. 1.
Dianthus acicularis 105.
acicularis 105. 63 *
aciphyllus 101. 10.
acinifolius 105. 67 *
actinopetalus 101.
alpestris 101. 17. 104. 56.
alpinus 102.
alpinus 101. 16. 102. 26.
 27.
ambiguus 104. 54 *
anticarius 101.
arboreus 101.
arenarius 104.
arenarius 104. 61.
aridus 102. 31 obs.
Armeria 102.
Armeriastrum 102. 32.
aragonensis 105. 78 *
Arrostii 105.
asper 101. 17.
atrorubens 103.
atrorubens 103. 44 *. 104.
 51. 53. 54.
attenuatus 105.
Balbisii 103. 46.
banaticus 104. 53 *
Barati 106. 97.
barbatus 102.
Bauhinianus 105. 72.
bebicus 106. 88.
benearnensis 105. 80 *
Bertolonii 101.
bicolor 106.
biflorus 101. 7. 103. 42.
binatus 105. 67 *. 72.
Bisignani 101. 4.
bitermatus 104. 53.
Boissieri 105.
brachyanthus 106.
brachyanthus 102. 28. 105.
 74.
brachycalyx 105. 72.
brevifolius 103. 49.
Broteri 104.
cæspitosifolius 106. 83.
cæsius 101.
callizonus 101.
campestris 101.
capitatus 104.
capitatus 103. 46.
Carthusianorum 103.
Carthusianorum 104. 54.
caryophylloides 105. 67 *
Caryophyllus 105.
ciliatus 106.
cinnabarinus 103.
cinnamomens 106. 92.
cintrannus 106. 82 *
cloëphyllus 103. 44.
cognobilis 105. 78.
collinus 101. 17 *. 103.
 46.
collivagus 105. 68.
compactus 102. 37. 103.
 48.
condensatus 104. 56.
congestus 103. 44 *
consanguineus 103. 43.
consimilis 105. 72.
contractus 105. 71.
corymbosus 102.
Courtoisii 104. 55 x
cous 101. 3.
crassipes 101.
cruentus 103.
cylleneus 102. 31.
cyathophorus 105. 71.
deltoides 101.
deltoides 102. 29.
diffusus 102. 31.
diutinus 103.
diutinus 103. 41. 45.
dubius 103. 44.
elegans 101. 3.
emarginatus 106. 92.
fallens 104. 57 *
fastigiatus 103. 43.
ferrugineus 104.
ferrugineus 103. 44 *
flaccidus 101. 19.
frigidus 105. 72. —
Friwaldskyanus 101.
fruticosus 101.
furcatus 106.
furcatus 104. 57.
gaditanus 106.
gallicus 104.
Gasparrini 106.
gelidus 102. 26 *
geminiflorus 101. 17.
giganteus 104.
Girardini 102. 37 *
glacialis 102.
glaucophyllus 104. 51. 53 *
glaucus 101. 20.
glumaceus 106.
glutinosus 102.
Godronianus 105. 74.
gracilis 101.
gramineus 103. 44.
graniticus 105.
gratianopolitanus 101. 19.
Grisebachii 103. 39.
Gulix 104. 52.
hamatocalyx 101.
Henteri 105. 67 *
heptaneurus 102. 38.
hirtus 105.
hirtus 105. 77.
hispanicus 106. 82.
hortensis 104. 58.
humilis 102.
hungaricus 104. 58. 105.
 63.
hypanius 101. 21.
insignitus 106. 82.
integer 106. 88.
integripetalus 105. 63.
intermedius 104.
juniperinus 101.
juratensis 105. 72.
Kayserianus 105. 67 *
Knappii 103. 46 *
lanceolatus 106. 91.
lanceifolius 102. 38. 103.
 44.
laricifolius 106.
leptopetalus 106.
leucophæus 106. 87.
liburnicus 103.
ligusticus 103. 46.
lilacinus 103.
liliodorus 105.
litoralis 106. 89.
longicaulis 105.

- longicaulis* 105. 74.
lusitanus 105.
marsicus 104. 56.
medius 103. 41 +
membranaceus 43. 41.
Mercurii 101. 7 *
microlepis 102.
miniatus 105. 70 *
monspessulanus 104.
multiceps 101.
multinervis 105.
multipunctatus 106.
myrtinervius 102.
nardiformis 101.
nazareus 105. 73.
neglectus 102.
nitidus 102.
nitidus 101. 18.
Noëanus 105.
obcordatus 106. 98.
odoratissimus 104. 56.
olympicus 103. 39.
oreades 104. 56.
orophilus 105. 72.
pullens 106.
pallidiflorus 102.
papillosus 106.
parnassicus 103. 39.
petraeus 104.
petraeus 106. 88.
pinifolius 103.
Planellæ 106.
plumarius 104.
polymorphus 103.
ponticus 104. 54.
prolifer 106.
propinquus 103. 46.
pruinosis 101. 16. 104. 53.
pseudarmeria 102.
Pseudarmeria 102. 32.
pseudobarbatus 103. 46.
pseudocæsius 105. 63.
pubescens 102.
pulchellus 101. 19.
pungens 106.
pungens 105. 74. 106. 81.
 82.
racemosus 106. 89.
ramosissimus 102. 22.
Requieni 105.
Requieni 105. 78.
rigidus 101.
rosulatus 103. 46 *
rupicola 101.
rupicola 105. 72.
rupicolus 103. 44.
sabuletorum 103. 44 *
Samaritani 103. 42.
sanguineus 103. 45 *
Sartorii 107. 100.
saxatilis 104. 56.
saxicola 105. 72.
Scheuchzeri 105. 68. 72 *
schizopetalus 104. 55.
Seguieri 101.
serotinus 104. 58 *
serratifolius 105.
serrulatus 104. 58. 106.
 88.
siculus 105. 70 *
silvatico-monspessulanus
 104. 56.
silvaticus 101. 17.
silvestris 105.
silvestris 105. 72.
speciosus 104. 56 *
sphacioticus 106.
spiculifolius 105. 63 *
squarrosus 104.
stenopetalus 103.
Sternbergii 104. 56.
strictus 106.
subacaulis 105.
superbus 104.
superbus 104. 55.
tener 104.
tenuiflorus 102.
tenuifolius 103. 44.
toletanus 101.
transsilvanicus 102. 38.
trifasciculatus 102.
tripunctatus 106.
tymphrestes 103.
vaginatus 103. 44. 44 *.
 45.
valentinus 104. 59.
velutinus 106.
ventricosus 101. 16.
virgatus 101.
virgineus 105.
virgineus 105. 72. 74.
viridescens 102.
viscidus 103.
vivariensis 105. 76.
vulturius 103. 46 *
Waldsteinii 104. 56 *
Wimmeri 104. 55.
xylochizus 106.
Diapensia lapponica 504.
Dibothrospermum *agreste*
 374. 5.
 pusillum 374. 5.
Dichodon cerastoides 110. 38.
Dichostylis fluitans 766. 13. 1.
 hamulosa 763.
 Micheliana 763.
Dichroanthus linifolius 31.
 15. 4.
Dictamnus albus 142.
Fraxinella 142.
gymnostylis 142.
hispanicus 142.
microphyllus 142.
obtusiflorus 142.
Didesmus ægyptiacus 30.
tenuifolius 30.
Digitalis ambigua 535.
 ambiguo-lutea 536. 15 ×
 aurea 535. 3.
 dubia 535.
 ferruginea 535.
 fuscescens 535. 8 *
 grandiflora 535. 8.
 intermedia 536. 15 ×
 laciniata 535.
 lævigata 535.
 lanata 535.
 leucophæa 535.
 lutea 535.
 mariana 535.
 media 536. 15 ×
 micrantha 535. 15.
 minor 535.
 minor 535. 12.
 nevadensis 535. 9 *
 nova 535. 15.
 obscura 535.
 ochroleuca 535. 8.
 orientalis 535.
 parviflora 536.
 parviflora 535. 15.
 purpurascens 535.
 purpurea 535.
 purpureo-lutea 535. 14.
 Thapsi 535.
 Thapsi 535. 9. 12.
 tomentosa 535. 9.
 viridiflora 536.
 Winterli 535. 5.
Digitaria debilis 788.
 filiformis 788.
 gracilis 788.
 paspaloïdes 788. 15 obs.
 sanguinalis 788.
Digraphis arundinacea 791.
 26.
Dimorphanthus ambigua 389.
 47. 1.
 Gouani 389. 47. 2.
Dineba ægyptiaca 789.
 arabica 789.
 divaricata 831. 1.
Dioscorea pyrenaica 718.
Diospyros Lotus 493.
Diotis candidissima 369.
Dipeadi fulvum 731. 20. 2.
 serotinum 731. 20. 1.

- Diplachne serotina* 819.
Diplopappus dysentericus 394. 56. 2.
pulicarius 394. 56. 3.
Plotaxis apula 48.
Barrelieri 49.
bracteata 48. 37. 7.
catholica 49.
crassifolia 49.
decipiens 48. 3 obs.
Erucastrum 48. 37. 6.
erucoides 48.
hispidula 49. 13.
hispidula 48.
humilis 46. 19.
intermedia 49. 4. 10.
intricata 49.
Lagascana 49.
muralis 49.
neonensis 49. 4.
pendula 49.
pendula 49. 16.
platystylos 49. 7.
Prolongi 49. 11.
repanda 46. 18.
Sagoti 48. 3 obs.
saxatilis 49.
saxatilis 49. 11.
scaposa 49.
siifolia 49.
tenuifolia 49.
viminea 49.
virgata 49.
Dipsacus Botteri 345. 6. 1.
comosus 345. 6. 2.
ferox 345.
Fullonum 345. 6. 3 obs.
Gmelini 345. 6. 4 obs.
laciniatus 345.
microcephalus 345. 6. 2.
mirabilis 345. 6. 1.
pilosus 345.
pseudo-silvestris 345. 6. 2+
purpurascens 345. 6. 1.
silvestris 345.
strigosus 345.
Disandra africana 549. 15. 1.
Dodartia orientalis 536.
Dollineria ciliata 35. 34.
Donax arundinaceus 797. 42.
1.
Dornera alpina 783. 152.
Doronicumaustriacum 349.
Bauhini 349. 3. 2*
carpathicum 349. 3. 1*
carpetanum 349.
caucasicum 350.
caucasicum 350. 10.
Clusii 349. 3.
Columnæ 350.
cordatum 349. 6. 350. 10.
cordifolium 349. 6. 350. 10.
corsicum 349.
eriorhizon 350. 9.
glaciale 349.
grandiflorum 349.
Halleri 349. 3. 1.
hirsutum 349.
hungaricum 350.
Jacquini 349. 3. 1.
longifolium 350. 8*
Matthioli 349. 6. 350. 8.
Nendtvichii 350. 9.
orientale 350. 9.
Orphanidis 349.
Pardalianches 349.
Pardalianches var. 349. 5. 7.
350. 8. 9.
plantagineum 350.
rotundifolium 390. 50. 1.
scorpioides 349. 3. 1. 6.
350. 12 obs.
Dorycnium affine 181. 4*
decumbens 101. 4*
diffusum 181. 4.
gracile 181. 4*
græcum 181. 2.
herbaceum 181.
herbaceum 181. 4*
hirsutum 181.
intermedium 181. 4*
Jordani 181. 4*
latifolium 181.
microcarpum 183. 25.
monspeliense 181. 5.
pentaphyllum 181. 5.
rectum 181.
sabaudum 181. 4*
sericeum 181. 23. 1.
suffruticosum 181.
suffruticosum 181. 4*
tomentosum 181. 23. 1.
Dorycnopsis Gerardi 165. 18.
Draba affais 52. 1.
aizoides 52.
Aizoon 52.
algida 52.
alpestris 52. 1.
alpina 52.
altaica] 53.
androsacea 53. 19. 23. 24.
arctica 52.
armata 52. 9.
aspera 52. 1*
athoa 52.
austriaca 53. 21.
Baumgartenii 52. 3.
Bertolonii 52. 1*
borealis 53. 17.
brachycarpa 53. 25*
cantabrica 52. 1*
carinthiaca 53.
ciliaris 52. 3. 53. 24.
ciliata 35. 34. 52. 3.
compacta 52. 3*
confusa 54. 27 et*
contorta 54. 27.
corsica 52. 5.
corymbosa 53.
corymbosa 52. 14. 53. 18*
crassifolia 52.
cretica 52.
curtisiliqua 53. 25*
cuspidata 52.
cuspidata 52. 1*
Dedeana 52. 1*
Dorneri 53. 24*
dovrensis 53. 17*
fladnizensis 53. 24.
frigida 53. 20*
glacialis 52.
glacialis 52. 1.
Gmelini 52. 15.
Haynaldi 52. 3*
helvetica 53. 24.
hirta 53.
hispanica 52.
Hoppeana 52. 1. 53. 22.
Hoppii 53. 22.
Johannis 53. 22.
incana 53.
incano-hirta 53. 17*
involuta 52. 6.
Kotschyi 53.
lactea 53.
laevigata 53. 24.
laevipes 53. 20*
lapponica 53. 23. 24.
lasiocarpa 52. 3.
laxa 53. 18.
leptopetala 52. 14.
Liljebladii 53. 25.
Loiseleurii 52.
longirostra 52.
lutea 54. 29.
lutescens 54.
micropetala 52. 14.
mollis 35. 18. 33.
muralis 54.
muricella 53. 25.
nemoralis 54. 29.
nemorosa 54.
nivalis 53.
nivalis 53. 22.
nivea 53. 20.
oblongata 52.
oblongata 52. 1. 53. 26.

- ochroleuca 52. 13.
 olympica 52. 5.
 oxycarpa 52. 10.
 Pacheri 53. 20.
 parnassica 52. 6 *
 pilosa 52. 13.
 pumila 53. 20.
 pyrenaica 51. 47. 1.
 repens 52.
 rigida 52. 5.
 rupestris 53.
 Sauteri 52.
 saxigena 52. 1.
 scandinavica 53. 18.
 sclerophylla 53. 24.
 Spitzelii 52. 4.
 stellata 53.
 stellata 53. 22.
 stylaris 54. 27 *
 Thomasii 54. 27 *
 tomentosa 53.
 tomentosa 53. 23.
 transsilvanica 53. 23.
 Traunsteineri 53. 22 *
 trichella 53. 18 *
 turgida 52. 9.
 verna 54. 49. 1.
 Wahlenbergii 53. 23. 24.
Dracocephalum austriacum 585.
 Moldavica 585. 4 obs.
 nutans 585.
 Ruyschiana 585.
 thymiflorum 585.
Dracunculus creticus 754. 4.
 1.
 crinitus 754.
 muscivorus 754. 4. 2.
 vulgaris 754.
Drepania barbata 473. 142. 1.
 umbellata 473. 142. 2.
Drosera anglica 82. 2. 1.
 intermedia 82.
 longifolia 82.
 longifolia 82. 2. 2.
 longifolio-rotundifolia 82.
 2. 1.
 obovata 82. 2. 1 ×
 rotundifolia 82.
 rotundifolio-anglica 82. 2.
 1.
Drosophyllum lusitanicum 81.
Drymospartum sardoum 150.
 5. 1.
Drypis spinosa 98.
Dupontia Fischeri 808.
 pellizera 808. 1.
 psilosantha 808.
Durieuia graeca 280. 9. 18.
 hispanica 280.
 juncea 278. 9. 2.
 spicata 549. 17. 1.
Ebenus cretica 200.
 pinnata 200. 44. 2.
 Sibthorpii 200.
Ecballium agreste 245. 2. 1.
 Elaterium 245. 2. 1.
Echinaria capitata 795.
 pumila 795.
Echinochloa colonum 787.
 crus galli 787.
 cruciformis 787.
Echinodorus ranunculoides 679. 1. 4.
 alpestris 679. 1. 5.
Echinophora Sibthorpiana 299.
 spinosa 299.
 tenuifolia 299.
 tenuifolia 299. 64. 2.
Echinops albidus 399. 5.
 armatus 399. 4.
 australis 399. 6.
 banaticus 399.
 banaticus 399. 6 *
 commutatus 399.
 creticus 398. 67. 1.
 exaltatus 398. 67. 2. 399.
 3.
 glandulosus 398. 67. 1.
 globifer 398.
 graecus 399.
 humilis 399. 4.
 lanuginosus 399. 7. 8.
 microcephalus 399.
 mollis 399. 3.
 Neumayeri 399.
 paniculatus 399. 5.
 Ritro 399.
 Rochelianus 399. 4.
 ruthenicus 399. 4. 6. 7.
 Sartorianus 399. 6.
 sphærocephalus 399.
 sphærocephalus 398. 67. 1.
 spinosus 398. 67. 1.
 strigosus 399.
 taygeteus 399. 5.
 tenuifolius 399. 4. 6 *
 tenuissimus 399. 8.
 virgatus 399. 6.
 viscosus 398.
 viscosus 399. 5.
Echinopsilon hirsutus 625.
 7. 8.
 hyssopifolius 625. 7. 5.
 Reuterianus 625. 7. 6.
 sedoides 625. 7. 7.
Echinospermum barbatum 523.
 casanense 523. 24. 3.
 deflexum 523.
 Lappula 523.
 marginatum 523.
 patulum 523.
 squarrosum 523. 24. 3.
 vulgare 523. 24. 3.
Echium albereanum 515. 11.
 albicans 514.
 albicans 514. 4.
 altissimum 515. 11 *
 angustifolium 515. 15.
 arenarium 515.
 asperimum 515. 11. 11 *
 australe 515. 15.
 Boissieri 514. 4.
 calycinum 515.
 candicans 516. 20 obs.
 creticum 515.
 creticum 515. 19.
 dalmaticum 514. 7.
 diffusum 515. 14. 17.
 elegans 514. 6. 515. 16.
 fastuosum 514. 1.
 flavum 514.
 Fontanesii 514. 5.
 gaditanum 515.
 glomeratum 514. 4.
 grandiflorum 515. 13.
 hispidum 515.
 italicum 515.
 italicum 514. 9.
 Lagascæ 514. 4.
 lusitanicum 514.
 lusitanicum 514. 3.
 luteum 515. 11.
 macranthum 515. 13.
 Marianum 514.
 maritimum 515.
 megalanthos 515. 13.
 molle 514. 6.
 parviflorum 515. 19.
 Pavonianum 514.
 pictum 514. 7.
 plantagineum 15.
 polycaulon 514.
 pomponium 514.
 prostratum 515. 19.
 pustulatum 514.
 pustulatum 515. 12.
 pyramidale 515. 11.
 pyramidatum 515. 11.
 pyrenaicum 515. 11. 13.
 rosulatum 515.
 rubrum 514.
 salmanticum 514. 9.

- Schifferi* 514. 6 *
sericeum 515.
setosum 515. 16.
Sibthorpii 515. 16.
spathulatum 515. 14.
tuberculatum 514. 7.
valentinum 514. 5.
violaceum 514. 7. 515. 10.
 13.
virescens 516. 20 obs.
vulgare 514.
vulgare 514. 3. 7.
Wierzbickii 514. 6 *
Edraianthus caricinus 486.
 9. 3 *
croaticus 486. 9. 1 *
dalmaticus 486.
graminifolius 486.
Kitaibelii 486.
Pumilio 486.
serpyllifolius 486.
tenuifolius 486.
thymifolius 486. 9. 5 *
Ehrharta panicæ 789. 18 obs.
Elæagnus angustifolius
 644.
Elæoselinum Asclepium
 276.
Asclepium 276. 2. 2.
foetidum 276.
Lagasce 276.
Loscpii 276.
meoides 276.
millefolium 276.
tenuifolium 276. 2. 6.
Elatine Alsinastrium 123.
callitrichoides 124. 6 *
campylosperma 123. 4 *
Fabri 123. 4.
Hardyana 123. 2.
hastata 542. 82.
hexandra 123.
Hydropiper 123.
Hydropiper, 123. 3.
macropoda 123.
major 123.
majuscula 123. 3.
orthosperma 123. 2.
paludosa 123. 3. 5.
Schkuhriana 123. 2.
siphosperma 123. 2.
spathulata 123. 2.
tenuis 543. 85.
triandra 123.
tripetala 123. 5.
Eleocharis acicularis 767.
affinis 767. 4.
atropurpurea 766. 2.
Bartoliniana 767. 6.
carniolica 767.
costata 767. 7.
crassa 767. 3.
Lereschii 766.
multicaulis 767.
nebrodensis 767. 3 *
ovata 766.
palustris 767.
uniglumis 767.
Watsoni 767. 4.
Zanardini 767.
Eleocharis ovatus 766. 14. 1.
Eleogiton fluitans 766.
Elephas Columnæ 552. 25. 1.
Elensine indica 789. 23 obs.
barcinonensis 789. 23 obs.
Elisma natans 679. 1. 3.
Elizaldia nonneoides 512. 9.
Elodea canadensis 678. 5. 1.
Elodes palustris 134.
Elsholzia cristata 597. 38 obs.
Elymus arenarius 837.
caput Medusæ 837.
crinitus 837. 5 *
europæus 837.
geniculatus 837. 2.
giganteus 837.
intermedius 837. 5 *
sabulosus 837.
Elyna caricina 784. 16. 1.
spicata 784.
Emex spinosa 633.
Empetrum album 646.
nigrum 646.
Enarthrocarpus arcuatus
 29.
lyratus 29.
Endoptera aspera 460.
dichotoma 460.
Dioscoridis 460.
Endressia pyrenaica 291.
Endymion amoenuus 731.
campanulatus 731.
cernuus 731.
nutans 731.
patulus 730.
Engelmannia migrans 508.
 11.
suaveolens 508. 11.
Enodium coeruleum 818. 82.
 1
Ephedra altissima 677. 3.
arborea 677. 5.
campylopoda 677.
Clusii 677. 3. 4.
distachya 677. 2. 3. 4. 5.
fragilis 677.
fragilis 676. 1. 4.
græca 677. 1.
helvetica 677. 5 *
major 677. 4.
minor 677. 5.
monostachya 677. 5.
nebrodensis 677.
procera 677.
scoparia 677. 2 *
Villarsii 677. 2.
vulgaris 677.
Ephemerum nemorum 600. 5.
Epilinea cuscutoideus 507. 3.
Epilobium adnatum 247. 4.
alpestre 248. 8. 12.
alpinum 248. 12. 13.
alpinum majus 248. 13 *
alsinefolium 248.
amplexicaule 246. 2. 1.
anagallidifolium 248.
anceps 248. 9 x
angustifolium 246. 1. 1.
angustissimum 246. 1. 2.
attenuatum 247. 2.
brachycarpum 246. 1. 1.
canescens 246. 1. 1.
carpetanum 248. 10 *
chordorhizum 247. 5. 5 *
collinum 248. 10 *
crassifolium 246. 1. 3.
dasyarpum 248. 13.
denticulatum 246. 1. 3.
Dodonæi 246. 1. 2.
Duriei 248.
Facchinii 248. 12 *
flaccidum 247. 3.
Fleischeri 246. 1. 3.
gemmascens 247. 6. 6 obs.
gemmiferum 247.
Hornemanni 248. 13 *
hirsutum 246.
hybridum 246. 2. 1 x
hypericifolium 248. 10 *
intermedium 246. 2. 1.
Kernerii 248. 11 x
Krausei 248. 14 x
Lamyi 247. 4 *
lanceolatum 247.
Larambergianum 248. 10 *
latifolium 246. 1. 4.
ligulatum 248. 14.
limosum 248. 10.
lineare 248.
lineare 248. 14 x
macrocarpum 246. 1. 1.
molle 247. 2.
montano-parviflorum 248.
 10.
montanum 248.
montanum 248. 9.
mutabile 248. 9 *

- nutans 248. 13. 13*. 14 ×.
 15.
 obscuro-origanifolium 248.
 12 ×
obscurum 247.
 obscurum 247. 3. 4*. 5*
 origanifolium 248. 12.
 Ozanonis 248. 10*
palustre 248.
 palustri-hirsutum 247. 2 ×
 palustri-obscurum 247. 5.
 palustri-parviflorum 248.
 14 ×
 palustri-roseum 247. 7 ×
 parvifloro-palustre 247. 2 ×
parviflorum 247.
 perramosum 248. 10*
 persicium 248. 10.
 pubescens 247. 2.
 purpureum 247. 5 ×
 rivulare 247. 2.
 roseo-parviflorum 247. 7 ×
 roseo-pubescens 247. 2 ×
roseum 247.
 rosmarinifolium 246. 1. 2.
 salicifolium 248. 12*
 Salzmanni 247. 3.
 scaturiginum 248. 14 ×
 Schmidtianum 248. 14.
 silvaticum 248. 11.
 sparsifolium 248. 9.
 spicatum 246. 1. 1.
 sudeticum 248. 13.
tetragonum 247.
 tetragonum 247. 4*. 5.
 tomentosum 246. 2. 1.
Tournefortii 247.
 Tournefortii 247. 4.
trigonum 247.
 verticillatum 248. 10.
 virgatum 247. 4*. 5. 5*
Epimedium alpinum 22.
 alpinum 22. 2. 1*
 pubigerum 22. 2. 1*
Epipactis athenensis 688. 9. 4
 obs.
atrorubens 688.
latifolia 688.
longifolia 688. 9. 1.
media 688. 9. 2*. 3.
microphylla 688.
ovalis 688. 9. 2*
palustris 687.
 purpurata 688. 9. 2.
 rubiginosa 688. 9. 3.
 sessilifolia 688. 9. 2.
 violacea 688. 9. 2.
 viridiflora 688. 9. 3.
Epipogon aphyllum 687.
 Gmelini 687. 6. 1.
Equisetum alpinum 860. 9.
 ambiguum 859. 1.
 amphibolium 859. 4.
 aquaticum 859. 5.
 arenarium 860. 7.
arvense 859.
 arvensi-limosum 859. 6.
 asperrium 860. 9.
 Brannii 869. 1.
 caespitosum 860. 8.
 capillare 859. 3.
 Drummondii 859. 4.
 eburneum 859. 1.
 Ehrharti 859. 4.
 elongatum 860. 8. 10.
 ephedroides 860. 8.
fluviale 859.
 fluviale 859. 1.
 fusco-zonatum 860. 9.
 granatense 859. 1.
 Heleocharis 859. 5.
hiemale 860.
 illyricum 860. 8.
 intermedium 860. 9.
 inundatum 859. 6.
 Kochianum 859. 6.
 lacustre 859. 5.
 lapponicum 860. 12.
 limosum 859. 5.
litorale 859.
 Mackaii 860. 10.
 maximum 859. 1.
 Moorei 860. 9.
 multicaule 860. 8.
 nemorosum 859. 2.
 nodosum 860. 7.
 pallidum 860. 8.
palustre 860.
 pannonicum 860. 8.
pratense 859.
 pratense 859. 2. 860. 7.
 prostratum 860. 7.
 ramosissimum 860.
 ramosum 860. 8.
 reptans 860. 11. 12.
 Rionii 860. 11.
 riparium 859. 2*
 rivulare 859. 1.
 Schleicheri 860. 9.
scirpoides 860. 12.
 serotinum 860. 11.
silvaticum 859.
 striatum 859. 5.
Telmateia 859.
 tenue 860. 8. 11.
trachyodon 860.
 trachyodon 860. 9.
 uliginosum 859. 6.
 umbrosum 859. 4.
variegatum 860.
 veronense 860. 7.
 Wilsoni 860. 11.
 zonatum 860. 9.
Eragrostis atrovirens 833. 5.
collina 833.
major 833.
megastachya 833. 2.
minor 833.
papposa 833.
pilosa 833.
 poæformis 833. 3.
 poæoides 833. 3.
 speirostachya 833. 5.
 suaveolens 833. 1.
 verticillata 833. 4. 5.
Eranthis hiemalis 18.
Eremopyrum cristatum 842.
 25.
 orientale 842. 26.
Eremurus spectabilis 720. 8.
 1 obs.
tauricus 720.
Erianthus Hostii 785.
Ravennæ 785.
Erica anthura 489. 11*
 aragonensis 488. 2*
arborea 488.
australis 488.
 australis 488. 2*
carnea 489.
ciliaris 488.
cinerea 488.
corsica 488. 3.
 cretica 489. 12.
 decipiens 489. 11.
 elata 488. 8.
 herbacea 489. 14.
 hibernica 489. 13.
 lugubris 489. 13.
lusitanica 488.
 Mackayana 488. 5*
 Mackayi 488. 5*
 manipuliflora 489. 12.
 Martinezii 488. 5.
mediterranea 489.
 mediterranea 489. 12. 14.
multiflora 489.
 nematodes 489. 12*
 peduncularis 489. 10.
 polytrichifolia 488. 7.
 purpurascens 489. 13*
 ramulosa 488. 3.
 saxatilis 489. 14.
scoparia 488.
 sicula 488. 1. 1.
 stricta 488.
Tetralix 488.

- umbellata* 488.
umbellata 488. 2 *
vaga 489. 12.
vagans 489.
vagans 489. 10. 12.
verticillata 489.
 Watsoni 488 6 x
Erigeron *acre* 389.
alpestre 388. 4.
alpinum 388.
alpinum 388. 46. 2. 4 *
angulosum 389. 7. 9 *
angustatum 389. 9 *
asteroides 388. 4. 389. 9 *
atticum 388. 5.
bonariense 389. 9 obs. 1.
canadense 389. 9 obs. 1.
carpathicum 388. 5.
corymbosum 389. 9.
crispum 389. 47. 1.
droebachense 389.
elongatum 389. 6. 7.
frigidum 388.
Funkii 388. 4 *
glaberrimum 389. 7.
glabratum 388.
glabrum 388. 4.
Gouani 389. 47. 1.
grandiflorum 388. 4.
hirsutum 388. 4.
intermedium 388. 5 + 389.
 9.
linearifolium 389. 47. 1.
macrophyllum 388. 46. 3 *
Mülleri 389. 7.
nanum 388. 4.
neglectum 388. 4.
podolicum 389. 9. 9 *
politum 388.
pseudoacre 389. 46. 7.
rigidum 389.
rupestre 388. 4.
scandinavicum 389. 6.
serotinum 389. 9.
uniflorum 388.
uniflorum 388. 4.
Villarsii 388.
vulgare 389. 9.
Erinacea *pungens* 154.
Erinia campanulata 481. 71.
Erinosma verum 714. 7. 1.
Erinus *alpinus* 543.
campanulatus 481. 71.
glabratus 544. 12. 1.
hispanicus 544. 12. 1.
Eriocaulon *septangulare*
 753.
Eriolepis lanceolata 405. 20.
lanigera 405. 5.
Eriophorum *alpinum* 762.
angustifolium 761.
cæspitosum 762. 4.
callithrix 762.
capitatum 762. 7.
gracile 762.
gracile 762. 2.
latifolium 761.
polystachyum 761. 1. 762.
 2.
pubescens 761. 1.
russeolum 762.
Scheuchzeri 762.
triquetrum 762. 3.
vaginatum 762.
Vaillantii 762. 2.
Eriosynaphe *longifolia* 284.
Eritrichium *Hacquetii* 523.
 25. 1.
latifolium 523. 25. 2 *
nanum 523.
tergloviense 523. 25. 1.
villosum 523.
Erodium *absinthoides* 141.
absinthoides 141. 37.
affine 139. 3.
albiflorum 139. 9.
alnifolium 139.
alpinum 141.
althæoides 139. 5.
anthemidifolium 141. 35.
apenninum 141. 35.
arenarium 140. 19.
asplenioides 139. 14.
astragaloides 140.
australe 139. 17.
Barrandonianum 140. 26.
Bocconi 139. 11.
Boissieri 139.
Boræanum 140. 19 *
Botrys 139.
brevicaule 140. 18.
Camposianum 140.
carvifolium 139.
chærophylloides 140. 23.
chamædryoides 139. 12.
cheilanthesifolium 140. 31.
chium 139.
chrysanthum 141.
ciconium 140.
ciconium 139. 2 *
cicutarium 140.
cinerascens 139. 3.
commixtum 140. 19.
commutatum 139. 5.
corsicum 139.
cuneatum 139. 13 *
daucoides 140.
dentatum 139. 17.
elongatum 139. 9.
fallax 140. 26.
fumarioides 141. 34.
Gasparrinii 139. 2.
glandulosum 140. 30.
glutinosum 140. 19 *
gruinum 138.
Guccicardii 141.
Gussonii 139.
guttatum 139.
hirtum 140. 20 *
hispidum 139. 3.
Jacquinianum 140. 20 *
involveratum 139. 3.
laciniatum 139.
litoreum 139.
litoreum 139. 13. 13 *
longicaule 139. 9.
macradenum 140.
malacoides 139.
malopoides 139. 9. 10.
malvaceum 139. 5.
Manescavi 139.
Marcuccii 140.
maritimum 139.
minutiflorum 140. 19.
moschatum 139.
murcicum 139. 13.
Neileichii 139. 2 *
nervulosum 139.
obliquifolium 139. 9.
pallidiflorum 140. 19 *
parviflorum 140. 19.
petraeum 141.
petraeum 141. 34. 35.
pilosum 140. 19.
pimpinellifolium 140. 19.
præcox 140. 19.
prætermisum 140. 19.
primulacæum 140.
provinciale 140. 26 *
pulverulentum 139. 3.
radicatum 140. 30.
Reichardi 139.
Robertianum 140. 17 *
romanum 140.
rupicola 140.
ruthenicum 140. 25.
sabulicolum 140. 19.
Salzmanni 140.
Salzmanni 140. 24.
serotinum 140.
solantinum 139. 3 *
staphylinum 140.
stellatum 140. 24.
stipulaceum 139. 5.
subalbidum 140. 19 *
subtrilobum 139. 5.
supracanum 141.

- tenuisectum* 140. 20.
tolosanum 140. 26.
trichomanefolium 140.
trilobatum 139. 5.
triviale 140. 19.
Erophila brachycarpa 54. 49. 1*
furcipila 54. 49. 1*
glabrescens 54. 49. 1.
hirta 54. 49. 1*
hirtella 54. 49. 1*
Krockeri 54. 49. 1*
majuscula 54. 49. 1*
medioxima 54. 49. 1.
micantha 54. 49. 1.
minutissima 54. 49. 1*
oblongata 54. 49. 1.
præcox 54. 49. 1*
spatulata 54. 49. 1*
stenocarpa 54. 49. 1*
vulgaris 54.
Eruca glabrescens 49. 40. 1.
orthosepala 49.
permixta 49. 40. 1.
sativa 49.
vesicaria 50.
Erucago arvensis 67. 76. 1.
brachyptera 67. 76. 1.
campestris 67.
dentata 67. 76. 1.
macroptera 67. 76. 1.
tricornis 67.
Erucaria aleppica 30.
Erucastrum bæticum 48.
elongatum 46. 28.
fruticulosum 47. 29.
heterophyllum 48. 9.
incanum 48.
inodorum 48. 7.
intermedium 48. 6*
longirostre 48.
obtusangulum 48.
Pollichii 48.
Pseudosinapis 48.
subbipinnatifidum 48.
virgatum 48.
virgatum 48. 2.
Zanonii 48.
Ervilia sativa 212. 8.
Ervum agrigentinum 211.
Biebersteinii 212. 11.
corsicum 211.
dispermum 211. 4.
Ervilia 211.
gracile 212.
hirsutum 211.
Hohenackeri 211. 6.
Hoppei 212. 11.
Lens 211.
Lenticula 211.
lentoides 211. 5.
Loiseleurii 212. 11.
longifolium 212. 9.
monanthos 208. 30.
nigricans 211.
parviflorum 211.
pilosissimum 211. 4.
pubescens 212.
sardoum 211. 7.
tenuifolium 212. 9.
tenuissimum 212. 9.
Terronii 211. 7.
tetraspermum 212.
uniflorum 211. 6.
varium 212. 9.
vicioides 208. 34.
Eryngium alpinum 317.
amethystinum 316.
amethystinum 316. 5.
aquifolium 317.
australe 316. 4.
Barrelieri 318.
Bourgati 316.
campestre 317.
corniculatum 317.
creticum 317.
creticum 317. 21.
crinitum 316. 5. 317. 15.
cyaneum 317. 20.
dichotomum 317.
dilatatum 316.
dilatatum 316. 4.
Duricanum 317.
Duriei 317. 16.
galioides 318.
glaciale 317.
glomeratum 316.
ilicifolium 317.
ilicifolium 317. 16.
intermedium 317. 12*
latifolium 316.
maritimum 317.
multifidum 316. 4*
palmatum 317.
parviflorum 316. 3.
pauciflorum 318. 24.
pentechinum 316. 3.
planum 317.
pusillum 317.
pusillum 318. 24. 25. 26.
scariosum 316. 3.
serbicum 316.
Spina alba 316.
tenuë 317. 22.
ternatum 316.
tricuspidatum 317.
triquetrum 317.
virens 317. 9.
viviparum 318.
Erysimum accedens 40. 8.
aciphyllum 40.
adscendens 40. 8.
alpestre 41. 19*
alpinum 32. 18. 3. 41. 19*
altissimum 41. 19*
Andrzeiowskianum 41. 21.
arcuatum 32. 16. 5.
asperulum 41.
atticum 40. 5.
aureum 42.
austriacum 42. 30. 1.
ausoricum 41. 13.
australe 41.
australe 41. 20.
Baumgartenianum 40. 2*
Bonnannianum 41. 9*
Boryanum 40.
Bourgeauianum 41. 11.
calycinum 40.
campestre 42. 30. 1.
canescens 41.
canescens 41. 11.
carniolicum 41. 12*
cheiranthoides 42.
Cheiranthus 41. 9.
cheiriflorum 41. 12.
chrysanthum 41. 12*
confertum 42. 23.
consimile 40. 8.
crepidifolium 40.
creticum 40.
cuspidatum 42.
diffusum 41. 21.
durum 42. 23.
elatum 41. 15.
exaltatum 41. 19*
Fussianum 41. 15.
glareosum 40. 8.
græcum 42.
helveticum 41. 8*
hieracifolium 41.
hieracifolium 40. 2. 41. 12. 17.
incanum 42.
Kunzeanum 42. 24.
lanceolatum 41.
lanceolatum 41. 12.
leptostylum 41.
linariæfolium 41. 9.
linifolium 31. 15. 4.
longifolium 41.
longisiliquosum 42. 23.
longisiliquum 42. 23.
Marschallianum 41.
montosicolum 41.
murale 42.

- murale 41. 9.
 nevadense 41. 11.
 ochroleucum 40.
 odoratum 41.
 odoratum 40. 2*. 41. 12*
 olympicum 40.
 orientale 42. 30. 1.
 pallens 40. 2. 41. 8*
 pannonicum 41. 12.
 Parnassi 40. 5*
 pectinatum 40.
 perfoliatum 42. 30. 1.
 planisiliquum 42. 30. 3.
 pumilum 41. 9*
 pyrenaicum 41. 8*
 ramosissimum 42. 28.
 Raulini 41.
 repandum 42.
 rhæticum 41. 8*
 rupestre 40. 5.
 siculum 41. 9.
 silvaticum 41.
 smyrnæum 41.
 strictum 41. 12. 19*. 42.
 24.
 suffruticosum 42. 26.
 transsilvanicum 40. 8.
 Urvillæanum 41. 17.
 versicolor 42.
 virgatum 42.
 virgatum 41. 19. 42. 26.
 Witmanni 40. 2*
 Erythraea angustifolia 502. 6.
 arenaria 502. 8.
 Barrelieri 501. 5. 3.
 Boissieri 501. 5. 1.
 caespitosa 502. 7.
 Centaurium 501.
 centauroides 502. 8.
 chloodes 502. 7.
 compressa 502. 6.
 conferta 502.
 conferta 502. 8.
 diffusa 502.
 emarginata 502. 9.
 Gerardi 502. 9.
 grandiflora 501.
 gypsicola 502.
 inaperta 502. 9.
 latifolia 502.
 linarifolia 502.
 linarifolia 501. 5. 3.
 linearifolia 501. 5. 2. 502.
 6*
 litoralis 502. 6. 7.
 lutea 502. 12.
 major 501.
 major 501. 5. 1.
 maritima 502.
 Meyeri 502. 9*
 microcalyx 502.
 nana 502. 9.
 portensis 502. 10.
 pulchella 502.
 pulchella 502. 8.
 pyrenaica 502. 9.
 ramosissima 502. 9.
 rhodensis 501. 5. 2.
 sanguinea 501. 5. 3.
 scilloides 502. 10.
 spicata 502.
 suffruticosa 501. 5. 1.
 tenuiflora 502. 8.
 tenuifolia 502. 6*
 Erythronium dens canis
 724.
 Erythrostictus europæus
 744.
 punctatus 744. 4. 1.
 Eschenbachia ambigua 389.
 47. 1.
 Euclidium syriacum 68.
 Eudianthe coeli rosa 85.
 corsica 85.
 lata 85.
 Eufragia atroviolacea 550.
 20. 3*
 latifolia 550. 20. 3.
 viscosa 550. 20. 2.
 Eunomia orbiculata 61. 63. 1.
 Euonymus europæus 144. 2.
 2.
 floribundus 144. 2. 2.
 latifolius 144.
 leiophlæos 144. 2. 1.
 verrucosus 144.
 vulgaris 144.
 Eupatorium cannabinum
 396.
 corsicum 396. 60. 1.
 Soleirolii 396. 60. 1*
 syriacum 396. 60. 1*
 Euphorbia acanthotham-
 nos 648.
 acuminata 655. 94.
 agraria 653.
 akenocarpa 651.
 aleppica 655.
 alexandrina 653. 73.
 alpigena 649. 16.
 ambigua 649. 18.
 amygdaloides 651.
 androsæmifolia 652.
 androsæmifolia 652. 51.
 656. 105.
 angulata 649.
 Apios 649.
 aragonensis 652. 58*. 653.
 63*
 ararica 652. 58.
 arguta 650.
 artandiana 654. 82.
 arvensis 655. 94.
 astrachanica 652. 55.
 avenia 654. 86.
 azorica 654. 77.
 bætica 654.
 Barrelieri 653.
 Baselicis 653. 69.
 bialata 651. 42.
 biglandulosa 655.
 biglandulosa 653. 65.
 biumbellata 653.
 biumbellata 654. 84.
 Bivonæ 648.
 bonifaciensis 654. 85.
 brachiata 648. 6.
 Brittingeri 650. 25.
 caespitosa 654. 82.
 Cajogala 658. 64.
 canescens 656. 106.
 Canuti 648.
 capitulata 650.
 carniolica 649.
 carniolica 654. 88.
 cechica 650. 31.
 ceratocarpa 648.
 Chaixiana 651. 49*
 Chamæbuxus 650.
 Chamæsyce 656.
 Characias 651.
 Characias 651. 46. 47.
 Clementei 649.
 Clementei 648. 2.
 Coderiana 650. 35.
 coralloides 650.
 coralloides 649. 15*
 corsica 655.
 crosinosperma 654. 82.
 cretica 651. 44.
 crispata 649. 12.
 cuneifolia 651.
 Cupani 654.
 Cupani 654. 85.
 curtifolia 655. 101.
 cybirensis 651.
 Cyprissias 652.
 dalmatica 654. 79*
 deflexa 654.
 Delorti 653. 73.
 dendroides 648.
 denudata 650. 30.
 Deseglisei 649. 17*
 diffusa 648. 2.
 dubia 651. 36.
 dulcis 649.

- dulcis* 650. 25. 32.
Duvalii 649.
echinosperma 651. 40.
epithymoides 649.
epithymoides 648. 11.
eriocarpa 651. 44.
eriolclada 649. 12. 15.
Esula 652.
esuloides 652. 62.
esulo-lucida 652. 51 ×
exigua 655.
expansa 649. 18 *
fulcata 655.
filicina 652.
flavicomma 650.
flavopurpurea 650. 35 *
Fleuroti 652. 58.
foetida 651. 36.
fragifera 648.
fruticosa 648. 3.
gaditana 651.
Gasparrinii 649.
Gayi 653.
Gerardiana 653.
glabrifolia 649. 12.
glareosa 653.
Gmelini 652. 53.
gracilis 652. 54. 58.
græca 654.
graminifolia 652. 54.
Heldreichii 651. 48.
helioscopioides 651. 38 *
herniariæfolia 655.
hiberna 648.
hiberna 648. 9. 10. 649.
 22.
Hohenackeri 653. 71.
homophylla 653. 64.
humifusa 656. 107.
hypericifolia 656. 105.
illyrica 650. 31.
imbricata 654.
imperfoliata 652. 60.
incana 652. 52.
incompta 649. 16.
inermis 648. 11.
insularis 648.
intermedia 652. 58.
isatidifolia 650.
japygica 653. 65.
junceæ 655. 98.
Kunzei 650. 33.
Lagascæ 650.
Lagascæ 654. 79.
lanuginosa 650. 30. 35.
Lathyrus 655.
Ledebourii 654.
leiosperma 649. 12. 653. 73.
- leptocaula* 652.
leptophylla 652. 54.
leucotricha 649. 12.
ligulata 651. 49.
lingulata 649. 14 *
linifolia 654. 82.
literata 650. 35.
litoralis 654. 82.
longibracteata 654. 81.
Loreyi 652. 58 *
lucida 652.
lucida 652. 59 *
maculata 656. 105.
Martiusiana 650. 33.
massiliensis 656. 106.
matritensis 654.
medicaginea 654.
mehadiensis 649. 14 *
melapetala 651.
melitensis 648. 4 *
mierantha 651. 36 *
minuta 654. 91.
mollis 650. 31.
mosana 652. 58.
mucronata 654. 85. 655.
 94.
myrsinites 655.
myrsinites 653. 65.
neapolitana 653. 73.
nevadensis 653.
nicæensis 653.
nicæensis 652. 58.
oblongata 649.
obscura 652. 53. 655. 94.
oleæfolia 652. 51. 653. 65.
opaca 652. 53.
orientalis 648. 7.
Orphanidis 653.
pallida 652. 51. 52.
palustris 648.
paniculata 650. 35.
pannonica 653. 66.
papillaris 648. 3.
papillosa 649. 24.
Paralias 653.
pauciflora 654.
Peplis 655.
peploides 655.
peploides 655. 95.
Peplus 655.
perforata 656. 106 obs.
petrophila 654.
pilosa 650.
pilosa 649. 12. 15 et *
pinæa 654.
pinæa 654. 83 *
pinifolia 652. 58 *
Pithyusa 654.
platyphylla 650.
- polychroma* 649. 14.
polygalæfolia 649.
polygonisperma 656.
portlandica 654.
portlandica 653. 73.
præcox 652. 55.
Preslii 656.
Preslii 654. 79.
procera 648. 6. 8. 650. 31.
prostrata 656. 106 obs.
provincialis 653. 66. 73.
pseudochamæsyce 656. 107
pseudocyparissias 652. 58 *
pseudolucida 652. 51 ×
pterococca 651.
pubescens 649.
pubigera 649. 19.
pulchella 654. 86.
pulverulenta 653. 66.
pumila 655. 93.
purpurata 649. 16.
pyrenaica 650. 28.
Pythinsa 654. 92.
racemosa 652. 58.
ragusana 654. 82.
ramosissima 653. 73.
Reichenbachiana 650. 31.
retusa 655. 97. 99.
rigida 655. 100. 102.
riparia 652. 58.
Roeseri 651. 48.
rotundifolia 655. 96.
rubra 655. 94. 99.
rupestris 653. 69.
rupicola 648.
ruscinonensis 650.
salicetorum 652. 59 *
salicifolia 652.
salicifolia 652. 58.
Sarati 652.
sareptana 652.
saxatilis 653.
saxatilis 653. 64. 654. 90.
segetalis 654.
segetalis 653. 64. 73.
Seguieri 653. 64. 65.
semiperfoliata 652.
serrata 651.
serrulata 651. 36.
sessiliflora 649. 15 *
seticornis 653. 73.
Sibthorpii 651. 47.
silvatica 651. 49.
simplex 654. 81.
soliflora 650. 29.
solisæqua 649. 16.
spinosa 648.
spinosa 648. 5.
squamigera 648. 2 obs.

- stellulata* 651. 41.
stricta 650.
stricta 650. 35.
subciliata 650. 35.
subhastata 653. 67.
suffruticulosa 650. 26.
sulcata 97.
tanaicensis 654. 84.
taurinenis 654.
tenuifolia 652.
tenuifolia 652. 55.
terraccina 653.
terraccina 650. 33. 654. 78.
 79.
tetraceras 654. 83*
thyrsiflora 653. 67.
Tommasiniana 652. 53*
transsilvanica 653. 67.
transtagana 654.
tricuspidata 655. 99.
triflora 653.
trinervia 654. 88.
trinervis 656. 105.
tristis 652. 58.
Triumfetti 652. 58.
uliginosa 649. 20. 650. 26.
undulata 652.
valentina 653. 73.
valerianæfolia 651. 40.
variabilis 653.
veneta 651. 44. 46.
verrucosa 649.
verrucosa 649. 12. 13. 651.
 40.
verticillata 651. 48.
villosa 650. 31.
virgata 652.
virgata 652. 51. 53*
viridiflora 649. 16.
vitellina 650. 32.
Welwitschii 649.
Wulfeni 651.
Wulfeni 651. 47.
Euphrasia alpina 551. 1. 552.
 4.
aspera 549. 19. 3.
campestris 551. 1.
cebennensis 551. 3*
coerulea 551. 3*
condensata 551. 3*
cuprea 552. 4*
ericetorum 551. 3*
frutescens 550. 8.
gracilis 551.
hirtella 551. 1.
Kochii 551. 11*
linifolia 550. 21. 3.
majalis 551. 3*
micrantha 551. 3.
minima 551.
minima 551. 1.
montana 551. 1.
nemorosa 551. 1*
nitidula 551. 2*
Odontites 551. 12.
officinalis 551.
officinalis 551. 1*
parviflora 551. 1*
pectinata 551. 1*
pieta 551. 1.
pratensis 551. 1.
puberula 551. 1*
ramosissima 552. 5*
rigidifolia 550. 21. 6.
rigidula 551. 3.
Rostkoviana 551. 1.
salisburgensis 552.
serotina 551. 11*
Soyeri 552. 4*
stricta 551. 1*
tetraquetra 551. 3.
tricuspidata 552.
Uechtritziiana 551. 3*
uliginosa 551. 1.
verna 551. 12*
Eurotia ceratoides 628.
ferruginea 628.
Eutrema Edwardsii 45.
parviflorum 45. 33. 1.
Euxolus Blitum 622. 4. 2.
deflexus 621.
viridis 622.
*Euzomodendron Bourgæ-
 num* 45.
Evax asterisciflora 395.
carpetana 395.
discolor 395.
discolor micropodioides
 395. 58. 7*
exigua 395.
Funkii 395. 58. 1*
Heldreichii 395.
lasiocarpa 395. 58. 2.
nevadensis 395. 58. 7*
perpusilla 395.
pygmæa 395.
rotundata 395.
tenuifolia 395.
Eversmannia hedysaroides
 197.
Exacum Candollei 503. 6. 2.
pusillum 503. 6. 2.
Faba minor 211. 61 obs.
vulgaris 211. 61 obs.
Fabera cretensis 471. 133 1.
Pagonia cretica 142.
hispanica 142.
Fagopyrum esculentum 639.
 31 obs.
tataricum 639. 31 obs.
Fagus silvatica 660.
Falcaria carvifolia 305.
latifolia 304.
Rivini 304.
saxifraga 305. 80. 1.
vulgaris 304. 78. 2.
Faldermannia parviflora 571.
 5.
taurica 571. 4.
Farsesia clypeata 50.
dalmatica 50. 42. 3.
deltoidea 50. 43. 1.
incana 50. 44. 1.
lunarioides 50.
mutabilis 51. 44. 2.
triquetra 50.
Faya fragifera 673. 2.
Fedia brachystephana 340.
 14.
Cornucopia 338.
dasycarpa 339. 8.
dentata 339. 8.
graciliflora 338. 3. 1*
sicula 340. 18.
tridentata 340. 13.
Ferula brachyloba 284. 25. 3.
campestris 284. 25. 1.
Candelabrum 284. 23. 2.
caspica 284.
communis 285.
communis 283. 23. 1*
Ferulago 284. 25. 1. 3.
glaucæ 284.
granatensis 284. 25. 2.
Heuffelii 284.
monticola 284. 25. 5.
neapolitana 284. 23. 2*
nodiflora 283. 23. 1*. 284.
 25. 1.
nodosa 285. 25. 9.
orientalis 284.
pencedanifolia 285. 26. 1.
rigida 284. 25. 8.
Sadleriana 284.
sibirica 284. 25. 7. 285.
 26. 1.
silvatica 284. 25. 5. 7.
sulcata 284. 25. 1.
tatarica 284.
thyrsiflora 285. 25. 12.
tingitana 284.
Ferulago Barrelieri 284.
brachyloba 284.
communis 284. 25. 6.
galbanifera 284.
geniculata 284.

- geniculata* 285. 25. 9.
granatensis 284.
humilis 285.
meoides 276. 3. 1.
monticola 284.
monticola 284. 25. 7.
nodosa 285.
Orphanidea 284. 25. 5.
Sadleri 284. 23. 7.
Sartorii 285.
silvatica 284.
sulcata 284.
sulcata 284. 25. 1.
thyrsiflora 285.
Festuca acuminata 826. 22.
affinis 826.
agrestis 819. 87. 2.
alopecuroides 820. 10.
alopecuros 819. 87. 1.
alpestris 826. 20 *. 827.
 29.
alpina 829.
alpina 826. 20 *
altissima 825. 6 *. 7.
amethystea 827. 29.
amethystina 828.
amethystina 827. 29. 829.
 42 *
ampla 828.
apennina 825.
arduenna 829. 42.
arenaria 827. 27. 28.
arundinacea 824.
arundinacea 807. 68. 1.
aspera 822. 8.
attenuata 820. 7.
aurata 828. 30.
aurea 825. 9.
australis 825. 5.
austriaca 828. 32.
baltica 827. 27.
barbata 827. 27. 819. 87. 1.
Bartherei 827. 27.
Beckeri 829. 42 *
Boissieri 825. 6 *
Borderii 829. 47.
borealis 807. 68. 1.
bosniaca 827. 22 *
brennea 836. 22.
brevifolia 829.
Brinkmanni 824. 1 x
bromoides 820. 11. 819.
 87. 2.
Broteri 820. 13.
bulbosa 826. 10.
cæsia 829. 42.
cagiriensis 829. 44.
calabrica 826.
calamaria 825. 7.
calycina 832. 94. 1.
canescens 826. 16. 828. 39.
capillata 829. 43.
carpathica 826. 15.
ciliata 820. 10. 819. 87. 1.
cinerea 829. 42.
Clementei 828.
coerulans 828. 32.
coerulescens 826.
colorata 828. 39.
convoluta 831. 8.
consobrina 825. 9 *
cretica 825. 4.
crinum ursi 827. 23.
croatia 826. 12.
curvula 829. 44.
cyllenica 827. 22 *
cynosuroides 821. 14. 15.
decidua 825. 7.
decipiens 829. 47.
decolorans 825. 2.
delicatula 821. 14.
depauperata 837. 29.
dimorpha 826.
dimorpha 826. 15.
distans 830. 6.
donacina 807. 68. 1.
drymeja 825. 6 *
dumetorum 827.
dumetorum 827. 27 et *
dura 828. 40 *
Durandii 825. 9.
duriuscula 829.
duriuscula 827. 26. 27 *.
 828. 36. 39. 40. 829. 42.
elatior 825.
elatior 824. 2.
elegans 826.
erecta 822. 9.
eskia 827.
exaltata 825. 6 et *
expansa 833. 97. 1.
fallax 827. 27 *
fenas 825.
ferruginea 825. 9.
festucaeformis 831. 7.
fibrosa 825. 9.
flaccida 828. 30.
flavescens 826.
flavescens 826. 21. 22. 827.
 24.
frigida 829. 47 *
fusca 826. 22.
Gaudini 829. 47.
geniculata 820. 6.
gigantea 824.
glaberrima 828. 39.
glacialis 829. 47 *
glauca 829.
glauca 829. 42.
glaucescens 827. 27.
granatensis 829.
guestphalica 829. 43.
Gussonii 831. 8.
gypsophila 821. 15.
Halleri 829.
Halleri 828. 30. 829. 45.
halmyris 827. 28.
Henriquezii 828.
heterophylla 827.
heterophylla 827. 29.
hirsuta 828. 39.
hybrida 820. 13.
Hystrix 829.
inarmata 828. 32.
incrassata 820. 4.
indigesta 828.
indigesta 829. 44.
inermis 822. 17.
inops 829. 42.
interrupta 825. 3.
juncifolia 827. 28.
jurana 826. 14.
Kitabeliana 827. 27.
Lachenalii 843. 2.
laevigata 829. 44.
laevis 828.
lanuginosa 827. 27.
latifolia 825. 7.
laxa 826.
laxa 825. 2.
Lemani 829. 43.
lignistica 819. 3.
litorea 824. 2.
loliacea 825. 4 et x. 845.
 4 x
longifolia 827. 27. 829.
 44 (bis).
longiseta 827. 26. 819. 87.
 2.
lubrica 827. 23.
lucorum 825. 6.
maritima 831. 10.
megaphylla 828. 39.
megastachys 827. 27.
mempitica 831. 1.
Micheli 815. 77. 1.
minor 826. 22.
montana 825.
montana 822. 9. 834. 2.
montis aurei 829. 45.
Morisiana 828.
multiflora 825. 4. 827. 27.
mutica 828. 32.
myuros 820. 10. 12.
nebrodensis 836. 22.
nemorum 827. 26. 27 *
nevadensis 827. 28 *

- nigrescens* 827.
nigrescens 828. 30.
nigricans 828. 30.
nitida 828. 30.
nutans 826.
nutans 826. 14.
ochroleuca 829. 44 *
oelandica 827. 27 *
oraria 827. 28.
ovina 829.
ovina 828. 33. 39.
pallens 829. 42.
pannonica 829. 42 *
panormitana 820. 11 *
phoenicoides 842. 105. 2 *
picta 828. 30.
pilosa 836. 22.
plicata 828.
pluriflora 825. 4.
Poa 843. 2.
poaeformis 836. 22.
Porcii 828.
pratensis 825. 4. 827. 27.
pratensi-perennis 825. 4 x
procumbens 831. 13.
pseudo-dura 828. 40 *
pseudo-eskia 826.
pseudo-laxa 826. 15.
pseudo-myuros 820. 12.
pseudo-rubra 827. 27 *
psendovina 828. 39.
pubescens 827. 27.
Puccinellii 828. 30.
pulchella 826.
pumila 827.
pungens 827. 22 *
pyrenaica 828. 30 *
repens 827. 27.
reptatrix 829. 49 obs.
rhachiantha 844. 3.
rhætica 836. 22.
rigida 832. 5.
rigorosa 829. 42.
rivularis 827. 27.
rotboellioides 844. 2.
rubra 827.
rupicaprina 829. 47 *
rupicola 828. 39.
sabulicola 827. 28.
sancta 843. 105. 6.
saxatilis 828. 39.
scaberrima 828.
Scheuchzeri 826. 14.
scheuchzeriformis 826. 14.
Schlickumi 824. 1 x
sciaphila 829. 43.
sciuroides 820. 11.
scoparia 826.
setacea 820. 9.
sicula 820. 8.
Sieberi 826. 11.
silvatica 825.
silvatica 825. 6.
spadicea 825.
spectabilis 826.
spectabilis 825. 9 *. 826.
 12. 13. 17.
stenantha 828. 40.
stolonifera 828. 30 *
stricta 829. 44.
strictifolia 829. 42.
subracemosa 828. 30.
sulcata 828.
supina 829. 43.
tenuicula 815. 77. 2. 843.
 2.
tenuifolia 829. 43.
tenuis 820. 5.
thalassica 831. 10.
Thomasiana 820. 9.
trichophylla 827. 27.
triflora 825.
triflora 824. 1.
Uechtriziana 825. 2.
uniglumis 819. 87. 2.
vaginata 829. 42 *
valesiaca 828. 32. 39 *
varia 826.
versicolor 826. 22.
violacea 828.
vulpioides 827. 26.
wanthina 827.
Fibigia clypeata 50. 42. 2.
lunarioides 50. 42. 1.
Ficaria calthæfolia 7. 9. 1. 2 *
 grandiflora 7.
 intermedia 7. 9. 2 *
 nudicaulis 7. 9. 2 *
 peloponnesiaca 7.
 ranunculoides 7. 9. 2.
 transsilvanica 7. 9. 2.
 verna 7.
Ficus carica 656.
Fidelia kalbfussioides 469.
 22.
Filago affinis 384. 4 *
 alpestris 385. 10 *
 apiculata 384. 5 *
 arvensis 384.
 arvensis 385. 11.
 Candolleana 384. 4 *
 canescens 384. 5 *
 Clementei 384. 7.
 congesta 395. 58. 6.
 Cupaniana 385.
 discolor 395. 58. 7.
 Duriæi 384.
 eriocephala 384.
floribunda 384. 7.
gallica 384.
germanica 384.
heterantha 385. 12.
Jussæi 384. 4.
Kaltenbachii 384. 5 *
lagopus 385. 10 *
lanuginosa 384. 6.
lutescens 384. 5 *
mareotica 384.
micropodioides 384.
minima 385.
mixta 384. 5 x
montana 385. 10. 11.
neglecta 384.
prostrata 384. 4 *
pygmæa 395. 6.
pyramidata 384.
pyramidata 384. 4. 5.
ramosissima 384. 7.
spathulata 384.
subspicata 384. 5 x
tenuifolia 384. 8.
Fimbristylis adventitia 763.
 annua 762. 2.
 Cioniana 762.
 dichotoma 762.
 laxa 762.
 Micheliana 763. 8. 1.
 squarrosa 762.
Fiorinia pulchella 814. 53 *
Fluminia arundinacea 807.
Foeniculum capillaceum 292.
 45. 1.
 divaricatum 292. 45. 2 *
 dulce 292. 45. 1 *
 officinale 292.
 piperatum 292. 45. 2.
 piperitum 292.
 vulgare 292. 45. 1.
Fontanesia phillyreoides
 495.
Forskohlea Cossoniana
 658.
Fragaria campestris 222. 3.
 cerino-alba 222. 3.
 chiloensis 222. 3 obs.
 collina 222.
 drymophila 222. 3 *
 dumetorum 222. 3.
 elati 222.
 grandiflora 222. 3 obs.
 Hagenbachiana 222. 3.
 magna 222. 3. 1.
 Majoufea 222. 3 *
 media 222. 3.
 monophylla 222. 2 *
 moschata 222. 3. 1.
 pratensis 222. 3. 1.

- semperflorens* 222. 2.
silvestris 222. 2.
sterilis 228. 58. 59.
succica 222. 3.
umbelliformis 222. 3.
vesca 222.
virginiana 222. 3 obs.
viridis 222. 3 obs.
vulgaris 222. 2.
- Frangula rupestris* 145. 3. 2
vulgaris 145. 3. 1.
Wulfenii 145. 3. 2.
- Frankenia Boissieri* 85.
canescens 85. 5.
corymbosa 84. 1.
glomerulata 85. 6.
hirsuta 84.
hispida 84. 3.
intermedia 84. 3.
lavis 84.
pulverulenta 85.
Reuteri 84.
revoluta 84. 1.
thymifolia 84. 2.
Webbii 84.
- Fraxinus angustifolia* 495.
angustifolia 495. 6. 2 *
argentea 495. 6. 1.
australis 495. 6. 2 *. 3 *
biloba 495. 3 *
excelsior 495.
excelsior 495. 6. 2 *
heterophylla 495. 6. 2.
mannifera 495. 6. 1 *
monophylla 495. 6. 2.
Montagnei 495. 3 *
Ornus 495.
oxyphylla 495.
oxyphylla 495. 2 *. 4.
parvifolia 495.
rostrata 495.
rotundifolia 495. 6. 1. 1 *
simplicifolia 495. 6. 2.
- Freyera Biasoletiana* 302.
 70. 1.
congesta 302. 70. 3.
cretica 303. 70. 7.
cynapioides 303. 70. 1.
divaricata 302. 70. 5.
macrocarpa 302. 70. 4.
parnassica 302. 70. 2.
tuberosa 302. 70. 1.
- Fritillaria Burnati* 722. 9.
chia 722. 13.
conica 721.
coussolensis 722. 18.
delphinensis 722.
Ehrharti 722.
Fleischeri 722. 15.
- græca* 722.
Guicciardii 722.
hispanica 722.
involuta 721.
involuta 722. 18.
latifolia 722. 10.
linophylla 721. 4.
lusitanica 721.
lusitanica 722. 7.
lutea 722. 9.
Meleagris 721.
Meleagris 721. 4. 7.
meleagroides 722. 7.
messanensis 721.
messanensis 721. 5 *. 722.
 8.
minor 722.
Moggridgei 722. 9.
montana 722. 18.
neglecta 721. 5 *
nigra 721. 4.
obliqua 722. 17.
Orsiniana 722. 18 *
Pinardi 722.
pontica 722.
pyrenæa 721. 4
pyrenaica 721.
pyrenaica 722. 8. 10. 11.
 16.
Regis Georgii 722. 15 *
Rhodocanakis 722.
ruthenica 721.
Sibthorpiana 722.
stenophylla 722. 7.
tenella 722.
thessalica 722. 11 *
tristis 722.
tubæformis 722. 9.
tulipæfolia 721. 2. 722. 10.
- Fairena pubescens* 761.
Fumana minor 76. 59.
procumbens 76. 59.
Spachii 76. 58.
viscida 76. 57.
vulgaris 76. 58.
- Fumaria acrocarpa* 28. 24.
affinis 27. 12.
agraria 27.
agraria 27. 5.
amarysia 27.
anatolica 28.
apiculata 27. 13.
arundana 27. 10 *
Bastardi 27. 11. 11 *
Foræi 27.
bracteata 28. 21.
cæspitosa 28. 23.
calycina 28. 18.
capnoides 26. 10.
- capreolata* 27.
capreolata 27. 11.
carinata 28. 24.
Chavini 28. 22.
confusa 27. 11 *
corymbosa 26.
deflexa 28. 19. 23.
densiflora 28.
densiflora 27. 15. 28. 23.
disjuncta 27. 12.
elegans 27. 8 *
fabacea 26. 1. 7.
flabellata 27.
gaditana 27.
Gasparinii 27. 15.
glauca 28. 23.
Gussonii 27.
Gussonii 27. 12.
Heldreichii 28. 20.
intermedia 26. 7.
Jankæ 28.
Jordani 27. 12.
Kraliki 28. 19.
Laggeri 28. 22. 24.
leucantha 28. 23.
litoralis 28. 18.
macrocarpa 26.
macrosepala 27.
macrosepala 27. 17.
major 27.
malacitana 27. 10 *
media 27. 5. 11 *. 12. 13.
 16. 28. 24.
megalocarpa 26. 2.
micrantha 28. 18.
muralis 27.
muralis 27. 11 *
officinalis 27.
pallidiflora 27. 8.
parviflora 28.
parviflora 28. 22.
Petteri 27. 12. 13. 28. 20.
 23.
pikermiana 28.
prehensilis 27. 17 obs.
Reuteri 28.
rostellata 27. 17.
rupestris 27.
rupestris 27. 10.
saxicola 28.
Schleicheri 28.
Schrammii 28. 22 *
sepium 27.
serotina 27. 12.
solida 26. 4.
speciosa 27. 8 *
spicata 28.
tenuiflora 27. 16. 28. 22.
tenuifolia 28. 23.

- Thureti 28. 18.
 transsilvanica 27. 17.
 vagans 27. 12.
Vaillantii 28.
Wirtgeni 27.
 Wirtgeni 28. 24.
Gagea amblyopetala 726.
 andegavensis 725. 12.
 arvensis 725.
 belgica 725. 5.
 bohémica 725.
 bohemica 725. 10.
 bulbifera 726.
 busambarensis 726. 14.
 callosa 725. 4.
 chrysantha 726.
 corsica 725. 10*. 726. 17.
 erubescens 726. 13*.
 fistulosa 726. 13.
 foliosa 726.
 gracilis 725. 8.
Granatelli 725.
 Guicciardii 725. 8.
 intermedia 725. 4*.
Liottardi 725.
 Liottardi 726. 17.
 lutea 725.
 minima 725.
 nebrodensis 725.
 nevadensis 726. 17.
 nivalis 726. 14*.
 podolica 725. 3.
 polymorpha 724. 13. 1. 726.
 14. 17.
 polyphylla 726.
 pratensis 724. 13. 1.
 pusilla 725.
 pusillo-arvensis 725. 3 ×
 pygmæa 726. 14*.
 reflexa 725. 3.
 reticulata 726.
 rigida 725.
 saxatilis 725.
 saxatilis 725. 11. 12.
 Schreberi 724. 13. 1.
 silvatica 725. 2.
Soleirolii 726.
 spathacea 725.
 stenopetala 724.
 succedanea 725.
 Szovitsii 725. 12.
 taurica 726. 13*.
 transversalis 726. 13. 1.
 villosa 725. 8.
Galactites Duriei 411.
 elegans 411. 83. 1.
 pyracantha 411. 83. 2.
 tomentosa 411.
Galanthus græcus 715.
Imperati 715.
 nivalis 714.
Olgæ 715.
 plicatus 715.
 plicatus 715. 12.
 Galatea rigida 386. 43. 4.
 Galatella acris 386. 43. 4.
 arragonensis 386.
 biflora 386. 43. 3.
 cana 386.
 canescens 386. 43. 6.
 collina 386. 43. 1.
 dracunculoides 386. 43. 3.
 fugax 386. 43. 5*.
 insculpta 386.
 intermedia 386. 43. 1.
 lusitanica 386. 43. 5*.
 pauciflora 386.
 pinetorum 386. 43. 1.
 punctata 386.
 punctata 386. 43. 2.
 rigida 386.
 sedifolia 386. 43. 1.
 tatarica 386. 43. 3.
 villosa 386. 42. 2.
 Galea officinalis 188.
 patula 188.
 Galeobdolon luteum 575.
 montanum 576.
 vulgare 576.
 Galeopsis acuminata 576. 3.
 alpicola 576. 3*.
 angustifolia 576. 7*.
 arvatica 576. 7*.
 Berteti 576. 7*.
 bifida 576. 3*.
 canescens 576. 7.
 cannabina 576. 1. 2.
 carpetana 576.
 dubia 576. 4.
 Filholeana 576. 7*.
 Gacognei 576. 3*.
 glandulosa 576. 7.
 grandiflora 576. 1. 4. 7.
 hirsuta 579. 24.
 intermedia 576.
 intermedia 576. 7.
 Ladanum 576.
 latifolia 576. 7.
 leucantha 576. 3*.
 ochroleuca 576.
 parviflora 576. 6.
 præcox 576. 3*.
 prostrata 576. 4.
 pubescens 576.
 pubescens 576. 3*.
 pyrenaica 576.
 Reichenbachii 576. 3*.
 Reuteri 576. 7*.
 segetum 576. 4.
 speciosa 576. 2.
 sulphurea 576. 2.
Tetrahit 576.
 urticifolia 576. 1.
 Verloti 576. 3*.
 versicolor 576.
 villosa 576. 4.
 Walterina 576. 1.
 Galilea mucronata 760. 2. 1.
 Galinsoga parviflora 385. 39.
 1 obs.
 Galium aciphyllum 325. 15.
 æthnicum 325. 12.
 agreste 330. 74.
 alpestre 327. 45.
 alpicola 325. 18.
 alpinum 331. 91*.
 ambiguum 324. 11 ×
 anglicum 330.
 anisophyllum 327.
 Aparine 330.
 Aparinella 330. 75*.
 apiculatum 329.
 apiculatum 328. 55.
 approximatum 324. 10 ×
 apricum 332.
 arenarium 328.
 argenteum 327. 44. 45.
 aristatum 325.
 aristatum 324. 11. 325.
 22*.
 articulatum 331.
 articulatum 323. 3.
 asparagifolium 328. 55.
 aureum 328.
 austriacum 327. 44.
 baldense 326. 37.
 Barrelieri 324. 7.
 Bauhini 331. 91.
 Bernardi 325.
 Bocconi 327. 44. 45.
 boreale 324.
 Boryanum 329.
 brachypodium 325. 18.
 Brebissonii 328. 57.
 brevifolium 330.
 Broterianum 324.
 bryophilum 324. 9.
 cæspitosum 326.
 cæspitosum 326. 30.
 campanulatum 332. 6. 3.
 campestre 329. 68. 331. 86.
 capillare 330. 78.
 capillipes 326. 24*.
 capitatum 331.
 caudatum 330. 76.
 Chamæaparine 330. 79*.
 chersonense 331. 89.

- chlorophyllum 327. 44 *
 cinereum 325.
 citraceum 328. 55.
 Closianum 327. 42.
 collinum 327. 42.
 cometorhizon 326. 38 *
 commutatum 327. 44 *
 concatenatum 329.
 congestum 328. 50.
 constrictum 327.
 cordatum 331. 93.
 coronatum 331.
 corradæfolium 325. 12.
 corsicum 329. 68.
 creticum 328. 50.
Cruciata 331.
 cruciatum 331. 89.
 cyllenum 326.
 debile 327.
 decipiens 324. 8. 330. 79 *
 decolorans 328. 57 x
 demissum 327.
 diffusum 324. 4. 11.
 divaricatum 330.
 divaricatum 330. 82.
 dunetorum 324. 10.
 effusum 326. 23.
 elato-verum 324. 10 x. 11 x
 elatum 324. 10.
 ellipticum 324.
 elongatum 328.
 eminens 328. 57 et x
 ephedroides 324.
 erecto-verum 324. 10 x
 (bis)
 erecto-Wirtgeni 328. 57 x
 erectum 324.
 erythrorhizon 326.
 firmum 328. 55.
 Fleuroti 327. 42 *
 floribundum 331.
 floribundum 328. 55. 330.
 78.
 fragile 331. 87.
 fruticescens 325.
 fruticosum 327.
 fruticosum 328. 54.
 geniculatum 323. 3.
 glabrum 327. 44.
 glaucum 332. 6. 3.
 glomeratum 331. 86.
 gracile 330. 79.
 gracilentum 327. 42 *
 græcum 329.
 Halleri 331. 91.
 helodes 327. 47.
 helveticum 326.
 hercynicum 327. 41.
 hierosolymitanum 328. 59.
 hirtum 329. 67.
 hispidum 330. 79 *
 hypnoides 326.
 hyssopifolium 324. 4.
 implexum 327. 42.
 incanum 325. 20.
 incurvum 328. 55.
 infestum 330. 75.
 insubricum 324. 10.
 intermedium 326.
 intermedium 330. 74.
 intertextum 327. 42.
 intricatum 330.
Jordani 327.
 junceum 328. 54.
 Jussæi 326. 29 *
 Kitaibelianum 326. 24 *
 laconicum 325.
 lætum 325. 18.
 læve 327. 44.
 lævigatum 325. 22.
 Lapeyrouisianum 327. 44.
 leucophæum 325. 18.
 linifolium 325. 22. 326.
 24 *
 litigiosum 330. 79 *
 litorale 325.
 longifolium 326.
 lucidum 325.
 lucidum 324. 11.
 luteolum 325. 18.
 luteum 328. 57.
 magellense 326. 30 *
 maritimum 329.
 maximum 328. 51.
 mediterraneum 329. 68.
 megalospermum 326.
 melanantherum 328. 55.
 micranthum 330. 72.
 microcarpum 331. 83.
 minutulum 330.
 minutum 328.
 mollugine-verum 324. 10 x
Mollugo 324.
Monachinii 330.
 montanum 327. 41. 44 et *
 Morisii 329. 67.
 mucronatum 325. 18. 329.
 67 *
 multicaule 327. 44.
 Mungieri 330. 80.
 murale 331.
 murcicum 326.
 musciforme 329.
 muscoides 326. 34.
 mutabile 326.
 myrianthum 325. 18.
 nebulosum 331. 84.
 neglectum 324. 10 *
 nemorosum 324. 10.
 nevadense 327. 44.
 nitidulum 327. 44.
 nitidum 325. 12. 326. 24 *
 Nouletianum 327. 43.
 nudiflorum 329. 68.
 obliquum 325.
 obliquum 329. 67 *
 oblongifolium 328. 55.
 ochroleucum 328.
 ochroleucum 324. 10 x.
 328. 57 *
 olympicum 326.
 orientale 325.
 ovalifolium 324. 7.
 palatinum 328. 57 x
 pallens 325. 18.
 pallidum 325. 13.
 palustre 328.
 papillosum 327.
 papillosum 325. 22 *
 parisiense 330. 79 et *. 82.
 Paulianum 324. 10 x
 pedemontanum 331.
 petræum 324. 11.
 physocarpum 323.
 plebeium 327. 44.
 Prostii 325. 18 *
 pruinatum 326.
 pseudo-aristatum 326. 24 *
 pubescens 324. 11. 327. 44.
 pulvinatum 326.
 pumilum 326. 30.
 purpureum 329.
 pusillum 326.
 pusillum 326. 37. 327. 44.
 pycnophyllum 329. 66.
 pygmæum 331. 93.
 pyrenaicum 326.
 pyrenaicum 326. 36.
 recurvum 330.
 reflexum 331. 92.
 retrorsum 331. 92.
 rigidum 325. 12.
 rivale 332. 6. 5.
 rivulare 327.
 rosellum 327.
 rotundatum 333. 9.
 rotundifolium 324.
 rotundifolium 333. 9.
 rubidum 329. 67 *
 rubioides 323.
 rubrum 329.
 rupestre 328. 55. 332. 6. 1.
 rupicola 326. 37. 328. 52.
 ruricolum 330. 79.
 ruthenicum 328. 57.
 saccharatum 329.
 satireiæfolium 328. 51.

- saxatile* 327.
scabridum 327. 42. 44.
scabrum 324. 10. 327. 44.
Schultesii 325. 22 *
setaceum 330.
Sibthorpii 330. 78.
silvaticum 326.
silvaticum 325. 22.
silvestre 327.
silvivagum 327. 44 *
Soleirolii 329.
Spruneri 328. 55.
spurium 330.
Sternbergii 324. 10 x
suaveolens 326. 38 *
suberosum 328. 54.
sudeticum 327. 45.
supinum 327. 44 et *
tataricum 323.
tauricum 331. 90.
Tendæ 326. 37.
tenellum 330.
tenerum 330. 75 *
tenuë 326.
tenuicaule 330. 80.
tenuifolium 325. 12.
tenuissimum 330.
thymifolium 325.
Timeroi 327. 42.
transsilvanicum 325. 22.
trichophorum 331. 83.
tricornè 329.
trifidum 328.
triflorum 324.
tunetanum 328. 57.
tyrolense 324. 11.
uliginosum 327.
umbellatum 327. 44.
Urvillæi 330. 78.
Vaillantii 330. 75.
venustum 325.
vernum 331.
vero-elatum 328. 57 x
vero-erectum 328. 57 x
vero-mollugo 324. 10 x.
 328. 57 x
verosimile 328. 57.
verrucosum 329. 70.
verticillatum 331.
verum 328.
Villarsii 326. 38.
villosum 329. 62.
viridiflorum 329.
viridulum 325. 12.
viscosum 331.
Wirtgeni 328. 57.
Witheringii 328. 52.
zacyanthium 331. 83.
- Ganymedes cernuus* 710. 11.
 12.
 concolor 710. 14.
 Linnæi 710. 10.
Garidella Nigellastrum
 17.
Gasparrinia virescens 292.
 48. 1.
Gastridium australe 803.
 laxum 803. 1 *
 lendigerum 803. 1.
 muticum 803. 2.
 scabrum 803.
 siculum 803. 2.
Gastrosolum præcox 374. 6.
Gatyna Dioscoridis 460. 116.
 1.
 globifera 460. 116. 1.
Gaya pyrenaica 296. 11. 297.
 31.
 simplex 293. 51. 1.
Gaudinia fragilis 844.
Gelasia villosa 465. 23.
Genersichia obtusata 783.
 150.
Genista acanthoclada 150.
 etnensis 150.
 albida 152.
 algarbiensis 151. 18.
 alpicola 153. 56.
 ancistrocarpa 152.
 anglica 151.
 anxantica 153.
 anxantica 153. 56 *
 aprutia 151. 15.
 arcuata 151. 13 *
 aristata 151.
 aspalathoides 152.
 aspalathoides 152. 39.
 Barnadesii 150.
 berberidea 151.
 biflora 157. 28.
 boetica 152.
 Boissieri 150.
 Bourgæi 152. 41 *
 Broteri 151.
 Bruguieri 150. 6.
 campestris 153. 56 *
 canariensis 155. 7.
 candicans 155. 7.
 cantabrica 154. 66 *
 carinalis 150.
 carpetana 152. 29 obs.
 cinerascens 152. 40 *
 cinerea 152.
 cinerea 152. 41. 45 *
 clavata 154.
 corsica 152.
 cosoniaca 150. 7.
- Cupani* 151.^s
dalmatica 151. 14. 15.
decipiens 151. 20 *
decumbens 157. 32.
Delarbrei 153. 56 *
delphinensis 154. 67 *
depressa 154.
depressa 153. 53.
diffusa 153. 53. 158. 33 *
elata 153. 56 *
elatiore 153. 56 *
elliptica 157. 32.
ephedroides 150.
equisetiformis 154.
eriocarpa 155. 8.
eriodclada 151.
exaltata 153. 49.
falcata 151.
florida 153.
Friedrichsthaliana 150. 6.
Friwaldskyi 153.
frutescens 153. 56 *
Gasparrini 150. 4.
genuensis 153. 54.
germanica 151.
gibraltaria 151.
Godetii 152. 44.
gracilis 150. 10.
gymnoptera 152. 34.
Hanseleri 152.
Halleri 153. 33.
heteracantha 151. 16.
hirsuta 151.
hirsuta 151. 15.
hispanica 151.
hispanica 151. 13. 14.
holopetala 150. 3 *
horrida 150.
horrida 150. 8.
humifusa 152. 45. 153. 56.
 154. 59 obs.
humilis 153.
hungarica 153. 56.
hystrix 152.
januensis 153. 54.
incubacea 153. 56.
lamprophylla 153. 57.
lanuginosa 151. 18.
lasiantha 154. 66.
lasiocarpa 154. 60.
leptoclada 153. 49 *
linifolia 155. 9.
Lobelii 152. 34.
lucida 152.
lugdunensis 150. 7.
lusitanica 150.
lusitanica 150. 8.
lydia 153.
mantica 154.

- marginata* 153. 56 *
Mayeri 153. 59 *
melia 152.
Michelii 151.
micrantha 151.
microphylla 152. 33.
monosperma 154. 6. 2.
Morisii 152.
murcica 152.
nervata 153. 59.
nervosa 153. 59.
obtusiramea 152.
oretana 152.
ovata 153.
ovata 154. 60.
parviflora 151. 12.
parvifolia 152. 33.
peloponnesiaca 150. 6.
Perreymondi 154. 60.
pilosa 153.
pilosa 152. 44.
polyanthos 152.
polygalæfolia 153.
polygalæphylla 153. 49.
procumbens 157. 32.
prostrata 158. 33.
pseudopilosa 153.
ptilophylla 154. 62.
pubescens 153. 56 *
pulchella 152. 45 *
radiata 150.
radiata 150. 6.
ramosissima 152.
ramosissima 152. 40.
retamoides 150.
rupestris 153. 56.
sagittalis 154.
Sakellariadis 153.
Salzmanni 152. 34.
scariosa 153. 54.
scolopendria 154. 66.
scorpioides 151. 23 *
Scorpius 152.
Scorpius 152. 30.
sericea 153.
sibirica 153. 56 *
silvestris 151.
spathulata 153. 57.
sphacelata 150. 6 obs.
spiniflora 152. 29.
stenoptera 154. 66 *
subcapitata 153. 47 *
subsecunda 157. 32.
tenella 151. 11.
tenuifolia 154.
teretifolia 153.
tetragona 154. 62 *
tinctoria 153.
Tournefortii 151.
transsilvanica 153. 57.
triacanthos 151.
triacanthos 151. 23 *
triangularis 153.
triangularis 153. 57.
tridentata 154.
tridentata 154. 66 *
triquetra 153. 54. 57.
umbellata 154.
Villarsiana 152. 45.
Villarsii 152.
virgata 153. 56 *
Webbii 150. 8.
Welwitschii 151.
Winkleri 151. 24 obs.
Gennaria diphylla 697.
Gentiana acaulis 498.
acaulis 498. 9.
æstiva 499.
alpina 498. 9 *
Amarella 500.
angulosa 499. 20.
angustifolia 498. 8 *
aquatica 499. 19.
asclepiadea 499.
aspera 500. 29.
aurea 500.
bavarica 499.
Boryi 499.
brachyphylla 499.
bucovinensis 499. 18.
Burseri 498.
campestris 500.
campanulata 498. 4.
carnica 498. 10.
carpathica 499. 19.
caulescens 498. 8 *
Charpentieri 498. 4 ×
chloodes 502. 7.
chloræfolia 500. 30 ×
ciliata 500.
Clusii 498. 8.
Columnæ 500. 28 *
compacta 500. 30.
crispata 500. 29 *
cruciata 497.
depressa 499. 12.
detonsa 500.
elongata 499. 23 *
excisa 498.
excisa 498. 8.
frigida 498.
Froelichii 498.
Gaudiniana 498. 6 ×
germanica 500.
glacialis 500. 32.
gracilis 500. 28 *
humilis 499. 19.
hybrida 498. 3 ×
imbricata 499.
imbricata 499. 23. 25.
involverata 500. 34.
Kochiana 498. 9.
Koenigii 500. 32.
Laengstii 498. 4 ×
lancifolia 500. 28.
lingulata 500. 28.
livonica 500. 28.
lutea 498.
macrophylla 498. 7 *
minima 499. 19.
montana 500. 29.
nana 500.
nana 500. 32.
nivalis 499.
obtusifolia 500.
obtusifolia 500. 28.
orbicularis 499. 23.
pannonica 498.
phlogifolia 498.
pneumonanthe 498.
pratensis 500. 28.
prostrata 499.
prostrata 499. 23.
pumila 499.
punctata 498.
punctata 498. 5. 7.
punctato-purpurea 498. 6 ×
purpurea 498.
purpurea 498. 4.
purpureo-lutea 498. 3 ×
pyramidalis 500. 29.
pyrenaica 499.
Rostani 499. 23 *
rotundifolia 499. 23.
rubra 498. 3 ×
sabauda 498. 8 *
scilloides 502. 10.
septemfida 499.
serrata 500. 27.
spathulata 500. 29.
tenella 500.
tenuiflora 500. 28 *
terglovensis 499. 24.
Thomasiana 498. 3 ×
Thomasii 498. 3 ×
uliginosa 500. 28 *
utriculosa 499.
verna 499.
verna 499. 20.
Geocaryum capillifolium 303.
71. 3.
pumilum 302. 70. 6.
tenuifolium 303. 71. 2.
Geracium aureum 456. 18.
croaticum 455. 13.
incarnatum 458. 36.
lapsanoides 455. 11.

- paludosum 456. 14.
 parviflorum 458. 36.
 præmorsum 458. 35.
 succisæfolium 455. 13.
 Geranium abortivum 138. 29.
 acanitifolium 137. 15. 17.
 albanum 137.
 alpestre 137. 15.
 alpinum 141. 35.
 argenteum 136.
 argenteum 136. 3.
 asphodeloides 137.
 asphodeloides 136. 3.
 Baumgartenianum 138. 32.
 bohemicum 138.
 brutum 138.
 cataractarum 136.
 cineraceum 136. 4.
 cinereum 136.
 coelestinum 137. 16.
 coeruleatum 137. 16.
 collinum 137.
 columbinum 138.
 cristatum 137. 21.
 delicatulum 138.
 dissectum 138.
 divaricatum 138.
 divaricatum 138. 27.
 dubium 138. 32.
 Endressi 137.
 fasciculatum 137.
 Freyeri 137. 13.
 fuseum 137. 19.
 lancastricense 136. 8.
 Lebelii 138. 35.
 lividum 137. 19.
 longipes 137. 10.
 lucanum 138. 29.
 lucidum 138.
 macrorrhizon 136.
 macrostylon 136. 6.
 malvaceum 138. 30.
 malvæflorum 136.
 malvæfolium 138. 32.
 mediterraneum 138. 35 *
 Minæ 138. 24.
 minutiflorum 138. 35 *
 modestum 138. 35 *
 molle 138.
 neapolitanum 137. 16.
 nemorosum 137. 18.
 nodosum 137.
 nodosum 137. 13.
 oreades 137. 18 *
 palustre 137.
 patulum 137. 19.
 peloponnesiacum 137.
 phæum 137.
 phæum 137. 20.
 pilosum 138. 2. 19.
 pratense 137.
 prostratum 136. 8.
 purpureum 138. 35. 35 *
 pusillum 138.
 pyrenaicum 137.
 Raii 138. 34.
 ranunculifolium 137. 15.
 reflexum 137.
 rivulare 137.
 Robertianum 138.
 rotundifolium 138.
 rotundifolium 138. 32.
 ruthenicum 137. 22 *
 sanguineum 136. 8.
 scopulicolum 138. 35.
 semiglabrum 138. 35.
 sibiricum 137.
 silvaticum 137.
 simile 138. 35 *
 stipulare 138. 29.
 striatum 137.
 subcaulescens 136.
 subcoeruleum 137. 19.
 tuberosum 136.
 tuberosum 136. 7.
 umbrosum 137. 24.
 valdepilosum 137. 16.
 varium 136. 4.
 Villarsianum 138. 35 *
 villosum 138. 24 *
 viscidulum 138. 30.
 Geropogon glabrum 462.
 hirsutum 462. 123. 1. 464.
 19.
 Geum ambiguum 230. 7.
 biflorum 229. 9. 2.
 coccineum 229.
 heterocarpum 230.
 hirtum 230. 7.
 hispidum 230.
 hispidum 230. 6.
 hybridum 230. 8.
 inclinatum 230.
 inclinatum 229. 9. 3.
 intermedium 230. 4. 6 *.
 7. 7 ×
 macedonicum 229. 9. 1.
 micropetalum 229. 9. 3.
 molle 230.
 montano-rivale 230. 9.
 pseudomolle 230. 4 +
 pyrenaico-rivale 229. 9. 3 ×
 pyrenaicum 229.
 pyrenaicum 229. 9. 2. 230.
 9.
 rivale 230.
 rivale 230. 9.
 rivali-urbanum 230. 7.
 robustum 230. 7.
 rubifolium 230. 7.
 silvaticum 229.
 strictum 230.
 sudeticum 230. 9.
 Thomasianum 230. 9.
 Tournefortii 229. 9. 3.
 umbrosum 230. 10.
 urbano-rivale 230. 7.
 urbanum 230.
 vicanum 230. 7.
 Gifola vulgaris 384. 5.
 Githago segetum 85.
 Gladiolus Boucheanus 704. 9.
 byzantinus 703.
 communis 704.
 communis 704. 7. 8.
 crispiflorus 703. 3.
 dubius 704.
 galiciensis 703. 3.
 Guepini 703. 5. 1 *
 illyricus 703.
 imbricatus 703.
 imbricatus 704. 7.
 inarimensis 704. 6 *
 infestus 703. 5. 1.
 italicus 703. 5. 1.
 Ludovicæ 703. 5. 1.
 neglectus 704. 9.
 Notarisii 704.
 palustris 704.
 parviflorus 703. 3.
 pauciflorus 703. 3.
 pratensis 704. 9.
 Reuteri 704. 4.
 rossicus 703. 3.
 segetum 703.
 serotinus 704. 4.
 spathaceus 704.
 tenuis 704. 9.
 triphyllus 704. 9.
 Glaucium aurantiacum 25. 3.
 2.
 corniculatum 25. 3. 2.
 flavum 25.
 fulvum 25. 3. 1.
 luteum 25. 3. 1.
 phoeniceum 25.
 rubrum 25. 3. 2 *
 tricolor 25. 3. 2.
 Glaux maritima 600.
 Glechoma hederacea 587.
 heterophylla 587. 25. 1.
 hirsuta 587.
 hirsuta 587. 25. 1.
 lamiiifolia 587. 25. 2.
 magna 587. 25. 1.
 micrantha 587. 25. 21.
 Glinus lotoides 254.

Globularia *Alypum* 608.

- bellidifolia* 608. 9 *
cæspitosa 608. 3.
cordifolia 608.
elongata 608. 4.
ilicifolia 608. 2.
incanescens 609.
minima 608. 8.
multicaulis 608. 4.
nana 608.
nudicaulis 608.
punctata 608. 9.
repens 608. 9.
spinosa 608.
spinosa 608. 3.
stygia 609.
tenella 608.
trichosantha 608.
valentina 608. 3.
vulgaris 608.
vulgaris 608. 4.
Willkommii 608.
Glossopappus *chrysanthemoides* 370. 20. 4.
Glyceria *airoides* 837. 99. 1.
angustata 831.
aquatica 830.
aquatica 837. 99. 1.
Borreri 831.
Borreri 831. 11.
conferta 831. 10. 11 *
convoluta 831.
distans 830.
distans 831. 8.
festucæformis 831.
festucæformis 831. 8.
fluitans 830.
fulva 830. 91. 2.
Gussonii 831. 8.
intermedia 830. 6.
leptophylla 831. 9.
loliacea 830. 3.
maritima 831.
maritima 831. 11.
Michauxii 830. 2 obs.
nemoralis 830.
nervata 830. 2 obs.
norvegica 830. 2.
ochroleuca 837. 99. 1 *
pedicellata 830. 3.
pendulina 830. 91. 1.
permixta 831. 11.
plicata 830.
procumbens 831.
pseudo-distans 830. 6.
remota 830.
spectabilis 830. 1.
spicata 830. 4 *
tenuifolia 831.

- transsilvanica* 831. 10.
Glycyrrhiza *echinata* 188.
Frearitis 188. 35. 3.
glabra 188.
glabra 188. 35. 2.
glandulifera 188.
spinescens 188. 35. 3 obs.
Gnaphalium *acaule* 383. 6.
angustifolium 382. 19.
arenarium 381. 15.
calabrum 385. 11.
carpetanum 382. 3.
crassifolium 381. 5.
Einseleanum 382. 3.
fuscatum 383. 34. 4.
fusum 383. 34. 4. 5 *. 6.
Hoppeanum 383.
humifusum 382. 2.
lævisimum 382. 2 *
luteo-album 382.
medium 383. 34. 4.
microphyllum 382. 18 *
minimum 385. 11.
montanum 385. 11.
muscoides 383. 36. 1.
neglectum 384. 9.
norvegicum 383.
nudum 382. 2 *
pedunculare 385. 10 *
pilulare 382. 2 *
plicatum 381. 14.
pompejanum 382. 1.
prostratum 382. 2.
pusillum 383. 6.
rectum 382. 3.
Roeseri 383. 5 *
rosmarinifolium 382. 18.
rupestre 381. 7. 10.
scandens 381. 11 *
siculum 381. 11. 12 *. 382. 18.
silvaticum 382.
silvaticum 383. 34. 4.
Sophiæ 382. 3.
sordidum 385. 40. 1.
Stoechas 382. 18.
supinum 383.
supinum 383. 5.
supracanum 384. 37. 1.
tomentosum 382. 2.
uliginosum 382.
undulatum 382. 1 o's.
Wirtgeni 382. 2.
Goldbachia *lævigata* 29.
torulosa 29.
Gomphocarpus *fruticosus* 497.
Goniolimon *Besserianum* 613. 3 *

- collinum* 613.
dalmaticum 613.
elatum 613.
graminifolium 613.
Sartorii 613.
serbicum 613.
speciosum 613.
tyataricum 613.
Goodera *repens* 689.
Gouffea *arenarioides* 119.
Grammitis *Ceterach* 868. 17. 1.
hispanica 868. 17. 2.
leptophylla 868. 18. 1.
Gratiola *Broteri* 536. 5. 1 *
crassifolia 536. 5. 2.
linifolia 536.
linifolia 536. 5. 1 *
officinalis 536.
Gregoria *Vitaliana* 606.
Guenthera *elongata* 46. 28.
Guillonea *canescens* 277. 5. 1 *
scabra 277.
Guiraoa *arvensis* 30.
Gymnadenia *albida* 695.
anisoloba 695. 19. 1.
comigera 695. 19. 1.
conopsea 695.
cucullata 695.
densiflora 695. 19. 1.
Frivaldii 695. 19. 3.
Frivaldszkyana 695.
intermedia 695. 19. 1.
odoratissima 695.
ornithis 695. 19. 1.
pseudo-conopea 695. 19. 1.
pyrenaica 695. 19. 1.
suaveolens 695. 19. 2.
viridis 696. 21. 1.
Gymnandra *Pallasii* 598.
Stelleri 598.
Gymnocline *leucocephala* 373. 11.
macrophylla 373. 11.
Gymnogramme *leptophylla* 863.
Marantæ 861. 3. 1.
Pozoi 868. 17. 2.
Gymnomesium *pictum* 755. 5. 8.
Gymnostyles *stolonifera* 380. 31. 1.
Gynandris *monophylla* 703.
Sisyrinchium 703.
Gypsophila *acutifolia* 99.
aggregata 116. 40.
alpestris 99. 7.

- altissima* 99.
altissima 99. 19.
arenaria 99. 15.
arenicola 100. 10*
armerioides 100. 5.
Arrostii 99.
asperula 100. 10.
collina 99. 15*
compressa 100. 1.
cretica 100. 2. 4.
dianthoides 100. 6.
dichotoma 99. 8.
effusa 99. 12.
erectiuscula 99. 7.
fasciculata 99.
fastigiata 99.
fruticulosa 99.
glomerata 100.
Gmelini 99.
graminea 100. 1.
Haynaldiana 100. 4.
hispanica 99.
illyrica 100. 4. 5.
muralis 100.
nana 100.
ocellata 99. 3*
ochroleuca 100. 3.
paniculata 99.
perfoliata 99.
perfoliata 99. 11.
permixta 100. 10.
petraea 100. 17.
porrigens 99.
prostrata 99. 7.
repens 99.
rigida 100. 8. 10.
sabauda 99. 7.
sabulosa 99. 11.
saxifraga 100. 10.
scabra 100. 10.
scorzoneræfolia 99. 10*
serotina 100. 20.
Struthium 99.
Struthium 99. 6. 15*
thessala 100. 7.
thymifolia 99.
tomentosa 99. 10.
transsilvanica 100.
trichotoma 99.
uralensis 100.
- Habenaria cordata* 697. 25. 1.
Haberla Heldreichii 503. 3.
rhodopensis 503.
Hacquetia Epipactis 318.
Hænselera elatior 472. 140. 1.
granatensis 472.
Ilagea polycarpoides 254. 2.
 3*
- Halianthus peploides* 116. 8.
 1.
Halimium heterophyllum 72.
 4.
hirsutissimum 72. 5.
lasanthum 72. 9.
lepidotum 72. 7.
occidentale 72. 3.
rosmarinifolium 72. 2.
Halimocnemis alternifolia
 632. 29. 5.
brachiata 632.
crassifolia 632.
glauca 632.
malacophylla 632.
monandra 632.
sclerosperma 632.
sibirica 632.
triandra 632. 29. 4.
volvox 632.
Halimus pedunculatus 626.
 10. 6.
portulacoides 626. 10. 5.
Halmyra stellaris 709. 1. 2.
Halcocnemum strobilaceum
 628.
Halogeton monandrus 632.
 29. 7.
sativus 631.
spinosissimus 632. 27. 1.
Halopeplis amplexicaulis
 629.
pygmæa 629.
Haloscias scoticum 293.
Halostachys nodulosa 629.
 19. 1.
soongorica 629. 19. 2.
Haloxylon articulatum 630.
 22. 2.
Hammatocaulis cretica 285.
 9.
Haplophyllum Besseri 142.
Biebersteinii 142.
Boissierianum 142. 2*
Buxbaumii 142. 4.
ciliatum 142. 4.
coronatum 142.
hispanicum 143.
linifolium 142. 2. 4.
patavinum 142.
pubescens 143. 6.
rosmarinifolium 143.
spathulatum 143.
suaveolens 142. 4.
tauricum 142.
Hecatonia palustris 14. 82.
Hedera canariensis 319.
chrysocarpa 319. 1*
Helix 319.
- poëtarum* 319. 1*
Hedyphylla recta 193. 74.
vulgaris 193. 73.
Hedypnois arenaria 473.
coronopifolia 473. 144. 1.
crepidiformis 473. 144. 2.
cretica 473.
cretica 473. 144. 2.
furfuracea 473. 144. 2.
mauritanica 473. 144. 2.
monspeliensis 473. 144. 2*
pendula 473. 144. 2.
polymorpha 473. 144. 2.
pygmæa 473.
rhagadioloides 473.
rhagadioloides 473. 144. 1.
 1*
tubæformis 473. 144. 1*
Hedysarum alpinum 198.
angustifolium 198. 43. 6.
argenteum 198.
argyrophyllum 198.
candidum 198.
capitatum 197.
controversum 198. 6.
coronarium 197.
corsicum 197. 3.
cretaceum 198.
elongatum 198.
eriophorum 199. 10.
exaltatum 198. 6*
flexuosum 197.
Fontanesii 198. 11.
grandiflorum 198.
humile 198.
obscurum 197.
pallidum 197. 4. 198. 43.
 6.
platyphyllum 198.
Razoumovianum 198.
sibiricum 198. 7.
Sibthorpii 197.
spinosissimum 197.
spinosissimum 197. 3. 4.
tauricum 198.
variegatum 197. 3.
Heleogiton glaucum 764. 4*
litorale 764. 7.
pungens 764. 9.
trigonum 764. 5.
triquetrum 764. 8.
Helianthemum ægyptiacum
 73.
algarvense 72. 4.
Allionii 75. 50.
alpestre 75. 50. 51*
alyssoides 72.
alyssoides 72. 15.
apenninum 74. 33.

- arabicum* 76.
arcuatum 74. 28.
asperum 74.
atriplicifolium 72.
Barrelieri 76. 57*
Berterianum 74. 30.
bicolor 74. 28*
Bourgæanum 71. 14.
brevipes 73. 15*
Breweri 72. 15.
bupleurifolium 72.
calcareum 74. 33.
calycinum 72. 2.
canum 75. 50.
caput felis 73.
Chamæcistus 74. 30.
cheiranthoides 72. 9*
ciliatum 74.
ciliatum 72. 1. 74. 37.
cinerascens 72. 3.
cinereum 75.
contortum 73. 18.
crassifolium 75.
crassifolium 75. 43.
crispulum 72. 7.
croceum 74. 28*. 30.
denticulatum 73. 21.
dichotomum 76.
dichroum 75. 50*
dubium 76. 56 obs.
echioides 72.
ericoides 76. 58*
eriocaulon 72. 15.
formosum 72.
Fumana 76.
glabellum 75. 51*
glaucum 73.
globulariæfolium 72.
glutinosum 76. 57*
græcum 74. 28*
grandiflorum 74. 30. 30*
Guiraoi 75.
guttatum 72.
halimifolium 72.
heterodoxon 72. 13.
heterophyllum 74. 30*
hirsutissimum 72.
hirtum 74.
hispidum 74. 31*. 33. 40
 obs.
hymettium 75. 49*
hyssopifolium 74. 33.
inconspicuum 73. 15*
inflatum 73. 24.
intermedium 73.
involutum 72. 9*
italicum 75.
Jacquinianum 74. 36.
juniperinum 76. 57. 59.
læve 76. 57.
lævipes 76.
lævigatum 74. 30*
Lagasæ 74. 31*
Langei 72. 10.
lasianthum 72. 9*
lasiocarpum 73. 19*
lavandulæfolium 73.
lavandulæfolium 74. 33.
ledifolium 73.
leptophyllum 74.
Libanotis 72.
lineare 74. 34.
lunulatum 73.
macranthum 74. 30.
macrosepalum 72.
majoranæfolium 74. 31.
marifolium 75. 50*. 53.
micranthum 73. 22.
molle 75.
Morisianum 74.
nebrodense 75. 50*
niloticum 73. 19. 19*
nudicaule 74. 28.
nummularium 74. 30.
obovatum 75. 50.
obscurum 74. 30.
occidentale 72.
ocimifolium 72. 4.
ocymoides 72.
oelandicum 75. 50. 51*
origanifolium 75.
origanifolium 72. 4.
ovatum 74. 30.
paniculatum 75.
pannosum 75.
papillare 73.
penicillatum 75. 51.
petiolatum 73.
piliferum 74.
piloselloides 75. 45. 50.
pilosum 74.
plantagineum 72. 15.
polifolium 74.
procumbens 76.
pulverulentum 74. 33.
punctatum 72. 15.
racemosum 74. 34.
refractum 73. 21.
retrofractum 73.
retrofractum 73. 21.
rhodanthum 75. 40 obs.
roseum 74. 30. 33*
Rossmæssleri 75.
rotundifolium 75. 49. 49*
rubellum 75.
rubellum 75. 49*
rugosum 72. 9.
rupicolum 74. 30*
salicifolium 73.
sanguinem 73. 23.
Savii 76. 55.
scabrosum 72. 9.
scorpioides 72. 13.
semiglabrum 74.
semiglabrum 74. 37.
sericeum 72. 9*
serpillifolium 74. 30*
Serræ 76. 53.
sessiliflorum 73.
Sexte 75.
Spachii 76. 58.
splendens 72. 2.
squamatum 75.
Stabianum 74. 28*
stæchadifolium 74. 33.
stellatum 74. 28.
stœchadifolium 74. 28.
strictum 74. 34.
sulphureum 75. 40 obs.
ternifolium 72. 9.
Thibaudii 73. 26.
thymifolium 76. 57.
tomentosum 74. 28. 30.
tripetalum 73. 21.
Uberaria 72. 11.
umbellatum 71.
umbellatum 71. 13.
velutinum 74. 33.
verticillatum 72. 1.
villosum 73. 18.
vineale 75. 50.
violaceum 74. 34.
virgatum 74. 33*
viride 76. 57.
viscarium 74. 35.
viscidulum 75. 46.
vulgare 74.
vulgare 74. 28.
Helichrysum algarbiense 381.
 12 obs.
amorginum 380.
angustifolium 381. 12.
arenarium 381.
argyreum 382. 18*
Barrelieri 381. 12*
Boissieri 381.
citrinum 381. 12.
decumbens 381.
elegans 381. 11.
Erreræ 381. 9*
Fontanesii 381.
frigidum 380.
glutinosum 381. 7*
graveolens 381.
Heldreichii 381.
hispanicum 382. 17.
italicum 382.

- Lamarckii* 381.
leptophyllum 382. 17.
litoreum 382.
luteo-album 382. 1.
microphyllum 381. 11. 382.
 18*
nebrodense 381. 7.
olonnense 381. 12 obs.
orientale 381.
panormitanum 381. 7. 8.
pendulum 381. 7.
Picardi 382. 17.
plicatum 381.
rupestre 381.
rupestre 381. 6. 9*. 11.
saxatile 381.
scandens 381. 11*
serotinum 382.
serotinum orientale 382.
 18.
siculum 381.
siculum 381. 11.
Stoechas 381.
Stoechas 382. 17.
stramineum 381. 9.
uliginosum 382. 2.
virginicum 380.
Helicodiceros crinitus 754.
 4. 2.
muscivorus 754. 4. 2.
Heliosperma alpestre 87.
chromodontum 87.
eriphorum 87. 9. 3.
macranthum 88. 9. 5.
monachorum 87. 9. 2*
pudibundum 87. 9. 2.
pusillum 87.
pusillum 87. 9. 2*
quadrifidum 87.
Tommasinii 88.
Veselskyi 87.
Heliotropium Bocconi 508.
curassavicum 509 obs.
dolosum 508.
Eichwaldi 508. 2. 3.
ellipticum 508.
europaeum 508.
litorale 508. 6.
macrocarpum 508. 6.
mieranthos 509. 2. 8.
micranthum 509.
odorum 508. 2. 2.
parviflorum 508. 6.
Stevenianum 508. 6.
suaveolens 508.
subcanescens 508. 5.
supinum 508.
tenuiflorum 508. 5*
turcicum 508. 2. 2.
villosum 508.
Helleborine longipetala 689.
 14. 3.
pseudo-cordigera 689. 14.
 3.
Helleborus altifolius 18. 7.
angustifolius 17. 6*
argutifolius 17. 1.
atrorubens 17. 5.
Bocconi 17. 6.
brevicaulis 17. 6.
corsicus 17. 1.
cúpreus 17. 5.
cyclophyllus 17.
dumetorum 17. 6.
foetidus 17.
graveolens 17. 5.
laxus 17. 6.
lividus 17.
multifidus 17. 6*
niger 17.
occidentalis 17. 6.
odorus 17.
orientalis 17.
orientalis 17. 4.
pallidus 17. 5* (6)
purpurascens 17. 5*
viridis 17.
viridis 17. 6.
Helminthia aculeata 466.
asplenioides 466. 5 obs.
comosa 466.
echioides 466.
humifusa 466. 128. 1.
lusitanica 466.
mucronata 466. 4*
pratensis 466. 128. 1.
spinosa 466.
tuberculata 466. 128. 1.
Helosciadium bulbosum 308.
 85. 9.
crassipes 310.
intermedium 308. 85. 9.
 309. 95. 1*
inundatum 310.
lateriflorum 310. 95. 5 obs.
leptophyllum 305. 80. 2.
nodiflorum 309.
oppositifolium 310.
palatinum 309. 95. 2*
repens 309.
stoloniferum 309. 95. 1.
Heloseris palustris 352. 5. 25.
Helxine Soleirolii 658.
Hemarthria fasciculata
 845.
Hemerocallis flava 718.
fulva 718.
Hemestheum montanum 866.
 11.
Thelypteris 867. 12. 12.
Hepatica angulosa 3.
multiloba 4. 5. 2.
triloba 3.
Heptaptera colladonioides
 314. 99. 3.
Heracleum aëstivum 290. 11.
alpinum 290.
alpinum 289. 37. 3.
amplifolium 289. 37. 4.
angustatum 290. 11.
angustifolium 290. 11. 12.
arcticum 290.
armoricum 290. 11.
asperum 289. 37. 2. 3. 4.
australe 290. 11*
austriacum 290.
caucasicum 290. 9.
cordatum 290.
delphinense 290. 11.
dubium 289. 37. 5.
elegans 290. 11.
flavescens 290. 12. 12*
granatense 290.
Lecoqii 290. 12*
ligusticifolium 290.
longifolium 290. 11.
minimum 290.
montanum 289. 37. 4.
occidentale 290. 11.
Orphanidis 290.
Orsinii 289. 37. 3.
palmatum 289.
Panaces 289. 37. 4. 5. 5 obs.
 290. 11.
platyphyllum 289. 37. 3.
Pollinianum 289.
pratense 290. 11.
pubescens 290.
pumilum 290. 16.
pyrenaicum 289.
pyrenaicum 289. 37. 1.
redolens 289. 37. 5.
setosum 289.
sibiricum 290.
sibiricum 290. 12*
stifolium 290. 15*
simplicifolium 289. 37. 2.
Sphondylium 290.
Sphondylium 290. 11* 12.
stenophyllum 290. 11.
subvillosum 289. 37. 1.
suecicum 290. 11*
transsilvanicum 289. 37. 2*
villosum 289.
Herbiechia abrotanifolia 356.
 38*

- Herminium alpinum* 699. 27.
 1.
clandestinum 699. 28. 1. *
Monorchis 699.
Hermione seculimiba 712. 41.
aurea 712. 31.
Bertolonii 712. 29 *
chlorotica 712. 29 *
discolor 711. 25 obs.
elegans 712. 40.
formosa 711. 25 obs.
ganymedoides 711. 25 obs.
insolita 711. 25 obs.
intermedia 712. 34.
italica 712. 29.
Jonquilla 712. 35.
mediterranea 711. 25 obs.
monspeliensis 711. 25 obs.
multiflora 712. 31.
papyracea 711. 19.
polyantha 710. 18.
præcox 712. 29.
pratensis 711. 25 obs.
primulina 712. 30.
Seguentiæ 711. 19.
serotina 712. 41.
stellaris 712. 30.
unicolor 711. 21.
Hermodactylus tuberosus
 703.
Herniaria alpina 256.
batica 256.
Besseri 256. 5 *
Boissieri 256. 7 *
ciliata 256 (add.).
cinerea 256.
frigida 256. 7 *
fruticosa 256.
glabra 256 (add.).
hirsuta 256.
incana 256.
latifolia 256.
macrocarpa 256. 5.
maritima 256 (add.).
microcarpa 256 (add.).
nebrodensis 256 (add.).
odorata 256. 9.
paniculata 256.
parnassica 256.
permixta 256. 8 *
polygama 256 (add.).
polygonoides 256.
pyrenaica 256. 6.
scabrida 256.
Hesiodia bicolor 585. 29.
Hesperis arenaria 40. 10.
cretacea 39.
Cupaniana 39.
dalmatica 39. 2 *
elata 39. 5.
glutinosa 39. 2 *
heterophylla 39. 5.
hieracifolia 39. 4.
Hookeri 39. 8.
inodora 39. 5.
laciniata 39.
laciniata 39. 2 *
leucantha 39. 5.
linifolia 31. 15. 4.
litorea 40. 26. 11.
matronalis 39.
nivea 39. 5.
purpurascens 39. 4.
pygmaea 39.
repanda 31. 15. 4.
runcinata 39. 5 *
secundiflora 39.
silvestris 39. 5.
spectabilis 39. 4.
Steveniana 39.
tristis 38.
umbrosa 39. 5.
villosa 39. 4.
Visianii 39. 2 *
Heteropogon Allionii 786. 7.
 1.
contortus 786. 7. 1.
glaber 786.
messanensis 786. 7. 1.
Heterotenia arvensis 303.
Bourgæi 303. 71. 6.
glaberrima 303. 73. 1.
thalictrifolia 303.
Hibiscus Abelmoschus 127.
 1 obs.
aquaticus 126. 1.
palustris 126. 1.
roseus 126.
ternatus 127. 1. 2.
Trionum 126.
vesicarius 127. 1. 2.
Hieracium additum 443. 57
 obs.
abietinum 443. 57 *
æstivum 439.
æstivum 439. 10 *. 441.
 29.
affine 439. 12.
ageratoides 442.
aggregatum 445. 75.
alatum 449.
albidum 441. 26.
albium 442. 47 *
albo-cinereum 452. 162.
albulum 445. 79 obs.
alpicola 452.
alpicola 454. 185.
alpinum 447.
alpinum 447. 105. 450. 139.
 454. 184.
ambiguum 451. 157.
amplexicaule 448.
anchusæfolium 450. 137.
andryaloides 446.
anfractum 443.
anglicum 449.
anglicum 445. 69 *
angulare 444. 67.
angustatum 440. 16. 444.
 66 *
angustifolium 452. 166.
 454. 185.
angustum 440. 16 *
anisotrichum 452. 168.
apiculatum 447. 105.
approximatum 443. 57.
arganense 449. 124 *
arcticum 443. 61. 62.
arenarium 444. 66.
argenteum 445.
argillaceum 443. 57.
argutidens 443. 54 *
arnicoides 444. 64.
arrectum 440. 24 *
Aschersonianum 441. 34 *
asperatum 451. 156 *
athoum 446. 85.
atratum 445.
atratum 448. 105 *. 106.
atricapillum 447. 104.
atrovirens 444. 63. 64.
atticum 452. 160 *
aurantiacum 453.
auratum 440. 16 obs.
aureum 456. 20.
Auricula 453.
auriculeforme 454. 181 *
auriculoides 451. 156 *.
 453. 176.
aurigeranum 439. 15. 445.
 79.
Ausserdorferi 441. 33.
australe 441.
autumnale 438. 1.
balsameum 448. 109.
banaticum 453. 179.
barbatum 439.
barbatum 449. 119.
Bauhini 451. 156.
bellidifolium 448. 113 *
bellum 443. 57 obs.
bernense 450. 136.
bicolor 449. 126 *. 453.
 169.
bidentatum 440. 22.
biene 444. 64 *
bifidum 444.

- bifidum 446. 80.
bifurcum 454.
bifurcum 454. 180. 184 *
bitense 454. 181.
Blanci 448. 110.
Blyttianum 453.
Bocconi 447.
bohemicum 447.
Boissieri 450. 136.
bombeyinum 448. 116.
Boreanum 438. 3 obs. 441.
 29.
Borderi 448. 117.
boreale 438.
boreale 441. 30.
Bourgæi 443.
brachiatum 453.
brachyphyllum 453. 173.
bracteolatum 442.
bracteolatum 457. 32.
brevifolium 439. 10 *. 11 *
breviscapum 452. 164. 166.
brigantiacum 450. 144.
bupleurifolium 440. 22.
bupleuroides 451.
bursæfolium 443. 54.
bursifolium 443. 52.
cæsium 444.
cæspitosum 453. 172.
calabricum 447. 96.
calcareum 450. 146.
calenduleflorum 447. 103.
calophyllum 446. 86 *
Camerarii 454. 184 *
candicans 445. 79.
candidissimum 446. 80 *
candidum 449. 119 *
canescens 445.
canescens 445. 72. 74 *
carpathicum 442.
carpathicum 447. 102.
carpetanum 442. 44 *
castellanum 454. 181 *
cerinthoides 449.
cerinthoides 448. 110 *.
 449. 127.
cernuum 454.
cernuum 451. 153.
chalcidicum 446.
chalicophilum 449. 119.
charadream 444. 66.
chenocaulum 438. 1.
chlorocephalum 447. 102 *
chloropsis 450. 146 *
chlorospermum 442. 39.
chondrillaefolium 450. 141.
chondrilloides 450.
chondrilloides 456. 15.
chrysanthum 448. 105 *
- ciliosum* 442. 38.
cinerascens 445. 78.
cinereum 452. 161. 162.
 454. 184 *
collinum 451. 156 *. 157.
 453. 172. 454. 181.
Columnæ 456. 19.
commixtum 443. 57 *
commutatum 448. 105 *
compositum 448.
confertum 443. 57 obs.
confusum 440. 17 *
conspicuum 438. 3 obs.
contignum 445. 74.
controversum 438. 1 *
cordatum 448. 110 *
cordifolium 448. 113 *
coriaceum 443.
coronopifolium 439. 10.
corruscans 449.
corymbosum 440.
corymbuliferum 438. 1.
Costæ 442. 37 *
cotoneifolium 440. 19.
crassicaule 438. 1.
crinitum 442.
crispatum 446. 91.
crissaloense 440. 22.
croatium 439. 3 *. 449.
 124. 455. 13.
crocatum 439.
crocatum 441. 30.
curvidens 438. 3 obs.
cuspidatum 441.
cuspidatum 441. 29. 448.
 110 *
cydonæfolium 442. 45. 47.
 447. 102.
cydoniæfolium 440.
cydoniæfolium 440. 20.
 24 *. 447. 102.
cymigerum 452. 159 *
cymosum 452.
cymosum 452. 160. 453.
 172.
Czereianum 450. 135.
dasycephalum 446. 89.
dasypodum 448. 109.
decipiens 449.
decipiens 447. 105. 449.
 127.
decolorans 453.
decolorans 453. 171.
decrescens 441. 30.
Delasorii 450. 146 *
dentatum 450.
denticulatum 440. 20.
denudatum 442. 37. 451.
 149.
- depauperatum* 439. 3 *
depilatum 447. 99.
diaphanum 443.
dichotomum 454. 180.
diffusum 451. 150.
dinaricum 442.
discolor 454. 183.
dissitum 438. 3 obs.
divaricatum 446.
Dollinerii 443. 54 *
dovrense 442.
dovrense 439. 13. 443. 60 *
dubium 451.
dubium 453. 175. 176.
echioides 452. 162.
editum 438. 3 obs.
elatum 440.
elatum 442. 47. 453. 170 *
elegans 442.
elegans 451. 156.
ellipticum 443. 57 *
elongatum 448. 114 *. 450.
 136.
Engleri 443. 60 *
epimedium 442.
eriocaulum 443. 61.
eriocerinthum 448. 113 *
eriophorum 439.
eriophyllum 446. 86.
eriopsilon 446. 91.
eripus 442. 38.
eximium 447.
exotericum 444. 64.
extensum 445. 79 *
fallacinum 454. 184 *
fallax 451. 156. 157.
farinulentum 445. 78. 446.
 94.
fasciculare 443.
fastigiatum 443. 57 *
fennicum 453. 175 *
filiferum 451. 156.
filiforme 442.
firmum 441. 29.
flagellare 454. 184 *
flammeum 453.
flexuosum 449.
flexuosum 449. 132.
floccosum 449. 133.
florentinum 451.
florentinum 453. 176.
floribundum 453.
focundum 443. 57 obs.
foetidum 458. 40.
foliosum 439.
Forskohlei 439. 4.
fragile 444.
fratris 454. 184 *
Friesii 439. 12. 440. 16.

Friwaldii 446.
Friwaldii 446. 81.
fulgidum 441. 30.
fuliginatum 452. 167.
furcatum 454. 185.
fuscidulum 439. 3 *
fuscum 453. 169. 174.
Fussianum 451. 154 *
Ganderi 440. 24. 443. 54 *
Garcceanum 441. 29.
Garibaldianum 441.
Gaudini 450. 137.
Gaudryi 446. 81 *
Gibsoni 444. 66 *
glabratum 449.
glabratum 450. 140.
glaciale 452.
glanduliferum 450.
glareosum 439. 12 *. 441.
 29 *
glaucellum 443. 57.
glauescens 451. 156. 453.
 176.
glaucinum 444. 65.
glaucophyllum 448. 110 *.
 450. 135.
glauopsis 450. 146 *
glaucum 450.
glaucum 451. 149 *. 150.
globosum 447. 105.
glomeratum 451.
glomeratum 451. 157. 452.
 159 *
gothicum 441.
gothicum 341. 28. 33 et *
Gougetianum 449. 127 *
gracile 442. 44.
gracilentum 447. 105.
graciliscapum 446. 90.
græcum 449.
graniticum 445. 78 *
graveolens 450. 146.
Grenieri 449. 124.
halimifolium 439. 10 *
Hausmanni 439. 12 *. 454.
 183 *
Heldreichii 446.
Herculis 452. 160.
heterogynum 450. 143.
heterophyllum 438. 3.
Heuffelii 452. 160. 164.
Hinterhuberi 453. 169.
hirsutum 438.
hispidum 439.
hispidum 447. 100.
holosericeum 447. 104.
Hoppeanum 444. 64 *
humile 447.
Huteri 441. 25.

hybridum 454.
hybridum 454. 185.
hyperboreum 451.
ilicetorum 439. 10 *
illyricum 450.
incanum 468. 11.
incisum 450.
incisum 444. 64 *
inquinatum 443. 57.
insidiosum 440. 24.
insuetum 441. 29.
integrifolium 444. 64 *.
 455. 13.
intybaceum 441.
intybaceum 448. 109.
inuloides 438. 3. 440. 16.
 17.
iricum 449.
irriguum 439. 12 *
italicum 442.
Jacquini 447. 97.
Jankæ 446.
Jankæ 441. 34.
Janus 444. 64.
Jaubertianum 444. 66 *.
 67.
juratum 442.
juratum 449. 125.
jurassicum 442. 47.
kobrinense 453. 172.
Kochianum 446.
lacerum 445.
laciniosum 444. 65.
Lactaris 439. 10.
lactucaceum 439. 15.
lævicaule 444. 65.
lævigatum 438. 3. 439. 12.
 443. 54 *. 445. 74. 450.
 146.
Laggeri 446. 90. 452. 160.
lamprophyllum 448. 114 *
lanatum 446.
lanatum 446. 81. 90.
lanceolatum 438. 1 *. 439.
 12. 440. 20. 24.
lancifolium 438. 3 obs.
Langei 449.
laniferum 448.
Lapeyrousii 449. 123.
lapponicum 441.
largum 439.
lasiophyllum 445.
lasiophyllum 445. 79.
latifolium 430.
Lawsonii 449. 119.
legionense 444. 63 *
leiocephalum 451. 149.
leiopogon 450. 146 *

leptocephalum 442. 47. 443.
 62.
leucocephalum 454. 184.
leucophæum 450. 144 *
ligusticum 448.
ligusticum 442. 40.
lindebergii 445. 74 *
Lingenfeldii 444. 64.
lingulatum 447.
linifolium 441. 33 *
Linnæanum 444. 64 obs.
Liottardi 446.
Liottardi 446. 93.
longifolium 449. 124 *
Loreti 450. 136.
Loscosianum 449. 124 *
lucidum 441.
luridum 438. 3 obs.
lutescens 441. 25.
Lychnitis 448.
lycopifolium 440.
macedonicum 450.
macilentum 442.
macilentum 442. 44 *
macranthum 441. 32 *.
 454. 184.
macrocephalum 441. 25.
macrophyllum 448. 114.
macrotrichum 452.
maculatum 439. 12. 443.
 57. 444. 64 *
magistri 441. 29.
Mairanum 452. 167.
majellense 449. 134.
marmoreum 446. 88. 90 *
melachætum 451. 156 *
melanocephalum 439. 12 *.
 447. 104.
Michelii 451. 154.
mieranum 453. 178.
micromegas 452. 164.
mixtum 448.
Moëanum 444. 64 *
moesiæum 441. 34.
molle 455. 13.
montanum 455. 8.
montenegrinum 446. 86 *
monticola 439. 10 *
Morisianum 449.
mosanum 445. 79.
Mougeoti 449. 125.
multiflorum 452. 160.
murorum 444.
murorum 442. 39. 443. 63.
 444. 64 *. 66.
myriadenum 453.
myrianthum 438. 2.
myriophorum 448. 110 *
nævuliferum 443. 57.

- nanum 453. 176.
 neapolitanum 450. 136.
 nemorale 443. 57 obs.
 nemorense 444. 64.
 nemorosum 443. 52.
 nemorum 444. 66. 449.
 125 *
neo-cerinthæ 448.
 Nestleri 452. 159.
nigrescens 447.
nigrescens 445. 68.
nigricans 445. 68 *
nitens 443.
 nitidum 445. 79 *. 448.
 109.
 nobile 442. 37 *
norvegicum 441.
 Notarisii 442. 40.
 Oberleitneri 447. 97.
 obliquum 438. 3 obs.
 oblongifolium 443. 62.
 oblongum 444. 66.
 obovatum 448. 114 *
 obscureum 451. 156 *. 454.
 179.
 obtusifolium 444. 66.
 occitanicum 438. 3 obs.
 ochroleucum 440. 24. 455.
 3.
olivaceum 449.
 olivaceum 449. 126 *
olympicum 441.
onosmoides 445.
 oporinoides 451. 149.
 oppositifolium 439. 6.
 orarium 442. 45 *
oreades 445.
 oreades 445. 69 *. 452.
 164.
 oreophilum 452. 164.
 Orieni 446. 86 *
 organifolium 448. 115.
 Orphanidis 446. 81 *
 ovalifolium 444. 64.
ozydon 445.
 Ozanoni 449. 134.
pallescens 445.
 pallescens 444. 64. 445. 72.
 79.
 pallidiflorum 441. 25.
 pallidifolium 447. 102 *
pallidum 445.
 pallidum 441. 67. 445. 75.
 79.
 paludosum 456. 14.
 Pancicii 447. 96.
 pannonicum 456. 22.
 pannosum 446.
 Papperitzii 450. 143 *
 papyraceum 440. 22.
Parnassi 446.
 parviflorum 458. 36.
 patens 441. 27.
 Pavichii 451. 154 *
 pedunculare 447. 101. 454.
 184 *
 Peleterianum 454. 184.
pellitum 446.
 perfoliatum 440. 22.
 personatum 447. 101.
Perusianum 449.
 petiolare 444. 65.
petraeum 452.
 petrophilum 449. 134.
 petrosum 445. 68 *. 448.
 108.
phlomoïdes 448.
 phochleri 446. 86 *
picroides 440.
 picroides 440. 24.
 pictaviense 441. 27 *
pictum 446.
 pictum 444. 66.
piliferum 450.
Pilosella 454.
 pilosellæforme 454. 184.
 pilosellinum 454. 184 *
 Pilosello-Auricula 454.
 181 *
 piloselloides 451. 154.
 pilosissimum 446. 87.
 pilosum 450. 137.
 Planchonianum 444. 67.
 pleiocephalum 454. 179.
 pleiophyllum 443. 62.
 plicatum 442. 45 *
 plumbeum 444. 67.
 plumulosum 446. 86 *
 poliotrichum 452. 159 *
politum 451.
 Pollichiae 444. 64.
 polycladon 441. 27.
 polyphyllum 451. 149.
porrectum 442.
 porrectum 450. 137.
porrifolium 451.
 porrifolium 450. 144.
præaltum 451.
 præaltum 451. 156 *. 452.
 161.
 præcox 444. 64. 451. 156 *
prælongum 440.
 præruptorum 440. 17 *
pratense 453.
prenanthoides 440.
 prenanthoides 440. 18.
 prostratum 439. 8.
 protractum 442. 45 *
 provinciale 441. 27 *. 442.
 38.
 prünellæfolium 456. 16.
 pseudo-Blyttii 453. 171 *
pseudo-cerinthæ 448.
 pseudo-dentatum 450. 136.
 pseudo-prenanthes 440. 20.
pulchellum 443.
 pulchellum 446. 89.
pulmonarioides 448.
 pulmonarioides 447. 102.
 pumilum 447. 97. 104. 452.
 166 *. 456. 16. 19.
 purpurascens 449. 119 *
 pusillum 454. 185.
pyrenaicum 442.
 pyrenaicum 454. 2. 455. 3.
racemosum 439.
 radiocaulæ 451. 156.
 Ramondii 448. 114 *
ramosum 443.
 Reinholdi 442. 42.
 reticulatum 440. 20 *
 Retzii 444. 67. 445. 79.
 Reuteri 448. 108.
 Reuterianum 451. 153.
 rhæticum 447. 104 *
 rhodopeum 452. 164.
 rhomboidale 448. 114 *
 rigidulum 438. 3 obs.
rigidum 439.
 rigidum 449. 12. 441. 29.
 riphæum 440. 22 *
 robustum 439. 14.
 rosulatum 445. 72 *
 Rothianum 452. 161 *
rotundatum 443.
 rubescens 444. 66.
 rubricaulæ 438. 1.
 rufisetum 453. 172.
rupestre 447.
 rupestre 445. 79.
 rupicola 448. 109 *
rupicolum 446.
 rupicolum 445. 79.
sabaudum 438.
 sabaudum 438. 1 *
sabinum 452.
 sabinum 451. 156. 452.
 160 *
 Sælani 453. 171 *
 salebrosum 445. 79 obs.
 salicifolium 440. 17 *
 sanctum 460. 117. 1. 461.
 117. 2.
 sarmentosum 451. 156.
Sartorianum 447.
 saucium 445. 79 obs.
 Saunteri 454. 183 *

saxatile 448.
saxatile 448. 118. 450. 144.
 146.
saxetanum 450.
saxetorum 448. 109.
saxifragum 445.
saxifragum 447. 99.
scapigerum 447.
Scheelei 440. 22.
Schlosseri 446. 86.
Schmidtii 445. 78. 79.
Schraderi 450. 139.
Schultesii 454. 181 *
sciaphilum 443. 57 obs.
scopulorum 449. 119.
scorzoneraefolium 449.
semivestitum 446. 86.
semivillosum 450. 144 *
senescens 448. 105 *
sericeum 448. 118.
Seridis 439. 15.
serotinum 439. 10.
serpyllifolium 453.
serum 438. 3 obs.
sessiliflorum 439. 6.
setigerum 452.
setigerum 452. 162.
siculum 442. 38 *
Sieberi 440. 25.
silesiacum 443.
silvaticum 441. 30. 442.
 40. 443. 57.
silvestre 438. 3. 441. 30.
silvicola 443. 57 *
sinuosum 450.
solidagineum 448.
Sommerfeltii 444. 67 *
sonchifolium 448. 110 *
sparsifolium 441.
sparsum 451.
spathulæfolium 454. 183.
spathulatum 448. 113 *
speciosum 449.
speciosum 450. 146 *
sphærocephalum 454.
sphærocephalum 454. 180.
sphærophyllum 444. 65.
spicatum 440. 24 *
staticefolium 451.
stelligerum 445.
stenolepis 444. 64 *
Sternbergii 445. 79.
stoloniflorum 454.
stoloniflorum 454. 184 *
strictum 440.
stuppeum 450.
stuppeum 450. 143.
subcesium 444. 64 *
subdolum 444. 64 *

subhirsutum 438. 3 obs.
submaculatum 444. 64 obs.
submurorum 448.
subnivale 452.
subnudum 450. 137.
subpræaltum 451. 156 *
subsalsum 439. 3 obs.
sudeticum 447.
sudeticum 447. 101. 102.
 104.
suecicum 453.
Tatrae 451. 149 *
taygeteum 446. 81.
tenuifolium 439. 7.
tephrocephalum 454. 181.
tomentosum 446.
Tommasinii 446. 86. 450.
 143 *
Trachselianum 445. 77.
trachycaulon 438. 1.
transsilvanicum 443.
transsilvanicum 443. 62.
Triasii 458. 43.
trichodes 440. 16 *
tridentatum 441.
truncatum 439.
tubulosum 441. 26.
umbellatum 439.
umbrosum 443. 57 *
undulatum 450.
uniflorum 454. 185.
vagum 439. 3 obs.
Vahllei 452.
Vaillantii 452. 159 *
valdepilosum 449.
vallicolum 439. 3 obs.
vallisiacum 440.
vellereum 448. 118 *
velutinum 454. 184 *
verbascifolium 446. 86. 90.
Verloti 444. 66 *. 445. 78.
vernum 444. 67.
versicolor 453. 173. 454.
 183 *
versutum 446. 82. 85.
vestitum 446. 80 *
vietum 445. 79.
Villarsii 448. 110 *. 454.
 181.
villoso-lanatum 450. 136.
villosum 450.
villosum 446. 85. 447. 103.
 449. 124. 450. 137.
virescens 441. 29.
virga aurea 442.
virosum 439. 14. 15.
vittatopetalum 454. 183.
vogesiacum 449. 125.
vulcanicum 445. 79.

vulgatum 443.
Waldsteinii 446. 86.
Willkommii 449. 126 *
Wimmeri 445. 69 *
Zizanium 451. 156.
Hierochloa alpina 790.
australis 790.
borealis 790.
fragrans 790. 1 *
odorata 790. 1.
orientalis 790. 1.
pauciflora 790.
vinealis 790. 1.
Himantoglossum antropopho-
rum 696. 24. 1.
hircinum 696. 23. 1.
secundiflorum 696. 22. 1.
Hinterhubera Berengeriana
 66. 69. 3.
pauciflora 66. 69. 4.
Hippocrepis annua 187. 9.
annularis 187. 11.
balearica 186.
balearica 186. 29. 1.
biflora 187.
Bourgæi 186. 29. 4 *
ciliata 187.
comosa 186.
comosa 186. 29. 4 *
eliocarpa 187. 6 *
flexuosa 187. 11 obs.
glauca 186.
multisiliquosa 187.
prostrata 186. 29. 3.
Salzmanni 187.
scabra 186.
scabra 187. 8.
squamata 187.
unisiliquosa 187.
valentina 186.
Willkommiana 187. 5 *
Hippomarathrum Bocconi
 314.
cristatum 314.
pterochlanum 314.
siculum 314. 101. 3.
Hippophaë rhamnoides 644.
Hippuris maritima 249. 1.
vulgaris 249.
Hirschfeldia adpressa 48. 9.
Hispidella Barnadesii 473.
 143. 1.
hispanica 473.
Hladnikia golacensis 314.
Golaka 315. 105. 1.
pastinacæfolia 304. 78. 1.
Hohenackeria bupleurifo-
lia 313.
polyodon 313.

- Holcus alpinus* 790. 24. 4.
annuus 809. 8.
arcticus 808. 71. 1.
argenteus 809. 5.
atropurpureus 808. 70. 1.
australis 790. 24. 3.
borealis 790. 24. 1.
cæspitosus 809.
densus 809. 3.
Duræi 809. 7.
Gayanus 809.
glaucus 809. 5.
grandiflorus 808.
lanatus 809.
mollis 809.
Notarisii 809.
odoratus 790. 24. 1. 3.
Reuteri 808.
setiger 809. 4.
setiglumis 809.
tenuis 809. 7.
Holoschoenus albovittatus 765. 1.
australis 765. 1.
exserens 765. 1.
filiformis 765. 1.
globiferus 766.
Linnæi 765. 1.
panormitanus 765. 1 *
vulgaris 765.
Holosteum glandulosum 112. 5. 2.
glutinosum 112. 5. 1 *
Heuffelii 112. 5. 1.
imberbe 112. 5. 2.
biniflorum 112.
umbellatum 112.
Homogyne alpina 397.
discolor 397.
silvestris 397.
Honkenya oblongifolia 116. 8. 1.
peplodes 116.
Hoppea sibirica 350. 4. 1.
Hordeum bulbosum 837.
geniculatum 838. 2. 6.
Gussoneanum 838.
leporinum 838.
maritimum 838.
murinum 838.
murinum 838. 5.
nodosum 838. 2.
pratense 838. 2.
pseudo-murinum 838. 5.
pubescens 838. 6.
rubens 838. 4 *
secalinum 838.
secalinum 838. 3.
silvaticum 837. 100. 4.
strictum 838. 1.
Winkleri 838. 3.
Horminum coloratum 571. 38.
pyrenaicum 587.
Hornungia petræa 66. 69. 2.
Hottonia palustris 602.
Huetia pumila 302. 70. 6.
Hugueninia tanacetifolia 43. 1.
Humulus Lupulus 658.
Hutchinsia affinis 65. 69. 1.
alpina 65.
Auerswaldii 65. 69. 1 *
brevicaulis 65. 69. 1.
brevistyla 63. 20 *
caulifera 65. 69. 1.
corymbosa 63. 21.
grandiflora 65. 25.
Loreti 66. 69. 3.
maritima 66. 69. 3.
pauciflora 66.
pauciflora 66. 5.
petræa 66.
procumbens 66.
procumbens 66. 5.
Prostii 66.
rotundifolia 63. 22.
Hyacinthella leucophæa 734. 2.
Hyacinthus abortivus 732. 3.
albulus 731. 21. 1 *
amethystinus 731.
ciliatus 732. 2.
commutatus 734. 3.
creticus 731. 22. 2.
curvulus 731. 21. 2.
dalmaticus 733. 25. 1.
dubius 732. 5.
fastigiatus 731.
fulvus 731. 20. 2.
leucophæus 733. 25. 2.
lividus 731. 20. 1.
montanns 731. 21. 2.
nanus 731. 22. 1.
orientalis 731.
Pallasianus 731. 21. 2.
pallens 733. 25. 1. 2.
pallidiflorus 731. 21. 2.
Pouzolzii 731. 21. 3.
provincialis 731. 21. 1.
pyrenæus 731. 21. 2.
romanus 732. 4.
spicatus 732. 1.
trifolius 732. 3.
Webbianus 732. 6.
Hydrilla verticillata 678. 4. 1.
Hydrocharis Morsus ranae 678.
Hydrocotyle natans 319.
pleiantha 319. 118. 2 *
Schkuhriana 319. 118. 2.
vulgaris 319.
Hymenocarpus circinatus 165.
Hymenonema Bergeri 472. 138. 2.
græcum 472.
laconicum 472.
Hymenophyllum tunbridgense 869.
unilaterale 869.
Wilsoni 869. 2. 2.
Hymenostemma Fontanesii 371. 23. 9.
pseudanthemis 370. 21. 2.
Hyoscyamus agrestis 524. 2. 1.
albus 524.
aureus 524.
aureus 524. 2. 3 *
auriculatus 524. 2. 1 *
bohemicus 524. 2. 1.
creticus 524. 2. 4.
major 524. 2. 3 *
niger 524.
pallidus 524. 2. 1.
reticulatus 524.
va ians 524. 2. 3 *
verviensis 524. 2. 1.
Hyoseris bætica 474. 145. 1.
calyculata 474. 145. 1.
cretica 473. 144. 1.
Hedypnois 473. 144. 2 *
lucida 474. 145. 1.
microcephala 474. 145. 2.
radiata 473.
rhagadioloides 473. 144. 2.
scabra 474.
Hypecoum caucasicum 25. 6. 4.
glaucescens 25. 6. 2 *
gracile 25. 6. 2 *
grandiflorum 25.
litorale 25. 6. 2.
patens 25.
pendulum 25.
procumbens 25.
Hypericum ægyptiacum 134. 3. 1.
alpestre 134. 31.
alpigenum 132. 8 *
alpinum 132. 8 *
ambiguum 133. 27.
Androsæmum 131. 1. 1.
androsemifolium 132. 8.
anglicum 131. 1. 1.
annulatum 133.
Apollinis 132.

athoum 134.
athoum 132. 10.
atomarium 133.
australe 134.
bæticum 133. 25 *
balearicum 132.
barbatum 132.
Barbatum 132. 8. 12. 13.
Baumgartenianum 133. 24 *
bithynicum 132.
blenticense 135. 4. 1 obs.
Bocconi 132. 14.
Burseri 132. 8 *
calabricum 132. 12 *
callithyrsus 133. 22.
calycinum 131.
canariense 131. 1. 3.
caprifolium 133.
ciliatum 132. 14.
commutatum 133. 28 obs.
Coris 134.
Coris 134. 36.
corsicum 133. 26 *
creticum 134. 3. 2.
crispum 134.
delphicum 133.
delphinense 133. 27.
dentatum 132. 14.
Desetangii 134. 28 obs.
diversifolium 133. 22.
dubium 133. 27.
elegans 133.
elegans 132. 14.
elegantissimum 132. 15.
 133. 24 *
clodes 134. 4. 1.
empetrifolium 134.
ericoides 134.
ferrugineum 132. 11.
fimbriatum 132. 8.
fragile 134.
Grisebachii 132. 8 *
Heldreichii 132. 14 *
heterostylum 134. 31.
hircinum 131. 1. 2.
hirsutum 133.
humifusum 134.
hyssopifolium 133.
intermedium 133. 27 x.
 28 obs.
Kohlianum 133. 23.
linarifolium 134.
linearifolium 134. 35.
lineolatum 133. 28.
Liottardi 134. 34.
lusitanicum 134.
macedonicum 132. 12.
maculatum 132. 8 *. 133.
 27.

maritimum 134. 3. 2.
microphyllum 133. 28.
montanum 132.
montanum 132. 10. 14.
Montbretii 132.
mutilum 135. 4. 1 obs.
neapolitanum 133. 26.
nummularium 134.
olympticum 132.
origanifolium 132. 4.
perfoliatum 132.
perforatum 133.
pubescens 133. 19.
pulchrum 133.
quadrangulare 133. 26.
quadrangulo-tetrapterum
 133. 27.
quadrangulum 133.
quadrangulum 133. 26.
quadrilatum 133. 26.
quinquenervium 134. 4. 1
 obs.
repens 134.
repens 133. 26 *. 134. 30.
 32.
rhodopeum 132.
Richeri 132.
Richeri 132. 8. 8 *
Rochelii 132. 8.
rumelicum 132.
Schlosseri 133. 28.
Spruneri 132.
stenophyllum 133. 28.
tenellum 133. 26 *
tetrapterum 133.
thasium 132.
tomentosum 133.
transsilvanicum 132. 8 *
trichanthum 132. 12.
trichocaulon 134.
tymphrestum 133. 22.
undulatum 133.
veronense 133. 28.
verticillatum 134. 37.
vesiculosum 132.
Webbii 134. 3. 1 *
Hypochaeris adscendens 470.
 132. 5.
ætnensis 471. 134. 2.
alpina 470. 1.
arachnoidea 471. 133. 5 *
arachnoides 470. 132. 5.
Balbisi 470. 132. 4. 5. 5 *
corsica 471. 133. 2.
cretensis 471. 133. 1.
dimorpha 470. 132. 4 *. 5.
Fauchiniana 470. 2 *
glabra 470.
glaucia 471. 134. 1.

helvetica 470. 2.
hispida 470. 132. 5. 471.
 133. 1.
intermedia 470. 132. 4.
lævigata 471. 134. 1.
lasiophylla 470. 132. 4 *
maculata 470.
minima 470. 132. 5. 5 *.
 471. 5 *
neapolitana 470. 132. 4 *
platylepis 470. 132. 4.
radicata 470.
salina 470. 132. 4 *
Salzmanniana 471.
taraxacoides 459. 48.
Tenorii 470. 132. 4 *
tenuiflora 470.
thracica 470. 132. 5.
uniflora 470.
Hypopeltis hastulata 865. 2.
lobulata 865. 2.
Hypopitys glabra 493. 20. 1.
multiflora 493. 20. 1.
Hyssopus angustifolius 587.
 26. 1.
aristatus 587. 26. 1 *
canescens 587. 26. 1 *
officinalis 587.
pubescens 587. 26. 1 *
Ianthe bugulifolia 532. 2. 9.
Iasione amethystina 487.
amethystina 487. 7 *
blepharodon 486.
Carioni 486. 1.
carpetana 487. 7 *
corymbosa 486.
depressa 487. 11.
echinata 486. 1 *
fallax 487. 12.
foliosa 487.
Heldreichii 486. 1. 2.
humilis 487.
humilis 486. 1.
Jankæ 486.
litoralis 486. 1.
lusitanica 487.
mariana 487.
maritima 486. 1.
montana 486.
orbiculata 487. 11.
penicillata 487.
perennis 487.
perennis 486. 1. 487. 12.
rosularis 487.
sessiliflora 487. 12 *
supina 487.
tristis 487. 10.
Iberis affinis 61. 27.

- amara* 61.
amoena 60. 16.
arvatica 61. 26.
attica 60. 13 obs.
aurosica 61. 19.
Benthamiana 61. 22.
Bernardiana 61.
bicorymbifera 61. 27.
boppardensis 61. 24.
Bourgæi 60. 9. 61. 21 *
Bouteloui 61. 21.
Bubanii 61. 22.
campestris 65. 18.
Candolleana 61. 19.
carnosa 61.
carnosa 61. 18.
ceratophylla 61. 27.
ciliata 60.
collina 61. 24 *
conferta 60.
Contejeani 61. 24.
contracta 60.
contracta 60. 3.
decipiens 61. 26 *
deflexifolia 61. 25 *
delphinensis 61. 25 *
divaricata 61. 24.
Durandi 61. 25 *
Forestieri 61. 26.
garrexiana 60. 6 *
Gastoni 60. 6 *
gibraltarica 60.
granatensis 60. 11 *
humilis 60. 1.
integrerrima 60. 10 *
integrifolia 60. 14 *
intermedia 61.
intermedia 61. 24.
Lagascana 61.
Lamotti 61. 24 *
leptophylla 60. 14.
linifolia 60.
linifolia 60. 16.
lusitanica 60. 9 *
majalis 61. 24 *
nana 61.
nana 60. 11 *
odorata 61.
pauduræformis 61.
pectinata 61.
petræa 60. 11.
pinnata 61.
polita 61. 25 *
procumbens 60.
Prostii 61.
Pruiti 60.
radicans 60. 4.
rhodocarpa 60. 11.
sabanda 61. 26.
saxatilis 60.
semperflorens 60.
sempervirens 60.
sempervirens 60. 5.
serrulata 60.
serrulata 61. 17.
spathulata 61. 18.
Spruneri 60.
stricta 60. 14.
subvelutina 60.
taurica 60. 14 *
Tenoreana 60.
Timeroyi 61. 24 *
umbellata 60.
vermiculata 60. 3.
Villarsii 60. 14.
Violetti 61. 25 *
Welwitschii 60. 9 *
Zanardinii 60.
Ifigia Fontanesii 384.
Sibthorpii 384. 37. 1.
Ilex Aquifolium 144.
balearica 144. 4. 1 *
Perado 144. 4. 1 obs.
Illecebrum capitatum 255. 6.
Kapela 255. 9.
lugdunense 255. 9.
serpyllifolium 255. 10.
verticillatum 255.
Ilysanthes gratioides 536.
 6 obs.
Impatiens fulva 141 obs.
noli tangere 141.
parviflora 141 obs.
Imperata arundinacea 785.
cylindrica 785. 3. 1.
Imperatoria angustifolia
 285.
glauca 287. 27.
hispanica 285. 29. 1.
lævigata 285. 29. 2.
Ostruthium 285.
Intybellia pulchra 457. 34.
purpurea 461. 117. 4.
Intybus bulbosus 458. 42.
incarnatus 458. 36.
multicaulis 458. 37.
præmorsus 458. 35.
Inula adriatica 392. 6 x
argentea 392. 10.
Aschersoniana 393.
auriculata 392. 5.
bengesiaca 392. 10.
bifrons 393.
Britanica 392.
Bubonium 392. 6.
calycina 392. 10.
campestris 392. 9.
candida 393.
caspia 393.
cinerea 391. 55. 3.
Conyza 393.
cordata 392.
cordata 391. 55. 2.
cordato-germanica 392.
 5 x
coriacea 392. 5.
crithmifolia 393. 21.
crithmoides 393.
dichotoma 393. 11.
dysenterica 394. 2.
ensifolia 392.
ensiformis 392. 4.
etrusca 391. 55. 2.
foetida 395. 57. 3.
foliosa 392. 6.
germanica 392.
germanica 392. 6.
glabra 393. 16 *
graveolens 394.
Halleri 391. 55. 3.
Hausmanni 392. 4 x
helenioides 393.
Helenium 391.
heterolepis 393.
hirta 391.
hybrida 392. 8 *
limonifolia 393.
media 392. 5 x. 7 x
micranthos 393. 11.
montana 392.
montana 392. 4.
Oculus Christi 392.
odora 392. 10.
Oetteliana 393. 11.
orientalis 392. 7. 393. 11.
oxylepis 393. 17.
parnassica 393. 17.
pseudo-Bubonium 391. 55.
 2.
Pulicaria 394. 56. 3.
revoluta 394.
rigida 392. 4 x
salicina 391.
semiamplexicaulis 391. 55.
 2 *. 392. 6.
spiræifolia 392. 6 *
squarrosa 392.
squarrosa 392. 5. 393. 14.
suaveolens 393.
thapsoides 393. 16 obs.
transsilvanica 392. 5 x
Vaillantii 391.
Vaillantii 393. 11.
villosa 394. 56. 4.
viscosa 393.
Ipomoea arenaria 504 (Ba-
 tatas).

sagittata 504.
Iris acoriformis 702. 36.
aquiloba 701.
alata 703.
alba 700. 8.
albicans 700.
arenaria 701.
attica 701.
australis 700.
balkana 701.
Bastardi 702. 36.
bayonnensis 702. 43.
biflora 701.
biflora 701. 18. 19 *
binata 701. 27.
bohemica 701. 19.
cæspitosa 702.
Cengialti 701. 25.
Chamævis 701.
Clusiana 701. 19. 28.
compressa 702. 43.
cretensis 703. 48 *
cucullata 700. 12.
desertorum 702. 39.
erratica 701. 28.
falcata 701. 19.
Fieberi 701. 19 *
filifolia 700.
flavissima 701. 22.
florentina 700.
florentina 700. 9.
foetidissima 702.
Fontanesii 700.
fragrans 701. 21.
fugax 703. 4. 1.
furcata 701.
germanica 700.
graminea 702.
graminea 702. 42.
Güldenstædtiana 702.
hortensis 700. 12.
humilis 702.
humilis 703. 48. 48 *
hungarica 701.
illyrica 700. 10 *
involuta 703. 4. 1.
italica 701.
juncea 700.
juncea 699. 3.
lepida 700. 14 *
leucographa 700. 17 *
lilacina 702. 39 *
lurida 700. 10. 14. 17.
lusitanica 699.
lutescens 701.
lutescens 701. 29. 30.
Mandraliscre 700. 13.
mauritanica 700. 6.
mellita 701.

Monnieri 702.
monophylla 703. 4. 2.
neglecta 700.
nudicaulis 701.
nudicaulis 701. 19 *
odoratissima 700. 12.
olbiensis 701.
pallida 700.
pallida 700. 8.
panormitana 701. 26.
pratensis 702. 41.
Pseudacorus 702.
Pseudo-Cyperus 702.
pseudo-pumila 701.
pumila 701.
pumila 701. 25. 26. 27. 29.
pyrenaica 700. 4.
Reichenbachiana 702. 39 *
Reichenbachii 701. 28 *
rigida 701. 19 *
rubro-marginata 702.
ruthenica 702. 45.
sambucina 700.
scorpioides 703. 49.
serbica 701. 28 *
serotina 699.
sibirica 702.
sicula 700.
silvatica 702. 43.
Sintenisii 702.
Sisyrinchium 703. 4. 1.
spuria 702.
spuria 702. 37. 39 *
squalens 700.
squalens 700. 15.
Statellæ 701. 28.
stricta 702. 41.
suaveolens 701.
subbarbata 702. 39 *
subbiflora 701. 21.
subtriflora 701. 18.
Tenoreana 703. 4. 1.
tenuifolia 702.
Tinei 700. 13.
transsilvanica 701. 27.
transtagana 703. 49.
trialata 703. 49.
triflora 702. 41 *
tristis 701. 25. 27. 28 *
tuberosa 703. 3. 1.
unguicularis 702.
uniflora 702. 45.
variabilis 699. 2. 1.
variegata 700.
violacea 700. 10.
virescens 701.
xiphoides 700.
Xiphium 699.
Xiphium 700. 4. 5.

Isatis aleppica 67.
alpina 66.
apiculata 67. 7.
banatica 67. 7.
campestris 67. 7.
canescens 67. 7 *
costata 67.
hebecarpa 67.
lasiocarpa 67. 7.
litoralis 67.
lusitanica 66.
lusitanica 67. 7 *
mæotica 67. 7.
maritima 67. 7 *
orientalis 67. 9.
pilosa 67. 7.
platyloba 66. 1.
præcox 67.
rostellata 67. 7 *
taurica 67. 7 *
tinctoria 67.
Villarsii 67. 8.
Ischarum Hænseleri 755. 6.
 4.
Spruneri 755. 6. 3.
Isias triloba 689. 14. 2 x
Isnardia palustris 249.
Isoëtella Duriei 872. 11.
Isoëtes adspersa 871. 8.
ambigua 871. 2.
atrovirens 871. 1.
bætica 871. 5.
Boryana 871.
Braunii 871. 2.
capillacea 871.
Delalandei 872. 12.
dubia 871.
Duriei 872.
Duriei 872. 12.
echinospora 871.
hystrix 872.
lacustris 871.
longissima 871. 3.
Malinverniana 871.
Morei 871. 1.
setacea 871.
setacea 871. 3.
siçula 872. 12.
tegulensis 871.
tenuissima 871.
velata 871.
Isolepis controversa 766.
fluitans 766. 13. 1.
globifera 765. 2.
gracillima 766. 2 *
Holoschoenus 765. 1.
Kochii 766. 3.
leptalea 766. 3.
Micheliana 763. 8. 1.

- Minæ* 766.
panormitana 765. 1*
Saviana 766.
setacea 766.
sicula 766. 3.
supina 766.
tenuis 766. 3.
Isopyrum thalictroides
 17.
Ixia Bulbocodium 705. 6.
elongata 704. 4.
minima 705. 11.
purpurascens 704. 5.
ramiflora 705. 9.
Jacobæa anthoraefolia 357.
 45.
Jankæa Heldreichii 503.
Jasminum fruticans 493.
humile 494.
officinale 494.
Jasione glutinosa 395.
glutinosa 393. 55. 2. 394.
 57. 2.
saxatilis 394.
sicula 394. 56. 6.
tuberosa 394.
Jirasekia alpina 601. 7.
crassifolia 601. 8.
tenella 601. 7.
Joachimia phalaroides 789.
 23. 1.
Johrenia dichotoma 288. 30
 obs.
græca 287.
Jonopsidium aculea 66.
albiflorum 66.
Savianum 66. 71. 2.
Juglans regia 659.
Juncus acuminatus 747. 13.
acutiflorus 747. 18. 22.
acutus 746.
adscendens 748. 23.
alpestris 748. 26.
alpinus 748.
ambiguus 749. 39*
anceps 748.
Angelisii 746.
angustifolius 751. 3.
aquaticus 748. 23.
arcticus 747.
articulatus 747. 18. 21.
 748. 23.
asper 747. 20.
atratus 747.
atratus 748. 24. 750. 43.
atricapillus 748.
atrofuscus 749. 33.
attenuatus 749. 33.
balticus 746.
bicephalus 749. 40.
biglumis 750.
biglumis 750. 43.
bottnicus 749. 33.
brevirostris 747. 18.
Broteri 745. 1*
bufonius 749.
bulbosus 748. 28. 32.
capitatus 750.
castaneus 750.
Castelli 747. 22.
coenosus 749. 33.
communis 746. 5. 6.
compressus 748.
conglomeratus 746.
consanguineus 749. 33.
Czetzii 750. 44.
depauperatus 746. 10*
diaphragmarius 746. 11.
 747. 18*
diffusus 746.
echinuloides 747. 19. 20.
effusus 746.
effusus × *glaucus* 746. 7.
elator 749. 32*
erectus 752. 17.
ericetorum 750. 42.
fasciculatus 749. 38. 40.
filiformis 747.
fistulosus 746.
fluitans 748. 28.
foliosus 749.
Fontanesii 747.
Fontanesii 747. 20.
fuscoater 748. 26.
Gerardi 749.
glabratus 751. 10.
glaucus 746.
gracilis 749. 35. 750. 42.
Gussoneanus 747. 22.
Gussonii 747.
Heldreichianus 746. 4.
heterophyllus 748.
Hochstetteri 747. 20.
Hoppii 746. 2.
Hostii 750. 48*
hybridus 749. 39.
inflexus 746. 11.
insulanus 749. 39.
intermedius 751. 10.
inundatus 747. 12*
Jacquini 750.
Kochii 748. 28*
lacteus 751. 5.
lagenarius 747. 21.
lampocarpus 747.
Leersii 746. 5.
macrocephalus 748. 23.
maritimus 745.
maritimus 745. 1*
maximus 751. 1.
melananthos 747. 17.
Minæ 749. 40.
monanthos 750. 48*
multibracteatus 746.
multiflorus 748.
multiflorus 752. 17.
mutabilis 749.
mutabilis 750. 42.
nebrodensis 747. 21.
nemosus 752. 15.
nigricans 748. 24.
nigritellus 748. 23*. 28*
nodulosus 748. 26.
obtusiflorus 747.
pallescent 752. 17*
paniculatus 746.
pilosus 752. 14.
ponticus 745. 1.
pratensis 748. 23.
purpureus 751. 11.
pygmaeus 749.
pygmaeus 749. 41.
ranarius 749. 39.
repens 747. 21.
Requienii 748. 26*
rigidus 745. 1*
Rochelianus 747. 18.
rugosus 747. 18*
salinus 749. 32*
septangulus 747. 17.
setifolius 748. 28.
siculus 747. 20. 748. 30.
silvaticus 747.
silvaticus 747. 20. 22. 751.
 1.
Sorrentinii 749.
spadiceus 752. 13.
spharocarpus 749.
squarrosus 748.
stoechadanthos 751. 5.
striatus 747.
stygius 750.
subulatus 748. 30.
subuliflorus 746. 5*
sudeticus 752. 18.
supinus 748.
supinus 748. 29.
Tenageia 749.
tenuis 749.
Thomasii 747.
Tommasinii 746.
transsilvanicus 747. 14.
triandrus 750. 42.
tricephalus 748. 23. 29.
trichocephalus 748. 23.
trifidus 750.

- triglumis* 750.
uliginosus 748. 28.
ustulatus 748. 26.
Vaillantii 749. 35.
valvatus 747.
variegatus 746. 3*
vernalis 752. 14. 15.
verticillatus 748. 28.
Welwitschii 748.
Juniperus *ægaea* 676. 8*
alpina 676. 4. 9.
Biasoletti 676. 1.
communis 676.
depressa 676. 4.
drupacea 675. 5. 1.
excelsa 676.
excelsa 676. 9.
foetidissima 676. 7.
hemisphaerica 676. 3*
heterocarpa 676. 2.
intermedia 676. 3.
Lobelia 676. 1.
lusitanica 676. 9.
macrocarpa 676.
Marschalliana 676. 2.
nana 676.
oophora 676. 6*
Oxycedrus 676.
phoenicea 676.
rufescens 676. 2.
Sabina 676.
Sabina 676. 7.
sabinoides 676.
tetragona 676. 6.
thurifera 676.
turbinata 676. 6*
umbilicata 676. 1.
Jurinea *ambigua* 415.
anatolica 415.
arachnoidea 415.
Bocconi 416.
Bocconi 416. 14. 14*
chia 415. 87. 11.
cretacea 415.
cyanoidea 415.
Eversmanni 415.
glycacantha 415.
heterophylla 415. 87. 7.
humilis 416.
integrifolia 415. 87. 7.
Ledebourii 415. 87. 12.
linearifolia 415.
macrocalathia 415.
mollis 415.
Monardi 416. 15 obs.
moschata 415. 87. 7*
pinnata 415.
Pollichii 415. 87. 10.
polyclonos 415.
pyrenaica 416. 14*
sordida 415. 87. 10.
stoechadifolia 415.
tenuiloba 415. 87. 10*
Jussiaea *grandiflora* 249. 3.
 1 obs.
Kalbfussia *Muelleri* 470.
Salzmanni 470.
Kalidium *foliatum* 629.
Kentrophyllum *arborescens*
 419. 98. 1.
coeruleum 418. 97. 1.
dentatum 419. 7.
elatum 419. 2.
glaucum 419. 5.
lanatum 419. 3.
leucocaulon 419. 6.
rubrum 419. 7.
tauricum 419. 3.
turbinatum 419. 4.
Kernera *auriculata* 51. 46. 1.
Boissieri 51. 46. 1*
saxatilis 51.
saxatilis 51. 46. 1*
Kitaibelia *vitifolia* 127.
Klasea *heterophylla* 417. 5.
Knappia *agrostidea* 795. 35.
Knautia *ambigua* 347. 4.
arvensis 347. 1. 2.
carpophyllax 347. 5.
collina 347. 2.
diversifolia 344. 25.
drymeia 347. 6.
dumetorum 347. 6.
Godeti 347. 8.
longifolia 347. 8.
macedonica 347. 3.
ochroleuca 347. 4.
orientalis 348.
pannonica 347. 6.
propontica 348. 9. 1.
silvatica 347. 5.
subcanescens 347. 5.
Kobresia *caricina* 784.
scirpina 784. 17. 1.
Kochia *arenaria* 625.
dasyantha 625. 7. 3.
hirsuta 625.
hyssopifolia 625.
prostrata 625.
Reuteriana 625.
saxicola 625.
scoparia 625.
sedoides 625.
Koeleria *albescens* 816.
alpicola 816.
ambigua 816. 3.
arenaria 816. 4.
australis 816. 2*
Barrelieri 817. 11.
brachystachys 817. 13.
brevifolia 816. 9*
brevis 816. 5.
cantabrica 817.
carniolica 816. 9.
castellana 816.
caudata 815. 1.
cenisia 816. 9.
coerulescens 826. 10.
crassipes 815.
cristata 816.
dactyloides 816. 5*
discolor 817. 11.
eristachya 816.
Fenzliana 816. 3.
flexilis 816. 3.
glauca 816.
gracilis 815. 2. 816. 3.
grandiflora 815. 2.
grandis 816. 3.
hirsuta 816.
hispida 817.
intermedia 816. 5. 817. 11.
interrupta 816. 3.
Langeana 816. 6*
Linkii 816. 3.
macilenta 815. 77. 1.
maritima 816. 4*
montana 816. 9*
phleoides 817.
pseudoglauca 816. 3.
Rochelii 816. 5*
scabriuscula 815. 77. 3.
setacea 816.
splendens 815.
transsilvanica 816. 6.
tunicata 826. 10.
valesiaca 816. 6.
villosa 816.
Koenigia *islandica* 639.
Konigia *emarginata* 54.
halimifolia 54.
Lagascæ 55.
libyca 55.
longicaulis 55.
macrocarpa 54.
maritima 55.
Perusiana 54. 2*
pyrenaica 55.
rupestris 55.
saxigena 54. 4.
scardica 55.
spinosa 54.
strigulosa 55. 10.
Kosteletzskya *pentacarpa*
 127.
Kruberia *leptophylla* 291.

- peregrina* 291. 39. 1.
Kundmannia sicula 292.
Lachenalia serotina 731. 20. 1.
Lachnagrostis, *Gussonis* 803. 52. 1.
Lactuca acanthifolia 435. *altissima* 435. 6. *angustana* 435. 6. 10. *Chaixi* 435. 6. *chondrillæflora* 435. *cichoriifolia* 434. 108. 1. *coriacea* 435. 10. *cracoviensis* 435. 11. *cretica* 434. *dubia* 435. 10. *flavida* 435. 8. *fragilis* 461. 120. 1. *græca* 434. *hispidia* 461. 118. 1. *leucophæa* 434. 108. 5. *livida* 435. *longidentata* 435. *muralis* 435. *perennis* 434. *Plumieri* 433. 106. 2. *pseudovirosa* 435. 10. *quercina* 435. *ramosissima* 435. *sagittata* 435. *saligna* 435. *sativa* 435. 10 obs. *Scariola* 435. *Schimperi* 435. 10. *segusiana* 434. 108. 2. *silvestris* 435. 10. *sonchifolia* 433. 106. 4. 434. 108. 4. *stricta* 435. 7. *tenerrima* 434. *Tommasiniana* 435. 11. *tuberosa* 434. *viminea* 435. *virosa* 435.
Lactucopsis Plumieri 433. 106. 2.
Lafuentea rotundifolia 549.
Lagenaria vulgaris 245. obs. 2.
Lagoecia cuminoides 319.
Lagoseris alata 460. 117. 1. *bifida* 460. *nemausensis* 460. *nemausensis* 461. 117. 3. *orientalis* 461. *purpurea* 461. 117. 4. *taurica* 461.
Lagurus ovatus 804.
Lamarekia aurea 797.
Lamium album 574. *amplexicaule* 575. *amplexicaule-purpureum* 575. 15 * *bifidum* 575. *calycinum* 574. 12. 4. *Columnæ* 575. *confertum* 575. 15 * *corsicum* 575. 12 * *cryptanthum* 575. 14. *cupreum* 575. *dilatatum* 575. 8 * *dissectum* 575. 15 * *elegantissimum* 575. 8. *flexuosum* 574. *Galeobdolon* 576. 13. 1. *garganicum* 575. *grandiflorum* 575. 12. *guestphalicum* 575. 15 * *hirsutum* 574. 7. *hybridum* 575. 15 * *incisum* 575. 15 * *inflatum* 574. *intermedium* 575. *lævigatum* 574. 7. 575. 12. *longiflorum* 575. *maculatum* 574. *molle* 575. *moschatum* 574. *mutabile* 574. 7. *nivale* 575. 13 * *niveum* 574. 7. *numidicum* 575. 12 * *ochroleucum* 574. 4. *Orvala* 574. *pannonicum* 574. 12. 1. *parietariæfolium* 574. 6. *pedemontanum* 575. 12. *Petitinum* 574. 12. 2. *pictum* 575. 13 * *pubescens* 574. *purpureum* 575. *purpur.-amplexicaule* 575. 16. *rubrum* 574. 7. *rugosum* 574. 7. *striatum* 575. *tomentosum* 575. 9.
Lamyra stipulacea 404. 7. *triacantha* 404. 4. *undulata* 404. 5.
Lapiedra Martinezii 714.
Lappa intermedia 402. 73. 3. *macrosperma* 402. 73. 3. *major* 402. 73. 2. *minor* 402. 73. 4. *nemorosa* 402. 73. 3. *officinalis* 402. 73. 2. *tomentosa* 402. 73. 1.
Lappago racemosa 788. 16. 1.
Lappula Myosotis 523. 24. 3.
Lapsana capillaris 457. 27. *communis* 474. *grandiflora* 474. *intermedia* 474. *leontodontoides* 474. 147. 1. *macrocarpa* 474. 148. 3 * *Rhagadiolus* 474. 149. 2. *silvatica* 474. 148. 3. *stellata* 474. 149. 1.
Larbeta aquatica 107. 1. 1. 112. 9. *bracteata* 112. 9. *crassifolia* 112. 10. *uliginosa* 112. 9.
Larix europæa 674. *excelsa* 674. 2. 1. *sibirica* 674.
Laser trilobum 277. 6. 4. 282. 16. 1.
Laserpitium alpinum 277. *ambiguum* 277. 4. *angustifolium* 277. 9. 10 * *angustissimum* 277. 10 * *aquilegifolium* 277. 2. 282. 16. 1.
Archangelica 277. *asperum* 277. 1. *canescens* 277. 5. 1 * *daucoides* 278. 14. *ferulaceum* 314. 100. 1. *formosum* 277. 10. *gallicum* 277. *garganicum* 277. 8. *Gaudini* 277. 4 * *glabrum* 277. 1. *gracile* 277. 1. *Halleri* 278. 11. *hirsutum* 278. 11. *hirtellum* 277. 7. *hispidum* 278. *latifolium* 277. *longiradium* 277. *luteolum* 277. 4 * *marginatum* 277. *micranthum* 278. 14. *Nestleri* 277. *nitidum* 277. *Panax* 278. *peucedanoides* 277. *pencedanoides* 286. 29. 12. *pilosum* 277. 7. 278. 13. *pruthenicum* 278. *pseudo-meum* 278. *pseudosiler* 277. 1. *pubescens* 277. 1.

- scabrum 277. 5. 1.
 siculum 277. 8 *
 silaifolium 293. 53. 1.
Siler 277.
 simplex 291. 42. 1.
 trifoliatum 277. 8.
 trilobum 277. 5. 282. 16.
 1.
Lasiagrostis Calamagrostis 804.
Lasiopera Bocconi 550. 5.
 rhinanthina 550. 20. 1.
 rigidifolia 550. 4.
 tenuifolia 550. 21. 3.
 viscosa 550. 20. 2.
Lasiopogon lanatum 383.
 muscoides 383. 36. 1.
Lasiospermum alpinum 360.
 15.
Lasiospora ensifolia 464. 17.
 hirsuta 465. 19.
 lanata 465. 20.
Lastrea æmula 866. 8.
 Callipteris 866. 6.
 collina 866. 7 *
 cristata 866. 6.
 dilatata 866. 7 *
 Filix mas 865. 5.
 foenicicii 866. 8.
 glandulosa 866. 7 *
 multiflora 866. 7 *
 Oreopteris 866. 11.
 recurva 866. 8.
 rigida 866. 9.
 spinulosa 866. 7.
 Thelypteris 866. 12.
 uliginosa 866. 6 *
Lathræa clandestina 563. 6.
 1.
 rhodopæa 563.
 Squamaria 562.
Lathyrus affinis 204. 35 *
 alatus 203. 31 *
 amphicarpos 202. 20.
 angulatus 202.
 angustifolius 201. 4.
 annuus 203.
 Aphaca 204.
 articulatus 203.
 articulatus 203. 31 *
 asphodeloides 205. 13.
 auriculatus 203. 31 *
 blepharicarpos 203.
 brachyphyllus 201. 4.
 brutius 201. 3.
 canescens 205. 14.
 chiui 203.
 Cicera 203.
 ciliatus 202.
 cirrhosus 201.
 Clymænum 203.
 controversus 202. 18.
 dubius 203. 28.
 ensifolius 201. 4 *. 205.
 12 *
 erectus 202. 19.
 erythrinus 203. 28.
 Gorgoni 203.
 Gorgoni 203. 24.
 gramineus 204. 34.
 grandiflorus 201.
 grandiflorus 201. 7 *
 granulatus 202. 13.
 Hallersteinii 202. 15 *
 heterophyllus 201.
 hexædrus 202. 17.
 hirsutus 203.
 inconspicuus 202.
 incurvus 202.
 incurvus 202. 13.
 iuermis 204. 6.
 intermedius 201. 7 *
 latifolius 201.
 latifolius 201. 5. 7 *
 linearifolius 212. 13.
 longifolius 201. 4 *
 Lusseri 202. 15.
 luteus 204. 2.
 Maccaguenii 201. 1.
 macrorrhizus 205. 12.
 maritimus 202.
 megalanthos 202. 7 *
 micranthus 201. 19.
 miniatus 201. 6.
 montanus 204. 2. 205. 12.
 mutabilis 202. 11.
 neglectus 201. 7.
 neurolobus 202.
 niger 205. 9.
 Nissolia 204.
 Noëanus 201. 7.
 Ochrus 203.
 odoratus 201.
 palustris 202.
 pannonicus 205. 12.
 parviflorus 202. 19.
 peduncularis 201. 6.
 pilosus 203.
 pisiformis 201.
 platyphyllus 201. 7 *
 pratensis 202.
 pseudaphaca 204.
 pulcher 201. 4 *
 purpureus 203. 31 *
 pyrenaicus 201. 7.
 quadrimarginatus 203
 rotundifolius 201.
 sativus 203.
 saxatilis 202. 21.
 sepium 202. 15.
 setifolius 202.
 silvestris 201.
 sphaericus 202.
 spurius 203. 32.
 stans 202. 19.
 stenophyllus 203.
 tenuifolius 203. 31. 31 *
 tingitanus 201.
 tuberosus 201.
 undulatus 201.
 vernus 204. 4.
 vicieformis 202. 13.
 villosus 204. 6.
Laurentia Michellii 487.
 tenella 487.
Laurus indica 642 obs.
 nobilis 642.
 Persea 642 obs.
Lavandula delphinensis 572.
 5.
 dentata 571.
 cingens 572. 6.
 fragrans 572. 5.
 interrupta 572. 6.
 lanata 572.
 latifolia 572.
 multifida 572.
 officinalis 572. 5.
 pedunculata 572.
 pinnatifida 572. 8.
 pseudo-stoechas 572. 7. 2.
 pyrenaica 572. 5.
 Spica 572.
 Spica 572. 6.
 Stoechas 572.
 viridis 572.
Lavatera africana 128.
 agrigentina 128.
 ambigua 128. 14 *
 arborea 128.
 biennis 129.
 calycina 128. 1.
 cretica 128.
 Empedoclis 128. 5.
 flava 128. 12.
 gallica 128. 2.
 grandiflora 129. 16.
 hispida 128. 7 *
 lusitanica 128.
 maritima 128.
 micans 128.
 minoricensis 128.
 moschata 128. 1.
 muricata 128.
 neapolitana 128. 5.
 oblongifolia 128.
 olbia 128.

- olbia* 128. 7*. 8.
pallescens 128. 1*
punctata 129.
sicula 128. 5.
silvestris 128. 5*. 14*
thuringiaca 128.
thuringiaca 128. 7.
triloba 128.
triloba 128. 5.
trimestris 129.
unguiculata 128.
vitifolia 128. 14.
Lazarolus oxyacanthoides
 243. 7.
pinnatifida 241. 3. 3.
pollwilleriana 241. 2. 3. obs.
Lecokia cretica 313.
Ledum dilatatum 492.
palustre 492.
Leersia oryzoides 788.
Lemna arhiza 756. 3. 1.
gibba 756.
minor 756.
orbicularis 756. 1. 1.
polyrhiza 756. 1. 1.
trisulca 756.
Lens Biebersteinii 211. 5.
esculenta 211. 4.
nigricans 211. 5.
Tenorii 211. 5.
Leobordea lupinifolia 158.
Leontice altaica 23.
Chrysogonum 23.
Leontopetalum 23.
odessana 33. 3. 3.
Leontodon alpestris 437. 4.
alpinus 468.
alpinus 437. 4. 468. 14*
anomalus 469.
asper 467.
aurantiacus 469. 17. 17*
autumnalis 469.
Berinii 468.
bessarabicus 437. 8.
biscutellæfolius 468. 5*
Borgi 468.
Bourgeoisianus 468.
brachyglossus 469. 20.
Brumati 468. 14.
carpetanus 467.
caucasicus 468. 14.
creticus 469.
crispus 468.
crispus 468. 8. 14.
croceus 469. 17*
danubiale 468. 14.
dentatus 437. 8. 456. 16.
dubius 468. 14.
erectum 437. 8.
fasciculatus 467.
glaucescens 437. 4*
græcus 468.
græcum 468. 6.
Gussonii 459. 56.
hastilis 468.
Heldreichianum 468. 6.
hirtum 468. 13*. 470. 131.
 3.
hispanicus 467.
hispidulus 469.
hispidum 467. 4. 468. 7.
 14.
hyoseroides 468. 14.
incanus 468.
keretinus 469. 17*
lævigatus 437. 4.
Linkii 469. 20.
lividus 437. 8.
lucidus 469.
microcephalus 469.
minimus 437. 5.
montanum 469. 19.
nevadensis 467.
nigricans 437. 4.
palustre 437. 8.
Pavonii 469.
Pollinii 469. 17.
pratensis 469. 20.
pseudocrispus 468. 14.
pyrenaicus 469.
Raii 437. 8.
recognitum 468. 14.
Rosani 468. 13*
salinus 437. 8.
saxatilis 468. 8*
serotinus 436. 112. 1.
serotinum 437. 4.
siculus 468. 14*
spathulæfolius 468. 11.
squamosus 469. 17.
Taraxaci 469.
Taraxaci 469. 20.
taraxacoides 437. 4.
Taraxacum 437. 4.
tenuiflorus 468. 10*
tenuifolius 437. 9.
Tenorii 468. 14.
tergloviense 455. 9.
umbellatum 466. 3.
Villarsii 468.
Leontopodium alpinum 383.
 35. 1.
Leonurus canescens 580. 17.
 1.
Cardiaca 580.
glaucescens 580. 17. 1 obs.
Marrubiastrum 580.
sibiricus 580. 17. 1 obs.
tataricus 580. 17. 1 obs.
villosus 580. 17. 1.
Leopoldia Bouviara 733. 19.
Calandriniana 732. 9 obs.
Clusiana 732. 9*
comosa 732. 9.
Cupaniana 733. 15.
curta 733. 11*
græca 732. 8.
graminifolia 733. 18.
Gussonii 733. 14.
Holzmanni 733. 11.
maritima 733. 13.
pharmacusana 733. 12*
Pinardi 733. 16.
Sartoriana 733. 12.
tenuiflora 732. 10.
theræa 733. 17.
Weissii 733. 14*
Leopoldina abortiva 732. 3.
Lepidium affine 64. 4.
ambiguum 64. 9*
angulosum 64. 12.
Bonannianum 65. 23.
brevicaule 65. 69. 1.
calycotrichum 65.
campestre 65.
campestre 65. 20.
compiculom 65. 18.
Cardamines 64.
Carrerasii 65.
cornutum 36. 21. 1. 64.
 15.
coronopifolium 64.
crassifolium 64.
Descemetii 64. 5*
Draba 64.
graminifolium 64.
granatense 65. 21.
heterophyllum 65.
heterophyllum 65. 21. 22.
hirtum 65.
hirtum 65. 20.
humifusum 65.
Iberis 64.
Iberis 64. 2.
incisum 64.
incisum 65. 16.
latifolium 64.
lineare 64.
lineare 64. 1.
majus 64.
majus 64. 11.
micranthum 64. 12.
microstylum 65. 23.
nebrodense 65.
nebrodense 65. 23.
perfoliatum 64.

- petrophilum* 65.
polycladum 64. 2.
pratense 65. 20.
rudemale 64.
sativum 65.
sativum 65. 17.
Smithii 65. 20.
spinosum 64.
stylatum 65.
subulatum 64.
suffruticosum 64.
Villarsii 65. 20.
virginicum 64. 11.
Lepidophorum repandum 369.
Lepidotis incurva 872. 5.
Lepigonum azoricum 122. 17. 4*
campestre 123. 17. 7*
caninum 122. 17. 5* obs.
capillaceum 123. 8.
diandrum 123. 7.
fasciculare 122. 17. 4.
fimbriatum 122. 17. 1.
heterospermum 122. 5.
leiospermum 122. 5.
macrorrhizum 122. 17. 2.
marinum 122. 17. 4.
medium 122. 17. 5. 5*.
123. 6.
neglectum 122. 5.
purpureum 123. 8. 8 obs.
radicans 123. 17. 6*
rubrum 123. 17. 6.
rupestre 122. 17. 3.
salinum 122. 17. 5.
salsugineum 123. 7.
Lepturus cylindricus 846.
filiformis 846.
incurvatus 846.
incurvatus 846. 3.
subulatus 846. 1.
Lereschia Thomasii 309.
Lerouxia nemorum 600. 5.
Leucanthemum affine 371. 13.
anomalum 372.
arcticum 372.
atratum 371.
atratum 371. 6*. 13.
auriculatum 371. 13.
Bauhini 371. 6*
canescens 370. 23. 2.
cebennense 371.
ceratophylloides 371.
commutatum 371. 6.
coronopifolium 371.
corsicum 371. 11.
corymbosum 372. 24. 1.
crassifolium 370.
discoideum 370. 23. 2.
glabrum 371. 9.
gracilicaule 371. 7*
graminifolium 371.
Gussonii 371. 7.
Herminii 372. 16*
heterophyllum 370. 23. 2.
371. 4.
lanceolatum 371.
lanceolatum 371. 13.
latifolium 370.
maximum 371.
montanum 371.
mureicum 371. 9*
pallens 370.
palmatum 371. 8.
Parthenium 372. 24. 3.
pectinatum 370. 21. 1.
platylepis 371. 4*
rotundifolium 372. 24. 6.
sericeum 372. 16.
sibiricum 372.
setabense 371.
silvaticum 371. 13*
subglaucum 370. 23. 2.
suffruticosum 371. 6.
tomentosum 373. 9.
varians 371. 8.
virgatum 375. 26. 1.
vulgare 371.
Zawadskii 372. 15.
Leucoglochin pauciflorus 783. 153.
Leucojum aestivum 714.
aestivum 714. 2.
autumnale 714.
grandiflorum 714.
Hernandezii 714.
Hernandezianum 714. 3.
hiemale 714.
longifolium 714.
roseum 714.
trichophyllum 714.
trichophyllum 714. 18.
vernum 714.
Leucorchis albida 695. 19. 4.
Leuzea australis 416. 90. 4
obs.
conifera 416.
exaltata 416. 90. 2.
longifolia 416.
Palmellana 416. 90. 3.
rhaponticoides 416.
salina 416.
Lestivicum officinale 282.
Leysera capillifolia 385.
Libanotis arctica 295.
athamantoides 295.
aurea 294. 58. 6.
bayonnensis 295. 59. 5.
Candollei 295.
crithmoides 295. 59. 2.
daucoides 295. 59. 2.
gracilis 295. 59. 2*
humilis 295. 59. 2.
intermedia 295. 59. 1.
Matthioli 294. 58. 3.
montana 295.
nitens 295. 59. 3*
pubescens 295. 59. 2.
pyrenaica 295. 59. 2.
Riviniana 295. 59. 2.
rupestris 294. 58. 3.
sibirica 295.
verticillata 295. 59. 5.
vulgaris 295. 59. 2.
Libertia arduennensis 824. 89. 1.
Ligularia sibirica 350.
Ligusticum athamantoides 295. 59. 3.
corsicum 293.
cynapiifolium 293.
cyprium 307. 85. 1.
decussatum 287. 29. 28.
ferulaceum 293.
ferulaceum 293. 50. 1.
græcum 307. 85. 1.
pyrenæum 293.
Seguieri 293.
Seguieri 293. 50. 4.
simplex 291. 42. 1. 293. 51. 1.
splendens 292. 44. 1.
Sprengelii 315. 105. 1.
tenuifolium 292. 44. 1.
Ligustrum italicum 494.
sempervirens 494.
vulgare 494.
Liliastrum album 719. 3. 1.
Lilium albanicum 721.
Boissieri 721. 9.
bulbiferum 720.
bulbiferum 720. 2*
candidum 720.
carniolicum 721.
Cattaniæ 721. 9*
chalcedonicum 721.
chalcedonicum 721. 7. 8.
croceum 720. 2*
dalmaticum 721. 9*
gracile 722. 18.
Heldreichii 721.
Jankæ 721. 4*
Martagon 721.
Martagon 721. 9*
pomponium 721.
pyrenaicum 720.

- rubrum 721. 5.
Limbarda tricuspidis 393. 21.
Limnanthemum nymphoides 503.
peltatum 503.
Limnolobos acicularis 767. 7.
 alpina 762. 8. 765. 13.
Bæothryon 765. 12.
 caespitosa 765. 11.
 parvula 765. 14.
Limnolobos abortivum 687.
 sphaerolabium 687. 7. 1.
Limnolobos articulatum 609.
 monopetalum 609. 2. 1.
Limnolobos aquatica 549.
 borealis 549. 16. 1*
Linaria acutangula 543.
aequilobata 543.
 æruginosa 539. 34.
 algarbiensis 538. 11.
 algarviana 538.
 almijarensis 540. 49.
 alpina 540.
 alpina 540. 46.
 alsinæfolia 542.
 ambigua 540. 39*
 amethystea 540.
 amethystea 540. 53.
 Amo 539. 34.
 angustifolia 537. 4.
 anticaria 540.
 antirrhinoides 538. 12.
 aparinoides 538. 15.
 arenaria 541.
 arrabidensis 539. 33.
 arvensis 539.
 Biebersteinii 537. 3.
 bipartita 538.
 bipunctata 540. 52. 541.
 61.
 Boissieri 539. 28.
 bombycina 542. 83.
 Bourgei 541. 68*
 Broussoneti 540. 53.
 cæsia 539.
 Candollei 541. 60.
 capraria 539.
 caulirhiza 542. 84.
 Cavanillesii 538.
 chalcidensis 539.
 chloræfolia 538. 9.
 cirrhosa 542.
 Clementei 538.
 commutata 542.
 concolor 538. 9*
 crassifolia 70.
 crassifolia 541. 68.
 cretacea 541.
 erinita 542. 83*
Cymbalaria 543.
 dalmatica 538.
 dealbata 542. 81.
 delphinoides 539. 22.
 depauperata 541.
 diffusa 540. 55.
 elatine 542.
 elatine 542. 83.
 elatineflora 542. 80*
 exilis 542.
 filifolia 539.
 flava 541.
 genistæfolia 538.
 genistæfolia 537. 4.
 glacialis 540.
 glareosa 541. 70*
 glauca 541.
 glaucophylla 539.
 glutinosa 539. 28. 541. 59.
 græca 542. 84 et*
 granatensis 541. 73*
 Hænseleri 540.
 hepaticæfolia 543.
 hirta 538.
 humilis 538. 15*
 ignescens 540. 53.
 intermedia 537. 3.
 italica 537.
 italica 537. 4 obs.
 lancifolia 538. 9.
 Langei 541.
 lanigera 542.
 lanigera 542. 80.
 Lapeyrousiana 541. 68.
 lasiopoda 542. 83.
 latifolia 537.
 laxiflora 541.
 lilacina 540. 50.
 linifolia 537. 4. 538. 9 et*
 linogrisea 538. 21.
 litoralis 542. 75.
 Loeselii 538.
 longipes 543.
 lusitanica 539.
 lusitanica 537. 1.
 macedonica 538.
 macropoda 541.
 macroura 537.
 marginata 539. 33.
 maritima 540.
 maritima 538. 6.
 melanantha 539.
 meonanthe 538. 20.
 micrantha 539.
 microcalyx 543.
 minor 542.
 nospessulana 539. 26.
 Mülleri 543. 90*
 multicaulis 540.
 multicaulis 540. 53.
 multipunctata 540.
 Munbyana 540.
 neglecta 538. 13.
 nevadensis 540. 39*
 nigricans 541.
 nivea 539.
 nummularia 542. 73*
 oblongifolia 540.
 ochroleuca 539. 26*
 odora 538. 6.
 origanifolia 541.
 pallida 543.
 pallida 530. 10.
 parnassica 538. 10.
 pauciflora 540. 55.
 pedunculata 541.
 Pelisseriana 539.
 peloponnesiaca 538. 10*
 Perezii 541.
 petraea 540.
 petraea 538. 9.
 pilosa 543.
 pilosa var. 543. 90*
 platycalyx 539.
 polygalæfolia 540. 40.
 polygonifolia 540. 48.
 præcox 538. 20.
 prætermissa 542. 76*
 Prestandere 542. 83.
 propinqua 540.
 pubescens 543. 90.
 purpurea 539.
 pyramidata 538. 9.
 pyrenaica 540. 39*
 ramosissima 539. 28.
 Ravey 542. 77*
 reflexa 541.
 repens 539. 26.
 reticulata 538.
 reticulata 538. 18.
 rhagina 541. 67.
 Rossmässleri 540.
 rubioides 538.
 rubrifolia 542.
 rudis 537. 3*
 rupestris 542. 77.
 Salzmanni 538. 16*. 20.
 sapphirina 539.
 satyroides 541.
 saxatilis 541. 58. 59. 60.
 segoviensis 541. 70.
 semiglabra 538. 11.
 sepium 537. 4 obs.
 serpyllifolia 542.
 setabensis 541. 70.
 Sibthorpiana 538.

- Sieberi* 542.
simplex 539.
Smithii 538. 7.
spartea 538.
speciosa 537. 3 *
spicata 538. 16.
spuria 542.
Stevani 538. 9.
striata 539.
striato-vulgaris 539. 26 *
stricta 538.
supina 540.
supina 540. 40. 42.
tenella 541.
Thuillieri 540. 39.
thymifolia 540.
Tournefortii 541.
transtagana 541. 66.
trionithophora 537.
triphylla 538.
tristis 539.
verticillata 540.
verticillata 540. 41.
villosa 541.
villosa pusilla 542. 73.
violacea 541. 62.
viscosa 538.
vulgaris 537.
Lindernia pyxidaria 536.
Linnaea borealis 322.
Linosyris divaricata 386.
palustris 386. 42. 1 *
punctata 386. 43. 3.
villosa 336.
vulgaris 386.
Linum agreste 125. 18.
alpinum 125.
alpinum 125. 22 *
ambiguum 125. 18.
anglicum 125. 21.
angustifolium 125.
arborescens 124.
arvense 125.
aureum 126. 27. 30.
austriacum 125.
austriacum 125. 20 *
barbulatum 125. 20.
bavaricum 125. 22 *
bellidifolium 124. 3.
cæspitosum 124. 1.
campanulatum 124.
capitatum 124.
catharticum 126.
collinum 125. 20 *
corymbulosum 126. 30.
cribrosum 125. 18.
decoloratum 125. 13.
decumbens 125.
elegans 124.
flavum 124.
flavum thracicum 124. 5.
gallicum 126.
Galloi 126. 30.
hirsutum 124.
hirsutum 124. 11.
hologynum 125.
humile 125. 18 *
inæquale 126. 31 *
læve 125. 14. 22 *. 126.
Leonii 125. 22.
leucanthum 124.
liburnicum 126.
liburnicum 124. 7. 126.
31.
limanense 125. 20 *
Loreyi 125. 20 *
luteolum 124. 7.
marginatum 125. 18. 20.
maritimum 124.
melianthum 126. 29.
montanum 125. 20 *. 22.
Mülleri 124.
narbonense 125.
nervosum 125.
nodiflorum 124.
Pallasianum 124. 5.
perenne 125.
perenne 125. 18. 21. 22 *
piligerum 125. 13.
provinciale 125. 20 *
pubescens 124.
punctatum 125.
pycnophyllum 125. 22 *
ramosissimum 126. 24.
rigidum 126. 31.
Rochelianum 124. 3.
rubrum 125. 19.
ruscinonense 125. 22 *
salsoloides 126.
sardoum 124. 9.
saxicola 125. 20 *
scabrum 126. 24. 29.
serrulatum 124. 6.
setaceum 126.
Sibthorpiannum 124. 13.
siculum 125. 18.
silvestre 124. 11.
spicatum 126. 31 *
squamulosum 125. 20.
strictum 126.
strictum 126. 31 *
suffruticosum 126.
suffruticosum 126. 25.
tauricum 124.
tenuè 126.
tenuifolium 126.
Tommasinii 125. 20.
transsilvanicum 125. 22 *
usitatissimum 125. 18 obs.
viscosum 124.
Liparis Loeselii 686. 4. 1.
Lippia repens 563.
Listera cordata 688.
ovata 688.
Lithodora fruticosa 518. 1.
Lithospermum apulum 519.
arvense 518.
calabrum 518.
commutatum 517. 13. 5 *
diffusum 518. 4.
fruticosum 518.
fruticosum 518. 3. 4.
Gasparrinii 518. 12 *
Gastoni 518.
graminifolium 518. 15. 2.
hispidulum 518.
incrassatum 518.
Lehmani 517. 13. 5 *
Leithneri 518. 12 *
minimum 519.
officinale 518.
oleosum 518.
permixtum 518. 12.
petreum 517. 15. 1.
prostratum 518.
purpureo-coeruleum 518.
Rochelii 518. 10.
rosmarinifolium 518.
rosmarinifolium 517. 15. 1.
Sibthorpiannum 518.
Splitgerberi 518.
strigosum 519. 16.
tenuiflorum 518.
tenuiflorum 518. 11. 519.
15.
Littorella juncea 620.
lacustris 620.
Lloydia græca 726.
serotina 726.
sicula 726.
trinervia 726. 14. 3.
Lobelia Bivonæ 487. 2. 2.
Dortmanna 487.
Gasparrinii 487. 2. 1.
minuta 487. 2. 2.
Salzmänniana 487. 2. 1.
setacea 487. 2. 2.
urens 487.
Loeflingia gaditana 254. 1 *
hispanica 254.
micrantha 254.
pentandra 254.
Logfia gallica 384. 8.
subulata 384. 8.

- Loiseleuria procumbens* 491.
 14. 1.
Lolium aristatum 845. 3.
arvense 844. 1. 2.
Boucheaunum 845. 3.
complanatum 844. 2.
compositum 845. 4.
compressum 845. 8 *
cristatum 845. 4.
festuaceum 845. 4 ×
Gaudini 845.
Gussonii 844. 1 *
italicum 844. 3.
lepturoides 845.
linicola 844. 2.
linicolum 844. 2.
macilentum 845. 8.
Marschallii 845.
maximum 844. 1.
multiflorum 844.
multiflorum 845. 6. 7.
perenne 845.
pseudo-linicola 844. 2.
remotum 844.
rigidum 845.
rigidum 845. 9.
robustum 844. 1.
siculum 845.
speciosum 844. 1.
strictum 845. 8.
subulatum 845.
temulentum 844.
tenue 845. 4. 5. 8.
- Lomatogonium carinthiacum*
 501. 2. 2.
- rotatum* 500. 2. 1.
- Lonas inodora* 369.
- Lonicera adenocarpa* 321.
alpigena 322.
arborescens 322.
balearica 321. 4. 5.
Caprifolium 321.
Caprifolium 321. 4. 2.
canescens 322.
Carioti 321. 4. 1.
coerulea 322.
dimorpha 322.
Dioscoridis 321. 4. 5.
etrusca 321.
etrusca 321. 4. 2.
glutinosa 322.
hellenica 322.
hispanica 322. 7 *
implexa 321.
nigra 322.
nummularifolia 322.
pallida 321. 4. 1.
Periclymenum 321.
pyrenaica 322.
- Roeseri* 321. 4. 3.
splendida 321.
stabiana 321.
tatarica 322.
virescens 322. 7.
Xylosteum 322.
Xylosteum 322. 11.
- Lophiolepis araneosa* 405. 82.
 1.
calcephala 405. 82. 2.
- Lophocachrys echinophora*
 314. 101. 3.
- Lophochloa phleoides* 817.
 13.
- Lophodium Callipteris* 866.
 6.
collinum 866. 7 *
foeniseii 866. 8.
glandulosum 866. 7.
multiflorum 866. 7 *
recurvum 866. 8.
rigidum 866. 9.
spinulosum 866. 7.
uliginosum 866. 6 *
- Lophosciadium Barrelieri*
 284. 25. 5.
- neifolium* 276.
- Lophotaenia aurea* 288. 35. 1.
- Loranthus europaeus* 320.
- Loroglossum antropophorum*
 696. 24. 1.
- hircinum* 696. 23. 1.
- Lotononis lupinifolia* 158. 13.
 1.
- Lotus aduncus* 183.
egaeus 182.
albus 183.
Allioni 182.
alpinus 183. 17.
angustissimus 183.
arabicus 184. 27 obs.
arenarius 183.
argolicus 182. 11.
aristatus 184. 27.
arvensis 183. 17.
aurantiacus 183. 22.
belgradicus 181. 23. 2.
biflorus 182.
biflorus 182. 2.
Bivoneus 182.
Bouteloui 182. 4.
canescens 183. 22.
castellanus 184.
ciliatus 183. 23. 184. 27.
commutatus 182.
conimbricensis 184.
conjugatus 182.
conjugatus 182. 6.
corniculatus 183.
- corniculatus* var. 183. 19.
coronillaeifolius 182. 11 *
creticus 182.
creticus 182. 11.
cytisoides 182.
cytisoides 182. 12 et obs.
 184. 30.
- decumbens* 183. 16. 16 *
Delorti 183. 17 *
diffusus 183. 23. 184. 28.
Dioscoridis 184. 29.
Dorycnium 181. 23. 4.
drepanocarpus 182. 12 obs.
edulis 182.
- glaberrimus* 184. 27.
glacialis 183. 18.
glareosus 183.
glaucescens 182. 11 *
gracilis 183. 23.
Gussonii 182. 6.
halophilus 184. 30 *
hispidus 183.
hispidus 183. 15. 25.
judaicus 182. 11.
lamprocarpus 183.
Lavieri 183. 24 *
longesiliquosus 183.
- longicaulis* 183. 15.
major 182. 14.
maritimus 182. 4.
microcarpus 183. 25.
odoratus 183. 24.
oligoeratos 184. 30 *
ornithopodioides 184.
palustris 183. 15. 23.
parviflorus 183.
patens 182. 12 *
pedunculatus 182. 14.
peregrinus 184.
pilosus 183. 17 *
Preslii 183. 16 *
prostratus 182. 12 *
pusillus 184.
Requienii 182.
Salzmanni 182. 10.
siliquosus 182.
stenodon 183. 17.
subbiflorus 183. 24.
symmetricus 183. 17 *
Tchihatchewii 183. 17.
tenuifolius 183. 16.
tenuis 183.
tetragnolobus 181.
tetraphyllus 184.
trichocarpus 184. 27.
uliginosus 182.
valdepilosus 183. 17.
versicolor 183. 17.
villosus 182. 14.

- Wiedemanni* 182.
Lunaria annua 50.
 biennis 50. 41. 2.
 rediviva 50.
Lupinus albus 159.
 angustifolius 159.
 angustifolius 159. 10.
 Bivonii 159. 2.
 Cosentini 159.
 Douglasii 159. 5.
 græcus 159.
 Gussoneanus 159. 5.
 hirsutus 159.
 hispanicus 159.
 leucospermus 159.
 linifolius 159. 10. 10 *
 luteus 159.
 micranthus 159.
 pilosus 159.
 reticulatus 159.
 Termis 159.
 varius 159.
 varius 159. 9.
Luteola glauca 69. 14.
 tinctoria 69. 18.
Luzula albida 751.
 albida 751. 4.
 alpigena 751. 3.
 Althii 752. 18.
 angustifolia 751. 3.
 arctica 752. 20. 753. 22.
 arcuata 753.
 borealis 752. 13.
 Borreri 752. 14.
 cæspitosa 753.
 calabra 752. 17.
 campestris 752.
 campestris 752. 20.
 confusa 753.
 congesta 752. 17.
 cuprina 751. 3.
 Desvauxii 751.
 erecta 752.
 erecta 752. 19.
 flavescens 752. 16.
 Forsteri 752.
 fusco-rubra 751. 3.
 glabrata 751.
 glabrata 751. 9. 752. 13.
 gracilis 751. 11.
 græca 750.
 græca 751. 1 *
 Hostii 752.
 hyperborea 752.
 hyperborea 753. 21.
 intermedia 751. 10.
 italica 753.
 lactea 751.
 lactea 751. 4.
 lutea 751.
 maxima 750.
 maxima 751. 1 *
 multiflora 752. 17.
 neglecta 751. 8.
 nemorosa 751. 3.
 nigricans 752.
 nigricans 753. 25.
 nivalis 752. 20.
 nivea 751.
 nodulosa 751. 2.
 pallescens 752. 17 et *
 parviflora 751.
 parviflora 751. 12.
 pedemontana 751.
 pediformis 753.
 pilosa 752. 14.
 purpurea 751.
 rubella 751. 3.
 scicula 751. 1 *
 Sieberi 751. 1.
 silvatica 750. 1.
 spadicea 741.
 spadicea 751. 9.
 spicata 753.
 sudetica 752. 18.
 tenella 752. 19.
 Wahlenbergii 752.
 velutina 751. 5 *
 vernalis 752.
Lychnis alba 86. 7. 4.
 alpina 86. 5. 4.
 apetala 87. 8. 1.
 aragonica 86. 6. 1.
 atropurpurea 86. 5. 2.
 chalconica 85.
 Coronaria 85. 2. 1.
 corsica 85. 3. 3.
 Cyrilli 85. 4. 2 *
 diurna 86. 7. 3.
 Dorotheæ 87. 8. 2.
 flos cuculi 85.
 Flos lovis 85. 2. 2.
 fulgida 85. 4. 1.
 læta 85. 3. 3.
 Lagascæ 86. 6. 2.
 lusitanica 85. 4. 2.
 nemorosa 87. 7. 6.
 nivalis 86. 7. 1.
 nummularia 86. 6. 1.
 palustris 85. 3. 2.
 pyrenaica 86. 6. 1.
 quadridentata 87. 9. 2.
 rubra 86. 7. 3.
 Siegeriana 86. 7. 1.
 Sigeri 86. 7. 1.
 Sigiflora 87. 8. 3.
 vespertina 86. 7. 4.
 viscaria 86. 5. 1.
Lychnothamnus alopecuroides 877.
 barbatus 877.
 Montagnei 877. 2. 3.
 stelliger 876.
 Wallrothii 877. 2. 3 *
Lycium afrum 524.
 barbarum 524. 4. 1.
 chinense 524. 4. 1 *
 europæum 524.
 intricatum 524.
 mediterraneum 524. 4. 3.
 ovatum 524. 4. 1 *
 ruthenicum 524.
 vulgare 524.
Lycopodium alpinum 872.
 annotinum 872.
 Chamæcyparissus 872. 1 *
 clavatum 872.
 complanatum 872.
 cupressifolium 872. 2.
 denticulatum 873. 2. 2.
 helveticum 873. 2. 1.
 inundatum 872.
 juniperifolium 872. 3.
 microstachyum 872. 4.
 pseudo-annotinum 872. 4.
 recurvum 873. 6.
 selaginoides 873. 2. 3.
 Selago 873.
Lycopsis arvensis 511.
 bullata 511. 6. 1.
 erecta 511. 6. 3 *
 glomerata 511. 18.
 hispidula 511. 6. 2
 micrantha 511. 6. 3 *
 nigricans 512. 5.
 orientalis 511.
 pulla 512. 5.
 taurica 511. 6. 3.
 variegata 511.
Lycopus europæus 597.
 exaltatus 597.
 menthaefolius 597. 2.
Lygeum Spartum 791.
Lygia Passerina 642.
 pubescens 642.
Lyonia calyculata 491. 9. 1.
Lyonnetia abrotanifolia 359.
 5 * 362. 39.
 pectinata 361. 20. 21.
 pusilla 362. 40.
 rigida 362. 40.
 tenuiloba 360. 14 *
Lysimachia anagalloides 600.
 atropurpurea 600.
 ciliata 599. 3 obs.
 decipiens 599. 3 obs.

- dubia* 600.
ephemerum 600.
glauca 600. 7.
guestphalica 599. 2.
intermedia 600. 8.
nemorum 599.
Numularia 599.
orientalis 600. 8.
Otani 600. 7.
paludosa 599. 2.
punctata 599.
thyrsiflora 599.
verticillata 599. 3.
vulgaris 599.
Zawadskii 600. 5.
Lythropsis peploides 352. 2.
3.
Lythrum acutangulum
251.
alatum 251. 3.
austriacum 251. 2.
bibracteatum 252. 8.
cinereum 251. 1.
dibracteatum 252. 8.
dubium 251. 1.
flexuosum 251. 3.
geminiflorum 252.
gracile 251. 1.
Gussonii 251. 3.
Hyssopifolia 251.
maculatum 251.
nanum 252.
nummularifolium 252. 3.
Preslii 251. 3.
Salicaria 251.
Salzmanni 252. 8.
Thymifolia 252.
Thymifolia 252. 8.
tomentosum 251. 1.
tribracteatum 252.
virgatum 251.
Macrochloa arenaria 804.
gigantea 804. 1.
tenacissima 804.
Macropodium elongatum 46.
28.
Macrotonia cephalotes
517.
Magydaris panacifolia 294.
55. 2.
panacina 294.
tomentosa 294.
Maillea Urvillei 791.
Majanthemum bifolium 717.
6 1.
Convallaria 717.
Majorana hortensis 592. 13
obs.
Malabaila aurea 288.
Golaka 314. 105. 1.
graveolens 288.
Hacquetii 314. 105. 1.
involutocrata 288.
obtusifolia 288.
orientalis 288. 34. 2.
rectistyla 288. 35. 1.
Malachium aquaticum 107.
manticum 111. 3. 1.
Malacochaete litoralis 764. 7.
Malaxis Loeselii 686. 4. 1.
monophyllos 686.
paludosa 686.
Malcolmia africana 40.
alyssoides 40. 11 *
angulifolia 39. 26. 1.
bicolor 39.
Broussonetii 40. 11.
chia 39.
confusa 40.
contortuplicata 40.
cymbalaria 39.
flezuosa 39.
græca 39.
incrassata 39. 26. 2.
lacera 40.
litorea 40.
maritima 39.
Orsiniana 40.
parviflora 40.
patula 40.
veluchensis 39. 6. 6.
Malope althæoides 129. 8. 1.
malacoides 129.
multiflora 129.
stipulacea 129. 8. 1.
trifida 129.
Malus Sorbus 241. 3. 1.
Malva ægyptia 130.
Alcea 129.
alceoides 129. 1.
althæoides 129.
althæoides 129. 5.
ambigua 130.
arvensis 130. 9.
Bismalva 129. 1 *
borealis 130.
cannabina 129. 1.
Colmeiroi 129. 3 *
crenata 130. 11.
cretica 129.
crispa 130. 16 obs.
erecta 130. 7 *
excelsa 130. 9.
excisa 129. 1.
fastigiata 129. 1 *
flexuosa 130. 12 *
geraniifolia 129. 2.
Henningii 130. 11.
hirsuta 129. 5. 130. 7 *
hispanica 130.
hybrida 130. 10 ×
intermedia 129. 1.
italica 129. 1.
laciniata 129. 2.
Lamottei 129. 2.
litoralis 130. 10.
mamillosa 128. 7. 5.
mauritanica 129.
mauritanica 129. 7.
microcarpa 130. 12 *
Morenii 129. 1 *
moschata 129.
Mülleri 128. 7. 1.
neglecta 130. 10.
nicaensis 130.
Orsiniana 129. 2.
Papaver 130.
parviflora 130.
parviflora 130. 11.
plebeia 130. 7 *
polymorpha 130. 7 *
pseudoborealis 130. 11.
pusilla 130. 11.
racemosa 130. 7.
recta 129. 7.
rotundifolia 130.
rotundifolia 130. 11.
rotundifolia × *borealis* 130.
10.
Sherardiana 130. 10. 1.
silvestris 129.
tomentella 129. 7.
Tournéfortiana 129.
trifida 130.
vulgaris 129. 7. 130. 10.
Malvella Sherardiana 130.
Mandragora autumnalis
525.
microcarpa 525. 6. 2 *
officinaria 525. 6. 1. 2.
vernalis 525.
Margotia gummiifera 276. 1.
1.
laserpitiioides 276.
Marrubium elegans 584.
26.
Marrubium Alysson 583.
apulum 582. 1.
candidissimum 582.
cinereum 582. 20. 6.
circinatum 582. 21. 6.
creticum 582. 3.
cylleneum 582. 21. 6 *
Frivaldskyanum 582.
pannonicum 582.
parnassicum 582. 21. 6.

- pauciflorum* 582. 3.
peregrinum 582.
peregrinum 582. 2. 5.
peregrino-vulgare 582. 2.
plicatum 583. 21. 10.
præcox 582.
pseudodictamnus 582. 20.
 4. 5.
remotum 582. 2. 21. 4.
rupestre 582. 20. 7.
sericeum 583. 21. 9.
supinum 583.
thessalum 582.
Vaillantii 582. 1 obs.
velutinum 582.
vulgare 582.
- Marsdenia erecta* 496.
Marsilea Fabri 870. 1. 2.
pubescens 870.
quadrifolia 870.
strigosa 870. 1. 2.
Maruta Cotula 363. 43.
foetida 363. 43.
fuscata 363. 45.
mixta 363. 11. 1.
Mastrucium pinnatifidum
 417. 1.
Matricaria arvensis 374. 7.
aurea 375.
Bayeri 374. 8.
Chamomilla 374.
conoclinia 374.
coronata 375. 8 *
corymbosa 372. 1 *
Courrantiana 375. 8 *
decipiens 374. 1 obs.
discoidea 375.
elegans 374. 5.
glabra 374.
inodora 374.
Kochiana 374. 8.
maritima 374.
maritima 374. 5.
præcox 374.
pumila 374. 5.
pusilla 374. 5.
rosella 374.
salina 374. 5. 8.
suaveolens 375.
suaveolens 374. 5. 8.
trichophylla 374.
Matthiola biennis 31.
coronopifolia 31. 9 *
fragrans 30.
glabrata 30.
glandulosa 30.
græca 30. 1.
incana 30.
lunata 31.
odoratissima 30.
parviflora 31.
pumilio 31. 10.
rupestris 30. 1 *
sinuata 30.
thessala 31.
tricuspidata 31.
tristis 31.
undulata 30. 2 *
valesiaca 30. 7 *
varia 30.
Mattia græca 521.
Schmidtii 521. 19. 2.
umbellata 521.
Meconopsis cambrica 24.
Medicago aculeata 167. 24.
 168. 30 *
agrestis 168.
ambigua 167. 17.
angulata 166. 6.
annularis 166. 7 *
apennina 170.
apiculata 169.
applanata 167. 17.
arabica 169.
arborea 165.
arborescens 165. 1.
arenaria 167. 25.
astroites 167. 16.
banocensis 168. 32.
Berteroana 169. 38.
Biancæ 167. 17.
brachyacantha 169. 41.
Braunii 167. 25.
cancellata 166.
cancellata 168. 35.
carstiensis 170.
catalonica 168. 27.
ciliaris 169.
cinerascens 168. 32.
circinata 165. 17. 1.
coerulea 166. 6 *
commutata 167. 23.
confinis 169. 38.
connivens 170. 19. 4.
constricta 168. 31.
cordata 169. 39.
coronata 168.
corrugata 166. 15.
corymbifera 170. 50.
crassispina 167. 24.
cretacea 166.
crinita 169. 43.
cuneata 167.
Cupaniana 170. 50 *
cuspidata 166. 10.
cylindracea 167. 25 *
Decandollii 169.
declinata 166. 11.
denticulata 169. 37 *
depressa 168. 33.
disciformis 170.
Echinus 169.
elegans 167. 20.
falcata 166.
falcato-sativa 166. 6 *
fissa 170. 19. 7.
flexuosa 169. 37 *
Gerardi 168. 32.
germana 168. 32.
globosa 168.
glomerata 166. 7 *
glutinosa 166.
glutinosa 166. 7 *
gracillima 169. 37 *
græca 169. 41.
granatensis 169.
Helix 167.
hirsuta 168. 32. 38. 169.
 41.
histrix 169. 37.
hybrida 166. 3.
intermedia 166. 4.
intertexta 169. 43. 45.
lacinata 169.
lævis 166. 15.
lappacea 169.
leiocarpa 166. 14 *
lenticularis 166. 15.
lineata 169. 41.
litoralis 167.
litoralis 167. 25.
lupulina 170.
macrocarpa 168. 28.
maculata 169. 39.
marginata 167. 17. 17 *
marina 166.
media 166. 6 *
microdon 169. 37.
minima 169.
mitis 168. 33 *
mollissima 169. 41.
Morisiana 168. 32.
murex 168.
murex 167. 24 *
muricata 167. 23. 168. 29.
 30 *
muricoleptis 169.
muricoleptis 169. 44.
neglecta 168. 30 *
nigra 169. 37.
Nocæ 170. 48.
obscura 166.
olivæformis 168. 30 *
orbicularis 167.
orbicularis 167. 17 *
ovalis 170. 19. 9.
ovata 168. 28.

- Paillerii 166. 14.
 panormitana 169. 43.
 pentacycla 169. 37.
Pironæ 166.
 plagiospira 167. 21.
 plumbea 167. 16 *
 polycarpa 169. 38.
 polycycla 169. 37.
 polymorpha 169. 39.
pontificalis 169.
Pourretii 166.
præcox 168.
 procumbens 166. 4.
 prostrata 166.
 pseudo-Gerardi 168. 33 *
 pubescens 168. 27.
 pugionata 170. 19. 5.
 pungens 171. 19. 16.
 radiata 170. 51 obs.
 recta 169. 41.
reticulata 167.
rigidula 168.
 rigidula 167. 16. 24. 169.
 41.
rugosa 167.
 rugosa 168. 27.
rupestris 166.
 sardoa 169. 37 *
satina 166.
saxatilis 166.
scutellata 167.
 sicula 168. 29.
silvestris 166.
Soleirolii 167.
 Sorrentini 168. 28.
sphaerocarpa 168.
 spinulosa 168. 27.
 stipularis 170. 50.
striata 167.
 subinermis 167. 25 *
suffruticosa 166.
Tenoreana 168.
 tentaculata 167. 24.
 tennifolia 166. 11.
 Terebellum 169. 37.
 tetracycla 167. 25 *
 Timeroyi 168. 32.
tornata 167.
tribuloides 167.
 trieycla 167. 26.
 truncatula 167. 24 *
 truncatulata 167. 24 *
tuberculata 167.
 tuberculata 168. 31.
turbinata 168.
 uncinata 167. 24. 169. 37 *
vermicularis 168.
 villosa 168. 32.
 villosula 168. 32.
 Willdenowii 170. 50.
Medicusia aspera 467. 7.
 lappacea 467. 6.
 Sprengeriana 467. 7.
 Megastachya eragrostis 833.
 2.
 unioides 844. 1.
 Melampyrum alpestre 556. 6.
arvense 555.
barbatum 555.
ciliatum 556. 3 *
commutatum 556. 5.
cristatum 555.
 heracleoticum 556. 5 *
 hybridum 555. 2.
 lineare 556. 5.
 montanum 556. 5.
nemorosum 555.
pratense 555.
 pseudobarbatum 555. 2.
 saxosum 556. 6 *
silvaticum 555.
 subalpinum 556. 4 *
 vulgatum 556. 5.
 Melandryum affine 87. 8. 2.
 apetalum 87. 8. 1.
 auriculatum 89. 11.
dicline 87.
 divaricatum 86. 7. 2.
 dubium 87. 7. 4 obs.
 Elisabethæ 93. 75.
ericalycinum 87.
 intermedium 87. 4 obs.
 lanuginosum 88. 10.
macrocarpum 86.
nemorale 87.
nivale 86.
 noctiflorum 93. 79.
pratense 86.
 Preslii 86. 7. 3.
 Requiæni 89. 23.
setubense 87.
silvestre 86.
 viscosum 89. 18.
 Zawadskii 89. 12.
 Melanoloma pullatum 419.
 Melica altissima 818.
 amethystina 818. 5.
 arrecta 818. 7.
 australis 818. 7.
Bauhini 818.
ciliata 817.
 ciliata 817. 1. 3.
 cretica 817. 3. 3 *
Cupani 817.
glauca 817.
 humilis 817. 4 *
 lobata 817. 2 *
Magnolii 817.
 major 818.
 minuta 818.
 nebrodensis 817. 3. 3 *
nutans 818.
 nutans 818. 9.
picta 818.
pyramidalis 818.
 pyramidalis 818. 7.
 ramosa 818. 7. 8.
rectiflora 818.
 saxatilis 818. 9.
 setacea 818. 5.
 sibirica 818. 6.
 taurica 817. 3.
 transsilvanica 817. 2 *
 typhina 817. 1.
uniflora 818.
 viridiflora 818. 11.
 Melilotus alba 172.
 altissima 172.
 arborea 172. 10 *
 arguta 172. 10.
 arvensis 172. 4.
Besseriana 172.
 coerulea 171. 18.
 collina 172. 5.
 compacta 171. 2 *
 dentata 172.
 diffusa 172. 4.
elegans 172.
 globulosa 173. 14.
 gracilis 173. 14.
indica 173.
 infesta 172.
 intermedia 171. 2.
 intricata 172. 6.
italica 172.
 Kochiana 172. 4. 7.
 leucantha 172. 10.
 linearis 172. 7 +
 longifolia 171. 2.
macrorrhiza 172.
 macrorrhiza 172. 9. 11.
 maxima 172. 4 +
 melanosperma 172. 10.
messanensis 171.
neapolitana 172.
 nebrodunensis 172. 9.
officinalis 172.
 officinalis 172. 9.
 ornithopodioides 171. 14
pallida 172.
 palustris 172. 8 *
 parviflora 173. 14.
 permixta 173. 15.
 Petitpierreana 172. 4.
polonica 173.
 polonica 172. 12.
 procumbens 171. 19.

- rotundifolia 172. 13.
ruthenica 172.
segetalis 171. 2.
sulcata 171.
taurica 173. 14.
tenella 172. 10.
Tommasinii 173. 15.
uncinata 171. 15.
virescens 172. 9 +
vulgaris 172. 10.
wolgica 172. 12.
Melissa acinoides 589. 11.
Acinosa 589. 14.
alpina 589. 12.
altissima 587. 28. 1.
arundana 587. 29. 1 *
Calamintha 588. 2.
Clinopodium 587. 29.
cretica 589. 2.
fruticosa 589. 2.
glandulosa 588. 5.
granatensis 589. 12 *
grandiflora 587. 30. 1.
graveolens 587. 28. 1. 589.
 15.
hirsuta 587. 28. 1.
incana 588. 9.
intermedia 588. 2.
marifolia 589. 1. 2.
maritima 589. 17.
microphylla 589. 13.
Nepeta 588. 4.
officinalis 587.
patavina 588. 10.
Pulegium 589. 3.
pyrenaica 587. 27.
rotundifolia 589. 16.
serpyllifolia 589. 1.
suaveolens 588. 11.
subnuda 588. 6.
thymifolia 588. 7.
Melittis alba 574. 11. 1.
grandiflora 574. 11. 1.
melissophyllum 574.
Meniocus lilifolius 57. 31.
Mentha adpersa 596. 7.
Agardhiana 596. 9. 597.
 10.
agrestis 597. 11.
alopecuroides 595. 1 *
ambigua 595. 1 *
aquatica 596.
aquatico-arvensis 597. 11 x
aquatico-rotundifolia 595.
 1 x
aquatico-rubra 596. 7 x
aquatica-silvestris 596. 3 *
arvensis 597.
arvensi-aquatica 597. 11 x
arvensi-hirsuta 597. 11 x
arvensi-rotundifolia 597.
 11 x
austriaca 597. 11 x
Avellini 596. 8 *
ballotaefolia 596. 7 x
Brittingeri 596. 3 x
candicans 595. 3.
canescens 595. 2.
cinerea 597. 10.
citrata 596. 7.
cordata 596. 8 *
cordifolia 596. 4 obs.
crispa 596. 3. 4 obs. 7.
crispata 596. 4.
cri-po-silvestris 596. 3 x
domestica 595. 3.
dulcissima 596. 3 *
elliptica 597. 11 x
emarginata 596. 3.
exigua 597. 12.
gentilis 597.
gentilis 597. 10.
glomerulata 596. 5.
gratissima 595. 3.
hirsuta 596.
hirsuta 596. 7.
hirsuto-silvestris 596. 3 *
hirta 596. 3 *
hispidula 596. 3 *
hortensis 596. 4. 597. 10.
inarimensis 596. 4 *
incana 595. 3.
incano-hirsuta 596. 3 *
insularis 596.
laevigata 596. 4.
Lamareckii 596. 3 x
lamiifolia 596. 5.
lapponica 597. 11 *
Lloydii 596. 7 *
macrostachya 595. 1 *
marrubiastrum 597. 11.
Maximiliana 596. 7 x
Michellii 596. 4.
mollissima 595. 3.
Mülleriana 597. 11 x
neapolitana 596. 4 obs.
neglecta 595. 1.
nemorosa 595. 3.
nemoroso-aquatica 596. 3 *
nemoroso-hirsuta 596. 3 *
nemoroso-macrostachya
 596. 3 *
nepetoides 596. 3 *
Nouletiana 596. 4 *
origanoides 596. 8 *
palatina 597. 11.
paludosa 597. 11 x
palustris 597. 9.
Pauliana 597. 11.
pimentum 596. 4 obs.
piperita 596. 4 obs.
plicata 597. 11 x
pratensis 597. 10.
pubescens 596. 3 *
Pulegium 597.
punctata 595. 36. 1.
pyramidalis 596. 7 *. 8 *
Requienii 597.
resinosa 597. 10.
riparia 597. 9 x
Rosani 596. 3.
rotundifolia 595.
rotundifolio-aquatica 596.
 7 x
rotundifolio-arvensis 597.
 11 x
rotundifolio-silvestris 596.
 3 x
rubra 597. 9 et x. 10 *
rugosa 595. 1.
sativa 596.
sativum-aquatica 597. 9 x
Schultzii 595. 1 x
Scordiastrum 597. 11.
serotina 596. 3.
Sieberi 595. 2.
silvestris 595.
silvestri-aquatica 596. 7 x
silvestri-hirsuta 596. 3 *
silvestri-rotundifolia 596.
 3 x
stricta 596. 7 x
suavis 596.
subspicata 596. 7 x. 597.
 11 x
tomentella 597. 12 *
tomentosa 595.
tomentosa 597. 12 *
undulata 596. 3.
urticaefolia 596. 8 *
velutina 595. 1 *. 596. 3 *
verticillata 597. 9.
viridis 596.
viridi-arvensis 597. 11.
weissenburgensis 596. 7 x
Wirtgeniana 597. 9 x
wirtgeniano-aquatica 596.
 7 x
Wohlwertiana 597. 11 x
Menyanthes trifoliata 503.
Mercurialis alpina 647. 4.
ambigua 647. 6.
annua 647.
ciliata 647. 6.
corsica 647.
elliptica 647.
elliptica 647. 3.

- Huetii 647. 6 *
ovata 647.
perennis 647.
silvatica 647. 4.
tomentosa 647.
 Merendera *attica* 744.
bulbocodioides 744.
Bulbocodium 744.
caucasica 744.
caucasica 744. 2. 4.
filifolia 644.
montana 744. 2. 1.
sobolifera 744.
 Mertensia *maritima* 521.
 Sendtneri 517. 14. 1.
 Mesembryanthemum *brachyphyllum* 266.
crystallinum 265.
nodiflorum 265.
 Mespilus *germanica* 243.
triloba 244. 6. 9 *
 Messerschmidia *Arguzia* 508.
 1. 1.
cancellata 523. 27. 1.
 Metabasis *cretensis* 471.
hymettia 471. 133. 1.
neapolitana 471.
 Meum *adonidifolium* 292. 43.
 2 *
athamanticum 291.
athamanticum 291. 43. 1 *
carvifolium 307. 85. 3.
corsicum 293. 50. 2.
græcum 307. 85. 4.
Mutellina 292.
nevadense 291. 43. 1 *
pyrenaicum 291. 42. 1.
rigidulum 307. 85. 6.
 Mibora *Desvauxii* 795. 35. 1 *
minima 795. 35. 1.
verna 795.
 Michelaria *arduennensis* 824.
 89. 1.
bromoidea 824.
eburonensis 824. 89. 1 *
hirsuta 824. 89. 1 *
 Microcala *filiformis* 502. 6. 1.
 Microlonchus *Clusii* 432. 104.
 1.
Delileanus 432. 104. 1 *
Duriæ 432.
salmanticus 432.
tenellus 432. 104. 2 *
valdemorensis 432. 104. 2.
Ysernianus 432.
 Micromeria *approximata* 590.
Barceloi 590. 11 *
canescens 590.
consentina 590. 7.
cordata 590.
cremnophila 590.
cristata 590.
croatica 591.
dalmatica 590.
dalmatica 588. 6.
filiformis 591.
græca 590.
hirsuta 590. 6. 14.
hispida 590.
juliana 590.
longiflora 590. 7 *
marifolia 589.
marifolia 589. 31. 1.
microphylla 591.
montana 591. 4.
myrtifolia 590. 14.
nervosa 590.
parviflora 590.
Piperella 591.
Piperella 591. 17 obs.
plumosa 590. 6.
Pulegium 589.
pygmæa 591. 4 *
Reinholdi 590. 14.
Rodriguezii 590. 6 *
rupestris 590.
serpyllifolia 589.
sicula 590. 7.
sphaciotica 591. 18.
spicata 591. 3.
tenuifolia 590. 7 *. 8.
thymoides 591.
variegata 591. 4.
 Micropus *bombycinus* 395.
discolor 395. 59. 2.
erectus 395.
erectus 395. 59. 2.
exiguus 395. 58. 6.
supinus 395.
 Micropyrum *tenellum* 843. 2.
 Microrhynchus *nudicaulis* 462.
 Microscadium *tenuifolium* 308.
 Microstylis *monophylla* 686.
 5. 2.
 Middendorfia *hamulosa* 252.
 2. 3.
 Milium *arundinaceum* 806.
 62. 1.
coerulescens 806. 62. 3.
confertum 806. 1. 3. 4.
effusum 806.
heleiforme 806. 62. 3 *
Montianum 806.
multiflorum 805. 62. 1.
muticum 803. 53. 2.
paradoxum 806. 62. 2.
scabrum 806.
scabrum 803. 53. 2.
tenellum 807. 67. 1.
 Thomasii 806. 62. 1 *
transsilvanicum 806. 1.
vernale 806.
vernale 806. 3. 4.
 Millina *hyosceroides* 471. 136.
 1.
leontodontoides 467. 130. 1.
 Mimulus *guttatus* 536. 5 obs.
luteus 536. 5 obs.
 Minuartia *campestris* 120.
campestris 120. 13. 2.
dichotoma 120.
fasciculata 118. 14.
fastigiata 117. 12. 118. 13.
montana 120.
montana 120. 13. 3.
 Petteri 118. 14.
 Mnemion *Lagascæ* 81. 50.
tenellum 80. 43.
 Moehringia *dasyphylla* 113.
diversifolia 113.
flaccida 113. 12.
glabrescens 113. 4.
glauca 113. 9.
glaucescens 113. 6 *
glauco-virens 113.
Grisebachii 113.
intricata 113.
Janka 113.
lateriflora 112.
muscosa 113.
obtusata 113. 7.
papulosa 113.
pendula 113.
pentandra 112. 1 *
polygonoides 113.
Ponæ 113. 6.
radiolata 113. 15 obs.
sedifolia 113. 6 *
sperguloides 113. 12.
sphagnoides 113.
stricta 120. 12. 5.
thesiifolia 113. 7.
Thomasiæ 113.
trinervia 112.
villosa 113.
 Moenchia *erecta* 111. 3. 2.
glauca 111. 3. 2.
græca 111.
mantica 111.
octandra 111. 3. 2 *
quaternella 111.
 Moldavica *punctata* 585. 23.
 4 obs.
 Molineria *lævis* 807. 66. 2.
 70

- lendigera* 807.
minuta 807.
palustris 807. 66. 1 *
Molinia aquatica 837. 99. 1.
Molopospermum cicutarium 314.
peloponnesiacum 314. 103. 1.
Moltkia graminifolia 518.
petraea 517.
Sendtneri 517. 14. 1.
Moluccella armata 581. 19. 1.
frutescens 581. 20. 1.
spinosa 581.
Momordica Elaterium 245.
Monerma subulata 846. 114. 1.
Moneses grandiflora 493.
Monotropa glabra 493.
hirsuta 493.
hypophegea 493.
Hypopithys 493.
hypopitys 493.
Montia arvensis 253. 1 *
Chaberti 253. 1 *
fontana 253.
lamprosperma 253. 1 *
minor 253. 1 *
rivularis 253. 1 *
Moræa fugax 703. 4. 1.
Sisyrinchium 703. 4. 1.
Morgagnia bicolor 719. 5. 1.
Moricandia arvensis 49.
batica 49.
foetida 49.
Ramburii 49.
Morina graeca 341. 1. 1.
persica 341.
Morisia hypogaea 29.
Morus alba 656 obs.
nigra 656 obs.
papyrifera 656 obs.
tatarica 656 obs.
Muehlenbergia pendula 800. 49. 1.
Mulgedium alpinum 433.
Aurora 433. 106. 4.
Pancicii 433.
Plumieri 433.
sibiricum 433.
sonchifolium 433. 106. 4.
tataricum 433.
Munbya cephalotes 517. 12. 1.
Muretia tanaicensis 308.
Musa paradisiaca 685.
Muscari acutilobum 734. 10.
ambrosiacum 733. 24. 1 obs.
atlanticum 734. 8.
autumnale 734. 12.
botryoides 734. 6.
commutatum 734. 3.
comosum 732. 9.
compactum 734. 10.
Cupanianum 733. 15.
filifolium 734. 12.
Gussonei 733. 14. 734. 10.
Heldreichii 734. 5.
hymenophorum 734. 5.
La Farinae 734. 3.
Lelievrii 734. 7.
leucophæum 734. 2.
luteum 733. 24. 1.
macrocarpum 733.
maritimum 733. 14.
Mordoanum 734. 4.
moschatum 733. 24. 1 obs.
neglectum 734. 9.
pallens 733. 25. 2.
parviflorum 734. 12.
pulchellum 734. 7. 11.
racemosum 734. 3. 10.
Strangwaisii 734. 7.
tenuiflorum 732. 10.
transsilvanicum 734. 6.
tubiflorum 732. 10.
Myagrum auriculatum 51. 46. 1.
hispanicum 29. 8. 5.
iberioides 68. 80. 1.
perfoliatum 67.
Mycelis angulosa 436. 17.
muralis 435. 17.
Myconia Chrysanthemum 370. 20. 3.
Myogalum Boucheanum 728.
nutans 728.
Myosotis adulterina 520. 11 *
alpestris 519.
alpina 519. 8.
aprica 520. 12.
arenaria 520. 14.
arvensis 520. 11. 12. 14.
bæotica 519. 6.
Balbisiana 520. 13.
cadmea 519. 6.
cæspitosa 519.
cæspitosa 519. 8.
chrysanthia 520. 13 *
collina 520.
coronaria 519. 1.
cretica 519. 5. 6.
cyanea 520. 10.
dubia 520. 13.
Dumortieri 519. 1 *
fallacina 520. 13.
gracillima 520. 12 *
hispida 520. 12.
idea 519.
intermedia 520.
Kicsenwetteri 519. 6.
laxiflora 519. 1.
Lebelii 520. 11 *
lingulata 519. 2.
lithospermifolia 520. 9. 10.
litoralis 519.
lutea 520. 13. 13 *
micrantha 519. 3.
minutiflora 520. 14.
montana 520. 9. 10.
multiflora 519. 2.
nana 520. 9. 11.
nemorosa 519. 1.
obtusata 511. 14.
palustris 519.
pusilla 519.
pusilla 519. 7.
pyrenaica 519.
ramosissima 520. 12.
refracta 520.
Rehsteineri 519. 2 *. 5 *
repens 519. 1. 1 *
rupicola 520. 9.
siacula 519.
silvatica 520.
Soleirolii 519. 8 *
sparsiflora 520.
speluncicola 520. 14 *
squarrosa 523. 24. 4.
stolonifera 519. 2.
stricta 520.
stricta 519. 6.
strigulosa 519. 1.
suaveolens 520. 9.
tergloviensis 523. 25. 1.
umbrosa 520. 11.
variabilis 520. 10 *
verna 520. 14.
versicolor 520.
Welwitschii 519.
Myosurus minimus 4.
Myrica Faya 673.
Gale 673.
Myricaria germanica 252.
squamosa 252.
Myriophyllum alterniflorum 250.
montanum 250. 2. 2.
pectinatum 250. 2. 1. 3.
siculum 250. 2. 3 *
spicatum 250.
verticillatum 250.
Myrrhis Cicutaria 300. 9.
magellensis 300. 6.
odorata 299.
sulcata 299. 65. 1 *
Myrsiphyllum asparagoides 716. 9 obs.

- Myrtillus niger* 490. 5. 2.
uliginosa 489. 5. 1.
Myrtus communis 245.
tarentina 245. 1 *
Myscolus megacephalus 471.
 137. 1.
microcephalus 472. 137. 2.
Najas alagnensis 685. 2. 1. 2.
flexilis 685. 2. 3.
graminea 685. 2. 2.
major 685. 1. 1. 2. 1.
marina 685.
minor 685. 2. 1.
monosperma 685. 1. 1.
tenuifolia 685. 2. 2.
Nananthea perpusilla 380.
Nanophytum caspicum 632.
juniperinum 632. 30. 1.
Narcissus æquilimbus 713.
 41.
albidus 709. 7.
albus 709. 7.
angustifolius 710. 17.
apodanthus 710. 9.
Ascheronii 711. 24 *
Aesoanus 712. 37.
aurantiacus 709. 7.
aureus 712.
aureus 713. 4. 1 *
autumnalis 712.
Barkæ 711. 19 *
Bernardi 709. 3. 1 ×
Bertolonii 712.
Bertolonii 712. 29 *
Biancæ 711. 27 *
Bicchianus 711. 27 *
bicolor 709. 3. 1. 2.
biflorus 710.
biflorus 709. 3. 1 ×. 710.
 16 ×
bifrons 712. 30.
Bulbocodium 713. 4. 1. 5.
calathinus 709.
calathinus 709. 8.
canaliculatus 711. 25 *
candidissimus 709. 3.
cantabricus 713. 4. 5.
cernuus 710.
cernuus 709. 3 obs. 710. 12.
chrysanthus 712. 29 *
Clusii 713. 4. 5.
commutatus 711. 27.
cothurnalis 710. 15.
cuneiflorus 709. 4.
Cupanianus 712. 40. 41.
cupularis 712. 31. 32.
dubius 711.
elatus 711.
elegans 712. 40.
etruscus 711. 26 *
festalis 709. 1. 3.
flavus 712. 35.
gaditanus 712.
Gennarii 711. 19 *
glaucifolius 711. 26.
Graëllsii 713. 4. 3.
grandicrenatus 711. 27 *
grandiflorus 709. 2. 3.
Gouani 709. 7.
herminicus 710. 9.
hispanicus 709. 2. 710. 9.
incomparabilis 709.
intermedius 712.
italicus 711.
italicus 711. 24. 26 *
Jonquilla 712.
Jonquilla 712. 36. 37.
jonquilloides 712.
jonquilloides 710. 12.
juncifolius 712.
juncifolius 712. 38.
lætus 710. 8.
lobatus 710. 8.
Macleaii 710. 10.
majalis 710. 16.
major 709.
major 709. 1. 3.
minor 709.
minutiflorus 712.
moschatus 709.
neglectus 711.
nivalis 713. 4. 2.
niveus 710. 19.
obesus 713. 4. 1.
obliquus 711.
obsoletus 713. 41.
ochroleucus 711.
odoratus 709.
odorus 710. 8.
oxypetalus 712. 40.
pallidulus 710.
pallidus 711. 20. 713. 4. 5.
Panizzianus 711. 19.
papyraceus 710.
patulus 711.
patulus 711. 26. 27.
poculiformis 710. 10.
poëticus 710.
poëticus 710. 15.
poëtico-pseudonarcissus
 710. 16.
poëtico-tazetta 710. 16 ×
polyanthos 710.
precox 711. 29.
primulinus 712.
pseudonarcisso-poëticus
 709. 1 ×. 3.
Pseudo-Narcissus 709.
pseudo-poëticus 710. 16.
Puccinellii 712.
pulchellus 710.
radiiflorus 710.
reflexus 710.
reflexus 709. 5.
remopolensis 711. 25 *
Ricasolianus 711. 26 *
rupicola 710.
Sabini 709. 3.
serotinus 712.
scicular 711. 26 *
spiralis 711. 27 *
stellatus 710. 18. 711. 19.
subalbidus 712. 29.
Tazetta 711.
Tazetta 711. 19.
tazetto-poëticus 711. 25 ×
Tenorii 711.
tenuifolius 713. 4. 6.
tereticaulis 711. 22.
Tinei 711. 26.
tortuosus 709. 3 obs.
triandrus 710.
triandrus 710. 11.
trilobus 709.
unicolor 711.
varians 711. 25.
vergellensis 711. 26 *
viridiflorus 713.
Webbii 712. 36.
Nardosmia angulosa 396. 62.
 3.
denticulata 396. 62. 1.
fragrans 396.
frigida 396.
racemosa 396. 62. 1.
straminea 396.
Nardurus Lachenalii 843.
montanus 843.
patens 843.
Poa 843. 2.
Salzmanni 843.
tenellus 843.
tenuiflorus 843. 4.
Nardus stricta 846.
Narthecium ossifragum
 745.
Nasturtium amphibium 35.
anceps 35.
anceps 36. 6 *
aquaticum 35. 1. 3.
Armoracia 51. 45. 1.
armoracioides 35.
arvensis 36. 8.
asperum 44. 23. 24.
astyloides 36. 6.
astylon 35. 20. 2 ×

- austriacum* 35.
barbareoides 36. 6 *
Boissieri 44.
brachycarpum 36.
brevistylum 36. 6.
commutatum 35. 3 *
hispanicum 36. 11 *
hybridum 35. 2.
lippizense 36.
microphyllum 35. 1.
Morisonii 36. 6 *
mucronulatum 36. 6.
officinale 35.
palustre 36.
proliferum 36. 7 *
pyrenaicum 36.
Reichenbachii 36. 6 *
riparium 35. 3.
riivulare 36. 6.
sifolium 35. 1 *
silvestre 35.
stenocarpum 35. 4 *
supinum 44. 21.
terrestre 35. 3 *, 36. 8.
thracicum 36.
Wulfenianum 36. 9.
Naumburgia guttata 599. 1.
thyrsiflora 599. 1.
Nectaroscilla hyacinthoides
 729. 1.
Nectaroscordum bulgaricum
 735.
siculum 735.
Nemauchenes aculeata 460.
 116. 3.
Nemocharis radicans 763. 10.
 2.
silvatica 763. 10. 1.
Neogaya simplex 293.
Neotinea intacta 696. 22. 1.
Neottia nidus avis 688.
Nepeta acerosa 586. 17.
agrestis 586.
amethystina 586.
Apuleji 586.
aragonensis 586. 9 *
argolica 586. 13.
Boissieri 586. 10 *
camphorata 586.
Cataria 585.
citriodora 586. 7.
delphinensis 586. 9.
dirphyia 586. 13.
foliosa 585.
Glechoma 587. 25. 1.
granatensis 586.
grandiflora 585. 24. 3.
graveolens 586. 9.
hirsuta 586. 12 obs. 15.
hispanica 586.
italica 586. 13. 13 obs.
laconica 586. 19 *
lanceolata 586. 8. 9.
latifolia 585.
longicaulis 586. 9.
macrantha 585.
mallophora 585.
marifolia 589. 2.
melissæfolia 585.
multibracteata 586.
multibracteata 586. 11.
murcica 586. 10 *
Nepetella 586.
Nepetella 586. 10. 10 *
nuda 585.
orientalis 586. 13 obs.
Orphanidea 586. 19 *
paniculata 585. 24. 2.
pannonica 585. 24. 2.
parnassica 586.
parviflora 586. 21.
reticulata 586.
Scordotis 586.
serpyllifolia 589. 1.
Sibthorpii 586.
Spruneri 586.
tuberosa 586.
tuberosa 586. 17.
tymphrestea 586. 20.
ucranica 586.
ucranica 585. 24. 2.
violacea 585. 24. 2. 3. 586.
 14.
Nephrodium cristatum 866.
 6.
distans 866. 10.
Filix mas 865. 5.
foenisecii 866. 8.
pallidum 866. 10.
rigidum 866. 9.
spinulosum 866. 7.
Nerine sarniensis 715. 5 obs.
Nerium Oleander 497.
Neslia paniculata 68.
Neubeckia unguicularis 702.
 47.
Neumayera austriaca 117. 5.
filicaulis 117. 5.
Nicandra physalodes 525. 8
 obs.
Nigella arvensis 16.
arvensis 17. 3.
aristata 17. 3 *
Bourgei 16. 1.
Catenæ 17. 3.
confusa 16. 2 *
cretensis 17. 3.
damascena 16.
divaricata 16. 3.
foeniculacea 16. 3.
gaditana 16. 2.
gallica 16. 2 *
hispanica 16.
hispan.parviflora 16. 2 *
sativa 17.
segetalis 17.
taurica 16. 1.
tuberculata 16. 3.
Nigritella angustifolia
 694.
fragrans 695. 18. 1.
globosa 691. 10.
Heuffleri 695. 18. 1 x
nigra 695. 18. 1.
suaveolens 695. 18. 1 x
Nitella atrovirens 877. 3. 3.
batrachosperma 878.
Bertolonii 877. 2. 1.
borealis 878. 8.
Borreri 879. 2.
brachyteles 878.
Brongniartiana 877. 4.
capitata 877.
confervacea 878.
contracta 878. 8.
fasciculata 879. 1.
flabellata 878. 7.
flexilis 877.
glomerata 879. 4.
glomerulifera 879. 4.
gracilis 878.
hyalina 878.
intricata 878. 8. 4. 1.
mucronata 878.
nidifica 877. 4. 879. 3.
nigricans 877. 4.
norvegica 878. 7.
opaca 877.
ornithopoda 878.
polysperma 879. 1.
procera 878. 5 *
prolifera 879. 2.
Smithii 879. 4.
stellata 878. 8.
stelligera 876. 2. 1.
Stenhammariana 879. 3.
subcapitata 877. 4.
syncarpa 877.
tenuissima 878.
translucens 877.
ulvoides 877. 2. 1.
virgata 878. 7.
Wahlbergiana 878. 7 *
Nitria caspia 146. 4. 1.
Schoberi 146.
Nivaria festalis 714. 7. 2.
verna 714. 7. 1.

- Nocca alpina* 65. 69. 1.
brevicaulis 65. 69. 1.
procumbens 66. 69. 3.
rotundifolia 63. 22.
Noëa spinosissima 632.
Nolletia chrysocomoidea 386.
Nonnea alba 512.
atra 512. 7. 4.
auriculata 513. 8. 6.
Bourgæi 512. 7 *
lamprocarpa 512. 7. 2.
lutea 512.
lutea 517. 13. 2.
micrantha 512.
multicolor 512.
nigrifolia 512.
obtusifolia 511.
picta 512.
pulla 512.
rosea 511.
taurica 512. 7. 4.
ventricosa 512. 8 *
vesicaria 512. 5.
Norna borealis 686. 2. 1.
Notholæna lanuginosa 861. 3. 2.
Marantæ 861.
persica 861. 6. 2.
vellea 861.
vellea 861. 3. 2.
Nothoscordum fragrans 742. 78 obs.
Notobasis syriaca 405.
Notoceras cardaminifolium 36. 21. 1.
hispanicum 31.
Nuphar intermedium 23.
luteo-pumilum 23. 2. 2.
luteum 23.
pumilum 23.
rivulare 23. 2. 1.
sericeum 23. 2. 1 *
Spennertianum 23. 2. 3 *
Nymphaea alba 23.
biradiata 23. 1. 2 *
candida 23.
erythrocarpa 23. 1. 2.
intermedia 23. 1. 3.
Kosteletzkii 23. 1. 3.
Milletii 23. 1. 2.
minima 23. 2. 3 *
neglecta 23. 1. 3 *
parviflora 23. 1. 2.
permixta 23. 1. 2.
rotundifolia 23. 1. 2.
semiaperta 23. 1. 2 *
splendens 23. 1. 2.
suaveolens 23. 1. 2.
thermalis 23.
urceolata 23. 1. 2.
venusta 23. 1. 2.
Obione glauca 626.
græca 626.
muricata 626.
pedunculata 626.
portulacoides 626.
sibirica 626. 10. 1.
Ocimum Basilicum 572 obs.
Odontites alpestris 551. 14.
Bianca 550.
Bocconi 550.
chrysantha 550. 10.
Citardæ 550. 21. 4 *
corsica 551.
cretica 550.
divergens 550. 11.
glutinosa 550.
granatensis 551.
hispanica 551.
Jaubertiana 550.
Jaubertiana 550. 10 *
ixodes 550. 21. 2.
Kochii 551. 11 *
lanceolata 551.
linifolia 551. 18.
Linkii 550.
litoralis 551. 12 *
longiflora 550.
lutea 551.
purpurea 551.
rigidifolia 550.
rotundata 551. 12 *
rubra 550. 11. 551. 12.
serotina 550.
sicula 550. 10 *
simplex 551. 12 *
tenuifolia 550.
verna 551.
virgata 550.
viscosa 551.
Odontospermum aquaticum 391. 53. 2.
Oeosporangium persicum 861. 6. 2.
Szovitsii 861. 6. 2.
Oenanthe angulosa 298.
apiifolia 297. 63. 2.
approximata 298. 5. 8.
aquatica 297. 63. 1.
australis 298. 4 *
banatica 298.
carviformis 298. 10.
chærophylloides 298. 3.
crocata 297.
dacica 297. 10.
densa 299.
diffusa 299. 17.
fistulosa 298.
fluviatilis 297. 63. 1 *
globulosa 299.
gymnorhiza 298. 6.
incrassans 298.
incrassans 298. 5.
Jordani 298.
karstia 298. 4 *
Kunzei 299. 17 *
Lachenalii 298.
Lisæ 298. 3 *
macrosciadia 297. 63. 2 *
marginata 298.
media 298.
media 298. 9 *
megapolitana 298. 6.
meifolia 298. 16 *
millefolia 298.
peucedanifolia 298.
peucedanifolia 298. 5.
Phellandrium 297.
pimpinelloides 297.
pimpinelloides 298. 6.
Pollichii 298. 9.
rhenana 298. 6.
silatifolia 298.
silatifolia 298. 10.
stenoloba 298. 5 *
Tabernæmontani 298. 16.
tenuifolia 298.
thracica 298.
virgata 298. 15. 307. 85. 1.
Oenothera biennis 249. 2 obs.
muricata 249. 2 obs.
rosea 249. 2 obs.
stricta 249. 2 obs.
Ofaiston monandrum 681.
Oglifa arvensis 385. 38. 10.
Olbia hispida 128. 7 *
Olea cajetana 494.
europæa 494.
Oleaster 494.
sativa 494.
Oligosporus condimentarius 377. 21.
Omalothea supina 383. 5.
Omphalodes amplexicaulis 522.
brassicæfolia 522. 23. 4.
linifolia 522.
litoralis 522.
Luciliæ 522.
lusitanica 522. 23. 8.

- myosotoides* 522.
nitida 522.
Pavoniana 522.
scorpioides 522.
verna 522.
Onobrychis alba 198.
alba 198. 4. 5. 5 *
arenaria 198.
arenaria 199. 16 *
argentea 199.
caput galli 199.
caput galli 198. 7.
carnea 198. 6. 199. 12.
carpathica 198.
collina 198. 4.
conferta 199. 14 *
cretica 199.
crista galli 199. 21. 200.
21 obs.
decumbens 198. 4.
ebenoides 199.
echinata 198. 5.
eriophora 199.
foveolata 199. 19 *
Gærtneriana 199.
gracilis 199.
horrida 199.
inermis 198. 4.
laconica 199.
lasistachya 199.
matritensis 199. 15 *
megalophylla 198.
montana 198. 4 *
Pallasii 198.
parviflora 199.
peduncularis 199.
petraea 198. 7.
pulchella 199. 11.
pumila 198.
sativa 198.
saxatilis 199.
Spruneriana 199. 12.
stenorhiza 199.
supina 198. 6. 199. 14. 14 *
Tommasinii 198. 5 *. 199.
16 *
viciæfolia 198. 4.
Visianii 198. 5 *
Ononis adglutinans 160. 11.
aggregata 163. 56.
alba 162.
alopecuroides 162.
alopecuroides var. 162. 35.
altissima 161.
antiquorum 162.
antiquorum 162. 30.
aphylla 163. 61.
arachnoidea 160. 11.
arragonensis 163.
arthropodia 161. 25.
arvensis 161.
arvensis 162. 29.
bætica 163. 48.
balearica 161. 25.
barbata 163. 60.
Barrelieri 160. 3 *
bicolor 161. 18.
biflora 161.
Bonanniana 162. 37.
Bourgæi 162.
brachycarpa 161.
brachystachya 163.
breviflora 161. 19 *
Broteriana 160.
calycina 161. 25.
campestris 162.
capitata 163. 59.
carnea 162. 29.
cenisia 160.
cephalotes 163.
Cherleri 160. 8. 9. 163.
59.
cintrana 161.
Columnæ 163.
Cossoniana 162.
crassifolia 160. 3 *
crispa 160.
crispa 160. 13 *
crotalarioides 161.
Dehnharti 163. 46 *
diacantha 162. 31.
diffusa 162.
diffusa 162. 43. 163. 46 *
dumosa 163. 52.
ellipticifolia 162.
ervoides 200. 46. 3.
euphrasiæfolia 163.
filicaulis 162.
foliosa 160.
fruticosa 160.
fruticosa 160. 2.
geminiflora 161. 18.
gibraltarica 160. 15 *
Hackelii 161. 18 obs.
hircina 161.
hircina 161. 29.
hircino-spinosa 161. 28 +
hirta 163.
hispanica 160.
hispanica 160. 15.
inæquifolia 160. 11.
inclusa 160.
insignis 161.
intermedia 162. 29 *
juncea 163.
latifolia 160. 1.
laxiflora 160.
legitima 162. 30.
leucotricha 162.
longearistata 161. 19 *
maritima 160. 15. 162.
29 *
Masquillerii 163.
microphylla 160. 13 *
Miniana 161. 29.
minutissima 163.
minutissima 163. 59.
mitis 161. 29.
mitissima 162.
mollis 160.
monophylla 162. 35.
montana 163.
Morisonii 161. 25.
Natrix 160.
occidentalis 162. 29 *
oligophylla 162.
ornithopodioides 161.
parviflora 163. 59.
pendula 160.
pendula 161. 23.
Picardi 162.
pieta 160. 11 *
pilosa 160. 9.
pinguis 160. 11.
pinnata 162.
polymorpha 161. 23.
præcox 161. 18.
procurrens 161. 29. 162.
29 *
pseudo-hircina 161. 28.
pubescens 161.
pyrenaica 161.
ramosissima 160.
ramosissima 160. 13 *
reclinata 160.
reclinata 163. 56.
repens 161. 29. 162. 29.
Reuteri 163.
rigida 160. 2.
rosæfolia 163.
rotundifolia 159.
Salzmänniana 162.
saxatilis 163. 60.
saxicola 163.
Schouwii 160. 5.
serrata 162.
serrata 163. 46.
sicula 161.
Sieberi 161.
speciosa 163.
spinosa 162. 29. 30.
stipularis 161. 21.
striata 163.
subocculta 163. 59.
Tournesfortii 163.
tridentata 160.
tridentata 160. 3. 3 *

- variegata* 163.
villosissima 162.
virgata 161.
viscosa 161.
viscosa 161. 19 *
Onopordon Acanthium 402.
acanthophorum 403. 75. 3.
acaulon 403.
alexandrinum 403. 75. 5.
arabicum 403.
argolicum 403. 75. 2.
candidissimum 403. 75. 1.
caulescens 403. 8 obs.
corymbosum 403. 75. 2 *
elatum 403. 75. 2 *
elongatum 403. 75. 3.
glomeratum 403. 75. 3.
græcum 403. 75. 3. 5.
horridum 403. 75. 3.
illyricum 403.
macrocanthum 403.
macrocanthum 403. 75. 3.
 5.
myriacanthum 403. 75. 3 *
nevrosus 403.
nivescens 403. 75. 3.
parnasicum 403. 75. 1 *
pyrenaicum 403. 8.
rhodense 403. 75. 3.
Schultesii 403. 75. 1.
Sibthorpium 403.
tauricum 403.
transiens 403. 75. 3.
uniflorum 403. 8.
virens 403. 75. 2.
Weissianum 403. 75. 5.
Onosma angustifolium 516.
 2.
arenarium 516.
Aucherianum 516. 3.
aurantiacum 516. 2.
calycinum 516. 7.
canescens 516. 5.
cinereum 516. 5.
echioides 516.
echioides 516. 9. 11. 14.
erectum 516. 5.
fallax 516. 7.
frutescens 516.
græcum 516.
helveticum 516. 4 *
heterophyllum 516. 4.
micranthos 509. 2. 8.
montanum 516.
montanum 516. 4 *
orientale 517. 14.
Orphanidis 516. 2.
pallidum 516.
paradoxum 516. 2.
polyphyllum 516.
pseudo-arenarium 516. 7 *
pustulatum 516. 4.
pyrenaicum 516. 8.
rigidum 516. 3.
scaberrimum 516. 3.
setosum 516.
simplicissimum 516.
Spruneri 516.
stellulatum 516.
stellulatum 516. 4 *
tauricum 516.
taygeteum 516.
tinctorium 516.
tinctorium 516. 11.
Tournefortii 517. 14.
transsilvanicum 516. 7 *
tricerospema 516. 8.
vandense 516. 9.
Visianii 516.
Ophioglossum intermedium
 870. 1.
lusitanicum 870.
ovatum 870. 1.
vulgatum 870.
Ophiurus incurvatus 846. 114.
 2.
pannonicus 846. 113. 1.
Ophrys andrachnites 697. 8.
apifera 698.
arachnites 697.
arachnites 698. 13.
araneola 697. 6.
aranifera 697.
atrata 697.
Bertolonii 697.
Biancæ 697. 3.
biceratia 697. 5.
bicornis 698.
bombyliflora 698.
brachyotus 697. 3.
bremifera 698. 15.
Broteroi 698. 13.
canaliculata 698. 17.
chlorantha 698. 13.
ciliata 698. 19.
corniculata 698. 14.
cornuta 698. 16.
crabronifera 697. 4.
cyanogramma 697. 5.
diosthome 698. 17.
discors 697. 3.
distoma 698. 17.
exaltata 697.
ferrum equinum 697.
flavicans 697. 26. 1. 3 *
fucifera 697. 6.
fuciflora 697. 3.
funerea 699. 21 *
fusca 699.
galactostictos 698. 10.
grandiflora 697. 26. 1. 2.
hiulea 698. 10. 17.
hybrida 698. 18 x
incubacea 697. 5.
Inzengæ 698.
labrofossa 698. 17.
lunulata 697.
lutea 698.
muscifera 698.
myodes 698. 18.
neglecta 697.
oestriifera 698.
ostrifera 697. 3.
oxyrhynchos 697. 3 *
pallida 699.
Philippi 698. 14.
picta 698. 14. 15. 16.
pseudo-speculum 697. 6.
pulla 698. 17.
purpurea 698. 13.
Reinholdi 698. 10.
rostrata 698. 13.
Scolopax 698.
Scolopax 698. 15. 19.
sicula 699. 20.
Speculum 698.
speculum 697. 9. 699. 20.
Spruneri 698.
tabanifera 697. 26. 1. 698.
 17.
Tenoreana 697. 26. 1.
tenthredinifera 697.
tenthredinifera 697. 2.
Tommasinii 698.
tricolor 699. 21.
Trollii 698. 13.
vernixia 698. 19.
vespifera 699. 20.
Opismenus undulatifoli-
 us 787.
Opopanax Chironium 288.
Chironium 288. 34. 2 *
hispidus 288.
orientale 288. 34. 2. 2 *
siculum 288. 34. 2 *
Oporanthus luteus 713. 5. 1.
siculus 713. 5. 3.
Oporina autumnalis 469. 20.
microcephala 469. 21.
Opuntia amylacea 266. 1.
cochinillifera 266. obs. 1.
Dillenii 266. obs. 1.
Ficus indica 266.
inermis 266. 3.
italica 266. obs. 2.
maxima 266.
nana 266.

- Tuna 266 obs. 1.
vulgaris 266.
vulgaris 266. 4.
Orchis acuminata 691. 8.
retensis 691. 7*
alata 693. 28.
alba 696. 20. 2.
albida 605. 19. 4.
amoena 691. 9.
anatolica 694.
angustifolia 692.
angustifolia 692. 17. 693.
 22.
austriacea 691. 9 ×
Biermanni 693. 21.
bipunctata 694. 38.
Bivonæ 690. 6*
Bonanniana 693. 21.
Bornemannii 691. 12 ×
Boryi 694. 37.
bracteata 693. 24.
Brancifortii 694.
brevicornis 694.
brevicornu 694. 32.
cassidea 691. 11.
Champagneuxii 692. 14.
cimicina 691. 11.
cinerea 690. 3.
Columnæ 691. 9.
commutata 691. 7*
Comperiana 690.
conica 691. 7*. 8.
cordata 697. 25. 1.
cordigera 692.
coriophora 691.
corsica 691. 8.
cruenta 692. 17*. 18.
Cyrilli 694. 33.
decipiens 692. 15.
Dietrichiana 691. 9 ×
divaricata 692. 16. 19.
Duquesnei 694. 17. 1 ×
Durandii 692. 17.
elegans 693. 27.
elodes 693. 21.
ennensis 691. 8.
ensifolia 693. 28.
expansa 692. 15.
fallax 694. 32*
fasciculata 693. 24.
fragrans 690. 15. 1. 691.
 11.
fusca 690. 2.
fusco-cinerea 690. 2 ×
galeata 690. 3.
galeato-fusca 690. 2 ×
Gennarii 692. 15 ×
germanorum 693. 27.
Gervasiana 693. 21.
glaucophylla 693. 29.
globosa 691.
globosa 691. 8.
Grisebachii 693.
Gussonii 691. 7*
hæmatodes 692. 17.
Halleri 691. 10.
Hanrii 691. 8.
Hostii 694. 37.
hybrida 690. 2 ×
hyperborea 696. 4.
Jacquini 690. 2 ×
iberica 693.
incarnata 692.
incarnata 693. 23.
intacta 696. 22. 1.
italica 690. 6.
Koenigii 696. 4.
lactea 691.
læta 694. 34.
lanceata 692. 17.
lancibracteata 692. 20.
lapponum 693. 21*
latifolia 692.
laxiflora 693.
leptophylla 693. 22.
leucostachys 694. 33.
longibracteata 690. 15. 1.
 693. 21.
longicornu 691.
longicruris 690.
macra 690. 4.
macrostachys 692. 20.
maculata 692.
majalis 692. 16.
Markusii 693. 24*
Martrinii 691. 11*
mascula 693.
mascula 693. 27.
mediterranea 693. 27.
militaris 690.
miniata 695. 18. 1.
montana 696. 20. 2.
moravica 690. 2.
Morio 691.
morio-laxiflora 693. 28.
morio-papilionacea 692.
 15 ×
Natalis 693. 24.
nervata 690. 3.
Nicodemi 691. 13.
nigra 695. 18. 1.
ochroleuca 695. 20. 1.
olbiensis 694.
olivetorum 693. 29.
ovalis 693. 29.
pallens 693.
palustris 693.
panormitana 694. 32.
papilionacea 692.
papilionacea-morio 692.
 15 ×
Parlatoris 691. 7.
parviflora 691. 8. 9.
parvifolia 693. 28 ×
pauciflora 694.
picta 692.
Polliniana 691. 11.
provincialis 694.
pseudo-pallens 694. 34.
pseudo-sambucina 693.
punctulata 690.
purpurea 690.
purpureo-militaris 690. 2 ×
pyramidalis 694. 17. 1.
quadrupunctata 694.
recurva 693. 21.
Ricasoliana 691. 8.
Rivini 690. 3.
Rivino-Simia 690. 4 ×
Robertiana 690. 15. 1.
romana 693. 24.
rubra 692. 15.
saccata 694.
saccifera 692.
sambucina 693.
sambucina 693. 24.
satyrioides 696. 21. 2.
Scopolii 691. 7.
sesquipedalis 692. 17.
sicula 693.
Simia 690. 3. 4. 691. 7.
simio-militaris 690. 4 ×
Simio-Rivini 690. 4 ×
speciosa 693. 29.
Spitzelii 694.
Stabiana 693. 29.
Steveni 690. 3.
Tabernæmontani 693. 28.
taurica 691. 7.
Tenoreana 691. 8.
tephrosanthos 690.
Traunsteineri 692. 19.
trichoceras 694. 37.
tridentatu 691.
undulatifolia 690. 6.
ustulata 691.
variegata 691. 7.
virescens 695. 20. 1.
viridis 696. 21. 1.
Oreochloa disticha 796.
pedemontana 796.
Oreoselinum legitimum 286.
 8.
Origanum compactum 592.
creticum 592. 6*
Dictamnus 592.
dubium 592.

- heracleoticum* 592. 6. 7.
hirtum 592.
hirtum 592. 6 *
humile 592. 6 *
illyricum 592. 7.
latifolium 592. 7 *
macrostachyum 592. 6.
Majorana 592. 13 obs.
majoranoides 592. 13 obs.
majoricum 592.
Maru 592.
Maru 592. 13.
microphyllum 592.
neglectum 592. 7.
parviflorum 592. 7.
pulchrum 592.
sardoum 592. 7 *
scabrum 592.
siculum 592. 5 *
smyrnæum 592. 7.
thymiflorum 592. 6 *
Tournefortii 592.
virens 592.
virens 592. 5 *. 6 *
viridulum 592. 6 *
vulgare 592.
vulgare 592. 5.
Orlaya Bubania 278. 8. 3 *
cretica 278. 8. 3.
grandiflora 278.
maritima 278.
platycarpus 278.
Ormenis bicolor 363. 11. 1.
fusca 363. 45.
mixta 363.
nobilis 359. 10. 5.
Ormosolenia cretica 287. 29.
Ornithogalum affine 727. 10.
angustifolium 727. 10.
arabicum 727.
arcuatum 727. 3 obs.
atticum 727. 7 *
Aucherii 728. 20.
bæticum 727. 10.
biflorum 728. 18.
Boncheanum 728. 16. 2.
brevistylum 726. 1 *
callosum 725. 4.
chloranthum 728. 16. 2.
Clusianum 725. 3.
coeruleum 729. 6.
collinum 728.
collinum 728. 15.
comosum 727.
contortum 727. 5 *
divergens 727.
etruscum 727.
escapum 728.
fimbriatum 727.
fistulosum 725. 10.
foliosum 726. 16.
garganicum 727. 5 *
Gussonei 728. 16.
Kochii 728.
lacteam 726. 1.
Liottardi 726. 13.
minimum 725. 8. 728. 18.
mutabile 728. 18.
montanum 727.
nanum 728.
nanum 727. 10. 728. 19.
narbonense 726.
narbonense 726. 1 *
oligophyllum 728.
orthophyllum 727.
paterfamilias 728. 13.
Persoonii 725. 2.
prasandrum 728. 16. 1 *
proliferum 728. 13.
pyramidale 726. 1.
pyrenaicum 727.
refractum 727.
refractum 728. 17.
rigidum 725. 6.
Roegnerianum 727. 6.
ruthenicum 727.
saxatile 728. 15.
silvaticum 725. 2.
spicatum 728. 19.
stachyoides 726. 1.
stenopetalum 724. 13. 1.
Sternbergii 725. 4.
sulphureum 727. 3.
tenuifolium 728.
tennifolium 727. 10. 728. 15.
tunicatum 725. 3.
umbellatum 727.
umbellatum 727. 10.
unifolium 728.
villosum 725. 8.
Visianicum 727.
Ornithopus compressus 186.
durus 186. 26. 3. 4.
heterophyllus 186. 26. 3.
isthmocarpus 186.
perpusillus 186.
roseus 186. 26. 3.
sativus 186.
Ornus europæa 495. 6. 1.
Orobanche adenostemon 559. 20.
alba 558.
alba 558. 15 et *
Alexandri 558.
alpestris 560. 41.
alsatica 560. 43. 562. 66 *
altissima 558. 15.
ambigua 561.
amethystea 561.
amethystea 560. 35.
antirrhina 559.
apiculata 560. 43. 562. 66.
arenaria 562. 69. 557. 7.
Artemisia campestris 561. 60.
atrorubens 559. 21.
attica 561.
australis 560.
banatica 559. 19 *
barbata 559.
barbata 560. 46.
Bartlingii 560. 43.
Berberidis 558. 7.
bicolor 561.
bipontina 559. 20.
brachysepalæ 560. 43.
bracteata 562.
bracteata 560. 40.
bracteosa 558. 10.
Buekiana 560. 39. 43.
Buekii 560. 39.
caesia 556. 4. 5.
canescens 560.
Cardui 559. 25.
Carotæ 561. 60 *. 562. 66.
caryophyllacea 559.
caryophyllacea 558. 1.
castellana 562.
caudata 560. 43.
centaurina 561.
cervina 562.
Cervaria 560.
Cirsii 559. 26 et *
citrina 558. 1. 559. 20.
coccinea 562. 4. 1.
coerulea 556. 3.
coerulescens 562.
Columbaria 558. 8.
concolor 558.
condensata 558.
condensata 558. 1 *. 562. 66 *
congesta 558.
crassistyla 558. 2.
crinita 560.
crinita 558. 10. 559. 31.
Crithmi 561.
Crithmi 562. 66 *
cruenta 557.
cumana 562.
cumana 561. 48. 562. 70.
decora 560. 38.
densiflora 559.
denudata 560.
Deucalion 559. 25 *

Echinopsis 560. 41 *
elatio 560. 34. 39. 43.
 561. 60. 562. 61.
epithymoides 559. 29 *
Epithymum 559.
erubescens 559. 29 *
Eryngii 562. 61.
euglossa 559.
flava 560.
foetida 558.
foetida 558. 5. 6.
forojuliensis 560. 34.
Fraasii 557. 10.
fragrans 561. 55.
fragrantissima 560. 39 *
Freyii 561. 60 *
Froelichii 560. 36 *
fuliginosa 559.
Galii 559. 20.
gallica 562. 70.
gilva 559. 20.
glaberrima 561.
gracilis 558. 1. 562. 66 *
grandiflora 558. 15.
grandiuscula 558.
Grenieri 562. 66 *. 70.
Grisebachii 562. 66 *
Gussonei 558. 15 *
Hænseleri 559.
Hedera 560.
Helicis 561. 46.
hians 558.
hispanica 562. 70.
hyalina 561.
hygrophila 559. 26.
Klugei 562. 66.
Knappii 562. 61 *
Kochii 560.
Kraussei 559. 20.
Lamyana 562. 61.
Laserpitii 560. 36.
Laserpitii-Sileris 560.
laurina 562.
laurina 561. 46.
lavandulacea 557. 10.
laxiflora 559. 20.
Leonuri 562. 66.
leucantha 559.
Libanotidis 560.
Ligustri 559. 20 *
litorea 561.
livida 562.
Lobelii 558. 1.
longiflora 557. 6.
loricata 561.
lucorum 558.
lutea 560. 39. 556. 1. 1.
macrantha 559. 20.
macrolepis 557. 2. 1.

macrosepala 562. 66 *
major 560.
major 558. 10. 561. 46.
Mathesii 559. 26 *
Medicaginis 560. 39. 561.
 46.
minor 562.
minor 562. 67.
Morisiana 557. 15.
Muteli 557. 14.
nana 557. 9.
nebrodensis 560. 33 *
Noëana 558. 1 *
nudiflora 562. 66.
olbiensis 557. 14 *
Ozanonis 560. 41 *
pallens 561. 50.
pallidiflora 559.
Picridis 561.
platystigma 559.
platystigma 558. 1.
procera 559. 26.
pruinosa 558. 15.
pubescens 561.
pumila 562. 67.
punctata 559.
purpurea 557. 7.
ramosa 557. 13.
Rapum 558.
Reichardiae 561. 50 *
reticulata 558.
Reuteri 561. 56.
rigens 558. 10.
Ritro 560.
robusta 557. 7.
rubens 560.
rubiginosa 559. 29.
rubra 559. 29.
rufescens 557. 14.
Salisii 562.
Salviae 560.
sanguinea 560.
Santolinæ 561.
Satyrus 558.
Sauteri 559. 25.
Scabiosæ 559. 25.
Schultzii 557. 11.
segetum 558. 15.
sparsiflora 559. 29.
Spartii 558.
speciosa 558.
speciosa 559. 26. 562. 64.
Spruneri 558.
squalida 561. 55 *
stigmatodes 560. 34.
stricta 557. 8.
strobiligena 559. 20.
superba 558. 5.
superficialis 561. 55.

Teucris 559.
thyrsoides 558.
tinctoria 556. 2.
Tommasinii 558. 15 *
torquata 559. 20.
tubiflora 559. 20.
Ulicis 558. 1.
unicolor 562. 66.
variegata 558.
versicolor 561. 55.
Vitalbæ 561.
vulgaris 558. 1. 559. 20.
Welwitschii 562. 66 *
Wierzbickii 558. 1.
Yuccæ 561.
Orobis æstivalis 204. 5.
albus 205. 13.
alpestris 204.
asphodeloides 205. 13.
atropurpureus 208. 35.
aureus 204.
austriacus 205. 13.
canescens 205. 1. 4.
ciliatus 202. 21.
Clusii 208. 37.
cyanens 205. 15.
digitatus 205. 15.
ensifolius 205. 14 *
exaltatus 205.
filiformis 205.
Fischeri 208. 35.
flaccidus 204. 4 *
Friedrichsthalii 204. 3.
glaberrimus 204. 2.
glabratus 204. 6.
Gmelini 205. 13.
gracilis 205. 12.
hirsutus 204.
intermedius 205.
Jordani 205.
Jordani 204. 3.
lacteus 205. 13.
lævigatus 204. 2. 2 *
lathyroides 205. 6 obs.
laxiflorus 204. 6.
linifolius 205. 12.
luteus 204.
maritimus 202. 12.
montanus 204. 2.
multiflorus 204. 5.
niger 205.
ochroleucus 205.
pallescens 205. 14.
pannonicus 205.
prostratus 205. 12.
pyrenæicus 204. 5. 205. 12.
rigidus 204. 5.
saxatilis 202. 21.
sessilifolius 205.

- silvaticus* 204. 4.
subalpinus 204. 2. 3.
tenuifolius 205. 12. 13.
Tournefortii 204. 2.
transsilvanicus 204. 2*
tristis 205. 9.
tuberosus 205.
variegatus 204.
varius 205. 13*
venetus 204. 5.
vernus 204.
vernus 204. 5.
versicolor 205. 13.
vicioides 205. 14. 208. 37.
Orsinia camphorata 395. 57.
3.
Ortegia dichotoma 254.
hispanica 254.
Orthocentron glomeratum
410. 58.
Orvala lamioides 574. 12. 1.
Oryza clandestina 788. 17. 1.
Osmunda regalis 869.
Ostericum palustre 283. 21.
1.
pratense 283.
Ostrya carpinifolia 663.
italica 663. 4. 1.
vulgaris 663. 4. 1.
Osyris alba 642.
lanceolata 643. 1. 2.
quadrifida 643. 1. 2.
quadripartita 643.
Otanthus maritimus 369. 17.
1.
Otospermum glabrum 374.
7.
Oxalis Acetosella 141.
cernua 141. 3 obs.
corniculata 141.
europæa 141. 2.
libyca 141. 3 obs.
Navieri 141. 2.
stricta 141.
violacea 141. 3 obs.
Oxycoccus macrocarpus
490.
microcarpus 490. 6. 1*
palustris 490.
Oxyria digyna 636.
reniformis 636. 5. 1.
Oxytropis ambigua 197.
campestris 196.
carinthiaca 197. 12.
carpathica 197. 11*
caudata 197.
dealbata 189. 4.
foetida 196.
Halleri 196.
Jacquini 197. 11*
lapponica 197.
montana 197.
montana 197. 10. 11*
neglecta 197. 12*
Pallasii 196.
pilosa 196.
pyrenaica 197.
sericea 196. 2.
sordida 196.
sordida 196. 1.
sulphurea 197.
uralensis 196. 2. 197. 8.
velutina 196. 2.
viscosa 196. 3.
Pachyloma arvense 13. 75.
Pachypleurum alpinum 288.
simplex 293. 51. 1.
Padus germanica 212. 3.
vulgaris 212. 3.
Pæderota Ageria 544.
Bonarota 544.
chamaedrifolia 544. 13. 2*
urticaefolia 544. 13. 1.
Zannichellii 544. 13. 1.
Pæonia anomala 21.
banatica 22. 6.
Broteri 22.
corallina 21.
coriacea 22.
corsica 22. 3*
decora 22.
festiva 22. 6.
flavescens 22. 3*
hybrida 22. 8.
intermedia 21.
lobata 22. 4.
lusitanica 22. 6*
microcarpa 22. 6*
officinalis 22.
officinalis 22. 6*
paradoxa 22. 6*
peregrina 22. 6*
porrigens 22. 6.
promiscua 22. 3.
pubens 22. 6.
rosea 22. 6*
Russi 22. 3*
tenuifolia 22.
triternata 22. 3.
Paleyia albida 459. 48.
Palimbia Chabræi 287. 27.
28.
salsa 288.
Paliurus aculeatus 145. 1. 1.
australis 144.
Palladia atropurpurea 600. 9.
Pallasia caspica 632. 1. 1.
Pallenis aurea 391. 54. 1.
spinosa 391.
Pancicia serbica 307.
Pancratium illyricum 709.
maritimum 708.
Panicum arenarium 787. 14.
2.
capillare 788. 14 obs.
ciliare 788. 15. 1.
colonum 787. 13. 2.
compressum 787.
crus galli 787. 13. 1.
debile 788. 15. 3.
deflexum 789. 18 obs.
eruciforme 787. 13. 3.
glabrum 788. 15. 2.
gracile 788. 15. 4.
hirtellum 787. 12. 1.
lineare 788. 15. 2.
miliaceum 788. 14 obs.
repens 787.
sanguinale 788. 15. 1.
undulatifolium 787. 12. 1.
villosum 786. 9. 1.
zonale 787. 13. 2.
Papaver alpinum 24.
alpinum 24. 11*
ambiguum 24. 5 obs.
angustulum 24. 5 obs.
apulum 24.
Argemone 24.
argemonoides 24. 9.
aurantiacum 24. 11.
Burseri 24. 11.
collinum 24. 5*
commutatum 24. 3*
corsicum 24. 5 obs.
depressum 24. 5 obs.
dubium 24.
dubium 24. 5*
erosulum 24. 7*
hortense 23. 1.
hybridum 24.
improperum 24. 5 obs.
intermedium 24. 3.
lævigatum 24.
lævigatum 24. 5.
Lamottii 24. 5.
Lecoquii 24. 5*
maculosum 24. 5.
mieranthum 24. 8*
modestum 24. 7*
nothum 24. 7.
nudicaule 24. 11*
obtusifolium 24.
pinnatifidum 24.
pyrenaicum 24. 11.
radicatum 24. 11*

- rarpilum* 24. 5 obs.
Rhoeas 24.
Roubiae 24. 3.
rupifragum 24.
setigerum 23.
siculum 24. 10 +
somniferum 24. 1 obs.
strigosum 24. 3.
trilobum 24. 3.
Papyrus antiquorum 758. 1.
sicula 758. 1.
Paracaryum myosotoides 522.
 23. 5.
Paradisia hemeroanthericoides 718.
Liliastrium 718.
Parietaria cretica 658.
diffusa 658.
erecta 657.
filiformis 658. 6 *
judaica 658. 2.
lusitanica 658.
lusitanica 658. 3. 1.
mauritanica 658.
officinalis 658. 1. 2.
populifolia 658.
punctata 658. 2.
ramiflora 658. 2.
serbica 658. 6.
Soleirolia 658. 3. 1.
Paris quadrifolia 717.
Parnassia obtusiflora 82.
palustris 82.
tenuis 82. 4. 1.
Paronychia aretioides 255.
argentea 255.
brevistipulata 255.
capitata 255.
capitata 255. 7. 9.
cephalotus 255.
chionæa 255.
cymosa 255.
echinata 255.
hispanica 255. 5. 1.
hungarica 255. 7.
imbricata 255.
Kochiana 255. 9.
macrosepala 255.
nivea 255. 8.
polygonifolia 255.
serpyllifolia 255.
serpyllifolia 255. 9.
Parrya arctica 35.
macrocarpa 35.
Paspalum vaginatum 788.
 15 obs.
Passerina annua 642. 4. 1.
arvensis 642. 4. 1.
calycina 642. 3. 7.
canescens 641. 3. 2.
cantabrica 642. 13.
coridifolia 642. 13.
dioica 642. 3. 8.
elliptica 642. 3. 12.
empetrifolia 642. 3. 8.
hirsuta 641.
hirsuta 641. 3. 6.
juniperifolia 641. 3. 6 *.
 642. 3. 7.
nitida 641. 3. 4.
nivalis 641. 3. 6 *
polygalæfolia 641. 2. 1.
pubescens 642. 3. 9. 4. 2.
Stellera 642. 4. 1.
Tartouira 641. 3. 1.
thesioides 642. 3. 11.
Thomasii 641. 3. 1.
Thymelæa 642. 3. 10.
tinctoria 641. 3. 6.
velutina 641. 3. 5. 642. 3.
 12.
villosa 641. 3. 3.
virgata 642. 3. 9.
Pastinaca divaricata 289.
Fleischmanni 289.
graveolens 288. 35. 3. 289.
 36. 2.
hirsuta 289. 36. 4 *
hispidula 288. 34. 2.
involuerata 288. 35. 2.
Kochii 289. 36. 2.
latifolia 289.
lucida 289.
lucida 289. 36. 3.
obtusifolia 288. 35. 4.
opaca 289. 36. 4 *
Opopanax 288. 34. 1.
parvifolia 289. 36. 2.
Petteri 287. 23.
pimpinellifolia 288. 35. 1.
 2.
pratensis 289. 36. 4.
propinqua 289. 36. 4 *
rectistylis 288. 35. 1.
saliva 289.
selinoides 287. 28 *
sicula 279. 9. 6.
silvestris 289. 36. 4.
tereticaulis 289. 36. 4 *
teretiuseula 289. 36. 4 *
umbrosa 289. 36. 4.
urens 289. 36. 4 *
Pastorea præcox 66. 72. 1.
Saviana 66. 71. 2.
Pavonia veneta 127. 2. 1.
Pectinastrium napifolium 482.
 169.
Pedicularis acaulis 555.
adscendens 553.
adscendens 553. 2.
Allionii 555. 34.
amoena 555.
ascendens 553. 2.
asparagoides 554. 17.
asplenifolia 553.
asplenifolia 555. 36.
atrorubens 553.
Barrelieri 553. 3.
bicuspidata 554. 19.
Bonjeani 553. 8.
brachyodonta 554. 17.
caespitosa 555. 41.
campestris 554.
cenisia 553.
comosa 554.
comosa 554. 18.
coronensis 554. 17 *
dolichorrhiza 554.
elegans 553.
erubescens 553. 5 x
exaltata 554.
fasciculata 553. 10. 11.
flammea 555.
flammea 555. 36.
flava 554. 19.
foliosa 554.
foliosa 554. 29. 31.
Friderici Augusti 554.
geminata 553. 12.
græca 554.
gyroflexa 553.
gyroflexa 553. 7. 8. 10.
Hacquetii 555.
Hausmanni 555. 34 x
heterodonta 554. 18 *
hirsuta 555.
hirsuta 555. 34.
Huguenini 553. 10 *
Jacquini 553.
iucarnata 553.
incarnata 553. 5.
insubrica 553. 15.
læta 554.
lanata 555.
lapponica 553.
Letourneuxii 553. 6 *
leucodon 554.
leucodon 554. 17 *
limnogenæa 555.
lusitanica 553.
mixta 553. 7.
montenegrina 554. 20 *
occulta 554.
ochroleuca 554. 17 *
Oederi 555. 36 *
orthantha 555.
palustris 553.

- pennina 553. 13.
petiolaris 554.
Portenschlagii 553.
pratensis 554. 18.
pseudocomosa 554. 18.
pyrenaica 553.
recutita 555.
rosea 555.
rostrata 553.
rostrata 553. 11.
rupestris 554. 23.
Sceptrum Carolinum
 552.
Schlosseri 554. 17 *
Sibthorpii 554.
silvatica 554.
sudetica 554.
transsilvanica 554. 29.
tuberosa 552.
versicolor 555.
versicolor 555. 36 *
verticillata 555.
Peganum Harmala 143.
Peltaria alliacea 57.
Pennisetum cenchroides
 786.
distylum 786. 10. 1.
glaucum 787. 11. 3.
italicum 786. 11. 1.
viride 787. 11. 2.
Pentagonocarpus pentacarpus
 127. 2. 1.
Zannichellii 127. 2. 1.
Pentapera sicula 488.
Peplis alternifolia 252.
australis 252. 2. 3.
Boræi 252.
Boræi 252. 2. 3.
borysthénica 252.
erecta 252.
longedentata 252. 2. 1 *
nummularifolia 252. 2. 3.
Portula 252.
Timeroyi 252. 2. 3 *
tithymaloides 252. 2. 3.
Periballia hispanica 806.
involverata 806. 64. 1.
Perideræa aurea 375. 11.
fuscata 363. 45.
Periploca angustifolia 496.
 1. 2.
græca 495.
lævigata 496.
rigida 496. 1. 2.
Peristylus albidus 695. 19. 4.
satyrioides 696. 21. 2.
Persea gratissima 642 obs.
indica 642 obs.
Persica vulgaris 212. 1 obs.
- Petagnia saniculæfolia*
 318.
Petasites albus 397.
alpinus 397. 64. 2.
consimilis 397. 63. 1.
discolor 397. 64. 3.
fragrans 396. 62. 1.
frigida 396. 62. 3.
intermedia 397. 63. 1.
Kablikiana 397. 63. 1 x
lævigatus 397. 63. 2 obs.
macrophyllus 397. 63. 1.
niveus 397.
officinalis 397.
paradoxus 397. 63. 3.
pratensis 397. 63. 1.
ramosus 397. 63. 2.
Reuteriana 397. 63. 1.
riparia 397. 63. 1.
sebethia 397. 63. 1.
spurius 397.
straminea 396. 62. 2.
tomentosus 397. 63. 4.
vulgaris 397. 63. 1.
Petitia scabra 291. 41. 1.
Petrocallis pyrenaica 51.
Petrocoptis Lagasce 86.
pyrenaica 86.
Petromarula pinnata 483.
Petroselinum crispum 309.
 92. 3.
peregrinum 309.
sativum 309.
segetum 309.
Thorei 308. 85. 9.
Petrosimonia brachiata 632.
 29. 2.
crassifolia 632. 29. 5.
glaucæ 632. 29. 6.
volvæ 632. 29. 4.
Petteria graminifolia 117. 6.
Peucedanum alsaticum 286.
arenarium 286.
austriacum 285.
baicalense 286.
Bellardi 285. 4 *
Besserianum 287.
Bourgæi 286. 8 *
campestre 287.
carvifolium 287.
cephalotes 285. 26. 1.
Cervaria 286.
cnidioides 286.
coriaceum 287.
creticum 287.
creticum 285. 9.
Crouanorum 286. 11 *
gallicum 287. 17.
heterophyllum 287. 28 *
hispanicum 285.
idanense 286. 11.
involutum 285.
italicum 287. 20.
lancifolium 286.
latifolium 285.
longifolium 287.
macedonicum 286.
minus 287. 28.
montanum 285. 4.
Morisonii 287. 22 *
nebrodensis 287. 28 *
Neumayeri 286.
nodosum 285. 9.
officinale 287.
officinale 287. 17.
Oreoselinum 286.
Ostrnithium 285. 28. 1.
palustre 286.
paniculatum 287.
parisiense 287.
parisiense 287. 23.
petreum 287. 27.
Pelletier 287. 23.
podolicum 287. 28.
rablense 285. 4 *
Rochelianum 287. 22 *
ruthenicum 287.
ruthenicum 287. 22 *
Schottii 287.
selinoides 288. 31. 1.
sibiricum 284. 23. 6. 7.
silvestre 286. 11.
stenocarpum 287.
sulcatum 286.
tauricum 287. 22.
venetum 286.
vittijugum 287.
Phaca alpina 196.
alpina 196. 2.
astragalina 193. 89.
australis 193. 87.
bætica 196.
Bayeri 194. 98.
frigida 196.
frigida var. 196. 2 *
Gerardi 193. 87.
glabra 193. 87.
Halleri 193. 87.
lapponica 197. 12.
montana 197. 11 *. 12.
sordida 196. 6.
umbellata 196. 38. 2 *
uralensis 196. 39. 2.
Phacelurus digitatus 845.
 112. 1.
Phæcasium lampsanoides
 457. 34.

- Phæopappus chrysocollus* 418. 95. 1 *
inuloides 418. 95. 1.
saxatilis 418.
trinervius 418.
Phagnalon calycinum 385. 4 *
geminiflorum 385. 4.
græcum 385.
Lagascæ 385. 2.
pumilum 385.
rupestre 385.
saxatile 385.
sordidum 385.
spathulatum 385. 4.
subdentatum 385. 2.
telonense 385. 40. 1.
tricephalon 385. 40. 1.
Phalacrocarpum oppositifolium 372. 16.
Phalacroderis coa 471. 136. 1.
Phalangium bæticum 719. 4. 2.
Liliago 719. 4. 1.
planifolium 719. 5. 1.
ramosum 719. 4. 3.
Phalaris appendiculata 791. 6.
aquatica 791.
aquatica 791. 3. 5.
arundinacea 790. 26. 1.
brachystachys 791.
brachystachys 791. 4 obs.
bulbosa 791. 1. 2. 5.
canariensis 791. 4 et obs.
coerulescens 791. 2.
cryptoides 791. 28. 1.
gracilis 791. 5.
minor 791.
nitida 791. 4.
nodosa 791. 1.
paradoxa 791.
quadrivalvis 791. 4.
Sibthorpii 791. 6.
truncata 791.
tuberosa 791.
variegata 791. 2.
Pharnaceum Cerviana 254.
Phegopteris calcarea 868.
conjuncta 868. 16. 3.
disjuncta 868. 16. 2.
Dryopteris 868.
polypodioides 867.
Robertiana 868. 16. 3.
vulgaris 867. 16. 1.
Phelipæa albiflora 557. 13.
arenaria 557.
cæsia 556.
cæsia 557. 14.
coerulea 556.
concolor 557. 15.
Fraasii 557. 10.
lanuginosa 556.
lavandulacea 557.
longiflora 557.
lusitanica 556. 2.
lutea 556.
Millefolii 556. 3.
Muteli 557.
nana 557.
olbiensis 557. 14 *
pyramidalis 557.
ramosa 557.
Reuteri 557.
Reuteriana 556. 4.
robusta 557. 7.
Rosmarini 557. 14.
rubenti-arenaria 557. 7 ×
rufescens 557. 14.
Schultzii 557.
stricta 557.
tinctoria 556.
Phellandrium aquaticum 297. 63. 1.
coniioides 297. 63. 1.
globulosum 299. 17.
Philadelphus coronarius 245.
Phillyrea angustifolia 494.
latifolia 494.
latifolia 494. 2. 2.
levis 494. 2. 2.
media 494.
obliqua 494. 2. 3.
pedunculata 494. 2. 2.
spinosa 494. 2. 1.
stricta 494. 2. 1 *
variabilis 494. 2. 3 obs.
vulgaris 494. 2. 3 obs.
Phillyrea calathina 709. 5.
Phippsia algida 837. 99. 3.
Phleboanthe Laxmanni 567. 3. 1.
Phleum alpinum 792.
ambiguum 792. 4 * 5.
annuum 793. 8.
arenarium 792.
asperum 793.
Bellardi 793. 9.
Bertolonii 792. 1.
Boehmeri 792. 5.
ciliatum 792. 5.
collinum 792. 5 *
commutatum 792. 2.
cuspidatum 792. 4.
echinatum 792.
exaratum 793. 7.
fallax 792. 1 *
felinum 792. 3.
Gerardi 793. 31. 1.
glabrum 792. 5.
græcum 793.
hirsutum 792. 4.
intermedium 792. 1.
Michellii 792.
microstachyum 792. 1.
nodosum 792. 1.
parnassicum 792. 1 *
phalarideum 792. 5.
phalaroides 792.
præcox 792. 1.
pratense 792.
serotinum 792. 1.
serrulatum 792. 5 *
tenue 793.
ventricosum 793. 8.
viride 793. 8.
Phlomis Barrelieri 581. 9.
clandestina 583. 2.
cretica 581. 18. 1.
crinita 581.
ferruginea 580.
fruticosa 581.
fruticosa 581. 18. 1.
herba venti 581.
italica 581.
lanata 581.
lunarifolia 581. 5.
Lychnitis 581.
microphylla 581. 5.
Portæ 581. 2.
pungens 581.
purpurea 581.
samia 581.
tuberosa 581.
Phoenix dactylifera 753 obs.
Phoenixopus decurrens 435. 15.
 muralis 436. 17.
Phoenixopus vimineus 435. 15.
Pholiurus pannonicus 845.
Phragmites communis 798.
flavescens 798. 43. 2.
gigantea 798.
humilis 798. 43. 2 *
isiaca 798. 43. 2.
nigricans 798. 43. 2.
pumila 798. 43. 2 *
ruseinonensis 798. 43. 1.
Phucagrostis major 680.
minor 681. 3. 2.
Phyllitis Scolopendrium 862. 9. 1.
Phyllodoce coerulea 491. 13. 1.
tazifolia 491.

- Physalis Alkekengi* 525.
edulis 525. 8. 3.
Halicacabum 525. 8. 1.
peruviana 525.
Sedntneri 525.
somnifera 525. 7. 2.
suberosa 525. 7. 1.
Physanthyllistetraphylla 165.
 19.
Physocaulus nodosus 299.
Physospermum actææfolium
 315. 107. 1 *
ægopodioides 315.
angelicæfolium 315. 107.
 1 *
aquilegifolium 315.
cornubiense 315. 107. 3 *
verticillatum 315.
Pytheuma angustifolium
 484.
anthericoides 484.
atropurpureum 484. 9.
Balbisii 484.
betonicæfolium 484. 10 *.
 13.
canescens 483.
Carestiæ 485. 15. 17.
Charmelii 484. 12 *. 485.
 14.
charmelioides 484. 12.
collinum 484. 3.
comosum 485.
comosa 484. 13.
confusum 484. 13.
cordatum 484. 11. 13. 485.
 14.
cordifolia 484. 13.
corniculatum 484. 12.
dubia 485. 3.
ellipticifolia 484. 13.
fistulosum 484. 13. 13 *.
 485. 13 *
foliosum 483. 2 *
giganteum 483.
glaciale 485. 14.
globulariæfolium 485. 18.
 18 *
graminifolium 485. 16.
Grisebachii 484. 10 +
Halleri 484.
hemisphæricum 485.
hemisphæricum 485. 13.
humile 485.
Jacquini 485. 4.
inæquatum 484. 13.
intermedium 485. 14.
lanceolata 484. 13.
limoniifolium 484.
Michelii 484.
minutum 487. 13.
nanum 485. 18.
nigrum 484.
orbiculare 484.
orbiculare var. 485. 13.
ovatum 484. 7.
paniculatum 483. 2. 2 *
pauciflorum 485.
pauciflorum 485. 18 *
persicifolium 484. 10.
pseudorbiculare 484. 13.
repandum 484. 3.
rigidifolium 487. 13.
rumelicum 485. 3.
salicifolium 483. 2. 2 *
salignum 483. 2.
Scheuchzeri 484.
scorzonerifolium 484. 10.
serratum 485.
sphæra Jovis 485. 7. 3.
Sieberi 485.
spicatum 484.
sublyratum 484. 7 *
tenuifolium 484.
tetramerium 484. 8.
transilvanicum 485. 16.
urticifolium 484. 7.
veronicæfolium 484. 10.
virgatum 484. 3.
Phytolacca decandra 622.
dioica 622 obs.
Pienomon Alcarua 405.
Picotia nitida 522. 23. 8.
verna 522. 23. 6.
Picridium crassifolium 461.
 119. 4.
gaditanum 461.
hispanicum 461. 119. 1.
intermedium 461.
ligulatum 461. 119. 3. 4.
macrogaranum 461. 119. 4 *
macrophyllum 461. 119. 4 *
maritimum 461. 119. 4.
pinnatifidum 461. 119. 1.
tingitanum 461.
vulgare 461.
Pieris arvalis 466. 3.
aspera 467. 8.
auriculata 467. 3.
corymbosa 467. 5.
crepoides 467. 3. 3 *
crinita 467. 3.
gracilis 466. 3.
grandiflora 466. 3. 467. 6.
hieracioides 466.
hieracioides 467. 4. 5.
hispidissima 466. 1. 467.
 5.
humifusa 466. 128. 1.
integrifolia 467.
laciniata 466.
laxa 467. 7.
longifolia 467.
orophila 467. 3 *
paleacea 466. 3.
pauciflora 467.
pinnatifida 467. 5.
pyrenaica 454. 2. 467. 3 *
Rhagadiolus 467. 7.
rigida 466.
ruderalis 466. 3.
scaberrima 466. 1.
sonchoides 467. 3.
spinulosa 467.
Sprengeriana 467.
stricta 467. 5.
umbellata 466. 3.
Villarsii 467. 3 *
Willkommii 467.
Pilularia globulifera 870.
minuta 870.
Pimpinella alpina 306. 2 *
anisoides 306.
anisoides 306. 6.
Anisum 306.
Asopii 306. 2.
bubonoides 306. 5. 6.
carvifolia 307. 85. 3.
cretica 307.
cretica 315. 108. 1.
depressa 306. 7.
dichotoma 307.
dioica 308. 88. 3.
dissecta 306. 1 *
genevensis 306. 2.
glauca 306. 7. 308. 88. 1.
 4.
Gussonii 306.
hircina 306. 2.
lutea 306.
magna 305.
multicaulis 308. 88. 3.
nigra 306. 2.
olenea 306. 7 *
orientalis 306. 1.
parnassica 306. 7 *
peregrina 306.
petraea 306. 7.
polyclada 306. 7 *
polygama 308. 88. 4.
pratensis 306. 2.
Pretenderis 306. 7 *
pumila 308. 88. 4 *
rubra 306. 1.
rugosa 306. 1.
Sartorii 306. 7 *
Saxifraga 306.
tenuifolia 306. 7.

- tenuis* 307. 10.
Tragium 306.
villosa 306.
Pinardia anisocephala 369.
coronaria 369.
viscosa 369. 19. 2.
Picea excelsa 674. 6.
obovata 674. 7.
subarctica 674. 6.
vulgaris 674. 6.
Pinguicula albanica 599. 2. 5.
alpestris 599. 6.
alpina 599.
brachyloba 599. 6.
corsica 598. 2. 3 *
flavescens 599. 6.
grandiflora 598.
grandiflora 598. 2. 3.
hirtiflora 598.
hirtiflora 599. 2. 5.
gypsophila 598. 2. 4.
læta 599. 2. 5.
leptoceras 598.
longifolia 598. 2. 2 *. 3.
lusitana 599.
megaspilæa 599. 2. 5 *
vallisneriaefolia 598.
villosa 599.
vulgaris 599.
Pinus Abies 673. 1. 6.
austriaca 674. 3. 5.
brutia 675.
Cembra 674.
dalmatica 674. 3. 5.
Escarena 675. 6.
excelsa 674. 3. 2 obs.
Frieseana 675. 10.
halepensis 675.
Heldreichii 674. 3. 5 *
hispanica 675. 7 *
humilis 675. 13.
Laricio 674.
Laricio 674. 3. 5. 675. 6.
leucodermis 674. 3. 5 *
magellensis 674. 3. 5. 675. 13 *
maritima 674. 3. 4. 4 *. 675. 6. 7.
monspeliensis 674. 3. 4.
montana 675.
Mughus 675.
Mughus 675. 10.
nigricans 674.
obliqua 675. 12.
Omorica 673. 5.
orientalis 674. 7.
Pallasiana 674. 3. 4.
Peuce 674.
Picea 673. 1. 2. 6.
Pinaster 675.
Pinea 674.
Pinsapo 673. 4.
pithyusa 675. 7.
Pumilio 675. 13.
pyrenaica 675.
pyrenaica 674. 3. 4. 675. 7 *
rotundata 675. 12.
rubra 675. 10. 11.
Salzmanni 674. 3. 4.
sanguinea 675. 11.
sibirica 673. 3.
silvestris 675.
syrtica 675. 6.
uliginosa 675. 12.
uncinata 675.
Piptatherum coerulescens 806.
frutescens 806. 1.
holciforme 806. 3 *
miliaceum 806. 1.
multiflorum 805.
paradoxum 806.
Thomasii 806. 1 *
Piptoccephalum carpholepis 472. 139. 2 *
luteum 472. 139. 2.
Piptochlamys hirsuta 641. 2. 1.
Piptopogon decipiens 471. 134. 1.
Pircunia dioica 622 obs.
Pistacia atlantica 147. 2.
brevifolia 147. 3.
chia 147. 2.
hybrida 147. 3 obs.
Lentiscus 147.
multiflora 147. 3.
mutica 147.
narbonensis 147. 3 obs.
nemausensis 147. 3 obs.
Terebinthus 146.
vera 147. 3 obs.
Pistorinia breviflora 258. 2. 2.
hispanica 258.
Salzmanni 258.
Pisum arvense 200.
arvense 200. 47. 1.
biflorum 200. 47. 1.
elatius 200.
elatus 200. 47. 2 obs.
granulatum 200. 47. 1.
sativum 200. 47. 2 obs.
Tuffetii 200. 47. 1.
variegatum 200. 47. 1.
Plagius ageratifolius 375.
virgatus 375.
Plantago acanthophylla 618.
adriatica 620. 35.
agrestis 617. 1.
albicans 619.
alpina 618.
alpina 618. 10. 20.
altissima 619. 26 et *
ambigua 619. 26.
amplexicaulis 618.
arenaria 617.
argentea 619.
argentea 618. 21. 619. 22. 30.
arvensis 619. 29.
asiatica 620. 41.
aspera 618. 10.
atrata 618. 20. 619. 26.
Bellardi 619.
Bertolonii 620. 37.
bidentata 618. 10.
borealis 617. 9 *
Broteri 618.
brutia 619.
capitata 619. 26. 27.
capitellata 618. 13 *. 14.
carinata 618. 14.
ceratophylla 617. 5.
ciliata 619. 30.
Columnæ 617. 7.
commutata 617. 7.
contorta 619. 26.
Cornuti 619.
Cornuti 617. 7.
Coronopus 617.
coronopifolia 617. 5.
crassifolia 617.
cretica 619.
cucullata 620. 36.
Cupani 617. 7 *
Cynops 617.
dalmatica 619. 26.
dentata 618. 10.
denticulata 618. 10. 619. 28.
dubia 619. 26.
elata 619. 26.
eriophora 619. 26.
eriostachya 619. 29.
fuscescens 618.
genevensis 617. 3.
gentianoides 618.
Gerardi 619. 27.
graminea 617. 9.
grauatensis 618. 13.
humilis 618. 14 *
hungarica 619. 26.

- incana* 618. 15.
insularis 618. 13 *
integralis 618. 10.
intermedia 619. 29. 620.
 40.
laciniata 617. 4.
lagopus 819.
Lamarckii 619. 21.
lanata 619. 22. 26.
lanceolata 619.
lanuginosa 619. 26.
Loeflingii 619.
Loscosii 617.
lusitanica 619.
macrorhiza 617.
major 619.
maritima 617.
maritima 617. 8. 618. 10.
maxima 619.
maxima 620. 35.
media 619.
minima 620. 40.
minor 619.
minuta 619.
minuta 620. 33.
monosperma 618.
montana 618.
montana 618. 18.
neglecta 617. 5.
nivalis 619.
nivalis 619. 21.
notata 619.
oblongifolia 620. 37.
ovata 619.
ovina 618. 15.
paludosa 619.
pilosa 620. 33.
plicata 620. 38.
Preslii 619. 26.
Psyllium 617.
pumila 617. 2.
pungens 618. 13.
purpurascens 617. 5 *
pygmæa 620. 33.
radicata 618. 13.
recurvata 618.
recurvata 617. 8.
rubens 619. 27.
salsa 617. 9.
sarda 618. 13.
saxatilis 618.
Schwarzenbergiana 620.
 39.
sericea 618. 19. 21. 619.
 27.
serpentina 618.
serpentina 618. 12. 13. 14
 et *
Serraria 617.
sibirica 619.
scula 617. 1.
subulata 618.
subulata 618. 11. 12. 14.
Tabernæmontani 620. 35.
tenuiflora 619.
tenuis 620. 33.
Timbali 619. 26.
transsilvanica 620. 37.
triquetra 618. 13.
uliginosa 618. 17.
velutina 619. 30.
victoralis 619. 27.
Weldenii 619.
Wulfenii 617. 9. 618. 10.
Platanthera bifolia 695. 20. 1.
 696. 20. 2.
brachyglossa 696. 20. 2.
chlorantha 695.
diphylla 697. 25. 1.
hyperborea 696.
Koenigii 696. 20. 4.
montana 695. 20. 1.
obtusata 696.
solstitialis 696.
viridis 696. 21. 1.
Waukelii 695. 20. 1.
Platanus acerifolia 657 obs.
cuneata 656.
occidentalis 657 obs.
orientalis 656.
Platycapnos saxicola 28. 27.
spicatus 28. 26.
Platypetalum purpurascens
 45. 32. 2.
Pleurogyne carinthiaca
 501.
rotata 500.
Pleuropogon Sabini 818.
Pleurospermum austriacum 314.
Golaka 315. 105. 1.
uralense 314.
Plumbago europæa 609.
Poa abbreviata 835.
abbreviata 836. 18 *
ætnensis 836.
alida 837. 99. 3.
alpina 835.
alpina 835. 12.
anceps 834. 4.
angustata 831. 12.
angustifolia 834. 4. 6.
annua 837.
arctica 836. 18 *
aspera 835. 10. 836. 19.
attica 834.
badensis 835. 13 *
Balbisii 837.
Balfourii 836. 19 *
biflora 834. 8 *
Bivonæ 835. 12.
brevifolia 835. 13.
bulbosa 836.
cæsia 836.
cæsia 836. 19 *
carniolica 836. 25.
cenisia 835.
Chaixii 833. 1.
coarctata 834. 8.
collina 835. 13 *
commutata 834.
compressa 835.
concinna 836.
conferta 836. 19 *
costata 834. 4.
cyperoides 797. 39. 1.
depauperata 834. 8.
distichophylla 835. 18.
divaricata 833. 97. 1. 835.
 13.
dolosa 835. 18.
dura 832. 6.
Eragrostis 833. 96. 3.
Feratiana 834. 8 *
fertilis 834. 6.
flaccidula 834.
flexuosa 835. 16. 17. 18.
fulva 830. 91. 2.
glauca 834. 8. 836. 19.
glauantha 834. 8.
Halleridis 836. 18.
humilis 834. 4.
hybrida 834.
hybrida 833. 1 *
insularis 835.
jubata 835. 17.
Kitaibellii 834. 8.
Langeana 835. 11 *
laxa 835.
laxa 835. 18.
laxiuscula 836. 19 *
ligulata 836.
lithuanica 830. 92. 2.
maritima 832. 2.
mediterranea 831. 7.
megastachya 833. 96. 2.
minor 835.
Molinerii 835. 13 *
montana 834. 8 *. 836.
 19 *
nemoralis 834.
nitida 816. 5.
Nymanii 834. 5.
oreophila 835. 18.
ovalis 837. 28 *
pallens 836. 18.
palustris 834.

- papposa 833. 96. 4.
 Parnassi 835. 15 *
 Parnellii 834. 8 *
 polynoda 835. 11.
 præcox 836. 23 *
 pratensis 834.
 procumbens 831. 13.
 pseudo-concinna 836. 23.
 psychrophila 835. 18.
 pumila 835.
 pyrenaica 835. 17.
 remota 830. 92. 2.
 (sudetica) remota 833. 1 *
 scabra 834. 7. 835. 10.
 scariosa 829. 49.
 serotina 834. 6. 8.
 seslerioides 796. 38. 2.
 setifolia 836. 22.
 silvatica 833.
 silvicola 834. 5.
 sterilis 835.
 stricta 836.
 subcompressa 835. 11.
 sudetica 833. 1 et *
 sulcata 834. 3.
 supina 835. 17. 837. 28.
 thessala 835. 15.
Timoleonotis 836.
 tremula 835. 17.
 trichophylla 836.
 trivialis 834.
 trivialis 834. 5.
 versicolor 835. 10.
 violacea 836.
Pocockia cretica 171.
græca 171.
 Podanthum giganteum 483.
 6. 1.
 trichocalycinum 479. 43.
 Podospermum calcitrapifolium 465.
 callosum 465. 23 *
 canum 465. 4.
 Columnæ 465. 2 *
 decumbens 465. 3.
 diversifolium 465. 4.
Jacquinianum 465.
intermedium 465.
laciniatum 465.
 loreum 465. 4.
 messeniacum 465. 3.
 muricatum 465. 1.
 octangulare 465. 1. 4.
 resedifolium 465. 3.
 subulatum 465. 1.
 Tenorii 465. 1 *
 villosum 465.
 Willkommii 465. 2.
 Pogonostylis squarrosus 763.
 4.
 Polemonium areticum 504.
 campanulatum 504.
 coeruleum 503.
 pulchellum 504.
 Polium album 566. 44.
 aureum 566. 43.
 montanum 566. 37. 44.
 pyrenaicum 566. 32.
 rhodanicum 566. 44.
 Pollinia distachya 785. 1.
 Gryllus 785. 5. 1.
 Polycarpon alsinefolium 254.
 Bivonæ 254. 2. 3 *
 diphyllum 254. 2. 1.
 floribundum 254. 2. 1.
 Gmelini 254. 2. 2.
 latifolium 254. 2. 3.
 peploides 254.
 tetraphyllum 254.
 Polycnemum arvense 622.
 arvense 622. 5. 2.
 Heuffelii 622. 5. 3.
 majus 622.
 minus 622. 5. 1.
 recurvum 622. 5. 1.
 verrucosum 622.
 Polygala adscendens 84. 17.
 alpestris 84.
 alpina 84. 11 *
 amara 83.
 amara 83. 10.
 amarella 83. 10. 11.
 amblyptera 83. 11.
 andrachnoidea 84. 18.
 Angelisii 84. 12 *
 angustata 83. 9.
 angustifolia 84.
 austriaca 83. 11 *
 badensis 83. 8.
 Ballii 83. 9.
 basaltica 83. 9.
 Boissieri 82.
 buxifolia 83. 9. 10.
 calcarea 83.
 Chamæbuxus 82.
 ciliata 83. 8 *
 comosa 83.
 corsica 83. 5.
 decipiens 84. 11 *
 depressa 83. 8.
 dubia 83. 9 *
 dunensis 83. 9 *
 elongata 83. 5 *
 exilis 84.
 flavescens 83.
 Gariodiana 83. 5.
 glumacea 84. 20.
 heterophylla 83. 10.
 hospita 84. 18.
 hybrida 83. 7.
 involutiflora 83. 7 *
 juniperina 82. 1.
 Lejeunii 83. 7 *
 Lensii 83. 7 *
 linearis 84. 21.
 Liorani 83. 8.
 major 82.
 Michaletii 83. 7 *
 microphylla 82.
 monspeliaca 84.
 montana 83. 9.
 Morisiana 84.
 multicaulis 83. 9 *
 multabilis 83. 8.
 myrtifolia 84. 11 *
 nicæensis 83. 5.
 nivea 84. 11 *
 oxyptera 83. 7 *. 9 *
 parviflora 83. 7 *. 84. 21.
 pedemontana 83. 7.
 podolica 83. 7.
 Preslii 83. 5 *
 pruinosa 83. 5.
 pyxophylla 83. 8.
 recurvata 84. 18 *
 rosea 83.
 rosea 83. 5.
 rupestris 84.
 saxatilis 84. 14.
 serpyllacea 83.
 serpyllifolia 83. 8.
 sibirica 84.
 straminea 84. 20.
 subniflora 84.
 supina 84.
 transylvanica 83. 7.
 uliginosa 84. 11 *
 Vaillantii 83. 9.
 venulosa 84.
 verviana 83. 7 *
 vulgaris 83.
 Polygonatum ambiguum 717.
 6.
 bracteatum 717. 3.
 Gussonei 717.
 latifolium 717.
 multiflorum 717.
 officinale 717.
 polyanthemum 717.
 verticillatum 717.
 Polygonum acetosum 639.
 agrestinum 639. 24.
 alpestre 637. 5.
 alpinum 637.
 amphibium 637.

- angustifolium 638. 14.
arenarium 639.
arenarium 639. 21. 22.
arenastrum 639. 24.
aviculare 639.
Bellardi 639.
biforme 637. 10.
Bistorta 637.
Blancheanum 637. 6.
Braunii 638. 13.
Brittingeri 637. 8.
carthusianorum 637. 5.
Cherrolatii 637. 6.
condensatum 638. 13 ×
controversum 638.
Convolvulus 637.
crassinerve 639. 26.
denudatum 639. 24.
dissitiflorum 639. 21 *
divaricatum 637. 3.
dubium 638. 13.
dubio-persicaria 638. 13 ×
dumetorum 636.
elegans 639. 23 *
equisetiforme 638.
equisetiforme 638. 16.
erectum 639. 24.
Fagopyrum 639. 31 obs.
flagellare 639. 20.
flagelliforme 639. 22.
flavescens 639. 21.
gracile 639. 21 *
graminifolium 639.
Gussonei 639.
herniarioides 639.
herniarioides 639. 28.
humifusum 639. 24.
hybridum 638. 13.
Hydropiper 638.
hydropiperi-dubium 638.
 13.
incanum 637. 8. 10.
intermedium 638. 19.
Kitaibelianum 639. 21.
lapathifolium 637.
lapathifolium 637. 8 *
laxiflorum 638. 13.
laxifloro-persicaria 638.
 13 ×
laxum 637. 8 *. 9. 10 *
litorale 639.
maculatum 637. 8 *
maritimum 638.
microspermum 639. 24.
minus 638.
minori-persicaria 638. 14 ×
mite 638.
miti-persicaria 638. 13 ×
monspeliense 639. 21. 24.
nanum 639. 24.
neglectum 639. 23. 24.
nodosum 637. 8 *
orientale 638. 14 obs.
oxyspermum 639.
pallidum 637. 8.
patulum 639. 21.
Persicaria 637.
Persicaria 637. 8. 638. 14.
persicaria-minus 638. 14 ×
persicaria-mite 638. 13 ×
pilatense 637. 5.
pulchellum 639.
pusillum 638. 14. 639. 24.
Raji 638. 19.
ramiflorum 639. 21.
Roberti 638.
romanum 639.
rubriflorum 639. 22.
rurivagum 639. 24.
salicifolium 638. 11. et *
salignum 637.
salsugineum 639.
salsuginosum 639. 26.
scoparium 638.
serotinum 637. 10.
serrulatum 638.
sibiricum 637. 3 *
strictum 638. 14. et ×
tataricum 639. 31 obs.
tenuiflorum 637.
tinctorium 638. 14 obs.
tomentosum 637. 8.
Venantianum 639. 23.
virgatum 639. 21. 23.
viviparum 637.
Polypodium æmulum 866. 8.
alpestre 864. 11. 2.
alpinum 867. 13. 3.
arvonicum 868. 19. 2.
auriculatum 867. 15. 1.
australe 867. 15. 1.
calcareum 868. 16. 3.
Callipteris 866. 6.
cambricum 867. 15. 1.
Dryopteris 868. 16. 2.
fragrans 866. 11.
hyperboreum 868. 19. 3.
montanum 866. 11. 867.
 13. 1.
Oreopteris 866. 11.
Phegopteris 866. 16. 1.
Petrarchæ 863. 4.
rhaeticum 864. 11. 2.
rigidum 866. 9.
Robertianum 868. 16. 3.
vulgare 867.
Polypogon adscendens 804.
 4 obs.
elongatus 804. 4.
intermedius 803. 1.
litoralis 804.
maritimus 803.
monspeliensis 803.
subspathaceus 803.
Polyschemone nivalis 86. 7.
 1.
Polystichum cristatum 865.
 6.
durum 865. 5.
Filix mas 865. 5.
induratum 865. 5.
montanum 866. 11.
pallidum 866. 10.
pseudo-cristatum 866. 7.
rigidum 866. 9.
spinulosum 866. 7.
strigosum 866. 9.
Thelypteris 867. 12.
Populus alba 663.
albo-tremula 663. 1. 2.
atheniensis 664. 2 obs.
australis 664. 1. 3.
Bachofeni 663. 1. 1.
canescens 663.
caudina 664. 1. 4.
dilatata 664. 1. 5.
græca 664. 1. 2 et obs.
hybrida 663. 1. 2.
neapolitana 664. 1. 4.
nigra 664.
pannonica 664. 1. 4.
pyramidalis 664.
repanda 664. 1. 3.
tremula 664.
tremuloides 664. 2 obs.
villosa 664. 1. 3.
Porcellites radicata 470. 132.
 4.
Porrum Ampeloprasum 735.
 1.
arenarium 736. 7.
commune 735. 2 obs.
descendens 736. 12.
rotundum 735. 4.
sativum 736. 6 obs.
Scorodoprasum 736. 6.
sphærocephalon 736. 9.
strictum 739. 39.
Portenschlagia ramosissima 294.
Portulaca oleracea 253.
sativa 253.
Posidonia Caulini 680.
oceanica 680.
Potamogeton acuminatus 682.
 13.
acutifolius 683.

alpinus 681. 8.
 annulatus 681. 8.
 augustanus 682. 10.
 Berchtoldi 683. 23.
 Billotii 681. 3.
 caespitosus 683. 26.
 coloratus 682.
 complanatus 683. 19.
 compressus 683.
 compressus 683. 21. 22.
 crispus 682.
 curvifolius 682. 11.
 decipiens 682.
 densus 683.
 fasciculatus 684. 29.
 filiformis 684. 28. 29.
 flabellatus 684. 28.
 flexicaulis 682. 15.
 fluitans 681.
 fluitans 681. 2. 8.
 Friesii 683.
 gracilis 683.
 gramineus 682.
 gramineus 683. 21.
 Grisebachii 683. 26.
 helodes 682. 9.
 heterophyllus 682. 10. 11.
 Hornemannii 682. 9.
 hybridus 682. 10.
 Kirkii 681. 1 *
 Kochii 681. 5.
 lanceolatus 682.
 lanceolatus 681. 6.
 laticaulis 683. 19.
 lithuanicus 681. 6.
 lonchites 681.
 longifolius 682. 13 *. 14.
 lucens 682.
 macrophyllus 682. 13 *
 marinus 684.
 marinus 684. 28.
 microcarpus 681. 4 *
 monogynus 683. 25.
 mucronatus 683. 22.
 natans 681.
 nerviger 681. 8.
 nigrescens 681. 8 *
 nitens 682.
 oblongus 681. 4.
 obscurus 681. 8.
 obtusifolius 683.
 obtusus 681. 8.
 Oederi 683. 22.
 oppositifolius 683. 18.
 panormitanus 683. 23.
 pectinatus 684.
 perfoliatus 682.
 petiolare 681. 1.
 petiolatus 681. 1.

plantagineus 682. 9.
 polygonifolius 681.
 prelongus 682.
 pusillus 683.
 rufescens 681.
 rutilus 683.
 salicifolius 681.
 semipellucidus 681. 8.
 serratus 682. 17. 683. 18.
 setaceus 683. 18. 684. 28.
 sculus 682. 9.
 sparganifolius 681.
 sparganifolius 681. 1 *
 spathulatus 681.
 spathulatus 681. 3.
 trichoides 683.
 tuberculatus 683. 25.
 variifolius 682. 10 *
 Zizii 682. 13 *
 zosteraceus 683.
 zosteraceus 684. 28.
 zosteræfolius 683. 19.
 Potentilla adpressa 225. 25.
 adscendens 224. 19. 23.
 225. 30.
 alba 227.
 alba 227. 44.
 albo-villosa 224. 21.
 alchemilloides 227.
 alpestris 225.
 Amansiana 226. 34.
 ambigua 225. 29 *
 amphibola 225. 23 *
 angustifolia 224. 17.
 Anserina 223.
 apennina 228.
 arenaria 226. 36.
 argentata 224. 21.
 argentea 224.
 assurgens 224. 19.
 astrachanica 224. 16.
 aurea 225.
 aurea 225. 29. 29 *
 australis 224. 17.
 autaretica 225. 23.
 baldensis 226. 31 *
 Baumgarteniana 224. 19.
 Benyetzskiyi 223. 2.
 bifurca 223.
 Billotii 226. 34 *
 biserrata 225. 23 *
 Bocconi 228. 54.
 Bouquojana 225. 23 *
 Brauniana 229. 63.
 breviscapa 228. 59.
 brutia 224. 21 *
 Buccoana 228. 51.
 calabra 224. 21 *
 cana 224. 21.

canescens 224. 19.
 caulescens 227.
 Chaubardiana 226. 34.
 chrysanthia 224. 17. 225.
 23.
 chrysanthia 225.
 chrysocraspeda 225. 29 *
 cinerea 226.
 Clementei 226. 36.
 clivicola 225. 31.
 Clusiana 227.
 collina 225.
 collina 224. 21. 225. 25.
 25 *
 confinis 224. 21.
 corsica 223.
 corsica 228. 50.
 crassa 224. 16.
 crassinervia 228.
 curvidens 224. 19.
 dasypphylla 223.
 debilis 225. 31.
 decipiens 225. 25.
 decumbens 224. 21.
 delphinensis 225.
 demissa 224. 21.
 deorum 228.
 Detonmasii 224.
 dichotoma 228. 60.
 divaricata 224. 16.
 divergens 227. 29 *
 emarginata 229.
 Eversmanniana 223.
 fagineicola 226. 35.
 filiformis 225. 3.
 Fontolii 227. 47.
 Fragaria 228. 58.
 Fragariastrum 228.
 fragarioides 223.
 fragarioides 228. 58.
 fragarioides 228. 58.
 fraterna 228. 58 *
 frigida 229.
 fruticosa 222.
 galiciana 226. 35.
 gelida 225. 29 *. 226. 31 *
 gentilis 225. 23.
 geoides 223. 4.
 geranioides 225. 29 *
 glacialis 227. 45. 229. 65.
 glandulifera 226. 35.
 glandulosa 226. 34.
 glauca 228. 50.
 grammopetala 227.
 grandiflora 228.
 grandiflora 225. 29 *
 Grenierana 225. 23.
 Grenieri 224. 21.
 groenlandica 229. 64.

- Güntheri 225. 25.
 Halleri 225. 29.
Haynaldiana 227.
 helvetica 229. 65.
heptaphylla 224.
 Heuffeliana 225. 23.
hirta 224.
 hirta 224. 17 *
 hispida 223. 3.
holosericea 227.
 hybrida 228. 58.
Jankeana 228.
 impolita 224. 21.
 inaperta 225. 25.
 incana 226. 36. 36 *
inclinata 224.
 integrifolia 227. 45.
intermedia 225.
 intermedia 224. 23. 225.
 25 *
 italica 227. 38 *
 jurana 225. 31.
 Keilhau 223. 11.
 laciniosa 224. 16 *
 laeta 224. 17.
 lanuginosa 226. 34.
leiocarpa 225.
 leucopolitana 225. 25.
 limosa 223. 15.
 Lindackeri 225. 25.
 lupinoides 227. 45.
 macrocalyx 223. 2.
 macrophylla 224. 16.
 maculata 225. 31.
 Mathonetii 225. 23 *
 medioxima 225. 23.
micrantha 228.
 microdon 225. 25.
 micropetala 224. 23.
minima 229.
 minima 225. 29.
 mixta 226. 37 *
 mollis 223. 9 obs.
 monspeliensis 228. 60.
 montana 227. 38. 57.
montenegrina 228.
 Morisonii 228. 60.
multifida 223.
 neglecta 224. 21.
 nemoralis 227. 38.
 Neumanniana 226. 35.
 Neumayeriana 227. 39.
nevadensis 226.
nitida 228.
 nitida 227. 42. 228. 57.
 nivalis 227.
 nivea 229.
norvegica 228.
 obscura 224. 16.
 opaca 226.
 opacata 226. 35.
 oreites 225. 31.
 oronoma 225. 31.
 paradoxa 224. 23.
 parnassica 224. 17.
 parva 224. 17.
 parviflora 224. 23.
 parvula 226. 36.
 patens 225. 28.
patula 226.
 pedata 224. 17.
 pedemontana 228. 61 *
pensylvanica 223.
 pensylvanica 223. 3 obs.
 permixta 224. 23.
 petiolulata 227. 44 *
 petrophila 227. 44 *
 pilosa 224. 16. 17.
 pilosissima 225. 31.
 pimpinelloides 223. 5.
 pinnatifida 226. 37.
 poetarum 228. 53.
 polyphylla 225. 23 *
 poteriifolia 223. 5.
 praecox 225. 25 *
 praeceptorum 225. 31.
 pratensis 225. 28. 226. 33.
procumbens 226.
 prostrata 223. 1 obs. 228.
 58.
 pseudo-alpestris 225. 31.
 pseudo-frigida 225. 31.
pulchella 223. 11.
 pygmaea 223. 2.
pyrenaica 225.
 recta 224.
 recta 224. 19.
 reptans 226.
 Reuteri 224.
 rhenana 225. 25 *
 rotundifolia 225. 31.
 rubens 225. 31. 226. 34.
rupestris 223.
 ruthenica 228. 60.
 sabauda 225. 31.
 Sadleri 224. 16. 19 x. 225.
 23 *
 salisburgensis 225. 31.
 saxatilis 226. 35 *
saxifraga 227.
 Schultzei 225. 25 *
 serotina 226. 34.
 silesiaca 225. 25.
 silvestris 227. 39.
Sommerfeltii 223.
 sordida 225. 25.
speciosa 228.
splendens 228.
 splendens 228. 58 *
 stellulata 226. 36.
 stenantha 238. 1.
 subacaulis 226. 36. 36 *
 subrecta 224. 19 *
 subsalsa 223. 15.
supina 223.
 tanacetifolia 223. 3 obs.
 taurica 224. 17 *. 225.
 23 *
 tenuiloba 224. 21.
 terglaviensis 228. 56.
 tetrapetala 227. 39.
 Thomasii 224. 20.
 thuringiaca 224. 23.
 tomentosa 225. 25 *
 Tommasiniana 226. 36.
Tormentilla 227.
 tormentilloides 226. 35.
 227. 38.
 transsilvanica 225. 29 *
 tridentata 223. 1 obs.
umbrosa 224.
 Vaillantii 228. 57.
valderia 227.
 valderia 227. 45.
 velutina 226. 36 *
 Verloti 225. 31.
verna 226.
 vestita 226. 36.
Visianii 223.
 vivariensis 226. 34.
 Wiemanniana 225. 25.
 xerophila 226. 34.
 Poterium agrimoniae-folium
 239. 1.
agrimonioides 239.
 alophum 240. 10.
ancistroides 239.
 ancistroides 239. 7.
 balearicum 240. 10 *
 Delorti 239. 4.
dictyocarpum 239.
 Duriei 240. 10.
garganicum 239.
 glaucescens 239. 4.
 glaucum 239. 2.
 guestphalicum 239. 4.
 hybridum 239. 1.
lateriflorum 239.
Magnolii 240.
mauritanicum 240.
 microphyllum 240. 11.
multicaule 240.
muricatum 240.
 obscurum 239. 4.
 platylophum 240. 8.
 polygamum 240. 8.
rupicolum 239.

- Sanguisorba* 239. 4.
Spachianum 240.
spinosum 240.
stenolophum 240. 8.
verrucosum 240.
villosum 239.
Prangos angustifolia 314. 99. 2.
colladonioides 314. 99. 3.
cylindracea 314.
ferulacea 314.
triquetra 313. 99. 1.
Prasium creticum 564. 1. 1.
majus 563.
minus 564. 1. 1.
Prenanthes acanthifolia 435. 13.
hispida 461. 118. 1.
purpurea 436.
ramosissima 435. 16.
runcinata 462. 121. 1.
tenuifolia 436. 109. 1.
tuberosa 461. 118. 1.
Wolffiana 436. 109. 1.
Preslia cervina 595.
glabriflora 595. 36. 1.
villiflora 595. 36. 1.
Primula acaulis 603. 2.
acauli-elatior 603. 2 ×
algida 603. 5.
Allionii 605.
Allionii 605. 32.
alpestris 603. 1 *
alpina 605. 23.
Auricula 604.
Balbisii 604. 12 *
Bonjeani 605. 24.
brevistyla 603. 2 ×
calycina 605.
Candolleana 605. 28.
carniolica 604.
carpathica 603. 1 *
ciliata 604.
ciliata 604. 12 *
Clusiana 605.
Clusii 605. 27.
Columnae 603. 4 et *
commutata 605. 22 *
confinis 604. 20 *
crenata 604. 16.
daonensis 604.
Dinyana 605. 30.
discolor 604. 16 ×
elatior 603.
exscapa 605. 22.
Facchinii 606. 34 *
farinosa 603.
farinosa 603. 5.
finmarchica 604. 10.
Floerkeana 606.
Floerkeana 606. 34 *
Flüggeana 603. 1.
Freyeri 604. 15.
frondosa 603.
glaucescens 605. 25
glutinosa 606.
glutinosa 605. 31.
grandiflora 603. 2.
graveolens 604. 18 *
helvetica 604. 13. 605. 23.
hirsuta 604.
hirsuta 604. 21. 605. 22.
hirsuto-glandulosa 605. 24.
inflata 603. 3. 4.
integrifolia 605.
integrifolia 604. 15. 505. 26 *. 27. 29.
intermedia 605. 27 ×
intricata 603. 1.
Jellenkiana 604. 15.
Kitaibeliana 605.
latifolia 604.
latifolia 604. 18 *
longiflora 603.
macrocalyx 603. 3.
marginata 604.
minima 605.
minimo-Clusiana 605. 27 ×
minimo-glutinosa 606. 34.
montana 603. 1. 3.
multiceps 604. 15.
Mureti 605. 30.
Muretiana 605.
norvegica 604. 10.
oenensis 604. 21.
officinalis 603.
officinali-acaulis 603. 2 ×
officinali-elatior 603. 3 *
Palinuri 604.
Pallasii 603. 1.
pallida 604. 20.
pedemontana 605.
Perreiniana 603. 1.
Polliniana 605. 26.
Portae 604. 14 *
pubescens 604.
pyrenaica 603. 4 *
rhatica 605.
salisburgensis 606. 34.
Sauteri 605. 33.
scotica 604.
sibirica 604.
Sibthorpii 603. 2.
spectabilis 605.
spectabilis 605. 26 *. 27.
stelviana 604. 21.
stricta 604.
suaveolens 603.
suaveolens 603. 3.
subarctica 603. 1 *
Thomasinii 603. 4 *
Tommasinii 603. 4 *
truncata 605. 33.
tyrolensis 605.
unicolor 603. 3 *
variabilis 603. 2 ×
venusta 604.
Venzoi 605. 32 *
veris 603. 3.
villosa 604.
villosa 605. 22.
viscosa 605.
viscosa 604. 18. 605. 29.
vulgaris 603.
vulgari-elatior 603. 2 ×
vulgari-officinalis 603. 2 ×
Wulfeniana 605. 26 *
Prismatocarpus cordatus 483. 4. 4.
Procrassula mediterranea 265. 42.
pallidiflora 265. 42.
Prolongoa pectinata 370.
pseudanthemis 370.
setabensis 371. 3.
Prunella alba 573. 9. 4.
alpina 573. 9. 2.
grandiflora 573.
hastæfolia 573. 9. 2.
hybrida 574. 9. 4.
hyssopifolia 573.
intermedia 573. 9. 3. 574. 9. 4. 10. 1.
laciniata 573.
pinnatifida 573. 9. 3.
pyrenaica 573. 9. 2.
reptans 573. 9. 3.
surrecta 573. 9. 3.
violacea 574. 9. 4.
vulgaris 573.
Prunus acida 213. 6.
Armeniaca 214. 16 obs.
austera 213. 6.
avium 213.
Ballota 213. 10 obs.
borealis 212. 3 *
brigiatiaca 213.
brigitina 213. 9.
cerasifera 213. 10. 10 obs.
Cerasus 213.
cereola 213. 10.
Chamaecerasus 213.
cinerascens 214. 14 *
cocomilia 214.
Cupaniana 213. 4.
Desvauxii 214. 14.
divaricata 214.

- domestica* 213.
dumetorum 214. 14 *
fruticans 214. 15 *
Hausmanni 214. 15.
humilis 213. 8.
insititia 214.
Laurocerasus 212.
ligerina 214. 15 *
lusitanica 212.
Mahaleb 212.
Marasca 213. 6 *
Meyeri 214. 15.
Mirabolana 214. 10 obs.
montana 214. 15.
nigra 214. 14.
Padus 212.
petraea 212. 3.
platyphylla 214. 15 *
prostrata 213.
pseudoarmeniaca 214.
Ramburii 214.
rubescens 213. 10 obs.
rustica 213. 10 obs.
Sanctæ Catharinæ 213. 10 obs.
saxicola 213. 10.
serotina 213. 6. 214. 15 *
silvestris 214. 14.
spinosa 214.
stenopetala 214. 15 *
varactensis 213. 10.
Psamma arenaria 798. 45. 1.
australis 798. 45. 1.
baltica 798.
litoralis 798.
pallida 798. 45. 1.
Psephellus declinatus 418.
Psilathera tenella 796. 12.
Psilostemon creticum 509. 3. 4.
orientale 509. 3. 3.
Psilurus nardoides 846.
Psoralea alnifolia 188.
bituminosa 188.
palestina 188. 36. 1.
plumosa 188. 36. 1 *
taurica 188. 36. 1 *
Psorophytum undulatum 132. 2.
Psyllophora vulgaris 784. 155.
Ptarmica abrotanoides 365. 16 *
ageratifolia 364.
Aizoon 364. 5.
alpina 365.
alpina 364. 7.
ambrosiaca 365.
argentea 366. 23.
atrata 365.
atrato-nana 365. 18.
Barrelieri 364.
buglossis 364. 9.
cæspitosa 364. 4.
cartilaginea 364.
Clavenæ 366.
Clusiana 365.
denudata 366. 23.
Dumasiæ 366. 21.
Fraasii 365.
Hænkeana 365. 17.
Haussknechtiana 364. 10 x
Herba-rota 364.
hybrida 365. 19 x
impatiens 365.
impunctata 365. 18 x
ircutiana 364. 8.
Laggeri 365. 20 *
Lereschii 366. 21 *
lingulata 364.
macrophylla 365.
mongolica 365. 11 obs.
Morisiana 364. 10 *
moschata 365.
macronulata 364.
multifida 365.
nana 365.
oxyloba 364.
pectinata 368. 21.
pseudo-atrata 364. 4.
pyrenaica 364. 7 *
scardica 365. 16.
Schouwii 364. 1 *
serbica 364. 5 *
serrata 365. 11 obs.
sibirica 365. 11 obs.
speciosa 364.
tenuifolia 364.
Thomasiana 366.
umbellata 365.
valesiaca 366. 21 *
vulgaris 364.
Pteranthus echinatus 257.
Pteris Alpini 861. 4. 4.
aquilina 861.
arguta 861.
brevipes 861. 4. 1.
cretica 861.
ensifolia 861. 4. 4.
lanceolata 861. 4. 4.
longifolia 861.
oligophylla 861. 4. 3.
palustris 861. 4. 2.
vittata 861. 4. 4.
vulcanica 861. 4. 4.
Pterocephalus bellidifolius 341. 5.
brevis 341.
Bronssonetii 341. 6.
Coulteri 341. 2.
diandrus 341. 2. 1.
involucratus 341. 2.
lusitanicus 341.
niveus 341. 4.
palestinus 341. 3. 1.
papposus 341.
papposus 341. 2. 1.
Parnassi 341.
perennis 341. 5.
plumosus 341.
spathulatus 341.
tomentosus 342. 10.
Pteroneurum bipinnatum 38. 19.
græcum 38. 21.
Rochelianum 38. 21.
Pteronia Chamæpeuce 404. 79. 2.
Pteroselinum Chabræi 287. 28. 28 *
glaucum 287. 27.
intermedium 285. 29. 4.
pencedanoides 285. 29. 3.
Pterotheca bifida 460. 117. 2.
nemausensis 460. 117. 1. 461. 117. 2.
sancta 460. 117. 1.
Ptilostemon appendiculatum 404. 79. 1.
muticum 404. 79. 3.
Ptilotrichum Candolleum 54. 51. 4.
cyclocarpum 55. 51. 7.
emarginatum 54. 51. 1.
purpureum 55. 51. 9.
strigulosum 55. 51. 10.
Ptychotis ammoides 305.
Bunius 305. 80. 1.
heterophylla 305.
heterophylla 305. 80. 1 *
Thorei 308. 85. 9.
Timbali 305. 80. 1 *
trachysperma 305. 80. 2 *
verticillata 305. 80. 2.
Puccinellia distans 830. 6.
Pulegium Tomentella 597. 12 *
vulgare 597. 12.
Pulicaria arabica 394.
arabica 394. 4.
dentata 394. 2 *. 3.
dysenterica 394.
græca 394. 3.
graveolens 394. 24.
hispanica 394.
odora 394.
paludosa 394. 4.

- pratensis* 394. 3.
sicula 394.
Steveni 394. 2*
uliginosa 394. 2*
viscosa 393. 22.
vulgaris 394.
Pulmonaria affinis 512. 8. 4.
angustifolia 512.
angustifolia 512. 8. 3.
azurea 512. 8. 5.
Clusii 513. 8. 5.
grandiflora 512. 8. 4.
longifolia 512. 8. 3*
maculosa 512. 8. 1.
media 513. 8. 5.
mollis 513.
mollissima 513. 8. 6*
montana 513. 8. 6.
oblongata 512. 8. 1. 2.
obscura 512. 8. 2.
officinalis 512.
officinalis 512. 8. 4*
ovalis 512. 8. 3*
parviflora 513. 8. 5.
rubra 512.
saccharata 512.
saccharata 512. 8. 4*
transsilvanica 512. 8. 2.
tuberosa 512. 8. 3.
vulgaris 512.
variabilis 512. 8. 3.
Pulsatilla affinis 2. 4 +
alpina 2.
alpina 2. 6*
aperta 2. 4.
apiifolia 2. 6*
Bauhini 2. 2.
Bogenhardiana 2. 4.
Burseriana 2. 6*
Hackellii 2. 3*
Halleri 2.
hybrida 2. 3*
Jankæ 2. 5.
intermedia 2. 2.
lutea 2. 6*
media 2. 4.
millefoliata 2. 6*
montana 2. 5*
montano-vulgaris 2. 4.
myrrhidiifolia 2. 6*
nigricans 2. 5.
patens 2.
patenti-vernalis 2. 1 x
pratensis 2.
propria 2. 4.
propinqua 2. 1.
pseudopatens 2. 2 +
rubra 2. 5.
slavica 2. 3.
transsilvanica 2. 4 +
vernalis 2.
Wolfgangiana 2. 2.
vulgaris 2.
Punica Granatum 245.
Puschkinia dubia 732. 1.
scilloides 731. 22. 1.
Putoria calabrica 323.
hispanica 323. 1. 1*
Pycnocomum bæticum 348.
 10. 1.
rutæfolium 348.
Pycnus capitatus 760. 2. 1.
flavescens 760. 17.
Monti 760. 14.
pannonicus 760. 19.
Pyrethrum Achilleæ 372. 24.
 1*
achilleæfolium 373.
alpinum 373.
alpinum 360. 12.
anomalum 372. 16.
arundanum 372.
Barrelieri 371. 10.
Baumannii 373. 14*
bipinnatum 373.
Bocconi 373. 17 obs.
ceratophylloides 371. 11.
cinerariæfolium 372.
cinereum 372.
Clusii 372. 1.
corymbosum 372.
decipiens 374. 2 obs.
elegans 374. 5.
Fischeri 372. 1.
flaveolum 373.
glabrum 374. 7.
graminifolium 371. 7.
Halleri 371. 10.
hispanicum 373. 16 obs.
 375. 25. 8*
hybridum 370. 20. 2.
larvatum 371. 11.
macrophyllum 373.
maritimum 374. 3.
millefoliatum 373.
minimum 373. 8. 9.
mucronulatum 372. 1.
Myconis 370. 20. 3.
palmatifidum 373.
parthenifolium 372. 3.
Parthenium 372.
Pourretii 372. 1*
pulverulentum 373.
radicans 373. 16*
spathulæfolium 373. 16*
subcorymbosum 372. 1.
sulphureum 373. 16.
Tanacetum 375. 27. 7 obs.
tenuifolium 372. 1. 1*
tenuisectum 371. 11.
tomentosum 373.
tomentosum 373. 8.
trichophyllum 374. 1.
uliginosum 372.
Vahlîi 373.
Waldsteinii 372.
Willkommii 373. 15.
Zawadskii 372. 15.
Pyrola chlorantha 492.
hybrida 493. 5.
intermedia 493. 4.
maritima 492. 18. 1.
media 492.
minor 492.
pedemontana 493. 5.
rosea 493. 4.
rossica 493. 5.
rotundifolia 492.
rotundifolia var. 492. 1.
secunda 493.
serotina 492. 18. 1.
uniflora 493. 19. 1.
virens 492. 2.
Pyrus acerba 240. 2. 1.
Achras 240. 2. 2.
æstivalis 240. 2. 2.
amgdaliformis 241.
Aria 242. 5.
Aria-torminalis 242. 6.
Bollwylleriana 241. 2. 3
 obs.
Bourgæana 240. 2. 2*
canopliza 241. 2. 5.
Chamæmespilus 242. 9.
communis 240.
communis azarolifera 241.
 2. 3.
communis Briggsii 241. 2.
 3.
cordata 241.
cratægifolia 242. 8.
cuneifolia 241. 2. 5.
dasyphylla 240. 2. 1.
domestica 240. 2. 2. 241.
 3. 1.
elæagnifolia 241.
eriopleura 241. 2. 5.
eristyla 240. 2. 1.
fennica 241. 3. 3.
florentina 242. 8.
hybrida 241. 3. 3.
intermedia 241. 3. 4. 242.
 6.
Malus 240.
nebrodensis 244. 7. 3.
nivalis 240. 2. 2. 241. 2.
 4 obs.

- oblongifolia 241. 2. 5.
 parviflora 241. 2. 5.
 pollveria 240. 2. 1. 241.
 2. 3.
 Pollwilleriana 241. 2. 3 obs.
 præcox 240. 2. 1*
 præmorsa 241. 3. 2*
 pyrinus 241. 2. 5.
 Pyraster 240. 2. 2.
 salicifolia 241. 2. 5.
 salviaefolia 241. 2. 5.
 salvifolia 241. 2. 4 obs.
 scandica 241. 3. 4.
 sicala 241. 2. 5.
 silvestris 240. 2. 2.
 Sorbus 241. 3. 1.
 sudetica 242. 9*
 suecica 241. 3. 4.
 tardevieta 240. 2. 2.
 thuringiaca 241. 3. 2.
 Tinei 241. 2. 5.
 terminalis 242. 7.
- Queltia ampla 709. 7.
 incomparabilis 709. 7.
 odora 710. 8.
- Quercus ægilopifolia 662.
 15 obs.
Ægilops 661.
Ægilops 662. 14.
 alpestris 661. 9*
 amplifolia 660. 3*
apennina 660.
Aucherii 663.
 aurea 660. 4.
 australis 661. 9.
 austriaca 661. 12*
 Auzandri 662. 22*
Ballota 662.
 Bivoniana 662. 19.
 brachyphylla 661. 5*
 Brossa 661. 6.
 brntia 660. 3. 1*
 Budayana 661. 5.
calliprinos 663.
 castaneifolia 662. 14.
 cerrioides 661. 5*
Cerris 661.
 cintrana 662. 20.
coccifera 662.
 coccifera 662. 21.
 condensata 660. 4.
 conferta 661. 7*
 congesta 661. 5*
 conglomerata 661. 5.
 crinita 661. 12.
 Capaniana 661. 4*
 cyclophylla 662. 18.
 Dalechampii 661. 8.
- Esculus* 661.
 Esculus 661. 7*
 faginea 661. 5. 9.
Farnetto 661.
 fastigiata 660. 3. 1.
 filipendula 660. 2.
 Fontanesii 662. 15.
 fruticosa 661. 11.
gracilis 662.
 græca 661. 13.
 gramuntia 662. 16.
 haliphlaeos 661. 12.
 hispanica 662. 15.
humilis 661.
 humilis 661. 6.
 hungarica 661. 7*
 hybrida 661. 9.
Ilex 662.
infectoria 661.
 intermedia 660. 4.
 laciniosa 661. 5.
lanuginosa 661.
 leptobalana 661. 6*
lusitanica 661.
macedonica 662.
 macrolepis 662. 13.
 malacophylla 660. 3. 1.
 Mesto 662. 21*
 microbalanos 660. 3. 1.
 microcarpa 660. 4.
 Mirbeckii 661. 10*
 nigra 661. 6.
occidentalis 662.
 pallida 660. 4.
 pedemontana 660. 4.
pedunculata 660.
pendulina 660.
 pendulina 660. 2.
 polycarpa 661. 4*
pseudo-coccifera 662.
 pseudo-coccifera 662. 21.
 663. 23.
Pseudo-Suber 662.
 pubescens 661. 5. 6.
 pyrenaica 661. 6.
 rigida 663. 23.
 Robur 660. 3. 1. 4.
 rotundifolia 662. 18.
 rumelica 660. 3.
sessiliflora 660.
 Sibthorpii 662. 21.
 Streimii 661. 5.
Suber 662.
 Suber 662. 15. 20.
 sublobata 660. 4.
 Tauzin 661. 6.
 Thomasii 660. 3. 1*.
 Tommasinii 661. 5.
 Tournefortii 661. 12.
- Toza* 661.
 Tozza 660. 3.
 valentina 661. 9.
 Virgiliana 661. 4*
Queria hispanica 120.
- Radiola linoides* 126.
 Ramondia Heldreichii 503.
 3. 1.
 Myconi 503.
 Nataliæ 503.
pyrenaica 503.
 serbica 503.
- Ranunculus abnormis* 13.
 accessivus 11. 45.
acetosellæfolius 10.
aconitifolius 9.
acris 12.
 acris 12. 54 et*
 adscendens 9. 15.
 aduncus 11. 45.
affinis 12.
 Agerii 8. 4*
 agrarius 14. 78.
 albicans 8. 6*
 albonævus 13. 62.
 alismoides 10. 37.
alpestris 10.
 alpicola 11. 45.
 altaicus 13. 63.
 Amansii 11. 46.
 ambiguus 11. 47. 12. 55.
 Anmani 13. 67.
amplexicaulis 10.
anemonoides 9.
 angulatus 14. 78*
angustifolius 10.
 arcticus 12. 57.
 arvensis 13.
asiaticus 8.
 asiaticus 8. 12.
 astrantiæfolius 11. 46*
 aureus 11. 46.
auricomus 12.
 Balbisii 12. 61.
 Bertolonii 10. 31.
bilobus 10.
 binatus 12. 56.
 blepharicarpos 8. 13*
 Boræanus 12. 54.
 borealis 12. 54*
 brachiatus 13. 62.
 brevifolius 9. 23*
 Breynius 11. 46.
brutius 10.
 bulbifer 13. 62.
bulbosus 13.
bullatus 9.
 bupleuroides 10. 36.

- cæspititius* 13. 72.
Calcaræ 14.
Canuti 9.
carinthiacus 11. 50*
carpaticus 10.
carpaticus 9. 22.
carpetanus 8.
carpetanus 9. 14.
cassubicus 12.
causicus 10.
chærophylloides 8. 12*
chærophyllos 8.
chærophyllos 8. 12.
chius 14.
coenosus 16. 15.
concinnatus 11. 50.
confusus 16. 10.
constantinopolitanus
 12.
constantinopolitanus 12.
 59. 60.
cordigerus 14.
corsicus 12. 60.
Crantzii 11. 46.
crenatus 10.
crenatus 10. 31.
creticus 8.
crithmifolius 10. 27.
croaticus 11. 49.
cuneatus 13. 63.
cupreus 9.
cyclophyllus 8. 6*
cylindricus 8. 6*
Delacourii 11. 46*
demissus 10.
demissus 10. 44*. 11. 45.
dimorphorhizus 8. 12.
dissectus 10.
divergens 9. 15.
eriotorus 11. 45*
escurialensis 9. 14.
flabellatus 8.
flabellifolius 12. 55.
Flammula 13.
fluvialis 15. 12. 1.
fontanus 14.
Franchetianus 12. 54.
Friesianus 12. 54. 54*
garganicus 9. 17.
gelidus 11. 50*
geraniifolius 11. 50*
glacialis 10.
Gouani 11.
Gouani 10. 39. 11. 45*.
 46.
gracilis 11. 50*
græcus 14. 83.
gramineus 13.
granatensis 12. 54*
grandiflorus 10.
grandiflorus 10. 38.
Grenieranus 11. 45*
granulatus 8. 4*
gregarius 8. 12.
gruinialis 11. 49*
Heldreichianus 9. 15*
heucherifolius 12. 60*
hirsutus 14. 78.
Hornschuchii 11. 45.
humilis 14. 85 obs.
hybridus 9.
hyperboreus 13.
idionanthus 13. 72.
illyricus 8.
incrassatus 14. 84.
inops 11. 45.
insularis 8. 12*
isthmicus 8.
lacerus 9. 26 +. 10. 36.
laciniatus 9. 26. 14. 78.
lanuginosus 11.
lapponicus 13.
lapponicus 10. 44*. 11. 45.
lateriflorus 14.
Lecoquii 11. 46.
Lerchenfeldianus 10. 39.
Lingua 13.
lomatacarpus 13.
longipes 14. 89.
lugdunensis 8. 6*
macrophyllus 10. 38. 12.
 60*
magellensis 10. 30*
Marschlinii 10. 44*
mediterraneus 14. 78.
millefoliatus 9.
Millii 9.
mixtus 11. 46*
monspeliacus 8.
monspeliacus 8. 6*
monspessulanus 8. 6.
montanus 11.
montanus 12. 54.
muricatus 14.
neapolitanus 12.
nemorivagus 12. 54.
nemorosus 11.
Nendtvichii 14. 91.
nivalis 13.
nivalis 11. 50.
nodiflorus 14.
oenanthifolius 11. 47.
olyssiponensis 8. 3.
ophioglossifolius 14.
oreophilus 11. 45.
orientalis 7.
oxyrhynchus 9. 15.
oæyspermus 8.
Pallasii 10.
pallidior 14. 78.
palustris 22.
panormitanus 12. 61.
parnassifolius 10.
parviflorus 14.
parviflorus 14. 78.
parvulus 14. 78.
pascuiculus 12. 54.
paucistamineus 15. 5.
pedatifidus 12. 57.
pedatus 9.
peduncularis 8. 12*
pedunculatus 14.
pedunculatus 14. 78.
Petiveri 16. 10. 12.
peloponnesiacus 8. 4*
Philonotis 14.
plantagineus 10. 36.
platanifolius 9. 26.
polyanthemoides 11. 46.
 47.
polyanthemoidi-nemorosus
 11. 46.
polyanthemos 11.
polymorphus 11. 50.
polyphyllus 14.
polyrhizos 11.
polyrhizus 10. 44*
pratensis 12. 60*
procerus 12. 60*
pseudo-bulbosus 14. 78.
pseudo-hirsutus 14. 78.
pseudothora 9. 23.
pseudo-Villarsii 11. 45.
psilostachys 8.
Pthora 9. 23.
Purshii 13.
pusillus 13. 68.
pygmæus 13.
pyrenæus 10.
pyrenæus 11. 49.
Quæstieri 11. 46*
radicescens 11. 46.
rectus 12. 54.
repens 11.
reptans 13.
reticulatus 13. 75.
Revelieri 14. 89*
rhombifolius 9. 21.
rhynchocharpus 13. 77.
rotundifolius 8. 6*
rumelicus 8.
rupestris 8.
rutæfolius 9.
samojedorum 13.
saniculæfolius 11. 46*
sardous 14. 78.
Sartorianus 11. 45*

- saxatilis* 8. 6 *
sceleratus 14.
Schraderianus 14. 84.
Schurii 10. 39.
scutatus 9. 22.
segetalis 13. 75.
Seguieri 10.
semicalvus 9. 21.
serbicus 10.
silvaticus 11. 46. 12. 54 *
sparsipilus 13. 62.
spicatus 8.
spicatus 8. 13.
spretus 11. 46.
Sprunerianus 9.
squarrosus 12. 54 +
stagnalis 15. 12. 3.
Steveni 12. 54 *
stipatus 12. 54.
subapetalus 14. 85.
sulphureus 13.
Tappeineri 13. 65.
tenellus 10. 44 *
Tenorii 8. 5.
tenuifolius 11. 50 *
Thora 9.
Thora 9. 23 *
Timbali 11. 46.
Tommasinii 12. 59 *
tomophyllus 12. 54.
trachycarpus 13. 76.
Traunfellneri 10. 29 *
trilobus 14. 80.
tripartitus 16. 10. 12. 13.
 14.
tuberculatus 13. 75.
tuberosus 10. 39. 11. 46.
 12. 54 *
uliginosus 14. 87.
umbrosus 12. 53.
vaginatus 10. 30.
valdepubens 13. 62.
velutinus 12.
velutinus 12. 53.
Villarsii 11.
villosus 11. 46.
vulgatus 12. 54.
Weyleri 11.
Raphanistrum arvense 29. 6.
 1.
fugax 29. 6. 1 *
innocuum 29.
Landra 29.
maritimum 29.
odessanum 29. 6. 3 *
Raphanus Landra 29. 6. 3.
maritimus 29. 6. 2.
Raphanistrum 29. 6. 1.
sativus 29. 6 obs.
Rapistrum costatum 29.
hispanicum 29. 8. 5.
Linnæanum 29.
microcarpum 29. 8. 5.
orientale 29.
perenne 29.
rugosum 29.
venosum 29. 8. 4.
Razoumowskia Oxycedri 320.
 3. 1.
Reaumuria hypericoides
 253.
vermiculata 253.
Reichardia picroides 461. 119.
 4.
tingitana 461. 119. 4.
Reseda alba 68.
aragonensis 69. 6.
bætica 69. 4.
Barrelieri 68.
bipinnata 68.
calycinalis 69. 6.
canescens 70. 2. 2.
complicata 69.
constricta 69. 10.
crispata 70. 18. 18 *
erecta 69. 9.
Gayana 69. 4.
gigantea 68. 1.
glauca 69.
glauca 69. 16.
gracilis 69. 12. 12 *
gredensis 69.
Gussonii 70. 18 *
Hookeri 68. 3.
Jacquini 69.
incisa 68. 3.
inodora 69.
Lamottei 69. 12.
lanceolata 69.
linifolia 70. 18 obs.
litorea 69. 8.
lusitanica 69. 4.
lutea 69.
Luteola 69.
macrosperma 69. 5.
media 69.
mediterranea 69. 7. 8.
mucronulata 69. 12.
myriophylla 68. 3 (em.).
odorata 69. 6.
Phyteuma 69.
pseudophyteuma 69. 6.
pseudovirens 70. 18.
purpurascens 70. 2. 2.
pygmæa 70. 2. 4.
ramosissima 69.
ramosissima 69. 9.
saxatilis 69. 9.
sesamoides 70. 2. 2.
stricta 69.
suffruticulosa 68. 3.
tenuifolia 69. 12.
truncata 69.
undata 69.
undata 68. 2. 3.
virgata 69.
Yannezii 69. 12.
Retama Gussonei 154.
monosperma 154.
sphærocarpa 154.
Reutera catalaunica 309. 91.
 2.
gracilis 309.
procumbens 309.
puberula 309. 91. 2 *
rigidula 309.
Rhagadiolus edulis 474.
intermedius 474. 149. 1.
stellatus 474.
Rhamnus adriatica 145. 8.
Alaternus 145.
alpinus 146.
alpinus 146. 17.
amygdalinus 146. 13.
aragonensis 146. 15.
autumnalis 145. 1.
balearicus 145.
Boissieri 146. 11.
carniolicus 146. 10.
catharticus 145.
Clusii 145. 3.
Crini 146. 17.
fallax 146.
Frangula 145.
græcus 146.
Guicciardii 146. 18 *
hederacea 145. 3.
humifusa 146. 10.
illyrica 145. 8.
infectorius 145.
infectorius 145. 8. 9.
intermedius 145.
lycioides 146.
myrtifolius 145.
oleoides 146.
pentaphyllus 147. 2. 3.
persicifolius 146.
prunifolius 146.
pubescens 145. 7. 146. 18.
pumilus 146.
pumilus 145. 2.
pusillus 146. 19.
rumeliaca 145. 2.
rupestris 145.
rupestris 146. 19.
sanguineus 145. 1.
saxatilis 145.

- saxatilis* 146. 14.
Sibthorpianus 146.
silvatica 145. 6.
tinctorius 146. 10 *
tripartitus 147. 2. 4.
valentinus 146. 19.
velutinus 146. 19.
velutinus 146. 15 *
Villarsii 145.
Rhaponticum cynaroides 416.
heleniifolium 416. 91. 1 *
lyratum 416. 91. 1.
scariosum 416.
Rhinanthus Alectorolophus 552. 24. 2 *
alpestris 552. 24. 4.
alpinus 552.
alpinus 552. 24. 1.
angustifolius 552.
aristatus 552. 24. 1 *
buccalis 552. 24. 2 *
hirsutus 552. 24. 2 *
major 552.
maximus 550. 20. 1. 2.
minor 552.
montanus 552. 24. 4.
pubescens 552. 24. 2.
pulcher 552. 24. 4.
Reichenbachii 552. 24. 2 *
versicolor 550. 20. 1.
villosus 552. 24. 2 *
viscosus 550. 20. 2.
Rhizobotrya alpina 51. 6.
Rhodalsine procumbens 119. 28.
Rhodiola quadrifida 265.
rosea 265.
Rhododendron baticum 491.
Chamaecistus 492.
ferrugineum 492.
ferrugineum 492. 4 *
flavum 491.
hirsutum 491.
intermedium 492. 3 x. 4 *
lapponicum 492.
latifolium 492. 3.
myrtifolium 492. 4 *
ponticum 491. 2.
Rhodothamnus Chamaecistus 492. 6.
Rhus Coriaria 147.
Cotinus 147.
dioica 147.
oxyacanthoides 147. 4.
pentaphylla 147.
Thezera 147. 3.
toxicodendron 147. 4 obs.
typhina 147. 4 obs.
zizyphina 147. 4.
Rhynchocorys elephas 552.
Rhynchospora alba 761.
fusca 761.
Rhytispermum apulum 519. 16.
arvense 518. 10.
minimum 519. 15.
tenuiflorum 518. 14.
Ribes acerrimum 267. 5.
alpinum 267.
carpathicum 267. 5.
Fleischmanni 266. 3 *
Grossularia 266. 1.
Hladnikii 267. 6 *
hybridum 266. 1.
multiflorum 266.
nigrum 266.
orientale 267.
petraeum 267.
petraeum 266. 3 *
reclinatum 266. 1.
Roeseri 266. 1. 4.
rubrum 266.
rubrum pubescens 266. 3.
Schlechtendalii 266. 3.
Scopolii 267. 6 *
spicatum 266. 3 * 4.
Uva crispera 266.
vitifolium 266. 4.
Ricinus africanus 647. 5. 1 *
communis 647.
scaber 647. 5. 1 *
vulgaris 647. 5. 1.
Ricotia cretica 38.
Ridolfia segetum 308.
Rindera graeca 521. 19. 2.
tetraspis 521.
Robertia taraxacoides 471.
tenuiflora 470. 132. 3.
Robinia Caragana 188. 33. 1 obs.
frutescens 188.
Pseudacacia 188. 33. 1 obs.
Rochelia stellulata 523.
Rodigia commutata 471.
interrupta 471. 136. 1.
laevigata 471. 134. 1.
Roemeria hybrida 25.
Romulea Bulbocodium 704.
Clusiana 704.
Columnae 705.
corsica 705.
crocifolia 704.
elongata 704.
flaveola 704. 1 *
grandiflora 704. 1 *
ligustica 705.
Linairesii 705.
Linairesii 705. 9.
modesta 705. 11.
multiflora 704. 1 *
neglecta 705. 10.
Parlatorii 705. 9.
pulchella 704. 1 *
purpurascens 704.
purpurascens 705. 9.
pylia 704. 1 *
ramiflora 705.
Requienii 705.
Revelieri 705.
Rollii 705. 9.
subalbida 705. 11.
subpalustris 704. 5 *
syrtica 704. 1 *
uliginosa 704. 5 *
Roripa amphibia 35. 20. 3.
austriaca 35. 20. 2.
lippicensis 36. 9.
palustris 36. 8.
pyrenaica 36. 11.
rusticana 51. 45. 1.
silvestris 36. 6.
stolonifera 35. 20. 3.
Rosa abietina 232. 12 *
Acharii 235. 24 *
acicularis 236. 33.
aciphylla 235. 24 *
adjecta 236. 36.
affinis 234. 24 * 235. 25. 237. 37.
agraria 235. 24 *
agrestis 233. 19 *
alpestris 236. 31 *. 36.
alpina 236.
andegavensis 234. 24 *
Andrzeiowski 232.
Andrzeiowski 232. 9.
annesiensis 232. 12.
apennina 233. 19 *
apricorum 233. 16.
arduennensis 232. 12 *
arenivaga 231. 6 *
arguta 234. 22 *
armata 235. 24 *
arvatica 233. 19.
arvensis 231.
arvina 231.
arvina 231. 6 *
aspernata 234. 24 *
assimilis 231. 6.
Annieri 234. 24 *
australis 232. 8 *
austriaca 231. 6 *
Bakeri 233. 20.
balearica 236.

- balsamica 233. 19.
baltica 236.
 belgica 231. 6.
 Bellevalis 235. 27.
 Besseri 237. 38.
bibracteata 231.
 Billietii 233. 19 *
 biserrata 234. 24 *
 biturigensis 237. 37.
 blanda 236. 32 *
 Blondæana 234. 20 *
 Boræana 231. 6 *
 borealis 237. 37.
 Boreykiana 235. 27 *
 Borkhausenii 232. 12.
 Borreri 233. 20 *
 Boullui 233. 19 *
 bractescens 235. 26.
 brevistyla 231. 7 *
 caballicensis 236. 30 *
 cæsia 235. 27.
 calycina 235. 24 *
 camberiensis 232. 13.
 campestris 234. 23.
 canescens 235. 26.
canina 234.
 cantabrica 231. 7.
 capnoides 232. 12 *
carelica 236.
 Carioti 234. 24.
 caryophyllacea 232. 12 *
 celsicola 236. 31 *
 cerasifera 235. 27.
 Chaboissæi 234. 24 *
 Chaillietii 232. 13.
 Chapusii 235. 25 *
 Chavini 235. 28 *
 cheriensis 233. 19 *
 ciliatopetala 231. 8. 232.
 9.
 cinerascens 232. 12 *. 235.
 26 *
 cinerea 235. 27. 236. 32.
 cinerosa 235. 26.
cinnamomea 236.
 cinnamomea 236. 36.
 cladoleia 234. 24 *
 clivorum 232. 12 *
 clotildea 231. 7.
 Clusiana 231. 8. 237. 36 *
collina 235.
 collina 231. 7 *. 235. 25.
 collivaga 232. 12.
 commutata 234. 21 *
 comosa 233. 16.
 complicata 236. 31.
 concinna 233. 20.
 condensata 235. 24 *
 confusa 232. 12.
 conica 231. 5.
 consanguinea 234. 23 *
 consimilis 237. 38.
 conspicua 231. 4.
 controversa 234. 20 *
 cordifolia 231. 6.
coriifolia 235.
 coronata 237. 40.
 corymbifera 235. 27 *
 Colleti 234. 23 *
 crassifolia 235. 26.
 cremsensis 232. 9.
 Crepiniana 236. 31 *
 cretica 232. 14.
 cuspidata 232. 12 *
 cuspidatoides 232. 12 *
 Czackiana 231. 6.
 decipiens 231. 6 *
 decora 234. 21.
 Delasoiei 236. 31.
 densa 233. 16.
 Deseglisei 235. 27.
 dichroa 237. 39.
 diminuta 233. 16.
 dimorpha 232. 12.
 dimorphacantha 233. 16.
 Diomedis 235. 28.
 dolosa 234. 24 *
 Doniana 237. 40 *
 dryadea 234. 23.
 dumalis 234. 24 *
dumetorum 235.
 dumosa 232. 12 *
 echinocarpa 233. 18.
 Eglanteria 233. 16. 237.
 41.
 erinacea 237. 40 *
 eriostyla 234. 24 *
 erronea 231. 3.
 erythrantha 235. 25.
 falcata 236. 30 *
 fallaciosa 235. 27.
 fallens 235. 24 *
 farinosa 232. 12 *
 farinulenta 232. 12 *
 fastigiata 231. 7 *
 ferox 233. 17.
ferruginea 235.
 firma 234. 24 *
 fissispina 234. 24 *
 flexibilis 235. 24 *
flexuosa 234.
 floribunda 233. 16.
 foecundissima 236. 32.
 foetida 232. 12 *
 Forsteri 235. 25 *
 Fourræi 231. 6 *
 Franzonii 236. 29.
 fraxinifolia 236. 32 *
 friburgensis 231. 8.
 Friedländeri 235. 27.
 Friedländeriana 235. 27.
 Friesii 235. 27.
 frutetorum 235. 26.
 fugax 236. 31.
gallica 231.
 gallicoides 231. 3.
 Gandogeriana 231. 2.
 Gaudini 231. 8.
 geminata 231. 6 *
 genevensis 232. 12 *
 Gennarii 234. 24.
 gentilis 237. 37 *
 Gisleri 232. 12 *
 glaberrima 234. 24 *
 glabrata 236. 29 *
 glabrescens 232. 13.
 glandulosa 234. 22. 236.
 30. 237. 36 *
glauca 236.
 glauca 235. 24 *. 236. 29.
 glaucescens 234. 24. 236.
 29.
 globularis 235. 24 *
glutinosa 232.
 glutinosa 231. 8. 233. 15.
 19.
 Godeti 234. 23 *
 gombensis 231. 8.
 gracilis 237. 40 *
 granatensis 237. 39.
 graveolens 233. 19 *. 235.
 28.
 Grenieri 231. 8.
 Guepini 235. 27.
 Habermaniana 234. 24 *
Hackeliana 233.
 hallandica 233. 20.
Heldreichii 232.
 hemitricha 235. 25 *
 herporhodon 231. 3.
 hibernica 236. 31 *. 237.
 37 *. 38.
 hispanica 234. 20 *. 235.
 28 *
horrida 233.
 hybrida 231. 5.
 hystrix 233. 18.
 imitata 235. 27.
 immitis 231. 7 *
 implexa 235. 25 *
 imponens 236. 30 *
 incarnata 231. 6 *
 inclinata 236. 31.
 incomparabilis 231. 6 *
 inconsiderata 235. 28 *
 inconspicua 234. 24 *
 inodora 235. 19. 20 *

insidiosa 232. 12. 234. 23.
 insignis 234. 24 *
 intercalaris 236. 36.
 intermissa 232. 12.
 intricata 232. 12. 236. 31.
 involuta 237.
 jactata 235. 25 *
 Jordani 233. 19 *
Jundzilli 234.
 jurana 232. 13.
 Kluckii 233. 19.
 Klukii 233. 19 *
 Kosinsciana 234. 24 *
 lactiflora 233. 16.
 ladanifera 233. 19 *
 lagenaria 237. 36 *
 latebrosa 234. 24 *
 Lemaitrei 235. 24 *
 Lemani 233. 18.
 leucantha 235. 25.
 leucochroa 231. 7 *
 Libertiana 233. 18.
 livescens 234. 22 *
 Lloydii 235. 27.
 longepedunculata 236. 30.
 lucida 236. 35.
 lugdunensis 233. 19 *
 Lusseri 233. 17 *
lutea 237.
 lutetiana 234. 24.
 macrantha 235. 27 *
 macroacantha 234. 24.
 macrocarpa 234. 24 *
 macropoda 237. 39.
 majalis 236. 32.
 malmundariensis 234. 24.
 Mareyana 232. 12 *
 Martini 235. 28 *
 Mathonneti 237. 38.
 medioxima 234. 24.
 mentita 233. 19 *
 micans 232. 12 *
micrantha 233.
 micrantha 233. 16. 235.
 28.
 microcarpa 237. 38.
 minuta 231. 8.
 mirabilis 231. 6 *
 mitissima 237. 38.
 mixta 231. 6 *
 mollis 232. 9.
mollissima 232.
 mouspeliaca 237. 36 *
montana 236.
 montana 232. 12 *
 montivaga 234. 24 *
moschata 230.
 mucronulata 234. 24.
 multivaga 232. 13.

Murithii 231. 8.
myriacantha 237.
 myrtifolia 233. 19 *
 nebrodensis 234. 20 *
 neglecta 233. 19.
 nemorivaga 234. 21.
 nemorosa 233. 18.
 nevadensis 231. 7.
 nitens 234. 24.
 nitidula 234. 22 *
 nivalis 237. 40 *
 obscura 235. 25 *
 obtusifolia 235. 25.
 Oederiana 237. 38.
 oenensis 234. 24 *
 omisa 232. 9.
 opaca 235. 25 *
 opacifolia 231. 6 *
 operta 233. 18 *
 Orphanidis 233. 15 *
 orthacantha 235. 24 *
 ovata 231. 3.
 Ozanonii 237. 38.
 parvula 231. 7 *. 233. 16.
 pendulina 237. 36 *
 pennina 236. 31.
 permixta 233. 17 *
 Perrieri 236. 30 *
 Perusiana 231. 8.
pimpinellifolia 237.
 pimpinellifolia 237. 38.
 platyphylla 235. 25 *
 platyphylloides 235. 25 *
 Polliniana 231. 5.
pomifera 231.
 pomifera 232. 9 *
 poteriifolia 237. 38.
Pouzini 235.
 præcox 232. 12.
 præterita 234. 20 *
 propinqua 232. 13.
 prostrata 231. 2.
 protea 234. 23.
 provincialis 231. 6. 233.
 17.
 proxima 231. 8.
 pseudoflexuosa 234. 21.
 psilophylla 234. 24 *
 Pugeti 234. 21 *
 pulchella 231. 6 *. 232.
 12.
 pulverulenta 232. 14.
 pumila 231. 6 *
 pustulosa 232. 14.
 pygmæa 231. 6.
 pyrenaica 237. 36 *
 pyriformis 235. 27.
 ramealis 235. 25 *
 ramosissima 235. 24 *

ramulosa 234. 24 *
 Ratomschiana 235. 27 *
 Raui 234. 24 *
 recondita 231. 8.
 repens 231. 3.
 resinosa 232. 8 *. 9 *. 233.
 16.
 resinosoides 232. 9 *
 reticulata 234. 22.
 Reuteri 236. 31.
 reversa 237. 38 *
 Reynieri 236. 30.
 Rhodani 231. 5.
 rigidula 235. 27.
 Ripartii 237. 39.
 rotundifolia 233. 16.
 Rousselli 235. 24 *
 rubella 237. 37 *
 rubescens 234. 24 *
 rubicunda 236. 29.
rubiginosa 233.
 rubiginosa 233. 17 *
 rubiginoso-pimpinellifolia
 237. 37.
 rubrifolia 235. 29.
 rupestris 236. 36.
 ruralis 231. 6.
 ruscinonensis 230. 1.
 rusticana 231. 4.
 sabauda 237. 40.
 Sabini 237. 40 *
 salævensis 236. 30 *. 237.
 36 x
 salvanensis 233. 17 *
 Sambrancheriana 236. 31.
 sarmentacea 234. 24 *
 saxatilis 234. 24 *. 235.
 27 *
 scabriuscula 232. 12 *
 scandens 231. 2.
 Scheutzii 232. 9 *
 Schottiana 235. 24 *
 Schultzii 236. 31 *
 sclerophylla 233. 20 *
 scotica 237. 37.
 semiglabra 235. 25 *
 semiglandulosa 234. 20 *
sempervirens 230.
 sempervirens 231. 2.
 senticosa 235. 24 *
 seperina 231. 3.
sepium 233.
 sepium 234. 24. 235. 27 *
 septicola 233. 18 *
 Seraphini 233. 19 *
 Seringeana 232. 12 *
 setulifera 234. 21.
 sicula 233. 15.
 silvatica 231. 6 *

- silvestris* 231. 3. 235. 25 *.
 27 *
silvicola 233. 16.
similata 233. 20.
solstitialis 235. 25. 26.
speciosa 234. 21.
sphaerica 235. 24 *
sphaerocarpa 235. 25 *
sphaerophora 233. 18 *
spinosissima 237.
spinosissima 236. 32. 35.
 237. 39.
spinulifolia 232.
spretia 237. 38.
spuria 234. 24 *
squarrosa 234. 24 *
stipulacantha 234. 24 *
stipularis 234. 24 *
stylosa 231.
stylosa 231. 3. 7 *
suberistata 236. 31 *
subdola 233. 19 *
Suberti 235. 24 *
subglobosa 232. 12.
subinermis 231. 6 *
subintrans 234. 20 *
submitis 235. 25.
subulida 234. 21 *
Sufferti 232. 12 *
Swartzii 234. 24.
syntrichostyla 234. 24.
systla 231. 7 *
terebinthacea 234. 21 *.
 235. 26.
Thomasii 234. 21.
Timeroi 235. 24 *
tomentella 233.
tomentosa 232. 12.
tortuosa 234. 24 * (bis)
Touranginiana 235. 24 *
trachyphylla 234.
trachyphylla 234. 20 *
transiens 236. 31.
transmota 234. 24 *
transsilvanica 235. 24 *
trichoneura 235. 25 *
triflora 231. 6 *
tristis 232. 12 *
tunoniensis 232. 12.
turbinata 231. 6 obs.
turbinella 236. 32.
tyroliensis 233. 20.
umbellata 233. 16.
uncinella 235. 25 *
uncinelloides 235. 25 *
urbica 235. 25 *
uriensis 232. 12 *
Vaillantiana 233. 19 *
valesiaca 233. 20 *
velutina 232. 12 et *
velutinæflora 231. 6 *
venosa 236. 31 *
venusta 232. 9 *
Verloti 235. 24 *
versicolor 233. 19.
verticillacantha 234. 24 *
vestita 232. 12 *
vicina 235. 28.
Villarsiana 237. 38.
villosa 231. 8. 232. 9. 12.
villosiuscula 234. 24 *
villosula 233. 20. 235. 27.
vinealis 235. 24 *
vinetorum 234. 20 *
vinodora 233. 19 *
virescens 231. 6 *
virginea 231. 7 *
virgultorum 233. 19.
viscida 234. 20 *
viscosa 233. 19 *
vogesiaca 236. 31.
vosagiaca 236. 31.
wasserburgensis 234. 21.
Wilsoni 237. 40.
Wolfgangiana 231. 6 *
Rosmarinus laxiflorus 571.
 5. 1 *
officinalis 571.
Rothia tenuifolia 438. 113. 3.
Rottboellia altissima 845. 111.
 1.
cylindrica 846. 114. 1.
digitata 845.
erecta 846. 3.
filiformis 846. 3.
incurvata 846. 2.
loliacea 845. 10.
monandra 846. 115. 1.
pannonica 845. 113. 1.
Sandorii 845. 112. 1.
subulata 846. 114. 1.
Roubieva multifida 624.
Roucela Erinus 481. 71.
hederacea 486. 8. 1.
Rubia angustifolia 323.
Aucheri 323. 2. 2.
Bocconi 323. 2. 2 *
cretica 323. 2. 1.
dalmatica 323. 2. 2.
longifolia 323. 2. 3.
lucida 323. 2. 1. 2.
Olivieri 323.
peregrina 323.
Requienii 323. 2. 3.
silvestris 323. 2. 2.
splendens 323. 2. 2.
tatarica 323. 3. 1.
tenuifolia 323. 2. 1.
tinctorum 323.
Rubus abruptus 217. 13.
acheruntinus 221. 50 *
acidacanthus 218. 21 x
acridentulus 220. 40.
aculeatissimus 220. 35.
acuminatus 216. 10.
adenoleucus 221. 49 *
adornatus 219. 25 *
affinis 216.
affinis 216. 3.
agastachys 217. 15.
aggregatus 219. 26.
agrestis 218. 21 *. 221.
 49.
albicornis 219. 30 *
althæifolius 221. 49.
ambifarius 221. 49 *
amiantinus 217. 15 *
ammobius 216. 4 x
amoenus 217. 13 *. 220.
 40 *
amphitapos 218. 21 x
amygdalanthus 216. 10.
anomalus 218. 21 x
apiculatus 219. 28 +
approximatus 219. 25.
apricus 220. 36 *
arcticus 222.
arduennensis 216.
Areschougii 221. 50 x
argentatus 217. 15 *
argenteus 216. 10. 217.
 15 *. 218. 21.
argyropsis 216. 10.
Arrhenii 218.
Arrhenii 221. 48.
atrocaulis 217. 16.
atrorubens 219. 25 *
atrovirescens 219.
australis 218. 21.
Babingtonii 219. 32.
baldensis 218. 21 x
Balfourianus 221. 48.
Banningii 216. 8 *
bavaricus 220. 36.
Bayeri 220.
Bellardii 220. 42.
Bertramii 216. 4 x
bertricensis 218. 21 x
Betckei 220. 37 *
bifrons 217.
Bloxami 219. 32.
Borreri 218. 19.
brachyandros 220.
brachyphyllus 217. 11.
bracteatus 219. 32.
bregutiensis 218. 23 *
cæcio-idæus 221. 50.

- cæsius* ~~*X*~~ *candicans* 221. 50.
cæsius 221.
callianthus 221. 49 *
calvatus 218. 18.
calyculatus 220. 39 *
candicans 216. 10.
canescens 218. 21.
carpinifolius 216.
Casparyi 219. 28.
castoreus 222.
cernuus 220. 40 *
Chamæmorus 222.
chlorocarpus 217. 13.
chlorothyrsus 218. 18 *
chnoostachys 218. 21 ~~*X*~~
cinerascens 219. 26. 30 *
cinereus 218. 21.
coarctatus 216. 10.
collinus 218.
collinus 216. 11. 218. 21.
communis 216. 8.
confluentinus 217. 15.
conspicuus 218. 23.
cordifolius 216. 9 *
cordigerus 220. 39 *
corylifolius 221.
corylifolius 216. 4. 221.
49.
corymbosus 221. 45.
cruentatus 219. 26.
Cupanianus 220.
cyclopetalus 216. 10.
dalmaticus 217. 13 *
Debeauxii 221. 49 *
Decheni 217. 17 *
Decloetii 216. 5.
delectus 221. 49 *
deltoideus 218. 21 *
dicrophilus 221. 45.
discolor 217.
discolor 217. 14. 14 *. 16.
discriminatus 221. 49 *
dissectus 218. 21.
distractus 220. 36.
divaricatus 216. 7 *
diversifolius 221. 49 *
dubiosus 221. 49 *
dumeto-hirtus 221. 49 *
dumetorum 221. 49.
Ebneri 221. 45.
echinatus 219. 28.
eglandulosus 220.
egregius 216. 10 *
eifelensis 219. 24 *
elator 216. 10.
epipsilos 217. 16 *
erubescens 219. 26.
excelsior 216. 10.
exsecatus 219. 26.
falcarius 217. 15.
fallax 216. 10.
fastigiatus 215. 2. 216. 3.
221. 48.
ferox 221. 49 *
festivus 219. 27 *
Fieberi 221. 49.
fimbrifolius 216. 10 *
fissus 215. 2 *
floribundus 219. 27 *
foliosus 219.
foliosus 218. 18 *. 23 *
fragrans 216. 10.
Francipani 217. 13.
fraternus 218. 23 *
fruticosus 216. 4. 10. 217.
13.
Fuckelii 219.
fusco-ater 220.
fusco-ater 219. 25 *
fuscus 219. 33 *
Genevieri 219. 32.
geniculatus 216. 7. 217.
15.
Gerardi Martini 219. 27.
geromensis 220. 39.
glabrefactus 218. 21.
glandulosus 220. 40.
Godroni 217. 15 *. 221.
49 *
Grabowskii 216. 7 *. 10.
grandiflorus 221. 49 *
gratus 217. 16 *
Gremlii 218. 18 *
Guentheri 219. 30 *. 220.
40 *
hamulosus 216. 5.
Hasskarlii 219. 24 *
helveticus 218. 18 *
heteracanthus 220. 35.
heteroclitus 216. 7 *
hirsutus 218. 23. 220. 36 *
hirtifolius 219. 23 *
hirtus 220.
hirtus 220. 42.
hispanicus 217. 13 *
horridus 219.
horridus 220. 36. 221. 49 *
hostilis 219. 28.
humifusus 220. 38 *
humulifolius 222.
hybridus 215. 2. 220. 42.
hypoleucos 217. 17. 218.
21.
hypomallus 216. 10. 218.
21 ~~*X*~~
hystrix 220. 35 *
idæo-cæsius 221. 50.
idæus 215.
Jenseni 221. 45.
incarnatus 217. 16.
incultus 220. 39 *
incurvatus 221. 48.
infestus 216. 7 *. 219. 25.
insericatus 219. 26.
insolatus 220. 40 *
Kaltenbachii 220. 37. 40 *
Koehlerii 220.
lamprophyllus 220. 41.
lanatus 218. 23.
Laschii 221. 50 +
lasiocladus 217. 15 *
Leesii 215. 1.
Leightonii 219. 29.
Lejeunii 219.
Lejeunii 219. 25.
lepidus 217. 15 *
leptacanthos 220. 36 *
leucandrus 217. 16 *
leucanthemus 218. 23.
leucophæus 218. 21 *
leucophyllus 218. 21.
leucostachys 218. 23.
levefactus 216. 10 *
Leyi 218. 18 *
lilacinus 220. 40 *
Lindebergii 217. 14 *
Lindleyanus 216. 8 *
Lingua 219. 28 +
Lloydianus 218. 21.
Löhrii 219. 29.
Maasii 216. 9 *
macranthelos 219. 23 *
macroacanthus 218.
macroacanthus 216. 8.
macrophyllus 217.
macrostemon 217. 15 *
macrothyrsos 218. 23.
malacophyllus 218. 21 *
marginum 218. 21 *
maximus 221.
maximus 221. 48.
megathamnus 218. 21 ~~*X*~~
melanoxydon 217. 16 *
Menkei 219.
Menkei 218. 23.
mentitus 219. 28. 32.
Mercieri 217. 11.
meridionalis 218. 21.
Metschii 220.
microacanthus 215. 2.
Mikani 220. 36 *
minutiflorus 220. 38.
mollis 221. 49.
montanus 216. 7 *. 10.
Mougeoti 221. 49 *
mucronulatus 220. 40.
Muenteri 216. 9 *

- Mülleri 220. 39.
 myriacanthus 221. 49 *
 neglectus 221. 49 *
 nemorosus 221.
 nemorosus 218. 23.
 nitidus 216.
 nitidus 216. 8 *
 nutans 215. 2.
 obliquus 219. 33.
 oblongifolius 219. 24.
 obscurifrons 219. 27 *
 obscurus 219.
 obtusatus 217. 16.
 oligacanthos 221. 49.
 omalodontos 220. 36 *
 opacus 216. 4. 4 x
 oreades 221. 45.
 orthacanthus 221.
 pallidus 219.
 pannosus 219. 24 *
 panormitanus 221.
 permiscibilis 218. 21 *
 perplexus 220. 40 *
 persicinus 216. 10.
 petraeus 220. 36 *
 phyllophorus 220. 42.
 pileostachys 217. 17 *
 plicatus 216.
 polyacanthus 220. 41.
 polyanthus 218. 21 x
 porphyraianthus 216. 9.
 praecox 216. 3.
 prasinus 221. 45 *
 pruinosis 221. 48 *
 pseudoidaeus 215. 2.
 pseudopsis 221. 45 *
 psyllostachys 216. 10.
 pubescens 217.
 purpureus 216. 10.
 pycnostachys 218. 21 x
 pygmaeopsis 220. 38 *
 pygmaeus 220. 36 *. 38 *
 pyramidalis 219. 23 *. 30 *
 pyramidatus 216. 8 *
 Radula 219.
 rectispinus 218. 21 x
 Reichenbachii 217. 16 *
 Reussii 220. 40 *
 rhamnifolius 216.
 rhamnifolius 217. 14.
 rhombifolius 217. 16 *
 rivularis 220. 39 *
 robustus 217. 15. 15 *. 218.
 21 x
 rosaceus 220. 35.
 rosulentus 216. 4.
 Rothii 219. 23 *
 rotundipetalus 216. 10.
 rubeculus 216. 6. 9 *
 rubescens 220. 35 *
 rubicundus 219. 26.
 rudis 219.
 rudis 219. 28.
 rusticanus 217. 13.
 Salteri 218. 18.
 saltuum 219. 30 *
 sanctus 217. 13 *
 saxatilis 222.
 saxicolus 220. 40 *
 scaber 219. 33 *
 Schleicheri 220.
 Schlechtendalii 217. 17.
 Schlickumi 216. 10 *
 Schultzii 218. 21 x
 sericophyllus 218. 21 x
 serpens 220.
 serpens 221. 45.
 sicularis 218. 21.
 silesiacus 216. 10 *
 silvaticus 218.
 silvaticus 217. 16.
 silvestris 219. 30.
 speciosus 217. 14.
 Sprengelii 218.
 suavifolius 218. 23 *
 suberectus 215.
 subinermis 215. 2.
 sulcatus 215.
 tenuis 221. 50.
 teretiusculus 218. 23 *
 thuringiacus 219. 28.
 thyrsanthus 216. 10.
 thyrsoiflorus 219.
 thyrsoiflorus 220. 37 *
 thyrsoideus 216.
 thyrsoideus 217. 15.
 tomentosus 218.
 Trevirani 216. 10 *
 trichocarpus 219. 33 *
 triphyllus 218. 21.
 tuberculatus 221. 49 *
 ulmifolius 221.
 ulmifolius 217. 13 *
 umbraticus 219. 23 *
 umbrosus 217. 16 *
 uncinatus 219. 29.
 vespicum 218. 21 *
 Vestii 217.
 vestitus 218.
 vestitus 218. 23.
 vigorosus 216. 6.
 Villarsianus 221. 45.
 villicaulis 217.
 villosus 219. 23 *
 vinetorum 218. 23.
 viretorum 218. 21 *
 viridis 215. 2. 220. 39 *
 viscosus 219. 30.
 vulgaris 216.
 Wahlbergii 221.
 Weigelii 220. 40 *
 Weihei 221. 49.
 Weitenberii 218. 21.
 Wimmeri 217. 17.
 Winteri 217. 15 *
 Rudbeckia hirta 348. 1. 4
 obs.
 laciniata 348. 1. 4 obs.
 Rumex Acetosa 635.
 Acetosa 635. 27.
 Acetosella 636.
 Acetosella 636. 33.
 acetoselloides 636. 34.
 aculeatus 635. 23.
 acutus 634.
 acutus 633. 8. 634. 14.
 adulterinus 634. 10.
 aetnensis 636. 32.
 alpinus 633.
 ambiguus 635. 27.
 amplexicaulis 635. 25 *
 aquaticus 633.
 aquaticus 633. 1.
 aquatico-hydrolapathum
 633. 2.
 arifolius 635.
 aureus 635. 20.
 bucephalophorus 635.
 campestris 634. 14.
 chymophyllus 633. 7.
 confertus 634. 9 *
 conglomeratus 634.
 conspersus 633.
 creticus 636. 30.
 crispus 633.
 cristatus 633. 8. 634. 10.
 dimorphus 635. 25.
 divaricatus 634. 11. 17.
 domesticus 633.
 elongatus 633. 7 *
 Friesii 633. 3. 634. 11.
 gentilis 634. 10 *
 glaucus 636. 32.
 graecus 633.
 graminifolius 636.
 hastifolius 635. 28 *. 636.
 32.
 Heleolapathum 633. 3.
 heterophyllus 633. 2.
 Hippolapathum 633. 3. 4.
 hispanicus 635. 27.
 hortensis 635. 27.
 Hydrolapathum 633.
 induratus 636. 32 *
 intermedius 635.
 intermedius 635. 27. 636.
 29.

- iseriensis 634. 9.
 Knafii 635. 20 x
 laevigatus 634. 11.
 limosus 635. 19.
 lingulatus 633. 7.
 luxurians 635. 25 *
 maritimus 635.
 Marschallianus 635.
 maximus 633.
 multifidus 636.
 multifidus 635. 28.
 uebroides 635. 28 *
 Nemolapathum 634. 13. 14.
 nemorosus 634. 13.
 nivalis 635.
 obtusifolius 634.
 obtusifolius 634. 12.
 obovatus 634. 13.
 palustris 635.
 papillaris 635. 27 *
 Patientia 633.
 platyphyllus 633. 3 *
 pratensis 634. 10.
 propinquus 633. 4 x
 Pseudo-Acetosa 635. 27.
 pulcher 634.
 pyrenaicus 636. 35.
 Raulini 635.
 reticulatus 634. 17.
 rupestris 634.
 sanguineus 634.
 scutatus 636.
 scutatus 636. 32 *
 silvestris 634.
 Steini 635. 19 *
 stenophyllus 634.
 stenophyllus 635. 27.
 suffocatus 634. 17 *
 suffruticosus 636.
 thyrsiflorus 635. 27.
 thyrsoides 636.
 thyrsoides 635. 28.
 tingitanus 636.
 triangularis 635. 27. 28 *
 tuberosus 636.
 ucranicus 635.
 uliginosus 635. 19.
 vesicarius 635.
 vinealis 637. 27.
 Wallothii 634. 11.
 Warrenii 635. 20 x
 Winterlii 634. 14.
 Rumia frigida 308.
 Guicciardii 308.
 leiogona 308. 88. 2.
 taurica 308.
 Ruminia hiemalis 714. 7. 9.
 Ruppia aragonensis 685. 4. 3.
 brachypus 685.
 drepanensis 685.
 maritima 684. 4. 1. 685.
 4. 3.
 obliqua 684. 4. 1 *
 rostellata 685.
 spiralis 684.
 transsilvanica 684. 4. 1 *
 Ruscus aculeatus 715.
 Hypoglossum 715.
 Hypophyllum 715.
 microglossus 715. 2.
 Ruta angustifolia 143. 3.
 Besseri 142. 2. 3.
 Biebersteinii 142. 2. 4.
 bracteosa 143.
 Buxbaumii 143. 2. 8.
 chalcensis 143.
 chalcensis 143. 2.
 coronata 142. 2. 1.
 corsica 143.
 crithmifolia 143. 5.
 divaricata 143. 1.
 fumarifolia 143. 3 *
 graveolens 143.
 graveolens 143. 5.
 hortensis 143. 4.
 linifolia 142. 2. 2. 4. 143.
 2. 6. 8.
 macrophylla 143. 2.
 montana 143.
 patavina 142. 2. 2.
 rosmarinifolia 143. 2. 7.
 spathulata 143. 2. 8.
 suaveolens 142. 2. 4.
 taurica 142. 2. 5.
 tenuifolia 143. 6.
 Ruyschiana laciniata 585. 23.
 1.
 spicata 585. 23. 1.
 Sabulina austriaca 117. 5.
 biflora 118. 20.
 caespitosa 119. 25.
 fastigiata 117. 12.
 Gerardi 119. 25.
 glareosa 118. 23.
 graminifolia var. 117. 6.
 loricifolia 116. 9. 1.
 macrocarpa 116. 9. 2 *
 marginata 118. 15.
 polygonoides 113. 7.
 Ponæ 113. 6.
 procera 113. 7. 1.
 recurva 118. 23.
 rostrata 118. 15.
 sphagnoides 113. 10.
 striata 116. 9. 2.
 stricta 118. 18.
 tenella 117. 5 *
 Saccharum *egyptiacum* 785.
 cylindricum 785. 3. 1.
 laguroides 785. 3. 1.
 Ravanæ 785. 2. 1.
 Sisca 785. 3. 1.
 strictum 785. 2. 2.
 Sagina ambigua 121. 9.
 apetala 121.
 bryoides 121.
 ciliata 121.
 corsica 121.
 debilis 121. 13.
 densa 121. 13.
 depressa 121. 9.
 fasciculata 121.
 filicaulis 121. 10.
 filiformis 121. 13.
 glabra 120.
 glandulifera 120. 1.
 glandulosa 120. 1.
 Lamyi 121.
 Linnæi 121.
 macrocarpa 121. 7 *
 maritima 121.
 muscosa 121. 14 *
 nevadensis 120.
 nivalis 121.
 nodosa 120.
 patula 121. 9 *
 pilifera 121. 4.
 procumbens 121.
 Reuteri 121.
 Revelieri 120. 2.
 Rodriguezii 121. 13 *
 sabuletorum 121.
 saxatilis 121. 7.
 stricta 121. 13.
 subulata 120.
 Thiebautii 121. 13.
 urceolata 121. 13.
 Sagittaria *sagittifolia* 679.
 Salicornia Alpini 628. 16. 1.
 amplexicaulis 629. 19. 4.
 annua 629. 17. 3.
 biennis 629. 17. 3.
 Emerici 629. 17. 3.
 fruticosa 629.
 fruticosa 628. 16.
 fruticulosa 629. 17. 1.
 herbacea 629.
 macrostachya 628. 16. 1.
 patula 629. 17. 3.
 perennans 629. 17. 3.
 procumbens 629. 17. 3.
 pygmaea 629. 19. 2.
 radicans 629.
 radicans 629. 17. 1.

- sarmentosa 629. 17. 2.
 stricta 629. 17. 3.
 Salix acuminata 666. 15 *.
 acutifolia 666.
 affinis 666. 15 et *
 alba 664.
 albicans 667. 21.
 alopeurioides 665. 4 ×
 alpestris 669. 32. 670. 44.
 alpigena 670. 45.
 alpina 669. 32. 670. 43.
 Amandæ 670. 39 ×
 Amaniana 668. 30.
 ambigua 668. 29 ×
 amplexicaulis 665. 5 *
 amygdalina 664. 4.
 androgyna 665. 4.
 angustifolia 665.
 angustifolia 668. 28. 29 ×
 appendiculata 667. 21.
 aquatica 667. 24.
 arbuscula 669.
 arbuscula 669. 31.
 arctica 670.
 arenaria 668. 29.
 argentea 668. 29.
 atrocinerea 667. 24.
 attenuata 667. 21 ×
 aurita 667.
 aurita-cinerea 667. 24 ×
 aurita-grandifolia 667. 21 ×
 aurito-incana 667. 17 ×
 aurita-livida 667. 22 ×
 aurita-myrtilloides 668.
 27 ×
 aurita-silesiaca 667. 23 ×
 auritoides 665. 5 ×
 aurora 668. 27 ×
 austriaca 665. 5 ×
 babylonica 664. 3 obs.
 badensis 669. 30 ×
 bicolor 668. 26. 669. 31
 et ×
 bioida 667. 17 ×
 blanda 664. 3 ×
 borealis 668. 30.
 Brayi 670. 43.
 cæsia 665.
 calliantha 665. 5 ×. 7 ×
 calodendron 666. 15 *
 canaliculata 668. 28.
 canescens 670. 38 ×
 caprea 667.
 caprea-aurita 667. 20 ×
 caprea-cinerea 667. 20 ×
 caprea-daphnoides 666.
 12 ×
 caprea-dasyclados 666. 15 *
 caprea-incana 667. 19.
 caprea-lapponum 670. 38 ×
 caprea-nigricans 669. 30 ×
 caprea-purpurea 665. 5 ×
 caprea-silesiaca 667. 23 ×
 caprea-viminalis 666. 15.
 capreola 667. 20 ×
 cerasifolia 669. 35.
 chlorophana 669. 33 ×
 chrysanthos 669. 37.
 ciliata 670. 40.
 cinerascens 667. 21.
 cinerea 667.
 cinerea-aurita 667. 24 ×
 cinerea-lapponum 670. 38 ×
 cinereo-limosa 670. 38 ×
 cinerea-livida 668. 26 ×
 cinerea-nigricans 669. 30 ×
 cinerea-purpurea 665. 5 ×
 cinereo-silvatica 667. 23 ×
 cinerea-viminalis 666. 15 ×
 coerulea 664. 3.
 coerulescens 668. 26 ×
 constricta 667. 24.
 coruscans 669. 33.
 Cotteti 671. 45 ×
 cratægifolia 669.
 cuspidata 664. 1 ×
 cyllenea 666. 17.
 daphneola 670. 38.
 daphnoides 665.
 daphnoides-incana 666.
 12 ×
 daphnoides-phylicifol. 669.
 31 ×
 daphnoides-repens 668.
 29 ×
 depressa 668. 26. 669. 37.
 dichroa 665. 5 ×
 discolor 665. 5 ×. 669.
 31 ×
 Doniana 665.
 Ehrhartiana 664. 1 ×
 elaëgnifolia 665. 7.
 elaëgnoides 670. 39.
 elegans 668. 27.
 Erdingeri 666. 12 ×
 excelsior 664. 2 ×
 Fenzliana 671. 45 ×
 ferruginea 666. 15 ×
 finmarkica 668. 27 × bis
 fissa 665. 7.
 Flüggeana 667. 18.
 foetida 669. 32.
 Forbyana 665. 7.
 formosa 669. 32.
 fragilis 664.
 fragilis-alba 664. 2 ×
 fragili-triandra 665. 4 ×
 Friesiana 668. 29 ×
 Friesii 664. 1.
 fruticulosa 669. 32 ×
 fusca 668. 27 ×. 29. 670.
 43.
 glabra 669.
 glabra-grandifolia 669. 33.
 glabra-nigricans 669. 33.
 glauca 670.
 glauca 670. 38 et *
 glauca-grandifol. 667. 21 ×
 glauco-myrsinites 670. 43 ×
 glauca-nigricans 670. 39 ×
 glauco-phylicifol. 670. 39 ×
 glauca-retusa 670. 39.
 glaucoides 670. 43 ×
 Grahami 671. 45 *
 grandifolia 667.
 grandifolia 667. 20.
 grandifolia-arbuscula 669.
 32 ×
 grandifol.-incana 666. 17 ×
 Hartmaniana 669. 37 ×
 hastata 669.
 hastata-herbacea 671. 47.
 hastata-reticuloides 671.
 51 ×
 hastata-silesiaca 669. 33 ×
 Hegetschweileri 669. 31 *
 Helix 665. 5.
 helvetica 670. 38 *
 helvetica-myrsinites 670.
 38 *
 herbacea 671.
 herbacea 671. 49. 50.
 herbacea-reticulata 671.
 48 ×
 hexandra 664. 1 ×
 hippophæfolia 666. 16 ×
 hippophæfolia-viminalis
 666. 16.
 hircina 666. 17 ×
 hirtula 668. 27 ×
 holosericea 666. 15 ×. 667.
 19.
 Hoppeana 665. 4.
 Hostii 666. 14 *
 Hutéri 670. 38 *
 hyperborea 669. 35.
 Jacquini 670. 43.
 Jacquiniiana 670. 43.
 incana 666. ×
 incana-aurita 667. 17 ×
 incano-caprea 667. 18. 19.
 incana-cinerea 666. 17 ×.
 667. 18.
 incana-daphnoides 666.
 12 ×
 incubacea 668. 29 et ×
 intermedia 666. 17 ×

- Kanderiana 667. 19.
 Kernerii 667. 17 ×
 Kitaibeliana 670. 45.
 Koernickei 666. 12 ×
 Krausei 665. 4 ×
 Læstadiana 670. 38 ×
 Laggeri 667. 21 ×
 Lambertiana 665. 5.
lanata 669.
lanceolata 665. 4 ×. 666.
 15. 667. 19.
lanceifolia 666. 15 ×
Lapponum 670.
lapponum-arbuscula 670.
 38 ×
lapponum-aurita 670. 38 ×
lapponum-myrsinites 670.
 43 ×
lapponum-myrtilloides 668.
 27 ×
lapponum-silesiaca 670.
 38 ×
latifolia 669. 30 ×
laurina 669. 31 ×
laxiflora 669. 33.
limnogenæ 667. 21 ×
limosa 670. 38 et *
livescens 667. 22 ×
livida 668.
livida-myrtilloides 668.
 27 ×
livida-nigricans 668. 26 ×
livida-purpurea 665. 5 ×
livida-repens 668. 26 ×
Ludwigii 667. 23.
lutescens 667. 24 ×
macrophylla 667. 20.
macrorhyncha 669. 31 ×
majalis 669. 31.
malifolia 669. 35.
Mauckschii 667. 23.
mauternensis 665. 5 ×
Meyeriana 664. 1 ×
Mielichhoferi 669. 33 *
mollissima 666.
mollissima 666. 15.
multinervis 667. 24.
myrsinites 670.
myrsinites-glaucia 670. 43 ×
myrsinites-herbacea 670.
 43 ×
myrsinites-nigricans 669.
 30 ×
myrsinitoides 669. 30 ×
myrtilloides 668.
myrtilloides 669. 32.
myrtoides 668. 26 ×. 27 ×
Neilreichii 665. 5 ×
nigricans 668.
nigricans-cinerea 669. 30 ×
nigricanti-glaucia 670. 39 ×
ivalis 671. 51.
nivea 670. 38 *
Normani 670. 43 ×
notha 670. 43 ×
oleæfolia 667.
oleifolia 667. 17 ×. 24.
onusta 668. 27 ×
onychophylla 671. 48 ×
ovata 670.
paludosa 668. 27 ×
palustris 664. 2 ×
parvifolia 670. 39 ×
patula 667. 17 ×
Patzeana 668. 29 ×
Patzei 667. 22 ×
pedicellata 668.
peloritana 665.
pentandra 664.
pentandra-fragilis 664. 1 ×
phæophylla 670. 43 ×
phlomidoides 667. 24 *
phylicifolia 669.
phylicifolia 668. 30.
phylicifolia-caprea 669.
 31 ×
phylicifolia-hastata 669.
 31 *
phylicifolia-myrsinites 670.
 43 ×
plicata 668. 29 ×
polaris 671.
polyandra 664. 1.
pomeranica 666. 12.
Pontederæ 669. 35.
Pontederana 665. 5 ×
præcox 666. 12.
procumbens 670. 43.
pruinosa 666. 13.
prunifolia 669. 32.
pseudo-glaucia 670. 39.
pubera 666. 16.
puberula 669. 30 ×
pubescens 667. 21.
pulchra 666. 12.
punctata 669. 30 ×
purpurea 665.
purpurea-aurita 665. 5 ×
purpureo-grandifolia 665.
 5 ×
purpurea-incana 667. 17 ×
purpurea-repens 665. 10.
pyrenaica 670.
pyrolæfolia 669.
Reichardtii 667. 20 ×
repens 668.
repens-incana 668. 29 ×
repens-myrtilloides 668.
 27 ×
repens-phylicifol. 669. 31 ×
repens-purpurea 665. 10.
repens-viminalis 668. 29 ×
reptans 670.
reticulata 671.
reticuloides 671. 51 ×
retusa 670.
retusa-glabra 671. 45 ×
retusa-nigricans 671. 45 ×
retusoides 670. 45.
Reuteri 666. 12 ×
rhaetica 669. 31 *
riparia 666. 17.
Ritschellii 665. 5 ×
rosmarinifolia 668.
Rossmæssleri 665. 5 *
rotundifolia 671.
rubens 667. 23.
rubra 665.
rugosa 667. 22.
rugulosa 668. 27 ×
Russelliana 664. 2 ×
Sadleri 669. 37 *
salviæfolia 667. 17 ×. 18.
sarmentacea 671.
Schraderiana 669. 31 ×
sericans 666. 15.
sericea 670. 39.
Seringeana 667.
Seringeana 667. 18.
serpyllifolia 670. 45.
serrulata 669. 35.
Siegerti 665. 5 ×
silesiaca 667.
silesiaca 667. 20.
silesiaca-lapponum 670.
 38 ×
silesiaco-purpurea 665. 5 ×
Smithiana 666.
Sommerfeltii 670. 43 ×
sordida 665. 5 ×
spathulata 668. 29 ×
speciosa 665. 4 ×
sphaclata 667. 20. 21. 668.
 26.
sphærocephala 665. 5 ×
spuria 670. 38 *
Starkeana 668. 26.
stenoclados 668. 26 ×
stenostachya 669. 33.
stipularis 666. 14 *. 667.
 21.
Stuartiana 670. 38.
stylaris 668. 30.
stylosa 668. 30.
subalpina 668. 29 ×
subaurita 667. 23 ×

- subcaprea 667. 23 ×
 subcinerea 667. 23 ×
 subglabra 669. 33.
 subgrandifolia-caprea 667.
 20.
 subhastata 669. 37 ×
 sublanata 669. 37 ×
 superdaphnoides-caprea
 666. 12 ×
 supergrandifolia-caprea
 667. 21 ×
 superpurpureo-grandifolia
 665. 5 ×
 superviminalis-cinerea 666.
 14 *
 Tauschiana 670. 38 ×
 tenuifolia 669. 31.
 tetrandra 664. 1.
 Thomasii 671.
 Traunsteineri 665. 5 ×
 Trevirani 666. 16 ×
 triandra 664.
 triandra-alba 665. 4 ×
 triandra-cinerea 665. 4 ×
 triandra-viminalis 666. 16
 et ×
 uliginosa 667. 21 ×
 undulata 665. 4 ×
 vagans 668. 26.
 vaudensis 669. 30 ×
 velutina 666. 15 ×
 venulosa 669. 32.
 versifolia 668. 27 ×. 29 ×
 viburnoides 669. 35.
 Villarsiana 665. 4.
 vilnensis 668. 27 ×
 viminalis 666.
 viminalis 666. 17.
 viminalis-caprea 666. 15.
 viminalis-cinerea 666. 15 *
 viminalis-incana 667. 17 ×
 viminalis-purpurea 665. 7.
 viminalis-repens 668. 29 ×
 violacea 666. 16 ×
 viridis 664. 2 ×
 vitellina 664. 3.
 volgensis 665.
 Wahlenbergii 669. 30 ×
 Waldsteiniana 669. 32.
 Weigeliiana 669. 31.
 Wichuræ 670. 39 ×
 Wilhelmsiana 665. 9.
 Wimmeri 666. 12 ×
 Wimmeriana 665. 5 ×
 Wulfeniana 669. 33.
 Salsola argentina 631. 23.
 7.
 arborescens 630. 23. 2.
 arbuscula 630.
 articulata 630. 22. 2.
 brachiata 631.
 clavifolia 631.
 collina 631.
 contrversa 631. 23. 10 *
 crassa 631.
 dendroides 631. 23. 5.
 ennea 631. 23. 7.
 ericoides 630.
 ericoides 630. 23. 3.
 flavescens 631. 23. 7.
 foliosa 631. 23. 17.
 fruticosa 630. 23. 1.
 genistoides 630. 22. 1.
 Kali 631.
 lanata 631.
 laniflora 631. 23. 15.
 laricina 631.
 longifolia 630. 23. 1. 631.
 23. 9.
 microphylla 631. 23. 7.
 monandra 631. 25. 1.
 oppositiflora 630. 23. 1.
 oppositifolia 630.
 papillosa 631.
 platyphylla 625. 6. 1.
 rosacea 631.
 rosacea 631. 23. 10 *
 rosea 631. 23. 13.
 salsa 630. 20. 8 * 9.
 sativa 630. 20. 9.
 setifera 631. 24. 1.
 Soda 631.
 Souda 631. 24. 1.
 spicata 630. 20. 9.
 spinosa 631. 23. 10.
 splendens 629. 20. 5.
 tamariscina 631.
 Tragus 631. 23. 10. 10 *
 turgida 631. 23. 10.
 vermiculata 631.
 verrucosa 631.
 Webbii 630.
 Salvia æthiopis 569.
 æthiopis 569. 17.
 agrestis 569. 23.
 amplexicaulis 570. 28 *
 aprica 569. 23.
 arachnoidea 569. 19.
 argentea 569.
 austriaca 569.
 bætica 570. 33.
 Barrelieri 569. 21. 24.
 Baumgartenii 569. 23 *
 Bertolonii 570.
 betonicaefolia 570. 30. 34 *
 bicolor 569.
 Blancoana 568.
 bullata 570.
 calostachya 569. 14.
 calycina 568.
 campestris 570. 27.
 canariensis 569. 11 obs.
 Candelabrum 568.
 candidissima 569.
 candidissima 569. 17.
 ceratophylla 570. 37.
 ceratophylloides 570.
 clandestina 570.
 clandestina 570. 34 * 35 *.
 36.
 controversa 570.
 crassifolia 569. 20.
 cremenecensis 570. 30.
 cretica 568. 5.
 disermas 570. 34.
 dumetorum 570.
 elata 570. 28.
 Forstæhlii 569.
 fragifera 568. 10.
 fruticosa 568. 7.
 garganica 570. 27.
 glutinosa 569.
 grandiflora 568.
 Gussonii 569. 17.
 Hablitziana 568.
 hæmatodes 569.
 hastata 570. 31.
 Hermani 570. 27 obs.
 hiemalis 570. 35.
 hispanica 571. 42 obs.
 hispanorum 568. 5.
 horminoides 570. 34 * 35.
 Horminum 571.
 hypanica 570. 27.
 inamoena 569.
 laciniosa 569. 23.
 lavandulaefolia 568.
 lusitanica 570. 32.
 multifida 570. 35 *
 napifolia 571.
 napifolia 571. 40.
 neglecta 570. 34 *
 nemorosa 569. 23 * 570.
 28.
 nutans 570.
 oblongata 570. 34 *
 officinalis 568.
 oxyodon 568.
 pallidiflora 570. 35.
 patula 569. 17.
 peloponnesiaca 571.
 pendula 570.
 pendula 570. 30. 31.
 phlomoides 569.
 polymorpha 570. 35.
 pomifera 568.
 pratensis 569.

- pyrenaica* 570. 27 obs.
ringens 568.
Rosani 571. 39.
rostrata 569. 23.
ruthenica 570. 31 *
scabrida 570. 26.
Scleurea 569.
scleareoides 570.
Sibthorpian 570. 27. 34. 34 *
silvestris 570.
silvestris 570. 29.
taurica 568. 9.
Tenorii 569. 24.
tiberina 569. 24 *
tingitana 569.
transilvanica 569. 23 *
triloba 568.
valentina 570.
variegata 569. 23.
Verbenaca 570.
verbenacoides 570. 35.
verticillata 571.
virgata 570.
viridis 571.
Salvinia natans 871.
vulgaris 871.
Sambucus Ebulus 321.
nigra 321.
racemosa 321.
Samolus Valerandi 600.
Sanguisorba auriculata 239.
 15. 1.
dodecandra 239.
minor 239. 16. 4.
montana 239. 15. 1.
officinalis 239.
polygama 239.
præcox 239. 15. 1.
serotina 239. 15. 1.
Sanicula europæa 318.
Santolina alpina 360. 14 *
 anthemoides 362. 39.
 canescens 369. 15. 6 *
 Chamæcyparissus 368.
 elegans 369.
 ericoides 368. 15. 1 *
 heterophylla 369. 15. 7.
 impressa 369. 15. 6.
 incana 368. 15. 1.
 leucantha 369. 15. 4.
 montana 360. 16.
 oblongifolia 369.
 pectinata 369.
 pectinata 369. 15. 6.
 pinnata 369.
 rosmarinifolia 369.
 squarrosa 368. 15. 1 *
 tomentosa 368. 15. 1.
 villosissima 368. 15. 1.
 viridis 369.
 viscosa 369.
Santolinoides alpina 360. 15.
Saponaria anesia 98.
 alsinoides 98. 4.
 Baumgartenii 93. 77.
 bellidifolia 98.
 bellidifolia 336. 8.
 cæspitosa 98.
 calabrica 98.
 calabrica 98. 6.
 depressa 98.
 elegans 98. 10.
 Elisabethæ 93. 75.
 fasciculata 99. 1.
 fruticulosa 99. 2.
 glutinosa 98.
 græca 98.
 lutea 98.
 noctiflora 93. 79.
 ocymoides 98.
 officinalis 98.
 orientalis 98.
 polygonoides 99. 3 *
 porrigens 99. 4.
 repens 98. 4.
 sicula 98. 9.
 Struthium 99. 5.
 thessala 99. 3.
 Vaccaria 98.
Sarcocapnos bœtica 26.
 crassifolia 26. 2. 1.
 enneaphylla 26.
 speciosa 26.
Sarothamnus affinis 149. 3.
 arboreus 150. 8.
 bœticus 150.
 bœticus 150. 8.
 Bourgæi 149. 1 *
 cantabricus 139.
 cantabricus 140. 6.
 Carlieri 150. 9.
 catalaunicus 150.
 ericetorum 149. 1.
 eriocarpus 150.
 gaditanus 150. 8.
 grandiflorus 149. 3.
 malacitanus 150.
 obtusatus 149. 1.
 oxyphyllus 149.
 parviflorus 157. 30.
 patens 150.
 patens 149. 5.
 purgans 157. 31.
 scoparius 149. 1.
 virgatus 149.
 vulgaris 149.
 Welwitschii 149.
 Welwitschii 149. 5.
Sarothra blentiniensis 135 obs.
Satureia approximata 591.
 approximata 590. 11.
 Barceloi 590. 11 *
 canescens 590. 15.
 cœrulea 591.
 consentina 590. 7.
 cordata 590. 19.
 cristata 590. 12.
 cuneifolia 591.
 dalmatica 590. 5.
 fasciculata 590. 11. 591. 3.
 Fenzlii 588. 6.
 filiformis 591. 19.
 græca 590. 7.
 hirtuta 590. 14.
 hirta 591. 3.
 hispida 590. 10.
 hortensis 591.
 hyssopifolia 591. 2. 4.
 illyrica 591. 4 *
 inodora 590. 8.
 juliana 590. 14.
 Kitaibelii 591. 4.
 longiflora 590. 7 *
 microphylla 591. 18.
 montana 591.
 nervosa 590. 6.
 obovata 591.
 parnassica 591. 5.
 parviflora 590. 8.
 Piperella 591. 17. 20.
 plumosa 590. 6.
 pygmæa 591. 4 *
 rupestris 590. 4.
 sessiliflora 590. 7 *
 spicata 591. 3.
 spinosa 591.
 spinosa 591. 5.
 subspicata 591. 4 *
 tenuifolia 590. 7 *
 Thymbra 591.
 thymoides 591. 16.
 variegata 591. 4.
Satyrion Antropophora 696.
 24. 1.
 diphyllum 697. 25. 1.
 hircinum 696.
 maculatum 696. 22. 1.
Saussurea alpina 415.
 crassifolia 414.
 depressa 415. 86. 3. 4 *
 discolor 414.
 glomerata 414.
 leucantha 415. 86. 4 *
 macrophylla 415. 86. 4 *
 pygmæa 415.
 sergata 415.
Saxifraga acaulis 272. 62.

- adenophora* 270. 40 *
adscendens 273.
adscendens 271. 52.
affinis 270. 44.
aizoides 269.
aizoidoides 269.
Aizoon 267.
ajugæfolia 271. 55.
ajugifolia 271.
Allionii 270. 40. 271. 53 *
almeriensis 270. 39.
altissima 268. 8.
ambigua 268. 16 obs.
ampullacea 272. 62.
androsæcea 272.
angulosa 275. 101.
angustifolia 272. 65.
aphylla 272.
aphylla 272. 67.
aquatica 271.
arachnoidea 273.
arenarioides 269. 30.
aretoides 268.
arundanæ 273.
aspera 274.
atropurpurea 272. 62.
atrorubens 269. 28.
australis 267. 5 *
autumnalis 269. 28.
Baumgarteni 269. 32. 273. 86.
Bellardi 273. 86.
biflora 269.
biflora 269. 33.
biternata 273.
Boissieri 273.
Borgi 268.
Bourgeana 273.
bronchialis 274.
bryoides 274. 92 *
bulbifera 273.
bulbosa 272. 72.
Burseriana 269.
Burseriana 268. 18.
cæsia 269.
cæσιο-aizoides 269. 21 *
cæspitosa 270.
cæspitosa 270. 38. 45. 271. 48. 272. 62 et *
calyciflora 268. 16.
Camposii 270.
cantabrica 271. 56.
capitata 271. 52 *
carinthiaca 267. 4.
carpathica 273.
carpetana 273.
castellana 273. 72.
catalaunica 268.
ceratophylla 270. 36.
cernua 273.
cernua 272. 71.
cervicornis 271. 53.
chlorantha 268. 15.
chrysosplenifolia 275.
ciliaris 270. 42.
ciliolata 267. 4.
Clusii 274.
Clusii 274. 96.
cochlearis 268.
condensata 270. 44.
conifera 271.
controversa 273. 86.
corbariensis 271. 50 *
coriophylla 268. 11.
corsica 273. 72.
Cossoniana 272.
Cotyledon 267.
crocea 272. 62 *
crustata 268.
cultrata 267. 4.
cuneata 270.
cuneifolia 275.
cuneifolia 270. 37.
Cymbalaria 275. 105.
cymosa 271. 53 *
decipiens 270.
demissa 268. 14.
dentata 275. 99.
denudata 270. 45.
depressa 272. 64.
diapensioides 268.
diapensioides 268. 16.
dichotoma 273. 73 obs.
elatior 267. 4. 268. 8.
elegans 275. 100 *
elongata 270. 44.
erigella 270. 44.
eriolabris 271.
exarata 270.
exarata 270. 40 *
Facchinii 272. 66 *
flagellaris 274.
Flittneri 271. 55.
florulenta 267.
foliolosa 274. 96.
fonticola 275. 101.
Friderici Augusti 268. 17.
gemmaulosa 273.
geranioides 271.
Geum 275.
Geum 275. 104.
gibraltaria 271.
glabella 269.
glaucescens 272.
globulifera 267. 4. 271. 58. 59.
gracilis 275. 99.
græca 272. 71 *
granatensis 271.
granulata 272.
granulata 272. 71 *
groenlandica 270. 40. 45 *. 271. 47.
Grzegorzekii 271. 55.
Hanseleri 273.
hederacea 275.
heucherifolia 275. 101.
Henffeli 275. 101.
hieracifolia 274.
Hirculus 274.
hirsuta 275.
hirta 270. 44.
hispanica 273. 73.
Hohenwartii 272. 67.
Hostii 268.
hyperborea 273. 78 *
hypnoides 271.
hypnoides 270. 41. 44.
ineurvifolia 270. 46.
intermedia 270. 40. 274. 92.
intricata 270. 40.
iradiana 271.
irrigua 272.
Kochii 270. 34 *
Kunzeana 273. 73 *
ladanifera 271. 50.
laeta 267. 4 *
laetevirens 270. 44.
lantoscana 267. 5.
Lapeyroussii 268. 15. 16 obs.
lasiophylla 275. 101.
latepetiolata 272. 69.
latifolia 270. 45.
lepisimigena 274. 95.
leptophylla 272. 63.
leucantha 270. 40.
leucanthemifolia 274. 95.
lingulata 267.
lingulata 268. 7.
Linnæi 273. 86.
longifolia 267.
longifolia 268. 9.
luteopurpurea 268. 15. 16 obs.
luteoviridis 268.
Malyi 267. 4.
marginata 268.
marginata 268. 13.
media 268.
media 268. 17.
melena 271. 47.
mixta 270.
mixta 271. 48.
moschata 271. 56. 272. 62 et *

muscoides 272.
muscoides 272. 66.
mutata 268.
mutato-aizoides 268. 14 x
neglecta 267. 4 *
nervosa 270. 40.
nevadensis 271.
nivalis 274.
notata 267. 4.
obscura 270.
obtusifida 270. 39 obs.
olympica 275.
olympica 275. 101. 104.
oppositifolia 269.
palmata 270. 44. 271. 50 *
paniculata 270.
paniculata 272. 70.
paradoxa 275.
parnassica 274. 86 *
parviflora 275. 106.
patens 269. 21 *
pectinata 267. 4.
pedatifida 271.
pedemontana 271.
penduliflora 272. 71.
pentadactylis 270.
perdurans 271.
perporosa 269. 32.
petraea 273.
petraea 271. 52. 273. 86.
planifolia 272.
platyptala 270. 44.
Ponae 273. 84.
porophylla 268.
propaginea 274. 95.
Prostiana 270. 42.
Prostii 271. 51.
pseudocnesia 268. 11.
pseudosanta 269.
pubescens 270.
pubescens 270. 42.
punctata 274. 97.
pungens 269. 26.
pyramidalis 267. 3.
pyrenaica 272. 62. 64.
quinquefida 271. 50.
ramosissima 273. 84.
recta 267. 4.
recurvifolia 269. 21.
repanda 275. 101.
retusa 269.
Reuteriana 272.
Rhei 272. 62 *
rivularis 273.
rivularis 273. 77.
robusta 267. 4 *
Rocheliana 268. 11.
rosea 269. 34.
rotundifolia 275.

rotundifolia 275. 102. 103.
Rudolphiana 269. 33 *
rupesstris 273. 84.
Russi 273. 75.
santa 269.
scardica 269.
serobiculata 269. 32.
secunda 272. 62 *
sedoides 272.
Sequieri 272.
serratifolia 274. 97.
sibirica 273. 76. 77.
Sibthorpii 275.
sileniflora 271.
spathularis 274. 97.
spathulata 271. 60.
sponhemica 270.
Spruneri 268.
squarrosa 269.
Stabiana 267. 4 *
Steinmanni 270. 45.
stellaris 274.
stenopetala 272. 63.
Sternbergii 270. 44.
stricta 274. 88.
Sturmiana 267. 4.
taygetea 275.
tenella 269.
tenera 272. 66.
tenerrima 274. 87 *
thessalica 268. 17.
tombeanensis 268. 19 *
tricuspidata 274.
tridactylites 274.
tridens 272. 64.
trifurcata 270.
umbrosa 274.
uniflora 270. 44. 46.
valdensis 269.
Vandellii 269.
Vandellii 268. 18.
veronicaefolia 273. 74. 75.
villosa 270. 45.
vivipara 273. 75.
Wahlenbergii 271. 55.
Willkommiana 270. 39.
Wulfeniana 269. 32.
Scabiosa acutiflora 343. 16.
affinis 344. 24 *
agrestis 344. 26. 27.
alpestris 344. 31.
alpina 346. 3 *
ambigua 343. 17 *. 344.
 29. 347. 4.
argentea 342. 4. 6.
atropurpurea 343.
australis 345. 5. 3.
Baileti 343. 16.
banatica 344.

bidens 347. 11.
bipinnata 343. 13. 22.
brachiata 341. 3. 1.
brevicomis 343. 13.
breviscapa 342. 8 *
breviseta 344. 27.
calyptocarpa 343. 17.
candicans 344. 29.
canescens 344. 32.
capillata 344. 27.
ceratophylla 344. 24 *
ciliata 347. 6.
cinerascens 344. 30.
cinerea 344. 29.
Columbaria 343.
Columnae 344. 27 *
corniculata 346. 6.
coronopifolia 342. 8.
crenata 342.
cretica 342.
Cupani 343. 16 *
Dallaportae 342.
dichotoma 345.
diversifolia 344. 25.
eburnea 342. 6. 6 *
flavescens 343. 22 *
Fleischmanni 347. 1 *
fumarioides 343.
glabrescens 344. 31.
gracilis 343. 18 *
graminifolia 342.
gramontia 344.
gramuntia 341. 2. 6.
grandiflora 343. 16.
Guitardi 344. 31.
Gussonii 342. 8.
Hladnikiana 344. 31 *
holosericea 344.
holosericea 343. 22. 344.
 31.
hymettia 342.
integrifolia 347. 5.
involuta 341. 2. 2.
isetensis 342.
Jordani 344. 29.
leucanthema 346. 7.
limonifolia 341.
lobata 343. 13.
Loretiana 344. 27.
lucida 344.
lyrata 343. 15.
macropoda 342. 9 *
maritima 343.
maritima 342. 6.
mediterranea 346. 4.
micrantha 343.
microcephala 345. 5. 4.
mollis 344. 27.
mollissima 344. 27. 29.

- monspeliensis* 342.
montana 343. 22 *
multisetia 341. 3. 1 *
norica 344. 31.
ochroleuca 343.
orophila 344. 24.
palæstina 341. 3. 1.
pallida 343. 22. 344. 25.
papposa 341. 2. 2.
patens 344. 24.
paucisetia 344. 27 *
permixta 344. 24.
pilosa 342. 6.
plumosa 341. 2. 6.
pratensis 344. 24.
pseudo-banatica 344. 31.
pubescens 344. 31.
pulsatilloides 342.
pyrenaica 344.
repens 345. 5. 3.
Saviana 343. 16.
saxatilis 342.
Scopolii 344.
semipapposa 343.
sericea 342. 5.
Sibthorpiana 341. 3. 1 *
sicula 343.
silenifolia 345.
simplex 343. 13.
sphaciotica 341. 2. 5.
sphakiotica 342.
stellata 342.
stricta 344. 31.
suaveolens 344.
taygetea 343.
tenuifolia 343. 22 *
tenuis 343.
tenuisecta 344. 27.
tomentosa 344.
transsilvanica 343. 16.
triandra 344. 27.
trinæfolia 343.
ucranica 342.
uniseta 344. 27 *
variifolia 342. 4 *
velutina 344. 29.
vestina 344.
vestita 344. 29.
virescens 342. 5.
Webbiana 343. 22 *
Scaligeria cretica 315. 108. 1.
microcarpa 315.
Tournefortii 315. 108. 1.
Scandix australis 302.
brachycarpa 302.
falcata 302. 69. 1.
fumarioides 301. 68. 8.
grandiflora 302.
hispanica 302. 69. 5.
infesta 281. 15. 4.
macrorhyncha 302.
microcarpa 302.
orientalis 302. 69. 1.
Pecten Veneris 302.
persica 302. 69. 4.
pinnatifida 302.
pinnatifida 302. 69. 4.
taurica 302.
Sceptrum Carolinum 552. 26.
1.
Schanginia baccifera 630.
linifolia 630.
Schedonorus Benekeni 822. 8.
elatii 824. 2.
erectus 822. 9.
inermis 822. 17.
serotinus 822. 8 *
sterilis 821. 3.
tectorum 821. 4.
Schellhammeria capitata 779.
110.
cyperoides 779. 110.
Scheuchzeria palustris
680.
Schieverackia podolica 54.
Schismus arabicus 832.
marginatus 832.
minutus 832. 2.
Schlosseria heterophylla 287.
28 *
Schmidtia ambigua 473. 142.
3.
subtilis 788. 18. 1.
utriculata 789. 18. 1.
utriculosa 789. 18. 1.
Schoberia acuminata 630. 20.
6.
altissima 629. 20. 4.
maritima 630. 20. 8. 8 *
salsa 630. 20. 7.
setigera 629. 20. 5.
spicata 630. 20. 9.
Schoenus compressus 763. 9.
1.
ferrugineus 761.
mucronatus 760.
nigricans 760.
Scilla alpina 730. 19 *
alvesiana 729. 9.
amethystina 730. 15.
amoena 730.
amoenua 731. 19. 5.
autumnalis 730.
azurea 731. 19. 5.
Bertolonii 729. 8.
bifolia 730.
bifolia 730. 20.
campanulata 731. 19. 2.
candida 729. 4.
cernua 730. 19. 731. 19. 4.
5.
Clusii 729.
comata 729. 4.
Cupani 729.
Cupaniana 729. 6.
elongata 729.
fastigiata 731. 21. 3.
fugax 729. 17. 3.
gallica 730. 18.
hemisphærica 729. 4.
Hohenackeri 730. 19.
Hughii 729.
hyacinthoides 729.
intermedia 730.
italica 729.
Kladnii 730. 19.
lanceolata 729. 17. 1.
laxa 739. 19 *
lilio-hyacinthus 729.
lusitanica 729.
maritima 728. 17. 1.
mauritanica 729. 11.
messenica 730.
minor 730. 20.
monophyllos 730.
monophylla 730. 16.
nivalis 730.
nivalis 730. 20 *
nutans 731. 19. 3.
obtusifolia 730. 17.
odorata 729.
Pancration 729. 17. 1.
patula 730. 1. 731. 2.
peruviana 729. 3. 4. 5.
præcox 730. 20.
pratensis 730.
pumila 730. 16.
Ramburei 729. 10.
sibirica 731. 19. 5.
sicula 729.
subnivalis 730. 20 *
subtriphylla 730. 19 *
Ughii 729.
umbellata 730. 12.
undulata 729. 17. 2.
verna 730.
verna 729. 8. 10.
vincentina 729.
Vivianii 729. 3.
Scirpidium aciculare 767. 7.
Scirpus acicularis 767. 7. 8.
alpinus 765.
annuus 762. 7. 2.
atropurpureus 766. 14. 2.
australis 765. 1.
Bæothryon 765. 12.
Baillii 765. 14.

- cæspitosus* 765.
Caricis 763. 9. 1.
carinatus 764.
compactus 763. 3.
compressus 763. 9. 1.
Custoris 764. 4.
dichotomus 762. 7. 1.
Duvallii 764. 5.
filiformis 766. 12. 3.
fluitans 766. 13. 1.
glaucus 764. 4*
globifer 764.
globiferus 765. 2.
glomeratus 765. 10.
gracilis 762. 7. 4. 766. 12. 3.
hamulosus 763. 8. 2.
Holoschoenus 765. 1.
Hoppii 764. 8.
intermedius 763. 10. 1 ×
lacustris 764.
Lejeunii 764. 8.
leptaleus 766. 12. 3.
Lereschii 766. 14. 2.
litoralis 764.
macrostachys 763. 3.
maritimus 763.
Martii 761. 3. 2.
megastachys 763. 3.
Michelianus 763. 8. 1.
Minæ 766. 12. 4.
mucronatus 765.
mucronatus 764. 8.
multicaulis 767. 5.
nanus 765. 14.
ovatus 766. 13. 1. 14. 1.
palustris 767. 3.
Parlatoris 765. 2.
parvulus 765.
pauciflorus 765.
Philippi 764. 7.
Pollichii 764. 8.
pubescens 761. 5. 1.
pungens 764.
radicans 763.
romanus 765. 1.
Rosellinii 764. 5 ×
Rothii 764. 9.
rufus 763. 9. 2.
Savii 766. 12. 3.
setaceus 766. 12. 2. 3. 5.
silvaticus 763.
silvatico-radicans 763. 10. 1 ×
supinus 766. 12. 1.
Tabernæmontani 764. 4*
translucens 765. 14.
trigonus 764. 5. 8.
triqueter 764.
- triqueter* 764. 7.
uniglumis 767. 4.
Sclarea æthiopis 569. 16.
lanata 569. 16.
vulgaris 569. 14.
Scleranthus annuus 257.
annuus biennis 257. 5.
biennis 257. 4*
campestris 257. 4.
cineus 257. 4.
collinus 257. 4. 5.
comosus 257. 4.
corrigioleflorus 257. 1.
Delorti 257. 5*. 6.
dichotomus 257. 1.
divaricatus 257. 5.
ferrugineus 257. 4.
glomeratus 257. 5.
gypsophilanthus 257. 1.
hamosus 257. 3.
hirsutus 257. 1.
intermedius 257. 1. 4.
marginatus 257. 1*
marginellus 257. 4.
neglectus 257. 1*
Noëanus 257. 1*
perennis 257.
polycarpus 257. 3. 5*. 6.
polycnemoides 257.
præcox 257. 5.
pseudopolycarpus 257.
rodnanus 257. 3.
Sprengelii 257. 1.
tauricus 257. 4*
tenellus 257. 5.
tenuissimus 257. 5.
uncinatus 257.
verticillatus 257.
verticillatus 257. 6.
Sclerochloa articulata 832. 3.
Borreri 831. 11.
dichotoma 832. 2.
distans 830. 6.
divaricata 832.
divaricata 833. 97. 1.
dura 832.
expansa 833. 97. 1.
hemipoa 832.
holiacea 844. 2.
maritima 831.
maritima 831. 10.
memphitica 831.
patens 832. 5.
procumbens 831. 13.
rigida 832.
Sclerochorton junceum 297.
Sclerophyllum pulchrum 457. 34.
Scleropoa divaricata 832. 3.
- hemipoa* 832. 4.
maritima 832. 2.
memphitica 831. 1.
rigida 832. 5.
Scolochloa arundinacea 797. 42. 1.
festuacea 807. 68. 1.
Scolopendrium breve 862. 9. 2.
cordatum 862. 9. 2.
Hemionitis 862.
hybridum 862. 9. 2 ×
officinale 862. 9. 1.
officinarum 862. 9. 1.
Phyllitis 862. 9. 1.
sagittatum 862. 9. 2.
vulgare 862.
Scolymus grandiflorus 471.
hispanicus 471.
maculatus 472.
pectinatus 472. 137. 3.
Scopolia carniolica 524.
Hladnikiana 524. 3. 1*
Scopolina atropoides 524. 3. 1.
viridiflora 524. 3. 1*
Scorodonia Arduini 564. 8.
cordata 564. 12.
heteromalla 564. 10.
sicula 564. 10*
Scorpiurus lævigata 187. 30. 2.
muricata 187.
subvillosa 187.
sulcata 187.
sulcata 187. 30. 4.
vermiculata 187.
Scorzonera albicans 465.
alpina 464. 10*. 14.
ambigua 466. 5.
angustifolia 464.
angustifolia 463. 5. 464. 8. 10. 465. 23. 23*
araneosa 466. 5.
aristata 464.
asphodeloides 464. 6.
astrachanica 466. 5.
austriaca 464.
austriaca 464. 10*
bætica 464.
bohémica 464. 9.
calcitrapifolia 465. 3.
callosa 465. 23*
calvescens 465. 4.
Candollii 464.
caricifolia 464. 11.
Clusii 464. 9.
Columnæ 465. 23*
cretica 464.

- crispa* 464. 8 *
crispatula 464. 6 *
crocifolia 463.
dalmatica 465. 23.
deliciosa 464.
denticulata 463. 6.
edulis 463. 6.
elata 463.
elongata 472. 2.
ensifolia 464.
eriosperma 465. 19.
glastifolia 463. 6.
graminifolia 363. 1. 3. 5.
 464. 11. 466. 126. 5.
grandiflora 464. 14. ,
hirsuta 464.
hirsuta 465. 23.
hispanica 463.
Hoppeana 464. 14.
humilis 464.
humilis 464. 8.
intermedia 465. 2.
julia 465. 23.
laciniata 465. 3.
lanata 465.
lanata 464. 9.
lanuginosa 464. 9.
latifolia 464. 8.
macrocephala 463.
macrorhiza 464. 9.
Marschalliana 463. 2.
messeniaca 465. 4.
mollis 465. 5.
montana 463. 6.
muricata 465. 1.
nervosa 464. 9.
octangularis 465. 1.
parviflora 464. 11.
pinifolia 463. 5. 465. 1.
plantaginea 464. 9.
Prescottii 464. 8 *
purpurea 464.
pusilla 464.
resedifolia 465. 3.
rosea 464. 15 *
sardoa 465. 23 *
stricta 463.
taurica 463. 2. 464. 6.
Tenorii 465. 1 *
tenuifolia 464. 10 *. 14.
trachysperma 463.
tuberosa 465.
undulata 466. 5.
vaginata 465. 20.
villosa 465.
villosa 463. 2.
Scrophularia œstivalis 533.
alpestris 533.
aquatica 533.
- aquatica* 532. 3. 10.
arguta 534.
auriculata 532.
auriculata 533. 10. 11. 20.
Balbisi 532. 3. 9. 10.
betonicæfolia 533. 10. 16 *
bicolor 534.
Bourgæana 533.
byzantina 532. 3. 2 obs.
caesia 534. 34. 35 *
canina 534.
canina 534. 29.
Castagneana 533. 20 *
chrysanthemifolia 534. 27
 —29.
cinerea 533. 12 *
cretacea 534.
cretica 533.
crithmifolia 534.
decora 532. 3. 3.
ebulifolia 532. 3. 5.
Ehrharti 533. 12.
filicifolia 534. 32 *
frutescens 534.
frutescens 534. 35.
geminiflora 533. 22.
glandulifera 533. 20.
glandulosa 533. 20.
glauca 534. 32.
grandidentata 533.
grandiflora 532. 3. 3.
Gussonei 534. 25 *
Herminii 532.
heterophylla 534.
heterophylla 534. 35.
hispanica 532. 3. 6.
Hoppii 534.
humifusa 534. 27.
juratensis 534. 29.
laciniata 534.
laxa 534.
laxiflora 533. 14 *
livida 534. 32 *
lucida 534.
lyrata 532. 3. 9.
melissifolia 533. 20.
mellifera 532. 3. 7.
micrantha 534. 34.
multifida 534. 35 *
murcica 532. 3. 6.
Neesii 533. 12 *
nodosa 533.
oblongifolia 532.
oligantha 533. 19.
Oliveriana 534. 34.
olympica 534.
orientalis 532.
Pantocsekii 533. 19 *
peregrina 533.
- pinnatifida* 534. 25 *. 27 *
pulverulenta 534. 35.
pyramidalis 534. 27. 34.
pyrenaica 533.
ramosissima 534.
ramosissima 534. 27.
rupestris 534.
Samaritani 533. 12.
sambucifolia 532.
sambucifolia 532. 3. 7.
Schousboei 532.
sciaphila 532.
Scopolii 533.
Scorodonia 533.
Scorodonia 533. 20.
silvatica 533.
sublyrata 532.
subverticillata 532. 3. 9.
taygetea 534.
tenuisecta 534. 27.
Tinantii 533. 16 *
trifoliata 532.
trifoliata 532. 3. 9.
umbrosa 533. 12.
Urvillæana 534. 34.
variegata 534. 35.
vernalis 532.
Scutellaria adenotricha 573.
5.
albida 573.
alpina 572.
altissima 573.
Columnæ 572.
Columnæ 573. 4 *
commutata 573. 4 *
cretica 564. 7.
decumbens 573. 8.
galericulata 573.
Gussonei 573. 3 *
hastifolia 573.
hirta 573.
hirta 573. 7.
lupulina 572. 8. 2.
minor 573.
orientalis 572.
pallida 573. 3 *. 6.
parnassica 573. 5.
pauciflora 573. 9.
peregrina 573.
peregrina 573. 4 *. 5.
pubescens 573. 9.
rupestris 573. 8.
Sibthorpii 573. 5 *
Sieberi 573.
Secale campestre 838. 3.
cereale 838. 3 obs.
creticum 840. 2.
dalmaticum 838.
fragile 838.

- glaucum* 838. 3.
montanum 838.
silvestre 838. 3.
strictum 838. 1.
villosum 839. 104. 1.
Securinega buxifolia 646. 3. 1.
Sedum acre 262.
aestivum 264. 31.
aetnense 264.
Aizoon 263. 24 obs.
albellum 262. 15.
albescens 261. 8 *
album 262.
album 262. 15.
alpestre 262.
alsinefolium 263.
altissimum 261.
amplexicaule 261.
Anacampseros 260.
andegavense 265.
anglicum 263.
annuum 264.
anopetalum 261.
arenarium 263. 21 *
aristatum 261. 7. 264. 39.
arrigens 261. 8 *
athoum 262. 15 *
atratum 264.
atratum 265. 44.
aureum 261. 9 *
balticum 262. 14 *
boloniense 261. 10 *
brevifolium 262.
cæspitosum 265.
carpathicum 260. 3.
Cepæa 263.
Clusianum 262. 15. 15 *
coeruleum 264.
confertiflorum 264.
confertum 260. 3.
corsicum 263. 19 *
creticum 263.
cruciatum 263. 28.
dasyphyllum 262.
deltoidum 264. 29.
elegans 261. 9. 9 *
eriocarpum 264. 39.
erythraeum 263.
erythromelanum 260. 1.
Fabaria 260.
Forsterianum 261. 9 *. 10 *
galioides 263. 25.
glanduliferum 263. 19 *
glandulosum 264.
glaucum 264.
glaucum 261. 8.
globiferum 262. 18.
graniticum 261. 8.
Grisebachii 264.
gypsicolum 263.
heptapetalum 264. 34.
hexangulare 264. 31.
Hillebrandii 261. 10 *
hirsutum 262.
hispanicum 264. 39.
hybridum 263. 24 obs.
laconicum 262.
laconicum 262. 12 *
latifolium 260. 1.
litoreum 264.
lividum 260. 3.
lugdunense 260. 3.
lusitanicum 261. 6.
magellense 263.
Marichalii 264. 30.
maximum 260.
melanantherum 263.
micanthum 262.
monregalense 263.
montanum 261. 7.
neapolitanum 263. 19.
nebrodense 263. 19 *
neglectum 262. 12.
nevadense 264. 36 *
nicæense 261. 6 *
Notarjanni 260. 3 obs.
ochroleucum 261. 6. 7.
olympicum 263. 24.
orientale 264. 39.
pallidum 264.
pallidum 264. 39.
paniculatum 263. 25.
parnassicum 264. 31.
pedicellatum 264.
pentandrum 264. 36.
pruinatum 261.
puberulum 264. 39.
purpurascens 260. 2.
purpureum 260. 2. 2 *
racemiferum 264. 32.
recurvatum 261. 8.
reflexum 261. 5. 7. 8 *. 9.
repens 260. 3. 262. 13.
rhodanense 260. 2.
rivulare 263. 22. 23.
rostratum 261. 5.
rubens 265.
rubens 262. 13. 264. 38.
rufescens 261. 6.
rupestre 261.
rupestre 261. 7. 9. 262. 13.
Sartorianum 262. 12 *
saxatile 262. 13. 264. 31.
schistosum 261. 10.
sexangulare 261. 10 *. 262. 12.
soluntinum 261. 6.
spathulatum 263. 25.
sphaericum 262. 18.
spurium 485. 7. 3.
stellatum 263.
stellatum 265. 43.
Telephium 260. 1. 2.
tetraphyllum 263. 25.
trevericum 261. 9 *
tristriatum 262.
turgidum 262. 14. 15. 15 *
uniflorum 263. 25.
Urvillei 264. 40.
Verloti 261. 7.
villosum 264.
vogesiaceum 260. 3.
vulgare 260.
Seidlia Jechlii 763. 10. 1.
silvatica 763. 10. 1.
Selaginella ciliata 873. 3.
denticulata 873.
helvetica 873.
helvetica 873. 2.
spinulosa 873.
Selinum argenteum 285. 29. 3. 4.
austriacum 286. 5.
carniolicum 285. 29. 4 *
Carvifolia 283.
Gmelini 293. 52. 1.
intermedium 286. 11.
Lachenalii 283. 22. 2.
lineare 285. 29. 4 *. 293. 53. 2.
palustre 286. 11.
peucedanoides 286. 12.
pyrenaicum 283.
rigidulum 307. 85. 6.
Rochelii 292. 48. 1.
scabrum 291. 41. 1.
silvestre 283. 5 *. 286. 11. 293. 53. 2.
sulcatum 286. 5.
Thysselinum 286. 11..
Sempervivum acuminatum 258. 3. 4.
Allionii 260. 25.
alpestre 259. 8.
alpinum 259.
arachnoideum 259.
arborescens 258.
arenarium 260.
arenarium 259. 22.
arvernense 258.
arvensi-arachnoideum 259. 7 x. 18 x
assimile 259.

austriacum 260. 25.
 barbulatum 259. 15.
 blandum 258.
 Boutigniano-arachnoideum
 259. 18 ×
 Boutignianum 259. 7 *
 Braunii 259.
 calcareum 258.
 cebenense 258. 3. 7.
 Comollii 258. 3. 4.
 debile 260.
 Doellianum 259. 16 *
 dolomiticum 259. 11 *
 erubescens 258. 3. 7.
 Fanconeti 259. 16 *
 fimbriatum 259.
 frigidum 259. 8.
 Funckii 259.
 Funkii 258. 3. 6.
 glaucum 258. 3. 4.
 globiferum 260.
 globiferum 259. 21. 22.
 Guillemotii 259. 7 obs.
 Hausmanni 259. 16 *
 heterotrichum 259.
 Heuffelii 260. 24.
 Hillebrandtii 260. 24 *
 hirtellum 260. 27.
 hirtum 260.
 hirtum 260. 24. 26.
 Kochii 260. 27.
 Laggeri 259. 16.
 Lamottei 258. 3. 2 *
 lautareticum 259. 16.
 Legendi 258. 3. 7.
 lesurinum 258. 3. 7.
 marmoreum 259.
 Mettenianum 258. 3. 2 *
 minimum 259. 14.
 minutum 258. 3. 2.
 montanum 259.
 montanum 259. 9.
 monticolum 259. 8.
 Neilreichii 260. 27.
 patens 260.
 piliferum 259.
 Pittonii 259.
 Pomelii 259.
 pseudo-arachnoideum 259.
 16.
 purpurascens 259. 9.
 Reginæ Amaliæ 258. 3. 2 *
 roseum 259. 12.
 rubellum 259.
 rubicundum 258. 3. 3.
 ruthenicum 259.
 Schlehani 258. 3. 4 *
 Schnittpahni 258.
 Schottii 258.

soboliferum 260. 26.
 stramineum 260. 24.
 tectorum 258.
 tectorum 258. 3. 2 *
 tomentosum 259. 16.
 transsilvanicum 260. 26 *
 vellanum 258. 3. 7.
 villosum 259. 7 ×
 Wulfeni 259.
 Zeleborii 259.
 Senebiera Coronopus 65. 68.
 1.
 didyma 65. 68. 2.
 pinnatifida 65. 68. 2.
 Senecillis carpathica 358. 8.
 1 *
 glauca 358.
 Senecio abrotanifolius
 356.
 abrotanifolius 356. 39.
 adonidifolius 356.
 ætensis 357.
 ætensis 357. 48 *
 alpestris 353. 3.
 alpinus 355.
 ambraceus 355. 29.
 anthemifolius 357. 45.
 anthoræfolius 355. 32.
 apenninus 354. 21.
 apulus 357. 50.
 aquaticus 355.
 aquaticus 355. 27.
 arachnoideus 355. 22.
 arenarius 356. 34. 357. 50.
 artemisiæfolius 356. 39.
 auratus 353.
 auratus 354. 11.
 Auricula 354.
 aurinitens 355. 29.
 Badaroi 357. 45.
 barbareaefolius 355.
 barbareaefolius 355. 28.
 barckhausiæfolius 354.
 Barrelieri 354. 21. 21 *
 bayonnensis 353. 4 *
 bohemicus 354. 11.
 Boissieri 357.
 borysthénicus 355. 32.
 brachyotus 356. 34.
 bracteatus 354. 13.
 byzantinus 354.
 byzantinus 354. 11.
 Cacaliaster 353.
 cæspitosus 354.
 canadensis 356. 39.
 carniolicus 356.
 carpathicus 356. 38 *
 carpetanus 355.
 Castagneanus 354. 13 obs.

Chaberti 356. 34.
 chrysanthemifolius 357.
 48. 49.
 commutatus 353. 3.
 controversus 353. 4.
 coronopifolius 357.
 crassifolius 357.
 crassifolius 357. 52.
 crinitus 357. 45.
 croaticus 353. 5.
 dalmaticus 355. 29.
 delphinifolius 357.
 delphiuifolius 356. 34.
 denticulatus 358. 60.
 desquamatus 357. 47.
 difficilis 357. 47.
 divergens 355. 27.
 Doria 353.
 Doronicum 354.
 Doronicum 354. 21 *
 Duriæ 358.
 eriopus 355.
 erraticus 355. 27. 28.
 erucifolius 356.
 erucifolius 358. 59.
 eubæus 354.
 exsquameus 357. 47.
 Fayeii 358. 57.
 flabellatus 357. 45.
 flosculosus 355. 29.
 fluviatilis 353. 2.
 foeniculaceus 358. 58 *
 foliosus 355.
 fontanus 353. 4.
 frondosus 353. 4.
 fruticulosus 356.
 Fuchsii 353.
 gallicus 357.
 Gerardi 354. 21 *
 germanicus 353. 4.
 glaber 357. 48 *
 glaberrimus 354. 21 *
 glaucescens 357. 48 *
 glaucus 358. 54.
 glutinosus 358. 57.
 granatensis 354. 17.
 grandiflorus 353. 6.
 grandissimus 353. 2.
 Hervaloira 354. 18.
 humilis 358.
 humilis 357. 50.
 hydrophilus 356.
 immunis 354. 11.
 incanus 356.
 iucanus 356. 40. 42.
 incisus 357. 48 *
 incrassatus 358. 54 *
 intermedius 358. 59 *
 Jacobæa 355.

jacobæoides 355.
laciniatus 356. 36.
Lagascanus 354.
Laggeri 356. 41.
lanatus 355.
legionensis 353.
leucanthemifolius 357.
leucophyllus 356.
linifolius 355.
lividus 358.
lividus 358. 59.
Lopezii 354.
lycopifolius 356. 34 *
lyratifolius 355. 29. 31.
macedonicus 354.
macrophyllus 353. 6 *
Marmoræ 357. 50 *
minutus 357.
monocephalus 356. 38 *
montanus 356. 36.
munitus 353. 11.
nebrodensis 356.
neglectus 355. 29.
nemorensis 353.
nemorosus 355. 29.
nevadensis 355. 25 *
octoglossus 353. 4.
orientalis 354. 13.
Othonnæ 353.
ovatus 353. 3.
palmatus 356. 40.
paludosus 353.
paradoxus 356. 36.
parviflorus 356. 41.
peduncularis 357. 52.
persicæfolius 354. 17.
Persoonii 356. 41 *
petraeus 357.
præaltus 355.
pratensis 355. 28. 29.
Pseudo-Doronicum 354.
 21 *
pseudovernalis 357. 52 ×
pusillus 358. 61.
pygmaeus 358.
quinqueradiatus 355.
racemosus 353.
rapistroides 357. 52 *
riparius 354. 11.
rotundifolius 354. 21.
rupestris 356. 36.
ruthenicus 354. 21 *
Sadleri 354. 11.
salicetorum 353. 2.
salicifolius 353. 3.
saracenicus 353.
saracenicus 353. 3. 4. 5.
Scopolii 355. 22.
siculus 356. 34 *

silvaticus 358.
sinuatidens 355. 28.
squalidus 357.
squalidus 357. 51. 52 *
syrmienis 357. 52.
tasconensis 356. 34.
tataricus 353. 10.
tenuifolius 356. 34. 39.
tmoleus 354. 13.
tomentosus 354. 11.
Tournefortii 354.
transsilvanicus 354. 21 *
trilobus 358. 58 *
tymphresteus 358. 57.
umbrosus 353.
uniflorus 356.
variabilis 353. 3.
vernalis 357.
vernalis 356. 36.
vernus 357. 52. 358. 54.
viridulus 356. 34.
viscidulus 358. 59 *
viscosus 358.
viscosus 358. 56.
vulgaris 358.
vulgari-vernalis 357. 52 ×
Weylii 357. 52 ×
Serapias *athensis* 688. 9. 4
 obs.
cordigera 689.
cordigera 689. 14. 2. 3.
cordigero-laxiflora 689. 14.
 1 ×
ensifolia 687. 8. 4.
glabra 689. 14. 4.
grandiflora 687. 8. 2.
hirsuta 689. 14. 3.
lancifera 689. 14. 3.
lancifolia 687. 8. 2.
latifolia 688. 9. 2.
laxiflora 689. 14. 3. 690.
 5.
laxiflora-cordigera 689. 14.
 1 ×
laxiflora-longipetala 689.
 14. 3 ×
Lingua 689.
Lingua 689. 14. 2. 3.
linguo-longipetala 690. 14.
 4 ×
Lonchophyllum 687. 8. 2.
longifolia 688. 9. 1.
longipetala 689. 14. 3.
longipetalo-laxiflora 689.
 14. 3 ×
longipetalo-lingua 690. 14.
 4 ×
microphylla 688. 9. 4.
neglecta 689.

neglecta 690. 14. 4 ×
occultata 690. 14. 5.
oxyglottis 689. 14. 4.
palustris 688. 9. 1.
parviflora 690.
pseudo-cordigera 689.
purpurea 689. 14. 3 ×
Todari 690.
triloba 689. 14. 1 ×. 2 ×.
 3 ×
Xiphophyllum 687. 8. 4.
Seriola *albicans* 471. 1.
ætnensis 471.
Alliata 471. 1.
commutata 471. 136. 1.
cretensis 471. 133. 1.
depressa 471. 134. 2.
glauca 471. 1.
hispida 471. 2.
hyosoroides 469. 23.
lævigata 471.
rubescens 471. 1.
taraxacifolia 471. 133. 2.
tenuiflora 470. 3.
urens 471. 133. 1. 134. 2.
Serpicula *verticillata* 678. 4.
 1.
Serrafalcus *alopecuroides* 823.
 26.
arvensis 823. 21.
Cavanillesii 823. 24 *
commutatus 822. 19.
intermedius 823. 27.
Lloydianus 823. 24.
macrostachys 824. 28.
mollis 823. 23.
neglectus 823. 20 *
patulus 824. 30.
racemosus 823. 20.
scoparius 823. 25.
secalinus 822. 18.
squarrosus 824. 29.
Serratula *Alcalæ* 417.
alpina 415. 86. 3. 4 *
altissima 417. 1.
betica 417.
Barrelieri 417. 10.
centauroides 417. 4.
cichoracea 417.
coronata 417.
coronata 417. 3.
flavescens 417.
glauca 417.
Gmelini 417.
heterophylla 417.
humilis 416. 14.
indivisa 417. 2.
leucantha 417. 12.
macrocephala 417.

- mollis* 416. 14*
monticola 417. 3.
multiflora 415. 87. 1.
nitida 417.
nitida 417. 5.
nudicaulis 417.
pinnata 417. 2.
pinnatifida 417.
pumila 417. 2.
radiata 417.
rosmarinifolia 401. 71. 5.
thracica 430. 151.
tinctoria 417.
traussilvanica 415. 87. 7.
Vulpjii 417. 3.
Wolfii 417. 1.
xeranthemoides 418.
Seseli ammoides 305. 80. 2.
annuum 296.
articulatum 295. 60. 2.
Bocconi 296.
brevicaule 296. 20.
campestre 296.
cantabricum 296.
carvifolium 296.
coloratum 296. 20.
corsicum 305. 80. 2.
crithmifolium 295.
dichotomum 295.
elatum 296.
elatum 296. 24.
ferulaceum 296. 20.
filifolium 297.
glaucescens 297. 28.
glaucum 296. 24. 297. 27.
 28. 28*
globiferum 295.
Gouani 296. 23.
gracile 296.
granatense 296.
gummiferum 295.
gummiferum 295. 60. 3.
heterophyllum 296.
Hippomarathrum 295.
intricatum 296.
juncum 297. 61. 1.
leucospermum 295.
Libanotis 295. 59. 2.
litorale 296. 16*
lucanum 296.
montanum 297.
montanum 297. 27. 28.
montanum nanum 297. 31.
multicaule 297. 28.
nanum 297.
nitidum 295. 59. 3*
oligophyllum 297.
osseum 296.
Pallasii 296.
parnassicum 295.
peucedanifolium 295. 60.
 5*. 297. 28.
polyphyllum 296.
promonense 296. 26.
puberulum 296. 16.
pumilum 303. 88. 1. 4*
purpurascens 295.
pusillum 305. 80. 2.
rigidum 295.
Sibthorpii 295. 59. 5.
stylare 297. 61. 1.
tauricum 296. 16.
tomentosum 295.
Tommassinii 296.
tortuosum 296.
tortuosum 288. 30. 1.
tortuosum græcum 296.
 16*
varium 296.
venosum 293. 53. 2.
vulgatum 298. 28.
Sesleria alba 795. 1.
argentea 795. 1.
autumnalis 792. 2.
Bielzii 795. 3. 796. 7.
coerulans 795. 3.
coerulea 796.
cyindrica 795.
disticha 796. 38. 1.
elongata 795.
filifolia 796. 8. 9.
gracilis 796. 8.
Haynaldiana 796.
Heufleriana 795.
juncifolia 796. 9.
interrupta 796.
leucocephala 796. 11.
marginata 795.
microcephala 796.
mutica 796. 6.
nitida 796.
nitida 796. 4.
pedemontana 796. 38. 2.
rigida 796.
rigida 795. 3.
robusta 795. 2*
sphærocephala 796.
tenella 796. 8. 12.
tenuifolia 796.
tenuifolia 796. 8.
transsilvanica 796. 4*
vaginalis 795. 3.
Setaria ambigua 787.
decipiens 787. 11. 5.
germanica 786. 11. 1.
glauca 787.
italica 786.
purpurascens 787. 11. 3.
verticillata 787.
viridis 786.
Sherardia arvensis 335.
neglecta 335. 8. 1.
pusilla 329. 69.
Sibbaldia procumbens 229.
Sibthorpia africana 549.
europæa 549.
Sicyos angulata 246. 3. 4 obs.
Sida Abutilon 127.
Sideritis alpina 584. 15.
angustifolia 584.
angustifolia 584. 20.
approximata 584. 27.
arborescens 584.
bætica 584.
Bourgæana 584. 17.
brutia 583. 3.
candicans 583. 7 obs.
Cavanillesii 583. 13*
chamædrifolia 584. 15*.
 16.
crenata 584. 15.
cretica 583.
cretica 583. 2.
elegans 584. 26.
Endressi 584. 16*
florida 583. 6.
foetens 584. 18. 24.
fragrans 583.
fruticulosa 583. 13.
Funkiana 584. 19*
glacialis 583.
glauca 584.
grandiflora 583.
hirsuta 584.
hirtula 584. 15*
hyssopifolia 583.
hyssopifolia 583. 13.
ilicifolia 583. 12.
incana 584.
incana 584. 22*
Lagascana 584.
lanata 584.
lasiantha 584.
lavandulacea 584. 22.
leucantha 584.
linearifolia 584. 17. 18. 20.
 23.
litoralis 584. 16.
longicaulis 584. 15.
lucida 584. 15.
montana 584.
montana 585. 30.
ovata 583.
peloponnesiaca 583. 2*
perfoliata 583.
Peyrei 583. 13.
phleoides 584. 24.

- provincialis* 584. 16.
pungens 584.
purpurea 584.
pyrenaica 584. 16 *
remota 585.
Roeseri 583.
romana 584.
scardica 583.
scordioides 583.
scordioides 583. 13 *. 15.
sericea 584. 22 *
serrata 583. 11.
sicula 583.
spinosa 583.
stachydioides 583.
stricta 584. 15.
subspinosa 583. 11.
syriaca 583. 2 *. 7.
taurica 583.
theezans 583.
tomentosa 584. 16 *
Tragoriganum 584. 22.
vestita 583. 14.
Siebera cherlerioides 119. 31.
Sieglingia decumbens 817.
 79. 2.
Sieversia micropetala 229.
 montana 229.
 reptans 229.
Silau alpestris 293.
 Besseri 293. 48. 3.
 carvifolius 292. 48. 1 *
 Gasparrinii 292. 48. 1.
 meoides 307. 85. 4.
 pratensis 292.
 virescens 292.
Silene acaulis 93.
 acutifolia 93.
 adscendens 96.
 ætolica 94.
 affinis 96. 118.
 agrestina 97. 129.
 Agrostemma 96. 115.
 allophila 96. 117.
 Almolæ 94.
 alpestris 87. 9. 1. 92. 61.
 alpina 88. 7 *
 altaica 97. 137 obs.
 ambigua 95. 108.
 amblevana 90. 32.
 ammophila 97.
 anglica 97.
 angustissima 88. 6.
 annulata 94. 92.
 anomala 95. 110.
 apetala 95.
 Armeria 89.
 arvatica 92. 56 *
 aspera 85. 3. 1.
 Asterias 89.
 auriculata 89.
 auriculata 88. 10.
 bassanensis 90. 29.
 Bastardi 88. 7.
 Baumgartenii 93. 77.
 Behen 93.
 Bergeri 93. 85.
 bicolor 95. 103.
 bipartita 95. 107. 111.
 bohémica 97. 129.
 Boissieri 94.
 Boissieri 95. 107.
 Borderi 92.
 Boryi 92.
 brachiata 88. 6.
 brachyantha 88. 6.
 brachypetala 96. 119 *
 bracteosa 94. 89.
 bryoides 93. 78 *
 bupleuroides 91. 40. 97.
 137 obs.
 byzantina 88. 1.
 calycina 97. 137 obs.
 Cambessedesii 96. 116.
 Campanula 92.
 Candollei 97. 129.
 canescens 95. 107.
 cantabrica 97. 129.
 catholica 90.
 Ceccariniana 91. 46.
 cephalonica 88. 1.
 cerastoides 97.
 cerastoides 97. 128 *
 cheiranthifolia 96. 118.
 chlorantha 91.
 chromodonta 87. 9. 4.
 ciliata 91.
 ciliata 96. 114.
 clandestina 94. 92.
 clavæcarpa 90. 29 *
 coarctata 97. 131.
 cæsia 88.
 cæsia 90. 29.
 colorata 95.
 colorata 90. 39. 96. 122.
 commutata 88.
 commutata 88. 7 *. 90. 32 *
 compacta 89.
 congesta 89.
 congesta 91. 48. 52.
 conica 97.
 conoidea 97.
 cordifolia 93.
 corsica 92. 64 *
 corymbifera 94.
 Coulteriana 88. 6.
 crassicaulis 89.
 crassifolia 88. 8.
 cretacea 92.
 cretica 94.
 cruentata 97. 128 *
 Cucubalus 88.
 cylindriflora 97. 136.
 Czerei 88. 1 *
 dalmatica 93. 71.
 decumbens 95. 107.
 delicatula 88. 9. 5.
 delphica 89. 17.
 densiflora 91.
 dichotoma 93.
 dichotoma 93. 81.
 diffusa 95. 107.
 dinarica 93.
 discolor 96.
 distachya 95. 107.
 disticha 93.
 disticha 97. 132.
 divaricata 94.
 divaricata 93. 81.
 dubia 90. 32 *
 echinata 93.
 echinosperma 95.
 effusa 91. 50.
 elata 91. 42.
 elegans 92.
 Elisabethæ 93.
 elongata 93.
 eranthema 94. 87.
 eriphylla 87. 9. 3.
 exaltata 91. 47.
 exscapa 93. 78 *
 fabaria 88.
 fimbriata 98. 137 obs.
 flavescens 89.
 foetida 93.
 fontana 87. 9. 2.
 Friwaldskyana 90.
 fruticosa 89.
 fruticulosa 92.
 fruticulosa 89. 22.
 fuscata 94.
 fuscata var. 93. 72.
 gallica 97.
 Gallinyi 97. 126.
 geniculata 92. 56 *
 germana 94. 93.
 gibraltarica 89.
 gigantea 89.
 Giraldii 97.
 glandulosa 97. 129.
 glareosa 88. 7 *
 glauca 95.
 glaucofolia 86. 6. 1. 2.
 glutinosa 87. 9. 3.
 græca 93.
 Græfferi 92. 56 *
 graminifolia 90. 38.

- graminea 92. 59 *
 graveolens 95. 112.
Guicciardii 90.
 gymnothea 92. 69.
 Heuffleri 87. 9. 3.
hirsuta 96.
hirsuta 96. 124. 97. 128.
hispanica 96. 116.
hispidia 96. 124.
inaperta 95.
inaperta 92. 70.
inflata 88. 6.
infracta 90. 32.
integripetala 94.
involuta 98. 137 obs.
italica 90.
italica var. *incana* 89. 16.
jucunda 97. 128 *
Kitaibelii 92. 71.
laconica 94.
læta 85. 3. 2.
Lagascæ 95. 110.
lanuginosa 88.
lasiostyla 96. 115.
laxiflora 96. 121.
legionensis 91.
Lerchenfeldiana 92.
leucojifolia 92. 70 *
leucophæa 96. 113.
linicola 94.
linifolia 91.
linoides 91. 46.
litoralis 96. 121. 97. 129.
litorea 96.
livida 90. 29. 32.
longicaulis 95.
longicilia 90. 32.
longiflora 91.
longiflora 92. 58.
longipetala 90.
lusitanica 97.
lusitanica 96. 124.
lychnidiflora 94. 92.
macrorrhiza 93. 72.
Mandralisci 95. 107.
marginata 97. 128 *
maritima 88.
maritima 88. 7 *
megaspilæa 92. 70.
melandrioides 93. 73 obs.
mellifera 90.
micrantha 96. 118.
microloba 88. 7 *
micropetala 96.
modesta 97. 129.
mollissima 89. 16. 22.
monachorum 87. 9. 2 *
montana 88. 7.
multicaulis 92.
multiflora 89.
muscipula 94.
muscipula 94. 88.
myloptera 97. 128 *
nana 96. 116.
nebrodensis 90. 29.
neglecta 96. 120.
nemorialis 90. 29. 29 *
Nentvichii 91. 52.
nevadensis 90.
nicæensis 95.
Niederi 90.
noctiflora 93.
nocturna 96.
nutans 90.
obtusifolia 96.
occitanica 97. 129.
oleracea 88. 6.
oligantha 91. 41.
olympica 92. 69.
Orphanidis 92.
Orsiniana 92. 70 *
Otitis 91.
pallida 91. 40.
panormitana 94. 92.
paradoxa 89.
parnassica 92.
parviflora 91.
parviflora 91. 52.
patens 90. 29.
pauciflora 90.
paucifolia 91.
pelidna 90. 32.
pendula 96.
pentelica 94. 98 *
permixta 96. 119 *
pernoctans 95. 107.
petræa 92. 68.
picta 91. 45.
pilosa 90. 29.
pinetorum 94.
Pollinii 90. 32.
polygonoides 97. 137 obs.
polyphylla 90. 32 *
portensis 95.
procumbens 88.
psammites 96.
pseudo-atocion 94.
pseudobehen 88. 6. 94.
 86 *
pseudo-otites 91. 50.
pteropleura 94. 88.
puberula 88. 6.
pubescens 95. 111.
Pumilio 93.
punctata 92. 67.
purpurea 89. 14.
pyriformis 95. 108.
quadridentata 87. 9. 2.
quadrifida 87. 9. 2. 90. 32
quinquevalvera 97. 128 *
racemosa 93.
radicosa 91.
Ramburiana 92. 58.
ramosa 94. 98.
ramosissima 95.
reflexa 96.
Reichenbachii 91.
Reinholdii 94. 86 *
remotiflora 96.
repens 91.
Requienii 89.
rhodopea 90. 30 obs.
rigidula 95.
rigidula 95. 104. 97. 132.
Roemeri 91.
Roeseri 92. 56 *
rostrata 97. 132.
rubella 94.
rubens 90. 32.
rupestris 92.
rupestris 87. 9. 14. 88. 7 *
rupicola 92. 70 *
sabuletorum 96. 121.
Salzmanni 89.
Salzmanni 89. 22.
saponariæfolia 88. 1. 1 *.
 6 *
Sartorii 97.
Sassiana 94. 94.
saxatilis 90. 32.
saxifraga 92.
saxifraga 92. 69. 70. 70 *
scabra 95. 106.
Schottiana 88. 6 *
sciatica 97. 128 *
sclerocarpa 97. 132.
sedoides 94.
segetalis 94. 100 *
semiglabra 97. 129.
Sendtneri 91.
sericea 95.
sericea 95. 107.
setabensis 95. 108.
setacea 96. 114.
sibirica 91.
Sibthorpiana 93. 81.
sicula 90. 29. 94. 92.
Sieberi 90.
Sigeri 86. 7. 1.
silvestris 97. 128 *
Smithii 92. 68 *
spatulata 90. 32 *
spatulæfolia 90. 32.
spergulifolia 90. 32 *
spicata 96. 119.
spinescens 90.
squamigera 93.

- staminea 91. 52 *
 staticifolia 91. 40.
 stellata 91. 56.
 stenophylla 88. 7. 95. 106.
 stricta 94.
 stricta 94. 89.
 subconica 97.
 subspathulata 91. 42.
 subvinosa 96. 113.
 succulenta 92.
 supina 91.
 tatarica 91.
 tejedensis 92. 58.
 tenella 87. 9. 2.
 tenerrima 96. 121.
 Tenoreana 88. 6.
 tenuiflora 94. 92 *
 tergestina 97. 129.
 thebana 88.
 thessalonica 89. 20 *
 Thorei 88.
 tineta 90. 39.
 tomentosa 89. 21.
 Tommasinii 88. 9. 5.
 transsilvanica 90. 32 *
 tridentata 97.
 tridentata 97. 129.
 trinervia 97.
 tubiflora 95. 107.
 turbinata 94. 100.
 turgida 98. 137 obs.
 Ungerii 94.
 uniflora 88. 7. 7 *
 Urvillii 92.
 vallesia 92.
 vallesia 89. 26.
 variegata 88.
 velutina 89.
 vespertina 96.
 vespertina 95. 107.
 vestita 96. 118.
 vilipensa 95. 105. 106.
 vilis 95. 106.
 villosa 96. 116.
 viridiflora 90.
 viscida 87. 9. 1. 93. 79.
 viscosa 89.
 viscosissima 90. 29 *
 Waldsteinii 92.
 wolgensis 91.
 Zawadskii 89.
 Silenanthe Zawadskii 89. 12.
 Silenopsis Lagascae 86. 6. 2.
 Siler alpinum 277. 5.
 lancifolium 277. 8. 286.
 12.
 trilobum 282.
 Silybum eburneum 404.
 hispanicum 404. 72. 2.
 Marianum 404.
 pygmaeum 404. 78. 1.
 Simethis bicolor 719.
 planifolia 719. 5. 1.
 Sinapis alba 47.
 amplexicaulis 48.
 arvensis 47.
 baetica 48. 37. 2.
 campestris 47. 6.
 Cheiranthus 47.
 dissecta 47.
 heterophylla 48. 37. 9.
 hispida 47.
 laevigata 47.
 longirostris 48. 37. 5.
 montana 47. 2 *
 nigra 47.
 orientalis 47. 6.
 pubescens 47.
 pyrenaica 43. 8.
 Schkuhriana 47. 6.
 Schlosseri 67. 6.
 setigera 47.
 sicula 48. 37. 1.
 subbipinnatifida 48. 37. 4.
 villosa 47. 6.
 virgata 48. 37. 1.
 Sison Ammi 310. 95. 5 obs.
 Amomum 305.
 flexuosum 307. 85. 3.
 lateriflorum 310. 95. 5 obs.
 silvaticum 315. 107. 3.
 Sisymbrium acutangulum 43.
 8. 8 *
 altissimum 43.
 altissimum 43. 6. 14.
 arundanum 43. 9.
 asperum 44.
 Assoanum 43.
 austriacum 43.
 Boissieri 44.
 Boryi 44. 27 *
 bursifolium 44.
 bursifolium 44. 24 *. 27.
 cartilagineum 43. 3.
 Columnae 43. 6.
 confertum 44. 19 *
 contortum 44. 15.
 contortuplicatum 40. 14.
 corniculatum 44.
 crassifolium 44.
 dentatum 44. 27.
 eckartsbergense 43. 8.
 erysimoides 43.
 fugax 44.
 granatense 43.
 hirsutum 44. 20.
 hispanicum 44.
 Irio 43.
 islandicum 36. 20. 8.
 junceum 43.
 laevigatum 44. 24.
 laxiflorum 43.
 leiocarpum 44. 17.
 Loeselii 43.
 monense 49. 38. 4.
 montivagum 43. 8.
 multisiliquosum 43. 8.
 murale 49. 38. 11.
 nitidum 43. 7.
 officinale 44.
 orientale 43.
 palustre 36. 20. 8.
 pannonicum 43. 5.
 Peyrouisianum 44. 27.
 pinnatifidum 44.
 polyceratium 44.
 polyceratium 44. 19 *
 pumilum 44.
 pygmaeum 39. 25. 8.
 pyrenaicum 43. 8 *
 rhodonense 43. 8.
 rigidulum 43. 7.
 rigidum 44.
 ruderales 44. 17.
 runcinatum 44.
 septulatum 43. 5.
 Sinapistrum 43. 5.
 Sophia 43.
 strictissimum 43.
 subhastatum 43. 6.
 sueticum 44.
 supinum 44.
 tanacetifolium 43.
 taraxacifolium 43. 8.
 Thalianum 44.
 toxophyllum 44.
 Villarsii 43. 8 *
 villosum 44. 20.
 Zanonii 44. 27 *. (cf. 48. 8.
 Sisyrinchium anceps 699.
 Bermudiana 699.
 Sium angustifolium 304.
 graecum 285. 27. 1.
 lancifolium 304.
 latifolium 304.
 longifolium 304. 77. 1.
 Sisarum 304. 77. 2 obs.
 sisoniferum 309. 95. 1.
 Smilacina stellata 717 obs.
 Smilax aspera 715.
 aspera 715. 3.
 catalonica 715. 3.
 excelsa 715.
 mauritanica 715.
 nigra 715. 2 *
 Smyrniacum apiifolium 315.
 Dioscoridis 315. 109. 4.

- Dodonæi* 315. 109. 5.
Matthioli 315. 109. 5.
Olusatrum 315.
Orphanidis 315.
perfoliatum 315.
ramosum 315. 109. 5.
rotundifolium 315.
Sobolewska litophila 67.
Solanum assimile 525. 9. 2.
 atriplicifolium 526. 7.
 bonariense 525. 9. 1 obs.
 chlorocarpum 526. 3 *
 citrullifolium 525. 9. 1 obs.
 Dillenii 526. 7 *
 Dulcamara 525.
 flavum 526. 3 *
 heterodoxum 525. 9. 1 obs.
 humile 526.
 litorale 525. 9. 2.
 luteo-virescens 526. 5.
 luteum 526. 3.
 melanocerasus 526.
 miniatum 526.
 minutiflorum 526. 3.
 moschatum 526.
 nigrum 526.
 ochroleucum 526. 3 *
 parviflorum 526. 9 *
 persicum 525. 9. 2.
 pteroaulon 526. 8.
 puniceum 526. 4.
 sodomæum 525.
 stenopetalum 526. 7.
 suffruticosum 526.
 villosum 526.
Soldanella alpina 602.
 alpina 602. 9. 1.
 Clusii 602. 9. 2. 3.
 Ganderi 602. 9. 4 ×
 minima 602.
 montana 602.
 pusilla 602.
 pyrolæfolia 602. 9. 2.
 villosa 602. 9. 1 *
Soldevilla setosa 473. 143. 1.
Soleirolia corsica 658. 3. 1.
Solenanthus apenninus 521.
 Biebersteinii 521.
Solidago alpestris 387. 45. 1.
 arenaria 388. 45. 1.
 cambrica 388. 45. 1.
 canadensis 388. 45. 3 obs.
 carpathica 388. 45. 1.
 Doronicum 354. 6. 21.
 glabra 388. 45. 3 obs.
 litoralis 388.
 macrophylla 387. 45. 1.
 macrorhiza 388. 45. 1 *
 minuta 388.
 monticola 387. 45. 1.
 nudiflora 388. 45. 1 *
 procera 388. 45. 3 obs.
 pygmæa 388. 45. 1 *
 serotina 388. 45. 3 obs.
 Virgaurea 387.
 vulgaris 387. 45. 1.
Soliva lusitanica 380.
Sommeraueria quadrifaria
 119. 31.
Sonchus aquatilis 434. 3 *
 arvensis 433.
 asper 434.
 Bocconi 461. 120. 1.
 cervicornis 461. 120. 3.
 chondrilloides 461. 119. 4.
 ciliatus 434. 9.
 crassifolius 434.
 decorus 434.
 fallax 434. 8.
 glaucescens 434.
 græcus 434. 7.
 hieracioides 434.
 intermedius 433. 107. 2.
 461. 119. 3.
 italicus 434. 107. 10.
 lacerus 434. 9.
 litoralis 434. 3.
 maritimus 434.
 maritimus 433. 107. 2.
 434. 3 *
 nitidus 433. 107. 2.
 Nymanii 433. 107. 2 *
 oleraceus 434.
 oleraceus 434. 8.
 palustris 433.
 parviflorus 434. 9.
 pectinatus 434. 10.
 picroides 461. 119. 3.
 pustulatus 434.
 roseus 434. 9.
 scorzonæræformis 461. 120.
 2.
 simplicissimus 434. 5.
 spinosus 434. 8. 461. 120.
 3.
 tenerrimus 434.
 tuberosus 434. 108. 4.
 uliginosus 433. 107. 2 *
 volhynicus 433. 106. 4.
Soranthus Meyeri 285.
Sorbus ambigua 242. 9 *
 Aria 242.
 Aria 242. 9 *
 aria-chamæespilus 242.
 5 *
 Aria-torminalis 242. 6 ×
 arioides 242. 4 *
 arvernensis 242. 5 *
aucuparia 241.
Chamæespilus 242.
cordata 241. 3. 2.
domestica 241.
fennica 241. 3. 3.
florentina 242.
glaberrima 242. 7.
græca 242. 5.
hybrida 241.
lanuginosa 241. 3. 2.
latifolia 242.
monticola 241. 3. 2.
Mougeoti 241. 3. 4.
oblongifolia 242. 5 *
pilosula 242. 9 *
præmorsa 241. 3. 2 *
Reverchoni 242. 5 *
rupicola 242. 4 *
sabauda 242. 9 *
scandica 241.
sphærocarpa 242. 5.
sudetica 242. 9 *
Tommasinii 242. 7.
tomophylla 242. 4.
torminali-aria 242. 6.
torminalis 242.
Sorghum campanum 785.
cernuum 785. 4. 2 obs.
halepense 785.
saccharatum 785. 4. 2 obs.
Schreberi 785. 4. 1.
vulgare 785. 4. 2 obs.
Soyeria blattarioides 454. 115.
 2.
 grandiflora 455. 4.
 hyoseridifolia 455. 9.
 lampsanoides 455. 11.
 montana 455. 8.
 paludosa 456. 14.
 serbica 455. 3.
 sibirica 454. 115. 1.
Sparganium affine 758.
 boreale 758. 5.
 fluitans 758.
 fluitans 758. 2.
 Friesii 758. 4.
 glomeratum 758. 3.
 hyperboreum 758.
 minimum 758.
 nutans 758.
 natans 758. 5. 7.
 oligocarpon 758.
 ramosum 757.
 simplex 758.
 vaginatum 758. 5 *
Spartianthus juncus 149. 3.
 1.
Spartina alterniflora 789.
 Duriæi 789. 1.

- stricta* 789.
Townsendi 789.
versicolor 789.
Spartium capitatum 154. 65.
Clusii 154. 6. 1.
cuspidatum 151. 18.
erinacoides 152. 34.
horridum 150. 5. 6.
interruptum 151. 23.
junceum 149.
patens 150. 4. 7. 156. 10.
sericeum 154. 65.
spinosum 158. 11. 3.
Spartocytisus purgans 157. 31.
Specularia castellana 483. 4. 2 *
coa 483. 4. 1.
cordata 483. 4. 3.
falcata 483.
hirta 483. 4. 3.
hybrida 483.
pentagonia 483.
speculum 483.
Spergella glabra 121. 15. 4.
glandulifera 120. 15. 1.
saginoidea 121. 15. 7.
subulata 120. 15. 2.
Spergula arvensis 121.
linicola 122. 1 *
maxima 122. 1 *
Morisonii 122. 2.
pentandra 122.
pentandra 122. 2.
rimarum 122. 4 obs.
sabuletorum 121. 15. 8.
saginoidea 121. 4. 6. 7.
sativa 122. 1.
vernalis 122.
viscosa 123.
vulgaris 122. 1.
Spergularia alpina 123. 6.
atheniensis 123. 7 *
azorica 122. 4 *
capillacea 123.
campestris 123. 7 *
diandra 123.
diandra 123. 7 *
Dillenii 122. 5.
fascicularis 122. 4.
fimbriata 122.
heterosperma 122. 5.
laxiflora 123. 6.
leiosperma 122. 5.
longipes 123. 6.
macrorrhiza 122.
marina 122. 4.
media 122.
media 123. 6.
purpurea 123. 8 obs.
radicans 123. 6 *
rubra 122.
rupestris 122.
salina 122.
salsuginea 123. 7.
segetalis 123.
urbica 122. 5 obs.
Sphenopus divaricatus 833.
Gouani 833.
Spiraea Aruncus 215.
banatica 214. 1 *
cana 214.
carpinifolia 215. 8 obs.
chamaedrifolia 214.
chamaedrifolia 214. 1. 2 *
crenata 215.
crenata 214. 3. 215. 6.
crenifolia 214. 2 *
decumbens 214.
denudata 215. 10.
Filipendula 215.
flabellata 214.
flexuosa 214. 4.
glauca 215. 10.
Hacquetii 214. 4.
hypericifolia 215. 6 obs. 7.
lancifolia 214. 4.
media 214. 2.
oblongifolia 214. 2 *
obovata 215.
opulifolia 215. 8 obs.
pikoviensis 214. 2.
prostrata 214. 1.
quinqueloba 215. 10.
salicifolia 215.
tomentosa 215. 8 obs. 1
Ulmaria 215.
ulmifolia 214.
Spiranthes aestivalis 688.
autumnalis 689.
cernua 689. 12. 3.
gemmipara 689.
Spirodela polyrrhiza 756.
Spitzelia Willkommii 467. 9.
Sporobolus arenarius 800. 48. 1.
gaditanus 800. 48. 1 *
pungens 800.
Squilla maritima 729. 17. 1.
Stachys abrotanifolia 580. 40.
acutifolia 577. 16. 1.
adenocalyx 579. 26.
alpina 577.
ambigua 578. 14 x
angustifolia 580.
anisochila 579.
annua 579.
arenaria 579.
argentea 577. 6.
argolica 580. 49 et *
arvensis 578.
barbata 578. 10.
barbigera 578. 10.
betonicæfolia 578. 10.
byzantina 578. 13.
candida 580.
canescens 578. 19.
cassia 577.
chrysanthia 580. 46 *
circinata 578.
corsica 579.
cretica 578.
cretica 578. 7. 11.
dasyanthos 577.
dasyanthos 577. 16. 3.
decumbens 580. 39. 45.
delphinensis 579. 30 *
divaricata 579. 24.
fragilis 579. 31.
germanica 577.
glutinosa 580.
græca 577.
græca 577. 15. 2.
grandiflora 579. 28.
Haynaldi 580. 40.
Heldreichii 577.
heraclea 578.
heraclea 577. 16. 1.
hirta 579.
Janiana 578.
iberica 579.
intermedia 578. 10.
italica 578.
italica 577. 16. 4. 578. 9. 12.
Iva 580.
labiosa 579. 31 *
lanata 578.
lanata 577. 6.
leucoglossa 579.
lusitanica 577. 16. 1. 6.
maritima 579.
marrubifolia 578.
menthaefolia 579.
messenica 578.
mollissima 580.
mucronata 580.
nitens 579.
obliqua 578.
obscura 579.
orientalis 578. 11.
palustris 578.
palustri-silvatica 578. 14 x
pannonica 577. 6.
Parolini 579.
patula 579.

- penicillata 577. 16. 3. 578.
 6 *
Pinardi 578.
plumosa 579. 30 *
Poiretii 578. 20.
polystachya 577. 6.
procumbens 579. 30.
pubescens 580.
purpurea 579. 37.
ramosissima 579. 30 *. 35.
recta 579.
recta 579. 30 *
Reinerti 577. 6.
salviaefolia 578. 8.
seyronica 580. 49.
segetum 578. 15.
serbica 579.
sideritoides 579. 29.
Sieberi 578. 7.
silvatica 578.
silvatico-palustris 578.
 14 x
silvestris 579. 30.
spinosa 580.
spinulosa 579.
Spreitzenhoferi 580.
Spruneri 580.
stenophylla 579. 30.
subcrenata 579.
subcrenata 579. 30.
sublanata 577. 6.
Swainsoni 580.
Swainsoni 580. 50.
tenuifolia 580. 40 *
Tournefortii 578.
Tournefortii 578. 19.
valentina 578. 10.
virgata 580.
viridis 578.
Zuccarinii 580. 41.
Stæhelinia arborescens
 401.
bætica 401.
dubia 401.
fruticosa 401.
uniflosculosa 401.
Stapelia europæa 497.
Staphylea pinnata 144.
Statice acutifolia 612. 35.
alata 609. 2.
albida 611. 25.
alliacea 614. 14. 615. 22.
 616. 32 *
alpina 615. 37.
alutacea 612.
aristata 613. 48.
articulata 612.
articulata 612. 37. 39.
Ancheri 610. 19 *
auriculæfolia 610. 10—13.
auriculæursifolia 610. 11.
australis 611. 26 *
Avei 613. 48.
bahusiensis 609. 8.
bayonensis 610. 16.
Behen 610.
bellidifolia 612.
bellidifolia 610. 19 *. 611.
 25.
Besseriana 613. 3 *. 4. 6.
binervosa 610. 16.
Bubanii 610. 16.
cæsia 613.
Calcaræ 611. 32 *
cancellata 612.
canescens 615. 24.
caspia 611. 31. 612. 44.
catalaunica 611. 26 *
collina 613. 4. 4. 6.
Companyonis 610.
confusa 611.
congesta 610. 18.
cordata 612.
cordata 611. 25. 612. 39.
coriaria 612. 42.
corinthiaca 610.
corymbulosa 609.
Costæ 610. 12 *
cosyrensis 612.
Crouanii 609. 8.
cumana 612.
cuspidata 611. 26.
dalmatica 613. 4. 4.
delicatula 611.
densiflora 610.
densiflora 610. 12.
desertorum 613. 3 *. 4.
dichotoma 613.
dichotoma 610. 13. 15.
 611. 26. 32 *. 612. 39 *.
 45.
dictyoclada 611.
dictyophora 612. 37.
diffusa 613.
diffusa 612. 45.
Dodartii 610.
drepanensis 609. 7 *
dubia 611. 32.
Dubyei 612.
Dufourei 610.
duriuscula 611.
Echinus 614. 5. 1.
echioides 613.
echioides 611. 23.
elata 613. 4. 1.
elegans 613. 49.
emarginata 610.
ferulacea 613.
furfuracea 612.
furfuracea 612. 37.
Gerardiana 610.
globulariæfolia 610. 12.
 611. 24. 29.
Gmelini 609.
Gmelini 609. 7 *
Gougetiana 610.
gracilis 611. 32 *
græca 611. 23 *
graminifolia 613. 4. 5.
Gussoneana 611. 29.
hybrida 610. 10.
hyssopifolia 611. 23 *
inarimensis 611. 30.
incana 613. 3 *. 4. 6.
insignis 613.
intermedia 611. 25.
læta 611. 26 *
lanceolata 610. 11.
latifolia 612.
Legrandi 610. 20 *
leucantha 614. 18.
Limonium 609.
Limonium 610. 9.
lusitanica 615. 29.
lychnidifolia 610.
melia 612. 39 *
Meyeri 609.
minuta 612.
minuta 610. 17. 611. 30.
 31. 612. 36. 37.
minutiflora 611.
monopetala 609. 2. 1.
occidentalis 610.
ocymifolia 610.
oleæfolia 611. 31.
ovalifolia 610.
oxylepis 610. 13.
palmaris 611. 23 *
panormitana 611. 30 *
parvifolia 611. 32 *
plantaginea 614. 15.
prolifera 611. 23.
Pseudo-Limonium 610. 9.
psiloclada 611.
pubescens 612. 34. 36. 37.
pygmæa 611. 32 *
rariflora 609.
reticulata 612.
reticulata 611. 31. 32. 612.
 44 et *
rorida 611.
rorida 612. 37.
rubella 613. 3. 4.
rupicola 612.
salsuginosa 611.
sareptana 609. 6.
Sartorii 613. 4. 8.

- scoparia* 609. 4. 5. 7 *
Scopoliana 610. 13.
serbica 613. 4. 7.
serotina 609. 7 *
Sibthorpiana 611.
Sieberi 610.
sinuata 609.
Smithii 611. 31.
spathulata 610. 13. 15. 16.
 21. 22. 611. 23 *
speciosa 613. 4. 2. 6.
suffruticosa 613.
tatarica 613. 4. 3. 4.
tenuicula 612. 38.
tenuifolia 612. 35.
Thouini 609.
Tinei 611. 32 *
tomentella 609.
Tournefortii 611. 23 *. 28.
undulata 615. 22.
viminea 611. 31.
virgata 611.
virgata 610. 22. 611. 24.
Willdenowiana 610. 13.
 611. 26.
Stauracanthus aphyllus 149.
 20.
spartioides 149. 21.
Stellaria alpestris 112. 14.
 15.
alpicola 111. 3.
apetala 111. 3.
borealis 112.
Boreana 111. 3 *
bracteata 112. 9.
bulbosa 111.
Bungeana 111.
cerastoides 110. 38.
crassifolia 112.
Cupaniana 111. 3 *
davurica 112.
dichotoma 111.
dichotoma 111. 5.
Dilleniana 111. 7.
dubia 110. 39.
Edwardsii 112. 12.
Elisabethæ 111. 3.
Friesiana 112.
glabella 111. 3.
glacialis 112. 9.
glauca 111. 7.
graminea 112.
graminea 111. 7.
hebecalyx 112.
holostea 111.
humifusa 112.
junceæ 112. 8 *
latifolia 111. 3.
linoides 112. 9.
longifolia 112. 14.
longipes 112.
media 111.
microphylla 111. 3 *
muralis 114. 22.
neglecta 111. 3.
nemorum 111.
pallida 111. 3.
palustris 111.
Pseudo-Malachium 111. 1 *
pumila 108. 9.
Reichenbachii 111. 1 *
rupestris 119. 29.
saxifraga 114. 15.
scapigera 112. 16 obs.
subulata 112. 8.
uliginosa 112.
umbrosa 111. 3 *
viscida 110. 39.
Stellera Passerina 642. 4. 1.
pubescens 642. 4. 2.
Stenactis annua 389. obs. 2.
Stenhammaria maritima 521.
 18. 1.
Stenotaphrum americanum
 788. 16 obs.
 glabrum 788. 16 obs.
Sterigma tomentosum 29.
Sternbergia ætnensis 713.
 citrina 713.
 colchiciflora 713.
 dalmatica 713. 4.
 exscapa 713.
 lutea 713.
 lutea 713. 2.
 sicula 713.
Stipa arenaria 804. 58. 1.
Aristella 805. 61. 1.
barbata 805.
Bergeri 805. 11.
Calamagrostis 804. 59. 1.
calatajeronensis 805.
capillata 805.
gigantea 805.
gigantea 804. 58. 1. 805.
 7.
Grafiana 805.
hispanica 805. 4.
humilis 805. 10.
juncea 805.
Lagasceæ 805.
Lagasceæ 805. 6.
Lessingiana 805.
paleacea 805. 10.
parviflora 805.
pennata 805.
plumosa 805. 4.
pubescens 805. 7.
Sibthorpii 805. 7.
tenacissima 804. 58. 2.
Tirsa 805. 2.
tortilis 805.
Stoechas dentata 571. 7. 1.
officinarum 571. 7. 2.
pedunculata 571. 7. 3.
viridis 571. 7. 4.
Stratiotes aloides 678.
Streptopus amplexifolius
 716.
 distortus 716.
Strophostoma sparsiflorum
 520. 16 obs.
Sruthiopteris germanica
 860.
Sturmia Loeselii 686.
 minima 795. 35. 1.
 verna 795. 35. 1.
Styrax officinalis 493.
Suaeda acuminata 630.
æstuarina 630. 20. 8.
altissima 629.
baccifera 630. 21. 2.
bacciformis 630. 20. 8.
dendroides 629.
filiformis 630. 20. 8.
fruticosa 629.
hirsuta 625. 7. 8.
hyssopifolia 625. 7. 5.
Jacquini 630. 20. 8 *
Kochii 630. 20. 8 *
linifolia 630. 21. 1.
macrocarpa 630. 20. 8.
maritima 630.
pruinosa 629. 20. 3.
salsa 630.
sedifolia 625. 7. 7.
setigera 629.
spicata 630.
splendens 629. 20. 5.
vera 629.
Subularia aquatica 28.
Succisa altissima 345. 5. 1.
 australis 345.
 inflexa 345. 5. 3 *
 microcephala 345.
 pinnatifida 345.
 pratensis 345.
 pyrenaica 345. 5. 1.
 uralensis 346. 6.
Succowia balearica 58.
Suffrenia filiformis 252.
Swertia alpestris 501.
 intermedia 501. 3. 2.
 perennis 501.
 punctata 501.
Symphandra cretica 475.
 Wanneri 475.

- Symphytum anatolicum* 509.
angustifolium 510. 4. 8*
asperillum 509. 7.
bohemicum 509. 4. 1.
brochum 510. 10*
bulbosum 510.
Clusii 510. 10.
cordatum 509.
cordifolium 509. 6.
floribundum 509. 4. 2.
Gussonei 510.
macrolepis 510. 10.
mediterraneum 509.
mediterraneum 510. 9.
microcalyx 509. 4. 1.
molle 509.
officinale 509.
orientale 509.
ottomanum 510.
pannonicum 509. 6.
patens 509. 4. 1 et 4 obs.
punctatum 510. 10.
tauricum 509.
tuberosum 509.
uliginosum 509. 4. 1*
uplandicum 509. 4. 4 obs.
Zeyheri 510. 10*
Syrenia angustifolia 42.
cuspidata 42. 30.
Ehrhartiana 42. 29. 1.
sessiliflora 42.
siliculosa 42.
Syringa Josikea 495.
vulgaris 495.
Treniopetalum Neumayeri 286. 16.
Tamarix africana 255.
africana 253. 9.
anglica 253.
cretica 253. 8.
gallica 253.
gallica 253. 8.
Hampeana 253.
hexandra 253. 7.
hispanica 253.
laxa 253.
odessana 253.
Pallasii 253.
Pallasii 253. 5 obs.
paniculata 253. 5 obs.
parviflora 253.
tetrandra 253.
Tamus communis 718.
cretica 718.
Tanacetum achilleæfolium 373. 14.
alpinum 373. 8.
annuum 375.
argenteum 375.
atratum 371. 10.
Audiberti 375.
Balsamita 375. 27. 7 obs.
boreale 375.
corymbosum 372. 24. 1.
Funkii 375.
Gmelini 372. 15.
larvatum 371. 11.
macrophyllum 373. 11.
microphyllum 375.
Parthenium 372. 3.
serotinum 372. 5.
VahlII 373. 15.
vulgare 375.
Waldsteinii 372. 6.
Willkommii 373. 15.
Tapeinanthus humilis 709. 2.
1.
Taraxacum affine 437. 4.
alpestre 437. 4.
alpinum 437. 8*
apenninum 437.
autumnale 437. 6.
bulbosum 458. 42.
ceratophorum 437.
commutatum 437. 4.
corniculatum 437. 4*
crispum 436. 1.
dens leonis 437. 4.
erythrospermum 437. 4.
frigidum 437. 8.
glaciale 437. 2.
glaucanthum 437. 4.
glaucescens 437. 4*
gymnanthum 437.
gymnanthum 438. 10 obs.
hibernum 437. 6.
Hoppeanum 437. 4*
lævigatum 437. 4* 5.
lanuginosum 436. 1.
leptocephalum 437. 8.
leucospermum 437. 2.
maculatum 437. 4.
minimum 437.
minimum 437. 4.
nigricans 437. 4.
obovatum 437.
officinale 437.
Pacheri 437. 7*
palustre 437.
phymatocarpum 437.
purpurascens 437. 4.
pyrenaicum 437. 4.
pyrrhopappum 437. 1.
pyrrinerve 437. 4.
salsugineum 437. 8.
Scorzonera 437. 8. 10.
serotinum 436.
stipitatum 436. 1.
tenuifolium 437.
tomentosum 437. 1*
udum 437. 8.
vulgare var. 437. 10.
Taxus baccata 677.
Teesdalia Iberis 63.
Lepidium 63.
nudicaulis 63. 65. 1.
Telekia cordifolia 390. 51. 1.
speciosa 390.
speciosissima 390.
Telephium Imperati 254.
orientale 254. 1. 1*
Teline candicans 155. 7.
linifolia 155. 9.
Telmatophace gibba 756. 2.
3.
Teloxys aristata 625.
Tendana Piperella 591. 20.
Tenoria fruticosa 310. 1.
Tephrosia angustifolia 351. 14*
stenophylla 351. 14*
Tetragonolobus aduncus 183.
21.
purpureus 181. 24. 1.
tauriens 182. 4.
Teucrium achæmenis 566.
44.
alpestre 566.
amplexicaule 566.
angustifolium 567. 45.
angustissimum 566. 45.
aragonense 566. 44*
Arduini 564.
Arduini 564. 7.
arosanum 564.
asiaticum 565. 14.
aureum 566.
bæticum 564.
bæticum 564. 2.
balearicum 565. 16.
Botrys 565.
brevifolium 564.
buxifolium 566.
cæspitosum 567. 45.
campanulatum 564.
capitatum 566.
Chamædrys 565.
cinereum 566.
compactum 565.
corbariense 565. 19.
corymbiferum 567. 45*
creticum 564. 3. 4.
cuneifolium 566.
cuneifolium 566. 30.
densiflorum 564. 7.

divaricatum 565.
eriocephalum 566.
euganæum 564. 10.
flavescens 567. 45.
flavicans 566. 43.
flavum 565.
fragile 566.
fruticans 564.
Funkianum 567. 46.
Gasparrinii 564. 10 *
gnaphalodes 567.
granatense 566.
Gussonii 567. 45 *
Henseleri 566.
Halacsyanum 564.
hyssopifolium 564. 3.
intricatum 566.
lamiifolium 564.
lancifolium 565.
lanigerum 567. 46.
lanuginosum 565. 19.
latifolium 564. 2.
Libanotis 567. 49.
lucidum 565.
lucidum 565. 25.
lusitanicum 565.
Insitanicum 565. 14. 566.
 44. 567. 45.
Majorana 567.
maritimum 565. 28.
Marum 565.
massiliense 564.
Mazziarrii 567. 50 obs.
microphyllum 565.
montanum 566.
Nissolianum 564. 5.
ochroleucum 566. 37.
odoratum 564. 12.
palustre 565. 18.
Polium 566.
pseudochamæpitys
 564.
pseudohyssopus 566. 44.
pulverulentum 567.
pumilum 567.
pyrenaicum 566.
quadratum 566.
quadratum 565. 26.
reptans 566. 32.
resupinatum 565.
rosmarinifolium 564.
salviastrum 565. 13.
scordioides 565.
Scordium 565.
Scordium 565. 19.
Scorodonia 564.
siculum 564. 10 *
silvestre 564. 10.
spinosum 565.

subspinosum 565.
subtriphyllum 566. 44.
supinum 566. 37.
thymifolium 566.
valentinum 567. 45 *
verticillatum 567.
Webbianum 565.
Thalictrum acuminatum 6.
 18 *
acutibulum 7. 24.
affine 6. 17.
alpestre 5. 4. 7. 24.
alpinum 7.
angustifolium 5.
angustifolium 6. 17.
angustissimum 5. 10.
aquilegifolium 5.
arrigens 6. 20.
atropurpureum 5. 3.
auriculatum 5. 10.
aurgeranum 7. 21.
Bauhini 6.
Bauhini 5. 10.
Bauhinianum 5. 10.
brevepubens 7. 23 *
calabricum 7.
calcareum 7. 23.
collinum 6. 18 *. 7. 23.
commutatum 5.
Delarbei 6. 18 *
depauperatum 7. 23.
distans 6. 15.
dubium 6. 16.
dumulosum 6. 20.
dunense 7. 23.
elatum 5.
elongatum 6. 17.
eminens 6. 18.
exaltatum 5.
expansum 6. 19.
flavum 5.
flexuosum 6. 18.
foetidum 7.
Friesii 6. 15.
fulgidum 5. 10.
galioides 5. 10. 6. 17.
glaucum 5.
Godroni 7. 21.
Grenieri 6.
heterophyllum 5. 8.
hybridum 5. 8.
Jacquinianum 6.
Jordani 6. 13.
kemense 5. 11 *
Kochii 6. 18 *
Laggeri 6. 18.
laserpitiifolium 5. 10.
leptophyllum 6.
lucidum 5. 8 *. 6. 13.

macrocarpum 5.
majus 6.
majus 5. 11 *. 6. 20.
maritimum 5. 8 *
medianum 5. 8 *
mediterraneum 5. 8 *
medium 6.
minus 7.
minus 6. 18 et *
montanum 7. 23.
monticolum 6. 18 *
mucronatum 5. 11 *
neglectum 6. 18 *
Nestleri 6. 17.
nigricans 5. 8 et *
nitidulum 6. 13.
nutans 6. 18 *. 20.
obscuratum 7. 20.
odoratum 7. 23 *
olidum 7. 24 *
olympicum 6. 19 *
oreites 6. 20.
orientale 5.
paradoxum 6. 16.
pauciflorum 5.
petrosum 7. 21.
peucedanifolium 5. 10.
porrectum 5. 8.
præcox 6. 18. 23.
præfloreus 6. 18.
pratense 7. 23.
princeps 5. 10.
propendens 7. 20.
pubescens 7. 23 et *
pyrenaicum 6. 18.
rariflorum 6.
riparium 5. 8.
rotundifolium 6. 15.
rufinerve 5. 8. 6. 14.
saxatile 6. 18 *. 7. 21. 24.
Schultzii 7. 23.
silvaticum 7.
silvaticum 7. 21.
simplex 6.
simplex boreale 6. 15.
soboliferum 5. 8.
sphaerocarpon 5. 8.
spurium 5. 8 *
strictum 6.
strictum 6. 15.
strictum boreale 6. 15.
tenuifolium 6. 17.
Timeroyi 6. 16.
tortuosum 7. 20.
transsilvanicum 7.
tuberosum 5.
Thapsia decussata 276.
garganica 276.
maxima 276. 4. 1.

- meoides 276. 2. 1.
 minor 276. 4. 1.
 salmanticensis 276. 4. 1.
 transtagana 276.
 villosa 276.
Theligonum *Cynocrambe*
 658.
Thelysia *alata* 703. 49.
grandiflora 703. 49.
Thesium *alpinum* 644.
alpinum 643. 5.
ambiguum 644. 10 *
bavaram 643. 3. 1.
Bergeri 644.
brevicolle 644. 10.
byzantium 643. 4 *
brachyphyllum 643.
carnosum 644. 11.
comosum 644. 14.
decumbens 644. 13.
diffusum 643.
divaricatum 643.
ebracteatum 644.
elegans 643. 2. 1.
fulvipes 643. 3. 2.
gallicum 643. 5.
glaucum 643. 4.
græcum 644. 12. 13.
humifusum 643.
humifusum 643. 4. 6. 7.
humile 644.
Hussenoti 643. 5.
intermedium 643.
intermedium 643. 3. 2 *
italicum 643. 3. 2 *
linophyllum 643. 3. 1. 2. 4.
macranthum 644. 15.
montanum 643.
nevadense 643.
Parnassi 643.
pratense 644.
pyrenaicum 644. 10.
ramosum 643.
ramosum 643. 3. 8.
rostratum 644.
sessiliflorum 644. 11.
tenuifolium 644. 11 *
Thlaspi *affine* 62.
alliaceum 62.
alpestre 62.
alpestre 62. 15. 63. 16 *
alpinum 62.
alpinum 62. 11.
arenarium 62. 16.
Arnaudiae 62. 15.
arvense 61.
arvernense 63. 16 *
bellidifolium 63.
brachypetalum 62. 15.
brevistylum 63. 20 *
bulbosum 61.
calaminare 62. 16.
cepeæfolium 63.
cochleariforme 62.
coerulescens 62. 16.
Corongianum 63. 18.
cuneifolium 62. 6 *
dacicum 63.
erraticum 62. 4.
Gaudinianum 62. 16 *
græcum 62.
granatense 62.
Janke 63. 19 *
improperum 62. 4.
Kovatsii 63.
Lereschii 62. 16 *
martiale 62. 4.
microphyllum 63.
montanum 62.
montanum 62. 9.
natolicum 62.
neglectum 62. 4 *
nemoricolum 62. 15.
nevadense 63.
occitanum 62. 16.
ochroleucum 62.
perfoliatum 62.
præcox 63.
præcox 62. 16. 63. 20.
pratulorum 62. 4.
Prolongi 62.
pygmæum 63. 20.
Revellieri 62. 4.
rheticum 62. 16.
rivale 63.
rotundifolium 63.
rubellum 66. 70. 2.
salticolum 32. 15.
scapiflorum 65. 25.
silvestre 62. 16.
stenopterum 63. 16 *
stylosum 63.
suecicum 62. 16.
sylvium 32. 10.
taygeteum 62. 9.
Tineanum 62. 7.
Tinei 62.
Verloti 62. 15.
Villarsianum 62. 6.
virens 63. 16 *
virgatum 62.
virgatum 62. 15.
vogesiacum 62. 16.
vulcanorum 62. 15.
Thlipsocarpus *bæticus* 474.
 145. 1.
Thrinia *grumosa* 469. 1.
hirta 470.
hirta 469. 2.
hispidæ 469.
hispidæ 470. 131. 3.
lævis 470. 131. 3.
Leysseri 470. 131. 3.
major 470. 131. 3.
maroccana 469. 2.
Mülleri 470.
nudicalyx 470. 131. 3.
orientalis 469. 22.
psilocalyx 469. 2.
Salzmanni 470.
tuberosa 469.
Thymbra *capitata* 595. 38.
hirsuta 591. 1.
spicata 595.
Thymelæa *argentea* 641. 3. 1.
Bauhini 642. 3. 10.
calycina 642.
canescens 641.
Cneorum 642. 3. 10.
coridifolia 642.
dioica 642.
elliptica 642.
hirsuta 641. 2. 1.
nitida 641.
pubescens 642. 3. 9.
Rodriguezii 641. 5.
Ruezii 642. 7 *
Sanamunda 642.
thesioides 642.
Tartonraira 641.
Thomasii 641. 3. 1.
tinctoria 641.
velutina 641.
villosa 641.
virgata 642.
Thymus *acicularis* 594.
acicularis 594. 20 *. 29.
acinoides 589. 11.
æstivus 593.
affinis 593. 18.
albicans 594.
albicans 594. 30.
algarbiensis 594.
angustifolius 594. 20 et *.
 26.
arenarius 594. 20.
austriacus 594. 20 *
bracteatus 594.
bracteatus 594.
caespititius 593.
capitatus 595.
capitellatus 594.
carnosus 593.
cephalotus 595.
Chamædryis 593.
Chaubardi 594. 20 *
collinus 594. 19 *

- comosus* 593. 19 *
comptus 594.
corsicus 589. 13. 597. 13.
creticus 595. 38.
cristatus 590. 12.
croaticus 591. 17.
dalmaticus 594. 20 *
diffusus 593.
diffusus 593. 4.
filiformis 590. 6. 591. 19.
Funkii 595.
glabratus 593. 19. 594.
 20 *
glabrescens 594. 20 *
granatensis 594.
gratissimus 594. 20 *
graveolens 589. 15. 593.
 14.
Herba barona 593.
heterotrichus 594. 20 *
hiemalis 593.
hirsutus 594.
hirsutus 594. 20 *
hirtus 593.
hirtus 594. 29.
humifusus 594. 20.
incanus 588. 9.
inodorus 590. 12.
integer 594. 20.
lanceolatus 594. 20 *
lanuginosus 593. 19. 594.
 20.
lobatus 595. 33.
longicaulis 594. 29.
longiflorus 595.
Loscosii 593.
lusitanicus 595. 33.
Marinosci 594. 29.
Mastichina 593.
Mastichina 590. 6.
membranaceus 595.
micranthus 590. 7.
microphyllus 591. 18.
montanus 594. 19 *
nervosus 594. 20 *
nitidus 593.
nummularius 594. 19 *
ocheus 594. 20.
odoratissimus 594.
origanifolius 590. 5.
panuonicus 594. 20 *
Piperella 593.
Piperella 591. 17. 20.
pulcherrimus 594. 20.
pulegioides 593. 19.
Richardi 592. 9.
rotundifolius 588. 10. 593.
 19 *
sabulicola 593.
serpylloides 594.
Serpyllum 594.
Serpyllum 593. 19. 594.
 20. 25.
Sibthorpii 594. 20 *
silvestris 593.
spinulosus 594. 29.
striatus 594.
subcordatus 591. 17.
tenuifolius 593. 8.
teucrioides 593.
tomentosus 593.
transsilvanicus 593. 19 *
variabilis 594. 20.
villosus 595.
vulgaris 593.
vulgaris 593. 10. 594. 22.
Welwitschii 593.
Willdenowii 593. 4.
zygioides 594. 29.
Zygis 593.
Zygis 593. 9. 594. 29.
Thysanthus palustris 599.
 1.
Thyselinum angustifolium
 286. 11.
palustre 286. 11.
silvestre 286. 11.
Tilia acuminata 131. 3.
alba 130. 1.
argentea 130.
bohemica 131. 2.
cordifolia 131. 3.
corylifolia 131. 2.
dasytyla 131. 4.
europaea 131. 3. 5.
flava 131. 2.
flavescens 131. 5 obs.
glabra 131. 5 obs.
grandifolia 130. 2.
grandifolio-parvifolia 131.
 2.
Hoffmanniana 131. 5.
hybrida 131. 3.
intermedia 131. 3.
latebracteata 131. 5.
microphylla 131. 5.
mollis 131. 2.
Nickerlii 131. 2.
nigra 131. 5 obs.
obliqua 131. 2.
oxycarpa 131. 3 *
pallida 131. 2 *
pannonica 130. 1.
parvifolia 131.
parvifolio-grandifolia 131.
 3.
pauciflora 131. 2.
petiolaris 130. 1.
platyphyllos 130.
polyantha 131. 5.
rotundifolia 130. 1.
rubra 131.
septentrionalis 131. 5 *
silvestris 131. 5.
translucens 131. 2.
ulmifolia 131. 5.
vitifolia 131. 2.
vulgaris 131.
Tillaea aquatica 265. 6. 2.
muscosa 265.
Vaillantii 265. 6. 1.
Tinea cylindracea 696.
Tinguarra sicula 294.
Tofieldia alpina 745. 6. 1. 2.
borealis 745.
calyculata 745.
galialis 745. 6. 1.
palustris 745. 6. 1. 2.
Tolpis altissima 473. 142. 3.
ambigua 473. 142. 3.
barbata 473.
barbata 473. 142. 2.
Bivona 473. 142. 1 *
concolor 473. 142. 2.
cretica 473. 142. 3.
dichroa 473. 142. 1.
discolor 473. 142. 1.
grandiflora 473. 142. 3 *
macrodonata 473. 142. 2.
quadriaristata 473. 142. 3 *
quinqueradiata 473. 142. 2.
sexaristata 473. 142. 3.
staticifolia 451. 152.
umbellata 473.
virgata 473.
Tolypella flexilis 879. 3.
glomerata 879.
intricata 878.
nidifica 879.
Normaniana 879. 3 *
prolifera 879.
Tommasinia verticillaris
 282.
Tordylium apulum 290.
apulum 291. 38. 3.
concinnum 291. 38. 1 *
humile 290. 38. 1. 291.
 38. 1 *
intermedium 291. 38. 1 *
maximum 291.
microspermum 291. 38. 3.
officinale 291.
officinale 290. 38. 1.
Pestalozze 291.
Torilis Anthriscus 281.
arvensis 281. 15. 4.
bracteosa 282. 6 *

- chlorocarpa* 281. 15. 3.
Friedrichsthalii 281. 15. 4.
helvetica 281.
heterophylla 282.
infesta 281. 15. 4.
leptophylla 281. 14. 1.
microcarpa 281.
neglecta 281.
nodosa 282.
purpurea 281. 15. 2. 281.
 15. 4 *
trichosperma 280. 11. 1.
ucranica 281. 15. 2.
Tormentilla erecta 227. 39.
nodosa 227. 39.
officinalis 227. 39.
parviflora 227. 39.
reptans 227. 38.
Tournefortia Arguzia 508. 1.
 1.
micranthos 509. 2. 8.
sibirica 508.
Tozzettia pratensis 794. 10.
Tozzia alpina 556.
Trachelium alteratum 485.
 7. 1 *
asperuloides 485.
coeruleum 485.
Jacquini 485.
lanceolatum 485.
longifolium 485. 7. 2.
rumelianum 485.
Trachynia distachya 843. 7.
subtilis 843. 7.
Trachynotis alterniflora 789.
 19. 2.
stricta 789. 19. 4.
Tragium Columnæ 306. 7.
depressum 306. 7.
Gussonii 306. 6.
peregrinum 306. 8.
Tragopogon angustifolium
 462. 6.
australe 462. 2. 2 *. 3.
barbirostre 462. 124. 1.
brachyphyllum 462. 2.
brevirostre 462.
campestre 463. 12.
crocifolium 462.
crocifolium 462. 3.
Cupani 462.
dubium 463. 12. 12 *
elatus 462.
eriospermum 462.
floccosum 462.
floccosum 463. 13.
Gorskianum 462. 10 *
grandiflorum 463. 15.
heterospermum 462. 10.
hirsutum 465. 19.
intermedium 462. 11.
leiocarpum 463. 15.
lithaunicum 462. 11.
livescens 463. 12.
longifolium 462.
longipappum 463. 14.
longirostre 462.
majus 463.
minor 463. 12.
minus 463. 15.
nebrodense 462.
orientale 463.
podolicum 462. 11.
Pommeretii 463. 12.
porrifolium 462.
pratense 463.
revolutum 463. 14.
rosens 462. 5.
rubrum 462.
Samaritani 463.
Shuttleworthii 463. 15.
stenophyllum 462. 6.
Tommasinii 463.
undulatus 463. 14. 14 *.
 15.
Tragopyrum Billardieri 632.
 2. 2.
lanceolatum 632. 2. 3.
Tragus racemosus 788.
Trapa hungarica 249. 5. 1.
lævis 249. 5. 1.
natans 249.
verbanensis 249. 5. 1. obs.
 2.
Traunsteinera globosa 691.
 10.
Triadenia aegyptiaca 134.
maritima 134. 3. 2.
Sieberi 134.
Webbii 134. 3. 1 *
Tribulus Gussoni 142. 3. 1.
terrestris 142.
Trichera ambigua 347.
arvensis 347.
bidens 347.
bohémica 347. 1.
campestris 347. 1.
carpathica 347. 1.
carpophyllax 347. 5.
ciliata 347.
collina 347.
cuspidata 347. 5.
dipsacifolia 347. 5.
diversifolia 344. 25.
drymeia 347.
exaltata 347. 1.
Fleischmanni 347. 1 *
Godeti 347. 8.
hybrida 348.
indivisa 347. 1.
integrifolia 348. 12.
lancifolia 347. 5.
legionensis 347. 9.
longifolia 347.
lyrophylla 347. 3.
macedonica 347.
magnifica 347.
mollis 347. 1 *
mutabilis 348. 12.
nympharum 347. 10 *
puberula 347. 5.
pubescens 347. 1.
Salcedi 347.
silvatica 347.
subcanescens 347. 5.
subscaposa 347. 2.
Timeroyi 347. 1 *
transilvanica 347. 5 *
trivialis 347. 1.
Urvillei 348. 12 *
virgata 347. 1.
Trichocrepis bifida 460. 117.
 2.
Trichodium alpinum 802. 17.
caninum 801. 13.
elegans 802. 22.
rupestre 802. 15.
setaceum 801. 11.
Trichogyne cauliflora 384.
 37. 1.
Tricholena micrantha 786.
Teneriffæ 786. 9. 1.
Trichomanes Andrewsii 868.
 1. 1.
brevisetum 868. 1. 1.
europæum 868. 1. 1.
hibernicum 868. 1. 1.
radicans 868.
speciosum 868. 1. 1.
Trichonema Bulbocodium
 704. 1. 705. 11.
Clusia 704. 2.
Columnæ 705. 11.
elongatum 704. 4.
grandiflorum 704. 1 *
Linæesii 705. 6. 7.
purpurascens 704. 5.
ramiflorum 705. 9.
vernum 705. 6.
Trichophorum alpinum 762.
 8.
cæspitosum 765. 11.
Tridentalis europæa 600.
Trifolium affine 175. 28.
agrarium 180.
agrarium 108. 104.
agrestinum 175. 29.

alatum 177. 55.
alexandrinum 175.
alexandrinum 176. 39.
alpestre 173.
alpinum 179.
ambiguum 178.
angulatum 178.
angustifolium 174.
anomalum 177. 55.
arenivagum 175. 29*
armenium 174.
armenium 174. 13.
arrectisetum 175. 25.
arvense 175.
arvernense 178. 77*
arvicolum 175. 29.
aurantiacum 180.
aureum 180. 102. 103.
badium 179.
bæticum 173.
Balbisianum 178.
Biasolettianum 178. 79*
Billardieri 180. 98 obs.
Bivonæ 178.
Bocconi 176.
Bocconi 176. 43.
Boissieri 180.
Bonanni 177.
brachystylos 173. 8.
bracteatum 173.
Brittingeri 175. 29.
brutium 180.
cæspitosum 178. 71. 75.
 77.
caloxanthum 180. 99.
campestre 180. 104.
capilliforme 181. 108.
carpathicum 173. 8*
cernuum 179.
Cherleri 174.
chrysanthum 180. 102.
ciliatum 180. 98 obs.
ciliolum 176. 41.
cinctum 175.
Clusii 177. 58.
clypeatum 175.
collinum 176. 45.
commutatum 175. 35.
congestum 179.
congestum 177. 56.
conicum 176. 50. 51.
constantinopolitanum 175.
 36.
controversum 181. 108.
cryptoscias 179. 93.
Cupani 177. 55.
cylindricum 176. 51.
dalmaticum 176.
diffusum 176.

echinatum 175. 32. 176.
 38.
elegans 178.
Endressi 178. 68.
eriocephalum 175. 28.
expansum 173.
filicaulis 176.
filiforme 180.
filiforme 180. 107.
flavescens 176. 40.
flexuosum 173. 4.
formosum 176.
fragiferum 177.
frigidum 173. 8.
fulcratum 173. 7.
fusum 180. 103.
gemellum 176.
glabrum 175. 35.
glareosum 178. 77. 77*
glaucum 180. 105.
globosum 177.
globosum 176. 52.
glomeratum 179.
gracile 175. 29. 29*
græcum 180. 98.
Gussoni 180. 98.
heterophyllum 173. 8.
hirtum 174.
hybridum 178.
hybridum 179. 83.
Jaminianum 179.
incarnatum 174.
intermedium 174.
irregulare 175. 35.
isthmocarpum 179.
isthmocarpum 179. 86.
Kitaibelianum 176. 50.
lævigatum 178. 66.
lagopinum 175. 29.
lagopus 175.
Lagrangei 180.
lappaceum 174.
latinum 176.
leiocalycinum 177.
leucanthum 175.
ligusticum 175.
litigiosum 180. 97.
litorale 175. 29.
longestipulatum 173. 6.
 175. 31.
lucanicum 176. 48.
Lupinaster 179.
macropodium 178. 80*
maritimum 175.
medium 173.
medium 173. 6.
Meneghinianum 179.
mesogitanum 180. 100.
Michelianum 178.

Michelianum 178. 74. 179.
 82.
micranthum 180. 108.
microphyllum 173. 8.
minus 180.
minutum 179. 88.
Molinerii 174. 22.
montanum 178.
multistriatum 177.
mutabile 177.
neglectum 178. 79*
nevadense 178.
nidificum 176. 52.
nigrescens 179.
nigrocinetum 175. 35*
nivale 173. 8.
Noëanum 174. 22.
noricum 174.
nothum 178. 79.
obscurum 175.
ochroleucum 174.
Oliverianum 177. 53.
Orphanideum 178. 79*
Ottonis 173.
ovatifolium 177. 55.
oxaloides 177. 54*
oxypetalum 174. 17.
pallescent 178.
pallidum 178. 77*. 179.
 83.
pallidulum 174. 15.
pallidum 176.
pallidum 173. 7.
pannonicum 174.
pannonicum 174. 14.
panormitanum 175. 31.
parisiense 180. 102.
Parnassi 178.
Parassii 178. 79*
parviflorum 179.
parviflorum 179. 88.
parvifolium 180. 107.
patens 180.
patulum 173.
pauciflorum 177. 53.
Perreymondi 179.
Petrisavii 179.
phleoides 175.
physodes 177.
Pignantii 173.
piliferum 176. 42.
protutianum 178.
pratense 173.
Preslianum 175.
procerum 175. 32*
procumbens 180.
procumbens 180. 104. 107.
prostratum 178. 79*. 179.
 84.

- pseudoprocumbens* 180.
 104.
purpurascens 176. 41.
purpureum 174.
radiosum 176.
reclinatum 175.
reclinatum 175. 33.
recurvatum 177. 60.
repens 178.
resupinatum 177.
resupinatum 177. 57. 58.
roseum 174. 15.
rotundifolium 174. 17 obs.
 176. 46.
Rouxii 179. 86.
rubellum 175. 29*
rubens 173.
rupestre 178. 68*
sabuletorum 175. 29*
sarosiense 173.
sativum 173. 8 obs.
Savianum 179. 93*
saxatile 178.
scabrum 176.
Schreberi 108. 104.
Sebastiani 180.
serrulatum 179. 89.
smyrnæum 174.
spadiceum 180.
speciosum 180.
speciosum 180. 98 obs. 99.
 101. 102.
spumosum 177.
squarrosus 175.
squarrosus 174. 15 obs.
stellatum 174.
stramineum 176. 43.
strepens 180. 103.
striatum 176.
strictum 177.
strictum 179. 87.
suaveolens 177. 58.
subterraneum 177.
succinctum 175. 37.
suffocatum 179.
supinum 176.
Tenoreanum 176. 43.
tenuiflorum 176.
tenuifolium 176.
Thalii 178.
thymiflorum 178. 73.
tomentosum 177.
tomentosum 177. 57.
traussilvanicum 173. 8.
trichopterum 176.
uniflorum 179.
uniflorum 179. 93.
Vaillantii 178. 80.
vesiculosum 177. 61.
vesiculosum 177. 61.
Xatardii 175. 35.
xerocephalum 177.
Triglochin Barrelieri 680.
laxiflorum 680.
maritimum 680.
palustre 680.
Trigonella arcuata 170.
azurea 171.
Balanse 171.
Besseriana 171.
cariensis 170.
coerulea 171.
corniculata 171.
corniculata 171. 12.
cretica 171. 20. 1.
divaricata 170. 8.
elatior 171. 11.
fasciculata 171. 17.
foenum græcum 170.
foenum græcum 170. 3.
gladiata 170.
græca 171. 20. 2.
hybrida 166. 3.
litoralis 171. 16.
longirostris 170. 3.
maritima 171.
maritima 171. 11.
monspeliaca 170.
ornithopodioides 171.
ovalis 170.
pes avium 171.
pinnatifida 170. 7.
polycerata 170.
polyceratoides 170. 7*
procumbens 171. 19.
prostrata 170. 2.
spicata 171.
spinosa 170.
Sprunneriana 171.
striata 170.
tenuis 170. 4.
torulosa 171. 10.
tuberculata 170. 2.
uncinata 171. 15.
Triguera ambrosiaca 526.
baccata 526. 10. 3. 532. 2.
 9.
inodora 526.
Osbeckii 526.
Trimorphæa vulgaris 389. 9.
Trinia Dufourii 308.
elatior 308. 88. 4.
glaberrima 308. 88. 2. 4.
glauca 308. 88. 4.
Henningii 308.
Henningii 308. 88. 4.
hispidula 308. 88. 2.
Hoffmanni 308.
Kitaibelii 308.
pumila 308. 88. 4*
ramosissima 308. 88. 1.
vulgaris 308.
Triniusa flavescent 821. 7.
Triodia decumbens 817. 79.
 2.
Triplachne nitens 803.
Tripleurospermum bienue
 374. 5.
decipiens 374. 2 obs.
inodorum 374. 5.
maritimum 374. 5.
Tripolium longicaule 387. 9*
vulgare 387. 9.
Trisetum agrostideum 813.
 36*
alpestre 812. 30.
argenteum 812. 35.
aurum 813. 46.
Burnouffii 812. 32.
carpatium 812. 25.
Cavanillesii 814. 51.
condensatum 813. 46.
distichophyllum 812. 34.
Dufourei 813. 48.
flavescent 812. 27.
gallegicum 813. 44.
Gaudinianum 814. 51.
glaciale 813. 37.
gracile 813. 40.
hispidum 812. 31.
laconicum 812. 28.
Loeflingianum 813. 46. 50.
melitense 813. 46.
myrianthum 813. 42.
neglectum 813. 43. 44.
ovatum 813. 47.
parviflorum 813. 41.
pratense 812. 27.
puberulum 815. 77. 1.
pumilum 813. 45.
scabriusculum 815. 77. 3.
sibiricum 812. 26.
striatum 815. 76. 1.
subspicatum 813. 38.
valesiacum 814. 51.
velutinum 812. 29.
villosum 813. 39.
Triticum acutum 840.
acutum 840. 9.
affine 840. 10.
alpinum 841. 17.
arundinaceum 841. 16.
arvense 841. 16.
athericum 841. 13.
Aucherii 840.
baeticum 840.
biflorum 842.

- caesium* 841. 16.
campestre 841. 15 *
caninum 841.
caudatum 839. 5.
creticum 840.
cristatum 842.
curvifolium 840. 8 *
cylindricum 839. 6.
dasyanthum 842.
desertorum 842.
dumetorum 841. 16.
elongatum 841.
festucoides 843. 2.
filiforme 843. 106. 5.
fragile 839. 9.
glaucum 841. 13. 14. 15.
gracile 841. 15 *
Halleri 843. 2.
hebestachyum 840. 9.
hirsutum 841. 12.
hispanicum 843. 2.
imbricatum 842. 25.
intermedium 841.
intermedium 841. 12.
junceum 840.
Lachenalii 843. 2.
latronum 841. 15.
laxum 840. 10.
Leersianum 841. 16.
ligusticum 840.
litorale 841.
litorale 841. 16.
litoreum 840. 6. 841. 16.
lohiaceum 844. 2.
monococcum 840. 3 obs.
muricatum 842. 25.
Nardus 843. 4.
obtusiusculum 840.
orientale 842.
ovatum 839. 103. 1.
panormitanum 842.
patens 843. 1.
pectinatum 842. 25.
petraeum 842. 20.
Poa 843. 2.
Pouzolzii 841. 15 *
prostratum 842.
pungens 841.
pycnanthum 841. 14.
ramificum 841. 13.
ramosum 841. 16.
repens 841.
Requienii 839. 1 ×
rigidum 841. 12.
Rouxi 842.
Sartorii 840. 6 *
Savignonei 841.
scirpeum 840.
sepium 841. 16.
strictum 840.
strigosum 842.
tenellum 843. 4.
tenuicolum 843. 2.
triaristatum 839. 3.
trunciale 839. 4.
truncatum 841. 15.
unilaterale 843. 4.
unioloides 844. 1.
Vaillantianum 841. 16.
ventricosum 839. 8.
villosum 839.
violaceum 841.
virescens 841. 15.
vulgare 840. 3 obs.
vulgari-ovatum 839. 1 ×
vulgari-triaristatum 839.
 3 ×
Trixago apula 549.
atroviolacea 550. 20. 3 *
carnea 550. 20. 1.
latifolia 550.
purpurea 550. 20. 3.
rhinanthina 550. 20. 1.
versicolor 550. 20. 1.
viscosa 550.
Trochiscanthes nodiflorus
 291.
Trollius altissimus 18. 19. 1.
asiaticus 18.
europaeus 18.
humilis 18. 19. 1.
medius 18. 19. 1.
minimus 18. 19. 1.
napellifolius 18. 19. 1.
transsilvanicus 18. 19. 1 *
Tryphane caespitosa 119. 25.
Gerardi 119. 25.
recurva 118. 23.
verna 119. 25.
Tuberaria annua 72. 15.
perennis 72. 11.
Tulipa acrocarpa 723. 6.
agenensis 724. 16.
alpestris 723. 7.
apula 724.
australis 723. 6. 7.
Beccariana 723.
Biebersteiniana 723.
biflora 723. 3.
bithynica 724. 14.
boeotica 723.
Bonarotiana 723. 11.
caucasica 723. 7.
Celsiana 723.
Celsiana 723. 3.
Clusiana 724.
Clusiana 723. 5.
cretica 724.
Didieri 724.
Didieri 724. 22 *
Eunanthiæ 723. 12.
Foxiana 724. 17.
fragrans 723. 7.
Franconiana 724.
gallica 723.
Gesneriana 723.
Grisebachiana 723.
Hageri 723.
maleolens 724.
neglecta 723. 11.
oculus solis 724.
oculus solis 724. 22.
Orphanidea 723.
oxypetala 724.
platystigma 724. 22 *
præcox 724.
præcox 724. 20.
Raddii 724. 17.
rubro-alba 724. 20.
saxatilis 723.
scabriscapa 723.
serotina 723. 11 obs.
Sibthorpiana 722. 15.
silvestris 723.
silvestris 723. 3.
spathulata 723. 1.
strangulata 723. 11.
suaveolens 723.
transtaganica 723. 7.
tricolor 723. 3.
turcica 724.
variopicta 723. 11.
Tunica arenicola 100. 10 *
bicolor 100. 10.
cretica 100.
dianthoides 100.
erecta 100. 10.
Gasparrini 100.
glumacea 106. 98.
graminea 100.
illyrica 100.
ochroleuca 100.
Orphanidesiana 100. 7.
rigida 100.
saxifraga 100.
Sibthorpii 100.
thessala 100.
xerophila 100. 10.
Turgenia latifolia 281.
Turritis alpina 33. 7 *
Gerardi 33. 7 *
glabra 32.
hirsuta 33. 8.
planisiliqua 33. 7 *
Raji 33. 7.
sagittata 32. 18. 6.
Tussilago alba 397. 63. 2.

- alpina 397. 64. 2. 3.
Farfara 397.
 hybrida 397. 63. 1.
 paradoxa 397. 63. 3.
 Petasites 397. 63. 1.
 ramosa 397. 63. 2.
 spuria 397. 63. 4.
Typha angustata 757.
angustifolia 757.
angustifolia 757. 6.
 elata 757. 5.
 elatior 757. 5.
 glauca 757.
 gracilis 757. 6. 8.
 juncifolia 757. 4.
 latifolia 757.
 Laxmanni 757. 7.
 Martini 757.
 media 757. 1.
 minima 757.
 minor 757. 7.
 nana 757. 7.
 remotiuscula 757. 1.
Shuttleworthii 757.
stenophylla 757.
Udora lithuanica 678.
occidentalis 678.
 pomeranica 678. 4. 1.
Ulex aphyllus 149. 20.
argenteus 149.
 armoricanus 148. 2. 1.
 australis 148. 6. 10. 11.
 autumnalis 148. 4.
 beticus 148.
 beticus 148. 9. 11.
 Boivini 149.
 Boivini 149. 17.
 Bourgaeanus 148. 7.
brachyacanthus 148.
canescens 149.
 Cossoni 149.
densus 149.
erinaceus 149.
 eriophorus 148. 4.
Escayracii 149.
 europeus 148.
 Funkii 148. 11.
 Gallii 148.
genistoides 149.
genistoides 149. 21.
ianthocladus 148.
Jussiei 148.
 luridus 149. 16.
 micranthus 148. 11 *
 nanus 148.
 opistholepis 148. 2. 1 *
 parviflorus 148.
 parviflorus 148. 6.
 provincialis 148. 2. 6.
 recurvatus 148. 6.
 scaber 148.
spartioides 149.
 spectabilis 149. 21 *
 spicatus 148. 4.
 strictus 148. 2. 1.
 Vaillantii 149. 18.
 vernalis 148. 2. 1.
Webbianus 149.
Welwitschianus 148.
Willkommii 148.
Ulmus campestris 659.
 campestris 659. 1.
 carpinifolia 659. 2.
 ciliata 659. 3.
 effusa 659. 3.
 expansa 659. 1.
 glabra 659. 2.
 leucocarpa 659. 1.
 major 659. 1.
 montana 659.
 nuda 659. 1.
 octandra 659. 3.
 pedunculata 659.
 stricta 659. 2.
 suberosa 659. 2.
 tetrandra 659. 2.
Umbilicus chloranthus
 257.
erectus 257.
gaditanus 258.
hispidus 258.
horizontalis 258.
parviflorus 257.
parviflorus 257. 3.
pendulinus 258.
 samius 258. 7.
sedoides 258.
 serratus 258.
 Sprunerianus 257. 2.
Uncinia microglochin 783.
 154.
Urginea fugax 729.
 Paneracion 729. 17. 1.
Scilla 728.
 undulata 729.
Uropetalum Bourgaei 731.
serotinum 731.
Urospermum asperum 466.
 127. 2.
Dalechampii 466.
picroides 466.
Urtica atrovirens 657.
 balearica 657. 1. 3 *
 Bollæ 657. 1. 1.
 caudata 657. 1. 5.
 dioica 657.
 Dodartii 657. 1. 3.
 galeopsifolia 657. 1. 1 *
 glabrata 657. 1. 1 *
 grandidentata 657. 1. 2.
 hispida 657. 1. 1 *
 kioviensis 657. 1. 1.
 lusitanica 657. 1. 5.
 membranacea 657.
 neglecta 657. 1. 5 *
 oblongata 657. 1. 6 *
pilulifera 657.
 pubescens 657. 1. 1 *
 radicans 657. 1. 1.
rupestris 657.
 sicula 657. 1. 1 *
 urens 657.
Utricularia Bremii 598. 5 *
 dubia 598. 1 *
 Grafiana 598. 3.
 intermedia 598.
 macroptera 598. 5.
 major 598. 2.
 minor 598.
 neglecta 598.
 ochroleuca 598.
 pulchella 598. 5 *
 spectabilis 598. 2.
 vulgaris 598.
Uvularia amplexifolia 717.
 3. 1.
Vaccaria parviflora 98. 13. 1.
Vaccinium intermedium 490.
 5. 2 x
 macrocarpum 490. 6. 2.
Myrtillus 490.
 pubescens 489. 5. 1.
 sednense 490. 5. 1.
 splendens 490. 5. 1.
 uliginosum 489.
 vitis idæa 490.
Vahlodea atropurpurea
 808.
 Vaillantia aristata 332. 94.
 Valantia aculeata 332. 1.
 hispida 332.
 muralis 332.
 pedemontana 331. 92.
Valeriana alliariæfolia
 337.
 angustifolia 336. 2 *. 338.
 2. 2.
 apula 336. 8.
 asarifolia 336.
 bertiscæa 336.
 bulbosa 336. 6.
 capitata 337.
 celtica 337.
 celtica 337. 19.
 collina 336. 2 *

- Crinii 337. 15*
 cuspidata 337. 15.
 dioica 336.
 Dioscoridis 336.
 divaricata 336. 1.
 elongata 337.
 exaltata 335.
 exscapa 337. 21.
 glauca 336. 8.
 globulariæfolia 336.
 heterophylla 336. 8. 337.
 11.
 hispidula 336. 2*
 incrassata 339. 6.
 intermedia 337. 11. 15.
 italica 336. 5. 6.
 longiflora 337.
 mixta 339. 8 obs.
 monorhiza 336. 6.
 montana 337.
 multiceps 336. 1.
 officinalis 336.
 olenæ 337.
 orbiculata 338. 8.
 parviflora 338. 8.
 Phu 336. 5. 6 obs.
 polygama 337. 16.
 procurrens 336. 2.
 pubescens 338. 4. 1.
 pumila 340. 13.
 pyrenaica 336.
 rotundifolia 337. 15.
 salicunca 337.
 sambucifolia 336.
 saxatilis 337.
 sciaphila 336. 3.
 serophulariæfolia 337. 15.
 simplicifolia 336. 7*
 sisymbriifolia 336. 5. 337.
 11.
 Steveni 338. 8.
 supina 337.
 supina 337. 19.
 tripteris 337.
 tuberosa 336.
 tuberosa 336. 5.
 Valerianella Auricula 339.
 12.
 brachystephana 340.
 campanulata 339. 6.
 carinata 339.
 coronata 340.
 coronata 340. 18.
 costata 339.
 dentata 339.
 dentata 340. 12.
 discoidea 340.
 divaricata 340.
 echinata 338.
 eriocarpa 339.
 eriocephala 340. 21.
 fallax 340.
 gibbosa 339. 5.
 hamata 340. 16.
 hirsutissima 340.
 incrassata 339. 6.
 lasiocarpa 340.
 lasiocephala 340. 22 obs.
 laticuspis 340. 13*
 laxiflora 340. 12.
 membranacea 340.
 microcarpa 339.
 mixta 339. 8.
 Morisonii 339. 8.
 multidentata 340. 16*
 muricata 339. 6*
 obtusiloba 340.
 olitoria 338.
 platyloba 340. 18 obs.
 præcox 339. 11.
 puberula 339. 6. 9.
 pubescens 338. 4. 1. 339.
 8.
 pumila 340. 13.
 pusilla 338. 4. 4.
 rimosa 339.
 Soyeri 338.
 sphærocarpa 340. 13.
 tridentata 340. 12. 13. 13*
 trigonocarpa 339. 10.
 truncata 339.
 truncata 339. 6.
 turgida 339.
 uncinata 338.
 vesicaria 340.
 Vallisneria Jacquini 678.
 Michelii 678.
 pusilla 678.
 spiralis 678.
 Velezia clavata 107. 17. 2.
 quadridentata 107.
 rigida 107.
 Vella aspera 58.
 Pseudocytisus 58.
 spinosa 58.
 Ventenata avenacea 815.
 bromoides 815. 76. 1.
 triflora 815. 76. 1.
 Veratrum album 744.
 Lobelianum 745. 5. 1.
 nigrum 745.
 Verbascum Adeliæ 529.
 adenophorum 531. 53 obs.
 adulterinum 527. 4 ×
 album 530. 37.
 alopecuros 530. 42.
 alpinum 531. 47.
 ambiguum 527. 4 ×
 angustifolium 528.
 argentatum 528. 22 obs.
 argyrostachys 527. 9.
 auriculatum 529. 27.
 australe 526. 1*
 austriacum 531. 46.
 banaticum 530.
 Barnadesii 531. 6.
 Bastardi 527. 4 ×
 bicolor 529. 24.
 Biebersteinii 530. 37.
 bithynicum 531.
 Blattaria 528.
 blattaria-phoeniceum 531.
 52 ×
 blattariforme 528. 18.
 blattarioides 528. 17. 530.
 37 ×
 Boerhavi 529.
 Boerhavi 526. 1*
 bombyciferum 527. 8*
 bracteatum 530. 37.
 bracteolatum 527. 9 obs.
 brevidens 529.
 calaurium 528. 23*
 calcutatum 527. 6 ×
 candidissimum 529. 27.
 canescens 527. 6.
 Ceccarinianum 529. 29.
 Celsiæ 528. 17.
 ceratophyllum 529. 28.
 Chaizi 531.
 chium 528. 19.
 collinum 527. 6 ×
 commutatum 531. 52 ×
 compactum 528. 13 obs.
 condensatum 526. 1.
 conocarpum 529. 24*
 cotoneum 528. 19.
 crassifolium 527.
 crassifolium 527. 7.
 crenatifolium 526.
 cuspidatum 527. 4.
 cylindrocarpum 531.
 Delileanum 528. 22 obs.
 delphicum 530.
 densiflorum 527. 4*
 dentifolium 529. 25 obs.
 denudatum 526. 1 ×
 diphyon 527. 9 obs.
 epicanthinum 528.
 cremocharis 527. 4.
 eriophorum 528. 16 obs.
 euryale 530. 35 obs.
 flagrifforme 528. 18 ×
 floccoso-nigrum 529. 35 ×
 floccosum 529. 35.
 foetidum 528.
 foliosum 530. 37 ×.

- Freynianum 531. 47 ×
 galileum 529. 25 obs.
 gallicum 531. 47.
garganicum 528.
 Gaudini 530. 37 ×
 geminatum 529. 29 ×
 giganteum 527. 6 *
glabratum 530.
 glabrum 528. 17. 18.
 glandulosum 531. 53 obs.
glomeratum 528.
gnaphalodes 529.
 Godroni 527. 6 ×
 graciliflorum 529. 27 obs.
græcum 531.
granatense 530.
 grandiflorum 528. 17.
Guicciardii 527.
 Gussonei 529. 35 *
Hanseleri 530.
 Hausmanni 530. 37 ×
Heldreichii 530.
 heteromallum 528. 14.
 heterophlomos 527. 4 ×
 heterophyllum 529. 35.
 Heuffelii 527. 8 *
 Hinkei 530. 42.
 Hornemanni 530. 44.
humile 530.
 hybridum 529. 29 ×
 hypoleucum 530. 42 *
 incanum 530. 37 ×
 intermedium 528. 18 ×
 italicum 526. 1.
 Kicxianum 527. 4.
Lagurus 527.
 Lagurus 526. 2.
 Lamoſtei 527. 6 ×
 lanatum 530. 42 *
 laxiflorum 529. 35.
 leiocaulon 530. 44.
 leiostachyon 530. 44.
 leptocladum 530. 44.
 leptostachyum 528. 22 obs.
 leucanthemum 530. 37.
leucophyllum 529.
 Linnæi 527. 6.
longifolium 527.
 longifolium 529. 34.
 longiracemosum 529. 29 ×
Lychnitis 530.
 lychnitidi-blattaria 530.
 37 ×
 lychnitidi-floccosum 529.
 35 ×
 lyratum 530. 42. 531. 5.
 macilentum 528. 18 ×
 macranthum 526. 1.
macrurum 527.
malacotrichum 528.
 mallophorum 529. 35 *
 Martini 528. 17 ×
 megaphlomos 529. 34 *
 messanense 527. 5.
 micranthum 530. 37.
 mixtum 530. 37 ×. 42 ×
 Moenchii 530. 37.
 monspessulanum 531. 47.
montanum 527.
 montanum 526. 1.
 mosellanum 527. 6 ×
mucronatum 529.
 Muhlenbechii 528. 18 ×
 neglectum 527. 6.
 nemorosum 526. 1. 2.
nevadense 531.
 nigro-blattaria 528. 18 ×
 nigro-floccosum 529. 35 ×.
 530. 42 ×
 nigro-lychnitis 530. 42 ×
 nigro-phoeniceum 531.
 52 ×
 nigro-thapsiforme 530.
 42 ×
 nigro-thapsus 530. 42 ×
nigrum 530.
 nissus 530. 35 obs.
niveum 528.
 nothum 530. 42 ×
orientale 531.
 orientale 530. 42.
 orientali-lychnitis 530.
 37 ×
 orientali-phoeniceum 531.
 46 ×
 Osbeckii 526. 10. 3. 532.
 2. 9.
 ovalifolium 528. 13 obs.
 pallidum 527. 6.
 pannosum 527. 8 *
 parisiense 530. 42.
phlomoïdes 526.
 phlomoïdes 529. 24. 31.
 phlomoïdi-blattaria 528.
 18 ×
 phlomoïdi-lychnitis 526.
 1 ×
phoeniceum 531.
 pilosum 528. 18 ×
pinnaatifidum 529.
 plantagineum 527. 6 *
plicatum 528.
prusianum 528.
 pseudoblattaria 528. 18 ×
 pseudophoeniceum 531.
 52 ×
 pterocaulon 528. 18 ×
pulverulentum 529.
pulverulentum 529. 35 ×.
 530. 37.
 pulvinatum 529. 35 ×
 puniceum 531. 52.
pyramidatum 529.
 ramigerum 527. 4 ×
 ramosissimum 527. 4 ×
 repandum 528. 18 et *.
 530. 37.
 rigidulum 529. 27 obs.
 rigidum 528. 23 *
rotundifolium 529.
 rubiginosum 528. 18 ×.
 531. 46 ×. 52 ×
 ruderalis 530. 42.
 rugulosum 526. 1.
 salutans 527. 9 obs.
 Samaritani 528. 16.
 samniticum 526. 1 *
 Sartorii 526. 1 *
 scabrum 529. 29.
 Schiedeum 530. 42 ×
 Schottianum 529. 34 ×.
 35 ×
 Schraderi 527. 6.
 semialbum 530. 42 ×
 semidecurrens 526. 1.
 semilanatum 531. 47 ×
 seminigrum 530. 42 ×
 simplex 527. 6 obs.
sinuatum 529.
 sinuatum-banaticum 530.
 38.
 sinuato-blattaria 529. 29 ×
 sinuato-dentatum 530. 37.
 sinuato-pulverulentum 529.
 29 ×
 sinuato-thapsus 529. 29 ×
 slavonicum 526. 1.
speciosum 529.
 speciosum 526. 1 ×
 specioso-orientale 529.
 34 ×
spectabile 528.
spinosum 531.
 spurium 527. 6 ×
 syriacum 528. 22 obs.
thapsiforme 527.
 thapsiformi-blattaria 527.
 4 ×. 528. 18 ×
 thapsiformi-lychnitis 527.
 4 ×
 thapsiformi-nigrum 527.
 4 ×
 thapsoides 527. 6 obs. 529.
 34.
 Thapsi 527. 6 ×
Thapsus 527.
 Thapsus 527. 4. 6 *.

- thapso-floccosum 527. 6 ×
 thapso-lychnitis 527. 6 ×
 thapso-nigrum 527. 6 ×.
 530. 42 ×
 thapso-phoeniceum 531.
 52 ×
 thapso-pulverulentum 527.
 6 ×
 thapso-sinuatatum 527. 6 ×
 Thomæanum 530. 42 ×
 thyrsioideum 530. 42.
 Tommasinianum 531. 47 ×
 triste 531. 52.
 undulatum 528. 23. 529.
 29.
 ustulatum 531. 52 ×
 vernale 531. 48.
 versiflorum 531. 52 ×
 viminale 527.
 virens 530. 42. 531. 46.
 virgatum 528.
 viscidulum 528. 17.
 Visianianum 527. 5.
 Weldenii 530. 37.
 Wierzbickii 531.
 Wierzbickii 530. 42 *
 Wirtgeni 529. 35 ×
 xanthophoeniceum 531.
 Zuccarinii 531. 51.
 Verbena officinalis 563.
 supina 563.
 Veronica acinifolia 548.
 agrestis 548.
 agrestis 548. 58.
 Allionii 545.
 alpina 546.
 alternifolia 544. 3 obs.
 amoena 548. 49.
 Anagallis 546.
 anagalloides 546.
 apennina 547.
 aphylla 546.
 arbustulosa 547. 37.
 arguta 544. 3. 4.
 arvensis 547.
 Assoana 545.
 australis 544. 4.
 austriaca 545.
 Bachofeni 544. 14. 2.
 Barrelieri 544. 4.
 Bastardi 545. 12.
 Baumgartenii 546.
 Beccabunga 546.
 Bellardi 547. 46.
 bellidioides 546.
 brachysepala 545. 12.
 brevistyla 547.
 Bungabecca 547. 34.
 Buxbaumii 548. 55.
 canescens 545. 6. 12.
 Chaixi 545. 12 *
 chamædryoides 546. 19.
 Chamædrys 546.
 chamæpitys 547.
 chamæpitys 547. 44.
 Chaubardi 548.
 ciliata 548. 48.
 Clusii 544. 4.
 commutata 544. 3.
 complicata 544. 3.
 crassifolia 544. 5 et *
 cretica 545. 17.
 crinita 545. 12 *
 cristata 544. 5.
 cuneata 549. 60 *
 cymbalaria 549.
 dentata 545. 12.
 depauperata 546. 24.
 didyma 548. 58.
 digitata 547.
 digitata 548. 53.
 diversifolia 545. 13 *
 dubia 545. 12 *
 elata 544. 3.
 elatior 544. 3.
 erinoides 547. 41.
 filiformis 548. 55.
 foliosa 544. 14. 1 *
 Frieseana 548. 56.
 Froelichiana 546. 19 *
 frutescens 547. 37.
 fruticans 547. 36.
 fruticulosa 547.
 gentianoides 546.
 glabra 544. 14. 1. 3.
 glandulifera 549. 60 *
 glauca 548.
 glauca 548. 51.
 græca 548. 49.
 grandis 544.
 hederæfolia 549.
 hirsuta 545. 15. 548. 48.
 hispanica 545. 9.
 hospita 548. 55.
 Hostii 544. 3.
 hybrida 544. 4.
 incana 545.
 incana 544. 4 *
 integrifolia 547. 32.
 irregularis 547. 40.
 lævis 548. 47 obs.
 latifolia 545.
 latifolia 545. 12 *
 laxiflora 544. 3 obs.
 longifolia 544.
 longifolia 544. 4.
 longipes 549. 60.
 longistyla 546. 24.
 macrostemon 547.
 maritima 544. 3.
 media 544. 3.
 micrantha 546. 19.
 microphylla 547. 34.
 montana 546.
 multifida 545.
 multifida 545. 9. 11.
 neglecta 544. 4 *. 545. 6.
 547. 34.
 Nenningii 544. 3.
 nitens 544. 4 *
 nitida 544. 14. 1 *
 nivalis 547. 32.
 nudicaulis 546. 24.
 nummularia 547.
 nummularifolia 547. 40.
 ocyimifolia 548. 54.
 officinalis 545.
 opaca 548.
 orbiculata 545. 13 *
 orchidea 544.
 orientalis 545.
 Orsiniana 545. 13.
 pallens 544. 4 *
 palmatiloba 547. 41.
 paludosa 544. 3 obs.
 paniculata 544. 14. 1.
 panormitana 549. 60 *
 parmlaria 546. 22.
 pectinata 545.
 peduncularis 548. 50.
 peloponnesiaca 548.
 peregrina 548. 47 obs.
 persica 548.
 petræa 546. 23.
 Pettersii 544. 3.
 pilosa 545. 13.
 polita 548.
 polyanthos 547. 46.
 Ponce 546.
 præcox 548.
 prætutiana 545. 15.
 pratensis 545. 13.
 prostrata 545.
 prostrata 545. 12 et *
 pseudo-arvensis 547. 46.
 pseudo-chamædrys 545.
 12 *
 pulchella 548. 57.
 pumila 548.
 pumila 547. 32.
 pyrenaica 545. 16.
 repens 547.
 repens 547. 33.
 riparia 544. 3.
 romana 547. 44. 47 obs.
 rosea 545.

- rotundifolia* 547. 32.
Sartoriana 547.
satureioides 547.
saxatilis 547.
scardica 546. 25 *
scutellata 546.
serpyllifolia 547.
setigera 545. 15.
spicata 544.
spuria 544.
spuria 544. 3.
squamosa 544. 4.
Sternbergiana 544. 4 *
subacaulis 546. 24.
succulenta 547. 44.
taurica 545. 17.
tenella 546. 27. 547. 34.
tenerrima 546. 26.
tenuifolia 545. 8. 9.
teucrioides 545. 17.
Teucrium 545.
thessalica 547.
thymifolia 545.
ticiensis 544. 3.
Tournefortii 545. 15. 548. 55.
triloba 549. 59.
triphyllifolia 548.
triphyllus 547. 44.
tymphrestea 545. 17.
umbrosa 546.
urticaefolia 545. 18.
Vaillantii 544. 4.
verna 547.
versicolor 548. 57.
villosa 544. 3.
viscosa 548. 54.
Vesicaria cretica 55. 53. 1.
græca 55.
sinuata 55.
sinuata 55. 53. 2.
utriculata 55.
Viburnum Lantana 320.
Opulus 320.
Tinus 320.
Vicia altissima 206.
ambigua 207. 23 *
amphicarpa 210.
angulata 208. 32.
angustifolia 210.
angustifolia 210. 55 *
arenivaga 210. 58 *
argentea 206.
atropurpurea 207.
australis 207. 16 *
bætica 208.
Barbazite 210.
benghalensis 207. 21.
Biebersteinii 210. 50.
biennis 206.
biflora 208.
bithynica 208.
Bivonæ 211. 1.
Bivonea 207. 25. 211. 1.
Bobartii 210. 55 *
boetica 209. 43.
Boissieri 207. 22.
Broteriana 207. 21.
calcarata 208.
campestris 210. 54.
Candolleana 207. 16 *
canescens 207. 16.
cassubica 207.
chlorantha 209. 39.
ciliata 209. 45.
consentina 207.
consentina 207. 25.
cordata 210.
cordata 210. 52.
Cosentini 210. 54 *
Cracca 206.
cretica 208.
cuneata 210.
cuspidata 211.
dasycarpa 207. 23.
Diomedis 210. 55 *
disperma 211. 2.
Drymeia 209. 38.
dumetorum 206.
elegans 206. 11 *
equina 211. 61 obs.
erviformis 208.
erviformis 208. 33.
ervoides 212. 11.
excisa 210. 55.
Faba 211. 61 obs.
Fagoni 209. 41.
flavida 209. 45.
Fontanesiana 207. 16.
Forsteri 210. 55 *
galloprovincialis 207. 16.
gemella 212. 9.
Gerardi 206.
Gerardi 206. 14. 207. 16 *.
18.
glauca 206.
grandiflora 210.
heterophylla 209. 42 *.
*210. 55 **
hirsuta 211. 7.
hirta 209.
hungarica 211.
hybrida 209.
incana 206. 14. 207. 16.
incisa 210. 51. 54.
Kitaibeliana 210. 50.
Kitaibeli 206. 14.
læta 210. 51.
lævigata 209. 44.
lanciformis 210. 55 *
lathyroides 210.
laxiflora 212. 9.
Lerchenfeldiana 209. 44.
leucantha 211. 1.
lineata 209. 47 *
litoralis 207. 23 *. 25.
longifolia 210. 55 *
lutea 209.
macrocarpa 210.
maculata 210. 55 *
Martini 210. 55 *
melanops 209.
microphylla 208.
militans 207. 18.
monantha 208. 32.
monanthos 208.
montana 209. 38.
Morisiana 210. 52.
multicaulis 210. 58.
narbonensis 209.
narbonensis 209. 42 *
nebrodensis 210. 56.
nemoralis 210. 55 *
obcordata 210. 53.
ochroleuca 206.
ochiensis 210. 56.
onobrychioides 206.
oroboides 208.
Orobis 207.
oxyphylla 209. 38 +
pannonica 209.
parviflora 211. 61 obs.
peregrina 211.
perennis 207. 21.
picta 208.
pilisensis 205. 7.
pilosa 210. 55.
pimpinelloides 210. 54.
pinetorum 206.
pisiformis 205.
polyphylla 206.
polyphylla 206. 13. 207. 16. 22. 23.
polysperma 206. 5.
pratensis 209. 38.
pseudocracca 207.
pseudocracca 207. 23.
pseudosepium 209.
pseudovillosa 207. 23.
purpurascens 209. 47 *
pyrenaica 209.
repens 211. 61 obs.
rigida 207. 18.
Rosani 206.
salaminea 207.
Salsii 212. 11.
Sallei 210. 56.

- sativa* 210.
sativa 210. 52.
segetalis 210. 55 *
Seguenzæ 208. 35 *
sepium 208.
serrata 210. 50 *
serratifolia 209. 42 *
Sibthorpii 206.
sicula 208.
silvatica 206.
smyrnæa 208.
sordida 210. 50.
sparsiflora 207.
Spruneri 208. 29.
spuria 209. 46 *
Stabiana 207. 16.
stenophylla 210. 55.
striata 209. 47 *
subrotunda 209. 38.
syratica 209.
tenuifolia 206.
tenuifolia 207. 23 *
thessalia 210. 51.
Timbali 210. 56.
trichocalyx 207. 21.
tricolor 209. 38. 49.
tricuspidata 208. 34 obs.
triflora 208. 32 *
torulosa 210. 55 *
truncatula 209.
uncinata 210. 55 *
varia 207.
vestita 209.
villosa 207.
villosa 207. 21. 23.
vulcanica 207. 25.
Vignea Gebhardi 780. 126.
pacifica 777. 93.
Vilfa brachystachys 794. 33.
 2.
capillaris 802. 20.
pungens 800. 48. 1.
setacea 801. 11.
stolonifera 801. 3.
Villarsia nymphoides 503. 7.
 1.
Vinca acutiflora 497. 2. 2.
difformis 497. 2. 2.
herbacea 497.
major 497.
major 497. 2. 2.
media 497.
minor 497.
intermedia 497. 2. 3.
Vincetoxicum canescens
 496.
contiguum 496. 8 *
fuscatum 496.
Huteri 496.
laxum 496. 8 *
luteolum 496. 8.
luteum 496.
luteum 496. 3. 1.
medium 496.
melanthum 496. 3.
nigrescens 496. 3.
nigrum 496.
nivale 496.
officinale 496.
petrophilum 496. 8.
pyrenaicum 496. 8.
speciosum 496.
undulatum 496. 9.
Viola abortiva 78. 15.
adulterina 78. 14.
atolica 80.
ætnensis 81. 48 *
agrestis 80. 42 *
alba 78.
Allionii 77. 10.
alpestris 80. 42.
alpina 81.
alpina 81. 48.
altaica 81.
ambigua 79.
ambigua 79. 19.
amoena 81. 44.
arborescens 76.
arenaria 77.
arvatica 80. 42 *
arvensis 80. 42 *
austriaca 78. 13 *
badensis 78. 14 x
banatica 80. 42.
Baumgarteniana 81. 56.
Beraudii 78. 17.
Bertolonii 81.
Bertolonii 80. 35 *
bicolor 80. 42 *
Bielziana 80.
biflora 79.
Billettiana 77. 4.
borealis 79. 23.
Bubani 81. 44 *
calabra 77. 10.
calaminaria 81. 44.
calcarata 81.
calcarata 81. 47.
campestris 79. 19.
canina 77.
canina 77. 9.
celtica 78. 12.
cenisia 81.
cenisia 81. 49 *
chelmea 79.
Clementiana 81.
collina 78.
collina 78. 16 *
Comollia 81.
confinis 80. 42 *
contempta 80. 42 *
cornuta 79.
corsica 81. 45.
cretica 79.
Curtisii 80. 44.
cyanea 78. 13 *
cyclophylla 78. 13.
declinata 80.
Dehnhardtii 78. 13 *
delphinantha 79.
delphinensis 78. 18.
Demetria 80. 42.
demetria 80. 42.
derelieta 80. 42 *
Deseglisei 80. 42 *
drymeia 78. 15.
dumetorum 78. 14.
Einseleana 77. 5.
elatio 76.
elegantula 80. 35.
elongata 80. 35.
epipsila 79.
epipsila 79. 26.
ericetorum 77. 9 *
Eugeniae 81. 48.
fennica 79. 25. 26.
flavicornis 77. 9. 11.
fragrans 81.
Foudrasii 78. 15.
Ganderi 79. 19.
garganica 80. 42 *
glauca 77. 9 *
gracilescens 80. 42 *
gracilis 79.
gracilis 80. 35. 36. 81. 44 *.
 47. 48 *
grandiflora 80. 44. 81. 47.
 48 et *
Grisebachiana 81.
gymnocarpa 78. 16 *
hebecarpa 78. 15.
heterophylla 80. 35 *. 81.
 48 *
heterosepala 80. 39.
hirta 78.
hirta 78. 13 *
hirta odorata 78. 17.
hirto-alba 78. 15.
hispida 80. 38. 81. 44 *
Hladnikii 77. 5.
hybrida 78. 13.
hymettia 80. 42.
insularis 77. 9 *. 81. 45.
Jooi 79.
Kitaibeliana 80. 42 *
lactea 77.
lactea 76. 3. 77. 4.

- lancifolia* 77. 7. 78. 12.
lepida 80. 42 *
lilascens 80. 42 *
livida 77. 10.
Lloydii 80. 42.
lusitana 77. 12.
lutea 80.
macedonica 80.
macrantha 81. 48.
macrostipulata 77. 5.
magellensis 81. 49 *
mentita 80. 42 *
micrantha 80. 42 *. 43
microceras 79.
microceras 78. 16.
microphylla 81. 56.
Minæ 81. 48.
mirabilis 77.
montana 77.
montana 76. 2.
monticola 80. 42.
Mucuzii 80. 42.
multicaulis 78. 13.
nana 80. 42 *
nebrodensis 81. 48.
neglecta 77. 9.
nemausensis 80. 42.
memoralis 77. 6. 9 *
nevadensis 81.
Nicolai 79. 34 *
nigricans 78. 14 *
nitens 79. 25.
nummularifolia 81.
nummularifolia 81. 52.
obscura 78. 16.
odorata 78.
olonnensis 80. 42 *
Opizii 78. 16.
Orphanidis 79.
Paillouxii 81. 44 *
pallescens 80. 42 *
pallidiflora 81. 48.
palustris 79.
parviflora 80. 42 *
parvula 80.
parvula 78. 15. 16.
permixta 78. 15 ×
persicæfolia 77.
persicifolia 76. 2.
Pesneai 80. 38.
pinnata 79.
poëtica 81.
pratensis 76.
prionantha 79.
propæra 78. 16 *
pseudolutea 80. 44.
pumila 77. 3. 78. 12.
pyrenaica 78. 18.
Reichenbachiana 77. 9.
riparia 79. 25.
Riviniana 77. 9.
rothomagensis 80.
rupestris 77. 10 *
ruralis 80. 42 *
Ruppii 77. 6. 6 *
sabulosa 80. 44.
Sagoti 81. 44 *
saxatilis 80. 42.
saxigena 77. 10.
scanica 79. 26.
scardica 81. 49 *
scaturiginosa 79. 25.
sciaphila 78.
scotophylla 78. 14 *
Schultzii 77.
segetalis 80. 42 *
sepincola 78.
sicula 80. 41.
silvatica 77.
silvestris 77. 9. 11.
speciosa 80.
spuria 77. 8 ×
stagnina 77. 4.
stricta 77.
suavis 78. 13 *
subtilis 80. 42 *
sudetica 81. 44 *
suecica 79.
sulphurea 78. 13.
tenerrima 78. 15.
thessala 78. 13 *. 14 *
Thomasiæna 79. 19.
Timbali 80. 42 *
tolosana 78. 17.
transsilvanica 79. 24.
tricolor 80.
tricolor-bellidioides 80. 43.
uliginosa 79.
umbrosa 79.
umbrosa 78. 16. 18.
Valderia 80. 35 *. 81. 49.
variata 80. 42 *
vicina 77. 9.
vinealis 78. 13.
virescens 78. 14.
vivariensis 81. 44 *
Wahlenbergii 77. 7.
Zoysii 81. 48.
Viscaria alpina 86.
atropurpurea 86.
purpurea 86. 5. 1.
purpureo-alpina 86. 5. 1.
Sartorii 86.
vulgaris 86.
Viscum album 320.
album 320. 2. 3.
cruciatum 320.
laxum 320.
Vitex agnus castus 363.
Vitis cebennensis 136.
Labrusca 136.
silvestris 136.
vinifera 136.
Vulneraria heterophylla 164.
 3.
tetraphylla 164. 19.
Vulpia ætnensis 820. 10 *
agrestis 819. 2.
alopecuroides 819.
ambigua 820. 12 *
attenuata 820.
bromoides 820. 11.
Broteri 820.
ciliata 820.
delicatula 821.
geniculata 820.
gypsophila 821.
hispidula 820. 3.
incrassata 820.
ligustica 819.
longiseta 819. 2.
membranacea 819.
Michellii 815. 77. 1.
myuros 820.
myuros 820. 10.
panormitana 820. 11 *
pseudo-myuros 820. 12.
sciuroides 820.
setacea 820.
sicula 820.
tenuicula 815. 77. 2.
tenuis 820.
uniglumis 819. 2.
Wahlbergella affinis 87. 8. 2.
angustiflora 87.
apetala 87.
triflora 87. 8. 3.
Vahlhii 87.
Wahlenbergia dalmatica 486.
 9. 4.
Erinus 481. 71.
hederacea 485.
natabunda 486.
Waldsteinia geoides 230.
sibirica 230. 10. 2.
trifolia 230.
Wallrothia tenuifolia 292. 44.
 1.
Wangenheimia disticha 819.
Lima 819. 85. 1.
Weingærtnera canescens 815.
 75. 3.
Wibelia chondrilloides 456.
 21.
foetida 458. 45.

- Wierzbickia loricifolia 116.
 9. 1.
 macrocarpa 116. 9. 2 *
 striata 116. 9. 2.
 Willemetia apargioides 436.
 111. 1.
 hieracioides 436.
 prenanthoides 436. 110. 5.
 Willkommia minuta 357. 46.
 Withania frutescens 525.
 somnifera 525.
 Wolffia arhiza 756. 3. 1.
 Michellii 756.
 Woodsia glabella 868.
 Hausmanniana 868. 3.
 hyperborea 868.
 ilvensis 868.
 pilosella 868. 2.
 pulchella 868. 3.
 Woodwardia radicans 862.
 Wulfenia carinthiaca 543.
 Xanthium antiquorum 475. 1.
 canadense 475. 3.
 echinatum 475. 2 *
 fuscescens 475. 2.
 italicum 475. 2 *
 macrocarpum 475.
 macrocarpum 475. 2 *
 Nigri 475. 2 *
 orientale 475. 2 *
 Revelieri 475. 2.
 riparium 475. 2.
 saccharatum 475. 2 *
 spinosum 475.
 strumarium 475.
 vulgare 475. 1.
 Xanthoselinum alsaticum 286.
 10.
 Xatardia scabra 291.
 Xeranthemum annuum 401.
 cylindraceum 402.
 cylindricum 402. 72. 3.
 erectum 402.
 frigidum 380. 33. 3.
 inapertum 402. 72. 2. 3.
 incomptum 402. 72. 2.
 radiatum 401. 72. 1.
 sesamoides 402. 72. 3.
 Xeroloma foetidum 402. 72. 3.
 Xiphion alatum 703. 49.
 filifolium 700. 7.
 Fontanesii 700. 5.
 junceum 700. 6.
 latifolium 700. 4.
 lusitanicum 699. 3.
 planifolium 703. 49.
 Sisyrinchium 703. 4. 1.
 sordidum 699. 3.
 triflorum 702. 41 *
 vulgare 699. 2. 1.
 Zacynthia verrucosa 462.
 Zannichellia brachystemon
 684. 2. 2.
 dentata 684. 2. 2.
 gibberosa 684. 2. 2.
 macrostemon 684. 2. 1.
 major 684. 2. 1.
 maritima 684. 2. 2.
 palustris 684.
 pedicellata 684.
 pedunculata 684. 2. 2.
 polycarpa 684.
 repens 684. 2. 1.
 tenuis 684. 2. 1 *
 Zappania nodiflora 563. 3. 1.
 repens 563. 3. 1.
 Zelkova cretica 659. 2. 1.
 Ziziphora acinoides 571.
 capitata 571.
 compacta 571.
 hispanica 571.
 spicata 571. 6. 5.
 taurica 571.
 tenuior 571.
 Zizyphus Jujuba 145. 2. 2 obs.
 Lotus 145.
 sativa 145.
 vulgaris 145. 2. 2.
 Zollikoferia chondrilloides
 461. 120. 1.
 pumila 461.
 resedifolia 461.
 spinosa 461.
 Zornia nautas 585. 23. 3.
 parviflora 585. 23. 4.
 Zostera angustifolia 680. 3. 1.
 marina 680.
 mediterranea 680. 2. 1.
 minor 681. 3. 2.
 nana 681.
 nodosa 680. 2. 1. 681. 3. 2.
 Noltei 681. 3. 2.
 oceanica 680. 1. 1.
 pumila 681. 3. 2.
 serrulata 680. 2. 1.
 uninervis 681. 3. 2.
 Zwackhia aurea 517.
 Zygophyllum album 142.
 Fabago 142.

Obs. Post editam hujus operis partem primam sextus jam
volvitur annus, unde aucta est copia symbolarum, ad idem augen-
dum et emendandum idonearum, quæ pro ejus Supplemento a
collegis benevole communicatæ vel a me ipso collectæ sunt. Sed
cum multo plures adhuc exspecto, præcipue absolutis illis botani-
corum scriptis, ubi de vegetatione regionum europæarum minus
cognitarum agitur, melius esse existimo hæ omnia seponere et
pro Supplemento altero, seorsum et tardius edendo, servare, ut
idem eo completius prodeat nec diutius desideretur index, a mul-
tis expetitus. Holmiæ, mense April. 1884.

C. F. Nyman.

hommage respectueux de l'auteur

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ.

SUPPLEMENTUM II.

PARS PRIMA.

AUCTORE

CAROLO FRIDER. NYMAN.

ADDITAMENTA. EMENDATIONES. OBSERVATIONES.

ÖREBRO (SUECIÆ).

TYPIS OFFICINÆ BOHLINIANÆ.

1839.

Supplementum alterum Conspectus Floræ Europææ in partes duas dividere necesse erat, quarum prima, — plus quam dimidium operis amplectens — nunc prostat et secunda, cum præfatione et indice generum novitiarumque, anno insequente ut spero, publicetur.

In elaborando hoc Conspectus mei Supplemento, et jam antea, observationes varias et multas de specierum limitatione et dispositione, nec non de earum synonymia, historia etc. collegi. Hæc omnia, in ordinem et methodum redacta, sub titulo Commentarii, absoluto Supplemento, publicare posse spero, quare jam ab initio, — ob faciliorem in usu practico investigationem per numeros, — hunc commentarium, quamquam vix perfectum, citare debui.

Holmiæ, mense Novembr. 1889.

C. F. Nyman.

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ.

SUPPLEMENTUM II.

PARS PRIMA.

AUCTORE

CAROLO FRIDER. NYMAN.

1889.

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ SUPPLEMENTUM II.

ADDITAMENTA. EMENDATIONES. OBSERVATIONES

I. RANUNCULACEÆ.

1. **Atragene.** 1. *A. alpina*; Styr., Carinth. etiam extra Alpes; Fenn.or. (oneg.); Ross. bor. ad oram oriental. lacus Onega copiose (: Günther). — *A. austriaca* Sep. — *A. speciosa* Weinm. in act. mosq. 1850. (Ross. or. gub. Perm).

**A. sibirica* L. sp. ed. I. — Ross.med. gub. Nowgorod (: Latkin sec. Batalin 1876).

Obs. *A. Wenderothii* Schltd., interdum ex Helv. et Tyrol. indicata, primitus descripta est e culta *A. americana* Sims, cui patria erronea adscripta erat: Richter in act. soc. z.-b. vind. 1886; cfr. tamen Kuntze ib. 1887.

2. **Clematis.** 1. *C. cirrhosa*; etiam in Balearib. adest.

**C. balearica*; adest etiam Ital.mer. (sic pr. Taranto, ubi est terminus ejus orientalis, cum *C. cirrhosa* typica lecta est a cl. H.Groves et Lacaita). Comment. I.

2. *C. Viticella*: Rumel. Thessal. (: Heldr. 1885); Lusit. indicatur a Brotero inter Santarem et Tancos ad flum. Tagum, sed Hisp. in locis plurimis forse non nisi subspontanea est (Willk.).

3. *C. campaniflora*; Lusit. bor. inhabitat et adest etiam in Hisp. centr. (m. Mariani: Willk.) et bætica (Colm.), sed ex Willk. vix propria species est.

4. *C. Flammula*: Balear. Croat.litoral. — *C. maritima*; *C. tenuifolia* Cav. *C. canaliculata* Lag. (Hisp.or.,mer).

6. *C. Vitalba*; ceterum in aliquot terris quasi subsponte occurrit (e. gr. Galiz.).

7. *C. recta*: Hisp.bor.,centr.,or. Roman. — *C. hispanica* Mill. *C. recta* var. *humilis* Colm.

8. *C. integrifolia*; Bavar., ubi olim pr. Passau et Deggendorf lecta, nunc deest sec. Prantl; adest etiam Roman.

3. **Pulsatilla.** 1. *P. vernalis*: Fenn. mer. plur. (nec centr.,or.), Jutland. bor.(r.). Helv. Hisp.bor. (Picos-de-Europa: Ler. Lev.), or. catal. et arag. (plurib. loc.) nec non in regno granat.(r.); etiam in Castil. indicata (Quer et al.); Transs. olim (ex Bmg.) lecta nunc deest (: Simonk.).

2. *P. patens*: Rumel. (: Velen.); Suec.bor. in sola Angerm.(r.) lecta. Fenn. potius mer. (se. in Tavastl.), mer.-or. (isthm. carel.). — *P. Baubini* Tsh ex Rupr. *P. latifolia* Rupr. ingr. (Ross. gub. Petrop.).

+*P. pseudopatens*; est solum status *P. patens* foliis nonnullis perhiemantibus (: Simonk.).

3. *P. Halleri*; Helv. (ex Gremli) adest in sola valle Nicolaithal Vales.

**P. Hackelii*: Ross.balt.(r.), Ingr. (gub. Petrop.). Siles. Hung. (: Hazsl.); Transs. dubia ex Simonk.

4. *P. vulgaris*: Hisp. centr. castel.(r.), ceterum in Catal. et Arag. pyren., Navarra et Leon indicata. Roman.; deest in Norv., Fenn. (cum Lappon.) et in Suec.bor.; etiam in Ross. centr. (gub. Moscov. etc.) deesse videtur. — ? *P. grandis* Wender. 1831. (Austr. Hung.).

+*P. transsilvanica*; sec. Simonk. est = *P. pratensi-vulgaris* Blockl.

5. *P. pratensis*; Germ. vix ultra fluv. Elbe et silv. Thüringerwald occid. versus procedit; adest etiam Galiz., Styr., Carinth., Roman.; in Ross. centr. (gub. Moscov. etc.) deesse dicitur. — *P. Breynei* Rupr. (Ross.balt., Ingria, Carel.). — *P. versicolor* Andrz. (Podol., Ucrain.).

**P. montana* (*P. aperta* Schur ex Simonk.!) etiam Hung. (: Hazsl.), Roman. (Dobrudscha), Istr. (mte Maggiore). Verona (: Goiran).

6. *P. alpina*; *Hisp. etiam or. et centr.* — *P. alba* Rehb. exc. excl. syn. Lobel. et loc. alp. *Anemone alba* Kern. (1882); *Herceyn., Bohem., Siles., mont.* (1300—1400 metr. s. m.).

**P. apiifolia* (*P. Burseriana* Rehb. exc.; *Anem. Burseriana* Sep.): *Pyren., Jura, Alpes.* Comment. 2.

4. **Anemone.** 1. *A. coronaria*: *Balear. (ins. Mallorca).* — *A. stellata* Risso non Lam. (var. fl. pleno, variegato). — *H. Ventreana* Henry. (*Grasse etc. Gall. mer.*).

2. *A. hortensis*: *Istr.; Helv. olim prope Chillon obvia, nunc ibi frustra queritur et e flora helvet. excl.*

**A. stellata*; — *A. versicolor* Jord. (in *Consp. sub præc. specie allata*). *A. Mouansii* Henry: in campis ad Mouans pr. Grasse abunde; Dr. Bornet probavit eam hybridam esse inter hanc et sequentem subspeciem (: *Ardoino*). — *A. lepida* Jord. (*Alp.-Marit.*) probab. hybr. ejusdem originis.

**A. fulgens*; *A. pavonina* Lam.; *A. Reginae hort.* (= var. fl. pleno) exstat in hb. eur., a Dr. Elgenstierna prope Nizza lecta 1812.

3. *A. palmata*; adest etiam in *Hisp. centr. castellana et indicatur (rr.) in bor.*

4. *A. silvestris*: *Roman.; Belg. non nisi subsponte (rr.) occurrit ex Crepin.; indicatur (r.) in Hisp. centr. a Quer et Asso, sed recentioribus latuit.*

**A. ochotensis*; planta transsylv. (cum *A. sordida* Schur) ab *A. silvestri* non distinguenda est ex Simonk.

5. *A. baldensis* (*A. alpina* Sep. non L.; *A. fragifera* Wulf. ap. Jacq. 1781): *Herceg. m. Curntica* (: Brandis 1887). *Transs. (rarius).*

5. a. *A. Pavoniana* Boiss. (hb.); *Ler. Lev. in journ. of bot.* 1879 et deux exc. 54. c. ic. (1880). — *Castil. (m. Carpetani: hb. Pavon. nunc Boiss.). Extrem. (S. de Gata: Boiss.). Cantabr. (prov. Santander m. Picos de Europa: Ler. Lev. 1878).* Comment. 3.

6. *A. narcissiflora*: *Roman.; indicatur etiam in Pyren. hispan. (r.) et in Castil. (pr. Burgos: Palau).*

7. *A. trifolia*; indicata est etiam *Hisp. mer. (m. Sierra Mariola regni valent.: Pourr. ex Lge), Lusit. (r.); Transs. excl. teste Simonk. ("Schurius eam in Transs. numquam legit").*

8. *A. altaica*; *Ross. med. adest in sola parte orientali: gub. Wiatka (: Kriloff), gub. Perm (: Schell 1874).*

9. *A. nemorosa*; adest (passim) in *Hisp. or., bor. et centr.; deest in Lapon. plur. (non nisi in Umensi parce lecta est) nec non in Fenn. bor. (cum Lapp.).*

10. *A. ranunculoides*; indicatur in *Hisp. or. et bor.-or. sed raro; adest etiam in Norv. bor. (ex Norman immo ultra 69° lat. procedit), sed deest in Lapp., Fenn. bor., med.*

12. *A. apennina*; extra aream geogr. adest inquilina aliquot locis, sic in *Hampsh. Angl. (: Townsend), in valle Erlaf Austr. - Infer. (: Kerner), Belg. (Magnier sel. exs. 1361); planta danica ex ins. Bornholm (ubi non rara) a Lange antea huc relata est, sed nunc (haandb. ed. IV. 585) propria species: *A. coerulescens* Lge., hucusque e sola hac insula nota.*

5. **Hepatica.** 1. *H. triloba*: *Dan. Fenn. (exc. bor., med.). Roman.; adest etiam in Norv. arct. (terminus polaris ad 67° 17' ex Norman).*

2. *H. angulosa* Sch. Ky in bot. zeit. 1851. (*H. transsilvanica* Fuss in verh. sieb. ver. I. 1850. 83. *H. multiloba* Schur ib. 116); adest etiam *Galic. or. (: Herbieh 1865) et Bucov. (Mustazza exs. teste Knapp).* Comment. 4.

× *H. media* Simk. = *angulosa* + *triloba*. (*Transs.*).

6. **Adonis.** 4. *A. vernalis*; *Germ. bor. adest (paucis locis): Marchiæ, Posen., Pomeran.; Hung. (: Hazsl. et al.). Roman. Bulgar. (det. Velenovsky 1885). Rumel. (ex eodem); Hisp. paucis solummodo locis Castil. et Gran. indicata est et in m. Sierra de Alfácar adest var. granatensis Uechtr., quæ insignis et forse species propria. — *A. soproniensis* Mygind ap. Borb. est (test. Simonk.) var. parviflora, foliis latius sectis (Hung.).*

5. *A. wolgensis*: Roman.; Bessarab., Cherson (ex Lindem.).

6. *A. æstivalis*; —? *A. micrantha* d'Urv. (Odessa).

**A. squarrosa*; sec. Simonk. planta transs. ad *A. æstivalem* ipsiss. pertinet.

7. *A. microcarpa* (Heldr. hb. norm. 813): Istr.mer. (: Freyn). — *A. Cupaniana*: Sicil. Balear. (*A. æstivalis* auct. balear. ex Marès). Creta (Heldr. exs.) etc.

9. *A. flammea*: Hisp.cent.,mer.,or.; Helv. etiam Basil., Schaffh.; Bavar.; in Germ. centr. distributa Thuring. usque ad Halle et Hercyn. bor. usque ad Hakei; Siles. (r.). Roman. Rumel. (: Velenovsky). Istr.mer. (: Freyn).

10. *A. autumnalis*; Belg. saltem in Hainaut indig. ex Crepin; Hisp. centr. et or. (indicatio Olyssipone et in Balearibus probab. subspeciem spectat); Sard. (ex Aschn 1883). Roman.

**A. bætica*; in arvis agri gaditani pr. Porto de S. Maria et Xeres de la Frontera, ceterum pr. Sevilla (Colm.) et Malaga (Prol.).

× *A. abortiva* Hsks (1886) = *æstivalis* + *flammea*. (Wimar.).

× *A. Walziana* Simk. (1878) = *vernalis* + *wolgensis*. (Transs.).

7. *Myosurus*. 1. *M. minimus*; exc. etiam Fenn. bor. (sed adest in Ostrob.); Norv. ultra Nidaros. non indicatur; adest in Hisp. bor. sed raro (vel prætervisus).

8. *Thalictrum*; 1. *T. tuberosum*; Hisp. borealem et orientalem inhabitat (indicatur etiam in Castil.).

3. *T. aquilegifolium*; Hisp. non nisi (et rarius) in Astur., Castil. et Catal. indicatur; Bulgar. (: Velenovsky); Roman. — *T. niveum* Bmg. ex Simonk. (Transs.).

4. *T. pauciflorum*; præcedentis in regione alpina et subalpina vices gerit ejusque subspeciem sistit (Simonk.).

5. *T. macrocarpum* Gren. (1838). *T. majus* Gren. 1836 (act. soc. linn. burdig.). Comment. 5.

6. *T. glaucum* (*T. flavum speciosum* L.; *T. flav. hispan.* Brot. *T. speciosum* P.): Lusit. Hisp.occ.,centr.,mer. et or. (*T. maritimum* Duf.?); adest etiam Pyren.or. Gall. (: Debeaux).

**T. Costæ* Timb.-Lagr. ap. Debeaux (1878). *T. flavum* var. Costa (1877). Catal. Pyren. or. cfr. *T. simplex* (16).

7. *T. commutatum*; sec. Lecoyer planta wolgensis ad *T. minus elatum* pertinet.

8. *T. flavum*; exc. etiam Lapp. plur. — *T. capitatum* Jord. 1848. (Lyon). — *T. angustatum* Weinm. (Ingria, Suec., Dan.). — *T. prorepens* Jord. 1860. (Lyon). — *T. belgicum* Jord. (1860); ex Lecoyer forma vulgatiores speciei, jam Lejeunio nota. — *T. udum* Jord. 1860. (ad ripas Rhodani). Comment. 6.

**T. spurium*; — *T. medianum* Jord. 1860 = *T. porrigens* Jord. 1848 ex ipso auct.

**T. mediterraneum*; melius sub *T. angustifolio* (10) militet; — *T. lucidum hispanicum* indicatur in sola Aragon. (Pourr. ex Amo) et dubium est ex Willk. et Colm.

10. *T. angustifolium*: Fenn. or. (Carel. oneg.). Roman. Bulgar. Helv.? ex Grenli; Öland. nunc extinctum et Norv. mer. dubium (introd.?) dicitur. — *T. angustissimum*; *T. stenophyllum* Schur. — *T. laserpitiifolium*; *T. lucidum* Rehb. ic.: Ross.med. (Moscov. etc.). — *T. heterophyllum* Schur. *T. spurium* Jka. — *T. Morisonii* Gm. *T. nigricans* Bmg., Schur. Comment. 7.

11. *T. elatum*: Roman.; Banat. (: Borbäs); Bulgar. (: Bornmüller); Ital.mer. (Amalfi, in montibus Lacaita).

**T. kemense*: Ross.bor.-or.; Fenn.bor.-or.

**T. mucronatum*; —? *T. viperinum* Andr. (act. mosq. 1832); Lindem. (Ross.mer.); ad *T. majus* pertinet ex Lecoyer.

13. *T. medium*: Ross.med. Roman. Transs. (— *T. acuminatum* Schur ex Simonk.). — *T. parisiense* Jord. 1860. — *T. silaifolium* Jord. 1860. — *T. abortivum* Jord. 1848. *T. nothum* Jord. 1860. (Lyon); ex Lecoyer = *T. majus* (19).

**T. Barthii* Schur (1876). *T. majus* Barth (ex Simonk.). Transs.

14. *T. strictum*; *T. exaltatum* Schur ex Simonk. (non Gaud.). — *T. rufinerve* Schur ad *T. simplex* (16) pertinet ex Simonk.

16. *T. simplex*: Roman. (Dobrud.); Scand. exc. etiam Fenn. bor. — *T. Leyii* Löhr in Flora XXV. (Germ. occ.). — *T. axilliflorum* et *T. rufinerve* Schur (ex Simonk. testib. specim. authent.). — *T. procerulum* Jord. 1860. (Lyon). — *T. rhodanense* Jord. (1860). — *T. lætum* Jord. 1860. (Rhône). — *T. alpicolum* Jord. (Delph. Vales.). — *T. subspicatum* Jord. 1860. (Lyon); ex Lecoyer. — *T. Costæ* Timb. (ex Willk. Lge). Catalon. (r.); vid. etiam supra sub *T. glauco* (6).

17. *T. Bauhini*: Transs. (r.). Rumel. (ex Velenovsky); in Germ. bor. rarum.

18. *T. Jacquinianum*: Dan. (r.). Ross. med., mer. — *T. capillare* Rchb. (Germ. or. Ross. med., mer.). — *T. gracile* Schur. — *T. Csatoi* Schur (sec. Simonk. ex specim. authent.).

**T. Kochii*; etiam Ostrog. (rr.) indicat. (in Gotland. vulgatum).

**T. saxatile*: Hisp. or., bor., centr. Roman. Ross. mer. (: Lindem.), med. (Moscov.: Clerc); *T. flavo-virens* Led. (1841). — *T. monticolum*, observ. Lecoyer, ex specim. authent. ad *T. minus* pertinet ut etiam *T. Delarbrei*. — *T. alpestre* Gaud., in Consp. sub 24 cum dubio allatum, huc potius referendum est.

19. *T. majus* (*T. ruthenicum* Fisch. *T. elatum* Gaud. non Murr.): Lothar. (Godr.). Roman. Ross. mer. (gub. Cherson: Lindem.). Transs.: *T. silvaticum* et *T. capillare* Schur (ex Simonk., qui specim. authent. vidit). — *T. elegans* Jord. *T. ambigens* Jord. (Tournon, Ardèche). — *T. ambiguum* Schleich. (Vales.). — *T. Arnaudie* Jord. (1860) sec. Lecoyer ex specim. authent. — *T. subalpinum* et *T. inclinatum* Schur. (Transs.). — *T. serotinum* F.Sz (1859) ex Lecoy. — *T. cuneatum* Schur (Transs.) et *T. hirtellum* Schur (Austr. p. d.) ex eodem. — *T. frutetorum* Jord. 1860 ex Lecoy. (dep. Vienne, Isère). — ? *T. glaucescens* W.; *T. elatum* Bmg. (Austr., Transs.).

20. *T. Grenieri*; — *T. obscuratum* pertinet ad *T. minus* (23) ex Lecoyer. — Comment. 8.

21. *T. silvaticum*: Batav. (detect. ab Hartsen 1861 ex Abeleven 1876). Gall. bor., or. Siles. Galic. Roman.; Transs. excl. (sec. Simonk. planta Schur. et — *T. petrosum* ej. ad 18. *T. collinum* pertinent). — *T. Godroni* (*T. silvaticum* Godr. lorr.) ad *T. minus* pertinet ex Lecoyer.

22. *T. transsilvanicum*; sec. generis monographum Lecoyer pertinet ad *T. majus* (19), sed ex Simonkai, qui specimen authent. vidit, est = *T. saxatile* (18*).

23. *T. minus* (*T. vulgatum* F.Sz): Roman.; Scand. non nisi in Norv. mer. et Suec. mer.-occ. adest. — *T. pubescens* (*T. foetidum* Gou.); habitat præcipue in montib. Vales. et Gallopr.; Pyren., S. Nevada (Bourg. 1004). — *T. calcareum* (potius ad 18* *T. saxatile*?) Helv. — *T. præcox*; *T. Billotii* F. Sz.; Bill. exs. 2402. (Alsati.). — *T. Schultzii*: Germ. max. occ. — *T. Savatieri* Lloyd (1871) ex Lecoy. — *T. præruptorum* Timb.-Lagr. (mass. d'Arbas H.-Garon.). — *T. stenocarpum* ej. ex ipso (ex eod. loco). — *T. polycarpum* Loret ex Lecoy. (Pyren.). — *T. porphyrite* Sz in Flora 1873 ex eod. (Alsati.). — *T. clypeatum* Timb.-Lagr. (mass. d'Arbas dep. H.-Garon.). — *T. flexuosum* Dmrt. ex Lecoy. (Belg. in dunis). — *T. macilentum* Jord. 1860. (dep. Loiret). *T. virgultorum* Jord. 1848. (Lyon). *T. thamnophyllum* Jord. 1860. (Lyon); ex Lecoy. — ? *T. Vrabelyi* Schur. (Hung.).

**T. odoratum*; *T. saxatile* Vill. p. p.

**T. appendiculatum* CAMey. — Moscov. (: Clerc).

24. *T. foetidum*: Hisp. (Arag. mer. r. et Catal. ex Pourr. teste Amo). Alp.-Marit. (: Ardoino). Sabaud. (: Chabert 1884). Roman.

25. *T. calabricum*; *T. calabrum* et *T. purpureum* Ten.

25. a. *T. podolicum* Lecoy. in bull. belg. 1885. 173. — *Podol.* (leg. Hoch); sec. auct. proximum est speciei præced., quâcum ad ejus *Thalictra microgyna longistaminea claviformia* pertinet.

26. *T. alpinum*: ins Færøer. Hibern. (co. Donegal). Lapp. tota. (Suec. versus merid. usque ad Tåsjö Angerm. et Idre Dalec. procedit). Alp.-Marit. (mt Tenebre, col de la Maddalena, col de Jallorgues etc.). Ross. arct. etiam in ins. Nov.-Semi. et Waigatsch; Transs. deest ex Simonkai.

26. *a. T. petaloideum* L. sp. ed. II. 771. — Species hæcce sibirica (altaico-dahurica) nuper (1884) in Galic.mer-or. lecta est (: Blocki).

- × *T. budense* Simonk. = *angustifolium* + *collinum*. (Pesth).
- × *T. iodositemon* Borb. = *elatum* + *angustifolium* (Torda Transs.).
- × *T. Regelianum* Brugg. = *aquilegifolium* + *simplex*. (Helv.).
- × *T. rhætium* Brugg. = *majus* + *simplex*. (Rhætia).

9. **Ficaria.** 1. *F. grandiflora*; *F. Roberti* FSz. *Ranunc. ficariæformis* F Sz 1855.

2. *F. verna*; exc. etiam Fenn. plur. (in sola mer. lecta), sed adest in Norv. arct. (ubi jam a Wlhub. indicata); termin. polar. circ. 67°, 30' (ex Norman).

**F. calthæfolia*; — *F. ambigua* Bor. — Comment 9.

3. *F. peloponnesiaca* (*Ranunculus ficarioides* Bory): m. Chelmos (ex Lacaita in litt. 1884). m. Kalolamni ins. Karpathos (: Pichler) sec. Boiss. or. suppl.

**F. pumila* Vel. in diar. (sitzungsber.) soc. sc. bohém. 1887. 438. — Rumel. or. in alpestribus Balcani slivenecensis (: Skorpil) et (?) Herceg. et Monten. (: Bornmüller ex Velenovsky).

10. **Ranunculus.** 3. *R. spicatus*; planta iberica sistit speciem a *R. spicato* valde diversam sc.:

R. nigrescens Freyn ap. Willk. Lge III. 921. *R. blepharicarpos* var. Bourg. hisp. exs. 2583. *R. spicatus* Plan. *R. spic.* var. *lusitan.* Colm. (1885). — Astur. (: Bourgeau). Galloec. (: Colmeiro, Planera). Lusit.

3. *a. R. Henriquezii* Freyn in bot. centralbl. 1881. — Lusit. (*R. lusitanicus* Pourr.?).

4. *R. chærophyllos.* — Comment. 10.

**R. Agerii*: Sicil. sub m. Aetna inter Catanam et Misterbianco (: Strobl). Græc. tota (in ins. Coreyra species frequentiss. ex Heldr.).

4. *a. R. rhodensis* Boiss. or. suppl. 7. — Rhodus (in herbis prope urbem: Bourg.).

5. *R. illyricus*: Saxon. (prov.) pr. Wettin, Stassfurt, Schönebeck etc.; Siles. (pr. Glogau, Kösling); Roman. Istr. Bosn. (: Brandis 1887); Ross. med. intrat per gub. Kursk.

6. *R. monspeliacus*; Balear. a Barcelò, Arag. ab Asso indicatur (cf. *); planta Winkleriana, prope Malaga lecta, omnino diversa est et ex affinitate *R. flabellati* sed adhuc dubia (Freyn).

**R. saxatilis*: m. Aetna (ex Strobl). Cors. Arag. Gall. mer. (*R. monspeliacus* Lmtt. plat. centr. ex Loret).

**R. albicans*; *R. illyricus* Gou. (non L.). — *R. cylindricus*; *R. illyricus* Vill. — *R. Gontetii* Jord. (dep. Gard).

9. *R. oxyspermus*: Roman.

10. *R. creticus*: m. Lastos ins. Karpathos nunc Scarpanto (: Pichler) ex Boiss. or. suppl.

11. *R. asiaticus*; prope Otranto Ital. mer., in collibus saxosis et macris, detectus (var. *rubra*) ab H. Groves 1877; ibi igitur speciei locus europæus maxime occidentalis sed a destructione non securus imminente cultura (H. Groves in linn. soc. journ. 1885 et giorn. bot. ital. 1887*). *Cyprianthe anemonoides* Spach (1839). *C. asiatica* Freyn.

12. *R. flabellatus*: Hisp.bor. Balear. (typicus adest in Hisp. mer. bætica ex Freyn). Ital. ins. Istr.mer. (Freyn 1875). Turc.; *R. chærophyllus* Bourg. hisp. exs. 1009. 2081. 2352 (teste Freyn). — *R. dimorphorhizus*; (Lusit., Hisp.mer.). — *R. gregarius*; (Lusit., Astur.). — *R. rufulus* Brot. sec. Freyn. (Lusit., Bætica).

13. *R. rupestris*; var. *bætica* Freyn in Huter. Porta exs. hisp. a. 1879. *R. blepharicarpos* Willk. exs. hisp. 809. — Hisp. gran. mont. (S. de la Nieve, 2500 — 3000': Willk.; S. Prieta, 4000': Hut. Porta).

**R. blepharicarpos* verus videtur planta sat rara: Ronda, Estepona, Gibraltar etc. (etiam Lusit.?) ex Freyn ap. Willk. Lge.

13. *a. R. Hollianus* Rehb. (in Holl exs. lusit. 1828) 1829—30. *R. suborbiculatus* Freyn ap. Willk. Lge III. 921; Magnier fl. sel. exs. 1066, cf. ej. serin. (V) 99. *R. carpetanus* Bourg. hisp. exs. 2351 (p. p.). — Lusit. (pr. Cintra et in S. de Arrabida: Daveau). Hisp.occ. (S. de Majareina Extrem.: Bourg. 1852).

13. *b.* *R. nevadensis* Willk. pugill. in linn. XXX. (1859). 85. — *Hisp. mer. m. Nevad.* ad alt. circ. 2000 metr. (in cacum. Dornajo: Willkomm detex. 1845; in valle super. fluvii Jenil: Winkl.).

14. *R. carpetanus*; *Hisp. præcip. centr.* (Arag. occ., Castil.) reg. mont. et alpin. inhabitat, in occid. raro lectus (*Extrem.: Bourg.*); detectus a Reuter in *S. de Guadarr.* 1841. — *R. escurialensis* est species propria sec. Freyn:

14. *a.* *R. escurialensis* (Boiss. exs.) Freyn ap. Willk. *Lge* III. 922. *R. carpetanus* auct. *hisp. p. p.* — *Hisp. centr.* (præcip. *S. de Guadarrama*), bor.-occ.

15. *R. Sprunerianus*; — *R. oxyrhynchus* proximus est *R. constantinopolitano* (58 ex ipso auct. (Grsb.)).

15. *a.* *R. incomparabilis* Jka brev. I. 1. — *Bulgar. m. Balkan* supra *Kalofer* (: *Janka*). — *Sec. Grsb.* (ex *Kanitz*) locum habeat post *R. polyrhiz.* (52), sec. Boiss. post *R. cadmicum*.

16. *R. pedatus*: *Roman.*; *Ross. med.* intrat per gub. *Kursk.*

17. *R. millefoliatus*; — *R. garganicus*: *Dalm.* (*R. millefoliatus* *Pett. e Spalato*); *Sicil.* (*m. Pellegrino, Termini: R. scaber* *Pr.*).

18. *R. Canuti* (*Coss. etiam in Ardoin. alp.-marit.* 1867). *R. Spreitzenhoferi* *Heldr.* in *oe. bot. z.* 1878 (ex ipso auct. 1880). Hæc species *Alpib. Marit.* (ubi in col de Braus et in valle Peill a beato Canut detecta) priva videbatur, sed dein lecta est etiam *Hetr.* (adv.?) et in *Græc. ins. Corcyra* (*m. Hagious Dekas: beat. Spreitzenhofer* 1878).

20. *R. Millii*: *Messen.* copiose ex *Lacaita* (litt. 1884).

21. *R. bullatus*; *Hisp. mer.* (*bætic. et granat.*) inhabitat et indicatur (*rarius*) etiam in occ.

22. *R. Thora*: *Carinth. mont. et alp.*; *Styr.* etiam *pr. Cilli* etc. adest.

23. *R. hybridus*: *Bavar.* (*Soyernspitze ad Mittenwald Alpium*); *Transs.* cum dubio citetur (specim. *transsilv.* in hb. *Bmg.* desunt teste *Simonkai*).

**R. brevifolius*: *Heldr. hb. norm.* 901 (e *Taygeto* et *Kyllene*).

24. *R. rutæfolius*: *Alp.-Marit.* (*alp. Carlin, mt Bego*).

26. *R. aconitifolius*: *Hisp. bor., centr. (r.), or. Roman.*; *Suec.* solum in *Jemtia, Herjedal. et Dalec. (Särna)* obvius. -- *R. platanifolius* adest etiam *Luxemb.*

27. *R. glacialis*: *Lapp. etiam or. (Imandri)*; *insulæ boreal. Færøer* (: *Rostrup*) et *Jan Mayen*; *Pyren.* etiam *hispan.* habitat, sed in *Hisp. mer.* adest sola var. *holosericea* (*Gaud.*), quæ regionem nivalem *m. S. Nevada* inhabitat.

28. *R. Seguieri*; *R. Columnæ* *All.* (excl. *pl. Column.*).

29. * *R. Traunfellneri*: *Styr.* (*Sulzbacher Gebirge: Zechenter ex Maly*); *Helv.* dubia est ex *Gremli* et sec. *Brügger* planta *helvet.* est var. (: *ambiguus*) *R. alpestris* (num ita etiam planta *ital.*?). *R. alpestris* *Sep.*; cfr. *Pacher kârnt. gefpfl.* (1885).

30. *R. crenatus*: *Jezero Bosn.* (: *Brandis* 1885 ex *Freyn*).

31. *R. bilobus* *Bert.* (1858). *R. Bertolonii* *Hausm.* in *act. soc. zool.-botan.* vindob. (eod. anno).

32. *R. acetosellæfolius*; species mont. *Nevadens.* endemica ibique regionem nivalem inter 7000 et 10000' inhabitans.

33. *R. Pallasii* (*Fr. hb. norm.* XII. 47): *ins. arct. N.-Semi.* (*Kjellm. Lundstr.* 1875) et *Waigatsch*; *Adventbay ins. arct. Spitzberg* (ubi lecta a cl. *Nathorst* 1882); aliis locis harum insularum adest var. *spetsbergensis* *Nath.* in *act. acad. scient. suec.* XX. 1883 (sep.*), ubi exstant auctoris laudati symbolæ ad plantas vasculares *Spitzbergæ* earumque distrib. geogr. cognoscendas.

35. *R. amplexicaulis*; *Hisp.* adest præcipue in *Pyrenæis, Cantabr.* (*Picos de Europa: Ler. Lev.*) et *Astur.*; ceterum in *Extremad.* (*S. de Majareina: Bourg.*).

37. *R. angustifolius*; etiam in montib. valent. *Hisp. or.* indicatur (: *Dufour*). — *R. alismoides* non nisi in *m. S. Nevada* (inter 8500' et 9500') lectus est.

39. *R. carpaticus*; *R. szurulensis* *Lerchenf. ap. Schur* (ex *Simonk.*). *R. dentatus* (*Bmg.*) *Simonk.* (1886).

41. *R. serbicus*: Bulgar. (Balkan-Arabakunak pr. Orchanie: Velenovsky 1885); m. Oeta Thessal. (Heldr. ex Boiss.); sec. Grsb. (!) est = præc. (*R. brutius*).

42. *R. caucasicus*; planta transsilvanica est var. *R. nemorosi* (= *R. geraniifolius* Bmg., *R. Crantzii* Schur) sec. Simonk.

44. *R. demissus*; montes Nevad. præcipue inhabitat (ubi in reg. nivali inter 7 et 10000' vegetat), sed insuper in m. S. Tejeda ad 5500' lectus (: Huter) et nuper etiam in Hisp. bor. (Picos de Europa: Ler. Lev.); Creta (Reverchon, sub *R. brevifolius*) ex Boiss. or. suppl.

45. *R. Villarsii* (*R. Hornschuchii* Hpe., *R. Villarsii* K., est = *R. Breynius* sub seq.): Alp.-Marit. (reg. alp. et mont.: Ardoino). — *R. aduncus* (sec. Grsb. ad 49 *R. Gouani* pertinet): Helv. mer. (alp.). — *R. oreophilus*; *R. Villarsii* auct. transs. plur. *R. Thomasii* Ky ap. Neilr. (non Ten.). *R. Gouani* Schur.

**R. Sartorianus*; adest etiam in m. Pindo (: Heldr. 1885).

46. *R. nemorosus*: Batav. (ex Abeleven 1876.). Roman. Bulgar.; Suec. non nisi in ins. Gotland. et Norv. vix nisi ad Christiania lectus videtur. — *R. Breynius*; Comment. 11. — *R. aureus*; *R. Thomasii* Kern. (non Ten.). — *R. villosus*; *R. aureus* Costa catalon. *R. polyanthemus* auct. arag. (ex Freyn.). — *R. Timbali* est = 46. a.

46. a. *R. tuberosus* Lap. hist. pl. pyr. 32. (1813). *R. Amansii* F.Sz hb. norm. 807 (non Jord.). *R. Peyrousi* Timb.-Lagr. *R. lanuginosus* auct. pyr. (ex Freyn).

Pyren. tam gallic. quam hispan.

47. *R. polyanthemus*: Dan. Fenn. exc. Lappon. bor. multa. (Norv. usque ad Nidaros, ex A. Blytt) Roman.; Helv. solum in Chur, U.-Engadin (: Brügger). — *R. laciniatus* Bmg ex Simonk. (in Consp. sub 78 *R. sardoo* citatus).

+*R. polyanthemoides*; a specie non diversus sec. Simonk.

49. *. *R. gruinalis*; ad speciem sequentem (*R. montan.*) pertinet ex Simonk.; beat. Schott descriptionem (in Analect.) elaboravit.

50. *R. montanus*: Germ. mer.-occ. (Badia, Würtemb., Bavar.); Astur. (r.). Pyren. (*R. mont.* var. *arabascensis* Timb.-Lagr.). Roman. Bulgar. — *R. pseudomontanus* Schur (ex Simonk.). — ? *R. alpicola* Timb.-Lagr. (in Consp. sub 45 *R. Villarsii* allatus). *R. Gouani* Costa (ex Freyn). Pyren., ubi in reg. alp. frequens dicitur.

**R. geraniifolius* (*R. gracilis* Schleich. nil nisi *R. montanus* parvus ex Freyn): Helv.: Hung. (Hazsl.). Bosn. (Brandis 1884).

51. *R. Weyleri*: species rariss. et non nisi in ins. balear. Mallorca lecta, ubi in cacumine montis Puig-major de Torellas, altitud. circa 1400 metr., in rupibus abruptis, loco unico, habitat; delineata et plene descripta in Marès et Vigneix catal. raison. (1880); sec. Burn. Barb. not. balear. (1882) valde proxima est (test. specim. authent.) *R. Balbisii* Mor. (61-) e montib. elatis Sardiniae.

53. *R. lanuginosus*: Roman.

53. a. *R. Orphanidis* Boiss. (Heldr.) or. suppl. 13. *R. lanuginosus* Orph. exs. 259. — Maced. pr. Bitolia (: Orphanides), m. Oeta Pthiotidis (: Heldr.).

54. *R. acris* (*R. Boreanus* Jord.); Hisp. indicatur solum in Gallec. et Castil. sed probab. adest etiam alibi; — *R. napellifolius* Cr.; *R. verrucosus* Schur; *R. Barthii*, *R. subtilis* et *R. trachyticus* Schur (ex Simonk.). — *R. Kladnii* Schur; *R. parvulus* Schur (= var. alpina vel subalp. ex Simonk.). — ? *R. propinquus* Schur; *R. pseudoacris* Schur.

**R. silvaticus*; *R. Steveni* Andr. in suppl. tert. ad cat. hort. crem. (1813). *R. Stevenianus* Bess. in Flora. *R. acris* Jord.; Boiss. voy.: Hisp. (ubi hinc inde adest et ex Freyn frequentior *R. acris* typicor. Siles. (probab. cum seminib. gramin. introd.). Bosn. (: Beck, Brandis). Bulgar. (: Bornmüller). Roman. Ross. balt. (: Klinge.). Gotland. (ex Htn.f.). — *R. Friesianus*; *R. constantinopolitanus* et *R. malacophyllus* Schur enum. (excl. synonym. nonnullis). *R. tuberosus* Schur (in Consp. err. legitur Stur). — *R. strigulosus* Schur (1866). — *R. platyphyllus* (Schur) Simonk. *R. geraniifolius* Schur. *R. constantinopolitanus* Schur in oe. b. z. *R. macrophyllus* Schur. — *R. Csatói* Schur (1876). — *R. Kayserii* Schur (1876).

**R. granatensis*; a subspecie præced. non distinguendus ex Freyn.

**R. borealis*: Island. or. (Strömfelt 1883); Ross. arct. etiam in Nov.-Semlia; — *R. glabrusculus* Rupr. samoj.; etiam Lapp. or. (Fellm.). — *R. lanuginoseformis* Selin sec. Fellm. (Lapp. or.).

55. *R. cassubicus*: Boruss., Poson.; Suec. impr. mediam inhabitat, in mer. non nisi (et r.) Ostrog. et Smol. lectus; Fenn. sola mer.-occ. et or. (Olonets, Onegr.). Bavar. (ad Waging); Croat. (: Hirc 1886); Roman. — *R. flabellifolius* (*R. flabellatus* Wolff ap. Schur. *R. ambiguus* Schur) est potius subspecies, cujus var. sit *R. alliariefolius* (Rehb.) Simonk.

56. *R. auricomus*; adest etiam Hisp., ubi in Astur. lectus (Bourgeau exs. 2586 ex Freyn); in regno valent. indicatur a Pourret. — *R. pseudocassubicus* Schur (ex Simonk.).

57. *R. affinis*: Ross. arct. ins. Waigatsch; Spitzberg. plurib. loc. adest (vid. Nathorst in act. acad. scient. suec. XX. 1883) ibique etiam:

*Wilanderi Nath. l. c. ad Cap Thordsen lectus est (: Wilander et Nathorst 1870, Nathorst 1882).

59. *R. velutinus*: Gall. mer. pr. Cannes, Antibes (: Jord.).

**R. Tommasinii*; est = *R. neapolitanus* (*R. velutinus* K.) et in Istr. mer. freqq. (: Freyn). Comment. 12.

59. *a. R. eriophyllus* CKoch (vid. Freyn in Flora 1880). *R. palustris* Boiss. fl. or. ex obs. cl.: mi CClacaita (litt. 1884), qui specimen hb. Linn. examinavit et in eo receptaculum glabrum esse probavit. — Taur. (etc.).

60. *R. palustris*: ins. Jonic. (Corfu: Spreitzenh. 1877); Lusit. et Hisp. ad sequentes 60. a—c pertinent. Comment. 13. — *R. heucherifolius* Pr.

60. *a. R. macrophyllus* Dsf. (sec. Freyn). *R. balearicus* Freyn (ex ipso) in oe. bot. z. 1876. *R. lanuginosus* Camb. (non L.). *R. palustris* Mor., Rodr., Willk. ind. balear.; Mab. hb. cors. 202. (*R. corsicus* Viv. Soleir. hb. cors. 261, non DC.). — Balear. Batica (pr. Algeciras: Hegelm.). Sard. Cors. *R. heucherifolius* Pr. proximus, sed ab eo, ut etiam a *R. palustri*, calyce patente abhorrens (: Freyn).

60. *b. R. Broteri* Freyn ap. Willk. Lge III. 930. *R. adscendens* Brot. phyt. lusit. (1827). *R. neapolitanus* Bourg. hisp. exs. 1750 (ex Freyn).

Lusit. Batica (pr. Algeciras). — *R. palustris* Boiss. voy. p. p.; Bourg. hisp. exs. 1751. (Hisp. mer.).

60. *c. R. adscendens* Brot. fl. lusit. II. (1804); Freyn. — Lusit. Hisp. mer. batica (Cadiz etc.) et mariana (pr. La Carolina: *R. palustris* Lge exs.). — ? *R. pubescens* Lag. (1816). *R. Lagascanus* DC. (1824). Hisp. bor. (pr. Leon: Lag.).

61. *R. neapolitanus*: Heldr. hb. norm. 902 (var. ex Attica); Croat. (Borbás et Hirc). Comment. 14.

61. *a. R. Aleæ* Willk. in linn. XXX. 84. (1859). *R. bulbosus* auct. hisp. p. p. Lusit. (: Daveau). Hisp. plur. præcip. centr. mont. (ubi in S. de Guadarr. ab Alea primum lectus 1843). Balear. (ins. Mallorca). Gall. mer.: Pyr. or. (Collioure: Rouy 1876 ex ipso in bull. soc. bot. 1881), Aude (m. Corbar.: Gautier). Otranto Ital. mer. (H. Groves teste Freyn). — *R. neapolitanus* Bourg. hisp. exs. 2349. (Extrem.; S. Nevada: Hut. Porta).

61. *b. R. castellanus* Boiss. Reut. ap. Freyn in Willk. Lge III. 932. *R. bulbosus* auct. hisp. p. p.; Bourg. exs. a. 1864 (ex Freyn). — Hisp. bor. (*R. Aleæ* Bourg. exs. a. 1864), sed etiam (r.) centr. et mer. (valent.), in his regionem mont. alpin. inhabitans. — *R. neapolitanus* Bourg. hisp. exs. a. 1854. s. num. (Castil. Guadarr.).

62. *R. bulbosus*; septentr. versus (Suec.) ultra Helsingiam non procedit; Fenn. adest in sola mer.-occ. extima (Aboæ, Aland.); var. hispanicus Freyn ap. Willk. Lge: Astur. (*R. bulbosus* Bourg. exs. 2587). — *R. sparsipilus*; *R. bulbosus* auct. fl. paris. — *R. cibinensis* Schur (ex Simonk.).

62. *a. R. galleecicus* Freyn in Willk. ill. hisp. I. 100. *R. occidentalis* Freyn ap. Willk. Lge. III. 929 (non Nutt.). *R. bulbosus* Plan. p. p. (1852). — Hisp. bor.-occ. (freqq. circa Santiago de Compostela: *R. mixtus* Lge pug. ex ipso in litt. 1888).

63. *R. sulphureus*: ins. arct. Beeren Eiland.

64. *R. nivalis*: Ross. arct. etiam in Nov.-Sempl. et Waigatsch.; Lapp. etiam fenn.; in Suec. speciei area geogr. a Lapp. bor. ad Ekordörren Jemtiae extenditur.

65. *R. pygmæus*: Lapp. etiam fenn. et or.; ins. Beeren-Eiland; est planta alpina.

66. *R. samojedarum* (potius var. speciei seq.): Lapp. or.

67. *R. hyperboreus*: ins. Beeren-Eiland. Fenn. bor. (cum Lapp.); Suec. impr. Lapponiam inhabitat, ceterum in Jemtia et Dalec. (Idre) lectus. — *R. tricrenatus* Rupr. (Samojed.). — *R. Baerianus* Bogusl. sec. Trautv. (Archang., Nov.-Semb.).

68. *R. Purshii* (var. *terrestris*); Ross. med. centr. (gub. Jaroslaw; gub. Wladimir, ubi sec. Petrowsky inter plantas vulgatiore numerandus); med. or. (gub. N.-Nowgorod in regione a flum. Wolga septentrionem spectante: Krasnow ex Batalin).

69. *R. gramineus*; Helv. rr. nempe solum in colle St. Leonhard Vales. (ex Gremli); indicatur etiam Livon. et Moscov. — *R. luzulæfolius* (Boiss.) Amo. *R. gramineus* Cut. fl. madr.; Bourg. hisp. exs. 1008. (Castil., m. Gran.).

70. *R. abnormis*; hab. in Castil. (mte la Serrata ad alt. 1800—2300 metr.: Cut. detex. 1857) et Extrem. (S. de Majareina pr. Placencia: Bourg.); in S. de Gredos a collectore Isern repertus 1855 et a Leresche lectus 1862, sed 1878 ab eo et Levier frustra quæsitus. Species rara, insignis, habitu et foliis *R. graminei* et *R. pyrenæi*; corolla *Ficariæ* sed minor, 8—10-petala, petalis oblongis.

72. *R. Flammula*; exc. etiam Lapp. plur. et Fenn. bor. multa.

73. *R. reptans*: ins. Færøer. Dan. Fenn. — De hac specie eruditi, ut notum est, multum dissentiunt; nuper Charles Bailey (in conv. soc. liter. phil. nov. 1886, proceed. XXVI. 47—51*) historiam ejus cum illa *R. Flammulæ* plene et concinne exposuit, consideratis etiam judiciis aliorum de earum nexu etc.

74. *R. lapponicus*: Ross. arct. etiam in Nov.-Semia; Fenn. etiam centr. (Sb. Kb).

76. *R. trachycarpus* (Heldr. hb. norm. 814.). *R. hirsutus* Sm. prodr. p. m. p. *R. lomatacarpus* Schur (sed ex Simonk. in Transs. non indig.); adest etiam in Attica.

77. *R. lomatacarpus*; planta e Transs. citata ad speciem præced. spectat (ex Simonk.).

78. *R. sardous*; Hisp. mer. et centr. non indicatur, sed adest in bor. (Bourg. hisp. exs. 2584); Suec. in Scan., Blek. et ins. baltic. — *R. subtrifolius* Schur.

82. *R. sceleratus*; deest in Hisp. mer. (ex Willk. Lge), ut etiam in Lapp. plur. et Norv. bor. multa. — *R. reptabundus* Rupr. (Ross. arct.).

83. *R. muricatus*: Istr. Roman. — *R. græcus*: Ital. mer.-or. (pr. Otranto, Gallipoli: H. Groves).

84. *R. chius* (*R. incrassatus* Guss.): Cors. (: Chabert 1882). Istr. Fiume Croat. (: Parreyss ex Knapp).

85. *R. parviflorus*: Croat. litoral. (Fiume: Maria Smith). Istr.

Obs. *R. humilis*; sec. Grsb. = "*R. polyanthemii* var. alpina Appen. et Cors. rostro carpel. brevissimo".

85. a. *R. marginatus* d'Urv. enum. *R. glechonoides* Grsb. spicil. (ex Boiss.). — Thessalonica, Salonichi Maced. (ex Grsb.).

86. *R. polyphyllus*: Galiz. (r.); indicatur etiam Moscov.; Transs. nuper non lectus ex Simonk. (in hb. Bmg. deest).

87. *R. ophioglossifolius*: Angl. (Hants: Groves). Hisp. centr. (territ. matrit.). Balear. Gall. or. r. (Châlons etc.). Istr. Hung. (: Hazsl); in ins. Jersey Gall. bor.-occ. nunc destructus dicitur. — *R. uliginosus* ad seq. (*R. fontan.*) pertinet ex Grsb.

89. *R. pedunculatus*; *R. longipes* Lge (exs. et) in Cut. matr. (1861). *R. dichotomiflorus* Lag. hb. ex Freyn ap. Willk. Lge. — Hisp. centr., bor.-occ.

90. *R. nodiflorus*: Hisp. centr. (Guadarrama ex. gr. ad Escorial).

91. *R. lateriflorus*: Hisp. bor.-occ. (Leon). Gall. dep. H.-Loire ex Loret,

qui hanc speciem in Gall. mer. jam diu collegit (in "le plateau volcanique de Roquehaute" dep. Hérault). Roman. Ross. mer.-or. (pr. Sarepta: Becker).

× *R. chrysanthus* Brugg. = *nemorosus* + *repens*. (Chur).

× *R. gelidus* Hfegg (ex Brugg.) = *glacialis* + *alpestris*. (Helv.).

11. **Ceratocephalus.** 1. *C. falcatus* (*C. leiocarpus* Stev.): Bavar. Morav. (r.). Roman.; Transs. ad seq. pertinet ex Simonk. — *C. incurvus*; *C. falcatus* Bourg. hisp. exs. 2086 (ex Willk. Lge): *Hisp. rarius*.

2. *C. orthoceras*: Morav. mer., med. Galiz. or. Roman.

12. **Batrachium:** 1. *B. fluitans*: *Hisp.*, præsertim bor. et centr. (Willk. Lge). Hung. (: Hszl.). Roman.

2. *B. marinum*: *Ingria* (gub. Petropol.); *Ross. balt.* (: Klinge); *Suec. ultra Angerm.* non lectum; *Fenn. in sola mer.-occ.*

3. *B. circinatum*; deest etiam in *Suec. bor.* et in *Fenn. plur.* (indicatur in *sola mer.*); indicatur in *Hisp. or.* (*Catal. et Aragon.*). —? *B. submersum* Hiern (sub *Ranunc.*).

**B. fucoides* Freyn ap. Willk. Lge (sub *Ranunc.*). *R. circinatus* var. *fucifol.* Uechtr. in *Fritze* exs. — *Hisp. prov. gadit.* (*Cadiz*) pr. *Puerto de S. Maria*.

4. *B. trichophyllum*; in *Norv. bor.* et in *Suec. ultra Helsingiam* non indicatur; *Fenn. in sola mer.* et *mer.-or.* — *B. lutulentum*: *Helv.*; indicatur etiam *Westphal.* (: Wilms). — *B. paucistamineum*; in multis adest, immo *Croat.* (: Hire) et *Transs.* (*B. Baudoti* Schur ex Simonk.). *Comment.* 15. — *B. Rionii* in loco classico (pr. *Sion*: *R. sedunensis* Rion) nunc destructum est sed copiose crescit inter *Guercet* et *Charrat* (: Favre 1883) nec non (ex *Grenli*) pr. *Saillon* et *Siders* (omn. in *Vales.*); adest immo *Transs. ex Simonk.*, cui *B. circinatum* auct. *transs.* —? *B. trichophylloides* *Humnicki* (sub *Ranunc.*) *catal. pl. de Luxenil* (*Haute-Saône*). *S. 78.* (1876) *.

5. *B. Drouetii*: *Hibern.* (co. *Dublin*: Corry 1882). *Westph.* (*R. Rionii* Gcke ex *Wilms*). *Schwab.* (: *Cafisch*). *Austr. p. d.* (: *Dichtl*). *Ingria* (gub. *Petropol.*: *Schmalh.*). *Ross. mer.-or.* (pr. *Sarepta*: *Becker*). *Island.* satis superque obium ex *Feddersen* (*Rostrup*).

6. *B. confervoides*: *Hibern.* (co. *Dublin. sec.* Corry 1882). *Hercyn.* (: *Hampe*). *Ross.* (ex. gr. gub. *Petropol.*). *Ostrog* (lac. *Täkern* et *Vettern* ex *Kindb.*). *Fenn. exc. centr.* —? *B. micranthum* Brugg. (1874). *Ranunc. Rionii* *Sendtn.* (non *Lagg.*)

7. *B. diversifolium*; — *B. radians*: *Germ.* (*Rhen.*: *FSz*, *Siles.*: *Uechtr.* 1865). *Helv. occ.* (cant. *Vaud*). —? *B. heleophilum* *Arv.-Touv.* (sub *Ranunc.*).

**B. carinatum* Schur (phyt. mitth. 1876). *Austr.* (*Wien*: Schur). *Bohem.* (p. *Opočno*: *Freyn* in *Kern.* exs. 96.). *Comment.* 16. — *B. rigidum* Schur ex *Simonk.*! (*Transs.*).

8 *. *B. floribundum* (*Ranunc. florib.* *Bab.* 1855). *B. confusum* *Htn* et auct. *suec. plur.* antea, sed nunc a *Tallberg* (*Bot. Not.* 1873) et *Htn f.* (*Handb.* 1879) recognitum; *Scand. lectum Suec. med.*, *mer.-occ.*, *Fenn. occ.* et *or.* (*Oneg. Olon.*), *Norv. mer.* (etiam *Dan. ex Lge*).

9. *B. heterophyllum*; — *B. triphyllum* *Dmrt.*

**B. lusitanicum* *Freyn* in *Flora* 1880 (sep. *). *Lusit.* in *S. da Estrella* (*Fonseca* 1879).

10. *B. confusum*: *Hisp. mer., or.* *Carel.* (: *Norrlin*). *Morav.* (: *Oborny*). *Istr.* (: *Freyn*); *Germ.* præcipue ad *lit. mar.* (ceter ad *Cleve*, *Neisse*, *Breslau* indicatur); *Ross. balt.* (: *Klinge*); *Suec. hucusque* non nisi *Scan.* (*Malmö*) et *Smol.* (ad *Vester-vik*) lectum (cfr. 8 * *B. floribundum*).

11. *B. Baudotii*: *Hisp. mer.* et *or.* (*rarius*). *Ital. mer.-or.* (pr. *Taranto*: *Lacaita*). *Melita* (: *Duthie*); *Germ.* *rarius* lectum (pr. *Eisleben*, *Münster* etc.).

**B. leontinense* *Freyn* ap. Willk. Lge (sub *Ranunc.*). — *Hisp. mer. ins.* *Leontina* pr. *Cadiz* (: *Willkomm*: *R. aquat. truncatus* ej. exs.).

12. *B. tripartitum*; in *Hisp.* *rurum* (nisi prætervisum) et in *sola Baetica* (pr. *S. Roque*) lectum (: *Willk.*), sed var. *B. triphyllus* in *Aragon.* indicatur (ut etiam in *Transs.*: *Schur*, *Simonk.*).

13. *B. hololeucos*: *Bremia*, *Westph.* (: *Wilms*); *Hisp.* non nisi pr. *Lugos Galloec.* (: *Lange*) et *Navalmoral Extrem.* (*R. hederaceus* *Bourg. hisp. exs. a.* 1863 p. p.) lectum ex *Freyn*.

**B. dubium* Freyn ap. Willk. Lge (sub *Ranunc.*). — *Hisp. centr.* (m. Mariani).

14. *B. intermedium*; *Comment.* 17.

15. *B. Lenormandii*: *Hisp. bor.* (Gallic., Astur). *Lusit.* (Matozinhos: Sjögren 1855).

16. *B. hederaceum*; *Germ.* (ex Gcke), non nisi in occ. et bor.-occ. (usque ad Rostock); in *Suec.* (Scan., Halland., Bahus., Gotland.) paucis (singulis) locis lectum est.

**B. coenosum*; adest etiam *Hisp. sec.* Hiern et ex Freyn aream habet extensam. — *B. lutarium* Revel (sub *Ranunc.*). *Gall. occ.*

13. *Nigella*. 1. *N. damascena*: ins. *Jonic.* (Ithaca: Spreitzenh. 1877). *Istr. Roman.* *Epirus* (: Chodzes ex Heldr.). — *N. Bourgæi* adest solum in *Hisp. mer.* et or. (Willk. Lge).

2. *N. hispanica*; *Hisp.* (ex Willk. Lge) potius *mer.* (Gran., Bætic.) inhabitat quamquam etiam in *Catal.*, *Aragon.* et *Castil.* indicata sit. (*Gall. mer.* partim ad subspeciem, partim ad *N. divaricatam* pertineat).

**N. gallica* Jord. *N. hispanica* G. G. — *Gall. occ. mer.*

3. *N. arvensis*; typica *Hisp.* præcipue in regione *centr.* et or. indicatur. — *N. foeniculacea*: *Rumel. or.* (: Velenovsky). *Bulgar.* (: Bornmüller). — *N. divaricata* melius propriam speciem habenda est:

3. *a. N. divaricata* Beaupré in *DC. syst.* I. 329. *N. hispanica* var. *parviflora* Coss. not.; *Bourg. hisp. exs.* 2085. *Hisp. centr., or.* *Gall. mer.* *Sard.* *Sicil.* *Taur. Roman.* (Dobr.).

4. *N. segetalis*: hab. etiam *Moldav.*

5. *N. sativa*; *Transs.* non nisi culta adest (Simonk.), ut etiam (ex Heldr.) in *Græc.* nullibi spontanea sed in *Creta* et aliis insulis sæpe culta.

5. *a. N. fumariæiolia* Ky. (Boiss. or. I. 66). — *Arch. turc. ins.* *Karpathos* (: Pichler).

14. *Garidella*. 1. *G. Nigellastrum*; *Hisp. or.* præcipue inhabitat, in *mer.* rara (Willk. Lge).

15. *Isopyrum*. 1. *thalictroides*: *Hisp. or.* (*Catal. bor., r.*). *Genevæ* (pr. Chancy). *Roman.* *Rumel.* *Ross. mer.* (Cherson). *Poson.* (Bromberg etc.). *Boruss. occ.* (Koenigsb. etc.).

16. *Coptis*. 1. *C. trifolia*; probab. immerito (nescio quo casu) inter plantas islandicas recepta.

17. *Helleborus*. 1. *H. lividus*; *Mallorca* (300—400 metr. s. m.); species *Aitoniana* diversa dicta est ab illa auctor. recent., sed planta in loco natali multum variat (vid. Marès. *Vigin. catal. balear.* 10; cfr. etiam Vallot de pl. cors. in *bull. soc. bot.* 1887).

2. *H. foetidus*: *Bavar. Batav.* (pr. Bronkhorst: detect. ab Ankersmit 1878).

4. *H. cyclophyllus*; *Orph. exs.* 1052 (e monte *Helicon* *Bætiæ* ad alt. 3000—5000').

5. *H. odoratus*: *Roman.* *Bulgar.* (: Velenovsky 1885). *Rumel.* (ex. eod.). — *H. atrorubens* est species propria et *H. orientalis* (*H. officinal.* *Slsb.*) proxima ex *Grsb.*; adest etiam *Styr.*

**H. purpurascens*: *Roman.* — *H. Baumgartenii* (Kov.) Simonk. *H. Bocconi* Schur. (*Transs.*).

6. *H. viridis*; *Germ.* (exc. *mer.-occ.*) sæpius non nisi inquil.; *Dan.* solum efferata adest; deest in *Hisp. mer.* et *Lusit.* — *H. occidentalis*: *Helv. occ.*

**H. multifidus*; *Transs.* ad *H. Baumgartenii* (5* —) pertinet.

7. *H. niger*: *Roman.*; *Hung.* et *Transs.* dubie indigenus, sed in *Croat.* subalp. indubie spontaneus (: Borbás). *Helv.* in sola *ticin.* (mte *Generoso*, mte *Salvadore*) ex Gremli. — *H. altifolius* Kern. *Comment.* 18.

18. *Eranthis*. 1. *E. hiemalis*: Dan. ins. (probab. ex hortis efferata). Sty. (ex hb. Pittoni); Transs. vix indig. ex Simonk.

19. *Trollius*. 1. *T. europæus*: Dan. Fenn. Hisp. bor. et or. (etiam centr. parce indicatur). Roman.

20. *Caltha*. 1. *C. palustris*; adest etiam in ins. arcticis Waigatsch et Nov.-Semlia. — *C. vulgaris* S. N. K. — *C. intermedia* S. N. K. — *C. minor* Mill. — *C. dentata* Celak. — *C. subintegerrima* Reg. (Ucran.). — *C. ucranica* Raciborski (Ucr., Polon.). — *C. Guérangerii*, etiam in Hampshire Angl. observata (: Townsend 1883), subspeciei seq. (*C. cornuta*) valde proxima est. Comment. 19.

**C. cornuta* S. N. K. *C. recurvirostris* Schur (1876); Bosn. Croat. Hung. Transs. (: Borbás 1883). Polon. et Lithaun. ex Raciborski, Morav. et Austr.-Infer. ex Beck. — *C. latifolia* S. N. K. (1854). *C. grosseserrata* Pntck (reg. alp. m. Kom) in ej. adnot. (1874) descripta est. Transs. Bosn. Herceg. Monten.; — *C. longirostris* Beck. in act. soc. z.-b. vind. 1886. (Bosn. alp.).

**C. licta* S. N. K. (*C. alpina* Schur 1866). Sty. Bohem. Transs. Marmaros Hung. (: Janka). Austr.-Infer. (: Beck). — *C. alpestris* S. N. K. (Styr. Salisb. Austr.-Infer.). — *C. Freyniana* Heldr. (Beck). Thessal. Austr. p. d. — *C. ranunculoides* et *C. pumila* Schur. (Transs.). — *C. truncata* Beck. (Galie. or., Tatra).

2. *C. radicans*: Siles. r. (: Fiek 1878, Ansorge); planta norveg. (Finnm.) nunc diversa dicitur et potius cum varietate a Beeby detecta conveniens: (var.) *zetlandica* Beeby in scot. natural. 1887. 4 et 1888. 2 (sep. *). Ins. Shetland. — *Humilis*, *radicans*, *parviflora*.

21. *Aquilegia*. 1. *A. vulgaris*; adest in Fenn.mer., sed deest (nisi inquil. in Suec. (et Norv.) bor.; typica (ex Willk. lge) Hisp. non nisi in parte boreali occurrit, sed in centr. et or. adest var.: *hispanica* Willk. (*A. vulgaris* var. *viscosa* Coss. in Bourg. hisp. exs. 2357). — *A. nivea* (*A. ochroleuca* Schur) est planta culta ex Simonk. — *A. Hænkeana*; ad *A. nigric.* (1. a) nunc relata est. — *A. longispala* Zimmet. (1875): Hung. bor.-occ. (vall. Bozac), comit. Neutra (pr. ruinam arcis Tematin: Holuby). — *A. Ebneri* Zimmet. (1875): Carinth. (Arn. Bosn. (: Beck, Brandis ex Freyn); Sty. (detecta ab Ebner pr. Graz 1870)

**A. atrata* (1830). *A. nigricans* Rehb. (1832) non Bmg. (1816): Sty.; Germ. non nisi mer.-occ. (mont.); Transs. ad speciem seq. (1. a) pertinet. Comment. 20.

**A. arvensis* Filh. *A. speciosa* Timb.-Lagr. (non DC); Hisp. or. (Catal.).

1. a. *A. nigricans* Bmg. enum. II. 104. (1816). *A. Hænkeana* K. (1843). *A. glandulosa* Jka in linn. XXX (non Fisch.). *A. atrata* Schur (non K.). Sty. (Arn. Carinth. (: Jabornegg). Bosn. (: Brandis 1885 ex Freyn). Transs. (in rupibus calcar. vulgata ex Simonk.). Roman. — *A. orthoceras* Borb. — *A. subscaposa* Borb.

1. b. *A. transsilvanica* Schur (in verh. sieb. ver. 1853. 31). *A. sibirica* Schur l. c. II (non Lam.). *A. glandulosa* Jka in oe. bot. z. VIII.; Fuss (non Fisch.). *A. paraplesia* Schur (ex Simonk.); in Consp. citatur sub *A. vulgari*. *A. Kitaibelii* auct. transs. *A. Baumgartenii* Schur. *A. Fussii* Zimmet.? Carpat. or. in rupibus graniticis (ex Simonk.).

1. c. *A. nevadensis* Boiss. in ann. sc. nat. ser. VI. 2. 380. *A. vulgaris* var. *viscosa* Boiss. voy. p. p. Hisp. regn. gran., ubi in solo m. Sierra Nevada (inter 4000—6000') lecta est.

3. *A. glandulosa*; Transs. r. (m. Pareng: Barth 1883, sed etiam hic locus a Simonkai ad *A. transsilvanicam* citatur); cf. *A. nigric.* (1. a).

4. *A. alpina*: Alpes-Marit. (: Ardoino).

4. a. *A. aurea* Jka brevior. n. 2. — Maced. m. Orbelus (hod. Perimdagh): Janka.

5. *A. Ottonis*: m. Taygetus (: Psarides); m. Majella Aprutii (H. P. R. exs. itin. ital. a. 1877. 513); observ. Lacaita (litt. 1884) ad hanc plantam brutiam pertineat *A. viscosa* Ten. syll. 263.

6. *A. Kitaibelii*; *A. thalictrifolia* Panc. ex Grsb.! (Serb.). — *A. Magnolii*; *A. hirsutissima* Timb.-Lagr.: Alp.-Marit. (: Ardoino).

7. *A. pyrenaica*; cf. *A. Reuteri* (8 *).

7. *a.* *A. aragonensis* Willk. in Willk. Lge III. 966. — Pyren. Aragon, ubi a Souberville detecta 1877.

7. *b.* *A. discolor* Ler. Lev. in j. of bot. 1879 et deux excurs. (1880) 47. cum ic. (*). Hisp. bor. (Cantabr.) mts Picos de Europa (Ler. Lev. 1878).

**A. Reuteri* Boiss. diagn. — B. Alpes, Vaucluse, Alp.-Marit.; ex Grsb. ad *A. pyrenaicum* (7) pertinet et etiam in Alpib. Apuan. provenit.

8. *A. Bauhini*; *A. thalictrifolia* Jab. in hb. Bantz (non Sch.) ex Borbás.

22. **Aconitum.** 1. *A. lycoctonum*; *Hisp. præc. or. et centr.* (Bourg. exs. 2355), mer. Gran.; Roman.; Batav. (Limburg) ex Abeleven 1876; deest in regno Saxon. (ex Gecke). — *A. myoctonum* Rehb. (Germ. etc.).

**A. septentrionale*; in Suecia extra boreal. parum obvium (: Dalec., Vermel.); Fenn. bor. (extra Lapp.) vix adest, sed in or. (Carel.); est potius species majoris dignitatis: flores (nisi variatim) violacei ut in *A. moldavico* (2), dum in speciebus reliquis hujus stirpis (nisi variatim aliter) lutei vel ochroleuci.

**A. orientale* (*A. pyrenaicum* Grsb. it. hung. ex ipso): Roman. Taur. (: Aggjenko 1886). — *A. lasianthum* (Rehb.) Simonk. *A. lasiostomum* Schur. *A. ochroleucum* Bmg. et auct. transs. — *A. Baumgartenianum* Simk. (1886). *A. pyrenaicum* Schur enum. p. p.

**A. pyrenaicum*; loca oriental. (saltem Transs.) ad præc. (*A. orientale*) pertinent.

**A. Vulparia* Rehb.: Austr. Hung. Transs. — *A. altissimum* Schur. — *A. triste* Fisch.

2. *A. moldavicum* (*A. septentrionale* Bmg. et al.): Roman.; *A. Hosteanum* Schur et *A. transsilvanicum* Schur certe huc pertinent etiam ex Simonk. (in *Consp. sub præc. obs. duplicatim enumerantur*).

3. *A. Cammarum*; *A. variegatum* Schur. *A. rostratum* Schur. *A. nasutum* Grsb. iter (ex Simonk.). — *A. acutum* Schur.

**A. Stoerkianum*; *Helv.* (rarius); Germ. mer.-occ., ceter. rarum (Saxon., Thuring., Sudeti); in Lithuan., Volhyn. etc. indicatur (ex Trautv.) cultum vel efferatum.

4. *A. variegatum*; Germ. adest in mer.-occ., Thuring., Francon., Boruss., Siles.; Transs. ad *A. Cammarum* (3) pertinet ex Simonk.

5. *A. paniculatum*: Alp.-Marit. (Roccabigliera, col de Fenestre). Bavar. (Alpes). Banat. (: Borbás). Roman. — *A. toxicum* potius subspecies est. (Transs.).

**A. cernuum*: Transs. (*A. paniculatum* et *A. molle* auct. transs. ante Simonk. *A. strictum* Schur ex Simonk. *A. toxicum* Grsb. iter).

6. *A. Napellus* (*A. montanum* Heg. ex Brügg.): Roman. Ross. occ. (Grodno et Mohilew ex Lindem. 1860). Belg. (de Vries ex Abeleven); Gall. non solum in mont. obvium; Suec. inhab. (r.) Dalec. et etiam (r.) Suderm. et Scan. lectum est. — *A. tauricum*; *A. alpinum* Heg. (ex Brügg.). — *A. multifidum* K. ap. Rehb. *A. Baumgartenii* Schur (ex Simonk.).

**A. lusitanicum* Rouy (1884). *A. paniculatum* Machado (ex Rouy): Lusit. bor.

7. *A. Anthora*; adest etiam in Pyren. hispan. et indicatur in Astur. (: Palau) et Castil. (pr. Burgos: Palau). *Helv.* solum in jurana (Dôle, mt d'Or). Roman. Bosn. (m. Vlasic: Brandis 1882). — *A. nemorosum* Schur.

23. **Delphinium.** 1. *D. Staphisagria*: Sard. (ex Reverchon).

2. *D. Requienii*: Balear. (Mallorca, r.). — *D. pictum*: Mallorca (ex Marès).

3. *D. elatum*: Siles. (jam Clusius plantam e Sudetis habuit et memorat 1583). Roman. — *D. intermedium*; *D. speciosum* Jka (ex Simonk.!).

4. *D. emarginatum*; *D. pentagynum* est etiam Fontanesii (atl. I. 427) ex Willk.; Boiss. voy. p. p. — *D. nevadense* restit.

4. *a.* *D. nevadense* Kze chlor. austr.-hisp. 215; *D. pentagynum* Boiss. voy. p. p.; Bourg. hisp. exs. a. 1851. 1005.

Sierra Nevada inter 3000 et 5000' (rarius).

5. *D. fissum*: Herceg. mer. (m. Mala Velez: Vandas 1886).

6. *D. hybridum*: Galic. or. (r.). Dobrudscha.

7. *D. halteratum*: Thessal. m. Ossa (Heldr. 1882). — *D. longipes* (*D. peregrinum* var. *longipes* Boiss. voy.: *Hisp. mer.* (Cádiz, Gibraltar, Almería); *Messen.* (: Sartori), ins. Poros et Cythera (: Heldr. et Spreitzenh.).

8. *D. cardiopetalum*: *Hisp. bor., centr., or.* (in mer. non indicatur). — *D. gracile*; *Hisp. bor.-occ. et centr. castell.* (rarius).

9. *D. peregrinum* (*D. junceum* DC.); Bourg. hisp. exs. 1754. 2311. 2356 (ex Willk. Lge): — ? *D. Hirschfeldianum* Heldr. Holzm. in Boiss. or. suppl. 19. (1888). *Atticæ ins. Aegina*.

11. *D. Ajacis*; extra aream geogr. e culturâ, subsponte occurrit (ut etiam spec. seq.).

12. *D. orientale*; *D. ornatum* Bouché (1843): Bessarab. in hortis Komrad. copiose, etiam spontaneum factum, et in cultis Elisabethgrad. gub. Cherson (: Lindem.); etiam Dan. ex hortis efferatum. Roman. Bulgar.; ex Hung. usque ad Vindobonam nunc migravit.

**D. hispanicum* Willk. in Willk. Lge III. 969. *D. orientale* Losc. Pard. — *Hisp. plur.* sed non nisi hinc inde. — *D. grandiflorum* bot. matr. (S. de Guadarr.: Willk.).

13. *D. brevicornu* (ex Grsb. = *D. orientale*): Cephalon. (Dr. Schrader ex Aschn).

14. *D. tomentosum*; *D. holopetalum* Grsb. ex ipso.

17. *D. Consolidæ*; Norv. ad Christianiam et Suec. bor. in Medelp. et Jemtia (r.) lectum est. *Hisp.* non nisi in centr. (castell.) et or. indicatur; in Græc. bor. adest var. *Cadetianum* Heldr. hb. norm. 815 (Pindus Tymphæus: Heldr. 1885).

17. *a. D. paniculatum* Host austr. II. 65. (*D. Cons. var. micranth.* Boiss.). — Dalm. Serb. Bulgar. Maced. Thrac. Taur. (ex Boiss.). Planta robusta, ramosior, florib. (quam in præc. minorib.) saturate violaceis; ex Bornmüller, qui eam in Bulgar. legit, culturâ constans.

**D. pubescens*: Lusit. *Hisp. centr.*, or.

17. *b. D. Loscosii* Costa ampl. 8 (ex Willk.). — *Hisp. or.*, bor.-or.

24. *Pæonia*. 1. *P. anomala*: Ross. bor.-or. (gub. Perm: Krilow. 1874).

3. *P. corallina*; *Hisp.* (ex Willk. Lge) pertinet ad *P. coriaceam* (5) et partim ad *P. Russi* (3*) corsicam, cujus typus speciem propriam constituit:

3. *a. P. Cambessedesii* Willk. Lge III. 976 (obs. sub n. 5086). *P. corallina* var. *Camb. enum.* (1827). Balear. (in rupestrib. et glareosis herbis). — *P. corsica* Sieb. (= var. *angustifolia* ex Willk.).

**P. Russi*; *P. corallina pubescens* Mor. (Sard.).

4. *P. Broteri*; typica (*P. officinalis* Brot., Quer. *P. lusitanica* Juss.) in Lusit. multa adest; *Hisp. præcip. occ.* et centr. inhabitat, sed etiam in bor. et mer. observata. — *P. lobata* (Webb) Boiss. voy. vix nisi in montibus *Hisp. mer.* lecta est, in Lusit. r.

5. *P. coriacea*; *P. corallina* var. *Russi* Webb iter (non *P. Russi* Biv.); habitat in montibus regni granatensis, inter 5000 et 6500', præcipue in Sierra Nevada lecta (exs Bourg. 1005, a. Campo gran. 1.).

6. *P. officinalis*; planta spontanea e Dobrudscha sequenti adnumer. ex Kanitz; ita etiam pl. helvet. (mte Generoso cant. Ticino) sec. Gremli. — *P. pubens* Rehb. (non Sims) ad * *P. peregrinam* pertinet. Comment. 21.

**P. microcarpa* (*P. peregrina* var. *leiocarpa* Coss.): Lusit. (pr. Portalegre: Machado). *Hisp. præcip. centr.* et or. Gall. mer. (Vigan dep. Gard: Anthouard 1877; dep. Herault ex Rouy 1881); species sit majoris dignitatis, a proxime præced. aliena.

7. *P. decora*; *P. romanica* Brandza (1881): Roman.

8. *P. tenuifolia*: Roman. (Dobr.). Rumel. or. (ex Velenovsky 1886).

25. *Cimicifuga*. 1. *C. foetida*; adest etiam in Austr. Infer. (Niederoestr.) ex H Braun, Halacsy et Oborny; Boruss. occ. (Poson.).

Obs. *C. racemosa* Bart. (*Actæa racemosa* L.), herba boreali-americana, inquil. dicitur in alneto ad Guteborn pr. Ruhland Lusat. (Siles.).

26. *Actæa*. 1. *A. spicata*: Dan. Fenn. *Hisp. or.* (Catal.), centr. (Castil., rarior). Roman. Bulgar. Herceg. mer. (: Vandas).

Obs. *Zanthorhiza apiifolia* L'her., planta virginica, olim pr. Greifswald (Germ. bor.) culta, ibi nunc inquilina est (ut etiam Berolini et alibi).

II. BERBERIDEÆ.

1. **Berberis.** 1. *B. vulgaris*; — cretica Willem. est speciei var. *longepetiolata* ex Caruel.

2. *B. ætnensis*; indicatur in Catalon., sed nec Willkomm nec Colmeiro eam ibi viderunt.

3. *B. hispanica*; reg. mont. et alp. regni grantens. inter 4500 et 7000' inhabitat.

4. *B. cretica*; Græc. etiam in m. Pelion (Thessal.) et aliis montibus altis (copiose) adest.

2. **Epimedium.** 1. *E. alpinum*: Carinth. in dumetis ad Gailitz-Arnoldstein (Jabornegg 1886); Styr. mont. (plur. loc. a Maly indicatum); in montib. Voges. (Hohneck) a beat. Mougeot plantatum est.

3. **Leontice.** 3. *L. altaica* (var. *odessana*): Dobr. (pr. Grecii et Ciernu). Ross. mer. gub. Cherson ("in campis circa Odessa usque ad Nikolajew vulgatisima": Lindemann).

III. NYMPHÆACEÆ.

1. **Nymphæa.** 1. *N. thermalis* (*N. Lotus* W. K. non L.); ad Grosswardein etiam in parte inferiori rivuli Peczebach (ubi *N. alba* deest). Comment. 22.

2. *N. alba* L. p. p. (Pr. 1821); deest etiam in Suec. bor. plur. (usque in Medelpad, ubi a Dusén lecta; vid. Bot. Not. 1881) et med. p. p.; in Fennia tota adest; var. *rosea* detecta est 1856 in lacu parvo Fagertårn silvæ Tiveden Neric. a stud. Kjellmark (ex Lönnroth in Bot. Not. eod. a.); Siles. hæc var. lecta est 1873 ab Unverricht (quod in conventu extraord. botan. siles. 1874 a nunc beat. Goepfert commemoratum est). — *N. exumbonata* Rupr. (Ingria). — *N. Asopii* Orph. sched. (Maced.). — *N. Dioscoridis* Heldr. sched. (Aetol.) ex Boiss. — Species, quas cl. Hentze in Germ. ex hac distinctxit, præeunte b. Caspary, ita disponentur: a (sphaerocarpæ): *N. parviflora*, *N. splendens*, - b (depressa): *N. venusta*, *N. rotundifolia*; - *N. erythrocarpa*, - c (urceolata): *N. urceolata*.

**N. biradiata*; Hung. (Hzi.). Sec. b. Caspary (vid. Bot. Not. 1879) hæc subspecies est var. seq. (*N. candidæ*).

3. *N. candida* Pr. rostlinár 10. tab. 2. (1821). *N. alba* L. p. p. *N. (alba) biradiata* Fr. hb. norm. XI. 30: Suec. (etiam Lapp. plur. loc.). Fenn. (præc. centr. Sælan) exc. Lapp. et bor. plur.; Boruss. Ingria. Ross. balt. Siles. Morav.; indicatur etiam Helv. (cant. St. Gallen et Zürich). *N. intermedia* Weiker in Rchb. saxon. (ex Casp. 1879). — *N. Kosteletzki* Palliardi (ind. h. hamburg. 1852); etiam Lappon. lecta a b. Caspary.

**N. semiaperta* (1848): Siles. Morav. (: Oborny 1878). Dobr. (in lacub. deltæ). Sec. b. Caspary (1879) = *N. biradiata* (1833), quæ var. *N. candidæ* habenda.

2. **Nuphar.** 1. *N. luteum*; *N. grandiflorum* Læst. (1858); deest in Lapp. fenn. plur.; rr. variat flore rubro, quæ var. lecta est in fossa quadam munimentaria (wallgrab) oppidi Danzig Boruss. or. (Klinggr. 1881).

**N. sericeum*; Comment. 23.

2. *N. intermedium*: Fenn. etiam centr. et or. Germ. bor. Ingria.; ex Ostrogothia (Suec. mer.) vidit Caspary, qui hanc speciem etiam e loco classico (Dorpat Livoniæ) habuit et varios ejus gradus hybriditatis diligenter observavit (etiam in Lapponia!) et sagaciter disposuit (vid. Bot. Not. 1879). *N. graveolens*, *N. lobatum* et *N. fluviatile* Læst. (in Bot. Not. 1858) ex Caspary. — ? *N. grandifolium* Læst. (Lappon.). — *N. latifolium* Læst. (Suec. bor., med.); * boreale: Lappon.).

3. *N. pumilum*: Angl. (r.: Arthr Bennett). Morav. (pr. Czernin et Datschitz detect. ab Oborny 1880). Ross. centr. (gub. Moscov.: Clerc); Helv. rarum est (*N. intermedium* Rehstein). Germ. non nisi in bor. (Preuss., Pomern., etc.) adest; in Suec. med. et mer. paucis locis lectum est; deest in Fenn. bor. plur. et mer. multa.

**N. Spennerianum*; *N. vogesiacum* Hussen.

IV. PAPAVERACEÆ.

1. **Papaver.** 1. *P. setigerum*; Hisp. in sola Catal. indicatur (Willk. Lge); in Menorca (Balear.) ex Rodriguez.

2. *P. rupifragum*; lectum est in m. Serrania de Ronda pr. oppid. Graza-
lema (: Boiss. Reut.), in Cerro de S. Cristobal (: Clemente ex Colm.: *P. phoeniceum*
Clem.); melius ad calcem generis citetur; perenne.

3. *P. Rhoeas*; Succ. indicat. (in cultis) a Scan. ad Gestric. et Vestm. et in
Gotl. — *P. Roubiei*; *P. obtusifolium* minus Mor.: ins. parvæ sardoe Caprera et
Maddalena (: Gennaro).

**P. commutatum*: Hung. comit. Pesth. (: Borbás).

4. *P. pinnatifidum*: Alp.-Marit. (Mentone et Nizza abunde), a Sarato
detectum ex Ardoino. Var (Toulon: Huet ex Rouy).

4. a. *P. rumelicum* Velen. in act. ac. sc. bohém. 1887. 444. Rumel. or.
(Slivno: Skorpil ex Velenovsky).

5. *P. dubium*; — *P. Lamottii*: Hampsh. Angl. (: Townsend). Helv. (ex Gremli).

**P. Lecoqui*: Helv. — **P. collinum*: Helv.

6. *P. obtusifolium*; hoc (et 4 *P. pinnatifidum*) a specie præced. parum
differt.

8. *P. Argemone*; Norv. mer. (r.) indicatur.

9. *P. apulum*; Heldr. hb. norm. 816 (Achaia: Heldr. 1885). Istr. mer.

10. *P. hybridum*: Helv. mer. (Valais). Roman. Istr.

11. *P. alpinum*: Roman. — *P. aurantiacum*; Styr. etiam in montib. Sulz-
bach. adest.

**P. nudicaule*: ins. arct. Nov.-Sém. (albi-et flaviflora) et Beeren-Eiland; ins. Færøer;
Lapp. Tornens. (r.).

**P. pyrenaicum* W. (*P. suaveolens* Lap.): Pyren. S. Nevada (reg. alp.).

**P. rhaticum* Leresche. *P. pyrenaicum* auct. helv. (non W.): Helv. mer. (Engadin) etc.

2. **Meconopsis.** 1. *M. cambrica*; Gall. mer. etiam in dep. Aveyron
lecta (: Bras) et in or. (Côte-d'Or) pr. Lusignan relecta (abbé Fournier 1881); cl.
Morière eam in Normand. loco unico legit 1837.

3. **Glaucium.** 1. *G. flavum*: Germ. solum in centr. (prov. Sachs., Thü-
ringen, Kassel), rarius cum saburra navali introd.; Batav. (v. Eeden ex Abeleven).
Dan. non nisi in Jutland. bor.-occ. lectum. Istr. Dobrudscha; Transs. cum dubio
citetur ex Simonkai.

2. *G. phoeniceum*: Helv. (rr.). Morav. mer. et med. (sporad.). Roman. Bulgar.

3. *G. Serpieri* Heldr. in Reg. gartenfl. 1874.

Attic. ad Laurion nuper repertum circa argentifodinas, ubi scorie olim accumu-
latæ, quibus ablatis planta hæc apparuit.

4. **Roemeria.** 1. *R. hybrida*; Orph. exs. 1092 (Athen.).

5. **Chelidonium.** 1. *C. majus*; exc. etiam Suec. bor. plur. nec non Fenn.
bor. et centr.

6. **Hypocoum.** 1. *H. grandiflorum* (Bourg. hisp. exs. 2107); Sard. (ex
Biondi). Rhodus (: Hedenborg); Hisp. bor. deest.

**H. pseudograndiflorum* Petrovic; Magn. fl. select. exs. 1072 et scrin. (V) 99. (1886).
— Serb.

2. *H. procumbens*; — *H. litorale* est "forma petalis integris" ex Grsb.

**H. glaucescens*: Hisp. mer. (Malaga etc.); huc probab. pertinet "*H. patens* W.", post
Webbium non lectum.

4. *H. pendulum*; Germ. (ex Geke) cum seminibus extraneis introductum
est: pr. Greussen Thuring. copiosum, Ellerstadt Phalzæ.

V. FUMARIACEÆ.

1. **Corydalis.** 2. *C. Marshalliana*: Roman. Ross. med. gub. Kursk

(ubi freq. sec. Lindem. 1865) et Tambow; mer. etiam gub. Cherson (in silvis sat copiose: Lindemann).

3. *C. cava*: Roman. Bulgar. Istr.; Hisp. mer. non indicata nisi raro in Valenc. et Murc.; Ostrog. (forse adv.).

**C. pseudocava* (e pratis alpinis m. Kom) descripta est in Pantocsek. adnot. 88; a *C. cava* præcipue "tubere solido, caule humili" distincta.

4. *C. solida*: Dan. ins. Mœn.; Suec. mer. et med. adest sed probab. inquil.; Fenn. non nisi in mer.; Pyren. etiam hispan. (reg. mont. et subalp. r.); Roman. — *C. depauperata* certe (teste Simonk.) huc pertinet. — *C. intermedia* Merat. — *C. Stummeri* Pntek. (pr. Serajevo Bosniæ: Pantocsek). — *C. australis* Hsm. (ex Grsb.).

4. *a. C. tenella* Led. in bull. acad. petersb. II. 313; Velen. in act. soc. sc. bohém. 1887. 445. — Rumel. or. pr. Slivno (:Skorpil ex Velenovsky).

5. *C. laxa* (sub præc. a Sw. l. c. subsumta): Suec. or. sc. Scan. et a Calmaria Smoland. ad Upland. nec non in ins. balt. L. Carlslöf.

5. *a. C. slivenensis* Velenov. l. c. — Rumel. or. pr. Slivno (: Skorpil, Apr. 1886). Bulgar. plur. loc. (ab eodem lecta ex Vandas 1888).

6. *. *C. decipiens* (a Simonkai ad *C. solidam* relata): Roman. (alp. Petracraului).

7. *C. fabacea*; in Suec. bor. rara et Lappon. solum in Laxfjellet Lapp. Umens. lecta; Norv. usque ad Lyngen.; Fenn. in sola mer.-occ.

8. *C. lntea*; Hisp. aliquot locis indicatur; Gall. mult. locis probab. non nisi inquilina (e. gr. dep. Côte-d'Or).

10. *C. capnoides*; etiam Galiz. lecta.

12. *C. claviculata*; Germ. solum in bor.-occ. habitat, scil. a Slesvicia usque ad Westphalam; adest in tota Hisp. bor. nec non in Catal. (rarius).

2. **Sarcocapnos.** 1. *S. speciosa*; Bourg. hisp. exs. a. 1852. 1539: Hisp. mer.-or. (Valenc.). Parum diversa a *S. crassifolia* typica alger. s. Fumar. crassifolia Dsf. (cf. Willk. Lge III. 887).

2. *S. bætica*; *Aplectrocapnos bætica* Boiss. diagn. or. V. 79. Species rariss.: Bætic. (Serrania de Ronda, Yunquera). Murc. (Sierra de Alcaraz).

**S. integrifolia* Boiss. diagn. or. (sub *Aplectrocapno*). *Aplectr. bætica* Coss. not.; Bourg. hisp. exs. a. 1851. 1017. Sierra de Segura et La Sagra pr. Huescar.

3. **Fumaria.** 1. *F. corymbosa* (1792). *F. africana* Lam. enc. (1786). Species in Hisp. rara et in sola prov. malacit. (pr. Malaga etc.) lecta.

3. *F. rupestris*; est species mauritanica, excludenda; var. *laxa* B. R. ad *F. arundana* (10*) pertinet.

4. *F. agraria* (Bourg. hisp. exs. 1756); adest etiam in Hisp. centr. et or.

5. *F. major*; a præced. parum diversa est nec propria species sec. Lange, qui utramque in Hisp. observavit. — *F. spectabilis* Bisch. 1849. (Dalm.).

6. *F. amarysia*; Attica: Heldr. a. 1855, 1884.

8. *F. capreolata*: Helv. mer., mer.-occ. Istr.

**F. speciosa* Hisp. præcip. bætica (Sevilla, Gibraltar etc.).

10. *F. gaditana*; speciei area geogr. accuratius (sec. Willk. Lge) determinetur: ad Fretum Gaditanum plurib. loc. (Gracalema, m. Gibraltar., Algeciras etc.).

**F. arundana* et præced. *F. malacitana* potius militent in vicinitate *F. macrosepala* (7), cui hæc imprimis valde proxima est ex (Willk.) Lge!

11. *F. Boræi*: Norv. mer.-occ. (*F. capreolata* * media Fr. mant. III; vid. Murbeck in Bot. Not. 1885).

**F. Bastardi*: Gall. or. (Côte-d'Or), bor.-occ. (Normand.).

13. *F. muralis*; Batav. (: Bondam ex Abeleven (1876). Dan. et Suec. interdum introd.; adest etiam Hibern. (pr. Belfast: Corry 1882). — *F. apiculata* non in Hisp. mer. sed in centr. (Escorial etc.) lecta est. Comment. 24.

14. *F. sepium*; non nisi pr. Algeciras Bæticæ lecta videtur (Boiss. Reut.); num a *F. murali* (13) satis diversa?

16. *F. Wirtgeni*: Istr. mer. (Freyn 1875). Bosn. (: Brandis ex Freyn); Helv. solum pr. Basil. adest ex Gremli; Transs. ad *F. Schleicheri* (24) pertinet ex Simonk.

17. *F. prehensilis*; *F. micrantha* Grsb. *F. media* Jka (ex Hzl.). *F. calycina* Borb. *F. deflexa* Schur (ex Simonk.!): Germ. copios. in Thuring., nec deest in occ. et mer.; Austr.-Infer. (pr. Gloggnitz, Wiener-Neustadt: Heimerl, Kempf 1879, 1880). Morav. Galiz.or. Roman. Ross.mer.-occ.

18. *F. densiflora*; etiam *Hisp. or. plurib. locis lecta est*. Mallorca (r.: Marès). Rumel. (ex Velenovsky).

19. *T. anatolica*: Roman. (pr. Virciorova: Simkow.). Taur.

20. *F. Reuteri*; species in sola Castil. hucusque obvia (ad Madrid etc. lecta); *F. Thureti*, *Hisp. mer. rara incola*, quam cum hac junxi, melius seorsim militet:

20. *a. F. Thureti* Boiss. *F. Reuteri* consp., excl. *Hisp. centr.*, ad præced. pertinente.

22. *F. Vaillantii*; Suec. usque in Upland. et Vestmaniam procedit; Fenn. in sola ins. Aland. lecta. — *F. Chavini*; Helv. non nisi mer.-occ. — *F. Laggeri*: Bavar. (Augsb.). Phalz. (Zweibr.).

**F. Schrammii*; *Hisp. non nisi pr. Madrid lecta est*: Bourg. hisp. exs. 2108.

23. *F. parviflora*: *Hisp. tota exc.*, ut videtur, maxime bor. (Bourg. exs. 1014. 2109). Bavar. Bosn. (: Brandis 1886 ex Freyn); Transs. ad 17 pertinet. — *F. cæspitosa* (Arag.) est speciei status vernalis ex Hsskt; sec. Grsb. (!) ad præced. pertinet. — *F. Reuteri* Lge pug. (non Boiss.) ex ipso auct. (opp. Granada: Lange).

24. *F. Schleicheri*: Banat. (: Borbás). Roman. Bulgar. Ross.mer.-occ.; in Germ.bor. deest ex Gecke. — *F. carinata* ad *F. Vaillantii* (22) pertinet ex eodem. — *F. supina* Jka 1877. (Transs. centr.). *F. Wirtgeni* Schur ex Smk.

26. *a. F. grandiflora* Rouy (sub *Platycapno*) exc. bot. esp. in rev. sc. nat. 1883 (sep. 50 *). *Hisp. mer. (pr. Velez-Rubio: Rouy).*

27. *F. saxicola*; species valde rara et non nisi in regni gran. monte Sagra Sierra, pr. Huescar, in reg. alp. ad alt. 2000—2300 metr. (ubi a Willkommio detecta 1845) observata.

Obs. Genus *Platycapnos* Bernh., *F. spicatum* (26), *F. grandifloram* (26. a) et *F. saxicolam* (27) amplectens, a *Fumaria* sat distinctum est et potius restituendum cum speciebus: 1. *P. spicatus* Bernh. — 2. *P. grandiflorus* Rouy. — 3. *P. saxicola* Willk. (in exs. 1845 et bot. z. 1848).

VI. CRUCIFERÆ.

1. **Chorispora.** 1. *C. tenella*: Roman.; in gub. Kursk Ross. med. ubique vulgatissima (ex Lindem.), et adest etiam in or. (N.-Nowg., Simbirsk); pr. Aix Galloprov. introducta dicitur.

2. **Cakile.** 1. *C. maritima*: Fenn. non nisi in mer. et mer.-occ. adest.

2. *C. monosperma*; habitat pr. La Coruña Galloec., ubi a Lange detecta 1852; planta danica (et batava) ulterius observanda ex ipso Lange (vid. haandb. ed. IV. 614).

6. **Raphanistrum.** 1. *a. R. microcarpum*; *Raphanus microcarpus* (Lge pug. ut var.) Willk. Lge III. 750. - *Hisp. centr. (ager matrit.)*, bor.-occ. (Galloe.: Lge). Lusit. (Coimbra: Henriquez).

2. *R. maritimum*: Normand. Cantabr. (Santander: Lge). Bætica (Porto Real: Willk.). Mallorca (Camb.).

3. *R. Landra*: *Hisp. (Castil., Catal., Balear.)*. Gall. e litore medit. secus "Canal du Midi" usque ad Tolosam (ubi nunc in pratis molestum ob radicem validam) penetravit: Timb.-Lagr. ap. Magnier (fl. sel. exs. 7); in mer.-occ. (dep. Gironde) non rarum ex Clavaud.; Transs. ad *R. innocuum* (1) pertinet ex Simonk.

8. *Rapistrum*. 1. *R. costatum*: Ross, mer.-occ. (: Schmalh.); Transs. ad seq. (*R. perenne*) pertinet ex Simonk.
2. *R. perenne*: Roman. Bulgar. Ross, mer. (gub. Cherson); in Hisp. non provenit (cf. Willk. Lge III. 752), sed in Engadin Bundiæ circa Tharasp nunc inquilina (: Killias 1882).
3. *R. orientale*; Heldr. hb. norm. 818. Observ. cl. Lacaita (litt. 1883) *R. orientale* auct. ital. (et specim. ex Ital, mer.) videtur nil nisi var. *R. rugosi* et a *R. orientali* vero omnino alienum.
5. *R. Linneæanum*; etiam Hisp, mer.-or. lectum est et in bor. et or. rr. (in Balear. satis) indicatur. *Myagrum hispanicum* L. huc spectare ex eo confirmatur quod planta Broter., sub hoc nomine in Fl. Lusit. descripta, hujus speciei varietas est (Willk.).
9. *Didesmus*. 2. *D. tenuifolius*: Attica in campis ad Piræum (: Heldreich). Arch. turc. ins. Karpathos (: Pichler) ex Boiss. — *D. ægyptius* ad Phalerum a Lacaita (litt. 1884) parce lectus est.
10. *Crambe*. 1. *C. maritima*: Lusit. Gallocc. (pr. Ferrol) sec. Planera. Fenn, mer. (Nyland). Ross, balt. (: Klinge). Dobrud. — *C. pontica* Stev. (Taur).
2. *C. pinnatifida*; sec. Rupr. non species Bieberstein. sed *C. pinnatifida* Stev. (1836) ideoque *C. Steveniana* Rupr. (cauc. 136) nominanda.
3. *C. tataria* Sebeök diss. de Tataria hungar. (1779) et in Jacq. misc. II. (1781): Roman.; Ross, med. intrat per gub. Kursk (ubi in cretaceis leg. Lindemann); Galiz. solummodo ex Herbich indicata. — *C. aspera*; *C. Biebersteinii* Jka (1884). *C. tataria* auct. transs. p. p.
4. *C. hispanica*; hæc species in patria sua Hispania rara est: Valenc. (Boiss.), Bætic. (Sevilla: Boutelou); in aliis provinc., ubi olim indicata, recenter non lecta est; in ins. Lissa Dalm. a Pichler lecta 1872.
5. *C. glabrata*; planta rariss.; cl. Rouy in loco, hucusque unico (Jativa), solum quatuor individua vidit; specimina a Bourgeau distributa (1852) enata sunt apud Durieu e seminibus speciminum in loco classico lectorum (vid. Rouy in bull. soc. bot. 1882); ex Willk. videtur nil nisi varietas speciei præced.
6. *C. reniformis*; *C. filiformis* Boiss.; Bourg. hisp. exs. 1052. Comment. 25.
11. *Erucaria*. 1. *E. aleppica*: planta in Hisp. rara: Bætica (: Webb). Valenc. (Onil: Webb, Alicante: Hegelm.).
Obs. *E. tenuifolia* DC. est *Sinapis hispanica* L., sed in Hisp. vix lecta.
13. *Matthiola*. 1. *M. incana*; Lusit. in rupibus et muris reg. litor. rarius; Hisp. non nisi in bor. et or. (etiam Balear.) indicata.
3. *M. sinuata*: Lusit. (r.). — *M. oyensis* Menier-Viaud. (ins. Oya, ile d'Yeu, cum specie, cujus var. *glabra*, *albiflora* ex Lloyd).
6. *M. fragrans*: Novo-Pskow gub. Charkow in montosis cretaceis (: Lindemann 1860).
7. *M. varia*; Hisp, mer. hucusque a solo Boissier, in m. Sierra de Mijar prov. malacitanæ, observata; in bor. mtbs pr. Avila (prov. Santander) a Leresche et Levier nuper lecta est.
- **M. valesiaca*: Helv. extra Vales. (Simplon, Nicolaithal etc.) non lecta; Sabaud. etiam a St. Lager et sociis lecta (1875) in rupibus gypsaceis ad Pont-de-Dramans; pr. Modane jam ab Allionio indicata; Friul. (Kern. exs. 86). Carinth. (pr. Pontafel: Pichler).
9. *M. tristis*; Heldr. hb. norm. 819. *M. coronopifolia* Heldr. hb. norm. 61;
10. *M. bicornis*: Corinth. (ex Lacaita in litt. 1884).
13. *M. parviflora*: Lusit, mer. r. (: Daveau).
14. *Notoceras*. 1. *N. hispanicum* (Diceratium prostratum Lag.): Murc. Valenc. — *N. canariense* Br. (Gran. or.: cabo de Gata, Almería).
15. *Cheiranthus*. 1. *C. Cheiri*: Helv, occ.; Hisp. indicatur in rupibus et

muris præcique provinciarum bor. et or. (cum Balear.), sed de *C. fruticulosus* (1*) silent auctores recentiores; Taur. mer. (pr. Aluschta) a Steven indicatus, sed incertum videtur an ibi vere spontaneus sit, nam in temperaturibus plurimis quasi sponte occurrit in muris nec non in rupibus prope domos, qualis adest e. gr. Belg.

2. *C. corinthius*: in monte Lastos ins. Karpathos (: Pichler ex Boiss.).

4. *C. linifolius*; Hisp. bor. plurib. locis lectus est, in centr. montes Carpetan. (S. de Gredos etc.) inhabitat, in mer. præcipue in regno granat. (ubi in montib. plurimis adest) obvius, Bourg. hisp. exs. 1020. 2593.

16. *Barbarea*. 1. *B. stricta*: Fenn. Dan. Gall. bor., occ. Morav. Galiz.; indicatur etiam Helv. (r.), Sty., Carinth.

2. *B. præcox*; Hisp. plur. hinc inde adsit (indicatur præcip. Catal., Castil. et Bætic.). Lusit. (reg. mont. rarius: de Mariz in bolet. soc. broter. 1884). Colitur et interdum subspont. evadit.

3. *B. vulgaris*: Cors. (EPetit 1883); deest in Fenn. bor. plurima; — *B. stricta* Bor.: Gall. or. (Côte-d'Or).

**B. Kayseri*; a specie (*B. vulgari*) non distinguenda ex Simonk.

5. *B. arcuata*; Norv. (mer.) probabiliter adest.

7. *B. intermedia* (*B. præcox* K.): Batav. (: Ankersm. 1875). Lusit. (: de Mariz l. c.). Galloec. (: Texid.). Arag. (: Willk.). Cors. (EPetit. 1883). Helv. (m. St. Bernhard).

8. *B. sicula*: — *B. prostrata*, a Durieu in Astur. detecta (Gay in ann. sc. nat. 1836 et in Dur. astur. exs. 401), adest etiam Cantabr. (Picos de Europa: Ler. Lev.), Galloec. et Arag.

8. *a. conferta* Boiss. Heldr. (in Boiss. or. suppl. 36). Achaïæ m. Kyllene (: Helderich).

17. *Turritis*. 1. *T. glabra*; deest etiam in Lapp. plur. et Fenn. bor.-or.

18. *Arabis*. 1*. *A. crepidipoda*; descr. in oe. bot. z. et in Pantosek. adnot. 90 (*).

3. *A. brassicæformis* (*A. pauciflora* Geke): Hisp. or. (Catal. et ex Asso et al. etiam Arag.). Tyrol. centr. (: Huter). Helv. occ. Bavar. bor.-occ. Morav.; Transs. (Erys. alpin. Bmg.) ad speciem seq. (*A. Turrita*) pertinet ex Simonk.

5. *A. pendula*: Ross. centr. (gub. Kursk: Lindem.).

6. *A. Gerardi*: Roman.; indicatur etiam in alpinis Pedem. (pr. Valdieri: Lacaita); Fenn. mer.-occ. (Åland.), or. (Carel. Oneg.).

7. *A. hirsuta*: Fenn. mer.-occ. (Aboa, Åland.). Dan.; deest Lapp. exc. Pitens. Gall. Roman. Bulgar. et Rumel. or. (: Velenov.). Istr.; Lusit. ex de Mariz l. c. (: *Turritis hirsuta* Brot.), sed miror quod in Hisp. ignota sit; cf. *A. lusitan.* (S.).

**A. sagittata*: Lusit. bor. (Bussaco: Loureiro). Helv. Bulgar. Bosn. (: Brandis ex Freyn).

**A. Retziana*; Suec. hab. in ins. balt. (Gotl., Åland) et rr. in Scania. — *A. constricta* est species restituenda et *A. ochroleucæ* (9) approximanda. — *A. Hornungiana* Schur ex Simonk. *A. ciliata* Schur. (Transs.).

8. *A. lusitanica*; adest pr. Coimbra (Mach.) et in Extremad. (Welw.).

10. *A. longisiliqua*: Ital. mer. (Otranto, Gallipoli: HGroves).

11. *A. collina*: Sicil. (ipse!).

13. *A. alpestris*: Alp.-Marit. (reg. mont. rarius: Ardoino). Roman. — *A. cenisia*: Colombier, Engadin.

14. *A. serpyllifolia*: Hisp. r. (Catal., Arag., Madrid). Alp.-Marit. (col de Tenda: Ardoino). Carinth. ad Bleiberg (?).

**A. nivalis*; — *A. crepidipoda* minime huc pertinet et jam sub *A. pseudoturrite* (1) enumerata est (a beato auct. cum *Turritinis* recensita).

16. *A. muralis*: Lusit. etiam in Serra do Gerez et Serra Luiz (: de Mariz in bolet. soc. broter. 1884). Hisp. bor., centr., or. (cum Balear.). ins. Jonic. (Corfu: Spreitzenhofer 1877). Belg. inter Vervier et Ensival inquil. (: Crepin); Transs. dubia est ex Simonk. — *A. sicula* Huet ex Grsb. (!).

**A. rosea*; *A. collina* Ten. (non Guss.) sec. Grsb.

17. *A. stricta*: *Hisp. bor.*, *bor.-or.*; in centr. pr. *Encinillas lecta* (Lge). *Helv.* (ubi in m. Salève *Genev. indicata*) dubie ex *Gremli*; *Transs. ad A. petrogenam* (30 *) pertinet.

17. *a. A. Costæ* Willk. in Willk. *Lge* III. 820. *A. stricta* Costa ampl. *Pyren. centr. ad basin cacuminis Maladetta*. Species quoad affinitatem dubia ex ipso ej. auct.

18. *A. saxatilis*; *Hisp. non nisi in Gran. (Sagra Sierra, Sierra Nevada) Aragon. et Catal. (r.) lecta est*; adest etiam in m. *Balkan Thrac. (Jka)*.

**A. stenocarpa*; ab *A. saxatili* sat aliena, sed quoad sectionem dubia; montibus *Carpetanis (Sierra de Guadarrama, ubi a Reutero detecta)* priva dicta est, sed nunc etiam *Lusit. (Serra de Rebordãos: Moller)* indicatur a de Mariz.

19. *A. auriculata*; *Bavar. Hisp. tota (Bourg. exs. 1038, 1039). Dobr.*

20. *A. parvula*; adest etiam in *Hisp. bor. (Navarra, ubi a Dufoureo detecta)*. — *A. latifolia* Duf.

21. *A. verna*: *Balear. (Mallorca)*.

23. *A. albidā*; — *A. Tenorii* est *A. apennina* Tsh in *syll. ratisb. 1828*; vid. "*Arabis Apennina* Tausch von Dr. Vinc. v. Borbás" in *Botan. Centralbl. (sep. *)*.

24. *A. alpina*: *Scot. occ. ins. Shye (: Arth. Bennett 1887)*; *Færøa (ins. Kunö: Trevelyan ex Rostrup)*. — *A. nana (Bmg.) Simonk.: Trans. r.* — *A. anachoretica Porta exs. a. 1883. (Val di Ledro Tyrol. mer.)*.

**A. Lerchenfeldiana* et *A. obtusifolia* sunt plantæ dubiæ ex *Simonk.*

24. *a. A. cantabrica* Ler. Lev. in *journal. of bot. 1879 et deux excurs. 55. (1880) **.

Hisp. bor. (prov. Santander) in lapidosis alpinis montium Picos de Europa, alt. 6500—7000' (detecta Jul. 1878).

27. *A. coerulea*: *Alp.-Marit. (col de Jallorgues ex Ardoino). Transs. sec. Bmg., sed in ejus herbario deest teste Simonkai.*

28. *A. pumila*; interdum cum aquis ex *Alpibus* devehitur; sic *Bavar. lecta ad München, Lechbruck etc.*

29 *. *A. ovirensis*; sec. *Pacher: in jugo mont. Karawanken, Baba et præcip. Obir. A. dacica Heuff. ex Grsb. (Carpat. mer.)*.

30. *A. arenosa*: *Roman. Bulgar. Ross. mer.-occ.; Lappon. deest; typica adest etiam in Suec. mer. sc. Smoland. pr. Kråksmåla et Scan. pr. Helsingborg (ex beat. Lönnroth 1880)*.

**A. petrogena* Kern. in *oe. bot. z. 1863. A. arenosa Sadl. A. stricta Bmg. A. heterophylla Schur 1853 et A. segetalis Schur 1866 (ex Simonk.). Hung. centr. Transs. ~ A. multijuga Borb. ex ipso (1878)*.

30. *a. A. carpetana* Willk. in Willk. *Lge* IPI. 822.

Hisp. centr. (mts Carpetani pr. Escorial: Alea 1843). — ? Sisymb. arenosum Loeff. iter hisp.

31. *A. neglecta*: *Styr. (m. Veitsch ex Wettstein 1884); Hung. bor. (1500—2000 metr.). Galic. (Carpat. centr.). — A. glareosa Schur enum. ex Borb. et Simonk. (in Consp. sub 30 A. aren. allata). — A. floribunda et A. transsilvanica Schur ex Simonk. (!)*.

**A. croatica* S. N. K. (1854). *A. neglecta* Neillr. (1869) non Schult. — *Croat. (etiam Gorpie: Vuk.) 1000—1500 metr. s. m.*

32. *A. petraea*: *Carinth. (r.). Morav. (r.). Ross. bor. (Ural, Waigatsch: Kj. Lu.); Suec. non nisi in taniis Angerm. adest; Fenn. non bor. sed or. (Carel. oneg.); Transs. dubitat Simonk.; loca germ. (Francon. Thur. Bavar.) sec. Geke citanda: Hercyn. mer.-occ. (in montib. gypsaceis inter Stollberg et Osterode). Bavar. (Jura Francon.). Comment. 26.*

× *A. intermedia* Brügg. = *hirsuta* + *alpestris*. (Helv.); vid. Brügg. in *hirsb. graub. 1882*.

× *A. rhætica* Brügg. l. c. = *bellidifolia* + *pumila*. (Helv.).

× *A. sabauda* Brügg. l. c. (*Turritis ciliata* Reyn. 1788 ex Brügg.) = *alpestris* + *bellidifolia*. (Sabaud. Helv.).

× *A. subnivalis* Brügg. l. c. = *coerulea* + *pumila*. (Helv.).

19. *Parrya*. 1. *P. macrocarpa*. — *P. nudicaulis* Reg. (1870). *Matthiola nudicaulis* Trautv. (1871).

2. *P. arctica*; ThFr. exs. spitzb. 22; locus in Spitzb. (ex Nathorst) unicus: Treurenbergbay, ubi a Parry detecta 1827.

20. *Nasturtium*. 1. *N. officinale*; deest etiam in Suec.med. (et Vestrog., Ostrog., Öland.) ut etiam in Transs. (pl. transsylv. ad Cardam. amar. pertinet ex Simonk.), sed adest in Græc. (ad Corinth. ex Lacaita) et Ross.mer. rarius (ex gr. pr. Odessa: Lindem.).

2. *N. austriacum*: Bulgar. Rumel.or. Roman. Ross.med. (Moscov.: Rupr. ex Clerc; Minsk et Mohilew: Lindem.).

3. *N. amphibium*; deest in Norv. tota et Suec.bor.; abest etiam ab Hisp. multa, præcip. mer., sed adest in Lusit.bor. —? *N. Borbasii* Menyh. 1879 (sub *Roripa*).

**N. terrestre*: Hung. (pr. Tokaj freq.). Bulgar. — *N. anceps* Rehb. (non D.C.). *N. armoracioides* auct. (non Tsh).

4. *N. anceps*: Normand. (: Moriére). Lothar. (: Godr.). Ross.; Germ. etiam ad Bremen, Hamburg, Rostock; Poson., Siles. nec non in bor.-occ.; Suec.mer. extra Scania parum lectum. — *N. Menyharthianum* Borb. (sub *Roripa*).

5. *N. armoracioides*: Roman. (versus Orsova: Winkl.); Germ. etiam ad Hamburg et pr. Marienwerder Boruss. — *Brachylobus barbareoides* et *B. anceps* Schur. *Roripa anceps* Fuss. R. Haynaldiana Borb. (ex Simonk.).

6. *N. silvestre*; Hisp. mult., præcip.mer.; deest; adest in Lusit. bor. —? *N. riparium* Greml. (Helv.).

**N. barbareoides*: Morav. Roman. Ross.med.

**N. Reichenbachii* Knaf (1879). *N. uliginosum* Simk. (sub *Roripa*) ex ipso. *Roripa astylis* Borb. (ex Simonk.). Bohem. Hung. Transs. Ross.mer. — *R. danubialis* Borb. ex Simonk.

6. a. *N. aureum* Boiss. (et Heldr.) diagn. VIII. 17. — Ross.mer. in pratis pr. Elisabethgrad, r. (: Lindemann 1881).

7. *N. brachycarpum*: Ross.mer. (gub. Cherson loc. humidiusc. ad flum. Dniepr: Lindem.). — *N. Kernerii* Menyh. (ex Jka 1883).

**N. proliferum*: Transs. (rarius). Dobr. (in delta etc.). Serb. Bulgar. (: Velenovsky 1885). Rumel.or. (: Skorpil). Thrac. (pr. Philippopol: Jka); sec. Grsb. (!) est var. *N. silvestris* et a *N. brachycarpo* (quod *N. pyrenaico* proxim.) alienum.

10. *N. thracicum*: Rumel.or. pr. Slivno (ex Velenovsky 1886). Bulgar.

11. *N. pyrenaicum*: Hisp.bor. et centr.; Bulgar.; Germ. non nisi in valle fluv. Elbe inter Dessau et Magdeburg, ceterum in Breisgau Badia et in Vogesis.

**N. hispanicum*; sec. Grsb. locum teneat inter *N. anceps* et *N. palustre medium*.

**N. capillipes* Borb. (sub *Roripa*) = *austriacum* + *silvestre*. (Transs.).

**N. erythrocaule* Borb. (sub *Roripa*) = *amphibium* + *palustre*.

**N. hungaricum* Borb. (sub *Roripa*) = *austriacum* + *amphibium*.

**N. neogradense* Borb. (sub *Roripa*) = *amphibium* + *silvestre*. (Hung.).

**N. stenophyllum* Borb. (sub *Roripa*) = *silvestre* + *pyrenaicum*. (Transs.).

**N. subglobosum* Borb. (sub *Roripa*) = *silvestre* + *amphibium*. (Hung.).

**N. Turczaninowii* Czern. = *austriacum* + *Reichenbachii*. (Ucran. Transs.: *Brachylobus hybridus* Schur e descr.).

22. *Cardamine*. 1. *C. latifolia*: Cantabr. (Picos de Europa: Ler. Lev.).

2. *C. acris*: Bulgar. (m. Vitos: Velenov. 1885). Thessal. (m. Pelion: Heldr. 1882). Euboea (m. Dirphys).

3. *C. pratensis*; in Hisp.mer. tota deesse videtur, jam in Catal. et Arag. rara. — *C. Hayneana* (Welw.): Austr. p. d. Siles. Transs. — *C. deciduifolia* Royer (Côte-d'Or), unico loco lecta, probabiliter est tantum status e natura loci natalis ortus. Comment. 27.

**C. dentata*; Europæ mer.-or. incola (etiam Hung., Transs.).

**C. Matthioli*: Helv.mer., mer.-occ. —? *C. calabrica* Arcang. (1877). Calabr. (ad altit. circa 1000 metr.).

**C. rivularis*; potius species majoris dignitatis: Carpat.mer. reg. alp. et silv. Comment. 28. — *C. amethystea* Panc. (Bulgar.) ex Vandas 1868.

5. *C. amara*; Hisp.bor., centr. et or. adest; Lapp., Norv.bor. et Fenn.bor.

deest. —? *C. uliginosa* Tin. hb. (Messina). *C. dubia* Nicotr. prodr. fl. messan. 95. (1883). — **æquiloba* CHtn. (Finnerödja Vestrog. : Elgenstierna 1863).

**C. Opicii*; Carpat. Galic.

6. *C. uliginosa*; — *C. amethystina* Pancic (in sched.) ex Boiss. (m. Rilo Maced.).

7. *C. chelidonia*; *Dentaria chelidonia* Ball in Kan. reliq. Griseb. 54 (ob cotyledones convolutas).

8. *C. impatiens*; Hisp. bor. adest passim, centr. rr., or. in Pyren. (etiam in Balear. indicata); in mer. deest.

10. *C. silvatica*: Aland. (Sælan 1877); adest (var. *ambigua* Htn) in Suec. bor., sed deest in Lappon. — *C. duraniensis* Revel (ex ipso). — *C. drymeja* et *C. pusilla* Schur ex Simonk.

11. *C. hirsuta*; deest etiam in Suec. et Norv. bor., sed adest in Fenn. mer.-occ. extima (Aboa, Aland.). *C. multicaulis* est var. e loco pingui.

12. *C. parviflora*: Norv. mer.-occ. (ex Norman 1880). Suec. non nisi mer. (Ostrog., Vestrog.) et med. (prov. plur.) adest; Hisp. non nisi prope Escorial (Madr.) observata (: Lge); Galiz. deesse videtur ut etiam Transs., sed Germ. (bor.) adest etiam aliis locis: Wittenberg, Magdeburg, Mecklenburg, Berlin etc.

13. *C. resedifolia*: Hisp. adest præcipue in Pyren. sed aliter non nisi in Cantabr. (r.) et in Sierra Nev.; Transs. ad subspec. *C. gelidam* pertinet.

**C. gelida*; inter præced. et sequent. media; in alpib. transsilv. hinc inde copiosa (: Simonk.); = *C. resedifolia* et *C. alpina* auct. transs.

14. *C. alpina*: Catal. et Arag. (Pyren.); Transs. ad *C. gelidam* (13 *) pertinet.

16. *C. trifolia*: Carinth. Morav. Galiz. (rarius); Transs. dubitat Simonkai.

19. *C. Plumieri*; — *C. Bocconi* Viv. *C. Plumieri* auct. mult.

20. *C. carnosa*; — *C. croatica*: Bosn.; *C. glauca* Panc. e Mokragesa Serb. (ex Jka).

21. *C. græca*: ins. Corcyra (Corfù): Lacaita.

22. *C. maritima*; *C. thalictroides* K., Vis. (ex Grsb.).

23. *C. longirostris*: Vallach. (Vircirova: Borb.). Serb. (ex Grsb.). Com-
ment. 29.

23. *Ricotia*. 1. *R. cretica*; *Cardamine cretica* Grsb. (Kanitz reliq. Gri-
seb. 53 *).

24. *Dentaria*. 1. *D. polyphylla*: Bosn. (: Brandis 1885).

2. *D. pinnata*; Germ. (mer.-occ.) solum paucis locis Badiæ (Jura) adest.

3. *D. bulbifera*: Dan. Fenn. (non plur.) in sola mer.-occ. Roman. Bulgar. Rumel. or. (: Skorpil). Euboeæ m. Dirphys (Heldr., Orph. exs. 1124).

4. *D. quinquefolia*: Ross. centr. (gub. Kursk: Lindem.); Byzant. (silva Belgrad.: Duparq. ex Boiss.).

5. *D. enneaphyllos*: Bavar. etiam mer. (Alpes etc.). Lusat. (Lausitz.). Roman.; Transs. ex Simonk. ad seq. (*D. glandulosam*) pertinet.

6. *D. glandulosa*: hab. etiam Roman.

7. *D. digitata* (1790). *D. pentaphyllos* Sep. (1772): Helv. Bavar. (præcip. Alpes). Badia (Jura) et Würtemb. Styr. (pr. Cilli: Zechenter ex Maly). Carinth. — *D. intermedia*; Kern. exs. 84.

**D. Clusiana* Rehb. — Helv. pr. lac. Leman.

× *D. digenea* Greml. = *digitata* + *pinnata*. (Helv.).

× *D. Killiasii* Brügg. = *digitata* + *polyphylla*. (Helv.).

25. *Hesperis*. 1. *H. tristis*: Roman.

2. *H. secundiflora* (ex ipso auct. Boiss. = **H. glutinosa* Vis.): Apulia si, ut videtur, *Cheiranthus villosus* Sieb. hb. apul. huc pertinet.

3. *H. Cupaniana*; a seq. (*H. laciniata*) vix diversa.

4. *H. laciniata*; *Hisp.* non nisi in regno grānat. (paucis loc.) et in Castil. (r.) lecta.

Obs. *H. dauriensis* Amo, pr. Granada in valle flum. Darro lecta, species parum cognita est et dubia videtur.

5. *H. matronalis*; potius sit var. meridionalior *H. inodora* et sæpe culta: *H. glabra* Boiss.; *Ross.med. gub. Tambow* etc. in fruticetis aridis sponte. — *H. nivea*; *H. albiflora* Schur (ex Simonk.). — *H. caucasica* Rupr. (Taur.); alia var. (ex Led.) est *Deilosma suaveolens* Andr. & *Ross.mer.*

**H. runcinata*: Morav. Galiz.bor.-or. Roman. Bosn. (: Brandis 1885 ex Freyn).

**H. alpina* Schur (1853). *H. pendula* Ten. in Rehb. exc. (non DC.). — *H. Kladnii* et *H. glabra* Schur 1853. *H. moniliformis* Schur (1853). *H. oblongifolia* et *H. parviflora* Schur enum. (omn. ex Simonk.).

6. *H. Steveniana*; sec. Grsb. non differt ab *H. runcinata* (5 *), quæ speciem majoris dignitatis sistit.

26. *Malcolmia*. 1. *M. cymbalaria*; *M. serbica* Panc. (ex Grsb.).

2. *M. flexuosa*: Banat. (ex Borbàs).

2. *a.* *M. arenaria* DC. syst. II. 442. *M. ramosa* Coss. in Marès. Vigin. catal. balear. 23 (sec. add. 326). — Ins. Ibiza (: Marès).

3. *M. maritima*: *Hisp.* vix indig., sed quasi sponte occurit ex hortis au-fuga (Willk.), ut etiam alibi (Gall. etc.) interdum inquilina est (e cultura) in arenosis et muris; Cors. (pr. Bastia: EPetit).

5. *M. chia*; ins. Cephal. etiam a Schrader et Spreitzenhofer lecta, in Corcyra (Corfu) a Spreitzenh. 1877; adest etiam Dalm. et Bosn. ex Boiss.

7. *M. Orsiniana*; adest etiam in mte Morrone (Abruz.), ubi a Levier detecta 1880.

8. *M. africana*; in *Hisp.bor.* deest; exs. Bourg. hisp. 1065. 1568, c. 2087, a (ex Willk.).

9. *M. lacera*; adest etiam (sed raro) in *Hisp.bor.-occ.* — *M. erosa* DC. *Hesperis erosa* Lag. (Bætic. Algarb.).

9. *a.* *M. castellana* Rouy exc. bot. esp. in rev. sc. nat. 1883. (sep. 55 *). Castil. (Casa de Campo Matriti: Rouy 1881).

10. *M. patula*; Lusit. plur. locis adest; *Hisp.* non nisi in Castil. (utr.) addito loco in Leon a Willkomm detecto; var. *tenella* Lge in Bætica (pr. La Carolina) lecta est.

11. *M. litorea*; — *M. Broussonetii*: Bætic. præcip. Gadit. (etiam Malac. etc.); Lusit. (r.) a Welwitsch et Davau lecta est.

11. *a.* *M. crenulata* Boiss. *Hesperis crenulata* DC. — Rumel. (Grsb.).

12. *M. parviflora*; Lusit. plurib. loc. lecta est; adest etiam Ligur.; exs. Bill. 3008 ad *Sisymb. nanum* DC. pertinet sec. Loret. (an etiam Gall.mer. tota?).

13. *M. confusa*; Heldr. hb. norm. 820 (ex Attica). *M. parviflora* Heldr. hb. norm. 550; indicatur etiam Ital.mer. (: Porta. Rigo) et Gall.mer. (*Sisymb. nanum* DC. p. p.).

27. *Alliaria*. 1. *A. officinalis*; Fenn. adest in ins. Aland. (et casu Aboæ, Nyland. etc.).

28. *Erysimum*. 2! *E. crepidifolium*: Roman. Bulgar. Rumel.or. (: Skor-pil); etiam Westphal. (pr. Hattingen) ex Wilms (1879); Saxon. (pr. Koenigstein); Francon.; Würtemb.; Badia (in Hegau).

**E. Wittmanni* (err. Witm—); *E. odoratum* Herbieh (1834); etiam Hung.bor. Potius speciem salutanda. *E. Baumgartenianum* ad *E. Wahlenbergii* (12 *) pertinet ex Simonk.!

8. *E. ochroleucum*; *Hisp.* hab. in reg. subalp. et alp. Catal., Arag., Castil., Cantabr. et Astur.: Bourg. hisp. exs. 2598 (deest in mer.). Lusit. (Serra da Estrella) nuper lectum est (de Mariz in bolet. soc. broter. 1884). Transs. (*E. transsilvanicum* Schur) ad *E. Wahlenbergii* (12 *) pertinet.

**E. helveticum*: Helv. non nisi in mer. adest. — *E. rheticum*; Transs. ad *E. canescens* (21) pertinet ex Simonk.

9. *E. lanceolatum*: Roman.; in Bohem. deest. — *E. Bocconi* Sieb. hb. ex Apulia est var. simplicior, macrior, qualis adest etiam e Sicil. (Guss. *b.*) et Roma (: Wahlb.). Comment. 30.

**E. pumilum*: Carinth. Alp.-Marit. (reg. alp. hinc inde: Ardoino); Transs. ad *E. Wahlenbergii* (12*) pertinet. Comment. 31.

11. *E. australe*: Ital.mer. (Otranto, Patimisco: HGroves), med. (m. Argentar. Hetr mer.: Forsyth Major 1883). Alp.-Marit. (non rarum: Ardoino). Lusit. S. da Estrella etc.: *E. virgatum* Brot. (ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1884); in Hisp. valde variat: *E. lanceolatum* Colm. catal. *E. murale* et *E. helveticum* Cut. madr. *E. pallens* Boiss. olim. Amo. *E. rheticum* Kze. — *E. canescens* Coss. ap. Bourg. (mont. Gran. reg. alp.). — *E. curvifolium* Jord.

**E. ruscinonense* Jord. diagn. (Pyren. or.) — *E. cinerascens* Jord.

11. *a.* *E. myriophyllum* Lge in vidensk. meddel. 1881. 102 (sep. 10 *). Hisp. gran. (Sierra Tejada: H. P. R. exs. itin. a. 1879. 463).

12. *E. odoratum*: Würtemb., Francon., Hannov. (pr. Neustadt); Roman. Ross. centr. (Moscov.: Clerc), mer. (Cherson: Lindem.); Belg. exclud. nam ibi non nisi subspontaneum (rr.) lectum ex Crepin. Comment. 32.

**E. carniolicum*: Roman. (pr. Sinaia); Transs. ad speciem (*E. odoratum* pertinet.

**E. Wahlenbergii* (Aschn. Engl.) Simonk. 1886. *E. odoratum* Bmg. *E. Baumgartenianum*, *E. Czetsianum* et *E. transsilvanicum* Schur. — *E. pumilum* Schur. (omn. ex Simonk.!). Transs. alp.

13. *E. montosicolum*; *E. hieracifolium* Vill. Forse pertinet ad sectionem præced. (*).

15. *E. Marschallianum*: Ross. centr. (gub. Kursk, Moscov.). — *E. elatum* et *E. Fussianum* Schur pertinent ad *E. odoratum* (12) ex Simonk.

18. *E. asperulum*: Aetoliæ m. Korax (: Heldreich ex Boiss.).

19. *E. hieracifolium*; etiam Fenn. plur. et Roman. adest.

**E. strictum*: Ross.med. (Kursk, Tambow) etc.; Helv. nunc deest ex Gremli. — *E. exaltatum*: Bucov. (Blocki 1885); huc ex Blocki probabiliter pertinet *E. crepidifolium* Rehmann e Zaleszczyki ad Dniestr.

21. *E. canescens* (1797). *E. diffusum* Ehrh. Beitr. VII. (1792). 157: Roman. Bulgar. (: Bornmüller). — *E. Andrzejowskianum*: Ross. centr. et mer. (gub. Kursk, Charkow, Cherson: Lindem.), mer.-or. (Sarepta: Becker); potius subspecies est. — *E. pallens* Herbach (1853). Galiz.

22. *E. græcum*; hab. etiam in m. Pindo Græc.bor. (Heldr. 1885).

23. *E. virgatum*; adest etiam in Ross. balt. (: Heugel).

24. *E. incanum*; etiam in Catal. et Arag. adest hæc species (*E. repandum* et *E. virgatum* auct. hisp.), in monte Sierra de la Nieve (regni gran.) a. 1845 a Willkomm detecta et in ej. plantis exs. a Kunze eod. anno edita.

24. *a.* *E. Duriei* Boiss. diagn. ser. II. 1. 26. Astur. ad rupes pr. Puente Gallego (Dur. pl. astur. exs. 407). Species parum nota.

25. *E. aureum*; huc *E. Marschallianum* Blocki ex ipso. (Galiz.or.)

27. *E. cheiranthoides*; deest in ultima Lappon, et Norv. (a Nordl.); in Hisp. plur. indicatum, sed a recentioribus in sola or., et quidem rare, lectum est. — *E. micranthum* Buek (ex Lindem.).

28. *E. repandum*: Roman. Bulgar. (ex Vandas); in Germ.bor. plurima deest. — ? *E. Comperianum* Czern. ap. Turcz. 1854. (Taur.).

28. *a.* *E. cretaceum* Rupr. *E. tanaicense* Andrz. (sched.). Ross.mer.-occ.

30. *E. cuspidatum*: Bulgar. (: Velenovsky 1885). Rumel. or. (: Skorpil).

29. *Syrenia*. 1. *S. angustifolia*: Roman. Ross. centr. (gub. Kursk p. copiose).

2: *S. sessiliflora*; adest etiam in Ross. centr. (gub. Kursk).

30. *Conringia*. 1. *C. orientalis*: Batav. (Ankersm. 1872). Hisp.or.,mer., centr. (Bourg. hisp. exs. 2106). Roman. Istr.mer. (Freyn 1877).

2. *C. austriaca*: Bavar. (Passau, München, Lechfeld). Roman. Bulgar. Ross. mer.-occ. (Bessarab.) et mer. (Cherson) ex Lindemann. Synon. *E. austriac.* Bmg. et auct. transs. ad præced. pertinet ex Simonkai (!).

3. *C. planisiliqua*; planta transsilv. ad *C. orientalem* pertinet sec. Simonk.

30. *a. Tetracme* Bge ind. sem. hort. dorpat. 1836.

1. *T. quadricornis* Bge l. c. *Erysim. quadricorne* Steph. ap. W. *Notoceras quadricornis* DC.

Ross. mer.-or. ad lac. Bogdo in collibus gypsaceis (Becker 1880).

31. *Sisymbrium*. 1. *S. tanacetifolium*; Castil., Astur. et Cantabr. indicatum a Palau et al.; Alp.-Marit. (reg. alp. plur. locis: Ardoino).

2. *S. strictissimum*: Bavar. Roman. Bulgar. Ross. centr. et mer. (gub. Kursk et Cherson: Lindem.), mer.-or. (Sarepta: Becker).

3. *S. junceum*; etiam Roman. adest.

4. *S. Sophia*; deest in Lappon. (et Fenn. bor. plur.) nisi rarius adsit ad domos novacularum Lappon. mer. infimæ (Whlnb.).

5. *S. altissimum* (*S. hungaricum* Lumn. ex Hzl.): Roman. Galiz. Siles. (rr. et probab. introd.). Bavar. Helv. solum in vales. (r.). Est planta proprie orientalis, versus occidentem migrata; sic nunc pr. Hamburgam, in Batav., Dan. (pr. Havniam) et Gall. (Clermont: Lmtt, Creuzot: Guiney) introducta (ut nuperr. etiam Fenniae ad Lojo et Wasa: Lindberg, Sælan) legitur.

6. *S. orientale*: Carinth. (r.). Galiz. mer.-or. Roman. Bulgar. Rumel. or.; introd. Belg. (pr. Hérent: Bagnet 1882), Batav. (pr. Deventer: van der Veen 1880) et Lusit. bor. (pr. Bragança ex de Mariz). — *S. pseudoirio* Schur ex Simonk.! (Transs.).

7. *S. erysimoides*: Mallorca Balear. (*S. obtusangulum* Barc. apunt.).

8. *S. austriacum*; Germ. bor. deest, sed in centr. (Thuring.) adest plur. locis; Helv. solum in mer.-occ. Hisp. adest solum in Pyren. et r. in centr. (m. Carpetani: Bourg. hisp. exs. 2361). Lusit. bor. (r.). — *S. taraxacifolium*; Hisp. vix intrat nisi per Pyren. — *S. acutangulum* (est potius subspecies quam varietas): Hisp. or. et bor. (Bourg. hisp. exs. 2595). Lusit. bor. (r.). — *S. chrysanthum* Jord. Sinapis pyrenaica L. (Pyren. centr.). — *S. wolgensæ* MB. (Sarepta etc. Ross. mer.-or.).

**S. Villarsii*; — *S. glaucescens* Jord. (B.-Alpes).

Obs. *S. erysimifolium* Pourr. speciem propriam sistit sec. Timb.-Lagr., quæ vero parum cognita est.

10. *S. granatense*; est species quodammodo dubia (*S. arundani* var.?), in solis montib. Sierra de las Nieves et Serrania de Ronda a Bourgeau lecta.

11. *S. laxiflorum* nonnisi in montibus granatensib., ubi reg. montanæ et alpinæ incola, lectum est (Bourg. hisp. exs. 1060, a).

12. *S. Loeselii*: Roman. Bulgar.; Batav. pr. Deventer (introd.) detectum a van der Veen 1880; Dan. (r.) introd. ut etiam Suec. (med.).

13. *S. Irio*; Germ. (ex Geke) in m. Stintelgebirge (Hassie), ceterum introd. (in cultis) ad Suhl (Thuring.), Berolini etc.

14. *S. Assoanum*; ex obs. cl. Willkomm (ill. hisp. I. 106—8) hæc species *S. strictissimo* (2) approximanda est; "planta spectabilis, plus quam metri altitudinem attingens, sapore acerrimo urente" (Willk. l. c., ubi historia plena speciei); hab. in Arag. centr. et mer., in glareosis, ruderatis et cultis hinc inde abundans.

15. *S. hispanicum* ipsiss. in Hisp. rarum et recentius a solo Bourgeau, duobus locis (Murciæ et Gran.), lectum videtur. — *S. contortum* vero, quod etiam sec. Willk. et Colm. propria species est, in Hisp. bor. et in utrâque Castil. (multis locis) crescit, indicato etiam in Valenc. et Bætica.

16. *S. fugax* solum et raro in Bætica (Sierra de Maria: Lag.) et Murcia (Bourg. hisp. exs. 1064) occurrit.

17. *S. officinale*; deest etiam in Fenn.bor. (cum Lapp.) et med. plur. (adest in Ostrob.).

18. *S. corniculatum*; non nisi in agro matritensi (Casa de Campo, Aranjuez etc.) lectum est.

19. *S. polyceratium*; Hisp.bor. non indicatur, Helv. sporadice (Bern, Basel, Genève).

20. *S. runcinatum* (*S. Lagasce* Asso etiam *S. hirsutum* Lag. comprehendit): Lusit. (Bragança, serra de Ficolho) ex de Mariz.

21. *S. supinum*: Ross.balt. (Osilia, Livon., Esthon., r.); Alsat. (Lauterthal).

22. *S. crassifolium* (Bourg. hisp. exs. 2101): Hisp.or., bor.-or.

23. *S. asperum* (Bourg. hisp. exs. 2364): Gall.or. (Côte-d'Or, Aube: Briand, Le Grand). Hisp.mer. Lusit. (de Mariz in bolet. broter. 1884).

24. *S. Boissieri* in solo regno granat., inter 2500 et 6000' alt., observatum erat, nuper vero etiam in Arag. (: Loscos) et Valenc. (: Costa) indicatur.

27. *S. pinnatifidum*; *Braya pinnatifida* K.; Bourg. hisp. exs. 1036, 2090, 2602 (ex Willk., sed probab. partim ad subspec. *S. Boryi* refer.).

**S. Boryi*: Lusit. etiam in Serra do Marão adest (: Henriquez).

28. *S. toxophyllum*; nomen ob vires intoxicantes plantæ, quæ comesa apud animalia, præcipue equos, tetanum provocat.

29. *a. S. nanum* DC. syst. II 486. *Cheiranthus lacerus* Gou. ill. non L. (ex Loret). Gall.mer. dep. Aude (pr. Leucate: Le Grand 1863), dep. Herault (in sabulosis marit. plur. loc. ex Loret).

30. *S. suecicum*: Dan. ins. Möen (Lge haandb. ed. IV 633); Lappon. deest.

31. *S. Thalianum*; deest in Lapp. plur., Norv.bor. (a Nordl.) et partim in Fenn.bor.

32. *Braya*. 1. *B. alpina* (*Sisymb. alpinum* Fourn.); in Lapp. Lulens. (ad Sähk) semel lecta (: Ångström 1837).

2. *B. glabella*; Th.Fr. exs. spitzb. 24 (*B. purpurascens*).

33. *Eutrema*. 1. *E. Edwardsii*; Th.Fr. exs. spitzb. 23; *Sisymb. Edwardsii* Trautv. in act. hort. petrop. 1871: "genus *Eutrema* a *Sisymbrio* non nisi habitu distinctum est".

34. *Euzomodendron*. 1. *E. Bourgaeum* hab. in prov. Almer., ubi hæc planta memorabilis et rara ad montem Sierra de Gador a Bourgeau detecta est (: *E. fruticosum* Bourg. exs.).

35. *Brassica*. 4. *B. Robertiana*; *B. balearica* DC. syst. e descr. et specim. authent. in hb. Cand. (e rupe rubra pr. Nizza, ubi etiam hodie adest): Burnat. Barbey notes balear. (1881)*. *B. balearica* Bad. in Moret. bot. ital. = *B. oleracea* Bad. antea in diar. phys. chem. (in Consp. sub 12 *B. olerac.* enumerata). — *B. insularis* Ard. alp.-marit. ex Burn. Barb. not. balear: Gall.mer. a Telona usque ad ins. Galinaria pr. Albengo; adest etiam Catal. in rupibus ad Cadaqués et Cabo Norteo.

6. *B. balearica*; hab. in ins. Mallorca, ubi in cacuminibus omnibus jugi montium N.O., inter 600 et 1400 metr. s. m., in rupibus calcareis abruptis obvia; sic in Puig major de Torrella, mts Teix etc. (Camb., Bourg., Barcelò, Willk.). Comment. 33.

8. *B. insularis*; *B. corsica* Jord.

11. *B. incana*; orientem versus usque in Japygiam (T. d'Otranto: HGroves) procedit.

12. *B. oleracea*: Cimbr. (Jutland) litor. Comment. 34. — *B. balearica*; vid. *B. Robertiana* (4).

13. *B. Napus* (*B. campestris* DC.); Suec. adest in Scan. (m. Kullen et) lit. bor.-or. indeque ad Upland. (in tæniis), nec non in ins. balt. Gotland. et Oeland.

14. *B. campestris*: in aliquot plagis dubie indigena est (sic in Hampshire Angl. "an escape" dicitur). — *B. Rapa* var. *Briggsii* Wats. (Angl.). Comment. 35.

15. *B. pinnatifida*; in regno granat. a Lagasca et Prolongo indicata, sed flore hispan. dubia civis ex Colmeiro.

18. *B. repanda*: Alp.-Marit. (Entraunes: Bornet ex Ardoino).

19. *B. humilis*; in plurib. aliis montib. Gall.mer. adest, Hisp. in montib. granat. et valent. inter 3000 et 5000' s. m. lecta (Willk. Lge); ex Rouy planta hispan. pertinet ad *Diplo.* *brassicoides* Rouy.

20. *B. latisiliqua*; *Diplo.* *subcuneata* Jord. *B. humilis* var. *granatensis* Rouy; hab. in reg. alp. regni granat.: Sierra Nevada (Bourg. hisp. exs. 1048), S. Tejada, S. de Segura Murc. (: Bourg.).

21. *B. Blancoana*; *B. humilis* var. Bourg. hisp. exs. 560. *B. Rouyana* Jka (p. p.). *Diplo.* *taxis* *brassicoides* Rouy p. p. (cf. infra). Betic. Murc. (: Bourg.). Valenc. (Rouy 1881). — *Sinapis nudicaulis* Lag. (Murc.). — *D. leucanthemifolia* Jord. — *B. Diane* Lacaita in litt. ad Willkomm. (Valenc. ad Denia: Rouy, Lacaita).

24. *B. oxorrhina* (*B. sabularia* Kze non Brot.): Castil. (Bourg. hisp. exs. 1759).

25. *B. valentina*: Lusit. (: de Mariz in bolet. soc. broter. 1884). Galloec. (pr. Orense). — *B. Pseudo-Erucastrum* Brot. (ex de Mariz).

28. *B. elongata*: Bohem. (ex Celak. 1883). Roman. Bulgar.

29. *B. fruticulosa*: Pyren. or. (pr. Perpignan copiose: Naudin ut olim Xatard). Catal. (sed in Hisp.mer. frequentior: Bourg. hisp. exs. 1050). Sard. (Forsyth Major ex Aschn). — *B. raphanoides* Costa olim. (Catal.).

30. *B. Cossoneana* (*B. fruticulosa* var. Bourg. hisp. exs. 1578); species rarior est: Valenc. (pr. Orihuela). Murc. (plur. loc.).

31. *B. sabularia* (*Sisymb.* *Parra* L.); in Hisp. rara est et solum in mer. occ. obvia. — *B. papillaris* non nisi pr. Gibraltar et Ronda lecta est.

Obs. *B. lanceolata*, quæ etiam in ins. Bornholm (inter linum) nunc lecta est, ad *Sinap. juncea* L. pertinet ex ipso auct. (Lge haandb. ed. IV. 870. 1888), qui e seminibus *Sinapis juncea* educavit indubiam *B. lanceolatam*, quæ igitur nunc est *B. juncea* Lge (in litt. 1888).

32. *B. coryneloba*; ad *Erucastrum* *beticum* pertinet ex Willk. Lge.

36. **Sinapis.** 2. *S. Cheiranthus*: Hampshire Angl. (: JGroves 1879; forse introd.). Helv. vix adest (teste Gremli). Hisp.bor., centr. et or. indicatur (Bourg. hisp. exs. 1761. 2592), sed in alpinis mont. Nevad. (et Serra do Gerez Lusit.) adest varietas sat distincta (Bourg. hisp. exs. 1047). Synon. Broter. ad *Brassicam* *valentinam* pertinet ex de Mariz.

**S. montana*: Hisp., præcipue in Pyren., montib. Carpetanis (Bourg. hisp. exs. 2365) et Nevad. (Webb, Boiss.).

3. *S. setigera* adest etiam in regno legion. (Villafranca del Vierzo: Lge).

4. *S. pubescens* (*Erucastrum* *pubescens* Willk. 1880): Hisp.bor. (pr. Santander: Salcedo); etiam mer. indicata sed recenter non lecta videtur. Alp.-Marit. (ex Ardoino). Sard. (: Biondi ex l'arbey). Ital.mer. usque in Japygiam (T. d'Otranto: HGroves) procedit.

5. *S. lævigata*; probab. (ex Willk.) est *Erucastrum* species; forse var. *glabra* E. incani: *Brassica lævigata* Mach. (quæ a solo Brotero, in Serra do Gerez, lecta dicitur).

6. *S. arvensis*; in Lappon. plur. deest. — *S. retrohirsuta* Bess. (*S. orientalis* auct.). — *S. campestris* Bess. (Galiz.). — *S. taurica* Fisch. (= var. *glabra* ex Lindem.).

7. *S. alba*; sæpe non nisi culta et spont. facta; sic in Germ., Suec.mer. et med. indicatur (r.) in agris.

8. *S. dissecta*; hanc speciem in Eur.mer. non nisi inquilinam esse et (?) e Russia introductam nuper suspicatum est; Dobrudsche inter Linum usitatiss. legitur. — *S. ucranica* Czern. (Ross.mer. Transs.).

Obs. *S. juncea* L. (*Brassica juncea* Czern. B. *Besseriana* Andrz.), quæ Chinæ indigena dicitur, in Ross.mer. et mer.-or. indicatur et sæpius ibi colitur (sic pr. Sarepta, ubi inclytum obtinetur "sinapi sareptanum" et sapidum oleum sinapi); interdum, etiam in borealibus (ut pr. Stettin, Koenigsberg: Caspary), quasi sponte obviam venit; cfr. *Brassica lanceolata* pag. 28. n. 31 ols.

37. **Erucastrum.** 2. *E. beticum* (*Brassica betica* Boiss. voy.): Valenc. (: Rouy 1881). — *B. corynloba* Nym. (consp. 47).

3. *E. Pseudosinapis*: Murc. (: Rouy). — ? *E. brachycarpum* Rouy in bull. soc. bot. 1884; *Hisp.mer.-or.* (Rouy 1880, 1883).

4. *E. subbipinnatifidum*; cf. *E. obtusangulum* (6), cujus varietas est sec. Willk. Lge.

5. *E. longirostre* species rarior est et præcipue bætica (Sierra Bermeja, S. Morena etc.), sed etiam in Castil. (pr. Toledo a Reuter) lecta.

6. *E. obtusangulum* (Bourg. hisp. exs. 1561. 2103): Ross. occ. (Grodno: Lindem.). Hung. (: Hzl.). Bavar. (lit. lacus Bodani); Germ. rariss., sæpe non nisi introd. et vulgo inconstans; Lusit. (*Sisymb. Erucastrum* Brot.): de Mariz in bolet. soc. broter. 1884. — *E. subbipinnatifidum* Lge. *E. obtusangulum* Bourg. hisp. exs. 2596. (*Hisp.bor.,or.*).

7. *E. Pollichii* (*Brassica ochroleuca* Soy.-Willk.); Morav. (rr.). Roman. Ross. mer.,occ., balt. (ins. Osilia); Dan. duob. loc. introd.; Suec. non nisi in Ostrog. ad litora lacus Tåkern; in Angl. rr. lectum. *Hisp.* non nisi in Catal. et Arag. indicatur; Lusit. ad. præced. pertinet ex de Mariz.

9. *E. incanum*; Germ. non nisi introductum adest. — *E. heterophyllum* potius propria species est:

9. *a. E. heterophyllum* Nym. (1854); Willk. (1880). *Hirschfeldia heterophylla* Amo.

Hisp. castell., malacit. etc. Sard. Sicil.

32. **Diploaxis.** 4. *D. tenuifolia*; etiam in *Hisp.* plur. deest. Suec. indigen. dicitur in Sandhammar Scan. et ad lac. Tåkern Ostrog., ceterum freq. cum saburra navali introd. — *D. intermedia* rectius enumeratur sub *D. murali* (10), cujus var. glabrior ex Simonk. (!).

5. *D. catholica* (Bourg. hisp. exs. 1758, 2105, 2368): *Hisp.occ.,centr. et mer.*

6. *D. siifolia*; species rarior est: Cadiz, Sevilla, Gibraltar etc.; detecta a Willkomm 1845 ad Sanlucar de Barrameda (Betic.), ubi in sabulosis abundat.

7. *D. virgata* (Bourg. hisp. exs. 1563. 2369): *Hisp.or.,centr. et impr. mer.* — *D. platystylos*; *Hisp.mer.,mer.-or.* (Bourg. hisp. exs. 1032. *B. virgata* var. *humilis* Bourg. 1564).

8. *D. Barrelieri*; est planta rarior, fere solum in Castil. et Aragon. lecta.

9. *D. saxatilis*; sec. Rouy ad hanc speciem, tamquam varietates, referendæ sunt *Brassica repanda*, *B. humilis* et *B. latisilica* (18—20); vid. "Études des *Diploaxis* Européens de la section *Brassicaria* par G.Rouy" in revue des scienc. natur. 1882. 423—436 (*).

10. *D. muralis*: *Hisp.*, ubi præcipue in parte centr. et or. indicatur (etiam ins. Mallorca: Willk.). Istr. Roman. Bulgar. Ross.mer. (Cherson); Scand. interdum cum saburra navali introducta (Fr. hb. norm. XV. 32).

11. *D. viminea*; Lusit. plur. locis adest. Lothar. (rr.). Côte-d'Or Gall.or. Bavar. (rarius). Roman. Ross. mer. etiam gub. Cherson. — *D. Prolongi*; *Hisp.mer.r.* (Malaga, P. de S. Maria).

11. *a. D. brassicoides* Rouy in bull. soc. bot. 1882 (sep. 1 *) et in revue d. sc. nat. eod. anno. *Brassica Rouyana* Jka brass. eur. — *D. saxatilis* auct. hisp. *D. nevadensis* Jord. — *Brassica humilis* auct. hisp. — Hæc species Rouy. (de qua cfr. etiam Willk. ill. hisp. I. 142—4) insuper *Brassicam Blancoanum* comprehendit.

13. *D. pendula*; *Pendulina Fontanesii* Willk.; *Sisymb. pendulum* Dsf. — *D. hispida* (*Sisymb. hispidum* Vahl. *Sinapis Harra* Forsk.) est species bene diversa, ægyptiaca.

14. *D. crassifolia*; est var. speciei præc. (*D. pendulæ*) ex Rouy (1881) et Willk. (ill. I. 139).

15. *D. intricata* (*D. Lagascana* Willk. haloph. *Pendulina intricata* Willk. enum.); hab. in prov. Almeriensi (: Willk., Lge) et in Murcia (: Rouy); herba pallide glauca, cæspites grandes intricatos constituens (Willk.); sec. Rouy (1883) est var. speciei seq. (*D. Lagascanæ*), cfr. tamen Wk. ill. hisp. I. 140.

16. *D. Lagascana* (*D. pendula* Bourg. hisp. exs. 1033, 1561, a; Nym. consp. p. p.); *Sisymb. pendulum* Lag. (non Dsf.). — *Hisp. mer., mer.-or.*

**D. Webbiana* Willk. (sub *Pendulina*). *D. hispida* Webb iter (non DC.): Valenc. (Alicante: Webb 1826, Hegelm. 1878; Orihuela: Rouy). Mure. (: Rouy).

De speciebus hujus sectionis (gen. *Pendulina* Willk.) cfr. Rouy excurs. bot. esp. in rev. sc. nat. 1883 (sep. 53—55 *).

39. *Moricandia*. 1. *M. arvensis*; *Hisp. etiam mer.-or., rarius or. et centr. (in bor. deest)*; Bourg. hisp. exs. 1566.

2. *M. foetida*; species rariss. et solum inter Vera et Cabo de Gata regni gran. or. lecta (Bourg.).

3. *M. Ramburii* (Bourg. hisp. exs. 1045. 2087); adest etiam, sed rarius, in prov. matrit.

4. *M. bætica* non nisi pr. Antequera regni gran. indicatur et ex Willk. (et Colm.) est tantum varietas præced. speciei.

40. *Eruca*. 1. *E. sativa*; hinc inde adest etiam subsponte (e cultura); *Hisp. habit. præcipue centr. et or., in mer. rara, sequens vero frequentior.*

1. *a. E. longirostris* Uechtr. in oestr. bot. z. 1874. 136. *E. sativa* auct. hisp. p. p. *Brassica Eruca* Boiss. voy: *Hisp. mer. Sard. Sicil. (etiam Græc. ex Willk.).*

2. *E. orthosepala*; species rariss. (solum pr. Aranjuez Castil. et Lorca Mure. lecta), sed adhuc subdubia (cfr. Willk. Lge III. 850); sec. Rouy est var. (major) *E. stenocarpæ* (4).

3. *E. vesicaria* (Bourg. hisp. exs. 1053, 2097); adest etiam in *Hisp. or., ubi in Arag. infer. et regno valent. mer. "communissima"; Navar. Galloec. (ex Pourr.).*

3. *a. E. stenocarpa* Boiss. Reut. pug. pl. nov. 8. (1852). *Hisp. mer. (Velez Rubio: Rouy 1881).*

De speciebus hujus generis cfr. Rouy excurs. bot. esp. in rev. sc. nat. 1883. (sep. 51—52 *).

41. *Lunaria*. 1. *L. rediviva*; Suec. extra Scaniam non nisi in Kinnekulle et ad Uddevalla obvia; *Hisp. nunc indicatur sed rr. (Cast. nov. or., Catal., Bæt.). Roman.*

2. *L. annua*: *Hisp.-r. (Galloec. Castil. Catal.). Vales. (pr. Orsières nuper relecta; Lugano). Roman.; Transs. solum culta et subspont. adest.*

42. *Farsetia*. 1. *F. lunarioides*; Orph. fl. gr. exs. 1125.

2. *F. clypeata*; etiam Rumel. or. indicata (ad Aitos: Skorpil).

43. *Aubrietia*. 1 *. *A. italica*: Sicil. prov. messan. (Salvatesta in rupibus calcar.: Seguenza, Nicotra).

5. *A. gracilis*: Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882).

44. *Berteroa*. 1. *B. incana*: Suec. med. Fenn. mer., med. Gall. post bellum germanicum usque in centr. et occid. migravit. Helv. (r. et inconstans). Roman. Bulgar. Rumel. or. (: Skorpil). Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882).

45. *Cochlearia*. 1. *C. Armoracia*; *Hisp. dicitur spontanea in pingui-bus et ad fluvior. ripas Catal. et forse alibi. — C. Wunderlichii* CAMEy. in Claus localfl. d. wolg. 203. Comment. 36.

2. *C. macrocarpa*; ab hac derivatur *Aarmoracia* culta observ. cl. Ascherson.

3. *C. officinalis*; deest in Suec. bor. et med.; adest in *Hisp. bor., ubi in*

zona litorali spontan. (Willk. Lge); item Gall.mer.-occ. (dep. Gironde, rarius). — *C. pyrenaica*; in mts Cantal Arvern. plur. loc. copiosa (: Gatien et Heribaud).

4. *C. anglica*; litora maris inhabitat (Germ. a Batav. ad Pomeran.) et adest etiam in Fenn.bor.-or. (cum Lapp.) et in Bleking. (Suec.mer.-or.) ex Svanlund (in Bot. Not. 1886).

**C. arctica*; adest etiam in Jan Mayen, Beeren-Eiland et Nov.-Seml. ideoque in omnibus insulis arcticis. Fenn.bor. extra Lapp. non adest. Hæc in Groenland. vulgatissima et omnino est *C. groenlandica* L. (Lange in litt. 1888); a Beeby in Shetland. bor. detecta est; vid. scotch natural. 1887. 5. et 1889. 2. (sep. *).

5. *C. danica*: Gall.mer.-occ. (dep. Girond). Hisp.bor. (Astur. Galloec.). Lusit. (Oporto: Sjögren 1855, Johnston; Berlingas: Daveau ex de Mariz 1884); Island. non lecta, sed adest in ins. Færöens. (: Rostrup); Ross. balt. (ins. Osilia, Moon: Klinge).

7. *C. glastifolia*; deest in Hisp.bor.

46. **Kernera.** 1. *K. saxatilis*; etiam Pyrenæos hispanicos inhabitat Germ. non nisi mer.-occ. (: Badia, Würtemb., Bavar.).

**K. Boissieri*; — *K. decipiens* Nym. syll. 199. (1854); Willk. Lge III. 842. (1880). *Cochlearia decipiens* Willk. seit. et exs. 1850. Pyren. aragon. inter 3000 et 3800' (r.).

47. **Petrocallis.** 1. *P. pyrenaica*: Styr. mts Sulzbachens.

48. **Draba.** 1. *D. aizoides*; Belg. solum pr. Yvoir, ubi (ex Crepin) destructio nunc imminet; adest etiam Hisp. sc. in Pyren. et Castil. vet. (Burgos: Palau, Encinillas: Lge). Bulgar. (Vrabca pr. Sofia). — *D. saxigena*; *D. aizoides* Guss. (ex Lojac. contrib. 10 *). — *D. Hoppeana* Rehb. *D. Zahlbruckneri* Host. (Tyrol. Carinth.); Styr. alp. Hochgolling: Zahlbr.). Comment. 37.

**D. Dedeana*; vid. infra (6. c.). — **D. Beckeri* Kern. Comment. 38.

2. *D. athoa*; — ? *D. Lacaitæ* Boiss. or. suppl. 53. Pelop. m. Chelmos, 4—5000' (: Lacaita), Kyllene? (planta sub *D. aizoides* var. inde allata huc spectat ex Boiss.).

3. *D. Aizoon*: Roman. Rumel.or. (ex Velen.). — *D. lasiocarpa* Roch. exs. 1810; banat. 1828. (Hung. Banat. Transs.). — *D. elongata* Schur.

**D. compacta*: Roman. (alp. Bucieciu).

4. *D. Santeri*: Bavar. (Alpes or.).

5. *D. Loiseleurii*; — *D. corsica* Jord. diagn.

6. *D. hispanica* (*D. aizoides* Webb iter. *D. cuspidata* DC. quoad plant. hispan.; Bourg. hisp. exs. 1072; etiam in Hisp.or. adest.

**D. parnassica*: Euboæ m. Delphi (Heldreich ex Boiss.).

6. a. *D. Mawii* Hook. f. in Curt. bot. mag. XXXI. 6186. (1875). Hisp.bor.: Burgos (Pancorbo: Lk., Maw 1870!), Leon (: Bourg.). Flores albi.

6. b. *D. cantabrica* Willk. sert. 11. (1852). — Hisp.bor.-or. (in m. Peña Gorgeya detexit Willkomm).

6. c. *D. Dedeana* Boiss. voy. suppl. 718. — Navarra (ubi a Dédé detecta). Vizcaya (: Willk.). Cantabr. (Boiss. Ler. Lev. 1879). Flores albi.

**D. Zapaterii* Willk. in Willk. Lge prodr. — Arag.mer.-occ. in montib. pr. oppid. Albarracin, a Zapater detecta 1879; var. (*Dedeana*) dicitur elegantissima, habitû *D. hispanicæ*, flores vero nivei. Comment. 39.

10. *D. alpina*; Ross. arct. etiam in ins.Nov.-Seml. et Waigatsch; hab. insuper in Beeren-Eiland et Jan Mayen (exp. austriac. 1883) et sic in omnibus insulis arcticis. Suec.bor.: Herjedal. (in alpe St. Midtåklappen); Fenn. non nisi in extima Lapp.or.

**D. Adamsii* Led. ross. *D. lasiocarpa* Adams (non Roch.). *D. astylon* Bge ap. Schrenk: Samoj. Nov.-Seml.

10. a. ? *D. Martinsiana* Gay. - Ins. arct. Spitzberg., Beeren-Eil.

11. *D. crassifolia* (*D. Wahlenb.* * *glacialis* Htn handb. ed. V. certe! ex ed. XI.); in Norv. primum lecta 1838 a Læstadio ("*D. hirta* var. *glacialis*") supra Lyngen, dein a Norman in alpibus ad vallem Tromsøensem.

13. *D. algida*; — *D. pilosa*; *D. pauciflora* Br.? — *D. samojarum* Rupr.

in beitr. z. kennntn. russ. VII. - Ross. arct. (ural.); probab. idem ac var. altera *D. ochroleuca* Bge.

14. *D. oblongata*: Beeren-Eiland (ins. arct.).

15. *D. repens*; etiam Ross.med.or. (gub. Tambow freq., Woronesch etc.), mer.-occ. (ex Schmalhausen).

16. *D. arctica*; *D. rupestris* Trautv. ex ipso.

17. *D. hirta*: Færøa (: Rostrup). Samoj. et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr.). — *D. borealis* Bge. (Nov.-Seml.).

18. *. *D. trichella*: ins. Færøer (vid. Rostrup in botan. tidskr. 1870. 40).

19. *D. altaica* Bge sem. hort. dorp. 1841: Ross. arct. (Samoj.: Schrenk, Waigatsch: Kjellm. Lundstr.); Beeren-Eiland.

20. *D. tomentosa*; — *D. nivea*: Helv. (locus class. est Pizlat vall. Engadin). Carinth. deest ex Pacher. — *D. Pacheri*; hab. in alp. summo Stern vallis Katschthal Carinth.; sec. beat. Pacher (Kärnt. gefässpf.) est aff. prox. *D. hirta* et forse ej. var. — ? *D. rhætica* Brügg. (1882). *D. stellata* Moritzi 1884 (non Jacq.). Stelvio Valtell. reg. alp. (Moritzi 1832).

**D. frigida* (*D. nivalis* Lap.): Bavar. (Alp.or., rarius): Helv. solum in Alpibus adest: Gran. in m. Sierra Nevada (ad moles glaciales rr.: Boiss.). — *D. levipipes* etiam in S. Nevada cum specie occurrit (Boiss.).

22. *D. carinthiaca*: Bavar. (Alp. Algov.). Styr. (Alpes plur.). Roman. (alp. Bucieciu). *D. androsacea* et *D. frigida* Schur. — ? *D. Moritziana* Brügg. (1882). *D. hirta* Moritz. *D. Traunsteineri* auct. non Hpe. (Helv.mer., a Moritzi pr. pagum St. Bernhardin detecta 1832).

**D. Traunsteineri*: hujus plante tantum duo caespites a Traunsteiner (1832) in Kitzbühler-Horn (Tyrol.bor.-or.), inter *D. carinthiacam* et *D. tomentosam*, lecti sunt, dein vero planta hæc frustra quesita est et progenies fortuita specierum dictarum habenda (Brügger in jahresb. graub. 1882. 83—84 *).

23. *D. Kotschyi* (*D. ciliata* Schur): Roman. (alp. Bucieciu).

24. *D. lactea* (1817) = *D. Wahlenbergii* Htn handb. (1820) var. homotricha; *D. lapponica* (W. ap.) DC. = *D. Wahlenbergii* var. heterotricha; igitur nomen Hartmanian. potius adhibendum; adest etiam in Nov.-Seml.

25. *D. nivalis* (1799): Island. Nov.-Seml. Waigatsch (: Kjellm. Lundstr.).

**D. curtisiliqua* (1857). *D. brachycarpa* (1854). *D. nivalis* var. *brachycarpa* Lindbl. 1839: etiam in alpe Peltsana Lapp. Torn. ex Htn handb.

26. *D. corymbosa* (Th Fr. exs. spitzb. 30): Nov.-Seml. (: Kjellman. Lundstr. 1875). Beeren-Eiland. Jan Mayen.

27. *D. incana*: Dan. (Jutl.bor.); ins. Færøer (: Rostrup); Lapp. Torn.bor. (: Ekstrand 1881); Suec.mer. adest in Vestrog., Öland. et Gotland.

28. *D. muralis*; Norv. indicatur ad Tönsberg (introd.?). Lusit. satis adest ex de Mariz (1884). Hisp. etiam in centr. et or. Helv. (sec. Favre 1883) solum Basiliæ (Basel). Germ. vix nisi occ. (rhen.) et centr. (Thuring.). Aland. (: Selan 1877). Moldav. Dobr.

29. *D. nemorosa*: Suec.bor. (Medelp. Angerm.); in mer. (in Consp. erron. cit.) deest. Fenn. in sola mer. adest. Austr.-Infer. (r.). Moldav.; in alp. Mauriennes Sabaud., post semisæculum, relecta est a Chabert 1882.

30. *D. lutescens*; species rara, non nisi in monte Serra de Baza regni gran. (a Bourgeau) lecta.

49. *Erophila*. 1. *E. vulgaris*; exc. etiam Fenn.bor. (et med.) cum Lappon.

50. *Schievereckia*. 1. *S. podolica*; Galiz. (circul. Tarnopol.) jam a Besser indicata. Comment. 40.

51. *Koniga*. 1. *K. emarginata*: Pindus Tymphaeus in summo monte Zygos (Heldr. 1885).

2. *K. halimifolia*; Hisp. non adest, sed ibi subspecies:

**K. Perusiana* (Ptilotrichum Peyrou. Willk.): Arag. Catal. Cast. nov. — *K. tortuosa* Willk. 1847 (sub Ptilotr.): Arag.occ. et mer. Valenc.

3. *K. spinosa* (Ptilotr. spinosum Boiss.); adest etiam in *Hisp.or. tota*; Bourg. *hisp. exs.* 1041. 1041, a (var. *virens*).

5. *K. longicaulis* (Ptilotr. longicaule Boiss.); regionem mont. et alpin. regni gran. inter 2500 et 7000' inhabitat (*K. halimifolia* Webb).

8. *K. pyrenaica*; species valde rara dicitur, in unica et vix accessibili rupe lecta.

9. *K. Lagascae* (*Alyssum purpureum* Lag. *A. dubium* Bory) crescit solum in reg. nivali montis Sierra Nevada inter 8000 et 11000'.

10. *K. maritima* (*Lobularia maritima* Desv.) indicatur etiam ad litora Maris Nigri (Tauria, Bessarab.); ab hac specie removeatur distinctissima *K. strigulosa* (vid. infra 11. a).

Obs. De hac specie et de illis a Rouy cum ea junctis cfr. ej. excurs. bot. esp. in rev. sc. nat. 1883. 57-58 (sep. *).

11. *K. libyca* (*Lobularia lybica* Webb); floræ hispan. (bæticae) civis rara est: Cabo de Gata, Almeria, territ. gaditan. (Cadiz etc.).

11. a. *K. strigulosa* Nym. syll. 200. *Lobularia strigulosa* Willk. Lge. *Hisp. gran.*, ubi solum in reg. alp. m. Sierra de Yunquera, ad altit. 5500' lecta (ibi a Willkomm a. 1844 detecta est). Herba pulchella, sub anthesi nana, hieme (Nov., Dec.) florens et fructicans.

52. *Vesicaria*. 1. *V. utriculata*; *Helv.* solum in mer.-occ. adest; in loco german. (Bonn) rariss. et probab. olim sata.

2. a. *V. tymphaea* Hsskt in "mitteil." soc. bot. thur. 1886. 70 (*). — *Pindus tymph.* (vall. Penei et jug. *Zygos* usque ad 5000' s. m.: Haussknecht 1885).

53. *Alyssum*. 2. *A. sinuatum* (*Vesicaria sinuata* Poir.): *Castil.* (Madrid, r.); ceterum a recentioribus in *Hisp.* non indicatur.

3. *A. corymbosum* (*Vesicaria microcarpa* Grsb.): *Banat.mer.* (Jka 1879). *Kajabasa Bosn.* (: Brandis 1884).

4. *A. gemonense*: *Roman. Ross.mer.*; in rupibus porphyreis mts Dornberg pr. Suhl (Thuring.), ubi olim satum, nunc omnino inquil. est. — *A. edentulum* W.K. *Aurinia edentula* Grsb. *Vesicaria microcarpa* Jka olim (1870, 1875). — De hac et præced. specie (etc.) cfr. "Zur Banater Flora von V. v. Janka" in *Termész. Füzetek* III. 1879 (*).

5. *A. orientale*: *Bulgar. et Rumel.or.* (: Skorpil ex Velen.). *Ins. Jonic.* (Corfu: Spreitzenh. 1877). — *A. affine*; *A. saxatile* H.P.R. iter ital. III. 535 (ex Janka).

6. *A. leucadeum*; hoc per multos annos frustra quesitum erat, et in loco classico Capo di Leuca exstinctum videtur, sed nuper pr. Gallipoli (copiose: HGroves) et Otranto (Montagna d'Oro: Profeta) relectum est; observ. HGroves ab *A. gemonensi* (4) specie non diversum (vid. HGroves in linn. soc. journ. 1885 et ej. flora di terra d'Otranto in nuov. giorn. bot. ital. 1887. 124').

7. *A. saxatile* (*Aurinia media* Schur): *Dobrukscha*; *Normand.* (ex Morière) in hortis cultum et in muris vetustis inquilinum. — *A. petræum* Andrz. ap. DC. non Ard. (Galiz.or.).

? 7. a. *A. Bilimeki* Willk. in Willk. Lge III. 830. *Hisp.mer.* prope Granada, in rupibus, leg. Bilimek 1877. Hæc species, ex ipso auct., incertæ sedis est et ulterius observanda.

8. *A. repens*; *A. Wulfenianum* auct. transs. exc. Schur. *A. Rochelii* Schur p. p. — *A. Rochelii* dicitur = *A. Wulfenianum*. (10); Transs. ad *A. repens* ipsiss. pertinet ex Simonk.

8. a. *A. transsilvanicum* Schur enum. 63. (1866). *A. montanum* Bmg. et auct. transs. *A. rostratum* auct. transs. non Stev. *A. arenarium* Schur p. p. — *A. Wulfenianum* Schur enum. *A. Wierzbickii* Freyn non Heuff. (omn. ex Simonk.).

9. *A. montanum*; deest in Lusit. (*A. montanum* Brot. ad *A. campestre* pertinet) et Transs. (*A. montanum* auct. transs. præced. spectat); *Japygiæ* (T.

d'Otranto), exceptione rara, adest ad litus marinum (S. Pietro in Bevagna): H Groves in Journ. linn. soc. 1885.

**A. atlanticum*; — *A. cuneifolium*; Comment. 41.

10. *A. Wulfenianum*; pro hoc ex Kerner substituitur (in Consp. sub 8. *A. repens* allatum) *A. Rochelii* Andr. in Rehb. ic. germ. 1837.

**A. diffusum*; in reg. niv. m. S. Nevada a Boiss. raro observatum, sed pl. castell. (Escorial: Colm.) probab. ad *A. serpyllifol.* spectat ex Willk. Comment. 42. — *A. flexicaule* ad *A. cuneifolium* (9 * —) pertinet ex Jka (1883).

**A. ovirense* Kern. in sched. ad exs. a. 1882. 99. *A. Wulfenianum* auct. (transsilv. vid. 8, 8. a.). Carinth. (m. Ovir etc., 2100 metr. s. m.). Carn. Friul. Venet. Comment. 43.

12. *A. Fischerianum*; adest etiam in Ross. ural.

14. *A. rostratum*: Roman. Bulgar.; Ross. mer. etiam gub. Cherson (cop. ad latera collium circa Odessa: Lindem.). Transs. ad 8. a pertinet.

**A. Wierzbickii*; Transs. deest ex Simonkai.

17. *A. hirsutum*: Ross. mer. (Taur., Cherson), mer.-occ. Dobr. Hung. (Hzl.); Transs. deest ex Simonk. ("Schurius ibi numquam legit").

18. *A. campestre*: Istr. Moldav., sed deest Transs. (ex Simonkai). — *A. collinum* Brot. phyt. *A. montanum* Brot. fl. lusit. — *A. siculum* Jord.

20. *A. minimum*: Bulgar. Roman. Attica (m. Hymettus: Lacaita); adest etiam Galiz, sed (ex Oborny) deest Morav., ubi a Schlosser indicata erat.

21. *A. minutum*: Dobrudscha. Arcad. (ex Lacaita in litt.). Thessal. m. Pelion (: Heldreich ex Boiss.).

22. *A. compactum*; sec. Janka (cruc. eur. 1883) = *A. Aucheri* (19—).

23. *A. argenteum* (*A. alpestre* Bmg. et auct. transs.): Hung. (Hzl.), Roman. Bulgar. Ruinelor.

23. a. *A. chalcidicum* Jka brev. n. 3. — Chalcidice in Thrac. (: Janka).

25. *A. Robertianum*: ins. Tavolara ad Sard. (Forsyth Major 1884).

26. *A. serpyllifolium*; *A. alpestre* Brot.

27. *A. alpestre*: Alp.-Marit. reg. alp. (: Dnt. ex Ardoino).

**A. tortuosum*: Roman. Bulgar. (pr. Trnova). Ross. mer. (gub. Cherson), mer. or. (Sarepta: Becker).

**A. obtusifolium*; ex Janka (cruc. eur. 1883) = subspec. præced. (*A. tortuosum*).

30. *A. calycinum*; Norv. mer. (Christiania, Asker) nunc lectum est.

**A. granatense*: ex Willk. ill. est var. alpestris (Gran. Mure.) speciei ab eo in Bætica 1846 lectæ: *A. Willkommii* R. v. Roem. in Willk. enum. 8. (1852) *A. hispidum* Losc. Pard. ms. 1850 (ex Willk.). *A. granatense* eor. serius. Catal., Arag. (Losc.); Ayamonte Bætic. (Willk.). Lusit.

**A. psilocarpum*; *A. calycinum* Bourg. hisp. exs. 1040.

31. *A. linifolium* (*A. linearifolium* Lag. Meniocus serpyllifolius Desv.): Ross. mer.-occ. Roman. Arag. mer. Cast. nova. Valenc. Mure. Gran.

54. *Peltaria*. 1. *P. alliacea*: Dobrudscha.

1. a. *P. isatoidea* Barb. in bull. soc. vaud. XXI. (1885). 93. (sep. 1 *). Arch. turc. ins. Karpathos (Scarpanto), ubi ab egregio plantarum collectore Pichler detecta 1883.

55. *Clypeola*. 1. *C. Jonthlaspi*: Heldr. hb. norm. 822.

**C. pyrenaica*: Arag. (cl. Campo); sec. Lorel! (fl. montp.) = *C. Gaudini* (2 *).

2. *C. microcarpa*: Heldr. hb. norm. 823; habitat etiam Cephalon. (Heldr.), Hetr. (Parl. ex Aschn), Sard. or. (mts calcar.: Lisa 1840), Sicil. (Gasparrini in hb. Moris ex Aschn et Lojac.), Valenc. (Sierra Mariola: Rouy 1881).

**C. Gaudini*; in sola Valesia adhuc lecta erat, sed ex Lorel (fl. montp.) etiam Gall. mer. inhabitat et *C. gracilis* Pl. (in Consp. meo sub præced. allata) huc ducenda est.

3. *C. eriocarpa* DC. (1821). *C. eriocarpa* Cav. præl. n. 911. (1802); ex Willk. lge. — Species rara et solum in Castil. (pr. Aranjuez) et Gran. or. (: Bourgeau) lecta.

56. *Camelina*. 1. *C. foetida*; deest etiam in Norv. bor., Fenn. bor. et in Lappon.; Lusit. et Hisp. vix indig.

2. *C. sativa*; in Scan. et Hall. (Suec.mer.) non rara et adest etiam Suec. med.; Hisp. culta et inter segetes subspont. (ex Amo). Lothar. inter segetes subspontanea (: Godron). Roman. — *C. macrocarpa* ad præced. pertinet ex Simonkai.

3. *C. silvestris*; *Cochlearia polysperma* Costa ex ipso. Kerneria polysperma Willk. Costa.

3. *a. C. rumelica* Velen. in diar. (sitzungsb.) soc. sc. bohem. 1887. 448. Rumel.or. (pr. Sotira a Skorpil lecta 1886).

57. *Vella*. 1. *V. Pseudocytisus*; species rara, præcipue in collibus gypsaceis prope Aranjuez lecta; ceterum Bætic. (Sierra de Maria: Bourg.); etc.?

2. *V. spinosa* est montib. regni gran. priva, regionem alpinam inter 5500 et 7000' inhabitans.

3. *V. aspera* (*Boleum asperum* Desv.); Hisp. non nisi in Arag.mer. (: Loscos) et Catal. indicata.

58. *Carrichteria*. 1. *C. Vellæ*; adest etiam in Hisp.or. (cum ins. Balear.).

59. *Succowia*. 1. *S. balearica*; Hisp. extra Baleares indicatur in Catal. (rr.), Valenc. (m. Hifac) et Gran. (Cabo de Gata, Gibralt.); Hetr.mer. (m. Argentario) nuper (1883) lecta est a Forsyth Major.

60. *Subularia*. 1. *S. aquatica*: Dan. Fenn. Batav. (Lunteren en Ede, ubi a Beyerinck detecta 1881); Belg. primum lecta est a pharmacopola Dossin ineunte sæculo nostro; Gall. loca exactius sic notanda: Lac de Longemer, Lac de Gerardmer (Voges.), Pyr.or. (Etang Liard: Reboud et Guinand 1849); Germ.: Holsat, Brunsvic. (pr. Vorsfeld), Thuring., Bavar. (pr. Erlangen).

61. *Biscutella*. 2. *B. auriculata*; — *B. erigerifolia*; *B. orcelitana* Lag. (Valenc.: Lag.; Bætic.). — *B. Lamarekii*; - *B. Candollei* Jord. - *B. balearica* Jord.

3. *B. frutescens*; habitat in rupibus calcareis reg. subalpinæ regni gran., rarius (Serrania de Ronda, Grazalema etc.); species valde insignis!

4. *B. sempervirens*; Lusit. deest ex de Mariz. Comment. 44.

5. *B. coronopifolia*; — *B. stenophylla*, in Consp. huc relata, est species omnino propria (in Gall. non lecta); vid. infra (6. c).

**B. ambigua* (*B. intermedia* Gou.) adest in tota Hisp. nec non in Lusit.; Gall.mer.-occ. — *B. stricta* Jord. — ? *B. pratensis* Timb.-Lagr. (Catal.).

6. *B. lævigata*; — *B. pyrenaica*; vid. subspeciem. — *B. neustriaca* Bonnet (1879); Magn. fl. sel. exs. 190: Gall. dep. Eure (pr. les Andelys), Paris.

**B. pyrenaica* Huet in ann. sc. nat. 3e ser. XIX. 252. *B. saxatilis* Endr. pyr. exs. a. 1829. Pyren.; Arag. (S. de Moncayo). Castil. (S. de Guadarr. in Pico de Penalar: Boiss. Reut. Ler. Lev.).

6. *a. B. montana* Cav. ic. II. 59. *B. tomentosa* Lag. ap. DC. (utr. in Consp. sub præced. allata).

Valenc. (plur. loc.). Bætic. (S. de Yunquera, Gibralt.) reg. mont.

6. *b. B. laxa* Boiss. diagn. pl. or. III. 43. *B. saxatilis* var. *angustifolia* Boiss. voy.; Bourg. hisp. exs. 1070.

Gran. Murc. reg. montana et alpina.

6. *c. B. stenophylla* Duf. (DC. prodr. I. 183).

Valenc. (Sierra de Chiva etc.). Murc. (Hellin: Rouy). Gran. (S. de Maria); Arag. (S. de Moncayo).

7. *B. rosularis* habitat in rupibus maritim. verticalib. montis Hifac regni valent. (Boiss. 1837); species parum nota et ex Willkomm forse var. *B. frutescens* (3); ex Rouy minime, sed certe var. *B. montanæ* (vid. bull. soc. bot. 1884).

8. *B. scutulata* (*B. apula* Webb p. p.); Bætic. plur. loc. (Algeciras, Puerto Real etc.) lecta est; sec. cl. Willkomm a *B. microcarpa* (10) specificè vix differt.

9. *B. didyma*; — ? *B. oreites* Jord. (Catal.: Timb.-Lagr.).

**B. apula*; Hisp. pertinet ad — *B. bætica* (*B. apula* Duf., Webb p. p.).

**B. lyrata*: Sard. (: Biondi ex Barbey); Hisp. deest ex Willk. Lge.

10. *B. microcarpa* (*B. tumidula* Lag. ex Willk. Lge) hab. in Bætic.mer.: San Roque (plur.), Algeciras cop. (Willk.), Gibralt. (plur.), Cadiz (Willkomm, Bourgeau et al.).

62. *Iberis*. 2. *I. gibraltarica*; non nisi in latere orientali montis gibraltarici lecta est, sed indicatur etiam pr. Ronda (Clem.), Caratraca (Hæns.) et Malaga (Prol.).

3. *I. saxatilis*: Dobr. in collibus calcar. pr. Grecii et Cierna (: Janka ex Kanitz); Hisp. non nisi in provinc. orientalib. et (r.) in Gran. lecta est; indicatur etiam Castil. (: Amo).

4. *I. conferta*; Hisp.bor. (montes inter Asturiam et regn. legion.) solum inhabitat; Lusit. ex Machado. Species quoad siliculam etc. a reliquis valde recedit, unde cl. Willkomm sectionem propriam (*Teesdaliopsis*) pro ea constituit.

5. *I. subvelutina*; species rara et præcipue castellana (Ocaña: Cut.; S. de Guadarrama: Duf.; Aranjuez); ceterum pr. Cordoba Bætic. observata et in Valenc. (Cav.) et Extrem. (Salv.) indicata; Lusit.

6*. *I. garrexiana*; Lusit. a solo Webb lecta; deest in Hisp.bor.; in centr. rara est, sed in mer. et præcip. or. frequentior. — *J. Gastoni* pertinet ad *I. Bernardiana* (22) ex Loret.

7. *I. Zanardinii*; sec. Janka (1883) = *I. saxatilis* (3).

8. *I. serrulata* (*I. commutata* Schott ex Grsb.); sec. Janka et Boiss. est = *I. sempervirens* (6).

9. *I. contracta* (*I. umbellata* Webb iter, Boiss. voy.); Hisp. non nisi in Castil. et Gran. nunc indicatur (Valenc.?), sed in Extrem. jam ab Ant. Jussieu lecta erat (: *I. fruticosa* sempervirens); Lusit. plur. locis adest.

10. *I. Pruiti*; Hisp. (mont. Gran.) a solo Boissier indicata.

11. *I. Tenoreana*; in Hisp. rara est et solum in S. Nevada (cacum. Cerro Trevenque: Willk.) et S. de Mariola Valenc. (Pourr., Rouy 1881) lecta; in Arag. (et Catal.) adest var. *longepedunculata* Losc. Pardo; Lusit. etiam aliis locis (a Moller et Sophia) lecta est. — *I. petraea*: Cantabr. (Santander, Picos de Europa etc.: Ler. Lev.).

12. *I. procumbens*; Lusit. plur. locis adest (: de Mariz in bolet. soc. broter. 1884).

14. *I. ciliata*: Aragon.occ. Catal. (var.).

15. *I. linifolia*: Hisp.or. et centr.; var. *purpurea* jam a Brotero in Lusit. lecta erat, var. *alba* nuper (rr.) a Cortezão ex de Mariz l. c.

16. *I. umbellata*: Gall.mer. (dep. Var, Alpes-Marit.); Hisp., ubi jam a Linnæo indicatur, vix indigena est nisi forse in montib. Marianis (Willk.), sed e cultura subsponte hinc inde occurrit. Lusit. ad *I. contracta* (9) pertinet ex de Mariz.

16. a. *I. Raynevalii* Boiss. Reut. diagn. pl. hisp. 5. Castil. (Aranjuez: Rayneval et al.; m. de Batres etc.).

16. b. *I. Hegelmaieri* Willk. in Willk. Lge III. 770. Valenc. in m. Puig-Campana pr. Alicante, ubi a cl. Hegelmaier 1878 detecta; in Sierra de Mariola a cl. Rouy nuper lecta est.

17. *I. Lagascana*; hab. præcipue in Valenc. et Murc., in Bætica rr.; etiam Arag. indicata (: Zapater); a cl. Janka (1883) cum *I. Tenoreana* (11) jungitur.

19. *I. nana*; hæc species (hucusque solum e loco classico la Rascaira alp. Mondov. nota) *I. spatulata* (18—) propior sit et — *I. Candolleana* (Drôme, Vaucluse, B.-Alp.) species distincta; vid. Rouy in Le Natural. 1888. 31.

20. *I. pinnata*: Helv. (in agris, ad vias, r.) ex Gremli; in Hisp. bor. non indicata nisi Viscayæ (Colm.).

21. *I. pectinata* (*I. odorata* auct. hisp. veter. non L.; *I. pinnata* Bout.): Bourg. hisp. exs. 2078. 2098.

**I. Bourgæi* (*I. pectinata* Bourg. hisp. exs. 1029 ex Boiss.); indicatur solum in Gran. (Baza: Bourg.) et Valenc. (Elche: Funk).

24. *I. intermedia*; — *I. divaricata* Tsh. *I. amara* Sep. non L. (Illyr. littoral. e. gr. Triest).

25 *. *I. Durandii*; proxima est speciei seq. et Lorey solus auctor habendus operis Flore de la Côte-d'Or, ab eo cum Duret, qui vix nisi præfationem scripsit, editi (: Royer).

26. *I. amara*: Hampsh. Angl. mer., r. et forse introd. (: Townsend); adest in Hisp. or. plur. locis nec non in Navarra et Castil. nova (r.); indicatur etiam in Bætica et Lusit.

**I. decipiens*; Magn. fl. sel. exs. 18. — *I. apricorum* Giraud. 1876. (Gall. dep. Lot, cant. Limogues).

27. *I. panduræformis*: Helv. mer.-occ. (Cheserex cant. de Vaud).

64. *Thlaspi*. 1. *T. arvense*; adest in Hisp. tota, sed in mer. non nisi in reg. mont.-alp. (rarius).

4. *T. perfoliatum*; Norv. deest; Suec. adest solum in Oeland. et (r.) Upland.; Angl. in Oxfordsh. et Gloucestersh. (rupestre). — *T. erraticum*; etiam Thuring. indicatur.

6. *T. montanum*: Moldav.; Hisp. indicatur a Webb et al., sed Willkomm de hoc proventu dubitat (etiam Colm. n. v.); Lusit. (Traz os Montes) a solo Brotero lecta est; Germ.: mer.-mer.-occ. centr. (in calcareis et porphyraceis).

**T. cuneifolium*; descr. in oestr. bot. z. et in Pantocsek. adnot. 93, ubi *T. bulbosum* (2) proximum dicitur; sec. GBeck a *T. alpino* (10) vix distinguenda; in Bosn. mer. alp. non rarum.

7. *T. Tinei*; *T. rotundifolium* Tin. (non Gaud.).

8. *T. ochroleucum* (*T. balcanum* Jka. *T. heterochroum* Boiss. 1888): Thrac. m. Balkan (: Janka); Bæot. m. Helicon (Orph. exs. 1053), m. Dirphys Euboeæ (1053. b); huc probab. pertinet *T. cochleariforme* Ung. ex Euboea. Flores (ex Janka) in vivo albi sunt et non nisi exsiccatione ochroleuci, unde nomen mutatum.

**T. goesingense* Halacsy! in oe. b. z. 1880; Kern. exs. 79; Magn. fl. sel. exs. 475. — Goesingberg (Austr.-Infer.) ad pagum Ternitz. — Janka quærit (1883): nonne *T. alpinum* Jacq.?

10 *. *T. Kernerii* Huter: Austr. Alpes mer. (: Huter 1873). Comment. 45.

11. *T. Kovacsii* Heuff. in Flora 1853. 624 (in Consp. ad subsect. seq. relatum). *T. alpinum* auct. transs. plur. *T. præcox* Schur. *T. longeracemosum* Schur (1858). *T. Jankæ* Borb. (1878) non Kern. *T. cochleariforme* Jka non DC. (cfr. Simonk. enum. transs. 97).

Carpati mer.-or. (Banat. Transs.). Hung. (r.). Serb. (*T. Avellanæ* Panc.). Bosn. (: Brandis 1885 ex Freyn). — *T. affine* Sch. hb. transs. (1850); Boiss. or. (Consp. pag. 62. no. 11).

12. *T. cochleariforme*; vix species Candolleana (quæ sibirica) sed præced., in Transs. et Serb. vulgata; adest etiam in Ross. mer.-occ. ex Schmalhausen.

13. *T. Prolongi*; Bourg. hisp. exs. 1026; Minæa *Prolongi* Lojac. (1881); hab. in reg. alp. et subalp. montium plurim. Gran. nec non in Castil. (S. de Guadarrama). *T. montano* (6) approximandum est.

14. *T. alliaceum*: Castil. et Arag. (in utr. r.), etiam in Valenc. et Bætica. indicatum. Bavar. (Alpes or. in agris pr. Berchtesgaden). Galiz. (rr.) ex Rehmann. Moldav. Bulgar. (: Skorpil ex Vandas). Bosn. mer. (ex GBeck).

15. *T. virgatum*: Helv. mer. (*T. brachypetal.*); etiam Catal. (pyren.) indicatur.

16. *T. alpestre* (*T. ambiguum* Jord.); Norv. mer. (Bryhn 1881); Suec. mer. in sola Ostrog. (r.) adest, ceterum in Suderm. et Upland. r. lectum. Podol. Ucrain. (*T. præcox* Andr. ex Stev.). Taur.; etiam Hisp. bor. et or. (rr.) indicatum. — *T. arenarium*; dep. Aveyron (vid. Le Grand in bull. soc. bot. 1881. 53 *). — *T. rhæticum*; *T. Salisii* Brügg. (Engadin).

**T. virens*; — *T. Mureti* Grml. (Alpes helv. r.).

16. a. *T. stenopterum* Boiss. Reut. (in Consp. = 16 * *T. virentis* var.). Astur. (mont.). Castil. (mts Carpetani); Arag. pr. Albarracin ex Zapater. Species rara et a specie præced. bene distincta sec. Willkomm.

16. b. *T. commutatum* Roch. banat. rar. 6. (1828). *T. robustum* Sch. hb. transs. (1850). *T. banaticum* Uechtr. (1875). *T. alpestre* Heuff. *T. alpinum* Borb. Banat. (Mehadia, Domuglett). Transs. (r.).

17. *T. Kovatsii* nunc supra (n. 11) militat.

18. *T. dacicum*; *T. alpestre* Bmg., Schur, Sch. hb. transs. 378. *T. korongianum* (Czetz ap. Jka 1856 (nomen solum), *T. korongiense* ej. ap. eund. 1859. *T. banaticum* Borb. (non Uechtr.); ex Simonk. — Banat. Transs. (Korongy, Fogaras, etc.).

19. *T. præcox*: Istr. Carinth. (r.); Transs. ad *T. perfoliatum* (4) pertinet ex Simonkai.

**T. Jankæ*: Slivno Rumel.or. (: Skorpil ex Velen.).

20 *. *T. brevistylum* Jord. *Hutchinsia pygmæa* Viv.: Sard. ex Gillot 1877 (*T. rivale* Mor.?).

21. *T. microphyllum*: Aetolie m. Korax, reg. alp. (: Heldreich ex Boiss).

22. *T. rotundifolium*; Transs. ad *T. dacicum* pertinet ex Simonk.; indicatur etiam (Colm.) in Catal. (S. de Nuria), ubi ex Willkomm "certe non provenit". — *T. corymbosum*; *T. cepeæfolium* Moritzi (non nisi ad Zermatt lectum est).

23. *T. nevadense*; habitat in reg. alp. montis S. Nevada (ubi a Funk detectum 1848) et in m. S. de Guadarrama Castil. (: Bourgeau).

24. *T. cepeæfolium*: Styr. alp. Hochschwab (: Stur ex Maly); Carinth. in calcareis alpium carnic. satis adest ex Pacher; Vales., ubi a Koch et al. indicatur, probab. ad *T. corymbosum* (22—) pertinet. Comment. 46.

65. *Teesdalia*. 1. *T. Iberis*; deest etiam in Scand.med. (Suec. non ultra Smolandiam lecta est); adest Ross.mer.-occ. ex Schmalhausen.

66. *Æthionema*. 2. *Æ. saxatile*: Hisp.bor.-or., or. et centr. (sed non bor. p. d.), Murc.; Roman. Istr. — *Æ. banaticum* ex Freyn (in act. soc. z.-b. vind. 1877) certe hic pertinet et = planta istriaca (var. *gracile* Freyn.).

**Æ. ovalifolium* (cfr. 2. a); reg. alp. et subalp. montium Gran. et (r.) Valenc.: Arag. r. (: Campo); etiam in Pyren. gall. adest ex Willk. (pic de Crabère dep. H.-Pyr. ex Rouy). — *Æ. almi-jarensis* Amo. (S. de Almi-jara Beticæ: Campo).

2. a. *Æ. creticum* Boiss. (et Heldr.) or. suppl. 61. *Æ. ovalifolium* Boiss. (antea) quoad plantam creticam (pl. pelop. ad seq. *Æ. gracile* pertinet). — *Crète mts Sphaciotici* (: Heldreich) et *Lakous* (: Reverchon); m. *Kalolamni ins. Karpavhos* (: Pichler).

3. *Æ. gracile*; Carinth. (pr. Raiblensee: Jaborn. et al.) a Pacher indicatur.

6. *Æ. monospermum*; a Brownio olim ex Hispania indicatum, recenter ibi non lectum est.

**Æ. pyrenaicum*; planta rarissima: Montgaillard pr. Foix.

67. *Lepidium*. 1. *L. lineare*; Hisp. non nisi auctoritate DC. indicatum (Willk. Lge).

2. *L. graminifolium*: Istr. Bulgar. (: Bornmüller, Vandas).

3. *L. suffruticosum* (*L. graminifolium* Cav. ic. non L.); species rarior, paucis locis Hisp.or. (cum Balear.), centr. et mer. lecta.

4. *L. latifolium*: Bavar. (r.). Morav. (pr. Klobouk). Galiz.mer.-or. (r.). Moldav. Dobr.; Germ.bor. aliquot locis introductum et subspontanum; in Gall.or. (sic in Côte-d'Or) ex hortis a fuga et radicibus longe procurrentibus (immo muros penetrant.) propagatum: Royer.

5. *L. crassifolium*: hab. etiam Moldav.

6. *L. Draba*: Sussex Angl., ubi ad Newhavn jam a multis annis in cultis valde molestum dicitur; Ramsgate, Portsmouth etc. recentius introductum. Carls-cronæ Suec.mer. (ubi ante semiseculum cum saburra nav. introd.) nunc quasi indigenum et etiam Norv.mer. nuper lectum; Dan. in ruderalis Amager.

8. *L. perfoliatum*: Carinth. (Klagenf., Berg). Moldav. Dobr. Ross.med. (Mohilew: Lindem.). Morav. (ex Hung. introd. 1866). Alsat. sub bello germanico introductum, ibi nunc inquilinum videtur (quod de plurimis aliis plantis ibi eodem modo introductis negatur). Hisp. adest in utr. Castil., in regno Legion. (r.: Lge), Astur. (Lag.) et Navar. (Duf.).

9 *. *L. ambiguum*; unico loco (Ciempozuelos) et specim. paucis lectum et quidem inter *L. subulatum* et *L. Cardamines*, a quibus probab. hybridum (Lge in litt. 1888).

11. *L. majus* (ut jam apud G. G.) est *L. virginicum* L., in Europam introductum et nunc quasi indigenum: Hisp. bor.-or. (San Sebastian). Gall. mer.-occ. tota (jam 1877 a Bayona ad Burdigalam et Pau distributum), vias ferratas sequens, unde et ad margines viarum publicarum et loca deserta dispersum est (: Dubalen); porro ad fluv. Marne (pr. Charenton: Franchet) lectum, in "la Rhune" Gall. or. satis obvium (: Boullu 1880) et nunc etiam in Normand. (Cherbourg, Fécamp) inquil. (cfr. Corbière in bull. soc. linn. norm. 1887). Belg. (: Bagnet 1882). Germ. bor. (Pomeran., Berolin. etc.: Aschn).

13. *L. ruderale*; adest in Fenn. plur.; Hisp. (in tota ex Willk. Lge; sec. Colm. parum extra Catal.).

14. *L. subulatum*; in Hisp. bor. deest.

15. *L. spinosum*; cultum et quasi spontan. pr. Malaga (Hänsel., Webb, Boiss.) et Mahon Balear. (Pourr.): Colmeiro.

17. *L. Carrerasii*; obs. Willkomm hæc species valde similis est *P. spinoso*, quare indicatio Pourretii sub illo huc probab. pertinet; rarior et solum ad Mahon et pauciss. aliis locis lecta, a Rodriguez l. c. (1874) Dri J. Carreras, medico urbis dictæ, dicata.

18. *L. campestre*; Suec. bor. adest (r.) in Angermania; Fenn. deest exc. in Aboa et Aland.; Lusit. nunc (r.) lectum a P. Coutinho.

18. a. *L. Ramburei* Boiss. voy. 52. Hisp. mer. prov. malacit., pr. pagum Colmenar: Ramb. ex Boiss.; ab aliis non lectum.

19. *L. hirtum*: Hisp. quasi tota, sed ubique rarum videtur; Lusit. ex Willk. Lge.

20. *L. heterophyllum*; adest Hisp. or., centr. (Bourg. hisp. exs. 2601), bor.; Belg. introductum et inconstans ex Crepin. — *L. Smithii*; etiam Belg. (Crepin 1881; Magn. fl. sel. exs. 20); Hisp. centr. etc.

21. *L. calycotrichum* hab. in reg. alp. et subalp. montium granat. et (var. *brachystylum* Willk. *L. calycotr.* Losc. Pard.) in Aragon. mer.

22. *L. petrophilum*; species rara, reg. alpinam et nivalem montium granat. (S. Nevada, S. de Baza) inhabitans.

23. *L. nebrodense*: Arcad. (ex Lacaita in litt.).

24. *L. stylatum*; hæc rara species reg. nivalem montis S. Nevada (inter 9000 et 10000') inhabitat; in montib. jiennensib. (Jaën) a Blanco lecta est.

68. *Coronopus*. 2. *C. didymus*: Helv. (Genève, Lausanne, Bern). Badia (Carlsruhe), Thuring. (Schnepfenthal); Germ. bor.: Altona, Hamburg, Wolgast.; Livon. (pr. Riga).

69. *Hutchinsia*. 1. *H. alpina*: Hisp. or. Castil.; Sty. etiam in montib. Sulzbach. adest. Bavar., cum fluviis alpinis devecta, ad München et Augsburg; Würtemb. pr. Aitrach ad fluv. Iller. — *H. brevicaulis*: Helv. (Alpes).

**H. Auerswaldi*; *Nocca* Auerswaldi Willk. ap. Willk. Lge. *H. alpina* var. *gracilis* Ler. Lev. deux excurs.: reg. mont. et alp. Galloec. (Lge), Astur. (*H. alpina* Bourg. hisp. exs. 2599), Cantabr. (in m. Peña Gorveya detecta a Willkomm 1850).

2. *H. petraea* (*Lepidium petraeum* L.); deest in Norv. tota (ex Bl. et Htn) et etiam in Suec. med. plur. — *H. granatensis* (Amo). — *H. nana* (Willk.). *Lepidium tetraspermum* Duf. (ex Willk.): Castil., Catalon., in utr. r.

**H. aragonensis* Losc. Pard. in Losc. trat. pl. arag. (1877-8) ex Willk. *H. petraea* var. *aragonensis* Losc. Pard. series. — Aragon. mer.

3. *H. procumbens*: Istr. Dobrud. (in pratis salsis reg. litor.). Ross. mer.-occ., mer. (Cherson, Taur.), mer.-or. (Sarepta: Becker); Germ. rara est: pr. Stassfurt, Magdeburg, Frankenhause etc. (in salsuginosis).

4. *H. pauciflora*: Helv. mer. (Engadin Bundie, ubi a Brügger detecta 1885; vid. Killias fl. unterengad. 18).

70. **Capsella**. 2. *C. rubella*: Helv. mer. Sard. (Schweinf. ex Aschn.) Ital. mer. (Otranto: HGroves). Græc. (Attica: Heldr.; ad m. Ziria: Orph.) ex Boiss. Croat. (Fiume copiose: Untchj). Westphal. (Altena: Focke 1875). Comment. 47.
3. *C. grandiflora*: Aetolia (ad Missolungh.) et Eurytania: Heldr. ex Boiss.
71. **Bivonæa**. 2. *B. Saviana* (Minæa Saviana Lojac.); Hetr. mer. marit. (raro), ubi in montis Calvi cacum. S. Leonardo, locis silvaticis, a P. Savi 1845 detecta est; Dr Forsyth Major (pl. ital. sel. exs.) eam legit in eodem monte ad orient. pagi S. Vincenzo, in herbosis.
- Obs. Genus Minæa Lojac. (n. gior. bot. ital. 1881) cum specie præced. (*M. Saviana*) etiam *M. Prolongi* (Thlaspi Prolongi Boiss.) comprehendit. De hoc genere cum proximis cfr. "Sui generi Jonopsidium e Pastorea, e sul nuovo genere Minea, per M. Lojacono", in nuov. giorn. bot. ital. 1881. 291—307 (*).
72. **Jonopsidium**. 1. *J. albiflorum*; *Bivonæa albiflora* Bert. Pastorea albiflora Lojac. (1881).
2. *J. acaule*; Comment. 48.
73. **Isatis**. 1. *I. lusitanica*; Lusit. solum a Brotero et Hoffmannsegg lecta (Miranda do Douro, in rupibus). Hisp. (Extremad) sec. Palau.
4. *I. præcox* Kit. ap. Tratt. (1814); DC. (1821): Moldav. Transs. multis loc. (*I. tinctoria* Bmg. et auct. transs. plur. *I. campestris* Schur; ex Simonk.). — *I. banatica* Lk (in Consp. sub *I. tinctor.* allata): Banat. Valach.
- **I. transsilvanica* Simk. in term. füzet. X. (1886). 180. *I. lasiocarpa* Schur. — Transs. Banat.
5. *I. litoralis*: Ross. mer. etiam in gub. Cherson (ad mare).
7. *I. tinctoria*; Norv. indicatur: Lørdal in Sogn et Grønholmen (Salten) et ex Norman (1881) certe spontanea est in Norv. arct. (lat. 68° 49'), ubi in loco lapidoso, a cultura remoto, obvia. — *I. lasiocarpa*; pl. transs. ad *I. transsilvan.* (4*) pertinet ex Simonk. — *I. heterocarpa* Andr. *I. tinctoria microcarpa* DC. (Ross. mer. occ.).
8. *I. Villarsii*: Delph. Sabaud. Vales.; sec. Favrat (1880) et Gremli (1885) est solum "forma æstivalis et autumnalis" *I. tinctoriæ*.
8. a. *I. athoa* Boiss. or. suppl. 64. — Maced. m. Athos (: Pichler).
75. **Bunias**. 1. *B. orientalis*: Hassia, Bavar. bor.; etiam Dan. nunc omnino inquil.; Fenn. mer., med.; Roman.
76. **Erucago**. 1. *E. campestris*: Catal. (Hisp. or.), ubi plurib. loc. lecta. Bavar. (introd.). Istr.
77. **Myagrum**. 1. *M. perfoliatum*: Istr. Bulgar. Bavar. (Augsburg etc.), ex Geke in tota Germ. rarum, cum seminibus extraneis introductum et inconstans. Sard. (: Biondi ex Barbey); Helv. (ex Gremli) non nisi fortuito introd.; Hisp. rarum est et vix nisi in or. obvium quamquam antiquitus etiam in centr. etc. indicetur.
78. **Neslia**. 1. *N. paniculata*; adest in Fenn. mer. et med.
79. **Euclidium**. 1. *E. syriacum*: Helv. mer. occ. (in ruderalis, r.). Bohem. (: Celak.). Styr. (pr. Cilli ex Maly). Dobrud. Ross. gub. Kursk, pr. urbem ad vias copiose (: Lindem.).
79. a. **Ochtodium** DC. syst. II. 423.
1. *O. ægyptiacum* DC. l. c. *Bunias ægyptiaca* L. Hetr. sec. Arcang. 1882 (certe introd.).
80. **Calepina**. 1. *C. Corvini*: Batav. (ad fines belgicas: Verheggen 1874). Luxemb. (: Tinant). Belg. (: Crepin 1881). Bavar. (Phalz.). Helv. (cant. Vaud, r.; Basil.). Dobrud. (in desertis passim). Bulgar.

VII. CAPPARIDEÆ.

1. **Capparis.** 1. *C. spinosa*: hab. etiam in ins. Balear.
**C. rupestris* (*C. rotundifolia* Pourr.): Catal. Valenc. Balear.
2. *C. sicula*; in *Hisp.* rarissima est: Xeres de la Frontera (etc.).
2. **Cleome.** 1. *C. violacea*: *Hisp. or.* (valent.) ex Ortega et bor.-occ. (galloec.) ex Quer.

VIII. RESEDACEÆ.

1. **Reseda.** 1. *R. bipinnata*; species rara, non nisi in agro Matrit. et in Bætica (Sierra de Yunquera, de Mijas etc.) lecta. Comment. 49.
1. *a.* *R. macrostachya* Lge ap. Willk. Lge III. 890. *R. bipinnata* Losc. Pard. ser. imp. 51. -- Arag. mer.
2. *R. Barrelieri*; *R. bætica* Gay in hb. Boiss., quod nomen nunc, altero antepositum, a Lange editum est in Willk. Lge prodr. hisp. (1880); ex eo speciei centrum videtur Bætica or., ubi reg. montanam et subalpin. inhabitat.
3. *R. alba*; *Hisp. bor.* deest et in centr. r. indicatur.
4. *R. undata*; — *R. bætica* ad *R. Barrelieri* (2) pertinet. — *R. Gayana* ne quidem varietas est ex Willk. Lge, quare hoc nomen illi *R. undatæ*, "varie interpretato et non certissimo" præferunt.
**R. leucantha* Hegelm. ap. Willk. Lge (1880). Valenc. (: Hegelmaier, Rouy). Murc. (: Guirao, Rouy). Matrit. (: Rouy 1883). Sec. Rouy sit varietas (brevipes) speciei præced. (*R. Gayanæ*).
5. *R. media*: *Hisp. bor.-occ.* (Galloec.), centr. (Burgos).
Obs. *R. odorata* L., species ubique culta patriâ ignotâ, quasi medium tenet inter præced. (*R. media*) et sequent. (*R. Phyteuma*), e cujus varietate odorata (*R. aragonensis*) forse cultura orta est.
6. *R. Phyteuma*: Gall. mer.-occ. (dep. Gironde), bor. (Normand.) in campis sabulosis et dunis cultis (: Moriére); dep. Aube (Gall. med.) primitus introd. (Briard ex Le Grand). Istr. — *R. aragonensis*: Pyren. or. freq. (: Debeaux).
7. *R. inodora*: Valach. Dobrud. Ross. mer. (Cherson).
7. *a.* *R. tymphæa* Hsskt. in mitteil. bot. ver. — Thessal. (ad Peneum super.: Haussknecht).
10. *R. lanceolata*; — *R. constricta* est propria species (cfr. Willk. Lge III. 893):
10. *a.* *R. constricta* Lge descr. ic. illustr. 6.
Hisp. mer.: Jaën (: Lge, Winkl.), Murc. (: Rouy). Species, observ. auct. Lange (litt. 1879) a præced. (*R. lanceol.*) toto coelo diversa est; vir laudatus utramque in *Hisp.* legit et *R. constrictam* coluit et observavit in hort. havn.
12. *R. lutea*; in Germ. bor. deest vel rara et Dan. non nisi adv. (rarior). — *R. Yannezii*: Galloec. (: Texidor). Cast. (: plur.). Murc. (: Rouy). — ? *R. Reyeri* Porta, Rigo. (Ital. mer.: Otranto, capo di Leuca).
13. *R. ramosissima*; species rariss. et non nisi in collibus gypsaceis ad Aranjuez lecta.
14. *R. glauca*: *Hisp. bor.-or.* (Picos-de-Europa: Ler. Lev.).
15. *R. gredensis*; *Hisp. centr. reg. alpin.* inter 7000 et 9000' inhabitat: Castil. (Sierra de Gredos etc.). Extrem (S. de Majareina: Bourg.); Leon (: Graëlls).
- 18 *. *R. Gussonii*: *Hisp. præcip. mer., mer.-occ.*
2. **Astrocarpus.** 1. *A. suffruticosus* est species rara, *Hisp. or.-occ.* (Galloeciam) inhabitans, ab auct. ejus unico loco lecta (sec. Texidor plur. locis adest).
Obs. *Oligomeris subulata* Boiss. fl. or. (*O. glaucescens* Boiss. voy.), cujus specimen Rambureus olim pr. Granada legit, dein nec ibi (ubi probab. casu solum occurrebat) nec alibi in Europa reperta est; itaque genus hocce e flora europæa excludetur.

IX. CISTINEÆ.

1. *Cistus*. 1 *. *C. varius* (*C. Pouzolzii* Del.): Catal. (Barcelona); Gall. mer. in Ceven.med., ubi plurib. locis abundat et minime hybr. (Loret in bull. soc. bot. 1880. 271 *); apud Willk. Lge post *C. monspeliensis*, recensitur, de hybriditate nullus sermo.

2. *C. crispus*; — *C. albido-crispus*: Gran. (Boiss.). Lusit. (Welw.).

3. *C. villosus*; ex Willkomm recentiori tempore in Hisp. vix observatus est. — *C. corsicus*: Sard. (: Reverchon).

**C. creticus*; — *C. garganicus*; exs. Porta. Rigo 236 (e loco classico). — *C. tauricus* Pr. (Taur.).

4 *. *C. Skånbergi* Lojac. in natural. sicil. 1884. 16 (*). *C. incanus* β Guss. e Lampedusa, ubi cl. Lojacono hanc plantam 1884 observavit; etiam cum *C. monspeliensis* multum habet commune et forse ab eo procreatus, sed pollen normale (Lojac.).

5. *C. populifolius*: Hisp. bor. occ. (Galloec.); etiam Arag. et Valenc. ex Asso et Cav.

7. *C. longifolius*; in Hisp. nuper non lectus ex Willkomm sed probab. adest in Catal.

9. *C. salvifolius*: Helv. mer. (cant. Ticino pr. Locarno et Ascona).

10. *C. monspeliensis*; — *C. affinis* melius subspeciem salutanda est (cfr. Guss. syn. fl. sic.).

12. *C. ladaniferus*: Hisp. bor. occ. (Galloec.). — *C. grandiflorus* Pourr.

13. *C. Clusii*: Hisp. or.: Catal. Valenc. Balear. (Mallorca, r., Ibiza). — *Halimium Clusii* Sp. — *Helianthem. Libanotis* Guss. (non W.).

2. *Helianthemum*. 1. *H. umbellatum*; *H. anthurus* Lk.

3. *H. occidentale*; *Halimium occidentale* Willk. etiam *H. alyssoides* (9) et *H. cheiranthoides* (9 * excl. varr.) comprehendit.

7. *H. halimifolium*; Hisp. inhabitat impr. mer. et or. (litoralem). — *H. crispulum* a Boiss. Reut. prope Algeiras prov. gadit. lectum est.

7. a. *H. multiflorum* Salzm. ined. (sched. plant. tingit.). *Halimium multiflorum* Willk. ic. II. 67.

Lusit.; Magnier fl. sel. exs. 1378 (cfr. ej. scriin. 114 *). — *H. involueratum* P. (in Consp. exstat sub 9 *): Extrem. (Pourr. ex Amo); Lusit.

8. *H. formosum*; *Halimium formosum* Willk.; Magn. fl. sel. exs. 1376! — Species rariss. et solum in Serra de Monchique lecta ibique nuper a Daveau re-detecta.

9. *H. alyssoides*; *Halimium lasianthum* Sp. comprehendit etiam *Helianthem. lasianthum* (9. a).

**H. cheiranthoides*; — *H. lasianthum* est propr. spec. (9. a). — *H. involueratum* ad *H. multiflorum* (7. a) pertinet.

9. a. *H. lasianthum* P. syn. II. 76. *Halimium eriocephalum* Willk. *Cistus lasianthus* Lam. in Brot. lusit. *C. eriocephalus* Amo.

Bætic. Lusit. (Magn. fl. sel. exs. 1377; cf. ej. scriin. 113). Hæc species in Consp. minus bene sub *H. cheiranthoide* (9 *) enumeratur.

10. *H. globulariæfolium* (*Tuberaria globulariæfolia* Willk.): Extrem. (sec. Quer). Bætic. (ex Webb). — *H. Langei*; (Galloec.).

11. *H. Tuberaria*; *Tuberaria vulgaris* Willk.

12. *H. bupleurifolium* (*Tuberaria bupleurifolia* Willk.); Bourg. hisp. exs. 1770 ex Willk. (in Consp. sub 15 * *H. inconspicuo* citatur).

13. *H. echioides*; rarum est et non nisi in territ. gaditano et gibraltar. lectum. — *H. heterodoxum* certe huc pertinet ex Willk.

15. *H. guttatum* (*Tuberaria variabilis* Willk.); Germ. bor. nunc non valde rarum est et in centr. (Hassia) pr. Darmst. lectum; Istr. Epirus (: Chodzes ex Heldr.

1879). Attica (Heldr. hb. norm. 905). — *H. plantagineum*: Lusit. (Bourg. exs. 1768). — *H. punctatum*: Serra de Cintra Lusit. (: Welw.). — *H. ericaulon* (*H. semistipulatum* Lag.): Cast. (pr. Escorial). Bætic. Balear. — *H. Vivianii* Pollin. in Rehb. ic. *Cistus acuminatus* Viv.

**H. inconspicuum* (*Tabularia inconspicua* Willk.: *Hisp. matrit. et gibralt.*) potius speciem sistit, a qua bene distinctum sit:

15. *a. H. brevipes* Boiss. Reut. pug. 13. *Tabularia brevipes* Willk. — S. Roque pr. Gibraltar, ubi a Boissier et Reuter detectum a. 1849.

17. *H. petiolatum*; in *Hisp.* a Thibaud indicatum, est species dubia, incertæ sedis (Willk.).

19 *. *H. lasiocarpum*: Dobrud. in deserto saxoso inter Sariat et K. Nasib (: Sintenis).

21. *H. salicifolium*; *Hisp.* etiam or. et bor.-or. sat adest; *Helv.* solum in Vales. (pr. Branson); *Phalerus Atticæ* (ad mare!): *Lacaita* in litt.; in *Hisp. centr.* (Burgos) et mer. (hinc inde) occurrit var. *trifoliata* Willk. (= bracteis stipulatis), ad quam referas Bourg. *hisp.* exs. 1076 (in *Consp.* sub specie seq. citatur).

22. *H. intermedium*: *Hisp. or.* (Valenc. Catal. Arag.). *H. salicifolium* Sp. et *Cistus salicifolius* Cav. (non L.) ex Willk.

25. *H. sessiliflorum*: Patimisco, in collibus arenosis mari proximis prope ostium flum. Taro (T. d'Otranto): HGroves.

26. *H. lavandulæfolium*; *Cistus racemosus* Cav. et probab. etiam L.; cfr. Rouy exc. bot. esp. in rev. sc. nat. 1883. 60 (sep. *).

27. *H. caput felis*; species rariss.: Valenc. in calcareis litoral. "loco Calpe dicto ad radices septentrionales montis Hifac" (Willk.). Balear. (Mallorca, salinas de Campos: Marès 1855).

28. *H. glaucum*: Ital.mer. — *H. rupincolum* Huter. Rigo (ex HGroves flora T. d'Otranto).

**H. croceum*: Leon, Extrem., Gran.; Bourg. *hisp.* exs. 2404. 2604.

**H. græcum*; — *H. stabianum* non huc pertinet sed est *H. glaucum* ipsiss. excepto calyce, qui medium tenet inter illum *H. vulgaris* et *H. asperi* (*Lacaita* in litt. 1884).

29. *H. leptophyllum*; species valde rara videtur, prope Purullena et Almeria regni gran. nec non pr. urbem Murcia indicata. — *H. Lacaitæ* nob. (flores lutei): Ital.mer. ad litus inter Taranto et Metaponto et ad Leucaspide a cl. Lacaita detectum (cfr. HGroves in giorn. bot. ital. 1887).

30. *H. vulgare*; exc. etiam Norv. (teste ABlytt) — *H. serpyllifolium* Bmg., Schur (ex Simonk.). — *H. obscurum* P. (1807). *H. vulgare-hirsutum* K.; *H. hirsutum* Kern. (1883). *H. grandiflorum* Schur ex Simonk. — *H. roseum*; cfr. ad *H. polifolium* (33).

**H. grandiflorum*: Voges. (Hohneck: Godr.). Roman. (m. Muscel. Dimboviciora); Transs. ad var. *H. obscurum* (vid. mox supra) pertinet.

**H. serpyllifolium*; *H. heterophyllum* est *H. vulgare* ipsiss. et *H. rupincolum* ad var. *H. obscurum* pertinet ex Simonk. Comment. 50.

31. *H. hirtum*; — *H. aureum* P. (Gall.mer. etc.?).

32. *H. piliferum*; montib. Sierra Nevada et S. de Alfacer (inter 3000 et 6000') primum videtur (Boiss., Willk.).

33. *H. polifolium*; Germ. adest solum in Ockenheiner-Spitze inter Mainz et Bingen; Bavar. bor.-occ. (Würzburg etc.). Sty. pr. Grosssonntag (: Verbniaik ex Maly). — *H. apenninum*; *H. controversum* FSz. palat. et fl. gall.-germ. exs. 1219 ex Willk. — *H. roseum* DC., in *Consp.* sub *H. vulgare* (30) allatum, est var. *H. polifolii* sec. Willk.

**H. virgatum*: Mallorca, in caecuminib. montium (couma de Arbona, puig major de Torrella, puig de Massanella). Catal. (Willk.). Valenc. (ex Duf.); ex Willkomm bene distincta species (inter 33 et 34 media), ejus var. est: — *H. ciliatum* (38), in *Hisp. or.* tota et in centr. rr. obvium.

34. *H. pilosum*: Alp.-Marit. (Le Chaudan, mt du Cheiron: Ardoino). Præeunte cl. Rouy (rev. sc. nat. 1883) ab hoc separentur, in majorem dignitatem eleventur et sic disponentur:

**H. lineare* P.; *H. racemosum* var. *violascens* Dun. — *H. violaceum* P.

**H. strictum* P.; *H. racemosum* var. *farinosum* Dun.

36. *H. semiglabrum* (*Cistus roseus* Jacq.): Alp.-Marit. (Mentone, non rarum: Ardoino).

38. *H. ciliatum* est var. *H. virgati* (33 *) sec. Willk.

40. *H. Guiraoi* (*H. pilosum* Guir. non P.) est proles hybr. *H. viscarii* (35) et *H. asperi* (39), cum quibus in regno murcico crescit. (Willk.).

43. *H. Sexte*; sec. Willk. et Colm. idem est a *H. crassifolium* (42) utrumque vero dubium et non nisi auct. Lagasca allatum.

45. *H. paniculatum*; habitat in *Hisp. centr. mer. et or., Lusit.* — *H. rotundifolium* Dun. *Cistus nummularius* Cav. (*Hisp. mer., mer.-or., centr.*) ex Willk. — *H. rubellum* Guir. non P. (Murc.).

47. *H. Rossmæssleri* solum in reg. mont. regni Gran or. lectum est (a Rossmæssler detect.).

48. *H. pannosum*; hæc species non nisi in Cerro de Trebenque montis S. Nevada (inter 6000 et 6500') lecta videtur.

49. *H. rubellum*; *Hisp.* adest præcipue in reg. mont. et alp. regni granat. (*H. paniculatum* Boiss.); Murc. (Guir., Bourg.); Jaën (: Blanco). — *H. rotundifolium* ad *H. paniculatum* (45) pertinet sec. Willk.

50. *H. vineale*: Badia (pr. Boxberg), Würtemb. (in Böllert ad Pfeffingen). Bulgar. et Rumel.or. (: Velenov.). Herceg. (: Vandas). Ross. centr. (Kursk, in cretaceis: Lindem.). — *H. rupifragum* Kern. (oe. bot. z. 1868). *H. marifolium* Bmg. (non DC.). *H. alpestre* et *H. ambiguum* Schur. *H. penicillatum* Simk. (Transs. tota et Morav. m. Kotouc pr. Stramberg, ubi detectum a Czizek 1881).

51 * *H. oelandicum*: Ross. mer.-occ. — *H. alpestre*: Roman. (alp. Bucieciu). Comment. 51.

52. *H. molle*; est var. *H. organifolii* (53) sec. Willk.: Valenc. (r.) ex Cavanilles.

53. *H. organifolium*: *Hisp. or.* etiam adest. — *H. Serræ* hab. in Mallorca (inter Torre d'en Pou et Torre Redona pr. Palma, planta endemica). — *H. dichotomum* Dun. (54) varietatem glabratum Willk. sistit.

54. *H. dichotomum* (in Valenc. et Catal. indicatum) vid. sub præced.

57. *H. thymifolium*: *Hisp. or., bor.-or., centr.* — *H. viride*: Balear., Valenc., Bætic. — *H. leve* P. (*Fumana hispidula* Losc. Pard.): *Hisp. or.*; centr. (rr.), murc. (rr.).

* *H. glutinosum*: *Hisp. or., bor.-or., centr. Istr.*; adest etiam in Epiro (: Chodzes ex Heldr. 1879). — *H. Barrellieri*: Mallorca, Valenc. Bætica.

58 * *H. ericoides*; *Fumana vulgaris* Sp. p. p. *Cistus Fumana* β L. sp.

59. *H. procumbens* (*Fumana vulgaris* Sp. p. p.): *Hisp.* (in bor. r.), sed ibi præcedente (*H. Fumana*) rarius videtur. Belg. in collibus calcareis inter Matagne-la-Petite et Vierves (: François 1881). Roman. Bulgar. Rumel.or. Istr.

× *H. Heerii* Brügg. = *alpestre* + *vulgare*. (Helv.).

× *H. Sieberi* Brügg. = *Fumana* + *vulgare*. (Bergamo).

X. VIOLARIEÆ.

1. *Viola*. 1. *V. arborescens*: *Hisp. or.* (cum Balear.). — *V. suberosa* Dsf.; *V. lusitanica* Pourr. (Algarv., Cadiz).

2. *V. elatior*: Helv. (Genève, Orbe etc.). Bulgar. Dobrud.

3. *V. pratensis*; etiam Vestrog. (Suec. mer.) r. lecta; Carinth., Bavar., Siles. — *V. biturigensis* Bor. ap. Desegl. 1863 ex Le Grand in bull. soc. bot. 1881: Gall. dep. Cher (: Boreau 1853), Indre (: Le Grand 1860).

4. *V. persicæfolia*: Fenn. mer. *Hisp. bor.-or.* (Navar. Vize.) r., bor.-occ.? Moldav. *V. Ruppil* Fuss. *V. Schultzii* auct. transs. (ex Simonk.). — *V. stipularis* Peterm.! (Lipsiæ, inter *V. pratensem* et *V. caninam*); est var. florib. partim coeruleis.

5. *V. Schultzii*: Friesland.or. (in Geest) et Bavar. (pr. Berchtesgaden etc.), ex Gecke ("certe var. præcedentis"); Transs. (*V. macrostipulata* Schur) ad præced. pertinet ex Simonk.

6. *V. stricta*: Helv. Ross.bor., med.; Dobrud. (var. pubesc. Uechtr. Sinten.).
7. *V. montana*; etiam Dalecarl. et Vermel. (Suec. med.); immo Ostrog. et Blek. (Suec. mer.) indicata; adest in tota Fenn.
8. *V. mirabilis*: Fenn. mer. et or. (Carel.). Dan. Lotharing. Dobrudscha; deest in Norv. arct. (ad Stegen Nordland. a Norman observata est).
8. *a. V. Willkommii* R. v. Roem. in Willk. enum. in linn. 1852. 10. *V. pyrenaica* Willk. in sched. 1846 (non Ram.). Catal. (Montserrat: Willk. 1846). Arag. mer. (pr. Penarroya: Loscos).
9. *V. silvatica*; deest etiam Fenn. bor. (exc. Ostrob.). — *V. Reichenbachiana*: Istr.; Angl. ex. gr. Hampsh. (: Townsend); certe etiam alibi. — ? *V. olimpia* Begg. in att. soc. ital. VIIL (Dchemnitz Hung.) ex Jka 1882.
10. *V. arenaria* (*V. cinerascens* Kern. ex Hzl.): Aragon. (: Campo, Timb.-Lagr., Loscos); Suec. bor. r. (Jemtia, Angerm.), sed deest (exc. var. glaberr. Murb.) in Fenn. bor. (cum Lapp.). — *V. saxigena* vid. seq. (*V. canina*).
**V. puberula* Lge. — Bætic. Sierra de Alfacar (: H. P. R.).
11. *V. canina* (*V. lancifolia* et *V. saxigena* Schur ex Simonk.); deest etiam in Fenn. bor.
12. *V. lactea*: Angl. etiam Hampsh. (: Townsend). Belg. pr. Exaerde in Campine (: Hecking 1873). Gall. bor.-occ. Hisp. bor. (Galloe., Santander: Lge).
13. *V. odorata*; etiam Norv. (mer.) non nisi inquil. adest. — *V. multicaulis*: Vindob. (Wien). Hung. Istr. mer. (Freyn 1876). Transs. (*V. pseudosuavis* Schur) et Hung. (Carpat. minor. etc.). — *V. hybrida* ad *V. permixtam* (15 x) ref. — ? *V. variegata* Rossm. (Croat.). Comment. 52.
**V. Dehnhardtii* melius sub *V. hirta* (15) citanda videtur; etiam Hung. adest ex Simkov. 1878.
- **V. suavis*: Moldav.; Thuring. (et Morav.) excl. (vid. **cyanea*). — *V. austriaca* A. et J. Kern. in ber. nat.-med. vers. Innsbr. 1872; AKern. in oestr. bot. z. et exs. 67: Hung. Austr. mer. et Austr. Infer. (ubi sec. Halacsy vulgata). Transs. (*V. suavis* auct. plur. et — *V. hortensis* Schur). Istr. mer. (Kerner, Freyn). Bosn. (: Brandis 1886 ex Freyn). Vales. (*V. Steveni* Fauconnet). — *V. Beraudii* Bor. (in Consp. sub 17 allata): Gall. Helv. mer.-occ.
- **V. cyanea* (*V. suavis* auct. bohém. et siles. plur.): Bohem. Siles. Lusat. Morav. (rarius). Bavar. (pr. Passau). Wriezen.
14. *V. alba*: Alsat. (pr. Wasselnheim), Badia (ex Gcke). Öland. (ad Borgholm: Neuman 1886). Morav. mer. (r.). Sty. (: Maly). Helv. plur. Banat. (: Borbàs). Moldav. Dobrud. Bulgar. — *V. virescens*: Helv.; Istr.: Freyn, cui var. subspeciei proximæ *V. scotophyllæ*; (an huc *V. alba* Colm. ex Hisp. or.?). — *V. microceras* Schur (non Rupr.) et *V. præcox* Fuss ex Simonk.! — *V. scotophylloides* Wiesb. ex ipso (non est planta hybr.).
**V. scotophylla*: Sierra Morena Bætic. (Lge). Istr. (: Tommasini, Freyn). Croat. (Fiume: Hire 1882). Bosn. (ex Borbàs 1883, Brandis 1886). — ? *V. picta* Schloss. Vuk. (Croat.). — De hac et plurib. aliis Violis ejusd. gregis cfr. Freyn, Flora von Süd-Istrien, in act. soc. z.-b. vind. 1877.
- **V. adriatica* Freyn in Flora 1884. — Dalm. ins. Lussin (*V. Dehnhardti* Freyn nachtr. südistr. 1881). Croat. (Buccari: Hire, nom. *V. austriacæ*).
- **V. badensis*: Baden Austr.; Pressburg Hung.
14. *a. V. Jaubertiana* Marès, Vigin. cat. balear. 31 (cum ic.). - Mallorca Balear. (in rupibus abruptis septentrionem spectantibus, r.).
14. *b. V. stolonifera* Rodr. in bull. soc. bot. 1878. Menorca Balear. (Baranco de Algendó: Rodriguez); de hac et præced. specie cfr. Burnat. Barbey not. balear. 16, 17. 1882 (*).
14. *c. V. Barceloi* nob. *V. ambigua* Barc. fl. isl. balear. 53 (non W. K.). — Mallorca.
15. *V. hirta*; — *V. abortiva*: Hung. (: Wiesb.). *V. adulterina* Godr. (in Consp. sub *V. collina* allata) ex ipso. *V. collina* Suard. (Nancy, Metz). — *V. drymeia* ad *V. gymnocarpam* (16 *) pertinet ex Simonk.
× *V. permixta* (*V. foliosa* Celak.): Gall. mer.-occ. Tyrol., Carinth., Hung. ex Wiesb.; Transs. (*V. hybrida* Schur).
16. *V. collina*: Badia, Würtemb.; Suec. bor. (prov. Medelpad). Fenn. in sola or. (Carel.) adest. *V. valesiaca* Hsckt. (ex Gremli). *V. declivis* Du Moul. (ex eod.). —

V. microceras ad *V. albam* (14) pertinet. — *V. merkensteinensis* Wiesb. ap. Halacsy et Braun. (Pressburg Hung.).

**V. gymnocarpa*; *V. drymeia* Schur et *V. sciaphila* Schur enum. ex Simonk.

17. *V. sepincola* sec. Freyn l. c. (1877) est var. (brevifolia) *V. austriacæ* (13 *); — *V. tolosana*: Arag. (Timb.-Lagr.). — *V. Beraudii* nunc ad *V. suav.* (13 *) relata est.

18. *V. sciaphila* (*V. glabrata* Salis ex Brügg.); sec. Wiesbaur deesse videtur in Austr.-Super., quia planta tyrol. est *V. permixta* Jord., et proventus prope Steyr dubius factus (nunc dicitur deesse etiam in Austr.-Infer.), sed adest pr. Kalocsa Hung.; Transs. ad *V. gymnocarpam* (16 *) et *V. Jooi* (24) pertinet ex Simonk.

**V. porphyrea* Uechtr. *V. sciaphila* auct. siles. plur. (non K.). — Siles. in saxosis Rabenfelden pr. Liebau (beat. Uechtritz detex. 1859).

19. *V. ambigua*: Carinth. (pr. Klagenfurt). Dobrud.; Austr. adest in m. Bisamberg pr. Wien (Heimerl 1879, Wiesbaur 1880 April. 6, "cum novem aliis Violis vernalib."), ceterum Krems, Stein etc. — *V. campestris*; — *V. purpurea* Stev. (Taur.).

22. *V. prionantha*; planta transsilv. est = *V. Jooi* (24) ex Simonk.

23. *V. umbrosa*; Suec. non nisi bor. inhabitat (a Lapp. Um. ad Helsing., Dalec. et Vermel.); Fenn. non nisi in mer. et med. adest. — *V. Selkirki* Goldie in edinb. phil. journ. 1822. 319 (ex Maximov. in bull. petersb. 1877); quod nomen igitur Friesiano anterius.

24. *V. Jooi*: Moldav. (in lapidosis calcareis Transsilvaniam versus freqq.: Jka). Hung. (pr. Szaszka: Borb.). *V. sciaphila* Schur et auct. transs. plur. *V. prionantha* Jka 1858 ex Simonk.).

25. *V. uliginosa*: Lusat., Saxon. (Bockwitz pr. Leipzig); Marmaros Hung. pr. Huszt, ubi copiosissime crescit (Janka 1884). Ross.mer.-occ. (: Schmalhausen); Suec.med. in sola Uplandia (impr. ad flum. Dalecarlic.) adest, Suec.mer. præcip. in Smoland.or. (præf. Calmar.); Fenn. in sola mer.-occ. — *V. ingrica* (MB. sched.) Rupr.

27. *V. epipsila*: Badia (ad lac. Titisee). Morav. (r.). Siles. Ross.mer.-occ. (: Schmalh.); deest in Lapp. (et Norv. ex Htn. handb. ed. XI).

28. *V. palustris*: Hisp.mer. solum in montib. Nevad. (inter 8000 et 9500') lecta est. Ross.mer.-occ. adest ex Schmalhansen.

30. *V. pinnata*; Helv. in Alpibus solum adest.

32. *V. biflora*: Roman. Alp.-Marit.; in montib. Nevad. a Webb observata, dein ibi non reperta videtur, sed in Arag. et Catal. a variis lecta est; in Picos de Europa Cantabr. a Leresche et Levier. Ceterum non solum alpina, sed etiam in subalp. et montium vallibus umbrosis adest; sic Lusat., Saxon., Ramsbeck Westphal.; Angerm., Helsing.bor.-occ. et Dalec. (Idre); Fenn. non nisi in Lapp. lecta est.

32. a. *V. Mauritii* Teplouchoff (1882). *V. Willkommii* id. antea eod. anno (non v. Roem.).

Ross.or. gub. Perm in latere m. Ural. "Habitus *V. bifloræ*, cui proxima, sed flores dimorphi, albedo-lilacini".

33. *V. cornuta*: Arag. Catal. (et Astur.?). Cast. nov. (Samosierra: Cutanda).

34. *V. Orphanidis* (*V. proluxa* Panc. ex Jka): Heldr. hb. norm. 824 (Agrapha in reg. silv. m. Pindi). Orph. fl. gr. exs. 1055 (*Bitolia* Maced.); Serb. Herceg.

**V. Nicolai*; habitat cum *Telekia* locis umbrosis infra m. Kom etc.; plenius descripta in Pantocsekii adnot. 98 (*).

35. *V. gracilis*; — *V. elongata* certe huc pertineat; ex cl. Lacaita var. speciei (in montib. ad Amalfi frequentis) lutea, inter gramina crescens, sæpe ultra bipedalis. — *V. pseudogracilis* Strobl in oe. bot. z. 1877. *V. gracilis* Ten. e mte St. Angelo Castellam. (ex Strobl *V. gracilis* typica in Ital. vix provenit); ad hanc plantam neapol. pertinet (var. vel subspec.) *V. gracilis* Guss. quoad plant. messan. (Lacaita in litt. 1884).

**V. Valderia*; Transs. (Schur) ad sequent. (*V. declinata*) pertinet ex Simonk. — ?*V. cassinensis* Strobl in oe. bot. z. 1877. (Monte Cassino inter territ. romanum et neapolit.).

36. *V. declinata*: Roman. Bulgar. (ex Vandas). Bosn. (: Brandis). — *V. cenisia* et *V. grandiflora* Schur et *V. heterophylla* auct. transs. ex Simonk.

37. *V. speciosa*; ex Boiss. (or. suppl.) videtur var. florib. submajoribus *V. macedonica* (40)

38. *V. rothomagensis*; — *V. eryana* Gillot 1878. *Viola de Cry Ravin* 1866. (Gall. or. dep. Yonne pr. Cry etc.). Comment. 53.

39. *V. ætolica*: m. Pindus (Hausskn. et Heldr. 1885). Pelop. m. Chelmos (ex Lacaita in litt.).

40. *V. macedonica*: Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht). Bulgar. (in Balkan-Arabakunak pr. Orchanie et in m. Vitos pr. urbem Sofia leg. Velenovsky 1885). Rumel. or. m. Rhodope ad Philippopel (: Skorpil ex Velenovsky); adest etiam Hung. et Valach. ex Borbás (sec. Sink. planta Borb. est var. hirsutior *V. arvensis*).

41. *V. Bielziana*; a sequente (*V. tricolor*) non distinguenda ex Simonk.

42. *V. tricolor*; typica in Lapp. plur. deest. — *V. saxatilis* (1793). *V. alpestris* Jord. (1846). *V. sudetica* et *V. pseudolutea* Schur ex Simonk. — *V. Demetria* reg. alpin. et subalp. inter 3500 et 7000' prov. malac. (Sierra de Antequera, de Yunqueira etc.) inhabitat et saltem subspeciem constituit (cf. Willk. ic. hisp. 18; domo Demetrio Rodriguez, olim directori hort. botan. matrit., dicata est. — *V. meduanensis* Bor. (Gall. centr. bor.-occ.). — *V. nivalis* Brügg. *V. comollia* auct. non Mass. (Helv.). — *V. garganica* Strobl. *V. tricolor* bicolor Ten. (nte Gargano Apulæ: Porta. Rigo).

**V. parviflora*: — *V. nana* (in Gall. sabulosis maritimis extimis a cl. Le Jolis jam 1860 distincta est, et 1878 vir laudatus observationes posteriores, nec non illas Dris Godron, circa hanc plantam per literas benigne mihi communicavit; ex his saltem subspecies est. — *V. olonnensis*; cfr. Corbière in bull. soc. linn. norm. 1887.

**V. polychroma* Kern. in sched. ad-exs. 1882 (ubi descr. et histor. plena). Tyrol. Carinth. etc. Comment. 54.

**V. Foucaudi* Savatier; Magnier fl. sel. exs. 204. Gall. dep. Charente-Infer. et Deux-Sevres (et ex Loret etiam dep. Herault, ubi = *V. nemausensis* 42—).

**V. olyssiponensis* Rouy in Magn. serin. VI. (1887). 114 (*); fl. sel. exs. 1380! — Lisboa Lusit. (: Daveau 1886).

43. *V. parvula*: Castil. (reg. matrit. etc.). Arag. mer. (ex Loscos): Euboeæ m. Delphi (: Pichler) ex Boiss. — *V. arvensioides* Strobl in oe. bot. z. 1877. (Sicil., copiose ad viam inter Paternò et Nicolosi altit. 500—700 metr.).

44. *V. lutea*: Hisp. or. (Catal.: *V. calcarata* Colm. ex Lge); etiam bor. indicatur; Transs. (—um—*pseudolutea*) ad *V. saxatilem* (42—) pertinet. — *V. sabulosa*: Hisp. (litoral.); etiam in Jutland. occ. non rara (Lge). — *V. calaminiaria*: Batav. (Limburg), detecta a Lacoste 1872 (ex Abeleven); Westphal. ad Blankerode in terra calaminiaria. — *V. elegans* (Kirschl.) Sp; *V. grandiflora* Vill. non alior. (Voges, Helv. alp. calcar.).

**V. sudetica* (a *V. lutea* non distincta ex Kern.); — *V. Paillouxii*: Gall. etiam bor.-occ.

**V. cæspitosa* Lge in Willk. Lge III. 701. *V. tricolor* var. Bourg. hisp. exs. 2392. Extrem. in reg. alp. montis Sierra de Marcena pr. Plasencia (: Bourgeau 1854). Serra da Estrella Lusit. (: Henriquez 1881 ex Willk.).

45. *V. Bertolonii*: Sard. (m. Genargentu, m. Limbara). *V. cenisia* Mor.

46. *V. calcarata*; Transs. vix adest ex Simonk. — *V. Eugeniæ*: Hetr. (sec. Arcangeli 1882). — *V. Zoysii*: Carinth.

47. *V. cenisia*: Alp.-Marit. (: Ardoino); Transs. ad *V. declinatam* (36) pertinet.

**V. magellensis*; specierum proximarum minima, loca arenosa inter 7000 et 8000' alt. inhabitans.

48. *V. nevadensis* (*V. crassiuscula* Bory); non nisi in mont. Nevadens. reg. nivali (inter 9000 et 12000') occurrit.

49. *V. nummularifolia*: Alp.-Marit. (: Ardoino).

50. *V. Comollia*: Lomb. lac. Barbellino supra Bondione (: Leresche 1882).

51. *V. alpina*; indicatur etiam Roman.

× *V. Christi* Wolf. = *calcarata* + *saxatilis*. (Vales).

× *V. Haynaldi* Wiesb. = *ambigua* + *austriaca*. (Austr.).

- × *V. helvetica* Brugg. = *calcarata* + *tricolor*. (Helv.).
 × *V. hirtæformis* Wiesb. = *ambigua* + *hirta*. (Hung. Austr.).
 × *V. hungarica* Degen. Sabransk. = *ambigua* + *odorata*.
 × *V. hybrida* Val de Lievre = *hirta* + *collina*. (Hung.).
 × *V. kalksburgensis* Wiesb. = *alba* + *austriaca*. (Kalksburg Austr., Pressburg Hung.).
 × *V. Kernerii* Wiesb. (*V. camporum* Sabransk.) = *austriaca* + *hirta*. (Austr., Hung.).
 × *V. suaveolens* Wiesb. = *collina* + *austriaca*. (Hung. Austr.).
 × *V. Wiesbaurii* Sabransk. (*V. fragrans* Wiesb. non Sieb.) = *alba* + *collina* (Hung. Austr.).

XI. DROSERACEÆ.

1. *Drosophyllum*. 1. *D. lusitanicum*; Hisp. non nisi in Bætica mer. (præcip. pr. Algeciras, Ronda et San Roque) lectum, sed probab. aderit (ut ex Quer et Palau) etiam in Galloec.

2. *Drosera*. 1. *D. longifolia*; Hisp.or. (Catal.) indicata erat, sed nuper vix lecta; Transs. deest ex Simonk. (vid. x).

× *D. obovata*: Helv. (r.). Bohem. (: Celak.). Transs. (*D. longifolia* Bmg., Schur.; *D. intermedia* Schur.).

2. *D. intermedia*: Dan.; deest Lapp. et in Fenn. bor.; Hisp. bor. tota (et antiquit. centr.) indicatur; Transs. ad præced. (*D. obovatam*) pertinet ex Simonk.

3. *D. rotundifolia*; Hisp.mer. non lecta est.

3. *Aldrovanda*. 1. *A. vesiculosa*: Gall.mer.-occ. (dep. Gironde, r.). Boruss. or. circ. Grauden. (: Caspary 1882), occ. in lacu quodam circ. Thorn: Marchia (duob. locis). Galiz. etiam a Rehmann (pr. Kankow) lecta. Dobr. reg. Delta freq. (: Uechtr. Sinten.); adest etiam Bavar. — Comment. 55.

4. *Parnassia*. 1. *P. palustris*; adest in Græc.bor., ubi in Pindo Dolop. a Haussknecht et in m. Oeta Phthiotidis, 4500—6000', a Heldreich lecta est. Hisp. solum in montib. Nevad. (inter 5000 et 9000') adest. — *P. alpina* Brugg. (Helv.).

XII. POLYGALEÆ.

1. *Polygala*. 1. *P. microphylla* (*Brachytropis microphylla* Willk.); etiam Hisp. centr. (r.) indicata. Species inter europeas maxima (interdum sesquipedalis et ultra). foliis vero minimis; florum (speciosor.) fructuumque structurâ peculiarî genus proprium poscit (Willkomm ill. hisp.). — *P. juniperina* ad *P. rupestrem* (14) pertineat.

2. *P. Chamæbuxus*: Germ. centr. (Thuring., Saxon.). Comment. 56.

2. *a. P. Vayredæ* Costa in anal. de la soc. esp. VIII. (1877). *Chamæbuxus Vayredæ* Willk.

Catal. (vall del Bach, coll de Carreras: Vayreda 1877). Arag.? (*P. Chamæbuxus* Asso?).

3. *P. major*: Roman. Bulgar. Ross.med. (Minsk, Mohilew: Lindem.); in Bohem. deest. — *P. neglecta* Kern.

4. *P. Boissieri* (*P. major* Webb. *P. rosea* Boiss. voy.); Gran. et Murcia reg. mont. et alp. Media inter præced. et sequentem, cui propior.

5. *P. rosea*; solum in Hisp.mer.(r.),mer.-or. (et Lusit.?) adest; loca (et synon.) cætera omnia ad sequentem speciem (*P. nicænsis*) pertinent. Comment. 57.

× *P. bætica* Willk. in Willk. Lge III. 559. *P. nicænsis* Willk. hisp. exs. a. 1845. — *Bætica* mer. (a Willkomm detecta 1845). Galloec. (pr. Orense: Winkl.).

5. *a. P. nicænsis* Risso in Rhb. ic. I. 26. (1823); in Consp. meo militat sub *P. rosea*, cujus loca (exc. iberic.) etc. huc pertinent; seqq. add.: Ital.bor. Cors. (: EPetit 1883). Istr. Croat. (Fiume). Carn. Herceg. Grec. (*P. comosa* Ung.). Ital.mer. (Amalfi, in silvis copiose: Lacaita: Calabr.: *P. comosa* Ten.). Species a *P. rosea* (5) optime distincta!; vid. etiam Bennett in Journ. of bot. VII. (1878). — *P. corsica*: Helv.mer. (Ticino, Simplon). — *P. Garidiana*: Pedem. (alp. Salces: *P. comosa*? Rost. hb.).

6. *P. flavescens*; — *P. pisauensis* Caldesi (1879). Ital.bor. nelle Marche (pr. Pesaro: Caldesi). — var. minor (*P. provincialis*?) Le Grand, in bull. soc. bot. 1881. 54 (*). Galloprov. (Bouches-du-Rhône: H. Roux ex Le Grand).

6. a. *P. forojulensis* Kern, in oe. bot. z. 1874. 102; exs. austr.-hung. 873. Ital.bor.-or. (Venet. uticens. Tyrol.mer. conterm.: Huter.; Venzone vall. Tagliamento: Pichler 1865). Carn. Carinth. (vall. Kanal.: Jaborn. et al.). Fere media est inter *P. niceensem* et *P. comosam* (bona species etiam ex Bennett l. c.).

7. *P. comosa*: Fenn.mer.-or. (Olonets). Arag. mont. r. (: Willk., Losc. Pard.). Moldav. Dobrud. Rumel.or. (ex Velenov.); Belg. adest sola "var. oxyptera florib. parvis": Crepin (num * *P. Lejeunii*?); Græc. (Pentelicon, Corcyrâ) ad *P. niceensem* pertinet (ex cl. Lacaita, qui plantam in utroque loco legit). — *P. Wolfgangiana* Bess. (Ross.mer.). — *P. angustata* Schur! (et certe etiam *P. transsilvanica* ej.) huc pertinet ex Simonk.

**P. Michaleti*; *P. aquitania* hort. burdig. 1874 ex Clavaud: Gall.mer.-occ.

8. *P. serpyllacea*; Helv. etiam alibi (Thun, Zug etc.); ins. Færöer (: Roststrup); Norv.occ. usque ad Molde (Florö ex Norman 1880). Suec. in sola Scan. et Halland. adest. Transs. ad sp. sequentem (9) pertinet ex Simonk.

9. *P. vulgaris*; Norv. adest usque ad Nordlandiam; Fenn. in sola mer. (et Oneg.). — *P. pubescens* Rhode. *P. vulg.* var. lusitan. Welw. (Gall.occ. Hisp.bor. Lusit.; litor.). — *P. caliptera* Le Grand. ms. *P. vulg.* var. caliptera ej. in bull. soc. bot. 1881. 54 *. (Gall.mer.: Vigan etc. dep. Gard: Anthouard). — *P. speciosa* Kern. (Carn., Carinth.). — *P. depressa* Schur (ex Simonk.).

**P. oxyptera*; — *P. angustata* ad *P. comosam* (7) pertinet ex Simonk.

10. *P. calcarea*; Luxemb. Hassia (r.). Rheinprov. (Saarbrücken, Gerolstein). Alsat. Badia, Phalz. — *P. Timbali* Le Grand (ms.). *P. calcar.* var. *Timbali* ej. in bull. soc. bot. 1881. 54 *. (Haute-Garonne: Timb.-Lagr.). — *P. corbariensis* Timb.-Lagr.

11. *P. amara*; Helv. cum dubio citetur (Gremli specim. helv. n. v.). Germ. in pratis siccis et montib. elatiorib. hinc inde obviam venit. Comment. 58.

**P. austriaca*: Belg. (Baelen-lez-Limbourg, Bilstain territ. Verviers: Collard 1885 sec. Durand). Ross.balt.mer. *P. alpestris* Schur (ex Simonk.). — *P. decipiens*; *P. fatua* Whe. (Hercyn. etc.). Comment. 59.

**P. carniolica* Kern. sched. ad exs. (1883). Carn. m. Nanos, 800—1000 metr. s. m., sed "primum in m. Valentini ad Goriziam inventa"; a specie differt foliis resol. maximis etc.

11. a. *P. alpina* Perr. Song. (in Consp. subspec. præced. *P. amarae*). Delph. Sabaud. Helv. (Alpes); etiam Arag. (Pyren.) ex Timb.-Lagr. — *P. glacialis* Brügg. (1856); cfr. Brügger in annal. (jahresb.) soc. nat. scrutat. Bundiæ (Graubünd.) 1882. 77—80 (*). Unica generis species in regione nivali obvia. *P. serpyllifolia* Ficher-Ooster (non alior.).

12. *P. alpestris* (*P. microcarpa* Gaud. helv. 1829): Bavar. Carinth. (ad Sugritz et Tröpolach: Pacher). Tyrol. centr. (: Kerner). Hung. (: Hzl.). Galiz. (r.). Moldav. (alp. Buciciu); Transs. ad *P. austriac.* (11 *) pertinet ex Simonk. Comment. 60. — ? *P. Morisiana* Rchb. f. (16). — var. ? pyrenaica Timb.-Lagr.; ex eo = *P. calcarea* Zett. (Pyren. et Catal. alp.).

13. *P. sibirica*: Ross. centr. (gub. Kursk territ. Korocza in cretaceis copiose: Lindem.), occ. (Podol.: Schmalh.). Transs. (non Hung. ut in Consp. err. indic.) in collibus Scholten (350—400 metr. s. m.): Barth 1866. *P. Barthiana* Fuss in verk. siebenb. ver. XIX.

14. *P. rupestris* (*P. juniperina* Cav. ex Willk. Lge): Hisp.or. (Arag., Catal., Balear.); etiam in Navarra indicata.

15. *P. angustifolia*; apud Willk. Lge inter *P. vulgarem* (cujus var.?) et *P. alpestrem* militat.

16. *P. Morisiana* probab. ad *P. alpestrem* (12) pertinet.

18 * *P. recurvata*; ex Boiss. (or. suppl. 74) a specie (*P. supina*) essentialiter non differt.

20. *P. monspeliaca*: hab. etiam Cors. (: Gillot).

21. *P. exilis*; *Hisp. mer.* solum in *Murc.* (*Lag.*) et *pr. Carratraca Bætic.* (: *Hænsel.*), *sed Catal. et Arag. plur. locis, lecta; Matriti ex Rodr.*
× P. hybrida Brügg. = vulgaris + austriaca. (Thusis).

XIII. FRANKENIACEÆ.

1. *Frankenia*. 2. *F. Reuteri*: *Hisp. mer.* (*granat., murc.*); *Lusit. (ex Willk.)*.
 3. *F. hirsuta*: *Hisp. or. (cum Balear.) Rhodus* (*Dr Hedenborg in hb. mus. holm.*). *Dobrud. in salsis litoreis ad lac. Sinoë etc. (: Uechtr. Sinten.)*. -- *F. intermedia (F. arborescens Pourr.): F. lævis Bourg. hisp. exs. 1580 (in Consp. sub seq. citatur).*
 4. *F. lævis*: *Angl. mer. (Hampsh.) Gall. bor.-occ.*
 5. *F. pulverulenta*: *Ross. mer. (Odessa: Lindem.; Taur.: Rehm.), mer. or. (Sarepta: Becker).*

XIV. SILENACEÆ.

1. *Githago*. 1. *G. segetum*; *adest etiam in Suec. bor. (Jemtia); Norv. usque ad Finnm.; deest in Fenn. bor. et Lapp. tota.*
 1. *a. G. gracilis Boiss. fl. or. I. 661. Heldr. hb. norm. 825. Agrostemma gracilis Boiss. diagn. — Thessal. in collibus saxosis, inter frutices, prope Pharsalum (Hausskn. Heldr. 1885); antea solum ex Anatolia cognita. Habitū simillima speciei vulgatæ et probab. hujus typus originalis; cfr. tamen Haussknecht in diar. soc. bot. thuring. 1886. 61 (*).*
 2. *Agrostemma*. 1. *A. coronaria* (*Coronaria tomentosa L. hort. ups.; ABr.: Bulgar. Roman. Istr. mer. (pr. Pola). Bosn. mer. (: GBeck). Gall. mer.-occ.; Helv. solum Vales. adest; Hisp. indicatur: Astur., Arag., Catal. Extrem. (antiquitūs etiam Castil.); etiam Dan. (e cultura in hortis) interdum efferata adest.*
 2. *A. flos Jovis*: *Alp.-Marit. (reg. alp.): Ardoino.*
 3. *Eudianthe*. 1. *E. coeli rosa* (*Coronaria glabra L. hort. ups.*); *Hisp. mer. adest (Willk. Lge).*
 2. *E. læta* (*Lychnis corsica Dur. astur. exs. 383*); *Hisp. mer. certe adest sc. Bætic.; in Extrem. rarius (Plasencia: Bourg.). Ital. mer. (Taranto: HGroves).*
 3. *E. corsica*: *Archip. Hetr. (Tosc.)*, *abunde in ins. Icilio (hodie Giglio): Dr Forsyth Major pl. ital. select. (1883).*
 4. *Lychnis*. 1. *L. chalcædonica*: *Ross. centr. (gub. Kursk).*
 2. *L. flos cuculi*; *exc. etiam Lapon. plur. — L. Cyrilli: Bulgar. m. Vitos (: Skorpil).*
 2. *a. L. sibirica L. sp. ed. I. 437. II. 626. Ross. bor.-or. (62° lat.).*
 5. *Viscaria*. 1. *V. vulgaris*; *adest etiam in Suec. bor. (Jemtia) sed deest in Fenn. lappon. etc. Roman. Alp.-Marit. (reg. mont., rarius). Lothar. Lusit. bor. (ex Willk. Lge). Hisp. raro et subdubie adest. — V. purpureo-alpina (= hybr. ex dictis). V. media Fr.*
 2. *V. atropurpurea*: *Bulgar. (V. vulgaris Vel. 1886 ex ipso). Rumel. or. (Slivno: Skorpil ex Velen.).*
 3. *V. Sartorii*: *Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht 1885).*
 4. *V. alpina* (*Fr. in bot. not. 1842. 170 cum Fzl ap. Led. contemp. est*) *GDon gen. syst. I. (1831): Norv. a Finnm. or. ad præf. Christiansand; Suec. mer. (Öland, Blek., rr. in Bahus. et Hall.), med. r., bor. plur.; Fenn. tota. Hisp. bor. (Santander, Arag.), or. (Catal.), centr. (Sierra de Gredos: Cut.). Sabaud. (: AChabert 1884). Carinth. (ad Sagritz, in Pasterze etc.); Helv. in Alpibus solum adest.*

6. *Petrocoptis*. 1. *P. pyrenaica* (var.): Hisp.bor. (Pico de Arvas: Bourg., Picos de Europa: Ler.-Lev.; etc.).

7. *Melandryum*. 1. *M. nivale*; Comment. 61.

2. *M. macrocarpum*: Gall.mer. (Perpignan: Debeau, Rouy; Marseille: Gren.). Ital.mer. (Amalfi, Otranto, Gallipoli etc.: Lacaita, HGroves). Thessal. (: Haussknecht).

3. *M. silvestre* (*M. rubrum* Geke. *Silene diurna* G. G.); Ross.mer.-occ. adest (: Schmalb.).

× *M. dubium* Hmp.; in hoc flores dicuntur semper aperti.

4. *M. pratense*; *M. album* Geke. *Silene pratensis* G. G.; deest etiam in Norv.bor. et in Lapon.

5. *M. eriocalycinum*: Dobrud. inter Ciernavoda et Hirsova (: Janka).

6. *M. nemorale* ABraun in Flora 1843. *Lychnis nemoralis* Heuff. ap. Rehb. (1832);

8. *Wahlbergella*. 1. *W. apetala*; — *W. uralensis* Rupr. *Gasterolychnis uralensis* Rupr. (Ross. arct.). — *W. macropetala* Rupr. *Gasterol. macropetala* Rupr. (Ross. arct.).

2. *W. angustiflora*; in Lapp. Torn. rara et non nisi ad lac. Tornens. lecta; Lapp. fenn. (Inar.) et or. (Ponoj.) etiam adest.

9. *Heliosperma*. 1. *H. alpestre*: Bosn.mer. (Treskavica: GBeck). Roman. (alp. Cehlau); pl. transsylv. ad speciem seq. pertinet ex Simonk.

2. *H. quadrifidum*: Roman. (alp. Bucieciu). Styr. adest etiam ad Neuhaus; in montib. Sulzbach.

**H. pusillum*: Herceg.mer. (: Vandas 1886). Bosn. (: GBeck). Carinth.

3. *H. Veselskyi*: Carn. (: Zois, Krasan, Deschmann); Styr. non nisi pr. Tüffer lectum, ubi in rupibus supra balneum a Juratzka detectum est (speciem descripsit in act. soc. zool.-bot. vindob.). *H. glutinosum* Deschmann ap. Kern. (1883). *Silene glutinosa* Zois in Rehb. exs.

10. *Cucubalus*. 1. *C. bacciferus*; Belg. olim (fortuito introduct.) observatus, nunc evanuit.

11. *Silene*. 1*. *S. Cserei*: Dobr. in m. Suluču (: Janka).

1. *a. S. fabarioides* Hsskt ms. (litt. 1889). — Græc.bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht 1885).

5. *S. commutata* (*S. Fabaria* Bert.): Mallorca Balear. (: Porta 1885); pr. urbem Murcia et oppid. S. Roque (supra Gibraltar) adest var. *elata* (— *longifolia* Willk.).

6. *S. Cucubalus* (*S. Cserei* Schur non Bmg. ex Simonk.!); — *S. puberula*: Catal. (: Timb.-Lagr.). — *S. brachyantha*; *S. antilopum* (Vest). — *S. crispata* Stev. (Taur.).

**S. saponariæfolia*: Dobrud. (: Uechtr. Sinten.). Ross.mer. (Cherson in salsis, ad litora maris copiose: Lindem.). Forse melius (saltem pl. transsylv.) cum *S. Cserei* (1*) jungenda.

7. *S. maritima*: Dan. (Jutl.bor.-occ.). Lapp.or. (lit. Kola); — *S. montana* Arrand. (bull. soc. polym. du morbih. 1863), in maritimis Gall.bor.-occ. (Bretagne, Vendée), diversa est a *S. maritima* (et *S. Thorei*) seminibus aliter insculptis, minoribus (ex Godron).

**S. alpina*: Gall.or. (Côte-d'Or). Transs. — *S. glareosa* est var. propria, nec identica cum *S. alpina*, et adest etiam in glareosis maritimis Catal.

8. *S. Thorei*: Hisp.bor. (*S. Sebastian*: Lange), or. (Catal.: Vayreda).

9. *S. procumbens*: Ross. centr. (gub. Moscov. secus flum. Moskvá: Clerc).

12. *S. Zawadskii* Herbieh in diar. mnemos. 1833 (nomen solum) et in Zaw. enum. (1835). Hab. in alpinis calcar. Carpat. or.; Moldav. cl. Janka in alpe Cehlau eam legit.

13. *S. Asterias*: Bulgar. m. Balkan ad Petrov Han (: Vandas. Velen. 1887).

14. *S. compacta*: Dobrud. (: Janka, Uechtr. Sinten.); Rumel. or. (: Skorpil ex Velenovsky). Transs. ad speciem seq. pertinet ex Simonk.

15. *S. Armeria*; Hisp. aliquot locis Galloec., Astur., Arag. etc. indicata est, sed incerta civis videtur. Luxemb. adest spontanea, qualis etiam in Belgio proximo nuper reperta (pr. Romeldange: Cardot 1884). Gall. or. (Côte-d'Or etc.). Galiz. (r.). Roman. Bulgar. Ross. centr. (gub. Kursk); inquil. etiam Siles. — *S. compacta* Bmg., Schur (ex Simonk.!).

17. *S. congesta*: m. Taygeti (Lacón.) radices (Orph. exs.). Thessal. (: Hsskt).

17. *a. S. cephalenia* Heldr. fl. de Cephalon. (1883). 26 (*).

Ins. Cephalon., in rupibus supra Poros (ubi a Heldreich detecta 1872).

18. *S. viscosa*; Suec. or. litor. mar. saxos. a Bleking. (Utklipporna) ad Grislehamn Roslag. nec non ins. Öland. prom. Holmudden; Fenn. non nisi mer-occ. (Åland., Åbo, Nyland.); Germ. lit. Hiddensee; Austr. (pr. Wien) nunc lecta ex Hung. immigrata (: Heimerl). Dobrud. (: Uechtr. Sinten.). Bulgar. (: Bornmüller). *S. tatarica* auct. transs. ex Simonk. — *S. quadriloba* Turcz. (Cherson Ross. mer.).

19. *S. multiflora*: Moldav. Dobrud. Ross. mer.-occ.

20. *S. flavescens*: Bulgar. (: Vandas, Velen., Skorpil); Transs. dubie citatur ex Simonk.

21. *S. gibraltarica*; hab. in latere orientali montis gibraltarici, in rupibus præruptis; ex Willk. etiam Lusit. in Serra de Cintra et mte Santo pr. Olyssipon. (Lisboa) lecta est (: Winkler 1876).

21. *a. S. hifacensis* Rouy exc. bot. esp. 1883. 10. in bull. soc. bot. 1884 (nomen); Willk. ill. hisp. I. 150. *S. Lacaitæ* Willk. in litt. — Hisp. mer. prov. alicant., in rupibus maritimis pr. Denia (m. Hifac: Rouy 1883; prom. San Antonio: Lacaita 1884).

23. *S. Requienii*: Sard. (Reverchon ex Barbey).

24. *S. crassicaulis*: Pyren. or. (Collioure, Argelès-sur-Mer etc.); locus speciei systematicus sit prope *S. nemoralem* (29 *), cujus var. pedemontana Burn. Barb. (*S. nemoralis* Thuret hb.) e val Pesio Alp.-Marit. medium tenet (Burnat. Barbey not. sur un voy. etc. 52—4 *).

26. *S. paradoxa*: Herceg. mer. (: Vandas 1886).

29. *S. italica*: Hisp. or. centr. Styr. (pr. Neuhaus: Reichardt ex Maly); Carinth. non nisi post Wulfen (rr.) indicata a Pacher. Transs. ad subspec. (*S. nemoral.*) pertinet ex-Simonk. — *S. catholica* Willk. sert. ex ipso.

**S. nemoralis*: Würtemb. pr. Isny ex Gecke (Siles. deest ex eod.). Bosn. (: GBeck). Roman.; *S. italica* auct. transs. (ex Simonk.). Celak. böhm. *S. ital. var. floccosa* Rohrb. (Cucubalus floccosus Ficin.). Melius pro specie habenda ejusdem dignitatis ac *S. italica*, a qua essentialiter diversa videtur.

29. *a. S. nevadensis*: Hisp. or. (Valenc.; Arag. et Catal. mer.); indicatur etiam in bor. (Navarra: Duf.; Santander: Salc.).

30. obs. *S. rhodopea* (Janka in term. fuzet. 1878), e Thrac. (pr. Philippopol.), videtur proprior *S. longipetalæ* (37) sec. Boiss. or. suppl.

32. *S. nutans*; Hisp. mer. non nisi in Valenc. et Extrem. adest. — *S. longicilia* Otth (Cucub. longicil. Brot.) forse propria (restituenda) species? — *S. livida*: Valach. Istr.; melius subspecies.

? 32. *a. S. pseudonutans* Panc. -- Serb.; Bulgar. (pr. Konjavo in rupib. calcar.: Vandas, Velen.). Rumel. or. (ex Velen.).

33. *S. catholica*; Arag. ad *S. italicam* (29) pertinet.

35. *S. viridiflora*: Lusit. (ex Willk.); Hisp. mer. vix, sed (rarius) bor.-occ., centr. et Arag.; Sard. pr. Aritzo lecta a cl. Ascherson (ex Barbey). Istr. mer. (: Freyn); Styr. adest in m. Wotschberg (: Maly) et pr. Neuhaus (: Reichardt); Dobrud. (in pratis silvatic. freq.: Uechtr. Sinten.); Bulgar. — *S. livida* Bmg. et auct. transs. ex Simonk.

39. *S. Friwaldskyana*: Bulgar. (pr. Varna a Velenovsky lecta 1885, ad Petrov Han: Vandas, Velen. 1887).

40. *S. longiflora*: Dobrud. in desertis australioribus (: Uechtr. Sinten.). Bulgar.; Galiz. vix adest teste Knapp. — *S. staticifolia*; Boissier hanc e montib. Korax Aetol. et Oeta Phthiotidis, ab Heldreich lectam vidit (non e Pelop.); sec. Haussknecht, qui eam in Pindo Tymph. legit (1885), a *S. longiflora* valde diversa est.

42. *S. chlorantha*; Germ. hab. Pomeran., Marchia, Boruss., Poson., Siles.; adest etiam Moldav. et Dobrud. (U.S.). *S. polyphylla* Bmg. (non MB.) ex Simonk.

43. *S. tatarica*: Fenn. max. bor. March. et Poson. ad ripas flum. Oder et Warthe, copiose; Transs. ad *S. viscosam* (18) pertinet ex Simonk.

45. *S. Reichenbachii*: Croat. (: Pichler). Ostaria m. Velebith (: Borbás).

46. *S. linifolia*: Thessal. pr. Pharsalum (Heldr. 1885).

47. *S. densiflora*: Banat. (: Borbás). Bulgar. Ross.mer. (: Lindemann).

48. *S. Sendtneri*: Bulgar.; etiam in Pindo Tymph. Thessal. lecta (: Hausskn. Heldr. 1885). — *S. Schlosseri* Vuk. (1876) in oe. bot. z. 1880. (Croat. pr. oppid. Fuzine; Vuk.; m. Risnjak: Borb.); ex ipso auct. non satis diversa a specie ipsa.

49. *S. Otites*: Anglor. Hisp.or. et centr. hinc inde (etiam mer. antiquitatis indicata). Moldav. Dobrud. Bulgar. (: Vandas. Velen. Skorpil). — *S. parviflora*: Bulgar. Rumel.or. Ross. centr. (gub. Kursk). — *S. Hellmanni* Claus. (Saratow Ross.med.or.).

50. *S. wolgensis*: Ross. centr. (gub. Kursk). — *S. pseudotites*: Galiz.; exs. in Consp. citata probab. ad speciem præced. pertinet.

52. *S. Roemerii*: Bulgar. (: Velenovsky 1885). Rumel.or. (: Skorpil 1886).

53. *S. supina*: Dobrud. in jugo saxoso inter Grecii et Macinu (: Janka). Bulgar. (in arenosis marit. ad Varna leg. Velenovsky 1885).

55. *S. legionensis*; Hisp. præcipue bor. et centr.; Arag.occ.; Murc. (r.).

56. *S. ciliata*: Hisp.bor. (Cantabr.) Picos de Europa: Ler. Lev.

57. *S. elegans*: Pyren. (aragon.) Bubani (1845); Arag. pr. Bielsa (: Campo ex Colm.). *S. Campoi* Losc.; sec. Willk. etiam *S. Borderi* (67) huc pertinet.

58. *S. Boryi* ipsiss. non nisi in reg. alpina et nivali montium Sierra Nevada et *S. de Maria* (regni Gran.) lecta est. — *S. tejedensis* adest etiam (rr.) in Hisp.bor. (Peña Redonda Cantabr.: Boiss. Ler. Lev. 1879).

59. *S. vallesia*; Helv. non nisi in Valesia (Simplon, Nicolaithal etc.) adest.

60. *S. Lerchenfeldiana*: Hung.mer. (: Hzl.). Bulgar. (: Vandas. Velen.). *S. rupestris* Schur (ex Simonk.).

61. *S. rupestris*: Bavar. (Alpes); Würtemb. (vall. Bernecker pr. Schramberg). Alp-Marit. (reg. alp.). Sard. (Reverch. ex Barbey); Transs. deest ibique ex Simonkai "e mystificatione" et "speciminibus mystificatis" indicata est. Scand. (cum Fennia) exc. etiam Lapp. plur.

63. *a. S. pindicola* Hsskt ms. (litt. 1889). — Græc.bor. (Pindus Tymph.: Hausskn. 1885).

66. *S. Campanula*: Alp-Marit. vall. Valmasca sub mte le Clapier et in cacum. ejusd. montis; Tenda.

67. *S. Borderi*; nunc eadem dicitur ac *S. elegans* (57).

68. *S. saxifraga*: Carinth. (in montib. calcar. et alpihus). — *S. pseudo-saxifraga* Rouy hb. olim. *S. saxifraga* var. hispanica Rouy in bull. soc. bot. 1882 (sep. 4*). Hisp.mer. (a Rouy pr. Jativa detecta).

68. *a. S. Barbeyana* Heldr. in Boiss.or. suppl. 107. — *Ætolie* m. Korax, 6—7500' (: Heldreich).

69. *S. fruticulosa*: mts Tymphrestes *Ætolie* et Oeta Phthiotid. (: Heldr.). Kyllene (: Pichler); ex Boiss.

70. *S. multicaulis*: Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882).

70. *a. S. macropoda* Velenov. in act. soc. scient. bohem. 1886. (sep. 8*).

Bulgar. (m. Vitos pr. urbem Sofia: Velenovsky 1885, m. Osogovska Planina: Vandas. Velen. 1887).

71. *S. Waldsteinii* (*S. saxifraga* W.K. non L.): Maced. m. Athos.

72. *S. foetida*; — *S. Herminii* Welw. ap. Rouy. (*S. da Estrella*); vid. Rouy in Le Nat. 1888. 43.

73. *S. acutifolia*; in m. Serra da Estrella detecta a Link 1789 ibique relecta a Fonseca 1881; ex obs. cl. Willkomm (vid. ill. hisp. I. 94) est var alpina speciei nuper propositæ:

73. *a. S. melandrioides* Lge in meddel. 1877. 233. Lusit.med. (pr. Bus-saco: Hackel et al.). Galloec. (ad Orense: Hackel).

74. *S. cordifolia*: Alp.-Marit. reg. alp. plur. locis.

75. *S. Elisabethæ* Jan cat. (1832). 3. not.; hab. etiam Tyrol.mer.-occ.

76. *S. Pumilio* Wulf. ap. Jacq. (1778). *Cucubalus Pumilio* L. syst. ed. XII. et mant. 1767.

77. *S. dinarica*; *S. depressa* Bmg. (non MB.).

78. *S. acaulis*: ins. bor. Færøer, Jan Mayen (Dr Fischer 1883) et Beeren-Eiland.; Ross. arct. etiam in ins. Nov.-Semi. et Waigatsch; Hisp.bor. (Picos de Europa: Ler. Lev.); Styr. mont. Sulzbach.; Galiz. Moldav. (alp. Bucieciu).

**S. bryoides*: Helv. (Albula, Jaman). — *S. exscapa*: Alp.-Marit. (reg. alp., rarius). Helv. (Alpes: *S. polytrichoides* Zumagl ex Gremli).

79. *S. noctiflora*; adest etiam Suec.bor. (Jemtia), in Norv.mer. (et ad Bergen ex ABlytt); in Græc.bor. (Pindus Dolop.: Hausskn. 1885).

80. *S. dichotoma*: Morav. (: Tomaschek). Bulgar. tota (: Janka). Dobrud. (copiose: U. S.); casû Batav. pr. Deventer (: van der Veen 1880); etiam Dan. nuper introd. ibique præcip. in agris trifolio consitis lecta.

81. *S. racemosa*: Slivno Rumel.or. (Skorpil ex Velen.).

82. *S. græca*: Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879).

83. *S. disticha*; species rara: Mallorca pr. Pollenza (Marès 1852), Menorca (: Rodriguez); nuper etiam in Lusit. lecta a Daveau (Magn. fl. sel. exs. 1382).

86. *S. Behen*: Melita (ex Duthie 1874). Lamped. (Lojac. in natural. sicil. 1884). — ? *S. Holzmanni* Heldr. in Boiss. or. suppl. 91.; hab. in scopulo Arpedoni ins. Pharmacusar. (Heldr. et Holzm. 1877).

**S. Reinholdii* (Heldr. sertul. in congr. florent. 1874): Cephalon.: Heldr. vid. ej. Flore de Cephalon. 25 (*). Parnass. (pr. Delphos); ins. Lero Pharmacus. (: Heldreich).

87. *S. linicola*; etiam Luxemb. indicata.

88. *S. stricta*; flore hispanicæ civis valde rara est et solum in Valenc. et Murc. (Cav.) et pr. Cadiz (Fauché) indicata.

89. *S. muscipula*: Hisp.or. cum Balear (Mallorca: Barcelò). Attica! (Heldr. hb. norm. 907). — *S. arvensis* Losc. (Arag., Catal.).

91. *S. Almole*; species rariss., non nisi pr. Ronda (Sierra de Almola) a Bourgeau et ad Aranjuez (pr. Madrid) a Lange lecta.

92. *S. cretica*: Hisp.bor.-occ., centr. (matrit.), or. — *S. annulata*: Styr. in agris lino consitis plur. locis (ex Maly). Gall.bor.-occ.

92. *a. S. ætolica* Heldr. 1876 ex ipso auct. 1878 est = *S. Unger* (101), que vero *Rigidulis* non adnumeranda sed *S. creticæ* proxima est. — *Ætol.*, ad m. Arapocephala, detecta a Samaritani et Guicciardi 1857; Misolonghi (: Nicker). — *Ithaca* (Unger 1860, Spreitzenhofer 1877). — *Coreyra*, hod. Corfu, in m. Salvatore (JSchrader 1872). — Cfr. "Ueber *Silene Unger* Fzl., ihre Synonyma und ihren Verbreitungsbezirk, von Th. v. Heldreich" in oe. bot. z. 1878. 27—29 (*).

92. *b. S. corinthiaca* Boiss. (et Heldr.) or. suppl. 96. — Isthm. Corinth. (: Heldreich).

93. *S. Boissieri* (*S. ramossissima* Boiss. voy.); non nisi in montib. regni granat. (et Sicil.: Tod. ex Willk.) lecta est.

94. *S. fuscata*; Hisp. raro (Xeres, Cadiz) lectaest. - *S. articulata* Kze chlor. hisp. *S. undulatifolia* Mor. *S. pseudatocion* Guss.

95. *S. pseudo-atocion*; Balear. in sola ins. Mallorca (pr. Artá) lecta est.

96. *S. divaricata*; species rara: Murc. ad Sierra de Carrascoy (: Guirao, Bourgeau). Bætic. (: Clem., Bourg.). — *S. Willkommiana* Gay in Coss. not. *S. ramosissima* Willk. haloph. (ager Malacit. r.: Willkomm).

97. *a. S. insularis* Barb. in bull. soc. vaud. 1885. 220. — Ins. Karpathos (Arch. turc.) m. Kalolamni (: Pichler).

98. *S. sedoides*: Sard. (: Gennari). Murc. (pr. Carthagera); Balear. solum in Menorca lecta est. - *S. Tommasinii* Willk. haloph. ex ipso.

98. *a. S. pachyphylla* Hsskt ms. (litt. 1889). Attica (ad Phaler., Laurion: Haussknecht).

98. *b. S. Haussknechtii* Heldr. (ex Hsskt in litt. 1889). - Græc. bor. (Pindus Tymph.: Hsskt 1885).

100. *S. rubella*; Hisp. mer. totius incola, nec deest in Arag., Catal. et Balear. (Mallorca, Ibiza); indicatur etiam (rr.) in Hisp. bor. *S. patula* Lag. (non Dsf.).

101. *S. Ungerii* cum *S. ætolica* (92. *a*) nunc juncta est, sed nomen Fenzl. prioritatem gaudet, quia a. 1862 editum (in Unger wissensch. ergebn. ein. reise in Griechenl. pag. 136). *S. Rohrbachiana* Aschn ms. in pl. Schrad. e Coreyra (ex Boiss.).

103. *a. S. juncea* Sibth. Sm. prodr. I. 297. — Rhodus, in m. Comoli (: Bourg. ex Boiss.).

105. *S. portensis* (*S. polyphylla* L. sp. ed. I. ex Rohrb.). — *S. bicolor* Thore (*S. picta* Pers.): Bourg. hisp. exs. 2387. — ? *S. anastomosana* Lag. ined. sec. Colm. 1885. (Bætic.). — *S. methanæa* Heldr. exs. ex Hsskt. (Argolis, Attica).

107. *S. colorata* (*S. hispanica* Jacq. non Otth); Cors. deest (vid. Bonnet in Magnier serin. I. 43). — *S. distachya*; *S. Duriei* Sp.; *S. vespertina* Webb iter. Boiss. voy. (non Retz.); Bourg. hisp. exs. 1788. 2384. — *S. Mandralisci* est *S. sericea* (111) *viridis* ex Caruel (1880).

**S. saxicola* Rouy in bull. soc. bot. 1882. (sep. 4*). *S. colorata* var. *angustifolia* Willk. ic. — Bætic. Valenc. (et Castil. r.).

108. *S. glauca*; *S. decumbens* Salzm. (non alior.).

109. *S. longicaulis*; Hisp. habitat in Bætica pr. Sanlúcar de Barrameda (: Clemente) et Puerto Real (: Bourgeau, Colmeiro).

110. *S. apetalá*: Mallorca Balear. pr. Palma etc. (*S. decipiens* Barcelò isl. balear. 61, ex autop. Leresche sec. Burn. Barb. not. balear. 18*); adest etiam (r.) in Castil. (Zubia, Bourg.). — *S. pallidiflora* Lk (ex Willk.). *S. Lagascae* Boiss. (Lusit.: Welw.).

111. *S. sericea*: Mallorca Balear. (: Willkomm, Marès). — *S. Mandralisci* Parl., in Consp. sub *S. colorata* (107) *allata*, huc pertineat.

112. *S. ramosissima*: Hisp. or. (rarius). *S. fallax* Willk. haloph. ex ipso.

113. *S. nicæensis*: Hisp. or.: Catalon. Mallorca Balear. (Palma: Barcelò); Arch. turc. (Rhodus: Bourg., Karpathos: Pichler). *S. litoralis* Pourr. (non alior.). *S. viscosissima* Ten. (ex Willk.).

115. *S. psammitis*; Castil. præcipue inhabitat, Murciam et Beticam r. — *S. villosa* Boiss. voy. (excl. var. *nana*). *S. adscendens* var. Bourg. hisp. exs. a. 1854 (s. num.). — *S. lasiostyla* Boiss. est var. (subspec.?) in montib. regni granat. plurib. locis lecta, in Lusit. a Guthnick.

116. *S. litorea* (*S. halophila* Lk.): Hisp. or. (in centr. deest). — *S. Cambessedesii* (*S. villosa* var. *nana* Camb.): Balear. (Ibiza, Formentera). — *S. villosa* Holl. (Algarb.).

117. *S. adscendens*: Bætica (: Clemente). Murc. (Sierra Segura: Bourg.). Valenc. (Cav.: *S. prostrata*).

121. *S. hirsuta*; *S. hirsutissima* Otth ap. DC. *S. pernoctans* Lk. — *S. sabuletorum*: Galloec. (: Planera, Lange). Valenc. (Pourr.). Balear. (ex Willk.).

124. *S. vespertina*: Balear. Corcyra (Corfu): Spreitzenh. 1877. — *S. sabuletorum* Dub. non Lk.-(Cors.).

125. *S. pendula*: prov. Veneta, probab. introducta (: Bizzosero 1882).

126. *S. trinervia*; — *S. Gallinyi*: Bulgar. in planitie inter Konjavo et Kistendyl vulg. (Vandas. Velen.).

128. * *S. quinquevulnera*: potius sub seq. (*S. gallica*) recensenda est. — *S. cruentata*: Magn. fl. sel. exs. 26.

129. *S. gallica*; adest Angl. (Hampsh., r.). — *S. Candollei*: descr. in Guss. inar.; *S. gallica* Guss. syn.

132. *S. cerastoides*: Balear. (: Marès).

134. *S. conica*: Hisp. tota. Bavar. bor. (Nürnberg, Erlangen etc.). March. (vall. Inathal, hinc inde cop.: Pæske 1878); Germ. occ. etiam in territ. Main-, Nahe- et Mosel; Dobrud. (copiose: Ue.S.). Bulgar.

135. *S. Sartorii*: Attica pr. Rhapsi (Heldr. hb. norm. 908).

136. *a. S. juvenalis* Del. ind. sem. monsp. 1836. 28. — Attica in scoriis ad Laurion (ubi cum Glaucio Serpieri apparuit: Heldr. 1874). Thessal. pr. Volo ad radices m. Pelion (: Heldr. Holzm. 1883); ad Portum Juvenalem primum lecta (introd., probab. ex Anatolia, ubi satis adest).

13. *Saponaria*. 1. *S. Vaccaria*; etiam Batav. deest; Dan. introd. (precip. cum lino) et talis etiam Suec. nuper lecta est.

1. *a. S. grandiflora* (Fisch.) Borb. 1884. *S. Vaccaria* var. *grandiflora* Fisch. ap. DC. *Vaccaria grandiflora* Jaub. Sp. — Rumel. (: Friv.). Bulgar. et Serb. (: Bornmüller). Dobrud. (: Sintenis). Hung. Austr. (Wien: *S. Vaccaria* Kov. exs.). Croat. (Fiume) et Quarnero (: Borbas). Dalm.

3. *S. glutinosa*: Valach. (Virciorova: Simk.). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky); Hisp. in solo monte Sierra de Baza regni granat. or. lecta est, a Bourgeau detecta.

4. *S. ocymoides*: Gall. or. (Côte-d'Or, rr.). Helv. mer., occ. (Alpes, Jura). Bavar. (Lindau ad lac. Bodan.; Mittelwalder Gesteig). — *S. alsinoides*: Cors. Sard.

7. *S. ænesia* (Heldr. sertul. in act. congr. florent. 1874); hab. in reg. abiet. m. Ænos, 3500—5500'.

9. *S. depressa*: in Pindo Tymphæo varietas hujus speciei, proprie sicule, a Heldreich (1885) lecta est.

11. *S. lutea*: Alp.-Marit. (reg. alp., r.). Sabaud. alp., r. (Savine, Petit-Cenis circa lacum in planitie montis), sed (ex Chabert) non in Delph. (solus locus gallicus est sub Col du Petit-Mt-Cenis) nec in Helv. (locus Breuil in val Tormanche, Helvetiæ vulgo adscriptus, Pedemontio pertinet: Gremli).

12. *S. bellidifolia*: Transs. m. Skarisora comitat. Torda Aranyos (: Wolff 1883; Kern, exs. 1885).

14. *Gypsophila*. 1. *G. fasciculata*; typ. (Marg. Reut.) ex Boiss. (fl. or. suppl.) ad genus *Tunicam* pertinet, sed var. (Lacon.) propriam sistit speciem:

1. *a. G. laconica* Boiss. or. suppl. 88. - Lacon. m. Malevo (Heldr., Orph.), m. Taygetus (: Pichler nom. *G. hirsutæ*).

3. *G. thymifolia*: Lacon. m. Taygetus in rupestribus (: Pichler).

3. *a. G. spergulifolia* Grsb. spicil. I. 183. — Alban. m. Puka (: Grisebach); Serb.

4. *G. porrigens*; solum in Mallorca (pr. Solter: Bourgeau) lecta est.

6. *G. hispanica* Hisp. or. precipue inhabitat, in Castil. et Betic. rarissima (Willk., Cabr.).

7. *G. repens*: Hassia (m. Vogelsberg). Badia (pr. Rheinweiler, ubi fluvio advecta: Frey). Würtemb., Bavar. (ex Alpib. cum fluviis devecta; lit. lacus Bodani). Polon. a Rostafinski indicatur. — *G. alpigena* Brügg. (Helv.).

8. *G. Gmelini*: — *G. dichotoma* (teste Knapp 1872) est planta dubia, in rupibus pr. Jaslo a Besser indicata, sed post eum a nemine lecta.

10. *G. perfoliata*: — *G. tomentosa* adest etiam in Hisp.or. (Catal., Aragon.).

11. *G. trichotoma*: Dobrud. (in reg. litor. abunde: Ue.S.).

12. *G. paniculata*: Dobrud. (in delta: Ue.S.); pr. Memel Boruss. or. introducta.

14. *G. altissima*: Galiz. (in rupib. gypsac. ad Dniestr, rarius). Ross.cent. (gub. Kursk), mer. (Cherson).

15. *G. fastigiata*: Fenn.bor. (Im, K.), mer.-or. (Ik). Siles.; Helv. (ital.) ex solo Thomas in hb. Burnat. (sec. Grenli); in Germ.mer. deest.

16. *G. glomerata*: Dobrud. pr. Ciernavoda (: Janka 1872) alibique freq. (: Uechtr. Sinten.). Bulgar. et Rumel.or. (: Velenovsky).

17. *G. transsilvanica*: Roman. alp. Cehlaulu, Bucieciu, Petra-crauliui.

18. *G. uralensis*: Ross.bor.med. (gub. Wologda: Ivanitzky 1884).

19. *G. nana*: Heldr. hb. norm. 909 (e Taygeto).

20. *G. muralis*: Hisp.bor. ex Amo (Willk.) et Salcedo. — Caprera (casa Garibaldi, introd.? : Aschn. Reinh.). — Moldav. Bulgar. — Fenn. non nisi in mer. et or. (Carel.) adest.

15. *Tunica*. 1. *a*. *T. phthiotica* Boiss. (et Heldr.) or. suppl. 82. *Phthiotidis* m. Oeta, 4500—6000' (: Heldreich).

2. *T. cretica*: ins. Cephalon. pr. Pylavos (: Heldreich).

4. *T. illyrica*; in Illyr. non crescit (vid. Neilr. nachtr. et Simonk. in oe. b. z. 1888).

4. *a*. *T. Haynaldiana* Jka in oe. bot. z. 1870 (sub *Gypsophila*). — Vallach. (et? Serb.: vid. Simonk. l. c.), ubi locus speciei natalis est pr. Virciorova, in declivibus lapidosis aridissimis versus Portam Ferream. - Bulgar. (Petrov Han, Kostinbrod etc.: Vandas. Velen. Skorpil). Thessal. super. (: Hausskn. 1885).

5. *T. Sibthorpii*: mons Za ins. Naxos (: Heldreich).

8. *a*. *T. fasciculata* Boiss. or. suppl. 82. *Gypsophila fasciculata* Marg. Reut. - Ins. Jon. (Zante: Margot, ad Orondonero: Letourn.; Cephal.: Heldr.).

10. *T. saxifraga*; exc. Germ. plur. cum non nisi in Bavar. certe proveniat.

16. *Dianthus*. 4. *D. rupicola*; in Ital.mer. orientem versus usque in Japygiam (*T. d'Otranto*: HGroves) procedit.

7. *D. gracilis*; — *D. ætæus* Heldr. in sched. exs. it. græc. sept. - *Phthiotidis* m. Oeta ad cacumen Hagios Elias, 5500' (: Heldreich).

**D. Mercurii*; ab Heldreich detectus et primum descriptus in actis congr. florent. 1874. 13. *Hab.* (ex Boiss. or. suppl.) ad rupes reg. medice montis Kyllenes Achaie pr. Tricale et pr. Megaspoleon. *D. actinopetalus* (3) similis, sed magis affinis *D. gracili*.

11. *D. nardiformis*: Dobrud. in montib. ad Grecii etc. (: Janka) alibique (: Uechtr. Sinten.). Trebovic (: Pantocsek ex GBeck).

12. *D. crassipes*; species insignis, rara, non nisi in montib. Marianis regni Jiënn. (ubi a Willkomm detecta) hucusque lecta; in Willk. Lge prodr. hisp. post *D. barbatum* (37) militat.

13. *D. toletanus*: Betic. (S. Morena: Colm.). Extrem. (: Graëlls). Leon (: Texidor).

14. *D. anticarius*; species hæc rariss. solum "ad radices meridionales montis calcarei Sierra de Antequera" regni granat. (ubi a Reuter detecta 1849) lecta est.

15. *D. multiceps*: Valenc. (Jativa: Rouy 1881); pertinet ad gregem *Pungentium*, inter 80 et 81 inserendus.

16. *D. hematocalyx*: — ? *D. purpureo-luteus* Velen. (Rumel.or.).

17. *D. Seguiieri* (*D. Carthusianorum* All. non L.; *D. collinus* Gaud. non

alior.): - Arag., Catal., m. Mariani regni jienn. (r.), Murc. (r.); Badia (in der Baar); Saxon. hab. in declivib. rupestrib. fluv. Saale inter Lobenstein et Eichicht; planta transsylv. (D. asper, D. Seguieri et D. Courtoisii Schur) ad subspc. (D. collin.) pertinet ex Simonk.

*D. collinus: Roman. Ross.mer. — D. pratensis MB. (Sarepta: Becker).

19. D. cæsius; Germ. bor. adest Siles., Poson. (et Rosstreppe Hercyn.); Transs. ad D. subneglectum (44—) pertinet ex Simonk.

20. D. deltoides; adest in Norv.bor., sed vix attingit lat. 64° (Inderøn); ex Norman 1880. — D. alpestris Bmg. (ex Simonk.!).

21. D. campestris: Ross. centr. (gub. Kursk). — D. guttatus MB. (Ross. mer.-occ.: Schmalhausen).

21. a. D. roseo-luteus Velenovsky in oe. bot. z. 1886. Rumel.or. (pr. Aitos etc.).

24. D. nitidus: Galic. in rupib. calcar. m. Pioniny raro (teste Knapp); Transs. ad D. subneglectum (44—) pertinet ex Simonkai.

25. D. alpinus: Carinth. (alp. Lesachthal., Wischberg, Baba; Steiner-Alpen).

26 *. D. gelidus: Roman. alp. Bucieciu in pascuis ubique.

27. D. neglectus; planta transs. (Schur.) ad D. subneglectum (44—) pertinet ex Simonk.

28. D. microlepis: Bulgar. m. Vitos pr. Sofia, cæspit. densis (: Velenov. 1885); Maced. m. Orbelus (Perimdagħ) in pascuis alpinis: Jka ex Boiss.

29. D. myrtinervius: Orph. fl. gr. exs. 1027 (m. Peristeri).

31. D. pubescens: Karnabad Rumel.or. (Skorpil ex Velen.).

31. obs. D. aridus Grsb. ap. Jka in oe. bot. z. 1873. 196. Jka brevior. II. 25. - Thrac.bor., Rumel.or. (: Janka, Velenovsky); sec. Uechtritz jam a Noë sub nomine erroneo D. brevifol. Friv. (ex Adrianopoli) editus; ex Boiss. valde affinis est D. Friwaldskyano (8).

32. D. Armeria: Hisp. centr., or.; mer. (Jaën) r.; Istr. Roman: Bulgar. — D. corymbosus Borb. (ex Simonk.!).

33. D. pseudarmeria: Dobrud. in m. Balve et pr. Rassova (: Ue.S.). Bulgar. (: Velenovsky 1885). Rumel.or. (Skorpil ex Velen.).

34. D. corymbosus: Orph. fl. gr. exs. 1026 (e m. Korthiati). Rumel.or. (: Skorpil ex Velenovsky). Bosn.mer. (Zagorje: Blau ex GBeck).

35. D. tenuiflorus: Bulgar. (: Velenovsky 1885).

36. D. glutinosus: Attica (Heldr. hb. norm. 910).

37. D. barbatus: Bavar. (Valep ad Schliersee Alpium). Ross. centr. (gub. Kursk). Bulgar. (: Vandas. Velen. Skorpil.).

*D. compactus Kit. ap. Schult. (1814). D. barbatus Bmg. et auct. transs. ex Simonk. D. subbarbatus Schur (ex Simonk.!). Hung. Transs. Serb. Styr. Carn. (etiam mte Majella Aprutii ex Kerner).

38. D. trifasciculatus (D. banaticus Kit. non Heuff.): Ross.mer. (Cherson).

*D. brachycarpus Velenov. in act. soc. sc. bohém. 1886 (sep. 9 *). — Bulgar. inter Razgrad et Kalova (: Velenovsky 1885).

39. D. viscidus; — D. parnassicus: Pindus (Heldr. 1885). — D. Grisebachii: Bulgar. (Dragalevce, Vitos: Skorpil). — D. Heldreichii Orph. exs. 914. (Maced.).

41. D. polymorphus: Dobrud. in reg. litor. (Uechtr. Sinten.).

* (D. medius; non Bess.). D. membranaceus Borb. in oe. bot. z. 1876. D. Rehmanni Blocki (1880). — Galiz.mer.-or. Ross.mer.-occ. D. collinus var. Bess. ex Borb. sec. specim. ! - Besser nullum "D. medius" nominavit, sed in schedulis scripsit: "medius inter D. collinum et D. Carthusianorum" (Borbás in bot. centralbl. 1881 *). Comment. 62.

43. D. cruentus: Thessal. (Heldr. 1885). — D. fastigiatus descr. in Pantocsek adnot. 105, ubi etiam cum D. collino et D. trifasciculato comparatio; hab. in pratis infra m. Crna Planina. — D. consanguineus ad D. giganteum (53) pertinet ex Simonkai.

? 43. a. D. Holzmännianus Heldr. Hsskt. (in Heldr. exs. it. thessal.). Pindus (: Hausskn. Heldreich 1885).

44. *D. Carthusianorum*; Hisp. extra Catal., Arag. et Castil. vix vel parum lectus. Roman. plur. locis. Bosn. (Sarajevo: GBeck). — *D. vaginatus* Vill. (non alior.) est = *D. atrorubens* All. (45) ex Kern. — *D. gramineus* Schur ad *D. tenuifolium* ej. pertinet ut etiam *D. tenuis* ej. (ex Simonk.). — *D. subneglectus* Schur enum. 95. *D. neglectus* ej. l. c. 96 (non Loïs.). *D. cæsius* Bmg., Schur (non Sm.). *D. nitidus* Bmg., Fuss. (ex Simonk.). — *D. ferrugineus* Pourr. ex Willk. (Hisp. bor., or.).

**D. sabuletorum*; Comment. 63. — **D. congestus*: Helv. Ital. bor.

**D. puberulus* (Simk.) Kern. sched. ad exs. 1882. *D. marisensis* Simk. term. füz. IX. *D. atrorubens* auct. transs. (ex Simonk.). *D. vaginatus* et *D. diutinus* Schur (ex Simonk.): Hung. or., Transs., Serb. Bosn. (: GBeck), mont. — *D. sabuletorum* Simk. non Heuff.

45. *D. atrorubens*: Galiz. or. Moldav. Banat.; Helv. solum in cant. Ticino (r.). Comment. 64. — *D. banaticus* Kern. — *D. Pontederæ* Kern. (*D. atrorubens* auct. hung.).: Hung. Morav. — ? *D. moesiacus* Panc. (Serb.; Bulgar. pr. Knezevo: Skorpil ex Vandas).

**D. croaticus* Borb. (1876). *D. vaginatus* Schloss. Vuk. (non alior.). Croat. Bosn. (: GBeck). — ? *D. Schlosseri* Williams in journ. of bot. 1885. (sep. 3 *). Janobor (: Schlosser ex Williams).

46. *D. liburnicus*: Herceg. mer. (: Vandas 1886); Transs. (*D. Balbisii* Schur) ad *D. giganteum* (53) pertinet. — *D. Balbisii*; *D. liburnicus* G.G.

**D. vulturius*; *D. liburnicus* Porta. Rigo exs. (e mte Gargano).

47. *D. stenopetalus*; — ? *D. Pancicii* Velenov. in act. soc. sc. bohém. 1886. (sep. 9 *). — Bulgar. in summo m. Vitos (pr. Sofia): Velenovsky 1885.

49. *D. pinifolius*: Bulgar. in rupibus ad Konjavo rarius (: Vandas. Velen. 1887); locus valach. Jankean. (1870) est *Virgiorova*, in rupestribus versus Portam Ferream. — *D. brevifolius* (Maced., Thessal. m. Pindus: Haussknecht 1885).

50. *D. lilacinus*; — var. *androsacens* Boiss. Heldr.; hab. in m. Kyllene (: Pichler).

51. *D. capitatus*: Galiz. or. (rarius). Dobrud. copiose (Ue.S.). — *D. glaucophyllus* ad *D. giganteum* (53) pertineat.

52. *D. ferrugineus*; — *D. Giulie* forse melius sub *D. Carthusianorum* citetur, "ad quem se habet fere ut *D. Knappii* ad *D. liburnicum*"; hab. ad Pestum (inter Eboli et Sele): Janka 1874.

53. *D. giganteus* (*D. atrorubens* Bmg. ad 44 — *D. tenuifolius* spectat ex Simonk.): Moldav. Dobrud. — *D. pruinosis* Jka in delect. sem. h. vindob. 1858 (reimpr. in linn. 1860). *D. Balbisii* Schur et auct. transs. (ex Simonk.). — *D. glaucophyllus* Reh. ic. (non Horn.). *D. banaticus* Grsb. et auct. transs. (non Heuff.) ex Simonk. — *D. giganteiformis* Borb. in bot. zeit. 1876. *D. banaticus* Borb. 1873. (Versete Banat., *Virgiorova* Valach.). — Comment. 65.

54. *D. intermedius*; in Thessal. freq. ex Haussknecht (1885).

**D. ambiguus*: Bulgar. (: Vandas, Velen. Skorpil).

55. *D. superbus*: Bosn. (: Brandis 1886). Roman. Ross. med. plur. (etiam balt.), mer.-occ. Fenn. etiam cetera bor. (Ks. Kk.). — *D. Wimmeri*; Carinth. (r.). Transs.; Siles. solum in summis Sudetis (Kesselkoppe, Teufelsgärtchen, Glatzer Schneeberg) provenit. Comment. 66.

**D. Courtoisii*; hunc pro *D. asper* W. primum habuit Lejeune, dein pro hybr. a *D. aspero* et *D. superbo*, demum (in Reh. exc.) recte hybr. *D. barbati* et *D. superbi* agnovit. Courtois plantam in territ. Spa detexit.

56. *D. monspessulanus*: Hisp. centr. (r.), or. (Arag., Catal.); Transs. non indig. est (Simonk.). Comment. 67. — *D. condensatus* ad *D. strictum* (88) pertineat. — *D. Sternbergii*; Comment. 68.

**D. Waldsteinii*; *D. monspessulanus* Wulf. — *D. geminatus* Kit. — *D. controversus* Gaud. (Helv.).

57. *D. tener*: Alp.-Marit. (reg. alp., rarius): Ardoino.

**D. fallens* (*D. tener* G.G.): Arag. Catal.

58. *D. plumarius*; Carinth. loco (ex Pacher 1886) unico adest sc. in rupibus Rabensteiner. vallis Lavant (: Graf); Transs. ad *D. spiculifolium* (63 *) pertineat.

**D. serotinus*: Moldav.; Morav. a Schlosser (pr. Wsetin) indicata, nunc ibi deesse videtur (: Oborny). *D. Stawkianus* Tangl ex Knapp.

59. *D. Broteri* (*D. fimbriatus* Brot.) ipsiss. in *Hisp. solum in regno granat.* (mult. loc.) et *murc. (rarius)* lectus est. — *D. valentinus* (*D. superbus* Asso): *Hisp. mer.-or.-or.* (et *Navar.*); potius subspecies est.

59. *a. D. crinitus* Sm. in *act. soc. linn. II. 300.* - *Rhodus* (pr. *Bastida*: *Bourg.*) ex *Boiss.*

60. *D. arenarius*: *Pomeran., Poson. Moldav. Ross.mer. (Cherson)* ex *Lindem.*; *Fenn. non nisi in mer. et or. (Oneg.) adest.*

63. *D. petraeus*: *Roman. alp. Bucieciu. (Fronius). Skit la Jalomnita. (Winkler).* — *D. integripetalus* certe huc pertinet ex *Simonkai!*

**D. spiculifolius*: *Roman. (D. acicularis* *Grecescu* 1882 ex *Reuterm.*). *Transs. (Barth sub eod. nom.). D. plumarius auct. transs. ex Simonk.!*

64. *D. acicularis*: *Ross. or. gub. Perm. (Sorokin* 1876).

65. *D. Noëanus*: *Bulgar. in rupibus calcar. ad Konjavo, cop. (Vandas, Velen.* 1887).

66. *D. liliodorus*; *cl. Williams* (*enum. dianth. 1885*) hanc speciem post *D. marsicum* (56—) recenset; flores albi, odore *Convallariæ majalis.*

67. *D. Caryophyllus*: *Gall.bor.-occ. Hisp. or. locis rupestribus et ad muros vetustos reg. mont. sponte crescit* (ex *Costa et Amo*); subsponte in temperatioribus plurimis hæc species passim obvia est in *muris etc. Comment. 69.*

**D. caryophylloides* *Rehb. (p. p.)* sed (ex *Kern.*) minime *Schult. (qui D. Armeriæ affinis est). Tyrol. Carn.*

**D. tergestinus* *Kern. sched. ad exs. 1882. D. virgineus* *Jacq.; Pett. dalm. exs. (non L.). D. longicaulis fl. croat. D. silvestris litoralis* *Noë sched. — Istr. Croat. Dalm. Bosn. (Brandis* 1886 ex *Frey.*)

68. *D. longicaulis*: *Bosn. (Brandis* 1884 ex *Frey.*) — *D. nodosus* *Tsh (1828). D. caryophylloides* *Rehb. p. p.: Illyr. Croat.; etiam Aprut. si, ut videtur cl. Ker.* *D. longicaulis var. minor* *Ten. huc pertinet.*

**D. Levieri* *Borb. (1876). Mte Cucciolli Florentiæ (Levier); sec. Williams (journ. of bot. 1885) est propior D. attenuato (80).*

70 * *D. siculus*: *Pindus Tymph. (Hausskn. 1885). — ? D. marginatus* *Lacaita ap. HGroves (1887). Ital.mer. (territ. Leucaspide).*

72. *D. silvestris* (1786): *Bavar. (Alpes). D. Caryophyllus var. inodorus* *L. (1753). D. inodorus* *Kern. (1882). — D. saxicola: Gall.or. (Côte-d'Or). — D. nodosus* *Tsh (ex GBeck). — D. brevicalyx* *GBeck in annal. mus. vindob. 1887. (Bosn. mer. alp. Vratlo, Maglic).*

74. *D. virgineus*; *Arag. ex Loscos, ceter. floræ hispan. dubia civis; Ital. mer. (Otranto et probab. alibi) ex HGroves, sed hic forse D. longicaulem (68) spectat* (cui ex *Loret adnumerandæ varr. in Consp. allatæ = D. virgineus* *Timb.-Lagr.*) — *D. brevistylus* *Timb.-Lagr.*

76. *D. hirtus*: *Hisp.or. (Catal.). Bth., Costa. — D. vivariensis pertinet ad seq. (D. granitic), ejus levis varietas dicitur.*

78. *D. Requienii*: *Hisp.or. (Catal. Arag.: Willk.), bor. (Picos de Europa: Ler. Lev.).*

**D. aragonensis*; ex ipso auct. (serius) proxime affinis est *D. benearnensi* (80 *), ejus var. *grandiflora* *sec. Loret (1884).*

79. *D. lusitanus* (*D. attenuatus* *Webb iter et auct. hisp.): Hisp.bor. (r.).*

80. *D. attenuatus* (*D. pyreneus* *Pourr.*). — *D. catalaunicus* *Pourr. ined. (Catal., Arag.: D. aragonensis* *Timb.? ex Willk.). — D. pungens* *Timb. dicitur = planta (status speciei) litoralis. — ? D. Levieri* *Borb. ex Williams. (Firenze).*

**D. benearnensis*; *cl. autor Loret de hoc amplius disseruit in bull. soc. bot. 1884. (sep. 3-5 *).*

80. *a. D. Costæ* *Willk. in Willk. Lge prodr. hisp. III. 683. D. ciliatus* *Costa (non Guss.). — Catal.mer., r. (Costa* (1858).

81. *D. furcatus* (*D. Faurei* *Arv.-Touv.): Alp.-Marit. (reg. alp.). — D. pungens est subspecies.*

Obs. D. furcatus, D. teres et D. alpestris *Balb. sunt formæ vix distinctæ uniús speciei, Alp.-Marit. privæ, ex Burnat (litt. ad Rouy), qui specim. auth. comparavit.*

**D. subulatus* Timb.-Lagr. *D. pungens* G.G.; *D. furcatus* Godr. (non Balb.). Pyren.or. Catal. Arag. — *D. insignitus* Timb.-Lagr. ex Willk.

82. *D. pungens*: ins. Planasse in "Etang de Bages" pr. Narbonam (: Gautier); de hac specie cl. Loret observationes novas sagacissimas societati botan. gall. 1884 communicavit; vid. ej. soc. bull. (sep. 5—7 *). — *D. hispanicus* nunc species propria habetur (vid. infra). — *D. insignitus* ad subspec. præced. pertineat et etiam in Pyren. catal. adest.

**D. cintranus* (*D. pungens* Lge pug.): *Hisp.bor.-occ.rr.* (: Lange).

82. *a.* *D. hispanicus* Asso. *D. hisp. borealis* Willk. (*D. pungens* Timb.) et *D. hisp. australis* Willk. (*D. pungens* Webb iter). *Hisp. (bor. rr.) centr., or., mer.* — *D. sætabensis* Rouy in bull. soc. bot. 1882. (sep. 5 *). *D. silvestris micropetalus* Bourg. *hisp. exs.* 1704. *Hisp.mer.-or.* (Valenc. m. Sierra de S. Felipe de Jativa). Ex ipso Rouy (in bull. soc. bot. 1884) est = *D. hispanicus* Asso.

**D. Langeanus* Willk. ap. Willk. Lge III. 690. *D. hispanicus occidentalis* Willk. ic. — *Hisp.bor.-occ. mont. et subalp.*: *Galloec.* (Lge). *Leon* (Lge). *Astur.* (Bourg.); *Cast. vet.* (: Levier).

83. *D. Planellæ*; *D. laricifolius* Lge. *D. ericetorum* Pourr.

84. *D. brachyanthus* (*D. pungens* Gay, an L.?); adest etiam in Gall.mer. (mt Ventoux et Roussill. ex Willk., mt Alarie dep. Hérault: *D. brevistylus* Timb.-Lagr. ex Loret). — *D. subacaulis* Cut. fl. madr. (*D. brach. nivalis* Willk.); hab. præcipue in montib. Nevad., alt. 8000—10000'. — De hac specie (et de *D. pun-gente*) vid. cl. Loret animadversiones criticas in bull. soc. bot. 1884. 7—8 sep. (*).

85. *D. laricifolius* extra Castiliam (Sierra de Gredos, S. de Guadarrama) vix vel parum (*Galloec.*: Texidor) lectus est.

88. *D. strictus*: Herecg. (: Brandis 1887); *D. condensatus* Kit. ex Borbás teste specim. authent. — *D. integer*: Bosn. mer. (ex GBeck).

89. *D. ciliatus*; — *D. dalmaticus* Celak. in oe. bot. z. 1885. *D. ciliatus* var. *cyomosus* Vis. (Ragusa, Cattaro: Studniczka; in montib. calcar. Herecg.mer. freq.: Vandas 1886).

92. *D. pallens*: Bulgar. in declivibus calcar. ad Konjavo freq. (: Vandas. Velen. 1887).

93. *D. leptopetalus*: Dobrud. (: Uechtr. Sinten., Janka). Bulgar. pr. Razgrad, Varna etc. in collib. graminosis (: Velen. 1885).

96. *D. gaditanus*; hæc species a Colmeiro *D. anticario* (14) approximatur; a solo Fauché lecta videtur.

98. *D. glumaceus*: Eurytania et Cephalonia (: Heldreich). Bosn. (m. Zimje polje: Blau ex GBeck). — *D. obcordatus*: Thessal. freq. (: Hausskn. 1885).

99. *D. prolifer*; Suec. impr. in Gotland. et Scania, r. in Ostrog. et Oelandia obviam venit. — *D. diminutus* L.

100. *D. velutinus*: Istr.mer. (: Tommasini, Freyn).

×*D. decrescens* Borb. = *deltoides* + *Seguieri*. (*Ligur.occ.*).

×*D. Dufftii* Hsbn. = *Carthusianorum* + *deltoides*. (*Thuring.*).

×*D. fallax* Kern. = *alpinus* + *deltoides*. (*Austr.*).

×*D. Helwigii* Borb. = *Armeria* + *deltoides*. (*Germ. Bohem.*).

×*D. Jazonis* Aschn. = *deltoides* + *superbus*. (*March.*).

×*D. Leitgebi* Reichardt. = *barbatus* + *superbus*. (*Germ.*).

×*D. Lucæ* Aschn. = *Carthusianorum* + *arenarius*. (*Boruss.*).

×*D. Mikii* Reichardt. = *barbatus* + *monspessulanus* (*Goriza*).

×*D. oenipontanus* Kern. = *alpinus* + *superbus*. (*Innsbruck*).

×*D. spurius* Kern. = *Carthusianorum* + *inodorus*. (*Innsbr.*).

×*D. Vukotinovicii* Borb. = *croaticus* + *caryophylloides*. (*Croat.*).

×*D. Warionii* Timb.-Lagr. = *catalonicus* + *monspessul.* (*les Albères*).

×*D. Wolfii* Vetter = *barbatus* + *superbus*. (*Helv.*).

17. *Velezia*. 1. *V. rigida*; adest etiam Sard. (: Gennari).

2. *V. quadridentata*: Nauplia (: Haussknecht 1885).

XV. ALSINACEÆ.

1. *Malachium*. 1. *M. aquaticum*; exc. etiam Fenn.bor. (cum Lapp.) et med.; Hisp. extra Catal. parum lectum est: Leon, Cast. nova; in Thessal. ad m. Ossa (Heldr. 1882).

**M. calycinum* Willk. in bot. zeit. 1847. — Hisp. gran. pr. Carratraca (: Prolongo).

2. *Cerastium*. 4. *C. grandiflorum*: Phthiotidis m. Oeta, ad 5—6000' (: Heldreich), sed planta Heldr. hb. norm. 518 pertinet ad *C. tomentosum* (ex Boiss. or. suppl.). — *C. banaticum*: Valach. (: Borbás 1873). — *C. filifolium* Vest in Flora 1820. (Styr. alp. Hohenschwab pr. Mariazell).

4. *a.* *C. balcanicum* Vandas in diar. soc. sc. boh. 1888. 436. — Bulgar. in reg. alp. tractus montium Osogovska Planina supra Kistendyl a Vandas. Velen. detectum.

6. *C. tomentosum*: Parnass. reg. alp. 6—7000' (Heldr. hb. norm. 518) ex Boiss. — *C. decalvans* est species distincta et *C. moesiacum* ejus varietas sec. Borbás. — *C. lanigerum* (1841). *C. tomentosum* Pntek adn.: Dalm. Herceg. Bosn. (: GBeck 1885). — *C. Dollineri* GBeck 1887. (Bosn.). — *C. bosniacum* GBeck 1887. (Bosn. mer.).

7 * *C. lineare*; pro Valdieri (observ. Ascherson) legendum est: Alpes Valdenses; de planta sardoa vid. infra obs. sub *C. Boissieri* (12).

8. *C. arvense*; adest in Suec.bor. (Helsing., Gestric.) ex RHtn. — *C. ciliatum*; *C. repens* Schur (ex Simonk.). - *C. Lerchenfeldian*. Schur (1866). *C. coronense*, *C. caespitosum*, *C. laricifolium* et *C. alpicolum* Schur, *C. repens* Bmg. ex Simonk. — *C. repens* Schleich. ex Helv. (hb. eur.) medium tenet inter *C. arvense* typicum et — *C. strictum*, idemque videtur *C. alpicolum* Brügg. (*C. Poolianum* ej. olim).

**C. hirsutum*; Comment. 70.

10. *C. alpinum*: Ins. arct. Island., Beeren-Eiland, Nov.-Seml., Waigatsch (exped. Rosenthal. 1871). — *C. squalidum*; *C. microphyllum* Schur (ex Simonk.)

**C. caespitosum*: Beeren-Eiland.

10. *a.* *C. arcticum* Lge in fl. dan. L. (1880). 2963; cfr. ej. adnot. (bemærkn.) ad flor. danic. L. in overs. vid. selsk. forh. 1880. 119. (sep. 9 *). *C. latifolium* Htn handb. p. p. (non L.). — Spitzb. Norv. Lapp.; ins. Færøer (?). Island. (Scot.?). Shetland. (: Beeby 1885): *C. arcticum* var. *Edmonstonii* Beeby in scottish natural 1887. 7 sep. (*).

11. *C. vulgatum*; — *C. nemorale* Uechtr.; *C. lucorum* et *C. pseudosilvaticum* Schur ex Oborny.

**C. macrocarpum* Schur 1851 (nomen solum) et 1859: Carinth. (ad Heiligenbl. jam 1816 lectum a Hoppe); ins. Shetland. (: Beeby 1886). *C. alpinum* Schur 1876 (ex Oborny). *C. fontanum* Bmg. (1816) certe huc pertinet ex Simonk., itaque nomen hocce prioritate gaudet.

12. *C. Boissieri* (*C. physospermum* Gay ined.): Hisp. regn. Jienn. (: Lange), prov. Toletana (: Pourret). Sard. centr. (reg. mont. et subalp.). Cors. (Mab. a. 1865. 89 ex Aschn: var. *sublanata*). — *C. gibraltarium*; hab. in mte Gibralt. et in Sierra de Agua pr. Carratraca (Hänsel. ex Willk.).

Obs. Ad hanc speciem (var. *lanugin.*) pertinet (ex Aschn) *C. lineare sardoum* (7 *) nec non *C. alpinum angustifolium* Mor. (*C. repens lineare* Ces. Pass. Gib.) et *C. Soleirolii* de Sardagna (e Sard. 1883); cfr. Barb. fl. sard. comp. 219.

13. *C. transsilvanicum* est *C. alpinum* (10) ipsiss. ex Simonkai!

14. *C. ovatum*; Transs. (ex Simonk.) pertinet partim (*C. acutifolium* et *C. petrosum*) ad *C. alpinum glabratum*, partim (*C. ovatum* Schur, Fuss) ad *C. trigynum*. — *C. Lerchenfeldianum* est (ex eod.) var. *C. ciliati* (8—).

× *C. mixtum* Huter (ex Stein) = ovatum + latifolium.

15. *C. latifolium*: Alp.-Marit. (mt Bego, val de Strop etc.). Helv. adest solum in albis summis. Galiz. in summis Carpat. centr. a pluribus lectum est; ins. Færøens. ex Rostrup 1870 (sed cum *C. arctico* compar.). Scand. (omn.?). Scot. et Wales ad *C. arcticum* vel *C. alpinum compactum* pertinent. — *C. filiforme* ad (subspeciem) *C. pedunculatum* (ut jam apud K. et Rehb.) pertineat. — *C. glaciale*; sec. Brügger sit propria species, cujus var. est *C. subacaule* Heg. — *C.*

uniflorum; Alpes Helv.; (etiam m. Corstnica Herceg. ex Freyn). — *C. pedunculatum* et *C. macranthum* Schur ex Simonk.

**C. pedunculatum* (*C. filiforme* Schlecht.); Delph. Pedem. Vales. Tyrol. — Proximum est *C. obtusifolio* Kar. Kir. (quod Sibir. altaic. incolæ) ex Celak., et etiam sec. Brügger speciem distinctam constituit.

**C. pyrenaicum* (*C. latifolium* Lap.); etiam hoc bene distinctum videtur a *C. latifolio* typico, ut jam habet auctor Gay (in ann. sc. nat. XXVI. 1832).

17. *C. campanulatum*: Mallorca Balear. (Marès 1855). Thessal. (: Hsskt).

18. *C. silvaticum*; etiam Galiz. et Moldav. indicatur; Thessal. (Hausskn. 1885).

21. *C. viscosum*; Norv. bor. adest usque ad Nordlandiam (Ranen, Salten).

22. *C. brachypetalum* Desp. ap. P. 1805. (*C. strigosum* Fr. 1817); Istr. Ins. Jonic. (Corfu: Spreitzenh. 1877). Moldav. Dobrud. — *C. tauricum* (1825). *C. brachypetalum glandulosum* K.; hoc prævalet in Europa orientali, sed adest etiam in occid., ubi typus speciei vulgarior est (Kerner).

**C. luridum*: Castellamare et Amalfi (Ital. mer.) in collibus copiose (: Lacaita).

23. *C. alsinoides*: Hisp. Gall. mer. Cors. Sard. — *C. gracile* Duf. ap. DC. ex Willk. (Valenc., r.). Comment. 71.

24. *C. pentandrum*; hæc species solum in agro Matrit. lecta videtur, nam incertum est an planta Cavanilles. valentina huc pertineat (Willk.).

25. *C. laxum*; in collibus Arcadiæ et Messen. copiosum ex Lacaita.

27. *C. glutinosum* (*C. viscidum* Schur ex Simonk.!); Dan. adest se. in ins. Bornholm et Möen (Ige); Suec. med. non nisi in Upland. marit. (Roslag.) lectum est. Norv. deest ex ABlytt et Htn handb. (1879).

28. *C. pumilum*: Belg. (ex Crepin); loca merid. probab. omnia ad *C. alsinoides* (23) pertinent; sec. Arth. Bennett *C. pumilum* typicum vix adest extra Angliam, ubi in calcareis, nec in arenosis, crescit.

29. *C. litigiosum*; adest etiam in Hisp. ex Willkomm. — *C. pallens*; pertinet (ex Townsend 1883) ad præced. *C. pumilum* Curt. (non auct. gall.), ut etiam *C. glutinosum* (27)!, sed sæpe non est planta pumila.

31. *C. Gayanum*; species (*C. glutinoso* simillima) solum in Arag. mer. et (r.) in Murcia (Bourg. hisp. exs. a 1852 s. num.) lecta.

32. *C. semidecandrum* (*C. pentandrum* Losc. Pardo ex Willk.): Cors. (E Petit 1883). Norv. saltem usque ad Sogn lectum; Fenn. non nisi in mer. occ. adest. — *C. macilentum* extra Sueciam (Bleking., Torekow Scan.) non nisi ad Gästrow Mecklenb. lectum videtur; vid. Neuman in Bot. Not. 1883. — *C. murale* jam (et rectius!) sub *C. glutinoso* (27) enumeratum est.

33. *C. tetrandrum*: ins. bor. Færöer (: Rostrup); Suec. (Bahus.) add.: Scania, Blekinge., Öland. (vid. Murbeck in Bot. Not. 1886. 193—5). — *C. pedunculatum* Bab. non Gaud. (St. Helens, Hampsh. Angl.).

34 *. *C. gracile* nunc tamquam varietas *C. alsinoidis* (23) militat.

34. a. *C. bulgaricum* Uechtr. in oe. bot. z. 1876. — Dobrud. pr. Matschin (: Sintenis 1875) et in montibus ad Grecii (Ue. S.). Valde proximum *C. ramosissimo* Boiss. (34—), immo ejus varietas dicitur ab ipso auct.

35. *C. dichotomum*; species jam a Loeffling in agro matritensi lecta, in aliquot locis Hisp. centr. et bor. nec non Gran. (r.) et Lusit. occurrit; adest etiam Græc., ubi ad radices m. Pateras Atticæ 1884 detectum est a Heldreich (hb. norm. 829) et dein (ex Boiss. or. suppl.) etiam in Bæotia et Arcad. lectum.

36. *C. illyricum*: Rhodus, in montib. (Bourg. ex Boiss.).

38. *C. trigynum*: Nov.-Seml. Færöer; Hisp. in solo m. Sierra Nevada hucusque lectum est; adest etiam in Bulgar. monte Vitos (pr. Sofia), Bosn. m. Tre-skavica (: GBeck 1885).

39. *C. anomalum*: Phalz. (Germ. occ.). Roman. Bulgar. (in planitie circa urbem Sofia vulgare: Skorpil).

3. **Moenchia.** 1. *M. mantica*: Styr. (plur. loc.: Maly). Bulgar. (: Skor-

pil ex Vandas). Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879). — Transs. (Cerast. mantic. Bmg., Pentaple mantica Schur) ad Cerast. trigynum pertinet ex Simonk.

2. *M. quaternella*: Istr. Thessal. (: Hausskn. 1885); Helv. solum pr. Genavam lecta ex Gremli; Transs. deest teste Simonk. (1886) ut etiam Galiz. sec. Knapp (1872); Morav. a Schlosser indicata, nuper non lecta est teste Oborny.

**M. octandra* (Holost. filiforme Risso); Hisp. raro obvia est: Cadiz (: Willkomm, Fritze), Catal. (: Vayreda).

4. *Stellaria*. 1. *S. nemorum*; adest in Græc. bor. (: Hausskn. 1885). — *S. montana* Lierrat (= var. debilior ex Bonnet). — *S. Bungeana* Fuss p. p. (Transs.).

**S. Reichenbachii*; *S. Bungeana* Jka, Fuss p. p.

3. *S. media*; — *S. Elisabethæ* pertinet ad subspeciem *S. umbrosa*, quæ et seminibus et vegetatione a vulgari typica diversa est (: Boswell).

**S. Cupaniana*: Hyères dep. Var (: Albert ex Rouy in bull. soc. bot. 1884).

**S. umbrosa* (vid. 3); — *S. apetala* Bor. (*S. pallida* Piré) est potius forma debilior kleistogama, quam varietas, etiam Germ. etc. (e. gr. Istria) observata (jam beat. Uechtritz specie distinctit; cfr. etiam Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 292).

4. *S. dichotoma*; planta transsilv. est Moehringia trinervia in statu fructifero ex Simonkai!

5. *S. bulbosa* Wulf. ap. Jacq. (1789). *S. dichotoma* Sep. (1772) non L. (1753); etiam Styr. (rarius: Unger, Feiler et al.). Transs. incerta est ex Simonk.

6. *S. holostea*; adest in Fenn. mer. et mer.-or. (Carel.).

7. *S. palustris*: Bulgar.; Scand.: Norv. mer. Suec. mer. med., bor. r. (Jemtia, Angerm.). Fenn. tota. Comment. 72. — ?*S. glauciformis* Bouret (1873). Gall. dep. Maine-et-Loire. "Flores ut in specie, sed bractæ ciliatæ."

**S. Laxmanni* Fisch. ap. DC. — Transs.-(r.).

8. *S. graminea*; deest etiam in Hisp. mer., sed adest in Græc. bor. (: Hausskn. 1885). — *S. Dilleniana* Rehb. — *S. Barthiana* Schur 1876. (Transs.).

?*S. ponojensis* A. Arrh. ap. soc. f. fl. fenn. 1888. — Lapp. or. (Ponoj.).

9. *S. uliginosa*; in Suec. bor. prov. Medelpad (. Reuterman) et Jemtia lecta est; in Norv. extra partem mer.-or. parum obvia; deest in Fenn. bor. (cum Lapp.) et med. plur.

10. *S. crassifolia*: Fenn. bor. Suec. bor. (Jemtia, Angerm.). Würtemb. (Buchauer-et Wurzacher Ried). Galiz. r. (ad Pantalicha teste Knapp).

12. *S. longipes*; locus norv. hucusque unicus est ad Talvik Finnm. — *S. peduncularis* Bge. (Ross, arct.).

14. *S. Friesiana* (*S. mosquensis* MB.): Lauenburg (Holsat.) ad Crumese; Fenn.; Boruss. etiam occ.; Ross. mer. (Cherson: Lindem.) mer.-occ. (ex Schmalhaus.) Galiz. r. (alp. Giewont ex Janka). Transs. (r.). Helv. mer. (Engadin); Morav. solum et raro in "Gesenke" (pr. Karlsbrunn); deest in ins. balt. Gotland et Oeland.

**S. alpestris*; hab. etiam Fenn. bor.

15. *S. borealis*; deest in Fenn. mer. et med.

16. *S. humifusa*: ins. arct. Nov.-Seml. et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr.). Fenn. bor.-or. (Kp); in Island., unde olim Rottboellio cognita, nuper (1883) relecta est a Strömfelt.

5. *Holosteum*. 1 *. *H. glutinosum*: Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker exs. a. 1881).

6. *Moehringia*. 1. *M. trinervia*; adest in Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi term. pol. circ. 69° 48' (ex Norman); in Græc. etiam hodie lecta est sc. a cl. Heldreich in M. Delphi Euboeæ et Olympo Thessal.

**M. pentandra*; in Hisp. præcipue Catal. et Arag. (*M. trinervia* Losc. ex Willk.) inhabitat, sed adest etiam (r.) in Leon (Lge) et in Valenc. (ex. gr. Sierra de Fuente: Bourg. exs. 1705); Balear. solum in Mallorca (a Willkomm) lecta. — Bene distincta a *M. trinervia*; cfr. Willk. Lge prodr. hisp. III. 617.

2. *M. lateriflora*; nunc etiam in Finnm. or. Norv. arct. (ad lat. 69° 32') lecta est (Norman in arch. 1881); Fenn. or. (Olonets).

3. *M. diversifolia* Dollin. ap. K. in Flora 1839; Carinth. plur. locis adest
4. *M. villosa*: Carinth. (Loibl: Graf).
5. *M. Grisebachii* (*M. villosa* var. *tenuifolia* Reichardt): Dobrud. (in saxosis sat freq.: Ue.S.).
6. *M. Ponaë* Fzl (1833). *M. dasyphylla* Nym. consp. (non Bruno). *Arenaria bavarica* L. — Comment. 73.
6. *a. M. Tommasinii* Marches. in bull. soc. adr. 1880. — Istria: Tergesti in rupibus ad Balneolin (Bolunz) et Cernical; Justianopoli in muro diruto ante antrum Ospoense (: Marchesetti). Comment. 74.
6. *b. M. dasyphylla* Bruno ap. Balb. (1804). *M. sedifolia* W. in berl. mag. 1808.
- Alp.-Marit. (m. Tenda, la Briga etc.). Comment. 75.
7. *M. polygonoides*; Helv. deest ex Gremli et Transs. ex Simonkai.
10. *M. sphagnoides* (*Arenaria sphagnoides* Froel. non Thom.): Carinth. (m. Roskofel: Pacher 1860).
11. *M. pendula*: Bulgar. in præruptis montis Kom supra Berkovce (: Vandas. Velen. 1887).
12. *M. muscosa*: Moldav.; Hisp. præcipue in Catal. lecta est, ceterum (r.) in Astur. et Vizcaya, sed antiquitûs etiam alibi indicata. — *M. bavarica* Gren. varietatem florib. pentameris sistere dicitur.
14. *M. Jankæ*: Dobrud. rupes calcar. pr. Hirsova (: Janka).
15. *M. intricata* adest solum in Hisp. mer.-or., ubi forma primaria Willkomm. (*Stellaria Willkommii* v. Roem.) montem Sierra de Maria, altit. circ. 5000', inhabitat; planta Bourgeana, in Murciæ m. Sierra de Alcaraz lecta (*Arenar. intricata* Gay), est var. laxior, gracilior (— *rivularis* Willk.).
7. *Arenaria*. 1. *A. graminifolia* Schrad. (1809). *A. procera* Spr. hist. II. (1808). Germ. huc usque solum ad Lyck in Borussia (Preussen) lecta ibique rara.
3. *A. rigida*: Dobrud. mer. (: Uechtr. Sint., Janka).
5. *A. pungens*; hæc species insignis inhabitat regionem alpin. et nival. montis Sierra Nevada, altit. 5800—9000', "caespites latos semiglobosos valde pungentes formans".
6. *A. grandiflora*: Helv. in Jura (r.) et Salève. Carinth. (rarius). Styr. (in Raxalpe ex Maly). Morav. non nisi in rupibus calcar. montium Polauer et Nicsburg lecta. Transs. a solo Schur indicata et dubia.
- **A. Bourgeana* (*A. grandiflora* Barc. apunt.); hab. in montibus oræ septentr. insulæ Mallorca inter 500 et 1400 metr. s. m.
9. *A. gracilis* WK. (1812). *A. densa* Schltd. (1816).
- **A. Huteri* Kern. in oe. bot. z. 1872. — Venet. territ. utiense, Tyrol. mer. conterm. (Canale di Cimolais, in rupibus verticalibus et in glareosis ad margines torrentium, 700—1900 metr. s. m., detecta a Huter 1872).
10. *A. incrassata* hucusque non nisi in Castil. (supra Encinillas: Lge) et Astur. (Oviedo: Bourg.) lecta est; a Willkomm cum dubio recensetur.
12. *A. cinerea*: Alp.-Marit. (Sigale, le Mas cant. St. Auban: Loret).
13. *A. valentina*; ex hb. Pavon. indicata pr. Denia in m. Mongo et in Sierra de Sagarria, ubi a Rouy relecta 1883 (vid. ej. exc. bot. esp. 15).
14. *A. montana*: Gall. bor.-occ. in sabulosis pr. Evreux (ex Morière fl. norm.). — *A. intricata* solum in Hisp. mer. et mer.-or. provenit.
15. *a. A. tejedensis* H.P.R. exs. itin. hisp. 1879. 97. — Sierra Tejada (Hisp. mer.); bona species videtur (ex Lge in litt.).
16. *A. balearica*; in Balear. adest in sola Mallorca, ubi in montib. altis oræ septentr., inter 400 et 1400 metr., sat abunde obvia.
18. *A. rotundifolia*: m. Hæmus (ad Kalofer: Pichler); — *A. transsilva-*

nica-Simk. in term. füz. 1866. *A. rotundifolia* Borb. 1882. (Transs. in m. Kiralykö, ubi a Borbás detecta 1882).

19. *A. biflora*; Hung. (Hzl.). Bulgar. in summo m. Vitos (: Velenov. 1885) et m. Osogovska Planina ad Kistendyl (: Vand. Velen. 1887). Helv. solum in Alpibus. *A. multicaulis* Schur ex Simonk.!

20. *A. ciliata*; Ross. arct. etiam in ins. Nov.-Semi.; Hisp. centr. solum in montib. Carpetanis (parce) lecta, Navar. (r.); Astur. et Leon antiquitus indicata; adest in m. Jura, etiam in parte gallica (le Reculet, Colombier); cfr. Genty in *Le Natural*. 1885. Styr. etiam in montib. Sulzbach.; m. Vran planina Herceg. (: Brandis 1887 ex Freyn). — *A. multicaulis*; *A. ciliata* Bmg. et auct. transs. (et hung.?).

23. *A. gothica*; locus Jurass. ad Lac de Joux ad Helv. pertinet (: Genty l. c.), sed in hb. Gren. servatur (ex Bonnet) specimen *A. gothicæ* e Reculet (Jura gall.).

24. *A. serpyllifolia*; adest in Norv.bor., immo arct., ubi (ex Norman) terminus polar. paullo ultra lat. 69° situs est; etiam in Lapp. Pitensi (r.) lecta; deest in Fenn.bor. — *A. Lloydii*: Gall.bor.-occ.; hispanica sistit varietatem alteram: *A. cantabrica* Amo, quæ a Willkomm pr. Bilbao lecta est (*A. Lloydii* var. gracillima Willk.).

**A. Marschlinii*: Helv.mer. (Alpes).

**A. leptoclados*: Hisp. præcipue mer. et or. (frequentior speciè). Belg.mer. (Brabant: Baguet 1876). Dan. (Lge). Marchia plur. loc. (ex Ascherson). Morav. (rarius). Helv. Istr. (: Freyn). Bosn. (: Brandis). Herceg. (: Vandas). Transs. (: Borbas). Dobrud. (Ue.S.). Ross.mer. (ex Lindem.). — *A. minutiflora* Losc. (Arag.). — Characteres, quibus hæc subspecies a specie primaria distinguitur, cl. Willkomm plene exposuit in Willk. Lge prodr. fl. hisp. III. 620; cfr. etiam Freyn, Flora von Süd-Istrien, in act. soc. z.-b. vind. 1877. 490.

25 * *A. nevadensis*; species rariss., in solo cacumine Mulahacen montis Sierra Nevada indicata (*A. serpyllifolia* Bourg. hisp. exs. 1321 ex Willk.).

25. *a. A. conica* Boiss. voy. 93.

Hisp.mer., ubi solum prope Malaga (Boiss.!) et Niebla Betic. indicata; in Consp. meo immerito cum *A. emarginata* (34) juncta est.

26. *A. Guicciardii*: Cephalon. (m. Aenos: Heldr.).

28. *A. conimbricensis*; Hisp. indicatur in Catal. (: Vayreda, Costa), in Cast. raro; Valenc. et Betic. rr. *Spergula ciliaris* Brot. ex Mach.

29. *A. obtusiflora*; species rarior hab. in calcareis reg. mont. Valenc.; in Murc. (: Rouy), Bætica pr. Velez-Rubio et Hellin (Rouy 1881). *A. saxatilis* Bout. (non L.).

30. *A. controversa* indicatur etiam Hisp. centr. pr. Valladolid (: Texidor).

30. *a. A. ciliaris* Losc. trat. plant. arag. I. 69; Willk. illustr. I. 96. *A. modesta* var. *Assoana* Losc. Pard. serie (p. p.). Aragon. mer. reg. mont.; ab Asso (syn. stirp. n. 382) detecta et a Loscos relecta 1876.

30. *b. A. Loscosii* Texid. in restaur. farmac. 1878 (ex Willk.). *A. modesta* var. *Assoana* Losc. Pard. serie (p. p.). Arag. Catal. (reg. mont.); detecta a Loscos et Pardo circa 1860.

32. *A. tenuis*: Murc. (Sierra de Alcaraz: Bourg.).

34. *A. emarginata*; in Hisp. rariss. et non nisi in Bætica mer. parce lecta; *A. conica* est species diversa et supra (25. *a*) restituta.

36. *A. capillipes*; species rarissima hab. in Gran. occ. Sierra Lérmeja pr. Estepona, altit. circ. 4000 (Boiss.!).

38. *A. oxypetala*; planta rhodia (Bourg.) pertinet ad *A. graveol.* (22) ex Boiss. or. suppl.

39. *A. purpurascens*: Hisp.bor. (mts Picos de Europa: Ler. Lev.); in Sierra Nevada a Webb "prope verticem" observata, dein ibi non reperta est.

40. *A. aggregata*: Alp.-Marit. (reg. mont., rarius): Ardoino.

42. *A. capitata*; Hisp. præcipue in or. et centr. obvia (reg. mont. et subalp.). — *A. querioides* in Cast. et Arag. super. lecta est.

43. *A. Armeriastrum*: Valenc. prov. Alicante (Sierra Mariola (: Leresche 1881).

**A. pseudarmeriastrum* Rouy in bull. soc. bot. 1882. sep. 7 (*). — Valldigna Valenc. (: Rouy).

44. *A. racemosa* sec. Willk. Lge solummodo in montibus baeticis lecta est a Cabrera, cujus plantam Willkomm vidit in hb. Hænseler.

45. *A. tomentosa* hab. in calcareis regni granat. prov. Almeria, altit. 3500—4000'.

46. *A. erinacea* inhabitat montes granat. (Sierra Tejeda, S. de las Nieves etc.); in Hisp. legion. a solo Lagasca lecta videtur. *A. aggregata* Boiss. elench. (non Lam.).

8. **Honkenya**. 1. *H. peploides*: Fenn. Dan. Ross. arct. et insulæ arct. Nov.-Semi. (Kjellm. Lundstr. 1875), Jan Mayen; ins. Færøer; in Astur. lecta etiam a Bourgeau (exs. 2615) et adest in tota Hisp. bor. —

9. **Alsine**. 2. *A. laricifolia*: adest in Catal. subalp. et in Castil. (Isern, Palau, Amo) et antiquitus in Hisp. bor. et valent. indicata est. Alp.-Marit. Herceg. mer. (: Vandas); Helv. e Jurasso abest.

3. *a. A. Pichleri* Boiss. or. suppl. 113. - Pelop. m. Kyllene, 4000' (: Pichler, nom. Arenar. creticae).

4. *A. Villarsii*; Hisp. primum in montibus inter Asturiam et Leon sitis observata est (Lagasca, Bourg. exs. 2613), dein in Arag. (: Timbal-Lagr.) et Santander (Ler. Lev.) lecta. — *A. griseensis* est = Moehring. Thomasiana, quæ in Helv. non crescit.

**A. rhætica* Brugg. o.-rh. 109. *A. Villarsii* auct. helv. — Helv.

5. *A. austriaca*: Bavar. (Alpes); Transs. ad *A. Gerardi* (25—) pertinet.

**A. tenella* ad *A. vernam* (25) mandetur ex Simonk.

6. *A. graminifolia*; *A. Arduini* Fzl. *Sabulina graminifolia* Rehb. exc. — *A. Arduini*; *A. clandestina* Kern. sched. ad exs. a 1882.

7. *A. parnassica*: Aetol. m. Korax (: Heldreich). Taygetus (: Pichl.).

8. *A. setacea*: Badia (Limburg in Kaiserstuhl). Carinth. (rr.). Galiz. Dobrud. (Uechtr. Sinten.). Bulgar. (Konjavo, Kostinbrod: Vandas. Velen.). Transs. ad subspeciem pertineat.

**A. banatica*; *A. setacea* auct. transs. ex Simonk.! — *A. falcata* nunc sub specie seq. militet (subspecies).

8. *a. A. frutescens* Kern. in oe. bot. z. 1868. *Arenaria frutescens* Kit. ap. Schult. (1794).

Hung. Transs. Valach. (: Simkov.). *Sabulina falcata* Schur enum. (ex Simonk.!). *S. marginata* et *S. rostrata* Schur ex Simonk.

**A. falcata* Grsb. 1843. *A. cataractarum* Jka. — Valach. Bulgar. Thessal.; Bosn. (: GBeck)

9. *A. tenuifolia* (typica): Scan. (: Braun 1877; ex Bot. Not. 1879).

10. *A. mucronata*; Transs. (Schur) ad *A. vernam* (25) pertinet.

**A. conferta*: Sard. (Reverchon ex Barbey). Herceg. mer. (: Vandas 1886). Dalm. (Lesina) ex hb. eur.; Istr. (ex Freyn). Creta (ex Jord.).

12. *A. Jacquini*: Lusit. mer. (Salv. ex Willk.). Castil. nov. (Née ex Willk.). Arag. (r.). Catal. Comment. 76.

**A. Funkii*: Aragon. (: Loscos).

+*A. ramosissima* a specie (*A. Jacquini*) nullo modo differt ex Simonkai.

13. *A. glomerata*: Dobrud., in desertis et montib. lapidosis non rara (Ue. S.). Bulgar. (pr. Varna, Sofia: Velenovsky 1885; in declivibus calcareis ad Konjavo: Vandas. Velen. 1887). Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.). Byzant. (Pichler ex Boiss.).

14. *A. Smithii*: Heldr. hb. norm. 830. Orph. 930.

15. *A. rostrata* (Minuartia rostr. Rehb.); Hisp. rarius lecta (Arag., Catal. Cast. vej. et Santand. ex Salcedo). Gall. or. (Côte-d'Or); Transs. (*Sabulina marginata* Schur) ad *A. frutescens* (8. a) pertinet ex Simonk.

16. *A. trichocalycina*; planta Ten. (Abruz.) ad speciem præced. pertinet, quare planta parnassica aliud et sibi proprium habeat nomen sc. *A. confusa* (Heldr. et Sart. exs.) Boiss. or. suppl.

18. *A. stricta* (*Arenaria lapponica* Spr.): Island. (: Steenstr., Strömf.); Würtemb. plurib. loc.

19. *A. Rossii*: ThFr. exs. spitzb. 41.

20. *A. biflora* (*Arenaria sphagnoides* Thom. Moritzi ex Brügg.): Carinth. — *Sabulina obtusa* Rehb. (est var. minor, contracta).

23. *A. recurva*: Castil. (m. Carpetani: Bourg. 2375), Catal. (alp.). Arag. (rr.). (even. (Lozère: Loret); Helv. e Jurasso abest; Galiz. vix adest ex Knapp; Thrac. ad *A. falcata* (8. a *) pertineat.

24. *A. eurytanica*; in Pindo tymphaeo adest var. hujus speciei (Heldr. 1885).

25. *A. verna*; Hisp. præcip. centr. et bor. (in or.—*A. Gerardi*). Bulgar. (: Vandas. Velen. Skorpil). Istr.; adest etiam paroc. Impilaks Fenn. mer.-or.: Neiglick 1877 (sec. Sælan 1882); Germ. sic (ex Gcke); Hercyn. et inde per aquas montium devecta usque in Hildesheim, Braunsch. et Hannover; in territ. Mansfeld. copiosa; ad Wendelstein Thuring.; in montib. calamin. ad Aachen; Sudeti. — *A. tenuifolia* auct. transs. (non Whlrb.) ex Simonkai! *A. ramosissima* Kern. sec. Simonk. *Sabulina mucronata*, *S. tenella* et *S. viscosa* Schur (ex Simonk.). — *A. Gerardi*; *A. cæspitosa* Heg.; *A. alpina* Andræ. *Sabulina Villarsii* Schur (ex Simonk.). — *A. subnivalis* Heg. *A. verna* var. *nivalis* Fzl. (Helv. etc.).

**A. attica*: Ital. mer. (Taranto loco dicto Leucaspide: Lacaita in litt.).

26. *A. hirta*: Ross. arct. etiam in ins. Nov.-Sempl. et Waigatsch (Kjellm. Lundstr.: *A. rubella*); ins. Shetland. (Baltasound: Beeby 1886).

**A. sedoides* (*A. verna* var. *glacialis* Fzl): Helv. (Brügger). Carinth. (Luschariberg: Kkl).

26. a. *A. propinqua* Richards. in Frankl. journ.: Hook. fl. bor.-amer. Island. (ad Myvatn: Lundgr.; Esia: Grönlund); planta island. sistit var. *glabra* (Lge in fl. dan. 2903).

28. *A. procumbens*: Balear. (Mallorca pr. Palma etc.).

29. *A. lanceolata*: Helv. mer. (r.). Bavar. (Alp. Algov.).

31. *A. aretioides*: Bavar. (Alp. or.); Helv. non nisi in Alpibus vales. adest (var. *Rionii* Grml.); Transs. ad seq. (Cherler. sedoid.) pertinet. Comment. 77.

10. *Cherleria*. 1. *C. sedoides*; Styr. etiam in montib. Sulzbach. adest. Siebera *cherlerioides* Schur (non Schrad.) ex Simonkai!

12. *Buffonia*. 1. *B. macrosperma*: Gall. or. (Côte-d'Or); Hisp. solum in regno granat. (Malaga, Granada) lecta est. Ross. mer. adest etiam gub. Cherson (pr. Odessa). Bulgar. (pr. Varna ex Velenovsky 1886).

2. *B. tenuifolia*: Hisp. or. (Catal., Arag.) et centr. (Castil.) plur. loc.

**B. parviflora*: Dobrud. (rr. in deserto Kaukadii: Ue.S.). Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen. 1887).

3. **B. Willkommiana* parce lecta est: mts. Mariani (Sierra Morena), Almeria.

13. *Minuartia*. 2. *M. montana*; Hisp. bor. non obvia exc. in Navar. (Duf.). *Alsine montana* Fzl.

3. *M. campestris*; Hisp. bor. deest exc. in Navarra. *Alsine campestris* Fzl.

14. *Queria*. 1. *Q. hispanica*: Bulgar. in declivib. balcan. ad Petrov Han sporadice (: Vandas. Velen. 1887); in Hisp. bor. vix lecta est.

15. *Sagina*. 2. *S. subulata*: ins. Færøer (: Rostrup!). Batav. (pr. Bussum: de Vries 1878). Bavar. Hung. comit. neograd. copiose (: Borbás). Græc. bor. (m. Pelion, Pindus: Hausskn. 1885); Hisp. præcipue in bor. lecta est, in centr. r., in mer. vix.

3. *S. nevadensis* in solo m. Sierra Nevada et quidem rr. (a Reuter 1849) observata est.

4. *S. glabra* (*S. repens* Burn.): Alp.-Marit.; Helv. (St. Bernh.). — *S. pilifera* Sard. m. Genargentu (de Sardagna 1883).

5. *S. fasciculata* etiam e Navar. hisp. (Irati) citatur.

6. *S. nivalis*: ins. arct. Beeren-Eiland, Nov.-Semlia (Kjellm. Lundstr. 1875) Island. bor. (: Strömfelt 1883), occ. (: Feddersen 1886).

**S. cæspitosa* Lge adnot. (bemærkn.) ad fl. dan. vol. L. in ovs. vid. selsk. forh. 1880 118. sep. 8 (*). *Arenaria cæspitosa* JVahl (non Fr.). — Norv. Lapp.bor. Spitzb.

7. *S. Linnæi*: ins. Shetland. (: Beeby). Badie m. Belchen, Schluchsee; Würtemb. (Adelepp pr. Isny, Reinerzau). Hisp. bor., centr. Græc. m. Pindus (Heldr. 1885). Bosn. (: Brandis 1885 ex Freyn). Bulgar. (in summo m. Vitos: Velen.). — *S. Baumgarteni* Simk. (Transs. r.).

**S. macrocarpa*: *S. alpina* Brügg. *Spergella glabra* Schur ex Simonkai.

8. *S. sabuletorum* parce lecta est: Astur. (Oviedo etc.: Dur.), Castil. (Burgos: Lge), Arag.mer. (Loscoc, nom. *S. macrocarpæ*).

9. *S. ciliata*: Helv. (Genève, Basel etc.). Bavar. bor. cum Phalzia. Austr. Infer. (pr. Melk, ex Heimerl 1881). Hung. (: Simkov.). Istr. Sard. (Reverch. ex Barb.). Sicil. (Etna: ipse). Græc.bor. (Thessal., Methana: Hausskn. 1885); in Suec. extra Scania rr. est. — *S. depressa*; *S. dichotoma* Heuff. (1853).

**S. patula*; sæpe pro ipsa specie (*S. ciliata*) sumitur, interdum etiam pro *S. apetala*; sic ut dicitur, in Benitz hb. eur. 3851 (Florentiæ: Levier). — *S. ambigua*: Hampsh. Angl.mer. (r.).

10. *S. apetala*: Dan., precip. insul. (in Falster et Lolland vulgata); in Scand. rel. non nisi Scan. (r.) adest (var. *cæspitosa* FÅresch.).

11. *S. Reuteri*; typica non nisi in agro matritensi lecta est (a Reuter 1841), sed in Arag. mer. exstat var. *peduncularis* Willk. — ? *S. capillaris* Lge. (Galloe.).

13. *S. maritima*: Lampedusa (: Lojaccono). Istr. (rarius); adest etiam in Germ. inter. ad Gr. Salze.

14. *S. procumbens*; — *S. bryoides* Schur ex Simonkai.

16. *S. bryoides*: Helv. Siles. (Riesengeb. ex Uechtr. 1882). Bosn. (: Brandis ex Freyn).

× *S. media* Brügg. = *Linnæi* + *procumbens*. (Helv.).

16. **Spergula**. 2. *S. vernalis*: Fennia (exc. bor. et med. multa). Ingria. Dan. (Bornholm, Slesv.); Helv. negat Gremli; Transs. (*S. Morisonii* Schur) ad *S. arvensem* pertinet ex Simonkai.

3. *S. pentandra*: Morav. bor. (pr. Iglau). Poson. (in Germ. mer. a Garcke non indicatur). Ross.mer.-occ. (: Schmalhausen); Helv. non adest (ex Gremli) nec Transs. (pl. transs. est *S. arvensis* ex Simonk.).

4. *S. viscosa* lecta est in Sierra de Guadarrama Castil. et in Sierra Nevada Gran.; sec. Lagasca etiam in Hisp. bor.

17. **Spergularia**. 1. *S. fimbriata*: Ibiza Balear. (Camb., Barcelò).

2. *S. macrorrhiza*: Ital. mer. (Taranto, Gallipoli: HGroves).

4. *S. media*; *S. marginata* Bor.; ad Corinthum Græc. leg. Haussknecht. — *S. fascicularis*; hab. in Gotland. (ad Klintehamn), Bahu. (ins. Väderöarne), Shetland. (Beeby 1887), Dan. occ. ins. Föhr (: Lange).

6. *S. rubra*; -- *S. longipes* hab. in Castil. matrit. (Lge, Bontel.) nec non in Bætica (la Carolina: Lge) et Extremad. (Bourg.).

7. *S. diandra*; Heldr. hb. norm. 492 (in Consp. meo ad subspec. relatum) Sard. (: Gennari, de Sardagna).

**S. campestris*; Heldr. hb. norm. 831; *S. rubra* var. *atheniensis* Heldr. hb. norm. 590 (in Consp. ad *S. rubram* citatur); adest plur. loc. Græc. (Hsekt) et etiam in Mallorca Balear (: Willkomm).

8. *S. capillacea*; Lepig. *capillaceum* (Lge) Kindb.; vid. Lge descr. iconib. illustr.

9. *S. segetalis*: Siles., Thuring., Hassia. Bavar. (Würzb., Kahlgrund). Helv. (cant. Bern et Basel, in utr. rr.). Ross.mer.-or. (Sarepta: Becker)

XVI. ELATINEÆ.

1. *Elatine*. 1. *E. Alsinastrum*: Norv. mer. (Studsalskjern ad Kragerø ex ABlytt in Bot. Not. 1881) Hisp. or. (Catal.: Boutel.) et a Quer pr. Escorial Castil. indicata (sed recentius non lecta). Sard. (Reverch. ex Barb.). Ross. mer. occ. (: Schmalh.), mer. or. (lac. Bogdo: Becker): Helv. nunc deest ex Gremli (olim Basilie etc. aderat, sed nuper non lecta est).

2. *E. Hydropiper*: Fenn. mer., med. (et Ostrob.). Dan.; Cherbourg etc. Gall. bor. occ., Trappes (Seine-et-Oise) et depp. Loire (: Le Grand 1879) et Landes (ex Rouy); Galiz. (rr.). Bulgar. Ross. mer. occ. (: Schmalh.). Helv. solum in Valtellina; in Lapp. plur. deest et Norv. non nisi in Skedsmo lecta est.

3. *E. major*: Belg. valde dubia civis ex Crepin.

4. *E. macropoda*: Ital. mer. (T. d'Otranto: HGroves). Lamped. (: Lojacono); Balear. in sola Menorca et (rr.) a solo Rodriguez lecta.

**E. campylosperma*: Cors. (: Reverchon). Hung. (: Borbás).

5. *E. hexandra*; etiam Suec. centr. (Neric.) nunc lecta est (: C. et RHartman); Helv. in litore genev. aderat pr. Versoix (locus nunc destructus ex Barbey 1884).

**E. Brochoni* Clavaud in act. soc. linn. burdig. 1883: Magn. sel. exs. 496 et scriin. (II) 67. — Gall. mer. occ. dep. Gironde (: Brochon).

6. *E. triandra*: Jura (la Dôle). Loire (pr. Precieux in planit. Forez: Le Grand 1879). Lusatia (pr. Niesky et Luckau: Aschn 1878). Zwickau, Danzig. Mühlheim ad Rhenum, Strassb. (ex Gren.). Morav. (: Oborny). Ross. med. (gub. Moscov.: Clerc.). Fenn. mer., med. - Helv. deest ex Gremli; Transs. ad præc. (*E. hexandr.*) pertinet ex Simonk.

Obs. *E. inaperta* Lloyd (add. ad Flore de l'Ouest 1877), in limosis litor. ad Nantes et Sèvre lecta, est status cleistogamus *E. triandræ* ex Le Grand, qui specc. authent. comparavit.

XVII. LINEÆ.

1. *Linum*. 1. *L. arboreum*: Arch. ture. ins. Karpathos (: Pichler) ex Boiss.

2. *L. elegans*; in montibus Euboeæ, ad 4200', leg. Pichler (ex Boiss.).

3. *L. campanulatum* non in Hisp. bor., sed in or. (Catal., Arag.) habitat.

4. *L. flavum*: Würtemb. Bavar. (rarius). Carinth. Galiz. or. Roman. Bulgar. (Lom Palanka: Vandas. Velen. 1887). Ross. centr. (gub. Kursk, Moscov.). — *L. ucranicum* Czern. (Ross. mer.).

5. *L. tauricum*: Dobrud. (Uechtr. Sinten.). Bulgar. (pr. Razgrad et Varna leg. Velenovsky).

6. *L. capitatum*: Bulgar. (Velenov. 1885). Rumel. or. (m. Rhodope).

7. *L. nodiflorum*: Ross. mer. gub. Cherson (Odessa). Rumel. or.

8. *L. maritimum*: Hisp. centr. (pr. Ribas, Aranjuez etc.).

11. *L. viscosum*: Alp. Marit. (: Ardoino). Würtemb. (pr. Ulm). Styr. (pl. loc.: Maly). Hung. (ex Hzl.). — ? *L. pannonicum* Kern. (*L. hirsutum* Wzb. in Flora 1840 ex Borb.).

12. *L. hirsutum*: Roman. Bulgar. (loc. idoneis freq.: Velenov.). Ross. centr. (gub. Kursk).

13. *L. pubescens*: Epirus (Chodzes ex Heldr. 1879). *L. hirsutum* var. Heldr. exs. ex Olympo thessal. (loc. in Consp. sub specie præced. allatus).

14. *L. narbonense*; planta transsilv. ad seq. (*L. nervos.*) pertinet.

15. *L. nervosum*: Moldav. Bulgar. (m. Vitos pr. Sofia: Skorpil). Ross. centr. (gub. Kursk). *L. narbonense* auct. transs. ex Simonk.

17. *L. hologynum*: Bulgar. m. Vitos (: Vandas. Velen.).

18. *L. angustifolium*: Gall. bor. occ. Hisp. tota (Bourg. exs. 2394) cum Mallorca. Croat. (Fiume: A-M. Smith). Arch. ins. Karpathos (: Pichler) ex Boiss.

Ross.mer. (: Trautv.). *L. pyrenaicum* Pourr. ex Gren. — *L. agreste* Brot.: Lusit. Betic. (Ayamonte: Willkomm).

19. *L. decumbens*: Arch. turc. ins. Karpathos (: Pichler) ex Boiss.

20. *L. austriacum*: Lothar. (rr.: Godr.). Bonn in rud. Godesberg, sed probab. olim satum. Bohem. (pr. Laun ex Celak. 1885). Styr. (: Maly). Carinth. (Raibl, Obir etc.). Roman. Bulgar. et Rumel.or. — *L. squamulosum*: *L. trinervium* Freyn in oe. bot. z. 1876 (ex ipso). Transs. Dobrud. (in collib. aren. reg. Delta gregarie: Ue. S.).

**L. Loreyi*; — *L. limanense*; Magnier fl. sel. exs. 30.

**L. collinum*; Hisp. non nisi in Castil. et Catal. lectum est (*L. austriacum* Willk. Lge).

21. *L. perenne*: Moldav. Rumel.or. (ex Velenovsky).

**L. extraaxillare* Kit. in Roch. ban. (1828); Magnier fl. sel. exs. 1386. — Bosn. (ex GBeck). Banat. Hung. (ex. gr. alp. Scepus., 1800 metr. s. m.). Galiz. Transs. (*L. alpinum* auct. galic. plur. et transs.).

22. *L. alpinum*: Bosn.mer. GBeck 1885); — *L. Leonii* potius subspeciem sistit (vel var. *L. levis*); in Godr. fl. lorr. tamquam species propria, in declivibus calcareis Lotharingæ obvia, recensetur; hab. etiam in dep. d. Vosges (: Beshier).

**L. læve*; — *L. montanum*: Bosn. (: Brandis ex Freyn). Carinth.

24. *L. suffruticosum*; adest etiam Hisp. or. et centr.

25. *L. salsoloides*: Hisp. bor. r. (Navar. Arag.). Castil. rr. (Lge. Ler.).

25. a. *L. Ortægæ* Planch. in Hook. lond. journ. VI. 184. *L. suffruticosum* Ort.ms. — Castella nova (r.) et forse Catalon.

26. *L. tenuifolium*: Istr. Moldav. Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky).

27. *L. gallicum*: Rumel. or. (ex Velenovsky).

28. *L. setaceum*; Hisp. non nisi aliquot locis regni gran. lectum est.

**L. nitidum* Clem. ap. Colm. (1884). Estepona Bæticæ.

30. *L. liburnicum*; indicatur etiam in Banatū.

31. *L. strictum*: Ithaca ins. Jonic. (Spreitzenh. 1877).

**L. spicatum*; adest etiam Dalm.

32. *L. catharticum*; exc. etiam Fenn. bor. (cum Lapp.) sed adest in Lapp. norv. (Norv. aret.), ubi usque ad 68° 50' procedit (ex Norman).

2. **Radiola.** 1. *R. linoides*: Pindus agraph. supra coenob. Korona (: Haussknecht 1885); deest etiam in Suec.med. (in Ross. termin. bor.-or. est in gub. Pskow; ex Batalin).

XVIII. MALVACEÆ.

1. **Hibiscus.** 1. *H. roseus*; in Gall.mer.-occ. crescit ad Vieux-Boucau, St. Etienne, l'Orth, Dax, Arcachon (sed non Bayonnæ); amat loca subsalsa, a mari parum remota.

2. *H. Trionum*: Istr. Morav.med.,mer. (Siles. inquil.). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenov.). Valach. Dobrud.; planta transsylv. ad var. *H. ternatus* pertinet ex Simonk. — *H. vesicarius* a solo Cavanilles in Valenc. indicatur. — *H. ternatus* etiam Catal. et Arag. lectus est, sed probab. introductus (ex Willk.).

4. **Sida.** 1. *S. Abutilon*: Istr.mer. (Weiss 1866). Ross.mer.-or. (Sarpa: Becker), mer. (gub. Cherson), mer.-occ.; Dobrud. (in humidis reg. danub.: Ue.S.); Mallorca Balear. et aliquot locis Hisp. p. d. inquil. et quasi sponte obvia.

5. **Alcea.** 1. *A. rosea*; Hisp. interdum (e cultura) quasi spontanea occurrit; sic etiam in Gall. mer. dep. Herault, ubi in montib. ad Saint-Bausille-de-Putois sæpe copiose obvia in rupibus inaccessibilibus (: Loret).

2. *A. pallida*: Morav. med. et mer. passim (ex Oborny). Dobrud. (vulgatiss. in campis desertis: Ue.S.). Bulgar. (ad Razgrad et Varna silvas et lucos ornat: Velenovsky 1885, in planitie circa Sofia et Kistendyl freq: Vandas. Velen.).

6. **Althæa.** 1. *A. cannabina*: Istr. Roman. Rumel. or. Bulgar. (in demissis ubique: Velenov.).

**A. narbonensis*; flore hispan. dubia civis est, post Pourret et Cavanilles non lecta.

2. *A. taurinensis*: Ross. mer.-or. (Sarepta ex Becker).

**A. micrantha* Wiesb. in oe. bot. z. 1878. - Austr. p. d. plur. loc. copiosa (Wiesb.). Hung. comit. Zala et Slavon. (: Knapp); Bœnitz hb. eur. n. 2479 e seminibus hungaricis (kapornacensibus) educatus est. Colitur in hortis rusticorum Hungariæ occ., unde forse migravit (Borb.).

3. *A. officinalis*; Scand. non nisi duobus locis (Malmö, Trelleborg) Scandiæ indicatur ibique probab. primitus introd.

4. *A. hirsuta*: Istr. Moldav. Dobrud. Bulgar.; Helv. non nisi in mer.-occ. indig. sed interdum alibi introducta.

5. *A. longiflora*; species rara: Castil. (Aranjuez, in collibus gypsaceis locisque argillosis salsis: Reut., Colm.); Gran. (Sevilla: Colm., Fuente de la Piedra: Winkl.).

7. **Lavatera.** 1. *L. triloba*; in Hisp. bor. non lecta. — *L. rotundata* Lazar. *L. micans* auct. non *L.* (Castil. etc., Lusit.).

3. *L. oblongifolia* non nisi in regno Gran. lecta est.

4. *L. arborea*; Hisp. (et Lusit.) solum in plagis litoral. indigena est et in Gall. bor.-occ. in rupibus maritimis (cap de la Hague, Granville etc.) sponte obvia, sed in litore hinc inde etiam culta occurrit (: Morière).

5. *L. cretica*: Hisp. bor.-or., mer.; Pyren. or. (: Debeaux). — *Malva Willkommiana* Scheele ex Willk. (Malaga).

**L. silvestris*; hab. etiam Hisp. bor.

7. *L. olbia*: Hisp. or., mer. Lusit. (ex Willk.).

**L. hispida*: Catal. (r.). Sevilla. Lusit. (r.); sec. Willk. Lge.

10. *L. micans*; olim Lusit. et Hisp. pr. Madrid indicata, nunc disparuisse videtur (si umquam ibi sponte adfuit).

11. *L. lusitanica* (*L. undulata* Mill.), Lusit. (ex T.), et etiam Hisp., indicata, est species dubia (Willk. Lge).

13. *L. minoricensis* in sola ins. Menorca (rarius) lecta est. *Malva minoricensis* Rodr.

14. *L. thuringiaca*: Roman. Bulgar.; Suec. mer. vix nisi Ostrogoth., sed ibi, ut in Suec. med. (ubi impr. circa lacum Mälaren obvia), probab. ex antiquâ culturâ superstes et inquilina.

15. *L. punctata* non in Hisp. ipsa sed in Balearibus crescit; adest etiam in Cephalon. (Heldr.).

16. *L. trimestris*: hab. etiam Balear. (r.).

8. **Malope.** 1. *M. malacoides*: Cors. (EPetit 1883); jam tempore Linnaei in Hisp. indicata, a recentioribus ibi non observata est (adest vero r. in Lusit.). sed — *M. stipulacea* (nunc in speciem restituta) in Batica (Cadiz, Medina-Sidonia, Xeres) lecta est.

2. *M. trifida*: Lusit. rr. (Welw.); etiam in Hisp. mer. (Batica) parce lecta est.

3. *M. multiflora*, in Batica pr. Sevilla et Carmona indicata (: Triguer), valde dubia videtur.

9. **Malva.** 1. *M. Alcea*; Hisp. vix vel parum extra Castiliam et Galloeciā lecta est. — ? *M. tuberculata* Lk. ap. Spr. (Lusit. ex Lk.).

**M. fastigiata*; in Hisp. rara videtur, paucis locis in bor., centr. et or. indicata; Transs. ad *M. silvestrem* (7) pertineat.

Obs. *M. fastigiata* Cav., quæ solum in australioribus provenit, a recentioribus cum var. *fastigiata* *M. Alceæ* sepe commutata est, unde in Consp. meo cum illa et cum *M. Morenii* eam junxi. Hæc vero a cl. Willkomm (in Willk. Lge prodr. fl. hisp.) restituta est:

1. *a. M. Morenii* Pollin. veron. II. 437. (*M. alceoides* Ten. ex Willk.). — Ital.; Hisp. r. (occ.: Willk., Lge).

3. * *M. Colmeiroi*: rariss. et solum in Galloec. et Leon a Colmeiro et Lange lecta; ex auct. (Willkomm) ad *M. Alceam* et *M. Morenii* multo propius accedit quam ad *M. Tournefortianam*.

4. *M. althæoides*; *M. cretica* Webb. iter.

5. *M. cretica*: ins. Jonic. (Ithaca, in rupibus: Spreitzenhofer 1877); ins. Hydra (: Pichler).

7. *M. silvestris*; *M. fastigiata* Schur (non Cav.) ex Simonk.

**M. erecta*; — *M. plebeia*: Taur.

8. *M. ambigua*: Istr. (: Freyn in act. soc. z.-b. 1881). Croat. (ex Hirc 1883); Hisp. valde rara est et solum in bor. et or. (parcissime) lecta.

9. *M. nicæensis*: Istr. mer. (Tommasini, Freyn); in borealibus (e. gr. Dan.) interdum introducta adest.

10. *M. rotundifolia*; adest Fenn. sed solum in max. mer. (Nyland etc.).

11. *M. borealis*: Dan.; Fenn. in sola mer. adest. Batav. (pr. Utrecht et Haag detecta a de Bruijn 1878). Island. (: Feddersen ex Rostr. 1888). Siles. Dobrud. (ad Cincaro: Ue.S.).

12. *M. parviflora*: Hisp. centr. (Castil.), raro.

**M. microcarpa*: Lusit. Hisp. mer. (Murcia: Rouy 1881), or. (Catal. Arag.).

13. *M. Papaver* est species boreali-americana et solum errore scriptor. vel typogr. in Lusit. pro Louisiana indicata (vid. Torr. Gray fl. N-Amer. I. 227).

14. *M. ægyptia* (*M. ciliata* Duf. sched.): Bourg. hisp. exs. 1096. 2120. Hisp. extra Castil. et Arag. mer. rarius adest in Navar. (Duf.), Murc. (Bourg.) et Gran. (Bourg.); Arch. ins. Syra (: Weiss) ex Boiss.

15. *M. trifida*; — ? *M. anodæformis* Lag. in period. soc. med. Cadiz. 1824. Bætic. (Sevilla etc.: Lag.).

16. *M. hispanica*: Lusit. bor. (Oporto: Sjögren 1854); indicatur etiam in Hisp. bor.-occ. (Galloec., Leon). — *M. spithamea* Cav. (Bætic. a Triguer indicata).

16. a. *M. stipulacea* Cav. diss. II. tab. 15. *M. hispanica* Asso (non L.). — Arag. occ. (Asso, Cav.).

Obs. *M. verticillata* L., species chinensis, in Rossia "statu efferato passim reperitur" ex Trautvetter.

10. **Malvella.** 1. *M. Sherardiana*: Thessal. (Heldr. 1885); Hisp. solum in prov. matrit. (Cerro Negro, San Fernando etc.) certius adest, sed indicatur (rr.) in Bætica et Murcia et antiquitas etiam alibi.

XIX. TILIACEÆ.

1. *Tilia*. 1. *T. argentea* (1813): Dobrud. in reg. silv. abunde (: Uechtr. Sinten.). Bulgar. (ubi silvæ Deli-Orman præcip. ex hac arbore: Velen.). Græc. bor. m. Pindus (Hausskn. 1885) et Thessal. adest etiam in m. Ossa (Heldr. 1882), ubi speciei terminus merid. *T. alba* W.K. (1799). *T. tomentosa* Mch weissenst. (1785). — *T. pannonica* Jacq. ap. Lång in Flora 1827. *T. petiolaris* DC. (1824).

Obs. *T. tomentosa* Mch est forse = *T. alba* Ait. (non W.K.) = *T. heterophylla* Vent. et non omnino certe = *T. argentea* Dsf. (cfr. Borbás in bot. centralbl. 1889).

2. *T. platyphyllos*; Scand. non nisi in aliquot insulis Bahus. (Suec. mer.-occ.) sponte obvia est; Hisp. mer. non nisi culta indicatur. — *T. corallina* Sm. ap. Rees (Rehb. exc.); sæpe culta et etiam spontanea dicta.

3. *T. vulgaris*; Hisp. (r.) in nemorib. montan. Astur., Cantabr. et Catal.; Helv. solum culta adest, r. etiam (cant. Vaud) spontan. dicta; nuper in Sicil. bor. (prov. messan.: Nicotra) et Calabr. mer. (l. b. Zwierlein) indicatur a Nicotra sed ex specim. incompl.

5. *T. parvifolia*; adest in Lusit. bor. (Beira) et Hisp. bor., ceterum in Castil. (Burgos, Sierra de Guadarrama), Arag. et Catal. indicata; in Scand. terminus polaris arboris est in m. Skuluberget Angerm. (Suec. bor.) et ad Söndmöre Norv. litor.; Fenn. hic in Ostrob. med. ponitur.

× *T. Richter* Borb. — *parvifolia* + *argentea*. (Oravitza Banat.).

XX. HYPERICINÆÆ.

1. *Androsæmum*. 1. *A. officinale*: Gall. bor.-occ. Bosn. (: Conrath ex Freyn). Helv. solum pr. Lugano adest ex Gremli.

3. *A. Gambessedesii* in sola ins. Mallorca lecta est, ubi (rarius) in alveis torrentium crescit.

2. *Hypericum*. 2. *H. balearicum*; abundat in Mallorca, in Menorca et Ibiza rarum est.

3. *H. thasium*: ad portum Lagos Rumel. (: Janka) ex Boiss.

5. *H. olympicum*: Thrac. bor. (ad Karlova m. Hæmi: Janka).

6. *H. Apollinis*: Phthiotidis m. Oeta, 6—6500' (: Heldreich ex Boiss.).

8. *H. Richeri* (1786 et 1789): Bulgar. (m. Vitos leg. Velenovsky). Bosn. mer. (: GBeck 1885): Hisp. non lectum est et e commutatione cum subspecie (*H. Burseri*) ibi indicatum erat. *H. alpinum* W.K. (1812) p. p. — *H. alpinum* Vill. (1786); W.K. (1812) p. p. *H. androsemaefolium* Vill. (1789). *H. fimbriatum* Schur.

**H. Burseri* (*H. Richeri* Lap., Cut. et al.); Hisp. bor. totam et Pyren. tam hispan. quam gallicos inhabitat: Cast. nova (r.). — *H. transsilvanicum*; *H. Burseri* Kern., Fuss.

**H. umbellatum* Kern. in oe. bot. z. 1863; sec. Celak. ib. 1879 est propria species: *H. Richeri* Bmg. (Transs. m. Bihar. etc., Bulgar.: Velenov.).

10. *H. Montbretii*: Rumel. or. (pr. Slivno: Skorpil ex Velenovsky).

12. *H. barbatum*: Græc. bor. m. Pindus Tymph. (: Haussknecht 1885).

13. *H. rumelicum*: Rumel. or. (pr. Slivno etc. ex Velenovsky). Bulgar. (Bucina, Kostinbrod etc.: Vandas, Velen.). Thessal. (in collibus: Hausskn. 1885).

14. *H. perfoliatum*: Istr. (Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 296); Hisp. vix extra mer. lectum est.

15. *H. montanum*; deest in Suec. med. plur., in Norv. non lectum ultra Vårdalen (præf. Trondh.); Sard. adest (: Reverchon ex Barbey).

19. *H. tomentosum*; Hisp. bor. parcius lectum, in mer. frequenter. Valenc. adest var. intermedium Coss. (Bourg. exs. 1582). — *H. pubescens*, duce Lange, restituetur in propriam speciem:

19. a. *H. pubescens* Boiss. voy. 115. Floræ hispan. rara civis est et non nisi in regno Gran. (parce) lectum.

20. *H. caprifolium*: Arag. (*H. hirsutum* Asso); Castil. et Valenc. rr. indicatum est.

21. *H. hirsutum*; deest etiam in Norv. arct.; Fenn. etiam Abor. lectum; adest in Lusit. bor., Hisp. bor. (Navar., Astur.) et or. (Arag., Catal.).

22. *H. hyssopifolium*: Hisp. bor. (Vizcaya: Willk.), centr. (pr. Madrid etc.). — *H. callithyrsum* videtur saltem subspecies:

**H. callithyrsum* Coss. not. 3. 162; hucusque in solo monte Sierra de Baza lectum est (a Bourgeau).

23. *H. elegans* (Steph. ap. W. 1880): Hassia rhen. (r.). Krems Austr. (: Halacsy et Braun), Morav. mer. (r.). Dobrud. (: Sintenis). Bulgar. et Rumel. or. (Velenovsky). *H. Kohlianum* Spr. (1806).

24. *H. pulchrum*: ins. Færöer (: Rostrup); Vestrog. r. (Sotenäs) indicatur. Bavar. Styr. (pr. Tüffer: Fleischm.); indicatur etiam Lusat. et (rr.) Siles., Galiz.; Transs. ad *H. montanum* (15) pertinet ex Simonkai.

24. a. *H. Noëanum* Boiss. or. suppl. 130. — Thrac. m. Hæmus (Noë in hb. Comman).

25. *H. undulatum*; *H. decipiens* Wats. ex Bonnet.

**H. baticum*: in Hisp. mer. et centr. vulgatiore, in bor. parcius adest (Lge, Bourg.).

26. *H. tetrapterum*: *H. rotundatum* Schur (ex Simonk.). — *H. quadrangulare* Lag. (S. Nevada).

27. *H. quadrangulum*: Ins. Færöer. Roman. Bulgar. Ross. mer.-occ.; Fenn. bor. adest in Ostrob. et circ. Imandra. — *H. commutatum* Schur ex Simonk.!

**H. Desetangii* Lmtt. *H. quadrangulum* des Etangs. *H. intermedium* Bellynick (non alior.). Gall.or., centr. bor. Belg.; cfr. Consp. obs. sub *H. perforato*. Comment. 78.

28. *H. perforatum*; — *H. tetraptero-perforatum* Michal. ex ipso.

29. *H. crispum*; *Hisp. rarius obvium*: Catal. (: Costa, Texid.), Menorca (rr.), Gran. (pr. Malaga); Lusit. ex Vandelli; adest etiam Thessal. (Heldr. 1882).

30. *a. H. Janka nob. H. tenellum* Jka brev. I. (non Tsh). — Thrac. m. Rhodope centr. (: Janka).

31. *H. repens*: Bulgar. in collibus calcar. pr. Petrov Ham (: Vandas, Velen.). *H. polygonifolium* Rupr. (quia planta taurica alia est ac syriaca, Linnæana, quæ speciè diversa).

32. *H. australe*: Menorca Balear. (: Rodriguez).

33. *H. nummularium*: *Hisp. bor.-or.* (Picos de Europa Cantabr.: Ler. Lev.).

34. *H. humifusum*; in Scand. extra Scaniam rr. est, sc. duob. loc. Blekingiæ et uno Smolandie obvium.

35. *H. linearifolium*: Gall. mer.-occ. *Hisp. centr.*: Extremad. (: Bourgeau).

36. *H. empetrifolium*: ins. Cephalon. (Heldreich).

38. *H. ericoides*; *Hisp. non nisi in mer. et or. obvium*.

39. *H. lusitanicum*; *Hisp. incerta civis est* (in Baetica, loco non indicato, a Webb lectum, sed postea non repertum); post *H. tomentosum* (19) inserendum est.

41. *a. H. Cuisini* Barb. in bull. soc. vand. XXI. 93. (1885). — Arch. turc. ins. Karpathos (in declivib. m. Elympos: Pichler 1883).

Obs. 1. *H. mutilum* L.; cfr. Consp. obs. ad calcem ordinis et amplius: Caruel, statist. botan. d. Toscana (1872).

Obs. 2. *H. japonicum* Thb. (*H. gymnanthum* Engelm. Gray) nuper repertum est in Posenia Germ. or. (pr. Wronke: Strehler 1884), probab. cum seminibus americanis introductum, negante tamen detectore, qui aboriginem esse censet. Cfr. tractatum elaboratiss. cl. Uechtritz et Ascherson: "*Hypericum japonicum* Thb. in Deutschland gefunden" in ber. d. deutsch. bot. ges. 1884. 63—72 (*).

4. *Elodes*. 1. *E. palustris*: Mallorca Balear. (Borguña de Artá: Barcelò). — Ascherson memorat hanc plantam jam 1666 lectam esse inter Brabant et Cleve a Dre Mentzel.

XXI. ACERINÆ.

1. *Acer*. 1. *A. Pseudo-Platanus*; in *Hisp. spontan. non nisi in bor. et or.*; indicatur (r.) in centr. et mer., sed incertum videtur num ibi indigenum; adest etiam Thessal. (: Orphan.). *A. Ortmanni* Opiz. *A. Opizii* Ort. — *A. Ditrachii*: Siles. (Krummhübel m. Riesengeb.). — *A. villosum*; *A. macropterum* Guss. exs. — *A. nebrodense* Tin. ined.

2. *A. Visianii*: Bulgar. in jugo mont. Osogovska Planina (: Vandas, Velen. 1887); est var. *A. Heldreichii* (4) sec. Pax (1885).

3. *A. platanoides*: Arag. et Catal. (Pyren.) et nuper in Navarra et Santander indicat.; Moldav. Dobrud. (: Sintenis). Bulgar. (Kokalena: Skorpil). Epirus (: Heldreich); Fenn. bor. et med. deest.

**A. Lobelii*; — ? *A. fallax* Pax. (Dalm.).

4. *A. Heldreichi*; — *A. macropterum* Vis. (Serb.) ex Pax; sec. Boiss. immo synon.

5. *A. opulifolium*; *Hisp. præcip. or. et bor.-or. incola*, sed indicatur (r.) etiam in centr. et mer.; Helv. occ. et mer.-occ. inhabitat; loca oriental. plur. ad -- *A. obtusatum* pertinent. *A. italum* Lauth (Pax). *A. vernum* Reyn. — *A. obtusatum*: Istr. Croat. Dalm. Serb. Bosn. et Herceg. (in his duab. silvas constituit ex GBeck). Ital. mer. Sicil. (*A. neapolitanum* Guss.); potius, ut habet Pax, in speciem propriam restituendum; cfr. etiam Freyn, Flora von Südtirol, in act. soc. z.-b. vind. 1877.

**A. neapolitanum*: typicum non nisi Neapol. (et Sicil.?) observatum est (*A. ætnense*

differtur propius præced. *A. obtusato*). Forse species (cfr. Willk. Lge prodr. hisp.) vel (ut apud Pax) *A. obtusati* Kit. restituti subspecies.

**A. granatense* habitat in regno Gran., ubi in montib. (S. Nevada, S. Tejada etc.) inter 5000 et 6000' obvium.

6. *A. campestre*; Scot.deest. Græc. bor. (Thessal.) adest (ut in Maced.). — *A. marsicum*: Ital.mer. Bulgar. ex Bornmüller. (ceterum Istr., Banat., Transs., Dobrud. et Morav.mer. sec. Pax). — *A. tomentosum* certe huc pertinet ex Pax (in Bulgar. freq. ex Bornmüller).

7. *A. tataricum*: Istr. (: Bilimek ex Pax). Styr. (Pyramidenberg pr. Marburg, plures arbores vetustiss.: Dietl). Galiz. solum in mer-or. (rarius) adest teste Knapp). Dobrud. copiose (: Uechtr. Sinten.). Bulgar. (ad Razgrad, Varna etc. in silvis ubique: Velenovsky).

8. *A. monspessulanum*: Helv.mer. Carn. (Sieb. exs. 137). Herceg.mer. (: Vandas). — *A. illyricum* (Istr. Dalm.). — *A. ibericum* MB. (Hung. mer. Banat. Roman.; ex Pax).

**A. intermedium*: Bulgar. (m. Osogovska Planina et Vitos, Kokalena: Vandas. Velen Skorpil).

10. *A. creticum* (*A. orientale* CKoch). — *A. sempervirens* L. mant. (pl. culta). — *A. cuneatum* Boiss. (Messen., Arcad., Lacon.: Orph. 51). *A. heterophyllum* ad—*A. sempervirens* pertinet sec.Pax.

XXI. a. HIPPOCASTANEÆ.

1. *Æsculus* L. 1. *Æ. Hippo-Castanum* L. sp. ed. I. 344. II. 488. Græc.bor.: Thessal.! Epirus. — Vid. "Beiträg. zur Kenntniss des Vaterlandes und der geogr. Verbreitung des Rosskastanien, etc., von Th. v. Heldreich" in sitzungsb. d. bot. ver. prov. brandenb. 1879. 139—153 (*).

Arbor illa, in statu culto notissima et olim (1806) a Dr Hawkins apud Smithium in montib. Pindo et Pelio indicata, nostris diebus (1879) denuo detecta est a cl. et docto Theod. de Heldreich, cui ideo contigit Floræ Europææ ornamentum hocce insigne revindicare! Dein (ex eod. 1883) hæc arbor observata est etiam in declivitate merid. Pindi, ad parietes rupestres umbrosas regionis silvat. (: rex Georgius, dom. Münster et v. Höslin), et demum (1885) cl. Haussknecht in Pindo agrapho et ad aquas superiores flumin. Acheloos arbores tales numerosas vidit. Hippocastana ibi adsunt (etiam fruticosa) tam sparsa in silvis quam secus rivulos et in angustiis montium, inter 3000 et 4000' s. m., cum *Tilia argentea*, *Castanea*, *Fago*, *Carpino* duinensi, *Quercu Farnetto*, *Populo nigra*, etc. (Hausskn. in "mittheilungen" soc. bot. thuring. 1886).

XXII. AMPELIDEÆ.

1. *Vitis*. 1. *V. vinifera*: Bulgar. (ubi pr. Varna etc., in fruticetis declivium, "omnino spontaneam cum ampelis innumeris" vidit Velenovsky 1885). Bes-sarab. (Ross.mer.-occ.) spontan. lecta est baccis parvis rubris insipidis (: Lindemann). Comment. 79.

Obs. Ab hoc ordine, in serie Candolleana, parum distat ordo Meliacearum, quare hæc commemorare liceat quod *Melia Azedarach* L., arbor in Europa merid. sæpe culta, aliquot locis Bæticæ (Gibraltar, Malaga, Motril) quasi spontanea indicatur.

XXIII. GERANIACEÆ.

1. *Geranium*. 1. *G. macrorrhizon*: Alp.-Marit. (Saorgio, St.-Dalmas, la Briga etc.). Moldav. Bulgar. Rumel. or.

2. *G. cataractarum*; species rariss., unico loco montis Sierra de Segura (Murc.) a Bourgeau lecta.

5. a. *G. subargenteum* Lge in Willk. Lge prodr. III. 525. - Hisp.bor. subalp. (rarius). *G. cinereum* Boiss. in Leresch. exs. sec. Lange.

8. *G. sanguineum*; exc. etiam Fenn. plur. (adest in sola mer.-occ.) cum Lapon.

9. *G. palustre*: Catal. (r.) nuper indicatum; Leon (cordill. del Vierzo: Texidor 1872). Gall.bor.-occ. (Eu, in silvis plurib. abunde; Blainville-Crevon; ex Morière). Belg. (pr. Hockay Ardenn. teste Crepin). Moldav. Dobrud. Bulgar.: Fenn. non nisi in mer. adest.

10. *G. collinum*; — *G. tauricum* Rupr. (Taur.).

12. *G. striatum*: Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882), Pind.-Dolop. (Hausskn. 1885).

13. *G. nodosum*: Hisp.or. et bor.-or. (Catal., Arag., Navar.).

15. *G. silvaticum*; — *G. alpestre*; de hac specie Schur. vid. Simonk. enum. 160. (1886), quo teste *G. silvaticum* typicum in Transs. deest.

16. *G. pratense*; exc. etiam Hisp. plur. (adest præcip. in or.); Lapp.or. indicatur in territ. Kola et Imandra.

+*G. coeruleatum*; ex Simonkai est propria species (*G. aconitifolium* Fuss), *G. collino* (10) proxima.

17. *G. rivulare*: Alp.-Marit. (mte Bego etc.): Ardoino.

18. *G. asphodeloides*: Græc. bor. m. Pindus (: Haussknecht 1885).

19. *G. phæum*: Boruss. (circul. Thorn: Preuss 1882); sed Rugiæ, Hamburg., Hannov. (ut etiam Wimariæ et Hercyn.) non nisi inquilinum, quale adest (r.) etiam Scaniæ (Suec.mer.). Belg. (sat raro). Picard. (ad Angres) cum humulo belgico introd. dicitur (: Girard). Alp.-Marit. (reg. alp., r.). Moldav. Bulgar. (Petrov-Han, Vitosa).

20. *G. reflexum*: Græc. bor. m. Pindus Tymph. (: Haussknecht 1885).

22. *G. sibiricum*: Ross. mer.-occ. (: Schmalh.); Austr. (p. d.) plur. loc. inquil. (sic ad Katzeldorf pr. Wiener-Neustadt copiosum: Wiesb. 1880).

**G. ruthenicum*: Tilsit (Boruss.or.) in hortis copiose adest (introducitur).

23. *G. Endressi*; planta rara, in solis Pyrenæis occ. obvia (mt Behorleguy pr. St. Jean-Pied-de-Port).

24. *G. pyrenaicum*; Belg., Batav., Dan. et Germ. bor., et probab. etiam Suec., inquilina est (sed spontan. dicitur Siles. et Lusat.); Norv. deest (ex Htn handb.).

**G. villosum*: Græc. bor. m. Pindus Dolop. (: Hausskn. 1885): planta pelop.-coreyr. (ob carpella rugosa et glabra) pertinet ad *G. molle* ex Lacaita.

25. *G. columbinum*; Norv. adest secus lit. mer. et occ. usque ad Bergen. — ? *G. album* Humnicki cat. pl. d'Orleans, 7. (1876) *.

26. *G. dissectum*; deest etiam Suec. med. et in Norv. non nisi pr. Bergen et in ins. Hvaløer lectum est.

27. *G. bohemicum*: Siles. (rr.). Sicil. nemor. Ficuzza,r. (: Lojac). Pindus agraph. supra coenob. Korona (Hsskt 1885); Suec.mer.-occ. (Hall., Bah., Vestrog.) non indicatur; Fenn. in sola mer. (et or. Oneg.). Transs. ad *G. divaricatum* (28) pertineat; Gall., Cors. (et prob. etiam Ital.) ad seq. (27, a) pertineant.

27. a. *G. Perreymondi* Shuttlew. ined.; Barb. in bull. soc. dauph. 1881. 324 (ex Rouy); sard. comp. 26. (1885). — Sard. Cors. Gall.mer. (Var. Alp.-Marit.): *G. bohemicum* *G. G.*; auct. ital. p. p.

28. *G. divaricatum*: Galiz. or. (rr.). Roman. Dobrud. Bulgar. Herceg. (: Hensch ex Vandas). Ross. centr. (gub. Kursk), mer. (gub. Cherson), mer.-or. (Sarepta: Becker); Hisp. huc usque solum in regno Gran. et in Castil. (pr. Escorial) lectum, nuper etiam in Catal. (a Timb.-Lagr.) observatum est. — *G. bohemicum* et *G. molle* auct. transs. ex Simonkai.

29. *G. molle*; adest in ins. Aland. (Fenn.mer.-occ.). — *G. abortivum* ad seq. pertinet ex Caruel. — *G. villosum* Rehb. exc. (non Ten.).

30. *G. rotundifolium*: adest in Scan., sed in Dan. nondum lectum est.

32. *G. pusillum*; deest etiam in Suec bor. multa; Fenn. extra mer.-occ. parce lectum est; adest in Sard. (Reverch. ex Barb.). — *G. Baumgartenianum* (*G. malvæfolium* Bmg.) ad *G. dissectum* (26) pertinet ex Simonkai.

34. *G. lucidum* adest in Fenn.mer.-occ. (ins.Aland. et casu Abœ).

35. *G. Robertianum*; deest in Norv. arct., in Lappon. p. d. et in Fenn. bor. cum media plur. — *G. Lebellii*: Normand. (: Morière; loc. classic. est ad prom. Carteret: Corbière; cfr. in bull. soc. linn. norm. 1887).

**G. purpureum* (et — *G. minutiflorum*): Angl. mer. (: Townsend). Gall. bor.-occ.

? *G. perrugosum* Borb. *G. cataractarum* Simk. (non Coss.). — Vircirova in coll. calcar. "ultra Portam Ferream" (Simk.).

2. *Erodium*. 1. *E. gruinum* indicatur etiam Hisp., ubi nostro ævo non lectum videtur (nisi forse in Catal.?).

2. *E. Botrys*: Arcad. (pr. Siderokastron ex Lacaita in litt.).

**E. Neilreichii* (ex Boiss. or. suppl. — *E. tmoleum* Reut.): Dobrud. præcip. in desertis (: Ue.S.). Serb.

3. *E. laciniatum*; *E. involucratum* est var. (subspec.?) in Hisp. mer. et or. (r.) lecta. — *E. pulverulentum* ad spec. seq. pertinet.

**E. glauco-virens* Lojac. (pl. sic. rar. exs. et) in diar. natural. sicil. I. 1884 (*); Magnier fl. sel. exs. 1891. — Sicil. (pr. Balestrate: Lojacono 1881).

3. *a. E. Cavanillesii* Willk. pl. haloph. 111 (539). *E. pulverulentum* W. *Geranium pulverulentum* Cav. Castil. (pr. Aranjuez etc.). Valenc. Murc. (r.). Bætic. (Baza, P. de S. Maria); adest etiam Sicil. (pr. Balestrate) ex Lojac.

4. *E. carvifolium*: non nisi in montib. Sierra de Gredos indicatur (a Reuter detect. 1841); ex Willk. Lge proximum stat *E. daucoidi* (27) ideoque post hoc inserendum.

5. *E. malacoides*; — *E. althæoides*: Hisp. centr. et mer., r. — *E. subtrilobum*; *E. aragenense* Loscos: Hisp. or. et mer., r.

Obs. Proximum *E. hymenodes* l'Her. a Dufour pr. Cadiz indicatur, sed ab aliis ibi non visum est.

6. *E. litoreum*: Cors. (ex Lange). Balear. (: Marès, Willkomm). Catal. (r.). Murc. (rr.).

7. *E. guttatum*; in Hisp. valde rarum est et non nisi in regno Gran. lectum (Yunquera, Ronda: Boiss., Willk.; Antequera: Prol.).

9. *E. alnifolium*; hab. etiam Ital. med. (pr. Pisa).

11. *E. maritimum* indicatur etiam (r.) in Bætica (Hisp. mer.).

13. *E. chium*: Bætic. plur. loc. — *E. murcicum*: Murc. Valenc.

14. *E. Boissieri* non nisi in montibus Nevad. lectum est; ex Willk. Lge prodr. sit verum *E. asplenoides* W. et majorem affinitatem habet cum *E. astragaloide* (28).

16. *E. Manescavi*: Navarra (: Lacoizq.).

18. *E. ciconium*: Rumel. or. (ex Velenovsky). Dobrud. r. ad arcem Jenis-sala (: Uechtr. Sinten.). Ross. mer. (Odessa).

19. *E. cicutarium*; deest etiam in Norv. arct. (supra Ranen) et in Fenn. bor. multa. — *E. commixtum* (*E. pimpinellifolium* Sibth. oxon.) potius subspecies est. — *E. Ballii* Jord. (Gall. bor.-occ.). — *E. Lebellii* Jord. (Gall. bor.-occ.).

20 *. *E. Jacquinianum*; Hisp. non nisi et raro in centr. (reg. matrit.) lectum est. — *E. malacitanum* Amo. (Malaga). — *E. hirtum* et *E. arenarium* ad speciem seq. pertineant.

20. *a. E. sabulicola* Lge (pug. 327 et) in Willk. Lge prodr. III. 537. — Galloec. (Pourr., Lge). Belg. (: Dumortier, Lge) et probab. etiam in Gall. occ. *E. arenarium* Pourr. (non Jord.) ex Lge. *E. glandulosum* Dmrt. 1865 (non W.).

22. *E. rupicola*; non nisi in reg. mont. et alp. m. Nevad. (raro) lecta est hæc species, quæ locum suum habeat ante *E. romanum* (26).

23. *E. Salzmanni* habitat in Bætica (: plur.) et Galloec. (: Lange). *E. viscosum* Salzm. exs. 1825. *E. tenuisectum* Lge pug. (ex ipso auct.).

24. *E. primulaceum*; — *E. pumilum* (Lge). *E. cicutarium pusillum* Kze. *Geranium præcox* Cav.

25. *E. serotinum*: Dobrud. (: Janka).

26. *E. romanum*: Heldr. hb. norm. 832 (ex Attica).

27. *E. daucoides* hab. in Castil. (Boiss. Reut. r.), Murc. (Bourg. r.), Gran. (S. Nevada).

28. *E. astragaloides* in solis montib. Nevadensib. et quidem rr. occurrit.

29. *E. Camposianum* cum specie præced. a Lange (in Willk. Lge prodr.) jungitur.

30. *E. macradenum*: Hisp. bor. in Pico de las Corvas pr. Leon (: Bourgeau).

31. *E. trichomanefolium*; ex Boiss. fl. or. planta hispan. a vera specie Heritieri differt, unde restit.: *E. cheilanthifolium* Boiss. elench. 43 (*E. trichomanefolium* Boiss. voy.); hab. in alpib. Granatens. inter 5000 et 8500'.

32. *E. petraeum*: habitat in Catal. et Arag.; indicatur etiam (rr.) in Hisp. bor. et centr. — *E. crispum* Lap. (Pyren.). — *E. valentinum* Boiss. Reut. (ms.). *E. petraeum* Bourg. exs. e Murcia.

33. *E. supracanum* (Geran. rupestre Cav.) hab. in Catal.; antiquitus etiam Valenc. indicatum.

Obs. *Pelargonium inquinans* Ait. in Hisp. mer. (Cadiz, Gibraltar, Malaga), et probab. etiam alibi in max. meridionalibus, interdum quasi sponte occurrit (e cultura).

XXIV. BALSAMINEÆ.

Impatiens. 1. *I. noli tangere*; exc. etiam Fenn. bor.; deest etiam in Norv. max. bor. nec non in ins. balt. Gotland et Oeland; Hisp. or. (Catal. et Arag.) indicatur (rr.).

Obs. *I. parviflora* plurib. locis Austr. nunc inquilina (quasi indigena) adest, ex. gr. Graciæ (Graz Styriæ) "in silvaticis et ad sæpes montis cui arx superstructa" (Schlossberg).

XXV. OXALIDEÆ.

1. **Oxalis.** 1. *O. Acetosella*; deest Island., sed in ins. Færöer reperta a Trevelyan (ex Rostrup 1870); in Norv. arct. rarescit, ut desit in Finnm.; in Lapp. suec. rara est et omnino desideratur in Lapp. fenn. et ross.

2. *O. stricta*: Scan. (Suec. mer.), ceter. subspont. usque in Suec. med. Ross. occ. - Hæc species commemoratur, ut dicunt, in manuscripto quodam, Modenæ servato, ex anno 1458, unde concludere licet plantam non esse originis americanæ ut aliqui putaverunt.

XXVI. ZYGOPHYLLÆ.

1. **Zygophyllum.** 1. *Z. Fabago*: Ross. mer. (Odessa, in argillaceis et subsalsis copiose) et mer.-occ. (Bessarab. locis salsis ad ostia fluviorum, copiose): Lindemann. — Hisp. rara civis est et paucis locis litoral. obvium (Matriti, ubi etiam lectum, certe introd. ex Willk.).

2. *Z. album* e flora hispan. (ideo etiam ex europæa) exclud., cum ad ostia Iberi (in Catalon), ubi a Webb indicatur, recentiori tempore non observatum et probab. casu adfuit.

2. **Fagonia.** 2. *F. hispanica* est species dubia, nomine tantum nota (Willk.).

3. **Tribulus.** 1. *T. terrestris*: Istr. Moldav. Dobrud. Bulgar. (: Bornmüller); pr. Danzig Boruss. or. nunc inquilina dicitur.

**T. orientalis* Kern. in ber. natur.-medic. in Innsbruck 1872. Hung. centr. (Kern. exs. 391). *T. terrestris* auct. hung.

XXVII. RUTACEÆ.

1. **Dictamnus.** 1. *D. albus*; Germ. bor., Scand. (s. l.) et Ross. bor. deest.

**D. gymnostylis*: Transs. r. (: Janka. Pavai).

2. **Haplophyllum.** 1. *H. coronatum*: Epirus (Chodzes ex Heldr. 1879). Bulgar. (Velenovsky 1885); ex Bornmüller (1888) planta bulgar. ad spec. seq. pertinet.

4. *H. Biebersteinii*: Dobrud. (: Uechtr. Sinten.); Transs. jam a Lerchenfeld (1785) lectum, a Brassai 1838.

5. *H. tauricum*; *H. congestum* Sp. (Taur.).

7. *H. rosmarinifolium* a specie præced. (*H. hispan.*), et præcip. var. *H. pubesc.*, non differt ex Willk.

3. **Ruta.** 2. *R. bracteosa*; Hisp. bor. et mer. zona litoral. (in Hisp. centr. deest). Istr. mer. (Freyn 1875).

3. *R. chalepensis*; Hisp. præcip. in mer. obvia est, sed etiam in or. et bor. lecta (in centr. antiquitas indicata).

4. *R. graveolens*: Bulgar. or. (in vineis: Bornmüller).

4. **Peganum.** 1. *P. Harmala*; Hisp. or., centr. et mer. in desertis salsuginosis omnibus frequens, in ruderatis hinc inde (: Willk.). Thessal. (Heldr. 1882). Bulgar. (: Velenovsky 1885). Hung. solum in m. Blocksberg oppidi Ofen adest, ubi alii hanc plantam e cultura (turcica) superstitem, alii (sic cl. Janka) aboriginem esse credunt (cfr. Herman in termesz. füzet. mus. nat. hung. 1878).

XXVIII. CORIARIEÆ.

1. **Coriaria.** 1. *C. myrtifolia*; Hisp. etiam in or. (Catal. Valenc. Mure.) adest; Gall. mer.-occ. (dep. Gironde, r.).

XXIX. CELASTRINEÆ.

1. **Staphylea.** 1. *S. pinnata*: Siles. Roman. Bulgar.

2. **Euonymus.** 1. *E. latifolius*: Bavar. Würtemb. Moldav. Bulgar.

2. *E. vulgaris*: Dan. Moldav. Bulgar. Thessal. m. Ossa (: Heldr. 1882). — *E. pubescens* Stev. (Taur.).

3. *L. verrucosus*: Moldav. Bulgar. Rumel. or.

3. *a. E. nanus* MB. t. c. III. 160. — Ross. mer.-occ. ex Schmalh.

4. **Ilex.** 1. *I. Aquifolium*; Norv. mer. et occ. (litoral.) adest ab Arendal ad Christiansand. Græc. non solum in Euboea (m. Delphi), sed etiam in Thessal. m. Oeta, Olympus et Pelion, in ult. monte (ut ad pedem Olympi) copiosa et sæpe arborescens: Heldreich 1882 (etiam in Maced. freq. ex Heldr.); deest in Germ. centr.

**I. balearica*; Hisp. indicatur: Algeçiras, Murcia (: Bourgeau), Castil. (pr. Encenillas, Navarra).

XXX. RHAMNEÆ.

1. **Paliurus.** 1. *P. australis*: Istr. Dobrud. in fruticetis ad Fulte freq. (: Zel.); pr. Jenissala, Rassova etc. (: Ue. Sint.). Bosn. (ex GBeck). Bulgar. aliquot locis magnâ copiâ montes et clivos obtegit et fruticeta constituit.

3. **Rhamnus.** 1. *R. Frangula*; exc. etiam Norv. bor. et Lapp. plur. (adest in sola suecic. mer.). — *R. sanguineus* P. syn. *R. Sanguino* Orteg. dec. (Galloeec.).

2. *R. rupestris*: Moldav.; Transs. ad præced. pertinet et Simonk.

3. *R. Alaternus*: Gall. mer.-occ. (Gironde) in sepibus et clivis, præcipue circa Burdigalam (Bordeaux): Clavaud.

**R. piceensis* Duv.-Jouv. (1878). *R. Alaternus* var. *Clusii* Lor. Barr. (non *R. Clusii* W.). — Gall. mer. territ. monspel. (ubi copiose obvius ad Pezenas, unde nomen).

4. *R. balearicus* (*R. rotundifolius* Dum.-Cours. 1811. non *Rth. R. ferrugineus* Pourr.); adest etiam in Menorca et Ibiza, nec non in prov. Alicante (cap de la Nao, pr. Denia; Rouy 1883).

5. *R. myrtifolius*: Castil. (circa Encenillas: Lge). Gall. mer. dep. Herault (*R. hederaceus* Delort ined. ex Loret; nomen ob ramos rupibus adpressos).

6. *R. catharticus*; Norv. in sola mer.-or. obvius, Fenn. non nisi in mer.-occ. (Aboa, Åland.).

**R. hydiensis* Hacq. — Carn. in montibus pr. Idria.

8. *R. intermedius*: Istr. (vid. Freyn, flora v. Südistr. in act. soc. z.-b. vind. 1877. 301); Transs. ad *R. tinctorium* (10 *) pertinet ex Simonk. — *R. illyricus*; pr. Billeki Herceg., ad sapes, a Pantocsek detecta est et in ej. adnot. descripta.

10. *R. saxatilis*: Hisp. centr. ex Colmeiro (1886). Alp.-Marit. (reg. mont.). Badia (Jura). Würtemb. (Mohren-Tobel pr. Ludwigsthal). Ital. mer. (Taranto) ex Lacaita. Moldav. Bulgar.; Transs. ad subspeciem pertineat. — *R. carniolicus* (*R. alpinus* K. p. p.): Bosn. mer. mont. altior. (GBeck 1885). Carinth. Comment. 80.

**R. tinctorius* (*R. saxatilis* auct. transs. ex Simonk.): Bulgar.

10. *a. R. Pallasii* F.M. ind. sem. h. petrop. 1837. *R. lycioides* Pall. — Ross. or. gub. Stawropol (: Owerin).

16. *R. alpinus*: Moldav. Herceg. mer. (: Vandas), sed ex Kerner loca orientalia (incl. Carinth. et Carnia) ad *R. carniolicum* (10—) pertinent. Transs. a Baumgarten indicatus erat, sed in ejus hb. non nisi cultus adest (ex Simonkai).

19. *R. pumilus*: Alp.-Marit. (reg. mont. plur. loc.). Bavar. (Alpes).

XXXI. TEREBINTHACEÆ.

1. **Pistacia.** 1. *P. Terebinthus* (*P. mutica* Raul. cret. 734 ex Engler): Istr. Thessal. m. Ossa (Heldreich 1882); etiam in Græcia p. d. (rarius) ab Engler indicatur.

3. *P. Lentiscus*: Hisp. centr., bor. Turc. medit.

2. **Rhus.** 1. *R. Cotinus*: Moldav. Dobrud. (: Uechtr. Sint.). Bulgar. (in calidioribus vulgata: Velen.). Thessal. m. Ossa (: Heldreich 1882). — *R. C.* var. *arenaria* Wierzb. (Banat. Vallach. Bulgar.: Bornm.); altera var. est γ cinerea Engl. e Banatu et Moldavia (Guebh. 337). Comment. 81.

2. *R. Coriaria*: Gall. mer.-occ. (Gironde) in clivis calcareis et rupestribus (: Clavand). Bulgar. ad Varna hinc inde copiosam vidit cl. Velenovsky; Thessal. m. Ossa (Heldr. 1882).

4. *R. dioica*; ex Engler nomen antiquiss. (1794) est *R. oxyacantha* Cav. (ic. et descr. III. 36); post hoc venit *R. oxyacanthoides* Dum.-Cours. (1802): species adest etiam in ins. parva Linosa, quæ igitur locum præbet transitorium inter oras siculas et tunetanas.

Obs. *R. radicans* L.; etiam hæc species boreali-americana in Europa temperatori (e. gr. Gall.) inquilina adest.

XXIII. PAPILIONACEÆ.

1. *a. Goebelia* Bge in litt.; Boiss. or. II. 628.

1. *G. alopecuroides* Bge ap. Boiss. l. c. *Sophora alopecuroides* L. Thrac. (Buxb.) or. litor. (Jka legum. eur. 1885).

Obs. Hoc genus pertinet ad tribum Sophoraceæ Bth., quæ Cæsalpinieis appropinquatur.

2. **Ulex.** 1. *U. europæus*: Bavar. aliquot locis indicatur, sed probab. introd. Gall. adest etiam bor.-or. (Lothar., sed in locis plurim., nisi omnibus.

plantatus: Godr.), or. (dep. Cote-d'Or), mer. (dep. Herault, rarius spontan.). Lusit. etiam mer. (Lisboa etc.); var. latebracteatus de Mariz. (Caldas da Rainha etc.). — *U. armoricanus* non est varietas sed (ex Godron) monstrositas physiologica, a tempore florescentiæ abnormi, autumnali, orta.

**F. opistholepis*: Lusit. bor.; a de Mariz (in bolet. soc. broter. 1883) ut species propria, inter *U. Jussæi* (8) et *U. densum* (13), enumeratur.

2. *U. Gallii*; Magnier sel. exs. 37; cfr. Miciol in ej. scriin. I. 8—13, ubi plena hujus speciei historia exponitur. Comment. 82.

3. *U. scaber*: Lusit. bor. (var. glabrescens) ex de Mariz l. c.

6. *a. U. lusitanicus* de Mariz in bolet. soc. broter. 1883. 115. sep. 62 (*). — Lusit. bor. (: Henriquez, Ferreira).

7. *U. bæticus*: Lusit. (S. de Monchique: Willk.).

9. *U. ianthocladus*: Lusit. (Guim. ex de Mariz). — *U. calycotomoides* Webb. (Malaga).

11. *U. Willkommii*: Lusit. pr. Setubal (: Daveau, de Mariz).

**U. micranthus*; etiam in S. do Bussaco (: Winkler) et S. da Estrella (: Fonseca) ex de Mariz l. c.

12. *U. canescens*; — ? *U. sparsiflorus* Lge. (Bætic. cabo de Gata: H. P. R. 1879).

16. *U. Webbianus*; species rara et, ut videtur, a solo Willkomm (inter Faro et Albufeira) lecta, — *U. luridus* non nisi a Welwitsch lectus dicitur.

18. *U. Boivini*; Lusit. ad — *U. Vaillantii* pertineat.

18. *a. U. megalorites* Webb (sub Nepa). Hisp. Gadit. (Sierra de Palma pr. Algeiras: Reverchon).

3. **Spartium.** 1. *S. junceum*; in Gall. bor. (e cultura) quasi spontaneum est, ut etiam (et alibi?) in dep. Loire, præcip. in glareosis fluminis ejusdem nominis. ab undis advectum (JHervier 1885). Istr.; Styr. in vineis etc. pr. Marburg et Posruk a Maly indicatur.

4. **Sarothamnus.** 1. *S. vulgaris*; exc. etiam Suec. med. et Norv. (in his non nisi introd.); Sard. adest (: Reverch. ex Barbey), sed desit Transs.

3. *S. virgatus*; *Spartium grandiflorum* Brot.

4. *S. cantabricus*: Castil. (Ler. Lev.).

5. *a. S. commutatus* Willk. in oe. b. z. 1881. 105. Hisp. bor. (e prov. Santander nom. *S. cantabrici* a Laguna ad Willkomm missus 1877).

6. *S. eriocarpus*: Lusit. (S. da Estrella, S. do Gerez Bragança); de Mariz in bolet. soc. broter. 1883.

7. *S. patens*; etiam Lusit. rarior, sc. non nisi in S. de Cintra et Monserate (: Welw., Daveau) certe lectus.

8. *S. bæticus*: Lusit. (: Daveau ex Mariz l. c.).

9. *S. catalaunicus* (*S. arboreus* G.G. non Webb); usque ad Fontfroide pr. Narbonam descendit; ante 40 annos lectus (hb. Girard ex Loret).

5. **Genista.** 1. *G. ætnensis*; planta sardoa (*Drymospartum sardoum* Pr.) a sicula forse diversa est (cfr. Barbey fl. sard. comp. 222). Comment. 83.

5. *G. Barnadesii*; detecta a Graëlls (1851?) in Sierra de Gredos.

6. *G. acanthoclada*: Balear. (Mallorca, rr.: Marès 1852). — *G. balearica* Willk. (: Porta 1885).

6. *a. G. sphacelata* Dene (ann. sc. nat. 1835. 360) nuper in ins. Karpathos (Arch. turc.) a Pichler lecta est (in Cypro a Sintenis et Rigo).

7. *G. horrida*; Gall. etiam in Aveyron (Magn. sel. exs. 1119).

9. *G. lusitanica*; Lusit. etiam med. (S. da Estrella plur. loc.).

11. *G. micrantha* (*G. odoratissima* Pourr.): Lusit. (Bragança, S. do Gerez: Ferreira, Moller); ex de Mariz.

12. *G. Broteri*; Lusit. a solo Brotero lecta videtur (de Mariz n. v.).
14. *G. aristata*; etiam in Apulia (mte Gargano) a Porta lecta est, si non sequens (*G. Michelii*), quæ ab hac parum diversa videtur.
16. *G. germanica*; exc. etiam, ut videtur, Hisp. et Lusit. (*G. germanica* Brot. ad 20 * *G. decipiens* pertinet).
17. *G. Welwitschii* non nisi in S. de Monsanto, S. de Cintra (Estrem. Lusit.) lecta est; melius post *G. anglicam* (27) enumeretur.
18. *G. hirsuta*; — *G. algarbiensis*: Lusit., Gran.
- 20 * *G. decipiens*; *G. germanica* Brot. ex de Mariz.
21. *G. hispanica* (*Nepa aragonensis* Losc.); Lusit. cum dubio citanda est (de Mariz n. v.).
24. *a. G. Winkleri* Lge meddel. 1877. 17. - S. Roque Bætic. (; Winkler).
26. *G. berberidea*: Lusit. (Oporto: Johnston) ex de Mariz.
27. *G. anglica*: Lusit. (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883); Germ. adest in sola bor., a Batav. ad Pomeran. et Poson.; Halland. relecta est a dom. Lahkander 1870.
28. *G. ancistrocarpa*; species rarissima et a solo Webb (in Alemtejo) lecta.
29. *G. Scorpis*; Lusit. a solo Vandelli lecta videtur (de Mariz n. v.).
29. *a. G. carpetana* Lge meddel. 1877. 237.
- Castil. (m. Sierra de Gredos); a Leresch detecta 1862.
32. *G. lucida*; hab. (unice) in ins. Mallorca, ubi in collibus aridis abundat.
32. *a. G. Pomeli* Marès, Vigin, cat. raison. 70. (1880). - Balear. (Mallorca, Ermita de Artà: Marès); speciei præced. valde proxima videtur ex Burn. Barb.
34. *G. aspalathoides*; Lusit. a Hffgg. Lk indicata et in S. de Monchique a Willkomm lecta (de Mariz n. v.).
35. *G. murcica*; adest etiam Valenc. (pr. Orihuela).
36. *G. hystrix*: Lusit. (Bragança, S. da Estrella: Ferreira, Fonseca) ex de Mariz.
38. *G. Hænseleri*; etiam Lusit. (rarius) adest.
40. *G. cinerea*; hab. etiam in dep. Alpes-Maritimes.
- **G. cinerascens*: Lusit. (S. da Estrella: Daveau, Ferreira) ex de Mariz.
- 45 * *G. pulchella*: Pyren. pr. Luchon. (ex Timb.-Lagr.).
46. *G. sericea*; Transs. ad *G. spathulatam* (57) pertinet.
47. *a. G. Millii* Heldr. in sched. (1876); Boiss. or. suppl. (1888). Euboæe m. Delphi (; Pichler).
48. *G. florida*; adest etiam in Hisp. bor.
- 49 * *G. leptoclada*: Lusit. (Bragança: Ferreira) ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883.
51. *G. teretifolia*; non nisi loco citato (Navarræ) et a solo Willkomm lecta videtur.
52. *G. pilosa*: Bulgar. (in declivibus m. Kom: Vandas, Velen.). Siles.; Suec. adest in Scan. bor.-occ., Halland. (in mer. vulg.) et Smoland. (r). Curon. incerte ex Klinge.
54. *G. triangularis* (Kit. ap. W.); adest etiam Carniol.; Græc. bor. (Pindus: Haussknecht). — *G. bihariensis* Kern.
56. *G. tinctoria*; exc. etiam Lusit. (ubi recenter vix lecta est), sed adest in Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.). — *G. insubrica* Brügg. in ann. soc. nat. scrut. bund. 1882. 62 (*). *G. Marii* Fav. (cant. Ticino Helv. mer.). — *G. Sigeriana* Fuss (1866). *G. oligosperma* (Andræ) Simonk. enum. 169. (1886), quæ etiam species Schurianas (in Cons. = varietates) comprehendit.
- **G. elatior*: Istr. Bulgar. Ross. mer. (: Lindemann); huc probab. *G. sibirica* Becker (Sarepta Ross. mer.-or.).
- **G. Delarbreyi*: Gall. etiam mer. (Aveyron: Bras). — *G. campestris* est *G. tinctoria* ipsiss. ex Simonk.

57. *G. lydia* (*G. leptophylla* Sp.; *G. sericea* Schur ex Simonk.); Rumel.or. (Sliven, Sotira) ex Velen.; Euboeæ m. Delphi in castanetis (: Heldreich). - Sec. ell. Kerner et Simonkai hæc species est *G. lydia* Grsb. Schenk iter hung. et auct. transs., sed non Boiss., unde nomine *G. spathulatæ* Sp. (ann. sc. nat. 1845) salutanda.

59. *G. ovata*: Helv. (cant. Schaffhausen). Bulgar.

**G. Mayeri*: Transs.; a specie parum differt (glabritie).

60. *G. mantica*; Pollini hanc speciem primum in catal. del orto botan. veron. (1814) proposuit. — *G. lasiocarpa*: Hung. (m. Matra) et Slavon. ex Borbás. Croat. (: Vukotinov.).

62. *G. depressa*: Bulgar. in summo monte Vitos pr. Sofia (: Velenovsky in act. soc. sc. bohém. 1886. sep. 12 (*)).

66. *G. tridentata* (*Pterospartum tridentatum* Willk.); etiam Hisp. bor. plur. loc. lecta est.

**G. cantabrica* (*Pterospartum cantabricum* Willk.): Lusit. plur. loc. (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883).

**G. stenoptera*; *Pterospartum stenopterum* Willk.

67. *G. sagittalis*; hab. etiam Bulgar. (pl. loc. freq.).

**G. delphinensis*: Pyren. ad Fond-de-Comps (: Timb.-Lagr. 1852 ex Verlot); Delph. lecta est a Bernardin 1872 in m. Touloux (Drôme).

10. **Cytisus**. 1. *C. Laburnum*: Gall. bor.-or. (Lothar. in silvis montosis). Bulgar. in silvis ad Razgrad, Varna leg. Velenovsky; Transs. ad speciem seq. pertineat.

2. *C. alpinus* (*C. Laburnum* Bmg. ex Simonk.): Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.).

3. *C. æolicus*; species memorabilis, insul. æoliæar. (Vulcano, Stromboli) endemica, nunc eheu! rarissima, testante cl. Lojacono, qui nuper (1877) has insulas visitavit; vidit tamen in Piano del Vulcano arbusculas pulcherrimas (4—6 metr.) cum aliis Genisteis dumetum constituentes; cfr. M. Lojacono: Le Isole Eolie e la loro vegetazione etc. 50—51 et 96 (*). *C. Bartolottæ* Tod. ind. sem. hort. b. panorm. a. 1858.

8. *C. Kunzeanus*; non nisi in prov. Gaditana mer.-or. lectus est: Algeras (ubi a Willkomm detectus 1845), Palmares, Vejer etc.

9. *C. linifolius*; Lusit. citatur ex Link (de Mariz n. v.).

11. *C. nigricans*: Badia, Würtemb., Thuring., Lusat., Roman., Bulgar., Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879). — ? *C. unibracteatus* Lindem. in bull. mosc. 1850. (Grodno Lithaun. ad monasterium Berosa: Lindemann).

12. *C. sessilifolius*: Valenc. (S. de Mariola); Helv. non nisi cultus vel inquil adesse dicitur.

13. *C. triflorus*: Lusit. (ubi jam a Loeffling lectus; Serra d'Ossa: Daveau). Thessal. m. Pelion (: Heldr.).

18. *C. hirsutus*: Bavar. (r.). Helv. mer. (Ticino). Roman. Rumel. or. Thessal. m. Pelion (: Heldr.); Arrag. cum dubio citetur. Transs. ad subspeciem pertinet. — *C. pumilus*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., r.). — Comment. 84.

**C. leucotrichus* (Schur) Simonk. enum. (1886). *C. supinus* auct. transs. (exc. Schur. enum.). *C. hirsutus* auct. transs. *C. prostratus* Schur; ex Simonk.

19. *C. polytrichus*: Transs. r. (*C. supinus* Schur p. p.; Simonk.). — *C. alpestris* Schur (ex GBeck pertinet ad *C. ciliatus* Whlbn.). *C. leiocarpus* Borb. (non Kern.) ex Simonk.!: adest etiam Bosn. (: GBeck).

**C. Haynaldi* Simk. (Simonk. enum. 173). *C. supinus* Schur p. p. *C. leiocarpus* Jka (non Kern.). *C. ciliatus* Simk. quoad plant. transsilv.

20. *C. biflorus*: Dobrud. (pr. Grecii: Uechtr. Sint.). — *C. graniticus* Rehm. (Ross. mer. gub. Cherson). — Comment. 85.

**C. elongatus*: Rumel. or. Ross. med. mer.; Transs. dubie adest quia ibi cum *C. leiocarpus* (var.) et *C. leucotricho* (18*) commutatus ex Simonk. (enum. 173). — *C. leiocarpus* Kern. in oe. b. z. 1863. *C. elongatus* Bmg. p. p.; Andræ. - *C. subleiocarpus* Simk. 1885. (Transs.).

21. *C. prostratus*; adest etiam Carinth. (ex Pacher).

**C. aggregatus* Schur enum. 149. *C. capitatus* auct. transs. (non Sep.) ex Simonk.

22. *C. austriacus*: Styr. (: Graf ex Maly), Roman. Bulgar. Bosn. Ross. centr. (gub. Kursk); Transs. (et — *C. banaticus*) ad subspeciem pertinet.

**C. leucanthus* (1805). *C. albus* Hacq. reise durch die nördl. Karpat. 1790. (etiam *C. albus* Pall. ex Jka). *C. microphyllus* Jka in linn. XXX (ex Simonk.); adest etiam in Morav. mer. (: Ansorge 1877), Moldav., Bulgar., Ross. mer. (gub. Cherson). *C. microphyllus*: Aetol. (m. Velugo) et Serb. ex Boiss. — *C. obvallatus* = *C. leucanthus* ipsiss. ex Simonk.! — *C. Heuffelii* (Grsb. Schenk. 1852): Valach. (Virciorova: Simk.); flores pallide lutei v. albid. — *C. banaticus* Grsb. (1852). *C. pallidus* Schrad. in DC. pr. (1825). *C. austriacus* auct. transs. *C. Heuffelii* Schur; ex Simonk. — Hæc subspecies *C. leucanthus* probab. speciem majoris dignitatis, a *C. austriaco* magis diversam, constituit.

+ *C. ambiguus*; ex Simonk.! = *C. Rochelii* (22 *)—.

23. *C. pygmaeus*: Bulgar. in juniperetis ad Petrov Han (ex Vandas).

25. *C. capitatus*: Istr. Bulgar. (in demissis vulgatus: Velen.). Rumel. or.; Transs. ad *C. aggregatus* (21 *) pertinet. — ? *C. virescens* Kovacs. (*C. austriaco-capitatus* Neilr. (Austr. Morav.).

**C. ciliatus*; adest etiam Banat. ex Borbás. Bosn. mer. (: GBeck). — *C. bosniacus* G Beck in ann. mus. vind. 1887. (Bosn. mer. mont.).

**C. Tommasinii* (*C. capitatus* var. *parviflora* Ebel monten.): Bosn. mer. (: Blau ex GBeck).

26. *C. supinus*: Castil. (*C. austriacus* et *C. capitatus* auct. hisp.). Moldav.; Transs. ad *C. leucotrichum* (18 *) pertineat. — ? *C. alpestris* Thur. et Bonnet ap. Ardoino 1867. (Alp.-Marit. reg. alp. et mont., r.). — *C. alpestris* Schur est var. *C. polytrichi* (19). — Comment. 86.

30. *C. albus*; *C. Linkii* Jka 1884 (nomen mutatum ob *C. album* Pall.).

31. *C. purgans*: Lusit. (Serra da Estrella): de Mariz in bolet. soc. broter. 1883.

32. *C. Kitaibelii*: Styr. pr. Cilli (: Tomaschek ex Maly). Genista diffusa Schur ex Simonk.!

33. *C. decumbens*: Gall. mer. (Ceven. cacum. Mezone: Sargnon 1880), or. (Côte-d'Or), bor.-or. (Lorr.).

**C. humifusus*: Styr. pr. Cilli (: Tomaschek ex Maly); Transs. ad speciem præced. (*C. Kitaibelii*) pertineat.

34. *C. Ardoini*; locus, ubi hæc species ab Ardoino et Hawker lecta erat, ligusticus, nunc pertinet ad dep. Alpes-Marit. (montagne de l'Aiguille, au-dessus de Menton); dein pluribus locis ejusdem dep. lecta est (: Moggridge, Burnat). Signum? deleatur.

11. **Calycotome**. 1. *C. spinosa*; cl. Lacaita in Ital. mer. n. v.

2. *C. infesta*: Sard. pr. Antiocho (Dr Thorén!). Ital. mer. (Otranto, Gallipoli etc.: HGroves, Lacaita). Ins. Jon. (Corfû: Barbey ex Boiss.).

3. *C. villosa*: Menorca Balear. sec. Camb. et Rodr.

12. **Adenocarpus**. 3 * *A. cebennensis*: Lusit. (*A. commutatus* Guss.) ex de Mariz 1883; in m. Ceven. late distributa est (Lozère, Gard, Aiguel, Esperou).

4. *A. grandiflorus*: Lusit. (Evoramonte prov. de Extremoz: Daveau). Hisp. etiam centr. (r.) adest; in Gall. regionem litoralem (Roussillon, Prov.) inhabitat.

5. *A. anisochilus*; a solo Bourgeau (in S. de Monchique) lectus videtur (de Mariz n. v.).

6. *A. parvifolius*: Gall. mer.-occ. (Pyren., les Landes: St. Lager), or. etiam dep. Côte-d'Or; Lusit. vix adest (ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883).

14. **Lupinus**. 3. *L. græcus*: Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879).

4. *L. hirsutus*: Istr. Herceg. mer. (: Hensch ex Vandas).

7. *L. Cosentini*; Lusit. (rarius) indicatur: de Mariz l. c. - Forse var. *L. hirsuti* (4).

8. *L. varius*; Lusit. non nisi in bor. (Coimbra), in campis, lectus; Balear. cum dubio citentur.

9. *L. angustifolius*; Hisp. etiam in centr. et bor. adest.

10. *L. reticulatus*: Gall. mer.-occ. (Gironde: Clavaud).
11. *L. leucospermus*; a solo Pavon lectus videtur (pr. Madrid).
12. *L. luteus*: Messenia in planitie arenosa inter Kalamata et m. Ithome, ubi omnino indigenus videtur (ex Lacaita in litt.).

13. *L. hispanicus*: Lusit. (Bragança, Coimbra, S. da Estrella etc.).

Obs. *L. perennis* L. ex Boswell nunc in Scotia tamquam herba pabularia divulgatus est et aliquot locis inquilina: etiam in ins. Orkney (ad Sandwick ab a. 1883) nunc quasi spontaneus est, ex horto primum elapsus (: Johnston).

15. **Ononis**. 1. *O. rotundifolia*: Alpes-Marit. (reg. mont.). Abruz. (mte Sirente: Groves ex Lacaita). Carinth. (rarius: Pacher et al.).

2. *O. fruticosa*; — *O. rigida*: Hisp. etiam centr. (Cerro negro pr. Madrid: Amo).

3. *O. tridentata*; Hisp. etiam centr. (Castil.). — *O. angustifolia* Lge.

**O. crassifolia* (*O. latifolia* Lge). — *O. intermedia* Lge. (Arag., Castil. etc.).

7. *O. Broteriana* (*O. racemosa* Brot. non Thb.); a solo Brotero lecta videtur (in Extremadura).

8. *O. reclinata*; Hisp. etiam or., Balear.

9. *O. mollis*: Istr. (*O. pilosa* Bartl.).

10. *O. inclusa*: Sard., ubi a cl. Gennari lecta est.

11. *O. Natrix* (*O. hispanica* Brot. p. p.); etiam Taur. sec. Stev. (1856). — *O. inequifolia*: Hisp. mer. (Jaën: Lange). Sard. (: Forsyth-Major et al.).

**O. picta* (*O. hispanica* DC. pr.); Hisp. probab. etiam alibi lecta.

13. *O. hispanica*: Lusit. (Cezimbra: Moller ex de Mariz).

14. *O. crispa*; Lusit. nondum lecta est ex de Mariz.

15. *O. ramosissima* (*O. hispanica* Brot. p. p.): — *O. arenaria* DC. (Hisp. or., Gall. mer.); est varietas sat distincta (forse subspecies).

17. *O. pyrenaica*: Catal. (Pyren.). Arag. (Castanea).

18. *a. O. Hackelii* Lge (1877) hab. in Lusit., ubi ad Melides et S. André a Welwitsch (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883) et ad Sines (a Winkler et Hackel) lecta est.

19. *O. viscosa*; planta Broter. ad subspeciem pertinet ex de Mariz l. c., sed typica nuper in Lusit. lecta est a Ferreira.

**O. breviflora*; *O. viscosa* Brot.

19. *a. O. foetida* Schousb. (var. *submutica* Lge). - Andal. prov. gadit. (pr. Algeciras: Reverchon, Winkler).

20. *a. O. ambigua* Lge. - Sierra de Alfacar Andal. (: Winkler).

? 24. *a. O. subspicata* Lag. in period. de la soc. med. de Cadiz. - Andal. (: Lagasca).

25. *O. pubescens*: Ital. mer. (Terra d'Otranto: HGroves). Ins. Jon. (Cephallonia: Heldreich). — ? *O. paniculata* Cav. (Hisp. mer.).

28. *O. hircina*: Carinth. Moldav. Dobrud. (Uechtr. Sint.). Bulgar. (: Vandas. Velen.). Rumel.; Vales. indicata est, sed ex Gremli ab omni Helv. exsul. — *O. pseudohircina* Schur (*O. spinosa* et *O. repens* auct. transs.) ex Simonk.

29. *O. arvensis*: Lusit. (ex de Mariz 1883). Carinth. Dobrud. (var.). Herceg. (: Vandas). Ross. mer. (: Lindemann), balt. (: Klinge). — ? *C. spinosiformis* Simk. 1877. (Hung. mer. Banat.).

**O. maritima*: Hibern. Angl. or. (Arth. Bennet). Gall. bor.-occ.; etc.

30. *O. campestris*: Gotland. (Visby, Sandön). Moldav. Dobrud. Bulgar. (: Vandas, Velenovsky et al.)

31. *O. antiquorum*: Lusit. (rarius) ex de Mariz. Istr. (Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877).

32. *O. pinnata*; Hisp. a solo Schott (pr. Algeciras) lecta videtur.

34. *O. alopecuroides*; Lusit. a solo Brotero indicatur.

35. *O. Salzmanniana*: Lusit. pr. Lisboa (Welwitsch ex de Mariz).
38. *O. mitissima*; etiam in Balearibus (rr.) lecta est.
- 46 * *O. Dehnharti*: Bætica (P. de Sta Maria, Cadiz etc.). — *O. serrata* Coss. non Forsk.; Galeoc. (Coruña etc.). Lusit. (Alcochete: cl. Coutinho).
51. *O. Renteri*; hab. in Sierra de las Nieves et S. Nevada.
54. *O. rosæfolia*; indicatur etiam in Castil (: Quer) et Aragon. (: Asso).
56. *O. striata*; sec. cl. Morièræ hæc et *O. minutissima* (60) pr. Chambois (Normand.) lectæ sunt a cl. Duhamel, sed dubitare liceat num species ille meridionales ibi indigenæ sint.
58. a. *O. brachyantha* Rouy exc. bot. esp. in rev. sc. nat. 1883. 64 (*). *O. parviflora* Cav. (non alior.). - Valenc. (Cav.). Velez-Rubio (Rouy 1881).
59. *O. Columnæ*: Dobrud. (r. in m. Balve: Uechtr. Sint.). Bulgar. (ad Konjavo, Varna etc.). Rumel. or. -- *O. capitata*; Hisp. or., centr.
60. *O. minutissima*; Hisp. etiam centr. (r.). — *O. barbata*; Hisp. or., mer.-or.
62. *O. euphrasiæfolia*; non nisi a Cabrera et Clemente lecta videtur (pr. Cabo de Gata).
16. **Anthyllis.** 2. *A. Genistæ*; melius *A. genistoides* Duf. in bull. soc. bot. 1860.
3. *A. Hermanniæ*: Menorca Balear. (Pourr. ex Colm.; Rodr.): var. *hystrix* Willk. (*A. Aspalathi* Rodr. non DC.).
- Obs. H. Groves narrat (Journ. linn. soc. 1885) hanc raram speciem in Japygiæ oppido Gallipoli pro usu scopario adhiberi, ut alibi utuntur *Erica* scopariâ.
4. *A. barba Jovis*; Hisp. mer. adest! et indicatur etiam in or. et centr.; Sard. (: Reverchon, Forsyth-Major).
10. *A. montana*: Carinth. (r.). Herceg. (: Beck, Brandis); Helv. hab. in m. Jura (la Dôle, Creux du Van) et Salève. — *A. Jacquini*: Bosn. mer. alp. (: GBeck).
11. *A. balearica* (*A. Vulner.* var. *rosea* Willk. ind. balear. *A. rosea* Willk. Lge) non nisi in Mallorca lecta est: Puig Mayor de Torrella (ubi a Bourgeau detecta 1869) et ad viam a Soller versus P. M. de Torella ducentem ad alt. circiter 800 metr. (Willkomm 1873), Coma den Arbona (: Rodriguez).
13. *A. Vulneraria*; Lapp. norv. (Norv. arct.) adest multis locis ibique usque ad lat. 70° progreditur (: Norman). — *A. calcicola*; *A. alpestris* Schur. — *A. alpestris* Kit. ap. Schult. (Alpes dinaric.) — *A. alpestris* Heg. *A. Cherleri* Brügg. (Helv.). — Comment. 87.
- **A. polyphylla*: Croat. (Fiume: A-M. Smith). Bosn. (: GBeck). Transs. (r.). Ross. mer. — *A. tricolor* Vuk. hab. in Croat., ubi in pratis montanis litoral. predominat (vexillum et carina cum calyce rubræ sunt); Bosn. mer. (m. Trebovic: GBeck).
- **A. carpatica* Pntek. in Kanitz, magyar növen. lapok. 1882. 162 (*). — Hung. comit. Liptov. (ad radices alpis Choecs).
15. *A. hispida*: Lusit. (Coimbra, Cintra) ex de Mariz in bolet soc. broter. 1883.
16. *A. Webbiana*: Lusit. (Bragança) ex de Mariz l. c. Hisp. bor. (Ler. Lev.).
- **A. arundana*; crescit etiam in Murcia (: Rouy 1881).
20. *A. cornicina*; in Lusit. rara est et (ex de Mariz) solum pr. Bragança lecta (*A. cornicina* Brot. est 22. *A. hamosa*).
21. *A. lotoides*; etiam in Hisp. bor. (Leon, Navar.) lecta est.
22. *A. hamosa*: Lusit. latius distributa videtur (*A. cornicina* Brot.).
18. **Medicago.** 1. *M. arborea*: Mallorca pr. Esporlas (ex Camb.), mts de Torrella, rr. (: Barceló). Terra d'Otranto Ital. mer.-or. (: HGroves).
4. *M. falcata*; Norv. (ex ABlytt) adest ad Christiania et Christiansand.
6. *M. sativa*; etiam in Germ. bor. et Suec. mer. quasi sponte adest, sed in his probab. ubique primitus introducta. Comment. 88.
- **M. media* (*M. cibinensis* et *M. subfalcata* Schur ex Simonk.): Dan. Helv. Istr. Austr. Hung. Transs.

- 7 * *M. glomerata*: Gall. mer. (Luc dep. Var ex Rouy).
11. *M. prostrata*: Ross. mer.-occ. (: Rehmann).
12. *M. Pironæ*; *M. rupestris* Pir. (non MB.).
14. *M. suffruticosa*: Hisp. bor. et or. (Catal., Arag., Cantabr., Astur.).
**M. leiocarpa*; etiam Catal. et Murc. lecta.
15. *M. obscura*; in Hisp. rariss. est (indicatur solum in Aragon: Colm.).
16. *M. Helix*: Lusit. (ex de Mariz). Hisp. mer., or. (r.). — *M. spinulosa* DC. (Hisp. centr., mer. Lusit.).
17. *M. orbicularis*: Istr. Dobrud. mer. Bulgar. — *M. Biancæ*: Sicil. (: Todaro), Sard. (: de Sardagna 1883).
**M. marginata*: Lusit. (pr. Bragança) ex de Mariz.
17. a. *M. Blancheana* Boiss. diagn. ser. II. 5. 75. — *M. Bonarotiana* Arcang. in n. giorn. bot. ital. 1875. (Firenze: Arcangeli); est var. inermis *M. Blancheanæ* ex Urban.
19. *M. scutellata*: Istr.; in Lusit. a solo Brotero lecta videtur; extra aream geogr. interdum introducta occurrit.
21. *M. Soleirolii*: Gall. mer. (pr. Cannes: Loret).
23. *M. tornata*: Lusit. sec. Brotero (et Valenc. sec. Clemente) citatur; recentior ibi non lecta videtur.
24. *M. tribuloides*: Lusit. (Coimbra ex de Mariz 1883). Hisp. etiam or.; Istr. — *M. heteracantha* Loret (in sched.).
**M. truncatula*: Attica (Heldr. hb. norm. 833; var.).
25. *M. litoralis* (Heldr. hb. norm. 834. a. b.): Hisp. etiam or. (cum Balear.). Istr. — *M. Braunii*; adest etiam pr. Laconi Sard. (: Biondi ex Barbey).
27. *M. tuberculata*: Lusit. (S. de Monsanto) ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883. Hisp. bor. (Leon: Lange). Balear. Alpes-Marit. (pr. Antibes: Thuret). Istr.
28. *M. murex*: Balear. (rarius). — *M. macrocarpa*: Hisp. or., mer., centr. (r.).
29. *M. sphærocarpa*: Menorca Balear. (rarius et forse seq. *M. turb.*) Creta (: Reverchon ex Boiss.).
31. *M. globosa*: Attica (Heldr. hb. norm. 835).
32. *M. rigidula* (Heldr. hb. norm. 836): Lusit. (Coimbra) ex de Mariz, Gall. or. (Côte-d'Or). Istr. Dobrud. (in desertis et montibus: Uechtr. Sint.).
33. *M. agrestis*: Attica (Heldr. hb. norm. 837).
34. *M. coronata*; Heldr. hb. norm. 838. — *M. Urbanii* Heldr. exs. 1875 ex Boiss. (Attica: Heldreich).
35. *M. Tenoreana*; crescit etiam in Sard. ex Biondi.
36. *M. præcox*; etiam in Balear. obviam venit; in Eleusi Atticæ (: Haussknecht).
37. *M. lappacea*: Castil.; Lusit. (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883).
**M. denticulata*: Lusit. (ex de Mariz). Hisp. mer. Helv. (sporad.). Germ. mer. Hung. (: Hzl.). Croat. (Fiume: A.-M. Smith). Istr.; Suec. mer. et med. (rr) introd. ex Neuman in Bot. Not. 1882.
38. *M. apiculata*: Lusit. (: Moller ex de Mariz). Hisp. mer., or. (cum Balear.). Helv. (inconst.). Istr.
Obs. Species duæ præcedentes (cum subspecie) sec. Urban unam solam constituunt: *M. hispida* (Gærtn.) Urb.
39. *M. arabica*: Bulgar. (: Skorpil ex Vandas). Bosn. mer. (: GBeck). Istr.; ceterum in variis terris pluribus locis introd. et inquil.
40. *M. pontificalis*; ex Urban (!) = *M. præcox* var.; in Barb. comp. fl. sard. post *M. Echinus* militat.
41. *M. minima*; S an. hab. inter Kåseberga et Sandhammar in præruptis versus mare (et ad Malmö ex FAesch.) et nuper etiam ad Borgholm Öland. (: Adlerz, Lalin) lecta est; in Suderm. (et Halland.) introducta.

42. *M. laciniata* indicatur etiam in *Hisp.* (Catal., Castil.).
45. *M. ciliaris*; *Lusit.* rara et nuper (in prov. de Lisboa) detecta ex de Mariz (: *M. ciliaris* Brot. ad *M. lappaceam* et *M. apiculatam* pertinet).
49. *M. disciformis*: *Ins. Jonicæ* (Corfû: Spreitzenhofer 1877).
50. *M. lupulina*; — *M. corymbifera*; *Trigonella multiflora* Humnicki catal. pl. de Luxeuil (Haute-Saône) 1876. 18, 19 (*).
51. *a. M. secundiflora* Dur. in *Duchartre rev. bot.* I. 365; *Magn. sel. exs.* 1442.
- Gall. mer. (pr. Narbonne): ile de la Planasse, etang de Bages; ile de la Sidrière de l'etang Leucate (: Gautier). Est species algeriensis, etiam *Hetr. pr.* Port'Ercole reperta (: Arcangeli 1883).
19. **Trigonella.** 1. *T. foenum græcum*: *Hisp.* etiam bor. *Balear.* (Mallorea: cl. Serra); *Lusit.* a solo Brotero indicata est.
2. *T. gladiata*; Gall. etiam in dep. Char.-Infer. lecta (introd.?) ibique (saltem 1878) freq. ex Foucaud. *Istr. Dobrud.* (coll. calcar. pr. Zybil: Uechtr. Sint.).
- 7 * *T. polyceratoides*; species rara et, ut videtur, non nisi Matriti lecta (Lange).
7. *a. T. orthoceras* Kar. Kir. in *bull. mosc.* XV. 399. (1841). *T. polycerata* auct. ross. - *Ross. mer.-or.* (Sarepta: Becker exs. a. 1881).
8. *T. monspeliaca*: *Istr. Ins. Jonicæ* (Corfû: Spreitzenhof.). *Dobrud.* (in desertis passim: Uechtr. Sint.). *Ross. mer.-occ.* (Bessarab.) et mer. (: Lindemann). *Morav.* (pr. Znaim: Oborny). *Bohem.* in summo Radobil pr. Leitmeritz (ex Gecke).
11. *T. corniculata*: *Istr. Bosn. mer.* (: Blau ex GBeck). *Epirus* (: Chodzes ex Heldr. 1879). *Cephalon.* etiam a Heldreich lecta est.
12. *T. Balansæ*: *Attica* (Heldr. hb. norm. X. 913).
14. *T. ornithopodioides*: *Dan. ins. Læsøe et Bornholm* (r.). *Batav.* (: de Vries 1878). *Gall. mer.-occ.* (Gironde: Clavaud). *Hisp. or., centr., mer.* *Istr.*
18. *T. coerulea*: *Moldav. Dobrud.* (in desertis, salsis, freq.: Uechtr. Sint.).
19. *T. Besseriana* (Melil. coerul. var. laxiflora Roeb. ban. *M. coerulea* auct. transs. quoad plant. spontan.): *Styr.* (: Angelis). *Rumel. or.*; *Belg.* cum cerealibus introducta (: Bagnet 1882).
21. **Melilotus.** 1. *M. messanensis*: *Lusit. mer.* (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883); *Menorca Balear.* (r.).
2. *M. sulcata*; *Hisp.* etiam *Arag. et Castil.* (r.) indicata. *Istr. mer.* (r.). *Taur.* (ex Cosson). - *M. segetalis* (Trifol. Melil. segetalis Brot.); bene distincta species et *M. intermediæ* Boiss. (vid. subspec.) propior ex de Mariz (bolet. soc. broter. 1883).
3. *M. infesta*: *Lusit.* (: de Mariz l. c.). *Menorca Balear.* (: Rodr.).
4. *M. officinalis* (*M. parviflora* Schur ex Simonk.!): *Hisp.* etiam or., mer. (*Lusit.* a Brotero indicata). *Roman. Bulgar. Attica* (inter segetes Phalerum versus leg. Haussknecht).
5. *M. elegans*: *Lusit.* (Beja) ex de Mariz 1883. *Hisp.* etiam *Catal., Mallorea* (pr. Soller) et *Ibiza Balear.*
7. *M. dentata*: *Batav.* (: Lacoste 1873). *Ross. balt.* (: Klinge). *Roman.*
8. *M. macrorrhiza*: *Galic. Austr. p. d.* (Wien). *Banat. Croat.* (Fiume). *Serb.*
- **M. palustris*; hæc fere eandem aream geogr. habet ac species (sed etiam *Monspeli* lecta dicitur). *Comment.* 89.
9. *M. altissima* (*M. Brandisiana* Wirtg.). — *M. longipedicellata* Rosbach (quæ flaviflora) est status morbosus, qualis etiam in specie seq. occurrit (GBeck). *Comment.* 90.
10. *M. alba*; exc. etiam *Fenn. plur.*; in *Ital. mer. pr.* Amalfi a cl. Lacaita (freq.) lecta est; in *Thessal.* a cl. Haussknecht.
11. *M. pallida*; etiam *Roman.* indicatur.

12. *M. ruthenica*; Comment. 91.

13. *M. italica*; indicatur etiam Hisp. centr., mer.; Mallorca (rr.); Lusit. (cultā et subspont.).

14. *M. neapolitana* (1811). *M. gracilis* DC. (1815); adest etiam Istr. (ins. Sansego) et Lusit. (ex de Mariz 1883); introd. extra aream geogr. interdum lecta est, in Balear., ut videtur, a solo Willkomm.

15. *M. indica*: Helv. (introd.). Istr. — *M. Tommasinii* Jord.; vid. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877 et 1881).

16. *M. polonica*; Comment. 92.

22. **Trifolium.** 1. *T. rubens*: Hisp. bor. et centr. (rarius). Lusit. bor. Ital. mer. (Otranto: HGroves). Istr. Moldav. Ross. med. (Minsk, Mohilew).

2. *T. alpestre*: Hisp. etiam in Catal. et Leon indicatur. Roman. Bulgar. Phthiotidis m. Oeta in alpinis (var. incanum: Heldr. ex Boiss.); in Lotharing. (Lorraine) non rarum, sed in Scania, ubi olim (r.) aderat, nuper non lectum est.

3. *T. sarosiense* pertinet ad *T. medium* (4), cujus var. banatica Heuff. sistit ex Borbás; in Hung. sat obvium, in Transs. rarius.

4. *T. medium*: Fenn. (exc. bor.). Dan. Roman. Bulgar. or.; etiam Lusit. bor. (Bragança) ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883. — *T. Haynaldianum* Pntek in oe. bot. z. 1878; Menyh. (comitat. Nyitra Hung.).

5. *T. expansum*; *T. diffusum* Bmg. et *T. purpurascens* Schur (non Rth) ex Simonk. — ? *T. pseudomedium* Hsskt in mittel. thür. bot. ver. 1886. 70 (*). *Pindus* agraph. in silvis quercinis (: Haussknecht 1885).

6. *a. T. Heldreichii* Hsskt in Heldr. exs. itin. thessal. et in litt. 1889. - Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht et Heldreich 1885).

8. *T. pratense*; — *T. nivale*; *T. frigidum* Gaud.: Helv. Carinth. — *T. brachystylus*; hæc monstr. nunc *T. pratense-pedicellatum* Knaf audit et etiam in Badia (: ABraun) et Alsatia (Dr. Mühlenbeck) lecta est. — *T. alpicolum* Heg. (*T. noricum* Thom. non Wulf). Helv.

11. *T. Ottonis*: Aetoliæ m. Korax, 6000—7700' (: Heldreich).

13. *T. pannonicum*: Alpes-Marit. (reg. alp.). Roman. Bulgar. Rumel.or. — *T. armenium* auct. transs. ex Simonk., sed planta Baumgarten. ad *T. ochroleucum* (15) pertinet ex eodem.

15. *T. ochroleucum*: Istr. Herceg. mer. (: Vandas). Roman. Bulgar.; Germ. bor. non nisi in Siles. et Bahnsche Heide Pomeran. indicatur; typicum deest in Sicil., ubi solum — *T. roseum*, quod nomen incongruum est (nam corolla ochroleuca vel roseo-tincta), quare cl. Lojacono (1878) nomen *T. inaequale* proposuit.

17. *T. hirtum*: Lusit. bor. (Bragança: de Mariz 1883). Banat. (Jka ex Hzl.). Bulgar. Rumel. or. Pindus (: Heldreich 1885).

18. *T. lappaceum*: Gall. mer.-occ. (Gironde), rarius. — *T. selinuntinum* Tin. in sched. — *T. messanense* Tin. in sched. (ex Lojac.).

18. *a. T. Barbeyi* Gibelli-Belli in act. ac. scient. taurin. XXII. (1887). sep. 3 (*). - Ins. Karpachos (inter Cretam et Rhodum sita), in cultis (: Pichler 1883, F.-Major 1886).

19. *T. angustifolium* (Heldr. hb. norm. 839): Istr. Ins. Jonicæ (Corfū, Ithaca: Spreitzenh. 1877); Transs. (ex Simonk.) sponte non obvium.

20. *T. purpureum*; adest etiam Bulgar.

21. *T. intermedium*: Argolis (Heldr. hb. norm. 914). Cephalon. (Heldreich).

22. *T. incarnatum*: Lusit. (plur. loc. indicatum). Istr. Bulgar. — *T. Molinerii*; *T. stramineum* Pr. (Tod. exs. sic. 500).

23. *a. T. xanthinum* Freyn (in bot. centralbl. 1880). *T. incarnatum* Molinerii Heldr. exs. - Aetolia, Epirus, Ithaca, Cephalon. (: Heldreich). Flores magni, sulphurei.

25. *T. ligusticum*; Gall. mer.-occ. (Bayonæ) indicatum, sed ibi nunc vix adest.
26. *T. phleoides*; hab. etiam in Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht).
26. *a.* *T. Minæ* Lojac. mon. trifol. di Sicil. 123 (*). *T. phleoides* var. *Tin.* in sched. - Mts Nebrod. (le Madonie), loco speciali non notato.
27. *T. lagopus*; Hisp. etiam mer. (r.). Lusit. bor. raro (: Moller) ex de Mariz.
29. *T. arvense*; exc. etiam Fenn. bor., med.; floræ island. incerta civis ex Groenlund (nec in enum. Strömfeltii 1884 obvium).
- **T. gracile*; adest etiam Transs. (ex Simk.). — *T. rubellum*: Transs.; Pindus (: Heldreich 1885).
31. *T. squarrosum* (*T. commutatum* Led.); Gall. nunc indicatum est locis humidis pr. Rouen (introd. ?); in mer.-occ. (Gironde) rarius est et a Clavaud (1884) non visum. — *T. marsicum* Ten.
32. *T. reclinatum*; hab. etiam Bosn. (: GBeck 1885).
33. *T. leucanthum*: Ital. med. (Toscana: Levier 1880). — *T. obscurum* Guss. non Savi. (Sicil., ubi a solo Gussone lectum).
34. *T. obscurum*; hæc rara species nunc tandem redetecta est in loco classico Michel., sc. San Casciano ai Bagni, ad occid. oppidi Chiusi juxta fines romanos (: Arcangeli 1878, Levier 1881).
35. *T. maritimum*; Hibern. (plur. loc. lectum, sed an ibi indig. sit incertum videtur). Gall. bor.-occ. Lusit. (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883). Hisp. or. (cum Balear.). Istr. (r.).
- T. nigrocinctum*: Sicil. (Ficuzza, Avola, Termini, Trapani etc.). *T. glabellum* Pr. — *T. syracusanum* Bianca in litt. ad Tineo. — De hac subspecie cfr. Lojacono, mon. d. trifol. Sicil. 135 (*).
36. *T. alexandrinum*; etiam Panormi Sicil. semel lectum (introd.: *T. elatum* aff. *squarroso* Tin. in sched.); synonym. Sering. exclud. videtur; cfr. Lojac. l. c. 138.
38. *T. supinum*: Dobrud. in ripa alta Danubii inter Rassova et Ciernavoda (: Uechtr. Sint.). Bulgar.
40. *T. pallidum*; Bulgar. (Petrohan-Falkan). Ross. mer. (Cherson: Lindemann). — *T. flavescens*; *T. villosum* Pr.; *T. corsicum* Req. exs. (ex Lojac.).
41. *T. diffusum*; Mallorca Balear. (: Barcelò). Sicil. m. Aetna (: Tineo ex Lojac., sed loc. special. ignot.). Virciorova Valach. (: Simkovics). Dobrud. (: Uechtr. Sint.). Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht); Transs. ad *T. expansum* (5) pertinet ex Simonk.
43. *T. tenuifolium*: Pindus (: Heldreich 1885). Creta (: Reverchon 1884).
44. *T. gemellum*: Lusit. bor. r. (: Moller) ex de Mariz.
45. *T. Bocconi*; (*T. semiglabrum* Brot.); indicatur etiam Gall. bor.-occ. (dep. Manche: Lebel), Catal., Balear. (: Rodriguez); Istr.
47. *T. scabrum*: Batav. (: Walraven 1876). Vallach. (Virciorova: Janka). Istr.; Transs. deest ex Simonk. — *T. dalmaticum* Guss. (non Vis.); cfr. Lojac. mon. d. trifol. Sicil. 127. 161 (*).
48. *T. dalmaticum*: Bulgar. (in declivib. calcar. ad Bucina et Kostinbrod: Vandas. Velen). Attic. ins. Pharmacusæ (: Heldr. ex Boiss.). Ins. Jonicæ (Cephalon.: Heldr. et al.; Ithaca: Spreitzenh.); loca occid. ad præced. p. p. pertinent.
49. *T. trichopterum*; Bulgar. plurib. loc. adest et in montosis Balkanis denudatis pr. Orhanie freq. ex Velenovsky.
50. *T. striatum*; exc. etiam Suec. med. (et partim mer.).
51. *T. tenuiflorum* (*T. striatum* var. *elatum* Lojac. mon. d. trifol. di Sicil. 124); Istr. (vid. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 311). Creta (: Reverchon 1884).
54. *T. subterraneum*: Gall. bor.-occ. Ins. Jonicæ (Corfu: Spreitzenhofer 1877).

55. *T. physodes*: Ins. Jonicæ (Cephalon.: Schmidt ex Heldr.; Corfû: Spreitzenh.). Creta (: Reverch. ex Boiss.); Lusit. nuper lectum est (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883), sed probab. introd.; synonym. Boryanum: non omnino certum (cfr. Lojac. l. c. 117).

57. *T. Bonanni*; in Sicil. a recentioribus non lectum est ex Lojacono (1878).

58. *T. resupinatum*: Gall. bor.-occ. Hung. (: Borbás, Hzl.). Moldav. Bulgar. Istr. Genevie (in ruderat. introd.); Transs. a solo Baumgarten indicatur, sed deest in ejus hb. (ex Simonk.). — *T. Clusii*: Lusit. (plur. loc.: de Mariz in bolet. broter. 1883). Hisp. bor. (pr. Salamanca: Clusius), or. (Catal.).

60. *T. vesiculosum*: Balear. (pr. Palma, r.: Barceló). Catal. (Barcellona, introd., ex Colm.); in Pyren. or. non rarum ad Port-Vendres etc. ex Roumeguère (1876). Græc. bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht).

61. *T. multistriatum* (Heldr. hb. norm. 840): Cephal. (ins. Jonic.) supra Same (: Heldreich). Bulgar. (pr. Kistendyl: Vandas. Velen.).

61. *a.* *T. setiferum* Boiss. diagn. ser. I. 2. 32. — Sliven Rumel. or. (: Velenovsky).

63. *T. leiocalycinum* (Heldr. hb. norm. 841): Thessal. (: Haussknecht et Heldreich 1885).

66. *T. strictum*: Hisp. or., mer. Lusit. (de Mariz in bolet. broter. 1883). Istr. Thessal., Pindus Dolop. (: Haussknecht).

68. *T. montanum*: Roman. Bulgar.; Fenn. hab. non nisi in mer.-occ.

69. *T. Balbisanum*: in Ligur. alpinus supra Tenda leg. Huet a. 1854 (ex hb. eur.); de hac (et præced.) specie cfr. Gibelli. Belli in act. taur. XXII. 1887. (*).

70. *T. prætutianum*; hæc species rara nunc etiam in prov. Romana (mts Ernici) lecta est (: Baldini et Pelosi 1886).

71. *T. Thalii*: Hisp. bor. (Picos de Europa, montes de Aliva: Ler. Lev.). Ligur. (Tenda etc.). Abruz. (mte Majella, Pizzo di Sivo etc.). Bavar. Carinth.; Transs. ad *T. glareosum* (77—) pertinet.

72. *T. Parnassi*: m. Rhodope (pr. Philippopel: Velenovsky).

73. *T. saxatile*: Sabaud. (Chamounis, Mer de Glace).

74. *T. hybridum* (*T. formosum* Sav. ex Gibelli. Belli!): Angl. (Hampsh.) culturâ introductum et nunc in pascuis, ad vias etc. obvium. Dan. (ex Lange primitus introd.). Fenn. mer. (in rel. sporadice). Moldav. Dobrud. Bulgar.

75. *T. elegans*: Roman. (Bucuresci etc.). Rumel. or. Bulgar. Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.). Ross. mer. (in gub. Cherson obvium "in pratis humidis et ad silvarum oras": Lindem.), mer.-occ. (: Schmalh.) et balt. ex Klinge; Helv. probab. sæpius introd., quale adest etiam Dan.

77. *T. pallescens*: Helv. (Alpes). Styr. (pr. Cilli: Tomaschek ex Maly). Roman. (alp. Bucieciu vall. Jalomnita). Bulgar. (m. Balkan); Transs. (ex Simonk.) pertinet ad: — *T. glareosum*; *T. Biasolettianum* et *T. cæspitosum* Schur ex Simonk.

79. *T. repens* (*T. nigrescens* Schur ex Simonk.). — *T. umbellatum* Losc. (= forma capitulis proliferis).

**T. prostratum* Bias. in Flora 1829. *T. Biasolettii* Steud. Hochst. ib. 1827; cfr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 312.

**T. Orphanideum*: Aetol. m. Tymphrestes (: Heldreich); ex Lojacono (1878) adest etiam in montosis Sicil. (Messina, Madon.); sec. Freyn (in act. soc. z.-b. vind. 1881) est = sub-species præcedens.

80. *T. Michelianum*: Lusit. (Lisboa: Welw.) ex de Mariz 1884. Campan. (: Terraciano) ex Gibelli. Belli 1887. Sicil., ubi a Lojacono detectum (1878) ad marginem stagni Gurgo di Cerro dicti (Ficuzza), ubi subamphibium, caule imo aquâ immerso et radices emittente.

**T. macropodium*; "species valde dubia et in Sicil. non relecta": Lojac.; cfr. Gibelli. Belli in act. acad. taur. XXII. (1887).

82. *T. Meneghinianum*: Bulgar. (Petrohan-Balkan: Velenovsky 1885 et al. loc.: Vandas. Velen. 1887: ex Vandas est planta characteristica reg. subalpinae). Trieste (adv.). *T. Michelianum* K.; Velen. antea. — *T. polyanthemum* Ten.
83. *T. nigrescens*: Hisp. indicatur etiam Astur., Castil., Catal.; Balear. Istr. Croat. (Fiume: A-M.Smith); Transs. ad *T. repens* (79) pertineat. — *T. polyanthemum* Guss. inar. ex Lojac. (etiam Sicil. pr. Palermo etc.).
87. *T. parviflorum*: Andal. (: Lange). Catal. (: Compan.). Hercyn. (: Hampe). Morav. mer. (: Oborny). Austr. p. d. (Wien: Halacsy, Heimerl). Dobrud. (: Ue. S. et al.); Galic. vix adest teste Knapp.
89. *T. cernuum*; Hisp. etiam mer. (et or.) adest.
90. *T. glomeratum*: Gall. bor.-occ. Istr. Græc. (Nauplia, Methana, Thessal., Pindus Dolop.: Hausskn.).
91. *T. suffocatum*: Gall. bor.-occ. Balear. præs. Menorca (: Rodriguez). Attica (Athen., Aegina: Heldreich).
- 93 * *T. Savianum*; cfr. Lojacono, monogr. d. trif. di Sicilia. 1878. 98 (*).
94. *T. Lupinaster*: Ross. mer.-occ. (: Schmalhausen).
95. *T. alpinum*: Cantabr. (Santander: Ler. Lev.), Arag., Catal.; Transs. non crescit ex Smk. (deest in hb. Bmg., nec in locis a Bmg. citatis lectum est).
96. *T. badium* (*T. spadiceum* auct. transs. ex Smk.): Jura. Bulgar. m. Vitos.
97. *T. spadiceum*: Bulgar. (m. Vitos; Petrov Han); Suec. mer. in sola Ostrog. lectum est, sed adest etiam in bor. (Jemtia, Angerm.); Transs. ad præced. spectat.
99. *T. Boissieri*: Ithaca (ins. Jonic.) secus viam a Marina ad Vathy (: Spreitzenh. 1877). Arch. turc. ins. Karpathos (: Pichler).
100. *T. brutium*; — *T. mesogitanum*, quod sec. Grsb. spicil. addit. est == *T. procumbens* var. pauciflor. Grsb. (quod ab icone *T. brutii* Ten. nap. non recedit), a *T. brutio* speciè diversum esse probavit cl. Velenovsky.
101. *T. aurantiacum*; in Messen. ins. parva *Sphakteria* lectum est a cl. Lacaita.
102. *T. patens*: Bulgar. (Knezevo: Vandas. Velen.): adest etiam Istr., sed Helv. non nisi in mer. (ital.); Transs. ad *T. procumbens* (104) pertinet.
103. *T. agrarium*: Epirus (cl. Chodzes ex Heldr. 1879); deest in Fenn. bor.
103. a. *T. Velenovskyi* Vandas in diar. (sitzb.) soc. sc. boh. 1888. 441 (*). - Bulgar. in silvaticis reg. mont. (: Vandas. Velen.: *T. mesogitanum* Velen. antea). Serb. (: Bornmüller ex Vandas).
104. *T. procumbens*; *T. patens* auct. transs. ex Smk.
**T. Schreberi* Jord.; *T. agrarium* minus G. G.; *T. procumbens pumilum* Gren.
105. *T. Lagrangei*: Creta (: Reverchon). Karpathos (: Pichler). Attica (Heldr. hb. norm. 916); ex Heldreich non species est, immo vix varietas.
105. a. *T. thionanthum* Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1885. 71 (*). — Attica, Nauplia, Thessal. (: Haussknecht 1885).
106. *T. Sebastiani* Sav. in diar. med. Flajan. (1815): Sicil. (Ficuzza: Lojac. 1878, Busambra: Citarda). Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.); loca istriaca vid. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 314.
107. *T. minus*; in Suec. non ultra Smoland. et Gotland. lectum est; adest in Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.). — *T. filiforme* auct. transs. et *T. micranthum* Schur ex Simonk.
108. *T. filiforme*: Norv. mer. in rupibus maritimis ad Christiansand (: Murbeck; vid. Bot. Not. 1885. 76--78). Scot. (ex Arth. Bennett! in litt.). Gall. bor.-occ. Istr. Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.). Arch. turc. ins. Karpathos (: Pichler).

23. *Dorycnium*. 1. *D. hirsutum*: Istr.; Lusit. a solo com. de Hoffmannsegg (in prov. de Monchique) lectum dicitur.

2. *D. latifolium*: Bulgar. or. (a Bornmüller detectum).

4. *D. herbaceum*: Helv. mer. (cant. Ticino, r.). Moldav. Dobrud. Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). *D. suffruticosum* auct. transs. (ex Simonk.!).

**D. sabaudum*; Transs. (et alia quedam oriental.?) ad *D. herbaceum* ipsiss. (quod igitur unicum *Doryenium* in Transs.) pertinet ex Simonk.

**D. gracile*; — *D. decumbens* Jord. (*D. suffruticosum* K., auct. austr.-hung., et reverà potius subspeciem *D. suffruticosi* sistit): Catal. Bulgar. Bosn. (: GBeck). — *D. Jordani*; *D. Jordanianum* Willk. Lge.

5. *D. suffruticosum*: Gall. mer.-occ. (Gironde). Bavar. plur. locis (ex Geke in toto territ. Isar. et Loisach.). Morav. mer. et med. (interdum abunde); typicum omnino occidentale dicitur, ultra Rhodanum (Rhône) non progrediens. — *D. corsicum* Jord. (ex hb. eur.).

**D. decumbens* Jord. (1846); vid. supra sub *D. gracile* (4 *).

24. *Lotus*. 1. *L. tetragonolobus*: Lusit. (Bragança) ex de Mariz.

**L. pseudopurpureus* Uechtr. sub *Tetragonol.* (1844). Algeciras Hisp. mer. - *Loto tetragonol.* simillimus dicitur.

4. *L. siliquosus*; indicatur etiam Sard. Istr. (r.). Dobrud. (Ue.S.).

5. *L. conjugatus*; Matriti etiam a Lagasca et al. lectus dicitur et in Hisp. mer. (rr.) indicatur; in Mallorca (barranco de Soller) nuper detectus est a Burnat et Barbey; vid. eor. Notes sur un voyage botan. etc. 1883. 37, 38 (*), ubi descr. plenissima et observationes de speciebus proximis.

8. *L. edulis*: Lusit. (Welwitsch ex de Mariz).

9. *L. creticus*: Ital. mer. (Terra d'Otranto: HGroves).

10. *L. commutatus*: Ital. mer. (Terra d'Otranto: HGroves). — *L. Salzmanni*: Lusit. (r.).

11. *L. cytisoides*: Sard. Croat. (Fiume in rupibus marit.: A-M.Smith). — *L. argolicus*; extra Argolin lecta est ad Phalerum Atticæ a cl. Haussknecht.

14. *L. uliginosus*; Norv. rr. lectus est, Succ. in sola mer.; adest etiam in Hisp. multa, Sard. (: Gennari) et Græc. bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht). — *L. pedunculatus*: Lusit.

15. *L. lamprocarpus*: Creta (Heldr. ex Boiss.).

16. *L. tenuis*; *L. gracilis* Schur ex Simonk.

**L. decumbens*; Sard. a Reverchon lectus est.

**L. silvaticus* Wierzb. sec. Hzl. (Magyar.). - Banat.

17. *L. corniculatus*; adest in Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi ex Norman usque ad lat. 71° lectus est, et raro etiam in Lapp. Lul.

**L. Delortii*: Lusit. (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883).

18. *L. glareosus*: Lusit. Serra da Estrella (Ferreira ex de Mariz l. c.).

19. *L. longesiliquosus*; non nisi pr. Malaga (: Willkomm) et in Balear. lectus est.

20. *L. albus* (= *L. strictus* F. M. ex Boiss.); hab. in pratis salsis Bulgar. pr. Sliven.

22. *L. arenarius*; in Lusit. (costa da Trafaria) a solo Brotero lectus dicitur.

23. *L. angustissimus* (*L. oligoceras* Brot. ex de Mariz); Lusit. (Coimbra) a solo Brotero lectus est sec. de Mariz. Hisp. adest etiam in or. et in mer. a pluribus lectus est. Gall. bor.-occ. Istr.; Transs. deest ex Simonk.

24. *L. hispidus*; Angl. etiam in Hampsh. lectus est (: Townsend); Hisp. etiam in mer. — *L. subbiflorus* Lag. in P. syn. (Balear.; P.). *L. parvifloro* simillimus dicitur (P.).

**L. Levieri*; detectus a cl. Levier 1873 in agris siccis inter pagum Altopascio (pr. Lucca) et lacum Sibolla; reliqua vid. apud Th. de Heldreich "descrizione di una nuova specie di Lotus etc." l. c. (*).

25. *L. parviflorus*: Balear. (Menorca: Rodriguez).

26. *L. castellanus*: Lusit. plur. loc. (*L. angustissimus* Brot.) ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883.

27. *L. conimbricensis*: *Hisp. mer. (rarius)*, *Beotia theb. (: Heldr.)*, *Creta (: Reverchon)*, *Karpathos (Arch. turc.)*; *Pichler*. — *L. glaberrimus* etiam in statu spontaneo lectus est e. gr. in *Gall. mer. dep. Herault (rr.) ex Loret*.

28. *L. ornithopodioides*: *Lusit. (prov. de Tavira) ex Welw.*; *Istr. mer. (r.)*, *Croat. (: Fiume: A-M. Smith)*.

30. *L. pusillus*: *Ital. mer-or. (Taranto, in litoribus: Lacaita)*.

25. **Coronilla** 1. *C. Emerus*: *Bavar. (Alpes r. et pr. Wasserburg region. Bodan.)*, *Lothar. (rarius)*, *Normand. plur. loc. inquil. (e cultura)*, *Girond. Hisp. bor. et centr. (r.)*, *Istr. Bulgar. (inter Sofia et Konjavo et in rupibus calcareis supra Konjavo: Vandas. Velen)*.

2. *C. emeroides*: *Banat. vall. Kazan (: Borbás 1874)*, *Bosn. mer. (in rupibus m. Trebovic: GBeck 1885)*, *Serb. (: Pancic) et Monten. (: Pantocsek) ex Boiss.*, *Bulgar. in jasminetis ad Varna (: Bornmüller): Comment. 93*.

3. *C. juncea*: *Lusit. mer. (ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883)*.

4. *C. valentina*; adest etiam in *Ital. med.*

7. *C. coronata*: *Germ. usque in Hannover, ubi terminus speciei borealis in m. Siebenbergen pr. Alfeld indicatur*; *Helv. non nisi in Jura et Bundia (cant. Graub) lecta est*; *Transs. indicatur a Baumgarten, sed in ejus hb. deest*.

8. *C. vaginalis*; *Transs. non adest ex Simonkai*.

9. *C. minima*: *Gall. mer.-occ. (St-Laurent pr. Bourg. dep. Gironde)*; *Transs. indicatur a Schur post Bmg., sed (ex Simonk.) ibi non crescit*.

**C. lotoides*; indicatur etiam *Hisp. bor.*

11. *C. varia*: *Istr. Roman. Bulgar. (: Skorpil, Vandas)*, *Rumel. or. Carel. or. (ex Hjelt 1877)*

11. *a. C. elegans* *Panc. : Serb. (: Pancic)*, *Dobrud. (reg. silv. inter Grecii et Ciganka: Ue.S., Jka)*; *Bulgar. pr. Razgrad leg. Velenovsky, qui dicit speciem bonam esse, foliolis magnis et calyce facile distinctam*.

26. **Arthrolobium** 1. *A. scorpioides*: *Gall. mer.-occ. (Gironde)*, *Istr. Dobrud. (r. inter Ciucarova et Grecii: Uechtr. Sint.)*, *Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879)*; *Cephal. etiam a Heldreich lectum est*.

2. *A. repandum*: *Hisp. mer. (Cadiz: Boiss. Reut. ex Boiss. diagn. 1856)*.

27. **Ornithopus** 1. *O. compressus*; *Hisp. bor. adest*, *Gall. bor.-occ. (Normand, rarius)*, *Ins. Jonic. (Corfù: Spreitzenh.)*; indicatur etiam *Batav. (introd.?)*.

3. *O. sativus*; indicatur etiam in *Gall. or. (dep. d. Vosges: Beshier, probab. introd.)*.

4. *O. perpusillus*: *Lusit. (ex de Mariz in bolet. broter. 1883)*, *Hisp. etiam or. (cum Mallorca: Barceló) et mer. (rarius)*, *Austr. Helv. raro adest (cant. Luzern)*.

27. *a. Hammatolobium* *Fz! ill. taur. I. tab. 1. — 1. H. græcum* *Heldr. in sched. (1876)*; *Boiss. or. suppl. 171. (1888)*. - *Lacon. m. Taygetus, in fissuris rupium (: Pichler)*.

28. **Bonaveria** 1. *B. Securidaca*: *Lusit. (Coimbra: Moller)*; indicatur etiam in *Hisp. mer. (r.)*, *Sicil. (: Seguenza ex Nicotra prodr. messan.)*, *Istr.*

29. **Hippocrepis** 1. *H. valentina*; *planta rariss., hucusque non nisi ad Denia (prov. Alicante) lecta*.

3. *H. comosa*; in *Bavar. etiam extra Alpes adest*, *Austr. Istr. Ross. balt. (Curland., Osil.) ex Klinge*.

7. *H. multisiliquosa*: *Balear. (Menorca: Marès)*.

9. *H. ciliata*: *Lusit. mer., rarius (: Daveau)*.

10. *H. unisiliquosa*: *Hisp. centr.*; *Transs. vix adest ex Simonkai*.

11. *H. biflora*: *Cephal. ins. Jonic. (: Spreitzenhofer ex Heldr.)*.

Obs. De hac, ut de ceteris hujus generis speciebus annuis, cfr. Rouy in Le Natural. 1888. 85, 86.

30. **Scorpiurus.** 2. *S. muricata*; etiam *Hisp. or. indicatur.*

4. *S. subvillosa*: *Gall. mer.-occ. (Gironde, r.).*

31. **Colutea.** 1. *C. arborescens*: *Lothar. (r.). Helv. occ. Bulgar. (in jasminetis ad Varna; Bornmüller); Germ. non nisi in Badia vere spontanea dicitur.*

33. **Robinia.** 1. *R. frutescens*; adest etiam in *Ross. centr. (gub. Kursk).*

34. **Galega.** 1. *G. officinalis*; *Germ. vix nisi (cultā et) efferata obviam venit (in Siles. mer. tamen spontanea). Hisp. indicatur etiam in bor. et centr. (rarius). Roman. Bulgar.*

2. *G. patula*: *Ross. mer. (gub. Cherson) ex Lindemann.*

35. **Glycyrrhiza.** 1. *G. glabra*: *Hisp. bor. (Lusit. plur. loc. ex Brot., sed forse culta). Moldav. Dobrud. Cephal. (freq. in demissis prope mare ex Heldr.).*

2. *G. glandulifera* (*Orph. exs. 1037*); *Galiz. vix adest ex Knapp.*

3. *G. echinata*: *Dobrud. (in reg. danub. copiosa). Bulgar. (: Bornmüller). Rumel. or. (ex Velen.). Bessarab. (: Eichwald ex Lindem.). Ross. mer. (gub. Cherson), mer.-or. (Sarepta; Becker).*

36. **Psoralea.** 1. *P. bituminosa*: *Balear. Gall. mer.-occ. (Gironde) raro. *P. plumosa: Gall. mer. (dep. Alpes-Marit.). Bulgar. in demissis (P. bituminosa Velen. antea).*

3. *a. P. dentata* *DC. (P. hispanica Lag.). Hisp. mer. — P. polystachya Poir. (Cadiz, Rota); ex Colm.*

37. **Astragalus.** 1. *A. vesicarius*: *Alpes-Marit. (Caussols, les Claps supra Grasse: abb. Goaty). Dobrud. (passim). Ross. etiam centr. (gub. Kursk). — A. venostinus Kern. (ex Jka).*

4. *A. albicaulis*: *Ross. centr. (gub. Kursk, in cretaceis).*

4. *a. A. tauricolus* *Boiss. var. niveus Barb. in bull. soc. vaud. XXI. (1885). - Arch. turc. ins. Karpathos (: Pichler 1883).*

6. *A. asper*: *Moldav. Dobrud. (vulg.).*

7. *A. austriacus (A. sulcatus Schur ex Smk.): Moldav. Dobrud. Ross. centr. (gub. Kursk).*

9. *A. bayonensis*: *Gall. bor.-occ. (Normand. in dunis ad Merville pr. ostium flum. Orne, ubi a Dr Le Sauvage detectus et nunc copiosus: Morière). Hisp. bor.-or. (Viscaya pr. Fuenterrabia: Franqueville).*

10. *A. arenarius*; *Germ. præcip. bor.: Mecklenb., Brandenb., Pommern, Posen, Preussen, Schlesien; cet. prov. Saxon. et in Bavar. ad Nürnberg. Ross. mer.-occ. (: Schmalhausen); ad Uleåborg Fenn. bor. (et Slite Gotland) cum saburra navali introductus dicitur; Transs. ad A. dacicum (16) pertinet ex Smk.*

14. *A. Onobrychis*: *Moldav. Dobrud. — A. onobrychioides MB. (Ross. mer. gub. Cherson: Lindem.).*

15. *A. chlorocarpus*: *Dobrud. Bulgar. (pl. loc. freq.). Rumel. or. (pr. Sliven etc.).*

16. *A. dacicus* (1858); *ex Smk. = A. linearifolius P. (1807), in Consp. meo sub præced. cum dubio allatus.*

17. *A. Bungeanus*; *planta transsilv. (A. aduncus Jka) ad speciem præced. pertinet ex Smk.*

17. *a. A. odoratus* *Lam. enc. I. 311. - Ital. centr. (Appen. marsici: Levier) ex Boiss. or. suppl.*

18. *A. leontinus*; *Helv. non nisi in Alpihus vales. adest. Comment. 94.*

25. *A. dolicophyllus*: Dobrud. (r. in declivibus saxosis pr. Kiermet et Kalika: Ue.S.; ad lacum salsum Ratzin: Jka). Ross. mer. (Odessa) et mer.-occ. ex Lindem.

28 * *A. sareptanus* Becker in bull. mosc. 1882. *A. rupifragus* var. *caulescens* CAMey. - Ross. mer.-or. (pr. Sarepta: Becker 1881).

29. *A. monspessulanus*: Hisp. bor.-or.; centr. (r.). Gall. bor.-occ. (Norm, r.); Helv. in sola mer., mer.-occ. adest.

**A. gypsophilus* Rouy. exc. bot. esp. 1883. 39 (*). *A. incanus* Rth (non L.). - Hisp. centr. (Aranjuez: Rouy).

30. *A. chlorocyaneus*: Lusit. bor. (*A. montanus* Brot. ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883).

31. *A. Wulfenii* (A. illyricus Bernh. 1836): Bosn. (m. Bahtjevica: Blau ex GBeck). Herceg. (Hensch ex Vandas). Bulgar.

33. *A. macrorhizus*: Hisp. bor.-or. (m. Peña Redonda Cantabr.: Boiss. Ler. Lev. 1879); Lusit. ad *A. chlorocyaneum* pertineat.

37. *A. Sprunneri*: Rumel. or. pr. Slivno ex Velenovsky.

39. *A. virgatus*: Dobrud. (in reg. litor. aren. freq.). Ross. centr. (gub. Kursk).

41. *A. vimineus*: Dobrud. (ad ripam altam Danubii inter Rassoia et Ciernavoda: Ue.S.). Bulgar.

43. *A. subulatus*: crescit etiam in Ross. centr. (gub. Kursk, r.).

48. *A. angustifolius*: Rumel. or. in Sedlarovo-Balkan ex Velenovsky (var.).

49. *A. massiliensis*; in Sard. lectus est 1858 a Schweinfurth, 1882 a Reverchon (*A. tragacantha* Rev. exs. 214). — *A. Salvatoris*; hab. in Catalon. (: Salvator, Costa).

50. *A. Poterium* (*A. balearicus* Pourr. hb.); adest tam in litoralibus quam in montibus summis Balearium.

51. *A. sirinicus*; hæc species Apenn. centr. et mer. priva est, nam planta corsica et sardoa pertinet ad *A. genargenteum*, qui saltem subspeciem sistit et restituendus:

**A. genargenteus* Mor. elench. *A. sirinicus* Mor. fl. sard., G.G. (non Ten.). - Sard. m. Genargentu versus 1800 metr. s. m. Cors. mont. inter 1000 et 2000 metr. De hac et speciebus duabus præced., sæpe commutatis, vid. Burnat et Barbey notes sur un voy. bot. balear. 20, 21 (*).

52. *A. tymphresteus*: Pindus Dolop. alp. (: Haussknecht).

53. *A. alopecuroides*; locus gallicus (unicus) est in silva Boscadon ad pagum Savines inter Gap et Embrun, ubi planta abundat (: Loret); hæc species rara in Pedem. (vallis Cogne) detecta est.

55. *A. ponticus*: Dobrud. (in desertis et pratis silvaticis freqq.: Ue.S.).

58. *A. aristatus*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.).

59. *A. cephalonicus*; endem. ins. Cephalon., ubi regionem super. m. Aeni (hodie mte Nero) inter 3000 et 5500' inhabitat; sec. Boiss. est var. minor speciei præced.

65. *A. Parnassi*: Phthiotidis m. Oeta (: Heldr.). Thrac. ad Hæmum pr. Slivno (: Jka).

71. *A. veluchensis*: Pindus Dolop. et centr. alp. (: Haussknecht).

72. *A. galegiformis*: Moldav. Ross. mer.-occ.; Transs. deesse videtur.

73. *A. glycyphyllus*; adest etiam in Thessal. (m. Pelion, ubi speciei terminus mer.: Heldr.), in ins. Ischia neapol. (copiose: Lacaita) et in Lusit. (Fundão: R. da Cunha ex de Mariz 1883).

78. *A. utriger*: Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker exs. a. 1882).

81. *A. exscapus*; Transs. ad seq. (81. a) pertineat.

81. a. *A. transsylvanicus* Barth in Schur phyt. (1876); Jka in anal.

mus. nat. hung. 1884. *A. exscapus* bot. transs. ex Smk. *A. pubiflorus* Jka (ex Smk.). - Transs. centr. in herbis collinis.

82. *A. pubiflorus*: Dobrud. (in desertis, rarius; Ue.S.). Transs. ad præced. (81. a) pertinet.

82. a. *A. maroniensis* Dingl. in Flora 1881. 382. - Thrac. mer. inter Mucri et Maronia (: Dingler).

85. a. *A. ictericus* Dingl. l. c. - Thrac. m. Rhodope (: Dingler).

86. *A. dasyanthus*: Dobrud. (in deserto inter Nalbant et Katalui; Ue.S.). Bulgar. (in collibus arenosis ad Varna: Bornmüller). — *A. stollenburgensis* (Lerchenf.) Schur.

88. *A. oroboides*; Carinth. adest! (Pacher 1852, Jaborn. et al.). Styr. hab. in m. Rothkogel pr. Turrach. Comment. 95.

89. *A. alpinus*: Ross. arct. (etiam Nov. - Seml. et Waigatsch: Kjellm. Lundstr. 1880), sed cum specie seq. (*A. arcticus*) comparand. Styr. etiam in montib. Sulzbach. adest. - *Oxytropis lapponica* Schur (ex Smk.).

91. *A. sulcatus* (A. Jacquini Jka 1886): Ross. mer. (gub. Charkow, Cherson), mer.-or. (Sarepta); Transs. ad *A. austriacum* (7) pertinet ex Smk.

92. *A. depressus*: Arag. et Navar. (: Asso, Loscos, Lacoizq.). Cantabr. (Santander: Ler. Lev.). Alpes-Marit. (reg. alp., r.). Helv. etiam in Freiburg, Bern, Bernerobel. Bosn. (alp. m. Prenj Planina: GBeck). Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht).

93. *A. leucophæus*: Creta (m. Ida: Heldr.). -

94. *A. Cicer*: Roman. Bulgar.

95. *A. danicus*; Hibern. in sola ins. Arran lectus est (: Hart 1875). Suec. non nisi in Scan. mer.-occ. (inter Malmö et Lomma) et Smoland. ad Calmar obviam venit; Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., rarius). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.).

98. *A. Haarbachi*: Bulgar. ad Razgrad (: Velen.). — ? *A. argolicus* Hsckt in litt. 1889. (Argolis inter Naupliam et Port Tolon: Haussknecht).

98. a. *A. pamphylicus* Boiss. or. II. 239. - Arch. ins. Hydra (*A. peregrinus* Heldr. exs.) ex Boiss. or. suppl.

100. *A. hamosus*: Istr. Dobrud. (in desertis ad Küstendje, Kaleh: Ue.S.).

103. *A. bæticus* (Orph. exs. 1095); Balear. non nisi in Menorca lectus est (: Rodriguez, Marès, Barceló).

108. *A. Stella*: Græc. (isthm. Corinth.: Haussknecht).

110. *A. Glaux* (*A. hypoglottis* Dsf.); Gall. mer. (Herault) nunc etiam ad Capestang (: Castel) et Lunel (: Barrandon) lectus est.

111. *A. granatensis*: Lusit. (: Brotero, Lobo, de Carv.).

116. *A. sesameus*: Lusit. (Castromarim; Welw. ex de Mariz); Istr. dubius est, a solo Biasoletto (ex Koch) lectus et probab. casu introd. (sic ex Freyn).

117. *A. pseudostella*; etiam in ins. Karpathos (Arch. ture.) lectus est (: Pichler). Heldr. hb. hellen. 121 (ex ins. Pharmacus.); hb. norm. 843 (ex Athen.).

38. **Phaca**. 2. *P. frigida* L. syst. ed. X. 2. 1173 (in opere Species Plantar. nominato specie seq. subsumitur); Lapp. etiam in mer. (r.) lecta est. Helv. non nisi in Alpibus obvia. - *Astragalus frigidus* Bge.

**P. umbellata* Nym. consp. *Astragalus umbellatus* Bge.

3. *P. alpina* L. syst. ed. X. (1759); Wulf. ap. Jacq. (1781): Alpes-Marit. (reg. alp., rarius). Bavar. (Alpes). Helv. (Alpes nec alibi). Suec. bor. (Medelp., Jemtia, Dalec.). Transs. deest ex Smk.; in Suecia, scil. prov. Medelpad, primum immotuit clo Dusen in itinere a. 1880; vid. "*Astragalus penduliflorus* Lam., neu für die Flora des nördlichen Europa von K.F. Dusen" in bih. vet. ak. handl. 1881 (*), ubi auctor etiam geographiam, anatomiam et synonymiam speciei tractavit.

39. **Oxytropis**. 1. *O. campestris*; *Phaca alpina* Bmg. ex Smk.! — *O. sordida*; potius subspecies videtur.

2. *O. Halleri*; Galic. (ex Knapp) vix adest. Transs. ad var. *O. velutina* (*O. Halleri* auct. transs.) pertinet. — *O. prenja* GBeck in annal. mus. vind. (1887) II. 122. (Bosn. mer. alp. m. Prenj Planina: GBeck).

**O. intermedia* Brugg. in annal. (jahresb.) soc. nat. scrut. bund. 1882. 64 (*). *O. Steigeri* Brugg. antea. *O. uralensis* auct. helv. p. p. *Astragalus intermedius* Host. au. - Salisb. alp. (Host). Helv. Sabaud. (alp.).

3. *O. foetida*; Helv. non nisi in Alpib. vales. obvia.

4. *O. pilosa*: Catal. (pr. Nuria: Comp.). Moldav. Dobrud. Transs. plur. loc. lecta (*O. campestris* ibi rara est); Suec. (mer.) adest in sola parte orientali: Gotland., Ostrog., Smoland.

10. *O. pyrenaica*: Cantabr. (Picos de Europa: Ler. Lev.).

**O. generosa* Brugg. l. c. 66 (*). *O. montana* auct. ital. saltem quoad plantam mtes Generoso. - Mte Generoso Helv. mer. (Salis-Marschlins 1838, Siegfried 1869).

11. *O. montana*: mtes Sulzbach. Styriae. — *O. carinthiaca* Fisch.-Ooster (in Flora 1844), quæ in Conspectu meo sub seq. *O. lapponica* militat, huc pertinet sec. specim. Lageri, sed ex Pacher propria species est, in Carinth. non rara.

**O. Jacquini*; — *O. carpathica* (*O. montana* Bmg. et auct. transs.): Galic. supra terminum Mughl.

12. *O. lapponica*: Sabaud. (m. Iseran ex Rouy). Carinth. (alp. Pasterze et Leiber pr. Heiligenbl.); in Helv. nondum lecta est ex Brügger (locus Helv. mer. ad 10 * pertinet, Transs. ad *Astragal. alpinum*). — *O. carinthiaca*; vid. sub *O. montana* (11).

**O. neglecta*; Pedem. (p. p.?) ad seq. pertinet; ad plantam neapol. forse pertinet *O. Gaudini* var. *samnitica* Arcang. (e mte Sirente Abruz.).

13. *O. Gaudini* Bge in Beitr. z. fl. russl. (1851). *O. cyanea* Gaud. (non MB.). - Delph. (H.-Alpes). Pedem. (m. Cenis). Alpes-Marit. (reg. alp., rarius: Ardonio; in mt Bertrand pr. col di Tenda leg. Lacaita). Vales. Carinth. (rarius). alp.

14. *O. triflora* Hpe ap. Sturm h. 49. - Styria. Carinth. Carn. Tyrol. alp.

X *O. hybrida* Brugg. (1882) = *campestris* + *Halleri*. (Helv.).

42. *Hedysarum*. 3. *H. capitatum*: Lusit. (Silves: Daveau). Alpes-Marit. (Menton, Nice); Cephalon: etiam a Heldreich lectum est.

6 * *H. exaltatum*: Pedem. in alpinis (a Moris lectum).

12. *H. grandiflorum*: Ross. centr. (gub. Kursk).

15. *H. argenteum*: Ross. mer. (gub. Cherson).

43. *Onobrychis*. 4. *O. sativa*: Gall. or. (Côte-d'Or) in pratis, collibus incultis etc.; Moldav. Dobrud. (vulgata: Ue.Sint.). Bulgar.; de hac specie (et proximis) cfr. observationes cl. Haussknecht in diar. (mitteil.) soc. bot. thur. 1885. — *O. inermis* (ex Smk.) propior est *O. arenar.* (6).

**O. montana*: Ross. mer. — *O. (m. var.) scardica* Grsb. it. *O. sativa* var. *scard.* Grsb. spic.: m. Scardus (Grsb.), m. Velucho Aetol. (Heldr. exs. it. græc. 1879). Bosn. mer. (m. Treskavica: GBeck).

**O. transilvanica* Simk. term. füz. 1886; Simonk. enum. 191. (1886). *O. montana* auct. transs.

5. *O. alba*: Valach. (Virciorova): Borbás 1873. Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.). — *O. echinata* probab. est speciè diversa, colles calcareos, usque ad mare, inhabitans (Terra d'Otranto: Lacaita), dum *O. alba* typ. in Ital. mer. planta montana est.

**O. Visianii* Borb. 1877. (*O. Tommasinii* Borb. 1876. non Jord.): Fiume Croat.

**O. pentelica* Hsskt in mittel. soc. bot. thur. 1886. 71 (*). Heldr. hb. norm. 920. — Attice m. Pentelikon (: Haussknecht 1885).

6. *O. arenaria* Ser. ap. DC. *Hedysarum arenarium* Kit. ap. W. (1813): Dobrud. Ross. mer., mer.-occ. — *O. supina*; *O. Gaudini* Jord.

11. *O. laconica*: Euboeæ m. Delphi et Phthiotidis m. Oeta (: Heldr. ex Boiss.).

12. *O. ebenoides*; — ? *O. Halacsyana* Heldr. hb. norm. 922. (1887). Attica.

12. a. *O. calcarea* Vandas in diar. (sitzb.) soc. scient. bohém. 1888. 443 (*). - Bulgar. (in saxis calcar. pr. Kostinbrod etc.: Vandas. Velen.).

15. *O. argentea*: Murcia, Jaën (r.).

15. *a. O. Reuteri* Leresch in Ler. Lev. deux exc. 1880. 73 (*). - *Hisp. centr. bor.*, ad radices montium cantabr. (pr. Cervera del Rey, Alar del Rey; Leresch 1879; jam 1858 ad Aguilar del Campo et Reynosa a Boiss. Reut. lecta erat, sed inedita jacebat in hb. Boiss.).

16. *O. gracilis*: Moldav. Dobrud. (in desertis et pratis silvaticis freq.: Ue.S.). Bulgar. Ross. mer., mer.-occ.; Transs. ad *O. arenariam* (6) pertinet ex Smk. **O. Tommasinii*: Croat., in pratis et collibus ad Fiume freq. (: A-M. Smith).

16. *a. O. pindicola* Hsck in mitteil. soc. bot. thur. 1885. 71 (*). - *Pin-dus tymph.* in reg. alp. et subalp. (: Haussknecht 1885).

17. *O. horrida*; locus Castil. dubius est.

19. *O. cretica* (1814). *O. aequidentata* d'Urv. enum. (1822). Hedys. aequident. S.S.: Dalm. (a Pichler lecta 1885).

**O. foveolata*, - *O. crista galli* Ten.

20. *O. caput galli* (Heldr. hb. norm. 924); Lusit. etiam ex de Mariz (1883) cum dubio citetur.

46. *Cicer.* 2. *C. Montbretii*; rarissimum, quale in rupestribus constantinopolitanis, Jun. 1844, leg. Noë (exs. itin. or. 174).

47. *Pisum.* 1. *P. elatius* (*P. arvense* fl. gr. ex Boiss.): Bulgar. (Podujena; Skorpil ex Vandas); Lusit. rarius adest (Lisboa; Welw.; Tancos; Daveau). -- *P. biflorum* (*P. elatius* K.p.p.) est saltem subspecies; restitutum est a Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 323. — *P. Tuffetii* hab. in dep. Char.-Infer.

2. *P. arvense*; in Ross. (ex Trautv.) non nisi cultum occurrit; in Scand. vix nisi e culturâ efferatum vel cum cerealibus satum adest. (Island. non colitur sed interdum sponte suâ seritur ex Strömf.).

48. *Lathyrus.* 2. *L. tingitanus*: Lusit. valle de Cannas prov. de Coimbra (: Lobo ex de Mariz).

4. *L. latifolius*: Gall. or. (Côte-d'Or). Helv. mer.-occ. Istr. Styr. rarius (ex Maly). Morav. med., mer. (: Oborný). Moldav. Bulgar. (: Vandas. Velen.); planta rossica (exc. mer.?) dubia est (ex Trautv.) et forse ad *L. platyphyllum* (7*) spectat.

6. *L. rotundifolius*; planta transsilv. ad præced. (4) pertinet ex Smk.

7. *L. silvestris*; exc. etiam Fenn. bor., med.

**L. platyphyllum*: Lusit. (de Mariz 1883). Germ. mer. Fenn. mer. (Nyland). Siles. rr. (: Uechtritz 1852). Galic. Roman. Bulgar.

8. *L. heterophyllus*: Suec. med. (prov. Neric.). Siles. raro (*L. latifolius* Wimm.). Germ. mer. (mult. loc.). Lusit. (Bragança, mont.) ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883; Transs. ad præced. (7*) pertinet ex Smk.

9. *L. cirrhosus*; etiam Catal. plur. loc. lectus est.

10. *L. tuberosus*; Norv. non indicatur et in Suec. forse ubique primitus introd. et e cultura inquil. *Hisp. præ.* in centr. et bor. indicatus est, et antiquitus e Lusit. innotuit (: *Vicia lusitanica* Munting et al.).

12. *L. maritimus*: Ross. balt. et arct.; Suec. med. in sola Suderm. (marit.) adest; mer. in litorib. Scan. et Bahus.

13. *L. palustris*: Gall. mer.-occ. (r.). Ross. bor. (: Ruprecht). Moldav. Dobrud. — *L. emarginatus* Schur ap. Barth (ex Smk.).

15. *L. pratensis*; Lusit. adest! (in prov. de Bragança; Ferreira ex de Mariz); deest in Lapp. p. d., sed adest in Finnm. usque ad Tromsö.

**L. Hallersteinii*; *L. pratensis* var. grandistipulus Roch. (1823). *L. sepium* K. (olim), Andrie, Grsb. iter (non Sep.); etiam Moldav. lectus est.

17. *L. angulatus*; add. Gall. or. (Côte-d'Or), sed Helv. exclud.

18. *L. sphaericus*: Dan. (ad Hammershus, sed ex Lge forse casu introd.). Scan. (m. Kullen). Istr. Bulgar. (in decliv. calcar. ad Kostenbrod parce; Vandas.

Veleu.). Ins. Jonic. (Corfu: Spreitzenh.; Cephal.: Heldr., Schmidt). Taur. (ex Trautv.); Transs. ad L. Nissolia (34) pertinet ex Smk.

19. *L. inconspicuus*; — *L. stans*: Istr. Rumel. or.

20. *L. setifolius*: Istr.; Corfu et Ithaca (: Spreitzenh. 1877). Taur. (ex Trautv.); Lusit. a solo Brotero lectus videtur.

21. *L. ciliatus*: Balear., Murcia.

22. *L. hirsutus*: Helv. plur. Istr. Bulgar. Dobrud. Moldav. Galic. (rr.).

25. *L. Gorgoni*: Sard. (pr. Cagliari: Gennari).

28. *L. Cicera* (Orph. exs. 1122): Istr.

29. *L. sativus*; "in Ross. mer. colitur et inter segetes offenditur" (Trautv.); "inter segetes Moldav. totius" (Guebh.). — *L. amphicarpos* Brot. non L.; *L. sativus* var. *stipulaceus* Willk. Lge. (Lusit. Hisp. mer.).

32. *L. articulatus*: ins. Caprera (a cl. Gennari lectus).

34. *L. Nissolia*: Germ. bor. (Marchia), mer. (Bavar., Würtemb.). Lusit. bor. (: Ferreira ex de Mariz 1883). Istr. Morav. (r.). Dobrud. (Teke et Ciucarova: Ue.S.). Bulgar. — *L. gramineus*: Hung.; Istr. (: Freyn).

35. *L. Aphaca*: Istr. Dobrud. (in ripa alta graminosa Danubii: Ue.S.). Bulgar.

**L. affinis*: Rumel. or. (ex Velenovsky 1887).

**L. floribundus* Velen. in oe. b. z. 1886. Rumel. or. (pr. Jambol etc.: Velenovsky). Comment. 96.

49. **Orob.** 1. *O. aureus*: Dobrud. (in reg. silv.: fratr. Sintenis). Rumel. or. pr. Slivno (ex Velen.).

2. *O. luteus*: Hisp. (rr. indicat.): Navar., Vizc., Santand., Castil.; Alpes-Marit. (reg. alp. et mont. rarius). Bavar. (Alpes). Boruss. (pr. Insterburg: Kühn 1883). Galic. or. (: Knapp). Moldav.; Transs. (*O. glaberrimus* Schur) ad var. *O. lævigatus* pertinet.

**O. transsilvanicus*; — ? *O. Ewaldi* Meinsh. (Ross. med.).

3. *O. alpestris*; Transs. (: Schur) ad *O. flaccidum* (4') pertinet ex Smk.

4. *O. vernus*; adest in Lapp. or. (: Fellman) et indicatur (rarius) in Lusit., Hisp. bor., centr. et or. — *O. gracilis* Gaud. (Ticino, Como). — *O. flaccidus* Kern. in oe. bot. z. 1860.

**O. flaccidus* Radius in DC. pr. (1825); Kit. in Rechb. exc. (1832); hab. in Croat., Hung., Galic., Transs.

5. *O. variegatus* (*O. silvaticus* Bmg. ex Smk.): Istr. Moldav. Bulgar. (: Skorpil ex Vandas). Rumel. or. (ex Velen.). Thessal. m. Pelion (: Heldreich). Atticæ m. Parnes (: Pichler). Ross. mer. (gub. Charkow et Cherson ex Trautv.). — *O. rigidus* Lang. (*O. variegatus* Heuff. ban. ex Borb.): Valach. (Vircior.: Borb. 1873).

6. *O. hirsutus*: Serb. (: Petrovic ex Boiss.). Bulgar. (Skorpil ex Vandas).

7. *O. ochroleucus*: Bulgar. (cl. Bornmüller); Transs. ad *O. lævigatum* (7—) pertinet ex Smk.

9. *O. niger*: Suec. bor. paroec. Arbrå Helsing. (: Collinder). Lusit. (Beira: Brot., Bragança: Ferreira). Hisp. bor. Istr. Roman. Bulgar.; Ross. med. non nisi in Curland. (cum ins. Osil.) et in gub. Pskow lectus est (ex Batalin), in or. deest ex Trautv.

12. *O. tuberosus*; exc. etiam Fenn. plur. (adest in sola mer.-occ.); Hung. adest! (pr. Güns: v. Sonklar ex Kerner 1873); Galic. et Polon. vix vel rr.; Transs. deest ex Smk.; in Ross. (ex Trautv.) rarus est et non vel parum extra partem max. occidentalem lectus.

13. *O. pannonicus* (*O. austriacus* Cr. 1769): Moldav. Dobrud. (in pratis silvat. et in desertis vulg.: Ue.S.). Bulgar. Rumel. or. (var. *rumelicus* Velen.); Germ. non nisi pr. Tübingen Würtemb. (in m. Hirschauerg) lectus est; Transs. (*O. tenuifolius* Bmg.) ad subspeciem pertinet.

**O. versicolor* Gm. (1791). *O. varius* Soland. in Sims bot. mag. (1803). *O. albus* auct.

transs. — *O. lacteus* MB. (1808). *O. pannonicus* Sadl. (1840) non Jacq. (Bohem. Hung. Transs.; sec. Hegelmaier etiam ad Tübingen).

14. *O. filiformis*; — *O. pallescens*; *O. canescens* Neilr. diagn. et auct. transs.: Transs. Bulgar. Ross. or. — *O. Gmelini* Weinu.

15. *O. sessilifolius* (*Lathyrus cyaneus* (Koch): Ins. Jonic. (Corfu: Spreitzenh. 1877). Rumel. or. (ex Velen. 1886). Ross. mer.-occ. (pr. Odessa).

50. *Vicia*. 1. *V. pisiformis*: Gall. or. (Côte-d'Or), bor.-or. (Lorr.). Moldav. Dobrud. (reg. silv., rarius: Ue.S.); in Suec. præc. Ostrogoth. inhabitat, Smoland. rr., Vestrog. in m. Huneberg; Helv. adest solum in silva castan. pr. Fully Vales.

2. *V. dumetorum*: Gall. centr. (Saône-et-Loire, rr.; Bor.). Moldav. Bulgar. (Knezevo: Skorpil.). — *V. dentata* Fisch. (Ucran. et Podolia: Rogowitsch ex Trautv.).

3. *V. silvatica*: Lapp. norv. (Norv. arct.) adest usque ad circiter 68° lat. (ex Norman). Fenn. Dan. Moldav.; in Sard. (et Cors.) vix lecta est.

4. *V. biennis*: Ross. mer. gub. Charkow (ex Lindem.). — *V. cumana* Hzl. ex Smk. (Hung.).

5. *V. altissima*: Sard. (ex Reverchon).

5. *a. V. amoena* Fisch. in DC. pr. II. 355. — Ross. or. ad Wolgam.

6. *V. onobrychioides*: Lusit. (Bragança: Ferreira) ex de Mariz 1883. Hisp. bor. Istr.

7. *a. V. serinica* Uechtr. Hut. (*V. argentea* H.P.R. exs. ital. 457). Lucan. m. Papa in Serino (H.P.R. 1877).

11. *V. tenuifolia*: Dan. etiam in pænins. nunc lecta est. Lusit. bor. (de Mariz in bolet. soc. broter. 1883). Moldav. Dobrud. (var.). Rumel. or. et Bulgar. (var. = *V. Gerardi* Velen. 1886 ex ipso). Bosn. (Brandis 1884 ex Freyn); Helv. incerta est (cfr. *). — *V. dalmatica* Kern. sched. ad exs. 1886. *V. tenuifolia* var. *laxiflora* Vis. dalm.

**V. elegans*: Thessal. (Heldr. 1885); Genuæ ad portum Bartolomeum a De Notaris lecta est (probab. introd.).

**V. Scheuchzeri* Brügg. (1874). *V. tenuifolia* Gaud. (non Rth). Helv.

14. *V. Cracca*; Hisp. mer. (Andal.) nunc indicatur; in Lusit. rara et nuper ab Henriquet detecta, nam *V. Cracca* Brot. ad *V. variam* pertinet (vid. ap. de Mariz in bolet. soc. broter. 1883). — *V. plumosa* Timb.-Lagr. *V. Cracca* β Lap.

? 14. *a. V. branchitropis* Kur. Kir. enum. alt. n. 274. — Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker exs. a. 1882. 198).

16. *V. Gerardi*: Lusit. (S. do Gerez: Ferreira) ex de Mariz 1883. Carinth. (r.). Ucran. (ex Czern.). Ross. centr. (gub. Kursk); Transs. (pl. Schur.) ad *V. cassubica* (18) pertinet ex Smk. — *V. villosa* Heg. ex Brügg.

16. *a. V. megalotropis* Led. ross. I. 674. — Ross. or. (gub. Perm):

18. *V. cassubica*: Norv. (ad Tvedestrand) ex ABlytt. Hisp. etiam (r.) in bor., or. et mer. indicatur. Bulgar. (: Skorpil ex Vandas); ex Helv. exsulat (sec. Greml).)

19. *V. Orobus*: Hisp. bor. cantabr. (Picos de Europa: Ler. Lev.).

21. *V. atropurpurea*; etiam Hisp. bor. (r.) indicatur.

**V. aquitania* Clavand in act. soc. linn. bord. 1884. Gall. mer.-occ. (Gironde).

22. *V. villosa*: Suec. bor. (Jemtia, Helsing.). Dan. nunc satis adest. Gall. occ. (r.). Moldav. Dobrud. Rumel. or. Carinth. (r.); Helv. deest (vid. 16. *V. Gerardi*).

23. *V. varia* (Orph. exs. 1035): Belg. introd. (ex Crepin). Lusit. bor., med. Hisp. mer. (r.). Helv. (rarius et sæpe inconst.). Morav. (r.). Istr. (vid. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877). Ins. Jonic.: Cephalon. (Schmidt ex Heldr.), Ithaca (: Spreitzenh.). Epirus (Chodzes ex Heldr. 1879). Bæotia. Valach. (pr. Virciorova). Bulgar. (pr. Kistendyl: Vandas. Velen.). Ross. — *V. pseudovillosa* Schur enum.

V. dasycarpa Schur sert. (non Ten.). *V. villosa* var. *glabrescens* K. syn. *V. pseudocracca* Velen. (Transs. Serb. Bulgar. Rumel. or.).

**V. ambigua*: Pelop. (Argolis, Astrós) ex Lacaita in litt.

24. *V. salaminia*: Thessal. (Heldreich 1885).

25. *V. pseudocracca*: Balear. (Menorea): Casall.

26. *V. microphylla*: Ins. Jonic. (Cephalon.: Heldr.). *V. pseudocracca* Ung. reis.?

28. *V. picta* (*V. cumana* Hzl. ex Jka): Ross. mer. (Charkow, Cherson etc.); in mer.-or. etiam ad Sarepta in salsis humidis (: Becker). Hung. plur. loc. sponte adest ex Borbás. Comment. 97.

29. *V. cretica*; — *V. Sprunneri*: m. Ithome Messen. ex Lacaita.

30. *V. monanthos*: Lusit. (de Mariz 1883). Hisp. bor., or. (r.). Thessal. m. Pelion (: Heldr. ex Boiss.). Moldav. (in silv. ad monaster. Adami: Guebh.). Boruss. or. et Megalopol. (Mecklenb.) introd. et subspont.; Transs. (Bmg., Schur) ad *Eryum tetraspermum* pertinet ex Simonk.

32 * *V. triflora*; — ? *V. pauciflora* Genn. non Guss. (Caprera: cl. Gennari).

32. *a. V. elegantissima* Shuttl. (ined.); Rouy in rev. sc. nat. 1883. 65 sep. (*). - Iles d'Hières; ile de Porquerolles (: Shuttleworth). Hellin Hisp. mer. (Rouy 1881).

33. *V. bætica*: Algeçiras (Winkler et Fritze 1873); ad radices montis Sierra Prieta prov. malacitanæ (H.P.R. 1879).

36. *V. bithynica* (*Lathyrus barcinonensis* Pourr.): Lusit. (Miranda do Corvo: Balthazar) ex de Mariz 1883. Catal. Balear. Istr. Corfù (: Spreitzenh. 1877). Obs. *V. bifoliolata* Rodr. (sub Ervo), species balearica, a Barcelò post præced. enumeratur, sed ab eo non visa. Hab. in ins. Menorea (: Rodriguez, Porta. Rigo).

37. *V. oroboides*: Moldav. (in silvis: Guebh.); Transs. excl. ex Smk.

38. *V. sepium*: Fenn. Dan. Lusit. bor. (ex de Mariz in bolet. soc. broter. 1883). Hisp. etiam or. sat lecta. Sard. (ex Reverchon). Roman.; Island. a solo Steenstrup lecta loco non indicato (ex Groenlund); Shetland (: Beeby 1888); deest in Lapp. p. d., sed Norv. adest usque ad Tromsø.

+*V. oxyphylla* (ex Smk.) pertinet ad speciei præced. varietatem *V. montana*.

42. *V. narbonensis* (Orph. exs. 1066): Istr.; indicatur etiam Helv. pr. Basel et Batav. pr. Nijmegen, sed his locis probab. introd.

**V. serratifolia*: Valach. Dobrud. Bulgar. Græc. bor. (Pindus Dolop.: Häusskn.).

44. *V. lutea*: Batav. (Nijmegen, in muniment., probab. introd.: Abeleven 1874). Bavar. (Regensb., Weissenburg). Austr. (Laaerberg: v. Höhncl). Istr. Moldav. Bulgar. (Sofia: Skorpil). Ross. mer. (Charkow: Czern.).

45. *V. hirta*: Lusit. (Cintra, S. d'Arrabida, Faro) ex de Mariz 1883. Istr. — *V. flavida* et *V. ciliata* ad *V. segetal.* (55 *) pertinent ex Smk.

46. *V. hybrida*: Gall. bor.: Normand. (r.). Lothar. (Argonne, pr. Neuilly etc.: Doisy). Helv. rara et inconstans. Croat. (pr. Fiume: A-M. Smith).

47. *V. pannonica*: Banat. (Orsova: Winkl.). Valach. Dobrud. Bulgar. Ross. mer.-occ.; mer. (Odessa: Lindem.).

**V. striata*: Hisp. centr. (etc.); forse introd. sed nunc quasi spontanea (ex Colm.).

48. *V. syrtica* (*V. pallens* Rehb. exc.); nunc ex solo Duby (et Rehb.) citatur; Clavaud, qui botanices causâ dep. Gironde diligenter lustravit, hanc plantam numquam vidit.

49. *V. melanops*: Cors. (pr. Corte: Burnouf ex Le Grand). Telonæ (Toulon) Gall. mer. ex Huet (introd.?). Rumel. or. (ex Velen.).

50. *V. grandiflora*: Morav. mer. Ins. Jon. (Corfù, in olivetis: Spreitzenh.). Bulgar. Rumel. or. (ex Velen.); Galiz non adest et in Bucow. a solo Zawadsky indicata est (ex Knapp). — *V. Biebersteinii* (*V. sordida* Bmg., Schur ex Smk.): Transs. Dobrud. (r.). — *V. sordida* (*V. lutea* Bmg., Schur ex Smk.; *V. Kitaibel*. Schur sert. est *V. Cracca* ex eod.): Moldav. Dobrud. Banat. (ad Orsova: Winkler).

**V. serrata*; cl. Pantocsek hanc speciem primum descripsit in oe. bot. z. 1873 et ul-

terius in tractatu "adnotationes" (1674).130 (*), ubi dicitur media inter V. sordidam et V. Barbazitæ; hab. in dumetis m. Gliva pr. Trebinje.

51. V. Barbazitæ: Cors. in m. Felce pr. Corté (: Burnouf 1879 ex Rouy). Arcad. non rara (ambæ formæ) ex Lacaita.

52. V. macrocarpa: Gall. mer.-occ. (Gironde: Clavaud). Rumel. or. (cfr. Velen. in act. soc. sc. boh. 1887).

53. V. cordata: Lusit. (Coimbra, Cintra) ex de Mariz 1883. Menorca (var. albiflora: Freyn). Ins. Jon. (Corfû: Spreitzenh. 1877). Istr. (cum var. albifl. Freyn). Croat. (Hirc 1883). Carinth. (r.). - Sec. Kerner planta Wulfen. ad V. sativam pertinet, quare Kochium auctorem speciei proclamât.

54. V. sativa; adest in Ross. bor.; in Fenn. bor. deest (nisi adsit in Ostrob.). — V. incisa (V. pimpinelloides Seb. Maur.) potius saltem subspeciem sistit.

*V. Cosentini: Istr. Attica, Methana (: Haussknecht); de hac et proxime præcedentibus vid. ap. Freyn, Flora von Südtirol, in act. soc. z.-b. vind. 1877. 320—2 et 1881. 364.

55. V. angustifolia; in Island. certe adest (: Groenlund), ex Strömfelt probab. introd.; in Suec. bor. non ultra Helsingiam progreditur; in Fenn. bor. deest (nisi adsit in Ostrob.).

*V. segetalis; — V. maculata: Gallopr. dep. Var pr. Ampus (: Albert ex Rouy in bull. soc. bot. 1884); Magnier sel. exs. 817.

56. V. cuneata; Balear. (Mallorca: Marès). Terra d'Otranto (: HGroves).

57. V. amphicarpa: Balear. (r.). T. d'Otranto (: HGroves, Lacaita).

60. V. peregrina (Orph. exs. 1097): Lusit. (rarius: de Mariz in bolet. soc. broter. 1884). Cephalon. (: Heldreich). Istr. Dobrud. (rarius). Moldav.

61. V. hungarica; sec. Janka (vicieæ eur. 1885) est = V. Biebersteinii (50—).

51. **Ervum.** 1. E. agrigentinum: Ital. mer. (T. d'Otranto: HGroves, Lacaita).

5. E. nigricans: Lusit. (r.: R. da Cunha ex de Mariz). Mallorca (r.: Marès). Ins. Jon. (Ithaca: Spreitzenh. 1877). Taur. (ex Trautv.). Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker).

7. E. hirsutum; exc. etiam Lapp. plur. et Norv. bor. (ultra Nidaros. non lectum); in Ins. Jon. (Corfû) a Spreitzenhofer lectum est. — E. Terronii: Gall. dep. Char.-Infer.; Ital. mer. ad Amalfi in nemoribus (ibi planta viva ab E. hirsuto toto coelo diversa videbatur — nonne Vicia Meyeri Boiss. or.?: Lacaita in litt. 1883).

8. E. Ervilia; Lusit. non nisi subspont.; Helv. rara et probab. introd. (cum cerealibus).

9. E. gracile: Bavar. (vall. Aschaff.- et Kahl.-). Hung. (: Hzl.). Istr.; planta taurica (Stev.) ad E. pubescens (11) pertinet ex Trautv.

10. E. tetraspermum; exc. etiam Suec. bor. (ultra Gestric.), Fenn. bor. et med.; sed adest in Græcia (Methana, Pindus Dolop.: Hausskn.). — Vicia Gussoni Sartori (ex Jka).

11. E. pubescens; Balear. non nisi in Mallorca, et quidem raro, observatum.

*E. nemorale Giraudias in Magn. scrin. VI. (1887). 155; fl. sel. exs. 1428. - Gall.

XXXIV. DRUPACEÆ.

1. **Amygdalus.** 1. A. communis: Vales. (Helv. mer.), in collibus ad Saillon et Montorge, et probab. subsponte etiam alibi in calidioribus.

2. A. nana: Bulgar. (ad Balkan pr. Orchanie; pr. Kostinbrod: Vandas. Velen.). Ross. centr. (gub. Kursk). Comment. 98.

*A. campestris: Ross. mer. (Cherson); Transs. deest ex Smk. — A. Pallasiana: Moldav. Dobrud. (in desertis freq.; etiam in montibus saxosis: Ue.S.).

2. **Prunus.** 2. P. lusitanica; indicatur etiam Hisp. or. et centr.

3. *P. Padus*: Dan. Fenn. Moldav. Lothar. — *P. petræa*: Helv.
4. *P. Mahaleb*: Hisp. mer. (r.). Helv. plur. Istr. Styr. (pr. Neuhaus: Reichardt). Morav. Roman. Bulgar.
5. *P. avium*: Moldav. Dobrud. Bulgar. (m. Vitos pr. Sofia).
6. *P. Cerasus*: Helv. præs. mer., mer.-occ. Ross. mer.-or. (*Sarepta*, in rupestribus: Becker); Angl. in ins. Wight indigenam detexit et descripsit D:r Bromfield (1839); Suec. mer. (et med.) efferata hinc inde obviam venit.
7. *P. Chamæcerasus*: Styr. (pr. Neuhaus: Reichardt). Ital. bor. prov. veron (pr. Monteforte et in montibus vallis Pantena et vall. Pollicella: Goiran 1878). Roman. Bulgar. Ross. centr. (Kursk); Germ. vix extra Phalziam rhen. et Thuring. (Halle) spontan., sed interdum inquil.
9. *P. brigantiaca*: Alpes-Marit.: la Briga, col de Tanarello, Estenc, St-Dalmas-le Sauvage.
11. *P. divaricata*: Ross. gub. Stawropol (ex Owerin).
14. *P. insititia*: Norv. mer. Dobrud. (spont.: Ue.S.). Bulgar. (in sæpibus vinearum: Bornmüller). Bosn. (ex GBeck).
15. *P. spinosa*: Fenn. adest in Aland. (et Aboæ introd.). Hisp. etiam in mer.

XXXV. SENTICOSÆ.

1. *Spiræa*. 1. *S. ulmifolia*; etiam Moldav. lecta est.
2. *S. chamædrifolia*: Moldav.; *S. media* et — *S. pikoviensis* (nomen a *Pikow Podolie*) vid. in subspecie prima (et cum? etiam in altera).
**S. oblongifolia* (1812). *S. media* Schm. æstr. baumz. (1792). *S. pikoviensis* Bess. *S. crenata* Wolff. *S. chamædrifolia* Led. *S. confusa* Reg. Körnick. (1857). — Styr. adest! (in rupibus calcareis pr. Graz); etiam Banat.; Bulgar. (m. Vitos). Ross. mer. et med.
**S. crenifolia* (*S. crenata* auct. ross. mer.): *Sarepta* (in rupestribus umbrosis: Becker); etiam Bessarab. et Cherson (: Lindem.), Orel, Simbirsk, Perm (: Maximov.) — *capitata* Trautv. (Ross. mer.-occ., Dobrud.). — *S. sawranica* Bess. (Ross. mer.-oce.). — ? *S. pikoviensis* Bess. ex Maxim.
3. *a. S. rhodoclada* Ler. Lev. deux excurs. (1880). 26. (*). Hisp. bor. ad pagum Alar del Rey (: Levier 1879).
4. *S. decumbens* (*S. flexuosa* Rchb. exc. 1832 non Fisch. ap. Camb. 1824); Carinth.: Bombasch-Graben pr. Pontafel, Vogelbach-Graben, Schinouz, Scisera; locus classicus est Carniæ (Friul.) vallis canalensis, in rupestribus et glareosis, altit. 460—800 mtr. — *S. lancifolia* est species sat diversa (ex Maxim. speciebus quibusdam asiaticis forse magis affinis):
4. *a. S. lancifolia* Hffgg verz. (1825). *S. Hacqueti* Fzl. CKoch in Reg. gartenfl. 1854. - Hab. in prov. veneta, ubi Tyroliae mer. confinis est, "in fissuris rupium erectarum in Canale di Cimolais, 900—1300 mtr. s. m."
6. *S. obovata*: Ross. mer.-or. (: Maximov.); Helv. quoad indigenatum dubia; Transs. ad *S. mediam* (2 *) pertinet ex Smk. — *S. oblongifolia* Led.
7. *S. crenata*: Dobrud. (pr. Turkoi et Grecii: Ue.S.; Sulucu: Jka); Galiz. ab Hacquet (rarius) lecta est, sed recentius ibi non observata teste Knapp.; Ross. mer. cfr. *S. crenifol.* (2 *).
8. *S. salicifolia*: Bavar. (Bayr.-Wald, Fichtelgeb.; Bodenau etc.); Transs. non nisi culta et subspontanea adest; sic etiam Dan. (et Fenn.).
9. *S. Aruncus* (*Aruncus silvestris* Kostel.): Moldav.; in Germ. bor. deest.
10. *S. Ulmaria* (*Ulmaria pentapetala* Gilib.); Lusit. (Figueira, Oporto etc.) adest et etiam in Hisp. mer. prov. malacitana indicatur.
11. *S. Filipendula* (*Ulmaria Filipendula* ABr.); Fenn. adest in sola mer.-occ. (Aland., Aboa). Comment. 99.
2. *Rubus*. 1. *R. idæus*; adest in m. Oeta Phthiotidis, alt. 5800' (: Heldreich); in Ross. mer. vix indig. et non nisi subspontan. (: Lindem., Schmahlh.). — *R. Leesi* (*R. idæus anomalus* Arrh.) in Scand. obvius est Holmiæ (et Fenn. mer.-

occ.), item Vestrog., Bahus. et Norv. mer. singulis locis. — *R. acanthoclados* Borb. ex Smk.

2. *R. suberectus*: Suec. med. usque ad 60° et Norv. ad 62° 40' (ex F. Aesch.). Gall. or. (Côte-d'Or). Fenn. mer.-or. (isthm. carel.), ubi a Malmberg detectus 1866. **R. fissus*: Norv. mer. (detex. Lindeberg). Suec. mer.-occ. (ad Balm Mölla Scan. et pr. Falkenberg Halland.). Batav. (: de Bruijn).

3. *R. sulcatus* (*R. affinis* Arrh.): Dan. (præs. Slesvic); in Suec. med. non nisi ad Holmiam indicatur.

4. *R. plicatus*: Suec. etiam med. (usque in Suderm. ad lat. 59°); Helv. non nisi in m. Zugens. obvius ex Focke. — *R. maritimus* L. it. scan. (vid. Arrh. monogr. et ap. Lindeb. in bot. not. 1877. 75).

5. *R. nitidus*: ins. balt. Bornholm (ad Hunsemyre: Gelert). Scan. bor.-occ. (paroc. Jonstorp: Neum. in bot. not. 1883; *R. nitidoides* ej. antea). Gall. or. (Côte-d'Or).

6. *R. affinis*: Carinth. (ex Pacher), sed Helv. vix ex Gremli; Dan. ad *R. sulcatum* (3) pertinet.

**R. relatus* F. Aesch. obs. on the gen. *Rubus*. 156. (1886). - Smoland. (ad Vestervik: Dr Lund).

**R. hemistemon* J. Müller ex Baker (1886). Angl. Gall. Germ.

7. *R. carpinifolius*: Morav. (ex Oborny); planta anglica potius ad subspeciem (*R. montan.*) pertinet; cfr. cl. Baker: "On the relation of the british forms of *Rubi* to the continental types" in Journ. of bot. 1886. (*).

**R. montanus*; — *R. Grabowskii*: cfr. sub 33. a *. — *R. pseudoradula* Holuby (1873) ex Sabransky (1886). Austr. p. d. Hung. occ.

8 * *R. cimbricus* Focke; Fredr. Gel. exs. 42. - Slesvic.

9. *R. rhamnifolius*; *R. germanicus* (Focke): Brit., ut videtur, sat vulgaris et variabilis (: Baker 1886).

**R. cordifolius*; — *R. Scheutzii* Lindeb. hb. rub. 32. *R. thyrsoides-virescens* Scheutz (1871). *R. Lindebergii-viridis* F. Aesch. olim. - Smoland. (ad Oscarshamn).

**R. Maasii*: Surrey Angl. (: Baker). — *R. Muenteri* est subspecies propria.

**R. incurvatus* Bab. (in Consp. meo erronee sub *R. corylifolio* allatus).

10. *R. thyrsoides*: Angl. (Devonsh. ex Baker, Hampsh. ex Townsend). Suec. med. (usque ad Holmiam). Istr. Bosn. Bulgar.

**R. egregius*: Dan. insul., Slesvic. or.

**R. Schlickumi*; — *R. fimbriifolius*: reg. Rhen.; sec. F. Aesch. (1885) ad *R. Radula* pertinet.

11. *R. arduennensis*; — *R. Mercieri* (melius subspecies): Helv.

13. *R. discolor*: Lusit. Hisp. centr. Bosn. mer. (: G. Beck).

**R. ulmifolius* (1811): Lusit. Hisp. mer. (*R. hispanicus* Willk.). -- *R. siculus* Pr. — *R. Linkianus* Guss. — *R. Francipani* Tin. — *R. panormitanus* Tin. (51?) ex Focke.

**R. rusticus* Merc. (ex Kerner). *R. dalmaticus* Guss. syn. (non Tratt.). - Gall. mer. Helv. mer. Ital. Sicil. Sard.

**R. amoenus* Portenschl. *R. dalmaticus* Tratt. (ex Kern.). *R. ulmifolius* var. *anatolicus* Focke. - Istr. Croat. Dalm. Bosn. mer. (: G. Beck). Herceg. Bulgar. Turc. Græc. (Heldr. hb. norm. 844. a. b.).

14. *R. bifrons* (*R. albus* Bayer 1869, *R. amoenus* Celak. non Portenschl.): Istr.

**R. Lindebergii* (*R. vulgaris* * *discolor* Arrh.) proximus est *R. insulari* (16. b) et ab eo derivatus ex F. Aesch. (ex eodem 1888 est propior *R. villicaulis*); Scan. Dan. Germ. bor.-occ. (*R. obovatus* G. Braun hb. rub.); in Suec. occ. litorali et Norv. mer. sporad. — *R. Langei* Jensen in Fridr. Gel. exs. (Dan.).

**R. Pantocsekii* Holuby. — Herceg. pr. Trebinje.

15. *R. pubescens*: Belg. Batav. (*R. geniculatus* Klth.).

**R. macrostemon*; — ? *R. myrianthus* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881. 372. (Istr.).

**R. rorulentus* Halacs. (1883). *R. carpinifolius* Halacs. Braun. 1882. (non Whe). — Austr. p. d. (pr. Gloggnitz).

16. *R. villicaulis*: Suec. mer. exclud. (vid. 16. b). — *R. Selmeri* Lindeb. hb. rub. 33 (ex F. Aesch.); Norv. mer.-occ. — *R. derasus* P. J. Müll.; *R. adscitus* Genév.; *R. Bakeri* Blox. (ex Baker).

**R. umbrosus*; excl. citat. e Fr. hb. norm. et locum Suec. mer. (vid. 16. b).

**R. gratus*: Jutland. (pr. Ribe). Angl. adest! (Surrey: Beeby ex Baker).

**R. carpinetorum* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881. 373. *R. villicaulis* var. *trifoliiol.* ej. l. c. 1877. - Istr. mer.

16. *a. R. polyanthemus* Lindeb. hb. rub. 16. *R. Neumani* Focke. *R. pulcherrimus* Neum. (in sched.) non Hook. - Scan. bor.-occ. Slesvic. (: Gelert). Brit. (*R. umbrosus* bot. angl. ex FÅresch.).

**R. Gelertii* Fridrichs. in bot. tidskr. XV. 237; Fridr. Gel. exs. 39. 40. - Slesvic. (et ins. Brandsö).

16. *b. R. insularis* FÅresch. skån. fl. ed. II. 570. (1881). *R. vulgaris* * *umbrosus* Arrh.; Fr. hb. norm. X. 53. *R. similatus* Lindeb. hb. rub. 13 (non PJ Müll.). *R. villicaulis* * *insularis* Fridr. Gel. rub. dan.-slesv. exs. - Scan. bor.-occ. (ad Väsby; in ins. Hallands Väderö detect. a L. Neuman). Dan. Germ. bor.-occ. — *R. umbraticus* Lindeb. non PJMüll. (ex FÅresch.). — *R. confinis* Lindeb. hb. rub. 12 ex FÅresch. (Bahus. Norv. mer.).

**R. Langei* Jensen in Fridr. Gel. exs. 9. - Jutland. (Veile, Ribe etc.). Slesvic.

17. *R. macrophyllus*: Slesvic. mer. Helv. (varius). Morav. or. (: Oborny). Bosn. (ex Freyn).

**R. pileostachys*: Batav. (: de Bruijn). Helv. mer.-occ. (: Favrat).

**R. danicus* Focke in abh. nat. ver. brem. IX; Fridr. Gel. exs. 37. - Slesvic. præs. mer.-or.

18. *R. silvaticus*: Slesv. pr. urbem, in Angel vulgatus. — ? *R. mucronatus* Blox. (1850). *R. mucronulatus* Bab. (non Bory): Scot. Angl. bor. Dan. (Fridr. Gel. exs. 15. 16).

**R. chlorothyrsus*; — *R. sciaphilus* Lge in fl. dan. 3026; Fridr. Gel. exs. 37: Dan. pæ-nins. et Fionia.

**R. Gremlii* (*R. infestus* Bayer 1869, non Whe 1824): Austr. p. d. Morav. Bohem.

20. *a. R. scanicus* FÅresch. skån. fl. ed. II. (1881); Lindeb. hb. rub. 17. - Scan. bor.-occ. (in ins. Hallands Väderö detect. a L. Neuman). Dan. (Sjælland: Fridrichs.).

21. *R. tomentosus*: Arrag., Murc., Andal. (ex Colm.). Helv. Istr. Bosn. (: GBeck, Brandis). Rumel. or.; Belg. nondum lectus est ex Crepin; in Germ. bor. merid. (in Hassia et Thuring. rariiss. est). — *R. australis* Kern. (*R. tomentosus* auct. merid.). Comment. 100. — *R. ætnicus* Tin. (*R. siculus* Pr.?).

**R. polyanthus*; — *R. baldensis* (= *tomentosus* + *ulmifolius*) etiam Istr. (a Freyn) lectus est.

**R. bertricensis*; in Hung. (bor.-occ.) cl. Kerner plantam cum illa e loco classico Bertrich omnino convenientem observavit.

**R. decorus* Halacs. ap. Kern. (1883). Austr. p. d. (m. Semmering); probab. hybr. *R. tomentosi* cum — ?

22. *R. collinus*: Sicil. (Castelbuono: Lojacono 1882).

23. *R. vestitus*: Batav. (ex Abeleven). Bavar. (et Germ. tota hinc inde ex Gcke). Belg. (ex Baker). — *R. macrothyrsos*; bene distinctus a *R. vestito* (vid. ap. Lange in fl. dan.).

**R. pyramidalis* (Lindeb. hb. rub. 36): Scan. bor.-occ. (Kullaberg). Dan. (præs. pæ-nins.). — *R. hirtifolius*: Angl. mer. (Wight, Plymouth).

**R. Drejeri* Jensen (fl. dan. 3023); Fridr. Gel. exs. 43. - Fionia. Jutland. (Skamlingsban-ken). Slesvic. or.

26. *R. obscurus*; adest etiam Belg. ex Baker.

27. *R. Lejeunii*; Angl. mer. nuper indicatus est (forse præced.).

**R. festivus*: Angl. mer. (var.).

28. *R. Radula*; etiam Polon. indicatur. — *R. thuringiacus*; non nisi (et rr.) ad Schleusingen lectus est. — + *R. apiculatus* nunc citatur ad *R. aculeatiss.* (sub 35), qui vero var. *R. hirti* dicitur. — + *R. Lingua* a Weihe pr. Minden Westphal. observatus est, sed dein nec ibi nec alibi lectus.

29. *R. rudis*: Surrey Angl. (: Beeby ex Baker). Slesvic. (r.); Germ. hab. præs. in bor.-occ. (Bremen, Westphal.), ceter. Hercyn., Thuring., Bavar. (München, Augsburg.).

30. *R. foliosus*: Angl. mer. (Hampsh., rr.: Townsend).

**R. saltuum* (1870); *R. flexuosus* PJMüll. (1859): Slesvic. (Gelert 1885: Fridr. Gel. exs. 20).

32. *R. thyrsoiflorus*; Germ. (ex Gcke) rarus est: Hannover, Minden; sed cartudiin etiam in Germ. med. (e. gr. Thuring.).

33. *R. pallidus*: Angl. (sec. Focke ex Arth. Bennet). Fionia, Jutland. et Slesvic. or. (*R. hirtus* Lge haandb. ed. III). Smoland. (rr.: *R. horridus* * mitigatus Alund vesterv.); Germ. hab. solum in bor.-occ. (ex Geke).

**R. scaber*: Saxon. Angl. mer. (Hampsh., r.).

**R. Schummelii* Whe (*R. glaucovirens* Maass). Siles. Hercyn. occ.

**R. longithyriger* (Lees ms.) Baker in journ. of bot. 1886. *R. pyramidalis* Bab. (non alior.). - Angl. occ.

33. *a. R. infestus* Whe in Bngl. prodr. monast. 153. (1824). Germ. (Mind. Harz, Thüring.; etiam Marchia ex Warnstorf). Dan. Angl. — *R. teniarum* Lindeb. ex FÅresch. (ins. Orust et Kalfö Bahus.).

**R. horridicaulis* PJMüll. - Germ. occ. Vogesi.

Obs. Hæc species et duæ sequentes in Consp. desunt quia schedula, quæ earum nomen continebat, manuscr. intercalata, sub impressione amissa est.

33. *b. R. egregius* Focke syn. 258. — Slesvic. Germ.; Angl.? — *R. Purchasii* Blox. ex Baker.

33. *c. R. badius* Focke syn. 276. Germ. — ? *R. fuscoater* Bab. (ex Focke).

34. *R. fusco-ater*; species rara: Westphal. pr. Altena, Drachenfels in montib. Siebengebirge; Mülheim ad Rhenum; ex Geke.

35. *R. rosaceus*; Germ. non nisi ad Aachen et Eupen lectus videtur.

**R. hystrix*: Angl. mer. (Hampshire, r.).

36. *R. Koehleri*: Angl. (Hampsh., Surrey). Belg. (: Baker). Morav. (: Oborny). Siles. — *R. calvatifolius* PJMüll.

**R. aprieus*: Morav. (: Oborny). — *R. pallidus* auct. angl. ex Baker).

38. *R. Schleicheri*: Belg. (teste Crepin). Morav. (: Oborny).

**R. humifusus* pr. urbem Hannover nunc lectus est ex Geke et (rr.) in Hampshire Angl. mer. (Groves 1879 ex Towns.).

39. *R. serpens*: Slesvic. (raro: Fridr. Gel. exs. 45). Bavar. Carinth. (raro: Pacher).

40. *R. hirtus*: Bosn. mer. (: GBeck). Græc. bor. (Pindi distr. Agrapha: Haussknecht). Istr. (mte Maggiore in quercetis et castanetis: Freyn); Dan. excl. (cfr. *R. pallidus*). — *R. rotundifolius* Blox — *R. Reuteri* Merc.

**R. insolatus*; — *R. saxicolus*: Yorkshire Angl. (*R. humifusus* Bab. ex Baker).

41. *R. Bayeri*; — *R. polyacanthus*: Carinth. (raro: Pacher).

42. *R. (e)glandulosus*; Suec. hab. in sola parte or. (Smoland., Ostrog.); Transs. ad *R. hirtum* (40) pertinet ex Smk. — *R. glandulosus* Bell. (1792) est nomen aliis antè et prioritate indubiã gaudens, sed incertum dicitur quia Bellardi speciem suam valde vage descripsit. *R. eglandulosus* est nomen Fockeanum (nec errore typogr. ortum).

43. *R. Cupanianus* (Tod. exs. 1380); forse var. speciei præced. (vel *R. hirti*).

45. *R. orthacanthus*; hab. etiam Morav. — *R. Ebneri* (*R. Schleicheri* Holub. non Whe); Hung. occ. (ex Kerner). — *R. Jensenii*: March. (ex Warnstorf). — *R. Villarsianus*; ex Gremlî species eximia et facile cognoscenda.

47. *R. Wahlbergii*; hab. etiam Carinth. (ex Pacher). — *R. cyclophyllus* Lindeb. hb. rub. 48.

48. *R. corylifolius*: Hisp. bor., centr.; etiam Austr. p. d. indicatur. — *R. maximus* (*R. corylifolius* * *maximus* FÅresch.); Dan. Scan. Bahus. Norv. mer. — *R. coryl.* * *maxim.* - *cordatus* FÅresch.; *R. rosanthus* Lindeb. hb. rub. 42 et 43 (= var. *raduloides*). *R. rosiflorus* Lindeb. in act. gothob.; ex FÅresch.; (extra Scand. deesse videtur). *R. Balfourianus*; (*R. divergens* Neum. in v. a. ö. 1883 ex FÅresch.). — *R. ciliatus* Lindeb. hb. rub. 50. 51. *R. nemoralis macrocarpus* FÅresch. olim. *R. divergens* Scheutz 1885 ex FÅresch. 1888. (Angl. occ., mer. Gall. occ. Germ. Slesv. Seeland. Rugia. Suec. mer.). — ? *R. Fionie* Fridr. in bot. tidskr. XVI. 115; Fridr. Gel. exs. 28. (*Fionia*, Slesvic., Bornh.).

**R. pruinosis*; verus (Fr. hb. norm.) non nisi paucissimis locis Suec. or. (Smoland. et Sudern.) lectus est (ultimis annis parcissime); alibi var. *R. coryl.* * *maximi* pro illo sumtus est (ex FÅresch. 1885).

**R. (corylifolius) * bahusiensis* Scheutz (1880). *R. dissimulans* Lindeb. in act. gothob. 1885; hb. rub. 44. 45. *R. serrulatus* Lindeb. hb. rub. 46 (ex Färesch.). - Bahus. Norv. mer. Dan.

**R. (corylifolius) * maritimus* Färesch. (non L. it. scan., qui = *R. plicatus*). *R. Lagerbergii* Lindeb. (hb. rub. 40). - Suec. mer.-occ. (litor.), or. (Smoland. litor., rr.).

**R. (corylifolius) * nemoralis* Färesch. *R. nemorosus* Arrh. *R. gothicus* Fridr. Gel. - Norv. mer., occ. Dan. Suec. mer., med. Fenn. mer.-occ. (ins. Aland.). - *R. acutus* Lindeb. ex Färesch. (Bahus.); *R. acuminatus* Lindeb. hb. rub. 38. - *R. Laschii* Focke (50+) ex Färesch. (Germ.). - *R. jucundus* Koehl. ex Färesch. (Germ.).

**R. Warmingii* Jensen in Fridr. Gel. exs. 49; Lge haandb. ed. IV. 800. - Slesvic. (plur. locis) Jutland. (pr. Kolding).

49. *R. nemorosus*: Ross. mer.-occ. — ? *R. oreogeton* Focke. (Saxon. Siles.).
**R. horridus*: Dan. (r.). — *R. tenuiarmatus* Lees et — *R. Bagnellii* Blox. et *R. Briggsii* Blox. ex Baker (1886). — ? *R. Friesii* Jensen in Fridr. Gel. exs. 25. (Slesvic.).

**R. dumetorum*; in pænis. scand. extra Scan. bor.-occ. non lectus est. — *R. slesvicensis* Lge in fl. dan. 2905. (1877); Fridr. Gel. exs. 24. (Slesvic. or., ubi a G. Jensen detectus). — *R. Friderichsenii* Lge haandb. ed. IV. (Slesvic.; Jutland. et Langel. r.). — *R. imitabilis* Fridr. Gel. exs. 23. (Fionia, Slesvic., r.). — *R. pyracanthus* Lge; Fridr. Gel. exs. 21. (Slesvic.).

**R. viridulus* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881. 376. Istr. (: Freyn). *Planta spectabilis, grandifolia et grandiflora; petala viriduli-alba.*

50. *R. cæsius*: Thessal. m. Olympus, ubi speciei terminus merid. (: Heldreich 1882); Fenn. hab. in ins. Aland. — *R. pseudo-cæsius* Lej. et *R. pseudo-idæus* Lej., jam a Weihe et Nees huc relati, hybriditate orti sunt et etiam in Suec. et Norv. mer. occurrunt (ex Färesch.). — *R. Areschougii*; Comment. 101.

**R. acheruntinus* (Tod. exs. 367); planta sicula ex unico loco cognita est, neapolitana ad *Corylifolias* varias pertinet (ex Focke).

51. *R. panormitanus*; cfr. *R. ulmifolius* (13 *).

52. *R. saxatilis*; hab. etiam Hisp. bor.; in Thessal. m. Olympo, ubi terminus speciei merid., a Heldreich lectus est 1882.

53. *R. castoreus* (Fr. hb. norm. III. 1837) Læst. in Htn handb. ed. III. (1838). Fr. mant. alt. (1839); hab. etiam Fenn. plur. (scil. exc. mer. multa).

54. *R. arcticus*; Norv. hab. a Finnm. or. usque in Hedemarken; Suec. a Lappon. Torn. usque in Upland. (etiam Holmiæ), Vestman. et Vermel.; Scot. erronee indicatus est.

55. *R. Chamæmorus*: Dan. Fenn. (deest in Gotland. et Öland.); hab. etiam in ins. Spitzberg. (ubi a Nathorst detectus 1882) et in Ross. arct. (Nov.-Semlia: Kjellm. Lundstr. 1875; Waigatsch); Germ. hab. Siles. (Riesengeb.), Pomeran. (Stolpe, Swinem.), Boruss., sed in Hassia (ubi olim in m. Meissner aderat) nunc exstinctus est.

56. *R. humulifolius*; Ross. or. gub. Perm a pluribus (Clerc, Krylow 1873) lectus est.

× *R. mortuorum* Freyn = *carpinetorum* + *tomentosus*. (Pola Istr.).

× *R. Schwarzeri* Holuby = *discolor* + *tomentosus*. (Hung.).

3. *Fragaria*. 1. *F. elatior* (*F. reversa* Kit. ex Hzl.); Suec. med. (et bor. r. sed sine dubio primitus introd.). Lothar. Bulgar. (m. Vitos: Skorpil). Ross. med., mer. — *F. calycina* Soy.-Will.

3. *F. collina*: Istr. Roman. Rumel. or. (ex Velen.). Græc. bor. (Pindi distr. Agrapha: Hausskn.); Fenn. non nisi in Aland. lecta est.

**F. neglecta* Lindem. in bull. mosc. 1865. *F. campestris* Stev.? ex Lindem. *F. collina* var. *pilosa* Czern. - Ross. mer. (et probab. alibi), in Bessarab. et Cherson frequens. — Comment. 102.

× *F. sericea* Christ = *collina* + *elatior*. (Basilie).

4. *Comarum*. 1. *C. palustre*: ins. Færøer. Dan. Fenn.; Ross. etiam in ins. arct. Nov.-Seml. (: Kjellm. Lundstr. 1875).

5. *Potentilla*. 1. *P. fruticosa*; locus bavar. (pr. Wemding) dubius est (cl. Prantl plantam ibi obviam efferatam esse credit; etiam a Garcke inter indígenas non accepta); prope Tenda (Alpes-Marit.), ubi ab Allionio indicata erat, ab aliis non lecta est, sed Hawker et Moggridge specimina (incompleta sed indubia), ad fontes Boréon collecta, reportaverunt (ex Ardoino).

2. *P. rupestris*: Rumel. or. — *P. Benyetzkyi*; hab. etiam pr. Mehadia

Banat. (*P. rapestris* var. *grandiflora* Heuff.) ex Borbás. — *P. macrocalyx*; hab. etiam in dep. Herault.

3. *P. pensylvanica*; indicatur etiam in Arag. et Navar.

8. *P. multifida* (*P. geranioides* F.Nyl. spic. cent. I. *P. multif.* var. *lapponica* ej. cent. II.); Spitzb. (cap. Thorsen ad cataractam: Nathorst 1870 et de-nuo 1882); Helv. non nisi in alpe Zermatt, (Vales.) lecta est teste Gremli.

10. *P. bifurca*: Dobrud. (in montib. saxosis supra Grecii, rr.: Ue.S.).

11. *P. pulchella*; planta spitzberg. (Nath. 1870) a cl. Nathorst nunc ad *P. multifidam* (8) ducitur.

12. *P. dasyphylla*: Ross. arct. ins. Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875); "specimina Baeriana sistunt formam pusillam" = *P. multicaulis* Turcz. (1838).

15. *P. supina*: Belg. inter Wilsle et Wygmæl lecta est a Bagnet (1882). Moldav. Dobrud.; Helv. non nisi Basilie adest ex Gremli.

16. *P. recta*: Badia (pr. Müllheim). Rheinprov. Hamburg. (Dan. plur. loc. inquil. e cultura in hortis). Hisp. bor., or. Roman. Rumel. or. (: Velen.). Bulgar. (: Bornmüller, Vandas). Græc. bor. (Pindus: Haussknecht); Helv. non nisi mer. hab. (sed alibi interdum introducta est). — *P. obscura*; *P. corymbosa* Mch (1802). — *P. strictissima* et *P. sciaphila* Zim. (ex Blocki).

17. *P. hirta*: Istr. Carinth. (rr.). Moldav. Dobrud. Comment. 103.

**P. taurica*: Dobrud. (in montib. calcar.: Jka, Ue.S.). Dalm. (Zichler in Kern. fl. austr.-hung. exs.).

19. *P. inclinata* (Vill. 1789) ab hac grege aliena est et melius in sectione sequenti collocanda quia *P. heptaphyllæ* (23) proxima et forse cum — *P. gentili* Jord. identica; cfr. ap. Zimmeter in Kern. sched. ad exs. IV. 9. (1886). Delph. et Vales. (Helv. mer.) præcipue inhabitat.

19. a. *P. canescens* Bess. (1809). *P. inclinata* auct. *P. intermedia* auct. transs. *P. curvidens* Schur. — Helv. bor. (finitima Christ). Bavar. Würtemb. Moldav. Dobrud. Bulgar. Rumel. or. Fenn. mer., med. (: Norrlin 1871).

**P. pindicola* Hsskt in litt. 1889. *P. inclinata* var. *virescens* Boiss. fl. or. - Græc. bor. (Pindus Agrapha: Hausskn.; Aetol.: Samarit. Guicc. ex Hausskn.). Maced. (Orph. 687).

20. *P. Detommasii*: Græc. bor. (Pindus: Haussknecht et Heldreich 1885). *P. holosericea* Grsb. (40) certissime, sec. specim. auth. (teste cl. Haussknecht in litt. 1889).

**P. subsericea* Hsskt in litt. 1889. *P. hirta* var. *subsericea* Grsb. - Græc. bor. (Pindus Tymphaeus: Haussknecht).

21. *P. argentea*; exc. etiam Lapp. plur. et Fenn. bor.-or., sed Hisp. bor. plur. loc. indicatur. — *P. incanescens* Op. — *P. Detommasii* Schur.

23. *P. heptaphylla* (*P. Nestleri* Fr. 1814. *P. thuringiaca* Bernh. ap. Lk. 1822. *P. Nestleriana* Tratt. 1823): Succ. med. (ubi primum lecta in Gestric. a Schlyter). Ross. mer. (et gub. Wologda: Ivanitz 1884). Galic. mer.-or. (*P. patens* et *P. pratensis* Herbich ex Knapp). — *P. permixta*; *P. coronensis* Schur ex Blocki (!). — *P. gentilis*; *P. engadinensis* Brügg. (Helv. mer.). — Comment. 104.

**P. elongata* Goldb. in Flora 1820. *P. Goldbachii* Rupr. ingr. (1845). Ross. med., mer. — *P. virgata* Lehm. (Podol.).

24. *P. chrysanthra*: Ross. mer. Hung. or. Banat. Transs. Serb. Alban. Maced.; cfr. ap. Zimmeter in Kern. sched. ad exs. 1883.

25. *P. collina*: Ross. mer., mer.-occ. Marchia (Brandenb.). Carinth. (Oberdrauburg: Jabornegg). — *P. Lindackeri*; vid. sub *P. verna* (34). — *P. thyrsoiflora* (Hülßen ap.) Zimmeter in Kern. sched. ad exs. 1882. *P. Wiemanniana* var. *grandiflora* Blocki in sched.; Poson. (: Hülßen). Galic. (pr. Lemberg: Blocki).

**P. præcox* (*P. alpicola* Delasole ex Gremli). — *P. leucopolitana* (1858); nomen e loco classico Weissenburg Alsatie. *P. Wiemanniana* auct. (non Günth.). *P. Wieman. parviflora* Blocki (in sched.): Polon. Galic. (— *P. leucopolitanoides* Blocki 1886).

27. *P. intermedia* (*P. diffusa* W. ex Rehb. exc. add. 870. *P. visurgina* Whe 1825): Ross. bor. (gub. Wologda: Ivanitzky 1884). Boruss. (nuperius introd.). Westphal. (Vlotho ad fluv. Weser). — *P. digitato-flabellata* Heidenr. (Tilsit) est var. vegetior ex Aschn et Uechtr.; cfr. Ascherson in sitzb. bot. ver. brandenb. 1882.

28. *P. delphinensis*; pl. Herbich. (*P. patens* et *P. pratensis*) ad *P. heptaphyllum* (23) pertineant; see. Blocki *P. pratensis* Herbich probab. est = *P. chrysanthia* Trev. (24).

29. *P. aurea*: Bavar. (extra Alpes) pr. Kempten; etiam Island. ex Lindsay (1877), sed ab aliis non commemoratur; an igitur indicatio hæc *P. alpestrem* (31), ibi frequentem, vel ejus subspec. *P. gelidam* respicit?

**P. chrysocraspeda*: Moldav. Bulgar. (m. Osogovska Planina : Vandas. Velen.).

**P. ambigua*; ins. Færøer (: Rostrup); ad hanc *P. alpestris* islandica sæpe accedit ex Strömfelt.

31. *P. alpestris* (*P. verna* L. suec. quoad descr.): Ross. balt. (: Klinge). — *P. pseudofrigida* ad *P. chrysocraspedam* (29 *) pertinet ex Smk. — Comment. 105.

**P. gelida*; Lapp. non nisi ad Kvikkjokk lecta videtur.

**P. baldensis*; Comment. 106.

32. *P. nevadensis*; hab. etiam Hisp. bor. (Santander: Ler. Lev.!, Pico de Arvas Astur.: Dur.) et Jaën. (: Blanco).

33. *P. patula* (*P. hirta* Bng. et auct. transs. ex Smk.): Moldav. Bosn. (: Brandis ex Freyn); Galic. vix adest teste Knapp. — *P. pratensis* certe hic pertinet ex Smk. (et = *P. Schurii* Fuss in Kern. exs. p. p.). — Comment. 107.

34. *P. verna* (*P. opaca* Kern.). — *P. serotina* (1789). *P. Lindackeri* Tsh in Flora 1819; cfr. Zimmer in Kern. sched. ad exs. 1886 (*P. Lindackeri* Tsh in Flora 1830 sub 25 *P. collina* militat). — *P. bolzanensis* Zimmet. europ. potent. (1884). *P. verna* var. *pilosa* Hsm. (Tyrol.) — ? *P. aurulenta* Greml. 1885. (Helv.). — ? *P. prostrata* Greml. (Helv.).

35. *P. opaca* (*P. Schurii* Fuss in Kern. exs. p. p.): Bleking. (juxta fines scanic.). Moldav. Carinth. — *P. rubens* Crantz (1769). *P. opaca* Jacq. Comment. 108. — *P. tirolensis*; Comment. 109. — *P. vindobonensis*; Comment. 110.

**P. australis* Kern. non Jord. (*P. verna* var. *hirsuta* Vis.); Istr. (vid. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 331); hab. etiam Helv. et Hung. ex Freyn; *P. opacæ* valde proxima. Comment. 111.

36. *P. cinerea*: Bosn. (: Brandis ex Freyn) Bulgar. Ross. centr. (gub. Kursk), balt. (ex Klinge); Helv. (ex Greml.) non nisi Basilie hab., nam loca cetera (Vales.) pertinent ad *P. Gaudini* Grml. (*P. cinerea* Gaud. p. p.). - *P. incana* (1802). *P. arenaria* (1800). — Comment. 112.

**P. subacaulis* Wulf. (1788). *P. grandiflora* Sep. carn. (non al.). — *P. Tommasiniana*: Istr. Bosn. mer. (: GBeck 1885).

**P. velutina*; *P. subacaulis* L. (1762).

37. *P. reptans*; Fenn. adest in Aland. (et casu Nyland). — *P. microphylla* Tratt.

38. *P. procumbens*: Hisp. bor.; Suec. extra Scaniam valde rara est; Germ. hab. etiam mer. sed raro (solum in Würtemb. aliquot locis satius lecta); Ross. hab. etiam balt.; Siles.; Transs. (sicut Hung.) dubie citetur; Helv. excl., nam pl. helvet. (ex Greml.) est *P. ascendens* Grml. (*P. procumbens* et *P. mixta* auct. helv.) et = hybr. a *P. reptante* et *P. Tormentilla*.

39. *P. Tormentilla*; Hisp. mer. indicatur ex Née, de la Leña et al.

40. *P. holosericea*; ex obs. cl. Haussknecht (litt. 1889) hæc species (erronee inter *Leucanthas* citata) identica est cum *P. Detommasii* (20).

41. *P. alchemilloides*: Hisp. bor. (prov. Vascongados).

42. *P. alba*; hab. etiam Moldav. Bulgar. (Petrov Han, m. Vitos etc.).

43. *P. valderia*; dep. Alpes-Marit. (reg. alp. plur. loc.)

44. *P. caulescens*: Hisp. centr. castel. (r) indicata est (: Amo, Cienf.). Alpes-Marit. (reg. mont. sat abunde). Bosn. mer. (: GBeck 1885).

**P. petiolulata*: Tyrol. mer. (val di Ledro: Porta); Helv. (ex Greml.) in solo m. Salève pr. Genevam lecta est.

45. *P. nivalis*: Hisp. bor. (Picos de Europa: Le. Lev.). Catal.

46. *P. Haynaldiana*; locus classicus speciei hujus pulcherrimæ est ad Kalofer (Thrac.); alius detectus est a Csátó (1873), in m. Pareng, inter Transsilv.

et Valachiam (circ. 2000 metr. s. m.); Barth plantam ibi legit 1882; in tractu montium Osogovska Planina Bulgar. adest var. balcanica Vandas in diar. (sitzb.) soc. scient. bohém. 1888. 445.

47. *P. grammopetala*: Helv. mer. (Val Forcola in Misox).

48. *P. Clusiana*: Bavar. (Alpes or.). Transs. (Bmg.).

49. *P. saxifraga*; eximia hæc species detecta est ab Ardoino (1847) in rupibus valde abruptis inter Ste-Agnès et Castillon (alt. 870 metr. supra Mentone) et postea a plurib. aliis, variis locis lecta est (a cl. Lacaita copiosiss. in rupibus calcareis pr. S-Dalmazzo di Tenda et inter La Briga et Tenda); in valle de Thorenc supra Grasse a cl. Loret.

51. *P. montenegrina*; sec. b. Uechtritz (litt 1881) omnino est *P. Buccoana* Clem., collatis speciminib. authentic. Pantocsekianis. Planta e seminibus serbicis in horto Uechtr. educata sæpe folia radicalia quinata protulit.

52. *P. Jankeana*; hæc et præcedens in Consp. male inter *Leucanthas* enumerantur, nam pertinent ad *Chrysanthas* et locum habeant ante *P. grandifloram* (61).

54. *P. apennina*: Serb. in montibus elatis circa Nisch et Hereeg. in alpinis ad Mostar (: Bornmüller 1886).

56. *P. nitida*: Bosn. (in rupibus m. Prenj Planina: GBeck 1885); in Styr. alpe Hochschwab indicatur ex Maly.

57. *P. splendens*: Gall. bor.-occ. (Normand., r.).

58. *P. Fragariastrum* (Ehrh. herb.) *P. syn.* (1807). *P. fragarioides* Vill. (1789). *P. fragariaefolia* Gm. (1806). *P. sterilis* Geke (1863); adest in Scan. mer.-or. (vid. ap. Nilsson in bot. not. 1881), in Lusit. (Oporto, Valenca) ex Johnston et Texidor; Transs. desit (*P. prostrata* Bmg. ad seq. *P. micrantham* pertinet ex Smk.).

**P. carniolica* Kern. (oe. bot. z. 1870). Carn. mont. (Laibach). Croat. (vall. Recina).

59. *P. micrantha*: Hisp. bor. (Picos-de-Europa Cantabr.: Ler. Lev.), centr. castel. (r., ex Amo, Colm.). Gall. or. (Côte-d'Or). Germ. prov. rhen., rarius (Andernach, Boppard etc.). Debrud. (reg. silv. freq.: Ue.S.).

60. *P. norvegica*: Dan. Fenn. (cum Lapp. occ.). Siles. Styr. (pr. Graz, r.).

61. *P. grandiflora*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.). Helv. non nisi in Alpihus. —? *P. valesiaca* Huet.

62. *P. emarginata* (ex Torr. Gray species Pursh. dubia est); *P. fragiformis* W. in mag. ges. nat. fr. zu Berlin VII. 294. — var. *parviflora* Trautv. nov. seml. Hab. etiam ins. Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875).

63. *P. minima*; Comment. 113.

64. *P. nivea*: Fenn. bor. (Ks). Carinth. (Kleinzirknitz: Jaborn. 1872).

65. *P. frigida*; Helv. solum in Alpihus adest.

× *P. Breunia* Huter = *nivea* + *opaca* (Tyrol.).

× *P. commixta* Hsskt. (ms.) = *Detommasii* + *recta* (m. Pindus).

× *P. dispersa* Hsskt. (ms.) = *pedata* + *pindicola*. (m. Pindus).

× *P. Heerii* Brügg. = *aurea* + *heptaphylla*. (Helv.).

× *P. Hegetschweileri* Brügg. = *alpestris* + *frigida*. (Helv.).

× *P. intercedens* Hsskt. (ms.) = *Detommasii* + *pedata*. (Pindus).

× *P. Kernerii* Borb. = *argentea* + *recta*. (Hung.).

× *P. micans* Hsskt. (ms.) = *Detommasii* + *pindicola* (m. Pindus).

× *P. pedatoides* Hsskt. (ms.) = *pedata* + *recta*. (m. Pindus).

6. *Sibbaldia*. 1. *S. procumbens*: ins. Færöer. Jura (Reculet, MtTendre).

7. *Dryas*. 1. *D. octopetala*: ins. Færöer. Galiz. Moldav. Styr. etiam extra Alpes obvia (m. Schöckel pr. Graz, Sulzbacher-Geb.). Ross. gub. Stawropol, ad alt. 3100' (: Owerin).

8. *Sieversia*. 1. *S. reptans*: Alpes-Marit. (St-Dalmas-le Sauvage). Bavar. (Alpes Algov.). Galic. (Carp. centr.). Roman. (m. Zaganu). Maced. m. Rilo (: Pance); Helv. non extra Alpes obviam venit.

2. *S. montana*: Galic. Roman. (alp. Bucieciu, vall. Jalomni). Bulgar. (in summo m. Vitos pr. Sofia: Velen.).

2. *a. S. bulgarica* Panc. elem. bulg. 26. 1883 (sub Geo). - Bulgar. Maced. m. Rilo (: Pancic); ex Boiss. or. suppl.

**S. rhætica* Brügger (sub Geo) in annal. soc. nat. scrut. bund. 1882 (*) = *reptans* + *montana*. (Engadin).

9. *Geum*. 1. *G. coccineum*; Bulgar. in summo m. Vitos, ad scaturigines, floribus nunc rubris nunc luteis (: Velen.); in m. Osogovska Planina et in decliv. m. Kom (: Vandas. Velen.).

4. *G. molle*: Bulgar. ad Petrov Han, in m. Vitos et in decliv. m. Osogovska Planina (: Vandas. Velen.).

5. *G. hispidum*: Suec. med. (in tæniis Nycop. Suderm.: Elmqvist); in Suec. mer. extra Smolandiam rarum (Ostrog., Bleking., Halland.).

6. *G. strictum* (1789). *G. aleppicum* Jacq. (1786): Rumel. or. pr. Slivno (: Skorpil ex Velen.)

**G. intermedium*: Galic. — *G. spurium* F.M.; Rupr. ingr.; dicitur hybr. ex *G. stricto* et *G. urbano*.

7. *G. urbanum*; adest in Norv. arct., ubi in ins. Lofoten, ad lat. 68° 12', terminus speciei polaris (ex Norman); in Suec. bor. usque ad Medelpad.; in Fenn. bor. deest.

**G. intermedium* Ehrh.; exacte medium inter præced. (urbanum) et seq. (rivale), sed vix hybr. (cfr. Lge haandb. ed. IV. 811).

**G. intermedium* W.; *G. Willdenowii* F.M. - Eur. med., bor.

8. *G. rivale*; Hisp. bor. (r.) adest! — *G. pallidum* (A.Mey. ind. sem. petr. XI. (1846): Suec. med. scil. Suderm. (: Elgenstierna), Vermel. (: Reuterman) et probab. alibi (sic ad Christiania Norv.); ex Scheutz monogr. et Lge haandb. sat diversum est a *G. rivali*.

9. *G. inclinatum*: Carinth. (Wolliger-Alm, Seisera Giesbach).

**G. pseudomolle* Pntek. = *molle* + *rivale*. (Monten., Bulgar.).

**G. teszlense* Smk. = *strictum* + *urbanum* (m. Teszla etc. Transs.).

10. *Waldsteinia*. 1. *W. geoides*: Moldav.

2. *W. trifolia* (1838). *W. triloba* Hornung in Bmg. mant. (1846). *W. sibirica* et *Comaropsis sibirica* auct. transs. (ex Smk.). - Transs. nunc plurib. loc. lecta est.

11. *Rosa*. 1. *R. moschata*; vera hab. (teste Lojac.) solum (et rr.) in Nebrodib. sc. Porcari (ex hb. panorm.) et in silva ad S. Guglielmo (frutex unicus), unde Panormi culta adest (= *R. sempervirens* $\beta\beta$ Guss.). — *R. ruscinonensis* (et *R. Broteri* Tratt.) a *R. moschata* typica vix distinguendæ et in Pyr. or. non nisi inquilinæ adsunt (nec indigenæ).

2. *R. sempervirens*: Hisp. mer. Croat. (Fiume, in locis asperis litoral.: A-MSmith). — *R. microphylla* DC. (Gall. mer.). — *R. panormitana* Tod.; *R. sempervirens* β Guss.; vid. de hac (et præc.) specie ap. Lojac. in diar. malpigh. 1888. 318—324.

3. *R. arvensis*: Lusit. Hisp. bor., centr. Balear. (Mallorca: Barcelò). Germ. in bor.-occ. et centr. (Thuring.) rarior, in mer. frequentior. Bulgar. Græc. m. Kylene (: Heldreich).

**R. baldensis* Kern. ap. Desegl. (1876). *R. repens* Bmg. *R. arvensis* auct. transs. ex Smk.

6. *R. gallica*: Lusit. et Hisp. non vel vix indig. est et non nisi subsponsanea adsit; Germ. indicatur etiam in Bavar. et Siles., sed ex Geke in Germ. adest solum in hortis et planta spontanea pertinet ad subspeciem *R. pumila*, quæ ibi in mer. et centr. passim occurrit.

**R. pumila*: Græc. bor. m. Pindus (: Hausskn. Heldr.). Ross. mer.

**R. austriaca*: Helv. Bosn. mer. (: GBeck). Bulgar. Transs. (*R. gallica* auct. transs. ex Smk.). — *R. mirogajana* Vuk. Braun ap. Kern. 1883. (Croat.).

7. *R. stylosa*: Hisp. mer. (S. Nev.) ex Willk.; Istr. (: Freyn).

**R. systyla*: Hisp. or. (Catal.: Timb.). Angl. mer. (South-Hampsh.: H. Groves).

8 * *R. resinosa*: Bosn. mer. (Lukavac ad Bjelasnica: GBeck 1885).

9. *R. mollissima* (*R. tomentosa* auct. suec. veter.); in Suec. bor. rara (Jemtia, Helsing.), deest in Lapp., et Fenn. non nisi in mer.-occ. obviam venit.

**R. venusta*: Dan. (hinc inde ex Lge). Siles. Helv. (Flims in cant. Graub.; Gremli). — *R. Scheutzii* (etiam Dan. obvia) ad speciem ipsam (*R. molliss.*) propius accedit et ejus var. albidiflora dicitur.

11. *R. Heldreichii*; ex Christ in Boiss. or. suppl. = *R. mollis* (9).

12. *R. tomentosa*; Dan. non rara, sed Fenn. non nisi in ins. Aland, obvia; Hisp. bor. navar. et centr. castel. plur. loc. indicatur. — *R. Friesii* Scheutz (in Consp. sub 27 *R. collina allata*) hab. etiam Dan. (Sjelland.) ex Lge.

**R. vestita*: Morav. (: Oborny).

**R. scabriuscula*: — *R. cuspidatoides* (*R. umbelliflora* Sw. in sched.): Suec. med. Dan. — *R. Seringeana* (1854). *R. cuspidatoides* Desegl. ex HBraun (non Crep.). *R. pseudocuspidata* Crep. (1872). — *R. leucadia* HBraun in act. soc. z.-b. vind. 1885. Ins. *Leucadia* (Sta Maura): Spreitzenhofer 1878.

**R. foetida*: — *R. abietina*: Scan. ex Scheutz (var.). Helv. Austr. p. d. (: Keller). Carinth. (rarius). — *R. Brunica* Bouv. (1875) sec. Christ.

**R. cinerascens*: — *R. Hawrana* Kmet in Kern. sched. ad exs. 1882. Hung. bor. in rupetribus montis Hawran ad oppid. S. Antal.

13. *R. spinulifolia*; Helv. mult. adest ex Gremli, Siles. r. ex Fiek et Garcke. Comment. 114. — *R. wasserburgensis* (in Consp. sub 21. *R. flexuosa* cum? *allata*): Alsat. (Bollenberg arcis Wasserburg, Hohneck Voges.); etiam Styr. (pr. Sulzbach) indicata.

14. *R. glutinosa*: Monten. Dalm. (*R. dalmatica* Kern. in oe. bot. z. 1870) ex Boiss. or. suppl.

**R. Coqueberti* Burn. Grml. - Græc. (Coquebert de Montbret in hb. Webb.).

15. *R. Heckeliana* (err. Hackeliana); ex Christ *R. tomentosa* (12) affinis est. — *R. sicula* (ex Christ proxima 19 * *R. agresti*): Parnass. (Heldr. 1878). *Agrapha Pindi*, 5500'—6000' (Heldr. 1885); ex Boiss. or. suppl.

16. *R. rubiginosa*; Hisp. etiam mer. indicatur. — *R. Gremlii* (Christ 1873) Kern. 1882. Germ. mer.-occ. Helv. Pedem. — *R. bohémica* HBraun (1885). Bohem. Hung. — *R. anisopoda* Christ. *R. Kluckii* Gren. jur. non Bess. (Genève). — *R. comosa*; Comment. 115.

**R. drosophora* (Comment. 116).

**R. caryophyllacea* (in Consp. vid. sub 12 * *R. scabriuscula*). Comment. 117.

**R. Thureti* Burn. Grml. suppl. ros. alp.-marit. (1883). *R. calabrica* Huter var. *Thureti* cor. ros. alp.-marit. (1879); hab. etiam Græc. m. Parnass. et Velucho (ceterum "in tota reg. medit. hinc inde" ex Boiss. or. suppl.).

17 * *R. permixta* (sequenti *R. micranthæ* propior videtur): Morav. (r.). Carinth.

18. *R. micrantha*: Scot. (: Arth. Bennett). Austr.-Infer. (: HBraun). Istr. Carinth. (Obervellach: Pacher). Transs. (Smk.). — *R. Lemani*: Helv. Carinth.

19. *R. sepium*: Belg. bor. (Campine, rr.). Istr. — *R. inodora*; in Suec. vix extra Bahus. (Orust etc.) et Halland, obvia (Gotland, hæc species nunc destructa dicitur). — ? *R. almericensis* Rouy. (Velez Rubio Andal.). — *R. elliptica* Tsh. 1819; HBraun in act. soc. z.-b. vind. 1885. 81—87. (Bohem. Morav.).

**R. agrestis*: Hisp. mer. (Andal.), rr. ex Rouy.; Græc. bor. m. Pindus (: Haussknecht 1885) ex Boiss. or. suppl. (var. abscondita Christ). — *R. vinodora* (*R. sepium* Host et al.): Morav. — *R. graveolens*: Carinth. (in valle Möllthal vulgata). — *R. lugdunensis*: Carinth. (: Pacher). — *R. cheriensis*: Carinth. Tyrol. — *R. albiflora* Opiz. (Bohem. Morav.).

**R. Seraphini*; ex Burnat hab. in Ital. med. (Modena, Tosc.). Cors. et Sard., nec in Sicil., nam *R. Seraphini* Guss. ad *R. siculam* (15—) pertinet. — *R. viscosa* (an potius ad 15 *R. Heckel.*?) : Gran. (S. Tejada, S. Nev.) ex Boiss.

20. *R. tomentella*: Siles. Bavar. (rarius). Carinth. (pr. Malborgeth: Pacher 1883). Græc. bor. (m. Pelion, Pindus). Thessal.; ex Boiss. or. suppl. — *R. similata*: Morav. (: Oborny). — *R. hallandica* (Scheutz in b. v. a. ö. 1873) est propior *R. abietina* (sub 12 * *R. foetida*) ex Winslow. — *R. Oborniana* Christ in Flora 1877. *R. Gizellæ* Borb. (1880) ex Smk. (Morav. Transs. etc.).

**R. sclerophylla*: Vales. (Binn: Favrat). Morav. (pr. Brunn: Oborny 1875 ex Christ). Siles. (ex Fiek). Slesvic. (pr. Haderslev). Langel. (ex Lge); ad *R. inodoram* Fr. (19—) valde accedit. (: *R. inodora* var. *danica* Scheutz antea).

**R. nebrodensis*; — *R. subintrans*: Vales. (r.).

21. *R. flexuosa*; hab. etiam Siles.

**R. Pugeti* (ex Gremli ad seq. *R. Jundzilli* pertinet): Helv. (Genève etc.).

22. *R. Jundzilli*: Bavar. bor.-occ. (rr.). Carinth. (r.). Helv. r. (Genève, Schaffh., Wald in cant. Zürich). Transs. (: Freyn ex Borb.). Bohem. (: Velenowsky 1883). Morav. (— *R. reticulata* Kern.).

**R. nitidula*; — *R. belgradensis* Panc. (ex Borbás 1880).

**R. livescens*; hab. etiam Morav. (: Oborny).

23. *R. trachyphylla*: Lothar. (rarius, primum lecta a Godron 1850 pr. Nancy). — ? *R. Schmidtii* HBraun. (Austr.).

24. *R. canina*; Suec. bor. non adest ultra Angerm., sed Norv. usque in arct. (ins. Lofoten), ibique ad 68° 13' terminus speciei polaris (ex Norman). Fenn. bor. et med. deest. — *R. Carioti*: Carinth. (Wolligen, Stallhofen: Pacher). — *R. medioxima*: Carinth. (: Pacher). — *R. venosa* Sw. sum. (1814); sv. bot. 29. — *R. sarmentacea* Sw. (non Woods). *R. Swartziana* Fr. hall. — *R. Afzeliana* Fr. hall.

**R. dumalis*; — *R. glaberrima*: Helv. (: Vevey; Salève etc.). — *R. squarrosa*: Morav. (r.). Carinth. — *R. rubescens*: Carinth. — *R. latebrosa*; Magn. fl. sel. exs. 61. — *R. montivaga*: Carinth. Morav. Hung.

**R. biserrata*; hab. etiam Angl. mer. (Hampsh.); Morav. — *R. eriostyla*; etiam Morav., Vindob., Carinth. (Obervellach: Pacher). — *R. podolica* Tratt. *R. glaucescens* Bess. (non Wulf.).

**R. andegavensis*: Angl. mer. — ? *R. litigiosa* Crep. (Gall. mer.).

**R. senticosæ*; — *R. fallens*; *R. albo-lutescens* Rip. ap. Desegl. (1876); hab. etiam Vindob. — *R. transsilvanica*: (cfr. ap. HBraun in Kern. sched. ad exs. IV. 18—21); Bosn. (: GBeck). Hung. Transs. Moldav. — *R. globularis*: Belg. (: Durand). Morav. (: Oborny). — *R. aciphylla*: Carinth. (r.). — *R. myrtilloides* (Tratt.) HBraun in act. soc. z.-b. vind. 1885: Morav. Styr. Carniol. (Wulfen 1762).

25. *R. dumetorum*; *R. agrestis* et *R. campestris* Sw. ex Scheutz.

**R. urbica*; hab. etiam ins. Chios (: Orph. ex Boiss. or. suppl.). — *R. uncinelloides*; hab. Sabaud., Tyrol., Austr.-Infer. (ex HBraun). — *R. uncinella*; hab. Ross. mer., Transs., Hung.

26. *R. coriifolia* (*R. sepincola* et *R. sepium* Sw.); Fenn. mer.-occ. (Aboa, Aland.), Dan. (passim). Germ. (ex Garcke) non nisi Hamburgi et pr. Wrietzen hab., sed etiam Bavar., Saxon. (r.). Morav. (: Oborny), Galic. (: Blocki) etc. indicatur. Ital. med. (Apenn. pr. Pistoja: Forsyth Major). Bosn. mer. (: GBeck). Græc. m. Pelion et Agrapha Pindi (Hausskn.: var. subcollina Christ). — *R. incana* Kit.; *R. Kmetiana* Borb. (Hung. Morav.). — *R. Vagiana* Crep. ex Borbás (1880).

**R. pycnanantha* HBraun ap. Kern. (1883). *R. coriifolia* var. Borb. (1880). Hung.

27. *R. collina*; — *R. Zoiseana* Oborn. HBraun. (Morav.). — *R. Tauschiana* HBraun. *R. rupestris* Tsh in litt. non Cr. (Bohem.). — *R. Kernerii* HBraun 1885. *R. cerasifera* Kern. sched. (non Timb.). *R. gorenkensis* Halacs. HBraun non Bess. (Austr.-Infer.). — *R. Friesii*; cfr. sub *R. tomentosa* (12). — *R. alba* L. sp., quæ teste Kochio certe huc pertinet (ex aliis est hybr. e grege *R. gallicæ*) et ("omnium varietatum pulcherrima"), in hortis sæpe colitur (multa varietate); in variis terris subspontanea indicatur.

**R. corymbifera* (Borkh. Holzg. 1790); *R. sepium* Rau virceb. (1816) non Th. 1799; hab. etiam Morav. etc.

**R. saxatilis*; — *R. Boreykiana* (cfr. hybr. ad calcem generis); Morav. (: Oborny). — ? *R. Helmerlii* HBraun. (Hung.); forse hybr. ex ipso auct.

* — ? *R. catalaunica* Costa. - Hisp. or. (Catalon.).

28. *R. Pouzini*: Sard. (ex Burnat). Agrapha Pindi, 5500—6000': Haussknecht 1885 (var. *græca* Christ).

**R. inconsiderata*; — *R. hispanica*: Etna (Strobl teste Christ). — *R. Chavini*; Helv. non nisi in m. Salève (Genève) lecta dicitur.

29. *R. ferruginea*: Vizcaya (Bilbao: Willk.). Bavar. (Alpes Algov.; Kempfen). Styr. (Maria-Zell, Neuhaus etc.). Serbia (ex Kerner); Transs. (ex Smk.) excl., sed ibi adest (r.) var. *R. livida* (*R. gutensteinensis* Jacq. f. 1821). — *R. glaucescens* (1805); Carinth. (Malmitzthal: Wulfen). Comment. 118.

**R. glabrata*; Styr. (ex Maly) hab. loco unico sc. m. Buchberg pr. Frohnleiten (: Vest), sed nunc (ex HBraun) etiam in Austr.-Infer. ad pagum Prein lecta est. — ? *R. Pachleri* Keller in deut. bot. monats. 1884. Carinth. vall. Malmitzthal, 1100 metr. s. m. (: Pacher).

30. *R. montana*: Castil. et Arag. (r.). Helv. indie. in Vales., Salève, Neuenbg.; hab. etiam in Græc. bor. (Pindi tymph. m. Zygos, 4500—5000': Hsskt 1885) ex Boiss. or. suppl. — *R. sytnensis* Kmet in Kern. sched. ad exs. 1882. (Hung. bor. m. Sytno pr. oppid. Schemnik.).

**R. salævensis*: Vales., Vaudia etc. (r.):

31. *R. glauca*: Carinth. (in convallib. montium satis). Græc. m. Parnass.

(: Orph.) ex Boiss. or. suppl. — *R. Reuteri*; hab. Helv. Bavar. Saxon. (r.). Morav. Siles.; etiam Germ. bor. (Wolgast, Koenigsb.) ex Christ nec non Suec. mer. et med. (mult. loc.) ex Scheutz; Dan. (hinc inde) ex Lange.

**R. venosa*; — *R. suberistata* sec. Christ = *R. sclerophylla* (20 *). — *R. Schultzii*: Suec. occ. (Göteborg etc.) ex Winslow (: *R. hibernica* ej. antea).

**R. hibernica*; — *R. armatissima* Desegl. ex Christ. (Gall. dep. Cher).

32. *R. cinnamomea*; in Fenn. tota indig., sed Dan. non nisi culta (et pluribus locis efferata) adest; sic etiam Transs. ex Smk. — *R. glabrifolia* (CA Mey. in litt.) Rupr.; hab. Ross. med. (Ingria, Wiatka, Ural).

**R. blanda*; — *R. fraxinifolia* ex America bor. introducta est et nunc inquil. Gall., Helv., Germ. occ., Belg.

33. *R. carelica* (*R. acicularis* Lindl. 1820. var. *carelica* Rupr. ingr.); adest in Fenn. tota exc. mer.-occ. et Lapp.; in loco suec. primar. (Skellefte Vestrob.) nunc destructa (sed in hortis ibi culta persistens) dicitur.

34. *R. balearica*; sine dubio culta vel introd. (*R. virginiana* Tratt. *R. carolina* var. *lævis* Ser.): Marès sec. specim. auth. hb. DC.

35. *R. baltica*: Kullaberg Scan.bor.-occ.: JPWeland 1871 (teste Elgenstierna).

36. *R. alpina*: Hisp. bor. (Astur. etc.), centr. (rr.); Sty. adest etiam extra Alpes (pr. Rohitsch, Neuhaus etc.) ut etiam in montib. Carinth. — *R. adenophora* Kit. ap. Schult. (1814): Transs. (*R. pyrenaica* et *R. monspeliaca* auct. transs. *R. adenosepala* et *R. stenodonta* Borb.: om. ex Smk.).

**R. pyrenaica*: Helv. Bavar. mer. Siles. (Sudeti). Olymp. Thessal. (: Heldreich).

37. *R. pimpinellifolia*: Morav. — ? *R. Malyi* Kern. 1869; HBraun in act. soc. z.-b. vind. 1835. (Dalm. Bosn. Aprut. m. Corno; ex HBraun).

**R. rubella*; — *R. hibernica* jam sub 31 *R. glauca* allata est.

**R. gentilis*: Croat. Bosn. ex HBraun.

38. *R. spinosissima*; in Norv. occ. (præf. Bergen) non valde rara est, sed Suec. non nisi in ins. Koön Bahus. lecta; etiam Hisp. centr. et mer. (rarius) indicatur.

**R. reversa*: Tyrol. — *R. Simkoviesii* Kmet 1884. *R. reversa* Smk. 1883. (Hung.). — *R. holikensis* Kmet 1884. (Hung. m. Holik etc., Croat.). — ? *R. Wulfenii* Tratt. 1823; HBraun in act. soc. z.-b. vind. 1885. (Carniol., Croat.).

39. *R. myriacantha*; — *R. Riparti*: Angl. (Surrey) ex Nicholson; Germ. a Garcke non citatur.

40. *R. involuta*; planta Norv. mer. (: Leffler in bot. not. 1874 et in Htn handb. 1879) diversa est et = *pimpinellifolio-mollissima* Christ (1877); vid. Scheutz in bot. not. 1877 et Murbeck ib. 1885. 67—74 (sed cfr. etiam Leffler in Htn handb. ed. XI. 273) Hab. in Mosteröen (: Lindeberg), Bömmelöen (: Murbeck). — *R. coronata*: Angl. mer. (ins. Wight).

**R. Sabini*: Belg. mer. (calcar. Givet: Crepin). Badia (rr., var. *Ravellæ* Christ). Delph. (dep. Isère: Moutin ex Crepin 1881). — *R. Doniana*; hab. etiam Delph. (ex Boullu 1881).

Obs. *R. lucida* Ehrh., species boreali-americana, in hortis culta, interdum subspontanea occurrit; sed sub hoc nomine etiam *R. baltica* (35) citatur.

41. *R. lutea*; — *R. bicolor* Jacq.; etiam hæc interdum quasi spontanea obviavit.

XR. *anoplangantha* Christ = *pomifera* + *cinnamomea* ex Favrat.

XR. *Bænitzi* Christ = *cinnamomea* + *pomifera* ex Christ.

XR. *Boreykiana* (27 * —) = *gallica* + *obtusifolia* (25 —) ex Christ.

XR. *Chaberti* Desegl. = *gallica* + *canina* ex Christ.

XR. *Franzonii* (29 —) = *pomifera* + *ferruginea* ex Christ.

XR. *Guicciardii* Burn. Grml. = *glutinosa* + *Heckeliana* (Parnass.).

XR. *Lereschii* Christ = *coriifolia* + *alpina* ex Christ.

XR. *oetæa* Burn. Grml. = *glutinosa* + *glauca*. (m. Oeta Græc.).

XR. *Waitziana* Rehb. = *gallica* + *Reuteri* ex Christ.

12. *Agrimonia*. 1. *A. Eupatoria*; exc. etiam Fenn. bor., med.

2. *A. odorata*: Scot. (ins. Arran et Stirlingsh.: Craig-Christie 1877). Suec. med. (rr.). Batav. (ex Abeleven). Helv. (rarius). Morav. Siles. Galic. (rr.). Hung. (Hzl.). Bulgar.; Transs. pertineat ad — *A. glandulosa* Smk. (*A. repens* Bmg. *A. odorata* var. *macrocarpa* Borb.).

3. *A. repens*; Transs. ad præc. (var.) pertinet ex Smk.

4. *A. pilosa*: Fenn. mer.-or. (Karel.), mer.-occ. (Tavastl.). Hung. (Biharia: Smk., Marmaros: Jka 1885). Transs. r. (Smk.).

13. **Aremonia.** 1. *A. agrimonioides*: Bulgar. (Velen. et al.).

14. **Alchemilla.** 1. *A. vulgaris*; — *A. glabra* (Wimm. Grab.) Kern. *A. vulgaris* β L. suec.? (Siles., Tyrol. etc.); cfr. Kern. sched. ad exs. 1883. 12, 13. **A. hybrida*: Pyren. or. (: Rouy 1877). Pedem. (: Rostan). Styr. Bosn. mer. (: GBeck). Siles. Galic. Moldav. — *A. montana* W. 1809. *A. vulgaris* γ hybrida W. 1795 (Saxon., Bavar. etc.). Semper cano-pilosa est, sed speciei typus (*A. vulgaris*) ætate glabrescit. Pro historia ejusd. cfr. præ aliis Rouy in bull. soc. bot. 1881 (*). — *A. ambigens*: Pyren., Cantal.

2. *A. fissa* (*A. palmatifida* Tsh): Bosn. (: GBeck, Brandis ex Freyn). Herceg. (: GBeck). Jura (Colombier de Gex ex Gremli). Voges. raro (: Boulay, Moeder). — *A. pubescens* auct. var. (vix MB.).

**A. (fissa var.) færoëensis* Lge nomencl. fl. dan. 173. *A. conjuncta* Strömf. in v. a. 5 1884. 113. - Ins. Færoër. Island.

3. *A. conjuncta*; aff. propior est speciei sequenti et forse melius hujus subspeciem sistet; de planta færoënsi cfr. Rostrup in bot. tidskr. IV. (1870). 30 et XVI. (1888)-173, nec non Arth. Bennett in journ. of bot. 1886.

4. *A. alpina*: Lusit. (S. de Estrella: Welw.). Catal. Aragon. Navar. Santander. Herceg. (: GBeck, Brandis); Hibern. non indig. est sed ex horto quodam elapsa ex Corry (1883).

7. *A. microcarpa*: Sard. (Reverchon 1881, de Sardagna 1883).

8. *A. cornucopioides*: Lusit. bor. (Bragança: Henriquez).

× *A. algida* Brugg. = *fissa* + *pentaphylla* (Helv.)

× *A. Geheebii* (Siegfr.) Brugg. in annal. soc. nat. scrut. bund. 1882.

× *A. helvetica* Brugg. = *fissa* + *hybrida*, (Helv.).

15. **Sanguisorba.** 1. *S. officinalis*: Lusit. (Caldas da Rainha: Brand.). Moldav. Bulgar. — *S. montana*: Helv. Bulgar.

2. *S. polygama*: Fenn. bor.-or. (Kk.).

3. *S. dodecandra*: Valtellina (ex Gremli).

16. **Poterium.** 1. *P. agrimonioides*; Hisp. etiam bor. indicatur.

3. *P. garganicum*; hab. etiam in Græc. (m. Pentelikon: Haussknecht 1885).

4. *P. dictyocarpum*; Suec. hab. in or. multa sc. a Scania usque in Up-land.; Norv. deest.

4. *a.* *P. Gaillardoti* Boiss. diagn. ser. II. 2. 52. Bulgar. in collibus et versuris ad Varna: Velen. 1885; vid. act. soc. sc. boh. 1885. sep. 15. (*). Species præcipue syriaca.

6. *P. ancistroides*; hæc species rara ad Denia relecta est a Rouy (1883).

7. *P. rupicolum*: Lusit. (: Welwitsch). Sard. (: Ascherson).

8. *P. muricatum*: Germ. (med. etc.; cum Onobr. sativa introd.). Helv. (cum Medic. sativa introd.). Styr. (Dietl ex Maly). Istr. Bosn. (: GBeck). Roman. Bulgar.

9. *P. Magnolii*: Lusit. (: Welw., Daveau); etiam Sicil. (Catania-Misterbianco) ex Strobl (1886).

10. *P. mauritanicum*: Balear. ex Barcelò.

12. *P. multicaule*: Lusit. (: Daveau, Welw.).

13. *P. verrucosum*: Sard. (: Ascherson). Attica (ad Hymettum: Lacaita).

XXXVI. POMACEÆ.

1. **Cydonia.** 1. *C. vulgaris*: Istr.; etiam Germ. med. spont. ("in silvis") ex Gcke, alii vero (sic Kochius) plantam in cisalpinis omnibus non nisi inquilinam habent.

2. *Pyrus*. 1. *P. Malus*: Thessal. m. Ossa (: Heldreich 1882); Fenn. mer. adest.

2. *P. communis*; — *P. cultrensis* Godr. (est arbor culta).

3. *P. cordata*; hab. vere indigena in Græc. bor. sc. in m. Pindo Agrapha, in silvis supra coenobium Korona, 3000—4000' s. m., ubi a cl. Haussknecht detecta 1885.

Obs. *P. Pollveria*; Comment. 119.

4. *P. elæagnifolia*: Dobrud. (in reg. silvat.: Ue.S.). Bulgar.? (cfr. seq.).

Obs. *P. salvifolia* DC.; etiam Helv. ad Vuache pr. Genevam (Gremli) et in Vales. (Fully) indicatur.

5. *P. amygdaliformis*; Bulgar. sec. Velenovsky (1886) ubique in collibus et silvis; — cfr. præced.

3. *Sorbus*. 1. *S. domestica*: Hisp. bor., centr. (et Lusit.) culta et spont. Lothar. (Lorraine) non rara. Bavar. Istr. Bosn. (: GBeck, Brandis). Bulgar. (in collibus ad Varna: Bornmüller). Thessal. (m. Ossa: Heldr. 1882); Transs. non nisi culta adest. — *S. syriensis* Kit.

2. *S. aucuparia*: Lusit. adest (: *S. de Estrella*, Gerez.: Brot., Welw., Figueir). — *S. alandica* Bergstrand naturh. antekn. om Åland. — **Meinichii* Lindeb. in Htn handb. ed. XI. (1879). Norv. occ. ins. Mosterö, cum proximis et forse earum hybr.

3. *S. hybrida*: Dan. (Bornh., Sjælland, r.). Angl. mer. (Hampsh.) introd. Hisp. mer. *S. Nev.* (barranco del Gualnon: comision forestal ex Colm.). Bavar. (Tegernsee, Pappenheim etc.). Würtemb. (rudera Reussenstein.). Alsat. (Voges.) ex Gcke. Styr. (m. Wotschberg: Dietl ex Maly). Helv. (raro; huc *S. Aria* × *torminalis* Brügg. ex Jäggi). Sabaud. (Chambery: Huguenin in hb. eur.). — *S. Aria*-*aucuparia*; *S. hybrida* K. (Helv. etc.).

**S. semipinnata* Borb. (1883). *S. hybrida* Heuff. - Banat. (Domuglet pr. Mehadia). Transs. (pr. Torda). Forse hybr. a *S. aucuparia* et *S. græca* ex Borbás.

4. *S. scandica* (*Cratægus suecica* L. am. III. *C. Aria* var. *suecica* L. sp. quoad pl. suec.): Scot. ins. Arran (: Craig Christie 1869); Angl. incerta est, quia *S. scandica* auct. angl. plur. est *S. latifolia* (ex Boswell). Gall. or. dep. Côte d'Or (in silva ad Montbard: Royer); Arvern. et Aube (ex Royer). Vales. (pr. Bovernies et Sourtier: Favre 1875). Styr. (in silvis pr. Lietzen ex Maly). Hung. et Croat. (var. ex Borbás). Bosn. mer. (Romanja Planina: GBeck 1885).

5. *S. Aria*; deest in Suec. or. exc. Gotland. et extima Suderm. (ad Landsort) et ceterum non nisi in Scania bor.-occ. (Kullaberg), Bahus. et Dalsland. (r.) obvium venit; Lusit. (m. Gerez) a solo Brotero indicatur. — *S. græca* est potius subspecies:

**S. græca* Lodd. - Græc. Rumel. or. (ex Velen.). Transs. plur. loc. (*S. Aria* auct. transs.). Hung. (pr. Treszkovac ex Borbás). — *S. meridionalis* Guss. (syn. sub *Pyro*) ap. Stöbl. (m. Nebrod.).

6. *S. latifolia*: Hisp. occ. (Leon, Extrem.) rarius ex Colm. Gall. or. (Côte d'Or: Royer); Lothar. plur. loc. (sed parisiensis e Fontainebl. valde diversa est ex Godr.). Germ. occ. (Coblentz, Trier). Alsat. (pr. Andolsheim ex Gcke). — ? *S. fallacina* Royer. — Comment. 120.

×*S. intermedia* nob. *Aria intermedia* Schur excl. syn. *S. latifolia* auct. transs. — Transs. (et Hung.).

7. *S. torminalis*; Hisp. plur. adest!; etiam in Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.).

8. *S. florentina*: Serb. (in colle Goriza pr Nisch: Bornmüller 1888).

9. *S. Chamæmespilus*: Alpes-Marit. (reg. alp., r.).

**S. sudetica*; hab. in Teufelsgärtchen montium Riesengeb. nec non (ex Gcke) in Vogesis (Hoheneck).

4. *Aronia*. 1. *A. rotundifolia*: Bosn. (: Blau, Beck). Moldav.; indicatur etiam Batav. (Uilenput et Ubbergen pr. Nijmegen).

6. *Cratægus*. 1. *C. orientalis*: Thessal. m. Ossa (: Heldr. 1884).

2. *C. pycnoloba*: Achaia (Heldr. hb. norm. 926).
3. *C. pentagyna*; — *C. melanocarpa*: Bulgar. (pr. Kebedze: Bornmüller). Ross. gub. Stawropol. (: Owerin). — *C. atrofusca* Stev. (Taur.).
4. *C. nigra*: Transs. indicata est post Bmg., sed in ej. herbario desideratur, nec in locis ab eo allatis lecta est (ex Smk.).
6. *C. laciniata*: Hisp. etiam Murc. (S. de Segura: Bourg.). — ? *C. lasiocarpa* Lge in vidensk. meddel. 1881. (S. Nev. Dehesa de S. Geronimo: H.P.R. 1879).
7. *C. Azarolus*: Hisp. plur. (et Lusit.) hab. quasi spontanea.
**C. ruscinonensis*; hab. ad Sommières in dep. Gard (: Lombard. Dumas 1876); in Herault sat freq. (in tota planitie hinc inde ex Loret). Comment. 121.
8. *C. Oxyacantha*; hæc species, ut nunc constat, in ins. Aland. deest (sequens pro hac ibi indicata erat).
9. *C. monogyna*: Aland. (Fenn. mer.-occ.). — ? *C. ambigua* CAMEy. (Ross. mer.-or. in rupestribus ad Sarepta freq.: Becker). Comment. 122.
X *C. lobata* (Mespilus lobata Poir.); hab. Gall., sed non nisi paucissimis locis et singulis individuis observata (: Clavaud 1879; Magn. fl. sel. exs. 67; cfr. Gillot in Magn. serin. I. 24: *C. oxyacanto-germanica*).

13. *C. Insegnae*; hab. etiam in Græc. bor. (Thessal., Pindus: Haussknecht).
7. *Cotoneaster*. 1. *C. pyracantha*; etiam Lusit. indicata (: Mont.).
4. *C. tomentosa*: Castil., Arag., Catal. (r.). Würtemb. (Tuttenthal pr. Duttlingen). Moldav. Bosn.; Transs. ad *C. orientalem* (5 * —) pertinet ex Smk.
5. *C. vulgaris*: Bosn. (: Blau, GBeck). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). Dobrud. Moldav.; Fenn. bor.-occ. et med. plur. deest; Suec. non ultra Gestriciam progreditur; Angl. in unico loco observata est sc. ad Ormes Head in Carnarvonsh. (N. Wales) et quidem tam parce ut cl. Druce (1877) unum solum fruticem invenerit.
**C. nigra*: Fenn. bor.-or. (Kk). Hogland (ins. Sinus Fenn.) ex Wainio 1878. — *C. orientalis* Kern. in oe. b. z. XIX (ex Smk.). Hung. or. Transs. (*C. tomentosa* auct. transs. p.). Ross. mer. lit. (: Rehm. veg. d. nördl. gest. d. schwarz. meer.).

XXXVII. GRANATEÆ.

1. *Punica*. 1. *P. Granatum*; subspons. adest e. gr. in convallibus calidis Valesie (Helv. mer.), culta sub dio et fructus edules proferens, immo in Delph. scil. in valle illa tepida ubi balnei Aix-les-Bains; etiam in rupestribus dep. Herault saltem duobis locis quasi indigena (: Loret).

XXXVIII. MYRTACEÆ.

1. *Myrtus*. 1. *M. communis*; — *M. italica* Mill. (1759); hab. etiam Istr., ubi r. vel rr. baccis albis occurrit.

XL. CUCURBITACEÆ.

1. *Cucumis*. 1. *C. Colocynthis*; hab. etiam Valenc. et Balear. (in Castil. subspons.); in ins. Aeolic. (Vulcanello, in arenis vulcanicis, r.) detecta (1877) a cl. Lojacono (vid. ej. "le Isole Eolie e la loro vegetazione" 37 et 104*), qui ibi observavit hanc plantam gaudere caudice subterraneo perenni, globoso, sat magno.
2. *Momordica*. 1. *M. Elaterium*; hab. etiam Byzant. et Turc. medit.; Dobrud. (ad lit. Ponti Euxini: Ue.S.).
3. *Bryonia*. 1. *B. cretica* (Raul. exs. 714); hab. etiam Attica (: Heldreich), ins. Karpathos et Hydra (: Pichler).
2. *B. dioica*; etiam Morav. vix indig. nec in Transs. spontanea (teste Smk.).
**B. sicula* (a specie minime differt ex Cogniaux): Græc. (Palamidi supra Naupliam: Haussknecht).

3. *B. alba*; adest etiam Suec. med., sed (ut in mer.?) probabiliter primitus introducta et nunc inquil.; Germ. bor., centr. etc. (deest in prov. Rhen., in Westphal. plur. et in tota mer. exc. Bavar. teste Geke); hab. etiam Styr. (: Maly), Moldav., Dobrud., Rumel. or.

4. *B. acuta*; aff. propior est *B. dioicæ* (2) et ejus varietas sec. Cogniaux; ex eodem hab. etiam in Lusit. et Hisp.

XLII. ONAGRARIÆ.

1. *Chamænerium*. 1. *Ch. angustifolium*; Hisp. tam bor. quam centr. (S. de Guadarr. etc.) et mer. (S. Nev.) indicatur (sed rarum); adest etiam (copiose) in m. Pelion Thessal. (: Heldr. 1882), ibique terminus meridionalis speciei; m. Rilo Maced. (: Haussknecht). — *E. canescens* (*E. Steveni* Boiss.) pertinet ad speciem sequentem, cujus var. vestita, australior ex Hsskt.

2. *Ch. palustre*: Galic. Morav. Styr. Carinth. Carn. Friul. Tyrol. Moldav. Bucov. Bosn. et Herceg. (ex Hsskn., GBeck). Græc. bor. (: Heldreich). Ins. Poros (: Wiedem. ex Hsskt); ad Strassburg lectum est a Buchinger 1878, in Scotia (Perthsh.) a Robertson 1845. sed vix postea ibi repertum; Island. incerta est (etiam ex Lge). Comment. 123.

3. *Ch. denticulatum* (pro auctore citetur Spach phan. 1835): Alpes-Marit. (r.). Sabaud. Helv. occ. Bavar. et Carn. rarius (ex Hsskn.). Styr. plur. locis (: Maly); Transs. "nec antea nec recenter observatum est" (Smk.). — *E. angustissimum* Rehb. (non alior.).

× *Ch. gracile* Brügg. (sub. *Epilob.*) = *Ch. angustifolium* + *denticulatum*. (Helv. mer.).

2. *Epilobium*. 1. *E. hirsutum*; — *E. intermedium* pertinet ad speciem seq. (*E. parviflorum* ex Hausskn., qui specim. authent. vidit. Comment. 124.

× *E. intermedium* Rehb. *E. hirsutum*-*parviflorum* Wimm. *E. rivulare* Kirschl.

2. *E. parviflorum* (*E. villosum* Curt. 1777). — *E. rivulare* cfr. sub *E. palustri* (14). — *E. attenuatum* certe huc pertinet ex Smk. — *E. cordatum* Biv. (Sicil., Cors., Hisp. mer. etc.). — *E. umbrosum* Dmrt. (Belg.). — *E. mutabile* B. R. (9*) ex Hsskt. (S.Nev.). — *E. montano-parviflorum* Neilr. ex Hsskt.

× *E. palustri*-*hirsutum*; — *E. roseo-pube* cens. a me. erronee huc relatum, ex ipso auct. est = *E. roseum-parviflorum* Lasch 1831 (sub 7. *E. roseo*).

× *E. limosum* Schur. *E. intermedium* Heg. *E. crassicaule* Grml. *E. parvifl.*-*montanum* Focke; ex Hsskt.

3. *E. Tournefortii* (*E. tetragonum* Guss. syn. p. p.; Tod. exs. 494. 1043); hab. etiam Gall. mer. (Marseille) ex Hsskn.; — *E. flaccidum* ad *E. obscurum* (5) pertinet.

4. *E. tetragonum* (*E. obscurum* Schmidt. *E. ptarmicæfolium* FSz): Græc. bor. (Pindus *Agrapha*: Hausskn.). Euboea. Attica (Athen, Pentelikon: Hsskt). Creta (: Raulin ex Hsskn.); Norv. deest ex Murbeck, qui in locis pro hoc citatis solum *E. virgatum* (5*) invenit; Fenn. non nisi Aboæ lectum est (detect. a Reuter 1856), Comment. 125. — *E. minutiflorum* Hsskt in oe. b. z. 1879. Sarepta (: Becker) ex Boiss. or. suppl.

**E. Lamyi* (*E. canescens* Lamy. *E. obscurum* Fr. hb. norm. VIII. 42); hab. (ex Hsskt) etiam Angl. Suec. med.-mer. Dan. Germ. plur. Hisp. mer. Cors. Sicil. Ital. bor. (r.). Dalm. Serb. Græc. (Pindus, Nauplia, Athen). Thrac. Ross. mer. (r.). Morav. Austr. p. d. Hung. Transs. (*E. bifforme* Schur). Comment. 126.

Obs. *E. hispidum* Weinm. (1850), in Ross. or. gub. Perm lectum et *E. tetragono* et *E. virgato* affine dictum, est species dubia ex Hsskn.

5. *E. obscurum* (*E. virgatum* Lam. 1786 ex Hsskt; cfr. ej. monogr. 117); post Schreber speciem sic nominavit Roth (tent. 1788); sec. Hsskt hab. etiam Lusit. Hisp. mer. Sard. Hetr. Lacon. (m. Taygetus). Parnass. (: Heldr.). Ross. mer., med. Fenn. mer., -or. ubi in isthmo carel. detectum a Malmberg 1876. (*E. fennicum* Læst. hb.). — *E. flaccidum* Brot. *E. Schmidtianum* Rostk. (p. p.). *E. decumbens* Dmrt. — *E. fontanum* Schur (ex Smk.).

**E. virgatum*; hab. etiam Suec. med. (r.). Norv. occ. (ad Bergen, ubi Elgenstierna primo legit 1875), Morav., Luxemb.; sec. Haussknecht (monogr. 117) est var. *E. obscuri*, cui etiam pertineat *E. gemmiferum* Lge ex Hisp. bor.

× *E. purpureum*, in Halland. et Suderm. (raro) lectum, ibi nunc destructum est; cfr. sub *E. palustri* (14 ×).

× *E. Wimmeri* FSz (1859). *E. chordorhizum* Grsb. (1852); Michal. *E. ligulatum* Baker (1857). *E. phyllonema* Knaf f. (1878). *E. matrense* Borb. (1879). Hæc hybr. (ex Hsskt) orta est ab *E. obscuro* + *E. palustre*. Comment. 127.

6. *E. gemmiferum* (vid. infra 12 ×); ex obs. cl. Haussknecht est hybr. inter *E. alsinefolium* et *E. gemmascens* verum (CAMey.), quod ab eo e Delph. cognitum et in m. Pindo Tymph. (Græc. bor.) 1885 detectum est (vid. diar. soc. geogr. in Jena a. 1888).

7. *E. roseum* (*E. tetragonum* Kern. ex hb. Linn.); ins. Færøer.; Norv. etiam occ. (Bergen etc.). Aragon. Ital. bor. (etiam Aprnt. ex Ten. et Neapoli; Mertens). Græc. bor. (Pindus Aspropotamitikos; Hausskn.). Bosn. Bucov. Dobrud. Moldav. Fenn. mer.-occ. (Aboæ detex. Zettermann. 1862). — *E. umbrosum* Dmrt. — *E. radicans* Schur ex Smk.!

× *E. persicinum* Rehb. exc. = *E. roseo-parviflorum*? (*E. Knafii* Celak. *E. opacum* Pe-term.). Scan. Dan. Angl. Belg. Germ. Helv. Austr. Hung. (*E. stenophyllum* Borb. ex Smk.). Transs. (*E. tetragoniforme* Smk.).

8. *E. trigonum* (*E. montanum alpestre* Jacq. 1762. *E. alpestre* Hpe exs. cent. I. 1799): Badiæ m. Baar, Fichtelgeb. (Zechgrund) et Sächs. Erzgeb. ex Gecke. Styr. (: Maly). Carinth. Galic. Bosn. (: GBeck). Herceg., Monten. et Serb. ex Aschn.

× *E. pallidum* Tsh. *E. Freynii* Celak. (1881). *E. montano-trigonum* Hsskt.

9. *E. lanceolatum* (*E. nitidum* Guep. 1845 ex Hsskt): Angl. mer. (Hampsh., rr.). Lusit. (Hffgg ex Hsskt). Astur. (: Bourgeau). Island. (ex Hsskt, sed ex Lge incertum). Bleking. (Fr. ex Hsskt). Fenn. mer.-or. et Ingr. (ex Hsskt). Thuring. (: Hsskt). Morav. mer. (r.). Hung. Serb. Venet. (ex Bizzozero). Cephalon. (: Heldr.). Græc. bor. (m. Pelion; Heldr. 1882; m. Pindus; Hausskn. 1885). Parnass. (Zuccar. ex Hsskt).

× *E. neogradiense* Borb. ex Hsskt = *lanceolatum* + *montanum*. - Hung.

10. *E. montanum*; exc. etiam Lapp. plur. et Finnm. nec non Fenn. bor. plur.; sed adest in Græc. bor. (m. Pindus; Hausskn. 1885). — *E. persicinum*; cfr. supra sub *E. roseo* (7). — *E. limosum* (planta dubia et ab *E. montano* aliena ex Smk.); cfr. sub *E. parvifloro* (2). — *E. silvaticum* Bor. (in Consp. sub 11. *E. Duriei* allatum est). Comment. 128.

**E. collinum* (*E. nitidum* Host 1827). Sec. cl. Haussknecht est species majoris dignitatis. *E. montano* coordinata, cuius area geogr. accuratius indicitur: Island. Norv. Suec. Fenn. Ross. med. Germ. Belg. Gall. Hisp. Cors. Ital. bor.-med. Helv. Austr. Hung. Croat. Transs. Bucov. Bulgar. Græc. bor. (m. Pindus; Hsskt). — *E. ramosissimum* Heg. (1831).

**E. hypericifolium*; monente Haussknecht (monogr. 1884) certe non hybridum est, sed species, culturâ omnino constans, rariss. tamen et sporadica, non nisi e Bohem. et Smoland. (Fr. hb. norm. XVI. 49) nota; Carinth. (Maria-Saal; Welw.) a Pacher indicatur.

11. *E. Duriei* (*E. origanifolium* Kirschl. 1836): Voges. (Hoheneck, inter Münster et Gardmer, etc.). — *E. silvaticum* ad *E. montanum* (10) pertineat quoad plant. Gall. centr., sed exs. Bill. et Sz recte sistunt *E. Duriei* ipsissimum. — *E. Mathiei* FSz (1854) ex Hsskt.

12. *E. alsinefolium*; *E. alatum* Heg. (1840). *E. nitidum* Saut. — *E. Sandorii* Borb. 1879 (ex Smk.). — Comment. 129.

**E. salicifolium*; ex Haussknecht est hybrida proles *E. alsinefolii* et *E. montani*.

**E. Hornemanni* Rehb. ic. crit. II. (1824). *E. alsinefolium* Fellm. pl. arct. 94. - Suec. bor. Norv. Lapp. Fenn. bor. Cfr. Hsskt monogr. 175.

× *E. gemmiferum* Bor. (1853). *E. gemmascens* Michal. (1855). Delph. Pedem. — *E. gemmiferum hispanicum* est partim hujus var. partim hybr. ab *E. alsinefolio* et *E. obscuro* (ex Hsskt); cfr. 5 * *E. virgatum*. — *E. gemmascens* CAMey. est species omnino diversa.

13. *E. anagallidifolium*; hab. etiam Island. et in ins. Færøer.; in Ital. non nisi in m. Cenisio et in Tyrol. subalp. di Fiemme et in m. Prado alp. di Mommia observatum. — *E. nutans* (ex Hsskt monogr.) est species diversa, *E. palustri* aff. propior:

13. a. *E. nutans* (Schm. 1794) Tsh (1828). *E. heterophyllum* Heg. (1831). *E. Hornemanni* Schur (1866); hab. in Pyren. Ceven. Helv. Badiæ m. Feldberg. Voges. Bavar. (Alpes, Bair-Wald). Bohem. Siles. Tyrol. Carinth. Hung. Transs. — *E. dasycarpum*, non nisi in Scand. lectum, hybridum videtur (Hsskt).

**E. lactiflorum* Hsskt (1879). *E. Hornemanni* Beurl. (1853) non Rehb. (1824); cfr. Hsskt monogr. 159. — *E. Hornemanni* Rehb. vid. supra sub *E. alsinefolium* (12 *).

14. *E. palustre*; *E. simplex* Tratt. (1812). *E. ramiflorum* Heg. (1831). — *E. ligulatum* nunc ad *E. Wimmeri* (5 x) translatum est. — *E. hyssopifolium* Schür (ex Smk.).

× *E. Krausei*; ex obs. cl. Haussknecht (vid. mittel. thür. IV.) certe hybr. ex *E. collino* et *E. palustre*.

× *E. rivulare* Whlbn. (in Consp. sub 2. *E. parvifloro* militat); Rehb. exs. 2254. *E. palustri-parviflorum* Krause (1851); Michx. (1855). *E. palustriflorum* FSz (1859). *E. sarmentosum* Celak. (1878). - Hibern. Angl. Dan. Succ. mer. med. Ross. med. Germ. Bohem. Austr. p. d. Helv.: ex Hsskt.

× *E. purpureum* Fr. in Consp. sub *E. obscuro* (5) allatum, est hybr. sec. Hsskt. (= *E. palustre* + *E. roseum*). *E. rivulare* Celak. (1881). *E. Treunfelsianum* Ausserdorfer ap. Kern. (1882). Comment. 130.

14. a. *E. davuricum* Fisch. in Hornem. suppl. (1819). *E. lineare* Fr. (non Mühlenb.); hab. etiam in Ross. arct., Fenn. bor. (Ostrob.); Fellm. exs. 96, in Consp. ad præc. *E. palustre* citatum, est hybr. ab hoc et *E. davurico* ex Hsskt.

× *E. aggregatum* Celak. = montanum + obscurum. (Siles. etc.).

× *E. alpicolum* Brügg. = alsinefolium + trigonum. (Helv.).

× *E. bihariense* Smk. = alsinefolium + scaturiginum. (Transs.).

× *E. confine* Hsskt = collinum + montanum. (Thuring.).

× *E. decipiens* FSz. = collinum + obscurum. (Germ.).

× *E. Dufftii* Hsskt = Lamyi + roseum. (Thuring.).

× *E. glanduligerum* Knaf = collinum + roseum. (Bohem. etc.).

× *E. Haynaldianum* Hsskt = alsinefolium + palustre. (Transs.).

× *E. heterocaulum* Borb. = montanum + roseum. (Transs. etc.).

× *E. Hugueninii* Brügg. = montanum + trigonum. (Helv.).

× *E. Huteri* Borb. = alsinefolium + collinum. (Tyrol.).

× *E. Lamotteanum* Hsskt = lanceolatum + obscurum. (Gall. etc.).

× *E. montaniforme* Knaf = montanum + palustre. (Bohem. etc.).

× *E. palatinum* FSz. = Lamyi + parviflorum. (Francon. etc.).

× *E. Salisianum* Brügg. = roseum + trigonum. (Helv.).

× *E. semiobscurum* Borb. = Lamyi + obscurum. (Hung.).

× *E. stenophyllum* Borb. = parviflorum + roseum. (Hung.).

× *E. Tarni De Laremb.* = collinum + lanceolatum. (Gall.).

× *E. Uechtritizianum* Pax = obscurum + trigonum. (Sudet.).

× *E. Winkleri* Kern. = alsinefolium + roseum. (Tyrol.).

Monographia Epilobiorum, elaboratissima et splendidissima, a cl. Haussknecht (1879) edita, ad cognitionem meliorem specierum et hybridarum generis difficillimi valde contulit eaque heic, ut e citatis patet, sedulo usus sum. De speciebus etc. hungaricis et transsylvanicis cl. Borbás plurima scripsit; cfr. inter alia: Hazai Epilobiumok Ismeretehez. 1879. (*).

Obs. *Ænothera rosea* Ait., a cl. Dubalen circ. 1870 pr. Bayonam reperta, ibi dein ita increvit ut post 1877 in pratis longe plurimis proveniat. *E. longiflora* Jacq., species australi-americana, in depp. Landes et B.-Pyren. pluribus locis introducta est et nunc quasi spontanea.

3. *Isnardia*. 1. *I. palustris*: Styr. (: Maly). Carinth. Euboea Græc. (Orph. exs. 1020); Angl. (Sussex) nunc fere extincta et in unico loco (Hampsh.) superstes dicitur.

4. *Circæa*. 1. *C. Lutetiana*; adest in Græc. bor. (Thessal. m. Osea, Pelion: Heldr. 1882; Pindus Dolop.: Hausskn., ibique speciei terminus merid.).

2. *C. intermedia*: Gall. bor.-or. (Lorr.). Vestrog. (Kinnekulle et Mösseberg). Smoland. (Huskvarna). Moldav.

3. *C. alpina*: Dan. Fenn. exc. bor. plur. (deest etiam in Finnm. et Lapp. plur.). Moldav. Bosn. mer. (ex GBeck). Alpes-Marit. (reg. alp.).

5. *Trapa*. 1. *T. natans*: Balear. (Mallorca, lagunas de la Puebla: Barcelò). Moldav. Dobrud. Ross. mer. (Cherson) ad Borysthen. et Tyram passim copiose; in Helv. cisalpina nunc extincta est (ex Jäggi ibi numquam indigena erat) et in transalp. adest unico loco (lac Muzano) in cant. Ticino; in Gall. bor. et Germ. valde sporadica est; in Dan. olim aderat (vid. Lge haandb. 74). Comment. 131.

Obs. 1. *Trapa*, quæ in Smoland. olim vegetabat, erat *T. natans* var. *conocarpa*; vid. ap. Faresch. in Bot. Not. 1888.

Obs. 2. *T. verbanensis* (*T. natans* var. *verbanensis* Jäggi wassern. 7); hab. Lago Maggiore (olim Lacus Verbanus) Ital. bor., ubi in sinu ad Angera, in extremitate merid. lacus dicti, sat copiosa; cfr. Jäggi l. c.

XLIII. HALORAGEÆ.

1. *Hippuris*. 1. *H. vulgaris*; *Hisp.* etiam *bor.-or.*, *centr.* et *mer.* (*rr.*) nunc indicatur.

2. *Myriophyllum*. 1. *M. spicatum*; exc. etiam *Lappon.*

2. *M. alterniflorum*: *Dan.* *Fenn.* *Ross.* *bor.*, *balt.* (: *Klinge*). *Færøer* (: *Rostrup*).

XLIV. CALLITRICHINEÆ.

1. *Callitriche*. 1. *C. stagnalis*; *Norv.* *bor.*, immo *arct.*, ibique ad lat. 66° 40' term. polar. speciei (ex *Norman*). *Island.* *Færøer* (: *Rostrup*). *Cephalon.* (: *Heldreich*); *Transs.* ad — *C. transsylvanicam* (quæ *C. vernæ* aff. propior) pertinet ex *Smk.* — *C. Kützingii* *Rupr.* ingr.

**C. platycarpa*; *Transs.* ad *C. vernam* (3) pertinet (ex *Smk.*!).

2. *C. obtusangula*: *Angl.* etiam in *Hampsh.* plur. loc. (: *Groves*). *Ital.* med. etiam in prov. *Romana* (: *Pirotta* et *Pelosi*).

3 * *C. alpina*; *C. transsylvanica* *Schur* (nomen); *Smk.* enum. 231. *C. pedunculata* et *C. turfosa* *Schur* ex *Smk.*

4. *C. polymorpha*: *Scot.* *bor.*; ins. *Shetland* (*Beeby* 1887; vid. *scot. natur.* 1888. 4). *Dan.* (ex *Lge*). *Fenn.* mult. (*præcip. mer.*, detecta in *Satakunda* a *Sælan* 1859). *Ross.* *bor.* (*gub. Olonetz*).

5. *C. hamulata*: *Island.* plur. loc. (: *Feddersen* ex *Rostrup* 1888). *Færøer* (: *Rostrup*). *Castil.* (*S. de Gredos*, in lacu majori: *Leresche* 1862). *Catal.* (: *Costa*); *Transs.* (cum var. *C. decussata* *Schur*) ad *C. transsylvanicam* (3 *) pertinet ex *Smk.* (enum. 232). *Comment.* 132.

**C. pedunculata*; — *C. reflexa*: *Castil.* (*Guadarr.*). *Andal.* (*la Carolina*). *Balear.* (*Menorca* ex *Hegelmaier*).

6. *C. autumnalis*: *Island.* (: *Feddersen* 1884 ex *Rostrup*). *Færøer* (: *Rostrup.*). *Dan.* *Fenn.* *Belg.* (: *Crepin* 1881); *Transs.* ad *C. vernam* (3) pertinet ex *Smk.*

XLV. CERATOPHYLLEÆ.

1. *Ceratophyllum*. 1. *C. submersum*: *Helv.* *Ross.* *mer.*; *Suec.* nunc (*Htn* handb. ed. XI) in sola *Scania* occ. indicatur (nec in *Ostrogoth.*).

1. *a.* *C. Haynaldianum* *Borb.* in *Kanitz* mag. növény lapok. 1884. 20 (*). - *Banat.* ad pagum *Mehala* *Temesvar.* (*Borbás* 1883).

2. *C. demersum*; exc. etiam *Fenn.* *bor.* (et med. plur.).

**C. platyacanthum*: *Ross.* (*Kiew*: *Schmalhausen* 1882). *Transs.* (*C. polyacanthum* *Schur*) ad *C. demersum* ipsiss. pertinet ex *Smk.*

2. *a.* *C. pentacanthum* *Haynald* in magy. növent. lapok 1881. - *Hung.* *centr.* (loc. class. est *Kalocsa*, in lacu horti *episcopalis*).

XLVI. LYTHRARIÆ.

1. *Lythrum*. 1. *L. Salicaria*; — *L. Bocconi* *Desegl.* (*Durand*) est = var. *verticillata* (*Lysimachia trifolia* *spicata* *purpurea* *Bocc.*). — *L. alternifolium* *Lorey.* — *L. propinquum* *Weinm.* in bull. mosc. 1850 ex *Koehne.* (*Ross.* *or.* *gub. Perm.*).

2. *L. virgatum*: *Bohem.* (ex *Geke*). *Styr.* (*rarius*). *Moldav.* *Dobrud.* *Bulgar.*

3. *L. acutangulum*: *Balear.* — *L. meonanthum* *Lk* hb. ex *Koehne.* (*Lusit.*).

4. *L. maculatum*; sec. *Koehne* a *præced.* specificè non differt.

5. *L. Hyssopifolia*: *Moldav.* *Dobrud.* (in delta: *Ue.S.*). *Bulgar.* *Bosn.* (ex *GBeck*). *Cephalon.* (: *Heldr.*). *Ross.* med. (*gub. Tambow*).

6. *L. Thymifolia*; *Ital.* et *Dalm.* ad *præced.* referendæ sunt ex *Koehne*; vid. ej. *Lythr.* *Italian.* in n. giorn. bot. ital. 1884. 103 (*).

7. *L. geminiflorum*; *L. thesioides* MB. (quod nomen antiquius est quam illud Bertolonii); hab. in Gall. mer. (pr. Beaucaire dep. Gard), Ital. bor. (Luzzara pr. Mantua), Ross. mer.-or. (Sarepta, Stawropol). Planta occid. (Bertolon.) cum rossica (Bieberst.) omnino identica est ex Koehne! l. c.

8. *L. tribracteatum* (*L. thymifolium* S.S.): Andal. (: Bourgeau). Balear. (: Casalles). Hung. (comitat. Bekes, pr. Veszto: Borbas; Kalocsa); Ital. (ex Koehne) non nisi in bor. (Luzzara ad Padum, a Mantua meridiem versus). Thessal. (: Haussknecht). — *L. nanum* Beck. volg. exs. 137. (Sarepta).

9. *L. nanum* (non Kar. Kir.) est var. speciei præced. ex Koehne.

× *L. scabrum* Borb. (Smk.) = *Salicaria* + *virgatum*. (Hung.).

2. **Peplis.** 1. *P. Portula*; exc. etiam Fenn. bor. omn. et med. plur., sed adest in Græc. bor. (Pind. Dolop.: Hausskn.). — *P. serpyllifolia* Rupr. (ex Koehne).

2. *P. alternifolia*: Ross. centr. (gub. Kursk: Augustinovicz).

3. *P. erecta*: Hisp. tota (penins. iberica tota, rarius, ex Koehne). Pisa (ex Koehne). Creta (: Réverchon ex Boiss.). *Lythropsis peploides* ad *P. hispidulam* (5. a) pertinet ex Koehne.

4. *P. Boræi*: Gall. bor.-occ. (Normandie, r.).

5. *P. borysthenica*; cl. Koehne (1880) hanc et præced. cum *P. erecta* (3) in unam speciem (: *Lythrum nummularifolium* Lois. 1810) jungit, sed hæc duæ arctiorem inter se habent affinitatem (subidenticæ) quam cum *P. erecta*, quare potius eas sub titulo subspeciei huic subjungerem.

5. a. *P. hispidula* Dur. (ex Koehne). *Lythropsis peploides* Welw. exs. *Lythrum hispidulum* Koehne in diar. soc. bot. brand. 1880. 29. (*). - Lusit. mer.

3. **Ammannia.** 1. *A. verticillata*: Transs. (pr. Thorda) teste Koehne.

4. **Suffrenia.** 1. *S. filiformis*; *Rotala filiformis* Hiern. - *Suffrenia* ex Koehne certiss. cum *Rotala* jungenda est, sed minime hæc cum *Ammannia*.

XLVII. TAMARISCINÆ.

1. **Myricaria.** 1. *M. germanica*; Suec. bor. multa hab., sed non in Lappon.; Alp.-Marit. (ad rivos, ut in alveo flum. Var); adest etiam Hisp. scil. in Catal. (ubi plurib. loc. lecta dicitur) et Arag. (ubi rr. ex Willk. Lge).

2. **Tamarix.** 2. *T. hispanica*: Vizcaya (: Willkomm).

5. *T. Pallasii*: Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker). Thessal. (: Heldr. 1885).

7. *T. Hampeana*: Ins. Jonicæ: Cephalon. (: Spreitzenh. ex Heldr.), Corcyra (Corfu) in pratis ad ripam Potami (: Spreitzenhofer 1877).

8. *T. parviflora*: Cephalon. (: Heldreich).

XLVIII. PORTULACÆ.

1. **Portulaca.** 1. *P. oleracea*; exc. etiam Belg. (etc.), ubi non nisi culta et ad domos interdum quasi spontanea adest.

3. **Glinus.** 1. *G. lotoides*: Extremad. Hisp. (ubi jam a Loeffling lecta). Thessal. in arena riparia fluv. Peneios (: Heldr. 1882).

4. **Pharnaceum.** 1. *P. Cerviana*: Bulgar. ad Varna in arena litor. mar. (: Velenovsky 1885).

XLIX. PARONYCHIEÆ.

1. **Telephium.** 1. *T. Imperati*; Helv. (vales.) non nisi introd. et quasi spontan. adest ex Gremli.

2. **Polycarpon**. 1. *P. tetraphyllum*: Phalz. (Speyer, Hassloch etc.) et Hercyn. (pr. Westerhausen) etc. introductum occurrit.

3. *P. peploides*: Castil. (Aranjuez: Boutelou). Balear. (rarius).

**P. colomense* Porta. Rigo exs. a. 1885. Menorca Balear. in agris sterilibus ins. parvæ Colom (P.R.).

4. **Loeflingia**. 1. *L. hispanica*: Pyren. or. (: Debeaux).

3. *L. micrantha*; — ? *L. bætica* Lag. (Sevilla etc.).

5. **Paronychia**. 1. *P. argentea*; hab. etiam Hisp. bor.; Transs. ad *P. cephalotum* (7) pertinet ex Smk.

2. *P. polygonifolia*: Catal. (ubi plur. loc. indicata).

4. *P. echinata*; Hisp. hab. etiam Catal. et (r.) Menorca (: Rodriguez). Atticæ ins. Aegina (: Heldr.) ex Boiss.

7. *P. cephalotus*; *P. argentea* Rehb. exc. quoad pl. transsilv.

9. *P. imbricata* (*P. Kapela* Kern. *P. argentea* Wulf. non Lam.): Rumel. or. (Slivno: Skorpil ex Velen.). Bulgar. (Kistendyl: Vandas, Velen.).

9. *a. P. kurdica* Boiss. diagn. ser. I. 10. - Rhodus pr. Bastida (: Bourg. ex Boiss.).

10. *P. serpyllifolia*; hab. etiam Castil. (Encenillas: Lge).

6. **Illecebrum**. 1. *I. verticillatum*; Hisp. etiam occ. (Extrem.) lectum est (ex Cavanilles etiam in centr. et mer.); Helv. (ex Grml.) non nisi ad Mendrisio (cant. Ticino) lectum; etiam ins. Osiliæ indicatum est, sed ex Klinge in tota Ross. balt. incertum.

7. **Herniaria**. 2. *H. paniculata*; hab. etiam in Murcia (ad Orihuela et præcipue Hellen); sec. Rouy (rev. sc. nat. 1883) certissime est = *H. polygonoides* var. (diffusa).

5. *H. incana* (*H. hirsuta* auct. transs. ex Smk.); Hisp. etiam bor.-or. et centr. indicatur; Banat. (: Borbás). Thessal. m. Ossa (: Heldr. 1882). — *H. macrocarpa* (: Orph. exs. 22).

**H. Besseri* Fisch. in Horn. suppl. hort. havn. - Ross. etiam mer.-or. (Sarepta: Becker) et med. (gub. Poltawa ex Trautv.). Transs. Bulgar. (: Velenovsky: *H. incana* antea); a specie primar. (*H. incana*) parum diversa videtur.

7. *H. alpina*: Alpes-Marit. (col de Fremamorta, de l'Enchastraye). Styr. (alp. Dachstein ex Maly).

9. *H. hirsuta*: Hampsh. Angl. mer., r., ex Townsend 1879 (an introd.?). Transs. ad *H. incanam* (5) pertinet; etiam in Ross. deest ex Trautv. — *H. odorata*; hab. etiam Ross. centr. (Kursk) et mer.-occ. (Bessarab.); cfr. *H. polygama* (14).

12. *H. glabra*: Bulgar. Bosn. (: Brandis ex Freyn).

13. *H. ciliata*: Holsat. (Hennings).

14. *H. polygama*; *H. odorata* Andrz. (9—) ex Trautv., cui hoc est nomen princeps.

8. **Corrigiola**. 1. *C. litoralis*: Styr. (r.); Helv. (ad Vevey, ubi plantata erat) nunc extincta (ex Leresche); Transs. a solo Bmg. indicata nec ab aliis lecta (ex Smk.).

1. *a. C. imbricata* Lap. hist. abr. 169. (1813). Hæc species relecta est 1879 in Pyren. or. ad Vernet (m. de la Pène) a Gautier et Timb.-Lagrange; dicitur eximia, inter duas alteras media, sed sequenti propior quoad flores et durationem (et habitum): vid. "Extrait de la Soc. d. sc. phys. et natur." (1880?).

L. SCLERANTHEÆ.

1. **Scleranthus**. 1. *S. perennis*; Fenn. adest in mer.-or., ubi detectus (1851) a WNylander pr. Wiborg et relectus 1880 a Nervander.; Belg. solum ad Liège (: Durand), ceterum incertus. — *S. hirsutus* ad *S. annuum* (4) pertineat.

**S. marginatus*: Bulgar. (m. Vitos, m. Osogovska Planina: Vandas. Velen.); — *S. vulcanicus* Strobl in oe. b. z. 1874. (Aetna, Nebrod.).

**S. dichotomus* Schur (1851). *S. perennis* Bmg. (typus in Transs. non lectus est ex Smk.; cfr. ej. enum. 148). *S. heterosanthus* et *S. microdichodon* Rehb. ex Smk.

2. *S. polycnemoides*; Prats-de-Mollo Catal. (: Vayreda-y-Vila).

3. *S. uncinatus* (*S. Czetsii*, *S. Fussii*, *S. Jankei* et *S. Haynaldi* Rehb.); hab. etiam Galic.; Bosn. (ex Freyn).

4. *S. annuus* (*S. elegans* Barth et *S. borborygius* Rehb. ex Smk.); exc. etiam Fenn. bor. — *S. hirsutus* Pr. (1822). Sieil.; etiam Tyrol, centr. (ex Kern. exs. 59); cfr. Strobl in oe. b. z. XXIV. 71. — *S. aetnensis* Strobl l. c.

5. *S. verticillatus*: Helv. mer.-occ. — *S. collinus*: Helv. (*S. biennis* sub præced. subspecie idem est ex Grml.). - *S. Durandoi* Rehb. ap. Holuby in oe. b. z. 1874. (Hung. bor.-occ. in collibus calcar.; biennis).

**S. Delorti* (*S. pseudoverticillatus* Lacroix ex Loret); Cors. (: Burnouf). Sard. (ex Barbey).

Obs. Wiesbaur, S. J., in oe. bot. z. 1876, enumerat *Scleranthos* Reichenbach. austriacos ultra viginti.

LI. CRASSULACEÆ.

1. **Umbilicus.** 1. *U. erectus*: Andal. (Carratraca: Hænseler; Sevilla: Rodriguez, Colmeiro). Astur. (: Pasto).

2. *U. parviflorus*: Dalm. (pr. Cattaro: Studnicka 1876).

3. *U. pendulinus*; Gall. etiam or. (Côte-d'Or), bor.-occ. (Normand.); Ins. Jon. (Cephal.: Heldr., Ithaca: Spreitzenh.).

4. *U. horizontalis*: Majorca Balear. (var. *majoricensis* Barcelò. *U. gaditanus* Rodr.). Ins. Jon. (Cephal., Ithaca: Heldr., Spreitzenh.).

7. *a. U. Winkleri* Willk. in act. soc. bot. germ. I. 268. (1883). - *Hisp. mer. in rupibus calcar. ad oppid. S. Roque territ. gibralt. (rr.)*; detecta a Winkler 1873.

9. *U. sedoides*; hab. etiam in Lusit. (*S. da Estrella*: Ler. Lev.).

2. **Pistorinia.** 1. *P. hispanica*; indicatur etiam Lusit., *Hisp. bor., bor.-or.*

3. **Sempervivum.** 1. *S. arboreum*; *Hisp. (etiam Catal., Balear.) et Lusit. (e. gr. pr. Coimbra) culturâ, ornamenti gratia, inquilinum et quasi spontaneum in rupibus et muris (Colm.)*; in Mallorca spontaneum dicitur in rupib. marit. pr. Soller.

2. *S. tectorum* (*S. juratense* Jord.); etiam Dan. solum in tectis stramentariis rusticorum legitur; Rumel. or. certe spontaneum est in rupibus ad Slivno (: Velenovsky); Carel. ad litus or. lacus Ladoga indicatum est (: Sahlberg 1884), sed hoc ad *S. globiferum* (26) pertinet ex Kihlman (Soc. F. Fl. Fenn. 1887).

3. *S. blandum*; *S. tectorum* Bmg. et auct. transs. p. p.; *S. acuminatum* Hinteröcker, Smk. — *S. rubicundum*: Bosn. m. Kajabasa (Brandis 1884 ex Freyn).

4. *S. Schottii*; hab. etiam Carinth. — *S. Comollii* est hybr. a *S. tectorum* et *S. Wulfenii* ex Brügger.

5. *S. calcareum*: Alpes-Marit. (in rupibus mont. calid.: Ardoino).

6. *S. Schnittspahni*; de Belg. cfr. *S. Funckii* (11).

7 * *S. Boutignyanum*: dep. Herault (St. Amans-de-Mouries) ex Loret.

8. *S. montanum* (*S. Braunii* et *S. Funkii* Schur ex Smk.); *Hisp. etiam in Navarra et Aragon. indicatur.*

10. *S. assimile*; Transs. plurib. locis lectum et nom. *S. tectorum* post Bmg. indicatum est. — *S. blandum* (3) valde proximum videtur.

11. *S. Funckii*: Helv. mer. (Valais, Grisons, r.); Transs. ad *S. montanum* (8) pertineat. - var. *aqualiense* Morren in bull. soc. bot. 1873. *S. Schnittspahni* (rep. (Belg., pr. Aywille et in Malmedy et Verviers, detectum 1813 a Lejeune, cui tunc erat "*S. montanum*").

12. *S. fimbriatum*: Carinth. (alp. Pasterze, 2200—2500 metr. s. m.).

15. *S. piliferum*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.). — ? *S. lasiopogon* Schnittsp. ms. (ad moles glaciales Rhodani: hb. eur.).

18. *S. rubellum*: Gall. mer. dep. Herault (St.-Amans-de-Mouries et inde ad Mourières translatum: Loret); est hybr. a *S. Boutigniano* (7 *) et *S. arachnoideo* (16) ex Loret.

19. *S. Braunii*; Transs. ad *S. montanum* (8) pertinet ex Smk.

21. *S. Wulfenianum*; Transs. ad *S. globiferum* (26) pertinet ex Smk.; Helv. cfr. subspeciem:

**S. Gaudini* Christ (Grml.). *S. globiferum* Gaud. - Vales. (Cogne, val Tornanche).

22. *S. ruthenicum*: Hung. in rupibus ad pagum Svinicza: Simonkai (qui speciem e Transs. excludit). Bulgar. (Aitos: Skorpil) ex Velen.

23. *S. Zeleborii*; a præced. vix distinguendum.

24. *S. patens* (Dec. 1852; *S. Heuffelii* Jan. 1852): Bulgar. in rupibus ad m. Vitos pr. Sofia (: Velenovsky), in m. Osogovska Planina etc. (: Vandas. Velen.). — *S. campaniforme* Schur (ex Smk.).

**S. Hillebrandtii*; ex Maly vix diversum est a *S. sobolifero* Sims (26); in rupibus serpentinis Styriæ super. ab Hillebrandt detectum.

25. *S. hirtum*: Alpes-Marit. (alp. Tenda, Gordalasca, Fenestre etc.). Moldav. Bosc. mer. (Romanja Planina: GBeck 1885). Transs. ad præc. pertinet ex Smk.

26. *S. globiferum*: Carinth. (in montib. altior. et alpi.). Bavar. Hercyn. (in rupibus pr. Falkenstein). Fenn. mer.-or. (Olonets, ad litus lacus Ladoga, in arenosis siccis graminosis: Sahlberg 1884 nom. *S. tectorum*). Moldav. Dobrud. Ross. mer. (gub. Cherson); Transs. non solum a Bmg., sed etiam a Schur, Fuss et al. lectum est.

**S. transsilvanicum*; ad *S. patens* (24) pertinet ex Smk.

27. *S. arenarium*; hab. etiam Styr. (: Hillebrandt ex Maly).

× *S. Fontanæ* Brügg. = *Mettenianum* + *arachnoideum*. (Engadin).

× *S. Heerianum* Brügg. = *alpinum* + *arachnoideum*. (Engadin).

× *S. rheticum* Brügg. = *montanum* + *alpinum*. (Helv. mer.).

4. **Sedum**. 1. *S. maximum*: Dan. Fenn. (exc. bor.) Moldav. Dobrud. Hisp. centr., or. (ex Colm. sæpe cultum et inde quasi spontaneum). Lusit. (pr. Lisboa). — *S. Boguslawii* Rupr. in beitr. VII. *S. maritimum* Bogusl., Rupr. samoj. (Ross. bor., or.), quod nomen (ex Trautv.) lapsu calami vel errore typogr. ortum est (pro "maximum"). — *S. intermedium* Rupr. (Ingria). — *S. purpurascens* Lge (non K.). *S. Telephium* var. *angustifol.* Lilja; Falk in bot. not. 1867.

2. *S. vulgare*: Fenn. mer. (Nyland), or. (Olonets). Morav. Germ. occ. et bor.-occ. rarius, mer. et mer.-occ. freq. Hisp. indicatur etiam Balear., Navar. etc.; Dan. sæpius ad hortos antiquos legitur et vix indig. (Lge).

**S. purpureum*; Germ. bor. Ross. med. (etc.); speciei seq. magis affine est ex obs. cl. Lange (litt. 1888).

3. *S. Fabaria*: Helv. (cant. Freiburg). Morav. (pr. Iglau). Bavar. (Bayr.-Wald, Röhn, Lemberg). Alsat. (ubi diu amissum) adest pr. Eckbolsheim (Buchinger 1877). Lothar. (in calcareis et præcipue in vineis). Normand. (ex Morière). Hisp. bor. (Astur., Navar.). Transs. (et probab. etiam Galic.) ad var. *S. carpaticum* (*S. purpureum* Bmg. *S. purpurascens* Fuss) pertinet.

Obs. *S. spurium* MB., e Caucaso, in hortis (Germ. etc.) ad aræas cingendas colitur et interdum etiam inquil. adest.

4. *S. Anacampteros*: Alpes-Marit. (reg. alp.). Hisp. bor. (Astur., Santander).

5. *S. amplexicaule*; Hisp. etiam bor. (Leon, Santand.).

6. *S. altissimum*; Hisp. etiam bor. (Navar., Santand.).

7. *S. anopetalum*: Hisp. or., bor.-or., centr. et mer. prov. plur. indicat. Gall. mer.-or. (Alpes-Marit). Helv. nunc deest (ex Leresche). Rumel. or. (mont. ad Sedlarovo: Skorpil). Bulgar. (in rupib. calcar. supra Konjavo: Vandas. Velen.).

8. *S. rupestre*: Suec. med.; Fenn. mer.-occ. ins. Aland. (AArrhenius 1881); etiam Hisp. et Lusit. adsit; Transs. ad *S. alpestre* (13) pertinet ex Smk.

9. *S. pruina*tum; est species a proxime allatis valde diversa (*S. amplexicauli* similior) et Lusit. bor. (territ. Gerez et contin. Duriminio) priva, observ. de Mariz in bolet. soc. broter. 1888 et rev. Murray in journ. of bot. 1889.

**S. Forsterianum*; — *S. aureum* habeatur = *S. elegans viride*, sicut *S. reflexum* = *S. rupestre viride*. — *S. trevericum*: m. Fachberg inter Ehrenbreitstein et Ems, nec non ad Bingen (ex Geke).

10. *S. sexangulare*: Suec. bor. (Jemtia in Åreskutan etc.). Aland. (Bergstrand; (AArrhen. et Zetterman 1863). Dan. (pauc. loc. Sjællandia, ceterum rr.).

**S. boloniense*: Helv. mer. (: Brügger). Croat. litor. Ross. mer.-occ. Dan. etiam (r.) Sjel-land. adest.

**S. Hillebrandii*: Dobrud. (Zelebor, Uechtr. Sinten.). Bulgar. (: Vandas. Velen.).

12. *S. acre*; adest Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi paullo ultra lat. 71° progreditur (ex Norman), et indicatur etiam in Lapp. fenn. bor. nec non in Lapp. ross.

13. *S. alpestre* (*S. pseudoatratum* Schur ex Smk.): Bulgar. m. Vitos (: Skorpil) et Osogovska Planina (: Vandas. Velen.).

14. *S. album*; adest (r.) in Suec. bor. (Helsing.); Siles. non indig. sed solum inquil. rara (ex Fiek); etiam Transs. deest (*S. album* ibi indicatum ad *S. glaucum* pertinet ex Smk.). — *S. album* Bourg.; huc forse referendum est *S. album lusitan.* a Sjögren 1855 pr. Oporto lectum (in Consp. sub *S. gypsicolo* citatur); de *S. albo* siculo cfr. Nicotra in n. giorn. bot. ital. 1881. 287 (*). — *S. album* = *balticum* hab. Suderm. Gotland. Oeland. (et Aland. ex Wainio 1880).

15. *S. micranthum*; Valenc. (*S. Mariola*: Rouy). Murc. (*S. de Segura*: Bourg.). Gall. bor.-or. (Metz, Nancy); nuper etiam Parisiis indicatum est, sed ex Bonnet hoc est solum var. *parviflora* *S. albi*. — *S. clusianum* saltem subspeciem (*S. albi*?) sistet (cfr. Rouy in Le Natur. 1881 et bull. soc. bot. 1882); hab. etiam in Ital. mer. (T. d'Otranto: HGroves).

16. *S. hirsutum*; Lusit. (Beira) a solo Brotero lectum videtur.

18. *S. brevifolium*; hab. etiam Sard. (: Arcangeli).

19. *S. dasphyllum*; Hisp. etiam mer. adsit. Styr. multis locis (: Maly). Croat. (: Borb., Tomm.); Transs. ad *S. glaucum* (39) var. pertineat. Comment. 133.

**S. glanduliferum*; — *S. nebrodense* forse saltem subspecies est.

20. *S. gypsicolum*; hab. etiam Hisp. mer. (pr. Hellin: Rouy 1881).

21. *S. anglicum*: Gall. bor.-occ. (Vire, Cherbourg etc.); Transs. ad *S. glaucum* (39) pertinet ex Smk. — *S. pyrenaicum* Lge. *S. anglicum* Dur. et al. (Pyren., Hisp. bor., Valenca Lusit.).

**S. arenarium*; *S. anglicum* = *Raji* Lge ex ipso (cfr. ej. pugill. plant. hisp.).

25. *S. Cepæa*; Hisp. bor. etiam in Astur. et Navar. indicatur; Alsat. (pr. Nothalten et Barr) ex Geke; Croat. mer. (pr. thermas Topusko: Vukotinovic). Bulgar. (m. Vitos: Skorpil). — *S. tetraphyllum*: Bulgar. m. Vitos (: Skorpil) et Osogovska Planina (: Vandas. Velen.). Comment. 134.

26. *S. alsinefolium*: Alpes-Marit. (pr. oppid. Tenda, St. Martin-Lant.).

27. *S. creticum*: ins. Karpathos (Arch. turc.); Pichler ex Boiss.

29. *S. stellatum*: Lusit. bor. (Coimbra: Bapt.). Mallorca Balear. (rarius). Catal. (: Boutel.). Alpes-Marit. (Menton, Nice, Biot, etc.).

31. *S. annuum*; Fenn. non nisi in mer. adest; Hisp. etiam in bor. (Leon, Astur.); Lothar. descendit e Vogesis, in sabulosis fluv. Mosel usque ad Epinal.

32. *S. Grisebachii*; hab. etiam Hung. or. ex Janka; Græc. bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht).

36. *S. villosum*: Livon. (pr. Riga: Klinge). Ins. Færöer.; Lapp. (suec.) loco unico lectum est sc. sub alpe Ripanes; Transs. ad *S. glaucum* (39) var. pertinet ex Smk.

38. *S. atratum*: Hisp. bor.-or. (Santander: Ler. Lev.). Styr. etiam mont. Sulzbach.

39. *S. glaucum*: Valach. (Virciorova: Borbás.). Bulgar. (pr. Sofia: Skorpil.). — *S. glanduloso-pubescens* Feicht 1873. *S. dasyphyllum* et *S. villosum* Bmg. ex Smk.

40. *S. pallidum*: ins. parva Petali ad Euboeam mer. sita (Heldr. 1880).

41. *S. confertiflorum*; in Pindi Tymph. jugo Zygos (Græc. bor.) leg. Haussknecht 1885.

42. *S. rubens*: Bulgar. (: Vandas. Velen.); - *Procrassula mediterranea*: Cors. (: Gillot).

43. *S. cæspitosum*: Dobrud. (in desertis lapidosis passim: Ue.S.); Transs. ad *S. glanduloso-pubescens* (39—) pertinet ex Smk.

44. *S. andegavense*: Lusit. (ins. Berlinge: Daveau 1883). Andal. (la Carolina: Lge).

× *S. engadinense* Brügg. = annuum + alpestre. (Engadin Helv.).

× *S. erraticum* Brügg. = ? boloniense + annuum; vid. Brügg. in jahresb. nat. ges. Graub. 1882. 96—98 (*).

5. **Rhodiola**. 1. *R. rosea*: Fenn. bor.-or. Ins. Færöer. Hisp. bor. (mont. Santander.) et centr. (Peñas de Virhes) ex Salcedo. Styr. etiam mont. Sulzbach. Ross. arct. etiam ins. Waigatsch et ad Jugor Schar (exped. Rosenthal.). — *R. Scopoli* Kern. (hb.); Smk. enum. *R. rosea* auct. hung.-transs. (Hung. Transs.).

2. *R. quadrifida*; hab. etiam Ross. or. (gub. Perm: Sorokin 1876).

6. **Bulliarda**. 1. *B. Vaillantii*: Gall. bor.-or. (Nancy). Menorca Balear. (r.); Ross. mer. a Lindem. (Cherson) et Becker (Sarepta) indicatur sed forse pro sequente.

2. *B. aquatica*; deest in Fenn. bor. multa (exc. Ostrob.) cum Lapon.

7. **Tillæa**. 1. *T. muscosa*: Germ. bor. (ad Jüterbogk Marchie) ex Gecke.

LII. FICOIDEÆ.

1. **Mesembryanthemum**. 1. *M. crystallinum*; hab. etiam ad Cette et Narbonne (Gall. mer.) ibique probab. indigen. ex Flahault.

2. *M. nodiflorum*; hab. etiam Balear.

3. *M. brachyphyllum*; inter *M. glaucum* L. et *M. aurantiacum* Haw. medium est, fruticulosum; crescit cum *Cistis*, *Ericis* et *Ulicibus*.

Obs. *M. acinaciforme* L., planta capensis, in reg. medit. sub dio colitur ibique in muris, rupibus etc. hinc inde (Cors. Sard. Neap. etc.) inquil. occurrit.

2. **Aizoon**. 1. *A. hispanicum*; etiam Catal. et Navar. indicatur.

LIII. CACTEÆ.

1. **Opuntia**. 1. *O. maxima*; Hisp. pr. Sanlucar de Barrameda inquil. ex Colm.

2. *O. Ficus indica*; in rupibus Ligur. marit. (Mentone, Monaco, Nizza) inquil. facta est.

4. *O. nana*; Helv. non nisi ad Sion (Sitten) Vales. obvia (ibi in rupibus vegetat et saltem subspont.).

LIV. GROSSULARIÆ.

1. **Ribes**. 1. *R. uva crispa*: Dan. Fenn. Moldav. Bulgar.; indicatur etiam Hisp. bor. et in Andal., ubi (r.) adest var. *microphylla* Lge (: H.P.R.). — *R. aciculare* Borb. (non Sm.).

2. *R. nigrum*: Dan. Fenn. Moldav.

3. *R. rubrum*: Dan. Fenn. Moldav.; indicatur (rr.) in Hisp. or., bor., centr.; in Ross. mer. indigenatus incertus videtur (sic cl. Lindemann in gub. Cherson

hoc spontaneum non vidit); Transs. non nisi cultum adest. — R. Schlechtendalii pertinet ad * R. petræum ejusque duas formas amplectitur.

5. R. petræum; — R. Biebersteinii Stev.: Galiz. (Lemberg: Blocki ex oe. b. z. 1885; etiam? Brody: Klöber).

6. R. alpinum; exc. etiam Lapp. fenn., Fenn. bor. (et med.); adest in Nordlanden Norv. bor. ex ABlytt.

7. R. orientale: Græc. m. Taygetus et Delphi Euboeæ (: Pichler).

LV. SAXIFRAGACEÆ.

1. **Saxifraga**. 1. S. florulenta (Magnier fl. sel. exs. 839): mt Bego, Clapier, mt Ponset vall. Gordolasca (: Canut et Bornet); laes de Vens pr. St-Etienne-aux-Monts (Burnat 1883). Comment. 135.

3. S. Cotyledon: Styr. super. in Alpihus, rarius (: Sommerauer, Vest), sæpe etiam culta; in Jurasso deest.

4. S. Aizoon; Island. certe adest (ex Rostrup ibi ad Seydisfiordr a Davidsson nuper lecta est). Siles. (Sudeti or.). Moldav. — S. intacta W.; hab. in Carn. (alp. Rosza: Ullepitsch), Tyrol., Helv. etc. — S. compacta Heg. (Helv.).

5. S. lingulata; — S. lantosca; loca natal. accuratius ita citanda sunt: mt Aiguille supra Mentone (: Hawker), St-Martin-Lantosce, le Villars, Entraunes, omnia in dep. Alpes-Marit.

*S. australis; Sicil. etiam in prov. messan. (Salvatesta ad rupes altiores, rr.: Seguenza ex Nicotra).

6. S. cochlearis: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont. a col de Tenda usque ad mt Mulacé supra Mentone: Ardoino); in La Briga et San Dalmazzo di Tenda copiose adest ex Lacaita.

8. S. Hostii (S. longifolia Host non Lap. S. Besleri Sternb. 1831); Helv. ab Hegetsch. (in BUNDIA) indicata, sed ex Gremli exclud.; Styr. et Carinth. non rara. Galiz. (m. Czerna Hora). Transs. bor. — S. altissima; etiam Carinth. (plur. loc.) adest. — S. rhætica Kern. sched. ad exs. 1886. (Tyrol. mer.).

9. S. crustata; Transs. (Bmg.) ad S. Aizoon (4) pertinet ex Smk.

10. S. marginata: Amalfi Ital. mer. in summis montib. calcareis, 4—5000' s. m. (: Lacaita).

11. S. Rocheliana; etiam in m. Grappa prov. Vicenza Ital. bor. lecta dicitur (: Massalongo 1882). Comment. 136.

14. S. mutata; Galiz. deest ex Knapp. - Transs. ad var. (heic subspec.) S. demissam pertinet.

*S. demissa Sch. Ky (1859). S. transsylvanica Fuss (1866). S. mutata auct. transs. — Transs. Moldav. alp.

15. S. luteo-viridis: Moldav. (alp. Bucieciu: Fronius, Cehlaulu: Jka).

18. S. aretioides: Pyren. hab. etiam hispan. (r.). Cantábr. (Picos-de-Europa: Ler. Lev.).

19. S. diapiensioides: Alpes-Marit. (loca natal. ex Ardoino: mt Orno pr. col de Tenda, cima dei Gelas inter mt Clapier et col de Fenestre, Jallorgues). Helv. non nisi in Vales. (pr. Pierre-à-voir, Bagne) adest.

20. S. squarrosa: Carinth. (alp. calcar.); Galiz. vix adsit.

21. S. cæsia (S. recurvifolia Lap.; Lag. est err. typ.); hab. etiam Galiz., sed Transs. ad S. Rochelianam (11) pertinet ex Smk.

23. S. glabella; hab. etiam Bosn. mer. (: GBeck 1885).

24. S. Burseriana; hab. etiam Bavar. (Alpes), sed Transs. incola dubia est.

25. S. scardica; — ?S. Sartorii Heldr. in Boiss. or. suppl. 248. Euboeæ m. Delphi (: Heldr., Pichler).

26. S. Vandellii: Styr. super. (m. Vorderberger-Mauer ex Maly). Helv. hab. in sola Valtellina (inter Livigno et S.-Giacomo); err. in Engadin indicata est. Comment. 137.

28. *S. aizoides*; hab. etiam Fenn. bor. (Ks). Bosn. mer. (: GBeck).
30. *S. tenella*; loca Carinth. ex Pacher: Krebenzen, Wischberg ad Raibl (1500—1800 metr.).
32. *S. retusa* (*S. purpurea* All.); floræ helv. incerta civis est (ex Gremli hab. solum in declivitate mer. m. Rosa). — *S. Baumgartenii*: Moldav. alp. Cehlaulu in summis rupestribus (: Janka 1868).
33. *S. oppositifolia*; hab. etiam Beeren-Eiland et Jan Mayen, itaque in omnibus insulis arcticis; ins. Færøer; Angl. etiam bor. (Yorksh. "in montibus rarius visitatis sat copiosa": Wolley 1880). Hisp. bor.; Lusit. (Gerez, *S. da Estrella*) a Brotero indicata est.
- **S. Rudolphiana*: Helv. (in summis Alpib.); Transs. ad speciem ipsiss. pertinet ex Smk.
34. *S. biflora* (*S. Hornungii* Shuttlew. 1835); Helv. non nisi in Alpibus adest; Transs. ad præced. (33) pertinet ex Smk.
- **S. Kochii* (*S. macropetala* Kern.); Helv. solum in Alpib. obviam venit; Styr. in alp. Hochwart; Transs. ad *S. oppositifoliam* (33) pertinet.
36. *S. trifurcata*; indicatur etiam Castil. (: Salcedo). — *S. multifida* Rosbach in bull. soc. bot. belg. 1875 ex Engl. (1879). Boruss. ad limites belgic. pr. Bollendorf supra Echternach (sed ibi vix indig.).
37. *S. cuneata*; locus Hisp. bor. (Cantabr.) est in m. Peña Redonda pr. Cervera, ubi primum lecta a Rentero 1858 et iterum 1879 a Boiss. Ler. Lev.
38. *S. pentadactylis*; — *S. cæspitosa* (Arag. mer.) probab. ad *S. intricatam* (40—) pertinet.
38. a. *S. canaliculata* (B.Rhb.) Ler. Lev. deux exc. (1880) 190. cum ic. (*). *S. Willkommiana* Bourg. hisp. exs. 2647 (in Consp. sub 39— allata). - Hisp. bor. (Cantabr., 4000—7000' s. m.), præcip. in montib. Picos de Europa, ubi rupes plurimos ornat hæc species pulchra, quæ, etsi inter distinctissimas, diu obscura erat et parum cognita; primum lecta a Rentero in itinere cum Boissiero 1858 pr. Cervera in m. Peña Redonda.
39. *S. Camposii*; primum lecta est in Gran. centr. a P. del Campo (1849). — *S. almeriensis* detecta est a Willkomm in Sierra de Maria (Gran. or.) 1845. — *S. Willkommiana* (Curavacas supra Cervera Cantabr.: Boiss. 1858; Navacerrada: Ler. 1862; Arag.: Willk. 1850. Ler. 1870) est species omnino distincta (cfr. Ler. Lev. deux exc. 190), sed pl. Bourg. (e Leon) ad præced. (*S. canalicul.*) pertinet.
40. *S. exarata*; Helv. solum in Alpibus adest; Transs. ad *S. muscoidem* (62) pertinet ex Smk.
- **S. adenophora*: Eubœæ m. Delphi et Xerobouno (: Heldr., Pichler).
44. *S. sponhemica*: Bohem. (: Celak., Freyn). Siles. pr. Cudowa (sed ex Fiek nunc fere evanuit). Gall. or. etiam in Voges. (rarius). Luxemb. (ex Geke), sed Belg. deest ex Crepin.
45. *S. decipiens*: Belg. (: Crepin). Westph. (pr. Laasphe). Thuring. Saxon. (Erzgeb.; sächs. Schweiz, rr.). Austr.-Infer. (: Halacsy); Siles. deest ex Fiek.
- **S. groenlandica*; hab. etiam ins. Færøer (: Rostrop).
46. *S. cæspitosa*: Samoied. Ural. bor.; hab. etiam Waigatsch, Beeren-Eiland et Jan-Mayen, ideoque in omnibus insulis arcticis.
47. *S. iratiana*; hæc et seq. (*S. nevad.*) ex Engler et Lange ad sectionem Exaratarum pertinent et *S. mixtæ* (42) valde proximæ sunt.
50. *S. geranioides*; indicatur etiam in Vizcaya, Astur. et Leon.
51. *S. pedatifida*: Hibern. occ. (Achill Island) sec. specim. ArthBennett, sed sec. Corry (1883) non spontan. *S. multifida* Rosb. est hujus var. glabrata ex Engler 1877 (cfr. 36).
52. *S. aquatica*; hab. etiam Catal. (: Boutel., Timb.-Lagr.).
53. *S. pedemontana*; — *S. cervicornis*; *S. pedemontana* var. minor Mor. sard., sed bona species est et a *S. pedemontana* toto coelo diversa ex Barbey.
54. *S. ajugifolia*: Catal. (: Bru.). Arag. (: Timb.-Lagr.). Cantabr. (Picos-de-Europa: Ler. Lev.).

55. *S. perdurans*; Comment. 138.

56. *S. hypnoides*; Belg. (et Luxemb.) non indig. est sed ad Waulsort introduct. (abunde) et interdum in muris quasi sponte obvia (ex Crepin); Island. a Grönlund et Strömfelt freq. dicitur ut etiam in ins. Færøer a Rostrup.

57. *S. conifera*; in Hisp. bor.-or. (Picos-de-Europa) et centr. (Cervera Castil.) nuper legerunt Leresche et Levier.

58. *S. granatensis*; hab. etiam Murc. (: Blanco).

62. *S. muscoides*; in Sudetis rariss. est (Kl. Schneeegrube).

63. *S. aphylla*: Carinth. (Minsfeldeck vallis Katschthal ad 2500 metr.: Jabornegg).

64. *S. androsacea*; lecta dicitur etiam Arvern. in mont. Cantal. Puy Mary, Pas-de-Roland (Gatien et Heribaud 1878).

65. *S. Seguiieri*; Helv. solum in Alpibus (r.) adest.

67. *S. sedoides*: Bavar. (Funtensektauern Alp. or.). — *S. Hohenwartii*; planta transs. (Kotschy) est *S. sedoides* ipsiss. ex Smk.

67. *a. S. prenja* GBeck in annal. mus. vind. (1887). II. 93. - Bosn. mer. (m. Prenj-Bjelasnica alp.: GBeck 1885).

69. *S. latepetiolata*; hæc species hucusque ex unico loco nota est, sc. Sierra de Chiva, ubi in cacumine Cerro de Sta Maria (circ. 1500 metr. s. m.) detecta et parvissime lecta a Willkomm (1844); ibidem nuper (1881) a Burnat et Barbey recognita et uberius lecta est (vid. eor. notes bal. etc. 5 *).

71. *S. granulata*; Scand. hab. Norv. mer., Suec. mer., med.; bor. r. (Jemtia, Angerm.). Fenn. mer.

72. *S. glaucescens*; — *S. castellana*; hab. Castil. (Toledo, Escorial etc.). — *S. bulbosa*; cfr. ad 75. *a.*

73. *a. S. Blancae* Willk. ill. hisp. I. 8. - Arag. mer., ubi in rupibus pr. oppid. Valdecabriel a virgine nobili Blanca Catalan detecta est (1879); in pratis pr. oppidum Albaracin legit Zapater.

75. *S. bulbifera*: Bulgar. (pr. Sofia: Skorpil); Helv. solum in vales. (Sion, Branson etc.) adest.

75. *a. S. Hochstetteriana* Lge (hb.). *S. granulata* var. *Hochstetteriana* Engl. - Lusit. - Species bona ex Lange (litt. 1888) test. specim. Welwitsch. et Hackel.

76. *S. cernua*: ins. arct. Jan Mayen (: Fischer 1883). Beeren-Eiland. Waigatsch (exped. Rosenthal. 1871). Fenn. bor. (Ks). Helv. ex Gremli non nisi "ob Lens. Sanetsch" adest. Styr. in unico loco lecta est sc. in declivitate septentr. cacuminis altissimi alpis Eisenhut, loco umbroso humido, aditū difficili (Maly); Transs. deest ex Smk., sed ibi in Buczecs a Janka et Freyn (litt. 1888) lecta.

77. *S. carpatica*; hab. etiam Moldav. Comment. 139.

78. *S. rivularis*: ins. Færøer; hab. etiam ins. Waigatsch (Kjellm. Lundstr. 1875), Beeren-Eiland et Jan Mayen, itaque in omnibus insulis arcticis.

84. *S. petræa*; — *S. ramosissima*; sec. Kanitz et Simonkai est var. *S. adscend.* (86).

**S. Blavii* (Engl.) GBeck. - Bosn. mer. (: Blau, Beck).

86. *S. adscendens*; Austr. (e. gr. Styriæ) etiam extra Alpes adest. — *S. controversa*: m. Balkan in summo cacumine angustiarum Schipka (: Janka 1878).

**S. parnassica*; hab. etiam in m. Pindo (: Heldr. 1885).

87. *S. tridactylites*; Fenn. adest in sola mer.-occ. extima (Aboa, Aland.). Lusit. a solo Vandelli lecta videtur; hab. etiam in ins. Cephalon. (: Heldreich).

**S. tenerima*; loc. natal. (majoric.) est ad rupes madidas umbrosas in faucibus Gorch-Blau inter Lluck et Aumallueh (: Willkomm); cl. Barbey ex hac, in horto satā, *S. tridactylitem* ipsiss. obtinuit (cfr. etiam Burn. Barb. not. balear. 22).

88. *S. hieracifolia*: Ross. arct. ins. Waigatsch (exped. Rosenthal. 1871). Lapp. or. centr. Imandr. (Kihlman 1887). Galiz. Carinth. (alp. Reichenauer: Pacher

cum sociis 1861) Arvern. m. Cantal., Puy Mary jugi Pas-de-Roland, in alt. 1700 metr.: Gatien et Heribaud 1878; Magnier sel. exs. 1183 (*S. nivalis* Delarbre fl. de l'Auvergne, non L.).

89. *S. nivalis*: ins. Færøer; nunc etiam in Beeren-Eiland et Jan Mayen (ideoque in omnibus insulis arcticis) lecta est. Fenn. or. tota. bor. et med. partim hab.; in Sudetis non nisi in parte occid. et quidem unico loco (Kl. Schnee-grube) lecta est.

90. *S. Hirculus*: Beeren-Eiland. Waigatsch (exped. Rosenthal 1871). Batav.; Fenn. deest in tota mer.-occ., in mer. et med. partim; Morav. rr. et non nisi pr. Troppau ex Dr. Hein adest (ab Oborny cum dubio citatur).

91. *S. flagellaris*; ThFr. exs. spitzb. 50.

92. *S. aspera*; Transs. (Schur) ad subspeciem (*S. bryoides*) pertinet ex Smk.

94. *S. tricuspidata*; planta færøensis (ex Rostrup) dubia manet, nam deest in hb. Lyngbyei, cujus auctoritate hæc species groenlandica a Trevelyan enumeratur.

95. *S. Clusii*: Banat. ex Borbás, sed Hung. et Transs. ad seq. (*S. stellar.*) pertinet ex Smk.

96. *S. stellaris*: Ross. arct. ins. Waigatsch (exped. Rosenthal. 1871). Ins. Færøer. Styr. etiam in m. Sulzbach. adest. Maced. m. Peristeri (Orph. exs. 1011). Bosn. (m. Vranica luca: Brandis 1885 ex Freyn). Bulgar. (m. Osogovska Planina, in declivibus m. Kom, in m. Vitos pr. Sofia etc.). — *S. Clusii*; *S. Engleri* Dalla Torre. — *S. leucanthemifolia* auct. transs. ex Smk.

97. *S. umbrosa*: Austr-Super., 800 metr. s. m. (certe spontan. ex Kern.). — *S. serratifolia*: Hisp. bor. (Galloe.: Texidor, Leon: Lange).

98. *S. cuneifolia*: Aragon. (: Asso). Castil. (: Link.). Styr. in montibus pr. Cilli, Neuhaus etc.

99. *S. hirsuta*; Castil. jam antiquitūs indicata, nuper prope Cervera lecta est (Ler. Lev.); Lusit. pr. Coimbia etc. (Bapt. Brand.).

100. *S. Geum*: in alpinis Rodnensibus non provenit (teste Smk.).

101. *S. rotundifolia*: Hisp. etiam bor. (Astur.: Palau, Santander: Ler. Lev.). Sard. (ex Reverchon). Bavar. (extra Alpes) Wengendobel pr. Kempton; Styr. (extra Alpes) plur. locis. Bulgar. (m. Osogovska Planina et Vitos). Belg. inquil. pr. Roly (: Crepin).

102. *S. chrysosplenifolia*: Thessal. m. Pelion (: Heldr. Holzm. 1883).

107. *S. paradoxa*; Zahlbrucknera paradoxa Rchb. (1832). *Z. austriaca* Maly (1868).

× *S. Forsteri* Stein = *cæsia* + *mutata*. (Tyrol.).

× *S. Girtanneri* Brügg. = *mutata* + *aizoides*. (Helv.).

× *S. hybrida* Kern. = *oppositifolia* + *biflora*. (Carinth.).

× *S. norica* Kern. = *Kochii* + *oppositifolia*. (Carinth.).

× *S. Padellæ* Brügg. = *androsacea* + *Seguieri*. (Helv.).

× *S. Reyeri* Tomm. = *sedoides* + *tenella*.

× *S. Wettsteinii* Brügg. = *exarata* + *planifolia*. (Helv.).

2. *Chrysosplenium*. 1. *C. alternifolium*; exc. etiam Lapp. (ex Whlhb. ibi rr.) et Fenn. bor., sed indicatur (typicum) immo Nov.-Semliæ, Samojed. et Ural. bor. — *C. nivale* hab. etiam Ross. et non nisi statura humiliore a specie diversa est ex Maximov.

**C. tetrandrum*: Nov.-Seml. (ThFr.). Beeren-Eiland. Waigatsch et ad Jugor Sharr (exped. Rosenthal 1871). Lapp. or. (ponoj.), occ. (inar. et tulom.: JFellm. 1863).

2. *C. oppositifolium*: Siles. Moldav.; Ross. deest ex Maximov.; Transs. ad subspeciem (*C. alpinum*) pertinet ex Smk.

**C. alpinum*; *C. kamtschaticum* Jka (ex Smk.).

3. *C. dubium*; sec. Maximov. nomen antierius est: (*C. macrocarpum* Cham. in linn. VI. 558.

LVI. UMBELLATÆ.

1. **Margotia**. 1. *M. laserpitioides*; Hisp. etiam Arag. (: Loscos et al.). Leon (: Lange); Cors. in litore ad Portovecchio nuper abunde lecta (: Mars.).

2. **Elæoselinum**. 2. *E. Loscosii*; hab. etiam Valenc. (: Rouy).

3. *E. Asclepium*; hab. etiam in Hisp. (Valenc. pr. Jativa et Valldigna: Rouy 1879, 1881); cfr. Rouy in bull. soc. bot. 1882 (*).

6. *E. Lagascæ*; hab. etiam Valenc. (: Rouy); in Cors. nunc destructum dicitur.

3. **Lophosciadium**. 1. *L. meifolium*: Dobrud. (in pratis silvaticis: Ue.Sint.). Bulgar. (in or. adest var. *microcarpum* Velen.; vid. act. soc. sc. boh. 1885. sep. 16 *). — *L. Barrelieri* Grsb. spic. excl. syn. (ex Jka 1879). Chlevax athous Ces. ms. (ex Jka). *Ferulago monticola* Boiss. or. p. p.

4. **Thapsia**. 1. *T. villosa*; — *T. salmanticensis*; Hisp. plur.

3. *T. garganica*: Balear.: Mallorca (: Marès); Ibiza et Formentera (: Barceló). Cephal. ins. Jon. (: Heldreich); Ital. cont. hab. solum in mer. (Calabr., Apul.) et in mte Argentaro Hetr.

6. **Laserpitium**. 1. *L. latifolium*: Norv. mer. (in Consp. omitta). **L. Winkleri* Herbieh (1836). Galic. mer.-or. (rarius). — *L. podolicum* Rehm. (Galic. etc.).

2. *L. Nestleri*; hab. etiam Murc. (: Bourgeau); indicatur etiam in Hisp. bor.; Lusit. non nisi in Serra de Gerez (Lk. Brot.) lectum videtur.

4. *L. marginatum*; Helv. (mer.), ubi post *Kochium* indicatum, deest ex Gremli; Transs. (*L. ambiguum* Schur et *Laser trilobum* Bmg.) ad *L. alpinum* (5) pertinet ex Smk.

5. *L. alpinum*: Bulgar. (m. Kom: Vandas. Velen.); hab. (sec. Kerner) etiam Aprut. in tractu m. Majella. — *L. marginatum* Grsb. iter et auct. transs. (ex Smk.).

6. *L. Archangelica*: Transs. (*Imperatoria Ostruthium* Bmg. ex Smk.).

7. *L. nitidum*; hab. etiam in Lomb. (Alpes).

8. *L. Siler*; Bavar. (pauc. loc.). Tyr. (m. Wotschberg etc.) et Carinth. etiam extra Alpes obvium. Curon. (ad riv. Abau) ex Klinge; Transs. indicatur sec. Bmg., sed in ejus hb. deest, nec alius (teste Smk.) hanc speciem hac in terra legit.

**L. siculum*; hab. etiam in Calabr., ubi in mte Pollino detectum a Terraciano 1886 (ex Car.).

9. *L. peucedanoides*; Helv. (mer.) post *Kochium* indicatur, sed incertum nunc dicitur; Transs. ad *L. glabratum* Roch. (14—) pertinet ex Smk.

10. *L. gallicum*; hab. etiam Gall. or. (Côte-d'Or); deest in Ital. mer. (desinit in Aprutio).

11. *L. Panax*: Ital. bor. (Pedem. Lomb. Tyrol. Friul.); planta Cors. sistit var. *L. cynapiifolium* Sal.-Marschl.; Helv. non nisi in Alpibus adest.

13. *L. hispidum*; hab. etiam Ross. centr. (gub. Kursk).

14. *L. pruthenicum*: Friul. Venet. Emilia (ad Parma: Passerini); Germ. bor.-occ. deest.

8. **Orlaya**. 1. *O. grandiflora*: Lusit. (Coimbra: Bapt.). Coreyra ins. Jon. (: Letourn. ex Boiss.). Epirus (: Chodzes ex Heldr.). Roman. Rumel. or. Bulgar.

3. *O. maritima* K. (*Caucalis pumila* L. 1759. *C. maritima* Gou. 1762); hab. etiam Hisp. or. (cum Balear.).

9. **Daucus**. 1. *D. crinitus*: Murc. (: Bourg.). Valenc. (Cav.).

2. *D. setifolius*: Murc. (: Funk). Valenc. (: Pourret).

3. *D. maximus* (probabiliter = *D. mauritanicus* L.): Cephal. ins. Jon. (: Heldreich).

4. *D. Carota*; Norv. mer. adest; typus deest in Ital. mer. (desinit, ut videtur, in Hetr.). — *D. Tommasinii* nob. *D. maximus* Tomm. *D. Carota* var. major Vis. dalm. (Istr. Dalm.); de hac planta vid. ap. Freyn in act. soc. z.-b. 1877 et 1881. — *D. parviflorus* Bert. non Dsf. (Ligur. Hetr.).

5. *D. aureus*; hæc species, quæ in Sicil. sat vulgata est (immo segetibus infesta), in Ital. cont. solum paucis locis Calabr. occurrit.

**D. serratus*; hab. etiam Catal. (: Costa); sec. Caruel est *D. dentatus* (14).

6. *D. Bocconi*; indicatur etiam in Menorca Balear. (: Rodrig.).

7. *D. mauritanicus*: Ital. med. (Hetr., Aprut.) ex Caruel; Castil. (Manzanares etc.) etiam ex Colmeiro; *D. mauritanicus* Guss. (syn. et inar.) ad *D. Gingidium* (9) pertinet ex Caruel.

8. *D. rupestris*; ex Caruel etiam hæc species ad *D. dentatum* (14) pertinet.

9. *D. Gingidium*: Menorca Balear. ex Rodriguez. — *D. nitidus*; ex Caruel pertinet ad *D. Carotam* (4) et est = *D. polygamus* (Guss.).

Obs. Hæc species, sec. Caruel (l. c. 547. 550), sistit typum valde polymorphum, a quo auctores varii immerito distinxere species varias sc. *D. Bocconi* (6), *D. gummifer* (10), *D. hispidus* (11), *D. foliosus* (13), *D. gibbosus* (13*), *D. siculus* (19).

10. *D. gummifer*; *D. mauritanicus* Barcelô ex ipso.

13 obs. *D. parviflorus* (verus); ex Caruel adest in Sicil. ad Catania (: Parlatore) et Terranova (: Tineo) sed pl. ligust. ad var. *D. Carotæ* pertinet.

16. *D. setulosus* (*D. bicolor* Sibth. Sm. ex Car.): Cephal. ins. Jon. (: Heldreich). Melita (: Calcaria ex Caruel).

17. *D. polygamus*; hab. etiam Hisp. bor. (Irun: Rouy 1881, Astur: Gou.); cfr. Rouy in rev. sc. nat. 1883.

18. *D. involueratus*: Isthm. Corinth. (lit. mar.) ex Lacaita in litt.

21. *D. muricatus*: Alpes-Marit. r. (Menton, Roquebrun).

22. *D. Broteri* (*D. pubescens* Dnt., Ces. Pass. Gib.): Ligur. (Porto Maurizio: Dnt.); in Ital. med. usque in Emiliam (Faenza, Parma), progreditur.

23. *D. lopadusanus*; hæc species prox. est *D. Gingidio* (9), cui ex cl. Caruel affinis, distincta tamen et insulis Lampedusa (: Calcaria, Aiuti) et Malta (: Tôdaro, Calcaria) priva.

25. *D. bessarabicus*: Dobrud. (ad litus Ponti pr. Portica: Uechtr. Sint.)

10. *Durieu*. 1. *D. hispanica*; hab. etiam Murc. (: Bourg., Rouy).

13. *Turgenia*. 1. *T. latifolia*: Bohem. (: Pospichal sec. Celak.). Morav. (: Oborny). Dobrud. (pr. Malcodiu: Ue.S.). Bulgar.

14. *Caucalis*. 1. *C. leptophylla*; Hisp. bor. (Leon, Arag.) nunc a Lange, Loscos et al. lecta est; Lusit., ut videtur, a solo Vandelli; Helv. olim in Valesia et pr. Basel lecta, nuper in cant. Neuchatel raro (introd.) observata est.

1. *a. C. Torgesiana* Hsskt ms. (litt. 1889). - Græc. pænins. Methana (: Haussknecht).

2. *C. coerulescens*; hab. etiam Hisp. bor. (Leon, r.) sec. Lange.

5. *C. daucoides*; exc. forse etiam Lusit., ubi a solo Tournef. indicata videtur. — *C. muricata*: Bavar. Phalz. (r.). Istr. (Triest).

15. *Torilis*. 1. *T. Anthriscus*; adest, sed raro, in Cors. (: Marsil., Salis).

2. *T. microcarpa*: Roman. Bulgar. (: Bornm. 1887).

3. *T. neglecta*; hab. etiam Bulgar. (: Bornmüller).

4. *T. helvetica*; Germ. bor.-occ. usque ad Braunsch., Hannover et Osnabrück progreditur; introd. adest etiam in Marchia.

5. *T. heterophylla*: Hisp. bor. (Leon: Lge). Balear. — *T. heterosperma* Stev. (Taur.); ex Trautv. probab. errore scriptorio orta.

6. *T. nodosa*: Bulgar. (pr. Varna); Transs. ex Smk. vix adest.

16. **Siler.** 1. *S. trilobum*: Valach. (Virciorova: Kanitz). Dobrud. (reg. silv.: Uechtr. Sint.).

17. **Levisticum.** 1. *L. officinale*; Catal., Arag., Cantabr. etc. spontaneum dicitur; Lusit. ex Brand.; Moldav. (ad ripas fluv. Siretu, Pruth etc.). Carinth. plur. loc. (ex Pacher), sed Ital. nullibi indig. videtur teste Caruel.

18. **Tommasinia.** 1. *T. verticillaris*: Carinth. (mont. et subalp.). Comment. 140.

19. **Archangelica.** 1. *A. officinalis*: Moldav. Bulgar. (m. Vitos); indicatur in Lomb. etc. Ital. bor. (nec non in Basilicata); Germ. (etc.) etiam efferata adest (e cultura). — *A. alpina* Sm. (1886). *Angelica pachyptera* Smk. (non Avé-Lall.).

**A. norvegica*; hab. etiam Ross. arct., Fenn. bor.; ins. Færøer.

†*A. litoralis*: Ross. balt. (: Heugel). Fenn. bor.-occ. (Ostrob.). Suec. bor.-or. (Bothnia bor.).

20. **Angelica.** 2. *A. lævis*; hab. etiam in prov. Leon (Ler. Lev.).

‡*A. pachycarpa*: Lusit. ins. Berlenga (: Daveau 1883).

§*A. silvestris*: Orph. exs. 1016 e Vodena Maced. (var.).

**A. montana*: Bosn. (: Brandis ex Freyn). — *A. macrophylla* (ex Smk.) est *A. silvestris* ipsiss. et = *A. silv.* var. *appendiculata* Heuff.

†*A. alpina* pertinet ad præced. (*A. montan.*) ex Smk.

§*a.* *A. brachyradia* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1888. 607. - Bosn. centr. subalp. (Gujni dol etc.: Brandis).

§*b.* *A. Pancicii* Vandas in diar. (sitzb.) soc. scient. bohém. 1888. 448. (*). - Bulgar. m. Vitos subalp. pr. Knezevo (: Vandas. Velen.); in m. Rilo eandem legit b. Pancic (ex Vandas).

7. *A. Razulii*; in Hisp. bor. tota adesse videtur.

21. **Ostericum.** 1. *O. pratense*: Marchia. Carinth. (Tröpolacher Moos, rr.: Pacher); Transs. ad Angel. silvestr. pertinet ex Smk.

22. **Selinum.** 1. *S. Carvifolia*: Angl. (Lincoln, Cambr. ex Arth'r Bennett). Murcia (ex Ortega). Mallorca (ex Barceló).

2. *S. pyrenæum*: Cantabr. Castil. (S. de Gredos: Ler. Lev.). Catal.

23. **Ferula.** 1. *F. communis*: Ligur. litor. (pr. Noli et Albenga); est inter maxime notabiles et characteristicas plantas plagarum mediterranearum, cujus historiam (in Grecia), tam antiquam quam hodiernam, cl. Heldreich nuper plene exposuit; vid. "die Ferulastaude (*F. communis*) von Th. von H." in verh. d. bot. ver. prov. brand. XXIII. 1881. (*).

**F. nodiflora*: Lomb. ad lac. Garda (ex Bert.). — *F. glauca* DC. (non L.): Gall. mer. (dep. Herault, in rupib. calcar.).

2. *F. glauca* (*F. tingitana* auct. hisp. plur.): Ibiza Balear. (: Marès). Malaga (: de la Leña). Gibraltar (: Broussonet); antiquitús etiam aliis locis Hisp. indicata est.

**F. hispanica* Rouy ex. bot. esp. 1883. (39 *). - Hisp. valent. (in rupibus promontorii Hífac: Rouy).

‡*F. Heuffelii*; in Valach. lecta est ad Virciorova versus Portam Ferream (: Janka, Borbás).

§*F. athoa* Jka brev. n. 28. - Maced. pænins. *athoa*. - Planta orgyalis. Flores et fructus ignoti.

24. **Eriosynaphe.** 1. *E. longifolia*; Comment. 141.

25. **Ferulago.** 1. *F. galbanifera*: Bulgar. (in rupib. calcar. ad Kostinbrod et Konjavo: Vandas. Velen.); Transs. ad *F. silvatic.* (7) pertinet ex Smk.; Galic. deest ex Knapp.

2. *F. granatensis*: Arag. (: Colmeiro). Castil. pr. Hoyoquesero (: Bourgeau).

3. *F. brachyloba*: Lusit. (Caldas da Reinha: Brand.).

5. *F. monticola* Boiss. diagn. (et fl. or. p. p.). Neilr. diagn. (non nachtr.); synon. Grsb. (Lophosc. Barrelieri) excl. (pertinet ad Lophosc. meifol.). Species certe adest in Banatu sed raro (inter Toplecz et Mehadia pr. Alt-Orsova: Janka). Maced. (et Serb.?) ad Lophosc. meifol. referenda est. — De hac specie cfr. ceterum clmi Janka tractatum in termes. füzet. 1879 (*).

6. *F. Barrelieri*: Ital. centr. (Aprut., Samn.); indicatur etiam in Appen. Bonon.

7. *F. silvatica* (Ferula athamantifolia Schur): Bulgar. (m. Kom: Vandas. Velen.). Valach. Moldav. Ross. mer. (gub. Cherson). - Lophosc. Barrelieri Grsb. (et Schenk) iter hung. (non spicil.); cfr. Jka l. c.

**F. Rocheliana* nob. *F. silvatica* var. commutata Borb. (1878). *F. monticola* Borb. (non al.). - Banat. (Orsova, vall. Czerna ad therm. Herculis; jam a Rochel lecta et illustrata). Valach. (Virelorova circa Portam Ferream: Borbás).

8. *F. geniculata*; hab. Sicil. mer. et mer.-or. (nec in Nebrod.), Melita (: Delicata); in Ital. ipsa deest, sed Tenore descripsit *F. rigidam* suam (siculam) in append. ad prodr. fl. neap., unde plantam neapolitanam habuere.

9. *F. nodosa*; hab. etiam Cephalon. (: Heldreich).

10. *F. Sartorii*: Heldr. hb. norm. 931 ex ins. Andros (locus speciei unicus; Sartori detex. 1857).

27. **Bonannia**. 1. *B. resinifera*; extra Sicil. non nisi in Calabr. lecta est. Comment. 142.

28. **Imperatoria**. 1. *I. Ostruthium*: Island. (Vithey: Fridriksson. Grönl. addit.). Astur. Navar. Arag. Catal. Alpes-Marit. (silvat. Boréon, convall. Fenestre, Ste-Anne-de-Vinai, Salsamorena). Westphal. (Balve in Hönnethal, ad Braberg). Ross. med. occ. (Curl., Lith., Mohilew); Succ. vix indig., sed olim culta et nunc inquil.; Transs. ad Laserpit. Archangelica pertinet ex Smk.

2. *I. angustifolia* (Peuced. angustifol. Rehb.): Ligur., ubi speciei hujus raræ locus classicus (Limone) situs est pr. Tenda (Alpes-Marit.); etiam in Helv. mer. cant. Ticino (in monte supra Lugano et Bironico: Schleich. hb. ex Gremli).

29. **Peucedanum**. 2. *P. latifolium*: Dobrud. (in pratis litor., in silvis deltæ: Ue.Sint.). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.).

4. *P. austriacum*; add. Hung. (ex Hzl.). Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.); Helv. hab.: Valesia, Vaudia et Bernerobel., ita occid.; planta transs. pertinet ad *P. intermedium* (Schur) Smk. = *P. montanum* Bmg. et auct. transs.

**P. rablense*; — *P. Bellardi* (Selinum Bellardi Balb.) non est planta pedem. sed hortensis patriâ ignotâ (ex Caruel).

7. *P. Cervaria*; indicatur etiam Hisp. bor. (Navar., Vize. etc.). Bulgar.; deest in Ital. mer.

8. *P. Oreoselinum*: Hisp. bor. (Vize., Navar.). Moldav.

9. *P. venetum*; in Ital. mer. non lectum est (desinit in Aprutio).

10. *P. alsaticum*: Gall. dep. Loire (ex JHervier 1885). Bavar. bor. Carinth. (Satnitz: Graf); Helv. (ubi ex Hegetschw. indicata) non adest sec. Gremli; Dobrud. (in desertis, pratis silvaticis freq.: Uechtr. Sint.). Bulgar. Rumel. or. (: Skorpil 1886).

11. *P. palustre*: Fenn. Dan.; Hisp. etiam bor. indicatur.

**P. Crouanorum*; pertinet ad speciem seq. et cum ea identicum est ex Lange, qui specce. authent. comparavit.

12. *P. lancifolium* (1865); Magn. sel. exs. 844 et bis (Gall.).

14. *P. arenarium*: Moldav. (: Guebh.). Dobrud. (: Ue.S.). Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.); Transs. (Bmg.) ad Silaus virescens pertinet ex Smk.

17. *P. parisiense* (1815). *P. gallicum* Latourette (1785).

18. *P. paniculatum*; hab. etiam Catal. (: Costa, Isern).

19. *P. stenocarpum* (*P. officinale* Palau p. p.): Murc. (: Bourgeau). Extrem. (: Guijo); indicatur etiam Valenc. (: Bened.) et Catal. (: Vayreda).

20. *P. officinale*: Bavar. Germ. occ. (secus Rhenum), bor. (ad Elbe inter Barby et Havelberg). Hisp. bor. Moldav. Bulgar. Ross. mer.-occ.; Ital. impr. bor. inhab. (in med. rarum est, in mer. a solo Ten. indicatum). Transs. ad P. Rochel. (22 *) pertinet ex Smk. — *P. italicum*: Arag. Catal. (*P. officinale* Costa ex Lge).

21. *P. longifolium*; Transs. ad P. Rochel. (22 *) pertinet ex Smk.

22. *P. ruthenicum*: Dobrud. (in pratis silvat. pr. Ciucarova: Uechtr. Sint.); Transs. ad subspeciem (*P. Rochel.*) pertinet ex Smk.

24. *P. campestre*; sec. Borbás est = *P. ruthenic.* (22), ex Smk. = *P. Rochel.* (22 *).

25. *P. Bessarianum*; hab. etiam Moldav. (r.).

26. *P. vittijugum*; hab. etiam Thrac. bor. (: Janka).

27. *P. Schottii*; in Ital. mer. parce lectum est (mte Corno: Orsini, mte Matese: Pasquale). — *P. petraeum*: Istr. (: Freyn). Alp.-Marit. (La Briga: Lacaita).

28. *P. carvifolium*: Ital. centr. Istr. Galiz. or. Bulgar.

**P. heterophyllum*; — *P. nebrodense*; de hac planta rariss. cfr. Lojac. stud. crit. in natural. sicil. 1881. sep. 8-10 (*).

30. *Johrenia*. 1. *a.* *J. Pichleri* Boiss. or. suppl. 266. - Thrac. m. Hæmus pr. Kalofer (: Pichler).

31. *Anethum*. 1. *A. graveolens*: Hisp. plur. (centr., or., mer.) inter segetes, nec non Lusit.; indicatur etiam in Istr. (Trieste, Pola) et Aprut. (Piscina, Aquila etc.) nec non Melitæ.

32. *Palimbia*. 1. *P. salsa*; *Ferula salsa* Led. Peuced. salsum Bth.Hook.

33. *Pachypleurum*. 1. *P. alpinum*: Ins. Waigatsch et ad Jugor Sharr (exped. Rosenthal. 1871).

34. *Opopanax*. 1. *O. Chironium* (*Ferula Opopanax* Spr.): Græc. bor. (Thessal. planit. et Pindus Dolop.: Haussknecht); deest in Cors. - Ex obs. cl. (Carnel (Parl. fl. ital. VIII. 297) hæc species certe est *Pastinaca Opopanax* L., sed non, ut voluere Gouan et Boissier, *Laserpitium Chironium* L.

2. *O. hispidus* (*Ferula hispida* Friv. 1835): Cephal. (: Heldr.). Ital. mer.: Otranto, Gallipoli (: HGroves), m. Gargano (: Porta, Rigo et Boiss.).

35. *Malabaila*. 1. *M. aurea*; hab. etiam in Epiro (: Chodzes ex Heldr. 1879).

1. *a.* *M. biradiata* Hsskt. ms. (litt. 1889). - Græc. bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht).

3. *M. graveolens*: Moldav. Dobrud. (in desertis, pratis silvat. freq.: Ue.S., Jka).

36. *Pastinaca*. 1. *P. lucida* (L., Gou., DC.); vid. Burn. Barb. notes voy. bot. balear. (1882). 24 (*), ubi species plene describitur et comparatur cum ceteris (de quibus insunt observationes); in Mallorca lecta est in montibus plurimis, in Menorca in mte Toro.

2. *P. divaricata*: Sard. (ex Reverch.); planta cors. sæpe (e. gr. Mab. 130) ad *P. opacam* (4 *) pertinet ex Burn. Barb. l. c.; cfr. etiam Fournier in bull. soc. bot. V.

3. *P. latifolia*; hab. etiam in Ligur. occ., ad Caramanico Abruz. et in Campan.; synon. et exs. citata pertinent ad:

3. *a.* *P. corsica* Car. in Parl. fl. ital. VIII. 260. - Cors., ubi secus rivulos ad Bastia et in parte bor. insulæ vulgata.

4. *P. sativa*; in ins. ital. (Cors., Sard., Sicil.) deest vel rr. obvia. — ? *P. tereticaulis* Bor. (in Consp. sub * *opaca* militat).

**P. opaca*: Scan. occ. (ex FAresch.). Bosn. (: Brandis 1884 ex Freyn). Bulgar. (Petrov Han, Sofia); de hac (et al.) vid. Celak. in oe. b. z. 1877. — *P. elatior*; ex Borbás. rite distinguitur a *P. opaca*, sed erronee jungitur cum *P. teretiuseula* Jord.

4. *a. P. hirsuta* Panc. princip. serb. 359. - Thrac. m. Rilo (: Pancic) ex Boiss. or. suppl.; ex Vandas hab. etiam ad Petrov Han et in m. Vitos (Bulgar.).

5. *P. Fleischmanni*; in m. Schlossberg Laibacæ nunc exstincta est et adest solum in horto botan. ibidem (: Voss).

37. *Heracleum*. 2. *H. palmatum*; synonym. *H. simplicifolium* (1859) pertinet ad subspeciem *H. transsylv.* (1866), quod vero (ex Smk.) non nisi varietatem leiocarpm *H. palmati* sistit. — var. *oetium* Boiss.: *Phthiotidis* m. Oeta (: Heldreich).

3. *H. Pollinianum* (*H. asperum* Ces. ex Car.); hab. etiam Bosn. (: Brandis 1887 ex Freyn); *H. alpinum* Bmg. (Transs.) ad *H. carpaticum* (7. *a*) pertinet ex Smk., ut forse etiam *H. alpinum* Rehmann (Galiz.) et *H. alpinum* Hzl. (Hung.).

4. *H. pyrenaicum*: *Hisp. bor. plur. Carinth. (rarius). Austr.-Infer. (Rax-alpe: Halacsy et Braun); sec. Kerner hæc species a præced. (H. Pollin. e Tyrol. mer., Lomb.) nullo modo diversa est.*

5. *H. setosum*; hab. etiam in Aragon.

6. *H. alpinum*; *H. juranum* Genty in Magn. scrutin. V. (1886). 101 et fl. sel. exs. 1186; etiam nunc (Parl. ital. ed. Caruel) indicatur in Alpi. Lomb. rr. (mt Simplon).

7. *a. H. carpaticum* Porc. enum. 25. (1878). *H. alpinum* Bmg. (ex Smk.). - Mts Carpati.

10. *H. granatense*; species rara: Gran. (S. Nev.). Castil. vet. (Hoyoquero: Bourg.). Castil. nova (Guadarr.: Reut.).

11. *H. Sphondylium*: *Hisp. centr. sat lectum est. Roman. Græc. bor. (Pindus subalp.: Hausskn.). Ross. balt. (ex Klinge). Gotland. Scan. — H. Panaces; H. dubium* Ten.! ex Caruel; etiam *H. cordatum* Pr. (8) huc pertinet ex eodem.

**H. suecicum*: *Suec. med. (Upland., Neric.) rarius.*

12. *H. sibiricum*: Dan. Fenn. (deest in Lapp. exc. max. or. ross., sed adest in Bothnia). Helv. adhuc incerte. Dobrud. (in pratis silvatic. freq.: Uechtr. Sint.). Bulgar.

12. *a. H. verticillatum* Panc. (sched. 1883); Boiss. or. suppl. 269. - Maced. m. Rilo ad rivulos (: Pancic).

14. *a. H. humile* Boiss. or. II. 1048. - Maced. m. Athos in lapidosis (: Pichler).

15. *H. austriacum*: Bavar. (Alpes or.); Transs. ad *H. Sphondylium* (11) pertinet ex Smk.

**H. siifolium*: *Carinth. (alp. calcar. rarius).*

38. *Tordylium*. 1. *T. apulum* (*T. concinnum* Ten. ex Car.): Menorca Balear. (r.: Rodriguez). Ligur. Cors. (: EPetit 1883). Fiume Croat. (: A-MSmith).

2. *T. maximum*: Morav. mer., med. Helv. rr. est (ex Gremli non nisi pr. Orbe lectum). Roman. — *T. intermedium* Ces. Pass. Gib. comp. ital. (ex Caruel).

3. *T. officinale*: Ins. Jon. (Cephalon.: Heldr., Ithaca: Spreitzenh.).

40. *Trochiscanthus*. 1. *T. nodiflorus*: Alpes-Marit. (silvat. Farghet., col de Tenda, S-Martin-Lant. etc.). Ital. hab. in silvis et pratis silvaticis Alpium et Appen. bor.

41. *Xatardia*. 1. *X. scabra*; hab. etiam in Pyren. latere hispan. (: Gautier 1879).

42. *Endressia*. 1. *E. pyrenaica*: Catal. (mts de Nuria, Cerdaña etc.).

43. *Meum*. 1. *M. athamanticum*; *Hisp. etiam or. (Catal.) adest; in Germ. bor. deest (sed crescit in mont. Isergebirge etc. Siles.); Ital. hab. etiam in Alpi. Apuan. et Appen. centr. (pro mer. leg. med.), in mte Pollino desinens.*

2. *M. Mutellina*: Moldav. (alp. Bucieciu, Cehlaulu). Bulgar. (in summo montium Kom et Vitos); in Cors. vix exstat (vid. Caruel. fl. ital. VIII. 332).

44. *Dethawia*. 1. *D. tenuifolia*: Hisp. bor.: Cantabr. (Picos de Europa: Ler. Lev.), Vizc. (: Mieg.).

45. *Foeniculum*. 1. *F. officinale*: Istr. (sponte vel saltem subspont. leg. Freyn 1877). Cephal. (in vineis pr. Argostoli: Heldr.). Bulgar. (in campis plur. loc. omnino spont.: Velen.). Lusit. ex solo Grisley indicatum.

46. *Kundmannia*. 1. *K. sicula*: Lusit. (ex Vandelli). Valenc. et Catal. (: Boissier, Colmeiro). Ligur. Ital. med., mer.

47. *Crithmum*. 1. *C. maritimum*: Cephalon. (ubi herba comeditur, in aceto condita): Heldr.

48. *Silaus*. 1. *S. virescens*; hab. etiam Bulgar. (m. Vitos: Velen., Petrov Han: Vandas, Velen.). *S. peucedanoides* auct. transs. ex Smk. Comment. 143. **C. carvifolius*; sec. Janka est *Foeniculi* species et *F. peucedanoides* nominandus.

2. *S. pratensis*: Ross. mer. (gub. Cherson); Transs. a solo Bmg. lectus est, sed in ej. hb. desideratur (ex Smk.).

3. *S. alpestris*; Transs. a Schur indicatur, sed ex Smk. ibi dubius.

49. *Haloscias*. 1. *H. scoticum*: Lapp. fenn. max.-bor. (Inar. Kol.). Fenn. bor.-or. (Kp.).

50. *Ligusticum*. 1. *L. pyrenæum*: Catal. Arag. Cantabr. Leon.

1. *a.* *L. Huteri* Porta. Rigo exs. a. 1885. - Mallorca Balear.

3. *L. Seguieri*: Istr. (: Freyn). Bosn. (m. Vlasic: Brandis 1885 ex Freyn). Helv. rr. est (in solo m. Generoso cant. Ticino lectum ex Gremli).

4. *L. ferulaceum*: Alpes-Marit. (reg. alp., rarius).

51. *Neogaya*. 1. *N. simplex*: Bavar. (Alpes). Helv. non nisi in Alpi-bus, Alpes-Marit. (m. Bego, col de Fenestre et ad lac. Entrecolpes).

52. *Conioselinum*. 1. *C. Fischeri* (1827): Morav. (pr. Zöptau). Ross. mer.-occ. Fenn. or. tota. — *C. tataricum* Fisch. ap. Hfn. (1816).

53. *Cnidium*. 1. *C. apioides* (*Selinum Seguieri* All. non al.): Alpes-Marit. (mont. de l'Agel supra la Turbie). Helv. (ex Gremli) in solo monte Gene-roso cant. Ticino. Bulgar. (rup. calcar. ad Konjavo: Vandas, Velen.). Cephalon. (ins. Jon.): Heldreich. — *C. athoum* a specie diversum dicitur involuero.

**C. orientale* Boiss.: Transs., rarius (Smk.). Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.).

**C. Reichenbachii* Huter sched. ad pl. dalm. exs. 1870; Kern. exs. 117. (1881). *C. apioides* Vis. *Selinum Seguieri* Pett. dalm. exs. 347. - Dalm.

2. *C. venosum*: Gotland. (ad Klintehamn: Thedenius). Dan. etiam in Bornholm.; Siles. Hassia (r.). Badia (inter Schwetzingen et Mannheim); in Germ. occ. rel. non nisi in Holsat. et Hannover.

3. *C. Monnierii*; Transs. (Schur) ad *C. apioides* (1) pertinet ex Smk.; nec ex Ital. hæc species nota est teste Caruel.

4. *C. cuneifolium* (*Ligusticum cuneifolium* Guss.); hab. Ital. centr. (Abruz.). Hæc species brutia, a Gussone detecta (1824), descripta et delineata est in opere ej. *Plante Rariores* etc., ubi affinis dicitur *L. pyrenæo*, et dubitare liceat an feli-citer ad *Cnidiorum* genus translatus est, cum a Caruel (Parl. fl. ital. VIII. 329. 330) ne quidem ut varietas a *Ligustico* dicto distinguatur.

54. *Cenolophium*. 1. *C. Fischeri*: Fenn. bor.-or. — *C. lapponicum* W Nyl. et Sæl. hb. mus. fenn. 33. *C. Fisch.* var. *lappon.* FNyl. spic. II.

55. *Magydaris*. 1. *M. tomentosa*: Menorca Balear. (: Rodr., Willk.).

56. *Portenschlagia*. 1. *P. ramosissima*; hab. etiam in Basilicata (Ital. mer.) in rupibus altiss. ad Balvani, in loco dicto Le Armi (ex Bert. et Car.).

58. *Athamanta*. 2. *A. macedonica*: Thessal. (in rupibus pr. monaster.

Meteora supra Kalabaka: Hausskn.); indicatur inquil. in muris insulæ Murano (laguna veneta) et S. Giulio (lago d'Orta) nec non in mte Gargano (et alibi: Ten.).

2. *a. A. arachnoidea* Boiss. (in Orph. exs. 1870 et) or. suppl. 262. - Lacon. m. Taygetus (: Orph., Pichler).

3. *A. Matthioli*: Styr. (: Maly). Carinth. (alp. calcar., rarius). Istr. (: Freyn et al.). — *A. hungarica* (*A. Matthioli* auct. hung.). Comment. 144.

**A. Haynaldi*: Bosnia (ad Devecani m. Vlasie copiosam legit Brandis 1884): inter præced. et seq. media.

4. *A. cretensis*: Carinth. Bosn. mer. (GBeck 1885); Transs. (Bmg.) pertinet ad *Meum Mutellina* ex Smk. - Nomen (*Daucus*) cretensis, primum a Lobelio huic plantæ datum, erroneum est, quare cl. Caruel hanc speciem *A. Lobelii* appellavit (vid. fl. ital. VIII. 351).

59. **Libanotis**. 1. *L. sibirica*: Boruss. occ. (pr. Marienwerder etc.). Posen. (pr. Posen). Ross. etiam arct. (gub. Archangel). Bulgar. (m. Vitos: Velen.); Transs. ad speciem seq. pertinet ex Smk.

2. *L. montana*: deest in Ital. mer. sed adest in montibus centr.; Hisp. indicatur etiam Vizc. et Cantabr. (: Palau, Salcedo); planta transs. pertinet ad var. *leiocarpam* (= *L. leiocarpa* Smk. 1886). — *L. humilis* Schur (1859) est species propria (= *L. alpina* et *L. Hosteana* Schur) sec. Smk.

3. *L. athamantoides*: B.-Pyren. (Eaux-Chaudes: Loret 1859; etc.). Arden. (Charlemont: Remy 1865). Transs. pertinet ad *L. leiocarpam* (vid. sub præced.).

4. *L. Candollei* (Magnier fl. sel. exs. 77): Hisp. bor.-or. (St-Jean-Pied-de-Port); locus gallic. speciei est pr. Biarritz (ad "Chambre d'Amour") nec Bayonæ stricte dictum; planta e silva Irati Pyr. occ. (: Richter 1881), pro hac sumta, est præced. *L. athamantoides* (ex Rouy), cui hæc sat proxima est et forse ejus subspecies.

60. **Seseli**. 2. *S. Hippomarathrum*: prov. Rhen. (pr. Kreuznach), prov. Saxon. (ubi ad Sülldorf pr. Magdeburg terminus speciei borealis).

5. *S. rigidum*: Valach. (Virciorova: Jka, Borb.). Bulgar.

6. *S. purpurascens*: Bulgar. in rupibus calcareis ad Konjavo (: Vandas. Velen.).

8. *S. leucospermum*; Transs. (Schur) ad *S. rigidum* (5) pertinet ex Smk.

11. *S. granatense*; hab. in rupibus calcareis montium Sierra de Alfacar (alt. circ. 1400—2300 metr.), ubi detecta a Rambur et relecta a Willkomm (1884); S. Nevada (: Boissier, Campo), S. Tejada (: Hænseler, Boiss.).

15. *S. campestre*: Moldav. (: Guebard). Dobrud. (: Uechtr. Sint.).

16. *S. tortuosum* (Atham. ramosiss. Hffgg. Lk): Andal. (rarius). Balear. Rumel. or. (ex Velen.). Dobrud. (in desertis et pratis silvaticis passim: Ue.S.); deest in Cors., et Sard. (ex Moris) non nisi in ins. parva Tavolara lectum est.

17. *S. cantabricum*: Castil. (: Lange, Salcedo); *S. gracili* (12) approximandum est ex speciei cl. auctore.

19. *S. polyphyllum*; sec. Caruel (Parl. fl. ital. VIII. 319) non distinguendum a *S. montano* (28), specie polymorpha.

20. *S. annuum*: Arag. Catal. Moldav. Dobrud. Bulgar.

**S. Malyi* Kern. (1881). - Croat. m. Vellebith.

21. *S. carvifolium*; species *Alpium* occid., extra Delph. hab. Alpes-Marit. (S-Martin-Lant.; Fontano: B.R.); ceterum (ex Caruel) ad Bardonecchia (: Becari) et in reg. silv. m. Cramont (: Parlatore); Transs. (Jka) ad præc. *S. annuum* pertinet ex Smk.

22. *S. heterophyllum*; etiam alio quodam loco Transs. lectum est a Smk. (affinitate proximum subsequenti *S. osseo* et ab eo parum diversum).

24. *S. osseum*; hab. etiam Dobrud., ubi sat freq. ex Uechtr. Sint.

26. *S. varium*: Styrr., r. (ex Maly). Bosn. (: Brandis ex Freyn). Bulgar. (in decliv. calcar. ad Kostinbrod: Vandas. Velen.).

27. *S. Tommasinii*; de hac specie cfr. Freyn, Flora von Süd-Istrien, in act. soc. z.-b. vind. 1877. 343 (*); a Caruel cum seq. juncta est (vid. Parl. fl. ital. VIII. 320).

28. *S. montanum*: Hisp. centr. Styrr. (Graz etc.). Carinth. (Loibl, Ulrichsberg etc.); Belg. (Flandr.) nunc deest ex Crepin (olim pr. Namur lectum erat).

30. *S. oligophyllum*: Orph. exs. 1018 (e m. Peristeri).

62. *Æthusa*. 1. *Æ. Cynapium*; Fenn. extra mer.-occ. vix adsit.

**Æ. cynapioides*: Moldav. Morav. Ross. centr.

63. *Cœnanthe*. 1. *Æ. Phellandrium*; Fenn. adest (extra Aland.) in mer. (parcius).

2. *Æ. crocata*; hab. etiam Gall. bor.-occ.; in Ital. cont. (ex Car.) nunc hab. solum Ligur. supra Sestri et Pegli (: Figari).

2. a. *Æ. callosa* (Salzm. exs.) DC. prodr. IV. 137. - Creta (Kissamos: Reverchon 1884); cfr. 13. *Æ. incrassans*.

3. *Æ. pimpinelloides*; adest etiam in Gall. bor.-occ., sed Belg. (Flandr.) nunc deest (ex Crepin 1881); Transs. ad *Æ. banaticam* (10) pertinet ex Smk. — *Æ. thracica* Jka exs. a. 1871 e penins. athoa (non Grsb.) sec. Boiss. or. suppl.

4. *Æ. silaifolia*: Morav. (r.). Carinth. (Lesachthal: Jaborn.). Græc. bor. (Thessal., Pindus Dolop.: Hausskn.).

5. *Æ. media*: Valach. (pr. Bucuresci ex Grec). Bulgar. (: Bornmül. 1887). Rumel. or. (pr. Slivno: Skorpil ex Velen.).

**Æ. stenoloba*; est propior *Æ. banaticæ* (10) ex Simonkai (= *Æ. banatica* Smk.) et Borbas (= var. *longifolia* Borb. 1878).

6. *Æ. Lachenalii*: Helv. Alsat. (rhen.). Hassia rhen. (Mainz). Oldenb. (ins. Borkum et Norderney).

7. *Æ. marginata*: Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.).

8. *Æ. Jordani* (rectius Giordani); species huc usque solum ex unico loco cognita erat (sc. in Principato citeriore ad fluv. Sele), sed nuper etiam in Græc. bor. (Pind. Dolop.) a cl. Haussknecht lecta est.

9. *Æ. peucedanifolia*: Pedem. Ligur. Hetr. occ. (r.). Alsat. (in convall. voges.); Helv. del. ex Grml.; Transs. ad *Æ. silaifol.* (4) pertinet ex Smk.

10. *Æ. banatica*; Hung. hab. etiam in Marmaros (: Janka 1885).

12. *Æ. angulosa*; hab. etiam Græc. (ad Phalerum Atticæ et pr. Naupliam: Hausskn.).

13. *Æ. incrassans*; hab. etiam in ins. Corfû (: Spreitzenh. 1877: act. soc. z.-b. vind.).

14. *Æ. thracica*: Bosn. mer. (: GBeck 1885).

15. *Æ. tenuifolia*: Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht).

16. *Æ. fistulosa*: Ross. mer.-occ. (: Schmalh.); Suec. inhab. prov. mer. litorales: Halland., Scan., Blek. (rr.), Gotland.

17. *Æ. globulosa* (*Globocarpus œnanthoides* Car.); hab. tota Ital. (ad mare) exc. Lomb. - Genus novum *Globocarpus* a cl. Caruel propositum est in Parl. fl. ital. VIII. 239. (1889).

**Æ. Kunzei* (*Æ. diffusa* Kze); non nisi inter S. Roque et Gibraltar lectum est (: Willkomm).

64. *Echinophora*. 1. *E. spinosa*; pr. Danzig Boruss. or. introd. dicitur (saburra navali?).

2. *E. Sibthorpiana*: Creta (*E. tenuifolia* Sieb. exs.). Dobrud. mer. (in desertis passim: Ue.S.).

65. *Myrrhis*. 1. *M. odorata*: Hisp. bor., or. Ital. bor. (Alpes, Appen.).

Alpes-Marit. (alp. Tenda et Briga: Loret; val de Jallorgues etc.: Bornet). Helv. Carinth. (in pratis montanis usque in alp.). Styr. (mont. et subalp.); Transs. (Kronst.) ad *Chæroph. maculatum* (4 *) pertinet ex Smk.

66. **Physocaulus.** 1. *P. nodosus*; indicatur etiam Hisp. bor. Sicil. (S. Maria del Bosco supra Palermo: Tod.; Ficuzza al mte Busambra: Lojac.; Madon. supra Castellobuono: Huet). Valach. (pr. Virciorova: Borbäs).

67. **Chærophyllum.** 1. *Ch. Heldreichii*; Heldr. hb. norm. 932: *Phthiotidis m. Oeta*.

2. *a. Ch. Gageorum*. Velen. in act. soc. sc. boh. 1886. sep. 17 (*). - Bulgar. ad Kebedze in convall. umbr. (: Velenovsky 1885). Rumel. or. (pr. Slivno: Skorpil ex Vel., et in silvat. humidis ad flum. Kamcyk: Bornmüller 1887).

3. *Ch. aromaticum*: Bavar. in jugo mont. Bayr.-Wald (Eschekam, Fürth). Fenn. or. (Carel. Oneg., ubi a Sahlberg detectum 1869).

4. *Ch. aureum*: Cantabr. (Reinosa: Camal.). Arag. et Catal. (mont.). Alpes-Marit. (St-Martin-Lant., Tenda, Estenc etc.). Istr. Ital. hab. in Alpib., alp. Apuan. et in Appen. (usque in m. Vulture Basilicatæ). Loire plur. loc. (ex JHervier 1885). Erzgeb. (varius). Marchia (r.); Transs. ad subspeciem (*Ch. maculatum*) pertinet ex Smk.

5. *Ch. elegans*: Bavar. in Alpib. Algov. (rr.).

6. *Ch. magellense*; ex Caruel! (fl. ital. VIII. 371) = *Ch. hirsutum* (s).

7. *Ch. Villarsii*; hab. etiam Ital. bor. (prov. Veneta, Modena etc.).

8. *Ch. hirsutum*; Germ. etiam bor. (cum Siles.) sed paucis locis. Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., rarius). Hisp. etiam centr. Moldav. Bulgar. (m. Vitos: Vand. Velen.).

9. *Ch. calabricum* (ex Caruel = præced.); hab. etiam Hetr. (ex Arcang. 1882)

10. *Ch. bulbosum*: Roman. Bulgar. (ex Vandas). Rumel. or. (ex Velen.); Helv. excl. sec. Gremli. — *Ch. neglectum* Zinger in bull. mosc. 1881. (Ross. med. gub. Tula).

**Ch. Prescottii*: Lapp. fenn. Fenn. bor.; or. (Oneg. Olon.). Ross. mer.-oce. et mer. (gub. Cherson: Lindem.), centr. (gub. Kursk).

13. *Ch. coloratum*; hab. etiam Bosn. (: GBeck, Blau).

68. **Anthriscus.** 1. *A. silvestris*; adest etiam in Ital. mer. sed rarius: Basilicata (Vulture etc.), Calabria (Pollino), Apulia (ad Martina: Ten.). — *A. torquata* Duby. — *A. lævigata* est potius var. speciei seq.

2. *A. alpestris* (*A. nitida* Gecke): Hercyn. Morav. Galiz. (: Blocki). Austr. (pr. Steyr: Zimmer). Tyrol. (: Kramer). Bosn. (GBeck). Bulgar. (m. Osogovska Planina: Vandas. Velen.). — *A. torquata*; *A. alpina* Jord. — *A. heterosantha*; *A. torquata* Schur.

3. *A. nemorosa*: Valach. (: Borbas). Bosn. (Brandis 1884). — *A. rivularis* dicitur var. *glabrata* *Chæroph. hirsuti*.

6. *A. Cerefolium*; Suec. etiam med. (et Norv. mer.) adest inquil.; etiam in Hisp. plur. culta est et quasi spontanea occurrit.

**A. trichosperma*: Helv. mer. (Vales). Siles. (r.). Dobrud. (r.). Valach. (Virciorova: Borb.). Rumel. or. (ex Velen.).

7. *A. vulgaris*: Thessal. m. Pelion (: Heldr.).

69. **Scandix.** 2. *S. australis*: Bosn. mer. (ex GBeck); nuper etiam pr. Genuam (introd.?) lecta est.

4. *S. Pecten Veneris*; Suec. hab. (nisi introd.) solum in ins. baltic. Gotlandia et Ölandia; in Dan. bor. rara est (hab. præcip. in insulis minoribus); Ross. etiam in mer. deest vel rara (teste Lindem., Schmalh.).

5. *S. macrorhyncha*; planta bætica non nisi (et quidem rarius) in montib. S. Tejada et S. Nevada lecta est. Species (*S. hispanica*) indicatur etiam in

Pedem. (: Carestia, Rostan): in Pindo Tymph. (Græc. bor.) adest var. *tymphaea* Hsskt.

70. *Biasolettia*. 1. *B. tuberosa*: Bulgar. (in decliv. ad Petrov Han: Vandas. Velen.); Ital. hab. impr. in Aprutio (Majella, Morrone etc.), ceterum r. in Basilicata; lstr. vix adest.

3. *B. congesta*: Phthiotidis m. Oeta, 5500—6300' (: Heldreich).

4. *B. macrocarpa*: Cephal. (ins. Jon.): JSchmidt ex Heldr.

6. *a. B. pindicola* Hsskt. ms. (litt. 1889). Græc. bor. (Pindus Dolop. subalp.: Haussknecht).

71. *Conopodium*. 1. *C. denudatum*: Norv. bor. (Nordlandia ad lat. 66° 40' ex Norman). Hisp. etiam mer. (Valenc.) adest; Lusit. a solo Webb (pr. Cintra) lectum videtur. — *C. pyrenæum* Nym. *Bunium pyrenæum* Lois. (Catal. Arag. Pyren.).

2. *C. subcarneum*: Hisp. bor.-occ. pr. Ferrol Galloec. (: Seoane).

3. *C. capillifolium*: Ligur. (S. Remo etc.). — *C. flexuosum* (*Bunium flexuosum* Brot.) Lusit. etiam nuper lectum est (pr. Cintra: Ler. Lev.).

4. *C. brachycarpum*; Hisp. bor. etiam Leon (: Lange). — ? *C. marianum* Lge. (Andal., rr.).

5. *C. ramosum*; hab. etiam in Valenc. (S. Mariola: Rouy 1881).

6. *C. Bourgæi*: Hisp. bor. pr. Santander (: Ler. Lev.).

73. *Heterotrœnia*. 1. *H. thalictrifolia*; — *H. glaberrima*: Desierto de las Nieves, Yunquera (Andal.).

74. *Bulbocastanum*. 1. *B. Linnei*: Gall. bor.-occ. (r.); Hisp. bor. et centr. etc. (etiam Lusit.) indicatur, sed loca incerta quia cum *Conopod. denudato* sæpe commutatum; deest in Cors. et Sard. - *Bunium aphyllum* Jan in DC. pr.

2. *B. incrassatum*; in Balear. hucusque extra Majorcam non lectum est.

75. *Bunium*. 2. *a. B. tenerum* Hsskt. ms. (litt. 1889). - Græc. bor. (Pindus Tymph. subalp.: Hausskn.).

3. *B. montanum*; *B. divaricatum* Bert. (1837). *Carum divaricatum* K. (1837).

5. *B. alpinum*: Bosn. mer. (m. Treskavica: GBeck 1885). Ital. bor. (Appen.), centr. (Abruz.). — * *B. corydalinum*; Comment. 145.

76. *Cicuta*. 1. *C. virosa*; Norv. ad Nordlandiam desinit. Ital. adest in sola bor. (Lomb., Tyrol.).

77. *Sium*. 1. *S. latifolium*; exc. etiam Suec. bor.; Fenn. hab. in sola mer.-or. (Carel., Olon.); deest etiam in Ital. mer. et med. plur. (ibi solum ad palud. Bientina in Hetr. lectum est).

2. *S. lancifolium*: Moldav. Dobrud. (in pratis litor., raro: Ue.S.). Bulgar. (ad Kebedze: Bornmüller 1887).

3. *S. angustifolium*; Norv. rr. (Smaalenene) adest ex ABlytt.

78. *Falcaria*. 2. *F. Rivini*: Belg. (pr. Vise: Hardy 1884). Roman. Bulgar. (: Bornmüller 1887).

79. *Ammi*. 1. *A. majus*; Hisp. etiam in tota bor. adsit nec non in Valenc. et Murc.; Batav. introd. est (ex Abeleven 1883).

4. *A. pumilum*; hæc species a solo Brotero lecta videtur.

80. *Ptychotis*. 1. *P. heterophylla*; Hisp. etiam in Navarra, Santander etc. indicatur.

2. *P. ammoides*; hab. etiam Valenc. et indicatur (r.) in Castil., Catal. et Balear.; Cephal. (ins. Jon.): Heldr.; synon. *Proter.* (*Seseli pusillum*) potius ad subspeciem pertinet.

81. *Sison*. 1. *S. Amomum*; etiam Catal. (plur. loc.) et Astur. indicatur; Lusit. ad Coimbra (: Bapt.); in montib. Ossa et Pelion Thessal. (ubi speciei term. merid.) leg. Heldreich (1882). Istr. mer. (: Freyn 1877). Bulgar. in silvat. ad flum. Kamcyk (: Bornmüller 1887); in Sard. non indicatum est.

82. *Ægopodium*. 1. *Æ. Podagraria*; exc. etiam Norv. bor., Suec. bor plur. et Fenn. bor. multa. Ital. adest usque ad Neapolin.

83. *Pimpinella*. 1. *P. magna*; indicatur in Fenn. or. (in Carel. bor. detexit Europæus 1869). — *P. rubra*; *P. orientalis* auct. (non Gou.).

2. *a. P. siifolia* Leresch. in journ. of b. 1879 et in Ler. Lev. deux exc. 42. 183—4 cum ic. (*). — *Hisp. bor.* (Cantabr.) mts Picos-de-Europa (: Ler. Lev.).

2. *P. Saxifraga*; exc. etiam Lapp. plur.; in *Hisp. mer. r.* adsit; prov. Malaga (: de Leña), Sierra Nevada (: Webb).

5. *P. villosa*; hab. etiam *Hisp. bor.* (Leon; Lge).

6. *P. Gussonii*; in Ital. cont. rariss. est: Latium (mte Circeo), Calabr. (Dirupata di Murano, Reggio); probabile (ex Car. l. c. 459. 460 certe) solum var. *P. anisoidis* (4).

7. *P. Tragium*; Ligur.; Balear. non nisi in Majorca lecta est. Dobrud. (in montibus, desertis lapidosis, passim: Ue.S.). Bulgar. (in decliv. calcar. ad Kostin-brod: Vandas. Velen.). Ross. mer. (gub. Cherson: Lindem.), mer.-occ. (: Schmalh.); indicatur etiam in centr. (gub. Kursk). — *P. glauca* Nym. *P. rupestris* Bory. *Tragium glaucum* Pr.

8. *P. peregrina*; Bulgar. pr. Varna (: Velenovsky 1885).

11. *P. dichotoma*; hab. etiam in Murcia (pr. Hellin: Rouy 1881).

85. *Carum*. 1. *C. multiflorum*: Ital. mer. (T. d'Otranto, in rupestribus ad Gallipoli detectum a HGroves 1883 ex Lacaita in litt. 1884 et ex diar. soc. linn. lond. 1885; sec. Car. lectum a herborista Profeta); de synonym. cfr. Caruel (Parl) fl. ital. VIII. 329.

2. *C. rupestre*: Heldr. hb. norm. 933; Pindus tymphaeus (: Heldreich 1885).

4. *C. græcum*: Thrac. m. Hæmus supra Kalofer (: Pichler). Eurytan. m. Tymphrestes (: Heldreich).

5. *C. Heldreichii*: Eurytan. m. Tymphrestes (: Heldreich).

6. *C. rigidulum*; Alpibus Apuanis primum est ibique in rupibus marmoreis, tam cacuminum quam declivium, abundat (ex Caruel).

7. *C. Carvi*: Bulgar. (: Skorpil); Angl. omnino indigenum dicitur in districtu Woolhope Herefordsh., ubi ab a. 1850 notum (Aley in j. of b. 1887). Dan. Fenn.; indicatur etiam Castil. (mts de Burgos).

8. *C. verticillatum*: Gall. etiam bor.-occ. Phalzia (Bienwald); in Cors. vix adest obs. Caruel.

87. *Rumia*. 3. *R. frigida*: Thessal. (m. Pelion: Heldr. 1885).

88. *Trinia*. 1. *T. Kitaibelii*: Dobrud. Bulgar.

2. *T. Hoffmanni*; Transs. ad præced. pertinet ex Smk.

3. *T. Henningii*: Ross. etiam centr. (gub. Kursk). Moldav. (: Guebhard). Dobrud.

4. *T. vulgaris*: Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). Græc. bor. (m. Pindus subalp.: Haussknecht). — *T. Dalechampii* (DC). Meum Dalechampii Ten. *T. pumila* Kern. — *T. dioica* Kern. (1886). *Pimp. dioica* L. syst. (1774). *P. pumila* Jacq. *Selinum montanum pumilum* Clus. (1583).

**T. pumila*; synonym. Jacq. ad speciei var. et citat. Rehb. p. m. p. ad speciem ipsam pertinet.

5. *T. Dufourei*; in Valenc. a solo Dufour lecta videtur.

90. *Ridolfia*. 1. *R. segetum*: Gall. mer. (Toulon, Marseille, Perpignan). Mallorca Balear. (pr. Pollenza: Marès); etiam in Ital. bor. obviam venit sed sporadice.

91. *Reutera*. 2 * *R. puberula*; ex obs. cli Willkomm (ill. hisp. 154) est species a *R. gracili* distinctissima; detecta a Pardo circa a. 1860 et descripta a Willkomm (1863) in Losc. Pard. ser. inc., ab eo edita.

92. *Petroselinum*. 1. *P. segetum*: Catal. Alpes-Marit. (Mentone, Nizza). Ligur. Pisa, Parma; Reggio, Pinerolo, Mondovi (Ital. bor.).

3. *P. sativum*; in Lusit. et Hisp. non nisi cultum adsit; in Ital. usque ad Neapolin multis locis in collibus, vineis, olivetis etc. (saltem quasi) sponte obviam venit.

94. *Apium*. 1. *A. graveolens*; Suec. non nisi in Scania occ. et in Gotland. sponte obviam venit; Dan. in omnibus prov. sed sporadice et non vulgatum; Norv. et Fenn. deest.

95. *Helosciadium*. 1. *H. nodiflorum*; hab. etiam Croat. (: Vukot. 1880). — *H. repens* Syme (Scotia) est var. longepedunculata.

**H. intermedium*; in hb. eur. adest ex Oporto Lusit. (: Sjögren 1854).

2. *H. repens*; hab. etiam Croat. (: Vukotinov. 1880).

**H. palatinum*; *H. nodifloro* (1) et præcip. ejus var. (*H. repens*) propius accedit.

3. *H. inundatum*: Emilia (Appen. bor.). prov. Roman. (: Arcang.). Campan. (: Terrac.). etiam Astur. indicatum est.

4. *H. crassipes*; adest etiam in Lazio (Ital. med.) inter Nettuno et Astura (ex Car.).

96. *Bupleurum*. 1. *B. fruticosum*: Castil. (Madrid: Lagasca, Willkomm). Mancha (: Clemente); etiam Ital. mer. (capo di Leuca: HGroves) indicatur, ut etiam alibi sed non indig. (ex Caruel in hortis italicis sepe colitur et quasi spontaneum evadit).

2. *B. gibraltarium*; Lusit. (pr. Lisboa) solum ex Lk. Hffgg indicatum videtur.

4. *B. elatum*; hæc species montibus Nebrod. priva est ibique rupes calcaras (ad Colma grande, Isnello etc.) rarior inhabitat.

5. *B. rigidum*; indicatur etiam in m. Cenisio et in Appen. ligust. (Bert., Arcang.).

7. *B. Barceloi* (*B. petraeum* Barc. apunt. non L.). Bourgeau in itin. balear. 1869 plantam legit, Cosson in ej. exs. speciem nominavit et Willkomm nomen amplius publicavit (in tractatū ind. balear.); nuperius Marès hanc speciem observavit et (in cat. balear.) delineavit, et demum Burnat et Barbey (not. balear. 26) ejus cum speciebus proxime affinibus *B. acutifolium* (6—) et *B. dianthifolium* (cui maxime affinis) comparisonem criticam instituerunt.

9. *B. frutescens*; hab. etiam Lusit. sec. Brot. et Hffgg. Lk.

10. *B. dianthifolium*; non nisi in ins. parva Maretimo (ad angulum occid. Sicil.) lectum est.

12. *B. longifolium*; Transs. ad seq. (?. aureum) pertinet ex Smk.

13. *B. aureum*; Transs. plurib. loc. lectum est (= *B. longifolium* Bmg. et auct. transs.).

14. *B. angulosum*; Hisp. or. bor.-or. (Catal., Arag., Navar.).

16. *B. falcatum*; Hisp. indie. etiam Catal., Arag., Navar., Vize.; hab. etiam Moldav., Ross. centr. (gub. Kursk). — *B. oppositifolium* Lap.

17. *B. exaltatum*: Croat. ? (m. Risnjak: Vuk.; Vellebit: Borb.). Bosn. mer. (GBäck 1885).

18. *B. gramineum*; — *B. diversifolium*; *B. caricifolium* Bmg. et auct. transs. *B. caricinum*, *B. exaltatum* et *B. subfalcatum* Schur ex Smk. Comment. 146.

**B. cernuum*; *B. obtusifolium* Ten. (*B. exaltatum* K.); hab. etiam Istr. Croat. (: Borbás — *B. neglectum*: Alpes-Marit. (Tenda, S.-M.-Lant., Dalmas-le-Sauvage).

**B. olympicum*; hab. etiam Maced. (: Janka).

20. *B. ranunculoides*: Hisp. or., bor.-or. (Catal. Arag. Navar. Vizc.), Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.), Bavar. (Alpes Algov., r.), Galiz. in Carpat. centr. hinc inde a pluribus lectum (ex Knapp); Carinth. non nisi subspecies (* canal.) adest ex Pacher. — *B. telonense* Gren. in Billotia 63. *B. Brasi* Timb. *B. caricinum* Lmtte; ex Loret: La Sérane au Roc-Blanc (dep. Herault); Barrandon.

**B. canalense* (fl. nor. ed. Fzl. 1858). *B. caricifolium* Rehb. (nam species Willdenow aliena est) ex Kern.; hab. etiam in Helv. mer. (m. Salvatore cant. Ticino); nomen e Friuliæ valle Canal., ubi pr. Gemona, Venzona etc. hæc planta lecta est.

21. *B. petraeum*: Alp.-Marit. (mult. loc.); Helv. mer. (cant. Ticino) indicatur, sed ex Gremli ibi vix crescit; Transs. ad præced. (*B. ranunc.*) pertinet ex Smk.

22. *B. rotundifolium*: Istr. Moldav. Dobrud. Rumel. or.; in Ital. mer. non lectum est (desinit in Abruz. et Umbria).

23. *B. Savignoni*; hoc (ex Caruel!) essentialiter non differt a specie seq., cujus monstr. potius quam var. (vid. fl. ital. VIII. 393).

24. *B. protractum*; Gall. etiam bor.-occ. (rarius) indicatur; deest in Pedem.

26. *B. glumaceum*: Rumel. or. (pr. Slivno: Skorpil ex Velen.).

27. *B. apiculatum*: Bulgar. (in collibus siccis ad Razgrad et Varna: Velenovsky 1885; in rupib. calcar. ad Kostinbrod: Vandas. Velen.). Rumel. or. (: Skorpil)

28. *B. flavicans*; hab. etiam in m. Pindo (: Heldr. 1885).

30. *B. Odontites* (*B. Fontanesii* Guss.); Ligur. (pr. Genuam) semel tantum lectum est (a De Notaris), in Ital. mer. (Calabr.) a solo Gussone.

31. *B. Kargli*; hab. etiam Bosn. (: Brandis 1886 ex Freyn).

32. *B. aristatum*; Gall. etiam bor.-occ. indicatur, sed observ. Timb.-Lagr. typicum in Gall. non crescit et sec. Lange (litt. 1882) et Le Jolis (litt. 1884) loca omnia occ. (incl. Ital. saltem occ., med.) ad subspeciem (*B. opacum*) pertinent, sed typicum idem (rr. tamen) adest in Hisp. (: Funk ex Lge); Transs. a Schur indicatur sed ex Smk. exclud.

**B. opacum*; de area hujus geogr. cfr. sub specie primar.

33. *B. junceum*: Bosn. (: Brandis 1886 ex Freyn) Valach. (pr. Virciorova: Borbás). Dobrud. Bulgar. Rumel. or. Græc. bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht).

34. *B. commutatum*; hab. etiam in Serbia (: Pancic ex Boiss.). Bulgar. (in siccis ad Knezevo: Vandas. Velen.). Græc. bor. (Pindus Tymph.: Hausskn.).

35. *B. Gerardi*: Morav. mer. (raro, detectum ab Osterauer 1884). Ross.mer.-occ.; Ital. non solum in Ligur. adest, sed hinc inde (locis paucis) usque in Apuliam lectum est.

36. *B. affine*: Gall. bor.-occ. Bulgar. Taur. (: Steven).

? 36. *a. B. Perrierii* de Breb. Morière fl. norm. 171. (1880). — Normand. pr. Chambois).

37. *B. filicaule*; — *B. Scheffleri* Hmp. fl. hercyn. (1873).

40. *B. tenuissimum*: Germ. occ. (pr. Oggersheim Phalziæ). Bulgar. (: Bornmüller 1887). Rumel. or.

41. *B. semicompositum*: Littorale austr. (specim. Welw. in hb. eur.); ibi forse introd., indicatur tamen pr. Venezia et Aquileia (et in Istr.). Græc. (Attica: Hausskn.).

42. *B. glaucum*; monente cl. Lange (litt. 1879) hoc a præced. minime diversum est; utrumque in locis natal. legit et comparavit; vid. etiam Caruel (Parl.) fl. ital. VIII. 413.

99. *Colladonia*. 2. *C. angustifolia*; species parum cognita, rariss., locis duobus solum nota: Serra del ponte pr. Tricarico in Basilicata (Ten.), Gravina Apuliæ (Borb.).

3. *C. heptaptera*; hab. etiam in ins. Ithaca (Spreitzenh. 1877: act. soc. z.-b. vind.).

100. **Prangos**. 1. *P. ferulacea*; hab. etiam in Græc. bor. (m. Baba Pindi: Haussknecht et Heldreich 1885). - *Planta e Porta Ferrea Valach.* (— *P. carinata* Grsb. ap. Jka 1876) habet juga meric. carinata nec alata ut in planta typica sicula, quare potius species *Cachrydis* (= *C. stenoptera* Boiss. Buhse?) ex Borbás.

101. **Hippomarathrum**. 2. *H. cristatum*: Ceph. (ins. Jon.): Heldreich.

3. *H. Bocconi*; in Ital. mer. loc. plur. copiosa et procera adest; sic pr. Otranto quasi dumetum (macchia) constituit et pr. Gallipoli cl. HGroves observavit plantam fere 6-pedalem; caulis gummi-resinâ luteola graveolente scatet (HGroves in gio. b. ital. 1887 *).

102. **Cachrys**. 1. *C. lævigata* (C. Morisonii All. 1789); etiam in Andal. (plur. loc.) lecta est.

2. *C. alpina*: Dobrud. in pascuis saxosis montium supra Grecii (: Uechtr. Sint., Janka). Serb. (: Petrovic).

103. **Molopospermum**. 1. *M. cicutarium*; hab. etiam in Catal.; Carinth. (in rupibus ad lacum Raiblersee: Rotky 1886).

104. **Pleurospermum**. 1. *P. austriacum*: Tyrol. mer.; prov. rhen., inter Bell et Rieden pr. Laach; indicatur etiam in Suderm. (parocc. Kila) Suec. med

105. **Hladnikia**. 1. *H. golacensis* (Grafia Golaka Rehb.); Comment. 147.

106. **Conium**. 1. *C. maculatum*; adest in Fenn. mer. et (parcius) med. **C. divaricatum*; hab. etiam in m. Malevo Lacon. (Orph. exs. 1091).

106. *a.* **Aulacospermum** Led. alt. 1. *A. tenuilobum* Meinsh. - Ross. or.; detectum in montib. Slmen (Ural.) a Meinshausen (1844); dein in m. Karabash (gub. Perm) reperta a Kryloff; demum (1885) in montib. Shegulew (Simbirk) a Korzhinsky lectum.

107. **Physospermum**. 2. *P. ægopodioides*; Orph. exs. 1017 (e Bitolia Maced.); adest etiam in Græc. bor. (Pindus Dolop. subalp.: Haussknecht); Bulgar. (Balkan Arabakunak pr. Orchanie: Velenovsky; vid. act. soc. sc. bohém. 1886; supra Berkovec, ad Knezevo, in m. Osog. Planina: Vandas. Velen.). — Hæc planta spectabilis ad genus *Peucedanum* (sect. *Selinoidea*) pertinet sec. Vandas, qui eam in diar. (sitzb.) soc. scient. bohém. 1888. 449 nom. *P. ægopodioidis* descripsit, observans hanc speciem etiam in Serbia provenire ibique a Petrovic sub speciebus duabus, sc. *P. serbicum* et *P. rivulare*, publicatam esse; vid. ap. Vandas l. c. 450. 451.

3. *P. aquilegifolium*; in Hisp. bor. tota lectum est; Bulgar.; indicatur etiam Ross. mer.-or. gub. Stawropol (: Owerin).

109. **Smyrnum**. 2. *S. Olusatrum*; in Hisp. bor. tota, nec non in Balear., lectum est; Gall. bor.-occ.

3. *S. apiifolium*; sec. Ascherson (1880) omnino est = spec. præced., excludendum vero synonym. Bernhard., nam ejus *Anosmia* idæa, testante specim. autentico (ut jam a Schlechtendal observatum), est *Conium* (*C. divaricatum* B.O.?).

4. *S. perfoliatum*: ins. Jon. (Corfû et Ithaca: Spreitzenh. 1877). Bulgar. (: Skorpil). Rumel. or. (ex Velenovsky). Ross. mer.-or. (gub. Stawropol ex Owerin); Transs. non lectum est ex Smk.

110. **Bifora**. 1. *B. radians*; Hisp. indicatur (r.) Aragon. (: Pardo, Loscos), Mallorca Balear. (: Barcelò); Gall. dep. Loire, rr. (: fr. Chrysostôme); Ital. etiam med. (Hetr.) et (r.) in Sicil. et Melita; Galiz. (rr.). Bulgar. (ad Petrov Han: Vandas. Velen.).

111. **Coriandrum**. 1. *C. sativum*; in Hisp. plur. cultum et quasi spontaneum inter segetes et in campis.

112. *Eryngium*. 1. *E. ternatum*; etiam a Spreitzenhofer (1882) lectum est.

4. *E. amethystinum* (*E. multifidum* Ten. syll.): Bulgar. (Vandas et Velenovsky).

**E. multifidum*: Thessal. hab. etiam in m. Pelion (: Heldr. 1882).

5. *E. dilatatum*; — *E. crinitum* (Sicil., Ital. mer.) potius sit saltem subspecies (*E. dilatatum* auct. ital.); de hac et speciebus proximis cfr. Lojac. stud. crit. in natural. sicil. 1881.

6. *E. spina alba*: Alpes-Marit. (la Briga, Sansone, col di Braus).

8. *E. latifolium*; videtur varietas speciei sequentis (*E. campestr.*).

11. *E. alpinum*: Alpes-Marit. (m. di Fenestre et S. Dalmazzo Selvatico, col della Maddalena).

12. *E. planum*: Galiz. Moldav. Friul. (et in proxim. Venet. et Tyrol. ex Caruel).

13. *E. dichotomum*; planta dalmatica probab. ad *E. creticum* (20) pertinet.

20. *E. creticum*: indicatur etiam ad Ancona (: Paolucci 1884) et Livorno (: com. Costa-Reghini); probab. introd.

22. *E. pusillum*; Hisp. bor. adest etiam in Leon (: Clus., Lge); occ. indicatur Extrem. et or. (cum dubio) Valenc.

24. *E. galioides*; hab. etiam in Hisp. bor.

113. *Astrantia*. 1. *A. major*: Alpes-Marit.; Thur. (in Consp. post Saxon. err. typogr. legitur Thrac.). March. Poson. Moldav. Ital. exc. mer. (ultra Abruz. non lecta est). — *A. alpestris* Ky hb. transs. 1850. 297 et ap. Stur (1860). *A. carniolica* Bng. *A. minor* Schur.

**A. saniculæfolia*: *A. croatica* Tomm. in litt. 1877; Vuk. 1878. *A. major* var. (calearea) illyrica Borb.; *A. major* var. *alpestris* Vis.

2. *A. carniolica*; hab. etiam Styr. (pr. Cilli, Sulzbach etc.: Maly).

**A. transsilvanica* (*A. carniolica* Schur) pertinet ad speciem primam (*A. major*) ex Smk.

3. *A. gracilis*; — *A. dondiæfolia*; etiam hæc ad *A. majorem* (1) pertinet ex Smk.

4. *A. minor*: Alpes-Marit.; Hisp. bor.-or. (Navar. et Vize.).

5. *A. pauciflora*: Alpes-Marit. (non rara). Appen. tosc. bor. (m. Prado) ex Caruel; Aprut. hab. plur. loc. (*A. minor* Ten.) et Campan. in m. Meta et Cavallo (ex Car.).

114. *Sanicula*. 1. *S. europæa*; adest in Aland. (Fenn. mer.-occ.) et in Mallorca Balear. (: Serra).

115. *Hacquetia*. 1. *H. Epipactis*; hab. etiam Austr.-Infer. (vall. Traisenthal inter Kaltekuchel et Hohenberg).

116. *Petagnia*. 1. *P. saniculæfolia*; locus natalis exactius sic exhibetur: Val Demone, boschi di Cannata lungo la strada da Floresta a Maniaci (: Gussone, Nicotra), ad Tortorici (: Parlatore, Todaro).

Obs. Hæc planta quoad characteres genericos typum præbet valde singularem, quare cl. Caruel pro ea tribum propriam constituit: *Petagnæa* Car. in (Parl.) fl. ital. VIII. 199.

117. *Lagoecia*. 1. *L. cuminoides*: Ital. mer. T. d'Otranto (Leucaspidæ, ad S. Giovanni, in fruticetis non rara: HGroves, Lacaita), sed in loco (Gallipoli), ubi olim a Marinosci detecta nunc deest.

118. *Hydrocotyle*. 2. *H. vulgaris*: Carniol. (: Wulfen et nuper Paulin). Siles. Galiz. Moldav. Ross. mer.-occ. (: Schmalhausen). - Island. ad fontes calidos vallis Reykholt copios. (sed sine flor.) legit Grönlund; in fonte calido (48 C.) ad Andakilsá a Thoroddsen lecta est.

LVII. ARALIACEÆ.

1. *Hedera*. 1. *H. Helix*; indicatur immo in Island.

**H. poëtarum* (1827). *H. chrysocarpa* (1826); est varietas (baccis luteis) potius quam subspecies.

LVIII. CORNEÆ.

1. *Cornus*. 1. *C. sanguinea*; exc. etiam Suec. med. et Norv. plur. (solum in mer.-or. obviam venit); adest (cum var. *C. latifolia* de Bray) in Ross. mer. (gub. Cherson, in silvis freq.: Lindemann).

2. *C. citrifolia*; *C. australis* hab. etiam Ross. mer.-or. (gub. Stawropol: Owerin).

2. *a.* *C. sibirica* Lodd. *C. alba* Led. p. p. *C. alba* var. *sibirica* Rupr. - Ross. or. (etiam arct.)

3. *C. mas*: Moldav. Dobrud. Bulgar. Thessal. (m. Ossa copiose: Heldr. 1882).

4. *C. suecica*: Fenn. Dan.; ins. Færøer. Shetland. (ins. Fowla, ad cacum. Sneug, rarius: Beeby 1887).

LIX. LORANTHACEÆ.

1. *Loranthus*. 1. *L. europæus*: Saxon. pr. Pirna (Dohna et Dohna ex Geke) et a Nobbe in alio quodam loco lectus. Galiz. (r.). Moldav. Bulgar. (: Bornm. 1887). Dobrud. Ross. mer.-occ. (: Schmalh.).

2. *Viscum*. 1. *V. album*: Moldav. Dobrud. Bulgar. (: Bornm. 1887). — *V. austriacum* Wiesb. olim, sed nunc ab ipso cum seq. junctum et = *V. laxum* var. *albescens* Wiesb.; parasita in Pinû silvestri.

2. *V. laxum*; Hisp. etiam in Navar. et Sierra de Cazorla Andal. (ex comis. forestal). Gall. adest variis locis: Pyren. hinc inde, Briançon, vallée de l'Ubaye, Bourg-d'Oisans, vall. de Cervières etc.; Ital. bor. (Trentino, valle di Non: Saccardo). Calabr. et Etna (in Pinu Laricio: Borzi).

Obs. Hæc species baccis luteis et foliis angustis a præc. distinguitur, sed auctores plures habent pro *V. albo*, ex indole arboris nutritricis (sæpe Pinû silvest.) diversa et loci s. m. altitudine majori mutato, quale hoc etiam alibi observatum est e. gr. in Siles. a Uechtritz et in Helv. a Gremli; vid. etiam Uechtr. durchf. schles. phan. 1882. 19 (*).

3. *V. cruciatum*; *V. Clusii* Clem. (a Clusio pr. Sevilla lectum).

3. *Arceuthobium*. 1. *A. Oxycedri*: Croat. litoral.: Fiume (ex Noë), Bukarica (in Junip. Oxycedro, copios.) ex Schloss. Vukot.

LX. CAPRIFOLIACEÆ.

1. *Viburnum*. 2. *V. Lantana*: Batav. (pr. Maastricht: Oudemans). Moldav. Dobrud. Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.); Germ. exc. etiam Saxon. (ex Geke); etiam in Ital. ins. deest.

**V. maculatum* Pntek (1874); Vandas in oe. b. z. 1882. - Dalm. Monten. Herceg. (ubi a Pantocsek detect. 1872). mont.

2. *Sambucus*. 1. *S. racemosa*: Roman. Bulgar. (in silvatic. alpin. m. Balkan); Ital. usque in Hetruriam et ad Garganum (ubi in silvis: Ten.) progreditur, e magis meridionalibus exsul.

2. *S. nigra*; in Suec. med. (et in Norv. tota?) non nisi inquil. adest; in Græc. bor. (fauc. Pindi Dolop.) a Haussknecht nuper lecta est.

3. *S. Ebulus*: Roman. Bulgar.; in Suec. (mer., med.) paucis locis obvia et vix indigena.

4. *Lonicera*. 1. *L. Caprifolium*: Moldav.; Transs. ex Simonk. "sponte nullibi provenit".

2. *L. stabiana*; species bene distincta etiam ex Lacaita (litt. 1884), qui eam in toto tractu montium inter Amalfi, Castellamare et Salerno, supra 1500' altit., observavit (semper in rimis rupium calcar.).

3. *L. etrusca*; hab. etiam Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich).

4. *L. adenocarpa*; distinguitur præcipue baccis apice glandulosis (unde etiam nomen), sed a seq. *L. implexa* vix speciè diversa est.

7. *L. Periclymenum*; exc. etiam Suec. med. (Norv. adest secus litus usque ad Molde et Aalesund ex ABlytt); Cors. indicatur a Marçigl.; Transs. non nisi culta (rarius) provenire dicitur.

8. *L. dimorpha*; species dubia, descripta e planta in hortis bohemicis culta; sec. Ten. in sæpibus Villamaina (Principati) a Gussone lecta est.

9. *L. canescens* (1800). *L. biflora* Duf. (1798—1800); Sicil. non nisi Panormi (in sæpibus umbrosis Parco) lecta est.

11. *L. nummularifolia*; hab. etiam in Creta (m. Voloki: Reverch. 1884).

12. *L. Xylosteum*: Bulgar. Fenn. mer., med.; Dan. hab. freq. in parte or. (præcip. in Bornholm), in occ. rarior.

13. *L. nigra*; Germ. add. mts Erzgebirge, Thüringerwald. - Styr. et Carinth. etiam montes subalp. inhabitat; Bulgar. (m. Vitos etc.).

15. *L. pyrenaica*: mts Corbar. (Gall. mer-occ.); Balear. hab. solum in montibus altioribus Majorcæ et quidem rarius. Pedem. indicata erat ab Allione, sed sine loco speciali, et a Pollini indicatur in alpe Ravenola (territ. Besc.), ubi recentiores solam *L. coeruleam* invenerunt.

17. *L. alpigena*; — *L. leiophylla* Kern. (1870). *L. carpatica* Porcius (1885). *L. alpigena* Bmg. et al. (Transs.).

19. *L. coerulea*: Ross. balt. (: Klinge). Lapp. or.; Fenn. non nisi in or. et Kuusamo (bor.) observata. Styr. et Carinth. (mont. et subalp.). Bulgar. (m. Vitos; Velenov. 1887). Bosn. mer. (m. Prenj Planina alp.: GBeck 1886).

19. *a. L. reticulata* Borb. (1882). - Carn. (Karst). Croat. Obs. *Diervilla canadensis* W. (*Lonicera Diervilla* L.) nunc Germ. inquil. adest: March. (pr. Potsdam), Pomeran. (Gryphisw.), Saxon. (pr. Freiberg), Siles. rar., et talis etiam Batav. indicatur (: van Ledden Hulsebosch).

5. *Linnæa*. 1. *L. borealis*: Fenn. Dan. nunc etiam in Sjælland (Hornbæk Plantage et Tisvilde hegn) et Bornholm (pr. Rønne) lecta est. Bavar. (Rap-penalpenth alium Algov.). Carinth. (ex Pacher) loco unico lecta (Katschthal, in der Alm des Pfarrers von St-Peter). Zips, ad m. Mlynarz (: Rehmann), cui loco, teste Knapp, pertinet indicatio de plantæ proventû in Carpatibus centralibus Galizie (Morav. deest). Etiam floræ gallicæ hanc plantam Linnæi facile adnumerare poteris, nam crescit, in territorio tamen helvetico, fere ad ipsum limitem Sabaudie nunc gallicæ, in valle Creux de Novel, ubi a Privat detecta: Barbey "*Linnæa borealis* appartient-il à la flore française?" in bull. soc. bot. 1881. (*).

LXI. RUBIACEÆ.

2. *Rubia*. 2. *R. peregrina*; Gall. etiam bor-occ.; centr. (P.-de-Dôme, Cantal etc.) ex Lamotte.

4. *R. tinctoria*; etiam in Gall. centr. (Arvern.) sponte adest sec. Lamotte (1881); in Ital. bor. passim quasi spontanea est, sed probab. ex antiqua cultura superstes. Dobrud. ad sæpes, in vineis, passim (: Ue.S.).

4. *a. R. lævis* Poir. voy. II. 111. - Mallorca Balear. (pr. Soller et Pollenza: Marès).

3. *Galium*. 2. *G. physocarpum* (*Microphysa rubioides* CAMey); pr. Sarepta a Becker lectum est; radix tinctoria ut *Rubie*.

3. *G. rubioides* (*G. hyssopifolium* auct. transs. ex Smk.); Galiz. bor., r.

(; Knapp). Roman. Bulgar. — *G. pseudorubioides* (Schur) Smk. *G. boreale* Bmg., Fuss (vid. Simonk. enum. 287).

4. *G. boreale*: ins. Færøer. Dan. in Sjælland. bor. et or. (et magis in Bornholm) vulgatum, ceterum rarius et sporadice obvium. Norv. usque ad Finnm., Suec. usque in Lapp. mer. progreditur. Fenn. tota. Belg. mer. pr. Vanu (abbé Schmitz ex Crep. 1883). Gall. mer. (Lozère, Alp.-Marit. reg. alp.). Tyrol. mer. Friul.; Transs. ad præc. speciem pertinet ex Smk.

7. *G. ellipticum*; *G. rotundifolium majus* Mor., et in Sard. multo frequentius quam *G. rotundifolium typicum* (ex Aschn).

7. a. *G. valantioides* MB. t. c. I. 102. *Asperula rubioides* Schur. *Galium Bailloni* Brandza (1881). — Transs. et Roman. ad fines transsilvanic. (in silvis lapidosis alium ad Turrin Rubram: Simkov. in Kanitz mag. növ. lap. 1884).

8. *G. rotundifolium*; Gall. etiam in utr. dep. Loire (: Lamotte). Germ. bor. etiam ad Neu-Ruppin Marchiæ (: Warnstorf 1877). Bulgar.

9. *G. triflorum*; adest etiam Suec. med., ubi in Vermel. (plur. loc.) et Neric. (unico loco paroec. Kil) lectum est; in Lapp. suec. solum ad Lycksele (Lapp. Umens.); deest in Fenn. bor. (cum Lapp.). — *G. bryophilum* (*G. triflor.* var. *viridiflor.* DC.); nuper (1873) in albis rhæticis detectum est a Dr Killias, locis turfosis silvæ abietinæ prope balneum Tarasp (Engadin Helv.); vid. P. Ascherson "de Galio trifloro Melx in albis rhæticis a cl. Dr Killias reperto" in Kanitz mag. növ. lap. 1882 (*) et Killias flora d. Unterengad. (1887). 78 (*).

10. *G. Mollugo*; adest in Fenn. bor. (immo Lapp. lmandr.) et in Cors. — *G. dumetorum* Jord. (*G. Mollugo* auct. plur.). — *G. album* Bor. centr. (*G. album* Lam. est species collectiva). — ? *G. virgultorum* Lmtt. 1881. (Puy-de-Dôme).

**G. neglectum*: Gall. bor. (Normand.: Le Jolis, Corbière et al.).

X *G. approximatum*; — *G. dumetosum-verum* Bail. Timb.-Lagr. *G. vero-elatum* Lmtt.

11. *G. erectum*: Batav. (ex Abeleven); Suec. adest (ex Htn. handb. 1879), ut in Germ. tota (ex Gcke); indicatur etiam Morav., Siles.; Bosn. (: Brandis ex Freyn). Mallorca Balear. (*G. Mollugo* var. *Barc.* apud. ex ipso). — *G. aristatum* Schur, Fuss (ex Smk.). *G. lucidum* auct. transs. ex Smk. — *G. transsilvanicum* Schur. (Transs. Roman.). — *G. Bielzii* Schur. (Transs. Banat.). — *G. pseudocinereum* Schur. (Transs.). De his varietatibus scripsit Simkovicz in Kanitz mag. növ. lap. 1884 (*); cfr. etiam Smk. enum. 283.

12. *G. lucidum*: Bosn. mer. (: GBeck). *G. rigidum* (*G. lucidum* K. p. p. et auct. istr. ex Freyn) est saltem var. — *G. viridulum*; Gall. (Lyon, Gard, Allier). — *G. tenuifolium* All. (non DC.) ad *G. myrianthum* Jord. (18) pertinet ex GBeck test. spec. auth. Allionii. — *G. æthnicum*: Mallorca Balear. (in cacum. montis Puig de Massanellas, ad alt. 1340 metr.: Marès). — *G. pubescens* DC.

13. *G. cinereum* (*G. erectum* auct. ital. mult.) Balear. non nisi in Majorca et quidem raro (: Cambess., Marès) lectum est. — *G. ætense* Pr.

16. *G. Bernardi*; videtur var. *G. rubri* (67) vel potius (ex Caruel) = *G. venustum* (17).

17. *G. venustum*: Mallorca Balear. (barranco del Gorch-blan) ex Rodriguez. Ital. mer. et ins. ex Caruel (= *G. montanum* Guss. = *G. erectum* Guss., Lojac. = *G. Bernardi* G.G. = *G. lucidum* peloritatum Nicotra).

18. *G. obliquum*: Lomb. Venet. (sed Helv. exclud. sec. Gremli). — *G. alpicola*: Alpes-Marit. — *G. luteolum*: Arvern. (Cantal) ex Lmtt. — *G. pseudomyrianthum* Genn. (Ligur.). Hæc species ad *G. rubrum* (67) ita accedit, ut interdum pro ejus var. (fl. albis vel luteolis) sumta sit.

**G. Prostii* (*G. rubrum* Lec. Lmtt.): dep. Gard (: Lamotte). — *G. Centroniæ* Cariot. 1879. (Brides-les-Bains Sabaud.).

22. *G. aristatum*: Bavar. Bulgar. Moldav.; indicatur etiam in Ross. mer. occ. (: Schmalh.) et balt. (Curon.) post Bienert 1869. Helv. solum in cant. Ticino lectum est; Bohem. pertinet ad subspec. *G. Schultesii* et Transs. ad *G. erectum* (11). — *G. transsilvanicum* est *G. erecti* (11) var. ex Smk. ser. specim. orig. et descr. — *G. polonicum* Blocki 1886. (Polon. Galiz. or.).

**G. Schultesii* (*G. aristatum* Geke, Celak.): Germ. bor.-or. et mèr.-or. (ex Geke). Siles, Morav. Transs. (*G. silvaticum* auct. ex Smk.). Moldav. (?) Dobrud. (pr. Rassova: Ue.S.). Carinth. (locus classicus est pr. Klagenfurt). Croat. (pr. Fiume), sed Istr. pertinet ad speciem primar. (*G. levigatum* L.) ex ipso Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881.

24. *G. silvaticum*: Gall. bor.-or. (Lothar. cop.), sed Arvern. (ex Lmtt.) vix adest cum probab. e commutatione cum statu juvenili *G. dumetor*. (10—) ibi indicatum sit. Morav. lectum dicitur et Hung. duobus locis clo Borbás innotuit, sc. in m. Papuk pr. Kamengrad et ad oppid. Szombathely (Steinamanger), sed loca cet. maxime orientalia partim *G. aristatum* (22) vel ejus subspeciem spectant (jam in Germ. or. hæc species rariss. est ex Geke).

**G. pseudoaristatum* Schur (1866). *G. Heuffelii* Borb. (1875). *G. papillosum* Heuff. (in Consp. est subspec. *G. aristati*): Transs. Hung. — *G. oligotrichum* (Borb.) Simonk.; *G. asperiflorum* Borb. exs.; *G. asperuliflorum* Borb. 1886 (nomen); cfr. Simkov. in Kanitz mag. növ. lap. 1884 et Simonk. eum. 285.

25. *G. intermedium*; Transs. pertinet ad *G. Schultesii* (22 *) ex Kerner.

29. *G. tenue*: Alpes-Marit. (Touët-de-Beuil: Thuret. Bornet). Helv. (alp.). — *G. puberulum* Christ (ex Gremli).

30. *G. pusillum*; indicatur etiam in Alpib. Marit. et in Appen., nec non Carinth. (rarius), sed Helv. ad *G. austriacum* Jacq. (= *G. pusillum* Gaud. non Lam.) pertinet ex Gremli.

**G. magellense*; ex Tanfani (in Parl. fl. ital.) est = *G. baldense* (37—).

36. *G. olympicum*; hab. etiam in mte Pollino, ad alt. 2100 metr. (: H. P.R.).

37. *G. helveticum*: Alpes-Marit.; Bavar. hæc species cum fluv. Isar ex alpinis usque ad München descendit. Helv. solum in Alpibus adest. Neap. (et Lomb. p. p.) ad var. *G. baldense* pertinet. — *G. baldense*: Ital. cont. multa (mont.). Carinth.; etiam Austr.-Infer., in summis alpinis calcareis (: Halaes et Braun); melius species propria (vel saltem subspec.) videtur. *G. silvestri* (44) propius accedens. — *G. Tendæ*; *G. margaritaceum* Kern. (Tyrol.).

38. *G. megalospermum*; *G. saxatile* L. sp. ed. I. ex cit. Juss. (act. paris. 1741), sed Jussæus plantam suam in Galloprov. (nec Hisp.) detexit.

41. *G. saxatile*: Siles. Bavar. Styr. (ex Maly); in Helv. rarum est (ad Chur: Brügger, vall. Aosta: Thomas). Island. non lectum est, sed adest in ins. Færöer (: Rostrup). Transs. ad *G. sudeticum* (45—) pertinet ex Smk. Comment. 148.

42. *G. Jordani*; — *G. scabridum*, hab. etiam in dep. Gard (Vigan).

**G. Fleuroti*; *G. commutatum* Ravin fl. de l'Yonne ex Gillot (*G. Fleuroti* Gill. e Santenay est *G. silvestre*).

42. a. *G. valentinum* Lge in vidensk. meddel. 1881. 95. sep. 3 (*). - Hisp. valent. (Sierra Mariola: Hegelmaier 1878). *G. mariolense* Rouy hb. 1879.

44. *G. silvestre*; Dan. nunc etiam in insulis (r.) lectum est. Batav. (ex Abeleven). Ross. (balt. etc.). Roman. Mallorca Balear. (la couma freda de Massanellas: Marès. — *G. montanum*; *G. læve* (ex Godr.) propria species est, etiam in Vögesis lecta.

**G. commutatum*; *G. nitidulum* Th. ex Godr. (in consp. sub specie ipsa *G. silvestre* allatum est); etiam Lotharing. lectum est.

45. *G. anisophyllum* (*G. umbellatum* Heg.): Arvern. (Puy-de-Dôme). Bosn. mer. (: GBeck). Herceg. (: GBeck, Brandis). — *G. sudeticum* Tsh (1835); ad hoc pertinent *G. pusillum*, *G. pumilum*, *G. supinum*, *G. alpestre* et *G. saxatile* auct. transs. ex Simkov. in Kanitz mag. növ. lap. 1884 (*).

50. *G. constrictum*: Gall. bor.-occ., med. (dep. Cher: Le Grand pl. nouv. ou rares. 1884). Ital. tota (etiam Sicil.). Bosn. (: Brandis 1884 ex Freyn). — *G. debile* ad *G. palustre* (52) pertineat et forse etiam *G. constrictum* ipsiss. hujus varietas est.

51. *G. elongatum*: Suec. et Norv. (ex Htn handb.). Siles. (: Uechtr.). Morav. Bavar. Bulgar. (: Bornmüller). Ross. mer. (: Lindem., Trautv.); ex experient. cl. Lange et al. hoc sub specie seq. *G. palustri* (ut ejus subspecies) militet (cfr. etiam Willk. Lge prodr. fl. hisp.).

52. *G. palustre*; — *G. rupicola* hab. etiam Siles. ex Uechtr. — *G. debile* Desv. (non Hffgg. Lk).

53. *G. trifidum*; Island. ex hb. Hornem. sec. Fridriksson et nuper (ex Rostrup 1888) ibi ad Breidifjörð lectum a stud. Magnusson. Ross. mer.-occ. (: Schmalhausen).

55. *G. aureum*: Bulgar. (m. Balkan: Velen. 1887). — *G. oblongifolium*: Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich).

**G. umbellulatum* Velen. in diar. soc. sc. bohém. 1888. sep. 37 (*). - Bulgar. in cacum. m. Vitos (: Velen. 1887).

56. *G. ochroleucum* Kit. 1814 (non Wolf ap. Schweig. Körte 1811). *G. aristatum* Wolff in Fuss transs. (non L.). *G. asparagifolium* Kern. in oe. b. z. 1870 (non Boiss. Heldr. 1859). *G. flavescens* Borb. in ak. közl. 1874 (non Wierzb. 1858). — igitur novo nomine *G. marisense* Simk. salutandum; hab. etiam Dobrud. (in montib. saxosis: Ue.S.). Valach. (Virciorova: Borbàs). Bulgar. (m. Vitos: Velen.). Bosn. (: Brandis 1884 ex Freyn).

57. *G. verum*; exc. Fenn. bor. plur. sed Norv. (ex ABlytt) versus septentr. usque ad Helgeland progreditur.

**G. eminens*; sec. Lamotte (prodr. 1881, ubi plena deser.) minime hybridum est, sed species propria, *G. vero* quidem proxima sed distincta (*G. verum-altissimum* Lec. Lmtt.): Puy-de-Dôme, Allier, H.-Loire, Lozère.

57. a. *G. Crespianum* Rodr. in ann. esp. 1879. *G. decolorans* Barc. apunt., Coss. in Bourg. exs. balear. (non G.G.). - Mallorca Balear.; ex Burnat et Barbey, qui hanc speciem attente observarunt, pertinet ad sect. b. *Lejogalia* (* *Mucroniloba*), ubi post *G. erectum* (11) militet (Burn. Barb. notes 27, 28).

62. *G. maritimum*; in Ligur. rarissim. est et solum ad Montalbano pr. Nizza (post Allioni a Moris et Cesati) lectum.

63. *G. græcum*; in Friulia a Pirona indicatum est ex specimine (manco) a Brumati (in Littorale) lecto, sed hoc certe fortuito ibi introductum erat.

65. *G. purpureum*; hab. etiam Valach. (Virciorova: Borbàs); in Bulgar. balcan. ad Petrohan leg. Velenovsky.

66. *G. apiculatum*: Thessal. (m. Pindus: Heldr. 1885). Eurytan. (m. Chelidoni, 3—5500': Heldr.).

67. *G. rubrum* (*G. Bocconi* Req.): Alpes-Marit. (col de Tenda, val de Pesio), Ligur.; Emilia (etiam alibi Ital. med.: Abruz., T. di Lavoro). Mallorca Balear. (raro: Marès).

68. *G. Soleirolii*: Sard. (ex Reverchon). Mallorca (coma d'en Arbona, alt. 1000 metr.: Crespi ex Barceló; puig de Torrella ex Marès).

70. *G. saccharatum*; in Helv. non nisi rr. et transitorie observatum est.

71. *G. tricornis*; Dan. incerta (sed Holsat, certa) floræ civis est.

74. *G. Aparine*; in Fenn. (exc. Aland.), Suec. bor., Lapp. et Finnm. plurimum deest.

75. *G. spurium*: Dan. (Falster, Lolland) inter linum et (var.) inter segetes hinc inde. Moldav. Dobrud. — *G. Vaillantii* adest in Scand. bor. et in Fenn. usque in Lappon. et ad Finnm.

**G. tenerum*; hoc melius citetur sub specie præced., sed *G. Aparinella* ex ipso auct. proximum est *G. spurio* et forse ejus subspecies.

77. *G. Monachinii*: Heldr. hb. norm. 845. Arch. turc. ins. Karpathos (: Pichler).

78. *G. setaceum*: Mallorca Balear. (Barranco de Soller: Marès); in Heldr. hb. norm. editum est sub n. 135 (1357 est err. typogr.).

79. *G. anglicum*: Hung. (ex Hzl.). — *G. ruciculom*. (Gall. mer.-or.).

**G. parisiense*; — *G. microspermum* Ten.; hab. etiam Styr. (Graz etc.).

80. *G. divaricatum* (*G. gracile* Pr.): Bulgar. (Velen. 1887). — *G. tenuicaule*: Gall. mer.-or., centr. (Puy-de-Dôme).

82. *G. tenuissimum*: Ross. mer. ad Poltawa (: Lindem.), mer.-occ. (: Schmalh.). Transs. (Smk.). Roman. (mont. Buzen).

83. *G. intricatum*: Heldr. hb. norm. 846. — *G. zacynthium*: Cephalon. (Heldr.). — *G. trichophorum*: Thessal. (Heldr. l. c.) Ithaca (: Spreitzenh.).

87. *G. murale*; *G. stenocarpum* Duf. (hb. eur.).

88. *G. verticillatum*: Dobrud. (in saxosis calcareis ad arcem vetustam Jenissala, raro: Ue.S.).

89. *G. Cruciata*; exc. etiam Sard., Sicil.; in Hibern. adest ex AMore; Græc. (in Euboeæ m. Delphi) lectum est a Heldr.; in Germ. bor. adest solum Boruss. et secus fluv. Elbe usque ad Lenzen.

91. *G. vernum*: Moldav. Bulgar. Rumel. or.; in Sicil. non lectum est.

**G. alpinum*: Bulgar., præcip. in montib. vulgatum (: Velen. 1887).

92. *G. pedemontanum* (*G. chloranthum* Brot.): Gran. (S. Nev.) ex Rouy; Gall. mer. non nisi in depart. Gard (pr. Vigan) et Var (Aiguines) observatum; Ital. mer. solum (et rarius) in Calabr. lectum est, sed adest etiam in med. (Parma: Passer., Lazio: Rolli); add. demum Moldav., Dobrud., Bulgar., Rumel. or. — *G. pedemontanum* DC. est varietas rarior. *G. pedemontanum* herbarior. pedemont. classicor. (Bellardii, Allionii, Balbisii) ad *G. retrorsum* DC. pertinet ex Chaboisseau.

**G. Sieberi* Kern. sec. Aschn. (1876). Cors. (Ajaccio: Sieber).

94. *G. apricum*; Heldr. hb. norm. 847: *Agrapha* in Pindi summo monte Karava (Heldr. 1885). - *Vaillantia aristata* B.H.; *V. aristata* var. *mutica* Heldr. exs. a. 1846 e Creta.

× *G. digeneum* Kern. = *silvaticum* + *verum*. (Austr.).

× *G. hungaricum* Kern. = *Mollugo* + *Schultesii*. (Hung.).

× *G. Huteri* Kern. = *lævigatum* (*aristatum*) + *lucidum*. (Venet.).

4. *Vaillantia* DC.; *Valantia* T. in act. acad. paris. 1706; genus Linn. etiam Galia quædam comprehendebat. Candolleus (fl. fr. IV) primus nomen generis recte scripsit.

1. *V. muralis*: Coreyra (Corfu) et Ithaca: Spreitzenh. 1887. — *V. aculeata* Ten. quoad plantam e Miseno.

2. *V. hispida*: Balear. Sard. (pr. Cagliari: de Sardagna 1883). Alpes-Marit., rr. (: Canut, Thuret). Roma (: Sanguinetti). T. di Lavoro (Ten., Terrac.). Gargan. (Ten.). Ins. Melit. (Gozzo, Cominotto); in Pedem. non lecta est et Calabr. raro. *V. aculeata* Ten. quoad plantam calabr.

6. *Asperula*. 2. *A. chlorantha*: Thessal. (m. Pindus: Heldr. 1885).

3. *A. galioides*; Gall. huc usque solum in tribus depp. lecta erat, sed nuper (1881) etiam in Dordogne (pr. Lasiguenie) a Clavaud observata est; seq. add.: Carinth. (rarius). Siles. (r.). Moldav. Dobrud. Bulgar. Rumel. or.

**A. tyraica*: Galiz. mer.-or. Moldav. Dobrud. Ross. mer. (gub. Cherson). — *A. strictissima*, ex specim. auth. Schur., est *A. galioides* ipsa sec. Simkov. in Kanitz mag. nov. lap. 1884 (*).

4. *A. humifusa*: Moldav. Dobrud.; Bulgar. plur. loc. (copiosam) legit Velenovsky.

5. *A. Aparine*: Orph. exs. 1062 (Vodena Maced.). Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882). Bulgar. (: Bornm.).

6. *A. odorata*: Fenn. mer.; Dan. in silvis humosis vulgata est; Norv. ad Nordlandiam et Suec. ad Angerm. et Jemtiam desinit; in Sard. non lecta est; seq. add.: Moldav. Bulgar. (: Skorpil, Velen.). Rumel. or. (: Skorpil). Græc. bor. (Pindi Dolop. subalp.: Hausskn. 1885).

7. *A. taurina*: Moldav.; adest etiam pr. Mergentheim Würtemb. ex Gcke (et inquil. Monach. Bavar.).

9. *A. lævigata*: Balear. Græc. bor. (Pind. Dolop. subalp.: Hausskn.).

10. *A. hexaphylla*: Alpes-Marit. (reg. mont. hinc inde), ceterum planta rara et rupibus calcareis Ital. bor. priva; Pedem. p. d. probab. deest, sed in val Sesia lecta est a Birolì (acon.). Lomb. excl., in Friulia vero a Pirona indicatur.

**A. capitata*: Moldav. Bosn. mer. (alp. m. Prenj Planina: GBeck).

11. *A. hirta*: Cantabr. (Picos-de-Europa: Ler. Lev.).

12. *A. tinctoria*; Lozère et Gard Gall. mer. (rr.). Alsat. Siles. Carinth. (ad Zell: Trflhr ex Pacher). Lomb. loc. special. non notavi, sed in Veneto a Zanardini et al. lecta est. Roman.; Dan. e loco cit. probab. nunc disparuit (ex Lge).

13. *A. ciliata*; est species eximia testantibus speciminibus authent. in hb. eur. mus. holm.

14. *A. graveolens*: Dobrud. (in desertis, montib. apricis, vulg.: Ue.Sint.).

15. *A. cynanchica*: Moldav. Dobrud. Bulgar. (in collibus arenosis ad Varna: Bornm.). — *A. alpina*: Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn. 1885). Etna (Biv. ex Tanf.). — *A. supina* MB. (Ross. mer.-occ.). — var. *scabrida* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 348 (*A. cynanchica* Vis. dalm. excl. var.) memorabilis est et in Istria frequens.

15. a. *A. Neilreichii* GBeck in act. soc. z.-b. vind. 1882. 182. *A. cynanchica* var. *alpina* Neih. (1859). - Austr. (Raxalpe, Schneeberg). Styria.

17. *A. neglecta*; hab. in Apenn. romano et neapol. (præc. Abruz.). — *A. nitens* Guss. rar. 70 (*A. cynanchica* Ten. syll.) omnino diversa est et restit.; hab. in montibus altis Italiæ: Matese, Vettore, Majella etc. Abruz.; mte Cenis. (: Parlatore); indicatur etiam in alpe di Succiso Moden. (: Gibelli).

18. *A. pumila*; Sard. hæc species non nisi in montib. Oliena (alt. 1330 metr.) lecta est, sed etiam Græciam inhabitat si, ut nunc dicitur (Parl. fl. ital. VII. 95), cum *A. lutea* (35) identica est.

20. *A. litoralis*; — *A. setulosa*: Dobrud. (in collib. arenosis regionis delta: Ue.S.).

21. a. *A. pulvinaris* Heldr. hb. fl. hellen. 74; Boiss. or. suppl. 281. - Atticæ m. Pateras, 3500—4000' (Heldr. et al.).

21. b. *A. Boissieri* Heldr. in sched. 1876; Boiss. or. suppl. 281. *A. lutea* var. *pulvinaris* Boiss. or. *A. nitida* Heldr. Orph. exs. - Græc. in summis m. Chelmos, Kyllene, Malevo.

25. *A. tomentosa*; *A. incana* Pasq. fl. vesuv. (non S.S.). — *A. deficiens* rariss. est et in sola ins. parva Tavolara (Sard.) lecta.

27. *A. suberosa*: Calabr. or. (m. Dolcedormie: H.P.R. exs. itin. ital. a. 1877. 468).

33. *A. longiflora*: Moldav. Bulgar. Eurytan. m. Tymphrestes (var. condensata Heldr.). Ross. mer. (ex Trautv.).

34. *A. aristata*: Sicil. m. Nebrod. (ex Strobl).

35. *A. lutea*; — *A. pulvinaris*; vid. *A. Boissieri* (21. b). — *A. pinifolia* Heldr. in sched. (Parnass., Aetol. m. Velucho).

**A. oetæa* Heldr. exs. it. græc. sept. 1879. - Phthiotidis m. Oeta, 5500—6300' (: Heldreich).

38. a. *A. Bœnitzii* Heldr. in verh. d. bot. ver. d. prov. brand. 1876 et hb. fl. hellen. 75. - Atticæ m. Pateras (Heldr. 1876).

39. *A. arvensis*: Helv. plur. Moldav. Bulgar.; Thrac. (Rumel. or.) etiam nuper lecta est.

7. **Crucianella**. 1. *C. latifolia*; hab. etiam in Mallorca Balear., sed in Corsica deesse videtur.

3. *C. græca*: Serb. mer. (Pancic ex Boiss.).

4. *C. angustifolia*: Ital. med. T. di Lavoro (mte Marsico, Itri). Ins. Jon. (Cephalon: Heldreich). Græc. bor. (m. Pindus). Bulgar. ad Varna et Masar-Pascha-Teke (Velen. 1885; cfr. subspec.). Dobrud. (in montib. apricis passim: Ue.S.).

**C. oxyloba* (*C. angustifolia* auct. fl. bulgar. ex Bornm.): Bulgar. (ad Kebedze leg. Bornmüller 1887).

6. *C. maritima*; Ital. oram occidentalem inhabitat et in extima orientali (Terra d'Otranto) a Groves nuper lecta est.

**C. rupestris*; *C. maritima* Delic. melit., sed a specie dicta bene distincta est (Parl. fl. ital. VII. 100).

LXII. VALERIANEÆ.

1. *Valeriana*. 1. *V. exaltata*: Styr. Carinth. Croat. (Fiume: A.-M.-Smith). Ross. mer. (Cherson). — *V. subalpina* GBeck (*V. sambucifolia* Neilr.). Austr. — *V. divaricata* Hinteröcker (1858) ad speciem seq. pertinet ex Smk.

2. *V. officinalis*: in Dan. (ex Lge) hæc species rarior est quam seq. — *V. versifolia* Brügg. (Engadin Bundiæ; *V. offic.* typica ibi deest).

**V. collina*; *V. alternifolia* Schur ex Smk.

3. *V. sambucifolia*; *V. excelsa* Poir. enc. VIII. 1808 (cfr. Bonnet in diar. Le Natural. 1881); adest etiam Ardenn., Paris, Côte-d'Or, Lozère (et probab. Gall. plur.); porro etiam Carinth., Helv. (in Dan. frequentior quam præc.).

6. *V. tuberosa*: Ross. mer. (recentius lecta a Fischer, Hasshagen!), mer.-or. (Sarepta in argillosis freq.: Becker), centr. (gub. Kursk).

7. *V. dioica*: Friulia. Emilia (pr. Parma, Modena etc.); Transs. ad subspeciem (*V. simplicifol.*) forse pertinet.

**V. simplicifolia*: Boruss. occ. (Danzig, Elbing). Siles. Galiz. Transs. (*V. elongata* Bmg. ex Smk.). Ross. mer.-occ. — Potius propr. spec. considerata et = *V. polygama* Bess. ap. DC. 1830 (in Consp. hæc sub *V. elongata* militat).

11. *V. tripteris*: Alpes-Marit. Bavar. (præc. Alpes). Moldav. — *V. heterophylla* (Bmg.). *V. bijuga* Smk. (1878). *V. dacica* Panc. (1885). — *V. Hoppii* Rehb. ic. (1850).

13. *V. capitata*; in Lapp. or. (ponoj.) etiam lecta est (: Fellman).

15. *V. montana*: Alpes-Marit. Moldav.; loca ital. max. merid. sunt; mte Meta (Terrac.), mte Vergine (Ten.) et mte S. Angelo pr. Castellamare (Pasq.).

16. *V. elongata*: Venet. Friulia. — Transs. et var. cfr. sub 7*.

17. *V. saxatilis*: Bavar. (Alpes). Friul., Venet.; mont. Vicent. et Veron.; Tyrol.; montes circa lacum Como; alp. Apuane, alpe di Mommo in Apenn.; Helv. non nisi in Alpib. adest; Transs. (Bmg.) probab. ad *V. simplicifol.* (7*) pertinet ex Smk.

18. *V. celtica*: Sabaud. (alpes Mauriennes: Chabert 1882); Helv. non nisi in Alpib. vales. adest et Lomb. incerte.

19. *V. salinca*: Alpes-Marit.; montes italicæ, in quibus recentius lecta est, hæc sunt: Majella (: Levier), Velino (: Cherici) et Sirente (: Groves).

20. *V. supina*: Bavar. (Alpes); Helv. non nisi in Alpibus calcar. Bundiæ obviam venit, Ital. solum in Alpibus.

21. *V. longiflora*; hæc species huc usque (ex Willk. ill.) non nisi in parietibus umbrosis monasterii antiqui S.-Juan-de-la-Peña observata videtur (a Willkomm ibi 1850 lecta est); corollâ (roseâ) longe et anguste tubulosâ a Valerianis ceteris recedit et transitum ad genus proxime sequens constituit.

× *V. Gesneri* Brügg. (vid. jahrb. nat. ges. Graub. 1882. 102-4) = officinalis + dioica. (Helv.).

× *V. ternata* Smk. = montana + tripteris. (Transs.).

2. *Centranthus*. 3. *C. angustifolius*; distrib. speciei in Ital. accuratius (ex Parl. fl. ital. VII) indicetur: Pedem. Ligur. (Alpes-Marit.). Piceno (mts Sibillini et intra fines brutios ad fontem fluvii Castellano). T. di Lavoro (pr. Nola ai Camaldoli); Basilicata (pr. Potenza: Ten.).

6. *C. nervosus*; Cors. non nisi in monte della Trinità pr. Bonifacio indicatur.

7. *C. macrosiphon*: Mallorca (mts de Artà: Barceló). Menorca (: Marès). — *C. orbiculatus* Barc. apunt. (ex ipso).

8. *C. Calcitrapa*; exstat var. memorabilis hujus speciei fol. infer. suborbiculato-lyratis, pr. Oporto Lusit. a Sjögren 1854 lecta (hb. eur. mus. holm.).

3. *Fedia*. 1. *F. Cornucopiæ*: Cors. (EPetit 1883); de loco ligust. (Nizza) silent auctores recent. (etiam Ardoïno).

1. *a. F. caput-bovis* Pomel nouv. mater. atl. 72. (1874). *F. cornucopiæ*

Camb., Barc. (ex ipso). - Mallorca Balear. (ad Palma abunde sicut etiam in valle Andraix).

4. *Valerianella*. 2. *V. echinata*: Ligur. Mallorca (Andraix, rr.: Barcelona).

4. *V. olitoria*; deest in tota Fenn. exc. ins. Aland.

5. *V. costata*: Dobrud. (pr. Cierna, Grecii; Ue.S.).

7. *V. truncata*: Alpes-Marit. (Mentone, Monaco, Nizza). Mallorca Balear. (in ditone el Prat: Willk.). Sard. (de Sardagna 1883). Hetr. Roma (: Rolli). Basilic. et Calabr. (Gaspar., Pasq.). Melita (: Duthie).

8. *V. dentata*: Roman. — *V. eriocarpa* Schur (ex Smk.).

9. *V. microcarpa*: Balear.; Ital. hab. etiam in ins. tyrrhen. (Montecristo, Giglio, Elba, Capraia, Gorgona).

10. *V. turgida* (Heldr. hb. norm. 937): Banat. (: Borbàs). Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.). Cephalon. (: Heldr. et Spreitzenh.).

11. *V. carinata*: Siles. (r.). Morav. (r., detecta a Formanek 1883). Dobrud. (copiose: Ue.S.).

12. *V. rimosa* (*V. dentata* DC. pr.): Cors. Sicil.; Ross. mer.-occ. tota. — *V. tridentata* Rehb. exc. (*Fedia trid.* Rehb. ic. pl. crit.) saltem ut varietas distinguere potest.

13. *V. membranacea*: Rumel. or. (ex Velenovsky).

14. *V. brachystephana*: Ital. med. (Albacina nelle Marche: Bucci).

16. *V. coronata*: Ross. mer.-occ.

17. *V. divaricata*; sine dubio bona species etsi adhuc unico loco (at copiose) lecta, sed ejus affinitas mihi incerta videtur.

18. *V. discoidea*: Ligur. (Alpes-Marit.). Latium (pr. Vallepiastra: Sanguin.). Aprut. (Caramanico: Ces.). Calabr. (pr. Reggio).

19. *V. obtusiloba*: Arch. ture. ins. Karpathos (: Pichler).

20. *V. vesicaria*: Ital. mer. T. d'Otranto (Leucaspide: Lacaita, HGroves). Sard. (pr. Sassari: Binna ex Caruel); Sicil. non nisi in pascuis pr. il Pachino hæc species lecta est.

22. *V. lasiocarpa*: Dobrud. (in montibus graminosis, inter segetes, non rara: Ue.S.).

LXIII. DIPSACÆÆ.

2. *Pterocephalus*. 2. *P. brevis*: Arch. ture. ins. Karpathos (: Pichler).

3. *Callistemma*. 1 * *C. Sibthorpiannum*: Ital. mer. (Leucaspide in T. d'Otranto: HGroves, Lacaita, qui *C. brachiatum* typic. ibi non vidit).

4. *Scabiosa*. 1. *S. limonifolia*; species Siciliæ priva est ibique non nisi Panormi (mte Gallo), ad Trapani (mte Cofani) et in ins. Maretime lecta.

2. *S. cretica*: ins. Capri Neap., rr. (: Pasquale).

3. *S. saxatilis*; ad Denia (regni valent.) relecta est a Rouy 1883.

4 * *S. variifolia*: Arch. ture. ins. Karpathos ad rupes montium (: Pichler).

5. *S. graminifolia*: Alpes-Marit. (reg. alp., r.). Ital. mer. deest (desinit in Appen. centr. et in T. di Lavoro lecta est pr. Picinisco). Carinth. rr. lecta (vall. canal. inter Leopoldskirchen et Pontafel, ubi a Jabornegg detecta 1859).

6. *S. ucranica*: Bulgar. Roman.; Transs. (Schur) ad *S. banaticam* (25) perinet ex Smk. — *S. Wulfenii* Kern. Comment. 149.

* *S. eburnea*: Apul. (T. d'Otranto: HGroves).

6. a. *S. rotata* MB. fl. taur.-cane. III. 102. - Bulgar. in saxosis ad radices m. Konjavo Planina, ubi a Velenovsky detecta 1887.

12. *S. stellata*: Mallorca Balear. (r.); indicatur etiam in Alp.-Marit. (Grasse, Nizza), ubi forse introducta.

13. *S. monspeliaca*; Pedem. non nisi ad Genuam lecta et (S. mixta Dnt.).

15. *S. sicula*; hujus specimen in m. Etna lectum et a Bivona missum in Erbario centrale Florentiæ servatur ex Tanfani.

16. *S. maritima*; hab. etiam in ins. Corfû (: Spreitzenh. 1887).

17. *S. atropurpurea*: Gall. mer. (depp. Gard, Herault: Lmtt.). Genua (: Denotar.). Florent. (: Levier). Calabr. (Ten.). Sard. (Mor.). De hac specie cl. Lange (litt. 1879, 1888) observavit: a *S. maritima* vix specie diversa est, nam in Hisp. bor. illam florib. atropurpureis et dilute rubris promiscue legi, sed nullam notam characteristicam, colore excepto, detegere potui; eam Burdigalæ floribus nunc atropurpureis nunc luteis vidi, ideoque est forma vere spontan. nec e cultura orta.

20. *S. triniæfolia*: Serb. (pr. Pirot: Pelivanovic). Bulgar. (in asperis supra Kostinbrod et Konjavo freq.: Velen. 1887).

21. *S. fumaroides*; — ? *S. silaifolia* Velen. in act. soc. scient. bohém. 1886. sep. 19 (*). Bulgar. in fruticetis ad Galata (: Velenovsky 1885).

22. *S. ochroleuca*: Ital. (Calabr., Apul., Ancona etc.). Roman. Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). - Helv. (ubi Basil. indicatur) exclud. ex Gremli.

**S. flavescens* (Asteroceph. exaltatus Barth ex Smk.); sec. Smk. etiam *S. Scopoli* Grsb. iter rumel. huc pertinet, sed *S. tenuifolia* Bmg. (Asteroceph. montanus Schur) est *S. ochroleuca* ipsiss.

**S. leioccephala* Schloss. (sub *Asterocephalo*); Croat.

22. *α. S. balcanica* Velen. in diar. soc. scient. bohém. 1888. 40 (sep.). *S. ochroleuca* var. *balcan.* ej. 1886. - Bulgar. in alpinis m. Vitos et Kom (: Velenovsky).

23. *S. taygetea*: Heldr. hb. norm. 938.

24. *S. Columbaria*; adest in Ital. mer. (ad Otranto lecta est a Groves) et probab. in tota pænins. — *S. permixta*; *S. Columbaria* auct. mult. — *S. pratensis*; (Arvern. etc.). — *S. patens*: Arvern. Helv. (ad. lac. Genev.). — *S. spreata* Jord. *S. lucida* Lec. Lmtt. (Arvern. etc.). — *S. vogesiaca* Jord. *S. lucida* Godr. ex ipso. (Voges).

**S. affinis*; ad *S. gramontiam* (27) propius accedere videtur.

25. *S. banatica*; *S. Columbaria* auct. transs. ex Smk. *Asteroceph. ucranicus* Schur. — *S. diversifolia* Bmg. est *Trichera arvensis* ex Smk.

26. *S. Scopoli*; Transs. ad *S. flavescens* (22 *) pertinet ex Smk.

27. *S. gramontia*: Helv. mer. Carinth. (rarius: Jaborn., Pacher). Bosn. — *S. breviseta* saltem ut varietas distingui debet. (Delph., Gallopr.).

29. *S. pyrenaica*: Ital. med. (Abruz. etc.). — *S. candicans*; hab. Alpes-Marit. (in petrosis montium humilior.). — *S. vestita*; Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.). — *S. magellensis* (Parl. hb.) Arcang.; Mte Majella Abruz. (: Orsini).

30. *S. holosericea*: Ligur. (r.). Bulgar. balcan. (Petrohan et m. Konjavo Planina: Velen.). — *S. garganica* Arcang. (mte Gargano Apuliæ: H.P.R.).

30. *α. S. leucophylla* Borb. in oe. bot. z. 1882. 171. *S. holosericea* DC. pr. p. p. *Asteroceph. holosericeus* Vis. - Croat. (: Borbás). Bosn. (: Brandis, GBeck; pr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1888. 610—612). — *S. virescens* Freyn l. c. (Bosn.). — *S. dalmatica* Hnt. Kern. *S. leucophylla* Kern. fl. exs. 1009. (Dalm.; Bosn.: subvar.). — *S. incana* Freyn l. c. (Bosn.).

31. *S. lucida*: Alpes-Marit. (rarius). Appen. lucc. et pistoj. (rarius). Siles. (Riesengeb., Gesenke). Moldav. Bulgar. (in summis Balcani jugis: Velen.); loc. Voges. spectat ad varietatem *S. Columbariæ* (24); in Pyren. hæc species vix adest, nam planta pyren. ad veram *S. pyrenaicam* (29) pertinet monente Lange, qui eam in Pyren. centr. copiosam vidit. — *S. pseudobanatica* ad *S. banaticam* (25) pertinet ex Smk.

**S. Hladnikiana*: Bosn. mer. (GBeck 1885).

32. *S. suaveolens* (1805). *S. canescens* (1802): Siles. Styr. (pr. Cilli ex Maly). Appen. di Bobbio (mte Lesima: Bert.) et indicatur etiam (r.) in Pedem..

sed sec. Tanfani (Parl. ital. VII. 235) planta italica pertinet ad seq. (S. vestina), quæ minime diversa. - Dan. hab. in sola Seeland. bor. (plur. loc.); Helv. solum Basil. (et non sine dubio) indicatur.

34. *S. silenifolia*; Ital. med. Terra di Lavoro (supra Picinisco: Terrac., Levier).

5. **Succisa.** 1. *S. pratensis*; exc. etiam Fenn. bor. et med.; adest in Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi term. polar. speciei ad lat. 68° 26' (ex Norman). — *S. glabrata* Schott. — *S. hirsuta* Rehb.

3 * *S. inflexa*; *Scabiosa inflexa* Kluk (1786): Galiz. (rr.). Lithaun. (: Lindem.).

6. **Dipsacus.** 1. *D. silvestris*; — *D. divaricatus* Pr. — *D. Orsini* Sang. rom. prodr. alt.

2. *D. laciniatus* (Magn. fl. sel. exs. 81): Pedem. Venet. Friul. Emilia. Roman. Bulgar.

+ *D. pseudosilvestris* est (sec. Smk.) forma *D. Fullonum* culti versus typum ejus spontaneum (*D. silvestrem*) regrediens.

3. *D. ferox*: Ital. med. (Piceno, Abruz.) ex Bert. et Ten.

3. *a.* *D. Gmelini* MB. fl. t. c. l. 92. Ross. mer.-or. pr. Sarepta in salsis ad fluv. Sarpa (: Becker); antiquitas etiam in Ross. mer. ipsa indicatus est.

4. *D. strigosus*: Ross. mer. (Taur., Charkow), mer.-occ., centr. (Kursk).

5. *D. pilosus*: Roman. (rarius). Bulgar.

× *D. fallax* Smk. = *fullonum* + *laciniatus*. (Transs.).

7. **Cephalaria.** 1. *C. tatarica*; hab. etiam Moldav.

2. *C. alpina*: Alpes-Marit. (alp. Briga, Carlin, Tenda).

3. *C. ambrosioides*; hab. etiam in m. Aenos ins. Cephalon. (Letourneux ex Heldr.).

4 * *C. linearifolia*; huc usque solum in montib. Nevad. lecta est: Sierra de Dilas (Winkler 1876), Cortijo de S-Geronimo (H.P.R. 1879).

6. *C. corniculata*: Moldav. Dobrud. Bulgar.

7. *C. græca*: Orph. exs. 1058 (e mte Atho, 3000–5000'); hab. etiam Bulgar. (in saxosis supra Konjavo: Velen. 1887).

8. *C. balearica*; sec. Barcelò non rara est in montibus Majorcæ (præcip. bor., inter 500 et 800 metr. s. m.), ubi eam primus legit in Sierra del Teix 1862: dein (1869) a Bourgeau lecta est in barranco del Soller; descr. hujus speciei plena (cum ic.) exstat in Marès-Vigin, catal. rais. (1880) et in Willk. ill. hisp. I. 18.

9. *C. transsilvanica*; in Gall. mer. lecta est etiam ad Cannes (: Loret), Antibes (: Thuret, Bornet), Mentone (: Ardoino); hab. etiam Moldav., Dobrud. (: Ue. S.), Bulgar. — ? *C. Allionii* Kern. (*C. transsilv.* auct.), Venet. prov. Verona (: Rigo).

11. *C. syriaca*; etiam pr. Genuam (Ligur.) lecta est, ubi probab. cum frumento introducta.

8. **Trichera.** 1. *T. arvensis*; adest in Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi usque ad lat. 68° 47' progreditur (ex Norman). Sicil. non nisi in summis Nebrodib. et in montib. Cammerata (— *T. calycina* Pr.) lecta est; etiam in Cors. rara et montana ut in Ital. max. mer. (ibi etiam pr. Otranto a Groves lecta est); in Sard. deest. — *T. indivisa*; *T. (Knautia) hybrida* et *K. integrifolia* Schur ex Smk. — *T. moravica* Schur exs. sub *Knautia* (= var. fl. alb. ex Velen. in litt.): Hung. comitat. Trencin (: Holuby 1875). — *T. crenata* Luce sub *Scabiosa*. (ins. Osilia maris balt.). — *T. laciniata* ej. (ib.).

* *T. Fleischmanni*: Bosn. (Kajabasa etc.: Brandis ex Freyn). — ? *T. lyrophylla* Nym. (vid. 3—).

* *T. Timeroyi* (*Knautia Timeroyi* Jord. 1848): depp. Gard et Herault (: Lmтт.).

* *T. carpatica* Nym. (1864). *Knautia carpatica* Heuff. (1856). *K. Kossuthii* Pntek (in Kanitz mag. nov. lap. 1882). *Scabiosa pubescens* Kit., *S. Kitaibelii* Schult.; *S. arvensis carpatica* Rehb. exc.; *S. ciliata* auct. - Hung. bor.-occ. Siles. — *T. (Knautia) alpigena* Schur ex Smk. (Transs.).

2. *T. collina*; — *T. subscaposa*: Pyren. or. (m. Louis: Rouy 1883), centr. (Torla: Bordère); Hisp. hab. præcip. valentinam et granat.

3. *T. macedonica*: Bosn. (Brandis ex Freyn). Serb. (: Petrovic). Dobrud. (in desertis, pratis, silvaticis: Ue.S.). — *T. lyrophylla* (Scabiosa lyroph. Vis. Panc. 1869): Bosn. (Brandis 1886 ex Freyn). Bulgar. (Velen. 1887); a *T. macedonica* removenda ("est quasi *T. Fleischmanni hirsuta*": Freyn).

5. *T. silvatica*: Moldav. Bulgar.; Germ. hab. præcip. in mer. et mer.-occ.; Ital. mer. deest (desinit in Aprutio). — *T. dipsacifolia* saltem subspecies videtur. — *T. lancifolia*; ex Smk. = subspecies *T. transsilvanica*.

**T. transsilvanica* (1866); sec. Smk. = *T. (Knaulia) lancifolia* Heuff. (1858) = *T. (Knaulia) dipsacifolia* Schur (non Host).

6. *T. drymeja*; Transs. (cum Scab. ciliata Fuss) ad præced. (*T. silvatic.*) pertinet ex Smk. - *T. (Knaulia) dumetorum* est var. *T. arvensis* sec. Smk.

7. *T. magnifica*: Orph. exs. 1057 (e m. Peristeri Maced.); in Phthiotidis m. Oeta (alpin.) a Heldreich lecta est. — *T. robusta* Panc. (Serbia).

8. *T. longifolia*: Galiz. (r.). Moldav. Ital. bor.; typica in Helv. desideratur (ex Gremli), sed adest (in Jurasso) var. *T. Godeti*.

12. *T. hybrida* (*Knaulia hybrida* Coult.): Mallorca Balear. (: Marès). Bulgar.; in Sard. non indicatur; Transs. ad *T. arvensis* var. indivisam pertinet. — *T. (Knaulia) diodon* Pr. sic., in Consp. cum dubio sub præc. (*T. bidens*) allata, huc pertineat; cfr. Lojac. stud. crit. in natural. sicil. 1881. sep. 6—7 (*).

9. *Knaulia*. 1. *K. orientalis*: Græc. bor. m. Pindus: Dolop. (: Hausskn.), *Agrapha* in pratis oropedii Neuropolis (Heldr. hb. norm. 848). — ? *K. atropurpurea* Jka (in campestribus herbis inter Ciernavoda et Küstendje).

LXIV. COMPOSITÆ.

1. *Bidens*. 1. *B. cernua*: Roman. Bulgar. Bosn.; Lappon. deest.

2. *B. tripartita*; exc. etiam Fenn. bor.-or. (cum Lapp.).

2. *a. B. orientalis* Velen. in diar. (sitzb.) soc. scient. bohem. 1888. 48 (sep.). *B. tripartita* Velen. 1886 (et auct. fl. or.?). - Bulgar. plur. loc. (: Velenovsky, Skorpil).

3. *B. radiata*: Fenn. mer. (Tavastia: Collin 1884). Lothar. (ex Gcke). Carinth. (rarius). Bohem. mer. et mer.-occ. nunc locis idoneis copiosa (: Celak.). Ross. med. et mer. hinc inde lecta est. Comment. 150.

Obs. 1. *B. heterophylla* Ort., species mexicana, circa a. 1870 Burdigalæ (pr. Souys) subspontanea apparuit et dein tam aucta est ut jam 1878 ripæ fluvii Garonne ab ea partim tegebantur (ex Clavaud).

Obs. 2. *Rudbeckia fulgida* Ait., ex America boreali introducta, nunc Germ., Dan., Norv. (et alibi?), etiam locis desertis et incultis, interdum quasi sponte obviam venit.

Obs. 3. *Helianthus annuus* L. in Ross. mer. gub. Charkow "frequenter quasi spontaneus" est ex Lindemann.

2. *Arnica*. 1. *A. montana*; Gall. etiam in mer.-occ. (Gironde) lecta est. Moldav.; in Ross. mer. et or. deesse videtur et in occ. a Lindemann solum ad Grodno, Minsk et Mohilew indicatur.

2. *A. alpina*: Lappon. (or.) Imandræ (: Envald 1883). Nov.-Sempl. (Kjellm. Lundstr. 1875).

3. *Doronicum*. 1. *D. grandiflorum*: Mallorca Balear. (coma-freda de Massanellas: Marès).

**D. carpaticum*; *Aronicum scorpioides* Bmg. et auct. transs. *A. latifolium* Schur (non Rehb.). *D. orientale* Ky.; ex Smk. — ? *D. barcense* (Smk.).

1. *a. D. viscosum* Freyn. Gantier in bull. soc. bot. 1881. 50. cum ic. (sub *Aronico*). - Pyren. or. (col de Nourri vall. d'Eynes, vall. Carença, alt. circ. 2,600 metr.).

3. *D. glaciale*: Alpes-Marit. (le Garret supra Entraunes: Bornet). Bavar. (Untersberg *Alpium* or.); Helv. hab. solum in Alpibus (summis); in Transs. etiam a Bmg. (r.) lectum est.

6. *D. pardalianches*: Moldav.; inquil. etiam Siles. - Transs. ad *D. austriacum* (8) pertineat.

6. *a. D. macrophyllum* Fisch. (ex Velen. in diar. soc. sc. bohém. 1888). Bulgar. in alpinis ad rivulos pr. Petrov-Han m. Balkan (: Velenovsky 1887). Planta (ex Velen.) splendidiſſima, sæpe ultra 4-pedalis, foliis amplis, capitulis numerosis late radiantibus; huc usque solum e terris caucasicis nota.

8. *D. austriacum*: Moldav. Bulgar. (m. Vitos et Osogovska Planina: Velenovsky). Bavar. hab. etiam in jugo mont. Bayr.-Wald. — *D. pardalianches* et *D. scorpioides* auct. transs. (ex Smk.).

9. *D. caucasicum*: Dobrud. (in faucib. reg. silvat. ad Teke, raro: Ue.S.). Bosn. mer. (var.). - Transs. ad seq. (*D. Columnæ*) pertinet ex Smk. — *D. Nendtvichii*; probab. saltem subspecies est test. specim. Lager.

10. *D. Columnæ*: Bavar. (Alpes or.). Carinth. (: Jabornegg). Galiz. rr. (Kamieniec, Piatra-Domnei). Bulgar. — *D. pilosum* Smk. közl. 1878; Simonk. enum. 322. (Transs. alp. Szarsko, Szurul).

**D. lucidum* (Bernh. e pl. culta) Grsb. ap. Pntek. - Herceg. Monten. (: Pantočsek).

4. *Ligularia*. 1. *L. sibirica*: Ross. mer.-occ. Fenn. mer.-or. (Carel.); Gall. hab. etiam in dep. Côte-d'Or (pr. Aignay-le-Duc); Pyren.: le Capsir, inter Matemalle et Villeneuve (Timb.-Lagrave cum sociis 1878), la Quillane, pont de Conangle (alia loca dubia sunt).

5. *Cineraria*. 1. *C. maritima*: Mallorca Balear. (Barceló); indicatur etiam Taur. (: Leveillé), sed ibi vix indigena adsit.

5. *C. gnaphalodes*: Arch. turc. ins Karpathos (: Pichler).

7. *C. thapsoides*; hæc species (cum subspecie) potius generi præc. (*Ligularia*) adscribenda est sec. Grisebach (in Pntek. adn. 42).

**C. Visianiana*: Bosn. mer. (Prenj Bjelasnica: GBeck). *Ligularia thapsoides* var. *Visianiana* Grsb. l. c.

10. *C. Balbisiana* (Senecio Balbianus DC.): Alpes-Marit. (Tenda, vall. Gordolasea, val Rabuons etc.).

11. *C. Aucheri*: Serbia (m. Souva Planina: Petrovic ex Rouy).

12. *C. pratensis*: Carinth. (rarius). Styr. Bavar. Galiz. - Transs. ad *C. angustata* (14 *) pertinet ex Smk.

**C. (Tephroseris) Fussii* Grsb. iter (1852) ad seq. (*C. papposa*) pertinet ex Smk.; hab. etiam in Bosn. mer. (: GBeck).

13. *C. papposa*; Senecio papposus Less. (1831). *S. alpester* Kern. (non *C. alpestris* Hpe).

**C. (Tephroseris) Wolffii* Schur in verh. sieb. ver. 1859. *Tephros. Fussii* Czató (non Grsb.). — Transs. (rarius).

14. *C. transsilvanica* (cum — *C. rupicola* et * *C. angustata*) ad speciem præced. pertinet ex Smk.; hab. etiam in Roman.

**C. angustata*; *C. integrifolia* Bmg. *Tephroseris pratensis* Grsb. (iter) et auct. transs. (ex Smk.). — *C. (Tephroseris) longifolia* Barth.

15. *C. alpestris*: Bavar. (Alpes. or.). Galiz.; Transs. ad *C. papposam* (13) pertinet ex Smk. — *C. Clusiana*: Bosn. (ex Freyn). — *C. crassifolia*: Bosn. mer. (GBeck). Monten. (Pntek).

**C. ovirensis*; adest plur. loc. Carinth. scil. in Seleniza, alt. 1500 metr. (: Jaborn.), Baba (: Vulpus), Steiner-Alpen; item in Bosn. (ex Freyn).

15. *a. C. bosniaca* GBeck in annal. mus. vind. (1887). II. 163. - Bosn. mer. (m. Romanja Planina subalp.: GBeck 1885).

16. *C. crispa*: Galiz. Bavar. (præcip. Bayr.-Wald). Erzgeb.

**C. rivularis*: Morav. Galiz. Styr. Carinth.

17. *C. longifolia*: Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.); Transs. ad *C. microrhiza* Schur. (17. *a*) pertineat.

**C. arvernensis* Rouy in bull. soc. bot. 1881. 68 (*); idem in sess. extr. ej. anni, sep. 1-5 (*). Senecio brachychaetus Lmtt. - Arvern. (Cantal: fr. Heribaud 1880).

17. *a. C. sulphurea* Bmg. enum. III. 124. (1816). *C. longifolia* var. Jacq. hb. (ex GBeck). *C. (Tephroseris) microrhiza* Schur enum. 346. (1866). *Tephros. alpestris* ad *T. longifolia* Schur ib. Senecio sulphureus Smk. — *C. longifolia* Bmg. (non Jacq.). - Transs.

18. *C. lanceolata*: Angl. (ad Mickl Fell Yorksh. et in Wales; ex Batingt. 1882). Styr. Taur. (: CKoch). — *C. Wolffii* nunc sub *C. papposa* (13) militat.

+ *C. microrrhiza* nunc ad speciem præced. (17 a) relata est.

20. *C. aurantiaca*: Alpes-Marit. Moldav. Ross. mer.-occ.; Helv. non nisi in Alpihus lecta est; Transs. pertinet ad var. radiatam subspeciei (*C. capitatae*).

**C. capitata*: Transs. (r.). Bosn. — *C. coronata* nob. *C. aurantiaca* auct. transs. (Transs. plur. loc.).

21. *C. campestris*: Alpes-Marit. (pr. S-M. Lantosca: Burnat ex Rouy). Voges. (ex Gcke). Bavar. (rarius); Helv. solum in Jurasso lecta est (etiam in dep. Jura Gall.: Grenier). - *Othonna integrifolia* et *O. helenitis* L. sp. ed. I. *C. alpina* var. *integrifolia* et var. *helenitis* L. sp. ed. II. *Tephroseris spathulifolia* Schur, Fuss. (ex Smk.).

22. *C. cordifolia*; deest in Jurasso et (ex Smk.) in Transs. — *Senecio auriculatus* Jacq. *S. difformis* Roch. ex Hzl.

**C. alpina*: Carinth. (rarius). Galiz. nunc a pluribus lecta est. *C. auriculata* Herbieh (ex Hzl.). *C. cordifolia* Bmg. *Senecio lyratifolius* Schur et *S. cordatus* auct. transs. ex Smk.

22. a. *C. arnautorum* Velen. in diar. soc. sc. bohém. 1888. 45 (sub *Senec.*). - Bulgar. sub cacum. m. Rujen (Osog. Planina): Velenovsky 1887. "Planta capitulis magnis auratis decora facieque *Senec.* erubesc. Panc. revocans."

25. *C. palustris*: Alsat. (ex Gcke). Bavar. bor. (ad Aschaffenburg: Prantl). Styr. (pr. Graz).

**C. congesta* (*Senecio arcticus* Rupr. samej.); in ins. Nov.-Sempl., inter lat. 72—730, lecta est a Kjellm. Lundstr. (1875).

6. *Senecio*. 2. *S. saracenicus*: Bulgar. in salicetis ad rivum Struma pr. Kistendyl (: Velenovsky 1887).

3. *S. Fuchsii*: Moldav. Morav. (: Oborny). Styria (: Maly). Carinth. Istr. (: Freyn). Herceg. (Brandis ex Freyn). Bulgar. - Observ. Soyer-Willemet et Godron hic est *S. saracenicus* L. p. d. (*Solidago saracenica* Fuchs).

**S. bulgaricus* Velen. in diar. soc. sc. bohém. 1888. 44 (sep.). Bulgar. in umbrosis ad rivulos silvarum in m. Osogovska Planina (Velenovsky 1887); in Serbia a Bornmüller lectus est ex eodem.

4. *S. nemorensis*: Moldav. Bulgar. Bosn. — *S. octoglossus*; etiam Transs. (Retzezat) indicatur (: Grsb., Borb.). — *S. Jacquinianus* Rehb. (Austr. Hung. Croat. etc.).

**S. dalmaticus* Grsb. ap. Pntek (1874). *S. Cacaliaster* β et γ Vis. dalm.; Dalm. Monten. — ? *S. nemorensis* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1888. (Istr. Croat. Bosn.).

6. *S. Doria*: Morav.; Ross. mer. (Cherson) aliquot locis sat adest; Transs. pertinet ad — *S. Biebersteinii* (Lindem.) Smk. enum. 329. *S. umbrosus* auct. (non W.K.). Ross. mer., Transs.

**S. macrophyllus*: Ross. centr. (gub. Kursk, r.). Dobrud. (in pratis silvat., rarius in desertis: Ue.S.). Transs. ad *S. Bieberst.* (6—) pertinet ex Smk.

9. *S. racemosus* (*Cineraria racemosa* MB.): Ross. mer. (Cherson) et mer.-occ. (gub. Kiev: Rogowicz); sec. Grsb. (1873) generi *Ligulariæ* adscribendus est.

11. *S. paludosus*: Gall. bor.-occ. (Normand.). Lothar. (r.). Moldav. Dobrud. (in paludib. reg. danub. abunde: Ue.S.).

13. *S. macedonicus*: Bulgar. in saxosis supra Kostenbrod (: Velen. 1887).

16. a. *S. gibraltarius* Rouy in Le Natural. 1887. 78. - Hisp. mer. (Sierra de Palma pr. Algeciras: Reverch. 1887; ej. exs. andal. 137).

20. *S. Lagascanus*: Lusit. (cabo Mondego: Henriquez ex Lge).

21 * *S. transsilvanicus*: Orph. exs. 1065 (e Maced. m. Peristeri, alt. 7000'). — *S. Rochelianus* Fuss (ex Smk.).

**S. ruthenensis* (err. *ruthenicus*); *S. Doronicum* de Barran; hab. etiam dep. Aveyron; Rodez unde nomen; Mazue, Vayettes (: Revel). - Magn. fl. sel. exs. 306.

**S. Gerardi*; *S. lanatus* Lec. Lmtt. (Ger.) non Sep.: Lozère (plur. loc.). Gard. (rr.). - Sat distinctus a proximis; probabiliter *Inula provincialis* L. sp. huc referenda est.

25. *S. linifolius*: Ibiza Balear. (ad vias abunde: Delaroche, Cambess., Barceló).

27. *S. barbareaefolius*: Gall. bor.-occ. Scan., rr. (Hj. Nilsson 1876). Helv., r. (Misox: Brügg., Gex pr. Genevam: Michal.). Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich). Bulgar. Ross. mer.-occ.

28. *S. aquaticus*; etiam Norv. bor. (r.) lectus est; indicatur etiam Ross. med. or. (Tambow) et mer. (Cherson), sed forse pro præced., cui (ex Smk.) pertinet Transs.

29. *S. Jacobæa*; Suec. (et Norv.) bor. aliquot locis cum saburra navali introducta est. — *S. nemorosus*; *S. Jacobæa* auct. gall. (saltem plurimor.) nam *S. Jacobæa* typica in Gall. vix (vel raro) adsit. — *S. fuscus* est valde proximus varietati præc. (*S. nemorosus*) et = ejus subvar. *eradiata*.

31 obs. Sub nomine *S. lyratifolii* ex Grembl. (1876) duæ occurrunt proles hybridæ, quarum una (quæ *S. lyratifolius* p. d.) est = *S. (Cinerar.) cordatus* + *erucifolius* et altera (quæ *S. Reisachii* Grembl. e Tyrol., Bavar., Helv.) est = *S. (Cinerar.) cordatus* + *Jacobæa*.

31. a. *S. erubescens* Panc. elem. bulg. 41. *S. balcanus* ej. olim. - Serb. or. (: Pancic.). Bulgar. (in pratis alpin. m. Vitos et sub cacum. m. Kom: Velen. 1885, 1887). Rumel. or. (m. Rilo: Pancic ex Boiss.). - Spectabilis dicitur et capitulis magnis flammeis insignis.

32. *S. præaltus*; — *S. borysthemicus*; hab. Ross. mer. (gub. Cherson, præcip. ad flum. Borysthenum, nunc Dniepr), mer.-occ. — *S. arenarius* MB. ap. Bess. (Ross. mer.-occ.).

34 * *S. cinereus* Velen. - Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky, Bornm., Skorp.).

36. *S. nebrodensis*; — *S. rupestris*: Bavar. (Alpes or.). Morav. (Trebitsch, ubi a Zawrel detecta 1879). Bulgar.

38. *S. abrotanifolius*: Bavar. (Alpes or., rarius); Helv. non nisi in Alpibus summis or. obvis; Transs. ad subspeciem pertinet (ex Smk.).

**S. carpaticus*: Moldav. Bulgar. (in summo m. Vitos: Velenovsky).

39. *S. adonidifolius*; Gall. bor.-occ. (in silvis mont. ad Rouen et Evreux: Morière).

41. *S. incanus*: Alpes-Marit. Carinth. (Kreuzkofel-Gruppe ex Jaborn.); Helv. hab. solum in Alpib. summis. - Transs. ad seq. (*S. carniolic.*) pertinet ex Smk. — *S. Lageri*; specim. Lager. (unifloro-carniolica) e Vales. in hb. eur. pleiantha sunt et similiora seq. *S. carniolico*.

42. *S. carniolicus*: Bavar. (Fellhorn alpinum algov.). Galiz. post Herbig ab aliis (r.) lectus est.

43. *S. uniflorus*; hab. etiam dep. H.-Alpes (Chazallet ex Rouy).

46. *S. minutus*: Hisp. bor. (Cantabr.) m. Peña Redonda (Boiss. Ler. Lev. 1879).

**S. (minutus var.) gibraltaricus* Willk. in Willk. Lge prodr. II. 123. Hisp. mer.: m. Gibralt. (ubi detect. a Willkomm 1845), Sierra de la Nieve et pr. Ronda (Fritze 1873).

48. *S. squalidus*; Transs. ad *S. vernalem* (52) pertinet ex Smk.

50. *S. crassifolius*: Ibiza et Formentera Balear. (: Marès). Pelop. (Navarino): Lacaita 1884. — *S. apulus* sec. specim. auth. Tenor. (teste Lacaita) pertinet ad *S. leucanthemifol.* (54) et præcip. ad ejus var. *S. vernus* Biv., planta in Ital. mer.-or. vulgata et in litore marino carnosula.

50. a. *S. Rodriguezii* Willk. ind. balear. 264; Rodr. suppl. 32. - Balear. ins. Menorca ad oram bor. et or. (detecta a Rodriguez 1872), Mallorca ad portum Soller (: Crespi) in rupibus et glareosis schistosis, Species florib. purpureis et habitu elegante læta et insignis.

52. *S. vernalis*: Roman. Bulgar. Græc. bor. (Epirus: Chodzes ex Heldr.). Ins. Jon. (Cephalon.: Heldreich, Corfû: Spreitzenh.). Ross. balt. (ex Klinge). Terminus speciei bor.-or. (ex Batalin) est in gub. Pskow (circul. Opotschka); in Siles., ubi 1822 primum apparuit, nunc vulgata est præcip. in parte or.; versus occid. ulterius migravit usque in Megapolitanum (Mecklenburg) et Thuringiam, in Falstriam et Sjellandiam Dan., nec non Scan. (ubi rr.). Comment. 151.

57. *S. viscosus*: Fenn. mer.; Suec. etiam in bor. (Angerm. et Helsing.) lectus est (: VHolm). Moldav. Ross. mer.-occ.

- X *S. Kernerii* Blocki = *Doria* + *saracenicus*. (Galiz.).
 X *S. Reisachii* Grembl. = *Jacobea* + *Cinerar. cordifol.* (Tyrol. etc.).
 X *S. Siegfriedi* Brügg. = *abrotanifolius* + *incanus*. (Helv.).
 X *S. subnebrodensis* Smk. = *nebrodensis* + *viscosus*. (Transs.).

Obs. 1. *S. scandens* DC., species capensis, Lusit. plur. loc. inquilina dicitur.

Obs. 2. Speciem generis (capensis) *Kleinia*, a lib. b. *Mandalisca* ex ins. *Vulcano* missam, beat. Tineo nomine *K. Mandaliscæ* descripsit (in annal. di agric. sicil.) at in illa insula minime indigena est sed, ut in ins. *Lipari* (ubi cl. *Lojacono* cultam vidit), non nisi introducta adsit; cfr. *Lojac.* "le isole eolie e la loro vegetazione" etc. 48 et 111 (*). Eodem modo, ut videtur, se habeat *K. ficoides* Haw., in *Hisp. bor.* indicata.

8. *Senecillis*. 1 * *S. carpatica*; in *Galiz.* rariss. est et (teste *Knapp*) non nisi in parte or. (pr. *Pantalicha*) lecta.

Obs. E generibus *Senecionearum* nunc etiam genus illud americanum, quod *Senecioni* proximum, *Erechtites* Raf., commemorare debemus, quia ultimis annis *E. hieracifolia* Raf. (*Senecio sonchoides* Vuk.; *S. Vukotinoviici* Schloss.) ut planta migratoria apparuit in *Croat.* ad *Agram* (: *Vukotinovic* 1876), in *Hung.* occ. (: *Borbás* et al.) et in *Styria* (: *Preissmann*), probab. primum ex horto quodam botanico elapsa. Vid. ap. *Kornhuber* et *Heimerl* in *oe. bot. z.* 1885.

10. *Anthemis*. 1. *A. tinctoria*; — *A. chrysantha* (1866). *A. Fussii* Grsb. iter (1852) ex Smk.

2. *A. macrantha*: *Bulgar.* (in silvis m. *Osog. Planina*: *Velen.* 1887). — *A. rigescens*: *Maced.*

5. *A. nobilis*; *Gall. hab.* etiam or. (*Côte d'Or*, sat freq.).

6. *A. Cota*: *Croat.* (*Fiume*: *A.-M. Smith*).

8. *A. brachycentros*: *Bulgar.* (*Velenovsky* 1887).

9. *A. austriaca*: *Morav. mer., med.*; *Bavar. bor.* sat adest (indicatur etiam ad *Lippspring Westphal.*: *Wilms* 1879). *Styr. pr. Graz* (: *Maly*). *Moldav.*; *Transs.* ad *A. ruthenicam* (26) pertinet ex Smk.

12. *A. carpatica*: *Moldav. Græc. bor.* (*Pind. Dolop.*: *Hsskt* 1885). — *A. pyrethriiformis* (1866) est = *A. carpatica* var. abbreviata *Sch. Ky* exs. 154.

**A. cinerea* *Panc. elem. bulg.* 39. - *Thrac. m. Rilo reg. alp.* (: *Pancic*) ex *Boiss. or. suppl.*

13. *A. Cupaniana*; — ? *A. Ismelia* *Lojac.* in *Magn. fl. sel.* exs. 1463. *A. punctata* *Lojac.* olim. (*Panormi*, mte *Gallo*, in rupibus umbrosis: *Lojacono* 1887).

14. *A. montana*: *Rumel. or.* (: *Velenovsky*); in *Bohem. loco novo* (ubi copiosa) detecta est a *Polak* et *Rosicky*. — *A. collina*; hab. etiam *Gall. centr.* (*Puy-de-Dôme*, *Cantal*, *Allier*, *Loire*) ex *Lmtt. prodr.*

18. a. *A. hydruntina* *HGroves* in *linn. soc. journ.* 1885. 533 et in *giorn. bot. ital.* 1887. 157. c. ic. (*). - *Otranto* (olim *Hydruntum*) *Japygiæ*, ubi in collibus circa lacus degli *Alimini* detexit cl. *HGroves*.

20. a. *A. meteorica* *Hsskt ms.* (litt. 1889). - *Thessal. super.* in saxosis pr. *monaster. Meteora* (: *Haussknecht* 1885).

23. *A. arvensis*; — *A. Haynaldi* *Jka* (1856). *A. multicaulis* *Jka* antea. *A. auriculata* *Grsb. iter* et *Schur enum.* (ex Smk.).

**A. incrassata* (1810). *A. nicæensis* (1800).

26. *A. ruthenica*: *Siles. circul. Guhraner.* (*Ansorge* 1881). *Moldav. Dobrud.* (*Jka*). *Bulgar. or.* (: *Bornmüller*). *Rumel. or.* — *A. Neilreichii*: *Siles. bor. (r.)*. *Morav.*

27. *A. sphacelata*: *Græc. pr. Nauplia* et in *pæנים. Methana* (: *Hausskn.* 1885).

30. a. *A. Muentेरiana* *Heldr.* in *Boiss. or. suppl.* 298. - *Græc. in maritimis insular.* *Petalium* ad *Euboeam mer.* (: *Heldr. Holzm.* 1880).

33. *A. peregrina*: *Cephalon.* (ins. jon.): *Heldr.* — *A. heracleotica*: *Arch. ture. ins. Karpathos* (: *Pichler*). — *A. metallorum* *Heldr. hb. norm.* 940. *A. peregrina* var. *platyloba* *Hsskt* ex ipso. (*Attica*).

35. *A. auriculata*: *Attica* (ad *Laurion*: *Heldr.*).

37. *A. chia*: *Ins. Jon. (Cephalon.*: *Heldr.*, *Corfù*: *Spreitzenh.*), *Ital. mer.-or.* (*T. d'Otranto*: *HGroves*).

**A. Visianii*: *Græc. (Nauplia, m. Pentelikon*: *Haussknecht*).

12. *Anacyclus*. 1. *A. clavatus*: Mallorca Balear. (ad Palma: Barcelò, Soller etc.: Marès).

13. *Ptarmica*. 1. *P. Barrelieri* (*Achillea Barrelieri* Sz. bip. 1855); etiam in montibus Calabr. nunc lecta est (: H.P.R.).

2. *P. mucronulata*; *Achillea mucronulata* Sz. bip. (1855).

3. *P. oxyloba* (*Achillea oxyloba* Sz. bip. 1855); Transs. probab. ad speciem pertinet. Comment. 152.

**P. dacica* Smk. sub *Achillea* (1886). Transs. (rarius); cfr. Smk. enum. 317.

4. *P. tenuifolia* (pl. transs. hb. Schott. 151); hab. etiam Moldav. *Achillea atrata* Bmg. et auct. transs. (ex Smk.). Comment. 153.

5 * *P. serbica*; *P. Aizoon* Panc. (1874) non Grsb.

6. *P. speciosa*; planta europæa ad *P. cartilagineam* (8) pertinet et *Achillea speciosa* Henck. ex hac culturâ orta est ex Heimerl (act. vindob. 1884. 176).

7. *P. vulgaris*: Roman.; ins. Færöer; etiam Island. indicata est, sed ibi forse efferata ex Strömfelt; Fenn. bor. plur. (ut in tota Lapp.) deest.

**P. pyrenaica* (*Achillea pyrenaica* DC. fl. fr. IV. 211): Gall. centr. et mer. (Puy-de-Dôme, Cantal, Lozère, Gard) ex Lmtt.

8. *P. cartilaginea*: Poson. (ad ripam Warthe) ex Gecke. - Boruss. præcip. in demissis flum. Weichsel copiosa est. - Fenn. in Carel. oneg. (: Simming 1863, Norrlin 1871). *Tavastia* et *Aboa* indicatur. - Transs. (Schur, Janka) ad præced. (*P. vulg.*) spectat ex Smk., sed ad Lugos Banat. et in Galiz. certe adest ex Heimerl.

9. *P. lingulata*: Bulgar. (m. Kom, m. Osogovska - Planina: Velen.). — *Achillea alpina* Schur.

9. *a.* *P. rupestris* H.P.R. (sub *Achillea*) in sched. pl. ital. exs. a. 1877. 467 et in nuov. giorn. bot. ital. 1879. 281. - Calabr. or. m. Pollino, alt. 1700—1800 metr. (r.).

10. *P. herba-rotæ*: Alpes-Marit. (sat vulgata in alpinis omnibus: Ardoine). Sabaud. (: Chabert). *Achillea Erba rotta* All. auctuar. (1774). *A. herbarota* All. pedem. (1785).

**P. Morisiana*; *Achillea Morisiana* Rehb. f. (1854); typica solum in valle Cogne (Pedem.) lecta est ibique sæpe cum *P. moschata* crescit, unde orta dicitur hybr. sequens:

×*P. Haussknechtiana* (*Achillea Haussknechtiana* Aschn non Boiss.), quæ in ditione Aosta vall. Cogne a cl. Haussknecht detecta est; hæc vero potius var. *P. Morisianæ*, cui simillima, quam hybr. habenda videtur; cfr. Heimerl in act. vindob. 1884.

11. *P. impatiens*; Transs. l. c. (Claudiopoli) quidem lecta est (a GWolff 1853), sed ex Smk. hæc planta sibirica ibi non nisi inquilina adest.

12. *P. alpina*; sec. Heimerl (l. c. 179) a solo Thomas lecta est (pr. Airolo in radicib. m. St-Gotthard) et hybr. sistit a *P. macrophylla* et *P. vulgari* ortam (= *P. commutata* Heimerl sub *Achillea*); de *Achillea alpina* L. vid. Heimerl in Flora a. 1883 et in act. vindob. 1884. 186.

13. *P. umbellata*; — *P. Millii* Heldr. in sched. (sub *Achillea*). Achaia, rr. (: J.Stuart Mill).

13. *a.* *P. Barbeyana* Heimerl in act. vindob. 1884. 161 (sub *Achillea*). A. Boissieriana Heldr. in exs. itin. 1879 (non A. Boissieri Hsskt.). - Aetol. m. Korax, reg. alp. (detecta a Heldreich 1879).

14. *P. Fraasii*; *Achillea nivea* Sprun. in Flora 1842. II. 638. — A. Neumayeri Heldr. in sched. 1883 (ex Heimerl).

15. *P. multifida*; m. Rhodope (: Dingler ex Heimerl), Perim Dagh (Jka). - *Achillea aromatica* Velen. in act. soc. sc. bohem. 1886. sep. 20 (*). Bulgar. (m. Vitos pr. Sofia: Velenovsky 1885).

**P. abrotanoides* (Ach. multifida Grsb. in hb. vind. e Scardo Alban. ex Heimerl l. c. 141); hæc species a *P. multifida* DC. multum distat et *Achillea chamæmelifolia* Pourr. propior est (vid. ap. Janka in oe. bot. z. XXII. 134 et Heimerl in act. vind. 1884. 142).

17. *P. Clusiana*: Helv. mer. (Samnaien in Engadin ex Brügger et Killias); in Transs. dubie adest ex Smk. (sed ex Heimerl! *P. atrata* Bmg huc pertinet) et

tali modo etiam in Hung., Carn., Carinth. et Salisb. ex Heimerl. Comment. 154.
- *Achillea impunctata* Vest.

18. *P. atrata*: Bavar. (Alp.); etiam in Schneeberg et Raxalpe Austr.-Infer. (rr.) lecta est; indicatio in Carpatibus spectat ad *P. tenuifolium* (4). Comment. 155.
× *P. impunctata* DC. prodr. *Achillea moschata* var. *impunctata* Hpe. *A. atrato-moschata* Kern. (1873). *A. Krättiliana* Brügg. (1880). - Helv., Carinth. etc.

19. *P. moschata* (Ach. *moschata* Wulf. ap. Jacq. 1778): Sabaud. (ex Heimerl.) Helv. non nisi in Alpib. granit.; Transs. deest ex Smk. Comment. 156.
— ? *P. olympica* Heimerl. (subspec.). Olymp. Thessal. (ad nives), ubi a Heldreich detecta et rr. lecta (ex Heimerl.). — *P. calcarea nob. Achillea moschata* var. *calcarea* H.P.R. exs. itin. ital. a. 1877. 379 et in n. gior. b. ital. 1879. (Ital. mer., rarius).

× *P. hybrida*; *A. moschata* var. *hybrida* Gaud. (1829). *A. intermedia* Schleich. (1821); cfr. ap. Heimerl. l. c. 161.

20. *P. nana*: Alpes-Marit. (le Garret et col de Jallorgues; Bornet; col de la Maddalena; Loret). Helv. non nisi in Alpibus lecta est.

21. *P. macrophylla*: Alpes-Marit. (alp. Tenda, silva Borèon supra S-Martin, Ste-Anne-de-Vinai; Ardoino). Sabaud. (: Heimerl.). Hetr. (Apenn. Parm.-Tosc.). — *P. Dumasiana*; ex Ascherson (et Heimerl.) certe hybrida est a *P. macrophylla* et *P. Clavenæ*; a cl. Dumas in ditione Bellunensi prov. venetæ detecta.

* *P. valesiaca* (vid. Heimerl. in act. vind. 1884. 167—171) composita est ex hybridis duabus: × Ach. *obscura* Nees (1831). *A. valesiaca* K. (non Suter). *A. Thomasiana* Rehb. f. (non Hall. f.). *A. asplenifolia* Leresch. (Alpes Helv. et = *macrophylla* + *moschata*). — × Ach. *helvetica* W. (1789), Murith (1810). *A. valesiaca* Sut. (1802). Alpes Vales. et = *macrophylla* + *nana*.

22. *P. Thomasiana* (*Achillea helvetica* Rehb. f. non alior.); de *Achillea Thomasiana* Hall. f. ap. Murith (1810) et *A. montana* Schleich. cat. (1807) vid. ap. Heimerl. l. c. 165—6.

23. *P. Clavenæ*: Bosn. mer. (GBeck; var); in Helv. (ex Heimerl.) rariss. est et solum in m. Generoso (cant. Ticino) lecta, Mte Serva (prov. venetæ) est "locus classicus Absinthii umbelliferi Nicolai Clavenæ". — *Achillea capitata* (1789). *A. absynthifolia* Clairv. (1811). *A. tyrolensis* Wender. (1826) ex Rehb. et Heimerl.

23. a. *P. pindicola* Hsskt ms. (litt. 1889). Græc. bor. (Pind. Dolop. alp. Karawa: Haussknecht 1885).

× *P. cristata* DC. (Achil. *cristata* Retz.) = *P. vulgaris* + Achil. *cretica*? ex Heimerl. l. c. 183 (probab. in horto florent. orta).

× *P. Jaborneggi* Halacsy (sub *Achillea*) = *Clavenæ* + *moschata*. (Heil.-Blut Carinth.).

× *P. Krättiliana* Brügg. (sub *Achillea*) = *atrata* + *moschata*. (Bundia Helv.).

× *P. Reichardtiana* GBeck (sub *Achillea*) = *Clavenæ* + *Clusiana*. (Austr.).

14. *Achillea*. 1. *A. grandifolia*: Thessal. m. Pelion (: Heldr. 1882) Bulgar. m. Vitos et supra Kostinbrod (: Velen. 1885, 1887).

2. *A. magna*: Alpes-Marit. (vall. Cavallé supra S-Martino, Ste-Anne-de-Vinai etc.). Moldav. Ross. centr. (gub. Kursk); - in Helv. (mer.) adest, sec. Gremli, sola subspecies *A. stricta* (*A. lanata* K.). — *A. distans* (1800). *A. dentifera* DC. (1815). Comment. 157.

* *A. stricta*: Transs., r. (Bmg., Freyn). Comment. 158.

* *A. lanata*; hab. etiam, Galiz.

3. *A. ligustica*: Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich).

5. *A. Millefolium*; — *A. sudetica*; Comment. 159. — *A. collina* Becker ex K. syn. (1837); hab. Germ., Austr. (Vindob. freq.), Hung., Transs., Bulgar., et a specie ipsa non distincta. — *A. pannonica*; hab. etiam Bosn. (ex Freyn). Comment. 160. — *A. maxima* Heuff. in diar. soc. z.-b. vind. 1858 (hæc var. insignis Transs. et Banat. propria videtur ex Smk.). — *A. monticola* de Martr. (Gall.: *A. Millefolium* auct. gall. plur.).

* *A. crustata*: Morav. Galiz. Ross. mer.-occ. Comment. 161. — *A. tenuis* (*A. crustata* Schur non Roch.) est var. *A. Millefolii* ipsiss. ex Smk.

6. *A. setacea*: Siles. (r.). Moldav. Dobrud. Bulgar. (: Bornmüller); Helv. non nisi in mer. lecta dicitur. *A. capillaris* Roch. (exs.).

* *A. fililoba* Freyn in Flora 1881. Græc. bor.: Aetol. m. Korax: Heldr.: Pindus et Pelion: Hausskn.

7. *A. crithmifolia*: Valach. (ad Virciorova: Borbás). Dobrud. (: Janka). Thessal. super. (: Haussknecht).

8. *A. odorata*: Alpes-Marit. (la Briga: Lacaita). Bulgar. (: Velenovsky). Græc. bor. (Pind. Tymph. in jugo Zygos: Haussknecht).

9. *A. punctata*: Thessal. (: Hausskn.). — *A. virescens* (Fzl) Heimerl ap. Kern. 1883. *A. odorata* K. (Istr. Dalm.).

**A. Neireichii* Kern. in oe. bot. z. 1871 (in Cons. sub specie seq. allata). *A. nobilis* Sadl., Roch. (in Cons. sub *A. crithmifol.* citat.), Neilr.; *A. pubescens* Roch. (exs.). - Austr. Morav. Hung. Transs. Moldav. Dobrud. (in desertis freqq.: Ue.S.). Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.).

10. *A. nobilis*: Bulgar. Ross. med. (gub. Kursk, Tambow); - Helv. non nisi in cant. Ticino, Valais et Neuchatel.

11. *A. chamæmelifolia*; obs. Heimerl (in act. vind. 1884. 143) hæc species a ceteris Millefoliatis recedit, Ptarmicis propior est et *P. abrotanoidi* (16 *) proxima. — *A. falcata* Lap. (non L.). *A. capillata* Lap.

12. *A. Ageratum*: Mallorca Balear.

Obs. *A. decolorans*; sec. Heimerl (l. c. 182) est hybr. (= *Ageratum* + *Ptarmica*).

14. *A. clypeolata*: Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht).

16. *A. taygetea*; Orph. exs. 1082.

17. *A. compacta*: Dobrud. (in desertis, pratis silvat., abunde: Jka, Ue.S.). Bulgar. (in collibus apricis ad Varna etc: Velen.). Thessal. (m. Pelion: Heldr. 1882), ubi speciei terminus meridionalis ponitur.

**A. sericea*: Transs. (: Sigerus, Andræ).

19. *A. micrantha*: Ross. mer. (gub. Cherson), mer.-occ.

20. *A. leptophylla*: Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker); Galiz. loco non indicato adest ex Partsch in hb. Pittoni teste Knapp.

21. *A. pectinata* (1800): Dobrud. (in desertis, montib. lapidosis, passim: Ue.S.). Ross. mer., mer.-occ.; Transs. excl. sec. Smk. — *A. ochroleuca* Ehrh. n. beitr. VII. 1792 (in Cons. sub *A. nobili* citatur); cfr. ap. Kerner in oe. bot. z. 1871.

22. *A. pseudopectinata*: Bulgar. m. Vitos et pr. Philippopolin (: Skorpil ex Velen.).

23. *A. depressa*: Bulgar. pr. Sliven, alias Slivno (: Skorpil ex Jka).

25. *A. chrysocoma*: Græc. bor. m. Pindus tymph. (Hausskn. Heldr. 1885).

**A. dentato-serrata* (Heuff.) Heimerl = *A. Millefolium* + *Ptarmica* cartilaginea. (Banat.).

**A. major* (Boiss.) Heimerl = *A. grandifolia* + *Ptarmica* umbellata. (Thessal.).

**A. tymphæa* Hsskt. = *A. compacta* + *A. punctata*. (Pindus).

15. **Santolina**. 1. *S. Chamæcyparissus*; Styr. adest plurib. loc. (in collibus calidis et vineis) ex Maly.

19. **Pinardia**. 1. *P. coronaria*: Balear. (in campis, ad vias etc. abunde); indicatur etiam in Gall. mer. (Marseille: Kralik, Cette: Flahault).

20. **Chrysanthemum**. 1. *C. segetum*; Cephalon. (ins. Jon.) adest ex Heldreich et Spreitzenhofer. Comment. 162.

3. *C. Myconis*: Corfu ins. Jon. (: Spreitzenh. 1877). Taur. (ex Coss.).

21. **Prolongoa**. 2. *P. pseudanthemis*; hæc species rara detecta est a Willkomm (1845) in pinetis ad Chiclana pr. San-Roque, sed dein latuit usque ad 1876, cum a Perez-Lara pr. Jerez-de-la-Frontera relecta est (ex Willk.).

23. **Leucanthemum**. 2. *L. pallens*; in Helv. err. indicatur obs. Gremli. — *L. subglaucum* cfr. sub *L. maximo* (12).

4 * *L. platylepis*; cl. Borbás hæc speciem in rupestribus arduis et aditū difficil. crescentem observavit, sed minime, ut putaverunt, a *L. vulgari* resecto orta est.

5. *L. atratum*: Carinth. Bosn. mer. (m. Vratlo: GBeck).

6. *L. montanum*: Bosn. mer. (non rarum: GBeck). — *L. commutatum*; sec. Loret pertinet ad *L. vulgare* (13).

*L. Delarbreyi Timb.-Lagr. in Lmth. prodr. plat. centr. (1881). Chrysanth. atratum Delarbr. (non allor.). - Arvern. (Puy-de-Dôme, Cantal).

8. L. cebennense; adest etiam (r.) Arvern. (Puy-de-Dôme, Cantal) ex Lmth. prodr. plat. centr.; dep. Loire (gorges de la Loire" plur. loc. inter le Peruiset et St-Just ex Hervier 1885).

9 * L. murcicum: Ibiza Balear. (Puig den Serra: Marès 1852).

10. L. ceratophylloides; Helv. hab. solum in Alpibus; Bavar. olim in Alpib. algov. indicata est, sed ex Prantl exclud.; Transs. ad Pyrethrum alpinum pertinet.

*S. larvatum Grsb. ap. Pntek in oe. bot. z. 1873 sub Chrysanth. (in Consp. sub specie seq. allatum est). - Monten. in vertice m. Kom (Pantocsek 1872); cfr. etiam Pntek adnot. 41.

11. L. coronopifolium: Alpes-Marit. (sat obvium in alpinis, unde usque ad Contes supra Nicæam descendit: Ardoino). Bavar. (Alpes; cum flum. Isar usque ad München devehitur). Comment. 162.

Obs. Cl. Lacaita (litt. 1883) de hoc et præced. (L. ceratoph.) observat: omnia quæ legi specimina achenia disci coronata et flores tubulosos, minime basi subcalcaratos vel cucullatos, habent; igitur enumeranda sunt inter Pyrethra (P. alpino proxima).

12. L. maximum: Alpes-Marit. (reg. mont.: la Briga, val de Pesio etc.).

*L. subglaucum de Laramb. (in Consp. sub L. pallens enumerat.). L. Candolleum Mart.-Donos. - Gall. mer. (Lozere, Gard, Tarn etc.).

13. L. vulgare; — L. subalpinum Schur (sub Tanaceto). L. atratum Bmg. et auct. transs. (sub Chrysanth.).

L. meridionale Le Grand in Bæn. hb. eur. 4184 et in bull. soc. bot. 1881. 56 (); cfr. ib. 1884. - Gall. mer. (Aveyron, in rupibus serpentinis Puy de Wolf pr. Firmy: fr. Salter 1879; etc.).

15. L. sibiricum: Ross. or. (gub. Perm: Kirilow 1874). — L. Zawadskii Nym. Chrysanthem. Zawadskii Herbich (1830). Galiz. hab. solum in montib. Pieninis, sed in toto eorum jugo, et quidem frequenter, obvium venit (ex Knapp).

24. **Pyrethrum.** 1. P. corymbosum: Græc. bor. (m. Pindus Dolop.: Hsskt). Bulgar. Rumel. or. Roman. Ross. bor. (ad litus or. lacus Onega: Günther).

2. P. cinereum: Dalm. (ex Janka). Bulgar. (in submontanis silvaticis m. Osogovska Planina: Velen. 1887).

2. a. P. caucasicum W. sp. III. 2156. Chamæmelum caucasicum Boiss. - Bulgar. m. Vitos (in pratis sub cacumine: Velenovsky 1887). — P. Pichleri Panc. (sub Chamæmelo). Thrac. m. Rilo.

3. P. Parthenium; omnino spontaneum indicatur e. gr. in Hung. m. Loppennik (ubi copiosum: Holuby 1880); subspont. (ad domicilia) adest etiam Suec. med.

4. P. cinerariæfolium: Bosn. mer. (Blau ex Geck). Chrysanth. rigidum Vis. delect. sem. hort. patav. 1825. Tanacetum cinerariifolium Sz bip. (1844).

5. P. uliginosum: Roman. Ross. mer.-occ. (gub. Kiew). - Transs. cruce-notatur a Smk.

6. P. Waldsteinii; hab. etiam Moldav.

8. P. alpinum: Alpes-Marit. (in alpib. omnib. satis: Ardoino). Helv. solum in Alpibus (summis). Bavar. (Alpes). Galiz. - P. Halleri Bmg.; P. coronopifolium Fuss, Schur (ex Smk.). — P. minimum: Carinth. (Malnitzer Tauern: Dr Schweinfurth). Helv. non nisi in alpe Zermatt Vales. lectum est.

11. P. macrophyllum: Bulgar. m. Vitos et Osogovska Planina (Velenovsky 1885, 1887).

12. P. bipinnatum: Ross. bor.-or. inter 62° et 68° lat.; in ins. Nov.-Sekl. non lectum, sed adest in ins. Waigatsch (ex Kjellman).

13. P. millefoliatum: Dobrud. (in montibus, desertis, pratis silvat., freq.: Ue.S., Jka). Bulgar.

25. **Matricaria.** 1. M. trichophylla: Transs. (e. gr. S.-Gothard inter segetes, in pomariis, freq.: Janka). Bulgar. (pr. Petrov Han m. Balkan: Velen. 1887). Græc. bor. (m. Pindus: Hausskn. Heldr. 1885). Ross. mer. (gub. Cherson).

3. *M. maritima*; Comment. 163. (cfr. speciem seq.).

5. *M. inodora*; — *M. ambigua* Led. (sub *Pyrethro*). *M. inodora* var. *phæcephala* Rupr. (Ostrob. bor., Lapp. or., Samoj., Nov.-Sekl.). — *M. Retzii* Neum. in bot. not. 1882. *M. maritima* Retz. (vix L.); cfr. comment. præced. et Lge haandb. ed. IV. 865. Norv. arct. (et alibi in litt. mar. ex Murbeck). Island. Feröa. Scot. cum Shetland.

10. *M. discoidea*; Fenn., ubi nunc locis habitatis (exc. Lapp.) non rara, a. 1849 primum lecta est ex Sælan.

11. *M. aurea*: *Lampedusa* (ad vias pr. portum: Lojacono 1884).

26. **Plagi.** 1. *P. virgatus*: Alpes-Marit. (in convallibus et alveis sat freq. ad Castillon, Menton, Nizza, St-Martin-du-Var, Levens et usque ad Tenda: Ardoino). Comment. 164.

27. **Tanacetum.** 1. *T. vulgare*; in Eur. max. bor. plurimum deest (citatur e. gr. e Jokkmokk et Gellivare Lapp.).

2. *T. boreale*: Moldav. (in humidis circa Galati).

Obs. *T. Balsamita*; Taur. certe indigena est ex Steven.

28. **Artemisia.** 1. *A. arborescens*: Valenc. (Rouy 1881). Balear. (: Rodrig., Barceló). Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich). Arch. turc. ins. Karpathos (: Pichler).

2. *A. Absinthium*; exc. etiam Fenn. bor.; adest in Græc. bor. (m. Pindus Dolop.: Hausskn.).

3. *A. camphorata*: Belg. hab. in valle flum. Meuse (ad Heer, Dinant etc.). Lothar. (Saint-Mihiel in rupib. calcar.: Larzillière). Alpes-Marit. (reg. mont.). Helv. mer.-occ. (Vuache pr. Genevam: Gremli). Styr. rr. indicata (: Dietl ex Maly). Bulgar. Bosn. mer. (GBeck).

4. *A. rupestris*; indicatur etiam in Ross. balt. (Curon. et Esthon., r.).

5. *A. lanata* (*A. lanata* γ DC. prodr. quoad pl. hisp. *A. alpina* Sz bip. in Willk. sert. non al.); hab. Arag. mer.-occ. Murc. bor. Castil. nov. or. - Ex obs. cl. Willkomm hæc species ad sectionem *Seriphidiorum* pertinet et post *A. herba alba* (45) inserenda; vid. ei. ill. plant. hisp. II. 13—14, ubi historiam speciei, jam *Barreliero* cognite sed a recentioribus cum aliis commutata, plene expositam invenies.

**A. pedemontana* (*A. lanata* γ DC. prodr. excl. pl. hisp.): Alpes-Marit. (mt. Ponset, col de Fenestre, mt Tenibre supra St-Etienne).

6. *A. caucasica*; *A. lanata* α et β DC. prodr.

7. *A. nitida*; *A. lanata* δ DC. prodr.

8. *A. glacialis*: Alpes-Marit. (col Bertrand, cacum. m. Bego). Helv. hab. solum in Alpibus vales. (Zermatt, vall. Bagnens.). Transs. ad *A. Baumgartenii* (40) pertinet ex Smk.

9. *A. Mutellina*: Alpes-Marit. (mt Bego, alp. de Fenestre). Bavar. (Höfats alpium Algov.). - Transs. ad *A. Baumgartenii*. (40) pertinet ex Smk.

14. *A. arenaria*; — *A. Trautvetteriana* Bess. (Ross. mer. litor.).

15. *A. salsoloides*: Ross. mer. (gub. Poltava: Lindem.), mer.-occ.

16. *A. campestris*: Roman. Bulgar. (: Bornmüller). Fenn. extra mer. adest in sola Ostrob.

**A. botanica* Lundstr. in sched. *A. campestris* var. *botanica* Htn f. (1879). Suec. bor. (Vestrobothn. ubi ad ostium flum. Pite a Lundström detecta); indicatur etiam in Ostrobothn. bor. Fenn. (par. Limingo: Bremer 1878).

19. *A. nana*: Sabaud. (Chabert). Carinth. (r.). — *A. alpestris*; *A. nana* var. *norica* Leyb. (Gamsgrube Carinth.: Pacher).

23. *A. scoparia*: Boruss. occ. Siles. (pr. Görlitz). Galiz. Bavar. Roman. Bulgar. Rumel. or.

26. *A. chamæmelifolia*: Alpes-Marit. (reg. alp. val de Jallorgues pr. St-Dalmas-le-Sauvage: Bornet).

29. *A. austriaca*: Moldav. Dobrud. Bulgar. or. (: Bornmüller). Ross. centr. (gub. Kursk).

30. *A. pontica*: Belg. (ex Durand). Carinth. (r.). Helv. non nisi ad arces antiquas (Mont le Grand, Ramstein etc.) inquil. (ex Gremli). Moldav. Dobrud. Bosn. mer. (: GBeck).

32. *A. vulgaris*; — *A. coarctata*; etiam Angl. nunc lecta: Stratford-on-Avon (: Bagnal), Plymouth (: Briggs).

32. *α*. *A. Verlotorum* Lmtt. in mem. assoc. franc. 1876; cfr. ej. prodr. plat. centr. 400, ubi auctor descriptionem speciei et observationes de ea varias denuo publicavit. - Gall. centr. (præcip. Puy-de-Dôme), or. (Doubs, Isère); etiam Paris. ex Bonnet, at sec. B. non est planta indig. sed = *A. selengensis* Turcz. (e Sibir. baical.), quæ *A. vulgari* valde proxima est.

34. *A. atrata*; Transs. (*A. tanacetifolia* Bmg.) pertinet ad *A. Baumgart.* (40) ex Smk.

35. *A. laciniata*; loca (salsuginosa) eadem ac *A. rupestris* (4) inhabitat in Anhaltia (inter Stassfurt et Bernberg) et Thuring. (inter Artern et Kahnstedt et ad Berksleben).

Obs. Ad hanc sectionem pertinet etiam *A. Stelleriana* Bess., species asiatico-rossica, quæ nunc adest etiam in Scania, ubi in litore marino occidentali pr. Helsingborg et inde per milliar. 11½, inter Elymum arenar. et Psammam arenar., observata est (vid. ap. FÅresch. in bot. not. 1880. 137-150); a typica kamtschatica satis recedit (quod non mirum).

37. *A. annua*: Dobrud. Bulgar. Ross. mer.-occ.; in Europa occidentali interdum lecta est in cultis etc. (sic in Gall. dep. Char.-Infer.: Foucaud 1878).

38. *A. norvegica*; hab. etiam in montib. Ural. ex Rupr.

40. *A. Baumgarteni*: Moldav. — *A. Villarsii*: Alp.-Marit. Pedem. (in summis montibus graniticis "Stella" et "Cima de Gelas": Lacaita).

43. *A. coerulescens*; hab. etiam Sard. (Reverchon 1881).

46. *A. fragrans*; hab. etiam Ross. mer.-occ.

**A. monogyna*; Transs. ad *A. salinam* (48 *) pertinet ex Smk. — *A. pendula* (*A. nutans* Grsb. iter et auct. transs.) est var. ejusdem speciei (*A. salinæ*) ex eodem.

47. *A. gallica*: Dan. litor. omn. exc. Bornholm. (ex Lge). Balear. Croat. (Fiume: A-M.Smith).

48. *A. maritima*; — *A. nutans*: Dobrud. (ad litora Ponti Eux. et lacuum salsor. copiose: Ue.S.). - Transs. ad *A. pendulam* Schur (= var. subspeciei) pertinet ex Smk.

**A. salina*: Moldav. in pratis salsis, ad ripas flum. Pruth et Danub. — *A. pendula* Schur. (Transs.).

49. *A. valesiaca*: Fiume Croat. in Scoglio (scopulo) di San Marco (: Borbás, A-M.Smith).

29. *Cotula*. 1. *C. coronopifolia*; Cheshire Angl. nunc omnino inquil. est ibique, ut in meridionalibus, robustior (: Ch. Bailey). Norv. mer.-occ. juxta domicilia in Lærdalsören ad Sognefjord, ubi primum lecta a Benitz 1875 (ABlytt); Bahus. (Suec. mer.-occ.), ubi in Kasens Nabb pr. Uddevalla olim navibus advecta erat, nunc deest. Germ. hab. in litoralibus a Frieslandia or. ad Holsatiam (sic ad ostia flum. Weser, ad Emden, Jever copiose, ut etiam Hamburgi et pr. Beverstedt a. d. Lune), sed adest etiam in interioribus (Meppen in Hannover, Hattingen in Westphalen); jam sæculo præterito ex Africa mer. introducta (Focke).

Obs. *C. aurea* L., quæ nunc in ins. Melita indicatur (Duthie 1874), olim a Loeffling in Hispania lecta erat et in ejus itin. (a Linneo edito) accuratissime et plenissime descripta exstat.

31. *Soliva*. 1. *S. lusitanica*: Menorca Balear. (Porta. Rigo 1885).

32. *Carpesium*. 1. *C. cernuum*: Bavar. (r.). Helv. hab. etiam bor. (Bodense etc.). Styr. pl. locis. Dobrud. (in silvis pr. Ciucarova rr.: Ue.S.). Bulgar. (: Bornmüller).

33. *Helichrysum*. 1. *H. virgineum*; hab. in Maced. m. Athô inter 5800 et 6100', rr. (Orph. exs. 1066).

3. *H. frigidum*; hab. etiam in Sard., ubi in summo monte Limbaro (1500 metr.) a Reverchon lectum est (1882): Magn. fl. sel. exs. 86 bis.

5. *H. Fontanesii*: Valenc. m. Mongo pr. Denia (Rouy 1883: *H. valentinum* Rouy in bull. soc. bot. 1884. 40); in Menorca non lectum. - Observ. Rouy (l. c.) nomen *H. Fontanesii* servandum est pro algeriensi *Gnaphal. Stoech. var. inodora* Dsf., quâcum Cambessedes plantam balearicam erronee combinavit.

11. *H. siculum*; Ins. Jon. etiam in Cephalon. (: Heldr.) et Corfû (: Spreitzenh.) lectum est.

13. *H. orientale*; etiam in Cephalon. ins. Jon. (raro) provenire dicitur ex Heldr.

13. *a. H. Pichleri* Barb. in bull. soc. vaud. XXI. (1885). 96. sep. 4 (*). - Arch. turc. ins. Karpathos (Scarpanto), ubi in rupibus verticalibus cacum. montis Kalolamni (4800') ab oculatiss. Pichler detectum (1883).

14. *H. plicatum*: Orph. exs. 1067 (e Bitolia Maced.); hab. etiam in Thes-sal. m. Pindo (: Haussknecht).

16. *H. arenarium*: Lothar. Siles. Roman. Bulgar. (: Bornm.).

17. *H. serotinum*; — *H. Libanotis* Jord. (Gall. mer.).

18 * *H. microphyllum*; in Balear. rarissimum est et in sola Mallorca lectum.

34. **Gnaphalium.** 1. *G. luteo-album*; Dan. adest solum in ins. Bornholm.

Obs. *G. undulatum* circa a. 1840 ad Plouescat (dep. Finisterre) primum innotuit (introducunt).

2 * *G. pilulare*: Siles. Thuring. Phalz. (ex Geke); in Lapp. suec. non nisi Vestrob. bor. indicatur.

**G. nudum*: Dan.; in Scand. cetera rarius et non nisi Suec. mer. indicatum est.

4. *G. norvegicum*: Fenn. bor. Alpes-Marit. reg. alp. (Boréon supra S-Martin: Bornet).

5. *G. Hoppeanum*: Helv. (Alpes). Bavar. (Alpes). Styr. (alp. calcar. et mts Sulzbach.). Bosn. mer. (Prenj Bjelasnica: GBeck). - Transs. ad spec. seq. pertinet ex Smk.

6. *G. supinum*: Ins. Færöer. Arvern. (Mont-Dore). Sard. (ex Reverchon). Bulgar. (in summo m. Vitos, in alpinis m. Balkan etc.: Velen.).

35. **Antennaria.** 1. *A. Leontopodium*: Alpes-Marit. (Capelet-de-Raus, Tenda, St-Martin, alp. Entraunes). Styr. etiam in montib. Sulzbach.; Croat. in mte Risnjak (Borbás 1876, Vukotinov. 1877). Dalm. (m. Orien, Crnopac). Monten. (m. Rarnisava: Knapp 1872). Herceg. (m. Grabovica). Bosn. Serb. mer. (vid. ap. Bornmüller in oe. bot. z. 1888).

2. *A. dioica*: Fenn. Dan. (ubi etiam, præ. in ins. Bornholm, adest var. *A. hyperborea*). Bulgar. (in alpinis m. Balkan, Osogovska Planina, Vitos).

3. *A. alpina*; Island. adest! (: Grönlund, Strömfelt).

4. *A. carpatica*: Ross. bor.-or. ural. (ex Rupr.), aret. ins. Waigatsch (exped. Rosenthal. 1871 ex ABlytt).

38. **Filago.** 1. *F. Duriei*: Hisp. (mer.) etiam pr. Hellin (: Rouy 1881).

2. *a. F. Pseudo-Evax* Rouy in rev. sc. nat. 1883. sep. 69 (*). - Hisp. mer. (pr. Hellin: Rouy 1881), centr. (Madrid: Rouy 1883).

4. *F. spathulata*: Helv. occ. (cant. Vaud, Basel). Sard. (: Reverchon). Croat. (Frey, Hirc). Thessal. (Heldr. hb. norm. 849).

**F. prostrata*: Japygia (T. d'Otranto: HGroves). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).

5. *F. germanica*; exc. etiam Suec. mer. plur. (non nisi in Scan. et rr. Halland. lecta est). Byzant. adest var. simplex (*Gnaphal. pyramidale* Noë exs. or. 189).

**F. lutescens* Jord. (1846 Sept.). *F. apiculata* GESm. (1846 Jul.). — *F. iodolepis* Breb. (Normand.).

6. *F. eriocephala*: Sard. (Reverchon 1882). Argolis (Heldr. hb. norm. 850. a). Thessal. (var. major: Heldr. hb. norm. 850. b).

7. *F. mareotica*; *F. ramosissima* (e Granada) minime identica est cum *F. mareotica*, quæ adest in Murcia (*F. murcica* Guir., *F. Clementei* Willk.), testantib. specim. utriusque a cl. auct. Lange benigne communicatis (cfr. etiam ej. descr. iconib. illustr.).

8. *F. gallica*; Germ. hab. (rarius) in occ. et mer. et interdum etiam in reliqua cum seminibus extraneis introducta obviam venit, sed inconstans (ex Geke). — *F. tenuifolia*; Sard. adest! (: Reverchon).

9. *F. neglecta*; Oglifa *Soyerii* Godr.

10. *F. arvensis*; exc. etiam Fenn. bor.

12. *F. heterantha*; hab. etiam Sard. (: Gennari, de Sardagna).

×*F. intermedia* Hsskt. = canescens + spathulata. (Thessal.).

×*F. similata* Hsskt = *eriocephala* + spathulata. (Methana).

Obs. 1. *Galinsoga parviflora* Cav. in Europa plurima nunc lecta est et sæpe omnino quasi indigena apparet; sic Berolini et Hamburgæ lolium est vulgatissimum.

Obs. 2. *Silphium perfoliatum* L., herba perennis elata, boreali-americana, in Europa interdum adest inquilina, e. gr. Germ. ad Rhenum inter Braubach et Oberlahnstein (ex Geke).

40. *Phagnalon*. 2. *Ph. saxatile*: Pola Istr. (: Dr Thorén 1878). Argolis (*Ph. methanæum* Hsskt 1887 ex Heldr. hb. norm. 941); ins. Aegina (ex Heldr.). **Ph. viride* Uechtr. (1874). Hisp. mer. (Jerez de la Frontera).

3. *Ph. græcum*: Cephalon. ins. jon. (Schmidt teste Heldr.).

42. *Linosyris*. 1. *L. vulgaris*: Moldav. Dobrud. Bulgar.; in Germ. bor.-occ. plur. deest.

2. *L. villosa*: Dobrud. (in montibus siccis, desertis: Ue.S., Jka). Bulgar. (in collibus ad Varna, etc.: Velen.).

43. *Galatella*. 2. *G. insculpta*: Moldav. Ross. centr. et med. or.; in Galiz. deest ex Knapp. — *Aster exaltatus* Barth (1879) ex Smk. — *A. canescens* Smk. (1882). *A. canus* Bmg. (non W. K.).

3. *G. pauciflora*; hab. etiam Ross. centr. (gub. Kursk).

6. *G. cana*: Moldav.; in Morav. nuper non lecta est.

44. *Aster*. 2. *A. alpinus*: Moldav. — *A. Wolfii* Favr. (Vales. pr. Sion al. Sitten).

3. *A. Willkommii*; detectus est a Willkomm (1850) in sabinetis ad Po-zandón, sed ex eo probab. jam ab Asso repertus erat (et sub nomine *A. alpini* publicatus); nunc plurib. locis Aragoniæ, immo copiose, lectus est.

4. *A. Amellus*: Roman. Bulgar.; in Germ. bor.-occ. deest.

6. *A. sibiricus*; hab. etiam Fenn. bor. (Kuusamo).

8. *A. salignus*: Gall. or. (dep. Vosges: Beshier). Helv. Styr. (pr. Cilli: Graf teste Maly). Carinth. (r.). Ross. occ. (hinc inde). — *A. angustus* Schur (ex Smk.).

Obs. *A. paniculatus* Lam. nunc Angl. plur. loc. inquil. est (ex Britten). *A. præcox* W. talis indicatur in Marchia (: Ascherson) et Ingria (: Ruprecht), *A. levis* L. eodem modo in Morav.

9. *A. Tripolium*; in interioribus citatur immo e convallibus quibusdam Mantuanis, ubi locis solo salso predictis occurrit (: Paglia). — *A. panonicus*: Dobrud. (reg. litor. et danub.: Ue.S.).

45. *Solidago*. 1. *S. Virgaurea*; — *S. lapponica* With. *S. Virg.* var. *lapponica* Whlhb. succ. Lapp. (etiam rossica: Fellman); sec. Whlhb. fl. lapp. non est var. distincta, sed (etiam in Lapp.) in typum vulgarem transit. — *S. valesiaca* Bor. (Helv. etc.).

**S. macrorhiza*; hujus auctor cl. in litt. observat quod plantam dictam per triginta annos in horto (e seminibus in loco natali collectis educatam) immutatam et a *S. Virgaurea* omnino diversam habuit; floret (Havniæ; mens. Octobr.—Novembr., sed *S. Virgaurea* mense Augusti, maturans dum altera prima alabastra sua explicat.

2. *S. minuta*; probab. est = *S. Virgaureæ* var. *pumila* (alpina auct. p. p.). Obs. *S. gigantea* Ait. in Gall. centr. (Puy-de-Dôme etc.) inquil. est non valde rara. *S. lithospermifolia* Lec. Lmtt. (non W.) est *S. canadensis* ipsa ex ipso Lamotte.

46. *Erigeron*. 1. *E. frigidum*; in Pyren. or. valle alp. Carença (utroque latere) detectum est a Gautier 1879; vid. ap. Freyn et Gautier in bull. soc. bot. 1881 (*).

2. *E. uniflorum*; Island. incerta civis dicitur. Ross. arct. etiam extra N.-Seml.; Alpes-Marit. (col de Fenestre, lac d'Entrecoulpes, etc.). Helv. hab. solum in Alpihus. Bavar. (Alpes). Moldav. (alp. Cehlauhu: Janka).

3. *E. glabratum*: Alpes-Marit. (valle Cavallé supra S-Martino: Bornet). Styr. (: Maly); indicatur etiam Galiz.

**E. macrophyllum*; ex Smk. pertinet ad *E. podolicum* (9 *) teste specimine autent. in hb. Haynald.

4. *E. alpinum*: Ross. bor. gub. Wologda (ex Ivanitsky 1884). Arvern. (Puy-de-Dôme, Cantal). Bosn. mer. (: GBeck). — *E. nanum*; ad *E. uniflorum* pertinet ex Smk. — *E. neglectus* nunc tamquam subspecies militet:

**E. neglectus* Kern. in bericht d. nat. med. ver. Innsbr. 1872. *E. alpinum* auct. transs. et *E. glabratum* Schur ex Smk. - Alpes. Carpati (etiam Lapp. et Dovre ex Kern.). Herba monocephala; radii breviores quam in *E. alpino* typico.

5. *E. Villarsii*: Bavar. (kl. Rappenkopf Alpihus algov.). Helv. solum in Alpihus adest; *E. glandulosus* Heg.

**E. Hegetschweileri* Brugg. (1874). *E. Villarsii* Heg. *E. Schleicheri* Moritz. - Helv.

**E. Schleicheri* Grm. (1885). *E. rupestre* Schleich. (non Hpe). - Vales. in rupibus graniticis.

6. *E. politum*; locis quibusdam boreali-suecic. sequentis huc ductis area speciei in Suecia a Lapon. ad Herjedal. et Helsingiam extenditur.

7. *E. droebachense*: Ross. arct. et bor.-or. Fenn. plur. (sed Lapp. et Suec. bor. nunc ad præced. citantur). Bavar. (non rarum). Siles. (r.). Transs. ad *E. podolicum* (9 *) pertinet. — *E. pseudoacre* est *E. acre* ipsiss. ex Smk.

9 * *E. podolicum* (1822). *E. racemosum* (Bmg.) Smk. 1886. *E. angulosum* Schur (non Gaud.). *E. droebachense* Wolf ap. Fuss; ex Smk.

× *E. engadinense* Brugg. = *Hegetschweileri* + *uniflorum*. (Bundia).

× *E. glabrescens* Brugg. = *angulosum* + *acre*. (Bundia).

× *E. glareosum* Brugg. = *angulosum* + *Villarsii*. (Helv.).

× *E. Hülsenii* Vatke = *acre* + *canadense*. (March., Helv.).

× *E. intermedium* Trachs. (*E. Trachselsi* D.Torre) = *Hegetschweileri* + *Villarsii*. (Bundia).

× *E. parviflorum* Brugg. = *angulosum* + *canadense*. (Bundia).

× *E. rheticum* Brugg. = *alpinum* + *uniflorum*. (Bundia).

47. *Conyza*. 1. *C. ambigua*; in Gall. bor. nunc magis magisque divulgatur; sic in portu La Rochelle omnino inquilina exstat (Foucaud 1883).

48. *Bellidiastrum*. 1. *B. Michellii*: Alpes-Marit. Herceg. (: Brandis ex Freyn); in Transs. deest ex Smk.

50. *Bellis*. 1. *B. rotundifolia*; *B. cordifolia* Willk. ill. I. 74 (quia non identica cum planta Fontanes.). *B. rotundifolia* var. *hispanica* Willk. Lge.; hucusque solum in Sierra de Palma pr. Algeçiras lecta (ibi a Willkomm detecta est 1845).

2. *B. silvestris*; Transs. proventu incerta ex Smk. (cruce notat.). — *B. pappulosa*; Ital. mer.-or. (Otranto: HGroves).

3. *B. longifolia*; Eurytaniæ m. *Chelidoni* (Heldr. exs. a. 1879 nom. *B. amoenæ*): Boiss. or. suppl.

4. *B. perennis*; in Suec. vix extra Scaniam, Bleking. et ins. balticas (in Norv. mer.-occ. probabiliter) vere spontanea, sed talis adest in Island. (: Fridriks-son, Mortensen) ex Grönl. addit.; in ins. Færöer vulgata (: Rostrup).

**B. hybrida*; Sard. (pr. Sassari) ex Biondi. Attica (Heldr. hb. norm. 944).

5. *B. Bernardi* (*Bellium nivale* Bernard non Req.); species in m. Rotondo (Cors.) vulgata est, sed simile *Bellium nivale* Req. (*B. bellidioides* var.) ibi rariss. obviam venit ex Bonnet.

6. *a. B. Vandasii* Velen, in diar. soc. sc. bohém. 1888. 49 (sep.). - Bulgar. ad radices m. Osogovska Planina (: Velen. 1887).

51. *Telekia*. 1. *T. speciosa*: Moldav. Bulgar. (m. Balkan ad rivulos alpinos, m. Vitos etc.: Velen.); interdum (Dan., Siles. etc.) etiam inquil. obviam venit (e cultura in hortis). Comment. 165.

2. *T. speciosissima* Less. (1832); DC. (1836). *Buphthalmum speciosissimum* Ard. specim. alt. (1763).

52. *Buphthalmum*. 1. *B. salicifolium*; Transs. probab. ad *Inulam cordatam* pertinet ex Smk.

3. *B. grandiflorum*: Alpes-Marit. (in herbis lapideis a Tenda et S-M-Lantosca usque ad Mentone et Nizza et in fere toto territ. Grasse: Ardoine). Helv. hab. solum in cant. Ticino. - Transs. ad *Telek. specios.* pertinet ex Smk.

53. *Asteriscus*. 2. *A. aquaticus*; — *A. nanus*: Balear. (Formentera: Marès).

55. *Inula*. 1. *I. Helenium*; Suec. etiam med. adest inquil. ad pagos etc. Belg. in duobus saltem locis (Barse, Marneffe) indigena videtur (ex Crepin). Sard. (: Reverchon). Galiz. (non rara: Knapp). Hung. (in mer.-or. vere indig. ex Borbás). Moldav. Dobrud. (reg. silv. passim: Ue.S.). Bulgar. (in vallibus humidis silvarum: Velen.). Thessal. exstat copiosior ad pedem Olympi, ibique inter *Pterides excelsas* (*P. aquil.*) eminet, sed adest etiam alibi in prov. dicta.

2. *I. salicina*: Moldav. Dobrud. (: Ue.S.). Bulgar. Thrac. (Rumel.) plur. loc. (: Skorpil ex Velen.). Fenn. hab. solum in mer. et Kuusamo bor. - Transs. ad *I. cordatam* (5) pertinet ex Smk. — *I. Pseudo-Bubonium* est = *I. cordata* (5) ex eodem. — ? *I. Savii* GBeck 1882. (Hetr.: Savi).

4. *I. hirta*: Roman. Bulgar. Rumel. or. *I. montana* Bmg. hb. ex Smk.!

× *I. rigida* (1862). *I. spuria* Kern. (1871). *I. semihirta* Borb. (1878); ex GBeck.: Bavar. Thuring. Bohem. (: Celak.). Morav. (: Oborny). Vindob. (: Halacsy et Braun). Hung. et Transs. (: Borbás).

× *I. Hausmanni*: Polon. mer. Morav. (: Oborny). Hung. Dalm. Lomb. (ex GBeck).

× *I. pleiocephala* (Heuff.) Borb. in Engl. jahrb. 1887. Hung. Banat. Transs.

5. *I. cordata* (1884): Hung. Croat. Transs. Bulgar. (in silvis ad Varna: Fornm.). Græc. bor. (Pind. Dolop.: Hausskn.). *I. aspera* Poir. (1813) ex GBeck et Borbás. — *I. pseudosalicina* Smk. 1878. (*I. salicina* Schur). — ? *I. semicordata* Borb. (1879). Hung. Transs.; sec. Smk. est species media inter *I. cordatam* et *I. salicinam* (cujus vices gerit in Hung. med.) et = *I. obvallata* Kit. (1864).

× *I. transsilvanica* (1866); ex Smk. est = *I. hybrida* Bmg. (1816); sec. Borbás est var. *I. pseudo-ensiformis* (7. a*); maneat vero *I. cordato-germanica* Schur.

6. *I. squarrosa*: Cors. (ex GBeck). Helv. solum in cant. Ticino (Gandria) lecta est; indicatur etiam in Ross. med. (gub. Kursk), sed hoc (an etiam Ross. mer.?) probab. speciem præced. spectat.

**I. spiræifolia*; characteres certi ad hanc a præced. *I. squarrosa* distinguendam desunt, quare hæc duæ a multis junguntur sub nomine *I. spiræifolia* (quia hæc in *Speciebus Plantarum* alteram antecedit), sed potius adhiberem illud *I. squarrosæ*, quod magis certum utpote apud Linnæum descriptione etc. suffultum et ceterum non nisi paucis numeris ab altero distat.

× *I. adriatica*; hucusque solum in ins. Veglia et Pago lecta est.

7. *I. germanica*: Germ. bor. (pr. Potsdam, Oderberg) ex Geke; Galiz. dubia civis ex Knapp; Moldav. Dobrud. Bulgar. — *I. media*: Bosn. Maced. Ross. mer.-occ. (— *I. hybrida* Led.). — *I. præalta* Dmrt. fl. belg. ex GBeck. (Luxemb.). — ? *I. pseudogermanica* GBeck in act. ac. scient. vindob. XLIV. (1881). 299. Transs.(?); ex auct. est hybr. (= *I. germanica* + *I. salicina*).

× *I. crassinervis* Borb. in (oe. b. z. 1866 et) Engl. jahrb. 1887. *I. media* Borb. (1874) non MB. *I. transsilvanica* Kern. (1871). Borb. 1875 non Schur. (Banat. ad Orsova). — *I. media* Kiss 1880. *I. transsilvanica* GBeck 1881 ex Borb. (Hung. Transs.).

7. *a. I. hybrida* Bmg. enum. III. 132. (1816). *I. hybr. majoriflora* Borb. in magy. növ. lapok. 1883. - Transs. (et Hung.?). Vindob. m. Leopoldeb. (r.). Moldav. (Guebl. exs. 73 ex GBeck). Ross. mer.-occ. - Species valde vexata, cujus

historiam cl. Borbás plenissime exposuit in Engl. jahrb. 1887. 229—232. Comment. 166.

**I. pseudo-ensiformis* (Schur) Borb. l. c. 232. *I. hybrida* auct.: Csató in Bœnitz, hb. eur. 3361 (1878) ex Borbás; GBeck (Kern. exs. 245). *I. pseudo-ensifolia* Borb. in oe. bot. z. 1883. *I. valiensis* (rectius *vaaliensis*) Tauscher exs. 1871. - Transs. Hung. Galiz. Morav. Austr. p. d.

8. *I. ensifolia*: Bavar. (Moos pr. Degendorf), Carinth. (Unterloibl: Jaborn. 1886). Bosn. (: GBeck). Bulgar. Rumel. or. Dobrud. Moldav. Galiz. (: Knapp).

**I. hybrida*; hæc planta hybriditate quidem, ut vulgo admittitur, ab origine procreata sit, sed nunc qualitatibus speciei legitimæ gaudens, ut talis supra (7. a) proponitur.

9. *I. Oculus-Christi*: Styr. (rr.: *I. montana* Maly ex GBeck). Moldav. Dobrud. Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky, Skorpil). - Transs. a Bmg. indicata est sed "hodie ibi non nascitur" (Smk.).

10. *I. montana*; Helv. excl. (sec. Gremli). Transs. ad *I. hirtam* (4) pertineat.

Obs. *I. provincialis* L., in ej. Spec. Plant. post *I. montanam* descripta, quæ omnibus planta dubia (cfr. DC. prodr. V. 471, GBeck in act. vind. XLIV), non est hujus generis sed species mixta e genere *Senecionum*, scil. sec. cit. Bauh. = *S. uniflorus* All., sec. cit. Burser. (ex Dusén et Reuterman, qui hb. Burser., Upsalia servatum, nuper examinaverunt) = *S. lanatus* Scp., sed descr. et patria (Collioure) ad proximi *S. Doronici* varietatem vel subspeciem quamdam spectant.

11. *I. Britanica*: Fenn. mer.-or. (in Isthmo carel. a Malmberg detecta 1866). Roman.; Bulgar. nuper a Velenovsky et Skorpil lecta est (cum var. *microcephala* Vel.), Thrac. (Rumel. or.) plur. loc. (et var.) a Skorpil et Velenovsky; Thessal. (m. Ossa: Heldr. 1882).

14. *I. Conyza* (*I. vulgaris* Trevis.): Moldav. Dobrud. Bulgar.; etiam ad Lund Scaniae nuper lecta est (probab. introd.).

15. *I. suaveolens*; planta Jacq. (quæ solum e specim. cultis nota) hybr. dicitur ab *I. Conyza* et *I. Oculus-Christi*; hispanica probab. hybrida ab *I. montana* et *I. Conyza*; vid. GBeck, *Inulæ Europæ* in act. vindob. XLIV. 328—9. Comment. 167.

16. *I. bifrons*: Alpes-Marit. reg. mont. (Luceran, Venanson, Tenda etc.).

**I. glabra*: Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky); de hac subspecie cfr. ap. GBeck l. c. 333.

17. *I. candida*: Bosn. mer. (ad Jablonika: Blau ex GBeck); de hac specie vid. ap. GBeck l. c. 325—6 (ibi species tres sequentes huic tamquam varietates adscriptæ sunt).

**I. methanæa* Hsskt ms. (litt. 1889). Græc. pænins. Methana in saxosis (: Haussknecht).

20. *I. limonifolia*; in ins. Cerigo (olim Cythera) a Spreitzenhofer lecta est 1880 (Heldr. in oe. bot. z. eod. a.).

21. *I. crithmoides*: Istr. Croat. (Fiume in rupib. marit.: A-M.-Smith).

22. *I. viscosa*; Cephalon. (ins. jon.) in locis demissis, campis et olivetis ubique obviam venit et in vulnerib. sanandis adhibetur (ex Heldreich).

23. *I. revoluta*; ad speciem sequentem pertinet ex ipso auct. (Lk) ap. W. (observ. GBeck).

24. *I. graveolens*: Gall. etiam centr. (Cantal), bor.-occ. (pr. Pontorson dep. Manche). Cephalon. (ins. jon.) freq. locis cultis ex Heldr. - *Cupularia graveolens* G.G.

× *I. Csatói* Borb. = germanica + ensifolia. (Transs.: v. Csató).

× *I. hispida* Schur (*I. semicordata* var. Borb.) = cordata + hirta. (Transs.).

× *I. intermedia* JKern. = *Oculus-Christi* + *Conyza*. (Austr. p. d., Morav.).

× *I. litoralis* Borb. = ensifolia + squarrosa. (Croat.).

× *I. microcephala* Borb. = salicina + squarrosa. (Fiume).

× *I. Neidreichii* (GBeck sched.) Kern. = ensifolia-salicina Neir. (Baden Austr., Hung.).

× *I. stricta* Tsh = salicina + ensifolia. (Hung. Galiz.).

× *I. Vrabelyiana* Kern. (*I. Barthiana* Schur) = ensifolia + cordata. (Hung. Transs. etc.).

56. *Pulicaria*. 1. *P. odora*: Cephalon. ins. jon. (Heldreich).

2 * *P. uliginosa*; Istr. mer. (vid. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881. 381). Croat. (ex Hire 1883). Bosn. (Conrath teste Freyn).

3. *P. vulgaris*: Moldav. Dobrud. Bulgar.

4. *a. P. microcephala* Lge (in bolet. soc. broter. 1882); Daveau ib. 1883. 22; Magn. fl. sel. exs. 581. - Lusit. ins. Berlenga (a Daveau detecta 1879).

6. *P. sicula*; in convallibus quibusdam Mantuanis locis solo salso præditis a cl. Paglia lecta est.

57. *Jasonia*. 3. *J. glutinosa*: Mallorca Balear. (ad Soller: Barcelò).

58. *Evax*. 1. *a. E. contracta* Boiss. diagn. ser. I. 11. 3. Arch. turc. ins. Karpathos in olivetis (: Pichler).

2. *E. carpetana* (Magn. fl. sel. exs. 878): Lusit. (Portalegre prov. Alemtejo: Schmitz teste Rouy). Gall. mer.-occ. (dep. Char.-Infer.: *E. Cavanillesii* var. gallica Rouy).

**E. Cavanillesii* Rouy in Le Natural. 1884. 557. *E. exigua* DC. prodr. p. p.; Willk. Lge. Filago pygmæa Cav. (non L.). - Castil. (territ. Matrit.).

3. *E. pygmæa*: Cephalon. (locis aridis non rara: Heldr.). Corfù (: Spreitzenhofer).

5. *E. tenuifolia*; hab. etiam in ins. parva Linosa (a Lamped. non multum distante, ubi a Calcara lecta; sec. Lojacono non est hujus generis, sed Filago, quæ nominanda: Filago cossyrensis (Tin. hb.) Lojac. in Natural. sicil. 1884. 21 sep. (*).

6. *E. exigua*; exclud. synonym. Cav. et planta hisp.; hæc nunc *E. Cavanillesii* (2*) sistit.

7 * *E. nevadensis* (1875). *E. micropodioides* Willk. in prodr. fl. hisp. II. (1870) excl. synonym. Barrel. - S. Nevad. calcar. ad alt. 1700—2200 metr. (detecta a Willkomm 1844) et in agri Granat. collibus aridis (: Willk.).

59. *Micropus*. 1. *M. erectus*: Gall. bor.-or. (Nancy, Metz etc.). Alsat. Dobrud. (in desertis, montibus lapidosis, freq.: Ue.S.). Bulgar.

60. *Eupatorium*. 1. *E. cannabinum*; Fenn. adest in Carel. bor. et ladog., ut etiam in ins. Aland., sed non in Lapp.

**E. syriacum*; hab. etiam Hung. (Kazan) ex Borbás.

61. *Adenostyles*. 1. *A. viridis*: Alpes-Marit. (reg. alp.). Würtemb. (Adelegg pr. Isny). Moldav. Istr. (m. Maggiore) ex Hirc.

2. *A. albida*: Moldav. Bulgar. (Petrov-Han m. Balkan: Velen. 1887). - Transs. pertineat ad subspeciem:

**A. Kernerii* Smk. *Cacalia Alliarie* Kern. (non Gou.). *A. albifrons* auct. transs. (ex Smk.).

3. *A. orientalis*: Transs. (*A. hybrida* auct. transs. ex Smk.); e loco maced. (m. Peristeri, 7500') hæc species (planta speciosa) nunc edita est a Orphanides (exs. 1068).

4. *A. candidissima*: Alpes-Marit. - Transs. (ex Smk.) ad præced. refer.

5. *A. pyrenaica*; hab. etiam B.-Pyren. (silva Irati pr. Mendioc: Richter 1879); ex auctore (cfr. ej. Descr. icon. illustr. pl. hisp.) proxime affinis est *A. albidæ* (2), cujus vices in Pyren. gerit ex Bonnet.

63. *Petasites*. 1. *P. officinalis*: Suec. hab. (ad domos et pagos) etiam in med. Fenn. mer.-occ. Moldav. Bulgar. (: Bornm.). *P. giganteus* Fuss (ex Smk.). — *P. pratensis*; Arvern. etc., Delph.

2. *P. albus*; hab. etiam Moldav.

3. *P. niveus*: Alpes-Marit. (Tenda, alp. Fenestre). Würtemb. (pr. Aitrach). Styr. Bosn. (m. Vlasie: Brandis 1885 ex Freyn). Moldav. Ross. centr. (gub. Kursk ex Augustinovicz).

4. *P. spurius*: Moldav. (r.). Dobrud. (ad litora Ponti, raro: Ue.S.). - Transs. ad *P. officinal.* pertineat.

64. *Homogyne*. 2. *H. alpina*: Styr. Moldav. Bulgar. (m. Vitos, m. Osogovska Planina etc.).

3. *H. discolor*: hab. etiam Bavar. (Alpes or.).

65. *Tussilago*. 1. *T. Farfara*; etiam Sard. nunc (a Reverchon) lecta est.
66. *Calendula*. 6. *C. fulgida*: Ital. mer.-or. (*T. d'Otranto*: HGroves).
6. *a. C. ceratosperma* Viv. fl. lib. 59. Ins. Lampedusa (Lojacono 1884).
7. *C. stellata*: Calabr. or. (pr. Gerace: H.P.R. 1877). — ? *C. Crista galli* Viv. (Lampedusa: Lojacono).
7. *a. C. microphylla* Lge in (litt., sched. et) adnot. Henriq. ad enum. specierum a. 1880 a soc. broter. distrib. (bolet. soc. brot. 1883). - Lusit. litor. (delecta a Moller 1877).
8. *C. arvensis*: Thuring. (ex Geke). Galiz.; Helv. rr. (Basel, Biel) et inconstans dicitur.
**C. sublanata*; hab. etiam Tyrol. mer. (Porta 1878).
9 * *C. malacitana*; Lusit. adest: Lisboa (Daveau; Magn. fl. sel. exs. 1214), prov. Estremad. et Alemtejo (: Daveau). Hisp. valent. pr. Jativa leg. Rouy 1881.
Obs. *Arctotis acaulis* L., herba capensis e tribu *Calendulearum*, nunc (ex Goeze) in Lusit. mer. (a S. de Arrabida ad Algarbiam et a litore marino usque ad 20 milliar. internam versus) plagas arenosas omnes tegit.
67. *Echinops*. 1. *a. E. spinosus* L. mant. 119. - Ins. Lampedusa (: Calcara, Tineo, Lojacono).
2. *E. globifer*: Bulgar. in collibus pr. Knezevo et Bucina (: Velen. 1887).
3. *E. commutatus*; hab. etiam Galiz. — ? *E. setaceofimbriatus* (Andræ) Simonk. enum. 332. Transs. (parce: Andræ).
4. *E. banaticus*: Roman. Bulgar. (mult. loc.: Velenovsky).
5. *E. sphærocephalus*; Suec. etiam med. adv. (r.) adest, Helv. non nisi Vales. indig. dicitur, sed hinc inde introd. Roman. Bulgar. — *E. albidus* (Boiss. diagn. or. 1845) saltem subspecies sit; ex Velenovsky, qui eum in Bulgar. (in rupibus et asperis calcareis pr. Trnova, Konjavo etc.) legit, est species pulchra et facile distincta (act. soc. sc. boh. 1886).
6. *E. Ritro*: Bulgar. et Rumel. or. (Velenovsky). - Transs. (ex Smk.) pertineat ad subspeciem:
**E. ruthenicus*: Dobrud. (pres. in desertis: Ue.S.). *E. Ritro* auct. transs. *E. Rochelianus* Schur.
7. *E. microcephalus*: Thessal. (Heldreich 1882). Bulgar. in campis, arvis et secus vias ad Sofia, Kistendyl etc. a Velenovsky lecta est. Serbia (— ? *E. dumosus* Panc.) ex Boiss.
68. *Cardopatum*. 1. *C. corymbosum* (Heldr. hb. norm. 851): Thessal. (Heldr. 1882). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).
69. *Carlina*. 2. *C. acanthifolia*: Dobrud. (pr. Ciucarova, rr.: Ue.S.). Bulgar. Græc. bor. (Pind. Tymph.: Hausskn.); sec. Karo (1881) hæc species reperta est a Frl. Hempel pr. oppid. Helm gub. Lublin (Polon.) et etiam ex Schmalhausen in Ross. mer.-occ. adest (*C. Cynara* Bess?); Transs. dub. est ex Smk. (*C. transsilvanica* ad var. *C. acaulis* pertinet).
3. *C. Cynara*: Arvern. (puy-de-Côme: Lmtt.), m. Forez (: Le Grand.), Aude (DC.). - Timbal-Lagrange et Loret hanc speciem pleniss. illustraverunt in bull. soc. bot.
4. *C. acaulis*: Alpes-Marit. (reg. mont.). Gall. med. dep. Aube (Briard teste Le Grand). Moldav. Ross. mer.-occ. — *C. alpina* Jacq. (1762). (*C. caulescens* Lam. (1778). *C. grandiflora* Meh (1794).
**C. simplex*: Polon. (: Lapczynski). Carinth. Bosn. (: Hofmann, Brandis ex Freyn). - Transs. pertinet ad var. speciei (*C. alpina* Jacq.) ex Smk.
6. *C. lanata*; in Istr. p. d. vix adest.
9. *a. C. acanthophylla* Hsskt ms. (litt. 1889). Græc. bor. (m. Pelion, Pindi m. Batu: Haussknecht).
13. *C. vulgaris*: Dan. (in incultis non rara). Fenn. mer. Moldav. Dobrud. Eurytan. m. Chelidoni (: Heldreich) ex Boiss. — *C. Biebersteinii*: Ross. mer. gub.

Cherson. — *C. intermedia*: Austr. p. d. ex Richter et probab. alibi (*C. nebrodensis* auct. transs. ex Smk.). — *C. orophila* Lmtt. plat. centr. 1881. (Arvern. mont. altior.).

**C. longifolia*: Helv. (alp. Vaudens. et Bernens., rarius). Bavar. (Höfats Alpium algov.). Austr.-Infer. (subalp. m. Schneeberg; cfr. ap. Richter in act. soc. z.-b. vind. 1887). Rumel. or. - Transs. ad *C. intermediam* (var. speciei) pertinet ex Smk.

72. *Xeranthemum*. 1. *X. annuum*: Dobrud. (Ue.S., Jka). Valach. (pr. Virciorova). Bulgar.

3. *X. cylindraceum*: Dobrud. (Ue.S., Jka et al.). Bulgar.

3. *a. X. cretense* Reverch. exs. a. 1884. - Creta (m. Volokia).

73. *Arctium*. 1. *A. tomentosum*; exc. etiam Fenn. bor. et med. plur. Norv. mer. r. (Christiania etc.) lectum est.

**A. pubens* Bab. (in Consp. sub *A. nemor. allatum*). Lappa pubens Bor. centr. *A. tomentosum* auct. gall. plur. (ex Lmtt.).

2. *A. majus*; Fenn. mer. adest (in isthmo carel. a Malmberg detectum 1866).

3. *A. nemorosum* (1813). *A. intermedium* (1843): Suec. med. Siles. (: Fiek). Hung. (: Simkov.). Ross. mer.-occ.; in Germ. mer. et mer.-occ. (ex Gcke) rarum: Würtemb. (schwäb. Alp.), Badia (plagæ lacus Bodanus).

4. *A. minus*; exc. etiam Fenn. bor., sed Sard. adest (a Reverchon lectum). — *A. conglomeratum*: Hung. teste Smk., sed ex eodem non nisi statum juvenilem speciei sistit.

× *A. ambiguum* (Celak.) = *majus* + *tomentosum*. (Bohem. Transs.).

× *A. mixtum* (Smk.) = *minus* + *tomentosum*. (Hung. Transs.).

× *A. subracemosum* (Smk.) = *majus* + *minus*. (Transs.).

74. *Cousinia*. 1. *a. C. bulgarica* CKoch (1851). Dobrud. (in margaceis ad Danubium: CKoch).

75. *Onopordon*. 1. *O. Acanthium*; adest in Græc. bor. (Thessal: Hausskn.).

2. *O. tauricum*: Dobrud. (in desertis freq.: Ue.S.). Bulgar.

**O. corymbosum*: Puerto de Lumbreras, la Rambla (Rouy 1881).

**O. elatum*: Græc. pænins. Methana (: Haussknecht); bona species est sec. Hsskt.

3. *O. illyricum*: Cephalon. ins. jon. (: Heldreich). — *O. horridum*; in Thessal. lectum a cl. Haussknecht (1885); ex eo immerito cum *O. illyrico* junctum est.

3. *a. O. Ilex* Jka descr. pl. nov. 2. (1878). Maced. pænins. Chalcidice pr. Hierisso (: Janka).

76. *Cynara*. 1. *C. Cardunculus*: Cephalon. ins. jon. (Heldr.).

77. *Bourgæa*. 1. *B. humilis*; hab. etiam in Balear. (ex Barceló).

79. *Chamæpeuce*. 2. *Ch. gnaphalodes* (Ch. Alpini Jaub. Sp.): Corcyra ins. jon. (Letourn.). Maced. m. Athos, in rupibus marit. (: Pichler).

3. *Ch. mutica*: Cephalon. ins. jon., in rupibus maritimis: Heldreich.

4. *Ch. Casabonæ*: Lusit. (Queluz pr. Lisboa): Daveau ex Rouy in bull. soc. bot. 1886.

6. *Ch. stricta*: Bosu. mer. (ad Papraska): Blau teste GBeck.

8. *Ch. afra*: Bulgar. in declivit. mer. m. Balkan et in calcareis pr. Dragalevce etc. (Velenovsky 1885, 1887). Thessal. m. Pelion (Heldreich 1882).

80. *Notobasis*. 1. *N. syriaca*: Balear. Attica (pr. Athenas cop.: Lacaita).

81. *Picnomon*. 1. *P. Acarna*: Bulgar. (Varna, Razgrad, Konjavo etc.: Velenovsky).

82. *Cirsium*. 1. *C. fimbriatum*; planta Schur. est var. speciei seq. ex Smk.

2. *C. ciliatum*; typicum in Transs. deest ex Smk. — *C. transsilvanicum*: Galiz. (Knapp 1872). Moldav. Comment. 168.
3. *C. serrulatum*; hab. etiam in Serbia (ex Boiss.).
5. *C. eriophorum*: Moldav. Ross. med. (centr. et or.). Germ. bor.-occ. (ex Geke) usque ad Werningerode (Hercyn.) et Asse (Brunsvic.) progreditur.
 **C. spathulatum*: Helv. mer. (cant. Ticino). Comment. 169.
 **C. Richterianum* Gillot (1880); Magnier fl. sel. exs. 883. - Basses-Pyren. pr. St-Jean-Pied-de-Port; cfr. ap. Rouy in Le Natural. 1886.
5. *a. C. albidum* Velen. in diar. soc. sc. boh. 1888. 53 (sep.). Bulgar. pr. Kutlovica et Lom Palanka (Velenovsky 1887).
6. *C. odontolepis*: Gall. mer. mts Corbar. ad St-Antoine-de-Galamus. Thrac. in campis montanis inter Sinaia et Ploiesti (: Janka). Thessal. m. Pelion (Heldreich 1882).
6. *a. C. armatum* Velen. in diar. soc. sc. boh. 1888. 52 (sep.). Bulgar. mont. (Balkan, Vitos etc. in pratis et pascuis alpinis: Velenovsky 1887).
7. *C. ligulare*: Bulgar. (pr. Knezevo: Velenovsky 1887).
10. *C. morinæfolium*; — ? *C. vallis demonis* Lojac. (*C. Lobelii* Tin.). Sicil. (: Lojacono). Calabr. (Serra S. Bruno: Zwierlein).
11. *C. laniflorum*; — *C. leucophanum* pertinet ad *C. nemorale* (20—) ex Smk.
12. *C. echinatum*: Gall. mer. mts Corbar. (ad St-Antoine-de-Galamus). Sicil. mts Nebrod. (versus Polizzi: Lojacono); a Gussone in Etna indicatum erat.
12. *a. C. Willkommianum* Porta. Rigo pl. balear. exs. a. 1885. 153; Willk. ill. hisp. II. 19. (1886). - Mallorca, in reg. mont. (Willkomm 1873), Puig Mayor de Torrellas (Porta. Rigo 1885).
16. *C. ferox*; ad hoc cl. Lacaita observavit (litt. 1883): num re vera in Ital. bor. proveniat?, nonne specimina italica omnia ad *C. Morisianum* Rehb. (sequens) referenda?; hoc propter defectum speciminum authenticorum botanicis ital. ignotum, ab eis *C. ferox* nominatur. Comment. 170.
20. *C. lanceolatum*; exc. etiam Norv. bor. (Nordl., Finnm.) et Fenn. bor. plur. — *C. Drejeri* ex Lge (haandb. 1886) lectum est in Jutlandia (nec in Möen).
 × *C. gracile* est varietas speciei (nec hybr.); cfr. seq.
21. *C. microcephalum*; nunc etiam Dan. (r.) lectum est, sed ex ipso auct. (haandb. ed. IV. 363) est solum varietas speciei præced. (= *C. lanceolatum* var. *microcephal.* Lge. *C. lanceol.* var. *gracile* Rostr. 1864).
22. *C. crinitum*: Herault (: Loret). Pyren. or. (P.-Vendres: Rouy 1878).
 **C. balearicum* Willk. ill. hisp. II. 20. (1886) in obs. *C. crinitum catalaunicum*? Willk. index balear. - Balear. (*C. italicum* Barc. apunt. ex ipso).
23. *C. italicum*: Cephalon. ins. jon. (Heldr.).
24. *C. cynaroides*: Ins. Jon. (Cephalon.): Heldr.; Zante: Letourn.).
25. *C. heterophyllum*: Dan. (pres. pæנים. or.). Fenn. Moldav. - Bavar. adest etiam in jugo mont. Bayr.-Wald et Fichtelgeb.; Helv. non nisi in Alpibus.
 × *C. affine*: Siles. (mähr. Gesenke). — *C. Mielihoferi*; *C. Pacheri* Sz bip. in litt. (Carinth. rr.: Pacher).
26. *C. acaule*: Carinth. Morav. (pr. Wsetin: Bubela 1885). Ross. med. (r.); in balt. sporadice ex Klinge.
 × *C. rigens*; hab. etiam in Gall. or. (Côte-d'Or).
30. *C. tuberosum*: Bavar. Würtemb. - Transs. ad *C. canum* (55) pertinet ex Smk.
 × *C. medium*; hab. etiam in Gall. or. (Côte-d'Or).
31. *C. filipendulum*; hab. etiam Gall.: Landes mer. (: Foucaud), Basses-Pyren. (: Richter; Magnier fl. sel. exs. 587). *C. alpestre* Dur. ex Rouy.
32. *C. montanum*; planta transsilv. (Bmg.) pertinet ad *C. rivulare* (34) ex Smk. Comment. 171.
 **C. Portæ*; *C. Linkianum* Löhr (ex Kern.). Comment. 172.
33. *C. appendiculatum*: Bulgar. m. Vitos et Osogov.-Planina, ad rivulos

(: Velenovsky). Thessal. (Pind. tymph.: Hausskn.). Phthiotidis m. Oeta, 4500—6000' (: Pichler)

34. *C. rivulare*: Ceven. (Lozère). Moldav. Bosn. (Crnivrh: Brandis 1885 ex Freyn).

34. *a. C. Allionii* Thuret in Ardoino fl. alp. marit. 200. *C. pyrenaicum* All. ped. - Alpes-Marit. (reg. alp. et mont. in pratis humidis).

35. *C. pauciflorum*: Sty. Carinth. (rr.: Jabornegg). Moldav.

36. *C. Erisithales*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.). Ross. mer., balt. (Curland.: Klinge). Polon. (pr. Żabkowice a GSchneider 1879 detectum ex Fiek). Moldav.

38. *C. candelabrum*: Bulgar. Thessal. (Pelion, Ossa: Heldr. 1882).

39. *C. spinosissimum*: Helv. (Alpes). Bavar. (Alpes). - Transs. deest ex Smk.

41. *a. C. pindicolum* Hsskn. ms. (litt. 1889). Græc. bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht).

44. *C. carniolicum*; hab. etiam Sty. (ex Maly).

45. *C. oleraceum*: Fenn. mer.-occ. (Aland.), mer.-or. Moldav.

× *C. Lachenalii*; etiam Gall. or. (Côte-d'Or) lectum est.

× *C. Thomasii*; etiam Tyrol. lectum (: Gremblach 1880).

46. *C. palustre*; exc. etiam Lapp. plur. (non nisi in max. mer. lectum est). — *C. brachycephalum* Barth ex Smk. (Transs.).

× *C. silesiacum*; *C. Wimmeri* Celak. (1871) non Sz bip.

47. *C. brachycephalum*; — *C. pseudopalustre* Schur (Transs.) certe huc pertinet ex Smk.!

49. *C. elodes*; — ? *C. viride* Velen. in act. soc. boh. 1885. sep. 23 (*). Bulgar. in paludosis lacūs Devno pr. Varna (: Velenovsky 1885).

51. *C. pannonicum*: Hetr. alp. apuan. supra Forno (: Duthie). Dobrud. in pratis silvat., desertis, freq. (: Ue.S.). Bulgar. — *C. pseudo-oleraceum* pertinet ad *C. tataricum* (55×) ex Smk.!

51. *a. C. heterotrichum* Panc. elem. bulg. 42. - Thrac. m. Rilo (: Panic). Bulgar. ad rivulos alpinos m. Vitos (: Velenovsky).

55. *C. canum*: Bavar. (r.). Carinth. (rr.). Moldav. Dobrud. Bulgar. Norv. (in Romsdalen) a Lindblom lectum 1839, sed recentius ibi non observatum videtur (cfr. ABlytt norg. fl. 596). — *C. pungens* Schur est hybr. (= canum + furiens) ex Smk.

× *C. tataricum*; — *C. pseudo-oleraceum* Schur, in Consp. sub 51 cum dubio allatum, huc pertinet ex Smk.

57. *C. siculum*: Bulgar. Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882). Comment. 173.

**C. polyanthos*: Bulgar. *C. creticum* Velen. 1886 (cfr. Bornm. in bot. centralbl. 1888). *C. Hippolyti* Boiss. (Heldr. hb. norm. 946).

58. *C. polyanthemum*: Linnæus clare (in Mant. Plant.) descripsit *Carduum polyanthemum* suum, addens plantam similem esse *C. crispum*, sed foliis glabrioribus gaudere, et Romæ habitare.

59. *a. C. tymphaeum*, Hsskt ms. (litt. 1889). Græc. bor. (Pindus tymph. Haussknecht).

60. *C. nevadense*; sec. Winkler est hybr. et = *Flavispina* (59) + *gregarium* (27).

61. *C. arvense*; exc. etiam Lapp. (saltem plur.).

× *C. Aschersonii* Celak. = *tuberosum* + *canum*. (Bohem. pr. Loucen).

× *C. benacense* Treunf. = *carniolicum* + *erisithales*. (Garda etc.).

× *C. Borbasii* Freyn. = *brachycephalum* + *canum*. (Hung.).

× *C. csepeliense* Borb. = *arvense* + *lanceolatum*. (Hung.).

× *C. Haynaldi* Borb. = *canum* + *palustre*. (Hung.).

× *C. hemipterum* Borb. = *pannicum* + *palustre*. (Istr.).

× *C. Huteri* Hsm. = *palustre* + *erisithales*. (Tyrol.).

× *C. intermedium* Borb. = *eriphorum* + *lanceolatum*.

× *C. ledrense* Porta (exs.) = *montanum* + *spinosissimum*. (Tyrol. mer.).

- ✕ *C. nolitangere* Borb. = *eriphorum* + *lanceolatum*. (Istr.).
 ✕ *C. Prantlii* Grembl. = *tuberosum* + *arvense*. (Bavar.).
 ✕ *C. Reichardtii* Jur. = *pauciflorum* + *palustre*. (Vellach Carinth.).
 ✕ *C. rubrum* Porta (exs.) = ? *pannonicum* + *erisithales*. (Tyrol. mer.).
 ✕ *C. spinifolium* Beck = *spinosissimum* + *palustre*. (Oberöstr.).

84. *Carduus*. 1. *C. nutans*; — *C. Thoermeri*: Ross. mer. — ? *C. leiophyllus* Petrov. (1887). Serb. Bulgar. (Velen. et al.); species eximia est sec. Bornmüller (1888).

**C. platylepis*: Helv. (Chur, Engadin: Brügger). Bavar. (r.).

2. *C. platypus*; in Lge. descr. icon. illustr. pl. hisp. descriptus et depictus est.

**C. granatensis*: Valenc. (Rouy 1881).

4. *C. chrysacanthus*: Istr. (cl. Freyn, qui in ins. Orisieri et Lussin hanc plantam primus legit)

6. *C. carlinæfolius*: Alpes-Marit. (St-Martin-Lant., val de Jallorgues etc.); planta Schur. (Transs.) ad *C. viridem* (10 *) pertineat.

9. *C. arctioides*: Styr. (rarius). Bulgar. (sub cacum. m. Kom: Velen. 1887). - Helv. (mer.), ubi a variis indicatus, deest ex Gremli. - Transs. ad *C. Kernerii* (9. a) pertinet ex Smk.

**C. alpestris*: Bosn. (Brandis teste Freyn.). - Transs. ad seq. (9. a) pertinet ex Smk. et sec. Vukot. species solum in Croat. provenit.

9. a. *C. Kernerii* Smk. in term. füzet. 1886. *C. nigrescens* et *C. arctioides* Bmg. et auct. transs. *C. alpestris* Schur et auct. transs. (non W.K.). - Transs.

10. *C. defloratus*: Alsat. Hassia. - Transs. ad subspec. *C. glaucus* et *C. viridis* pertinet ex Smk. - Comment. 174. — *C. rhaeticus* (DC. ut var.) Kern. sched. exs. a. 1881. *C. carlinæfolius* Gaud. non Lam. (Helv. mer., Tyrol.).

**C. glaucus* (anthodio bene distinctus est a specie); Hung. et Transs. (*C. defloratus* Schur) vulgatus, occid. versus usque ad Vindob. et Graciam (Graz) progreditur. — *C. summanus*: Helv. mer. (cant. Ticino).

**C. viridis* Kern. sched. exs. a. 1881. *C. defloratus* W. enum., Whlhb. helv. (et auct. plur. p. p.). Bavar. Tyrol. Helv. — *C. carlinæfolius* Schur. (Transs.).

11. *C. Personata*: Moldav. Iulgar. — *C. pseudocrispus* Schur (ex Smk.).

12. *C. cronius*: Aetol. m. Velucho, inter 5500 et 7000' (Heldr.).

13. *C. nigrescens*: Gall. dep. Loire, in glareosis flum. ejusd. nom. (JHer-vier). Mallorca Balear. (ex Barceló apunt.).

16. *C. hamulosus*: Moldav. Dobrud. (copiose: Ue.S.). Bulgar. Græc. bor. (Pind. dolop.: Hausskn.). Ross. centr. (gub. Kursk). - Gall. mer. ad var. (nunc subspec.) *C. spinigerum* refer.; Helv. excl. ex Gremli. — *C. nigrescens* Jka.

**C. spinigerus* Jord. *C. hamulosus* auct. gall. plur. - Gall. mer. Lusit. (Coimbra: *C. nigrescens* Moell. ex Rouy).

18. *C. acanthoides*: Roman. Bulgar. - Helv. (ex Gremli) dubie vel saltem rr. adest.

19. *C. camporum*: Dobrud. (pr. Küstendje).

21 * *C. agrestis* Kern. sched. in Bænitz hb. eur. (1878). Alp. Tyrol. etc.

22. *C. candicans* (*C. cinereus* Jka ex Smk.): Valach. pr. Virciorova (: Borbás). Bulgar. - Galic. dubitat Knapp. — *C. collinus* (potius subspecies est): Styr. (pr. Cilli ex Maly). Istr. Bulgar.; Transs. deest nam (ex Smk.) *C. collinus* auct. transsylv. est *C. candicans* ipsis.

**C. brachycephalus* est (sec. Smk.) mera var. *C. crispus* et minime hybr.

33 * *C. congestus*; hab. etiam Sard. (ex Gennari).

38. *C. pycnocephalus*: Helv. (pr. Genevam).

**C. pseudosyrriacus* Lojac. in natural. sicil. 1884. 22 sep. (*). *C. pycnocephalus* var. *lapodusanus* Arcang. - Lamped., Melita (ex Lojac.).

39. *C. tenuiflorus*: Cors. (Bastia: EPetit 1883). - Helv. solum Genevæ lectus est.

41. *C. acicularis*: Thessal., in planitie (: Haussknecht).

✕ *C. Amsteinii* Brügg. = *multiflorus* + *defloratus*. (Helv.).

✕ *C. Aschersonianus* Ruhmer = *acanthoides* + *crispus*. (Germ., Austr.).

- × *C. bihariensis* Smk. = *acanthoides* + *candicans*. (Hung.).
 × *C. Brunneri* Döll = *nutans* + *defloratus*. (Germ., Austr.).
 × *C. Caflischii* Brügg. = *multiflorus* + *nutans*. (Helv.).
 × *C. cirsiformis* Vuk. = *alpestris* + *Cirsium eristhales*. (Croat.).
 × *C. Killiasii* Brügg. = *multiflorus* + *platylepis*. (Engadin).
 × *C. litoralis* Borb. = *candicans* + *nutans*. (Croat.).
 × *C. Polii* Brügg. = *defloratus* + *platylepis*. (Helv.).
 × *C. pseudo-hamulosus* Schur = *hamulosus* + *acanthoides*. (Transs. etc.).
 × *C. Schulzeanus* Ruhmer = *acanthoides* + *defloratus*. (Austr.).
 × *C. umbrosus* Smk. = *candicans* + *crispus*. (Transs.).

85. **Tyrimnus**. 1. *T. leucographus*: Sard. (ex Reverchon). Valenc. (Rouy 1881). Mallorca Balear. (ex Barceló). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).

86. **Saussurea**. 4. *S. alpina*: Ross. balt. (in pratis turfosis, r, ex Klinge; forse hæc ad var. pertinet). Fenn. non nisi in bor. (cum Lapp.) et or. (Carel.) lecta est. Suec. etiam in mer.-occ. (paroc. Gäladere Vestrog.: ONordstedt). Bavar. (Alpes algov.). Helv. hab. solum in Alpibus. - Pyren. (*S. macrophylla* G.G.): Loret in bull. soc. bot. 1880. 274 (*). — *S. esthonica* Baer (CAMey.). *S. alpina* var. *glabra* Led. (Esthon.).

**S. macrophylla*: Galiz. (Giewont) ex Fritze. Carinth. (r.: Jabornegg, Pacher).

**S. depressa*: Sabaud. (alp. Mauriennes: Chabert). Alpes-Marit. (reg. alp. ad cacumen col de Jallorgues: Bornet). Carinth.

6. *S. pygmæa*; hab. etiam Bavar. (Alpes).

87. **Jurinea**. 7. *J. mollis*: Galiz. or. Moldav. Ross. centr. (gub. Kursk), mer. (Cherson). Dobrud. (freqq.: Ue.S., Jka). Bulgar. - Transs. pertinet ad subspeciem:

**J. transsilvanica* Simonk. enum. 344. (1886). *Jurinea Ledebourii* Jka et *J. cyanoides* Schur ex Smk. *Serratula transsilvanica* Spr.

8. *J. macrocalathia*: Bosn. (Kajabasa: Brandis ex Freyn).

8. *a. J. bulgarica* Velen. in diar. soc. sc. boh. 1881. 51 (sep.). Bulgar. in collibus dumosis pr. Razgrad (: Velenovsky 1885). - Hæc et prox. anteced. species ad sectionem præced. propius accedunt.

10. *J. cyanoides*; hab. etiam Bavar. - Transs. ad *J. transsilv.* (7 *) pertinet ex Smk.

12. *J. arachnoidea*; *J. Roegnieri* CKoch. — *J. Ledebourii*; Transs. ad *J. transsilv.* (7 *) pertinet ex Smk. — *J. pluriceps* CKoch (1851) ex Kern. (Dobrud.: CKoch).

14. *J. humilis*; Gall. mer. etiam m. Corbar. (: Gautier), dep. Aveyron, dep. Gard (Campestre pr. Alzon); sec. Lmtt.

**J. pyrenaica*: Gall. mer. dep. Herault (in collibus aridis ad Sorbs: Martin ex Loret).

88. **Amphoricarpus**. 1. *A. Neumayeri* (*Xeranthemum Neumayeri* Bail 1880): Bosn. (m. Vlasic: Brandis 1885). - Hoc genus, ex obs. Griseb., a *Serratula* parum diversum est, sed a *Jurinea* magis recedit.

89. **Berardia**. 1. *B. subacaulis*: Alpes-Marit. (reg. alp., r.).

90. **Leuzea**. 1. *L. salina*: Dobrud. (reg. litor. passim: Ue.S.). Ross. mer.-occ. (: Schmalhausen), mer. (Woznessensk gub. Cherson ex Rehmann).

2. *L. rhaponticoides*; detecta a Graëlls (1851?) in Sierra de Gredos.

91. **Rhaponticum**. 1. *R. scariosum*: Alpes-Marit. reg. alp. (Rio-Freddo supra Tenda: All., Ste-Anne-de-Vinai: Ardoino).

93. **Serratula**. 1. *S. coronata*: Ross. or. (Nischn.-Nowg., Simbirsk), mer., mer.-occ.

2. *S. tinctoria*: Roman. Bulgar. — ? *S. isophylla* Claus. (Ross. or. tract. volg.; Becker et al.).

3. *S. macrocephala*; — *S. monticola*, *S. tinctoria* var. *alpina* G.G. (Arvern., Ceven.), ex observ. Lmtt. (cfr. prodr. fl. plat. centr. 442) orta est in statione

altiore a *S. tinctoria* ideoque ad illam pertinet; idem de — *S. Vulpii* (quæ etiam in Helv. provenit) valet ex Gremli.

4. *S. radiata*; hab. etiam Ross. centr. (gub. Kursk).

5. *S. heterophylla*; indicatur etiam in montanis circ. Grasse (Gall. mer.). Galiz. or. (rr.).

8. *S. glauca*; Transs. "certe non nascitur": Simonk.

9. *S. nudicaulis*: Alpes-Marit. (reg. alp., r.); Occitan. hab. etiam in Lozère (r.), Alarie m. Corbar.

94. **Amberboa**. 2. *A. Lippii*: Ins. Linosa (locis herbosis copiose: v. Zwierlein): var. *subdiscolor* Lojac. in natural. sicil. 1884. 22 sep. (*).

95. **Phæopappus**. 1. *P. trinervius*: Moldav. — *P. inuloides* est species propria, a *P. trinervio* diversa, ex Boiss. (fl. or. suppl. 312).

97. **Carduncellus**. 1. *C. coeruleus*: Cephalon. ins. jon. (Heldr.).

**C. hispanicus*; — *C. danius* Webb iter hisp. 33; hæc planta rariss. et "inter hispanicas pulcherrimas" a *C. hispanica* aliena est et speciem omnino propriam sistit ex Rouy (in bull. soc. bot. 1884); hab. in rupibus abruptis montis Mongo pr. Deniam, ubi post Webbium cl. Rouy eam legit 1883 (vid. Rouy l. c. 13 et 41).

98. **Carthamus**. 3. *C. lanatus*: Gall. bor.-occ. Roman. Bulgar.

5. *C. glaucus*: Amorgos Cyclad. (: Heldreich). Creta (: Weiss). Rhodus (: Pichler). — *C. creticus*; *C. lanatus* Sieb. exs. cret. p.p. (altera pars est *Carduncellus*) ex Celak.

7. *C. dentatus*; *C. ruber* Lk in linn. 1830. *C. creticus* Sieb. exs. (Creta etc.).

101. **Chartolepis**. 1. *C. intermedia*; hab. etiam Ross. mer.-occ.

102. **Centaurea**. 5. *C. ruthenica*: Moldav. (mont. Prahov: l. b. Mus-tazza in litt. ad Janka ex Kanitz). Galiz. non adest teste Knapp. — *C. ruthenica* Bmg., Jka, ad *Serratula Wolffii* André (quæ var. *S. coronate*) pertinet ex Smk.

8 * *C. margaritacea*: Bulgar. (vid. ap. Bornmüller in centralbl. 1888).

9. *C. alba*: Ross. mer., mer.-occ.; planta serbica ad *C. sterilem* (11) pertinet ex Velen. teste Bornm.

**C. deusta*: Bosn. mer. (in rupibus ad Konjica: GBeck). Cephalon. ins. jon. (: Letourneux). — *C. princeps* (bona species ex Hausskn.): Thessal. (Haussknecht). — *C. deusta* varr. duas memorabiles e *Japgyia* (T. d'Otranto) descripsit HGroves in linn. soc. journ. 1885. 534 —5 et (cum ic.) in giorn. bot. ital. 1887. 162. 163 (*), sc. var. *tenacissima* (rupes pr. Gallipoli) et var. *nobilis* (Montagna d'Oro pr. Otranto).

11. *C. sterilis*; — *C. Gerberi* Stev. 1856. (Ross. mer.-or.).

12. *C. subciliaris*; hab. in reg. media m. Oeni (Aeni) nec non in reg. abietina montis dicti et m. Rhædi (: Heldreich).

17. *C. amara*: Carinth. (rarius: Jaborn., Pach.), Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.). Græc. bor. (Pindus dolop.: Hausskn.). — *C. Weldeniana*; *C. amara* Pett. dalm. exs. 85. *C. Jacea* var. *amara* Vis. — *C. Gaudini*: Hung. (ex Smk. 1889).

18. *C. dracunculifolia*; etiam in Gall. nunc lecta: dep. Pyren. or. in sabulosis ad Salces (: Guillon ex Rouy 1886).

19. *C. Jacea*: Fenn. (exc. bor.). Moldav. Bulgar. (: Bornmüller). — *C. Duboisii*; inter *C. amaram* et *C. Jaceam* media ex Lmtt. — *C. consimilis* a *C. obscura* (21—) vix diversa dicitur.

20. *C. nigrescens*: Bosn. (: GBeck). Bulgar. m. Balkan et Vitos (: Velen.). Phthiotidis m. Oeta (: Heldr.). — *C. Kochii*; *C. nigrescens* Rehb. exs., G.G., FSz hb. 467. (Germ., Gall.); sec. Kerner, qui historiam nomenclaturæ plenam et criticam dedit in schedis ad exs. a. 1881 edita. — ? *C. livonica* Weinm. (ex Led.). — *C. Nouelii* Franch. 1881. Ilette pr. Vendôme dep. Loire-et-Cher (similis dicitur *C. pratensi* Th., sed hybrida proles).

**C. serotina* (*C. amara* FSz); in prov. rhen. (Kreuznach) copiosa ex Geissenheiner.

**C. vochinensis*: Carinth. (r.: Welw., Pacher). Hung. (sec. Kerner). Austr.-Infer. (ex Halacsy et Braun).

21. *C. nigra*: Würtemb. Bohem. (pr. Eger ex Celak. 1885). Dan. (et Germ.

bor.) inquil. rara, Norv. paullo ultra lat. 64^o progreditur (ex Norman). — *C. nemoralis*; Magn. fl. sel. exs. 89. *C. nigra* Bor. — *C. Endressi*; *C. coronata* Lamy in compt. rend. d. congr. 1865; hab. etiam Arvern. (Mont-Dore); ex Lmtt. medium tenet inter *C. pratensem* Th. et var. seq. *C. obscuram* Jord. — *C. obscura* (*C. nigra* Jord. pug.); hab. etiam Gall. centr.

**C. microptilon*: Carinth. (rarius: Pacher). Transs. ad — *C. indurata* pertinet (ex Smk.).
**C. salicifolia*: Transs. nunc plur. loc. lecta est.

22. *C. conglomerata*; hab. etiam Ross. mer. (gub. Cherson).

24. *C. nervosa* (*C. plumosa* Lam. 1793): Alpes-Marit. (Maden. delle Fene-stre). Helv. solum in Alpibus. — Carinth. Moldav. Bulgar. — *C. ambigua*; *C. Thomasiana* Grml. (Helv.). — *C. carpatica* Porc. ex Smk. — *C. flosculosa* ad subspiciem pertineat.

**C. Ferdinandi*: Alpes-Marit. (Colmiane, vall. Nanduebis; la Briga).

27. *C. phrygia* (cfr. 28 * *C. stenolepis*); Helv. hab. in sola mer. (Engadin Bundiæ). Transs. ad speciem seq. pertinet ex Smk. *C. pseudophrygia* CAmey. in Rupr. hist. stirp. petrop. (in beitr. etc. 1845 et in bull. ac. sc. 1848). — *C. rhætica* ad *C. cirratam* (28*) pertinet ex Kern.

28. *C. austriaca*: Poson. (Annaberg). Ross. balt. (: Klinge). — Fenn. bor. plur. deest. Morav. vix adest teste Oborny.

**C. cirrata* Rchb. exc. 1830 (non exs.). *C. rhætica* Moritz graub. (1838). *C. pectinata* All., Balb. (non L.). — Pedem. Sabaud. (: Chabert). Helv. mer. Lomb. Tyrol.

**C. stenolepis* Kern. in oe. bot. z. 1872. *C. cirrata* Rchb. exs. (non exc.). *C. austriaca* Sadl. *C. phrygia* fl. croat. — Moldav. Austr. Hung. Banat. Croat. Bulgar. Ital. centr. (etc.). — ? *C. razgradensis* Velen. in act. soc. sc. boh. 1886. (Bulgar. pr. Kalova: Velenovsky 1885).

29. *C. pectinata*: Gall. dep. Loire (: Fourreau, Le Grand). — *C. fuscata*: Gall. centr. — *C. comata*: Gall. centr. — *C. rufescens*; Gall. centr., mer. (Cevenn.).

31. *C. procumbens*: Alpes-Marit. reg. mont. (Levens, Tourette, Utelle etc.).

32. *C. trichocephala*; hab. etiam Moldav.

35. *C. Janerii*; hæc species detecta est a plantar. collect. Isern in Sierra de Gredos (1855).

37. *C. Marschalliana*: Dobrud. in montib. calcareis ad Zybil, r. (: Ue.Sint.).

38. *C. sempervirens*; *Ptosimopappus sempervirens* Boiss.

39. *C. intybacea*; hab. etiam in Mallorca Balear. (: Barcelò).

40. *C. uliginosa*; *Ptosimopappus uliginosus* Boiss.

41. *C. montana*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.). Moldav. Bosn. (Brandis ex Freyn). — Batav. pr. Diepenheim (in silva quadam abunde lecta a van der Veen 1880). Dan. plur. loc. (e cultura in hortis) quasi spontanea lecta est. — *C. mollis*; *C. montana* Jacq. — *C. intermedia* Cariot; Magn. fl. sel. exs. 1223, scriu. (V) 102. Gall.

42. *C. axillaris*: Alpes-Marit. (reg. alp.). Helv. hab. solam mer. Bulgar. et Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.). Ross. mer.-occ. Moldav. — *C. pinnatifida* certe huc pertinet teste Smk. (*C. seuseana* auct. transs.).

43 * *C. cana*: Rumel. or. Bulgar. (*C. variegata* Velen. ant. ex ipso).

45. *C. napulifera*: Bulgar. (Balkan Slivenens.: Skorpil ex Velen.).

47. *C. Cyanus*: Dan. (ibi inter segetes "hiemales" lolium freq.). Fenn. Moldav. Dobrud. (in montibus lapidosis, rarius; inter segetes non visa: Ue.S.). Bulgar. Ins. Jon. (Ithaca: Spreitzenh. 1877).

49. *C. Scabiosa*: Moldav. Bulgar.; Fenn. bor. plur. deest. Transs. ad (—) *C. spinulosam* pertinet ex Smk. — *C. coriacea* potius subspecies est. — *C. badensis* (cfr. Kern. in oe. bot. z. 1874); Austr. p. d., ubi locus class. est Baden Vin-dob. — *C. spinulosa* videtur propior *C. stereophyllæ* (54) et heic sub ea militat.

**C. alpestris* (1840). *C. fuliginosa* (1842); Bavar. (Alpes algov.); indicatur etiam Galiz.

51. *C. Sadleriana* (cfr. Janka in oe. bot. z. 1876); hab. in Hung. centr., ubi a Pesthino fere usque ad Gyöngövos et fluv. Theiss distrib.; unica species quæ Hungarie endemica (*C. hungarica* Kern. ined.). Comment. 175.

54. *C. stereophylla*: Dobrud. (in arvis et desertis haud rara: Ue.S.). Bulgar. Rumel. or. (: Velen.). Transs. pr. St-Gothard (: Janka; "subspont. facta": Smk.),

sed species auct. transs. plur. est (ex Smk.) *C. stereophylla* Grsb. (quæ plurimis var. *C. Scabiosæ*) vel subspecies:

**C. spinulosa* Roch. (1828). Banat. Hung. (in plurib. comit. *C. Scabiosam* excludit ex Borbás). Transs. Dobrud. (freq.: Ue.S.). Taur.

56. *C. cinerea*: *Alpes-Marit.* (r.); planta Tenor. (syll.) ex Abruz. et **C. prostrata* ex iisdem montibus pertinent ad *C. dissectam* (59), sed *C. cinerea* Ten. fl. nap. (Miseno, Capri, Ischia, in rupib. marit.) est vera planta Lamarckii observ. Lacaita (litt. 1884).

59. *a. C. tartarea* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1886. sep. 25 (*); cfr. diar. ej. soc. 1888. 56 (sep.). - Bulgar. in rupibus m. Vitos, supra coenobium, et in m. Osogovska Planina (: Velenovsky 1885, 1887).

? 64. *a. C. calvescens* Panc. serb. 442. (1874) ex Velen. - Bulgar. in collibus ad Danubium pr. Lom Palanka (: Velenovsky 1887).

66. *C. rutæfolia*; in Bulgar. lecta est a Bornmüller ad Kamcyk (in collibus) et a Velenovsky pr. Varna: *C. pannosa* Velen. 1885 ex ipso.

**C. jurineifolia*: Dobrud. (in pratis silvaticis et desertis: Jka, Ue.S.). Bulgar. (in collibus graminosis et dumetosis plur. loc.: Velen.).

67. *C. pannosa*: Orph. exs. 1087 (ex pænins. athoa).

70. *C. Niederi*; in rupibus montis Aracynthi Aetol. a Heldreich lecta est.

73. *C. Friderici*; species rara, huc usque non nisi in insulis Pelagosa et Pomo lecta.

77. *C. pallida*: Bulgar. (pr. Kotel: Skorpil ex Velen.). Græc. bor. (Pindus tymph.: Hausskn.).

77. *a. C. tymphæa* Hsskt ms. (litt. 1889). Græc. bor. (Pindus tymph.: Haussknecht).

78. *C. Kartschiana*; - deest in Croat. litorali (ibi pro ea adest hybr. spinuloso-ciliata); Dalm. ex Kern. refer. ad subspeciem:

**C. dalmatica* Kern. (litt. 1872) sched. ad exs. a. 1881. *C. Kartschiana* Vis. (non Sep.). Dalm.: Veglia, Cherso.

79. *C. Herbichii*; unico loco lecta est et sec. Neilr. hybr. (: maculoso-Scabiosa).

80. *C. cristata*; — *C. spinoso-ciliata* Bernh. ap. Spr. 1826. (Fiume, Veglia, Istr.).

**C. Tommasinii* Kern. (litt. 1873) sched. ad exs. a. 1881. Ins. Veglia.

81. *C. paniculata*; — *C. Mierghii*: dep. Gard etc.

**C. polycephala*: Helv. mer. (pr. Nyon). — *C. rigida*: Antibes (cl. Thuret).

82. *C. castellana*: Lusit. (S. da Estrella: *C. paniculata* Henriq. ex Rouy); cfr. subspeciem.

**C. micrantha*; — *C. Herminii* Rouy in Le Natur. 1883. *C. paniculata* Brót. ex Rouy. (S. da Estrella: Ferreira).

84. *a. C. carratracensis* Lge in vidensk. meddel. 1881. 94. sep. 2 (*). Hisp. malacit. (ad Carratraca: H.P.R. 1879).

89. *C. maculosa*: Moldav. Dobrud. Bulgar.; Helv. hab. solum Bundiæ et Basil. (— *C. rhenana*); Transs. pertinet ad subspeciem (*C. rhenana* Freyn) ex Smk. — *C. subalbida*; hab. Ardèche etc. — *C. trinæfolia* (*C. myriotoma* Vis. Panc.) est bona species ex Borbás.

**C. Biebersteinii*: Ross. gub. Kursk, Minsk, Charkow, Cherson (: Lindem.). Valách. (Virciorova: Borbás 1873). Bulgar. (Velen.: *C. australis*). — *C. Reichenbachii* Schur (non DC.) et *C. reichenbachoides* Schur ex Smk. (Transs.).

89. *a. C. Kanitziana* Jka ap. Kan. — Dobrud. in lapidosis calcareis inter Cierna et Grecii (: Janka).

91 * *C. Mureti*; non nisi in Engadin (Bundiæ) lecta videtur et ad *C. maculosam* (89) proxime accedit (: *C. rhenana* var. *vestita* Brügg.); vid. Killias fl. untereng. 103. (1888).

95. *C. leucophæa*; *C. Reuteri* Rehb. f. (81 *) ex Ardoino.

97. *C. Willkommii*; — *C. Spachii*: Valenc. (Rouy 1881).

98. *a. C. mariolensis* Rouy in bull. soc. bot. 1882. 10 (*). - Sierra Mariola Valenc. (: Rouy 1881).

99. *C. prostrata*; hab. etiam Valenc. (pr. Valldigna: Rouy 1881).
100. *C. ovina*: Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.). Ross. centr. (gub. Kursk).
101. *C. Besseriana*: Ross. mer. (gub. Cherson).
101. *a. C. squarrosa* W. sp. III. 2319. Ross. mer. (gub. Cherson, ad Mare Nigrum ex Lindem.).
103. *C. tenuiflora*: Dobrud.: inter Topalu et Hirsiova (Jka); Ciucarova (: Ue.S.).
104. *C. arenaria*: Dobrud. (in desertis gregatim: Ue.S.). Bulgar. (ad Varna: Velen.). Ross. centr. (gub. Kursk). — *C. borysthenica* Gruner 1868. (Ross. or. ad Borysthenem). Comment. 176.
- **C. Jankeana* Simkov. - Hung. mer-or.
106. *C. divergens*; — *C. Petteri* ad *C. tenuifloram* (103) pertinere dicitur et etiam in prov. veron. (Rivoli) provenire (: Goiran).
107. *C. Orphanidea*; — ? *C. thessala* Hsskt ms. (litt. 1889). Thessal. super. (: Haussknecht).
107. *a. C. laureotica* Heldr. hb. norm. 948 (1887). Attica.
108. *C. pelia*: Phthiotis ad radices m. Oeta (: Heldreich).
108. *a. C. brevispina* Hsskt ms. (litt. 1889). Thessal. m. Pelion (: Haussknecht); cfr. var. *brevispina* speciei seq.
109. *C. diffusa*: Dobrud. in desertis abunde: Ue.S.). Bulgar. (pr. Varna: Velen.). Rumel. or. (: Skorpil); introducta (ex Oriente vel Ross. mer.) adest etiam Tergesti (ab anno 1878: Marchesetti), Berolini (: Aschn), in Luxemb., Batav. (ex Abeleven), prov. Rhen. et Lothar. — *C. Comperiana* est proxima *C. stereophyllæ* (54) ex Boiss. — *C. Edersia* Orph. ms. *C. diff. brevispina* Boiss.; Orph. exs. 1090 (e Vodena Maced.).
111. *C. limbata*; ex Lange (litt. 1882) hæc species inter *Acrolophos* *Paniculatos* recensenda est et *C. coerulescenti* (91) approximanda. — ? *C. Herminii* Rouy (82 *).
112. *C. Zuccariniana*; hab. etiam Thessal. (: Heldr. 1885).
116. *C. atropurpurea*: Valach. (Vircirova: Janka, Kanitz). Bosn. (m. Vlasic: Brandis 1884 ex Freyn).
117. *C. rubescens*: Dobrud. (CKoch 1851).
118. *C. orientalis*: Galic. or. Dobrud. Valach. Rumel. or. Ross. centr.
119. *C. sordida*; Comment. 177. — *C. dichroantha*; Venet. inhab. uticens., Tyrol. mer. conterm., 700—900 metr. s. m.: val. Zellina, m. Raut, vall. Canale di Ferro etc. (: Huter). Schleicher hanc plantam sub nomine *C. rupestris* distribuit et Pacher eam sub eodem titulo in flora sua carinth. (e Pontafel: Jaborn.) recenset, sed in addend. (1888) se ipsum correxit.
123. *C. Oliveriana*: Cyclad. ins. Amorgos, in rupibus maritimis (: Orphanides; var. *amorgina* Boiss. Orph.).
128. *C. Guicciardii*: Eurytania ad Carpenisi (: Heldreich).
129. *C. Ceccariniana*; hujus speciei varietas in m. Pindo a Heldreich lecta est.
134. *C. macedonica*: Thessal. m. Pelion (Heldreich 1882).
136. *a. C. Loscosii* Willk. (litt. 1883) ill. hisp. I. 133. *C. podospermifolia* var. *caulescens* Losc. ser. imp. - Arag. mer., raro (a Loscos detecta).
140. *C. latisquama*: Dobrud. (in montib. lapidosis: Ue.S.). Bulgar. (in collibus siccis ad Varna et Galata: Velen.). Thessal. (in planitie: Heldr. 1882).
- **C. salonitana*: Bulgar. (pr. Radomir et Konjavo: Velen. 1887). Thessal. m. Pelion (: Heldreich 1882).
141. *C. rumelica*; Bulgar. pr. Lom-Palanka ad Danubium leg. Velenovsky (1885).
146. *C. amblensis*: Sierra de Gredos (: Graëlls, Ler. Lev.).

147. *C. diluta*; Bætic. in sola prov. Gadit. et quidem paucis locis lecta est, sed a Schousboe in regno maroccano nom. *C. elongatæ* commemoratur (1800).

150. *C. raphanina*: Arch. turc. ins. Karpathos (m. Volatha: Pichler).

154. *C. solstitialis*: Bosn. mer. (ex GBeck). Roman. Bulgar. Rumel. or. (ubique). Ross. mer. (gub. Cherson. in ruderatis et ad vias: Lindem.), mer.-occ. (Bessarab. "überall massenhaft": Lindem.).

**C. Adami*: Dobrud. (pr. Küstendje). Bulgar. (in collibus ad Varna: Bornmüller).

157. *C. melitensis*; in ins. Lampedusa vulgatiss. ex' Lojacono.

160. *C. calcitrapa*: Roman. Bulgar. Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).

163. *C. iberica*: Banat. ad Orsova copiosa adest ex Borbás. Bulgar. in ruderatis vulgaris (: Velenovsky). — *C. Holzmänniana* Heldr. (in sched.). Atticæ m. Parnes in planitie super. (: Heldreich).

163. *a. C. hyalolepis* Boiss. diagn. ser. I. 6. 133; Heldr. hb. norm. 852. - Athen. vall. Cephissi. Creta (: Reverchon).

164. *C. Seridis*: Murcia (: Rouy 1881); cfr. Rouy in rev. sc. nat. 1883. 71—2.

164. *a. C. cruenta* W. enum. 929. - Valenc. pr. Jativa (rr.: Burnat). Forse subspecies præcedentis, cujus varietas ex Rouy l. c.

165 * *C. maritima*; *C. Seridis* (164) propior est et ejus varietas ex Lge et Rouy l. c.

168. *C. aspera*; — *C. heterophylla*; sec. Rouy est valde proxima subspecies *C. stenophylla*, quâcum sæpe crescit (Valenc.).

**C. stenophylla* et **C. scorpiurifolia* sunt varietates *C. asperæ* ex Rouy (bull. soc. bot. 1882), quarum hæc etiam in Valencia obviam venit.

171 obs. *C. Alopium*; ex Rouy (bull. soc. bot. 1882) est varietas subinermis *C. heterophylla* (168—).

× *C. Csatói* Borb. = atropurpurea + spinulosa. (Transs.).

× *C. diversifolia* Borb. = alba + Jacea. (Fiume).

× *C. druenticæ* Rouy. = solstitialis + aspera. (Hisp.).

× *C. Fabrei* Bonnet = aspera? + solstitialis. (Gall. mer.); vid. ap. Bonnet in Magn. scriin. I. 44—46.

× *C. hemiptera* Borb. = rhenana + solstitialis. (Hung.).

× *C. ligerina* Franch. = maculosa + Jacea. (Loire-et-Cher).

× *C. Salisiana* Brugg. = Scabiosa + transalpina. (Helv.).

× *C. sciaphila* Vuk. = stenolepis + nigrescens. (Croat.).

104. *Microlonchus*. 2. *M. Duriæi*: Corinth. (Heldr.) ex Boiss. or. suppl. — *M. valdemorensis*: Hellin. (Hisp. mer. (Rouy 1881); est species a *M. Duriæi* omnino diversa (rara) ex Rouy (rev. sc. nat. 1883).

2. *a. M. spinulosus* Rouy exc. bot. esp. 1883 (bull. soc. bot. 1884. 42). Cerro Negro prov. matrit. (: Rouy).

105. *Crupina*. 1. *C. vulgaris*: Helv. mer. (Vales.). Roman. Bulgar. (mult. loc.: Velen. 1887). Thrac. (Rumel.) etiam a Skorpil lecta (ex Velen. 1887). Thessal. (: Haussknecht).

2. *C. Crupinastrum*: Mallorca (ad Palma: Barceló; Soller: Bourg.). Ins. Jon. (Cephalon.: Heldr., Ithaca: Spreitzenh.). Istr. (Pola: Freyn). Thessal. (: Hausskn.).

106. *Mulgedium*. 1. *M. alpinum*; in Suec. a septentr. usque in Hel-sing., Dalec. et Vermel. progreditur. Germ. hab. (ex Gecke) etiam in Westphal. mer.-or. et in m. Erzgebirge; adest etiam Arvern. (Puy-de-Dôme, Cantal), Forez (: Le Grand), Moldav. Bulgar. (m. Balkan et Vitos: Velen.).

Obs. *M. macrophyllum* DC. (*Sonchus macrophyllus* W.), species boreali-americana, interdum (e cultura in hortis) inquil. adest Dan., Germ. etc.; in Vogesis duobus locis a Nestler plantata est.

2. *M. Plumieri*; Helv. hab. solum in Alpibus.

4. *M. tataricum*: Dobrud. (in reg. litor. pr. Portica et Küstendje: Ue.S.). Bulgar. (admare pr. Varna leg. Velenovsky). — *M. sonchifolium*, in Consp., nescio quo casu, heic enumeratum, a *M. tatarico* toto coelo diversum est, ob flores luteos anomalum et ad calcem generis, in sectionem propriam, relegandum.

5. *M. sibiricum*; deest in Fenn. mer.-occ. et mer. plurima.

5. *a. M. sonchifolium* Vis. Panc.; hab. Serb., Bulgar. (m. Balkan et Vitos: Velen. 1885, 1887) et (ex Simkov. 1874) in alpe Hunka-Kamena ad fines romanicos.

107. **Sonchus.** 1. *S. palustris*: Scan. bor.-or. (loco unico). Gall. bor.-occ. (plur. loc.). Germ. mer. (Bavar.) adest plurib. loc., sed in bor.-or. (Boruss.) deest. Moldav. Dobrud.; Helv. (ubi in Vales. indicatur) vix adsit ex Gremli.

2. *S. arvensis*; — *S. intermedius*; *S. repens* Rupr. ingr. — *S. exaltatus* Wallr. ex Hsstk. (Hercyn., Thuring. et probab. alibi).

**S. uliginosus*: Morav. Siles. Bulgar. (Razgrad, Varna: Velenovsky). Rumel. or. (: Skorpil). — *S. Nymani* (*S. arvensis* S.S. ex Hsstk): Attica, Nauplia. Carinth., Thessal., Pindus (: Hausskn.).

3. *S. maritimus*; Sard. adest! (: Reverchon).

**S. aquatilis*; Gall. non nisi in dep. Pyren. or. (r.) lectus est.

6. *S. decorus* (*S. arvensis* var.), in vineis monspel. olim indicatus, ibi nunc disparuit ex Loret.

7. *S. glaucescens*: Ital. mer. (Otranto: HGroves). Istr. (vid. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881. 383). Dalm. (: Studniczka ex Freyn). Bulgar. (: Velenovsky). Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.).

8. *S. asper*: exc. etiam Fenn. bor. — ?*S. pallescens* Panc. 1875. (Montenegro ad Cetinje).

10. *S. tenerimus*: Attica (ins. Pharmacus.: Heldr.; ad Phalerum: Hausskn.). Akrokorinth (: Haussknecht).

10. *a. S. zollikoferioides* Rouy (exc. bot. esp.) in rev. sc. nat. 1883. 73 sep. (*). Totana Lorca Murc. (Rouy 1881). — ?*S. Dianæ* Lacaita in Willk. ill. hisp. II. 16. (1886). Valenc. litoral. in rupibus præruptis promont. S. Antonii, Hifac, pr. Denia (olim Dianium cum templo Dianæ) et in montib. La Segarria (detectus a Lacaita 1884).

**S. oxyspermus* Wallr. ex Hsstk (vid. diar. soc. bot. thuring. 1887. 27) = *asper* + *oleraceus*. (Thuring.).

108. **Lactuca.** 1. *L. perennis*: Ross.-occ., mer.-occ.

4. *L. tuberosa*: Bessarab. (Tardent ex Lindem.).

5. *L. cretica*; hab. etiam in Taur. ex CKoch.

6. *L. sagittata*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., rarius). Moldav. Bulgar. (: Bornmüller). — *L. altissima* Lec. Lmтт. (Puy-de-Dôme, subsponte; colitur pr. Clermont ad lactucarium extractione obtinendum).

7. *L. quercina*: Moldav. Dobrud. (raro: Ue.S.). Bulgar. Ross. mer.-occ.

8. *L. virosa*: Roman. Ross. occ. (Minsk, Wilna: Lindem.), mer.-occ.; Transs. ad L. Scariola pertinet ex Smk. — *L. flavida*: Gall. centr. (Puy-de-Dôme). — *L. Scariola* var. altissima Lec. Lmтт. (Puy-de-Dôme, subsponte; colitur pr. Clermont ad lactucarium extractione obtinendum).

10. *L. Scariola*: Roman. Bulgar. Rumel. or.; in Suec. probab. non nisi inquil. — *L. dubia*: Gall. centr. (freq.).

11. *L. saligna*: Siles. (Oppeln: Schmit ex Fiek 1881). Roman. Bulgar. — *L. cyanea* CKoch. (Taur.). — *L. cracoviensis* Sawiczewski ap. Roczn. (1840) est forma culturâ orta sec. Wodzicki teste Knapp.

14. *L. chondrillæflora* (*L. ramosissima* Bor. 1846. non G.G.); Gall. or. (Côte-d'Or), mer. (depp. Gard, Lozère et Ardèche freq. ex Lmтт.); a cl. Loret (in rev. sc. nat. 1882) jungitur cum specie seq. (*L. viminea*) nom. *L. Bauhini* Lor.

**L. contracta* Velen. in act. soc. sc. boh. 1886. 27 sep. (*). Bulgar. in rupibus calcareis ad pagum Kebedze et pr. Varna (: Velen. 1883); in collibus aridis supra Knezevo et Konjavo (: Velen. 1887).

15. *L. viminea*: Mallorca Balear. (: Barceló). Sard. (ex Aschn). Styr. (: Maly). Valach. (Vircirova: Borb. 1873). Ins. Jon. (Cephalon.: Heldr.).

16. *L. ramosissima*; *L. Grenieri* Loret in rev. sc. nat. 1882 (cfr. ej. Flore de Montpell. append.).

17. *L. muralis*: Fenn. mer. Dan. (in silv. humid. freq.). Roman. Bulgar.
109. **Prenanthes**. 1. *P. purpurea*: Moldav. Bulgar.
110. **Chondrilla**. 2. *C. juncea*: Roman. Bulgar. Ins. jon. (Cephalon.: Heldr.).
4. *C. graminea*: Ross. mer., mer.-occ. Bulgar. plur. loc. (: Velen. 1887).
5. *C. prenanthoides*; Helv. hab. in cant. Bundia (Graub.) et St-Gallen (ad torrentes Alpium). Bavar. in glareis fluvior. alpin. Iller, Lech, Isar.
112. **Taraxacum**. 1. *T. serotinum*: Moldav. Dobrud. (copiose: Ue.S.). Bulgar. (ad Razgrad et Varna freq. vidit cl. Velenovsky). Ross. centr. (gub. Kursk: Augustinovicz).
1. *a. T. Haussknechtii* Uechtr. ex Hsskt in litt. 1889. — Græc. bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht 1885).
4. *T. officinale*; — *T. maculatum*: Burgund. Arvern. (etc.). — *T. rubrinerve*; hab. Gall. centr., or. (etc.). — *T. affine*; hab. Gall. or., centr. (etc.). — *T. Scorzonera* Trautv. non Rehb. (ins. arct. Nov.-Semi.: *T. phymatocarpum* ThFr. ex Trautv.). — var. *alpinum* K. hab. etiam in insulis arcticis nec non (ex Heldr.) in reg. abietina m. Aeni Cephalon.
- **T. lævigatum* (Leontod. arcuatus Tsh); *T. caucasicum* Schur; *T. Steveni* Fuss (ex Smk.). — *T. nigricans* (T. alpestre DC.) saltem subspecies sit (hab. in Sudetis, Carpat.); sec. b. Uechtritz (durchf. schles. phan. 1875) est species optima, quæ ab oculo Tausch detecta et (in Flora 1821) descripta est (: Leontod. alpestris Tsh), sed dein oblita vel commutata. — *T. minimum* Heldr. nunc ad *T. gymnanthum* (6) trahitur.
6. *T. gymnanthum*; — *T. minimum* Heldr. hb. norm. 796. *T. gymnanth. fol. synanth.* Heldr. hb. norm. 853. b. *T. humifusum* Heldr. Sart. olim. (Attica).
- 7 * *T. Pacheri*; Comment. 178.
8. *T. palustre*; Fenn. non nisi in mer.-occ. indicatur. — *T. udum*; hab. in Gall. or., centr. (etc.). — *T. leptocephalum*: Bulgar. Transs. (*T. microcephalum* Schur); floret a medio Jul. usque in Septemb. Comment. 179. — *T. halophilum* Trautv. (Sarepta: Becker) est "*T. vulgaris* Schrk forma" ex Trautv. increm.
- **T. Steveni* DC. (*T. alpinum* Schur. var.); Moldav. Bulgar. (in alpinis m. Vitos: Velen. 1887).
9. *a. T. scolopendrinum* Heldr. - Attica (Pharmacusar. ins. Ledro: Heldreich 1879).
- 10 * *T. nivale* Lge in hb. mus. fenn. ed. II. 145. - Lapp. or. (: Kihlman).
113. **Andryala**. 3. *A. dentata*: Heldr. hb. norm. 854 (: Argolis); *A. tenuifolia* DC.: Heldr. exs. 1711, 1712 (: Andros, Poros).
- **A. arenaria*; est subspecies *A. Rothiæ* (5) ex Rouy.
- **A. dissecta* Hfegg. Lk. — ? *A. allochroa* Hfegg. Lk. (Lusit.).
5. *A. Rothia*: Casa de Campo Matriti (: Rouy 1881); de hac specie, huc usque dubia, videas ap. Rouy (exc. bot. esp.) in rev. sc. nat. 1883. 74—5 sep. (*) et in bull. soc. bot. 1884. 43 sep. (*).
- **A. Ficalhoana* Daveau in bolst. soc. broter. 1882. Lusit. ins. Berlenga (ubi a Daveau detecta 1879).
114. **Hieracium**. 1. *H. sabaudum*: Germ. mer. (in med. et bor. r.) ex Gcke. Styr. (ex Maly); Helv. plur. loc. indicatur, sed Gremlí non nisi cultum vidit. Transs. ad *H. boreale* (3) pertinet ex Smk. — *H. corymbiferum*; *H. abruptifolium* Vuk. (1877). *H. croaticum* Schloss. olim. — *H. gallicum* Jord. (1849); Bor. centr. (Arvern. etc.). — *H. grandidentatum* Jord. in Bor. centr. (Arvern.).
- **H. carpetanum* Freyn in Flora 1880. 9 sep. (*). *H. sabaudum* Torrep. exs. (Willk. Lge ?). - Hisp. pr. Escorial, in dumetis (comes Torrepando 1872).
1. *a. H. fistulosum* Lindeb. in Htn handb. ed. XI. 57. (1879). *H. corymbosum* ej. hier. exs. 47. *H. corymb. fistul. ej. ap.* ABlytt. - Norv. r. (Nordmarken, Sundalen).
2. *H. hirsutum*; — *H. pseudo-eriophorum* Timb. Loret. (Gall. mer.).
3. *H. boreale*; *H. sabaudum* L. succ. *H. commutatum* Becker (fl. francof. 1828); Lindeb. ap. ABlytt; cfr. Lge haandb. ed. IV. 393. — *H. inuloides* Tsh,

ex obs. ulter. b. Uechtritz (litt. 1881), non est hujus loci, sed *H. crocato* propius accedit (vid. 16. a). — *H. subhirsutum* Jord. ap. Bor. (Gall. centr. etc.). — *H. curvidens* Jord. 1849. (Gall. centr.). — *H. virgultorum* Jord. 1848. (Gall. or., centr.). — *H. vivariense* Jord. ap. Bor. (Gall. centr.). — *H. strictum* Kirschl. non Fr. (Voges.). *H. boreale lanceolatum* Godr. fl. lorr. ed. I. *H. auratum* ej. ed. II., ubi sub siglis Fr. allatum est, sed Friesius ipse (serius) hoc nomen pro specie aliena adhibuit. — ? *H. validum* Arv.-Touv. ap. JHervier 1885. (dep. Loire).

Obs. Nomen boreale improprium est cum in terris borealibus (Suec., Norv., Fenn.) hæc species non nisi (parce) inquilina adsit.

6. *H. racemosum*: Galiz. Morav. mer.

**H. stiriacum* Kern. — Styr. Morav. mer. (*H. racemosum* auct. plur.).

7. *H. barbatum*: Croat. (Fiume: A-M.Sm.). Istr. (: Freyn). — *H. tenuifolium*: Transs. (r.: Czetz.). — *H. istriacam* Freyn exs. et in litt. (Istr. mer.).

8. *H. eriophorum*; — *H. prostratum*; a litoribus oceani remotum et in interioribus cultum in plantam erectam et *H. umbellatum* mentientem mutari asserunt.

9. *H. æstivum*; ex Lindeb. est var. *H. corymbosi* (17).

10. *H. umbellatum*; — *H. lactaris* etiam alibi lectum est. — *H. umbelliforme* Jord. ex Rouy. — ? *H. verbenaceum* Arv.-Touv. (pr. Vigan dep. Gard).

**H. monticola* (*H. æstivum* Bill. exs. 1522): Arvern. (Puy-de-Dôme et Cantal, alt. ultra 1200 metr.). Voges. Helv. (Verrières, mt Brezon).

11. *H. latifolium*: Croat. (Fiume in valle Recina: A-M.Smith).

**H. brevifolium* (*H. boreale subsabaudum* Rech. f. ex Gremli); hab. in Gall. mer. (Corrèze, Gard), Vales. (r.), Croat. (pr. Fiume), Bosn. (: Brandis ex Freyn).

12. *H. rigidum*: Morav. (rarius); Dan. hab. in Seeland. et Fionia (huc usque rr. lectum), Fenn. in Tavast. et Carel.; deest in Lapp. et Norv. arct. — *H. Friesii*; Fr. hier. eur. 154 ad *H. crocatum* (16) pertineat.

**H. melanocephalum* (Lindeb. hier. exs. 137) ex ipso auct. (in Htn handb. ed. XI. 1879) proximum est *H. norvegico* (32); sec. Uechtritz (1881) valde simile est *H. chlorocephalo* (102 *), sed ex Arv.-Touv. (.883) = *H. acuminatum* Jord.

14. *H. foliosum*: Moldav. Dobrud. Ross. centr. (gub. Kursk); Transs. ad *Crepidum viscidulam* pertinet ex Smk.

**H. laurinum* (sphalm. laureolum) Arv.-Touv. *H. mauriannense* Didier (1879). - Sabaud. (ad St-Jean-de Maurienne).

16. *H. crocatum*: Ostrob. bor. Lapp. or.; in Lapp. suec. deest ex Lindeb., sed adest ad Koddiss Vestrob.; in Norv. rarum est (Nordlanden, Valders); exs. Fr. hb. norm. XI. 7 pertinet ad subspec. *H. angustum* ex Lindeb.

**H. angustum* præsertim Norv. inhabitat, in Suec. non nisi Herjedal. et Jemtå lectum: Lapp. ad Kvikkjokk.

16. a. *H. strictum* Tsh in Flora (1837). *H. Tauschianum* Uechtr. ap. Fiek (1881); cfr. durchf. phan. schles. 1883. - Riesengeb. (rr.). Sudeti or. — *H. inuloides* Tsh l. c. (Riesengeb. r., Sudeti or.).

17. *H. corymbosum*: Arvern. (mont-Dore, Cantal); in Scand. rariss. videtur (a Fr. in Lapp. lulensi et in Norv. indicat.). — ? *H. pseudocorymbosum* Grml. (1885). *H. corymbosum* ej. olim. (Vales.: Bovernier).

**H. salicifolium*; huc usque solum in Nordmarken Norv. lectum est. — *H. præruptorum* vid. 22 * — ? *H. Fiekii* Uechtr. ap. Fiek 1881. (Riesengeb. Siles.).

**H. conicum* Arv.-Touv. ap. Dene (1877). Arvern. (Puy-de-Dôme).

**H. hirtellum* Lindeb. in Htn handb. ed. XI. 56. (1879). *H. corymbosum* * *hirtellum* cj. hier. exs. 97. - Norv. (Valders, Hardanger).

19. *H. valesiacum* (*H. silvaticum* Schleich. ex Grml.); non solum in Vales., sed etiam in cant. Vaud et Ticino lectum est. — *H. bifrons* Arv.-Touv.

20. *H. strictum*: Fenn. or. Helv. (Vales., Frib.). Bavar. (Alp. algov.), sed (ex Geke) non in Badia et Alsat. (cfr. 22 * *H. præruptorum*). — *H. lanceolatum* (*H. spicatum* Bor. centr. non All.); Arvern. (Puy-de-Dôme, Cantal). Forez (var.). — ? *H. blattarioides* Arv.-Touv. (Mont-Dore Arvern., rr.).

**H. reticulatum* Lindeb. in Htn handb. ed. XI. 56. (1879). *H. corymbosum* * *hirtellum* cj. hier. exs. 97. - Norv. (Valders, Hardanger).

21. *H. lycopifolium*; Badia hab. etiam ad Freiburg (in m. Schlossberg).

**H. Favratii* Muret. - Helv. (pr. Lausanne). — ? *H. melanotrichum* Reut. (m. Salève pr. Genev.).

22. *H. prenanthoides*; in Jura rr. adest (Creux du Van); in Lapp. kemensi indicatur a Norrlin. — *H. perfoliatum*: Siles. et Transs. (: Uechtr., Smk.). — *H. papyraceum*: huc. probab. (ex Freyn) refer. Porta. Rigo itin. II. exs. 36 (e Majella Aprut.). — *H. myriocephalum* Panc. 1875 ex Uechtr. (Montenegro). — ? *H. violascens* Borb. 1878. (Croat.).

**H. riphaeum*; species Sudetor. occ. endemica et a veris *Prenanthoideis* removenda ex Uechtr. (1881).

**H. præruptorum* Godr. *H. inuloides* Sz bip. *H. prenanthoides vogesiaceum* G.G. (in Consp. sub 17* allatum). *Voges.* (Hoheneck). — *H. prenanthoides verum*, observ. b. Godron, parum cognitum est, sed descriptione characteristica (in fl. du Dauph.) et figura bonâ (in Précis d'un voyage) Villarsii indubium; crescit (loc. class.) in montibus siccis, insolatis.

23. *H. prælongum*; ex Arv.-Touv. (1883) Lindeb. hier. exs. 42 sistit var. subspecies præced. (*H. præruptorum*), cui etiam pertineat *H. prenanth. parviflorum* ej. exs. 43.

24. *H. cydoniaefolium*; — ? *H. cantalicum* Arv.-Touv. (Cantal Arvern., rr.).

**H. pachycephalum* Uechtr. in Oborn. mähr. 605. (1884). *H. corymbosum* var. *pachycephalum* Fr. in litt. (ad Uechtr.). Sudeti (Glatzer-Schneebl., Hochgesenke).

25. *H. pieroides*; Helv. non nisi in Alpibus (r.) lectum est.

**H. ramosissimum* (Schleich.) Heg. *H. helveticum* Arv.-Touv.; hab. in Vales. — *H. lactucaefolium* Arv.-Touv. (Lozère, r.). — *H. conringiaefolium* ej. — ? *H. viscosum* Arv.-Touv.

26. *a.* *H. lantoscanum* Burn. Grml. hier. alp.-marit. 22. - Alpes-Marit.

27. *H. australe*: Helv. mer. (Puschlav: Brügg.; Mandello ad lac. Comens.).

**H. provinciale*; — *H. Lamotteanum* Arv.-Touv. in Lmtt. prodr. plat. centr. (Cantal, rr.).

**H. symphytaceum* Arv.-Touv. in bull. soc. dauph. 1876. *H. provinciale* var. *symphytaceum* Burn. Grml. - Alp.-Marit.

28. *H. sparsifolium*; species (ex Lindeb.) rarior: Norv. (Dovre, Drivstuen; Valdres pl. loc.); Suec. (Kvikkjokk Lapp., Glissjöberg Herjed., Jemt Krogen Medelp.).

29. *H. tridentatum*: Fenn. (exc. or. et bor.-or. cum Lapp.). Dan. (in silvis non rarum). Ins. Færøer (: Rostrup). Gall. centr. (freq. ex Arv.-Touv.). Siles. Morav. Galiz. — *H. Boræanum* Jord. in Bor. centr. (Puy-de-Dôme etc.). — *H. virescens*; hab. pr. Hamburg, in Holsat. (Kiel, Ratzeburg) et probab. alibi; sic nuper lectum est in Morav. (r) et Guestph. (pr. Bollendorf a. d. Sauer). — *H. magistri* Godr. (*H. gothicum* Kirschl. non Fr.) est species propria etiam ex novissima flora lothar., montes Voges., præsertim cacumen Hoheneck, inhabitans (ibi detecta est a Dre Freder. Kirschleger: "Epervière de maître Friedrich"). — *H. Garckeianum* Aschn est forma microclada speciei ex ipso auct. — *H. glanduliferum* Schur. (Transs.).

30. *H. gothicum* (*H. diaphanum* Grsb. non Fr.): Fenn. mult. Dan. (in Sjælland. bor. et Jutland. non rarum); Lothar. (Bitch) et Alsat. (Voges.) ex Gcke, sed cfr. *H. magistri* et *H. Garckeianum* sub specie præced. — *H. pseudogothicum* Arv.-Touv. suppl. hier. (m. Forez Gall. mer.; dep. Loire in Mont-Pilat: JHervier; Pierre-sur-Haute: Le Grand).

**H. asperum* Schleich. in Rehb. exc. *H. ambiguum* Schult. (non Ehrh.). Helv. Gall. or. (etc.).

30. *a.* *H. dacicum* Uechtr. in oe. bot. z. 1875. - Transs., r. (: Borb., Smk.).

32. *H. norvegicum*: Fenn. mer.-occ. Scot. bor. (: Hanbury 1885 ex A. Bennett).

**H. macranthum*: Halland. ad speciem ipsam pertinet ex Lindeb. (1879).

37 * *H. nobile*; — *H. eurypus* Knaf 1875. (Catal.: Compañó 1872).

38. *a.* *H. anisophyllum* Boiss. or. III. 876. - Balkan pr. Kalofer (: Pichler). Serb. mer. (sed specim. majora vix ab *H. barbato* distinguenda ex Uechtr. 1876). — *H. eriostachyum* Borb. 1878 (e Croat. m. Visenura) dicitur valde simile *H. anisophyllo*.

42. *H. bracteolatum*: Thessal. m. Pelion (: Heldreich 1882).

**H. Koracis* Boiss. or. suppl. 328. - Aetol. m. Korax, 4500—5500' (Heldr. pl. græc. septentr. 1879 nom. H. Reinholdi).

43. *H. porrectum*; Helv. hab. in solo m. Reculet (Jura).

44. *H. macilentum*; in Helv. rr. est (Valais, vall. Eginen). — *H. gracile*: Monten. (: Pntek ex Grsb.).

*H. gombense Lagg. ex Grml. - Vales., rr. (vall. Eginen).

45. H. dovrense; Island. (* demissum Almq.); Strömfelt 1883. Shetland. (: Beeby 1886, 1887).

*H. orarium; Scot. bor. (ex Arth. Bennett 1887).

*H. Dewari Bosw. (1878). H. strictum Backh. p. p. H. dovrense scoticum Fr. symb.? - Scot. ad lacus varios.

* 47. H. juranum; Helv. mer., occ. Arvern. (mont-Dore). — H. jurassicum Grsb. (H. juranum b. Fr. epicr. H. denticulatum Grsb., Rehb. f. H. molle Lagg. exs.). — ? H. pseudojuranum Arv.-Touv.; H. prenanthoides latifolium Lindeb. hier. exs. 92. (in Consp. ad 18 H. elatum citat.) ex Arv.-Touv.

*H. albinum; mont. Sudet., ut videtur, endemicum est, in utroque eorum latere, tam bohemicum quam silesiaco, obvium.

H. corconticum (Knaf) Celak. H. asperulum Freyn in Flora 1881. Sudeti occ. (Kesselkoppe etc.); lectum in m. Krkonos ib. a K. Knaf (1872) et descriptum a Celakovsky, sed nomen non prius quam 1883 (in oe. bot. z.) publicavit. — H. Freynianum Velen. in oe. bot. z. 1883. H. tenue Freyn (in sched.). — Ad hanc subspeciem (cum proximis) cfr. observationes accuratissimas beati Uechtritz 1883. 11—15 ().

47. a. H. pseudoalbinum Uechtr. in durchf. schles. 1884. 6. (*). Sudeti (probab. non nisi in Riesengeb. or. adsit).

49. H. carpaticum; hab. etiam in Moldav.

50. a. H. stygium Uechtr. in jahresb. schles. ges. 1875 (cfr. durchf. phan. schles. 1883. 35). H. plumbeum elatius Fr. epicr. - Sudeti or. (Glatzer Schneeb., Gesenke), "quorum est inter generis typos primarios maxime caracteristicos et frequentes"; hab. etiam in Carpatis bor. et or., sed ibi, ut videtur, multo rarius. An potius ad Aurella Alpina refer. et post 106. H. submurorum citandum?

52. H. ramosum; Gotland. (ad Vestöös i Hall: ÖVestöö). Moldav. Carinth. (: Pacher).

54 * H. argutidens; Galiz. (vall. Pruthen.: Rehmann). H. graveolens Dollin. ap. Maly (non Froel.), sed H. Dollineri Sz. lip. ad H. canescens (74) pertinet ex Uechtr. — H. Sendtneri Näg. H. argutidens monacense Fr. (München; Chur: Brügger).

57. H. vulgatum; — H. argillaceum est species propria ex Godr. (Lothar.). — H. acuminatum Jord. 1849. (Gall. centr. etc.). — H. pallidifolium Jord. ap. Bor. (Gall. centr.). — H. reconditum Jord. ap. Bor. (Gall. centr.). — H. erubescens Jord. ap. Bor. (dep. Allier). — H. cheriense Jord. ap. Bor. (ib.). — H. calcigenum Rehm. (Sudeti, Carpati). — ? H. Lecokianum Arv.-Touv. ap. Lmtt. (Cantal, rr.). — ? H. ericetorum Ravaut 1879. (Delph. dep. Isère).

*H. fastigiatum; Delph.; Arvern.; etiam Hung. ex Borbás. — H. translucens Arv.-Touv. suppl. hier. H. diaphanum Ravaut exs. sec. Arv.-Touv.

*H. glaucellum; Bohem. (m. Riesengeb.) ex Celak.; b. Uechtritz idem novit e Kiesberge in Riesengebirge et monuit (1884) ab omni H. vulgato alienum esse et H. Wimmeri proximum.

*H. danubiale Borb.; ortum est a H. vulgato, ob locum, silvis destructis et rupibus insolatis, mutatum (B.).

58. H. diaphanum; Fenn. (Tavastl., Karelen); adest etiam Arvern. (Mont-Dore) ex Arvet-Touvet.

59. H. pulchellum; hab. etiam in ins. Shetland., ubi hæc rara species nuper (1886) a Beeby et Linton lecta est (ex Beeby in scot. natur. 1889).

60. H. silesiacum; detectum a Krause 1846; ex Uechtritz mont. Sudet. (or.) endemicum (hab. in Gesenke plur. locis) et H. Kotschyano Heuff. (e Transs.) proximum est.

*H. Engleri; non huc sed ad Alpestria pertinet ex Uechtritz; hab. etiam in Kl. Schnee-grube mont. Riesengebirge.

*H. Grisebachii Kern. (litt. 1861) sched. ad exs. 1881. - Tyrol. centr. (Oetzthal, alt. 1800—2000 metr.).

60. a. H. Schultizianum Vis. Panc. pl. serb. dec. III. 10. (1870). Serb. mer. (m. Kopaonik). Huc forse pertinet H. Engleri e m. Kom Monten. (: Pancic 1873).

Obs. Hieracia tria præced. valde proxima sunt et ex Kerner his accedit etiam H. sparsum (153); sec. b. Uechtritz (litt. 1881) hoc proxime affine est H. silesiaco (60) et H. Schultizianum (60. a) p. p. comprehendit. Sectionem peculiarem Oliganthorum Kern. (Cernuor Uechtr.) constituunt.

61. *H. transsilvanicum* (Schur ap. Fr. 1862) Heuff. in act. soc. z.-b. vind. 1858. *H. rotundatum* Kern. in oe. bot. z. (non Kit.). *H. arcticum* Schur (1859). *H. pseudomurorum* et *H. pseudolasiophyllum* Schur, *Crepis Fussii* Kovacs exs. (Janka in linn. 1859).

62. *H. rotundatum*: Monten. Herceg. Bosn. Serb. Croat. Vallach. Moldav.; Transs. (cum synon. Schur.) ad præced. pertinet.

64. *H. murorum*; - *silvaticum* Fr. hb. norm. II. 7; in Lapp. plur. deesse videtur. — *H. ovalifolium*: Gall. centr. — *H. Pollichiae*; hab. etiam Arvern. (ex Arvet-Touv.). — *H. præcox*: Arvern. ex eodem. — *H. conjugatum* Jord. ap. Bor. (Gall. centr.). — *H. prasinifolium* Jord. l. c. (Gall. centr.). — *H. petiolare* Jord. (in Consp. sub seq. allatum); Gall. centr., mer. — *H. fagicolum* Jord. in Bor. centr. (Forez, Pierre-sur-Haute etc.). — *H. silvivagum* Jord. ap. Bor. (Gall. centr.). — *H. integrifolium* Norrl. non alior.; Fenn. (Tavastl., Karelen). — *H. crepidiflorum* Polak in oe. bot. z. 1884. Riesengeb.; vid. ap. Uechtr. durchf. schles. 1883. 7 (*). — ? *H. Pacheri* Sz bip. (litt. 1884); Carinth.

**H. Moëanum*; *H. bifido* (67) proximum est ex auct. Lindeb. (1879).

**H. integrifolium*: monente cl. auctore (in litt. 1879, 1888) non ad hanc gregem pertinet (attamen in ej. haandb. ed. IV. inter *H. murorum* et *H. cæsium* militat) sed *H. rotundatum* (62) proximum est; rarum et non nisi paucis locis Jutlandiæ mer.-or. et Slesvic. bor. lectum, sed in horto auctoris e seminibus plantæ spontaneæ per multos annos sese propagavit et nunc quasi sponte provenit.

**H. subcæsium*: Fenn. mer., or.; Dan. hab. etiam in ins. Bornholm. Bavar. Bosn. (: G Beck, Brandis ex Freyn). Transs. (*H. cæsium* auct. transs. ex Smk.).

**H. stenolepis*; *H. bifido* (67) proximum est ex ipso auct. et hujus var. habendum ex Uechtr. (litt. 1881). *H. cascioides* Arv.-Touv. ex ipso (1883).

**H. diaphanoides* Lindeb. hier. bidr. (1882). *H. murorum-medium* Lindeb. ap. Htn et exs. 123.

65. *H. fragile*; probabiliter adest etiam alibi (sic in Morav. ex Oborny). — *H. petiolare*; ad præc. (*H. murorum*) nunc ducitur. — *H. glaucinum*; hab. etiam Croat. (Hirc 1883).

66. *H. cæsium*; Helv. hab. in alpinis et subalpin. (haud frequens): *H. petraeum* Heg.; Germ. potissimum in Hercyn., Thuring. et Siles. (m. Riesengebirge); adest etiam in Gall. centr. (Puy-de-Dôme Arvern.: Arv.-Touv.). — *H. cruentum* Jord. (Gall. et probabiliter alibi). — *H. subincisum* Arv.-Touv. (saltem p. p.) ex Gremli.

**H. angustatum*; ex Lindeberg (1879) proximum est *H. fasciculari* (54).

**H. nigriceps* Lindeb. hierac. bidr. (1882). *H. cæsium* politum ej. hier. scand. exs. 62. - Norv. occ.

67. *H. bifidum*: Siles. (Riesengeb., Gesenke). Gall. mer. (Lozère, Gard) ex Arvet-Touv. - Suec. bor. (Jemtia, Medelp.) hab. ex Lindeb.; sec. Uechtr. (1881) *H. bifidum* auct. scand. alienum est et cfr. cum *H. stenolepi* (64 *). — *H. plumbeum*; indicatur etiam in Ross. balt. et in Ingria, Tavastia. — *H. Planchonianum*: dep. Loire (mont-Pilat, St-Etienne: JHervier). — *H. albereanum* Timb.-Lagr. 1879. Col de Baladon etc. in Albères orientales. — *H. rupicolum* Smk. *H. umbrosum* Schur, *H. Jacquini* auct. transs. (ex Smk.).

**H. Sommerfeltii*: Scot. bor. (ex Arth. Bennet 1887); adest etiam Austr. ad Gumpoldskirchen pr. Vindobonam (: Wiesbaur 1876) teste Elgenstierna, qui specc. norvegica et austriaca comparavit.

67. a. *H. taraxaciforme* Arv.-Touv. suppl. hier. 15. - Arvern. (Puy-de-Dôme, rr.). — *H. arvernense* Arv.-Touv. ap. Lmtt. (Mont-Dore).

68. *H. atratum*: Siles. (m. Riesengebirge multis locis: — *H. nigratum* Uechtr. ex Gcke). Carinth. (r.: Pacher). Helv. adest solum (et r.) in Alpibus (*H. nigrescens* Lagg. exs.). Ad hanc speciem cfr. observationes beati Uechtritz in durchf. schles. phaner. 1883. 8—9 (*). — *H. glanduloso-dentatum* Uechtr. ex Gcke. — *H. polycephalum* Velen. in oe. bot. z. 1883.

**H. nigricans*; — ? *H. pseudobifidum* Schur.

**H. moravicum* (Freyn ms.) Uechtr. in Oborny mähr. 590. (1884). *H. integrifolium* Lge var. alpestre Uechtr. in durchf. phan. schles. 1883. *H. albinum* Fiek p. p. - Hochgesenke Sudet.

69. *H. pallescens*: Bosn. (: Brandis ex Freyn). Sec. Arv.-Touv. ap. JHervier rech. sur la flore de la Loire (1885, cum ic. fotogr.) in territorio dicto

adest var. (atriplicifolia eor.) hujus speciei, quæ in Mont-Pilat (r.) lecta est a JChaix (1883).

*H. Wimmeri; hab. etiam in Tatra m. Carpator. (: Rehmann).

69. *a. H. erythropodum* Uechtr. *H. albinum* var. *dentatum* Freyn ap. Celak. - Sudet.; cfr. Uechtr. durchf. phan. schles. 1883.

70. *H. onosmoides*; — ? *H. subrude* Arv.-Touv.; hab. etiam in dep. Loire plur. loc. (Le Grand, JHervier et al.).

**H. buglossoides* Arv.-Touv.; hab. etiam Pierre-sur-Haute dep. Loire (Le Grand).

71. *H. oreades*; *Succ.* (ex Lindeb.) adest præcipue Upland. ad lacum Mälaren, ceterum rr. Ostrogoth. et Bahus.

72. *H. saxifragum*; Scand. add. sensu latiss., nam adest etiam in Fenn. mer.-occ.; ex Lindeb. deest in Suec. bor. plur. (sed in Norv. paullo ultra circul. polar. progreditur var.).

73. *H. lacerum*; *H. rupestre* Heg. (non All.). *H. Heerii* Brügg. (1860); non nisi in Helv. or. (mont.-subalp.) lectum videtur.

74. *H. canescens*; — *H. austriacum* Britting., Kern. (hab. pr. Steyr et alibi Austr.). — *H. Dollineri* Sz bip. (Friul., Carn., Graz; N.-Oestr.). — *H. eriodopodum* Kern. (Bavar. Tyrol. Carinth. Venet.); ex Uechtr.

Obs. Patria plantæ Schleicher. incognita est, sed specim. ejus authent. ad *H. Trachselianum* (vid. sub 77) pertinet ex Schumbach (1883).

75. *H. argenteum*; hab. etiam Hibern. (cl. Hart 1886).

77. *H. oxydon*; *H. saxatile* Schleich. *H. petraeum* Heg. (ex Gremli). — *H. Trachselianum* Christener (1860). Helv. Carinth.; indicatur etiam in m. Tatra Carpator. (an verum?).

78. *H. lasiophyllum*; a specie seq. (*H. Schmidtii* Tsh) vix distinguendum videtur. — *H. cinerascens* G.G., Fr. (non Jord., quod ex Arv.-Touv. est var. *H. murorum*); dep. Loire plur. loc. (JHervier 1885).

**H. graniticum*; hab. etiam in Austr.-Infer. (Oborny 1879).

79. *H. pallidum*; Gall. certe adest sil. in Mont Dore, Puy-Mary etc. Arvern.; deest in Suec. bor. ex Lindeb. — *H. Favrei* Wolf (ex Gremli). — *H. ceratodon*, *H. intricatum* et *H. cephalodes* Arv.-Touv. — ? *H. danubiale* Borb. (Budapesthini Hung.; Borb.); hoc cl. auctor 1877 cum var. *criniger* Fr. comparat, sed 1878 pro specie propria habet.

80. *H. rupicolum*; Siles. (m. Riesengebirge). Bavar. bor. Würtemb. plur. loc. (ex Gcke); Helv. non nisi in Vales. lectum dicitur. — *H. pallidiforme* Arv.-Touv. ex Grml. (Cantal etc.).

**H. Mureti* Grml. *H. politum* Christen. p. p. (non Fr.). - *Bundia* Helv. mer. (alp., subalp.).

81. *H. pannosum*; Atticæ m. Parnes et Phthiotidis m. Oeta (: Heldreich). — *H. taygeteum*; Bosn. mer. (in rupibus m. Suha gora: GBeck 1885).

82. *H. Friwaldii*; Thrac. m. Hæmus supra Kasanlik (: Janka) ex Boiss.

85. *H. chalcidicum*; — *H. athoum* Grsb. (1874). *H. Waldsteinii* Grsb. antea. (Monten. Serb. mer.).

86. *H. lanatum*; Transs. (Schur) ad *H. villosum* (136) pertinet ex Smk. — *H. gymnocephalum* Grsb. ap. Pntek in oe. bot. z. 1873; Pntek adn. (Monten. ad m. Kom; Pantocsek 1872; Bosn. mer.: GBeck 1885); sec. b. Uechtritz est = subspecies (*H. calophyllum*) nisi potius forma *H. Orieni* Kern. (sub eadem).

88. *H. Jankæ*; *H. marmoreum* Grsb. ap. Pntek (non Vis. Panc.); in m. Treskovac pr. Svinica a Janka detectum est (1870).

89. *H. Liottardi*; pr. Culoz dep. Ain a Le Grand lectum est.

90. *H. tomentosum*; — *H. pteropogon* Arv.-Touv.

**H. Laggeri* Jord. — *H. gombense* Lagg. exs.

91. *H. andryaloides*; Helv. non nisi in mt Salève (pr. Genevam) adest teste Gremli.

92. *H. pellitum*; patria hujus speciei, jam observ. cl. Lacaita, erronee Hisp. indicata est, habitat enim in Ligur., Pedem., Delph. (Limone est pagus

pr. Col di Tenda in Ligur.; locus Gueriacco ibidem situs est et ad plantas a Reuter lectas sæpe citatur). *H. sublanatum* Arv.-Touv. *H. pseudolanatum* Arv.-Touv. — *H. floccosum* Arv.-Touv. *H. Chaboissei* Arv.-Touv. ex Rouy (*H.-Alpes Delph.*, r.).

95. *H. rupestre*; hæc species in Helv. (mer.) indicata est, sed teste Gremli ibi non crescit (cfr. 97 * *H. Heerii*).

96. *H. Sartorianum*: var. *Leithneri* Boiss. or. suppl. *H. murorum* var. *Leithneri* Heldr. Sart. in sched.

97. *H. humile*; Helv. in montanis et subalpinis sat obvium, sed non copiosum; Styr. etiam extra Alpes lectum est (in Weizer-Klamm pr. Graz et in m. Sulzbach.); adest etiam in Würtemb. (alp.) et Alsat. (Pfirt) ex Geke; in Bosn. mer. a GBeck lectum est (var. *sarajevense*). — ? *H. adenophyllum* Scheele.

**H. Heerii* Brügg. (1862 et 1874). *H. rupestre* Heg. Heer (non All.). *H. lacrum* Christener (1863)? - Helv.

98. *H. scapigerum*: *Phthiotidis* m. Oeta, 4600—6000' (: Heldreich).

99. *H. lingulatum*; — *H. depilatum* (cfr. Lindeb. in Htn handb. ed. XI. 41); loca suecica citata sunt: Jemtia mer.-occ., Herjed. (m. Ljusnestöten).

100. *H. Bocconi*: *Carinth.*; Helv. non nisi in Alpinis (Bundiae, Valesiae) adest.

101. *H. sudeticum* (Sternb. pro min. parte ex Uechtr., quare nomen *H. pedunculare* Tsh potius adhibendum). *H. alpinum* Tsh (non Fr.). Sudet. (occ.) species endemica teste Uechtritz. — *H. personatum*; sec. Lindeberg (1879) in propriam speciem restituendum est; in Norv. plurib. loc. lectum, in Jemtia rr. — ? *H. bellidifolium* Froel. (Carinth. alp.).

102. *H. bohemicum*; ex Uechtritz est *H. sudeticum* Sternb. pro max. parte et Sudetis (occ.) privum.

**H. chlorocephalum*; minime hybr. est et *H. Bocconi* (100) proximum ex Uechtritz (in litt. 1881).

103. *H. eximium*; hab. etiam in Sudetis (Glatzer Schneeberg, Gesenke). — *H. calenduliflorum*; etiam hoc in Glatzer Schneeberg adest ex Uechtritz.

**H. Uechtritzianum* Schneider (1886). Sudeti occ. (Riesengebirge), r.

104. *H. alpinum*: Island. Lapon. — *H. montanum* Schneider (1886) non Jacq. *H. Fritzei* FSz p. p. (Riesengeb. copiose, Tatra Carpator.). — *H. tubulosum* Tsh. non Lam. (Sudeti). — *H. lorophyllum* Arv.-Touv. *H. alpinum* gracile Lindeb. hier. scand. exs. 109 ex Arv.-Touv.

**H. rheticum*; *H. fuliginosum* Rehb. f. ex Gremli; hab. in summis Alpibus.

105. *H. nigrescens*: Island. or. (Strömfelt 1883). Lapp. (Læstadius ex Lindeb.). Ross. arct. (: Ruprecht). Tatra Carpator. Transs. (Smk.) cum — ? *H. peliophyllum* Schur. — *H. decipiens*; *H. alpinum* melanocephalum Wimm. (in m. Riesengeb. freq. et hab. etiam in m. Tatra Carpator.); species optima et a *H. nigrescente* valde diversa dicitur. — *H. gracilentum* (quod hab. etiam Norv.) et *H. globosum* (hoc etiam in Lapp. ad Kvikkjokk: Ands.) ad præced. (*H. alpinum*) pertinent ex Lindeb. — *H. cochleare* Huter. (Tyrol. mer. m. Roën: Huter 1883).

**H. glandulosum-dentatum* Uechtr. in jahresb. schles. 1875. Sudeti occ. (Riesengeb.). — *H. apiculatum* Tsh. - *H. tortuosum* Tsh.

106. *H. submurorum*: Siles. (Riesengeb.) ex Uechtr.; loca suec. (ex Lindeb.) sunt: Herjedal. (m. Ramansberget: Axel), Jemtia (m. Åreskutan etc.), Lapp. (: Læstadius).

**H. nigrum* Uechtr. in jahresb. 1872. *H. amplexicaule* Tsh (non L.). *H. epimedium* Celak. (non Fr.). - Sudeti (Riesengeb., Gesenke).

107. *H. ligusticum*; in Helv. rarum est: Valais (Lourtier, Iserable), Bernerob. (Meiringen). *H. amplexic. aureum* Gaud. ex Grml.

108. *H. pulmonarioides*; Helv. hab. in rupibus et muris, species præced. in subalpinis; Transs. (Schur ex hb. Bmg.) ad *Crepidem viscidulam* pertinet ex Smk. — *H. valesiacum* Reut. (non Fr.). *H. pulm. glaucescens* Grml. (non alior.). - Vales. (Simplon, Iserable).

**H. Reichenbachii* Verlot (cat. 1879). *H. ligusticum* Rehb. ic., Reut. (non Fr.). Grenoble Delph.; Helv. (m. Salève pr. Genevam, Fort de l'Ecluse, Yverdon). — ? *H. urticaceum* Arv.-Touv. (Delph.). Comment. 180.

109. *H. amplexicaule*: Gall. mer. (Occitan.) etiam Lozère, Gard; Ital. etiam in mts Ernici prov. Rom. or. (: Baldini et Pelosi 1886). - Batav. (Maastricht, Tongern) in muris vetustis etc. indicatur, certe e cultura in hortis inquilinum. — *H. viscosum* Arv.-Touv. *H. lactucaefolium* Arv.-Touv. olim (p. p.); ex Rouy in bull. soc. bot. 1882. 349. (Gall. mer.). — ? *H. pseudopulmonarioides* Pacher 1882. (Carinth., rr.: Pacher 1844).

110. *H. pseudo-cerinthæ*: Galloprov. (Vigan dep. Gard, altit. 1200 metr.). — *H. Reuteri* Rehb. f. (in Consp. sub 108 allatum) huc pertinet ex Gremli.

**H. Legrandianum* Arv.-Touv. ap. Le Grand in bull. soc. bot. 1884. 186 (*). - Pyren. or.: Vernet-les-Bains (: Germain), Prats-de-Mollo (ex Arvet-Touv.).

114. *H. neo-cerinthæ*; — *H. sericeum* Lap. p. p., nam species Perous. collectiva est, tam hoc quam *H. cerinthoides* (124), *H. phlomoides* (118) et *H. saxatile* (119) amplectens (ex Loret).

118. *H. phlomoides*: Mallorca Balear. (Puig de Torrella, P. de Massanella etc.); Serra de Soller: Burn. Barb.). — ? *H. cordifolium* Froel. vix Lap. (Pyren.).

118. *a.* *H. mariolense* Rouy in bull. soc. bot. 1882. 15 (*). - Valenc. (Sierra Mariola, rr.: Rouy).

119. *H. saxatile*; Gall. mer. hab. etiam depp. Gard, Alpes-Marit.; Sabaud. (: Burnat).

119. *a.* *H. lividum* Arv.-Touv. (litt. 1878) suppl. hier. 9. - Arvern. (Mont-Dore, Puy-de-Dôme, r.). — *H. falcidens* Arv.-Touv. ap. Lmtt. 1881. (Mont-Dore, r.).

112. *H. valdepilosum* (*H. virescens* Schleich. ex Grml.); hab. etiam Helv. mer.

124. *H. cerinthoides*; indicatur etiam Arvern. (Mont-Dore, r.).

**H. longifolium*: Arvern. (Cantal, puy Mary etc.). Carinth. (Guilthal 1859: Pacher); Helv. non nisi in Alpibus adest.

125. *H. Mougeoti* Froel. in K. syn. (1837). *H. decipiens* (1838). *H. juranum* Rap. (1842) non Fr.: Alpes occ. (Helv.). — ? *H. sonchoides* Arv.-Touv. suppl. hier. 8.

**H. remotum* (sphalm. *nemorum*) Jord.: m. Forez, Pierre-sur-Haute.

126. *H. olivaceum*; — ? *H. oleovirens* Arv.-Touv. 1876. (Collioure Pyr. or.: Guillon).

127. *H. anglicum*; hab. etiam in Hibern.

131. *H. speciosum*: Bavar. (Spitzingsee Alpium: Prantl); Helv. hab. in Alpibus (vall. Binnthal, Bagne etc.), r.

133. *H. flexuosum*: Montenegro (m. Kom: Pntek); Transs. ad *H. villosum* (136) pertinet ex Smk.

134. *H. scorzonæfolium* (*H. glabratum* K. ex Grml.): Bosn. (Brandis ex Freyn). — *H. Rapini* Grml. *H. speciosum* Rap. non Horn. (Valesia Helv. mer.). — *H. chlorifolium* Arv.-Touv. — *H. callianthum* Arv.-Touv.

**H. nudum* nob. *H. villosum* var. *nudum* G.G.; *H. elegans* Arv.-Touv. 1876 (non alior.). - Delph., ibique alpibus Villars-de-Lans primum videtur ex Arvet-Touv.

135. *H. glabratum*: Bavar. (Alpes). Styr. (Alpes, subalp.: Maly). Bosn. mer. (: GBeck); Helv. dubia videtur (Gremli e sola Tyrol. vidit). — *H. Czerei-anum*; *H. carpaticum* Schur (Bess.?). *H. sudeticum* auct. transs. (ex Smk.). *H. subnigrescens* Smk. — ? *H. trichoneurum* Prantl. (Alpes Bavar., r.).

**H. calycinum* Arv.-Touv. (1876). - Mte Viso.

**H. Jaborneggi* Pacher in jahrb. d. landes-mus. 1882. - Carinth. subalp. (Jaborn. 1867).

136. *H. villosum*; Styr. hab. etiam ad Graz, Cilli, Sulzbach. — *H. elongatum*; hab. in Alpibus et Jurasso. — *H. villosolanicum*; ad subspeciem pertineat. — *H. bernense* Christener (non Christ); hab. in Alpibus helvetic., r.

**H. eriophyllum* W. - Pedem. (vall. Aosta). Alpes-Marit.; ex Gremli.

137. *H. dentatum*: Bavar. (Alpes). Styr. rarius adest. Helv. non nisi in Alpibus (*H. pallascens* Gaud. *H. macrophyllum* Schleich. ex Grml.). — *H. Baumgartenianum* Schur (ex Freyn). — *H. Gaudini* Christener 1863 (nec Christ). Helv. Carinth.; varr. *H. pilosum* et *H. subnudum* sunt hujus synonyma ex Gremli, cui species propria. — *H. salævense* Rap. (Helv. m. Salève).

**H. pseudoporrectum* Christener. - Helv. — *H. Neilreichii* GBeck ex Freyn. (Bosn.).

138. *H. incisum*: Carinth. (alp. Pasterze etc.). Bosn. (: Brandis ex Freyn); Helv. p. d. exclud., sed adest in Bernina Heuthal.

139. *H. piliferum*; hab. etiam (r.) Arvern. (Cantal) ex Lmtt. fl. plat. centr. (1881). — ? *H. Kokeilii* Pacher (1882); hab. alp. Cordin in Gailthal (: Pacher 1859).

**H. fuliginatum* Huter. Gander (in Consp. sub 167 *H. subnivale* enumeratum). Carinth.

140. *H. glanduliferum*; hab. etiam (r.) Arvern. (Mont-Dore: Lamotte).

140. *a.* *H. armerioides* Arv.-Touv. ess. 48. *H. Murithianum* Favre. *H. penninum* Rap. - Delph. Sabaud. Helv. mer. (Simplon, St-Bernhard). alp. — *H. trichocladum* Arv.-Touv. (Alpes-Marit., Zermatt Helv.). — *H. nigritellum* Arv.-Touv.

143 * *H. Tommasinii*: Croat. (vall. Recina pr. Fiume: A-M.Smith). Dalm. (ins. Veglia: Borbás 1877; Bocche di Cattaro: Pichler 1870 nom. *H. croatic.*).

144. *H. glaucum*; — ? *H. Nægelianum* Panc. 1875. (Monten. m. Kom).

**H. leucophæum*; *H. Godeti* Christen. ex Arv.-Touv. - Jura (Creux du Van).

144. *a.* *H. Burnati* Arv.-Touv. in Burn. Grml. hier. alp. marit. 57. - Alpes-Marit.

145. *H. undulatum*: Aetol. m. Korax et Eurytan. m. Velucho reg. alp. (: Heldreich).

146. *H. saxetanum*; — *H. porphyriticum* Kern. (1863). *H. saxatile* et *H. glaucum* auct. transs.

**H. glaucopsis*; — *H. Delasoiei* (err. *Delasorii*): Helv. mer. — ? *H. arenicola* Godet. *H. saxatile* Lagg. exs. - Helv. mer., r. (vallée de Conche, Bulle).

? 146. *a.* *H. Kotschyianum* Heuff. in Flora 1853; cfr. Simonk. enum. 375. — Transs. Banat.

148. *H. illyricum*: Istr. (præsertim in Mala Utzka: Freyn).

149. *H. bupleuroides*: Bosn. mer. (GBeck: *H. Schenkii* Grsb.); Transs. ad *H. porphyriticum* (146—) pertinet ex Smk. — *H. juratense* Grml. (Jura, Salève, Bex).

150. *H. politum*; — *H. Arvetii* Verl. cat. 1879. *H. glaucum* var. *politum* Arv.-Touv. *H. Grenierianum* Arv.-Touv. (Grenoble Delph.).

151. *H. porrifolium*; Helv. exclud. est ex Grml.; Transs. ad *H. porphyriticum* (146—) pertinet ex Smk.

152. *H. staticifolium*; Transs. deest ex Smk. — *H. gadense* Wiesb. (1881). Austr.: Gaden (Anniger) et Baden.

153. *H. sparsum* (cfr. 60. *a.*). — *H. cernuum*: Bosn. (*H. silesiacum* Uechtr. olim); Hung. (Hohe Tatra) ex Pax 1883.

154. *H. florentinum*: Bavar. Carinth. Styr. (ex Maly). Istr. Croat. (pr. Fiume). Græc. bor. (Pindus Tymph. ad jugum mont. Zygos: Haussknecht); ad Bastia Cors. leg. Debeaux (ex Le Grand).

**H. Pavichii*: Bosn. mer. (m. Trebovic pr. Sarajevo: GBeck 1885).

155. *a.* *H. adriaticum* Næg. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 370. — Istr. Dalm.

156. *H. præaltum*; Belg. lectum est in muris pr. Freyr, Huy (ex Crepin probab. introd.). Suec. (ex Lindeb.) adest, sed typicum non nisi Medelpad. (m. Getberger) lectum videtur; var. *hirsuta* K. aliquot locis valde dissitis ibi (in Suec.) lecta est.

158. *H. glomeratum*: Norv. (in centr. alpestri sat vulgatum ex Lindeb.). Suec. (in mer. rarior). Fenn. Siles. Ross. med., mer. - *Pilosella grisea* et *P. galactina* Norrl. — *P. detonsa* Norrl. (*H. glomeratum* auct. fenn.).

159. *H. cymosum*: Gall. centr. (Cantal); vid. Arv.-Touv. in Magn. scriin. (II.) 52.: Moldav.; in Germ. bor.-occ. deest ex Gecke. — ⁶*H. neglectum* Norrl. (*H. cymosum* auct. fenn. p. p.); *H. cymosum* ipsiss. (*H. poliotrichum* Wimm.) in Fenn. deest ex Norrlin. — *H. umbelluliferum* Arv.-Touv. ess. pl. dauph. ex ipso (1883). *H. dubium* alpestre Lindeb. hier. scand. 17 (ex Arv.-Touv.).

**H. Vaillantii*; *H. glomeratum* Lindeb. ap. ABlytt. *H. cymosum* var. *pubescens* Lindbl. *H. cymosum* * *pubescens* Fr. *Pilosella pubescens* Norrl. — *H. cymigerum* (Saxon., Thuring.) ad *H. glomeratum* (158) pertinet ex Lindeb. — *H. poliotrichum* est (ex Lindeb.) = *H. cymosum* validius pilosum (etiam Suec. et Norv., aliquot locis dissitis, lectum est).

**H. (Pilosella) suomense* Norrl. *H. cymosum* auct. fenn. p. p. - Fenn. (exc. occ.).
**H. (Pilosella) arctogenum* Norrl. (1884). *H. cymosum-setosum nigrescens* Lindbl. (1841). *H. sabinum norveg. herbar. var. ex Norrl.* - Norv. bor., med. (Suec. et Fenn.).

160. *H. sabinum*: Carinth.(?). Croat. (Fiume in valle Recina: A-M.Smith); Helv. pertinet ad var. *H. multiflorum* (Alpes mer.). — *H. Laggeri*; probab. melius militet sub *H. glaciale* (166), quod cfr.

**H. atticum*; sec. Uechtritz (1881) est e grege *H. præalti* et formæ tales etiam alibi occurrunt.

161. *H. setigerum*: Dobr. Valach. (pr. Virciorova: Jka). Morav.; ex Uechtritz (1881) *H. setigerum typicum* (Tausch.) in Suec. vix adest et loca suecica ad subspeciem (*H. Rothian.*) pertineant.

**H. Rothianum*: Fenn. Ross. balt.

162. *H. echiioides*: Roman. — *H. albo-cinereum*; hab. Ingria, Polon. etc.

164. *H. petræum*; — *H. oreades* (*H. Heuffelii* Jka) non est e Rosellis sed accedit ad *H. sabinum* (160), cui in Consp. cum dubio allatum est.

165. *H. alpicola*; Helv. hab. in sola mer. (Simplon, Saas, Zermatt, m. Legnone in Valtellina); sec. Grsb. etiam in m. Tatra Hung. (*H. angustifolium* Herbieh?) et in m. Kom Monten. provenit.

166. *H. glaciale*: Sabaud. (col de Bonhomme: St Lager); Helv. non nisi in Alpibus summis adest; Transs. (*H. breviscapum* Schur) ad *H. Auricula* pertinet ex Smk.

**H. Laggeri* Sz bip.; Fr. epier. *H. glaciale* var. *Laggeri* Christener. - Carinth. Tyrol. mer. Helv. mer. (Alpes). Delph. Sabaud. Pedem. Ligur. (Alp.-Marit.).

167. *H. subnivale*; adest Sabaud. (: Gremli!) et hab. etiam Pedem. (sapius ultra 2000 metr. s. m.), e cujus valle Maira nomen *H. Mairani* ortum est.

169. *H. aurantiacum*; Bavar. etiam extra Alpes (sporadice) adest; Pomeran. lacus Kargen-See nunc exsiccatus est et cl. Sydow in fundo ejus turfoso hanc plantam detexit (1877). -- *H. subfuscum* Schur. (Transs.). — *H. subauratum* Schur. (Transs.).

**H. rubrum* Peter in Flora 1881 (*). Riesengeb., Gesenke. - Sec. Fiek. Flora von Schlesien (1881) est solum varietas *H. aurantiaci*, botanicis silesiacis bene cognita et etiam in Alpibus proveniens.

170. *H. decolorans*; Suec. non nisi in Herjedal. et Jemtia (circa lac. Åre) lectum videtur; Fenn. ad *H. kajanense* (175. a) pertinet.

**H. elatum*; cfr. *H. pratense* (172).

171. *H. flammeum*: Fenn. (Tavastl. etc.; *H. decolorans* Norrl. olim non Fr.). — * *jemtlandicum* Norrl. in act. soc. f. fl. fenn. 1888.

**H. Pseudo-Blyttii*; — *H. (Pilosella) pulvinatum* Norrl. (Fenn. or., Ingria: *H. decolorans* Meinsh. ex Norriin). — ? *H. dimorphoides* Norrl. (Fenn. centr.).

171. a. *H. onegense* Norrl. (1878). *H. flammeum* ej. olim. - Fenn. or. (Karel.). Ingria (ex Norrl.); etiam Siles. et alibi (immo Herceg.) sec. Norrlin.

172. *H. pratense*: Moldav. Helv. (St-Gallen); Suec. non nisi duobus locis in mer. indig. dicitur, sed paucis aliis in med. et mer. inquilinum. - *H. dimorphum* Norrl. 1870 ex ipso. (Fenn. med., mer.).

Obs. Sec. cl. Norrlin *H. elatum* Lindeb. (170 *), Smolandiam inhabitans, est verum *H. pratense*, sed *H. pratense* auct. scand. (Fr. hb. norm. VI. 10, Lindeb. hier. exs. 15 = *H. pratense* obovatum Tsh) speciem sistit distinctam (: *H. horticola* Norrl. 1884). Ex b. Uechtritz (litt. 1881) *H. elatum* Lindeb., optimum et typicum, in Silesia vulgatum est et pratorum meliorum *H. pratense* sistit.

173. *H. floribundum*: Island. (: Grönlund et al.: var. *islandicum* Lge). Fenn. (Tavastl., Karelen). Galiz. Morav.; Helv. (observ. Gremli) erronee indicatur; Transs. ad *H. Bauhini* (156—) pertinet ex Smk.

**H. iseranum* Uechtr. (Fiek flora von Schles.). *H. floribundum* var. *montanum* Wimm. - Sudeti occ. (Iserwiese, Riesengeb. plur. loc.).

175. *H. suecicum*: Island. Suec. a Bothnia ad Ostrogothiam, Norv. a Nidarosia ad Christianiam adest ex Lindeb. (in Lappon. deest). Ross. balt.

(: Klinge). Polon. (pr. Losice: Karo). Galiz. (vall. Pruth.: Rehmann). Siles. plur. loc. ex Fiek (varietas ad subspeciem præced. pertinet). - De hac specie (et de *H. floribundo*) cfr. animadversiones criticas b. Uechtritz in durchf. schles. 1884. 5 (*).

**H. fennicum*: Fenn. occ., bor.-occ. (exc. Lapp.). — *H. (Pilosella) chrysocephalum* Norrl. (Fenn.). — *H. (P.) ventricosum* Norrl. 1884. *H. suecicum* Norrl. olim. (Fenn.). — *H. (P.) discoloratum* Norrl. (Fennia, Ingria).

**H. (Pilosella) brachycephalum* Norrl. 1884. (Fenn. plur.). — *H. (P.) cochleare* Norrl. *H. cochleatum* ej. 1888. (Fenn. bor., Norv., Jemtia); vid. ap. Norrlin in act. soc. f. fl. fenn. 1888.

**H. (Pilosella) subpratense* Norrl. (1884). Fenn.

175. *a. H. kajanense* Malmgr. *H. decolorans* Sæl. (non Fr.). - Fenn. centr., bor. (cfr. n. 170).

179. *H. brachiatum*: Moldav.; Transs. ad *H. hungaricum* (181—) pertinet; cfr. *H. bifurcum* (181). - *H. banaticum* (Heuff. 1858) nunc dicitur hybr. et = *H. asperifolium* Schur.

180. *H. cernuum*: Siles. or. (m. Beskiden: Wichura) Hung. (m. Tatra).

181. *H. bifurcum*: Norv. (Mallöen) ex Lindeb. — *H. hungaricum* Smk. *H. brachiatum* auct. hung. et morav. (ex Borbás et Oborny) nec non transsilv. (ex Smk.). *H. pseudobrachiolum* Celak.

**H. auriculeforme*: Morav. Bosn. (: GBeck).

**H. castellatum*; ex b. Uechtritz (litt. 1881) est species omnino propria et a proximis valde diversa.

183. *H. stoloniflorum*: Galiz. (: Knapp). Bosn. (: Brandis ex Freyn). - Transs. ad subspeciem pertinet ex Smk.

**H. versicolor* (1856). *H. Moritzianum* Heg. Heer (1840): Helv. Morav. etc. - Sec. Kerner et Nägeli est hybr. a *H. aurantiaco* et *H. Pilosella*.

184. *H. Pilosella*; in Lapp. norv. (Norv. arct.) adest multis locis et usque ad lat. 70° 41' progreditur (ex Norman) — *H. macranthum* (*H. leucocephalum* Vuk. ex Barbey): Hisp. mer.-or. (: Rouy). Bosn. mer. (m. Trebovic pr. Sarajevo: GBeck); etiam Croat. et in Hung. centr. freq. adest ex Borbas.

**H. (Pilosella) exatum* Norrl. (1884). - Fenn. centr.

**H. (P.) tenuilingua* Norrl. (1884). - Fenn. centr.

**H. (P.) prasinatum* Norrl. (1884). - Fenn. centr., occ.

**H. (P.) coalescens* Norrl. (1884). - Fenn. plur. Upland.

184. *a. H. pseudo-pilosella* Ten. syll. 399. - Lucan. (mte Pollino etc.). Aprut. (mte Majella). Thrac. (*H. Pilosella* var. *byzantina* Boiss. or.), etiam m. Rhodope (: Dingler).

185. *H. sphærocephalum*; Helv. hab. non nisi in Alpib. summis Bundiæ (les Grisons), Bernæ (Berneroberl.) et ? Vales. — ? *H. raiblense* Huter. (Raibl Carinth.: Huter 1875).

× *H. asperifolium* Schur = præaltum + cymosum. (Transs.).

× *H. bihariense* Kern. = aurantiacum + nigrescens. (Hung. Transs.).

× *H. budense* Borb. = auriculoides + macranthum. (Hung.).

× *H. cinereum* Tsh. = *Pilosella* + *setigerum*. (Germ.); vid. ap. Hausskn. in mitteil. bot. ges. thür. 1887. 28.

× *H. Cotteti* Godet = humile + murorum? (Helv.).

× *H. Custorii* Brügg. = aurantiacum + glaciale. (Bundia).

× *H. Czetsianum* Smk. (*H. sulphureum* Neilr.) = *Auricula* + præaltum. (Transs.).

× *H. flagelliflorum* Celak. (*H. bifurcum* auct. mult.) = *echioides* + *Pilosella*. (Bohem.).

× *H. Lavernellei* Timb.-Lagr. = *eriphorum* + *jacobææfolium*. (Gall.).

× *H. naszdödense* Smk. = *Auricula* + pratense. (Transs.).

× *H. nigricans* Næg. Peter (non alior.) = *floribundum* + *Pilosella* (ex Uechtr.).

× *H. pseudocymosum* Borb. = *Bauhini* + cymosum. (Hung.).

× *H. Pseudo-Schmidtii* Schur = murorum + subcaesium. (Transs.).

× *H. Rackii* Vuk. = *Pilosella* + *piloselloides*. (Croat.).

× *H. Reboudianum* Arv.-Touv. = amplexicaule + andryaloides. (Gall.).

× *H. Rotæ* Brügg. = *piloselloides* + glaucum. (Bergamo).

× *H. sphærocephaloides* Lge. = *Pilosella* + pratense. (Dan.: *H. Blyttianum* Rostrup).

× *H. subcollinum* Celak. = *Pilosella* + auriculoides. (Bohem.).

× *H. tömösen* Smk. = murorum + transsilvanicum. (Transs.).

× *H. Wolfgangianum* Borb. = *echioides* + macranthum. (Hung.).

115. *Crepis*. 1. *C. sibirica*: Fenn. mer.-or. (Carel. olonets.).

3. *C. viscidula*: Transs. Bulgar. m. Vitos (Velenovsky 1885), Balkan etc. (Velen. 1887). *C. nigra* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1886. 28 sep. (ex ipso). Hierac. foliosum et *H. amplexicaule* auct. transs. ex Smk.
5. *C. alpestris*: Bavar.; in m. Jurasso deest; Transs. (Schur, Fuss) ad Hieracium Czereianum (135—) pertinet ex Smk.
7. *C. jubata*; Helv. hab. in Alpibus Valesiæ (r.) et Bundiæ (Engadin, in jugo mont. Samnaun, alt. circ. 3000 metr; vid. ap. Killias 216).
8. *C. montana*: Alpes-Marit. (col della Maddalena: Loret). Bavar. (Alpes). Moldav. (alp. Bucieciu vall. Jalomnita). - Transs. ad *C. grandiflor.* (4) pertinet ex Smk.
9. *C. hyoseridifolia* (*C. tergloviensis* Kern. 1881); Helv. non nisi in Alpibus omnibus sed imprimis in orientalibus et algoviensibus. - Transs. deest ex Smk.
10. *C. Sieberi*: Ins. Jon. (Cephalon. pr. Argostoli: JSchmidt ex Heldr. Ithaca: Spreitzenhofer). — *C. Mungieri*: ins. Karpathos (: Pichler).
10. a. *C. smyrnæa* DC. prodr. VII. 170. - Atticæ m. Pentelikon (: Haussknecht 1885).
11. *C. lamsanoides*; hab. etiam Arvern. (Cantal) ex Lmtt.
**C. Murmanni* Boiss. or. suppl. 325. - Byzant. in collibus calcareis ad Flemur (: Murmann).
11. a. *C. geracioides* Hsskt ms. (litt. 1889). Græc. bor. (Pindus Tymph. in jugo mont. Zygos: Haussknecht).
13. *C. succisæfolia*: Ceven. (Lozère). Moldav.; Germ. bor. (ex Gcke) solum in Boruss. et Poson. adest; Helv. hab. præcipue in Jura, in Alpibus rara est.
14. *C. paludosa*: Fenn. Dan. (ubi in pratis et silvis humidis vulgata). Alpes-Marit. (r.). Moldav.; in Lapp. plur. deest.
15. *C. Jacquini*: Carinth. - Comment. 181.
16. *C. pygmæa*: Alpes-Marit. (mt Monnier, val de Strop etc.); Helv. hab. solum in Alpibus summis.
18. *C. aurea*: Bosn. mer. (m. Bjelasnica: GBeck 1885). Styr. hab. etiam in m. Sulzbach.
19. *C. Columnæ*: Aetoliæ m. Tymphrestes et Phthiotidis m. Oeta (: Heldreich).
22. *C. rigida*; Galic. (ex Knapp) dubia civis est, sed adest Morav. (distr. Klobouk), ubi a Steiger detecta 1880. Dobrud. in desertis et pratis apricis passim adest (: Uechtr. Sinten.).
24. *C. biennis*: Sard. (ex Reverchon). Halland. (pr. Halmstad). Bleking. (: Svanlund). Fenn. mer.-or. Ross. balt. (hinc inde ex Klinge), centr. (gub. Kursk). Bulgar. (ex Velenovsky). Thrac. (Rumel. or.) nuper a Skorpil (pr. Philippopol) lecta ex Velenovsky. — *C. lodomeriensis*; *C. transsilvanica* Schur (ex Smk.). — *C. taraxacifolia* Fr. sum. non Th. (Fenn. mer.-or.).
25. *C. nicæensis*: Gall. or. (dep. Vosges: Beshier); Lothar. nuper introd. est et præcipue circa Nancy inter Medicag. sativam freq.; etiam Angl. introd. et magis magisque inquil.; Helv. in cant. Vaud non rara (etiam Bern etc.). Dan. hinc inde cum seminibus extran. introducta est. Taur. (: CKoch).
26. *C. tectorum*: Fenn. Dan. (in agris et ad vias vulgata). Gall. bor.-occ. (Normand.), or. (Côte-d'Or). Moldav.; Helv. non nisi in mer., et quidem raro, lectum videtur; in Lapp. plur. deest. — *C. campestris* Schur ex Smk.
27. *C. virens*: Scan. (ad Ramlösa etc.). Bleking. (: Svanlund). Gotland. (pr. Visby). Moldav. Dobrud. Ross. mer.
**C. gaditana*: Lusit. ins. Berlenga (: Daveau 1883).
34. *C. pulchra*: Phalzia, Würtemb. Bulgar. (: Velenovsky). Dobrud. (in campis, pratis silvaticis, rarius: Ue.S.). - Belg. exclud. sec. Crepin fl. belg. 1884, sed species adest Luxemb. (pr. Mertert copiosa ex Gcke).

35. *C. præmorsa*: Fenn. mer.-occ. (in Tavastl. detecta a CJArrhenius 1861). Gall. bor.-or. (Lorraine). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky).

36. *C. incarnata*: Styr. pr. Cilli (ex Maly). — *C. dinarica* GBeck in ann. mus. vind. (1887) II. 169. Bosn. mer. alp. et subalp. (: GBeck).

42. *C. bulbosa*: Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich).

42. *a. C. Willkommii* Burn. Barb. not. balear. etc. 56. *Aetheorhiza montana* Willk. in oe. bot. z. 1875; ill. hisp. I. 25. *Crepis montana* Marès. Vigin. (non alior.). - Mallorca Balear. (præcipue reg. mont.: Willkomm detex. 1873).

43. *C. Triasii* (Nym. 1854; Willk. 1876). *C. balearica* Costa. *Barkhausia Triasii* Coss. in Bourg. exs. balear. 2762. - *Cambessedes* speciem hanc eximiam detexit pr. Esporlas ins. Majoræ, in rupibus montis qui prædio D-ris Trias imminet, et inde nomen dedit; sec. Barcelò in catena montium septentr. insulæ dictæ planta frequens est, et sec. Marès adest in omnibus cacuminibus abruptis ejusdem insulæ; hab. etiam in Minorca.

44. *C. rubra*: Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879) Ithaca ins. Jon. (Spreitzenh. 1877). Japygia (T. d'Otranto: HGroves).

45. *C. foetida*: Batav. (Maastricht: de Vries 1867). Balear. (r.). Bulgar. (ex Velenovsky). Moldav.; in Morav. (et probab. in Austr-Infer.) deest. - Transs. ad sequentem speciem pertinet ex Smk. — *C. byzantina*: Taur. (CKoch).

46. *D. rhoeadifolia*: Siles. pr. Gogolin (: Fiek 1878). Styr. pr. Marburg (ex Maly). Bulgar. (: Bornmüller). Rumel. or. Dobrud. (præcipue in desertis: Ue.S.).

47. *C. insularis*; adest etiam in Sard. ipsa ex Reverchon.

48. *C. albida*; — *C. macrocephala* hab. non solum in Catal. (ubi in Montserrat optima et pulcherrima). sed etiam in Arag. et Hisp. centr., sæpe in formam minorem, in Hisp. mer. prævalentem, transiens (Willk.).

48. *a. C. scorzoneroides* Rouy (exc. bot. esp.) in bull. soc. bot. 1884. 43. sep. (*). - Valenc. in rupibus montis Mongo pr. Denia (: Rouy 1883).

49. *C. alpina*; Transs. deest (sic etiam in hb. Bmg.) ex Smk.

50. *C. vesicaria*: Taur. (CKoch); Balear. in sola Mallorca (certe) lecta est (: Cambess., Marès). — *C. scariosa*: Sard. (leg. de Sardagna 1883).

53. *C. taraxacifolia*: Batav. (ex Suringar 1882). — *C. recognita*: Lotharing. (locis aridis, rarius) Voges. (: Beshier). — *C. præcox*: Gall. mer. (Gard) ex Lmtt.

56. *C. bursifolia*: Hetr. m. Argentaro (Duthie 1873); indicatur etiam in Hung. comit. Kraszn (vall. Körös. pr. Csueza: Dr Feichtinger).

58. *C. setosa*: Batav. (: Ankersmit 1876). Ins. Caprera (in horto Garibald. ex Barbey). Galiz. (r.). Moldav. Bulgar. Rumel. or. Ross. mer.-occ.; Morav. hinc inde inquil. adest et etiam in Gall. centr. et bor. vix nisi adventitia.

61. *C. Suffreniana*: Japygia (T. d'Otranto: Lacaita).

62. *C. bellidifolia*: Mallorca Balear. (Sierra Burguesa: Barcelò).

× *C. hybrida* Kern. = Jacquin + *hyoseridifolia*. (Tyrol.).

× *C. longifolia* Heg. = *alpestris* + *grandiflora*. (Helv.).

× *C. turicensis* Brugg. = *biennis* + *taraxacifolia*. (Zürich).

116. **Endoptera.** 1. *E. Dioscoridis*: Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich); Transs. ad *Crepidem* tectorum pertinet ex Smk.

117. **Lagoseris.** 1. *L. nemausensis*; Gall. in dep. Char.-Infer. immigrata est et ulterius progreditur ex Foucaud.

2. *L. bifida*: Valach. (pr. Virciorova). Bulgar. (ex Velenovsky). Dobrud. (: Ue.S.). Japygia (pr. Gallipoli: HGroves).

118. **Cephalorhynchus.** 1. *C. hispidus*: Valach. pr. Virciorova in saxosis ad Portam Ferream (: Borbás 1874). Rumel. or. (Slivno: Skorpil ex Velenovsky).

1. *a. C. glandulosus* Boiss. - Thessal. super. (: Haussknecht 1885). — cataractarum Simk. (1877). *Lactuca cataractarum* Simk. in litt. ad Boiss. (ad Portam Ferream, inter Virciorova et Guravoia, in silvis: Simkov.).

119. *Picridium*. 1. *P. tingitanum*; typic. in Hisp. non nisi pr. Cadiz (et in Balear.) lectum videtur (cfr. speciem seq.). — *P. hispanicum* adest etiam in Lusit. (Lisboa etc.).

2. *P. gaditanum*: Lusit. (Magn. fl. sel. exs. 598: var. lusitan. Rouy).

3. *P. intermedium*: Mallorca Balear. (in arenosis pineti pr. Belver: Willk.).

**P. prenanthoides* Rouy (exc. bot. esp.) in bull. soc. bot. 1884. 44 sep. (*). - Valenc. (in rubibus montis Mongo pr. Denia: Rouy 1883).

4 * *P. macrophyllum* (1870). *Reichardia macrophylla* Vis.; *P. vulgare* β scapigerum Vis. dalm.: Dalm. m. Orien. Bosn. mer. (in declivibus lapidosis ad Konjica: GBeck 1885).

120. *Zollikoferia*. 3. *Z. spinosa*; — *Z. cervicornis*; ex Willk. (ill. hisp. 25) est species propria, non nisi in Balearibus (ubi non rara) lecta.

122. *Zacyntha*. 1. *Z. verrucosa*: Ins. Jon. (Cephalon.: Heldr.; Ithaca: Spreitzenh.).

123. *Geropogon*. 1. *G. glabrum*: Mallorca Balear.; etiam in Cephalon. (ins. Jon.) a cl. Heldreich lectum est.

124. *Tragopogon*. 1. *T. eriospermum*; in Gallia, ubi cum *T. porrifolio* (sub nomine *Salsifis*) saepe colitur, etiam subsponte occurrit (Lmtt. fl. centr.) et forse est typus spontaneus a quo planta vulgo culta derivatur.

2. *T. porrifolium*: Moldav. Ross. mer.-occ.; in Cephalon. etiam a Heldreich lectum est.

6. *T. crocifolium*: Gall. centr. (Puy-de-Dôme). Mallorca Balear. (m. S' Escrop: Barcelò). - Helv. exclud., nam hæc species non nisi in latere italico montis S-Bernhard lecta est (ex Gremli).

6. *a. T. balcanicum* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1886. sep. 28 (*); cfr. in diar. ej. soc. 1888. 43 (sep.). - Bulgar. in summo m. Balkan pr. Petrohan (1886), dein (1887) in locis submontanis jugi ejusdem a Velenovsky lectum est; hab. etiam in Serb. (et probab. Maced.) ex eodem.

8. *T. elatius*: Rumel. or. (m. Balkan pr. Sedlarovo: Skorpil ex Velenovsky 1887).

10. *T. floccosum*: Dobrud. (: Uechtr. Sinten.).

10. *a. T. castellanum* Lev. in Ler. Lev. deux exc. (1880) 26 (*). - Hisp. bor. (ad pagum Alar del Rey Castil. veter.: Levier 1879).

11. *T. brevirostre*: Ross. mer.

12. *T. majus*: Istr. Moldav. Dobrud. (passim.: Ue.S.). Rumel. or. Græc. bor. (Thessalia: Haussknecht). - Helv. hab. in sola mer.; Transs. pertinet ad var. *T. campestre* (ex Smk.). — *T. campestre*: Ross. centr. (gub. Kursk). Hung. (Pesth. etc.). Banat. Transs. — *T. livescens*: Moldav. (in pratis salsis pr. Galate). — *T. Baylei* Lec. Lmtt. (Florac Gall. mer.) est solum status morbosus speciei ex ipso Lamotte (1881).

14. *T. orientale*: Moldav. (r.). Curland., Livon. mer. (pr. Riga). Bulgar. (ex Velenovsky). Dobrud. (in pratis silvat., desertis, freq.: Ue.S.); in Gall. centr. cl. Lamotte (contra Boreau) hanc speciem numquam nisi advenam (rr.) observavit; Helv. freq. adest (*T. pratense* auct. helv.; *T. Shuttleworthii* Godet; ex Gremli). *T. transsilvanicum* Schur ex Smk.

**T. undulatum*: Ross. centr. (gub. Kursk). Roman.

15. *T. pratense*; exc. etiam Fenn. bor.; in Helv. rarum est (Vevey, Chur). — *T. longifolium* Lmtt (1881) non Heldr. *T. Lamottei* Rouy in litt. 1879 et in bull. soc. bot. 1881 (*). Arvern. (Puy-de-Dôme, Mont-Dore). — *T. Shuttleworthii* cfr. præc. (14).

**T. minus*: Siles. (*T. pratense micranthum* Wimm.).

16. *T. Samaritani*: Serb. (: Pancic, Petrovic). Bulgar. in collibus supra Knezevo et Konjavo (: Velenovsky 1887).

125. *Scorzonera*. 2. *S. stricta*: Hung. (pr. Grebenac) ex Borbâs, Bulgar. (: Velen., Skorpil).

5. *S. macrocephala*: observ. cl. Rouy (in bull. soc. bot. 1882) melius adhibetur nomen *S. graminifolia* L., ejus var. major sit *S. macrocephala* DC. et var. minor *S. pinifolia* Gou.

6. *S. hispanica*: Moldav. (in pratis humidis). Dobrud. (in pratis silvat. desertis, freq.: Ue.S.). Bulgar. (in calcareis saxosis: Velen.); in Helv. non nisi culta adest ex Gremli; Bavar. a Geke non citatur; Batav. lecta ex Abeleven (introd.?). — *S. glastifolia*; est potius subspecies vel forse typus spontaneus *S. hispanice* cultæ (num hæc unquam vere spontanea?). — *S. montana*: Pedem. vall. Aosta.

8. *S. austriaca*: Roman. Ross. centr. (gub. Kursk), mer.-or. (: Becker). — *S. glabra* Rupr. samoj. (Ross. arct.).

9. *S. humilis*: Roman.; per. Fenn. mer. distributa est, sed in or. non lecta. — *S. lanuginosa*: Moldav.

11. *S. parviflora*: Dobrud. (in pratis humidis salsis ad Kara-Nasib; Ue.S.).

12. *S. angustifolia*; de hac specie cfr. ap. Rouy in bull. soc. bot. 1882. sep. 14 (*).

15. *S. purpurea*: Bosn. (Brandis ex Freyn). Aetol. m. Korax reg. alp. (var. *pumila*: Heldreich). Ross. med. or. (N.-Nowg., Simbirsk).

**S. rosea*: Styr. (pr. Cilli ex Maly). Moldav.; hab. etiam in mte Majella (Abruz.) ex Kerner. — *S. rhodantha* Hsskt ms. (litt. 1889). Græc. bor. (Pindus Dolop. alp.: Haussknecht).

19. *S. hirsuta*; hab. etiam in prov. Veron. Ital. bor. (: Rigo).

20. *S. lanata*: Rumel. or.

23 * *S. Columnæ*; — *S. callosa*, ab ipso auct. cum specie Gusson. juncta, forse restituenda est; ins. Sardiniae endemica dicitur (cfr. Barbey sard. comp. 229).

Obs. *S. coronopifolia* Dsf. (atl. II. 220) ex Timb.-Lagr. in Gall. mer. (depp. Aude et Pyren. or.) lecta est.

126. *Podospermum*. 1. *P. laciniatum*: Moldav. Bulgar. (: Velenovsky); Helv. non nisi in Vales, lectum est. — *P. subulatum*; synon. Gouani ad *Scorzoneram macrocephalam* pertinet. — *P. angustissimum* Schur (ex Smk.).

**P. Tenorii*: Japygia (T. d'Otranto: HGroves); hab. etiam (r.) in Gall. mer. (Gard, Lozère) ex Lmtte.

3. *P. calcitrapifolium*: Alsat. (ex Geke). - Helv. exclud. ex Gremli. Transs. (Schur) ad speciem seq. pertinet ex Smk.

4. *P. Jacquinianum*: Bulgar. plur. loc. (: Velenovsky). Moldav. Ross. mer.-occ. *P. heterophyllum* Schur non CKoch (ex Smk.). — *P. canum*; hab. etiam Ross. mer.-or. (: Becker). — *P. ponticum* Stev. (Ross. mer. gub. Jekaterinoslaw). — *P. integrifolium* Schur (ex Smk.).

4. *a. pindicolum* Hsskt ms. (litt. 1889). Græc. bor. (Pindus Dolop. alp.: Hausskn.).

5. *P. villosum*: Moldav. Dobrud. (in montibus, desertis lapidosis, freq.: Ue.S.). Rumel. or. pr. Slivno (ex Velenovsky). Euboeæ m. Delphi (Pichler: var. *euboea* Boiss.). Ross. mer.: Bessarab. pr. Skuljani (: Irschesniowski ex Lindem.), Cherson (: Lindem.), Sarepta (: Becker).

128. *Urospermum*. 2. *U. picroides*: Croat. (pr. Fiume in pratis siccis: A-M.Smith).

129. *Picris*. 1. *P. laciniata*; *P. hispidissima* (Istr., Dalm.) forse separanda est; vid. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881. 382.

3. *P. hieracioides*: Fenn. mer. Roman. Bulgar. (: Velenovsky). — *P. monticola* Lmtte. (Mont-Dore Arvern.).

**P. crepoides*; — *P. sonchoides*; Transs. nunc a pluribus lecta est. — *P. auriculata*: Arvern. — *P. prenanthoides* et *P. oligocephala* Schur ex Smk.

**P. Villarsii*; hab. etiam Helv.

5. *P. spinulosa*: Croat. (pr. Fiume) ex Freyn. Istr. (: Freyn). Dalm. ex Freyn (pr. Spalato a Studniczka lecta). — *P. corymbosa*; cfr. ap. Bonnet in Magn. scriñ. I. 46—47.

6. *P. pauciflora*; hab. etiam Taur. (: Rehmann ex Boiss.).

130. *Leontodon*. 1. *L. fasciculatus*: Græc. bor. (Pindus: Heldr. 1885).

5. *L. asper*: Moldav. Dobrud. (: Uechtr. Sint.). Bulgar. (: Velenovsky). Bosn. mer. (GBeck 1885). Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht). Japyg. (T. d'Otranto: HGroves). *L. crispus* Neilr., Janka, Schur (non Vill.).

**L. biscutellæfolius*; planta italica (cum synonym. Ten.) pertinet ad *L. saxatilis* (8 *) ex observ. cll. Ball et Lacaita.

8. *L. crispus*; Helv. (mer.) indicatus est in cant. Ticino, sed sec. Gremli non omnino certe.

**L. saxatilis*: Bulgar. (: Velenovsky). Japyg. (T. d'Otranto: HGroves: etiam a Lacaita lectus in calcareis pr. Taranto). Neap. (in ins. Capri et in collibus ad Amalfi: Lacaita).

10. *L. alpinus*: Alpes-Marit. (Tenda, Ste-Agnes, alt. 650 metr. supra Mentone; etc.).

11. *L. incanus*; Transs. ad *L. hispidum* (14—) pertinet ex Smk.

12. *L. Berinii*; hab. etiam Carinth. (Raibl: Jabornegg).

14. *L. hastilis*; exc. etiam Fenn. bor. — *L. hyoseroides*: Helv. mer. — *L. longifolius* et *L. asperrimus* Schur (ex Smk.).

17. *L. pyrenaicus*: Alpes-Marit. (in alpinis omnibus sat adest ex Ardoino). Galiz. Moldav. - Helv. non nisi in Alpibus obviam venit.

**L. croceus*: Carinth. — *L. Pollinii*: - *L. medius* Smk. *Apargia media* Host. A. aurea Bmg. (ex Smk.). *L. Pseudotaraxaci* Schur (ex Smk.).

19. *L. Taraxaci*: Bavar. (Alpes, præcipue algov.). Galiz. Moldav.; Helv. non nisi in Alpibus summis adest (*L. nivalis* Heg.); Transs. ad *L. pratensis* Rchb. (20—) pertinet ex Smk.

20. *L. autumnalis*: — *L. Taraxaci*; *L. oligocephalus* Schur (ex Smk.). — *L. alpestris* Heg. (Helv.).

131. *Thrincia*. 2. *T. hispida*; Transs. (Schur) ad *Leontodon* (14—) *hispidum* pertinet ex Smk.

3. *T. hirta*: Moldav. Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn.); Helv. non nisi in cant. Ticino, Vaud et Genève hab.; Transs. ad *Leontodon* (14—) *hispidum* pertinet ex Smk.

132. *Hypochoeris*. 1. *H. maculata*: Fenn. mer. Dan. (per omnes provinc. sed sporad. vel raro). Roman. Bulgar. (: Velen.).

2. *H. uniflora*: Voges. (: Beshier). Alpes-Marit. (alp. Tenda etc.). Helv. non nisi in Alpibus adest.

4. *H. radicata*: Moldav. Bulgar. (ex Velenovsky).

5. *H. glabra*: Siles. Styr. (ex Maly). - Helv. (ubi Basiliæ indicata est) exclud. ex Gremli. — *H. glabra* auct. transs. est (ex Smk.) var. minor speciei præced. (= *H. subalpina* Schur).

133. *Metabasis*. 1. *M. cretensis* (Heldr. hb. norm. 855): Japygia (Otranto, Gallipoli: HGroves).

137. *Scolymus*. 2. *S. hispanicus*: Dobrud. (ad litus Ponti, rarius). Bulgar. in campis et graminosis ad Varna copiosum vidit cl. Velenovsky.

141. *Cichorium*. 1. *C. Intybus*; — *C. glabratum*; *C. illyricum* Borb. ex ipso.

2. *C. divaricatum*: Attica (pr. Laurion: Haussknecht). Cephalon. (: Heldreich). Bulgar. (: Bornmüller). Ross. mer. (: Lindemann). - Transs. (Jka) ad præced.

pertinet ex Smk. — *C. pumilum* Jacq. (1771) et *C. minimum* (err. nanum) Portenschl. (1824) non nisi speciei statum reductum respiciunt.

3. *C. spinosum*: Japygia (Otranto: HGreves). Ins. Karpathos (Arch. turc.) rupestr. marit. (: Pichler).

142. *Tolpis*. 2. *T. umbellata* (Heldr. hb. norm. 953); in Hisp. multo frequentior est quam *T. barbata*, exc. in Galloecia (cfr. Lge pug. pl. hisp.).

145. *Hyoseris*. 2. *H. scabra*: Balear. Valenc. (ad Denia hæc species relecta est a Rouy 1883). Gall. mer. hab. etiam ad Antibes et in ins. Ste-Marguerite (: Thuret et Bornet). Cephalon. ins. Jon. (Spreitzenh. ex Heldr.). Attica (ad Athenas et Eleusin: Heldreich).

147. *Aposeris*. 1. *A. foetida*: Polon. (: Lapezynski). Roman.; Helv. non nisi in subalpinis occid. adest (ex Grml.). Germ. (ex Gcke) hab. in sola Bavar. et rr. Würtemb. (ad Riedlingen).

148. *Lapsana*. 1. *L. grandiflora*: Bulgar. (: Velenovsky). Rumel. or. (ex Velen.).

3. *L. communis*; Norv. (et Suec.) bor. adest (rarius), sed deest in Fenn. bor. plur. (cum Lappon.). — *L. glanduloso-pilosa* Schur. *L. pisidica* Borb. (1875). *L. grandiflora* Borb.? (Virciorova Valach.).

149. *Rhagadiolus*. 1. *R. edulis*; hab. etiam in ins. Balear.

LXV. AMBROSIACEÆ.

1. *Ambrosia*. 1. *A. maritima*: Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich).

Obs. *A. artemisiæfolia*: Batav. (ex Abeleven). Belg. hinc inde in cultis introducta (: Crepin); ab anno 1863 observata est in Germ. (ubi nunc multis locis adest et sicut in Dan. et Angl. cum seminibus trifoliorum ex America introducta); etiam Gall. hæc planta nuper introducta est et quidem primum pr. Moulins (Allier). ubi imprimis cum seminibus *Medicaginis sativæ* dispersa dicitur et nunc subspontanea (: Lamotte 1881); in dep. Vosges ex Beshier.

2. *Xanthium*. 1. *X. strumarium*; Sard. adest! (: Reverchon). Dan. locis habitatis sporadice obviam venit (certe olim immigrata). — *X. arenarium* Lasch. (Siles, etc.).

2. *X. macrocarpum*: Gall. centr. (Puy-de-Dôme Arvern.). Sard. (leg. Reverchon).

**X. italicum*; — *X. riparium* (Lasch in Rabenh. bot. centralbl.) sat diversum videtur. (Germ. bor.-or.).

3. *X. spinosum*: Helv. (Basiliæ, Bernæ, Genève etc., cum lanis hungaricis introd.). Sard. adest! (Reverchon). Morav. (ubi aliquot locis copiosum et molestissimum). Hung., ubi nunc copiam suam molestum, jam 1848 introductum est (cum subibus) e Turcia et Serbia et exinde in Romaniam, Styriam et Saxoniam, immo Belgium et Scotiam. Bulgar. in ruderalis ubique vidit cl. Velenovsky. Thessal. (: Heldreich 1882). Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich). Ross. etiam centr. (in gub. Kursk dicitur vulgarissima et molestissima herba ad vias et domos).

LXVI. CAMPANULACEÆ.

1. *Symphyandra*. 2. *a. S. Hofmanni* Pantocs. in oe. bot. z. 1882. Bosn.: in locis rupestribus ad Banjaluka et Jaice detecta a Hofmann; inter Veceriska dolnja et Vitez leg. Brandis 1885.

2. *Adenophora*. 1. *A. Lamarckii*; ex Smk. (enum. 380) planta transsilv. est solum varietas speciei seq. (= *A. edentula* Smk. *A. stylosa* Smk.).

2. *A. liliifolia*: Helv. mer. cant. Ticino (pr. Meride ex Gremli, mte S. Giorgio ex Parl.), sed in Lomb. occ. deest. Bavar. (pr. Deggen Dorf) teste Prantl. Galiz. Bulgar. (ad Razgrad: Velenovsky).

3. *A. stylosa*: Galic. or. (: Tomashek) et probab. Hung. (Brod a. d. Kulpa) ex Preismann et Hirc (1886); Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk. - Comment. 182.
3. **Campanula**. 1. *C. Medium*; in Transs. non nisi culta adest (ex Smk.).
3. *C. tubulosa*: ins. Cerigo (olim Cythera), ubi a beato Spreitzenhofer detecta 1880 (ex Heldr. in oe. bot. z. eod. anno).
6. *C. saxatilis*; in montibus insulæ Karpathos (Arch. ture.) nuper lecta est a Pichler.
7. *C. laciniata*: locus speciei huc usque unicus erat in scopulo quodam ad ins. Pholegandros (Orph. 1119), sed Pichler eam nuper legit in rupibus montium ins. Karpathos (Arch. ture.).
8. *C. incurva*; *C. Leutweinii*: Thessal. (Pelion, Ossa: Heldr. 1882).
9. *C. lanata*; in rupestribus m. Rilo Thrac. leg. Pancic.
13. *C. lingulata*: Valach. (pr. Virciorova: Borbás 1873). Bulgar. (: Velenovsky); Transs. non adest ex Smk. — *C. tenuiflora* (valle di Novi et Ascea) a solo Ten. lecta videtur.
14. *C. sibirica*: Moldav. Dobrud. Bulgar. Rumel. or.; in Siles. nunc rarissima est (non nisi ad Gr.Stein distr. Oppeln obvia: Uechtritz).
15. *a. C. Bolosii* Vayr. plant. notab. catal. 107. (1879). *C. Vayredæ* Ler. Lev. dec. pl. nov. 5. (1879). *C. speciosa* Colm., Costa (non Pourr.). — Catal. (reg. mont.); species speciosissima sed diu cum præced. commutata, nuper, post fere duo sæcula, relecta est a Dr Bolós (ex Willk. ill.).
17. *C. barbata*: Siles. (Glatzer-Schneeberg etc., Gesenke). Moldav. Alpes-Marit. (col de Puriac, col della Maddalena: Loret); Helv. non nisi in Alpibus adest; Transs. ad speciem sequent. pertinet ex Smk.
18. *C. alpina*: Bavar. (Alpes: Berchtesgaden, Sonntagsh., Wendelstein). Galiz. Moldav. Bulgar. (in suum m. Vitos: Velenovsky). Venet. (territ. Belluno: Vis. Sacc). - Helv. (ubi in Bundia indicata) exclud. ex Gremli.
18. *a. C. orbelica* Panc. elem. bulgar. 48. - Thrac. m. Rilo (: Pancic).
19. *C. Grossekii*: Valach. (pr. Virciorova: Borb. 1873). Bulgar. (pr. Galata: Bornmüller). Rumel. or. (Slivno: Skorpil ex Velenovsky).
20. *C. dichotoma* (*C. catinensis* Tornab. 1887): Ibiza Balear. (: Marès).
23. *C. heterophylla*: Arch. (Cyclad.) ins. Amorgos in rupibus pr. coenobium Panagia (: Heldreich 1881).
24. *C. Allionii* (*C. alpestris* All. misc. 1774): Alpes-Marit. (Tenda, alpes supra St-Etienne, col della Maddalena).
- 26 * *C. monanthos* Pntek (1874). Montenegro (ad m. Crna Planina detex. Pantocsek); species eximia dicitur, sed unicum tantum specimen lectum; flores minores et sepala angustiora quam in præced. (*C. rupicola*).
27. *C. Cervicaria*: Suec. bor. (Angerm., Jemtia) r; Dan. (Fion., Jutland.) r. (in Fenn. bor. deest). Ligur. occ. (Rezzo: Genn.). Pedem. Lomb. Tyrol. mer. Venet. Bonon. Moldav. Ross. bor. — *C. echiifolia* Rupr. ingr.; huc etiam *C. desertorum* (29) pertinet ex Trautv.
29. *C. desertorum*; cfr. nris 27 et 30.
30. *C. glomerata*; Scand. exc. etiam Suec. bor. plur. et Fenn. bor.; in Dan. tota (exc. Bornholm) adest, sed sæpius sporadice et non copiose. Ross. bor. Moldav. Dobrud. Bulgar. (: Velenovsky). Sard. (mte Zarri prov. Sassari: Binna teste Caruel) — *C. desertorum* Weinm. (Ross. gub. Tambow). — *C. aggregata*; potius pro subspecie (cujus var. sit *C. farinosa* Andr.) habenda; cfr. Lmtt. prodr. plat. centr. 500.
31. *C. foliosa*: Ital. mer. (Calabr. etc.), rarius, inter 4500 et 6000'. Græc. bor. (Pindus Tymph.: Haussknecht).
32. *C. petræa*: Alpes-Marit. (ad Escales d'Aiglun in valle Esterou). Lomb. hab. etiam in territ. Veron. et in mte Gazzo territ. Brescia.

33. *C. macrostachys*: Moldav. (r.). Dobrud. (reg. silvat. et mont. freq.: Ue. S.). — *C. macedonica* (species propria etiam sec. Freyn): Bosnia (Brandis 1885 ex Freyn).

34. *C. spicata*: Alpes-Marit. Sabaud. (: Chabert). Ital. centr. hab. etiam in alpib. Apuanis et in Piceno; nuper etiam Sard. lecta est (mte Manai prov. Sassari: Binna teste Caruel). Styr. (mont. Sulzbach. ex Maly).

35. *C. thyrsoidea*: Bulgar. (m. Kom et Vitos: Velenovsky 1887). Styr. hab. etiam extra Alpes (scil. pr. Neuhaus, Cilli, Tüffer); ita etiam Carinth.; Transs. ad *C. transsilvanicam* (27) pertinet ex Smk.

36. *C. latifolia*: Dan. in insulis et in parte orientali pæninsulæ non rara; in Suec. bor. non nisi in Medelpad. et Jemtia indicatur; adest in Lappon. norv. (Norv. arct.) ibique usque ad lat. 67° 30' progreditur (ex Norman); hab. etiam in Bavar., Siles., Galiz., Moldav., Bosn. (: Brandis, GBeck). Alpes-Marit. (les Viosennes: Loret, val de Pesio: Thuret, Bornet; etc.).

37. *C. Trachelium*: Roman. Bulgar. (ex Velenovsky). Sicil. (ubi in mte Cham ab Ucria indicata erat) nuper in silvis ad Milazzo lecta est sec. Parl. Car. fl. ital.; in Calabr. rara est, ceterum in Ital. maxime mer. non indicatur.

38. *C. rapunculoides*: Dan. non rara et in hortis, ob radicem valde ramosam et gemmiferam, sæpe molesta; in Fenn. bor. deest; hab. etiam in Bulgar. (: Velen.) et Moldav.

39. *C. bononiensis*: Alpes-Marit.; in Ital. mer. parce (m. Matese etc.) lecta est (Ten.). Moldav. Dobrud. (vulgata: Ue.S.). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). — *C. Tauscheri* Kern. (1871). — *C. cana* Smk.

40. *C. rhomboidalis*: Alpes-Marit. (Tenda: Parl., val de Pesio: Ardoino, Ste-Anne-de-Vinai: Thuret). Pedem. plurib. loc. lecta est; Lomb. etiam in territor. Bresciano; in Arvern. (teste Lamotte) non crescit et errore determ. ibi olim indicata est.

**C. pseudolanceolata* Pntek in Kan. mag. növ. lapok 1882 (*). *C. rhomboidalis* β Whlrb. carp. *C. lanceolata* Neillr., Hzl. - Hung. (alp. Chocs comitat. Liptov.).

41. *C. lanceolata*: "valle del Varo di contro a Tuet du Beuil (: Burnat)": Parl. et Caruel fl. ital.

**C. lancifolia* Schur (*C. Baumgartenii* Schur serius). - Transs.; cfr. cum subspecie præced. — ? *C. Hornungiana* Schur.

42. *C. hispanica*; proxime accedit ad 58 *C. macrorhizam* (cujus varietas ex Costa) et cum ea ad sectionem *Heterophyllorum* (****) referenda ex Lange; probabiliter *C. rotundifolia* auct. hisp. veter. (Quer, Palau) hanc speciem spectat.

43. *C. trichocalycina* (1811). *C. alburnica* Briganti 1816 (in Consp. erronee legitur Brign.), quod nomen derivatur a mte Alburno, hodie mte Palermo. - Species extra Calabriam hab. aliis locis regni neapol. e. gr. in mte Majella, mte Vergine (planta sicula nebrosa. sistit varietatem *C. Minæ* Strobl in Flora 1883); adest etiam iu Græc. bor. (Pindus tymphæus: Heldr. 1885).

44. *C. rotundifolia*; speciei typus in ins. italicis deesse videtur. — *C. confertifolia* Reut. cat. genev.; hab. etiam in Arvern. montib. altioribus (: Lamotte). — *C. arcuata* est propior *C. lancifolia* (41*) ex Smk. — ? *C. pinifolia* Uechtr. (Serb., Herceg., Bosn.: Brandis 1886 ex Freyn). — *C. Bertolæ* et *C. Re Colla* ex Parl. (Pedem.). — *C. micrantha* Bert., a solo Marzialetti lecta (nelle Marche), est speciei status abnormis (vid. Parl. Caruel. fl. ital. VIII. 99).

+ *C. napuligera*; ad *C. lancifoliam* (41*) pertinet ex Smk.

**C. stenocodon* (*C. stenosphon* Rehb. f. est synon.); ad *C. Scheuchzeri* (48) valde accedit ex Parl. Car. fl. ital.

45. *C. pusilla* (*C. caespitosa* auct. var., non Vill. nec Sep.): Würtemb. (Tuttlingen, Bronnen etc.); in Styr. etiam extra Alpes (e. gr. in Schöckel pr. Graz) adest, ut etiam in Ital., ubi vel cum fluviis ex Alpibus devehitur, vel in montibus aliis (alpi Apuane, Gr. Sasso Abruz., m. Meta Campan.) lecta est; in Sudetis deest, nam Wimmer pro ea varietatem *pumilam* *C. Scheuchzeri* habuit (ex Fiek). — *C. Hoppeana* Ruppr.; Rehb. ic. (Carinth.: Rupprecht, Pacher).

**C. Villarsii* nob. *C. caespitosa* Vill. non Sep. (51).

46. *C. Lostritti*; est species incerta, a Tanfani (in Parl. Car. fl. ital. VIII. 105), non sine dubio, ad *C. macrorrhizam* (58) relata; in hb. Ten. et Guss. non exstat.

47. *C. linifolia*: Alpes-Marit. Voges. (Holneck etc.: Godr.).

**C. valdensis*: Alpes-Marit.; Helv. exclud. ex Gremli.

**C. ficarioides*; — *C. ruscinonensis*; sec. Loret est var. *C. rotundifolia* (44).

48. *C. Scheuchzeri*; etiam extra Alpes adest, ut Carinth. (ad rivulos alpinos convallium), Styr. (in montib. Sulzbach.), Istr. (mte Maggiore: Tommasini). Appen. etiam centr. (et mer.) incola est; sec. Parl. fl. ital. crescit in Ital. cont. pascuis elatis et silvis montanis, sed in mer. rara (Ten.), et etiam in Sicil. m. Nebrod.; hab. etiam in Jurasso (Jura) helvet. ex Gremli.

49. *C. carnica*: Tyrol. mer. (: Ball et al.). Lomb. (or.) in plur. loc. lecta est. Hung. (m. Tatra: Hzl.). Banat. (ex Borbás). - Transs. pertinet ad subspeciem.

**C. consanguinea* S.N.K. (1854). *C. carnica* auct. transs.

51. *C. cæspitosa*: Carinth.; in Ital. bor. hab. Friulia, Lomb. or. et med. val Tellina, Tyrol. mer.; loc. appen. ad *C. pusillam* (45) spectat ex Parl. Car. fl. ital.; Transs. deleatur, nam (ex Smk.) hæc species in hb. Schur, Iemberg. non nisi "mystificatione" inde adest.

**C. glareosa*; ad *C. Scheuchzeri* (48) pertinet ex Parl. Car. fl. ital.

52. *C. excisa*; adest Lomb. in val Brembana territor. Bergamo, pr. Bormio etc.; Transs. ad *C. consanguineam* (49*) pertinet ex Smk.

53. *C. pulla*: Moldav. (r.); Transs. non adest ex Smk. — *C. pseudo-pulla* ad *C. lancifoliam* (41*) pertinet ex eodem.

54. *C. pyramidalis*: Venezia, Verona, Brescia. — *C. Staubii* Uechtr. ap. Staub (1877), cujus specimen pr. Fiume Croat, legit cl. Staub, est speciei status autumnalis (mutilatus et deformis), ut jam monuit b. Tommasini.

55 * *C. Rosani*; hab. in Ital. mer.-or. (loc. Bertol. calabr. Leucopetra probab. erroneus est); sic in T. d'Otranto (Leucaspide in "pietra viva dura delle gravine", Gallipoli in rupibus: HGroves); horum locorum ornamentum est insigne, initio autumnii, plurimis aliis plantis jam sole siccatis, flores suos numerosissimos et pulchros saltem per duos menses explicans; planta robusta, caule sæpe crassitie digiti minoris; vid. ap. HGroves in linn. soc. journ. 1885 et in giorn. bot. ital. 1887. 114. 169 (*).

57. *C. fragilis*: Ital. med. (Abruzzo, Terracina, Campania); *C. Cavolini* est var. (incana) sec. Parl. Car. fl. ital., hinc inde præcipue in montibus cum specie obvia, sed ex observat. cl. Lacaita (litt. 1884) potius subspeciem constituit; non nisi (ut jam habet Tenore) in montibus brutiis (Abruz.) obvia venit, dum *C. fragilis* ipsiss. rupes litorales a Neapoli meridiem versus inhabitat (cfr. tamen Parl. Car. l. c. VIII. 121).

58. *C. macrorrhiza* (*C. nicæensis* Risso in Ardoin. fl. alp. marit. ed I.): Alpes-Marit. abunde in rupibus totius comitat. nicæens. a Tenda usque ad Mentone, Monaco et Nizza; dein ad St-Vallier le Bar, Caussols et Gourdon pr. Grasse (ex Ardoino); sec. Parl. species adest etiam in Lomb., nelle Marche (m. Catria etc.) et in jugo m. Vettore. — *C. sardoa* (Levier). *C. rotundifolia* Mor., Barb. *C. rotundifolia* Forsythii Arcang. (Sard.).

Obs. Hæc species, monente cl. Lacaita (in litt.), capsulas habet minime erectas, sed propter caules e rupibus pendentes in sicco sæpe erectæ videntur; immerito igitur ad "*Saxicola*" relata est et potius ad "*Rupestris*" spectat; cfr. tamen ap. Burnat in Magnier serin. (II.) 53 (ubi etiam cl. Gandoger observationes varias de hac specie publicavit) et Parl. Car. fl. ital. VIII. 104.

59. a. *C. Hawkinsiana* Hsskt in Heldr. hb. norm. - Græc. bor. (Pindus tymph.: Hausskn. Heldr.).

60. *C. Sabatia*; etiam aliis locis Liguriæ lecta est (pr. Albenga jam a Viviani); cl. Lacaita de hac specie observat eam ob pedunculos fructiferos recurvatos ad "*Heterophylla*" vel "*Rupestris*" potius spectare; apud Tanfani in Parl. Car. fl. ital. ut varietas *C. macrorrhizæ* (58) militat.

62. *C. parnassica*: Phthiotidis m. Oeta in saxosis cacum. Kreveno, alt. 6000—6600' (: Heldreich).

62. a. *C. tymphaea* Hsskt ms. (litt. 1889). - Græc. bor. (Pindus tymph.: Haussknecht).

65. *C. Sartorii*: Heldr. hb. norm. 954; detecta est a Sartori 1857.

66. *C. Morettiana*; plurimum adest in Tyrol. mer., ubi "Francesco Facchini, medico di Fassa, ritrovà la Campanula Moretti nel monte di S-Martino verso Premiero nel 1817" (sched. ms. in hb. Wahlb. nunc mus. holm.); ceterum in prov. venetæ district. Belluno.

? 66. *a. C. acutangula* Ler. Lev. in journ. of bot. (1879) et deux exc. 51. cum ic. 1880 (*). - *Hisp. bor. (Cantabr.)* in rupibus alpinis montium Picos de Europa (Ler. Ler.). Fig. l. c. *C. fragilem* (57) in mentem revocat.

69. *C. elatinoides*: prov. Veneta (district. Belluno, r.).

69. *a. C. adsurgens* Ler. Lev. in j. of bot. 1879 et deux exc. 87. cum ic. (1880). *Hisp. bor.-occ. prov. Orense Galloec., ad limites regni Leon.*

70. *C. Rainerii*; Helv. in solo monte Generoso cant. Ticino lecta est ex Gremli, sed Lomb. in montibus circa lacum Comensem et in territor. Bergamo et Brescia uberius adest. - Cl. Lacaita, qui exeunte mense Septembri plantam fructiferam in mte Grigna (ad Lago di Como) legit, observavit rimas capsularum ad vel supra (nec infra) medium sitas esse.

71. *C. Erinus*; Gall. hab. etiam in depp. Lot et Corrèze (: Lamotte).

72. *C. attica*: (Orph. exs. 249). *C. drabifolia* β major Boiss. or.: Heldr. hb. norm. 857.

73. *C. scutellata*: Græc. bor. (Thessal. super., Pindus tymph.: Haussknecht).

75. *C. persicifolia*; Scand. exc. etiam Fenn. bor.; Dan. adest præcipue in insulis Sjælland. (or. et mer.), Falster, Møen et Bornholm; hab. etiam Sard. (: Binna ex Carnel). Moldav. Dobrud.; Thrac. (Bulgar.) nunc plurib. locis lecta est ex Velenovsky. — *C. subpyrenaica*: dep. Vienne (: Guitteau).

76. *C. Steveni*: Ross. or. (gub. Voronesch, Ufa, Perm). Bulgar., ubi in summo m. Vitos prata spongiosa floribus suis albis pulchelliss. ornat (: Velenovsky 1885); cfr. Velen. in diar. soc. sc. boh. 1888. *C. abietina* Panc. ex Velen.

77. *C. abietina*: Galic. or. (ubi etiam præced. adest ex Knapp). Moldav. (alp. Bucieciu).

78. *C. Spruneriana*: Græc. bor. (Epirus: Chodzes ex Heldr. 1879). Ithaca (: Spreitzenh. 1887).

80. *C. carpatica*; hab. etiam in Moldav. (r.).

**C. turbinata*: Moldav. (r.); est potius varietas, cum specie ipsa (*C. carpatica*) crescens (: Fronius).

81. *C. uniflora*: ins. arct. Spitzberg (ThFr. 1868; exs. 6). Island. bor. in Hoffjall ad Mödruvellir vall. Hörgardalr (: Davidsson ex Rostrup 1888).

82. *C. cenisia*; in Lomb. deesse videtur, sed in Pedem. alpinis editissimis, præcipue in glareosis ad nives æternas, non rara est.

83. *C. Zoysii*; Transs. ad *C. pusillam* (45) pertinet ex Smk.

85. *C. Rapunculus*: Roman. Bulgar. Græc. bor. (Epirus: Chodzes ex Heldr. 1879). Ross. centr. (gub. Kursk). - Austr. exc. etiam Morav. (Oborný n. v.). Ital. exc. Sicil. et Sard. (ex Parl. Car. fl. ital.). — *C. Lambertiana*: Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht).

**C. verruculosa*: est potius varietas quam subspecies, in meridionalibus vulgarior quam ipsa species.

86. *C. patula*; Scand. exc. etiam Fenn. bor.-or.; loc. oriental. speciei add.: Moldav., Bulgar., Græc. bor. (Pindus Tymphæus: Hausskn.); ceterum indicatur etiam Sard. (m. Zarri in Nurra: Binna ex Carnel) et hab. etiam in Ross. bor. (gub. Olonets, Wologda), balt. et or. (Wiatka etc.), nec non (?) in centr. (gub. Kursk, Moskwa).

? 86. *a. C. hemschinica* CKoch; Velen. in diar. soc. sc. bohém. 1888. sep. 34 (*). - Bulgar. m. Vitos et Kom (: Skorpil, Velen. 1887).

88. *C. expansa* Friv. (non Rudolphi). *C. sparsa* Friv. 1840. *C. Frivaldszkyi* Steud. (1840): Valach. (: Borbás). Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht).

Obs. E. v. Frivaldszky hanc speciem e monte Balkan primus obtinuit et in Flora 1836 descripsit, dein vero etiam in annal. soc. erud. hung. (Magyar Tudós Tarsasaj) 1840 sub nomine C. sparsæ (eum icone) publicavit. Cfr. ceterum ap. Borbás in diar. mus. nat. hung. a. 1886. sep. 250 (*).

90. *C. phrygia*: Græc. bor. (Thessal. planit.: Haussknecht).

91. *C. ramosissima*: Græc. bor. (Epirus: Chodzes ex Heldr. 1879). Ithaca ins. Jonic. (Spreitzenhofer 1887). — *C. Loreyi*; etiam (paucis) aliis locis territor. Veron. adest nec non (rr.) in prov. Udine et in territ. Bergamo.

× *C. Hausmanni* Rehb. f. = *C. barbata* + *Phyteuma hemisphaericum*. (Seiseralpe Tyrol.).

4. *Specularia*. 2. *S. falcata*: Mallorca Balear. (Palma: Barceló, Polenza etc.: Marèz).

**S. castellana*: Catalon.; Gall. mer. hab. etiam dep. Vaucluse (mt Ventoux: Reverchon ex Rouy).

3. *S. speculum*: Moldav. Bulgar. (: Velenovsky). Græc. bor. (Epirus: Chodzes ex Heldr. 1879); in Transs. non nisi culta adest ex Smk.

4. *S. hybrida*: Balear. Carinth. (r.). Hung. (Hzl.). Moldav.; Helv. hab. solum in cant. Basel et Schaffhausen; Transs. non nisi culta exstat sec. Smk.

6. *Phyteuma*. 2. *P. canescens*: Moldav. Bulgar. (m. Balkan pr. Petrov Han: Velen. 1887).

3. *P. limonifolium* (Podanthum limonifolium Boiss.); in Ital. mer. (T. d'Otranto) adest plurib. locis e. gr. Otranto, Leucaspidè (: HGroves), Massafra (: Gussone). Bulgar. ad radices m. Konjavo Planina (: Velenovsky 1887). — *P. repandum*: Phthiotidis m. Oeta (: Heldreich).

5. *P. anthericoides* Nym. consp. 484. (1879). Podanthum anthericoides Jka descr. pl. nov. 3. (1878). In m. Rhodope (Thrac.) declivibus calcareis supra Stanimah cum Haberlea rhodopensi leg. Janka; ad Slivno a Skorpil lectum est (ex Velenovsky).

7. *P. Halleri*: Lozère (sub Born: Lamotte). Alpes-Marit. (col de Tenda: Loret, vall. Borèon et Estenc supra Entraunes: Bornet; etc.). Sabaud. (: Chabert 1884). Bavar. (Alpes, præcip. Algov.). Voges. (Ballon de Soultz: Godron); in Jura deest; Transs. ad P. Vagneri (9—) pertinet ex Smk.

8. *P. spicatum*: Appen. Moden. — *P. spicatum* Bmg. pertinet ad — *P. tetramerium*, sed in hb. Haynald adest *P. spicatum* ipsiss. e Transs. (ex Smk.).

9. *P. nigrum*: Lothar. (: Godron). Lomb. or., Venet. Moldav. - Helv. non nisi in m. Jura (vallée de Joux) adest; Transs. ad var. *P. Vagneri* pertinet. — *P. atropurpureum* Schur (non Hpe) *P. Vagneri* Kern. in Vágn. mármarosmegye (enum. plant. mármaros.). növ. ism. 1875. (Hung., Transs.). Comment. 183.

10. *P. Michelii*: Alpes-Marit. - Helv. non nisi in cant. Ticino hab. (ex Gremli); Transs. dubie. — Species parum cognita et certissime (lobis calycinis, foliorum basi etc.) distincta a var. *P. scorzonrifolio* Vill. (Rostan adnot. in sched. hb.).

11. *P. Balbisii*; Pedem. p. d. non inhabitat, sed Alpes-Marit. (reg. alp.: val di Pesio: Balbis; Tenda, mt Bego: Burnat, Loret). Lomb. ad *P. Michelii* (10) pertinet.

12. *P. Scheuchzeri*; Helv. vix nisi in Alpibus hab. (in Jura deest); Transs. ad speciem seq. (*P. orbiculare*) pertinet ex Smk!

**P. Charmelii*; hab. non in Pedem. p. d. sed in Alpes-Marit. (reg. alp. inter 800 et 1600 metr.).

13. *P. orbiculare*: Angl. mer. (Hampsh.). Ital. versus meridiem usque in m. Meta (: Terraciano) progreditur. Moldav. (m. Muscelului). — *P. pseudo-orbiculare* Pntck adnot. 53 (*); species bene distincta sec. auct. l. c.; hab. etiam Bosn. (: Brandis ex Freyn).

**P. fistulosum*: Herceg. (Brandis ex Freyn). — *P. confusum*; nunc sub (16*) militat.

**P. austriacum* Beck in act. soc. z.-b. vind. 1882. 179 (*P. Sieberi* Schur). - Austr. (Schneeberg, Raxalpe etc.). sty. alp. subalp. (1200—2500 metr. s. m.).

14. *P. Sieberi*; locus appen. (Parm.) suspectus est ex Caruel.

16. *P. hemisphæricum*: Gall. m. Forez (: Le Grand), Le Mesenc etc., l'Esperou (dep. Gard). Venet. (in montib. plur.). Emilia (mte Cimone, Ventasso etc.). Umbr. (mte Vettore, Sibilla etc.). Neap. "alla cima del Sirente (: Groves) e del Mutria: Tenore" (ex Car.). Bavar. (Alpes); Helv. non nisi in summis Alpibus adest; Transs. (et — *P. transsilvan.*) ad subspeciem pertinet ex Smk.

**P. confusum* Kern. (1870). *P. hemisphæricum* var. *latifolium* Heuff. *P. hemisphæricum* auct. transs. *P. graminifolium* Schur (ex Smk.). - Sty. Carinth. Banat. Transs.

17. *P. humile*: Venet. (territ. Belluno versus limites tyrol.); Transs. ad *P. austriacum* (13*) pertinet ex Smk.

18. *P. pauciflorum*: Sabaud. (Chabert 1884); Helv. non nisi in summis Alpibus hab.; Transs. (et — *P. nanum*) ad *P. confusum* (16*) pertinet ex Smk.

**P. globulariæfolium*; Transs. ad *P. confusum* (16*) pertinet ex Smk.

19. *P. comosum*: Pedem. (Novarese in alpibus Alagnens. etc.).

7. *Trachelium*. 1. *T. coeruleum*: Ital. med. (Lucca, Roma) et quasi spontaneum in Ligur. (Genova, Pegli). Sicil. etiam ad Avola (: Bianca) et Messina (: Seguenza) lectum est.

8. *Wahlenbergia*. 1. *W. hederacea*: Haute-Saône (ex Humnicki catal. des plantes de Luxeuil. 1877). Badia (Mooswald ad Freiburg ex Gcke).

2. *W. nutabunda*: ins. Aeolicæ, ubi in Panaria a cl. Lojacono in cactetis lecta (1877); in Calabr. non nisi ad Reggio lecta est; indicatur etiam (G.G.) Cors. ad Ajaccio.

9. *Edraianthus*. 1. *E. Kitaibelii*: Bosn. mer. alp. (Blau, GBeck).

**E. croaticus* (E. Kitaibelii K.): Dalm. m. Prologh (: Pichler 1872). Sec. Borbás est = *E. caricinus* (3*).

2. *E. graminifolius*: Ital. mer. (mte Pollino, mte Vergine etc.; Amalfi, Salerno, in montib. calcareis: Lacaita); Sicil. adest sola var.: — *E. siculus* Strobl in Flora 1883 (*E. graminifolius* Nicotra), quæ præcipue montes Nebrod. inhabitat.

3. *E. tenuifolius*; Transs. ad *E. Kitaibelii* (1) pertinet ex Smk.

4. *E. dalmaticus*; etiam ad Fiume Croat. lectus est.

**E. serbicus* Kern. - Serb. mer. Bulgar. m. Konjavo Planina (Velenovsky 1887).

5. *E. serpyllifolius* (*Wahlenbergia serpyllifolia* GBeck).

**E. dinaricus* Kern. - Dalm. mer. mont.

20. *Jasione*. 1. *J. montana*; exc. etiam Fenn. bor., med. — J. Carioni; ex Lmte (prodr. fl. plat. centr.) magis accedit ad *J. perennem*, cujus filia probabiliter est, locis demissioribus enata.

**J. echinata*: Calabr. Sicil. - J. Heldreichii restituetur in propriam speciem, cujus varietas sit: *J. glabra* Velen. in oe. bot. z. 1884 (cfr. in act. soc. sc. bohem. 1886); Bulgar. Rumel. or. Græc. bor. (Pindus tymph.: Hausskn.).

2. *J. Jankæ*: Bulgar. m. Osogovska Planina (: Velenovsky 1887); locus valach. est prope Portam Ferream (Jka, Smk.).

7. *J. perennis*; hab. etiam Cors. pr. Capiletto (Capitello): EPetit 1883.

11. *J. supina*: Basilicata (mte Serino, mte del Papa, ad altit. 2000 metr.: H.P.R. 1877). Bulgar. m. Osogovska Planina (Velenovsky 1887). Thrac. m. Rhodope (Dingler 1878). Sec. GBeck (in ann. mus. vind. 1887) *J. orbiculata* Grsb. a *J. supina* separanda est, ut etiam ex Freyn (: *J. propullulans* ej. ined.) et Velenovsky (in litt.).

14. *J. humilis*; hab. etiam Arvern. (Mont-Dore: Lamotte).

LXVII. LOBELIACEÆ.

1. *Lobelia*. 1. *L. urens*; Angl. hab. etiam in Cornwall (: Miss Woods sec. Archer Briggs 1883). Gall. etiam in centr. plur. loc.

2. *L. Dortmanna*: Fenn. Dan. pænins. hinc inde, in insul. valde rara (Læsö, ad Helsingör Sjælland.); adest in insul. Lofoten Lapp. norv. (Norv. arct.),

ubi paullo ultra lat. 68° terminus polaris situs est (ex Norman). Germ. bor.-occ. (Wesel prov. rhen., Westphal. bor.). Ross. mer.-occ.

2. **Laurentia.** 1. *L. Michellii*; hab. etiam in Menorca (: Rodriguez).
2. *L. tenella*; Balear. non nisi in Mallorca (barranco de Soller) lecta est (: Bourgeau).

LXVIII. BICORNES.

2. **Erica.** 4. *E. cinerea*; hab. etiam in insul. Færøensibus.
5. *E. Tetralix*: Suec. mèd. (Vermel. et Neric. occ.; etiam Suderm. ex Thed.). Ross. balt. r. (: Klinge). Bavar. (pr. Aschaffenburg). Lusat. (Ober-Lausitz Siles.); terminus speciei orientalis Hung. videtur (ibi indicata est in comitatu Arva ad fines galic.); ex Smk. in Transs. non adest (a Baumgarten ibi indicata erat sed desideratur in ejus herbario); Island., ubi antiquitùs indicata, recenter non lecta est ex Grönlund.
6. *E. ciliaris*: Gall. bor.-occ.; locus bor.-or. extimus est pr. Parisios (ad Essarts-le-Roi: Chatin).
10. *E. multiflora*: Balear. Alpes-Marit. (pr. Villefranche: Thuret. Bornet; Nizza, vall. Maynan et ad Bellet: Ardoino). Pyren. or. (in rupibus marit. inter Leucate et La Nouvelle: Tremols 1874 ex Debeaux). — *E. peduncularis*: ins. Lampedusa (: Lojacono).
11. *E. vagans*: Gall. bor.-occ., centr. (Puy-de-Dôme pr. Lezoux: Lmtte); indicatur etiam ad Monehal, Lyonnais nec non ad Chambaran (: Palay sec. Carret).
12. *E. verticillata*: Ital. mer.-or. (Gallipoli: HGroves). Cephalon. ins. Jonic. (: Heldreich). Thessal. m. Ossa (: Heldreich 1882).
14. *E. carnea*: Sabaud. (Magn. fl. sel. exs. 612). Alpes-Marit. (reg. alp: col de Tenda, val de Pesio); in m. Jura deest ut etiam (ex Smk.) in Transs. (a Bmg. ibi indicata est, sed in ejus hb. desideratur); locus Siles. (Einsiedel in Gesenke: Geke) valde dubius est ex Fiek.
3. **Bruckenthalia.** 1. *B. spiculifolia*: Moldav. (alp. Bucieciu: Fronius, mont. Muschelului: Grecescu). Bulgar. mont. (: Velenovsky), Rhodope (Dingler 1878).
4. **Calluna.** 1. *C. vulgaris*; in Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.
5. **Vaccinium.** 1. *V. uliginosum*: Dan. Fenn. Moldav. Bulgar.; in Ross. arct. adest etiam in ins. Waigatsch (var. Kruhsiana Fisch.: Kjellm. Lundstr. 1880); in mer. partim (gub. Cherson) deest. — *V. pubescens*: ins. boreales Færøer.
2. *V. Myrtillus*: Dan. Ins. Færøer. Fenn. Moldav. Bulgar. Bosn. Alpes-Marit. (reg. mont. sat abunde in silvis frigidis); in Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.
3. *V. vitis idæa*: Dan. Ins. Færøer. Fenn. Moldav. Bulgar. Bosn. Alpes-Marit. (reg. alp.: St-Dalmas-le-Sauvage, col della Maddalena). Ross. arct. usque in Waigatsch progreditur (var. pumila Hornem.); in mer. partim (gub. Cherson) deest.
6. **Oxycoccus.** 1. *O. palustris*: Fenn. Dan.; Island. non rara (ex Fridriksson); in Gall. mer. adest (dep. Lozère); in Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.
**O. microcarpus*; Norv. adest etiam in mer. (Lom, immo Christianiæ: ABlytt), Suec. etiam in med., immo mer. (Ostrog. et r. Bleking.), Dan. r. (Sjælland. ad Nymølle, Jutland. in Himmelsbjerget); hab. etiam Siles. ubi a Uechtritz primum recognita est (sed in speciem primar. transiens).
2. *O. macrocarpus*: Ducat. Oldenburg, in Steinhuder-Meer, præcipue ad lacum inter Hagenburg et Winzlau (ex Gcke), sed ibi non indig. suadente AAndrée, qui plantam experimentis culturæ a Dre Struve ibi institutis introductam esse credit.

7. *Arbutus*. 1. *A. Unedo*: Hibern. co. Kerry. — *A. nothocomaros* Heldr. hb. norm. 959 (ex Attica); sec. Heldr. = *A. Andrachne* + *A. Unedo*.

× *A. andrachnoides*: Attica (Heldr. hb. norm. 958 b. et c.); in pænis. Methana frequentem legit cl. Haussknecht. — *A. intermedia*: Heldr. hb. norm. 958. a.

2. *A. Andrachne* (Heldr. hb. norm. 957): Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich).

8. *Arctostaphylos*. 1. *A. uva ursi*: Fenn. Dan. (sed in insul. rr.). Gall. centr. (Arvern.). Alpes-Marit. (reg. alp. et mont. hinc inde). Bulgar.; - Germ. med. solum ad Dresden Saxon. (et in Unterharz) indicatur; Transs. vix adest ex Smk.; in Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

2. *A. alpina*; Fenn. hab. in sola bor.-or.; Dan. non nisi in Dejbjerg lyng, ubi aream circ. 10 pedes longam occupat (ex Lange). - Transs. (Bucsecs, Csukás) ex Bmg., sed planta in ejus hb. ex his locis non adest, nec ab alio in Transs. lecta est (teste Smk.).

9. *Chamædaphne*. 1. *C. calyculata*; hab. in Fennia plur. (exc. mer.-occ.); in Lapp. or. deest (sed adest in kemensi).

10. *Andromeda*. 1. *A. polifolia*: Fenn. Dan. (in pænis. non rara, in insulis sporad. vel parca). Normand. (pr. Rouen et Pèriers: Morière). - Ross. mer. partim (in gub. Cherson) deest.

11. *Cassiope*. 2. *C. hypnoides*: ins. arct. Spitzberg (ThFr. 1868; exs. 63).

12. *Daboecia*. 1. *D. polifolia*: Gall. hab. etiam in la Rhune (sec. Boullu 1880).

14. *Azalea*. 1. *A. procumbens*: ins. boreal. Færøer; hab. etiam in Carpatis Galic. ex Rehmman.

15. *Rhododendron*. 1. *R. flavum* (*Azalea pontica* L.): Ross. or. (gub. Stavropol) ad 2800' s. m.: Owerin).

2. *R. bæticum*; Lusit. nunc lectum est in tribus aliis locis, quorum maxime septentrionalis situs est in Sierra do Caramullo prov. Beira (: Henriquez 1884).

2. *R. hirsutum*: Hung. m. Tatra (Gewont) teste autopta Ascherson. - Transs. (Bucsecs) a Baumgarten indicatur, sed in ejus hb. deest (ex Smk.).

× *R. intermedium* (= *hirsutum* + *ferrugineum*); etiam Bavar. lectum.

4. *R. ferrugineum*; Würtemb. (Germ. mer.-occ.) ad Lautersee pr. Kislegg (ex Geke). Ital. med.: Appen. (pr. Pistoja: Forsyth Major). - Transs. ad subspeciem pertinet (ex Smk.). Comment. 184.

**R. myrtifolium* (*R. Kotschy* Smk.): Galiz. in Carpator. reg. Mughl hinc inde (m. Czerna Hora copiosiss.); etiam Bucow. (: Zawadsky), Moldav. (alp. Bucieciu freqq.: Fronius: alp. Petra Craiului Virou: Kotschy).

5. *R. lapponicum*; Norv. hab. in Finnm. et Nordland, nec non in alpi. Lom.

6. *R. Chamæcistus*: Bavar. (Alpes). - Transs. a Baumgarten indicatur, sed in ejus hb. deest (ex Smk.).

16. *Ledum*. 1. *L. palustre*: Ross. mer. (Ucran: Czernij.). Siles. - Styr. rr. est (non nisi pr. Admont lecta ex Maly). Bavar. nunc deest ut etiam Transs. (ex Smk.).

17. *Chimaphila*. 1. *C. umbellata*: Siles. Ross. mer.-occ. - Fenn. hab. in sola mer.; Dan. etiam in ins. Sjælland (Tisvilde Hegn: ThHolm); in Helv. non nisi pr. Andelfingen lecta est (ex Gremli). - Würtemb. et Alsat. deest ex Gareke ut etiam Transs. ex Smk.

18. *Pyrola*. 1. *P. rotundifolia*: Hibern. (AMore). Island. (Eyafjörð: Fridriksson, Grönl. addit.). Dan. Fenn. Moldav. Bulgar. (ex Velenovsky). Bosn. mer. (ex GBeck). Istr. (mte Maggiore: A-M.Smith). - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

2. *P. chlorantha*: Dan. (ins. Sjelland., r.). Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi term. polar. speciei ad 67° 18' (ex Norman). Fenn. (exc. Lapp. plur.). Siles. Moldav. Transs. (detex. Simonkai). Ross. mer.-occ.

3. *P. media*: Fenn. (exc. Lapp.). Dan. hab. præcipue in ins. Bornholm, ceterum (rarius) in Sjelland. et Jutland.; adest in Lapp. norv. (Norv. arct.), ibique usque ad lat. 70° 41' progreditur (ex Norman). Bavar. Siles. Moldav. Bulgar. (m. Vitos ex Velenovsky). Ross. mer.-occ.; in Helv. rarius provenit. Transs. ad *P. rotundifoliam* (1) pertinet ex Smk.

4. *P. minor*: Dan. Fenn. Moldav. Bulgar. (: Velenovsky). - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

5. *P. secunda*: Fenn. Dan.; Gall. hab. etiam Lozère (pr. Langogne: Prost), Gard (pr. Trèves: Diomède) et nuper (1878) pr. Rheims lecta est in silva Pinus silvestris plantata. Moldav. Bulgar. (ex Velenovsky). - in Ross. mer. partim (gub. Cherson) desideratur.

19. *Moneses*. 1. *M. grandiflora*: Fenn. Island. (Reynistadir: Fri-driksson, Grönl. addit.). Dan. (præcipue in Sjelland, ceterum raro in Jutland, Möen et Bornholm); Gall. hab. etiam in Lozère (pr. Langogne: Prost), Gard (pr. Cam-prieux: Anthouard). Bosn. (: Brandis). Moldav. (in silv. Carpator.). Ross. mer.-occ.

20. *Monotropa*. 1. *M. Hypopithys*: Balear. (Mallorca, in quercetis supra prædium Massanella: Porta). Ins. Jonic. (Cephalon., in silvis abietinis: Letourneux). Bosn. (: Brandis ex Freyn). - Fenn. in sola mer. adest.

LXIX. EBENACEÆ.

1. *Styrax*. 1. *S. officinalis*; hab. etiam in Ital. prov. Terra di Lavoro ex Terraciano (1873).

LXX. JASMINEÆ.

1. *Jasminum*. 1. *J. fruticans*: Bulgar. or. (Slivno, Varna, Kebedze); in fruticetis raris Bulgariae sepe plagas extensas occupat (: Bornmüller).

LXXI. OLEACEÆ.

1. *Olea*. 1. *O. europæa*; — oleaster: Heldr. hb. norm. 858; — sativa subvar. atheniensis Heldr. hb. norm. 859; — sativa subvar. megarensis Heldr. hb. norm. 860; Attica pr. Megaram sæpius culta (etiam pr. Corinthum); — sativa subvar. leucocarpa Heldr. hb. norm. 861; Attica, rarius culta.

2. *Phillyrea*. 1. *P. latifolia*: Alpes-Marit. (in rupibus, locis aridis reg. litoral.). Istr. (cfr. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 375); Fiume in Scoglio (scopulo) di S-Marco (: A-M.Smith).

2. *P. angustifolia*; Comment. 185.

3. *Ligustrum*. 1. *L. vulgare*: Sicil. r. (sed deest in Sard. et Cors. ex Parl. Car. fl. ital.). Istr. Bulgar. (: Velenovsky).

4. *Syringa*. 1. *S. vulgaris*; Hung. mer.-or. (certe spontanea), in valle Danubii inferioris copiosissima usque ad summa cacumina (: Janka, Borbás). Val-lach. (pr. Virciorova: Borbás). Bulgar. (omnino spontan.: Velen.).

2. *S. Josikæa* Jacq. f. in vers. deutsch. naturf. u. ærtz. in Hamburg 1830 et in Flora 1831; Rchb. pl. cit. VIII. (1830) et exc. (1831). - Hæc species jam Kitaibelio cognita erat e comitatu Beregh, ut e manuscriptis ejus (: *S. prunifolia* Kit.), in mus. nat. hung. servatis, nuper probavit cl. Borbás; cl. Janka (1885)

novit eam crescere in comitatu vicino Marmaros (ad pagum Kelecseny), historiam explorationis suæ indagatoriæ narrans in oe. bot. z. eodem anno (frutex ibi crescit in turfosis inter Alnos, Frangulas et Salices); cl. Borbás specimina e comit. Ung. possidet, transsylvanicis omnino similia.

6. *Fraxinus*. 1. *F. Ornus*: Hisp. mer.-or. (Valenc. reg. mont.). Alpes-Marit. (Monaco, Nizza; le Bar ad ripam fl. Loup). Helv. mer. (cant. Ticino, in silvis; Gremli). Styr. (in silvis montanis plur. loc.: Maly). Carinth. (in silvis montan. calcar.). Bulgar. (Varna, in declivibus ad mare: Velen.). Thessal. hab. etiam in m. Ossa (: Heldreich 1822).

2. *F. excelsior*: Moldav. Ross. med., mer.

**F. australis*; — *F. oxyphylla* G.G. — *F. parvifolia* G.G.

3. *F. oxyphylla* (1808): Galiz. (pr. Brody; Pntek teste Knapp). Transs. r. (Schur, Janka ex Pntek). Bulgar. (arbores altæ vetustæ in silvis circa partem inferiorem fluv. Kamecyk: Borumüller). — Sec. Willkomm et Loret hæc species identica est cum *F. angustifolia* Vahl (1805), cujus var. sit *F. rostrata* (4), quæ ex Parl. Car. = *F. oxyphylla*.

**F. Montagnei*; melius jungetur cum *F. australi* (2*). — *F. biloba* est solum forma ("une simple particularité": Loret).

4. *F. rostrata*: Hisp. mer., centr. — *F. leptocarpa* DC. (ex Loret).

LXXII. ASCLEPIADEÆ.

1. *Periploca*. 1. *P. græca*; Hetr. hab. a Livorno ad Viareggio; in Ital. mer. solum pr. Otranto. — Bulgar. ad Varna in fruticetis copiosam vidit Velenovsky, ad Kamecyk validissimam observavit Bornmüller.

2. *P. lævigata*; adest in Sicil. ipsa sed raro (Palermo, Trapani); hab. etiam in insulis Pantellaria, Linosa et Lampedusa.

2. *Cynanchum*. 1. *C. acutum*; *C. sibiricum* W. (non Br.). *C. acuminatum* Moric. (non Thb.). *C. longifolium* Martens! 1824 (in hb. Wahlb., e Venet.): Japygia (Taranto: Lacaita, HGroves). Bulgar. (cum Peripl. græca ad Varna: Velenovsky). Dobrud. (in dumetis et arundinetis). Istr. non nisi in ins. S. Maria (in saxosis ad mare) lectum est. — *C. monspeliacum* potius (cum Linnæo) propria species sit; multo majus est et magis latifolium quam *C. acutum*.

3. *C. Vincetoxicum*. 3. *V. nigrum*: Sard. (: Binna ex Caruel). Ross. mer. gub. Charkow et Cherson (ex Lindemann), mer.-or. ad Sarepta (in rupestribus umbrosis: Becker).

5. *V. medium*; *V. latifolium* CKoch. — Ross. mer.-occ. (: Schmalh.). — ? *V. triste* Grsb. spicil. (sub *Cynancho*) Maced. pænins. athoa (Grsb.). Taur. (CKoch).

7. *V. fuscatum*: Istr. mer. (Tommasini detex. 1865); vid. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 377.

8. *V. officinale*: Valach, Bulgar. Rumel. or.

**V. laxum*; in Gall. rarum est (Puy-de-Dôme). Carinth. ad Pirkach et Raibl ex Pacher, pr. Pontafel (in limite veneto) a Preisman lectum. Banat. (: Borbás). Transs. (: Czató 1874); indicatur etiam in alpb. calcar. Helv.

**V. contiguum*: Bosn. mer. (GBeck 1885).

9. *V. nivale*: Bosn. mer. (alp. Prenj Planina: GBeck 1885).

6. *Stapelia*. 1. *S. europæa*; in Lampedusa hab. "in due o tre luoghi fra i sassi sul suolo argilloso": Lojac. una excurs. botan. etc. Comment. 186.

LXXIII. APOCYNÆÆ.

1. *Nerium*. 1. *N. Oleander*: Balear. (Mallorca, cordill. Norte in convallibus; Ibiza). Alpes-Marit. (abunde et sponte provenit in valle Nervia pr. Ventim.: Ardoino; val Latte inter Ventimiglia et Mentone: Moggridge; in les Maures de Vallouris: Thuret, Bornet).

2. *Vinca*. 1. *V. major*: Gall. bor.-occ. Istr.; extra aream geogr. inclinata occurrit ex. gr. in Angl. mer.
2. *V. media*; hab. etiam in ins. Balear.
3. *V. minor*: Istr. - deest in Sard. (in Sicil. rara est, in Cors. rariss.).
4. *V. herbacea*: Galiz. (rarius). Bulgar. (: Velenovsky). Ross. centr. (gub. Kursk).

LXXIV. GENTIANACEÆ.

1. *Gentiana*. 1. *G. cruciata*: Gall. bor.-occ. Ital. versus meridiem usque in Samnium (m. Matese) progreditur. Bulgar. (ex Velenovsky).
3. *G. lutea*: Gall. dep. Aube (: Briard ex Le Grand). Ital. meridiem versus usque in Campaniam (m. Meta) et Lucaniam (m. Pollino sec. Ten) progreditur.
4. *G. punctata*: Sudeti silesiaci (Gesenke). Galiz. Styr. Carinth. Lomb. (Brescia etc.). Bulgar. (m. Vitos: Velen.).
5. *G. pannonica*: Helv. (alp. Churfirsten). Bavar. (Alpes, Blomberg, Lusen et Rachel in Bayr.-Wald). - Transs. cruce notatur ap. Smk
6. *G. purpurea*: Bavar. (Alpes Algov.). Styr. (Veitscheralpe, Wechsel etc.); in Apenninis et alpihus Apuanis rarior adest; in Transs. deest ex Smk.
- 7 * *G. macrophylla*: Alpes-Marit. (col della Maddalena etc.: Ardoino; col della Madonna di Finistre: Bourgeau).
8. *G. acaulis*; in Vogesis (m. Belchen) indicata est, sed ibi a curioso quodam plantata; etiam (ex Sagorski 1883) in Thuring. (ad Freiburg a. d. Unstrutt) a pharmacopola quodam plantata est.
9. *G. excisa*; hab. etiam in Jurasso (Jura) ex Gremli. — *G. Kochiana*: Helv. mer. (St-Bernhard: Perroud). — *G. dinarica* GBeck in annal. mus. vind. (1887) II. 128. Bosn. mer. (Alpes dinaricæ calcar.: GBeck 1885).
10. *G. Frölichii* Jan in Rchb. exc. add. 865. *G. alpina* Rchb. exc. 427 (uon Vill.). *G. Hladnikiana* Host ined. sec. K.
12. *G. pneumonanthe*: Fenn. mer.-or. (Isthm. Carel.). Norv. hab. non nisi in mer. (Suec. occ. a Vermeland., or. in Scan. et Bleking.). Ital. hab. etiam in Hetr. (m. Carlo nel Pesciatino); in Aprutio adest solum "al Piano de cinque miglia" (: Ten.). Bulgar. (: Velenovsky).
13. *G. asclepiadea*: Alpes-Marit. (reg. alp., rarius). Vogesi. Bavar. Bulgar. (: Velenovsky).
17. *G. prostrata*: Styr. (alp. Hochwart, Eisenhut etc.). Galic. et Bucov. dubiæ sunt et ad *G. pyrenaicam* (15) probabiliter pertinent ex Knapp.
18. *G. utriculosa*; Germ. in valle rhen. hab. usque ad Mainz; in Helv. area geogr. a Gremli indicatur: non ubique et in occ. rarior (deest Genève, Basiliæ etc.); hab. etiam in Sabaud. (: Chabert); in Ital. locus max. merid. est in Samnii mte Matese (sulla vetta di mte Mutria: Terrac.).
19. *G. nivalis*; Styr. hab. etiam (extra Alpes) in montib. Sulzbach., in Schöckel pr. Graz; adest etiam in Appen. toscano-emiliano (al Cimone, al Corno) et max. meridionalis in m. Meta Campaniæ (ad Settefrati: Terraciano); in mte Baldo jam a Martini lecta est (a Goiran relecta circ. 1870). Bulgar. m. Vitos (: Velenovsky).
20. *G. æstiva*: Bavar. Istr. (mte Maggiore: Freyn). Bulgar. (m. Vitos: Velenovsky). Rumel. or. (m. Rhodope: Skorpil). — *G. angulosa* MB. a *G. æstiva* sat distincta est caule rigido, foliis angustioribus, alis calycinis latioribus; in Karst, ad Steyer (etc.) indicatur — *G. tergestina* GBeck in ann. mus. vind. 1887. (Istr., Bosn. mer.). — *G. chalybea* GBeck l. c. (Bosn. mer. alp. subalp.).
21. *G. verna*: Siles. (Sudeti or., r.). Bosn., Herceg. (: Beck, Brandis ex Freyn). Alpes apuane, Apenn. bor. (Parma, Toscana). Campan. (m. Meta). - Transs. ad præced. (*G. æstivam*) pertinet ex Smk.

22. *G. brachyphylla*: Bavar. (Alpes). - Helv. non nisi in summis Alpibus adest. - Transs. ad speciem seq. pertinet ex Smk.

23. *G. bavarica*: Bavar. (Alpes). Styr. hab. etiam in montib. Sulzbach.; Helv. non nisi in summis Alpibus.

25. *G. pumila*; in Transs. vix adest (ap. Smk. cruce notatur).

26. *G. ciliata*: Bulgar. (m. Vitos: Velenovsky); in Ital. meridiem versus usque ad m. Cairo (T. di Lavoro) progreditur; in Germ. linea terminalis borealis ponitur pr. Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Oschersleben et Magdeburg (ex Gcke).

26. *a. G. barbata* Froel. gent. 114, Ross. or.: gub. Perm (: Schell 1874), m. Ural. (: Sommier 1887; vid. giorn. bot. ital. 1888. 424).

28. *G. Amarella*; adest in Norv. arct. (ubi usque ad lat. 68° 35' progreditur) et Fenn. bor.; in Ital. centr. (ubi planta montana) rarior quidem est, attamen locis compluribus lecta. - Helv. (ex Gremli) solum in Engadin (: Uechtr.) lecta est. Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest. - Transs. ad *G. caucasicam* (30. *b*) pertinet ex Smk. Comment. 187.

**G. uliginosa*; — *præcox* (*G. fugax* verna seu *præcox* Rajus ex Trimen): Angl. (: Bennett, Stratton et al.). — *G. Columnæ*: prov. romana or. (mts Ernici: Baldini et Pelosi 1886).

29. *G. obtusifolia*; hab. etiam in Thrac. m. Rilo (: Pancic ex Boiss.).

29. *a. G. bulgarica* Velen. in diar. (sitzb.) soc. sc. boh. 1886. 457. Bulgar. in declivibus montis Vitos et in alpinis m. Osogovska Planina (: Velenovsky 1885, 1887).

30. *G. germanica*: Gall. bor.-occ. (Normandie), or. (Côte-d'Or, Aube). Batav. (ex Abeleven). Siles. Ross. mer.-occ. - Transs. ad *G. caucasicam* (30. *b*) pertinet ex Smk. - De hac specie (cum proximis) vid. cl. Kernerii commentationem in sched. ad exs. a. 1882. 124—8. — *G. Sturmiana* A. et JKern. sched. 1882. *G. Amarella* Sturm. (Austr. p. d., Bavar.: *G. germanica* Sendtn.).

**G. austriaca* A. et JKern. sched. ad exs. a. 1882. *G. Amarella* Jacq. enum. vind. (1762). Saut. (1826). Dollin. (1842). *G. germanica* Neilr. fl. v. Wien. - Austr. p. d. or. Hung.

**G. rhætica* A. et JKern. l. c. *G. germanica* Hausm. - Alpes centr.

30. *a. G. lutescens* Velen. in diar. soc. sc. boh. 1888. 89 sep. (*). - Bulgar. (m. Stara Planina: Velen. 1887). Serb. (m. Suva Planina: Bornmüller).

30. *b. G. caucasica* MB. t. c. I. 198. *G. Amarella*, *G. uliginosa*, *G. obtusifolia*, *G. germanica* et *G. campestris* auct. transs. ex Smk. - Transs.

31. *G. campestris*: ins. bor. Færöer. - Fenn. bor. adest in Ostrobothn. - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

32. *G. tenella*: Lapp. or. (: Fellman, Brenner), fennica (: Gunnerus, JFellman); in Lapp. suec. usque ad litus bor.-occ. lacus Tornens. lecta est. Bavar. (Alpes, rarius).

33. *G. nana*; Transs. ad speciem præcedentem pertinet ex Smk.

✕*G. Kummeriana* Sendtn. = *lutea* + *pannonica*. (Bavar.).

2. *Pleurogyne*. 2. *P. carinthiaca*; Helv. indicatur: Zermatt Valesiæ, val Avers Bundiæ (cant. Graub.), Kistengrat (cant. Glarus). Moldav. (alp. Bucieciu: Fronius).

3. *Swertia*. 1. *S. perennis*: Appen. bor. (rarius), Alpes apuanæ (r.). Gall. centr. (Mont-Dore, Aubrac, la Guiole). Bavar.

2. *S. alpestris* Bmg. mant. 19. (1846). *S. obtusa* Jka (non Led.).

4. *Chlora*. 1. *Ch. grandiflora*: Valenc. (pr. Denia: Rouy 1883). Blear. (Mallorca: Marès; Menorca: Rodrig.).

2. *Ch. perfoliata*: Istr. - Transs. a Bmg. indicatur, sed in ejus lib. specim. non adsunt, nec ab alio ibi lecta est (Smk.).

5. *Ch. serotina*: Batav. (ex Abeleven). Neapoli (sec. Guss. et spec. propr.). Græc. (Pentelikon, Nauplia, Thessal.): Haussknecht 1885). Austr. (in territ. Vindob. plur. loc.), et sec. Kerner sistit *Ch. perfoliatam* auct. austr.-hung. mult. (cfr. oe. bot. z. 1873); in Helv. rara est (Valais, Vaud, Zürich etc.).

5. *Erythræa*. 1. *E. grandiflora*: Gall. mer. (pr. Anduze dep. Gard). - Notas características, quæ hanc speciem a sequente distinguunt, cl. Lamotte fusius exposuit in prodr. fl. plat. centr. pag. 524.

2. *E. Centaurium*: Istr. Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky).

2. *α*. *E. capitata* (W.) Cham. adn. fl. berol. in app. ad Walters verz. ed. 3. (1815). Germ. (Berlin; München ex Wittrock). Öland. (: Wittrock 1883: erythr. exs. 11). Gall. bor.-occ. (Cherbourg etc.: Corbière 1885; cfr. ap. eundem in bull. soc. linn. norm.). — var. *sphærocephala* Towns. in journ. of. bot. 1881. *E. capitata* Bab. - Angl. mer. (ins. Wight, Newhawen in Sussex); cfr. Townsend flora of Hampsh. 213, 502.

3. *E. major*; — *E. sanguinea*; hab. etiam Sard. ex Reverchon.

6. *E. linarifolia*; in Suec. septentr. versus usque ad Tynderö Medelpad. progreditur; in Gall. (bor.-occ.) rara est: St-Quentin (Somme), Surville (Manche; Corbière 1887). *E. vulgaris* Wittr. 1884 (ob *Centaurium vulgare* Rafn, sed cfr. Lange haandb. ed. IV. 436). — *E. vulgaris* var. *uliginosa* Wittr. erythr. exs. 17 et in bot. not. 1885. *Chironia uliginosa* W.K.

Obs. *Gentiana llinarifolia* Lam. ab *E. linarifolia* aliena est et planta meridionalis, observ. Wittrock 1884 (cfr. bot. not. ejusd. anni). *Chironia litoralis* Turn. typica non nisi in Angl. et Gall. occ. huc usque lecta est ex Wittrock.

6. *α*. *E. glomerata* Wittr. in bot. not. 1884. 115; erythr. exs. 101. Bleking. plur. loc. (in Karön pr. Ronneby detecta a Wittrock 1882). Scan. bor.-occ. (: Lidfors in bot. not. 1885. 179). — ? *E. turcica* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1886. 31. sep. (*). Bulgar. pr. Galata (a Velenovsky detecta 1885). Rumel. or. (pr. Slivno: Skorpil).

7. *E. conferta*; — *E. chloodes* var. *brachyclada* Magn. fl. sel. exs. 102; scrin. 31.

8. *E. latifolia*; — *E. tenuiflora* speciei sequenti (*E. pulchellæ*) propius accedere videtur nisi potius subspeciem sistat; hab. etiam in ins. Wight (: Townsend 1879) et in Gall. bor.-occ. (: Lloyd, Corbière).

9. *E. pulchella*; Fenn. non nisi in max. mer. (Nyland., Aboa, Åland.) lecta est.

**E. Morieri* Corbière in mem. soc. sc. nat. Cherbourg XXV. (sep. *). Gall. bor.-occ. (pr. Lossay etc. dep. Manche, ubi a Corbière detecta 1886).

10. *E. diffusa*; Brit. (probab.) exclud. quia ne unicus quidem locus specialis botanicis anglicis notus est ex A.Bennett: "not known to us as a british plant".

12. *E. maritima*; in Italiæ ora orientali adest solum in mte Gargano versus Vico (: Porta. Rigo).

6. *Cicendia*. 1. *C. filiformis* (*Exacum filiforme* W.); Germ. hab. etiam in Marchia, Silesia (Lusat. pr. Rietschen: Fiek 1884), Bavar. (rarius). - Transs. vix adest (in hb. Bmg. desideratur) ex Smk.

2. *C. pusilla* (*Exaculum pusillum* Car. 1886): Gall. bor.-occ.

7. *Limnanthemum*. 1. *L. peltatum* S.G. (Theoph.) Gmel. in act. petrop. XIV. (1770): Gall. or. (Côte-d'Or). Alsat. - Dan. aliquot locis (Sjælland., Fion.) introduct. est et nunc quasi spontan.; in Ital. bor. non valde rarum est sed in reliqua non nisi Hetr. (parciss.), in paludibus Pontinis et pr. Fondi Campaniæ lectum; Transs. deest ex Smk.

8. *Menyanthes*. 1. *M. trifoliata*: Fenn. Dan. Ins. Færøer. - Ital. bor. frequentius adest, ceterum non nisi Hetr. (paucis locis) et in Samnii mte Matese indicatur.

LXXV. CYRTANDRACEÆ.

3. *Jankæa*. Hoc genus melius inter Ramondiam (cujus sectionem sistit ap. Clarke) et Haberleam militet, nam inter hæc genera omnino medium est.

LXXVI. POLEMONIACEÆ.

1. *Polemonium*. 1. *P. coeruleum*: Sabaud. (alpes Mauriennes: Chabert). Gall. centr. (Puy-de-Dôme, Cantal, H.-Loire). Alsat. (in ripis Rheni inter Hüningen et Markolsheim: Geke). Carinth. (in silvis humidis). - deest in Fenn. bor. (cum Lapp.).

**P. campanulatum*; hab. etiam Fenn. bor.-occ. (Ostrob., Lapp. kem. etc.).

2. *P. pulchellum*: Ural. bor., Samojed. (indicatur etiam pr. lacum Onega: Günther 1880); in Finnm. huc usque unico loco lectum est, scil. in pratis litoral. ad Bugönäs in Syd-Varanger.

2. *Diapensia*. 1. *D. lapponica*: Ross. aret. ad Jugor Sharr (expedit. Rosenthal 1871 ex ABlytt).

LXXVII. CONVULVULACEÆ.

1. *Ipomoea*. 1. *I. sagittata*; hab. etiam in Ital. mer., ubi ad fluv. S.-Anastasia pr. lago di Fondi (Neapolit.) a Pasquale detecta est, et in T. d'Otranto (Taro, Gallipoli) a Lacaita et HGroves lecta; in palude magna ad Gallipoli copiosam vidit cl. HGroves, culmos Junci tenuiflori, Caricis hispidae etc. spiris suis gracilibus amplectentem.

2. *Batatas*. 1. *B. litoralis* (Convolv. litoralis L. *Ipomoea stolonifera* Poir.); hab. Napoli ai Bagnuoli, Ischia alle Marini, Capri.

3. *Calystegia*. 1. *C. sepium*; — *C. silvestris* R.S. Convolv. silvestris (Kit. in) W. enum.

2. *C. silvatica*; hab. etiam Ligur.; in Transs. vix adest et in hb. Bmg. non exstat (teste Smk.).

3. *C. Soldanella*; Frisia or. (Ostfriesland) hab. in ins. Borkum (ex Buchenau); Oldenburg, in ins. Norderney et Wangeroog (ex Geke).

4. *Convolvulus*. 2. *C. Cneorum*: Hetr.-m. Argentaro "a Torre Capo d'uomo" (a Forsyth Major detectus 1883).

6. *C. Calverti*; *C. triqueter* Rehm. pl. exs. e Tauria.

8. *C. Cantabrica*: Gall. centr. (Puy-de-Dôme: la Limagne, Cantal), or. (Côte d'Or). Istr. Bosn. mer. (: Blau ex GBeck). Bulgar., non rarus (: Velenovsky). Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879). Cephalon. (ins. Jonic) in saxosis rarius (: Heldreich). Ross. mer. (gub. Cherson), mer.-or. - Transs. deest ex Simonkai, qui plantam in loc. Schur. frustra quæsit.

9. *C. valentinus*; species hæc rariss. non nisi ad pagum Benitachel pr. Denia (prov. alicant.) habitat, et vix post Cavanilles lecta erat antequam a Rouy a. 1883 in loco classico redetecta est; cfr. Rouy exc. bot. esp. in bull. soc. bot. 1884. sep. 8 et 44 (*).

11. *C. dorycnoides*; ex ipso auctore De Notaris vix aliud est quam "forma peculiaris" *C. Cantabricæ*.

13. *C. lineatus*; hab. etiam in Gall. centr. (Puy-de-Dôme, rr.).

16. *C. radicosus*; loco dicto (Achaïæ m. Kyllene) nunc uberius lectus est et in Heldr. hb. norm. sub no. 961 distributus.

17. a. *C. tomentosus* Choisy in DC. prodr. IX. 413. *C. lanuginosus* Vahl symb. (non Desr.). Gall. mer. inter Toulon et Hières ad vias, in sæpibus et inter segetes (: Robert ex G.G.).

18. *C. hirsutus*; pr. Genuam introductus adest (: Caldesi). — *C. sagittifolius* a *C. hirsuto* certe specificè differt ex Haussknecht; in Thessal. collibus frequens.

20. *C. althæoides*: Cephalon. ins. Jon. (ex Heldr.); in Lomb. et Pedem. (p. d.) deesse dicitur.

21. *C. tenuissimus*: Ins. Jon. (Cephalon.: Heldr., JSchmidt; Ithaca: Spreitzenh.); in Ital. bor. (Lomb., Pedem.) desit.
22. *C. tricolor*: Balear. (ex Barceló copiose). Cors. (pr. Brando: EPetit 1883); indicatur etiam Hetr. "nel Senese, a Vescovado (: Santi) et presso Firenze nel m. Marello" (: Arcang.).
**C. meonanthus*: Ital. centr. in mte Romano et pr. Corneto (*C. tricolor* Seb. Maur.).
23. *C. undulatus* (1795). *C. humilis* Jacq. (1790).
24. *C. siculus* (*C. pseudosiculus* Cav.): Balear.; in Ital. pænins. rarissimus est (Terracina sec. Sanguinetti, Calabr.).
26. *C. pentapetaloides*; Balear. in sola Mallorca lectus est (: Cambesedes, Marès); Hetr. locus est (ex Caruel) Porto S-Stefano.
5. **Cressa.** 1. *C. cretica*; in Ital. mer. non nisi pr. Pellaro Calabr. (Ten.) indicatur; etiam Ligur. (pr. Nizza) olim lecta est. — *C. villosa*: Lusit. Hisp. mer., mer.-or. Gall. mer. — *C. Loscosii* Tremols in litt. 1873; Losc. trat. arag. (Arag. mer. reg. calid. in salsugin.).
6. **Cuscuta.** 1. *C. monogyna* (vera): Hung. m. Vratnik pr. Zeng (: Borbás 1885). Serb. (ex Borbás). Bulgar. (: Velenovsky). Ross. mer.-occ.
2. *C. lupuliformis*: Siles. Galiz. Ross. med. Transs. (*C. monogyna* auct. transs. ex Smk.).
3. *C. Epilinum*: Gall. bor.-occ., centr. (Puy-de-Dôme, r.). Ital. med. et mer. rarius (Firenze, Urbino, Gaëta etc.).
4. *C. europæa*: Fenn. mer., med. Sard. (: Reverchon). — *C. Solani* Holuby (1874). Hung. Corolla squamulis destituta.
5. *a. C. triumvirati* Lge in vidensk. meddel. 1881. 98. sep. 6 (*). Mtes Nevad. (ad Dornajo: H.P.R. 1879).
6. *C. Epithymum*: Scania (: Nordstedt 1883). Gotland. (: Lönnrot 1882). Istr. Bulgar. (: Velenovsky). Ross. med. et mer. plur. — *C. Ulicis*: Oporto Lusit. (: Sjögren in hb. mus. holm.).
**C. macranthera*; — *C. calliopes*: Croat. litor. (ex Borbás 1883).
7. *C. Trifolii*: Hibern. (ex Arth. Bennett). Batav. (: Abeleven 1874). Gall. or. (Côte-d'Or), mer. (Herault: Loret). Alpes-Marit. (Puget-Theniers: Bornet; Tenda: Bornet). Transs. (: Simonkai). Comment. 188.
8. *C. alba*: Litorale austriaco (ex Borbás 1883); sec. Engler hæc species est "forma" *C. Epithymi* (6).
9. *C. planiflora*: Mallorca Balear. (pr. Soller: Marès). Ital. bor. (Pedem. Lomb., r.). Ross. mer. plur. — ? *C. candicans* Genn. exs. (Sard.).
**C. approximata*: Helv. mer. cant. Ticino.
10. *C. globularis* (1850). *C. palestina* Boiss. diagn. (1849); hab. etiam in Istr. mer. (Frey in act. soc. z.-b. vind. 1877 et 1881).
11. *C. suaveolens*; in Helv. rarius (pr. Bellinzona et Genève) lecta est; in Europa media nuper non observata videtur ex Aschn; adest etiam in Rossia ex Janka.
12. *C. breviflora*; *C. obtusiflora* H.B.K.: Hung. med. vere indig. ex Jka et Aschn 1865). Banat. (ex Pancic). Bulgar. (: Velenovsky). Dobrud. (pr. Nicolicielu: Janka). Ross. mer. — *C. Bidentis* Berthiot. Grammica *Bidentis* Royer. (Côte-d'Or).
**C. Cesatiana*: Germ. mar. (Bavar.). - Helv. solum in cant. Ticino indicatur.

LXXVIII. BORRAGINEÆ.

1. **Tournefortia.** 1. *T. sibirica*; Arguzia cimmerica Stev. (e Bosphoro Cimmerico nominata); hab. etiam in Bulgar. (pr. Varna, in arenosis: Velenovsky 1885).

Obs. *T. heliotropioides* Hook. introducta dicitur (e Buenos Ayres) et ab anno 1875 inquilina Bononiæ (Bologna) et in territor. Parmensi.

2. *Heliotropium*. 1. *H. villosum*; pr. Odessa Ross. mer. indicatur (hb. Lindem.); forse introductum.

2. *H. suaveolens*: Ross. mer.-occ.; mer. etiam gub. Cherson. Bulgar. (: Bornmüller). Thessal. (m. Ossa: Heldr. 1882).

4. *H. Bocconi*: Epirus (Chodzes ex Heldr. 1879). — *H. æthnicum* Jan.; hab. etiam in ins. Panaria delle Eolie (Guss.) et ins. Ischia (alle fumarole a Bellomo: Guss.). - Ex observ. cl. Caruel hæc species non differt a *H. suaveol.* (2), cui jam Bieberstein synonymon Bocconei rite retulit.

5. *H. europæum*; Heldr. hb. norm. 863. *a*; 863. *b* (var. *tenuiflora* Boiss. or. excl. syn. Guss.); Morav. mer. adest et hab. etiam Bulgar., Istr. (et Luxemb. ex Gcke).

**H. tenuiflorum*: Basilicata et Campan. rr.; Vesuv. (: Pasquale); ins. siculæ Lipari et Salina.

6. *H. dolosum* (Heldr. hb. norm. 864. *H. suaveolens* Orph. exs. 866). Pompeji etc. (: Pasquale). Capri (Pasq.). Linosa (: Aiuti). Ross. mer.-occ.; mer. gub. Cherson. - Sec. Caruel hæc species pertinet ad *H. Eichwaldi* Steud. (1840), in Consp. sub *H. elliptico* (3) allatum.

7. *H. supinum*: Ital. med. (prov. di Roma: Pirotta et Pelosi, Tivoli al lago dei Tartari, Pisa et Firenze al Arno). Bulgar. (: Velenovsky).

3. *Borago*. 1. *B. officinalis*: Croat. (Fiume: A-M. Smith).

4. *B. cretica*: ins. Karpathos (Arch. turc.) in speluncis montium (: Pichler).

4. *Symphytum*. 1. *S. officinale*; Fenn. mer.-occ. non nisi inquilinum, sed in mer.-or. (Olonets) indigenum adest; hab. etiam in Bulgar. (: Velenovsky), in Ital. mer. usque in Basilicata (m. Vulture: Ten.); in Cors. non lectum est. — *S. tanaicense* Stev. (1851). Ross. mer. (gub. Cherson), centr. (gub. Kursk: Lindem.). — *S. stenophyllum* GBeck in ann. mus. vind. 1887. (Bosn. mer. pr. Sarajevo).

4. Obs. *S. peregrinum* Led. (ind. dorp. 1820) nunc inquilinum est Angl. (*S. asperrium* Bab. bath.) et nostrum *S. uplandicum* idem dicitur (vid. Journ. of bot.), sed etiam *S. asperrium* verum (MB.), quod tamquam herba pabularia colitur, in aliquot terris interdum quasi sponte obviam venit.

5. *S. tauricum* (*S. orientale* MB. non L.); *S. patens* Fr. (hb. norm. V. 4) nunc ad hoc citatur et tunc omnia, quæ in Consp. sub *S. orientali* observavimus, ad *S. tauricum* referenda essent.

8. *S. tuberosum*: Gall. centr. (Puy-de-Dôme, Cantal, Loire). Helv. etiam cant. Fribg. (Montbovon). Cors. (EPetit 1883). Siles. — *S. foliosum* Rehm. (1868). Galiz. in silvis frondosis ad Dniestr pr. Czernelica; "corollæ duplo crassiores" (quam in specie ipsa).

Obs. Ab hac specie non separentur *S. bulbosum* (10), cum subspecie *S. Zeyheri*, et *S. Gussonei* (9), monente cl. Caruel, qui has omnes s. d. species circa Florentiam promiscue crescentes observavit.

10. *S. bulbosum*: Alpes-Marit. (Mentone, Nizza). Ins. Jon. (Cephalon.: Heldr., Corfû: Spreitzenh.). Alsatiæ pr. Weissenbourg in vineis copiosum (: Buchinger 1877), probab. introd. (FSchultz observavit hanc plantam in Phalzia introductam esse cum vitibus).

11. *S. ottomanum*: Bulgar. vall. Jantra (: Janka 1878).

5. *Anchusa*. 1. *A. sempervirens*; Angl. probab. tantum inquilina (sic in Hampshire); etiam Belg. aliquot locis inquil. adest.

2. *A. officinalis*: Transs. Bulgar.; in Belg. rarior est et sec. Crepin introducta. — *A. biceps* Vest (e stigmate bilobo sic nominata, sed stigma tale etiam in planta vulgari observatur).

**A. Baumgarteni* (1881). *A. pustulata* Schur (1866) ex Smk.

2. *a*. *A. macrocalyx* Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1886. 71 (*). Pindus agraph. in reg. subalp. (: Haussknecht 1885).

2. *b*. *A. osmanica* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1885. 32 sep. (*). Bulgar. balcan. (in lapidosis ad Berkovce: Velenovsky 1885).

5. *A. ochroleuca*; hab. etiam Galiz. (r.).

**A. procera* Bess. (1822). *A. stricta* Herbieh (1855): Galiz. Ross. mer. Forse *A. officinali* (2) propior et tantum ejus varietas vel subspecies.

6. *A. Gmelini*: Bulgar. (cfr. Velen. in act. soc. sc. boh. 1886). Rumel. or. Isthm. Corinfb. (: Hausskn. 1885); "per Hungariam usque ad Vindobonam Austr. et Flumen (Fiume) Croat. progreditur".

9. *A. undulata*; Ligur. adest!; hab. etiam in Corfû ins. Jon. (: Spreitzenh. 1887).

10. *A. hybrida*; a specie præced. minime differt (subspecies *A. Capellii* est tantum forma gracilis diffusa ex Car.). Tenoreus speciem hybridam esse credidit (inter *A. undulata* et *A. officinalem*); alii in ea Linnæi *A. angustifoliam* quesiverunt. — *A. crispa* sec. Caruel est species restituenda; rarissima est, locis paucissimis lecta.

13. *A. italica*: Alsac. Bosn. (: Hofman, Brandis). Bulgar. (: Velenovsky).

14. *A. Barrelieri*: Alpes-Marit. (reg. mont.). Bulgar. (ex Velen.). Ross. mer.-occ. (Bessarab.), mer. (gub. Cherson: Lindem.).

16. *A. stylosa*: Thessal. (: Heldr. Holzm. 1883).

Obs. *A. Aucheri* DC., quæ *A. ægyptiacæ* (19) proxima, in Taur. a CKoch indicatur.

6. *Lycopsis*. 1. *L. variegata*: Creta (: Reverchon). Ins. Jon. (Cephalon.: JSchmidt, Heldr.; Corfû et Ithaca: Spreitzenh.). - Ligur. ab Allioni et Bertoloni indicata est, sed a recentioribus ibi non observata.

2. *L. arvensis*; exc. etiam Fenn. bor.; in Ital. bor. sat obvia, sed in med. (Hetr.) rara et in mer. vix ultra Neapolin progreditur.

3. *L. orientalis*; in Gall. mer. (dep. Gard, rr.) introducta dicitur, probabiliter cum frumento extraneo.

7. *Nonnea*. 1. *N. rosea*; Germ. hinc inde introd. (ex Geke) adest, ut probab. etiam alibi.

2. *N. obtusifolia* (*Anchusa obtusifolia* Car. 1886); Romæ (ab a. 1876) plurib. loc. inquilina est.

3. *N. lutea* (*N. setosa* R.S. 1819. *Anchusa setosa* Car. 1886); loca occidental. (insul. mediter.) exclud., nam ad Alkannam luteam pertinent, et in Ital. ipsa hæc species probab. non nisi advena occurrit ex Caruel (pr. Parma; a DC. et Groves etiam in Ital. mer. indicata).

4. *N. pulla*: Bavar. (rarius). Styr. (pr. Neuhaus: Reichardt). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). — *N. atra*: Bulgar. et Serb. (: Bornmüller); ex Bornm. (centralbl. 1888) a *N. pulla* satis distincta est. — *N. rossica* Stev. 1851. (Taur., Cherson).

5. *N. nigricans*; Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

8 * *N. ventricosa*: Ital. mer.-or. (Taranto, Leucaspidæ: HGroves).

8. *Pulmonaria*. 1. *P. officinalis* (cfr. Kern. monogr. 24—28): Fenn. mer.-occ. Gall. bor.-or. (Lothar.)

**P. alpestris* Lmtt. fl. plat. centr. (1881). Arvern. (Mont-Dore, Cantal).

2. *P. rubra*: Galic. Bucov. Bulgar. (m. Vitos: Velen. 1887).

**P. dacica* (Simk. közlem. 1878) Smk. enum. (1886). Transs. (rarius).

3. *P. vulgaris*: Bosn. mer. Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.). - Hampshire Angl. plur. loc. copiosa dicitur.

**P. ovalis*; hab. etiam (freq.) in Gall. centr. ex Lmtte.

4. *P. saccharata*; ex Bonnet planta gallica partim ad subspeciem proximam, partim ad *P. longifoliam* (3 *) pertinet.

**P. affinis*; etiam in Gall. med. adest (frequentior) ex AMagnin.

**P. stiriaca* Kern. monogr. (1878). *P. oblongata* Rehb. exs. 1539; Fleischm. 1844 (non Schrad. in litt. ad R.S. 18 4). *P. saccharata* K. p. p. - Styr. Carinth. (mont. vallis Lavanthal: Wiesb.). Carniol. Bosn. (: Brandis ex Freyn).

5. *P. angustifolia*: Gall. or. (Côte-d'Or). Alpes-Marit. (reg. mont., rarius). Styr. (ex Maly). Siles. Ross. mer.-occ., mer. - Transs. incerta civis est (a Smk. cruciata).

6. *P. mollis* (1815): Bosn. mer. Bulgar. (ex Velenovsky). - Transs. ad sub-speciem pertinet ex Smk.

**P. mollissima* Kern. monogr. (1878): Morav. Galliz. Hung. Transs. (*P. parviflora* Schur). *P. angustifolia* Bess. (1809). Sadl. (1840). *P. mollis* Bess. (1822). Kern. (1873) et auct. mult. (saltem p. p.).

× *P. digenea* Kern. = *mollissima* + *officinalis*. (Hung.).

× *P. hybrida* Kern. = *angustifolia* + *officinalis*. (Tyrol.).

× *P. notha* Kern. = *angustifolia* + *obscura*. (Austr.).

× *P. oblongata* Schrad. = *angustifolia* + *vulgaris*. (Germ.).

9. *Cerinthē*. 1. *C. major*; — *C. glabra* Mill. (non Gaud.).

2. *C. aspera*; Ligur. plur. loc. adest. - Transs. ad *C. minorem* (7) pertinet ex Smk.

4. *C. longiflora*; valde similis *C. glabræ* (5) et in sicco vix distinguenda ex Caruel.

**C. Smithiæ*: planta rarissima utpote in unico loco huc usque lecta sc. in Seoglio (scopulo) di S-Marco prope Porto-Rè in Sinu Fluminensi (Flume); sec. Kerner est species media inter *C. glabram* (5) et *C. minorem* (7).

5. *C. glabra* Gaud. (non Mill.): Alpes-Marit. (Tenda et val de Pesio ex Ardoino). Pedem. (val d'Aosta). Aprut. (m. Grande di Pizzoli). Bosn. (: Brandis ex Freyn, GBeck 1885). Ross. mer. Styr. (ex Maly) non nisi in montib. Sulzbach. adest.

6. *C. maculata*: Bulgar. (leg. Bornmüller). - Sicil. exclud. sec. Caruel (planta sicula est *C. minor*), ut etiam Abruz. (cfr. præc.).

**C. auriculata*; a specie seq. (*C. minor*) non differt ex Caruel.

7. *C. minor*: Alpes-Marit. Istr. (ins. Brioni: Tommasini ex Freyn). Rumel. or.

10. *Echium*. 6. *E. vulgare*; hab. etiam in Rumel. or. (ex Velen.).

7. *E. pustulatum*: Croat. litoral., rarius (: A-M.Smith). *E. tuberculatum* Hffgg. Lk. probab. speciem distinctam (restituendam) constituit.

10. *E. rubrum*: Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky).

10. *a.* *E. angustifolium* Lam. ill. n. 1856. (DC. prodr.). - Species raro lecta et parum cognita, sed cl. Rouy eam pr. Hellin Hisp. mer. (1881) sat copiose legit et plenius descripsit in bull. soc. bot. 1882.

11. *E. italicum*: Bulgar. - Helv. hab. in sola Valesia, ubi pr. Branson nuper relectum dicitur. — *E. pyrenaicum*; Comment. 189.

**E. altissimum*; hab. etiam Bulgar. (: Velenovsky).

13. *E. plantagineum*; Ital. bor. hab. in sola Ligur.; etiam Germ. lectum est, cum *Serradella* introductum (Aschn).

**E. Davæi* Rouy in Le Natural. 1882. - Lusit. ins. Berlenga (detectum a Daveau 1879).

14. *E. maritimum*; hab. etiam in Mallorca Balear.

18. *E. arenarium*: Balear. (Mallorca, Ibiza: Barcelò, Marès). Apulia. Melita, Pantellaria.

19. *E. calycinum* (*E. parviflorum*, a. 1794 editum, prioritate gaudet); hab. etiam in Balearibus.

11. *Onosma*. 2. *O. tauricum* (*O. laconicum* Boiss. in Orph. exs. 860): Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). Transs. (*O. stellulatum* auct. transs. ex Smk.; Led. ross.).

3. *O. pallidum*; *O. chium* Boiss. in Orph., exs. 861.

4. *O. stellulatum*: Bulgar. (: Velenovsky). - Transs. ad *O. tauricum* (2) pertinet ex Smk. — *O. pustulatum* est var. *O. arenarii* (9) ex eodem.

6. *O. setosum*: Bulgar. plur. loc. (Velenovsky 1887).

7 * *O. transsilvanicum* (*O. fallax* Borb.) dicitur fere idem ac *O. arenarium* (9).

8. *O. echioides*: Morav. (r.). Bulgar. (: Velen.). Istr.; - Transs. ad seq. (*O. arenarium*) pertinet ex Smk.

9. *O. arenarium*: Friul., Ligur.; Gall. (mer.) forse non nisi in Lozère certum. Morav. certe adest (r.). Helv. (mer.) spectat varietatem: *O. vaudense*; *O.*

hommage respectueux de l'auteur

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ.

SUPPLEMENTUM II.

PARS ALTERA.

AUCTORE

CAROLO FRIDER. NYMAN.

ADDITAMENTA. EMENDATIONES. OBSERVATIONES.

COMMENTARIUS. INDEX.

ÖREBRO (SUECIÆ).

TYPIS OFFICINÆ BOHLINIANÆ.

1890.

L. B.

Sub decennio et quod excurrit post editam partem primam *Conspectus Floræ Europææ*, botanici complures meritissimi, vegetabilium europæorum scrutatores, strenue et cum successu curaverunt ut plantæ illæ omni modo illustrentur et ut proventus ac distributio earum melius cognoscentur. Sed campus ille vastissimus — *Floræ Europææ* dico — non ubique æque excultus erat (immo partim fere incultus jacebat) usque dum, præsertim tempore novissimo, botanicis contigit obtinere et observare etiam gazas regionum earum, quæ huc usque botanices causa non vel parum calcatæ erant, — et notum est quod etiam plagæ, botanice jam diu et bene cognitæ, aliquid novi proferre non recusant. Tali modo pro hoc *Supplemento* novitiæ accederunt numerosæ e toto territorio vasto quod extenditur a plagis, quibus orientem versus latissime patet, a montibus dico *Uralensibus* et desertis *Wolgensibus* usque ad *Mare Atlanticum*, ab oris *Maris Glacialis* usque ad illas *Mediterranei*; tam ex insulis, quæ versus polum excubias agunt, *Spitzbergensibus*, quam ex parvis illis ac solitariis maxime meridionalibus et potius africanis (quarum princeps *Lampedusa*); tam ex *Islandia* illa hyperborea et *Groenlandiæ* approximata, quam ex insulis inelytis, quæ, quamquam oris *Anatoliæ* adjectæ sint, antiquitûs tamen territorio *Floræ Græcæ* adnumeratæ fuerunt.

Quod attinet ad distributionem specierum etc. intra singulas territorii nostri circumscriptiones, vel ad loca earum nova detecta, monere liceat quod mihi præsto fuere tam opera botanica majora (*floræ*, *monographiæ*) quam scripta in actis vel diariis edita (quorum auctores locis suis citare gratum mihi erat officium), quæ omnia materiam præbuere vastam et ad vegetationem europæam melius cognoscendam idoneam. Quæ vero ex his documentis numerosis et varii argumenti ab auctoribus ipsis mihi pro hoc *Supplemento* benevole missa et tradita fuerunt, ea omnia pergratus accepi, locis idoneis inserui et asterisco (*) notavi.

Absolutâ nunc hac parte altera Supplementi II et edito cum ea Commentario, quem pollicitus sum, Conspectus meus Floræ Europææ ita ad finem perductus est ut tandem, qualiscunque sit, completus judicetur. Gratias igitur maximas heic iterum refero viris illis præstantissimis et collegis clarissimis, qui me amicitia suâ non indignum censuere, sed per longam annorum seriem eâdem benevolentia me amplectere operique meo favere non desierunt.

Holmiæ, mense Jun. 1890.

C. F. Nyman.

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ.

SUPPLEMENTUM II.

PARS ALTERA.

AUCTORE

CAROLO FRIDER. NYMAN.

1890.

arenarium Rehb. exc. quoad plant. helv. — *O. pustulatum* Schur (1860). *O. montanum* Schur (1866). *O. tuberculatum* Kit. (nomen solum). Transs. Hung. — *O. tridentinum* Wettst. in Kern. fl. exs. 1885. n. 1413. (Tyrol. mer. ad lacum Benacum: Porta).

13. *O. simplicissimum*; hab. etiam Ross. centr. (gub. Kursk).

15. *a. O. fruticosum* Lab. syr. dec. III. 10. - Creta (: Sintenis. Rigo). Fere unica hujus generis species vere fruticosa; fruticulus sistit humilem, ramosissimum, ramis dumoso-intricatis.

13. *Alkanna*. 1. *A. orientalis*; — hellenica: ad rupes *Acrocorinthis* (: Lacaita).

2. *A. græca*: Cephalon. ins. jon. (: Spreitzenhofer ex Heldreich).

**A. methanæa* Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1886. 32 (*). Pæninus. *Methana* (: Haussknecht 1885).

2. *a. A. pindicola* Hsskt l. c. - Pindi Dolop. m. Gawellu (: Haussknecht 1885).

5. *A. tinctoria*; hab. etiam in Apulia et Calabr. (Ital. mer.).

8. *a. A. calliensis* Heldr. in Boiss. or. suppl. 353 (in Consp. sub *A. græca* cum dubio citatur): Eurytaniæ m. Chelidoni in reg. abietina (: Heldreich).

9. *A. lutea* (*Nonnea lutea* DC. fl. fr. suppl. excl. syn. Lam.); hab. etiam in ins. Balear.

15. *Moltkia*. 1. *M. petræa*: Bosn. mer. m. Crnovrelo pr. Grabovica (: Blau ex GBeck).

2. *M. graminifolia* (*Pulmonaria suffruticosa* L. *Lithospermum* suffruticosum Kern.); Venet. hab. non solum in m. Sumano et in montib. di Valstagna, sed etiam pluribus aliis locis ibi lecta est.

16. *Lithospermum*. 5. *L. calabrum*; hab. in Calabr. or. (ad Corigliano), nec in occ., observ. cl. Lacaita in litt.

8. *L. purpureo-coeruleum*: Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.). Thessal. m. Pelion (: Heldr.). Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879). Ins. Jon. (Corfu: Spreitzenh. 1877). Ross. centr. (gub. Kursk).

10. *L. arvense*; — *L. medium* Chev. paris. (= var. corollæ coerulea).

12. *L. incrassatum*: Mallorca Balear. (: Marès. Willk.). Cephalon. ins. jon. (reg. abietina m. Aeni: Heldr.). Forse, ut vult cl. Carnel, nihil aliud quam *L. arvense* (fl. coerul.) monstrosum "thalamo introrsum obliquo etc." (et subspecies *L. Gasparrini* idem fl. albo). — *L. permixtum*: Alpes-Marit. (reg. mont.).

13. *L. Splitgerberi*: Sard. (pr. Cagliari: Gennari). Hæc species a *L. arvensi* parum differt.

14. *L. tenuiflorum*; etiam in Ross. centr. (gub. Kursk: Augustinoviez) et mer. (gub. Cherson: Lindemann) indicatur.

16. *L. apulum*; Batav. pr. Deventer a cl. Abeleven (1883) lectum dicitur (introd.).

Obs. *Amsinckia* Lehm. est genus *Lithospermo* proximum, americanum, cujus species sequentes, in Europam introductæ, ibi in aliquot terris nunc p. m. inquilinæ lectæ sunt: *A. lycopsioides* Lehm. (Germ., Belg., Gall.), *A. angustifolia* Lehm. (Gall., Germ. etc.), *A. intermedia* F.M. (Lothar. etc.).

17. *Myosotis*. 1. *M. palustris*; adest etiam, sed rr., in Ital. mer. (Basilic., Calabr.) et Sicil. (bosco di Caronia etc.); in Norv. bor. deesse dicitur et proventus vel distributio in Lapp. incerta (in Lapp. fenn. non lecta est). — *M. aspera* Lmte (1881). Gall. centr. — *M. lithuanica* Bess.

**M. repens*: ins. Færøer (: Rostrup: vid. bot. tidskr. 1870 et fl. dan. 2828); Dan. nondum lecta est (cfr. Lange haandb. ed. IV. 475).

2. *M. cæspitosa*: Dan. Fenn. (cum Lapp.). Bulgar. (ex Velen.). Cors. (r.).

**M. Rehsteineri*; hab. etiam ad lacum Bodensee (Bavar.) et ad Rhenum (Helv.).

3. *M. sicala*: Ital. med. (territ. roman.), mer. (Apulia). Rumel. or. (ex Velenovsky).

5. *M. pusilla*; hab. etiam in Ital. pænis.: mte Gargano, in rupibus ad m. S. Angelo (: Pasquale), Calabr. (Bert.). — *M. ænesia* Heldr. exs. cephal. a. 1861. *M. litoralis* Ung. non Stev. (m. Aenos Cephalon.).

6. *M. idæa*: ins. Karpathos (Arch. turc.): Pichler. — *M. Kiesenwetteri*; *M. idæa* β *grandiflora* Boiss. or., Heldr. hb. norm. 865; hab. etiam in Attica. — *M. cadmea*; hab. etiam in Taur. ex Trautv. *M. bæotica* nunc subspecies sit:

**M. bæotica* Reut.; Orph. exs. 1002. *Bæotiæ* m. Helicon.

7. *M. litoralis*; Cephalon. ad *M. pusillam* (5) pertinet ex Heldr.

9. *M. alpestris*: Nov.-Sempl. (ex Kjellman). Würtemb. (Rauhe Alp.). Bulgar. (m. Vitos: Velen. 1887) — *M. suaveolens* W.K. ap. W. (1809). *M. lithospermifolia* (W.) Hornem. (1813); dicitur bene distincta a *M. alpestri* (cfr. Wettstein in Kern. fl. exs. a. 1885). Istr. Croat. Bosn. (: Brandis ex Freyn, GBeck 1885). Alpes mer. (ubi multo frequentior *M. alpestri*), rarior in bor., Carpat. etc. — *M. cognata* Schott in Ky exs. ex GBeck. (Bosn. mer. mont.: GBeck 1885).

10. *M. silvatica*: Fenn. or. et bor. (cum Lapp.). Ross. mer. - in Sard. deesse videtur.

**M. variabilis*; locus styriacus (ex Maly unicus) est in reg. silv. m. Rottenmanner-tauern (: Angelis). — *M. lactea* Schur 1866. *M. transilvanica* Porc. 1885. (Transs.).

11. *M. intermedia*; adest in Lapp. norv. (Finnm.), ubi fere usque ad lat. 69° progreditur (ex Norman); etiam in Lapp. fenn. lecta est.

**M. Lebelii*; — *M. sparsiflora* Breb. (Normandie); ex Le Jolis probab. hybr. a *M. intermedia* et *M. laxiflora* (1--).

12. *M. collina*; exc. etiam Fenn. med.; in Suec. bor. adest (r.) in Jemtia et Herjedalia.

**M. gracillima*; hab. etiam in Mallorca Balear. (: Marès).

13. *M. versicolor*: Island. Ins. Færøer (: Rostrop). Suec. med. (Suderm.: Thed.). Hetr. (Pisa, Firenze). Roma. Napoli (ad lac. Fusaro, in Capri). Cors. (pr. Biguglia: EPetit 1884). Ross. mer.-occ. — *M. fallacina*; hab. etiam in Gall. mer. (Herault: Loret).

14. *M. stricta*: Rumel. or. (: Velen.). Cors. (pr. Suarella et alibi: EPetit 1884); ceterum species ("saltem auctor. ital.") in Italia sat vulgata est ex Caruel.

**M. speluncicola*; *M. Alberti* Henry. Huet ex Rouy (1881): Aiguines dep. Var (: Albert).

16. *M. sparsiflora*: Bavar. bor. (pr. Nürnberg). Fenn. bor.-or. (em. pro or.).

18. *Mertensia*. 1. *M. maritima*: Fenn. bor.-or. (Carel. keret. et pomor.). Ins. Færøer (Strömö, ubi copiosa et luxurians ad Hvidenæs in glareæ alba e testis molluscorum fractis constituta). Jan-Mayen (Dr Fischer in exped. austr. 1883).

19. *Mattia*. 1. *M. umbellata*: Ross. mer.-occ.

21. *Solenanthus*. 1. *S. apenninus*; hab. etiam in Campan. (Ital. mer.).

22. *Cynoglossum*. 1. *C. officinale*: Bulgar. et Rumel. or. (ex Velenovsky).

2. *C. montanum*: Thuring. Belg. (calcar.); Gall. bor.-occ. (la Bouille pr. Rouen: Dubreuil). Occitan. hab. etiam in dep. Gard (pr. Sumône) et in silva des Fanges m. Corbar.; in Polon. indicatur a Rostafinsky, sed Morav. deest ex Oborny.

3. *C. Dioscoridis*: Alpes-Marit. (reg. mont., r.).

4. *C. nebrodense*: Euboeæ m. Delphi (: Heldreich). Bulgar. m. Osogovska Planina (: Velen. 1887).

5. *C. pictum*: Gall. centr. (la Limagne Arvern.). Bosn. mer. (: GBeck 1885). Bulgar. (: Velenovsky). Ross. mer. (gub. Cherson).

**C. siculum*; proximum dicitur speciei seq. (*C. clandestino*) sed distinctissimum, Pannoni in unico loco (al Caputo, in cultis montosis apricis) lectum et non satis notum.

8. *C. Columnæ*: Fiume Croat. (: A-M-Smith, Pichler); in Ital. pænis. non nisi Campaniam (rr.) et Aprutium inhabitat.

10. *C. arundanum*; hab. etiam in Valenc. (: Rouy 1881).

11. *C. magellense*: Sicil. bor.-or. (Val di Noto): Silipranti ex Nicotra.

23. *Omphalodes*. 1. *O. linifolia*; in campis meridionalium interdum obviam venit, ex hortis aufuga.

6. *C. verna*: Carinth. (Klagenf., Feldkirchen: Pacher). Friulia, Lomb. Banat. (: Borbás). - Transs. sponte non adest ex Smk.

9. *O. scorpioides*: Bavar. (pr. Schweinfurt, Ludwigsbad). Thuring. (m. Kyffhäusergebirge: Evers 1876).

24. *Echinospermum*. 1. *E. deflexum*: Fenn. bor. (Kuusamo) et mer.-or. (Carel. Ladog.); indicatur ad Hattingen et Siegen Westphal. (: Wilms 1879), sed an introductum? (ut in Germ. hinc inde ex Garcke, quo teste nunc deest ad Birkenfeld a. d. Nahe et ad Rudolfstadt Thuring., ubi indicatum erat).

2. *E. barbatum*: Ross. centr. Rumel. or. (pr. Slivno: Velen.). — *E. marginatum* Bess. ex Stev. (Podol.).

3. *E. Lappula*: Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). - Suec. bor. (Helsing. et Bothn.) nunc lectum est (r.). Fenn. extra mer. parcius adest. Belg. r. introd. et inconstans (ex Crepin). Ital. meridiem versus ultra Campaniam (S-Donato) non progreditur.

4. *E. patulum*; hab. etiam in Dobrud. (: Uechtr. Sint., Janka).

5. *a.* *E. Vahlianum* Lehm. asp. n. 103. *Anchusa spinocarpus* Forsk. descr. - Ross. mer.-or. (Astrachan: Becker ex Rouy). Hæc species sectionem generis propriam (*Sclerocaryum* DC.) constituit.

25. *Eritrichium*. 1. *E. nanum*: Alpes-Marit. (mt Bego, col. de Fenestre etc.). Styr. (etiam m. Sulzbach.). Transs. etiam a Kotschy et al. lectum est. Comment. 190.

**E. Jankæ* Smk. *E. villosum* Jka (non Bge). - Transs. (r.).

2. *E. villosum*: Lapp. or. (Kola: Brotherus 1885; cfr. Sælan in diar. Soc. F. F. Fenn. 1887). Ross. arct. hab. etiam in ins. Kolgujew et Waigatsch. - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk. — *E. Chamissonis* Rupr. (Ural. bor.).

**E. latifolium*; a specie primaria non differt ex Trautv. et Sælan (ap. Soc. F. F. Fenn. 1881).

26. *Asperugo*. 1. *A. procumbens*: Fenn. Dan. - in Belg. planta introducta est et inconstans (ex Crepin).

LXXIX. SOLANACEÆ.

1. *Datura*. 2. *D. Stramonium*; in plurimis (omnibus?) terris europæis non nisi in cultis et ruderatis inquilina adest.

**D. Tatula*; Comment. 191.

3. *D. ferox*; nuper (1883) pr. Romam lecta est (: Tanfani ex Caruel); Sicil. solum Catanæ et Messanæ adest.

Obs. 1. *D. Bertolonii* Parl. est varietas (constans) inermis *D. Stramonii* sec. Godr.
Obs. 2. *Nicotiana glauca* Grah., planta australi-americana, in regione mediterr. hinc inde inquilina est.

2. *Hyoscyamus*. 2 * *H. eminens* Kze sem. lips. 1847. - Ross. mer. (: CKoch).

3. *H. albus*: Istr. Ross. mer. gub. Cherson.

**H. major*; hab. etiam in ins. Balear.

3. *Scopolia*. 1. *S. carniolica*; Carinth. non nisi ad Freisach (: Graf) indicatur (cum dubio); in Curland. silvis umbrosis (rr.) a Klinge.

4. *Lycium*. 2. *L. ruthenicum*: Ross. occ. (Lithaun.: Lindem.).

2. *a.* *L. arabicum* Schweinf. in Boiss. or. IV. 289. Ins. sicula *Linosa* (: Solla).

3. *L. europæum*; in Ital. bor. hab. solum in sæpibus, sed in media et mer. etiam in fruticetis, præcipue mari vicinis (Caruel).

5. *L. afrum*; Ital. hab. etiam in Terra di Lavoro (:Terraciano).

5. *Atropa*. 1. *A. Belladonna*: Batav. Bulgar. (in silvaticis alpinis m. Balkan: Velen.).

6. *Mandragora*. 1. *M. vernalis*; Ital. hab. (ex Caruel) etiam in Veron. et Vicent.; porro "nelle Marche (prati dello Smerillo)" et in Umbria "lungo la Norcia"; in ins. Melita "naturalizzata dal 1883" (:Delicata).

2. *M. autumnalis*; Ital. adest etiam in Japygia (T. d'Otranto: Groves), Campania, in Latio, nec non in Sard.

**M. microcarpa*; planta italica a specie primaria non differt sec. Moris et Caruel.

7. *Withania*. 2. *W. somnifera*: ins. Balear. (Mallorca, Ibiza).

8. *Physalis*. 1. *Ph. Alkekengi*: Istr. Bulgar. (in silvis ad flumen Kamcyk: Bornmüller). Rumel. or. Thessal. (m. Ossa: Heldr. 1882). - Belg. rr. adest (in calcar.).

Obs. *Nicandra physalodes*; hæc nunc indicatur omnino inquilina in pluribus terris europæis, ut in ruderatis vallium montis Biharia Hung., in Banatu, Tyrol. mer., ad Genevam Helv., in Belg. et Germ. (immo bor.).

9. *Solanum*. 1. *S. sodomæum*; hab. etiam in ins. Balear.

Obs. *S. bonariense* L. etiam pr. Pompeji (Neapol.) indigenum factum est ex Pasquale.

2. *S. Dulcamara*; exc. etiam Fenn. bor. plur. (adest in Ostrobothn.).

5. *S. humile*: Suec. med. (sporadice). Norv. (ad Christiania). Ross. mer. - Transs. ad *S. nigrum* (7) pertinet ex Smk.

6. *S. suffruticosum*: Menorca Balear. (:Porta). Græc. pænins. methan. (:Haussknecht 1885).

LXXX. PERSONATÆ.

1. *Verbascum*. 1. *V. phlomoides* (Orph. exs. 1007): Sard. (ex Reverchon). Istr. (r.). Bulgar. (:Velenovsky). — *V. calvescens* Schur (ex Smk.). — *V. bohemicum* Borb. (ex Smk.).

**V. australe*: Gall. centr., bor.-or. (:Godron). Transs. Ross. mer. (:Lindem.).

**V. Sartorii*: Orph. exs. 1008 (e Maced. m. Korthiati).

2. *V. crenatifolium*: Dobrud. inter Küstendje et Ciernavoda.

4. *V. thapsiforme*: Bosn. mer. (GBeck 1885).

✕ *V. ramigerum*; *V. Braunianum* Wirtg.

5. *V. macrurum*: Cephalon. ins. Jon. (in saxosis frequens: Heldr.).

6. *V. Thapsus*; exc. etiam Fenn. med.

7. *V. montanum*: Germ. occ. (Mittelrh., Mosel) ex Garcke (ex Schrader olim pr. Halle Saxon. aderat). Gall. centr. (freq.). - Transs. ad *V. australe* (1 *) pertinet ex Smk.

8. *V. longifolium*: Campan. (m. Meta etc.). Basilic. (m. Vulture). Apulia (m. Gargano).

**V. pannosum*; *V. Jankæ* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1886. 33 sep. (*) ex ipso 1888. - Bulgar. in pratis alpinis totius jugi mont. Stara Planina; m. Vitos etc. (:Velenovsky).

9. *V. viminale*; — ? *V. valentinum* Burn. Barb. notes sur un voy. bot. etc. 50 (*). Sierra de Chiva (:Burnat. Barbey 1881).

Obs. *V. diphyon*; a cl. Humnicki pr. Orleans lectum est (cfr. ej. catal. d. plant. 1876. 19—22 *).

13 Obs. *V. ovalifolium*; Ross. mer. hab. etiam (ex Ledeb.) in gub. Cherson.

14. *V. malacotrichum*: Bulgar. in saxosis supra Kostinbrod (:Velenovsky 1887).

14. a. *V. pulchrum* Velen. in diar. (sitzb.) soc. sc. bohém. 1887. 454. *V. crenatifolium* ej. 1886. - Bulgar. pr. Razgrad et Varna (:Velenovsky). Rumel. or. (pr. Slivno: Skorpil).

16. *V. epixanthinum*: Thessal. m. Pelion (: Heldr. 1882). — *V. Samari-tani*: Græc. bor. m. Pindus (: Heldr. 1885).

17. *V. virgatum*; Gall. etiam in or. (Côte-d'Or) adest.

18. *V. Blattaria*: Bulgar. (Velenovsky). Ross. centr. (gub. Kursk). - Belg. certe introductum ex Crepin; etiam Dan. hinc inde efferatum occurrit (e cultura in hortis). — *V. blattariforme*: Thessal. (: Hausskn. 1885).

**V. repandum*: Bulgar. (Velenovsky). Neap. (Ischia, Vesuv. etc.).

20. *V. angustifolium*: Abruz. (pr. Giulianova), Osteria di Salino. T. d'O-tranto (: HGroves).

22. *V. garganicum*: Japyg. litor. (T. d'Otranto: HGroves); a *V. angusti-folio* (20) non differt ex Carnel.

23. *a. V. meteoricum* Hsskt ms. (litt. 1889). - Thessal. super. (: Hauss-knecht 1885).

24. *V. Boerhavi*: Gall. centr. (Puy-de-Dôme, Haute-Loire).

**V. conocarpum*; hoc sec. Carnel est species majoris dignitatis, pulcherrima, in Sard. sat frequens; crescit in montosis, copiosissime vero in ins. Caprera pr. casa Sorsa nec non in ins. Maddalena (ubi speciei terminus borealis).

25. *V. rotundifolium*; a præced. non distinguendum ex Carnel.

29. *V. sinuatum*: Croat. (Porto Rê: Borbás). Ross. mer. (Odessa ex Lin-dem.). - Batav. introductum pr. Apeldoorn (: Ankersmit 1880).

33. *V. leucophyllum*; hab. etiam Thessal. (: Hausskn. Heldr. 1885).

34. *V. speciosum*: Morav. (Oborny). Bulgar. (Velenovsky).

× *V. Schottianum*; *V. Neibreichii* Schur (1866).

35. *V. pulverulentum*: Bulgar. (ex Velenovsky). Græc. bor. (Pind. Dolop.: Haussknecht 1885). - Transs. ad *V. austriacum* (46—) pertinet ex Smk. — ? *V. Kanitzianum* Smk. Walz. in mag. növ. lap. 1878. (Transs.).

35. *a. V. Haussknechtii* Heldr. exs.; Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1886. - Thessal., in collibus (: Haussknecht 1885).

37. *V. Lychnitis*: Bulgar. (: Velen.). Ross. centr. et or. (gub. Kursk et Tam-bow). - Ital. max. mer. deest, ultra Basilic. (m. Vulture) non progrediens; in Suec. adest sola var. albiflora, sed nunc rariss. et non nisi duob. locis Suderm. obvia.

× *V. Hausmanni* (1872); *V. orientali-Lychnitis* Hausm. *V. pseudolychnitis* Schur (1866) ex Smk. - Bohem. Transs.; etiam ad Baden Austr. lectum.

38. *V. banaticum*: Bulgar. (Velenovsky; pr. Varna vulgatum).

40. *V. Heldreichii*: Thessal. m. Pindus Dolop. (ad monaster. Kórona: Hausskn. Heldr. 1885).

42. *V. nigrum*: Bulgar.; Ital. mer. adest (r.) usque in Basilic. (m. Vulture). — *V. thyrsoides*; *V. abietinum* Borb. (1875) ex Smk. — *V. Barthii* Schur 1879 (*V. sublyratum* Borb. 1885) ex Smk.

**V. lanatum*: Germ. bor.-occ. (Hamburg etc.) ex Garecke. Siles. (r.) ex Fiek.

**V. Hinkei*: sec. Borbás (1876) est = *V. Wierzbickii* Heuff. (48), quare præsens (*V. Wierzbickii* Rechf. f., *V. phlomoidi-blattariforme* Grsb. Schenk) *V. Grisebachianum* Borb. nominandum.

44. *V. glabratum*: Transs. (*V. erythrocaule* Schur). — *V. decalvans* Borb. (ex Smk.).

46. *V. orientale*: Bulgar. (Velen.). Ross. centr. (gub. Kursk). - Helv. non adest (ex Gremli).

47. *V. Chaixi*; etiam hæc species ex Helv. exclud. sec. Gremli.

**V. semilanatum*; vid. descriptionem et observationes cl. Freyn in ann. mus. nat. hung. 1879. 11 sep. (*).

48. *V. Wierzbickii* Heuff. in Roch. reise (1838). *V. Hinkei* Friv. 1836). *V. lanatum* auct. transs. ex Smk. (etiam *V. lanatum* Schrad. ex Kern.).

50. *a. V. heterophyllum* Velen. in diar. soc. sc. boh. 1888. 21 sep. (*). Bulgar. in saxosis ad radices m. Konjavo-Planina (detect. a Velenovsky 1887).

52. *V. phoeniceum*: Ital. med. (Toscana, Abruz., Roma); etiam in Apul. m. Gargano (rr.) lectum est. Istr. Bosn. mer. (: Zoch ex GBeck). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). Ross. med. (gub. Kursk, Simbirsk, Tambow).

- XV. *ambigens* Hsskt = *Heldreichii* + *sinuatum*. (m. Pindus).
 XV. *coenobitarum* Hsskt = *Heldreichii* + *Sartorii*. (m. Pindus).
 XV. *comosum* Smk. = *austriacum* + *phlomoides*. (Hung.).
 XV. *crenatum* Borb. = *Chaixi* + *phlomoides*? (Croati.).
 XV. *danubiale* Smk. = *austriacum* + *phlomoides*. (Hung. Transs.).
 XV. *dervichorum* Hsskt. Heldr. = *Haussknechtii* + *rigidum*. (m. Pindus).
 XV. *dimorphum* Franch. = *phlomoides* + *Lychnitis*. (Gall.).
 XV. *erraticum* Hsskt. = *plicatum* + *sinuatum*. (Attica).
 XV. *fluminense* Kern. = *Chaixi* + *floccosum*. (Croati. Istr.).
 XV. *Haynaldianum* Borb. = *glabratum* + *phoeniceum*. (Banat.).
 XV. *Humnickii* Franch. = *Thapsus* + *thapsiforme*. (Luxeuil Gall.).
 XV. *Killiasii* Brügg. = *nigrum* + *montanum*. (Ardez Helv.).
 XV. *liburnicum* Borb. = *Chaixi* + *phlomoides*. (Zeng).
 XV. *Neilreichii* Reichardt. = *phlomoides* + *speciosum*. (Austr.).
 XV. *paradoxum* Hsskt. = *pinnatifidum* + *plicatum*. (Athen.).
 XV. *phalereum* Hsskt. = *pinnatifidum* + *sinuatum*. (Athen.).
 XV. *pseudosinuatum* Hsskt. = *Sartorii* + *sinuatum*. (m. Pindus).
 XV. *Reissekii* Kern. = *Lychnitis* + *phlomoides*. (Hung. Morav. etc.).
 XV. *Schmidtii* Kern. (V. claudiopolitanum Smk.) = *lychnitis* + *phoeniceum*. (Transs.).
 XV. *semirigidum* Hsskt. = *Sartorii* + *rigidum*. (Thessal.).
 XV. *subalpinum* Brügg. = *montanum* + *lychnitis*. (Helv.).
 XV. *subphlomoides* Hsskt. = *floccosum* + *phlomoides*. (m. Pindus).
 XV. *thessalium* Hsskt. = *Haussknechtii* + *sinuatum*. (Thessal.).
 XV. *tomentosulum* Freyn. = *Chaixi* + *sinuatum*. (Pola Istr.).
 XV. *vidavense* Smk. = *austriacum* + *Blattaria*. (Hung.).

2. *Celsia*. 3. *C. Boissieri*: Isthm. Corinth. (: Lacaita).

4. *C. cretica*: hab. etiam in ins. Balear. (r.: Rodrig., Marès, Willk.).

12. *C. acaulis*: Heldr. hb. norm. 963 (e Taygeto).

3. *Scrophularia*. 1. *S. vernalis*: Succ. med. (Holmiæ et Upsaliæ inquil.). Norv. mer. (Christiania, inquil.). Gall. bor.-occ. Sabaud. (alp. Mauriennes, post sæculum denno lecta a Chabert 1883), sed Helv. raro lecta est et vix indigena (ex Gremli). Mallorca Balear. (pr. Selva: Marès). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.).

4. *S. Schousboei*: Lusit. (Alemtejo: Schmitz ex Rouy).

4. a. *S. Schmitzii* Rouy in Le Natural. 1882. 1 sep. (*). Lusit. (Alemtejo: Schmitz 1873).

9. *S. auriculata*: Cors. (: EPetit 1883). Balear. (*S. aquatica* Barc. apunt. ex ipso).

12. *S. aquatica*; *S. alata* Gilib. (1781): Ital. bor. (plur. loc.), med. (usque in Campaniam progreditur). Bulgar. (: Velenovsky). Ross. balt. (Livon. mer., Curland.). - Helv. (saltem p. p.) subspeciem spectat.

**S. Neesii*; hab. etiam in Helv. (ex Gremli).

13. *S. alpestris*: Aubrac dep. Lozère (: Prost ex Lmtte). Salles-Curon dep. Aveyron (: fr. Saltel sec. Le Grand). La Salvetat ex dep. Herault (: Loret).

14. *S. nodosa*: Dan. Norv. arct. (Lapp. norv., ubi usque ad lat. 69° 48' progreditur ex Norman). Ital. med. et mer. usque in Basilic. (m. Vulture). Bulgar. (ex Velenovsky). — *S. grandifolia* CKoch. (Hung.).

14. a. *S. bosniaca* GBeck in ann. mus. vind. (1887). II. 135. Bosn. mer. alp. (: GBeck 1885).

? 15. a. *S. valentina* Rouy in bull. soc. bot. 1882. 17 (*). - Hisp. valent. (pr. Jativa: Rouy).

16. *S. Scorodonia*: Gall. bor.-occ. - Ligur. (pr. Nizza) hæc species a Bertoloni (post Allione) indicata erat, sed probab. erronee quia area ejus geographica magis occidentalis est.

18. *S. æstivalis*: Bulgar. m. Osogovska Planina (: Velenovsky 1887).

19. *S. grandidentata*: Bulgar. (m. Vitos: Skorpil ex Velen.); Græc. hab. etiam in m. Pindo (: Heldr. 1885).

**S. Pantocsekii*; sec. GBeck(l) est = *S. laciniata* (35).

20. *S. Scopoli*: Styr. plur. loc. (: Maly). Galiz. (freq.: Knapp). Ital. bor. (Bologna, Modena), med. (Toscana etc.). Bulgar. (: Velen.). Græc. bor. (Pindus Dolop: Hausskn. 1885). *S. glandulosa* W.K. a *S. Scopoli* Hpe multum distat ex GBeck.

22. *S. peregrina*: Lusit. (S. de Cintra: Daveau). Slavon. (: Pavich ex Hzl.); in Lomb. et Pedem. non indicatur (sed plurib. locis Ligur.).

24. *S. cretacea*; in montosis cretaceis circa Novo-Pskow (gub. Charkow) copiosa (: Lindemann).

26. *S. ramosissima*; hab. etiam in Mallorca Balear. (r.: Marès).

27. *S. canina*: Carinth. (in glareosis rivulor. alpinor.). Bulgar. (: Velen.)

29. *S. Hoppii*: Alpes-Marit. (Tenda, val de Pesio, mt Monnier; ex Ardoino). Ital. centr. hab. in montibus piceno-brutiis, Campan. in m. Meta. - Helv. in solo Jurasso indicatur.

32. *S. lucida*: Alpes-Marit. (reg. litoral. sed adscendit usque ad Tenda etc.: Ardoino). Ital. mer. litor. or. (Bari. Brindisi etc.); in T. d'Otranto hab. etiam ad Gallipoli (ubi in Serra et Montagna Spaccata abundat) et Leucaspide (: Lacaita, HGroves).

**S. filicifolia*: Corfû ins. Jon. (: Spreitzenhofer 1877). T. d'Otranto, rarius, sed a *S. lucida*, quâcum crescit, parum distincta (: HGroves).

35. *S. laciniata*: Istr., præsertim in m. Mala-Utzka (: Freyn.).

**S. lasiocaulis* Schur (1866) ex Smk. *S. Jankæ* Borb. in oe. bot. z. 1886. *S. pulverulenta* Jka (non Boiss.) in termes. füzetek IV (1880). 309. sep. 29 (*). *S. laciniata* auct. transs. — *S. alpina* Heuff. in act. soc. z.-b. vind. 1858. (Transs.).

37. *S. olympica*; planta transsilv. (a Janka lecta) pertinet ad *S. lasiocaulum* (35 *) ex Smk.

4. *Digitalis*. 3. *D. ferruginea*: Bulgar. (m. Balkan: Velenovsky). Rumel. or. (Aitos: Skorpil).

4. *D. lævigata*: Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882). - Transs. ad *D. ambiguum* (8) pertinet ex Smk.

5. *D. lanata*: Bulgar. (plur. locis: Velenovsky). - Transs. a Baumgarten indicata est, sed in ejus herbario deest (ex Smk.).

6. *D. orientalis*: Bulgar. pr. Sliven (: Skorpil ex Velen.).

7. *D. leucophæa*: Thessal., in planitie (Haussknecht 1885).

8. *D. ambigua*: Gall. bor.-or. Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). Thessal. hab. etiam in m. Pelion (ubi speciei terminus meridionalis): Heldreich 1882.

9. *D. purpurea*: Lothar. (Bar-le-Duc, Argonne etc.); ceterum Gall. hab. (extra Arvern.) etiam in bor.-occ. (Normand.), or. (Côte-d'Or) et mer. (in dep. Herault plur. locis reg. mont. granit. ex Loret).

**D. nevadensis*; hab. etiam in Serra da Estrella Lusit. (: Daveau ex Rouy).

14. *D. purpurascens*: Normand. (r.: Le Jolis, Duquesne). Lothar. (: Godron).

Obs. Ad hujus speciei (hybridæ) typum, cui corolla purpurasc., pertineant: *D. hybrida* de Salvest, *D. longiflora* Lej., *D. rigida* et *D. variegata* Lindl., *D. Lindleyana* et *D. fuscopunctata* Tsh.; ad formam corollâ lutescente: *D. intermedia* Lap., *D. fucata* Lois., *D. lutescens* et *D. tubiflora* Lindl., *D. tubulosa* et *D. denticulata* Tsh.; vid. Rouy in bull. soc. bot. 1875 et Le Natural. 1882.

15. *D. lutea*; hab. etiam in Cors. (: Marsigl.); in Galic. vix adest ex Knapp et in Siles. rarior est et probab. non indig. (sec. Fiek). - Transs. ad *D. ambiguum* (8) pertinet ex Smk. — *D. australis* Ten. (Ital. mer., med.: Caldesi).

× *D. media*: Alpes-Marit. (: Burnat). Lomb. (: Rota).

5. *Gratiola*. 1. *G. officinalis*: Bulgar. (: Velenovsky). Græc. bor. (Pin-dus Dolop.: Haussknecht 1885). - Dan. nunc cum dubio citetur.

6. *Lindernia*. 1. *L. pyxidaria* (Vandellia erecta Bth.; V. pyxidaria Maxim.): Ital. mer. (Campan. pr. Caianello: Ten., Terrac.). Banat. (hb. eur.).

8. *Antirrhinum*. 1. *A. Asarina*: Gall. centr. (Haute-Loire: Negra ex Lmtte); in Germ. interdum inquil. adest ex Gcke.

3. *A. Barrelieri*; — *A. ruscionense* ad speciem seq. pertinet ex Rouy(!); vid. Le Natural. 1882. sep. 2 (*). — var. *cirrhosum* Rouy l. c. 9. *A. majus* var. *ramosissimum* H.P.R. (exs. itin. hisp. 1879. 76).

4. *A. siculum*; — *A. assurgens* Bianca. (Avola Sicil.).

5. *A. tortuosum*: Alpes-Marit. (Nizza, Grasse). Ital. med. (Roma). — *A. compositum* Lojac. ex Caruel. (Sicil., in rupibus ad Girgenti).

6. *A. majus*; — *A. cirrhigerum* Welw. (ex Rouy); est var. ramosissima, ramulis contortis subcirrhosis; hab. in sœpibus Lusitaniæ, mari proximis. — ? *A. ottomanum* Jka.

7. *A. latifolium*; Pedem. vix adest, sed indicatur in Friulia et Venet. — *A. Linkianum*; forse melius in propriam speciem restituendum (vid. Rouy in *Le Natural* 1882. 16 sep.).

**A. intermedium*; *A. Huetii*; de his cfr. Rouy l. c. 11—15 sep.

8. *A. ambiguum*; hab. etiam in Lusit. (: Daveau ex Rouy).

9. *A. meonanthum*; — *A. Huetii* Lge ex Rouy. (Castil.).

**A. Huetii*; typus speciei est planta Pyren. or. (in *Consp.* ad subspeciem 7* allata) observ. Rouy in *Le Natural* 1882. — *A. hispanorum* Bord.

10. *A. glutinosum*; hab. in regno granat. (typus speciei præcipue ad urbem Granada, v. c. in muris arcis Alhambra) et ex Reuter etiam in Castil.

11. *a. A. Charidemi* Lge in *vidensk. meddel.* 1881. 99. sep. 7 (*). *Hisp. mer.* Cabo de Gata, olim promont. Charidemi (detectum a Winkler 1876, relectum a H.P.R. 1879)

13. *A. Orontium*; hab. etiam in Istr. — *A. nanum* Debeaux (Pyren. or.).

**A. calycinum*: Balear. Gall. mer. dep. Herault (ex Loret).

9. *Linaria*. 3. *L. vulgaris*: Dan.; Fenn. bor. adest in Ostrob. etc.; Istr. Bulgar. (: Bornmüller). — ? *L. hybrida* Schur (probab. hybr. a — *L. intermedia* et *L. genistæfolia* ex Smk.).

**L. speciosa* (in Ten. fl. nap. delineata) est forma optime evoluta speciei, nec varietas; specimina neapolitana *L. vulgarem* typicam sistunt (: Caruel).

**L. rudis* Jka scroph. eur. (1880). *L. kösensis* Simk. (1878). *L. Biebersteinii* Jka exs.

4. *L. italica*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.). Ross. mer. - *L. ciliata* Láng. (Hung.). — ? *L. Kocianovichii* Aschn (ex eo hybr. a *L. vulgari* et *L. genistæfolia*).

**L. sofiana* Velen. in *diar. soc. sc. boh.* 1887. 453. *L. concolor* ej. 1886. - Bulgar. in lapidosis et collibus, in campis, ad vias pr. Sofia et in plurib. aliis locis (: Velenovsky).

5. *L. macroura*; — *L. Besseriana* Rehb. (Odessa Ross. mer.).

7. *L. dalmatica*: Bulgar. (m. Vitos: Velen., Skorpil). Thessal. (Pindus Dolo. et Tymph.: Hausskn. 1885). — *L. transsilvanica* Schur; *L. dalmatica* Bmg. (Transs.).

8. *L. macedonica* (*L. Pancicii* Jka ex Velen.): Bulgar. (Velen. 1887). Thessal. m. Pelion (: Heldr. 1882); a specie præced. vix diversa ex Velen.

9. *L. genistæfolia*: Siles.; m. Erzgeb. (ad Bieberstein) ex Garcke; Styr. (pr. Neuhaus: Reichardt). Bulgar. (: Velenovsky). Rumel. or. (: Skorpil); in Ital. rariss. est et vix indig., sed indicatur Ligur. (Riviera di Ponente) et antiquitùs Pedem., Lomb.; in Calabr. unico loco a H.P.R. lecta est (an subspec. *L. linifolia*?). — *L. lancifolia*; ad *L. transsilvanicam* (7—) pertinet ex Smk. — *L. nervosa* Bmg. ex Smk. (Transs.).

**L. linifolia*; — *L. concolor* (*L. Nyssana* Petrov. ex Velen.): Bulgar. (Velen. 1887). Transs. a Schur et Borbás paucis locis lecta est.

10. *L. Sibthorpiana*: Thessal. m. Ossa (: Heldreich 1882).

14. *L. rubioides*; est = *L. concolor* Grsb. (9*) ex Velenovsky.

15. *L. stricta*; species e Mauritania primum descripta (*L. heterophylla* Dsf. 1800), in Sicil. sat adest, sed in Calabr. rara.

**L. humilis*; non subspecies est, sed ne quidem varietas (*L. strictæ*) ex Caruel.

17. *L. reticulata*; hæc species Fontanesiana e flora europæa excludenda est si, ut vult cl. Rouy, planta lusit. ab ea differt et propriam speciem sistit scil.:

17. *a. L. Ficalhoana* Rouy in *Le Natural* 1883. 33 sep. (*). - Lusit. (Setubal etc.).

20. *L. spartea*; de varietatibus nec non de synonymia hujus speciei polymorphæ cfr. ap. Rouy in *Le Natural* 1882. 35, 36 sep. (*).

20. *a. L. oligantha* Lge in vidensk. meddel. 1881. 100. sep. 8 (*). - *Hisp. mer.* (Jativa, Almeria: H.P.R. 1879).

21. *L. bipartita*; sec. Rouy (in *Le Natural.* 1882. 38 sep.) *planta iberica* ad — *L. linogrisea* Hffgg. Lk (quæ species propria) pertinet.

24. *L. capraria*; adest etiam in parva insula, nominatis illis vicina, quæ *Pianosa* dicitur (: Simonelli).

26. *L. striata*; *L. striata* Ten. syll. est species dubia ex Caruel. — ? *L. microsepala* Kern. sched. ad exs. 1881. *L. repens* Vis. (Dalm.).

27. *L. chalepensis*; hab. etiam in Croat. (: Hirc 1883).

28. *a. L. Huteri* Lge in vidensk. meddel. 1881. 99. sep. 7 (*). *Hisp. malacit.* (S. de Mijas: H.P.R. 1879).

28. *b. L. Welwitschiana* Rouy in *Le Natural.* 1882. 60 sep. (*). *Lusit.* (Estremad.: Welwitsch).

30. *L. arvensis*; hab. etiam in Siles., sed Transs. cum dubio citetur (species apud Simonkai cruce notatur).

31. *L. micrantha* (1825); *L. parviflora* Dsf. atl. (1800).

32. *L. Pelisseriana*; nomen rectius scribitur *Pellicierana*, quia in memoriam episcopi cujusdam Pellicier datum (ex Martins).

33. *L. tristis*; planta in *Hisp.* rara, ibi lecta est in agro malacit., in monte gibraltari, pr. S-Roque et (var. *trachysperma* Coss.) in S. de Segura Murciæ; de hac specie (et de algeriensi *L. marginata*) cfr. Rouy in *Le Natural.* 1883. 342. (sep. 41—43).

34. *L. melanantha*; *L. tristis* Marès catal. balear.; *Antirrh. ærugineum* Guss. ill. 32. — *L. Amoi* Campo in *Amo descr. pl. gran.*

**L. atrofusca* Rouy in *Le Natural.* 1882. 44 sep. (*). *Lusit.* (Regoa: Schmitz 1880 nom. *L. melananthæ*).

35. *L. lusitanica*; de hac specie cfr. ap. Rouy l. c. 46—49. — *L. Lamarekii* Rouy l. c. 47. *Antirrhinum lusitanicum* Lam. (*Lusit.*: Welwitsch, Daveau).

37. *a. L. Broteri* Rouy in *Le Natural.* 1882. 40 sep. (*). *Antirrhinum lusitanicum* Brot. p. p. - *Lusit.* (: Welwitsch, Schmitz, Moller).

39. *L. supina*; *Ligur.* (Tenda etc.). *Pavia*; *planta sicula* (Bertol.) ad *L. humilem* (15 *) pertinet.

43. *L. Hænseleri*; potius approximanda est *L. supinæ* (39), cujus subspecies ex Rouy.

45. *L. alpina*; *Alsat.* (ad Rhenum). *Würtemb.* (ad ripas fluv. Iller). - Transs. indicata est a Baumgarten, sed in ejus hb. deest nec ab alio ibi lecta (ex Smk.).

45. *a. L. filicaulis* Boiss. in j. of bot. 1879 et ap. Ler. Lev. deux exc. 46. (1880). *Hisp. bor.* (Cantabr.) in glareosis alpinis jugi Picos de Europa (Leresche et Levier 1878) et in mte Peña de Curavacas pr. Cervera (ubi jam 1858 a Boissier lecta est).

49. *L. Rossmässleri*; *L. almijarensis* (del Amo descr. pl. gran.) est synon. certum teste Willk.; hab. in m. Sierra Almijara prov. Gran. (: Campo) et in prov. Malac. loco non indicato (: Rossmässler 1853).

51. *L. anticaria*; in Betica huc usque vix nisi in rupibus calcareis Torcal de Antequera (900—1300 metr. s. m.) lecta est ibique a Prolongo detecta; relecta est a Reuter 1849 et a H.P.R. 1879.

52. *a. L. fauicicola* Ler. Lev. in journ. of bot. 1879 et deux exc. 38. (1880). *Hisp. bor. prov. Santander* in faucibus vallis fluvii Deva s. Deba (: Leresche et Levier).

53. *L. multipunctata*; — *L. ignescens*; hab. in Andal. (: Willk.), Valenc. (: Rouy 1881).

55. *a. L. aragonensis* Losc. (sched. et) in Willk. ill. hisp. II. 35. *L. fili-*

folia Losc. ser. imp. (non Lag.). *L. diffusa* β (?) *aragonensis* Lge in prodr. fl. hisp. - Arag. mer. (a Loscos detecta).

56. *L. depauperata*; in Sierra de Castella pr. Alicante detecta est a Leresche (1867); hab. etiam in Puig Campana pr. Villajoyosa regni valent. (: Hegelmaier). — ? *L. Hegelmaieri* Lge in vidensk. meddel. 1881. (Valenc. mer. in vineis ad oppid. Villena: Hegelmaier 1878).

57. *L. saxatilis*; de hac specie et de proxime sequentibus vid. ap. Rouy in *Le Natural*. 1882. 55—60 sep. (*).

59. *L. Perezii* (*L. Tournefortii* var. *inquinans* Lge); Siles. introducta est (probab. cum *Serradella*), sed raro lecta.

60. *L. arenaria*: Gall. bor.-occ. (rarius).

61. *L. glauca* (1812); *L. bipunctata* (1802).

62. *L. Badali* Willk. ill. hisp. II. 33. (1887). *Linaria* con flor blanca Losc. suppl. 6. ad trat. de plant. arag. (1884). - Arag. mer. pr. Las Parras de Martin (1400 metr. s. m.), ubi a Badal detecta 1883.

67. *L. reflexa*: Japyg. (T. d'Otranto: HGroves, Lacaita); pr. Roccabruna Alp.-Marit. (comitat. niceens.) a. 1879 a Moggridge lecta est (introducta?).

68 * *L. Gangitis* Duv.-Jouv. (1879). - Gall. mer. dep. Herault (pr. Ganges detecta est).

69 * *L. robusta* Losc. trat. pl. arag. (1876) I. 14 (sub *Chænorrh.*). *L. villosa* Losc. ser. imp. (1866) p. p. - Arag. mer. (ubi a Loscos detecta 1854).

70. *L. crassifolia* (Kze chlor. hisp. 11. *L. origanifolia* β Bth. ap. DC.). *Chænorrh. crassifolium* Lge: Hisp. bor. (Picos de Europa: var. *capitatum* Willk. *L. origanifolia* Ler. Lev. ex ipsis), centr. (r.). Gall. mer. (mts Corbarienses). — *L. segoviensis*; ex Rouy (in bull. soc. bot. 1882) propria species sit et media inter *L. crassifoliam* et *L. villosam* (73). — *L. setabensis* non nisi ad S-Felipe-de-Jativa lecta est (a Leresche).

**L. Rodriguezii* Porta (1885). Balear. (Puig Major de Torrella: Rodriguez, Porta).

74. *L. alsinæfolia*; hæc species, parum cognita, non observata videtur post Vivianum, cujus specimina Moris descripsit in Flora Sardoæ.

75. *L. litoralis*: Banat. (ex Borbàs). Græc. penins. methan. (: Haussknecht 1885).

76. *L. minor*: Bulgar. (: Velenovsky); in Ital. mer. ultra Neapolin, ut videtur, non lecta est.

**L. prætermissa*; hab. etiam in Gall. or. (Côte-d'Or).

77. *L. rubrifolia* (*Chænorrhinum rubrifolium* Lge); Hisp. a Catal. per Arag. mer. ad Cast. nov. (et probab. per Valenc. et Murciam ad regn. Granat.) distributa est ex Willk.; hab. etiam (rarius) in Ligur. (*L. origanifolia* Dnt.), ad Tivoli (: Rolli), ad S-Vittorino Abruz. (ex Bertol.).

79. *L. exilis* (1854); *Chænorrhinum exile* Lge (1878); planta rara, detecta a Kralik in regno tunetano (1854); in Arag. mer. collibus gypsaceis pr. Castelseràs a Loscos (1872).

80. *L. spuria* (Heldr. hb. norm. 656. 866): Bosn. (Hofman, Brandis). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky); in Germ. bor. deest ex Gcke. — *L. lanigera* sit species propria et (ob *L. lanigeram* Dsf.) novo nomine salutanda: *L. racemigera* Rouy in *Le Natural*. 1882. 28 sep. (*).¹

**L. elatiniiflora*; hab. etiam in ins. Rhodo (hb. eur.: Hedenborg).

81. *L. lanigera*: ins. Balear. (Mallorca, Ibiza: Barceló). - Lusit. non nisi pr. Faro (: Welwitsch) lecta est ex Rouy.

82. *L. Elatine*: Bulgar. (: Bornmüller); in Suec. species rara est, non nisi in Scania occ. et Gotland. obvia. — *L. confinis* Lacroix (*L. crenifolia* Del. ined. ex Loret).

83. *L. Sieberi* (Heldr. hb. norm. 867. a. *L. Prestandree* var. *villosiss.* Heldr. hb. norm. 656): Ital. mer. (Gallipoli: HGroves). — *L. Prestandree*: Ital. mer. (Amalfi: Lacaita). mer.-or. (Gallipoli: HGroves). Argolis, Attica (*L. Sieberi* umbrosa Heldr. hb. norm. 867. b); sec. Rouy huc pertinet subspecies *L. crinita* et (*Cor-sica*. — *L. lasiopoda*; vid. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 389. — *L.*

Biancæ Lojac. observ. Linar. elatinoid. (*). *L. Prestandrea* Bianca in sched. (Sicil. mer., or.).

**L. convolvulacea* Lojac. l. c. *L. Prestandrea* var. *glabrata* Guss. inar. - Ischia.

84. *L. commutata* (*L. græca* G.G.); hab. etiam in Balear. (: Rodriguez, Marès, Rouy); de hac specie cfr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 388 et Lojac. observ. Linar. elatinoid. 19—22, ubi etiam de subspecie fusius agitur.

**L. græca*: Thessal. (: Heldreich 1885). Ital. mer.-or. (Otranto, Leucaspide: HGroves).

85. *L. cirrhosa*: Hetr. ad Altopascio; Latium (ad Fiumicino etc.); ins. Ischia, Pantellaria, Linosa (in Sicil. ipsa non indicatur). Menorca Balear. (: Rodriguez).

87. *L. pallida*; hab. etiam in mte Morrone (: Levier) et mte Meta; in Picinisco (: Terraciano, Rolli).

88. *L. Cymbalaria*: Mallorca Balear. Carinth.

89. *L. acutangula*; ex observ. cl. Caruel hæc species identica est cum præced. et cl. Bolle e seminibus *L. acutangula*, in ins. Capri ab eo lectæ, *L. Cymbalaria* typicam educavit.

90. *L. pilosa*; deest in Sard. (cfr. seq.) et Sicil. — *L. pubescens* Pr. (del. prag. 74), Siciliæ priva, restituenda videtur.

91. *L. æquitriloba* (*L. pilosa* Mor.): Sard., in montib. freq. (Reverch. exs. 273); in ins. Menorca rara est, sed in Mallorca plur. locis lecta.

**L. Müller*i (in Consp. sub præced. specie citatur); *L. æquitriloba* Hook. bot. mag.; sec. Caruel videtur species bene distincta; rarissima est et non nisi in rupibus montium pr. Laconi Sard. lecta (a Müller).

91. a. *L. fragilis* Rodrig. in bull. soc. bot. 1878. Marès et Vigin. catal. balear. 334. - Menorca (barranco de Algendar: *L. æquitriloba* Rodr. cat. men.).

93. *L. longipes*: Argolis (Heldr. hb. norm. 964). Comment. 192.

×*L. ambigua* Boullu = *striata* + *vulgaris*. (Gall. centr.).

×*L. oligotricha* Borb. = *italica* + *vulgaris*. (Hung.).

×*L. salsa* Borb. = *italica* + *genistæfolia*. (Transs.).

10. *Anarrhinum*. 1. *A. bellidifolium*: Gall. or. (Côte-d'Or, Lyon). Helv. a Gremli indicatur ad Peney cant. Vaud; Germ. (occ.) non nisi pr. Trier adsit. — *A. lusitanicum* Jord. Fourr.; hab. etiam in Pyr. or. ex Rouy. — *A. corsicum* eor. probab. bona species est, inter n. 1 et n. 2 media (cfr. Rouy in Le Natural. 1887. 396).

11. *Wulfenia*. 1. *W. carinthiaca*; in Carinth. loca speciei natalia sunt (ex Pacher): Gailthal, circa m. Gartneekofel, in Watschiger-, Kühweger-, Granitzer-, Zickel- et Auernigalm; hab. inter rupes, in pascuis et silvaticis apertis, 1500—1900 metr. s. m.; loca italica, ut in Consp. indicantur, duo, sec. Caruel (1886) unum solum sistunt: Friul. et quidem in limite extremo bor.-or. alpium italicarum, in latere meridionali montis Auernick Kogel, orientem versus a monte Nassfeld (1500 metr.), qui versus boreali-occidentem a pago Pontebba (Pontafel) situs est. Comment. 193.

12. *Erinus*. 1. *E. alpinus*: Alpes-Marit. (reg. mont., unde hinc inde descendit). Ital. in Alpibus occ. plurib. locis lecta est: mte Legnono (Como), val Formazza (supra Crodo), Bugnanco (supra mte d'Ossola), mte Rosa, mte Cenisio.

13. *Pæderota*. 1. *P. Ageria* L. (1771). *P. lutea* Scp. (1769). *Bonarota chamædrifolia* Scp. (1772). — *P. Zannichellii*; similior est speciei sequenti et forse hybr. (Carinth., Carnia).

2. *P. Bonarota* L. (1763). *P. coerulea* Scp. (1769). *Bonarota rotundifolia* Car. (1885). Styr. hab. solum in alpibus Sulzbach. (ex Maly). Transs. (Bucsecs) a Baumgarten indicatur, sed in ejus hb. deest (ex Smk.). Comment. 194.

14. *Veronica*. 1. *V. spuria*; hab. etiam in Bulgar. (: Velen.). — *V. crenulata* (Hfn) fl. hercyn. (: Hampe).

2. *V. grandis*; — *V. Bachofeni* (*V. media* Bmg. non Schrad.): Hung. or. (m. Bihar); cfr. Kern. sched. ad exs. 1883.

3. *V. longifolia*: Fenn. (cum Lappon.). Dan. pænins. (rarius).
4. *V. spicata*: Fenn. mer.-occ. (Aboa, Aland.). Suec. bor. (Jemtia: Selberg), Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky).
5. *V. orchidea*; hab. etiam in Bavar.
 **V. crassifolia*: Bulgar. in collibus supra Kostenbrod freq. (: Velenovsky 1887).
6. *V. incana*: Galiz. in rupibus calcareis ad Dniestr (r.) teste Knapp (ad Bileze: Blocki 1884). Ross. med. et mer. (gub. Kursk, Tambow, Tula, Mohilew, Kiew, Cherson).
8. *V. multifida*: Galiz. mer.-or. (pr. Bileze: Blocki 1884). Comment. 195.
11. *V. austriaca*: Morav. (r.). Galiz. Bulgar. (freq. circa Sofia, Kutlovica etc.: Velen.). — *V. Jacquini* Bmg. (1816); Schott (1817). *V. multifida* Kern. et auct. transsilv. (non L.). — *V. bihariensis* Kern. (1873). Hung. or. (m. Biharia). Transs. (isdem locis ac species ex Smk.). — ? *V. brachystyla* Rehmann (1874). Galiz. — *V. prenja* GBeck in ann. mus. vind. 1887. (Bosn. mer. m. Prenja Plana).
12. *V. Teucrium*: Alpes-Marit. (Mentone, Nizza, Tenda etc.). — *V. Schmidti* R.S. (Bohem. etc.); *V. dentata* Schm.; cfr. ap. Kerner in oe. bot. z. 1873 etc.
 **V. pseudo-chamædrys*: Dan. (insul.) inquil. rarior. Ross. balt. — *V. crinita*: Transs. occ. (locus classic.).
13. *V. prostrata*: Bulgar. (ex Velen.). — *V. macrodonta* Borb. (ex Smk.). — *V. pubicarpa* Smk. (Transs.).
 **V. orbiculata*; *V. diversifolia* Pntek (cfr. ej. adnot. 70).
15. *V. officinalis*; exc. etiam Lapp. plur. (adest in Umensi et Imandr.) et Fenn. bor. plur. (adest in sola Ostrobothn.). — *V. Tournefortii*: Lusit. (S. da Estrella: Daveau). — *V. spadana* Lej. est monstrositas, in Belg., Saxon. (: Rehnb.), Siles. (: Uechtr. et al.) observata.
16. *V. Allionii*: Alpes-Marit. (in reg. alpina sat freq. ex Ardoino).
18. *V. latifolia*: Arvern. (Cantal, r.). Alpes-Marit. (Tenda, la Fraca, val Fenestre etc.; ex Ardoino); ex Ital. bor. usque ad Lucca et Alpes apuane progreditur. Badia (Hochbodmann ad lac. Bodanum ex Gecke). Würtemb. (Oberschwaben). Bavar. (Alpes etc.). Galiz.
19. *V. Chamædrys*; deest in Lapp. suec. (sed adest rr. in Vestrobothn.); etiam in Fenn. bor. adest (immo in Lapp. Imandr. lecta est). — *V. chamædryoides*; forse subspecies est, nam observ. cll. Heldreich et Lacaita (litt. 1884) mox distinguitur corollâ albâ, coeruleo-venosâ et-maculatâ nec non herbæ colore pallido; laudatus Lacaita plantam in Arcadia occ. et bor. copiosam vidit.
21. *V. montana*; hab. etiam in Bosn. (: Brandis ex Freyn).
22. *V. scutellata*; Dan. et Fenn. non rara, in Lapp. plur. deest; in Calabr. a Tenore indicatur.
23. *V. Baumgartenii*; Galic. or. hab. (r.) in regione Mughi ibique jam a Zawadzki et aliis lecta est.
24. *V. aphylla*: Styr. hab. etiam in m. Sulzbach. et in m. Schöckel pr. Graz (*V. Mülleriana* Vest); in Ital. meridiem versus progreditur usque ad m. Meta neapol. (*V. saxatilis* Terrac. ex Caruel).
25. *V. Beccabunga*; exc. etiam Fenn. med.; in Cors. deesse videtur et in Sard. rariss. est.
 **V. gracilis* Uechtr. ap. Velen. in act. soc. sc. boh. 1886. 35 sep. (*). Bulgar. (Varna etc.: Velenovsky 1885). Dobrud. (ex Uechtr.).
26. *V. Anagallis*; hab. etiam in ins. Shetland (Beeby 1888). — *V. anagalliformis* (Bor.) Rouy; *V. anagalloides* auct. var. (non Guss.). — ? *V. intermedia* Terrac. (vall. Volturmo neapol.).
 **V. aquatica* Brnh.; area geogr. videtur eadem ac speciei primariæ; cfr. Uechtritz in (jahresb. 1877) durchf. schles. phan. pag. 2—4 sep. (*), ubi gregem *V. Anagallidis* plenius tractavit et species ejus clare distinxit. — ? *V. salina* Schur.
27. *V. anagalloides*: Ital. bor. (rarius). Bavar., Siles., Morav. (: Prantl, Uechtritz, Oborny). Bulgar. Ross. mer. (: Lindem., Schmalh.).

**V. tenuis* Led. fl. alt. I. - Ross. mer.-or. pr. Sarepta (: Becker exs. n. 1881. 197).

30. *V. Ponæ*; - Comment. 196.

31. *V. bellidioides*: Carinth. (mont. altior.). Bulgar. in summo m. Vitos et ad nives m. Kom (: Velenovsky 1885, 1887); in Sudetis rara est (Schneekoppe, gr. Kessel des Gesenkes).

**V. lilacina* Towns. in bull. soc. bot. 1878. 16. (-20 cum tab.). Vales., ubi in Bel-Alp et Riederhorn (ad 2000-2400 metr. alt. s. m.) primum reperta est a cl. Townsend; hab. etiam in Pyren. (Pic-du-Midi, Bagnères etc.).

32. *V. alpina*; etiam in Ins. Færøer (at ex Rostrup incerte) indicata est; in Sudetis (Riesengeb.) rarissima dicitur; in Aprut. (Appen. piceno-abruz.) plurib. locis lecta est: Pizzo di Sivo, la Stanca, le Moricane etc. — *V. nivalis*; sec. Smk. est var. major *V. serpyllifolia* (*V. Bungabecca* Jka).

33. *V. apennina* (*V. repens* H.P.R. exs.): Lusit. (S. da Estrella: Daveau). Bulgar. in summo m. Vitos, rarius (*V. repens* Velen. 1886); vid. ap. Velen. in diar. soc. sc. boh. 1888.

34. *V. serpyllifolia*; — *V. repens* Terrac. ex Car. non Clar. (T. di Lavoro). — *V. nummularioides* Lec. Lmtt. (Arvern., Alpes, Jura; etiam in S. da Estrella Lusit. ex Rouy). — *V. integerrima* GBeck. *V. integrifolia* W. non Schrank. (Bosn. mer. alp.). — *V. rotundifolia* Schrank (ex GBeck). — *V. humifusa* Dicks. (Scot.; Ins. Færøer: *V. serpyllifolia borealis* Feilb. Rostr. 1867).

36. *V. saxatilis*: Ins. Færøer (ex Trevelyan). Galiz. Jura helv. (Crêt du Miroir) ex Grenli. Gall. centr. (Mont-Dôre, rr.), mer. (dep. Gard, rr.). Carinth. (montes altior.). Styr. hab. etiam in m. Sulzbach. et in m. Schöckel pr. Graz (: Maly). Appen. hab. præcipue in parte ligustica (Riviera di Levante).

37. *V. fruticulosa*; Styr. hab. etiam in m. Ursulaberg (ex Maly). Carinth. (in montib. altiorib.).

44. *V. verna*: Dan. Fenn. mer. (et med. p. p.).

48. *V. acinifolia*: Bavar. bor. (rr.). Phalz.; Wetterau (ex Gcke). Carinth. (Klagenfurt: Kkl ex Pacher). — *V. præcox* Terrac. (sec. Caruel) non All. (Campan.).

50. *V. Chaubardi*: Cephalon. ins. Jon. (ex Spreitzenh. in act. soc. z.-b. vind. 1877).

51. *V. peloponnesiaca*; planta corcyr. forse ad speciem præced. pertinet ex Lacaita in litt. — *V. syriaca* hb. Mazziari ex ins. jon. 1122 cum speciminibus syriacis convenit et probab. eadem ac *V. syriaca* a Benthām ex ins. Cephalon. (: Talbot) citata.

53. *V. triphyllos*: Hetr. (rr.). Cors. (sec. Bertol.). Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.). Ross. balt. mer. (: Klinge).

54. *V. præcox*: Dan. (pr. Kalundborg: Lassen). Lomb. occ. et Modena (r.).

55. *V. persica*: Lusit. (Lisboa: Welwitsch). Dubitant aliqui de identitate hujus speciei cum *V. Buxbaumii* Ten.

56. *V. opaca*: Fenn. mer.-occ. (Aland.: FNyl., AArrhenius 1878, sporadice etiam in Nyland); Suec. med. solum Holmiæ indicatur. Ross. mer.-occ. - Transs. ad *V. politam* (58) pertinet ex Smk.

57. *V. agrestis*; Suec. bor. usque in Angerm. et Jemtiam progreditur. Austr., præcip. Infer., deest vel rr. obviam venit, *V. polita* vices ejus gerente (cfr. imprimis Wiesbaur in deut. bot. monats. 1887); etiam Transs. deest teste Smk.

58. *V. polita*; Suec. hab. mer.-occ. et ins. baltic.; in Norv. parum lecta est; adest in Ross. centr. (gub. Kursk), mer. (gub. Cherson: Lindem.), mer.-occ. (Schmalh.). *V. agrestis* auct. transs. ex Smk. — *V. Reuteri* Moritz ex Brügger. (Helv.).

59. *V. hederæfolia*; — *V. triloba*, quæ varietas insignis, adest etiam extra Bohem., e. gr. Austr. p. d. (: Wiesbaur).

60. *V. cymbalaria*: Ital. bor. (Modena, Lomb.-Venet., r.). Croat. (: Fiume: A-M. Smith; Rossi: var. *glabriuscula* Freyn).

×*V. microcoma* Borb. prostrata + *Teucrii*. (Hung.).

Obs. V. decussata Ait., species Americæ antarcticæ, nunc omnino inquilina est in Galliæ bor.-occ. (Finistère) insulis Molene et Ouessant (unde sæpe nominatur "Myrte d'Ouessant").

15. *Sibthorpia*. 1. *S. africana*: Thessal. m. Pelion, inter muscos (: Heldreich 1882).

2. *S. europæa*: Aveyron, ubi in muris humidis Entraigues lecta est; in hunc locum, a centro speciei valde distantem, forse sensim e Mont-de-Marsas migravit.

16. *Limosella*. 1. *L. aquatica*: Fenn. Dan. Ins. Færøer (ex Lyngbye).

19. *Bartsia*. 1. *B. alpina*: Carinth. (mont. altior. et Alpes). Bosn. mer. (: GBeck). Fenn. bor. (Ostrob. bor., Kuusamo). Ins. Færøer (in Nordströmö a Landt olim lecta).

20. *Trixago*. 1. *T. apula* (Bellardia Trixago All. 1785); Ligur. non nisi in comitatu niceensi indicatur.

2. *T. viscosa*: Angl. mer. (Hampsh.). Gall. bor.-occ. Parentucellia viscosa Car. (1885). Parentucellie genus a Viviani (1824) propositum est et cum genere Eufragia Grsb. congruit.

3. *T. latifolia*; Parentucellia latifolia Car. (1885).

20. *a. Siphonostegia*, Bth. 1. *S. syriaca* Boiss.; Heldr. exs. itin. thessal. 30. - Thessal. m. Pelion, in latere orientali, in collibus apricis inter Ericam arboream. - Nova floræ europæe civis valde insignis et inexpectata, a cl. Heldreich detecta d. 27 Jul. 1882.

21. *Odontites*. 5. *O. Bocconi*; rupes calcareas inhabitat; a Borzi lecta est (Nov. 1885) in loco novo, Picco di Salvatesta pr. Novara (Sicil.), ubi cæspites elegantes, e fissuris rupium erumpentes, constituit. Anthere glabræ, sed apice pilis paucissimis albis instructæ (Parl.).

6. *O. Linkii*: Thessal. m. Pelion (: Heldreich 1882).

7. *O. Bianca*; Euphrasia Bianca Guss. ap. Bianca. Hæc species rariss. e loco suo natali (Avola) nunc fere evanuit. - Non satis distincta a *O. Bocconi* (5) ex Carnel.

8. *O. cretica*; sec. Janka (scroph. eur. 1880) est = species præc. *O. Bianca*.

9. *a. O. Recordoni* Burn. Barb. not. voy. bot. (1883). 42 (cum ic.). Valenc., in arenosis inter mare et lacum Albufera (: Burn. Barb. 1881).

10. *O. Jaubertiana*; hab. etiam in Gall. bor.-occ. (r.).

11. *O. serotina* (*O. rubra* Gilib. 1782); exc. etiam Fenn. bor. et med.

12. *O. verna*: Austr. (in Consp. omissa). Ross. mer.

**O. litoralis*: Fenn. mer. et occ. (emend. pro mer.-occ.). Ross. balt.

13. *O. hispanica* (*O. viscosa* auct. lusit. ex Rouy); hab. etiam in Lusit. (Serra de Arrabida: Welw.; S. de San Luiz: Daveau 1880).

14. *O. viscosa*; Lusit. (saltem p. p.) ad speciem præced. pertinet. — *O. alpestris*; Magn. fl. sel. exs. 112 (cfr. Jord. in Magn. scrin. I. 31). *O. brigantiaca* Jord. (Briançon H.-Alpes).

15. *O. purpurea*; cfr. obs. in Burnat. Barbey notes sur un voy. bot. (1883). 45 (*).

17. *O. corsica* (*O. albidula* Mab.); loca rupestris montium altiorum, præcipue Corsicæ, inhabitat; in Sard. rara est.

18. *O. lutea*: Istr. Rumel. or. (: Skorpil). - in Helv. plur. adest.

19. *O. lanceolata*: Alpes-Marit. (Tenda, Limone etc.).

22. *Euphrasia*. 1. *E. officinalis*: Fenn. Dan. Ins. Færøer. — *E. hirtella*; *E. brevipila* Burn. Grml. (Vales). — *E. versicolor* Kern. sched. ad exs.

1881. *E. picta* Kern. olim (ined.). Alpes etc. — *E. pulchella* Kern. sched. ad exs. 1881. (Tyrol. alp.). — *E. pumila* Kern. sched. ad exs. 1881. (Tyrol. alp.); forse propior *E. strictæ* (vid. subspec.).

**E. nemorosa*; — *E. stricta*; *E. montana* Fr. - Comment. 197. — *E. arguta* Kern. sched. ad exs. 1881. *E. speciosa* Kern. 1874 (non Br. 1810); Hung. Bosn. (: Brandis ex Freyn). Comment. 198. — *E. pectinata*; hab. etiam Hetr. (: Arcang. 1882). Pindus Dolop. (: Hausskn. 1885). — *E. pudibunda* Simk. (Simonk. enum. 432). Transs.

**E. Willkommii* Freyn in Flora 1884. *E. minima* Willk. quoad plant. nevad. - S. Nevada, in graminosis reg. alpinæ.

**E. arctica* Lge ap. Rostr. in bot. tidskr. 1870. - Island. Ins. Færöer.

2. *E. minima*: Alp.-Marit. (col de Tenda, col de Fenestre, alp. St-Etienne etc.). Transs. (et probab. Hung.). - Schleicher in catalogis suis nomen *E. minimæ* Jacquinio tribuit (: *E. minima* Jacq. in Schleich. cat. 1800)

**E. variabilis* Freyn in Kern. sched. ad exs. 1886. Tyrol. (2000—2400 metr. s. m.).

3. *E. gracilis*: Fenn. mer.-occ. (Aland.: Bergstrand, Kihlman). Ins. Færöer (: Rostrup). Angl. (Sussex: Townsend). Morav. Carinth. Helv. — *E. mierantha* Rehb. exs. (non exc.) nunc (cum dubio) ad *E. salisburg.* citatur. — ? *E. Brandisii* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1888. Bosn.; vid. Freyn l. c. 622. sep. 48 (*).

**E. ericetorum* (*E. aristata* Favrat. Gremli): Helv. mer., mer.-occ.

**E. coerulea*; — *E. majalis*: Helv. mer. (*E. stricta* Schleich. exs. sec. Favrat). — *E. picta* Wimm. (1857). *E. officinalis alpestris* Günth. Grab.; Wimm. 1824. (Siles., 1200—1400 metr. s. m.). Comment. 199. — *E. montana* (Jord. ex) GBeck. *E. versicolor* Halacsy. Braun (non Kern.).

4. *E. salisburgensis*: Alpes-Marit. (Ste-Agnès supra Mentone, S.-M.-Lantosca etc.). Ital. mer. (in montibus ad Amalfi, inter 3000 et 5000' s. m.: Lacaita). Styr. etiam in m. Sulzbach. (: Maly). Bavar. (: Wörlein). Austr. p. d.; Galiz.; Norv. indicatur etiam ad Christiania (in aret. ad Kaafjord: Elgenstierna, et in Maalselv-dalen: ABlytt, lecta est). — *E. alpina* Lam. *E. cuprea* Rehbf. — *E. carniolica* Kern. sched. ad exs. 1882. Carn. Friul. Venet. or. convall. alp. ("species endemica"). Comment. 200. — *E. dinarica* GBeck. (Bosn. mer.).

**E. nivalis* GBeck in act. soc. z.-b. vind. 1883. Austr. Styr. (alp. calcar.).

×*E. lepontica* Brügg. = *alpina* + *minima*. (Alpes).

24. *Rhinanthus*. 1. *R. angustifolius*: Lothar. (r.). Carinth. Siles. (cfr. seq.). Galiz. (r.). Bulgar. (: Velenovsky).

**R. aristatus*: Helv. alp. (Engadin et probab. alibi).

2. *R. major*; exc. etiam Lapp. (p. d.) suec.; adest in Græc. bor. (Pindus Dolop. in nemorosis: Haussknecht 1885). — *R. serotinus* (Schönheit) Oborny. *R. angustifolius* Celak., Fiek.

**R. rumelicus* Velen. in diar. soc. sc. bohém. 1887. 455. Rumel. or. (Slivno etc.: Skorpil ex Velen.).

4. *R. alpinus*: Styr. Carinth. Helv. (Alpes) ex Gremli, sed an planta helv. (ut etiam styr.-carinth.?) subspeciem spectat?

25. *Rhynchocorys*. 1. *R. elephas* (1844). Elephantina proboscidea Bert. (1845). Probosciphora (Neck.) Columnæ Car. (1885). Comment. 201.

26. *Pedicularis*. 1. *P. sceptrum carolinum*: Dan. (semel, 1861, in paroc. Brande Jutland. a Schiött lecta); in Suec. mer. multa (Bahus., Halland., Scania, Bleking.) deest; in Morav. deest ex Oborny et probab. etiam in Transs. (a Simonkai cruce notatur).

2. *P. tuberosa*: Alpes-Marit. (Ste-Anne-de-Vinai: Ardoino; le Garret supra Entraunes: Bornet). Helv. hab. solum in Alpihus et in m. Salève.

**P. elongata* Kern. nov. sp. (1870). Tyrol. mer. et Venet. illi conternm.; Carinth. (alp. calcar.). Speciei sequenti proxima ex Kern.

3. *P. adscendens*: Ligur. (pr. Tenda). Lomb. (val Brembana supra Valleve, val Sabia supra Lavenone).

**P. Baumgarteni* Simk. (1886). *P. tuberosa* Bmg. (non L.). - Transs. (Bmg.).

4. *P. incarnata*: Alpes-Marit.; Lomb. occ.; Friulia (m. Cren: Huter). Bavar. (Alpes Berchtesg., Sonntagsh. etc.).

5. *P. Jacquini*; Styr. hab. etiam in m. Schöckel pr. Graz; Helv. solum in Bundia ad fines tyrolenses. Comment. 202.

6. *P. rostrata* (*P. rhætica* Kern.): Alpes-Marit. (Fenestre, Tenda etc.). Appen. Piceno (m. Vettore: Levier). Abruz. (*P. gyroflexa* Ten.). Friul. - Helv. hab. solum in Alpihus. — *P. cæspitosa* Sieb.
7. *P. pyrenaica*: Hisp. bor. (Picos-de-Europa: Ler. Lev.). — *P. mixta* (species propria sec. Ler. Lev. deux excurs. 187): Hisp. bor. prov. Santander (: Boiss. Leresche). Pyren. (Panticosa, supra Sallent, paullo sub limite gallico, "quam alibi pulchrior": Boiss. Reut. Ler.).
9. *P. asplenifolia*: Helv., in alpihus ad Samnaun in Engadin Bundiæ, in limite tyrolensi (a pluribus lecta).
10. *P. gyroflexa*: Alpes-Marit. (plur. loc.).
11. *P. elegans*; *P. rosea* Ten. syll. 301 (excl. var. B). *P. fasciculata* Ten. syll. app. 613.
13. *a. P. resupinata* L. sp. ed. II. 846. *P. lepidota* Weinm. (1850)? - Ross. bor.-or. (gub. Perm).
14. *P. lapponica*: Fenn. bor.-occ. (Ostrobothn. bor.).
15. *P. palustris*: Fenn. Dan. Ins. Færøer. Bulgar. (ex Velen.). Bosn. mer. (: Zoch ex GBeck).
16. *P. lusitanica*; sec. Rouy (Le Natural. 1882) prope *P. silvaticam* (27) collocanda est.
17. *P. comosa*: Alpes-Marit. (Tenda, col de Raus, col de Fenestre etc.). Arvern. hab. etiam in Puy-de-Dôme (Mont-Dore plurib. loc.). Haute-Loire (r.). Bulgar. (m. Kom et Vitos: Velenovsky). - Transs. ad subspeciem et *P. campestrum* (18) pertinet ex Smk.
- **P. brachyodonta*: Græc. bor. (m. Pindus: Heldr. 1885). Rumel. or. (: Velenovsky); planta rumelica caule crebre lanato distincta est. — *P. coronensis* (ex Smk.) est var. minor speciei sequentis (*P. comosa* auct. transs. plur.).
18. *P. campestris*: Hung. (Hzl.). Galiz. or. (*P. comosa* Herbich). Ross. mer., mer.-occ. (*P. comosa* Led. ex Lindem.).
20. *P. Friderici Augusti* (1839); ex Carnel (Parl. fl. ital.) hæc species identica est cum seq. *P. petiolaris* (1835). — *P. scardica* GBeck in ann. mus. vind. 1887. *P. Friderici Augusti* Grsb. spic. (Maced. m. Scardus).
- **P. montenegrina* Jka (non Ebel). *P. Malyi* Jka in termes. füzetek IV. 318 (1880); hab. etiam in Bosn. mer. alp. (: GBeck).
21. *P. petiolaris* (*P. rosea* Ten. syll. 301 var. B. non Wulf.); Aprut. plurib. locis lecta est (mte Corno, mte Velino): in mte S-Angelo pr. Castellamare a Tenore. — *P. Tenoreana* H.P.R. exs. itin. ital. a. 1877. 429.
22. *P. dolichorhiza*; planta transsilv. ad *P. campestrum* (18) pertinet ex Smk.
24. *P. occulta*; *P. comosa* var. *procera* Friv. pl. ture. exs.
25. *P. leucodon*; — *P. bosniaca* GBeck in ann. mus. vind. 1887. (Bosn. mer. mont. altior.) — *P. fallax* GBeck l. c. (Bosn. mer. alp.).
26. *P. læta*; hab. etiam in Ross. mer.-occ. ex Schmalhausen.
27. *P. silvatica*; etiam Lomb. aliquot locis antiquitûs indicatur. - Transs. ad *P. verticillatam* (41) pertinet ex Smk.
27. *a. P. euphrasioides* Steph. in W. sp. III. 204. - Ural. bor.
30. *P. foliosa*: Hisp. bor. (Picos-de-Europa: Ler. Lev.). Alpes-Marit.; Apenn. bor.; Arvern. hab. etiam puy-de-Dôme, puy-de-Côme etc.
31. *P. Hacquetii*; hab. etiam in Carinth. (alp. calcâr.).
32. *P. recutita*: Bavar. (Alpes). Styria etiam in montib. Sulzbach. (: Maly). Taur. (CKoch). - Transs. ad *P. verticillatam* (41) pertinet ex Smk.
34. *P. rosea*: Lomb. occ.; Pedem. mult. loc. lecta; Aprut. ad *P. petiolarum* (21) pertinet; Transs. (ex Smk.) ad *P. versicolorem* (36). — *P. Allionii*: Alpes-Marit. (les Viosennes: Loret, Tenda: Bourgeau, Carlin: Rehb. f.; etc.).
35. *P. orthantha*: Bulgar. m. Vitos (ex Velenovsky).

35. *P. versicolor*; Pedem. rariss. est (m. Cenis, alp. Savine, Cramont). Helv. hab. solum in Alpinis (boreal. omnibus, sed non in central.). Galic. non rara est (ex Knapp). Carinth. r. (Krebenzen ad Friesach: Graf).

**P. Oederi*; Succ. hab. solum in Jemtia et Herjedal.; Ross. arct. etiam in Nov.-Semi.

39. *P. lanata*: Ural. bor.; Spitzberga (: Nathorst; vid. V.A.H. 1883). Comment. 203.

40. *P. acaulis*; - Comment. 204.

41. *P. verticillata*: Styr. hab. etiam in m. Schöckel pr. Graz; Galiz. in toto jugo Carpator. central. (: Knapp). Moldav. (alp. Bucieciu: Fronius, alp. Cehlaulu: Janka). — *P. cæspitosa*; hab. in reg. alp. montis S. Nevada (r.).

× *P. erubescens* Kern. = *rostrata* + *tuberosa*. (Tyrol., Bund.).

× *P. Kernerii* Hut. = *elongata* + *gyroflexa*. (Venet.).

× *P. Murithiana* Arvet-Touv. = *tuberosa* + *recutita*. (Helv.).

× *P. pallescens* Brügg. = *incarnata* + *tuberosa*. (Engadin).

× *P. pseudoasplenifolia* Steining. = *asplenifolia* + *rostrata*. (Engadin).

× *P. Vulpilii* Solms = *incarnata* + *tuberosa*. (Helv.).

27. *Melampyrum*. 1. *M. cristatum*: Bulgar. et Rumel. (ex Velen.); Carinth. nuper non lectum est (ex Pacher probab. cum frumento introductum erat).

2. *M. arvense*; hab. etiam Fenn. mer.-occ. (sed Aland, nunc non indicatur).

3. *M. barbatum*: Venet., colles Euganei, Umbr. (r.), mte Gargano (etc.); adest etiam Lothar. (: Godron) et Luxemb. (ex Aschu), probab. cum frumento extraneo introductum; etiam Morav. non indigenum (et ibi nuper non lectum) ex Oborny; in Styr. a Maly non commemoratur.

4. *M. nemorosum*: Alpes-Marit. (reg. mont.). Gall. centr. (H.-Loire: St-Didier, Doue) ex Lmtte. - Transs. ad * *M. bihariense* pertinet ex Smk. — ? *M. moravicum* HBraun (1884). Comment. 205.

**M. catalaunicum* Freyn in Flora 1884. *M. nemorosum* Willk. Lge quoad plant. catalaun. - Catal. (: Vayreda, nom. *M. nemorosi*).

**M. bihariense* Kern. (1881). Hung. or. et Transs. occ. (m. Biharia). Bosn. Comment. 206. - *M. grandiflorum* Kern. (a p. Semmering).

**M. subalpinum* (Jur. 1857) Kern. sched. ad exs. 1881. Austr. p. d.

4. *a. M. angustissimum* GBeck in act. soc. z.-b. vind. 1882. 189. Austr. (Schneeberg, Vöslau). Forse hybr.

5. *M. pratense*; — *M. commutatum* Tsh. (= *nemosum* + *pratense*?). *M. laciniatum* Kosh-Zinger enum. plant. gub. Tula (1881); hab. etiam in Gall. dep. Loire (a JHervier detectum 1883 et a Lange determinatum) et Dan. pr. Viborg (ex Lge). — *M. paludosum* (Gaud.) Prantl. *M. lineare* Saut. — *M. alpestre* Brügg. (Helv.).

6. *M. silvaticum*: Fenn. Dan. (in insulis rr.). Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., rarius). Bulgar. (: Velenovsky).

**M. saxosum*: Siles. (: Riesengeb., r.; Glatzer Schneeberg); fere medium inter *M. silvaticum* et *M. pratense* (*M. silvaticum* auct. hung. plur. ex Smk.).

6. *a. M. bohemicum* Kern. sched. ad exs. 1881. *M. subalpinum* Kern. olim. *M. nemorosum* subalpinum Celak. 1871 (non Juratz.). *M. stenophyllum* Celak. in oe. bot. z. aut. 1879 (non Boiss. or. vere 1879). - Bohem. Morav.

28. *Tozzia*. 1. *T. alpina*: Arvern. (Cantal, sub rupibus Pas-de-Roland ad Puy-Mary: Gatien et Heribaud 1878). Alpes-Marit. (reg. alpina, rarius). Lomb. Friulia, Bosn. (m. Vlasic: Brandis 1886). - Siles. loca natal. Malinow et Barania sunt montes jugi Beskiden dicti.

LXXXI. OROBANCHEÆ.

1. *Phelipæa*. 3. *P. coerulea* (*P. purpurea* Aschu): Pedem. (plur. loc. . Ligur. (comitat. Nicæens.). Modena, Urbino, Piceno, Gaëta, Napoli (pl. loc.); mte Vulture, mte Gargano, Bagnara Calabr. (: Pasquale); Salina ins. æoliar. (: Lojaccono 1877). Ross. med. (gub. Tambow). — ? *P. bohémica* Celak. (Karlstain Bohem.: Celak.).

**P. ionantha* Kern.; Hung. Tyrol. Helv. Gall. centr. (dep. Loire).

4. *P. cæsia*: Murc. (: Rouy 1881). Balear. (: Rodrig., Barceló).

7. *P. arenaria*: Alpes-Marit. (Tenda etc.). Helv. hab. etiam in cant. Vaud et in Engadin Bundiæ; in Lomb. occ.; Hetr. a Caruel (Parl. fl. ital.) non indicatur (sed Florentiæ "alle Cascine" adest *P. coerulea*, interdum pro hac specie sumta); etiam Siles. (rarius) lecta est. - *Orobanche purpurea* Jacq. est *P. coerulea* (3) ex Kerner.

**P. Pareysi* Boiss. or. suppl. *Orobanche Pareysi* GBeck in oe. bot. z. 1881. - Taur.

8. *P. stricta*; etiam Panormi (rr.) et in Nebrodibus (Timpe di Marfa) a Tineo lecta est et a Lojacono recognita (contrib. alla flor. sicil. 16 *); adsit etiam in Alicuri ins. æoliar. ex eodem.

9. *P. nana*: Gall. centr. (pr. Rocamadour dep. Lot) ex Lmtte. Bosn. (: Brandis ex Freyn). *Orobanche nana* K. (in litt. ad Noë) nunc dicitur var. *P. Muteli* (14).

10. *P. lavandulacea*: Ligur. plur. loc.; Hetr. in m. Argentaro (: Beccari). Ital. mer. (Amalfi, in memoribus: Lacaita). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).

10. a. *P. ægyptiaca* *P. syn.* II. 181 (sub *Orobanche*). *P. elongata* Lojac. crit. orob. 65 (ex Car.). - Sicil. (mte Gallo Panormi: Lojacono 1882). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).

12. *P. pyramidalis*: Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht 1885).

13. *P. ramosa*: Belg. (cum cannabi introd.: Crepin). Polon. (Lublin: Lindem.). Bulgar. (: Velen.). Ross. centr. — *P. emarginata* Lojac. ex Caruel. — *P. proboscistyla* Bianca est forse monstrositas (sec. Caruel).

14. *P. Muteli*: Sicil.; Vulcano ins. æoliar. (: Lojacono 1877); indicatur etiam Hung. - *P. panormitana* et *P. Gussoneana* Lojac. ex Caruel. - Ad hanc speciem pertineat etiam *P. cæsia* sicula (*Orobanche cæsia* Guss.) ex Caruel. — *P. rufescens*: Sicil. (Ficuzza, ad m. Busambra: Lojacono 1878).

**P. ramosissima* Genn. spec. 10. - Sard. pr. Cagliari (: Gennari).

3. **Orobanche.** 1. *O. cruenta*: Gall. bor.-occ. Sard. et (?) Cors. - *O. Levieri* Lojac. (ex Caruel).

5. *O. variegata*: Alpes-Marit. (rarius). Hetr. etiam in Appen.; Sicil. (Palermo: Parl., Ficuzza: Lojac. etc.). - *O. lutea* Lojac. (ex Caruel).

6. *O. Spartii*: Hisp. mer. (Hellin: Rouy 1881). Calabr. (Pizzo, S-Cristina). Napoli (*O. foetida* Ten. syll.). Genuæ etiam hodie sat lecta est. - *O. sicula* et - *O. Todari* Lojac. (sec. Caruel).

7. *O. lucorum*: Styr. (r.). Lomb. (plur. loc.). Hetr. (Apenn. pistor.: Beccari). Umbr. (mte S-Vicino: Bucci). - Helv. hab. solum in cantt. Bundia (Engadin) et Ticino. Comment. 207.

**O. micrantha* Kern. - Tyrol.

10. *O. Rapum*: Hetr. (hinc inde). Neap. (Picinisco, Vesuvio, Vulture). Cors., Sard. (?). Sicil. (Ficuzza: *O. carnea* Lojac. ex Caruel, quæ etiam pr. Amalfi lecta est a Lacaita). - Helv. non nisi in mer. (ital.) provenit. — *O. rigens*; ex GBeck pertinet ad *O. thyrsiodeam* (12). — *O. Benthami* Timb.-Lagr. *O. crinita* Bth. cat. pyr. (non Viv.).

10. a. *O. Chironii* Lojac. contrib. fl. sic. (1878). 12 (*). Sicil. (basse rupi di Busambra, in radicibus *Opop. Chironii*: Lojacono). Sec. cl. Caruel ad *O. denu-datam* (38) pertinet.

11. *O. Satyrus*; hab. etiam in insul. Aeolic. (: Lojacono); sec. GBeck (teste Caruel) est forma comosa *O. variegatæ* (5).

12. *O. thyrsioidea*; ex GBeck ad hanc speciem forse pertinent *O. Rapum* et *O. carnea* Guss. inar. (Ischia).

14. *O. condensata* Mor.: Cors. (sec. Mutel et Reuter). Ligur. (pr. Cervo: Ricca ex Caruel).

15. *O. speciosa*; in Sard. nondum lecta videtur, sed Sicil. abundat.

**O. Gussonii*; sistit potius varietatem *O. speciosæ*, cui sec. Caruel pertinent etiam *O. Tommasinii* Lojac. et *O. Pelargonii* Cald.

16. *O. congesta*; sec. GBeck est tantum forma *O. rubentis* (39).

17. *O. Alexandri*; cfr. ad *O. Epithymum* (29).

18. *O. alba*: Ross. centr. (gub. Kursk). Bosn. mer. (Sarajevo: GBeck); - indicatur etiam Morav. — *O. Buhsei* Reut. Boiss. (Bosn. mer. in pratis lapidosis declivium m. Trebovic: GBeck 1885).

20. *O. caryophyllea*; Helv. plur. adest; in Ital. pænins. tota, sed in med. et mer. multo rarior; in Sicil. freq.; hab. etiam in Ross. centr. (gub. Kursk) et balt. rr. (: Klinge).

**O. Ligustri*; est status (rarior) luteus, quasi decoloratus, *O. caryophyllæ* ex Godr. fl. lorr. ed. 3.

21. *O. Teucrii*: Lothar. Helv. plur. Alpi Apuane (Versilia: Simi ex Caruel). Styr. (pr. Neuhaus; Reichardt). Galiz. (r.). Transs. (r.). - Istr. del. ex correct. cl. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881.

23. *O. fuliginosa*: Narbonne (cl. Gautier), ile Ste-Marguerite (: Thuret. Bornet).

24. *O. barbata*: Ins. Æolicæ: Salina (: Gussone) et Panaria (: Lojacono 1877).

25. *O. platystigma*: Ligur. (Nizzardo: Ardiss.). Arvern. (Royat dep. Puy-de-Dôme); Lozère (Mende). Aprut. (mte Majella: Huet). Carinth. (Malnitz: Hkl; Tröpolach: Pacher); in Transs. nunc etiam ab aliis lecta est. - *O. procera* Lec. Lmtte. — *O. rhætica* Brügg. 1854. (Helv.).

**O. Deucalion*; sec. GBeck videtur tantum forma depauperata, abnormis.

25. *a. O. Pancicii* GBeck in ann. mus. vind. (1887). II. 148. - Bosn. mer. (ad m. Maglic: GBeck 1885). Serb. (: Pancic ex GBeck).

26. *O. pallidiflora*: Phalzia. Pedem. (vall. valdens.). Aprut. (Rocca di Corno, mte Coccarello: Levier). Ross. mer.-occ. — ? *O. sambucina* Jka 1884. (Transs.).

**O. Cirsii*: Dan. (rr.); indicatur etiam Tyrol. mer. et Vales.

29. *E. Epithymum*: Helv. tota; in Ital. max. mer. (transneap.) non indicatur; Cephalon. etiam a Heldreich lecta est. - *O. Alexandri* (17) et *O. fragrantissima* (39*) cum hac specie (*O. Epithymo*) identicæ dicuntur. — *O. pallescens* G.G. — *O. alba* Halacsy. Braun nachtr. (Austr. p. d.).

**O. epithymoides*; *O. transsilvanica* Porcius (1881) ex Smk.

30. *a. O. glabrata* CAMEY. in Eichw. casp.-cauc. 16. 24. - Laurion Atticæ, ad Cistos (: Haussknecht 1885).

32. *O. crinita*: Amalfi (Ital. mer.), in collibus herbosis copiosiss. (: Lacaita in litt.). Fiume (Croat.), pr. Mal Tempo (: A.-M. Smith).

33. *O. sanguinea*; est potius subspecies *O. crinitæ* (32).

**O. nebrodensis*; vix diversa ab *O. crinita* (32).

34. *O. major*: Arvern. (Puy-de-Dôme: la Limagne etc.). Helv. (mer. r.; cant. Bern et Schwyz, r.). Carinth. (Heil.-Bl.: Pacher). Morav. Siles. mer. (Kosel, Ktsch, Rybnik, Teschen). Suec. etiam Halland. (ad Hasslöf) indicatur; Ross. etiam in centr. (gub. Kursk), mer. (gub. Cherson) et mer.-or. (ad Sarepta: Becker). Comment. 208.

**O. Krylowi* GBeck in oe. bot. z. 1881. - Ross. or. (gub. Perm).

35. *O. Kochii*; locus styriac. est in latere occid. montis Schlossberg urbis Graz, ubi hæc species a Maly detecta est (1840).

36. *O. Laserpitii-Sileris*; Helv. hab. etiam in cant. Bern (pr. Schwarzenmatt). Bosn. (: Brandis 1886 ex Freyn). — *O. habrocaulon* GBeck. (Bosn. mer. in saxosis pr. Starigrad: GBeck 1885).

38. *O. denudata*: Sicil. (Palermo, Ficuzza etc.). *O. Chironii* Lojac. (10. *a*) ex Caruel.

39. *O. rubens*; in Ital. bor. plurib. loc. (præcip. Lomb.) lecta est; indicatur etiam in Ross. mer. et (r.) balt. (: Klinge). - *O. congesta* Rehb. f. (16) est hujus speciei forma spica densiore sec. GBeck. — *O. lutea* Bmg. (1816) rite huc relata est etiam ex Simonkai, qui prioritatem nominis Baumgarten. indicat.

**O. fragrantissima* (*O. fragrans* Gib. Pir. fl. mod. non K.); sec. GBeck (teste Caruel) nihil aliud est quam *O. Epithymum* (29).

40. *O. canescens*: Neap. (mte Vulture). Sard. Cors. - Sec. GBeck (teste Caruel) est var. bractealis lanatis *O. minoris* (66). *O. arcuata* Lojac.?

41. *O. Salviæ*: Alpes-Marit. (Tenda, S-M-Lantosce). Banat. (: Heuff. ex Hzl.).

**O. Echinopis*; est *O. major* (34) sec. Kerner et Simkow.

43. *O. Cervariæ*: Bavar. bor. (r.); in Lothar. rariss. est et loco unico pr. Nancy lecta (Suard detex. 1839). Helv. hab. etiam in cant. Zürich et Schaffh.). Vindob. (Austr.) indicatur pr. Mödling. - Siles. rariss. est (Ktsch. in fruticetis ad fodinas gypsaceas Dirschelenses: Fiek 1868). Ross. mer.-occ. (*O. strumosa* Rogow.).

44. *O. flava*: Helv. (etiam Jura ex de Rougemont 1874); in Bavar. plurib. aliis locis adest, præcip. Alpium (in Petasite nivea). Siles. (Eulengeb., r.). Galiz. r. (: Fritze sec. Hausskn.). Transs. (*O. Petasitis* Borb. ex Smk.).

45. *O. australis*: Sicil. (Palermo, Girgenti etc.). Attica (Phalerus, Laurion) et ad Nauplia (: Haussknecht 1885). - *O. sabulicola* Lojac. — *O. thapsoides* Lojac.?

46. *O. Hederæ*: Gall. bor.-occ.; Arvern. (rarius). Sicil. (Palermo et ins. Lipari: Lojacono). Græc. (pr. Athenas: Hausskn.). — *O. Pyrrha* Rchb. f., in valle Tenda (Ligur.) lecta, ex cl. GBeck videtur hujus speciei "forma misera".

48. *O. bicolor*; hab. etiam in ins. Salina nec non in Nebrodis. (: Lojacono); sec. GBeck (teste Caruel) hæc species ad *O. cernuam* (70) pertinet.

50. *O. Picridis*: Belg. hab. plur. loc. (ex Crepin). Gall. bor.-occ. (r.), or. (Côte-d'Or). Arvern. (Cantal, rr.). Ital. med. et mer. (Roma, Capri, Ischia; Amalfi ex Lacaita). Sard. (: Moris). Sicil. (: Lojacono). Attica (ad Laurion: Hausskn.). - *O. ambigua* Mor. (58) ex GBeck. - *O. litoralis*, *O. canescens* et *O. denudata* Lojac. (ex GBeck teste Caruel).

**O. Reichardiæ*; vid. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 392. - Parasita in Helminthia (Reichardia) picroides; in rupestribus.

52. *O. Crithmi*; hab. etiam in ins. parva Maddalena Sard. (: Gennari).

53. *O. Yuccæ*; sec. GBeck (teste Caruel) est = *O. minor* spicâ laxâ.

55. *O. pubescens*: Panormi (mte Gallo: Lojacono). Arch. turc. ins. Karpathos (: Pichler). Taur. (: CKoch). *O. arachnoidea* FSz (ex Reut.).

56. *O. hyalina*: Phalerus (Atticæ), in arenosis marit. (: Lacaita); indicatur etiam Cors. (*O. Salisii* Lojac.?). Forma *O. minoris* videtur ex GBeck.

57. *O. attica*; hab. etiam in Sicil. (pr. Terranova: Lojacono 1883).

58. *O. ambigua*; ex GBeck pertinet ad *O. Picridis* (50).

60. *O. loricata*: Hisp. mer. (Orihuela: Rouy 1881). Arvern. (Puy-de-Dôme, rr.). Carinth. (r.: Pacher). Transs. (*O. minor* auct. transs. ex Smk.).

**O. Freynii*; vid. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 394.

61. *O. amethystea*: Gall. bor.-occ. (Normand.), or. (Côte-d'Or). Ligur. (Nizza, Tenda). - Hetr. non nisi Florentiæ a Caruel (Parl. fl. ital.) indicatur.

**O. Knappii* Pntek; cfr. Pantocsek, adnot. 73 (*).

66. *O. minor*: Helv. tota. Carinth. (r.). Morav. (rr. et non nisi pr. Brunn, a GBeck, lecta ex Oborny). Ross. mer.-occ. - Transs. ad *O. loricatam* (60) pertinet. - *O. barbata* Lojac. isol. eol. (ex Caruel). — *O. Carotæ*; *O. alostensis* Demoor.

**O. Grisebachii*: Athen. ad Akropolin (: Haussknecht)

**O. Grenieri*; sec. Loret (fl. montp. ed. II. 37) nullo modo a specie (*O. minor*) diversa est.

67. *O. livida*: Gall. mer. (Lozère, pr. Le Pompidou); de hac specie cfr. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 393 et in ann. mus. nat. hung. 1879. 12 sep. (*).

69. *O. coerulescens*; Bavar. hab. etiam pr. München, Schwandorf etc.; Hung. ad lacum Neusiedler.

70. *O. cernua*: Ross. mer.-occ. Ins. Aeolicæ Vulcano et Salina: Lojacono 1877; cfr. *O. bicolor* (48).

5. *Lathræa*. 1. *L. Squamaria*: Fenn. mer.-occ. (Aland., Nyland.: Dr Lille sec. Lindberg 1886). Pedem. adest! (Torino etc.). Ligur. Friul., Istr.; Umbr., Calabr. (mte Alto). Bulgar. (ex Velen.).

2. *L. rhodopea*; - Comment, 209.

6. *Glandestina*. 1. *G. rectiflora*: Gall. bor.-occ. (r.), centr. (mult. loc.), mer. (Lozère etc.); in Aprutiu non nisi alla Majella lecta est, sed adest etiam in mte Vergine (Neap.) et in aliquot locis Calabr.

LXXXII. ACANTHACEÆ.

1. *Acanthus*. 1. *A. longifolius*: Bulgar. (: Velenovsky). Transs. (*A. mollis* et *A. spinosus* auct. transsilv.).

3. *A. spinosus*: Cephalon. ins. jon. (: Heldreich). Florentiæ (alla Certosa) et Veronæ (villa Giusti) quasi spontaneus, sed certe introductus, ut probab. (e Rhodo?) in ins. Melita, ubi tamen sec. Zerapha et Grech-Delicata vere indigenus videtur.

**A. spinosissimus*; hab. etiam in Japygia (T. d'Otranto: HGroves).

4. *a. A. Caroli Alexandri* Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1886. 62 (*) et in Regel-Engl. gartenfl. 1886 (Novemb.). - Græc. bor. m. Pindus agraph., in silvis quercinis, rr. (: Haussknecht 1885).

LXXXIII. VERBENACEÆ.

2. *Verbena*. 2. *V. supina*: Ross. mer.-occ. (Bessarab., ad Dniestr), mer. (gub. Cherson ex Lindem.), mer.-occ. (Sarepta: Becker).

**V. adulterina* Hsskt. = *officinalis* + *supina*. (Thessal.).

3. *Lippia*. 1. *L. repens*: Gall. mer. (Salces dep. Pyr. or.: Gautier; Fitou dep. Aude: Rouy). Ligur. hab. etiam ad Nizza (: Laire ex Rouy 1884); Hetr. plurib. locis, ut etiam in T. di Lavoro et T. d'Otranto (ad Taranto, Otranto etc.: HGroves).

LXXXIV. LABIATÆ.

1. *Prasium*. 1. *P. majus*; — *P. creticum*; hab. etiam ad Akrokorinth Græc. (: Haussknecht). — *P. liparitanum* Mandralisca in Tod. hb. est var. villosa, in ins. Panaria obvia (ex Lojaccono).

2. *Teucrium*. 2. *T. fruticans*: Sard. (ex Reverchon). Ligur. (capo delle Mele: Caruel). Apul. m. Gargano (: Porta et Rigo), locus in Ital. or. unicus.

4. *T. brevifolium*: Heldr. hb. norm. 965 (ex Attica).

6. *T. campanulatum*; in Mallorca a Cambess. et Barcelò lectum est, in ceteris insulis balearib. non observatum.

8. *T. Arduini*; hab. etiam in Bosn. mer. (: Blau, GBeck).

8. *a. T. cuspidatum* Celak. in bot. centralbl. 1883. 222. - Creta, ubi in m. Mirabello a Sieber lectum est (ex Celak.).

10. *T. Scorodonia*: Germ. med., rarius (et in Siles. pr. Rybnik introd.?) ex Gcke. Sard. (ex Reverchon). Bohem. (pr. Blatna: Velenovsky 1883). Hung. comitat. Neutra (m. Kozlica pr. Szadek: v. Hutten 1878 sec. Pantocsek).

**T. siculum*; restit. in speciem majoris dignitatis, inter *T. Scorodonia* L. et *T. Pseudoscorodonia* Dsf. mediam; hab. etiam in Pyrenæis ex Franqueville (teste Caruel), sed com. de Franqueville, tam in montibus dictis quam in Sicilia plantas legit, unde forse specimina commutata.

**T. Gasparrinii*; est var. *T. siculi*.

13. *T. lusitanicum*; hæc species mti Herminio (Serra da Estrella) priva est, ibique paucis solum locis obvia; cfr. etiam ap. Rouy in Le Natural. 1882. 7 sep. (*).

14. *T. lancifolium*; *T. lusitanicum* auct. balear.
15. *T. spinosum*; in Apulia rarum est (pr. Lecce et paucis al. loc. lectum).
16. *T. subspinosum*: Sard. (Biondi ex Aschn). Hæc species detecta est a Pourret in ins. Mallorca, ubi post eum lecta est a Barcelò (1848) et dein a Marès (1852).
17. *T. Scordium*: Istr. Bulgar. (: Velenovsky); ex Bornmüller (centralbl. 1888) planta bulgarico-serbica speciei sequenti propius accedit.
18. *T. scordioides*: Croat. (pr. Novi: Borbás). Ross. mer. (gub. Cherson ex Lindem.).
19. *T. Botrys*: Batav. (: Lacoste 1871). Siles. Bulgar. (: Velen.). - Balear. in sola Mallorca lectum est.
20. *T. Chamædrys*: Lusit. (cap Mondego: Schmitz ex Rouy 1882). Bulgar. (: Velen., Bornm.).
21. *T. flavum*: Cephalon. ins. jon. (in saxosis freq.: Heldr.). - Balear. non nisi in Mallorca lectum est.
22. *T. divaricatum*; *T. græcum* Celak. (1883). *T. flavum* β *purpureum* Bth.; Heldr. hb. norm. 868. — *T. Sieberi* Celak. 1883. *T. saxatile* Sieb. exs. (Creta).
23. *T. Marum*; hæc species in Consp. citatur ex insulis Lacûs Majoris (Ital. bor.), sed sec. Caruel ibi non nisi introducta adest; in Balear. in sola Menorca lecta est (: Rodriguez).
24. *T. montanum*: Germ. occ. (prov. rhén.). Bulgar. (: Velen.). Ross. mer. (: Lindem., Schmalh.). Sard. (m. Oliena); deest in Ital. max. mer., in Aprutio et ad Castellamare Neap. desinens. — *T. pannonicum* (1863). *T. prostratum* Schur (1853).
25. *T. thymifolium*; locus special. Dufour. ignotus est, sed pr. Velez-Rubio hæc species lecta est a Rouy (1881).
26. *T. alpestre*; *T. divaricatum* Sieb. ex Celak. (*T. saxatile* ej. est var. *T. divaricati* veri ex eodem).
27. *T. Hænseleri*: Lusit. mer. (vid. ap. Rouy in *Le Natural*, 1882. 8. sep. (*)).
28. *a. T. carthaginense* Lge in *vidensk. meddel.* 1881. 97. sep. 5 (*). — *Hisp. mer.*: Jativa (: Rouy), Carthagera (: Winkler 1876, H.P.R. 1879, Rouy 1881).
29. *T. eriocephalum*; *T. gnaphalodes* H.P.R. (ex Celak.).
30. *a. T. vincentinum* Rouy in *Le Natural*. 1882. 9 sep. (*). *T. Polium gnaphalodes* Welw. exs. lusit. 583. - Lusit. ad Cap St-Vincent (in rupestrib. ad monaster. Sti Vincentii).
31. *T. aureum*; — *T. gnaphalodes* Lmtt. non Vahl. (dep. Gard, Lozère).
32. *a. T. chrysotrichum* Lge in *vidensk. meddel.* 1881. 96. sep. 4 (*). - *Hisp. malacit.* (S. de Mijas: H.P.R. 1879).
33. *T. Polium*: Sard. (pr. Sassari ex Biondi). Bulgar. (: Velenovsky); indicatur etiam in Ross. centr. (gub. Kursk).
34. **T. aragonense*; sec. Rouy (ex specim. authent.) pertinet ad *T. cæspitosum* (45—).
35. *T. capitatum*; — *T. angustifolium* (1860) est = *T. valentinum* Schreb. ex Rouy. — *T. cæspitosum* (1860) est species propria ex Rouy et = *T. coeleste* Schreb. (1774), quod igitur restituendum.
36. **T. majoricum* Rouy (1882). *T. Majorana* Willk. ind. balear. et in hb. Boiss. *T. Willkommii* Porta in n. giorn. bot. ital. 1887; cfr. Rouy in *bull. soc. bot.* 1888. - Ins. Mallorca (in montibus ad Soller).
37. *T. gnaphalodes*; verum in Lusit. nondum lectum est ex Rouy (planta lusitan. ad 42. *a. T. vincentinum* pertinet); vid. ap. Rouy in *Le Natural*. 1882. 9. sep. (*).
38. *T. pulverulentum*; sec. Marès (cat. balear.) est var. (memorabilis)

T. Polii (= T. capitatum var. calycinum Willk.), sed etiam ex Rouy (in Le Natural. 1882) speciem propriam, a T. Polio distinctam, constituit.

50. T. Majorana; sec. Rouy (in Le Natural. 1882) planta Persoon. est = T. capitatum var. gracillimum (Hisp. mer.-or.), sed illa Barceloi (Balear.) = T. capitatum typicum; - at T. Majorana, quam Porta 1885 in his insulis legit (n. giorn. bot. ital. 1887), est var. media inter T. capitatum typicum et var. gracillimum ex Rouy in bull. soc. bot. 1888 (sec. Willk. probabiliter est subvarietas præcox insularis T. capitati).

50. a. T. heliotropifolium Barb. in bull. soc. vaud. XXI. (1885). 97. sep. 5 (*). - Arch. ture. ins. Karpathos (Scarpanto), ubi ab oculato Pichler detectum 1883. - Hæc species nova pertinet ad sectionem Isotriodon Boiss., cujus species reliquæ omnes extra-europæe sunt.

3. Ajuga. 1. A. Laxmanni: Bulgar. (ad Razgrad et Varna: Velenovsky). Ross. centr. (gub. Kursk).

2. A. orientalis: Corfû ins. jon. (: Spreitzenh. 1877); planta Cephal. (in reg. abietina m. Aeni et m. Rhudi obvia) sistit varietatem: A. orientalis aenesia Heldr.

3. A. reptans: Fenn. mer.-or. (Carel. olonets.; in isthmo carelico detex. Wallenius 1865).

4. A. pyramidalis: Dan. (sporad. et rarior). Alsat. (rarius). Badia, rr (in Würtemb. non indicatur). Arvern. mont. altior. (Mont-Dore, Cantal). Alpes-Marit. (alp. Tenda, col de Fenestre, col de Salèse etc.). Friul. - in Lapp. plur. et Finnm. deest; in Morav. non lecta est (ex Oborny); Transs. ad speciem seq. pertinet (ex Oborny).

5. A. genevensis: Bulgar. et Rumel. or. (ex Velenovsky). Ross. med. (gub. Kursk, Tambow) et (r.) balt. (: Klinge); - deest in Jura et in Helv. planiori; in Ital. media rarecit et meridiem versus ultra m. Garganum non indicatur.

7. A. acaulis; in Sicil. plurib. locis lecta est: mte Soro, Cartolari in Valdemona (: Todaro), inter Caronia et San Fratello.

9. A. Iva; adest in Ligur. (ubi freq.) et Ital. occ. tota incl. Calabr.; in or. non nisi in Gargano et Majella lecta est.

10. A. chia; loca italica ad speciem sequentem referenda sunt.

11. A. Chamæpitys: Bulgar. (in demissis ubique ex Velen.). - Observ. cl. Caruel (Parl. fl. ital.) ad hanc speciem pertinet A. chia auct. ital., quæ est varietas, præcipue meridionalis, grandiflora hujus speciei, ad quam igitur loca italica, in Consp. sub A. chia allata, referenda sunt; ita (ex Freyn) etiam A. chia K. (Istr.) et probab. illa, quæ in Ross. mer. et Rumel. or. (: Velen.) indicata est.

× A. hybrida Kern. = genevensis + reptans. (Austr. Germ.).

4. Salvia. 2. S. grandiflora; hab. etiam in Bulgar. (pr. Varna: Velen. 1885).

2. a. S. Eichleriana Heldr. in diar. (sitzb.) reg. ac. sc. berol. 1883. - Thessal. m. Pelion in reg. silvatica, inter Pterid. aquilin. (detecta a Heldreich 1882). - Planta 5—6-pedalis, speciosa.

4. S. officinalis: Gall. centr. (Cantal: fr. Heribaud; Lot: Puel). Cors. ex solo Bertoloni indicatur, sed in Sard. (monti d'Orgosolo) vere spontanea sec. Moris; in Ital. pænins. multis locis, usque in Campaniam et Basilicatam indicata est, sed in plurimis vix nisi subsponsanea (inquit.).

7. S. triloba: T. d'Otranto (Leucaspide, Taranto: HGroves, Lacaita). T. di Lavoro (r.).

8. S. ringens; hab. etiam in Bulgar. (: Velenovsky).

12. S. glutinosa: Alsat. (Jura). Bavar. Bulgar. (: Velen.). Ross. mer.-occ. - in Ital. rarecit versus meridiem, pr. Neapolin et in m. Vulture desinens.

14. S. Sclarea: Gall. centr., or. (Côte-d'Or, Yonne). Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky). Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879). Cephalon. (in saxosis: Heldr.), - in pratis ad Pesthinum Hung. inquilina est.

16. *S. æthiopis*; Pedem. aliquot locis hæc species ab Allioni et Colla indicata est, sed a recentioribus ibi non lecta, teste cl. Carueli fl. ital., quæ etiam de proventu ejus in Lomb. silet. Ceterum in Hung. (pr. Pressburg), Austr. (Wien), Morav. (Brünn etc.), ubi nunc quasi spontanea legitur, probab. olim e Rossia mer. cum lana ovina migravit, Hassiæ (pr. Eschwege) nunc læte viget, sed ibi a pharmac. Gomermann a. 1836 plantata est, eo ipso fatente (in bot. zeit. 1877); etiam in Luxemb. et Angl. (pr. Croyden) nuper lecta est. Transs. non nisi culta adest (ex Smk.), sed in Bulgar. et Rumel. or. spontanea ex Velenovsky.

17. *S. argentea*; planta sicula (et calabr.) sistit varietatem *S. Gussonii* Boiss. (*S. argentea* Guss.), quæ in Sicil. rarissima (: monte di Cammarata).

18. *S. alpestris* Hsskt ms. (litt. 1889). *S. argentea* var. *alpina* Heldr. exs. - *Euboea* (: Heldreich). Græc. bor. m. Pindus (: Hausskn. 1885).

19. *a. S. Sonklari* Pntek (1881). - Bosn. (pr. Banjaluka).

22. *S. austriaca*; in Morav. (ex Oborny) non nisi sporadice obvia et probab. cum seminibus extraneis introducta.

23. *S. pratensis*: Bulgar. (: Velenovsky). Epirus (: Chodzes ex Heldr. 1879). Cephalon. ins. jon. (: Heldr.). - Dan. nunc inquil. (r.).

25. *S. dumetorum*; in Galic. or. nunc amplius lecta est et adest etiam (rarius) in Siles. et Morav. ex Fiek et Oborny.

27. *S. virgata*; *S. tiberina* Mauri (24*) ex Caruel. — *S. pallidiflora* Cald. fl. favent. tent. (ex Car.).

27. *a. S. viscosa* Jacq. misc. II. 328. Bassano. in silvis vall. Valstagna (: Montini ex Caruel!); antiquitûs etiam in collibus Euganeis indicata. Hæc species (asiatica) locis citatis probab. introducta est.

30. *S. pendula*; — *S. betonicæfolia* (*S. pendula* Maly; *S. silvestri-nutans* Jka); observ. cl. Wolff (1877) occurrit ubi crescit *S. nutans*, si ibi adest etiam *S. silvestris*, unde patet eam hybridam esse.

31. *S. nutans*; hab. etiam Bulgar. (Golem Jug ad Razgrad: Velenovsky).

32. *S. sclareoides*; *S. lusitanica* Jacq. f. ecl. I. 57. (Bth. in DC. prodr. XII. 290); hæc species Jacquin., quæ antea dubia erat, nunc a Rouy recognita est et restituta (vid. Le Natural. 1882. 18 sep.); rara est et recentius a solo Welwitsch lecta videtur (in Serra de Bellas, 1842); *S. pratensis* (23) et *S. virgatæ* (27) proprior dicitur.

33. *S. bullata*; in Lusit. (pr. Caxarias) a Daveau lecta est (1879) sec. Rouy.

34. *S. Verbenaca*: Gall. bor.-occ.; ceterum in Gall. ulterius sese propagavit (sic nuper pr. Lyon et ab anno 1831 in Côte-d'Or plurib. locis apparuit).

**S. horminoides* (Magn. fl. sel. exs. 115); hab. etiam in Sard. (: Reverchon); synon. *S. Verbenaca* ad speciem sequi pertinet. De hac specie Pourret. cfr. Timb.-Lagr. in act. tolos. ser. VII. vol. II. et Magn. scrin. 34-5.

**S. oblongata*; hab. etiam in Lusit. mer. (*S. verbenacoides* Welw. lusit. exs. 761 ex Rouy).

35. *S. clandestina* (*S. oblongata* Rehb. non Vahl); nomen melius *Clandestina* scribendum est (vid. Loret fl. montp. II. 384). — *S. pallidiflora*; hab. in Gall. occ.; centr. (Puy-de-Dôme). — *S. mixta* Timb.-Lagr. (ex Rouy).

**S. multifida*; *S. laciniata* W.; *S. acutata* Lk. — *S. obtusata* Lk.

36. *S. controversa*; hab. etiam in Sard. (: Macchiati 1882); - ex observ. cl. Caruel species Tenor. (planta italica) ad speciem preced. pertinet et planta hispanica *S. lanigera* Poir. nominanda est.

37. *S. ceratophylloides*; - Comment. 210.

39. *S. viridis*; cl. Caruel hanc solam (nec *S. Horminum* L.) spontaneam ex Italia vidit, has duas species in unam jungens (Parl. fl. ital.); cl. Lacaita (pr. Taranto) comam vidit nunc purpuream nunc albam, carneam vel viridem.

40. *S. verticillata*: Alpes-Marit. (rarius). Istr. Bulgar. (: Velen.). - Suec. mer.-occ. (Scan. Dalsl.) interdum inquil. (: Wittrock).

X *S. adulterina* Hsskt. = *amplexicaulis* + *virgata*. (m. Pindus).

6. *Ziziphora*. 1. *Z. capitata*: Bulgar. (: Velen.); in Italia primum observata est a Gaetano Savi (1795) pr. Florentiam, ubi non erat tempore Michellii sed nunc vulgaris; Tenore (1820) eam in Apulia detectam esse memorat; dein variis locis Ital. med. lecta est.

7. *Lavandula*. 1. *L. dentata*: Ins. Balear. (Mallorca, in collibus aridis abunde: Barcelò; Ibiza: Marès); in promont. inclyto Hifac (Valenc.) jam a Clusio lecta erat. Etiam cl. Caruel dubitat hanc speciem indigenam esse in Italia, ubi sæpe in hortis colitur.

2. *L. Stoechas*; hæc species deest in Lomb., Tyrol. etc., nec non in parte orientali Italiæ plur., sed copiose adest in Ligur. et Hetr. (præcip. litorali et insulari); ceterum hab. in T. di Lavoro et Calabr. (rarius), in Cors., Sard. (freq.) et Sicil., nec non in Pantellaria.

5. *L. Spica*; Cors. et Sicil. adest!; in Ital. pænins. sæpe colitur et facile subspontanea evadit, unde indigenatus hinc inde dubius (sic cl. Caruel hanc speciem in Hetr. spontaneam non vidit); in Germ. locus (usque ad a. 1840) unicus, ubi hæc species quasi sponte occurrebat, erat in monte quodam (inde Lavendelberg dicto) pr. Kreuznach prov. rhen., postea vero (rr.) lecta est in proximo monte Sponsheimer pr. Laubenheim ad Nahe; dein etiam ibi destructa est, sed nuper (1879) cl. Geissenheyner in rupe vicina individuum hujus speciei detexit.

8. *Scutellaria*. 1. *S. orientalis*; hab. etiam in Bulgar. (ad Razgrad etc.: Velen.).

2. *S. alpina*: Ceven. (Lozère, r.); Côte-d'Or; Alpes-Marit. (plur. loc.). Lomb. (Como, Valtellina, Vicenza). Abruz. (mte Velino). Banat. (: Borbás). — *S. lupulina* est potius subspecies. (Ross. mer., mer.-occ.).

3. *S. Columnæ*; hab. etiam Bulgar. (plur. locis: Velen.).

4. *S. altissima*; indicatur etiam Ross. centr. (gub. Kursk).

**S. commutata*; loca italica accuratius sic citanda sunt: mte Volubrio in Piceno, Molise, mte Capraro, mte di Mezzo, Serra S-Antonio, omnia in Appen. centr.; Galic. hab. in fruticetis riparum præruptarum flum. Dniestr hinc inde (: Knapp).

5. *S. peregrina*; indicatur etiam Ross. centr. (gub. Kursk). Comment. 211.

6. *S. albidæ*; hab. etiam in Bulgar. (ad Varna etc.: Velen.).

8. *S. hirta* (var. *brachystegia* Boiss.): Cephalon. (ins. jon.), in lapidosis ad cacumen Megalo Sorò montis Aeni (: Heldreich).

9. *S. galericulata* (Orph. exs. 1041): Fenn. Dan. Sard. (: Moris). — *S. pauciflora* (Pntek. adnot. 62) est var. memorabilis et forse subspecies.

10. *S. hastifolia*: Bulgar. or. (ad lacum Devno: Bornmüller 1887). - Helv. deleatur ex Gremli.

11. *S. minor*: Bavar. bor.-occ. Lomb. (rr. ut Pedem.). Germ. hab. etiam in Marchia (pr. Perleberg: GLehmann 1876). - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

11. a. *S. balearica* Barc. in annal. soc. espan. VI. 399. (1877). *S. Vigineixii* Marès in Marès-Vigin. cat. rais. (1880). - Ins. Mallorca: Puig maj. de Torrella, Coma den Arbona, Serra de Sollier, ubi a Marès detecta 1850; relecta est (1877) in Puig de Torrella a Rodriguez socio Crespi, qui plantam cum cl.o Barcelò communicavit (: Marès l. c.); hab. etiam in rupibus d'Ariant pr. Pollenza (: Marès 1852).

✕ *S. Nicholsoni* Taubert. = minor + *galericulata*, inter quas pr. Windsor Angl. a cl. Nicholson detecta est; cfr. Taubert in abh. d. bot. ver. d. prov. Brandenb. 1886. 25—8 (*).

9. *Prunella*. 2. *P. grandiflora*: Bulgar. (: Velen.). - Suec. hab. solum in Vestrog. et in insulis baltic. Ölandia et Gotland. — *P. hastifolia* (*P. Tournefortii* Timb.-Lagr. 1866); a *P. grandiflora* bene distincta est sec. Rouy (vid. Le Natural. 1882) et ex Lamotte adest etiam in Arvern. (Cantal); planta pyren. (*P. grandiflora* var. *pyrenaica* G.G.) rite huc ducitur teste etiam cl.o Rouy. — *P. alpina* ad *P. intermediam* (3—) pertineat.

3. *P. vulgaris*; — *P. intermedia* Lk. (1791) est hybr. sec. GBeck et = *vulgaris* + *grandiflora*; *P. pinnatifida* ex eodem = *vulgaris* + *laciniata*. — *P. capiteolata* GBeck. (Bosn. et probab. alibi).

4. *P. laciniata*: Istr. Bulgar. (: Velen. 1887). — *P. violacea* (*P. elatior* Salis-Marschl. ex GBeck) et *P. intermedia* (Lk ap.) Brot. sunt hybridæ sec. GBeck et = *laciniata* + *vulgaris*, sed ex Rouy (in *Le Natural*. 1882) et Stapf (in Kern. sched. ad exs. 1885) hæc *P. intermedia* Lk (*lusitanica*) est planta ab illis aliena et ex Rouy (l. c. 25 sep.) species restituenda, inter *P. laciniatam* et *P. hastæfoliam* (2—) media. — *P. integerrima* GBeck. (Bosn.).

× *P. bicolor* GBeck. = *laciniata* + *grandiflora*. (Austr. Hung.).

× *P. spuria* Stapf. = *grandiflora* + *vulgaris*. (Tyrol. etc.).

× *P. variabilis* GBeck. = *grandiflora* + *laciniata*. (Austr. Hung.).

11. *Melittis*. 1. *M. melissophyllum*: Siles. Bulgar. (Velen. 1887).

12. *Lamium*. 1. *L. Orvala*; Transs. ad *L. maculatum* (7) pertinet ex Smk. - Comment. 212.

5. *L. inflatum*; adest in Thrac. (Bulgar.: Velen. 1887), nec non in Transs. (: Janka) et Serb. (: Panic).

6. *L. album*: Abruz. (: Cesati). T. di Lavoro (pr. Calvi: Terraciano). Calabr. (ad Pizzo: Ricca).

7. *L. maculatum*; deest in Ital. max. mer., ad Garganum et pr. Potenza desinens. *L. Columnæ* Ten. hb. et fl. nap. (non syll.). *L. affine* Guss. ap. Ten. (ex Caruel!). — *L. tomentosum* Ces. Pass. Gib. — *L. hirsutum*; *L. maculatum* auct. gall. plur. (*L. maculatum* typicum in Gallia rarius videtur; cfr. Lmtt. plat. centr. 605). — *L. alpinum* Heuff. (Banat, Bosn.: GBeck). — *L. Grenieri* Mutel est var. unilabiata sec. Caruel (1880).

8. *L. cupreum*; forse potius subspecies (vel var. alpina) *L. maculati*. — *L. pallidiflorum* GBeck. (Bosn. mer. alp.).

9. *L. Columnæ*; ex Caruel (Parl. fl. ital.) est = var. *lævigata* *L. garganici* (11).

10. *L. molle*; Orph. fl. græc. exs. 1042.

11. *L. garganicum*; in Græc. bor. mte Pindo a cl. Haussknecht lectum est (1885).

12. *L. longiflorum*; in Ital. med. adest plur. locis usque ad Itri, Cassino etc., nec non in m. Catria, Piceno et in Abruz., ubi frequens (ibi "al Sirente" var. *L. veronicaefolium* Bth. ex Car. a Levier lecta est). Bosn. mer. (m. Suha gora: GBeck 1885). Sec. cl. Caruel (Parl. fl. ital.) etiam hæc species pertinet ad *L. garganicum* (11) et ejus var. *lævigatam* sistit.

**L. corsicum*: Sard. m. Oliena rupestr. (Forsyth Major 15 Maj. 1884). Huc usque non nisi in cacumine montis Cinto (Cors.) lectum, ubi Dr Forsyth Major, socio Dre Levier, Jul. 1881) hanc plantam frustra quesivit (ex F. Major in sched.), sed a Vallot ibi relectum est 1887 (ex bull. soc. bot.).

14. *L. bifidum*; hab. etiam in ins. Corecra, hodie Corfù (: Lacaita).

15. *L. purpureum*; adest sporadice in Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi in ins. Lofoten speciei terminus polaris (ex Norman); in Ital. max. mer. deesse videtur.

**L. hybridum*: Fenn. plur. Ross. balt. (: Klinge). Ligur. (Nizza, Mentone) sec. Ardoino; Hetr. ad *L. bifidum* (14) pertinet ex Caruel.

16. *L. intermedium*: Fenn. or. (: Reuter), mer.-occ. (Aboa: AArrhenius 1880). Ins. Færøer (: Rostrup). Batav. (: Lacoste 1861).

13. *Galeobdolon*. 1. *G. luteum*: Fenn. mer.-or. (Isthm. Karel, ubi a Malmberg detectum 1866); in Ital. mer. rarissimum (Aspromonte, la Sila etc.).

14. *Galeopsis*. 1. *G. pubescens*: Suec. (Upland., Vestm., Smol.; r.). Norv. (vall. Gudbrandsdalen). Germ. med. - Helv. (ex Gremli) hab. solum in mer. (ital.) et ad Chur, Bregenz.

2. *G. versicolor*: Fenn. Dan. Bosn. (: GBeck). - Gall. non nisi in depp.

Finistère et Côte-Nord lecta dicitur (Miciol in Magn. scrin. I. 36); Magn. fl. sel. exs. 117. — *G. sulphurea*; hab. etiam in Delph., Pedem., Alpes-Marit. (Tenda, val Pesio etc.). Bulgar. (: Bornmüller).

3. *G. Tetrahit*: Fenn. Dan. Ins. Fieröer (ubi vulgata ex Rostrup). Bulgar. (: Bornmüller).

**G. præcox*: Gall. centr. (freq. ex Lmtte). Helv. (mont., subalp.).

**G. Reichenbachii*: Arvern. (Puy-de-Dôme, Cantal).

4. *G. ochroleuca*: Bavar. (Pfalz, Röhn etc.). Helv. plur.

6. *G. intermedia*: Lothar. (r.). Arvern. (Puy-de-Dôme). — *G. longiflora* Timb. Marçais in Magn. scrin. VI. (1887). 116. Gall. centr. (Cantal).

7. *G. Ladanium*: Fenn. mer., med. Dan. (inter segetes). — Island. nuper vix lecta est (ex Grønland) ut etiam in ins. Fieröer deesse videtur ex Rostrup. — *G. canescens* (1809); hab. Austr. p. d., Hung. et etiam alibi (sic in Angl. mer. indicatur).

**G. angustifolia*; — *G. glaucescens* Reut.; Ardoin. fl. alp. marit. (Alpes-Marit., in tota reg. mont. freq.). — *G. glabra* Des Etangs (1876). Gall. dep. Haute-Marne (r.).

× *G. Haussknechtii* Ludw. = *ochroleuca* + *Ladanum*. (Thuring.).

× *G. Wirtgeni* Ludw. = *ochroleuca* + *angustifolia*. (Thuring. etc.).

15. *Betonica*. 1. *B. alopecuros*: Helv. (cant. Ticino, Bernerob. Berl.). Bavar. (Alpes). Carinth. (mont. calcar.). Styr. - Transs. ad *B. hirsutam* (3) pertinet ex Smk. Comment. 213.

2. *B. græca* (Heldr. hb. norm. 870): *Agrapha* (olim *Dolopia*) in reg. infer. et media m. Pindi (Heldr. 1885).

3. *B. hirsuta*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.). Carinth. (in montib. et subalpinis, rarius).

4. *B. officinalis*; *B. danica* Mill. dict. ed. VII. (vid. Lge haandb. ed. IV. 447). *B. hirsuta* Ten. syll. et *B. vulgaris* Rota pav. ex Caruel. — *B. laxata*, *B. leiocalyx* et *B. rusticana* Jord. Fourr. (1868). — *B. hirta* (Lays.) Rehb. *B. officinalis* Kern. (1883). — *B. polyclada*, *B. rigida* et *B. valdepubens* Jord. Fourr. Comment. 214.

**B. velebitica* Kern. sched. ad exs. 1883. - Croat. m. Velebit, 1000 metr. s. m. (: Pichler).

**B. Haussknechtii* Uechtr. ex Hausskn. (litt. 1889). Græc. bor. (Pind. Dolop.: Hausskn. 1885); florib. semper albis etc. a *B. officinali* distincta dicitur.

16. *Stachys*. 1. *S. græca* (Orph. fl. gr. exs. 1043).

3. *S. Heldreichii* (Orph. fl. gr. exs. 1045); hab. etiam in Rumel. or. (pr. Slivno ex Velenovsky).

5. *S. alpina*: Siles., Thuring., Würtemb. (Alp et Oberschwab.), Erzgeb. (ex Geke), Bulgar. (: Velenovsky). — var. *neapolitana* Car. (sericeo-hirsuta); hab. Abruz. (m. Corno etc.), Campan. et Basilicata (Potenza). — var. *discolor* Boiss.; Orph. fl. gr. exs. 1044. (Maced. m. Peristeri, 5500—6000').

5. a. *S. tymphæa* Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1886. 70. - Pindus Tymph. in m. *Zygos* supra Metzovo (: Haussknecht 1885).

6. *S. germanica*: Bulgar. (: Velenovsky). Ross. centr. (gub. Kursk). — *S. lusitanica* in speciem propr. restituenda est ex Rouy (in *Le Natural*. 1882, 1887); etiam a Welwitsch (1847) et Daveau (1879) in Lusit. lecta est et adest (var. interrupta Rouy in *Le Natural*. 1887) etiam in Hisp. mer. — *S. Reinerti*, in Pindo Tymph. a Haussknecht lecta, est species distincta ex eodem.

8. *S. italica*; cl. Caruel (Parl fl. ital.) et hanc et sequentem speciem (*S. Janiana*), nec non *S. dasyanthen* (4), cum specie præc. (*S. germanica*) jungit "e repetita observatione plantarum viventium et comparatis speciminibus siccis".

12. *S. cretica*; hab. etiam in locis aridis Cephalon. ins. Jon. (: Heldreich).

14. *S. silvatica*: Dan. Fenn. mer., med.; adest in Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi ad lat. 69° 10' terminus speciei polaris (ex Norman).

× *S. palustris*; — *S. silvatico-palustris*; *S. Wirtgeniana* FSZ.

15. *S. palustris*: Dan. Fenn. mer., med. - *S. ambigua* auct. ital. ex Caruel.

16. *S. viridis*: Græc. bor. m. Pindus (: Heldreich 1885).
20. *S. marrubiifolia*; Neap. hab. etiam in ins. Ischia (: Gussone).
23. *S. spinulosa*: Heldr. hb. norm. 966.
**S. Milani* Petrov. in Magn. scrin. VI. (1887). 117 et fl. sel. exs. 1268. *S. spinulosa* Petrov. in sched. - Serbia.
24. *S. hirta*; hab. etiam in Cors. (EPetit 1883).
25. *S. serbica*: Græc. bor. m. Pindus Dolop. (: Haussknecht 1885).
26. *S. annua*: Ross. med. (gub. Kursk, Moskwa etc.).
28. *a. S. Freynii* Hsckt in mitteil. soc. bot. thur. 1886. 70. - Græc. bor. m. Pindus *Agrapha*, in reg. subalp. (: Hausskn. 1885).
29. *S. patula*; hab. etiam Hung. (= var. *S. rectæ*) ex Borbás (1875). — *S. sideritoides*; a Janka detecta inter Ciernavoda et Küstendje.
30. *S. recta*: Ross. centr. (gub. Kursk, Tambow). — *S. glabrata* Simk. *S. ramosissima* Schur. (non alior.).
**S. plumosa*: Bulgar. ad radices m. Osog. Planina (: Velen. 1887). Serb. (: Petrovic).
31. *S. subcrenata*; hab. etiam in Bulgar. (ad Varna: Velenovsky).
**S. labiosa*: Bosn. mer. (: GBeck 1885). Monten. (m. Ivica: Pntek). Sec. cl. Caruel est forma grandiflora *S. rectæ*, in Ital. bor. sæpe obvia.
32. *S. leucoglossa*: Bulgar. (plur. loc. copiose: Velen.). Rumel. or. (: Skorpil).
34. *S. anisochila*; — ? *S. Sendtneri* GBeck. (Bosn.); cfr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1888.
35. *S. nitens*; *S. nitida* Neilr.; sec. Borbás est = *S. ramosissima* (30*), negante tamen speciei auctore.
37. *S. arenaria*: præcipue Siciliam (mer.) inhabitat, in Calabr. et Princip. citer. rarissima; etiam Venetiis lecta est a Moretti (sec. Caruel).
38. *S. maritima*: Bulgar. (ad Varna, in arenosis maritimis: Velen.).
39. *S. pubescens*; a specie præced. non satis differt sec. Caruel teste specim. authent. (icon fl. neap. haud bene congruit); loca oriental. probab. pertinent ad seq.:
39. *a. S. Sendtneri* GBeck in ann. mus. vind. (1887) II. 144. *S. pubescens* Vis., Rchb. ic. - Bosn. (*Sendtneri*, GBeck). Dalm. (etc.).
17. **Leonurus**. 1. *L. Cardiaca*: Dan. (in Consp. omissa). Bulgar. (: Bornmüller); in Ital. bor. hinc inde lecta est, ceterum (Hetr., Umbr.) rr. — *L. campestris* Andrz. *L. glaucescens* Bge. (Ross. mer.-occ.).
2. *L. Marrubiastrum*: Bavar. (rarius). Bulgar. (in calidioribus freq.: Velenovsky).
18. **Phlomis**. 1. *Ph. ferruginea*: Japyg. (T. d'Otranto); etiam Apul. et Calabr. ex hb. Ten. (teste Caruel.). Hæc species Tenor. (1811) identica est cum *Ph. viscosa* Poir. ap. Lam. (1804) et aliud synonym. est *Ph. polymorpha* Clos (ex obs. Car. in Parl. fl. ital.).
2. *Ph. fruticosa*: Cephalon. (in saxosis freq.: Heldreich); adest etiam in collibus Euganeis (Ital. bor.) et in insulis Stoechad. (Hières: Reynier), sed incertum videtur num his locis indigena sit. — *Ph. ferruginea* Groves (ex Otranto) sec. Caruel; cfr. Groves flora di T. d'Otranto in n. giorn. bot. ital. 1887. 179 (*).
6. *Ph. samia*; hab. etiam in Thessal. m. Pelion (: Heldreich 1882).
8. *Ph. pungens*: Thessal. pr. Pharsalum (: Heldr. 1885). Ross. centr. (gub. Kursk). — *Ph. spica venti* CKoch (*P. taurica* Hartw.?).
11. *Ph. tuberosa*: Morav. (mer., med.) certe adest; Galic. or. hinc inde (: Knapp). Bulgar. (: Velenovsky).
13. *a. Lagochilus* Bge in Bth. lab. 640.
1. *L. glaberrimus* CKoch in linn. XXI. - Taur.

19. *Moluccella*. 1. *M. spinosa*: Calabr. (pr. Polizzi: Arcang.). Japyg. (pr. Gallipoli: HGroves); in Mallorca Balear. a 50 annis introducta est in Col de Esporlas ad prædium Trias (: Barcelò).

20. *Ballota*. 1. *B. alba*: Transs. ad speciem seq. pertinet ex Smk.

3. *B. nigra*: Croat. (Fiume: A-M.Smith). Bosn. (GBeck). Bulgar. (: Velenovsky).

5. *B. pseudodictamnus*; in Ital. mer. (Gallipoli, mte Pollino, Napoli, mte Majella) vere indigena videtur.

7. *B. rupestris*: Ins. Balear. scil. Mallorca (pr. Esporlas: Cambess.), Ibiza (circa oppidum abunde: Barcelò).

21. *Marrubium*. 1. *M. vulgare*; — *M. apulum*: Istr. (Freyh).

Obs. *M. Vaillantii* ad Etsechy non lectum est postquam a Cosson et Germain ibi detectum erat, sed 1878 relectum est a Bonnet et Delacour ad Fontaineblau, ubi crescit inter *M. vulgare* typicum, cujus varietas est monstrosa foliis dissectis.

2. *M. pannonicum* (1831): Bohem. (ad Laun: Celak. 1885). Bulgar. (: Velenovsky). Thessal. (: Haussknecht). *M. remotum* Kit. ap. Schult. (1814), nomen antierius et melius.

3. *M. peregrinum*: Bohem. (ad Laun: Celak. 1885). Bulgar. (: Velen.). Thessal. (: Heldreich 1882). Ross. centr. (gub. Kursk).

4. *M. præcox*: Banat. Rumel. or. (: Skorpil, Velen.). - Hæc species media est inter *M. vulgare* et *M. peregrinum*, sed huic quoad calycem propior.

5. *M. candidissimum*; Ital. hab. etiam bor.-or. (Littorale, Veneto); meridiem versus usque ad mte Gargano Apuliæ et mte Matese et Itri Campaniæ progreditur.

6 * *M. cylleneum*: Heldr. hb. norm. 967 (ex Achaia).

8. *M. thessalum*; Thessal. hab. etiam in mte Ossa (: Heldreich 1884).

8. *a. M. Haussknechtii* Uechtr. (ex Haussknecht in litt. 1889). Græc. bor. m. Pindus (: Haussknecht 1885).

10. *M. Alysson*; in Calabr. erronee indicata est teste Caruel; in Sardinia rarum (ad Cagliari: Gennari).

× *M. Ascheronii* Magn. = vulgare + *Alysson*. (Sard.).

× *M. virescens* Borb. = vulgare + *candidissimum*. (Croat.).

22. *Sideritis*. 6. *S. scardica*: Thessal. m. Pelion (: Heldr. 1882).

7. *S. cretica*; S. Boissieri Magn. serin. (1885) 85; fl. sel. exs. 944.

10. *S. stachydoides*; hæc species rariss. (detecta a Willkomm 1845) huc usque solum in latere boreali montis Sierra de Maria lecta est; crescit in fissuris rupium calcarear., cæspites grandes constituens.

15. *S. hyssopifolia*; Pedem. (etc. Ital. bor.) antiquitùs indicata est (recentius a Comolli et Rota), sed cl. Caruel specimen italicum non vidit.

* *S. hirtula*; cfr. ap. Rouy in Le Natural. 1882. 30 sep. (*).

* *S. Guillonii* Timb.-Lagr.; Bill. exs. contin. 2344 bis. - Gall. med. (pr. Rocamadour dep. Lot, Crages dep. Charente, Saintes dep. Char.-Infer.) a cl. Malinvaud in loco classico Souillac, Rocamadour (: Fourmeault 1771) redetecta est 1860; vid. Magn. serin. VI. 117.

17. *S. leucantha*; species valde variabilis est et polymorpha (cfr. Rouy in rev. sc. nat. 1883).

19. *S. angustifolia*; — *S. setabensis* Rouy in bull. soc. bot. 1882. 19 (*). *S. angustifolia* var. *parviflora* Willk. Lge; *S. linearifolia* Coss. in Bourg. exs. a. 1852. n. 1645 (ex Rouy). - Valenc. (pr. Jativa).

21. *S. bætica*; hæc species, ex clo ejus auctore, affinis est *S. grandifloræ* (8) quare illi approximanda.

22. *S. incana*; — *S. Tragoriganum*; ex observ. cl. Rouy (bull. soc. bot. 1882) est var. speciei sequentis (*S. pungens*).

26. *S. lanata*: Heldr. hb. norm. 871 (Argolis).

29. *S. montana*: Bohem. (ex Celak. 1883). Gall. mer. hab. (ex Rouy 1888)

B.-Alpes (pr. Annot: Reverchon 1874), Bouches-du-Rhône (La Treille etc.: Derbès 1862).

23. *Dracocephalum*. 1. *D. austriacum*: Pedem. (Chamouni ad Mont-blanc; m. Cenis: Huguenin ex Caruel). Helv. hab. etiam cant. Graubünd. (in Engadin).

2. *D. Ruyschiana*: Suec. med. (ad Vesterås; introd.?). Galic. (: Knapp; 1885 a Woloszczak lecta est). Alpes-Marit. (col della Maddalena: Ardoino). Pedem. hab. in mte Cenis. etc., sed in alpestr. Pralugan, ubi post Allioni indicatum, recentius non lectum est (sec. Chabert). Germ. adest potissimum in Boruss., ceterum (ex Geke) non nisi Posen. (r.), Bavar. (r.) et pr. Dessau.

4. *D. thymiflorum*; Fenn. hab. mer.-or. (in mer.-occ. non indicatur).

24. *Nepeta*. 2. *N. nuda*: Alpes-Marit. (reg. alp.: col de Tenda, col de Fenestre, val Pesio). Bavar. (rr.) ex Prantl. Helv. hab. in sola mer.-occ. (vall. Rhodani). Comment. 215.

7. *N. Cataria*; Belg. hinc inde adest sed introd. et inquil. (: Crepin). Sard. (ex Reverchon).

9. *N. Nepetella*; Helv. delet. nam species ibi non adest sec. Gremli.

13. Obs. *N. italica* (L. sp.); ex herbar. centr. ital. constat (teste Caruel) hanc speciem denuo in Italia lectam esse, scil. "nel Piceno" (: Marzialetti 1839) et in mte S-Vicino delle Marche (: Paolucci); sec. De Notaris lecta erat a Viviani in mte S-Spirito del Genovesato.

14. *N. multibracteata*; sec. Rouy (in Le Natural. 1882) planta lusitan. non est species Fontanes.

16. *N. reticulata*; Lusit. (pr. Lisboa) a Welvitsch a. 1846 lecta est (ex Rouy).

21. *N. ucranica*; hab. etiam in Hung. (: Tauscher 1871).

Obs. *N. grandiflora* MB., species caucasica, in Siles. et Polon. introducta et (r.) inquilina indicatur.

25. *Glechoma*. 1. *G. hederacea*; in Cors. unico loco indicata est.

2. *G. hirsuta*: Bulgar. Rumel. or. Ross. mer.

26. *Hyssopus*. 1. *H. officinalis*: Ital. med. usque in Campaniam et Apuliam (r.). Carinth. (rarius: Pacher). Croat. (Fiume locis siccis et sterilibus: Tommasini, A.-M. Smith). Bulgar. (in rupibus calcar. ad Petrohan et in saxosis supra Konjavo leg. Velenovsky).

27. *Horminum*. 1. *H. pyrenaicum*: Alpes-Marit. (col della Garbella: Burnat). Bavar. (pr. Funtensee Alpium or.). Carinth. (Dobratsch: Jaborn. et al.). Styria (ad St-Hema pr. Sauerbrunn ad fines croat.: Felicetti ex Maly).

28. *Melissa*. 1. *M. officinalis*: Gall. centr. (mult. loc.). Carinth. (rarius: Pacher). Styria (in collibus et fruticetis ad fines croat.: Maly). Bulgar. (: Velenovsky). Ucran. (ex Montresor).

30. *Calamintha*. 1. *C. grandiflora*: Gall. centr. (Puy-de-Dôme, Forez, Cantal, H.-Loire). Styria (Wotschberg, Sulzbachergeb, Cilli). Carinth. (in convallibus alpinis præcipue montium Karavanken). Bulgar. (: Velenovsky). - Transs. (Schur) ad *C. Baumgarteni* (12*) pertinet ex Smk.

2. *C. officinalis*: Bavar. Würtemb. (sed Thuring. pr. Dornburg etc. probab. sata ex Geke). Austr. (in Cons. omissa). Bulgar. Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht). - Belg. nondum lecta est teste Crepin (sed adest ad Luxemb. et Spaa ex Geke). — *C. silvatica* (*C. officinalis* Jord. ex Towns., G.G. p. p.): Angl. (in ins. Wight unico loco sed copiosa), Gall. (et probab. alibi).

3. *C. menthaefolia*; in Helv. adest solum var. — *C. adscendens* (*C. menthaefolia* G.G.): Gall. Angl. mer. (ins. Wight). Helv.

4. *C. Nepeta*: Gall. bor.-occ. Helv. hab. solum var. *C. nepetoides* (exc. in cant. Ticino, ubi typica a Christ indicatur). Bavar. etiam in bor. (Regensburg etc.) adest. Styria (mtes Sulzbach.: Alexander). Carinth. (duobus locis ex Pacher).

Bosn. (: GBeck, Brandis ex Freyn). - Transs. ad *C. officinale* (2) pertinet ex Smk. — *C. nepetoides* (*C. Einzeleana* FSz): Helv. (Carinth. Istria (: Freyn). — *C. mollis* Jord. ap. Verlot; exs. soc. dauph. (Delph.); cfr. Magn. serin. I. 33—4. — *C. glandulosa* Barc. apunt. (Mallorca Balear.)

5. *C. glandulosa*: Balear. (Mallorca, in Puig mayor de Torrella: Porta et Rigo 1885 ex Rouy).

9. *C. incana*: Heldr. hb. norm. 873. a (typica). 873. b (var. *calvescens*).

11. *C. suaveolens*: Epirus (Chodzes ex Heldr. 1879). Japyg. (T. d'Otranto: HGroves). — *C. acinoides*; ex Caruel pertinet ad *C. Acinos* (14).

12. *C. alpina*: Galiz. Styria (Alpes et etiam in montibus ad Graz). Carinth. (Alpes, sed in glarea rivulor. alpinor. sepe multum descendit). Bulgar. (: Velenovsky). - Transs. ad subspeciem pertinet.

**C. Baumgarteni* Smk. in term. fűzet. 1886 (sub *Melissa*). *Thymus* (*Acinos*) *alpinus* Bmg. et auct. transsilv. - Transs.

13. *C. corsica*: Corsicæ montes altissimos inhabitat; cl. Caruel non novit e Sardinia, sed in hb. Webb. vidit specimen, quod sec. schedulam e Pyrenæis ortum est.

14. *C. Acinos*: Norv. parum ultra lat. 64° progreditur (ex Norman). Cors. deest sec. Caruel.

15. *C. graveolens* (*Thymus pallescens* Ten. fl. nap.); in Italia rariss. est. et non nisi in Aprutio adest (ibi 1829 detecta est a Tenore, Orsini et Mauri pr. Aquila ad Assergio); relecta 1882 a Levier pr. Solmona. - Transs. pertinet ad sequentem:

15. a. *C. hungarica* Smk. in term. fűzet. 1886 (sub *Melissa*). *C. rotundifolia* et *C. graveolens* auct. transsilv. - Hung. Transs.

31. **Micromeria**. 2. *M. marifolia*: Apulia (pr. Manfredonia: Porta et Rigo 1875 ex Caruel); num planta hæcce apula potius ad speciem præced. (1) pertineat?

3. *M. Pulegium*; hab. etiam (r.) in Transs. (: Baumgarten, Barth).

4. *M. rupestris*; Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

5. *M. dalmatica*: Bulgar. (ad Razgrad etc.: Velen.). Rumel. or. (pr. Slivno: Velen.).

6. *M. nervosa*; observ. cl. Lacaita (litt. 1884) hæc est species occidentalis (præcip. algeriensis), a qua omnino diversa est *M. plumosa* (Hampe) Heldr., in Sicil., Græc., Creta, Rhodo obvia et etiam in Japygia (T. d'Otranto) proveniens.

**M. Rodriguezii*; *M. græca* Barcelò apunt. (non Bth.). *M. microphylla* var. Coss. in Bourg. exs.

7. *M. græca*: Ins. Jonicæ (Cephalon.: Heldr.; Corfù: Spreitzenh.). — *M. consentina*: Basilicata (: Terraciano). Sardin. (: Moris); a *M. græca* typica sat distincta est.

**M. tenuifolia*: Lusit. (Welwitsch 1848, Sjögren 1854). Ligur.

11. *M. approximata*; in Ital. pænins. parum lecta est (ad Otranto, Napoli).

**M. Barceloi*: Ibiza (sat abunde); in Mallorca lecta est ad Palma (r.).

11. a. *M. inodora* Bth. lab. 375. *Thymus inodorus* Dsf. atl. II. 30. - Mallorca (pr. Palma: Marès).

12. *M. cristata*; sec. Caruel (fl. ital.) a Parlatore pr. Acquasanta nel Piceno a. 1856 lecta est.

14. *M. juliana*: Lusit. (pr. Coimbra: Moller in Sz hb. norm. nova ser. 1446)

15. *M. canescens*; ex Caruel (Parl. fl. ital.) est varietas *M. græca*.

16. *M. thymoides*; species Ligur. occ. (Riviera di Ponente) priva ibique non nisi duobus locis, Oneglia nempe et Piani, lecta.

17. *M. croatica*: Bosn. mer. (m. Prenj Planina alp.: GBeck 1885).

18. *M. microphylla*: Palear.: Mallorca (pr. Palma) et Menorca (ad Ciudadela) ex Marès et Vigin. - Ins. Lampedusa (: Lojacono).

20. *M. Piperella*; hæc species rupes Alpium Maritim., ad alt. circ. 1000 metr., inhabitat; sic non rara est in rupibus a Tenda usque ad Brès et pr. Agel supra Mentone; ad Albenga etc.

32. *Satureja*. 1. *S. Thymbra*; in Sard. non nisi pr. Cagliari lecta est, sed ibi copiosa.

3. *S. cuneifolia*; Cephalon. hab. etiam in montibus Rhudi et Phalaris (: Heldr.). — *S. Olla Ehrenb.* ex Bth. et Aschn. (Dalm.).

4. *S. montana*: Pyr. centr. inter Luz et Gavarnie (: Endres 1830). Carinth. (inter Pontafel et Leopoldskirchen: Rotky ex Pachter). Bosn. (: GBeck, Blau). — *S. variegata*; est varietas sat distincta, potius subspecies (*S. Campanella Ehrenb.* sec. Aschn.; Dalm.).

**S. illyrica*: Bulgar. (Velen.). Bosn. (ex Freyn). - *S. subspicata* (in hb. Guss. sic nominata) adest copiosa in collibus pr. Amalfi: Lacaita.

4. *a. S. intricata* Lge in vidensk. meddel. 1881. 96. sep. 4 (*). *S. montana* var. Boiss. - Mts Nevad. (Dehesa de S-Geronimo: Boiss., H.P.R.).

5. *a. S. inodora* Salzm. in Bth. lab. 353. - Bætica pr. Algeçiras (: Reverchon). Species antea solum e regno maroccano cognita.

6. *S. coerulea*: Bulgar. (litor. pr. Kebedze: Bornmüller). Rumel. or. (: Velen., Skorpil).

8. *S. hortensis*; — *S. pachyphylla* CKoch. (Ross. mer. deserta tanaic.).

33. *Origanum*. 6. *O. vulgare*; — ? *O. barcense* Simk. (1886). *O. hirtum* Schur. (Transs.).

9. *O. majoricum*; species dubia, a solo Cambessedes pr. Inca ins. Majorca lecta; synon. (*Thymus Richardi*) exclud. nam species Persoon. est verus *Thymus* (cfr. Rouy in *Le Natural*. 1882). — *O. lusitanicum* Rouy l. c. 37 (sep.); Burn. Barb. not. balear. 32, 33. (Lusit. rr.: Welwitsch). - *O. acinifolium* Wallr. est planta culta (cfr. Burn. Barb. l. c. et Rouy l. c. 38, 39).

10. *O. Onites*; Sicil. non nisi pr. Syracusas lectum est.

34. *Thymus*. 3. *T. Welwitschii*; sec. Rouy (in *Le Natural*. 1882) hybr. est inter *T. Mastichina* (1) et *T. capitellatus* (32), cum quibus crescit loco Welwitsch.: Villa-Nova de Portimão, sed exstat aliud *T. Welwitschii* Noé (1851) in hb. Welw., qui est hybr. a *T. Mastichina* et *T. carnosus* (7) et a Welwitsch lectus est in maritimis ad basin montis Serra da Arrabida.

8 * *T. ilderdensis* Gonzales ap. Costa (1877). - Catalon.

10. *T. æstivus*; — *T. Barrelieri* Rouy 1883 (*T. Renteri* Rouy 1884); sub hoc titulo cl. Rouy comprehendit *T. æstivum* (10) et *T. hiemalem* (13); vid. rev. se. nat. 1883. 76—8 et bull. soc. bot. 1884. 45. sep. (*).

12. *T. vulgaris*; in Ligur. et Pedem. proximo p. m. frequens, in Ital. cetera rarus: Terracina (: Bertol.), Gaeta (: Terraciano), Otranto (: HGroves); in temperatoribus (e. gr. Helv.), ex hortis elapsa, interdum quasi sponte occurrit; sec. Rouy planta lusitan. (Broter.) diversa est et inter hanc et præced. speciem media: *T. sublaxus* Rouy in *Le Natural*. 1882. 46. sep. (*): Olyssiponæ, in hortis et oleraceis (: Welwitsch 1849).

12. *a. T. Webbianus* Rouy in bull. soc. bot. 1884. 45. sep. (*). *T. Herbarona Webb* non Lois. (ex Rouy). - Hisp. valent. (promont. Hifac et mte Mongo pr. Denia).

13. *a. T. micromerioides* Rouy l. c. 46. - Hisp. prov. Alicant., ad pagum Benitachel pr. Denia (: Rouy 1883).

14. *T. teucrioides*; hab. etiam in m. Pindo (: Heldreich 1885).

16. *T. cæspititius*; planta rara; Welwitsch eam legit (1848) ad Oporto, in apricis graniticis rupes ornantem.

17. *T. nitidus*; species rarissima, huc usque solum in insula parva Maretto (ad angulum occidentalem Siciliæ), locis saxosis, lecta.

18. *T. Herba barona*; planta Webbiana hispan. pertinet (ex specim. authent.) ad *T. vulgarem* teste Caruel; ex Rouy est species propria (12. a.). — ? *T. nitens* Lmtt. plat. centr. (dep. Gard, rr.).

19. *T. Chamædrys*: Fenn. mer. (adv. rarior). Dan. (sed deest in pænis. occ. et in Bornholm). Norv. hab. solum in mer.-or.; Bosn. et Herceg. ex Freyn. — *T. alpestris* (Tsh in sched.) Ott cat. *T. alpinus* Pr. *T. pulegioides* Lang exs. *T. humifusus* var. *origanifolius* Rehb. exc. *T. Serpyllum* var. *nummularius* Celak; potius subspecies quam varietas. (Sudeti. Bohem. Hung.).

**T. comosus* (1852). — *T. rotundifolius* probab. ad *T. pulcherrimum* (20—) pertinet. — *T. comosus* Heuff. (1858). *T. pulchellus* Jka. — *T. marginatus* Kern. (1874).

**T. montanus*: Arvern. (sat freq. ex Lmtte). Morav. Styr. (: Heimerl 1883). Istr. (mte Maggiore etc.: Freyn). Bosn. (GBeck et al.).

**T. nummularius*; — *T. Rochelianus* Celak. (1883). *T. lanuginosus* Roch. (non alior.). — *T. sudeticus* Opiz. (Riesengeb., Gesenke).

20. *T. Serpyllum*: Fenn. Dan. Ins. Færöer (var. *borealis* Lge, quæ etiam in Islandia vulgata). — *T. angustifolius* P. (1807); Schreb. ap. Schweig. Körte (1811) est planta locorum siccissimor. (Suec. mer., Dan., Germ., Belg., Gall. bor.). — *T. pulcherrimus*; *T. alpicolus* Schur. *T. carpaticus* Celak. ex ipso. — *T. aureo-punctatus* GBeck. (Bosn. mer. pr. Konjica). — *T. humifusus* Brnh. ab hac specie (*T. Serpyllo*) alienus dicitur et *T. nummulario* (19*) valde proximus; ambo a cl. Kerner cum *T. comoso* (19*) ad sectionem Marginatarum remouentur.

**T. Marshallianus* W. - Ross. med., mer. — *T. Roegneri* CKoch. (Taur.). — *T. arenarius* Brnh. (in Consp. sub specie ipsa allatus) non Pers. — *T. austriacus* Brnh. (in Consp. sub **T. pannon. militat.*).

**T. dalmaticus* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 400 (ubi descr. plena et observ.). *T. Serpyllum* var. *angustifol.* Vis. dalm. - Dalm. Transs. (: Simonk.). Bulgar. balcan. ad Orchanie, m. Stara Planina (: Velen. 1881, 1887).

21. *T. acicularis*; cfr. Comment. ad 29 (*T. striatus*).

28. *T. bracteosus*; hab. etiam in Croat. (: Borbas, Hire).

28. a. *T. Jankæ* Celak. in Flora 1883. 146. *T. acicularis* auct. banat. (non W.K.). Rumel. or. (Hæmus ad Slivno: Janka). Banat. (Wierzb., Jka).

29. *T. striatus*; hab. etiam Ital. med. usque in Hetruriam et Umbriam. *T. spinulosus* (ex observ. cl. Caruel) est status bracteis viridibus, persistentibus (typus habet bracteas coloratas, caducas). *T. acicularis* vid. obs. subseq. Comment. 216. — *T. atticus* Celak. (1882); Heldr. hb. norm. 874. — *T. Zygis* fl. gr.; *T. striatus* Heldr. hb. norm. 291. Orph. fl. gr. exs. 199. - *Hymettus* et *Pentelicon Atticæ* (: Heldreich).

Obs. *T. acicularis* Guss. rar. (*T. Marinosei* Ten. ?; desunt specim. et descr. comparat.). Japygiæ colles usque ad mare inhabitat et omnino diversa est a *T. striato* vero, qui planta montana (: Lacaita in litt.).

**T. conspersus* Celak. - Sicil. Apul. (mte Gargano).

**T. holosericeus* Celak. - Cephalon. (ins. jon.) m. Oenos (*T. striatus* Letourn. in sched.).

29. a. *T. Richardi* P. syn. II. 130; Barcelò apunt. (1867). In ins. Balear. detectus ab Ant. Richard, 1760; iterum lectus in Mallorca pr. Soller (m. Coma den Arbona: Marès 1852, Barcelò 1863), in Puig. m. de Torrella et pr. Pollenza (: Marès 1852).

30. *T. algarbiensis*; sec. Rouy est var. *macrocephala* speciei sequentis (*T. albicans*).

31. *T. albicans*; de hac specie rariss., algarbiensi, cfr. ap Rouy in Le Natural. 1882. 42—44 sep. (*).

33. *T. villosus*; species rara, "male cum *T. lusitanico* Boiss. commutata" (: Ler. Lev.); vid etiam Rouy in Le Natural. 1882. 45 sep. (*), ubi *T. lusitanicus* (Serra de Cintra pr. Lisboa: Welw., Lev.) dicitur hybr. a *T. villosus* et *T. silvestri* (9). — *T. lobatus* (Lusit.) est species bene distincta ex Lange (litt. 1882) test. specim. Henriquez.

38. *T. capitatus* (Satureja capitata Bert.): Ins. Balear. (Mallorca, Ibiza). Lampedusa (ubi in parte or. fruticeta characteristica solus constituit: Lojacono).

× *T. paradoxus* Rouy. = *Funkii* + *Zygis*. (Hellin *Hisp. mer.*).

× *T. valentinus* Rouy. = *Reuteri* + *Webbianus*. (prom. *Hifac pr. Denia*).

37. *Mentha*. 1. *M. rotundifolia*: Bavar. bor.-occ.; Helv. hab. etiam in mer.; Marchia pr. Görbitsch (ex Aschn); in Bornholm nunc etiam alio loco (copiose) lecta est.

**M. macrostachya*; de hac et de speciebus proximis (cum varr.) cfr. Ten. *syll.* 607 -610. — *M. ambigua*; ex Caruel pertinet ad *M. silvestrem* (3). — *M. Bauhini* Ten. *syll.* *M. neglecta* B. Ten. fl. nap.

2. *M. tomentosa*; — ? *M. ilissia* Heldr. hb. norm. 972 (1887): Athen. ad ripas Ilissi.

3. *M. silvestris* (*M. longifolia* Huds. 1762); hab. etiam in Bulgar. (: Velen.). — *M. serotina*; *M. longistachya* Timb.-Lagr. ap. Malinv. — *M. Rosani*; *M. seriata* Kern. (Dalm.: Pichler). *Comment.* 217. — *M. niliaca* et *M. balsamea* Caldesi fl. fav. tent. (ex Caruel). — *M. alpigena* Kern. (Tyrol. ad rivulos alpin.). *Comment.* 218. — *M. marisensis* Smk. 1885. (Transs.). — *M. Wierzbickiana* (Opiz ap. Heuff.) Simonk. *enum. transs.*

**M. nepetoides*: Helv. occ., mer.-occ. Gall. mer. (Aveyron: Le Grand). — ? *M. Ayassei* Malinv. (cfr. 7× *M. subspicata*).

× *M. rotundifolio-nemorosa* Wirtg. - Germ. occ. Gall. centr.

? *M. Riparti* Desegl. (Magn. fl. sel. exs. 113; cfr. Magn. *scrin.* I. 32). Gall. mer.-or. Helv. occ. (Genève).

4. *M. viridis* (*M. spicata* Huds. 1762); Belg. adest, sed (ex Crepin) solum inquilina, ut etiam Suec. (mer.) probab. culturā introd.; Mallorca Balear. (pr. Solter, spont.: Barcelò). Ital. bor. et media (rarius) usque in Basilicata. Græc. bor. (Pindus Dolop.: Hausskn. 1885).

**M. inarimensis*; cfr. speciem sequent. (*M. suavis*).

Obs. *M. piperita*; *M. viridi-aquatica* FSz in Flora. *M. viridi-citrata* FSz in Pollechia.

5. *M. suavis*: Ital. bor. Cors. (EPetit 1883). - Sec. cl. Caruel ad hanc speciem tam *M. pyramidalis* (8 *) quam *M. inarimensis* (4 *) referendæ sunt et cum duabus aliis sic disponendæ: *M. pyramidalis* Ten. (1811). *M. suavis* Guss. - *M. Avellini* Tod. ap. Bert. (1844). *M. inarimensis* Guss.

6. *M. insularis*: Sard. (: Gennari, Reverch.). Caprar. (ex Caruel). Menorca (var. balearica Willk.). Sec. cl. Caruel hæc species a *M. rotundifolia* parum differt.

7. *M. aquatica*; Fenn. adest in extima mer.-occ. (ins. Aland.); hab. etiam in Ins. Færøer, ubi (sicut in Island.) *M. arvensis* deest (ex Rostrup). — *M. eriantha* CKoch. (Taur.). — *M. brachystachya* Borb. (1880) ex Smk. — *M. hungarica* Borb.

**M. Lloydii*: Dan. (ex Lge). Batav. (van der Scheer ex Abeleven 1876). Gall. bor.-occ.; or. (pr. Culoz dep. Ain: Desegl.).

**M. subspicata*: Belg. Gall. — *M. Ayassei* Malinv. (dep. Ain: Ayasse 1875; Heidelberg: Bischoff 1827). — *M. rotundifolio-hirsuta* Timb.-Lagr. (Gall.).

× *M. Maximiliana*; — *M. Mauponii* Gadecau ex Malinv.

8. *M. hirsuta*; *M. pannonica* Borb. ex Smk. (Hung. Transs.).

**M. pyramidalis*; cfr. *M. suavem* (5).

9. *M. sativa*: Ross. mer.; balt. (ex Klinge). - Transs. ad subspeciem pertineat. — *M. palustris* potius subspecies videtur (apud Rchb. species propria) ut etiam *M. verticillata*, quæ vero *M. arvensis* propior dicitur.

**M. paludosa* Schreb. (in *Consp.* sub n. 11 allata). — *M. reversa* Roch. in linn. 1838. *M. sativa* et *M. gentilis* auct. transs. (ex Smk.).

10. *M. gentilis*: Norv. occ. (Bergen etc.: Murbeck 1884). Belg. Helv. in sola mer.-occ. spontanea, sed interdum alibi ex hortis rusticorum elapsa (: Grenli). Ross. mer. *Comment.* 219. — *M. pratensis* est planta rariss. et, ut videtur, a solo Sole lecta (in Hampsh. Angl. mer. 1789). — *M. Pugeti* Per.

**M. rubra*: Belg. (Ardenn.: Durand). — *M. acutifolia* Sm. (Angl., Germ.).

11. *M. arvensis*: Dan. Fenn. Bulgar. (: Bornmüller). — *M. gracilis* Sole. — *M. deflexa* Dmrt. (ex autops. Malinv.). — *M. Scribæi* FSz (1873).

**M. fontana* Whe; HBraun in act. soc. z.-b. vind. 1886. - Belg. Germ. occ., med. Gall. Helv. Tyrol.

**M. parietariæfolia* (Becker). — *M. multiflora* Host. — *M. Obornyana* HBraun.

× *M. paludosa*; nunc sub *M. sativa* (9) militat.

× *M. plicata*; ad *M. palustrem* Mch (vid. sub 9. *M. sativa*) pertinere dicitur; *M. austri-*

aca Jacq. non alior. (Austr. Hung. etc.) species distincta sit; vid. HBraun in act. soc. z.-b. vind. 1886. — ? *M. nemorum* Bor.; *M. nemorosa* Host non W.

× *M. arvensi-reversa* Simk. - Transs.

12. *M. Pulegium*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto; HGroves). Styria (Graz etc.). Bulgar. (vulgata: Velenovsky). Helv. hab. in sola mer.

13. *M. Requieni*; ad Portum (Oporto) Lusit. occurrit (quasi spontan.) hinc inde secus fluvium Douro (ex Rouy).

38. *Lycopus*. 1. *L. exaltatus*: Ital. bor. (rarius) usque ad Bononiam et Luccam (in hb. eur. exstat e Florentia: CPasserini 1814); indicatur etiam Romæ et Neapoli, et Istr. adest sed rr. (: Freyn 1874). Bulgar. (litor. in silvis ad Kamcyk: Bornmüller). Thessal. (: Haussknecht 1885).

2. *L. europæus*; — *L. laciniatus* Rouy in Le Natural. 1882. 50 sep. (*). *L. europæus* var. *elatio* Lge. (Lusit. in paludosis ad Lagôa d'Obidos: Welwitsch 1850).

× *L. intermedius* Hsskt. = *europæus* + *exaltatus*. (Thessal.).

LXXXVI. LENTIBULARIÆ.

1. *Utricularia*. 1. *U. vulgaris*: Fenn. Dan.; Lusit. ad Matozinhos a Sjögren 1854 lecta est (hb. eur. mus. holm.); in Ital. bor. passim adest, sed in reliqua non nisi ad Minturno in T. di Lavoro (: Terrac.) et Neapoli (al Sebeto: Ten., al Pascone: Pasq.) indicator. Bulgar. Ross. mer. (ex Lindem.).

**U. dubia* detecta est (1844) a Rosellini, qui eam in schedula descripsit; Cesati dein in comp. fl. ital. nomen publicavit.

2. *U. neglecta*: Suec. med. (ad litus bor. lacûs Venern: Larsson). Batav. (pr. Apeldoorn: Kok Ankersmit 1877). Gall. bor.-occ., med. (Puy-de-Dôme, Allier), mer. (pr. Antibes: Thuret. Bornet). Lothar. Alsat. Phalz. Bavar. (pr. Eichstätt). Siles. Ross. occ. (Mohilew: Downar).

2. a. *U. Jankæ* Velen. in act. soc. sc. bohem. 1886. 37 sep. (*). Bulgar. pr. Kebedze (detecta a Velenovsky 1885).

3. *U. intermedia*: Dan. Fenn. - Transs. ad *U. vulgarem* pertinet ex Smk. — *U. Kochiana* Celak. *U. ochroleuca* FSz. (Zweibrücken). — *U. Grafiana*; vulgatio nunc dicitur quam hactenus indicata est; locus classicus est Studenzenbach ad Ebenthal Carinth.

4. *U. ochroleuca*: Fenn. bor. (Kuusamo et Ostrobothn. kajan.: Sælan, Nyberg 1864). Suec. ab Angerm. et Helsing. usque in Vestrog. et Bleking. Dan. (vid. Lge haandb. ed. IV. 524). Germ. Bohem. *U. brevicornis* Celak. (in oe. bot. z. 1886) observ. cl. Ascherson (in act. brand. 1886) et consent. auct. ipso (oe. bot. z. 1887). — var. *microceras* RHtn. — *U. intermedia* Sz hb. norm. (Voges.).

5. *U. minor*: Fenn. Dan. Island. mer. (: Feddersen 1886 ex Rostrup). - Transs. ad subspeciem pertinet ex Smk.

**U. Bremii*: Angl. (Nairnsh. etc.: FMWebb 1876). Suec. nunc lecta est in Smoland., Vestrog., Vermel. et Angerm.: Germ. adest etiam in Bavar. bor. et Phalzia; Alsat. (ex Garecke). Siles. (Lausitz, r.). Hung. (Budapest, Villany). Transs. (rarius).

2. *Pinguicula*. 2 * *P. longifolia*: Alpes-Marit. (: Burnat ex Rouy). Lozère (la Malène: Prost; Meimieis: Lamotte).

3. *P. leptoceras*: Puy-de-Dôme (Forez, Pierre-sur-Haute). Haute-Loire (Mezenc: Neyra).

4. *P. vulgaris*: Fenn. Dan. Ins. Færöer. Bosn. (Brandis ex Freyn).

5. *P. hirtiflora*: Aetol. m. Korax, reg. alp. (: Heldreich). Pindus tymph. in decliv. montis Zygos (: Haussknecht 1885). — *P. læta* est species bene distincta sec. Pntck (oe. bot. z.; cfr. ej. adnot. 74).

6. *P. alpina*: Alpes-Marit. (val de Pesio, mt Bego, col de Fremamorta: Ardoino). Fenn. bor. (Kuusamo), or. (Carel. oneg.). Curland. (Ross. balt.), r. Galiz.

7. *P. lusitanica*; hab. etiam in Gall. bor.-occ.

8. *P. villosa*; hab. etiam in Fenn. bor. (Kuusamo, Ostrob.).

LXXXVII. PRIMULACEÆ.

1. *Lysimachia*. 1. *L. thyrsiflora*: Dan. Fenn. (exc. Lapp. multa). - Gall. locus hujus speciei, nunc unicus, est in paludosis ad Harly pr. St-Quentin ubi a dom. Petermann detecta 1868 (ex Ch. Magnier; vid. bull. soc. bot. 1880 et scrin. I. 28).

2. *L. vulgaris*: Dan. Fenn.

3. *L. punctata*: Galiz. Helv. olim Zürich., nuper Basilie lecta est. Bavar. aliquot locis (Baireuth, Erlangen, Passau etc.) indigena ex Prantl. Rumel. or. (: Skorpil, Velen.). Thessal. (m. Pelion: Heldr. 1882, Pindus dolop.: Hausskn. 1885).

4. *L. Numularia*; ex *Alandia* (Fenn. mer.-occ.) nunc non citatur, sed *Aboæ* etc. inquil. adest (in Carel. ladog. indig.); hab. etiam in Pindo dolop. (: Haussknecht 1885).

7. *L. ephemereum*; hab. etiam in Pyren. centr. (: Zetterstedt).

7. *a. L. minoricensis* Rodr. in bull. soc. bot. XXV. 240. Ins. Menorca (barranco de se Vall: Rodriguez; relecta a Porta et Rigo 1885).

3. *Trientalis*. 1. *T. europæa*: Fenn. Dan.; Helv. hab. etiam Roseggthal, Bernina. - Transs. dubitat Smk.

4. *Samolus*. 1. *S. Valerandi*: Bulgar.; Fenn. adest etiam in Nyland. et Carel. mer. — *S. nanus* Thore. (Bayonne: Grateloup in hb. eur.).

5. *Glaux*. 1. *G. maritima*: Fenn. Dan. Island. (cfr. Groenlund addit.). Hetr. (Firenze all' Impruneta: Reboul sec. Car.). Mallorca Balear. (: Barcelò). Gall. hab. etiam dep. Allier in salsis pr. pagum Jeuzat (: de Buysson 1884).

6. *Anagallis*. 2 * *A. (collina var.) hispanica* Willk.; *A. collina* Costa. - Catal. (: Costa 1860, Willkomm 1873).

3. *A. latifolia*: Sard. (Dr Thorèn 1880) et ins. parva S-Stefano illi proxima (: Gennari). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).

4. *A. coerulea*; hab. etiam in Bulgar. (: Velenovsky 1887).

6. *A. parviflora*: Ins. Mallorca (rarius: Willkomm 1873). Sicil. (ad Castelbuono: Lojacomo 1883). Sard. (Duby, Barbey). Cors. (: Marsil.).

7. *A. tenella*; in Ins. Færøens. olim lecta a Mohr (inde 1794 pro fl. dan. picta est) et 1821 a Trevelyan, sed dein frustra quaesita (ex Rostrup 1870). Germ. adest etiam in prov. Rhen. (pr. Aachen etc.). Helv. solum in cant. Vaud (pr. Vevey) lecta est. Polon. ex Rostafinsky; in hb. sard. Moris. deest ex Barbey.

7. *Centunculus*. 1. *C. minimus*; hab. etiam in Norv. mer. (: ABlytt).

8. *Cyclamen*. 1. *C. neapolitanum*: Sard. (ex Reverchon). Bosn. mer. (pr. Grabovica: Blau ex GBeck). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich). - Helv. non nisi pr. Roche (cant. de Vaud) certe adest.

2. *C. græcum*: Cephalon. ins. jon. (in saxosis, rarius: Heldr.).

4. *C. repandum*; loc. Herault (Gall. mer.) pertinet ad *C. balearicum* (5 *) ex Loret (vid. fl. montp. ed. II. 318).

5. *C. europæum*; hab. etiam Bulgar. (: Velenovsky); in Italia (ex Car.) solum in Alpibus et in montib. ex eis directis provenit). — *C. aestivum*: Ital. bor. Helv. — *C. Dodonæi* Hmp.; Lagg. exs.! (Helv.). — *C. linearifolium* DC. (ex Car.).

**C. balearicum*; *C. repandum* var. *stenopetalum* Loret fl. montp. ed. I. (ex ipso). Herault: les Capouladoux aux Cambrettes, ubi jam a Magnol lectum (relectum a Dunal 1825).

9. *Soldanella*. 1. *S. montana*: Bavar. (præcip. in jugo mont. Bayr.-Wald). Galiz. (: Knapp). Banat. (: Borbás); Helv. exclud. (sec. Gremli).

**S. hungarica* Smk. (Simonk. enum. 461). Hung. Transs. (S. Clusii Bmg.).

2. *S. alpina*: Bulgar. (m. Kom et Vitos: Velenovsky). - Transs. ad subspeciem præced. pertinet ex Smk.

**S. pindicola* Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1886. 61(*). *Pindus tymph.* in decliv. montis *Zygos* supra Metzowo (: Haussknecht 1885).

3. *S. pusilla*: Bavar. (Alpes); in m. Jura deest.

4. *S. minima*: Bassano (Montini), alp. Borgo (Burnat), mte Premaggiore (Pirona) ex Car.; Helv. non nisi in Bundia (m. Valserberg) indicatur et ch. Gremli dubia.

× *S. hybrida* Kern. = *alpina* + *pusilla*. (Tyrol.).

11. *Cortusa*. 1. *C. Matthioli*: Sabaud. (: Chabert; a Tignes usque ad Gurra ex Rouy). Helv. mer. (Engadin, ubi locis idoneis non rara; vid. Killias fl. untereng. 156). Galiz. (: Knapp). Ross. arct. hab. etiam ins. Waigatsch (sed in Nov.-Seml. non lecta ex Kjellm.).

12. *Primula*. 1. *P. elatior*; in Ital. solum e paucis locis Lomb. citatur (Car. fl. ital. VIII); hab. etiam Ross. mer.-occ. (et balt. ex Klinge); de planta culta cfr. *P. variabilis* (2 ×). — *P. Perreiniana* non nisi calyce fisso recedit (ex Caruel). — *P. intricata* (= forma speciei alpina ex Godron) adest etiam in Tyrol. mer. et probab. alibi in Alpib. mer. (: Kerner); in Ligur., Lomb., Friul. et Aprut. (*P. di Sivo*) ex Car. it. VIII; in alpinis Bosn. (ibi vices gerit *P. elatioris*, a qua etiam capsulâ distincta est: GBeck). *P. pachyscapa* Goir. ex Car.

**P. carpatica* Grsb. iter (1852). *P. intricata* Jka (non Gren.).

2. *P. vulgaris*: Würtemb. (pr. Wangen); Germ. bor.-occ. hab. solum ad Deutz (Köln), Stade (Holsat.), Sticklekamp (Friesl. or.). Bulgar. or. (in silvis ad Kamcyk: Bornmüller). Thessal. m. Pelion (freq.: Heldr. 1882). Euboeæ m. Delphi (var. rosea); deest in Ital. max. mer. (non ultra Campaniam, Neapolin, progreditur). — *P. flagellicaulis* Kern. — ? *P. grandiflora* var. (?) *balearica* Willk.; *P. (vulgaris* var.) *balearica* Willk. ill. hisp. I. 52. (Mallorca, in cacuminibus montium Puig de Torrella et de Massanella, in rupestribus ad alt. circ. 1500 metr. Flores nivei, suaveolentes).

× *P. variabilis*: Ital. bor., med.; hab. etiam Daniæ (in silvis hinc inde); in hortis sæpe sub nomine *P. elatioris* colitur et potius subspecies est (quamquam primitus origine hybr.); ejus historiam et varietates cl. Lange exposuit in bot. tidskr. 1884. 7—12 sep. (*) et in haandb. ed. IV. 522.

× *P. vulgari-elatior*; *P. digenea* Kern. - Austr. Tyrol.; indicatur etiam in ins. (Dan.) Fionia (: Holm) et Möen (cfr. Tullberg in bot. not. 1876).

3. *P. officinalis*: Fenn. Dan.; extra Ital. bor. non nisi e mte dei Fiori (nel Piceno) citatur. — *P. macrocalyx* (*P. inflata* auct. transs.); hab. etiam Ross. mer.

**P. unicolor*; cfr. Lge in bot. tidskr. 1884. 6 sep. (*).

4. *P. suaveolens*: Helv. mer. (cant. Ticino, Vaud). Carinth. (pr. Satnitz: Welwitsch sec. Pacher). Transs. Bulgar. (ex Velenovsky). — *P. inflata* auct. *P. veris* var. *inflata* Rchb. exc. *P. pannonica* Kern. sched. ad exs. 1886: Hung. centr. mont. Austr. p. d. (specim. in exs. Kerner. pr. Mödling lecta sunt); sec. Kerner etiam in m. Salève Genev. et "sporadice" in Appen. Ligur.

Obs. Sec. cl. Kerner *P. inflata* Lehm. 1817 (cujus var. est *P. macrocalyx* Bge 1829) est species propria, a *P. suaveolens* diversa (cfr. sched. ad exs. 1886. 46—8). *P. macrocalyx* Bge, e seminibus altaicis in horto vindob. enata, ibi in graminosis nunc quasi spontanea est (Kern. fl. austr.-hung. exs. 1372).

6. *P. longiflora*: Galiz. (m. Carpati: Zapalovicz).

× *P. oblongifolia* Schur (= *longiflora* + *suaveolens*). Transs.

7. *P. farinosa*; Fenn. hab. in sola ins. Aland.; Suec. bor. adest in Hel-sing., Jemtia, Lapp. mer.; Saxon. hab. solum pr. Eisenach.; in Ross. arct. (Wai-gatsch?) lecta est a Heuglin.

**P. exigua* Velen. in act. soc. sc. boh. 1886. 38 sep. (*); cfr. in diar. ejusd. soc. 1887. 32 (sep.). *P. farinosa* var. *denudata* Panc. ex Uechtr. - Bulgar. præcipue in m. Vitos (: Velenovsky 1885).

9. *P. stricta*: Island. ad Eyaffjördr (: Mortensen ex Grönl. addit.), ad Mö-druvellir (: Davidsson ex Rostrup 1888). Ross. arct. etiam in N.-Seml. (: Kjellm. Lundstr. 1875). — *P. glabrescens* (Fr.Nyl. ms.) W.Nyl. et Sælan. hb. mus. fenn. ed. I. (in nota): Lapp. or.

10. *P. sibirica*; Fenn. bor. extra Ostrob. hab. in Carel. keret. et Carel. pomor.; inteniis Lulens. (Uddskär) lecta 1872 a stud. Bäckström; ibi non relecta

est, sed 1885 copiose aderat in ins. Seskarön inter Haparanda et Kalix (: Burman ex Lundstr.).

11. *P. Palinuri*; sec. Car. (fl. ital. VIII) hæc rara species hab. in rupibus oræ calabr. et præcipue "al promontorio Palinuro ed alla Molpa".

12. *P. Auricula*; Transs. indicatur a Baumg. et Schur, sed a Simonkai cruciatur.

**P. Balbisii* (1817). *P. ciliata* Moret. not. vicent. 1815; hab. etiam in alp. Apuan. (alla Tambura), in montibus Umbriæ et Campan. (Car. fl. it. VIII).

13. *P. pubescens* Wulf. in Jacq. misc. (1778); Kern. fl. austr.-hung. exs. a. 1885 (Tyrol. centr.: Huter). Comment. 220.

16. *P. marginata*: Alpes-Marit. (in alpinis freq. usque ad montes supra Mentone et Thorenc; ex Ardoino). - ? *P. alp. Hochschwab* (ex Maly).

× *P. discolor* (*P. Portæ* Hut.); ex Kerner est hybr. a *P. Auricula* et *P. daonensi*.

18. *P. hirsuta* (*P. viscosa* All.): Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.).

19. *P. villosa*; Sty. hab. in alpinis plur. (ex Maly). Carinth. in alpinis et subalpin. non rara ex Pacher.

20. *P. ciliata* (1792). *P. hirsuta* All. (1785) ex Kern.; hæc ad *P. viscosam* (22) vulgo citatur. - *P. villosa* Hausm. tyrol.

21. *P. daonensis*; Helv. hab. solum in Bundia (val Muranza, Wormserjoch).

22. *P. viscosa*: Alpes-Marit. (les Viosennes; alp. Tenda, Fenestre). Helv. hab. solum in Alpinis (et subalpin.).

**P. commutata*; Sty. hab. etiam in cacumine montis Rennfeld pr. Bruck (: Maly). Forse *P. villosa* (19) propior est.

24. *P. pedemontana*; Helv. non adest ex Gremli.

25. *P. calycina*; — ? *P. longobarda* Porta in Hut. catal. 1882. Lomb. or. inter Bagolino et val Camonica, Tyrol. conterm., 2000—2300 metr. s. m. Hybr. dicitur a *P. spectabili* (?) et *P. calycina*; ex Car. (fl. ital. VIII) forse est var. *P. Wulfenianæ* (26 *), cui simillima.

26. *P. spectabilis*; — ? *P. Parlatorii* (Porta exs.) Car. fl. ital. VIII, 641. Tyrol. mer. (alp. La Piramide Giudicar.).

27. *P. Clusiana*: Bavar. (Alpes or., r.). Transs. ex Smk. (*P. spectabilis* Schur).

× *P. intermedia*; *P. Floerkeana* Salzer (1851) non Schrad. *P. Portenschlagii* GBeck (1884).

28. *P. integrifolia*: Vorarlberg Tyrol. (: Schönach in Kern. exs. 1876). Helv. non nisi in summis Alpinis adest.

29. *P. Kitaibeliana*: Bosn. mer. mont. (GBeck); Transs. probab. ad *P. Clusianam* (27) pertinet.

31. *P. Allionii*; hab. in Alpinis. Marit. (S. Dalmazzo di Tenda etc.) nec in Pedem. p. d. (cfr. Car. it. VIII, 639).

32. *P. tyrolensis*; hab. etiam in Alpinis. Venet. (Car. l.c. 640).

**P. Venzoi*; *P. venzoides* Venzo rel. viagg. alp.

33. *P. minima*: Bavar. (Alpes or.). Tyrol. mer.-or.; in Helv. (ex Brügger) non adest, sed — *P. exscapa* Heg. Heer (vid. Killias untereng. 155).

34. *P. Floerkeana*; hab. etiam in Styria (: Maly et al.). Comment. 221.

**P. Fachinii* (*P. magliassonica* Porta ms.); sec. Car. (fl. ital. VIII) est var. *P. spectabilis* (26).

35. *P. glutinosa*: Helv. cant. Graub. (Parpaner Rothhorn; Engadin plur. loc.).

× *P. bosniaca* GBeck. = *suaveolens* + *vulgaris*. (Bosn.).

× *P. caulescens* Neir. = *vulgaris* + *officinalis*. (Aust.).

× *P. coronata* Porta = (?) *Fachinii* + *minima*. (Tyrol. mer.).

× *P. Escheri* Brügg. = *Auricula* + *integrifolia*. (Helv.).

× *P. Huguenini* Brügg. = *integrifolia* + *glutinosa*. (Helv.).

× *P. Plantæ* Brügg. = *hirsuta* + *daonensis*. (Helv.).

× *P. pseudo-acaulis* Porta ap. Car. = *vulgaris* + *officinalis*. (Tyrol. mer.).

× *P. Salisii* Brügg. = *viscosa* + *graveolens*. (Engadin).

× *P. Schmidelyi* Grml. = *suaveolens* + *vulgaris*. (Helv.).

× *P. Steinii* Obrist = *hirsuta* + *minima*. (Tyrol.).

× *P. Sturii* Sch. = *villosa* + *minima*. (Styria).

13. **Gregoria.** 1. *G. Vitaliana*: Alpes-Marit. (cacum. Abisso; alp. St-Etienne: Canut; Tenda: Reuter; mte Orno etc.). Androsace *Vitaliana* Ten. *Vitaliana primulæflora* Bert.

14. **Androsace.** 1. *A. maxima*: Alp. Marit. (: Burnat). Parma (: Reboul). Abruz. (ad mte Velino: Levier). Morav. Bulgar. Rumel. or.; Helv. hab. in sola Valesia (ex Gremli). Transs. incerte (ex Smk.).

2. *A. Chaixi*: Alp. Marit. (Ardoino, Moggridge et al.). Nomen antiquiss. dicitur *A. lactiflora* Pall. 1776 (vid. Loret in bull. soc. bot. 1880. 273—4); hæc tamen planta sibirica.

3. *A. septentrionalis*; Fenn. hab. non solum Carel., sed etiam in Aland., Tavast. etc.; Boruss. etiam in occ.; Poson.; Helv. etiam in Bundia (Engadin). Sabaud. (ad Combe-de-Villette). - Morav. deest ex Oborny, Transs. ex Smk.

**A. Friesii* Trautv. increm. (1883). - Nov.Seml. (*A. ciliata* ThFr. ex Trautv.).

4. *A. elongata*; hab. etiam in Ross. med. (gub. Kursk, Tambow). - Bavar. solum pr. Regensburg lecta est.

4. *a.* *A. filiformis* Retz. obs. fasc. II. 10. (1781). Ross. or. (gub. Kasan., Wiatka) et inde per mediam (Smolensk, Tula etc.) usque ad Ingriam (gub. Petrop.). Fenn. mer-or. (Carel. olonets.; Elfving 1875, Wainio 1889). Cfr. cl. Zinger dissertat. in commentat. mosquens. 1880 (cum tab.). Floræ europææ additamentum insigne!

5. *A. villosa*: prov. romana or. (mts Ernici: Baldini et Pelosi 1886). Transs. pertinet ad subspeciem:

**A. arachnoidea*; *A. villosa* auct. transs. *A. articulata* Schur (ex Smk.).

5. *a.* *A. triflora* Adams in mem. mosc. V. 89. - Ins. arct. Nov.-Seml. (Kjellm. Lundstr. 1875: var. *pilosa* Kjellm.).

6. *A. Chamæjasme*; - Comment. 222.

7. *A. obtusifolia*; hab. etiam in Galiz.

8. *A. lactea*: Helv. alp. Bern. (Stockhornkette). Bavar. (Alpes). Galiz.

9. *A. carnea*: Alpes-Marit. (in alpb. omnib. ex Ardoino). Helv. hab. etiam in cant. Vaud.

× *A. Escheri* Brugg. = *obtusifolia* + *Chamæjasme*. (Helv.).

15. **Aretia.** 4. *A. brevis*; hab. in summis Alpibus ticinensibus (Carnoghe, Garzirola), in proximo Legnone ad lac. Comens. (: Heer) et in Pizzo dei Tre Signori (: Ball). Andros. Charpentieri Heer gränz.

5. *A. alpina*: Bavar. (Schneibstein Alpium or.). Sabaud. (H.-Maurienne: Chabert ex Rouy). Pedem. et Lomb. etiam in montib. aliis lecta est (Car. ital. VIII). Helv. hab. solum in summis Alpibus. - *A. pedunculata* Clairv. (sub *Androsace*).

**A. brutia*; *A. Mathildæ* Car. (1889); sec. Caruel est species bene distincta et cum sola *A. Hausmanni* (seq.) comparanda; cfr. fl. ital. VIII. 658.

6. *A. Hausmanni*: Styria (m. Hochwölbling pr. Lietzen ad fines Austr.-Super.: Stur ex Maly). Carinth. rupes dolomiticæ montium Rudnikkofel et Hochstadel ad Pirkach, 2200—2500 metr. (: Jabornegg).

8. *A. argentea*: Pedem. (mte Viso etc.; Rocca del Mat pr. thermas Valderianas: Lacaita). Alpes-Marit. (cacum. Abisso, Ste-Anne-de-Vinai). *A. tomentosa* Bert. *A. imbricata* Car. — *A. multiflora* Vand.

9. *A. Wulfeniana*: Valsugana (Montalone: Kellner 1845). Andros. Pacheri Leyb. in Flora 1855 (cfr. Pacher gefässpf. Kärnth. II. 136).

10. *A. Heerii*; Helv. hab. etiam in cant. Graub. (Piz Minschun in Engadin: hb. Theobald. 1850 ex Killias).

11. *A. helvetica*; Helv. hab. solum in summis Alpibus; Carinth. vix adest (cfr. Pacher l. c. 137).

16. **Coris.** 2. *C. hispanica*: Balear. ins. Menorca (: Porta 1885).

LXXXVIII. GLOBULARIÆ.

1. *Globularia*. 3. *G. vulgaris*: Ceven. (Lozère, r.). - Gall. primum lecta est 1872 a soc. bot. gall. in m. Trancade-d'Amboulia pr. Prades dep. Pyr. or.; in dep. Basses-Alpes nuper legit cl. Rouy (cfr. bull. soc. bot. 1882. 350); in ins. Balear. non nisi Majorcæ lecta est. *G. Linnei* Rouy in bull. soc. bot. 1882. 350 (*), ubi cl. auctor observat nomen *G. suecicæ*, a me (1855) pro hac specie propositum, non admittendum esse.

4. *G. Willkommii*: Bulgar. (: Velenovsky). Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.); in Ital. meridiem versus progreditur usque ad montes pr. Gaëta et Itri, mte Casino et mte Matese; in Ital. mer-or. (T. d'Otranto) a cl. Groves lecta est. Comment. 223.

7. *G. tenella*; hæc species ex cl. ejus auctore proxime accedit ad *G. Willkommii* (4); cfr. Lge pugill. 167 et descr. icon. illustr.

8. *G. cordifolia*; in m. Cevenn. (Lozère, r.) adest ex Lmtte; Alpes-Marit. (reg. alp. et mont. in rupibus; descendit usque ad 800 metr. altit. in montibus omnibus supra Mentone et Nizza et à la Marbiere pr. Grasse: Ardoino). Bavar. extra Alpes plur. locis (München, Landshut etc.) adest. - Transs. ad *G. Willkommii* (4) pertinet ex Sink.

9. *G. nana*; Gall. mer. hab. etiam in montib. Corbariens.

**G. bellidifolia*; hab. etiam in mte Meta et mte Taburno, ad Castellamare et in ins. Capri; forse potius subjungenda est *G. cordifoliæ* (8), cujus ex cl. Caruel (Parl. fl. ital.) forma est vulgatio, inter illam vegetiorem (quæ rarior) et nanam (9) media.

11. *G. incanescens*; hæc species propria est Alpibus Apuanis et Apennino illis proximo; in mte Argentaro (Toscana) a Savi indicata erat, sed post eum ibi non lecta est ex Caruel (Parl. fl. ital.).

LXXXIX. PLUMBAGINÆ.

1. *Plumbago*. 1. *P. europæa*: Bulgar. in rupibus ad Trnova (: Velenovsky); in declivibus rupestrib. litoral. ad Kebedze: Bornmüller.

3. *Statice*. 6. *S. tomentella*; hab. etiam in Ross. mer-occ., mer.

7 * *S. serotina* Rehb. pl. crit. (1830). *S. angustifolia* Tsh. in syll. ratish. (1828). *S. Limonium* Host, Vis.

8. *S. rariflora*; *S. bahusiensis* Fr. mant. I. 10. 1832 (implicite in obs. sub *S. Limonio*); hæc est typus speciei et *S. rariflora* ejus var minor.

9. *S. Behen*; *S. scanica* Fr. l. c. (implicite in obs. sub *S. Limonio*); cfr. Neuman in bot. not. 1883 et Lge haandb. ed. IV. 539.

13. *S. densiflora*; in Ital. mer. nunc non indicatur; de planta balear. (Barcel.) cfr. *S. salsuginosa* (27). *S. Girardiana* Mor.

17. *S. Gougetiana*: Balear., r. (: Marès). Menorca (: Porta. Rigo 1885).

20 * *S. Legrandi*; detecta est ad Leucate 1863 et (nom. *S. narbonensis*) primum distincta a cl. Legrand; vid. Gautier et Timb.-Lagr. in arch. sc. phys. et naturel. toul. 1879. 1-3 sep. (cum ic.). Sec. Loret (fl. montp. ed. II. 401 et append.) hæc *S. Legrandi* ad *S. Dodartii* (15) pertinet; Janka (Plumbagin. europ. 1882) eam ad *S. confusam* (24) trahit.

22. *S. Sieberi*: Heldr. hb. norm. 973 (ex isthmo corinth.).

23. *S. rorida*; hab. etiam in Cephalon. (pr. Poros: Heldr.).

26 * *S. læta*; proxime accedit ad *S. densiflora* (13) et vix nisi hujus varietas (Car. fl. it. VIII. 577).

27. *S. salsuginosa*; *S. densiflora* Barcel. apunt. ex ipso (non Guss.).

30. *S. minutiflora*: Mallorca (pr. Palma: Barcelò; Soller: Bourg). Menorca (: Rodriguez); in Ital. mer. non exstat ex Car. (fl. ital. VIII. 1889). — *S. inarimensis*; ad *S. cosyrensem* (39) pertineat. — *S. rupicola* Rodr. (non Bad.).

**S. panormitana*; sec. Janka (plumb. eur.) et Caruel (fl. ital. VIII.) pertinet ad *S. psiocladam* (25); in Tod. ind. sem. hort. panorm. 1857 primum publicata est.

31. *a. S. catanensis* Tod. sic. exs. 379. - Sicil. (pr. Catania).

32. *S. dictyoclada*; — *S. dubia*: Tod. sic. exs. 1094.

36. *S. cordata*: Istr. mer. (pr. Medolina: Freyn 1877). - Alpes-Marit. freq. in rupibus maritimis a Mentone ad Cannes et in insulis Lérins (: Ardoine).

37. *S. cancellata*: Ital. mer.-or. (Otranto: HGroves; cfr. ej. flora di T. d'Otranto in gio. bot. ital. 1887. 184). - var. *japygica* HGroves l. c. (cum ic.); var. *notabilis*, a cl. HGroves in lapidosis maritimis ins. St-Andrea pr. Gallipoli detecta.

42. *S. latifolia*; hab. etiam in Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.).

44. *S. bellidifolia*; hab. etiam in ins. Balear. (: Barcelò, Rodrig.).

48. *S. echiodes*; hab. etiam in ins. Balear. (rarius); Ligur. (pr. Ventimiglia); Apul. (ad Manfredonia).

4. *Goniolimon*. 3. *G. tataricum*: Rumel. or. (: Velenovsky). — *G. rubellum* Nym. consp.; etiam gub. Cherson (: Lindemann).

**G. Bessarianum*; — *G. Beckerianum* Jka in ann. mus. nat. hung. 1882. 6 sep. (*). *Statice incana* Becker (non L.).

3. *a. G. Heldreichii* v. Halaeszy in act. soc. z.-b. vind. 1886. 241. - Thessal. in collibus apricis pr. Tyrnovo ad Hagios-Elias (: Heldreich 1885).

8. *G. Sartorii*: Helder. hb. norm. 875 (lect. in saxosis ad litora maris prope ergastria Laurii); hæc species a Sartori detecta est (1856).

5. *Acantholimon*. 1. *A. androsaceum*: Cephalon. ins. jon. (m. Aenos: Letourneux ex Helder.).

6. *Armeria*. 6. *A. fasciculata*; *A. pungens* Ces. Pass. Gib.; Arcang.

11. *a. A. berlengensis* Daveau in bolet. soc. bot. 1883. 24. cum ic. (*); Magn. fl. sel. exs. 950. 951 (var. *villosa*). - Lusit. ins. Berlenga (a Daveau detecta 1879).

15. *a. A. sancta* Jka in annal. mus. nat. hung. 1882. 2 sep. (*). Hab. in rupibus maritimis pr. coenobium Lavra ad pedem montis Athos (: Janka). *A. Orphanidis* (Boiss.) consp. 615 quoad plantam athoam.

18. *A. leucocephala*: Sard. (mte Limbaro: Reverchon 1882). — *A. Soleirolii* G.G. *Statice Soleirolii* Dub.

20. *A. rumelica*: Pindus tymph. (: Haussknecht 1885); hæc species ad *A. canescens* (24) pertinet ex GBeck (vid. annal. mus. vind. 1887. 127).

23. *A. denticulata*; nunc etiam aliis locis Hetr. lecta est (Livorno, Sassi neri etc.: Car. ital. VIII. 598).

24. *A. canescens*: Lucan. (in Appen. cacum. lapidosus: Janka 1874). Calabr. or. distr. Castrovillari (mte Cotorrocte: H.P.R. 1877); ex Janka in ann. mus. hung. 1882 (*).

25. *A. majellensis*: Hetr. (Appen. etc.). Umbr. (mte Vettore). Campan. (mte Vergine). Græc. bor. m. Pindus (: Hausskn. Helder. 1885); a specie præced. non satis distincta est ex GBeck (vid. annal. mus. vind. 1887. 127). *A. gracilis* Ces. Pass. Gib.; Arc. (*A. gracilis* Ten. est species mixta.).

26. *A. nebrodensis*; hab. etiam in Græc. bor. monte Pindo tymph. (: Hausskn. 1885).

32. *A. plantaginea*; Helv. hab. solum in val d'Evolena Vales. (ex Gremli). — *A. sabulosa*; Arvern. (Gall. centr.) plur. locis lecta est; sec. Lamotte ab *A. plantaginea* sat distincta.

**A. castellana* (Boiss. Reut. hb.) Leresche in Ler. Lev. deux exc. 188 (*). - Hisp. bor., ubi primum lecta a Boiss. Reut. 1858 pr. oppid. Cervera, dein a Leresche (1862) pr. Monastero, quod ab oppido dicto versus austrum situm est.

33. *A. cantabrica*: Gall. dep. Basses-Pyren. in mt Orisson pr. St-Jean-Pied-de-Port (: J.Richter); ex Rouy in Le Natural. 1887.

34. *A. vulgaris*: Ital. bor., med.; Fenn. etiam in Nyland. et Carel. mer.; Bulgar. (: Velenovsky). Ross. mer.-occ.; in Transs. "certe non spontanea" (Smk.) et etiam Helv. exclud. sec. Gremli.

**A. rhenana* Grml. - Helv. rhen. (ad Constanza in pratis paludosis et ripis); ab *A. purpurea* K. parum diversa ex ipso auct.

35. *A. pubescens*: Gall. bor.-occ.; Belg. incerta manet (in cl. Crepin noviss. floræ belg. edit. non memoratur). Germ. deest in litor. baltico.
37. *A. alpina*: Alpes-Marit.; Bosn. (var. *lanceifolia* Freyn).
38. *A. Langei*; species *Henriqueziana* ejusdem nominis diversa est (cfr. bolet. soc. broter.).
39. *A. splendens*: Hisp. centr. occ. (Sierra de Gredos: Levier).
41. *A. maritima*; hab. etiam in ins. Færøer (: Rostrup).
- **A. sibirica*: Island. (leg. Grönlund; cfr. Strömfelt l. c. 108). Ins. Færøer (: Rostrup). Ross. arct. ins. Waigatsch (in N.-Semi. non lecta ex Kjellman).
43. *A. filicaulis*: Gall. mer. (Magn. fl. sel. exs. 949).

XC. PLANTAGINEÆ.

1. *Plantago*. 1. *P. arenaria*: Gall. centr. (freq.). Bulgar.; in Thrac. (Rumel. or.) nunc etiam ab aliis (Skorpil, Velenovsky) lecta est. — *P. pumila* est certe hujus loci sec. Simonkai.
4. *P. Serraria*: Sard. pr. Sassari (ex Biondi). Cephalon. (: Heldr.). Corfu (: Spreitzenh.).
- 5 * *P. purpurascens* Willk. in linn. 1876 (non Nutt.). *P. majoricensis* Willk. ill. hisp. l. 4. - Hab. in saxosis aridis ad oppid. Soller (Mallorca), ubi a Willkomm detecta 1873.
7. *P. Coronopus*: Ins. Færøer, ubi rara sed jam a Lyngby lecta (ex Rostrup).
9. *P. maritima*: Island. Ins. Færøer (ubi vulgata et valde variabilis: Rostrup). Fenn. (cum Lapp.). Bosn. (Brandis ex Freyn).
10. *P. serpentina*; — *P. maritima* Gren. exs. 1850. *P. argillosa* Gren. (Besançon). — *P. graminea* Moritzi. (Helv. mer.).
13. *P. subulata*; pr. Otranto Japygiæ cl. HGroves legit formam a typica sat diversam: giorn. bot. ital. 1887. 186 (*).
14. *P. recurvata*: Gall. centr. (Puy-de-Dôme, Loire). Ital. mer.-or. (pr. Otranto: HGroves). Carinth. (vall. Canal., rr., "e Friulia adscensa": Pacher. Jaborn.). Transs., rarius (*P. Wulfeni* Bmg., Schur).
15. *P. alpina*: Bavar. (Alpes algov.). - Carinth. deest ex Pach. Jaborn.
18. *P. saxatilis*: Transs. (rarius). *P. montana* Ky in Rechb. ic. (1855).
19. *P. fuscescens*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., rarius). - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.
20. *P. montana*; hab. etiam in Galic. (m. Tatra: Lapeczynski). Bulgar. (m. Vitos: Velen.).
26. *P. lanceolata*; adest in Norv. bor., immo arct., ultra lat. 67° progrediens (: Norman). — *P. hungarica*; hæc var. in Hung. rara est et specimina plurima sic nominata ad typum speciei pertinent (ex Kerner). — *P. Timbali*; hab. etiam in Angl. mer. (Hampsh.). — *P. villosa* Portenschl. (*P. lanata* Host, *P. victorialis* Pett. dalm.) est species propria, in plagis mediterr. orientalibus obvia, ex Kerner. — *P. crassipes* Borb. (1878) ex Smk. — *P. glareosa* Kern. (Bosnia: Freyn). — *P. sphaerostachya* Kern. (Bosnia: Freyn).
- **P. altissima*; species Jacquin. cum illa Linn. identica est ex Kerner; hab. etiam Hung. (: Borbás), Istria (: Freyn).
27. *P. argentea*: Ins. Mallorca (Puig maj. de Torrella: Barcelò). Bosnia (: Freyn).
28. *P. lusitanica*; hab. etiam in Gall. mer. (pr. Narbonne: Gautier).
29. *P. lagopus*; hab. etiam in Croat. (Fiume: Tommasini).
34. *P. Weldenii*; de hac specie cfr. Freyn nachtr. fl. südistr. in act. soc. z.-b. vind. 1881. 385.
35. *P. Cornuti*: Litorale austr. (: Pichler in Kern. exs. a. 1885). Bulgar. (ad lacum Devno: Bornmüller). Ross. mer.-occ.
36. *P. maxima*; hab. etiam in Ross. mer.-occ.

36. *a.* *P. reniformis* GBeck in annal. mus. vind. (1887). II. 149. - Bosn. mer. (in alpinis montium Hranicava et Treskavica: GBeck 1885).
 37. *P. media*; hab. etiam in Bosnia (: GBeck).
 40. *P. major*; — *P. lutulenta* Lmtte. (Puy-de-Dôme Arvern.).
 41. *P. paludosa*; planta transsilv. (Barth.) ad speciem præced. pertinere dicitur.

Ex observ. cl. Kerner etiam *P. paludosa* vera non differt a *P. asiatica* L. (quæ forse = *P. major* var.), cui ulterius pertinent *P. limosa* Kit., *P. nana* Tratt., *P. intermedia* G.G.; ejus area geogr. valde extensa est.

2. **Litorella.** 1. *L. lacustris*; adest in Norv. arct. (ins. Lofoten) ibique paullo ultra lat. 68° speciei terminus polaris (ex Norman). Fenn. mer.-occ. Ins. Færøer (in lacubus ubique: Rostrup). Sard. (: Reverchon 1882).

XCII. AMARANTACEÆ.

1. **Alternanthera.** 1. *A. Achyrantha*: Ins. Menorca (pr. Mahon "inter silices vici S-Eulaliæ": Porta Rigo 1885).
 3. **Amarantus.** 1. *A. retroflexus*: Dan. (in ruderalis etc. hinc inde). Batav. (ex Abeleven 1876). Ross. med. (etiam balt.) et mer. gub. plura (ex Lindemann: in gub. Cherson "molestissima herba"); mer.-or. (Sarepta: Becker). — ? *A. divaricatus* Andr. (Ross. mer. gub. Cherson).
 3. *A. viridis*; hab. etiam in Bulgar. (: Velenovsky).
 4. **Euxolus.** 1. *E. deflexus*: Gall. bor.-occ. Helv. mer.-occ. (pr. Genève). Ross. mer. (pr. Odessa). *Amarantus prostratus* Bell. in Balb. misc. in mem. acad. taurin. VII. (1804); cfr. Kerner in oe. bot. z. 1875.
 2. *E. viridis*: Ross. balt. (rarius). — *E. commutatus* Kern. l. c. (sub *Amaranto*). *Amarantus prostratus* Sadl. (Hung. Transs.).
 5. **Polycnemum** 1. *P. arvense*: Sard. (ex Reverchon). Ross. centr. (gub. Kursk), mer., mer.-occ.
 2. *P. majus*: Bulgar. Ross. mer., mer.-occ.
 3. *P. verrucosum*: Bulgar. (: Velenovsky). - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

**P. Heuffelii*: Græc. bor. (Pindus Dolop.: Haussknecht 1885).

XCIII. PHYTOLACCEÆ.

1. **Phytolacca.** 1. *P. decandra* (Orph. fl. gr. exs. 1098); a Burdigala (Bordeaux) ab anno 1770 per totam Galliam meridionalem, mediantibus avibus, distributa dicitur.

XCIV. CHENOPODIACEÆ.

1. **Beta.** 1. *B. trigyna*: Rumel. or. (pr. Slivno ex Velen.). Ross. mer. (: Lindem., Schmalh.). - Transs. non nisi culta adest ex Smk.
 2. *B. maritima*; adest in convallibus quibusdam Mantuanis, ideo locis a mari remotis sed solo salso præditis (: Paglia); ab hac specie *B. vulgaris* (vid. obs. sub specie) culturâ orta videtur.
 2. *a.* *B. atriplicifolia* Rouy in rev. sc. nat. 1883. 82 sep. (*). Hisp. mer. (Porto-Velez), in calcareis altit. ultra 700 metr.
 3. *B. macrocarpa*: Attica (ad Laurion: Haussknecht 1885).
 5. *B. Bourgæi*: Attica (ad Phalerum: Haussknecht 1885).
 2. **Blitum.** 1. *B. capitatum*: Hung. Ross. mer.

2. *B. virgatum*: Rumel. or. - Germ. non nisi efferatum est et (hinc inde) inquilina ex Geke. - Transs. non nisi cultum adest ex Smk.

3. *Chenopodium*. 1. *Ch. rubrum*: Fenn. med. Bulgar. (: Velenovsky).

2. *Ch. Bonus Henricus*: Fenn. (mer.-occ.) in sola ins. Åland. vere indigenum dicitur (in Nyland. et Abœ adest casu). Bulgar. (: Velenovsky, Skorpil).

3. *Ch. hybridum*: Fenn. mer.-occ. (Abœ: Brander 1862).

4. *Ch. urbicum*: Cephalon. ins. jon. (: Heldreich). Thessal. (pr. Volo: Heldreich 1882).

5. *Ch. murale*: hab. etiam in Ross. balt. (: Klinge).

6. *Ch. opulifolium*: Bulgar. or. (: Bornmüller). Ross. mer. (Bessarab.; Cherson: Lindem.).

8. *Ch. ficifolium*: Bulgar. (: Velenovsky). Galiz. (rr.). - Transs. ad *Ch. opulifolium* (6) pertinet ex Smk;

9. *Ch. glaucum*: hab. etiam in Fenn. occ. (Ostrob. mer.).

**Ch. Wolffii* Smk. term. füzet. 1879. - Transs. oppid. Torda, ubi "clarissimus et scientiæ amabilis bene peritus pharmacop. Gabr. Wolff" hanc plantam detexit.

13. *Ch. Botrys*: Morav. mer. Galiz. Bucov. Bulgar.; subsponte etiam in Ross. balt. (: Bienert 1869).

7. *Kochia*. 1. *K. scoparia*: Bulgar. Ross. centr. (gub. Kursk).

2. *K. prostrata*: Morav. loc. complur. (ex Oborny). Bulgar. - *Chenopodium augustanum* All. (in hb. eur. adest e muris Augustæ Prætoriae).

3. *K. arenaria* Roth ap. Schrad. (1801); hab. etiam in Bulgar. (: Velenovsky). - *Chenopodium arenarium* fl. wett. (1799). *Salsola arenaria* W.K. (1802).

4. *K. saxicola*: species rarissima; Gussone specimen unicum in rupibus insulæ Ischia detexit et etiam Lacaita unicum tale in rupibus verticalibus insulæ Capri legit (1877); Pasquale eodem loco 1878.

7. *K. sedoides*: ex Smk. locus Transs. ad *K. scopariam* (1) pertinet (?).

8. *K. hirsuta*: Dobrud. hab. etiam alibi in salsis reg. litoral, copiosiss. in insulis lacûs Sinœ (: Uechtr.Sint.); in Roman. p. d. vix adest.

9. *Corispermum*. 2. *C. hyssopifolium*: pr. Darmstadt Hassiæ satum, nunc (ab 1850) ibi copiose inquilinum dicitur; etiam Berolini introductum sed rarum (ex Geke). - Hung. ad *C. Marschallii* (5) pertinet ex Smk.

3. *C. intermedium*: Boruss. adest a Danzig (Boruss. occ.) usque ad Memel.

5. *C. Marschallii*; hanc speciem pr. Schwetzingen (ubi introducta erat) jam diu frustra quærunt; sic etiam pr. Danzig Boruss. occ.

6. *C. canescens*: Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

6. a. *C. filifolium* CAMEy. ap. Becker in bull. mosc. 1854. Ross. mer.-or. pr. Sarepta in ripis et insulis flum. Wolga (: Becker).

10. *Obione*. 5. *O. portulacoides*: hab. etiam in Thessal. (pr. Volo: Heldr. 1882).

6. *O. pedunculata*: Gall. (Magn. fl. sel. exs. 123) hab. ad Valéry-sur-Somme. Dunkerque et locis duobus interjectis scil. Calais et Treport; etiam in Germ. hæc species loca natalia habet pauca: Greifswald (Pomeran.). Halle et Naumburg (Thuring.), Magdeburg; in Ross. balt. sporadice crescit (: Klinge).

11. *Atriplex*. 2. *A. Halimus*: Ital. mer.-or. (pr. Taranto: HGroves, Lacaita).

5. *A. litoralis*: Angl. (: Arth. Bennett). Sard. Galiz. (in salsis Solec: Knapp). Ross. mer.-occ.

6. *A. patula*: typica deest (nisi sporadica) etiam in Fenn. bor., sed ibi (immo Lapp.) adest var. *halophila* Sæl.

7. *A. tatarica*: Dan. Siles. (rr.). Germ. (occ.) hab. in valle fluvior. Rhen et Nahe (infer.), passim copiosissime (ex Geke). Comment. 224.

7. *a. A. crassifolia* CAMEy. in Led. fl. alt. IV. 309. - Ross. mer-or. (Sarepta, in salsis: Becker 1858).

8. *A. calotheca*; in Germ. (ex Geke) rara est: Pomeran., Rugia, Boruss. **A. stipitata*; ex Lange probab. hybrida est ab *A. calotheca* (8) et *A. patula* (6). — *A. longipes* est monstr. speciei sequentis sec. Ascherson; flores tales longestipitati etiam in aliis speciebus occurrunt (cfr. Lge nomencl. fl. dan. 142).

9. *A. hastata* (*A. Smithii* Syme); Fenn. adest solum in occ. et mer. — *A. elongata* probab. saltem subspeciem sistit.

11. *A. prostrata*; in Island. vix adest (etiam Grönlund et Strömfelt de ea silent); ab *A. hastata* (9) forse non satis distincta est.

12. *A. Babingtonii*; Island. adest sed raro et probab. introducta. Dan. pluribus locis (ex Lge). Ins. Færøer (var. *virescens* Lge); Germ. bor. (ex Geke) in ins. Rügen et Usedom; aderat etiam ad Warnemünde (Mecklenb.), sed ibi nunc destructa dicitur.

13. *A. laciniata*: Galiz. Bulgar. litor. (: Bornmüller).

14. *A. arenaria*; *A. crassifolia* auct. gall. (præcip. quoad plantam oræ atlant.). *A. maritima* Hallier.

**A. Tornabeni*; *A. crassifolia* G.G. quoad plantam mediter. (ex Aschn).

15. *A. rosea*: Balear. Siles. Galiz. Bulgar. (in ruderalis circa urbem Sofia vulgaris: Velen.).

14. *Ceratocarpus*. 1. *C. arenarius*: Ross. centr. (gub. Kursk).

15. *Halocnemum*. 1. *a. H. cruciatum* Tod. adn. ad ind. sem. hort. panorm. 1872. *Salicornia cruciata* Forsk. - Sicil. (fres. Trapani: Tineo). Sard. (pr. Cagliari).

1. *b. H. caspicum* BB. t. c. III. 3. - Taur. or. (: Rehmann).

16. *Arthrocnemum*. 1. *A. macrostachyum*: Ital. mer-or. (T. d'Otranto: HGroves).

16. *a. Microcnemum* Ung.-Sternb. in act. congr. bot. in Firenze 1876.

1. *M. fastigiatum* Ung.-Sternb. l. c. 280. *Arthrocnemum coralloides* Losc. Pard. ser. inconf. (1863) 90. - Arag. mer. (ubi a Loscos detecta circ. a. 1850); hab. "in solo argilloso-arenoso salsuginoso aridissimo regionis calidæ" (pro historia plantæ pleniori vid. Willk. illustr. hisp.).

17. *Salicornia*. 1. *S. fruticosa*: Balear. Thessal. (pr. Volo in litor. mar.: Heldr. 1882). Ins. Jon. (Cephalon.: Heldr., Corfu: Spreitzenh.). Croat. (Fiume: A-M.Smith).

2. *S. radicans*; — *S. lignosa* Woods.

3. *S. herbacea*: Fenn. mer-occ. (et Ostrobothn.). Lapp.-Imandr. Galiz. (r.). Bulgar. (in marit. ad Varna etc.). — *S. procumbens*; - *S. intermedia* Woods 1851 (Angl.). - *S. ramosissima* Woods. (Angl.).

18. *Kalidium*. 1. *a. K. arabicum* Moq. in DC. pr. XIII. 2. 147. *K. caspicum* Ung.-Sternb. *Salicornia arabica* L. (?). — Ross. mer-or.

19. *Halopeplis*. 1. *H. amplexicaulis*: Sard. (ex Reverchon); locus tarentinus est in palude salsa, dicta Salina grande di S-Bruno, ubi in medio, locis inundatis vel arenosis, prata glauca constituit (: HGroves, observans plantam siculam alterâ multo robustiorem esse).

20. *Suæda*. 8. *S. maritima*: Fenn. mer-occ. (Åland.: AArrhenius 1879).

23. *Salsola*. 9. *S. Soda*: Thessal. in litore mar. ad Volo (: Heldr. 1882). Croat. (Fiume: A-M.Smith). — *S. mutica* CAMEy. ap. Becker in bull. mosc. 1854. (Sarepta Ross. mer-or.).

10. *S. Kali*: Bulgar. in asperis supra Konjavo et ad Lom Palanka (: Velenovsky). - Fenn. non in mer-occ., sed in mer-or. (Carel. mer. et Isthm. carel.) et mer. (Nyland) indicatur.

11. *S. collina*; hab. etiam in Ross. mer. (gub. Cherson).
 27. *Noëa*. 1. *N. spinosissima*; Heldr. hb. norm. 976 (ex Attica).

XCV. POLYGONACEÆ.

3. **Emex**. 1. *E. spinosa*; hab. etiam in ins. Balear.
 4. **Rumex**. 1. *R. Hydrolapathum*; Fenn. mer. Bulgar. or. (ad lacum Devno: Bornmüller).
 2. *R. maximus*: Angl. mer. (Hampsh.). - Helv. non adest ex Gremli.
 3. *R. aquaticus*: Fenn. tota (cum Lapp.). Lothar. (pr. Forbach: Sz). Bulgar. in humidis alpinis m. Balkan pr. Petrov Han (: Velen.); in Helv. rarus est (Neuenb., Soluth., Zürich etc.). - Transs. ad R. Patientia (5) pertinet ex Smk., Angl. et Scot. (ex Beeby) ad speciem sequentem.
 **R. platyphyllus*; nunc ex ipso auct. hybr. est a *R. aquatice* et *R. obtusifolio* (vid. ap. Jungner in bot. not. 1885). *R. Schmidtii* Hsck.
 4. *R. domesticus*: Ins. Færøer (: Rostrup). Shetland. (ubi species freqq. ex Beeby: *R. aquaticus* Edmonst.). Scot. Angl. bor. Batav. (pr. Vlieland: van d. Sande Lacoste 1882). Saxon. (pr. Chemnitz ex Geke). Ross. mer.; arct. (Nov.-Seml.: var. *nana* Hook.). - Transs. ad *R. crispum* (7) pertinet ex Smk.
 **R. propinquus*: Dania (: Lange). Norv. mer. (Murbeck 1884).
 5. *R. Patientia*; etiam Hung. et Austr.-Infer. (ubi terminus occid. speciei) vere spontaneus ex Kerner; in Pindi dolop. (Græc. bor.) subalpinis: Hausskn.; in rupibus Ehrenbreitstein. pr. Coblenz et ad Mutzig Alsatiæ quasi spontaneus ex Geke; Thuring. in declivibus dumetosis supra Seehausen (: Haussknecht).
 7. *R. crispus*: Fenn. mer. tota. Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.). — *R. microcarpus* Bryhn. (Norv. mer.). — *R. biformis* Menyh. kalocs. növ. 1877; Borb. ap. Kern. 1883. *R. crispus* var. *dentatus* Schur. (Transs. Hung. Banat.). Comment. 225.
 7. *a. R. arcticus* Trautv. in Middenb. it. I. 2. 8. - Ross. arct. ins. Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875).
 8. *R. conspersus*; hab. etiam in ins. Shetland. (ubi satis obvia: Beeby 1887).
 9. *R. alpinus*: Bulgar. in pratis humidis alpinis m. Balkan etc. (: Velenovsky). Græc. bor. m. Pindus (: Haussknecht 1885).
 10. *R. acutus*: Gall. bor.-occ. Belg. (hinc inde: Crepin). Thessal. (: Haussknecht 1885).
 Obs. *R. nepalensis* Spr. (syst. II. 159) a cl. Haussknecht in Græc. bor. m. Pindo agraph. supra coenobium Korona, prope ruinas castelli turcici, lectus est (1885); probab. a militibus turcicis introductus.
 11. *R. obtusifolius*: Ins. Færøer (non rarus: Rostrup). Bulgar. (ex Velen.). Thessal. (: Hausskn.).
 12. *R. silvestris*: Gall. bor.-occ. (dep. Manche, r.). Bosn. (Brandis ex Freyn).
 13. *R. sanguineus*: Rumel. or. (ex Velen.). Græc. bor. (Pindus dolop.: Hausskn.).
 14. *R. conglomeratus*: Ins. Jon. (Cephalon.: Heldr., Corfù: Spreitzenh.).
 15. *R. rupestris*; Angl. (pr. Exeter) jam 1839 a Balfour lectus est; in ins. Scilly a Beeby 1873 (sec. Trimen).
 16. *R. stenophyllus*; hab. in Ross. mer., mer.-occ.; planta Beckeri est *R. biformis* (7—) ex Borbás, et forse etiam illa Oborny (ad Brünn Morav.) ad eundem pertinet (si non species vera rossica l. c. introducta sit).
 17. *R. pulcher*; hab. etiam in Bulgar. (: Velenovsky).
 19. *R. palustris* (1800). *R. limosus* Thuill. (1799): Siles. (r.). Bulgar. litoral. (: Bornmüller). - Helv. incola incerta videtur (ad Rheinfelden, Bregenz indicatur).

20. *R. maritimus*: Bulgar. pr. urbem Sofia (ex Velenovsky). Fenn. mer.-or. (Carel. oneg.; in Carel. ladog. detectus a Backman 1859).

21. *R. ucranicus*; in Boruss. occ. (nec or.) lectus est ad ripam Vistulæ (fluv. Weichsel) inter Thorn et Danzig, hinc inde copiose.

25. *R. arifolius* (*R. montanus* Dsf. cat.): Sard. (cl. Binna ex Caruel). Græc. bor. (Pindus tymph.: Haussknecht). - Bavar. hab. (extra Alpes) etiam in jugo mont. Bayr.-Wald.

26. *R. nivalis*; in m. Jurasso (Jura) non lectus est.

27. *R. Acetosa*; hab. etiam in insulis arcticis Nov.-Semlia (ex Trautv. 1880) et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875). — *R. vinealis*; Magn. fl. sel. exs. 125; cfr. scrin. I. 36. — *R. haplorhizus* Czern. (Ross. centr., mer.).

**R. papillaris*; hab. etiam in Pyren. or. (: Timb.-Lagrange, Debeaux).

28. *R. intermedius*; hab. etiam in insulis Balear.

**R. triangularis*; in Græc. bor. m. Pindo dolop. a Haussknecht lectus est.

29. *R. thyrsoides*: Ins. Mallorca (Serra de Soller, couma Negra de Soller: Marès). Japygia (T. d'Otranto: HGroves).

30. *R. tuberosus*: T. d'Otranto (pr. Leucaspide: HGroves). Atticæ hab. etiam in m. Hymetto (: Lacaita).

34. *R. multifidus*: Bosnia (GBeck 1885). — *R. acetoselloides*; hab. etiam in Græc. bor. m. Pindo (: Heldreich 1885).

36. *R. graminifolius*; hab. etiam in Ross. bor.-or.

× *R. abortivus* Ruhmer = conglomeratus + obtusifolius. (Angl. Germ. etc.).

× *R. armoraciæfolius* Neum. = aquaticus + domesticus. (Suec. bor.).

× *R. bihariensis* Simk. = crispus + silvestris. (Transs. Hung.).

× *R. confusus* Simk. = crispus + Patientia. (Hung. Transs.).

× *R. dimidiatus* Hsskt. = crispus + græcus. (Thessal.).

× *R. erubescens* Simk. = Patientia + silvestris. (Hung. Transs.).

× *R. heteranthos* Borb. = crispus + palustris. (Hung.).

× *R. Mureti* Hsskt. = conglomeratus + pulcher. (Græc.).

× *R. palustroides* Simk. = maritimus + stenophyllus. (Hung.).

× *R. pseudopulcher* Hsskt. = crispus + pulcher. (Thessal.).

× *R. Sagorskii* Hsskt. = crispus + sanguineus. (Germ. Suec.).

× *R. semigræcus* Hsskt. = conglomeratus + græcus. (Thessal.).

× *R. stenophylloides* Simk. = maritimus + biformis. (Hung. Transs.).

5. *Oxyria*. 1. *O. digyna*; hab. etiam in Beeren-Eiland et Jan-Mayen (ideoque in omnibus insulis arcticis). Ins. Færøer.

6. *Polygonum*. 1. *P. dumetorum*: Istr. Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.).

3. *P. alpinum*: Alpes-Marit. (rarius). Bosn. (Brandis ex Freyn). Bulgar. (in cacum. m. Vitos et sub cacum. m. Kom: Velen.). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.); etiam in centr. gub. Kursk, in prato quodam humidiusculo, specimina nonnulla ab Augustinovicz (1861) lecta dicuntur. - Orph. fl. gr. exs. 1023 (e Maced. m. Peristeri).

5. *P. Bistorta*: Bulgar. in m. Vitos et in pratis alpinis m. Balkan circa Petrov Han. - Lapp. or. (ponoj.).

6. *P. viviparum*: Cantabr. (Picos-de-Europa: Ler. Lev.). Ins. Færøer. Ins. Jan-Mayen (: Dr Fischer exp. austriac. 1883). Samojed. Nov.-Seml. et Waigatsch; Beeren-Eiland. Galiz. (alp., subalp.). Bulgar. (m. Vitos, in alpinis: Velen.).

7. *P. amphibium*; Fenn. Dan.; Ins. Færøer.

8. *P. lapathifolium*; — *P. danubiale* Kern.; hab. etiam Morav., Siles. (cfr. Uechtr. durchf. Schles. 1877).

11. *P. serrulatum*: Japyg. (T. d'Otranto: HGroves, Lacaita). Ins. Jon. (Cephalon.: JSchmidt). - Lusit. ad Setuval a Forssell! (1846) lectum est.

12. *P. Hydropiper*; ad hanc speciem (ex specim. authent.) potius referes. *P. hybridum* Chaub. (in consp. sub seq. citatum): "spica, flos et semen *P. Hydropiperis*, foliorum textura et sapiditas *P. Persicariæ*" (Chaub. in sched.).

13. *P. mite*: Fenn. med. et bor.-occ. (Ostrob.). Bulgar. litoral. (: Born-müller). Rumel. or. (ex Velenovsky).

18. *P. maritimum*; in Anglia (mer.) rarum est: Christchurch Hampsh. (Borrer 1836). Bognor Sussex (: Balfour), Hugh Town Scilly (Woods 1852).

21. *P. Bellardi* (Heldr. hb. norm. 877): Croat. (pr. Fiume: A-M.Smith). Bulgar. - Transs. ad subspeciem primam pertinet.

**P. patulum* MB. fl. t.-c. (1808). *P. arenarium* et *P. Bellardi* auct. transsily. *P. virgatum* Schur (in Consp. sub 23 allatum).

**P. gracile* Guss.; hab. etiam in Thessal. (: Haussknecht).

22. *P. pulchellum*; hab. etiam in Bulgar. (pr. Kistendyl leg. Velenovsky).

23. *P. arenarium*: Bulgar. (: Velenovsky). Rumel. - Transs. ad *P. patulum* (21 *) pertinet.

24. *P. aviculare*; — *P. polycnemiforme* Lec. Lmtt.

26. *P. litorale* (*P. Roberti* G.G. p. p.); Dan. raro lecta est, sed probab. plurib. locis ibi aderit (: Lange) - Heldr. hb. norm. 879. a (— vegetum), 879. b (— macrum), utrumque ex Athenis.

29. *P. herniarioides*; ex l. b. Ferd. v. Müller (litt. 1888) hæc species eadem est ac novo-hollandica *P. plebejum* Br. prodr. 420. (1810), quod nomen igitur prioritate gaudet.

39. *P. oxyspermum*: Ross. mer.-occ. (Bessarab.) ex Lindem.

31. *P. salsugineum*: Ross. mer. (Odessa: Lindem.).

× *P. bicolor* Borb. = tomentosum + *mite*. (Hang.).

× *P. Braunianum* FSz. = minus + *Persicaria*. (Phalzia).

× *P. hydropiperiserrulatum* Nicotr. = *Hydropiper* + *serrulatum*. (Sicil.).

× *P. pseudopulchellum* Hsckt. = *aviculare* + *pulchellum*. (Thessal.).

× *P. serrulatonodosum* Nicotr. = *serrulatum* + *nodosum*. (Sicil.).

Obs. *P. Fagopyrum*; in Ross. med. (gub. Kursk, Tula) quasi spontaneum occurrit, quale etiam Siles. (etc.) obvium.

7. *Koenigia*. 1. *K. islandica*: Ins. Færöer (Feilberg et Rostrup 1867). Ins. Jan-Mayen (Dr Fischer expedit. austriac. 1883). Beeren-Eiland. Nov.-Semi. (: Kjellm. Lundstr. 1875).

XCVI. THYMELEÆ.

1. *Daphne*. 1. *D. Laureola*: Scot. ad Seggieder (Perth) in rupibus fere inaccessibilibus reperta a Dr Hay (1872). Belg. pr. Sclayn (prov. Namur) certe indig. (: Simon 1884), sed alibi vix. Sard. (ex Reverchon); indicatur etiam *Badie* pr. Kandern (rr.), et in ins. Möen (Dan.), in promontor. Möens Klint dicto, copiose inquilina est ex Lange.

**D. Philippi*: Hisp. bor. (mts Picos-de-Europa: Ler. Lev.).

3. *D. Mezereum*: Fenn. med. et bor. Bulgar. (: Velen.).

6. *D. Blagayana*: Transs. (D. alpina Bmg. p. p. D. Lerchenfeldiana Schur?). Hæc species detecta est a Dom. Blagay (1837) pr. Labacum (Laibach), ubi in parte septentr. montis S-Laurentii, solo calcareo, 500—800 metr. s. m., habitat.

11. *D. Cneorum*: Lothar. Bavar. - Helv. (ex Gremli) hab. in Jurasso (Jura) et mte Salvatore (cant. Ticino); indicatur etiam ad Schwengelsbrunnen in silva Francofurtensi (Gcke).

12. *D. striata*; Helv. hab. solum in Alpibus (orientalibus).

14. a. *D. vellæoides* Rodr. (litt. 1865 et) in bull. soc. bot. 1869. D. Rodriguezii Texid. apunt. 64. (1868). - Balear. ins. Minorea, in collibus dumosis pr. Puerto de Adaya et in ins. parva Colam (juxta oram Minoræ septentrionalem sita), ubi abundat.

2. *Passerina*. 1. *P. hirsuta*; hab. etiam in ins. Balear.

3. *Thymelæa*. 1. *Th. Tartonraira*: Cephalon. (ad rupes Charakas: Heldr.).

5. *Th. velutina*; — *Th. Rodriguezii*; ex observ. cl. Willkomm (ill. hisp. I. 2) est vera *Daphne* (a *D. myrtifolia* valde diversa), sed habitu subthymelæoideo a speciebus reliquis recedens et ad calcem generis dicti, in sectione propria, recensenda (vid. supra sub 14. *a. Daphne vellæoides*).

9. *Th. virgata*; — *Th. pubescens*; sec. Rouy est varietas (aragonensis) *Th. thesioidis* (11).

12. *Th. elliptica*; de hac et præced. *Th. thesioidi* cfr. ap. Rouy in Magn. scriñ. (IV) 86.

13. *a. Th. Ruizii* Losc. in litt. ad Casaviella; cfr. Losc. ap. Casav. in restaurador farmaceut. XXVII et in catal. navar. 65. (1880). - Navar. (ubi detecta a Ruiz Casaviella 1878). Cantabr. (Leresche, Levier 1879); reg. mont.-alp. *Th. ciliata* Casav. (non L.).

4. *Lygia*. 1. *L. Passerina*; in Belg. (ex Crepin) solum pr. Orval, ad fines gallicos, lecta est (et vix planta belgica habenda). Germ. bor.-or. hab. solum pr. Thorn (et pr. Freienwalde Marchiæ: Loew 1876). Bulgar.

XCVII. LAURINEÆ.

1. *Laurus*. 1. *L. nobilis*; Gall. mer.-or. in convalle calida balneorum Aix-les-Bains sub dio vegetat (St-Innocent); in Vales. (ad Gaudria etc.) omnino inquilina facta est (Jäggi et Schröter 1881).

XCVIII. SANTALACEÆ.

2. *Comandra*. 1. *C. elegans*: Transs. (Hagymás: Czetz ex Smk.).

3. *Thesium*. 1. *T. montanum*: Alpes-Marit. (reg. mont., r.). Styria (: Maly). Carinth. Bulgar. (: Velen.). - Galic. (rr.), sed non in Siles. et Morav. (*T. montanum* Wimm. est seq. *T. intermedium* ex Fiek et Oborny).

2. *T. intermedium*: Lothar. et Germ. bor.-occ. rr. est (in Hassia et Westphal. deesse dicitur). Bosn. (: Conrath, Brandis). Ross. centr. (gub. Kursk). *T. transsilvanicum* Schur (ex Smk.).

3. *T. diffusum* (*T. humile* auct. transs. exc. Schur.); hab. etiam in Bulgar. (: Velen.).

4. *T. divaricatum*: Gall. or. (Côte d'Or: Royer). Carinth. (r.: Wulfen, Pacher). Bulgar. (: Velen.). Græc. bor. m. Pindus (: Hausskn. Heldr. 1885).

4. *a. T. Kernerianum* Simk. term. füzet. 1886; Simonk. enum. 478. - Transs. in saxosis præruptis alpium Bucsecs et Királykö.

5. *T. humifusum*; in Helv. non adest ex Gremli; Transs. ad *T. intermedium* (2) pertinet.

7. *T. ramosum*: Morav. Bulgar. (: Velen.). Herceg. (: Brandis 1887). Ross. centr. (gub. Kursk); in Sard. a Reverchon indicatur.

10. *T. pratense*: Germ. septentrionem versus usque in Hercyn. (Osterode, Blankenburg etc.) progreditur. Transs. probab. ad *T. diffusum* (3) pertinet. — *T. refractum* Brügg. (Helv.).

11. *T. alpinum*: Polon. (inter Kazimierz et Janowiec). Ross. gub. Pskow, circul. Opotschka (ex Batalin). Bulgar. (: Velen.); in Germ. bor. plur. deest.

**T. tenuifolium*; hab. etiam in Helv. (raro) et ad Kufstein (: Borbás 1877). - Transs. ad speciem primar. (*T. alpinum*) pertinet ex Smk.

13. *T. humile*: Japyg. (*T. d'Otranto*: Lacaita, HGroves); prov. romana or. (mts Ernici: Baldini et Pelosi 1886). Bulgar. (: Velen.).

14. *T. ebracteatum*; Bohem. adest! (ad Sadska: Velen. 1883); Siles. (r.). Transs. a Simonk. cruciatur.

15. *T. rostratum*: Bohem. (pr. Prestic: Celak.). Carinth.

XCIX. ELÆAGNEÆ.

1. *Elæagnus*. 1. *E. angustifolia*; dicitur efferata etiam in aliis terris, immo Boruss.

Obs. *E. orientalis* L. exstat ad Phalerum Atticæ (:Heldreich 1879), sed forse introducta.

2. *Hippophaë*. 1. *H. rhamnoides*; Suec. hab. (lit. mar.) in Vestrobothn. et a Medelpad. usque in Upland. (Roslag.); Fenn. (occ.) etiam Aboæ et in Satakunda; indicatur etiam in Curland. (Ross. balt.). Germ. bor. hab. in litore baltico inter Holsatiam et Borussiam; mer. (Badia, Bavar.) ad ripas et in glareis fluviorum, ex Alpibus devecta. Bulgar.

CII. ARISTOLOCHIEÆ.

1. *Asarum*. 1. *A. europæum*: Jutland. (r.); etiam in Scania olim indigena erat, sed nunc in Suec. (mer., med.) non nisi inquil. adest. Bulgar. et Rumel. or. (Aitos-Balkan) ex Velen.

2. *Aristolochia*. 2. *A. altissima*: T. d'Otranto (pr. Gallipoli: HGroves).

7. *A. Clematidis* (Orph. fl. gr. exs. 1012): Bulgar. (ex Velen.). Thessal. (:Haussknecht). Ross. med. (gub. Kursk, Tambow); balt. (ex Klinge). - Belg. non nisi inquilina adest ex Crepin.

8. *A. longa*: Alpes-Marit. (Nizza; supra Mentone: Hawker ex Ardoino).

9. *A. pallida*: Styr. (pr. Cilli: Tüffer). - Helv. non adest ex Gremli.

10. *A. rotunda*: Bosn. (:Brandis 1885). - Helv. hab. solum pr. Lugano (cant. Ticino).

CIII. EMPETREÆ.

1. *Empetrum*. 1. *E. nigrum*: Ins. Færöer (freq.). - Belg. hab. solum in Ardennis (rarius). Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

CIV. EUPHORBIACEÆ.

1. *Buxus*. 1. *B. sempervirens*; Angl. pr. Eddlesboro, Dunstable (Buckinghamsh.) colles et clivos calcareos copiose tegit et fruticeta densa constituit, sed olim plantata (:Pryor). Ins. Euboea (loco inde Pyxaria nominato: Heldreich). Thessal. adest etiam in m. Pelion (:Heldr.); ad pedem Olympi sæpe arborescit.

6. *Mercurialis*. 1. *M. tomentosa*; — *M. Bichei* Magn. scrin. (VI). 118; fl. sel. exs. 1529. *M. tomentoso-annua* Biche (in litt.). - Pezenas, dep. Herault, inter species dictas.

2. *a. M. Reverchoni* Rouy in Le Natural. 1887. 199. - Hisp. mer. in rupibus montis Sierra de Palma pr. Algeciras (:Reverchon 1887).

4. *M. perennis*: Batav. (Limburg.) ex Abeleven 1876.

5. *M. ovata*: Morav. Galic. or. (r.: Schauer ex Knapp). Bulgar. Rumel. — *M. livida* Portenschl. ap. Bmg. (1816).

6 * *M. Hueti*; hab. etiam in Pyren. or.

7. *Euphorbia*. 1. *E. dendroides*: Alpes-Marit. (inter Mentone et Nizza in aridis rupium freq.: Ardoino).

4. *E. spinosa*: Bosn., Crno vrelu pr. Grabovica, in rupibus (:Blau ex GBeck). Græc. bor. (Pindus tymp.: Haussknecht 1885).

6. *E. palustris*: Fenn. mer.-or. (Carel. mer., Isthm. carel.).

10. *E. Canuti*; loca Alpium Marit. ab Ardoino ulterius citata sunt: silva Farghet, Berre, Villars du Var, silva Gourdon.

11. *E. fragifera*; hab. etiam in Styria (rarius). Huic nomen *E. epithymoides* L. (1762) restituendum est ex Kerner (cfr. oe. bot. z. 1875 et sched. ad exs. a. 1881).

14. *E. epithymoides*: Polon. (pr. Zabkovicæ ad limites silesiac.: Schneider 1879). Carinth. (Satnitz, Villach). Bulgar. (: Velen., Skorpil). *E. polychroma* Kern. (1875), restituito nomine *E. epithymoides* pro *E. fragifera* (11); cfr. supra.

**E. lingulata*: Bosn. mer. (Romanja Planina: GBeck 1885).

15. *E. oblongata*; Thessal. hab. etiam in m. Pelion (: Heldreich 1882).

16. *E. dulcis*: Angl. (Essex etc.; introd.). Marchia (Potsdam, Treuenbrietzen etc.). Boruss. occ. (pr. Thorn). Bulgar. Transs. ad speciem seq. (*E. angulata*) pertinet. Comment. 226.

**E. incompta* Ces. in linn. 1839. *E. alpigena* Kern. ex ipso (in 'Consp. ut varr. speciei primar. allatæ sunt). Tyrol. Helv.

17. *E. angulata*: Galic. Styria (: Maly). Carinth.

**E. Deseglisei*; etiam in depp. Côte-d'Or et Oise (r.) lecta est a cl. Rouy; ex eodem (vid. Le Natural. 1887) est propior *E. dulci* (16) et hujus subspeciei.

18. *E. carniolica*: Helv. cant. Graubünd. (pr. Vulpèra in Engadin: Kilias). Carinth. (Wischberg, Predil). Galiz. — *E. ambigua* W.K. (1805) est synonym. *E. carniolicæ* Jacq. (1778) ex Kerner.

19. *E. Apios*: Ital. mer-or. (T. d'Otranto pr. Taranto et Leucaspidæ: La-caita).

21. *a. E. mariolensis* Rouy in bull. soc. bot. 1882. 20 sep. (*). Valenc. (sierra Mariola, in saxosis: Rouy).

25. *E. verrucosa*: Luxemb. (sporad.). Lothar. (non rara: Godr.). Germ. med. (ex Gecke) sporadice ad Zeilfeld (in Meiningen), ad Ostheim et Lichtenburg (in Rhön). Bulgar. (: Velen.). Bosn. (: GBeck, Brandis). - Morav. exclud. sec. Oborny. - Transs. ad *E. epithymoides* (14) pertinet ex Smk.

28. *E. Chamæbuxus*: Hisp. bor. mts Picos de Europa (: Ler. Lev.).

31. *E. pilosa*: Bavar. (pr. Passau). Galiz. — *E. austriaca* Kern. in oe. bot. z. 1875. *E. pilosa trichocarpa* Neilr. (Austr. et Styr. alp. calcar., 800—1000 metr. s. m.).

**E. villosa* (Waldst. et) Kit. in W. sp. II. (1799); rar. I. (1802). *E. procera* MB. (1808). *E. mollis* Bess. *E. pilosa* Neilr. p. p. - Austr. Hung. etc. (Eur. mer-or. plurima); cfr. Kern. sched. ad exs. 1833.

31. *a. E. altissima* Boiss. var. *nuda* Velen. in diar. soc. sc. boh. 1888. 60 (sep.). Bulgar. ad radices m. Vitos (: Velen. 1887).

35. *E. platyphylla*: Galic. Bulgar. *E. verrucosa* Huds.; *E. stricta* Sm. e. b. 353.

**E. flavo-purpurea*; solum in ins. Minorca, et quidem rarius, lecta est (*E. dulcis* Texid. in Rodr. suppl.).

36. *E. stricta*: Siles. Galic.; in Bulgar. plurib. loc. a Velenovsky et aliis nunc lecta est.

42. *E. pterococca*; hab. etiam in ins. Menorca (: Rodriguez).

43. *E. serrata*; Helv. excl. quia locus ticinensis (cant. Ticino) ab ipso detectore (Muret) nunc negatur (ex Gremli).

47. *E. Sibthorpii*; hab. etiam in Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).

49. *E. amygdaloides*: Hibern. r. (solum in co. Cork). Germ. bor. hab. solum in Hannover et (rr.) Braunschw.; in bor-or. deest. Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.).

**E. Chaixiana*; planta istriaca dubia videtur ex Freyn nachtr. in act. soc. z.-b. vind. 1881.

51. *E. lucida*: Bavar. (Landshut, Moos). Lusat. (Neuzelle). March. (Frankf., Oderberg). Poson. Boruss. occ. Ross. mer-or. (pr. Sarepta).

52. *E. salicifolia* (1797): Polon. Lithaun. (ad Pinsk gub. Minsk: Twerdowska 1886). Ross. mer. — *E. incana* Schur (1852) est synonym. (nec var.). Host huic speciei capsulas "villosas" tribuit, unde Schur aliam talem se ante oculos habere credidit.

**E. Schurii* Simk.; Simonk. enum. 482. *E. obtusifolia* Schur (1866) non *E. platyph. obtusifolia* Roch. - Transs. Hung. centr. (Smk.).

52. *a. E. latifolia* CAMey. in Led. alt. IV. 183. - Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker), bor. (Kholmogory ad flum. Dvina: fratr. Brotherus 1872).

53. *E. virgata*: Siles. mer. (rr.). Galiz. Ross. med. (gub. Kursk, Moskwa, Tambow); balt. (Kurland; Riga). Styr. plur. loc. ex Maly (probab. inquil.). Bulgar. (var. *orientalis* Boiss.: Bornm.).

58. *E. Esula*; Helv. excl. sec. Greml. — *E. gracilis*: Galiz. (*E. uralensis* Blocki ex ipso). Ross. centr. (gub. Kursk).

**E. paradoxa* Schur (1866). *E. Esula pubescens* Grsb. it. hung. (non *E. pubescens* Vahl). *E. Esula puberula* Smk. (1882). - Austr. (Wien). Hung. Transs. Banat.

62. *E. Cyparissias*; Angl. indig. videtur ad Whitbarrow (Westmoreland) sec. Dr Boswell; Bulgar. et Rumel. or. (: Velenovsky).

64. *a. E. esuloides* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1886. 39 sep. (*); cfr. in diar. ej. soc. 1888. 60 (sep.). Bulgar. (plur. loc.; ad Sofia in campis copiosisima: Velen. 1885).

65. *E. nicæensis*: Carn. mer. Karsth. *E. serotina* Host (quia ceteris *Euphorbiis* austriacis serius floret).

66. *E. glareosa*: Rumel. or. — *E. serotina* ad speciem præced. pertinet.

67. *E. agraria* (*E. nitens* Trev. 1813): Bulgar. (Velenovsky).

68. *a. E. Kernerii* Huter in Kern. sched. ad exs. a. 1882. n. 503. *E. saxatilis* Pollini, Bert. (non Jacq.). *E. Baselicis* Facel., Rehb. ic. (non Ten.). - Carinth. (Raibl, Schinouz etc.). Tyrol. mer.-or. Venet. Veron. (subalp.). Sec. cl. Kerner media est inter speciem præced. (*E. saxatilis*), quâ major, et sequentem (*E. Barrelieri*), quâ minor.

75. *E. Gayi*; hab. etiam in Mallorca Balear. (ermita d'Arta: Marès; Puig de Masanella et de Torrella: Porta et Rigo).

76. *E. biumbellata*; non nisi in Mallorca, et quidem rarius, lecta est.

77. *E. medicaginea*; hab. solum in ins. Mallorca, sed aliquot locis abundat.

79. *E. græca*: Valach. (pr. Virciorova: Borbàs 1874).

**E. dalmatica*; *E. græca* Simk. *E. taurinensis* Borb.

81. *E. segetalis*; Helv. incola rr. (nempe Vales. olim pr. Sière, nuper ad Yvorne lecta); etiam Batav. introducta (: Dozy 1882). - Transs. ad *E. virgatam* (53) pertinet ex Smk.

82. *E. pinea*; hab. etiam in Mallorca Balear. (rarius).

83. *E. portlandica*; hab. etiam in Gall. bor.-occ.

94. *E. falcata*: Bavar. (rarius). Istr. Dobrud. (in deserto pr. Kara-Nasib: Ue.S.). *E. erythrosperma* Borb. (et Kern.?) ex Smk.

95. *E. Peplus*: Fenn. hab. in sola mer.-occ.

98. *E. aleppica*: Japyg. (T. d'Otranto: HGroves, Lacaita).

101. *E. myrsinites*: Mallorca Balear. (: Barcelò, Marès). Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882). Corfu ins. jon. (: Lacaita, Spreitzenh.).

101. *a. E. Broteri* Daveau in Magn. scrin. (V.) 103 (1886) et fl. sel. exs. 1287! - Lusit.

104. *E. Peplis*: Bulgar. (in arenosis marit.).

Obs. *E. polygonifolia* L., quæ speciei præced. proxime affinis, boreali-americana, nunc (ab anno 1877: Contejean) ad ostium fluminis Gironde legitur.

106. *E. Chamæsyce*; Transs. a Bmg. et Schur indicata, a Simonkai cruciatur.

CV. ARTOCARPEÆ.

1. *Ficus*. 1. *F. carica*; in plagis occidentalibus, immo Gall. bor.-occ. (Normand.), occurrit quasi sponte in aliquot locis maritimis; silvestris adest

etiam in convalle Isonzo Friul. et (saltem introducta) in cant. Ticino et Vales. calid. (convall. Rhodani); in declivitate merid. montis Blocksberg ad Ofen Hung. (ubi olim a Turcis plantata creditur) omnino quasi spontanea est et fructus (parvos) maturat, quamquam ramuli hieme necantur; demum etiam Styriæ ad arcem vetustam et nunc desertam Stattenberg quasi spontanea exstat (: Pittoni).

Obs. 3. *Broussonetia papyrifera*; etiam hæc arbor in plagis maxime merid. interdum inquilina facta est; sic ad Messina Sicil. sec. Borzi (1886).

CVI. PLATANÆ.

1. *Platanus*. 1. *P. orientalis*; cl. Heldreich in relatione itineris thessalici a. 1882 suscepti, quam Febr. 1883 reg. acad. scient. berol. tradidit, de hujus arboris in m. Pelion proventu hæc habet: et luxuriæ et staturæ eminet *Platanus*, et semper frequens adest ubi aqua fluminea non longe distat; arbores singule in pagis quibusdam, ubi vulgo fontes publicos obumbrant, ætate et mole tam superbiunt ut vix alibi; in pago Zachora, qui in latere orientali montis dicti situs est, arbores tales pulcherrimæ et giganteæ vegetant, quarum una e maximis habebat truncum ($\frac{1}{2}$ metr. supra terram) ambitu 12-metr.; *Platanus* in Kephissia pr. Athenas, quæ famâ inclyta est et multum admirata, truncum habet ambitu minorem, scil. ad basin ipsam $9\frac{3}{4}$ metr. circumcirca metientem.

CVII. URTICACEÆ.

1. *Urtica*. 1. *U. dioica*; — *U. Bollæ*; huc usque ex unico loco (St. Georgen comit. Pressburg) cognita erat, sed nuper (1883) a Sabransky in alio loco silvarum paludosarum detecta est; probab. etiam alibi adest (e. gr. Morav. mer.), sed cum speciei forma radicante commutata.

3. *U. pilulifera*: Gall. bor.-occ.; in sæpibus Sulzbach. (Styriæ) indicatur a Maly.

5. *U. membranacea*: Balear. (in Mallorca *U. urenti* frequentior ex Barcelò). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich).

6 * *U. oblongata*; detecta est a Zechenter (1833) pr. Weichselstätten (Styriæ) inter *U. urens* et *U. dioica*.

2. *Parietaria*. 1. *P. erecta*: Gall. bor.-occ. (rarius). Lotharing. Bulgar. - Boruss. (ex Gcke) hab. solum ad arcem Marieburg et in hortis ad Danzig.

2. *P. diffusa*; Styr. hab. solum in Schlossberg ad Graz (: Maly). - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk. — *P. judaica* (L. ex) Boiss.: Heldr. hb. norm. 880 (typica). 881 (lancifolia). 882 (brevipetiolata: "*P. judaica* L. hb.").

4. *a. P. serbica* Panc. serb. (1874); cfr. Velen. in diar. soc. bot. 1888, 58. - Serb. Bulgar. (in rupibus supra Kostinbrod: Velenovsky 1887). Banat. (ex Velen.). Hæc in Consp. ut varietas speciei seq. militat.

6. *P. lusitanica*: Balear. Bulgar. Ross. mer. gub. Cherson (ex Lindem.). - Heldr. hb; norm. 884.

3. *Helxine*. 1. *H. Soleirolii*: Mallorca (pr. Soller: Crespi ex Barcelò). Caprera (: Gennari); ins. Capraria hodie Capraja appellatur.

CVIII. CANNABINÆ.

1. *Humulus*. 1. *H. Lupulus*; terminus septentrionali-occident. speciei est prope lat. 64° 30' (ex Norman).

Obs. *Cannabis sativa*; herbam hanc utilissimam in Dobrudscha indigenam esse (vel sponte occurrere) cl. m. Kanitz (1880) jam testem habemus; talis adest etiam in Hung. (præcip. bor.), ubi monoica est et a Slovaci "*Sverepa Konopa*" (i. e. *cannabis silvestris*) appellatur; demum spontan. dicitur in Ross. mer.-or. (Sarepta), inmo centr. (gub. Kursk). Floræ europææ civibus igitur certe adnumeranda est.

CIX. ULMACEÆ.

1. *Ulmus*. 1. *U. montana*; hujus speciei terminus polaris est in Norv. arct. prope lat. 67° (ex Norman).

2. *U. campestris*; Bulgar. (ex Velen.); in Dan. (ex Lge) non nisi locis habitatis obvia, præcedente rarior et vix vere indig. — *U. suberosa* in speciem propriam restituenda (vel saltem pro subspecie habenda) videtur; cfr. Lge haandb. ed. IV. 268 et fl. dan. 2829.

3. *U. pedunculata* (*U. ciliata* Ehrh. 1791): Lothar. (r.). Bosn. (: Brandis); in Helv. rara est (Basel, Freudenthal cant. Schaffhausen, Lägern cant. Aargau).

3. *Celtis*. 1. *C. australis*: Bulgar. (Velen.). Sabaud. deest (ex Chabert).

1. *a. C. caucasica* W. sp. IV. 994; Velen. in diar. (sitzb.) soc. sc. boh. 1887. 461. - Rumel. or. (Aitos-Balkan: Skorpil ex Velen.).

CX. CUPULIFERÆ.

1. *Fagus*. 1. *F. silvatica*: Bulgar., ubi in decliv. septentr. m. Balkan et Osogovska-Planina silvas constituit (: Velenovsky). Thessal. etiam in m. Pelion, a 1000 metr. s. m. usque ad summa cacumina (: Heldreich 1882).

2. *Castanea*. 1. *C. sativa*; in Styriæ montibus calidioribus silvas fere constituit (: Maly), quæ vero probabiliter, ut in temperatoribus aliis, primitus culturâ ortæ sunt.

3. *Quercus*. 1. *Q. pedunculata* (*Q. borealis* Heuff. ex Simkov.): Bulgar. — *Q. malacophylla*: Bosn. (: GBeck). — *Q. brevipes* (Heuff.) Simk. (Hung. Transs.). — *Q. australis* (Heuff.) Simonk. 1886. *Q. extensa* Schur (1851). — ? *Q. pseudopedunculata* Vuk. 1878. (Croat.). Comment. 227.

**Q. brutia*; hab. etiam in Græc. bor. (Pindus tymph.: Haussknecht).

**Q. pilosa* (Schur) Simonk. 1866. *Q. dilatata* Kern. (1876) non Lindl. *Q. arenaria* Borb. (1878); ex Simonk. — *Q. nemorensis* Simk. — *Q. Csatói* Borb.

2. *Q. pendulina* Kit. (non Heuff.). *Q. Budayana* Haberl. ap. Heuff. (1850). *Q. Tommasinii* Ky (an Freyn?). Potius *Q. lanuginosæ* (5) approximanda est.

3. *Q. apennina*; Sicil. deest ex Todaro (giorn. bot. ital. 1878). Etiam hæc melius *Q. lanuginosæ* (5) approximanda videtur (immo, ut præc. ejus varietas dicitur!). Sec. cl. Todaro (l. c.) *Q. apennina* Guss. syn. pertinet ad gregem *Q. sessilifloræ*, sed non ad speciem illam vulgatam (glabram), quæ in Sicilia deest æque ac *Q. pedunculata*; ibi pro his *Q. haliphleas* W. (*Q. Cerris* var.) in usum venit.

5. *Q. sessiliflora*; in Lusit. rara est et in sola prov. Tras-os-montes (paucis locis) observata. — *Q. sublobata* Kit.; *Q. hungarica* Kit. (ex Smk.). — *Q. pallida* Heuff. (non Schur); *Q. glabrata* Heuff. — *Q. condensata* Schur (1857). *Q. Welandii* Heuff. in Wachtel zeitschr. 1850. — *Q. ambigua* Kit. *Q. budensis* Borb. (1878) ex Smk.; Hung. etc.; hybr. a *Q. lanuginosa* et *Q. pedunculata* (?). — *Q. decipiens* Bechst. in Sylvan jahrb. 1814.

**Q. Virgiliana*; hab. etiam in Græc. bor. (Pindus tymph.: Haussknecht 1885). De hac specie (subspecie) cfr. etiam Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 423 et 1881. 386.

**Q. Kerneri* Smk. mag. nov. lap. 1883. *Q. glabrescens* Kern. (non Bth.). Hung. (etc.); hybr. dicitur a *Q. sessiliflora* et *Q. lanuginosa*. — *Q. tridactyla* Borb. (1886) ex Smk. *Q. pallida* Schur.

5. *Q. lanuginosa*: Bulgar. Herceg. (: Bornmüller; determ. Borbás). - Germ. ex Gareke adsit solum ad Jena (in Kunitzberg, ubi "plures frutices, sed num aborigines?"). *Q. turbinata* Kit. (ex Smk.). *Q. vertesiensis* Kit. (ex Smk.). — *Q. Budayana* nunc sub *Q. pendulina* (2) militat. — *Q. Streimii*; *Q. glabrata* Borb. (ex Smk.). — *Q. Tommasinii* (*Q. pubescens* var. intermedia Vis.) potius saltem subspecies est; plene descripta a Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 424; adest etiam ad Ragusa Dalm. (: Bornmüller determ. Borbás). — *Q. Bedői* Smk. Feket. (Simonk. enum.). — *Q. erythrolepis* Borb. (ex Smk.). — *Q. oxycarpa* Vuk. (ins. Cherso Istr.). — ? *Q. Kitaibelii* Smk. *Q. cuneata* Kit. uon Wngh. (Croat.). Comment. 228.

**Q. Haynaldiana* Smk. in mag. nōv. lap. 1883. Simonk. enum. 1886. (*Q. apennina* Borb.?). - Transs. (Dévai, Smk.).

**Q. crispata* Stev. (*Q. undulata* Kit. ex Smk.). Taur. Bulgar. (ad Varna: Bornmüller 1886). Herceg.; indicatur etiam Tergesti (Triest); sec. Borbás, qui specim. Bornmüll. determinavit, proxima est *Q. macedonica* (14).

6. *Q. Toza*; *Q. stolonifera* Lap. (ex Laguna).

7 * *Q. conferta*: Bulgar. (in silvis plurim. a Rustschuk ad Varna: Velen.). Herceg. (: Bornmüll. determ. Borbás). Comment. 229. — *Q. spectabilis* Kit. ex Smk. (Hung.). — ? *Q. aurea* Wzb. (Ky) ex Freyn nachtr. (act. soc. z.-b. vind. 1881). *Q. Streimii* Freyn fl. v. Südistr. in act. soc. z.-b. vind. 1877 (non Heuff.).

9. *Q. lusitanica*; per totam fere Lusit. distributa est.

**Q. alpestris*; sec. Laguna est varietas *Q. fagineæ* Lam., in Cons. sub spec. primar. allatæ.

10 * *Q. Mirbeckii*; ex Laguna est varietas *Q. bæticæ* Lam., quæ subspecies est *Q. lusitanicæ*.

11. *Q. humilis*; *Q. prasina* Bose, ex Laguna.

12. *Q. Cerris*: Bulgar. Græc. bor. (Pind. tymph., ubi cum *Q. apennina* et *Q. Farnetto* silvas extensas constituit: Heldr.).

**Q. austriaca*: Bulgar. or. (: Bornm.). Bosn. (: GBeck).

13. *Q. Aegilops*: Japygia, ad Capo di Leuca (HGroves).

14. *Q. macedonica*: Herceg. (: Bornm. determ. Borbás). Ital. mer.-or. (cfr. Borzi in malpigh. 1887 et Martelli in giorn. bot. ital. 1888).

15. *Q. Pseudo-Suber* (*Q. Ilex* var. *suberosa* Vis. dalm.); in Gallopr. is speciei arbores tantum paucae (pr. Frejus et Grasse) adsunt ex Saporta; in a tam gregarie quam solitarie (cfr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877).

16. *Q. Ilex* (*Q. calycina* Poir.); — *Q. gramuntia*; non solum ad Grammont (nspe.) sed etiam multis aliis locis obviam venit (ex Loret). — *Q. expansa* (ex Laguna). — *Q. avellaniformis* Colm. Bout. ex Pereira Continho (1888).

17. *Q. gracilis*; sec. Laguna est varietas speciei præced.

18. *Q. Ballota*: ins. Mallorca, ubi crescit cum *Q. Ilice*, sed rarior.

19. *Q. Suber*; vera hæc species etiam in Lusit. adesse dicitur, sed adhuc rtum videtur numne indicata sit pro sequente (20), cujus autonomia a plurinunc negatur.

Obs. *Q. Morisii* Borzi (1881) hinc inde (Sard.) cum *Q. Ilice* et *Q. Subere* consociata crescit et probab. harum specierum proles hybrida (etiam quoad structuram corticis inter eas medium tenet). — *Q. hispanica* Colm., Bout. (non Lam.) etiam hybrida est inter species dictas (ex Laguna).

22. *Q. pseudococcifera*; in Ital. mer. prope Otranto (ex HGroves) minime rara est, sed sic dictas "macchie" pro magna parte constituit.

23. *Q. calliprinos*: Cephalon., ubi interdum cum *Q. Ilice* silvas format (: Heldr.). *Coreyra* (Corfû), ubi sub Signes aliquot hujus speciei exstant arbores (: Sprentzenh.).

4. *Ostrya*. 1. *Q. carpinifolia*; Hisp. non nisi culta adest (ex Laguna). Helv. solum in cant. Ticino. Styr. plur. locis (Donatiberg, Wotschberg; pr. Cilli, Neuhaus, Sulzbach etc.).

5. *Carpinus*. 1. *C. Betulus*; hab. etiam in Bulgar. (ex Velen.).

2. *C. duinensis*: Istr. Bulgar. (: Velen.). - Transs. ad speciem præced. pertinet (ex Smk.).

6. *Corylus*. 1. *C. Colurna*: Bulgar. in silvis m. Osogovska Planina.

2. *C. Avellana*: ins. Balear., sed non nisi culta vel subspont. (ibi Nov., Dec. floret); terminus polaris speciei est ad lat. 67° 56' (Norv. arct.) ex Norman. — *C. glandulosa* Shuttl. (Helv.).

3. *C. tubulosa*: m. Baldus (ex Goiran). Styr. aliquot locis (Reichenstein, Vordernberg) spontanea est ex Maly.

Obs. *C. Turczaninowii* Bess. ap. Steud. errore scriptor. e *Corydali* Turczan. Bess. (*C. bulbosa* Turcz.) orta est ex Trautv.

CXII. SALICINÆÆ.

1. *Populus*. 1. *P. alba*; Belg. non nisi plantata adest (ex Crepin). — *P. Bachofeni*: Bulgar. or. (ubique: Velen.). — *P. hybrida* MB.: Bulgar. or. (Varna, Galata: Bornm.).

3. *P. tremula*: Dan. Fenn. Bulgar. (ex Velen.). — *P. villosa*; *P. intermedia* Merat. — *P. repanda* ad speciem seq. pertinet ex Smk.

4. *P. nigra*; Dan. vix nisi plantata adest (ex Lge); sic etiam Thuring., ubi probab. ex *Alpium convallibus* introducta (sec. Hausskn.). *P. pannonica* est varietas, *P. pyramidalis* quoad staturam accedens.

5. *P. pyramidalis*; *P. italica* Mchx (1785). *P. dilitata* Ait. (1789). Hæc s. d. species probabiliter est forma (culturâ orta) *P. nigre*, quod pluribus certum videtur (cfr. e. gr. Hausskn. mitteil. soc. bot. thur. 1886. 34).

2. *Salix*. 1. *S. pentandra*: Dan. Fenn. (exc. Lapp. mult.).

2. *S. fragilis*: Mallorca Balear. (: Barcelò). Fenn. centr., mer. Bulgar. — *S. Pokorny* Kern.

3. *S. alba*; — *S. arelatensis* Delaveau (Arles Gall. mer.: Petit in hb. eur.).

4. *S. triandra*: Fenn. bor. (Ostrob. bor., Lapp. Imandr.). Bulgar. (m. Vitos in elatioribus non rara: Velen.; Kamecyk etc.: Bornm.).

5. *S. purpurea*: Bulgar. (ad aquas freq., præ. in submontanis: Velen.; Kamecyk etc.: Bornm.).

**S. amplexicaulis*: Græc. bor. (Pindus dolop.: Hausskn. 1885).

× *S. Pontederana*; Germ. (ex Geke) hab. solum in Siles. et Poson. — *S. calliantha*; vid. infra sub *S. rubra* (7).

7. *S. rubra* (*S. Hoffmanniana* Tsh): Morav. Carinth. (rarius: Graf).

× *S. calliantha*; cl. AKerner hanc primum distinxit 1865, dein in A. et JKerner hb. oesterr.-weid. 1869 edidit et hybridam esse censuit a *S. daphnoidi* et *S. purpurea*; rariss. est et forse cum simillima *S. mauternensi* commutata.

10. *S. Doniana*: Polon. Saxon. (Lipsiæ in pratis Bienitzwiesen). - Guestph. nuper non lecta est (ex Geke).

12. *S. daphnoides*; in Germ. (ex Geke) rarior est: Siles. Boruss. Bavar.; prov. Rhen. - Transs. a Schur indicata, sed a Simonk. (enum.) cruciatur.

× *S. Wimmeri*: Delph. (Magn. fl. sel. exs. 966).

15. *S. Smithiana*; — *S. sericans* Tsh (= *caprea* + *viminalis*) probab. solum in Bohem. bor.-or. adest ex Hansgirg (1881), sed ex Kern. (1881) etiam ad ripas rivi Wien Austr.

**S. dasyclados* Wimm. (1849). *S. longifolia* Host 1828 (non Mühlenb.). *S. Hostii* Kern. p. p. Sec. Heidenreich est species bona, sed quoad folia varians; hab. Polon. Boruss. or. Siles. Saxon. Bohem. Vindob.

17. *S. incana*: Rumel. or. (pr. Slivno, Sejmen: Velen.).

× *S. bifida*; synonym. *S. purpureo-incana* Wimm. ad hybr. *S. Wichuræ* Pokorn. (1864) pertineat.

18. *S. oleæfolia*; — *S. salviæfolia*: Hisp. centr. (Naval Peral sub Serra de Gredos: Ler. Lev.).

19. *S. Seringeana*; hab. etiam in Badia (pr. Rheinfelden) ex Geke.

20 × *S. Reichardti*: Hung. (: Freyn). Transs. (: Porcius). Bohem. (: Celak.). Arvern. (Magn. fl. sel. exs. 968).

21. *S. grandifolia*: Galic. vall. Olczysko m. Tatra (: Rehmann). Styr. plur. loc. (ex Maly). Calabr. (Serra San Bruno: l. b. Zwierlein ex Borzi).

22. *S. aurita*: Dan. Fenn. (exc. Lapp.).

23. *S. silesiaca*: Morav. Galiz. Livon. (pr. Riga). — *S. fagifolia* Kit. ap. W. (Hung. Transs.).

× *S. subcaprea*: Bohem. ad confines silesiac. (Stræhler in Kern. exs. 1885).

24. *S. cinerea*: Dan. Fenn. (exc. Lapp.).

26. *S. livida*: Alsac. (ad Weissenburg). Würtemb. (pr. Urach); in Badia (ubi detecta a Prummer versus 1850) etiam duobus aliis locis lecta est. Bavar. (rr.). Helv. (pr. Einsiedeln: Scheuerle 1887; vid. deut. bot. monats. 1888). Carinth. (r.: Josch, Pacher). - Transs. ad *S. silesiacam* (23) pertinet.

27. *S. myrtilloides*: Boruss. (Thorn: Preuss 1882; ex Gcke pr. Kernsdorf et Gilgenburg). Carinth. (rr.: Pacher. Jbgg.). Tyrol. certe adest (ad confines bavaricos: Kerner 1885).

× *S. versifolia*: Fenn. multa (cum Lapp.). — *S. myrtilloides*; hab. in Suec. bor., Lapp.; Fenn. (: Arrhenius, Wainio). — *S. neglecta* Gorski in sched. ex Ands. (Lithuan.).

28. *S. rosmarinifolia*: Siles. Carinth.

29. *S. repens*: Dan. Fenn.

× *S. ambigua*; hab. etiam in Batav. (ex Abeleven).

30. *S. nigricans*: Fenn. Dan. Germ. (in Consp. omissa). Voges. (au dessus de Retournemer: Godr. lorr. ed. 3.). Bosn. (GBeck). — *S. rivalis* Host.

× *S. punctata*: Suec. bor. (Jemtia etc.).

31. *S. phyllicifolia*: Ins. Færøer (: Rostrup). Alsat. (Frankenthal ad Hohenneck) et pr. Hamburg ex Gcke. Helv. in convall. alpinis rarius (: Gremli). Carinth. (: Pacher, Josch). — Transs. ad *S. hastatam* (35) pertinet ex Smk.

32. *S. arbuscula*: Galic. in reg. Mughi, r. (: Knapp). — Transs. ad *S. hastatam* (35) pertinet ex Smk.

33. *S. glabra*: Transs. ad *S. hastatam* (35) pertinet ex Smk.

**S. Mielichhoferi*: Tyrol. centr. (Huter in Kern. exs. a. 1885).

35. *S. hastata*: Ins. Færøer (ex Trevelyan). Alsat. (Frankenthal am Hohenneck; ex Gcke). Galic. in reg. Mughi (rarius). Transs.; Livon. (Riga etc.).

× *S. Schrenkiana* Ands.; *S. hastata* var. *inundata* Schrenk. — Ross. arct. (Archangel). Hybr. a *S. hastata* et *S. myrtilloide*.

37. *S. lanata*; hab. etiam in ins. Færøer (ex Trevelyan).

37. a. *S. tajmyrensis* Trautv. in Middend. it. I. 2. pag. 8. — Ins. arct. Nov.-Semlia (: Kjellm. Lundstr. 1875).

38. *S. Lapponum*: Galic. (rr.: Rehmann). Bulgar. (m. Vitos: Velen.). Morav. hab. solum in m. Gesenke (rarius). Ross. mer. p. p. (Cherson etc.) deest ut in Transs. (ex Smk.).

**S. helvetica*; hab. etiam in Alpibus bavaricis, unde detecta nuper prope Monachum (München) reperta est.

39. *S. glauca*: ins. arct. Nov.-Seml. et Waigatsch; hab. etiam in Carinth. (Winterthal etc.) ex Pacher.

41. *S. reptans*: Ross. arct. ins. Nov.-Seml. (Kjellm. Lundstr. 1875).

42. *S. arctica*: Ins. Waigatsch (Ross. arct.). Ural. bor. (: Ruprecht). Lapp. or. (ENylander 1844 ex Lundstr. in act. soc. f. fl. fenn. 1880).

**S. Brownei* Lundstr. (1877). *S. arctica* Br. (non Pall.). *S. arctica* var. *Brownei* Ands. — Nov.-Seml. (: Kjellm. Lundstr. 1875).

43. *S. myrsinites*: Alpes-Marit. (les Viosennes: Gennari ex Ardoino). Styr. (in alpinis calcareis plurimis). Ross. arct. hab. etiam in Nov.-Seml. — ? *S. tomentosum* Host. (alp. Pasterze Carinth.: Hoppe 1833).

× *S. glaucoides*; etiam in Suec. bor. (Jemtia) a Behm detecta est.

47. *S. sarmentacea*; hab. etiam in Island. (: Grönlund, Lundgren).

48. *S. herbacea*: Ins. Jan-Mayen (Dr Fischer in exp. arct. austriac. 1833). Ins. Waigatsch Ross. arct. (sed in Nov.-Seml. nondum lecta est ex Kjellman).

49. *S. rotundifolia*: Ins. Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1880). Lapp. or., ubi ante multos annos a ENylander (a Fellman 1863) lecta est; a Lundström nuper determinata (act. soc. f. fl. fenn. 1880). *S. herbacea* var. *integerrima* Fellm. (et speciei auctor ipse dubitat num hæc a præced. satis diversa sit).

50. *S. polaris*; hab. etiam in aliis insul. arct.: Beeren-Eiland, Nov.-Semlia, Waigatsch.

51. *S. reticulata*; Helv. hab. etiam (extra Alpes) in mt Salève et Reculet (Jura). Ross. arct. etiam in ins. Nov.-Seml. (: Kjellm. Lundstr. 1875) et Waigatsch.

× *S. Heerii* Brugg. = *cæsia* + *nigricans*. (Helv.).

× *S. Hugueninii* Brugg. = *cæsia* + *hastata*. (Helv.).

× *S. Krættliana* Brugg. = *nigricans* + *arbuscula*. (Engadin).

× *S. oenipontana* A. et JKern. *S. subalpina* AKern. = *grandifolia* + *incana*. (Tyrol.).

× *S. Rapini* Ayasse. = *purpurea* + *daphnoides*. (Genève).

× *S. recondita* Ausserd. = *helvetica* + *retusa*. (Tyrol.).

× *S. Sendtneri* Brugg. = *cinerea* + *repens*. (Bavar.).

- × *S. subnivalis* Brugg. = *retusa* + *herbacea*. (Engadin).
 × *S. Trefferi* Hut. = *arbuscula* + *cæsia*. (Tyrol).
 × *S. Wichuræ* Pokorn. = *purpurea* + *incana*. (Austr.).

CXIII. BETULINÆÆ.

1. *Alnus*. 1. *A. incana*; *typica* deest in Lappon, *fennica*, sed ibi (ut in Finnm. et Nordland.) freq. adest var. *virescens* Whlhub.; — var. *sericea* Christ. (Helv. cant. Ticino; sporad. ad Wallensee et pr. Aarau).

2. *A. pubescens*: Fenn. exc. max. bor. et max. mer. nec non Lapp.; Ross. bor.; Morav.; Hung., ubi etiam duæ adsunt formæ: *subincana* (*pubescens* auct.) et *subglutinosa*. — *Badia* excl. videtur, nam probab. indicatio ibi hybrid. quandam spectat (vid. obs. in Consp.).

3. *A. glutinosa*: Bulgar. - Fenn. deest in bor.-or. et in Lapp. - Orph. fl. gr. exs. 1011 (e Maced.).

5. *A. viridis*: Bavar. Alpes-Marit. (reg. alp. freq. usque ad mt Mulacé supra Mentone; Ardoino). — *A. brembana*; Helv. hab. solum in cant. Ticino (Cammoghé, Val Maggia).

6. *A. suaveolens*; cl. Regel hanc a specie præced. parum diversam censet et cum arctica *A. fruticosa* (5 *) identicam putat!

2. *Betula*. 1. *B. verrucosa*: Fenn. exc. Lapp. plur.; Norv. usque ad lat. 64° 12' progreditur (ex Norman), Suec. usque ad Kengis Vestrob. et Glommersberget Lapp. Pitens.; Cors. adest in interioribus ex Vallot, qui ibi pr. Valdoniello hujus arboris silvam vidit (1887). — *B. dalecarlica*; hab. in Dalecarl. et Smoland. (r.). — *B. lobulata* præcipue in Vermel. observata est.

2. *B. pubescens* (*B. odorata* Bechst. in diar. Diana. I.): Island. (Grönlund, Strömfelt et al.). Fenn. Dan. (ubi var. *B. glutinosa* sæpe plantatur, sed in statu spontaneo rara: Lange). — *B. carpatica*; in Scand. et Fenn. non rara, ceterum in Hercyn., Sudetis etc. (sed sub var. *parvifolia* et hujus speciei et varietatis seq. sæpe citatur). — *B. glutinosa*; *B. rhombifolia* Tsh. - Nomen hujus speciei a nobis usitatum, Ehrhartianum (1791), arboris statum humiliorem et magis vestitum respicit, quare illud Bechsteinianum, quamquam posterius (1797), potius additendum videtur.

**B. tortuosa*; hab. etiam in Islandia (:Lundgren, Strömfelt).

**B. Murithi* Gaud. - Vales. (Mauvoisin convall. Bagne).

4. *B. intermedia*: Fenn. (exc. max. mer.). Ross. bor.

6. *B. humilis*: Morav. (pr. Olmütz). Carinth. - Helv. exclud. sec. Gremli.

7. *B. nana*: Spitzb., ubi ad Kolbay a Nathorst detecta 1882 (in * relictam transiens).

CXIV. MYRICACÆÆ.

1. *Myrica*. 1. *M. Gale*; adest in Lapp. norv. (Norv. arct.), ubi speciei terminus polaris ad lat. 68° 53' ponitur (: Norman).

CXV. CONIFERÆÆ.

1. *Abies*. 1. *A. alba*: Bulgar. (mont.); Germ. (ex Gecke) etiam, sed rarius, in planitie (oberschles. Ebene, Oberlausitz, Spremberg, Sorau).

1. *a. A. Apollinis* Lk. in linn. XV. 528; Heldr. hb. norm. - Thessal. (Olymp.; Pindus dolop. et tymph., ubi freq. ex Hausskn. 1885). Maced. m. Athos. Arcad. centr. mont. 3000—5000' s. m. (ibi prævalet var. *A. Reginæ Amaliæ* Heldr.). Hæc species in Consp. immerito cum sequente juncta est et nunc restituitur.

2. *A. cephalonica* (Heldr. hb. norm. 801); arbor ins. Cephalon. endemic, in m. Aeno (hodie Monte Nero) et in ejus jugis bor.-occ., Rhudi dictis, regionem propriam inter 2500 et 5000' s. m. constituens. *A. panachaica* (nomen e monte Panachaïkon supra Patras) pertinet (ex Heldr.) ad var. *A. peloponnesiacam* (excl. synonym. Heldreich., ad speciem præced. pertinente).

3. *A. sibirica*; in gub. Nischn.-Nowgor. hæc species primum apparet ad fluv. Wetluga, e septentr. fluvio Wolga affluentem (: Krasnow ex Batalin). Comment. 230.

4. *A. Pinsapo*; hæc arbor crescit solum in tractu montium dicto Serrania de Ronda, ubi præcipue adest in m. Sierra de Tolox seu de las Nieves et in S. Bermeja vel de Estepona (prov. Malaga) nec non in S. del Pinar vel de Graza- lema (prov. Cadiz); in Sierra Nevada nuper erronee indicata est observ. Rouy in bull. soc. bot. 1885. 366.

5. *A. Omorica*; *Pinus Omorika* Panc. 1876 (eine neue conifere der oestl. alpen. 4). Arbor hæcce cl. o Pancic innotuit in Serbia mer.-occ. (ubi incolis sub nomine Omorika cognita) et ab eo in dendrologia sua serbica (1871) primum commemoratur. *A. orientalis* (L.) proxime cognata dicitur, sed excelsior et angustior, strobilis et seminibus minoribus, squamis strobili dentatis; pertinet igitur ad subgenus insequens, ubi post *A. obovatam* enumeretur. Comment. 231.

6. *A. excelsa*: Bulgar. (var. *balcanica* Velen. 1886). Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest. — *Picea montana* Schur. — *P. erythrocarpa* Purk. - *P. chlorocarpa* Purk.

**A. extrema*; *A. medioxima* AMurr. (ex Trautv.). *Pinus Abies* var. *medioxima* WNyl.; *A. excelsa* var. *obovata* Fellm.: Lapp. or. Fenn.

7. *A. obovata*: Ural. mer. (Schell 1879, ibique jam a Lessing, vage quidem, commemorata); in gub. Nischn.-Nowg. adest in ea parte que a flum. Wolga septentrionem versus sita est (: Krasnow ex Batalin).

2. *Larix*. 1. *L. europæa*: Alpes-Marit., ubi infra 1200 metr. non descendit (ex Ardoino).

2. *L. sibirica*; Fenn. in Isthmo carel., Tavast. mer. et Carel. bor. silvas constituit, sed culta (in Carel. *pomorica* sponte crescere dicitur: Herb. Mus. Fenn. ed. II.). Ross. bor. ad oram orientalem lacus Onega (: Günther 1880).

**L. rossica* Sabine. *L. archangelica* Laws. - Ross. arct. ad Mare Album.

3. *Pinus*. 1. *P. Cembra*: Galic. in reg. Mughli catervatim (: Knapp). Ross. or. (gub. Perm).

2. *P. Peuce*: Thrac. m. Rilo (Pancic ex Boiss.). — *P. vermicularis* Jka in litt. ad Boiss. (m. Perimdagh Maced., ubi immediatim supra *P. Pumilionem* silvas constituit).

3. *P. Pinea*: Balear.; in Ibiza abunde (: Cambessed., Barceló). Boissier (fl. or.) hanc speciem solum e Pelop. (: Heldr.) spontaneam habuit; Grisebach eam in Maced. penins. athoa observavit; ex Heldreich in Creta non spontanea videtur.

4. *P. Laricio*: Maced. m. Athos (: Grsb., Orph.); in Boiss. fl. or. non e m. Ida Cretæ sed ex Ida Troadis citatur.

**P. Pallasiana*; *P. Pinaster* Stev. *P. taurica* hort.

5. *P. nigricans*: Carinth. (: Pacher, Jabornegg); in Transs. indig. dubia est, sed "sat frequens ibi colitur" (Smk.). - *Olympus* ad subspeciem pertinet. Comment. 232; vid. etiam GBeck in ann. mus. vind. 1887. 36.

**P. leucodermis* (*P. Prenja* GBeck olim); ex GBeck hæc arbor silvas pulchras constituit in Hereeg. (Romanja Planina) et in Bosn. mer. (Prenj Planina: GBeck 1885); adest etiam in Thessal., scil. in Olympo, ubi a Heldreich detecta (*P. Heldreichii* Christ), et in Pindo tymph. (: Hausskn. 1885); cfr. apud cl. GBeck l. c. 37, ubi auctor cum observationibus variis descriptionem plenam (etiam anatomicam) hujus arboris publicavit.

6. *P. Pinaster*; Angl. nunc inquil. adest in Hampsh. (ins. Wight) et Dorsetsh.; ex Boiss. loca oriental. delenda sunt quia e commutatione cum *P. Laricio* citata.

7. *P. halepensis*: Creta (Heldr.). Rhodus (Hedenb.). Byzant. (Noë).

**P. hispanica*; sec. Laguna pertinet ad *P. Laricio* (4).

8. *P. pyrenaica*; CKoch (1875) e loco Perusiano (vall. Pez) varietatem *P. Laricionis* (4) habuit.

9. *P. brutia*: Chios (: Orphanides). Rhodus (: Bourgeau); ex Boiss. fl. or. Comment. 233.

10. *P. silvestris*; hæc arbor etiam Angl. olim incola erat, testantibus

radicibus et truncis validis, quæ ibi in turfosis nunc reperiuntur; in Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest; ex Norman terminus polaris est prope lat. 70° 20' (in Norv. arct.).

13. *P. Mughus*: Germ. bor.-occ., scil. sporadice ad Oldenburg et Bremen, ibique forse, ut *Taxus*, olim indigena. Bulgar. præcip. in m. Kom (: Velen.). Rumel. or. (m. Rilo: Panic). Maced. (m. Perimdagh: Janka). Helv. hab. solum in Engadin (Graub.) ex Gremli; indicatur etiam Siles. (Riesengeb. inter 1150 et 1400 metr., abunde), sed hoc probab. spectat ad *P. montanam* (12), cujus varietatem (vel subspeciem) hæc forse sistit.

× *P. Neilreichiana* Reichardt (= silvestris + nigricans). Austr. ad Vöslau, ubi in silva a speciebus dictis constituta hæc hybr. rr. (duæ vel tres arbores) observata est.

× *P. rhætica* Brügg. = *montana* + *silvestris*. (Helv.).

4. *Cupressus*. 1. *C. sempervirens*; hab. in montibus Sphacioticis Cretæ, ubi regionem silvaticam inter 2000 et 4500' s. m. constituit; ex Bourgeau adest etiam in Rhodo et ex Armenis in Melo (sed num vere spontanea?).

Obs. *C. lusitanica* Mill. (*C. glauca* Lam.) non indigena est in Lusit., sed a. 1622 introducta, probab. ex ins. Azoricis (sec. Goeze); patria hujus arboris est India orientalis. - Sz herb. norm. nova ser. 1471.

5. *Arceuthos*. 1. *A. drupacea*: Heldr. hb. norm. 758. Hab. in Lacon. m. Malevo inter 3500 et 4500' s. m.; sec. Boiss. fl. or. ex insulis Cretæ adjacentibus erronee indicata est commutatione schedularum.

6. *Juniperus*. 1. *J. macrocarpa*: Bulgar.

2. *J. Oxycedrus*; Ital. mer.-or. (T. d'Otranto: HGroves). — *J. rhodocarpa* Stev. 1857. (Taur.).

3. *J. communis*: Fenn. Dan. Græc. m. Parnass. (pr. Rachova: Guicciardi ex Boiss.). - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

4. *J. nana*: Ins. Færöer (ubi nunc rara sed olim frequentior). Bulgar. (ubi in reg. alp. "formationem" plerumque vastam constituit: Velen.). Græc. bor. (Pindus dolop.: Hausskn. 18c5). — *J. depressa*; ex Boiss. pertinet ad *J. hemisphæricam* (3 *).

6. *J. phoenicea*; Taur. ex auctoritate Parlat. indicata est.

**J. turbinata*: Isthm. Corinth. (Heldr. hb. norm. 978). Mallorca Balear. (r.: Willkomm). *J. oophora* ad speciem primar. (*J. phoenic.*) pertinet ex Laguna.

7. *J. sabinoides*; ex Boiss. fl. or. hæc est ipsiss. *J. foetidissima* W., habitans in subalpinis et alpinis montium plurimorum Græciæ inter 4500 et 6000' s. m., in m. Delphi Euboeæ et Athô Maced.

8 * *J. ægæa*; hæc non commemoratur in Boiss. fl. or., ubi locus natalis (ins. Thassos maris ægæi) ad speciem ipsam (*J. excelsa*) citatur.

9. *J. Sabina*: Bavar. (Alpes: Berchtesgaden, Ammergau). Carinth. Styria (aliquot locis spontanea: Maly). Transs. certe et pluribus locis adest (: Simonkai).

7. *Taxus*. 1. *T. baccata*: Dan. in silvis ad Vejle Fjord meridiem versus (locus danicus nunc unicus ubi hæc arbor vere spontanea; vid. Lge haandb. ed. IV. 35). Belg. spontanea videtur in aliquot silvis ad fluv. Sambre, ceterum culta (: Crepin). Pelop. m. Malevo (: Heldr., Orph.), Chelmos (: Orphanides); ex Boiss.

CXVI. GNETACEÆ.

1. *Ephedra*. 1. *E. procera*; adest in Maced. m. Korthiati (: Orph. ex Boiss.).

2. *E. nebrodensis*: Aveyron (pr. Milhan, loco natali speciei max. occid.; ex Bonnet); mts Corbariens., ubi detecta a Gautier (ex Rouy 1881).

3. *E. fragilis*; hab. etiam in Balear. et in hb. Lenormand citatur e Laconia (ad Eurotas), sed an sched. commut.?, exclud. (sec. ipsum auct.) synonym. *E. altissima* Boiss., quæ nunc propria species:

3. *a. E. gibraltarica* Boiss. or. V. 714 (in obs.). *E. altissima* Boiss. voy. Hisp. mer. (Gibraltar, Alhaurin prov. Malacit. occ.). Algarb. (ad Lagos).

4. *E. campylopoda*: Bosn. Serb. Aetol. (m. Velugo: Orph.). Achaia (pr. Patras: Heldr.), Lacon. (m. Taygetus: Psarides). Cephalon. (: Heldr.). Zea (: Sartori); ex Boiss.

5. *E. vulgaris*; in Gall. occ. litoral. usque ad ostium flum. Vilaine progreditur, ab hoc rarens et omnino desinens ad lat. 48°, ideo circa Brest (: Bonnet 1877); adest etiam Transs. (ad Torda: Barth ex Smk.).

**E. helvetica*; in Gallia territor. fluvior. Rhône et Durance inhabitat; planta feminea ibi rariss. est et solum ad Villeneuve-les-Avignon observata (Bonnet in bull. soc. bot. 1878).

CXVII. HYDROCHARIDEÆ.

1. *Hydrocharis*. 1. *H. Morsus ranæ*: Gall. or. (Aube, Côte-d'Or). Lothar. Bulgar. (: Velenovsky). Fenn. hab. etiam med.

2. *Stratiotes*. 1. *S. aloides*: Fenn. multa scil. exc. bor. plur. nec non mer.-occ. et max mer. Gall. probab. non indig. est, nam pr. Lille (solus locus ubi certe proveniet) ad initium sæculi plantata est; in Ital. non nisi planta feminea cognita erat (pr. Ferrara et Mantua), usque dum (1868) cl. Masé masculam ad Ostiglia observavit.

3. *Vallisneria*. 1. *V. spiralis*; in Gallia ultimis annis tam versus septentr. quam occidentem migravit, hinc inde abundans ubi olim incognita: sic in canale Burgund. (Côte-d'Or), ubi viâ fluv. Saône sese introduxit, 1856 rarissima erat, nunc vero copiosa (: Royer); in Ital. mer. nunc inquil. adest (ad Fondi: Pasquale 1881); in Bulgar. (ad Kebedze) a Velen. et Bornm. lecta est, in Thrac. (e. gr. inter Philippopol. et Tatar-Bazardsik) a Janka; in Ross. mer. gub. Cherson ad ostia Borysthenis (Dniepr) et Tyræ (Dniestr) copiosa est (: Lindemann).

Obs. *V. bulbosa* Sois. est = *Sagittariæ sagittifoliæ* status juvenilis graminifolius ex Caruel (1880).

4. *Udora*. 1. *U. occidentalis*; *Serpicula verticillata* Roxb. corom. *Hydrilla verticillata* Rich. (in mem. inst. 1811). — Ross. mer.-occ. (— *U. lithuanica* Bess.). Patria hujus plantæ est India orient., ubi frequens dicitur (sed planta rossica dubia est ex Ledeb.).

5. *Anacharis*. 1. *A. Alsinastrum*; hæc planta introducta est Scot. a. 1846, Batav. 1861, Gall. 1867, sed Burdigalæ jam 1862 a Durieu culta et in aquis proximis propagata erat (de proventu in Gallia et de distributione ibidem regionali vid. Le Grand in bull. soc. bot. 1879 et ej. plant. nouv. ou rares 1884. 13—17). Belg. primum a. 1860 apparuit (pr. Gand). Siles. etiam circ. 1860, Polon. (Cracov.: Reichardt) 1879. Ross. nuper observata est, ibique Petropoli et Moscoviæ (nunc) terminum habet orientalem; terminus mer.-or. est in Hung. (comit. Eisenb.: Borbás).

CXVIII. BUTOMACEÆ.

1. *Butomus*. 1. *B. umbellatus*: Bulgar. - Fenn. exc. bor. plur.; in Helv. ipsa nunc deest, sed exstat juxta fines Basilienses.

CXIX. ALISMACEÆ.

1. *Alisma*. 1 * *A. arcuatum*: Gall. or. (Côte-d'Or). Badia. Bavar. Bohem. Siles. Boruss. Hung. (: Borbás). Comment. 234.

2. *A. parnassifolium*: Gall. etiam dep. Loire-et-Cher (: MCornu). Ross. mer.-occ.

3. *A. natans*; Germ. hab. occ. (Trier, Andernach) et præcipue bor. et bor.-occ. (non mer.-occ.) nec non Saxon. - Livon. vix adsit ex Klinge.

4. *A. ranunculoides*: Alpes-Marit. (inter Nizza et le Var, Vaugrenier, Biot etc.). Gall. or. (Côte-d'Or, r.), bor.-or. (Lorraine, r.), bor.-occ. Germ. occ. non nisi in parte bor. (prov. Rhen. etc.); deest in Boruss. - Livon. (pr. Riga) et Curon. ex Klinge.

2. *Damasonium*. 1. *D. stellatum*; var. *trinerve* Trautv. - Ross. mer.-or. in lacu Bogdo (: Becker).

3. *Sagittaria*. 1. *S. sagittifolia*: Bulgar. or. lac. Devno (: Bornmüller). - Fenn. deest in Lapp. plur.

1. *a. S. alpina* W. sp. IV. 410. Ross. bor. (gub. Wologda ex Ivanitzky; gub. Olonetz ad oram oriental. lacus Onega: Günther 1880).

CXX. JUNCAGINEÆ.

1. *Triglochin*. 1. *T. maritimum*: Island. (: Grönlund, Strömfelt). Fenn. (exc. med. plur.). Bohem. ad flum. Moldau (sec. Celak. 1885).

2. *T. palustre*: Ins. Færøer. Alpes-Marit. (Tenda, N.-Dame-de-Fenestre et Entraunes, unde secus flum. Var descendit usque pr. Nizza: Ardoino). Bulgar. (: Bornmüller).

3. *T. Barrelieri*; hab. etiam in Mallorca (rr.: Barceló).

4. *T. laxiflorum*: Sard. ad Sta Teresa Gallura (Reverchon 1881) et Terranova (de Sardagna 1883), sed ex Ascherson planta sardoa ad speciem præced. pertinet.

2. *Scheuchzeria*. 1. *S. palustris*: Fenn. (exc. Lapp. mult.). Lothar. (r.). Ross. mer.-occ.

CXXI. ZOSTERACEÆ.

1. *Posidonia*. 1. *P. Caulini*: Croat. (ad Fiume et alibi in litore rejectam vidit A.-M. Smith).

2. *Cymodocea*. 1. *C. æquorea*: Alpes-Marit. (Antibes: Thuret. Bornet; Cannes: Thion). Turc. (in Hellesponto: Sintenis). Croat. ad Fiume et alibi cum præced.

3. *Zostera*. 1. *Z. marina*: Island. Færøer (ex Landt). Fenn. mer.-occ., bor.-or. (Mare Album). Bulgar. (in Ponto: Bornmüller).

2. *Z. nana*: Menorea Balear. (: Rodriguez). Bulgar. (in Ponto: Bornmüller). Thessal. (ad Volo a mari rejectam leg. Heldreich). Hellespontus (: Sintenis). Ross. mer. (ad Cherson et alibi).

CXXII. POTAMOGETONEÆ.

1. *Potamogeton*. 1. *P. natans*; — *P. petiolatus* (*P. rigidus* Wolfg. ex Schmalh.); sec. Schmalhausen pertinet ad *P. fluitans* (3), sed sec. Lindemann propria species est.

2. *P. sparganifolius*: Fenn. (Ostrob. bor.). Vestrobothn.

3. *P. fluitans*: Lusit. (ex Arth. Bennett). Bulgar. (ex Velenovsky). - Suec. mer. (ubi in Scania olim aderat) nuper non lectus est. — *P. petiolatus* Wolfg. (Ross. mer.-occ.); vid. *P. natans* (1).

4. *P. polygonifolius*: Gall. or. (Côte-d'Or). Lothar. Alsat. (pr. Hagenau). Bavar. (in Germ. mer. cetera, ut etiam in or., deesse videtur). Ins. Færøer (: Rostrup). Island. ex Feddersen 1884 (sed ex Rostrup 1888 planta islandica ad *P. natans* pertinet). Fenn. mer.-occ. (Alandia: a Sælan detect. 1865). Ross. balt. - Helv. excl. teste Greml. - Transs. ad *P. natans* pertinet (ex Smk.). — *P. parnassifolius* Schrad.; *P. acaulis* Whlbn. (= status amphib.).

5. *P. spathulatus*; in Germ. (sec. Garcke) extra Baviariam rariss. (: pr. Ulzen in Hannover et Limbach ad Saarbrücken).

6. *P. salicifolius*: Boruss. or. territ. Memel (stud. Knoblauch 1884); etiam in lacu Schallsee Lauenburg. olim lectus. Herefordsh. Angl. (: Arth. Bennett), sed ad Bath Angl. et in Hibern. erronee indicatus est (ex Arth. Bennett in litt.); Suec. solum in Vestrob. bor. et Lapp. torn. lectus est (loca cetera Suec., nec non Norv. et Fenn., e commutatione cum var. minori *P. rufescens* indicata sunt).

8. *P. rufescens*: Alpes-Marit. (reg. alp., rarius). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.).

**P. rivularis* Gillot in Magn. scrin. VI (1887). 118; fl. sel. exs. 1549. - Gall. (Nièvre, Côte d'Or).

9. *P. coloratus*: Bavar. (Augsburg, Dillingen, Moosburg etc.). Ital. mer.-or. (T. d'Otranto: HGroves).

**P. subflavus* Loret. Barrand. fl. de montp. (1876). - Monspel. pr. Manguio (a Duval-Jouve detectus): dictur medius inter duas precedentes; sec. Rouy (Le Natural. 1887) est varietas *P. siculi*, in Consp. sub specie primar. (*P. colorato*) allati.

10. *P. gramineus*: Ins. Færøer (: Rostrop). Fenn. (exc. Lapp. plur. etc.). Ross. etiam bor. et mer.

**P. variifolius*; forse varietas *P. polygonifolii* (4); vid. ap. Corbière in bull. soc. linn. norm. 1887.

**P. Wolfgangii* Kihlm. in hb. mus. fenn. ed. II. 33. 128. (1889). *P.* (gramineus) borealis Kihlm. ap. soc. f. fl. fenn. 1887 (non Læst.). Fenn. bor. Lapp. fenn. occ.

11. *P. nitens*: Shetland. (r.: Beeby). Angl. (Tweed, Teviot). Gall. bor.-occ. (: Morière). Fenn. mer.-occ. (Aland.: stud. Lindén 1886), mer.-or. (Carel. oneg.). Ross. mer.-occ. - Synon. Smith. (etiam ex ej. herb.) ad speciem præced. pertinet observ. Arth. Bennett in litt.

12. *L. lanceolatus*; indicatio ex Angl. 1804 ad Cambriam pertinet.

13. *P. lucens*: Fenn. (exc. med. et Lapp. plur.). Mallorea (r.: Barcelò). - Sard. dubia civis.

**P. Zizii*: Angl. (Roxburghsh.: Brotherston; Anglesea: Baker; Forfar etc.: Trimen). Gall. bor. (cfr. Corbière in bull. soc. linn. norm. 1885). Helv. (Reuss, Yverdon). Ross. med. (Ingria, Curon), mer.-occ. (*P. lanceolatus* Wolfg. ex Schmalh.). - Potius pro specie majoris dignitatis habendus; cfr. Note sur le Potamogeton Zizii par Corbière, l. c. 1—10 sep. (*). — *P. coriaceus* Nit. (Suec. med. Norv. mer. Angl.: Fryer sec. Arth. Bennett 1886).

14. *P. decipiens*: Scotia (: Arth. Bennett). Jutland. (Hald-sø pr. Viborg: Nielsen). Slesvic. certe adest. Ross. mer.-occ. (*P. undulatus* Wolfg. ex Schmalh.). — *P. salicifolius* (6) e Bath Angl. et ex Hibern. ad hanc speciem pertinet et cl. Tiselius in conventu soc. bot. holm. Nov. 1883 monstravit has species, quamquam sat dissimiles, unum solum sistere speciei typum.

14. a. *P. Griffithii* Arth. Bennett in journ. of bot. 1883. 1—3 (sep.) cum ic. (*). - North-Wales, Carrarvonsh. (pr. Aber detect. ab JEGriffith 1882).

15. *P. prælongus*: Ins. Færøer (ex Hornem, 1837). Ross. mer.-occ. Galiz. (: Knapp). Siles. (rr.). Bavar. bor. (Fichtelgeb.). Helv. (lac. alp. Brettaye, lac d'Etalières). - Transs. ad *P. lucens* pertinet ex Smk. — *P. gramineus borealis* Læst. (ex Almql.). Lapon., Ingria.

16. *P. perfoliatus*: Ins. Færøer (: Trevelyan, Rostrop). Fenn. Bulgar. or. (lac. Devno: Bornmüller).

17. *P. crispus*: Istr.; in Thrac. (Rumel. or.) etiam hodie lectus est (: Skor-pil ex Velen.). Fenn. non nisi in extrema mer.-occ. (ins. Alandia) adest.

19. *P. compressus*: Gall. bor.-occ. (Norm.). Lothar. (r.). Fenn. exc. Lapp. et bor. plur. (ceterum præcipue in mer.-or.). Ross. mer.-occ. - Transs. ad seq. *P. acutifolius* pertinet (ex Smk.).

20. *P. acutifolius*: Siles. Morav. Ross. mer.-occ. - Helv. cum dubio citetur ex Gremli.

21. *P. obtusifolius*: Gall. bor.-occ. Siles. Ross. mer.-occ. Fenn. exc. Lapp. et bor. plur. - Norv. solum in mer.-or. adest.

22. *P. Friesii*: Gall. bor.-occ. (Norm.). Lothar. Germ. occ. (Phalz.). Siles. Polon. Ross. mer.-occ. - Fenn. mer. et Aland. olim indicatus, sed in Herb. mus. fenn. specimina certa non adsunt.

23. *P. pusillus*: Fenn. Ins. Færöer (ex Trevel.) Bulgar. (: Velen.). — *P. tenuissimus* (M.K.) Schur. *P. trichoides* Schur (ex Smk.).

**P. Stunæckii* Arth. Bennett in scott. natural. 1883. - Scotia (pr. Perth detectus a Stunæck).

24. *P. gracilis*: Scan. occ. Holmia. Gestric. - Planta rariss. et fugacissima (in eodem loco vix plus quam semel lecta).

25. *P. trichoides*: Ins. balt. Bornholm (: Bergstedt ex Lge). Scania (pr. Lund: Tullberg 1875). Gall. or. (Côte d'Or, r.). Lothar. (r.). Morav. Siles. Galic. (r.: Rehmann). Carinth. (pr. Villach: Freism.). Herceg. (ex Arth Bennett). Ross. mer.-occ.

26. *P. rutilus*: Slesvic. (pr. Haderslev: Fischer-Benz, ex Lge). Fenn. mer.-or. (Carel. oneg.). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.). - Helv. exclud. sec. Greml. — *P. Grisebachii*; est status *P. pusilli* incrustatus (ex Smk.). — ? *P. reptans* Humnicki cat. pl. de Luxeuil (1876). 61 (*). *P. rutilus* ej. cat. pl. d'Orleans. 25 (*).

?**P. caespitosus* Humnicki cat. pl. de Luxeuil. 60. 90 (*). Gall. dep. Haute-Saone (detectus a cl. Humnicki 1865).

28. *P. pectinatus*: Island. (a Feddersen multis locis lectus ex Rostrup 1888). Fenn. mer. et occ. Bulgar. or. (lacus Devno: Bornm.). Herceg. (ex Arth. Bennett). Ross. mer.-occ. Terminus borealis hujus speciei in Suec. et Fennia situs est ad lat. 63° 50' et 62° 50' (ex Kihlman). — *P. flabellatus*; saltem subspecies videtur: *P. pumifolius* Kern. hb. (Tyrol.) ex Tiselius!, qui observationes suas de hac planta (etiam ex eo bonam speciem sistit) soc. bot. holm. Febr. 1884 communicavit; cfr. Bot. Not. 1884. 91—3; vid. etiam Fryer in j. of b. 1888. 297 (ex eo in Brit. freqq. species aquæ tam dulcis quam salis, et quidem duabus varr.: *P. scoparius* et *P. pseudomarinus*).

28. a. *P. vaginatus* Turcz. in bull. mosc. 1838 (nomen solum); fl. baical. dahur. II. 2. 162. (1856); Kihlman in meddel. soc. f. fl. fenn. 1887. 1—5 sep. (*). 1888. 112. — Fenn. bothn. Suec. bothn. usque ad Holmiam (Vermdön: Tiselius).

29. *P. marinus*: Ins. Færöer. Ins. Orkney. (Syme 1849) Fenn. tota (sed præcip. mer.-occ.). Alpes-Marit. (lac du col della Maddalena: Loret). Helv. (ex Greml.) hab. in Chur, Engadin, Schwarzsee (Freiburg), Thun, Interlaken, lac des Rousses (Jura), ad Fully (Valais). Ross. mer.-occ. - Transs. ad *P. interruptum* Kit. (= *P. pectinatus*) pertinet ex Smk.

2. *Zannichellia*. 1. *Z. palustris* (*Z. digyna* Breb. *Z. disperma* Salzm.); in Angl. rara et diu solum pr. Wicklow, Shannon, indicata, sed 1881 in Oxfordshire et Northamptonsh. a Druce detecta est. Suec. etiam in med. (in Ingarön pr. Holmiam) et bor. (Angerm., rr.) lecta est. Ross. hab. etiam in mer.-occ. et volgensi. — *Z. Rosenii* Wallm. in Bot. Not. 1840 ex Schlegel. (Gotland.). - *Z. intermedia* Niels. ex Lge. (Dania).

**Z. tenuis*; nunc exstincta dicitur ob locum natalem (in litore ad Versoix) constructionibus obiectum (: Barbey 1884).

2. *Z. pedicellata*; Suec. hab. etiam (r.) in bor. Sard. (ex Barbey). Ross. mer.-occ.; mer.-or. (Sarepta: Becker). Helv. exclud. sec. Greml. — *Z. aculeata* Schur (1870); Simonk. enum. 512. (Transs.).

3. *Z. polycarpa*: Island. (: Feddersen 1884 ex Rostrup). Shetland. (Loch of Watlec: Beeby). Norv. mer.-or. Fenn. etiam occ. Ross. balt.

3. *Althenia*. 1. *A. filiformis*; Cors. exclud., quia (teste cl. Ascherson) *Ruppia spiralis* pro *Althenia* ibi sumta erat. Messanie Sicil. nunc non exstat (sec. Borzi in malpigh. 1887). - Hec planta detecta est a Delile 1823, sed descriptio et icon in ejus herbario ineditæ manebant. Petit speciem primum publicavit (in annal. d. scienc. d'observation, I.). Paulo post Delile notulam edidit, ubi sub nomine novo (*Bellevalia australis*) plantam descripsit.

**A. Barrandonii*; ex Loret (fl. montp.) minime distinguenda est a specie primaria, in loco valde proximo crescente. Comment. 235.

4. *Ruppia*. 1. *R. spiralis*: Norv. tota usque in arct. (terminus polaris speciei est ad lat. 68° 10' teste Norman). Byzant. (: Montbret ex Boiss.). Ross. mer.-occ.

**R. transsilvanica*; ad *R. rostellatam* (3) pertinet ex Smk.

3. *R. rostellata*: Creta (Heldr. ex Boiss.). Ross. balt.
4. *R. brachypus*: Fenn. mer.-occ. (Aboæ: CJArrhenius 1862). Suec. etiam med. (Holmia, Suderm.). Gall. mer. etiam dep. Gard. (Aigues-Mortes: Duv.-Jouv.). — *R. intermedia* Thed. (1887); sec. Schlegel est forma (pedunc. et pedicell. longiorib.) *R. brachypi*, ad oras Scandinaviæ vulgarior.

CXXIII. NAJADEÆ.

1. *Najas*. 1. *N. marina*: Angl. in East Norfolk ad Hickling Broad (: Arth. Bennett 1883; cfr. j. of bot. eod. anno). Belg. olim ad Ypres et in fluv. Meuse (pr. Herstal etc.) lecta, nunc solum in duabus piscinis pr. Louvain adest (ex Crepin). Norv. non nisi in mer. (Hvalôarne, Lillesand etc.) lecta est. Suec. etiam in bor. (Helsing., r.). Fenn. etiam in bor.-occ. (Ostrobothn. mer.). Ross. mer.-occ. *N. fluvialis* Th. - *N. muricata* Th. (non Del.). — *N. intermedia* Wolffg. (Lithuan.).

2. *Caulinia*. 1. *C. fragilis*: Helv. certe adest (Nyon, Roggewyl, Michel-felden). Istr. Fenn. mer. Ross. mer. — *C. intermedia* (quæ etiam in Helv. lecta) ad speciem sequentem pertinere dicitur.

2. *C. alagnensis*; pr. Manchester Angl. bor. introducta est cum lana gossypina ex Egypto, quæ planta egyptiaco-anglica (ob structuram anatomicam foliorum diversam) sistit varietatem Delilei Magnus (: *N. graminea* Del. var. Delilei Magnus 1883; Magn. fl. sel. exs. 1302); cfr. commentationem elaboratissimam cl. i Ch. Bailey: "on the structure, the occurrence in Lancashire, and the source of origin of *Najas graminea* var. Delilei" in j. of b. 1884. c. ic. (*). *C. microphylla* Balb. Nocca ticin. *Najas serristipula* eor. ic.

3. *C. flexilis*: Scot. Perthsh. (Loch of Clunie: Robb et Sturock 1874). Boruss. or. (ex Geke). Fenn. mer.-or. (Carel. oneg.). Ross. bor. (gub. Olonetz).

CXXIV. ORCHIDEÆ.

1. *Cypripedium*. 1. *a. C. macranthum* Sw. in act. holm. 1800. 251. - Ross. or. (gub. Perm: Schell 1874); antiquitûs etiam in Kasan et Ucran. indicatum (Led.).

2. *C. Calceolus*: Lothar. (rarius). Belg. pr. Arlon olim indicatum erat, sed ex Crepin nunc floræ belg. valde dubia civis. Jutland. ad Buderupholm inter Aalborg et Hobro 1884 detectum est ab adsistente silviculture (forstassistent) Bruel, qui hanc plantam in clivo calcareo prærupto, fagis depauperatis consito, inter juniperos gregarie crescentem invenit (: Lange). Norv. hab. etiam in Nordland., ibique usque ad lat. 65° 47' progreditur (ex Norman).

3. *C. guttatum*: Ross. mer.-occ. (ex Schmalhausen).

2. *Calypso*. 1. *C. borealis*: Lapp. Kem., Imandræ; Fenn. bor. (Ostrob. bor., Kuusamo), mer. (Tavast., Carel. oneg.).

3. *Corallorhiza*. 1. *C. innata*: Arvern. (Heribaud 1887). Bosn. (: Brandis 1885).

5. *Malaxis*. 1. *M. paludosa*: Norv. usque ad Nidarosiam (Trondjem). Gall. bor.-occ. (Norm., r.). Lothar. (r.). - Transs. ad præced. (*Sturmia Loeseli*) pertinet ex Smk.

2. *M. monophyllos*: Volhyn. (Ross. occ.). Fenn. hab. solum in mer. et bor.-occ. (Ostrob.).

6. *Epipogum*. 1. *E. aphyllum*; Suec. exclud. Lapp. (indicatur tamen ad Jokkmokk Lapp. Lul.). Fenn. mer., med., bor.-or. (Sonostrow Karel. Keret.). Siles. Styr. Carinth. Alpes-Marit. (St-Dalmas-le-Sauvage etc.).

7. *Limodorum*. 1. *L. abortivum*: Carinth. (pr. Oberdrauburg: Preissm. 1876). Bulgar. (: Velen.). Croat. (ad Fiume in valle Recina et ad Abbazia: A.-M Smith). Istr. Creta (: Heldr.). Rhodus (: Bourg.).

8. **Cephalanthera**. 1. *C. rubra*: Fenn. mer.-occ. (paroec. Lojo reg. Abœc: stud. Wallén 1879). Belg. (prov. Namur: Bodart 1884). Rumel. or. (ex Velen.).

2. *C. pallens*: Arcad. m. Kyllene (Orphanides ex Boiss.).

4. *C. ensifolia*: Bulgar. m. Vitos et Osog.-Planina, in silvis (: Velen.). Rumel. or. (pr. Slivno: Skorpil ex Velen.). Istria.

9. **Epipactis**. 1. *E. palustris*: Fenn. mer.-or. (Carel. oneg. et olonets.). Bulgar. or. (ad Kebedze: Bornmüller).

2. *E. latifolia*: Norv. etiam arct., et quidem multis locis, adest usque ad lat. 70° et ultra (ex Norman). — *E. violacea* Durand-Dug. cat. pl. Lisieux; Bor. centr. *E. purpurata* Bor. not. (non Sm.). Gall. centr., bor.-occ. Hampsh. Angl. rr. (Townsend 1873); est var. memorabilis vel potius subspecies.

3. *E. atrorubens*: Batav. (ex Abeleven 1876). Fenn. mer.-or. (Carel. oneg.: Simming 1863). Parnass. (: Guicciardi ex Boiss.). — *E. viridiflora* ad speciem præced. propius accedit (vid. ap. Ljungström in bot. not. 1881) et inter hanc et sequentem media. *E. microphylla* Lge haandb. ed III. (cfr. ed. IV. 230).

4. *E. microphylla*: Alpes-Marit. (Nice, Gairaut, vall. Laghet etc.). Helv. (rarius). Bavar. rr. (sed Badia a Garcke non citatur).

10. **Neottia**. 1. *N. nidus avis*: Fenn. mer. Alpes-Marit. (la Mairis, col de Tenda, silva Clans, St-Etienne, Grasse). Istr. - Græc. p. d. in sola Messen. (: Bory) indicatur; Batav. in sola prov. Nord-Holland.

11. **Listera**. 1. *L. ovata*: Fenn. (exc. Lapp.). Istr. Bulgar. (m. Vitos).

2. *L. cordata*: Fenn. (cum Lapp.).

12. **Spiranthes**. 1. *S. æstivalis*: Batav. (Limburg pr. Weert: van der Sande Lacoste 1873). Germ. occ. versus septentr. usque ad Darmstadt progreditur. Bosn. (ex GBeck).

2. *S. autumnalis*: Istria; in Belgio ineunte sæculo nostro a pharmac. Dossin detecta est (ex Durand).

13. **Goodyera**. 1. *G. repens*: Dan. (paucis locis insular. Sjælland et Bornholm nuper lecta). Batav. (pr. Harderwijk: Bondam 1880). Gall. or. (Nancy, ubi 1878 in silva pinea plantatâ apparuit: Fliche). mer. (Aveyron, ad Milhau). Alpes-Marit. (silvæ Mairis et Clans, vall. Thorenc). Taur. (Aggjenko 1886).

14. **Serapias**. 1. $\times$ *S. triloba*; hæc hybr. etiam a cl. Arcangeli (qui eam pro *Isia triloba* Dnt. habet) ad Pisa observata est inter *S. cordigera* et *Orchis laxiflora*, quæ ultima ibi etiam cum *S. Lingua* et *S. neglecta* plantas hybridas procreat.

2. *S. neglecta*: Sard. (pr. Terranova: de Sardagna 1883). Alpes-Marit. (Menton, Biot, Cannes etc.).

3. *S. pseudo-cordigera*: Alpes-Marit. (reg. litor. et mont.). Herault (rr.: abbé Baichère ex Loret). — *S. laxiflora*; ex Boiss. = *S. parviflora* (5).

5. *S. parviflora*: Balear. (ibi etiam a Barceló et Rodriguez lecta est). Ital. mer. (Amalfi: Lacaita; T. d'Otranto: HGroves, Lacaita). Corcyra (etiam a Spreitzenhofer lecta). *S. laxiflora* (3—) est omnino eadem species ex Boiss.; hoc nomen prioritate gaudet.

15. **Barlea**. 1. *B. longibracteata*: Cephalon. ins. jon. (Mazziari ex Heldreich).

16. **Orchis**. 2. *O. purpurea*: Lothar. Gall. mer. dep. Herault (r.). Alpes-Marit. (Eze, Nice, Drap, Fontan, la Briga). Ross. med. (Curland, Minsk: Lindem.). $\times$ *O. hybrida*: Austr. p. d. (GBeck).

3. *O. militaris*: Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.). Bosn. (: GBeck et al.). - Aland. deest (vid. *O. mascula*).

4. *O. tephrosanthos*: Gall. bor.-occ., mer. (Herault, r.; Alpes-Marit.). Belg.

a *Crepin solum* pr. Wavre indicatur. Istr. (r.). Pelop. (Arcad. et Messen. ex Lacaita in litt.).

6. *O. longicruris*: Aetol. (: Nieder ex Boiss.). Messen. (: Despreaux). Ins. Jonicae (Corfû et Ithaca: Spreitzenh. 1877).

7. *O. tridentata*: Styria (: Maly). Carinth. Istr. Bulgar. (: Velen.). Rumel. or. Bosn. mer. (GBeck 1885). - Siles. solum in duobus locis circuli Teschen lecta. Helv. solum in cant. Ticino. Badia a Garcke non citatur. - Hanc esse veram speciem Scopoli e citatis auctoris (fl. carn.) ex Hallero optime confirmatur. *O. variegata* Jacq. ic. rar. et *O. tridentatam* Scp. et *O. commutatam* Tod. (subspec.) comprehendit. (: Kerner).

**O. commutata*; *O. variegata* Vis. dalm. *O. tridentata* Freyn südistr. (ex Kerner.); hæc in terris mediterraneis vices gerit *O. tridentata*, ut *O. picta* ibi representat *O. Morionem*, *O. saccifera* *O. maculatam*, *O. laxiflora* *O. palustrem* et *O. fragrans* *O. coriophoram*.

9. *O. ustulata*: Bulgar. in pratis alpinis m. Balkan (: Velen.). - Germ. bor. solum in Marchia, Poson., Boruss. — ? *O. ecalcarata* Vayr. in Costa suppl. (1876). Catal. reg. mont.

× *O. Dietrichiana* Bogenh. tasch. jen. 1850. *O. austriaca* Kern. in oe. b. z. 1864; cfr. in diar. soc. z.-b. 1865.

10. *O. globosa*: Siles. (Riesengeb., Gesenke). Erzgebirge. Bulgar.

11. *O. coriophora*: Istr. Bulgar. — *O. fragrans*; Orph. fl. gr. exs. 1108.

**O. olida* Breb. *O. cimicina* ej. olim. Gall. bor.-occ. (pr. Falaise: Brebisson 1834), occ. (dep. Dordogne: Des Moulins). Forse hybr. ab *O. coriophora* et *O. Morio*.

11. a. *O. sancta* L. sp. ed. II. 1830. *O. coriophora* var. *sancta* Rehb. f. - Arch. (Chios: Aucher, Orphanides; fl. gr. exs. 855; Cos: d'Urv.). Rhodus (: Bourgeau). - Specie præced. major, floribus duplo majoribus, etc.

13. *O. Morio*: Bulgar. (ex Velen.). — *O. Nicodemi*; ex Ascherson probab. hybr. ab *O. papilionacea* et *O. laxiflora*.

13. a. *O. Skorpili* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1886 et diar. (sitzb.) 1887. 461; cfr. 1888. 62 (sep.). - Rumel. or. (pr. Slivno, detecta a Skorpil 1885).

14. *O. picta*: Ital. mer.-or. (inter Taranto et Lecce et Brindisi: Lacaita).

15. *O. papilionacea*: Mallorca Balear. (: Barcelò). Alpes-Marit. (Nice, Contes, Berre, Biot; etc.). La Pape (dep. Ain). St-Maurice de Gourdan (: Fiard 1875). — *O. decipiens*; planta rariss. et probab. hybr.

× *O. Gennarii*; planta istriaca derivatur ab *O. picta* et *O. rubra* (*O. Morio* et *O. papilionacea* in Istr. mer. desunt); vid. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 434; etiam ad Goriza lecta est (: Krazan).

16. *O. latifolia*: Ins. Færøer. Island. ad Hafnarfjörðr (ex Rostrup 1888); in Græc. rara est (Lacon, ex Sibth., Messen. ex Bory); Transs. ad *O. incarnata* (17) et *O. cordigera* (18) pertinet ex Smk.

16. a. *O. bosniaca* GBeck in ann. mus. vind. (1887). II. 53. - Bosn. mer. (m. Treskavica alp.: GBeck 1885).

17. *O. incarnata*; *O. ochroleuca* Schur (ex Smk.). — *O. sesquipedalis* Mart.-Donos (ex Loret).

**O. cruenta*: Succ. etiam mer. (Gotland, Ostrog. etc.). Bornholm (ex Krok); Fenn. indicatur in Åland., Ostrob. bor., Carel. oneg.

18. *O. cordigera*: Bulgar. (eximium montium decus: Velen.). Transs. (*O. foliosa* Schur). *O. rivularis* Heuff. exs. *O. latifolia* var. *Rochelii* Grsb. iter.

19. *O. angustifolia*: Fenn. bor.-occ. (Ostrob. mer.), mer.-or. (Carel.). Ross. balt. (r.). Siles. (r.: Uechtritz). — *O. lapponica* (Læst.): Norv. Lapp. Succ. bor. Fenn. bor. — *O. curvifolia* FNyl. (Fenn. bor. Carel. or.).

**O. elatior* Fr. - Öland. Ostrog. Gotland.

20. *O. saccifera*: Bulgar. (m. Vitos, Osogov-Planina etc.) et Rumel. or. (: Velen.). Byzant. (: Coumany ex Boiss.). Bohem. (ad Marienbad ex Borbás 1883). Hung. Transs. Croat. Bosn. (: GBeck 1885). *O. saccigera* Rehb. ic. *O. tetragona* Heuff. (nisi hybr. ab *O. maculata* et *O. latifolia*).

21. *O. maculata*: Ins. Færøer. — *O. elodes*: Batav. (ex Abeleven). Helv. (Chur: Brügger). — *O. candidissima* Krock. (Siles.). — *O. transsilvanica* Schur.

— *O. recurva* FNyl. (in sched.?) probab. idem est ac *O. curvifolia* sub *O. angustifolia* (19).

**O. lapponica*: Norv. Suec. bor.; vid. supra sub *O. angustifolia* (19), ubi melius militet.

22. *O. iberica*; hab. etiam in Aetol. m. Velugo (ex Boiss.).

23. *O. sambucina*: Norv. mer.-or. (Kragerö). Gall. mer. (Herault, rr.; Alpes-Marit., reg. alp. et mont.). Bulgar. (ex Velen.). Pelop. (montes supra Androssa: Gittard sec. Boiss.).

27. *O. palustris*: Sard. (ex Reverchon). Bulgar. (ex Velen.). Ross. mer.-occ. — *O. elegans*: Serb. (ex Bornum. 1888). Bulgar. (ex Velen.); speciei sequenti propior est vel potius propria species, ut habet Borbás in bot. centralbl. 1882 (de distrib. geogr. formarum *O. laxiflora* per Hungariam).

28. *O. laxiflora*: Styria (: Maly). Istria. - Helv. solum in Vales. lecta est; in Germ. deest ex Geke. — *O. alata*: Gall. multis locis adest et bonam speciem constituit ex Gillot (bull. soc. bot. 1881) et JHervier (rech. sur la flore de la Loire, 1885).

29. *O. mascula*: Roslag. (in Lidö ex Krok). Aland. (paroec. Jomala: Kihlman; inde olim nom. *O. militaris* citata erat). Norv. usque ad lat. 67° 55' progreditur (ex Norman). Messen. (ex Bory). — *O. olbiensis* Reut. ap. Moggr. (contr. Mentone). *O. mascula* var. *olivetorum* Gren. in mem. soc. Doubs. 1859: Toulon (: Verlot). Nizza (: Barla). Mentone (: Moggridge).

30. *O. pallens*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., rarius; ex Ardoino).

31. *O. Spitzelii*: Rumel. or. (: Velen.). - Cl. Halacsy primum (1876) putabat hanc speciem prolem esse hybridam, sed postea (1882) hanc conjecturam revocavit.

32. *O. brevicornis*; hab. etiam in ins. Majorca Balear. (Porta 1885).

33. *O. provincialis*: Bosn. mer. (Zoch ex GBeck).

35. *O. saccata*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto, pr. Leucaspide, "rarissima et præcox": HGroves).

36. *O. olbiensis*; vid. supra sub *O. mascula* (29).

× *O. ambigua* Kern. = incarnata + maculata. (Austr.).

× *O. angusticruris* Franch. = militaris + purpurea. (Gall.).

× *O. Bornemanniana* Aschu. = longicornu + papilionacea. (Sard.).

× *O. Braunii* Halacs. = latifolia + maculata. (Wienerwald).

× *O. Bruniana* Brügg. = maculata + Gymnad. albid. (Helv.).

× *O. elatior* Lönnr. (non Fr.). = incarnata + maculata. (Gotland.).

× *O. Heinzeliana* Reich. = maculata + Gymnad. conopea. (Schneeberg).

× *O. Loreziana* Brügg. = mascula + pallens. (Chur Helv.).

× *O. Schulzii* Hsckt. = coriophora + latifolia. (Thuring.).

17. *Anacamptis*. 1. *A. pyramidalis*; Dan. extra ins. Möen solum ad Alindelille Sjælland. lecta est. — *A. brachystachys* d'Urv. enum. (sub Orchide) ex Boiss.: Attica (mont.). Melos (: d'Urville). Creta (: Sieber).

× *A. Durandi*; *Aceras Durandi* Gren.

18. *Nigritella*. 1. *N. angustifolia*: Bavar. in alpinis omnibus. Bulgar. sub cacum. montis Kom (: Velen.). Ross. balt. (Livon.) vix adsit (Klinge n. v.). × *N. fragrans* Saut. ap. Rehb. (1830). *N. suaveolens* K. (1837). *Orchis suaveolens* Vill. = *N. angustifolia* + Gymnad. odoratissima.

× *N. Moritziana* Brügg. = *N. angustifolia* + Gymnad. conopsea. (Bundlia).

19. *Gymnadenia*. 1. *G. conopsea*: Bulgar. plur. loc. (: Velen.).

2. *G. odoratissima*: Luxemb. (EFischer 1881). Westphal. (r.). Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., r.). Istria (mte Maggiore).

3. *G. Friwaldskyana*: Bulgar. (in pratis alpinis m. Kom et m. Vitos et sub m. Rujen: Velen.).

4. *G. albid.*: Ins. Færöer. Fenn. bor. (Kuusamo). Lapp. tulom. (ad Mare Album). Bulgar. (cum præced.: Velen.). Belg. (Spa, Verviers, Baraque-Michel). Gall. bor.-occ. (rarius).

5. *G. cucullata*; in Galic. rariss. est et (sec. Knapp 1872) solum pr. Brody lecta; in loco Bessariano (Rech. exc.) nunc extincta, sed dein (sec. Blocki

1882) in loco novo, scil. Bieniow pr. Zloczow, a Trusz. detecta. Vellhyn. (: Vandas 1886). Curon. (: Lindem., Klinge); locus boruss. ap. Garcke scribitur: Crantz in silva versus Sarkau.

- × *G. Aschersoniana* Brüg. Kill. = *G. albida* + *Herminium Monorchis*. (Engadin.)
- × *G. intermedia* Kern. = *conopsea* + *odoratissima*. (Austr., Bavar.)
- × *G. Schweinfurthii* Hegelm. = *conopsea* + *albida*. (Mähr. Gesenke).
- × *G. Strampfii* Aschn. = *odoratissima* + *albida*. (Engadin).

20. *Platanthera*. 1. *P. chlorantha*: Helv. Istr.: - in Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

× *P. hybrida* Brüg. (1882); inter species proximas a Brügger pr. Chur Helv. lecta: exacte inter parentes media.

2. *P. solstitialis*: Bulgar. (: Velen.): - in Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest. *Orchis montana* Schm. (1793) ad præced. pertinet. — *P. pervia* Peterm. (Lipsiæ etc.) est status abnormis.

3. *P. obtusata*: Lapp. torn. alp. Nuljalaki pr. lacum Torn. (stud. Hågerström 1880). Norv. hab. Finnm. occ. in alpe Sakkabani ad Kaafjord. Duobus his locis hucusque solum lecta est hæc planta rarissima.

4. *P. hyperborea*: cl. Lange l. c. probavit *Orchidem hyperboream* L. (*Platanthera*—Lindl.) et O. Koenigii Retz. (*Platanthera*—Lindl.) unam eandemque sistere speciem, sed distingui posse varietates duas, scil. major et minor; ultima sola in Islandia hucusque cognita erat, sed nuper etiam var. major a Thoroddsen ibi lecta est.

21. *Coeloglossum*. 1. *C. viride*: Ins. Færöer (: Feilberg et Rostrup). Alpes-Marit. (reg. mont.). Bulgar. (in alpinis Balcani: Velen.).

22. *Tinæa*. 1. *T. cylindracea*: Mallorca Balear. (in reg. mont. non rara inter 500 et 1100 metr. s. m. ex Barceló).

23. *Satyrium*. 1. *S. hircinum*: Rumel, or. (: Velen.). Cephalon. ins. jon. (: Letourn.).

24. *Aceras*. 1. *A. antropophora*: Ins. Osilia (Ösel) Ross. balt., rr. (ex Klinge).

25. *Gennaria*. 1. *G. diphylla*: Sard. territ. Tempio (Testa di Sta Teresa: Reverchon 1882). Caprera (præcip. in fruticetis circa domum Garibaldii).

26. *Ophrys*. 1. *O. tenthredinifera*: Balear.; e loco gallico Cete nunc ob viticulturam ibi institutam disparuit ex Gautier (in Le Natural. 1887), sed adsit in alio loco, non multum distante, scil. inter l'Étang de Vendres et mare (: Neyra ex Loret).

2. *O. neglecta*; hab. etiam in Sardin. ex Aschn.

3. *O. arachnites*: Germ. bor. (pr. Rheinsberg Marchiæ ex Geke). Attica. ad Stadium (Orphanides; var. attica Boiss.; pumila, micrantha). - Transs. ad *O. araniferam* (6) pertinet. — *O. obscura* GBeck (1879). *O. hybrida* var. Pokorn. (m. Bisamberg Vindob.).

5. *O. atrata*: Sard. (ex Barbey). Bulgar. (: Velen.); ex Boiss. in Græcia multo vulgarior est quam seq. et adest etiam in Rhodo (: Bourgeau).

6. *O. aranifera*: Belg. inter Blankenberghe et Heyst (: Crepin). — *O. panormitana* (Tod.). *O. Todaroana* Macchiati: Sicil. Sard.

9. *O. Bertolonii*: Sard. (ex Reverchon). Gall. mer. hab. etiam ad Antibes. St-Vallier, Contes. - Ligur. (Nizza, Mentone).

12. *O. Tommasinii*; in Istr. valde rara est; vid. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 435.

13. *O. apifera*: Trauss. a Schur, loco unico, indicata est, sed a Simonkai cruciatur. — *O. Trollii*; solum ad Winterthur et Bex lecta est (ex Gremli).

15. *O. oestriifera*; hab. etiam in Cephalon. ins. jon. (: Heldr.).

16. *O. bicornis*: — *O. cornuta*: Aetol. (: Nieder). Pelop. (: Bory). Ins. Jon.: Cephalon. (: Heldreich), Corcyra (: Barbey).

17. *O. bombyliflora*: Balear. Alpes-Marit. (Ventim.: Moggridge; Mentone: Hawker; Antibes: Thuret, Bornet).

18. *O. muscifera*: Fenn. mer.-or. (Carel. oneg.). Norv. arct. intrat (in Nordlandem), sed non ultra lat. 67° progreditur (ex Norman). Germ. bor. valde rara; in Siles. et Saxon. omnino deest ex Gcke. - Batav. solum in prov. Zeeland adest.

19. *O. Speculum*: Balear.; Græc. solum in Attica et Pelop. indicatur.

21. *O. fusca*: Menorca Balear. (: Rodriguez, Willkomm). *O. tricolor*: leg. iricolor.

27. *Chamæorchis*. 1. *C. alpina*: Galic. (rr.). Carinth. Styr. variis locis Alpium calcar. adest.

28. *Herminium*. 1. *H. Monorchis*: Aland. (olim a Kalm ibi indicatum erat; 1863 lectum est a Zetterman). Alpes-Marit. (Tenda, S-Martin-Lant. etc.).

CXXV. IRIDÆÆ.

1. *Sisyrinchium*. 1. *S. anceps*; ad Hamburg (in Eppendorfer Moor) a pluribus annis omnino inquilinum est.

2. *Iris*. 1. *I. Xiphium*; hab. etiam in Sard. ex Aschn.

7. *a. I. Boissieri* Henriq. in bolet. soc. broter. III. 183. Lusit. bor. (m. Serra do Gerez, alt. 600—900 metr. s. m.: Henriquez); ex Willk.

8. *I. florentina*: Sard. (ex Reverchon). Rhodus (: Bourg). Græc. solum in Lacon. indicatur: forse inquil., qualis etiam in Gall. mer. dep. Herault (inter Agde et Cette) adest.

9. *I. albicans*; — ? *I. majoricensis* Barc. fl. isl. balear. 446. *I. florentina* Barc. apunt. (ex ipso). - Mallorca Balear. (vall. d'en March inter Pollenza et Lluch, r.: Barcelò).

10. *I. germanica*: Achaia pr. Megaspoleon (Heldr. ex Boiss.). Bavar. (ex Prantl) et in tota Germ. (ex Gcke) non nisi e cultura in hortis nunc in muris et collibus, in pratis, rupibus etc. quasi spontanea. - Creta ad *I. pallidam* (12) pertineat.

**I. illyrica*: Fiume Croat. (A-M.Smith).

11. *I. sicula*: Sard. (ins. S. Pietro: Gennari). Balear. (*I. germanica* Barc. apunt.; vera non nisi culta ibi adest).

12. *I. pallida*: Sard. in herbidiis Oliastro et in pascuis sterilibus d'Orose etc. (hb. Moris. ex Barbey). Creta (Sibth.: *I. germanica* fl. gr.). Rhodus (: Bourgeau). - Helv. non nisi Vales. (ad St-Maurice) indicata est, sed dubie (ex Gremli).

14. *I. squalens*: Engadin (Helv. mer.) pr. Remues, val Sinestra, in pariete montis schistosi, circa 1200 metr. s. m. (var. *rhætica* Brügg.; vid. Killias fl. untereng. 177—180). - Transs. ad *I. variegatam* (17) pertinet ex Smk.

15. *I. sambucina*: Bavar. bor. (rupes ad Danubium: Donauwörth, Regensburg). Bayr.-Wald (Passau etc.). Nassauv. indicatur ad Braubach, sed sec. Garcke in tota Germ. (et Bohem.) non nisi introducta adest (prov. Rhen., Thuring. etc.). Transs. ad *I. hungaricam* (18) pertinet ex Smk.

17. *I. variegata*: Bavar. hab. (sec. Prantl) sponte ad München, Unterschleissheim et Landshut. Carinth., rarius (Satnitz in rupibus; Bleiburg: Pacher. Jaborn.). Bulg. (: Velen.). Rumel. or. (: Skorpil ex Velen.).

**I. leucographa*; non nisi Pesthini lecta est (ex Borbás).

19. *I. nudicaulis*: Thuring. Morav. (rr.). Galic. (ex Knapp). - Transs. ad *I. hungaricam* (18) pertinet ex Smk.

20. *I. furcata*; in Transs. nunc plurib. locis lecta est.

24. *I. olbiensis*; sec. Loret (fl. montp. ed. II. 482) hæc et præced. (*I. lutescens*) non species distinctas, sed vix varietates, constituunt; ambæ in dep. Herault, in rupibus montium (rr.) adsunt.

25. *I. italica*: Alpes-Marit. (Nizza, Vences, l'Esterel; ex Ardoino).
26. *I. pseudo-pumila*; Comment. 236.
27. *I. pumila*: m. Gargano Apuliæ ex Janka (: Cesati).
28. *I. virescens* (*I. lutescens* Gaud., K. non Lam.). Vales. (Helv. mer.) adest, sed loco unico, scil. in rupibus calcareis ad arcem Tourbillon pr. Sion (Sitten).
- **I. Reichenbachii*: Bulgar. (Lom Palanka). Rumel. or. (Sliven etc.: I. Balkana Vel. 1886 ex ipso).
29. *I. attica*: Arch. ins. Chios (: Orphanides); ins. Pharmacusæ (ex Boiss.).
30. *I. Chamæiris*: T. d'Otranto (pr. S. Pietro in Bevagna: HGroves); cfr. *I. pseudo-pumilæ* (26) comment.
32. *I. mellita*; *I. pumila* Grsb. spicil. p. p.
34. *a. I. bosniaca* GBeck in ann. mus. vind. 1887. - Bosn. m. Vlasie reg. alp. (Brandis 1884) et m. Trebovic pr. Sarajevo (GBeck 1885). *I. xanthina* Freyn (in litt. ad Brandis 1884).
35. *I. rubro-marginata*; a cl. Barbey detecta est pr. Scutari, igitur in litore asiatico (cfr. ej. fl. sard. comp. 59), sed nuper (1886) cl. Velenovsky hanc speciem invenit in Rumel. or. (m. Bakadzik) et sic floræ europæe eam vindicavit.
36. *I. Pseudacorus*; Norv. arct. adest ibique (ex Norman) progreditur usque ad lat. 68° 13' (speciei terminus polaris). Ins. Færøer. Fenn. hab. etiam med. et bor.-occ. (Ostrob.). Bulgar. (: Velen.).
38. *I. spuria*: Neap. (ad Eboli: Janka). Morav. (ad Lundenburg pr. limites austriacos: Formanek). Dan. ins. Saltholm copiose; ceterum in insulis sinüs Nakskov-fjord et in Aegholm ad Fynshoved.
39. *I. Güldenstædtiana*; Comment. 237.
40. *I. Monnieri*; hab. etiam in ins. Rhodo (Lemonnier ex Boiss).
41. *I. sibirica*; hab. etiam in Bulgar. (ex Velen.).
42. *I. Pseudo-Cyperus*; sec. Simonk. est = seq. *I. graminea*.
43. *I. graminea*: Bulgar. (ex Velen.). Bavar. non nisi efferata adest ex Prantl (1884): - Maced. ad I. Sintenisii (44) pertinet.
43. *a. I. lorea* Jka in diar. mus. nat. hung. 1877. *I. foetidissima* H.P.R. exs. 1875. - Ital. mer.; cfr. HGroves in gior. b. ital. 1887. 197 (*).
44. *I. Sintenisii*: Dobrud. (in dumetis apricis ad Teke: fratr. Sintenis). Bulgar. (pr. Razgrad: Velen. 1885). Hæc species primum lecta est a Frivaldszki pr. Slivno Thrac. (Rumel. or.) et a Janka ibidem 1872, dein a Skorpil plur. locis Rumel. or. (ex Velen.).
45. *I. cæspitosa* Pall. in litt. ad W.; Lk jahrb. I. (1820). *I. ruthenica* Fuss (non Ait.); cfr. Grsb. Schenk iter hung. et Jka in oe. b. z. 1868.
47. *I. unguicularis*; ex Boiss. planta europæa differt a specie Poirerii et ad *I. cretensis* Jka (48 *) pertinet; adest etiam in Thessal. (: Heldreich).
4. **Gynandriris.** 1. *G. Sisyrinchium*; hab. etiam in ins. Balear.
5. **Gladiolus.** 1. *G. segetum*: Helv. mer. (Genève, Lugano cant. Ticino). **G. Guepini*; sec. Arnaud (1877) est = *G. segetum sterilis* (antheris abortivis); prope Lagrac frequens, et adest etiam ad Agen et Montpellier (: Loret). — ? *G. Borneti* Ardoino fl. alp. marit. (Nizza, Antibes); crescit cum *G. segetum*, sed rarior est.
3. *G. imbricatus*: Poson. Lusat. Morav. Helv. mer. (cant. Ticino). *G. Fresneli* Zaw. (ex Knapp).
4. *G. illyricus*: Bulgar. (ex Velen.). Bosn. (: Brandis 1886 ex Freyn).
6. *G. communis*: Sard. (: Gennari); etiam in Balear. indicatus, sed ex Barceló ibi non nisi cultus adest.
7. *G. dubius*; synonym. fl. gr. ad *G. segetum* (1) pertinet ex Boiss.
9. *G. palustris*; hab. etiam in Carinth. (r.).
6. **Romulea.** 1 * *R. grandiflora*; — *R. flaveola*: Sard. (Reverch. 1882).

6. *R. Linaresii*: Mallorca Balear. (pr. Arta: Marès). Græc. (ex Boiss.) hab. in Thessal. (: Spruner), Attica (: Heldr.), Taygeto (Boiss.).

7. *R. Requierii*: Sard. (hb. Moris. ex Barb.; Reverchon).

8. *R. ligustica*: Sard. pr. Sta Teresa (: Reverchon).

9. *R. ramiflora*: Alpes-Marit. (Menton, Cannes, Antibes; ex Ardoino). Pyren. or. (Legrand 1883); in dep. Herault hab. (ex Loret) etiam ad Vic, Portiragnes, Maguelone; la Mossen (var. *R. Rollii*). Sard. (Schweinf. ex Aschn). — *R. Parlatoresi*: Ital. mer-or. (T. d'Otranto prope ostium fluv. Taro: CCLacaita ex HGroves).

7. **Crocus**. 2. *C. biflorus*: Rumel. or. (: Skorpil, Velen.). - Maced. non commemoratur in Boiss. fl. or., sed ibi var. *Pestalozzeæ* citatur e Byzantio (ad Bosphorum inter Pera et Bujukdere: Maw). — *C. lineatus*: Croat. (Hirc 1882).

3. *C. Crewii*; detectus est 1874 a cl. Elwes in ins. Syra; a cl. Lacaita (litt. 1884) lectus in Pelop. inter Agianni et coenob. montis Malevo, in Taygeto a Psarides (ex Boiss.); ex Maw (teste Lacaita) est = var. *antheris nigris* (*C. melantherus* Boiss. in Orph. exs. 1870) speciei præced.

5. *C. moesiacus*: Bulgar. (ex Velen.). — *C. sulphureus* culturâ ortus est, nec locis citatis spontaneus (ex Boiss.).

8. *C. pulchellus*; hab. etiam in Rumel. or. (: Velenovsky).

9. *C. Olivierii*: Pelop. (m. Malevo: Lacaita). *C. Aucheri* ex ipso Boiss. est = *C. Suterianus* Herbert, qui tamen vix aliud est quam var. *Croci* Olivieri.

10. *C. lævigatus* (Heldr. hb. norm. 885): Euboea (: Heldr.), sed e Cyclad. non citatur ap. Boiss. Flores sec. Boiss. autumnales. — *C. Boryi* Heldr. hb. norm. 440. *C. lævigatus* var. *Gayanus* Heldr. hb. norm. 886. *C. lævigatus* var. *albiflorus* Boiss. in Heldr. exs. a. 1845.

11. *C. Tournefortii* (*C. Tournefortianus* Herbert); loca plurima (Cephal., Zacynth., Pelop.) desunt ap. Boiss. et probab. ad aliam speciem (ad 14. *C. Boryi*?) pertinent.

12. *C. Orphanidis* (*C. pholegandrus* Orph. ms.) a præced. non distinguendus est sec. Maw.

13. *C. marathonisius*; sec. Boiss. fl. or. est var. major, latifolia et grandiflora speciei sequentis.

14. *C. Boryi*; hab. in Bæotia, Messen., Lacon., ins. Jonicis.

**C. cretensis* (*C. Veneris* Tapp. in Poech. cypr. 10); sec. Maw valde proximus *Croco Tournefortii* (11).

21. *C. Imperati*; indicatur etiam in Cors. (: Chabert 1882).

25. *C. medius*: Alpes-Marit. (inter Gorbio et Roccabruna, mt Mulacé supra Mentone: Ardoino; Tenda: Balbis).

26. *C. Thomasii*: T. d'Otranto, ubi a Sir James Lacaita 1879 (med. Nov.) repertus secus margines sic dictæ "gravina" di Leucaspide pr. Taranto (sed ad Gravina nelle Murgie, ubi a Tenore indicatur, frustra quæsitus est ob commutationem nominis et vocis gravina); ex HGroves in linn. soc. journ. 1885 et gior. bot. ital. 1887. 115 (*). CCLacaita (litt. 1884) hanc speciem legit (copiose) in alio loco, scil. in quercetis lapidosus inter San Basilio et Martina ad fines territ. T. d'Otranto et T. di Bari. Comment. 238.

27. *C. Pallasii*: Bulgar. (ad Razgrad: Velen.); sec. Janka (1882) ad hanc speciem pertineat: *C. Thomasii* (26), *C. hybernus* (28—), *C. peloponnesiacus* (30).

31. *C. Cambessedesii* (*C. Cambessedeanus* Herbert). *C. maguntanus* Rodr. catal. suppl. (Menorea plur. loc.); sec. auctores floret hieme (Nov.—Febr.), dum *C. Cambessedesii* autumnno flores explicat, sed ex cl. Maw, qui utrumque in loco natali legit, *C. maguntanus* minime differt, adeo ut in Balearibus una sola adsit species, scil. *C. Cambessedesii*, quæ ibi mens. Oct.—Nov. floret.

33. *C. Orsinii*; *C. dalmaticus* H.P.R. exs. sec. Jka.

35. *C. vernus*: Austr.-Infer. in alp. calcar. bor. vallecula Erlavensi (: Ker-

ner). Bavar. extra Alpes indicatur spontaneus ad Lindau, Schongau etc. (num 36 *?). Helv. hæc species non adest, sed solum 36 * C. albiflorus (ex Gremli).

Obs. Sec. Kerner (oe. bot. z. 1877) hic C. vernus Wulf. inhabitat loca magis meridionalia (Ital., Carn.), excepto illo austriaco supra citato; loca cetera austriaca ad C. albiflorum (36*) pertinent, sed flores sæpe violacei.

36. C. Heufelianus; adest in jugo omni Carpatorum et in m. Babiagora Galic. occ. usque in Silesiam; rarus est, sed gregatim crescit (in pratis montanis). C. veluchensis auct. transs. (ex Smk.).

*C. albiflorus (C. vernus All. ex Kerner): Pyren. Alpes. Hung. (r.). Siles. (r.). Würtemb. Silva Nigra (ex Kerner).

39. C. veluchensis: Bulgar. in cacum. montis Kom et m. Vitos copiose (ex Velen.); m. Korax etiam in Aetolia situs est, sed m. Oeta in Thessal.

40. C. Sieberi: Pelop., in m. Malevo, usque ad cacumen, in m. Chelmos ad nives deliquescentes (: Lacaita).

42. C. reticulatus: — ? C. Roegnerianus CKoch (1848). Ross. mer. ad Borysthenem (Dniepr) inferior. et pr. Odessa; sec. Lindemann.

CXXVI. AMARYLLIDEÆ.

2. Carregnoa. 1. *a.* C. dubia Perez-Lara (qui ad Jerez de la Frontera prov. Cadiz hanc plantam primus legit 1875). Crescit inter C. luteam et Narcissum serotinum; paucissima solum specimina cognita (hybr.?). Cfr. sub Narcisso serotino.

Obs. Forse immerito hæc planta a Narcisso separatur et contra naturam generi Carregnoa, aliter (sine hoc additamento) eximio, adscribitur.

3. Narcissus. 1. N. Pseudo-Narcissus; Germ., ubi (ex Geke) sæpius non nisi subspontaneus, potiss. habitat in prov. Rhen. (Eifel, Hundsrück etc.) et in Hassia; Alsat. (Vogesi altior.). - Transs. non nisi cultus adest ex Smk.

2. N. major: Gall. mer. dep. Aveyron (m. Aubrac, ubi spontaneus dicitur).

3. N. moschatus: Pyren., ubi a Bordère detectus (ex Timb.-Lagr. 1887).

5. N. calathinus; hab. etiam in ins. Groix (dep. Morbihan); in ins. Glénans hæc species peritura dicitur quia insulæ dictæ submersioni subjectæ sunt; rarissima igitur est et vix alibi lecta. N. reflexus auct. hisp. ad N. juncifolium (37) pertinet ex Crié.

7. N. incomparabilis; hab. etiam in Vales. (val d'Illicz) ex Gremli.

9. N. rupicola: Sierra de Gredos (Graëlls 1852, Leresche 1862). Pyren. (: Bordère ex Timb.-Lagr. 1887).

11. N. cernuus; sec. Willk. in Hisp. solum pr. Leon (: Bourgeau) lectus est quia planta asturica ad seq. (N. pallidulum) pertinet.

15. N. biflorus; hæc species adest copiosa pr. oppidum Saintes (dep. Char.-Infer.), ubi in pratis omnibus usque ad Port-Breteau provenit (: Brunaud 1878).

16. N. poëticus; in Helv. (ex Gremli) non nisi subsponte adest (in hortis rusticorum).

17. N. radiiflorus: Helv. (in pratis alpinis et subalp.). Ital. bor.-or. (prov. Veneta: Bizzozero 1882). Istr. etiam in mte Maggiore (freq.). Bosn. (m. Vlasic: Brandis ex Freyn). N. poëticus Sm. prodr. (ex Boiss.).

18. N. polyanthos; locus atticus probab. ad speciem sequentem pertinet.

19. C. papyraceus: Zacynth. (: Margot). Messen. (: Dænzer). Naupl. et Attica (: Spruner); ex Boiss. or. — N. (Hermione) Seguentiæ; ex Nicotra prodr. fl. messan. (1883) est potius "forma singularis" N. Tazettæ.

*N. Barlæ; — N. Gennarii; est = N. polyanthos (18) sec. Janka.

*N. albulus Levier in Sz. hb. et arch. ital. biol. 1884. Florentiæ nuper ortus et a Levier detectus; circa urbem dictam nunc freq. colitur (: Levier).

23. N. elatus: Ital. mer.-or. (Otranto: HGroves); Neapoli et Florentiæ e bulbis N. byzantini hort. enatus est, et (ad Fiesole, sub oleis) ab aliquot annis inquilinus (ex Levier).

24. *N. Tenorii*; Florentiæ inquilina est in pratis ad rivulum parvum "Ema"; species spectabilis et *N. poetico* et *N. bifloro* facile approximanda ex Levier, qui primus agnovit hanc stirpem eandem esse ac planta in Bot. Mag. (nom. *N. orientalis* = *N. constantinopolitanus* hort.) exhibita (: Boiss. fl. or.).

25. *N. Tazetta*; de hac specie valde variabili (si species ex ea distinctas non agnoscas), et præcipue de planta gallica, cfr. Loret fl. montp. ed. II. 486.

**N. canaliculatus*: Sard. in rupibus calcareis supra Sta Teresa (: Gennari).

26. *N. patulus*: Cors. (EPetit 1884). — *N. Timbali* Gaut.: Ile de la Planasse in Etang de Bages pr. Narbonam (Gautier 1876). Massif de la Clape (Pourret), locus ab altero parum distans.

27. *N. neglectus*: Istr. mer. (S. Marino: Marchesetti 1873 ex Freyn).

28. *N. obliquus*: Alpes-Marit. (Mentone: Moggr. ex Ardoino).

29. *N. italicus*: Sard. (ex Aschn). Alpes-Marit. (Mentone, Monaco, Nizza, Grasse; ex Ardoino).

31. *N. aureus*: Alpes-Marit. (le Bar, Magagnosc, Mentone; ex Ardoino). - Species quoad florum pulchritudinem, colorem et suaveolentiam cum nobilissimis amaryllideis exoticis certat (: Levier). Hæc et duæ sequentes (optime distinctæ) species non nisi in statu subspontaneo cognitæ sunt, patriâ vera omnino ignota, vel in hortis natæ a narcissis spontaneis nunc ignotis, vel e serie hybrid. occultâ ortæ; nunc in campis, ubi migravere, characteres servant (: Levier).

32. *N. Bertolonii*: Sard. (ad Sta Teresa Gallura: Reverch. 1882).

34. *N. intermedius*: Alpes-Marit. (Menton, Grasse; ex Ardoino).

37. *N. juncifolius* (1816 nec 1806); Hisp. usque in Navarra, Castella nova et Estremadura progreditur (: Willkomm).

40. *N. autumnalis*: Sard. (Scala di Ciocca) ex Macchiati.

41. *N. serotinus*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto: HGroves). — ? Carregnoa dubia Perez-Lara in annal. soc. hisp. hist. nat. XI. (1882); Willk. illustr. hisp. 120. tab. 74; cfr. supra pag. 297 sub gen. Carregnoa.

4. **Corbularia.** 2. *C. nivalis*: Cantabr. (Picos de Europa: Ler. Lev.). Sierra de Gredos (: Graëlls, Leresche).

5. *C. cantabrica*; — *C. monophylla*; Comment. 239.

5. **Sternbergia.** 1. *S. lutea*: Mallorca Balear. (: Barcelò). Croat. (pr. Buccari: Hire 1883).

2. *S. citrina*; exs. et loca attica ad speciem sequentem pertinent ex Boiss. et Heldr. - *Amaryllis citrina* fl. gr. 811 *S. colchicifloram* (4) spectat ex Boiss.

3. *S. sicula*; Heldr. hb. norm. 888 (ex Attica). *S. lutea* var. *græca* Heldr. olim; cfr. speciem præced.

4. *S. colchiciflora*: Ross. mer. (gub. Cherson, Odessa); in m. Olenos Pelop. a solo Sibthorp lecta est (*Amaryllis citrina* fl. gr.).

5. *S. ætnensis*: Prov. Rom. or. (mts Ernici: Baldini et Pelosi 1886). Hisp. bor. (prov. Santander: Ler. Lev. 1879), centr. (prov. Matrit. ex Rouy 1879), mer. (Sierra d'Antequera et S. de la Niève ex Rouy).

7. **Leucojum.** 1. *L. vernum*: Gall. bor.-or. — var. *biflorum* Smk. (1879). *L. æstivum* Schur, *Erinosma carpaticum* Herbert ap. Czetz; hæc var. in Transs. typo frequentior est sec. Smk.

2. *L. æstivum*: Phalzia (supra Speyer, ad Trippstadt). Helv. (Yverdon, Nidan). Bulgar. (ex Velen.). - Transs. ad præced. (var.) pertinet ex Smk.

3. *L. Hernandezii*: Cors. (Bastia: Huon ex Rouy). Gall. mer. (pr. Toulon ex Legrand 1883; Hières: Coincey ex Rouy 1888).

5. *L. roseum*: Sard. (Sta Teresa Gallura: Reverch. 1881).

6. *L. grandiflorum*; hab. Lusit. mer. (Lisboa etc.). Bætic. prov. Gadit. (: Schousb.; inter Conil et Vejer: Willk.); ex observ. cl. i Willkom. a seq. (*L. trichophyllo*) specificè non differt.

9. *L. hiemale*: Gall. mer. (pr. Villes dep. Vaucluse: Bouzquet sec. Bonnet 1882; ex Rouy locus est in dielivit. septentr. m. Ventoux). Alpes-Marit. (in rupibus inter Mentone et Nizza hinc inde). *L. niceense* Ardoino (quia species præcipue in comitatu niceensi provenit et nunquam hieme floret sed vulgo mense Aprilis).

8. *Galanthus*. 1. *G. nivalis*: Gall. bor.-occ., or. (Côte d'Or, H.-Marne). Bulgar. (ex Velen.).

2. *G. Imperati*; sec. Goiran (1880) adest etiam pr. Verona (Ital. bor.).

3. *G. Olgæ*; ad calcem generis removendus; a speciebus reliquis i. a. florescentia autumnali recedit.

4. *G. plicatus*: Rumel. or. (pr. Slivno et Philippopel: Velen., Skorpil).

5. *G. græcus*; *G. nivali* propius accedit quam *G. plicato*.

Obs. 2. *Agave americana*: pro historia locupletiori hujus plantæ oportet consultare dissertationem cl. Dr's Danielli "Studi sull' *Agave americana*" (in giorn. bot. ital. 1885. sep. 1—92*), ubi methodo et diligentia "plante mirabili" (arbol de las maravillas) omnino dignis tractatur de litteratura, introductione et distributione geographica hujus Agaves, de ejus systematica et nomenclatura, biologia, morphologia et histologia, nec non de cultura et usu.

CXXVII. SMILACÆ.

1. *Smilax*. 1. *S. excelsa*: Rumel. or. (Slivno: Skorpil). Bulgar., ubi cl. Velenovsky in declivibus maritimis ad Varna etc. hanc speciem, cum Vite et *Periploca*, rupes et arbores ornare vidit; in dielivibus omnibus Bulgar., inter frutices: cl. Bornmüller.

2. *S. aspera*; — var. *balearica* Willk. ind. balear. 143. Mallorca Balear., præcip. in montium declivibus asperis, usque ad cacumina et valde characteristicæ.

**S. nigra*; in Boiss. fl. or. non commemoratur.

3. *S. mauritanica*: Sicil. (ubi sec. Guss. magis obvia quam species præced.). Ins. Aeol. (Lipari, Saline: Lojac.). - Maced. pænins. athoa (Orph. fl. gr. exs. 1078).

CXXVIII. ASPARAGÆ.

1. *Ruscus*. 1. *R. aculeatus*: Bulgar. Cephalon. ins. jon.

2. *R. Hypoglossum*: Austr.-Infer., in silva faginea Minichwalde pr. Wilhelmsburg, unde a rusticis reportatus et a cl. Hackel recognitus est (1883); proxime provenit ad Pressburg Hung.; Galic. rr. adest (ex Knapp) et Styriæ, sec. Maly, duobus locis (Cilli et Wotschberg).

3. *R. Hypophyllum*; in m. Atho a solo Sibthorp lectus est.

2. *Asparagus*. 1. *A. stipularis*; hab. etiam in Sard.

2. *A. aphyllus*: Cephalon. ins. jon. (in saxosis ubique: Heldr.). - Euboea et Cyclad. in Boiss. or. non citantur.

5. *A. scaber*; hab. etiam in Sard. (ex hb. Moris.).

6. *A. officinalis*: Dan. etiam pænins. (sed raro). Helv. hinc inde in aridis et ripis spontaneus est ex Greml. — *A. oxycarpus* Stev. ex Boiss. (Taur.).

7. *A. tenuifolius*: Gall. mer. etiam dep. Herault (Le Larzac: Loret). Helv. mer. (cant. Ticino). Carinth. r. (in declivibus Dobratsch pr. Föderaun). Bulgar. Ross. mer. (Bessarab., Cherson: Lindem.). - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

8. *A. trichophyllus*: Bulgar. (pr. Sofia: Skorpil ex Velen.). Rumel. or. (ex Velen.). Ross. mer.-occ. (Bessarab.: Lindem.).

8. a. *A. maritimus* Pall. it. II. 329. (1773). - Ross. mer. gub. Cherson (in salsis et arenosis ad litora maris: Lindem.).

9. *A. verticillatus*: Bulgar. in declivibus marit. ad Varna et in collibus ad Lom Palanka (: Velen., Bornm.). Rumel. or. (Aitos: Skorpil).

3. **Streptopus**. 1. *S. distortus*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont.: Tenda, Boréon, St-Dalmas-le-Sauvage, Ste-Anne-de-Vinai). Bavar. (Alpes, Bayr.-Wald; Schongau, Tölz etc.). Bosn. mer. (m. Treskavica: GBeck 1885).

4. **Polygonatum**. 1. *P. verticillatum*: Gall. mer. etiam dep. Herault (Fraisie: Maillé ex Loret).

3. *P. multiflorum*: Dan. (in silvis vulgat.). Suec. etiam bor. (Angerm., r.). Fenn. etiam mer.

5. *P. latifolium*: Carinth. (Laufenberg vall. Kanningner). Bulgar. Rumel. or.

5. **Convallaria**. 1. *C. majalis*; exc. etiam Lapp. fenn.; hab. etiam in Bulgar. (ex Velen.).

6. **Majanthemum**. 1. *M. Convallaria*: Gall. mer. (dep. Herault, rr.). - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

7. **Paris**. 1. *P. quadrifolia*; hab. etiam in Bulgar. (ex Velen.).

CXXIX. DIOSCOREÆ.

1. **Tamus**. 1. *T. communis*: Luxemb. Bavar. bor. (ad Lindau). Bulgar. **T. cretica*; ex Boiss. or. solum in Creta et Attica provenit; in pœnins. athoa (Maced.) exstat var. valde latifolia (: Grisebach).

2. **Dioscorea**. 1. *D. pyrenaica*; Magn. fl. sel. exs. 133.

CXXX. LILIACEÆ.

1. **Aloë**. 1. *A. vulgaris*; etiam in Balear. (Mallorca, Formentera) quasi spontan. in rupibus et muris rarius adest; commemoratur in manuscr. quibusdam sæculi 12:i, ubi dicitur crescere in Græcia et Apulia, sed forse de planta culta agitur.

2. **Hemerocallis**. 1. *H. fulva*; Helv. sæpius vix nisi efferata adest ex Gremli; Carinth. non nisi subspontanea (in hortis) provenit ex Pach. Jaborn.; Ross. mer. gub. Cherson in umbrosis pr. Elisabethgrad ("verosimiliter tantum assuefacta": Lindem.).

2. *H. flava*; Styr. non nisi unico loco lecta est ex Maly. - Transs. solum culta adest ex Smk. (sic etiam species præced. ex eodem).

3. **Paradisica**. 1. *P. Liliastrum*; Helv. hab. etiam in Jura (la Dôle).

4. **Anthericum**. 1. *A. Liliago*: Batav. (pr. Apeldoorn: Hugenholz 1881). Dan. pauciss. locis Sjellandiæ, Fionie et Jutl. lectum est. Germ. (ex Geke) deest in Lusat., Poson., et in Boruss., Siles. rarissime provenit.

3. *A. ramosum*: Gall. bor.-occ., bor.-or., mer. (dep. Herault). Dan. non nisi in Sjelland. lectum est (ex Lge). Suec. hab. etiam in Bleking. (ad Sölvesborg). Bulgar. (: Velen.). Rumel. or. (: Bornm.).

5. **Simethis**. 1. *S. bicolor*: Gall. bor.-occ. (rarius); mer. etiam in dep. Herault (pr. Saint-Pons: Barthès ex Loret. Barrand.).

6. **Asphodelus**. 1. *A. ramosus*: Mallorca Balear. (rarius: Marès). Alpes-Marit. (l'Esterel, Villafranca, inter Monaco et cap. Veglia, mt Mulacé etc.; ex Ardoino). — *A. corsicus*; hab. etiam in Sard. (ex Reverch.).

2. *A. microcarpus*: Mallorca (Puig de Torrella: Bourg.). Græc. tota (ex Boiss. or.).

3. *A. albus*: Vales. (Helv. mer.). Bulgar. (in declivibus montium plur.).

5. *A. Morisianus*; species rariss. et solum e descript. Parlat. nota; in hb. Moris. non exstat (: Barbey).

7. *A. tenuifolius*: *Linosa* (ins. parva inter Siciliam et Mauritan.), locis saxosis: *Lojacono*.

7. **Asphodeline**. 1. *A. lutea*: *Arch.* (Wied ex Boiss.).

3. *A. liburnica*: *Bulgar. Thessal. m. Ossa* (Heldr. 1882). *Rhodus* (: *Bourg.*) ex Boiss. fl. or., ubi nulla loca attica citantur.

9. **Lilium**. 1. *L. candidum*: *Gall. mer. pr. Hières* (et Grasse) inquil.; etiam in *Balear. subspontan.* (*Mallorea* in campis ad *Valldemosa* etc.).

2. *L. bulbiferum*; *Germ.* (ex Geke) hab. in *Erzgebirge, Thüringerwald, Hannov., Westphal.*; *Siles.* in *Glatzer-Schneeb.*, *Gesenke.* - *Helv.* solum in cant. *Graubünd.* (les Grisons) ex *Gremli.* - *Bavar.* non nisi in *Alpibus* certe spontan. (*Berchtesgaden, Reichenhall, Kreut* etc.).

**L. croceum*: *Alpes-Marit.* (reg. mont. hinc inde); *Helv.* non rarum est. *Locus irregularis* est "in roggelanden bij Vries in Drenthe", ubi 1885 lectum (ex Abeleven), certe introductum.

4 * *L. Jankæ*: *Bulgar.* in lapidosis sub cacum. *m. Kom* (: *Velen.* 1887). — *L. graveolens* *Panc.* (*Serbia*) ex Boiss.

5. *L. pomponium*; in *Delph. convalle Gavel.* spontaneum sec. *Mutel*, sed ex *Verlot* specimina probab. in *Gavel* culta fuerunt.

6. *L. chalcædonicum*; hab. etiam in *m. Gymnovuono* (: *Orph.* ex Boiss.).

8. *L. carniolicum*: *Carinth.* (mont. calcar. et in subalpinis plurib. loc.). — *L. bosniacum* *GBeck* in ann. mus. vind. 1887. (*Bosn. mer. subalp.*).

9. *L. Martagon*: *Lothar.*; *Gall.* etiam *mer.* (dep. *Herault*, in reg. mont., rarius). *Bulgar.* (in *m. Vitos* etc. ex *Velen.*; in silvis *Kamcyk*: *Bornm.*). *Ross. centr.* (gub. *Kursk*: *Höfft*), *balt. mer.* in pratis silvaticis etc. (r.) ex *Klinge*.

10. **Fritillaria**. 1. *F. ruthenica*: *Ross. centr.* (gub. *Kursk*), *mer.* (gub. *Cherson*), *mer.-occ.*

2. *F. conica*; species rara, huc usque solum in *Messenia*, inter *Navarin* et *Modon*, lecta (a *Bory*).

4. *F. pyrenaica*: *Cantabr.* (*Picos de Europa*: *Ler. Lev.*). *Gall. mer.* etiam in dep. *Herault* (r.). — ? *F. Boissieri* *Costa. F. Meleagris* *Pourr.* (*Catalon.*).

5. *F. messanensis*; in *m. Malevo* (*Lacon.*) pr. *Hagios Joannis* lecta est ab *Orphanides*, in ins. *Leucade* a *Letourneux* (ex Boiss.).

8. *F. hispanica*: *Arag. Catal.* (*Montserrat, r.: Lacaita*). *Valenc.* (*Lacaita* ex *Willk.*). *F. montana* *Losc. Pardo*.

10. *F. græca* (*Orph. fl. gr. exs.* 111, nec 110); hæc species proxime stat *F. messanensi* (5) et sequens (*F. Guicciardii*) est ejus varietas (sec. Boiss.).

11. *F. Guicciardii*: *Parnass.* (*Sibth., Guicc.* ex Boiss.). *Thessal. m. Oeta* (*Sprun.* ex Boiss.).

12. *F. Rhodocanakis*; hab. in vineis coenobii *Hagios Elias* ins. *Hydra*.

14. *F. Ehrharti* (*Orph. fl. gr. exs.* 845); nomen rectius scribitur *Ehrhardii* sec. adnot. *Heldreich.* ap. *Orph. l. c.*; locus natalis est pr. *Coimos* (ins. *Syra*).

15. *F. Sibthorpiana*; extra *Euboeam* solum prope *Navarin* (: *Hawkins* sec. *Sm.*) lecta est. — *F. Fleischeri* est species propria sed non europæa (sec. Boiss. fl. or.).

16. *F. pontica*: *Thrac.* (*Rumel. or.*) etiam supra *Kalofer* et pr. *Slivno* (ex *Janka* et *Velenovsky*).

17. *F. tristis*; etiam pr. pagum *Patissia Athenar.* lecta est (a *Sartori*), sed ex Boiss. circa *Athenas* nunc fere destructa "hortulani cujusdam phytopolie rabie stulta". - Species floribus atris insignis.

18. *F. tenella*: *Zacynth.* (*Margot* ex Boiss.). *Bosn.* (*Brandis* ex *Freyn*). *Ross. mer.-occ.* (ex *Schmalhausen*).

19. *F. minor*: *Ross. mer. gub. Charkow* (pr. *Elisabethgrad, r.*); *mer.-occ.* (: *Schmalh.*). *F. meleagrioides* *Patrin* ex *Schult.* (1829).

11. *Tulipa*. 1. *T. Gesneriana* (non L.) Roch. banat.; Boiss. or. (p. p.) = *T. orientalis* Lev. in bull. neuch. XIV. (1884). 263: Banat. vall. Kazan in rupibus ad Danubium. *T. hungarica* Borb. (1882). *T. Billietiana* (non Jord.) et *T. Neilreichii* Borb. exs. - *T. Rocheliana* Jka exs.; sec. Levier. — *T. spathulata typica* (Bertol.) vid. sub 22. *a.* Comment. 240.

**T. Schrenkii* Reg. *T. Gesneriana* var. minor Boiss. or. Ross. mer. gub. Cherson (in pratis et collibus pr. Odessa (Lindem.), mer.-or. (Sarepta etc.).

1. *a.* *T. connivens* Lev. in arch. ital. biol. 1884. 12 (sep.) et in bull. neuch. 1884. 259. *T. Gesneriana* Reb., Parl. - Hetr. in cultis suburbium Florentiæ et Luccæ; probab. ex hortis oriunda, sed inter segetes per annos 60 characteres suos servavit (ex Levier).

2. *T. silvestris*: Atticæ m. Parnes (*T. Clusiana* Orph. 193). Lacon. m. Malevo (Orph. 296). Ross. balt. (in pratis silvat. sporadice: Klinge); cfr. Levier in bull. neuch. XIV. (1884).

3. *T. Biebersteiniana*: Ross. mer.-or. — *T. biflora* et *T. tricolor* ex Levier separantur:

3. *a.* *T. biflora* L. f. suppl. 196. - Ross. mer.-or. (Sarepta, Astrachan).

3. *b.* *T. patens* Ag. in R.S. syst. VII. 384 (1829). *T. tricolor* Led. alt. II. 33 (1830). Ross. mer.-or.

4. *T. Grisebachiana*: de hac specie cfr. etiam Pantocsekii "adnotationes ad floram Hercegovinæ etc." (1874). 23 (*).

5. *T. Orphanidea*: Orph. fl. gr. exs. 843 (193 ad *T. silvestrem* pertinet ex Boiss.). Lacon. m. Malevo (: *Orphanides*). Arcad. m. Menalus (4000'); ex Boiss. Chios (cum Orph. exs. 777) ad *T. Clusianam* pertinet. *T. atheniensis* et *T. Minervæ* Orph. ms. ex Boiss.

6. *T. gallica*; *T. Celsiana* G.G. quoad loca mediterranea.

7. *T. Celsiana*; sec. Loret in dep. Herault rarissima est (le Caroux, le Caylar, Fraisse). Alpes-Marit. (la Giandola, Saorgio, col de Tenda; ex Ardoino). *T. fragrans* speciei præced. propior est. — *T. alpestris* distincta est ex Levier; hab. in Sabaudia alta. — *T. transtagana* (ex eodem) hab. etiam in Hisp. centr. (*T. australis* parviflora Willk. Lge).

8. *T. Beccariana*; cum sequ. (*T. saxatili*) fere identica dicitur et forse ab ea, olim e Creta introducta et (mutatis characteribus) subspontanea facta, derivatur; nuper non relecta est (vid. ap. Levier in bull. neuch. 1884. 287).

10. *T. suaveolens*; *T. Gesneriana* L. p. p. *T. turcarum* Gesn. (1561); Levier in bull. neuch. 1884. 271. In hortis culta sub nomine Duc van Thol et verisimiliter prima tulipa e Byzantio in hortos europæos introducta (cfr. Levier l. c. 272). — ? *T. Passeriniana* Lev. in bull. neuch. 1884. 270. *T. Didieri* Passer. (Lugagnano territor. Piacenza).

11. *T. scabriscapa*; *T. strangulata* cum specie sequ. (*T. boeotica*) fere identica est et probab. ab ea derivatur ex Boiss. (fl. or.) et ut etiam sentit cl. Levier (cfr. tamen in bull. neuch. 1884. 277), qui locis citat. hanc et totam questionem tulipaceam sagaciter tractavit, varietates huic speciei adnexas sub speciebus duabus mox infra allatis (11. *a.*, *b.*) disponens (synonymis adjectis). — ? *T. Sommieri* Lev. l. c. (Florentiæ detecta a cl. Sommier 1871 in nemorosis subapenninis supra villam Pratolino).

Obs. *T. serotina*; Florentiæ relecta est 1880 (: Levier); a *T. scabriscapa* (ex Levier) omnino diversa est et sic restituenda: *T. serotina* Reb. select. tulip. 6. (1838). Florentiæ, loco huic usque unico "alle Rose" (vid. ap. Levier in bull. neuch. 1884). — ? *T. etrusca* Lev. l. c. (Florentiæ sine bulbo a rusticis advecta).

11. *a.* *T. neglecta* Reb. (Lev. l. c. 273). *T. scabriscapa* var. *primulina* Fox-Strangw. in bot. reg. *T. scabrisc.* var. *Howardiana* Bert. *T. variopicta* Parl. (non Reb.). *T. Bonarotiana* Car. (non Reb.). - Florentiæ hinc inde in agris et ad eorum margines, unde quotannis copiose a rusticis urbi advehitur. - Species temporibus Michellii ignota, probabiliter ex hortis oriunda et spontanea facta (Levier).

11. *b.* *T. strangulata* Reb. *T. scabriscapa* var. *strangulata* Fox-Strangw. in bot. reg. - Florentiæ (villa Bonarot.). — *T. variopicta* Reb. *T. scabrisc.* var.

mixta Fox-Strangw. in bot. reg. T. scabrisc. var. Reboulia Bert. (Florentiæ, typo frequentior). — T. Bonarotiana Reb.; olim in villa Bonarotiana ad pagum Settignano pr. Florentiam a Reboulia detecta, nunc evanuisse videtur (Lavier).

12. T. boeotica: Thebe (: Orphan.). Atticæ m. Parnes (T. strangulata Heldr. exs.).

13. T. Hageri; perigon. habet intus coccineum, sed ex Boiss. fl. or. proxima est T. Orphanidis (perig. intus luteo), quæ ex Lavier (in bull. neuch. 1884) in siccis a formis reductoribus T. silvestris interdum ægre distinguitur.

14. T. turcica; species Rothiana est planta hortensis (= T. acuminata Vahl. T. cornuta DC.), origine incerta; spontanea byzantina igitur T. bithynica Grsb. nominanda est; cfr. Boiss. or. et ap. Lavier in bull. neuch. (1884).

16. T. oculus solis; in Vales. et Græc. (Pelop.) minime adest teste Lavier. *T. Lortetii Jord. - Gall. mer. (Aix, Cannes, Grasse, Antibes); sec. Lavier (bull. neuch. 1884) est hybr. a T. præcoce et T. oculus solis.

17. T. præcox; ex Apulia initio hujus sæculi, ut videtur, Neapolin apporata est, unde dein ad alias terras pervenit. T. Foxiana est var. notabilis, quæ post tempora Reboulia evanuerat (Florentiæ) sed 1884 iterum reperta est (: Lavier). — T. hexagonata Borb. (Croat.: Hirc); tepalis obtusis, maculâ sexangulari-oblonga, nigrâ notatis, a specie ipsa differt, sed ex Lavier (bull. neuch. 1884) est hujus varietas et etiam in Hetr. (et alibi?) obvia.

18. T. apula; sec. Lavier (bull. neuch. 1884. 249) est varietas parum recedens speciei præcedentis.

19. T. maleolensis; "stirps recentior", italica, Florentiæ (ubi tempore Micheli prorsus ignota) 1822 a Reboulia detecta, et dein etiam alibi lecta (semper in cultis suburbium: Lavier).

*T. Martelliana Lev. l. c. - Florentiæ a com. de Martelli detecta est 1883, sed anno sequ. frustra quæsitâ; ex ipso auct. probab. hybrida est.

20. T. Clusiana: Pelop. (hb. Fauché ex Boiss.). Chios (Orph. fl. gr. exs. 777). Ex oriente advecta (e Persia?: T. persica præcox Clus.), Florentiæ primum floruit (circa 1607) in horto Mattei Caccini et dein versus occidentem migravit (: Caruel).

21. T. oxypetala; species a solo Steven lecta et "non satis nota" (: Boiss., Lavier).

22. T. Didieri; hujus speciei locus valesiac. est in agris ad Sion, sabaudus ad St-Jean-de-Maurienne; de Lomb. nulla mentio fit apud Lavier, cui T. Didieri est "stirps verisimiliter recentior, ex hortis oriunda".

*T. platystigma; est planta rariss. et solum ad Guillestre (H.-Alpes) lecta.

*T. Billietiana Jord. - Sabaud. ad St-Jean-de-Maurienne; cfr. Lavier l. c. 206.

22. a. T. spathulata Bert. fl. ital. IV. 85 (non alior.). Florentiæ, loco unico, "alle Rose" dicto (inter segetes), ubi a Reboul detecta et ubi annis 1880 — 3 relecta est. Stirps vexata, "recentior", cujus origo huc usque latet, inter tulipas europæas cum sola T. Didieri comparanda; cfr. ap. Lavier in bull. neuch. 1884.

23. T. Franconiana; species Tuliparum florentinarum elegantissima, huc usque unice lecta in agris "alle Rose" ad meridiem urbis (ubi a Parlatore detecta), unde ruricolæ magna manu venalem in emporium ferunt; hic locus sæpe calcatus est, quare credere liceat hanc Tulipam (cum novis aliis) in loco natali ortam esse; stirps (ut ex indole pollinis patet) probab. hybr. ex hortis oriunda, sed characteres per 30 annos omnino servavit (: Lavier in bull. neuch. 1884).

*T. mauriana Jord. Fourr. T. mauritiana Jord. olim. T. mauriannensis Didier exs. - Sabaud. ad St-Jean-de-Maurienne. Planta pulcherrima, ex hortis oriunda, cujus origo hybrida, e fabrica pollinis, valde probabilis est (: Lavier).

12. **Erythronium**. 1. E. dens canis: Alpes-Marit. (in montibus humilibus sat abunde usque supra Mentone, Escarène et Vence: Ardoino). Helv. etiam in cant. Ticino. Carinth. Bulgar.

13. **Gagea**. 1. G. stenopetala: Alpes-Marit. (mt Aiguille supra Mentone: Ardoino). Hisp. centr. (Villalba et La Granja in S. de Guadarrama) sec.

Lacaita, adsentiente cl. Willkomm, qui specimina e loc dicto vidit. Bulgar. et Rumel. or. (ex Velenovsky).

2. *G. lutea*: Lothar. Bulgar. (rarius: Velen.).

3. *G. pusilla*: Ross. centr. (gub. Kursk, "ubique"). - Helv. exclud. sec. Gremli. — *G. reflexa* ad *G. erubescens* (13*) nunc relata est.

4. *G. minima*: Fenn. med. - Germ. bor.-occ. (Westphal, prov. Rhen.) a Garcke non citatur.

5. *G. spathacea*; Helv. exclud. sec. Gremli, - Lugos est oppidum in Bannatu, sed hæc species etiam in Hung. p. d. (pr. Altsohl) nunc detecta est (: Freyn 1870). - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

6. *G. rigida*; est var. *G. reticulatæ* ex ipso auct. Boiss. (fl. or.).

7. *G. succedanea*: Hung. ad Budapest (ex Kerner). Ross. mer. (gub. Cherson). Sec. Simonk. (ex hb. Maynald) est solum forma (e loco sterili) macra *G. stenopetalæ*; sec. Lindem. est var. *G. pusillæ* (3). Comment. 241.

8. *G. arvensis*: Byzant. (Aucher ex Boiss.). Rumel. or. (: Skorpil). Arcad. (Heldr. ex Boiss.).

9. *G. Granatelli*: Sard. (m. Genargentu: Moris ex Barbey). T. d'Otranto (pr. Leucaspidæ: HGroves). Sec. Boiss. fl. or. hæc species identica est cum *G. mauritanica* Dur., quæ etiam in Hisp. provenit.

10. *G. saxatilis*: Hung. (Matra) ex Kern. 1877. - Germ. (ex Gcke) deest in bor. exc. Boruss. et in mer. solum Phalzizæ adest.

12. *G. bohémica*; Helv. exclud. sec. Gremli et Transs. sec. Smk. — *G. Fourraana* Cariot. (Angers, Thouars etc.). *G. bohémica* typica in Gall. deesse videtur exc. dep. Herault, ubi a Loret, rr. quidem, indicatur.

13. *G. Liottardi*: Sard. (Macchiati ex Barb.). Alpes-Marit. (alp. Tenda, col de Fenestre, col de Jallorgues etc.; ex Ardoino).

**G. erubescens* (1829). Ornithog. *erubescens* Bess. (1822). *G. reflexa* Czern. hb. (1826): Ross. centr. (gub. Kursk), mer. (gub. Cherson). — *G. taurica* probab. ad *G. reticulatam* (19) pertinet.

14. *G. foliosa*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto, pr. Leucaspidæ: HGroves). Ornithog. *spathaceum* fl. gr. et *O. luteum* B. Ch. ex Boiss.

15. *G. amblyopetala*; Comment. 242.

17. *G. Soleirolii*: Mallorca (Bellver, rr.: Weyler). Sard. (*G. Granatelli* Genn. Ornithog. *arvense* Mor.).

18. *a. G. chlorantha* Schult. syst. VII. 551. Ornithog. *chloranthum* MB. t. c. III. 264. Byzant. (: Coumany ex Boiss.).

19. *G. reticulata*; *G. rigida* (6) et *G. taurica* (13* —) huc pertinent ex Boiss. et Janka.

× *G. Theobaldi* Brugg. = minima + *Liottardi*. (Chur Helv.).

14. **Lloydia**. 1. *L. serotina*: Alpes-Marit. (Tenda, col de Fenestre, vall. Gordolasca etc.). Bavar. (alp. Algov., Göhl.). Ross. arct. etiam in ins. Waigatsch (ex Kjellm.).

2. *L. græca*; hab. etiam in Pelop. (Boiss. fl. or.).

15. **Ornithogalum**. 1. *O. narbonense*: Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.). — *O. stachyoides*; *O. narbonense* L. hb. (et sp. p. p.); Guss., Vis.; hab. in Ligur., Ital., Sicil., Istr., Dalm., Græc.

2. *O. Visianicum*; sec. Janka ad speciem sequ. pertinet.

3. *O. pyrenaicum*: Gall. dep. Loire (pr. St-Etienne ex JHervier 1885); etiam Burdigalæ (Bordeaux) ex Mortelay (1879). Sard. ex hb. Moris. (: Barbey). Bulgar. (non rarum ex Velen.). — *O. sphærocarpum* Kern. (1878). *O. pyrenaicum* Jacq., K. (Austr. Hung. Croat. Bosn.).

4. *O. arabicum*; Gall. mer. pr. Hières et Grasse inquil. ut probab. etiam ad Nizza, ubi ab Ardoino indicatur; hab. etiam in Balear.

5. *O. comosum*: Rumel. or. (ex Velen.). Ital. mer.-or. (T. d'Otranto, pr.

Leucaspide: HGroves, Lacaita). Attica etiam in m. Parnes et Pentelicon (: Heldr., Sartori). - Transs. ad *O. umbellatum* (10) pertinet.

6. *O. fimbriatum*; melius ad calcem generis militet (20.a.).

7 * *O. atticum*: Arch. ins. Chios (Orphanides ex Boiss.); ab ipso cl. auctore (in flora orient.) cum *O. montano* jungitur.

10. *O. umbellatum*; *O. paterfamilias* Heldr. hb. norm. 785 sec. Boiss. (in Consp. ad *O. divergens* citatur). — *O. sabaudum* Huguen. *O. Hugueninii* Jord. (Chambery). — *O. tenuifolium* (*O. acuminatum* Schur enum.) certe huc pertinet ex Smk.

**O. millegranum* Jka in term. füzet. (annal. mus. nat. hung.) 1884. *O. prætextum* Neilr. aufz. 52 in nota (non Stev. ap. Kth.). - Hung. comitat. Biharja; Transs.

11. *O. ruthenicum*; est var. speciei præced. (*O. umbellati*) sec. Kerner; ex Oborny (fl. mähr.) est = *O. Kochii* (15).

12. *O. refractum*: Dobrud. (in desertis, montibus apricis, copiose: Ue.S.). Rumel. or. (ex Velen.). - Transs. ad *O. umbellatum* pertinet ex Smk. — var. *Adalgisæ* HGroves in linn. soc. journ. 1885. 532 et in gior. bot. ital. 1887. 200 cum ic. (*). - Ital. mer.-or. pr. Otranto, in pascuis (detecta a HGroves); est var. insignis vel potius subspecies, floribus in genere maximis speciosa.

13. *O. divergens*: Cors. (EPetit 1883). Sard. ex hb. Moris (: Barbey). Sec. Kerner hæc species est solum varietas loci *O. exscapi* (18); cfr. tamen Freyn südistr. et nachtr. in act. soc. z.-b. vind. 1877. 441—442 et 1881. 387.

14. *O. collinum*: Ital. mer.-or. (Otranto; HGroves).

15. *O. Kochii*: Siles. mer. Morav. Bavar. (pr. Passau, Reichenhall). Lomb. (Verona, mte Baldo; Goiran). Bulgar. (m. Vitos, Kom etc.). Bosn. et Herceg. (Brandis ex Freyn). — *O. saxatile* ad *O. comosum* (5) pertinet ex Boiss.

16. *O. tenuifolium*: Alpes-Marit. (reg. mont.: Tenda etc. ex Ardoïno). Græc. (ex Boiss. or.) plur. loc., scil. ad Patràs et Acrocorinth (: Heldr., Orph.), in m. Olenos et in m. Parnasso (: Heldr.), in ins. Cephalon. (: Heldr.); Byzant. (ex Duparquet). — *O. bosniacum* GBeck in ann. mus. vind. 1887. (Bosn. mer. alp.).

17. *O. nanum*: Bulgar. ad Razgrad (: Velen.), in distr. Sofia (frequ.: Skorpil). Athen. (: Heldr.). Patràs (: Boiss.). Ins. Jon. (Zante et Corfù: Margot, Letourneux); ex Boiss. fl. or.

18. *O. exscapum*: Ins. Cephalon. (: Heldr.). Hæc species e Græcia non citatur in Boiss. fl. or.

20. *O. oligophyllum*: Aetol. m. Tymphrestes reg. alp. (: Heldr.); in Hæmo (ad Tshipka) a Janka nuper lectum est (ex Boiss.).

20. a. *O. fimbriatum*; Arcad. Boeotia. Ins. Mykonos. Byzant.

20. b. *O. Skorpili* Velen. in diar. (sitzb.) soc. sc. boh. 1887. 463. Rumel. or. (pr. Slivno: Skorpil 1886).

20. c. *O. Nyssanum* Petrov. (ex Velen.). Serbia. Bulgar. (freq. circa Sofia: Skorpil ex Velen.).

16. **Myogalum.** 1. *M. nutans*; Transs. ad sequ. speciem pertinet ex Smk.

2. *M. Boucheanum*: Hung. med. et or. (ubi quam præced. multo frequentior ex Kerner). Transs. (plur.). Banat. (Borbàs). Bulgar. (pr. Sofia: Velen.). Rumel. or. (m. Rhodope: Dingler). - Siles. etc., Morav. (pr. Bisenz, Kremsier) non nisi inquil. (in hortis). - Vera et distincta species, orientalis, in Anatolia indigena (ibi omnino spontaneam legit Bourgeau).

17. **Urginea.** 1. *U. Scilla*: Balear. (freq., in Mallorca usque ad 800 metr. s. m. obvia). Alpes-Marit. (Mentone, Monaco, rare florens: Ardoïno).

18. **Scilla.** 1. *S. hyacinthoides*: Alpes-Marit. (Mentone, Nizza, Levens, Antibes etc., in campis lapidosis: Ardoïno). Sard. (in ins. parva Maddalena: Barbey ex hb. Moris). Arch. ins. Chios (: Orphanides).

8. *S. italica*: Alpes-Marit. (reg. litor. rupes umbrosæ). - Helv. non nisi subspont. vel inquilina (ex Gremli).

13. *S. amoena*: Carinth. vall. canal. (Kanalthal; forse introd.).
18. *S. autumnalis*: Gall. bor.-occ., or. (Côte-d'Or). Bulgar. or. Rumel. or. — *S. gallica*; (Hières). — *S. corsica* Boullu. (Ajaccio).
19. *S. bifolia*: Sard. (: Binna ex Car.). Bulgar. plur. loc. (ex Velen.). Rumel. or. Ross. centr. (gub. Kursk). — *S. Kladnii* ad subspeciem pertinet. — ? *S. rosea* Lehm. *S. bifolia* var. *taurica* Reg. — *S. secunda* Jka ex Smk.
**S. alpina*; — *S. laxa* et *S. triphylla* ad speciem ipsam pertinent ex Smk.
20. *S. nivalis*: Herceg. (m. Prenj-Planina: GBeck 1885). Arch. ins. Chios (: Orph. ex Boiss.).
**S. subnivalis*; sec. Boiss. (fl. or.) non distinguenda est a *S. bifolia* ipsiss., cui etiam *S. nivalis* ipsa tamquam var. jungenda.
19. *Endymion*. 5. *E. amoenulum*: Bosn. (ex Boiss.). Ross. med. (gub. Kursk, Tambow etc.); ex Boiss. fl. or. proximum est *Scillæ amoenæ* et floribus cernuis, paucioribus, ab ea distinctum.
20. *Uropetalum*. 1. *U. serotinum*: Gall. mer. dep. Herault (in rupibus calcareis ad St-Chinian: Loret).
21. *Hyacinthus*. 1. *H. orientalis*: Alpes-Marit. (Menton, Nizza, Mougins, le Bar: Ardoino). Sard. (pr. Sassari).
2. *H. amethystinus*; — *H. Pallasianus*; *H. amethystinus* Pall. (Ross. mer.); forse species propria; cfr. ap. Baker in Journ. linn. soc. XI.
3. *H. fastigiatus*: Menorca Balear. (cuspile de la Anclusa: Rodrig.). *Charistemma* (Jka lil. 1886) *fastigiata* Jka.
22. *Chionodoxa*. 1. *Ch. nana* (*Ch. cretica* Jaub. Sp. ex Boiss.); etiam in m. Lassiti crescit (inter 4 et 6000' s. m.).
2. *Ch. cretica*; crescit in reg. subalp. montium Sphaciotie., m. Ida et m. Lassiti (: Heldreich).
23. *Bellevalia*. 1. *B. spicata*: Acarnan. (: Nieder). Leucada (: Letourn.). Boissier postea (in flora orient.) hanc speciem, præeunte Bertolonio, generi *Strangweia* (Bert. in act. soc. ital. XXI) adnumeravit.
2. *B. ciliata*: Argolis et Bæotia (: Heldr.). Ross. mer. (gub. Cherson).
**B. glauca* Kth. *Muscari glaucum* Lindl. M. Wilhelmsii Stev. - Taur.
5. *B. dubia*; *H. dubius* Guss. excl. synonym. Fontan. (*Hyac. roman.*, qui speciem propriam mauritan. sistit). De hac et sequ. specie (*B. Webbiana*) cfr. observationes cl. Freyn in Flora 1885. 37, 38 (sep. 93, 94). — ? *B. Boissieri* Freyn in Flora 1885. Arch. (ins. Hydra: Heldr., Pichler) Dalm. (ins. Lesina: Jirusch); ex Freyn.
**B. Clusiana* Grsb. spicil. II. 387; e loco, ubi infra citatur (sub *B. comosa*), huc transferenda est.
6. *B. Webbiana*; Florentiæ nunc plurib. locis copiosiss. legitur et pr. Faënza a cl. Caldesi detecta est (: Levier 1884).
7. *B. Hackelii*; species a *B. dubia*, ut etiam a proximis, præcipue capsulis coriaceis, multo minoribus, distincta (Freyn in Flora 1885).
9. *B. comosa*: Belg. (Liège: Forir). Lusit. (Lausitz). Galiz. Bulgar.
**B. Clusiana*; nunc sub *B. dubia* (5) citatur; cfr. Freyn in Flora 1885. 91, 92 (sep. 35, 36). Obs. *B. Calandriniana* (Muscari Calandr. Kern.); bona species sec. Kern. et Freyn (in act. soc. z.-b. vind. 1881) et hab. etiam in Istr.
9. a. *B. fuliginosa* Freyn in Flora 1885 (sub *Muscari*). *Hyacinth. fuliginosus* Pall.? - Taur. (: Parreisz in hb. mus. boh. nom. *Muscari comosi*); vid. ap. Freyn l. c. 8—11 (sep. 14—17).
10. *B. tenuiflora*: Morav. mer. Bosn. (: Brandis). Rumel. or. (: Velen.). Ross. mer., mer.-occ.
**B. constricta* Tsh in Flora 1841 (sub *Muscari*). - Cors. (Bastia: Sieber in hb. mus. boh.); vid. ap. Freyn in Flora 1885.
11. *B. Holzmanni*: Cors. (Bastia: Sieb. nom. *M. comosi*; ex Freyn). Capri (: Hackel ex Freyn). Croat. (pr. Buccari et Porto Ré: Hirc 1882, 1883); de hac specie cfr. cl. Freyn observationes in Flora 1885.

25. **Botryanthes**. 1. *B. pallens*; *Muscari pallens* Fisch.
 2. *B. stereophyllus*: Galiz. Rumel. or. (pr. Slivno, Philippopol: Velen., Skorpil). Ross. centr. (gub. Kursk). Comment. 243.
 3. *B. commutatus*; *Balear. solum ex hb. Camb. citatur (teste Guss.)*.
 3. *a. B. granatensis* Freyn in Flora 1885 (sub *Muscari*). - *Hisp. mer. prov. Malacit. (Sierra Prieta: H.P.R. 1879)*.
 5. *B. Heldreichii*; *planta montis Chelmos (7000', ad nives: Heldr.) sistit varietatem minorem (Boiss. fl. or.)*.
 6. *B. vulgaris*: Gall. bor.-occ. Arch. ins. Melos (: Ormenis). Bulgar. Besarab. (: Lindem.). — *B. Strangwaisii* Ten. (sub *Muscari*), e Byzantio, huc pertinet ex Boiss. fl. or. (in *Consp. sub sequ. B. Lelievrii citatur*). — *B. Kernerii* Marches. 1882 sub *Muscari* (Tergesti, ubi sat frequ.; Bosn. mer. et Herceg.: GBeck). Comment. 244.
 7. *B. Lelievrii*; — *B. Strangwaisii* nunc ad speciem præced. relatus est. Comment. 245.
 9. *B. neglectus*: Gall. or. (Côte d'Or). Lothar. et Phalz. rhen. (Landau, Neustadt etc.) introductus. Helv. (Vaud, Basel etc.). Sard. (: Schweinf. ex Aschn.). Rumel. or. (ex Velen.). Ross. mer. — *B. speciosus* Marches. 1882 sub *Muscari*. (Pelagosa; solum varietas robustior videtur).
 10. *B. odoratus*: Gall. bor.-occ., or. (Côte d'Or, in agris et vineis). Bulgar. Arch. (: Boissier). — *M. acutifolium* pertinet ad *B. commutatum* (3) ex Boiss.
 11. *B. pulchellus* (*B. Sartorii* Tod. hort. panorm. ex Boiss.): Rumel. or. pr. Slivno et Philippopolin; cfr. Velen. in diar. soc. sc. boh. 1886. 64 (sep.).
 12. *B. parviflorus*: Mallorca *Balear. (inter Santa Maria et Consell ex Barcelò)*.
 27. **Allium**. 1. *A. Ampeloprasum*: *Balear. Ross. mer. gub. Cherson (Elisabethgrad, Odessa)*. - Transs. non nisi cultum adest ex Smk. — *A. paterfamilias*; *A. sphaerocephalo* (9) similior ex Becker. Comment. 246. — ? *A. Regelianum* Beck. in bull. mosc. 1880. (Sarepta, in silvis copiose).
 **A. thessalum*; in Boiss. or. cum specie primar. jungitur.
 **A. Halleri*; etiam hoc a Boiss. cum specie primar. nunc junctum est. — *A. pyllum* est varietas capitulis diminutis.
 1. *a. A. Pardoii* Losc. trat. plant. ed. 3. (1876). I. 9. *A. Ampeloprasum* Losc. Pard. ser. imp. (p. p.). - Arag. mer.
 2. *A. Wildii*: *Zacynth. ins. jon. (: Margot ex Boiss., qui pro varietate A. Ampeloprasii habet)*.
 3. *a. A. gaditanum* Perez-Lara in Willk. ill. hisp. 81. - *Hisp. mer. prov. Cadiz, pr. oppid. Jerez de la Frontera (a Perez-Lara detectum 1879)*.
 4. *A. rotundum*: Lothar. (r.). Sard. (ex Reverch.). Helv. (ex Gremli) non nisi in cant. Schaffhausen adest, sed indicatur etiam ad Pruntrut et ad Viège. — *A. Cambiasii*: Gall. mer. ad Cannes (: Loret). — *A. multiflorum* (*A. polyanthum* R.S.) est species propria ex Loret (ambo in dep. Herault adsunt); hab. etiam in ins. Mallorca. — *A. atropurpureum* (Pall. in sched.) Stev. non W.K. (Ross. mer.-or. wolg.).
 4. *a. A. pyrenaicum* Vayr. in Costa adic. suppl. cat. 92. (1877). *A. controversum* Costa suppl. cat. 73 (non Schrad.). - Catal. bor. in saxosis Pyrenæor. (a Vayreda detectum).
 5. *A. multiflorum*; — *A. acutiflorum*: Alpes-Marit. (loca rupestria inter Mentone et Cannes usque ad l'Escarène et Tenda: Ardoino).
 6. *A. Scorodoprasum*: Norv. mer. Fenn. etiam Aboæ. Helv. non nisi ad Genève, Basel et in Aargau indicatur. *A. arenarium* est varietas (— minor Fr.). — *A. obscurum* MB., Stev. (Ross. mer. gub. Cherson).
 7. *A. vineale*: Bulgar. (ex Velen.).

**A. Kochii*; nunc in hortis pr. Havniam etc. inquilinum est (vid. Lge haandb. ed. IV. 181); etiam Holmiæ lectum (in Vermdön: Schlegel 1887).

9. *A. sphærocephalum*; Germ. bor. rr. adest (ibi non nisi ad Frankf. a. O. indicatur). Sard. ex hb. Moris. (: Barbey). Bulgar. Rumel. or. (: Velen.). — *A. scaberrimum*; a Serres pr. Gap detectum est (ante 1857) et a Loret relectum (1875) inter segetes ad pagum Savines inter Gap et Embrun (bull. soc. bot. 1880. 272). — *A. purpureum* Losc. trat. plant. arag. (1876). Arag. mer. (rr.); ex Willk. ill. add. est = *A. sphærocephalum* umbellâ bulbillifera, ut cultura probavit.

10. *A. arvense*: Maced. athoa. Bulgar. (pr. Kebedze: Velen.); loca græca a Boiss. citata sunt: Parnass., Attica, Cephalon. (ins. jon.).

**A. æstivum*; — *A. trachypus*, ad Nauplia lectum, est fere idem ac ipsa species (ex ipso auct.).

11. *A. sardoum*; species rarissima (cfr. Barbey sard. 61).

13. *A. margaritaceum*; *A. densiflorum* Hampe in Flora 1842 (ex Boiss.); varietatem perigonio rubello (sec. Boiss.) in m. Hæmo legit Pichler; talis adest etiam in Serbia.

**A. guttatum*: Bulgar. (in rupibus calcareis ad Galata etc.: Velen., Bornm.). Rumel. or. (m. Aitos: Skorpil).

13. *A. atroviolaceum* Boiss. diagn. - Hung. mer. (ex Kerner). Rumel. or. (ex Velenovsky).

17. *A. gomphrenoides* (*A. ascalonicum* B.Ch.); est planta rara, laconica, ex Boiss. or. non nisi ad Vitylos (: Bory) et in faucibus supra Androuvasta (: Heldreich) lecta.

20. *A. cristatum*; in Flora Orient. V. 237 nunc descriptum est.

21. *A. atropurpureum*: Vindob. pr. Moosbrunn et ad prox. Altenburg Hung. (ex Reichardt). Rumel. or. (pr. Slivno: Friv. ex Jka). - Dobr. exclud. (sec. Kanitz), quia ex errore citata.

22. *A. decipiens*: Ross. centr. (Korocza gub. Kursk, r.).

23. *A. nigrum* (*A. multibulbosum* Jacq.): Alpes-Marit. (reg. litor. hinc inde sub oleis ex Ardoino); in dep. Herault non nisi ad Candillargues (: Barrandon) nunc adest (ex Loret). Mallorca Balear. Pelop. (*A. magicum* B.Ch. ex Boiss.). Cyclad. (: Orphanides). Byzant. (Noë ex Boiss.).

24. *A. Cyrilli*: Ins. Chios (Orph. ex Boiss.). Taur. (Stev. ex Boiss.). — *A. multibulbosum* nunc ad speciem præced. citatur.

25. *A. Moly*; locus classic. Pourret. (montium Corbar.) est in monte Alaric pr. Moux dep. Aude (altit. circa 500 metr. s. m.), ubi relectum (1879) a Timbal-Lagrange, Gautier et Jeanbernard; vid. eor. "Allium Molly et la Flore Française" (*) in bull. soc. bot. 1880, ubi commemoratur hanc speciem etiam in Pyren. (pr. Gèdre) provenire, sed ibi a Bordère sata. — *A. stramineum*: prov. Cadiz (Sierra de Aljibe etc.: Perez-y-Lara; Sierra de Palma pr. Algeciras: Reverchon); ex Rouy.

29. *A. subvillosum*; hab. etiam in Mallorca Balear.

32. *A. ursinum*: Gall. medit.: dep. Herault (paucis locis); Alpes-Marit. (reg. mont.: Saorgio, val de Pesio etc.). Bulgar. (in silvaticis m. Vitos etc.). Rumel. or.

33. *A. neapolitanum*; hab. etiam in Sard. (: Magnus ex Aschn).

34. *A. phthioticum*; nunc a Boissier descriptum est (Fl. Orient. V. 274); hab. in pascuis subalpinis (5500—6000') montis Oeta, nunc Katavothra (: Heldreich).

35. *A. triquetrum*: Alpes-Marit. (Mentone, Nizza). Balear.

36. *A. pendulum*: hab. etiam in Sard. (hb. Moris ex Aschn).

37. *A. Victorialis*: Bulgar. in graminosis cacumin. m. Vitos (: Velenovsky 1885).

37. *a. A. tataricum* L. f. suppl. 196. *A. Beckerianum* Reg. (1860) ex ipso. - Ross. mer.-or. (Sarepta in argillosis montium: Becker 1862).

39. *A. strictum*: Pedem. (m. Viso: abb. Faure 1871; Magn. fl. sel. exs. 404). Delph. depp. Isère et H-Alpes (vid. Rouy in Le Natural. 1887). Helv. hab. etiam ad Hermance Valesie et in Engadin Bundie, Siles. (Probsthainer Spitzberge: Uechtr.). Fenn. mer.-or. (Carel. ladog.) a WNylander jam 1850 lectum est.

40. *A. narcissiflorum*: Alpes-Marit. (reg. alp. mte Frontero: Genn.; col de Tenda: Bourg.; col della Maddalena: Loret); indicatur etiam Croat. pr. Bucari (: Vukotinov. 1880), sed probabiliter introductum.

41. *A. suaveolens*; Helv. plurib. locis lectum est.

42. *A. ochroleucum* (*A. xanthinum* auct. plur.): Gall. mer. dep. Aveyron (a fr. Coudere detect. ex Le Grand 1884; Magn. fl. sel. exs. 976). Ross. centr. (gub. Kursk). — *A. ericetorum* Thore (1803); melius ut subspecies militet. *A. ochroleucum* auct. gall. plur.; Hausm. tyrol.; *A. suaveolens* Bert. quoad plantam *Alpium* et *Apenn. bor.*; cfr. Kerner in *oe. bot. z.* 1878.

44. *A. acutangulum*; *A. angulosum* L. sp. et Jacq. au. (nomen restit.); deest in Germ. prov. rhen. et in Westphal. (ex Gcke).

45. *A. montanum*: Gall. mer. dep. Herault (r.), Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., r.). Norv. mer.-or. (ins. Bastö ad Horten, ubi detectum a Poulsson ex ABlytt 1882). - Germ. deest in prov. rhen. et in Westphal. (ex Gcke). - Synon. princeps est *A. senescens* Jacq. (non L.).

46. *A. flavescens*: Bulgar. (supra Kostinbrod: Velen. 1887).

48. *A. paniculatum*: Istr. Bulgar. Rumel. or.

49. *A. longispathum*; de hac specie, ut etiam de præced. et sequ., cfr. Freyn *Flora v. Süd-Istrien* in act. soc. z.-b. vind. 1877. 446—9, ubi horum *Alliorum* historiam diligenter et sagaciter elaboratam invenies.

**A. rupestre*; sec. Boiss. est = sequens *A. pallens*.

**A. marginatum* Jka in term. füzet. (annal. mus. nat. hung.) 1884 (*). - Transs. campestr. (Mezősegy) e. gr. prope Szt-Gothárd (: Janka).

50. *A. pallens*: Croat. (Fiume: A-M. Smith). Maced. (: Orphanides). Zante ins. jon. (: Margot). Achaia (m. Clocos: Orph. fl. gr. exs. 427). Euboea (m. Delphi: Heldr.); ex Boiss. or. - Comment. 247.

**A. Coppolerii*: Istr. mer. Dalm. (ex Kerner).

51. *A. tenuiflorum*; *A. paniculatum* K. (: Istria) sec. Freyn et Kerner; in Græc. non provenit teste Boiss. or.

52. *A. Sibthorpianum*: hoc nomen (cum synon. S.S.) spectat plantam bithynicam (ex Olympe); pro planta europæa ponas:

52. a. *A. callimischon* Lk in linn. IX. 140 (in Consp. sub sequ. cum? allatum). *A. Boryanum* Kth. - Messen. (Bory, Sart.). Lacon. (Orph.). Aetolia (Nieder); m. Korax. (Heldr.); ex Boiss. or.

53. *A. achaium*; typicum rariss. est et non nisi in Achaia m. Clocos (pr. Vostitza), in loco Pente Vryseo dicto (4000' s. m.), lectum (: Orphanides), sed in m. Parnasso (: Heldr. Guice.) et in m. Malevo (: Orphan.) adest var. *parnassicum* Boiss. or.

55. *A. stamineum* (Orph. fl. gr. exs. 835): Maced. m. Korthiati (: Orphan.). Thrac. (pr. Philippopol: Janka).

56. *A. fuscum*: Ins. Lossin (et probab. Istr. mer.) ex Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. Bulgar. in pratis udis ad lac. Devno (: Bornmüller). *A. paniculatum* L. ex Kerner, sed certe solum p. p. (cfr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881. 388). — *A. Fussii* Kern. (Transs. or., r.: Fuss, Simonk.).

57. *A. flavum*: Bulgar. Rumel. or. (: Velen.); in Græc. solum auctoritate Smithii (prodr. fl. græcæ) indicatur.

**A. nebrodense*; — *A. Webbii*; sec. Boiss. (fl. or.) adest solum in m. Hæmo (: Janka) et sistit varietatem *A. flavi*.

58. *A. pulchellum*: Transs. (ubi specie sequ. frequentior ex Smk.). Bulgar. (: Velen.). Rumel. or. (: Friv.); loca græca ad aliam speciem pertinent ex Boiss. or. (probab. ad 67 *A. hymettium*). Kerner hanc speciem pro statu *ebullifloro* (capsulifero) speciei sequ. habet, sed cfr. Freyn l. c.

**A. Guicciardii*; est var. alpina *A. flavi* ex Boiss. or.

59. *A. carinatum*: Dan. ins. Falster. Batav. (Leiden, Gulpen in Limburg. Bulgar. (: Velen.)).

60. *A. oleraceum*: Fenn. mer., Carel. oneg. Austr. (in Consp. casu omitta).

61. *A. globosum*; Pesthini (Rehb.) e commutatione citatur (teste Kerner). — *A. kermesinum* est = *A. suaveolens* (41) sec. Jka. — *A. saxatile* MB. descr. d. länd. am casp. meer (1800): Bosn. (ex GBeck). Illyr. karst. (a saxosis m. Spacato usque ad Opicina hinc inde copiosum).

62. *A. xanthicum*; sec. Janka hæc species est = *A. ericetorum* (42—), quod dubitant alii; ex Simonkai probab. = *A. saxatile* (61—). — *A. pseudo-ochroleucum* ad *A. ochroleucum* (42) pertinet ex Smk. (plantam non vidit e Transs.).

64. *A. staticiforme*; hæc species a Sibthorp detecta est in ins. Cimoli; d'Urville eam legit in insulis Astypalea et Leri; Spruner in Aegina et Salami.

65. *A. phalereum*; in Boiss. fl. or. cum præced. junctum est.

67. *A. hymettium* (Heldr. hb. norm. 980); est varietas *A. staminei* (55) ex Boiss. fl. or.

68. *A. frigidum*; hab. in summo Taygeto (6000—7500'), ubi in lapidosis ab Heldreich lectum est; *A. paniculato* (48) et *A. pallenti* (50) approximandum.

71. *A. sibiricum*: Lapp. fenn. et ross. Ross. arct. ins. Waigatsch (ex Kjellm.) et ad Jugor Sharr (exped. Rosenthal 1871 ex ABlytt); indicatur etiam Transs. (Smk.) et Bulgar. (in cacum. m. Kom: Velen.).

72. *A. Schoenoprasum*: Norv. mer.-or. Fenn. mer., or. (Carel.). Belg. mer. rarius (Bouillon, Anglous) inquil. In ditione græca (sec. Boiss. or.) adest (var. *A. foliosum* Clar.) solum in alpinis (6000') montis Velugo Aetoliæ.

73. *A. erythræum*; sec. Janka est = *A. maritimum* (75).

74. *A. Weissii*; nunc a Boissier (fl. or. V. 253) descriptum est; hab. in ins. Syra (: Weiss, Orph.) et Thermia Cyclad. (: Orph.).

77. *A. meschatum*: Styr. (Rohitsch: Rigler ex Maly). Bulgar. in rupibus calcareis ad Petrohan et in collibus supra Kostinbrod et Konjavo (: Velenovsky).

78. *A. Cupani*; loca græca, a Boiss. (fl. or.) citata, sequ. sunt: Athenæ (: Heldr.), Acrocorinth. (: Heldr.), mons Malevo (: Orph.); ex eodem adest etiam in Serbia (*A. vaginatum* Panc. exs. et probab. *A. serbicum* Vis. exs.).

79 (sect. propr.). *A. obliquum* L. sp. 424. - Transs. centr. ad Hasadek pr. Torda ("huc usque unica statio europæa"), in præruptis calcareis et nunc solum in locis aditū difficillimis, quia bulbus a rusticis avide effoditur pro cibo.

CXXXI (cxxx). COLCHICACEÆ.

1. *Colchicum*. 1. *C. Bertolonii*; adest etiam in aliis Cycladum insulis, sic in Melo (: Cadet ex Boiss.). — *C. pusillum* Sieb. (?). Heldr. hb. norm. 766 (ex Hymetto) est varietas minor.

**C. Steveni*; synon. *C. montanum* fl. gr. et loca omnia europæa desunt in Boiss. fl. or. et probabiliter sub specie primaria subsumta sunt.

2. *C. pusillum*; ad speciem præced. (*C. Bertolonii*) nunc relatum est.

3. *C. bulbocodioides*: Bulgar. (Razgrad: Velen.). Rumel. or. (pr. Slivno ex Velen.). Sec. Janka hoc est verum *C. montanum* et vere sine foliis floret dum *C. Bertolonii* et *C. Steveni* foliata florent.

**C. hungaricum* Jka liliac. analyt. 76. *C. bulbocodioides* Neillr. diagn.

5. *C. Boissieri* (Heldr. hb. norm. 981); sec. Boiss. editum est in act. Congr. bot. florent. 1876; hab. in reg. super. Taygeti (ad 5000'); rhizomate horizontali subcylindrico insigne.

5. a. *C. Psaridis* Heldr. hb. norm. 982. (1887). - Lacon. m. Taygetus (b. Psarides 1870).

6. *C. Parkinsoni*; sec. Janka est = *C. variegatum* (4).

7. *C. Bivonæ*; planta græca speciem sistit distinctam:

7. a. *C. Sibthorpii* Bak. *C. latifolium* fl. gr. quoad flores. *C. Bivonæ* bot. græc. - Græc. cont. Maced. Creta (mont.). — *C. eubæum*, in Consp. sub specie præced. allatum, huc pertinet ex Boiss. or.

9. *C. amabile*; hab. in m. Delphi cacum. Xirobouni (4800'). — *C. vario-pictum*; a *C. pannonico* (15 *) vix distinctum est ex Borbás.

10. *C. byzantinum* (*C. latifolium* fl. gr. quoad folia); *C. speciosum* Stev. a Janka Byzantii lectum est (1872). *C. orientalis* Friv. specimina e Slivno Rumel. or. spectant (ex Janka) ad *C. autumnale minus* vel ad *C. neapolitanum*. — *C. lætum*: Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker). — *C. Bisignani* Ten. (*C. Todari* Parl.) et *C. lætum* Stev. sunt duæ species distinctæ ex Janka analyt.

Obs. Clusius hanc speciem Byzantii habitare dixit (: *C. byzantinum latifolium* Clus. hist.), sed recentiores non nisi cultum habuere. *C. speciosum* Stev. est species affinis quidem sed distincta, præcipue caucasica. *C. lætum* Stev. etiam diversum est et *C. autumnali* proximum. (Boiss. fl. or.).

12. *C. Jankæ*; detectum a cl. Studnizka (1875) et sub nom. *C. Bivonæ* Guss. distributum.

13. *C. turcicum* (*C. orientale* Friv. exs. sec. Boiss.); hab. in prato Platanorum ad Bujukdere et ad pagum Belgrad (: Janka).

15 * *C. pannonicum*; *C. Haynaldi* nunc dicitur propius *C. neapolitano*; — *C. transilvanicum* certe hujus loci est.

17. *C. neapolitanum*: Alpes-Marit. in reg. litor. locis siccis; in montibus supra Mentone usque ad altit. 1200 metr. (: Ardoino).

18. *C. longifolium* (*C. arenarium* G.G.); — *C. provinciale* Loret (bull. soc. bot. VI. 459) a specie satis distinctum est (vid. fl. montp. ed. II. 463).

20. *C. Kochii*: Croat. litor. (: Borbás). Atticæ m. Hymettus (: Heldr., Orph.); sec. Janka (et Boiss.) ad hanc speciem pertinent *C. polymorphum* Orph. exs. et *C. neapolitanum* Heldr. exs.

21. *C. arenarium*: Bulgar. (ex Velen.). Transs. ad *C. autumnale* (15) pertinet ex Smk. - Planta corsica probab. ad *C. longifolium* (18) pertinet.

22. a. *C. micranthum* Boiss. or. V. 162. *C. parvulum* Jka brevior, II (nota) non Ten. - Bujukdere Byzant. (: Janka). *C. arenarium* Sint. exs. (Dobrud.)?

23. *C. alpinum*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., rarius).

2. *Merendera*. 5. *M. sobolifera*; *Bulbocodium trigynum* Grsb. non Ad.; nomen *B. hastulati* editum est in "Magyar Hedos etc." (annal. societ. eruditorum hungar.) 1838.

6. *M. caucasica*; sec. specimina Frivaldsk. (teste Janka) adest etiam in Rumel. or. ad Slivno; ad Philippopol (: Skorpil ex Velen.); planta transsilv. (*Bulbocod. trigynum* Jka) ad *Bulbocodium ruthenicum* pertinet ex Smk.

3. *Bulbocodium*. 2. *B. ruthenicum*; — Comment. 248.

5. *Veratrum*. 1. *V. album*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont. sat abunde). Bulgar. (: Velen.). Rumel. or. (m. Rhodope: Skorpil). - Vogesi pertinent ad varietatem *V. Lobelianum*, quæ in Bavar. (Alpes etc.) typo vulgatiores est. — *V. Lobelianum*: Fenn. bor.-or. Lapp. or. — *V. bosniacum* GBeck in annal. mus. vind. 1887. (Bosn. mer. subalp.).

2. *V. nigrum*: Bohem. (ad Schlan: Celak. 1885). Carinth. (Bliess, alt. 1600 metr.). Bulgar. (: Velen.). Ross. centr. (gub. Kursk).

6. *Tofieldia*. 1. *T. calyculata*: Marchia, Lusat. Alsat. (ex Geke). Alpes-Marit. (reg. alp., rarius).

2. *T. borealis*: Ins. arct. Spitzberg (Kjellm. 1873, Nath. 1882). Fenn. or. (Carel. oneg.). Bavar. (Frauenalpe, Watzmann etc.).

7. *Narthecium*. 1. *N. ossifragum*: Ins. Færøer (in turfosis freq. ex Rostrup). Ross. balt., r. (ex Klinge). Gall. mer. (dep. Herault, reg. mont., r.). - Suec. bor. non nisi in Jemtia adest (med. in Nericia).

CXXXIII (cxxxii). JUNCACEÆ.

1. *Juncus*. 1. *J. maritimus*: Bulgar. (ad Varna etc.). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.).

2. *J. Tommasinii*; etiam sec. Buchenau (Engl. jahrb. 1875) est var. *J. acuti* (3).

3. *J. acutus*: Bulgar. litoral. (ad Varna freq.): Velen., Bornm.

4. *J. multibracteatus* et *J. Heldreichianus* sunt tantum "formæ diversæ" speciei præced. ex Buchenau l. c.

5. *J. conglomeratus*: Ins. Færøer. Fenn. med., occ. (Ostrob.). Bulgar. Sard. (ex hb. Moris). *J. Leersii* Marsson 1869 (quia ex eo species Linn. p. p. ad *J. effusum* pertinet).

**J. subuliflorus*; est var. speciei sequ. (*J. effusi*) sec. Buchenau.

6. *J. effusus*: Ins. Færøer. Fenn. non nisi in mer. indicatur (exc. etiam Lapon. tota). Bulgar.

7. *J. diffusus*: Dan. nunc aliquot locis certe lectus est. Carinth. (rarius). Ross. mer., mer.-occ.

8. *J. Angelisii*; est synonym. *J. glauci* sec. Buchenau (Engl. jahrb. VII).

9. *J. fistulosus*; est *J. effusi* forma medullâ caulis evanescente (vid. ap. Buchen. in Engl. jahrb. VII. 1885).

10. *J. paniculatus*; sec. Buchenau est var. speciei sequ. (*J. glauci*).

**J. depauperatus*; forma depauperata ejusdem speciei ex eodem.

11. *J. glaucus*: Bulgar. plur. loc. (: Velenovsky). — *J. longicornis* Bast. — *J. equisetosus* Dmrt.; ex Buchenau.

12. *J. balticus*: Batav. (Lacoste 1859). Ins. Færøer (Sandö: Rostrup). Fenn. bor.-occ. (Ostrob.), mer.-or. (Carel. mer., Isthm. carel.).

**J. inundatus* (1838): *J. balticus* var. *inundatus* Fr. (1846): Suec. bor. (pauciss. locis lectus, sed probab. in pluribus aderit); sec. Buchenau est solum forma *J. baltici*, sed ex aliis ab hoc et *J. filiformi* hybrida proles.

13. *J. arcticus*: Island. (Kalmanstunga: Grönlund; Oddeiri: Strömfelt); ex Grönl. addit. jam 1863 a Krabbe lectus est.

14. *J. filiformis*: Bulgar. Ross. mer.-occ. — *J. transsylvanicus* est species propria sec. Smk. (enum. 535), sed tantum "forma parva" *J. filiformis* ex Buchen.

15. *J. Thomasii*; sec. Buchenau est varietas *J. lampocarp*i (23).

16. *J. obtusiflorus*: Ross. balt. (Kurland: Klinge). Bulgar. - Siles. nondum lectus (ex Geke). *J. bifolius* Hpe (1810). *J. aquaticus* Seb. Maur. (ex Buchen.).

17. *J. atratus*: Hercyn. (: Hampe). Thuring. (pr. Stassfurt, Barby). Magdeburg. Phalz. rhen. (inter Schifferstadt et Mutterstadt). Bavar. pr. Wertingen et Neuburg (Donau Moore). Carinth. (pr. Himmelberg et Weissbriach). Morav. Poson. Bulgar. (ex Velen.). Ross. post. (gub. Tambow), mer.-or. (Sarepta: Becker). *J. acutiflorus* Grsb. spicil. (ex Boiss. or.).

18. *J. silvaticus* (*J. aquaticus* Brot. 1804): Bulgar. (: Velen.). Ross. balt. (: Klinge), mer.-occ. (: Schmalh.), mer.-or. (Sarepta: Becker). - Norv., Suec. et Fenn. probab. exclud. (vid. Hartm. handb. ed. XII. edit. Krok. 121). Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk. — *J. Rochelianus* est (sec. Buchen. et al.) species bene distincta (18a).

**J. rugosus*; est solum forma *J. silvatici*, quales etiam sunt *J. rufus* et *J. Wulfenii* Mielich. ap. Saut. (ex Trimen et Buchenau).

18a. *J. Rochelianus* R.S. syst. VII. 1658. (1830): Hung. Transs. Serb. Bulgar. (in paludosis alpinis Balcan. etc.). Græc. bor. (: Hausskn. 1885). *J. silvaticus* var. *multiflorus* Roch. ban. (1828). *J. striatus* Grsb. spicil.; *J. melanocephalus* Eriv. in Flora 1836. *J. brevirostris* Schur (non Nees). Sec. Buchenau hæc species (*J. Rochel.*) melius post *J. lampocarp*on militet. — *J. digeneus* Borb. (nomen); ex Buchenau est forma parva infloresc. compacta *J. Rocheliani*.

19. *J. valvatus* Lk in Schrad. journ. 1799. II. 316. *J. echinuloides* Brot. (1804).

19a. *J. alpigenus* CKoch in linn. XXI. 627. - Bulgar. (in paludos. alpin. m. Vitos: Velen.). Maced. (ex Velen.).

20. *J. striatus*; exsicc. sub hoc citata ad speciem sequ. pertinent sec. Buchenau.

21. *J. Fontanesii*: Thessal. (pr. Karditza, Neuropolis: Hausskn.). — *J. lagenarius* non est varietas sed monstrositas, larvâ insecti cujusdam, in capsula parasitante, orta (jam observ. Duv.-Jouve).

23. *J. lampocarpus*; *J. foliosus* Hpe (1810). — *J. repens* Nlt. (non alior.). — *J. sphærocephalus* Salzm. ap. Pouzolz (1826). *J. Thomasii* Ten. *J. lampoc. multiflorus* Lge.

**J. nigritellus*: Ins. Færøer (ex Rostrup). Voges (: Godron).

24. *J. atricapillus*: Slesvic. (ins. Amrom, Rön etc.); Norv. mer.

25. *J. anceps*; hab. etiam pr. Parisios (ad St-Leger).

26. *J. alpinus* (*J. mucroniflorus* Clairv. 1811): Scotia (Blair Athole in Perth: Dr White ex ArthBennett in litt.). Bulgar. — *J. alpinus* var. *fuscoater* Schreb. ap. Schweig. Körte (1811). — *J. carpaticus* Simk. (1886). *J. alpinus* Schur.

**J. Requienii* (Mab. cors. 400); est *J. alpini* forma *pygmæa* sec. Buchenau (*J. lampocarpus pygmæus* Sal.-Marschl.).

27. *J. heterophyllus*; hab. etiam in Sard. (ex hb. Moris.).

28. *J. supinus*: Ins. Færøer. Dan. Fenn. med. Sard. (: Reverch.). Comment. 249.

30. *J. multiflorus* (1798). *J. subulatus* Forsk. fl. ægypt. - arab. 75. (1775): Balear. Attica (ad Phaleron in paludosis salsis: Hausskn. 1885).

31. *J. squarrosus*: Island. (r.). Ins. Færøer (vulg.). Ingr. (sed in Fenn. non lectus). - Suec. med. hab. solum in Nericia, bor. in sola Jemtia; Helv. non nisi in Vales. (alp. Gotthard et des Ormonds); Transs. ad speciem sequ. pertinet. Thracia, ubi Byzant. indicatur (a Sestini), probab. exclud.

32. *J. compressus*: Fenn. med. (Suec. bor. in sola Jemtia adest). Dobrud. (: UeS.), Bulgar., Rumel. or. (ex Velen.). Sard. (ex hb. Moris.). — *J. Metzleri* FSz 1855. *J. compr.* var. *nudiculmis* ej. 1863.

**J. elatior*; ex ipso auct. (in haandb. ed. IV. 168) est varietas (— *sparsiflorus* Mertens) speciei sequentis, etiam in ins. Falstria Danie obvia.

33. *J. Gerardi*: Gall. bor.-occ., bor.-or. Alsat. Helv. (r.). Morav. *J. nitidiflorus* Duf. (ex Buchen.). — *J. soranthus* Schrenk 1843. (Sarepta: Becker 1858).

34. *J. tenuis*: Angl. (Herdordsh.: Towndrow 1884). Jutland. (ad Jul-sø pr. Svejlbæk: JE Lange); nuper etiam in Suecia (Wexiö Smoland.) lectus est sed forse introd. Gall. occ. (et Parisiis) probab. introductus (cfr. Magn. scrin. I. 38), sed (teste Gillot et Malinvaud) in depp. Saône-et-Loire et Jura plur. locis copiosus et certe indigenus; pr. Luxeuil dep. Haute-Saône a cl. Humnicki 1859 detectus est (vid. ej. catal. 1876. 62 et 91 *); dep. Vosges (: Beshier). Germ. bor. solum in Westphal. indicatur; etiam in centr. rarus est, sed in Silesia satis adest. Ital. bor. (pr. Trobaso ad Lacum Majorem: Dr Cuboni 1878). Ross. mer.-occ.

35. *J. Tenageia*: Siles. occ.; Transs. ad *J. bufonium* (38) pertinet ex Smk.

36. *J. sphærocarpus* (Sz hb. norm. nova ser. 623. Kern. fl. exs. austriaco-hungar. 274): Carn. (ex Buchen.). Serb. (ex Buchen.). Bulgar. (: Velen.). Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker).

37. *J. foliosus*; est var. speciei sequ. ex Boiss. (: *J. bufonium major*) et Buchenau (: *J. bufonium foliosus*).

38. *J. bufonius*; — *J. fasciculatus*; *J. bicephalus* Barcelò ex Burn. Barb. test. specim. auth. (ad Palma ins. Mallorca).

39. *J. mutabilis*; — *J. ranarius*: Thuring. Hannov. Siles. Helv. (Engadin). Sec. Hausskn. est var. *salsa* *J. bufonii*. Sec. Buchenau (in Engl. jahrb. VII. 157) *J. mutabilis* et alii sub hoc enumerati sunt "formæ diversæ" speciei præced. et *J. ranarius* ejus synon. (cfr. tamen i. a. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 453).

**J. ambiguus*: Sicil. etiam ad Syracusa (: Nicotra). Sard. (: Reverchon 1882); sec. Buchenau ne minime differt a *J. Tenageia* (35).

40. *J. pygmæus*: Menorca Balear. (: Rodrig.). Arch. (ins. Delos ex Buchen., Melos sec. d'Urv.). Boiss. hanc speciem non vidit e Græcia et forse planta attica ad præced. (*J. mutabilem*) pertinet. — *J. bicephalus*: Ibiza Balear. (: Marès).

41. *J. Sorrentinii* (synon. *J. pygmæi* ex Buchen.); hab. etiam in Sard. (: Reverchon).

42. *J. capitatus*: Gall. bor.-occ. (Norm., r.), or. (Côte-d'Or). Alsat. Siles. Carinth. nuper non lectus ex Pacher. Jaborn. (1880). - Fenn. non nisi in mer.-or. (Isthm. carel.: Sahlberg 1878). Transs. a Schur indicatur, sed in Simonk. enum. cruciatus est. — *J. setaceus* Ten. *J. capitatus* var. *congestus* Ten. 1830. — *J. physcomitroides* Bænitz (hb. eur. 1506) est forma pusilla sæpius uniflora ex Buchenau.

43. *J. Jacquini*; hab. etiam in Galic. (rr.).

44. *J. castaneus*: Spitzberg. (Nathorst 1882). Lapp. tulom. et ponoj. (ad Mare Album). Galic. (Carpati: Lapalovicz).

45. *J. stygius*: Bavar. etiam ad Kochelsee, Heilbronn (etc.). Helv. etiam Geissboden pr. Zug. Ross. mer.-occ. - Carinth. deest ex Pacher. Jaborn. (1880).

46. *J. triglumis*: Spitzberg (Nathorst 1882). Ins. Færøer (Feilberg et Rostrup 1867). Shetland. (: Beeby). Alpes-Marit. (col de Raus, mt Bego, N.-D.-de-Fenestre etc.).

47. *J. biglumis*; hab. etiam in ins. Færøer (: Feilb. Rostr.).

48. *J. trifidus*: Ins. Færøer (: Feilb. Rostr.). Fenn. bor. (Kuusamo, nec Ostrob.). Bavar. extra Alpes (Watzmann) etiam in jugo mont. Bayr.-Wald (rarius). Bulgar. in summo m. Vitos et in cacum. montis Kom (: Velenovsky).

**J. Hostii*: Galic. (cl. Knapp). Bosn. mer. (: GBeck).

2. *Luzula*. 1. *L. maxima*: Island. (ad Eyafjörðr: JMortensen). Ins. Færøer (: Rostrup). Norv. usque ad lat. 69° 10' progreditur (terminus polaris speciei) ex Norman. Ross. balt. (sec. Klinge). Galic. (: Knapp). Bosn. mer. (: GBeck). Bulgar. (: Velen.). — var. *gracilis* Rostr. (in bot. tidskr. 1870): ins. Færøer (Hestö: Rostrup). Shetland. (: Beeby in scott. natural. 1887, 12 sep.).

**L. sicula*: Neap. (m. Sant Angelo). Basilic. Lucan. (ut jam habet Gussone).

2. *L. græca*; a cl. Buchenau (in Engl. jahrb. 1885. 175) inter *L. pediformem* (23) et *L. cæspitosam* (24) enumeratur.

3. *L. albidula*: Suec. inquil. etiam in Bleking., Smoland. bor., Suderm., Neric.; Gothob. in tractu remoto et deserto (ad Skår) 1883—6 copiose aderat (: E Almquist). Fenn. (: Selan 1883), probab. introd., qualis etiam Daniæ plurib. locis adest. Ross. balt. rarius (ex Klinge). Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.). Lothar.

4. *L. pedemontana*: Alpes-Marit. (col de l'Abisso, vall. Gordolasca, S.-M.-Lantosca, alp. de Molieres etc.; ex Ardoino).

6. *L. nivea*; Bavar. (extra Alpes) ad Lechbruck pr. Schongau. - Transs. ad *L. albidam* (3) pertinet ex Smk.

7. *L. lutea*: Alpes-Marit. (rarius). *Juncus pistillaris* Jan (1832) ex Buchenau.

9. *L. Desvauxii*: Pyren. et Vogesi (ex Buchenau).

10. *L. glabrata*: Bavar. (Alpes or.). Carinth. (r.: Pacher. Jaborn.). - Transs. (*L. intermedia* Bmg.) ad *L. cuprinam* (3—) pertinet ex Smk.

12. *L. spadicea*: Galic. (nunc plurib. loc. lecta). Styr. (Alpes plur.: Maly). Bulgar. (: Velen.). — *L. carpatica* Kit. ex Buchenau. *L. spadic.* var. *glabrata* Whlhb.

13. *L. Wahlenbergii*: Spitzberga (Nathorst 1882). Nov.-Semlia (Kjellm. Lundstr. 1880). Waigatsch (ex Kjellm.).

15. *L. Forsteri*: Scotia (ex Buchen.). Croat. (vall. Recina pr. Fiume: A.-M.Smith). Bulgar. (ex Velen.). Galic. (pr. Lipowa: Rehmann), sed ex Fiek hæc indicatio forse ad speciem sequ. pertinet.

16. *L. Hostii*: Galic. Hung. (: Ilse, Rehmann; ex Hzl.). Bulgar. (ex Velen.). Transs. (rarius: Schur, Smk.).

17. *L. erecta*: Ins. Færøer (: Feilb. Rostr.). Bulgar. (: Velen.).

**L. pallascens*: Fenn. Siles. Morav.; melius species ejusdem dignitatis ac proximæ consideranda videtur.

18. *L. nigricans*; *L. alpina* Hpe (1839) ex Buchen. — *L. Althii* est forma major speciei sequent. ex Buchen.

19. *L. campestris*: Bulgar. Ins. Færøer. - Fenn. hab. in sola mer.-occ.;

in Suec. (et Norv.?) bor. vix vel parissime lectus est. — *L. nivalis* Spr. (ex Buchen.).

20. *L. hyperborea* Br. 1821 (p. p.): Nov.-Seml. (sed non Island. teste Nathorst); - in Lapon. nuper non lectus est. *Juncus arcuatus* β Whlhb. (1812) p. p. — *L. nivalis* Spr. est forma minor unicapitulata speciei præcedentis ex Buchen.

21. *L. confusa*: Island. (: Grönlund). Spitzberg (Th.Fr. exs. 73). Beeren-Eiland. Ross. arct. cum N.-Seml. (: v. Baer) et Waigatsch (: Kjellm.). Herjedal. *Juncus arcuatus* β Whlhb. (1812) p. p. *L. hyperborea* Br. (1821) p. p. (test. specim. auth. omnino; cfr. Th.Fr. in Bot. Not. 1873). *L. arcuata* Fellm. exs. 241 (= var. sudetico-arcuata Rupr. ex Buchen.).

22. *L. arcuata*: Ins. Færøer (ex Rostrup). Jan-Mayen (Dr Fischer exped. austriacæ 1883). - Fellm. exs. 241 ad speciem præced. pertinet. - *Juncus arcuatus* α Whlhb. (1812). *L. arcuata* Whlhb. (1824).

23. *L. pediformis* (1805): Alpes-Marit. (col de Tanarella: Loret; alp. de St-Dalmas: R.). *L. nutans* Duv.-Jouv. (1863). *Juncus nutans* Vill. (1785).

25. *L. spicata*: Fenn. bor. (Kunsamo). Suec. versus merid. usque ad Dalecarl. bor. (m. Städjan paroc. Idre) progreditur. Ins. Færøer (var. minor: Feilb. Rostrup 1867). Bavar. (Alpes). Alpes-Marit. (col Bertrand, Tenda, col de Salèse, Ste-Anne-de-Vinai etc.; ex Ardoino). Sard. (m. Genargentu) ex Barbey; cfr. cum sequente. Bulgar. (in cacum. mont. Kom et Rujen: Velen.).

26. *L. italica*; est "forma minor" speciei præcedentis sec. Buchenau.

CXXXV (cxxxiv). PALMÆ.

1. *Chamærops*. 1. *Ch. humilis*: Mallorca Balear. (abunde in cordill. Norte et in montib. de Artà, etc., usque ad 800 metr. s. m.). Ligur. in rupibus inter Monaco et Montalbano olim haud rara, nunc destructa est (ex Ardoino). Comment. 250. — *Ch. macrocarpa*; est var. carpellis duobus abortivis sec. Caruel.

Obs. *Phoenix dactylifera*; in Balearibus haud raro colitur et læte viget sed fructus non maturat. Comment. 251.

CXXXVI (cxxxv). AROIDEÆ.

1. *Acorus*. 1. *A. Calamus*: Bosn. (in palude sub Dolac: Brandis 1887).

2. *Calla*. 1. *C. palustris*: Lotharing.; Norv. hab. solum in mer., Lapp. solum in umensi et kemensi.

5. *Arum*. 3. *A. orientale*; — *A. longispathum*: Bulgar. (vall. Jantru: Janka 1878).

**A. albispatham*; sec. Boiss. pertinet ad *A. italicum* (5).

5. *A. italicum*: Dorsetsh. (Ridley 1882). Gall. bor.-occ., or. (Côte-d'Or). Sec. cl. Townsend *A. italicum* anglicum sistit varietatem (: neglectum) *A. italici* typici continentalis.

6. *A. maculatum*: Bulgar.; deest in Boruss. et Poson. (ex Gcke).

**A. Bessermanum*; *A. orientale* Bess. - Galic., sed Transs. ad speciem sequ. pertinet ex Smk.

7. *A. alpinum* (1851). *A. intermedium* Schur (1853). *A. gracile* Unverricht (1854). Sec. Smk. est var. speciei præced. (*A. maculati*).

6. *Biarum*. 2. *B. abbreviatum*; hab. in m. Taygeto (nec in Parnasso) ex Boiss. or.

8. *Ambrosinia*. 1. *A. Bassii*; — *A. reticulata*: Sard. (supra Domus novas: Gennari).

CXXXVII (cxxxvi). LEMNACEÆ.

1. *Spirodela*. 1. *S. polyrhiza*: Fenn. occ. (Ostrob. mer. etc.). Bulgar.
2. *Lemna*. 1. *L. trisulca*: Sard. (ex Barbey). - Norv. deest in bor.
3. *L. gibba*: Germ. Bulgar. (ad Varna: Bornm.). Ross. mer., mer.-occ.
3. *Wolffia*. 1. *W. Michellii*: Marchia (ad Potsdam ex Gcke). Ital. bor. (pr. Bernareggio et Ronco vallis Padani: Sordelli). Sicil. (Catania: Borzi 1888). Podol. (ex Schmalh.). - Transs. ad *L. gibbam* pertinet ex Smk.

CXXXVIII (cxxxvii). TYPHACEÆ.

1. *Typha*. 1. *T. latifolia*: Suec. bor. (rr.). Fenn. med., bor.-occ. (Ostrob.). Gall. Sard. (Terranova ex hb. Moris.). Bulgar. — *T. transsilvanica* Schur (et *T. Shuttleworthii* auct. hung.-transs. p. p.) ex Smk. — *T. elata* Bor. non alior. (in Consp. sub *T. angustifolia* militat).

2. *T. Shuttleworthii*: Pyren. or. (: Debeaux). Helv. plur. locis adest. Badia (Freiburg in Breisg.: Rohrb. 1869); cfr. ap. Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1886. Bavar. (Rohrb. 1869). Styria (: Hözl ex Kronfeld 1887). Hung. (Budapest: Steinitz 1882), plurib. loc. ex Borbás (vid. oe. bot. z. 1886). Transs. (: Janka, Freyn): *T. transsilvanica* Schur ex Jka; cfr. speciem præced. Bosn. (ex Borbás). Comment. 252.

5. *T. angustifolia*: Bulgar. - Formæ (hybr.), inter hanc speciem et *T. latifoliam* mediæ, ubi ambæ crescunt, non raræ sunt (cfr. ap. Hsskt in mitteil. soc. bot. thur. 1887).

6. *T. angustata* (Heldr. hb. norm. 892); *T. media* B.Ch. ex Boiss. — *T. gracilis* ad speciem præced. pertinet ex Smk.

7. *T. minima*: Styria (ad flum. Drau: Maly). Carinth. (r.). - Hung. hab. solum in parte occ. (ad lacus!), sed nuper etiam Pesthini lecta (introd.?). Comment. 253.

**T. Laxmanni* Lepechin in nov. act. acad. scient. petrop. XII. (1801). 335, ubi describitur planta a Laxmann in reg. transbaic. detecta.

8. *T. Martini*; status autumnalis *T. minimæ* dicitur.

2. *Sparganium*. 1. *S. ramosum*: Suec. bor. (Medelpad., Jemtia, Lapp. umens. et pitens.). Bulgar. (ad Kebedze exstat valde *latifolia*, usque *tripedalis*: Bornmüller). Creta (ex Boiss.).

**S. neglectum* Beeby in journ. of bot. 1885 (*). Angl. mer. (Surrey, Sussex). Gall. occ. (: Lloyd), mer. Helv. occ. (ex Beeby) et probab. alibi; sic sec. Beeby in Hetr. a Mori observatum est (1882), a *S. ramoso* typico, quod ibi rarum, distinctum; nuper etiam Dan. (ad Vedbæk Sjælland. or.) lectum est teste Neuman (1889).

2. *S. simplex*; in Lapp. suec., fenn. et ross. adest. Sard. (: Aschn et Reinh.). Shetland. (: Beeby). — *S. emersum* Rehm. (Podol.).

3. *S. fluitans*; *S. glomeratum* Læst. (cfr. Neuman in Htn handb. ed. XII. pag. 111): Fenn. mer., med. Ross. bor. Norv. usque ad lat. 64° 25' progreditur (ex Norman).

4. *S. natans*: Ins. Færøer (: Rostrup); in Dania non indicatur a Neuman (in Norv. cum dubio); deest in Fenn. bor. - Hung. (Biharia) nunc indicatur, sed *S. natans* in Batav. (ad Zutfen: Kok Ankersmit) indicatum, erat *Sagittaria sagittifolia*.

4. *a. S. speirocephalum* Neum. in Htn. handb. ed. XII (edit. Krok). 109. - Suec.; Norv. solum ad Mandal (: Wittr.) et Salten (: Tisel.) ex Neum. Fenn. (Carel. bor., Ostrob. mer., Savol. mer.; ex Neum.).

5. *S. affine*: Shetland., ubi freq. videtur (: Beeby). Færøa? Island. (Strömfelt 1883); an *S. natans* Fedders. 1884?, sed ex Rostr. hb. (teste ABennett) hoc est verum *S. natans*; forse *S. natans* e Sierra de Gredos (: Leresche) huc referendum est. Suec. hab. in mer. et med., Jemtia et Lapp.; Fenn. non nisi in Lapp. kemens. et ross.; Dan. freq. (ex Neuman). Angl. etiam mer. (: Surrey: Beeby).

6. *S. oligocarpon*; sec. Neuman (Htn handb. ed. XII.) hoc p. p. min. ad speciem sequ. (f. rostratam) pertinet, sed pro p. max. ex hybridis variis, parum cognitis, compositum videtur.

7. *S. minimum*: Island. (ex Rostrup). Norv. arct. saltem usque ad lat. 66° 34' progreditur (ex Norman). — ? *S. Borderi* Focke (1876). *S. minimum* Bordère exs. - H.-Pyren. (Trémouse); ex Beeby (litt. 1890) videtur forma alpina paupera *S. affinis*.

8. *S. hyperboreum* (1853). *S. submuticum* Htn handb. ed. IV. 1843 (*S. natans* var.); ed. XII.: Fenn. (Ostrob. bor. et med.).

CXXXIX (cxxxviii). CYPERACEÆ.

1. *Cyperus*. 1. *C. Papyrus*: Melita (: Grech-Delicata, Schweinfurth; ex Thiselton-Dyer); sec. Parlatore post sæculum decimum e Syria advectus est.

2. *C. longus*: Bulgar. (ad Varna; Velen.; ad lacum Devno: Bornm.). Rhodus (Bourg. ex Boiss.). — *C. Heldreichianus* Boiss. (Maced. penins. athoa: Janka).

3. *C. Preslii*: Cephalon. ins. jon. (r.: Heldr.); non commemoratur in Boiss. fl. or., quare loca græca a me citata probab. ad speciem sequ. pertinent.

4. *C. badius*; — *C. inconspicuus* Genn. (ins. Caprera); in Consp. sub *C. rotundo* (6) militat.

5. *C. myriostachys*: Creta (Reverchon 1883). Forse subspec. (vel varietas?) speciei præcedentis.

6. *C. rotundus*: Alpes-Marit. (Mentone, Nizza; ex Ardoino). Ins. Caprera (ad Casa Garibaldi, introd.?: Aschn. Reinh.). Thrac. (ex Boiss.). — *C. inconspicuus*; ad *C. badium* (4) referendus est sec. Aschn.

8. *C. aureus*; in hb. græc. Fauché (nunc Boiss.) exstat solum ex Androuvitz Pelop.

11. *C. glaber*: Rumel. or. (Aitos: Skorpil). Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker).

13. *C. fuscus*: Bulgar. Bosn. (: Brandis). Thessal. m. Pelion (Heldr. 1882). Obs. *C. vegetus*; ante 50 annos cum saburra navali e civitatibus merid. Americæ borealis Europæ (Burdigalæ) advectus est; nunc in magna parte vallis Adour dispersus, exstat tam ad Dax quam ad Burdigalam. Magn. fl. exs. 138.

14. *C. Monti*: Banat. Slavon. (Hzl.). - Helv. hab. solum in cant. Ticino (teste Gremli).

16. *C. globosus*: Alpes-Marit. (Ventimiglia: Ardoino; Mentone: Moggridge; Nizza).

17. *C. flavescens*: Sard. (ex Aschn). Bulgar. (pr. Kistendyl legit Veleznovsky, ad Kebedze Bornmüller). Thessal. m. Pelion (ubi terminus speciei meridionalis: Heldr.).

19. *C. pannonicus*; hab. etiam in Bulgar.

20. *C. mucronatus* (*C. lævigatus* L. mant. alt.; Boiss. or.): Rhodus (: Post ex Boiss.).

21. *C. distachyos* (*C. mucronatus* fl. gr. ex Boiss.): Pyren. or. (: Debeaux); in Sard. (Porto Scuso) legit Moris ex Parl., sed in hb. Mor. non exstat sec. Barbey.

2. *Schoenus*. 2. *S. nigricans*: Dan. ins. Sjælland et Bornholm (rr.).

3. *S. ferrugineus*: Scot. (Pertsh., Loch Tummel: JBrebner 1884). Fenn. mer.-or. (Carel. oneg.: FNYlander, Norrlin). Ross. mer.-occ.

× *S. intermedius* Celak. = ferrugineus + nigricans. (Bohem.).

× *S. Scheuchzeri* Brügg. = ferrugineus + nigricans. (Zürich).

3. *Cladium*. 1. *C. germanicum*: Bulgar. (: Velen.). - Græc. (teste Boiss.) hab. in Aetol. (: Heldr.), Pelop. (Sibth., Pichler), Cephalon. (: Heldr.). - Sec. HGroves planta Ital. mer. (pr. Otranto observata) staturâ et inflorescentiâ borealem multo superat (forse ad speciem seq. referenda).

Obs. Teste cl.º Ferd. v. Müller genus *Cladium* a *Gahnia* distingui non potest, quare hæc species *Gahnia Mariscus* F. v. Müll. (Key to the system etc.) nominanda est.

4. *Rhynchospora*. 1. *R. fusca*: Fenn. mer., mer.-occ. (Aland.). Gall. bor.-or. (r.). Siles. - Transs. deest ex Smk.

5. *Fuirena*. 1. *F. pubescens*; in hb. Pourret. (teste Lge) adest ex ins. Menorca Balear.

6. *Eriophorum*. 1. *E. latifolium*; adest in Lapp. norv. (Finmark.), usque ad lat. 70° et paullo ultra (: Norman). Bulgar.

2. *E. angustifolium*: Ins. Færøer. Spitzb. (var. triste Th.Fr. exs. 75). Bulgar. Bosn. (: Vandas ex GBeck). Ross. arct. ins. Waigatsch et Nov.-Seml.

3. *E. gracile*; Angl. hab. solum in Hampsh. (: Balton King 1882), Yorksh. et Surrey (in utroque unico loco lectum est). Fenn. exc. Lapp. plur. Germ. mer. (Bavar. et Würtemb.) hab. multis locis, in Badia et Alsatia rarior est. Bulgar. (in spongiosis alpinis m. Vitos ex Velen.). Ross. mer.-occ.

*E. Höftii FNyl. in act. soc. sc. III. (1849). - Ross. centr. gub. Kursk (Dr v. Höft 1825 ex FNylander).

4. *E. vaginatum*: Ins. Færøer; - Ross. hab. etiam in ins. arcticis Nov.-Seml. et Waigatsch; in mer. partim (Cherson) deest. Bulgar. (in spongiosis alpinis m. Vitos ex Velen.).

5. *E. callithrix*: Fenn. bor. (cum Lapp.), med. Ross. arct. ins. Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875); in Nov.-Seml. huc usque non lectum.

6. *E. russeolum*: Ross. arct. ins. Waigatsch (Kjellm. Lundstr.), sed non in Nov.-Seml. (ex Kjellm.). Fenn. bor.-occ. (Ostrob. bor.).

7. *E. Scheuchzeri*: Ross. arct. etiam in ins. Nov.-Seml. et Waigatsch. Bavar. (Alpes). Alpes-Marit. (Tenda, lacs de Fremamorta, Ste-Anne-de-Vinai; Salsamorena etc.; ex Ardoino). - Helv. solum in alpinis adest (non in Jura). *E. alpinum* auct. transs. ex Smk.

8. *E. alpinum*: Bavar. Würtemb. (Germ. med. vix nisi in Thüringer-Wald et Brocken lectum est). Ross. mer.-occ. - Transs. deest ex Smk.

7. *Fimbristylis*. 2. *F. laxa*; Hpe dec. 161 (e Friulia: Dr Mayer).

8. *Dichostylis*. 1. *D. Micheliana*; Transs. a Schur indicatur, sed ap. Simonk. cruce notata est.

9. *Blysmus*. 1. *B. compressus*: Sard. ex hb. Moris. (: Barbey).

2. *B. rufus*; — *B. bifolius* Wallr. (sub *Scirpo*): Germ. Dan. (vid. Lge haandb. ed. IV. 113).

10. *Scirpus*. 1. *S. silvaticus*: Bulgar. (ex Velen.). Norv. usque ad lat. circiter 64° 30' progreditur (ex Norman). Lapp. etiam fenn. deest.

2. *S. radicans*: hab. etiam in Ross. mer.-occ.

3. *S. maritimus*: Fenn. mer. et Lapp. Imandæ (ad Mare Album).

*S. Tabernæmontani: Fenn. occ., mer. Bulgar. (: Bornm.).

5. *S. carinatus*; Alsat. ad Strassburg destructus est ob locum nunc exscitatum, sed (ex Geke) manet ad Rheinau et Mühlhausen.

8. *S. triqueter*: Luxemb. Bavar. (Donauwörth—Passau, Main). Morav. (r.). Galic. (rr.). Sty. (: Maly). Sard. (ex hb. Moris.: Barbey).

9. *S. pungens* (*S. tenuifolius* DC.): Pomeran. (pr. Swinemünde) et Boruss. (ad Koenigsberg) ex Geke. - Belg. olim, sed per semisæculum non lectus (ex Crepin 1881).

10. *S. mucronatus*: Gall. or. (Etang des Breuillots: Chapellier 1878). Siles. (pr. Trachenberg: Uechtritz 1861). Transs. (Felsö-Arpás: Simonk. 1883).

11. *S. cæspitosus*: Ins. Færøer. Bulgar. (: Velen.). - Transs. deest ex Smk.

12. *S. pauciflorus*: Ins. Færøer. Alpes-Marit. (col de Fenestre, de Salèse etc.; ex Ardoino).

13. *S. alpinus*: Delph. (lac du Pontet ex Chabert 1879).

14. *S. parvulus*: Angl. Hampsh. (rr.: rever. GSSmith 1835, sed postea

ibi non lectus, antequam ad Mudeford a Bolton King relectus est (1879); in Dorsetsh. ad Prole harbour detectus a Mansel-Pleydel 1870 (ex Townsend); adest etiam in Surrey (: Dr Eyre de Crespigny sec. ABennett 1880). Scania (: Berggren 1886); lit. mar. ad Skanör, Falsterbo et Malmö: Hj.Nilsson 1887 (vid. Bot. Not. 1888). Dan. hab. etiam in ins. Möen et Bornholm. - Helv. rr. (cant. Bern. et cant. Solothurn, utr. unico loco), an etiam nunc, queritur (Gremli).

× *S. Scheuchzeri* Brüg. (1822); inter *S. Tabernemontani* ad *S. triquetrum* medius et verosimiliter ab iis primitus hybriditate ortus, quamquam, parentibus nunc (ob locum natalem, ad lac. Zürich, culturā etc. mutatum) extinctis, solus superstes sit; vid. ap. Brügger in Jahresb. nat. ges. Graub. 1882. 108—111 (*), ubi cl. auctor variā profert circa proles hybridās aliarum specierum affinium observata; cfr. etiam ea quæ idem auctor laudatus (pag. 93—94), multorum annorum experientiā edoctus, sagaciter exposuit de s. d. formis inter species transitoriiis (quæ plurimæ hybridæ sunt), de specierum constantia (relativa), quamquam ob proles hybridas (quæ interdum validiores evadunt quam parentes) ægre limitentur, — quibus omnibus libenter assentior, eo magis quod jam a multis annis eandem colui sententiam.

11. *Holoschoenus*. 1. *H. vulgaris*: Marchia. Saxonia (pr. Magdeburg). Bulgar. Ross. centr. (gub. Kursk).

12. *Isolepis*. 1. *I. supina*: Bavar. (rr.). March. (Berolini etc.). Lusat. - Boruss. (ex Geke) solum ad Thorn. - Trier prov. rhein. (: Bachkoltz 1873). - Bohem. (: Celak. 1882). - Istr. mer. (: Schlyter 1879; cfr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1881). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.), mer.-or. (pr. Sarepta: Becker). - Transs. cum dubio citetur.

2. *I. setacea*: Ital. mer. (var. *clathrata* Rehb.) ex Terrac. - Bulgar. (: Velen.). - Transs. a Baumgarten (sine loco natali) indicatur, sed in ejus hb. deest.

**I. gracillima*; potius varietas quam subspecies; cfr. Magnier scriin. (II) 55 et Loret fl. montp. ed. II. 520.

3. *I. Saviana*: Gall. bor.-occ. Rhodus (: Bourg. ex Boiss.). *I. sicula* (*I. Saviana* Guss. p. p.) est var. speciei sequ. sec. Terraciano (in malpigh. 1889. 423).

3. *a. I. nervosa* (Hochst.) Rich. abyss. 499. — var. *campana* Terrac. l. c. (*I. fuscescens* Terrac. antea). Campan. et prov. Rom. — var. *siculus* Terrac. (*I. sicula* Pr.).

5 *I. controversa*; probabiliter tam hæc quam præced. (4) melius tamquam subspecies *I. Savianæ* considerandæ sunt (vid. Terrac. in malpigh. 1889).

13. *Eleogiton*. 1. *E. fluitans*: Gall. or. (Côte-d'Or). Galic. (circul. Wadowic: Knapp). - Transs. deest ex Smk.

14. *Eleocharis*. 1. *E. ovata*: Ross. mer.-occ.; in Helv. rr. est sec. Gremli (solum ad Pruntrut, Genève et Cugnasco ab eo citatur); de planta sardoa et sicula vid. sub 4.a.

2. *E. Lereschii*; in Ital. bor. etiam ad Vercelli, Lomellina et Verona lecta. est (sec. Terrac. in malpigh. 1888). CBClarke observat (journ. of bot. 1887) speciei nomen Kunthianum (atropurpurea) servandum esse si nomen genericum scribitur *Eleocharis* (nam nomen Shuttlew. posterius est Kunthiano).

3 * *E. nebrodensis*; Calabr. in mte Pollino a Terraciano lecta est.

4. *E. uniglumis*: Lapp. fenn. (ad Mare Glaciale et Album); etiam in Lapp. norv. (Norv. arct.) adest multis locis usque ad lat. 71° (ex Norman). Ins. Færøer (: Feilb. Rostr.). Siles. Galic. Morav. Carinth. Fiume (Croat) inter Peschiera et Vos ins. Veglia (A-M.Smith). Ital. bor. usque ad agrum roman. (ex Terrac.). Bulgar. Ross. mer.-occ., mer.-or. (Sarepta: Becker).

4. *a. E. caduca* Schult. in R.S. mant. II. 88. *Scirpus caducus* Del. æg. 9. - Sard. pr. Porto Scuso (*E. uniglumis* Müll. exs.) et *Spedia* (Bertol.); etiam a Reverchon lecta (ex Clarke). Otranto Ital. mer.-or. (HGroves sub *E. ovata*). *E. ovata* auct. sard. et HGroves (cfr. descr. nuclei in giorn. bot. ital. 1887. 205); an etiam Guss.? (cfr. ej. syn. I. 48); vid. CBClarke in journ. of bot. 1887. 268. — *E. ovata* Tod. exs. *Scirpus ovatus* Guss. (Sicil. pr. Caronia; cfr. Terrac. in malpigh. 1888. 306).

5. *E. multicaulis*: Jutland. Bornholm. Alpes-Marit. (Nizza, ad Var, l'Estérel; ex Ardoino). Lago Sibolla prov. rom. (ex Terrac.). Cors. (Req. ex Terrac.).

6. *E. carniolica*: Styr. Croat. Transs.; locus carinth. unicus (pr. Klagenfurt) exsiccatione nunc destructus est (sec. Pacher. Jaborn. 1880).

7. *E. acicularis*: Ins. Færøer (ex Landt). Ital. etiam in med. lecta est.

7. a. *E. amphibia* Dur. in act. soc. lin. burdig. XXI. (1858). 487 (Heleoch —). *H. oxyneura* Dur. antea (in bull. soc. bot. II.). Gall. mer.-occ. ("les Landes" et æstuar. fluminis Garonne): Bill. exs. 2753. FSz hb. norm. IV. 367 (Durieu 1855). Rel. Maill. 19. Magn. fl. sel. 416. Cfr. Lloyd et Foucaud fl. ouest. ed. IV.

15. *Carex*. 1. *C. Pseudo-cyperus*: Ross. mer.-occ., mer.-or.

2. *C. riparia*: Bulgar. (ex Velenovsky). Byzant. (: Coumany sec. Boiss.).

3. *C. paludosa*: Fenn. mer. (Nyland). Bosn. (: Brandis). Istr. — *C. æmulans* Drej.; per semisæculum non lecta et ex unico specimine nota (vid. Lge haandb. ed. IV. 152).

4. *C. nutans*: Gall. dep. Côte-d'Or (Royer). Morav. mer. (pr. Lundenburg: Formanek). Bulgar. (ex Velen.) Ross. centr. (gub. Kursk).

5. *C. vesicaria*: Bulgar. (ex Velen.). - Ross. mer. partim (Cherson) deest.

6. *C. saxatilis*: Ins. Færøer (Féilb. Rostr.). Ins. Waigatsch (Ross. arct.).

7. *C. rhynchophysa* (*C. ampullacea* var. *robusta* Weinm. 1837): Fenn. med., Ostrob. bor.

8. *C. ampullacea*: Bulgar. ad rivulos alpinos m. Vitos (: Velen.). — var. *borealis* Læst. (Fenn. bor. Lapp. fenn., ross.).

10. *C. orthostachys*: hæc species (qua proprie altaica est) excludetur. quia planta europæa sic nominata ad *C. Siegertianam* (14*) pertinet ex Uechtr.: cfr. ejus commentationem criticam: "über *Carex aristata* Siegert" in verh. botan. ver. brand. 1867. sep. 1—24(*) et ap. Schmalhausen in bot. zeit. 1875.

11. *C. evoluta*: Ross. balt. (Dorpat: Klinge). Transs. r. (in prato spongioso Kukojszás: Simonk.). - in loco bayar. (ad Ulm) nunc deest.

12. *C. filiformis*: Ross. mer.-occ. — ? *C. acuminata* Rehb. *C. pseudonutans* Boreau. (Istr., Gall.). Forse hybr. a *C. filiformi* et *C. paludosa* (3).

13. *C. lasiochloæna*; est idem ac *C. hispida* (64) sec. Aschn.

14. *C. hirta*: Fenn. mer. Bulgar. (Velen.).

**C. Siegertiana*: Fenn. mer.-or. (Carel. olonets., ubi a Fr. Elfvig detecta 1875); species eximia, boreali-orientalis, cuius historiam (loco supra sub n. 10 citato) beat. Uechtritz plene exposuit; a *C. hirta* omnino differt et melius forse ad leiocarpas (*vesicarias*) referenda: loc. natal. siles. ex Fiek: Canth. ubi a Siegert detecta et 1883 ab Uechtr. lecta, pr. Koslau (r.) et Neudorf (ubi a Siegert detecta 1851 sed ex Uechtr. nunc destructa).

15. *C. pendula*: Jutland. (pr. Vejle: Gelert). Gall.

18. *C. silvatica*: Bulgar. (ex Velen.) Thrac. a solo Sibthorp lecta (Byzant.) ex Boiss.

19. *C. strigosa*: Dan. (plur. loc. ex Lge). Gall. bor.-or. Austr. pr. Vindob. (Vorder-Hainbach in monte inter Hainbach et Steinbach: Müllner 1873). Styr. (pr. Gili); in Hung. rara est et Transs. ad speciem præced. pertinet. *C. Godefrini* Willem. (in Consp. sub 23 allata) sec. specim. authent. a Godron apud Willemet visa.

22. *C. capillaris*: Ins. Færøer (ex Hornem.). Lapp. fenn., ross. Fenn. bor. Carel. ladog., oneg. Aland. Ross. mer.-occ.

23. *C. hordeistichos*: Gallopr. (Arles: Duv.-Jouv. ex Le Grand). Poson. (pr. Inowrazlaw ex Geke). Bulgar. (: Velen.). - Bavar. non lecta est. sed paullo extra fines adest (inter Wörstadt et Alzei: Prantl). *C. Godefrini* cfr. sub *C. strigosa* (19).

24. *C. secalina*: Hercyn. (: Hämpe). Morav. (r.).

25. *C. brevicollis*; in Bohem. jam antea a Sitsensky lecta est (ad Jicin). Hung. adest! (comitat. Neograd.).

26. *C. olbiensis*: Alpes-Marit. (pr. Mentone detecta ab Ardoino 1852).

27. *C. Micheli*: Bulgar. (ex Velen.). Carinth. (r.). Siles. (Schwedenschanze pr. Priestram). — *C. Beckeri* CAMey. ex Trev. (Kasan Ross. or.).
28. *C. binervis*; hab. etiam in ins. Færøer (: Rostrup).
29. *C. distans*: Aland. (detex. PEEriksson 1864).
29. a. *C. diluta* MB. t. c. II. 388. — Ross. mer. (Taur.), mer.-or. (Sarepta in salsis: Becker).
30. *C. punctata*: Frisia (Frisland): Büchenau ex ABennett.
31. *C. Mairii*: Alpes-Marit. (Nizza, Touët-de-Beuil; ex Ardoino); indicatur etiam pr. Lemberg Galic. (sec. b. Uechtritz hæc indicatio dubiis premitur).
31. a. *C. Loscosii* Lge diagn. plant. panins. iber. (1878). 4. — Arag. mer. (a Loscos detecta 1864; *C. Mairii* var. Losc. exs.).
31. b. *C. Winkleri* Lge l. c. — Hisp. mer.
32. *C. Hornschuchiana*: Ins. Færøer (: Rostrup). Ross. balt. (: Klinge). Aland. — Transs. ad *C. distans* (29) pertinet ex Smk. — *C. diluta*; restituetur in speciem propriam (29. a).
33. *C. fulva*: Suderö ins. Færøens. (: Rostrup). Aland. (AArrhenius 1878). Norv. arct. usque ad lat. 66° 38' (: Norman). — Transs. ad *C. distans* (29) pertinet ex Smk.
- **C. xanthocarpa*; etiam in ins. Orcad., cum *C. fulva* et *C. flava* consociata, a cl. Boswell (1875) observata est et hybr. declarata; ex Duv.-Jouve est tantum *C. distans* sterilis.
34. *C. flava*; hab. etiam in ins. Færøens.
35. *C. Oederi*: Bulgar. (m. Balkan: Velen.). Ross. mer.-occ.
36. *C. extensa*: Aland. (detex. PEEriksson 1864). Ross. balt. (: Klinge); mer. etiam gub. Cherson. (Odessa).
38. *C. depauperata*: Luxemb. (Koltz). Helv. (pr. Dell in Pruntrut). — Pelop. (Lacon.) solum ex Sm. prodr. citatur.
39. *C. fuliginosa*: Galic. Bavar. (Alpes or.). Styr. (: Maly).
- **C. misandra*; ThFr. exs. spitzb. 77. Hab. etiam in Nov.-Seml., Walgatsch (Kjellm. Lundstr. 1880) et Ural. bor.
40. *C. frigida*: Galic. — Transs. ad *C. tristem* (41 *) pertinet ex Smk.
41. *C. ferruginea*; Transs. ad subspeciem pertinet ex Smk.
42. *C. fimbriata*: BUNDIA (cant. Graub., les Grisons). ad Canziano. Vales. adest solum in Zermatt (ex Grömbli).
43. *C. tenuis*: Galic. (m. Tatra). Austr. p. d. Bosn. (: GBeck 1885). Schrank nomen *C. brachystach.* in Schrank et Mohl naturh. briefe (1785) publicavit.
44. *C. sempervirens*: Hisp. bor. (Picos-de-Europa: Ler. Lev.); in Pyren. (et Apenn.) rara dicitur, in Alpihus et Jurasso vulgaris. Galic. Bulgar. (cacum. m. Kom). — Transs. ad *C. tristem* (41 *) pertinet ex Smk., sed non omnino, nam teste Blocki etiam *C. sempervirens* vera a Schur in Transs. lecta est. — *C. laevis* in speciem propr. restituetur (cfr. GBeck in ann. mus. vind. 1887):
44. a. *C. laevis* Kit. in W. sp. IV. 292; adest etiam in Aprut. neap. (Porta. Rigò exs. 88 sub *C. macrolepi* ex Boiss.).
47. *C. pediformis*: Fenn. (non or.) mer.-occ. (Satakunta, ubi primum lecta a Simming 1859). Ross. balt. (Riga, Dorpat: Klinge), med. (gub. Kursk, Tambow), mer.-occ. Bohem. pr. Niemes (ex Gcke). Hung. (Hzl.), sed Transs. (Jka, Schur) ad speciem seq. pertinet ex Smk.
48. *C. digitata*; adest in Norv. arct. usque ad lat. 65° 28' (ex Norman).
- **C. bulgarica* Velen. in diar. soc. sc. boh. 1888. 67 (sep.). Bulgar. (m. Vitos, in silvaticis: Skorpil 1887).
49. *C. ornithopoda*: Norv. arct. adest multis locis, sed infra lat. 68° desinit (ex Norman). Aboa. Cantabr. (Picos de Europa: Ler. Lev.). — Germ. deest etiam in Saxon. et Siles. (ex Gcke). Comment. 254.
- **C. ornithopodioides*: Bavar. (Alp. Algov.). Austr.-Infer. alpes calcar. (sic in Heu-kuppe montis Raxalpe ex GBeck 1876). Carinth. (Kreuzkofel: Jaborn.).

50. *C. Halleriana*: Lothar. (r). Pelop. (m. Taygetus, reg. infer.: Pichler ex Boiss.). - Transs. ad *C. transsylvanicam* (51.a) pertinet ex Smk.

**C. depressa*; sec. Christ est = *C. basilaris* (51) et *C. dimorpha* Brot. fere eadem.

51. *C. basilaris*; *C. transsylvanica* sec. Smk. propria species sit:

51.a. *C. transsylvanica* Schur in verh. sieb. ver. 185 (nomen); enum. (1866). *C. diversiflora* Bmg. (non Host). *C. gynobasis* auct. transs. *C. Halleriana* Grsb. iter. *C. basilaris* Jka.

52. *C. oedipostyla*; ex Aschn. omnino est *C. ambigua* Lk; hab. etiam in ins. Menorca (: Rodriguez).

53. *C. humilis*; Angl. nunc in tribus aliis comitat. hæc species lecta est.

54. *C. umbrosa*: Sard. (cl. Macchiati ex Christ). Bulgar. (m. Vitos: Velen.). Ross. mer.-occ.

55. *C. præcox*: Ins. Færøer (ex hb. Hornem.). Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.). — *C. sicyocarpa* non est varietas, sed monstrositas, cujus causa est larva insecti ejusdam, in utriculo hospitans. — *C. mixta* Mieg. (Pyren.) est var. tenuis ex Christ.

57. *C. ericetorum*: Batav. (pr. Asselt: Ankersmit 1877). Alsat. — *C. approximata*; *C. membranacea* Hpe ap. Sturm (1835). Comment. 255.

58. *C. montana*: Bulgar. (ex Velen.). Ross. mer.-occ.

**C. Czetzii* Jka; a specie non differt ex Smk.

59. *C. tomentosa*: Bulgar., Rumel. or. (: Velen.). Ross. mer.-occ., balt. (: Klinge). — Germ. deest in Pomeran. et in Boruss. solum pr. Meve lecta est (sec. Gcke).

60. *C. grisea* (non Whlbn. 1803); *C. virescens* Mühlenb. ab hac sat diversa est sec. Boiss. et Christ. "*C. Griottii*: fuori la porta d'Arezzo Firenze" (5 Jun. 1813 leg. Dr Elgenstjerna ex hb. eur.).

61. *C. pilulifera*: Ins. Færøer. — *C. saxumbra* Lees (1880). *C. pilulifera* var. Leesii Riedl (1881). Yorkshire Angl.

63. *C. supina*; in Germ. mer. rara est (Mannheim Badiæ, Phalzia). *C. obtusata* Geke (non Lilj.) etiam *C. spicatam* (vid. sub 150) comprehendit.

64. *C. hispida*: Mallorca (pr. Esporlas: Marès). Menorca (: Rodriguez). — *C. Soleirolii*: T. d'Otranto (Lacaita, HGroves).

65. *C. serrulata*: Menorca Balear.; a specie sequ. vix satis distincta est.

66. *C. glauca*: Island. (Grönlund, JMortensen). Ins. Færøer. Aland. (CJArrhenius detex. 1863). Balear. Istr. Bulgar. (: Bornm.). — *C. acuminata* W.; præcipue in meridionalibus obviam venit. — *C. dinarica* (Heuff.) Simonk. enum. (1886). *C. clavæformis* Schur. (Transs. alpestr.).

**C. prætutiana*; sec. Christ a specie sequ. minime differt.

67. *C. clavæformis*; Helv. hab. solum in Alpibus.

68. *C. pallescens*: Ins. Færøer (ex Trevelyan). Bulgar. (: Velen.).

69. *C. nitida*; Transs. citatur sec. Bmg. et Schur, sed a Simonk. cruce notatur.

70. *C. alba*: Lothar. (loco unico, sed abunde). Germ. etiam mer. (Bavar., Würtemb.).

71. *C. pilosa*: Boruss. occ. Würtemb. Lothar. (Nancy, Pont-a-Mousson). Ross. mer., mer.-occ.

72. *C. asturica*: Cantabr. (m. Picos de Europa: Ler. Lev. 1878); a Durieu detecta est (1835).

73. *C. vaginata*: Siles. (Morav. vix). Hung. (Hzl.). Carinth. (Reichenau: Pacher 1862). Helv. solum in summis Alpibus (Engadin, Berner oberland) adest. balt. (: Klinge), mer.-occ. Comment. 256.

74. *C. panicea*: Ins. Færøer. Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.). - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest. — *C. sublivida* Norrl. *C. panicea sublivida* Htn. (Suec. med. etc., Carel.).

75. *C. livida*: Fenn. occ., bor. (Kuusamo), or. (Carel. ladog., oneg.).
76. *C. laxa*: Fenn. bor.-occ. (Ostrob. bor.).
77. *C. irrigua*: Bavar. (rarius). Bulgar. (in spongiosis alpinis m. Vitos (: Velenovsky). Ross. balt. (: Klinge). - Helv. solum in Alpibus adest.
78. *C. limosa*: Batav. (detecta ab Ankersmit 1875). Ross. mer.-occ.
79. *C. rariflora*: Ross. arct. hab. etiam in Nov.-Sempl. et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875, 1880).
81. *C. ustulata*: Sabaud. (vall. Lombarde pr. Bessans: E. Saint-Lager 1887). Carinth. olim pr. Heiligenblut a Hoppe et aliis lecta est, loco (Margaritzen alp. Pasterze) nunc (ex Pacher 1880) glaciæ oblecto ("vergletschert"). *C. atrofusca* Hpe dec. 78 (in Conspr. err. 178).
82. *C. atrata*: Island. (: Grönlund, Feddersen et al.). Bulgar. m. Vitos et Kom (: Velenovsky). Maced. (m. Peristeri: Orph.) et Aetol. (m. Korax: Heldr.) sec. Boiss. — *C. atterima*; *C. sudetica* Op. (ex Fiek).
83. *C. nigra*: Alpes-Marit. (mt Bego, mt Garret pr. Entraunes; ex Ardoino). Bavar. (Alpes). Transs. (r.: Fuss, Simonk.).
84. *C. alpina* (1798). *C. VahlII* (1801): Fenn. bor. Carinth. (inter Winterthal et Eisenhut ad fines styriac.: Pacher).
84. a. *C. holostoma* Drej.; species groenlandica, a Norman in Norv. arct. detecta; loca norveg. sunt: Alten (Norm. 1861), Finnm. or. (Norm. 1877), Liffjeldet i Bardo (: Nyhuus 1885).
85. *C. Buxbaumii*: Gall. med. (pr. Romorantin, Sologne: Magn. fl. sel. 148). Delph. etiam Argentiére, Rhône (: de la Chanrion 1877). Siles. Galic. Ross. mer.-occ. (: Schmalh.), mer. (: Lindem.).
87. *C. halophila*: Ins. Færöer (: Rostrup). Lapp. fenn. Carel. keret. (ad Mare Album). Ostrob.
88. *C. salina*: Island. (r.: Grönlund, Feddersen). Lapp. fenn. Carel. keret. (ad Mare Album). — *C. affinis* FNyl. (pr. Suma ad Mare Album: Ångström 1843). — *C. hyperborea*: Nov.-Sempl. (: Holm 1882).
- **C. subspathacea* (*C. salina* Th.Fr. exs. spitzb. 78): Nov.-Sempl. Waigatsch.
- 89 * *C. kattagatensis*: Scotia (Caithness, in dunis ad River Wick: JGrant 1884). Ostrob. bor. ex Alm. 1882 (a WNylander lecta). Hæc subspecies a *C. hæmatolepi* typica parum differt. Comment. 257.
91. *C. stricta*: Bosn. (: Blau ex GBeck).
92. *C. Buekkii*: Morav. (pr. Wsetin: Bubela ex Oborny). Hung. comitat. Neograd. (: Borbás). Bulgar. (: Skorpil, Velen.).
93. *C. cæspitosa*: Ins. Shetland. (ad Loch of Cliff: Beeby 1887). Morav. Bulgar. (: Velen.). - Helv. nunc indicatur, sed raro et dubie; etiam in Germ. mer. rara videtur (in Bavar. nondum lecta est sec. Prantl). — *C. dacica*; ex Borbas vix distinguetur a *C. hyperborea* Drej. (cfr. 97 *), sed sec. Simonkai est propria species:
93. a. *C. dacica* Heuff. in Flora 1835. *C. pacifica* Grsb. iter hung. (non Drej.): Hung. Transs. (*C. saxatilis* Bmg. *C. rigida* Schur).
94. *C. turfosa*: Island. (: Grönlund, Feddersen). Ins. Færöer (: Rostrup). Angl. (ex ArthBennett). Belg. (m. Eifel: Thielens 1872). Siles. Morav. Helv. indicatur in cant. Freiburg (ad Lustorf) et ad m. St-Bernhard. Transs. (: Schur, Simonk.).
95. *C. acuta*: Island. Ins. Færöer. Bulgar. (: Velén.). — *C. panormitana*: Sard. ex hb. Moris (: Christ).
- **C. proluxa*: Angl. (Norfolk: ArthBennett). Helv. Ross. balt. (: Klinge).
96. *C. tricostata*: Hibern. bor. (ex ArthBennett 1884). Dan. (Sjælland, ubi huc usque unico loco lecta est: Nielsen). Ross. balt. (Reval: Russow). Morav. — ? *C. Schummelii* Sievert in jahresb. 1857. (Breslau Siles.).
96. a. *C. mauritanica* Boiss. Reut. pug. 116 (1852). Hisp. mer. prov. gadit. ad rivul. Mujaccite pr. Olgar (: Perez-y-Lara ex Rouy).

97. *C. aquatilis*: Island. (pr. Reykiavik: Grönlund). Scot. (Caithness: Grant ex Abennett). Hibern. (: Stewart 1884 ex Abennett). Ross. arct. etiam in ins. Nov.-Seml. et Waigatsch (ex Kjellm.) et ad Jugor Sharr (exped. Rosenthal ex ABlytt). Livon. (pr. Reval: Klinge). Ross. mer.-occ.

**C. epigeios* (*borealis*): Scot. centr. (Perth), ubi a JBWhite detecta (ex Arth.Bennett in litt. 1886).

98. *C. vulgaris*: Ins. Færöer. Bulgar. (: Velen.). — ? *C. zonata* FNyl. ms.; spicil. fl. fenn. sub *C. vulgari*. (Lapp. ross.).

**C. juncella*: Ins. Færöer. Fenn. (cum Lapp.). Ross. bor., med.

**C. elytroides*: Cambr. (Anglesea: Griffith ex Arth.Bennett).

100. *C. trinervis*: Jutland. mer.-occ. (Fanöe: Holm). Sjælland. (r.). Angl. (Norfolk: Arth.Bennett in litt. 1884). Gall. bor.-occ. Ex sententia cl. Böckeler (Flora 1875) hæc species est solum varietas digyna *C. glauca*!

101. *C. limula*: Ross. balt. (Reval: Russow ex Klinge). — *C. decolorans* (*C. hyperborea* bot. siles.); hab. in Sudetis occ. (Riesengeb., Iserwiese).

102. *C. rigida*: Ins. Færöer. Ross. arct. etiam in Nov.-Seml. et Waigatsch. Carinth. (Koralm, Saualm, Sirbitzkogel etc.). Bohem. (in montibus Silesiæ boruss. conterminis). Galic. (ad lacum Zamarzle: Rehm.; sec. Uechtr. indicatur etiam e Tatra sed dubie). — *C. stolonifera* Hpe est var. trigyna ex Boeckeler.

103. *C. Dematrancea*; in schedula spec. authent. (hb. eur.) locus eorum natalis audit: "Seedorf in pago Friburgensi"; cfr. Flora 1855; haud dissimilia sunt *C. limulæ*.

106. *C. bicolor* Bell. ap. All. (1785); Hpe dec. 79 plantam vegetiorem exhibit; hab. etiam in Transs. (: Czetz ex Simonk.). — ? *C. minima* Boullu (1877). Cors.

107. *C. microstachya*: Ross. balt. (: Klinge). Fenn. hab. in mer.-occ., in Carel. ladog., Ostrob. bor. et Lapp. Imandrae.

**C. Gaudiniana*; a Christ (1885) sub *C. dioica* enumeratur ("C. dioico-echinata"); in Helv. plurib. aliis (sed paucis) locis lecta est et indicatur in Bavar. alp., in Wetterau etc.

108. *C. helvola*: Scotia (Lochnagar: Balfour 1846, pro *C. canescens* var. distributa, 1886 ab Arth.Bennett recognita). Siles. olim pr. Oppeln lecta erat (a Grabowski).

**C. pseudohelvola* Kihlm. hb. mus. fenn. ed. II. 126. *C. helvola* auct. fenn. (et suec. p. p.). Fenn. bor., mer.; inter *C. norvegicam* et *C. canescentem* omnino media et probab. hybr. (cfr. Kihlm. l. c. 125); adest etiam in Suec., e. gr. Holmiæ, præcipue ibi ubi ambæ species dictæ crescunt.

109. *C. mucronata*: Alpes-Marit. (les Viosennes, Lupega: Gennari ex Ardoino). Bavar. (mont. et inde cum fluviis devecta, ex. gr. Munich.). - Transs. ex Bmg. et Schur, sed a Simonkai cruciata.

110. *C. cyperoides*; Gall. etiam Parisiis, in dep. Loire-et-Cher (: Le Grand 1884) etc. lecta est et vulgo locis exsiccatis apparet (ad Etang des Brenillots, ubi a Chapellier detecta 1878, tam copiosa dicitur ut a pecoribus depascitur). Germ. mer. (Bavar., Würtemb.), bor. (Mecklenb.: Kræpelin; ad lac. Sprockwitzsee: Reinke). Dan. (meteorice et r.; vid. Lge haandb. ed. IV. 118).

111. *C. baldensis*; Helv. incerte adest, sec. Lager in Egina (Valais).

112. *C. elongata*: Scot. mer. (Kenmore Holms, Kirkcudbrightsh.: McAndrew sec. Arth.Bennett in j. of bot. 1885). Ross. mer.-occ.

113. *C. leporina*: Ins. Færöer (: Lyngbye in hb. Hornem.). Bulgar. (: Velen.).

114. *C. festiva*: Island. bor. (a Grönlund detecta).

115. *C. ligerica*: Angl. mer.-occ. (Scilly Isles; ex Arth.Bennett in litt. 1884). Germ. med. (Dresden, Glogau etc. ex Geke).

116. *C. Schreberi*: Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.). — *C. curvata*; *C. pallida* OFLang.

117 * *C. Ohmülleriana*: Badia (pr. Freiburg) ex Geke.

118. *C. heleonastes*: Fenn. med., bor. (cum Lapp.). Helv. nunc in plurib. territor. (canton.) lecta est. Ross. balt. passim (ex Klinge).

119. *C. lagopina*: Galic.; - Transs. ad *C. echinata* (122) pertinet ex Smk. — *C. Lageri* (138-?) huc pertinet ex Christ ("lagopino-foetida").

120. *C. glareosa*: Island. (Grimsey: Thoroddsen; Midtå: Feddersen; aliis locis: Strömfelt). Fenn. mer. Carel. pomor. (ad Mare Album). Lapp. fenn., ross. Ross. arct. etiam in Nov.-Sempl. et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875. 1880).

122. *C. echinata*: Ins. Færøer. Germ. (in Consp. omissa pro Brit. duplic.). Bulgar. (: Velen.).

123. *C. axillaris*: Scot. deesse videtur ibique subspec. *C. Boenninghausiana* pro *C. axillari* sumta dicitur.

124. *C. remota*: Bulgar. (m. Osogovska Planina, in silvaticis: Velen.). Pelop. (Messen.) solum ex Sm. prodr. citatur. Ross. mer.-occ.

125. *C. canescens*: Ins. Færøer (: Lyngbye ex Hornem. 1837). Bulgar. (in pratis alpinis m. Vitos: Velen.). — *C. longibracteata* Porc. 1885. *C. Kanitzii* Porc. 1881. (Transs.).

126. *C. Persoonii*: Galic. Styr. (Schladming: Heimerl 1883). - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk.

**C. vitilis*: Galic. (rr.: Uechtr. sec. Knapp.).

127. *C. macilentia*; in Carel. oneg. a Fr. Nylander lecta erat, sed nuper ibi non reperta est.

128. *C. tenuiflora*; hab. etiam in Fenn. med.

129. *C. loliacea*; hab. etiam in Ross. mer.-occ.

130. *C. tenella*; indicatur etiam in Lapp. fenn. kemensi.

131. *C. vulpina*: Bulgar. — *C. nemorosa*; ex Haussknecht (1877) restituenda est (in Thuring. vulgatio est quam *C. vulpina* typica). *C. cuprina* Nendtw. est fere eadem ex Simkov. — *C. Moniezi* (Magn. fl. sel. exs. 145): pr. Louhans (Saône-et-Loire), ad ripas stagni; detecta a mathematico Moniez 1856 et descripta a Lagrange 1857; cfr. Magn. scriin. 40—1.

132. *C. muricata*: Mallorca (Bourg. exs. balear. 2805). Fenn. mer.-occ. Carel. ladog. Bulgar., Rumel. or. (: Velen.). — *C. Leersii* FSz (ex Christ).

**C. Orsiniana*; sec. Christ = *C. divulsa* depauperata submonostachya.

133. *C. divulsa*: Norv. mer. (vid. Murbeck in bot. not. 1885). - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk. — *C. contigua*; sec. Christ (1885) pertinet ad *C. muricata* (132).

134. *C. paniculata*; hab. etiam in Ross. mer.-occ.

135. *C. paradoxa*: Fenn. med. (nec mer.), bor. (Kuusamo). Aland. Helv. Ross. mer.-occ.

136. *C. teretiuscula*; in Lapp. fenn. adest.

137. *C. disticha*: Ross. mer., mer.-occ.

138. *C. repens*; — *C. Laggeri* (cfr. 119); solum in alpinis vales. (Grimsel, Simplan) lecta est; specim. orig. (hb. eur.) locum natalem habent in sched. sic notatum: m. Grimsula in decur. Gomblensi, 7000' s. m. (cfr. Flora 1854).

139. *C. arenaria*: Fenn. mer. (Nyland: Sandell detex. 1889). - Galic. indicatur (post Herlich) a cl. Knapp, sed proventus dubius est sec. Uechtritz (adest tamen in Siles.). — ? *C. pseudo-brizoides* Clavaud (1880). *C. Reichenbachii* Bonnet ex Clav. (Gall.).

140. *C. divisa*: Belg. marit. (pr. Lombartzyde: Crepin 1884). Bulgar. (ex Velen.). — *C. austriaca* Schk. (*C. schoenoides* Host); varietas sat distincta. — *C. rivalis* "Good." omnino delenda est quia (ex observ. ill. Hooker in litt. 1884) hoc nomen ortum est errore typogr. (pro illo *C. ovalis* Good., ab hac specie omnino aliena).

**C. chaetophylla*; hab. etiam in ins. Balearibus.

141. *C. stenophylla*: Ross. mer. etiam gub. Cherson (: Lindem.), mer.-occ. (: Schmalh.), mer.-or. (pr. Sarepta ex Becker).

142. *C. chordorhiza*: Sjælland. (nunc duobus aliis locis lecta est). Siles. Carinth. (ad Leinig pr. Tiffen: Pacher 1865). Ross. mer.-occ.

**C. gynocrates*: non est species Wormsk. (quæ planta groenl., *C. dioica* proxima, sec. Lge in litt.), sed *C. gynocrates* auct., quæ est "forma tenuis submonostachya *C. chordorhizæ*" (ex Christ).

143. *C. incurva*: Lapp. fenn. Ins. Færöer (Feilb. Rostr.), Slesv. ins. Rön (: Borst sec. Prahl). Ross. arct. hab. etiam in ins. Waigatsch (Kjellm. Lundstr. 1875).
**C. Deinbolliana*: — *C. brevirostris*: Island. or. (in ripa Lagarfljots: Strömfelt 1883).
144. *C. foetida*: Alpes-Marit. (col de Fenestre, col Bertrand, Ste-Anne-de-Vinai, m. Tenibre; ex Ardoino).
145. *C. microstyla*; non nisi in summis Alpibus helveticis lecta est: Valais, Vaud, Bernerobertl.
146. *C. Linkii*; hab. etiam in ins. Balearium.
148. *C. curvula*; hab. etiam in Baviaræ Alpibus.
149. *C. ursina* (Th. Fr. exs. spitzb. 79): Nov.-Seml. et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875. 1880).
150. *C. obtusata*: Scania ad Åhus in arenosis copiose (Neuman 1886); cfr. bot. not. 1887. 21—30, ubi hujus speciei indoles et a *C. supina* diversitas a Neuman plenius expositæ sunt. *C. spicata* Schk. sec. Kze et Rehb. a *C. obtusata* typica bene distincta est; observ. Lagger (sched. hb. eur.) locum habet unicum: "Bienitz unweit Rückmansdorf bei Leipzig"; indicatur tamen (rarius) etiam pr. Potsdam et Spandau; cfr. *C. supina* (63).
151. *C. rupestris*: Fenn. bor.-or. (Carel. keret.). Nov.-Seml. (Kjellm. Lundstr. 1875). - in Sudetis (Geslenke) rariss. est; etiam Transs. raro adest (detecta a Heuffel et sub nom. *Elynæ spicata* enumerata).
152. *C. pyrenaica*: Transs. (ubi a Grisebach primum lecta est). Bulgar. (: Velen.).
153. *C. pauciflora*: Island. (jam a Koenig lecta ex Groenlund addit.).
154. *C. microglochis*: Galic. pr. Jawornik vallis Czarny; Czeremosz ad Carpatos (: Rehmann). Helv. hab. non solum in Vales., sed etiam in cant. BUNDIA (Graub.) et Appenzell (Alpes).
155. *C. pulicaris*: Norv. arcticam intrat et usque ad lat. 67° 30' progreditur (ex Norman). Ins. Færöer. - Transs. a Bmg. et Schur indicatur, sed a Simonkai cruce notatur.
157. *C. capitata*: Fenn. mer.-or. (Carel. oneg.).
160. *C. dioica*: Ins. Færöer. Ross. mer.-occ. (sed in occ. terminus speciei meridionalis ponitur pr. Minsk: Lapezynski). — *C. Custeriana* ad *C. Davallianam* (162) pertineat.
161. *C. parallela*: Ross. arct., etiam Nov.-Seml. (: Holm 1882) et Waigatsch (: Kjellman).
162. *C. Davalliana*: Luxemb. belg. (ex Durand in Le Natural. 1887). Lothar. (rarius). Ross. mer.-occ.
- × *C. biharica* Simk. = *canescens* + *echinata*. (Transs.).
 × *C. Caflischii* Brügg. = *echinata* + *canescens*. (Augsb.).
 × *C. esomadensis* Simk. = *riparia* + *vesicaria*. (Transs.).
 × *C. Dufftii* Hsck. = *digitata* + *ornithopoda*. (Thuring.).
 × *C. Fussii* Simk. = *elongata* + *paniculata*. (Transs.).
 × *C. Jägeri* FSz = *glauca* + *paludosa*. (Phalz.).
 × *C. luteola* Rehb. = *flava* + *distans*. (Bavar.).
 × *C. Pannewitziana* Figert. = *ampullacea* + *vesicaria*. (Siles. etc.).
 × *C. Paponi* Muret = *Davalliana* + *echinata*. (Vevey Helv.).
 × *C. pilosiuscula* Gobi = *vesicaria* + *hirta*. (Nowgorod).
 × *C. Salisiana* Brügg. = *atrata* + *sempervirens*. (Engadin).
 × *C. Sendtneriana* Brügg. = *elongata* + *heleonastes*. (Augsb.).
16. *Kobresia*. 1. *K. caricina*: Bavar. (Alpes or.). - Transs. (Schur) ad Elynam spicatum pertinet ex Smk. - Bordère (ex hb. Rouy) hanc plantam in Pyren. alio loco (Campvieil) legit.
17. *Elyna*. 1. *E. spicata*; in Lapp. torn. bor. (enontek.) olim a JFellman indicata est.

CXL (CXXXIX). GRAMINEÆ.

4. **Sorghum.** 1. *S. halepense*: Bosn. (Travnik, in hortis: Brandis). Bulgar. (in campis, inter segetes: Velen.). Thessal. m. Pelion (copiosum et pabulare: Heldr. 1882).

2. *S. campanum*; a *S. saccharato* (vid. in Obs.) parum differt.

5. **Chrysopogon.** 1. *Ch. Gryllus*: Bulgar. (in calidioribus freq.: Velen., Bornm.).

6. **Pollinia.** 1. *P. distachya*: Sard. (cl. Gennari). Rhodus (: Bourg. ex Boiss.).

7. **Heteropogon.** 1. *H. glaber*: Helv. mer. (cant. Ticino). Hisp. mer. (prov. valent. etc. ex Rouy).

8. **Andropogon.** 1. *A. hirtum*; — *A. pilosum* Duf! (hb. eur.). — *A. ambiguum* Genn. (Sard.).

2. *A. pubescens*: Heldr. hb. norm. 893. Forse solum varietas (subspecies?) melius aristata *A. hirti* (in Oriente vulgatius est sec. Boiss.).

4. *A. Ischæmum*: Bulgar. plur. loc. (: Velen., Bornm.), elatum et ramosissimum.

5. *A. provinciale*; hæc s. d. species (teste Franchet) e flora gallica omnino excludenda est, nam planta Gerardi erat americanum *A. furcatum*, in Horto Regio (Jardin du Roi) cultum; Garidel plantam habuit ex Aix (Gallopr.) et Garduelo, sed post eum non lecta est; planta Tournef. est solum forma *A. Ischæmi*.

10. **Pennisetum.** 1. *P. cenchroides*: Taormina in aridis calcareis prope mare (: Nicotra).

11. **Setaria.** 1. *S. italica*; etiam alibi inquil. adest, ex. gr. Carinth., Bavar., Siles., Ross. mer.

**S. macrochæta* R.S. - Taur. campi mæotici (Stev.).

2. *S. viridis*: Bulgar. — *S. fallax* Tod. exs. (Sicil. Sard.: Gennari).

3. *S. glauca*; Dan. non solum in Falstria, sed etiam in Lolland et alibi lecta est, Bulgar. (: Velen.).

4. *S. verticillata*: Bulgar. et Rumel. or. (ex Velen.).

5. *S. ambigua*: Sard. (: Reverchon). Mallorca (pr. Palma: Barcelò); in Badia (pr. Schwetzingen) detecta est a CSchimper, in Thuring. (pr. Frankenhäusen) ab Haussknecht 1875; dein plurib. locis Germ. lecta est: pr. Kreuznach, copiose (: Geissenheiner), pr. Ingelheim prov. rhen. (: Koernicke 1880). Helv. (Basel, Genève, Rolle, Lugano etc.). Austr. (pr. Wien: Halaeszy). Dalm. (: Bornmüller 1886). - Parlatore et A Braun hanc speciem pro varietate speciei præcedentis habebant, sed saltem subspecies videtur (cfr. etiam Haussknecht in oe. bot. z. 1875).

13. **Echinochloa.** 1. *E. crus galli*: Bulgar. (Velenovsky). — *E. Hostii* Stev. *Panicum stagninum* Host (non Retz.). — *E. echinata* (W.): Eurytan. (Heldreich).

3. *E. eruciformis*; in Arch. (ins. Samos) a solo Sibthorp lecta videtur.

14. **Panicum.** 2. Obs. 2. *P. capillare*; colitur in hortis et quasi spontaneum lectum est etiam Angl., Belg., March., Siles., Austr. (Vindob. etc.).

15. **Digitaria.** 1. *D. sanguinalis*; hab. etiam in Bulgar.

2. *D. filiformis*: Bulgar. in litore pontico (: Bornmüller).

4. *D. gracilis*: Sard. pr. Cagliari (: Gennari: *D. sanguinalis* — ? intermedia Genn.); etiam Genuæ (cum navibus introducta) nunc omnino inquilina dicitur; sec. Pirotta ibi primum lecta est a Ciapperi circa 1870.

Obs. *D. paspaloides*; Gall. etiam ad flum. Sèvre, ubi nunc agmine denso demissiora obteggit; in dep. Herault adest inquilina pr. Bedarieux in rupibus et glareis ad flum. Orb (cum lana extranea introducta). *Panicum Digitaria* Laterrade, P. vaginatum G.G. Comment. 258.

16. *Tragus*. 1. *T. racemosus*: Germ. (r.), Austr. (r.), in utraque cum seminibus extraneis introductus. Bulgar.

Obs. *Stenotaphrum americanum* (Magn. fl. sel. exs. 153). Bayonæ primum lectum (1871) ad St-Bernard; 1880 ibi in tredecim locis. aderat (ex Blanchet).

17. *Leersia*. 1. *L. oryzoides*: Scania (Wallengren; vid. ap. Strandmark in Bot. Not. 1882). Bleking. (: Wallengren). Comment. 259.

1. *a.* *L. hexandra* Sw. - Hisp. mer. prov. gadit. (ad Algeçiras: Reverchon).

18. *Coleanthus*. 1. *C. subtilis*; — Comment. 260.

19. *Spartina*. 1. *S. versicolor*; etiam pr. Cannes lecta est (sec. Ardoino fl. alp. marit.).

4. *S. stricta*; — Comment. 261.

22. *Cynodon*. 1. *C. Dactylon*: Germ. mer. (Bavar., Würtemb.). Bulgar.

23. *Beckmannia*. 1. *B. erucæformis*: Bulgar. et Rumel. or. ex Velen.

Obs. *Eleusine indica* (Magn. fl. sel. exs. 152); etiam Ital. bor. (Treviso, Verona) introducta est; in la Rhûne (Gall.) satis adest ex Boullu (1880). *E. barcinonensis* est (sec. Jka) = *E. italica* Terrac. = *E. tristachya* Kth.

24. *Hierochloa*. 1. *H. borealis*: Helv. (pr. Zürich et Einsiedel). Bavar. etiam ad Freising, Tölz, Deggendorfer Moos, Morav. solum pr. Czeitsch.

2. *H. pauciflora*: Ins. Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875). - Planta spitzb. (Th. Fr. exs. 107) est = *Dupontia Fischeri* (psilosantha) sec. Th. Fries (serius) et Nathorst, concedentibus tamen non impossibile esse veram *H. paucifloram*, ut primitus indicata erat, in Spitzberga adesse.

3. *H. australis*: Poson. (m. Annaberg). Morav. - in Helv. non adest ex Gremli.

4. *H. alpina*; Ross. arct. hab. etiam in Nov.-Sempl. et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875).

25. *Anthoxanthum*. 1. *A. amarum*; a specie sequ. non differt ex Hackel, sed re vera bona species videtur (cfr. cl. Rouy in bull. soc. bot. 1881, ubi etiam de *Anthoxanthis* aliis plenius disseruit).

2. *A. odoratum*; deest in Lusit. mer., sed adest in bor. (Serra de Busaco), unde Brotero e specc. vegetiorib. *A. amarum* suum descripsisse dicitur (sed cfr. obs. ad hanc speciem).

3. *A. Puelii*: Germ. nunc etiam in Thuring. (pr. Erfurt: Hausskn.) et Hannover. lectum est; etiam Dan. (ex Lge) introd. (r.); a Boullu in Cors. indicatur. *A. odoratum* Brot.

4. *A. ovatum*: Sard. m. Genargentu (hb. Moris. ex Barbey).

26. *Baldingera*. 1. *B. arundinacea*: Ins. Færöer. Sard. (: Reverchon). Ital. mer.-or. (paludi d'Otranto: HGroves).

27. *Phalaris*. 1. *P. tuberosa*: Rhodus (Bourgeau ex Boiss.).

3. *P. truncata*: Byzant. (Noë exs. or. 732 ex Boiss.).

4. *P. brachystachys*: Croat. (Fiume: A-M. Smith).

Obs. *P. canariensis*; quasi sponte occurrit (vel inquilina) etiam in magis septentrionalibus, ex gr. Bavar. immo in Germ. bor. (tal. ex gr. ad Rostock lecta est).

5. *P. minor*: Ins. Jon. (Zante: Margot; Cephal.: Heldr. et al.).

6. *P. paradoxa*; Heldr. hb. norm. 894 (var. e Thessal.). Comment. 262.

28. *Maillea*. 1. *M. Urvillei*: Pelop. (pr. Novo-Corinth: Hausskn. 1885). Rhodus (: Bourg.). Sard. pr. Sta-Teresa Gallura (Reverchon 1881: var. sardoa Hack.). Comment. 263.

30. *Phleum*. 1. *P. pratense*: Nov. Seml. (Dr Ssjerikow 1879 ex Trautv.), probab., ut in Island., introductum; in Græcia et Turc. (ex Boiss.) hab. in Pelop.

(a solo Bory lectum), Parnass. (forse subspec. spectat). Maced. m. Korthiati (: Orphan.). Byzant. - P. stoloniferum Borb. (?). — P. subalpinum Brügg.

*P. parnassicum: — P. fallax Jka (1876) ex ipso auctore est = P. stoloniferum Host, quod sit var. P. pratensis (glumis longius cuspidatis), sed aliter P. alpino propius.

2. P. alpinum: Island. (freq.: Groenlund). Fenn. med. (etiam Nyland. Fenn. mer. indicatur). Galic. Bulgar. (m. Kom et Osogovska Planina: Velen.). - Maced. (m. Scardus: Grsb.) ad var. P. commutatum pertinet ex Boiss.

3. P. echinatum; — Comment. 264.

4. P. Michellii: Galic. (ex Knapp). Ross. centr. (gub. Kursk: Lindem.). - Transs. et Banat. ad P. serrulatum (5*) pertinet ex Smk.

*P. ambiguum; sec. Lacaita (litt. 1883) prope Amalfi usque ad litora maris descendit et a P. Michellii (cum quo a Parlatore immerito junctum) pluribus notis distinctum est.

5. P. phalaroides: Aland. (Kihlman 1878 et antea ibi a Bergstrand indicatum).

*P. serrulatum Boiss. (1859). Chilochl. cuspidata Schur (1853). P. Boehmeri var. ciliatum Grsb. (1853). P. ciliatum Kern. (1883). Hung. mer.-or. Transs. Banat. Bulgar. (pr. Slivno etc. ex Velen.). - Forse species est majoris dignitatis, inter P. Michellii et P. phalaroiden media. — P. collinum Schur (sub Chilochloa).

7. P. græcum: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto: HGroves).

8. P. asperum: Germ. mer. (Bavar., Würtemb.). Styria (Janischb. in vineis: Felicetti ex Maly). Sard. (ex Aschn).

31. Colobachne. 1. C. Gerardi: Alpes-Marit. (col de Tenda, val. Gerdolasca, alp. St-Etienne, col de Fenestre etc.; ex Ardoino). Aetol. (m. Velugo: Sprun.) et Pelop. (: Heldr.) ex Boiss. - Transs. ad Alopecur. laguriform. Schur (vid. sub A. brachyst.) pertinet.

32. Alopecurus. 1. A. arundinaceus: Nov.-Sekl. (Dr. Ssjerikow 1879 ex Trautv.). Fenn. bor. (cum Lapp.), occ. (Ostrob. mer.), mer.-occ. (Aland., Aboa). Dan. etiam in Sjælland. (r.) nunc lectus est. Saxon. (ad Dresden ex Gecke). Bulgar. (ex Velen.). - Transs. (et var. A. altissimus Schur) ad speciem sequ. pertinet ex Smk.

2. A. pratensis: Ins. Færöer (rarius). Fenn. (exc. bor.-or. et Lapp.). Sard. (: Moris). Bulgar. — A. alpestris: ins. aret. Nov.-Sekl. (Kjellm. Lundstr. 1875) et Waigatsch (exped. Rosenthal. 1871 ex ABlytt).

*A. hybridus; A. nigricans Wichura (non Hornem.).

4. A. brachystachys; A. laguriformis Schur (ex Simonk. enum. 561) propriam et ab A. brachystachyo diversam speciem constituit, quæ est = A. Wlasowii Jka (non Trin.) = A. brachystachys auct. transs.

5. A. bulbosus; Transs. ad A. fulvum (9*) pertinet ex Smk.

6. A. agrestis: Cors. (EPetit 1883). Bulgar. (: Velen.).

7. A. creticus: Thessal. pr. Pharsala (Haussknecht 1885). A. agrestis Sieb. exs. cret.; ab A. agresti perbene distincta ex Boiss.

8. A. crypsoides; sec. Hackel est tantum status monstrosus Phlei phalaroidis, ictu Anguillulæ (ex ordine Nematodum), ovaria incolentis, ortus.

9. A. geniculatus: Ins. Færöer (: Rostrup). Bulgar. (: Velenovsky).

10. A. utriculatus: Luxemb. (Fischer 1881). Styr. (Graz, Cilli). Istr. Bosn. (: Hofmann, Brandis) Bulgar. (plur. locis ex Velen.). Sard. (ex hb. Moris: Barbey). - Helv. non adest ex Gremli.

10. a. A. anthoxanthoides Boiss. diagn. or. ser. I. XIII. 42. - Rhodus (: Bourgeau).

× A. turicensis Brügg. = pratensis + agrestis. (Zürich).

33. Crypsis. 1. C. alopecuroides: Bulgar. et Rumel. or. Ross. centr. (gub. Kursk.).

3. C. schoenoides; hab. etiam in Morav. mer.

4. C. aculeata: Bulgar. (in litore pontico). Ross. centr. (gub. Kursk.).

35. Mibora. 1. M. verna; Belg. olim in Campine sæpius lecta, sed

nunc latet (: Crepin 1884). Germ. hab. etiam in mer. (Bavar.). Helv. rr. (pr. Andelfingen; Bächtold). Ross. balt. (Curland, rr.) a Klinge indicatur.

36. **Echinaria**. 1. *E. capitata*: Sard. (ex hb. Moris.).

37. **Sesleria**. 1. *S. cylindrica*: Alpes-Marit. (Mentone, Nizza, Braus, col de Tenda etc.; ex Ardoino). Bulgar. (pr. Slivno; Skorpil: *S. coerulea* Velen. 1887 ex ipso 1888).

3. *S. marginata*; Orph. fl. gr. exs. 1100 (ex Euboea); Bulgar. (m. Kom: Velen.). Bosn. mer. alp. (GBeck 1885).

4. *S. Heufleriana*: Galic., rr. (ex Knapp). — *S. nitida* Heldr. est ipsa *S. nitida* Ten. (5) ex Boiss. or.; planta hungar. saltem subspeciem sistit:

**S. Sadleriana* Jka in ann. mus. nat. hung. 1884. *S. coerulea* Sadl. pesth. (non alior.).

5. *S. nitida*: Bosn. mer. alp. (: GBeck 1885). Herceg. (Vran Planina: GBeck, Brandis).

5. *a.* *S. comosa* Velen. in act. soc. scient. boh. 1886. sep. 44 (*). Bulgar. in summo monte Vitos (: Velenovsky 1885).

6. *S. coerulea*: Fenn. mer.-occ. (Aland.). Rumel. or. - Transs. ad *S. Heufleriana* (4) et *S. marginata* (3) pertinet ex Smk. — *S. angustifolia* Hackel; GBeck in ann. mus. nat. hung. 1887. (Bosn. m. Orlovac).

8. *S. Haynaldiana*; a Simonk. (enum. 569) cum specie præced. jungitur.

9. *S. tenuifolia*; Comment. 265. — *S. leptophylla* GBeck in annal. mus. vind. 1887. (Bosn. mer. alp.).

11. *S. sphærocephala* (1764); Helv. exclud. sec. Gremli. *S. microcephala* Lam. DC. (1805). — *S. leucocephala*; ad hanc pertinet Hpe dec. 123 (e Tyrol.).

12. *S. microcephala* K. (non Lam. DC. 1805). *S. tenella* Host (1802). Bavar. plurib. locis (Alpium or.) adest. Comment. 266.

38. **Oreochloa**. 1. *O. disticha*: Galic. (ex Knapp). Bavar. (Alpes algov., r.).

2. *O. pedemontana*: Alpes-Marit. (reg. alp.).

40. **Cynosurus**. 1. *C. echinatus*: Bulgar. - Helv. mer. (extra Vales.) hab. etiam in cant. Ticino. - Sty. plurib. locis a Maly indicatur, Carinth. unico a Pacher, ibique probab. (ut etiam interdum alibi introductus).

2. *C. elegans*: Alpes-Marit. (Cannes, l'Esterel; ex Ardoino). Mallorca Blear. (rarius). Cephalon. (m. Atro: Heldr.).

3. *C. cristatus*: Bulgar. - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

42. **Arundo**. 2. *A. Pliniana*: Bulgar. or. (Varna etc. in collibus et vineis: Bornmüller). Byzant. (: Castagne ex Boiss.).

43. **Phragmites**. 2. *Ph. communis*; — *Ph. flavescens*; *Ph. communis* flavescens Custor ap. Gaud. (1830); hab. etiam Saxon., Bohem. (ubi ex Freyn circa Opocno hæc sola adest, nec typica).

44. **Ampelodesmos**. 1. *a.* *A. bicolor* Kth. - Sard. (pr. Cagliari: Aschn. Reinh.). — var. *uniflora* Aschn (Sard. ex hb. Moris; Hackel).

45. **Psamma**. 1. *P. litoralis*: Sandö ins. Færöens. (Rostrup). Germ. mer. (ad Friedrichsfeld in Baden ex Gcke); etiam in med. raro adest (ad Dresden, Darmstadt etc.).

2. *P. baltica*: Germ. litor. a Bremia et Holsat. usque ad Borussiam. - Ross. balt. non nisi in Curland. adest ex Klinge.

46. **Calamagrostis**. 1. *C. arundinacea*: Bulgar. (in rupestribus alpinis m. Balkan et Osogovska Planina: Velen.). Maced. (m. Peristeri et Athos: Orphanides).

2. *C. montana*: Germ. occ. (prov. rhen. etc.). Alpes-Marit. (Tenda, St-Martino, val de Pesio etc.; ex Ardoino). Bosn. (ex GBeck). Phthiotis (m. Oeta: Heldr.). Carel. oneg. (ex Hult 1882). Ross. mer.-occ.

3. *C. Hartmanniana*: Fenn. (ex Hult 1882). Boruss. or. (pr. Tilsit): *C. Halleriana* var. *Heidenreichii* Aschn.
6. *C. lapponica*: Fenn. bor. (cum Lapp.), med.
7. *C. strigosa*: Nov.-Seml. (ex Trautv.). Fenn. bor.-occ. (Ostrob.). Suec. bor. (Jemtia: Almqvist 1886). Scot. (Caithness: JGrant 1885 ex Arth.Bennett!).
8. *C. neglecta*: Fenn. Dan. Gall. jur. (ad Pontarlier). Helv. (Radolfzell ad lac. Bodanum). Ross. mer.-occ.: arct. (*Agrostis groenlandica* Schrenk ex ipso).
**C. borealis*: Island. (: Groenlund). Scot. (Perthsh.: Druce 1888 ex Arth.Bennett). Lapp. fenn., ross. (ex Hult 1882).
9. *C. gracilescens*: Fenn. (Ostrob., Aland., Carel. ladog.).
10. *C. deschampsoides*: Lapp. or. ponoj. (JFellman detex. 1863).
11. *C. epigeios*: Bulgar. in elatioribus m. Vitos, Balkan; ad Varna, lac. Devno: Bornm.).
12. *C. litorea*: Germ. bor. (Lübeck, Unterharz etc.), mer. (Bavar.).
13. *C. phragmitoides*: Hassia in pratis ad Frauholle-Teich montis Meissner, ubi *Dryas*, *Chamæmorus* et *Linnæa* olim lectæ (: Hackel 1883). — *C. rubicunda*: Fenn. (cfr. Hult in meddel. 1882).
14. *C. Langsdorffii*: Dan. ad Sjæl-sø Sjælland. et Randers Jutland. ex Lge (vid. haandb. ed. IV. 65).
15. *C. lanceolata*: Scot. (Kenmore Holms, Kircudbrightsh.: Mac Andrew 1884). Siles. - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.
16. *C. Halleriana*: Batav. (ex Abeleven 1876). Germ. hab. præcip. ad litus baltic. (ab Holsat. ad Pomeran.), in Sudetis et Erzgeb.; ceterum Hercyn., silva Thuring. etc. Morav. Bulgar. (pr. Petrov Han m. Balkan leg. Velenovsky). — *C. dubia* Czetz ap. Jka. (Transs.).
17. *C. tenella*: Bavar. (Alpes). - Galic. cum dubio citetur (ex Knapp). Transs. ad speciem præced. pertinet (ex Smk.).
× *C. bihariensis* Smk. (Simonk. enum. 566) = *epigeios* + *varia*. (Transs.).
47. **Colpodium**. 1. *C. latifolium*: Spitzberg (ubi, ex Nathorst, ad cap Thorsden detectum a Gyllencreutz 1883). Nov.-Seml. et Waigatsch. Beeren-Eiland. Lapp. fenn. (inar. et tulom.).
2. *C. Malmgreni* (Th.Fr. exs. spitzb. (9): Nov.-Semlia; hæc species forse rectius sub genere *Arctophila* militet.
2. a. *C. humile* Lge ex THolm in diar. soc. bot. holm. 1884. - Nov.-Semlia (: THolm 1882).
48. **Sporobolus**. 1. *S. pungens*: Pelop. ex hb. Fauché (Boiss.).
Obs. *S. tenacissimus* Br.; hoc gramen ad Bayonne Gall. nunc inquilinum est sec. Blanchet (1883).
49. **Cinna**. 1. *C. pendula*: Fenn. mer. (Nyland., Tavast. mer., Carel. mer., Isthm. carel.), med. (Savol. bor.).
50. **Agrostis**. 1. *A. alba*; — *A. gigantea* (1788). *A. vinealis* Schreb. (1771). — *A. albida* Trin. (Ross. mer.-or.: Becker).
3. *A. verticillata*; Gall. bor.-occ. aliquot locis (Brest, Cherbourg) nunc inquilina est, navibus introducta. Bulgar. plur. locis lecta (ex Velen.).
**A. ascendens*; est species sat distincta sec. auctorem ejus (in litt.); caespitoso-multicaulis; folia convoluta-filiformia. — *A. Mülleri*; sec. Ascherson est = *A. pallida* (19), a Müller pr. Cagliari, Pula lecta (1827).
4. *A. vulgaris*; — *A. hispida* W. — ? *A. nigra* With. (Angl., Scot.; ex ABennett); probab. etiam alibi (sic a cl. Baker in Belgio pr. Spa lecta est).
- ? 7. a. *A. tarda* (Bartl.) Drude in Flora 1877. - Tyrol. (pr. Bozen etc.) a Bartling lecta (1869), dein culta et descripta (ms.).
10. *A. trichoclada*; — *A. Biebersteiniana* Claus; Becker. (Ross. wolg., pr. Sarepta frequens: Becker 1858).
13. *A. canina*: Island. (: Groenlund, Strömfelt). Ins. Færøer (: Rostrup).

Bulgar. (m. Vitos: Velen.). - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest. — ? *A. surculifera* Royer 1883. (Côte-d'Or).

14. *A. byzantina*; sec. Boiss. (fl. or.) pertinet ad *Enagrostides*, sed parce lecta est (Noë or. 225) et ulterius observanda.

15. *A. alpina*: Alpes-Marit. - Transs. ad *A. rupestr.* (17) pertinet ex Smk. **A. Schleicheri*; Helv. hab. in Alpib. occ. et in Jura.

17. *A. rupestris*: Bulgar. (in excelsiorib. m. Balkan freq. ex Velen.).

51. *Apera*. 2. *A. interrupta*; Carinth. cum dubio citant Pacher et Jabornegg; in Morav. rr. dicitur.

53. *Gastridium*. 1. *G. australe*: Gall. bor.-occ. Cephalon. ins. jon. (: Heldr.). Rhodus (: Bourg.). Byzant. (Post ex Boiss.).

54. *Polypogon*. 1. *P. monspeliensis*: Gall. bor.-occ.

2. *P. maritimus*: Pelop. (: Bory). Syra (: Weiss). Rhodus (: Bourgeau); ex Boiss.

3. *P. subspathaceus*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto).

4. *P. litoralis*: Gall. bor.-occ. (r.).

Obs. *P. (litoralis var.?) adscendens*; adest in Ischia (: Gussone) et prope Iglesias Sard. (: Gennari). — *P. Clausonis* Duv.-Jouv. jam 1860 a Clauson hybr. inter *P. monspeliensem* et *Agrost. verticillatam* declarata est; sec. Lange (litt. 1882) probab. est = *P. litoralis* var. *breviseta* Lge. (ex Hisp. centr.).

55. *Chæturus*. 2. *Ch. prostratus* (*Ch. fasciculatus pygmæus* Lge pug. 1860). Hisp. in rupibus maritimis pr. La Coruña primum lectus est a Lange (1852); Lusit. in arenosis montis Serra de Cintra a Hackel (1876).

56. *Lagurus*: Luxemb. et Gall. bor.-occ. (p. m. p. introd.). Bosn. (: Zivotsky ex GBeck).

59. *Lasiagrostis*. 1. *L. Calamagrostis*: Bavar. (r.).

60. *Stipa*. 1. *S. Grafiana*: Bohem. (rarius: Celak.). Morav. (pr. Brünn: Formanek; Znaim etc.: Oborny). *S. pennata* auct. transs. p. p.

2. *S. pennata*: Luxemb. (subspont.). Germ. etiam in Saxon. deest et in Siles. rr. obvia. Rumel. or. (ex Velen.). Cephalon. ins. jon. (in montosis eparch. Pylaros: Heldr.); in Boiss. fl. or. solum ex Attica et Maced. citatur. — *S. Tirsæ* (vera ex Celak.) etiam Bohem. lecta est (pr. Prag et Laun) et sola, quæ in loco Linn. succ. Åsaka Vestrog. adest. — *S. Johannis* Celak.; vulgatiores est in Bohem., ut probab. etiam in Morav., Austr. p. d. et Germ.; etiam *S. pennata* vestrog. p. p. (e paroec. Dala et Segerstad) ad hanc pertinere dicitur. — *S. dasyphylla* Czern. (1859) ex Lindem. — *S. stenophylla* Czern. (1859) ex Lindem. — *S. gallica* Celak. (1883).

3. *S. Lessingiana*: Ross. centr. (gub. Kursk), mer.-or. (Sarepta: Becker 1882).

7. *S. Lagascæ*; — *S. Sibthorpii*; *S. juncea* fl. gr. ex Boiss.

8. *S. capillata*: Sard. (ex hb. Moris.; Barbey). Bulgar. — ? *S. sareptana* Becker in bull. mosc. 1882.

10. *S. tortilis*: Rhodus (Bourgeau ex Boiss.).

61. *Aristella*. 1. *A. bromoides*: Bulgar. Thrac. bor. (: Janka). Maced. (sec. Janka).

62. *Piptatherum*. 2. *P. paradoxum*; Transs. ad sequ. (*P. viresc.*) pertinet, ut etiam (ex Boiss.) loca omnia orientalia incl. Bulgar. et Rumel. or. (: Velen., Eornm.).

2. a. *P. virescens* Boiss. fl. or. V. 507. *Urachne virescens* Trin. fund. 110. (1820). *P. paradoxum* auct. or.: Transs. (Jka, Smk.). Ross. mer.-occ.; etc.

3. *P. coerulescens*: Mallorca Balear. (: Bourgeau, Marès). Rhodus (: Bourgeau).

*P. holciforme: Rumel. or. (Skorpil ex Velen.); sec. Boiss. est species majoris dignitatis.

63. *Milium*. 1. *M. effusum*: Helv. Bulgar. (var.).

2. *M. vernale*: Banat. (Borbás). Ross. mer. etiam in gub. Cherson; mer.-occ.; planta cretensis a Boissier in Flora Orient. ad *M. Montianum* ducitur; ad *M. vernale* non nisi *m. Hymettus* et *Tauria* ibi citantur.

3. *M. scabrum*: Sard. (ex hb. Moris. Barbey). - Cephalon. (probab. etiam Creta) ad speciem sequi pertinet ex Heldr.

4. *M. Montianum*: Cephalon. (in reg. super. m. Aeni: Heldr.).

66. *Molineria*. 1. *M. minuta*: Alpes-Marit. (in collibus siccis ad Biot: Thuret. Bornet ex Ardoino). Lacon. m. Malevo (Orphanides ex Boiss.).

68. *Fluminia*. 1. *F. arundinacea*: Fenn. med., mer.-or. Ross. mer.-occ.

69. *Aira*. 1. *A. cæspitosa*: Ins. Færøer. Bulgar. (m. Vitos); Germ. hab. in Boruss. occ., March., Pomeran., Holsat. — *A. alpina*; *A. speciosa* Jka ex Smk. (Transs.). — *A. brevifolia* MB. *A. cæspitosa* var. *triflora* Friv. (1836). *A. cæsp. colorata* Grsb. (Thrac. m. Rhodope: Friv.).

**A. Hartmaniana*: Nov.-Semi. Waigatsch (*A. cæspitosa* *brevifolia* Trautv.); de planta ins. Færøer cfr. Rostrup in bot. tidskr. 1870.

**A. rhenana* Grml. 1885 (sub *Deschampsia*). Helv. in litore arenoso Rheni ad Schaffhausen.

2. *A. Wibeliana*; area geogr. hujus speciei (exclusâ Hung.) secus flum. Elbe, ab Hamburg usque ad mare, se extendit. - Transs. ad speciem præced. pertinet ex Smk. (an etiam Hung.?).

3. *A. bottnica*: Fenn. occ.

4. *A. media*: la Genevraie dep. Seine-et-Marne (loc. max. boreal.) *A. juncea* Vill. *A. pachybasis* Vallot (1832). — Comment. 267.

6. *A. alpina*: Ins. Færøer (: Feilberg et Rostrup 1867).

8. *A. flexuosa*: Island. (Grönlund, Strömfelt). Færoe (Feilberg, Rostrup). Bulgar. (in excelsioribus montium freq.) Maced. m. Peristeri (Orph. fl. gr. exs. 1075). Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

9. *A. setacea*: Ins. Shetland. (ad Thingwall Loch, rr.: Beeby). Pomeran. ins. Rügen (ex Geke). Livon. (ad Riga: Klinge). - Transs. ad præced. pertinet ex Smk.

71. *Dupontia*. 1. *D. Fischeri*: Th.Fr. exs. spitzb. 95; species domo Fisher, expedit. Parryanæ socio, dicata, quare nomen ejus Fisheri scribendum est.

2. *D. psilosantha*: Th.Fr. exs. spitzb. 94; a specie præced. non satis differt (vid. ap. Nathorst in act. ac. scient. holm. 1883).

72. *Holcus*. 3. *H. mollis*: Ins. Færøer. Bulgar. Bosn. - Transs. deest ex Smk.

5. *H. lanatus*: Island. (ad Eyafjörð a Mortensen nuper lectus; adv.?). Ins. Færøer. Lacon. m. Malevo (: Orphanides). - in Fenn. mer. sæpe colitur et etiam efferatus obviam venit.

73. *Arrhenatherum*. 1. *A. avenaceum*: Bulgar. (: Velen.). Parnass. (Orph. ex Boiss.). — *A. biaristatum* Peterm.

**A. palæstinum* Boiss. - Rhodus (: Bourgeau).

2. *A. erianthum*; *A. rumelicum* Velen. in diar. (sitzb.) soc. sc. boh. 1887. 465 (ex ipso ib. 1888). - Bulgar. (pr. Slivno ad flumen: Skorpil 1886).

3. *A. Thorei*; hab. etiam in Gall. bor.-occ. (r.).

74. *Avena*. 1. *A. sterilis*: Heldr. hb. norm. 895 (var. ex Attica); hab. etiam in Græc. insul. (: Boiss.). - Transs. vix adest ex Smk.

**A. Ludoviciana*; hab. etiam in Delph. (ex Chaboiss. 1879).

4. *A. fatua*: Fenn. bor.-or. (Karel. keret.). — *A. ambigua*; sec. Hauskn. est hybr. ab *A. fatua* et *A. sativa*. (Thuring.).

**A. intermedia*: Norv. mer. Bulgar.; hybr. dicitur inter *A. fatuam* et *A. sativam*.

5. *A. barbata*; — *A. pilosa*; ex Boiss. (fl. or.) omnino propria species est, *A. sterili* propior.

6. *A. strigosa*: Austr. p. d. (St-Pölten: Hackel). Morav. Siles. Ross. mer.-occ.

8. *A. planiculmis*: Galic. (ex Knapp). Bulgar. (m. Vitos: Velen.). Carinth. sec. Pacher cum dubio citetur.

8. a. *A. compacta* Boiss. diagn. ser. I. 7. 122. *A. Neumayeriana* Vis. - in Consp. hæc duæ sub *A. Heldreichii* (23) allatæ sunt.

11. *A. pubescens*: Bulgar. (plur. loc.; in m. Kom var. memorabilem legit Velenovsky).

12. *A. sesquitertia*; in Vogesis erronee indicata est (: Godr. fl. lorr. ed. 3). — *A. amethystina*: Tyrol. mer. Carinth. (: Pacher). Bavar. (alp. kl. Rappenkopf). Algov. alp.

13. *A. bromoides*; — *A. Sibthorpii*: Byzant. (Castagne). Ruskoi (Griseb.); in ins. Cimoli, ubi Sibthorp plantam suam legit, dein non reperta est; ex Boiss. (fl. or.) propriam sistit speciem, quamquam valde proxima *A. bromoidi* et *A. pratensi*, a quibus præcipue axi flosculorum glabrâ differt.

**A. australis*: Lacon. (m. Malevo: Orph.); sec. Boiss. (fl. or.) est varietas *Avenæ* prætensis spiculis majoribus et axi flosculorum subglabra.

14. *A. compressa*: Hung. (pr. Ofen: Freyn 1873). Bulgar. (pr. Sofia: Skorpil).

15 * *A. alpina*: Angl. bor. (Yorksh.). Carinth. r. (ex Pach.Jaborn.).

17. *A. versicolor*: Alpes-Marit. (mt Bego, alp. Tenda; ex Ardoino). Bavar. (Alpes). Bulgar. (m. Vitos: Velen.).

18 * *A. Notarisii*: Alpes-Marit. (alp. Frontero, Carlin, la Briga, Tenda etc.).

19. *A. Parlatorii*: Alpes-Marit. (Tenda; Bonnet-de-trois-eveques: Canut). Bavar. (Alp. Algov. r., Ammergau). - Transs. ad *A. decoram* (22—) pertinet.

20. *A. montana*: Alpes-Marit. (col de Pouriac supra St-Etienne: Loret ex Ardoino; cima de Gelas, val di Pesio et mte Bertrand: Lacaita).

21 * *A. convoluta*: Croat. (pr. Buccari: Vukot. 1880 sub *A. striata*). Coreyra (Corfù) ins. jon. (Barbey ex Boiss.). Attica (m. Hymettus: Lacaita).

22. *A. Besseri*; — *A. decora* Jka in term. fûzet. (annal. mus. nat. hung.) 1884. *A. Besseri* auct. transs.-hung. (non Grsb.).

23. *A. Heldreichii*; sec. Boiss. (fl. or.) non differt ab *A. convoluta*, sed exclud. varietates *A. compacta* et *A. Neumayeriana*, quæ speciem omnino diversam, *A. planiculmi* propiorem, constituunt (= 8. a).

25. *A. carpatica*; — *A. varia* ad *A. flavesc.* (27) var. pertinet ex Smk.

27. *A. flavescens*: Fenn. (mer.) sporadice adest, e pratis cultis aufuga. (Cors. (: Levier). Sard. (ex hb. Moris). Thessal. m. Pelion (: Heldr. 1882). — *A. Baumgarteni* Steud.; *A. alpestris* Bmg.; *A. transsilvanica* Schur (sub Triseti).

30. *A. alpestris*: Bosn. (cl. Brandis ex Freyn). - Transs. ad speciei præced. (*A. flavesc.*) var. pertinet ex Smk.

33. *A. hispida*: Hisp. bor. (Cantabr.) m. Peña de Curavacas (: Boissier 1858 et 1879).

34. *A. distichophylla*: Bavar. (Alpes).

35. *A. argentea*: Helv. mer. (Alpes ticin.). - Transs. ad speciem præced. pertinet.

36 * *A. baregensis*: Trisetum baregense Laffitte. Mieg. (1874). *T. agrostideum* Gay 1861; in Pyren. valle Barèges a Miegville, Laffitte et Bordère detecta 1860.

38. *A. airoides* (*Aira subspicata* L.): Nov.-Seml. et Waigatsch (Kjellm. Lundstr. 1875). Bavar. (Alp. Algov., r.). Helv. (Alpes). - Transs. a Bmg. indicata erat, sed a Simonk. cruce notatur. Comment. 268.

42. *A. myriantha*; hab. etiam in Thessal. (: Heldr. 1885).

46. *A. condensata*: Hetr. (selva Pisana, in prato quodam). Mallorca Balear. (r.: Marès). *A. chlorantha* Lk. in linn. XVII (ex Boiss.). — *A. Noëana* Boiss. sub Triseti (Noë exs. 116) certe huc pertinet et synonymon est ex ipso.

51. *A. valesiaca*: loca hujus speciei vales. (ex Gremli) sunt: Sierre, Montorge, St-Leonhard, Fully (inter) et Saillon.

52. *A. capillaris*: Bulgar. Byzant. (Noë ex Boiss.). Cephalon. ins. jon. (: Heldreich). — *A. corsica*: Ischia. Sicil. (*A. divaricata* Tod. exs.).

53 * *A. Tenorii*: Sard. (m. Ferru: Marcucci). Menorca Balear. (: Rodriguez). - Taur. erronee indicata dicitur.

54. *A. caryophyllea*: Syra Arch. Rhodus (: Bourg.). Transs. ad *A. capillarem* (52) pertinet ex Smk. — *A. Todari* Tin. hb. (*A. divaricata* Tin. antea); Tod. ind. sem. hort. panorm. 1859. Sicil. (Mirto, Catania, Madonie). Stromboli (: Lojac. 1877); cfr. Lojac. le isole eol. 136 et stud. crit. in natural. sicil. 1881 (*).

**A. multiculmis*: Batav. (Oudemans). Gall. bor.-occ. (Norm.), or. (Côte-d'Or).

55. *A. Cupaniana*: Menorca Balear. (Rodrig.).

56. *A. præcox*: Ins. Færøer (Rostrup). - Helv. non adest et numquam ibi lecta (ex Leresche), quamquam pr. Sion (Sitten) indicata. - Transs. ad *A. capillarem* (52) pertinet ex Smk.

75. *Corynephorus*. 1. *C. articulatus*: Rhodus (Bourgeau).

3. *C. canescens*: Norv. mer. (Lister, Mandal: Kaalaas ex ABløtt). Siles.

76. *Ventenata*. 1. *V. avenacea*: Germ. bor.-occ. (Doberan, Hamburg etc. usque in Hannover et Thüringen). Bavar. Styr. (Verbniak ex Maly).

78. *Koeleria*. 1. *K. crassipes*: Istr. (mte Maggiore: Freyn 1879); cfr. *K. austral.* (2 *).

2. *K. splendens*: Sard. ex hb. Moris. (teste Hackel). Bosn. (GBeck, Brandis). Athos (: Janka). Parnass. et Taygetus (ex Boiss.).

**K. australis*; *K. crassipes* Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 464 (desc. plena) non lge ex ipso Freyn l. c. 1881. 390. — *K. crassipes* Kern.

3. *K. cristata*: Sard. (ex hb. Moris.). Bulgar. (: Velen.). — *K. gracilis*; adsit in plurimis et sæpe, e. gr. Parisiis, typo (*K. ciliata* Kern. *Poa pyramidata* Lam.) vulgatio est. — *K. Fenzliana*; - *K. pseudoglaucæ*; *K. rigidula* Simk. (Simonk. enum. 570). — *K. glabra* Jka (sec. Smk.).

4. *K. albescens*: Gall. bor.-occ. - Transs. ad *K. Fenzlianam* (3—) pertinet ex Smk.

5. *K. glauca*: Galic. Siles. Carinth. (rr.).

6. *K. setacea*; — *K. valesiaca*: Gall. or. (Côte d'Or). — *K. transsilvanica*; sec. Simonk. est subspecies *K. cristatæ*.

7. *K. castellana*: Hisp. mer. (pr. Hellin: Rouy 1831).

9. *K. hirsuta*; — *K. cenisia*: mt Bertrand Alpium Marit. (: Lacaita). — *K. carniolica*; sec. Hackel pertinet ad speciem sequ. (*K. eriostachyam*).

**K. brevifolia*; hab. etiam in Sabaud. ubi non rara ex Saint-Lager).

10. *K. eriostachya*: Thrac. lor. (: Janka). Bulgar. (m. Kom: Velen.); sec. Velen. hæc species est = *K. splendens* (2).

79. *Danthonia*. 1. *D. provincialis*: Helv. mer. (cant. Ticino, rarius). Bulgar. - Carinth. post Wulfen et Vest non lecta videtur.

2. *D. decumbens*: Ins. Færøer, Sard. (ex Reverchon). Bulgar. Ross. mer.-occ.

80. *Melica*. 1. *M. Magnolii*: Mallorca Balear. (Bourg. pl. hisp. exs. 2808). Maced. (: Friv.). Parnass. (: Heldr.).

2. *M. ciliata*: Ins. Bornholm (ex Lange). Croat. (pr. Fiume: A-M. Smith). Ross. mer. - Helv. exclud. (sec. Gremli). — *M. cappadocica* Boiss., quæ *M. ciliata* valde proxima, indicatur pr. Cattaro Dalm.

**M. transsilvanica*: Bulgar.; usque ad Vindobonam procedere dicitur et alibi etiam adsit (*M. ciliata* G.G.); sec. Uechtr. est proprior speciei sequ. (3) et = *M. ciliata* auct. siles. (cfr. in durchf. phan. schles. 1882. 38 et 1883. 49). — *M. lobata* est var. panicula densiore.

3. *M. glauca*: Ital. (sed loca special. latent). Attica (m. Parnes). Euboea (m. Delphi). Aetol. (m. Korax). Kyllene et Chelmos (: Orph.). Oeta (: Heldr.). Cephalon. (m. Oenos: Heldr.). — *M. taurica* est var. panicula macriore, angusta et elongata (cfr. Rouy in bull. soc. bot. 1882).

**M. nebrodensis*: Bulgar. (in saxosis supra Bucina: Velen.). — *M. cretica*: Cephalon. ins. jon. (Heldreich). — Obs. *M. nebrodensis* a *M. glauca* vix distingui potest, sed nomen Parlator., quamquam antea, pro specie late distributa vix admittendum. - Lojacono de hac et sequ. (*M. Cupani*) plenius disseruit in natural. sicil. 1881 (sep. 3—6); cfr. etiam Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 467.

4. *M. Cupani*; — *M. Tinei* Lojac. (1881). *M. Cupani* var. *breviflora* Parl.; *M. nebrodensis* var. *malacitana* Lojac. (*M. nebrodensis* H.P.R. exs. hisp. a. 1879).

5. *M. Bauhini*: Mallorca Balear. (Puig major de Torrella, barranco de Soller).

7. *M. major*: Balear. Creta (: Sieber). Arch. ins. Lero (: Heldreich).

8. *M. pyramidalis*: Sard. ex hb. Moris. (teste Hackel). Creta (m. Amalos: Reverchon 1884).

9. *M. minuta*: Alpes-Marit. (Mentone, Villafranca; Grasse). - Boiss. (in fl. or.) hanc speciem solum ex ins. Chios et e monte Taygeto (: Pichler) citat.

10. *M. nutans*: Bulgar. - Byzant. a solo Sibthorp lecta est (ex Boiss.).

11. *M. picta*: Thuring. (pr. Sulza, Jena: Schulze 1885; Saalburg: Hausskn. 1885; probab. etiam alibi: vid. Hausskn. in mitteil. soc. bot. thur. 1887). Saxon. (Uechtritz 1883). Bohem. (vid. ap. Celak. in oe. bot. z. 1883). Morav. (pr. Bisenz, Branowitz et precipue Znaim). Transs. (: Janka, Simonk.). Ross. centr. (gub. Kursk). *M. nutans* var. *picta* Grsb. in Led. fl. ross. (1853). *M. nutans* var. *viridiflora* Led. hb.

12. *M. uniflora*: Bulgar. (in silvis m. Osogovska-Planina). Byzant. (: Post). Attica (m. Parnes: Pichler).

13. *M. rectiflora*; in Creta etiam ad promont. Maleka lecta est (: Raulin).

× *M. Aschersonii* Schulze = *nutans* + *picta*. (Jena).

81. *Pleuropogon*. 1. *P. Sabinii*: Ins. Waigatsch (Kjellm. Lundstr. 1875). Gramen hoc memorabile in Nov.-Semlia primum lectum est a v. Baer 1837 (teste Trautv.); ibidem ad Matotschkin Sharr relectum est in exped. Rosenthal. 1871 (ex determ. A. Blytt. in act. soc. sc. norv. 1873).

82. *Molinia*. 1. *M. coerulea*: Island. (r.) Ins. Færöer. Cors. (: EPetit). Bulgar. (in pratis alpinis m. Vitos: Velen.). — *M. litoralis*; dicitur varietas distinctissima, que in eodem loco cum typo crescens diversa persistit (: de Bruyn).

1. *a.* *M. squarrosa* Trin. in Led. fl. alt. I. 105. - Ross. mer.-or. (Sarepta: Becker exs. a. 1882).

83. *Diplachne*. 1. *D. serotina*: Morav. (r.). Bulgar. Rumel. or.

**D. bulgarica* Bornm. in centralbl. 1888. - Bulgar. in collibus siccis ad Varna.

84. *Dactylis*. 1. *D. glomerata*; exc. etiam Fenn. bor. — *D. rigida* Hssm. (*D. hispanica* auct. quor.).

**D. hispanica*: Istr. (Freyn). Athen. (Heldr.). Kyllene (Pichler). Parnass. (Orph.). Oeta (Heldr.). Creta (Weiss); ex Boiss. — *D. hispanica* var. *Sibthorpii* Hack. *Festuca dactyloides* fl. gr. (Arch. ins. Melos: Sibth. in hb. Jacq. ex Hackel).

1. *a.* *D. rigida* Boiss. (diagn. ser. I. 13. 60), a me sub *Festuca elatiori* enumerata, a Boissier in Flora Orientali restituta est. Hab. in alpinis et subalpinis (5000—7800') montis Ida (Psiloriti) Cretæ: Heldreich.

87. *Vulpia*. 2. *V. membranacea*; — *V. agrestis* (Magn. fl. sel. exs. 158): Paris, Tours; Arles, Aigues Mortes (: Duv.-Jouv.), Pyren. or. (: Le Grand). Potius videtur saltem subspecies, cui pertineat *V. longisetata* Hack.

3. *V. ligustica*; Loretia *ligustica* Duv.-Jouv. in rev. sc. nat. 1880.

4. *V. incrassata*: Gall. mer. (Marseille, Agde, Montp., Perpign.; ex Duv.-Jouv.). Balear. Sard. (ex hb. Moris. teste Hackel). Loretia *incrassata* Duv.-Jouv. l. c.

5. *V. tenuis*; in Balear. non nisi pr. Soller ins. Mallorcæ, in rupibus calcareis aridis, lecta est (Willkomm 1873). Loretia *tenuis* Willk. ill. hisp. l. 127.

6. *V. geniculata*: Menorca (: Marès). Loretia *geniculata* Duv.-Jouv. l. c.

9. *V. setacea*: Toulon Gall. mer. (: Duv.-Jouv.). Sard. (ex hb. Moris. teste Hackel). Loretia *setacea* Duv.-Jouv. l. c.

10. *V. ciliata*; hab. etiam in Gall. bor.-occ.

**V. ætnensis*: ins. *Æolîæ* (Vulcano: Lojac. 1877).

12. *V. myuros*; Comment. 269. — ? *V. declinata* Dmrt.

**V. ambigua*; *V. ciliatæ* (10) propior est sec. Townsend: *V. ciliata* var. *glabra* Towns.

13. *V. Broteri*; hab. etiam in Sard. (Moris, Reverchon).

15. *V. gypsophila*; *Loretia gypsophila* Willk. ill. hisp. I. 126.

88. **Bromus**. 1. *B. maximus*; Gall. bor.-occ. — *B. Gussonii* omnino medius est inter hanc speciem et *B. rigidum* (2), sed ultimo propior (hujus sub-species?).

2. *B. rigidus*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto: HGroves).

4. *B. tectorum*: Aland. (ad Bomarsund). Bulgar. et Rumel. or. (: Velen.). — *B. longipilus* ad *B. sterilem* (3) pertinet ex Hzl.

5. *B. madritensis*: Gall. bor.-occ. Croat. (pr. Fiume: A-M.Smith). Rhodus (: Balansa).

6. *B. rubens*: Sard. (ex hb. Moris, teste Barbey). Cephal. (: Heldr.), Argolis, Byzant. (: Noë); ex Boiss.

7. *B. fasciculatus*: Sard. (ex hb. Moris.). Arch. ins. Lero (Heldr. ex Boiss.).

8. *B. asper*: Bulgar. (in silvatic. montan.). - Angl. huc usque (1876) non lectus est, sed in Scotia.

**B. serotinus*: Austr.-Infer. (in declivib. silvatic. montis Sophienalpe, copiose: Heimerl). Sard. (: Ascherson).

10. *B. vernalis*; hab. etiam in Bosn. (: Brandis ex Freyn).

11 * *B. condensatus* Hackel (1879). Tyrol. mer. (: Bozen: Hsm.); forse propior *B. transsilvanico* (13).

12. *B. pannonicus* (1849); a *B. erecto leiostachyo* vix distinctus videtur (= *B. erectus* var. *pycnotrichus* Borb. 1878), sed sec. spec. authent. (hb. monac. teste Borb.) est = *B. vernalis* (10). Comment. 270.

13. *B. transsilvanicus*: Bulgar. (in calcareis prope Petrov Han copiose: Velen.). Bosn. mer. alp. (: GBeck 1885). — ? *B. barcensis* Simk. (pr. Brasoviam Transs.).

14. *B. fibrosus*: Bulgar. (cum præced.). Bosn. (: Brandis ex Freyn). *B. variegatus* auct. var. non MB. (ex Boiss.); sec. Simonk. (enum. 584) hæc et præced. unam constituunt speciem: *B. transsilvanicus* Steud.

15. *B. variegatus*; sec. Boiss. (fl. or.) planta taurica ad *B. cappadocicum* Boiss. diagn. pertinet; *B. angustifolius* (MB.) ad *B. erectum* pertineat. — *B. riparius* Rehm. (ex Borb.). *B. variegatus* Jka. (Hung. Vallach. Ross. mer.).

16. *B. tomentellus*; hab. etiam in montib. Sphacioticis (Cretæ): Raulin ex Boiss.

17. *B. inermis*: Lapp. or. ponoj. (probab. adventit.). Siles. Galic. Carinth. (r.: Pacher). - Belg. olim pr. Huy aderat.

18. *B. secalinus*: Austr. Bulgar.

19. *B. commutatus*: Bulgar. (ex Velen.). Ross. mer.-occ.; balt. (ex Klinge). — Comment. 271.

20. *B. racemosus*: Gall. bor.-occ. Ross. mer.; balt. (r.) ex Klinge. - Transs. deest.

21. *B. arvensis*: Fenn. mer., med. Bulgar., Rumel. or. (: Velen.).

**B. splendens* Velen. in act. soc. sc. bohém. 1886. 46 sep. (*). Bulgar. balcan. ad Petrohan in rupibus marmoreis (: Velen. 1885); in submontanis Stara Planina frequ., "sub montibus sensim in speciem primar. (*B. arvensis*) transit" (Velenovsky 1888).

22. *B. brachystachys*; *B. strictus* Schwabe (ex Geke); *B. ægyptiacus* Tsh (1837) ex Boiss. - Hoc gramen nunc non solum in Aegypto, sed etiam in Palestina, Syria etc. lectum est; specimina orientalia a germanicis non nisi glumellâ paullo longiore differunt (ex Boiss.).

23. *B. mollis*; Fenn. hab. solum in mer.-occ. Comment. 272. — *B. compactus* Breb. (Gall. bor., Angl.).

**B. hordeaceus*; hab. etiam in Angl. mer. (: Townsend).

24. *B. molliformis*: Ital. mer. (T. d'Otranto: HGroves; Amalfi: Lacaita). De hac specie cfr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 474, 475.
25. *B. scoparius* (Heldr. hb. norm. 896): Thessal. (pr. Pharsalum: Heldr.). Bæotia (Heldr. ex Boiss.). Creta (: Reverchon 1884).
26. *B. alopecuroides*: Sard. (ex hb. Moris, teste Barbey). Pelop. (Bory ex Boiss.).
27. *B. intermedius*: Rhodus (Bourg. ex Boiss.).
28. *B. macrostachys*: Rhodus (Post ex Boiss.); planta græca sistit varietatem spiculis lanuginosis (*B. lanuginosus* Poir.) ex Boiss. fl. or.
30. *B. patulus*: Angl. (Durham; introd.). Germ. hab. solum in mer. (passim) et med. (Weimar, Jena etc.). Lothar. (r.). Helv. r. et probab. introd. (Aargau, Neuchatel). Forez Gall. centr. (: Le Grand).
90. *Festuca*. 1. *F. gigantea*: Bulgar. (m. Osogov. Planina). Bosn. (Konjica: GBeck 1885). - Fenn. hab. solum ad Pyhäjärvi in isthmo carelico (J. Sahlberg 1878).
2. *F. arundinacea*: Fenn. mer. Bulgar. Bosn. (in paludosis sub Bandol: Brandis ex Freyn).
3. *F. fenas*: Menorca (r.: Rodrig.). Sard. (: Reverchon 1882 nom. *F. pratensis*); in hac insula (pr. pagum Pula) etiam *F. interrupta* vera (Fontanes.), teste Hackel, lecta est a Ascherson et Reinhold (1863).
4. *F. elatior*: Bulgar. Attica (m. Pentelicon: Heldr. ex Boiss.). — *F. cretica*; generi *Dactyli* nunc restituta est (: *D. rigida* B.H.).
 **F. loliacea*: *Lolium festucoides* Raspail in ann. sc. d'obs. 1829.
6. *F. montana*: Bulgar. (in silvatic. alpin. m. Balkan). Bosn. (: GBeck et al.). Byzant. (: Thuret ex Boiss.).
7. *F. silvatica*; in Boiss. fl. or. hæc species non citatur ex Olympo (sed solum præced.). - Transs. ad speciem præced. pertinet (ex Smk.).
9. *F. spadicea*: Alpes-Marit. (reg. alp. et mont., rarius). Bulgar. (sub cacum. montis Kom: Velen.). - Trauss. sec. Bmg. et Schur citata est, sed species ap. Simonk. cruce notatur.
 **F. consobrina*: dep. Allier (pr. Gaunat: Billiet); sec. Duv.-Jouve est = *F. spadicea* locorum demissiorum.
12. *F. affinis*; — *F. croatica*; in rupestr. et glareosis subalpin. m. Velebit; *F. dimorphæ* (17) similior (: Kern. sched. ad exs. 1881. 105).
14. *F. pulchella*; — Comment. 273.
15. *F. nutans*; cfr. Janka in oe. bot. z. 1866, Kern. sched. ad exs. 1881, Hack. monogr. 1882.
20. *F. flavescens*: Alpes-Marit. (reg. alp.).
22. *F. varia*: Alpes-Marit. (mte Frontero, les Viosennes, col de Tenda etc.; ex Ardoino). Bulgar. (sub cacum. m. Vitos et m. Kom: Velen.).
 **F. cyllenea*: Parnass. (Heldr.). Lacon. (m. Malevo: Orph.).
 **F. sardoa* Hack. in Barb. fl. sard. comp. 71. - Sard. mte Limbardo, pr. Tempio (Reverchon 1882).
25. *F. pumila*: Bavar. (Alpes). - Transs. ad *F. pictam* (30—) pertinet.
26. *F. heterophylla*: Angl. (Surrey: rev. Marshall ex Arth. Bennett 1889). Bulgar. (in silvis m. Vitos: Velen.).
27. *F. rubra*: Ins. Færøer, Jan Mayen (Dr Fischer 1883). Bulgar. Istr. Euboæ m. Delphi (: Pichler ex Boiss.).
 **F. fallax* (dumetorum): Dan. (in silvis et pratis silvaticis: Lge). Fenn. (: Brenner).
28. *F. dumetorum* (— *F. oraria*); Angl. non nisi in Hampshire certe adest sec. Townsend (1880).
30. *F. violacea*: Alpes-Marit. (col del Abisso: Bourg.; Salsamorena: Canut). Bulgar. (m. Vitos: Velen.). Maced. m. Scardus (*F. ovina* var. *scardica* Grsb. sec. Boiss. fl. or.).
32. *F. amethystina*; *F. tyrolensis* Kern. (ex Hackel). Comment. 274.

39. *F. sulcata*: Bosn. - Helv. hab. solum in Engadin Bundiæ (ex Gremli).
— *F. stricta* Host. *F. pannonica* Schur (non Wulf.).

**F. valesiaca* Gaud. ap. Schleich. (1807); agrost. helv. (1811): Bosn. (Brandis ex Freyn).

39. *a. F. Panciciana* Hack. monogr. 106, (GBeck). - Bosn. mer. (GBeck 1885). Herceg. (Romanja Planina).

42. *F. glauca*: Fenn. mer., mer.-or. (: Kihlman ap. soc. f. fl. fenn. 1887. 1888). Ross. bor., med. Bulgar. m. Rujen (Osog. Planina) in saxosis alpinis. Istr. Parnass. reg. alp. (var.: Boiss. or.). — *F. vaginata* Gaud. (non Kit.).

**F. vaginata*: Bavar. (pr. München). Siles. (Rothkretscham pr. Breslau: Uechtr. 1879). Transs. (rarius). Comment. 275.

43. *F. ovina*: Ins. Færöer, Jan-Mayen (Dr Fischer 1883). Nov.-Seml. et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1875). Bulgar. — *F. supina*; *F. alpestris* Simk. — *F. taurica* Kern, hb.; Hack. (Taur.).

44. *F. duriuscula*: Dan. (non rara: Lange). Bosn. mer. (: GBeck 1885).

45. *F. alpina*: Helv. (et al.) hab. solum in summis Alpibus. Comment. 276.

46. *F. brevifolia*: Th. Fr. pl. spitzb. exs. 88.

47. *F. Halleri* Vill.: Alpes-Marit. (col de Fremamorta: Loret ex Ardoino). Pyren. or. (vall. Carença: Gautier 1879). Bosn. mer. (: GBeck 1885). — *F. Halleri* All. ab hac specie aliena est et cum *F. stricta* Host (39—), cui similis, comparanda; cfr. *F. alpina* (45) Comment.

**F. rupicaprina*; *F. ovina alpina* Neill. (non K.).

91. *Arctophila*. 1. *A. Læstadii*: Nov.-Semlia (Kjellm. Lundstr. 1875).

**A. effusa* Lge; hab. in insulis arcticis Spitzberg (: Malmgren) et Waigatsch (: Kjellm. Lundstr. 1880). Colpodium Malmgreni Ands.; cfr. Nathorst in act. ac. scient. holm. 1883.

2. *A. fulva*; planta Lapp. or. (ponoj.) sistit var. lapponica FNyl.

92. *Glyceria*. 1. *G. aquatica*: Sard. (ex hb. Moris). Bulgar.

1. *a. G. retinosa* Velen. 1886. (*G. arundinacea* "MB." Velen. 1888). Bulgar. in lacu Devno et ad Kebedze (: Velen.).

2. *G. remota*: Fenn. med. Curon. (Illuxt).

3. *G. fluitans*: Ins. Færöer. Sard. (ex hb. Moris). Bulgar. — *G. pedicellata*, Angl. incola, ex auct. (Townsend) propior est *G. plicata* (4) et forse hujus status peculiaris, e loci natura ortus. — ? *G. hybrida* Towns. (Thursk Yorksh.: Baker).

4. *G. plicata*: Lusit. (pr. Oporto: Sjögren 1855). Bulgar. Rumel. or. (ex Velen.). — *G. declinata* Breb. norm. (1859). *G. plicata* var. *nana* Towns. (1864).

**G. spicata*: Ins. Caprera (in rivulo ad casa Garibaldi: Gennari).

5. *G. nemoralis*: Marchia (pr. Driesen). Galic. (m. Babiagora: Stein sec. Uechtritz 1873). Transs. (: Borbás, Simkov.).

6. *G. distans*: Island. (Steenstrup ex Fridriksen et al.). Færöer (: Rostrup). Sard. (: Gennari). Rumel. or. (ex Velen.). — *G. capillaris* Schur. — *G. transsilvanica* Schur.

7. *G. festucæformis*: Hetr. pr. Livorno (teste Cosson in Rel. Maill.), ubi jam a Dr Elgenstierna (1813) lecta erat ex hb. mus. holm. Sard. (pr. Cagliari: de Sardagna 1883). Ross. mer.-occ. (: Schmalh.).

8. *G. convoluta*: Bulgar. (pr. Varna: Velen.; ad lacum Devno: Bornm.). Ross. mer. (gub. Cherson: Lindem.).

10. *G. maritima*: Island. (Strömfelt 1883). Fenn. bor.-or. (Karel. keret., ad Mare Album). Ross. balt. (ex Klinge). Germ. bor. ab Ostfriesland ad Danzig Boruss. Gall. bor.-occ.

11. *G. Borreri*: Island. (r.: Steenstrup, Grönlund et al.). Flandr. occ. (: Crepin 1884). Gall. bor.-occ. (Cherbourg; vid. Corbière in bull. soc. linn. norm. 1887). — *G. permixta*: Istr. (cfr. ap. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 470).

12. *G. angustata*: Th. Fr. pl. spitzb. exs. 96.

12. *a. G. Vahlia* (Liebm.) Th. Fr. pl. spitzb. exs. 98. - Spitzberg (Th. Fr. 1868). Nov.-Semlia (Kjellm. Lundstr. 1875).

12. *b. G. vaginalis* Lge in Kjellm. Lundstr. fan. nov.-seml. 313 (1882). Ins. Waigatsch (Kjellm. Lundstr. 1880).

12. *c. G. tenella* Lge l. c. - Nov.-Semlia et Waigatsch (Kjellm. Lundstr. 1875. 1880).

12. *d. G. ? Kjellmani* Lge in Kjellm. nordk. faner. 273 (1882) et ap. Kjellm. Lundstr. l. c. 314. - Spitzberg. Nov.-Semlia (Kjellm. Lundstr. 1875). Planta quoad genus dubia, habitū Catabrosæ cujusdam macrioris; cfr. descr. et icon. ap. Lge l. c.

13. *G. procumbens*: Gall. bor.-occ. - Belg. olim ad Adinkerke et Ostende reperta, tempore recentiori in Belgio non lecta est (ex Crepin).

93. *Sclerochloa*. 2. *S. maritima*; *Cutandia maritima* Bth. (notes on grasses).

3. *S. divaricata* (*Cutandia divaricata* Bth.): Sard. (Pula: Ascherson et Reinhold).

4. *S. hemipoa*: Majorca Balear. (: Porta 1885). Sard. (pr. Cagliari: Ascherson et Reinhold). Dalm. (pr. Ragusa). Festuca hemipoa Del. in Spr. syst. IV. 36. Triticeum hemipoa Del. in Ten. syll. 56.

5. *S. rigida*: Gall. bor.-occ. - Germ. (ex Gcke) non nisi introducta adest (ad Aachen, Eupen, Jena etc.). *Poa rigida* L. am. 1759.

6. *S. dura*: Lothar. (r.). Bulgar. Istr.

94. *Schismus*. 2. *S. arabicus*: Menidi Atticæ (*S. minutus* Orph.) Rhodus (Bourg. ex Boiss.).

95. *Briza*. 1. *B. maxima*; hab. etiam in Bosn. (ex GBeck).

2. *B. media*: Ins. Færøer. Fenn. mer. Bulgar. (: Velen.). — *B. elatior* (Sibth. Sm. fl. gr. I. 59): Maced. m. Korthiati. Byzant. (Noë exs. or. 728); sec. Boiss. fl. or. in speciem propriam restituenda est.

3. *B. minor*; hab. etiam in Gall. bor.-occ.

96. *Eragrostis*. 1. *E. collina*; — *E. suaveolens* (e Sarepta) a Becker (in actis mosquens.) post *E. minor* (3) enumeratur.

2. *E. major*: Creta (Sieber ex Boiss.). - in Helv. rariss. est ex Gremli.

3. *E. minor*: Istr. Bulgar.

4. *E. pilosa*: Sard. (ex hb. Moris, teste Barbey). Bulgar.

97. *Sphenopus*. 1. *S. Gouani*: Pelop. (hb. Fauché). Byzant. (: Couman-y); ex Boiss. fl. or.

98. *Poa*. 1. *P. silvatica*: Polon. (: Rostafinski); adest etiam hinc inde introducta in ambulacris etc.

**P. remota*: Holsat. (Nolte). Hassia (pr. Darmstadt). Ross. mer.-occ.

2. *P. hybrida*: Bavar. Carinth. (alp. Pasterze). Styr. Hung. Transs. - Helv. hab. præcipue in Jurasso: *P. jurana* Genty in Magn. scrin. V. (1886). 104 (*).

4. *P. pratensis*: Ins. Færøer. Island. Bulgar. - in Græc. a solo Sibthorp (in Pelop.) lecta est. Turc. non nisi in Thrac. et Maced. adest (ex Boiss.).

5. *P. attica*: Hisp. mer. (prov. gadit.: Perez y Lara). Menorca Balear. (: Rodrig.). Hetr. (: Arcangeli 1882). Croat. (pr. Buccari: Hire 1883). Dalm. (pr. Cattaro: Ascherson). Hung. (ex Borbás).

6. *P. palustris*: Scotia (Pertshire: Dr Buchanan ex ABennett 1889). — *P. leviculmis* Borb. 1879. *P. levis* Borb. 1877. (Versec). — *P. adspersa* Drej. (ex Lge haandb. ed. IV. 85).

7. *P. trivialis*: Island. Ins. Færøer. Sard. (ex hb. Moris, teste Barbey). Bulgar.

8. *P. nemoralis*; hab. etiam in Bulgar. — *P. montana* Gaud.

8. *a. P. pannonica* Kern. in öe. bot. z. 1864. - Hung. or. Galic. mer.-or. — ? *P. anceps* Rehm. 1873. (Bucowina).

10. *P. sterilis*; — *P. scabra*; sec. Borbás propior est *P. palustri* (6), cuius forsan varietas e loco.

11. *P. compressa*: Fenn. mer. Maced. m. Korthiati (: Heldreich).

13. *P. alpina*: Ins. Færøer. Jan Mayen (Dr Fischer 1883). Fenn. bor., or. (Carel.). Ross. arct. etiam in ins. Nov.-Seml. et Waigatsch. Bulgar. (m. Vitos et Kom: Velen.). Ital. neap. in m. Pizzo delle Tende (pr. Amalfi), alt. circ. 4400 ped. (: Lacaita teste Hackel). — *P. glaucescens* GBeck in ann. mus. vind. 1887. (Bosn.).

**P. badensis*: Istr. (in cacum. m. Maggiore). Bosn. (GBeck 1885). Bulgar. (m. Balkan in reg. media).

13. *α. P. ursina* Velen. in act. soc. sc. boh. 1886. sep. 45 (*). Bulgar., ubi in summo monte Vitos detex. Velenovsky (1885); 1887 legit in m. Balkan (plur. loc.) et Osog. Planina; plenius eam illustravit in diar. soc. sc. boh. 1888. 72—3 (sep.).

14. *P. abbreviata*: Th.Fr. pl. spitzb. exs. 93.

15. *P. pumila*: Carinth. (rarius; alt. 2400 metr. valde characteristica: Pach. Jaborn.). Bosn. mer. alp. (GBeck 1885).

**P. Parnassi*; ex ipso Boissier (fl. or.) est = varietas *P. alpinæ* (13).

16. *P. laxa*; — *P. dolosa* Jka quoad plantam transsilv. (ex Smk.).

17. *P. minor*: Bavar. (Alpes et inde cum fluviis interdum devecta). Bosn. mer. (GBeck 1885). — *P. tremula* ad speciem præced. pertinet ex Smk.

18. *P. cenisia*: Alpes- Marit. (col de Fenestre, Ste-Anne-de-Vinai; ex Ardoino). Bavar. (Alpes, unde interdum, e. gr. ad München, Memmingen, cum fluviis devecta). Jurass. (Hasenmatt: Gremli). Bosn. mer. (GBeck 1885). Bulgar. (ad nives montis Vitos). — *P. distichophylla*; *P. cenisia* K.

**P. arctica*: Ross. arct. (etiam ins. Waigatsch: Kjellm. Lundstr. 1875). Beeren-Eiland. Jan-Mayen (Dr Fischer 1883: *P. flexuosa*).

19. *P. cæsia*: Ins. Færøer. Fenn. bor. — *P. Frearitis* Orph. ms. (Maced. m. Peristeri in cacum. Lynkos, 7500' s. m.: Orph. ex Boiss.).

**P. Balfourii*: Island. (ad Geysir et Reykjavik: Babington teste Lge).

**P. conferta*; — *P. laxiuscula* Lge fl. Dan. L. 2946 et bemærkn. 4. (1880). *P. aspera* var. *laxiuscula* Blytt.

20. *P. stricta*: Ross. arct. (etiam Waigatsch et Nov.-Semlia: Kjellm. Lundstr. 1875). - in Beeren-Eiland non lecta est teste Nathorst. - exclud. planta jemtland., nam hæc sec. Almqvist (1883) est varietas *P. laxæ* (16).

21. *P. trichophylla*; species insignis, detecta a Sartori (1846); cæspites præbet pulvinares, sæpe amplos; culmi tenuissimi, humiles; ligulæ imæ valde exsertæ.

22. *P. violacea*: Sabaud. (in valle super. fluvii Arc: ESaint Lager 1887). Galic. (Carpati ex Zapalovicz). Bulgar. (m. Vitos et Osog. Planina: Velen.).

23. *P. bulbosa*: Luxemb. (EFischer 1881). Bulgar. — *P. pseudo-concinna* ad *P. alpinam* (13) pertinet ex Smk.

24. *P. Timoleonis*; in Boiss. fl. or. V. 607 nunc descripta exstat.

25. *P. concinna*; Transs. ad *P. alpinam* (13) pertinet ex Smk.

29. *P. Balbisii*; post *P. cæsiæ* (19) collocanda est. Comment. 277.

99. *Catabrosa*. 1. *C. aquatica*: Island. (Strömfelt, Feddersen). Fenn. indicatur in bor. (cum Lapp.) et mer. (prov. Nyland). Bulgar. (: Velen.). Bæotia (Orph. exs. 1072)

2. *C. concinna* (Th.Fr. pl. spitzb. exs. 100): Samoj.; Waigatsch (Kjellm. Lundstr. 1875); etiam ins. Kalgujuk ex Kjellm. (in Nov.-Seml. non lecta est teste Kjellm.). *Phippsia algida* Trautv. ex ipso.

3. *C. algida*: Nov.-Seml.; Jan Mayen.

4. *C. vilfoidea*: Nov.-Seml. (Kjellm. Lundstr. 1875). *Glyceria vilfoidea* Th. Fr. pl. spitzb. exs. 97; Lge fl. dan. 2883.

4. *α. C. humilis* Trin. fund. 136. *Aira humilis* MB. *Colpodium bulbosum* Trin. *C. humile* Grsb. in Led. ross. - Ross. mer.-or. (Sarepta, frequ.: Becker 1858; exs. a. 1882).

100. *Elymus*. 2. *E. arenarius*: Ins. Færøer, Waigatsch. Bulgar. Ross. mer.-occ. Polon. (Waga, Warsav.: Kamienski). - Transs. exclud. teste Smk.

3. *E. sabulosus*: Bulgar. ad lacum Devno (var. depauperata Bornm. in centralbl. 1888 = *E. arenarius* Velen. 1887). Ross. centr. (gub. Kursk: Angustinov.).

4. *E. europæus*: Bulgar. in silvis m. Balkan (supra Klisura leg. Velenovsky).

5 * *E. crinitus*: Bulgar. (Varna etc.: Velen., Bornm.).

101. *Hordeum*. 1. *H. bulbosum*: Banat. (: Hzl.). Rhodus (: Bourg.).

2. *H. secalinum*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto: HGroves). Bulgar. (: Velen.). - Helv. hab. in cant. Genève, Vaud et Neuchatel (teste Gremli).

3. *H. Gussoneanum*: Sard. (pr. Tempio, palus Assossade: Reverch. 1882 teste Hackel).

4. *H. murinum*; hab. etiam in Bulgar. (plur. loc. leg. Velenovsky).

**H. rubens*; cfr. Burn. Barb. notes sur un voy. bot. balear. etc. 36 et 63 (*).

5. *H. leporinum*: Bulgar. (ad Varna etc.: Velen. Bornm.). — ? *H. ambiguum* Döll. (Creta: Sieber ex Döll).

6. *H. maritimum*: Bulgar. (plur. loc.). Arch. ins. Chios. (: Orph. ex Boiss.).

102. *Secale*. 3. *S. fragile*; indicatur etiam in Ross. centr. (gub. Kursk).

103. *Aegilops*. 1. *Ae. ovata*: Bosn. mer. (GBeck 1885). — *Ae. macrochaeta*; pr. Castelnau du Lez (dep. Herault) a Duval-Jouve copiose lecta est (1877); sec. Loret propria species est, inter *Ae. triarist.* (3) et *Ae. triuncial.* (4) media. Comment. 278.

× *Ae. triticoides*; — *Ae. speltaeformis*; Comment. 279.

2. *Ae. biuncialis*: Isthm. Corinth. (: Lacaita). T. d'Otranto (: Lacaita, H Groves: var. *biaristata*); sec. Lacaita est "circ. 20 dies serior" quam *Ae. ovata*, cum qua provenit.

3. *Ae. triaristata*; hab. etiam in Balear. ins. Mallorca (pr. Artá: Marès).

4. *Ae. triuncialis*; hab. etiam in Sard. ex hb. Moris. (teste Hackel).

× *Ae. vulgari-triuncialis* Lge pug. fl. hisp. 1860; Loret l. c. (1870).

5. *Ae. caudata*: Sard. (pr. Pula, in pascuis aridis) ex hb. Moris. (teste Hackel).

**Ae. Heldreichii* Holzm. (in Heldr. exs. a. 1883 et) Heldr. hb. norm. 898. 986. *Ae. comosa* Heldr. hb. norm. 606 (excl. synonym.). *Ae. comosa* var. *subventricosa* et *Ae. caudata* var. *Heldreichii* Boiss. or. - Attica. Thessal.

7. *Ae. uniaristata*; T. d'Otranto (pr. Leucaspide: Lacaita, HGroves); "40 — 50 dies serior" quam *Ae. ovata*, cum qua crescit (Lacaita).

7. *a.* *Ae. speltoides* Tsh (1837). *Ae. bicornis* Jaub. Sp. (1853); cfr. *Tritic. ligusticum* (4).

7. *b.* *Ae. Aucheri* Boiss. (1844). *Ae. macroura* Jaub. Sp. (1853); cfr. *Tritic. Aucheri* (5).

104. *Triticum*. 1. *T. villosum*: Menorca (r.: Marès). Bosn. mer. (GBeck 1885). Bulgar. Transs. (rarius).

3. *T. baoticum*: Thessal. (Heldr. hb. norm. 897); sec. Boiss. fl. or. adest etiam in Lydia, Phrygia etc. atque typus spontaneus (lasiorhachis) est ac. origo *T. monococci* culti (leiorhacheos).

Obs. 2. *T. monococcum*; in cultis ad Saint-Martin-de-Londres etc. (dep. Herault) copiâ sua molestum est.

4. *T. ligusticum* (*T. bicornis* Forsk. descr. 26). *T. obtusatum* Godr. fl. juven. - Hæc species, ut Parlatore suspicatus est, in Oriente indigena est; sec. Boiss. generi *Aegilopi* adnumeranda ob affinitatem cum *Ae. Tauschii* (post eam supra inserta est).

5. *T. Aucheri*; etiam hæc species (teste Boiss.) in Oriente (Mesopotam., Cilicia, Syria) indigena est et generi *Aegilopi* restituenda (cfr. supra 7.b).

6. *T. junceum*: Ins. Færøer (: Feilb. Rostr.). Bulgar.: planta cretica (Heldr.) et zacynth. (: Margot) ad subspeciem pertinet.

**T. Sartorii*: Attica (Heldr. hb. norm. 987). Creta (*T. junceum* Heldr. exs. ex ipso).

8. *T. scirpeum*; — *T. flaccidifolium* Heldr. hb. norm. 988 (sub *Agropyro*). *Agrop. elongatum* var. Boiss.

9. *T. obtusiusculum*; ad Cherbourg Gall. bor.-occ. a Le Jolis lectum est (teste Langel!).

10. *T. acutum*: Ins. Færøer (Rostrup).

11. *T. Savignonii*; — ? *T. Goiranianum* Vis. ap. Goiran. 1874 (sub *Agropyro*). Mte Baldo (: Goiran).

12. *T. elongatum*: Bulgar. Creta (Sieber ex Boiss.). Ross. mer.

13. *T. pungens*: Ross. mer. (gub. Cherson: Lindem.); de hoc et de tribus proxime sequentibus cfr. Freyn in act. soc. z.-b. vind. 1877. 478—480.

14. *T. litorale*: Ital. mer.-or. (Otranto: HGroves); in neapol. pr. Amalfi, ad rupes calcareas, legit Lacaita (ex eo in litt.). Attica (Heldr. hb. norm. 989, var. maxima). Bulgar. (pr. Varna, ad lacum Devno: Velen. Bornm.). — *T. pungens* Godr. (non P.) ex Loret.

15. *T. intermedium*; in Gall. mer. (ex Bonnet) non rarum est, in media rarius *T. obtusiusculum* Bill. exs. 4084?); hab. etiam in Bavar. (ad Bodensee pr. Wasserburg), Bulgar., Ross. mer., mer.-occ. (sec. Klinge etiam in balt.).

**T. campestre*; sec. Bonnet adest etiam in Gall. or. et med. (e. gr. Parisiis: *T. glaucum* Th.; *T. intermedium* Merat). — *T. Pouzolzii* est tantum status depauperatus (spiculis subabortivis) ex Duval-Jouve, qui plantam in loco classico pr. Nîmes observavit.

16. *T. repens*; — *T. cæsium*; Heldr. hb. norm. 990 (ex Attica).

17. *T. violaceum*: Lapp. fennica, rossica, Fenn. bor.

18. *T. caninum*: Sard. (ex hb. Moris). Bulgar. Ross. mer.

19. *T. biflorum*; Helv. (mer.) etiam in *Bundia* (cant. Graub., les Grisons) lectum est; Transs. ex Simonk. (enum. 594).

25. *T. cristatum*; hab. etiam in Ross. centr. (gub. Kursk).

27. *T. prostratum*; hab. etiam in Ross. centr. (gub. Kursk: Augustinovicz).

× *T. Duvalii* Loret (*T. acutum* Duv.-Jouve) = *junceum* + *pycnanthum*. (Gall. mer.).

105. *Brachypodium*. 1. *B. silvaticum*: Aland. (CJArrhenius 1863). Istr. Bosn. (: Brandis, Conrath). Bulgar.

2. *B. pinnatum*: Fenn. mer. Bulgar. Istr. Pelop. (m. Chelmos: Orph. ex Boiss.).

**B. phoenicoides*; hab. etiam in ins. Balear.

3. *B. mucronatum*; hæc species a Willkomm in Sierra de Chiva Valenc. detecta est (1844).

4. *B. ramosum*; hab. etiam in ins. Balear.

6. *B. sanctum*; in rupibus calcareis supra Sermeniko, ad alt. 4500', a cl. Haussknecht lectum est (1885) et in Heldr. hb. norm. a. 1886 editum.

106. *Nardurus*. 2. *N. Lachenalii*; Badiæ etiam ad Hecklingen lectus est (ex Gcke). Helv. adest solum in cant. Ticino (et Aargau introd.).

4. *N. tenellus*: Belg. (prov. Liège), ubi ante semiseculum a Dumortier detectus erat, relectus est 1870. Sard. ex herb. Moris. (teste Hackel). Helv. solum Genève (r.) lectus est. - Græc. deest ex Boiss. fl. or.

5. *N. Salzmanni*: Murcia (pr. Hellin: Rouy 1881); ex observ. bi Cosson, et consentiente Boissier, melius sub genere sequ. *Desmazeria* militet.

107. *Desmazeria*. 2. *D. loliacea*: Majorca Balear. (Porta 1885). Rhodus (: Post ex Boiss.). *Triticum Rottboella* DC. *Scleropoa loliacea* G.G.

109. *Gaudinia*. 1. *G. fragilis*: Argolis (: Spruner). Chios (: Orphanides). — *G. filiformis* Albert in Magn. scrutin. VI (1887). 120 et exs. 1579. Gall. mer. (Hières, Porquerolles etc.).

110. *Lolium*. 1. *L. temulentum*: Bosn. (Hofmann, Brandis). Bulgar. — *L. speciosum*; *L. triticoides* Jka. (Transs.).

3. *L. multiflorum*: Gall. bor.-or., bor.-occ., mer. Helv. (ex Gremli) non nisi in cant. Vaud lectum est. Bosn. (: Brandis); - introd. vel efferatum adest etiam in Dan. et Batav.

4. *L. perenne*: Balear. Creta (: Raulin). Chios (: Orph.). Bulgar.

6. *L. Gaudini*; — ? *L. pseudolinicola* Genn. (Sard.).

7. *L. siculum*: hab. etiam in Mallorca (: Willkomm, Barcelò).

8. *L. rigidum*: Croat. (Fiume: A-M. Smith). - Helv. non nisi pr. Sion Vales. lectum est ex Gremli.

9. *L. subulatum*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto, pr. Gallipoli: HGroves); - sec. Boiss. (fl. or.) hæc species non differt a *L. lepturoidi* (sequ.), quod (ex eodem) est var. *L. rigidi* (8), sed comparatis commentat. clm Visiani et Freyn hoc parum credibile videtur.

10. *L. lepturoides*: Ital. mer.-or. (T. d'Otranto, pr. Gallipoli: HGroves). Ins. Lero Pharmacusarum (: Heldr.). Rhodus (: Bourg.).

112. *Rottboellia*. 1. *R. digitata*: Thrac. (Friv. ex Boiss.). Thessal. (Heldreich 1885).

114. *Lepturus*. 1. *L. cylindricus*: Aetol. (: Heldr.). Pelop. (: Bory). Taur. (: Steven); ex Boiss. or.

2. *L. incurvatus* (Rottb. incurvata L. f. etiam speciem sequ. p. p. spectat): Pelop. (Bory). Rhodus (Bourg.).

3. *L. filiformis*; hab. etiam in Menorca Balear. (: Porta 1885).

115. *Psilurus*. 1. *P. nardoides*: Cephalon. ins. jon. (in collibus siccis frequens: Heldreich).

116. *Nardus*. 1. *N. stricta*: Ins. Færøer. Bosn. (: GBeck 1885). Bulgar. Ross. mer.-occ.

CXLI. (CXL). EQUISETACEÆ.

1. *Equisetum*. 1. *E. Telmateja*: Banat. (: Borbás). Dobrud. (: Uechtr. Sint.). Bosn. Bulgar. - Græc. (ex Boiss.) a solo Bory indicatur. — *E. eburneum* Schreb.

2. *E. arvense*; — *E. arcticum* Rupr. (Ross. arct. Lapp. or.). — *E. campestre* FSz. - *E. arvense* var. *serotinum* GFWMey. — *E. boreale* Bong. (Germ. bor.-or. Ross. med.).

3. *E. silvaticum*: Ins. Færøer. Gall. or., bor.-or., bor.-occ. Bosn.

4. *E. pratense*: Galic. Carinth. Helv. hab. etiam in Bundia (cant. Graub., les Grisons). - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

5. *E. fluviatile*; — *E. uliginosum* Mühlenb. *E. limosum* minus ABr. Siles.).

6. *E. litorale*: Norv. mer. (rr.). Angl. (Surrey: Beeby 1885). Gall. bor.-occ. dep. Manche, pr. Valognes, ubi detectum a Dre Lebel ex Morière). Alsac. (ex Garcke). Germ. (bor.) paucis locis (Berlin, Potsdam etc.) lectum est. Transs. (rarius). Bosn.

7. *E. palustre*: Island. Ins. Færøer. Dan. Fenn. Bulgar. Bosn. (: GBeck). — *E. campestre* Rab. ex Hübn. exs. — *E. nanum* Milde (1864).

8. *E. ramosissimum*: Siles. (r.). Banat. (: Borbás 1873). Dobrud. (: Uechtr. Sint.). Bulgar.

9. *E. hiemale*: Island. Bosn. - Ross. mer. partim (gub. Cherson) deesse videtur. — *E. Schleicheri*; *E. paleaceum* Schleich.: Dan. (*E. variegatum* Lge olim).

11. *E. variegatum*: Island. (ubi ex Strömfelt sat vulgatum). Spitzb. Lapp. Fenn. bor. Aland. Öland. (ex Krok). Galic. Polon. (: Krupa 1882). Ross. mer.-occ. Bavar. Würtemb. (in Germ. bor.-occ., exc. Hamburg., deest ex Geke). Belg. olim ad Saint-Trond aderat, sed ibi nunc destructum videtur (ex Crepin). Dan. exclud. sec. Lge haandb. ed. IV. *E. tenellum* Krok (incl. sequ.) in Htn. handb. ed. XII (1889).

12. *E. scirpoides*: Ross. arct. Beeren-Eiland. Island. ad Eyafjördr (Feddersen ex Rostrup 1888). - Fenn. non nisi in bor. et or. (Carel. oneg.) indicatur. Carinth. ad Moll pr. Heiligen-Blut legit Wulfen ex specim. in hb. palat. vind. - *E. hiemale* A. tenellum Liljebl. 1798 (incl. præced., cujus subspecies ex Krok in Htn. handb. ed. XII).

CXLII (CXLi). POLYPODIACEÆ.

1. *Struthiopteris*. 1. *S. germanica*: Dan. Fenn. (sed in Lapp. solum in Kemi et ad Kola indicatur); etiam in Lapp. suec. et norv. (Finnm.) rara est (sed Nordland. freq.). Helv. hab. solum in cant. Ticino (val Maggia, mte Generoso). Lomb. (Pavia etc. ex Penzig); - in Vogesis (pr. Bruyères et Barr) a Mougeot et Nestler olim plantata est et (ex Godr. lorr.) nunc persistit.

2. *Allosurus*. 1. *A. crispus*: Ins. Færøer (ex Hornem. 1837). Aland. (paroec. Wårdå, rr.: Bomausson 1885 ex Kihlman). Bavar. mer. (in jugo mont. Keitersberg); - in Vogesis plurib. locis lectus est (sec. Godr. fl. lorr.); Helv. non nisi in Alpibus graniticis.

1. *a. A. Stelleri* Rupr. beitr. III. 48. *Pteris Stelleri* SGGmel. - Ross. or. (gub. Perm: Kryloff 1883).

3. *Notholæna*. 1. *N. Marantæ*: Alpes-Marit. (Antibes, l'Esterel; ex Ardoino). Helv. mer. (cant. Ticino pr. Cavigliano). Valach. (pr. Virciorova: Borb.). Dobrud. (pr. Grecii: Ue.Sint.). Morav. hab. in valle Iglau., ubi in rupibus serpentinis pr. Mohelno locus speciei maxime borealis (: CRömer ex Oborny 1883); sec. Formanek locus magis septentr. est pr. Pernstein.

2. *N. vellea*: T. d'Otranto, pr. Gallipoli (in calcareis "da S. Mauro alla Montagna Spaccata verso la Torre di Alto Lido", locus in Ital. pænis. hucusque unicus: HGroves). *Cheilanthes vellea* F. v. Mueller fragm. 123. (1866); ex observ. auctoris laudati genus *Notholæna* ab illo *Cheilanthes* non distinguendum est.

4. *Pteris*. 1. *P. aquilina*; deest in Lapp. p. d. (et in Fenn. max. bor.). — *P. gracilis* Paterson ex Trimen. (Scot. ins. Arran).

3. *P. cretica*: Ital. neap. etiam pr. Amalfi (copiose: Lacaita). Alpes-Marit. (Aspremont, la Giandola).

4. *P. longifolia*; Neap. etiam pr. Amalfi (rarius: Lacaita).

5. *Adiantum*. 1. *A. Capillus Veneris*; Helv. etiam in Valais (La Sarraz) et Ticino. - Transs. exclud. nam (sec. Smk.) planta Bmg. (ex Hunyad) est Asplen. Ad. nigrum.

6. *Cheilanthes*. 3. *Ch. hispanica*: Hisp. bor. (Leon, in valle flum. Sil: Boissier. Levier 1878). Lusit. (Coimbra: Henriquez).

7. *Woodwardia*. 1. *W. radicans*; in territ. Neap. adest etiam ad Amalfi (in convallibus humidis copiose: Lacaita).

8. *Blechnum*. 1. *B. Spicant*: Island. (var. fallax Lge). Aland. (ceterum in Fenn. deest). Mallorca (r.: Barceló). Thessal. m. Pelion (: Heldr. 1882).

9. *Scolopendrium*. 1. *S. vulgare*: Moldav. Dobrud. (rarius: Uechtr. Sint.). Bosn. Creta (: Heldreich).

10. *Asplenium*. 1. *A. marinum*; hab. etiam in Ligur. occ. (r.) ex Penzig.

2. *A. Trichomanes*: Island. (rr.). Færøa (rr.). Roman. Bulgar. Bosn. Istr. Creta.

3. *A. viride*: Gall. centr. (m. Cantal: Gatien. Heribaud 1878). Lothar. (r.). Fenn. bor. Moldav. Bosn.

4. *A. Petrarchæ*: Mallorca (barranco de Pareys: Willk.). Croat. litoral. (ad Buccari: Borbas 1883).

5. *A. lanceolatum*: Herault (in rupib. humidis pr. Andabre-Rosis: Loret); indicatur etiam in collibus Euganeis (m. Pendica pr. Padua (: Bizzozero); in Phalzia (ad Steinbach et Fischbach) et ad Trier (sequ.).

6. *A. fontanum*: Mallorca (Sierra de Soller: Marès). - Transs. ad Cystopteris regiam pertinet ex Smk. — ? *A. forezienze* Le Grand stat. 252. (Forez, Le Pertuiset dep. Loire: JHervier 1885). *A. lanceolatum* Bras.

7. *A. Adiantum nigrum*: Belg. Gall. or., bor.-or., bor.-occ. Istr. Bosn. Valach. (pr. Virciorova: Borb.). Dobrud. (ad Ciucarova: Ue.S.).

**A. Virgillii*: Orph. fl. gr. exs. 975 (e mte Malevo Laconia).

**A. Serpentina*; *A. Forsteri* Sadl. diss. inaug. (1820). *A. Lamotteanum* Herib. (1880) ex Le Grand.

8. *A. fissum*: Bosn. (GBeck). Venet. (inter Cimolais et Barcis, Tyrol. conterm.). - Bavar. hab. solum in Alpium jugo or.

9. *A. lepidum*: Hung. pr. Rév ad flum. Körös (: Freyn 1874); etiam in alio loco ibi lectum dicitur.

10. *A. Ruta muraria*: Moldav. Dobrud. Bulgar. Bosn. Istr.; - in Græc. e solo mte Parnasso (reg. abiet.: Sibth., Heldr.) citatur in Boiss. or.; - in Fenn. extra mer.-or. et mer.-occ. raro (in Kuusamo) lectum est. — *A. Brunfelsii* Heuffl. (1856).

12. *A. septentrionale*: Island. (r.) teste Bab.; - adest in Lapp. norv. (Finnm.), ubi ad lat. 70° 25' terminus speciei polaris (ex Norman); in Fenn. bor. plur. deest. Gall. hab. etiam in bor.-occ. et bor.-or.; - Sard. pr. Arizzo lectum est ex Moris; Venet. in collibus Euganeis; Valach. pr. Virciorova (: Borbás), Bulgar. (: Velen.); Dobrud. (: Ue.Sint.). *Acropteris septentrionalis* Lk.

13. *A. Seelosii*; Carinth. non nisi ad fines tyrolenses lectum est (: Ausserdorfer, Jabornegg); etiam Thuring. indicatum est, sed teste Haussknecht hoc erat *A. septentr.* in statu juvenili. *Acropteris Seelosii* Heuffl. Comment. 280.

11. *Athyrium*. 2. *A. alpestre* F.Nyl. spicil. fl. fenn. 2 (in obs.): Galic. Bavar. (Alpes, Fichtelgeb., Bayr.-Wald) Würtemb. (hoh. Katzenkopf ex Geke). Styr. (St Johann: Heimerl 1883). Bosn. (GBeck 1885). - Transs. ex Bmg. et Schur, sed a Simonk. cruce notatur. Fenn. deest exc. in Lapp. *Asplenium rheticum* Brügg. (1874).

12. *Aspidium*. 1. *A. angulare*; Dan. (ex Lange 1886) loco unico sc. Frederiksdals skov lectum est (var. *A. Braunii*: Kiærskou); locus antea allatus, Christiansö, ad *A. lobatum* (2) pertinet; Scan. (Skäråli) ad var. *A. Braunii*. Hassia (in Frankenstein). Morav. (r.). Helv. certe adest, sed paucis locis (Haslithal, Engelberg, Ponte Brolla cant. Ticino). Valach. (pr. Virciorova: Borbás). Bosn. (: Brandis ex Freyn). Monten. — *A. Braunii* (est saltem varietas): Gall. or. (dep. Vosges: Beshier). Alsat. Bavar. (Ammergau, Passau). Carinth. Alpes-Marit. (ex Ardoino).

2. *A. aculeatum*: Sard. (ex Moris). Bosn. (: Brandis ex Freyn). Bulgar. Ucrain. (ex Montresor 1882). - Helv. deest ex Gremli.

3. *A. lobatum*: Suec. occ. (Dalsland). Dan. (Kolding Jutl., Falster, Bornholm). Ross. balt., mer.-occ. Bosn. Maced. Cephalon. ins. jon. (Heldreich ex Boiss.).

4. *A. Lonchitis*: Island. Færøa (: Trevelyan). Scan. (par. Höör: Berggren 1884; Kronovall par. Fogelttofta). Bavar. Banat. (: Borbás). Bosn. Bulgar. - in Belg. locus natal. hujus speciei destructus videtur ex Crepin; loca græca dubia sunt ex Boiss. fl. or.

5. *A. Filix mas*: Island. (etiam ex Groenlund et Rostrup). Færøa (in ru-

pestribus hinc inde). Sard. adest! (ex Moris). Moldav. Dobrud. Bosn. Bulgar. Maced. m. Athos (Orphan. ex Boiss.).

*A. remotum: Siles. Hung. (:Borbás). Polypodium carthusianorum Vill. (sec. Sanio 1883).

6. *A. cristatum*: Belg. hujus speciei proventus nunc dubius (ex Crepin 1884), locis, ubi antea aderat, destructis. Helv. raro provenit (Bern, Thun etc.). Styr. pr. Cilli (:Tomaschek ex Maly). Galic. - Transs. ad speciem sequ. pertinet ex Smk.

*A. uliginosum; hab. etiam in Dania (r.).

7. *A. spinulosum*: Island. (r.). Færoa (:Rostrup). Bosn. Bulgar. Ross. mer. partim (gub. Cherson) deest.

8. *A. æmulum* (Magn. fl. sel. exs. 1584); certe adest in Gall. bor.-occ. (circa Cherbourg sat copiosum et in Bretagne a Lloyd lectum: Le Jolis in litt. 1884).

9. *A. rigidum*: Bosn. (GBeck 1885). - Transs. ex Bmg., sed in ejus herbario deest et a Simonkai cruce notatur. — *A. nevadense*; forse ad speciem sequ. propius accedit. — *A. nivale* Bory, ex alpinis Taygeti, vix ab alio lectum est.

10. *A. pallidum*: Mallorca (Bourg. exs. balear. 2818). Croat. (m. Vellebit etc.; Pichler ex Kerner). Rhodus (:Bourg. ex Boiss.).

11. *A. Oreopteris*: Gall. bor.-occ. Alpes-Marit. (reg. mont., r.). *A. montanum* Aschn (non Sw.).

12. *A. Thelypteris*: Ross. mer.-occ. Moldav. Dobrud. Bulgar. Bosn.

13. *Cystopteris*. 1. *C. montana*: Fenn. bor. (Kuusamo, Karel. keret.); in Dan. ultimis annis non lecta est ex Lge (1886). Bavar. (Alpes). Venet. alp. (haud raro: Penzig).

2. *C. sudetica*; adest solum in Sudetis orientalibus (exc. montib. Beskiden), sed per Carpatos (a mte Tatra) haud raro obviam venit (:Fiek). Polon. (:Krupa 1882).

3. *C. regia*: Bavar. (Alpes). Transs. Bosn. Creta (Heldr. ex Boiss.).

4. *C. fragilis*: Ins. Jan-Mayen (Dr Fischer 1883). Spitzberg. Nov.-Seml. (Woodsia ilvens. Baer ex Trautv.). Waigatsch (:Aagaard 1887 ex ABlytt). Roman. Bulgar. Bosn. - Græc. hab. in solo mte Malevo et deest in Creta; ex Boiss. fl. or.

15. *Polypodium*. 1. *P. vulgare*; — *P. serratum* Kern. *P. vulgare* var. *serratum* W. (Tyrol. etc.).

16. *Phegopteris*. 1. *Ph. polypodioides*: Island. Færoa. Gall. bor.-occ. Bulgar. Bosn. Ross. mer.-occ.

2. *Ph. Dryopteris*: Island. Færoa (ins. Strömö: Rostrup). Moldav. Bulgar. Maced. m. Peristeri (Orph. ex Boiss.). Ross. mer.

3. *Ph. calcarea*: Island. (Steenstrup ex Groenl.). Fenn. mer.-or. (Carel. oneg.: Simming 1863). Bosn.

17. *Ceterach*. 1. *C. officinarum*: Boruss. occ. (sed ad Halle et in Hercyn. nunc deest ex Gecke). Bavar. Bohem. (pr. Raudnitz, rr., ex Polak 1874). Moldav. Bulgar. Bosn. Istr.

18. *Gymnogramme*. 1. *G. leptophylla*: Alpes-Marit. (Mentone; Biot, Vallauris, Cannes; vall. Esteron etc.; ex Ardoino). Venet. colles Euganei (mte Ricco) pr. Paduam (:Bizzozzo 1879).

19. *Woodsia*. 1. *W. ilvensis*: Island. Helv. (Alpes et in subalp., r.). Bavar. (Rhöngebiet, r.). Schwarzwald (Hirschensprung in Höllenthal). Pomeran. (in muro campestri ad Rummelsburg); ex Gecke. - Morav. rr. (solum pr. Iglau certe adest); in Ross. mer. partim deest.

2. *W. hyperborea*: Island. (Groenl., Strömf.). Fenn. bor. (Kuusamo, Ostrob. bor.), mer.-or. (Carel.). - in Sudetis rariss. est (Kl. Schnee-grube, Gesenke).

3. *W. glabella*: Spitzberg (Th.Fr. 1868). Lapp. Iulens., kemens. Fenn. bor. (Kuusamo: fratr. Sahlberg 1870); indicatur etiam in Jemtia (Frösön: Thed.).

CXLIII (CXLII). HYMENOPHYLLÆ.

1. *Trichomanes*. 1. *T. radicans*; in loco gallico (Rhune, B.-Pyren.) detectum est circa a. 1878 et recognitum 1880 a Boullu, qui plantam ibi ad alt. 220 metr. s. m. crescere observavit (cfr. etiam Bonnet in diario Le Natural. 1880); sec. Petit (1881) hab. ad St-Jean-de-Luz in Pyren. occ.

2. *Hymenophyllum*. 1. *H. tunbridgense*: Germ. (bor.-occ.) prov. rhen. (Bollendorf pr. Trier ex Geke); in Luxemb. relectum a Koltz 1873. sed Belg. nuper non lectum est teste Crepin (1884); - locus carniol. (Friul. bor.) Artegna jam 1870 a Henflero erroneus declarabatur et etiam locus croaticus dubius videtur.

2. *H. unilaterale*: Norv. mer. (in rupibus ad Einingevik ins. Tysnesöen copiosiss. a Murbeck lectum 1884). Gall. bor.-occ. (Finist., Cherbourg).

CXLIV (CXLIII). OSMUNDACEÆ.

1. *Osmunda*. 1. *O. regalis*; Helv. hab. solum in cant. Ticino (ex Gremli); - in Transs. post Baumgarten non lecta est (desideratur in ejus herbario) sec. Smk.

CXLV (CXLIV). OPHIOGLOSSÆ.

1. *Botrychium*. 1. *B. virginianum*: Fenn. mer.-or. (Carel.) et mer.-occ. (Aland.), in Fenn. reliqua non lectum. Boruss. or. (Zimnawoda etc.), occ. (Schwedenschanze ad Eichwald circuli Neidenburg); ex Geke. - Bavar. pr. Berchtesgaden, a dom. Rauschenberger detectum (ex Juratzka 1873; sec. Prantl 1884 locus bavar. est: Steinberg ad Ramsau). Austr.-Super. (m. Pyhrn pr. Admont; Prein inter prov. Austr. et Styriam); - locus rhaeticus (cant. Graub.) situs est milliar. pauca ab aquis taraspiensibus (: Ascherson).

2. *B. ternatum*; Dan. etiam in Jutland., Sjælland. et Bornholm lectum est (in Suec. med. deest). Pomeran. Marchia. Morav. (r.). Bavar. (pr. Regensburg). Erzgebirge. - Ross. mer. partim (in gub. Cherson) deest.

3. *B. simplex*: Tyrol. mer. mont. (Windisch-Matrei etc.); - in Megapol. (Mecklenb.) non nisi ad Rostock lectum videtur; in Boruss. etiam ad Memel et Danzig; ad Engelberg (ubi?) a Zabel lectum est ex Geke; in Siles. (ex Fiek) duo tantum specim. reperta sunt (pr. Nied. Lindewiese in Gesenke).

4. *B. lanceolatum*: Island. bor., ad Mödruvellir (Davidsson ex Rostrup 1888). Fenn. hab. etiam in centr., or. (Carel. oneg.) et mer.-occ. (Aboa). Helv. mer. (Engadin ad Pontresina: hb. Boiss. teste Milde).

5. *B. matricariæfolium*: Dan. (Bornholm, Jutland etc.); Fenn. non nisi in centr. (r.) et mer.-occ. adest. Ross. mer.-occ. Siles. Morav. (r.). Lothar. (r.). Sabaud. (Chamouni ex Gremli); Helv. non nisi in mer. (Bernhardin) lectum est (ex Grml.).

6. *B. boreale*: Fenn. mer.-occ. (Nylandia, Aboa). — ? *B. crassinervium* Rupr. (seq.).

7. *B. crassinervium*; forse potius forma speciei præced. (cfr. Krok in Htn. handb. ed. XII, 19).

8. *B. Lunaria*: Island. Færoa. Dan. Fenn. Moldav. Bulgar.

2. *Ophioglossum*. 1. *O. vulgatum*: Island. (ad Myvatn, Reykjanes in arenosis ubi calor 27° C.: Thoroddsen). Dan. Fenn. etiam occ. (Ostrob. mer.), mer.-or. (Carel.).

2. *O. lusitanicum*: Menorca Balear. (Rodriguez); - Græc. non citatur a Boiss. (fl. or.).

CXLVI (CXLV). MARSILIACEÆ.

1. *Marsilia*. 1. *M. quadrifolia*: Ital. neap. (lacus Nicola: Pasq.).

2. *M. pubescens*; — *M. strigosa* (W. sp. V. 539); in propriam speciem restituenda suadente Boissier. (fl. or.).

2. *Pilularia*. 1. *P. globulifera*: Gall. or. (Côte d'Or, r.). Lothar. (r.). Alsat. Ital. bor. etiam pr. Brescia et Verona (: Arcangeli 1884). Siles. (sed Morav. nunc deest ex Oborny). Dobrud. (: Uechtr.Sinten.).

2. *P. minuta*: Sicil. pr. Trapani (Nicotra 1888).

CXLVII (CXLVI). SALVINIAEÆ.

1. *Salvinia*. 1. *S. natans*: Batav. (Zwolle: van Tuinen 1870). Ital. mer. (Lago di Fondi etc.: Arcang. 1884). Siles. (sed Morav. exclud. sec. Oborny). Bulgar. (ad Kebedze: Bornm.); - in Transs. etiam recentius lecta est (: Unverricht).

Obs. *Azolla caroliniana* W. (Magn. fl. sel. exs. 162) nunc aliquot locis Gall. occ. inquil. est, primum ex horto bot. Burdigal. (Bordeaux) elapsa. *A. filiculoides* Lam. exstat in Magn. fl. sel. exs. 749 (e Gironde) et etiam pr. Cherbourg introductam lecta (: de la Chapelle). Comment. 281.

CXLVIII (CXLVII). ISOËTÆÆ.

1. *Isoëtes*. 1. *I. lacustris* (*I. macrospora* Dur.): Ins. Færøer (Sandö, ubi a Trevelyan primum lecta est). Shetland. (Beeby 1887). — *I. Morei*; detecta (1872) a cl. AGMore in Upper Lake Bray (co. Wicklow) et descripta et delineata a DMoore in Journ. of bot. 1878; var. (?) memorabilis, a typo speciei habitū valde recedens.

2. *I. echinospora*: Holsat. (pr. Lockstedt: Prahl). Boruss. circul. Neustadt (pr. Wahlendorf et in Grabowkesee: Caspary; Wooksee et Karpionkisee ex Gecke). Voges. (lac de Gerardmer: Caspary). Helv. mer. (cant. Ticino, inter Locarno et Magadino).

3. *I. velata* (Bill. exs. 1351): Menorca Balear. (: Rodrig.). Gall. dep. Loire-et-Cher (: Martin nom. *I. tenuissima*; ex Franchet in bull. soc. bot. 1884). Ital. med. (Selva di Nettuno in agro romano: Pirotta 1886). Synon. *I. setacea* Bert. ad *I. Malinvern.* (10) pertinet. — *I. adspersa* G.G. non ABr. (ex Franchet l. c.).

6. *I. Boryana*; hæc species in dep. d. Landes plur. locis lecta est, sed locus Casau ad dep. Gironde pertinet; inter Aquaticas Submersas citatur ab autopta Motelay.

6. *a.* *I. Heldreichii* v. Wettstein in act. soc. z.-b. vind. 1886. 239. Thessal. in palude pr. Palæokortion submersa: Heldreich 1885.

7. *I. tenuissima*: Gall. dep. Loire-et-Cher pr. Lhoreux ex hb. Motelay (sec. act. soc. linn. Bord. 1882); etiam hæc species statione gaudet submersa et inter Aquaticas recensenda est.

8. *I. capillacea* (Bill. exs. 1352); Gallopr. etiam pr. Saint-Raphaël dep. Var (: Schoenefeld ex hb. Motelay); ad Frejus a Perreymond detecta est. — *I. Perreymondi* Bory (1844).

9. *I. setacea*: Gall. bor. (Manche, Ariège) ex hb. Motelay sec. act. soc. linn. Bord. 1882. Græc. bor. in uliginosis demissiorib. m. Pindi. ad Agrapha, olim Dolopia (Heldr. hb. norm. 899). - Caprar. (et Cors.?) ad *I. hystricem* (12) pertinet.

10. *I. Malinerviana*; semper submersa describitur et igitur ad Aquaticas pertineat.

11. *I. Duriei*: Menorca Balear. (: Rodriguez). Romæ, in mte Testaccio (dom. Canepa sec. Arcangeli 1884); etiam in Monte Cave agri romani lecta est (sec. Pirotta in malpigh. 1886). Ins. Lipari (: Lojaccono 1877).

12. *I. hystrix*: Gall. occ. etiam in ins. Oya = Ile d'Yeu (: Llyod). Ital. med., ubi in Selva di Nettuno agri romani a Warion detecta est (1866) et relecta a Pirotta (1886); cl. Canepa (1880—2) hanc plantam invenit in collibus Romæ proximis, immo (1883) intra muros urbis in s. d. "monte" Testaccio. — *I. sicula* (Sicil., Sard. etc.). *I. pseudohystrix* Genn. in litt. (ex Aschn 1884). *Cephaloceron gymnocarpon* Genn. 1862. *C. pseudohystrix* Genn. 1865.

CXLIX (CXLVIII). LYCOPODIACEÆ.

1. *Lycopodium*. 1. *L. complanatum*: Batav. (Ankersmit et Oudemans 1880). Angl. adest ad Exmoor Sommersetsh. (rev. Lawson ex Baker 1885). Moldav. - Helv. (ex Grml.) cum dubio citetur. *L. anceps* Wallr.

**L. Chamæcyparissus*: Suec. bor. (rr.). Lapp. torn. (ad Karesuando), fenn. Fenn. mer.-or. (Carel. oneg., Isthm. carel.). Siles. Bohem. et Silva boh. (Böhmerwald) ex GBeck (1878). Bavar. - Helv. (ex Grml.) non nisi in cant. Ticino adest. *L. complanatum* Wallr.

2. *L. alpinum*: Island. Færoa (Feilberg et Rostrup). Bavar. hab. etiam in jugo mont. Bayr.-Wald et (ex Geke) adest etiam in m. Erzgebirge (ad Gottesgab). - Belg. (ubi in Ardennis indicat.) nuper non lectum est.

3. *L. annotinum*: Island. (r.). Germ. (in Cons. omissa est). Ital. mer. (Calabr., aliquot locis: Macchiati ex Arcangeli 1884).

4. *L. clavatum*: Roman. Bosn.

5. *L. inundatum*: Fenn. plur. (exc. impr. Lapp.). Lothar. Ross. mer.-occ.

6. *L. Selago*: Island. Spitzb. Ross. arct. Ins. Færöer. Gall. bor.-occ. (in Normand. plurib. locis indicatur: Morière); in territor. "floræ paris." lectum est 1877 a cl. Bonnet sc. ad St-Cyr pr. Versailles (jam 1859 pr. Villers-Cotterets lectum dicitur a Marcilly). Ital. mer. (aliquot locis Calabr.: Macchiati).

2. *Selaginella*. 1. *S. helvetica*: Germ. prov. rhen. in Hohe Veen inter Eupen et Malmedy (prope fines belgic.), ad alt. 2000' s. m. (detecta 1869 a Chalon ex Thielens); indicatur etiam (: Durand 1881) ad Goë territ. Liège (Belg.), sed ibi probab. introducta. Bavar. (extra Alpes) ad München, Augsburg, Freising, Landshut etc. lecta est.

2. *S. denticulata*; hab. etiam in ins. Iælear.

3. *S. spinulosa*: Island. (freq.). Færoa (vulg.). Fenn. plur. Ross. balt. (Curon.: præpos. Kawall). Polon. (: Krupa 1882). Moldav. (alp. Bucieciu). Bavar. (Alpes et sporadicæ ad München, Augsburg). Erzgeb. (Fichtelberg) ex Geke.

CL (CXLIX). CHARACEÆ.

1. *Chara*. 1. *Ch. aspera*: Hisp. mer. prov. malacit. (: Hj.Nilsson teste Nordst.). Sard. (ex Moris). Hung. (: Borbás).

3. *Ch. connivens*: Gall. bor.-occ. (pr. Pirou dep. Manche: Godey ex Morière); indicatur etiam in Austr.-Infer. (Laa a. d. Thaya: Ritter v. Reuss fil. 1873).

6. *Ch. fragilis*; *Ch. pulchella* Wallr.

7. *Ch. hispida*: Hisp. (Ciudad Real; Hj.Nilsson teste Nordst.). Sard. (ex Moris).

9. *Ch. vulgaris*; hab. etiam in Bosn. (GBeck 1885).

**C. gymnophylla*: Hisp. mer. (prov. Gran., Malaga: Hj.Nilsson teste Nordst.).

12. *Ch. contraria*: Angl. etiam in Hampsh. (: Groves 1881). Hisp. mer. (prov. Valenc., Malaga, Cadiz: Hj.Nilsson teste Nordst.).

16. *Ch. intermedia*: Angl. (Norfolk, pr. Potter Heigham a HGroves detecta 1884). Gall. bor.-occ. (Norm.). Hisp. mer. (prov. Malaga, Cadiz: Hj.Nilsson teste Nordst.). *Ch. papillosa* Kütz. (in Flora 1834) est nomen antiquius. — *Ch. aculeolata* potius ad speciem præc. (*Ch. polyacantha*) pertineat; vid. "Notes on the British Characeæ by H. et JGroves" in journ. of bot. 1885. sep. 1—4 (*).

17. *Ch. baltica*: Ross. balt. (: Winkler 1876). Angl. (Cornw., Dorset: H et JGroves 1883).

19. *Ch. imperfecta*: Hisp. mer. (prov. Granada: Hj.Nilsson teste Nordst.).

20. *Ch. Braunii*: Angl. bor., ad Reddish pr. Manchester, in canalibus aquæ calidæ lecta (cum Najade graminea) a Ch. Bailey (1883) et communicata cum cl. H. et JGroves, qui eam in journ. of bot. 1884 descripserunt et illustraverunt.

2. **Lychnothamnus.** 1. *L. stelliger*: Angl. etiam in Surrey lectus est. - Belg. nuper non repertus ex Crepin. *Nitella stelligera* Coss. Germ. (1845). — *Chara ulvoides* Bert. in Amici descr. char. (1827).

3. **Nitella.** 1. *N. syncarpa*: Gall. bor.-occ.

2. *N. capitata*; in Angl. detecta est a Fryer (1885) pr. Sutton (Cambridgesh.); ibi antea spec. inseq. (*N. opaca*) pro hac sumta erat (ex H. et J. Groves in Journ. of bot. 1886).

3. *N. opaca*: Ins. Færöer (Rostrup). Sard.(?).

4. *N. flexilis*: Ross. balt. (Winkler 1876).

11. *N. batrachosperma*: Ins. Hebrides (isle of Harris: Duncan 1889).

4. **Tolypella.** 1. *T. intricata*: Ross. balt. (Winkler 1876).

2. *T. prolifera*; in Normand. solum pr. Yvetot dep. Manche indicatur (: Dr. Lebel).

4. *T. glomerata*: Hisp. mer. (prov. Valencia: Hj. Nilsson teste Nordst.).

4. *a.* *T. hispanica* Nordst. in Allen char. amer. I. 51. - Hisp. mer. (prov. Malaga: Hj. Nilsson teste Nordst.).

CONSPECTUS FLORÆ EUROPÆÆ SUPPLEMENTUM II.

COMMENTARIUS.

1. *Clematis balearica*; etiam sec. auctores, qui nuper de flora balearica scripsere — Barcelò y Combis et Marès-Vigineix — est solum varietas *C. cirrhosæ*; *C. semitriloba* varietatem intermediam, in Balearibus rariorem, sistit (cfr. Marès et Vigin. catal. rais. 2).
2. *Pulsatilla apiifolia*; *P. (Anem.) grandiflora* Hpe est = planta gynodynama; *P. (Anem.) alpina* Hpe est = planta androdynama (florib. minoribus). — *Anemone sulphurea* L.
3. *Anemone Pavoniana*; in regione alpina montium Picos de Europa, loco las Gramas dicto, altit. circa 7000', a Leresche et Levier Jul. 1878 primum lecta est; 1879 cum *Daphne Philippi*, nive nondum relicta, florebat. Feliciter sic resurrexit eximia hæc species, quæ tam diu latuit et e tribus tantum speciminibus (loco natali et collectore non indicatis) herbarii Pavoniani, nunc Boissieri, cognita erat.
4. *Hepatica angulosa*; cl. Kanitz in diario Magyar Növénytani etc. 1883. 146—9 historiam hujus speciei eximie plene exposuit, additis (l. c. 150—1) quæ in litteris, Nov. 1883 datis, scripsit nunc beat. Roeper de planta herbarii Lamarckiani, tunc Rostockiæ servati. Lamarekius speciem e planta in horto pharmacopol. Parisiis, originis incertæ, cultâ et dein destructâ descripsit (Encycl. meth. 1783) nomine *Anemones angulosæ*, sed in herbario ejus, sub hoc nomine, adest flos (cum pedunculo) *Hepaticæ trilobæ* et folium (mutilatum) *Cortusæ Matthioli*!
5. *Thalictrum macrocarpum*; hæc species lateri boreali Pyrenæorum priva videtur (solo calcareo): Basses-Pyren., vall. Ossan; Bearn, vall. Aspe; Hautes-Pyren., vall. Azun, circa Eaux-Bonnes plur. locis; etiam prope Esquierry (Haute-Garonne) semel lecta dicitur (: Doassan).
6. *T. flavum*; ad hanc speciem pertinet etiam *T. pauperculum* Herm. in Lam. DC. fl. fr. (Strassb.) ex Lecoyer, qui specimen authenticum hb. Cand. examinavit.
7. *T. angustifolium*; — *T. princeps* Dmrt. (Campine) pertinet ad *T. flavum*, varietati *T. nigricans* Jacq. proxime accedens (ex Lecoyer). — *T. auriculatum* Bess.; specimina authent. in Rchb. exc. citata, nec non ea quæ Lecoyer vidit, sistunt varietatem *T. simplicis*.
8. *T. Grenieri*; *T. nutans* Dsf. descriptum est e planta in Horto Paris. culta, origine non indicata, sed ex albis genevensibus vel delphinensibus ortam dicta.
9. *Ficaria calthæfolia*; in multis adsit sed cum vulgatori *F. verna* p. d. sæpe commutata; sic pluribus locis territorii Vindobon., ubi 5—10 dies prius quam illa floret (: Wiesbaur); ad Fiume Croat. communis est (: Untchj).
10. *Ranunculus chærophyllus*; observ. Freyn (1876) e synonymis Linnæi exclud. sunt illa Column. cephr. 312 et Barrel. ic. 581, ad *R. millefoliatum* et *R. flabellatum* spectantia.
11. *R. Breyninus* Cr. (1769); monente Kerner (sched. ad exs. 99) male cum *R. nemoroso* DC. commutatur, nam est = *R. Hornschuchii* Hpe ap. St. (1826) = *R. Villarsii* K., Rchb., G.G. (non DC.) = *R. Grenierianus* Jord. = *R. Pseudo-Villarsii* Schur. - Nomen tenet ab alpe Breyn Austr. (hodie Raxalpe), unde

- Crantzius plantam suam habuit. Area geogr.: Alpes, Carpati or., Karstia, Istria (reg. alp., subalp.).
12. *R. Tommasinii*; suspicionem meam hunc ad *R. neapolitanum* (61) pertinere, cl. Freyn (in litt. 1878) confirmavit, testantibus ab eo comparatis tam specimen authent. Tenoreanum quam icon et descriptio primaria Tenorii, sed, ut nunc edoctus sum, cl. Janka jam 1857 hanc plantam ad *R. neapolitanum* Ten. (*R. velutinus* K.) retulit et 1860 probavit plantam Tommasinii ex Istria (Pola) cum ea identicam esse.
 13. *R. palustris*: indicatur etiam Istr., ubi interdum pro præced. (*R. Tommasinii*) sumtus dicitur; alii ibi rarissimum esse et loca ejus indicata plurima ad *R. velutinum* K. (cfr. præc.) spectare perhibent; sec. Freyn (litt. 1878) vera species Smithii, quæ descripta e specimine Tourn. ex Oriente, est planta omnino orientalis et ab occidentali diversa. — *R. heucherifolius*; in Sicil. vulgatus est, sed forma, quæ *R. pratensis* Pr., rara (Palermo etc.); formæ minores (regionum altior.), caule basi incrassato, a Preslio pro *R. bulboso* sumtæ sunt (: Strobl).
 14. *R. neapolitanus*; — *R. Balbisii*; ex Freyn (litt. 1878) species eximia est; habitus fere *R. chii*, unde nomen Balbisianum (*R. cymbalariaefolius*) sat characteristicum.
 15. *Batrachium paucistamineum*; observ. cl. Freyn, qui in Kern. sched. ad exs. 95 plantam bohemicam (vivam) exactissime descripsit, hæc inter Aquatiles p. d. (stigmatæ papilloso præditas) bonam speciem constituit.
 16. *B. carinatum*; sec. Freyn (l. c.) etiam hoc est e grege Aquatiliū p. d. (stigmatæ papilloso convenientium), nec, ut credidit Schur, cum *B. Baudoti* comparandum; idem auctor laudatus l. c. hanc plantam, a plurimis neglectam, descriptione (e vivo) elaboratissima et observationibus biologicis illustravit.
 17. *B. intermedium* (*Ranunculus intermedius* Knaf); observ. Townsend (1883) planta Knafiana sistit formam homophyllum, quare nomen *B. micranthi* potius forse adhibendum est.
 18. *Helleborus niger*; — *H. altifolius* Kern. sched. ad exs. a. 1883. *H. niger* var. *altifol.* Hayne 1829, Rehb. 1832. *H. niger* var. *macranth.* Freyn in Flora 1881. *H. niger* Pollini (1822). Lomb., Venet., Tyrol. mer. alp. calcar., ibique *H. nigrum* legitimum alpiū calcar. borealiū substituit. Idem cl. Kerner characteres certos ad unum ab altero distinguendum observavit in specimenibus, quæ a seminibus, e locis natalibus provenientia, in uno eodemque loco educavit.
 19. *Caltha palustris*; in Sicil. a Presl indicata est e commutatione cum *Ficaria grandiflora*, teste Strobl.
 20. *Aquilegia atrata* (*A. nigricans* Rehb.); cl. Simkovicz, ex inspectione herbarii Baumgarten. et e loco (in alpib. rodnens.) a Baumgarten citato, probavit *A. nigricantem* ej. veram et ab *A. nigricante* Rehb. (in Transs. non lecta) distinctam esse speciem, cui vero auctor (Baumgarten) e prava observatione capsulas modo tres tribuit; nomen dedit ob colorem obscurum caulis.
 21. *Pæonia officinalis*; — *P. pubens*; ex observ. cl. Kerner (sched. ad exs. 90) *P. pubens* Sims descripta est e planta in Horto Paris. culta (patriâ ignotâ) dum planta Reichenbachiana per Alpes meridionales (et per totam Karstiam), a convallibus usque ad regionem alpinam, distributa est.
 22. *Nymphæa thermalis*; hujus locus natalis p. d. est in thermis et in rivulo calido Peeze dicto prope Magnovaradinum, germ. Grosswardein (Hung. or.). Kern. exs. austr.-hung. 72.
 23. *Nuphar sericeum*; est solum varietas *N. lutei*, ut Caspary monstravit et Borbás (bot. centralbl. 1881) probavit; locus classicus est prope Waizen (Hung.), sed etiam ad Pesthinum et alibi occurrit.

24. *Fumaria muralis*; hæc et duæ proxime præcedentes (*F. Gussonei* et *F. Boræi*) forse non nisi "formæ" sunt unius speciei, sed — *F. apiculata* ob fructus punctatos a *F. murali* distinguenda est.
25. *Crambe reniformis*; planta hispanica sistit varietatem hispanica Lge, quæ imprimis floribus majoribus, foliis vero minoribus, lobo terminali rotundato, diversa est a mauritanica, cui foliorum lobus terminalis basi excisus est, unde nomen Fontanesii.
26. *Arabis petræa* (*A. hispida* Mygind in *L. syst. veg. ed. XIII. 1774. L. f. suppl. 1781*); cl. Kerner ad hanc speciem observat (sched. ad exs.): *A. petræa* Lam. probabiliter est = *A. arenosa* Sep., sed nullo modo ad hanc *A. hispida* pertinere potest. Huic proxima est *A. petræa* L. (sub *Cardamine*), quæ differt foliis radicalibus repandis (nec lyratis), glaberrimis, basi sensim attenuatis, siliquis brevioribus; hab. in Austr., unde a Mygind ad Linnæum missa est. Synon. *A. hispida* (ex Kern.) hæc sunt: *A. Thaliana* Cr. (non L.). *A. Crantziana* Ehrh. (1790). *A. petræa* M.K. *Cardamine petræa* Jacq. (non L.).
27. *Cardamine pratensis*; cl. Kerner de hac specie scripsit (sched. ad exs.): *C. pratensis* typica (suec.) est planta Europæ borealis, sed in occidentali et media insuper adest *C. palustris* Peterm. 1849 (*C. pratensis* Sm. engl. bot.), quæ demum (sic jam in Austr.-Infer.: *C. pratensis grandiflora* Neilr.) sola provenit et typicam substituit. — *C. Hayneana* Welw. in Rehb. exc. (: *C. pratensis* γ). *C. pratensis parviflora* Neilr. fl. Wien. (Austr. p. d., Morav.).
28. *C. rivularis*; Carpatorum et Alpium orientalium incola, deest in Alpibus occidentilibus sicut aliæ quædam plantæ memorabiles: *Saxifraga hieracifolia*, *Laserpitium alpinum*, *Anthemis styriaca*, *Scorzonera rosea*, *Gentiana frigida*; in alpinis Transs. detecta est a Schur; in Stubalpe Styriæ legit Dominicus. — Kern. sched. ad exs. fl. austr.-hung.
29. *C. longirostris*; etiam sec. b. Grisebach bona species est, inter *C. maritimam* et *C. græcam* media, sed cl. Borbás (1885) credit eam ortam esse ex heterocarpia *C. græcæ*, quæ species interdum in uno eodemque specimine et stylum late alatum et stylum cum apice siliquæ (seminibus summis tabescentibus) angustatum præbet.
30. *Erysimum lanceolatum*; *E. Cheiranthus* P. (1807). *Erysimum silvestre* Kern. (1882). *Cheiranthus silvestris* Crantz (1762 et 1769). *Leucojum silvestre* Clus. (1583)!, quod *Cheiranthus erysimoides* L. (sp. ed. I.) ex ipso. - Kern. sched. ad exs.
31. *E. pumilum* (Gaud. 1829); *Cheiranthus pumilus* Murith guid. val. (1810); cl. Kerner (sched. ad exs.) de hoc observat: hæc species sistit *Leucojum angustifolium alpinum* flore sulphureo All. rar. ped. st. t. VIII. fig. 2 (1755), quem auctorem Linnæus (mant. 1767) ad *Cheiranth. alpinum* suum citat, sed diagnosis etc. aliam speciem (forse *E. helveticum*) spectant.
32. *E. odoratum*; *E. pannonicum* Crantz (1762 et 1769). *E. hieracifolium* Jacq. 1773 (non L.). *E. odoratum* Ehrh. (1792). *E. strictum* DC. 1821 (non fl. wett.). *E. cheirifolium* Wallr. (1822). — Kern. sched. ad exs. fl. austr.-hung.
33. *Brassica balearica*; Cambessedes (1827) hanc speciem bene exposuit, et nuper Burnat et Barbey (notes balear. 14—15) et hanc et B. Robertsonam plenius describere, additis observationibus de speciebus proximis.
34. *B. oleracea*; cum de vera origine Brassicæ oleracæ cultæ non omnes conveniunt, commemorare liceat quod i. a. Metzger (syst. beschr. cult. Kohlart. 1833) et H. Hoffmann (vid. bot. zeit. 1878) experimentis probaverunt eam derivari a planta, quæ suffrutescens et spontanea crescit in litore marino (locis citatis).
35. *B. Rapa* var. *Briggsii*; notabilis sane varietas est, in Herefordshire, inter olera, vices gerens Sinapeos arvensis, quæ ibi rara est vel deficit; omnino indigena, magnâ copiâ apparet cum excoluntur pascua, quæ per longam annorum seriem jacuere intacta; etiam in Wales multum adest (: A. Ley).

36. *Cochleria Wunderlichii*; indicatur in gub. Kasan et prope Sarepta, ubi tamen, sec. Becker, non nisi subsponsanea in hortis adest et probabiliter ab *Armoracia* culta orta est.
37. *Draba Hoppeana* Rehb. ap. Mössl. (1828). *D. glacialis* Hpe (1823) non Adams. *D. Zahlbruckneri* Host (1831). — *D. Hoppeana* Rudolph. ap. Rehb. (1832) probab. hybrida est a *D. carinthiaca* (sub qua in Consp. allata) et *D. fladnizensi*. — Kern. sched. ad exs.
38. *Draba Beckeri* Kern. (1883). *D. Aizoon* Saut. umgeb. Wiens (1826) non Whlhb. carp. (1814). *D. aizoides* Neilr. fl. wien (non L.). Austr. p. d., in montibus calcareis alpem Schneeberg septentrionem versus obvallantibus, ubi vera est patria *Pini nigricantis* Host (300—1300 metr. s. m.), unde a topographiae hujus territorii illustratore, Becker, nomen habet. Observat cl. auctor (sched. ad. exs. 1883) de specierum sectionis *Aizopsis* distributione geographica, quod multae earum valde similes et proximae sed culturam constantes, per alpes et montes Europae mediae et australis, nec non Asiae Minoris, dispersae sunt, singulae territoriorum proprium et bene limitatum occupantes, ubi saepius solae sectionem suam representant. Harum specierum pars minor siliculis turgidis valvis duris gaudet: *D. longirostra*, armata, turgida etc.; pars major siliculas habet compressas et tenuivalves. Species hujus gregis europaeae sunt vel Vestitae (indumento caulis, pedicellorum silicularumque denso, griseo): *D. hispanica*, *Loiselenrii* etc.) vel Nudae (indumentum nullum, folia pilis rigidis ciliata). Hae ultimae etiam in duas series abeunt: 1. Tenerae, caule tenui, racemo angusto paupero, siliculis arrectis (*D. Zahlbruckneri* = *Hoppeana*, compacta, *D. affinis* Host, *aizoides* etc.); 2. Robustae, caule validiore, racemo latiori, siliculis numerosis patulis (*D. Aizoon*, *saxigena*, *elongata*, *Beckeri* etc.). *Drabae Beckeri* ideo proximae sunt: *D. Aizoon* Whlhb. (Hung., Transs., Banat., Serb.), *D. elongata* Host (Dalm.) et quam maxime *D. saxigena* Jord. diagn. (1864) = *D. elongata* Hpe (1832) non Host (1831) = *D. Aizoon* Hpe (1823) non Whlhb. (1814) = *D. ciliaris* Schrk (1789) non L. (1767) = *D. montana* Kern (1883) = *D. aizoides* var. *montana* K. (1838). Haec ultima e monte Salève per Jurassum distributa est, sed praecipue inhabitat montes calcareos ad Danubium Bavariae.
39. *D. Dedeana* (in Suppl. numerus Comment. ad subspeciem err. translatus est); haec species primum lecta est prope Pampelona a botanico quodam Dedé et conservata erat in hb. Fauché, sub cujus nomine Boissier eam descripsit, sed ex sicco ei flores (qui in vivo albi) luteos tribuit, unde inter *Aizopsis* dein recepta est. Postea in pluribus locis Hisp. bor. lecta est a Boissier, Reuter, Leresche et Levier; vid. *Ler. Lev. deux excurs.* 1880. 14. 186 (*).
40. *Schievereckia podolica*; *Alyssum podolicum* Bess. crem. (1816). *Moenchia podolica* Bess. volh. (1822). Nomen generis rectius scribitur *Schiwereckia*.
41. *Alyssum cuneifolium*; cl. Lacaita (litt. 1884) bene monuit hoc et *A. diffusum* (10 *) saepe valde commutata esse, et observationes suas cum notis characteristicis amborum benigne mihi tradidit: *A. cuneifolium* Ten. habet siliculas maturas dense corymbosas et caules complures, debiles (interdum filiformes) et flexuosos; identicum videtur cum *A. flexicaule* Jord. (sec. specimen a mte Ventoux et mt Ardonnex); *A. cuneifolium* G.G., Willk. Lge (Pyren.) valde dissimile est et ab *A. diffuso* vix differt.
42. *A. diffusum*; de hoc cl. Lacaita observat: *A. diffusum* Ten. habet siliculas maturas racemosas, caulem durum, basi sublignosum, et non nisi formam *A. montani* sistit. *A. cuneifolium* e Pyrenaeis est valde proximum *A. diffuso*, nisi omnino idem. — Sed quod cl. Lacaita de his duobus *Alyssis* ulterius mihi scripsit, lingua sua propria referre liceat: "These two plants have been much confused and usually transposed. Bertoloni (Fl. Ital. VI. 488—9) places them correctly; diffusum as a mere variety of montanum, cuneifolium as a separate species allied to Wulfenianum. The confusion made by other botanists probably arose from Tenore's own carelessness, who sent (e. g. to herb. Gay, now at Kew) one identical plant under both names, and then

- again both plants under the same name. You seem to have relied upon Huet's specimens, which are wrongly named. Huet no 265 is not *diffusum* but *cuneifolium*; his no 267 is not *cuneifolium* but rather a curious variety of *montanum*. The same plant is sent from the same place by Mr Groves under the name of *A. montanum*. The plants in the Abruzzi are quite distinct. The plant gathered by Mr Leresche 21 Aug. 1856 is *cuneifolium* not *diffusum*."
43. *A. ovirense*; sec. Kerner est bona et ab *A. Wulfeniano* bene (vegetatione, foliis etc.) distincta species; laudatus auctor historiam utriusque more suo solito, critice et concinne exposuit (l. c. pag. 196—9). *A. alpestre* Wulf. ap. Jacq. (1790) non L. (1767). *A. Wulfenianum* Rchb. ic. germ., exc. p. p.; K. p. p. (non Bernh.).
 44. *Biscutella sempervirens*; sec. Boissier et Colmeiro est varietas (glacialis) *B. laxæ* (6.b); hab. in Valenc. (Lag.), Extrem. (Lag.), Bætica (S. Nevada, S. de Maria, altit. 6000—10000).
 45. *Thlaspi Kernerii* Hut. in oe. bot. zeit. 1874; T. alpino Cr. proximum, sed habitu et innovatione ad *T. sylvium* etc. vergit; detectum a cl. Huter in monte Raut ditionis uticensis Venetiæ, Tyrol. mer.-occ. conterminæ (ad 1800 metr. s. m.); dein in Carniolæ occ. monte Krn in valle flum. Isonzo (ad 2000 metr. s. m.) ab eodem lectum est.
 46. *T. cepeæfolium* M.K. (1833). *Nocca cepeæfolia* Rchb. exc. (1832). *Lepidium cepeæfolium* Rchb. ap. Mössl. (1828). *Hutchinsia cepeæfolia* DC. (1821). *Iberis cepeæfolia* Wulf. ap. Jacq. (1781).
 47. *Capsella rubella*; inter Bursam pastoris vulgarem crescens, characteres sibi proprios per multos annos constantes præbuisse dicitur, cum altera prolem hybridam procreans.
 48. *Jonopsidium acaule*; planta hæcce sola est (exceptâ forse Arab. lusitanicâ Boiss.) e Cruciferis europæis, quæ Lusitanie priva sit (sed adest in regno maroccano): Willkomm.
-
49. *Reseda bipinnata*; jam a. 1717 ab Ant. de Jussieu in Hispania lecta est, dein (1753) a Loeffling ad Cienpozuels pr. Matritum observata et in ejus itin. hisp. pag. 79 commemorata.
-
50. *Helianthemum serpyllifolium*; H. glabrum Kern. (1883). H. vulgare glabrum K. (1837). H. serpyllifolium Cr. 1769 (non *Cistus serpyllifolius* L. 1753). Locus classicus est m. Schneeberg Austr. p. d. — *Cistus serpyllifolius* L. (excl. synonym. Clus.) est planta Gallie meridionalis.
 51. H. alpestre Dun.; H. oelandicum K. (non Whlnb. suec.). *Cistus alpestris* Jacq. enum. (1762). *C. oelandicus* Jacq. au. (1776) non L. sp. (1753). Alpes omnes copiose inhabitat, in Austr. et Styria detectum a Clusio, sed ejus synonym. Linneus p. p. ad *Cistum serpyllifolium* suum (e *Stipulatis*!) male citavit; cfr. Kerner sched. ad exs. a. 1883.
-
52. *Viola odorata*; inter species e grege *V. odoratæ*, a Jordan propositas, insignior est *V. subcarnea* ej., quæ typum bene distinctum et culturâ non mutandum sistere videtur (Le Jolis in litt. 1878).
 53. *V. cryana*; non nisi in Burgundia lecta, ibi jugum oolithicum Lary Blanc dictum (secus canalem burgund.) inhabitat; detecta a C.Royer, qui statuit eam sistere varietatem glabram *Violæ rothomagensis*.
 54. *V. polychroma*; inter *V. declinatam* W.K. et *V. saxatilem* Schmidt media; perennis, flores suos suave olentes et coloribus valde variis ornatos explicans a Majo usque in Septembr., unde in convallibus alpinis calcareis Salisburgi et Tyrol. bor. pratorum decus insigne constituit; de ea jam Hostius loquitur cum sub *V. tricolore* dicit: "in Tyrolia vidi individua, in pratis alpium crescentia, ob amplitudinem florum, ob coloris varietatem et elegantiam,

speciosa et conspicua". Probabile adsit etiam alibi, e. gr. in Pyrenæis, unde Bordère, sub nomine *V. monticola* Jord., specimina distribuit quæ ad *V. polychromam* pertineant. Kern. sched. ad exs.

55. *Aldrovanda vesiculosa*; in Lithaunia jam a Besser (1821) lecta est; insp. hort. B.Stein irritabilitatem observavit (1873) in plantis ad Rybnik Silesiæ tunc (estate calida et sicca) læte florentibus; vid. bericht d. bot. sect. d. schles. ges. 1874. 3—4 (*).
56. *Polygala Chamæbuxus*; in Hungaria, ubi jam a Clusio (1583) lecta, rara est et non nisi in parte occidentali et meridionali-occidentali obvia; in Banatu recentius non observata est, in Transsilvanica solum in Carpatibus (deest in hungaricis). Borbás in oe. bot. z. 1885.
57. *P. rosea*; sec. Bennet (journ. o. bot. 1878) *P. rosea græca* (cum *P. pruinosa* Boiss. p. p.) pertinet ad *P. major*, cujus varietates sunt *P. Boissieri* Coss. et *P. bætica* Willk. Lge.
58. *P. amara* (L. syst. ed. X. 1759). *P. amara* var. *alpestris* Whlhb. carp. (non *P. alpestris* Rehb. exc.). *P. amara* genuina K. — Observ. cl. Kerner (sched. a. 1882) *P. amara* L. syst. est planta eadem ac illa L. sp. (1763) et Jacq. enum. vind. (1762), quæ a Linnæo ipso citatur, a Jacquin in fl. au. (1778) descripta et picta est et in locis a Jacquin allatis etiam hodie copiosa viget; igitur sine ullo dubio huic pertinet nomen *P. amaræ*, quamquam in herb. Linn. sub hoc nomine adsit *P. calcarea* FSz.
59. *P. austriaca* Cr. (1769) non Rehb. (1831); cfr. Kern. sched. ad exs. a. 1882. — *P. amarella* Cr. (1769). *P. amara* Whlhb. *P. myrtifolia* Fr. (non L.). *P. uliginosa* Rehb. pl. crit.; exc. *P. minor* foliis circa radicem rotundioribus Vaill. bot. par. Hab. in Europa media omni, etiam in subalpinis, et ad eam (*P. amarella* Cr.) pertinent loca quædam (etiam borealia) in Consp. sub *P. austriaca* allata, ibique *P. amarella* tamquam varietas *P. amaræ* err. citatur.
60. *P. alpestris*; hæc species a Brügger dicitur exacte media (sed minime hybr.) inter *P. vulgarem* et *P. amaram*; vid. annal. (jahresb.) soc. nat. scrut. Bundiæ (Graubündens) 1882. 74—76.
61. *Melandryum nivale*; *Lychnis nivalis* Kit. ap. Schult. (1814). *Silene Siegeri* Bmg. (1816). *Viscaria Siegeri* Grsb. (1852). *Polyschemone nivalis* Schott (1854).
62. *Dianthus membranaceus*; cl. Borbás suspicatus est hanc plantam hybridam esse a *D. collino* W.K. et *D. diutino* Kit., sed sec. Blocki minime talis est, cum in tota Galizia mer.-or., ubi copiosa, in consortio eorum numquam crescit. Kern. sched. ad exs.
63. *D. sabuletorum*; *D. banaticus* Kern. (non Heuff.) ex ipso; etiam *D. diutinus* Rehb. ic. et exc. p. non Kit. (qui = *D. polymorphus* MB.) solum *Dianthus sabuletorum* spectare videtur, qui ipse proxime affinis est *D. atrorubenti* (n. 45). Kern. sched. ad exs.
64. *D. atrorubens* (1785). *D. vaginatus* Vill. (1789). *Pedem. Helv. mer. Tyrol. Venet.* (Veronæ!). — *D. Pontedera* Kern. (1882). *D. atrorubens* Rehb. ic. (Lomb. Croat. Slavon. Hung. etc.). — Pontedera hanc plantam e Padua misit ad Segnier Veronæ, qui eam memorat cum de specie nunc *atrorubens* dicta loquitur, dicens etiam priorem colles Veronenses non spernere, licet tam præsto non sit (ac *D. atrorubens*). De his duobus *Dianthis* cfr. expositionem criticam cl. Kerner in sched. ad exs. a. 1882. 64—68.
65. *D. giganteus*; *D. atrorubens* Jacq. ic. (1786) non All. (1785). *D. Balbisii* Grsb. (1852) et auct. transs. (non Ser.). *D. propinquus* Schur (in Consp. sub *D. liburnico* allatus). De hac specie cfr. Borbás in commentationibus acad. hungar. 1875 etc.
66. *D. superbus*; sec. citatum Linnæi e Clusio typus hujus speciei est planta austriaca, in pratis demissioribus humidis proveniens; in alpinis (et borea-

- libus) pro illo adest varietas *D. speciosus* Rchb. (*D. Wimmeri* Wich. *D. superbus* L. suec.). - Kern. sched. ad exs.
67. *D. monspessulanus* (L. amoen. IV. 1759). *Hisp. Gall. mer. Helv. mer. Tyrol. mer. Venet. (territ. Veron.)*. *Illyr. Croat.* — *D. plumosus* DC. e mte Baldo est status floribus gynodynamis (petalis imberbibus). — *D. erubescens* Trev. (1819) e *Tyrol. mer.* est varietas e loco. — (Kern. sched. ad exs.).
68. *D. Sternbergii*; *Tunica arenaria* Sep. (1772). *D. alpestris* Hpe ap. Sturm (1809); Sternb. ap. Spr. (1825) non Balb. (1804). *D. arenarius* Pirona foroj. *D. oreades* Ball in sched. 1870. *Hab. in Styria, Carinth., Carn., Tyrol., Venet., Illyr.* (500—2000 metr. s. m.). Kern. sched. ad exs.
69. *D. Caryophyllus*; observ. cl. Lacaita (litt. 1884) species plures ex hujus stirpe apud auctores sæpe commutantur; sic, e proxime sequentibus, *D. silvestris* Ten. et Guss. non est *D. silvestris* Wulf., et sub nomine *D. longicaulis* Ten. sæpe distributa sunt specimina, quæ ad *D. silvestrem* Ten. (non Wulf.) pertinent; etc.
-
70. *Cerastium hirsutum*; ex observ. cl. Lacaita (litt. 1884) non est hujus loci sed *C. tomentosum* proximum; pedicellos enim habet fructiferos rectos, nec ut in *C. arvensi* apice nutantes ("calyces deflorati erecti sunt, ideoque *C. arvense* esse nequit, in quo calyces deflorati cernui": nota ms. in hb. Guss.); porro corolla multo major est quam in ulla forma *C. arvensis*; in montibus neapolitanis Taburno, mte Vergine etc. exstant formæ variæ (e. gr. *C. Græfferi* Guss. hb.), quæ videntur mediæ inter *C. hirsutum* et *C. tomentosum*.
71. *C. alsinoides*; sec. Townsend (1877) hæc species (cum var. *C. gracile*) pertinet ad *C. tetrandrum* (n. 33).
72. *Stellaria palustris*; hæc a Ch. Magnier in tres "species" dividitur scil. *S. Mönchii*, *S. litigiosa*, *S. heterophylla*, quæ vero vix nisi varietates sistunt, cum formæ tales analogæ etiam apud *S. gramineam* et al. observantur.
73. *Moehringia* Ponæ (1833). *Sabulina* Ponæ Rchb. (1824). *Saxifraga bavarica* Pona (1608). *Arenaria bavarica* L. (1759). *Moehringia bavarica* Kern. (1882). — Pona, qui hanc plantam primum observavit et illustravit, eam nomine bavaricæ salutatur quia identicam esse putabat cum alia quadam (nunc ignota) a Jungermann in montibus Baviaræ lecta.
74. *M. Tommasinii*; *M. Ponæ Loser fl. capodistr.* (1860). *M. glaucescens* Neilr. *M. glauco-virens* Tomm. (1865); Sz hb. norm. 1026 (non Bert. 1844). *M. sedifolia* Freyn (non W.). — Kern. sched. ad exs.
75. *M. dasphylla*; flores tetrameri (in *M. Ponæ 5-meri*); folia brevissima (in *M. Ponæ elongata*), ima tam brevissima et crassa ut a Balbisio cum illis *Sedidasyphylli* comparentur.
76. *Alsine Jacquini* (1837); nomen *A. fasciculata* M.K. certe antea est (1831) et etiam melius, quia derivatur ab *Arenaria fasciculata* L. syst. (1767), a Gouan (1773)! et Jacquin (1774)! ulterius descripta et illustrata, sed *A. fastigiata* Sm. (1824) prioritate gaudet quamquam Smithius, e prava interpretatione herbarii Linn., synonym. Linn. ad aliam plantam (mer.-orientalem) transtulerit; hoc accepto nomen Kochii, ob hanc controversiam datum, supervacaneum evadit. Kern. sched. ad exs.
77. *A. aretioides*; *Cherleria octandra* Sieb. fl. austr. exs. (1813). *C. imbricata* Ser. ap. DC. (1824). *Sieberia cherlerioides* Schrad. ap. Sieb. l. c.; Hpe in Flora 1819. *Sommeraueria quadrifaria* Hpe in Flora 1819. *Arenaria aretioides* Portenschl. ined. sec. Sommerauer in Flora 1819. *Alsine aretioides* M.K. (1831). *A. octandra* Kern. sched. ad exs. (1882).
-
78. *Hypericum Desetangsii* Lmtte; hoc ex Bonnet (bull. soc. bot. 1878) sistit speciem omnino mediam inter *H. quadrangulum* et *H. tetrapterum*, sed

hybridum non est quia copiose viget ubi deest *H. quadrangulum*, quod in Gall. non nisi in montibus obviam venit; est quidem fere identicum cum *H. intermedio* Bellynk, sed hoc recentius est quam *H. intermedium* Steud. Hochst. (1842); ad hoc *H. Desetangii* genuinum pertinent *H. commutatum* Martr.-Donos (non Nolte) et *H. Linnæanum* Callay ap. Gren., sed varietatem imperforatam sistunt *H. dubium* Coss. Germ. et *H. quadrangulum* auct. plur. (non L.).

-
79. *Vitis vinifera*; b. Sagot hanc plantam in silvis circa Belley (dep. Ain) vidit copiosam, omnino spontaneam et *V. cebennensi* valde similem; folia ejus parva erant; flores polygami, masculis numerosissimis; baccæ, etiam maturissimæ, austere. Vites, quas Bronner tamquam spontaneas e valle Rhœnana descripsit, ex Sagot non nisi (saltem pro max. parte) efferatæ sunt.
-
80. *Rhamnus carniolicus* (Kern. nov. plant. spec. I. 36. 1870). Hab. in m. Krainer Schneeberg (1100—1300 metr. s. m.), in alpinis Carniæ et Carinthiæ merid., in montibus Carniolæ (e. gr. in silvis ad Adelsberg, copiose) et Styriæ maxime meridionalis, in Croat. (m. Velebit), Dalm. (et Alban. ?); in Bosnia et Hercegovina silvas constituit (: GBeck).
-
81. *Rhus Cotinus*; hæc species a ceteris hujus generis essentialiter differt, quare cl. Engler, præeunte Scopio, pro ea genus pristinum *Tournef. Cotinus* restituit, servato etiam pro specie nomine Scopiano *Coggygia* (: *Cotinus Coggygia* Scp.).
-
82. *Ulex Gallii*; sec. Godron etiam hæc species est tantum forma abnormis (floresc. seriori) *Ulicis* europææ, a climate marino orta, negante tamen cl. Le Jolis, regionem ejus inhabitante, et quod etiam vix credibile videtur post observationes a cl. Miciol institutas et a Magnier (l. c.) publicatas.
83. *Genista ætensis*; in monte Aetna inter 500 et 6500' s. m. hinc inde (exc. latere montis occidentali) copiosa est, in demissioribus sæpe arbores usque 6-metrales constituens, in elevationibus fruticosa; floræ ætensis novissimus et strenuus indagator Strobl eam præcipue supra Nicolosi ad vineas copiosam observavit, ubi ad altit. circa 2600' s. m. silvulas arbuscularum ramosissimarum sistit et inde rarens limitem regionis silvaticæ attingit.
84. *Cytisus hirsutus*; observ. cl. Kerner (sched. ad exs.) flores laterales in individuis vario modo truncatis sæpe in capitulum terminalem congregantur, quæ individua pro *C. prostrato* sæpe sumta sunt (sic a Tommasini et Koch). *C. falcatus* W.K. (Croat.) a *C. hirsuto* speciè non differt.
85. *C. biflorus*; sec. Kerner (sched. ad exs.) *C. biflorus* l'Her. et *C. ratisbonensis* Schæff. (botan. exped. tab. tit. 1760) sunt duæ species distinctæ. *C. biflorus* l'Her. stirp. nov. VI. 183. 1785 (*C. cinereus* Host 1831) rarior est, et non nisi in Hungaria lecta videtur planta cum icone Heritieri (ined.) omnino conveniens. Heritierus patriam ejus non novit, sed eam esse Hung. centr. Kernerus nos edocuit (locus classic. est in collibus arenosis inter Danubium et Tibiscum). *C. biflorus* W.K. huc pertinet, sed icon (pl. rar.) cum illo non convenit.
86. *C. supinus* (L. sp. α); *C. capitatus* Scp. carn., Jacq. au. Floristæ plurimi (quos in Consp. secuti sumus), auctoritate Kochii seducti, synonymiam hujus speciei aliter intellexerunt, sed cl. Kerner nunc monstravit (abhäng. d. pflanzenz. 1869 et sched. ad exs. 1883) *C. capitatum* Scp., Jacq. identicum esse cum *C. supino* α L., quod ceterum scripta Linnæi ipsius et Jacquinii — ambo citatum idem e Clusio afferentia — confirmant; insuper Linnæus ipse (syst. ed. XIII.) *C. capitatum* Jacq. au. sub suo *C. supino* α citat. Hæc species in Austr.-Hung. frequens est et ubiquista, sed rarius et sparsim proveniens. *C. virescens* Kov. et *C. Rochelii* Wzb., qui vulgo pro *C. supino* sumuntur. Sæpius eodem anno bis floret, scil. floribus vernalibus lateralibus, solitariis —

ternis, cum foliis erumpentibus (= *C. prostratus* Sep.) et floribus æstivalibus terminalibus, aggregatis (= *C. capitatus* Sep.). — Sed e supra dictis patet alteram speciem, quæ *C. supinus* auct. mult., novo egere nomine; a cl. Kerner *C. gallicus* nominatur.

87. *Anthyllis Vulneraria* L.; species, si placet, collectiva est, et ut Linnæus sub ea varietates plures enumerat, sic etiam species plures, ab illa una derivatæ, a recentioribus propositæ sunt, quas cl. Kerner (sched. ad. exs. a. 1882) ita disposuit: *A. polyphylla* Kit. ap. Ser. in DC. pr. (Austr. p. d. Hung. Transs. Ross. mer.). *A. Dillenii* Schult. ap. Ser. l. c. (Croat. Istr. Dalm.). *A. vulgaris* Kern. *A. Vulneraria* var. *vulgaris* M.K. *A. alpestris* Kit. (Hung. Tyrol. Helv.). — *A. pallidiflora* Jord. *A. affinis* Britting. ap. M.K. *A. alpestris* Rehb. exc. non Kit. (Austr. Sty. Salisb. Hung. Carpat.).
 88. *Medicago sativa*; cl. Urban inter hanc et præcedentem (*M. falcata*) stirpes hybridas procreavit a spontanea s. d. M. media non distinguendas et semina matura fertiliæque ferentes.
 89. *Melilotus palustris*; sec. Menyhart (oe. bot. z. XXVII) est varietas rarior (e loco udo) *M. macrorrhizæ*, quod Kerner culturâ probavit; cf. Kern. sched. ad. exs. a. 1882, ubi etiam species huic affines solitâ sagacitate tractantur.
 90. *M. altissima*; in hac et in *M. macrorrhiza* folia primi anni sat similia sunt, quod sine dubio ad has species commutandas haud parum contulit.
 91. *M. ruthenica*; ad hanc non nisi auctoritate Ledebourii in Consp. citatur *M. polonica* L. (cfr. seq.).
 92. *M. polonica*; hæc species, quam Linnæus e Polonia habuit (: *Trifolium Melilotus polonica* L.), hodiernis incognita videtur.
 93. *Coronilla emeroides* (*C. Emerus* fl. gr.); *C. Emerus* var. *austriaca* Heimerl (ex Borbás); indicatur e Litorale austriaco, Istr., Dalm., et variis locis una cum *C. Emero* typico crescentem observata est; hab. etiam in Sicilia.
 94. *Astragalus leontinus*; species rara, a Wulfen in Tyrolia prope Lienz (Leontinum) detecta et in ripis arenosis Isolæ (Isel) lecta. Hoc loco recentius non reperta est quamquam diligenter quæsita, sed circa Windisch-Matrei et in valle Virgen abunde adest, quare probabile est specimina olim ab Isola advecta fuisse. (Ausserdorfer).
 95. *A. oroboides* (Hornem. 1810). *A. leontinus* Whlbn. (1812) non Wulf. ap. Jacq. (1781). *Phaca oroboides* DC. (1825).
 96. *Lathyrus floribundus*; a *L. Aphaca* differt præcipue pedunculis rectis, quam stipulæ duplo longioribus, floribus binis, corollâ saturate luteâ.
 97. *Vicia picta*; sec. Trautvetter pertinet ad *V. biennem* L., sed ab hac specie, ad plantam cultam descriptâ, excludendum est synonym. Gmel. sibir., quod ad *V. megalotropin* Led. (non Reg.) spectat.
-
98. *Amygdalus nana*; arææ geogr. pars occidentalis est territorium quod (occidentem versus) secus fines Austriæ et Hungariæ extenditur a diclivibus planitium illam Marchfeld dictam limitantibus ad ripas lacûs Neusiedlersee, nam planta non longius quam ad declives mox dictas (Hochleiten nominatas) versus Vindobonam et occidentem progreditur.
-
99. *Spiræa Filipendula*; genus *Filipendula* T. (L. gen. ed. I.) a Maximovicz (act. hort. petrop. 1879) restitutum est, sensu tamen latiori sumtum. Hoc genus a *Spiræa* distinguitur fructibus indehiscenibus, caducis, stigmata amplo etc. et (cum paucis aliis) species hujus duas notissimas comprehendit: 1. *F. hexapetala* Gilib. (1792). *F. vulgaris* Mch (1794). *Spiræa Filipendula* L. — 2. *F. Ulmaria* Maxim. (1879). *Ulmaria pentapetala* Gilib. *U. palustris* Mch. *Spiræa Ulmaria* L. — Sed harum prima sola "filipendula" dici potest, unde nomen hoc genericum, contra leges nomenclature constructum, ægre admittetur. Ceterum cl. Maximovicz (l. c.) ipse observat Gilibertium expressis verbis nomina Linnæana pretulisse et propria sua non nisi "in usum tironum"

- proposuisse, dicens "talía nomina sunt relativa regioni, non absoluta, nec in pinace generali introducenda".
100. *Rubus tomentosus* (W. 1799). *R. tomentosus* Borkh. in Roem. mag. 1794 sat dubius est et vix idem ac Willdenowii; cfr. Kern. nov. pl. spec. 1871 et sched. ad exs. a. 1883.
 101. *R. Areschougii*; sec. cl. F. Areschoug propior est *R. saxatili* et inter eum et *R. caesium* "formam transitoriam, nec hybriditatem sistit"; cfr. auctoris laudati: Some observations on the genus *Rubus* (1885) pag. 107, ubi hæc planta ei argumentum bonum pro theoria sua de evolutione specierum præbet.
 102. *Fragaria neglecta*; est *F. collina* auct. mult. et ab illa typica (planta Ehrhart.) non nisi "pubescentia pedunculorum patente (marcescentium tamen interdum adpressa)" differt.
 103. *Potentilla hirta* typica est planta occidentalis (Gallia, Hispan.). — *P. læta* Rchb. exc. 595. *P. hirta* Sturm et auct. mult. *P. pedata* auct. plur. (non Nestl.). *P. heptaphylla* Mill. p. p. (non Lehm.). Pedem. Illyr. litoral. Istr. Croat. Dalm. — *P. heptaphylla* Mill. 1776 (Ital. Sicil.) et hanc et sequentem (*P. pedatam*) comprehendit. — *P. pedata* Nestl. (1816). *P. heptaphylla* Mill. p. p. (non Lehm.). Illyr. litor. Croat. Istr. (etc.). Folia ima pedata, foliolis valde serratis, latioribus; in *P. hirta* typica foliola sunt spatulato-cuneiformia, apice 3—5-dentata. Zimmeter.
 104. *P. heptaphylla*; sec. Celakovski (phyt. beitr. in oe. bot. z. 1871) planta Miller. (*P. heptaphylla*) diversa est a Bernhard. (*P. thuringiaca*) et nomen heptaphyllæ non admittendum. — Synon. *P. thuringiæ*: *P. chrysantha* Rchb. exc. (1832) non Trev. (1818). *P. heptaphylla* Lehm. rev. (excl. var.) non Mill. (cfr. præc.). *P. intermedia* auct. germ. p. p. non L. nec Nestl. (: *P. Nestleriana* Tratt.). — Hæc species adest etiam in Hung. or. (m. Bihar), Transs. bor., Tyrol. mer. (: Huter).
 105. *P. alpestris*; *P. verna* L. hb. et sp. ed. II. (*P. verna* ed. I. est species collectiva); Whlbn. *P. rubens* Vill. (1786) non All. nec Cr. *P. sabauda* DC. (1815), Rchb. exc. *P. affinis* Host (1831).
 106. *P. baldensis* (Kern. 1870 et 1883); *P. aurea* Pollini viag. (non L.). *P. villosæ* Cr. (quæ var. speciei præced.) proxime accedit. Hab. in Tyrol. mer. et Venet. alp. calcar.; detecta a Kerner in m. Cherle Tyrol. mer., dein (1871) in mte Baldo copiose lecta; Huter et Porta eam legerunt in Venetia, ubi cum *P. cinerea* Chx plantam hybridam procreat, quæ = *P. bellunensis* Hut. Porta exs.
 107. *P. patula*; sec. Zimmeter vera et genuina (W.K.) non nisi e Matra et territorio circumjacenti, in comitatu Heveser. ad Gyöngyös, Erlau etc. cognita videtur.
 108. *P. opaca*; *P. verna* Lehm. rev. (excl. var.) et auct. var. *P. minor* Gilib. (1792). — *P. rubens* Cr. st. au. (1769). *P. opaca* Jacq. ic., Lehm. rev. (excl. var.), K.; a specie distinguitur i. a. caulibus nec prostratis nec radicantibus, foliolis numerosioribus, indumento patente (ex Zimm.); locus classicus ejus est St-Veit pr. Vindobonam. — *P. Schurii* (Fuss 1882) Zimm. ap. Kern. 1883. *P. pratensis* Schur (1859) non Herbich (1855). *P. patula* Fuss (1866) non W.K. *P. hirta* Schur (1852); ex Zimmeter. Hab. in Transsilv. — *P. longifolia* (Borb. 1882) Zimm. (1883). Austr. (Steyr). Tyrol. — *P. glandulifera* Kras. ap. Kern. (1869). *P. glandulosa* Kras. in oe. bot. z. (non Lindl.). Carn. Illyr. Croat.
 109. *P. tirolensis* (Zimm. in Kern. sched. ad exs. a. 1883). Tyrol. centr. Helv. (et probab. in alpihus central. occ. plurimis sed pro "*P. verna*" sumta: Zimmeter). *P. Gaudini* Grml. huic proxima videtur.
 110. *P. vindobonensis* (Zimm. in Kern. sched. ad exs. a. 1883); dicitur similis *P. arenariæ* et *P. opacæ*, sed cum in Austr.-Infer., præcipue Vindobonæ, copiosa adest in locis ubi desideratur *P. opaca*, vix hybrida est.
 111. *P. australis* Kras. (1867). *P. opaca* γ congesta Gaud. (1828). Illyr. Istr. — *P. australis* Jord. ap. Verlot (1856) est var. *P. hirtæ*.

112. *P. cinerea* (Chx ex Zimm.); hab. etiam in mte Serva Venetiæ (Tyrol. conterm.) et in Alpibus meridionalibus, sed parce obvia et cum aliis, præcipue *P. arenaria* Borkh., commutata. *P. vestita* Jord. 1849. (Delph. pr. Gap). — *P. arenaria* Borkh. fl. wett. II. (1800). *P. incana* Mch. (1802). *P. cinerea* auct. plur. (non Chx). *P. subacaulis* Tratt., Host (non L.). Hæc præcipue per Austr.-Hung. et Germaniam distributa est. — *P. Gaudini* Grml. exc. (1878). *P. cinerea* Gaud. quoad loc. vales. (Helv. Tyrol.).
 113. *P. minima* (Hall. fil. ap. Schleich. 1794). *P. Brauneana* Hpe (1800). *P. dubia* Kern. (1883). *Fragaria dubia* Cr. (1769).
 114. *Rosa spinulifolia* Dematra detecta est ad Chatel-sur-Montsalvens pr. Friburgum Helv. et adhuc solum in hoc loco observata est; quæ ex aliis locis sub hoc nomine citatur non est vera species *Dematreana*. — (Deseglise 1875).
 115. *R. comosa* (Ripart in Sz arch. 1852); *R. rubiginosa* L. hb. *R. rubiginosa* var. *comosa* Dmrt. (1867); cfr. Deseglise, Crepin et HBraun in Kern. sched. ad exs. a. 1883. Hæc a Crepin *R. rubiginosa* L. typica salutatur, sed cum descriptione in Linnæi mant. non convenit (ibi citatum primum ex Hall. hist. *R. umbellatam* Leers spectat, alterum e Dodonæo hanc *R. comosam*). Deseglise hoc jam monstravit et HBraun ex observationibus Mygindi, a quo Linnæus plantam habuit, confirmavit *R. rubiginosam* in Kern. exs. (475) editam etiam Linnæi esse.
 116. *R. drosophora* (HBraun ap. Kern. 1883); hab. (Tyrol. centr.) in consortio *R. cheriensis* Desegl. (cui habitû proxima) et *R. comosæ* Rip. et probabiliter earum procreatio hybrida.
 117. *R. caryophyllacea* (Bess. crem. 1811; enum. volh. 1822). *R. rubiginosa* var. *caryophyll.* Ser. ap. DC., et jam Besser eam ad *Rubiginosas* retulit, sed Deseglise (et Consp.) erronee ad *Tomentosas*. Multum variat (: HBraun). — *R. zagabiensis* Vuk. HBraun ap. Kern. (1883). *R. anisopoda* Vuk. in sched. non Christ. (Zagrab Croat.). — ? *R. zalana* Wiesb. 1879. (Hung.).
 118. *R. glaucescens* (Wulf. in Roem. arch. III. 1805, non Desv. ap. Merat 1812); per Alpes centrales (helveticas, tyrolenses, salisburgenses, carinthiacas) inter 1000—1500 metr. s. m. vulgata, sed etiam in elevationibus Alpium meridional. et Jurassæ, nec non in montibus summis Croatiae, obvia; a Wulfen primum in Malnitzer-Tauern observata est. — *R. gutensteinensis* Jacq. f. in cat. hort. vind. 1821. *R. rubrifolia* Jacq. fragm. 1809 (non Vill.). Alpes. bor.-or. scil. Austriae et Styriae, inter 500 et 1000 metr. s. m.; pr. Gutenstein a Portenschlag detecta. (Kerner).
-
119. *Pyrus Pollweria*; sec. Heydenreich (1884) hæc arbor dicitur antiquitûs cognita ad Schmalkalden Thuring., ibique olim frequentius obvia, nunc vero destructa (restat sola arbor in horto quodam).
 120. *Sorbus latifolia* (P.); hæc arbor (Fontainebl.) a Godron 1887 bona et propria species, nec hybrida, declarata est, sed *S. hybrida* Godr. (sæpe cum *S. latifolia* commutata) ex observatione ipsius vera talis est (: *S. latifolia-torminalis*). Hujus synonyma sunt: *Cratægus hybrida* Bechst. *Pyrus intermedia* Soy.-Willem. (1828). *S. latifolia* K. et auct. germ., Godr. lorr. (non P.).
 121. *Cratægus ruscinonensis*; in Gallia mediterr. plur. non rara, sed pro *C. Azarolo* vulgo sumta, quæ vero ibi vix adsit nisi culta vel in *C. ruscinonensi* et *C. monogyna* inserta. (Loret, Rouy).
 122. *C. ambigua* (CAMey. in Becker verz. sarept. 1858); in hac fructus majores sunt et magis sapidi quam in *C. monogyna*; styli vulgo duo, sed sæpe etiam unus tantum adest.
-
123. *Chamænerium palustre*; observ. cl. Hausskn. hujus synonymon. post *Epilobium* Dodonæi antiquissimum, est *E. angustissimum* Web. pl. minus cogn. dec. (1784). *E. crassifolium* Lehm. huc pertinet, sed est planta culta,

- incerta, cujus nomen delendum est. De loco Verona, a Reichenbach citato, non dubitandum.
124. *Epilobium hirsutum*; *E. grandiflorum* Web. ap. Wigg. (1780). *E. aquaticum* Thuill. (1799).
125. *E. tetragonum*; *E. obscurum* Schm. (1794) non Schreb. *E. ptarmicæfolium* FSz (1855).
126. *E. Lamyi*; ex cl. Haussknecht coordinandum est *E. tetragono*, quod melius audiat *E. adnatum* Grsb. (cfr. Hausskn. monogr. 108).
127. *E. Wimmeri*; post hoc inser. aliud *Epilobium hybridum* scil. *E. dacicum* Borb. (*E. rivulare* Nolte non Whlnb.), quod ex Haussknecht est = *E. obscurum* + *E. parviflorum* et vix dubie etiam *E. virgatum* Fr. primum (novit. 1828).
128. *E. montanum*; ad hanc speciem duce cl. Haussknecht hybriditates duas, in Suppl. non commemoratas, citare liceat: × *E. intermedium* Heg. (*E. limosum* Schur. *E. hungaricum* Borb. *E. crassicaule* Grml.) = *montanum* + *parviflorum*. × *E. pallidum* Tsh (hb.). *E. pseudo-trigonum* Borb. = *montanum* + *trigonum*.
129. *E. alsinefolium*; hybrida proles ex hoc et *E. montano*, quæ a Facchini *E. salicifolium* nominata erat, est *E. Facchini* Haussm. in sched. (teste Haussknecht).
130. *E. Treuinfelsianum*; Leo Treuinfels, K.K.Professor (Meran), de *Cirsii* floræ tyrolensis bene meritus.
131. *Trapa natans*; de historia, distributione geographica, varietate fructus etc. hujus plantæ memorabilis cl. Jäggi plenissime disseruit in tractatu (1883 edito): *Die wassernuss Trapa natans und der Tribulus der Alten*, 1—34 (*); cl. Nathorst in conventu soc. bot. holm. Febr. 1884 communicavit observationes suas novas de hac planta et de provenitu ejus (præcipue in Suecia), et quidem tam plantæ typicæ (apud nos extinctæ) quam var. *conocarpæ*, quæ in Scania 1871 detecta est (vid. Bot. Not. 1884. 84—91).
-
132. *Callitriche hamulata* (Kütz. 1838). *C. pallens* Goldb. in mem. mosc. 1817; *C. intermedia* Hoffm. (1791).
-
133. *Sedum dasyphyllum*; hæc species olim (medio ævo) ornamentum gratia colebatur, et etiam nunc in ruinis et muris vetustis hinc inde obviam venit, sed extra regionem mediterraneam indigena non adest.
134. *S. Cerpæa* (*S. spathulatum* W.K. 1805); locus croaticus supplementarius est inter loca dalmatica et illa ad Semlin et in valle Cerna; ad Maastricht, Lichtenberg Batav. (Limburg) nunc omnino inquilinum est; sec. Clusium hæc planta sæpe colebatur in Belgio circa annum 1600.
-
135. *Saxifraga florulenta*; hæc species (teste Ardoino) detecta est circa a. 1820 ab anglo quodam (turista) in rupibus subverticalibus ad lacum d'Entreoulpes (a N-D-de-Fenestre occid. versus situm), unde specimen missum est ad Moretti, qui in eo speciem novam agnovit et a. 1824 publicavit; a pluribus dein frustra quæsitæ est planta hæcæ usque ad 1856, cum a dom. Lisa in eodem loco reperta et anno sequenti ab abbate Montolivo abundanter lecta est. — De eadem specie cl. Lacaita mihi scripsit (1883): *Saxifr. florulenta* per omnes montes graniticos editiores Alpium Maritimarum adest, semper vero in rupibus fere verticalibus, ubi rosulæ foliorum copiosæ sunt, sed flores multo rarius reperiuntur; ipse hanc plantam legi in summa valle Gordolasca, Val Masca, ut etiam in montibus omnibus circa thermas Valderianas. Styli non semper 3, sed in summo flore vulgo 4, aliquando etiam 5; in floribus lateralibus plurimis 2, in ceteris 3.
136. *S. Rocheliana* Sternb. ap. Host (1827). *S. pseudocæsia* Roch. (1828).
137. *S. Vandellii* Sternb. (1810). *S. pungens* Clairv. (1811).

138. *S. perdurans* Kit. ap. Whlnb. (1814). *S. Wahlenbergii* Ball (1846). *S. Flittneri* Heuff. (1854). *S. Grzegorsekii* Jka (1856).
 139. *S. carpatica* Rchb. (1832). *S. rivularis* Townson trav. (1797), Roch., Bmg., Host, Zaw. (non L.). *S. sibirica* Whlnb, 1814 (non L.).
-
140. *Tommasinia verticillaris*; *Angelica verticillaris* L. *Imperatoria verticillaris* DC. *Peucedanum verticillare* K. *Ostericum verticillare* Rchb.
 141. *Eriosynaphe longifolia*; radices tuberosæ, longæ, aromaticæ et sapidissimæ, a rusticis avidè vorantur (: Becker).
 142. *Bonannia resinifera*; specimen hujus plantæ ex horto Cliffort., manu Linnæi ipsius *Sium græcum* (!) determinatum, in Museo Britan. (British Museum) servatur (teste Trimen).
 143. *Silaus virescens*; sec. Bentham et Hooker hæc species e genere excludenda est prout *Foeniculo* quoad fructus valde proxima, et igitur *Foenic. virescens* Bth. Hook. nominanda; constat vero, ex observ. cl. Janka, e duabus speciebus distinctis scil. 1. *F. virescens* Bth. Hook. *Bunium virescens* DC. (*Gasparrinia virescens* Bert.). 2. *F. Rochelii* Jka in oe. bot. z. 1879. *Selinum Rochelii* Heuff. ap. Roch. *Peucedanum arenarium* Bmg. (non W.K.). *Silaus virescens* Grsb. spic. et auct. austr.; cfr. "*Silaus virescens* von V. v. Janka" l. c. (*).
 144. *Athamanta Matthioli*; sec. Grsb. et Rchb. planta e thermis Herculis, quæ *A. hungarica* nominata est, a carnica et istriaca diversa est et potius cum specie græca *A. densa* Boiss. comparanda (sed fructus maturi in utraque desunt); ex Simkovicz speciem propriam non sistit, quia secundum altitudinem loci variat, et rectius cum *Grisebach* var. *elata* dicitur.
 145. *Bunium alpinum*; species hujus gregis a cl. Gillot tali modo citantur: 1. *B. alpinum* p. d. (Hung. Croat. Dalm. Græc.). — 2. *B. corydalinum* DC. *B. petræum* Lois. non Ten. *B. alpinum* G.G. (Cors. Sard.). — 3. *B. petræum* Ten. (Ital. Sicil.). — 4. *B. nivale* Boiss. (Hisp.).
 146. *Bupleurum diversifolium* Roch. banat. rar. (1828). *B. heterophyllum* Roch. in ic. ejusd. operis, sed auct. ipse (p. 68) nomen mutavit⁴ ob plantam Linkeanam⁴. *B. baldense* Bmg. non alior. (sec. Roch.). Hab. etiam in Hung. or.
 147. *Hladnikia golacensis* (1837). *Athamanta Golaka* Hacq. (1782). *Pleurospermum Golaka* Rchb. (1832). *Malabaila Hacquetii* Tsh (1834). *M. Golaka* Kern. (1882).
-
148. *Galium saxatile*; *G. hircynicum* Weig. (1772). *G. saxatile* L. suec. ed. II. app. et sp. ed. II. p. p. (non ed. I.). — *G. saxatile* L. sp. ed. I. est planta hispanica (= *G. saxatile* supinum molliore folio Juss. act. paris. 1714 "in scopulis lapidosis marinis Hispaniæ"), quæcum Linneus scanicam (quæ = *G. hircynicum* Weig.) identicam esse putavit.
-
149. *Scabiosa Wulfenii* (Kern. 1883). *S. maritima* Wulf. ap. Roem. 1803 (non L.). *S. ucranica* All. et al. (non L.). *Asterocephalus Wulfenii* R.S. (1818). Illyr. litor. (in loco classico, Grado ad mare adriaticum, nuper legit Pichler).
 - 149 bis. *S. gramuntia* L. syst. nat. ed. X. 889 (1759); sp. ed. II. (1762); syst. nat. ed. XII. 113. (1767). *S. triandra* L. sp. ed. I. — Sauvages primus loquitur (1751) de hac planta, quam e "*Gramont*" Monspelii habuit, sed melius, ex eodem loco ("*lucus Gramuntius*"), eam novit Gerard (1781), qui iconem Tabernæmontani 162 citat, quare cl. Kerner (1883) pro hac specie nomen *gramuntia* vindicat, dum *S. gramuntia* recentiorum in proxima *S. agresti* W.K. quærenda sit. — *S. agrestis* W.K. (1812). *S. gramuntia* K. et al. Setæ variant longiores et breviores, interdum brevissimæ vel nullæ (= *S. leiocephala* Hpe ap. M.K.).

150. *Bidens radiata*; ut aliæ quædam plantæ annuæ, quæ locis ripariis vel paludosis delectantur, etiam hæc non omnibus annis, sed solum æstatibus tempestate favente idoneis, apparet, sed tunc copiose.
151. *Senecio vernalis*; hæc species nunc in provinciis orientalibus Borussiae lolium tam molestum evasit, ut ad destructionem ejus legem propriam promulgare necesse erat.
152. *Ptarmica oxyloba* DC. (1837). *Achillea oxyloba* Sz bip. (1855). *Anthemis alpina* L. am. (1759); sp. (1763). Quoad structuram acheniorum est indubia *Ptarmica*, sed habitu vera *Anthemis*.
153. *P. tenuifolia*; *Anthemis alpina* Bmg. 1816 (non L.). *A. tenuifolia* Schur (1851). *A. Schurii* Sz bip. in oe. bot. z. 1856. *A. cæspitosa* Herbieh in Flora 1857. *Achillea Schurii* Heimerl in Kern. sched. ad exs. 1883.
154. *P. Clusiana*; *Parthenium alpinum* Clus. (1583). *Achillea atrata* Jacq. vind. (1773). *Achillea Clusiana* Tsh in Flora 1821.
155. *P. atrata* (L. sp. ed. I.; ed. II. etiam seq. comprehendit). *Achillea Halleri* Cr. (1766). *A. impunctata* Vest in Flora 1820 (e loco et descr.). *Anthemis corymbosa* Hke ap. Jacq. 1788 (ex specim. authent. etc. pertinet ad varietatem *oligantha* Tsh). Heimerl.
156. *P. moschata*; *Achillea moschata* Wulf. ap. Jacq. (1778). *A. livia* Sep. (1786). *A. Genipi* Murr. appar. medic. (1791). — Hæc species jam a Gesner commemoratur (1559) tamquam herba medica, amara et aromatica: "Iva arthritica et moschata, in albis Bundiæ". Nostris diebus fama ejus resurrexit et ab anno circa 1860 planta hæc magnâ copiâ adhibetur ad liquorem, sub variis nominibus (Ivabitter, Ivavein, Crème d'Iva, Fleur d'Iva) venditum, destillatione obtinendum. Dom. Bernhard, pharmacopola in pago Samaden (cant. Graubünden), a. 1877 herbæ recentis 1500 kilos in laboratorio suo adhibuit et 12000 litros liquoris dicti vendidit. (Wartmann).
157. *Achillea distans* W.K. ap. W. (1800). *A. dentifera* DC. (1815). *A. tanacetifolia* Roch. exs. *A. tanacetifol. b. distans* ej. ban. rar. *A. dentifera b. distans* Heuff. enum. ban. Hung. med., mer.-or. Transs. Banat. Croat. Istr. Tyrol. mer. Ital. bor. Planta variabilis et nomen distantis sepe incongruum. (Heimerl.). — *A. pseudotanacetifolia* Wzb. in Rchb. exs. 1528. (in Consp. hæc sub * *lanata* militat).
158. *A. stricta* Schleich. cat. helv. 1881. *A. tanacetifolia* All. γ *stricta* K. syn. *A. compacta* Lam. dict. 1789 (non W.) sec. Godron, sed non certe, plantâ hb. Lam. non visâ. Helv. Carinth. Austr. p. d. Hung. Transs. (etc.).
159. *A. sudetica* Opiz ap. André (Hesperus 1812); Opiz in Flora 1822. *A. magna* Hke it. sudet. (1791). *A. Hænkeana* Tsh in Flora 1821. Bohem. bor.-or., ad 1000—1400 metr. s. m. (Heimerl.).
160. *A. pannonica* Scheele (in linn. 1844). *A. Millefol. \gamma lanata* K. syn. *A. lanata* auct. mult. (non Spr.). Bohem. (Prag). Morav. mer. (: Freyn). Austr. p. d. (territ. Vindob.). Hung. (freq. et characteristic). Transs. Istr. (: Freyn); ex Heimerl.
161. *A. crustata*; *A. asplenifolia* Vent. cels. 95. (1800). *A. Millefolium \beta rubra* Sadl. (1826). *A. rosea* Dsf. hort. par. (1829). *A. Millefolium* var. *crustata* Roch. (1828). *A. scabra* Host (1831); ex Heimerl. Cfr. Kerner in oe. bot. z. XXI.
162. *Chrysanthemum segetum*; hæc planta in Galliam bor. (prope Coursoire etc.) anno 1699 vel 1700 introducta est ibique tam prodigiose sese propagavit ut exstirpatio et destructio ejus lege superiorum præscriptæ erant.
163. *Matricaria maritima* Linnæi primaria erat *Chamæmelum maritimum* (L. vestg. resa 1747), quod in litore marino extra Gothoburgum primum legit et examinavit (1746) et quod = *M. inodora salina*. *M. maritima* vero sensu ampliori et recentiorum stirpes plures (varietates) comprehendit, quas cl. Neuman nuper (vid. Bot. Not. 1882. 168—174) descripsit et sic disposuit:

- a.* Raji. (Scan. m. Kullaberg). — *b.* minor. (Kullaberg; Fr. hb. norm. XII. 2). — *c.* Friesii. (cult. a Fr. hb. norm. VII. 1). — *d.* recentiorum. (in litore occ. frequens; *M. inodora* var. *maritima* Htn, F.Aesch. *Tripleurospermum maritimum* K.; hae omnes saepius prope litus marinum crescunt, sed in ipso m. Kullaberg, in declivitate boreali abrupta montis, sequentes duae (antecedentibus valde dissimiles): *e.* Retzii (*M. maritima* Retz. prodr.; *Pyreth. maritimum* Sm. ?); *pluricaulis*, caulibus basi induratis, longe ramosis; capitula maxima, radii apice obsolete tridentatis vel integerrimis; odor graveolens. — *f.* borealis (Htn. handb. ed. XI.); caules debiliores, simplices vel solum apice ramosi; radii apice tridentati; odor graveolens.
164. *Plagius virgatus*; de hac specie cl. Lacaita observat (in litt.): *Leucanthemi* receptaculum, corollas disci (subcalcaratas) et achenia omnino habet (sed non est forma nec *L. pallentis* nec *L. vulgaris*); nescio igitur cur ad genus *Plagii* refertur (nihil cum *P. ageratifolio* commune habet) et non, ut debet, *Leucanth. discoideum* All. (sub *Chrysanth.*) nominatur.
165. *Telekia speciosa* (Bmg. 1816). *T. cordifolia* DC. (1836). *Buphthalmum cordifolium* W.K. (1805). *B. speciosum* Schreb. (1766).
166. *Inula hybrida*; cfr. 8* (*I. hybrida* auct. vid. 7.a*).
167. *Inula suaveolens*; sec. J.Kerner (1875) est planta hortensis, a Jacquin, ut videtur, solum in Horto Vindob. observata et ab I. Oculus Christi et I. Conyza (cui habitus propior) hybriditate orta; planta Suffreniana (e Monfalcone, Duino) auctori citato latet.
168. *Cirsium transsilvanicum* Schur (1853); *C. Boujarti* Sz bip. in oe. bot. z. (1856). *Cnicus Boujarti* Pill. Mitterp. it. Poseg. et Slavon. (1783). *Cnicus ferox* Bmg. 1816 (non L.). *C. ciliatum* Maly (non MB.). *C. furiens* Grsb. (1852).
169. *C. spathulatum* (Gaud. helv. 1829); *Cnicus spathulatus* Moret. (1822). *C. eriophorum* var. *spathulatum* Rchb. exc. *C. decussatum* Jka in linn. 1860 (ex Kern.); cfr. Rchb. ic. germ. helv. XV (1853) et Kern. in oe. bot. z. 1871 (etc.).
170. Vacat.
171. *C. montanum* (Spr. 1826); *Cnicus montanus* W.K. ap. W. (1800). *C. al-sophilus* Pollini (1822); in nemoribus subalpinis et in umbrosis montanis Alpium meridional. (*C. rivulare* Ambr. et al.) et mer.-oriental., quibus (sec. Kerner) haec species endemica est, nec planta hybrida ut aliqui putaverunt. (Kern. sched. ad exs.).
172. *C. Linkianum* Löhr (1852). *C. Portae* Hsm. (act. soc. z.-b. vind. 1858). *C. polymorphum* Dollin. (in sched.). *C. Dollineri* Sz (in sched.).
173. *C. siculum* (DC. prodr. 1837). *C. palustre* var. *longispina* Jur. (1857). *C. microcephalum* Sz bip. in oe. bot. z. 1858 (ubi probatur Sprengelium sub *C. siculo* suo *Galactiten* tomentosam intellexisse, quare pro speciei auctore citari non potest).
174. *Carduus defloratus* (L. syst. nat. ed. X. 1759; sp. ed. II. 1763; syst. nat. ed. XII. 1767. Jacq. stirp. vind. 1762; fl. au. 1773); cl. Kerner (in sched. ad exs. a. 1881) de distributione geographica hujus speciei haec habet: *C. defloratus* in jugis orientalibus Alpium, et septentrionem et meridiem versus (Austr.—Carinth.), sat copiose adest, sed occidentem versus solum in meridionalibus provenit (sic in Tyrolia solam partem meridionalem provinciae occupat); in Helvetia rarus est (: *C. Argemone* "Lam." Schleich.) et subspecies *C. viridis* Kern. saepe pro eo sumitur; in prov. Veronensi pro nova specie (*C. summanus*) a Pollini descriptus est (1822). — Forma helvetica et veronensis in Consp. ad subspeciem *C. glaucum* citantur.
175. *Centaurea Sadleriana*; haec species non (ut vult cl. Borbás) ad *C. coriacea* W.K. pertinere potest, quia, inter alia argumenta, Kitaibel (teste cl. Janka) *C. Scabiosam* e loco *C. Sadlerianae* citat nec *C. coriaceam*; ceterum descriptio ejus in *C. Sadlerianam* non quadrat.
176. *C. arenaria*; sec. Borbás *C. banatica* Kern. identica est cum *C. arenaria*.

- MB. typica (hb. Willdenow.!), cujus varietas tomentosa est *C. arenaria* Szov., Lang, Kern.
177. *C. sordida*; sec. Borbás hæc species est planta hybrida et quidem var. *lutescens* K. = *C. rupestris* var. *brevispinosa* + *C. Scabiosa*, et var. *purpurascens* K. = *C. rupestris* var. *armata* + *C. Scabiosa* var. *badensis*.
178. *Taraxacum Pacheri* (Sz in Flora 1848); hab. Carinth. ad glacies alpis Grossglockner (a DPacher detectum 1847), Tyrol. alp. (ab Ausserdorfer lectum 1866 et 1867); species distinctissima, præcipue ob acheniorum (antice sensim attenuatorum) rostrum breve et crassum, qua ratione, observ. cl. Kerner, convenit cum *Taraxacis*, quæ montes altiores Persiæ et Anatoliæ inhabitant.
179. *T. leptcephalum* (Rehb. 1830); a *T. palustri* valde diversum est observ. Uechtritz (litt. 1881), pappo rufescenti, florescentiâ subautumnali etc. typum insignem præbens et species quasdam orientales in mentem revocans. *T. salsugineum* Lmtt. 1874 (P.-de-Dôme); cfr. descriptionem et historiam plantæ Arvern. in Lamotte prodr. fl. centr. (1881), ubi *T. gymnantho* proximum dicitur.
180. *Hieracium urticaceum* (Arv.-Touv. 1876); indicatur ad Villard-de-Lans (Dauph.) et suspicatur hybridum esse inter *H. Jacquini* Vill. et *H. amplexicaule* L. (: *H. Jacquini-amplexicaule* Arv.-Touv.). *H. rhombifolium* Arv.-Touv. (*H. ligusticum* Reut., Cariot, non Fr.) sistit hybriditatem *H. amplexicaule-Jacquini*.
181. *Crepis Jacquini* (Tsh 1818). *C. chondrilloides* Froel. (1838). *Hierac. chondrilloides* L.; Jacq. stirp. vind. 143. 273. *C. Adonis* Spr. pug. (1813). *C. chondrilloides* Jacq. stirp. vind. 312. *Andryala chondrilloides* Sep.
-
182. *Adenophora stylosa* (*Campanula stylosa* Lam.); cum *A. Lamarekii* (1) fere identica est sec. Trautvetter, qui (1879) utramque una cum *A. liliifolia* (2) sub titulo *A. communis* (Fisch.) junxit.
183. *Phyteuma Vagneri*; hab. in alpinis Hung. bor.-or. (comitat. Marmaros) et Transs. bor.; "in memoriam sagacissimi exploratoris floræ marmarosiensis L. Vagner denominatum, *P. nigri* Europæ occidentalis vicarium". (Kerner sched. ad exs. a. 1883).
184. *Rhododendron ferrugineum*; hæc species extra stationem suam elevatam (regio Pumlionis) interdum, exceptione rarâ, in demissioribus provenit; sic ad lacus Italiæ bor. Lago di Como et Lago Maggiore 200 metr. s. m. non attingit, et Guinier (1879) aliam talêm stationem commemorat scil. prope Grande-Chartreuse (dep. Isère), ubi in saxo quodam calcareo (580 metr. s. m.) viget frutex ille alpinus.
-
185. *Phillyrea angustifolia*; observ. cl. Lamotte drupa notas præbet bonas, ad hanc speciem a *P. media* certius distinguendam idoneas; est nempe in *P. media* subglobosa putamine globoso, in *P. angustifolia* subovalis (dimidio minor) putamine ovali.
-
186. *Stapelia europæa* (Guss. 1832). *S. Gussoneana* Jacq. f. in bot. reg. (1835). *Boucerosia* (Wight. Arn. 1834) *europæa* Car. fl. ital. VI. (1886). *Apteranthes* (Mik. 1835) *Gussoneana* Mik. (1835). Detecta a Gussoneo in rupibus calcareis ins. Lampedusa (1828).
-
187. *Gentiana Amarella*; hæc species sensu latissimo (Linnæano) sumta recentiores plures amplectitur, quas cl. Kerner ita disposuit: *a.* capsula sessilis vel subsessilis, corolla minor (*G. Amarella* p. d.). — *b.* capsula distincte stipitata, corolla major. *) æstivales fol. caulinis mediis obtusis (*G. obtusifolia*). **) autumnales fol. caulinis mediis acutis (*G. germanica*, *G. rhætica*, *G. Sturmiana*, *G. austriaca*).
-

188. *Cuscuta Trifolii*; hujus speciei modus crescendi, ab illo præcedentis (*C. Epithymi*) alienus, diversitatem harum specierum confirmat.

189. *Echium pyrenaicum*; immerito hoc cum *E. italico* jungitur, ut (sec. Bonnet) patet i. a. e culturis a Naudin institutis; hæ duæ species promiscue crescunt in Gallia meridionali, sed *E. pyrenaicum* arêa gaudet minori.
190. *Eritrichium nanum* (Schræd. 1820). *Myosotis nana* All. (1785); Wulf. ap. Jacq. (1786); Vill. (1787). *M. terglovens* Hacq. (1782). *Eritr. Hacquetii* K. syn. *E. terglovense* Kern. (1881).

191. *Datura Tatula*; ell. Focke et Buchenau e seminibus hujus plantæ, satione secunda vice repetita, *D. Stramonium* typicam obtinuerunt, sed sec. cl. Ernst in patria fere constans est (attamen ad Caracas non nisi in ruderalis, nec in montibus, adest).

192. *Linaria longipes*; cl. de Heldreich hanc speciem in Pamphylia detexit (1845) et denuo Mart. 1876 (cum Holzmann et Pichler) eam legit in litore saxoso capitis Skiradici ins. Salamis.
193. *Wulfenia carinthiaca*; de locis natalibus et de proventu hujus plantæ memorabilis in Carinthia cl. Jabornegg hæc habet: crescit abunde in solo pinguisimo montium inter vallem canalensem et vall. gibbiensem, et quidem in alpinis Granitzen-, Auernig-, Watschinger et Kuhweger-Alpe, in consortio *Rhododendri ferruginei* et *Hieracii intybacei*, inter 1500—1700 metr. s. m.; centrum ejus videtur Quernigg cum alpinis Watschinger et Granitzen, ubi inter 1600 et 1650 metr. s. m. viget.
194. *Pæderota Bonarota*; monente cl. Caruel (fl. ital.) genus Bonarota a Micheli bene conditum est et ab eo in honorem senatoris Buonarroti merito nominatum. Sed nomina generica præ-Linnæana resuscitare vetant leges nomenclaturæ botanicæ, a consilio botanicorum Parisiis a. 1867 sancitæ; quod igitur ita, in commodum omnium et ad majorem certitudinem, constitutum est, lubenter observem, salvâ erga veteres scientiæ principes reverentiâ.
195. *Veronica multifida* (L. 1753). Linnæus hanc speciem constituit e *Veronica montana* folio vario Buxb. cent., ubi descriptio et figura cum planta Linnæi congruunt.
196. *V. Ponæ*; est quidem species Gouani, sed exclud. synonym. ejus e *Pona allatum*, quod *Pæderotam Bonarotam* spectat; hanc ob causam Moretti (ital. dec. II.) speciem *V. Gouani* appellavit.
197. *Euphrasia stricta* (Host 1831). *E. officinalis* Hayne; Rehb. exc. *E. nemorosa* auct. plur. (non *E. officinalis* β *nemorosa* P., quæ = *E. Rostkovi*-*ana* Hayne = *E. micrantha* Rehb.). — *E. montana* Fr. (*E. officinalis* L. suec.) ad hanc speciem Hosteanam appropinquatur, sed cum ea non identica est. (: Kerner).
198. *E. arguta*; in hac flores majores sunt quam in præced. (*E. stricta*), cui ceterum prope accedit; habitû quodammodo similis est *E. alpinæ* Lam.
199. *E. picta*; corolla in hac alba est vel dilute violacea, vel galeam habet violaceam et labium album sed striis intense violaceis et maculis luteis pictum. *E. coerulea*, quæ huic proxima, corollam habet minorem et intense lilacinam. *E. alpestris* (W.G.) flores habet quam in *E. picta* majores et vulgo albos; præcipue in parte moravica jugi montani Gesenke dicti (inter 1100 et 1200 metr. s. m.) obviam venit. (: Freyn. ap. Kern. 1883).
200. *E. carniolica*; hæc quoad characteres medium tenet inter *E. tricuspidatam* L. et *E. alpinam* Lam.; cl. Kerner eam primum (1851) legit in valle Isonzo, ubi copiosissima, et tunc pro *E. tricuspidata* habuit.
201. *Rhynchocorys elephas*; Colonna (lat. Columna) hanc plantam in mte Matese (vall. Campociaro) detexit et in *Euphrasi* suo primus delineavit;

nomen genericum a Necker propositum (Probosciphora) ægre admittetur, quia contra leges nomenclaturæ peccat.

202. *Pedicularis Jacquini*; cl. Kerner monstravit (sched. ad exs. a. 1881) *P. rostratam* Jacq. cum illa Linnæi omnino convenire; Linnæus in *Speciebus* suis plantam austriacam (in loco classico Raxalpe etiam hodie vigentem) fere solam respexit, adeo ut non nisi synon. Halleri excludendum sit; immerito igitur Kochius plantam Hallerianam helveticam nomine *P. rostratæ* salutavit, quare hæc novo eget nomine (: *P. rhætica* Kern. sched. ad exs. 1881. *P. Kernerii* Dalla Torre 1882 non Huter 1871).
 203. *P. lanata*; planta uralensis, sicut illa Novæ-Semliæ et Spitzbergæ, sistit varietatem dasyantham Trautv. (in typica galea cor. glabra est = var. *leiantha* Trautv.).
 204. *P. acaulis*; planta rara, cujus loca specialia vid. ap. Deschmann in Kern. sched. ad exs. 1883; prope Labacum (Laibach) crescit sub umbra *Quercuum* vetustarum ad Stoschze, loco sat circumscripto et ab umbra arborum limitato.
 205. *Melampyrum moravicum*; sec. Bubela (1886) est forma *M. nemorosi* (varietati subsimplici Uechtr. valde proxima), quæ locis apricis, magis insolatis, delectatur.
 206. *M. bihariense* Kern. in sched. ad exs. 1881. *M. subalpinum* Kern. in oe. bot. z. 1863 (p. p.) "*Melampyrum* hocce in alpinis bihariensibus, et in toto montium tractu ab his usque ad Danubium, speciei typum (*M. nemorosum* L.) substituit": Simkovicz.
-
207. *Orobanche lucorum* ABr. ap. FSz 1830 (sine descr.); M.K. (1833); huic valde proxima (nisi cum ea identica) est *O. Rubi* Dub. (1828) = *O. Rubi fruticosi* FSz (1830) = *Orobanche de la Ronce frutescente* Vauch. (1827).
 208. *O. major* (L. 1755). *O. elatior* Sutt. (1797). *O. stigmatodes* Wimm. (1840); hæc species sæpius in Centaureis crescit, raro in *Echinopsidibus* (= *O. Echinopsis* Panc. 1868). — *O. major* Lam., DC., Duby et al. est = *O. Rapum* (*O. Genistæ* Thuill.). *O. major* Jacq., Cr. et al. est = *O. lutea* Bmg. (*O. rubens* Wallr.). Kerner.
 209. *Lathræa rhodopea*; detecta a cl. Dingler (Maj. 1876) in declivibus borealibus montis Karlykdagh jugi meridionalis Rhodopes, supra pagum Essekköi, ubi inter folia putrescentia et radices fagorum crescit; habitû similis est *L. Squamariæ*, sed quoad fructum generi *Clandestiniæ* appropinquatur, ceterum *L. japonicæ* Bth., ut videtur, accedens.
-
210. *Salvia ceratophylloides*; Ard. anim. alt. (1764); L. mant. 1767. Ardoino semina hujus speciei, ab eo in horto patavino cultæ, e Sicilia habuit, sed nec Gussone nec alii eam ibi reperiunt; adest vero in collibus prope Reggio Calabriae.
 211. *Scutellaria peregrina*; Linnæus sub hoc nomine etiam (et quidem pro max. p.) *S. Columnæ* All. comprehendebat, quare cl. Caruel nomen peregrini rejecit et præsentem *S. Linnæanam* salutavit (fl. ital. 1884). — *S. Sibthorpii* (*S. peregrina* Sibth.); sec. Caruel est = *S. Gussonii* Ten.; an huc "alia huic simillima", de qua Linnæus loquitur in *Speciebus* suis sub *S. peregrina*?
 212. *Lamium Orvala*; Micheli e monstrositate hujus plantæ, corollam omnino quadripartitam præbente, quam in itinere ad Garganum detexit, genus novum *Papia* constituit, quod nomen Linnæus in *Orvala* mutavit; speciem e loco nominavit (: *Orvala garganica*), sed nullus recentiorum hanc plantam in Gargano detegere potuit.
 213. *Betonica alopecurus*; Linnæus (spec. 1753), ex auctoribus ab eo citatis et e locis allatis, sub hoc nomine plantam occidentalem, Pyrenæos et Alpes Galliae et Italiae inhabitantem (terminus orientalis in Tyrol. mer.-oce), po-

- tissimum respexit. — B. Jacquini G.G. 1850 (B. alopecurus Jacq. 1773) est planta magis orientalis, a Tyrol. mer.-or. (Kirschbaumer-alpe!) per Carinthiam, Styriam et Austriam p. d. distributa. Kerner.
214. *B. officinalis*; *B. danica* Mill. *B. officinalis* fl. dan. 726 (1778). *B. stricta* Ait. (1789), Rehb.; est major et pilosior, foliis radicalibus latioribus quam in: — *B. hirta* Rehb. (non Leys.), quæ est forma latius distributa, versus septentrionem usque in Sueciam progrediens; *B. hirta* Leys. est = *Stachys recta* L. (: Kerner).
215. *Nepeta nuda*; cl. Kerner jam 1874 monuit plantas tres diversas sub hoc titulo commutari scil. 1. *N. violacea* Vill. (Europa mer. et med.). — 2. *N. pannonica* Jacq. (Hung. et, ut videtur, mte Morrone Aprut.). — 3. *N. nuda* Jacq. (Illyr. et usque ad Græciam bor., ubi a Heldreich 1879 in mte Velucho Eurytaniæ lecta est); ultima a duabus aliis, quæ magis inter se conveniunt, valde recedit, sed rara est et in statu spontaneo paucis cognita, nuper a Freyn descripta (Flora 1884).
216. *Thymus striatus* Vahl (1794). *T. acicularis* W.K. (1805) sec. Kern.! *T. angustifolius* Rehb. exc. p. p. (non P.). Kerner specim. authent. Kitaibelii comparavit cum speciminibus e Croatia, Dalmatia, Italia (etiam e loco classico ad Neapolin) et Sicilia, quæ omnia cum planta Kitaibel. fere identica esse intellexit (in italicis et siculis folia sæpius breviora et relative latiora observavit).
217. *Mentha seriata* (Kern. sched. ad exs. a. 1882). *M. Rosani* Ten., quæ simillima, foliis ellipticis, pectinato-dentatis, supra glabris (etc.) diversa est.
218. *M. alpigena* (Kern. sched. ad exs. a. 1882). Floret fere mensem serius quam proxima *M. candicans*, quæ in eodem loco crescit, quare cl. Kerner eam primum (oe. bot. z. 1870) *M. serotinam* nominavit, sed hoc nomen jam antea ab Host et Tenore usitatum est.
219. *M. gentilis*; sec. Malinvaud hæc species in Gallia fere tota deest et erronee ibi indicata est post Gren. et Godr., qui formas varias *M. arvensis* et *M. sativæ* cum ea commutarunt, ut ex herbar. Grenier. patet; hucusque solum in dep. Haute-Savoie lecta est (*M. cardiaca* Bill. 3750 non Ger.); *M. cardiaca* Ger. est alia varietas, scil. *M. Pauliana* FSz. = *M. intermedia* Puget 1868 (in Consp. hæc sub *M. arvensi* allata est).
-
220. *Primula pubescens*; historia hujus plantæ plenius exposita (sec. AKerner 1875) hæc est: Clusius eam primum vidit in horto professoris vindobonensis Aichholz et dein spontaneam in alibis salisburgensibus detexit. Sed post eum nullus botanicorum eandem ibi reperire potuit, et nec in Pusterthal nec in Tyrolia bor. spontaneam lecta est (tamen ibi in hortis rusticorum sæpe culta), usque dum cl. Kerner a. 1867 locum a Clusio indicatum, ab urbe Innsbruck mer.-occidentem versus situm, redetexit. *Primula* illa ibi copiose crescit in mte Hematkehl supra pagum Gschnitz ad limites schisti (ubi *P. viscosa*) et calcis (ubi *P. Auricula*), inter 1700 et 1800 metr. s. m.; porro ad pedem montis Garklerin obviam venit, et etiam in declivitate boreali jugi Piniserjoch et in jugo montano vallem Piniserthal orientem versus limitante lecta est. Clusius plantam, de qua nunc agitur, e Vindobona misit ad dom. Van der Dift in Belgio, qui eam cum hortulanis et florum amatoribus communicavit, unde demum per hortos plurimos Europæ divulgata est.
221. *P. Floerkeana* Schrad. in Krünitz oecon. enc. 1811 (sed tantum p. p. ex Kern.). *P. salisburgensis* Floerke in sched. 1798 sec. Schott (wilde Primel-Blendl. 1852).
222. *Androsace Chamæjasme* Host (1797). *A. villosa* Kramer (1756); Jacq. (1762). Linnaeus ex citatis e Clusio et al. etiam hanc speciem sub *A. villosa* sua intellexit, sed quoad loca citata ("Alpes rhæticae et Pyrenæi") tantum pro parte, quia in Pyrenæis non crescit. (: Kerner).

223. *Globularia Willkommii*; Dr Saint-Lager in tractatu *Vicissitudes Onomastiques de la Globulaire vulgaire* (1889), mihi benigne transmissa, *Globulariam rariorem* (suecicam etc.) cum vulgatori sequente tamquam varietatem (var. coriacea St-Lager) jungendam esse contendit et post expositam, multâ eruditione, historiam nomenclaturæ speciei, censet delendum esse nomen (*G. Willkommii*) a me propositum. Sed animadvertere liceat quod quæ refert auctor doctissimus argumenta graviora, e theoria, a legibus nomenclaturæ vulgo acceptis recedente, petita sunt. Linnæus sine dubio in opere *Species Plantarum* et hanc et speciem sequent. sub nomine *G. vulgaris* comprehendebat, sed in dijudicanda questione cui nunc pertineat nomen vulgaris, diagnosis ejus et citata primaria plus valere debent quam synonyma, quæ in edit. tam I. quam II. operis dicti citavit.
-
224. *Atriplex tatarica*; cl. Ascherson ex observatione propria intellexit specimen *A. tatarici* hb. Linn. sistere *A. (laciniatam) arenariam*, unde monuit (1872, 1882) nomenclaturam huc usque a plurimis (etiam a me) usitatum mutandam esse. Sed hoc specimen vix sufficiat ad speciem orientalem in occidentali dicta querendam, præcipue cum notum est commutationes speciminum in herbario Linn. non valde raras esse; ceterum fons speciei non est herbarium Linnæi sed ejus Hortus Upsaliensis (semina a Gmelin habuit). Commemorare liceat quod in hb. Mus. Holm. servatur specimen tale *Atriplicis* (arenariæ?) e reliquiis Linnæanis in hb. Solander. et cum londinensi probabiliter identicum. Constat e ramo (vel ramulo) plantæ nunc dictæ, more solito chartæ minori adglutinato, in qua a tergo superne manu Linnæi legitur: *A. caule fruticoso foliis lanceolatis obtusis*. Gmel. Ross. Sub hac phrasi (quæ *Obione portulacoides* Moq. var. significat), in medio chartæ, manu Solanderi, citantur diagnosis et patria (Tataria) *A. tataricæ* L. sp. (ed. I. 1053. 3). Sub ipso specimine vidimus, manu Linnæi, signum → et numerum 3 (quod *A. tataricam* L. sp. ed. I. significat).
-
225. *Rumex biformis*; *R. crispus* var. *odontocarpus* Sandor ap. Borb. (1879). *R. stenophyllus* Simk. (ex Hung.) et Becker (exs. sæpt.) non Led. — Hæc planta crescit gregarie in paludosis exsiccatis, in areis domiciliorum, circa domos rusticorum, ad vias etc., aut sola, sine aliis Rumicibus, aut non nisi in consortio *R. crispi*. (: Borbás).
-
226. *Euphorbia dulcis* L. sp. (1753); Jacq. au. (1775). *E. solisequa* Rchb. exc. — Smithius, cum in hb. Linn. sub nomine *E. dulcis* duo specimina *E. verrucosæ* unacum specimine unico alius speciei (*E. thamnoidis* ex Boiss.) invenerit, putabat *E. dulcem* L. in illa *E. verrucosa* querendam esse et ut talem in flora græca proposuit. Sed aliter docent quæ de specie sua scripsit Linnæus et planta quam in loco classico vigentem delineavit Jacquinus.
-
227. *Quercus pseudopedunculata*; glandes hujus arboris parvæ sunt et per 2—3 pedunculo brevi lignoso insident; folia majora quam in ceteris *Quercubus pedunculatis* montium Croatiae.
228. *Q. lanuginosa*; sec. Wiesbaur (1880) etiam in mte Leopoldsberg pr. Vindobonam observari possunt plures, ad *Q. lanuginosam* pertinentes, s. d. species *Quercuum croaticæ*, scil. *Q. crispa* Vuk., *Q. brachyphylloides* Vuk., *Q. susedana* Vuk., *Q. pinnatifida* Vuk.
229. *Q. conferta*; ab indigenis et silvicultoribus jam antiquitûs distincta, in Hungaria meridionali silvulas constituit.
-
230. *Abies sibirica*; etiam in loco quodam gub. Petropolitani forse spontanea adest sec. Beketow in bull. mosc. 1865; antea locus natalis maxime occidentalis hujus arboris erat ad lacum Koubinskoye gubernii Wologda.

231. *A. Omorica*; b. Panċie hanc arborem primum vidit 1875 ad pagum Zao-vina Serbiæ (ubi ab incolis Omorika nuncupatur), sed jam 1871 in dendrologia sua serbica de ea loquitur et nomen arboris vernaculum jam antea philologis innotuerat (: Bolle). Frequentior crescit ad Crvena Stena supra Rastite et talis provenit etiam in territor. Drobnjaci principat. Montenegro et in montibus ejus notissima dicitur. Panċie observat Omorikam, corona pyramidalis et statura gracili, in majorem excrescere altitudinem quam *A. excelsa*. Porro notandum est folia ejus quoad structuram anatomicam convenire cum illis proximæ *A. ajanensis* Lindl., quæ speciei orientali-asiaticæ et boreali-americanæ *A. Menziesii* accedit (: A Braun), unde concludere liceat Omorikam esse superstitem e temporibus illis remotissimis cum, separatis nondum Asia et America boreali, silvæ in his terris et in Europa existebant consimiles.
232. *Pinus nigricans* Host in Sauter geogr.-botan. schild. d. umgeb. Wiens (1826). *P. Pinaster* Schult. (1814); Höss in Flora 1825 (non Ait.). *P. nigrescens* Host in cat. hort. vind. 1822 (postea hoc nomen mutavit). *P. austriaca* Höss monogr. d. schwarzföhre (1831). *P. Laricio* K., Neilr. (non Poir.). Cfr. historiam plenam et criticam nomenclaturæ hujus speciei a cl. Kerner expositam in sched. ad exs. a. 1882. — De area et distributione geographica arboris laudatus auctor (l. c.) hæc habet, quæ breviter heic transcribere liceat: *P. nigricans* in Austria adest spontanea solum in collinis et montanis Danubium a meridie spectantibus et quidem in territorio limitibus sat arctis circumscripto. Excubias occidentem versus agunt montes ad exitum vallis Höllenthal ad Hirschwang ripæ dexteræ amnis Schwarza, territorium fluvii Traisen et monticuli, qui prope Hollenburg ripam dexteram Danubii limitant. His locis arbor, de qua agitur, non nisi sparsa et solitaria, vel paucis individuis juncta, crescit, sed in montibus calcareis, ante m. Schneeberg sitis, inter amnes Sirning et Mödling, silvas extensas sola constituit (locus classicus est in declivibus montium ad oppidum Mödling, 300 metr. s. m.). Silvæ tales adsunt quidem etiam in planitie ad Wiener-Neustadt, sed satte. Terminus verticalis arboris in monte Feuchta alpis Schneeberg est (sec. Kerner) 1247 metr. s. m.
233. *P. brutia*; sec. CKoch hæc arbor in statu spontaneo non observata est et satione in *P. halepensem* mutatur, quare ex eo nihil aliud videtur quam hujus forma inconstans (strobilis verticillatis), sed cum p. t. aliquid certi de hac re vix statuendum est, commemorare liceat quod etiam cl. Schouw, qui coniferas italicas bene novit, arbor hæcce propria erat species.
234. *Alisma arcuatum*; b. Caspary (1883) culturâ (e seminibus) *A. graminifolii* Ehrh. probavit hoc identicum esse cum *A. arcuato*, cujus forma fluitans vel submersa sistit; in aqua minus profunda cultum folia latiora *A. arcuati* profert (: forma terrestris); etiam cl. Royer (1883) hanc speciem e statione ortam declaravit (cfr. ej. Flore de la Côte-d'Or). Borbás eam ab anno 1877 in Hungaria (comitat. Pesthin.) observavit et Celakowsky docuit (oe. bot. z. 1885) hanc plantam jam a Knaf (1830) in Bohemia lectam esse. — *A. graminifolium* Ehrh. (*A. Plantago* var. *graminifol.* auct.). *A. angustifolium* Pr. (*A. longifolium* Pr. est forma natans).
235. *Althenia Barrandonii*; sec. Loret et Barrandon Fl. Montp. 673 et 790 *Althenia filiformis* typica Mompelii non adest, sed sola hæc subspecies, quæ a Delile detecta est (1823); cl. Duval-Jouve eam prope Cette legit. Commemorat cl. Loret quod Delile plantulæ tunc incognitæ descriptionem et iconem (addito nomine *Bellevallie australis*) in herbario suo deposuit, sed postea putabat plantam suam mompeliensem eandem esse ac *Althenia filiformis*, quam Petit post inspectionem herbarii Delilei publicaverat, quare etiam huic nomen *Bellevallie australis* tribuendum esse scripsit (in plagula seorsum impressa), nomine *filiformis* in setaceam mutato (*Alteinia*).

236. *Iris pseudo-pumila*; cl. Kerner observat quod *I. pseudo-pumila* Jka identica est cum *I. pumila* L., vel non nisi ejusdem status vegetior, et *I. Chamæiris* G.G. = specim. origin. Tinei *I. pseudo-pumilæ*.
237. *I. Gùldenstædtiana* Lepechin (in act. acad. scient. petropol. IX. 1784 pag. 292—4), qui speciem descripsit secundum plantam in Horto Petrop. enatam e seminibus a Gùldenstædt ad flumen Terek lectis.
238. *Crocus Thomasii*; de hac specie cl. Lacaita benevole mihi scripsit (1883): detexi ad Taranto, loco dicto Leucaspide, unde ad Ginosa et procul dubio ultra Lucaniam (hodie Basilicata) progreditur, sed ex errore a Tenore in Calabria et prope oppidum Gravina in Lucania indicatur (convalles nempe, in quibus provenit hic *Crocus*, vulgo "gravine" dicuntur); specimina calabrica omnia ad *C. longiflorum* referenda sunt.
239. *Corbularia cantabrica*; sec. Fenzl (1873) *Narcissus Clusii* Dun. est species algeriensis, e flora hispanica (et europæa) excludenda; est nempe *Clusii Pseudonarcissus* e Vizcaya = *Narcissus (Corbularia) Graëllsii* = *N. cantabricus* DC. = *Corbularia albicans* Haw., quæ ultima igitur et *N. Graëllsii* et *N. Clusii* Willk. (non Dun.) comprehendere debet.
240. *Tulipa spathulata* typica, a Reboul detecta et non nisi Florentiæ (in campis cultis ad villa Antinori) obvia, ex cl. Levier male cum *T. Gesneriana* juncta est duce Parlatoreo, cujus planta (in campis compluribus Hetruriæ obvia) nomine *T. connivens* Lev. salutanda est, quia a *T. Gesneriana* orientali (*T. orientalis* Lev.) omnino diversa. Sed typus spontaneus plantæ, quæ sub hoc nomine (*T. Gesneriana* L.) in hortis colitur, adhuc incertus manet. Levier: "l'origine des Tulipes de la Savoie et de l'Italie" in arch. ital. de biol. 1884. sep. 1—29 (*); cfr. etiam in bull. neuch. 1884. 260 et 267.
241. *Gagea succedanea*; cl. Kerner specimina possidet e Pesthino, banaticis (in m. Treskovac pr. Svinica a Janka lectis 1870) omnino similia, sed incertum videtur an non species hæc Grisebachii ad *G. pusillam* Schult. pertineat vel potius prolem hybridam a *G. pratensi* et *G. pusilla* sistat.
242. *G. amblyopetala*; cl. Janka hanc educavit e bulbis, quos cum glebula e Byzantio domum transtulit; attenter examinatis speciminibus sic enatis, intellexit hanc *Gageam amblyopetalam* cum sicula *G. chrysantha* R.S. identicam esse.
243. *Botryanthus stereophyllus* (Herbich 1853). *Muscari pallens* Bess. 1822 (non *Hyacinthus pallens* MB.). *M. leucophæum* CKoch (1849). *Hyacinthella leucophæa* Schur (1856).
244. *B. Kernerii* Nym. consp. suppl. II. 307. *Muscari Kernerii* Marches. in bollet. adriat. 1882. Tergesti copiosissimus est in declivibus graminosis collis arenacei inter Rojanum et montem Terstenicum. Flores quam in *B. vulgari* typico minores et pallidiores, scapus gracilior.
245. *B. Lelievrii*; sec. Cesati (teste Heldr.) *Muscari Strangwaisii* Ten., sub hac (et præced.) specie citatum, nec non *Scilla Strangwaisii* ejusd. auct., sunt species omnino apocryphicæ, descriptione et figurâ carentes, nec specimine ullo authentico suffultæ.
246. *Allium paterfamilias*; bulbilli numerosi brunnei, "semina Fagopyri simulant" (Becker), fibris connexæ, bulbo insident; hinc nomen plantæ.
247. *A. pallens*; sec. Kerner hæc species est solum forma ebulbillosa (magis meridionalis) *A. oleracei* (= *A. intermedium* DC. et *A. paniculatum* α G.G.).
248. *Bulbocodium ruthenicum* Bge (sem. hort. dorp. 1837). *B. vernum* Neilr. (non L.). Perigonium quam in *B. verno* minus, laciniis interioribus basi exauriculatis (in *B. verno* truncato-auriculatis); folia kete viridia (in *B. verno* glauca).

249. *Juncus supinus* Mch. enum. hass. (1777). *J. bulbosus* L. sp. ed. I. (1753). *J. uliginosus* Rth. (1788). *J. subverticillatus* Wulf. (1789).
-
250. *Chamærops humilis*; in Balearium ins. Mallorca ob clima marinum et tepidum usque ad 860 metr. s. m. provenit, hinc inde (etiam circa 300 metr. s. m.) maximam partem vegetationis constituens; in declivibus suprasylvaticis montis Atalaya vey, immo usque ad cacumen (610 metr. s. m.), copiosa adest (: Willkomm). In loco ligustico (inter Monaco et Montalbano) jam ab anno 1841 destructa erat ex Ch. Martins; in locum nicæensem (St-Hospice) forse olim e mauris introducta erat observ. Alph. Decandolle (geogr. botan.) et Barbey (fl. sard. comp.); locus igitur maxime borealis, ubi nunc provenit hæc palma, est insula parva tyrrhenica Capraja.
251. *Phoenix dactylifera*; hujus palmæ silva magna et inclyta, quæ ad Elche in prov. Alicante Hisp. mer. viget, nunc, ut nobis traditum est, constat ex arboribus circa 80000 (quarum circiter 4000 fructiferae); arbores ibi usque ad 80 ped. altitudinem attingunt (in Italia ad maximum 40 ped.). Ad oram Mediterranei borealem numerosissima dicitur hæc Phoenix (circa 4000) inter Ventimiglia et San Remo (sed fructus non format), pulcherrima vero in Monaco (qualis etiam in Hyères admiratur). R.A. Philippi affirmat (1879) eam in Sicilia fructus maturare, quamquam vix edules.
-
252. *Typha Shuttleworthii*; hæc in Hung. non rara est teste Borbás, ex ejus sententia sit species *T. latifoliae* parallela, præcocior, asyngamica.
253. *T. minima*; auctor hujus speciei est Hoppe (bot. taseh. 1794. 187), sed nomen ejus ibidem pag. 118 a detectore H.C. Funck datum est (scribendum igitur: Funck ap. Hpe 1794); post hoc venit Braune (Salzb. Flora 1797).
-
254. *Carex ornithopoda*; adest magnâ copiâ in planitie Donauauen ad Lang-Enzersdorf, ubi certe ab aqua ex alpibus devecta est; etiam in insula Habern ad Pressburg crescere dicitur.
255. *C. membranacea*; specimina originalia Hoppii (ex alpe Pasterze) vegeta sunt, spicis crebris, magnis; glumæ saturate brunneæ, margine albidæ et membranaceæ.
256. *C. vaginata* (Tsh 1821). *C. panicea* var. *A. Liljebl.* (1798). *C. panicea sparsiflora* Whlnb. (1812).
257. *C. kattedgatensis*; de hac planta cl. Riedley commentationem criticam cum icone in Journ. of botan. 1885 edidit; ibi etiam variæ species vel formæ huic affines, ab eo examinatæ, tractantur et sic disponuntur: 1. *C. salina* typica (major) cum synonymis *C. cuspidata* Whlnb. *C. hematolepis* Drej. *C. halophila* Nyl. *C. kattedgatensis* Fr. *C. arctophila* Nyl. *C. flavicans* Nyl. *C. bicolor* Nyl. (non All.). *C. salinoides* Beurl. 2. *C. salina* minor cum synonym. *C. reducta* Drej. *C. subspathacea* Wormsk. *C. discolor* Nyl. *C. epigeios* Fr. (sum. veget.).
-
258. *Digitaria paspaloides*; hæc planta in Gallia primum e Burdigala (Bordeaux) et Bayona innotuit; dein (ab anno circiter 1870), secus flumen Adour usque ad Aquas Terbellicas (Dax) adscensa, tam increvit ut vegetatio primaria (indigena) ab ea multis locis expulsa sit. (: Dubalen).
259. *Leersia oryzoides*; hoc gramen probabiliter in septentrionalia immigravit e calidioribus cum avibus migratoriis, quæ spiculas et semina, ope ciliarum glumarum pennis adnexa, secum tulerunt.
260. *Coleanthus subtilis* (R.S. 1817). Roemer et Schultes nomen genericum Trattinikii, in memoriam Wilibaldi Schmidt datum, mutaverunt ob Smithiam parum similem.
261. *Spartina stricta*; P. Loefling, discipulus Linnæi dilectissimus et meri-

tissimus, hoc gramen prope Ulysiponem (Lissabon) a. 1751 legit et sub nomine *Dactylis cynosuroides* descripsit, quam descriptionem Linnaeus in Loeffl. it. hisp., ab illo 1768 edito, publicavit.

262. *Phalaris paradoxa*; P. Sibthorpii Grsb. (*P. appendiculata* Schult.) est forma in Graecia vulgata. Dimorphismus spicularum in hac specie jam Linnaeo cognitus, etiam in *P. aquatica* (*P. bulbosa* Cav.) a cl. Hackel (1870) observatus est. Spica enim hujus matura in septem fasciculos secedit, quorum unus solum fertilis est, ceteri vero vacui et scariosi quare, alarum instar, ad rupturam et dispersionem fasciculi fertilis (seminiferi) faciliorem reddendam multum adjuvant.
263. *Maillea Urvillei*; *Urvilleus*, qui hoc gramen rarum detexit, speciem generi *Phalaris* adnumeravit (1822), probabiliter deceptus a similitudine quadam quam habet cum *Phleo arenario*, quod tunc plurimis erat *Phalaris*; observat tamen "*Crypsi schoenoidi* valde affinis" (inde *Phalaris crypsoides* d'Urv.). Sed teste Hackel (in Barbey fl. sard. comp.) hoc genus *Phleideis* adnumerandum est et ipsissimo *Phleo* valde proximum.
264. *Phleum echinatum*; locus speciei maxime borealis est in collibus Euganeis; loca mte Baldo et mte Bolca antiquitus quidem pro hoc gramine citantur, sed e commutatione ejus cum *Phleo* commutato Gaud. (: Goiran 1880).
265. *Sesleria tenuifolia*; hæc species a Wulfen in rupestribus apricis (karsth.) supra Tergestum, Duinum etc. detecta est et sub nomine *Cynosuri juncifolii* distributa, sed Schrader eam primus, secus specimina Wulfenii descriptam, publicavit (misso nomine Wulfen.).
266. *S. microcephala*; *S. ovata* Kern. (1881). *Cynosurus ovatus* Hpe ap. Sturm (1799). Hoppeus hanc speciem in alpibus salisburg. et carinthiacis detexit 1798. Kernerus (sched. ad exs. a. 1881) observavit *S. microcephalam* Kochii non esse identicam cum illa Lamarekii et Candollei et plenioram dedit synonymiam specierum affinium.
267. *Aira media*; teste Bonnet (1877) hæc species est tantum progenies locorum siccorum, insolatorum, quæ solo meliori et irrigatione uberiori in *A. cæspitosam* mutatur.
268. *Avena airoides*; specimina Hoppeana (dec. 9), cum borealibus comparata, multo magis densiflora sunt et pluriculmia, culmis crebrius foliatis (foliis longioribus, planis) quam specimina lapponica et islandica, sed speciminibus jemtlandicis (formæ vulgatoris) et norvegicis similiora.
269. *Vulpia myuros*; observ. cl. Celakovsky, tam descriptio Linnaei quam synonyma (exc. forse Barrel.) et loca (nec non herbarium) testantur hanc speciem esse veram *Festuca myuros* L.
270. *Bromus pannonicus* (Kumm. Sendtn. 1849). *B. erectus* var. *vernalis* Panc. (1856). *B. erectus* var. *pynotrichus* Borb. (1878). Cfr. Hackel in oe. bot. z. 1879 et Borbás ib. 1882.
271. *B. commutatus* (Schrader. 1806). *B. multiflorus* Host (non Weig.). *B. simplex* Gaud. (1812).
272. *B. mollis* (L. sp. ed. II.). *B. hordeaceus* L. sp. ed. I. *B. secalinus* β L. suec. ed. II. ("in hortis satus transit in *B. secalinum*, cujus varietas, e loco arido et duro pygmaeus"). Observat cl. Hackel quod Linnaeus synonyma, quæ primum sub *B. hordeaceo* suo citavit, postea ad *B. mollem* transtulit, *B. hordeaceum* suppressens, quamquam lapsu quodam eum tamquam var. sub *B. secalino* servavit; hoc vero serius in exemplari suo proprio libri corripuit, deleto ibi nomine *B. hordeacei* et adscripto illo *B. mollis*, testante Hartman fil. (adnot. de plantis suec. herb. Linn.). Cum hoc convenit quod in herbario ejus sub nomine *B. hordeacei* adest solus *B. mollis* et quod sub *B. secalino* vero adest specimen *Bromi mollis* a Linnaeo ipso "*B. hordeaceus*" inscriptum.
273. *Festuca pulchella* Schrad. (1806). *F. Scheuchzeri* Gaud. ap. Schleich. (1807); agr. helv. (1811). *F. nutans* Host (1809). *F. cernua* Schult. (1814).

274. *F. amethystina* L. (1753). *F. austriaca* Hack. in oe. bot. z. 1879. *F. ovina* var. *vaginata* K. (non *F. vaginata* Kit.); cfr. Kerner in oe. bot. z. 1879. Observ. cl. Hackel panicula in speciminibus helveticis e loco classico virilascens est, in austriacis plerumque viridis.
275. *F. vaginata* (Kit. ap. W.); cfr. Kerner in oe. bot. z. 1879 et flora austr.-hung. exsic. 279, ubi hoc gramen adest e loco classico Hostii: Weinhaus pr. Vindobonam.
276. *F. alpina* Sut. helv. (1802); Gaud. in Schleich. cat. (1807); agr. helv. (1811). *F. Halleri* K. et auct. plur. p. p. (non All.). — *F. Halleri* All., ut jam Hostius habet, cum *F. hirsuta* Host, in regione montana Alpium meridional. vulgata, identica videtur, nam Allioni auct. citat Bellardi, qui plantam "in montanis sterilibus" legit. Festuca vero (alpes altissimas inhabitans), quam Gaudin et al. pro *F. Halleri* All. habent, cum illa citata parum convenit, quare Kunthius eam nomine *F. Gaudini* salutavit.
277. *Poa Balbisii*; hæc species diu male intellecta est, quia huc usque non nisi in statu depauperato, abnormi (uni- vel subunispiculata) cognita erat (unde in Consp. ad calcem generis rejecta), sed nuper, detecta a Reverchonio forma ejus normali, a cl. Hackel (in Barbey sard. comp.) plene illustrata est. Reverchon eam etiam in Corsica legit (1879).
278. *Aegilops macrochaeta*; floret quatuordecim dies ante *Ae. ovata*; spica linearis, brevis, e spiculis 2—3 constituta.
279. *Ae. speltæformis*; Durieu accepit (1844) specimina *Ae. triticoidis* Fabreana, e quorum seminibus repetita vice plantas educavit, quæ primum variabant, sed post aliquot annos *Ae. speltæformis* typicam constanter dabant.
-
280. *Asplenium Seelosii*; hæc species priva est dolomite alpium calcarearum (620—6000' s. m.) et diu solum ex illis meridionalibus (Ampezzo—Cingol Rosso) cognita erat; serius secus vallem Pusterthal usque ad Carinthiam, nec non in Carnia et Istria, detecta est; demum etiam in Austria-Infer., loco quodam prope Schindleralpe, lecta est.
-
281. *Azolla caroliniana*; hæc plantula, ex horto botan. Burdigal. (Bordeaux) a. 1879 ad aquas circa hanc urbem a Durieu translata, ibi mox tam increvit ut Lemnam et Salviniam, immo Hydrocharin, fere expulsi (: ERoze); in hortis botanicis urbium italicarum Torino, Modena et Pisa jam a. 1882 quasi spontanea (immo molesta) aderat et etiam extra ultimam inquilina nunc legitur (: Arcangeli).

Index nominum et synonymorum,
præsertim novorum,
quæ in hoc Supplemento altero occurrunt.

Nomina specierum et subspecierum novarum
litteris cursivis impressa sunt,
alia omnia erectis.

- Abies Apollinis* 282. 1.a
cephalonica 282. 2
medioxima 283. 6*
Omorica 283. 4
panachaica 282. 2
Pinsapo 283. 4
Reginæ Amaliæ 282. 1.a
sibirica 283. 3
- Acanthus Caroli Alexandri* 245. 4.a
- Acer ætense* 75. 5*
cuneatum 76. 10
fallax 75. 3*
ibericum 76. 8
italum 75. 5
nebrodense 75. 1
Opizii 75. 1
orientale 76. 10
Ortmanni 75. 1
sempervirens 76. 10
vernum 75. 5
- Aceras Durandi* 292. 17×
- Achillea absynthifolia* 167. 23
aromatica 166. 15
Barbeyana 166. 13.a
Barrelieri 166. 13. 1
Boissieriana 166. 13.a
commutata 166. 12
dacica 166. 3*
dentato-serrata 168. 14×
fililoba 167. 6*
Haussknechtiana 166. 10×
helvetica 167. 21* 22
impunctata 167. 17
major 168. 14×
maxima 167. 14. 5
Millii 166. 13
monticola 167. 14. 5
Morisiana 166. 10*
- mucronulata* 166. 2
Neumayeri 166. 14
obscura 167. 21*
oxyloba 166. 3
rupestris 166. 9.a
tymphæa 168. 14×
tyrolensis 167. 23
virescens 168. 9
- Aconitum alpinum* 13. 22. 6
altissimum 13. 22. 1*
Baumgartenianum 13. 1*
Baumgartenii 13. 22. 6
lasianthum 13. 22. 1*
lasiosomum 13. 22. 1*
lusitanicum 13. 22. 6*
montanum 13. 22. 6
myoctonum 13. 22. 1
nasutum 13. 22. 3
nemorosum 13. 22. 7
triste 13. 22. 1*
Vulparia 13. 22. 1*
- Acropteris Seelosii* 346. 13
septentrionalis 346. 12
- Adenophora edentula* 206. 2. 1
- Adenostyles Kernerii* 177. 61. 2*
- Adonis abortiva* 3. 6×
micrantha 3. 6. 6
soproniensis 2. 6. 4
Walziana 3. 6×
- Aegilops Aucheri* 342. 7.b
bicornis 342. 7.a
biuncialis 342. 2
Heldreichii 342. 5*
macrochaeta 342. 103. 1
macroura 342. 7.b
speltoides 342. 7.a
uniaristata 342. 7
vulgari-triuncialis 342. 4×
- Aesculus Hippo-Castanum* 76
- Aethionema almijarense* 38. 66. 2*
creticum 38. 66. 2.a
- Agave americana* 299
- Agrimonia glandulosa* 116. 12. 2
- Agropyrum flaccidifolium* 104. 8
Goiranianum 104. 11
- Agrostis adscendens* 331. 50. 3*
albida 331. 50. 1
Biebersteiniana 331. 50. 10
byzantina 332. 14
groenlandica 331. 46. 8
hispidula 331. 50. 4
Mülleri 331. 50. 3*
nigra 331. 50. 4
surculifera 332. 50. 13
tarda 331. 50. 7.a
vinealis 331. 50. 1
- Aira brevifolia* 333. 69. 1
humilis 341. 99. 4.a
pachybasis 333. 69. 4
rhenana 333. 69. 1*
speciosa 333. 69. 1
subspicata 334. 74. 38
Wibelliana 333. 69. 2
- Ajuga hybrida* 247×
- Alchemilla algida* 117. 14×
Geheebii 117. 14×
glabra 117. 14. 1
helvetica 117. 14×
palmatifida 117. 14. 2
- Alkanna calliensis* 225. 13. 8.a

- methanæa* 225. 13. 2*
pinicola 225. 13. 2.a
Allium *achaium* 309. 53
ascalonicum 308. 17
atropurpureum 307. 4
atroviolaceum 308. 13.a
Beckerianum 308. 37.a
callimischon 309. 52.a
controversum 307. 4.a
cristatum 308. 20
densiflorum 308. 13
ericetorum 309. 42
erythreum 310. 73
frigidum 310. 68
Fussii 309. 56
gaditanum 307. 3.a
Guicciardii 300. 58*
hymettium 310. 67
kermesinum 310. 61
Kochii 307. 7*
longispathum 309. 49
magicum 308. 23
marginatum 309. 49*
Moly 308. 25
multibulbosum 308. 23
multiflorum 307. 4
obliquum 310. 79
obscurum 307. 6
paniculatum 309. 51. 56
Pardoii 307. 1.a
phalereum 310. 65
phthioticum 308. 34
pseudo-ochroleucum
 310. 62
pulchellum 309. 58
purpureum 308. 9
pyrenaicum 307. 4.a
Regelianum 307. 1
saxatile 310. 61
scaberrimum 308. 9
serbicum 310. 78
Sibthorpiannum 309. 52
staticiforme 310. 64
tataricum 308. 37.a
vaginatum 310. 78
Webbii 309. 57*
Weissii 310. 74
xanthicum 310. 62
Allosurus Stelleri 345. 2. 1.a
Alnus *incana* 282
pubescens 282
Aloë vulgaris 300
Alopecurus anthoxanthoi-
des 329. 32. 10.a
crypsoides 329. 32. 8
laguriformis 329. 32. 4
turicensis 329. 32x
Alsine alpina 68. 25
campestris 68. 13. 3
clandestina 67. 6
confusa 68. 16
frutescens 67. 8.a
montana 68. 13. 2
Pichleri 67. 3.a
propinqua 68. 26.a
ramosissima 68. 25
rhetica 67. 4*
subnivalis 68. 25
Althæa micrantha 72. 6. 2*
Athenia Barrandonii 288
filiformis 288
Alyssum Bilimeki 33. 53.
 7. a
chalcidicum 34. 23.a
dubium 33. 51. 9
hispidum 34. 30*
linearifolium 34. 31
ovirens 34. 10*
purpureum 33. 51. 9
siculum 34. 18
transsilvanicum 33. 53.
 8. a
Willkommii 34. 30*
Amarantus commutatus
 267. 4. 2
divaricatus 267. 3. 3
prostratus 267. 4. 2
Ampelodesmos bicolor 330.
 44. 1.a
Amsinckia angustifolia
 225. 16obs.
intermedia ib.
lycopsioides ib.
Anacharis Alsinastrum 285
Anagallis (collina) hispa-
nica 260. 6. 2*
Anarrhinum lusitanicum
 235. 10. 1
Anchusa Aucheri 223. 5.
 16 obs.
biceps 222. 5. 2
macrocalyx 222. 5. 2.a
osmanica 222. 5. 2.b
pustulata 222. 5. 2*
spinocarpos 227. 24. 5.a
stricta 223. 5. 5*
Andropogon ambiguus
 327. 8. 1
pilosum 327. 8. 1
provinciale 327. 8. 5
pubescens 327. 8. 2
Androsace articulata 263.
 14. 5*
Charpentieri 263. 15. 4
Escheri 263. 14x
filiformis 263. 14. 4.a
Friesii 263. 14. 3*
lactiflora 263. 14. 2
triflora 263. 14. 5.a
Vitaliana 263. 13. 1
Andryala allochroa 190.
 113. 3*
dissecta 190. 113. 3*
Picalhoana 190. 113. 5*
Anemone alpina 353. 2
Burseriana 2. 3. 6*
coerulescens 2. 4. 12
grandiflora 353. 2
lepidia 2. 4. 1*
Mouansii 2. 4. 1*
Pavoniana 2. 4. 5.a
Reginæ 2. 4. 1*
stellata 2. 4. 1
Ventreana 2. 4. 1
Angelica brachyradia 136.
 20. 5.a
pachyptera 136. 19. 1
Pancicii 136. 20. 5.b
Anthemis cinerea 165. 12*
Fussii 165. 10. 1
Haynaldi 165. 23
hydruntina 165. 18.a
Ismelia 165. 13
metallorum 165. 33
meteorica 165. 20.a
Muentzeriana 165. 30.a
multicaulis 165. 23
Anthoxanthum amarum
 328. 25. 1
odoratum 328. 25. 2
Anthriscus nitida 143. 68. 2
Anthyllis alpestris 87. 16. 13
carpatica 87. 16. 13*
Cherleri 87. 16. 13
genistoides 87. 16. 2
tricolor 87. 16. 13*
Antirrhinum assurgens
 231. 8. 4
Charidemi 232. 8. 11.a
cirrigherum 232. 8. 6
compositum 232. 8. 5
hispanorum 232. 8. 9*
nanum 232. 8. 13
ottomanum 232. 8. 6
Aplectrocapnos bætica 17.
 2. 2
integrifolia 17. 2*

- Aquilegia aragonensis* 13.
 21. 7. *a*
aurea 12. 21. 4. *a*
Baumgartenii 12. 21. 1. *b*
discolor 13. 21. 7. *b*
Fussii 12. 21. 1. *b*
hirsutissima 12. 21. 6
longispala 12. 21. 1
nevadensis 12. 21. 1. *c*
nigricans 12. 21. 1. *a*
ochroleuca 12. 21. 1
orthoceras 12. 21. 1. *a*
speciosa 12. 21. 1*
subscaposa 12. 21. 1. *a*
transsilvanica 12. 21. 1. *b*
- Arabis anachoretica* 21. 24
apennina 21. 23
cantabrica 21. 24. *a*
carpetana 21. 30. *a*
Coste 21. 17. *a*
croatica 21. 31*
heterophylla 21. 30*
Hornungiana 20. 18. 7*
intermedia 21*
latifolia 21. 20
multijuga 21. 30*
nana 21. 24
pauciflora 20. 18. 3
rhætica 21*
sabaudia 21*
subnivalis 21*
- Arbutus nothocomarum* 214.
 7. 1
- Arceuthos drupacea* 284
- Archangelica alpina* 136.
 19. 1
- Arctium ambiguum* 179.
 73*
mixtum 179. 73*
pubens 179. 73. 1*
subracemosum 179. 73*
- Arctophila effusa* 339. 91.
 1*
fulva 91. 2
- Arctotis acaulis* 178. 66 obs.
- Arenaria aggregata* 67. 46
bavarica 65. 6. 6
cæspitosa 69. 6*
cantabrica 66. 24
ciliaris 66. 30. *a*
conica 66. 25. *a*
densa 65. 7. 9
Huteri 65. 7. 9*
lapponica 68. 18
Loscosii 66. 30. *b*
minutiflora 66. 24*
- pseudarmeriastrum* 67.
 43*
rotundifolia 66. 18
sphagnoides 65. 6. 10.
 68. 20
tejedensis 65. 7. 15. *a*
transsilvanica 65. 7. 18
- Aretia brutia* 263. 15. 5*
imbricata 263. 15. 8
Mathildæ 263. 15. 5*
multiflora 263. 15. 8
tomentosa 263. 15. 8
- Arguzia cimmerica* 211. 1. 1
- Armeria castellana* 265. 32*
berlengensis 265. 11. *a*
fasciculata 265. 6
gracilis 265. 25
Langei 266. 38
pungens 265. 6
rhenana 265. 34*
sancta 265. 15. *a*
- Aronicum viscosum* 161. 3.
 1. *a*
- Arrhenatherum biaristatum*
 333. 73. 1
palestinum 333. 73. 1*
rumelicum 333. 73. 2
- Artemisia bothnica* 170. 16*
selengensis 171. 32. *a*
Stelleriana 171. 35 obs.
Verlotorum 171. 32. *a*
- Arthrocnemum coralloides*
 269. 16. *a*. 1
- Arum albispalum* 315. 3*
gracile 315. 7
intermedium 315. 7
orientale 315. 6*
- Asparagus maritimus* 299.
 8. *a*
oxycarpus 299. 6
- Asperula Bœnitzii* 156. 38. *a*
Boissieri 156. 21. *b*
Neilreichii 156. 15. *a*
oetea 156. 35*
pinifolia 156. 35
pulvinaris 156. 21. *a*
supina 156. 15
- Aspidium Braunii* 346. 12. 1
montanum 347. 11
nevadense 347. 9
- Asplenium Brunfelsii* 346.
 10
foreziense 346. 6
Forsteri 346. 7*
- Lamotteanum* 346. 7*
rhæticum 346. 11. 2
- Aster canescens* 173. 43. 2
exaltatus 173. 43. 2
lævis 173. 44 obs.
paniculatus 173. 44 obs.
præcox 173. 44 obs.
Wolfii 173. 44. 2
- Astrocephalus exaltatus*
 159. 22*
leioccephalus 159. 22*
- Astragalus argolicus* 98. 98
frigidus 98. 32. 2
gypsophilus 97. 29*
ictericus 98. 85. *a*
illyricus 97. 31
maroniensis 98. 82. *a*
onobrychioides 96. 37. 14
pamphylicus 98. 98. *a*
peregrinus 98. 98. *a*
sareptanus 97. 28*
stolzenburgensis 98. 86
tauricolus 96. 37. 4. *a*
transsilvanicus 97. 81. *a*
umbellatus 98. 38. 2*
venotinus 96. 37. 1
- Astrantia alpestris* 149.
 113. 1
croatica 149. 113. 1*
- Athamanta arachnoidea*
 141. 58. 2. *a*
Lobelii 141. 58. 4
- Athyrium alpestre* 346. 11. 2
- Atragene austriaca* 1. 1. 1
sibirica 1. 1. 1
speciosa 1. 1. 1
Wenderothii 1. 1 obs.
- Atriplex crassifolia* 269. 7. *a*
longipes 269. 8*
maritima 269. 14
Smithii 269. 9
stipitata 269. 8*
- Aulacospermum tenuilo-*
bum 148. 106. *a*. 1
- Aurinia edentula* 33. 53. 4
media 33. 53. 7
- Avena ambigua* 333. 74. 4
australis 334. 13*
baregensis 334. 36*
Baumgarteni 334. 27
chlorantha 334. 46
compacta 334. 8. *a*
decora 334. 22
divaricata 335. 52. 54

- Heldreichii 334. 23
 intermedia 333. 4*
 Neumayeriana 334. 8.a
 Noëana 334. 46
 pilosa 334. 5
 Sibthorpii 334. 13
 Todari 335. 54
 varia 334. 25
 Azalea pontica 214. 15. 1
 Azolla caroliniana 349 obs.
 filicaulis 349 obs.
 Barbarea conferta 10. 16. 8.a
 Batrachium *carinatum* 10.
 7*
fucoides 10. 3*
heleophilum 10. 7
leontinense 10. 11*
lusitanicum 10. 9*
micranthum 10. 6
rigidum 10. 7*
submersum 10. 3
trichophylloides 10. 4
triphyllum 10. 9
 Bellevalia Boissieri 306. 5
 Calandriniana 306. 9 obs.
Chusiana 306. 5*. 9*
constricta 306. 10*
dubia 306. 5
fuliginosa 306. 9.a
glauca 306. 23. 2*
 Hackelii 306. 7
 Holzmanni 306. 11
spicata 306. 23. 1
 Webbiana 306. 6
 Bellis amoena 174. 50. 3
cordifolia 174. 50. 1
Vandasii 175. 50. 6.a
 Beta *atriplicifolia* 267. 2.a
maritima 267. 2
 Betonica danica 251. 15. 4
Haussknechtii 251. 15. 4*
laxata 251. 15. 4
leiocalyx 251. 15. 4
polyclada 251. 15. 4
rigida 251. 15. 4
rusticana 251. 15. 4
valdepubens 251. 15. 4
velebitica 251. 15. 4*
 Bétula Murithii 282. 2*
odorata 282
pubescens 282
verrucosa 282
 Biasolettia *pindicola* 144.
 70. 6.a
 Bidens *heterophylla* 161. 1.
 obs. 1
orientalis 161. 1. 2.a
 Biscutella balearica 35. 61. 2
 Candollei 35. 61. 2
laxa 35. 61. 6.b
montana 35. 61. 6.a
neustriaca 35. 61. 6
orcelitana 35. 61. 2
oreites 35. 61. 9
pratensis 35. 61. 5*
stenophylla 35. 61. 6.c
stricta 35. 61. 5*
tumidula 36. 61. 10
 Bivonæa albiflora 40. 72. 1
 Boleum asperum 35. 57. 3
 Bonarota rotundifolia 235.
 13. 2
 Botryanthes *granatensis*
 307. 25. 3.a
 Kernerii 307. 25. 6.
 Sartorii 307. 25. 11
speciosum 307. 25. 9
 Strangwaisii 307. 25. 6
 Botrychium crassinervium
 348. 7
virginianum 348. 1
 Brachypodium mucrona-
 tum 343. 3
sanctum 343. 6
 Brassica bætica 29. 37. 2
 Besseriana 29. 36 obs.
corsica 27. 35. 8
coryneloba 29. 37. 2
 Dianæ 28. 21
insularis 27. 35. 1
junceae 28. 31 obs. 29. 36
 obs.
laevigata 28. 36. 5
raphanoides 28. 29
 Rouyana 29. 38. 11.a
 Braya pinnatifida 27. 27
 Briza elatior 340. 95. 2
 Bromus ægyptiacus 337. 22
angustifolius 337. 15.
barcensis 337. 88. 13
brachystachys 337. 22
cappadocius 337. 88. 15
condensatus 337. 11*
fibrosus 337. 14
 Gussonii 337. 1
lanuginosus 338. 28
longipilus 337. 4
molliformis 338. 24
pannonicus 33. 88. 12
riparius 337. 88. 15
splendens 337. 21*
strictus 337. 22
variegatus 337. 88. 15
 Broussonetia papyrifera 277
 Bulbocodium hastulatum
 311. 2. 5
trigynum 310. 2. 5. 6
 Bunias ægyptiaca 40. 79.a. 1
 Bunium aphyllum 144. 74. 1
tenerum 144. 75. 2.a
 Bupleurum obtusifolium
 147. 18*
Perrierii 147. 36.a
 Buxus sempervirens 274
 Cacalia Alliariæ 177. 61. 2*
 Cachrys Morisonii 148.
 102. 1
 Calamagrostis bihariensis
 331*
borealis 331. 8*
dubia 331. 16
rubicunda 331. 13
 Calamintha *Baumgarteni*
 215. 30. 12*
Einzeleana 255. 30. 4
hungarica 255. 30. 15.a
mollis 255. 30. 4
 Calendula *ceratospemia*
 178. 66. 6.a
microphylla 178. 66. 7.a
 Callitriche Kützingii 123. 1
turfosa 123. 3*
 Caltha alpestris 12. 20. 1*
dentata 12. 20. 1
Freyniana 12. 20. 1*
intermedia 12. 20. 1
læta 12. 20. 1*
latifolia 12. 20. 1*
longirostris 12. 20. 1*
minor 11. 20. 1
recurvirostris 12. 20. 1*
subintegerrima 12. 20. 1
truncata 12. 20. 1*
ucranica 12. 20. 1
vulgaris 12. 20. 1
 Calystegia silvestris 220.
 3. 1
 Camelina *rumelica* 35. 56. 3.a
 Campanula *acutangula*
 210. 66.a

- adsurgens* 210. 69.*a*
Bertolæ 208. 44
Bolosii 207. 15.*a*
cæspitosa 208. 45.*
cana 208. 39
catinensis 207. 20
consanguinea 209. 49.*
desertorum 207. 30
echiifolia 207. 27
Frivaldszkyi 210. 88
Hausmanni 211. 91×
Hawkinsiana 209. 59.*a*
hemschinica 210. 86.*a*
Hoppeana 208. 45
lanceolata 208. 40.*
lancifolia 208. 41.*
micrantha 208. 44
monanthos 207. 26.*
orbelica 207. 18.*a*
pinifolia 208. 44
pseudolanceolata 208. 40.*
Re 208. 44
sardoa 209. 58
sparsa 210. 88
Staubii 209. 54
Tauscheri 208. 39
tymphaea 209. 62.*a*
Vayredæ 207. 15.*a*
Villarsii 208. 45.*
- Cannabis sativa* 277
Capparis rotundifolia 41. 1.*
Cardamine amethystea 22. 22. 3.*
amethystina 23. 6
calabrica 22. 22. 3.*
cretica 23. 23. 1
deciduifolia 22. 22. 3
drymeia 23. 10
dubia 23. 5
duraniensis 23. 10
Hayneana 22. 22. 3
palustris 355. 27
pusilla 23. 10
Carduncellus dianius 184. 97. 1.*
Carduus agrestis 182. 21.*
Amsteinii 182×
Aschersonianus 182×
bihariensis 183. 84×
Brunneri 183. 84×
Caflischii 183. 84×
cinereus 182. 22
cirsiformis 183. 84×
Kernerii 182. 9.*a*
Killiasii 183. 84×
leiophyllus 182. 1
litoralis 183. 84×
Polii 183. 84×
pseudocrispus 182. 11
pseudo-hamulosus 183. 84×
pseudoseriacus 182. 38.*
rheticus 182. 10
Schulzeanus 183. 84×
umbrosus 183. 84×
viridis 182. 10×
Carex acuminata 320. 12. 66
æmulans 320. 3
affinis 323. 88
ambigua 322. 52
asturica 322. 72
atrofusca 323. 81
austriaca 325. 140
Beckeri 321. 27
bicolor 324. 106
bihariana 326×
brachystachys 321. 43
bulgarica 321. 48.*
Caflischii 326×
clavæformis 322. 66
contigua 325. 133
csomadensis 326×
cuprina 325. 331
Custoriana 326. 160
Czetzii 322. 58.*
dacica 323. 93. 93.*a*
Dematrancea 324. 103
depressa 322. 50.*
diluta 321. 29.*a*. 32
dimorpha 322. 50.*
dinarica 322. 66
diversiflora 322. 51.*a*
Dufftii 326×
Fussii 326×
Gaudiniana 324. 107
Godefrini 320. 19. 23
Grioleti 322. 60
grisea 322. 60
gynocrates 325. 142.*
holostoma 323. 84.*a*
Jegeri 326×
Kanitzii 325. 125
lævis 321. 44. 44.*a*
Laggeri 324. 119. 325. 138
lasiochlena 320. 13
Leersii 325. 132
longibracteata 325. 125
Loscosii 321. 31.*a*
luteola 326×
mauritanica 323. 96.*a*
minima 324. 106
mixta 322. 55
Moniezi 325. 131
memorosa 325. 131
obtusata 322. 63. 326. 150
Orsiniana 325. 132.*
orthostachys 320. 10
pallida 324. 116
Pannewitziana 326×
Paponi 326×
pilosuscula 326×
pseudo-brizoides 325. 139
pseudohelvola 324. 108.*
pseudonutans 320. 12
Reichenbachii 325. 139
rivalis 325. 140
Salisiana 326×
saxumbra 326. 61
Schummelii 323. 96
Sendtneriana 326×
Siebertiana 320. 14.*
sicyocarpa 322. 55
spicata 326. 150
stolonifera 324. 102
sublivida 322. 74
sudetica 323. 82
transsilvanica 322. 51. 51.*a*
ustulata 323. 81
virescens 322. 60
Winkleri 321. 31.*b*
xanthocarpa 326. 33×
zonata 324. 98
Carlina acanthophylla 178. 69. 9.*a*
alpina 178. 69. 4
grandiflora 178. 69. 4
orophila 178. 69. 13
Carregnoa dubia 297. 2. 1.*a*
(cfr. Narciss. serotin.)
Carum divaricatum 144. 75. 3
Castanea sativa 278
Catabrosa humilis 341. 99. 4.*a*
Caucalis maritima 134. 8. 3
pumila 134. 8. 3
Torgesiana 135. 14. 1.*a*
Caulinia alagnensis 289. 2.
microphylla 289. 2
Celtis caucasica 278
Centaurea borysthenica 187. 104
brevispina 187. 108.*a*
calvescens 186. 64.*a*
carpatica 185. 24
carratracensis 186. 84.*a*
coronata 185. 21
cruenta 188. 163.*a*
Csatoi 188. 103×

- dalmatica* 186. 78*
diversifolia 188. 103x
druentica 188. 103x
Edersia 187. 109
Fabrei 188. 102x
Gerberi 184. 102. 11
hemiptera 188. 103x
Hermirii 186. 82*. 187. 111
Holzmanniana 188. 163
hungarica 185. 51
hyalolepis 188. 163.a
intermedia 185. 41
Jankeana 187. 104*
Kanitziana 186. 89.a
laureotica 187. 107.a
ligerina 188. 107x
Loscosii 187. 136.a
mariolensis 186. 98.a
myriotoma 186. 89
Novelii 184. 20
plumosa 185. 24
razgradensis 185. 28*
Reichenbachii 186. 89*
Salisiana 188. 103x
scaphila 188. 103x
squarrosa 187. 101.a
tartarea 186. 59.a
thessala 187. 107
Thomasi 185. 24
Tommasinii 186. 80*
tympheea 186. 77.a
- Cephalaria Allionii* 160. 7. 9
Cephaloceron gymnocarpum 349. 12
pseudohystrix 349. 12
Cephalorhynchus glandulosus 203. 118. 1.a
- Cerastium alpicolum* 62. 8
aligenum 62. 11*
arcticum 62. 10.a
balearicum 62. 4.a
bosniacum 62. 6
bulgaricum 63. 34.a
coronense 62. 8
Dollineri 62. 6
filifolium 62. 2. 4
fontanum 62. 11*
gracile 63. 23
lineare 62. 7*
lucorum 62. 11
microphyllum 62. 10
mixtum 62. 14x
pedunculatum 63. 33
physospermum 62. 12
Poolianum 62. 8
pseudosilvaticum 62. 11
- subacaule* 62. 15
viscidum 63. 27
- Ceratocephalus leiocarpus* 10. 11. 1
- Ceratophyllum Haynaldianum* 123. 1.a
pentacanthum 123. 2.a
polyacanthum 123. 2*
- Chaenorrhinum crassifolium* 234. 70
robustum 234. 69*
rubrifolium 234. 77
- Cherophyllum Gagasorum* 143. 67. 2.a
neglectum 143. 67. 10
- Chaeturus prostratus* 332. 55. 2
- Chamaebuxus Vayredæ* 48. 2.a
- Chamaemelum caucasicum* 169. 24. 2.a
Pichleri 169. 24. 2.a
- Chamaenerium gracile* 120. 1x
- Chamaepeuce Alpini* 179. 79. 2
- Chara aculeolata* 350. 16
Braunii 350. 20
papillosa 350. 16
pulchella 350. 6
ulvoides 351. 2. 1
- Charistemma fastigiata* 306. 21. 3
- Cheilanthes vellea* 345. 3. 2
- Chenopodium arenarium* 268. 7. 3
augustanum 268. 7. 2
Wolffii 268. 6. 9*
- Chlevax athous* 134. 3. 1
- Chrysanthemum atratum* 169. 23. 6*
larvatum 169. 23. 10*
rigidum 169. 24. 4
Zawadskii 169. 23. 15
- Chrysosplenium kamschat-ticum* 133. 2*
macrocarpum 133. 3
- Cichorium illyricum* 205. 141. 1
- Cimicifuga racemosa* 14. 25 obs.
- Cineraria arnautorum* 163. 22. a
arvernensis 162. 17*
bosniaca 162. 5. 15.a
coronata 163. 20*
racemosa 163. 6. 9
sulphurea 162. 17.a
- Cirsium albidum* 180. 5.a
Allionii 181. 34.a
alpestre 180. 31
armatum 180. 6. a
Aschersonii 181x
balearicum 180. 22*
benacense 181x
Borbasii 181x
creticum 181. 57*
csepeliense 181x
Haynaldi 181x
hemipterum 181x
heterotrichum 181. 51.a
Hippolyti 181. 57*
Huteri 181x
intermedium 181x
ledrense 181x
Linkianum 180. 32*
Lobellii 180. 10
nolitangere 182. 82x
Pacheri 180. 25x
pidicolum 181. 41.a
Prantlii 182. 82x
Reichardtii 182. 82x
Richterianum 180. 5*
rubrum 182. 82x
spinifolium 182. 82x
tympheum 181. 59.a
vallis demonis 180. 10
viride 181. 49
Willkommianum 180. 12.a
Wimmeri 181. 46x
- Cistus grandiflorus* 42. 12
roseus 44. 36
Skänbergi 42. 4*
tauricus 42. 3*
- Cladium germanicum* 317. 3. 1
- Clematis balearica* 353. 1
hispanica 1. 2. 7
tenuifolia 1. 2. 4
- Clypeola eriophora* 34. 55. 3
- Cnidium Reichenbachii* 140. 53. 1*
- Cochlearia decipiens* 31. 46. 1*
groenlandica 31. 45. 4*
Wunderlichii 30. 45. 1

- Colchicum Bisignani* 311.10
Boissieri 310.5
eubæum 310.7.a
Haynaldi 311.15*
hungaricum 310.3*
lætum 311.10 et obs.
mieranthum 311.22.a
montanum 310.3
neapolitanum 311.20
Parkinsoni 310.6
parvulum 311.22.a
polymorphum 311.20
provinciale 311.18
Psaridis 310.5.a
pusillum 310.1.2
Sipthorpii 310.7.a
speciosum 311.10 et obs.
transsilvanicum 311.15*
variopictum 311.9
- Colpodium bulbosum* 341.
 99.4.a
humile 331.47.2.a
humile 341.99.4.a
latifolium 331.47.1
Malmgreni 331.47.2.
 339.91.1*
- Conopodium marianum*
 144.71.4
pyrenæum 144.71.1
- Convolvulus litoralis* 220.
 2.1
pseudosiculus 221.24
silvestris 220.3.1
tomentosus 220.17.a
- Corispermum filifolium*
 268.9.6.a
hyssopifolium 268.9.2
- Cornus latifolia* 150.1
sibirica 150.2.a
- Corrigiola imbricata* 125.
 8.1.a
- Corydalis australis* 17.1.4
stivenensis 17.1.5.a
Stummeri 17.1.4
tenella 17.1.4.a
- Corylus Avellana* 279
glandulosa 279.1
tubulosa 279.3
Turczaninowii 279.3obs.
- Cotoneaster orientalis* 119.
 7.5*
- Cotula aurea* 171.29.1obs.
- Cousinia bulgarica* 179.74.
 1.a
- Crambe Biebersteinii* 19.
 10.3
pontica 19.10.1
Steveniana 19.10.2
- Cratægus ambigua* 119.6.9
atrofusca 119.6.3
lasiocarpa 119.6.6
suecica 118.3.4
- Crepis balearica* 202.43
dinarica 202.36
geracioides 201.11.a
hybrida 202x
longifolia 202x
Murmanni 201.11*
nigra 201.3
scorzoneroides 202.48.a
smyrnæa 201.10.a
taraxacifolia 201.24
tergloviensis 201.9
turicensis 202x
Willkommii 202.42.a
- Cressa Loscosii* 221.5.1
- Crocus Aucheri* 296.9
biflorus 296.2
Cambessedeanus 296.31
Crewii 296.3
dalmaticus 296.33
lævigatus 296.10
maguntanus 296.31
marathonisius 296.13
pholegandrus 296.12
Roegnerianus 297.42
sulphureus 296.5
Suterianus 296.9
Thomasii 296.26
Tournefortianus 296.11
Veneris 296.14*
vernus 296.35 et obs.
 297.36*
- Cupressus glauca* 284.4obs.
lusitanica 284.4obs.
sempervirens 284.4.1
- Cupularia graveolens* 176.
 24
- Cuscuta Bidentis* 221.12
candicans 221.9
obtusiflora 221.12
Solani 221.4
triumvirati 221.5.a
- Cutandia divaricata* 340.
 93.3
maritima 340.93.2
- Cyclamen Dodonæi* 260.8.5
linearifolium 260.8.5
repandum 260.8.4
- Cynanchum acuminatum*
 216.2.1
longifolium 216.2.1
sibiricum 216.2.1
- Cyperus Heldreichianus*
 317.2
inconspicuus 317.4
lævigatus 317.20
Preslii 317.3
vegetus 317.13obs.
- Cyprianthe anemonoides* 5.
 10.11
asiaticus 5.10.11
- Cypripedium Calceolus*
 289.2
macranthum 289.1.a
- Cytisus alpestris* 84.19.
 85.26
Bartolottæ 84.10.3
bosniacus 85.25*
gallicus 361.86
graniticus 84.20
Haynaldi 84.19*
leiocarpus 84.19.19*
leucotrichus 84.18*
Linkii 85.30
pallidus 85.22*
subleiocarpus 84.20*
unibracteatus 84.10.11
virescens 85.25
- Dactylis rigida* 336.84.1.a
rigida 336.84.1
- Daphne Lerchenfeldiana*
 272.6
Rodriguezii 272.14.a
vellaeoides 272.14.a
- Daucus bicolor* 135.16
parviflorus 135.9.4
pubescens 135.22
Tommasinii 135.9.4
- Deilosma suaveolens* 24.
 25.5
- Delphinium grandiflorum*
 14.23.12*
Hirschfeldianum 14.23.9
hispanicum 14.23.12*
holopetalum 14.23.14
Loscosii 14.23.17.b
nevadense 13.23.4.a
paniculatum 14.23.17.a
- Dentaria digenea* 23.24x
Killiasii 23.24x
- Deschampsia rhenana* 333.
 69.1*

- Dianthus aridus* 58. 31 obs.
banaticus 58. 38. 59. 45.
brachycarpus 58. 38*
brevicalyx 60. 72
brevistylus 60. 74. 61. 84
condensatus 61. 88
controversus 59. 56*
Coste 60. 80. *a*
crinitus 60. 59. *a*
croaticus 59. 45*
dalmaticus 61. 89
decrescens 61*
diminutus 61. 99
Dufftii 61*
ericetorum 61. 83
fallax 61*
fimbriatus 60. 59
Faurei 60. 81
geminatus 59. 56*
giganteiformis 59. 53
Giuliae 59. 52
guttatus 58. 21
Heldreichii 58. 39
Helwigii 61*
hispanicus 61. 82. *a*
Holzmannianus 58. 43. *a*
inodorus 60. 72
Jaczonis 61*
Langeanus 61. 82. *a* *
laricifolius 61. 83
Leitgebi 61*
Levieri 60. 68*
liburnicus 59. 46*
Lucæ 61*
marginatus 60. 70*
marisensis 59. 44*
membranaceus 58. 41*
Mikii 61*
moesiacus 59. 45
nodosus 60. 68. 72
oenipontanus 61*
oetæus 57. 16. 7
Pancicii 59. 47
Pontederæ 59. 45
pratensis 58. 18*
puberulus 59. 44*
purpureo-luteus 57. 16. 16
pyrenæus 60. 80
Rehmanni 58. 41*
roseo-luteus 58. 21. *a*
sabuletorum 59. 44*
setabensis 61. 82. *a*
Schlosseri 59. 45*
spurius 61*
Stawkianus 59. 58*
subbarbatus 58. 37*
subneglectus 59. 44
subulatus 61. 81*
tergestinus 60. 67*
Warionii 61*
- Wolffii* 61*
Vukotinovicii 61*
Diervilla canadensis 151.
 19 obs.
- Digitalis australis* 231. 15
denticulata 231. 14 obs.
fuscata 231. 14 obs.
fuscopunctata 231. 14 obs.
hybrida 231. 14 obs.
Lindleyana 231. 14 obs.
longiflora 231. 14 obs.
lutescens 231. 14 obs.
rigida 231. 14 obs.
tubiflora 231. 14 obs.
tubulosa 231. 14 obs.
variegata 231. 14 obs.
- Digitaria gracilis* 327. 15. 4
paspaloides 327. 15 obs.
- Diplachne bulgarica* 336.
 83. 1*
- Diplotaxis brassicoides* 29.
 38. 11. *a*
Lagascana 30. 38. 15
leucanthemifolia 28. 21
nevadensis 29. 38. 11. *a*
subcuneata 28. 20
Webbiana 30. 38. 16*
- Dipsacus fallax* 160. 6*
Gmelini 160. 6. 3. *a*
Orsini 160. 6. 1
- Doronicum barcense* 161.
 3. 1*
lucidum 162. 3. 10*
macrophyllum 162. 3. 6. *a*
orientale 161. 3. 1*
pilosum 162. 3. 10
viscosum 161. 3. 1. *a*
- Draba Adamsii* 31. 48. 10*
astylon 31. 48. 10*
Beckeri 31. 48. 1*
cantabrica 31. 48. 6. *b*
Dedeana 31. 48. 6. *c*
elongata 31. 48. 3
Hoppeana 356. 37
Lacaitæ 31. 48. 2
Martinsiana 31. 48. 10. *a*
Mawii 31. 48. 6. *a*
Moritziana 32. 22
pauciflora 31. 48. 13
rhætica 32. 20
samojedarum 31. 48. 13
Zahlbruckneri 31. 48. 1
Zapaterii 31. 48. 6. *c**
- Dupontia Fischeri* 328. 24.
 2. 333. 71. 1.
psilosantha 333. 71. 2.
- Echinochloa echinata* 327.
 13. 1
Hostii 327. 13. 1
- Echinops albidus* 178. 67. 5
dumosus 178. 67. 7
setaceofimbriatus 178.
 67. 3
spinousus 178. 67. 1. *a*
- Echinosperrum Vahlia-*
num 227. 24. 5. *a*
- Echium angustifolium* 224.
 10. 10. *a*
Davæi 224. 10. 13*
- Edraianthus dinaricus* 212.
 9. 5*
serbicus 212. 9. 4*
siculus 212. 9. 2
- Elæagnus orientalis* 274
- Elatine Brochoni* 70. 5*
inaperta 70. 6 obs.
- Eleocharis amphibia* 320.
 14. 7. *a*
caduca 319. 14. 4. *a*
Lereschii 319. 14. 2
oxyneura 320. 14. 7. *a*
- Eleusine barcinonensis* 328.
 23 obs.
italica 328. 23 obs.
tristachya 328. 23 obs.
- Endymion amoenulus* 306.
 19. 5
- Ephedra fragilis* 284. 3
gibraltaria 284. 3. *a*
helvetica 285. 5*
vulgaris 285. 5
- Epilobium aggregatum*
 122*
alatum 121. 12
alpicolum 122*
biforme 120. 2. 4*
bihariense 122*
confine 122*
cordatum 120. 2. 2
crassicaule 120. 2. 2*
davuricum 122. 14. *a*
decipiens 122*
decumbens 120. 2. 5
Dufftii 122*
flaccidum 120. 2. 5
fontanum 120. 2. 5
Freyunii 121. 8*
gemmascens 121. 12*
gemmaferum 120. 2. 5*
glanduligerum 122*

- gracile 120. 1. 3×
 Haynaldianum 122×
 heterocaulum 122×
 hispidum 120. 2. 4 obs.
 Hugueninii 122×
 Huteri 122×
 hyssopifolium 122. 14
 Knafii 121. 7×
 lactiflorum 122. 13.a*
 Lamotteanum 122×
 ligulatum 121. 5×
 limosum 120. 2. 2×
 lineare 122. 14.a
 Mathiæi 121. 11
 matrense 121. 5×
 minutiflorum 120. 2. 4
 montaniforme 122×
 mutabile 120. 2. 2
 neogradiense 121. 9×
 nitidum 121. 9. 10*
 nutans 121. 13.a
 opacum 121. 7×
 palatinum 122×
 pallidum 121. 8×
 palustriflorum 122. 14×
 persicinum 121. 7×
 phyllonema 121. 5×
 ptarmicæfolium 120. 2. 4
 radicans 121. 7
 ramiflorum 122. 14
 rivulare 122. 14×
 Salisianum 122×
 Sandorii 121. 12
 sarmentosum 122. 14×
 semiobscureum 122×
 simplex 122. 14
 silvaticum 121. 10
 stenophyllum 121×, 122×
 Steveni 120. 1. 1
 Tarni 122×
 tetragoniforme 121. 7×
 Treuinfelsianum 122. 14×
 Uechtritizianum 122×
 umbrosum 120. 2. 2. 121. 7
 virgatum 120. 2. 5
 Wimmeri 121. 5×
 Winkleri 122×
 Epipactis purpurata 290. 9. 2
 violacea 290. 9. 2
 viridiflora 290. 9. 3
 Equisetum arcticum 344. 2
 boreale 344. 2
 campestre 344. 2. 7
 eburneum 344. 1
 nanum 344. 7
 paleaceum 344. 9
 scirpoides 345. 12
 tenellum 345. 11. 12
 uliginosum 444. 5
 Eragrostis suaveolens 340.
 96. 1
 Erechites hieracifolia 165.
 8 obs.
 Erigeron engadinense 174.
 46×
 glabrescens 174. 46×
 glandulosus 174. 46. 5
 glareosum 174. 46×
 Hegetschweileri 174. 46.
 5*
 Hülsenii 174. 46×
 intermedium 174. 46×
 neglectus 174. 46. 4*
 parviflorum 174. 46×
 racemosum 174. 46. 9*
 rhæticum 174. 46×
 Schleicheri 174. 46. 5*
 Trachseli 174. 46×
 Eriophorum Höftii 318. 3*
 Eritrichium Chamissonis
 227. 25. 2
 Jankæ 227. 25. 1*
 Erodium aragonense 78. 5
 Ballii 78. 19
 Cavanillesii 78. 3.a
 crispum 78. 32
 glauco-virens 78. 3*
 hymenodes 78. 5 obs.
 Lobelii 78. 19
 malacitanum 78. 20*
 tenuisectum 78. 23
 tmoleum 78. 2*
 valentinum 78. 32
 Eruca longirostris 30. 40.
 1.a
 stenocarpa 30. 40. 3.a
 Erucaria tenuifolia 19. 11.
 1 obs.
 Erucastrum brachycarpum
 29. 37. 3
 heterophyllum 29. 37. 9.a
 pubescens 28. 36. 4
 subbipinnatifidum 29.
 37. 6
 Ervum bifoliolatum 103.
 36 obs.
 nemorale 104. 51. 11*
 Terronii 104. 51. 7
 Erysimum Bocconi 25. 9
 Comperianum 25. 28
 cretaceum 25. 28.a
 curvifolium 25. 11
 Czetsianum 25. 12*
 Duriei 25. 24.a
 micranthum 25. 27
 myriophyllum 25. 11.a
 quadricorne 26. 30.a. 1
 ruscinonense 25. 11*
 tanaicense 25. 28.a
 Wahlenbergii 25. 12*
 Erythræa capitata 219. 2.a
 glomerata 219. 6.a
 Morieri 219. 9*
 turcica 219. 6.a
 vulgaris 219. 6
 Euonymus nanus 80. 3.a
 Euphorbia alpigena 275.
 16*
 altissima 275. 31.a
 austriaca 275. 31
 Baselicis 276. 68.a
 Broteri 276. 101.a
 epithymoides 275. 11. 1
 erythrosperma 276. 94
 esuloides 276. 64.a
 græca 276. 79*
 incompta 275. 16*
 Kernerii 276. 68.a
 latifolia 276. 52.a
 mariolensis 275. 21.a
 mollis 275. 31*
 nitens 276. 67
 paradoxa 276. 58*
 polychroma 275. 14
 polygonifolia 276. 104
 obs.
 procera 275. 31*
 salicifolia 275. 52
 Schurii 276. 52*
 serotina 276. 65
 taurinensis 276. 79*
 villosa 275. 31*
 Euphrasia arctica 239. 22.
 1*
 arguta 239. 22. 1*
 aristata 239. 22. 3*
 Brandisii 239. 22. 3
 brevipila 238. 22. 1
 carniolica 239. 22. 4
 dinarica 239. 22. 4
 lepontica 239. 22×
 nivalis 239. 22. 4*
 pudibunda 239. 22. 1*
 pulchella 239. 22. 1
 pumila 239. 22. 1
 speciosa 239. 22. 1*
 variabilis 239. 22. 2*
 versicolor 238. 22. 1
 Willkommii 239. 22. 1*
 Evax Cavanillesii 177. 58.
 2*

- contracta* 177. 58. 1.
micropodioides 177. 58.
 7*
Exaculum pusillum 219. 6. 2
Exacum filiforme 219. 6. 1
Fagus silvatica 278
Fedia caputbovis 157. 3. 1.
Ferula athoa 136. 23?
 glauca 136. 23. 1*
 hispanica 136. 23. 2*
 hispida 138. 34. 2
 salsa 138. 32. 1
Ferulago Rocheliana 137.
 25. 7*
Festuca alpestris 339. 43
 consobrina 338. 9*
 cretica 338. 4
 croatica 338. 12
 Halleri 339. 47
 hemipoa 340. 93. 4
 interrupta 338. 3
 nutans 338. 15
 Panciciana 339. 39.
 annonica 339. 39
 sardoa 338. 22*
 stricta 339. 39
 taurica 339. 43
 tyrolensis 338. 32
 vaginata 339. 42*
Ficus carica 276
Filago cossyrensis 177. 58. 5
 intermedia 173. 38*
 iodolepis 172. 38. 5*
 murcica 173. 38. 7
 Pseudo-Erax 172. 38. 2.
 similata 173. 38*
Foeniculum Rochelii 365.
 143
 virescens 365. 143
Fragaria calycina 109. 3. 1
 neglecta 109. 3. 3*
 reversa 109. 3. 1
 sericea 109. 3*
Fraxinus leptocarpa 216. 4
 oxyphylla 216. 2*
 parvifolia 216. 2*
Fritillaria Boissieri 301. 4
 conica 301. 10. 2
 Ehrharti 301. 10. 14
 Fleischeri 301. 10. 15
 græca 301. 10. 10
 meleagrioides 301. 10. 19
 montana 301. 10. 8
 tristis 301. 10. 17
Fumaria africana 17. 3. 1
 grandiflora 18. 26.
 spectabilis 17. 3. 5
 supina 18. 24
 Thureti 18. 24.
Gagea bohémica 304. 12
 chlorantha 304. 18.
 Fourraana 304. 12
 Granatelli 304. 9. 17
 mauritanica 304. 9
 reflexa 304. 3 (nunc 13*)
 rigida 304. 6. 19
 succedanea 304. 7
 taurica 304. 13. 19
 Theobaldi 304. 19*
Gahnia Mariscus 317. 3. 1
 obs.
Galanthus græcus 299. 9. 5
 Olgæ 299. 9. 3
Galeopsis glabra 251. 14. 7*
 glaucescens 251. 14. 7*
 Haussknechtii 251. 14*
 longiflora 251. 14. 6
 Wirtgeni 251. 14*
Galium ætense 152. 13
 album 152. 10
 asparagifolium 154. 56
 asperuliflorum 153. 24*
 Bailloni 152. 7.
 Bielzii 152. 11
 Centroniæ 152. 18*
 Crespiantum 154. 57.
 digeneum 155*
 flavescens 154. 56
 Heuffelii 153. 24*
 hungaricum 155*
 Huteri 155*
 margaritaceum 153. 37
 mariolense 153. 42.
 marisense 154. 56
 microspermum 154. 79*
 oligotrichum 153. 24*
 polonicum 152. 22
 pseudocinereum 152. 11
 pseudomyrianthum 152.
 18
 pseudorubioides 152. 3
 puberulum 153. 29
 Sieberi 155. 92*
 stenocarpum 155. 87
 umbellulatum 155. 55*
 valantoides 152. 7.
 valentinum 153. 42.
 virgultorum 152. 10
Gasterolochnis macropetala
 51. 8. 1
 uralensis 51. 8. 1
Gaudinia filiformis 343.
 109. 1
Genista balearica 82. 5. 6
 bihariensis 83. 54
 carpetana 83. 29.
 diffusa 85. 32
 insubrica 83. 56
 leptophylla 84. 57
 Marii 83. 56
 Millii 83. 47.
 odoratissima 82. 5. 11
 oligosperma 83. 56
 Pomeli 83. 32.
 sericea 84. 57
 Sigeriana 83. 56
 sphacelata 82. 5. 6.
 Winkleri 83. 24.
Gentiana austriaca 218.
 30*
 barbata 218. 26.
 bulgarica 228. 29.
 caucasica 218. 30.
 chalybea 217. 20
 dinarica 217. 9
 Kummeriana 218*
 lutescens 218. 30.
 rhetica 218. 30*
 Sturmiana 218. 30
 tergestina 217. 20
Geranium album 77. 25
 catractarum 78. 35?
 Perreymondi 77. 27.
 perrugosum 78. 35?
 subargenteum 76. 5.
 tauricum 77. 10
 villosum 77. 29
Geum bulgaricum 113. 8.
 2.
 pallidum 113. 9. 8
 pseudomolle 113. 9*
 rhæticum 113. 8*
 spurium 113. 6*
 teszlense 113. 9*
 Willdenowii 113. 9. 7*
Githago gracilis 50. 1.
Gladiolus Borneti 295. 5. 1*
 Guepini 295. 5. 1*
Globularia bellidifolia 264.
 9*
 incanescens 364. 11
 Linnæi 264. 3
 tenella 264. 7
Glyceria Borreri 339. 11
 capillaris 339. 6
 declinata 339. 4
 hybrida 339. 3

- Kjellmani* 340. 12.*d*
 permixta 339. 11
retinosa 339. 1.*a*
tenella 340. 12.*c*
vaginalis 340. 12.*b*
Vahlkiana 339. 12.*a*
 vilfoidea 341. 99. 4
- Goebelia alopecuroides* 81.
 1.*a*
- Goniolimon Beckerianum*
 265. 4. 3*
 Heldreichii 265. 4. 3.*a*
 Sartorii 265. 4. 8
- Grafia Goloka* 148. 105. 1
- Gymnadenia Aschersoniana*
 293. 19×
 cucullata 292. 5
 intermedia 293. 19×
 Schweinfurthii 293. 19×
 Strampffii 293. 19×
- Gypsophila alpigena* 56.
 14. 7
 fasciculata 57. 15. 8.*a*
 Haynaldiana 57. 15. 4.*a*
 laconica 56. 14. 1.*a*
 spergulifolia 56. 14. 3.*a*
- Halimium Clusii* 42. 1. 13
 eriocephalum 42. 2. 9.*a*
 formosum 42. 2. 8
 multiflorum 42. 2. 7.*a*
- Halocnemum caspicum*
 269. 15. 1.*b*
 cruciatum 269. 15. 1.*a*
- Halopeplis amplexicaulis*
 269. 19. 1
- Hammatolobium graecum*
 95. 27.*a*
- Haplophyllum congestum*
 80. 5
- Hedysarum arenarium* 100.
 43. 6
- Helianthemum ambiguum*
 44. 50
 anthurus 42. 2. 1
 aureum 43. 31
 brevipes 43. 15.*a*
 controversum 43. 33
 Heerii 44×
 hirsutum 43. 30
 Lacaitæ 43. 29
 lasianthum 42. 2. 9.*a*
 multiflorum 42. 2. 7.*a*
 penicillatum 44. 50
 roseum 44. 36
- rupifragum 44. 50
 rupincolum 43. 28
 semistipulatum 43. 2. 15
 Sieberi 44×
 Vivianii 43. 2. 15
- Helianthus annuus* 161. 1
 obs. 3
- Helichrysum Libanotis* 172.
 33. 17
Pichleri 172. 33. 13.*a*
 valentinum 172. 33. 5
- Heliosperma glutinosum*
 51. 9. 3
- Heliotropium æthnicum*
 222. 2. 4
- Helleborus altifolius* 11. *
 17. 7
 Baumgartenii 11. 17. 5*
- Hepatica media* 2. 5×
 transsilvanica 2. 5. 2
- Heracleum carpaticum*
 139. 37. 7.*a*
 humile 139. 37. 14.*a*
 juranum 139. 37. 6
 verticillatum 139. 37.
 12.*a*
- Hesperis albiflora* 24. 25. 5
 alpina 24. 25. 5*
 caucasica 24. 25. 5
 crenulata 24. 26. 11.*a*
 dauriensis 24. 4 obs.
 erosa 24. 26. 9
 glabra 24. 25. 5. 5*
 Kladnii 24. 25. 5*
 moliniformis 24. 25. 5*
 oblongifolia 24. 25. 5*
 parviflora 24. 25. 5*
 pendula 24. 25. 5*
- Hieracium abruptifolium*
 190. 114. 1
 acuminatum 193. 57
 adenophyllum 196. 97
 adriaticum 198. 155. *a*
 albereum 194. 67
 albinum 196. 101
 anisophyllum 192. 38.*a*
 arctogenum 199. 159*
 arenicola 198. 146*
 armerioides 198. 140.*a*
 arvernense 194. 67.*a*
 Arvetii 198. 150
 asperifolium 200×
 asperulum 193. 47*
 asperulum 193. 47*
 asperum 192. 30*
- auratum 191. 3
 austriacum 195. 74
 bellidifolium 196. 101
 bifrons 191. 19
 bihariense 200×
 blattarioides 191. 20
 brachycephalum 200.
 175*
 budense 200×
 buglossoides 195. 70*
 Burnati 198. 144.*a*
 cæsioides 194. 64*
 calcigenum 193. 57
 callianthum 197. 134
 calycinum 197. 135*
 cantalicum 192. 24
 carpétanum 190. 114. 1*
 cephalodes 195. 79
 ceratodon 195. 79
 Chaboissæi 196. 92
 cheriense 193. 57
 chlorifolium 197. 134
 chrysocephalum 200.
 175*
 cinereum 200×
 coalescens 200. 184*
 cochleare 196. 105. 200.
 175*
 cochleatum 200. 175*
 commutatum 190. 114. 3
 conicum 191. 17*
 conjugatum 194. 64
 conringiefolium 192. 25*
 corconticum 193. 47*
 cordifolium 197. 118
 Cotteti 200×
 crepidiflorum 194. 64
 cruentum 194. 66
 Custoris 200×
 Czetsianum 200×
 dacicum 192. 30.*a*
 danubiale 193. 57*
 danubiale 195. 79
 decolorans 200. 175.*a*
 Delasoiei 198. 146*
 denticulatum 193. 47
 Dewari 193. 45*
 diaphanoides 194. 64*
 dimorphoides 199. 171*
 dimorphum 199. 172
 discoloratum 200. 175*
 Dollineri 195. 74
 elegans 197. 134*
 epimedium 196. 106*
 ericetorum 193. 57
 eriophyllum 197. 136*
 eriopodum 195. 74
 eriostachyum 192. 38.*a*
 erubescens 193. 57
 erythropodum 195. 69.*a*

- eurypus 192. 37*
exacutum 200. 184*
fagicolium 194. 64
falcidens 197. 119.a
Favratii 191. 21*
Favrei 195. 79
Fiekii 191. 17*
fistulosum 190. 114. 1.a
flagelliflorum 200x
floccosum 196. 92
Freynianum 193. 47*
Fritzei 196. 104
fuliginatum 198. 139*
fuliginosum 196. 104*
gadense 198. 152
gallicum 190. 114. 1
glanduloso-dentatum
 194. 68
glanduloso-dentatum
 196. 105*
Godeti 198. 144*
gombense 193. 44*
grandidentatum 190.
 114. 1
graveolens 193. 54*
Grenierianum 198. 150
Grisebachii 193. 60*
gymnocephalum 195. 86
Heerii 195. 73. 196. 97*
helveticum 192. 25*
hirtellum 191. 17*
horticola 199. 172 obs.
hungaricum 200. 181
Jaborneggi 197. 135*
juratense 198. 149
integrifolium 194. 64. 64*
intricatum 195. 79
iseranum 199. 173*
istriacum 191. 7
kajanense 200. 175.a
Kokeilii 198. 139
Koracis 192. 42*
Kotschyianum 198. 146.a
lacerum 196. 97*
lactucæfolium 192. 25*
 197. 109
Laggeri 199. 166*
Lamotteanum 192. 27*
lantoscanum 192. 26.a
laureolum 191. 14*
laurinum 191. 14*
Lavernellei 200x
Lecokianum 193. 57
Legrandianum 197. 110*
ligusticum 196. 108*
lividum 197. 119.a
lorophyllum 196. 104
marileense 197. 118.a
mauriannense 191. 14*
melanotrichum 191. 21*
montanum 196. 104
moravicum 194. 68*
Moritzianum 200. 183*
Mureti 195. 80*
Murithianum 198. 140.a
myriocephalum 192. 22
Nægelianum 198. 144
naszodense 200x
neglectum 198. 159
Neilreichii 198. 137*
nigricans 200x
nigriceps 194. 66*
nigritellum 198. 140.a
nigritum 194. 68. 196. 106*
nudum 197. 134*
oleovirens 197. 126
onegense 199. 171.a
Pacheri 194. 64
pachycephalum 192. 24*
pallidifolium 193. 57
pallidiforme 195. 80
peliophyllum 196. 105
penninum 198. 140.a
petraeum 195. 77
polycephalum 194. 68
præruptorum 192. 22*
porphyricum 198. 146
prasinatum 200. 184*
prasinifolium 194. 64
pseudocalbinum 193. 47.a
pseudobrachiatum 200.
 181
pseudocorymbosum 191.
 17
pseudocymosum 200x
pseudo-eriophorum 190.
 114. 2
pseudo-gothicum 192. 30
pseudojuranum 193. 47
pseudolanatum 196. 92
pseudo-pilosella 200.
 184. a
pseudoporrectum 198.
 137*
pseudo-pulmonarioides
 197. 109
Pseudo-Schmidtii 200x
pteropogon 195. 90
pulvinatum 199. 171*
Rackii 200x
raiblense 200. 185
ramosissimum 192. 25*
Rapini 197. 134
Reboudianum 200x
reconditum 193. 57
Reichenbachii 196. 108*
remotum 197. 125*
Reuteri 197. 110
rhombifolium 368. 180
Rotæ 200x
rubrum 199. 169*
rupestre 195. 73. 196. 97*
rupicolum 194. 67
sakævense 197. 137
saxatile 195. 77
Schenkii 198. 149
Schultzianum 193. 60.a
Sendtneri 193. 54*
silvivagum 194. 64
sonchoides 197. 125
speciosum 197. 134
sphærocephaloides 200x
stiriacum 191. 6*
strictum 191. 3. 16.a
stygium 193. 50.a
subcollinum 200x
subincisum 194. 66
sublanatum 196. 92
subnigrescens 197. 135
subpratense 200. 175*
subrude 195. 70
suomense 199. 159*
symphytaceum 192. 27*
taraxaciforme 194. 67.a
Tauschianum 191. 16.a
temvilingua 200. 184*
tortuosum 196. 105*
translucens 193. 57*
trichocladum 198. 140.a
trichoneurum 197. 135
tubulosum 196. 104
tömösense 200x
Uechtritizianum 196. 103*
umbelliforme 191. 10
umbelluliferum 198. 159
urticaceum 196. 108*
valesiacum 196. 108
validum 191. 3
ventricosum 200. 175*
verbenaceum 191. 10
violascens 192. 22
virgultorum 191. 3
viscosum 192. 25*. 197.
 109
viviariense 191. 3
Wolfgangianum 200x
Hierochloa pauciflora 328.
 24. 2
Hordeum ambiguum 342. 5
rubens 342. 4*
Hutchinsia aragonensis
 39. 69. 2*
granatensis 39. 69. 2
nana 39. 69. 2
pygmæa 38. 20*
Hyacinthus dubius 306.
 23. 5
Pallasianus 306. 21. 2

- Hymenophyllum tunbrid-*
gense 348
Hyoscyamus emineus 227.
 2. 2*
Hypocoum pseudograndi-
florum 16. 6. 1*
Hypericum callithyrsum
 74. 22*
Cuisini 75. 41.a
decipiens 74. 25
gymnanthum 75 obs. 2
Jankæ 75. 30.a
japonicum 75 obs. 2
Noëanum 74. 24.a
polygonifolium 75. 31
pubescens 74. 19.a
rotundatum 74. 26
tenellum 75. 30.a
umbellatum 74. 8*
Iberis apricorum 37. 62. 26*
commutata 36. 62. 8
Hegelmaieri 36. 62. 16.b
Raynevalii 36. 62. 16.a
Inula aspera 175. 55. 5
Barthiana 176. 55x
crassinervis 175. 7x
Csatoi 176. 55x
hispida 176. 55x
hybrida 175. 55. 7.a
intermedia 176. 55x
litoralis 176. 55x
methanæa 176. 17*
microcephala 176. 55x
Neilreichii 176. 55x
pleiocephala 175. 55. 4x
præalta 175. 55. 7
provincialis 163. 21*
 176. 10 obs.
pseudo-ensifolia 176. 7*
pseudo-ensiformis 176.
 7*
pseudogermanica 175.
 55. 7
pseudosalicina 175. 55. 5
Savii 175. 55. 2
semicordata 175. 55. 5
semihirta 175. 55. 4x
spuria 175. 55. 4x
stricta 176. 55x
vvaliensis 176. 7*
Vrabelyiana 176. 55x
vulgaris 176. 14
Iris balkana 295. 28*
Boissieri 294. 7.a
bosniaca 295. 34.a
cæspitosa 295. 45
germanica 294. 10
lorea 295. 43.a
majoricensis 294. 9
olbiensis 294. 24
rubro-marginata 295. 35
Sintenisi 295. 44
squalens 294. 14
unguicularis 295. 47
xanthina 295. 34.a
Isatis athoa 40. 73. 8.a
heterocarpa 40. 73. 7
transsilvanica 40. 73. 4*
Isoëtes adpersa 349. 3
Boryana 349. 6
Heldreichii 349. 6. a
hystrix 349. 12
macrospora 349. 1
Malinverniana 349. 10
Morei 349. 1
Perreymondi 349. 8
pseudohystrix 349. 12
setacea 349. 3
sicula 349. 12
tenuissima 349. 7
Isolepis controversa 319.
 12. 5
fuscescens 319. 3.a
gracillima 319. 12. 2*
nervosa 319. 3.a
sicula 319. 3. 3.a
Jasione glabra 212. 1*
propullulans 212. 11
Johrenia Pichleri 138. 30.
 1.a
Juncus alpinus 312. 19.a
ambiguus 313. 39*
Angelisii 312. 8
aquaticus 312. 16. 18
bicephalus 313. 38. 40
bifolius 312. 16
carpaticus 313. 26
digeneus 312. 18.a
elator 313. 32*
equisetosus 312. 11
fistulosus 312. 9
foliosus 313. 23
inundatus 312. 12*
lagenarius 313. 21.
Leersii 312. 5
longicormis 312. 11
melanocephalus 312. 18.a
Metzleri 313. 32
mucroniflorus 313. 26
mutabilis 313. 39
nitidiflorus 313. 33
paniculatus 312. 10
physcomitroides 313. 42
pistillaris 314. 2. 7
repens 313. 23
Requienii 313. 26*
Rochelianus 312. 18.a
rufus 312. 18*
rugosus 312. 18*
setaceus 313. 42
soranthus 313. 33
Sorrentinii 313. 41
spadiceus 312. 18
sphærocephalus 313. 22
striatus 312. 18.a
subulatus 313. 30
subuliflorus 312. 5*
tenuis 313. 34
Thomasii 312. 15. 313. 23
transsilvanicus 312. 14
Wulfenii 312. 18*
Juniperus ægæa 284. 8*
nana 284. 4
rhodocarpa 284. 2
sabinoides 284. 7
turbinata 284. 6*
Jurinea bulgarica 183. 87.
 8.a
Ledebourii 183. 87. 7*
pluriceps 183. 87. 12
transsilvanica 183. 87.
 7*
Kalidium arabicum 269. 18
caspicum 269. 18
Kernera decipiens 31. 46.
 1*
polysperma 35. 56. 3
Kleinia ficoides 165. 7. obs. 2
Mandraliscæ 165. 7. obs. 2
Knautia alpigena 160. 8.
 1*
atropurpurea 161. 9. 1
carpatica 160. 8. 1*
dipsacifolia 161. 8. 1*
hybrida 161. 8. 12
Kossuthii 160. 8. 1*
lancifolia 161. 8. 5*
Timeroyi 160. 8. 1*
Kochia saxicola 268. 7. 4
Koeleria australis 335. 78.
 2*
carniolica 335. 78. 9
ciliata 335. 78. 3
crassipes 335. 78. 2*
eristachya 335. 78. 10
glabra 335. 78. 3
gracilis 335. 78. 3
rigidula 335. 78. 3
transsilvanica 335. 78. 6

- Koniga strigulosa* 35. 51.
 11. *a*
 tortuosa 32. 51. 2*
Lactuca Baulhini 189. 108.
 14
 contracta 109. 108. 14*
 cyanea 189. 108. 11
 Grenieri 189. 106. 16
Lagochilus glaberrimus
 252. 18. *a*
Lamium affine 250. 12. 7
 alpinum 250. 12. 7
 Grenieri 250. 12. 7
 pallidiflorum 250. 12. 8
 veronicæfolium 250. 12. 12
Lappa pubens 179. 73. 1*
Lapsana pisidica 206. 148. 3
Larix archangelica 283. 2*
 rossica 283. 2*
 sibirica 283. 2
Laserpitium podolicum
 134. 6. 1*
 Winkleri 134. 6. 1*
Lathyrus barcinonensis
 103. 36
 emarginatus 100. 48. 13
 floribundus 101. 48. 35*
Leontodon alpestris 205. 20
 medius 205. 17*
Lepidium petræum 39. 69. 2
 Ramburei 39. 18. *a*
 tetraspermum 39. 69. 2
Lepigonum capillaceum
 69. 17. 8
Leucanthemum Candolle-
 anum 169. 23. 12*
 Delarbrei 169. 23. 6*
 larvatum 169. 23. 10*
 meridionale 169. 23. 13*
 subglaucum 169. 23. 12*
Leucojum grandiflorum
 298. 6
 hiemale 299. 7. 9
 nicæense 299. 7. 9
 vernum 298. 7. 1
Libanotis humilis 141. 59. 2
 leiocarpa 141. 59. 2
Ligusticum cuneifolium
 140. 53. 4
 Huteri 140. 51. 1. *a*
Lilium bosniacum 301. 9. 8
 graveolens 301. 9. 4*
Linaria almijarensis 233.
 49
 ambigua 235. 9*
 aragonensis 233. 55. *a*
 atrofusca 233. 34*
 Badali 234. 62
 Besseriana 232. 9. 5
 Biancæ 234. 83
 Broteri 233. 37. *a*
 ciliata 232. 9. 4
 concolor 232. 9. 4*
 confinis 234. 82
 convolvulacea 235. 83*
 crenifolia 234. 82
 faucicola 233. 52. *a*
 Ficalhoana 232. 9. 17. *a*
 filicaulis 233. 45. *a*
 filifolia 233. 55. *a*
 Gangitis 234. 68*
 heterophylla 232. 9. 15
 Hegelmaieri 234. 56
 Huteri 233. 28. *a*
 hybrida 232. 9. 3
 Kocianovichii 232. 4
 kösensis 232. 9. 3*
 Lamarekii 233. 35
 microsepala 233. 26
 nervosa 232. 9. 9
 Nyssana 232. 9. 9*
 oligantha 233. 20. *a*
 oligotricha 235. 9*
 parviflora 233. 31
 racemigera 234. 80
 robusta 234. 69*
 Rodriguezii 234. 70*
 rudis 232. 9. 3*
 salsa 235. 9*
 sofiana 332. 9. 4*
 transsilvanica 232. 9. 7
 Welwitschiana 233. 28. *b*
Lianum extra-axillare 71.
 21*
 nitidum 71. 28*
 Ortegæ 71. 25. *a*
 pannonicum 70. 11
 trinervium 71. 20
 ucranicum 70. 4
Lithospermum medium
 225. 16. 10
 suffruticosum 225. 15. 2
Lobularia lybica 33. 51. 11
 maritima 33. 51. 10
 strigulosa 33. 51. 11. *a*
Lolium pseudolinicola
 344. 6
 subulatum 344. 9
 triticoideus 344. 110. 1
Lonicera carpatica 151. 17
 Diervilla 151. 19 obs.
 leiophylla 151. 17
 reticulata 151. 19. *a*
Loretia geniculata 336.
 87. 6
 gypsophila 337. 87. 15
 incrassata 336. 87. 4
 ligustica 336. 87. 3
 setacea 336. 87. 9
 tenuis 336. 87. 5
Lotus elegans 95. 11. *a*
 Levieri 94. 24. 24*
 pseudopurpureus 94. 24.
 1*
 silvaticus 94. 24. 15*
 strictus 94. 24. 20
Lupinus perennis 86. 14
 obs.
Luzula alpina 314. 18
 Althii 314. 18
 arcuata 315. 21. 22
 carpatica 314. 12
 intermedia 314. 10
 italica 315. 26
 nivalis 315. 19. 20
 nutans 315. 23
 pallescens 314. 17*
Lychnis nemoralis 51. 7. 6
 sibirica 50. 4. 2. *a*
Lycium arabicum 227. 4.
 2. *a*
Lycopodium anceps 350. 1
Lycopus intermedius 259.
 38*
 laciniatus 259. 38. 2
Lysimachia minoricensis
 260. 1. 7. *a*
Lythrum alternifolium
 123. 1
 Bocconi 123. 1
 hispidulum 124. 5. *a*
 nanum 124. 8
 propinquum 123. 1
 scabrum 124*
 thesioides 124. 7
Malabaila biradiata 138.
 35. 1. *a*
Malcolmia arenaria 24. 26.
 2. *a*
 castellana 24. 26. 9. *a*
 crenulata 24. 26. 11. *a*
 erosa 24. 26. 9

- ramosa 24. 26. 2a
 serbica 24. 26. 1
- Malva** anodæformis 73. 15
 ciliata 73. 14
 fastigiata 72. 9. 1 obs.
 minoricensis 72. 7. 13
Morenii 72. 9. 1a
 spithamea 73. 16
stipulacea 73. 16a
 tuberculata 72. 9. 1
 verticillata 73. 16 obs.
 Willkommiana 72. 7. 5
- Marrubium** Aschersonii 253. 21x
Haussknechtii 253. 21. 8a
 virescens 253. 21x
- Marsilea** strigosa 348. 2
- Matricaria** Retzii 170. 25. 5
- Matthiola** nudicaulis 22. 19. 1
 oyensis 19. 11. 3
- Medicago** *Blancheana* 88. 17a
 Bonarotiana 88. 17a
 cibinensis 87. 18. 6*
 heteracantha 88. 24
 hispida 88. 38 obs.
 rupestris 88. 12
secundiflora 89. 51a
 spinulosa 88. 16
 subfalcata 87. 18. 6*
 Urbanii 88. 34
- Melandryum** album 51. 7. 4
 rubrum 51. 7. 3
- Melampyrum** alpestre 241. 27. 5
angustissimum 241. 27. 4a
bihariense 241. 27. 4*
bohemicum 241. 27. 6a
catalaunicum 241. 27. 4*
 laciniatum 241. 27. 5
 moravicum 241. 27. 4
 paludosum 241. 27. 5
 stenophyllum 241. 27. 6a
 subalpinum 241. 27. 4*
- Melia** *Azedarach* 76
- Melica** Aschersonii 336x
 cappadocica 335. 80. 2
 nebrodensis 336. 3*
 picta 336. 11
 taurica 335. 80. 3
 Tinei 336. 4
 transsilvanica 335. 80. 2*
- Melilotus** Brandisiana 89. 21. 9
 longipedicellata 89. 21. 9
- Melissa** Baumgarteni 255. 12*
 hungarica 255. 15a
- Meniocus** serpyllifolius 34. 53. 31
- Mentha** acutifolia 258. 10*
 alpigena 258. 3
 ambigua 258. 1*
 arvensi-reversa 259. 11x
 austriaca 258. 11x
 Avellini 258. 5
 Ayassei 258. 3*. 7x
 balsamea 258. 3
 Bauhini 258. 1*
 brachystachya 258. 7
 deflexa 258. 11
 eriantha 258. 7
fontana 258. 11*
 gracilis 258. 11
 hungarica 258. 7
 ilissia 258. 2
 inarimensis 258. 4*
 insularis 258. 6
 longifolia 258. 3
 longistachya 258. 3
 macrostachya 258. 1*
 marisensis 258. 3
 Mauponii 258. 7x
 multiflora 258. 11*
 nemorosa 259. 11x
 nemorum 259. 11x
 niliaca 258. 3
 Obornyana 258. 11*
 paludosa 258. 9
 palustris 258. 9
 pannonica 258. 8
parietariæfolia 258. 11*
 plicata 258. 11x
 pratensis 258. 10
 Pugeti 258. 10
 pyramidalis 258. 5
 reversa 258. 9*
Riparti 258. 3?
- rotundifolio-hirsuta 258. 7x
 Scribæ 258. 11
 seriata 258. 3
 spicata 258. 4
 suavis 258. 5
 verticillata 258. 9
 viridi-aquatica 258. 4 obs.
 viridi-citrata 258. 4 obs.
 Wierzbickiana 258. 3
- Mercurialis** Bichei 274. 6. 1
- livida 274. 5
 Reverchonii 274. 2a
- Mesembr.** *acinaciforme* 129. 3 obs.
- Mespilus** lobata 119. 6. 9x
- Meum** Dalechampii 145. 88. 4
- Microcnemum** *fastigiatum* 269. 16a. 1
- Microlonchus** *spinulosus* 188. 104. 2a
- Micromeria** *inodora* 255. 31. 11a
- Microphysa** rubioides 151. 3. 2
- Milium** vernale 333. 63. 2
- Minæa** Saviana 40. 71. 2
- Moehringia** bavarica 65. 6. 12
dasyphylla 65. 6. 6b
Tommasinii 65. 6. 6a
- Molinia** litoralis 336. 82. 1
squarrosa 336. 82. 1a
- Mulgedium** *macrophyllum* 188. 106. 1 obs.
sonchifolium 189. 106. 5a
- Muscari** acutilobum 307. 25. 10
 Calandrinianum 306. 23. 9 obs.
 constrictum 306. 23. 10*
 glaucum 306. 23. 2*
 granatense 307. 25. 3a
 Kernerii 307. 25. 6
 pallens 307. 25. 1
 speciosum 307. 25. 9
 Strangwaisii 307. 25. 6
 Wilhelmsii 306. 23. 2*
- Myogalum** Boucheanum 305. 16. 2
- Myosotis** ænesia 226. 17. 5
 Alberti 226. 14*
 aspera 225. 17. 1
 cognata 226. 17. 9
 lactea 226. 17. 10*
 lithuanica 225. 17. 1
 litoralis 226. 17. 5
 sparsiflora 226. 17. 11*
 transsilvanica 226. 17. 10*
- Najas** fluvialis 289

- intermedia* 289
muricata 289
Narcissus albulus 297. 19*
aureus 298. 31
calathinus 297. 5
elatus 297. 23
Gennarii 297. 19*
Seguentiæ 297. 19
Tazetta 298. 25
Tenorii 298. 24
Timbali 298. 26
Nardurus Salzmanni 343.
 106. 5
Nasturtium aureum 22.
 20. 6. *a*
Borbasi 22. 20. 3
capillipes 22. 20*
erythrocaule 22. 20*
hungaricum 22. 20*
Kernerii 22. 20. 7
Menyharthianum 22. 20. 4
neogradense 22. 20*
riparium 22. 20. 6
stenophyllum 22. 20*
subglobosum 22. 20*
Turczaninowii 22. 20*
uliginosum 22. 20. 6*
Nepa aragonensis 83. 21
megalorites 82. 2. 18. *a*
Nepeta grandiflora 254.
 24. 21 obs.
italica 254. 24. 13 obs.
Nicotiana glauca 227
Nigella divaricata 11. 13. 3. *a*
fumarifolia 11. 13. 5. *a*
Nigritella Moritziana 292.
 18. 1*
Nitella stelligera 351. 2. 1
Nocœa Anerswaldi 39.
 69. 1*
Nonnea lutea 225. 13. 9
rossica 223. 7. 4
Notholæna vellea 345. 3. 2
Notoceras canariense 19.
 14. 1
quadricornis 26. 30. *a*. 1
Nuphar fluviatile 15. 2. 2
grandiflorum 15. 2. 1
grandifolium 15. 2. 2
graveolens 15. 2. 2
latifolium 15. 2. 2
lobatum 15. 2. 2
vogesiacum 15. 2. 3*
Nymphæa Asopii 15. 1. 2
Dioscoridis 15. 1. 2
exumbonata 15. 1. 2
Lotus 15. 1. 1
Othodium ægyptiacum
 40. 79. *a*. 1
Odontites albidula 238. 21.
 17
brigantiaca 238. 21. 14
Recordoni 238. 31. 9. *a*
Oenanthe callosa 142. 63.
 2. *a*
Giordani 142. 63. 8
Oenothera longiflora 122.
 2 obs.
rosea 122. 2 obs.
Oglifa Soyerii 173. 38. 9
Oligomeris glaucescens
 41 obs.
subulata 41 obs.
Onobrychis æquidentata
 100. 43. 19
calcarea 99. 43. 12. *a*
Gaudini 99. 43. 6
Halaesyana 99. 43. 12
pentelica 99. 43. 5*
pindicola 100. 43. 16. *a*
Reuteri 100. 43. 15. *a*
transsilvanica 99. 43.
 4*
Ononis ambigua 86. 15.
 20. *a*
angustifolia 86. 15. 3
arenaria 86. 15. 15
brachyantha 87. 15. 58. *a*
foetida 86. 15. 19. *a*
Hackelii 86. 15. 18. *a*
intermedia 83. 15. 3*
latifolia 86. 15. 3*
paniculata 86. 15. 25
parviflora 87. 15. 5
racemosa 86. 15. 7
serrata 87. 15. 46*
spinosaformis 86. 15. 29
subspicata 86. 15. 24. *a*
Onopordon Ilex 179. 75.
 3. *a*
Onosma chium 224. 11. 3
laconicum 224. 11. 2
Ophrys obscura 293. 26. 3
panormitana 293. 26. 6
Todaroana 293. 26. 6
Orchis alata 292. 28
ambigua 292*
angusticuris 292*
austriaca 291. 9*
bosniaca 291. 16. *a*
brachystachys 292. 17. 1
Braunii 292*
Bruniana 292*
candidissima 291. 21
cimicina 291. 11*
commutata 291. 7*
curvifolia 291. 19
Dietrichiana 291. 9*
ecalcarata 291. 9
elatior 291. 19*
elatior 292*
elegans 292. 27
foliosa 291. 18
Gennarii 291. 15*
Heinzeliana 292*
Loreziana 292*
olbiensis 292. 29
olida 291. 11*
recurva 292. 21
rivularis 291. 18
saccigera 291. 20
sancta 291. 11. *a*
Schulzii 292*
Skorpili 291. 13. *a*
Spitzelii 292. 31
tetragona 291. 20
transilvanica 291. 21
tridentata 291. 7
Origanum acinifolium 256.
 33. 9
barcense 256. 33. 6
lusitanicum 256. 33. 9
Ornithogalum acuminatum
 305. 10
atticum 305. 7*
bosniacum 305. 16
chloranthum (Gagea)
 304. 18. *a*
divergens 305. 13
fimbriatum 305. 6. 20. *a*
Hugueninii 305. 10
millegranum 305. 10*
Nyssanum 305. 20. *c*
paterfamilias 305. 10
prætextum 305. 10*
refractum 305. 12
ruthenicum 305. 11
sabaudum 305. 10
saxatile 305. 15
Skorpili 305. 20. *b*
sphaerocarpum 304. 15. 3
Orobanche alba 243. 29
Alexandri 243. 29
alostensis 244. 66
arachnoidea 244. 55
arcuata 244. 40

- Benthami 242. 3. 10
 Buhsei 243. 18
 cæsia 242. 1. 14
Chironii 242. 3. 10. a
 243. 38
 congesta 243. 39
 fragrantissima 243. 29
glabrata 243. 30. a
 habrocaulon 243. 36
Krylowi 243. 34*
 Levieri 242. 3. 1
 litoralis 244. 50
 lutea 242. 3. 5. 243. 39
micrantha 242. 3. 7*
 pallescens 243. 29
Pancicii 243. 25. a
 Pareysi 242. 1. 7*
 Petargonii 242. 3. 15*
 Petasites 244. 44
 procera 243. 25
 Pyrrha 244. 46
 rhætica 243. 25
 sabulicola 244. 45
 sambucina 243. 26
 sicula 242. 3. 6
 strumosa 244. 43
 thapsoides 244. 45
 Todari 242. 3. 6
 Orobis Ewaldi 101. 49. 2*
 Oxytropis carinthiaca 99.
 39. 11
 cyanea 99. 39. 13
Gaudini 99. 39. 13
 generosa 99. 39. 10*
 hybrida 99. 39. x
 intermedia 99. 39. 2*
 prenja 99. 39. 2
 Steigeri 99. 39. 2*
 triflora 99. 39. 14
 Pæderota coerulea 235.
 13. 2
 lutea 235. 13. 1
 Pæonia Cambessedesii 14.
 24. 3. a
 romanica 14. 24. 7
 Panicum Digitaria 327.
 15 obs.
 vaginatum 327. 15 obs.
 Papaver phoeniceum 16.
 1. 2
 rhæticum 16. 1. 11*
 rimelicum 16. 1. 4. a
 suaveolens 16. 1. 11*
 Parietaria judaica 277. 2. 2
 serbica 277. 2. 4. a
 Parnassia alpina 48
 Paronychia kurdica 125.
 5. 9. a
 Parrya nudicaulis 22. 19. 1
 Pastinaca corsica 138. 36.
 3. a
 hirsuta 139. 36. 4. a
 Pastorea albiflora 40. 72. 1
 Pedicularis Baumgarteni
 229. 26. 3*
 bosniaca 240. 25
 elongata 239. 26. 2*
 rubescens 241. x
 euphrasioides 240. 27. a
 fallax 240. 25
 Kernerii 241. x. 370
 lepidota 240. 13. a
 Malyi 240. 20*
 Murithiana 241. x
 pallescens 241. x
 pseudoasplenifolia 241. x
 resupinata 240. 13. a
 rhætica 240. 6. 370
 scardica 240. 20
 Tenoreana 240. 21
 Vulpii 241. x
 Petargonium inquinans 79
 Peltaria isatoidea 34. 54.
 1. a
 Pendulina Fontanesii 29.
 38. 13
 intricata 30. 38. 15
 Webbiana 30. 38. 16*
 Peplis hispidula 124. 5. a
 serpyllifolia 124. 2. 1
 Peucedanum angustifolium
 137. 28. 2
 intermedium 137. 29. 4
 salsum 138. 32. 1
 Phagnalon viride 173. 40.
 2*
 Phelipæa ægyptiaca 242.
 1. 10. a
 bohémica 241. 1. 1
 emarginata 242. 1. 13
 Gussoneana 242. 1. 14
 ionantha 242. 21*
 panormitana 242. 1. 14
 Pareysi 242. 1. 7*
 proboscistyla 242. 1. 13
 ramosissima 242. 1. 14
 Phleum ambiguum 329.
 30. 4*
 ciliatum 329. 30. 5*
 fallax 329. 30. 1*
 serrulatum 329. 30. 5*
 stoloniferum 329. 30. 1
 subalpinum 329. 30. 1
 Phlomis polymorpha 252.
 18. 1
 taurica 252. 18. 8
 viscosa 252. 18. 1
 Phyteuma austriacum 211.
 13*
 confusum 212. 16*
 Vagneri 211. 6. 9
 Picridium prenanthoides
 203. 119. 3
 Piceris monticola 204. 129. 3
 Pilosella arctogena 199.
 159*
 brachycephala 200. 175*
 chrysocephala 200. 175*
 coalescens 200. 184*
 cochlearis 200. 175*
 cochleata 200. 175*
 detonsa 198. 158
 discolorata 200. 175*
 exacuta 200. 184*
 galactina 198. 158
 grisea 198. 158
 prasinata 200. 184*
 pubescens 199. 159*
 pulvinata 199. 171*
 subpratensis 200. 175*
 suomensis 199. 159*
 tenuilingua 200. 184*
 ventricosa 200. 175*
 Pimpinella rupestris 145.
 83. 7
 siifolia 145. 83. 2. a
 Pinguicula læta 259. 2. 5
 Pinus hispanica 283. 7*
 leucodermis 283. 5*
 Mughus 284. 13
 Neilreichiana 284. 13. x
 nigricans 283. 5
 Omorika 283. 1. 5
 Pinaster 283. 4*. 6
 Pinea 283. 3
 Prenja 283. 5*
 rhætica 284. 13. x
 silvestris 283. 10
 taurica 283. 4*
 vermicularis 283. 2
 Piptatherum virescens 332.
 62. 2. a
 Plantago altissima 266. 26*
 argillosa 266. 10
 crassipes 266. 26

- glareosa* 266. 26
intermedia 267. 41 obs.
limosa 267. 41 obs.
lutulenta 267. 40
majoricensis 266. 5*
nana 267. 41 obs.
paludosa 267. 41
purpurascens 266. 5*
reniformis 267. 36.a
sphaerostachya 266. 26
subulata 266. 13
villosa 266. 26
Weldeni 266. 34
Platanthera hybrida 293.
 20. 1x
hyperborea 293. 20. 4
Koenigii 293. 20. 4
obtusata 293. 20. 3
pervia 293. 20. 2
Platanus orientalis 277
Platycapnos grandiflora
 18. 26.a
Pleuropogon Sabinii 336.
 81. 1
Poa adspersa 340. 6
anceps 340. 8.a
Balbisii 341. 29
dolosa 341. 16
glaucescens 341. 13
jurana 340. 2
laeviculmis 340. 6
laevis 340. 6
laxiuscula 341. 19*
montana 340. 8
pannonica 340. 8.a
Parnassi 341. 15*
pseudoconcinna 341. 23
rigida 340. 93. 5
scabra 341. 10
silvatica 340. 98. 1
tremula 341. 17
trichophylla 341. 21
ursina 341. 13.a
Podanthum anthericoides
 211. 6. 5
limonifolium 211. 6. 3
Podospermum pindicolum
 204. 126. 4.a
ponticum 204. 126. 4
Polycarpon colomense 125.
 1. 3*
Polygala alpina 49. 11.a
bætica 48. 5*
Barthiana 49. 13
caliptera 49. 9
carniolica 49. 11*
corbariensis 49. 10
fatua 49. 11*
forojulensis 49. 6.a
glacialis 49. 11.a
hybrida 50x
microcarpa 49. 12
neglecta 48. 3
nicaensis 48. 5.a
pisaurensis 49. 6
provincialis 49. 6
pubescens 49. 9
speciosa 49. 9
Timbali 49. 10
Vayredae 48. 2.a
Wolfgangiana 49. 7
Polygonum bicolor 272x
Braunianum 272x
danubiale 271. 8
herniarioides 272. 29
hybridum 271. 12
hydropiperiserrulatum
 272x
patulum 272. 21*
plebejum 272. 29
polycnemiforme 272. 24
pseudopulchellum 272x
serrulatonodosum 272x
Polypodium serratum 347.
 15. 1
Polypogon Clausonis 332.
 54. 4 obs.
Populus hybrida 280. 1
intermedia 280. 3
italica 280. 5
pannonica 280. 4
pyramidalis 280. 5
Potamogeton acaulis 286. 4
caespitosus 288. 26*
coriaceus 287. 13*
decipiens 287. 14
flabellatus 288. 28
Griffithii 287. 14.a
nitens 287. 11
parnassifolius 286. 4
petiolatus 286. 3
reptans 288. 26
rigidus 286. 1
rivularis 287. 8*
salicifolius 287. 6
Stunackii 288. 23*
subflavus 287. 9*
vaginatus 288. 28.a
Wolfgangii 287. 10*
Zizii 287. 13*
Potentilla alpicola 110. 25*
aurulenta 111. 34
australis 111. 35*
bolzanensis 111. 34
carniolica 112. 58*
commixta 112x
coronensis 110. 23
diffusa 110. 27
dispersa 112x
elongata 110. 23*
engadinensis 110. 23
Gaudini 111. 36
Goldbachii 110. 23*
Heerii 112x
Hegetschweileri 112x
intercedens 112x
Kernerii 112x
micans 112x
multicaulis 110. 12
Nestleri 110. 23
pedatoides 112x
pindicola 110. 19.a*
sciaphila 110. 16
strictissima 110. 16
subsericea 110. 20*
thyrsiflora 110. 25
valesiaca 112. 61
virgata 110. 23*
Poterium Gaillardoti 117.
 16. 4.a
Prangos carinata 148. 100. 1
Prasium liparitanum 245. 1
Primula (vulgaris) bale-
arica 261. 2
bosniaca 262x
caulescens 262x
coronata 262x
digenea 261. 2x
Escheri 262x
exscapa 262. 33
exigua 261. 7*
flagellicaulis 261. 2
glabrescens 261. 9
Hugueninii 262x
inflata 261. 4 et obs.
intricata 261. 1
longobarba 262. 25
macrocalyx 261. 4 obs.
magiassonica 262. 34*
oblongifolia 261. 6x
pachyscapa 261. 1
Palinuri 262. 11
Parlatorii 262. 26
pannonica 261. 4
Plantae 262x
Portenschlagii 262. 27x
Salisii 262x
Schmidelyi 262x
Steinii 262x
Sturii 262x
unicolor 261. 3*

- variabilis 261. 2×
 venzoides 262. 32*
- Prunella bicolor* 250×
capitellata 250. 9. 3
elatio 250. 9. 4
integerrima 250. 9. 4
spuria 250×
Tournefortii 249. 9. 2
variabilis 250×
- Psoralea dentata* 96. 36. 3.a
hispanica 96. 36. 3.a
polystachya 96. 36. 3.a
- Ptarmica Barbeyana* 166.
 13.a
calcarea 167. 19
cristata 167. 13×
dacica 166. 3*
Jaborneggi 167. 13×
Krätzlina 167. 13×. 18×
Millii 166. 13
olympica 167. 19
pindicola 167. 23.a
Reichardtiana 167. 13×
rupestris 166. 9.a
- Pteris gracilis* 345. 4. 1
Stelleri 345. 2. 1.a
- Pterospartum cantabricum*
 84. 66*
stenopterum 84. 66*
tridentatum 84. 66
- Ptilotrichum longicaule*
 33. 51. 5
Peyrouisianum 32. 2*
spinosum 33. 51. 3
tortuosum 32. 51. 2*
- Ptosimopappus sempervirens* 185. 38
uliginosus 185. 40
- Pulicaria microcephala*
 177. 56. 4.a
- Pulmonaria alpestris* 223.
 8. 1*
dacica 223. 8. 2*
digenea 224. 8×
hybrida 224. 8×
notha 224. 8×
oblongata 224. 8×
stiriaca 223. 8. 4*
suffruticosa 225. 15. 2
- Pulsatilla alba* 2. 3. 6
Breynii 1. 3. 5
grandis 1. 3. 4
latifolia 1. 3. 2
versicolor 1. 3. 5
- Pyrethrum ambiguum* 170.
 25. 5
caucasicum 169. 24. 2.a
coronopifolium 169. 24. 8
- Pyrus cultrensis* 118. 2. 2
meridionalis 118. 3. 5*
- Quercus alpestris* 279. 9*
ambigua 278. 4
apennina 278. 3
arenaria 278. 1*
aurea 279. 7*
australis 278. 1
avellaniformis 279. 16
Bedöi 278. 5
borealis 278. 1
brevipes 278. 1
Budayana 278. 2
budensis 278. 4
calliprinos 279. 23
crispata 279. 5*
Csatöi 278. 1*
decipiens 278. 4
dilatata 278. 1*
erythrolepis 278. 5
expansa 279. 16
glabrata 278. 4. 5
glabrescens 278. 4*
gramuntia 279. 16
Haynaldiana 279. 5*
hispanica 279. 19 obs.
Kernerii 278. 4*
Kitaibelii 278. 5
macedonica 279. 14
Mirbeckii 279. 10*
monorensis 278. 1*
Morisii 279. 19 obs.
oxycarpa 278. 5
pallida 278. 4*
pilosa 278. 1*
prasina 279. 11
pseudococcifera 279. 22
pseudopedunculata 278. 1
Pseudo-Suber 279. 15
spectabilis 279. 7*
stolonifera 279. 6
Streimii 279. 7*
Suber 279. 19
Tommasinii 278. 5
tridactyla 278. 4*
Virgiliana 228. 4*
Welandii 278. 4
- Ranunculus adscendens*
 8. 60.c
Alcea 8. 61.a
alliariefolius 8. 55
aureus 7. 46
Baerianus 9. 67
balearicus 8. 60.a
- Barthii* 7. 54
Broteri 8. 60.b
castellanus 8. 61.b
chrysanthus 10×
cibinensis 8. 62
Csatöi 7. 54*
dentatus 6. 39
dubius 11. 13*
eriphyllus 8. 59.a
escorialensis 6. 14.a
ficariaeformis 5. 9. 1
ficarioides 5. 9. 3
floribundus 10. 8*
fucoides 10. 3*
gallicicus 8. 62.a
gelidus 10×
glabriusculus 7. 54*
glechonoides 9. 85.a
Gonnetii 5. 10. 6*
Gouani 7. 45
Grenierianus 353. 11
heleophilus 10. 7
Henriquezii 5. 10. 3.a
heucherifolius 354. 13
Hollianus 5. 10. 13.a
Hornschuchii 353. 11
incomparabilis 6. 15.a
intermedius 354. 17
Kayserii 7. 54*
Kladnii 7. 54
lacinatus 7. 47
Lagascanus 8. 60.c
lanuginosaeformis 7. 54*
leontinensis 10. 11*
lustinicus 5. 10. 3.a
lutarius 11. 16*
luzulaefolius 9. 69
macrophyllus 8. 60.a
malacophyllus 7. 54*
marginatus 9. 85.a
nevadensis 6. 13.b
nigrescens 5. 10. 3.o
occidentalis 8. 62.a
Orphanidis 7. 53.a
Peyrousianus 7. 46.a
platyphyllus 7. 54*
propinquus 7. 54
pseudocacris 7. 54
pseudocassubicus 8. 56
pseudomontanus 7. 50
pubescens 8. 60.c
reptabundus 9. 82
rhodensis 5. 10. 4.a
rufulus 5. 10. 13.a
sedunensis 10. 4
strigulosus 7. 54*
submersus 10. 3
suborbiculatus 5. 10. 13.a
subtilis 7. 54
subtrifolius 7. 78

- szurulensis 6. 39
 Thomasii 7. 45. 46
 trachyticus 7. 54
 trichophylloides 10. 4
 tricrenatus 9. 67
 tuberosus 7. 46. a
 verrucosus 7. 54
 Villarsii 353. 11
 Wilanderi 8. 57*
- Raphanistrum microcarpum* 18. 6. 1. a
- Reseda* *bætica* 41. 2
constricta 41. 10. a
leucantha 41. 4*
macrostachya 41. 1. a
Reyeri 41. 12
tymphaea 41. 7. a
- Reutera puberula* 146. 91. 2*
- Rhamnus ferrugineus* 81. 4
picenensis 81. 3. a
rotundifolius 81. 4
- Rhinanthus rumelicus* 239. 24. 2*
serotinus 239. 24. 2
- Rhodiola Scopolii* 129. 5. 1
- Rhododendron Kotschyi* 214. 15. 4*
- Rhus oxyacantha* 81. 4
radicans 81. 4 obs.
- Ribes acicularis* 129. 1
Biebersteinii 130. 5
- Roripa anceps* 22. 20. 5
astylis 22. 20. 6*
Borbasii 22. 20. 3
capillipes 22. 20×
danubialis 22. 20. 6*
erythrocaulis 22. 20×
Haynaldiana 22. 20. 5
hungarica 22. 20×
Menyhardtiana 22. 20. 4
neogradensis 22. 20×
stenophylla 22. 20×
subglobosa 22. 20×
uliginosa 22. 20. 6*
- Rosa adenosepala* 116. 36
Afzeliana 115. 24
albo-lutescens 115. 24*
almeriensis 114. 19
anisopoda 114. 16
anoplantha 116×
armatissima 115. 31*
Bœnitzii 116×
baldensis 113. 10. 3*
belgradensis 115. 22*
bohemica 114. 16
Brunica 114. 12*
catalaunica 115. 27*
Chaberti 116×
Coqueberti 114. 14*
dalmatica 114. 14
Franzonii 116×
Gizellæ 114. 20
glabrifolia 116. 32
gorenkensis 115. 27
Gremlii 114. 16
Guicciardii 116×
Hawrana 114. 12*
Heckeliana 114. 15
Heimerlii 115. 27*
holikensis 116. 38*
incana 115. 26
Kernerii 115. 27
Kmetiana 115. 26
Lereschii 116×
leucadia 114. 12*
litigiosa 115. 24*
lucida 116. 40 obs.
Malyi 116. 37
microphylla 113. 10. 2
mirogojana 113. 10. 6*
myrtilloides 115. 24*
Obornyana 114. 20
oetea 116×
Pacheri 115. 29*
panormitana 113. 10. 2
podolica 115. 24*
pseudocuspidata 114. 12*
pycnacantha 115. 26
reticulata 115. 22
sarmentacea 115. 24
Schmidtii 115. 23
Simkovicsii 116. 38*
stenodonta 116. 36
sytnensis 115. 30
Tauschiana 115. 27
Thureti 114. 16*
umbelliflora 114. 12*
Vagiana 115. 26
venosa 115. 24
Waitziana 116×
Wulfenii 116. 38*
Zoisæana 115. 27
- Rotala filiformis* 124. 4. 1
- Rubia lævis* 151. 4. a
- Rubus acanthoclados* 106. 1
acuminatus 109. 48*
acutus 109. 48*
adscitus 106. 16
ætnicus 107. 21
affinis 106. 3
albatius 106. 14
australis 107. 21
badinus 108. 33. c
Bagnellii 109. 49*
Bakeri 106. 16
Briggsii 109. 49*
calvatifolius 108. 36
carpinetorum 108. 16*
ciliatus 108. 48
cimbricus 106. 8*
confinis 107. 16. b
cyclophyllus 108. 47
danicus 107. 17*
decorus 107. 21×
derasus 106. 16
dissimulans 109. 48*
divergens 108. 48
Drejeri 107. 23*
egregius 108. 33. b
Fionie 108. 48
flexuosus 107. 30*
Friderichsenii 109. 49*
Friesii 109. 49*
Gelertii 107. 16. a*
germanicus 106. 9
glandulosus 108. 42
glauco-virens 108. 33*
gothicus 109. 48*
hemistemon 106. 6*
horridicaulis 108. 33. a*
imitabilis 109. 49*
incurvatus 106. 9*
infestus 108. 33*
insularis 107. 16. b
jucundus 109. 48*
Lagerbergii 109. 48*
Langei 106. 14*. 107. 16. b*
Linkianus 106. 13*
longithyriger 108. 33*
maritimus 106. 4
mortuorum 109×
mucronatus 107. 18
mucronulatus 107. 18
myrianthus 106. 15*
Neumani 107. 16. a
nitidoides 106. 5
obovatus 106. 14*
oreogeton 109. 49
Pantocsekii 106. 14*
polyanthemos 107. 16. a
pseudoradula 106. 7*
pulcherrimus 107. 16. a
Purchasii 108. 33. b
pyracanthus 109. 49*
relatus 106. 6*
Reuteri 108. 40
rorulentus 106. 15*
rosanthus 108. 48
rosiflorus 108. 48
rotundifolius 108. 40
scaniensis 107. 20. a

- Scheutzii 106. 9*
 Schummelii 108. 33*
 Schwarzeri 109×
 sciaphilus 107. 18*
 Selmeri 106. 16
 serrulatus 109. 48*
 similatus 107. 16. b
 slesvicensis 109. 49*
 tæniarum 108. 33. a
 tenuiarmatus 109. 49*
 umbraticus 107. 16. b
 viridulus 109. 49*
 Warmingii 109. 48*
 Rudbeckia *fulgida* 161. 1.
 obs. 2
 Rumex abortivus 271×
arcticus 270. 7. a
 armoraciefolius 271×
 biformis 270. 7
 bihariensis 271×
 confusus 271×
 dimidiatus 271×
 erubescens 271×
 haplorhizus 271. 27
 heteranthos 271×
 limosus 270. 19
 microcarpus 270. 7
 montanus 271. 25
 Mureti 271×
 nepalensis 270. 10 obs.
 palustroides 271×
 Patientia 270. 5
 platyphyllus 270. 3*
 pseudopulcher 271×
 Sagorskii 271×
 Schmidtii 270. 3*
 semigræcus 271×
 stenophylloides 271×
 stenophyllus 270. 16
 Ruppia intermedia 289. 4
 Sabulina mucronata 68. 25
 obtusa 68. 20
 Villarsii 68. 25
 viscosa 68. 25
 Sagina alpina 69. 7*
 Baumgarteni 69. 7
 bryoides 69. 14
 cæspitosa 69. 6*
 capillaris 69. 11
 dichotoma 69. 9
 media 69×
 repens 69. 15. 4
 Sagittaria alpina 286. 3. 1. a
 Salicornia arabica 269. 18. 1
 cruciata 269. 15. 1. a
 intermedia 269. 17. 3
 lignosa 269. 17. 2
 ramosissima 269. 17. 3
 Salix *arctica* 281. 42*
 arelatensis 280. 3
Brownii 281. 42*
 calliantha 280. 7×
dasyclados 280. 15*
 fagifolia 280. 23
 Heerii 281×
 Hoffmanniana 280. 7
 Hugueninii 281×
 Krættliana 281×
 longifolia 280. 15*
 oenipontana 281×
 Pokorny 280. 2
 Rapini 281×
 recondita 281×
 rivalis 281. 30
 Schrenkiana 281. 35×
 Sendtneri 281×
 sericans 280. 15
 subnivalis 281×
tainmyrensis 281. 37. a
 tomentosa 281. 43
 Trefferi 282×
 Wichuræ 282×
 Salsola arenaria 268. 7. 3
 mutica 269. 23. 9
 Salvia adulterina 248×
alpestris 248. 18. a
Eichleriana 247. 4. 2. a
 lanigera 248. 36
Sonklari 248. 18. b
 Samolus nanus 260. 4. 1
 Saponaria *grandiflora* 56.
 13. 1. a
 Sarcocapnos integrifolia
 17. 2. 2*
 Sarothamnus arboreus 82.
 4. 9
commutatus 22. 4. 5. a
 Satureja Campanella 256.
 32. 4
 capitata 257. 38
inodora 256. 32. 5. a
intricata 256. 32. 4. a
 Olla 256. 32. 3
 pachyphylla 256. 32. 8
 Saussurea esthonica 183.
 86. 4
 Saxifraga Besleri 130. 8
Blancæ 132. 73. a
Blavii 132. 84*
canaliculata 131. 38. a
 compacta 130. 4
 Engleri 133. 96
 Forsteri 133×
 Girtanneri 133×
Hochstetteriana 132. 75. a
 Hornungii 131. 34
 hybrida 133×
 intacta 130. 4
 macropetala 131. 34*
 multifida 131. 36. 51
 norica 133×
 Padellæ 133×
prenja 132. 67. a
 Reyeri 133×
 rhætica 130. 8
 Sartorii 130. 25
 transsilvanica 130. 14*
 Scabiosa *balcanica* 159.
 22. a
 dalmatica 159. 30. a
 garganica 159. 30
 incana 159. 30. a
 inflexa 160. 5. 3*
 leiocephala 159. 22*
leucophylla 159. 30. a
 lucida 159. 24
 lyrophylla 160. 8. 3
 magellensis 159. 29
rotata 158. 6. a
 silaifolia 159. 21
 spreta 159. 24
 virescens 159. 30. a
 vogesiaca 159. 24
 Wulfenii 158. 6
 Schoenus intermedius 317.
 2×
 Scheuchzeri 317. 2×
 Scilla corsica 306. 18
 Kladnii 306. 19
 laxa 306. 19*
 nivalis 306. 20*
 rosea 306. 19
 secunda 306. 19
 subnivalis 306. 20*
 triphylla 306. 19*
 Scirpus bifolius 318. 9. 2
 caducus 319. 14. 4. a
 ovatus 319. 14. 4. a
 Scheuchzeri 319. 10×
 tenuifolius 318. 9
 Scleranthus ætensis 126. 4
 Durandoi 126. 5
 pseudovercicillatus 126.
 5*
 Scleropoa loliacea 343.
 107. 2
 Scorzonera coronopifolia.
 204. 23 obs.

- glabra 204. 125. 8
 rhodantha 204. 15*
- Scrophularia* alata 230. 3. 12
 alpina 231. 35*
 bosniaca 230. 3. 14.a
 grandifolia 230. 3. 14
 Jankæ 231. 35*
 lasiocaulis 231. 35*
 pulverulenta 231. 35*
Schmitzii 230. 3. 4.a
 valentina 230. 3. 15.a
- Scutellaria* balearica 249. 11.a
 Nicholsoni 249×
- Sedum* Boguslawii 127. 4. 1
 engadinense 129×
 erraticum 129×
 glanduloso-pubesces 129. 39
 intermedium 127. 4. 1
 pyrenaicum 128. 21
 spiruim 127. 4. 3 obs.
- Selinum* Bellardi 137. 29. 4*
 Seguieri 140. 53. 1. 1*
- Sempervivum* campaniforme 127. 3. 24
 Fontanæ 127. 3×
 Gaudini 127. 3. 21*
 Heerianum 127. 3×
 juratense 126. 3. 2
 lasiopogon 127. 3. 15
 rheticum 127. 3×
- Senecio* alpestris 162. 13
 arcticus 163. 25*
 arenarius 164. 32
 auriculatus 163. 22
 Balbisianus 162. 5. 10
 balcanus 164. 31.a
 Biebersteinii 163. 6. 6
 brachychætus 162. 17*
 bulgaricus 163. 6. 3*
 cinereus 164. 34*
 dalmaticus 163. 6. 4*
 difformis 163. 22
 erubescens 164. 31.a
 gibraltarius 164. 46*
 gibraltarius 163. 6. 16.a
 Kernerii 165×
 lanatus 163. 6. 21*
 papposus 162. 13
 Reisachii 164. 31 obs. 165×
 Rochelianus 163. 6. 21*
 Rodriguezii 164. 50.a
 ruthenicus 163. 6. 21*
- scandens 165. 7. obs. 1
 Siegfriedi 165×
 sonchoides 165. 8 obs.
 subnebrodensis 165×
 sulphureus 162. 17.a
 Vukotinovicii 165. 8 obs.
- Serapias* laxiflora 290. 14. 5
 triloba 290. 14. 1×
- Serratula* isophylla 183. 93. 2
- Seseli* Malyi 141. 20*
- Sesleria* angustifolia 330. 37. 6
 comosa 330. 37. 5.a
 Haynaldiana 330. 37. 8
 leptophylla 330. 37. 9
 microcephala 330. 37. 11. 12
 tenella 330. 37. 12
- Setaria* ambigua 327. 11. 5
 fallax 327. 11. 2
 macrochaeta 327. 11. 1*
- Sideritis* Boissieri 253. 22. 6
 Guillonii 253. 22. 15*
 sætabensis 253. 22. 19
- Sieversia* bulgarica 113. 8. 2.a
 rhætica 113. 8×
- Silene* atolica 54. 92. a
 antilopum 51. 11. 6
 articulata 55. 94
 arvensis 54. 89
 Barbeyana 53. 68.a
 Campoi 53. 57
 cephalenia 52. 17.a
 carinthiaca 54. 92.b
 crispata 51. 11. 6
 decipiens 55. 110
 diurna 51. 7. 3
 Duriei 55. 107
 Fabaria 51. 11. 5
 fabarioides 51. 11. 1.a
 fallax 55. 112
 halophila 55. 116
 Haussknechtii 55. 98.b
 Hellmanni 53. 49
 Herminii 54. 72
 hifacensis 52. 21.a
 hirsutissima 55. 121
 Holzmanni 54. 86
 insularis 55. 97.a
 juncea 55. 103.a
 juvenalis 55. 136.a
 Lacaitæ 52. 21.a
 macropoda 53. 70.a
- melandrioides 54. 73.a
 methanea 55. 105
 montana 51. 11. 7
 nevadensis 52. 29.a
 pachyphylla 55. 98.a
 pallidiflora 55. 110
 pindicola 53. 63.a
 polytrichoides 54. 78*
 pratensis 51. 7. 4
 pseudonutans 52. 32.a
 pseudosaxifraga 53. 68
 quadriloba 52. 18
 rhodopea 52. 30 obs.
 Rohrbachiana 55. 101
 saxicola 55. 107*
 Schlosseri 53. 48
 Tommasinii 55. 98
 undulatifolia 55. 94
 Willkommiana 55. 96
- Silphium* perfoliatum 173. 38. obs. 2
- Sinapis* hispanica 19. 11. 1 obs.
 juncea 29. 36 obs.
 retrohirsuta 28. 36. 6
 taurica 28. 36. 6
 ucranica 28. 36. 8
- Siphonostegia* syriaca 238. 20.a. 1
- Sisymbrium* alpinum 27. 32. 1
 chrysanthum 26. 8
 Edwardsii 27. 33. 1
 erysimifolium 26. 8 obs.
 glaucescens 26. 8*
 hungaricum 26. 5
 nanum 27. 29.a
 nanum 24. 26. 13
 Parra 28. 31
 pendulum 29. 38. 13; 30. 38. 16
 pseudoirio 26. 6
 wolgensse 26. 8
- Smilax* aspera 299. 2
 excelsa 299. 1
 mauritanica 299. 3
- Soldanella* Clusii 260. 9*
 hungarica 260. 9*
 hybrida 261×
 pindicola 261. 2*
- Solidago* gigantea 174. 45. obs.
 lapponica 173. 45. 1
 lithospermifolia 174. 45 obs.
 valesiaca 173. 45. 1

- Sonchus Dianæ* 189. 107.
 10.*a*
exaltatus 189. 107. 2
macrophyllus 188. 106. 1
 obs.
oxyspermus 189. 107×
pallescens 189. 107. 8
repens 189. 107. 2
zollukoferioides 189. 107.
 10.*a*
Sophora alopecuroides 81.
 1.*a*
Sorbus alandica 118. 3. 2
fallacina 118. 3. 6
intermedia 118. 3. 6×
Meinichii 118. 2
meridionalis 118. 3. 5*
semipinnata 118. 3. 3*
syrmiensis 118. 3. 1
Sorghum campanum 327.
 4. 2
Sparganium Borderi 317. 7
emersum 316. 2
glomeratum 316. 3
neglectum 316. 1*
oligocarpum 317. 6
speirocephalum 316. 4.*a*
submuticum 317. 8
Spergularia marginata 69.
 17. 4
Spiræa confusa 105. 1. 2*
lancifolia 105. 1. 4.*a*
oblongifolia 105. 1. 6
rhodoclada 105. 1. 3.*a*
sawranica 105. 1. 2*
Sporobolus tenacissimus
 331. 48 obs.
Stachys Freynii 252. 16.
 28.*a*
glabrata 252. 16. 30
Milani 252. 16. 23*
nitida 252. 16. 35
Sendtneri 252. 16. 34.
 39.*a*
tymphaea 251. 16. 5.*a*
Wirtgeniana 251. 16.
 14×
Statice angustifolia 264.
 7*
bahusiensis 264. 8
cancellata 265. 37
catanensis 264. 31.*a*
Girardiana 264. 13
inarimensis 264. 30
incana 265. 4. 3*
læta 264. 26*
Legrandi 264. 20*
panormitana 264. 30*
rupicola 264. 30
scanica 264. 9
Stellaria Barthiana 64. 8
glaucoformis 64. 7
Laxmanni 64. 7*
montana 64. 4. 1
mosquensis 64. 14
peduncularis 64. 12
ponojensis 64. 8*
Stenotaphrum americanum
 328. 16 obs.
Sternbergia citrina 298. 5. 2
colchiciflora 298. 5. 4
Stipa dasyphylla 332. 60. 2
gallica 332. 60. 2
Johannis 332. 60. 2
sareptana 332. 60. 8
stenophylla 332. 60. 2
Stratiotes aloides 285
Succisa glabrata 160. 5. 1
hirsuta 160. 5. 1
Symphyandra Hofmanni
 206. 1. 2.*a*
Symphytum asperrimum
 222. 4 obs.
foliosum 222. 4. 8
orientale 222. 4. 5
peregrinum 222. 4 obs.
stenophyllum 222. 4. 1
tanaicense 222. 4. 1
Taraxacum alpestre 190.
 112. 4*
halophilum 190. 112. 8
Haussknechtii 190.
 112. 6
humifusum 190. 112
microcephalum 190.
 112. 8
nivale 190. 112. 10*
scolopendrinum 190. 112.
 9.*a*
Scorzonera 190. 112. 4
Steveni 190. 112. 8*
Tephrosieris Fussii 162.
 12*
pratensis 162. 14*
Wolffii 162. 13*
Tetracme quadricornis 26.
 30.*a*. 1
Teucrium carthaginense
 246. 41.*a*
chrysotrichum 246. 43.*a*
coeleste 246. 45
cuspidatum 245. 8.*a*
gnaphalodes 246. 42. 43
græcum 246. 25
heliotropifolium 247.
 50.*a*
majoricum 246. 45*
annonicum 246. 37
prostratum 246. 37
saxatile 246. 25
Sieberi 246. 25
vincentinum 246. 42.*a*
Willkommii 246. 45*
Thalictrum abortivum 3.
 8. 13
alpicolum 4. 16
ambigens 4. 19
ambiguum 4. 19
angustatum 3. 8. 8
appendiculatum 4. 23*
Arnaudie 4. 19
auriculatum 353. 7
Barthii 3. 8. 13*
belgium 3. 8. 8
Billotii 4. 23
budense 5. 8*
capillare 4. 18
capitatum 3. 8. 8
clypeatum 4. 23
Costæ 3. 8. 6*
Costæ 4. 16
Csatoi 4. 18
cuneatum 4. 19
elegans 4. 19
flavo-virens 4. 18*
frutetorum 4. 19
glaucescens 4. 19
gracile 4. 18
hirtellum 4. 19
inclinatum 4. 19
iodostemon 5. 8×
lætum 4. 16
Leyii 4. 16
macilentum 4. 23
Morisonii 3. 8. 10
niveum 3. 8. 3
nothum 3. 8. 13
pauperculum 353. 6
petaloideum 5. 26.*a*
podolicum 4. 25.*a*
polycarpum 4. 23
porphyritæ 4. 23
porrigens 3. 8. 8*
preruptorum 4. 23
princeps 353. 7
procerulum 4. 16
prorepens 3. 8. 8
purpureum 4. 25

- Regelianum 5. 8×
 rhæticum 5. 8×
 rhodanum 4. 16
 ruthenicum 4. 19
 Savatieri 4. 23
 serotinum 4. 19
 silaifolium 3. 8. 13
 speciosum 3. 8
 stenocarpum 4. 23
 stenophyllum 3. 8. 10
 subalpinum 4. 19
 subspicatum 4. 16
 thamnophyllum 4. 23
 udum 3. 8. 8
 viperinum 3. 8. 11*
 virgultorum 4. 23
 Vrabelyi 4. 23
 vulgatum 4. 23
- Thesium *Kernerianum*
 273. 4.a
 refractum 273. 10
 transsylvanicum 273. 2
- Thlaspi ambiguum 37. 16
 Avellanæ 37. 11
 balcanum 37. 8
 banaticum 37. 16. b. 38.
 18
commutatum 37. 16. b
goesingense 37. 8*
 heterochroum 37. 8
 Jankæ 37. 11
Kernerii 37. 10*
 korongianum 38. 18
 korongiense 38. 18
 longeracemosum 37. 11
 Mureti 37. 16*
 Prolongi 37. 64. 13. 40.
 71 obs.
 robustum 37. 16. b
 Salisii 37. 16
stenopterum 37. 16. a
- Thymelæa ciliata 273. 13. a
 elliptica 273. 12
 pubescens 273. 9
 Rodriguezii 273. 5
 Ruizi 273. 13. a
- Thymus acicularis 257. 21
 albicans 257. 31
 algarbiensis 257. 30
 alpestris 257. 19
 alpicolus 257. 20
 alpinus 257. 19
 angustifolius 257. 20
 arenarius 257. 20*
 atticus 257. 29
 aureopunctatus 257. 20
 austriacus 257. 20*
 Barrelieri 256. 34. 10
 capitatus 257. 38
 carpaticus 257. 20
 comosus 257. 19*
conspersus 257. 29*
dalmaticus 257. 20*
 Herba barona 257. 18
holosericeus 257. 29*
 humifusus 257. 20
ilderdensis 256. 34. 8*
Jankæ 257. 28. a
 lanuginosus 257. 19*
 lobatus 257. 33
 marginatus 257. 19*
 Marinosei 257. 29 obs.
 Marschallianus 257. 20*
micromerioides 256. 34.
 13. a
 nites 257. 18
 nitidus 257. 17
 pallescens 255. 15
 paradoxus 258×
 pulchellus 257. 19*
 Reuteri 256. 34. 10
Richardi 257. 29. a
 Rochelianus 257. 19*
 Roegnieri 257. 20*
 spinulosus 257. 29
 striatus 257. 29
 sublaxus 256. 34. 12
 sudeticus 257. 19*
 valentinus 258×
 villosus 257. 33
Webbianus 256. 34. 12. a
 Zygis 257. 29
- Tilia corallina 73. 2
 heterophylla 73. 1 obs.
 Richteri 73×
 tomentosa 73. 1
- Torilis heterosperma 135.
 15. 5
- Tournefortia *heliotropioides*
 221 obs.
- Tragopogon *balcanicum*
 203. 124. 6. a
 Baylei 203. 124. 12
castellanum 203. 124.
 10. a
 Lamottei 203. 15
 longifolium 203. 15
- Tribulus orientalis 79. 3*
- Trichera robusta 161. 8. 7
- Trichomanes radicans 348
- Trifolium alpicolum 90.
 22. 8
Barbeyi 90. 22. 13. a
 commutatum 91. 31
- corsicum 91. 40
 glabellum 91. 35*
 Haynaldianum 90. 22. 4
Heldreichii 90. 22. 6. a
 inæquale 90. 22. 15
 Jordanianum 94. 23. 4*
 marsicum 91. 31
 messanense 90. 22. 18
Mincæ 91. 26. a
 polyanthemum 93. 82. 83
 pseudomedium 90. 22. 5
 purpurascens 90. 22. 5
 selinuntinum 90. 22. 18
setiferum 92. 61. a
 stramineum 90. 22. 22
 syracusanum 91. 35*
thionanthum 93. 105. a
 umbellatum 92. 79
Velenovskyi 93. 103. a
 villosum 91. 40
xanthinum 90. 22. 23. a
- Trigonella multiflora 89.
 18. 50
 orthoceras 89. 19. 7. a
- Trinia dioica 145. 88. 4
- Trisetum baregense 334.
 74. 36*
 Noëanum 334. 74. 46
- Triticum Aucheri 342. 5
 bæoticum 342. 3
 bicornè 342. 4
 Duvalii 343. 104×
 flacidifolium 343. 8
 glaucum 343. 15*
 Goiranianum 343. 11
 hemipoa 340. 93. 4
 intermedium 343. 15*
 junceum 343. 6
 ligusticum 342. 4
 obtusatum 342. 4
 Pouzolzii 343. 15*
 pungens 343. 13. 14
 Rottboella 343. 107. 2
- Tuberaria brevipes 43.
 15. a
 bupleurifolia 42. 2. 12
 globulariæfolia 42. 2. 10
 inconspicua 43. 15*
 variabilis 42. 2. 15
 vulgaris 42. 2. 11
- Tulipa acuminata 303. 14
 alpestris 302. 7
 apula 303. 18
 atheniensis 302. 5
 Beccariana 302. 8
biflora 302. 3. a
Billietiana 303. 22*

- bithynica* 303. 14
Bonarotiana 302. 11. *a*
 303. 11. *b*
Clusiana 303. 20
connivens 302. 1. *a* 374. 240
cornuta 303. 14
Didieri 303. 22
etrusca 302. 11 obs.
Foxiana 303. 17
fragrans 302. 7
Fransoniana 303. 23
Gesneriana 302. 1. 1. *a*. 10
Grisebachiana 302. 4
Hageri 303. 13
hexagonata 303. 17
hungarica 302. 1
Lortetii 303. 16*
maleolens 303. 19
Martelliana 303. 19
mauriana 303. 23*
mauritanica 303. 23*
Minervæ 302. 5
neglecta 302. 11. *a*
Nielreichii 302. 1
orientalis 302. 1. 374. 240
Orphanidea 302. 5
Passeriniana 302. 10
patens 302. 3. *b*
præcox 303. 17
Rochelliana 302. 1
Schrenkii 302. 1*
serotina 302. 11 obs.
Sommieri 302. 11
spathulata 303. 22. *a*
strangulata 302. 11. *b*
strangulata 302. 11
tricolor 302. 3. *b*
turcarum 302. 10
turcica 303. 14
variopicta 302. 11. *a*. 11. *b*
Tunica fasciculata 57. 15.
S. a
Haymaldiana 57. 15. 4. *a*
phthiotica 57. 15. 1. *a*
Typha angustifolia 316. 5
elata 316. 1
gracilis 316. 6
Laxmanni 316. 7*
Martini 316. 8
media 316. 6
transsilvanica 316. 1. 2
Udora lithuanica 285. 4. 1
occidentalis 285. 4. 1
Ulex calycotomoides 82.
 2. 9
lusitanicus 82. 2. 6. *a*
megalorites 82. 2. 18. *a*
sparsiflorus 82. 2. 12
Ulmus suberosa 278. 2
Umbilicus Winkleri 126.
 1. 7. *a*
Urachne virescens 332. 62.
 2. *a*
Urtica Bollæ 277. 1
oblongata 277. 6*
Utricularia brevicornis
 259. 1. 4
Grafiana 259. 1. 3
Jankæ 259. 1. 2. *a*
Kochiana 259. 1. 3
Vaccaria grandiflora 56.
 13. 1. *a*
Valeriana bijuga 157. 1. 11
dacica 157. 1. 11
excelsa 157. 1. 3
Gesneri 157. 1. *x*
Hoppi 157. 1. 11
subalpina 157. 1. 1
ternata 157. 1. *x*
versifolia 157. 1. 2
Vallisneria bulbosa 285. 3
obs.
spiralis 285. 3. 1
Vandellia erecta 231. 6. 1
pyxidaria 231. 6. 1
Veratrum bosniacum 311.
 5. 1
Verbascum abietinum 229.
 42
ambigens 230. *x*
Barthii 229. 42
bohemicum 228. 1. 1
Braunianum 228. 1. 4. *x*
calvescens 228. 1. 1
coenobitarum 230. *x*
comosum 230. *x*
crenatum 230. *x*
danubiale 230. *x*
decalvans 229. 44
dervichorum 230. *x*
dimorphum 230. *x*
erraticum 230. *x*
erythrocaule 229. 44
fluminense 230. *x*
Grisebachianum 229.
 42*
Haussknechtii 229. 35. *a*
Haymaldianum 230. *x*
heterophyllum 229. 50. *a*
Humnickii 230. *x*
Jankæ 228. 1. 8*
Kanitzianum 229. 35
Killiasii 230. *x*
liburnicum 230. *x*
metcoricum 229. 23. *a*
Neilreichii 229. 34. *x*.
 230. *x*
phalereum 230. *x*
pseudolychnitis 229.
 37. *x*
pseudosinuatum 230. *x*
pulchrum 228. 1. 14. *a*
Reissekii 230. *x*
Schmidtii 230. *x*
semirigidum 230. *x*
subalpinum 230. *x*
subphlomoides 230. *x*
thessalum 230. *x*
tomentosum 230. *x*
valentinum 228. 1. 9
vidavense 230. *x*
Veronica adulterina 245. *x*
anagalliformis 236. 26
aquatica 236. 26*
bihariensis 236. 11
brachystyla 236. 11
crenulata 235. 14. 1
decussata 238. 14 obs.
diversifolia 236. 13*
gracilis 236. 25*
humifusa 237. 34
integerrima 237. 34
intermedia 236. 26
Jacquini 236. 11
lilacina 237. 31*
macrodonata 236. 13
media 235. 14. 2
microcoma 237. 60. *x*
nummularioides 237. 34
prenja 236. 11
pubicarpa 236. 13
repens 237. 33
Renteri 237. 58
salina 236. 26*
Schmidtii 236. 12
spadana 236. 15
tenuis 237. 29*
Vesicaria microcarpa 33.
 53. 3. 4
tymphaea 33. 52. 2. *a*
Viburnum maculatum
 150. 1*
Vicia amoena 102. 50. 5. *a*
aquitana 102. 50. 21*
argentea 102. 50. 7. *a*
bifoliolata 103. 36 obs.
branchitropis 102. 50.
 14. *a*
cumana 102. 50. 4. 103.
 28
dalmatica 102. 50. 11

- dentata 102. 50. 2
elegantissima 103. 32.*a*
 Gussonei 104. 51. 10
megalotropis 102. 50. 16.*a*
 pallens 103. 48
 pauciflora 103. 32*
 plumosa 102. 50. 14
Scheuchzeri 102. 50. 11*
serinica 102. 50. 7.*a*
Vincetoxicum latifolium
 216. 3. 5
 triste 216. 3. 5
Viola adriatica 45. 14*
 arvensioides 47. 43
Barceloi 45. 14.*c*
 Beraudii 45. 13*
 biturigensis 44. 3
cæspitosa 47. 44*
 cassinensis 47. 35*
 Christi 47×
 cinerascens 45. 10
 crassiuscula 47. 50
 Cryana 47. 38
 declivis 45. 16
 elegans 47. 44
 foliosa 45. 15×
Foucaudi 47. 42*
 fragrans 42×
 glabrata 46. 18
 Haynaldi 47×
 helvetica 48×
 hirtæformis 48×
 hortensis 45. 13*
 hungarica 48×
 hybrida 48×
 ingrlica 46. 25
Jaubertiana 45. 14.*a*
 kalksburgensis 48×
 Kernerii 48×
 lusitanica 44. 1
 markensteinensis 46. 16
Mauritii 46. 32.*a*
 meduanensis 47. 42
 microceras 45. 14
 nivalis 47. 42
 olimpia 45. 9
olyssiponensis 47. 42*
 picta 45. 14*
polychroma 47. 42*
 porphyrea 46. 18*
 præcox 45. 14
 proluxa 46. 34
 pseudogracilis 46. 35
 pseudosuavis 45. 13
puberula 45. 10*
 purpurea 46. 19
 scotophylloides 46. 14
 Selkirkii 46. 23
 Steveni 45. 13*
 stipularis 44. 4
stolonifera 45. 14.*b*
 suaveolens 48×
 suberosa 44. 1
 valesiaca 45. 16
 variegata 45. 13
 Wiesbaurii 48×
 Willkommii 45. 8.*a*
Viscaria media 50. 5. 1
Viscum austriacum 150. 1
 Clusii 150. 3
Vitaliana primulæflora
 13. 1
Vulpia agrestis 336. 2
 ambigua 337. 12*
 declinata 337. 12
Wahlbergella macropetala
 51. 8. 1
 uralensis 51. 8. 1
Xanthium arenarium 206.
 2. 1
Xeranthemum cretense
 179. 72. 3.*a*
Zahlbrucknera austriaca
 133. 107
 paradoxa 133. 107
Zannichellia aculeata
 288. 2
 digyna 288. 1
 disperma 288. 1
 intermedia 288. 1
 Rosenii 288. 1
Zanthorhiza apiifolia 14.
 26 obs.

F I N I S.

Obs. In indice nunc absoluto species et subspecies, quæ in Supplemento non nisi ratione geographica (ob loca natalia addita) citantur, ob nimium earum numerum omisi, sed in indicis primarii (in Supplem. I.) exemplaribus, quæ apud me prostant, nomina generum species tales continentium lineolâ subductâ indicabo, ut sic possessoribus Supplementi indicem præbeam aliquantum locupletiozem.

New York Botanical Garden Library

QK281 .N9 Suppl. 1-2 gen
Nyman, Carl Fredrik/Conspectus florae Eu

3 5185 00163 2577