R. H. Francé

Das Leben der Pflanze

IV. Band

R. B. Francé

Das Leben der Pflanze

Mit zahlreichen Abbildungen im Text, Facsimiles, Karten und Tafeln
in Schwarz- und Farbendruck.

II. Abteilung:

== Floristische Lebensbilder ==

Band II.

Stuttgart

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung
1911.

Floristische Lebensbilder

von

R. B. Francé.

==== Band II. =====

Mit ca. 200 Abbildungen im Text, 8 farbigen und 14 schwarzen Tafeln
nach Zeichnungen und Aquarellen von Fritz Bergen, R. B. Francé, Joh. Iseli,
R. Deffinger, Ch. Volfeler, sowie nach Photographien von C. Blumenthal, H. Dopfer,
B. Baldy, J. Hartmann, Prof. Dr. O. Heinek, Srl. A. Mayer, Prof. J. Römer,
O. Scharf, P. Wolff u. A.

Stuttgart

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung
1911.

Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Bilderverzeichnis	VIII	Einleitung	1

Das Leben der Farne

	Seite		Seite
Einleitung	1	Die Wasserfarne	33
Die Farnepflanzen	7		

Die Blütepflanzen

	Seite		Seite
Die Entstehung der Blütepflanzen aus		Die Nadelhölzer	64
Urchegoniaten	53	Die Gnetazeen	104
Die Farnepalmen	61		

Die bedecksamigen Blütepflanzen

	Seite		Seite
Die Eigenarten der Angiospermen	107	Leben und Eigenart der Getreidearten	145
Die Verlandungspflanzen	113	Die Gräser der Verlandungspflanzen	149
Die Gräser	125	Die Algen und ihre Verwandten	156
Die Industriegräser	129	Die Liliengewächse	169
Die Biologie der einheimischen Wiesen- gräser	135	Die Lilien	173
		Die Orchideen	206

Die zweikeimblättrigen Pflanzen

	Seite		Seite
Die Röhkenträger	236	Die Mohnengewächse	393
Die Brennesselgewächse	256	Die Kreuzblütler	404
Die Ampferpflanzen	292	Die Reseden	447
Die Meliden	302	Die Sonnenblumenarten	450
Die Nelkengewächse	317	Die Rosenblütler	460
Die Wasserrosen	328	Die Steinbrechgewächse	464
Die Hahnenfußgewächse	347	Die Rosen und ihre Verwandten	477
Literaturverzeichnis	527	Register	531

Bilder-Verzeichnis.

Farbendrucktafeln

	Seite
Schematische Darstellung des Generationswechsels der Pflanzen	8
Verlandungs-Bestände	112
Natürliche Narzissenwiese bei Montreux am Genfersee	168
Cattleya Mendelli Quordon House Var	208
Orchideen	232
Farbenvarietäten der buntblättrigen Pelargonie	312
Jägerflora auf der überdüngten Weidetrist einer Alm	368
Insektenfresser im heimischen Moor	456

Schwarze Tafeln

Araucaria imbricata Pav.	64
Heiliger Hain der Hera	70
Typus des urwüchsigen Mischwaldes	88
Der Zypressenhain im Giardino Giusti zu Verona	96
Fremde Nadelhölzer auf der Mainau	96
Grasflur im Amurland	128
Grasflur, in eine Waldbesichtung eindringend	136
Verlandungszone eines Flusses	144
Wollgras	152
Eingang in den botanischen Garten zu Padua	176
Habitus des gefleckten Knabenkrautes	208
Frauenschuhorchidee	216
Erlenbruch	240
Eichengehölz	248
Im Buchenforst	252
Berühmte Systematiker	352
Berühmte Systematiker	480

Einleitung.

(Eine Vorrede an den Kritiker.)

Der Erfolg, welcher den beiden ersten Bänden dieses Werkes beschieden war, legte mir die Pflicht auf, meine Aufgabe noch weiter und gewissenhafter zu fassen. Es ist damit die ungeheure Schwierigkeit entstanden, zu gleicher Zeit einen breiten Leserkreis in die Elemente der Pflanzenkunde einzuführen, aber auch die Wissenschaft mit demselben Werke zu fördern, indem darin ihr Tatsachenmaterial von dem neuen Gesichtspunkt aus bewertet wird, zu dem die Botanik in den letzten Jahren vorgeschritten ist. Bildung, Schule, die Studentenschaft, die Pflanzenfreunde und zahlreiche Forscher legen ihren Maßstab an das Fortschreiten dieses Unternehmens und spornen dadurch seinen Autor zur äußersten Anspannung seiner Kräfte an.

Man erlaube ihm, als Einleitung hier Rechenschaft abzulegen, in welcher Weise er nach bestem Können das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen suchte.

Im vorliegenden Bande wurden neben bloßer Bildungslektüre und Natur-schilderungen auch Lesestücke geboten, die dem Lehrer willkommen sein können; es wurde getrachtet, in jeden Kreis systematischer Betrachtung der Pflanzenformen gerade die neueren Kenntnisse einzuflechten, welche dem Lehrer niederer und höherer Schulen zur Fortbildung dienlich sind. Da der durch den Plan des Werkes für dessen dritten Band vorgeschriebene Gegenstand (Algen, Bakterien, Pilze, Flechten, Moose) tief in das Arbeitsgebiet des Mikrologen eingreift, wurde überall, wo es angängig war, danach getrachtet, Winke zu erteilen, die in jener Richtung Nutzen stiften können.

Soweit war das Programm des populären Theiles vorgezeichnet.

Man hat aber dieses Buch auch mit dem Maßstabe eines wissenschaftlichen Werkes beurteilt, und der Verfasser ist stolz darauf und froh darüber, denn das wollte das Werk auch von seinem zweiten Bande an erreichen. Es hat zahlreiche Schüler herangezogen, die aus ihm Rat holen wollen für die neuen Gesichtspunkte einer vergleichend biologisch arbeitenden Botanik, als deren Gründungswerk man es bezeichnet hat. Mit zahlreichen Hinweisen und Gegenüberstellungen alter und neuer Betrachtungsweise suchte es diesen Wunsch zu erfüllen. Und schließlich sind auch zahlreiche Angaben, theoretisch und empirisch „Neues“ in das Buch verwoben.

Ich habe getrachtet, noch mehr als bisher auf die Quellen zurückzugehen; und welche Arbeitslast angedeutet ist, wenn ich sage, es seien in diesem Band über 100 neuere Facharbeiten über den Gegenstand verarbeitet, das vermag nur jener ganz zu ermessen, der sich schon einmal an solch einer zusammenfassenden Darstellung versuchte.

Und wenn ich bitte, mir etwas an diesem Bande als wissenschaftliches Verdienst anzurechnen und kritisch zu prüfen, so ist es vor allem das Unternehmen, die alten und neuen empirischen Befunde der Algologie, der Pilz- und Flechtenkunde und der Bryologie unter dem neuen Gesichtspunkt einer vergleichenden Pflanzenpsychologie (wie ich sie in Bd. II und in meiner Abhandlung: Grundriß einer Pflanzenpsychologie [Zeitschr. für den Ausbau der Entwicklungslehre] formulierte) zu werten.

Gemäß diesem Programm bitte ich, nur als Lesestücke aufzufassen und zu beurteilen den Abschnitt: Blick auf die Gesamtheit der im Wasser lebenden Urgewächse (der inzwischen auch als Sonderdruck unter dem Titel: Der Bildungswert der Kleinwelt erschienen ist), ferner die Abschnitte: Die Spaltpilze, die Braun- und Rottange, die Pilze der biologischen Technik, die eßbaren und giftigen Pilze, die Darstellung der Rost- und Brandkrankheiten (S. 391 u. ff.), der Weinstockkrankheiten (S. 420—427), ebenso der Bedeutung der Flechten für Natur und Mensch (S. 458 u. ff.) und der Moose als Walderhalter und Bildner der Moore (S. 504 u. ff.).

Zur wissenschaftlichen Fortbildung der Lehrer sind namentlich bestimmt (außer dem hydrobiologischen und Spaltpilzkapitel) der Abschnitt über die Grünalgen, die Biologie der Pilze, die Schilderung der Pflanzenkrankheiten, der Flechten und Moose. Als Anleitung für mikroskopische Arbeiten sind ausgeführt die Kapitel der Flagellaten, Spaltalgen, Kieselalgen, Fuchsalgen und Grünalgen und der Schlußabsatz über allgemeine Winke.

Der Fachgelehrte findet in dem Band eine kritische Darstellung und Bewertung von neueren Arbeiten folgender 87 Autoren: Appel, Benecke, Bernard, Birger, Bonnevie, Borzi, Bresfeld, Brotherus, Bryhn, Calcar, Chodat, Correns, Dunbar, Eng jun. und sen., Eriksson, Falk, Jamineyn, Fisch, F., Fulton, Gaidukow, Gerassimow, Goebel, Golenkin, Haberlandt, Hahn, Herzog, Hieronymus, Hinterberger, J., Kueppe, Jäger, G., Jennings, Kammerling, Karsten, G., Kienitz-Gerloff, Kirchner, D., Klebahn, Klebs, Kolkwitz, Krüger, W., Kuckuck, M., Kuckuck, P., Künstler, Lagerheim, Lauterborn, Linhart, G., Loeske, Ludwig, J., Lütkenmüller, Migula, Mincks, Molisch, Müller, R., Müller, D., Münden, Raumann, A., Rémec, Oltmanns, Dettli, Paul, G., Péterfi, Raikow, Reinke, J., Richter, D., Richter, P., Rignano, Römer, J., Rothert, Schottelius, Schütt, Solla, Sorauer, Stolz, Strasburger, Szurák, Bajzey, Warweiler, Wehmer, G., Wiesner, Will, G., Winogradsky, Wittrock, Zacharias, D., Zahlbruckner, Zederbauer, Zukal, Zumstein.

Im engeren wurde für den Wissenschaftler außerdem geboten der Versuch einer Biologie der Flagellaten, einer biologischen Theorie der Pflanzenkrankheiten (S. 389, 403 u. a.), ein Versuch der Darstellung einer Physiologie der Flechten und der Prodromus einer zur Zeit noch fehlenden Biologie der Moose.

Neue Angaben und eigene Untersuchungsergebnisse wurden beigebracht über folgende Gegenstände: Nahrungswahl von Kollodiktyon (S. 64), Bau von Euglena (68), Bau und Funktion des Stigmas der Algen (75, 252), Bau von Bifosöka (87), Bau von Cryptomonas (94), Tastbewegungen von Peranema (97), Peridineenflora der Adria (101), Farbstoffbildung von Mikrokokkus (112), Versuche mit Nitragin und Minit (135), Bakteriose der Rüben (142), floristische Angaben über Wasserblüten

(155 u. ff.), Wabenbau von *Oszillaria* (148), Thermalflora (Zyanophyzeen 146, Diatomeen 165), Ursprung von *Chlorella* (236), Kopulation von *Chlorogonium* (253), Reizverwertungen von *Polytoma* (259), Reizverwertung bei *Chlorangium* (261), *Vikoföca Engii* n. sp. (Bild Tafel: Geißelzellen), Untersuchungen zur Mykoplasmahypothese (398), regulative Anpassungen des Flechtenthallus (451 u. ff. — Bau der Charaspermatozoiden (287), Bau der Elateren von *Marchantia*, neue Fundorte von *Schistostega* (497). Außerdem wurden über 100 größtenteils mikroskopische Abbildungen nach der Natur beigebracht.

Zum Ausbau der pflanzenpsychologischen Hypothese finden sich u. a. eine kritische Darstellung der Reizverwertungen von Desmidiaceen (S. 206—209, 218), eine Kritik des „mechanistischen“ Lamarckismus (218), eine Darstellung von Reizverwertungen der Pilze (325) und Beiträge auf S. 80, 252, 259, 261, 280, 353 usw.

Ich bitte meine Buchrichter, diesen verschiedenen Zwecken gerecht zu werden und Befestücke nicht mit dem Maßstab von Fachangaben zu messen, das rein Fachliche aber nicht als populäre Literatur zu bewerten.

*

*

*

Wie bei den bisherigen Bänden, habe ich mich auch diesmal bei zahlreichen Freunden meines Werkes und Fachgenossen zu bedanken für die Förderung, die sie dem Werke angedeihen ließen. Namentlich bei den Herren Prof. Dr. Fr. Darwin in Cambridge, Regierungsbaumeister Gißner in Tsingtau, Prof. Dr. Eriksson in Stockholm, Gärtner Grunewald in Jossen, Universitätslektor H. Hinterberger in Wien, Fräulein M. Mayer in Wien, Herrn Prof. Dr. M. Moebius in Frankfurt a. M., Herrn Prof. Dr. H. Molisch in Prag, Herrn Moorkulturanstaltsass. Dr. H. Paul in Bernau, Herrn Prof. J. Römer in Kronstadt, Herrn Prof. Dr. D. Schmeil in Wiesbaden, Herrn Oberlehrer G. E. F. Schulz in Friedenau, Herrn Prof. Dr. D. Zacharias in Plön und bei dem Institut für Gärungsgewerbe in Berlin, für die Bereitwilligkeit, mit der sie mich mit Ratschlägen, Bildern und Material unterstützten.

München, im Herbst 1908.

R. H. Francé.

Einleitung.

„Ich habe von Ihrer Erlaubnis, Sie aufsuchen zu dürfen, deswegen so rasch Gebrauch gemacht, Herr Professor, weil ich durch eine glückliche Änderung meiner Lebensverhältnisse nun meinen Wunsch verwirklichen kann, mich, wenn auch vorläufig nur als Liebhaber, mit unserer Flora zu beschäftigen, und nun vor Ungeduld geradezu brenne, die richtigen Anweisungen zu bekommen. Denn meine ersten Schritte auf diesem Gebiete kommen mir eigentlich etwas mißglückt vor.“

So begann ein Gespräch, in dem genau dasselbe verhandelt wurde, worüber auch die Leser eines Werkes mit Recht Auskunft verlangen können, wenn man von ihnen fordert, daß sie nun in das Studium der Blütepflanzen eintreten mögen. Es gilt auch für sie das, was jener Fragesteller zur Antwort bekam.

„Bevor ich Ihnen nutzbringend antworten kann,“ sagte ihm nämlich sein Lehrer, „muß ich um Ihre Vorkenntnisse und die letzte Absicht Ihres Strebens wissen. Denn es gibt Pflanzenliebhaber, die es dabei bewenden lassen, Pflanzen so zu sammeln, wie man alte Kupferstiche sammelt oder Vasen und Briefmarken, nämlich aus Freude an dem wechselnden Anblick und den ästhetischen Werten oder aus Ehrgeiz, um in den Besitz von Seltenheiten und Unika zu kommen . . . oder auch, weil man Handel treiben will damit. Denn Sie wissen doch wohl, daß es einen schwunghaften Herbarpflanzenhandel gibt, dem wir es zu verdanken haben, daß so viele unserer schönsten Blumen selten geworden, in manchen Gegenden geradezu ausgestorben sind. Oder wollen Sie sich mit den Pflanzen aus biologischem Interesse beschäftigen, d. h. ihre Blütenbiologie, ihre Bestäubungsverhältnisse studieren oder die Biologie ihrer Früchte? Solche Pflanzenfreunde, wenn sie gewissenhaft vorgehen, täten uns not und würden mit einfacher Arbeit sogar der Wissenschaft geschätzte Dienste erweisen. Oder wollen Sie Pflanzen kultivieren, sich unseren Kakteen- und Rosenfreunden anschließen? Wollen Sie aber direkt Botanik studieren, dann müßten Sie es berufsmäßig auf einer Universität tun, denn sonst bleibt man im Dilettantismus stecken. Sie sehen also, man kann sich unserer Flora von sehr verschiedenen Seiten nähern.“

„Die Bilder, die Sie mir da aufrollen, Herr Professor, entzücken mich eigentlich alle, verwirren mich aber auch. Man kann ja nicht alles zugleich tun. Das ist es gerade, worunter ich leide. Die Natur ist so unermesslich, so reich, so bunt, daß man ganz erdrückt und entmutigt ist von ihrer Schönheit und Unfaßbarkeit. Ich freue mich jederzeit kindlich auf die Tage, an denen ich hinauswandern kann in unsere schöne Umgebung;

ich habe manchmal Herzklopfen vor Freude und ein schmerzhaftes Gefühl in der Brust vor Sehnsucht, wenn ich es mir so untertags vorstelle, wie zauberhaft das wieder sein wird, wenn ich auf eine mir besonders liebgewordene Bergwaldwiese hinaustrete, wo eine Ummenge sonderbarer Blumen sind und alles so räthselhaft, so feierlich, ich könnte fast sagen, so märchenbang. — Aber ich verliere mich da in Phantasien, und ich sehe: Sie lächeln über mich als über einen unreifen Phantasten. Doch ich wollte damit nur zu fühlen geben, wie groß mein Eifer und mein Interesse ist! Wenn ich aber dann hinauskomme in die Natur, da bin ich immer ganz verzagt. Wohin soll man da zuerst blicken, was soll man tun? Ich kenne ja schon eine Menge Namen und kann so leidlich bestimmen — Kreuziferen und Umbelliferen und natürlich Kompositen fast gar nicht —, habe auch schon ein Herbar, aber das genügt mir alles nicht. Ich möchte mehr wissen. Blütenbiologie und Fruchtbilogie und sonstige Lebensgewohnheiten, das alles interessiert mich. Ich las öfters kleine Skizzen über die kulturgeschichtliche Rolle dieser und jener Pflanze. Das ist ja äußerst interessant, es scheint da eine ganze Weltgeschichte der Pflanzen zu geben. Auch liest man in den populärwissenschaftlichen Zeitschriften so oft von den sonderbaren Versuchen an den botanischen Instituten. Man möchte das im Zusammenhang einmal kennen lernen. Ich ließ mir in der hiesigen Bibliothek bereits eine Physiologie geben. Erstens aber habe ich fast gar nichts verstanden vor lauter Gelehrsamkeit, dann ist da alles auseinandergerissen. In der Natur sieht man stets die Einzelpflanze vor sich; in dem wissenschaftlichen Handbuch sind in einem Abschnitt die gleichen oder ähnlichen Lebenserscheinungen von hunderterlei Pflanzengattungen zusammen behandelt. Man findet sich daher nicht zurecht. Wertvoller war mir schon eine Blütenbiologie. Aber man kann so etwas gar nicht bezahlen. Das kostet gleich fast hundert Mark. Und die kleineren Floren enthalten wieder gar nichts davon. Da habe ich mir gedacht, und das wäre meine Hauptfrage an Sie: gibt es denn kein Werk, das bei mäßigem Preise für die wichtigsten und schönsten Pflanzen unserer Heimat alles das zusammenfaßt, was einen Pflanzenfreund interessieren kann? Also bei jeder Gattung die Sonderverhältnisse ihrer Lebensweise, was die Gelehrten aus ihrem Innenleben erforscht haben, ihre Blüten- und Fruchtbildung, ihre kulturgeschichtlichen Eigenheiten, ihre Bedeutung für Mensch und Gesamtnatur. Wenn ich so sagen darf, ein Werk, das Biographien unserer Pflanzenliebtinge enthält, das also gewissermaßen ein persönliches Verhältnis zu unserer Flora herstellt. So ein Werk kann sich natürlich nicht einmal mit allen Gattungen beschäftigen; schon dann müßte es vielbändig sein, wäre zu teuer und verwirrend. So etwas müßte ergänzend neben einer Flora von Mitteleuropa herlaufen und uns die in jener vorgestellten und anziehend erscheinenden Gestalten erst lieb und vertraut machen. Jetzt fällt mir das richtige Wort dafür ein: mir geht es mit den Blumen so, wie mit einem flüchtig geschauten schönen Mädchen, das tiefen Eindruck gemacht hat. Man möchte gerne mehr von ihr erfahren; wie sie lebt, was sie tut, wie sie wirklich ist. Das aber erfährt man aus der Flora nicht; die sagt zwar Namen, Wohnsitz, Stand und Familie, aber vermittelt nicht die Bekanntschaft mit der Schönen. — Wenn es ein solches Werk gäbe, das würde sicher viele glücklich machen. Ja, ich denke mir, ein solches Buch wäre eine patriotische That, denn es würde vielen Herzen die Heimat näher bringen. Ich bin gespannt, was Sie mir nun sagen. Existiert das, was ich mir wünsche?“

„Je länger ich es mir überlege, desto weniger kann ich Ihnen bejahend antworten. Ich finde, daß Ihre Naturliebe Sie ein wirkliches Bedürfnis empfinden ließ, und Ansätze zu dem, was Sie sich vorstellen, gibt es allerdings im botanischen Schrifttum vielfach. Am meisten kommt dem, was Ihnen vorschwebt, die ganz ausgezeichnete Flora von Hegi-Dunzinger nahe. Aber erstens wird sie erst in Jahren vollständig, dann fehlt darin das Ergebnis der Experimentalforschungen, weil es doch ausgesprochen eine Flora ist, und schließlich kostet auch dieses Werk über 100 Mark. Säurichs Leben der Pflanze strebt auch etwas Ähnliches an. Aber es sind darin kaum einige Duzend Kulturgewächse und „Schulpflanzen“ behandelt. Die Lebensgeschichte der einheimischen Blütenpflanzen von Loew, Kirchner und Schröter ist nichts für die Allgemeinheit, wenn es auch Ihrem Ideal teilweise ziemlich nahekommt. Sie ist sehr teuer und erst zum kleinsten Teil fertig. Schröters herrliches Pflanzenleben der Alpen berücksichtigt leider nur die Gebirgsflora. Nein, das Buch, das Sie sich wünschen, müßte erst noch geschrieben werden, und ich will Ihnen zugestehen, daß Sie es recht plastisch umrissen haben, was unserer populärwissenschaftlichen Literatur fehlt.

Eigentlich hätten auch wir Fachmenschen alle Ursache uns zu freuen, wenn sich einer von uns die unendliche Mühe gäbe, aus dem großen Schrifttum die physiologischen Experimente, die biologischen Beobachtungen, die anatomisch-morphologischen Besonderheiten, die systematisch-entwicklungsgeschichtlichen Merkwürdigkeiten und die kulturgeschichtlichen Angaben für die wichtigsten Pflanzen der Heimat zusammenzustellen und das Ganze mit dem warmen Gefühl zu durchtränken, daß er damit ein Lese- und Erziehungsbuch zur Heimatkunde und Naturfreude schafft, wie es bislang noch keines gibt. Gewiß, auch wir würden manchen Nutzen daraus schöpfen, wenn das Weitzerstreute gewissenhaft kritisiert würde . . . , aber wer soll das machen? Wir leben in der Zeit der Fachmenschen, und der Gedanke eines solchen Werkes, der mir dank unserer Unterredung so recht leuchtend, fast unwiderstehlich lockend vor Augen schwebt, greift weit über das Fach hinaus. . . . Und wir sind ja mit der Überspannung des Spezialistentums nun glücklich so weit gekommen, daß uns alles Gefühl für Einheit des Kulturstrebens aller ‚Fächer‘ abhanden gekommen ist. Man bringt sich in Verruf, wenn man mehr zu sein wagt, als ein bloßer Spezialist, der nie die Früchte dessen zu pflücken sich vermessen darf, was er erarbeitet hat. So ist es gekommen, daß so viele herzerwärmende und lebensbereichernde Wissenschaften neben dem Leben einhergehen, ohne voneinander zu wissen, ohne sich zu nützen. Die größten Schätze sind aufgehäuft — und liegen ungenützt, weil wir Gelehrte durch manches Unverschuldete und durch manche eigene Schuld verlernt haben, uns als Verwalter eines allgemeinen Kulturvermögens zu fühlen. Wir hüten den Schatz zu Tode, weil wir ihn in unserer Fachsprache ersticken und in tausend Bücher einsargen. Das aber ist eine kurzsichtige Politik. Je mehr wir ihn verschwenden, jedermann mitteilen und das von uns geschmiedete Gold verleihen würden, desto reicher würde es zinsen, denn geistiges Gut ist das größte Wunder auf Erden: je mehr man davon herschenkt, desto reicher wird man selbst.“ . . .

Dieses Gespräch fand, wenn auch nicht ganz so, weil es in moderne Verhältnisse übersetzt werden mußte, vor Jahren wirklich statt, als jener einstige Fragesteller noch kein Berufsbotaniker war. Er folgt daher nur einer Pflicht der Dankbarkeit, wenn er

in dem Augenblick, da er das von ihm erträumte und (da trotz der 18 Jahre, die seitdem dahinschwanden, es noch niemand machte) von ihm selbst geschaffene Werk einer populären Blütenpflanzenkunde Gleichsehnenden vorlegt, auch jenes alten Professors gedenkt, der dann sein Lehrer wurde und für immer sein Vorbild, mit seinem warmen Herzen für das Volk, mit seinem weiten Blick und seiner Vielseitigkeit. Da dieses Buch aus vielen Ansätzen entstand, um ein eigenes Bedürfnis zu befriedigen, wird ihm vielleicht das Glück zuteil, daß es auch nach dem Herzen vieler bearbeitet wurde.

München, im Februar 1909.

Das Leben der Farne.

Die Farnepflanzen (Filicines).

Man bezeichnet als Farnkräuter eine recht gut umschriebene Gruppe von Pflanzen, die man, durch neuere Erkenntnisse veranlaßt, enger an die Moose angeschlossen hat, als es in diesem Werke den Anschein hat. Da sich nämlich ihre geschlechtliche Fortpflanzung im wesentlichen ganz so abspielt, wie bei jenen, indem sie auch noch aus sehr einfachen Blütenteilen selbstbewegliche Befruchtungszellen, also Spermatozoiden oder mit dem neueren Ausdruck Gameten, entsenden, die das Ei auffuchen, um es zu befruchten, worauf dann wieder eine Pflanze entsteht, die sich ungeschlechtlich vermehrt, also Sporen abschnürt, aus denen wieder Geschlechtspflanzen hervorgehen, so haben diejenigen Naturforscher recht, die, wie A. Engler in seinem hier befolgten System, Moose und Farne in derselben Abteilung der Archegoniaten vereinigen. Ganz neue vergleichende Untersuchungen, die G. Schenk in den „Botanischen Jahrbüchern“ veröffentlicht, machen es ihm wahrscheinlich, daß die gemeinsamen Vorfahren dieser Archegoniaten Wasserpflanzen und zwar Braunalgen gewesen seien. Seine Beweisgründe stützen sich namentlich darauf, daß die Gametenbehälter und sogen. Tetrasporangien (vergl. dazu Bd. III, S. 305) ihrer Entwicklung nach gleichwertig, also homolog seien mit den Geschlechtsorganen und der „Sporenmutterzelle“ der Moose und Farne. Daß aber wirklich Wasserpflanzen die Vorfahren der ganzen höheren Pflanzenwelt seien, hat der Wiener Systematiker R. v. Wettstein durch eine sehr geistvolle Erklärung des Generationswechsels* von anderer Seite her zu erklären gewußt. Er setzte dadurch erst das Dach auf den großen Bau, den namentlich der rastlose Eifer Hofmeisters errichtet hat, der mit seinen vergleichenden „Untersuchungen über die Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen“ im Jahre 1851 dazu den Grundstein legte. Wenn Wettstein in seinem trefflichen Handbuch der systematischen Botanik sagt: „Die vier großen Gruppen der Kormophyten (Stamm bildenden Pflanzen), welche wir unterscheiden, repräsentieren ebenso viele Abschnitte in dem großen Prozesse der Anpassung der ursprünglich an das Wasser vollständig gebundenen Pflanze an das Landleben,“ so hat er damit gewissermaßen dem leblosen Antlitz der pflanzlichen Entwicklungs geschichte die Augen eingefest und ihm dadurch Intelligenz verliehen. Freilich wissen wir seit Hofmeister und seinen Nachfolgern, daß die Moose und Farne einander nahestehen, daß aber auch die höchstentwickelten Farne und die Blütenpflanzen lückenlos miteinander verbunden sind, weil uns in den von keiner Anpassung berührten, höchst konservativen Fortpflanzungsorganen gewisser Wasserfarne, der Selaginelle und des Brachsenkrautes, die Übergänge zu den einfachsten Blütenpflanzen, nämlich zu den tropischen Zapfenpalmen (Zykadazeen) und einheimischen Nadelhölzern, erhalten blieben. Wir erkennen ferner bei diesen Pflanzengruppen eine stufenweise Vereinfachung des Generationswechsels, so daß die echten Farne noch zweierlei selbständig ausgebildete Generationen gewahren lassen wie die Moose und Lauge, während die eine dieser Generationen, nämlich der Vorkeim, bei der Selaginelle nur noch aus der reifen Spore ein wenig hervorragt, bei dem Brachsen-

* Die elementare Erklärung des Generationswechsels findet sich in Bd. II, S. 474, dessen Kenntnis vorausgesetzt werden muß.

frant nicht einmal mehr das, während er bei den Phanerogamen nur noch auf eine oder wenige Zellen reduziert ist (vergl. das Bild). Wohl war uns die Erkenntnis dieser rückläufigen Entwicklung im Laufe der Stammesgeschichte sehr wichtig, weil dadurch die Einsicht gewonnen wurde, daß alle Pflanzenformen ebenso auseinander hervorgingen wie alle Tierarten. Trotz alledem fehlte es jedoch an einer befriedigenden Antwort auf die Frage, warum der Generationswechsel im Laufe der Pflanzengeschichte zurückging, und warum er denn überhaupt da war.

Die Vereinfachung des Generationswechsels bei den höheren Pflanzen.

- 1 = Männliches Prothallium eines Schachtelhalmes (*Equisetum*) = Gametophyt. 2 = Prothallium = Gametophyt eines Farnkrautes (*Aspidium*). 3 = Prothallium (pr) von *Salvinia*, das aus seinem Archegon schon einen Embryo (e) hervorgebracht hat. 4 = Prothallium (pt) von *Marsilia*, das aus einer Spore hervorgeht. 5 = Prothallium von *Selaginella* mit Embryonen, aus einer großen Spore entwickelt. 6 = Prothallium aus einer großen Spore von *Isoetes*. 7 = Pollenform (= kleine Spore) der Föhre (*Pinus*) mit dem einzelligen Prothallium (p). 8 = Pollenform des Türkenbundes (*Lillium Martagon*), dessen einzelliges Prothallium (m) eingeschlossen bleibt. 9 = Fruchtknoten des Knöterichs (*Polygonum*) mit dem Embryosack (= große Spore), in dem das weibliche Prothallium (p) aus 6 Zellen besteht.

Darauf hat Wettstein nun eine Antwort verschafft, die seinen Namen unter die großen Botaniker aller Zeiten einreicht.

Er zeigte nämlich, daß sich alle diese Vorgänge leicht verstehen lassen, wenn man annimmt, daß die ursprünglich nur im Wasser lebenden Pflanzen sich im Laufe der Zeiten daran gewöhnen mußten, bald aufs Trockene gesetzt zu werden, bald wieder unter Wasser zu vegetieren. Die Vermehrung durch freischwimmende Spermatozoiden ist nur im Wasser ganz sicher, daher entspricht die Geschlechtsgeneration (der Gametophyt) der Anpassung an das Wasserleben; die Sporen wieder bedürfen den Wind

Schematische Darstellung des Generationswechsels der Pflanzen.

(Nähere Erklärung siehe im Text S. 53—55.)

(Nach H. K. v. Wettstein, Handbuch der pfl. Botanik.)

zur Verbreitung, woraus abzulesen ist, daß die ungeschlechtliche Generation (der Sporophyt) die Anpassung an das Landleben darstellte. Wie kommt es nun aber, daß bei den Moosen und Farnen sich beide „Anpassungsformen“ so regelmäßig und unabhängig von dem Umgebungswechsel einstellen? Um dies zu erklären, muß man der Pflanze die auch sonst vielfach bezeugte Kraft zutrauen, eine einmal angenommene Anpassung automatisch zu wiederholen aus ihrem „unbewußten Gedächtnis“ heraus, auf dem auch die Vererbung oder bei den Tieren die Instinkte beruhen. Weil aber die Gewohnheit sinnlos geworden ist, da nun die größere Zahl der höheren Pflanzen dauernd auf dem Lande lebt, ist sie auch allmählich erloschen, und schon seit der Zeit,

Stehender Farnbaumstamm in einem
Steinkohlenflöz.

da sich Zykadeen und Koniferen bildeten, gibt es bei ihren stammesgeschichtlichen Nachkommen keinen Generationswechsel mehr. Der Sporophyt wurde der lebenskräftigere und blieb allein übrig. Denn auch der Konservatismus der Natur reicht nicht so weit, daß er sinnlos gewordene Einrichtungen dauernd beibehielt.

Wir mußten alles dies vorausschicken, um verständlich zu machen, warum man die Farne und namentlich die Übergangsformen, die sogen. Hydropteriden mit ihren Hauptgattungen *Salvinia*, *Azolla*, *Marsilia* und *Pilularia*, ferner die *Selaginellazeen* und *Isoëtazeen* mit ihren einzigen Gattungen *Selaginella* und *Isoetes* in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit so besonderem Interesse studierte und sie auch noch heute im Botanikunterricht besonders ausführlich behandeln muß. Sie sind eben die überlebenden Zeugen, welche die große Revolution der Weltgeschichte der Pflanzen mitgemacht haben, da aus Tannen, Moosen und Farnen die ganze bunte Mannigfaltigkeit der Blütengewächse entstand. Die meisten Vertreter jener Wandlung, die — wie aus dem Gefagten

hervorgeht — wohl durch erdgeschichtliche Ursachen, durch das Zurücktreten der endlosen Lagunen und Meere und die Bildung großer Kontinente hervorgerufen wurde, sind allerdings hinweggestorben. Vielleicht aus derselben Ursache: weil das Übergangsklima aufhörte. Ihre Reste findet man heute — in Steinkohlenbergwerken als *Lepidodendren*, *Sigillarien*, *Stigmarien*, *Sphenophyllum* und einen großen Reichtum von etwa 200 Arten fossiler Farne des Steinkohlenwaldes mit seinen *Calamites*- und *Annularia*-Beständen. Man ersieht daraus, daß sich dies alles schon in den ältesten Zeiten der Lebensgeschichte, schon seit dem Silur und Devon abgespielt hat, als sich Grauwacke, Rotliegendes und Steinkohle ablagerten. Es ist ein unendlich ehrwürdiger Anblick, wenn da und dort in den Kohlenbergwerken die Gasse einen versteinerten Riesenstamm geschont hat, und er nun im Grubengang

aufrecht steht, so mächtig, daß ein Schuppenbaumstamm (*Lepidodendron*) bis $3\frac{1}{2}$ m Umfang und bis 30 m Höhe erreichte. In jenem Steinkohlenwald lebten Farne, deren Wedel 6 m lang wurden. Die schlanken Bärlappe, heute ein unscheinbares Wald-

Steinkohlener Wald der Steinsieglung. (Nach Götting.)
 Links im Vordergrund ein Schuppenbaum (*Lepidodendron*), dahinter Farnbäume (*Sphenopteris*) und windende Farne (*Sphenopteris*).
 Im Hintergrund rechts ein Baumstamm von *Calamites ramosus*. Rechts diesem Urnadelbaum (*Cordaites*).
 Rechts im Vordergrund ein Siegelbaum (*Sigillaria*), daneben Farne (*Maropteris*).

kraut, ragten als Siegelbaum (*Sigillaria*) bis 40 m hoch über den heißen, sumpfen- den Lagunenschlamm, in dem sie so allgemein wurzelten, daß die eintönigen Farn- wälder der Steinkohle einander zum Verwechseln ähnlich sind in den Flözen von Australien, Deutschland, Ostindien und Spitzbergen, Südafrika und Nordamerika. Sie waren ja schon damals nicht mehr die höchste Form des Pflanzenlebens, denn im gleichen Sumpfdickicht lebten mit ihnen Palmen, Zykadeen, auch eine *Cordaïtes* ge- nannte Urform der Nadelhölzer. Die Chemnitzer Gartenanlagen erzählen mit den dort aufgestellten versteinerten Baumstämmen aus dem dortigen Rotliegenden jedemann,

Ablerfarne (*Pteridium aquilinum*) auf einem Schlag des Schwarzwaldes (Kniebis).
(Original von D. Feucht-Stuttgart.)

daß die Urzeit auch das Urbild unserer heutigen zierlichen Araukarien grünen sah als eine herrschende Form des Pflanzenlebens im Altertum der Erde. Daß aber die ein- facheren Pflanzen und Tiere stets als die älteren erkannt wurden, sagte den selbständig Denkenden unter den Erdgeschichtsforschern schon lange vor dem Sieg der Entwicklungs- lehre, daß sich die Vebewelt mit der Erde selbst ständig entwickelt haben müsse.

An den Resten dieser Steinkohlenfarnbäume hat man nun oft Sporen gefunden, aus denen man erkannte, daß jene Pflanzen die noch fehlenden Übergangsglieder zwischen den heute lebenden Gewächssformen darstellten. Die Reste, die man als *Medullosa* und *Colpoxylon* bezeichnet hat, vereinigen sogar Merkmale der Zapfenpalmen (also Blütenpflanzen) mit denen echter Farne in solchem Gemisch, daß sie eine echte Übergangs- bildung darstellen, die man als *Cycadofilices* bezeichnet hat. Durch sie schließt sich der Ring der Entwicklung endgültig, weshalb wir getrost sagen können: wohl durch Anpassung an veränderte Lebensumstände sind im Laufe der Erdgeschichte

aus den einfachsten Pflanzen die derzeit bekannten höchstentwickelten Blütenpflanzen geworden.

In dieser Entwicklungskette stellen die Farne die ersten vollendeter gestalteten Pflanzen dar, die sich durchaus dem Landleben angepaßt haben, bei denen also der Sporophyt bereits um so viel lebenskräftiger und dauerhafter geworden ist, daß er allein für die wahre Farnpflanze gilt. In einer sehr großen Mannigfaltigkeit, die etwa 4000

tropische Farnarten und gegen 50 deutsche Farne* zu unterscheiden erlaubt, besiedeln sie noch immer die Wälder aller Erdteile. Bei uns allerdings nur als bescheidene Mitglieder des Unterholzes und nur selten als Herrscher einer Waldeslichtung, in den Tropen aber noch als mächtige, bis 15 m hohe Baumfarne, ganze Wälder bildend, wenn große Luftfeuchtigkeit ihnen das Klima ihrer Glanzperiode verschafft.

Da ihre Gestaltung so überaus anmutig ist, hat die Gartenkunst sich ihrer eifrig angenommen und schätzt sie auf das höchste als Zimmerpflanze und unentbehrlichen Schmuck jedes Blumenstraußes. Es kommt ihr dabei weniger auf den Gesamtwuchs

Kunstformen der Farne.

Unten: *Adiantum macrophyllum* Sw. Rechts: *A. acutum* Lindl.
Oben: *A. Wagneri* Mett. (Aufnahme von G. Dopfer-München.)

als auf die zierliche Fiederung der Blätter an, die bis zu dem höchsten Formenadel hinaufreicht, den eine Pflanze überhaupt erreichen kann, wofür das bestehende Bild zeugen möge. Der Wedel von *Adiantum*, *Phegopteris* oder *Cystopteris* läßt sich an Schönheit nicht überbieten. Die botanische Fachsprache bezeichnet die Farnblätter deshalb mit dem Sondernamen Wedel, da sie außer der Assimilationsfunktion auch für die Fortpflanzung sorgen, mit Ausnahme gewisser höher entwickelter Farne, bei denen sich bereits besondere Fruchtblätter ausschließlich der Fortpflanzungsaufgabe bemächtigen und dadurch den Weg weisen, auf dem sich die „Blüten“ gebildet haben.

* Chr. Luerßen zählt in seinem Handbuch 88 Farnpflanzenarten, darunter 51 echte Farne, auf.

Wenn wir berücksichtigen, daß die Farne feuchtigkeitsliebende Schattenpflanzen sind, obwohl manche Arten, so der Adlerfarn, sich auch dem hellsten Sonnenschein der Waldeslichtungen angepaßt haben, so werden wir begreifen, warum sie großblättrig sind. Sie müssen viel Wasser ausgeben und eine große Lichtverwertungsfläche haben. Ein großes Blatt ist aber ein gefährlich Ding. Der Wind zerfetzt es; es ist schwer und sonst mit noch manchem Nachteil behaftet. Also war es geradezu lebenswichtig, es in feine Fiederchen aufzulösen. Diese Zartheit des Blattes, eine Folge der Lebensweise, hat wieder Folgen nach sich gezogen. Die jungen Blätter sind mit braunen Spreuhaaren überzogen und eingerollt wie das Gehäuse einer Schnecke. Dadurch haben sie ein absonderliches, fast tierisches Ansehen. Die Spreuschuppen stehen besonders dicht um den Stammscheitel, und schon dies verrät, daß sie die Aufgaben des Schutzes erfüllen, um so mehr, als sie auch harzartige Stoffe absondern. Das Einrollen der Blätter aber erleichtert ihnen das Durchbrechen des Bodens, hat also ebenfalls seine physiologische Ursache.

Diese Laubblätter können jedoch wieder der Lebensweise gemäß umgeformt sein. Eine besonders merkwürdige derartige Sonderanpassung kennt der Gärtner von den tropischen Geweihsfarnen (*Platy-
cerium*) und dem viel-

Epiphytische Geweihsfarne mit Mantel-Mischenblättern.

1 = *Platynerium alcicorne* Desv. var. *Hilli* Moore, aus Australien.

2 = *Pl. biforme* Blume, aus dem Malaiischen Archipel.

(Original von H. Dopfer-München.)

gezüchteten *Polypodium quereifolium*. Bedingt werden diese Sonderblätter durch die epiphytische Lebensweise der genannten Farne, die ihnen das Festhalten von Humus zur Notwendigkeit macht, um ihren Wurzeln Nahrung zu bieten. Diese wunderlichen Farne befriedigen dies Bedürfnis dadurch, daß sie ungestielte, mantelförmige, breite Blätter dem Baumstamm, auf dem sie sitzen, so anlegen, daß dadurch eine Nische zustande kommt, in der sich Feuchtigkeit und Humus sammeln kann, aus denen dann die Wurzeln schöpfen. Ja, einzelne, wie das aus dem Münchner botanischen Garten auf S. 13 abgebildete *Platyceerium biforme*, leisten an direkter Anpassung sogar das Bewunderungswürdige, daß sie den unteren Teil ihrer „Mantel-Nischenblätter“ zu einem dicken Wasserspeicher umbilden.

Eine so große assimilierende Fläche bedarf natürlich auch der geeigneten Ableitungsorgane, und so kam es, daß bei den Farne der anatomische Bau der Blattstiele, des Stammes und des Wurzelstockes fast so vollkommen durchgeführt ist wie bei den

Querschnitt durch den Stamm des Adlerfarnes.
(Original-Mikrophotographie von H. Dopfer-München.)

Blütopflanzen. Das Wesentliche hierbei ist, daß die Farnblätter, Stiele und Stämme echte Gefäßbündel besitzen, die sich im Stamm zu einem Achsenstrang oder einem röhrenförmigen Ake vereinigen. Wirkliche Gefäße sind hierbei zwar noch selten; so z. B. sind sie bei dem Adlerfarn vorhanden, dessen Gefäßbündelanordnung der Pflanze den deutschen Namen verschafft hat, da sie das österreichische Doppeladlerwappen in rohen Umrissen kopiert, wie an der nebenstehenden Mikrophotographie zu sehen ist.

Im ganzen ist aber der anatomische Bau in jeder Beziehung so vollkommen mit seinen wohlentwickelten Assimilations-, Leitungs-, Speicher- und Durchlüftungssystemen, mit trefflichen mechanischen Festigungsvorrichtungen, daß es ganz gerechtfertigt ist, die Farne als Gefäßkryptogamen den Moosen und niederen Pflanzen gegenüberzustellen, wie dies hier und in den meisten floristischen Werken geschieht. Um so einfacher ist es freilich mit der Fortpflanzung bestellt. Die Vegetationsorgane sind sehr rasch bereit, veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen und einer Pflanze das stattlichste Aussehen zu verleihen; aber die Fortpflanzungsorgane können nicht so leicht nachfolgen. Sie verraten, daß auch der mächtigste Baumpfarn nur eine primitive Sporenpflanze ist.

An den Blättern schnürt jeder Farn Sporen ab wie ein gemeiner Pilz. Diese braunschwarzen, oft auch leuchtend fuchsfarbenen Sporenhäufchen (Sori) sind im einzelnen sehr verschieden angeordnet und gebaut, stimmen aber doch so ziemlich darin überein, daß sie an der Unterseite der Blätter sitzen. Meist sind sie in Gruppen gestellt und mit einer feinen Hülle zugedeckt, wie das aus der nachstehenden Zeichnung, die einen Sorus des gemeinen Wurmfarnes (*Aspidium filix mas*) darstellt, ersehen werden möge.

Diese Schleier, besonders hübsch zu sehen bei dem Wurmfarn, geben den Sporenhäufchen die geschlossene, charakteristische Gestalt. Ohne sie würde die untere Farnblattseite ganz an die Büsteln des Getreiderostes erinnern, mit dem sie ohnedies insofern Ähnlichkeit hat, als die Sporen daraus auch so verstäuben wie bei jenem. Legt man ein reifes Farnblatt auf ein Blatt Papier, dann fallen die Sporen so massenhaft heraus, daß ihr Pulver den ganzen Umriß des Wedels erkennen läßt. Diese einzelligen Sporen, die sehr verschieden, oft recht hübsch geformt sind (vergl. das Bild), bilden sich stets zu vierten in den Sporenmutterzellen. Sie sind alle gleichartig und in reizend geformte Sporenkapseln eingeschlossen, deren Öffnung ein Meisterwerk pflanzlicher Mechanikerkunst darstellt. Sie sind nämlich bei dem Wurmfarn, den wir als Typus betrachten wollen, uhrgehäufesförmig. An der Kante dieses Gehäuses greift ein hal-

Querschnitt durch einen Blattabschnitt des Wurmfarnes (*Aspidium filix mas*) mit dem Sorus, den der Schleier (*Indusium*) bedeckt. Die Sporangien sind teilweise bereits geöffnet. (Nach den botan. Wandtafeln von Kun.)

ber Ring (*Annulus*) prächtig geformter und goldbraun gefärbter Zellen über das Sporangium, bezüglich dessen man sich obige Kunysche Abbildung nochmals betrachten möge. Dieser feste Ring bewirkt das Aufreißen der Sporenkapsel dadurch, daß er sich bei dem Eintrocknen des Sporangiums stark zusammenzieht, bis die Wand platzt.

Wie sich aus der keimenden Spore ein Vorkeim entwickelt, der bei der Gattung *Trichomanes* noch fädig ist, wie daran die Geschlechtsorgane geformt sind und ihre Befruchtung vollziehen, wie sich der junge Embryo dann von dem Prothallium los-

löst und als Sporophyt, d. h. als Farnpflanze heranwächst, das findet der Leser alles auf S. 476 u. ff. im I. Bande dieses Werkes ausführlich beschrieben und auf einer Farntafel nach den Originalen von Suminski, der im Jahre 1848 alles das entdeckte, auch abgebildet.

Sporen der Farne.

1—2 = von *Polypodium vulgare* L. von der Seite (1) und vom Scheitel (2) gesehen. 290fach vergr. 3 = von *Osmunda regalis* L. 290fach vergr. 4 = von *Ceratopteris thalictroides* Brongn. 150fach vergr. (Nach Sadebeck und Kun.)

Neben dieser regelrechten Fortpflanzung beobachtet man an den verschiedensten einheimischen Farnen auch, daß sich, unter Umgehung der Sporangien, direkt auf den Blättern neue Vorkeime bilden. Druery und Farlow sahen solche Aposporie bei

der Hirschzunge (*Scolopendrium*), bei *Athyrium*, *Trichomanes* und Adlerfarnen und fanden, man könne sie bei gewissen Hirschzungenfarnen auch künstlich hervorrufen, wenn man Stücke ihres fein gekrausten Randes abschneidet und in feuchte Erde bringt. Dies ist ein Vorgang, der in manchem noch an die fabelhafte Reproduktionsfähigkeit der Moose erinnert, so wie die Bildung von Wurzelaufläufern, wie sie der unten abgebildete prachtvolle Zierfarn der Gärtner aufweist, den man als Nierenfarn (*Nephrolepis*) bezeichnet. Auch die Bildung von Brutknospen ist für die meisten der einheimischen Farne nachgewiesen, die dann stets den Entwicklungsgang der Mutterpflanze mitmachen, und von denen einige der interessanteren Formen in den Einzelbeschreibungen vorgeführt werden sollen.

Nierenfarn (*Nephrolepis acuta* Presl.) mit Wurzelaufläufern. (Originalaufnahme von G. Dopfer-München.)

Die große Bildsamkeit der Farnpflanze, die wir hiermit in ihren Umrissen vor Augen gerückt haben, erforderte auch ein ziemlich ausgebreitetes System, um die über 4000 verschiedenen Formen auch nur übersehen zu können. Maßgebend ist hierbei der Umstand gewesen, ob die Sporangien aus einer Zelle, also als Haargebilde, oder aus Zellgruppen hervorgehen, wonach man lepto- und eusporangiate Formen unterscheidet. Bei den ersteren trennen sich die eigentlichen Farne (*Filices*) von den Wasserfarnen (*Hydropterides*) schon dadurch, daß diese ungleiche Sporen haben. Die Eusporangiaten umfassen eine tropische Reihe, die Marattiales genannten Riesenformen, die seit dem Paläozoikum die Erde bewohnen, und zwei kleine, einheimische Gattungen, *Ophioglossum* und *Botrychium*, denen man als Überbleibsel einer einst reicheren Farnwelt eine Sonderstellung unter dem Namen *Ophioglossales* schaffen mußte.

Die einfachste Familie der echten Farne, die Hautfarne (Hymenophyllaceae), kennzeichnet sich durch einen Vorkeim, der noch stark an das Protonema der Moose erinnert, ferner durch ungemein zarte, hautige Blätter, deren Blattgrünschicht meist sogar nur eine Zellreihe dick ist. Demgemäß sind sie auf das ewig-feuchte Klima des tropischen Bergwaldes angewiesen, wo die Gruppe auch vielgestaltig auftritt. Auf heimischem Boden gibt es nur ein derartiges Pflänzchen, den höchstens $\frac{1}{2}$ Dezimeter langen, meist aber viel kleineren Hautfarn (Hymenophyllum Tunbridgense Sm.). Er ist so selten geworden, daß in der ausgezeichneten Monographie der Farnpflanzen von Vuerffsen nur noch drei Fundorte: die feuchten Felswände des rechten Rheinufers, der Bord eines luxemburgischen Baches und der Uttenwalder Grund in der Sächsischen Schweiz, angegeben werden. Und auf dem letzteren scheint der Hautfarn ausgerottet zu sein. Dieses Pflänzchen gewährt einen reizenden Anblick unter der Lupe, da es seine Sporangien in einem zweiflappigen Schleier, wie Blüten in einer Dütte, dem Beschauer vor Augen stellt. Und unter dem Mikroskop bietet es schon deshalb ein ganz eigenartiges Bild, da es die einzige der höheren Pflanzen ist, deren Blatt ganz durchsichtig ist, weil es sogar die Oberhaut entbehrt. Bei uns sind diese Allerzartesten in keiner Weise gegen das Austrocknen geschützt; um so mehr ist man überrascht, von Sammlern im tropischen Amerika Hautfarne vorgewiesen zu sehen, die über und über aus den Blättern flügelartige Lappen treiben und sich mit einem dichten Filz wunderbarer Sternhaare überziehen, die angeblich zum Aufsaugen und Festhalten des Wassers dienen sollen.

Reifer Sorus des Hautfarnes (Hymenophyllum Tunbridgense Sm.) bei starker Lupenvergrößerung. (Nach Vuerffsen.)

Wir können uns, trotzdem in größeren botanischen Gärten überall die Warmhäuser wahre Prachtexemplare von Baumfarnen (meist die Gattungen Alsophila, Cibotium und Cyathea, siehe das Bild) bergen, nur schwer einen Begriff machen von dem entzückenden Bild eines tropischen Farnwaldes, wie solche die Reisenden immer wieder mit neuen Ausdrücken höchster Bewunderung ob ihrer Anmut schildern.

In unübertrefflicher Weise charakterisiert ihre Physiognomie A. v. Humboldt, wenn er in seinen „Ideen zu einer Physiognomie der Gewächse“, die unsere moderne Pflanzengeographie schufen, von ihnen sagt: „Die baumartigen, bis 40 Fuß (13 m) hohen Farne haben ein palmenartiges Ansehen; aber ihr Stamm ist minder schlank, kürzer, schuppig rauher als der der Palmen. Das Laub ist zarter, locker gewebt, durchscheinend und

an den Mändern sauber ausgezackt.“ Sie sind in Südamerika für ein gewisses feuchtes Bergklima, an das sie gebunden zu sein scheinen, so kennzeichnend, daß nach demselben Gewährsmann die Spanier diese Gebirgszone, die bei etwa 900—1500 m Höhe unterbrochen sehr feucht ist, direkt das Farnland (tierra templada de los helechos) nennen. Das gleiche

Tropische Baumsfarne (*Alsophila*-Arten) im Münchener Botanischen Garten.
(Originalaufnahme von H. Dopfer-München.)

gilt auch für die südliche Halbkugel, wo Baumsfarne im mild-feuchten Neuseeland ein Maximum ihres Gedeihens erreichen und sogar in südliche Breiten vordringen, die der nördlichen von Berlin fast gleich sind. So bietet sich in Tasmanien manchmal das uns geradezu unglaubliche Schauspiel schneebedeckter Farnbaumwipfel. Auch das Malaiengebiet wetteifert mit Amerika an anmutigen und gewaltigen Baumsfarnen, wenn auch Südamerika darin unbedingt der ganzen übrigen Erde überlegen ist.

Die nächsten Verwandten dieser Zygaeen sind offenbar die sehr natürlich abgegrenzte Pflanzenfamilieder auch in den Tropen am meisten

entfalteten Tüpfelfarne (Polypodiaceae), zu denen mit Ausnahme des Königsfarns (*Osmunda*) alle hier noch nicht besprochenen deutschen Farne zu zählen sind.

Diese ungemein formenreiche Farngruppe, innerhalb derer man 3000 Arten unterschieden hat, umfaßt sowohl winzige, moosartig auftretende, kaum 1 cm hohe Pflänzchen (wie die reizende *Hecistopteris pumila* [Spreng.] J. Sm., die an Baumrinden im südlichen Amerika lebt) als auch baumartige Riesenfarnen. Von diesen

ist *Didymochlaena lunulata* Desv. mit fast 2 m langen Blättern eine beliebte Kulturpflanze des Warmhauses geworden. Im allgemeinen aber halten die Tüpfelfarne die Mitte zwischen diesen beiden Extremen als ausdauernde Stauden mit prächtigen Wedeln, auf denen die Sporenhäufchen, meist auf der Blattunterseite, gewöhnlich entweder von dem umgeschlagenen Blattrand oder einem besonderen Schleierchen geschützt sind. Das Studium dieser Schleier (Indusien) verschafft fesselnde Einblicke in die wechselnden Mittel, deren sich eine Pflanze zur Erzielung des gleichen Erfolges bedienen kann. Um dazu anzuregen, habe ich einige der merkwürdigsten Indusientypen einheimischer Farne abbilden lassen. Die außer den Tüpfelfarnen in Mitteleuropa noch vertretene Gruppe der Königsfarne (*Osmundaceae*) läßt sich von diesen auf den ersten Blick durch ihre an besonderen freistehenden Blättern angebrachten Sori oder Fruchthäufchen unterscheiden, die den Schleier völlig entbehren.

Diese Farne sind, ganz wie die Baumfarne, nicht so sehr an ein heißes als an ein feuchtes Klima gebunden. Feuchten Bergwäldern verleihen sie bei uns die schönste Zier, und sehr feuchte Erdstriche, so der gemäßigte Himalaja, wo es fast ununterbrochen regnet, oder die Antillen und das westliche China sind am reichsten auf der ganzen Erde von Farnen besiedelt. So haben wir

Sorusbildungen der Farne.

1 = Sorus von *Asplenium bulbiferum*. 2 = *Cystopteris fragilis*. 3 = *Pteridium aquilinum* mit zwei Indusien. 4 = *Onoclea Struthiopteris*. Das Schleierchen verkümmert, da sich zugleich das Blatt als Deckrand umschlägt. 5 = *Adiantum Capillus Veneris* mit umgeschlagenem Deckrand.

(Nach Diels.)

das Recht, diese Pflanzen als eminent hygrophile zu bezeichnen. Noch kennzeichnender aber ist ihre ganz fabelhafte Wanderungsfähigkeit. Als der Vulkan auf Krakatau zwischen Java und Sumatra im Jahre 1883 die ganze Insel verheerte, indem er ihre schöne Vegetation unter einer dicken Aschendecke begrub, waren es Farne, die als erste höhere Pflanzen schon nach drei Jahren die Insel neuerdings in Masse besiedelten. Das ist nicht unbegreiflich von Pflanzen, deren Sporen staubleicht sind. Und so ist es auch begreiflich, daß die meisten Tüpfelfarnsgattungen in allen nicht ganz kalten Ländern verbreitet sind, ja manche fast über die ganze Erde, so die Adlerfarne (*Pteridium*), die eigentlichen Tüpfelfarne (*Polypodium*), der Nierenfarn (*Nephrodium*), der Punktfarn (*Polystichum*) und Rippenfarn (*Blechnum*).

Eine solche fast kosmopolitische Pflanze ist auch der Blasenfarn (*Cystopteris fragilis* Bernh.), dessen sehr zartes, an höchst zerbrechlichen Stielen nickendes Kraut, wenn auch nicht eben häufig, an Fels- und Mauerritzen, in Hohlwegen und an ähnlichen Orten gedeiht. An einer amerikanischen Art dieser Blasenfarne (*C. bulbifera* [L.] Bernh.), die man deswegen allenthalben in den botanischen Gärten hegt, beobachtet man eine höchst eigentümliche Brutknöllchenbildung (siehe das Bild). Die abfallenden

Knospen verhalten sich wie ein winziger Wurzelstock, treiben einerseits Wurzeln, anderseits sterile Blätter und entwickeln eine Pflanze, die erst im zweiten Jahr wieder eine Geschlechtsgeneration erzeugt. Da wir genug solcher Brutknospenbildungen kennen, wäre daran nichts so besonders Bemerkenswertes, wenn nicht gerade dieser Farn darin eine Ausnahme wäre, daß er nur spärlich Sporen erzeugt, während man z. B. für einen

Schildfarn an 15 Millionen Sporen berechnet hat. Es ist also ein innerer Zusammenhang zwischen der Adventiv- und der Sporenbildung da, der nur im Sinne eines Innenlebens der Pflanze zu deuten ist.

Die Schildfarne (*Aspidium*) der deutschen Flora sind nicht nur deswegen besonders beachtenswert, weil einer davon, der gemeine Wurmfarne (*A. Filix mas* Sw.), der neuerdings freilich zur Gattung *Polystichum* abgespalten wird*, eine der häufigsten Gestalten unserer Wälder ist, sondern weil Volksglauben und Volksmedizin in reichstem Maße an ihn anknüpfen. Neben dem Adlerfarn ist er übrigens einer der ansehnlichsten Farne, der manchem Walde den Namen eingebracht hat, so z. B. einem Gehölz bei Freudenstadt im Schwarzwalde die Bezeichnung „Palmenwald“. Diese ist schon deswegen nicht übel gewählt, da gerade dieses Gewächs sogar eine Art Stamm bilden kann und mit seiner eleganten Laubkrone wirklich an Palmen erinnert. In den Tropen treibt eine *Aspidium*-Art auch 10 m hohe, wahre Stämme, die auf Samoa nach Meinecke als Baumaterial geschätzt werden.

Erschiene dieser Farn unserem Volke nicht so auffällig, dann wäre nie der große Reichtum deutscher Bulgärnamen dafür entstanden. Wenn aber dieselbe Pflanze: Wurmfarne, Farnkraut-männchen, Teufelsklaue, Johannismurzel, männ-

1 = Brutknospenbildung bei *Cystopteris bulbifera* [L.] Bernh. 2 = Eine soeben abgefallene Adventivknospe. 3 = Dieselbe weiter entwickelt mit Wurzeln und einer Blattanlage. (Nach Ratouschek.)

liches Farnkraut, Otternkraut, Glückshand, Flöhkraut und noch sonst mannigfach genannt wird, da hat das Volk daran lange herumgedichtet und auf seine Weise geforscht, die freilich fast immer nach Nutzen in phantastischer Weise durch Erkennen „geheimer Kräfte“ trachtet. Und wirklich, nimmt man eines der alten „Kreuterbücher“ zur Hand, so springt einem ein ganzer Schabernack treuherzig=unsinniger Märlein entgegen „über der Farren Wirkung und Samen“. Das Geheimnisvolle, daß eine Pflanze so üppig gedeihen könne

* Die Nomenklatur der Farne ist ein wahrer Tummelplatz größter Willkür. So hat die Gattung *Aspidium* im Laufe des letzten Jahrhunderts allein 23 verschiedene Gattungsamen geführt!

ohne Blüte und Frucht, das Rätselhafte und Goldglänzende der Sporen, die man allerdings als Samen bezeichnete, ohne ihre Bedeutung zu kennen, mußte die Phantasie mächtig anregen. So fabulierte man denn wacker darauf los, daß man in den heiligen Sonnenwendnächten am 24. Juni und 24. Dezember um Schlag Mitternacht die wundersame Blüte des Farnkrautes im Walde sehen könne und schon eine Stunde darauf den feurig goldenen Samen. Ihn zu gewinnen, erfordere vollendete Zauberkunst; am sichersten erhalte man ihn, wenn man auf einem Kreuzwege nackt dem Teufel verschreibe.

Wurmfarn (*Aspidium Filix mas*) im Walde. (Originalaufnahme von J. E. Peters†-Graz.)

Der Besitzer von Farnkrautsamen gebot dann allerdings über Wunderkräfte. Hieb- und stichfest war er und auch unsichtbar; der Weg zum Reichtum stand ihm offen, besonders noch, wenn er eine Glückshand bei sich führte, d. h. eine aus dem Wurzelstock des Farnkrautes roh geschnittene Nachbildung der Menschenhand. Der Tiere Sprache verstand er, keine Frau widerstand ihm, und mancher Zauber ward ihm kund.

Der Glaube übersehte sich in die Wirklichkeit, und gar viele mögen ängstlich Farnkrautsamen gehütet und sich zergrübelt haben, welchen Fehler am umständlichen Zauberezeremoniell sie wohl begangen haben mochten, da sich bei ihnen keines der verheißenen Dinge einstellen wollte. Wohl aber genügte es im Hexenprozeß, wenn man bei dem Inculpanten Farnsamen fand, um all sein Zeugnen wirkungslos zu machen. Mitten in diesem Irrwahn, da solches Nachforschen schier lebensgefährlich war, zog ein wackerer deutscher Naturforscher in den Zaubernächten hinaus in den Wald, um der Fabel auf die Spur zu kommen. Das war der Pfälzer Arzt Hieronymus Bock (1498—1554),

der sich selbst nach gelehrter Sitte seiner Zeit *Tragus* nannte. In seinem „*New Kreutterbuch*“, das zu Straßburg anno 1539 herauskam, erzählt er darüber: „so hab ich zum vierdtenmal auff *S. Johannis* nacht dem samen nachgangen, und morgens fruh ehe der Tag anbrach, schwarzen kleinen Samen wie Magsamen auff Dächern und kleinen Wulkrautblettern auffgehaben. . . . Zu solchem Handel hab ich kein seggen, kein beschwerung noch Charakter gebraucht, sondern ohn alle superstition dem samen nachgangen und funden, doch ein Jahr mehr denn das andere binn etwann auch vergebens hinaußgangen.“

Aber trotzdem hielt das Volk an der altererbten Scheu fest, und *Säurich* erzählt, daß man noch im 30 jährigen Kriege Spione eingefangen habe, die sich, weil sie Farnsamens bei sich führten, alles Ernstes für unsichtbar gehalten hatten.

Ein Jahrhundert später wechselt der Ruf der Farnkräuter. Das Jahrhundert der Aufklärung macht dem Spuk ein Ende und entdeckt die wahre Zauberkraft der Farne. Für „Farnwurzeln“ werden Wunderpreise bezahlt, um damit — den Bandwurm zu vertreiben. Es wird behauptet, daß *Friedrich der Große* für die Arznei (die natürlich als Geheimmittel galt) 200 Taler Rente zahlen mußte; an den französischen Hof wurde sie aus der Schweiz für 18000 Livres verkauft. Solche Märchenpreise erzielte noch nie eine Pflanze, nicht einmal Tulpen und Orchideen, die als die kostbarsten Pflanzen galten. Den Heilmittelruf hat der Wurmfarn seitdem nicht mehr verloren. Noch im heutigen deutschen Arzneibuch wird *Rhizoma Filicis* angeführt als der im Herbst gesammelte und bei gelinder Wärme getrocknete Wurzelstock des Wurmfarns, der im Bruch noch grün sein muß, um als wirksam zu gelten. Heute wendet man zum meist sein ätherisches Extrakt an, das wohl der Hauptbestandteil der vielen Geheimmittel gegen den Bandwurm ist. Das Wirksame daran ist scheinbar neben *Silizsäure* und *Silizin* das *Aspidol* ($C_{20}H_{34}O$), das sich als farblose Kristallblättchen rein darstellen läßt.

Auch in der orientalischen Medizin ist eine *Aspidium*-Art hochgeschätzt, und daran knüpft sich eine ganz absonderliche Legende, die auch in Europa die Gemüter gewaltig verwirrt hat. Ich meine hierbei das *Pflanzenschaf*, das als *agnus scythicus* in der Naturgeschichte eine höchst mysteriöse Rolle spielte. Es läßt sich wohl so viel daraus heraus Schälen, daß tatarische Pelzhändler das Märchen aufgebracht haben, eine besonders feine Wolle (wohl von ungeborenen Lämmern), die sie als Mütze und Verbrämung verarbeiteten, sei pflanzlichen Ursprungs. Die Sagenpflanze sollte in den mongolischen Steppen wachsen. Ihr Stengel treibe als Blüte ein kleines Lamm, das freier Bewegung wohl fähig sei und das Gras ringsherum so weit abweide, als sein Stengel erlaube. Ein solches *Scythenschaf* hatte natürlich Talismankräfte, verschaffte Reichtum, Ruhm, den Frauen Fruchtbarkeit und war daher für die Schatzkammer eines Mongolendespoten unerlässlich.

Nun verbirgt sich hinter diesem ziemlich läppischen Märchen wirklich eine botanische Merkwürdigkeit. Es gibt eine ostasiatische *Aspidium*-Art (nach neuerer Auffassung jedoch als *Cibotium* *Barometz* *Link* bezeichnet), deren lange, dunkelgelbe Spreuschuppen tatsächlich an Wolle erinnern und den Wurzelstock so dicht bedecken, daß er (besonders ein wenig zurechtgedrückt) wohl an ein Lamm erinnern kann. Der tierähnliche Eindruck wird noch erhöht dadurch, daß dem sonderbaren Gebilde beim

Ausstechen Blut, d. h. ein roter Saft, entquillt. Und dieses „Farnhaar“ ist auf den Sundainseln ein Handelsartikel sowohl als blutstillendes Mittel wie als Tapezierfüllungsmaterial. So löste sich das geheimnisvolle Baromez in eine höchst nüchterne Handelsware auf, und wie so oft, steckt auch hier hinter „okkulten Phänomenen“ und „tiefsinniger“ Volksdichtung eine phantastisch aufgepuckte, sehr gemeine Geldspekulation.

Er hat also ein gutes Stück Kulturgeschichte erlebt, dieser prächtige Schildfarn, den die botanische Praxis hoffentlich bald am allermehrsten als Gartenzierpflanze schätzen wird. Heute sagt M. Lehmann in seinem trefflichen Werke „Unsere Gartenzierpflanzen“ noch mit Recht, daß die Farne in unseren Gärten viel zu wenig Verwendung finden, trotzdem sie nicht nur malerisch sind, sondern auch leicht und billig beschafft werden können. Höchst anspruchslos, nehmen sie mit jeder Gartenerde vorlieb, haben am liebsten allerdings ein Gemisch von Humus, Gartenerde, altem Lehm und besonders noch Sand und brauchen keinerlei Pflege, wenn sie nur an schattigem Orte wachsen. Sie lassen sich sehr leicht durch Teilung der Wurzelstöcke vermehren und noch leichter beschaffen, wenn man im Vorfrühling auf die Suche in die Wälder geht und die Stauden verpflanzt, bevor sie noch Blätter getrieben haben. Der gemeinbekannte Frankfurter „Praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau“ empfiehlt dazu aus seiner reichsten Erfahrung als winterharte Freilandfarne neben dem Wurmfarne noch *Blechnum Spicant*, *Asplenium Trichomanes*, *Osmunda regalis*, *Polypodium vulgare*, *Pteridium aquilinum*, *Scolopendrium vulgare*, *Onoclea Struthiopteris* und *Cystopteris fragilis*, also eine wirklich reiche Auswahl der entzückendsten Gestaltungen.

Von allen diesen verdienen das Interesse des Pflanzenfreundes die auf felsigem Boden gedeihenden Streifen- oder Milzfarne (*Asplenium**) durch die eigentümlichen Veränderungen, die sie auf gewissen Bodenarten annehmen. An vielen Stellen Deutschlands und Österreichs, besonders im Erzgebirge, in den Sudeten, im Frankenstein und Fichtelgebirge, aber auch an den steirischen Grenzbergen gegen Ungarn hin gedeiht ausschließlich auf Serpentinfels ein Streifenfarn (*A. adulterinum* Milde), der in allen seinen Eigenschaften dermaßen den Übergang von *A. viride* zu dem sehr gewöhnlichen *A. Trichomanes* darstellt, daß ihn sein Entdecker Milde, ebenso wie viele neuere Farnforscher, für einen Bastard, nämlich eine Kreuzung der beiden anderen, hielt. Aus bloßem Vergleichen der Merkmale und „Bestimmen“ ließ sich nicht zurecht-

1 = *Asplenium adulterinum*, ganze Pflanze in natürlicher Größe.
2 = *A. viride*, ein Wedel.
(Nach Zuerffen und Wiegand.)

* Fälschlich vielfach *Asplenium* geschrieben.

Boden züchtete, erhielt er nach der 6. Generation einen Rückschlag zu *A. viride*, womit bewiesen war, daß hier die Ernährung, mit anderen Worten, der Boden geradezu als artbildender Faktor gelten muß durch die direkte Anpassung der Pflanze an ihn, die uns freilich in ihren Motiven und ihrem Nutzen noch völlig unverständlich ist.

Viele Arten dieses Farnes, die wieder allerdings nicht der deutschen Flora angehören, überraschen durch eine Lebenskraft gelegentlich der Abschnürung junger Pflänzchen von den Spiken der Wedel, die wahrhaft ans Wunderbare grenzt und

einer Art den Beinamen: die Lebendgebärende (*vivipara*) verschafft hat. Es ist ein sehr merkwürdiger Anblick, einen Farnstock voll solcher blattbürtiger und schon im Zusammenhang mit der Mutterpflanze austreibender Sprosse zu sehen, zumal wenn, wie Goebel berichtet, an solchen sogar noch die natürliche Reihenfolge verrückt wird, nach der bei jungen Farnen zuerst einige Laubblätter getrieben werden und erst dann sporentragende Wedel, die man eben deshalb als *Sporophylle* bezeichnet. Die blattbürtigen Sprosse der *Asplenien* bringen dagegen bei günstiger Ernährung nach dem obgenannten Gewährsmann schon auf ihrem dritten Blättchen Sporenhäufchen hervor. Eine *Asplenium*-Art, die den hübschen Namen Mauerraute (*A. Ruta muraria*) führt, ist ein ganz gewöhnlicher Bewohner alter Mauern, eine

Mauerraute (*Asplenium Ruta muraria*) an einem Kirchthum.

durchaus typische süddeutsche Felsenpflanze, die manchmal die Ritzen alter Kirchtürme hoch oben phantastisch schmückt (Bild). Gerade von diesem Pflänzchen erzählt Goebel, daß er es in Südtirol auf seinen ersten, nur 4 mm breiten Blättchen bereits Sporangien hervorbringen sah. Sie überspringen also gewissermaßen einige Entwicklungsstadien, wofür es uns auch an einer Erklärung fehlt. Goebel versucht zwar dafür die reichliche Ernährung heranzuziehen, doch kann das nicht befriedigen, da viel Nahrung höchstens quantitative, aber nicht qualitative Folgen erklärt. Solche Turm- und Felsen-

bewohner verraten übrigens, daß nicht alle Farne Schattenliebend sind. Denn sie braten geradezu in der Sonne, und nähere Untersuchung, die noch aussteht, wird bei ihnen sicher eine Reihe von Lichtschikanpassungen aufdecken. J. Wiesner hat den Lichtgenuß eines tropischen Streifenfarns (*Asplenium Nidus*), der auf hohen Bäumen lebt (siehe das Bild), mit $\frac{1}{4} - \frac{1}{38}$ Lichtstärke gemessen. Bei einem anderen Mauer- und Felsenfarn, dem im Rheintal nicht allzu seltenen Schriftfarn (*Ceterach officinarum* Willd.), sind als solcher Schutz wohl die vielen dichtstehenden Spreuschuppen zu deuten. Sie umhüllen die dicken, lederigen Blätter mit einem Pelz und verleihen der Pflanze ein xerophiles Gepräge (Bild).

Asplenium Nidus L. Aus dem botan. Garten zu München.
(Photographie von H. Dopfer-München.)

Die alten Botaniker haben als weiblichen Gegensatz zum kräftigen Farnmännchen den häufigen Milzfarn (*Athyrium Filix femina* Roth) als das Farnweibchen bezeichnet, wozu aber keine weitere Berechtigung vorliegt, als daß er eben von zartem,

Der Schriftfarn (*Ceterach officinarum*). (Naturaufnahme von J. G. Peters†-Graz.)

schlanke
Gliederbau
ist. Wir
Neueren ha-
ben an ihm
anderes mer-
kenswert ge-
funden. Er
ist eine der
wenigen
Pflanzen, bei
denen man
jene sprung-
hafte Gestalt-
änderung be-

obachten kann, die man jetzt nach dem Vorgange von De Bries als Mutation bezeichnet. *Athyrium* galt von jeher als eine besonders variable Form, und es gab Botaniker, die sich das harmlose Vergnügen machten, deshalb einige Hundert solcher „Varietäten“ zu beschreiben und zu benennen, die natürlich nie mit Sicherheit bestimmt werden können, wodurch einer großen Zeit-, Mühe- und Papiervergeudung Tür und Tor geöffnet ist. Heute haben wir uns auf einen höheren Standpunkt erhoben, da wir erkannten, daß auch dieses Gewächs sich bezüglich seiner Eigenschaften in einem „labilen“ Zustand befindet, d. h. aus vorläufig unbekannten inneren Gründen immer wieder neue

Athyrium alpestre Ngl. im Schwarzwald. (Naturaufnahme von D. Feucht-Stuttgart.)

Eigenschaften hervorbringt, ohne daß diese einen unmittelbaren Vorteil für das Lebewesen bedeuten. So gibt es „Farnweibchen“ mit gabelig verzweigten Blättern, mit rötlichen Blattspindeln, einer sonst bei dieser Pflanze unbekannten Fiederung. Manchmal entwickeln sich die Blätter hautdünn; bei anderen Pflanzen sind die Sporangien nicht mehr fähig, Sporen hervorzubringen. Kurz, die Pflanze ist so unberechenbar, daß es vergebliche Mühe wäre, alle ihre „Formlaunen“ beschreiben zu wollen.

Da ist es denn bemerkenswert, daß gerade dieselbe Pflanze auch *apospore* ist, d. h. unmittelbar aus ihren Blättern kleine Vorkeime treibt, auf denen Geschlechtsorgane entstehen. Sie überspringt also einen Teil ihres Lebenslaufes, wenn auch wieder in anderer Weise wie die Schildfarne, und legt damit der Naturforschung Fragen über Fragen vor, deren Andeutung vielleicht genügt, um es dem Leser zur Empfindung zu bringen, daß die Botanik mit einer Entdeckungsreise zu vergleichen ist, die eben erst an den Küstenraum des neugefundenen Landes geführt hat. Indem wir bisher die Pflanzen in ihren äußeren wie inneren Eigenheiten erst beschrieben haben, ist

nur der erste Schritt getan. Viele werden noch folgen müssen, und die eigentliche Botanik, unter welcher ich das Verständnis des Pflanzenlebens begreife, beginnt erst noch.

Von weiteren interessanten Vertretern der heimischen Farnwelt sind die sonderbar gestalteten ungefiederten Hirschzungen (*Scolopendrium*) zu nennen, die der alte Apotheker als *Folia linguae cervinae* kannte. Wir dagegen schätzen sie nur als Schmutz der Alpenfelsen, an dem uns weiter nichts Besonderes auffallen kann, als daß diese Pflanze in den englischen Gärten, wo man sie gerne kultiviert, duzenderlei Monstrositäten bildet. Sigdor schreibt von ihr, daß ihre Regenerationsfähigkeit eine außerordentliche sei. Wenn man ihr Blatt an der Spitze der Länge nach ganz wenig spaltet, geht es nicht zugrunde, sondern der Mittelnerv gabelt sich; es entstehen zwei Vegetationspunkte, und aus ihnen erwächst ein gegabeltes Blatt, wie es der Gärtner bei dieser Pflanze gar wohl kennt.

Goebel, der sehr viel mit den Regenerationen der Farne experimentiert hat, eröffnete dadurch Einblicke in ganz absonderliche Verhältnisse. Wenn er Farnprothallien durch einen Längsschnitt entzweiteilte, wurde die verloren gegangene Hälfte nicht wieder ergänzt. Dagegen fing nun der Vegetationspunkt an, in besonderer Weise tätig zu sein; er verbreitete sich flügelartig und schuf so einen gewissen Ersatz. Wenn man dagegen den Vegetationspunkt herauschnitt, wurde der ganze Vorkeim zu lebhaftestem Wachstum angeregt. Allenthalben wucherten aus beliebigen Zellen neue Prothallien hervor. Es war also offenbar, daß für den Farnvorkeim der Vegetationspunkt so wirkt, wie etwa im tierischen Gehirn gewisse Zellen, die man als Hemmungszentren bezeichnet. Er reguliert die Wachstumstätigkeit, und das ist ganz im Einklang mit neueren Untersuchungen von Adolf Wagner, der Ähnliches für den Vegetationskegel gewisser Wasserpflanzen (*Myriophyllum*) feststellte. Aber nur an jungen Pflanzen funktioniert der Vegetationspunkt als Hemmungszentrum, denn bei älteren Farnen tritt Brutknospenbildung bekanntlich spontan ein.

Höchst interessante Ersatzvorgänge hat der erstgenannte Forscher auch an den Arten der FarnGattung *Pteris* beobachtet. Es ist das jener Farn, den man früher auch den allbekannten Adlerfarnen beizählte, die man aber jetzt mit dem Farnforscher Kuhn als *Pteridium* mit der einzigen Art *Pt. aquilinum* Kuhn abgetrennt hat. Den deutschen Namen „Adlerfarn“ führt die Pflanze wegen der eigentümlichen Figur, die ihre Gefäßbündel namentlich im etwas schief entzweigeschnittenen Wurzelstock bilden. Eigentlich aber sollten wir sie unseren Niesenfarn nennen, denn sie ist die größte (bis 4 m hoch) und zugleich häufigste der einheimischen Arten. Auf der ganzen Erde bildet sie auf Waldblößen und Schlägen, auch auf Heiderücken der mittleren Gebirge oft manneshohe und ganz undurchdringliche Dickichte von prächtig malerischer Wirkung. Auch dieser Farn verträgt gleich den Felsenfarnen das grellste Sonnenlicht (bis zu $\frac{1}{4}$ Lichtstärke nach Wiesner), nur bleicht er dabei zu einem hellen Gelbgrün aus, das ihn besonders reizvoll erscheinen läßt. Dabei ist er von seltener Lebenszähigkeit, daher vom Förster gehaßt. Seine dicken Wurzelstöcke kriechen weit unter der Erde dahin. Nach Querssen erzeugt die Keimpflanze im ersten Jahr bis zu 12 Blätter; von da an sendet jeder Rhizomast in der Regel aber nur ein Blatt jährlich über den Boden, das im ersten Jahre bloß einen niedrigen Hocker, im zweiten dagegen einen bis 4 cm langen, dichtbehaarten Stiel mit Niederanlagen bildet. Erst im Mai des dritten Jahres

tritt es erwachsen und dreifach gefiedert aus dem Boden, erreicht aber nur auf feuchtschattigen Standorten seine größten Maße und reift von Juli an seine Sporen. Eine ganz unerwartete biologische Erscheinung ist die fabelhafte Anpassungsfähigkeit der gewaltigen Pflanze. Wiesner fand sie noch an so dunklen Waldstellen, daß sie dort nur $\frac{1}{1000}$ des Lichtes genießen konnte, das ihr bei freier Besonnung zuteil wird. Interessanterweise haben die jungen Blätter an ihrer Basis auch kleine Honigdrüsen (extranuptiale Nektarien) ausgebildet.

Aldersfarne in einer Waldböfse. (Original von J. E. Peters†-Graz.)

Die Pflanze wird dieserhalb von Ameisen fleißig besucht, und wenn sich bei anderen Gewächsen herausgestellt hat, daß die Ameisengarde einen wirksamen Schutz gegen allerlei Raupen darstellt, so mag das auch vielleicht hier zutreffen. Im allgemeinen bedürfen die Farne freilich einen solchen Schutz nicht; sie werden z. B. vom Vieh offenkundig verschmäht, was man ihrem Gerbsäuregehalt zugeschrieben hat. Nur der Allesesser Mensch schrickt nicht zurück und verwendet z. B. die stärkereichen Wurzelstöcke des Aldersfarnes auf den kanarischen Inseln zur Brotbereitung. Im allgemeinen aber weiß das Volk, daß das Farnlaub Ungeziefer vertreibt, was sich auch in mancher Bezeichnung der Farne ausdrückt. Im rumänischen Teile Ungarns sah ich das Lager der Bauern oft mit getrockneten Wedeln des Aldersfarns zubereitet und habe selbst auf solcher Streu bei Gebirgswanderungen köstlich geschlafen in Hütten, in denen keine dort überhaupt vorkommende Art von Ungeziefer fehlte.

Von den nächsten Verwandten des Adlerfarns, den etwa 70 Saumfarn- (Pteris-) Arten, gedeiht eine ganz reizende Form wild noch in der Südschweiz und um den Gardasee. Das ist *Pteris cretica* L., die jeder Gärtner wohl kennt, da sie und mehrere Verwandte (*Pt. lineata*, *Pt. chinensis*) und Varietäten zu den beliebtesten Zimmerfarnen gehören. H. Peters gibt in seinem Handbuch der Zimmergärtnerei folgende Winke, um diesen ausdauernden und sehr anmutigen Gewächsen (wie Zimmerfarnen überhaupt) bestes Gedeihen zu sichern. Sie verlangen sandige Heideerde mit etwas Zusatz von zerkleinerter Holzkohle und gutverrotteter Lauberde, ferner große Feuchtigkeit (daher viel Spritzen) außer der Ruheperiode. Im Februar empfiehlt sich Umtopfen, aber nur dann, wenn der Ballen ganz durchwurzelt ist. Vermehrt werden sie in Kultur am besten durch Stockteilung.

Es ist also durchaus nicht schwer, sie zu pflegen, zumal da sie von Natur aus ohnedies mit großer Lebensfähigkeit begabt sind. Das hat sich

Junge Pflanze von *Ceratopteris* mit einem ersten Blatt, an dessen Basis sich drei Zwischenformen zwischen Blatt und Prothallium, also Sporen- und Geschlechts-generation, gebildet haben. (Nach Goebel.)

besonders im Laboratorium erwiesen, wo man die wunderbarsten Zerstückelungsversuche mit ihnen vorgenommen hat. Es ist dem Botaniker Farlow gelungen, junge *Pteris cretica*-Pflanzen dazu zu bringen, aus dem ersten Blättchen unmittelbar wieder Prothallien zu erzeugen, was man an *Pteris longifolia* auch unter natürlichen Verhältnissen beobachtet hat. Und H. Goebel erläutert die große Wichtigkeit dieser Tatsache mit folgenden Worten: „Hier tritt also bei der Regeneration scheinbar etwas ganz anderes auf als das, was verloren ging. Es findet eine Rückkehr zur geschlechtlichen Generation, zum Prothallium statt, und wir haben so eines der auffallendsten Beispiele für die Umkehr des Entwicklungsganges, denn tatsächlich kehrt die Pflanze auf ein Entwicklungsstadium zurück, welches sie schon hinter sich hatte.“

Ein baumbewohnender amerikanischer Farnfarn (*Polypodium lepidopteris* Kunze) aus dem Münchener botan. Garten. (Original von S. Dopfer-München.)

Da ihm ganz Ähnliches auch bei Baumpfarnen gelang, ja, er bei dem in den Tropen sehr gemeinen Wasserfarn *Ceratopteris thalictroides*, dessen untergetauchte Blätter einfacher sind als die in die Luft ragenden, auch Mittelbildungen zwischen Vorfeim und Blättern (s. das Bild) erzielte, wie solche in der Natur nie vorkommen, stehen wir hier allerdings vor einer ganz fabelhaften Erscheinung, die zu lebhaftem Nachdenken auffordert. Der Naturforscher, dem wir diese Kenntnisse verdanken, beschied sich allerdings dabei, anzunehmen, daß die morphologischen Unterschiede zwischen dem, was die Pflanze verlor, und dem, was sie an seine Stelle setzte, durch Unterschiede in der Ernährung erklärt seien. Aber er hat keine solchen Unterschiede gezeigt, und wir

Wedel des Tüpfelfarns (*Polypodium vulgare*) rechts, mit einer Mutationsform (var. *trichomanoides*) links.
(Nach Goebel.)

haben ja gar keine Einsicht darein, warum eine solche Ernährungsänderung aufgetreten sein soll, und ob sie wirklich qualitative Folgen nach sich zieht. Wir stehen vielmehr vorläufig ganz ratlos vor dieser künstlichen Apogamie, die uns nur so viel verrät, daß das Innenleben der Pflanze, dessen Äußerungen uns ja doch darin ansprechen, ein viel geheimnisvolleres Ding sei, als sich die älteren Botaniker vorstellten.

Einen entsprechenden Einblick in das Innenleben der Farne gewährten auch Versuche, die man mit Engelsfüßarten angestellt hat. Unter diesem etwas barocken Namen versteht das Volk den Tüpfelfarn (*Polypodium*), von dessen vielen Arten in Deutschland nur eine (*P. vulgare* L.), diese aber in zahlreichen Abänderungen,

vorkommt, als einer der häufigsten Farne, der in schattigen Bergwäldern auf Baumstämmen und Felsblöcken sitzt. Der Tüpfelfarn ist mit seinen einfachen, nur leicht gefiederten Fiedern viel weniger hübsch als seine meisten Verwandten, und wenn er dennoch allbekannt ist und eifrig gesucht wird, so liegt das an den Heilkräften seiner Wurzelstöcke, die ihm mit ihren vielen Verästelungen den griechischen Namen des Vielfüßigen eingebracht haben. Unser Volk nennt sie recht unschön Kropfwurzel, und als *Radix polypodii* gelangten sie auch in den Heilschatz und wurden zur Hoffnung der Lungenkranken und zu Schlagfluß Geneigten. Dieser alte Ruf hat sich verloren, trotzdem er einst so felsenfest gegründet war, daß man die Sage aufbrachte, Engel hätten diese „süße Wurzel“ den Menschen verraten. Heute weiß manchenorts nur noch die jüngste Generation von ihr, und auch diese schätzt sie bloß im Sinne einer Mäscherei als Süßholz. Der Wissenschaft aber hat der Tüpfelfarn noch immer viel zu sagen. Er bedeutet ihr ein prächtiges Versuchsobjekt zur Erkenntnis der Regenerationen. An ihm erkannte man, daß die Spitze der Farnblätter im Gegensatz zu denen der Blütenpflanzen lange

Zeit embryonal bleibe. Die abgeschnittenen ersten Blätter von *P. aureum* besitzen nach Goebel eine ganz außerordentliche Wiederherstellungskraft und können sogar aus alten, nicht mehr wachstumsfähigen Epidermiszellen neue Sprosse entsenden. Und auch hier lassen sich dadurch unmittelbar Prothallien erzielen wie bei *Pteris*. Welch wunderbare Plastizität muß doch diesen Lebewesen eigen sein, die mit solcher Leichtigkeit jedem Eingriff gegenüber die Harmonie ihrer Gestaltung wiederfinden und ihre Wesenheit durchsetzen können! Als ob sie geradezu das Schulbeispiel für die Berechtigung dieses Satzes liefern wollten, sind die Tüpfelfarne auch noch in stande, Mutationen, sprunghafte Gestaltänderungen, zu bilden, wovon eine auf S. 30 im Bilde vorgeführt wird. Wozu sie dienen, wissen wir nicht. Es ist überhaupt sehr zweifelhaft, ob Mutationen auf der Zweckmäßigkeit der Pflanze beruhen. Im gegebenen Fall ist nur das bekannt, daß, wenn man die Mutationsform in ganz trockenen, unfruchtbaren Boden verpflanzt und allen Fährnissen aussetzt, sie alsbald wieder zur regelrechten Form zurückkehrt, worüber man sich freilich den verschiedensten Gedanken hingeben kann, ohne eine befriedigende Deutung zu finden. — Einen ganz besonders reizenden Farn sieht man allenthalben in Blumenläden als Zimmerpflanze angeboten. Man bezeichnet ihn im gewöhnlichen Leben als Frauenhaar (*Adiantum Capillus Veneris* L., *A. cuneatum* und andere Arten) oder Haarfarn, obzwar eigentlich das Aussehen der Wedelchen dazu in keiner Weise verlockt (siehe Bild S. 12). Die Bezeichnung hat vielmehr ihre völkergeschichtliche Berechtigung, da die Mythologen versichern, daß im Brautfranz der alten Germanen *Asplenium trichomanes* und *Adiantum*, die beide als Freias Haar bezeichnet wurden, nicht fehlen durften, da sie, als der Göttin geweiht, Bürgen des Jungbleibens darstellten. Die erstgenannte Streifenfarnart sieht nun allerdings ein wenig manchen *Adiantum*-Arten ähnlich; im allgemeinen aber mag es sich hierbei um eine Verwechslung handeln, da der eigentliche Haarfarn in Deutschland nicht vorkommt. Erst in Südtirol, in der südlichen Schweiz und der Lombardei wächst er wild, und die dort eindringenden deutschen Völker mögen vielleicht ihre heimatliche Sage von *Asplenium* auch erst dort auf die andere Pflanze übertragen haben.

Der Königsfarn (*Osmunda regalis*). (Naturaufn. von J. E. Peters†-Graz.)

Wir dürfen uns von den Farnen nicht verabschieden, ohne des schönsten und am höchsten entwickelten, leider auch seltensten ihrer Gattung in Deutschland zu gedenken. Das ist der Königsfarn (*Osmunda regalis* L., siehe das Bild). Er ist der einzige deutsche Vertreter einer Gattung, die wieder allein steht in der gleichnamigen Familie, der zuliebe man eine besondere Ordnung der Osmundazeen (mit nur drei Gattungen und 11 Arten) schaffen mußte, die sich den ganzen dreitausenderlei Tüpfelfarnen gegenüberstellt. Eine derartig isolierte systematische Stellung deutet immer auf ganz besondere Eigenheiten. Solche erkennt man auch leicht an der vornehm gestalteten Staude mit ihren meterlangen, lederigen, doppelt gefiederten Wedeln, denn wenn man sie auf einem ihrer moorigen Standorte im Juni oder Juli aufsucht, sieht man ohne weiteres, daß dieser Farn geradezu „blüht“. In großen traubigen Rispen erhebt er an den Spizen unfruchtbarer Spreiten besondere fruchtbare Fiedern, an denen die Sporangien in dicken Knäueln sitzen. Er hat also fruchtbare und unfruchtbare Blätter auch schon gestaltlich gesondert. Er steht damit zwar nicht allein, da auch der schöne deutsche Straußfarn (*Oncoclea Struthiopteris* Hoffm.) schon Ähnliches zeigt, weshalb ihn Linné noch für eine *Osmunda*-Art hielt, oder da der Rippenfarn (*Blechnum Spicant* With.), dessen Laub bei uns überwintert, ebenfalls die fruchtbaren Wedel gestaltlich verschieden hält. Wohl aber ist er der einzige, der seine Sporenträger so blütenhaft auszubilden versteht, daß ein Teil der Botaniker (z. B. Vuerffen und Goebel) es ablehnt, die Fruchthäufchen noch als Sori zu bezeichnen.

Alles deutet an dieser edlen Pflanze auf einen höheren Rang. Schon ihr Vorkeim ist anders als bei den anderen Farnordnungen, die stets mit einem Faden beginnen. *Osmunda* stellt, wie Kny gezeigt hat, sofort eine Scheibe her. Das Prothallium zeigt eine gewisse höhere Gliederung. An der Sporenpflanze fehlen die Spreuschuppen; der anatomische Bau ihres Wurzelstockes weicht völlig von dem der anderen Farne ab; die Sporangien haben keinen Schleier; ihr „Ring“ ist sehr eigentümlich. Sie öffnen sich ganz anders, wie die der Tüpfelfarne. Kurz, in allem verrät sich ein Neues. Osmundazeen kommen schon in Kulm- und permischen Schichten vor, sind also eine sehr alte Gruppe. Sie sind eine ehrwürdige Reliquie der Pflanzengeschichte. Ihre Verwandten und sonstigen Übergangsformen sind ausgestorben, daher stehen diese Pflanzen jetzt so ganz fremdartig und isoliert da. Um so mehr muß man es bedauern, daß sie nicht systematisch geschützt werden. Sie fehlen z. B. in Österreich fast völlig, und auch in Deutschland sind sie nur noch in den nordwestlichen Mooren reichlich vorhanden, aber überall durch die Gier der Sammler bedroht und im Rückgang begriffen.

Die Wasserfarne (Hydropterides).

Unter dem gut gewählten Namen Wasserfarne mußte man einige sehr eigenartige Gewächse von den übrigen Farne deshalb abtrennen, da sie zweierlei Sporen hervorbringen. Wissenschaftlich ausgedrückt: sie sind heterospor, gegenüber den isosporen Landfarnen. Ihre großen Sporenträger (Makrosporangien) enthalten je eine Großspore, ihre kleinen Sporenträger (Mikrosporangien) dagegen zahlreiche kleine Sporen. Ihr Vorkeim ist so rückentwickelt, daß er nur noch wenig aus der Spore hervorragt.

Und da er nicht mehr beiderlei Geschlechtsorgane trägt wie bei den Farnen, sondern aus den Mikrosporen nur als männlicher, aus den Makrosporen als weiblicher Vorkeim hervorgeht, so liegt hier eine Differenzierung vor, die man schon deswegen als höhere Lebensform ansprechen darf, weil sie sich im Verlaufe der Stammesgeschichte nicht mehr wieder verloren hat. Auch die höchstentwickelte Blütenpflanze trägt noch Mikro- und Makrosporen, nur hat man für sie, weil man ihre wahre Natur lange nicht erkannte, die Namen Pollenkörner und Embryosack geschaffen. Man möge sich hiernach vorstellen, mit welchem wissenschaftlichen Inter-

1—3 = Büschelfarn (*Salvinia natans*).

1 = Habitusbild. 2 = Sporentragende Pflanze, seitlich gesehen mit zwei Luftblättern und einem fruchtbaren Wasserblatt. 3 = Mikro- und Makrosporangien im Querschnitt, 15 mal vergr. (Nach Querssen.) 4—5 = *Azolla filiculoides* Lam. 4 = Eine schwimmende Großspore mit Luftbirnen und Gangfäden, daran sich Kleinsporen festgeheftet haben, 75 mal vergr. 5 = Junge Pflanze, aus der Spore entwachsend, 40 mal vergr. (Nach Strasburger und Campbell.)

resse der Botaniker auf die seltsamen Pflanzen blickt, welche die Epigonen der Erfinder der Heterosporie sind. Es gibt nur wenige solche als Überbleibsel sehr alter Pflanzenfamilien, die größtenteils ausgestorben sind.

Am nächsten schließen sich von ihnen an die Farne die Salviniaceen an, von denen der Büschelfarn (*Salvinia natans* All.) auch in Deutschland und zwar am häufigsten in den Ländern um Schlesien gedeiht. Auf Teichen und in stillen Buchten der Flüsse, besonders gerne zwischen Flößen steigt dieses hellbläulich-grüne Pflänzchen im Frühling aus seinen Luftsäcke führenden Sporenfrüchten vom Boden empor und

wuchert manchmal bis gegen Weihnachten. Meist verweist es aber schon im November nach dem Reifen seiner Früchtchen. In prächtiger Anpassung an das Wasserleben erzeugt *Salvinia* zweierlei Blätter. Horizontal auf dem Wasser liegende Luftblätter mit ungeteilter Spreite und in Büscheln hinabhängende Wasserblätter, die wie eine behaarte Wurzel aussehen und auch physiologisch deren Stelle vertreten, denn die Pflanze ist wurzellos. Die Sporen entstehen an den Wasserblättern in Kapseln, und zwar bilden sich zuerst etwa 15—25 weibliche Sporangien und dann erst 70—100 männliche. Sehr interessieren muß es den Naturfreund, die Keimung der beiderlei Sporen zu verfolgen. Aus den weiblichen geht ein kleiner, grüner Vorkeimzipfel hervor; in den männlichen beschränkt sich das ganze Prothallium auf nur zwei Zellen. Man kann also sagen, daß bereits hier ganz ähnliche Verhältnisse vorliegen wie bei den Blütenpflanzen, deren Geschlechtseneration ja auch nicht viel mehr eingeschrumpft ist.

Da der Büschelfarn aber ein aussterbendes Gewächs ist, das man schonen sollte, wird es wohl nicht zu viele Pflanzensammler geben, die ihn zu Gesicht bekommen. Eigentümlicherweise wird er ersetzt durch einen amerikanischen nahen Verwandten (*Azolla caroliniana*), der noch zarter gebaut ist, sich aber in milderen Gegenden ungeheuer vermehren kann. Wenn man in einen Teich nur ein paar kleine, lebermoosartige Azollen wirft, überziehen sie schon nach ein paar Monaten dessen ganze Oberfläche und könnten sicher eine wahre Wasserpest werden, wenn sie nicht dem deutschen Winter erliegen. Von botanischen Gärten aus ist *Azolla* immerhin schon ziemlich verwildert. Dieses Pflänzchen empfiehlt sich der Aufmerksamkeit des Natur Liebhabers deswegen, weil es höchst sonderbare biologische Organe erzeugt hat. Seine Großsporen, die natürlich darauf angewiesen sind zu schwimmen, haben — wie E. Strasburger schreibt — einen besonderen Schwimmapparat hergestellt. Er besteht aus 3 oder 9 Luftbirnen, zu denen sich ein Teil der Sporenhaut umbildet (siehe das Bild). Der andere Teil paßt sich anderen Funktionen an. Er treibt Warzen und Höcker mit zahllosen feinen Fangfäden. Worauf diese abzielen, kann man leicht beobachten, wenn man fruchtende Azollen in einem Aquarium hält. Da sieht man dann eines Tages winzige Kügelchen umhertreiben, die schon unter der Lupe wie ein Nadelkissen aussehen. Zahllose Pfeile mit Widerhaken stehen aus ihnen empor. Jetzt berühren sie eine der mit ihrer Schwimmboje flottierenden Großsporen; sofort legen sie sich mit ihren Enterhaken im Gefolge der Fangfäden fest. Alle diese Mittel dienen zur Vereinigung der Geschlechter. Denn die kleinen Kugeln führen eine Ladung von Mikrosporen, die nun aus den Antheridien die infusorienartigen Spermatozoiden entleeren. Mit ihnen sind diese dicht herangesegelt an den Ort ihres Wirkungskreises, nämlich zur Befruchtung der durch ihren chemischen Sinn für sie jetzt leicht auffindbaren Archegonien der Makrosporenprothallien.

Azolla ist übrigens noch in einer weiteren Beziehung interessant. Ihre Blätter tragen Höhlungen, in denen regelmäßig Klost-Algen leben. Welche Anpassung damit vorliegt, wissen wir noch nicht; daß es aber eine ist, dünkt mich zweifellos.

Marsilia quadrifoliata L., zu deutsch Kleefarn, nennt man einen anderen Vertreter dieser Gruppe, der mit weitkriechenden Stämmchen und im Aussehen täuschend vierblättrigem Klee ähnlich (siehe das Bild) in Süddeutschland um den Rhein und in den Donauesmümpfen nicht zu selten stille Weiherufer und überschwemmte Orte über-

zieht. Er bedarf jährlich wiederkehrender Wasserbedeckung, da er sonst unfruchtbar wird. In anderen Ländern, z. B. in Australien, wo die Kleeferne eine großartige Entwicklung aufweisen, hat er sich wieder der außerordentlichen Dürre so angepaßt, daß M. Braun, der damit anziehende Versuche anstellte, uns darüber folgendes erzählen kann. Eine mit einem dichten Rasen von *M. hirsuta* erfüllte flache Schale wurde 6 Monate lang völlig trocken aufbewahrt. Trotzdem entwickelten sich alsdann bei bloßem Begießen allmählich an den Wurzelstöcken kleine Brutknöllchen, und daraus überzog ein grüner Rasen neuerdings die Schüssel.

Australische Kleeferne (links *Marsilia Nardii* A. Br., rechts *M. elata* A. Br.).
(Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

Diese uralten Pflanzengeschlechter sind im allgemeinen von einer staunenswerten Lebens- und Wandlungsfähigkeit; haben sie sich doch nur dadurch bis in unsere Tage gerettet. Als man unsere Marsilie aus Sporen züchtete, ergab sich, daß sie nicht weniger als viererlei Blätter hat. Ein Keimblatt, untergetauchte Erstlingsblätter, dann Schwimmblätter, die sich auf dem Wasser ausbreiten, und schließlich die sporenerzeugenden Luftblätter, durch die das Pflänzchen in seiner gemeinbekannten Form besteht.

Der Kleefern hat es dadurch in seiner Macht, widrigen Umständen zu trogen. Wie er das anstellt, darüber teilt Braun folgende Beobachtung mit: Am 7. August wurde ein Rasen von *M. pubescens* etwa 20 cm unter Wasser gesetzt. Schon 13 Tage später hatte er an langen Ausläufern etwa 50 Schwimmblätter an die Oberfläche getrieben, während die Luftblätter in der Tiefe langsam abstarben.

Am Grunde der Stiele bilden sich im Herbst an besonderen Stielen die Früchte als mehrfächerige Kapseln, die sich klappig öffnen und ihre Groß- und Kleinsporen entlassen. Für diese ist es nicht vorteilhaft, daß sie nun ins Trockene gesetzt sind. Da ist es denn sehr vielsagend, daß gerade diese Pflanze mit den Sporangien auch einen

quellenden Gallerttropfen entleert. Die keimenden Sporen erzeugen im Feuchten einen sehr geringfügigen Vorkeim mit Geschlechtsorganen. Die schraubenzieherförmigen Spermatozoiden unwirbeln den Eingang zum weiblichen Geschlechtsteil geradezu stürmisch. Shaw hat jedoch auch beobachtet, daß sich unbefruchtete Eizellen zu einem Embryo entwickeln können, der dann auch mit einer Art Fuß in die Makrospore hineinwächst, um ihren Nahrungsvorrat aufzusaugen (vergl. Bild S. 8), ganz so, wie es von den Blütenpflanzen, z. B. den Getreideembryonen, bekannt ist, die auf diese Weise den Stärkevorrat des Kornes verzehren.

Es ist also der Kleefarn in jeder Hinsicht ein sehr lehrreicher Übergang von der Kryptogamen- zur Phanerogamenwelt. Schon darin, daß der Embryo ein langes, fädiges Keimblatt erzeugt, erinnert er an die sich in ihm vorbereitende höhere Gestaltung, ebenso durch die Schließbewegungen seiner Blätter, während wieder der Umstand, daß er seine jungen Laubblätter noch spiralig einrollt, so recht seine Farnnatur ins Gedächtnis ruft.

So unscheinbar er ist, hat er doch für den Menschen sogar praktischen Wert. Die Ureinwohner Australiens fristen ihr elendes Leben mit dem Stärkemehl und der Gallerte, die in den holzigen Sporenfrüchten australischer Kleefarne (besonders *M. Nardu*, *Drummondii*) eingeschlossen sind. Sie nennen sie *Nardu* und bereiten daraus ein gelbes Mehl und Brot, indem sie die Früchte plump zwischen Steinen zerquetschen und das Pulver mit Wasser anrühren. In der Geschichte der menschlichen Großtaten ist das *Nardu* verzeichnet. Der Engländer Robert Burke brach im Jahre 1860 von Melbourne in Australien auf, um diesen Kontinent von S nach N zu durchqueren; in den zentralen Salzsümpfen umherirrend, ist der Ärmste, sicher nach namenlosen Leiden, mit seinem Begleiter Wills verhungert. Ein anderer seiner Genossen dagegen hielt es bei einem Trupp Australneger so lange aus, bis eine Rettungsexpedition ihn auffand. Alle diese sollen lange Monate hindurch mit nichts anderem ihr Leben verlängert haben, als mit eben diesen *Nardufrüchten*, die man also wohl das australische Korn nennen kann, da diesem Weltteil sonst (außer Araukarien) einheimische Brotfrucht fehlt.

Zu den Kleefarnen gehört auch ein höchst unscheinbares Pflänzchen, das sich in Norddeutschland auf nassen Wiesen und Seeufern einstellt und von *Marsilia* eigentlich nur dadurch unterschieden ist, daß seine Blätter fadenförmig sind und keine Spreite besitzen. Man nennt es Pillenkraut (*Pilularia globulifera* L.), und es ist nichts von seinem Leben Merkwürdiges bekannt als höchstens, daß es auch unterseefisch gedeiht, dann aber fast halbmeterlange Blätter treibt.

In den Tropen lebt eine Sippe von Farnpflanzen, die man als *Marattiales* abseits gestellt hat, und die ihrer meist riesigen Masse halber auch nur selten in die botanischen Gärten gelangen. Auch von ihnen ist nichts anderes zu bemerken, als daß sie, deren isospore Sporenhäuschen wieder auf den Blättern gebildet werden, mit ihrem langlebigen, gut entwickelten Vorkeim, den Fiederblättern und dem ganzen Wuchs außerordentlich an die Baumfarne erinnern. Durch die Art, wie ihre Sporen entstehen, gleichen sie aber doch wieder den gleich zu besprechenden Natternzungen, so daß sie uns den Dienst leisten, ein vermittelndes Glied am Stammbaum zu sein, weshalb sie auch erwähnt werden mußten.

Die Natternzungen (Ophioglossales mit einer Familie Ophioglossaceae und nur zwei Gattungen Ophioglossum und Botrychium) sind jedem herbarisierenden Pflanzenliebhaber wohlbekannt durch ihre abenteuerliche Gestalt, an die schon der Zauberlauben und Alchimistenschwindel vergangener Zeiten anknüpfte. Man hat diese zwei an grasigen Waldplätzen und lichten Bergabhängen nicht seltenen Gewächse schon seit Jahrhunderten gekannt und viel verfolgt, da sie ob mancher Umstände zu geheimnistuenden Beschwörungen geeignet schienen. Nur hat man ihre wahre Natur dabei verkannt, und noch Linné bezeichnete eine von ihnen, die Mondraute (Botrychium), als Königsfarn (Osmunda). Es läßt sich auch nicht leugnen, daß wenigstens ein Teil dieser sechs deutschen Arten, namentlich das große, aber ganz seltene

B. virginianum Sw., sehr stark daran erinnert. Die wahre Natur dieser Pflanze erschloß aber erst der Lichtbringer im Tempel der Natur, das Mikroskop. Da sah man denn, daß der Vorkeim dieser Kräuter ganz das Blattgrün entbehre, lebt er doch auch unterirdisch. Auch die Sporangien, von besonderen rispigen Ständern getragen, sind ganz anders gebaut wie die der Königsfarne, und die Blattknospen sind hier nicht mehr spiralig

Natternzungen (*Ophioglossum pedunculatum* Desv.) (Naturaufnahme von G. Dopfer-München.)

engerollt. Die Sporenträger bilden sich nicht wie bei den Farnen aus einer Zelle, sondern aus einer Gruppe von Oberflächenzellen.* Das wären etwa die Hauptunterschiedsmerkmale, die allerdings höchstens dem Fachmann etwas sagen. Doch halten wir uns hier nicht ohne Absicht bei solchen Einzelheiten auf, da es wichtig ist, die langsamen Übergänge von den einfachen zu den höheren Pflanzen herauszuarbeiten und dadurch den Leser zu überzeugen, daß die Annahme einer wirklichen Verwandtschaft und Abstammung der Pflanzen voneinander eine Tatsache ist, an der nie mehr wieder gerüttelt werden kann.

Sonst ist über die Natternzunge wenig von allgemeinerem Interesse zu sagen. Ihre Vermehrung durch die geschlechtliche Generation ist, wie es scheint, im Rückgange begriffen. Mindestens ist sie seltener, als die Bildung von Brutknospen aus den Wurzeln. Diese Wurzeln verbünden sich (so wie auch bei der Mondraute) mit einem Bodenpilz zu einer Mykorrhiza, über deren Bedeutung man jedoch sehr verschiedene Ansichten hat. Jeffrey hat sogar den Gedanken geäußert, die Natternzunge freße ihren Gast auf. Was

* Danach unterscheidet man eusporangiate Farnpflanzen von leptosporangiaten.

Wahres daran ist, müssen neuere Forschungen entscheiden. Es verlohnte sich ohnehin, dieses Gewächs eingehender zu durchforschen. Denn es besitzt viele anatomische Besonderheiten und soll ein besonders günstiges Objekt für den Nachweis der reizleitenden Plasmaverbindungen zwischen den Zellen sein. Dazu scheinen sich Farnpflanzen überhaupt zu eignen, gehören sie doch zu den verhältnismäßig wenigen Gewächsen, in denen der Prager Botaniker Kemeß seine Aufsehen erregenden „Pflanzennerven“ fand.

Die alten Botanici, besonders die Parazelsisten, haben die sporentragende Ähre, weil sie — wenn auch nur oberflächlich — einer Schlangenzunge gleicht, nach der „Lehre von der Signatur“ als geeignetes Heilmittel gegen Schlangenbisse bezeichnet. Wie unsinnig diese Lehre war, geht daraus hervor, daß sie nach der gleichen Logik das Schöllkraut als Arkanum gegen die Gelbsucht priesen — weil es gelben Milchsaft hat. Da aber durch das fortwährende Experimentieren an Kranken doch manches Pflanzenheilmittel gefunden wurde, hat diese ganze Verirrung, wie so viele andere, dem Menschen schließlich doch zum Heile gereicht.

Das auf Bergwiesen wachsende Walpurgiskraut oder die Mondraute (*Botrychium Lunaria* Sw.) hat die Phantasievollen wohl schon deshalb angeregt, ihr allerlei anzudichten, weil sie vielerlei Monstrositäten erzeugt. Als Heil- und Zauberkraut nahm sie ihren Platz ein in manchem Geheimkabinett. Wir Neueren wissen von ihr zu sagen, daß in ihrem Stamme sich zum erstenmal bei den primitiven Pflanzen ein wirkliches Dickenwachstum durch kambiale Tätigkeit einstellt. Da dies nun wieder an einem Punkte die Frage beantworten hilft, wie denn die höhere Gestaltung aus der einfacheren hervorgegangen sei, so hat das zarte Mondrütlein, wenn auch in anderem Sinne, wie bei den Alten, Anrecht auf unsere Beachtung.

Mondraute (*Botrychium Lunaria*) mit einem fruchtbaren und einem unfruchtbaren Zweig des Blattes.
(Nach Sachs.)

Eine Übergangspflanze von ehrwürdigem Geschlecht und großer Geschichte, dazu noch voll Besonderheiten in Bau und Leben, ist der Schachtelhalm (*Equisetum*). Seine Gattung ist der einzige Vertreter einer ganzen Klasse, und wenn seine 24 Arten heute noch über alle fünf Erdteile verbreitet sind*, so bestimmte er einst sogar das Aussehen ganzer Riesenwälder.

Genau so gestaltet wie jetzt, nur viel riesenhafter, lebte er schon in der Triaszeit und bot den Sauriern der Juraperiode Unterschlupf. In verwandten Gestaltungen, als *Calamites* baumhoch emporschießend, schloß er sich aber bereits zur Steinkohlenzeit zu düsteren und einförmigen Wäldern zusammen. Wenn er heute, zu dünnen Stränzen gebunden, als Zinnkraut auf dem Markte feilgeboten wird, merkt man ihm diese Zahl der Ahnen, die in die Millionen geht, wahrlich nicht an. In den größten Meerestiefen leben noch einige Armfüßer, die sich auch

* Nur das australische Festland und das tropische Afrika haben keine Schachtelhälme.

seit gleicher Zeit unverändert erhalten haben. Aber sie dümmerten dahin, geschützt durch ewig gleichbleibende Verhältnisse, an denen der Weltenlauf nichts modelte, während die Schachtelhalme Jahrtausende hindurch jeden Venz aufs neue vor die Aufgabe gestellt waren, sich zu behaupten, sich anzupassen, über die tausenderlei Aufgaben zu siegen, die ihnen der Weltgezeiten Änderung auferlegte. Und sie haben durch ihren Sieg bewiesen, daß von einem Altern des Lebens auf der Erde noch keine Rede sein kann. Wer dermaßen die Fähigkeit hat, sein Wesen von der Kohlenzeit bis heute unverändert durchzusetzen, der muß trotz des Märchenalters seiner Familie noch in Vollkraft sein!

Fig. 3 Der Bau der Schachtelhalme.

1 = Stütz des Wurzelknotens von *Equisetum Telmateja* Ehrh. mit Knollen. 2 = Habitus von *E. myriochaetum* Cham. mit den Sporangien. 3 = Habitus von *E. pratense* Ehrh. mit fertilen und sterilen Sprossen. (Nach Thomé.) 4 = Oberer Teil der Fruchtlähre von *E. Telmateja* mit den Schildern, an denen die Sporangien sitzen. Daneben einige verg. (Nach Sachs.) 5 = Brauner Stengel von *E. arvense* mit Sporangien. (Original von Prof. Heinrich-Algen.)

Das ist das erste, was die kleinen Schachtelhalme auf der sumpfsenden Wiese dem sinnenden Naturbeobachter zu sagen haben. Sie sind jedoch durchaus nicht immer so klein, wie man es nach dem gemeinsten Duwoß (*E. arvense* L.) der sandigen Äcker schließen möchte; schon der häufige Schlamm-schachtelhalme (*E. limosum* L.) der Moräste erreicht bis 8 dm Höhe, und das große *E. Telmateja* Ehrh. der Wald-sümpfe oder der überwinternde Winter-schachtelhalme (*E. hiemale* L.) spreizen sich bis über 1 m. Die Tropen brüten noch immer wahre Riesen aus. Im südamerikanischen Urwald klettert das 12 m lange *E. giganteum* L., und 2—4 m hohe Schachtelhalmdickichte sind in Mexiko und im tropischen Amerika noch immer vorhanden.

Ihre Gliederung und Gestaltung sind so gemeinbekannt, daß wir uns dabei kaum aufzuhalten brauchen. Die Pflanzen gehen aus den Geschlechtsvorgängen zwischen reich verzweigten, grünen Vorkeimen hervor (Bild anbei) und treiben aus einem farblosen Wurzelstock jährlich neue Sprosse. Dieser weithin kriechende Wurzelstock, der auch Knollen trägt, hat die Pflanze zu einer Landplage gemacht. Denn wo sie auf Äckern steht, verzehrt sie wertvolle Bodenbestandteile, auf feuchten Wiesen aber schädigt sie den Viehzüchter. Man wendet sie im Unverstand noch heute als harntreibendes Mittel an*, obwohl sie

1a

Fortpflanzung und Anatomie der Schachtelhalme. 1 = Reife Spore von *E. arvense* mit geschlossenen Glatern (^{20/1}). (Nach Sadebeck.) 1a = Reife Sporen mit offenen Glatern. (Originalaufnahme von Prof. Heineck-Alzey.) 2 = Weiblicher Vorkeim von *E. arvense* mit Archegonien (^{20/1}). (Nach Sadebeck.) 3 = Reife Spermatozoiden derselben Art (^{200/1}). (Nach Belajeff.) 4 = Spaltöffnungsapparat von *E. hiemale* (^{670/1}). (Nach Quereff.)

* Im Kneipp'schen Heilverfahren spielen Zinnkrautabsude eine große Rolle, und die Pflanze wird dieserhalb sogar gehandelt und als *Herba Equiseti* mit 40—60 Mark bezahlt. Kneipp empfiehlt sie jedoch vorwiegend nur äußerlich.

so scharf wirkt, daß es sogar bei dem Weidevieh Blutharnen nach sich zieht. Es nützt aber nichts, die Schafthalme* abzumähen, da sie immer wieder sprießen. So blickt denn der Landwirt gar scheel auf den schlanken, zierlichen Schaft, aus dem in regelmäßiger Folge anmutige Blattquirle aufsteigen, die, in der Nähe besehen, stark an Armleuchteralgen erinnernd, ein wahrhaft Wunderwerk ebenmäßig graziöser Formkunst sind. Man muß dabei wohl unterscheiden, daß manche Arten (*E. Telmateja* und *arvense*) im Lenz blattgrünfreie, rotbraune, unverzweigte Fruchtsprosse aussenden, denen erst später eine beblätterte Sommerform folgt. Die Sumpfschachtelhalme tragen wieder ihre Sporenfrüchtchen als kleine Keulchen auf dem Gipfel der gewöhnlichen Sprosse.

Jeder dieser Teile bietet der wissenschaftlichen Betrachtung unerschöpflichen Stoff. Eine der auffallendsten Eigenschaften der Schafthalme, die sie auch mit den Armleuchteralgen teilen, ist ihre überaus leichte Zerbrechlichkeit. Nur ist sie hier nicht von Kalkkrusten hervorgerufen, sondern durch Einlagerung von Kieselsäure. Dadurch werden die Halme so hart, daß man sich an ihnen verletzen kann, und daß sie zum Scheuern von Holz, Zinngeschirr u. dgl. verwendbar sind, worauf die Namen Tischlerkraut und Zinnkraut deuten. Der Winterschachtelhalm enthält am meisten davon. Seine Aschenanalyse ergibt unter 204,4 Teilen fester Bestandteile 110,0 Kieselerde. Abgelagert ist diese namentlich in den Außenwänden der Epidermiszellen in Form reizender Buckel, Körnchen, Rosetten, Stacheln, Ringen, Zähnen u. dgl. mehr.

Eine zweite Eigenart sind die interessanten Spaltöffnungen. Die Stengel und Sprosse der Schafthalme sind gerillt und tragen nur in den Rillen eingesenkt Spaltöffnungen, was aus biologischen Gründen bei so hochgradig xerophil angepassten Pflanzen verständlich ist. Die Schließ- und Nebenzellen dieser Spaltöffnungen sind nun, wie unser Bild zeigt, auf das reizendste verkieselt, was sich besonders dann hübsch macht, wenn man sein Präparat ausglüht. Es bleibt dann nämlich, wie bei den Kieseralgen, ein zartes Skelett zurück.

Wenn man die Stengel untersucht, wird man besonders auf die artigen Scheiden aufmerksam, die von Knoten zu Knoten den Stengel mit gezackter Manschette umfassen. Sie sind aber keine Verzierung, sondern notwendig, denn in diesen Knoten wächst der Stengel; seine Gewebe sind dort zart und bedürfen der Stütze. Es ist der analoge Fall wie bei den Gräsern.

An den Spitzenzähnen dieser Blattscheiden kann übrigens bei manchen Arten der Beobachter leicht das Ausperlen von Wassertropfen bemerken. Wenn er die Sache mikroskopisch untersucht, entdeckt er die solches bewirkenden Wasserdrüsen (Hydathoden).

Die experimentellen Gestaltungsforscher haben durch einen interessanten Versuch bewiesen, daß die kunstvolle Anordnung der Seitensprosse dieser Pflanzen nur eine Anpassung sei. Goebel hat *Equisetum*, deren Sproß stark nach unten gebogen wurde, sich zu dorsiventralen Pflanzen umgestalten sehen, d. h. sie trieben ihre Seitensprosse nicht mehr quirlig, sondern nur einseitig nach aufwärts gerichtet.

Auch die Fortpflanzung des Pferdehaares, wie der Lateiner unsere Pflanze benennt, ist sehr eigenartig. Die sporentragenden Sprosse tragen ihre Sporangien auf einer Art Ähre. Blätter bilden sich dabei zu Schildchen um, von deren Unterseite die

* Schafthalme ist die sinnvollere Urform des Wortes Schachtelhalm.

Sporangien auswachsen. Den Blütenpflanzenkenner mag dabei interessieren, daß es hier bereits einen Ring von Blättchen gibt, den man als ein Vorbild jener Hochblätter betrachtet hat, die für so viele Blütenstände kennzeichnend sind. An den Sporen, die alle gleich (also isospor) sind, bilden sich vier Häute, von denen die äußerste sich wie ein weites Hemd abhebt, dann in zwei Schraubenbänder zerreißt, die als sehr hygroskopisches Gebilde, so wie die bekannten Hauchbildchen, sich bald einrollen, bald ausstrecken. Sie haken sich zusammen, und es bilden sich große, wollige Flocken von Schleuderzellen und Sporen, die zusammen verstäuben. Man hat geglaubt, daß die Glateren Hilfsorgane zur Verstreung der Sporen seien wie bei den Schleimpilzen, darum hat man ihnen auch den Namen Glateren gegeben. Aber Sadebeck, ein genauer Kenner dieser Wesen, leugnet das und meint, sie dienten nur dazu, um die Sporen nicht einzeln verstäuben zu lassen. Und das dürfte wohl auch der Wahrheit entsprechen. Mindestens sind die Schachtelhalmsporen darauf angewiesen, in Gesellschaft zu keimen, denn der sich aus ihnen entwickelnde Vorkeim ist eingeschlechtig. Wenn also nicht männliche und weibliche dicht beisammen wären, wäre eine Befruchtung unmöglich. Höchst kurios gestaltet sind die vielgeißeligen Samenfäden (siehe das Bild), die man für Wimperinfusorien halten könnte, wüßte man nicht um ihre Zugehörigkeit zu einer Pflanze. Es wird niemand einen richtigen Begriff vom Wesen der Pflanze haben können, der nicht aus eigener Anschauung diese wildtanzenden, begehrliehen, durchaus tierisch aussehenden und sich so benehmenden Fortpflanzungszellen der Kryptogamen kennt. Sie sollten in der Schule unbedingt lebendig gezeigt werden, denn dann würde das heranwachsende Geschlecht nie mehr in den Fehler verfallen, die Pflanzen mit anderen Augen zu betrachten als die Tiere. Und wenn jemand zu prophezeien wagt, daß eine Zeit kommen wird, die beide Wesensgruppen ohne weiteres stets gemeinsam als dasselbe „Plasmawesen“ und „Lebewesen“ wertet und betrachtet, so kann er es sogar schon heute ungescheut vorwegnehmen, ohne daß ihm die Wissenschaft widersprechen wird.

Es ist also ein gar vielerzählendes Pflänzchen, dieser pudrige Quirlhalm, für den sich auch unser Volk seit Urzeiten immer interessierte, wenn das auch sich oft nur in Namensspielereien äußerte. Eine Unmenge Volksnamen entstanden so dafür, die manchmal recht merkwürdig begründet wurden, wie z. B. bei dem biedereren Mainzer Arzt Otto Brunfels (1488—1534) und Freund von Ulrich v. Hutten, den Vinné mit dem Ehrennamen „der Vater der Botanik“ auszeichnete. In seinem „Contrafayt Kreuterbuch“ sagt er an einer Stelle, daß dieses Gewächs „billiger pferd schwanz hieß, oder pferd zagel, dann es ist gleich einem pferd schwanz, in höhe anderhalben ellenbogen hoch, vilen wol bekant“. Söhnus erzählt in seinem fesselnden Werke über die Namensklärung der Pflanzen, daß man *Equisetum* auch mit einem Stahenschwanz verglich, weshalb es die Schlesier noch heute Stahenzagel oder Stahenzahl nennen, wodurch sich, nebenbei gesagt, herausstellt, daß ihr Rübezahl eigentlich ein Rübenschwanz sei. Andere seltsame Namen für unsere Pflanze sind: Spengelbüchse (weil man den Stengel aus den Scheiden ziehen kann, und dann ein nadel- [= Spindel] büchschenartiges Gebilde übrigbleibt), Mattensteert, Mattenschwanz, Weghansel, Spinnlich und Pipenstül (= Pfeifenstiel) als Zeichen, daß sie dem Landmann von je in die Augen stach. Der niederdeutsche Ausdruck *Du w en w o k* (= Du w o k) ist nach neueren

Sprachforschern zu Unrecht mit taube Wocke (d. i. Haube des Spinnrades) übersetzt. Einer von ihnen schreibt darüber: Ich erblicke in dem Wocke lieber das althochdeutsche Wuochar (= Wucher!), niederdeutsch Wöker=Nutzen, Gewinn, charakterisiere also damit Duwenwof als ein Gewächs, aus welchem die Taube Nutzen, Gewinn, Nahrung zieht, und welches sie mit Vorliebe aufsucht.

Man sieht, welch merkwürdige Geheimnisse auch der Sprachforscher den Pflanzen zu entlocken vermag, wenn auch manches daran an den berühmten ungarischen Forscher erinnert, der „nachwies“, daß die Babylonier Ungarn waren, weil Nebukadnezar ein ungarisches Wort sei, das freilich eigentlich ne bolondozzon az ur = mache der Herr keine Scherze, zu heißen habe. . . .

Als weitere Übergangspflanze von allgemeinem Interesse haben wir noch die Bärlappe (*Lycopodiales*) zu betrachten, deren 100 Arten über die ganze Erde verbreitet sind.

Stammesgeschichtlich betrachtet, bedeuten ihre Eigenheiten keinen wesentlichen Fortschritt gegenüber den Schachtelhalmen. Es mutet sogar fast wie ein Rückfall zu algen-, bzw. moosähnlichen Wesen an, daß aus ihren Sporen zuerst ein Protonem entsteht, aus dem dann langsam der Vorkeim hervorsproßt. Eine Neuerung im Sinne

Kolbenbärlapp (*Lycopodium clavatum* L.) mit Fruchtähren.
(Naturaufnahme von J. E. Peters†-Graz.)

einer Höherentwicklung liegt nur darin, daß bei dem Bärlapp (*Lycopodium*) bereits eine Art Embryoträger entsteht, wie er den Blütenpflanzen eignet. Sonst hat er gleichartige Sporen, einen jahrelang lebenden, sehr gut entwickelten Vorkeim, der, einhäufig, sowohl männliche wie weibliche Geschlechtsteile trägt. Als Sporenpflanze ist er ziemlich einfach gebaut und stellt ein ausdauerndes, immergrünes Kraut mit kriechendem Stengel und kleinen, quirlig oder spiralig angeordneten grünen Blättchen dar, das ohne besondere Scheitelzelle wächst und oftmals, so bei dem Tannenbärlapp (*L. Selago* L.), nicht einmal einen Unterschied zwischen fruchtbaren und bloßen Laubblättern erkennen läßt. Bei dem in allen alten Wäldern massenhaft verbreiteten Keulenbärlapp (*L. clavatum* L.) sind die Blüten allerdings wohlkenntlich auf besonderen Stielen als helle Ähren, aus denen das gelbe „Hexenmehl“ stäubt, von dem man sich früher allerlei Wunderliches dachte, während wir wissen, daß es nur die ganz reizend gestalteten Sporen (Bild) sind.

Nur verläßt sich auch diese Pflanze weniger auf sie als auf ihre mannigfachen Ableger und Brutknospen, die auch an die Moose erinnern und oft als regelrechte Überwinterungsorgane mit Beginn des Herbstes gebildet werden.

Das alles ist aber wenig interessant, und es würde uns nicht gelingen, für unser Pflänzchen Gehör zu finden, wenn nicht in seiner Lebensweise uns wieder die unbegreifliche Lebenszähigkeit, die wir schon an manchem der bisher betrachteten Gewächse bestaunten, anzöge. Von den fast 100 Arten leben $\frac{9}{10}$ in den Tropen und nur 6 bei uns.

1 = *Lycopodium cernuum* L. aus Brasilien, $\frac{1}{4}$ der natürl. Größe. 2–6 = Sporen der Bärlappe (Bestandteile des Horenmoths). 2–3 = *L. clavatum*, 4–6 = *L. inundatum*. 700fach vergr. (Nach Brihel.)

Da aber Bärlappe auch in der Arktis und im Hochgebirge gedeihen, so muß die Temperatur für sie kaum in Betracht kommen. Im südamerikanischen Regenwald hängen sie in prachtvollen Girlanden als Überpflanzen von den Bäumen herab, in Afrika wachsen welche in Sonnenglut und Trockenheit, im heimischen Wald haufen sie oft in Düster

und ewigem Moder. Um dort bestehen zu können, tun sie sich regelmäßig schon als Vorkeim mit Wurzelpilzen zusammen, sind aber bereit, auch mit einem Sumpf vorliebzunehmen, wo keine Mykorrhiza gedeiht, oder geradeswegs als Wasserpflanze zu vegetieren. Es gibt Arten, die sich in salzhaltigem Boden wohl fühlen, ja *L. cernuum* beweist, daß Pflanzenleben auch auf einem Planeten möglich ist, dessen Atmosphäre für uns ihrer tödlichen vulkanischen Gase halber unatembar wäre.

Dieses Gewächs lebt, als *L. volcanicum* Bl. bezeichnet, dort, wo alles Lebende schon zurückschreckt, nämlich in den Kratern der Tropeninseln, umweht von giftigen Dämpfen. Da ist es denn nicht unbegreiflich, daß dieselbe Gattung *Lycopodium* seit der Zeit, da sich die Devonschichten ablagerten, nicht mehr von der Erde verschwand.

Wie wenn unser Volk eine Ahnung gehabt hätte, was für ein ehrwürdig=phantastischer Urweltler das von ihm so viel mit Sagen umspinnene Schlangenmoos eigentlich ist, hat es das Pflänzchen so zu einer heiligen Pflanze gemacht wie seine Eichen, die, dagegen gehalten, eigentlich reine Emporkömmlinge sind. So hat es die Volksdichtung auch verstanden, das rein Nukbare des Bärlapps in glikernes Fabelgewand einzukleiden.

Jrgendein scharf zusehender Kopf hatte beobachtet, daß das gelbe Sporenpulver die angenehme Eigenschaft habe, ungemein fein und mild zu sein. Das setzte man dann in medizinische Verwendung um. Der Apotheker wälzte darin seine Pillen, damit sie nicht zusammenkleben, der Landarzt verordnete *Semen Lycopodii* zur Binderung wunder Stellen. Als Jungen lasen wir davon, daß mit Bärlappsaamen auf dem Theater die Blitze nachgemacht werden, und eifrig haben wir die gelben Kolben nach Hause getragen und das Pulver gegen ein Licht geblasen. Die „Blitze“ waren aber nicht eben imposant.

Dieses große Ansehen, das heute übrigens schon ganz verblaßt ist, war aber ein Erbstück uralter Volksitte. Schon die Ausdrücke: Drudenmehl und Hexenmehl dafür verweisen auf den Aberglauben, der ganz Sonderbares um den harmlosen Bärlapp spann.

„In alter Zeit nagelte man die Pflanze gegen Hexen an Stalltüren, hing sie in Form eines Kranzes gewunden unter dem Namen *Unruhe* (weil der Kranz sich der gleichmäßigen Dicke wegen sehr leicht und fast stets bewegte) in Schlafkammern auf und trug sie auch als Gürtel um den Leib als Abwehrmittel der Ermüdung. In Ulm nennt man sie daher auch den *St. Johannesgürtel*.“ So steht bei Söhn's darüber zu lesen. Und das gewährt schon gewisse Anhaltspunkte, besonders wenn wir noch die Lokalnamen: Drudenkraut, Truttenfuß dazu beachten. Eine Pflanze mit so viel Zauberkräft, da als Hexen- und Teufelspflanze verschrien, dort einem Heiligen geweiht, die hatte sicher mit der alten Naturreligion zu tun. Und da dem Johannes so viel zugeeignet wird, was die Altvorderen dem Donar zuschrieben, so haben wir wohl auch den Bärenfuß, womit eine etwas seltsam malende Phantasie die Zweigspitzen des *Lycopodium* vergleicht, unter die altheiligen Donarkräuter zu rechnen. Was manch Mütterlein noch heute auf der Einöde davon erhofft, ist nur ein nachhallendes Echo längstgestorbenen Glaubens.

Die Moosfarne (*Selaginellaceae*) sind ganz herabgekommene Epigonen von einstigen Weltherrschern. Wir haben nämlich alle Ursache anzunehmen, daß die Siegel- und Schuppenbäume des Steinkohlenalters (vergl. dazu S. 9) und deren Wurzelstöcke, die Stigmarien, Moosfarne sind, die sich allerdings von den heutigen dadurch unterschieden, daß sie lamiales Dickenwachstum besaßen, wodurch eben ihre Baumgestaltung ermöglicht war. Gegenwärtig paßt der Ausdruck Moosfarne so vollkommen auf diese Pflanzen, daß es Mühe hält, dem Nichtbotaniker auszureden, der gewöhnliche Moosfarn (*Selaginella*), der in zwei Arten im Riesengebirge, auf dem Felsberg, in den Scharauen um München und an den Fels- und Grashängen der Alpen noch häufig genug am Boden kriecht, sei ein Moos.

Der Moosfarn behauptet sogar unter den Farnpflanzen hohen Rang, hat er doch Groß- und Kleinsporen und einen so rückentwickelten Vorkeim, daß er in der Spore bleibt. Eine Zelle und ein Antheridium, das ist der ganze männliche Vorkeim. Auch der weibliche ist keiner vegetativen Weiterentwicklung mehr fähig (siehe Bild S. 8). Der aus ihrer Befruchtung, bei der Apfelsäure die Spermatozoiden ins Archegon lockt, entstehende Embryo wächst an einem regelrechten Träger und hat zwei Keimblätter wie irgendeine Blütenpflanze. Der feinere Bau der heranwachsenden Pflanze läßt alle Moose und Farne weit hinter sich. Es wächst der Stamm ohne Scheitelzelle, besitzt

dazu einen sehr vollkommenen Bau, wie auch die Blätter und Wurzeln den Vergleich mit denen von Blütenpflanzen nicht zu scheuen haben. Als anatomische Eigentümlichkeit sind gewisse Gelenkbildungen zu betrachten, die an den Stengeln aus einer Wucherung der Rinde entstehen, und die Hieronymus als Mittel zur vegetativen Vermehrung gedeutet hat, da die Stengel an diesen Stellen leicht zerbrechen. Es wären da also ähnliche Verhältnisse wie bei gewissen Meereskrebsen, die ihre Beine abschütteln, wenn sie ein Fisch daran packt; damit dies aber mit der wünschenswerten Schnelligkeit möglich sei, ist die Anatomie dieser Füße in den Gelenken schon von vornherein auf

das Abschütteln berechnet. Hieronymus meint übrigens auch, daß die Gelenke das Übereinanderschlagen der Seitenzweige ermöglichen sollen, wenn die Pflanze auf diese Weise einer allzu starken Austrocknung vorbeugen will.

Sehr eigenartige Sonderorgane der Moosfarne werden als Wurzelträger bezeichnet. Das sind Stelzen, die von der Pflanze oft dezimeterlang in die Erde

Moosfarne (Selaginella).

Links: *S. Guichenotii* Hier. (Ostindien). Mitte: *S. Vogelii* Spring. (trop. Afrika.)

Rechts: *S. erythropus* Spring. (trop. Amerika.)

(Naturaufnahme von H. Dopfer aus dem Münchener Botan. Garten.)

herabwachsen, um ihr vielverzweigtes Laubwerk zu stützen, die aber, wenn sie die Erde oder das Wasser erreicht haben, darein sich festwurzeln. Im kleinen bildet so der Moosfarn ein Mangrovedickicht, dessen Stützenwerk ihm sehr zustatte kommt, um sein Laub dem Lichte zuzuwenden, wenn er auch nach den Beobachtungen von Sachs und Wiesner monatelang im Dunkel, ja sogar in faulenden Flüssigkeiten unbehelligt leben kann. Es gibt an 500 Moosfarnarten, die im tropischen Regenwalde haufen, dort am Boden kriechen, manchmal an Bäumen klettern, sich durch Ausläufer oder auch kleine Zwiebelbulbillen vermehren, es also reichlich gelernt haben, anspruchslos zu sein und sich mit wenig Licht zu bescheiden. Bei dem einheimischen Moosfarn, der durch Wurzelträger kriecht, da immer neue aus den Stengelknoten sprießen, während die alten Teile abwelken, entstehen dadurch oft wahre Hexenringe, wie bei den Pilzen, weil die Tochter sprosse nach den verschiedensten Richtungen auseinanderwachsen.

Güßfches ist auch zu sagen von den Nebenblättern (ligulae) der Moosfarne, die diesen häutigen Anhängseln auch die Bezeichnung *Ligulatae* verdanken. Hieronymus erzählt von ihnen folgendes: „An älteren Blättern ist dieses Gebilde oft nicht mehr auffindbar, es ist oft verschrumpft und abgefallen, an den jüngeren aber wird man nie vergeblich nach ihm suchen. In der That ist auch die Funktion dieser *Ligula* nur eine zeitweilige. Sie ist außerordentlich frühzeitig am Blatte entwickelt, noch ehe das zu-

Die Moosfarne.

1 = *Selaginella selaginoides* Link. (Habitus nach Thomé.) 2 = Blüte von *S. helvetica* [L.]. 2a = Sporophyll mit Makrosporangium ($\frac{1}{2}$). 2b = Sporophyll mit Mikrosporangium ($\frac{1}{2}$). 3 = Die Außerflehungs-
pflanze (*S. lepidophylla* [Hook.] Spring.) in natürl. Größe, in feuchtem Zustand (a) und eingerollt (b).
(Nach Hieronymus.)

gehörige Blatt selbst seine volle Ausbildung erreicht hat. Ihre Randzellen und Papillen sind im Jugendzustande mit Schleim dicht erfüllt, und sie hat zur Zeit ihrer Lebens-tätigkeit den Zweck, die jungen Blattanlagen des Vegetationspunktes feucht zu halten.“ Wenn diese Deutung zu Recht besteht — und wir kennen keine bessere — ist die *Ligula* ein klassischer Beweis für eine vernunftgemäße Regelung des Innenlebens der Gewächse.

Diese Pflanzen bilden ihre Sporangien in wahren Blüten, d. h. in Blattsprossen, deren Blätter an ihrem Grunde kleine Säcke hervorbringen, in denen sich entweder nur wenige Großsporen (meist im unteren Teil der Blüte) oder sehr viele Kleinsporen bilden.

Bei dieser ersten Blüte stellt sich auch schon eine wahre Blütenbiologie ein. Es werden nämlich durch einen sehr sinnreich eingerichteten Mechanismus die Sporen weggeschleudert, was Goebel in seinen prächtigen Archegoniatenstudien ausführlich beschrieben hat. Von den Sporen behauptet Hieronymus, daß auch sie biologisch mehrfach bemerkenswert seien. Haken und nadelförmige Verzierungen werden als Kletteneinrichtungen gedeutet, um die Sporen durch Tiere, namentlich Landschnecken,

Ein amphibisches Brachsenkraut (*Isoetes malinverniana* Cls.) aus dem Mittelmeergebiet.
(Naturaufnahme von H. Dopfer.)

verschleppen zu lassen, die Verkieselung ihrer Schalen und ihre rote oder Orange-farbe dagegen als Schutzmittel, bzw. Schreckfarbe gegen diese Schnecken. Beobachtungen und Untersuchungen darüber wären allerdings sehr erwünscht. — Eine Eigenheit der biologisch höchst lehrreichen Moosfarne hat sie sogar in weiten Kreisen berühmt gemacht und einer Art (*S. lepidophylla*) den Namen Auferstehungs-pflanze eingetragen. Dieses mexikanische Kräutlein (vgl. Bd. I, S. 25) ist so lebenszäh, daß es jahrelang, selbst im Herbar getrocknet, nicht absterbt. Wojinowic, der dies näher untersuchte, vergleicht sie mit den bekannten Ferichorosen, die sich im trockenen Zustande auch einrollen und jahrelang so verharren können, ohne Schaden zu nehmen. Doch ist dies nur eine physikalische, nämlich eine hygroskopische, und nicht eine Lebenserscheinung. Dieses zähe Leben erklärt sich aus der großen Menge von Öl, das die ganze Pflanze durchtränkt, ihr als Reservenahrung und als Schutz vor völligem Wasserverlust dienend. — Die Gärtnerei ist an dem merkwürdigen und zierlichen Wesen nicht achtlos vorbeigegangen und hat dafür alle jene Verwendungen, die sie für Farne hat. Als Kulturregel gilt alles das, was für diese gesagt wurde.

In den norddeutschen und den Schwarzwaldseen wächst ziemlich selten*, auf dem schwarzen Schlamm Boden untergetaucht, das kleine unscheinbare Brachsenkraut (*Isoetes*). Wir müssen ihm unsere Aufmerksamkeit deshalb schenken, weil es die höchstentwickelte aller kryptogamen Pflanzen sein würde, wenn nicht *Selaginella* durch ihren Sporophyllstand, der allen an eine Blüte zu stellenden Anforderungen morpho-

* In den Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg (1862) hat M. Braun Hinde gegeben, wo und wie man das Brachsenkraut finden kann.

logisch entspricht und deshalb (z. B. von Wettstein) als der ursprünglichste Typus einer Blüte aufgefaßt wird, ihm darin überlegen wäre. Denn bei unserem Pflänzchen sind die fruchtbaren Blätter kaum von den anderen unterschieden und tragen ihre Sporangien in Taschen. Sonst aber verraten sowohl die Heterosporie, die große Reduktion der Vorkerne (die männlichen bestehen nur aus 1—2 Zellen und einem Antheridium!), wie das Dickenwachstum des Stammes den hohen Rang der Brachsenkräuter auf den Abstufungen des Lebens.

Die sehr einfache Erscheinung dürfte nach allem wohl nur eine Anpassung an das Leben unter Wasser sein. Schon die sehr einfachen, binsenartigen Blätter deuten darauf. Noch mehr der anatomische Bau, der sich ganz den wechselnden Verhältnissen anpaßt, also wahrlich nicht dem Sinn ihres gelehrten Namens (= sich gleichbleibende) entspricht. Es gibt nämlich Tiefwasser-, Untiefen-, amphibische und Landformen dieser Pflanze.

Die Tiefwasserform, die z. B. Goebel und Mer im Longemer-See in den Vogesen untersuchten, bildet nicht einmal Sporangien, sondern an ihrer Stelle Brutknospen und aus ihnen direkt kleine, sporentragende Pflanzen. Sie hat keinerlei Spaltöffnungen, dafür in den Blättern geräumige Lufthöhlen (*J. lacustris* und *echinospora* gehören hierher). Die in flachen Gewässern wachsenden besitzen schon wenige Spaltöffnungen. Die bald überfluteten, bald trocken wachsenden Brachsenkräuter haben die Zahl der Spaltöffnungen vermehrt und sich Versteigungsgewebe zugelegt. Hierher gehört die anbei abgebildete südeuropäische *J. malinverniana*.

Die Landisoeten endlich haben ganz enge Lufthöhlen, zahlreiche Spaltöffnungen, Niederblätter, Festigungsgewebe und Blattfüße.

Die Zusammenhänge zwischen Bedürfnis, d. h. Lebensweise und Bau, sind bei diesem Gewächs also dermaßen durchsichtig, daß es ein lohnender Gegenstand darauf gerichteter Sonderuntersuchungen wäre, die noch fehlen.

Die Blütenpflanzen

(Phanerogamen).

Die Entstehung der Blütenpflanzen aus Archegoniaten.

Der französische Pflanzenforscher A. Th. Brongniart (1801—1876) gab im Jahre 1843 eine Zusammenstellung der im Pariser Jardin des plantes gezogenen Pflanzen heraus und schied darin alle Pflanzen in zwei Gruppen, in Kryptogamen, das sind geschlechtslose, und in Phanerogamen, als zweigeschlechtige Pflanzen. Er erneuerte und übertrieb also die alte Anschauung Linnés, der den 23 Klassen seiner Blütenpflanzen als 24. die „Cryptogamia“ anreichte. Diese Unterscheidung ist vollständig geblieben, obschon bereits 6 Jahre nach Brongniart ihre Berechtigung unhaltbar wurde. Indem Hofmeister 1849 und 1851 nachwies, daß der Generationswechsel auch bei den Blütenpflanzen vorhanden, nur daß deren geschlechtliche Fortpflanzung viel mehr kryptogam, viel verborgener sei als die der Farnpflanze, war das gesamte Pflanzenreich als eine einheitliche, miteinander durch Verwandtschaftsbande verbundene Gruppe von Lebewesen erkannt. Warum halten wir also trotzdem an den alten Sonderungen fest? Es spricht nicht einmal das Zeugnis des Auges dafür, da die Baumfarne so entschieden palmenartig anzusehen sind, daß kein in der Botanik Unbewandelter sie für etwas anderes halten würde, oder umgekehrt die Wasserlinsen entschieden an Lebermoose und nicht an Blütenpflanzen erinnern. Die Berechtigung, einen Schnitt da auszuführen, wo auch wir ihn vorgenommen haben, erkennt man erst bei eingehender Betrachtung des Lebenslaufes der Gewächse. Keine der Pflanzen, die man als Blütenpflanze bezeichnet hat, verrät irgendwie nach außen, daß sie demselben Generationswechsel unterworfen sei wie die Farne. Es hat große Mühe gekostet, für sie die Spuren eines solchen überhaupt nachzuweisen. Man kann also die Phanerogamen gegenüber allen bisherigen Abteilungen so kennzeichnen, daß man sagt, sie seien in Stamm und Blatt gegliederte Gewächse (= Normophyten) mit verdecktem Generationswechsel.

Innerhalb dieses Begriffes ist aber immerhin noch eine Entwicklung dagewesen, die immer weiter von den Farnpflanzen abführte. Es gibt nämlich Blütengewächse, die noch Samenfäden erzeugen, dann solche, welche auch dies verloren haben, dafür aber noch Vorkeime erzeugen, wenngleich diese in der Blüte eingeschlossen bleiben, und endlich solche, bei denen der Generationswechsel völlig geschwunden scheint, weil sich die Gleichartigkeiten (Homologien) zu den weiblichen Vorkeimen noch mehr verwischt haben. Man hätte daher volles Recht, die Phanerogamen in drei Abteilungen zu zerlegen: in die ganz kleine Gruppe, die man als Spermatophyten* bezeichnen sollte, weil sie noch Spermatozoen haben, in eine Gruppe jener mit Vorkeimen, für die der Name Endoprothalliaten ganz kennzeichnend wäre, und schließlich in jene, die sich am weitesten von der ursprünglichen Bildungsweise entfernt haben. Für diese würde der engere Ausdruck Blütenpflanzen (Anthophyten) deswegen gut passen, weil nur sie im Besitze dessen sind, was eine vollkommene Blüte heißt.

Aber diese logisch geforderte Einteilung hat sich noch nicht verwirklicht, sondern man macht nur den Unterschied zwischen Nacktsamigen (Gymnospermen) und Bedecktsamigen (Angiospermen), wobei man die Samenfäden Besizenden mit denen zu-

* Der Ausdruck wurde jedoch bereits mit Phanerogamen gleichsinnig angewandt.

sammenvirzt, die noch reduzierte Vorkeime herstellen. Der Begriff der Angiospermen entspricht allerdings dem, wofür wir die Bezeichnung der eigentlichen Blütenpflanzen empfohlen haben.

Ganz verwickelt hat sich nun die ohnehin nicht leichte Darstellung dieser Abstammungsverhältnisse dadurch, daß alle diese Verhältnisse vor 60 Jahren unbekannt waren, während die den Klein- und Großsporen und den Vorkeimen entsprechenden Organe der Blütenpflanzen schon längst ihre Namen hatten. Diese sind heute bereits dermaßen im Gemeingebrauch eingebürgert, daß man sich mit Recht davor scheut, sie nun zu verpönen einer einheitlichen Namensgebung zuliebe. So sagte man von altersher Fruchtblätter (Karpelle) zu jenen Blättern, die man bei einer Farnpflanze als großsporentragendes Sporophyll bezeichnet; Staubblätter dagegen sagt man bei den Blütenpflanzen zu den Sporophyllen mit Mikrosporangien. Auch der Ausdruck Sporangien ist in der Blütenpflanzenkunde nicht üblich. Statt Mikrosporangium sagt man Pollensack, statt Kleinspore Pollenkorn. Das umhüllte Makrosporangium wurde von altersher Samen genannt und die Großspore Embryosack. Der Vorkeim wurde mit dem Namen Endosperm belegt.

Wir werden uns also von diesem Abschnitt an gewissermaßen für dieselben Dinge einer ganz anderen Sprache bedienen müssen. Um die Schwierigkeit ihrer Erlernung zu erleichtern, habe ich aus dem ausgezeichneten Handbuch der systematischen Botanik von Prof. H. v. Wettstein die beigelegte Farbentafel abdrucken lassen, auf der, angefangen von den Lagerpflanzen, bei Moosen, Farnen und Blütenpflanzen in schematischer Weise durch gleiche Farben ausgedrückt wurde, welche Organe bei den verschiedenen stammesgeschichtlichen Entwicklungsstufen einander entsprechen, d. h. homolog sind.

Ob man immer dabei bleiben wird, dem Herkommen noch den gleichen Respekt zu zollen, wie wir es in diesem Buche tun? Es dünkt mich fraglich, denn es hat sehr große Unzukömmlichkeiten im Gefolge. Es ist bei dem heutigen Zustand für den Botanikstudenten außerordentlich schwer, sich zurechtzufinden, während es ohne diese künstliche Sprachenverwirrung ein leichtes wäre und den großen Vorteil hätte, daß jedem Botaniker fortwährend das Tierhafte der Blüte, die Übereinstimmung der Geschlechts- generation mit tierischen Verhältnissen im Bewußtsein eingeprägt würde, was für die Beurteilung des Wesens der Pflanze von großem Werte wäre. Denn die Zeit ist nicht mehr ferne, da Botanik und Zoologie aufhören werden, ganz getrennte Wissenschaften zu sein, sondern in eine gemeinsame Biologie verschmelzen werden, die ja heute schon ihre Vorläufer hat.

Auf die an diesem Punkte sich einstellende Frage: warum hat sich die Geschlechts- generation bei den Blütenpflanzen so zurückentwickelt? haben wir bereits in Kürze Antwort gegeben. Wettstein, dem wir diese Antwort verdanken, sagt darüber in seinem oben erwähnten Werke: „Bei den isosporen Pteridophyten tritt die von der Gegenwart des Wassers mehr abhängige (geschlechtliche) Generation zurück, die an das Landleben angepasste bedeutend hervor; die Pflanze ist in viel höherem Maße Landpflanze als das Moos. Die Folge davon ist die an dem Sporophyten auftretende Gliederung in Stamm, Blatt und Wurzel, die Ausbildung von hochentwickelten Leitungsbahnen, den Leitbündeln. Die Umwandlung der an das Leben und die Fortpflanzung in zwei Medien angepassten Pflanze in eine Landpflanze geht noch um einen Schritt weiter bei den

heterosporen Pteridophyten. Die geschlechtliche Generation ist so reduziert, daß sie gerade noch hinreicht zur Ausbildung der Geschlechtsorgane, welche in Folge der erblich festgehaltenen Art der Befruchtung durch Spermatozoiden von der Gegenwart flüssigen Wassers abhängig ist. Die Notwendigkeit der tunlichsten Abkürzung der Geschlechts- generation bewirkt, daß der Entwicklung derselben schon im Sporangium des Sporophyten vorgearbeitet wird: der Dimorphismus der Sporangien ist die Folge davon.

„Bei den Gymnospermen endlich fällt die geschlechtliche Generation als selbstständige Generation ganz weg; dies war in dem Momente möglich, in dem die Pflanze ganz zur Landpflanze wurde, und an Stelle der Befruchtung durch im Wasser schwimmende Spermatozoiden die Befruchtung durch Vermittlung der Pollenschläuche trat. Außerordentlich belehrend ist in dieser Hinsicht das Verhalten der niedrigst stehenden unter den heute lebenden Gymnospermen, der Zykadeen und Gingkoazeen, bei denen noch Spermatozoiden vorkommen, die in einer vom weiblichen Organe ausgeschiedenen Flüssigkeit zur Eizelle schwimmen, während zur gleichen Zeit schon die erste Andeutung des Pollenschlauches in der in das Nuzellargewebe eindringenden Verlängerung des Pollenfornea sich zeigt.

„Bei den Angiospermen endlich erlangt die schon bei den Gymnospermen durchgeführte Anpassung an das Landleben in mehrfacher Hinsicht die höchste Ausbildung. Die weiblichen Fortpflanzungsorgane erhalten wirksame Schutzeinrichtungen (Fruchtknoten), die Übertragung der Pollenkörner an die zur Befruchtung geeigneten Stellen erfolgt nicht bloß durch den Wind, sondern später auch durch Tiere (Insekten, Vögel). Dementsprechend erfahren auch die mit dem Befruchtungsvorgang indirekt in Zusammenhang stehenden Organe (Blütenteile) Veränderungen.“

Mit diesen scharfsinnigen und durch alle Verhältnisse gerechtfertigten Gedanken ist eine durchaus biologische Theorie der Entstehung von Blütenpflanzen aus Lagerpflanzen entwickelt, die als einer der bedeutendsten Fortschritte der modernen Botanik bezeichnet werden muß, an der allerdings auch die Botaniker H. Müller und Kienitz-Gerloff als Vorläufer von Wettstein ihr Verdienst haben.* Es wird dadurch die historische Aufwärtsentwicklung, die Stammesgeschichte der Pflanzen, auf Umgebungsreize, in letzter Hinsicht auf die geologischen Veränderungen der Erdoberfläche zurückgeführt. Was unsere Farbentafel so hübsch versinnbildlicht, das allmähliche Heraustreten der ursprünglich ganz an das Wasser gebundenen Pflanze an das Land, das war also die Ursache, warum die Blütenpflanzen mit Wurzel, Blattkrone und Blumenpracht so geworden sind, wie sie heute sind.

Es sind damit alle ihre Einzelheiten auf Anpassungen, also auf ein Aktives in ihnen, auf ihre Reizverwertungen zurückgeführt. Sie haben alle ihre oberirdischen Organe dem Lustleben auf das feinste und vollkommenste angepaßt. Es gewährt unendlichen Reiz, nun im einzelnen zu erforschen, wie eine Anpassung die andere nach sich gezogen hat, wie sie sich gegenseitig stützen und stets die jeweils gegebene Sachlage sinnreich beantworten, soweit eine ererbte Schwerfälligkeit nicht da und dort zu Rückschlägen führte,

* Vergl. H. Müller, Der Ursprung der Blumen (Kosmos, 1877) und H. Kienitz-Gerloff, Botanik für Landwirte. 1886.

wie dies neuerdings ein jüngerer Wiener Botaniker, O. Persch, auf das lehrreichste, z. B. an den Spaltöffnungsapparaten, zeigen konnte.

So muß es denn nun auch eine „phylogenetische Morphologie und Anatomie“ geben gegenüber der physiologischen Betrachtungsweise, deren wir uns im II. Bande dieses Werkes bedienen. Sie hat uns zu lehren, daß die Organsysteme, Organe und ihre Elemente auch etwas Historisches, an ihre Vergangenheit Gebundenes, durch sie Beschränktes sind. Aus dem Zusammenwirken beider Faktoren, des Ererbten und der Neuanpassungen, versteht man erst die Wirklichkeit der vor uns gedeihenden Gewächse. So ist es denn selbstverständlich, daß die Blütenpflanzen auch im gröberen und feineren Bau durch eine Menge Übergänge, im Bau der Leitbündel usw., den Farnpflanzen angegliedert sind, auch abgesehen von den bereits betrachteten Homologien in der „Blüte“.

Vergleichende Darstellung des Querschnittes eines Mikrosporangiums von *Selaginella* (1) und eines jungen Pollensackes von *Symphytum* (2). (Nach Wettstein.)

Indem Schritt für Schritt die Fortpflanzungsorgane der sporentragenden Generation bei den Gymnospermen und Angiospermen zu reinen Geschlechtsorganen werden, mußten sich natürlich am allermeisten die Blätter umbilden, die bei ihnen die den Sporangien homologen Gebilde tragen. Immerhin läßt sich die Übereinstimmung bei diesen Staub- und Fruchtblättern, namentlich an den ersteren, noch gut erkennen.

Die Pollenkörner sind den Kleinsporen

der Farnpflanzen vergleichbar, und ein Pollensack, verglichen mit einem Mikrosporangium, läßt die Übereinstimmung sehr ins Auge fallen, wozu man das nebenstehende Bild betrachten möge. — Im anatomischen Bau des Sporophyten nehmen die Gymnospermen eine mittlere Stufe, zwischen den Phanerogamen und den Kryptogamen, ein. Die Scheitelzelle des Vegetationspunktes, sagt darüber J. Sachs, welche bei vielen Algen, den Characeen, Moosen, Farnen, Schachtelhalmen und Wasserrarnen als Urmutterzelle des Gewebes leicht zu erkennen ist*, wird, wie wir gesehen haben, schon bei den Bärlappen durch ein kleinzelliges Urmeristem ersetzt; das Scheitelwachstum der phanerogamischen Sproßachsen, Blätter und Wurzeln läßt sich nicht mehr auf die Tätigkeit einer einzigen Scheitelzelle, sondern nur auf Bildungsgewebe zurückführen.

Nur darf man hierbei sich nie die Sache so vorstellen, als ob die heutigen Blütenpflanzen von den heutigen Farnpflanzen, diese von den heutigen Moosen abstammten! Sondern was heute lebt, das sind verschieden angepasste und dadurch veränderte Nachkommen jener Vorfahren, die einst diese Entwicklungsschritte vollzogen haben. Es ist also ein ähnliches Verhältnis, wie bei der so viel mißverstandenen Affenabstammung des Menschen. Der Mensch ist nicht ein weiterentwickelter Affe, sondern Affe und Mensch sind Entwicklungszweige an einem gemeinsamen Stamm.

* Wie H. F. Freundlich neuerdings (1909) nachgewiesen hat, wächst *Adiantum Veitchianum* mittels einer meristematischen Blattkaute.

Es erhebt sich dadurch die Frage, welcher Art die wahren Vorfahren der Blütenpflanzen waren. Wo zweigten sie vom Entwicklungsstammbaum ab? Diese Frage muß durch das Studium der Gymnospermen entschieden werden, und das ist sehr schwierig, da offenbar die meisten der Übergangspflanzen ausgestorben sind, und es auch gar nicht klar ist, ob die noch lebenden Formen derselben Entwicklungsreihe angehören. Im großen und ganzen hat man aus dem Bau und Verlauf der Leitbündel bei manchen von ihnen, aus dem Blattbau ihrer Blüten- und aus ihrer Stammbildung darauf geschlossen, daß die bereits erwähnten Cycadofilices wirklich den Übergang von Farnen zu Farnpalmen darstellen.

Das verursacht jedoch, so mißlich es auch ist, feste Urteile zu wagen, noch immer bedeutend weniger Schwierigkeiten, als die stammesgeschichtliche Brücke zwischen den Gymnospermen und Angiospermen herzustellen. Der vorhin erwähnte D. Porsch sagt darüber in einer neueren Schrift*, daß uns der Embryosack der Angiospermen phylogenetisch als Rätsel erschien, daß seine direkte Ableitung von jenem der Gymnospermen ein Ding der Unmöglichkeit zu sein scheine. Man hat ja früher (Campbell) den Versuch gemacht, die eigentlichen Blütenpflanzen direkt von Farnpflanzen, namentlich von brachsenkrautartigen Pflanzen abzuleiten, aber man mußte das wieder aufgeben. In einer sehr interessanten neueren Studie zweier englischer Naturforscher (E. Arber und J. Parfin) über den Ursprung der Angiospermen** heißt es: „Nach der allgemeinen Annahme stehen die ersten fossilen Angiospermen, die in den mesozoischen Schichten auftreten, in ihren Blattabdrücken den rezenten Gattungen sehr nahe. Woher sie abstammen, blieb bis jetzt vollständiges Geheimnis. Es wurden bemerkenswerte Fossilien gefunden, welche die Gymnospermen den Farnen näher brachten, doch in bezug auf die Angiospermen fehlen ähnliche Funde bis jetzt noch. Das Gestein verharret in sonderbarem Schweigen über den Ursprung der letzteren Gruppe, die in der Vegetation der Jetztzeit eine so hervorragende Rolle spielt.“

Es ist also auch darin wieder eine seltsame Parallele zu der Tierwelt da, bei der auch gerade über den Ursprung ihres höchsten Typus, der Säugetiere, ein ähnlicher mysteriöser Nebel gebreitet ist, wie über die Herkunft der wahren Blütenpflanzen.

Dieser beunruhigende Sprung wird nicht nur durch das erzeugt, was den beiden Gruppen ihren Namen gab, nämlich daß die Nacktsamer stets einen offenen, die Bedecktsamer aber einen geschlossenen Fruchtknoten besitzen, sondern vor allem durch den eigentümlichen Bau und das Verhalten des Embryosackes der Angiospermen. Im Embryosack der Gymnospermen entsteht vor und nach der Befruchtung ein wahres Prothallium (Endosperm genannt), das eigentlich sogar noch ergrünen kann, und in dem sich Archegonien bilden (vergl. das Bild). Im Embryosack der Angiospermen gibt

Vergleich der Embryosäcke eines Nacktsamers (*Zamia*) und Bedecktsamers (*Lilium*). (Nach Porsch.)

* D. Porsch, Versuch einer phylogenet. Erklärung des Embryosackes und der doppelten Befruchtung der Angiospermen. 1907.

** In der österr. botan. Zeitschrift 1908, übersetzt aus dem Journal der Linnean Society.

es dies alles nicht, sondern es entstehen 8 Zellkerne, von denen je 3 an den Polen sich auch mit Zellwänden umkleiden. Nawaschin und nach ihm Guignard haben 1898 und 1899 nachgewiesen, daß bei der Befruchtung ein Kern aus dem Pollenschlauch mit einem der freien Kerne im Embryosack verschmilzt, woraus ein neues Gewebe entsteht, das man sekundäres Endosperm nennt. Dieser unglückliche Ausdruck ist irreführend,

denn dieses Gebilde ist etwas ganz anderes, als das Endosperm der Nacktsamer. Man hat die oben erwähnten Hilfszellen (Synergiden) und Antipoden teils als ganz vereinfachte Reste der Archegonien, teils als Vorkeimzellen gedeutet und das sekundäre Endosperm als eine verzögerte Vorkeimbildung.

Man wird jetzt verstehen, warum mit Recht von einer Kluft zwischen Nackt- und Bedecktsamern gesprochen werden kann. Wenn nun Arber und Parkin die Ansicht aussprechen, daß die Bildung der Angiospermen dadurch erzwingen wurde, daß ihre windblütigen Vorfahren zur Fremdbestäubung durch Insekten übergingen; wenn sie sich farnähnliche Vorfahren der Blütenpflanzen zurecht konstruieren, als deren Überbleibsel sie

Restaurierte und vereinfachte Längsschnitte durch einen Zapfen (1–2) von *Benettites*. In Fig. 1 ist einer der männlichen Wedel in voller Reife ausgebreitet. (Nach Wieland.) 2 = Zapfen von *Benettites*. 3 = Längsschnitt durch einen Blütenstand von *Benettites*. (Nach Solms-Laubach.)

4 = Schema der hypothetischen Blüte einer Hemiangiosperme. (Nach Arber und Parkin.)

die aus Jura-, Trias- und Kreideablagerungen bekannte farnpalmenartige Pflanze *Benettites* ansehen, so spricht zwar manches, aber durchaus nicht alles zu ihren Gunsten. Ein Blick auf die rekonstruierten Fortpflanzungsorgane von *Benettites*, deren Bild wir ihrer Arbeit entnehmen, zeigt, daß sie fiederige Staubblätter besaßen, die allerdings sehr an die Sporenblätter von Farnpflanzen erinnern (man vergl. *Botrychium*, S. 37). Die weiblichen Zapfen (Strobilus) dagegen haben einen Bau, der wieder an die Angiospermenblüte erinnert. Die beiden Engländer glauben, daß man sich die aus-

gestorbenen Vorfahren der Blütenpflanzen ganz ähnlich wie diese Benettiten vorzustellen habe, und sie geben sogar ein Bild (siehe S. 58), wie sie sich die Blüte der von ihnen erdichteten Urblütenpflanze mit ihrer abgekürzten Sproßachse, den Blumenblättern und Groß- und Kleinsporenblättern vorstellen.

Das alles ist zweifelsohne sehr interessant und auch belehrend, aber nicht zwingend. Der fatale Umstand, daß in den Kreideablagerungen die verschiedensten höheren Blütenpflanzen gefunden werden, vordem aber nicht eine einzige noch auch eine Übergangsform, versetzt uns in die unsicherste Lage. Den Gedanken, welche H. v. Wettstein, der dem Gegenstand in seinem Handbuch ebenfalls eine lange Untersuchung widmet, darüber äußert, und die darauf hinauslaufen, daß als die einfachsten bedecksamigen Pflanzen *Casuarina* und die *Monochlamydeen* (also Zweikeimblätterige) zu gelten haben und nicht Spitzkeimer, wie sie allenthalben in den das Engler'sche System befolgenden Lehrbüchern angenommen werden, dieser Auffassung, welche *Casuarina* von dem Typus der Gymnospermen ableitet, geht es auch nicht anders. Sie häuft Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten an, kann aber mangels fossiler Reste keine Sicherheiten gewähren.

Eine sehr interessante Theorie, um diese Schwierigkeit hinwegzuräumen, stellte neuerdings der uns schon bekannte Wiener Botaniker Porſch auf.* Er entdeckte nämlich bei einer der am meisten fortgeschrittenen Formen der Nacktsamigen, bei dem im südlichen Österreich wachsenden Meerträubchen (*Ephedra*), daß eine dessen Archegonien unmittelbar umgebende Zellschicht nichts anderes darstelle, als in der Entwicklung frühzeitig zurückgebliebene Archegonanlagen, welche die noch gut Entwickelten ernähren helfen. Er wußte aus dieser Entdeckung mit Geschick das allgemein Bedeutsame herauszulesen und auf sie seine „Archegontheorie“ aufzubauen, die er selbst mit folgenden Worten darstellt: „Der typische Embryosack der Angiospermen besteht aus zwei polar gelagerten, als Archegonien gedeuteten Zellgruppen, deren jede aus 4 Zellen, resp. Kernen besteht, nämlich zwei Halszellen, der Eizelle

Schematische Darstellung der Stammesgeschichtlichen Entwicklung des Embryosacks der Bedecksamigen aus dem der Nacktsamigen Pflanzen.

1 = Embryosack von *Sequoia* mit zahlreichen Archegonien, in denen durchgehend ez = Eizelle, ek = Eifern, hz = Halszellen, bk = Bauchanallernen bedeutet. 2 = Embryosack der Zypressen. 3 = von *Ephedra*. Die Zahl der Archegonien vermindert sich, ebenso der Vorkeim (p). ps = Pollenschlauch bei der Befruchtung. 4 = Ein hypothetisches Zwischenstadium mit nur drei Archegonien. 5 = Embryosack von *Balanophora* mit zwei Archegonien. Vom dritten sind nur Bauchanallernen vorhanden. 6 = *Casuarina*. Die zwei Archegone haben sich polar gelagert. 7 = Embryosack der Erle (*Alnus*). Nur ein Archegon ist mehr befruchtungsfähig. 8 = Normaltypus der Angiospermen. (Nach Porſch.)

* D. Porſch, Versuch einer phylogenetischen Erklärung des Embryosacks, usw. Jena 1907.

und dem Bauchkanalkern. Der Ciapparat mit dem oberen Polkerne stellt das obere, der Antipodenkomplex mit dem unteren Polkerne das untere Archegonium dar. Die Eizelle entspricht der Eizelle, die Synergiden entsprechen den Halszellen, der obere Polkern dem Bauchkanalkern des oberen Archegons. Im Antipodenkomplex entspricht eine der Antipoden, zumeist wohl die mittlere, der Eizelle, die beiden übrigen entsprechen den Halszellen, der untere Polkern dem Bauchkanalkern des unteren Archegons.

„Diese Auffassung findet nicht nur in der Physiologie der Einzelbestandteile des Embryosackes ihre Bestätigung, sondern sie erklärt auch sowohl die Achtzahl der Kerne als die polare und entwicklungsgehistorische Gleichheit beider Embryosackhälften. Weiter gibt sie eine sichere Grundlage für das phylogenetische Verständnis des Vorganges und Produktes der doppelten Befruchtung.“

Noch klarer macht er seine geistreiche Anschauung durch eine Reihe von Bildern, die wir anbei wiedergeben, und die so vielsagend sind, daß sie uns weiterer Erläuterungen überheben.

So hat sich denn das, was anfänglich am meisten Schwierigkeiten bereitete, nun gewissermaßen als die Brücke über die Kluft zwischen Gymnospermen und Angiospermen erwiesen. Mag diese Anschauung haltbar sein oder nicht, wozu es vor allem weiterer zellentfunder Arbeiten bedarf, jedenfalls können wir nicht mehr daran zweifeln, daß sich die höheren Blütenpflanzen durch gymnosperme Formen aus farnähnlichen Gewächsen noch vor der Zeit der Kreidemeere entwickelt haben, wahrscheinlich veranlaßt durch den Übergang von der Wind- zur Insektenbestäubung. Angesichts der Wichtigkeit solcher Einsicht bin ich dessen gewiß, daß kein Naturfreund, noch viel weniger ein Lehrer mir diese weitreichenden Erörterungen verübeln wird, haben sie doch noch die sehr belehrende Nebenfrucht getragen, uns an einem Beispiel zu zeigen, in welchem Geist, mit welchen Methoden moderne Systematik forscht, und wie turmhoch sie über ihren einstigen Begriff des „Heumachens“ hinausgekommen ist.

Die erste große Gruppe der Blütenpflanzen, nämlich die Nacktsamigen (Gymnospermen), gliedert sich in mehrere Klassen, die gleichzeitig verschiedene Reihen der Entwicklung darstellen. Solche sind die Zapfen- oder Farnpalmen (Cycadinae) und Elefantenohrbäume (Ginkgoinae), die noch durch den Besitz von Samenfäden ausgezeichnet sind, die bereits ausgestorbenen Benettitinae und Cordaitinae, über deren stammesgeschichtliche Bedeutung bereits das Nötige gesagt wurde (vergl. S. 58 und 64), schließlich die Nadelbäume (Coniferae) und die ganz kleine Klasse der Gnetae, die ebenso merkwürdige Übergangsformen zählt, wie etwa im Kreise der Farnpflanzen die Rattarnzungen.

Mit der Lebensweise und dem sonst Wissenswerten all dieser Pflanzen wollen wir uns nun beschäftigen.

Die Farnpalmen (Cycadinae).

Unter diese Überschrift gehört nur eine einzige Familie gleichen Namens, deren etwa 83 Vertreter man ihrem Äußeren nach ebensogut für Baumfarne wie für Palmen halten könnte. Sie sind die Überbleibsel einer mächtigen Pflanzengesellschaft, die während der Jurazeit das Bild vieler Landschaften bestimmt zu haben scheint. Heute beleben sie Südamerika, Australien und namentlich auch das südlichere Asien, von wo ihre schönen wedelartigen Blätter, in Massen getrocknet, neuerdings von findigen Japanern zu uns verschifft werden, weil wir sie als „Friedenspalme“ auf die Särge legen. Die Asiaten sind weniger poetisch, sondern essen die jungen Blätter als Gemüse und das stärke- mehlreiche Mark der Blätter als Sago (daher auch der falsche Name Sagopalme für *Cycas circinalis*).

Man kann sich den Anblick dieser schönen Gewächse in allen Gewächshäusern verschaffen. Sie sind so dankbar, daß sie sich sogar zur Zimmerpflanze eignen. Der Naturfreund bewundert ihre prachtvolle Krone gefiederter lederiger Blätter (siehe das Bild), der Wissenschaftler dagegen beachtet namentlich die sonderbare Art ihrer Wurzel- und Stammbildung und ihrer Blüten. Die Wurzeln sind bei vielen Farnpalmen in ihren

Indische Farnpalme (*Cycas circinalis* L.) aus dem Münchner botanischen Garten. (Aufnahme von S. Dopfer-München.)

Geweben durchsetzt mit Blaualgen, worüber wir uns noch gar keine befriedigende Erklärung geben können. Außerdem strecken sie kurze Verzweigungen aus der Erde heraus. Sie sind also wohl Atemorgane (Pneumathoden, vgl. darüber Bd. II, S. 246) und bezwecken eine reichere Sauerstoffversorgung des Wurzelsystems. Die Stämme sind meist mit den Resten der Blattstiele und dazwischen erwachsener Niederblätter besetzt wie bei den Baumfarnen, was ihnen ein höchst malerisches Ansehen verleiht, wie an dem beigefügten Lichtbild von *Cycas* ersichtlich. Das Innere dieses Stammes entbehrt zwar nicht des Kambiums, wohl aber der Holzgefäße im neu zuwachsenden Holze. Insofern könnte man von einem gewissen Übergange zu den höheren Blütenpflanzen sprechen.

Besonders merkwürdig sind die stets eingeschlechtigen Blüten, denen Blumenblätter völlig abgehen. Die männlichen erinnern stark an die Zapfen der Nadelbäume und heißen auch so. Die weiblichen Blumenblätter sind am Ende des Stammes (so

Die Blütenstiele der Farnpalmen.

1 = Weiblicher Zapfen von *Ceratozamia robusta* Mqn. (Original). 2 = Fruchtblätter von *Cycas revoluta*. (Nach Campbell.) 3 = Ein Pollenblatt aus dem Zapfen von *Macrozamia* mit Pollensäcken. 4 = Ein Fruchtblatt derselben Pflanze. 5 = Ein Fruchtblatt von *Cycas circinalis*. (Nach Wettstein.) 6 = Reifes Spermatozoid ($\frac{1}{2}$). (Nach Webber.) 7 = Längsschnitt des Samens. (Nach Richard.) 8 = Reifer Samen von *Cycas circinalis*. (Nach Richard.) 9 = Längsschnitt durch die Frucht.

bei *Ceratozamia* [siehe Bild]) auch zapfenförmig, meist aber weiche, dicht braunwollige, gefiederte Blätter. Dann tragen sie einige Samenanlagen, die offen daliegen oder — im Falle zapfenartiger, weiblicher Blütenstände — durch ein Klaffen der Schuppen an dem Zapfen für die vom Winde herbeigewehten Pollenkörner zugänglich werden. Die männlichen Zapfen scheiden in einer Menge von Pollensäcken (s. das Bild) eine ganz außerordentliche Menge Pollen ab, dessen sich der Wind bemächtigt. Und nun erfolgt ein biologisch geradezu klassischer Vorgang.

Die weibliche Blüte sondert in der Samenanlage einen Flüssigkeitstropfen ab, wenn die glatten Pollenkörner in eine von ihr spontan hergestellte „Pollenkammer“ eingedrungen sind. Das Pollenkorn wieder erzeugt

sowohl einen kurzen Schlauch, mit dem es sich gewissermaßen befestigt, als auch zwei große, kugelige Spermatozoiden, die mit schraubigen Wimper-

fränzen in dem Tropfen umherschwimmen und, wie uns japanische Naturforscher, namentlich Ikano, sichergestellt haben, mit dem Eiern der weiblichen Zelle verschmelzen. Durch diese Befruchtung entstehen rotfleischige Früchte (Bild) mit hartem Kern.

Ein sonderbar Gemisch von urweltlich=fremdartigen und gewohnt pflanzenhaften Erscheinungen ist dies, zugleich ein unermüdlicher Mahner, des pflanzlichen Innenlebens nicht zu vergessen! Keine Selektion, keine physikalisch=chemischen Gesetze erklären das Zusammenspiel, durch das sich eine Farnpalme befruchtet. Nur ihre zielstrebige, zweckhafte Selbsttätigkeit, die sich dazu wahrhaft raffinierter Mittel bedient. Die an das Land gestiegene Pflanze mit dem Wasser angepasster Befruchtung bereitet sich selbst das Wasser, worin ihre Samenfäden schwimmen können! Das mag uns die wertvollste Einsicht sein, wenn wir in einem Palmenhause vor der mächtigen Pflanze stehen.

Elefantenohrbaum hat man seiner eigenartig geformten Blätter halber ein Gewächs bezeichnet, das der Fachmann mit einem japanischen Wort Gingko nennt, weil es im Jahre 1730 von Ostasien in den botanischen Garten von Utrecht gelangte. Seitdem wird dieser Baum vielfach angepflanzt; gut gedeiht er allerdings nur in milderem Klima, so in Heidelberg, auf der „Frankfurter Rizzapromenade“, in Karlsruhe, in Klein-Flottbeck bei Hamburg, im berühmten Schloßpark zu Harbke, in den Anlagen von Halle, im Wiener botanischen Garten und sonst

Zweig mit Früchten von *Ginkgo biloba* L.

noch an manchen Orten. Man hat diesen schönen, bis 37 m hoch werdenden Baum bis in die neueste Zeit zu den Koniferen gerechnet. Er galt zwar auch dort seiner fächerförmigen Blätter halber, die man als zusammengewachsene Nadeln deutete, als Ausnahme. Seitdem aber der japanische Botaniker S. Hirase im Jahre 1898 sicherstellte, daß auch der Pollenschlauch dieses Baumes noch immer zwei Spermatozoiden entläßt, die mit ihren schraubigen Wimperkränzen denen der Farnpalmen sehr ähnlich sind, mußte man für dieses Gewächs, als Vertreter einer schon in der Steinkohlenzeit reichentwickelten Pflanzengruppe, einen besonderen Platz im System schaffen. Interessanterweise war noch zur Tertiärzeit Gingko ein weitverbreiteter Waldbaum in Europa, dessen Spuren in

Franken, Hannover, England, Italien, aber auch in Grönland und auf der Insel Sachalin vorhanden sind. Also auch er ist eine untergehende Übergangspflanze, die man allerdings, weil sie winterhart ist, bei uns als Parkzierbaum reichlich vermehren könnte. Seine eigentliche Heimat ist gegenwärtig China und Japan; doch auch dort soll der Elefantenoherbaum nach Gilg nur einen einzigen größeren Bestand in Süchina gegenüber der Insel Formosa bilden. Sonst wird er kaum wild angetroffen, wohl aber in China um Tempel in Sainen angepflanzt, wie Kämpfer schon vor zwei Jahrhunderten berichtete. Bunge hat bei Peking Bäume dieser Art gesehen, die er auf 2000 Jahre schätzte, und deren Stamm 13 m Umfang hatte. Die Japaner pressen aus seinen Samenkernen Öl oder essen die einer grünlichen Kirsche gleichenden Früchte geröstet. Reisende berichten, daß man diese „Pa-Kwo“ auf allen Märkten Ostasiens kaufen könne, da sie als „Magenmittel“ zum täglichen Nachtisch gehören. Die japanische Gartenkunst versteht es übrigens, den Baum in einer Zwergform als Topfpflanze zu erziehen, und solche waren auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1889 auch bei uns zu sehen. Die europäischen Exemplare und Gartenvarietäten sollen von einem männlichen Baum abstammen, den man über England in der Mitte des 18. Jahrhunderts nach Montpellier brachte. Dieser blühte im Jahre 1812 reichlich, trug aber erst Früchte, als man ihm einen Zweig eines weiblichen Baumes einpfropfte.

Die Nadelhölzer (Coniferae).

Dem aufmerksamen Leser wird es bereits aufgefallen sein, daß aus unseren bisherigen Darstellungen, wenn auch unausgesprochen, eine ganz bestimmte Beziehung zwischen der Verbreitung und der Geschichte der Pflanzen offenkundig wurde. Schon daraus allein läßt sich auf die Gültigkeit des Entwicklungsgesetzes schließen, daß in älteren Erdzeitaltern einfachere Pflanzen tonangebend waren, in jüngeren dagegen die höherentwickelten. Man erinnere sich, daß Farnpflanzen und Urschachtelhalme dem Steinkohlenwald das Gepräge verliehen, daß nach Abrollen der unermesslichen Zeiträume, die wir bis zur Juraperiode rechnen müssen, dann auf weiten Strecken die Farnpalmen vorherrschten. Es wurde auch bereits erwähnt, daß Ginkgo uralt sei und im Tertiär den halben Erdball besiedelte. Nun können wir diesen Faden aufnehmen und sagen, daß untergeordnet bereits in den allerältesten Schichten, welche Pflanzenreste beherbergen, nämlich im Devon, am häufigsten aber in den Steinkohlen, Überbleibsel von Laubbäumen gefunden wurden, die sehr an Ginkgo und an die heutigen Nadelhölzer erinnern. Diese sogen. *Kordaiten* sind nicht untergegangen. Schon in permischen Ablagerungen mischen sich zwischen sie *Norfolkfichten* (*Araucaria*); in der Kreide kommen dazu echte Fichten, Zedern, Wacholder, Mammutbäume, und diese sterben nicht mehr aus, sondern überziehen weite Länder, werden zu herrschenden Waldformationen, so wie wir sie heute gerade in Nord- und Mitteleuropa, Asien und Amerika kennen.

KOSMOS
GESELLSCHAFT
DER NATURFREUNDEN
STUTTGART

Araucaria imbricata Pav.

als Freilandgewächs bei Walzenhausen (Schweiz) am Bodensee. 12 m hoch.

(Aus den Mitteilungen der deutschen dendrologischen Gesellschaft 1905.)

Das ist die Herkunft des uns so liebvertrauten Nadelwaldes, der seit der Jura-periode die nördlichen Länder der alten Erdteile noch viel weiter gegen den Pol hin besiedelt zu haben scheint. Diese gegenwärtig meist baumlosen Wüsteneien der Arktis scheinen sogar, wenigstens nach der Ansicht Englers, die wahre Heimat der europäischen Koniferen gewesen zu sein. Von da aus haben sie sich verbreitet bis zu ihrer Südgrenze, dem Mittelmeer, den asiatischen Steppen und amerikanischen Prärien, über die allerdings viele Formen dort hinausgelangt sind, wo mächtige Gebirge ihnen das Überspringen der zu trockenen Klimagürtel ermöglichten. So konnten dann Nadelhölzer im neuen Weltteil bis Guatemala und Kuba vordringen. Dagegen fehlen sie im heißen Afrika fast gänzlich. Wohl aber haben sie das Pamirgebiet („Dach der Welt“) in Asien und die von ihm ausstrahlenden Gebirgszüge bis Japan und Melanesien erobert. Diesem nördlichen Verbreitungsbezirk gegenüber könnte man leicht einen südlichen aufstellen, der teilweise auch durch andere Gestalten, nämlich Araukarien, gekennzeichnet ist und seinen größten Herd in Neuseeland und Tasmanien hat, von dort aus sich weithin verbreitend. Araukarien sind dann auch in Brasilien heimisch, und Nadelbäume bilden Niesenwälder entlang der

Männliche Blüten der Schwarzkiefer (*Pinus Laricio*).
Links vor dem Stäuben, rechts verstäubt.
(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Seineck-Alzey.)

ganzen Andenkette. Mit Recht kann man also sagen, es gibt nur noch wenig Pflanzengruppen, die in solchem Maße wie die 350 Nadelholzarten das Antlitz der Erde bestimmen.

Systematisch kennzeichnen sie sich durch eine Reihe von Eigenheiten, die allerdings so gemeinbekannt sind, daß sie hier gar nicht eingehender erörtert zu werden brauchen. Es gehören zu ihnen durchgängig Holzgewächse, deren Blätter, angepaßt den xerophilen klimatischen Verhältnissen, nadelförmig umgestaltet sind. Da sie mittels eines Kambiumringes wachsen, erreichen ihre Stämme große Dicke, ja, es gehören sogar die dicksten aller Bäume hierher. Der anatomische Bau ihrer Stämme unterscheidet sie von den höheren Blütenpflanzen, denn ihr nachwachsendes Holz enthält keine Gefäße, sondern nur getüpfelte Tracheiden. Dagegen sind die meisten Nadelhölzer durch reichliche Harzbildung ausgezeichnet, was sich jedem Naturfreunde kundtut durch den wunder-vollen Duft, den die Kiefernheide und das Tannicht im Lenz ausströmen.

Ihre besondere Eigenheit wird jedoch durch die Betrachtung der Blüten kund. Was sie von dem nahestehenden Ginkgo und allen sonstigen Nacktsamigen scheidet, ist die Umbildung der Mikrosporangien zu reinen Pollenschläuchen. Sie sind die ersten

Landpflanzen, welche die innemische Wiederholung der Wasseranpassungen endgültig verloren haben. Sonst erinnert manches an ihnen an die Farnpalmen. Die männlichen Blüten (Bild S. 71) sind einfach. Blütenstände mit schuppen- oder schildförmigen Pollenblättern tragen so zahllose Pollensäcke, daß aus ihnen zur „Föhrenblüte“ eine gelbe Wolke über den Wäldern schwebt, und unser Volk von „Schwefelregen“ fabelt. Die weiblichen Blüten, über deren morphologische Deutung ein noch ungeschlichteter, aber auch wenig interessanter Streit herrscht, sind vielfach zapfenähnlich. An einer Achse stehen Fruchtblätter, welche die Samenanlagen tragen, in denen zwei oder viele Archegonien erkennbar sind. Statt trockener Beschreibungen von Gestaltungen wollen wir in diesem Werke, das ja neben einer Flora zu benützen ist, lieber nur reichlich Bilder geben, an denen man sich belehren kann, dafür das eingehender beschreiben, was sich nicht zeichnen läßt, nämlich die Lebensvorgänge.

Da sticht allem voran ins Auge, daß die Befruchtung ganz eigentümlich verläuft. Sie dauert viele Monate lang. Der Pollen wird durch den Wind verweht, die Samenanlage fängt ihn durch einen ausgeschiedenen Flüssigkeitstropfen auf: die letzte Erinnerung an das Wasserleben der Vorfahren! Aber der Pollenschlauch wächst nur ein Stück, wie um sich zu befestigen. Und erst ein Jahr später unterbricht er seine Ruhe, wächst geradeswegs auf die Eizelle los und befruchtet sie. Warum das so ist, harret noch seines Deuters.

Die Früchte der Nadelbäume kennt jedermann, und in ihrer Mannigfaltigkeit als Zapfen oder Beeren (Wachholder!) sollen sie noch bei den Einzelbeschreibungen vorgeführt werden.

Über die systematische Einteilung der ganzen Gruppe ist viel gestritten worden. Als Hauptgruppen kennzeichnen sich jedenfalls die Eibenartigen (Taxoideae) und Kiefernartigen (Pinoideae), wie sie Eichler unterscheidet, wobei die letzteren wieder in Zypressenartige (Cupressineae) und Tannenartige (Abietineae) zerfallen. Die neueren stammesgeschichtlich forschenden Systematiker zerlegen die Gruppe in die drei Familien: der Eiben-, Kiefern- und Zypressenartigen, wobei sie davon ausgehen, daß gewisse eibenartige Bäume (namentlich die japanische *Cephalotaxus*) engen Anschluß an Ginkgo verraten, während an den Zypressen so viel Neues und Selbständiges auftritt, daß man daran gedacht hat, sie ganz von den Nadelbäumen abzutrennen. Wir wollen uns in diesen Streit, aus dem wenig Praktisches herauszieht, nicht mischen, sondern nun Leben und Bau der wichtigeren Nadelbäume in der Ordnung betrachten, die das Eichler'sche System befolgt. In dieser Reihenfolge gebührt der erste Platz der

Zimmertanne (*Araucaria* [Bild Bd. I, S. 172 und Tafel]).

Unseren Eltern waren diese Gewächse nie gesehene Fremdlinge, von denen sie höchstens wußten, daß sie in Australien, Neukaledonien und Neuseeland hohe und dichte Wälder von der elegantesten Gestaltung bildeten. Besonders *A. excelsa* R. Br., die nach ihrer Heimat benannte Norfolk-tanne, wurde in alten Reisebeschreibungen immer wieder mit besonderer Bewunderung hervorgehoben. Durch die Expedition von Martins nach Brasilien, die unser botanisches Wissen so erweiterte, wurden wir auch mit den brasilianischen *Araucarien*, den „Pinheiros“ der Spanier, näher bekannt. So wie die neuholländischen Bäume dieser Art dem Australier durch ihre Früchte

Nahrung liefern, so sind auch die überkopfgroßen Zapfen der südamerikanischen *A. imbricata* Pav. mit ihren zahlreichen, großen, mandelartig schmeckenden Samen für den Eingeborenen von Chili eine wahre Brotsfrucht. Alles das tritt aber zurück vor der Bedeutung, welche die Zimmertanne für uns in dem letzten Jahrzehnt als Gärtnerpflanzling gewonnen hat. Als vor beiläufig 25 Jahren die ersten dieser kleinen „Schmucktannen“ in den Handel kamen, galten sie als sehr große Rarität und wurden teuer bezahlt. Von einem englischen derartigen Bäumchen lasen wir, daß es mit 500 Mark bezahlt wurde. Heute gibt es keine Blumenhandlung und wenig Wohnungen, wo es nicht gepflegt würde. Am beliebtesten ist die *A. excelsa* der Südsee und *A. compacta*; doch sind jetzt bereits viele Arten und noch mehr Kreuzungen im Handel. Sie sind im höchsten Grade dankbar, wenn man sie in sandiger, halbblehmiger Erde, lustig und halbschattig, bei ziemlich häufigem Spritzen pflegt. Aber meist lassen sie als Zimmerpflanze traurig ihre Zweige hängen. Das ist stets die Folge zu hoher Zimmertemperatur, auch von zu wenig Lüften. Mehr als -10° R. verträgt die Pflanze im Winter kaum. Man denke

Im Kiefernwald der Mark. (Aus dem Verlage von Feuer & Kirmse, Berlin.)

doch daran, daß die Araukarien in den „antarktischen Regenwäldern“ ihrer Heimat in einem rauen Klima leben, das an Nebelreichtum und Bewölkung noch England übertrifft.

Deshalb gedeiht die große, bis 40 m hohe *A. imbricata* Pav. (s. die Tafel) in Europa am besten auch in England, wo einzelne Exemplare in Gärten bis 20 m Höhe herangediehen sind. Man sieht den eigenartigen, schwarzgrünen Baum, dessen kandelaberartig sich abstreckende Äste und Zweige dachziegelartig von breitschuppigen Nadeln bedeckt werden, in Deutschland am häufigsten noch in den Gärten von Holstein (Riel!), um Hamburg, auch im Heidelberger Schloßpark und am schönsten im deutschen Kon-

ferenschmuckfästlein, nämlich auf der einzig schönen Insel Mainau im Bodensee, wo bis 6 m hohe Bäume gedeihen. Das sind aber doch nur Zwerge gegen die englischen Araukarien. In den berühmten Gärten der Orchideenzüchter J. Veitch & Sons zu London, auch in einzelnen Schlössern finden sich dort ganze Alleen dieser Bäume, die sich freilich mehr merkwürdig als schön ausnehmen. Dort blüht dieser Baum auch, wozu er bei uns (ebenso wie die Zimmertannen) nicht gelangt, weshalb er durch Stecklinge vermehrt wird. Versuche, die neuerdings Prof. Büchting und Prof. Goebel mit ihnen unternommen haben, erwiesen eine sehr ansehnliche Vermehrungskraft, durch Bildung von Ersagknospen. Nur findet sich dabei nie ein Aufrichten von Seitenzweigen, wenn man den Gipfel eines dieser Bäume entfernt, wie dies an Tannen und Fichten gemeinbekannt ist; es erwacht vielmehr einfach ein „schlafendes Auge“ im Gipfelfstummel und wächst zum neuen Gipfel aus.

Es profitiert übrigens auch unser Gewerbe von den Araukarien, denn das zu Firnis verwendete Dammarharz und Kaurikopal, das in Neu-Seeland stellenweise wie Bernstein aus der Erde gegraben wird, weil es verlegten Stämmen in ganzen Knollen entströmt, stammt ebenfalls von verwandten Arten (*Agathis*), die man als Dammar- und Kaurifichten bezeichnet.

Neben den edelzierlichen Gestaltungen dieser schönsten Nadelhölzer erscheint die heimatische Kiefer (*Pinus silvestris* L.) geradezu gemein. Aber es wäre einseitig, ihr deshalb alle Schönheit absprechen zu wollen. Die Kiefernheide, wie sie uns Reistkow und Liebermann auf so vielen Bildern vor Augen zu führen wußten, und Fontane und Grottewig so herzenswarm beschrieben, birgt dermaßen intime, freilich auf das Beschauliche und Lyrische gestimmte Schönheiten, daß wir sie in dem deutschen Landschaftsbilde nicht missen wollten. Wenn im Verglühen der Abendsonne die kräftig rotbraunen Stämme wie angezündet zum blauen Himmel flammen, und die dunkle Nadelkrone ein leichtes, goldiges Flirren umsäumt, nimmt der Föhrenwald den Vergleich mit jeder Landschaft auf. Welch ausdrucksvolle Physiognomie hat dazu der Einzelbaum! Ich habe genug Pinien gesehen, um die Keckerei wagen zu dürfen, daß ich behaupte, die deutsche Kiefer, im Alter knorrig und abenteuerlich, erreicht einen so malerischen Schattenriß, daß an sie der ungefüge, oft plumpe Charakterbaum der Italiener nicht heran kann. Oder gar die herrlichen Schwarzföhren (*Pinus nigra* oder richtiger *P. Laricio austriaca* Höss.) des Wienerwaldes! Sie sind für den Landschaftsgärtner unbezahlbar durch das Malerische ihrer Erscheinung. Übrigens nimmt auch die gewöhnliche Kiefer bei freiem Stande oft dieselbe schirmartig gewölbte Krone an wie die Pinie (*P. pinea*).

Unter allen europäischen Nadelbäumen hat die Kiefer den größten Verbreitungsbezirk. Nach Willkomm, dessen forstliche Flora noch immer eines der besten Werke über diesen Gegenstand ist, fehlt sie in Europa nur im ungarischen Tiefland, im Bakonyerwalde und in den Zentralkarpathen; ferner in Slawonien und dem Banat, außerdem auf den dänischen Inseln. In den Gebirgen steigt sie bis 1200 m (Schwarzwald) und 1600 m (Bayern), in der Schweiz bis 1950 m, in Spanien sogar bis 2100 m hinauf. In Norddeutschland, Polen, im westlichen Rußland, südlichen Schweden ist sie der wichtigste Waldbaum, aber auch in Österreich, Nordfrankreich und in Süddeutschland (Franken!) bildet sie Niesenwälder. Die Forstbotaniker berechnen nach Hausrath

ihren Anteil am deutschen Waldbestand auf 44,6 %. Im deutschen Osten werden ihr 70 % zugemessen, in Norddeutschland eine Waldfläche von mehr als 2½ Millionen Hektar (die Gesamtwaldungen Deutschlands bedecken 14 Millionen Hektar). Da kann man denn mit Recht sagen, daß die Kiefer einer unserer wichtigsten Waldbäume und, als Herrscher einer ganz ausgeprägten Pflanzengenossenschaft, auch einer der wesentlichsten Bestandteile des deutschen Naturbildes ist. Da sie an den Boden sehr geringe Ansprüche stellt, hat man ihr den ärmsten Sandboden allenthalben zugewiesen. Es sind also meist echte Sandpflanzen auch ihre unzertrennlichen Genossen, die sich gar wohl unter ihrem Schirm befinden, da er lichtdurchlässig und locker ist, was wohl jeder schon beseufzt hat, wenn es galt, in Sonnenglut lange durch den Kiefernwald zu wandern. Dadurch ist eine ganz ausgesprochene Pflanzengenossenschaft entstanden, die allerdings mit der ähnliche Ansprünge machenden Heidevegetation vielfach verschmilzt. Prof. Höck, einer der besten Kenner dieser Kiefernengenossenschaft, sagt darüber folgendes: Auf gar zu dürrtem Boden, wo der Mensch durch zu häufiges Zusammenharken der Nadeln den Unterwuchs vernichtet, sind diese Wälder pflanzenarm. An anderen Stellen aber zeigen sie sowohl viel Unterholz als namentlich viele Stauden. Hier treten neben echten Waldpflanzen vielfach Arten auf, die auch außerhalb des Waldes auf Sandboden vorkommen. Von diesen sind z. B. die Küchenschellen, die Kartäusernelke, der Berg-Haarstrang (*Peucedanum*), die Sand-Strohblume, mehrere Wintergrünarten und der ährige Ehrenpreis der Kiefer so ähnlich in ihrer Verbreitung, daß man sie gleich dem nickenden Taubenkropf als Kiefernengenossen bezeichnen kann. Auch der Wacholder tritt in Norddeutschland oft mit der Kiefer zusammen auf, und an sumpfigen Orten steht neben ihr oft auch der Sumpf-Porst.

Schwarzföhre (*Pinus nigra*) im Wienerwald bei Mödling.
(Naturaufnahme von Fr. A. Mayer-Wien.)

P. Graebener unterscheidet in seinem neuen Werk über die Pflanzenwelt Deutschlands zwei Typen der Kiefernengenossenschaft, je nachdem der Wald trocken oder

moosig feuchter ist. Im ersteren sind kaum einige Graspolster, Habichtskräuter und Strohblumen zu finden, im moosigen Wald aber sprießt reiches Unterholz, Heidekraut, Besenginster, Heidel- und Brombeeren, Farn, Seggen und dazwischen alle die leuchten- den Nelken, Orchideen, Wolfsmilchkräuter, kleinblütigen Bergißmeinnichte, die den Kiefernwald so poetisch machen. Nur dürfen wir hierbei nicht vergessen, daß die Föhre außergewöhnlich vielgestaltig ist. Auf dem Sande der Mark bildet sie andere Gestalten als in den süddeutschen Mooren (Bild Bd. I, S. 408), wohin auch das Strummholz (*Pinus montana*) eine verhugelte Sumpfform entsendet.

J. Scholz sagt in seinem wertvollen Werk über die Pflanzengenossenschaften Westpreußens: „Bei dem Anschmiegen der Kiefer an so verschiedenartige Bodenverhältnisse läßt sich ein großer Formenkreis erwarten. Das ist tatsächlich der Fall. Auf dürrer Sand- und Heideboden zeigt sie einen knickigen, kümmerlichen Wuchs. Ähnlich wie bei der Fegföhre im Hochgebirge liegen die unteren Äste fast dem Boden auf, und ebenso wie bei den krüppelhaften Formen der Moorkiefer bleiben die Nadeln kurz. Die seltsamsten Krüppelformen auf Sandboden habe ich bei Thorn auf den Bäderbergen beobachtet. Nicht zu verwechseln mit dieser Hungerform ist die Trauerkiefer mit Hängeästen und die sogen. Schlangenkiefer mit wenig verzweigten Hauptästen.“ An den deutschen Küsten dagegen leben wieder besondere Strandkiefern, die z. B. auf den Dünen der Frischen Nehrung mit ihren niederliegenden Ästen eine Art Sturmanpassung darstellen.

Es ist also leicht begreiflich, daß der Mensch diesen schmiegamen und genügsamen Baum in seiner großen Bedeutung als „Kulturpflanze“ bald erkannte, und Schmeil hat ganz recht, wenn er meint: Ohne die Kiefer wären weite Teile von Europa, die heute dichte Wälder sind, zum größten Teil öde Wüsteneien, in denen kaum ein Mensch leben könnte. In ihrem Bau bietet diese Pflanze jedoch nichts besonders Anziehendes oder Eigenartiges. Sie ist nur durchaus bescheidenen und ärmlichen Lebensverhältnissen angepaßt. Ein richtiger Proletarier unter den Bäumen. Das sieht man schon ihrem übermächtigen Wurzelwerk an. Der Förster wird es bezeugen, wie schwer sich Kiefern verpflanzen lassen, haben sie doch 24 mal mehr Wurzelfasern als die Tanne. Der karge Boden zwingt die Pflanze zu größeren Anstrengungen, woraus man deutlich ersehen kann, daß das Bedürfnis auch dann zu Formgestaltungen drängt, wenn die Ernährungsverhältnisse keinen Luxus gestatten. Also ist das Innenleben, die Empfindung von Bedürfnissen der wahre Regulator, nicht aber das Vorhandensein von Nahrungstoffen. Um der Ernährung und der Wasserversorgung nachzuhelfen, verbünden sich die Wurzelenden der Kiefer übrigens auch so reichlich mit Wurzelpilzen (*Mykorrhiza*), daß dadurch die Pflanze auch ohne Wurzelhaare bestehen kann. Dafür ist sie nun so abhängig von dem Pilz, daß steril erzogene Kiefernkeimlinge bei einem Versuch nach zwei Jahren eingingen.

An den Kiefernstämmen fällt besonders die sich ablösende Schuppenborke auf. Der Baum sprengt sie eigentlich selbsttätig ab, indem er von Zeit zu Zeit in den tieferen Schichten seiner Rinde neue Korkschichten anlegt. Dadurch werden die bisher ernährten äußeren Rindenschichten von der allgemeinen Ernährung abgesperrt. Sie werden zur Borke, die nun durch den Wechsel der Feuchtigkeit bald anschwillt, bald einschrumpft und somit ihren Zusammenhang mit dem Baum so lange lockert, bis sie abfällt.

Der stockwerkartige Bau dieser Bäume ist so bekannt, ebenso seine Entstehung durch die quirlförmige Anordnung der Zweige, daß wir uns dabei wohl nicht aufzuhalten brauchen. Da die langen, bekanntlich zu zweien in einer Scheide steckenden Nadeln sehr lichtempfindlich sind, ist es von vornherein zu erwarten, daß die Gestaltung der Kiefer bis ins Kleinste aus Lichtbedürfnissen erklärt werden kann. Es gewährt großen Genuß,

Der feinere Bau der Kiefer.

1 = Junger Kurztrieb der Schwarzföhre mit Niederblättern und den zwei Laubblättern. 2 = Derselbe völlig entwickelt. 3 = Triebspitze von *P. silvestris* mit weiblichem Blütenstand. 4 = Zweig mit Kurz- und Langtrieben mit männlichen Blüten. 5 = Weibliche Blüte der Schwarzföhre mit der Fruchtschuppe und den Samenanlagen. 6–7 = Reifer Zapfen von *Pinus silvestris*, geschlossen (6) und offen (7). 8 = Reifes Fruchtblatt von innen mit den geflügelten Samen. (Nach Willkomm und Wettstein.)

auf einer Wanderung einmal die Wirklichkeit mit dem zu vergleichen, was wir zur Befriedigung eines solchen Bedürfnisses für zweckentsprechend halten würden. In Betracht kommt hierbei auch noch die Anpassung an schwierige Wasserversorgung, wie sie sich namentlich in der Nadelbildung, der lederartigen Oberhaut, der Anordnung und Einsenkung der wasserabgebenden Spaltöffnungen ausdrückt. Julius Wiesner erzählt, daß er in hochnordischen Gegenden wunderbare direkte Anpassungen der Kiefern zur besten Ausnützung des Sonnenlichtes beobachtet habe. Die stets niedrigstehende Sonne des nördlichen Norwegens mache es den Bäumen zum Bedürfnis, ihre Gestalt zu verändern, um das ohnedies nicht zu reichliche Licht auszunützen. Und so wird dort, z. B. um Drontheim, die Föhre pyramidenartig wie eine Zypresse!

Daß die Nadelbäume immergrün sind, ist keine besondere Anpassung, sondern eigentlich nur der Mangel einer solchen, nämlich eines plötzlichen allgemeinen Laub-

falles. Xerophile Bäume brauchen eben einen solchen nicht. Doch darf man deshalb nicht glauben, daß die Kiefer seiner ganz entbehre. Sie wirft im September ziemlich viele Nadeln ab; weniger auch noch im Oktober und November. Die einzelne Nadel lebt dabei 2—3 Jahre lang. Dieser unvollkommene Laubfall ist eigentlich für die Pflanze recht unzweckmäßig, denn im nordischen Klima vermehrt er die Gefahr des Zusammenbrechens unter den Schneelasten, worunter alle Nadelhölzer schwer leiden.

Sehr anziehend ist das Blütenleben unseres Baumes. Wie alle Pflanzen, blüht er erst dann, wenn für ihn das intensivste Wachstum vorüber ist. So wie der Mensch erreicht auch die Kiefer ihr mannbares Alter erst nach dem 15. Jahr, unter den unnatürlichen Verhältnissen des Kunstwaldes allerdings erst mit 30—40 Jahren. Jeder Baum bringt dann Samenanlagen und Staubblätter hervor und überläßt die Befruchtung dem Winde. Das zwingt ihn zu großer Blütenstaubverschwendung. In ganzen gelben Wolken steht der Pollen im Mai über der Kiefernheide und erfüllt sie mit süßlichem, feinem Duft. Vom Regen zusammengeschwemmt, bedeckt er manchmal als Schwefelregen weithin den Waldboden. Die Blüten sind außerordentlich einfach. Die Staubblüten bestehen aus einer senkrechten Achse mit daran im Kreise stehenden Staubblättern. Ihnen entrieseln Pollenkörner, die ein beliebtes Schaustück mikroskopischer Studien sind. Sie tragen eine prächtige „Windanpassung“ am Leibe, nämlich zwei häutige Ballonsäcke, die sie schwebend erhalten. Im Innern aber bieten sie dem Auge Zeugnis für das Nachleben uralter Verhältnisse. Denn kurz vor dem Bestäuben sondert sich im Pollenkorn eine kleine, wandständige Zelle ab. Was ist sie? Ein einzelliger Vorseim!

Die Samenblüten stehen als rötliche Zapfen mit braunen Schuppen an der Spitze von Trieben und sind aus Fruchtblättern zusammengesetzt. Auf deren Oberseite ruhen ganz ungeschützt je zwei Samenanlagen. Die Bestäubung und später die Verbreitung der Samen werden von der Pflanze durch die verschiedensten merkwürdigsten Mittel bewirkt und gesichert. Wenn man Zweifel daran hat, daß die Bäume ihr Leben durch eigene Tätigkeit „von logischem Charakter“ sichern, dann prüfe man die hier erzählten Angaben über die Samenbildung der Kiefer nach. Es ist vor allem auffällig, daß alle windblütigen Gewächse in Massen beisammenstehen. Die „Waldbildung“ scheint wenigstens teilweise auf blütenbiologischen Bedürfnissen zu beruhen. Samen- und Staubblüten sind dabei stets an der Peripherie des Baumes so lustig angebracht, daß sie jederzeit vom Winde bestrichen werden können. Der dadurch auf die Samenanlagen gewehrte Pollen wird festgehalten. Die Hülle der Samenknospe hat zwei Zipfel, die sich später einwärts krümmen, dadurch Pollenkörner vor sich herschieben und eng an die Samenknospe anpressen. Diese wieder scheidet nach den Angaben von Strasburger noch ein wenig Feuchtigkeit aus, worauf das Pollenkorn plagt, und sein Keimschlauch dem Ei entgegenwächst. Aus unbekannter Ursache dauert es aber 13 Monate*, bis die Befruchtung erfolgt. In dieser langen Zeit bleibt die Samenblüte jedoch nicht schutzlos. Die Schuppenblätter, an denen die Samenanlagen sitzen, wachsen so, daß sie sich eng aneinanderschließen; sie sondern Harz aus und verkleben den ganzen Zapfen. Dieser wieder führt bestimmte Bewegungen aus! Er senkt sich mit der Spitze nach unten,

* Ist diese Periodizität noch ein Nachklang des Generationswechsels?

feine Schuppenblätter verholzen, werden braun, und im dritten Jahre ist das ganze Gebilde reif. Die Schuppen klaffen dann auseinander, weil sie eintrocknen, und vor uns hängt der allbekannte Kiefernzapfen. Jetzt erweist sich der Nutzen der vorhin unverständlichen karpotropen Bewegung. Weil der Zapfen nach abwärts hängt, fallen die reifgewordenen Samen sofort heraus. Sie haben eine flügelartige Haut; der Wind ergreift sie, wirbelt sie ein Weilchen umher. Dann keimen sie, nachdem sie noch lange Zeit in der Erde geruht haben, und bringen ein neues Kieferpflänzchen mit 5—6 Keimblättern hervor.

Krummhölz hügel Landschaft im steirischen Hochgebirge (Hochschwabgebiet). (Naturaufnahme von J. E. Peters + Graz.)

Wie klar spricht sich doch in diesen Vorgängen die Eigenkraft und Eigenart des Innenlebens der Kiefer aus! Mit kleinen Bewegungen da und dort, stets am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit einigen chemischen Umwandlungen, weiß dieser Baum so viel zustande zu bringen, wie das geschäftige Tier mit seinen vielen Anstrengungen um die Pflege seiner Jungen. Fast will es einen bedünken, daß, wenn zwei auf verschiedenen Wegen dasselbe erreichen, jener der intelligentere sein muß, der dazu die einfacheren Mittel anwendet.

Wenn man durch solches Forschen gewissermaßen in ein persönliches Verhältnis zu diesem schönen Baum getreten ist, tut es doppelt leid zu vernehmen, daß man die Kiefer in barbarischer Weise verstümmelt, um sie nutzbar zu machen. Namentlich in Österreich werden die Kiefern durch beständige Schnitte geschwächt (Bild Bd. I, S. 535), um sie zu möglichst reichem Harzfluß zu reizen; auch im östlichen Deutschland gab es eine eigenartige Kiefernutzung, die nicht weniger schädlich gewesen wäre, wenn sie sich

allgemein verbreitet hätte. Gemeint ist hiermit die sogen. Beutnererei. Oberforstmeister Hölweg, ein genauer Kenner dieser Sache, schreibt hierüber: „Besondere Erwähnung verdient hier die Art, wie durch Jahrhunderte und bis gegen das 19. Jahrhundert hin die Bienenzucht in den Wäldern der Weichselgegenden betrieben worden ist. Die Bienenwohnungen — Beuten genannt — wurden durch Einhauen von Höhlungen in die stärksten stehenden Kiefern hergestellt, 4—5 Fuß lang, 1—1½ Fuß breit, vorn durch ein plattes Holzstück mit Flugloch geschlossen, welches meist mit Weidenruten vorgebunden wurde; oft mehrere solcher Beuten übereinander auf demselben Stamm. Die Personen, denen diese Nutzung oblag, bildeten eine geschlossene Beutnerzunft. Welch eine Verwüstung zunächst an den stärkeren Baumstämmen diese Beutnererei zur Folge gehabt hat, erhellt aus dem Mitgetheilten leicht, auch wenn man annehmen will, daß für die Beuten zunächst die schadhafte Stämme gewählt worden sind. Zu den beliebten Mitteln der Beutner gehörte es weiter aber auch, daß man durch Ausbrennen der Waldungen, im Interesse der Verbesserung der Bienenweide, den Heidekrautwuchs zu verjüngen suchte.“

Solche unsinnigen Waldverwüstungen, die sicher manche Öde in Ostelbien geschaffen, haben nun zum Glück denn doch aufgehört. Es blieben ja der Kiefer ohnedies noch genug der Feinde unter den niederen Pilzen und den Insekten (Monne, Kiefernspinner, Borkenkäfer, Maikäfer), die um so verheerender auftreten, auf je größeren Flächen wir reine Kiefernbestände erziehen. Wir gönnen dem Baum natürlich auch nicht seine natürliche Lebensdauer, die etwa 600 Jahre beträgt, wobei die Kiefer bis über 40 m Höhe erreichen kann, wozu sie aber nur im Mischwald (z. B. zwischen Inn und Salzach) gelangt. Übrigens wurde sie von jeher stark für alltäglichste Bedürfnisse ausgenützt, war sie doch der Kienbaum, was im althochdeutschen Fackelbaum bedeutet und sich noch in Kienspan, eigentlich auch in ihrem von Kienföhre abgeleiteten norddeutschen Namen Kiefer ausspricht. Auch die süddeutsche Bezeichnung Föhre leitet nach Kaingießers Etymologie der Blütepflanzen auf Feuer, also auf denselben Begriff, zurück. Auch im lateinischen Namen (*Arbor pinus* schon bei Plinius) lehrt in *pix*, *picis* das Pech wieder, so wie im antiken Griechenland Pinie und verwandte Arten (*P. Laricio halepensis* L.) der Zunft der Fackelmacher ihr Werkmaterial lieferten.* Heute lebt eine ganze Industrie vom Terpentin, Geigenharz (Kolophonium), dem Teer, Kienruß und Pech, die aus dem Kiefernharz gewonnen werden, und unzählbar sind die Anwendungen der Produkte des anspruchslosen Baumes, von dem das dauerhafte Holz, ja auch die Rinde (zum Gerben) und die Nadeln (Waldwolle) Wert besitzen.

Die Gattung *Pinus* besitzt etwa 70 Arten, die sich alle nur auf die nördliche Halbkugel beschränken, und unter denen viele durch Eigenart ausgezeichnet sind. Einige davon, wie die Aleppo-Kiefer (*P. halepensis* Mill.) oder die Schwarzkiefer, haben wir schon erwähnt, andere sind für den Europäer bedeutungslos, da sie nur in Nordamerika ausgedehnte Wälder bilden, so die Weihrauchkiefer (*P. Taeda* L.), die Wichpinie der Amerikaner (*P. ponderosa*) oder die Weimutskiefer (*P. Strobus* L.), die man bei uns vielerorts in Gärten, aber auch waldmäßig (z. B. im Hagenschieß bei Pforzheim) anzubauen versucht hat, deren Holz aber bei uns wertlos sein soll. Trotzdem hat der Baum im deutschen Walde bereits Bürgerrecht erworben.

* Die besten Fackeln gewinnt man aus den Wurzeln der Kiefern.

Die Zuckerkiefer (*P. Lambertiana* Doupe) im westlichen Nordamerika verwirklicht die idealsten Schlaraffenträume eines Kindermärchenwaldes, denn ihr Stamm schwigt süßes Harz aus, aus dem man ohne weiteres Bonbons bereiten kann (kalifornisches Manna). Und dazu ist dieser Wunderbaum noch der Riese seiner Gattung, mit Stämmen von 4—6 m Durchmesser und an 100 m Höhe, deren Zapfen fast $\frac{1}{2}$ m lang werden. Damit aber leckere Gemüter die Amerikaner nicht allzusehr um diesen Zuckerbaum beneiden, sei hiermit verraten, daß auch unsere Lärche ein ähnliches Manna liefert, das man sogar industriell verwertet. Besonders nahe stehen uns von den Kiefernarten drei Bäume, die jeder in ihrer Art der Landschaft den Charakter aufprägen. Das sind die Zwergkiefer, die Pinie und die Urve. Eine treffliche Sonderschilderung hat der erste, die er als Bergföhre (*Pinus montana*) bezeichnet, in neuerer Zeit der gemüthvolle Verfasser des Pflanzenlebens der Alpen, Prof. C. Schröter, angedeihen lassen. Er beschreibt dieses merkwürdige Gewächs als einen in der Schweiz ungemein vielgestaltigen Baum, der in seinem Wuchs alle Übergänge von der hochstämmigen Baumform bis zum niedrigen, vielästigen Busch mit auf dem Boden liegenden Ästen zeigt. Wir haben ihm, den der Bayer Latsche, der Schlesier Krummholz nennen, in Bd. I, S. 156 u. ff. schon

Wetterarve in den Alpen. (Nach einer Photographie.)

eine ausführlichere Darstellung gewidmet und können uns hier auf das beschränken, was von seinen allgemeinen botanischen und sonstigen Beziehungen merkwürdig ist. Die Bergföhren entsenden ihre Vertreter bald hochstämmig, bald ganz verkümmert auch in die Hochmoore (Bild und Näheres Bd. I, S. 496), dort aber sind sie bedeutungslos. Wichtig und nützlich wird dieser Baum nur als Fegföhre, in der Höhenregion der Gebirge (in den Alpen von 1500—2300 m), wo er besonders auf Kalk und Urgestein überall als wahrer Gürtel die Waldgrenze umschließt. Meist ist sie dünn gesät, hängt über die Nasenbänder der Steilabsätze heraus, erklettert in zerstreuten Tirailleurketten dunkler Gestalten die Felsabhängen oder festigt die Geröllmassen der Schutthalden.

Seltener bildet sie ausgedehnte Bestände. Nach allen Seiten liegen in einem solchen die Äste schlangengleich am Boden, der von den aufgehäuften Generationen der schwer verweslichen Nadeln mit einem dicken Humuspolster bedeckt ist. Die elastischen aufstrebenden Äste mit ihrem schweren, dunkelgrünen Nadelwerk sind übermannshoch.

Die ältesten Zirbeln Deutschlands auf dem Schachen bei Partenkirchen im bairischen Hochland. (Nach F. Stüfers Baumbuch.)

Einen anderen Charakter als diese dichten, das Geröll überwuchernden Buschwälder zeigt die Krummholzhügellandschaft auf den Alpenweiden. Die Bergföhren bilden an solchen Orten die nach allen Seiten ausladende Bekrönung von Hügeln, die 2—3 m Höhe und 5—8 m Durchmesser haben; ihnen mischen sich Alpenrosen, Zwergwacholder, Rauschbeere und Aftmoose bei (Schröter) (Bild S. 73).

Für den Alpler ist dieses zähe Dickicht von außerordentlichem Werte als Schutzholz, vor allem gegen Lawinen. Die Äste der Bergföhre sind so biegsam, daß sie die Schneestürze unbeschädigt über sich ergehen lassen können, ja sogar deren Wucht mildern. Außerdem schützen sie den Wald in der rauhen Höhe vor dem Erfrieren, den Stürmen und nicht zuletzt vor dem Weidewieh, solange der junge Nachwuchs dessen noch bedarf.

In der Region des Krummholzes erwachsen auch die Riesen-

arven oder Zirbeln (*P. Cembra* L.) der Alpen, die merkwürdigerweise im Himalaja völlig die Rolle des Krummholzes übernehmen. Der älteste Bestand wahrer Riesenbäume befindet sich auf dem Schachen im Werdenfeller Ländchen (Bild); noch ansehnlichere Gaine hegt die Schweiz in Höhen zwischen 1500—2300 m (z. B. am Weg von Niffelalp nach Findelen, bei Arolla im Gringertal), wo die Bäume, bis 22 m hoch, ganz groteske Formen dadurch annehmen, daß zu gleicher Zeit zahlreiche Äste senkrecht emporwachsen. Das ist immer ein sicheres Zeichen, daß ein solcher Baum in sein Greisenalter getreten ist, und gewöhnlich fängt er um diese Zeit an, auch schon von oben her abzusterven, lebt aber immerhin 800 Jahre lang. Überall aber ist er im Rückgang begriffen; zu schwer erträgt er in der Jugend das Weidewieh, und da sein sehr gleichmäßiges Holz sich trefflich schnitzen läßt (die Berchtesgadener und Grödenener

Schneigwaren sind meist aus Arvenholz), verkürzt man auch das Leben der den Jugendgefahren entronnenen Arven. Da der Baum mit seinen prachtvollen Pyramiden in den wenigen Parks, wo man ihn hegt (z. B. im Nuepark zu Cassel), viel bewundert wird, sollte ihm wenigstens der Landschaftsgärtner in rauhen Tagen ein sicheres Asyl bereiten.

Es ist ein gewaltiger Sprung, wenn man sich nach den düster phantastischen Zirkeln den Charakterbaum der süditalienischen Landschaft vorstellt, ohne den die „Ansicht von Napoli“ nur halb so schön, und der nach ihm benannte Monte Pincio zu Rom nicht wieder zu erkennen wäre.

Die Pinie (*P. pinea* L.) ist ein altheiliger Baum der Südländer. Im Kult des Dionysos durfte er ebensowenig fehlen als Thyrsosstab mit dem Pinienzapfen darauf, den das antike Rom sogar ins Riesige vergrößert als architektonisches Motiv verwendete, wie die Aleppo-Kiefer, mit deren Harz der Wein von altersher bis heute in Italien haltbar gemacht wurde. Für uns verknüpft sich die

Römischer Garten mit Pinen. (Nach einem Gemälde von F. Knab [1834–1902].)

Pinie ausschließlich mit Italien, sie ist aber am ganzen Mittelmeer und darüber hinaus bis zum Kaukasus verbreitet und bildet in Spanien noch mächtigere Wälder, als die dem Archäologen hochberühmte „Pineta“ südöstlich von Ravenna, die zwar noch über 30 km lang, aber doch nur ein Schatten ihrer einstigen Herrlichkeit ist.

Die so vielbesungene schirmförmige Krone der Pinie ist offenbar eine Windanpassung, denn der Baum stellt sich mit der Schmalseite dieses Schirmes regelmäßig gegen die herrschende Windrichtung. — Der Italiener, der nicht so sentimental ist wie die Gäste seines Landes, schätzt den Baum auch, aber nicht so sehr aus ästhetischen Gründen als der „Pignoli“, d. h. der wohlschmeckenden Samen, halber, wie auch der Alpler dem malerischen Anblick der Arven die eßbaren „Zirkelnüsse“ vorzieht.

„Cedro digna opera“. Dieser Spruch der Alten ist so verschollen, wie die Kedros thaumaste, die wunderbare Zeder der Griechen und das unbezahlbare „heilige“ Zedernholz der antiken Welt. Die Kunst der ägyptischen Einbalsamierer

Zedern im Libanon. (Nach einem alten Kupferstich.)

hat ihr Geheimnis mit ins Grab genommen, welcher Art die Zedernspäne waren, durch die sich die Mumien so unverweslich erhielten. Steinkostbares Buch wird mehr in einem Kästchen von Zedernholz vor Wurmfraß geschützt, kein Reicher mehr im Zedernsarge begraben; untergegangen sind die wunderbaren Wälder des Libanon. Wir wissen nicht einmal, welche Pflanze es war, von deren Dauerhaftigkeit das Altertum seine Fabeln spann. Was man heute Zedernholz nennt, stammt vom virginischen Wacholder, und wahrscheinlich haben die wenigen Bäume, die der Orientreisende als heilige Zedern des Libanon und Zeitgenossen Salomos anstaunt, gar nichts zu tun mit den Zedern der Bibel, von denen Ezechiel spricht und das Gesetz des Moses und die Naturkunde des Pli-

nus und Theophrastus. Andere Nadelhölzer: Wacholder (*Juniperus excelsa*, *phoenicea* u. a.), *Callitris* und sonstige Arten waren es, von deren Wohlgeruch und Haltbarkeit Römer und Griechen so entzückt waren, und wir wissen nichts Bestimmtes, welche Konifere das Holz geliefert hat zu dem Prachtbau des Salomonischen Tempels, den phönizischen Schiffen, dem Dianatempel zu Ephesus und zu der ersten christlichen Kirche zu Jerusalem. Das ist die Wahrheit über die hochberühmte Zeder.

Die Araber zeigen allerdings geschäftig im Libanon den einzigen „Zedernwald des Königs Salomon“, aber es ist um ihn nicht anders bestellt, als um die Fußstapfen Adams auf Ceylon oder das Grab der Julia zu Verona. Dort und noch schöner im jilizischen Taurus und auf der Insel Zypern gedeihen sehr alte und mächtige lärchenähnliche Nadelbäume, die offiziell den Namen *Cedrus Libani* Barr. führen. Verschiedene Botaniker, Sir J. D. Hooker, J. v. Rußeger und Berggren, haben Beschreibungen ihres klassischen Standortes gegeben, auch der Dichter Alphonse Lamartine hat eine etwas süßliche Schilderung dieser lebenden Ruinen der Antike verfaßt, deren Alter man auf 2000 bis 3000 Jahre schätzen muß. Er sah im Jahre 1832 im Tale Eden (der Name, den Ezechiel im gleichen Zusammenhang erwähnt, ist ganz sicher erst durch die Bibel aufgenommen) noch 500 bis 600 Bäume. Heute ist ihre Zahl im Salomons-hain auf 400 zusammengeschrunpft, von denen nur 13 uralte sind und etwa 2—4 m Durchmesser haben.*

Die Zussleu-Zeder im Pariser Jardin des plantes. (Nach einer Photographie.)

„Die Araber aller Sekten“, sagt der Dichter, „haben eine traditionelle Anbetung für diese Bäume. Sie schreiben ihnen nicht nur ewiges Leben zu, sondern auch eine Seele, welche weise, vorhersehend durch Instinkte und menschliche Intelligenz, prophezeit mit den Bewegungen ihrer mächtigen Äste. Sie halten sie für göttliche Wesen in der Gestalt von Bäumen.“

Jedenfalls ist so viel wahr, daß diese Bäume sehr mächtig und edel geformt sind, aber auch, daß sie schon deswegen nichts mit Salomo zu tun haben konnten, da ihr Holz ganz weich, daher völlig ungeeignet zu Bauten ist.

Die türkische Regierung läßt sie seit langem bewachen und hat so das Verdienst, Naturschutz schon zu Zeiten geübt zu haben, da sich das Abendland nur im Zerstören von Naturdenkmälern gefiel. Angeblich soll aber auch diesem Edelsinn eine andere Ursache zugrunde liegen. Die Bäume sind das Ziel einträglicher Wallfahrten, und in

* Lamartine spricht übrigens nur von 7 Riesen.

Den ewigen Kämpfen zwischen Muselmännern und christlichen Maroniten sollen die letzteren die geschätzten Pflanzenheiligen schon des öfteren vandalisch verwüstet haben. Das klingt dem Menschenkenner nicht ganz unwahrscheinlich, und so schließt dieser kleine Auszug in die botanische Kulturgeschichte so, wie er begonnen: mit der Zerstörung von Illusionen.

Sind aber die geschichtlichen Traditionen, die sich daran knüpfen, auch zerflattert, so vermag uns das herrliche Gewächs, von dem einige ausgezeichnete Exemplare in Gärten der Londoner Umgebung, auch am Rhein stehen, trotzdem schon durch seinen Wuchs, mit den breitausladenden Ästen und dem garten Nadelwerk, anzuziehen. Ganz Paris kennt und besucht eine prachtvolle Zeder dieser Art, die im Jardin des plantes auf einem kleinen Hügel grünt. Auch sie hat ihre Geschichte. Bernard de Jussieu, der berühmte Direktor des Gartens, soll sie als Sämling in seinem Gut von England herübergebracht haben. Vielleicht verdient auch das nicht mehr Vertrauen als die Erzählungen der mundfertigen Wächter hoch oben am Dahr-el-Kodib, im Zedernhain des Salomo.

Wir haben bereits erwähnt, daß der Belaubung nach die Zeder sehr an die Lärche (*Larix*, in acht Arten, davon *L. decidua* Mill. [früher *europaea* genannt] bei uns einheimisch) erinnert. Diese Übereinstimmung geht so weit, daß man sie einst in Hannover im Glashaus zog, weil man sie für eine Libanonzeder hielt, und auch der Botaniker bei seiner Diagnose nichts anderes sagen kann als: „Alles wie bei *Cedrus*, nur Nadeln im ersten Herbst abfällig.“ Daran erkennt der Bergwanderer für gewöhnlich die Lärche, daß sie, die sonst im Wuchse von ferne an eine Fichte erinnert, im Lenz ein wunderzart hellgrünes Nadelwerk anhat, das im Oktober so feurig vergilbt, daß es goldenen Sonnenschein an den Bäumen vortäuscht. Warum wirft die Lärche jährlich ihr Laub ab? Die übliche Erklärung, die sagt, weil ihre Nadeln schlechte Schutzrichtungen gegen übermäßige Transpiration haben, will nicht recht befriedigen, und ihr sollte nachgeforscht werden. Jedenfalls wird dadurch dem Baum

Lärchengruppe (*Larix decidua*) in Tirol.
(Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

die Mühsal auferlegt, jährlich das Zwei- und Dreifache an Blattsubstanz zu erzeugen, wie etwa die Fichte. Vielleicht ist sie dadurch ins Hintertreffen geraten, so daß sie in den Alpen und Karpathen und in den beide verbindenden Gebirgen, wo sie einheimisch ist, nur selten in größeren Beständen (z. B. in Graubünden), sondern meist eingesprengt in kleinen Gruppen gedeiht. Oder ist es ihr überaus großes Lichtbedürfnis, das aus ihrem ganzen anmutigen lockeren Bau spricht, das sie so wählerisch sein läßt? Sie hat ihre Nadeln an dem Gipfel ihrer Kurztriebe in Büschel gestellt, dagegen sehr spärlich angeordnet an den Langtrieben. Diese zwei Begriffe sind für sehr viele Nadelbäume kennzeichnend, bei keinem aber so ausgeprägt, wie gerade bei der Lärche. Sonst ist ja dieser Baum nicht eben empfindlich; die sibirische Lärche geht bis an die Grenzen, die dem Baumwuchs gesteckt sind, und bildet z. B. auf Sachalin nur noch Krüppelbüsche. An sich scheint sie ganz dem Gebirgsleben angepaßt zu sein, denn trotzdem sie ziemlich raschwüchsig ist, hört sie in der Ebene schon mit 60—80 Jahren zu wachsen auf, verkrüppelt sogar, während man aus den Alpen 6—800 jährige Lärchen kennt. In die Ebenen geht sie bei uns auch nicht freiwillig*, sondern wird seit dem 18. Jahrhundert vielfach angepflanzt. Sie hat aber nicht viel Freude bereitet und ist dort widerstandslos gegen Insekten und Pilzfeinde (besonders *Peziza Willkommii* R. H.).

Dagegen ist sie in der kühlen Hochluft der Gebirge ein unüberwindlicher Riese; nicht umsonst hält der Alpler ihr Holz (Rotlärchenholz) für das dauerhafteste unter allen Nadelhölzern und verwendet es demgemäß. Und dort, im Zermattal oder im Oberinntal, gedeiht die Lärche auch bis zu 53 m Höhe und 8 m Stammumfang, und nur dort gibt sie ihr feinstes Produkt, die „Lärchenglorie“, d. h. den aromatischen und teuren venezianischen Terpentin. — Neben diesem eleganten und feingliederigen Baum verblaßte die Schönheit der einheimischen Tannen und Fichten, wären ihnen nicht durch den Zauber des deutschen Weihnachtsfestes unverlierbare Gemütswerte zu eigen geworden. Fichte und Tanne kennt, so unglaublich das klingt, der größere Teil der Städter nicht auseinander. Zu ihrem Troste möge es ihnen gesagt sein, daß die beiden auch tatsächlich nicht durch Merkmale voneinander getrennt sind, die sofort in das Auge fallen. Im allgemeinen unterscheidet man von der Ferne die beiden dadurch, daß die Tanne gedrungenen Wuchs und einen abgestumpften Gipfel hat, während die Fichte spitz und schlank ausläuft. Auch ist die Tanne stets dunkler benadelt als ihre Rivalin. Beim Näherkommen ergibt sich als weiterer Unterschied, daß die Fichte eine rote (daher Rottanne genannt), die Tanne dagegen eine glatte, grauweiße Rinde hat. Und bei eingehender Untersuchung erweisen sich die besten Merkmale. Nicht ganz sicher ist es, sich darauf zu verlassen, daß die Fichte spiralig gestellte, allseitswendige Nadeln hat, die Tanne dagegen sie „scheitelt“, d. h. in zwei Rämmen anordnet (daher der Name *Abies pectinata*), weil die letzten Nadeln der Zweige der Fichte gewöhnlich auch gescheitelt sind. Das beste Unterscheidungsmerkmal jedoch sind die zwei weißen Wachsfstreifen auf der Unterseite der Tannennadeln.

Von den beiden ist die Fichte (*Picea excelsa* Link.) die gemeinere, nicht nur, weil sie weniger lang lebt, sondern auch in dem Sinn, daß sie heute überall verbreitet ist.

* Nach Conwentz soll sie jedoch an der russischen Grenze (Kreis Rypin, Gouv. Plock) urwüchsig wachsen.

Sie ist jetzt der Charakterbaum des deutschen Mittelgebirges. Ihre natürliche Verbreitung erstreckt sich über ganz Europa (von den Pyrenäen bis Finnland), das ihre wahre Heimat zu sein scheint. Andere Arten, wie die Schwarz- oder die Schimmelfichte, die Kiefer des Himalaja und die orientalische Fichte, besiedeln Amerika und Asien, aber stets nur auf der nördlichen Halbkugel. Sie liebt felsigen Boden der Urgebirge am meisten, ebenso ein regenreiches und düsteres Klima; sie zieht sich daher am liebsten an die Nord- und Westabhänge unserer Berge bis zu etwa 1200 m Höhe. Angesichts dessen, wie üppig sie im tageweiten Mexier in den Sudeten gedeiht, nimmt es wahrhaft wunder, daß nur ein Teil dieser Gebirgsreihe und nicht der ganze Zug „Fichtelgebirge“ heißt.

Im Fichtenwald (Motiv aus der Romintener Heide).

Der Fichtenwald ist ein eigentümliches Gemisch von Lieblichem und Langweiligem. Der einzelne Baum ist ja entzückend geformt, im dichten Schluß des Kunstwaldes jedoch verliert er alle seine unteren Äste, und da seine 8—13 Jahre lang lebenden, sehr dicht sitzenden Nadeln ein schweres Dach wölben, sind die militärisch ausgerichteten Fichtenforste an den meisten Orten um so mehr ein gar trauriges Bild, als in ihrem Düster kaum einige Moose gedeihen. Die trockenen Nadeln bedecken hoch den Boden, zu dem kaum der Regen herabdringt, und nur in den Lichtungen siedelt sich eine ganz eigenartige Fichtenbegleitgenossenschaft an, in der Sauerklee, Waldveilchen, Siebenstern, Windröschen, Pirola und Heidelbeeren vorwiegen. Im Dickicht aber stehen Moderpflanzen, von denen der Fichtenspargel (*Monotropa*) höchst kennzeichnend ist. Anders im natürlichen Fichtenwalde, wie man ihn stellenweise in den Alpen zu sehen bekommt. Da die Fichtenwurzeln ganz flach streichen, richtet der Sturm im Fichtenwald stets leicht Unheil an, und darum ist jeder Fichtenurwald schon durch die vielen Windbrüche

mit ihrer heiteren Lichtungsflora bunt. Bartflechten und ihr Gefolge schmücken dort reichlich die Waldesalten, denen häufige Stelzenbildungen besonders abenteuerlich und romantisch zu Gesichte stehen. Graebener sagt hierüber: „Dieses Bild kommt dadurch zustande, daß die Fichten sehr gern und leicht auf den Stubben abgestorbener Bäume keimen, die in Verwesung überzugehen beginnen. In dem faulenden Holze und besonders zwischen der sich ablösenden Rinde und dem Holze wachsen die Wurzeln der jungen Fichte, sich eng anschmiegend, abwärts und gelangen so in den Erdboden, sich dort fest verankernd. Die Fichte wächst auf dem Stubben kräftig heran, und dieser zerfällt immer mehr und mehr. Dadurch werden die oberen Teile der Fichtenwurzel bloßgelegt, und der Baum steht dann in der charakteristischen Weise auf „Stelzen“ (s. das Bild).

Solche Fichtenurwälder gibt es jetzt nur noch in den Alpen und Sudeten; ja, es ist zweifelhaft, ob es in der norddeutschen Ebene überhaupt jemals welchegab. Höck tritt immerhin angedächtnis dessen, daß man in Pommern und bei Hannover „natürliche Fundorte“ dieses Bau-

Stelzenfichte aus dem Tegernseer Urwald.

(Nach einer Photographie im Besitze des Biologischen Institutes in München.)

mes kennt, dafür ein, aber er ist in kleiner Gesellschaft mit dieser Ansicht. Der Engländer nennt zwar die Fichte angeblich deshalb „Spruce“, weil sie zu ihm aus Preußen kam, aber damit ist ihre Ursprünglichkeit dort nicht bewiesen. Die großen Fichtenwälder dort sind selbst erst seit 1780 auf Ödflächen gepflanzt worden. Ihr deutscher Name gewährt auch keinen Anhaltspunkt, denn er spielt nur auf ihren Harzreichtum an, da er von feucht abgeleitet wird, so wie ihr lateinischer Name vom Pech (pix). Die vielen Dialektnamen, die Hegis Flora von Mitteleuropa mit großem Eifer zusammenstellt, beweisen allerdings gegen Höck, denn es findet sich keine einheimische norddeutsche Volksbezeichnung für diesen Baum. — Der Wuchs der Fichte wird durch so vollkommenes Ebenmaß ausgezeichnet, daß man diesen Baum wohl als ein „mathematisches Geschlecht“ bezeichnen konnte. Angesichts ihrer dichten Belaubung möchte man vermuten, daß ihre Verzweigung eine außerordentliche sein müsse, doch bewirkt gerade der dichte Schluß ihrer Benadelung, daß sie nicht mehr als maximal 5 Zweigordnungen aufweist (nach Wiesner); d. h. sie setzt ihrer Knospenentwicklung schon sehr bald eine Grenze, um auch in den tieferen Regionen ihrer Krone den Nadeln genügend Licht zu verschaffen. Auch ihre ausgeprochene Pyramidenform deutet auf große Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen.

Biologisch interessant ist auch das Verhalten der Nadeln, die im Winter anders gefärbt sind als im Frühling. Was den Dichtern und jedem Naturfreunde schon oft aufgefallen ist, daß die Fichte (auch die Tanne) im Vorfrühling helleres Grün zeigt, beruht nach den Untersuchungen von Haberlandt auf Wanderungen des Blattgrüns. Im Winter wird durch den Frost namentlich das Xanthophyll in den Blattzellen zerstört, das im Frühling wieder gebildet wird. Außerdem scheinen die Blattgrünkörner sich im Winter mehr an die Innenseite der von ihnen bewohnten Zellen zu ziehen. Daraus, daß auch die Nadeln von Harzgängen durchzogen sind, erklärt es sich übrigens, daß die Nadeln so langsam verwehen. Eine besondere Eigentümlichkeit ihres Baues ist die „Trennungsschichte“ an ihrem kurzen Stiel, denn die Fichte hat hierbei das Mittel angewandt, daß sie besonders gebaute Zellen in verschiedener Weise zusammenzieht und dadurch das Abfallen der Nadeln bewirkt.

Im pflanzenanatomischen Praktikum der Universitäten wird auch das Fichtenholz (so wie das aller Nadelbäume) demonstriert als Beispiel von „Tracheiden mit Höftüpfeln“; außerdem als Beleg für außerordentliche Harzbildung, denn das Harz durchtränkt in Gängen und Behältern nicht nur das Holz, sondern auch noch die Rinde.

Eine in weiten Kreisen bekannte Lebenserscheinung der Fichte (die sich auch bei der Tanne wiederfindet) führt zur Bildung von Kandelaber- oder Harfenbäumen (in Bd. I, S. 177, 178 und 182 abgebildet), wie solche in jeder Gegend als Merkwürdigkeit gezeigt werden. Die Fichte hat nämlich die Fähigkeit, jüngere und auch schon ältere Seitensprosse noch nachträglich zu Gipfel, d. h. Hauptsprossen, umzuwandeln, wenn ihr ursprünglicher Gipfelsproß aus irgendeiner Ursache verloren ging, was im Frühling durch sich darauf setzende Vögel besonders leicht geschieht. Es richten sich dann unverzüglich Seitenzweige senkrecht auf, und so entsteht die Armlenchterform des Baumes. Meist behält aber nur einer die Führung im Wachstum, und so bessert sich meist der Schaden bis zur Unmerklichkeit aus. Errera hat eine solche „Korrelation“ auf „innere Sekretionen“ zurückführen wollen, welche also dann den von der neueren Nervenforschung im Tierkörper entdeckten Hormonen entsprechen würden. Diese Auffassung würde aber nur das „Mittel“ und nicht die Ursache des Vorganges erläutern. Diese liegt vielmehr in einer Empfindung der Pflanze, denn ohne die Annahme eines Innenlebens der Fichte stehen wir ratlos da angesichts dieser Erscheinung.

Es gibt nur wenig Waldgänger, die schon blühende Fichten gesehen haben. Denn dieser Baum erreicht im Walde erst mit 70 Jahren, auch freistehend erst mit 50 Jahren und nur selten früher seine Mannbarkeit. Da er aber nur auf seinem Wipfel blüht, sind die Blüten von unten aus kaum zu bemerken, obwohl er schöne gelbe, erdbeerförmige, männliche Stäbchen und leuchtend rote, weibliche Zapfen treibt. Ihre nähere Betrachtung und Nachdenken über den hohen Sitz dieser Windblüten wird mit einer Unmenge von Anpassungen bekannt machen, mit deren Schilderung wir jedoch nur Bekanntes wiederholen würden. Nur eines möchten wir nicht übergehen. Das ist die hellrote Farbe der weiblichen Zapfen. Sie scheint sinnlos zu sein bei einem Windblütler. Man hat daran gedacht, sie als der Erwärmung dienend (also Beschleunigung der Entwicklung und Schutz vor Frösten?) aufzufassen. Aber es liegt doch näher, daran zu denken, daß dies nichts anderes als ein Ausdruck der erhöhten Lebensintensität zur Blütezeit sei, etwa dem entsprechend, was man bei niederen Krebsen, die sich im

Meerwasser doch nicht gut sehen können, dennoch als farbenprächtiges Hochzeitskleid gedeutet hat. — Bei der Entwicklung der reifen Zapfen macht sich die gleiche Lebenserscheinung wie bei der Kiefer und zugleich ein weiterer Unterschied zwischen Fichte und Tanne bemerkbar. Die erste dreht ihre anfänglich aufrecht stehenden Zapfen langsam nach abwärts, die zweite läßt sie aufwärts wachsen. Die Zapfen werden in einem Jahre reif und lassen die geflügelten Samen herausfallen, während der leere Zapfen oft noch lange am Baum hängenbleibt.

Der Keimling überrascht wieder mit einer Besonderheit. Er treibt gleich 8—9 Nadelchen, die aber bereits im Samen, in der Dunkelheit Blattgrün besitzen, worauf wir uns noch keinen Vers machen können.

Verbissene Krüppelfichten im Schnitztal (Tirol). (Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

Der Baum besitzt also viele biologische Eigenheiten und ist dazu noch von einer staunenswerten Vielgestaltigkeit. Da wir von seinen Arten schon gesprochen haben, können wir uns ganz auf die Varietäten unserer gemeinen Fichte konzentrieren. Eine *var. viminalis* wird als Schlangenfichte manchenorts gezogen, eine andere mit hängenden Ästen (Bild in Bd. I, S. 184) ist als Trauerfichte insgesamt nur in einem halben Duzend deutscher Bäume bekannt. In Hegis Flora werden allein 24 Varietäten unterschieden, worunter sich astlose, zwerghafte, grünzapfige, gelbnadelige, auch vielfach krankhaft veränderte Bäume befinden, deren Biologie noch fast gar nicht studiert ist.

Besonderes Interesse verdient von ihnen die Anpassung der Fichte an rauhe Verhältnisse. Aus Lappland beschreibt Rihlmann von der Waldgrenze eine buschartige Krüppelform (Bild in Bd. I, S. 163), und eine ähnliche Mattenfichte kennt man auch von der Waldgrenze der heimischen Gebirge. Dr. Chr. Kellermann beschreibt neuestens eine solche Verzweigung von dem Schneeberggipfel im Fichtelgebirge. Es heißt bei ihm: Die dem Boden zunächst stehenden Äste haben sich teppichartig weithin

ausgebreitet, so daß förmliche Matten von dicht den Felsstrümmern angeschmiegtten Fichtenzweigen entstehen. Aber nicht genug damit; diese Zweige bewurzeln sich in den moosigen Klüften, und wo der Zweig einmal Wurzel geschlagen hat, richtet er sich zu

einem neuen Stämmchen auf, welches ebenso normal wächst, wie ein aus

Samen erwachsenes

Bäumchen. Eine besonders merkwürdige Form nehmen auf Alpentriften vom Weidevieh benagte Fichten und Tannen an, die dadurch in der Entwicklung derart gehemmt werden, daß sie oft jahrzehntelang sich als Busch herumquälen. Es gibt das ein so bizarres Landschaftsbild, wie es unsere

Aufnahme aus dem Tiroler Schnigthal zeigt. Wenn aber dann der Busch endlich doch so hoch geworden ist, daß er an der Spitze nicht mehr verbissen werden kann, richtet sich ein Seitenproß empor, und rasch wächst nun ein kräftiger Baum heran.

Es wäre also eine sehr dankbare Arbeit, wenn ein Botaniker seine Aufmerksamkeit einmal der Biologie der Fichte zuwenden, diese Vorkommnisse sichten, experimentell prüfen und biologisch deuten würde.

Gleichsam als Gegensatz zu diesen Krüppel-

Die „schönste deutsche Fichte“ im Schlosspark zu Vieslau bei Meisse (Schlesien).

formen können wir den schönen Baum in seiner vollkommensten Ausbildung im Bilde vorführen. Man hält dieses 40 m hohe Exemplar für die schönste Fichte Deutschlands, obzwar sie weder die mächtigste noch die höchste oder älteste ist. Es gibt 5—600 jährige Bäume von 60 m Höhe und 2 m Stammdurchmesser. — Berühmte derartige Bäume sind aus dem Rubaniurwald in Böhmen beschrieben worden. Auch aus Ungarn

(Zsidnyovaer Revier bei Munkács) wird von einer 67 m hohen Fichte berichtet, und im Zuge der Sudeten hat fast jede Landschaft ihren Riesenbaum dieser Sorte.

Die mannigfache Nutzung der Fichten als Bau- und Schiffsholz ist zu bekannt, als daß man darüber weitläufig zu sein brauchte. Im Thüringerwald arbeitet die ganze Spielwarenindustrie mit Fichtenholz, für den Bedarf der Zeitungen an Holzpapier werden jährlich so viel Fichten geschlagen, daß jede Großstadt einen grünen Schuttgürtel haben könnte, wenn sie auf Zeitungen verzichten wollte. Teer, Terpentin, Pech, Kolophonium und alle Produkte der Teerindustrie liefert der Fichtenwald ebenso wie das Nieserngeshölz. Sogar fossile Fichten machen sich uns nützlich, denn *Picea succinifera* Como., die Bernsteinfichte der Kreidezeit, ist der Lieferant des „Strandsegens“, d. h. des Bernsteins an der ostdeutschen Meeresküste zwischen Memel und Danzig, von dem das größte (9½ kg schwere) Stück im Berliner mineralogischen Museum aufbewahrt wird.

An den Bernstein knüpft sich ein gewaltiges Kapitel Kulturgeschichte vom Mythos von Phaeton bis zu dem Bernsteineid, den die armen baltischen Bernsteintaucher schwören mußten. Er lockte

Trieb einer Tanne, dessen Spitze im Dunklen gewachsen ist.
(Nach Wächter.)

Griechen und Römer in die ultima Thule, und noch hat es keiner so recht abgeschätzt, was aus der deutschen Geschichte geworden wäre, wenn nicht dieser Handel die Eroberer und ihre Kultur nach Norden gezogen hätte.

Ohne dieses von den Bäumen an Wurzeln und Zweigen im Laufe der Jahrtausende in solchen Mengen abtropfende Harz, daß z. B. in einer einzigen stürmischen Nacht bei Palmnicken an 2000 kg Bernstein angespült wurden, wären unsere Kenntnisse über die Flora und Fauna der Wälder, die in der Kreidezeit die „blaue Erde“ übrigließen, höchst mangelhaft. So aber wissen wir seit den Forschungen von Prof. Conwentz durch die wunderbar erhaltenen Einschlüsse im Bernstein, daß jene Wälder nach Art der heutigen nordamerikanischen und ostasiatischen Fichten Tannen, Thuja mit Fächerpalmen, Lorbeer, Zimtbäume und Farne in buntem Gemisch in sich hegten und daß sie auf das reichste (z. B. 230 Fliegenarten!) von Insekten und höherem Getier belebt waren.

Ein guter Teil des Gesagten gilt auch für die Tanne (*Abies alba*), wenigstens was Nutzung und allgemeine Bedeutung anlangt. Die systematischen Unterschiede haben wir bereits erörtert, und aus der Biologie wäre nur der interessante Versuch nachzutragen, den Dr. W. Wächter zur Ergründung der Reizverwertungen der Tannennadeln unternommen hat. Bekanntlich stehen die Tannennadeln, wenigstens an der Spitze der Zweige, gescheitelt. Wächter zeigte nun, daß dies einfach eine Reaktion auf Lichtreize sei, denn es hänge vom Lichtgenuß des betreffenden Zweiges ab, ob er seine Nadeln in Kämme anordnet oder strahlig vom Zweige abstehen läßt. Besonders lehrreich war ein Versuch, dessen Ergebnis hier abgebildet ist. Es wurden nämlich einige Seitenzweige einer Tanne in verschiedener Höhe noch vor dem Austreiben der Knospen in allseitig geschlossene Holzkästen geleitet, die so befestigt waren, daß die Zweige in ihrer natürlichen Lage verblieben. Im Spätherbst wurden die Kästen ab-

genommen. Die Sprosse zeigten hierbei das umstehende Bild. Soweit der Kasten reichte, also das Licht ausgeschlossen war, waren auch die Nadeln strahlig, wie bei der Fichte, angeordnet, an dem belichteten Teil aber bildeten sie den bekannten Doppelfamm.

Die auf 400 Jahre geschätzte „schiefe Tanne“ im Spitalwald bei Rothenburg o. T.
(Nach Stüger.)

„Wir haben es hier offenbar“, sagt Wächter, „mit einem Zurückgreifen auf frühere einfache Zustände zu tun, die vielleicht einstmals lange Zeiträume hindurch die Form unserer Pflanze charakterisierten und die geeignet sind, uns die Geschichte der allmählichen Erlernung jener Blattbewegungen auch heutzutage noch zu erzählen.“

Diese gescheiterte Anordnung der Nadeln führte bei der Tanne noch zu einer weiteren Anpassung. Der Baum griff zur Anisophyllie, d. h. er gestaltet von oben nach unten in den übereinander liegenden Schichten die Nadeln größer, wodurch sie sich gegenseitig nicht völlig beschatten. Von den Wachstreifen, die auf der Unterseite die Spaltöffnungen überlagern, war schon die Rede (S. 81); daß sie als Schutz gegen Verlegung der Stomata mit Wassertröpfchen dienen, läßt sich ungezwungen

verstehen. Einer Lebenserscheinung, aus der die unbewußte Intelligenz der Pflanze recht vielsagend zu uns spricht, dürfen wir schließlich auch nicht vergessen. Die Tanne wirft ihre Deckschuppen samt den Samen ab. Sie unterläßt demgemäß alle besonderen Bewegungen des Zapfenstieles als überflüssig.

Unerklärlich scheint es dagegen, warum die Tanne um so viel länger lebt als die Fichte. Die gewaltige alte Tanne im Schwarzwald (der seinen Namen von den dunklen Tannen erhalten haben soll) bei Schwenningen, die den Namen „Hölzefönig“ führt,

Typus des urwüchfigen Mischwaldes.

(Nach einem Gemälde in der Wiener Kunstakademie.)

und deren Bild wir in Bd. I, S. 515 brachten, soll zwar nicht älter als 400 Jahre sein, bei 7 m Stammumfang und 45 m Höhe (im Jahre 1876 brach ein Sturm den 12 m hohen Gipfel ab), aber andere Riesen ihres Geschlechtes, so die auf 10 km weit sichtbare Riesentanne zwischen Niedlingen und Biberach in Württemberg, werden von anderer Seite auf das Doppelte geschätzt. Kerner gibt zwar merkwürdigerweise in seinem Pflanzenleben 1200 Jahre als beglaubigtes höchstes Alter der Fichte an, erwähnt aber in der gleichen Zusammenstellung, daß die Tanne um 15 m höher, um 1 m dicker werden kann als die bekanntlich viel rascher wachsende Fichte.

Daß die Slawen die Tanne zum Trauerbaum wählen, so daß Tannenholz bei ihnen vielerorts durch die Sitte als Sargholz vorgeschrieben ist, erscheint ganz sinnvoll, denn (wenn man von der seltenen Urve absieht) sie ist wirklich der ernsteste und düsterste Baum unserer ganzen Flora. Im Tannenwalde ist es noch einförmiger und lebloser als unter Fichten, und so hat es denn viele Gegenden nicht verhäßlicht, daß in ihnen, wie z. B. im bayrischen Walde, seit 50 Jahren

Randelabertanne in einem urwaldartigen Revier des Schwarzwaldes.
(Naturaufnahme von D. Feuch t-Stuttgart.)

die Zahl der Tannen von 70 auf 20 und 30 vom Hundert zurückgegangen ist. Das bedeutet allerdings nicht, daß dort der heitere Laubwald gesiegt, sondern an die Stelle der Tanne tritt eben immer mehr die raschwüchsige Fichte. Im großen und ganzen muß man vielmehr sagen, daß seit etwa dem 14. Jahrhundert die Bewaldung Deutschlands und Deutschösterreichs einförmiger geworden sei, denn, wie v. Berg feststellte, deuten von 6905 mit Holzgartennamen gebildeten Ortsbezeichnungen dieser Länder nur

790 auf Nadelholz*, während es heute 67,5% des deutschen Waldbodens besiedelt. Hiervon nimmt die Fichte nach Hausrath 20,1%, die Tanne allerdings nur 2,7%, und zwar meist im Westen ein. Die Vogesen tannen rühmt bereits Plinius, wenn auch der Römer die Nadelhölzer als arbores non frugiferae sonst mißachtete. Nicht so der Deutsche, wenn wir den Schriften der Äbtissin Hildegardis aus dem 12. Jahrhundert trauen dürfen, die von den Heilkräften und dem scharfen Duft der Tanne und der Annehmlichkeit spricht, daß die „bösen Lustgeister“ nicht gern in Tannenwäldern haufen.

Wenn uns bereits der heimische Tannenwald mit überernsten Eindrücken erfüllt, so ist doch eigentlich auch ein „Hölzlekönig“ nur ein schwaches Gewächs gegen die Riesen, welche die ohnedies mit dem Gigantischen so bereitwillig spielende Phantasie des Yankee als Mammutbäume bezeichnet. Botanisch gesprochen, handelt es sich hierbei um Gewächse aus der Gattung *Sequoia* (S. gigantea Torr. und S. sempervirens Endl.); diesen Namen wollen die Engländer und Amerikaner aber aus Nationalitätlichkeit unbedingt in *Wellingtonia* und *Washingtonia* ändern, so wie sie

Ein Mammutbaum (*Sequoia*) in Kalifornien.

* Allerdings betont Wimmer in seiner „Geschichte des deutschen Bodens“ mit Recht, daß solche Angaben nicht ganz zuverlässig seien, denn z. B. im tannenbestandenen Schwarzwald sind 24 Orte nach Laubbäumen und nur 8 nach Nadelhölzern benannt.

mit gleicher Starrköpfigkeit daran hängen, Ginkgo englisch *Salisburya* zu nennen. Im Jahre 1850 entdeckte man die ersten Gewächse dieser Art in der kalifornischen Sierra Nevada in einer Höhe von etwa 1500 m, die ohnedies ein herrliches Waldkleid von Riesenzedern, Douglasfichten, Tannen und Zuckerkiefern trägt. Seitdem hat man noch 9 Haine von meist je einigen Duzend alten Bäumen (nur einer* ist 16 km lang) entdeckt, von denen die im Yosemiteetal bei „Mariposa Grove“ (3—400 Bäume) und Calaveras von ganzen Reisendenkarawanen aufgesucht werden. Prof. Hef schildert den Eindruck, den man dort empfängt, mit folgenden Worten: „Wunderbar ergreifend auf das Gemüt wirkt ein solcher Hain durch den beständigen Wechsel gigantischer Formen. Die Bäume stehen so dicht, daß kein Sonnenstrahl den Boden trifft. Ein heiliger Schauer durchrieselt in dieser Dämmerung die Glieder. Zwischen Stämmen von 30—50 m Höhe erheben sich Riesenbäume bis auf das Doppelte. Vergebens verfolgt man diese Strebepfeiler mit den Augen, der Nacken ermüdet. Das fast unheimliche Dunkel, die schauerliche Stille und das Übermaß aller Verhältnisse überwältigen uns so, daß die Majestät dieser Szenerie nicht zu beschreiben ist. Einem riesigen Turme ist der Stamm eines solchen Mammutbaumes zu vergleichen, und erst in gewaltiger Höhe beginnen die wagerechten Zweige, welche die grasfarbigen, denen der Zypresse ähnlichen Blätter tragen. Merkwürdigerweise treibt der kolossale Baum verhältnismäßig sehr kleine Zapfen, die denen der Weimutskiefer ähnlich sind.“

„Von den alten Mammutbäumen hat jeder seinen besonderen Namen erhalten. Der eine, hoch über seine Umgebung hervorragend, heißt der ‚Vater des Waldes‘, einsam steht der ‚alte Junggeselle‘, die ‚Hütte des Minierers‘ zeigt im Stamm eine 6 m breite Höhlung, die ‚drei Schwestern‘ entspringen aus einer Wurzel, die ‚Familie‘ besteht aus den beiden Eltern und 24 Kindern, die ‚Reitschule‘ ist ein umgestürzter Baum, den man ausgebrannt hat, so daß ein Reiter 25 m weit hineinreiten kann. Auch der ‚Vater des Waldes‘ ist ausgebrannt. Man geht 60 m weit in einem gewölbten Gange und steigt zu einem Astloch wieder hinaus.“

Um die „Mutter des Waldes“, die eine Höhe von 105 m und einen Stammumfang von 20 m besitzt**, ihrer Rinde 36 m hoch zu entkleiden, arbeiteten 5 Männer 3 Monate lang.

Diese letztere Barbarei zeigt übrigens, von welchem Gesichtspunkte aus die wackeren Kalifornier diese „Meisterwerke der Natur“ betrachteten. Die Holzmasse mancher Bäume wurde um 10—12000 Mark verkauft. Man hat sich übrigens neuerdings eines Besseren besonnen und die Bäume für unantastbares Nationaleigentum erklärt. Doch soll auch hier Theorie und Praxis nicht ganz miteinander harmonieren. Und wie Zeitungsnachrichten vom Jahre 1908, über die bisher nichts Sicheres zu erfahren ist, meldeten, soll der „schönste“ der Mammuthaine einem Waldbrand zum Opfer gefallen sein.

Man fabelte früher, daß auf dem sinnigerweise zum Boden eines Tanzsalons umgewandelten Stumpf eines derartigen Waldesalten 4000 Jahresringe gezählt worden seien. Neuere Annahmen billigen ihnen aber nur 1500 Jahre zu.*** Man hat auch die Größenangaben übertrieben, und in vielen Werken ist von 140 m hohen Sequoien zu

* in der Provinz Fresno.

** Der gewaltigste Baum soll 107,3 m Höhe und 30,5 m Stammumfang am Boden gehabt haben.

*** Sir J. D. Hooker setzt sich für 3500 Jahresringe ein

lesen. Aber die genauen Messungen im Calaverashain ergaben als Maximum nur 110 m. Seitdem der Botaniker W. Lobb im Jahre 1853 eine große Menge der Samen nach England sandte, wurde *Sequoia*, die auch unseren Gärtnern als herrlicher und edler Baum gilt, vielfach angepflanzt. In England gibt es schon 22 m hohe Bäume mit 2 m Stammdurchmesser (bei Exeter); als schönste *Sequoia* Deutschlands gilt die auf der Nizzapromenade in Frankfurt a. M., wo ein 1860 gepflanzter Baum bereits 18 m hoch ist. Besonders gut gedeihen die Mammutbäume, außer auf der Insel Mainau

Ein ausgehöhlter Niesenbaum der Mariposa Grove.

und im Rheintal, im Taunus und an der Bergstraße, wo im „Weinheimer Koniferenwald“ an 300 winterharte Sequoien von 6–12 m Höhe vorhanden sind; aber auch in Heidelberg, Darmstadt, Auerbach und anderen Orten sind Prachteremplare zu sehen.

Mit den Mammutbäumen wetteifert an Ruf und Bedeutung eine ganz nah verwandte amerikanische Pflanze, die man als Sumpfsypresse (*Taxodium distichum* Rich.) zu bezeichnen pflegt. Sie ist wieder kennzeichnend für die großen Swamps, die Sumpfwälder im Süd-

westen der Vereinigten Staaten. Kein geringerer als der Entdecker der Pflanzenzelle, Jak. Schleiden, gibt von diesem Naturdenkmal folgende prächtige Schilderung, zu der er offenbar durch den heute fast vergessenen mährischen Erzähler Bostl begeistert wurde, der einst unter dem Namen Sealsfield mit seinen amerikanischen Romanen die Lesewelt entzückte, durch die Abenteuer seiner Helden in den Zypressensümpfen um den unteren Mississippi. „Niesenstämme von unerhörter Mächtigkeit drängen sich in solchen aneinander“, sagt Schleiden, „und sie verflechten ihre Zweige ineinander und verbreiten am hellsten Tage nur düsteres Dämmerlicht. Der Boden besteht nur aus halbverfaulten, übereinander getürmten Blöcken und dazwischen aus einem unergründlich tiefen, flüssigen Schlamm, in welchem sich gefräßige Alligatoren und die beißende Schildkröte umherwälzen, die alleinigen Herren dieser unter der Blut der

fast tropischen Sonne qualmenden Hölle; so im hohen Sommer, während im Frühling sich brausend die trüben, schlammigen Fluten der austretenden Ströme in meilenweiter Ausdehnung durch diese feindselige Vegetation ergießen.“

Diese Taxodien sind in dem schlechtdurchlüfteten Schlamm, in dem sie wurzeln, gezwungen, Atemwurzeln (Pneumathoden) zu bilden (vgl. das Bild in Bd. II, S. 246), die denn auch einen derartigen Wald mit übermeterhohen, innen hohlen Auswüchsen so dicht durchziehen, daß die Reisenden den Anblick treffend mit den Grabtafeln eines Judenfriedhofes verglichen haben. Der Baum ist übrigens auch dadurch bemerkenswert, daß er seine Blätter im Herbst oder Frühling gleich mit den kurzen Zweigen zusammen abwirft. Die ganz nah verwandte mexikanische Sumpfsypresse (*T. mexicanum* Carr.) bildet noch dickere Stämme in ihrer Heimat und hat ein Exemplar von historischer

Berühmtheit hervorgebracht, das jetzt, nachdem der Drachenbaum von Oratova nicht mehr lebt, vielleicht als die älteste aller Pflanzen angesehen werden kann. Das ist die

„Sypresse des Montezuma“ im Friedhof zu Santa Maria del Tule im mexikanischen Staat Oaxaca. Ferd. Cortez berichtet von ihr mit den Ausdrücken hellen Erstaunens, dieser Baum sei das größte Wunder des von ihm eroberten Landes. Im Jahre 1519 habe er mit seinem ganzen Heere in seinem Schatten lagern können. Der Baum wird in neuerer Zeit als 40 m hoch, aber von 30 m Stammumfang angegeben. De Candolle hat sein Alter auf 6000 Jahre geschätzt, A. v. Humboldt auf 4000 Jahre; neuestens kommt man auch davon zurück und will ihm nur 1400 Jahre zubilligen. Nach An-

Rein von Sypressen (*Cupressus sempervirens*) in der Lombardei.

gaben von Prof. Heß soll der Baum nun kränkeln und von dem Wipfel aus absterben. Die Paläontologen belehren uns, daß man sich den Anblick Europas zur Zeit, da sich die Braunkohlen bildeten, stellenweise also sogar in der jüngsten geologischen Zeit nicht viel anders vorzustellen habe als wie diese Zypressenwälder der Neuen Welt, denn Taxodien standen waldbildend (auch mit Sequoien) damals von Frankreich bis zur Insel Sachalin so massenhaft, daß auch ihre Nester sich zu Braunkohlenflözen verdichten könnten.

Wir haben diese Bäume schon des öfteren, dem Volksnamen folgend, als Zypresse bezeichnet. So tat es bis vor kurzem auch die botanische Wissenschaft. Jetzt aber hat sie sich geeinigt, den Namen *Cupressus* nur für jene Bäume anzuwenden, die uns von dem Bild südlicher Landschaften unzertrennlich geworden sind. Wer wird ein Bild des Bosporus oder des Gardasees als getreu anerkennen, in dem die dunkelgrünen, schlanken Säulen der Zypressen fehlen? Wer möchte in Verona den Giardino Giusti mit seinem ernsten Hain der mächtigen, hohen Bäume missen! Ein wahrhafter Trauerbaum, eine richtige Friedhofspflanze und mit ihren schuppenförmigen Blättern auch wahrhaft urweltlich anmutend, so steht die „ewig-lebende“ Zypresse (*C. sempervirens* L.) da, der man 2000 Jahre zuspricht. Und wenn sie unsere heimischen Gärtner in zahlreichen Abänderungen hochschätzen, so folgen sie damit mehr dem Herkömmlichen der Sitte, die schon im Altertum diesen Baum dem Pluto weihte, als einer spontanen Aufforderung des Geschmacks. Der Baum gehört nicht in unser Klima und paßt gar nicht zum Charakter unserer Vegetation. Darauf deutet seine überschlankte, säulenhafte Gestalt und sein extrem xerophiler Habitus. Die trefflichste Deutung dieser Eigentümlichkeiten hat unlängst Wiesner gegeben, als er das Urbild aller Pyramidenbäume mit Scharfsinn auf ein Schutzbestreben des Baumes zurückzuführen wußte. Die Säulenform ist nach ihm eine Lichtanpassung. Der glühende Strahlenregen der südlichen Mittagsonne fließt an diesen schlanken Gestalten schadloß ab, wohl aber saugt die ins Senkrechte gestellte Blattmasse die zerstreute Helligkeit des Tages als „Borderlicht“ ein. So weiß die Pflanze durch ein und dasselbe Mittel das schädliche Übermaß des grellsten Lichtes abzuwehren, das zuträgliches geschwächte Licht aber besonders intensiv auszunützen.

An ihrer Stelle zieht Gartenkunst bei uns in großer Zahl von Abänderungen den von den meisten Laien mit ihr verwechselten Lebensbaum (*Thuja occidentalis* und *Th. orientalis*), dem dieserhalb mit Recht auch der Name „falsche Zypresse“ beigelegt wird. In Blätterwerk und Wuchs ist denn auch namentlich zwischen der letzteren Art und den Zypressen kaum ein Unterschied; um so deutlicher prägt sich ein solcher in der Bildung der Zapfen aus, denn deren Schuppen neigen zum Verwachsen und „Fleischigwerden“, worüber unsere Abbildung mehr sagt als langatmige Beschreibung. Durch sie und ihre Verwandten ist bereits der Übergang zu einer anderen Gruppe von Nadelhölzern angedeutet, von denen zwei, der Wacholder* und die Eibe, die Phantasie des deutschen Volkes von jeher auf das lebhafteste angeregt haben.

Was ist nicht alles vom Wachandelbaum und von Frau Kranawitt des Märchens fabuliert worden, seit Matthiolum in seinem Kräuterbuch von ihnen schrieb: „Die alten Hexen und Wettermacherin üben damit viel Zauberei und Abenthewer. Sind

* So und nicht „Wachholder“ ist die richtige Schreibweise, da der Ausdruck auf das Althochdeutsche wehhäl = wach, lebensfrisch und trä = Baum zurückgeht.

ärger denn Herodes,“ und seit der alte Spruch entstand, man solle vorm Wacholder das Knie beugen. Sei es das würdig ernste Aussehen des Busches, der auf den Heiden schwer dunkle Zypressensäulen errichtet, sei es das heimlich-scheue Wissen um die Wirkung der Früchte einer seiner Arten (*Juniperus Sabina*), das ihm bei den Siebenbürger Sachsen den Namen „der verbotene Baum“ eingebracht und auch seinen lateinischen Namen von Mädchen und gebären abzuleiten treibt, von jeher hat man sich Wunderliches über den Wacholder zugeaunt, und noch heute spielt er im Volksgebrauch eine erste Rolle. So

erzählt Leoprechting aus Bayern folgendes von ihm: „Im Wacholder steckt eine große Kraft gegen jedwede Zauberei, darum gebraucht man nicht nur seine Beeren bei den Räucherungen, sondern auch das Holz überall. Aus den Stecken schneidet man Geißeln für die Kockknechte, wo dann kein Roß durch eine Stellung gesperrt werden kann; ebenso macht man aus ihm Nährstecken in die Nährkübel zum Buttern, dann kann keine böse Nachbarin verhindern, daß Butter gewonnen werde. Die Beeren des Strauchgenießt man teils roh, teils in einem aus

Zapfen und Früchte der Nadelbäume.

1 = Zapfen der Fichte. 2 = Zapfen von *Cedrus Deodara* Loud. 3 = Zapfen von *Sequoia gigantea*. 4 = Zapfen von *Taxodium distichum*. 5 = Zapfen der Zypresse. 6 = Frucht (geschlossen) der falschen Zypresse (*Thuja orientalis*). 7 = Beerentragender Zweig von *Juniperus communis*. 8 = Daneben (10) eine vergrößerte Frucht im Querschnitt. 9 = Reife Frucht der Eibe.

Darüber (9) im Längsschnitt mit dem aufgeschnittenen Samenmantel.

(Alle Figuren nach Engler-Prantls Werk verkleinert.)

ihm bereiteten Branntwein (Wacholderbranntwein, Steinhäger). Zu Zeiten ansteckender Krankheiten ist dies besonders heilsam (Choleraschnaps), und der Italiener sagt, wenn er täglich eine solche frische Beere könnte genießen, so werde er ewig leben. Wer einen Kranawitzweig auf dem Gute trägt, wird nicht müde und bekommt den Wolf nicht.“ Diese letztere Ansicht ist uralt und weit verbreitet. Konrad von Megenberg schreibt in seinem etwa um 1349—51 zu Regensburg verfaßten „Buch der Natur“: „*Juniperus* der Krametbaum heißt teutsch ein wechalter, und man spricht, das der Kramet helff für der gelider müden, und darumb so ettlich müd werden, so schlaffen sy unter des baumes schatten.“ Auch die Indier glauben das gleiche und schreiben ihrer Wacholderart sogar die Kraft der Verjüngung zu.

Was ist nun an dieser so vielbeachteten Zauberpflanze eigentlich so Auffälliges? Denn offenbar muß sie doch durch irgendein Merkmal die Aufmerksamkeit besonders

auf sich gezogen haben, sonst dichtet das Volk nicht daran. Man könnte da zuerst daran denken, daß der schwarze, mächtige Wacholderbusch, der gewissen Gegenden der Lüneburger Heide oder der schwäbischen Alb geradezu den Charakter verleiht, dadurch den

(Ein alter Wacholderbaum aus der Steiermark. (Nach einer Photographie gezeichnet von R. Deffinger.)

Blick auf sich lenkte. Aber er ist zu sehr mit der Volksheilkunde verwoben, und das deutet darauf, daß er doch von anderer Seite her, als bloß „ästhetisch“ beachtet wurde. Seine erst in zwei Jahren ausreifenden, blaubereiften Beeren, die viel Zucker, apfel-

Sequoia gigantea

Libocedrus decurrens

Cedrus Deodara

fremde Nadelhölzer auf der Mainau

Zukunft gelten, in der man sicher statt von „biologischen“ Anpassungen und Eigenheiten von „psychologischen“ Erscheinungen reden wird.

Der Wacholder kann als das verbreitetste aller Nadelhölzer bezeichnet werden, denn wenigstens der echte Wacholder kommt in ganz Europa und mit geringen Abänderungen auch auf sehr großen Gebieten Nordamerikas und Asiens vor. Bei uns ist er in Norddeutschland ein unzertrennlicher Begleiter der Kiefer.* In dieser Rolle als

(Ein Sadebaum (*Juniperus Sabina*). (Naturaufnahme von J. G. Peters†-Graz.)

Unterholz ist er von vornherein dazu verurteilt, ein allerdings abenteuerlich aussehender Busch zu bleiben; nur dort, wo er auf Heide- oder Sandboden den Ortstein mit den Wurzeln durchdringen kann, wächst er dann zu einem ansehnlichen Baum aus. Scholz gibt aus Westpreußen fast 7 m hohe, absichtlich geschonte Bäume aus Pletnitz an, und Pfuhl bildet aus Posen einen beim Höllengrundsee sprießenden 11 m hohen Wacholder ab, den man auf 400 Jahre schätzt. Einen solchen Baum aus Steiermark bringen wir auch im Bilde. — Im Gebirge und im Norden bildet unsere Pflanze eine für eine Kälteform ausgegebene Zwerggrasse (*J. nana*, Bild Bd. I, S. 139, 199), die im Aberglauben noch höhergehalten wird als die Tieflandform, weil alle Alpenpflanzen eben noch um einen Grad interessanter sind.

* Nur in Schleswig-Holstein und an der Nordseeküste fehlt er angeblich fast völlig, was des Unterfuchens wert wäre.

Am interessantesten ist leider unseren Bauern der Sadebaum (*J. Sabina*), den sie in ihren Gärten oft versteckt halten und um dessentwillen sie mit den ihn auf Anraten der Kreisärzte ausrottenden Behörden in steter Fehde liegen. Man hat ihn z. B. von Amts wegen im Berliner Tiergarten vertilgt. Fast immer, wenn sich auf dem Lande der Richter für eine dilettierende „weise Frau“ und ihre weibliche Kundschaft interessiert, zieren „Sevenzweige“ als beschlagnahmtes *Corpus delicti* den Amtstisch. . . .

Eine amerikanische Wachholderart (*J. virginiana*) haben wir täglich zur Hand. Denn das wohlriechende „Zedernholz“ der Faber- und Hardtmuthbleistifte wird von ihr geliefert, ebenso das Holz der feineren Zigarrenkisten.

Mit dem Wachholder wurzelt auch die Eibe (*Taxus baccata* L.) tief im heimischen Volksleben. Es mag dies, wie schon der griechische, von Gift abgeleitete oder der aus gleicher Wurzel stammende nordische Name (*eda*) des Baumes bezeugt, vielleicht auf feine giftigen Eigenschaften beruhen. Diese hat man so übertrieben, daß es im Altertum (*Dioscorides*) für todbringend galt, im Schatten des Baumes zu schlafen, weshalb auch die Mythologie ihn als Todesbaum bezeichnet und der Fackel der Erinnyen andichtet, sie sei aus Eibenholz.

Ein reicher Kranz kulturgeschichtlicher Erinnerungen knüpft sich an diesen düsteren, an die Tanne erinnernden Baum mit seinen scharlachroten Beeren. Caesar erzählt von den mit dem Eibensaft vergifteten Lanzenspitzen der Gallier; die Armbrustschützen des Mittelalters hatten ihren Bogen aus Eibenholz geschnitten, ja, sein feines und gleichmäßiges, fast unverwesliches Holz taucht aus Steinzeitgräbern und Pfahlbaudörfern auf, sorgsam geschnitten zu feinen Geräten. Zum letztenmal erwähnt seiner die Kulturgeschichte aus der heiteren Zeit des Mosokotandes. Als Taxushecke und -Architektur, zurechtgeschoren in wunder-

Alte Eibe aus dem Allgäu (Berggündeltal am Hochvogel). (Nach Stüger.)

liche Formen, zu Lauben, Säulen, Statuen und sogar Tierformen, schmückte er die Gärten des Sonnenkönigs und seiner Nachfolger. Im heutigen Versailles ist davon allerdings wenig mehr zu sehen; wo noch geschorene Hecken grünen, ist meist die falsche Zypresse an Stelle der Eibe getreten, und nur in manchem alten verlorenen englischen Garten ergeht sich noch der Schlossherr zwischen solchen plump-einförmigen, grün-lebendigen Mauern. Dort soll es auch noch mehrtausendjährige Eiben geben. Die auf dem Friedhof von Braburn wird auf 3000 Jahre geschätzt, woran jedoch kein Sachkundiger glaubt.*

Heute ist die Eibe ein aussterbender Waldbaum. Seit 200 Jahren ist sie erschrecklich zurückgegangen, vielleicht nicht nur deshalb, weil man ihr Holz benötigt. Im ganzen schätzt man, daß Deutschland noch 7000 Eiben ernährt, von denen etwa 1000 in der Tuheler Heide wachsen, die im Ziesbusch jetzt endlich staatlich geschützt werden, nachdem man ihre Zweige vorerst säckeweise zum Verkauf ausgedoten hatte. Drei andere Orte, wo sie in Mengen gedeihen, sind das Allgäu, ferner Treseburg im Harz (etwa 600 Bäume) und ein Revier in der rauhen Rhön, wo an 500 uralte Eiben, aber stets nur zerstreut, grünen. Der älteste deutsche Baum steht zu Rath bei Ürdingen a. Rh. mit 10 m Höhe und 1,25 m Stammdurchmesser. Andere berühmte Exemplare finden sich bei Mettmann, Düsseldorf, am Schloß zu Siegen. Ein auf 1400 Jahre geschätztes Exemplar bei Katholischhennersdorf bei Lauban in Schlesien gilt für den ältesten Baum Deutschlands überhaupt. Dem Botaniker hat der Baum manche biologische Eigentümlichkeit zu verraten, als deren auffälligste der fleischig süße, rote Samenmantel (Arillus) gilt, der sich, als sekundär rein biologische Anpassung an die Vogelverbreitung, erst nach der Befruchtung entwickelt (Bild S. 95) und auf den Geschmack der Vögel berechnet ist. In manchen Naturgeschichtswerken wird vor diesen Zapfenbeeren als giftig gewarnt. Doch mit Unrecht, denn die Älplerburschen genießen sie ohne Schaden. Giftig sind vielmehr Blätter und Zweige durch das Alkaloid Taxin, und es ist nun biologisch höchst bemerkenswert, daß gerade die Eibe das einzige Nadelholz ist, das des Harzes entbehrt. Es ist daher wohl nicht zu kühn, aus diesem Zusammenhang darauf zu schließen, daß beide, Alkaloid und Harz, zum Abhalten von Tieren dienen (die Ältäre der Antike waren aus Eibenholz, da nur solches als von Würmerfraß verschont galt!), sich daher erseken.

Eine weitere Eigentümlichkeit offenbart sich bei der Befruchtung. Die Samenanlage von *Taxus* steht ganz frei. Zur Festhaltung des vom Winde herbeigetragenen Pollens muß also der Baum aktiv zugreifen. Er tut es durch Abscheidung eines Tropfens aus der Mikropyle, so wie der Ginkgo, im richtigen Augenblick. Goebel hat neuerdings gezeigt, daß die Pollenbehälter dieses Baumes einen eigenartigen Mechanismus herstellen, wodurch das Staubblatt durch ein Gelenk eine Bewegung ausführt, wie sie beim Aufspannen eines Regenschirmes nötig ist. Dadurch wird der Pollen auf die zweckmäßigste Weise ausgeschüttet. Und bei den weiblichen Blüten bemerkte Schumann, daß des Nachts mit dem Sinken der Temperatur die Befruchtung stattfindet, indem dann die Samenanlage den von ihrer „Mikropyle“ ausgeschiedenen Tropfen, in dem der

* Die Stämme verwachsen leicht miteinander und täuschen dann enorm dicke Stämme, auf denen die Schätzungen beruhen, vor (vgl. unser Bild), doch sollen die Eiben im Park von Hamptoncourt bei London beglaubigt über 1000 Jahre alt sein.

Pollen schwimmt, durch die Druckdifferenz zwischen der Außenluft und der in der Samenanlage eingeschlossenen Binnenluft an sich reißt.

Alles an der Eibe deutet auf urweltliche Verhältnisse; dichterisch gesprochen, könnte man sagen: auf eine erlöschende Erterhaltungskraft. Das ungemein langsame Wachstum des Holzes und die Schwierigkeiten der Verbreitung drängen sie naturgemäß zurück im Wettbewerb der Pflanzen. Wenn ihr Samen nicht sofort zur Reifezeit in die Erde gelangt, braucht er 3—4 Jahre, bis er keimt, und sogar im günstigsten Fall noch immer 2—3 Jahre. So ist es denn wirklich nur noch eine Frage der Zeit, wann das Stündlein des letzten „Eibeneinsiedlers im Walde“ geschlagen hat.

Ausländische Koniferen im botanischen Garten zu Tokio.

Rechts im Hintergrund *Pinus Thunbergii* Parl. und *P. densiflora* Sieb. Die Tanne in der Mitte (rechts) ist *Abies firma* Sieb.; daneben steht *Cryptomeria japonica* Den. Der pinienartige Baum (links) ist *Pinus densiflora*. (Nach dem „Atlas of Japanese Vegetation“ von Prof. Miyoshi.)

Die Gartenfreunde werden von den Nadelhölzern nicht Abschied nehmen wollen, ohne Belehrung über den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse bezüglich der ausländischen Koniferen. Diesen wendet sich ja in steigendem Maße die Aufmerksamkeit des Gärtners zu. Und obzwar ich in diese Begeisterung für die Zusammenwürfelung von Bäumen aller Arten und aller Länder in unseren ohnedies barbarisch buntschedigen Villenvororten nicht gerade einstimmen kann, empfinde ich diesen Wunsch doch als berechtigt. Es gedeihen im deutschen Klima die sibirischen, chinesischen, japanischen und nordamerikanischen Bäume leicht, sogar solche vom Himalaja und von Nordpersien. Natürlich macht das den Wunsch rege, unsere Gärten mit fremden Neuheiten zu schmücken. Einiges darüber haben wir ja schon gesagt, und wenn wir aus dem großen Garten-

und Forstschritttum über diese Frage das Sichere herausholen wollen, so können wir hinzusetzen, daß die ersten Fachmänner (H. Mayr, Schwappach u. a.) die Bankskiefer (*Pinus Banksiana*) für die wertvollste amerikanische Einführung halten. Für dürre Sandgegenden ist sie unerseßlich. Neben ihr schätzt man die Douglastanne (*Pseudotsuga Douglasii*) und die Lawsonzypresse (*Chamaecyparis Lawsoniana*), weil sie beide raschwüchsig und nicht empfindlich gegen das deutsche Klima sind. Auch *Thuja occidentalis* ist ein unbezahlbarer Fremdling bei Aufzucht sowohl von kumpfigem als auch dürem Land.

In den Mitteilungen der Deutschen dendrologischen Gesellschaft (1905) werden in einer Zusammenfassung neuerer Erfahrungen über ausländische Koniferen außerdem noch *Larix leptolepis* und *Picea sitchensis* zum forstlichen Großbetrieb empfohlen, wozu wir auch noch wenigstens die Weimutskiefer rechnen möchten.

Erheblich größer ist die Anzahl der in den Gärten eingebürgerten Zierkoniferen. Wer jemals das schönste aller deutschen Eilande, die Insel Mainau, durchwanderte, von deren Anmut unsere Tafel nur eine sehr unvollkommene Vorstellung gibt, weiß es, welche Farbenpracht vom

Silberblausichte (*Picea pungens glauca*).

(Nach einer Aufnahme aus den Baumschulen von H. Weber & Co., Wiesbaden.)

dunkelsten Blau und Grün bis zu ganz goldgelben oder fastiggrünen, stahlblauen und silbergrauen Bäumen durch ausländische Nadelhölzer erzielt werden kann. Die Blausichte (*Picea pungens glauca*, siehe das Bild) gilt als die Königin der Fichten, Sequoia als die edelste Gestalt aller dieser Gartenpflänzlinge, die ganz oder halb goldfarbenen Zypressen und Lärchen als seltsamste Gäste im „Pinetum“. In unendlichem Wechsel gibt es da Gänge- und Trauerbäume, silberglänzende Abarten (namentlich Fichten), und noch immer verdrängen neue und fremdartige Einführungen und

Züchtungen die alten, so daß es schon eine ganze Wissenschaft für sich ist, sich im Koniferengehölz der großen Gärtner noch zurechtzufinden. Da ist eben alles der Mode unterworfen, die sich eines Tages ganz von den „Freilandkoniferen“ abwenden kann, so wie sie die Tulpenmanie verlassen hat oder in neuerer Zeit den Orchideen zuliebe die Rosen.

Im Schloßgarten zu Versailles.

Ewig schön und von jedem sinnigen Herzen verehrt bleiben aber die anspruchslosen Bäume des heimischen Nadelwaldes, dessen traute Heimlichkeit wenigstens mir viel mehr zu Herzen geht als die bunte Pracht der Ausländer, wenn ich sie auch bewundern muß.

Die Gnetazeen.

In Kürze muß hier zweier Übergangspflanzen von den Nachtsamigen zu den eigentlichen Blütenpflanzen deshalb gedacht werden, weil die eine zu den merkwürdigsten aller Pflanzenbildungen gehört, die andere aber durch die bereits erwähnten Untersuchungen von Borsch (vergl. S. 57) außerordentlich wichtig wurde zur Beurteilung der pflanzlichen Stammesgeschichte.

Tumboa Bainesii Hook. im Hereroland.

Tumboa Bainesii Hook. wurde bis vor kurzem noch als *Welwitschia mirabilis* bezeichnet und galt als wahres Pflanzenwunder der südwestafrikanischen Wüsten. Von Welwitsch wurde im Jahre 1860 in Voanda ein großes, über einen halben Meter hohes Gewächs entdeckt, das, dem Blütenkopf einer riesigen Sonnenblume nicht unähnlich, mit zwei 2—3 m langen, grünen, vielzerschligten Blättern auf dem Boden liegt. Aus dem holzigen, rübenartigen Strauch dieses Ungetüms brechen braune, nicht ganz nackte Blütenähren hervor, die sich später mit tannenzapfenartigen Früchten bedecken.

Man stelle sich nun vor, daß dieser Stumpf einen wahren Tisch von 4 m Umfang bildet und an 100 Jahre alt werden soll. Dann begreift man, daß die Hereros, in deren ödem Lande diese Gewächse ziemlich selten gedeihen, daran abergläubische Vorstellungen knüpfen. — Der andere Vertreter der Gnetazeen, dessen wir noch kurz gedenken wollen, ist ein schachtelhalmähnliches, bis 1 m hohes, graugrünes Rutengewächs der südöstlichen Steppengebiete Europas (bis Budapest!), das aber auch in den Mittelmeerlandern wächst, woher der deutsche Name Meerträubchen (*Ephedra*) dafür rühren mag. Auch dieser Strauch ist, so wie *Tumboa*, einem ausgesprochen trockenen Klima im ganzen Wuchs angepaßt. Warum er den Botaniker bedeutend mehr anzieht, als es sein gemeines Äußere verdient, darüber möge man auf S. 59 nachlesen. Anatomisch sind die *Ephedren* mit den echten Blütenpflanzen dadurch verknüpft, daß sie echte Gefäße besitzen!

Die bedecktsamigen Blütepflanzen

(Angiospermen).

Das botanische Institut Lamarcks im Pariser Jardin des Plantes.

Die Eigenarten der Angiospermen.

Unsere Leser wissen bereits von S. 57—60, welche Schwierigkeiten es der Forschung bereitet, die Bedecktsamigen zwanglos aus den Koniferen und Gnetazeen abzuleiten, obzwar die letzteren in mehrfacher Beziehung sowohl im Embryosack sowie in der Anatomie als auch durch manches Anzeichen für einen gewissen Schutz der Samenanlagen es bezeugen, daß sie die Nachkommen von Pflanzen sind, die im Begriffe waren, sich auf die stammesgeschichtliche Stufe zu heben, die wir jetzt als Angiospermen umgrenzen. Wir legen diesem Begriff etwa folgende Attribute bei:

Die Fruchtblätter der Bedecktsamigen bilden geschlossene Fruchtknoten, in denen die Sameneinlagen eingeschlossen sind. In den letzteren sind die Prothallien so rückentwickelt, daß sie nicht einmal mehr Archegonien herstellen*, sondern nur die Eizelle mit ihren Gehilfinnen, die man als letzte Überbleibsel (Rudimente) der Archegonien und des Prothalliums deutet. Die männlichen Gametophyten enthalten von den Anthridien nur noch die Zellkerne (Sexualkerne) und eine Zelle, die als Vorkeimrest gedeutet wird. Die Befruchtung erfolgt nie mehr aktiv, sondern durch Benützung des Windes (Beispiele: Gräser oder Käschenträger), des Wassers (Beispiele: Wasserpflanzen), namentlich aber mit Hilfe der Insekten, Vögel und anderer Tiere („schönblumige“ Pflanzen).

Es ist also eine Höherentwicklung, ein Komplizierterwerden, eine Verfeinerung der Hilfsmittel bei diesen Pflanzen zu bemerken, und wir haben dies historisch zu erklären. Sie sind weder größer noch dauerhafter als die Gymnospermen, also nicht im „Materiellen“ sind sie vorgeschritten, sondern im „Potentiellen“, in der Befähigung,

* Dies ist auch schon bei *Tumboa* der Fall.

in der „Anpassungshöhe“. Solche Riesen der Pflanzenwelt, wie die Mammutbäume, gibt es unter den Angiospermen nicht; wenngleich Eucalyptus als der höchste aller Bäume zu ihnen gehört, entspricht seine Masse doch nicht der einer Sequoia oder gar einem 300 m langen Tange. Es gibt vielmehr vorwiegend zarte und oft sehr unansehnliche Gewächse unter ihnen; aber stets sind sie von einer Feinheit und Mannigfaltigkeit der Hilfsmittel, die wir Anpassungen nennen, so daß sie jene Giganten durch „strukturelle Intelligenz“ weit überbieten. Man kann somit sagen, sie unterscheiden sich von den Gymnospermen und Kryptogamen

durch eine höhere Befähigung, also durch dasselbe, wodurch der Kulturmenschen von dem Urmenschen geschieden ist.

Schon diese Erwägung macht es unzweifelhaft, daß das Problem der pflanzlichen Stammesentwicklung ein Problem des pflanzlichen Innenlebens sei und auch von der Pflanzenpsychologie aus zu erforschen ist.

Wenn man diesen „Fortschritten“ der Organisation und Lebensweise (ich möchte fast sagen, dieser Kulturentwicklung der Pflanzenwelt) näher nachgeht, findet man bald heraus, daß der Bau der Vegetationsorgane sich weniger änderte als der der Blüte.

Es fällt auf, daß im Kreise der Angiospermen die Holzgewächse stark zurücktreten, während es unter den

Typen einfacher und hochangepaßter Angiospermenblüten.
1 = Einfache männliche Staubblüte (von Arisarum).
2 = Einfache weibliche Blüte (von Arum), nur aus Narbe und Fruchtknoten bestehend. 3 = Entwickeltere weibliche Blüte von Alocasia mit Griffel. 4 = Zwitterige, nackte Blüte (einer Aracee). 5 = Hochentwickelte, zwitterige Blüte (von Citrus). 6 = Höchstentwickelte Zwitterblüte (von Actaea). (Nach Baillon und Engler.)

Gymnospermen wieder gar keine Kräuter gibt. Doch kann dies vielleicht darauf beruhen, daß die zarteren Vertreter dieser älteren Gruppe im Laufe der Zeiten ausgestorben sind. Dagegen ist das Holz der angiospermen Bäume vollkommener gebaut; es besitzt Holzgefäße, die jenen fehlen. In großer Mannigfaltigkeit entwickeln sich bei den Bedecktsamigen auch allerlei Anpassungen zur Aufspeicherung von Nahrungstoffen, bald als Zwiebeln, bald als Knollen, Wurzelstöcke, wovon bei den Nacktsamigen nichts bekannt ist. Die ältere Botanik legte sich die Auffassung zurecht, daß innerhalb des systematischen Begriffes der Angiospermen die Tatsache eine weitere Entwicklung kennzeichne, daß ein Teil von ihnen bei der Keimung zwei Keimblätter entwickelt (Dikotyledonen), die anderen aber nur eines (Monokotyledonen, Spigkeimer). Die Spigkeimer wurden für die primitiveren gehalten, da vieles an ihnen, namentlich die Blütenbildung, einfacher ist als bei jenen. Es mußte aber bereits seit langem zugegeben werden, daß inmitten der Dikotyledonen (weil in jeder Beziehung mit solchen verwandt) gewisse Pflanzen, wie die Verchensporne, Zykamen oder das Scharbockskraut, echte Spigkeimer sind. Diese Einteilung ist also nur sehr cum grano salis zu nehmen.

Die neuere entwicklungsgeschichtlich-zytologisch forschende Systematik ist nun sogar im Begriff, diese ganze Auffassung auf den Kopf zu stellen, denn wenigstens die

Wettsteinsche Schule findet, daß sich von allen Angiospermen nur *Casuarina* (eine echt zweikeimblättrige Pflanze) von den Gymnospermen ableiten läßt, daß also die Dikotyledonen die stammesgeschichtlich älteren sind. Und Wettstein stürzt in seinem Handbuch der systematischen Botanik auf diese Vermutung hin denn auch die ganze systematische Anordnung der gesamten Gruppe dementsprechend um.

Der genannte Naturforscher erfreut durch den Mut, mit dem er der gerade in der Blütenpflanzen-systematik sehr zärtlich an Jahrhunderte alten Traditionen hängenden Forschung voranleuchtet, und er verdient sich das Prädikat, ein Führer seiner Wissenschaft zu sein, redlich durch den Scharfsinn und die bewunderungswürdig reichen Belege, mit denen er seine Theorie von der Entwicklung der Blüte der Angiospermen aus jener ihrer Vorgänger durchzuführen weiß.

Sein Gedankengang geht von der Betrachtung der einfachsten Blütenpflanzenblüte aus. Bei ihr gelangt das Pollenkorn unmittelbar auf die Samenanlage. Eine Weiterentwicklung konnte nur in einer Sicherung dieser Vorgänge bestehen. Eine

solche liegt bei den Angiospermen darin, daß die Samenanlage durch das Fruchtblatt umhüllt und so geschützt wird. Dadurch ist jedoch das Auffangen der Pollenkörner erschwert. Es wird einem besonderen Organ zugewiesen, zu dem sich jener Teil des Fruchtblattes umbildet, den man nun Narbe (Stigma) nennt, und der häufig bei den Blumen aus Zweckmäßigkeitsgründen am Ende eines besonderen Griffels sitzt. Beides fehlt den Gymnospermen aus der soeben angedeuteten Ursache gänzlich. In der Samenanlage selbst zeigen dagegen die Angiospermen eine Rückentwicklung. Sie haben keine Archegonien mehr, wie noch die einfacheren Gymnospermen. Aber es erwächst ihnen durchaus kein Nachteil daraus, denn sie behalten

Casuarina (torulosa Dryand.) (in der Mitte), eine den Gymnospermen am nächsten verwandte echte Blütenpflanze aus Australien.
(Naturaufnahme von S. Dopfer-München.)

ja die Eizelle. Die Vereinfachung ist vielmehr auch nur eine Bervollkommnung. Von den schon längst sinnlos gewordenen Rudimenten der einstigen Geschlechts- generation werfen sie eben noch mehr Ballast über Bord.

In den männlichen Geschlechtsteilen vollziehen sich weniger Änderungen. Das Staubblatt einer höheren Gymnosperme ist nicht viel anders als das einer Angiosperme. Die Samensädenbildung hat sich ja bereits bei den Nadelhölzern verloren. Schon bei ihnen wird durch aktives Wachstum des Pollenschlauches das Geschäft des Zusammenbringens der männlichen und weiblichen Kerne besorgt.

Inwiefern der Embryosack selbst neue Vereinfachungen eingeht, haben wir dem Leser schon des öfteren eingeprägt. Bei der Befruchtung der Angiospermen verweisen verschiedene Umstände auf ihren Zusammenhang mit Gymnospermen. In der Gruppe der Monoklamydeen (zu denen u. a. Buche, Nußbaum, Brennessel, Weide und Knöterich gehören) verstreicht, so wie bei der Kiefer, noch immer viel Zeit zwischen dem Anfliegen des Pollens und der wirklichen Befruchtung. Ein Neues liegt dagegen vor in der seltsamen „doppelten Befruchtung“, die Guignard entdeckt hat (vgl. Bd. II, S. 548), wobei das Wesen darin ruht, daß der dem Prothallium entsprechende sogen. vegetative Kern rückgebildet wird, während von den beiden Geschlechtskernen des Pollenschlauches nur der eine mit dem weiblichen Eikern verschmilzt, der andere dagegen die Polkerne des Embryosackes (bzw. deren Verschmelzungsprodukt) befruchtet. Aus der ersten Vermählung entsteht der Samen, aus der zweiten das den Embryo

Der doppelte Befruchtungsvorgang einer Angiosperme (*Lilium Martagon*).

1 = Ende des Pollenschlauches mit dem vegetativen Kern (v) und den zwei Geschlechtskernen (g). 2 = Embryosack vor der Befruchtung mit den Polkernen (p) und dem Eikern (e). 3 = Der Augenblick der Befruchtung. Ein Geschlechtskern des Pollenschlauches verbindet sich mit dem Eikern (e), der andere mit den beiden Polkernen (p).

(Nach Guignard.)

ernährende Gewebe (Endosperm). Wir wissen schon, daß diese Vorgänge bei den Nadelhölzern sich anders abspielen, aber wir werden durch die merkwürdig wurmförmige Gestalt (s. Bild) der generativen Kerne auch daran erinnert, daß an ihrer Stelle bei den Kryptogamen und noch bei Ginkgo Spermatozoiden die gleiche Aufgabe ausführen.

Nach außen hin bieten aber dieser Geschlechtsakt und seine Folgen oft ein ganz anderes Bild als bei den Gymnospermen. Darüber entscheiden allerdings weniger die Abstammungsverhältnisse als ein biologischer Umstand, nämlich ob die betreffende Pflanze ihren Pollen dem Winde anvertraut oder Tieren. Demgemäß richtet sie ihre Blüte ein. Diesen Satz unterschreibt jeder Botaniker, mag er auch sonst noch so sehr von den in diesem Werke vertretenen Anschauungen abweichen. Aber wenn er das zugibt, dann hat er sich damit auch auf die Seite jener gestellt, welche die wahre Ursache der Anpassungen im Physiologischen, im Innenleben der Pflanze suchen, wobei zu bedenken ist, daß es keine Physiologie ohne Psychologie gibt. An diesem Punkte fügen wir der bloßen Beschreibung des Erkannten

wieder unsere eigene Ansicht hinzu und weichen von Wettsteins Wege, dem wir bisher gefolgt sind, ab. Dieser Forscher knüpft nämlich an diesem Punkte an die Selektionstheorie an. Dem können wir nur sehr bedingt folgen. Wir geben zu, daß die Insekten Zuchtwahl üben, die honigreicheren und auffälligeren Blumen auffuchen und dadurch die anderen nicht zur Fortpflanzung gelangen lassen — bis zu einem gewissen Grad. Aber wir rufen uns aus der Blütenbiologie in das Gedächtnis, daß die Blüte zur Selbsthilfe durch Autogamie befähigt ist und davon so reichlich Gebrauch macht, daß Insektenbesuch für die einzelne Blütenpflanze nichts Lebensnotwendiges ist. Außerdem bedeutete für die Pflanze der Übergang von der Windbestäubung zur Anpassung an Insekten nur eine Sparsamkeit. Sie kann dadurch zwar größere Ausgaben an Pollen vermeiden, vermag sich aber auch bei schlechterer Wirtschaft ganz gut zu erhalten, wofür die 10000 existierenden anemophilen Blütenpflanzenarten Zeugnis ablegen. Es fehlt demnach an der wichtigsten Vorbedingung, um die Selektion als genügendes Erklärungsprinzip für die Blütenformung einsetzen zu können: es fehlt der harte und unbedingte Zwang. Die von den Insekten verschmähten Blüten werden dadurch nicht ausgemerzt. Warum entwickeln sich also so wunderbare, tausendgestaltige Blüten? Dies haben wir erst zu erforschen. Wir wissen es noch nicht. Als Arbeitshypothese empfiehlt sich hierzu ebenso gut die Pflanzenpsychologie wie die Selektionshypothese. Da wir gerade im Blütenleben hunderterlei Spontanitäten, selbstverursachte, bestimmt gerichtete Bewegungen und sonstige Handlungen, wie Erzeugung von Duft- und Lockstoffen, zu ökologisch passender Zeit und am richtigen Ort bemerken, so hat die Ansicht von vornherein die schwersten Argumente für sich, die im Innenleben der Blüte, in ihrer „Befähigung“ die Triebfeder der Blütenanpassungen sieht und sich durch deren physiologische Analyse diesem interessantesten Problem der ganzen Botanik zu nähern sucht. Hier eröffnet sich ein neuer Forschungsweg, den erst ganz wenige Pflanzenforscher betreten haben, so etwa Delapino, Hansgirg, von dem aber (meine in der Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre [Bd. III] veröffentlichten Untersuchungen über die Parnassia-Blüten und eine neue Arbeit von Prof. Fitting machen mir Mut, solches zu behaupten) eine völlige Umgestaltung der Botanik zu erwarten ist.

Bevor in diesem Sinne genügend gearbeitet worden ist, muß naturgemäß die Deutung der Blütenteile auf ihre stammesgeschichtliche Herkunft und ihre „Wertigkeit“ die größten Schwierigkeiten bereiten. Zu sehr verschlingen sich darin Anpassungen mit „organisatorischen Erbstücken“. Schließlich haben wir auf die Hauptfrage nach dem Wesen der Blüte, als Umformung des Gametophyten und Verschmelzung zweier Generationen in einem Pflanzenstock, bereits Antwort, ebenso auf die morphologische Grundfrage, welche letztere Antwort uns schon seit Goethes Metamorphosenlehre darüber beruhigte, daß alle Blüten nur umgewandelte Blätter sind. Die Einzelheiten würden nur mehr verwirren als belehren, besonders da sie so lückenhaft bekannt und in den Streit der Meinungen verstrickt sind; daher lassen wir sie lieber weg.

Wenden wir uns nun der Frage zu, welche systematische Anordnung der Angiospermen wir befolgen sollen, die von Engler-Eichler oder die von Wettstein, so wollen wir der letzteren zwar anerkennend gedenken, uns aber lieber der ersteren befleißigen. Und zwar aus den nachfolgenden Gründen:

Unsere Wissenschaft steht gerade erst am Beginn der Einsichten, daß die Monokotyledonen und Dikotyledonen nicht zwei völlig getrennte Äste am Stammbaum der Pflanzen sind, sondern, wie es scheint, bereits gemeinsame Ahnen von Angiospermentypus hatten, von denen sich die Monokotyledonen frühzeitig abzweigten. Völlig unmöglich ist es, die Zweikeimblätterigen aus den Spizkeimern abzuleiten. Das steht bereits fest. Mehr aber nicht, wenigstens unserer Ansicht nach. Da scheint es denn sehr mißlich, das ganze altgewohnte System auf den Kopf zu stellen und bei fast jeder Familie sich in neue Schwierigkeiten zu verwickeln. Denn phylogenetische Fragen sind ganz anders zu behandeln als z. B. neue Einsichten der Physiologie. Wenn auch nur an einem Gewächs Sicherheit erlangt ist darüber, daß in seinem Lebensgeschehen Selbstbestimmung zutage trete, kann und muß auf Grund dessen die gesamte Tropismenlehre und Lebenskunde völlig neu durchgearbeitet werden. Anders aber, wenn, wie im gegebenen Fall, die Gewißheit erlangt wird, daß irgendeine dikotyle Pflanze den Gymnospermen näher stehe als sämtliche Monokotyledonen. Daraus entsteht zwar auch ein Umsturz vieler Begriffe; aber ohne besondere Detailuntersuchungen ist nicht zu erkennen, welcher Art nun die weiteren stammesgeschichtlichen Zusammenhänge von Familie zu Familie und Gruppe zu Gruppe sind. Solche Einzelarbeit steht aber noch aus. Darum wollen wir die neue Einsicht zwar in ihrem Werte als Revolutionsprinzip gehörig würdigen, aber schließlich uns in der alten Form noch so lange bewegen, bis die neue einigermaßen feststeht.

Wir beginnen also unsere Einzelschilderungen wieder mit den Spizkeimern. Bevor das geschieht, soll jedoch einiges über deren gemeinsame Eigentümlichkeiten gesagt werden. Man muß es nämlich doch zugeben, daß die Aufstellung dieser beiden Pflanzengruppen dadurch berechtigt war, daß sich wirklich eine große Zahl einheitlicher Merkmale sowohl bei Spiz- wie bei Zweikeimern vereinigt findet.

Man erinnere sich nur daran, daß Gräser, Lilien und Hyazinthen, Palmen, alle Spizkeimer sind, und man erinnert sich auch schon eines gemeinsamen Kennzeichens: die Blätter aller dieser Gewächse sind sehr einfach gestaltet, mehr oder minder alle „linealisch“, und ihre Blattnerven verlaufen parallel. Von dieser Regel machen indes manche insofern eine Ausnahme, als die Alraeen verschieden gestaltete Blätter besitzen. Auch im Wurzelsystem findet sich häufig die Übereinstimmung, daß an Stelle einer wohl ausgebildeten Hauptwurzel ein großer Schopf von Nebenwurzeln zur Entwicklung kommt, denen sekundäres Dickenwachstum fehlt. Die Anatomie des Stammes verrät eines der als Schulbeispiel dienenden Merkmale der Spizkeimer. Es fehlt dem Stamm das Dickenwachstum; seine Gefäßbündel sind geschlossen und stehen nicht im Kreise, sondern über den ganzen Querschnitt zerstreut. Und schließlich läßt sich auch in der Blüte ein gemeinsamer Charakter erkennen. In auffallender Weise herrscht in ihr die Dreizahl (manchmal auch die Zweizahl). Wenn das auch durch manche Abweichung verwischt erscheint, so ist doch die ganze Gruppe darin einig, daß die bei den Dikotyledonen so häufige Fünfszahl bei ihnen durchaus fehlt.

France, Das Irben der Pflanze.

KOSMOS
DE JOURNAL
STUTTGART

Verlandungs-Bekänder.

(Nach Potonié-Götsch, Vegetationsbilder. Verlag von J. K. Schreiber, Eßlingen.)

Süßes im Vordergrund Sumpfsüßes (*Stachys palustris*) — daneben *Equisetum heliocharis* — dahinter Sumpfsüßes (nicht und Röhricht (*Megacarpus trifoliata*). Vor diesen eine rotblühende Schwammbüchse (*Ranunculus nemorosus*). — Neben blühende Weide (*Salix caprea*). Dahinter ein Weidenbaum (*Salix alba*). Neben diesen der weißblühende Weidenbaum (*Salix alba*). Dahinter der rotblühende Weidenbaum (*Salix alba*). Ganz hinten Röhricht (*Typha*), Weiden (*Salix*), im Vordergrund weiße Seerosen (*Nymphaea*), daneben Goldfisch (*Hydrocharis morsus ranae*) und Pfeilraut (*Sagittaria*). Im Mittelgrund gelbe Seerosen (*Nymphaea*) und Pfeilraut, dahinter Wasserlinsen (*Stratiotes aloides*).

Die Verlandungspflanzen.

Die zunehmende „Entnatürlichung“ unserer Heimat wird dem Naturfreund wohl durch nichts so fühlbar, wie durch das rasche Verschwinden der Sümpfe mit ihrer bezaubernd reichen und bunten Pflanzen- und Tierwelt. Mögen die Naturwälder auch zurückgedrängt werden, der Forst bringt doch so ungeheuren wirtschaftlichen Nutzen, daß man ihm immer mehr Rechte einräumt, und neuerdings, seitdem man erkannt hat, daß gemischter Wald das wertvollste Erträgnis gibt, nähert man die Forste sogar wieder künstlich „natürlicheren“ Zuständen an. Auch Wiesen und Triften erhält man, und um die Eigenart der Alpenwelt zerstören zu können, dazu ist der Mensch doch zu schwach. Aber der Sumpf ist bei uns überall dem Untergang geweiht, und so kommt es, daß wenigstens in Mitteleuropa schon heute alle jene Sumpfpflanzen und -Tiere, die sich nicht in andere Schlupfwinkel retten konnten, auf nur noch ganz geringfügige und zerstreute Fleckchen zurückgedrängt sind. Wirklich große Sümpfe gibt es in Europa nur noch im Osten, in Rußland, Ungarn und auf der Balkanhalbinsel.

Die Natur scheint dies so beschlossen zu haben, würde einer der alten „Physiko-teologen“ sagen, wenn man zu seinen Zeiten schon gewußt hätte, daß alle Sümpfe die natürliche Tendenz haben, sich in Wiesen umzuwandeln, daß also der Mensch, wenn er sie austrocknet, nur einen natürlichen Vorgang beschleunigt. Wissenschaftlich bezeichnet man das als Verlandung und kennt diese nun bereits in allen Einzelheiten.

Man weiß, daß jeder See, jeder Teich einer langsamen, aber sicheren Verlandung entgegengeht, und pessimistische Gemüter erblicken darin einen Schritt auf dem Wege des graufigen Weltenschicksals, dem auch die Erdkugel so ausgesetzt ist, wie alle Gestirne, nämlich zu vertrocknen, weil auf ihnen das freie Wasser immer mehr in chemisch gebundenes Wasser umgesetzt wird.

Die Verlandung erfolgt meist in folgender Weise:

Das Röhricht an der windstillen Seite der Ufer eines süßen Gewässers gibt zahlreichen kleinen Gewächsen Unterschlupf. Da schaukeln sich Algenwatten, und Wasserlinsen gleiten mit freundlichstem Gelbgrün, Binsen stellen ihr Blätterwerk auf, und Wasserrosen liegen friedlich auf dem Spiegel des ruhigen Uferwassers. Sie alle lassen jeden Herbst zahllose tote Blätter zu Boden sinken, zwischen dem Röhricht sammeln sich Schlamm und vor allem zahllose Nester von Kleinwesen, und so erhöht sich jedes Jahr der Bodensatz um ein Unmerkliches. Viele Jahre schaffen daraus ein Sichtbares. Auf dem weichen Faulschlamm siedeln sich alsbald Wasserkressen, Schlammstachelhalme, Sumpfsiebes, große Vergißmeinnicht und Hahnenfüße an; ihr Wurzelwerk verfilzt sich, Gräser kommen hinzu, und schließlich entsteht eine grüne Decke, die schon dem einzigen Sumpffarn unserer Heimat (*Aspidium thelypteris*), Schierlingen und anderen mächtigen Gewächsen den Boden zubereitet. Ist es einmal so weit, so beginnt das Niedgras seine Herrschaft. Mit dichten Schöpsen und Rasen wuchert es und befestigt den dem Wasser abgerungenen Uferrand dermaßen, daß nun Weiden und Erlen Halt finden. Das Röhricht aber wandert wieder einen Schritt weiter hinaus auf den freien Wasserspiegel. Bald folgt ihm die bunte Schar nach. Einzelne der Pflanzeninseln reißen ab, treiben bei Stürmen und Hochwasser ins tiefere Wasser und werden dort zu Mittelpunkten einer Inselbildung. Im Wasser selbst erstehen dem Teiche Feinde.

Schwimmende Flottillen der Wasserschere verbünden sich mit Tausendblatt, Hornkraut und Laichkräutern, Wasserranunkel und Froschbiß vermehren sich, und im ungleichen Kampf zwischen dem sich nicht vermehrenden Element und dem so fruchtbaren Leben unterliegt allmählich das erste. An immer weniger Stellen bligt noch klares Wasser;

in einem Lenz ist endlich alles bis auf wenige Pfützen überwuchert, und der Teich ist in einen Sumpf verwandelt. Bei den Seen dauert es ein Jahrtausend länger, aber auch sie entgehen der Verlandung nicht. Der größte Teil unserer Moore und Sümpfe war ehemals stille, weite Gewässer.

Der Sumpf aber erhält sich auch nicht. Moose, Seggen und tausend Blumen saugen sein übermäßiges Wasser so lange auf, bis es auch für sie nicht mehr reicht; dann treten sie von der Bühne ab, die feuchte Wiese wird allmählich trockener, Gebüsch und Gehölz schatten darüber und kündigen an, daß es sich bald entscheiden werde, ob dem Wald, der da sprechen will, nicht das Klima Halt gebietet.

Es ist nun eine sehr merkwürdige Tatsache, daß diese durch ihre gleichmäßigen Lebensverhältnisse auch ziemlich einheitlich angepasste Verlandungsvegetation zum großen Teil aus Gewächsen besteht, die auch in systematischer Beziehung zusammengehören. Es will einem unbedingt mehr als ein Zufall dünken, daß die aus dem Wasser emporsteigenden, daß die das Wasser überwindenden Pflanzen just auch zu den einfachsten wahren Blütenpflanzen gehören, die, wie wir bereits wissen, stammesgeschichtlich wirklich den Schritt getan haben, endgültig dem Wasserleben zu entsagen.

Der Rohrkolben (*Typha*) und Igelkolben (*Sparganium*), die Laichkräuter (*Potamogeton*), der Froschlöffel (*Alisma*) und Froschbiß (*Hydrocharis*), Pfeilkraut (*Sagittaria*) und Schwanenblume (*Butomus*), Wasserschere

(*Stratiotes*) und Wasserpest (*Helodea*), sie gehören mit zu den wichtigsten Verlandungspflanzen, sie aber sind mit ihren Verwandten nun auch an der Reihe, um in ihrem Bau und Leben von uns liebgewonnen zu werden.

Typha latifolia [Trn.] L. und *T. angustifolia*, der gewöhnliche Rohrkolben am Teich- und Flußufer, kann zwar am wenigsten darauf Anspruch machen,

Igelkolben (*Sparganium simplex*) [1—2] und Rohrkolben (*Typha latifolia*) [3—4].
1 = Ganze Pflanze. 2 = Weibliche Blüte. 3 = Früchtchen von *Typha*. 4 = Kolben (Blütenstand) von *Typha*. (Nach Segts Flora und Engler-Prantl.)

denn würde nicht sein braunschwarzer, bekannter Blütenkolben noch aus der Zeit der seligen „Makartbutetts“ da und dort als „Zierde“ der Kleinbürgerwohnung gelten, so müßte ich ihn wohl erst des langen und breiten beschreiben, damit man wisse, welche Pflanze unter diesem Namen gemeint sei. Die Asiaten kennen sie allerdings von einer „interessanteren“ Seite.

Sie essen nämlich den zucker- und stärke-mehlhaltigen Wurzelstock und machen dieserhalb in China aus dem beschriebenen Rohrkolben sogar eine „Feldfrucht“. Es hat sich übrigens auch unser Volk diese Pflanze mehrfach, wenn auch in primitiver Weise, zum Fässerverstopfen usw. nutzbar gemacht.

In biologischer Hinsicht ist an ihr mancherlei zu merken, wovon man in den botanischen Handbüchern gewöhnlich nichts findet. Da wäre allem voran zu sagen, daß sie der einzige der Spizkeimer ist, der mit einer echten Pfahlwurzel feimt. Allerdings verliert auch sie diese später und bildet dann einen mächtigen, oft bis 2—4 m langen, im Boden weit- hin kriechenden Wurzelstock, aus dem unmittelbar Wurzelfasern entspringen. Durch diese Wurzelstöcke wird der Rohrkolben gerade als

Ein Schraubenbaum (*Pandanus*) im Münchner botan. Garten.
(Aufnahme von H. Dopfer-München.)

Verlandungspflanze ein wichtiger „Erdbildner“. Denn er verhindert das Abschwemmen des Schlammes und verleiht ihm so viel Festigkeit, daß er anderen Gewächsen dienlich ist. So dicht durchzieht er schon in einem Sommer den Schlamm mit einem wahren Filz von Wurzelfasern, daß er meterweit eine feste Insel für viele Jahre lang darstellt.

Blütenbiologisch ist von ihm zu sagen, daß er so ziemlich eine der einfachsten aller Angiospermenblüten hervorbringt, die sich sowohl bei der Pollen- wie Samenverbreitung völlig dem Winde hingibt, auch mit den zahlreichen Haaren an der Blüte, die von einigen Naturforschern, so besonders von A. Diez, als eine in Haare zerfallige Blütenhülle aufgefaßt werden, einer Windverbreitung der Früchtchen angepaßt ist. Niemand, der es nicht weiß, würde in den zwei übereinanderstehenden Kolben die männlichen und weiblichen Blütenstände vermuten, von denen die ersteren die männlichen sind.

In dieser einfachsten Ausstattung seiner Fortpflanzungsorgane kommt der Rohrkolben dem an ähnlichen Orten wachsenden, nur viel niedrigeren Zgelfolben (*Sparganium ramosum* Huds.) gleich, der seine Blütenkölbchen an einem verzweigten Stengel trägt wie pugige, erst grüne, dann dunklere Morgensternchen, an denen aber immerhin schon zarte Blütenhüllblätter vorhanden sind. Es ist die erste „wahre“ Blüte, die uns darin entgegentritt. Diese Blütenhülle ist auch eine der Hauptursachen, warum man dem Zgelfolben eine besondere Familie zugewiesen hat.

Die einhäufigen Blütenstände dieser Pflanze sind protogyn, d. h. die Narben der weiblichen Blüte sind schon zu einer Zeit empfangsfähig, da die Staubfäden noch nicht reifen. In dieser „Zeitanpassung“, die durch keine Selektion, sondern nur physiologisch erklärt werden kann, hat die Pflanze ein gutes Mittel erworben, um die Selbstbestäubung zu verhindern, die nach den bekannten Untersuchungen Darwins den Gewächsen nicht zuträglich ist. Daß jedoch (und auch das gilt für *Typha*) die beiden Blüten in großen Kolben dicht beisammenstehen, gibt doch wieder die Möglichkeit einer Selbstbefruchtung, wenn der Wind versagt. Andererseits liegt auch darin ein Vorteil, daß so viele Narben in einem Kolben vereinigt sind; bieten sie doch damit dem Blumenstaub um so leichter eine Haftfläche. So ist sogar eine so einfache Blüte schon eine Fülle anziehendster Zweckmäßigkeiten.

Mit den Sparganien ganz nahe verwandt ist übrigens ein mächtiger Baum der asiatischen und afrikanischen Tropen, dem man in den Gewächshäusern schon deshalb gerne Platz gewährt, da er mit dem mächtigen Stelzengerüst seiner Luftwurzeln einen höchst malerischen Anblick gewährt (siehe das Bild). Das sind die Schraubenbäume (*Pandanus*), die der Unkundige stets für Palmen hält, wovon ihn aber der Botaniker durch die Mitteilung abbringen kann, daß die Palmblätter stets zerteilt, die der Pandanen aber stets einfach und meist dornig sind (vgl. Bild in Bd. I, S. 31). Die prachtvoll spiralförmige Anordnung der Blätter mancher Arten, so des aus dem Münchener botanischen Garten hier abgebildeten mächtigen Pandanus, beruht auf dem Streben nach

Stelzengerüst der Luftwurzeln von *Pandanus furcatus* Roxb. (Original von H. Dopfer-München.)

besserer Lichtausnützung, denn die gewaltigen Blätter würden einander verdecken, wenn sie wagrecht übereinanderfallen würden. Man hat diese eigenartige senkrechte Stellung auch dahin gedeutet, daß der Baum dadurch den allzu grellen Sonnenstrahlen ausweicht.

Als Anpassung ist auch das Gestell der Luftwurzeln aufzufassen. Die *Pandanus*-Arten gehören nämlich zu den Charakterpflanzen der tropischen Strandvegetation. Sie sind also dem Anprall der Winde besonders ausgesetzt und wurzeln dazu auch noch in durchtränktem oder lockerem Boden. Sie bedürfen also des Mittels, das ihnen unter solchen Umständen höchst dienlich ist, und von dem man doch schwer behaupten kann, es sei nur eben „zufällig“ da. Man darf jedoch hierbei auch nicht außer acht lassen, daß diese Stützen, die zuweilen so hoch sind, daß ein Reiter bequem unter ihrem Bogen durch kann, auch die Tragfähigkeit der dünnen, nicht in die Dicke wachsenden, dagegen oft vielverzweigten Stämme sichern.

Die Blüten dieser Bäume stehen oft in riesigen und, trotzdem die Einzelblüte jeder Blütenhülle entbehrt, höchst auffälligen Blütenständen beisammen und verraten die Fähigkeit zur direkten Anpassung unwiderleglich dadurch, daß sie nach Warburg an den die Meeresküste und die Ufer bewohnenden Arten anemophil sind, an den *Pandanus* des Waldesinneren dagegen auf Insektenbestäubung rechnen, weil sie ihren Pollen warzig gestalten, intensiven Duft ausströmen und aus hellgefärbten Hochblättern sogar einen primitiven Schauapparat herstellen.

Eine verwandte Pflanze von Java und den Südseeinseln (nämlich *Freycinetia*) ist dadurch sogar ein blütenbiologisches Unikum geworden, daß sie als auf Bäumen kletternder Strauch ihre einfachen Kolbenblüten mit karminroten Hoch- und Deckblättern auf das prächtigste umhüllt, ja durch besondere fleischige, süße „Beföstigungskörper“ so anziehend zu gestalten weiß, daß sie eifrigst des Nachts von kleinen Fledermäusen besucht und befruchtet wird.

Wenn wir nach diesem kleinen Ausflug zur tropischen Verwandtschaft wieder zur Verlandungsflora zurückkehren, müssen wir der Laichkräuter (*Potamogeton*) und ihrer Verwandten gedenken, die im Meere ein Gegenstück im gemeinbekannten Seegras (*Zostera*) finden. *Potamogeton* ist, wie die deutsche Flora besagt, ein ganz gewöhnlicher Bewohner der Seen und Flüsse von etwa 4—8 m Tiefe, wo die Pflanze oft auf weithin unterseeische Wiesen bildet und im Verein mit Tausendblatt und Hornkräutern im stehenden Wasser viel zur Verlandung beiträgt. Manchenorts, so in vielen Alpenseen oder im „Balaton“, wuchert sie so massenhaft, daß sie den Badenden Gefahr bringt, sich im unterseeischen Gefräß zu verstricken. In Ungarn hat man vor dem „hinär“ darob großen Respekt, obwohl ich wenigstens am Plattensee nie von einem derartigen Unglücksfall hörte. — Es wird wohl wenig Tümpel und Teiche geben, in denen von den fast zwei Duzend deutschen Arten, nicht wenigstens *P. acutifolius*, *natans* oder auch das glänzende *P. lucens* wucherte, oft so dicht, daß sie das Wasser bis oben hinauf erfüllen zur Wonne zahllosen Kleingetieres, das dazwischen seine Sicherung findet, so wie die Fische auch ihren Lieblingslaichplatz, was ja der Pflanze ihren Alltagsnamen eintrug. Es ist scheinbar nicht viel an dem Laichkraut zu sehen, nur ein flutendes, binsenförmiges, fein zerschlitztes oder lederiges, längliches und krauses Blattwerk. Doch trügt der Schein, und das Gewächs verdient eifriges Studium, ist es doch durch und durch anpassungsfähig und interessant.

Schon der Bau der Blätter ist von einer entzückenden „regulativen Plastik“, wie es die Fachsprache des Pflanzenanatomien nennt. Je nachdem, ob es untergetaucht ist oder auf dem Wasser schwimmt, ob es in ruhig stehendem Wasser wächst oder im Flusse fluten muß, fügt dieses Blatt seine Bausteine anders und zwar stets so, daß dem jeweiligen Bedürfnis Rechnung getragen ist. Für Freunde pflanzenanatomischer Studien eröffnet das Stunden genutzreicher Selbstbildung. Die untergetauchten Blätter erzeugen in den Oberhautzellen „Eplastiden“, d. h. kleine, farblose Plättchen, die E-

tröpfchen abcheiden. Von diesen rührt der Glanz des *P. lucens*, das im Bodensee so eigen glitzernde Wiesen bildet. Der Nutzen besteht darin, daß die Blätter kaum benetzt werden. Das „submerse“ Blatt hat reichlich große Atemhöhlen und Luftlücken im Innern, das flutende ist durchaus zugfest gebaut.

S. Schwendener zeigte, daß die in stehendem Wasser lebenden Laichkräuter (z. B. *P. crispus* oder *densus*) nirgends mechanische Zellen im Stengel erzeugen, um so mehr aber *P. lanceolatus* oder *longifolius*

1 = *Potamogeton densus* L., oberer Teil eines blühenden Sprosses. 2 = *P. fluitans* Roth., flutender und fruchtender Laichsproß. 3 = Winterknospe von *P. coloratus*. 4 = *P. compressus* L. 5 = Früchtchen von *P. pusillus* L. 6–7 = Blüte von *P. crispus* L. (6) und ein Staubblatt mit der „Mittelbandschuppe“ (7).
(Nach Hegis und Thomes Floren.)

als Bewohner strömenden Wassers. Diese haben sogar im Rindengewebe derbe Bastbündel, wodurch dem Zerreißen vorgebeugt ist. Daß für ein solches Blatt gitterförmige Nervatur die allein zweckmäßige ist, daß es Spaltöffnungen nicht brauchen kann, wohl aber (auf der Oberseite) wenn es an der Wasseroberfläche schwimmt, daß sich die Blattstellung an den Stengeln jeweils der Sachlage anpassen muß, daß alle diese Erfordernisse aber auch wirklich erfüllt sind, kann uns nach so vielen Belegen für die „strukturelle Intelligenz“ der Pflanzen eigentlich nicht wundernehmen. Trotzdem erstaunt auch der abgehärtete Pflanzenbewunderer vor der Einrichtung der Winterknospen dieser Gewächse. Sie schützen sich teils vor den Gefahren des Wintereises durch knollentragende Ausläufer, aber sie greifen auch zu einem noch besseren Mittel. Bei gewissen Arten (*P. crispus*, *coloratus*) schnüren sich von den sproßenden eine Art Brutknospen oder auch ganze Zweigchen (sogen. glasige Zweige) ab, die zu Boden sinken und, im Schlamm wohlverwahrt überwintend, das Geschlecht im Lenz neu aufleben lassen. Woher merkt denn das Laichkraut, daß nun eine gefährliche Zeit naht, wie erwarb es die Fähigkeit zu einer Handlung, die man bei einem Tiere ungeschämt als Instinkt ansprechen würde?

Brächtige Anpassungen enthüllt auch ihr Blütenleben. Um die Zeit, da es in ihr zum Blühen drängt, streckt sie den Trieb kühn über das Wasser empor. Sie ist ein

Windblütler, der aus einem zarten, einfachen Blütenstand eine Unmenge Pollen den Lüften anvertraut. Die vier Staubblätter treiben noch eine große, schaufelförmige „Mittelbandschuppe“ (siehe das Bild), die offenbar dem Zwecke dient, den Pollen aufzufangen, der an langen Narbenfäden hängenbleibt. Das wäre nur etwas Gewöhnliches. Ungewöhnlich vielsagend für das Innenleben des Laichkrautes ist jedoch, daß es nach der Befruchtung selbsttätig seinen Blütenstand wieder unter das Wasser hinabzieht (was übrigens einige nordamerikanische *Potamogeton* auch mit der Blüte machen)

und unterseeisch seine Steinfrüchtchen reift, die von Fischen, noch mehr von Vögeln verbreitet werden, so daß die Laichkräuter den ganzen Erdball besiedeln konnten. Diese Gewächse sind durch ihre außerordentliche Anpassungsfähigkeit, die

ja soweit geht, daß sich manche nordamerikanische Arten (z. B. *P. diversifolius* Raf.) auch unter dem Wasser selbst befruchten (Kleistogamie), vielenorts zur Zeitform der Wasservegetation geworden und sind, da sie durch ihre Kohlensäureassimilation gewöhnlich sehr viel Kalk auf ihren Blättern niederschlagen*, als wichtigste Kalkbildner des Süßwassers sogar von Bedeutung für die Bildung der Erdrinde. Das Überwuchernde,

Seegräser.

1 = *Zostera marina* L., fruchtendes Exemplar. (Nach Reichenbach.)

2 = *Posidonia oceanica* [L.] Del., blühende Pflanze. (Nach Savolini.)

3 = *Phyllospadix Scouleri* Hook., unfruchtbarer stütender Rasen. (Nach Rupprecht.) Sämtlich verkleinert.

Massenhafte des Vorkommens teilen sie mit allen Wasserpflanzen ihrer engeren Verwandtschaft, von denen namentlich die Seegräser des Meeres und der Binnengewässer in mehrfacher Beziehung Aufmerksamkeit heischen. Die schön gezähnten Nixenkräuter (*Najas*) der norddeutschen Seen, die Leichfäden (*Zauulichellia* und *Ruppia*), die auch in salzhaltigen Teichen (so bei Staßfurt) des Binnenlandes so gut gedeihen wie an dem Meeresstrand, sind zu selten, um eingehendere Darstellung zu verdienen, nicht so das gemeine Seegras (*Zostera marina* L. und *Z. nana* Roth.), von dem auch eine Reihe von Merkwürdigkeiten bekannt ist.

Wenn man sich Venedig von der Landseite aus nähert und die meilenweit gestreckten Seegraswiesen der Lagune sieht, die bis weit in die Kanäle der Stadt hineinreichen, bekommt man einen Begriff von der Fruchtbarkeit dieser Pflanze; wenn man

* Daher auch als Dünger verwendbar.

dann an den deutschen Küsten nach stürmischen Tagen die mannes hohen Wälle ausgeworfenen Seegrases sieht und hört, daß sich das gleiche an den Küsten der neuen Welt, den Ufern des stillen Ozeans, wiederholt, da lernt man diese häßliche und unansehnliche Pflanze doch mit anderen Augen anschauen und sie als ein von der Natur den Erfindern angebotenes Kapital schätzen, von dem man nur viel zu wenig Gebrauch macht. Zwar sammelt man allein an dem Holsteiner Strande eine halbe Million Pfund Seegras jährlich und in den Niederlanden noch mehr. Seit es der dänische Justizrat Lehmann im Jahre 1816 als Polstermaterial empfohlen hat, weiß man es auch rentabler zu verwenden als nur zum Düngen. Das findige Volk der Yankee's soll sogar gepreßtes Seegras, mit Tangen vermischt und in siedendes Pech getaucht, zur Herstellung eines geräuschdämpfenden Straßenpflasters verwenden können, mit dem z. B. Baltimore gepflastert ist. Die Pflanze hat also jedenfalls eine industrielle Zukunft und harret ihres „Impresario“.

„Rein botanisch“ ist sie auch nicht alles Interessess bar. Ist sie doch eine Blütenpflanze, die es in Flut und Ebbe nicht wagen darf, Blüten so kühnlich über den Wasserspiegel emporzurecken wie das Laichkraut. Wie stellt sie es nun an, um unterseeisch zu blühen? Sie entwickelt einen Blütenkolben, der ganz in eine schützende Blattscheide eingeschlossen ist. Darin sind die Geschlechtsorgane in zwei parallelen Reihen angeordnet. Die Blüte enthält nur das Allernotwendigste, und die Befruchtung geht unter dem Wasser vor sich. Es paßt sich dazu der Pollen dem Medium, in dem er tätig sein soll, an, er wächst zur Zeit der Reife zu einem Faden von 2 mm Länge, aber nur $\frac{2}{1000}$ mm Dicke heran. Mit anderen Worten, er wird fadenalgenförmig. Die Narben wieder sind sehr lang und auch fadenförmig, so daß sie der Pollen leicht treffen kann. Bei anderen unterseeischen Pflanzen dieser Gruppe, so bei der im Mittelmeer und an den Küsten des Atlantik lebenden *Cymodocea nodosa* Asch., bilden die bis 1 Dezimeter langen Narbenfäden einen wahren Keusenapparat, der die Pollenfäden leicht auffängt.

Wir haben bei der Erörterung dieser Verhältnisse länger verweilt, da es sehr zur Klärung unserer allgemeinen Vorstellungen vom Wesen der Pflanze beiträgt, sich möglichst unvergeßlich zu machen, wie gesetzmäßig, frei von allen Zufälligkeiten, jede Pflanze ihre Gestalt ändert, wenn ihre Lebensverhältnisse, richtiger gesagt ihr Lebensinteresse, dies bedingen.

Nebenbei mag hier noch zur Begründung dieses Satzes die ohnedies zu dieser Sippe gehörige südamerikanische *Lilaea subulata* herangezogen werden, die, in Sümpfen unter Wasser wuchernd, neben ihren regelrechten Blüten auch solche mit einem bis 14 cm langen Griffel erzeugt und zwar nicht beständig, sondern dann, wenn sie unter Wasser gerät. Die Pflanze sucht also offenbar die Wasseroberfläche, auf der sich der aus den Staubbeuteln herausgeschwemmte Blütenstaub umhertreibt, mit dem passenden Organ zu erreichen. Ein naher Verwandter dieser Liläen wird als Fenster- oder Gitterpflanze (*Aponogeton* [früher *Ouvirandra*] *fenestralis* (Poir.) Hook.) viel bestaunt und in botanischen Gärten gezüchtet. Der englische Missionar W. Ellis hat sie von Madagaskar zu uns gebracht, nachdem er sie auf Grund einer Zeichnung ihres ersten Entdeckers, mit der er seine Leute ausrüstete, von ihnen aus Bächen und Flüssen erhalten hatte. Die Gitterpflanze ist durch die Eigentümlichkeit ausgezeichnet, daß zwischen ihren Blattrippen das Füllgewebe im älteren Blatt ein-

trocknet, so daß nur ein nettes Gitter übrig bleibt. Ob dies eine Anpassung ist, um durch das Strömen des Wassers nicht zerseht zu werden, demzuliebe die großen Agarum-Tange des Meeres ihr Blatt zu durchlöchern scheinen, ist noch fraglich, aber nicht unmöglich.

Alisma, *Sagittaria*, *Butomus* und *Hydrocharis*, die nun im System folgen, bilden eine in keinem Sumpfgelände fehlende, überaus liebliche Pflanzengesellschaft, von deren Gliedern ich die zwei mittleren kühnlich zu den schönsten Gewächsen der Heimat zählen möchte.

Alisma Plantago L., der gewöhnliche Froschlöffel, ist ein Allerweltsbewohner in allen Erdteilen. Leicht kenntlich an den wegerichartigen Blättern, auf die der lateinische Artnamen verweist, und den vom Juli an sich meldenden weißrötlichen, reizenden Blumen, die in einer der schönsten pyramidalen Rispen beisammenstehen, bietet dieses Gewächs dem Lehrer ein treffliches Beispiel für Veränderung der Blattgestalt durch Funktion, da die unteren untergetauchten Blätter bandförmig, die Schwimmblätter gegenüber den Landblättern durch Aufklappen leicht gemacht, durch Wachsüberzug unbenehbar sind, während sie bei einer Varietät (*var. graminifolium*), die man jetzt als Art betrachten will, die Anpassung an ihr dauerndes Leben in tieferem Wasser durch bandförmige Blätter vollzogen haben. Im feineren Bau zeigt sich dies besonders hübsch, wenn man die Spaltöffnungen untergetauchter mit denen von Luftblättern vergleicht. Bis ins Feinste ist da alles so gestaltet, wie es die Umstände heischen.

Die Blüte tritt uns als vollkommenes Gebilde entgegen, in dem 6 Staubblätter und ein unregelmäßig dreieckiger Fruchtknoten von einer köstlich zartrofigen Krone und außen noch von Kelchblättern umhüllt sind. Dieser Bau deutet auf Insektenbesuch, und wirklich sah man die Blüten auch von Schwebefliegen besucht. Doch gibt es unter Umständen auch kleistogame Blüten, von denen man allerdings noch wenig weiß.

Mit diesem schlanken, schönen Geschöpf zusammen stehen die glänzend spizigen Blätter des Pfeilkrautes (*Sagittaria sagittifolia* L.) allerdings nur in der Ebene, dagegen fast in den ganzen österreichischen Alpen fehlend. Über die Ursachen solch wählerischen Gehabens hat man noch gar keine Anhaltspunkte, und einer biologisch forschenden Pflanzengeographie eröffnen sich hier die interessantesten Ausblicke. Auch *Sagittaria* ist ebenso mannigfaltig in seiner Blattgestalt, wie alle diese amphibischen Gewächse. Von riemenförmigen Erstlingsblättern bis zum vollendeten Pfeil gibt es da alle Übergänge. Wenn die Pflanze in einen tiefen Fluß gerät, nimmt sie sogar fast das Aussehen der allbekannten Vallisnerie an. Aus ihren ansehnlichen Blüten entwickelt sie ein ganzes Köpfchen geflügelter Früchtchen, an ihrem Wurzelstock dagegen im Herbst die von den Chinesen als Speise nicht verschmähten und den Enten als Futter dienenden großen Knollen, mit deren Hilfe sie überwintert.

Es bietet ihr Leben also nichts Besonderes, denn nur Schönheit und Eleganz. Dieserhalb allein aber wachsen sie und ihre Genossen* dem Aquariumfreund an das Herz. Wer wollte sie oder gar ihre noch schöner rosig und reich blühende Gefährtin, die stattliche Schwanenblume (*Butomus umbellatus* L.), aus dem gewohnten Naturbilde

* *S. Montevidensis* mit gelben Blüten, *Limnocharis Humboldtii* mit besonders großen Blumen, *Helodea canadensis*, *Hydrilla* und *Eichhornia* sowie *Hydromystris* (*Trianea*) sind die dankbarsten Aquarienbewohner.

missen oder sie gar zu gemeinen Feldfrüchten degradiert sehen, wie es die Chinesen mit den Pfeilkräutern trotz deren scharfem Milchsaft tun?

Man nennt die Schwanenblume auch Wasserveilchen, aber man tut unrecht daran, denn die bis 1½ m sich emporreckende prächtige Staude mit ihrer mächtigen Dolde voll der schönsten Blüten ist eher eine Herrscherin der Sumpfhälfte, jedenfalls alles andere denn bescheiden zu nennen. Man versteht recht gut, warum manche Naturvölker, so die

sibirischen Jakuten und Kamtschatken, ihr die Fähigkeit angedichten, des Nachts herumzuwandeln. Sie bringt auch unwillkürlich Feensagen und Nixenmärchen in Erinnerung, und mit Recht nennen Ovids Metamorphosen sie, die poetische Blumenbinse, den Liebling der Blumen Göttin. Um so abscheulicher trivial wirkt es, wenn ihr griechischer Gattungsname von Kindern, die sie abfressen, abgeleitet wird. Leider ist das so ziemlich das einzige „Biologische“, was wir derzeit von dieser schönsten Sumpfbiume berichten können.

Hydrocharis morsus ranae L., der vom Frosch Angebissene, wäre der letzte und ausgebildetste Vertreter dieser ganzen Sippe. Überall schwimmend, auf Teichen und Weihern, erhält er sich im Winter durch sich ablösende Knospen, ähnlich wie die Laichkräuter, nur noch wunderbarer, da diese Winterknospen bei Einbrechen milderer Witterung selbsttätig wieder emporsteigen. Über den Mechanismus dieses Vorganges liegen meines Wissens noch keine be-

Wasserpestarten. 1 = *Helodea densa*, 2 = *Helodea canadensis*.
(Naturaufnahme von G. Dopfer-München.)

sonderen Untersuchungen vor. — Auch über die Bestäubung haben wir noch zu wenig Angaben. Die ansehnlichen weißen, auf dem Wasser schwimmenden Blüten und namentlich der Umstand, daß die Blumenblätter der weiblichen Blüten auf der Innenseite ein Honig absonderndes Schüppchen besitzen, deuten mit Gewißheit auf Insektenbesuch. Die schöne Pflanze verdiente eingehenderes Studium, als ihr bislang zuteil geworden.

Da sind zwei ihrer Genossinnen, die Wasserpest und die überall bekannte Vallisnerie, viel besser daran. Die erste war um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine europäische Berühmtheit, die letztere ist ob ihrer reizenden Art der Befruchtung seit Jahrhunderten ein sogar in Gedichten besungener Lieblingsgegenstand der Naturfreunde und, da sie das „Versuchskaninchen“ ist, um Plasmaströmung zu demonstrieren, ein jedem Studenten wohlbekanntes Gewächs.

Helodea (fälschlich Elodea) canadensis (Rich.) Casp. nennt man die Wasserpest, da sie ihre wahre Heimat in den Gewässern des nördlichen Amerika hat. Ihr deutscher Name deutet auf ihre eigenartige Geschichte. Angeblich durch eine einzige Pflanze wurde sie im Jahre 1836 in Irland heimisch; sie ging von dort nach England, Frankreich, Holland, sprang nach dem Deutschen Reich über und besiedelte schließlich in ganz Europa mit Vorliebe die Schiffahrtskanäle. Darob gab es ein großes Geschrei. Der Handel war beeinträchtigt, der Fischerei geschah Abbruch, man hegte die schlimmsten Befürchtungen und erschöpfte sich in Ausrottungsmaßregeln ohne sonderlichen Nutzen. Da erlosch die Vermehrungskraft der unheimlich lebenskräftigen Pflanze. Heute ist sie überwunden. Aber nicht durch Menschenkraft, sondern durch eine noch unerfaßte Naturwirkung. Sie lebt zwar noch in vielen Gewässern bei uns und hat sich, allerdings fast stets nur in weiblichen Exemplaren, bei uns völlig eingebürgert, aber sie bedroht nicht mehr Handel und Gewerbe.

Ihr Überwuchern beruht darauf, daß jedes Endstückchen, jede Knospe zu einer vollständigen Pflanze auswachsen kann. Das, sowie der Umstand, daß sie vielerorts auch wintergrün ist, enthebt sie der Notwendigkeit, besondere Überwinterungsknospen zu bilden. Sie verläßt sich darauf, daß abgerissene Zweigendchen durch Wasservögel verschleppt werden. Aber vielleicht ist gerade diese fortgesetzte, nur vegetative Vermehrung die Ursache dessen, daß ihre Lebensenergie jetzt merklich erlahmte.

Man merkt es dem zarten, lustiggrünen Pflänzchen, das jeder „Aquarianer“ gerne sieht, da es das Wasser besonders rein hält, gar nicht an, daß es uns zur Erfindung von Vertilgungszeehen trieb und manchen Teich so völlig zugewachsen hat, daß es selbst aus Mangel an Wasser zugrunde gehen mußte.

Sein wohlthätiger Einfluß auf das Wasser beruht auf seiner ganz fabelhaften Assimilationsenergie. Keine Pflanze ist geeigneter, um in der Schule die Oxygen-erzeugung durch die Pflanzen zu demonstrieren, und auch der einfache Versuch, den wir in Bd. II, S. 14 dieses Werkes abbildeten, bezieht sich auf Helodea.

Die Vallisnerie (*Vallisneria spiralis* Mich.), der man den ganz guten Namen Sumpfschraube gegeben hat, ist eigentlich kein deutsches Gewächs, obwohl man sie nun an verschiedenen Orten (um Baderborn, Ofen) angesiedelt hat. Nur in den Südtiroler und Südschweizer Seen gedeiht sie noch wild und hat ihre eigentliche Heimat von den Mittelmeergestaden bis in die Tropen. In den vielen französischen Kanälen ist die Sumpfschraube allerdings schon bis Paris so vorgedrungen, daß sie mit ihren langen, flutenden, echten Schwimmblättern sich stellenweise schon unangenehm bemerkbar macht. Es ist nichts zu sehen an dem Pflänzchen. Aber es hat großen pflanzenanatomischen und blütenbiologischen Ruhm. Denn es ist am vollkommensten dem Wasserleben angepaßt. Wie seine Genossen Helodea, Hydrilla u. a., nimmt es seine mineralische Nahrung nicht mit Wurzeln, sondern algenhaft, mit allen Zellen

seiner Oberfläche, auf. Dementsprechend vereinfachte sich auch das Leitungssystem. Hat schon die Wasserpest ganz rückentwickelte Leitbündel, so fehlen sie in ausgewachsenen Vallisneria-Blättern gänzlich. Auch Palisaden- und Schwammparenchym sind verschwunden, das Blatt ist, wie der Thallus einer Alge, bei *Helodea* überhaupt nur zwei Zellreihen dick geworden. Ebenso fehlen alle Wurzelhaare. Man kann daran sich und andere zur klaren Einsicht bringen, daß die Gewächse wirklich die Fähigkeit haben, sich so zu bauen, wie es ihr Streben heischt. Denn man kann doch nicht darum herumkommen, daß die Eigenart der Umwelt für sie nur einen Reiz darstellen kann, auf den hin sie eine und zwar durch sie selbst bestimmte Entwicklungsrichtung einschlagen.

Wiesenartiger Bestand der Wasserpest (*Stratiotes aloides*) am Drausensee in Westpreußen. (Nach F. Scholz.)

Man muß diesen Punkt immer wieder betonen, denn es gibt merkwürdigerweise immer noch genug Pflanzenforscher, die sich der Täuschung hingeben, zwischen dem Reiz der Umgebung und der zweckmäßig darauf reagierenden Pflanze könne man ohne weiteres eine Verbindung wie zwischen Ursache und Wirkung annehmen, ohne dabei die „Selbsttätigkeit“ der Pflanze in die Rechnung einzusetzen. Daß

das Gewächs nicht blind wie ein Automat handelt, kann man sich gerade gelegentlich des Studiums dieser einfachen Wasserpflanzen einprägen. Die Süßwasser-Hydrocharitaceen haben keine Nebenwurzeln, wenn sie ganz untergetaucht leben. Die entsprechenden Meerbewohner an den Küsten haben aber sogar sehr kräftige Nebenwurzeln, trotzdem auch sie mit der ganzen Blattfläche Nahrung aufnehmen. Warum wird hier die Schablone durchbrochen? Weil diese Küstenpflanzen im ewig bewegten Meer eben Halt brauchen, und weil die Pflanze, wenn sie ein Bedürfnis empfindet, es auch befriedigen kann.

Die Befruchtung der *Vallisnerie* ist eine berühmte Merkwürdigkeit. Wir haben sie in Bd. II, S. 526—527 beschrieben und abgebildet, können uns also hier dessen enthalten. Und wenn es noch irgendwelcher Beweise bedurft hätte, um die durchaus „intelligente“, weil durchaus Zwecke anstrebende und sie auch meist erreichende Selbsttätigkeit der Pflanzen zu erhärten, so bietet sie dieser sich spiralig aufrollende und nach der Befruchtung wieder zurückziehende Blütenstiel, über den schon die italienischen Naturforscher der Renaissance so weiblich staunten, und dessen Schilderung kein Lehrer versäumen wird, dem es am Herzen liegt, daß seine Schüler eine lebendige und tiefe Empfindung für das Wesen der Pflanze erhalten. Wenn er bloß hinzusetzt:

diese Dinge deuten darauf, daß die Pflanze ein Innenleben besitzt, so hat er in keiner Weise dem anerkannten Stand der Wissenschaft vorgegriffen und doch seine ihm Anbefohlenen in eine völlig neue Welt geleitet.

Die letzte Verlandungspflanze, die wir nicht vernachlässigen dürfen, ist die Wasserschere. Lateinisch wird sie *Stratiotes aloides* L. mit gutem Recht genannt, da ihre steifen, gezähnten und den Unvorsichtigen leicht verlegenden Blätter wirklich frappant an eine kleine Aloe erinnern. Daran mag der Aberglaube angeknüpft haben, der das harmlose Gewächs als eine der Hexenpflanzen fürchten lehrte. Durch reichliche Ausläufer hat auch sie wuchern gelernt und bedeckt in Norddeutschland oftmals auf so weiten Flächen Seen und Weiher, daß man sie ebenso, wie die Wasserpfeife, als Viehfutter und Düngemittel verwendet. Das eigenartige Landschaftsbild aus Westpreußen auf S. 124 bezeugt, wie sehr der „Sichels Kohl“ zur Verlandung beitragen kann. Zu seinen Merkwürdigkeiten gehört auch, daß er vielenorts nur in weiblichen Blüten vorkommt, also niemals Früchte trägt, sondern sich nur vegetativ vermehrt. Offenbar aber rechnet *Stratiotes* auf Insektenbesuch, denn es trägt schöne weiße Blüten und ein besonders wohlentwickeltes Nektarium, das aus 15—30 hellgelben, drüsigen Fäden besteht. Es geben diese amphibischen Gewächse dem Forscher überhaupt die anziehendsten Aufgaben zu lösen, teils in ihrem so vollkommen dem Wasser angepaßten und überaus plastischen Bau, noch mehr aber durch ihre Blütenbiologie, in der noch viel zu erforschen übrig ist. Manchmal finden sich in ein und derselben Familie drei verschiedene Befruchtungsarten. So bei den *Hydrocharitaceen*, wo *Stratiotes* und *Hydrocharis* auf Insekten rechnen, *Vallisneria* und *Helodea* mit besonderer Kunst ihre Befruchtung auf der Wasseroberfläche vollziehen, während die meerbewohnende *Halophila* konfervenartigen Pollen unterseefisch auf ihre Narben fluten läßt. Dieser Reichtum an Hilfsmitteln macht diese Pflanzen überaus interessant, und wir wagen es wohl wahrzusagen, daß dem Forscher, der sich ihnen mit Liebe widmet, reichlich Lorbeer blüht.

Die Gräser (Glumiflorae).

Wer die Bedeutung der Gräser für die Gestaltung des Erdantlitzes und die menschliche Kultur auch nur einigermaßen anschaulich machen wollte, der müßte ein Gemälde des Erdballs entwerfen und dazu als Unterschrift eine Geschichte der menschlichen Kultur setzen. Wenn die Nadelhölzer einen gewaltigen Teil der gemäßigten Zonen besiedeln, und der Wald überhaupt ganzen Ländern ihr Gepräge gibt, so sind die Bäume doch gegen die Gräser ins Hintertreffen geraten, denn man kann mit gutem Gewissen sagen, daß diese in der gegenwärtigen Erdperiode die durch Zahl und Bedeutung machtvollsten Pflanzen überhaupt sind. Als echte Gräser (*Gramineen*) bilden sie in allen Erdteilen ausgedehnte Steppen, schieben Wiesen auch im Gehölzklima mitten zwischen die Wälder. Als Prärie, Savanne, Planos sind sie kulturhemmend, als Getreidefelder die Grundlagen der ganzen Kultur. Als Niedgräser (*Cyperaceen*) dringen sie in das Wasser, machen ihm seine Herrschaft streitig und gehören zu den wichtigsten Verlandungspflanzen. Sie besiedeln den Wald selbst und

wagen sich in sein lebensfeindliches Dunkel. Wiesner fand Grasanflug im Walde noch an Stellen, die nur $\frac{1}{60}$ — $\frac{1}{70}$ des vollen Lichtes erhielten, in den Tropen sogar bei $\frac{1}{100}$ Licht. Sie wandern auf die Bergeshöhen. Über dem Waldgürtel beginnen erst die Hochwiesen und Alpenmatten, und „Grasbänder“ begleiten das Geschröf hoch bis zur Grenze des ewigen Schnees, an geschützten Stellen sogar darüber hinaus.

Afrikanische Savanne, bestanden mit Elefantengras (*Pennisetum benthami*), dazwischen ein junger Kapokbaum (*Ceiba pentandra*).

(Aus Schenck & Karsten's Vegetationsbildern. IV. Reihe, 6. Heft. W. Fischer, Jena.)

Wo in der nordischen Landschaft die Bäume längst verkrüppelt sind, und nur mehr die Moos-tundra wirklich gesund gedeiht, mischt sich noch eine Wiesentundra zwischen sie.

Was wäre die Zivilisation ohne die Brotfrucht geworden? Der Armenisch kannte vielleicht nur die Hirse, den Neuweltlern bot der Mais Ersatz für das Getreide der alten Welt, dem Ostasiaten der Reis — keiner aber hätte bestehen können ohne die Sicherung, die ihm der sanfte, sittigende Ackerbau gewährt. Keine Kultur hätte sich entwickelt, hätte nicht der Dienst der Getreidegötter, das Vorbereiten des Bodens und Abwarten der „Grasreise“ die umherziehenden Halbwilden festhaft und dadurch auf die Vorzüge einer ständigen Gemeinschaft aufmerksam gemacht. Und sogar der

Nomade ist mit seinen Viehherden und seinen Pferden auf die Grassur gewiesen. Sie ist die wichtigste Vorbedingung, wollte sich der Mensch über ein Leben erheben, das seine zurückgebliebenen Brüder noch heute führen in den südamerikanischen Urwäldern, affenhaft zwischen Bäumen klimmend, auf Früchte und Wurzeln und so kärglich erlegbares Wild angewiesen, daß der arme Orinokovindianer Diatomeenerde und als Leckerbissen Holzwürmer und sonstige Insekten verzehrt. Naturkenntnis und Kulturgeschichte verschlingen sich hundertfach, unzerlösllich miteinander zu einem farben-

prächtigen Gewebe, das alle menschlichen Beziehungen umkleidet, wollte man die hier angeregte Untersuchung über die Bedeutung nach Gebühr durchführen. In dieser Abtheilung unseres Werkes aber haben wir uns das nicht vorgenommen, sondern wollen hier nur das Botanische über die Gräser zusammentragen.

Aber auch da muß doch noch bei der pflanzengeographischen Bedeutung dieser Gruppe verweilt werden. In Bd. I haben wir auf S. 387—400 bereits geschildert, daß die Menge und Verteilung der Niederschläge, die Grundwasserverhältnisse und die Bodenstruktur darüber entscheiden, ob Gehölz oder Grasflur einen Landstrich besiedeln, und um nicht in überflüssige Wiederholungen zu verfallen, nehmen wir den Faden hier erst da auf, wo wir ihn dort fallen ließen. Nicht beantwortet wurde dort die Frage, wie es kommt, daß inmitten des ausgeprägten Gehölzklimas von Mittel- und Westeuropa doch eine Menge natürlicher Grasfluren, nämlich Wiesen, gedeihen. P. Graebener hat hierauf die Antwort gegeben, daß dies an solchen Orten vorkommt, wo der Baumwuchs durch häufiges Hochwasser und namentlich in Flußniederungen durch den Eisgang beeinträchtigt wird, so wie sich Gebirgswiesen auch im regnerischen Gebirge überall dort von selbst bilden, wo Lawinen den Wald zerstören, und Stürme sowie starke Temperaturschwankungen dem „Holzwuchs“ hemmend entgegenstehen. Das sind allerdings nur ganz lokale Ursachen, und demgemäß reicht im westlichen Europa das Wiesenland trotz seiner achtfachen Typen, die Drude unterschieden wissen will, und von denen trockene Wiesen, feuchte Wiesen, Niedgrasbestände (saure Wiesen), Weiden, Gebirgswiesen jedermann wohlbekannt sind, nicht im entferntesten an die Macht und Pracht, welche die Grasflur dort entfalten kann, wo ihr die herrschenden Bedingungen günstig sind, und wofür als allerdings nur in unzulänglicher Technik wiedergegebenes Bild die nebenstehend dargestellte Grasflur im Amurgebiet (Tafel), sowie die prächtige Elefantengrasflur aus dem afrikanischen Deutschland zeugen möge, die wir dem herrlichen Vegetationsbilderwerk von Karsten-Schenk entnehmen.

Von den gewaltigen außereuropäischen Grasfluren sind allerdings nicht diese, sondern die nordamerikanischen Prärien jedem deutschen Knaben durch die Romantik des Büffeljäger- und Indianerlebens wohlvertraut. Aber wenn auch das Buffalo oder Büffelgras (*Buchloe dactyloides*) dort noch immer die herrschende und von den Viehzüchtern hochgeschätzte Grasart ist, so ist doch jene alte Romantik der Präriebrände und Jäger längst ausgestorben und vielfach einem im Milliardenstil großzügig betriebenen Getreidebau gewichen, der die Vereinigten Staaten zur Kornkammer der Welt macht. Urwüchsiges und Weltfremdes hat sich nur in dem südamerikanischen Gegenstück der Prärie, in den Pampas Argentiniens und den Planos um den Orinoko, erhalten. Alex. v. Humboldt hat uns in seiner „Reise in die Äquinoctialgegenden des neuen Continents“ eine Beschreibung ihrer Großartigkeit mit der schweren Klassik seiner Sprache gegeben, die besser denn ein Bild das Überwältigende, Gigantische der Herrschaft der Gräser empfinden läßt. Man horche ihm zu, wenn er sagt: „Hat man mehrere Monate in den dichten Wäldern am Orinoko zugebracht, hat man sich dort daran gewöhnt, daß man, sobald man vom Strome abgeht, die Sterne nur in der Nähe des Zenit und wie aus einem Brunnen heraus sehen kann, so hat die Wanderung über die Steppen etwas Unangenehmes, Unziehendes. Aber dieses Behagen ist nicht von langer Dauer; . . . die einen großen Teil des Jahres hindurch staubige, aufgerissene

Steppe stimmt trübe durch ihre ewige Eintönigkeit. Ist man nach acht- oder zehntägigem Marsch gewöhnt an das Spiel der Luftspiegelung und an das glänzende Grün der Mauritiabüsch (== Fächerpalmen), die von Meile zu Meile zum Vorschein kommen, so fühlt man das Bedürfnis mannigfaltigerer Eindrücke. Die nordischen Heiden, die Steppen an Wolga und Don sind kaum ärmer an Pflanzen- und Tierarten als unter dem herrlichsten Himmel der Welt, im Erdstrich der Bananen und des Brotfruchtbäumcs, 28000 Quadratmeilen Savannen, die im Halbkreise von Nordost nach Südwest, von den Mündungen des Orinoko bis zum Caqueta und Putumayo sich fortziehen. Der überall sonst belebende Einfluß des tropischen Klimas macht sich da nicht fühlbar, wo ein mächtiger Verein von Grasarten fast jedes andere Gewächs ausgeschlossen hat. Beim Anblick des Bodens, an Punkten, wo die zerstreuten Palmen fehlen, hätten wir glauben können, in der gemäßigten Zone, ja noch viel weiter gegen Norden zu sein; aber bei Einbruch der Nacht mahnten uns die schönen Sternbilder am Südhimmel daran, daß wir nur 8 Grade vom Äquator waren.“

Rechnet man die Gesamtfläche dieser südamerikanischen Graswüsten auf über 800000 km², also bedeutend mehr als etwa das Mittelländische Meer, so empfindet man in dem Staunen darüber wohl etwas von der überwältigenden Bedeutung der Gräser auf Erden.

Noch viel ließe sich so zusammentragen, um das Bild der Hochgrasfluren, die in anderen Erdteilen, so in Afrika, vielfach in Wälder übergehen, mit Licht und Schlagschatten plastisch herauszumodellieren, doch würde sich dadurch vielleicht nur die gewaltige, einheitliche Stimmung auflösen, in die Humboldts Schilderkunst den Leser versetzt. Man schätzt die Zahl der Grasarten auf 7000. Hunderte von Gattungen und Arten sind sich dabei so ähnlich, daß es oft ausgesuchter Kunst des Spezialisten bedarf, um sie überhaupt auseinanderhalten zu können. Man kann sogar sagen, daß dies nur kurze Zeit im Jahre möglich ist, nämlich zur Blütezeit und Grasreife, da die Formen meist nach Gestaltung ihrer Hüll- und Deckspelzen und Rispen und Ährchen unterschieden werden.

Die dem Menschen lebenswichtigen Gräser, die Wiesenbildner, Getreidearten, Reis und Mais und Bambus, sind unzähligemal beschrieben und jedem bekannt, der Bücher, wie das vorliegende, zur Hand nimmt. Nichts wäre überflüssiger, als in steten Wiederholungen in Einzelbildern Altes in neue Formen zu gießen, das schon in seiner ersten nur einförmig ist. Dafür hat neuere Forschung auch für die Gräser eine große Zahl biologischer Eigenheiten und sonstiger Merkwürdigkeiten aufgedeckt, von denen die Schule noch nichts weiß, viel weniger noch die Gemeinbildung, und deren Ausprägung zu vertieften Wertungen über das Leben des Grases der Beitrag dieses Werkes zur Gräserkunde sein möge.

Grasur im Auenland.
(Nach Emery, gezeichnet von J. Hefl.).

dungen der Bambuspflanze zusammenstellt, sind viele Duzend Seiten diesem hohen Nutzen der 230 Bambusarten, die man kennt, gewidmet. Diese Gewächse haben übrigens das Merkwürdige, daß man bei vielen wohl die Art, aber nicht die Gattung kennt.

Diese wird nämlich nach den Blüten und Früchten bestimmt, und nach reichlichem Blühen treibt die Pflanze oft viele (bis 32) Jahre lang nur dünne, unfruchtbare Halme, deren Geschlecht unerkennbar ist.

Ich bin in der größten Verlegenheit, welche Verwendung der Bambuspflanzen ich als die wichtigste bezeichnen soll, da Indier, Malaien und Chinesen sie so tausendfach zu verwerten gelernt haben, wie die Kokospalme, die man für gewöhnlich als das nützlichste aller Lebewesen bezeichnet. Man ißt die jungen Schößlinge als Gemüse, man spaltet die Rinde der Halme und verarbeitet daraus Papier, Packmaterial, Körbe und Matten, Fächer, Hüte, Jacken, Dosen und Stricke. Aus den fabelhaft elastischen und festen Halmen macht man je nach ihrer Dicke „Pfefferrohr“, Pfosten, Tragstangen, Messer, Pinsel, Bretter, Blasrohre, Dachziegel, Palisaden, Möbel, Kochtöpfe, Wassereimer, Krüge, Bienenkörbe, Schiffsmaste, Messerscheiden und Pfeifenrohre, Flöten und Wasserleitungsrohre. Aus dem Saft macht man berauschende Getränke. In Indien und Brasilien sammelt man die reisähnlichen, mehligten Samen in ungeheuren Mengen und verwendet sie, wie bei uns das Getreide. In China werden alle Theater nur aus Bambus gebaut. In den Malaienstaaten wohnt man mit Vorliebe in den hellen, lustigen und gesunden Bambushäusern, die vom ersten bis zum letzten aus der Wunderpflanze

Bambusstengel (der ostindischen Art *B. verticillata* Willd.), im botanischen Garten zu München gewachsen. (Originalaufnahme von H. Dopfer-München.)

hergestellt werden. Wenn also ein Robinson auf seiner Insel Bananen und Bambus findet, wird er nie notleiden und braucht sich nichts zu versagen.

Unbegreiflicherweise machen wir Europäer uns diesen Reichtum viel zu wenig zunutze. Wohl führt man Bambusrohr in steigendem Maße ein und kultiviert kleine und schöne Formen auch schon im Garten. Aber man beachtet nicht, daß die Bambusen ganz und gar nicht auf die Tropen allein beschränkt sind. *Chusquea aristata* Mart. steigt in Südamerika bis zur Schneegrenze und bildet noch bei 4700 m wahre Urwälder. Im Himalaja gedeiht *Bambusa* noch bei 3800 m. *Arundinaria japonica* Sieb. gedeiht in Frankreich und England ohne weiteres im Freien, *Phyllostachys* ist in deutschen Gärten heimisch geworden, gedeiht z. B. in Heidelberg in den öffentlichen Anlagen auf das prächtigste. Man hat noch gar keinen ernstlichen Versuch gemacht, eine dermaßen nützliche Pflanze in der europäischen Kulturwelt zu akklimatisieren, obwohl ihre Bedeutung denn doch weit darüber hinausgeht, nur ein „dekoratives Gras“ zu sein, wie sie der Gärtner noch einschätzt. Man hat in Deutschland in milden Lagen, die besonders gegen trockene Ostwinde geschützt sind, bisher etwa 15 *Bambusa*-, *Phyllostachys*- und *Arundinaria*-Arten im Freiland gezogen, von denen die vollständige Sammlung der Heidelberger Schloßgarten enthält, hat sich aber dabei ausschließlich vom künstlerischen Standpunkt leiten lassen. Die zahlreichen chinesischen und japanischen Bambusen, die oft an ein ähnliches Klima wie das unsere gewöhnt sind, würden noch reiche Auswahl namentlich dann bieten, wenn man industrielle Absichten im Auge hat. Die Sache ist so wichtig und verheißend, daß es unbegreiflich ist, weshalb das sonst so unternehmend jede Möglichkeit ergreifende deutsche Kapital sich damit noch nicht beschäftigt hat. Vielleicht gibt unsere Aufmunterung dazu einen Anstoß.

Nicht unähnlich verhält sich die deutsche Gartenkunst gegenüber dem Zuckerrohr (*Saccharum officinarum* L.), das man da und dort bei uns ebenfalls als Ziergras kultiviert, während es in seiner Heimat jährlich viele Millionen in dem süßen Saft seines Markes produziert. Wie bei fast allen dem Menschen besonders vertraut gewordenen Gewächsen, ist auch das wahre Vaterland dieser bis an 4 m hohen, überaus stattlichen Grasart der Erinnerung entschwunden. Man nimmt an, daß sie sich von Ostasien aus über alle heißen Landstriche verbreitet habe. Wenigstens deutet die Ableitung aus dem Sanskritnamen *sarkura*, auf den man das arabische *sukhar* zurückführt, und die im Nebel der Sage verschwimmende uralte Kultur der *Saccharum*-Pflanze in China darauf. Von dort wanderte sie mit den großen Schritten der Weltgeschichte bis nach Amerika. Die Araber bringen Zuckerrohr nach Südspanien, die Kreuzfahrer machen den Ruhm des Zuckers im Abendland bekannt, Kolumbus bringt das Zuckerrohr nach Westindien, wo es seitdem zur wichtigsten Kulturpflanze wurde. Dann verbleicht sein Stern. Der Schlag, durch den sich Napoleon mit der Kontinentalsperre England zum Todfeind machte, traf den Kolonialzucker tödlich, denn er eröffnete der Rübe die Zukunft. Immerhin wurden in den Tropen im Jahre 1905/06 noch 5729000 Tonnen Rohrzucker erzeugt gegen 6 Millionen Tonnen Rübenzucker, wobei Kuba, Java und Britisch-Indien an erster Stelle stehen. Welche Bedeutung das süße Schilf, an dessen Knoten der Zucker oft herauskristallisiert, so daß es sogar als Zuckerei ein Handelsartikel ist, für jene Länder hat, beweist die bekannte Berechnung Humboldts, wonach in Mexiko das gleiche Stück Land, das mit Weizen bestanden, nur 180—200

Franken trägt, mit Baumwolle schon 250, mit Zuckerrohr aber 450 Franken abwirft. Freilich knüpft sich gerade an die schwere Ackerbauarbeit, die es erfordert, der Fluch des Sklavenhandels, jener Schandfleck der christlichen Zivilisation, als dessen Urheber

die erst im Jahre 1880 befreiten Sklaven auf Kuba den spanischen Priester Las Casas verdammen. Und ob der Rum, den die Zuckersfabrikation nebenbei liefert, gerade ein Segen der Menschheit ist, werden auch viele bezweifeln.

Eine so uralte Kulturpflanze kann die Weltgeschichte nicht miterlebt haben, ohne sich selbst zu wandeln. Sie hat sich in der Kultur in ein fast nicht blühendes Gewächs umgestaltet. Bei manchen Rassen fehlen Staubbeutel und Stempel völlig, eine merkwürdige Folge dessen, daß die Pflanze immer nur durch Stecklinge vermehrt wird. Eine andere Kehrseite der Kultur, die das Zuckerrohr mit unseren heimischen Kulturpflanzen teilt, ist die geringe Widerstandskraft gegen Insektenfeinde, namentlich Wickler und Schildläuse, sowie gegen das merkwürdige „Hockenbleiben“ der Triebe, das man als Cerehkrankheit fürchtet, und gegen das sich Kreuzungen und Rein-

Kultiviertes Zuckerrohr (*Saccharum officinarum* L.)
(Aufnahme von H. Dopfer-München.)

züchteten immuner Rassen noch nicht so bewährt haben, um alle Sorgen zu bannen.

Es ist eine ganze Wissenschaft solch praktischer Botaniker entstanden, die durch künstliches Bestäuben ausgewählter Individuen seltene Eigenschaften zu befestigen suchen. Das dritt wichtigste Industrie- und Kulturgras, der mindestens jedem Österreicher

und Süddeutschen wohlbekannte Mais (*Zea Mays* L.), liefert dafür das prächtigste Arbeitsfeld und hat auch eine solche Unzahl von „Varietäten“, Rassen, Spielarten und Xenien hervorgebracht, daß es ganz aussichtslos wäre, anderswo als in einem Spezialwerk sich über deren Eigenheiten zu verbreiten. Der Begriff der Xenien wird vielen Lesern nicht geläufig sein. Botaniker verstehen darunter nicht die Geschenke für Gastfreunde, die man in der antiken Welt mit diesem Wort bezeichnete, sondern Abweichungen von der Gestaltung und Färbung einer Pflanze, die durch die Befruchtung mit fremdem Blütenstaub hervorgebracht wurden. Die Frage dieser Xenien hat man vorzugsweise an dem Befruchtungsvorgang der Maispflanze studiert und dabei tief in ein absonderliches Getriebe im Pflanzenkörper hineingesehen. F. Hildebrand, F. Körnicke, neuerdings besonders die Angelsachsen, S. Webber u. a. haben es durch ihre Maiskreuzungen sicher gemacht, daß die Xenienbildung auf der doppelten Befruchtung beruht. Aber indem solche Farbenabweichungen immer nur bei einzelnen Körnern vorkamen, während doch alle Körner Mischlingspflanzen ergaben, stieß man auf ganz rätselhafte

Junger Mais mit Stelzenwurzeln. (Naturaufnahme von S. Dopfer-München).

Vorgänge. Echte Xenien weisen nur Abweichungen des Endosperms und der Samenschale auf. Neben ihnen aber gibt es Abänderungen, die auch noch in anderen Organen beeinflusst erscheinen (Xenodochien). Um sich dies zu erklären, muß man an eine „innere Assoziation“, an eine Rückwirkung des Embryosackes auf andere Organe denken, die sich niemand materialistisch vorstellen kann.

Diese geheimnisvollen Andeutungen langweilen denjenigen, der nicht weiß, daß in solchen scheinbaren Kleinigkeiten Millionenwerte stecken. Das Studium dieser Kreuzungen befähigt uns nämlich, bestimmte ertragsreiche, großkörnige, frühreife oder sonst ausgezeichnete Sorten von Kulturpflanzen zu züchten. Der Menschenkenner ermißt den praktischen Wert solch „nebelgrauen Theoretisierens“ schon aus der Tatsache, daß die Amerikaner mit Feuereifer und großem Aufwand sich in ihrem „Departement of Agriculture“ zu Washington diesen Dingen hingeben.

Die Pflanzenforschung der alten Welt hat ihr Augenmerk wieder auf weniger praktische, dafür aber um so anziehendere Eigenheiten des Maises gerichtet. Seit langem

bekannt ist es, daß dieses mehrere Meter hohe Gras (so wie übrigens auch manche Bambus- und Sorghum-Arten) Stützwurzeln aus den 1—2 untersten Knoten in dem Maße bildet, in dem es ihrer bedarf. Haberlandt, der ihren Bau untersucht hat, schreibt, daß in diesen Wurzeln zwei ineinander geschachtelte Hohlzylinder als mechanische Sonderanpassung ausgebildet sind. Der äußere, aus Bastgewebe, bedingt die Säulenfestigkeit des Organs, der innere (mit Metomelementen) steigert die Zugfestigkeit. Das ist also eine so eigenartige, durchaus das vorliegende Sonderbedürfnis befriedigende Erscheinung, daß sie in dem Disput über das Innenleben der Pflanze der mechanistischen Denkungsart stets vorgerückt werden sollte.

Zea bildet unter den fast durchgängig zweihäufigen Gräsern insofern eine Ausnahme, als er Staubblüten und Stempelblüten an einem Stöcke vereint trägt. Die großen Kolben der letzteren sind gemeinbekannt. Hat man aber auch darüber nachgedacht, warum die Griffel der Maispflanze so auffallend lange Fäden sind? Sie hängen als seidenweicher Haarschopf weit über die Blütenhülle herab. Auch das ist durchaus eine Bedürfnisanpassung, denn als Windblütler muß der Mais wenigstens die Griffel leicht zugänglich machen. Goebel hat jedoch auch Pflanzen erzogen, die nur männliche Blüten hervorbrachten, wenn er sie in schlechtem, trockenem Boden bei schwacher Beleuchtung kultivierte. Er dürfte in diesem Fall ganz recht haben, wenn er das Verkümmern der weiblichen Blüten dem Mangel an Nahrungsstoffen beimißt. Nur ist es hierbei ganz und gar verschieden von einer rein physikalisch-chemischen Verursachung, daß sich überhaupt funktionsfähige Blüten bildeten. Wenn die Pflanze ohne Innenleben wäre, dann müßte bei Mangel an Nahrung einfach ihr Wachstum aufhören. Wie kommt es aber, daß sie in diesem Fall den „billiger“ herzustellenden männlichen Blütenstand fertigmacht, also ihre Arbeitsweise in einer Weise ändert, die man sonst nur einem urteilsfähigen Wesen zuzuschreiben pflegt? Die Pflanze ist eben nicht ein bloßes „Mineral“, mit dem sie die materialistisch denkenden Naturforscher auf eine Stufe stellen, wenn sie behaupten, ihre ganze Tätigkeit beruhe auf Chemismen. Der Mais beweist dies noch mit einer merkwürdigen Lebenserscheinung. Simon zerstörte in Wurzeln dieser Art durch Hineinstoßen einer Glasnadel die Gewebe, aus denen normalerweise das Wachstum besorgt wird. Dennoch bildete sich eine neue Wurzelspitze. Andere Gewebe (das Perikambium) übernahmen die Funktion der Zerstörten und zeugten dadurch laut gegen die alte Auffassung vom Leben der Pflanze.

Die im Äußeren so uninteressanten Industriegräser bereiten so dem Lebensforscher viel Freude. Namentlich die biologische Erklärung ihrer hervorragenden technischen Eigenschaften ist ein unerschöpfliches Kapitel. Nur hat man sich noch sehr wenig damit von botanischen Gesichtspunkten aus beschäftigt, und so kann das, was wir hier darüber geboten haben, nicht mehr Wert als den eines ersten Versuches beanspruchen.

Die Biologie der einheimischen Wiesengräser.

Es scheint eine ähnlich spitzfindige Frage, wie die, wer früher war, das Stücken oder das Ei, wenn man sich vor das Problem hinstellt, ob die eigenartige Gestalt der Gräser auf ihrer sozialen, freien und lustigen Lebensweise beruhe, oder ob sie durch ihre Ausläufer und Windblütigkeit zu der massenhaften Verbreitung gekommen seien, in der sie jetzt dahinleben. Aber so wie bei dem Spiel der Scholastiker, ist auch hier die Frage falsch gestellt. Der Bau ist der Ausdruck der Lebensweise. Die stammesgeschichtliche Forschung legt die Vermutung auf, daß sämtliche Gräser im weitesten Sinn Abkömmlinge von lilienartigen Gewächsen sind, die sich der ausgesprochensten Anemophilie ergeben haben und dadurch, daß sie nur in den seltensten Fällen baumartig zu werden vermochten, sich auf die Ebenen und Hochflächen zogen, wo sie aus klimatischen Ursachen nicht vom Walde verdrängt werden konnten. Von da an ergaben sich dann Schritt für Schritt aus den neuen Erfahrungen immer vollkommenere Hilfsmittel, um den Schwierigkeiten der neuen Lebenslage gewachsen zu sein. Sie nützten den Vorteil einer fast unbeschränkten Verbreitungsfähigkeit aus durch Bildung von Ausläufern und unterirdisches Kriechen ihrer Wurzelstöcke. Dadurch brachten sie die geschlossene Grasnarbe zustande und waren zur Wiesenbildung vorgeschritten. Das Klima der waldfreien Gegenden bewegt sich in Extremen. Frühlings- und Herbstregen wechseln mit langer Sommerdürre und langem Winterfrost. Pflanzen, die unter solchen Umständen bestehen wollen, müssen sich auf die Rhizombildung verstehen. Wir sehen sie auch an allen Gräsern trefflich entwickelt. Der sengende Sommer und frostige Winter duldet keine Blätter von langer Dauer. Die Pflanze darf nicht zugrunde gehen, wenn ihre Blätter verdorren; sie muß diese vor dem Verdorren aber auch durch peinlich durchgeführte Schutzmaßregeln bewahren. Der jähe Wechsel der Jahreszeiten in den meisten Wiesen- und Steppenländern duldet nicht das Anlegen von Holzkörpern, sondern erzwingt krautigen Wuchs. Die furchtbaren Stürme der frei daliegenden Flächen dulden keine zerreißbaren Blätter, sie erzwingen die jedem Lufthauch bereitwillig nachgebende „Grasgestalt“ mit den bandförmigen Blättern und den bewunderungswürdig elastischen Halmen. Aus alledem erklärt sich der Typus der Graspflanze, so wie er heute vor uns steht: ein perennierendes, geselliges Kraut mit Ausläufern und knotig gegliederten Halmen, daran linealische Blätter entstehen, und schließlich mit einer bis ins letzte dem Winde angepaßten Blüte, die ihre Kinder meist von vornherein zur Verbreitung durch die Luft ausrüstet.

Suchen wir nach dieser Übersicht über die hervorstechendsten Züge die Eigenheiten der Wiesengräser im einzelnen und feinsten zu verstehen, so tritt uns immer wieder das gleiche Prinzip in tausendfacher Variation entgegen.

Beginnen wir mit dem Wurzelsystem. Wer jemals in seinem Garten den vergeblichen Kampf mit den Ausläufern der Quacke (*Agropyrum repens*) führte, dem braucht man es nicht erst zu schildern, welch siegreiches Verbreitungsmittel das Gras mit seinen kriechenden Trieben erworben hat. Wer es im großen sehen will, was das bedeutet, begeben sich in eine echte Dünenlandschaft, wo Strandhafer und verwandte Dünengräser (*Elymus*, *Ammophila*) mit ihren fädigen, überall festwurzelnden Ausläufern rasch den „Boden binden“, d. h. dem Flugsand das Rollen verbieten, wo

sich auch nur erst ein Grashopf eingenistet hat. Und wer die praktische Bedeutung dieser Erscheinung erfassen will, der bedenke, daß die Erntehoffnung des Landmannes auf der reichlichen „Bestockung“ der Getreidegräser beruht, nämlich darauf, daß aus dem untersten Stengelknoten Zweige sprießen, die oft wieder neue treiben und schließlich alle eine Ähre hervorbringen. Man bevorzugt z. B. den Winterroggen hauptsächlich deshalb vor dem Sommerroggen, weil er sich reichlicher bestockt. Die ganze Wiesenbildung, die tageweite Ausdehnung der Schilfwälder in Sümpfen beruht ausschließlich auf dieser Eigenheit der Gräser. Theoretisch wären sie dadurch befähigt, eigentlich das ganze Festland und alle fechteren Gewässer völlig zu überwachsen. In der Wirklichkeit wird aber dem Graswuchs durch die verschiedensten Umstände ein Ziel gesetzt, wie der Landmann sehr wohl weiß aus seinen oft vergeblichen Versuchen, eine Wiese anzulegen. Bis vor kurzem wußte er nämlich nicht, daß die einzelnen Grasarten einem ganz bestimmten Wasserbedürfnis angepaßt sind, das sie von dem Grundwasser aus befriedigen. Nachdem schon Teihsberg in Dänemark darüber Erfahrungen

1

2

3

4

Blühende Wiesengräser.

1 = Anäuelgras (*Dactylis glomerata*). 2 = Alpenwindhalm (*Agrostis alpina*). 3 = Bittergras *Briza media*. 4 = Stoppfchwinkel (*Phleum alpinum*). (Naturaufnahme von S. Dopfer-Wandchen.)

Grasflur, in eine Waldeslichtung eindringend

(Naturaufnahme von O. Scharf-Treidel)

gesammelt, lieferte neuerdings namentlich Weber die merkwürdigsten Angaben. Im Graslande der hohen Geest, dem berühmten deutschen Wiesengebiet, herrscht das Wiesenrispengras (*Poa pratensis*), wenn das Grundwasser 2—3 m unter der Oberfläche stand. Stieg es um 1—1½ m, dann verschwand dieses Gras und wurde durch *Poa trivialis* ersetzt. Ein Meter weiteren Steigens verschaffte der Schmiere (*Aira caespitosa*) das Übergewicht. Gleich empfindlich sind die Wiesengräser auch gegen die chemische Zusammensetzung des Erdbodens. Auch darüber hat die landwirtschaftliche Botanik (namentlich die landwirtschaftlichen Versuchstationen) beschäftigt sich mit solchen Untersuchungen) statistisches Material beigebracht. Auf einer ungedüngten Parzelle standen in einem dieser Fälle 70—76% Gräser, durch Mineraldüngung gingen sie auf 52% herab, durch Mineral- und Ammoniakdüngung eroberten sie den Boden bis zu 97%. Dabei veränderte sich allerdings das Bild der Grasflora. Der Schafschwingel (*Festuca*) ging von 13% auf 1% zurück. Das Knäuelgras (*Dactylis*) und *Poa* dagegen stiegen von 2% auf 24%.

Ich setze diese Angaben mit Fleiß deshalb hierher, um auch den Nichtlandwirten unter meinen Lesern Verständnis dafür zu verschaffen, was man sich unter gutem und schlechtem Weizen- oder Kornboden vorzustellen habe, und warum die Düngungsfragen für den Getreidebau geradezu Lebensfragen sind. — Das Organ, mit dem die Gräser sich Erfahrung über die ihnen gebotenen Bodenverhältnisse verschaffen, ist übrigens ein berühmtes Beispiel pflanzlicher Sinnesstätigkeit. In der Wurzelspitze der Gramineen ist das Statozytenorgan, durch das sich die Pflanze über die Richtung orientiert, in reinsten Ausbildung zu sehen. In den mittleren Zellen der Wurzelhaube liegen die großen Stärkekörner, deren Lage der Wurzel anzeigt, in welcher Stellung sie sich befindet.

Dem Pflanzenanatomen ist die Graspflanze aber noch in anderer Beziehung lieb und wert. Ihr Stengel, der „Grashalm“, ist ein Meisterwerk der Natur in bezug auf höchste Festigung mit sparsamsten und sinnvollsten Mitteln. Wenn man die Maße eines mittleren Getreidehalmes auf die menschlichen Bauwerke überträgt, so müßten wir, um die gleiche technische Leistung vollbringen zu können, den Turm des Ulmer Münsters etwa 2000 mal höher, d. h. 340 000 m hoch, bauen können. Dies erscheint absurd und ist doch von den Pflanzen verwirklicht. Noch dazu hat ihr Ulmer Münster die Spezialität, daß man seine Spitze bis zur Erde herabbeugen kann, ohne daß er bricht. Die angewendeten technischen Mittel für diese Leistung findet der Leser im zweiten Bande dieses Werkes dargestellt. Wir wollen hier nur das nachtragen, was für die Festigungseinrichtungen der Gräser spezifisch kennzeichnend ist. Sie arbeiten alle mit Hohlrohren, in denen die Bastfasern, etwas schief (wie Mannesmannröhren!) ineinander verkeilt, der Länge nach verlaufen. Diese Röhre ist meist noch durch Rippenvorsprünge verstärkt, was man an den Halmen als helle Längsstreifen erkennt.

Knoten des Weizenhalmes (A), im Längsschnitt (B), C = Knoten am Stalm von *Andropogon* mit zur Hälfte entfernter Scheide. (Nach Sackel.)

Die an den Grashalmen sofort ins Auge fallenden Knoten hat man früher auch als Organe der Festigung gedeutet, doch ist dies nach Hackel irrtümlich. Dieser Forscher sagt: „Die Bedeutung der Knoten liegt vielmehr einzig und allein in der durch sie vermittelten Wiederaufrichtung nieder gebeugter Halme. Das Knotenparenchym nämlich ist geotropisch reizbar; sobald der Halm in eine schiefe oder horizontale Lage geraten ist, beginnen sich die Zellen auf der der Erde zugewendeten Seite des Knotens zu strecken, wodurch die Unterseite größer, die Oberseite durch den Druck der letzteren kleiner (und oft gefaltet) wird, und dies dauert so lange, bis das obere Internodium die vertikale Lage wieder gewonnen hat; doch können sich an dieser Aufrichtung mehrere Knoten zugleich beteiligen.“

Diese dem Landwirt wohlbekannte Lebenserscheinung, auf der das Aufrichten gelagerten Getreides beruht, ist ein sprechender Zeuge des eigenartigen Innenlebens dieser Wesen. Die Grasknoten sind zugleich die Stätten des Wachstums, denn in ihnen befindet sich lebendiges Gewebe in meristematischem Zustande. Das muß naturgemäß sehr weich sein, und so ist es nur im Sinne unserer Anschauung verständlich, daß die Blätter aus diesen Knoten entspringen, sie eng mit einer festen Scheide umschließen und dadurch stützen. Der innere Bau dieser Scheiden ist auch dieser Tätigkeit gemäß nicht der eines Blattes, sondern eines hohlen Stengelorganes. Im Schutze dieser Röhre bilden sich die Blätter und jungen Blütenanlagen, die dann wie die ineinandergeschobenen Abschnitte eines Fernrohres daraus hervortreten.

Soweit läßt sich alles an dem wunderbaren Gelenkknoten der Gräser durch Beobachtung klarstellen. Um so geheimnisvoller aber muß einem denkenden Pflanzenfreund die im passenden Augenblick erfolgende einseitige Streckung der Zellen im Knoten und das „Bedürfnismäßige“ ihrer Handlung erscheinen. Offenbar ist in den Knoten auch ein Sinnesorgan für Lageempfindungen vorhanden, durch dessen Reizung die Pflanze mit diesem wundervollen Reflex antwortet.

Ein drittes Sinnesorgan der Gräser wurde übrigens schon vor langen Jahren in deren sogen. Koleoptile entdeckt. Man versteht unter diesem Namen das erste Scheidenblatt, mit dem ein Grassamen keimt. Charles Darwin und W. Rotherbert haben durch Versuche sichergestellt, daß die Spitze dieser Koleoptile ein Sinnesorgan ist, das die den Keimling treffenden Lichtreize so aufnimmt, daß sie die Pflanze intelligent verwerten kann. Besonders am gemeinen Hafer (*Avena sativa*), aber auch an den für viele physiologische Versuche höchst geeigneten Keimlingen von *Phalaris*, *Setaria* und *Panicum* lassen sich diese Versuche leicht anstellen, die ergeben haben, daß die äußerste Spitze des Scheidenblattes in einer Länge von $1-1\frac{1}{2}$ mm äußerst lichtempfindlich sei. Befremdlicherweise ist es dieselbe Zone, in der zahlreiche Statozyten auch die Aufnahme von Schwerkraftreizen gestatten, so daß sich besonders darauf gerichtete Untersuchungen, wie sich denn die Arbeitsteilung der beiden Sinnesstätigkeiten vollzieht, empfehlen würden. Da ferner bei *Panicum* der von der Scheidenblattspitze aufgenommene Lichtreiz erst an ganz anderer Stelle, in dem für Licht gar nicht empfindlichen hypokotylen Glied, die antwortende und zweckentsprechende Krümmung auslöst, haben diese Versuche auch die Tatsache bewiesen, daß in der Pflanze die gleiche Einheit (= Solidarität) der Reaktionen vorhanden ist wie in dem Tiere. Das aber ist von größter Tragweite für das Verständnis des Pflanzenlebens.

Die Blätter der Gräser sind durchgängig den Besonderheiten des Klimas angepasst, das den Wald vertreibt, nämlich längerer Sommerdürre. Sie sind xerophil gebaut, d. h. sie schränken die Transpiration auf ein Minimum ein. Sie sind daher sehr häufig eingerollt und zusammengefaltete; ihre Epidermis ist stark verdickt, im Blatte sind zahlreiche Sklerenchymfasern vorhanden, die Leitbündel sind dementsprechend anders entwickelt. Die Zahl der Spaltöffnungen ist reduziert, sie liegen in Hohlblättern mit Vorliebe an der gefalteten, wohlgeschützten Seite. Auch daß die Grasblätter mit Vorliebe mehr oder minder senkrecht stehen, kann man im Sinne eines Transpirationsschutzes deuten, ebenso daß viele der „Wüsten- und Steppengräser“ graublau bereift sind.

Goebel hat Versuche mit einem solchen graublauen Schaffschwingel (*Festuca glauca*) von trocken-sonnigen Triften angestellt, indem er ihn in feuchter Atmosphäre kultivierte. Die unter solchen Umständen neugebildeten Blätter gaben die Einrollung mehr oder minder auf, wechselten die Farbe gegen frisches Grün, erzeugten eine dünnwandige Epidermis und reduzierten den Mantel von Sklerenchymfasern. Goebel meint hierzu, die Zweckmäßigkeit dieser Umänderungen sei nur eine scheinbare, „weil alle die Reaktionen, welche direkt unzweckmäßig sind, ausgejätet wurden.“ Es ist mir unersichtlich, worauf dieser Forscher diese von dem Augenschein widerlegte Behauptung stützt.

Manchmal, so z. B. bei *Sesleria caerulea*, klappt das Gras mit Hilfe von besonders zu diesem Zweck von ihm erzeugten Gelenkzellen täglich während der heißesten Zeit sein Blatt zusammen!

In bezug auf Lichtgenuß sind diese Gräser denn auch dank ihrer vollkommenen Schutzeinrichtungen gar nicht empfindlich. Wiesner zählt eine lange Reihe vollkommen lichtindifferenter Wiesengräser auf und erwähnt z. B., daß sich das Anäuelgras (*Dactylis glomerata*) bei Lichtintensitäten von $1 - \frac{1}{11}$ ganz normal ausbildet; bei $\frac{1}{11} - \frac{1}{30}$ bildet es eine Schattenform mit kurzen Stengeln und schmaler, langgezogener Blütenrispe. Bei $\frac{1}{39} - \frac{1}{52}$ blüht es nicht mehr, bleibt aber doch noch am Leben.

„Wenn aber die Gräser phylogenetisch baumartig werden“, sagt er, „ändern sie ihren biologischen Charakter um und nehmen alle jene Eigentümlichkeiten an, welche für das Baumleben erforderlich sind: das Blatt wird photometrisch, sein Lichtgenuß ist geregelt, und während die gewöhnlichen Gräser keinem Laubwechsel unterliegen, ihre Blätter vielmehr an den Halmen zugrunde gehen, sehen wir bei Bambusen einen rechten Laubfall: die Blätter der Bambusen bilden ihre Trennungsschichten an der Grenze zwischen Spreite und Vaginalteil aus; die Spreiten fallen ab, oft noch im grünen Zustande, die Blattscheiden bleiben vergilbt am Stammgewächs und verwesen hier.“

Wenn man diesen staunenswerten Zusammenhängen zwischen neu auftauchenden Bedürfnissen und ihrer Befriedigung durch selbsttätig erzeugte Mittel im ganzen Pflanzenreich vom Größten bis zum Kleinsten immer wieder begegnet, so muß man sich wohl oder übel daran gewöhnen, den Pflanzen die Fähigkeit hierfür zuzuschreiben, nicht aber den chemischen Stoffen, die außerhalb des lebendigen Körpers niemals solche Zusammenhänge herstellen.

Aus der Biologie der Grasblätter wäre noch nachzutragen, daß sie dermaßen reich an verkiefelten Zellen sind, daß man sich an unvorsichtig angefaßtem Schilfrohr die Hand zerschneiden kann. Ein ausgeglühter Getreidehalm hinterläßt ein Kiesel-

skelett wie die Schachtelhalme. Versuche haben ergeben, daß die Vertiefelung ein guter Schutz gegen Schneckenfraß ist. Auch macht sie es begreiflich, warum z. B. das Schilf von weidendem Vieh nie angegriffen wird. Schmeil erzählt, daß viele Gräser der afrikanischen Tropen dermaßen vertiefelt seien, daß sie für unsere Haustiere gänzlich ungenießbar sind.

Wenden wir uns nun der Blütenbiologie unserer Wiesengräser zu, so fesseln auch daran ganz unerwartete Erscheinungen. Die Grasblüte ist dermaßen dem Wind

angepaßt, daß man sie als den Typus aller Anemophilen bezeichnen kann.

Es ist natürlich überflüssig, meinen Lesern eine Uhr oder die Mannigfaltigkeit der schwankenden Blütenrispen zu beschreiben, mit denen sich die Wiesen im Mai und Juni schmücken. Aber darauf möchte ich die Aufmerksamkeit lenken, wieviel Sondermittel daran aufgeboden sind, um die Bestäubung der Grasblüte zu sichern. Eine Eigenart sind die sogen. Schwellkörper, welche man an den Uhrchen des Roggens ganz bequem studieren kann. Zwischen dem Fruchtknoten und der äußeren Blütenspelze liegen sie als farbloses Polsterchen. Kurz vor der Pollenreife schwellen

Blühendes Schilfrohr (*Arundo Phragmites* L.). (Naturaufnahme von J. G. Peters + Graz.)

sie an und spreizen dadurch die Blütenspelzen auseinander, so daß nun der Weg zu den vorher gut verschlossenen Narben frei ist. Eine zweite Lebenserscheinung, die ganz unpfanzenhaft anmutet, ist das plötzliche und außerordentliche Wachstum der Staubfäden, das auch erst in den letzten Minuten vor dem Stäuben einsetzt. Auch alle anderen Einrichtungen dieser Blüte sind von staunenswerter Sinnemäßigkeit.

Die Staubbeutel krümmen sich so, daß sich der herausrieselnde Pollen wie auf einem Schälchen ansammelt und erst von dem Luftzug abgeholt wird, der auch seine Verbreitung besorgt. Die Narbe bildet mit ihren großen Federchen einen vollkommenen Staubfänger. — Die Schule wird nicht versäumen können, bei den Lebenserscheinungen des Getreides ausführlich zu verweilen, und wenn man warm dafür eingetreten ist

aus der Biologie der Planktonwesen die großen Gesetze des Lebens in der Schule anschaulich zu machen, so kann namentlich der Landlehrer an der Biologie des Getreides einen noch wertvolleren Gegenstand hierfür finden. Eine kurze, dem jugendlichen Gemüte angepasste Anleitung hierzu versuchte ich in meinem Büchlein: Die Feldfrucht (Leipzig, 1909, F. W. Grunows Verlag) zu schaffen.

Der Lehrer wird dann auch auf die in den meisten Lehrbüchern vernachlässigten Einrichtungen der Gräser hinweisen müssen, mittels deren sie die Selbstbestäubung zu meiden wissen. Denn nicht alle Arten haben es so weit gebracht wie der Roggen, der bei Selbstbestäubung unfruchtbar bleibt. In polygamischen Blüten, z. B. bei der Hirse,

Blühende Roggenähren. (Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Heinemann-Alten.)

blühen zu diesem Zwecke die männlichen Blüten eines Ährchens später auf als die weiblichen. Die Blüte ist also proterandrisch. Andere sind umgekehrt protogyn. Bei vielen Wiesengräsern biegen sich die Narben aus hängenden oder nickenden Blütenähren nach aufwärts heraus, so daß sie nur von dem Pollen höher gelegener, also fremder Blüten erreicht werden können. Demgegenüber gibt es allerdings wieder eine Reihe von Gerstensorten, die sich ständig selbst befruchten und ebenso streng kleistogamische Arten.

Die Tatsache, daß die Gräser nicht sofort zugrunde gehen, sondern nur auf die Dauer entarten, wenn sie sich selbst befruchten, aber dennoch sich Sonderanstrengungen auferlegen, um dies zu vermeiden, gibt ein gutes Gegenargument gegen die Anschauung, als handle die Pflanze nur zwangsmäßig nach Art der vorhergesehenen mechanischen Auslösungsvorrichtungen.

Nicht weniger interessant und zu neuen Studien verlockend ist auch die Biologie der Grasfrüchte. Über den Bau der Getreidefrucht möge man in Bd. II auf S. 77, 549, sowie 569 Bilder und Beschreibung einsehen. So, wie Weizen und Mais, sind fast alle Schalf Früchte (Caryopsis) der Gramineen gebaut, obwohl auch, namentlich bei den Bambusen, Röhren, sogar Beeren gebildet werden.

Als die wichtigste Ausfüllungsvorrichtung der Früchte muß man die Spelzen betrachten, die sie einhüllen. Sie schützen nicht nur vor zu rascher Durchfeuchtung, sondern dienen auch noch als Flugorgane. Sie sind dieser Funktion oft auch dadurch angepaßt, daß die Granne lang federig auswächst. Die echten Steppengräser (*Stipa*, namentlich *St. pennata*), die deshalb Federgras genannt werden, haben durch diese Eigenheit von je die Aufmerksamkeit der Steppenvölker auf sich gelenkt. Der Bewohner des Alfölds schätzt sein „*árvaleányhaj*“ (= Waisenmädchenhaar), d. h. den Busch Federgras am Gute, als Zeichen der Mädchentreue. Vergeblich bläst der Wind darauf, es bleibt doch treu seinem Besitzer, sagt erläuternd dazu ein ungarischer Dichter.

Ausfüllungseinrichtungen der Gräser.

1 = Ährchen von *Tragus racemosus* Hall. mit Äletten. 2 = Fluggrannenfrucht von *Aristida caerulescens* Desf. 3 = Bohrergrannenfrucht von *Stipa capillata* L. 4 = Bohrergrannenfrucht von *Danthonia provincialis* Dc. 5 = Begrannnte Ähre von *Triticum trianciale* Gren. 6 = Mit Widerhaken versehene Ähre und Ährchen von *Ctenium americanum* Schr.

(Nach Engler-Prantl.)

Die langen Grannen der *Stipa*-Arten und ihrer Verwandten, die spiralig gedreht sind, wirken übrigens als treffliche Bohrer zur Befestigung der Früchte im Boden. Sie sind hygroskopisch, ziehen sich mit der wechselnden Luftfeuchtigkeit abwechselnd zusammen, strecken sich, sie rotieren dadurch, und da ihnen oft ein steifes Haar als Widerhaken nicht fehlt, bohren sie sich tief in den Erdboden, was nachzuprüfen eine sehr amüsante Beschäftigung für Naturfreunde ist. Oftmals üben diese Grannen ihre Künste allerdings am un-

rechten Ort. Sie gelangen auf das Fell von Weidetieren, namentlich Schafen, und dringen dann unaufhaltsam durch die Haut bis zu den Eingeweiden, wobei sie natürlich die gefährlichsten Entzündungen im Gefolge haben. *Andropogon*-Arten, die mit Widerhaken und Stacheln bewehrte Früchte erzeugen, sollen in Afrika deshalb als wahre Plage der Reisenden gelten. Sie dringen unter die Kleider und zerstechen den Eindringling in ihr Reich. — Ein besonders trefflicher „Bohrer“ ist die Frucht des Flughafers (*Avena fatua*). Ein Freund meines Werkes übersandte mir aus Duppau in Böhmen wiederholt Proben der Früchte dieser Pflanzen, die, dort in der Kornkammer als Unkrautsamen zwischen Erbsen lagernd, diese so tief angebohrt hatten, daß sie oft die ganze Erbsen durchlöcherten.

Hackel schreibt von einer verwandten Art noch Wunderlicheres. Es heißt bei ihm: „Eine eigentümliche Rolle spielen die Grannen von *Avena sterilis* L.; hier fallen immer zwei stark begrannnte Fruchtspelzen miteinander vereinigt ab; die gedrehten Grannen beginnen bei Befechtung zu rotieren, wobei sich ihre abstehenden Schenkel

kreuzen, aufeinander drücken und endlich mit Gewalt aneinander abgleiten, was den Früchten einen derartigen Stoß mitteilt, daß sie ziemlich weit fortgeschleudert werden.“

Diese vielfachen Ausläugseinrichtungen sind aber nur bei den wildwachsenden Gräsern vorhanden; bei den in Kultur genommenen verschwinden sie fast völlig. Dahinter steckt aber keine Aktivität der Pflanzen, sondern es ist ein Ergebnis der künstlichen Zuchtwahl durch den Menschen, dem die Spelzen und Grannen bei der Erntearbeit hinderlich waren, und der daher solche Individuen auslas, bei denen sie verkümmert waren. So zog er seine grannenlosen Weizen- und sonstigen Brotfrüchtarten in unendlicher Mannigfaltigkeit heran. Trotz seiner Künstelei gedeiht ihm aber sein Getreidefeld nicht jedes Jahr so trefflich, wie die sich selbst verjüngende natürliche Wiese, auf der ja neben Bestockung und trefflichen Verbreitungsmitteln auch noch eine ganz absonderliche Art von Bervielfältigung den Pflanzen zugebote steht. Das ist die Austreuung von „verlaubten Ährchen“. In älterer Zeit bezeichnete man das als „Lebendiggebären“ (Viviparie). Da es sich namentlich in Notfällen, also besonders im Hochgebirge und in den Polarländern, daher dort einstellt, wo die normale Fruchtweise zu vielen Zufällen ausgefeilt ist, wird man sich mit dem Gedanken befreunden müssen, als reagiere hierin auch wieder das seltsame Innenleben der Gräser, um so mehr als dieselbe Art, z. B. *Poa alpina*, in Niederungen normal abblüht, im Hochgebirge aber apogamisch wird, d. h. die ganzen Ährchen oder einzelne Blüten, ohne in ihnen Staubgefäße und Stempel zu bilden, in kleine Laubsprosse umwandelt, also Brutknospen bildet, die wie Früchte abgeworfen werden, am Boden Wurzeln bilden und zu neuen Pflanzen heranwachsen. In Deutschland hat es *Poa bulbosa* darob zur Berühmtheit gebracht; die schottische *Poa stricta* ist überhaupt nur in diesem eigentümlich blütenlosen Zustand bekannt.

Dem Pflanzenanatomien bieten schließlich die Grasfrüchte auch noch eine Absonderlichkeit, die sich nirgends so gut im ganzen Pflanzenreiche studieren läßt. Bekanntlich lebt jeder in den Früchten eingeschlossene Embryo wie ein Parasit von den ihm beigegebenen Reservestoffen mit Hilfe eines besonderen Absorptionsgewebes. Dieses letztere ist nun an den Graskeimlingen prächtig entwickelt in Form eines mächtigen Zottenbesazes, den man an dem Schildchen des Weizenkeimlings zu suchen hat. Haberlandt macht darauf aufmerksam, daß in gewissen Grasfrüchten, so z. B. in denen des reizenden Zittergrases (*Briza minor*, siehe Bild S. 136), das mit seinen großen Fruchtspelzen die Früchtchen weithin fliegen lassen kann, dieses auffaugende Gewebe des Schildchens eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem typischen Absorptionsgewebe der Wurzeln besitzt. Das wäre demnach ein Fall für analoge Organbildung durch analoge Bedürfnisse, wie er nicht schöner ausgedacht werden kann. Nicht weniger beachtens-

Ein apogames Alpengras (*Poa alpina*).
(Naturaufnahme von S. Dopfer = München.)

wert ist auch die physiologische Rolle, die im Grassamen den Geweben um das Schildchen (Scutellum) zukommt. Sie besorgen nämlich, wie Hansen den Vorgang treffend genannt hat, die Verdauung der in dem Samen zur Ernährung des Keimlings aufgespeicherten Reservestoffe. Dies geschieht unter dem Einfluß von Enzymen, ganz analog dem gleichbenannten Vorgang im Tierkörper. T angl, Haberlandt, Grütz u. a., die

Pampasgras (*Gynerium argenteum*) als Ziergewächs.

das beiden Gräsern untersucht haben, schildern es in folgender Weise: Zu Beginn der Keimung scheidet das Absorptionsgewebe des Skutellums das Diastase genannte Enzym aus, das die Stärkekörner der angrenzenden Endospermschichten angreift und auflöst. Auch die sogen. Kleberschicht des Samens scheidet nun das Enzym ab, betätigt sich also als wahrhaftige Verdauungsdrüse. Merkwürdigerweise ist dies aber an die Anwesenheit des Embryos gebunden. Macht man die Absonderung des Verdauungssaftes sinnlos, indem man den Embryo vom Korn ablöst, so unterbleibt die Enzyymbildung!

Wir mögen also die bescheidenen Gräser betrachten, von welcher Seite ihres Lebens wir wollen,

stets überraschen sie durch schöne und belehrende Züge ihrer „strukturellen und funktionellen Intelligenz“. Sie machen es dadurch wett, daß ihre äußere Erscheinung der vieler bevorzugteren Schwestern nachsteht, obzwar es auch unter ihnen manchen Gartenliebbling gibt, der mit gebänderten Blättern oder durch stattliche Erscheinung und prächtige Blütenrispenbildung das Auge auf sich zieht. So ist das Pampasgras (*Gynerium argenteum*) Argentiniens (s. das Bild) auch im heimischen Park ein vielbegehrter Schmuck, namentlich wenn es im Spätherbst seine silberschimmernden Blütenbüschel treibt. Im großen und ganzen aber läßt sich doch sagen, daß der Naturfreund die Gräser erst dann wahrhaft lieben lernt, wenn er in die Geseze ihres Seins eindringt, deren man freilich hier des Platzmangels halber einen größeren Teil verschwiegen als beschrieben findet.

Verlandungszone eines Flusses

(Der Fluß ist von typischer Verlandungsvegetation [Schilfrohr, Binsen, Simsen und Seggen] umfäumt)

(Naturaufnahme von H. Mayer-München)

Leben und Eigenart der Getreidearten.

Es ist wohl niemand in Zweifel, was er unter Getreide zu verstehen habe. Und dennoch ergeben sich schon dann sehr verschiedene Auffassungen, wenn man den Begriff von einem Mitteldeutschen, einem Franzosen oder Deutschungarn oder einem Skandinavier erklären läßt. Denn wenn es für den ersteren als selbstverständlich gilt, den Roggen (*Secale cereale*) für die bevorzugte Brotsfrucht zu halten, bereitet man in Frankreich oder in der bevorzugten ungarischen Ebene Brot und Mehl aus Weizen (*Triticum vulgare*), im Norden aber aus Hafer (*Avena sativa*). Und tritt man aus Europa heraus, entfremdet man sich gar bald dem liebgewohnten Bilde der wogenden Getreidefelder. Denn auch Mais, Hirse, Reis, Durrha (*Andropogon Sorghum*) und andere Gräserarten gelten als Brotsfrucht und eigentliches Getreide.

Die urgeschichtliche Forschung hat bewiesen, daß die eigentlichen Getreidegräser (unter denen man vorzugsweise Weizen und Korn — Roggen und erst entfernter Gerste und Hafer versteht) sogar in Europa erst Neuankömmlinge sind. In den Schweizer Pfahlbauten fehlen alle Spuren des Roggenbaues, dagegen ist in den ältesten Schichten (z. B. in Robenhäusen) die Kolbenhirse (*Setaria italica* Beauv.) in solchen Mengen erhalten, daß man annehmen muß, sie sei die Hauptbrotsfrucht der ältesten Steinzeitmenschen gewesen, so wie noch heute bei den Chinesen. Später lernten die Pfahlbauer allerdings die Gerste und verschiedene Weizensorten kennen, von denen sich der Dinkel (*Triticum Spelta*) als Lieblingsfrucht der Römer mit ihnen verbreitete. Und noch heute deutet der Dinkelbau bei Schwaben und Alemannen mit ziemlicher Sicherheit darauf, daß jene Gegend einst dauernd von Römern besiedelt war.

Es ist ein fesselndes, aber ganz dunkles Kapitel der Kulturgeschichte, das sich mit der Herkunft des Getreides befaßt. Wir wollen es hier nicht aufschlagen, denn es gehört nicht in die Biologie, sondern in die kulturgeschichtliche Botanik, die ich in einem besonderen Band abhandeln will. Hier sei nur so viel gesagt, daß wir über keine der Hauptgetreidearten Sicheres wissen. Man vermutet, daß der Roggen in wildem Zustand aus Vorderasien stammt, von dort nach Südrußland und mit prähistorischen Völkerwanderungen nach Mitteleuropa gelangte. Zur Bronzezeit tritt er zuerst in Funden von Olmütz in Mähren auf. Viel älter scheint die Gerste zu sein. Viele Forscher nahmen an, daß sie überhaupt die älteste Ackerfrucht sei, und damit stimmt es gut überein, daß Reisende sie dort wildwachsend fanden, wohin die Tradition sich und Quelle der abendländischen Zivilisation verlegt, nämlich zwischen den Strömen Euphrat und Tigris. Über den Weizen hat sich viel Legende verbreitet. Griechische Sagen lassen ihn auf Sizilien seine Heimat finden, eine vielgeglichene Legende verlegt den Anfang seiner Kultur nach Ägypten, wo die Mumiengräber reichliche Gaben davon enthalten. Noch immer macht von Zeit zu Zeit die Notiz von dem nach Jahrtausenden zum Keimen gebrachten Mumienweizen die Kunde durch die Tagesblätter. Davon ist meines Wissens so viel wahr, daß in der Wissenschaft wirklich diese Behauptung auftauchte und von einem Grafen Sternberg verfochten wurde, daß aber alle neueren Erfahrungen gegen sie sprechen. Aufsehen erregt in neuester Zeit die Entdeckung der Urpflanze des Weizens in Palästina, und soweit sich die vorliegenden Nachrichten beurteilen lassen, werden wir wohl auch daran glauben müssen.

Schließlich ist es eine reine Doktorfrage, woher wir unsere Brotpflanze genommen haben, und verschwindend unwichtig gegenüber der Tatsache, daß durch ihre Kultur auch der menschlichen Kultur die Vorbedingungen geschaffen wurden. Ganz mit Recht sagt daher ein neuerer Schriftsteller über sie: „An den Körnern des Weizens, Roggens, Reises und Maises nebst Hafer, Gerste, Hirse und Spelt hängt die Aufrechterhaltung der menschlichen Gesellschaft.“

Von diesen hat, wenn man die Menschheit als Ganzes betrachtet, der Reis beinahe mehr Wichtigkeit als unsere heimischen Brotrüchte, da man die Zahl der Reissesser

Wunderweizen (*Triticum compositum*).
(Nach einer Zeichnung von N. Deffinger.)

ziemlich übereinstimmend auf 750 Millionen schätzt. Ist der Reissenuß schon uns Europäern wohlvertraut, so möge man seine Wichtigkeit für die Asiaten daraus ermessen, daß der europäische Konsum auf 2 Millionen Tonnen, der ostasiatische aber auf 100 Millionen Tonnen jährlich geschätzt wird. Nach der chinesischen Tradition wird er dort seit 5000 Jahren kultiviert, obzwar seine eigentliche Heimat nicht dort, sondern in Indien gesucht wird, von wo aus ihn der für die Naturwissenschaft so bedeutsame indische Feldzug Alexanders des Großen nach Westen brachte. Für diese erste Vermutung spricht auch sein griechischer Name *Oryza* (*sativa* L.), da er aus dem iranischen *brizi* und dem Sanskrit *vrihi* entstanden zu sein scheint.

Heute ist die Reiskultur überall dort verbreitet, wo die Sommertemperatur 27–28° C übersteigt, und passender Sumpfboden vorhanden ist. Denn der Reis ist ein Sumpfgewächs, seine Kultur daher von der Gefahr der Malaria bedroht. Deshalb ist sie z. B. in Oberitalien, dem gegenwärtig wichtigsten

Reislande Europas, in der Umgebung von Städten und in der Nähe besuchter Landstraßen verboten. Wenig bekannt ist es, daß auch in Südungarn ein nicht unerheblicher, jedenfalls sich sehr gut lohnender Reiskbau betrieben wird, allerdings verschwindend wenig gegenüber den Riesenmengen, die heute Nord- und Südamerika auf den Markt werfen.

Für die Neue Welt bedeutet übrigens der Mais nicht weniger als der Reis. Der Mais ist dazu noch jene Brotrüchte, die, von der heißen bis in die gemäßigte Zone reichend, am weitesten Verbreitung gefunden hat. Wird sie doch noch in Mitteldeutschland landwirtschaftlich angebaut, allerdings nur zu Fütterungszwecken, da sie dort nicht mehr Körner reift. Und der Naturunkundige erfährt wenigstens aus den Zeitungsnachrichten über die fürchterliche Pellagra in Norditalien, daß sie durch einseitige Ernährung mit Maispolenta entsteht, daß also dort Mais ein Volksnahrungsmittel größten Stils ist. Mit dem Mais vergalt uns Amerika die Kulturschätze, die wir ihm

boten. Eine hübsche Sage, die uns Sir John Franklin, der Polarreisende mit dem erschütterndsten Schicksal, überliefert, sagt darüber mehr als noch so viele statistische Angaben. Ein Häuptling der Susquehannah-Indianer erzählte sie ihm in folgender Weise: Ehedem mußten unsere Vorfäter immer nur vom Fleische der Tiere leben, litten daher bei schlechter Jagd oft Hunger. Einst aber erlegten zwei junge Männer unseres Stammes einen Hirsch, zerlegten und brieten Stücke davon am offenen Feuer. Da erschien eine Frau vom Himmel und setzte sich auf einen Hügel. „Dieser Geist ist gewiß vom Bratenduft angelockt worden,“ sagten da unsere Leute, „bieten wir ihm doch ein Stück an.“ Und sie gaben ihm die Zunge, den besten Bissen am Braten. Die Frau war sehr erfreut darob und sprach: „Ich will euch belohnen für eure Güte, kommt in 13 Monaten an den gleichen Platz, da werdet ihr etwas finden, von dem ihr und alle eure Nachkommen leben könnet.“ Die zwei Jäger befolgten dieses Gebot! Mit großem Erstaunen sahen sie dort Pflanzen, wie sie solche sonst nie gesehen. Wo die rechte Hand des Geistes geruht, dort wuchs Mais, wo seine linke Hand gelegen hatte, blühte die weiße Bohne, und wo er gefessen, der Tabak.

Die Indianer machten den Mais sogar zum Kulturgegenstand und opferten seine Körner der Maisgöttin Cinteuti, nicht weniger naiv und sinnig als die Getreideopfer des europäischen Altertums am Altar der Getreidegöttin Ceres. Nur mit dem Unterschied, daß der Mais mehr Anlaß gibt zur Dankbarkeit, denn während die beste abendländische Brotfrucht nur 7- oder bestenfalls 30fach das Saatkorn wiedergibt, zahlt der Mais mit 300—400facher Ernte. Ja, Humboldt erzählt von 800fachem Ertragnis. Neben diesen großen Wohltäterinnen verblaßt alles, was sich von der Bedeutung der übrigen Getreidearten erzählen läßt. Die Mohrhirse als nationales Getreide in Afrika, die Gerste als Hauptbrotfrucht in Tibet, das Haferbrot des Schotten, Iren und Norwegers, sie sind in diesen Ländern zwar das „tägliche Brot“, aber nur Rückenbüßer, etwa so wie dem Australneger sein Nardu und die Araukarienzapfen.

So spiegeln sich in der Geschichte des täglichen Brotes die ganze Geographie, die Menschengeschichte, die Entwicklung der Kultur und nicht zuletzt die Geschichte der Botanik. Mit leichter Mühe könnte man sich verpflichten, an dem Beispiel der Brotfrüchte die ganze Buntheit menschlichen Lebens zu erläutern. Ja, man müßte sogar viel früher beginnen als bei dem Menschen, da doch wunderbarerweise bereits ein Insekt, die Ackerbauameise, den Nahrungswert der Grasfrucht so gut kennen lernte, wie der Hamster und seine vierfüßigen Genossen, die sich aus den Früchten des Feldes Vorratskammern anlegen.

Wenn man die zahllosen Varietäten der heimischen Getreidearten betrachtet, die wohl alle künstlich erzeugt wurden, wenn man die mit ihnen noch zusammen wachsenden wilden Formen, so namentlich den wilden Hafer (*Avena fatua*), die Mäusegerste (*Hordeum murinum*), die Roggengerste (*H. secalinum* Schreb.), die Strandgerste (*H. maritimum* Whit.) und den Sandroggen (*Secale fragile* Bieb.) Ungarns vergleicht, ermißt man erst, wieviel „praktische Wissenschaft“ doch eigentlich bereits der Urnensch beherrscht haben muß. Lassen doch schon die Pfahlbauten drei Gerstenforten, fünf Weizenrassen (und zwei Hirsesorten) wiedererkennen, also auf eine hohe Stufe der „angewandten Botanik“ schließen. Im Jahre 1847 wurden auf den berühmten Versuchsfeldern zu Hohenheim in Württemberg 51 Triticum-Rassen,

13 Gerstenforten, 15 Hafervarietäten und 3 Roggenforten gezüchtet, deren Zahl sich bis heute vervielfacht hat und auf 150 geschätzt wird. Allerdings handelt es sich hierbei stets nur um ganz wenige Arten, aus denen man durch Auslese und Kreuzungen Fortmen mit Sondereigenschaften herstellt. So unterscheidet Hegis Flora nur 5 Weizenarten: den Spelt oder Dinkel (*T. spelta* L.), den Emmer (*T. dicoccum* Schr.), das Einkorn (*T. monococcum* L.), den polnischen Weizen (*T. polonicum* L.) und schließlich den eigentlichen Weizen (*T. vulgare* Vill.), von dem allein dem Landwirt viele Dugend Abarten als Kolbenweizen, Igelweizen, Wunderweizen (siehe das Bild S. 146), Glasweizen, Hartweizen usw. angeboten werden. Auffallend wenig abänderungsfähig scheint dagegen der Roggen zu sein, von dem nur die einzige Art *Secale cereale* L. bekannt ist, aus der man künstlich eine überwinternde (Winterroggen) und eine einjährige (Sommerroggen) Form separiert hat.

Man hat sich bei den Getreidearten als Ziel der Züchtung vorgesteckt, eine Reihe von Mängeln der wildwachsenden Arten zu beseitigen. So hat die Stammart des Roggens (*S. montanum* Guss.) eine brüchige Ährenspindel. Dies wurde weggezüchtet. Auch ist der Roggen eine ausdauernde Pflanze, eine Eigenschaft, die durch die Kultur ebenfalls verloren ging. Jedoch findet man auf dem Roggenfelde fast stets Pflanzen, die aus den Stoppeln neu ausklugen als Zeichen, daß sich die alte Gewohnheit noch nicht ganz verloren hat. Bei dem Weizen hat man vielfach auf den Verlust der Grannen hingearbeitet, oder man hat zufällige Monstrositäten, wie Verzweigung der Ähren (*T. compositum*, siehe das Bild), erblich zu fixieren gesucht. Wenn man die Pflanze nicht der Frucht, sondern der Strohhalme halber anbaut, wie es in Norditalien der Fall ist, wo die Florentiner Strohütte daraus geflochten werden, weiß man die erforderliche Kürze und Zartheit der Halme dadurch hervorzurufen, daß man das Korn zu dicht in mageren Boden sät. Bei der Gerste, von der es 16 wildwachsende Arten gibt, hat man durch die Kultur auf Zäherwerden der brüchigen Spindel und Abkürzung der enorm langen Grannen hingearbeitet. Nur ist es gerade bei dieser Getreideart unmöglich, Kreuzungen auf dem Versuchsfelde vorzunehmen, da die Mehrzahl der Gerstenarten kleistogamisch blüht. Bei dem Hafer, von dem man 50 natürliche Arten unterscheidet, von denen aber der gebaute Hafer (*Avena sativa* L.) in seinen beiden Haupttrassen als Rispen- und als Fahrenhafer nur vom Flughafers abgeleitet wird, hat die Kultur das Ausfallen der Fruchtspelzen und die Sonderanpassungen der Grannen zu beseitigen gewußt.

Es sind also, wenn wir unsere Kenntnisse zusammenfassen, bei allen Getreidearten vornehmlich die Verbreitungsanpassungen herabgesetzt und gegenstandslos gemacht worden, da es der Mensch übernahm, diesen Gewächsen künstlich den Kampf ums Dasein zu erleichtern.

Die Gräser als Verlandungspflanzen.

Unser Urteil über die Bedeutung der Gräser wäre ganz schief, wenn man sich nicht mit den sumpf- und moorbewohnenden Arten bekannt machte. Wir denken hierbei nicht so sehr an das Schilfrohr, über dessen Bedeutung als einer der Verlandungspflanzen wir ja schon das Nötige gesagt haben, sondern an das „Nied“, das poetisch stille Land der Sumpfgräser, das die Moore umsäumt und sie überführt zu nutzbarem Wiesenland. Der Landwirt weiß zwar mit solchen „sauren Wiesen“ noch nichts zu beginnen und muß sie von seinem Standpunkt aus als Ödland betrachten.

Verlandender See. (Motiv vom Wildsee im württembergischen Schwarzwald bei Wildbad).
Sumpfmooße, Bultenbildung, Seggenrasen, Wollfräuter. (Naturaufnahme von C. Blumenthal in Wildbad.)

Der Naturkundige aber weiß, daß ihre Bewohner, die Seggen und Wollgräser, die Vorläufer neuer Fruchtbarkeit sind, daß sie, indem sie mit ihrem Wuchern Sumpf und Moor austrocknen, dem wahren Ödland ein Ende bereiten, indem aus der „sauren“ mit Sicherheit eine „süße“ Wiese wird. Nur ist das, wie alle Naturvorgänge, nicht der Ungeduld des Menschen angepaßt, sondern spielt mit Jahrhunderten.

Merkwürdigerweise gehört zu dieser natürlichen pflanzengeographischen Formation auch ein natürlicher systematischer Begriff. Denn die herrschenden Bewohner der Niede gehören einer Pflanzengruppe an, die man als Scheingräser (Cyperaceae) sehr einheitlich abgrenzen und als zweite Hauptgruppe den wahren Gräsern gegenüberstellen konnte.

Als einheitliches Merkmal gilt für sie der stets nur krautige Wuchs (die Papyrusstaude allein wird 3 m hoch). Ihre Halme sind meist scharf dreikantig und nur selten knotig gegliedert. Der anatomische Bau der Wurzeln und ebenso die Blütengestaltung ist ziemlich verschieden von den entsprechenden Verhältnissen der echten Gräser, obwohl auch hier die Blüten bis ins kleinste der Windbestäubung angepasst sind, aber bereits

eine „Blütenhülle“ besitzen, worüber ein Blick auf die nebenstehenden Zeichnungen alles sagt. Auch die Fruchtbildung ist eine wesentlich andere, nicht minder die Keimung. So haben sich denn die Systematiker damit befreundet, die Ähnlichkeit der Erscheinung, durch welche Gräser und Scheingräser eine innere Blutsverwandtschaft vortäuschen, nur als Konvergenzerscheinung, d.h. als Ausdruck gleicher Lebensweise, zu betrachten. Woher die Nied-

Blüten der Scheingräser.

- 1 = Blütenstand von *Cyperus longus* L.
 2 = Blütenstand von *Scirpus lacustris* L.
 3 = Weibliche Blüte von *Carex*. 4 = Blüte von *Scirpus littoralis*. (Nach Nees.)

gräser eigentlich stammen, ist völlig unklar. Sie traten seit dem Tertiär in großer Masse hervor und bewohnen heute den ganzen Erdball in etwa 3000 Arten. Da nun die Kompositen 11 000 Arten zählen, die Hülsenfrüchtler 7000, die Orchideen 5000, die echten Gräser 4000, so stehen die Niedgräser unter allen großen Pflanzengruppen an fünfter Stelle, ja eine Gattung (*Carex*), von der man 1200 Arten kennt, gilt für diejenige Pflanze, die der größten Variabilität fähig war.

Auch andere Gattungen sind sehr artenreich. So zählt *Cyperus* an 400 Arten, die Simse (*Scirpus*) 200, *Rhynchospora* noch an 150 Arten. Wer also Niedgräser gut bestimmen kann,

ist ein wahrer Künstler auf dem hohen Trapez der Systematik. Aber nur ganz wenige von ihnen vermögen dem Naturfreund Nennenswertes zu sagen. Eine Pflanze gehört hierher, die einst den Reichtum und Stolz Ägyptens bildete und in seinen Hieroglyphen das Symbol geistiger Nahrung darstellt. Und wenigstens im Wortbegriff klingt die gleiche Erinnerung noch immer in unserer Sprache, denn Papier borgte den Namen von *Cyperus Papyrus*, der Papyrusstaude, die noch immer in so unermesslichen

Mengen am Nil und an sonstigen Flüssen des Sudans wuchert, daß sie sich an der Bildung der die Schifffahrt oft hindernden „Pflanzenbarren“ beteiligt. *Cyperus Papyrus* ist eine höchst malerische, weit über manneshohe Staude mit einer Blüten-
dolde von oft mehr als 100 Einzelstrahlen, die in der Antike mit Recht die ihr zuteil gewordene hohe Verehrung verdiente. Es war nämlich nicht nur ihr Wurzelstock eßbar, sondern aus dem Mark ihrer Halme wurde auch das Papier der Alten Welt bereitet, wobei die spitze Blütenhülle der Pflanze noch den Schreibegriffel, der verkohlte Wurzelstock die Schreibetinte lieferte! Es ist ein Witz der Weltgeschichte, daß das Pergament, das später die steifen und teuren Papyri verdrängte, seine Geschichte mit einer Handlung des Reides beginnt und so bewies, daß auch das Streben gemeiner Seelen im Dienste der Kultur fruchtbar sein kann. Die Legende erzählt, es sei dem Beherrscher Ägyptens, Ptolemäos II., unerträglich gewesen, daß der von ihm gehaßte König von Pergamon, Eumenes II., dort eine Bibliothek anlegen wollte. Und da Ägypten damals das streng behütete Monopol der Papiererzeugung hatte, verbot er die Ausfuhr von Papyrusrollen. Doch die Pergamener wußten sich zu helfen. So wie eine

Papyrusstaude (*Cyperus Papyrus* L.)
(Originalaufnahme von G. Dopfer=München.)

ähnliche drakonische Maßregel Napoleons Anstoß zu einer Menge Erfindungen gab, so vervollkommnte man nun in Pergamon die Erfindung, auf Tierhäuten zu schreiben, die seitdem nicht mehr wieder unterging, sondern einige Jahrhunderte später als „Pergament“ den Papyrus vollständig vergessen ließ.

Die anderen Verwandten der Papierstaude aus der Gattung *Cyperus* sind für die Tropensümpfe kennzeichnend. Einzelne, allerdings unansehnliche, umsäumen noch in Mitteleuropa Teich- und Flußränder, und *C. alternifolius* aus Madagaskar ist eine vielbeliebte, allerdings auch wunderhübsche, ausdauernde Aquariumpflanze, die nur den einen Nachteil hat, daß sie, wenigstens in ihrer weißbunten Abart, sehr viel Sonne und auch im Winter noch ständig 10—12° C Wärme bedarf.

Blühende Seggen (*Carex*). (Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

Ganz in Verlegenheit ist der Botaniker, der für den wichtigsten heimischen Vertreter der Niedgräser, die eigentliche Segge (*Carex*), Interesse erwecken soll. Denn diese in zahllose Sektionen und Sippen zerlegte Riesengattung ist in der äußeren Erscheinung so uninteressant wie nur möglich. Ein bald kurzes, horstiges, mißfarbiges Gras auf Torfwiesen (*C. limosa* L.), bald (wie *C. stricta* Good.) in tiefen Sümpfen als große Polster und dichte Schöpfe vegetierend, manchmal bis zu einem Meter hoch (*C. rostrata* With.), ein typischer Bewohner der Moore, aber auch der Sandböden, der Heiden, der feuchten Wiesen, bis in die Arktis und mitten im nassen Gefels des Hochgebirges ein zäher, unverwüßlicher, anspruchsvoller Pionier der Vegetation, der es zu großen, das Landschaftsbild bestimmenden Beständen (*Caricetum*) bringen kann — darin erschöpft sich fast alles, was sich Allgemeines über die 100 heimischen *Carex*-

KOSMOS
GESELLSCHAFT
FÜR VERLEIH UND
STUTTGART

Wollgras
(*Eriophorum Scheuchzeri* Hoppe).
(Naturaufnahme von H. Popfer-München.)

Arten sagen läßt, die eigentlich nur im fruchtenden Zustand sicher zu bestimmen sind. Am besten malt Schleiden ihren Charakter, wenn er sie und ihre Verwandten als eine düstere Lebensform bezeichnet. „Aus versumpfter, schwarzer Erde,“ sagt er, „ragen in schmutzigem Graugrün die steifen, struppigen Stengel und Blätter, hin und wieder Knäuelchen brauner oder schwarzer trockener Blüten tragend oder weiße, wollige Flocken, das Greisenhaar der Fruchtknoten, in den herbstlichen Sturmwind streuend.“

Trichophorum alpinum (links) und *Eriophorum latifolium* (rechts).
(Naturaufnahme von H. Dopfer=München.)

Eine besondere pflanzengeographische Formation stellt, wenigstens in Ungarn und sonst an der unteren Donau, die steife Segge (*Carex stricta*) dar, die Kerner v. Marilaun, dem diese Gebilde durch seine vielen Streifzüge in jenem Lande gut vertraut wurden, in höchst anschaulicher Weise folgendermaßen schildert: Die Rasen dieser Pflanze ragen im Frühling und Vorfommer über das flache Wasser nur mit ihrem oberen Ende empor. Besucht man zu dieser Zeit eines der Moore, in welchem diese Segge die vorherrschende Pflanze ist, so erscheint es von einiger Entfernung wie eine üppige Wiese. Man sieht eben nur die vom Scheitel der Rasen nach allen Seiten abstehenden Halme und Blätter, während das Wasser, das unten die Rasen umgibt, von dem dichtgedrängten Blattwerk verhüllt wird. Tritt man aber näher heran, so bemerkt man, daß die Rasen isoliert, und zwischen ihnen kleine Tümpel ausgebreitet sind, die sich durch ein förmliches Wasserneß miteinander verbinden. Meist stehen die Rasen so nahe, daß man selbst mit dem schmalsten und kleinsten Rahn sich nicht durchzuwinden vermöchte; man ist daher, um in das Innere eines solchen

Moorens zu gelangen, gezwungen, von dem Scheitel des einen Rasens mit Vorsicht auf den eines benachbarten den Fuß zu setzen, will man nicht in das unten sich ausbreitende Wasser gleiten. . . . Die ungarischen Hirten fürchten und meiden die Sümpfe, in welchen die „Zsombék“-Rasen die Oberhand bekommen haben; denn wenn sich eines ihrer Kinder in dem aus dem Wasser ragenden Rasen verirrt hat, so kommt es häufig nicht mehr zurück. Da nämlich das Kind unfähig ist, auf den Kluppen der Rasen fortzuschreiten, so wadet es unten im Wasser fort und fort, ohne mehr den Rückweg

Eine Simse (*Scirpus uniglumis*).
(Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

zu finden, und geht endlich, nachdem es sich auch noch durch die scharfen Halme und Blätter die Haut der Füße zerschnitten, im Sumpfe jämmerlich zugrunde. Wenn bei sinkendem Grundwasserstande das labyrinthische Wasserneß in den Zsombék-Mooren verschwindet, dann bemerkt man mit Staunen, daß jeder grüne Rasenschopf eigentlich den Abschluß einer schwarzbraunen Säule bildet, welche die Höhe von $\frac{1}{2}$, ja selbst nahezu 1 m erreichen kann. Die untere Hälfte dieser Säule besteht aus einem Geflecht von abgestorbenen Wurzelfasern, Blättern und Stengeln und ist bereits in Torf umgewandelt, während der Scheitel noch fortgrünt und einen Schopf aus grünen, starren, schneidigen, hogenförmig nach auswärts gekrümmten Blättern und Halmen trägt. Dieser Schopf aber besteht aus Hunderten von Ablegern, die senkrecht emporwachsen und selbst wieder Ableger in die Höhe schicken. — Man begreift leicht, daß durch derartig massenhaftes Wachstum die Niedgräser große Verlandungstätigkeit entfalten, und wirklich gelingt es ihnen allein

(besonders *C. stricta*, *acutiformis*, *riparia*), ganze Wasserbecken in Niede umzuwandeln. Bei dieser Arbeit werden sie wacker unterstützt von den Simsen (*Scirpus*), die, bald untergetaucht (*Sc. fluitans* L.), bald als zarte Gräser, bald meterhoch, oft weithin den Wasserrand überziehen und am liebsten vor der Zone des Schilfrohes einen Gürtel für sich bilden. Und vervollständigt wird die Verlandung dann schließlich noch durch ähnliche Gewächse, wie *Heleocharis*, *Schoenus*, *Cladium*, über deren Leben noch viel zu wenig bekannt ist, als daß wir hier Anziehendes darüber sagen könnten.

Als wirklich malerisch wage ich von dieser Vegetation nur *Rhynchospora*, noch mehr aber die Wollfräuter (*Eriophorum* und *Trichophorum*, siehe die Tafel und die Bilder S. 153) zu empfehlen. Sie gehören mit zur Poesie der Moorniesen, wenn sie im Spätsommer ihre langen, an den Stielen bleibenden Früchte wie Schöpfchen feiner, weißer Seide im Winde flattern lassen. Mit silberigem Glanz beleben ihre Heerscharen das fahle und eintönige Bild der Niedlandschaften und Torfgegenden,

und sie versöhnen uns mit dem nichtsagenden Eindruck dieser Pflanzengruppe. Diese hätte wahrlich nie die Menschen zu Pflanzenliebhabern gemacht, wäre der ganze Erdball zu dem kümmerlichen Vegetieren verurteilt wie die polaren Gegenden, wo die Niedgräser nicht nur ein Zehntel der gesamten Blütepflanzenarten ausmachen, sondern auch die Hauptursache sind, warum uns Bilder jenes Erdgebietes so niederdrückend und quälend

Niedformation in einem Alpental (Motiv aus Oberstdorf im Allgäu) mit Seggen und Wollfräutern.
(Naturaufnahme von S. Dopfer-München.)

düster vorkommen. Und dabei kann man es nicht einmal so ganz von der Hand weisen, ob sie nicht in der Zukunft der Erde noch mehr hervortreten werden als heute. In ihrer Vergangenheit haben sie, wie es scheint, noch keine Bedeutung gehabt. Sie tun sich erst seit dem Tertiär hervor und muten so anpassungsfähig an, als ob sie auf die Eroberung der Erde ausgingen. *Scirpus*, *Carex*, *Heleocharis* sind schon heute Überallwohner.

Die Arazeen und ihre Verwandten.

Zu den vielbewunderten Schaustücken der Gewächshäuser gehört eine sehr große Gruppe von Pflanzen, die sich zwar nach drei heimischen Vertretern, nämlich dem allbekannten Kronstab (*Arum maculatum* L.), dem häßlich benannten und doch so hübschen Schweinekraut (*Calla palustris* L.) und dem eingebürgerten Fremdling *Alamus* (*Acorus Calamus* L.), wohl als höchst anziehend beurteilen läßt, von deren

Der Habitus der Arazeen. (Nach einer Zeichnung von R. Deffinger.)

Pracht und Bedeutung für das Naturbild überhaupt aber erst der Anblick des Tropenwaldes den rechten Begriff gibt. Denn dort sind von den bekannten (etwa 1000) Arten über 900 heimisch. In den Urwäldern von Amerika, Asien und auch Afrika überziehen Arazeen als richtige Schattenpflanzen in überwältigender Heerschar den dämmerigen Boden (vgl. Farrentafel Bd. I, S. 20), siedeln sich auf verwesenden Strüngen an,

ja erklettern mit ihren Wurzeln kühn Bäume und Felswände und blühen dazu in einer fremd-gleichenden, abschreckenden und doch wieder anziehenden Größe, daß manche von ihren Arten deshalb zu den Kuriositäten des Pflanzenreiches gehören. Aus diesem Grunde hat sich auch die Gartenkunst ihrer mehr denn sonst einer tropischen Pflanzengruppe (ausgenommen Palmen und Orchideen) bemächtigt und uns längst mit den seltsamsten-exotischen Formen dieser Gruppe bekannt gemacht. Philodendron, Sauromatum, Caladium, Anthurium, Colocasia sind dem Blumenfreund wohlvertraute Namen.

Sie gehören alle unter den Begriff der Araceen, deren allgemeine Eigenschaften wir nun kennen lernen wollen.

Es ist schwer, sie mit wenigen Worten zu kennzeichnen, denn sie sind nicht nur eine Ausnahme unter allen Spitzkeimern durch die merkwürdige Gestaltung ihrer großen, bisweilen enormen (die Spreite von *Dracontium Gigas* hat mehr als 1 m im Durchmesser) Schatttenblätter, sondern auch im Habitus so verschieden, daß man sowohl Kräuter als Epiphyten, Sträucher und Bäume zu ihnen zählen muß. Das Einigende ist nur der Blütenbau. Die Blütenhülle (Spatha) wird hier zum dauernden und wichtigen Organ.

In den Dienst der Insektenanlockung gestellt, bedarf sie aller der Farbkünste, durch die eine Pflanze nur entzücken kann. Unansehnlich grün-gelblich bei dem heimischen *Arum*, aber schon auf der Innenseite blendend weiß bei *Calla*, erfreut sie das Auge in der heißen Zone durch grelles Rot bei *Anthurium*, manchmal

Amorphophallus campanulatus Bl. blühend.
1/4 der natürl. Größe.

durch Vielfarbigkeit (bei *Stendnera*), meist allerdings nur durch gelbe und ins Fleischfarbene spielende Abweichungen. Eines der größten Geheimnisse der Lebenskunde tut sich auf, wenn *Amorphophallus* oder *Hydrosme* die mächtige Blüte öffnen, denn auf Fleischnachahmung, auf den unangenehmen, rotvioletten, dunkelmisfarbigen Farbenton faulenden Fleisches ist da alles gestimmt, und zwar nicht nutzlos, daher wohl auch nicht zufällig, sondern als richtige „Ekelblume“ zum Anlocken von Nasinsekten und demgemäß auch schweren Leichengeruch ausströmend. Dieserhalb ist der indische *Amorphophallus campanulatus* Blume, dessen Blütenstiel über 1 m hoch wird, während verwandte Formen auf Sumatra sogar fast 3 m hohe Blüten entsenden, ein hochberühmtes Schaustück der Treibhäuser Englands. Man sandte seinerzeit einen Knollen dieser Riesenekelblume nach Kew, wo er 11 Jahre hindurch gehegt wurde. Dann öffnete in einer Nacht die gewaltige Blüte die Hülle um den 1½ m langen Kolben und umloberte ihn dunkelweinrot mit bläulichem Schimmer. Dabei entwich aus der Blüte ein sehr starker Gestank nach faulenden Fischen.

Im ganzen sind jedoch die Blüten der Arazeen von größter Mannigfaltigkeit. Gemeinsam ist, daß sie einen Blütenkolben bilden, d. h. spiralig oder in Quirlen an einer Achse angewachsen sind, die von der Blüten Scheide mehr oder minder umhüllt wird. Diese muß man morphologisch für ein Hochblatt halten, während sonst an dem Blütenstand alle Deck- oder Vorblätter fehlen. Im vollkommensten Fall (so z. B. bei dem *Kalmus*) trägt jede zwittrige Einzelblüte noch ihr Perianth. Von solchen Gestaltungen finden sich aber alle möglichen Übergänge und Reduktionen bis zu eingeschlechtigen Blüten, die nur noch aus einem Staubblatt oder einem Fruchtknoten bestehen. Solche höchst reduzierte Blüten finden sich z. B. bei der in tropischen Sümpfen sehr gewöhnlichen schwimmenden Wasserpflanze *Pistia Stratiotes* L.

Die Blüten der uns gegenwärtig interessierenden Gruppe sind von einer biologischen Vielgestaltigkeit, die ihresgleichen sucht und noch viel zu wenig studiert wurde. Wer in den Tropen den Arazeenblüten seine Aufmerksamkeit zuwendet, wird zweifelsohne leicht die merkwürdigsten Entdeckungen machen. Namentlich die *Spatha* besitzt biologische Funktion von verblüffender Zweckmäßigkeit. Für gewöhnlich ist sie bloßes Schutzorgan für den Blütenstand, bei den *Anthurium*-Arten (siehe das Bild) ist sie hochrot gefärbt und dient als Schauapparat, bei dem *Kalmus* ist sie ein assimilierendes Blatt, bei dem *Kronstab* aber stellt sie im Verein mit gewissen umgebildeten Blüten Insektenfallen her, wobei alle möglichen Blütenteile raffiniert zusammenwirken, worüber wir uns bei der Schilderung des gut studierten *Kronstabes* des näheren auslassen.

Die Früchte der Arazeen sind fast durchgängig lebhaft gefärbte Beeren, was wohl jedem Naturfreund von den korallenroten Fruchtköpfchen des *Arum* und der *Calla* wohlvertraut ist. Das lockt Vögel an, die man als die Hauptverbreiter der Arazeen bezeichnen muß. Da aber die Samen nur kurze Zeit keimfähig sind, ist die Verbreitung dieser Gewächse ziemlich beschränkt. Darum haben die einzelnen Gattungen meist nur einen ziemlich engen Bezirk, und da sie außerdem viel Feuchtigkeit und Wärme beanspruchen, ist es nicht unbegreiflich, daß sie mit dem tropischen Regenwald leben und sterben. Darin klimmen und klettern sie mit Hilfe von Luftwurzeln, die ganz nach Bedürfnis entweder Nährwurzeln sind oder Haftwurzeln oder reine Luftorgane, die sich eine Wasser aufsaugende Hülle (*Velamen*) geschaffen haben, um die dampfgeschwängerte

Luft des Tropenwaldes zugunsten der Pflanze auszunützen. In den botanischen Gärten kann man solche oft von 20—30 m Höhe herabwachsende Luftwurzeln an der amerikanischen *Monstera deliciosa* bewundern, die vielerorts als Blattpflanze (von den Gärtnern *Philodendron pertusum* genannt) auch in Wohnungen gepflegt wird und da ebenfalls ihre wunderlichen Wasserfangarme ausstreckt. An diesen Monsterapflanzen wird

Blühende *Anthurium Scherzerianum* im Gewächshaus. (Nach einer Photographie gezeichnet von R. Deffinger.)

man auch mit einem zweiten Phänomen von großem biologischem Wert bekannt. Das Gewebe ihrer Blätter zerreißt an gewissen Stellen, weil es vertrocknet; es bilden sich Löcher (vgl. auch Bild Bd. I, S. 27), von denen man behauptet hat, daß sie zur Beleuchtung der tiefer liegenden Blätter dienen. Ob dem so sei, müssen wir, mangels experimenteller Untersuchungen, dahingestellt sein lassen.

Eine anatomische Eigentümlichkeit fast aller Aroideen ist die Bildung von Milchsaftschläuchen, eigentümlich H-förmigen, festen Zellen (Spikularzellen) und teilweise auch Harzgängen. Es scheint sich hierbei um Schutz gegen Schnecken, Insekten und

sonstige Feinde zu handeln.

In den Blättern des Aronstabes sind zu diesem Zweck

Kristallnadelbündel aus Kleesalz aufgewendet. Deshalb brennen die Blätter dieser Pflanze auf der Zunge, wenn man sie kaut.

Die wichtigsten und interessantesten Pflanzen dieser Gruppe sind (soweit wir sie nicht bereits eingehender geschildert haben) die folgenden:

Anthurium Scherzerianum Schott. (siehe Bild S. 159) aus Guatemala, als Vertreter der etwa 200 südamerikanischen Arten dieser Gattung, ist nebst manchem Verwandten eine sehr beliebte Zierpflanze der Warmhäuser. Sie ist so an Feuchtigkeit gewöhnt, daß man ihre Blätter täglich mehrmals übersprühen muß, außerdem braucht sie ständig Wärme und ist gegen Zugluft empfindlicher als ein Tropenaffchen. Dafür blüht die Pflanze, wenn man sie gut hält, das ganze Jahr, erfreut

mit einer scharlachroten Spatha, von der sich der chromgelbe Blütenkolben prächtig abhebt, und hat dazu noch den Vorzug, daß sich die einzelne Blüte monatelang lebendig erhält.

Monstera deliciosa mit Zustwurzeln, an der Mauer des Warmhauses klimmend. (Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

Der Kalmus (*Acorus Calamus* L.) wird für einen Bürger der deutschen Flora gehalten, so sehr hat er sich — wenn auch ziemlich zerstreut — an Gräben und Teichrändern eingenistet. Er hat sich durch seinen aromatischen Geruch sogar als Zimmer-

decoration (zu Pfingsten) beliebt gemacht. Bekannt ist er dadurch, daß sein Wurzelstock (*Rhizoma Calami*) Aufnahme in das deutsche Arzneibuch gefunden hat. Auch der Parfümfabrikant und Schnapsbrenner weiß die Kalmuswurzel zu schätzen. Die Orientalen verrieten die wahre Ursache dieser Beliebtheit. Ihnen ist die Wurzel als ein kräftiges Aphrodisiakum bekannt, und überall laut im Morgenland die jeunesse dorée Kalmuskonfekt. . . .

Die Pflanze ist in Asien weit verbreitet und, wie eine botanische Legende wissen will, auch heimisch. Charles de l'Écluse, der sich als Wissenschaftler Clusius nannte (1525—1609), und den wir verehren müssen als den größten Botaniker vor Linné, da er diese Wissenschaft aus den Händen der Scholastik befreite, weil er als Erster hervorhob, daß Naturbeobachtung für sie das Wichtigste sei, — Clusius soll sie zur Zeit, da er Gartendirektor in Wien war, dort eingeführt haben, und von dort soll sie dann ganz Europa und Nordamerika besiedelt haben. Diese Legende findet Glauben, weil der Kalmus bei uns niemals Früchte reift, sondern sich nur durch Verzweigung seiner Wurzelstöcke vermehrt. Doch erhebt sich in neuerer Zeit dagegen Opposition, da, wie Prof. Engler in seiner Bearbeitung der Araceen bemerkt, Kalmus auch in von menschlichen Wohnungen weit entfernten Gegenden wächst.

Calla palustris L., die schöne Arumvertreterin in den heimischen Walsümpfen, wurde bereits erwähnt. Ihren Namen borgt der Gärtner, wenn er als *Calla aethiopica* eine beliebte Zimmerpflanze empfiehlt, die aber der Botaniker der Gattung *Zantedeschia* zuweisen muß. Im Blumenhandel geht die Pflanze auch unter den gebräuchlichen Namen *Richardia* und *Colocasia*. Die große, weißliche oder gelbe trichterförmige Scheide ihres Blütenstandes ist im Frühling in den Auslagen aller Blumenhandlungen zu sehen, und die schönen, dunkelgrünen, spießförmigen Blätter machen das Gewächs auch außerhalb der Blütezeit wertvoll als Blattpflanze. In manchen gärtnerischen Werken findet man angegeben, daß *Arum maculatum* die Stammpflanze unserer Gartenkalla sei. Dies ist jedoch nicht richtig. *Zantedeschia* ist ein in Südafrika einheimisches Gewächs, das mit dem deutschen Aronstab nicht einmal nahe verwandt ist. Als Sumpfpflanze liebt sie eine Schlammbeimischung im Boden und zur Hauptzeit des Treibens so viel Feuchtigkeit, daß man den Unterfeger ihres Topfes stets voll Wasser halten soll. Als Tropenkind bedarf sie der Wärme, doch nicht zu vielen Sonnenscheins. Gute Pflege dankt sie damit, daß sie reichlich Brutknöllchen und Wurzelsprosse bildet, durch die sie sich auf das Leichteste vermehren läßt.

Die echte *Colocasia indica*, der ersten nicht unähnlich, nur mit mehr Blättern geschmückt, kann auch Mitte Mai im Garten ausgepflanzt werden; nur müssen dann die Knollen im Herbst aus der Erde genommen und in Kisten mit Erde und Holzkohle überwintert werden. Diese Knollen verschaffen eben einem Vertreter dieser Gruppe, nämlich der vielangepriesenen Eidechsenwurz (*Sauromatum guttatum*, *pedatum*, *venosum*) ihre Verühmtheit (Bild Bd. I, S. 46), denn angefüllt mit Reservennährstoffen, haben sie die Befähigung, ohne Erde und Wasser im Zimmer, allerdings nur kümmerlich, zu blühen. Aber man kann nicht gerade behaupten, daß sie eine schöne Pflanze sei. Anders die Kaladien, welche kein Gartenfreund missen mag angesichts ihrer herrlichen, buntfarbigen Blätter. *Caladium bicolor* Vent. (in der Gärtnersprache auch als *C. bulbosum* bezeichnet) kann mit Recht als die wertvollste aller buntblättrigen Warmhauspflanzen

bezeichnet werden. Wer jemals bei einem der großen Gärtner oder auf Ausstellungen eine Reihe der zahlreichen Sorten beisammen sah, ist erstaunt über die Farbenpracht dieser großen, bald weiß und rosa marmorierten, bald auf smaragdgrünem Grund weißgefleckten oder vollständig rosaroten oder schneeweißen, bald glänzend goldroten, violetten, goldig-gelben, ja sogar hellgrauen Blätter. Diese Färbungen kommen namentlich dann schön zur Ausbildung, wenn man die Blätter viel prallem Sonnenschein aussetzt, bedeuten also gewissermaßen einen Transpirations- oder Chlorophyllschuß. Man klagt im allgemeinen, daß Kaladien sehr hingällig und empfindlich seien,

Alocasia cuprea C. Koch aus Borneo.
(Naturaufnahme von S. Dopfer-München.)

und das kann nicht wundernehmen von einem aus den fieberheißen Ufern des Amazonas zu uns gebrachten Gewächs; doch kann man es durch Sorgfalt und stufenweise Abhärtung sogar zur Stubenpflanze machen, und gerade solche Exemplare sollen dann besonders dauerhaft sein.

Wenn man eines der Gärtnerpreisverzeichnisse zur Hand nimmt, findet man Kaladien des öfteren auch unter dem Namen *Alocasia macrorrhiza* angepriesen. Dies ist nicht korrekt, denn als *Alocasia* bezeichnet der Botaniker ein ganz anderes Gewächs, das im Malajengebiet als Ge-

müsepflanze (mit *Kolokasien*) vielfach kultiviert und dort auch bis 5 m hoch wird und fast meterlange Blätter treibt. Wir haben in Bd. I, S. 228 u. ff. dieses Werkes von den Anschauungen *Delpinos* berichtet, wonach *Alocasia* eine schneckenblütige Pflanze sei; neuere Untersuchungen von *Rnuth* haben kleine Fliegen und Ameisen als Befruchter verraten, so daß hier ein noch unaufgeklärter Widerspruch klafft. Die Blüteneinrichtung dieser Pflanze entbehrt allerdings der wunderlichen Sicherungen, durch welche die typische Kesselfallenblume unseres heimischen *Arum maculatum* ihre Fliegengäste zu Gefangenen macht (vgl. Bild Bd. II, S. 530), und worüber wir in Bd. II, S. 532—534 bereits ausführlich berichtet haben. Fast alle Aroideen (und teilweise auch Palmen) weisen zur Blütezeit ein biologisches Phänomen auf, das ganz einzig dasteht und der Erklärung harret. Ich meine hierbei die Temperaturerhöhung des Kolbens, die sehr ansehnlich sein und die Lufttemperatur bis 7° übertreffen kann*.

* *Arum italicum* bringt es bis zu Temperaturen von 40°.

Sie erfüllt jedenfalls den Zweck, den Insektenbesuchern den „Kessel“ behäglich zu gestalten, hat aber wohl weniger solche „Zweckhaftigkeit“ als Ursache, sondern stellt unserer Ansicht nach ein rein physiologisches Phänomen dar. Wir halten sie für den Ausdruck eines Erregungszustandes, der mit erhöhter Atmung und dadurch Wärme-
produktion einhergeht.

Da unsere Blütenbiologie — abgesehen von den Anfängen, die ich bei Parnassia und Fitting bei den Orchideen wagte — noch nicht physiologisch forscht, hat sie gar keine Möglichkeit, diesen Erscheinungen nahezukommen. Sie steigern sich

1 = Fruchtstand von *Arum maculatum*. (Naturaufnahme von S. Dopfer.) 2 = Aufgeschnittener, unbefruchteter (links), rechts befruchteter Blütenstand. (Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Senecl.)

im Kreise der Arazeen fast bis zum „Mysteriösen“. Wir erinnern nur daran, daß gewisse Arten, so *Staurostigma* in Brasilien, mit Blütenstengel und Blattstiel täuschend einer dort vielgefürchteten Giftschlange (der Jararaca) ähnlich sehen; wir erinnern an die merkwürdige Fleischnachahmung der Blüten von *Amorphophallus*, wovon eine Farbentafel zu S. 502 in Bd. II dieses Werkes einen ungefähren Begriff geben mag. Der Kolbenfortsatz vieler hierher gehöriger Gewächse, der zweifelsohne nur biologische, d. h. Lockfunktionen hat, ist mit Vorliebe dunkelfleischrot gefärbt, wenn auch sonst der Blütenstand nicht imstande ist, weitere „Farbenaufwendungen“ zu machen. Allem voran aber gibt der eigentümlich faulige, Naseninsekten anziehende Duft zu denken, der vielen dieser Blüten den Namen Ekelblumen eingetragen hat. Auch die psychologistische Richtung der Pflanzenbiologie hat heute noch keine Möglichkeit des Verständnisses dafür.

Und darüber braucht kein Wort mehr verloren zu werden, daß eine Hypothese, die sich auf das zufällige erste Auftreten jener Erscheinung stützt, die erklärt werden soll, nicht befriedigen kann. Die Arazeen bieten also wohl so ziemlich das schwierigste Problem für den Forscher, der an diesem Punkte mit seinen Analysen einsetzen möchte, und wenn irgendwo, so geziemt uns in diesem Augenblick Bescheidenheit, da wir die Betrachtung dieser rätselhaften Pflanzengruppe mit dem Gefühl voller Unbefriedigung über die Rückenhaftigkeit menschlicher Erkenntnis aufgeben.

Gewissermaßen als Anhang soll hier eingeschoben werden, was sich Gemeinwertvolles über die ganz kleine Gruppe der Wasserlinsen (*Lemnaeae*) sagen läßt, die man im System zwischen Arazeen und Bromeliazeen einzuschieben pflegt. Zu ihr gehört eine der gemeinsten aller Wassergewächse. Es gibt wenig Teiche oder Tümpel, in denen nicht Entengröße (*Lemna minor* L., *trisulca* L. und *gibba* L.) mit hellgelbgrün gleißender Decke den Wasserspiegel überzieht. Diese kleinen, oft bauchig angeschwollenen (*L. gibba*) Scheibchen mit ihrem

Wasserlinsen.

1 = Querschnitt durch *Wolffia arrhiza* Wimm. (vergrößert) mit einem Sproß, männlicher und weiblicher Blüte. 2 = *Lemna trisulca* L. 3 = Desgleichen mit einem Sproß und einer Blüte. 4 = Blüte von *Lemna minor* L. (vergr.). 5 = Frucht von *Lemna minor* L. (vergrößert). 6 = Längsschnitt durch *Lemna gibba* L., vergrößert mit den großen Atemhöhlen und einer Zwitterblüte.

(Nach Thome.)

langen, starren Wurzelfaden geben dem Naturfreund ein Rätsel auf, denn er weiß sich nur schwer zu entscheiden, was er hier für Blatt, Blüte, Stengel oder Wurzel halten soll. Die Lemnazeen zeigen eben unter allen Blütenpflanzen die geringste Gliederung. Sie scheinen durch das Wasserleben völlig rückentwickelt. Sie erwarben in großartigem Maße die Fähigkeit vegetativer Vermehrung, büßten aber die Fähigkeit zum Blühen wenigstens in Europa teilweise (z. B. *Wolffia arrhiza*) völlig ein. Es gibt auch gewiß nur wenig Botaniker, welche *Lemna gibba*, die bei uns verhältnismäßig am häufigsten blüht, jemals in diesem Zustande gesehen haben. Und dennoch sollen diese Pflänzchen nahe Verwandte der mächtigen Arazeen sein, und man hat sich damit befreundet, daß sie — aus unbekannten Gründen — weiter rückentwickelte Nachkommen von pistiaartigen Gewächsen seien. Jedenfalls deutet vielerlei — besonders ihre Unlust zum Blühen im gemäßigten Klima, ihr Fehlen in der Arktis und die zunehmende Artenzahl in den Tropen — darauf, daß die Wasserlinsen Flüchtlinge des Südens sind, die heute allerdings in alle fünf Erdteile eindringen.

Hegelmaier, der im Jahre 1868 zu Leipzig eine bis heute maßgebende und muster-gültige Monographie der Gruppe herausgab, hat zuerst Klarheit darüber geschaffen, daß man das scheinbare Blatt (das man als Thallus bezeichnet) als einen blattartigen Stamm aufzufassen hat, an dem sich (bei *Spirodela*) unter Umständen ein einziges Blättchen entwickelt, und von dem grundwärts eine (*Lemna*) oder mehrere (bei *Spirodela polyrrhiza* bis 16) Adventivwurzeln ausgehen. Diese sind für Schule und Selbststudium ein prächtiges Objekt zur Untersuchung der Wurzelhaube. Gewöhnlich sieht man jedoch an den Wasserlinsen mehrere „Blättchen“ zusammenkleben. Wenn man der Sache nachgeht, erweist sich, daß die Pflanze Tochter sprosse entsendet, nicht unähnlich den Geseipilzen. Auf diese rein vegetative Weise vermehren sie sich so massenhaft, daß sie die Gewässer, in denen sie sich einmal eingenistet haben, oftmals gänzlich überwachsen.

Es ist noch fraglich und wäre eine hübsche Aufgabe für Mikrologen, zu untersuchen, ob Schleiden recht hat, als er behauptete, *Lemna* entsende im Herbst Tochter sprosse zur Überwinterung auf den Grund der Gewässer, von wo sie im Venz aufstiegen. Man hat dies in neuerer Zeit bezweifelt. In der Regel geht die Wasserlinse im Winter nicht völlig zugrunde; sie kann, ohne Schaden zu nehmen, im Eise völlig einfrieren. *Spirodela* und *Wolffia* sind allerdings empfindlicher und versäumen es nicht, sich beizeiten mit Stärke gefüllte Wintersprosse mit geschlossenen Spaltöffnungen zuzulegen, die ihnen am Grunde der Gewässer über die böse Jahreszeit hinweghelfen.

Derartig rückentwickelte Gewächse müssen auch ihren inneren Bau vereinfacht haben. Als Wasserpflanzen bedurften sie eines Luftreservoirs, das sie sich in Gestalt großer Atemhöhlen geschaffen haben. Im Wasser sind sie auch gefräßigen Sumpfschnecken ausgesetzt. Man versteht also, wozu ihnen die eingestreuten Zellen voll spitzer Kristallnadeln (Raphiden) nützen. Da sie ihre Nahrung aus dem Wasser aufnehmen wie die Algen, ist für sie ein Leitungssystem Luxus. Es hat sich also stark zurückentwickelt und fehlt bei *Wolffia* vollständig. Dagegen trat ein neues Bedürfnis auf. Ihr Wohnort: die Wasseroberfläche, ist schutzlos dem grellen Sonnenlicht preisgegeben. Dagegen tat Schutz not. Und *Lemna* sowie *Spirodela* bilden unter der Epidermis reichlich in den Zellen rötlich-violetten Zellsaft, der gewiß dazu beiträgt, daß die Blattgrünorgane unter seinem Schirm unversehrt bleiben. So ist gerade die Wasserlinse ein so gutes Schulbeispiel dafür, wie die Lebensweise die lebendige Erscheinung bedingt, daß es sich kein Lehrer entgehen lassen sollte.

Besonders anziehend wäre auch das Studium der Blüten, wenn sich diese häufiger beobachten ließen. In Amerika hat man *L. trisulca*, *minor* und *Spirodela polyrrhiza* reichlich blühend gefunden, bei uns kann man viele Tausende der Pflänzchen vergeblich untersuchen. Wenn aber irgendwo blühende Wasserlinsen auftreten, dann kann man sicher sein, sie gleich massenhaft in diesem Zustande zu sehen.

Außer Hegelmaier hat uns besonders der Engländer Caldwell* eine genaue Beschreibung der blütenbiologischen Verhältnisse dieser Pflanze gegeben. Nach ihm besteht die zwitterige, am Rande des Scheibchens hervorwachsende Blüte (Bild Bd. I, S. 227) aus zwei Staubblättern und einem einzigen Fruchtblatt, das, wie eine Flasche

* „Of the Life-History of *Lemna minor*“ (Botanical Gazette, Bd. XXVII).

geformt, mit der runden Narbe nur wenig über dem Wasserspiegel hervorragt; die ganze Blüte aber ist von einer sehr dünnen, farblosen Scheide (*Spatha*) umhüllt. Dadurch wird es offenkundig, daß diese winzigsten und einfachsten aller Blütenpflanzen mit den so reich und großartig entwickelten *Arum*-Gewächsen in enger Verwandtschaft sein müssen. So spielt die Natur mit Kontrasten und stellt die bis 5 m hohe „größte Blume der Welt“, nämlich jene des indischen *Amorphophallus titanus*, zusammen mit der winzigsten und einfachsten der Wasserlinse.

Es ist noch nicht ganz zweifellos, in welcher Weise bei den Lemnazeen die Befruchtung stattfindet. Man hat beobachtet, daß die Narbe sich nach aufwärts streckt und zur passenden Zeit etwas Schleim absondert, an dem der Pollen hängen bleibt. Auch ist der kugelige Pollen mit kleinen Warzen bedeckt, also Verschleppung durch Blütengäste angepaßt. Wer besucht aber diese armseligen, winzigen, kaum sichtbaren, durch gar nichts, weder durch Farbe oder Duft noch durch Honig oder reichlichen Blütenstaub, verführerischen Blumen? Wir wissen es nicht. Manche Naturforscher (so Trelease und Knuth) schließen aus dem Bau der Blüte auf Insektengäste; der italienische Botaniker Delpino hat die Sumpfschnecken darob im Verdacht. Es fehlt ja an solchen niemals in den Gewässern, wo sich die Entengröße breitmacht. Die kleinen Bernstein-schnecke (Succinea) weiden dort ewig hungrig, die braunen Tellerchen von Planorbis und die spitzen Hüte der großen Schlamm-schnecke (Lymnaea) sind im grünen Pflanzenmeer der Weiher nicht weniger häufig. Sie alle ziehen lange Furchen auf der Wasserlinsenwiese, und ihr weicher Fuß könnte wirklich den Pollen unversehrt zu den Narben bringen, wenn er über sie hinwegzieht. So wären denn die Wasserlinsen Schneckenblütler und schon dadurch ein Kuriosum unserer Heimat.

Aber die Sache ist noch nicht sicher, und unsere kleine Abhandlung darüber hat ihren Zweck erreicht, wenn sie die Naturfreunde anregt, bei ihren Sammelausflügen den verachteten Wasserlinsen mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Wenn man nun schon selten blühende Lemnazeen zu Gesicht bekommt, so ist der ein ganz besonderer Glückspilz, der je ihre winzigen, roten Nüsschen mit ihrem Deckel gesehen hat. Denn auch unter den blühenden gibt es nur wenige, deren Samenanlage und Embryo ganz normal wäre. Die Wasserlinsen sind offenbar im Begriff, ihre geschlechtliche Fortpflanzung ganz einzubüßen. Das bequeme und gefahrlose Leben im Wasser wirkte auf sie wie ein Schmaroherdasein auf die Tiere; sie vereinfachten ihren Wuchs und Bau und beschränkten sich auf die Sprossung als die bequemste Vermehrungsart. Sie sanken herab auf der Stufenleiter des Lebens und sind so lebendige Zeugen des alten Sages, daß nur die Not erfinderisch macht, und jede Entwicklung stillsteht, wenn der Zwang dazu fehlt.

Die Systemkunde weiß als Verbindungsglieder zwischen diesen Ausläufern der *Arum*-Gewächse und den lilienblütigen Pflanzen eine ganze Menge kleiner und kleinster Pflanzengruppen einzuschieben, deren Heimat durchgängig in den warmen Ländern ist, und die selbst so wenig studiert und von so geringer allgemeiner Bedeutung sind, daß wir sie guten Gewissens vernachlässigen können. Nur eine Familie, die der

Bromeliaceae,

ringt uns Aufmerksamkeit ab, ist doch die Frucht eines ihrer Vertreter, nämlich die *Ananas*, zum gemeinbekannten Handelsartikel geworden. Undere, so *Billbergia*

und die prächtig große Vriesea, haben ihren Einzug in das Gewächshaus gehalten, und eine Gruppe, als deren populärster Vertreter Tillandsia gelten kann, bestimmt in Südamerika, namentlich um den Amazonas, dermaßen den Anblick der Waldlandschaft, daß, wie uns Reisende versichern, sie weit mehr als die Orchideen dem Besucher jener Wälder unvergeßlich bleiben, um so mehr, als sie sogar bis zu Berghöhen von 4300 m aufsteigen.

Prof. Wittmack, ein genauer Kenner ihres Lebens, macht folgende anschauliche Angaben über sie: Viele der Bromeliaceen bewohnen die dichtesten Urwälder; davon

Tillandsien als Überpflanzen.
(Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

leben einige Formen an den unteren Teilen der Baumstämme, die meisten aber, weil lichtbedürftiger, auf ihren Kronen. Manche nisten in den Wipfeln der höchsten Bäume. Viele Tillandsia-Arten, die noch mehr Licht und namentlich mehr Trockenheit zu ihrem Gedeihen erfordern, leben auf den lichteren Bäumen der Savannenwälder. Im allgemeinen kann man sagen, daß die baumbewohnenden Vertreter dieser

Gruppe die genügsamsten aller Überpflanzen sind und zugleich die vollkommensten. Wenn die Wasserlinsen ein

vollkommenes Spiegelbild des Wasserlebens sind, so sind es die Tillandsien als Baumbewohner. Selten trifft man sie anders denn auf Bäumen. „Es ist keine Rinde so glatt, daß nicht eine Kolonie von Tillandsia-Arten darauf üppig gedeihen könne, sogar in trockener, sonniger Lage, während diese Gewächse auf Felsen oder überhaupt nichtpflanzlicher Unterlage eine sehr seltene Erscheinung sind,“ sagt von ihnen F. W. Schimper.

Von den vielen kleinen Familien, welche die Arazeeen mit den Bilien verbinden, verdient nur noch eine unsere Aufmerksamkeit dadurch, daß sie zwei sehr beliebte Ampelpflanzen zum Schmuck unserer Wohnungen beige-steuert hat. Gemeint ist hierbei Zebrina pendula und Tradescantia, das vielgeplagte, arme „Versuchskaninchen“ der botan. Institute, die beide zu der Familie der Komme-linazeen gerechnet werden.

Zebrina (vielfach auch *Tradescantia* genannt) ist mit ihren etwa 350 Familien-
genossen in Amerika eingeboren und wurde nicht so sehr wegen der Blüten als der sehr
eigenartig gefärbten Blätter bei uns heimisch gemacht. Diese sind nämlich wahrhaft
farbenprächtigt; oberwärts grün und weiß gestreift, unten purpurrot.

Tradescantia sp. als Ampelpflanze.

Eichhornia crassipes im Münchner botanischen Garten.
(Aufnahme von G. Dopfer-München.)

Die *Tradescantien*
sind überaus leicht
kultivierbare, in Am-
peln und auf Konso-
len prächtig dekorativ
wirkende Blattpflan-
zen mit schönen
weißen, himmelblauen
oder violettrosa Blü-
ten, die sich allerdings
im Zimmer nur selten
einstellen. Da sie
ursprünglich Sumpf-
pflanzen sind, muß
man sie reichlich be-
wässern und sehr hell
stellen, da sie sonst
rasch kahl werden.

Tradescantia
virginica L. hat
sich ihre Berühmtheit
dadurch erworben,
daß die Haare der
Staubfäden, die man
halbgeöffneten Blü-
ten entnimmt, ein
treffliches Objekt sind,
um die Rotation des
Protoplasmas in
lebendigen Pflanzen-
zellenzudemonstrieren.

Aus einer nahe-
stehenden Familie

haben wir zwei Gewächse anzuführen, die vielfach Aufmerksamkeit erregt haben, und
deren eines, in Florida wenigstens, zur gefürchteten Landplage geworden ist.

In Bd. I dieses Werkes ist auf S. 405—406 die Pflanze, um die es sich hierbei
handelt, beschrieben und, wenn auch sehr unvollkommen, abgebildet. Es ist *Eich-*
hornia crassipes (Mart.) aus der Familie der Pontederiaceen, von der man
einer verwandten Art (*E. azurea* [Sw.]) wegen ihrer prächtig azurblauen Blüten
gegenwärtig auch im Wasserbassin der Gewächshäuser Platz gegönnt hat (s. das Bild).

Die Amerikaner nennen sie Wasserhyazinthe, wozu jedoch das Aussehen wenig Berechtigung gewährt. Die Pflanze verdient in biologischer Beziehung volle Aufmerksamkeit. Ihre Blätter stehen in dichter Rosette und zeichnen sich durch dick angeschwollene Blattstiele aus. Dadurch entsteht eine mit Luft erfüllte Kammer im Blattstiel, eine wahre Schwimmblase, die das stattliche Gewächs auf der Wassersfläche erhält. Es sind aber nicht alle Pflanzen gleich in dieser Beziehung. Eine Grundform entwickelt ein dichtes, im Schlamm festgewachsenes Wurzelnetz, allerdings ihrer untergetauchten Lebensweise entsprechend, oder mit anderen Worten: bedürfnismäßig lange Blütenstiele, da die Blüte stets über das Wasser gehoben wird. Es liegt aber, wie es scheint, bei allen Wasserpflanzen die Versuchung nahe, auf die Fortpflanzung durch vegetative Sprosse mehr Wert zu legen als auf die Vermehrung durch Samen. In den Blattachseln von Eichhornia entwickeln sich demgemäß reichlich Knospen, und daher vermehrt sich das Unkraut massenhaft, um so mehr, als es vorläufig auch seine geschlechtliche Fruchtbarkeit noch nicht eingebüßt hat, sondern aus einer vielfächerigen Frucht zahlreiche Samen austreut.

H. Weber schildert in einem im Auftrage der Vereinigten Staaten geschriebenen Bericht, dem wir diese Angaben entnehmen, daß sich die Eichhornien erst seit 1890 in den großen Strömen von Florida dermaßen vermehrten, daß sie die Schifffahrt hemmende Pflanzenbarren bilden. Bei uns in Europa beträgt sich die Pflanze viel zahmer, aber, namentlich angesichts dessen, daß sie frostwiderstandsfähig ist, könnte sie auch bei uns sich eines Tages zu einer ähnlichen Kalamität entwickeln, wie seinerzeit *Helodea* oder wie gegenwärtig *Azolla* künstlich vermehrt wird, seitdem man entdeckt hat, daß dadurch ein Mittel gegen die Vermehrung der Stechmücken gegeben sei. Eine gewisse Gefahr ist jedenfalls darin gegeben, daß die Eichhornie eine beliebte Aquariumspflanze geworden ist, also sicher verschiedentlich von Naturfreunden ins Freie versetzt wird.

Die Liliengewächse.

Wir wenden uns nun einer der lieblichsten Gruppen aller Pflanzen zu, in der sich alles vereinigt, was die Pflanze nur anziehend machen kann: Schönheit, Kraft, Macht und geheimnisvolle Eigenart. Da aber der botanische Begriff der Liliiflorae, wie ihn das Englersche System faßt mit seinen sieben Hauptfamilien*, eine Unmenge der verschiedensten Gewächse umschlingt, beispielsweise Winen mit Herbstzeitlosen, die prächtige Taglilie mit Agaven, Zwiebel mit Lilien, Tulpen mit Drachenbäumen, Schneeglöckchen mit *Gladiolus* unter einen Hut zu bringen sucht, ist es schwer möglich, in einer gemeinsamen Beschreibung ein anschauliches Bild von dem zu entwerfen, was diesen vielerlei Kräutern, Stauden und Bäumen gleicherweise eignet. Darum wollen wir darauf auch verzichten und den Gesamteindruck lieber dem Mosaik kleiner Einzel Lebensbilder überlassen.

* Diese sind die Familien der Juncaceae, Liliaceae, Amaryllidaceae und Iridaceae nebst zahlreichen kleineren, in den Tropen verbreiteten Familien.

Nur einen merkwürdigen gemeinsamen Zug kann ich doch nicht unterlassen herauszugreifen, da aus ihm etwas wie ein allgemeines, noch nicht erfaßtes Gesetz herauszuleuchten scheint. Und das ist, daß sich auch diesmal, wie bei den Verlandungspflanzen, den Gräsern und Niedgräsern oder den Nadelhölzern, eine Lebensgemeinschaft

Blüten von *Narcissus* als Typus der Liliiflorae, mit dem doppelten Perianth und der Dreizahl aller Blütenteile.

(Nach einer Photographie von Voigtländer & Sohn, Braunschweig.)

annähernd mit einem Begriffe des natürlichen Systems deckt. Ein großer Teil aller Liliengewächse — ich nenne nur die Lauche, *Fritillaria*, Tulpe, *Scilla*, Hyazinthe, *Muscari*, Maiglöckchen und Schattenblümchen, Salomonsiegel und Einbeere, Schneeglöckchen und *Leucojum*, Narzissen und *Krokus* — sind typische Bestandteile unseres Frühlingssflors. Ob dies ein Zufall oder mehr ist, wage ich nicht zu entscheiden. Doch drängt es sich dem Auge so auf, daß es auch nicht anging, dieses Zusammentreffen zu verschweigen.

Wettstein charakterisiert die Liliiflorae als Sammelbegriff durch etwa folgende Eigenheiten: Die (meistens) Zwitterblüten werden von

einer doppelten Blütenhülle umgeben, deren sämtliche Blätter entweder kelchartig oder blumenblätterartig sind. Die Samen enthalten stets Endosperm.

Alle übrigen Eigenschaften, wie die strahlige Anordnung der Blütenteile, die Dreiblättrigkeit des Fruchtknotens, die Entomophilie, sind nicht durchgängig vorhanden, denn innerhalb der ganzen „Reihe“, wie der moderne phylogenetisch geschulte Botaniker vorsichtiger sagt an Stelle des früheren starren Begriffes der „Ordnungen“, haben sich verschiedene Anpassungsrichtungen ausgebildet. Wasser- und Sumpfgewächse, wie

die Binsen, haben sich z. B. des Windes bedienen müssen als Befruchtungsvermittler; daher hat sich ihre ganze Blüte dementsprechend eingerichtet. Andere Forscher, wie Pax, vermögen überhaupt kein Merkmal anzugeben, das für alle Liliifloren gleichmäßig gültig ist, und auch demgemäß wollen wir dem Beispiele des Engler'schen Prachtwerkes über die Pflanzenfamilien folgen und die Lebensbilder, welche wir von Lilienblütigen Gewächsen malen wollen, in Einzelbilder zerlegt bearbeiten.

Man unterscheidet etwa 14 Familien und Unterfamilien, von denen aber nur 4 von merkwürdiger

Wichtigkeit sind, nämlich die binsenartigen Gewächse (Juncaceae), die eigentlichen Lilien (Liliaceae), die

Margittarten (Amaryllidaceae) und die Schwertlilien (Iridaceae). Diese stellen aber nicht eine fortlaufende Reihe höherer Entwicklung dar, sondern wir sind derzeit außerstande zu sagen, in welcher Weise sie miteinander, mit den Gräsern, Raich- und Seekräutern, Pontederiaceen und Bromeliaceen verwandt sind. Nur so viel ist sicher, daß sie mit den Genannten Verwandtschaftsbeziehungen aufweisen. Wir beginnen also mit dem wenigstens seiner Erscheinung nach einfachsten Typus, den

Eucomis punctata, als Typus einer tropischen Lilie.
(Nach einer Photographie von J. G. Petersen-Graz, gezeichnet von R. Doffinger.)

Binsen (Juncaceae).

Die bekannten zwei Gattungen, die Binse (*Juncus*) und Sainbinse (*Luzula*), sind ihrer ganzen Erscheinung nach, wenn sie nicht blühen, dermaßen grasartig, daß man es niemals glauben würde, in ihnen Liliengewächse vor sich zu haben. Erst ihre garten, wenn auch unscheinbaren und anemophilen, gelben oder rötlichen Blütchen

verraten es, welches Wesen in ihnen steckt, wenn auch ihre Blütenhülle spelzenartig erscheint. Auch darin erinnern sie an die Gräser, daß sie, im Gegensatz zu den meisten anderen Lilienblütlern, die gemäßigten, sogar die kalten Klimate bevorzugen.

Trotz des einfachen Buchses weiß der Pflanzenkenner von ihnen dennoch allerlei zu erzählen. Dem mikroskopierenden Naturfreund empfiehlt er, das Mark der Stengel von *Juncus effusus* L. oder *J. balticus* Willd. zu untersuchen, denn es besteht aus den zierlichsten Sternzellen, die man sich denken kann.

Der Blütenbiologe beachtet an ihnen die vortreffliche Anpassung an Windbestäubung durch glatten, leicht verstäubenden Pollen und außergewöhnlich lange Narbenpapillen. Daneben gibt es aber (namentlich außereuropäische) Sainbinsen mit hübschen schneeweißen oder roten Blütenhüllen, von denen wohl anzunehmen ist, daß sie von den Kerftieren nicht unbeachtet bleiben, wenn auch noch keine besonderen Beobachtungen darüber vorliegen. Da, wie ich aus verschiedenen an mich gelangten Briefen weiß, dieses Werk in den deutschen Kolonien ziemlich verbreitet ist, so möchte ich den die Tropen und anderen Teile der Erde bewohnenden Naturfreunden an dieser Stelle ans Herz legen, daß sie sich wirkliche Verdienste erwerben können, wenn sie sich an ihrem Wohnsitz mit Ausdauer und peinlicher Selbstkritik blütenbiologischen Beobachtungen widmen. Dies ist das dankbarste Gebiet der Betätigung für den Naturfreund in den Tropen.

Eine Eigentümlichkeit der Juncaceen ist auch die Neigung zur Kleistogamie. Bei dem nahezu über die ganze Erde verbreiteten *Juncus bufonius* oder *capitatus* findet man neben offenen Blüten regelmäßig auch solche, die geschlossen, sich selbst befruchten. Manche Arten sind überhaupt vollständig kleistogam geworden. Eine Ursache dafür vermögen wir aber nicht anzugeben. Es mögen auch hier Reduktionen durch die dem Wasser angepasste Lebensweise mit hineinspielen, da diese offenkundig auf die Pflanzen nicht entwickelnd wirkt. Dies sieht man daran, daß *Luzula* als Waldpflanze in manchem die Binsen übertrifft, allem voran in der Ausbildung der Blüten. Eine Eigenheit aller Sainbinsen ist die weißliche Behaarung ihrer Blätter, deren biologische Bedeutung noch nicht zu entziffern war. Buchenau, der die ganze Gruppe vielfach studiert hat, läßt es offen, ob diese Randhaare zur Fortleitung von Tautropfen dienen oder aber Insekten verhindern sollen, auf die Blätter zu kriechen. Eine anatomisch=biologische Untersuchung dieser Frage wäre eine dankbare Doktorarbeit.

Die Lilien (Liliaceae)

kann man getrost als die jungfräulichen Blumen bezeichnen, wenn man den Palmen die Attribute der Fürsten und der Mose das einer Königin des Pflanzenreiches beigelegt hat. Die Lilie, als ihr bekanntester Vertreter, hat des Volkes Geist und Gemüt viel beschäftigt und manche sinnige Sage der Vorzeit um die Gestalt der „Gottesmutter“ gerankt, deren Symbolpflanze dann die Lilie geworden ist. Von dieser Symbolik her ist sie dann eine der wichtigsten Wappenspflanzen und immer dichter mit allegorischen Beziehungen umspunnen worden, aus denen allen wieder nur der höchste ästhetische Wert hervorgeht, den die edelgeformte, im reinsten Weiß schimmernde, ansehnliche Blüte stets beanspruchen kann, wenn sie jetzt leider auch „aus der Mode“ gekommen und so ziemlich in die Bauern- und Kleinstadtgärten verbannt ist. Dabei aber ist die Lilie in ihrer Familie nur der eine, und zwar der „fadedste“ Typus der Schönheit. An die feurige Kaiserkrone (*Fritillaria*), den Türkenbund (*Lilium martagon*) als der schönsten Zier unserer Laubwälder, an die Pracht der Hyazinthen, die Schmucklilien (*Hemerocallis*), die elegante *Yucca* des südlichen Gartens, an die einst vergötterten Tulpen und heute endlich nach Verdienst gewürdigten Maiblumen (*Convallaria*), an diesen ganzen, üppig prangenden, farbenprächtigen Blumenstrauß muß man denken, will man der Lilien Wesen so recht erfassen.

Botanisch gewürdigt, klingt das alles freilich recht nüchtern. Als saftige Kräuter oder Bäume (Baumlilien [*Dracaena*]) mit parallel geaderten, ganzrandigen, schmalen, ungestieltten Blättern und reichentwickelten Blüten, meist mit buntem Perigon und von der Dreizahl beherrscht, charakterisiert sie der Systematikus. Der Pflanzengeograph weiß wieder großzügiger und anmutiger von ihnen zu melden, daß sie in gewisser Beziehung die Charakterpflanzen der offenen Landschaften Afrikas und der Mittelmeerländer sind, überhaupt in den warmen, sonnigen Grasfluren der Alten Welt ihre wahre Heimat finden. Einem Steppenleben mit seiner monatelangen Dürre, seinem Sommerschlaf und doppeltem Pflanzenerwachen sind sie angepasst mit ihren steifen Blättern und Zwiebeln, Knollen und Wurzelstöcken. In den weiten Grasebenen ergrünen sie rasch wie die Gräser, wenn im Venz und Herbst die Regenzeit einsetzt, und sticken dann in unglaublich kurzer Zeit ins grüne Feld ihr buntes und leuchtendes Muster.

Nicht so zufrieden mit den Lilien ist dagegen der Pflanzenanatom. So groß die Gruppe ist mit ihren annähernd 2600 Arten, so enthält sie doch wenig Besonderheiten im Bau. Merkwürdig ist höchstens, daß gewisse Arten, wie die Drachenbäume (*Yucca*) oder die Baumaolen (*Aloë arborescens*), unbegrenztes Dickenwachstum besitzen, da an der Grenze zwischen der Rinde und der Gefäßbündelmasse eine Zellschicht meristematisch bleibt. Mehr des Interessanten weiß endlich der Blütenbiologe von den Lilien zu sagen, obzwar alles in allem die Reihe gegenüber anderen ziemlich zurücksteht und den Freund des Schönen sicher mehr befriedigt als den Wissensdurstigen.

Natürlich kann eine so große Gruppe nicht überblickt werden ohne eine Einteilung in Unterfamilien, mit deren Gerüst wir jedoch unsere Leser nicht beschweren wollen. Man suche das in der Flora nach, ohne deren gleichzeitige Benützung unsere „Lebensbilder“ ohnedies unbefriedigt lassen müssen.

Wuchs und Blütenstand des weißen Germers (*Veratrum album*).
(Naturaufn. von Frl. A. Mayer-Wien und F. G. Peters†-Graz.)

Als einfachste aller Lilien gilt die auf Torfwiesen Norddeutschlands und in den Alpen grünende kleine Simsenlilie (*Tofieldia*), deren deutscher Name recht gut andeutet, wie sich in ihrer Erscheinung der Niedgraswuchs mit einer allerdings nicht hübschen, grünlich-gelben, aber doch echten Lilienblüte zu vereinen weiß. Mächtiger ist schon die Erscheinung des ihr verwandten Germers (*Veratrum album* und *nigrum*), den man nach einer flüchtigen Ähnlichkeit auch als weiße Nieswurz bezeichnet hat (siehe das Bild). Übrigens liegt eine gewisse Berechtigung hierzu darin, daß der Wurzelstock des Germers früher, als man dem Niesen eine besonders gesundheitsfördernde Wirkung beilegte, zur Bereitung von Niespulvern gebraucht wurde. Die Gärtnerei hat übrigens den Versuch gemacht, namentlich die rotblühenden Germerarten als Schmuck von Teich- und Bachufern zu verwenden, doch hat dies angesichts der Giftigkeit der Pflanze sein Bedenkliches.

Die bekannteste, durch ein Alkaloid (Kolchizin) giftige Lilienpflanze ist übrigens nicht der Germer, sondern die Herbstzeitlose (*Colchicum autumnale* L.). Sie ist aber nur ein Vertreter von etwa 30 Arten, die durchaus nicht alle die seltsame Lebensweise führen, im Herbst als letzte

Blume zu blühen und erst im darauffolgenden Frühling Blätter zu treiben und ihre großen Fruchtkapseln zu reifen.* *C. montanum* im Mittelmeergebiet blüht z. B. im Frühling, und zwar unter gleichzeitiger Entwicklung von 2—3 Blättern. Man hat die Umkehrung dieser normalen Verhältnisse bei unserem heimischen *Colchicum* biologisch damit zu erklären versucht, daß die Pflanze nicht imstande sei, einen hohen Blütenstengel zu entwickeln, und deshalb eine Zeit abwarte, zu der das Gras auf den Wiesen niedrig sei. Ich glaube aber, daß diese Erklärung zu weit geht, denn welche Urteilstkraft setzte sie bei der Pflanze voraus?

Wenn man die Zeitlose aus dem Boden zieht, erkennt man, daß sie Vorratskammern anlegt. Sie hat tiefliegende unterirdische Knollen, die der Laie für Zwiebeln hält, die aber in Wirklichkeit Anschwellungen des Stengels sind, die das Gewächs im Frühling mit Reservestoffen anfüllt.

Chlorophytum comosum im Münchner botanischen Garten.
(Originalaufnahme von G. Dopfer München.)

Das Blütenleben der Herbstzeitlose entbehrt nicht der anziehenden Züge. Die sehr zarten Blaulila-Blüten öffnen sich jeden Morgen und schließen sich abends sowie an regnerischen Tagen. Diese Instinktbewegungen erzielen natürlich wirksamen Pollenschutz. Aber A. v. Kerner hat beobachtet, daß sie im Notfall auch autogame Befruchtung bewirken. Die Blütenhülle wächst etwa 4mal schneller als die Griffel, und so kommt es, daß die Stellen, an denen sie durch das abendliche Schließen von ihren eigenen Staubgefäßen mit Pollen bestäubt ist, am letzten Abend ihres Lebens sich gerade über der Narbe zusammenneigen und so doch eine Erzeugung von Samen sichern, wenn auch die erwarteten Blütengäste ausgeblieben sind.

Merkwürdiger Mittel bedient sich auch die Pflanze zu ihrer Verbreitung. Die kleinen, braunen Samen besitzen einen Anhang, der bei feuchtem Wetter schleimig-klebrig wird. Dadurch haftet der Samen an den Hufen der Weidetiere und wird so durch sie weithin verschleppt. So kommt es, daß die Zeitlosen, trotz aller Bemühungen der sie als Wiesenverderber hassenden Landleute, dennoch im September überall ihre Lila-Blütenflämmchen aufschießen lassen.

* Darum nannten die mittelalterlichen botanici die Pflanze *filius ante patrem* (Sohn vor dem Vater).

Eine hübsche Verwandte der Herbstzeitlosen hat sich unter dem wohlklingenden Namen Ziliengrün auf dem Blumentisch eingebürgert als ungemein anspruchslose und dankbare Zimmerpflanze. Die Gärtner verkaufen sie unter dem Namen *Chlorophytum Sternbergianum* (siehe das Bild), der aber botanisch richtig *Chl. comosum* (Thunb.) Baker zu lauten hat. Das Ziliengrün erfreut nicht nur durch Bläßlila-Blüten, die es an einem langen Schaft herabhängen läßt, sondern noch mehr durch die reizenden Blattknospen, die sich nach dem Abblühen am Blütenstängel gleich mit den Wurzeln entwickeln und sofort anwachsen, wenn man sie in die Erde bringt. Eine seltsame Lilie, die mancher Pflanzenfreund als Kuriosität auf seinem Blumentisch pflegt, ist *Bowiea volubilis* Harv., eine Wüstenpflanze aus Südafrika, die einen vielverzweigten, windenden Stengel und kleine Blüten, aber kaum einige Blätter hervorbringt. Das eigenartig sparrige Gewächs zeigt so recht, was ein „Ökologismus“, wie groß die Macht der Anpassungen ans Bedürfnis ist. Eine dritte reizende und allgemein bekannte Gartenpflanze aus der Verwandtschaft der Herbstzeitlosen ist die Taglilie (*Hexaconis fulva* L. und *flava* L.), die auf Wegbeeten längst eingebürgert ist als dankbarer Schmuck, besonders wenn ihr in Wassernähe feuchter Boden geboten wird. Von diesem Gewächs berichtet D. Heineck in der Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre (1908) einen sehr merkwürdigen Zug ihres Innenlebens. Er fand senkrecht stehende Knospen von *H. fulva* so fest, daß sie sich beim Aufblühen nicht in die wagrechte Haltung senken konnten, die sie annehmen, wenn sie sich selbst überlassen bleiben. Sie blühten auf, aber ihre sonst S-förmig gekrümmten Befruchtungsteile blieben gerade. Hieraus ergibt sich, daß die Gestalt der Befruchtungsteile lediglich von der Haltung der Blüten, also von Reizen, abhängig ist und auf diese sinngemäß antwortet oder, wie sich Prof. Heineck ausdrückt, daß die Pflanze zu „individuell variierten, auf etwas individuell Zweckmäßiges abzielenden Handlungen“ befähigt sei. Als nächster Verwandter der Taglilien gilt *Phormium tenax* Forst., der neuseeländische Flachs, der wieder eine andere Seite, die der reinen Nützlichkeit, aufschlägt in dem großen Buche der Pflanzennatur. Die Cooksche Weltumseglung hatte zuerst die Kunde davon nach Europa gebracht, daß auf Neuseeland ein mächtiges, grasartiges Gewächs von mehr als Manneshöhe mit meterlangen Blättern von den Eingeborenen ob seiner sehr festen Fasern zu Seilen, Flechtwerk und Kleidern verarbeitet wird. Die praktischen Engländer ließen sich das nicht zweimal sagen. Sofort bemächtigte sich der Handel des wertvollen Faserstoffes; man führte *Phormium* in Australien, Ostindien und Südafrika ein und erzielte namentlich in Australien bald größere Ernten als in der eigentlichen Heimat der Pflanze. Auch heute ist die „Flachslilie“ eine der geschätztesten Faserpflanzen. Sie hat dies übrigens mit einer ganzen Zahl lilienartiger Gewächse gemein, namentlich dem Mauritiushanf (*Fourcroya gigantea*) und dem Sisalhanf (*Agave rigida*). In allen diesen Fällen ist es das außerordentlich stark entwickelte Leitbündelsystem der Blätter, das sich in Nützlichkeit und Geldeswert umsetzen läßt.

Eine andere Gruppe der Liliaceen umschließt zwei berühmte Gewächse, an denen wir nicht wortlos vorübergehen können. Das eine ist die in Afrika eingeführte Charakterpflanze des mittelländischen Meeres, die wahre Aloe (*Aloë vera* L.) geheißen zum Unterschied von der aus Amerika stammenden Agave, die auch hundertjährige Aloe genannt wird. Mit mächtigen, dicken Blättern in dichter Rosette verrät die Aloe,

Eingang in den botanischen Garten von Padua.

(Originalzeichnung von R. Vessinger.)

daß sie ein echtes Wüstenkind und an das Ertragen großer Trockenheit gewöhnt ist. Durch ihren bitteren Saft (den man getrocknet im medizinischen Handel gewöhnlich als Aloe bezeichnet) sucht sie sich wohl vor Angriffen von Tieren zu schützen.

Australischer Grasbaum (*Xanthorrhoea hastile* R. Br.), auf $\frac{1}{12}$ verkleinert.

Noch auffälliger im Wuchs sind die ihr verwandten Grasbäume (*Xanthorrhoea*), die auf einem zykladenartigen Stamm einen mächtigen Schopf grasartiger Blätter tragen und darüber mehrere Meter hoch einen Blütenstach emporstrecken, der nicht

unähnlich der vergrößerten Skopie einer Wegerichblüte ist. Das auffällige baumartige Gewächs bildet einen so kennzeichnenden Bestandteil mancher australischer Landschaften, daß man es geradezu als Charakterpflanze des fünften Erdteils angesprochen hat, die der Bevölkerung vielfach dient mit gelbem Harz (daher der griechische Name) als Viehfutter und in ihren zarteren Teilen sogar als schmackhaftes Gemüse.

Da sich nicht nur unter Menschen, sondern auch im Pflanzenleben die Gegensätze berühren, so stellt die Systematik neben diese ansehnlichen gerade die unscheinbarsten aller Liliengewächse, deren Liliencharakter der Nichtkenner niemals vermuten würde. Das sind

Stühenderlauch (*Allium suaveolens*).
(Nach der Natur aufgenommen
von H. Dopfer-München.)

Baumartige Aloe (*Aloë arborescens* Mile) aus Südafrika. (Nach einem jungen Exemplar des Münchner botan. Gartens aufgenommen von H. Dopfer-München.)

die unsere Küche so vielfach versorgendenlaucharten (*Allium*), die man in die besondere Unterfamilie der Alliioideae zusammenfaßt. In der deutschen Flora unterscheidet man 13laucharten, von denen aber die nützlichen, so namentlich der Porree (*A. Porrum* L.), der Knoblauch (*A. sativum* L.), die gemeine Küchenzwiebel (*A. fistulosum* L. und *A. Ceba* L.), alle aus Südeuropa und dem Orient stammen, teilweise, wie die letzteren, von ganz unbekannter Heimat und bei uns nur stellenweise verwildert sind. Nur der Schnittlauch (*A. Schoenoprasum* L.) wächst von den Küchenlauchen in Deutschland an Flußufern wild. Die genannten, wozu sich noch der in Muen zur Maienzeit widerlich riechende Bärenlauch (*A. ursinum* L.)

gefelt, sind aber nur ein Bruchteil aller bekannten Lauche, denn deren gibt es namentlich in der Alten Welt an 250 Arten.

Der auf Vorhandensein von ätherischen, schwefelhaltigen Ölen beruhende würzige Geschmack, der meist der ganzen Pflanze, in jedem Fall aber den Zwiebeln, d. h. den fleischigen Achsen dieser Pflanzen, zukommt, die von fleischig gewordenen Blattscheiden oder Blattschuppen bedeckt sind, hat die Lauche als Würze schätzen gelehrt. Allerdings dünkt uns der Gedanke nicht gerade anreizend, daß die „interessanten“ Völker des europäischen Südostens, daß Bulgaren, Griechen, auch Südtaliener vielfach geradezu von Zwiebeln leben. Wir übertragen aber hierbei eine falsche Vorstellung, denn die Zwiebeln schmecken in jenen Breiten bei weitem nicht so scharf und dazu noch viel süßer als bei uns.

Zu welchem Zweck aber versetzt die Pflanze ihre Vorratskammer mit den scharfen Ölen? Man vermutet, daß dies wohl ein Schutzmittel gegen Erdmäuse sein soll, die gerade in den Zwiebelländern den Steppenboden auf das gierigste durchwühlen. Dem widerspricht aber scheinbar der Umstand, daß gewisse Lauche, so der Knoblauch, im Blütenstand auch kleine Brutknöllchen hervorbringen (als Perlzwiebel geschätzt), die nicht weniger aromatisch sind als die unterirdischen. Doch man muß sich, um die Verhältnisse richtig beurteilen zu können, daran erinnern, wie solche Brutzwiebeln verbreitet werden. Sie fallen in einem gewissen Reifestadium ab und wurzeln in der Erde fest. Sie sind also den Mäusen (und Insekten) eigentlich noch schutzloser preisgegeben als die unterirdischen. So spricht auch diese Brutzwiebelbildung nicht gegen die erzählte Deutung.

Auf den Frühlingstriften und in Wäldern blüht im Mai gelb und weiß noch ein Zwiebelverwandter, nämlich der Goldstern (*Gagea*), der in seinem liebreizenden Blütenkleidchen überleitet zu den eigentlichen Lilien, von denen Lilie, Tulpe (*Tulipa*) und Kaiserkrone (*Fritillaria*) als Dreigestirn am Frühlingsblumenhimmel glänzen.

Man kennt 45 Lilienarten, von denen eine 3 m hohe Riesenart (*L. giganteum* Wall.) die Täler des ganzen Himalaja schmückt. Bei uns sind drei Arten allgemein bekannt: die jungfräuliche Blume von *L. candidum* L., die rot-orangefarbene und dunkelpurpurgefleckte Tigerlilie (*L. tigrinum* Gaw.) und der Türkenbund (*L. Martagon* L.), der in Süddeutschland für die schönste, leider bereits aussterbende Waldblume gilt. Es ist Geschmackssache, welcher von den dreien man die Palme reichen mag. Merk-

Ein blühender Goldstern (*Gagea pratensis*).
(Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

würdigerweise ist man bei einer so bekannten Pflanze noch nicht über alle Zweifel hinaus, wie sich ihre Bestäubung vollzieht. Man schließt aus der blendendweißen, wie eine Nachtlaterne wirkenden Färbung der Blüten, namentlich aber aus dem abends stärker werdenden Duft, daß die Lilie von Nachtfaltern besucht wird, worauf sich auch manches an der Blüteneinrichtung deuten läßt. Anders hingegen Türkenbund und Kaiserkrone. Sie duften nicht wohl; das Rot und Gelb und die Sprengelung, die offene Nektargrube bedeuten dem Kenner, daß hier die Hauptlockmittel für Miasfliegen gegeben sind. Die Feuerlilie (*L. bulbiferum*) hinwieder, die auf unseren

Türkenbund (*Lilium Martagon*).

Blühende Exemplare, bei deren mittlerem die Blütenachse verbändert ist. (Nach einem von H. Kell in den Farauden gefundenen Exemplar.)

Tigerlilie mit Brutknoschen. (Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Seneb.)

Mittelgebirgswiesen einheimisch, wenn auch sehr selten sein soll, gilt mit ihren aufrecht stehenden, duftlosen Blumen für eine Tagfalterblume. Wir hätten also hier die ganz einzigartige Erscheinung gegeben, daß dieselbe Gattung sich in dreierlei verschiedenen Richtungen angepasst hat.

L. bulbiferum und andere sind übrigens, wie ihr Name andeutet, auch noch dadurch ausgezeichnet, daß sie in den Achseln der oberen Blätter dunkelgefärbte Brutknospen (Bulbillen) hervorbringen (s. das Bild), wodurch sie sich von der Befruchtung bis zu einem gewissen Grad unabhängig machen. Gleiches vollführt auch die Tigerlilie, und wenn wir damit vergleichen, daß gerade diese Gewächse sehr selten Samen ansetzen, so sind wir wieder einer Äußerung der unbewußten Intelligenz auf die Spur gekommen, durch welche die Pflanzen so oft ihnen an-

haftende Mängel auszugleichen wissen. Wenn die neuere biologisch denkende Philosophie in dem Intellekt des Menschen nicht ein Werkzeug zur verständnisvollen Durchdringung des Weltgeheimnisses, sondern nur eine biologische Anpassung sieht, um sich angesichts der Mängel seines Organismus dennoch behaupten zu können, so ist es sehr auffällig, daß wir, ausgedrückt in Organen und Handlungen, auch bei den Pflanzen die Fähigkeit nicht vermissen, die Schwäche und Unzulänglichkeit ihrer Organisation durch Anpassungen zu korrigieren. Jeder Unbefangene wird hieraus den einzig offenstehenden Schluß ziehen, daß bei den Pflanzen angesichts des gleichen Effektes auch die gleiche Wirkung, nämlich „etwas wie ein Intellekt Wirkendes“ (um die vorsichtigste Form zu wählen), da sein müsse.

Habe ich dadurch vielleicht einiges beigetragen, um das etwas matte Interesse, das man den Lilien als

Gartenpflanze entgegenbringt, zu beleben, so möchte ich nun auch noch ein Vorurteil zerstreuen, das man gegen ihre Zucht hegt. Die Lilien fehlen zwar, wie durch Urkunden bezeugt ist, seit Karls des Großen Zeiten dem deutschen Garten nicht, aber sie sind die

Tigerlilie (*Lilium tigrinum*) mit sich selbst befruchtender Blüte.
(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Heine & Alzey.)

typische Zierde des Bauerngartens und nicht des vornehmen Blumenfreundes. Man sagt, ihre Kultur sei sehr schwer. Aber dem ist nicht so. Worunter sie leiden, das ist der Fehler aller Zwiebelgewächse: sie verschimmeln leicht. Doch läßt sich dem abhelfen, wenn man die Zwiebeln vor dem Verpflanzen mit Holzkohle einpudert und in sandigen Boden setzt. Auch darf man nicht glauben, daß, weil Lilien Steppenpflanzen sind, sie nun auch glühenden Sonnenschein lieben. Das wäre bureaukratisch gedacht. In der Steppe ist die Lilie Mitglied einer großen Pflanzengesellschaft. Andere um sie herum beschatten den Boden, und das muß man ihnen zu ihrem Gedeihen auch im Garten bieten.

Von den Gartenlilien schätzt man die aus Japan eingeführte Goldbandlilie (*L. auratum*) am höchsten. Und wirklich sind diese riesigen Blumen von bezauberndem Farbenreiz. Die Grundfarbe ist weiß mit roten Staubgefäßen. Dazu kommen aber noch rote Punkte und goldig-leuchtende Streifen in den Falten. Von den etwa 9 Lilienarten, die sich dem Gartenfreund liebwert gemacht haben, werden die Prachtlilie (*L. speciosum*), auch *L. auratum*, *lancifolium* u. a. gern als Zimmerpflanze

gezogen. In sandige Heideerde werden die Zwiebeln im Herbst gelegt und dunkel frostfrei überwintert. Vom Februar an kann man sie in das Zimmer bringen und mäßig gießen. Dann erfreut sie von Juni bis September mit ihren ausgezeichneten Blüten und hält sich ausdauernd, wenn man sie im Oktober wieder in den Keller bringt.

Zwiebelgewächse zu kultivieren, ist ohnedies eine liebsvertraute Beschäftigung für die vielen Tausende, die im Lenz nicht ihre Hyazinthen und Tulpen als Frühlingsboten missen möchten.

Die Tulpe (*Tulipa silvestris* L.) ist, wie wohl die wenigsten wissen, eine einheimische Waldblume, die an grasigen Waldplätzen, an Flußufern zerstreut mit schönen gelben Blüten in ganz Deutschland im April oder Mai blüht

und manchmal als ganz ansehnliches Gewächs bis zu einem halben Meter Höhe erreicht. Aber diese Blume hat den Gärten nichts geboten. Die Gartentulpe (*Tulipa Gesneriana* L.) ist vielmehr unbekannten Ursprungs. Sie scheint durch Kultur so vielfach

verändert, daß wir nur vermutungsweise *Tulipa suaveolens* von der Krim und dem Kaspischen Meer als ihre

Mutterpflanze ansprechen dürfen. Jedenfalls aber ist die Tulpe vom Orient zu uns gekommen, und wenn wir ihrer Geschichte nachgehen, so findet sich als erste beglaubigte Angabe, daß Busbecq, der Gesandte des Kaisers Ferdinand I., im Jahre 1554 Tulpen in Konstantinopel sah und nach

Eine Gartenlilie (*Lilium speciosum* var. hort.).
(Nach einer Photographie von Voigtländer & Sohn, Braunschweig.)

1 = Die Befruchtungsorgane der Tulpe. 2 = Netze Kapsel der Kaiserfrone. (Naturaufnahmen von Prof. Dr. D. Heinemann-Alhey.)

Wien sandte. Die Türken sollen diese ihre Nationalblume, zu deren Ehren noch heute Feste gefeiert werden, aus ihrer ursprünglichen Heimat, den Steppen Turkestans, mitgebracht haben. Tatsächlich gibt es dort ausgedehnte Steppen, die sich nach den Frühlingsregen mit einer Farbunglut der schönsten Tulpen und anderer Zwiebelgewächse überziehen. Der Augsburger botanische Garten hat den Ruhm, daß in ihm der Schweizer Konrad von Gesner (1516—1565), der den Ehrennamen des deutschen Plinius trug, die ersten Tulpen in Deutschland zur Blüte erzog und auch „botanisch“ entdeckte, weshalb seine Form noch *T. Gesneriana* L. heißt.

Das naturarme Holland, in dem einem tiefen Geseß der menschlichen Seele zufolge notwendigerweise die meiste Naturfreude entstehen mußte, wurde alsbald zur zweiten Heimat des Fremdlings. Man führte die Kunstwerke morgenländischer Gartenkünstler als kostbare Schiffsfracht in die Niederlande, erlernte aber bald selbst die namentlich bei Tulpen schwierige, viel Geduld und Sachkenntnis erfordernde Züchtung der wunderbar gestreiften, vielfarbigen, schwarzen, gefüllten und gefransten Sorten. Für diese entstand dann bald eine eigene Tulpenwissenschaft der „Blumisten“ und eine eigene Börse der Tulpenzwiebeln, die ebenso ihre Hausse und Baïsse, ihre wilde Kurstreiberei und ihre Falsiffements hatte, wie die

Moderne Ziertulpen.

(Nach einer Photographie von Voigtländer & Sohn, Braunschweig.)

Getreide- oder Wertpapierbörsen. Es entstand eine eigene Tulpensprache, in deren Kunstausdrücken sich nur der Fachblumist zurecht fand. Der Botaniker kann sich nichts dabei denken, wenn er von Bizarden und Flamanden, von Muttertulpen und gebrochenen Tulpen, von Bijbloemen und Monströsen hört als den Hauptsorten dieser so überschätzten Blumen.

Das Jahr 1570 wurde in den Niederlanden verehrt wie ein historisches Datum von großem Ruhm für das Land — blühte doch damals zu Mecheln die erste Tulpe auf niederländischem Boden. Man hatte nämlich ursprünglich aus der Türkei Tulpen samen eingeführt, statt die Pflanzen wie jetzt aus den Zwiebeln zu vermehren, und da dauerte es 7 Jahre, bis man sich der ersten Blüte erfreuen konnte, was übrigens

dem Psychologen einen Fingerzeig gibt für die besondere Wertschätzung dieser Pflanze.

Schon 60 Jahre später hatte man an 500 Spielarten herangezüchtet, mit denen namentlich in Haarlem, als dem Mittelpunkt des ganzen Treibens, so eifrig gehandelt wurde, daß man für eine einzige Zwiebel 13000 holl. Gulden (1 holl. G. = fl. 1,70 nach heutigem, nicht nach dem damaligen viel höherem Geldeswert) forderte und auch erhielt. Es war jene Zeit, welche die großen Blumenmaler Flanderns, einen Daniel Seghers, Jan Brueghel, in Holland aber den größten Meister dieser Art vielleicht für alle Zeiten, nämlich Jan Davidsz de Heem, hervorbrachte. Diese holländische Tulpenmalerei blieb auf der Höhe lange bis ins 18. Jahrhundert, da sie noch in der „göttlichen“ Rachel Ruysch und in dem (mir persönlich am meisten zusagenden) Jan van Huysum Unerreichtes schuf. Die „Tulpomanie“ war aber längst erloschen, wenn sie auch in Holland nie ganz ausgestorben ist, wie ein Spaziergang vor den Toren Haarlems oder Leidens sofort belehrt. Die holländische Regierung hatte sich im Jahre 1640 ins Mittel gelegt, nachdem ein großer „Tulpenkrach“ zahlreiche Fallissements nach sich zog. Durch eine Verordnung wurden damals alle auf Tulpen (auch Hyazinthen, Narzissen und Jonquillen, in denen man ebenfalls spekulierte) bezügliche Verträge und Schuldforderungen für uneintragbar erklärt, und im Nu hatten die Tulpenkönige, die man wie berühmte Diamanten mit Namen belegte (die Tulpe „Admiral Dieffien“ war auf nahe 7400 Mark, „Semper Augustus“ auf die Hälfte geschätzt), ausregiert. Die schönsten Tulpen hatten dann wieder den Normalwert von 3—4 Mark.

Heute ist die Tulpenliebhaberei wieder im Steigen, wenn auch nicht zu befürchten ist, daß der Orchideenwahnsinn neuerdings auf Tulpen übergreift. Im allgemeinen bemängelt es der Gärtner, daß er die Tulpenbeete nach ihrem Verblühen nur schwer sofort besetzen kann. In der Übergangszeit vom Lenz zum Sommer ist die Tulpenpracht meist schon zu Ende, aber es ist noch zu früh, um Sommergewächse auszupflanzen. Dem hat nun allerdings eine spät (Mai) blühende Tulpenform (Darwin-tulpen) abgeholfen, aber sie ist noch zu wenig bekannt, um das Vorurteil gebrochen zu haben. Und doch ist die Kultur der Tulpen so einfach, und wenn man ein Beet keinem anderen Zwecke zugeordnet hat, so erfreuen sie mehrere Jahre mit ihrem feurigen Flor, denn auch die Tulpe ist eine ausdauernde Pflanze. In der Zimmerkultur sind sie wie die Hyazinthen zu behandeln, d. h. es ist ganz gleichgültig, welche Erde man verwendet (deshalb genügt auch einfachste Kultur), nur muß man während des Treibens reichlich mit lauwarmem Wasser gießen und den Unterseker mit Wasser gefüllt erhalten. Aber das eine möge man nicht vergessen: Tulpe und Hyazinthe sind in bezug auf Temperatur sehr empfindlich in dem Sinne, daß sie an warmen, sonnigen Tagen rapid abblühen. Will man sich also im Zimmer ihrer lange erfreuen, so wähle man nur einen kühlen (jedoch hellen) Standort.

Eine andere Eigenheit der Tulpen und Hyazinthen ist, daß sie neue Töpfe nicht lieben. Man frage darüber nur einen erfahrenen Gärtner, und er wird es bestätigen. Man frage aber einen Botaniker, und er wird keine Ursache dafür angeben können. Es wäre dankbar, die Sache experimentell zu untersuchen. Der erfahrene Freund der Zwiebelgewächse stülpt übrigens auf seine frisch antreibenden Pflöge eine Papierdüte. Das ist angewandte Physiologie. Denn er bezweckt damit eine Unterdrückung des Blattwachses und Förderung der Blüte. Er entfernt die Düte, wenn der Trieb sie zu heben beginnt, aber er gönnt dem Pflöge erst wenige Tage vor dem Ausblühen das volle Licht.

Die Hyazinthenpflege im Glas (Tulpen, Arokus, Maiblumen, Narzissen usw. lassen sich nicht in Gläsern treiben) hat ebenfalls nur wenige Regeln. Man legt die gekauften Zwiebeln trocken auf einen Schrank und sieht öfters nach, ob die Pflanze durch Austreiben kleiner, weißlicher Wurzelnötchen das Signal gibt. Dann kommt sie in das Wasserglas, das nie voller sein sollte, als um noch einen Nagel breit Luft zwischen dem Wasser und der Zwiebel zu lassen. Der Erfahrene erneuert das Wasser nicht, sondern beugt seinem Verderben durch ein paar hineingeworfene Stückchen Holzkohle vor. Im übrigen sind dann die oben angegebenen Regeln zu beachten.

Von botanischen Gesichtspunkten aus ist über die Hyazinthe nicht viel zu sagen. *Hyacinthus orientalis* L., die Stammpflanze der in etwa 500 weißen, rosa, blauen und violetten Varietäten gezogenen Gartenpflanze, lebt wild in Dalmatien, Griechenland und Kleinasien; als botanische Marität kann ich eine nahverwandte, wilde Hyazinthe (*Hyacinthella leucophaea* Schur.) aus dem am östlichsten vorgeschobenen Vorposten deutscher Kultur, aus Siebenbürgen, nennen. Etwa weitere 30 Arten der hübschen Pflanze leben im Orient und in Afrika, und von dort, der Sage nach von Bagdad her, hat man sie im 16. Jahrhundert, als türkische Blumen in Europa Mode wurden, zu uns gebracht. Jedenfalls wurde sie schon 1596 in England gezogen. Heute hat die Hyazinthenkultur zwei Vororte: Haarlem und Berlin. Die erstere Stadt bewahrt diesen Ruhm schon an 200 Jahre, und man ist dort unerschöpflich im Hervorbringen neuer und überraschender Sorten.

Neben Tulpe und Hyazinthe tritt ein nicht minder schöner, ja als Frühlingszier der österreichischen und südwestdeutschen Wälder geradezu entzückender Verwandter ihrer Sippe unverdienterweise in den Hintergrund. Ich meine hierbei die Meerzwiebel (*Scilla*), von der zwei deutsche Arten schon durch eine biologische Eigentümlichkeit den Blick des Naturfreundes auf sich ziehen. Denn *S. bifolia* L. ist eine Vorfrühlingspflanze, *S. autumnalis* L. aber, wie ihr Name andeutet, eine Herbstblüherin gleich der Zeitlose, die nur deswegen nicht so volkstümlich ist wie jene, da sie in Deutschland ausschließlich im Elsaß wächst.

Die Gartenkunst hat ja die Szillen nicht ganz vergessen und kultiviert von den 80 Arten eine ganze Anzahl (besonders *Sc. maritima* und *amoena*) namentlich als Einfassung von Beeten, wozu sie sich besonders deshalb so gut eignen, da sie ihre volle Schönheit erst dann erlangen, wenn sie mehrere Jahre am Blase wachsen. Jedoch ist *Scilla* noch immer eine Pflanze, die ihrer „Entdeckung“ harrt und unter der Hand eines genialen Züchters die schönsten Hoffnungen wahr machen kann, um so mehr, als sie sich auch zur Frühreiberei eignet, also Werte gerade zu der Zeit schafft, da die Blumen am höchsten im Kurse stehen. *Sc. peruviana* L. z. B. erzeugt eine mächtige Blütenpyramide, an der sich 50—100 Blüten schaukeln.

Dem Eindruck nach nahe verwandt mit *Scilla* und Hyazinthe ist *Muscari*, dem man deshalb auch den deutschen Namen Bisamhyazinthe gegeben hat. Namentlich das große *M. comosum* [L.] Mill., dessen Blütentraube 40—100 Blüten hervorbringt, und das man in Mittel- und Süddeutschland während der Monate Mai—Juni blühen sieht, rechtfertigt es, daß Linné die ganze Gattung noch mit *Hyacinthus* vereinigt beschrieb.

M. botryoides Mill., das eigentliche „Träubel“, wie die Gärtner die Pflanze nennen, ist ein wunderhübscher Schmuck der Frühlingslandschaft mit seinen violett-

blauen Blütentrauben, die eifrig von Bienen beslogen werden. Die Gartenkunst hat sich die Träubelarten nicht entgehen lassen und verwendet sie gern, da sie winterhart sind, besonders zu Einfassungen. Ein reizendes Blümchen der Wiesen im Mai ist der hier abgebildete Milchstern (*Ornithogalum umbellatum* L.), deren in vielen Beziehungen mit *Scilla* nahe verwandte Gattung gleich dieser eigentlich aus südlicheren Ländern stammt, wo sie in über 70 Arten verbreitet ist. Auch sie weist die gleiche biologische Erscheinung auf wie *Gagea*, die Tulpen und überhaupt viele Arten der ganzen Gruppe. Diese schließen ihre Blüte bei regnerischem Wetter, was man als Schutzmaßregel zur Behütung des Pollens gedeutet hat. Da nun auch bei *Ornithogalum*, ebenso wie bei *Gagea* die Blätter der Blütenhülle nur an der Innenseite korollinischen Charakter haben, an der Außenseite aber wie gewöhnliche Laubblätter gefärbt sind, verschwindet der Milchstern an trüben Tagen geradezu für das Auge und ist eigentlich nur mit Mühe zu entdecken.

Einige ausländische Arten sind viel stattlicher als unsere deutsche Form und zogen deshalb bereits die Aufmerksamkeit der Gärtner auf sich, so das häufig kultivierte *O. lacteum* Jacq. vom Kap der guten Hoffnung. Andere sind noch nicht für die Gartenkunst entdeckt, trotzdem es darunter reizende Gewächse gibt. Ein solches ist das hundertblütige *Ornithogalum latifolium* L., das in den Bergen des Kaukasus wächst.

Eine sehr schöne Pflanze aus der gleichen Verwandtschaft, die unbedingt erwähnt werden muß, da sie durch die Gartenkunst bereits Bürgerrecht in der deutschen Flora erlangt hat, obzwar sie ursprünglich aus dem mittleren Amerika stammt, ist *Yucca*, die Palmillie, von deren etwa 20 Arten sich in unserem Klima nur *Y. filamentosa* L. zur Anpflanzung im Freien eignet. Die Pflanze ist außerordentlich ansehnlich (s. das Bild). Ihre einzelnen Blätter erreichen bis zu 60 cm Länge, und ihr Blütenstengel schießt gar bis zu 2½ m Höhe empor. Die Blüten selbst sind nicht besonders hübsch mit ihrem fahlen Weiß, das so wie bei *Gagea* auf der Außenseite der Blütenblätter ins Grünliche übergeht, aber der Gesamteindruck ist doch ein prächtiger und anziehender. In ihrer wahren Heimat gibt es noch dazu *Yucca*-Arten, die bis 10 m Höhe erreichen.

Milchstern (*Ornithogalum umbellatum* L.).
(Naturaufnahme von G. Dopfer-München.)

Die Palmlilie zeichnet sich durch eine große biologische Merkwürdigkeit aus, derzuliebe wir bei ihr länger verweilen müssen.

Die Bestäubung der Blüten wird nämlich ausschließlich durch eine Motte (*Pronuba*) bewirkt, wie schon im Jahre 1873 Riley entdeckte. Diese winzige Motte sitzt tagüber auf den *Juccablüten*, mit deren Farbe ihre Flügel merkwürdigerweise übereinstimmen. Des Nachts begatten sich die Tierchen. Hierauf kriecht das befruchtete Weibchen auf ein Staubgefäß und setzt seinen hierzu als besonderes Werkzeug umgestalteten Kiefertaster in so geschickter Weise in Bewegung, daß es den Blumenstaub zu einer Kugel festballt, die es zwischen Hals und Vorderbeinen einklemmt. So erzeugt die Motte durch wiederholten Besuch eine ihren Kopf an Größe übertreffende Kugel. Dann sticht sie mit ihrem Begeapparat in einer anderen Blüte den Fruchtknoten an und legt ihr Ei hinein. An derselben Blüte aber klettert sie dann bis zur Narbe empor und stopft in die Narbenhöhle von ihrem Blumenstaub eine mehr als genügende Menge, um die Befruchtung zu ermöglichen. Den weiteren Zusammenhang kann man sich leicht klarmachen. Die heranwachsende Larve frisst nicht alle heranwachsenden Samenanlagen, sondern nur einen Teil. Noch bevor die Samen reif sind, durchbohrt sie die Fruchtwand und läßt sich zur Erde herab, wo sie überwintert.

Im Frühling fliegt die Motte aus, gerade zur Zeit, da die Palmlilien blühen.

Jeder Kommentar würde die Wirkung abschwächen, die ein solches Wunder der Natur auf den Beschauer macht.

In die Verwandtschaft der *Yucca*-Arten gehören auch die Drachenbäume (*Dracaena*), die in Europa zur Tertiärzeit lebten, sich jetzt aber auf die heißen Landschaften der Alten Welt zurückgezogen haben. Erwähnenswert sind sie hier deshalb, weil von M. v. Humboldt ein Exemplar, das bei Orotava auf Teneriffa (kanarische Insel) wuchs und in Manneshöhe noch 15 m Umfang besaß, für die älteste aller Pflanzen gehalten wurde. Er schätzte es auf beiläufig 6000 Jahre, womit nur die

Yucca gloriosa in voller Blüte.
(Naturaufnahme von J. C. Peters + Graz.)

afrikanischen Affenbrotbäume wetteifern können. Leider hat im Jahre 1868 ein Sturm diesen ehrwürdigsten Zeugen, der so alt ist wie die menschliche „Geschichte“, zerstört.

Eine besondere Untergruppe der Liliaceen bilden Gewächse, als deren Leitpflanzen zwei Gartengewächse gelten können: der allbekannte Ruscus und der Spargel.

Der Spargel (*Asparagus officinalis*) ist eine einheimische Pflanze, die man an Waldrändern und Flußufern da und dort findet. Sie blüht von Juni an und reift

Ruscus androgynus L.
(Naturaufnahme von H. Topfer-München.)

schon im späten Sommer ihre roten Beeren. Das alles sind Dinge, von denen die Gemeinbildung fast gar nichts weiß. Sie kennt nur die ganz jungen, durch Lichtmangel vergeilten Triebe mit ihren Schuppenblättchen, d. h. das allererste unterirdische Entwicklungsstadium. Der Spargel hat einen ausdauernden Wurzelstock, der jeden Venz eine Menge solcher Triebe entsendet. Sie werden „gestochen“ und geben dann das überaus wohlschmeckende Gemüse, das im Mai, als Schwetzingen, Untertürkheimer, Braunschweiger Spargel und sonstwie bekannt, die Feinschmecker in freudige Erregung bringt.

Läßt man diese Triebe aber auswachsen, so entwickelt sich aus ihnen ein typisch xerophiles, meterhohes Gewächs, das nur aus Stengeln und winzigen Zweiglein zu bestehen scheint und seine Blätter auf kleine, braune Schuppen reduziert hat. Diese xerophilen Anpassungen deuten darauf hin, daß die Pflanze ihre wahre Heimat nicht bei uns,

sondern in regenarmen Ländern hat. Und wirklich sind von den etwa 100 bekannten Spargelarten 35 im trockenen Kapland, auch die anderen als kletternde Sträucher und holzige Büsche vornehmlich im Mittelmeergebiet verbreitet.

Eine solche Umwandlung von Zweigen zu assimilierenden Organen bezeichnet man bekanntlich als Cladodium. Daß es wirklich Zweige und nicht zweigartige Blätter sind, um die es sich hierbei handelt, geht schon daraus hervor, daß aus ihren Achseln niemals andere Blätter entspringen. Im Sommer brechen in großer Menge maiglöckchenartige, jedoch grüngelbe Blüten hervor, aus denen wieder Beeren hervorgehen, deren hochrote Farbe schon von vornherein auf Verbreitung durch Vögel schließen läßt.

Neben dieser Kuckspflanze haben aber verschiedene Spargelarten neuerdings den Blumentisch erobert. Diese Arten (*A. plumosus*, *Sprengeri* u. a.) stammen aus Natal und erfreuen als „Zierspargel“ mit dem feingliedrigsten Wuchs, im Sommer auch mit einer duftenden Blüentraube. Sie gehören zu den hübschesten Ampelpflanzen, die man empfehlen kann. Sie sind allerdings etwas anspruchsvoll. Für ein Westfenster mit nicht zuviel Sonne sind sie dankbar. Noch mehr für häufiges Sprühen und auch für Dunggüsse oder Erneuerung der obersten Erdschichten.

Die zweitgenannte Pflanze, nämlich *Ruscus aculeatus* L., gehört ganz der deutschen Westgrenze an und hat ihre eigentliche Heimat in Frankreich und im Mittelmeergebiet, von wo aus sie auch auf österreichisches Land übertritt. Sie hat strauchigen Wuchs und auffallend starre, lederartige, sogar durch Stachelspitzen bewehrte Bladodien. Es ist ein eigenartiger Anblick, wenn in ihrer Achsel die kurzstieligen Blüten hervorbrechen. Der myrtenähnliche Strauch hat den deutschen Namen Mäusedorn erhalten, wofür sich keine haltbare Erklärung finden läßt. Die moderne Industrie hat sich seiner bemächtigt seit dem Augenblick, da der Modegeschmack wieder an die Traditionen der Biedermaierzeit anknüpfte. Das in geeigneter Weise präparierte und lackierte Laub wird zur Krone von Kugelbäumchen, zu Kränzen und Leuchterreifen zusammengebunden, die, mit künstlichen roten Beeren besteckt, wirklich hervorragend dekorativ wirken.

An den Mäusedorn schließt sich eine reizende Pflanze der Frühlingswälder an, die unter dem Namen Schattenblümchen weit über die Kreise der botanischen Wissenschaft hinaus bekannt ist. Wie ihr botanischer Name *Maianthemum bifolium* [L.] D. C. andeutet, ist das überaus zarte Gewächs nur mit zwei herzförmigen Blättern ausgestattet. Wenn es nicht blüht, besitzt es in der Regel gar nur ein einziges Blatt. Besonders reizend ist die kleine, weiße Blüte, die sich zu Blüentrauben vereinigt, welche in dem Dämmerlicht weithin leuchten, in dem sich das Schattenblümchen am wohlsten fühlt. Es ist geradezu eine durchgängige Regel, daß solche in die Schattenplätze geratene Pflanzen besondere Anstrengungen machen, um sich in den Beziehungen, in denen sie auf Mithilfe anderer Lebewesen rechnen müssen, dennoch bemerkbar zu machen. Das erkennt man an der Schattenblume und ihrer nächsten Verwandten, dem Maiglöckchen (*Convallaria maialis* L.), in wahrhaft klassischer Weise. Die Blüten stehen in Trauben beisammen, sie verbreiten namentlich bei der Maiblume durchdringenden Wohlgeruch und sind von hellleuchtend weißer Farbe. Alle diese Eigenschaften locken befruchtende Insekten an, trotzdem die Pflanzen sich im Dickicht verstecken. In gleicher Weise erregen die in Rede stehenden Pflanzen Aufsehen mit ihren Früchten. Ihr Fruchtknoten entwickelt sich zu einer fleischigen Beere mit korallenroter Oberhaut. Wir wissen nicht bestimmt, welche Vögel dadurch angelockt werden, es unterliegt aber dennoch keinem Zweifel, daß es sich hierbei um eine ausgesprochene Lockfarbe handelt. Alle diese Waldliliazeen, wozu auch noch das Salomonsiegel (*Polygonatum verticillatum* All. im Gebirge, *multiflorum* All. und *officinale* All. in der Ebene) und die Einbeere (*Paris quadrifolia* L.) als die lieblichsten Vertreter des Frühlingssors im heimischen Laubwalde gehören, sind übrigens durch eine besondere Eigenheit ausgezeichnet, deren sich die gärtnerische Praxis, welche die Maiblumen heute zu Millionen in den Handel bringt, mit großem Nutzen bemächtigt hat. Gemeint sind hierbei die Wurzelstöcke dieser Pflanzen (s. das Bild), die dem Salomonsiegel sogar den Namen ver-

1 = *Convallaria majalis*. Ganze Pflanze mit Wurzelstock und einem Trieb, der sich erst im nächsten Jahre entfalten wird. 2 = Salomons-Siegel (*Polygonatum officinale* Ait.) in Blüte. 3 = *Paris quadrifolia* in Blüte. Daneben *Actaea spicata* in ihrer natürlichen Verfassung. (Naturaufnahmen von Prof. Dr. D. Seinedt [1], H. Dopfer [2] und J. Hartmann [3]).

schaft haben. Dieses Rhizom besitzt Transversalgeotropismus, es ist sogar das klassische Beispiel dafür, d. h. es wächst in der Erde stets wagrecht und nicht abwärts, wie eine Hauptwurzel. Aus ihm aber brechen jeden Lenz negativ geotrope Triebe hervor, die, mit einem Hüllblatt fest umwickelt, unversehrt die harte Erde durchdringen können. Aus ihnen gehen die Blätter hervor, bald nur zwei große, wie bei der Maiblume, oder eine ganze Reihe von halb stengelumfassenden, zu zweien zusammenstehenden Blättern wie bei *Polygonatum* (siehe das Bild) oder aber vier Blätter in einem Quirl, was Paris den Namen verschaffte (siehe das Bild).

Diese Blätter sterben samt dem Sproß ab, und an dem Wurzelstock bleibt eine Narbe zurück, die mit einiger Phantasie mit einem Siegelabdruck verglichen werden kann (Salomonsiegel). Man kann also an dem Wurzelstock aus diesen Narben ablesen, wie viele Sommer er schon miterlebt hat.

Als mehrjährige Gewächse treiben aber die Maiblumen und ihre Verwandten nicht bereits im ersten Jahre Blüten. Besonders bei der erstgenannten Liliacee (auch bei *Polygonatum*) entwickelt die unterirdische Keimpflanze im ersten Jahr nur Niederblätter; im zweiten und dritten Jahre folgen Laubblätter, und erst dann entfalten sich auch Blüten.

Wie uns aber Frmisch, ein heute fast ganz vergessener, einst jedoch hoch angesehener Botaniker des Vormärz, zuerst mitteilte, blühen die Maiglöckchen in der Natur nicht jedes Jahr, sondern treiben nach den Laubblättern wieder Niederblätter und erst nach 2—3 Jahren einen neuen Blüten-

stand. Auch in blütenbiologischer Beziehung verdienen die in Frage stehenden Gewächse vollste Aufmerksamkeit.

Das liebliche Glöckchen von *Convallaria* vollführt vor dem Aufblühen eine kennzeichnende gamotrope Bewegung. Wozu tut es dies? Der Blütenstiel neigt sich so, daß die schöngesackte, glockige Blütenhülle sich nach abwärts öffnet. Dies ist kein Reflex, da er durch keinen besonderen Reiz automatisch ausgelöst wird, sondern es ist eher mit einer Instinkthandlung zu vergleichen. Jedenfalls ist der Effekt ein zweckmäßiger, denn die Glockenhülle gewinnt nur dadurch funktionellen Wert als schützendes Dach für Pollen und Nektar bei Regenwetter. Bemerkenswert ist auch die einseitige Wendung aller Blütenglöckchen, eine Anisotropie, die wesentlich zum Auffälligerwerden des gesamten Blütenstandes beiträgt.

Bei *Polygonatum* hat die Blütenhülle ähnliche Gestalt (s. das Bild), nur ist sie langgezogen und bei weitem nicht so hübsch wie die der Maiblumen. Für den kausaldenkenden Naturfreund bietet der Aufbau des Blüten sprosses dieser Pflanze reichlich Anlaß zu lehrreichen Reflexionen. Ein Blick auf unser Bild genügt, um den merkwürdigen gestaltlichen Zusammenhang zwischen Blatt-, Blütenstellung und Krümmung der Sproßachse zu erraten. Die letztere könnte noch eher rein passiv als Lastkrümmung aufgefaßt werden. Physikalisch unverständlich aber ist, daß die kurzen Laubblätterstiele alle nach aufwärts, die Blütenstiele mit mathematischer Regelmäßigkeit erdwärts gekrümmt sind. Verlieren wir es doch nicht aus dem Gedächtnis, daß diese Stellungen von vornherein durch die Pflanze selbst bestimmt werden, daß, wenn also ein zweckgerechter Effekt zustande kommt, die Pflanze sein aktiver Erzeuger war durch ihre aktiven Wachstumsbewegungen!

Rein blütenbiologisch interessant ist wieder das häßlich eigenartige Blümchen der Einbeere. Diese Pflanze hat eine sehr komplizierte Blüte, die man, abweichend von allen anderen Siliaceen, als Skelblume betrachten muß, die Fliegenbesuch angepaßt ist. Sie schreitet erst dann, wenn entsprechender Besuch ausbleibt, zur Selbstbefruchtung, indem nun die anfangs von der Narbe abstehenden Staubbeutel durch eine entsprechende Krümmung der Staubfäden an die Narbe selbsttätig angelegt werden! Normalerweise ist sie protogyn und schon durch die düstere, fleischähnliche Farbe der Blüte geeignet, die Aufmerksamkeit der Fliegen auf sich zu ziehen.

Paris gehört durch ihren Wurzelstock zu den ausdauerndsten Besiedlern des heimischen Laubwaldes und gibt durch die auffällig wagrechte Stellung der Flachblätter dem Lehrer ein nettes Demonstrationsobjekt für eine typische Schattenpflanze ab. Übrigens hat sie schon manches Unheil angerichtet durch ihre schwarze, glänzende „Einbeere“, die hochgiftig ist, aber Unerfahrenen sich als sehr appetitliche Frucht vorstellt.

Bemerkenswert ist auch, in welcher ausgeprägter Weise die Vierzahl den Bau dieser Pflanze beherrscht. Sie hat nicht nur vier Laubblätter, sondern auch ein Perigon, das aus vier grünen äußeren und vier inneren gelblichgrünen Blättern gebildet wird. Ihren 8 Staubblättern entspricht ein vierfacher Fruchtnoten und demgemäß auch eine vierfacherige Beere. Dies trifft jedoch nur für die einheimische Art zu, da die Einbeeren im Kaukasus und Himalaja andere Symmetrieverhältnisse aufweisen.

Wenden wir uns nun der nächsten Familie zu, die laut dem Programm dieser Abteilung unseres Werkes in Betracht kommt, so haben wir nun Vertreter der Amaryllidazeen zu betrachten.

Die erste hier darzustellende Gattung kennt jedermann als ersten Frühlingsboten. Es ist das Schneeglöckchen (*Galanthus*), von dessen südöstlichen Formen in Mitteleuropa nur *G. nivalis* L. gedeiht (s. das Bild). Aus seiner Betrachtung ersehen wir, daß auch die Amaryllidazeen Zwiebelpflanzen sind, die wiederholt blühen. Ihre prächtige, auffällige Blüte verweist auf Insektenbesuch, ihr ganzer Wuchs und ihre Lebensweise,

Galanthus nivalis in voller Blüte.
(Naturaufnahme von J. Hartmann-Tresden.)

die sie Trockenheit leicht ertragen läßt, befähigt sie, sich in der Steppe anzusiedeln, wo ihre wahre Heimat zu sein scheint.

Galanthus ist als Bewohner der Auwälder nur besonders angepaßt, befindet sich aber eigentlich auch so unter Umständen, die denen des Steppenlebens ziemlich nahekommen. Denn der noch meist gefrorene Boden verfehlt sie auch in physiologische Trockenheit, und die Blütezeit im Vorfrühling hebt alle sonstigen Einflüsse des Waldstandortes auf. Überrigens geht die Pflanze mit Vorliebe auch auf Wiesen.

Wie alle Zwiebelpflanzen, ist das Schneeglöckchen befähigt, sich durch seine Reservestoffe in gewissem Grade von dem Klima unabhängig zu machen und bereits im Herbst mit seinem Trieb an der Erdoberfläche zu erscheinen. So wie die Tulpe, durchbricht dieser Trieb mit hartem, scheidigem Hüllblatt die gefrorene Erde. Eine interessante Anpassung finden wir bei diesem Vorgang an blühreifen Pflanzen. Die Blüte ist bei ihnen zwischen die an das Licht empordrängenden Blätter eingeklemmt, und um ihr Plaz zu schaffen, sind diese mit tiefen Rinnen versehen, die den Blättern nicht blühender Pflanzen fehlen. Es ist allerdings noch nicht untersucht, ob es sich hier nicht um eine sogen. Mechanomorphose, d. h. um eine durch rein mechanische Ursachen (Druck) erzwungene Formumgestaltung, handelt, analog jenen verwunderlichen Abnormitäten, die geboren werden mit scheinbar überzähligen Füßen oder Zehen, wenn der Fötus im Mutterleib durch falsche Lagerung an unrichtigen Stellen einem Druck ausgesetzt war.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern der Familie trägt das Schneeglöckchen nur eine einzige nickende Blüte. Seine Fortpflanzung ist also gewissermaßen

auf eine einzige Karte gestellt. Wer die Natur der Pflanzen kennt, den wird es unter botanischen Umständen nicht wundernehmen, daß gerade eine solche Blüte mit besonders raffinierten Anpassungen ausgestattet ist. Wie es Prof. Schmeil an einer Stelle seiner Werke hübsch ausdrückt: „Diese unscheinbare Blüte ist ein vollendetes Kunstwerk, wie es menschlicher Scharfsinn kaum auszudenken vermöchte.“

Nach den Untersuchungen von Askenasy an der Kirschlorbelle konnte man schließen, daß deren Entwicklung ziemlich unabhängig sei von den Wechselfällen des Winters. Bei dem Schneeglöckchen lehrt Erfahrung so ziemlich das Gegenteil. Die von einer Blütenhülle umhüllten Knospen entwickeln sich so lange nicht, bis ihnen nicht andauernd günstige Witterung eine erträgliche Blütezeit gewährleistet. Unter Umständen bleiben sie sogar wochenlang darunter verborgen.

Zu Beginn des Aufblühens ist das schneeige Glöckchen nach aufwärts gewendet; in dem Augenblick, da der Pollen reif ist, hat sich aber auch die instinktive Abwärtskehrung vollzogen. Der sehr trockene Blütenstaub mußte durch das Glöckchen gerade bei dem feuchten Vorfrühlingswetter besonders gut verwahrt werden.

Galanthus ist insektenblütig und besitzt demgemäß folgende Anpassungen: die drei inneren Blätter der Blütenhülle mit dem bekannten sichelförmigen, grünen Fleck scheiden an der Innenseite in sogen. Septaldrüsen, d. h. entlang von Längsstreifen, Honig aus. In die durch sie gebildete Röhre, in der auch der Griffel steht, muß daher der Besucher eindringen. Er erschüttert die Staubbeutel, bestäubt sich und überträgt den Pollen so an die Narbe der nächsten Blüte. An besonders kühlen Tagen oder bei Eintritt von Schneewetter beteiligen sich auch die äußeren Blütenhüllblätter am Schutz des Ganzen, denn sie, die sonst als Schauapparat weit abgespreizt sind, schlagen sich dann nach einwärts und verschließen die Blütenröhre.

Von sonstigen Schutzvorrichtungen der Pflanze wäre noch zu erwähnen, daß sie giftig ist. Ihre von Mäusen bedrohte Zwiebel, die reichlich Brutzwiebeln von sich abläßt, wirkt nämlich als scharfes Brechmittel.

Wohl nur der geringste Teil jener, die sich an dem zauberischen Bild eines mit weißen Schneeglöckchensternen übersäten Aulickichts ergötzen, haben sich je gefragt, wo denn die Früchte seien, die aus diesem Blütenmeer reifen müssen. Sie sind im Mai und Juni nicht weniger massenhaft vorhanden, nur verschwindet die dunkel blaugrüne Fruchtkapsel ganz in der grünen Wildnis des pflanzenreichen Aulickens. Verbreitet werden die Samen angeblich besonders von Ameisen, da sie, so wie der Weizenkorn, einen eßbaren, fleischigen Anhang besitzen. Jedenfalls verfügt die Pflanze über genügende Verbreitungsmittel, denn wenn sie auch — noch unerklärterweise — nur in gewissen Gebieten vorkommt (so in den Donauauen, in Schlesien, Westpreußen, Posen, am Rhein, seltener aber in Süddeutschland), so ist sie doch dort in unermesslicher Heerschar verbreitet.

Eine verwandte Pflanze, die man häufig mit dem Schneeglöckchen verwechselt, ist *Leucojum vernum* L., das in den Vorgebirgen das Schneeglöckchen ersetzt und in einer anderen Art (*L. aestivum* L.), im Mai bis Juni auf Auwiesen blühend, mit Recht den poetischen Namen Sommertürchen führt. Im gewissen Sinne ersetzen die Leukoien, deren sich neuerdings auch die Gartenliebhaberei bemächtigt hat, die wahren Schneeglöckchen. In vielen Orten blühen sie, während dort *Galanthus* fehlt.

Daher rührt auch die Verwechslung. Die botanische Fachsprache bezeichnet ein solches gegenseitiges Sichvertreten als *Vikariieren* und kennt dafür eine ansehnliche Zahl Beispiele.

Es ist übrigens verwunderlich, warum die Gärtner noch nicht versucht haben, mehrere der südeuropäischen *Leucoien* in den Handel zu bringen. Es gibt sehr zierliche Frühblüher darunter, die als Frühlingsboten sicher rasch Freunde fänden, darunter besonders das reizende *L. roseum* Lois., das alle Anmut unserer heimischen Frühlingsknotenblumen mit einer wunderbar rosafarbenen Blütenglocke vereinigt. Es bei

Gelbe Narzissen mit enorm entwickelter Pseudocorolla. (Nach einer Photographie von Voigtländer & Sohn, Braunschweig.)

uns einzubürgern, würde nicht mehr Schwierigkeiten machen als die Verpflanzung der verwandten *Amaryllis* *Belladonna* L., die heute zum eiserernen Bestand des Liebhabergartens gehört und ursprünglich doch auf den Gebirgen des Kaplandes und der kanarischen Inseln zu Hause ist. Zweifels- ohne sind auch die hier zu erwähnenden Narzissen (*Narcissus* L.) durch die Blumenfreunde zu der Verbreitung gekommen, die sie jetzt besitzen. Wild wachsen sie in Spanien, Italien und den an das Mittelmeer angrenzenden Gebirgen Nordafrikas. Von dort sind sie in zahlreichen Arten und Abarten (man unterscheidet jetzt an 30 Arten, über deren systematische Berechtigung jedoch gestritten wird) in der ganzen Kulturwelt verbreitet worden und so leicht verwildert, daß z. B. die Narzissenwiesen der Schweizer Berge, namentlich um Montreux (s. unsere Farbentafel), eine berühmte Frühlingssehenswürdigkeit sind. Auch in Japan sind die

Jonquillen (*N. Jonquilla* L.) und Tazetten (*N. Tazetta* L.) zu einem Bestandtheil der wilden Flora geworden. Es ist also diese Gattung so recht ein Beispiel, wie unmöglich es ist, die Grenze zwischen einheimischen und ausländischen Pflanzen zu ziehen. Wenn in diesem Werke versprochen wurde, in den floristischen Lebensbildern 250 einheimische Blütenpflanzen ausführlicher zu schildern, so darf diese Auswahl natürlich nicht in solch einseitiger Weise getroffen werden, daß dadurch die zahlreichen schönen, merkwürdigen, allbekannten und durch Gartenkunst geradezu einheimisch gewordenen Ausländer, wie sie namentlich die Orchideen in großer Zahl stellen, oder Musa, Gladiolus, Agave, Narzisse, Tulpe, Hyazinthe und viele andere ins Hintertreffen geraten, zumal weil es unmöglich ist, sie, die durchaus nicht immer den Tropen angehören, anderswo als dort zu behandeln, wo Verständnis der Gesamtheit der Lebenserscheinungen und systematischer Zusammenhang es ohnedies erfordern.

Es ist also von unserem Gesichtspunkte aus ohnedies ein müßiger Streit, ob die gelbe Narzisse (*N. pseudonarcissus* L.) auf mitteleuropäischen Bergwiesen wirklich wild vorkommt, wie von manchem Gelehrten verfochten wird. Sie ist jetzt bei uns weitverbreitet, in Gärten und Blumenhandlungen jedermann vor Augen, auch schmückt sie verwildert viele Landschaften, wir haben also die Pflicht, ihrer ausführlich zu gedenken. Bietet sie doch auch blütenbiologisch nicht wenig Interesse dadurch, daß die Blüten verschiedener Arten völlig umgeformt sind, je nachdem sie auf Hummel- oder Falterbesuch rechnen. Es sind nämlich in allen Narzissenblüten die Blätter der Blütenhülle zu einer Röhre verwachsen. An der Mündung dieser Röhre erhebt sich aber eine zweite Blütenhülle, meist prächtig gefärbt und offenbar Schauzwecken dienend. Sie wurde Nebenkronen (*Paracorolla*) genannt. Als mächtiger Becher (siehe das Bild) ist sie bei vielen Narzissenarten entwickelt, übertrifft sogar die Blütenhülle an Größe. Sie kann sich wie eine zweite der ersten aufgesetzte Blüte entwickeln, verschiedene Lappen aussenden, zierlich gekraust oder ganzrandig sein. Bei *N. Pseudonarcissus* ist die *Paracorolla* groß, die Blütenröhre selbst ganz kurz. Die Blüte ist also der Befruchtung durch Hummeln angepaßt, wie ein wenig Nachdenken belehrt. Bei der echten und mit Recht als „die poetische“ bezeichneten Narzisse (*N. poeticus* L.) hingegen ist die Nebenkronen niedrig, die Blütenröhre selbst lang und eng. Mit anderen Worten, sie ist dem langen Saugrüssel der Tagfalter angepaßt. Da es nun längst bekannt ist, daß diese mit Vorliebe rote Blumen besuchen, so scheint auch die Tatsache ihre biologische Erklärung gefunden zu haben, daß gerade die Nebenkronen der Faltarnarzissen einen scharlachroten, weithin leuchtenden Saum trägt. Dazu duften diese Blüten noch besonders stark, was ebenfalls nur aus blütenbiologischen Gesichtspunkten verständlich gemacht werden kann.

Wir haben bereits bei der Kulturgeschichte der Tulpen dessen gedacht, daß die Holländer auch die Narzissen (namentlich die Jonquillen) zu einem Gegenstand der Börsenspekulationen machten. Außerdem wußte sie die frühere Zeit als Medizinalgewächs (namentlich die Zwiebeln) zu schätzen. Dies haben wir verlernt, wohl aber gewinnen die Narzissen nun als Zimmerpflanze wieder erhöhte Beachtung, blühen sie doch als Nachklang der Lebensgewohnheiten ihrer südlichen Heimat bereits vom Januar bis zum April.

Besonders schätzt man jetzt neben der Dichterblume die Tazetten, welche daran kenntlich sind, daß ein Schaft mehrere wohlriechende, weiße oder blassgelbe Blumen treibt; ferner die Osterblumen (*N. Pseudonarcissus*), die mit ihren goldgelben, meist gefüllten Blütenkelchen und ihrer stattlichen Erscheinung das Auge besonders erfreuen. Auch die Jonquillen haben viele Liebhaber, duften sie doch besonders angenehm und machen die Kleinheit ihrer goldgelben Blüten immerhin dadurch wett, daß auch sie mehrere Blüten an einem Schaft emporheben. — Die Pflege der Narzissen ist ganz ähnlich wie die der Hyazinthen. Als allgemeine Kulturregel möge man folgendes beachten: In einen Topf legt man gewöhnlich im Oktober drei Zwiebeln*, bedeckt sie bis an den Hals mit Erde und hält sie gleichmäßig feucht, aber nicht zu warm. Erst gegen die Blütezeit bedürfen sie der Sonne, aber auch dann nicht mehr als etwa 10° R Wärme. Die Narzissen vermehren sich zwar durch Brutzwiebeln, doch tut der Blumenfreund gut daran, jährlich neue (keine durchlöchernten, denn diese blühen nicht) Zwiebeln zu kaufen.

* Marseiller Tazetten, die im August gelegt werden, blühen sogar schon um Weihnachten!

Zu den fremdländischen Amaryllidazeen, die in unseren Gärten eine neue Heimat gefunden haben, gehören auch mächtige Gewächse, von denen man diese Verwandtschaft nicht voraussetzen würde, trotzdem sie offen genug zutage liegt, wenn die Pflanzen blühen. Das sind die Vertreter der Agavoidengruppe, die „Wunderbaren“, wie ihr griechischer Name besagt, den sie mit vollem Recht führen. Die Heimat aller dieser Gewächse, von denen wir nur *Agave* und *Fourcroya* aufführen wollen, ist Mexiko, doch gilt auch für sie das vorhin über den Kreis der hier zu behandelnden Pflanzen Gesagte. Beide Amaryllidazeen sind in Italien, Dalmatien, Istrien, Südtirol, also im südlicheren Österreich und in der Schweiz so vollkommen eingebürgert, daß sie vielerorts einfach Charakterpflanzen der Landschaft geworden sind, ja man hat sie sogar im südlichen Deutschland, in den Main-, Rhein- und Neckargegenden zu einer Freilandpflanze gemacht, so daß es ein Gebot der Notwendigkeit ist, sie hier zu behandeln. Der Nichtbotaniker ist ohne weiteres geneigt, die *Agave* (etwa 50 Arten, davon *Agave americana* L., *A. mexicana* Lam. die bekanntesten) als eine Verwandte der Kakteen zu betrachten auf Grund ihrer dickfleischigen, blaugrünen Blätter, die noch häufig mit furchtbaren Dornen am Rande wie eine Säge bewehrt sind. Die *Agaven* sind eben infolge des wahrhaften Wüstenklimas, in dem sie leben, echt xerophile Gewächse geworden. Ihre Tracht ist nur durch die gleiche Ursache hervorgerufen, wie die der mit ihnen gar nicht verwandten Kakteen. Man nennt derlei eine Konvergenzerscheinung; sie hat ihr Gegenstück im fischähnlichen Habitus der Delphine und Wale, die doch echte Säuger sind.

Die *Agaven* werden in ihrer Heimat hochgeschätzt, namentlich als Gespinstpflanze, und angesichts dessen, daß auf den dalmatinischen Gestaden und Inseln die Pflanze ohne jede Pflege massenhaft gedeiht, könnte auch dort durch sie gerade der steinigste Boden doch noch zinstragend gemacht werden. Dieses Nutzens halber wurde sie gleich nach der Entdeckung Mexikos nach Spanien verpflanzt und verbreitete sich von dort an alle Küsten des Mittelmeeres. Immerhin ist sie in Italien zur Renaissancezeit noch unbekannt gewesen, und es ist ein drolliger Anachronismus auf den Bildern mancher Maler, die Renaissanceeszenen in eine mit *Agaven* staffierte „echt italienische“ Landschaft malten. In ihrer Heimat ist die *Agave* übrigens nicht nur wegen ihrer Bastfasern geschätzt, sondern wahrhaft beliebt als Quelle des mexikanischen Nationalgetränkes. Schneidet man den jugendlichen Schaft ab, so beginnt nämlich ein so mächtiger Fluß eines aromatisch-süßen Saftes, daß, wie *Par* versichert, eine einzige große *Agave* täglich 4—5 Liter, insgesamt aber etwa 1100 Liter Saft liefern kann. Diesen läßt man gären und gewinnt eine Art Wein (*Pulque*), an dem sich der gemeine Mexikaner berauscht.

Dies alles rechtfertigt aber noch nicht den Namen der „Wunderbaren“. Die alten Botaniker staunten die *Agaven* deshalb so an, weil sie, ungemein langsam wachsend und jedes Jahr nur 2—3 Blätter treibend, dennoch bis an 20 m Höhe erreichen, wie z. B. eine solche *Fourcroya* bekannt ist, die wie ein mächtiger Pandanusbaum aussieht, und deren Alter auf etwa 400 Jahre geschätzt wird. Man bezeichnet im Volksmunde *Agave americana* L. gewöhnlich als „hundertjährige Aloe“. Dieser Name hat immerhin dadurch Berechtigung, daß manche dieser Gewächse wirklich an 100 Jahre brauchen, bis sie ihren mächtigen Blütenstand treiben. Und zwar dann plötzlich binnen wenigen Wochen in den staunenswertesten Massen und Dimensionen. *Martius* erzählt, daß der hauptsächlich des Nachts wachsende Blütenstand von *Fourcroya* bei 10—15 m

Höhe an $1\frac{1}{2}$ Millionen Blütenblätter erzeugt, nachdem in den ersten 500 Jahren insgesamt kaum 3000 Blätter erwachsen waren. Nach solcher Anstrengung kann es nicht wundernehmen, daß die Pflanzen nach ihrem Blütenmond absterben, trotzdem sie baumartig sind.

Die nächste große Gruppe der Lilienpflanze stellt uns wieder manchen lieben heimischen Bekannten vor Augen, so die Schwertlilie (*Iris*) des Teichrandes und des Gartens oder den Frühlingskrokus.

Die Fritidazeen stellen einen ziemlich in sich geschlossenen Verwandtschaftskreis dar, der höchstens noch mit den Amaryllisgewächsen einige Beziehungen aufweist. Während einige Formen, so der gemeinbekannte Krokus oder die Gladiolen der Gärten, die Zusammengehörigkeit mit lilienartigen Gewächsen leicht vermuten lassen, bietet der Blütenbau der Schwertlilie so viel des Fremdartigen, daß wir diese Pflanze schon deshalb liebevoller schildern müssen.

Iris pseudacorus L., die Wasser-schwertlilie, hat an ihrem Standort zwischen dem üppigen Pflanzenwerk am Ufer der Gewächse von vornherein mit der Schwierigkeit zu kämpfen, ihre Blüten den Insekten sichtbar zu machen. Dazu dienen ihre übermeterhohen Langtriebe, aus deren Blattachseln die Blütenstiele entspringen. Die Blüte selbst ist noch längere Zeit durch Hüllblätter geschützt. Wenn sie sich entfaltet, bemerkt man an den Blumenblättern eine Reihe merkwürdiger Sonderanpassungen, die Prof. Schmeil, der unübertreffliche Neubeleber des deutschen Naturgeschichtsunterrichtes, in folgender Weise schildert: „Die sechs leuchtend-gelben Blätter der Blütenhülle sind im unteren Teile zu einer Röhre verwachsen, die dem unterständigen Fruchtknoten aufsitzt. Sodann sind die mit einem braunen Flecke (Saftmal!) gezeichneten Blätter des äußeren Kreises groß und mit dem breiten Endabschnitte schräg nach außen gebogen, während die kleinen Blätter

Blüte von *Iris pseudacorus* L.
(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Schmeil-Alzen.)

Prof. Dr. D. Schmeil,
der Neubeleber des biologischen Unterrichtes.

des inneren Kreises aufrecht stehen. Ferner ist von den beiden dreiblättrigen Staubblattkreisen der Lilienblüte nur der äußere vorhanden, und endlich teilt sich der Griffel in drei blumenblattartige, zweizipfelige Äste. Diese Gebilde helfen die Auffälligkeit der Blüte erhöhen und dienen den Staubbeuteln als schützendes Dach. Auf ihrer Unterseite bemerkt man je ein kleines Lappchen, dessen (in der Ruhe angedrückte) Oberseite die Narbe darstellt (vgl. die Tafel zu Bd. II, S. 264).

Im unteren Teil der Röhre findet sich der Honig. Zu ihm führen unter jedem Griffelaste zwei Kanäle, die für einen dünnen Insektenrüssel gerade weit genug sind.“

Man erkennt aus diesen Einrichtungen schon den einzig möglichen Weg des Blütenbesuches. Der Gast muß sich auf einem der großen Blütenblätter niederlassen und unter den Griffelast zwingen, dabei notgedrungen das Narbenlappchen berühren. In dieser Stellung aber wird er zugleich von den Staubbeuteln bepudert, trägt also den Pollen gerade an passender Stelle in die nächste Blüte. Da nun die Entfernung zwischen einem großen Blatt der Blütenhülle und dem dazugehörigen Narbenast gerade so groß ist, um eine Hummel oder Schwebefliege durchzulassen, ließ sich von vornherein erwarten, daß dies die Bestäuber seien. Durch direkte Beobachtung hat dies H. Müller auch festgestellt. Und interessanterweise hat sich hierbei ergeben, daß je nach dem Besucher die Blütenformen in zweckmäßiger Weise anders gestaltet sind.

Vergleichende Untersuchungen mit den tropischen Iridazeen haben ergeben, daß bei diesen Blüten die Tendenz zur Unterdrückung, d. h. mangelhaften Entwicklung, der inneren Perianthabschnitte vorhanden sei. Prof. Heinricher fand, daß diese Teile auch bei Iris sehr spät, erst nach den Staubblättern angelegt werden. Hieraus konnte man dann darauf schließen, daß diese Formen schon von Insekten befruchtet wurden, bevor noch alle Blütenteile vollentwickelt waren, worauf dann die Pflanze die überflüssigen Organe überhaupt einsparte. Iris ist übrigens auch ein Paradebeispiel für den Nutzen, den die Fremdbestäubung den Pflanzen gewährt. Needham, ein neuerer amerikanischer Forscher, sagt hierüber, daß bei künstlicher Selbstbestäubung nur 19,5% der Samenanlagen befruchtet wurden, bei künstlicher Kreuzung dagegen 93,7%. Interessanterweise fand er, daß auch der Standort hierbei großen Einfluß habe. Pflanzen, die in warmen Wiesentümpeln wachsen, sind am fruchtbarsten, solche, die in kaltem Wasser gedeihen, blühen spät und bleiben häufig unfruchtbar.

Knuth gibt nach diesem Forscher auch eine sehr ansprechende Schilderung, in welcher Weise zahlreiche Insekten es verstehen, sich des Honigs der Irisblüte zu bemächtigen, ohne die Befruchtung zu vollziehen. Es heißt bei ihm: „Die Zahl der im Laufe der gesamten Blütezeit sich an der „Blauflagge“ (blue flag nennt man Iris in Nordamerika) einfindenden Honigdiebe war eine beträchtliche. Von Tagfaltern waren 6 Hesperiden und 2 Nachtschmetterlinge am häufigsten. Erstere setzten sich behufs Ausbeutung des Honigs an die Außenseite der Blütenröhre und versuchten von dort in schräger Richtung ihren Rüssel zwischen einem Kelchblatte und der Basis des zugehörigen Griffelblattes in eines der Saftblätter einzuführen, ohne daß dabei die weit entfernten Bestäubungsorgane (Narbe und Anthere) berührt werden konnten. Wie die Käfer, pflegten auch die Falter meist die richtige Anflugstelle zu verfehlen und lassen sich gleich diesen im Blütenzentrum da nieder, wo die radiär gerichteten Farbstreifen der Griffelblätter ein Saftmal vortäuschen; während nun die vollkommen der Blüte

angepaßten Besucher, durch das richtige violett- und gelbgefärbte Saftmal des Perianths geleitet, sofort die Honigquelle aufzufinden vermögen, gelingt das den unnützen Blumen-
gästen nur ausnahmsweise, so daß Reedham eine Täuschung derselben durch die
falschen Saftmallinien anzunehmen geneigt ist. Tatsächlich gelangen aber viele Falter
beim Fortklettern über den Rand eines Kelchblattes schließlich an die Außenseite der
Blumenröhre, wo sie ihre Honigdiebstähle in der schon erwähnten Weise ausführen.

Auch *Mononychus vulpeculus* F. ist ein eifriger Honigräuber, der mit seinen Mundteilen das
Nektariumgewebe anbohrt, so daß etwas Honigsaft ausfließt. Die
feinen, von ihm gemachten Einstich-
löcher werden auch von zahlreichen
Musziden, Hemipteren (7 Arten),
anderen Käfern (7 Arten), einigen
kleinen Apiden (*Prosopis*),
Ameisen und Mücken zu fortgesetz-
ten Honigdiebstählen benützt.“

Wie man sieht, ist also die
Zweckmäßigkeit einer solchen Blüte
durchaus nicht eine absolute, son-
dern nur eine beschränkte, ange-
strebte, und das ist mit einer der
unerschütterlichsten Gründe,
warum auch die Ursache der Zweck-
mäßigkeit nicht im Absoluten, son-
dern nur in einem beschränkten
Vermögen zu suchen ist. Beschränkt
zwecktätig ist aber nur die psychische
Funktion, darum kann man nur
mit ihr allein das Geschehen in
einer Pflanzenblüte in Analogie
bringen.

Siegwurz (*Gladiolus* sp.), Gartenvarietät. (Nach einer
Photographie von Voigtländer & Sohn, Braunschweig.)

Die Vegetationsorgane der Schwertlilie bieten nicht mehr so viel des Merkwürdigen wie ihr Blütenleben. Ihr Wurzelstock kriecht horizontal im Schlamm. Die
schwertförmigen Blätter sind auf das auffälligste mit ihren Ranten senkrecht gerichtet.
Sie stecken wirklich wie Schwerter im Boden (Bild Bd. II, S. 241). Man hat das als
xerophile Anpassung gedeutet, worauf auch die blaugrüne Farbe und derbe Konsistenz
dieser Blätter verweist. Sie sind denn auch tatsächlich mit einem Wachsüberzug versehen.

Wenn man sich nun auch sagt, daß das Leben in kaltem (weil nassem) Boden
auch den Schwertlilien die Wasseraufnahme ebenso erschwert wie z. B. den Moos-
pflanzen und sie dadurch zu Schutzmitteln gegen zu heftige Transpiration zwingt (als
solches kann die senkrechte Stellung der Blätter, welche die Sonnenstrahlen abgleiten
läßt, aufgefaßt werden), so sind diese Verhältnisse nicht völlig zu beurteilen, solange

man nicht die fremdländischen Verwandten der einheimischen Schwertlilie kennt. Auch daraus erkennt man also, daß sich unsere floristischen Lebensbilder nicht nur auf einheimische Pflanzenarten beschränken dürfen. Das Wesen dieser wird oft nur durch die Kenntnis der ausländischen Gewächse verstanden, denn die Pflanzenwelt ist eine Einheit und kennt keine politischen Grenzen. Die Pflanze ist außerdem ein historisches Wesen. In Urzeiten sind Tropenpflanzen bei uns eingewandert und haben sich später akklimatisiert, oder einheimische sind nach Übersee gelangt, haben dort unter veränderten Verhältnissen neue Eigenschaften entwickelt, die uns erst Aufschluß über ihre wahre Befähigung geben. — Wenn man diese allgemeinen Betrachtungen auf die Schwertlilie anwendet, so geben uns die asiatischen und mediterranen Verwandten als Steppe- und Felsenpflanzen sofort Aufschluß darüber, daß die Notwendigkeit xerophiler Anpassungen bei *Iris* auch stammesgeschichtlich verständlich sei. Von den etwa 100 Arten der Gattung sind nur *Iris Pseudacorus*, *florentina* und *germanica* durchaus Bewohner sumpfiger Standorte, die übrigen, meist kleineren und weniger hübschen Arten mischen sich von Mähren bis Sibirien meist in den Frühlingsflor der Steppen oder verschönern die Macchien der Inseln im Mittelmeer. So bewohnt z. B. die als Beeteinfassung gern benützte *I. pumila* in ihrer Heimat die dürrsten Felsen.

Auch die Verbreitung der braunen, flachen Samen durch den Wind deutet darauf hin, daß die Irideen ursprünglich Steppenbewohner sind. Da die Samen aber auch eine „Schwimmlase“ in Form eines luftgefüllten Hohlraumes besitzen, gehen sie auch dann nicht zugrunde, wenn sie in das Wasser geweht werden.

Die Gärtner haben eine sehr große Zahl von Arten (außer den schon genannten noch *I. susiana*, *persica*, *alata*, *Lortetii* u. a.) herangezüchtet und die schönsten Farbenvarietäten erzielt. *Iris* ist so ziemlich die einzige Blume, aus der man auch graue und fast ganz schwarze Blüten züchten kann. Man kann aber nicht eben behaupten, daß diese „Damen in Trauer“ oder „Trauernden Schönen“, wie sie genannt werden, wirklich besonders reizvoll wären, und sie haben denn auch nicht allzuviel Freunde.

Neben der Schwertlilie gibt es in ihrer Familie noch eine Pflanze, die mit unserer Naturfreude aufs innigste verwachsen ist. Das ist der *Crocus*. Gewissermaßen einen Übergang zwischen beiden stellt das schöne, aber seltene Blümchen des südöstlichen Europas dar, das Schur seinerzeit als *Crociris* bezeichnete, und von dem wir hier ein Bild vorlegen könnten, das wir dem botanischen Eifer und der Liebenswürdigkeit von Prof. J. Römer verdanken, der es in den schönen Bergen seiner siebenbürgischen Heimat aufnahm, zu deren floristischen Spezialitäten *Crociris* gehört, wenn es in seiner Feinheit wiederzugeben wäre. Erscheinung und Wuchs von *Crocus* zu schildern, ist wohl überflüssig, so sehr kennt jedermann, wenigstens aus den städtischen Anlagen, diesen buntesten aller Frühlingsboten, den der Unkundige, besonders in den zahlreichen violetten Herbstblütlern (wie *Crocus sativus* L., *Cr. speciosus* M. B. u. a.), zu leicht mit Herbstzeitlosen verwechselt. Von *Colchicum* unterscheidet sich aber *Crocus* auf den ersten Blick nicht nur durch die Blätter, sondern auch die eigenartig gespaltene Narbe. Mit diesem Organ, das sich sogar zur Handelsbedeutung emporschwang, müssen wir uns etwas eingehender beschäftigen. Es gehört zu den Gattungsmerkmalen des *Crocus*, daß seine Narben an der Spitze eines vielfach geteilten oder gelappten Griffels sitzen.

Es gibt darunter solche, deren Griffel wie ein Hirschgeweih oder, mit noch besserem Vergleich, wie eine Renttiersflechte verzweigt ist; andere erinnern auffällig an Becherflechten, so z. B. der Griffel des gewöhnlichen *Crocus vernus* L. Es gibt griechische *Crocus*-Arten, die als Griffel wahre Pinsel und Rämme emporstrecken. Von diesen Griffeln ist einer zu solcher Berühmtheit gekommen, daß er im Mittelalter wahrhaft mit Gold aufgewogen wurde, was übrigens bei seiner Leichtigkeit nach mehr klingt, als dahinter steckt. Das ist der Safran. Was man unter diesem Namen im Handel erhält, sind die getrockneten Griffeläste von *Crocus sativus* L., der zwar auch wild wächst, aber nur in der Kultur jenen ausgezeichneten gelben Farbstoff liefert, demzuliebe Hausfrau und Bäcker den Safran zum Färben der Suppe, Butter und Backwaren benötigen. Auf dies beschränkt sich nämlich heute so ziemlich die Anwendung des Safrans, und demgemäß ist der Handel damit sehr stark zurückgegangen. Früher hat ihm die Medizin viel Heilkräftiges zugeschrieben, woran wir aber jetzt nicht mehr glauben.

Es scheint sich bei dem Safrankrokus um eine uralte Kulturvarietät (schon zur Römerzeit wurde Safran gebaut) einer in den Mittelmeerländern wild wachsenden Pflanze zu handeln, die sich immerhin derart verändert hat, daß sie nicht mehr imstande ist, mit ihrem eigenen Pollen Früchte zu tragen. Man muß sie immer wieder mit wilden Formen kreuzen, will man von ihr Samen erhalten.

Es ist leicht möglich, daß aller Krokus erst mit dem Menschen nach den hyperboräischen Ländern wanderte, denn die ursprüngliche Heimat der Gattung ist der Bord des Mittelmeeres, namentlich Spanien. Und so wie der Gartensafran immer wieder verwildert, können auch die prächtigen weißen, violetten, gestreiften Krokuspflanzen, die im Frühling oder Herbst die Bergwiesen in den Boralpen, im Riesengebirge und ansonst in deutschen Bergen oft zu Zehntausenden in ein leuchtend Gewand kleiden, ursprünglich Pflöglinge des Menschen gewesen sein. Sicheres läßt sich darüber nicht ausmachen. Von dem Städtchen und der Ruine Zavelstein im württembergischen Schwarzwald wird der wunderbare Krokusflor gerühmt, der dort auf den Wiesen der Umgebung das Ziel vieler Wanderer bildet. Der Krokus soll dort in dem Burggärtlein zur Zeit der Kreuzzüge gepflanzt und von dort aus verwildert sein, was an sich nicht unmöglich ist.

Echter Safran (*Crocus sativus*).

Wir sagten vorhin, daß *Crocus* im Frühjahr oder im Herbst blühe. Die etwa 60 Arten der Gattung bilden danach wahrhaft biologische Massen. In den Schulbiologien wird dies damit erklärt, daß die Pflanze, so wie die Herbstzeitlose, als Tristen- und Wiesenbewohnerin gezwungen sei, sich eine Blütezeit auszusuchen, in der die um-

Abbildungen von Gartenkrokus und Nieswurz aus dem „Kreuterbuch“ des Brunsfels.

gebenden Gewächse noch niedrig sind, also Aussicht vorhanden sei, ihre Blüte zur Geltung zu bringen. Das ist eine Erklärung, vor deren Kühnheit wir zurückschrecken. Man bedenke doch, was sie eigentlich von der Pflanze voraussetzt! Diese soll Anhaltspunkte dafür haben, daß ihre Pflanzengesellschaft ihr im Wettbewerb um befruchtende Insekten zu gewissen Zeiten Schaden bringt, und deshalb ihre Blütezeit verlegen!

Ich glaube, man mutet damit der unbewußten Intelligenz der Pflanze denn doch Dinge zu, die ohne ein Gehirn unmöglich sind. Es gibt nach unserer Ansicht eine viel einfachere Erklärung dafür, warum alle *Crocus*-Arten entweder im September=Oktober oder Februar=März blühen. Sie sind eben Kinder des Südens, einem anderen Klima (an den warmen Winterregen) gegenüber der sommerlichen Dürre angepasst und reproduzieren mnemisch ihre ererbte Blütezeit auch dort, wo das Klima nicht so ganz dazu geeignet ist. Durch den Winterfrost hat dies ohnedies eine Verschiebung, bzw. eine Spaltung der Blütenperiode erfahren. Man kann sich das so vorstellen: Alle *Crocus*-Arten waren ursprünglich Herbstblüher, jene aber, die damit zu spät kamen, müssen in unserem Klima in blühreifem Zustand den Winter erstarret verbringen, benutzen aber den ersten milderen Tag, um ihre Blume zu entfalten.

Ein so schönes Gewächs wurde natürlich auch im Garten gerne gehegt, noch dazu, wenn es wertvoll und ein lieber Frühlingsbote war. *Crocus* gehört demnach zum eisernen Bestande des Bauern- und Bürgergartens schon seit den ältesten Zeiten der Hortikultur. Daß er in zahlreichen Spielarten seit langem gezogen wurde, beweisen die schönen Abbildungen der „Kräuterbücher“. Aus einem von ihnen ist auch das vorstehende Faksimile entnommen.

Heute schätzt man *Crocus* ob seiner reinen, selten schön leuchtenden und mannigfaltigen Blütenfarben sogar als Zimmerpflanze, die man in jeder Beziehung so behandelt wie die Hyazinthen.

Als letztes für uns in Betracht kommendes Gewächs aus der Verwandtschaft der Schwertlilien müssen wir die Siegwurz (*Gladiolus*) erwähnen, da sie für den Gärtner von großer Bedeutung geworden ist. *Gladiolus* ist eigentlich eine Stappflanze. Sie gedeiht dort wild in mehr denn 50 Arten. Einige Formen (so *Gladiolus paluster* Gaud. und *G. imbricatus* L.) sind aber auch im östlichen Deutschland auf Sumpfwiesen einheimisch geworden. Ob *Gladiolus communis* L. nur verwildert sei oder ein echter Bürger der deutschen Flora, das müssen wir dahingestellt sein lassen. Gartenkunst arbeitet nicht mit ihnen, sondern mit den mehr als meterhohen, prächtig scharlachroten, großblütigen Arten von Südafrika, aus denen durch Kreuzung zahlreiche Mischlinge (Hybriden oder Bastarde) gewonnen wurden, die wir als Zierde des Gartens bewundern. Da sie schon von Natur aus in den prächtigsten Farben spielen, Hochrot, Gelb, Blau, Rötlichweiß, Blauviolett, Scharlachfarben und in Zusammensetzungen all dieser Farben, hatte man eigentlich ein leichtes Spiel, all die blendenden Gladiolen zu züchten, über die wir heute verfügen.

Gladiolus ist auch blütenbiologisch nicht ohne Interesse. Ältere Botaniker, so namentlich *Treviranus*, behaupten, die Siegwurz verzichte auf fremde Bestäuber und befruchte sich durch Autogamie. Neuere Beobachter (*Scott Elliot*) fanden, daß diese Behauptung nicht ganz grundlos sei, nur greife auch hier die Pflanze zur Autogamie nur als letztes Hilfsmittel.

Auch *Gladiolus* hat ähnlich gespaltene Griffel wie *Crocus*, doch entfalten sich diese erst dann, nachdem die Antheren bereits begonnen haben auszustäuben. In diesem Stadium rechnen die Blüten auf Käfer und Hummeln, deren Liebesdienst auch beobachtet wurde. Erst wenn sie ausbleiben, krümmen sich die Griffeläste selbsttätig so weit

Musa Ensete als Dekorationspflanze zu Dresden.
(Original von Obergärtner F. Hartmann-Dresden.)

Echter Ingwer (*Zingiber officinale* Rosc.) im botan. Garten zu München.
(Aufnahme von H. Dopfer-München.)

zurück, oder der ganze Griffel sinkt so zusammen, daß noch in letzter Minute Staubbeutel und Narbe miteinander in Berührung kommen. Die Frucht ist auch bei der Siegwurz, so wie bei allen Tridazeen, eine dreikantige Kapsel mit vielen scheibenförmigen Samen. Gladiolus eignet sich nicht als Zimmerpflanze und macht auch in Frei-

landkultur Ansprüche. Als Zwiebelgewächs liebt sie sonnige Standorte, auch empfehlen sich häufige Dünggüsse und reichliches Gießen bis zur Blütezeit im Juli. Auch die Durchwinterung der Zwiebel ist nicht so ganz einfach. Am besten gelingt sie an einem mäßig warmen und völlig trockenen Orte.

Bevor wir nun zu den Orchideen übergehen, müssen wir unbedingt zum besseren Verständnis der phylogenetischen Zusammenhänge, wenn auch nur kurz, einer Reihe von Pflanzen gedenken, die der Botaniker als Szitamineen zusammenfaßt und heute als vermittelnde Glieder zwischen Lilienblütlern und Orchideen betrachtet. Es gibt zwar keinen direkten Anschluß an

die erstgenannten, und man muß schon großzügig den Gesamtorganismus dieser Wesen betrachten, um sich darüber klar zu werden, daß es doch nur modifizierte Liliengewächse sind. Hierher rechnet man die Familie der Musazeen mit dem gemeinbekannten Bananenlieferanten *Musa paradisiaca* und der in allen Zieranlagen so gerne ausgepflanzten *Musa Ensete*. Hierher gehört der berühmte „Baum des Reisenden“ (*Ravenala madagascariensis*). In diese Reihe stellt man auch die Familie der

Ingwergewächse (Zingiberaceae) mit vielen kulturgeschichtlich und wirtschaftlich bedeutsamen Gewächsen, wie das Ingwergewürz (Zingiber) oder die Gelbwurzel (*Curcuma*), die das ostindische Arrow=root, d. h. eine Art Sago, liefert, ebenso aber auch den jedem Indienreisenden wohlbekannten „Curry“ und den Farbstoff des jedem Chemiker vertrauten Kurkumapapiers. Hier untergebracht wird die Familie der Blumenrohre (Cannaceae), schon dadurch hochinteressant, daß sie Vogelblütler umfaßt. *Canna indica* ist ein dem Gärtner sehr geläufiger Name, denn er möchte das indische Blumenrohr in seinen Dekorationsbeeten nicht missen. Hierher stellt man schließlich auch die Marantazeen, eine Familie, die sowohl Zierpflanzen für die Gewächshäuser als auch in den unterirdischen Ausläufern ihrer Mitglieder Stärkemehl (westindisches Arrow=root)

Canna indica als Dekorationspflanze im „großen Garten“ zu Dresden.
(Original von Obergärtner J. Hartmann-Dresden.)

für den Handel liefert. — Schweren Herzens übergehe ich diese für Schule und Gartenbau wichtigen Pflanzen. Nur über *Musa* und *Zingiber*, als zwei Pflanzen, mit denen sich die Schule eingehender beschäftigen muß, seien mir noch einige Bemerkungen erlaubt.

Da *Musa Ensete* Gmel. fast in ganz Europa das Anspflanzen ins Freie gut erträgt, so war von vornherein zu erwarten, daß sich für die Bananenkultur größere Gebiete erobern lassen als nur die Länder zwischen den Wendekreisen. Und es hat auch wirklich den Anschein. Denn schon gelang es, sie in Nordamerika in Gegenden heimisch zu machen, deren Temperatur bis 7° C sinkt. Auch in Palästina wird der Pisanj mit

Erfolg angebaut, und die Franzosen erzielten reife Früchte auch in ihren algerischen Versuchsgärten, deren Wintertemperatur bis auf 3° C heruntergeht.

Da man nun bisher schon an 200 Kulturrassen dieser Wunderpflanze, die dem Tropenbewohner tägliches Brot, Kleidung, Gemüse und Obst liefert, geschaffen hat, ist die Hoffnung wohl nicht eitel, daß es fortgesetzten Kulturversuchen gelingen wird, auch für gemäßigtere Klimate den Baum nutzbar zu machen. Die Sache ist des Schweißes der Edlen wohl wert, denn sie bedeutet die Eroberung von Millionenwerten.

Die andere Pflanze, die wir noch kurz betrachten wollen, liefert das gemeinbekannte Gewürz, das man Ingwer oder Ingber nennt. Es sind Stücke des Wurzelstockes von *Zingiber officinale* Rosc., die zu solchem Zwecke in den Handel, namentlich nach England, gebracht werden, wo man „Ginger=Ale“ damit braut und an 160 000 kg davon jährlich einführt. Auch diese Pflanze, die in den Tropenländern allgemein angebaut wird (Bild S. 204), könnte offenbar viel weiter verbreitet werden, als sie es gegenwärtig ist. Petersen erzählt, daß *Zingiber Mioga* [Thunb.] Roscoe mit Erfolg bereits um Paris angebaut wurde, wo sie auch strenge Winter im Freien ertrug. Es wird sich überhaupt in naher Zukunft eine ganz neue Form angewandter Botanik entwickeln müssen, wollen wir nicht unsere besten Kenntnisse über die Umzüchtung von Eigenschaften, die gerade der Pflanzenbau zu wahrhaft hoher Kunst gesteigert hat, brachliegen lassen. Was der Jardin d'acclimatation zu Paris schon seit langem mit Erfolg begann, das müssen wir in Deutschland in Einführungsgärten zur Vollendung bringen, soll die „wissenschaftliche Durchbildung“ des Deutschen nicht eine bloße Phrase sein. Wir haben im bisherigen schon einige Andeutungen gegeben, welche Möglichkeiten sich hierdurch eröffnen, und wir haben den tiefen Eindruck, daß die deutschen Botaniker, die sich zielbewußt den hier angeregten Aufgaben widmen, von Erfolg zu Erfolg gelangen werden. Hier gibt es ein Land noch ungeahnter Möglichkeiten zu entdecken.

Die Orchideen.

Das Wort Orchideen hat für unsere Zeit Zauberklang. Was dem Holländer einst Tulpen und Narzissen, das sind für uns seit einigen Jahren die Orchideen, Lieblinge des Geschmacks, Objekte einer Spekulation fiktiver Werte, die, entsprechend den großzügigeren Geldverhältnissen der Jetztzeit, die Tulpenpreise noch weit überbieten. Bis zu welchem Grad von Überschätzung diese Orchideenliebe bereits gediehen, illustriert besser denn jede langatmige allgemeine Erörterung ein Bericht der Zeitungen über die im Jahre 1908 im Londoner „Temple“ stattgefundene Orchideenausstellung, die es verdient, ob ihres zeitgeschichtlichen Gehaltes der Vergessenheit alter Zeitungsnachrichten entzogen zu werden. Es heißt in dem uns vorliegenden Bericht: „Ein breitschulteriger, stämmiger junger Mann in blauem Anzug und sorgfältig gefalzten Beinkleidern stand

an einem der letzten Abende in der Nähe der Orchideenabteilung der Blumenausstellung und überwachte mit scharfem Blick den Transport der kostbaren Pflanzen auf die Wagen der Züchter. Es war ein City-Detektiv in Zivil. Als die Orchideentafel, die sich der ganzen Länge des Hauptzeltes entlang erstreckte, sich rasch leerte, fuhr der junge Mann mit einem Taschentuch über seine Stirn und murmelte mit einem Seufzer der Erleichterung: Gott sei Dank, es ist alles vorbei! Drei Tage lang hatte er über Orchideen im Gesamtwert von 1 Million Mark Wache gehalten, wobei seine Stelle an der anderen Seite des Zeltes von anderen

Wächtern eingenommen wurde. Sinnreiche Vorsichtsmaßregeln hatte man getroffen, um jeden, der den Wunsch hegen sollte, ein kleines Vermögen in Gestalt einer oder zweier Blumen zu ergattern, an seinem verbrecherischen Unternehmen zu verhindern. Z. B. wurden Pflanzen im Werte bis zu 40 000 Mark absichtlich in der Gesellschaft bescheidener Orchideen aufgestellt, die ihnen, soweit sie ein ungeschultes Auge beurteilen konnte, gleichen, aber im Vergleich mit ihnen wertlos waren. „Eine Orchideensammlung wie diese ist ein Gegenstand großer Angst für die Eigentümer“, erklärte Herr Sanders aus St. Albans einem Interviewer. Herr Sanders (übrigens ein geborener Bre-

Eine kostbare Orchidee (*Vanda tricolor*).
(Originalaufnahme von Obergärtner J. Hartmann-Dresden.)

mer) ist der größte Orchideenzüchter der Welt; er schätzte den Wert der von ihm bei dieser Ausstellung gezeigten Pflanzen auf mindestens 300 000 Mark. „Es sind Fälle vorgekommen“, meinte er, „daß, nachdem eine Beschreibung einer besonders teuren Orchideenabart erschienen war, die betreffende Pflanze sorgfältig aus den übrigen ausgestellten Blumen herausgesucht und gestohlen worden ist.“

Ein Ausstellungsbesucher bezahlte der Firma Hugh Low & Co. für ein Exemplar einer neuen Abart von *Odontoglossum crispum* 28 000 Mark. Diese Pflanze hatte nur drei Blüten, es kostete also ein mit ihr geschmücktes Knopfloch für den Abend 9300 Mark. Diese Blume ist ihr Gewicht 30 mal in Diamanten wert gewesen. Und

dabei, wie war sie einfach! Die Blüte dicht mit Streifen und Flecken von zimmerrotem Braun besetzt, die im Sonnenlicht die Färbung glänzend polierten Kupfers annehmen, außen mit einem schmalen weißen Rand umrahmt — das war das Ganze.

Da jede Freude an Farbe und Formen Geschmackssache ist, wäre es töricht, darüber zu streiten, ob die Orchideen diese außerordentliche Wertschätzung gegenüber anderen Blumen auch wirklich verdienen. Unbegreiflich dünkt von vornherein nur das eine, warum die Preise verschiedener Bastarde so außerordentlich wechseln. Um dies zu verstehen, muß man die Arbeit des Orchideenzüchters näher kennen lernen.

Obwohl in der Natur an 10 000 Orchideenarten bekannt sind, und noch täglich von den Sammlern, welche die großen

Orchideenfirmer

namentlich nach Hindien und Südamerika entsenden, in den Urwäldern von Neu-Granada und Brasilien neue entdeckt werden, bescheidet man sich nicht mit dieser Formenfülle, sondern sucht durch künstliche Befruchtung der Blüten mit fremdem Pollen, d. h. Kreuzungen, auch solche Spielarten zu erzeugen, die es in der Natur noch nicht gibt, und die oft überhaupt nur

Künstliche Kreuzung einer Orchidee.

(Nach einer Photographie von Laurence & Co., Paris.)

in wenigen oder gar nur einem einzigen Exemplar vorhanden sind. Daß es den Ehrgeiz der Reichen anstacheln muß, eine solche Spezialität zu erwerben, liegt auf der Hand. Der Züchter aber hat ein Recht, besondere Preise zu verlangen, denn seine Arbeit ist wirklich außergewöhnlich kostspielig und mühsam.

Mit feinem Pinsel überträgt er den Pollen von einer Blüte zur anderen (s. Bild) und benützt hierzu nicht nur die Blüten gleicher, sondern verschiedener Arten, sogar Gattungen. Darum wimmelt die Nomenklatur der Orchideenzüchter von Doppelbezeichnungen in Art und Gattungsnamen (s. die Unterschriften zu den Farbentafeln). Man hat nun solche Gattungsbastarde wieder mit anderen Arten und Gattungen gekreuzt und dadurch Mischlinge von drei oder vier Gattungen (trigenerische Arten) erzeugt, etwa dem entsprechend, wenn man Zwischentiere von Hunden, Raken, Pferden und Rindern herstellen könnte. Welches Eigenschaftengemenge hierdurch entstanden ist, daß man der Natur derart ins Handwerk pfuschte, kann man sich leicht ausmalen; aber man hat auch mit viel Fehlschlägen der Züchter zu rechnen. Die Orchideen gehören

Habitus des gefleckten Knabenkrautes
(*Orchis maculata*)

(Naturaufnahme von H. Dopfer-München)

allerdings zu den Pflanzen, die sich am leichtesten bastardieren lassen, und es hat sich auch schon das Kuriosum ereignet, daß ein Sammler mit unendlicher Mühe aus fernem Weltteil Knollen nach Hause sandte, die, zur Blüte gebracht, einen Bastard ergaben, den man auch im Gewächshaus künstlich erzielt hatte.

Nun kommt hierzu noch die außerordentlich mühsame Anzucht solcher Bastarde. Man muß die gekreuzte Blüte ihren Samen reifen lassen, der fast mikroskopisch klein, also sehr schwierig zu behandeln ist. Auch die Sämlinge sind unendlich zart, haben sie doch manchmal kaum die Größe eines Fliegenkopfes. Welchen Schaden richten da Schimmel oder Insekten im Gewächshause an! Dazu kommt noch folgendes: Wir beherrschen die Kreuzungsgefecke keineswegs so, daß wir das Resultat der Kreuzungen im voraus berechnen könnten. Mendels, Correns' und Tschermaks Entdeckungen

18 Monate alte *Cypripedium*-Pflanzen in Kultur. (Nach einer Photographie von Laurence & Co., Paris.)

haben zwar in neuerer Zeit manchen Einblick darein verstattet, aber noch stehen wir in dieser Hinsicht erst am Beginn der wissenschaftlichen Einsichten. Es arbeitet also der Orchideenzüchter auf gut Glück. Da er nicht weiß, wie sein Bastard blühen wird, und er sich im Falle des Gelingens doch eine genügende „Ernte“ sichern will, arbeitet er gleichzeitig mit Tausenden von Pflanzen und pflegt sie auf das Unsichere hin. Orchideen wachsen außerordentlich langsam, nach Monaten erst bildet sich das erste Blatt, und nach vielen Jahren erst kommt die Pflanze zur Blüte. So lange muß er einen kostspieligen Apparat, Kapital und fachkundige Arbeit aufwenden, um dabei oft genug zu erfahren, daß seine Arbeit wertlos war, und der neue Bastard die bekannten weder an Farbenschmelz noch an wunderlicher Form oder Größe der Blüten übertrifft.

Wenn man dies weiß, begreift man, warum die Orchideen die kostspieligsten aller Blumen sind. Im allgemeinen aber kann man sagen, daß die Preise der Orchideen im Rückgang begriffen sind. Zwar werden für manche Neuzüchtungen immer fabelhaftere Preise bezahlt, aber der Durchschnitt sinkt im Werte, seitdem man durch bessere Kenntnis der Lebensweise auch günstigere Zuchtergebnisse erzielt. Um nur ein Beispiel zu erwähnen, worum es sich hierbei handelt, sei daran erinnert, daß man bis vor nicht langer Zeit die Orchideenzucht deshalb sehr kostspielig gestaltete, weil man unbedingt glaubte, France, Das Leben der Pflanze. IV.

sie gedeihen nur in einem Orchideenhaus mit künstlich erzeugter Tropenkultur. Jetzt aber weiß man, daß eine Reihe der schönsten Formen am besten bei 12—20° C gedeiht, und daß man sie früher einfach zu Tode heizte. Sofort war ihre Kultur wesentlich vereinfacht und verbilligt, und so kommt es, daß es längst nicht mehr ein Sport für Millionäre ist, den Tisch mit Orchideen zu schmücken. Wenn man nicht die Marotte hat, Spezialitäten besitzen zu wollen, kann man sogar als mäßig Begüterter die eigenartigsten und schönsten Formen erwerben. Im allgemeinen ist die Orchideenvorliebe in unserem Vaterlande aber erst zu den oberen Zehntausend vorgeedrungen; ihre Heimat ist Frankreich, Belgien, vor allem aber England und Nordamerika, wo sich auch die größten Orchideenzüchter niedergelassen haben.

Diese so vielgenannten Pflanzen haben nun nicht nur gesellschaftliches oder kulturgeschichtliches, sondern auch ein ganz bedeutendes naturwissenschaftliches Interesse.

Wir besitzen eine ganze Reihe ausgezeichnete Monographien über sie, und wer sich in ihre Formenfülle und die vielen Eigenarten ihres Lebens liebevoller vertiefen will, als dies in diesem Überblick möglich ist, der sehe auf den Bibliotheken namentlich folgende Werke ein:

E. Pfitzer, Grundzüge einer vergleichenden Morphologie der Orchideen. 1881.

H. G. Reichenbach, Die Orchideen der deutschen Flora. 1851.

L. Diels, Die Orchideen. 1908. (Billig!)

E. de Puydt, Les Orchidées. Histoire iconographique. 1880.

Vindenia, Iconographie des Orchidées. 1884—1888.

Über die Cyoten geben Aufschluß die Prachtwerke:

B. S. Williams, The Orchid Growers Manual. 1874—1885.

J. Veitch, Manual of Orchidaceous plants cultivated under glass. I—III. 1887—1888.

Es gibt auch neben den großen englischen, französischen und belgischen eine „deutsche Gesellschaft für Orchideenkunde“ in Berlin, welche die Zeitschrift „Orchis“ herausgibt. Die berühmteste Orchideenzeitschrift ist die von Sander herausgegebene „Reichenbachia“, die Abbildungen, Beschreibungen und Kulturanweisungen der schönsten Orchideen bringt.

Der Botaniker betrachtet als Merkmale der Orchideen, die er in die Reihe der Gynandren als deren einzige Familie stellt, etwa folgende Eigenheiten: Es gehören hierher Pflanzen von äußerst verschiedenem Habitus, mit ganz speziell angepassten zygomorphen, meist zwittrig entwickelten Blüten, deren Blütenhülle aus 6 Blättern besteht, die alle durchgängig korollinisch entwickelt sind. Die Früchte sind trocken, kapselartig, selten fleischig. Sie enthalten stets sehr zahlreiche Samen, die hervorragend klein sind und des Nährgewebes völlig entbehren, dementsprechend auch einen merkwürdig unvollkommenen und ungegliederten Embryo besitzen, der häufig sogar nur eine wenigzellige Kugel darstellt.

Alle diese Eigenheiten führt man auf eine extreme Anpassung an die häufig epiphytische Lebensweise und an den Insektenbesuch zurück. Da die Orchideen im inneren Bau in allem Wesentlichen mit den Lilienblütlern übereinstimmen, hat man sie nach Wettstein auch von diesen abzuleiten, um so mehr, als auch ihr Blütentypus diesen entspricht. Nur ist er von der strahligen Anordnung der Organe zu einer zweiseitig symmetrischen (zygomorphen) übergegangen.

Diese Vereinfachungen können natürlich gar keinen Begriff davon geben, wie eigenartig fast jedes Organ der Knabenkräuter, wie man die Orchideen zu deutsch benennen kann, durchgebildet ist. Es gibt wenige Gruppen im ganzen Pflanzenreiche, die so viel Sonderanpassungen entwickelt hätten. Wenn sich auch ein Teil dieser erst bei den exotischen Epiphyten entfaltet, so sind auch die schönen heimischen, unverdientermaßen zurückgesetzten Arten in dieser Hinsicht äußerst lehrreich, und ihnen wollen wir uns im folgenden vorzugsweise zuwenden.

Am besten machen wir uns mit den Eigenheiten der ganzen Gruppe vertraut, wenn wir zuerst einen ihrer typischen heimischen Vertreter eingehend betrachten. Wählen wir hierzu eine der gewöhnlichen Orchis-Arten, von denen es ja 70 in Europa gibt. Die häufigeren, wie *O. mascula*, *maculata*, *morio* oder *latifolia*, sind jedem botanisierenden Naturfreunde bekannt als reizender Schmuck der Waldwiesen (s. die Tafel).

Die Orchis-Arten blühen bereits im Frühling, da sie, so wie die meisten Frühlingspflanzen, einen unterirdischen Reservestoffbehälter besitzen. Orchis bedient sich dazu der eigentümlich geformten, mit Pflanzenschleim und Stärke erfüllten Knollen, die mit einiger Phantasie mit einer Hand verglichen werden können, weshalb auch Aberglaube und Volksdichtung daran anknüpfte und sie je nachdem als „Satansfinger“ oder als „Glücks-“ und „Christushändchen“ einschätzte.

Solche Rhizome finden sich bei allen erdbewohnenden Orchideen als Stammknollen, die manchmal, da in jedem Jahr ein Reservestoffbehälter gebildet wird, rosenkranzförmig zusammenhängen. Alle Orchideen aber sind perennierende, meist auch sehr alt werdende Pflanzen ohne Hauptwurzel, die stets Rhizome bilden, auch wenn sie als Überpflanzen nicht in der Erde leben. Nur bezeichnet man die nicht so, sondern nennt sie Basalstück, worunter jener Teil der vegetativen Achse verstanden wird, der bei den erdbewohnenden Orchideen im Boden bleibt, bei den rindenbewohnenden dagegen der Unterlage aufliegt. Aus diesen Basalstücken entwickeln sich die Wurzeln; sie tragen nur Niederblätter und kein Laub. Ein solches Rhizom geht auch den saprophytischen Orchideen nicht ab. Bei diesen merkwürdigen Humusbewohnern steckt in der Erde ein meist verzweigtes Rhizom, dessen ganze Oberfläche das Wasser und die Nährstoffe aufsaugt.

Der Bau einer einheimischen Orchidee (*Orchis latifolia*).
(Naturaufnahme von S. Dopfer-München.)

Auch *Orchis* treibt nun jedes Jahr an den Wurzeln eine Ersatzknolle, so daß man, wenn wir sie ausgraben, an den Pflanzen gewöhnlich mehrere Knollen findet, von denen eine mehr oder weniger ausgesogen ist. Aus diesen unterirdischen Teilen entwickelt sich ein Trieb, der zuerst von farblosen Hüllblättern geschützt ist, bald aber aus sich auch große, breitspreitige, tulpenähnliche Blätter treibt, die bei vielen *Orchis*-Arten (*maculata*) merkwürdig gefleckt sind, was man als Wärmeschutz, mit jedoch unserer Ansicht nach unzureichenden Gründen, gedeutet hat. Nicht alle Orchideen entwickeln ihr Laub in gleicher Art. Es gibt sogar welche, die gar keine Blätter besitzen,

Angraecum sesquipedale.

(Nach einer Photographie von Laurence & Co., Paris.)

sondern nur blasse Schuppen. Solche sind unsere heimischen Saprophyten (*Epipogon*, *Coralliorrhiza*), deren Blattlosigkeit biologisch ohne weiteres verständlich ist. Sie assimilieren ja nicht. Es gibt auch unter den erdbewohnenden (terrestrischen) Orchideen solche, die zur Blütezeit blattlos sind, danach allerdings ein einziges, um so größeres, merkwürdigerweise an die Arazeen erinnerndes Laubblatt treiben. So die Gattung *Nervilia*, die von Afrika bis China die Tropen besiedelt. Gewöhnlich aber besitzen die Orchideen ein sehr stattliches Laubwerk, und es gibt in der heißen Zone einige (allerdings terrestrische Formen), die bis 5 m hohe Gebüsche bilden, so z. B.

die *Sobralia*-Arten im tropischen Amerika. Gewöhnlich sind diese Blätter zweizeilig angeordnet (siehe die Farbentafel). Im Wuchs unterscheidet man scharf monopodiale von sympodialen Formen. Bei den ersteren, für die als Typus das anbei stehende Bild von *Angraecum sesquipedale* gelten kann, treibt ein kurzer Stamm zahlreiche zweizeilige Laubblätter und seitliche Blütenstände. Solche Formen können allerdings niemals klettern, wie z. B. die in unseren Gewächshäusern so häufig gezogene *Vanille*, die eine echt sympodiale Orchidee ist. Man erkennt an ihrem Bilde sofort, daß bei ihrer Wuchsform der Hauptstamm am Ende mit einer Blüte abgeschlossen wird, worauf neue Seitentriebe die Führung des Wachstums übernehmen. So entsteht eine viele Stockwerke hohe Kletterpflanze.

Wohl die wenigsten wissen es, daß es immergrüne und sommerdürre Orchideen gibt mit regelmäßigem Blattfall. Sie erhalten sich in der blattlosen Zeit durch die jedem Orchideenzüchter wohlbekannten knollenförmigen Anschwellungen des Stammes, die eine echte Überpflanzenanpassung sind. Man bezeichnet diese Gebilde als Scheinzwiebeln oder Luftknollen (siehe Farbentafel: *Cattleya*). Sie sind mit Reservestoffen erfüllt und durch ein Wassergewebe sehr saftig, dienen also offenbar zum Überstehen der trockensten Jahreszeit. Ihre Größe wechselt von der einer Linse (es gibt nämlich auch winzige Orchideen, so z. B. *Bolbophyllum*) bis zu der eines Kindskopfes.

Ein weiteres Organ, das anders entwickelt zu sein pflegt als bei unseren heimischen Orchideen, sind die Wurzeln. Auch sie sind der Überpflanzen-Lebensweise angepasst. Schon die Knollenwurzeln der europäischen *Ophrydin*-familie deuten auf die Plastizität dieser Gebilde, ihre volle Anpassungsfähigkeit haben offenbar aber erst die Luftwurzeln der exotischen Anabenkräuter. Auch dies ist wieder ein Hinweis, wie notwendig man stets die Tropenformen vergleichsweise heranziehen muß, um das Leben der heimatischen Flora zu verstehen.

Eine Orchidee, die hoch oben in den Baumwipfeln auf der Rinde eines Baumes lebt, ist in der Ernährung ausschließlich auf den Regen und Tau und, so wie die Moose, auf den Staub und höchstens einige Zersetzungsstoffe der Baumrinde angewiesen. Es besteht also das lebhafteste Bedürfnis für sie, mit ihren Wurzeln diese kärglichen Quellen möglichst intensiv auszunützen. Außerdem ist sie an ihrem luftigen Standorte

dem Sturm ausgesetzt, muß daher gut für Sicherungen sorgen. Demgemäß sehen wir auch die Luftwurzeln entwickelt. Sie sind mit einem Luftgewebe (Velamen) umkleidet, das in hohem Maße die Fähigkeit hat, die Feuchtigkeit der Luft zu kondensieren. Darum erscheinen sie in trockenem Zustand so hübsch schneeweiß schimmernd. Da sie etwas Chlorophyll führen und assimilieren, werden sie grün, wenn man sie befruchtet. Darum

Dendrobium fimbriatum Hook. var. *oculatum* Hook. in nichtblühendem Zustand mit Luftwurzeln, aus dem Münchner botanischen Garten. (Originalaufnahme von H. Dopfer-München.)

hängt ein Teil der Wurzeln frei in die Luft herab (siehe Bild S. 213), was bei den Zierorchideen vielfach so phantastisch und dem Laien unerklärlich anmutet. Ein anderer Teil der Wurzeln besorgt dagegen die Verankerung der Pflanze, zugleich auch die Ausbeutung der Rinde. Solche kriechen an dem Aste, auf dem die Orchidee sitzt, werden ganz flach, manchmal sogar bandartig und verwachsen fest mit ihrer Unterlage. Eine der extremsten Anpassungsformen dieser Art haben wir nach Wiesner in Bd. II (S. 198) dieses Werkes bereits geschildert und abgebildet in *Taeniophyllum*. Auch

eine verwandte westindische Form (*Polyrhiza funalis* [Lindl.] Pfitz.) ist völlig blattlos und besteht nur aus solchen assimilierenden grünen Haftwurzeln, aus deren Mitte sich eine prächtige Blütentraube erhebt.

Wer „Bedürfnisanpassungen“ studieren will, findet hier also ein Arbeitsfeld wie kein zweites. Aber nicht all dieser Eigenheiten halber, so absonderlich sie auch sein mögen, interessiert man sich so allgemein für die Orchi-

Die Blüteneinrichtung der Orchideen.

1 = Blüte von *Orchis morio*, von vorn gesehen. 2 = Blüte von *Cypripedium acaule*. 3 = Blüte von *Catasetum ornithorhynchus*. 4 = Blüte von *Oncidium varicosum*. 5 = Blüte von *Himantoglossum hircinum*. 6 = Blüte von *Vanda tricolor*. (Nach Wettsteins Handbuch.)

deen, sondern es ist ihre Blüte, die ihnen die vielen Freunde gebracht hat.

Orchis, von deren Schilderung wir ausgehen, ist in dieser Beziehung ein viel zu wenig beachtetes Kunstwerk. Sie ist in ihrem Blütenbau durchaus Insekten angepasst, wie aus der nachfolgenden Darstellung hervorgehen wird. Die Blüten stehen bei *Orchis* in einer ansehnlichen Traube beisammen. Jede scheint auf einem besonderen Stiel zu sitzen, der sich aber bei näherem Zusehen als der Fruchtknoten erweist. Die Einzelblüte ist zwitтерig und von einem schön- und buntgefärbten Perigon umgeben. Davon neigen sich drei Blätter so eigenartig helmförmig zusammen, daß dadurch die inneren Blütenteile völlig vor dem Regen geschützt sind. Ein Blatt aber hat seine Gestalt ganz besonders verändert. Es bildet die große, dreiteilige, auffällige „Unterlippe“ und ist noch dazu in einen langen Sporn ausgezogen. Am Eingang stehen vor dessen Röhre die eigentlichen Befruchtungsorgane. Auf einem kurzen Fortsatz des Fruchtknotens ragt glänzend-klebrig die Narbe, und darüber steht das in ganz eigenartiger Weise umgestaltete einzige Staubblatt. Es ist nämlich — wir folgen hierbei

der trefflich-klaren Darstellung von Meierhofer in dessen Biologie der Blütenpflanzen — der Blütenstaub der Anthere in zwei Portionen abgeteilt, die man Pollinien nennt. Jedes Pollinium besitzt ein kurzes Stielchen mit verbreitertem Fuß, der einen klebrigen Stoff ausscheidet. Die zwei Pollinien sind jedoch in der Blüte derart angeordnet, daß ein Insekt, das sich honigsuchend auf der „Unterlippe“ niederläßt und den Kopf in den Sporn steckt, hierbei die Klebescheibchen der Pollinien berühren muß. Sie kleben sich fest während des Saugens, und nun nimmt sie der Gast mit, wenn er die Blüte verläßt. Fest haften die zwei Pollinien an seinem Kopfe, da der Klebstoff (der in unberührtem

Zustand durch ein Häutchen geschützt ist) an der Lufterhärtet. Während dem Transport durch die Luft aber krümmen sich die Stielchen der Blumenstaubkeulchen nach abwärts. Ein scheinbar nebensächlicher und doch unendlich wichtiger Vorgang! Denn die Narbe der Orchideen steht doch in den Blüten unter der Anthere (s. d. Bild)!

Ein Bestand von *Orchis maculata* im Gefräß des lichten Laubwaldes.
(Naturaufnahme von J. E. Peters† = Gra.)

Kommt das Insekt zu einer anderen Blüte, so trifft nun die klebrige Pollenmasse genau auf die feuchte Narbe, und die Möglichkeit der Befruchtung ist gegeben.

Zu diesen Wunderlichkeiten fügt jedoch die Blüte noch aktive Bewegungen, um die Befruchtung auf jede Weise sicherzustellen. Denn die Unterlippe ist von vornherein durchaus nicht in der Stellung angelegt, die der bestäubenden Hummel oder Fliege den für den Blütenzweck einzig richtigen Sitzplatz aufzwingt. Sondern bevor sich die Blüte öffnet, wächst der Fruchtknoten so, daß eine Drehung um 180° um seine eigene Achse zustande kommt. Sie bewirkt, daß nun die Anflugstelle genau so steht, wie es die Befruchtung erfordert. An solche Erfahrungen muß die neue Botanik anknüpfen. Hier sind für sie die modernen Probleme gegeben. Hier kann sie mit ihren Experimenten einlegen, die Reaktionsfähigkeit der Blüte prüfen, indem sie von vornherein sie unter andere Bedingungen bringt. Diesen Weg hat gerade bei den Orchideen ein Botaniker unserer Tage, H. Fitting, auf einer Tropenreise betreten. Er knüpfte an die außerordentlich lange, oft Monate dauernde Blütenzeit der Orchideen an und versuchte bei verschiedenen *Dendrobium*-, *Oncidium*- und anderen Formen die Narben mechanisch zu reizen, indem er darauf etwas reinen Flußsand brachte. Schon

nach wenigen Tagen schlossen sich die Blüten und welkten, während die Kontrollblüten fast einen Monat länger frisch blieben. Das gleiche Ergebnis wurde erzielt durch eine ganz geringfügige Verletzung der Narbe, sei es durch Einrißen oder auch nur durch Abwischen des Narbenschleimes. Verletzungen anderer Befruchtungsteile haben weit geringere oder fast gar keine Wirkung. Zitting gelangte durch seine Versuche zu einem Schluß, den er selbst mit folgenden Worten wiedergibt: „Alles drängt (also) zur Annahme, daß bei den Blüten der Orchideen enge Reizbeziehungen besonderer Art zwischen der Narbe und der übrigen Blüte bestehen, daß die Narbe das Perzeptionsorgan bei diesen Reizvorgängen ist, und daß das Perzeptionsvermögen für den Wundreiz auf die Narbe lokalisiert ist. Wir kennen bei der Pflanze manche andere Fälle, wo durch Reizung der Reaktionszone oder der Gewebe zwischen Reaktions- und Perzeptionszone eine Reaktion nicht ausgelöst werden kann. Nur bietet die Trennung der Perzeptions- und Reaktionszone in der Blüte ein besonderes Interesse dar. Einmal für die Auffassung der Funktionen der Blütenteile: Die Narbe erscheint danach nicht bloß als das Organ, befähigt, den Pollen zu 'empfangen' und seine Keimung zu ermöglichen, sondern als ein Organ von viel größerer Bedeutung für die ganze Blüte, indem sie die Fähigkeit erhalten hat, bestimmte Einflüsse zu perzipieren und nach erfolgter Perzeption durch Reizleitung Entwicklungsumschaltungen in den übrigen Blütenteilen auszulösen, die für das Blütenleben sehr wichtig sind. Von Interesse ist die Aufdeckung dieser seltsamen Beziehungen aber auch für die allgemeinen entwicklungsphysiologischen Probleme an der Blüte. Denn sie weist augenscheinlich darauf hin, daß manche Veränderungen, welche an den Blütenteilen infolge der Bestäubung erfolgen, schon von der Narbe aus induziert werden können.“

Dies sind sehr bemerkenswerte Ergebnisse, und unser Forscher weiß sie auch auf das richtige Schlagwort zu bringen, indem er kurz seine Ansicht dahin zusammenfaßt, die Narbe der Orchideen besitze Gehirnfunktionen.

So hat schon der erste Versuch einer experimentellen Analyse des Blütenlebens dieser Pflanzen auf den Standpunkt geführt, den wir als dessen Eigenheit in diesem Werke vertreten, und er hat unser Streben mächtig unterstützt.

Hat uns nun schon die Blüteneinrichtung von *Orehis* aufs höchste angezogen, so ist sie durchaus nicht das Interessanteste, was sich über die Befruchtung der Orchideen ermitteln ließ. Namentlich Ch. Darwin hat in seinem Werke über die verschiedenen Einrichtungen, durch welche Orchideen von Insekten befruchtet werden, darüber ein wunderbares Beobachtungsmaterial zusammengetragen. Wir müssen es uns jedoch versagen, daraus zu schöpfen, da es der Umfang dieses Bandes nicht erlaubt, wenn wir den Prospekt einhalten wollen. Es ist der Blütenbau der tropischen Orchideen so vielfach modifiziert und verwickelt, daß wir viele Seiten damit füllen müßten, um seine Funktion auch wirklich verständlich zu machen. Allgemein läßt sich darüber nur etwa das sagen, was wir dem prächtigen Werke des jüngst verstorbenen Heidelberger Botanikers, E. Pfeiger, über die Orchideen entnehmen können, der als einer der besten deutschen Kenner dieser schönen Blumen galt.

Er sagt etwa: Es vermögen sich nur die wenigsten Orchideenblüten ohne Hilfe der Insekten zu befruchten, so daß die meisten, vor dem Besuche der letzteren geschützt, keine einzige Frucht hervorbringen. Hieraus erklärt sich, daß in unseren Gewächse-

Franzé, Das Leben der Pflanze.

KOSMOS
GESELLSCHAFT
FÜR NATURKUNDE
STUTTGART

Frauenschuorchidee
(Cypripedium Calceolus L.)

(Naturaufnahme von H. Popfer-München.)

häufeln ohne künstliche Bestäubung fast niemals ein Fruchtanfang stattfindet. Wenn auch die besonderen Einrichtungen, welche die Befruchtung durch die Insekten ermöglichen, hier nicht ausführlicher dargestellt werden können, so ist es doch nötig, einige allgemeine Gesichtspunkte zu betonen.

Die meisten Orchideenblüten zeichnen sich zunächst aus durch ihre überaus lange Dauer. Nur ganz wenige verwelken schon innerhalb weniger Tage; bei den meisten Gattungen bleibt die einzelne Blüte 30—40, ja in einzelnen Fällen 70—80 Tage lang vollkommen frisch, wenn sie nicht bestäubt wird. „Eine bestäubte Blüte welkt dagegen sehr schnell, da für sie längeres Frischbleiben der Blütenhülle keinen Nutzen hat.“ In der Regel werden sehr zahlreiche Blüten gleichzeitig geöffnet. Bei *Paphiopedilum* und anderen kommt es aber auch vor, daß bei langtraubigem Blütenstand doch gleichzeitig nur immer eine einzige Blüte offen ist. Da diese nun etwa einen Monat frisch bleibt, so kann die Pflanze ohne Erschöpfung jahrelang andauernd je eine Blüte den Insekten darbieten. Als eine Sparsamkeitseinrichtung ist es dabei zu betrachten, daß die meisten Orchideenblüten bei der geringen Wahrscheinlichkeit ihrer Befruchtung die ganzen Samenanlagen erst infolge der Bestäubung entwickeln, während deren Bildung ganz unterbleibt, wenn kein Pollen auf die Narbe gelangt.

Die Insekten werden zum Besuch der Blüten veranlaßt, teils durch deren schöngefärbte, große Blütenhüllen, besonders auffällig bei den allbekannten *Masdevallien*, teils auch durch besonderen Geruch. Es gibt nicht nur viele sehr wohlriechende, sondern auch solche Arten, die durch den Gestank nach faulendem Fleisch Schmeißfliegen anlocken. *Bolbophyllum Beccarii* übertrifft in dieser Beziehung die *Stapelien* und *Uroideen*. Eine heimische *Orchis (coriophora)* atmet ausgeprägten Wanzengeruch aus. Weiter dienen zur Herbeiziehung der Insekten die Nektarabsonderungen, die sich in den verschiedenen Spornbildungen finden. Auch die zuckerhaltigen Schwielen der Blütenlippen (bei *Oncidium* u. a.) dienen den Insekten zur Nahrung. Die eigenartigen „Futterhaare“, welche D. Porsch an den Orchideenblüten entdeckte, finden sich in Bd. II beschrieben und abgebildet (S. 126). *Maxillaria*-Arten locken durch imitierten Pollen an, *Ornithidium*-Arten durch Blütenwachs, auch ist es wahrscheinlich, daß dadurch Vögel als Befruchter angezogen werden.

Vielfach mögen die Insekten auf die Blüten auch aufmerksam gemacht werden durch das Schwanken des Labellums, d. h. des Anflugblättchens, welches oft an einem so dünnen Gelenk befestigt ist, daß die leiseste Erschütterung und der feinste Luftzug schon eine Bewegung auslösen. Bei *Megaclinium* hat man diese sogar für eine spontan von der Pflanze ausgeführte gehalten. Wirkliche Eigenbewegungen der Lippe kommen vor bei den *Pterostylidae*, wo ein auf jene aufliegendes Insekt eine Reizwirkung auslöst, infolge deren das Labellum gegen die Säule schlägt, auf der die Blüten Teile angeheftet sind, und das kleine Tier daran anpreßt. Viele Gattungen (*Caldenia*, *Pterostylis* u. a.) besitzen reizbare Lippen, andere schleudern die Pollinien bei Berührung ab; die neuerdings von H. v. Guttenberg untersuchten Verlängerungen der Säule von *Catasetum* sind reizbar und bewirken durch ihre Berührung ein Ausschleudern des Pollens.

Eine besonders merkwürdige Anpassung der Orchideen, der wir in gewissen engeren Grenzen bereits bei der Schwertlilie begegneten, äußert sich als Mehrgestaltigkeit

(Pleiomorphie) der Blüten. Bei dem obengenannten *Catasetum* (siehe das Bild), einer bekannten Warmhausorchidee, bringt dieselbe Pflanze zu gleicher Zeit oder in verschiedenen Jahren dreierlei so verschiedene Blütenformen hervor, daß man sie immer wieder als besondere Gattungen beschrieb, bevor man den Zusammenhang merkte. Es gibt da eine *Catasetum*-, eine *Myanthus*- und *Monachanthus*-Form, die sich, wie unser Bild zeigt, auf das wesentlichste voneinander unterscheiden. *Catasetum* ist rein männlich, *Monachanthus* rein weiblich, die dritte Form ist eine Zwitterblüte. Darwin hat dann diese südamerikanische Wunderblume auf ihre Bestäubung hin untersucht und gefunden, daß die Dreigestaltigkeit sehr wohl ihren Sinn durch ihre Funktion habe.

Blütendimorphismus von *Catasetum tridentatum* Lindl.
A = *Myanthus*-Form. B =
Monachanthus-Form.

Über die Sondergestaltungen der Blüten, wie sie unser heimischer Frauenschuh, die Fliegen- und Hummelblumen und andere Orchideen aufweisen, werden wir in deren Einzelschilderungen das Nötige sagen.

Aus dem Fruchtknoten der bestäubten Orchis entwickelt sich eine sechsflappige Kapsel, die sich nur in einzelnen Spalten öffnet, aus denen der Wind die winzigen, der Windverbreitung durch Flugmäntel angepassten Samen herausbläst. Bevor aber die Samenkapsel reift, vollführt die Pflanze wieder aktiv und spontan eine Bewegung von höchster Sinnmäßigkeit. Hatte sie vor der Befruchtung den Fruchtknoten schraubig gedreht, um das Labellum in eine vorteilhafte Lage zu bringen, so macht sie jetzt diese Drehung rückgängig. Und das mit gutem Nutzen. Denn in eine schraubig gedrehte Kapsel könnte der Wind nicht so leicht eindringen.

Ähnlich wie das Knabenkraut bilden fast alle Orchideen ihre Früchte. Eine davon ist jedermann bekannt als „Vanille“.

Vanilla planifolia Andr. ist eine aus Mexiko stammende, aber nun in allen Tropenländern, auf der Rinde des Kakaobaumes kultivierte Kletterorchidee, deren schotenförmige Früchte noch unreif abgenommen werden. Ihr feines Aroma verdanken sie dem „Vanillin“, das man aber immer häufiger mit einem aus Tannennadeln gewonnenen Kunstprodukt verfälscht.

Jedem Orchideenzüchter bekannt ist die Kleinheit und Feinheit der Orchideensamen. In den Kapseln von *Stanhopea* sind wohl Millionen Samen vorhanden, deren jeder mit einer dünnen, lockeren Samenschale umhüllt ist, und die manchmal durch besondere Schleuderhaare — eine analoge Organbildung zu den Lebermooselateren — verbreitet werden. Beccari hat das Gewicht eines Samenkörnchens der beliebten Zierorchidee *Dendrobium* auf 1/200 Milligramm berechnet.

Wie eigenartig sich die Keimung der Orchideen vollzieht, haben wir bereits kurz gestreift. Häufig, so bei der heimischen *Listera*, ist der Embryo eine wenigzellige Kugel, ohne Keimblätter und Wurzeln. Er schwillt zu einem Knöllchen an (man nennt es Protokorm), das sich mit Wurzelhaaren befestigt, stets mit Wurzelpilzen in Symbiose lebt, langsam ein Blättchen nach dem andern bildet und unendlich mühsam heranwächst. Dieses langsame Wachstum erschwert die Zucht der Orchideen außerordentlich.

Wenn es schon bei unseren heimischen Arten nach Pfiger 5—9 Jahre bedarf, bis sie „blühreif“ werden, so dauert es bei den herrlichen Zierorchideen unter Umständen noch länger, bei *Lycaste* 9 Jahre, bei *Cattleya* (s. die Farbensafel) oder *Laelia* sogar 10—12 Jahre.

Dieser kurze Umriss des Orchideenlebens genügt vielleicht schon, um den Eindruck zu erwecken, diese Pflanzengruppe sei eine der eigenartigsten, am meisten des Studiums werten und durch außerordentliche Genüsse erfreuenden. Man nehme hinzu, daß sie an 10000 verschiedene Arten umfaßt, daß sie noch verhältnismäßig wenig studiert ist, wie z. B. die schönen, ergebnisreichen Untersuchungen über Blütenmutationen tropischer Orchideen von Dr. D. Borsch beweisen; man denke daran, daß es in neuerer Zeit gelungen ist, auch die exotischen Orchideen zu Zimmerpflanzen und so für jedermann zugänglich zu machen — und man wird es begreifen, warum sich nun in rascher Folge Orchideenzüchtervereine bilden, und warum auch wir jedem Naturfreund, der sich um Nat wegen einer ihn befriedigenden Spezialbeschäftigung an uns wendet, es auf das wärmste empfehlen, sich mit Orchideen näher vertraut zu machen. Sie werden gewiß sein Herz und seinen Sinn gewinnen. — Über die Orchideenkultur im Zimmer ist ein besonderes, sehr anregend geschriebenes Werkchen von Braecklein erschienen*, das alle nötigen Anweisungen enthält. Als erste Winke, nur um zu beweisen, daß die Sache weder kostspielig noch allzu schwierig ist, möge etwa folgendes aufgefaßt werden:

Man pflegt die Orchideen (gemeint sind hier die einheimischen, an denen man zuerst Erfahrungen erwerben soll) in flachen Schalen, gefüllt mit groben Heideerdeestücken, etwas Lauberde, grob gehacktem Moos, gemischt mit Holzkohlestückchen, zu kultivieren und dadurch zu düngen, daß man Hornspäne mit der Erde vermengt. Sie erfordern kühlen, mehr schattigen und lustigen Standort, der nicht gewechselt werden darf. Gesprikelt muß häufig und reichlich werden. Nur während des Blühens vertragen es die Pflanzen schlecht.

Hat man sich erst mit unserem Knabenkraut und Frauenschuh, Fliegenstängel und Ruchblume genügend Erfahrungen erworben, dann gehe man zu Exoten über. Deren Behandlung fällt aber aus dem Rahmen dieses Werkes.

Von den Einzelformen, denen wir uns nun zuwenden wollen, gilt als die schönste der deutschen Orchideen der Frauenschuh (*Cypripedium***), der in etwa 20 Arten in allen Ländern der nördlichen gemäßigten Zone gedeiht. Bei uns ist er eine durch Naturverwüstung fast ausgerottete Pflanze. Namentlich im mittleren und südlichen Deutschland blüht er noch da und dort auf kalkigem Boden, und wenn er auch zu den in manchen Ländern polizeilich geschützten Pflanzen gehört, so ist er doch schon eine große Seltenheit der deutschen Flora. So sehr sich auch sonst das Empfinden gegen polizeiliche Maßregelung des privaten Lebens sträubt, so wirkt es angesichts des Vandalismus, den sich „gebildete“ Menschen noch immer gegen Blumen erlauben, wahrhaft erfreulich zu hören, daß z. B. in Wien die heimkehrenden Ausflügler sonntags an den Bahnhöfen beanstandet werden, wenn sie mit übermäßigen Blumenlasten oder bestimmten geschützten Alpenblumen oder gar Obstbaumblienzweigen (man denke dagegen an die Barbarei von Werder bei Potsdam!) heimkehren.

* Braecklein, Die Orchideen und ihre Kultur im Zimmer. Frankfurt a./D. 1904.

** Meist fälschlich *Cypripedium* geschrieben.

Es ist noch unerklärt, jedoch Tatsache, daß bei uns *Cypripedium Calceolus* L. als die einzige einheimische Art vorzugsweise in Buchenwäldern mit Kalkboden gedeiht. Dort stellt der Frauenschuh seine große eigenartige Fliegenblume auf, die als Typus eines ganz eigenartigen Mechanismus besondere Schilderung verdient.

Die Blüte (s. die Tafel) bringt 6 Perigonblätter hervor, die braunrot und purpurn gefärbt sind, mit Ausnahme der großen Lippe, die sich eigentümlich umgestaltete. Sie hat die Form eines Schuhs, wie man sie an der Wasserkante trägt, und schimmert herrlich in grünlichem Gold. Oben hat sie eine eirunde Öffnung, vor die sich die Narbe so stellt, daß neben und vor ihr nur noch enge Einschlupföffnungen bleiben. Insekten, die an den Rand der „Kesselfalle“ gelangen, gleiten dort leicht ab und fallen in die Lippe hinein, deren Wand innen so glatt ist, daß sogar die hakig-haarigen Fliegenbeine, die auf Glas anstandslos marschieren, den Dienst versagen. Nur an einer Stelle bieten dichte Haare die Möglichkeit, an der Wand hinaufzuklimmen. Dies ist nämlich unterhalb der Narbe. Aber gerade dort steht zu beiden Seiten der Narbe eine Anthere, die den Gefangenen zwar hinausläßt, aber ihn mit klebrigem Pollen beschmiert. In der nächsten Blüte, in die das noch nicht gewirkte oder auch vielleicht durch die gern gefressenen und saftigen Lippenhaare angezogene Insekt gerät, bestreicht es bei dem Abschied natürlich leicht die dort an gleicher Stelle stehende Narbe.

Wie man sieht, ist es gewissermaßen eine Bedingung dieser Vorgänge, daß der Pollen sehr gut haften, sonst würde er schon früher abgestreift. Der Pollen der Orchideen ist denn auch anders gestaltet wie der anderer Blütopflanzen. Mehrere Staubkörner sind zu wahren Paketen verwachsen, und diese dann durch einen ganz ausgezeichneten Klebstoff (Viszin) noch zu Ballen verklebt.

Die geschilderte Blüteneinrichtung ist allen *Cypripedilen* und ihren für die Gärtner bedeutungsvollen Verwandten (namentlich *Paphiopedilum*) eigen. Nur wechseln die Farben und Dimensionen außerordentlich. *Cypripedium japonicum* (Bat.) Pfitz. erfreut neben der Blüte auch durch ein wunderbares manschettenförmiges Blatt, aus dem die einzige Blüte emporsteigt; das prachtvolle *Paphiopedilum caudatum* hat schmale, bandartige Perigonblätter, die in anmutigen Windungen bis zu $\frac{3}{4}$ m Länge herabhängen.

Es wird sich kein Blumenfreund das Vergnügen entgehen lassen wollen, eine so merkwürdige Blume selbst beobachten zu können. Und gerade der Frauenschuh eignet sich besonders zur Zimmerkultur. Wir empfehlen hierzu die von den Gärtnern leicht zu beziehende Art *C. insigne*, die als ausdauerndes Knollengewächs zu dritt oder viert in einer flachen Schale, sowohl durch üppigen Blattwuchs, der noch etwas an Maiblumen erinnert, als auch durch reichliches Blühen im frühen Venz erfreut. Man braucht die Pflanzen nur vor Prallsonnenschein zu schützen, bei höchstens 10° C zu überwintern und alle 2—3 Jahre umzutopfen. *Cypripedium* wünscht feucht gehalten zu werden. Am besten spritzt man morgens und abends mit lauwarmem Wasser und wäscht öfters die Blätter.*

Neben den *Cypripedilen* gehören zu den interessantesten einheimischen Orchideen die Formen aus der Gruppe der *Ophrydineen*, zu denen *Ophrys*, *Orchis*,

* Näheres siehe in F. Dubois, Les *Cypripediums*. Gand. 1899.

Gymnadenia, Nigritella, Platanthera, ja fast die ganze Heerschar der vielgestaltigen Anabenkräuter gestellt wird, die noch unsere Fluren schmücken. Wir wollen von ihnen vor allem die Ständelarten (Ophrys) näher kennen lernen, gehören sie doch zu den größten Wundern, welche die deutsche Natur ihren Freunden zu bieten hat. Zu dem Charakter der Gruppe gehören folgende Eigenheiten: Die äußeren und inneren Kreise des Perigons, also die Sepalen und Petalen, sind ziemlich gleich ausgebildet und alle helmartig zusammengeneigt, bis auf die Lippe, die, größer als die übrigen Blütenhüllblätter, abwärts gewendet und meist gespornt ist. Die Säule, für den Bau der tropischen Orchideen unentbehrlich, ist hier rückentwickelt oder fehlt ganz. Die Lippe kann die wunderlichsten Formen annehmen (man denke an Himantoglossum [Bild S. 214 und 224] oder Aceras). Über den Bau und die Funktion der eigentlichen Geschlechtsorgane haben wir bereits das Nötige gesagt, als wir Orchis, die als Typus der ganzen Gruppe darin gelten kann, eingehender schilderten.

Die 30 Ophrys-Arten (vgl. die Farbentafel) unterscheiden sich von der erstgenannten Gattung eigentlich nur durch biologische Anpassungen, über deren Deutung man allerdings noch völlig in Verwirrung ist. Es gehören hierher die berühmten insektenähnlichen Blumen, Ophrys apifera L., die einer Biene gleichen soll, der Fliegenständel (O. muscifera Huds.), die Spinnenständel (O. aranifera Huds. und Arachnites Murr.), die an eine auf der Blüte sitzende Spinne erinnern (vgl. auch die Farbentafel in Bd. II zu S. 540).

Nun sind allerdings diese Vergleiche sehr dichterisch und durchaus anthropomorph, da die Insekten, auf die jene Gestaltungen wirken sollen, mehr dem Geruch folgen und die Blüten aus viel näherer Perspektive betrachten als wir. Tatsache ist jedoch, daß manche Ophrys-Arten von Insekten ziemlich gemieden werden und meist gezwungen sind, sich auf autogamem Wege zu erhalten. Dies geschieht z. B. bei O. apifera Huds. dadurch, daß sich die sehr dünnen Stielchen der Pollinien unter deren Gewicht so biegen, daß die Pollenpakete aus ihren Fächern heraustreten. Sie hängen in dieser Stellung gerade über den Narben, so daß bereits der leiseste Windstoß oder jede Erschütterung der sich gar nicht öffnenden Blüte genügt, um die Befruchtung zu ermöglichen. — Delapino, der sich mit diesen Verhältnissen eingehender beschäftigt hat, versichert jedoch, daß O. muscifera und aranifera nur durch Insekten befruchtet werden. Allerdings werden auch sie so spärlich besucht, daß er bei 3000 Blüten nur eine zählen konnte, die Frucht angefüllt hatte.

Ziehen wir aus diesen Tatsachen die notwendigen Folgerungen, so muß man wohl zugestehen, daß die „Insektenmimikry“, welche diese Blumen treiben, tatsächlich

Ophrys aranifera.
(Naturaufnahme
von H. Dopfer-München.)

eine gewisse Wirkung hat und Insekten verschreckt. Diese Pflanzen haben also eine biologische Eigenheit, eine Anpassung erworben, die ihnen offenbar schadet und ihre anderen Einrichtungen im Werte herabsetzt. Daraus muß man schließen, daß die Ursache, welche diese Anpassungen hervorbrachte, nicht eine unbeirrbar, absolut zwecktätige sei. Aber man kann daran auch folgende unwiderlegliche Gedankenreihe knüpfen. Diese Anpassung kann ganz gewiß nicht durch Insekten herangezöchtet worden sein, denn diese meiden ja die Blüten, sie bevorzugen gewiß nicht die insekten-ähnlicheren. Hier hat keine Auslese stattgefunden, und doch ist aus eigener Kraft der Pflanze ein Gebilde zustande gekommen, das biologische Wirkungen hat. Es ist dies einmal ein Fall, der ganz unzweifelhaft dagegen zeugt, daß die biologischen Merkmale der Lebewesen stets das Ergebnis selektiver Vorgänge seien.

Nun ist von uns damit durchaus nicht gesagt, daß wir der Ansicht sind, diese Gebilde seien zielstrebig, mit „Absicht“ zustande gekommen, um einen Zweck zu erreichen. Wir können uns gar nicht mit dem Gedanken befreunden, daß die Gestalt und Färbung des Labellums, das Zusammentreffen mit der Gestaltung des übrigen Perianths und der flebrigen Narben eine biologische Funktion ausüben sollen. Wir glauben vielmehr, hier werde dieselbe Erscheinung sowohl von uns Menschen mißdeutet, wie sie auch die Insekten irreführt, welche solche Blüten meiden.

Man hat noch gar nicht versucht, diese Gestaltungen physiologisch-experimentell zu analysieren, und sie auch noch nicht von phylogenetischem Gesichtspunkte betrachtet. Erst wenn sich diese Wege als absolut ungangbar erweisen sollten, dürfte man dazu zurückkehren, hier teleologisch zu spekulieren.

Einen gewissen Anhaltspunkt gewährt schon die Tatsache, daß das Labellum verwandter Gattungen, namentlich von *Aceras anthropophora* R. Br., auch *Listera ovata*, teilweise auch von *Anacamptis*, *Himantoglossum*- und *Orchis*-Arten, annähernd so gebildet ist, wie das von *Ophrys muscifera*, daß sich sogar aus den Lippenformen eine gewisse Reihenfolge der Gestaltung zusammenstellen läßt, die von *Orchis* zu *Ophrys* führt. Sie läuft allerdings nicht mit den „Graden“ der Verwandtschaft parallel, deutet aber immerhin darauf, daß diese Lippenbildungen nach anderen Regeln zustande kommen als jene, die eine Mimikryhypothese voraussetzen müßte.

So rollt *Ophrys* eine Reihe der merkwürdigsten Probleme auf, die geradezu nach den tiefsten Geheimnissen der Botanik zielen.

Über die nahe verwandte *Orchis* wurde bereits alles botanisch Merkwürdige gesagt. Nachzuholen wäre hier das, was sie pharmazeutisch wichtig macht. Der Apotheker versteht nämlich unter *Tubera Salep* die abgebrühten und getrockneten Knollen der verschiedensten *Orchis*-Arten, denen dieser Verwendung halber in manchen Gegenden auch eifrig nachgespürt wird. Smyrna allein exportiert an 500 000 Pfund davon. Wirksam daran soll das Bassorin, ein Schleimstoff, sein, der der Pflanze als Reservahrung dient.

Wir kennen in Deutschland 22 Orchideengattungen in 55 Arten, die freilich alle, außer *Orchis*, mehr oder minder selten geworden sind. Gewisse Gebiete, wie z. B. die fahlen Kalkberge um Jena oder die Heiden entlang dem Lech, galten als berühmte Fundorte, die heute freilich auch übermäßig ausgeplündert sind und längst nicht mehr den alten Ruf rechtfertigen. Gewisse Formen sind längst nur noch auf vereinzelte

Fundorte lokalisiert. So findet sich *Nigritella angustifolia* Rich. außer in den Alpen nur in Baden bei Bonndorf, *Gymnadenia cucullata* Rich. nur in Ostpreußen und Posen, *Limodorum abortivum* Sw. nur noch an wenigen Orten im westlichen Deutschland von Trier bis Freiburg im Breisgau. Warum dies so ist, warum unter den Orchideen auch die Zahl der „Einarter“ so groß ist, entzieht sich heute noch unserer Kenntnis. Nur eine Art kennt man z. B. von *Anacamptis*, trotzdem diese Gattung in Europa und Nordafrika verbreitet ist; monotyp ist auch *Chamaeorchis*, *Coeloglossum*, *Limodorum*, *Epipogon* und viele andere Gattungen, neben denen aber auch solche stehen, von denen man 40—70, ja sogar 300 Arten (*Habenaria*, *Dendrobium*, *Oncidium*) oder 400 Arten (*Epidendrum*) unterscheiden muß.

Ob die Vermutung gerechtfertigt ist, daß diese enorme Artenzersplitterung daher rührt, daß die Orchideen sich den verschiedensten Insekten, sowohl Nachtfaltern, Schlupfwespen, Hummeln als Fliegen, sogar Kolibris und größeren Vögeln angepaßt haben und deshalb ihre Blüteneinrichtung so unendlich variierten, wollen wir unentschieden lassen. Denn man hat heute noch viel zu wenig Einblick in die Ursachen der Variabilität.

Eine sehr hübsche und eigenartige Orchidee der deutschen Flora von hervorragendem interessantem Blütenbau, die das Obengesagte belegen kann, ist die Auckucksblume (*Platanthera*), von deren etwa 70 Arten *Pl.*

bifolia Rich. auf Wiesen und Heiden, auch an Waldrändern, noch ziemlich verbreitet ist. Auch bei ihnen machen, wie Darwin festgestellt hat, die Pollinien eine Bewegung nach einwärts, so daß sie von den Bestäubern richtig abgestreift werden. Als solche kommen aber bei dieser Art Nachtfalter in Betracht.

Dies läßt sich schon aus dem Blütenbau selbst erschließen. Der sehr lange und enge Sporn ist überhaupt nur Faltern angepaßt. Das reine Weiß der Blüten und vor allem der Umstand, daß ihr süßer Nektarduft besonders des Nachts hervortritt, machen es gewiß, daß nur ein nächtlich fliegendes Insekt für sie in Betracht kommen kann (Bild S. 224).

Platanthera ist aber auch ein gutes Beispiel für die biologische Variabilität, da Asa Gray, der sie blütenbiologisch eingehend studierte, bei fast jeder Art Sonderanpassungen fand, die auf Besonderheiten des Blütenbesuchers abzielen.

Gymnadenia albida.
(Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

Bocksorchis (*Himantoglossum hircinum*).
(Nach einem Aquarell von H. Daffinger in der
Wiener Kunstakademie.)

Die Gattung hat namentlich, in Nordamerika zahlreiche Vertreter und ist dort eine Präriepflanze, sie ist aber auch eine der wenigen Orchideen, die bis zu kalten Gegenden vordringen. In den Vereinigten Staaten ist sie eine ausgeprägte Nachtfalterblume. Wenn bei einzelnen Arten (so *Pl. Hookeri* Lindl.) die Klebeflecken sehr weit auseinanderstehen, daß der Rüssel des Blütengastes mit ihnen normalerweise nicht in Berührung zu kommen braucht, wird dies dadurch wettgemacht, daß der mittlere Teil der Narbe stark vorspringt, und die Lippe nach oben gebogen ist, anstatt herabzuhängen. Wir erwähnen dies als Beispiel, um zu zeigen, wie viel Korrelationen

Nachtsblume (*Platanthera bifolia*).
(Naturaufnahme von H. Dopfer-München)

und geradezu individuelle Zweckmäßigkeiten aufgeboten sind in einer solchen Blüte, die durch Selektion allein nicht erklärt werden können. Und so ist es denn auch kein Zufall, daß gerade die in Grönland und Island wachsende *Pl. hyperborea* Lind., die der Bestäuber besonders entbehrt, zu einer autogamen Blume geworden ist, deren Pollinien gewöhnlich schon in der Blütenknospe von selbst auf die Narbe fallen und sie befruchten.

Das anbei nach einem Aquarell Daffingers wiedergegebene *Himantoglossum hircinum* Spreng., das man zu deutsch als Bocksrorchis bezeichnet hat, ist zweifellos

Hänbelswurz (*Gymnadenia conopsea*). ♀ (Naturaufnahme von F. G. Peters + Graz.)

eine der seltsamsten Blumen, die es gibt, die sich nicht einmal vor ihren tropischen Schwestern zu verstecken braucht. Sie wächst in Süd- und Mitteldeutschland auf Kalkhügeln und in Weinbergen da und dort und ist eine der wenigen Orchideen, die sich durch unangenehmen Geruch (darauf deutet der deutsche Name) auffällig machen. Ihre Blüte vereinigt aber die zartesten Farben, die man ersinnen kann. Die seitlichen Hörner ihres Labellums sind zartgrün, der Mittellappen selbst ist samten weiß mit violetten Flecken, der Blütenhelm dagegen ist blaßviolett mit feinen grünen Adern.

Eine eigentümliche Pflanze ist auch *Listera ovata*, das Zweiblatt. Sie spielt eine Rolle bereits in der Wissenschaftsgeschichte. Hat doch an ihr Konrad Sprengel, der Entdecker des „Blumengeheimnisses“, zuerst die Blüteneinrichtung der Orchideen in ihrem wahren Sinn erfaßt und so genau beschrieben, daß wir es heute auch nicht besser machen können.

Francé, Das Leben der Pflanze. IV.

Listera öffnet im Mai oder Juni auf feuchten Wiesen oder zwischen Gebüsch ihre grünen Blüten, die mit einem ganz besonderen Mechanismus ausgestattet sind. Über die noch nicht befruchtungsreife Narbe wölbt sich das Schnäbelchen, das einen großen Tropfen absondert, der bei der leisesten Berührung der Blüte bereits hervorgeschleudert wird und die Insektenbesucher, nämlich Schlupfwespen und Bockkäfer, überschüttet. In ihm sind aber auch die Pollinien vorhanden, die nun an dem Blütengast haften bleiben.

Listera ovata im Waldesdunkel.
(Naturaufnahme von B. Saldy in Wiesbaden.)

Weitverbreitete Orchideen sind auch die Gänsewurzarten (*Gymnadenia*, siehe die Bilder) mit sehr angenehm duftenden, rosafarbenen Blüten und einem langen Sporn, der bis zur Hälfte mit Blütenhonig gefüllt ist. Ihre Blüteneinrichtung entspricht dem Wesen nach jener der *Orchis*-Arten. Die amerikanische *Gymnadenia tridentata* blüht jedoch, so wie die nordischen *Platantheren* oder unsere *Ophrys apifera*, kleistogamisch.

Nicht vergessen dürfen wir auch des Waldvögeleins (*Cephalanthera rubra* Rich.), das mit Ausnahme des deutschen Nordwestens sonst auf Kalkboden nicht allzu selten ist. Die Blüten dieser hübschen, manchmal bis zu 3—4 m Höhe erreichenden Orchidee besitzen eine dreieckige Lippe, die den Insekten als Anflugplatz dient, sich dann aber wieder vor den Blüteneingang stellt. Die Pollenkörner dieser Pflanze sind nicht miteinander verklebt. Wie haften sie also auf den Bestäubern? Durch ein ganz unglaubliches Hilfsmittel. Es keimen nämlich einige der Staubkörner aus, treiben lange verfilzte Pollenschläuche, in deren Wirrnis sich der übrige Pollen verfängt. So kann er dann leicht haften.

Die Orchideen entsenden eine Form auch in die Hochalpen. Dies ist das schwarzpurpurne, starkkriechende „Brändlein“, die *Nigritella angustifolia* Rich., die auf den Alpenwiesen weit über der Baumgrenze noch häufig ihr von dem Alpenler so geliebtes Blümchen einsticht. Ganz anders verhält sich dieses vielgestaltige Geschlecht aber als Moderblume im Schatten des Hochwaldes. Von *Epipogon*, dem Widerbart, *Neottia*, der Nestwurz, und *Coralliorrhiza*, der Korallenwurz, hat wohl schon jeder Naturfreund gelesen. Wir selbst haben diesen Humuszehrer bereits in Band II, S. 195 und 196 in Wort und Bild Beachtung geschenkt, können uns also hier solches füglich sparen. Diese Modererwäxse könnten ohne *Mykorrhiza* nicht bestehen und haben sich dermaßen der saprophytischen Lebensweise angepaßt, daß sie ihre Blätter fast völlig

rückentwickeln. *Epipogon aphyllus* Sw. deutet dies schon mit seinem Ortsnamen an, obzwar auch bei diesem Gewächs am Grunde des meist purpurn überlaufenen Stengels 5—8 stengelumfassende, schuppenartige, farblose Blattrudimente vorhanden sind. Ebenso bei der Korallen- und der Nestwurz. Die Blütenbiologie der Moderorchideen bietet ebenfalls mehr als ein Problem.

So zeigt *Neottia* das im Pflanzenreich sehr seltene Phänomen, daß aus ihren fleischigen Wurzeln, die wie zu einem Nestchen vereinigt sind, sich unmittelbar Blüten entwickeln können. Die jungen Pflanzen dieser Art sind zuerst gelblichweiß und werden erst zur Blütezeit mehr oder minder dunkelbraun. Man hat dies als Schauseinrichtung deuten wollen im Interesse der kleinen Fliegen, welche die unansehnliche und mißfarbene Blüte bestäuben. Aber man kann über diesen Punkt nicht zur Klarheit kommen. Es widerspricht dieser Auffassung, daß die Nestwurz sich meist selbst bestäubt.

Epipogon dagegen hat sehr hübsche weiße, rötlich angehauchte oder gelbe und rötlich gestrichelte Blütenhüllen. Durchaus im Sinne unserer Auffassung vom Pflanzenleben ist es, daß bei dieser Art die Blüten desto auffälliger gefärbt sind, je weniger Blüten das betreffende Exemplar erzeugt. Da der Fruchtknoten gelb und der Sporn lila gefärbt ist, die ganze Blume aber stark nach Vanille duftet, ist es ihr leicht abzulesen, daß sie auf Fremdbestäuber rechnet. Als solche stellen sich Hummeln ein, die der honigreichen Blüte zuliebe in das Dunkel der Tannen- und Buchenwälder eindringen, die der Lieblingsstandort aller dieser nicht assimilierenden Moderpflanzen sind. Sie sind diejenigen Orchideen, welche man als die am tiefsten stehenden Mitglieder der ganzen Familie bezeichnen muß. Sie bestehen nur aus dem Wurzelstock, der keine echten Wurzeln mehr bildet, nach oben den mit Schuppen besetzten Trieb entsendet, an dem auch der Blütenstand oft bis zu einer einzigen Blüte zurückgegangen ist. Ihre Nahrung beziehen diese Kümmerlinge durch das Rhizom, das mit seiner ganzen Oberfläche das Wasser und die in ihm gelösten Humusstoffe aufnimmt. Nur die Nestwurz hat wirkliche Wurzeln, aber diese Gattung lebt auch nicht mehr rein saprophytisch, sondern enthält schon ein wenig Blattgrün.

In den deutschen und österreichischen Nadelwäldern lebt zwischen Moos und abgefallenen Nadeln im Schatten noch eine winzige Orchidee, die der Anfänger in der Pflanzenkunde angesichts ihres Vorkommens auch für eine Humuspflanze halten könnte. Aber *Goodyera repens* R. Br., die wir hierbei meinen, ist kein Humuszehrer. Sie hat zwar einen durch seine kriechenden Ausläufer merkwürdigen Wurzelstock, aber aus diesem sprießen Triebe mit saftiggrünen Blättern. Die Blüte ist, wie es einer Schattenpflanze ziemt, weiß, außen gelblich oder grünlich, kann also im Dämmerlicht des Hochwaldes leicht gesehen werden.

Schließlich haben wir noch zweier einheimischen Gattungen zu gedenken, deren man auf botanischen Streifzügen öfters habhaft wird, und die auch in biologischer Hinsicht Interesse verdienen. Dies sind die Sumpfwurz (*Epipactis*, siehe das Bild auf S. 228) und der Drehling (*Spiranthes*).

Die *Epipactis*-Arten, von denen *E. latifolia* All. in Wäldern und auf buschigen Hügeln nicht selten ist, während *E. rubiginosa* Gaud. wieder mehr die trockenen, kalkigen und sandigen Hügel Mittel- und Süddeutschlands bevorzugt, sind ebenso wie die *Cephalanthera*-Arten mit Vorliebe Selbstbestäuber. Und zwar

dadurch, daß da wie dort aus den den Narben aufsitzenden Pollensäulen unmittelbar die auswachsenden Pollenschläuche zu dem Ei vordringen. Dies erfolgt, trotzdem die Sumpfwurz schöne rotbraune oder grünlichrote, wohlriechende große Blüten hervorbringt, deren Lippe (wenigstens bei *E. latifolia*) in großer Ausdehnung Honig abscheidet und dieserhalb auch reichlich von Wespen und Hummeln besflogen wird. Man steht hier vor einer wahrhaft rätselhaften Erscheinung, die bereits Darwin gebührend

Epipactis palustris (rechts), mit *Pirola rotundifolia* vergesellschaftet. (Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

bestaunte, noch dazu, da wir doch andere Orchideen kennen, für die der eigene Pollen geradezu Giftwirkung hat. Es ist das Geschlechtsleben der Knabenkräuter im allgemeinen ein Gebiet der größten Widersprüche. Es gibt in dieser Familie Pflanzen, die nur dann Früchte ansetzen, wenn sie sich selbst befruchten; es gibt andere, die unfruchtbar bleiben, wenn sie sich nicht bastardieren können, weshalb denn auch die Artgrenzen völlig schwankend sind, und die Zahl der Bastarde außerordentlich groß ist.

Die Wendelorchis (*Spiranthes*) lebt namentlich häufig in der Schweiz, mit Vorliebe auf feuchten Triften und hat die biologische Eigenheit, nicht nur mit ihren Fruchtknoten die Respiration, d. h. die bereits bei Orchis besprochene und gewürdigte Drehung, zu demonstrieren, sondern auch die

ganze Blütenähre schraubenförmig zu drehen. Zweifellos ist auch dies im Zusammenhang mit irgendeiner Befruchtungserleichterung, doch sind meines Wissens noch keine besonderen Untersuchungen darüber angestellt worden. Eine zweite biologische Merkwürdigkeit dieser Pflanze ist ihre Sonderung in Saisonarten mit verschiedener Blütezeit. Es gibt einen Herbstdrehling (*Sp. autumnalis* Rich.), der mit den Herbstzeitlosen erst im September und Oktober blüht, und eine Sommerform (*Sp. aestivalis* Rich.), die ihre reichen Blütenähren bereits im Juli erschließt.

Alle übrigen Orchideen haben nur gärtnerisches Interesse, allerdings ein so starkes, daß wir es uns nicht versagen können, ihnen auch noch unsere Aufmerksamkeit zuzu-

wenden, um so mehr, als sich im Verfolg dieses Werkes hierzu keine Gelegenheit mehr bieten wird.

Gegenwärtig zieht man in den Gewächshäusern an 2000 Orchideenarten, ein enormer Aufschwung, wenn man bedenkt, daß Linné im Jahre 1764 erst 102 Arten kannte. Der Linné der Orchideen heißt aber Lindley, der in seinem 1830—1840 erschienenen Hauptwerk 2000 Arten beschrieb und damit den Anstoß zu der Orchideenliebhaberei gab. 1813 kultivierte man in den berühmten Glashäusern von Kew bei London erst 40 Arten, aber schon im Jahre 1851 in den Gärten des Grafen Thun an 500 verschiedene Formen. Dresden und Hamburg waren die ersten Orte in Deutschland, in denen die Orchideenzucht namhafte Erfolge erzielte. Heute nehmen auch unsere Gärtner einen ehrenvollen Platz im Wettbewerb der internationalen Orchideenliebhaberei ein.

Es sind vornehmlich die Gattungen *Dendrobium*, *Vanda*, *Lycaste*, *Cattleya*, *Odontoglossum*, *Oncidium*, *Laelia*, *Angraecum*, *Coelogyne*, *Cypripedium*, *Masdevallia* und *Stanhopea*, denen der Blumenfreund seine Beachtung schenkt, und

sie sind es auch, die von unseren großen Gärtnereien als Schnittblumen gezogen werden. Ihnen gilt die begeisterte Schilderung Braeckleins, wenn er von den Orchideen sagt: „Ob wir eine helleuchtende oder eine dunkelgetönte Blume vor uns haben, immer wird sich die Orchidee auch durch ihre vornehme, zarte Farbe als etwas Besonderes zeigen. Mitunter kommen so außergewöhnliche Farben vor, wie wir sie sonst bei Pflanzen gar nicht zu sehen gewohnt sind. Häufig sind die Blumen zwei-, drei-, vier- und mehrfarbig, vielfach zeigen sich reizende Strich- und Fleckenzeichnungen und die feinsten Punktierungen. Dann aber kommt noch etwas hinzu, was alle Farbenschönheit der Orchideenblume so ganz außerordentlich hebt und diese, man möchte sagen, in überirdischem Lichte erscheinen läßt. Das ist der oft matter, oft heller auftretende herrliche, seidenartige Glanz, der so vielen dieser wunderschönen Blumen eigen ist. Nicht selten werden die Farben

Dendrobium Dalhousianum im Gewächshaus.
(Originalaufnahme von J. Hartmann-Dresden.)

auch gehoben durch die stoffliche Beschaffenheit der Blumen, indem diese oder einzelne ihrer Teile wie aus feinhaarigem Plüsch oder weichem Samt gearbeitet oder auch aus festerem Stoff, aus Saffian, Wachs oder hartem Glas gebildet erscheinen. Aber wer vermöchte mit Worten die Pracht der Orchideen zu schildern? Sie lachen und leuchten, sie glänzen und schimmern und sie starren – vornehme Kinder der Natur – in Samt und Seide.“

Wer sie kennt, dem ist es nicht unbegreiflich, daß die Liebhaber dieser seltsamen Geschöpfe, von deren Blüte einst so schön gesagt wurde, sie sei „die heldenmütigste

Dendrobium nobile.

(Originalaufnahme von J. Hartmann-Dresden.)

Anstrengung der Blumen-seele“, zu ganz außerordentlichen Opfern bereit sind. Ihren Wünschen zu entsprechen, entwickelte sich seit etwas über einem Jahrzehnt eine ganze Orchideenindustrie, die über ihre Weltfirmen, ihre Entdeckungsreisenden, ihre besonderen Warenschiffe und ihre „Industriezentren“ verfügt. Die Zeiten sind noch nicht vorbei, da in einzelnen Gegenden (so z. B. in den Vorbergen des Himalaja) die Orchideen in der Flora sämtliche andere Gruppen der Blütenpflanzen übertreffen.

Dies erzählt in seinem hübschen Werkchen über die Orchideen von diesem Reichtum folgendes: „Im Gebiet von Maulmain liegt ein Paradies der

Orchideen. Namentlich ist es ein Gebirgszug aus Kalkstein, der dort dem englischen Sammler Parish seine schönsten Perlen bot. Etwa 600 m über der Ebene erhoben, werden seine steilen Kalkwände unmittelbar von der unendlichen Fülle der Feuchtigkeit umhüllt, die der Südwestmonsun zwischen Mai und Oktober vom Meere herüberbringt; es fällt in diesen 6 Monaten dort ungefähr 10 mal so viel Regen, wie in Deutschland das ganze Jahr über. So bekleiden sich dann die schroffen Felsen bald mit lebendigem Flechtwerk zierlichster Pflanzen. Moose und Farne weben einen weichen Teppich herrlichen Grüns darüber, aus den Nischen blühen die buntesten Blumen, und auf Felsfinszen und Baumästen locken abenteuerliche Orchideengebilde. In schattigen Gründen sieht man die einfarbig rahmgelben Schuhblumen des *Paphiopedilum concolor* aus dem dunklen Laubwerk hervorschauen. An der Kalkwand selbst hängt *Phalaenopsis Lowii* herab;

locker neigt es seine Blütentrauben nieder, rein weiß gefärbt, doch von zartem Rosa überlaufen, das in der Lippe fast zu Purpur sich erwärmt.“

Es verbreitet sich die Mannigfaltigkeit und Schönheit der Orchideenflora aber auch über die Sundainseln hin, wo Java und die Philippinen den Sammlungen manches Juwel zugeführt haben, und nach Osten bis zu dem geheimnisvollen Neuguinea, dessen Flora wir noch so unvollkommen kennen, und das sicher noch Hunderte von unbekannten Orchideen birgt.

Aber die edelsten Kostbarkeiten unserer Orchideenhäuser stammen doch nicht von Asien, sondern aus Venezuela, Kolumbien und Guayana. Dort ist die Heimat der berühmten Stanhopea, Cattleya, Laelia, Oncidium, Catasetum, Masdevallia- und Lycaste-Arten, von denen einst A. v. Humboldt schrieb: „Das Leben eines Malers wäre nicht hinlänglich, um auch nur, einen beschränkten Raum durchmusternd, die prachtvollen Orchideen abzubilden, welche die tief ausgefurchten Gebirgstäler der peruanischen Andeskette zieren.“

Hauptsächlich von Südamerika werden nun unzählige Orchideen auf besonderen Schiffen, die manchmal 30 000—40 000 Stück auf einmal bringen, eingeführt. Londoner und Brüsseler sowie Genter Firmen, deren Umsatz sich auf viele Hunderttausende beläuft, haben ihre eigenen Reisenden und Sammler, die Entdeckungsfahrten, namentlich in die abgelegenen Gebirge und Urwälder Südamerikas, unternehmen, um neue Formen und Abarten zu finden oder das erforderliche Quantum Pflanzen zusammenzubringen.

Bogota, die Hauptstadt der Republik Kolumbien, ist so ziemlich das Zentrum dieses Orchideenhandels, mit dem unsere Gärtner versorgt werden. In der Nähe dieser Stadt liegt der dadurch in Rennerkreisen weltberühmt gewordene Ort Pachó (sprich Patscho), von dem aus in früheren Jahren Hunderttausende der herrlichsten Formen von *Odontoglossum crispum* nach Europa gesendet wurden. Infolge dieser Raubwirtschaft ist sogar der Urwald arm an diesen Orchideen geworden, so daß deren Preis ständig steigt, und bei uns jetzt für gewöhnliche schönblühende Exemplare vom wahren „Pachotyp“ bis zu 400 Mark verlangt werden.

In welcher Art die kostbaren Gewächse gewonnen werden, möge den Beschluß unserer kleinen Biologie der Orchideen bilden. Wir entnehmen unsere Angaben hierbei den jüngst in der „Gartenwelt“ erschienenen Schilderungen eines solchen südamerikanischen Sammlers. Er sagt:

Das Wichtigste für den Sammler ist stets, zuerst ein ergiebiges Urwaldterrain ausfindig zu machen. Denn es sind nicht alle Waldteile darin gleich. Von der dabei bewiesenen „guten Nase“ des Agenten hängt im wesentlichen der Erfolg ab. Hat sich ein passendes Gebiet gefunden, und ist dem Besitzer eine Pachtsumme, die meist den lächerlich geringen Betrag von 100—400 Pesos (1 Peso etwa 4 Mark) beträgt, für die Sammelerlaubnis gezahlt worden, so werden „Peone“, das sind eingeborene Arbeiter, aufgenommen, die in dem ebenso schwierigen als seltsamen Beruf des Orchideensammlers bereits Erfahrung haben. Denn die kostbaren *Odontoglossum crispum* wachsen hoch oben auf den Ästen und Wipfeln der Bäume, und ein Unkundiger würde unter all den Schätzen wochenlang umsonst herumirren, ohne etwas zu finden. Dieses Zusammensuchen geeigneter Deute ist bei der sprichwörtlichen Arbeitsfurcht der Kreolen eine ungeheure Schwierigkeit. Ist auch sie überwunden, wird eine Karawane ausgerüstet,

die mit Proviant, Kochgeschirren und Urten meist Montag morgens in die Berge abmarschiert. Im Walde werden vor allem „*Manchos*“ aus Stangen und Palmenblättern als Nachtquartiere gebaut, und dann zerstreuen sich die Sammler jeden Morgen im Walde und spähen nach den lustigen Schätzen aus. Ist ein Baum gefunden, auf dem *Odontoglossen* sitzen, wird er sofort umgehauen. Diese ganze schwere Arbeit liefert jedoch gewöhnlich nur 1—3 meist recht wertlose Pflanzen, aber immerhin bringt ein *Peon* 30—40 Pflanzen pro Woche zusammen und damit genügenden Verdienst. Mitunter hat er das Glück, ein unbefuchtes Dickicht zu finden, wo an tausend *Odontoglossen* mit leichter Mühe gesammelt werden können. — Aber die Indolenz und Beschränktheit dieser Kreolen ist so groß, daß sie sich gewöhnlich mit einem mäßigen Quantum begnügen und rasch in das Dorf eilen — um der „wohlverdienten Ruhe“ zu pflegen. Denn nichts in der Welt könnte einen *Peon* bewegen, früher zu arbeiten, als bis nicht auch der letzte *Peso* aus seiner Tasche verschwunden ist.

Die so gewonnenen Orchideen werden nur als Bulben nach Europa gesendet und dort von den Züchtern erst neu erzogen, einige Jahre gezüchtet, also akklimatisiert, bevor sie in den Handel gelangen. Neuestens verzichtet man jedoch immer mehr auf diesen umständlichen Weg und sucht die Pflanzen aus Samen zu vermehren — was jedoch nicht minder große Schwierigkeiten bietet, besonders da, wie wir wissen, der Samen staubfein ist.

Von diesen primitiven Anfängen der Orchideenkultur bis zum modernen Großgärtner, der Hunderte von Formen durch Kreuzungen zu erzeugen weiß, liegt eine ganze Kulturgeschichte, die noch nicht geschrieben ist, die aber glänzend dartun würde, wieviel Wissenschaft und Genie heute der Gärtner verbraucht, um uns seine Gaben bieten zu können, zu deren herrlichsten die Orchideen gehören.

Ophrys apuleia.

Orchideen.

Epilobium atrorubens var. *Randalianum*.

(Nach einem Aquarell von Ch. Pfeiffer-Stuttgart.)

Laelia-Cattleya Honble, Mrs. Astor.

Die
zweikeimblättrigen Pflanzen
(Dikotyledonen).

Wir gehen nun zu der zweiten großen Hauptgruppe der Pflanzen über, als deren Hauptmerkmal man den sehr nebensächlichen und, wie wir bereits auch gesehen haben, durchaus nicht durchgängigen Umstand seit alters hervorgehoben hat, daß ihre Keimlinge nicht mit einem, sondern mit zwei (auch drei) Keimblättern ihre Laufbahn beginnen. Aber in dem scheinbar Willkürlichen steckt doch ein natürlicher Begriff. Die Dikotyledonen haben doch zuviele gemeinsame Züge, als daß man diesen Begriff fallen lassen dürfte.

Als solche gemeinsame Merkmale zählt Wettsteins Handbuch der systematischen Botanik folgende Eigenschaften auf: Der Keim ist in der Regel mit zwei Keimblättern versehen, die lateral angelegt sind. Die Anlage der Wurzel wächst bei den meisten Formen zur Hauptwurzel heran, die sekundäres Dickenwachstum aufweist. Die Gefäßbündel der Laubblätter sind in der Regel netzförmig verzweigt. An Seitenachsen treten die ersten Blätter zumeist transversal (rechts und links) auf. Die Laubblätter sind vorherrschend gestielt oder mit verschmälelter Basis versehen. Die Blütenhüllen und Staubblattkreise der Blüte sind zumeist 4—5 zählig und nur seltener 2—3 zählig.

Innerhalb dieser Gemeinsamkeit bestehen allerdings die größten Mannigfaltigkeiten. So lassen sich die Blüten überhaupt nicht auf einen gemeinsamen Typus zurückführen, und demgemäß unterscheidet man innerhalb der Zweikeimblättrigen die großen Unterklassen der Choripetalae, deren Perianth fehlt, einfach oder doppelt ist, und der Synpetalae, bei denen von dem stets doppelten Perianth die Blätter des inneren Wirbels (nämlich der Korolla) seitlich mehr oder minder miteinander verwachsen sind.

Dem Kenner wird auffallen, daß in der gegebenen Charakteristik vieles so schwankend und unbestimmt gehalten ist. Es ist eben ohne Zwang unmöglich, scharfe Grenzen zwischen den Lebendigen anzugeben, und insofern ist die Erkenntnis von der Entwicklung und Einheit des Lebens eigentlich der Feind aller Systematik.

Das Engler'sche System, dem wir, wie bereits betont, aus Zweckmäßigkeitsgründen folgen, stellt an die Spitze der Zweikeimblättrigen die Choripetalae und innerhalb dieser deren erste Hauptgruppe (Monochlamydae oder Apetalae), bei denen die Blütenhülle entweder überhaupt fehlt oder nur einfach kelch- oder blütenartig ist. Wettstein beginnt hingegen bekanntlich das System der Angiospermen überhaupt mit den Monochlamydeen, namentlich mit den Kasuarbäumen (*Casuarina*), mit denen ja zweifellos phylogenetische Zusammenhänge nachgewiesen sind.

Die australische Eisenholzpflanze, wie man *Casuarina* zu deutsch benennen kann, ist insofern eines der für die Wissenschaft wichtigsten Gewächse geworden, wenn sie auch sonst gar nichts aufweist, wodurch sie das Auge des Nichtwissenschaftlers auf sich ziehen kann.

Anders der mit ihr verwandte Pfefferstrauch (*Piper nigrum*). Der ist schon ein seit Jahrhunderten bei uns so hochgeschätztes Gewächs (dessen Wertschätzung allerdings im Sinken begriffen ist), daß er den Anstoß zu zahlreichen Entdeckungsfahrten gab. Man unterscheidet im Handel den schwarzen von dem weißen Pfeffer, und der Laie glaubt deshalb, daß es sich hierbei um Produkte von verschiedener Herkunft handelt. Dem ist aber nicht so. Sondern der weiße Pfeffer ist der Same, der schwarze Pfeffer dagegen die ganze getrocknete unreife Beere derselben Pflanze. Das Land, wo der Pfeffer wächst, ist ursprünglich Indien gewesen, aber als Kulturpflanze gelangte dann der kletternde Strauch, von dem man 600 Arten kennt, in alle Tropenländer. Einst

war Venedig und Holland das Land der Pfefferkörner, heute hat England diesen Handel an sich gerissen und verhandelt den Pfeffer hauptsächlich von Singapur aus. Es ist uns heute, die wir den Pfeffer eigentlich nur als verdauungsanregende Zutat zu fetten Speisen schätzen, unbegreiflich, warum man dieses Gewürz einst so überschätzte, aber Tatsache ist, daß hauptsächlich die Gier nach Pfeffer z. B. Vasco de Gama auf seine abenteuerliche Fahrt trieb.

Die Kätzchenträger (Amentaceae).

Wir sind uns dessen bewußt, daß der im Titel genannte Begriff in der modernen Systematik verlassen wurde, da diese die Pflanzen, die man einst als Kätzchenträger zusammenfaßte, jetzt in verschiedene Reihen, in die der Weidengewächse (Salicales),

Männliche Blütenstände (Kätzchen) von Amentaceen.
(Naturaufnahme von H. Dopfer-München.)

der Walnußbäume (Juglandales) und Buchen (Fagales) teilt, die nebeneinander, aber nicht unter einen gemeinsamen Begriff geordnet sind. Trotzdem wollen wir praktisch sie in einem Abschnitt behandeln, denn sie zeigen in Bau und Lebensweise, in ihrer gesamten Ökologie soviel Übereinstimmung, daß dies wenigstens darstellungstechnisch gerechtfertigt ist. Alle Kätzchenträger haben einen ungewein einfachen Blütenbau, sie sind auch — mit Ausnahme der einzigen Edelkastanie und der Weiden — Windblütler. Von Kelch und Krone der Blüten ist demgemäß kaum eine Andeutung vorhanden.

Die Weiden fallen allein etwas aus dieser Einförmig-

keit heraus, mit ihnen wollen wir auch unsere Schilderungen beginnen.

Die Weide (*Salix*) ist als Baum und Strauch viel zu bekannt, als daß wir sie noch irgendwie zu charakterisieren brauchen. Die etwa 160 sehr schwer voneinander zu unterscheidenden Arten haben ähnlich wie die Orchideen das Vermögen, sehr leicht zu bastardieren, doch sind ihre Bastarde nur selten fortpflanzungsfähig. Es herrscht also große Verwirrung im Weidensystem.

Alle Arten leben in der gemäßigten Zone der nördlichen Halbkugel, sie bringen sogar bis zu den eisigen Höhen der Hochgebirge (*Salix reticulata*) und gehen in den Frost der zirkumpolaren Länder. Spitzbergen und Grönland entwickeln eine ganz eigene Weidenflora. — Eine unserer häufigsten Formen, die Salweide (*S. capraea* L.),

Weidenau in Ungarn. (Nach dem Gemälde von G. Mezőly.)

kann etwa als Typus der ganzen Gattung gelten. Mit welcher Sehnsucht wird im Lenz ihr Blütenwachstum erwartet, liefert sie doch die bekannten „Palmkästchen“! Die grauen Kästchen sind hierbei die Stempelblüten, die gelben dagegen die von den Bienen zur blütenarmen Zeit so reichlich besuchten Pollenblütenstände, während die weiblichen auch reichlich Nektar ausscheiden. Die Weidenblüte ist jedoch zugleich eine Pollenblüte, die Blumenstaub in sehr großer Masse herstellt, so daß die Bienenbesucher abwechselnd zu den männlichen und weiblichen Blütenständen hingelockt werden. Die langen Staubfäden verbürgen es, daß die Staubbeutel von den Insekten abgestreift werden,

Salweide (*Salix capraea*).
Links männliche, rechts weibliche Blüten. (Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Seined-Alzey.)

die frühe Blütezeit erhöht die Auffälligkeit der Blüten und vermindert die Konkurrenz. — Die Weiden sind überhaupt durch und durch gut angepasste Pflanzen. Der aus den Blüten entstehende Same wächst in Kapseln heran, die aufspringen und an sonnigen Tagen die kleinen Samenkörnchen entfliegen lassen, daß jedes mit einer Flocke seiden-

Weidenzweig, die, in Wasser gesteckt, sich bewurzeln.

(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Seined-Alzen.)

weicher Haare als Flugschirm versehen ist (mit diesen Flocken tapeziert der Buchfink sein Nest). Bekanntlich verwendet man aber zur Weidenkultur, die in sehr ausgebreitetem Maße betrieben wird (das Zentrum in Deutschland ist die Stadt Briezen), nicht die Samen, sondern Stecklinge, d. h. abgeschnittene Zweige, die sich sehr rasch bewurzeln und jene rätselhaften Erscheinungen der Polarität zeigen, deren wir in Bd. II, S. 79 ausführlich gedachten. Die Weide ist in biologischer Hinsicht ein besonders interessantes Gewächs. Ihre Rinde enthält den bekannten Bitterstoff, offenbar ein Schutzmittel gegen Tierfraß. Ihre Zählebigkeit ist sprichwörtlich. Darum kann man sich gerade bei ihr jene Barbarei erlauben, durch die so viele unserer Landschaften verunstaltet sind, nämlich sie der Zweige zu berauben und zu Kopfweiden zurechtzustutzen. Es wäre wert, eine besondere Untersuchung darüber anzustellen, ob nicht infolge dieser Jahrhunderte alten Übung die Weiden die Reserveknospen hervorgebracht haben, die bei ihnen an beiden Seiten der Triebe in besonders großer Zahl sitzen. Tatsache aber ist, daß sie durch diese imstande sind, an Stelle eines abgehauenen Zweiges zwei zu bilden, so daß gerade die am ärgsten beschädigten Sträucher den dichtesten Wuchs aufweisen.

Infolge dieser Zählebigkeit kann die Weide auch besonders dazu benützt werden, Ufer und Dämme vor dem Wasser zu schützen, um so mehr, als ihre mächtigen, langen Wurzeln den Boden nach allen Richtungen hin durchwachsen. Dies gilt besonders für die bekannte Korbweide (*S. viminalis*). In den Dünen besorgt die Natur selbst diese

Bindung des Bodens durch die Kriechweide (*S. repens*), die in ihrem Wuchs gewissermaßen ein Vorbild ist für die kriechenden Zwergweiden der Arktis und der Hochgebirge (vgl. Farbentafel Bd. I, S. 208), wo *Salix reticulata* und *retusa* ein kümmerliches Dasein führen. Mächtiger entwickelt ist diese Formation in Grönland und namentlich auf den norwegischen Gebirgen, wo zahlreiche Arten eine ganze „Weidenregion“

bilden. Als Ursache dieses niedrigen, oft nur wenige Zentimeter hohen Wuchses sieht man die Kälte an, der gegenüber die Sträuchlein von der Bodenwärme zu profitieren trachten. Auch mögen die Stürme hierbei beteiligt sein.

Die Gartenkunst hat den schönen malerischen Baum nicht ohne Beachtung gelassen und macht von ihm sowohl in Landschaftsgärten wie auch als Friedhofbaum Gebrauch. *Salix babylonica* L., die echte Trauerweide, ist mit ihren überhängenden Ästen darob allbekannt. Sie stammt ursprünglich aus China und Japan und wurde erst vor zirka 200 Jahren in den Orient eingeführt. Sie hat also nichts mit Babylon zu tun und ist auch nicht der Baum, den die Bibel als Trauerweide erwähnt. Wenig bekannt sein dürfte, daß sie nur in weiblichen Exemplaren in Europa lebt.

Der Handelswert der Weiden ist in stetem Steigen begriffen, und darum breitet sich die Weidenkultur neuerdings stark aus. Die Zeiten sind allerdings vorbei, da man aus ihrer Rinde Salizyl herstellte, aber sie gehört noch immer zu den wichtigsten Gerbmaterien, und man hat eine eigene Flechtindustrie auf sie gestellt, für die *S. fragilis*, *purpurea*, *vitellina*, *alba* und andere Arten vornehmlich in Betracht kommen.

Nahe verwandt mit den Weiden und mit ihnen in dieselbe Familie der Salikazeen gehörig sind auch die Pappeln

(*Populus*). Die Gattung ist in mehreren Erdteilen, vorwiegend aber in den gemäßigten Ländern der nördlichen Halbkugel verbreitet. Von ihren 18 Arten sind einige, so die Silberpappel (*P. alba* L.), die Schwarzpappel (*P. nigra* L.), die Zitterpappel, gemeinhin als Espe bekannt (*P. tremulata* L.), und neuerdings auch die kanadische Pappel (*P. canadensis* Mch.) jedem Naturfreund wohl bekannt. Er weiß auch, daß die Pappeln feuchtigkeitsliebende Gewächse, daher kennzeichnend für die Aulandschaft sind, wo namentlich Espe und besonders die Schwarzpappel Riesebäume von außerordentlichem Stammdurchmesser bilden. Man wird sich wundern, in dieser Aufzählung die schönen Allee-bäume zu vermissen, die hohen Pyramidenpappeln, deren Anpflanzung Napoleon so begünstigte, angeblich weil sie ihm im Feindesland schon von fernher die Orientierung über die Landstraßen so erleichterten. Neuere Botanik spricht jedoch diesem Baum die Artselbstständigkeit als *P. pyramidalis* oder *italica* Mch. ab. Wie Breton-Bonnard in seinem der Pappel gewidmeten Buch „Un arbre utile“ schreibt, ist die Alleepappel nur eine südöstliche Wuchsform der Schwarzpappel. Aus der Lombardei, wo sie wild wächst, soll am Ende des 18. Jahr-

Die Wurzeln eines umgekehrt ins Wasser gesteckten Zweiges wachsen nach unten, die Sprosse nach oben.
(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Seined-Allen.)

hundreds ein Baum in den Park von Wörlitz bei Dessau gelangt sein, und man behauptet, daß er der Stammvater aller deutschen Alleepappeln sei. Tatsache ist, daß man in ganz Deutschland nur 8 weibliche Pyramidenpappeln kennt, den Baum also durch Stecklinge fortpflanzen muß. Und Tatsache ist auch, daß fast alle männliche Bäume jetzt gipfeldürr werden, was man dieser Vermehrungsweise zuschreibt. Da außerdem die Pyramidenpappeln ein Hort zahlreicher schädlicher Insekten sind, pflanzt man sie in neuerer Zeit nicht mehr an, und so verschwindet langsam, aber sicher ein Stück Poesie der ohnedies reizlosen ebenen Landschaften. — Die Pappeln haben die biologische Eigentümlichkeit,

Alte Schwarzpappel in der Lobau bei Wien.
(Naturaufnahme von Fr. A. Mayer-Wien.)

daß sie unter allen Bäumen am raschesten wachsen; das macht sie wertvoll dem Tischler und Küfer, obzwar ihr Holz weich ist. So kommt es aber auch, daß man sehr oft äußerst mächtige Bäume, namentlich Schwarzpappeln trifft, die viel jünger sind, als sie eingeschätzt werden. Pfuhl schreibt in seinem Werke über die Bäume und Wälder der Provinz Posen, daß ein im Jahre 1840 gepflanzter Baum bei Romnik 30 m hoch ist und einen Stamm von 3,5 m Umfang hat. Im Osten gedeiht der Baum überhaupt besser, und als stärkste Schwarzpappel mag wohl die aus dem Breslauer botanischen Garten gelten mit 8 m Stammumfang. An die Spitze hat ob ihres ewig klingelnden Laubes die Sage reichlich angeknüpft. Sie soll der ganzen Gattung den Namen eingebracht haben, denn griechisch bedeutet papallomai =

ich zittere, was nach Kanngießers „Etymologie der Phanerogamen=Nomenklatur“ auch eipen bedeuten soll. Biologisch hat dieses durch lange und eigen gekrümmte Blattstiele bewirkte Zittern gewisser Spreiten den Nutzen, daß die Transpiration gefördert wird. Die Spitze hat an ihren ersten Frühlingsblättern Nektarien, durch die sie sich Ameisen als Schutztruppe gegen ihre zahlreichen Insektenfeinde sichert, worüber wir in Bd. I, S. 264 schon ausführlicher berichtet haben.

Gerade an der Spitze sieht man auch den „Reiserausschlag“ besonders häufig, der allen Pappeln eigen ist und sie im Auwalde dadurch unverwundlich macht, da sogar aus den Wurzeln gefällter Stämme neuerdings Pappelbüsche aus Adventivknospen hervorbrehen. Mit den Weiden teilen viele Pappeln (am wenigsten tremula und alba)

Erlenbruch
Motiv vom Dreieinigkeitssee im Schwarzwald
(Naturaufnahme von E. Blumenthal in Wildbad)

sogar die Eigenheit, daß man sie als „Stopfholz“ behandeln kann. Mit diesen stimmen sie auch im Blüten- und Fruchtbau im wesentlichen überein.

Wenn auch der Gärtner die Esen nicht ungern als Parkbaum verwendet, so gibt er doch den Silberpappeln (*P. alba*) mit ihrem blizenden Laube unbedingt den Vorzug. Die Pflanze hat ihren Namen von dem weißen Haariüberzug, durch den sie übermäßiger Transpiration zu entgehen weiß. Auch dieser Baum ist, so wie die Espe und die anderen Pappeln, ungemein lichtbedürftig und hat demgemäß eine außerordentlich lichte Krone.

Zitterpappel am Flußrand, deren Verästelung sich der Lage des Stammes angepaßt hat.
(Nach einer Photographie.)

Am meisten wird jedoch seit einiger Zeit für die kanadische Pappel (*P. canadensis* Mch.) geworben, die sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich ungemein rasch verbreitete. Sie hat bereits jetzt die ihr sehr ähnliche Schwarzpappel zurückgedrängt, denn wie ihre Vobpreisler, namentlich E. Kern, der eine besondere Werbeschrift für sie verfaßte, behaupten, ist sie die „wertvollste und größte Holzherzeugerin unserer Breiten“. Tatsächlich ist sie außerordentlich raschwüchsig, wofür unser Bild als Zeuge dienen mag, und sie verfertigt auch durchschnittlich besseres und wertvolleres Holz als die meisten anderen Pappelarten. Dazu hat sie noch den besonderen Vorteil, keinen Stocsausschlag zu erzeugen, durch den sich namentlich die Schwarzpappel lästig macht. Es gewährt zwar einen äußerst malerischen Anblick, so einen Alten des Waldes mit mächtigen Windpfeilern (vgl. Bd. I, S. 169 und Bild S. 170), umgeben von so viel Nachwuchs, zu sehen, aber in Wirklichkeit nimmt er dadurch wertvolleren Gewächsen den Platz weg.

Franeé, Das Leben der Pflanze. IV.

Wir gehen nun zur nächsten Reihe der Juglandales über, von der in der einzigen Familie der Juglandaceae von heimischen Gewächsen nur der edle Walnußbaum (*Juglans regia* L.) in Betracht kommt. Seine wahre Heimat ist ja nicht Deutschland, sondern das Mittelmeergebiet bis zum Himalaja, jedoch ist er durch Kultur ein vollberechtigter Bürger der deutschen Flora geworden. Ursprünglich (nach Skandra) ein heiliges Gewächs semitischer Völker, ist er heute ein Nationalbaum der Ungarn, und auch unser Volk hat bereits zahllose Gebräuche und Legenden um den Fremdling gesponnen, der ja auf seine wahre Heimat dadurch hinweist, daß seine größten

Gruppe von 10 jährigen kanadischen Pappeln. (Photographie von W. Veher-Bielefeld.)

und ältesten
Vertreter
nicht im
mittleren
Europa,
sondern im
Südosten
wachsen.
So soll ein
Nußbaum
im Bairische
tale bei
Balaklawia
in der Krim
mehrere
tausend
Jahre alt
sein und
jährlich oft
an 100 000
Nüsse tra-

gen. Er scheint von Griechenland über Italien zu uns gewandert zu sein, weshalb seine Früchte vielenorts auch noch „welsche Nüsse“ genannt werden, was in Walnuß widerklingen mag. Wenn das Holz der Pappeln geringwertig ist, so bildet der Nußbaum gerade den Gegensatz. Mehr noch als der Früchte halber schätzt man ihn wegen seines ausgezeichnet gleichmäßigen, harten und dauerhaften Möbelholzes. — Nur kann er bei uns nie so ganz heimisch werden (außer im Rheinland), denn es schaden ihm unsere kalten Frühjahrsnächte, und in jedem Winter erfrieren zahlreiche Nußbäume. Dagegen soll er in Birma wildwachsend sogar große Wälder bilden. Deswegen wird auch fast der gesamte Bedarf unserer Möbelindustrie von Osteuropa und noch weiter eingeführt, wobei besonders die über der Wurzel liegenden Maserteile hoch eingeschätzt werden.

Biologisch ist von dem Nußbaum nicht viel zu berichten. Im April treibt er seine grünen Fruchtblüten, an denen nur die weißlichen Narben etwas auffallen. Die Staubblüten sind zu herabhängenden Rätzchen vereinigt. Der Blütenstaub fällt von den Blüten auf muldenförmige Vertiefungen der unter ihnen stehenden Blütendecken. Da ist er vor Nässe gesichert und tritt mit jedem Lüftchen seine Reise an.

Ganz einzigartig in botanischem Sinne sind die Früchte des Nußbaumes. Bekanntlich haben sie zwei Hüllen, die grüns fleischige, die, so wie die Blätter, gerbstoffreich ist, und die steinharte braune Schale, die dann in Funktion tritt, wenn die Außenhülle aufplatzt. Was man an diesen Früchten verzehrt, sind die zwei ölhaltigen Keimblätter; was man aber an ihnen nicht deuten kann, das ist ihre merkwürdige, wirklich, wie einmal der Dichter Strindberg meint, an das Menschenhirn erinnernde Gestalt. Dagegen läßt es sich leicht einsehen, daß alle die angeführten Schutzmittel gegen Eichhörnchen und andere Nagetiere angewandt sind.

Von seinen Verwandten wird der Butternußbaum (*J. nigra* L.) und der Olußbaum (*J. cinerea* L.) in Nordamerika noch höher geschätzt als unser kostbarstes Nußholz, nämlich das italienische, und sein Holz wird in neuerer Zeit auch massenhaft nach Europa verschifft.

Damit wären wir bei der Hauptreihe aller Näßchenblütler, bei den Buchenartigen (*Fagales*), angelangt, von denen wir eine größere Anzahl heimischer Vertreter gemäß dem Programme unseres Werkes zu betrachten haben. Hierher gehören Birke und Erle, Hainbuche und Haselnuß, der Kastanienbaum und die Rotbuche, nicht zuletzt aber der edelste aller Bäume, die Eiche. Die vier erstgenannten pflegt man in die Familie der *Betulaceae*, die übrigen in die der *Fagaceae* einzuteilen. Beginnen wir mit dem zartesten aller einheimischen Laubbäume, mit der Birke (*Betula*).

Von den etwa 35 Arten dieser Gattung, die sich auf der ganzen nördlichen Halbkugel nahezu in der Verbreitung gegen Norden wie die Nadelhölzer, in deren Gesellschaft sie lebt, findet, kommen nur wenige Arten, wie *B. verrucosa*, *pubescens* und *nana*, in Deutschland vor, von denen eigentlich nur die erstere größere Bedeutung erlangt hat. An sich ist ja die schöne Birke mit ihrer weißen Rinde und ihrer zierlichen, freudig-grünen Krone ein uralter Kultbaum, an den sich zahlreiche Mythen und Gebräuche knüpfen. Besonders die Slawen, in deren Heimat, so in Rußland, große Birkenwälder bestehen, waren darin unerschöpflich. Die Birke war einst ihr Nationalbaum, nach ihm benannten sie zahlreiche Ortschaften, was sogar in vielen deutschen Ortsnamen widerklingt, da Treuenbrießen, Bretschke, Brix alle auf den slawischen Namen der Birke, nämlich *breza*, zurückgehen.

Von ihren Birkenwäldern ist unsere Birkenheide, wenn sie, mit Hängebirke (*B. verrucosa*) und Besenbirke (*B. pubescens*) besiedelt, ihr liches, pflanzenarmes Gehölz in den ärmsten sandigen und moorigen Gegenden aufstellt, nur ein schwacher Abklatsch. Die Birke ist ein überaus bescheidener Baum, darum nimmt sie auch mit Grönland und Sibirien als Besiedlungsgebiet vorlieb und vergesellschaftet sich bei uns besonders mit Heide, Wacholder und Dünenvegetation. Wenn sie auch zersprengt oder in kleinen Wäldchen nirgends in Deutschland fehlt, so macht sie doch insgesamt mit den Pappeln und Erlen zusammen nur etwa 9% unseres Waldbestandes, also verschwindend wenig, aus. Dies kommt schon daher, daß sie sehr viel Licht braucht, sich also im geschlossenen Bestand und im Hochwalde gar nicht wohl fühlt. Auch kann sie mit ihren sehr wenig ausgebreiteten und nicht tiefgehenden Wurzeln den Boden nur schlecht aufschließen.

Eine auch dem Laien, namentlich an der frischbelaubten, „Maian“ genannten Birke auffällige Erscheinung ist ihr kräftiger Balsamduft, den Hunderte von Harzdrüsen über

Im Birkengebüsch. (Naturaufnahme von J. Kaiser in München.)

in ihrer Jugend schneeweiße Rinde, die einst der Europäer vor Erfindung des Lumpenpapiers als Schreibtafel benützte. Im Zimeliensaal der Münchner Staatsbibliothek sind ständig derartige, auf Birkenrinde geschriebene alte Werke ausgestellt. Von dieser Rinde rührt auch der ältere Namen der Warzenbirke als *B. alba* her.

Die Blüten- und Fruchtbiologie der Birke belehrt ebenfalls über verschiedene Eigenheiten. Die hängenden Staubkäzchen entwickeln sich

die Blätter ergießen, die aber später ihre Tätigkeit einstellen. Man hat darin einen Schutz gegen Sonnenstrahlen und gegen Tierfraß sehen wollen und unserer Ansicht nach damit auch das Richtige getroffen.

Der mächtige Saftfluß, den ein im Frühling angebohrter Birkenstamm liefert, und der als kosmetisches Mittel unter dem Namen Birkenbalsam vielbegehrt ist, hat aber mit der soeben erwähnten Erscheinung nichts zu tun. Es ist dies nichts anderes als die jedem Pflanzenphysiologen wohlbekannte Erscheinung des Saftdruckes, die sich nur bei der Birke in außergewöhnlichem Maße äußert. Man fertigt aus diesem Saft sogar einen Birkenwein, schädigt aber damit viele Bäume unheilbar, daß man sie „verbluten“ läßt.

Wohlbekannt dem Naturfreund ist auch die warzige, nur

Birtenzweig mit männlichen und weiblichen Blütenständen.
(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Seined-Alzen.)

bereits im Herbst und bleiben den Winter über wie tot am Baume hängen, aber die kleineren Stempelflägchen kommen erst mit den hellen Blättlein aus den Knospen hervor. Die Birke ist also zweihäufig. Ihr Pollen ist wirklich staubartig und wird in außergewöhnlicher Menge erzeugt. Die Fruchtblüten stehen je zu dreien zusammen und haben unter ihren Deckschuppen je zwei große drüsige Narbenfäden. Der Massenproduktion entspricht auch die Samenmenge. Als Frucht werden geflügelte Nüßchen zu Tausenden erzeugt, die leicht vom Winde so gründlich verstreut werden, daß Birken auf Türmen, Ruinen, steilen Felsen etwas ganz Gewöhnliches sind und auch im Forstbetrieb niemals künstlich ausgesät zu werden brauchen.

Eine Eigenheit der deutschen Flora ist *Betula nana*, die Zwergbirke, die als nachlebendes Überbleibsel der Eiszeitflora in manchen Hochmooren noch ein kümmerliches Dasein führt. In Schweden, Grönland und Rußland reicht sie als niederes Buschwerk bis zum 75.° und überzieht dort weite Strecken. Bei uns ist sie eine der seltensten Baumarten und erreicht als Busch nur etwa 75 cm, wird merkwürdigerweise, obwohl sonst Birken bei 25 m Höhe bis 150 Jahre erreichen, nur etwa 25 Jahre alt. In den bayrischen Mooren kennt man nur 5 Fundorte dieses seltenen Gehölzes. J. Scholz gibt in seinen „Pflanzengenossenschaften Westpreußens“ von dem berühmten Fundort des Hochmoores von Neulinum bei Damerau (Kulm) an, daß die Zwergbirke dort staatlich geschützt werde. Die Pflanze erhebt sich dort in dichten Beständen etwa einen Meter hoch über das Moos und würde sich kräftig vermehren, wenn ihrem Bestreben der Wald ringsum keine Hindernisse entgegenstellen würde.

Ein nahverwandter Baum ist die allbekannte Erle (*Alnus*), von der etwa 14 Arten, hauptsächlich in Europa und Asien, weniger in der neuen Welt, verbreitet sind. Davon ist die Grünerle (*A. viridis* D.C.), die Schwarzerle (*A. glutinosa* Willd.) und die Grauerle (*A. incana* Willd.) auch bei uns überall verbreitet und ein Charakterbaum des Bachrandes und des „Erlenbruches“.

Im Erlenbruch (s. d. Tafel) herrscht meist die Schwarzerle im Verein mit Weiden vor und spielt bei der Verlandung eine wichtige Rolle. Für ihr dauerndes Gedeihen ist sowohl Bewegung des Bodenwassers wie ständige Grundfeuchtigkeit nötig. Die Erlen siedeln sich daher als erste Bäume schon auf den noch schwimmenden Rämpe an und tragen selbst noch zur Verlandung bei. Als Begleitvegetation stellen sich dann später reichlich Jarne, die Rafenschmiere, Waldbinsen, Milzkraut, Weideriche, Springkraut, Schachtelhalme und Zwiebeln ein. Aber nur die Weide allein leistet als Baum der Erle Gesellschaft.

Der schöne Baum mit der tiefgrünen Krone und dem dunklen Stamm, der im Herbst sein Laub noch ganz grün abwirft, im ersten Frühling aber sich in eine Wolke rötlich leuchtender Staub- und Fruchtblüten hüllt, hat von je die Deutschen angezogen, und nach unserer Mythologie ging aus „Embla“, der Erle, die Frau hervor, während „Ask“, die Esche, den Mann bildete. Nur ist wahrscheinlich unter der Erle des Mythos die in nordischen Gegenden mehr verbreitete *Alnus incana* zu verstehen. Diesen Begriffen entsprechend, knüpft unser Volk noch heute allerlei abergläubische Begriffe an die Erle, der es vielerlei Namen (Eller, Else, Elrige) verleiht. In Norddeutschland wächst der Baum auch zu ansehnlichen Dimensionen heran. So wird von einem Exemplar in Posen bei dem Dorfe Glinno berichtet, dessen Stamm fast 4 m Umfang

erreichte. An solchen älteren Stämmen kann man auch dieselben Strebepfeiler beobachten, die wir als Windanpassung bereits in Bd. I von den Pappeln beschrieben und abgebildet haben. Als noch unerklärte biologische Eigentümlichkeit des Baumes gilt, daß seine Knospen gestielt sind. Im Herbst wieder ist er überaus leicht daran zu erkennen, daß die zapfenartigen, dunkelgefärbten Fruchtstände winters über am Baum bleiben. Sie sperren im Winter ihre holzigen Deckschuppen auf, und die allerdings

nur wenig beflügelten, aber sehr leichten Samen werden durch den Wind verbreitet, nach anderen Naturforschern aber durch die Eisschollen verschleppt. Jedenfalls werden sie so leicht verbreitet, daß gerade die Erle ebenso wie die Birke besonders leicht zur „Überpflanze“ wird, wie das beistehende interessante Bildchen beweisen mag.

Höck gibt an, daß dieser Baum ganz ähnlich verbreitet sei wie die Stieleiche, während die Grauerle nach ihm im Westen Deutschlands gar nicht einheimisch sein soll. Als typische Erlenbegleiter dagegen nennt er auf Grund seiner Erfahrungen auch jene, welche die Waldgenossenschaft der Stieleiche bilden, nämlich den Kreuzdorn (*Rhamnus frangula*), die Alpen-

Welden- und Erlenbaum bei Groß-Gerau.
(Nach einer Photographie von G. Schnacker in Groß-Gerau.)

johannisbeere (*Ribes alpinum*), die Melkenwurz (*Geum montanum*), den Nachtschatten (*Solanum dulcamara*) und andere mehr. Woher aber diese merkwürdige Übereinstimmung rührt, vermag er nicht zu deuten. Es sind überhaupt von diesem Baum eigenartige Beziehungen bekannt. So steht z. B. die als Seitenstück zu den Patschen auf den höchsten Gebirgskämmen als Busch wachsende Grünerle (*A. viridis*) in ihrem Habitus den Erlen, in ihrem Blütenbau aber den Birken nahe.

Da die Erlen in den Brüchern die einzige rentable Holznutzung sind (z. B. im Oberbruch oder im Spreewald), haben sie immerhin auch forstwirtschaftliche Bedeutung und werden im Niederwaldbetrieb, allerdings in geringem Maßstabe kultiviert. Ihr Holz wird ganz besonders zu Wasserbauten geschätzt.

Von der Erle ist es scheinbar ein Sprung, zu den Haselsträuchern (*Corylus*) überzugehen, da sie im Buchse doch so verschieden sind. Aber dieser Sprung ist nur scheinbar vorhanden, denn im System stehen die beiden Gattungen einander ganz nahe. Vermittelnd könnte man vielleicht die Hopfenbuche (*Ostrya carpinifolia* Scop.) anführen, die in ganz Südeuropa und im Orient sowohl Bäume als Sträucher bildet, bei uns allerdings nur da und dort in Parkanlagen angepflanzt wird. Dieser Baum hat jedoch ziemlich große, auffällige, an Hopfenblüten erinnernde Blütenstände, während uns die Hasel als erster Frühlingsbote mit ihren lieblichen, schwankenden Nägchen ans Herz gewachsen ist.

Von den 7 Arten der Hasel weiß man, daß sie nur Überbleibsel einer einst viel weiter verbreiteten Gattung sind, die zur Tertiärzeit sogar noch die Polarländer besiedelte. Aber der Strauch scheint überhaupt im Aussterben begriffen zu sein, wenigstens deuten die Untersuchungen Gunnar Anderssons, über die wir in Bd. I bereits berichteten, darauf, daß er noch jetzt in beständigem Zurückweichen begriffen ist. Sein jetziges Verbreitungsgebiet ist allerdings noch ausgedehnt genug, erstreckt es sich doch von Schweden und Neufundland bis Zentral- und Ostasien und nach den Mittelmeerländern.

Es gibt zwar auch Haselbäume (*C. Colurna* L.), aber unsere heimatische Hasel (*C. avellana* L.) erscheint stets nur in Strauchform. Die in Gärten oft gezogene rotblättrige Form, die man als Bluthasel bezeichnet, gehört dagegen zu der Art *C. tubulosa* Willd., deren Frucht als Lambertnuß auch höher geschätzt wird (vgl. das Bild). Immerhin ist die Hasel kein so auffälliges Geschöpf, daß es sich erklären ließe, warum der Aberglaube der Vrier mit solcher Vorliebe an sie anknüpft. Sie gilt z. B. als blicksicher und war deshalb Thor geweiht, daher wirft die deutsche Bäuerin bei dem Gewitter noch immer drei Haselnägchen in das Feuer. Aus diesem Vorstellungskreis ist es auch zu erklären, warum „Zauberstab“ und Wünschelrute mit Vorliebe aus Haselzweigen verfertigt werden.

Über die Blütenbiologie der Hasel wurde bereits in Bd. II, S. 506 das Nötige gesagt und auch mit einem Bilde belegt. Die Hasel, als einer der frühesten Blüher, löst ihre Nägchen oft bereits im Februar, bildet aber ihre Samenanlagen erst 2—3 Monate nach der Blütezeit aus und bewahrt daher den Pollen so lange auf.

1 = Männliche Blüten von *Corylus avellana* im Stäuben.
2 = Männliche Blüten von *Corylus tubulosa*.
(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Heinemann.)

Von den zwei Samenanlagen kommt gewöhnlich nur eine zur Entwicklung; bilden sich beide aus, so entstehen die „Vielliebchen“. Trotzdem die Frucht so gut durch die harte Steinschale geschützt ist, fallen doch die Früchte massenhaft den Nüsselkäfern (*Balaninus*) zum Opfer, ohne daß die Pflanze es verstanden hat, irgendeine wirksame Gegenanpassung hervorzubringen, ein neuerlicher Beweis, daß die Ursache der Anpassungen nur eine beschränkte ist. Die Fruchtbildung zeigt auch eine merkwürdige biologische Eigentümlichkeit, die, weniger ausgeprägt, sich auch bei der Weißbuche und Buche findet und von Graebener in folgender Weise geschildert wird: Die weiblichen Blüten der Hasel strecken bekanntlich ihre roten Narben zwischen den Knospenschuppen der Winterknospen heraus, stehen also scheinbar an vorjährigen Zweigen. Sind die Narben vertrocknet, und beginnt der Laubaustrieb, so lassen sich die jungen Früchte außerordentlich schwer finden. Genaue Untersuchung zeigt aber, daß unterhalb der Blüten in der Winterknospe je ein schon vollständig angelegter beblätterter Trieb vorhanden ist. Dieser streckt sich, entwickelt seine Blätter und hebt die jungen Früchte an seiner Spitze heraus. Daher kommt es, daß die Früchte schließlich am Ende diesjähriger beblätterter Zweige stehen. Bis die Blätter ausgebildet sind, bleiben die jungen Früchte in der Entwicklung fast stehen und beinahe so klein, wie sie in der Blüte waren. Erst nach völliger Entfaltung des Zweiges und seiner Blätter beginnt ein lebhaftes Wachstum; die Früchte reifen also, trotz der frühesten Blütezeit, erst spät zu Beginn des Herbstes. Eine Erklärung dieses ganz ungewöhnlichen Verhaltens scheint derzeit nicht möglich zu sein.

Die vorhin genannte Hainbuche (*Carpinus Betulus* L.), auch Weißbuche genannt, ist ein naher Verwandter der Hasel und gehört ebenfalls noch in die Familie der *Betula*-zeen. Auch sie ist nicht immer ein Baum, sondern hat unter den 12 Arten der Gattung, die von Ostasien bis Mexiko verbreitet ist, auch manchen Strauch. Bei uns wächst die „Hagebuche“ allerdings meist zu einem mächtigen, bis 30 m hohen und 400 Jahre alten Baum heran, der mit seiner silbergrauen, mit rippigen Wülsten versehenen Rinde, seinen reichen, meist aufwärts gerichteten Zweigen und seiner schönen, domartigen, dichten, starren Krone ein echter deutscher Baum ist, der sich von da bis Rußland und Persien verbreitet, aber schon in der Schweiz selten wird, jenseits der Alpen sogar ganz fehlt. In Rußland bildet sie reine Wälder, bei uns steht sie stets eingesprengt, namentlich in feuchteren Lagen. Der Förster liebt sie, zumal da sie einer der Ausserkorenen des Schicksals ist, dem Frost nichts anhat, auch Krankheiten und Feinde verschonen sie. Dagegen hat sie ein so hartes Holz, daß man sie darob auch Hornbuche nennt und in den Sprichwörtertschatz aufnahm; auch treibt sie so reichlich Stoddausschlag, daß sie fast unverwundlich ist.

Im April blüht sie in langen Röhchen, aus denen Nüsse hervorgehen, die mit einem mächtigen, dreizackigen Deckblatt geschmückt sind, das ihnen zur Verbreitung durch den Wind außerordentlich dienlich ist. Dadurch, daß diese eigenartigen Früchte in langen Büscheln die ganze Krone durchsetzen, gewährt eine fruchtende Hainbuche einen höchst malerischen und belebenden Anblick. Ihrem schönen weißen, namentlich vom Stellmacher hochgeschätzten Holz verdankt sie den Namen Weißbuche.

Man möchte bei manchem in dieser Beschreibung glauben, daß die Hainbuche also unmerklich zu der Rotbuche überleite, aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Die echten Buchen gehören vielmehr einer ganz anderen Familie, in der Reihe *Fagales*, an,

Eichengehölz

(Naturaufnahme von W. Schaff-Greif)

sie sind echte Becherfrüchtler (*Cupuliferae*), deren Blütenbau sie scharf von allen bisher betrachteten Pflanzen scheidet. Der Botaniker sagt von ihnen, daß ihre Blüten in köpfchenförmigen Blütenständen angeordnet sind, die allerdings auch auf Windbestäubung rechnen. Ihre Frucht ist eine „einsamige Schließfrucht“, die einzeln oder zu mehreren von einem Fruchtbecher (*Cupula*, daher *Cupuliferae*) umgeben ist. Hierher gehören drei sehr bekannte europäische Bäume: die Buche, Eiche und die Edelkastanie, deren Schilderung wir uns denn auch nun hingeben wollen.

Am wenigsten wichtig für uns ist der letztgenannte Baum (*Castanea sativa*). Er ist in unserem Vaterland eigentlich auch nicht heimisch, sondern dort hin von den Mittelmeerlandern nur eingedrungen. Immerhin liefern auch die deutsche Südschweiz und Südtirol, Ungarn, die Rheinpfalz, die Bergstraße, einzelne Gegenden in Hessen-Nassau treffliche Maronen als Zeichen, daß dort die Kastanie in wahren Wäldern grünt. So gut gedeiht sie allerdings bei uns nicht wie in

300—400 jährige Edelkastanie (*Castanea sativa*) bei Graz. Ein Teil des Baumes ist durch einen Blitzschlag zerstört. (Naturaufnahme von J. E. Peters†=Graz.)

Italien, wo der berühmte Kastanienbaum des Vtna, ein vielbestauntes Wunder der Pflanzenwelt, 60 m Stammesumfang erreicht hat. Dieser Baum führt den Namen des Castagno dei cento cavalli, weil angeblich 100 Pferde in seinem Schatten stehen können. Eigentlich besteht dieser Riese aber aus 4 Stämmen, und es geht uns damit so wie mit den bekannten Rieseneiben. Immerhin hat man aber auch anderweitig Stämme von 20 m Durchmesser; ein solcher ehrwürdiger Baum steht bei Neuwecelle am Genfer See, südöstlich von Evian. Und auch in England gibt es derartige. Im allgemeinen aber reift der Baum über dem 50. Breitengrad nur ausnahmsweise seine

Früchte — so zu Berlin im Jahre 1895 — und erreicht seine volle Mächtigkeit auch nur in südlicheren Breiten.

Die Kastanie ist blütenbiologisch ebenso eine Ausnahme in ihrer ganzen Gruppe wie die Weiden. Durch ihre hellgelben Blütenhüllen und die vielen gelben Staubbeutel ist sie den Insekten sehr auffällig, wird daher auch eifrig von Bienen, Fliegen und Käfern besucht und befruchtet. Es ist also unbegreiflich, wie die sonst so scharf beobachtenden Naturforscher der Antike den Kastanienbaum zu den Eichen zählen konnten. Entschuldigt werden sie nur dadurch, daß die Blätter des Baumes sowie auch die rissige Rinde an die mancher südeuropäischen Eichen stark erinnern.

Die Edelkastanie ist ein überaus nützlicher Baum. Dem Südländer sind ihre Früchte, die „Maroni“ (gegen Tierfraß in eine Stachelhülle eingeschlossen!), unentbehrliche Brotfrucht, dem Skoten nebst Ziegenfleisch und Milch sogar vielfach einzige Nahrung. Die Rinde wird als wertvolles Gerbmateriale verarbeitet, und das Holz so hoch geschätzt wie das der Eiche.

Sie, deren lateinischer Name *Quercus* nach Rangierers Etymologie den Baum an sich, aber auch Kraft und Stärke bedeuten soll, und die man zum Sinnbild unseres Volkes gemacht hat, obzwar der deutsche Eichenwald längst nicht mehr kennzeichnend für die deutsche Landschaft ist, erweckt zwar eine Fülle kulturgeschichtlicher und praktischer Fragen, hat aber, ebenso wie die Buche, nur wenig botanisch Interessantes. Wir werden diese beiden Bäume also später ausführlich abhandeln, hier jedoch nur ganz kurz angesichts ihrer geringfügigen biologischen Wichtigkeit.

Das Geschlecht der *Quercus* zählt an etwa 200 Arten, die nach dem schönen Werke von Kotschy über die Eichen Europas und des Orients vorwiegend in diesen Ländern, aber auch in Nordamerika verbreitet sind. Von diesen vielen Formen kommen aber für uns nur die Sommer- oder Stieleiche (*Qu. pedunculata* Ehrh.), die Winter- oder Traubeneiche (*Qu. sessiliflora* Sm.*), höchstens auch noch die in Ungarn bis Mähren lebende Zerreiche (*Qu. Cerris* L.), dann die für die südlichen Teile Österreichs und das ganze Mittelmeer kennzeichnende *Qu. Ilex* L. und die ebendort wachsenden Korkeichen (*Qu. Suber* L. und *Qu. occidentalis* Gay) in Betracht.

Es ist ein Irrtum anzunehmen, daß alle Eichen mächtige Bäume seien, es gibt vielmehr unter ihnen genug strauchartige, so z. B. viele Arten, die an den Mittelmeerküsten die immergrünen Macchienwälder bilden. Unsere zwei einheimischen Hauptarten sind allerdings überaus stattliche Bäume, von denen die Sommerliche im Norden bis Drontheim und Petersburg, im Osten bis zum Ural, im Süden bis Spanien, Sizilien und Griechenland reicht, auch in den Alpen bis etwa 1000 m emporsteigt. Empfindlicher ist die Winterliche, die im Norden schon um 3° südlicher als jene ihr Wachstum einstellt, im Osten auch nur bis zur Krim geht, dafür in den Alpen noch in 1360 m Höhe grünt. Beide Arten haben aber ihr Paradies durchaus nicht in Deutschland, haben es da vielleicht niemals gehabt, sondern stets im mittleren Ungarn und in Kroatien, wo der Bakonyerwald, die Somogy und das slawonische Hügel land noch immer Eichenwälder von außerordentlicher Pracht bergen.

* Der Name *Qu. Robur* L. ist deshalb zu vermeiden, da Linné ihn für beide Arten angewandt hat.

Nach Schwappach hat die Eiche in Deutschland ihre Hauptverbreitung in den Bezirken Arnberg, Köln, Koblenz, Trier, Hessen und Rheinpfalz, aber auch die anstößenden Bezirke Aachen, Münster, Kassel, Unterfranken und Elsaß-Lothringen zeigen noch bedeutende, wenn auch meist schon gegen die Buche zurücktretende Eichenflächen. Allerdings ist der größte Teil dieser Gebiete (70 %) nur der häßliche junge Eichenschälwald. Mehr als 100jährige Eichenbestände sind in größerer Ausdehnung nur im Bezirk Kassel, im Elsaß, in den Bezirken Frankfurt (Taunus), Merseburg, Magdeburg, Marienwerder, Königsberg und Posen vorhanden.

Von diesen Gebieten beherrscht die Winter-eiche namentlich den Westen und die Gebirgslagen, während die Sommer-eiche mit Vorliebe die Ebenen, die Flußauen und den Osten aufsucht. Doch sind beide Arten ohnedies nur wenig voneinander verschieden (die Blätter der Sommer-eiche sind kräftiger, ihre weiblichen Blüten stehen an langem Stiel, die Blätter schlagen etwa zwei Wochen früher aus als die der Winter-eiche) und schwer kenntlich, da sie oft Bastarde und Halbbastarde bilden. Im ganzen be-

Alte Eiche aus dem „Gaßbruch-Wald“ bei Oldenburg.
(Nach einer Photographie.)

siedelt die Eiche 20 % des deutschen Laubwaldgebietes, die Buche dagegen 50 %. Daraus möge man nun ermessen, inwiefern es poetische Übertreibung ist, die Eiche als den deutschen Baum kategorisch zu bezeichnen. Es ließe sich dies höchstens damit begründen, daß im alten deutschen Glauben die Eiche eine große Rolle spielte. Sie war dem Thor geweiht, so wie bei den Römern dem Jupiter, weshalb auch auf dem Kapitol ein riesiger Baum stand; aus Eichenblättern bestand die civica corona. Die berühmte Eiche

zu Geismar in Hessen wurde durch Bonifazius gefällt, und eine heilige Eiche stand bei Nauders in Tirol noch bis 1855 in voller Verehrung. Wenn auch nicht mehr im religiösen Sinn, so beugt sich unser Volk aber auch noch heute vor der überwältigenden Majestät einzelner Rieseneichen, die zerstreut in deutschen Landen stehen. Eine davon, die der bayrische Staat schützt, haben wir schon in Bd. II, S. 56 abgebildet. Als ältesten, wirklich 1000-jährigen Baum dieser Art schätzt man eine Eiche bei Jvenack in Mecklenburg, die schon ein berühmter Baum war, als 1252 dort ein Kloster gegründet wurde! Staatlich geschützt wird auch die „dicke Eiche“ bei Arnshagen in Westfalen. Ebenso stehen unter Schutz die prächtigen alten Bäume im „Hasbruch“ bei Oldenburg, deren einen unser Bild darstellt. Dieser Niederungswald, dem man allerdings nicht ganz mit Recht den Namen eines Urwaldes gibt, soll noch am meisten den Typus der alten germanischen Wälder widerspiegeln. Berühmte Eichen sind auch die Körnereichen bei Karlsbad in Böhmen, die einen Umfang von 10 m im Stamm erreichen. Ein besonders schöner Erdenwinkel muß in dieser Hinsicht die Gegend von Rogalin in Posen sein, wo nach Pfuhl 400—500 der mächtigsten Eichen mit 8,5 m Stammumfang grünen. An solchen uralten Bäumen, die sehr schwer zu pflegen sind, da sie dem großen Bockkäfer (*Cerambyx heros*) leicht unterliegen, kann man den die Eichen kennzeichnenden malerisch-knorrigen Wuchs besonders gut wahrnehmen. Die größten aller bekannten Eichen leben aber gar nicht in Deutschland, sondern in England und Frankreich, wo bei Kent eine Eiche grünt, die schon der große De Candolle auf 2—3000 Jahre schätzte. Und den Eichbaum von Saintes (Dep. Charente) hielt Humboldt für den ältesten Baum Europas, in dessen Stamm ein Zimmer von 4 m Breite und 3 m Höhe eingerichtet werden konnte.

Dort, wo die Eiche Wälder bildet, zieht sie eine ganz typische, wenn auch nicht sehr eigenartige Genossenschaft nach sich. Höck nennt als ihre Begleiter den Haselstrauch, die Eiche, den Schlehdorn und die große Brennessel sowie auch die Steinpilze und meint, daß ihre Genossen sehr denen der Schwarzerle, zum Teil auch jenen der Schwarzbuche gleichen.

Graebener schildert als Hauptbestandteile der Eichengenossenschaft Ähnliches. Es ist jedoch im Eichenwald, wo die Kronen lichter sind, der Boden dichter mit Pflanzen bedeckt. Besonders auffallend ist der Reichtum an Farnen und Gräsern. In manchen Eichenwäldern ist *Lilium martagon* eine Charakterpflanze, ebenso *Walldorchideen*, *Salomonsiegel*, *Anemonen* und die verschiedensten *Doldengewächse*. Auch ist die Zahl der Überpflanzen und *Pianen* (Fleu) größer als im Buchenwald. Und schließlich zieht der mächtige Baum auch mehr Feinde nach sich denn eine andere Pflanze. Man kennt an 100 Tierfeinde der Eiche, von denen der erwähnte Bockkäfer und die Hirschkäfer allbekannt sind, nicht weniger aber auch die Gallwespen, (*Cynips calycis* Brgd.), aus deren Tätigkeit Knoppern (an Früchten) und Gallen (an Blättern) hervorgehen, und von der Färber und Gerber profitieren, die auch die Eichenrinde als Rohe ebenso hochschätzen wie der Möbeltischler und Baumeister das kernharte Eichenholz.

Botanisch-biologisch bietet aber die Eiche ebensowenig wie die Buche viel des Interessanten. Ihr Laub erzeugt in der Jugend reichlich zum Schutz Anthozyan und erscheint dadurch rot. Daraus beruht sowohl die Herbstfarbenpracht der nordamerikanischen Wälder, wo die Eichen hochgelb und purpurn verfärben, während bei uns ihr Laub nur bräunt und bis zum nächsten Mai auf dem Baume bleibt, als auch das Kunststück der Gärtner, die buntblättrige Eichen zu ziehen verstanden.

Im Buchenforst.

(Nach einer Naturstudie von E. Daffinger.)

Der Bau der Eichenblüte entspricht in allem dem, was wir von der Haselnuß sagen durften, nur erscheinen die Blüten erst nach dem Ausbruch des Laubes. Ihrer Bestäubung bereitet ja das sehr lockere Laub kein Hindernis. Die Früchte, die bekannten Eicheln, entwickeln ihr nettes Schüßelchen aus der Blütenhülle. Sie fallen daraus im Oktober von selbst ab. Ihr reicher Stärkegehalt (allerdings auch reich an Gerbsäure) macht sie nicht nur zur Schweinemast tauglich, sondern bekanntlich hat auch Eichelkaffee und Eichelkakao viele Liebhaber gefunden, nur müssen hierzu die Samen vorerst auch ausgelaugt werden.

Ein guter Teil dessen, was wir über die Eiche zu sagen wußten, gilt auch für die Buche (*Fagus silvatica* L.), und wir haben ihrem Lebensbilde gar nicht so viel eigene Farben aufzulegen.

Die Gattung *Fagus* ist merkwürdig einförmig. Sie zählt überhaupt nur 4 Arten, die von Japan bis Florida auf der nördlichen Halbkugel verbreitet sind. Unsere Rotbuche ist dabei ein echt europäischer Baum, dem die Grenzen der Verbreitung ziemlich weit gesteckt sind. Ihre Nordgrenze findet sie in Norwegen unter dem 60. Breitengrad, nach Osten geht sie bis zum Kaukasus und bis Persien, im Süden kommt sie noch in Thessalien, auf dem Apennin, sogar in Sizilien vor. In den Alpen steigt sie bis 1540 m empor. Sie ist der wichtigste deutsche Laubbaum, da sie allein 50% unserer Laubwälder ausmacht. Ihre größte Verbreitung hat sie nach Schwappach in den Bezirken Rassel, Wiesbaden, in denen Hessens und der Rheinpfalz. Am meisten sagt ihr kalkhaltiger Gebirgsboden zu, doch geht sie gerne auch auf den Sand der norddeutschen Tiefebene und an der Ostsee, und auf ihren Inseln grünen die schönsten deutschen Buchenwälder (s. d. Tafel), die man kennt. Zu ihren Hauptstadelungen gehören aber auch noch die Reichslände, Unterfranken, Württemberg und Baden, Hannover und Braunschweig, Dänemark, Böhmen und die innerösterreichischen Teile. Jedenfalls ist ihr Hauptgebiet bedeutend größer als das der Eiche, und wir kennen fast kein von Deutschen bewohntes Land, in dem es nicht Buchenwälder gäbe.

Dagegen sind wenig alte Riesenbuchen bekannt. Ihr Alter wird meist überschätzt, da die Buche bedeutend rascher wächst als die Linde oder gar die Eiche. Die Buche vollendet ihr Wachstum gewöhnlich mit dem 150. Jahr und erreicht um diese Zeit etwa 30 m Höhe und einen Stammdurchmesser von 1,20 m. Wenn wir also sehr mächtige Buchen sehen, brauchen sie nicht sehr viel älter zu sein. Als ältester Baum Deutschlands gilt nach Pfarrer Engel die Lutherbuche zwischen Schloß Altenstein und Ruhla, unter der Luther im Jahre 1521 ausgeruht haben soll. Aber auch sie wurde 1841 durch einen Sturm gefällt. Bei der alten Reichsstadt Alen und auf der schwäbischen Alb sowie in dem auch durch seine Eichen berühmten Speßart gibt es verschiedentlich Riesenbuchen, die wohl über 200 Jahre zählen können. Eine Kolossalbuche mit 6,6 m Stammumfang steht bei Birnbaum in Posen. Sie wird auf 250 bis 300 Jahre geschätzt. Der größte schlesische Baum dieser Art bei Mönchmotschelnitz mißt 5,73 m im Stammumfang, die stärkste Buche Westpreußens (in der Oberförsterei Neustadt) hat 6,27 m Stammumfang.

Aber nicht der Einzelbaum, so anziehend er auch mit seiner glatten, silbergrauen Rinde und dem üppigen, wagrecht ausgebreiteten Laub sein mag, fesselt so sehr an den Buchen als vielmehr der mächtig-feierliche Eindruck des Buchenhochwaldes im ganzen.

Die Buche liebt geschlossenen Wuchs und gedeiht am besten, wenn kein Lichtstrahl den Boden unter ihr durchdringt. Sie ist ein Schattenbaum, der am Waldesrand oft von der Sonne verbrannt wird. Sie ist sogar so sehr schattenertragend, namentlich in der Jugend, daß sie auch im tiefsten Dämmerlicht aufschießt und dann ihre Blätter wie der Esen sogar zu Mosaiken zusammenlegt. Da sie später dann im Alter selbst so mächtig schattet, duldet sie reiche Flora unter sich eigentlich nur im Frühjahr, bevor sie sich belaubt. Auch Gehölze läßt sie nicht so gastfreundlich neben sich auskommen wie die Eiche, am ehesten noch Hainbuche, Haselnuß und den schattenertragenden Seidelbast. Die Buche ist überhaupt ein sehr anspruchsvoller Baum und besiedelt mit Vorliebe die besten Böden. Dies ist auch die Ursache, warum man ihr so vielen Ortes den Krieg erklärt hat und die Buchenwälder lieber in Äcker umwandelt, den schlechtesten Boden aber zu Wald und dann natürlich zu Nadelwald macht. Als häufigste Buchenbegleiter nennt Hück das Buschwindröschen, den Waldmeister und *Sanicula*, außerdem *Dentaria*, die Melica-Gräser, Leberblümchen, *Ranunculus lanuginosus*, *Camp-nula latifolia*, die Rapunzel, die hohe Schlüsselblume und andere. Im allgemeinen aber hat der Buchenwald, wenn er auch anfangs durch den domartigen Eindruck ergreift, bald etwas Eintöniges und durch den Mangel an Tierleben auch Totes.

Auch botanisch fesselt die Gattung nicht gerade übermäßig.

An den Blättern findet sich im Frühling eine hübsche Anpassung. Die Ränder und Rippen der Blattunterseite sind dann mit weichen, seidigen Haaren bedeckt, worin wir einen Verdunstungsschutz erblicken müssen, da sie dann später, wenn das Blatt seine fixe Lichtlage einnimmt, abfallen. Die Blätter enthalten oft viel Anthozyan, so bei der prächtigen Varietät, die als Blutbuche in den Gärten gezogen wird. Wiesner gibt als Lichtbedürfnis der Buche in seinen Lichtstudien an, daß die Buche ihr Laub noch bei Lichtwerten von $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ ausbildet. Als Untergehölz ist sie so schattenertragend, daß sie noch bei $\frac{1}{58}$ Licht gedeiht (ebenso auch die Hainbuche und Ulme), dabei allerdings ihr Laub so wagrecht ausbreitet, daß „kein einziges Blatt des betreffenden Strauches mehr im Schatten des eigenen Laubes steht“.

Die Wurzeln der Buche verankern sich nicht so fest wie die der Eiche, sie gehen überhaupt nur wenig in die Tiefe und sind (wie fast alle Rupuliferen und Röhchenblütler) reich mit Pilzen vergesellschaftet. Prof. Frank versuchte Buchen aus Samen in wurzelpilzfreier Erde zu ziehen, aber seine Pflöglinge gingen schon nach einem Jahre ein, woraus wohl der Schluß zu ziehen, daß die Buche den Wurzelpilz braucht.

Die Buche blüht wie die Eiche zur Zeit der Laubentfaltung in höchst einfacher Weise. Die Fruchtblüten sind je zu zweien mit einer Hülle umgeben, aus der sich später der stachelige und klappig aufspringende Fruchtkelch bildet. Die Narben der Fruchtblüten sind am Rande gekräuselt; die Staubblüten sind in großer Anzahl vorhanden, stets zu 10—12 in knäuelige Röhchen vereint. Eine biologische Eigentümlichkeit der Buche ist, daß sie erst mit dem 60. Jahr blühreif wird, auch in den besten Tagen nur etwa alle 5 Jahre „volle Maat“ gibt, d. h. reichlich blüht.

In jedem Fruchtkelch stecken zwei dreikantige Früchte (Bucheckern), die aller besondern Verbreitungseinrichtungen entbehren, dennoch aber von Waldtieren weit verschleppt werden, da sie reichlich Öl enthalten. Deshalb können sie im Notfall sogar dem Menschen als Nahrungsmittel dienen. Dieses Öl ist aber nicht eine biologische

Anpassung an die Samenverbreitung, sondern dient den Keimpflanzen als Reservestoff, wie sich durch Versuche beweisen ließ.

Um unser Lebensbild abzurunden, müssen wir auch einiges über die Verwertung der Buche sagen. Daß sie das beste Brennholz ist, weiß jedermann. Und weil ihr Holz hart und schwer ist, bietet es dem Tischler und Wagner auch treffliches Werkholz. Aber auch der Gärtner weiß sie zu benützen. Die rote Albart (*F. purpurea* Ait.) erwähnten wir schon, und daß es auch eichenblättrige, zerschlitzte, bunte und Trauerbuchen gibt, wird mancher unserer Leser schon mit Verwunderung bemerkt haben, wenn er sich in den großen Parkanlagen unserer Städte ergangen hat.

Als letzte Gruppe unserer heimischen Waldbäume kommen die Ulmen (*Ulmaceae*) in Betracht, die von manchen Botanikern, so z. B. von Wettstein, bereits den Brennesselgewächsen angegliedert werden. Es interessiert uns hier von dieser kleinen Gruppe nur ein einziger Baum, die Rüster (*Ulmus*), die als Feldrüster (*U. campestris*) uns oft in Gärten und als Alleebaum mit ihrer prächtigen Gestalt erfreut, als Bergrüster (*U. montana*) und Platterrüster (*U. effusa*) aber auch ein, wenn auch nur eingesprengter Bestandteil des heimischen Waldes wird. Heimisch sind alle diese sowie noch weitere 13 Arten, außer in Europa, auch noch im nördlichen Asien und in Amerika, erlangen aber nirgends sehr große Bedeutung. Ihr Holz wird zwar als Werkholz geschätzt, ebenso wird ihre Rinde zum Gerben benützt, und die Norweger sollen sie auch ihrem Brote zusetzen, aber im großen und ganzen ist die Rüster zu wenig zahlreich, als daß sie besondere Werte darstellen könnte. Immerhin knüpft sich gerade an sie das Interesse, daß eine Ulme als der stärkste Baum Deutschlands gilt. Es ist dies die angeblich schon mehr als 1000 Jahre alte Ulme zu Schinsheim in Rheinhessen. Sie hat im Volksmunde den Namen „Schinsheimer Rathaus“, weil im Sommer die Väter des Dorfes sich zur Beratung nach altdeutscher Sitte noch immer unter ihr zusammenfinden. Diese Ulme hat einen Stammumfang von 15,5 m, der sich bis 5 m Höhe gleichbleibt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts ist sie allerdings durch Blitzschlag fast ausgebrannt und drohte einzugehen, hat sich jetzt aber wieder erholt. Auch an den Ufern des Genfer Sees stand früher eine ähnlich starke Rüster mit 11 m Stammumfang und 45 Ästen, deren stärkster noch immer 5 m Umfang hatte.

Gewöhnlich wächst die Feldrüster an Bachrändern bis zu etwa 35 m Höhe heran, oft von Efeu umrankt, stets von etwas düsterem Aussehen, mit rauen, zweizeilig stehenden Blättern. Als reiner Windblütler hat sie unansehnliche, kleine Blüten, die bereits im Venz noch vor den Blättern erscheinen. Die bald zwittrigen, bald getrennt geschlechtlichen Blüten sind immerhin dadurch auffällig, daß sie in großer Zahl beisammenstehen und purpurrote Staubbeutel besitzen. Die Narben ragen zwischen ihnen ziemlich auffällig hervor. Aus dem Fruchtknoten wächst eine merkwürdige „Flügelnuß“ heran, wohl als erste Frucht des Jahres. Sie ist auf das trefflichste dem Wind angepasst und wird von ihm auch so umhergewirbelt, daß oft der Boden unter den Ulmen ganz mit den lichtgrünen, kreisrunden Schirmchen bedeckt ist. Merkwürdigerweise behalten die Samen ihre Keimkraft nur wenige Tage.

Zu der Gruppe der Ulmaceen gehört auch ein tropischer Baum, von dem man jedoch eine im Mittelmeergebiet heimische Art nun auch in Deutschland eingebürgert

hat. Das ist der Jürgelbaum (*Celtis australis*), von dem angesichts seiner schönen Blätter, der hübschen grünlich-weißen Blüten und der kirschenartigen Früchte eine Bereicherung unseres Gartenbildes zu erwarten wäre, um so mehr, als er nicht nur ein sehr hohes Alter, sondern auch riesige Dimensionen erreicht, was schon mancher Baum im südlichen Oesterreich beweist. Leider ist er aber empfindlich, und so wird er bei uns immer nur ein Gast bleiben.

Die Brennesselgewächse (Urticales).

Die nun folgenden Familien der Maulbeerbäume (*Moraceae*), Brennesseln (*Urticaceae*) und Hanfgewächse (*Cannabineae*), die dem engeren Verwandtschaftskreise der „Urticales“ angehören, lenken unsere Aufmerksamkeit vor allem auf den Feigenbaum, Hanf, Hopfen und die Brennessel als die für Schule und Naturfreunde wertvollsten Vertreter.

Von den *Ficus*-Arten aus der Familie der *Moraceae* bietet vor allem unser Feigenbaum (*Ficus carica*) seiner blütenbiologischen Verhältnisse wegen ein sehr bemerkenswertes Objekt. Der Feigenbaum kann, da er in Süddeutschland und in Süd-

Fritz Müller-Teslerro.

österreich (z. B. um Heilbronn, am Bodensee, um Bozen) seine Früchte reift, getrost als einheimisches Gewächs gelten, wenn er auch lange als aus dem fernen Orient eingewandert galt. Die eßbare Feige wird gebildet von einer birnförmigen, fleischigen, aber hohlen Hauptachse, auf deren Innenfläche die Blüten sitzen. Da das Eßbare an der Feige die fleischig werdenden Stengelteile der Blütenstandachse sind, haben wir die Feige als eine Scheinfrucht anzusprechen, aber zugleich auch als eine Sammelfrucht; denn die einzelnen Früchte, die kleinen Körnchen im Innern der Feige, sind kleine Steinfrüchte mit dünnem Fleisch. Die Bestäubungsverhältnisse sind bei den *Ficus*-Arten an sich schon sehr kompliziert. Ganz eigenartig sind sie jedoch bei der eßbaren Feige. Die endgültige Aufklärung über die Geschlechtsverhältnisse und die Bestäubungsvorgänge bei diesem Baume verdankt die Wissenschaft in erster Linie dem Grafen Solms-Laubach und dem vielgenannten Deutschamerikaner Fritz Müller (s. Bild).

Die Bestäubung geschieht durch eine kleine Gallwespe (*Blastophaga grossorum*), die ihre Eier in die Feige legt und dabei den Pollen überträgt. In Anpassung an diesen Bestäuber finden sich nun bei *Ficus* dreierlei Arten von Blüten: eine männliche und zwei weibliche, nämlich solche mit kurzem und solche mit langem Griffel; nur

die ersteren, die zugleich ohne Narbenpapillen sind, können von dem Legestachel der Gallwespe getroffen werden. In die langgriffeligen Blüten dagegen vermag das Insekt aus nicht näher bekannten Gründen seine Eier nicht abzulegen, wohl aber streift es dabei den Pollen an den Narben ab, und es entwickeln sich dann aus diesen weiblichen Blüten in normaler Weise die kleinen, harten Früchtchen. Man unterscheidet diese beiden weiblichen Blütenformen auch als Gallenblüten und Samenblüten. Die männlichen Blüten finden sich im vorderen Teile des Blütenstandes, so daß das hineinkriechende Insekt sich zuerst mit dem Pollen beladen muß, den es dann auf die mit Narben versehenen weiblichen Blüten abstreift. Dieser einfache Tatbestand wird jedoch in eigenartiger Weise kompliziert. Wesentliche Veränderungen und mannigfaltige Beziehungen entstehen besonders dadurch, daß bei verschiedenen *Ficus*-Arten diese drei Blütenformen sehr sonderbar verteilt sind. Bei *Ficus elastica* z. B. stehen noch im selben Blütenstande männliche und weibliche Blüten regellos durcheinander, und es ist auch noch nicht zur Unterscheidung von Gall- und Samenblüten gekommen. Bei anderen *Ficus*-Arten hat sich bereits eine Scheidung in einen vorderen, mit männlichen Blüten besetzten und in einen

Süddeutscher Feigenbaum (*Ficus carica*).
(Naturaufnahme von Wolff-Bischweiler.)

hinteren, weibliche Blüten tragenden Teil im Blütenstande vollzogen. Bei wieder anderen Arten bilden sich dann noch kurz- und langgriffelige weibliche Blüten aus. Eine Reihe von *Ficus*-Arten, zu denen auch unsere Eßfeige gehört, besitzt ferner auch zweierlei Stöcke: weibliche, die in ihren Blütenständen vorwiegend Samenblüten, und männliche, die im oberen Teile des Blütenstandes, nahe der Eingangsöffnung, männliche, darunter früher sich entwickelnde Gallenblüten tragen. Speziell bei der Eßfeige sind die Verhältnisse folgende: Die echte Feige als der Kulturbaum stellt den weiblichen Stock dar, der sogenannte wilde Feigenbaum (*Caprificus*) dagegen den männlichen. Die Früchte des zahmen Feigenbaumes sind fleischig und süß, während die des wilden Feigenbaumes hart und ungenießbar sind. Außerdem aber unterscheiden sich die beiden Stöcke dadurch, daß der zahme Feigenbaum männliche

Blüten nur in Ausnahmefällen, dagegen reichlich empfängnisfähige weibliche Samenblüten erzeugt; letztere sind wieder bei dem wilden Feigenbaume selten. Die Gallwespe entwickelt sich also in den Blüten des *Caprificus*, holt auch dort den Blütenstaub und befruchtet dann beim Eindringen in die Blütenstände des echten Feigenbaumes die dort zahlreichen Samenblüten. Allerdings wächst bei letzterem die Blütenachse auch ohne Bestäubung weiter und wird süß, wie das ja auch bei anderen, nur im weiblichen Geschlecht gezogenen Kulturbäumen, z. B. Palmen, bekannt ist.

Doch auch damit ist des Merkwürdigen am Feigenbaum noch kein Ende. Die Verhältnisse werden noch außerordentlich verwickelt dadurch, daß sowohl der *Caprificus* als der echte Feigenbaum drei verschiedene Generationen von Blütenständen tragen, denen auch drei Generationen der *Blastophagawespe* entsprechen. Der *Caprificus* erzeugt nacheinander die im neapolitanischen Dialekt so bezeichneten „profichi“, „mammoni“ und „mamme“; die letzteren überwintern und gelangen erst im April zur Reife. Aus ihnen schlüpfen im Frühjahr die *Blastophagaweibchen* aus und finden dann die jungen „profichi“ des Baumes gerade in vollkommener Ausbildung der Blüten. Sie legen dort ihre Eier in die Fruchtknoten, die dann nach kurzer Zeit zu einer Galle anschwellen. Da die männlichen Blüten erst später reifen (denn der *Caprificus* ist protogyn), so beladen sich dann die aus den Gallen austretenden Insekten beim Verlassen des Blütenstandes mit den Pollen. Ende Juli sind wieder die „profichi“ reif, und die darin geborgenen Insekten voll entwickelt. Die Weibchen der Gallwespe suchen nun die inzwischen ausgebildeten „mammoni“ auf, die dann im Herbst wieder von den „mamme“ abgelöst werden, die nur Gallblüten, also keine männlichen Blüten, enthalten. Der zahme Feigenbaum entwickelt ebenfalls drei Generationen von Blütenständen (*grossi*, *pedagnuoli* und *cimaruoli*). Da er nun für gewöhnlich keine männlichen Blüten trägt, kann eine Bestäubung nur mit dem Pollen des *Caprificus* stattfinden, und zwar bei den „pedagnuoli“ mit dem Pollen der „profichi“, bei den „cimaruoli“ nur mit dem der „mammoni“. Und da außerdem nur Samenblüten entwickelt werden, so kann das Insekt in diesen Blüten keine Eiablage vollziehen, daher sich darin weder entwickeln noch überwintern. Die „cimaruoli“ gelangen häufig überhaupt nicht zur normalen Entwicklung.

Das Verhältnis dieser beiden Stöcke zueinander ist jedenfalls sehr interessant. Während echte Feige und *Caprificus* anfänglich als zwei verschiedene Massen aufgefaßt worden waren, zeigte schon Friß Müller, daß beide Formen wie „Mann und Weib“ zusammengehören. Tatsächlich ist der *Caprificus* physiologisch fast rein männlich, da er in zwei Blütengenerationen vollkommen steril ist und nur in den „mammoni“ einen sehr dürftigen Samenertag liefert. Seine weiblichen Blüten werden zur Wohnung des Gallinsektes, dessen Weibchen aus den „profichi“ auschwärmen und deren Pollen teils auf die Narben der fast steril bleibenden „mammoni“ teils auf die „pedagnuoli“ des kultivierten weiblichen Baumes übertragen, dessen Samenknochen auf diese Weise befruchtet werden. *Ficus carica* erscheint somit als eine Art, die sich im Laufe der Zeit in zwei Geschlechtsarten (die eine mit vorwiegend männlichen, die andere mit fast ausschließlich weiblichen Blüten) gespalten hat. Eine Stütze für diese Ansicht hat unter anderem Prof. Solms-Laubach beigebracht, indem er fand, daß im nördlichen Frankreich eine der ursprünglichen Stammform

näherstehende Varietät von *Ficus carica* vorkommt, deren Feigen in ihrem oberen Teile fest und geschmacklos bleiben und hier männliche Blüten nach Art des *Caprificus* enthalten, in ihrem unteren Teile aber wie bei gewöhnlichen Feigenarten saftreich, nur weniger aromatisch sind. Eine zweite Stütze liegt dann in der Tatsache, daß man bei Ausfaat von Feigensamen sowohl *Caprificus*-Individuen als Feigenbaumsämlinge erhält, letztere allerdings von minderer Qualität. Für die Kultur kommt übrigens die Aufzucht aus Samen nicht in Betracht; zur Erhaltung der besseren Sorten vermehrt man den Feigenbaum nur auf vegetativem Wege durch Ableger.

Schon im Altertum war allenthalben die „Kaprifikation“ üblich, und heute noch wird sie in manchen Gegenden Italiens gehandhabt. Man hängt dazu angestochene Früchte oder ganze Zweige mit solchen des *Caprificus* an die Zweige des Kulturbaumes, um so den Gallwespen die Vermittlung der Befruchtung zu erleichtern. Gegenwärtig, da viele Kultursorten ihre Früchte auch ohne Bestäubung reifen, ist aber das Verfahren durchaus entbehrlich, nach Solms war es jedoch ursprünglich zur Erzielung guter Kultursorten notwendig. Praktisch wußte man dies bereits im Altertum, freilich ohne auf die wahre Bedeutung dieser Beziehungen gekommen zu sein. Die antiken Naturforscher beschäftigten sich allerdings viel mit dem Gegenstand, und Plinius faßte den Zusammenhang so auf, daß durch das Anbohren des Insektes der „alles reisenden warmen Luft“ der Zugang in die Früchte verschafft werde.

Betreffs der Frage nach der Heimat des Feigenbaumes neigt man heute wohl der Ansicht zu, daß er nicht aus dem Orient eingeschleppt, sondern eine schon seit langen Zeiten im Mittelmeergebiet einheimische Pflanze sei. Man stützt sich dabei insbesondere auch auf Funde im Quartär von Montpellier, von la Celle bei Paris und von Toskana, die nicht bloß Blüten, sondern auch Blütenstände ergaben, die zu *Ficus Carica* gehören sollen.

Während die Gattung *Ficus* bei uns nur durch den Feigenbaum vertreten ist, spielt sie mit ihren verschiedenen Vertretern in der Tropenwelt, insbesondere in den Regenwaldzonen des indomalaischen Gebietes, eine große Rolle. In den Tropen geht ja alles gern ins Gewaltige, wo nur einmal die Anlagen dazu vorhanden sind. Und manche *Ficus*-Arten leisten da wirklich Verblüffendes an Gestaltungskraft und biologischen Eigentümlichkeiten. *Ficus bengalensis*, *indica* und *religiosa* sind z. B. solche Wunder der südlichen Zone. Sie verdienen mit noch anderen Arten den Titel „Baumwürger“, den ihnen manche Botaniker beigelegt haben. Sie beginnen ihren Lebenslauf als Überpflanzen, denn sie keimen auf anderen, oft mächtigen Bäumen und entwickeln sich zunächst auf deren Ästen, ohne dem Tragbaum weiter zu schaden. Parasiten sind sie niemals. Aber sie umklammern den Tragast vorerst mit wagrecht um ihn wachsenden Haftwurzeln, die sowohl anatomisch als physiologisch von normalen Boden- oder auch Luftwurzeln verschieden sind. Nebenbei senden sie auch lange Luftwurzeln, die normal gegen den Boden herabwachsen, diesen schließlich erreichen und sich unter entsprechender Verzweigung nun im Boden zu gewöhnlichen Bodenwurzeln umwandeln. Auf diese Weise sucht die Pflanze nachträglich den Zusammenhang mit dem ernährenden Erdreiche. Ein englisches Journal bildete einen solchen Baum als Beweis pflanzlicher Selbsttätigkeit ab. Dies ist nicht unglaublich, wenn man sein Verhalten näher kennen lernt. Denn sobald diese Luftwurzeln sich nun im Boden gehörig

verankert haben, werden sie zu „Stüchwurzeln“: sie erstarken, spreizen sich mächtig in die Dike und wachsen zu gewaltigen Säulen heran. Ihr Dienst ist aber ein doppelter. Sie versehen nicht nur den weiterwachsenden und im Geäste des Tragbaumes sich weiter ausbreitenden Epiphyten mit neuen Stützen, sondern vermehren natürlich auch die Zahl der Wasserleitungsbahnen für den immer mehr gesteigerten Wasserbedarf. Von den oben zuwachsenden Teilen der Pflanze, die nach allen Richtungen ihre Zweige entsendet, kommen immer neue junge Luftwurzeln herab, und so entsteht mit der Zeit, immer mehr nach außen sich ausdehnend, ein ganzer Wald solcher Stüchwurzeln, die im Verlaufe ihres ausgiebigen Dickenwachstums ebenso viele selbständige Stämme vor-tauschen. Alte Exemplare eines derartigen Banyans (*Ficus bengalensis*, fälschlich wird auch *Ficus indica* manchmal so benannt) überschatten also ein großes Stück Land mit vielbewunderten, riesigen Säulenhallen (vgl. Bild auf S. 455, Bd. II). Auch *Ficus religiosa* (der Pipal der Inder) wächst zu solchen Dimensionen heran. Er ist der heilige Baum der Inder, von dem die Sage geht, daß unter seinem Schatten Brahma seine Inspirationen hatte.

Der Baum aber, auf dem ein solcher *Ficus* zu günstiger Entfaltung kommt, ist dem Untergange geweiht, denn wie mit eisernen Armen wird er von den Haftwurzeln des *Ficus* umklammert. Diese Wurzeln legen sich von Anbeginn dicht an den Stamm, den sie ganz horizontal umschlingen; indem sie nun selbst allmählich in die Dike wachsen, aber auch der umschlungene Stamm oder Ast an Dike zunimmt, schneidet die Haftwurzel, die durch ihren widerstandsfähigen, anatomischen Bau vor einem Gesprengtwerden gesichert ist, immer tiefer in das Holz hinein. Dadurch aber unterbindet sie die Zuleitung der plastischen Nährstoffe, und ein derart eingeschnürter Baum muß dann in Kürze absterben. So wird der anfänglich harmlose Epiphyt zu einem todbringenden Feinde, der den Baum, dem er in der Jugend die Entwicklung zu verdanken hat, wahrhaft „erwürgt“. Oft sieht man im Innern eines solchen *Ficus*-Dickichts noch die traurigen Reste des abgestorbenen Tragbaumes, dann aber verschwinden auch diese, und ein alter, mächtiger Banyan, der für sich allein sozusagen einen kleinen Wald darstellt, obgleich er nur aus einem einzigen Sämling erwachsen ist, läßt dann in nichts mehr erkennen, wo sein Opfer gestanden, und welcher Art es gewesen. Daß solch merkwürdige Gewächse, insbesondere unter dem Einfluß der lebhaften Phantasie des Orients, der Ausgangspunkt zahlloser Sagen, ja sogar religiöser Begriffe werden mußten, ist also nur zu leicht erklärlich. Immer und immer wieder knüpft das religiöse Gefühl der Inder an sie an und umwuchert sie mit phantastischen Begriffen.

Die Morazeen, zu denen diese Gewächse gehören, sind fast durchweg Bäume oder wenigstens Sträucher und fast immer im Besitze von Milchsaft. Von unserem Feigenbaume ist dies ja allgemein bekannt, wenngleich sein Milchsaft keine praktische Verwendung gefunden hat. Interessanterweise ist jedoch dieser Milchsaft in seiner Beschaffenheit und Zusammensetzung sehr verschieden. Es gibt einen Kuh- oder Milchbaum (*Galactodendron utile*), der in Südamerika, besonders in Venezuela wächst und einen genießbaren, durch seinen Gehalt an Zucker nahrhaften Milchsaft hat, der als „Pflanzenmilch“ gar wohl mit unserer gewohnten Milch in Wettbewerb treten kann. Hingegen enthält der „Upasbaum“ (*Antiaris toxicaria*) der Sundainseln ein starkes Gift in seinem Milchsaft, das von den Malaien zur Erzeugung ihres Pfeil-

giftes benützt wird. Auch daran knüpft sich manche Sage, deren eine sogar in der bekannten Oper „Die Afrikanerin“ verwendet wurde. Schon die bloße Annäherung an einen Upas soll dem Menschen todbringend sein, was aber die Wissenschaft nicht bestätigen kann. Dagegen hat sie für die „Pflanzenmilch“ eine andere Verwendung gefunden. Sie hat sie in den Dienst der Industrie gestellt und lehrte daraus Kautschuk verfertigen. Diese Substanz findet sich nämlich im Milchsaft in Form mikroskopisch kleiner Körnchen schwimmend. Natürlich ist nicht jeder Milchsaft zur Kautschukfabrikation geeignet, vielmehr hängt die technische Verwertung vom Reichtum der Pflanze an Milchsaft und vom Reichtum des Milchsaftes an Kautschuk ab. Auch unsere einheimischen Wolfsmilcharten (*Euphorbia*) enthalten in ihrem Milchsaft Kautschuk; doch würde sich hier die Gewinnung als völlig unrentabel erweisen. Und sogar die Morazeen sind in dieser Hinsicht durchaus nicht alle zu verwerten. Es kommen als Kautschukpflanzen dieses Verwandtschaftskreises in Betracht eigentlich nur *Ficus elastica* in Asien und *Castilloa elastica* in Mittelamerika (Mexiko), die deshalb auch in großen Pflanzungen angebaut werden. Über die biologische Bedeutung des Kautschuks vermögen wir noch nichts Bestimmtes zu sagen.

Die *Ficus*-Arten haben auch als Zimmerpflanzen, wenigstens bei der älteren Generation, viele Liebhaber gefunden. *Ficus elastica* und *scandens* sind als sehr harte und ausdauernde Blattpflanzen, die allerdings niemals blühen, geschätzt, wenn auch, wenigstens für unsern Geschmack, ihre Blätter viel zu plump sind. Damit sie gedeihen, brauchen sie volle Sonne und dazu viel Wasser. Wenn man die Blätter wöchentlich lau wäscht und den Pflanzen gleichzeitig einen Düngguß gewährt, kann man es vermeiden, daß ihre unteren Blätter abfallen, was den meisten der Zimmerfeigenstöcke das bekannt unschöne Aussehen verleiht.

Beiläufig erwähnen möchte ich auch, daß in diese Familien auch die interessantesten unter den Ameisenpflanzen gehören, nämlich die Arten der Gattung *Cecropia*, deren merkwürdige Anpassungen an gewisse Ameisen, die sich die Bäume als Schutzgarde gegen andere ihrem Laub gefährliche Ameisenarten halten, und denen sie Quartier und Nahrung als Entgelt bieten, bereits im I. Bande dieses Werkes ausführlicher geschildert wurden. Aber neuerdings hat Frau v. Nerküll allerdings begründete Zweifel an dieser Hypothese vorgebracht.

Als Rugbaum wäre hier schließlich auch noch die ost- und mittelafrikanische Sykomore (*Sycomorus* oder *Ficus sycomorus*) zu erwähnen, ein Baum von mächtiger Größe, der ein beträchtliches Alter erreicht, und dessen Holz seiner großen Widerstandskraft wegen sehr geschätzt ist. Er lieferte den alten Ägyptern fast ausschließlich das Holz zu den Mumienfärgen (daher das Synonym *Sycomorus anti-quorum* D. C.), sein Ruhm ist aber mit jener untergegangenen Welt verblichen.

Mit einigen Worten hätten wir noch des ebenfalls hierhergehörigen Maulbeerbaumes (*Morus alba* und *nigra*) zu gedenken. Maulbeerfrüchte kennt jedermann, die wenigsten aber wissen sie zu deuten. Die Maulbeere ist eine Sammelfrucht, d. h. ein Fruchtstand, dessen kleine Steinfrüchte von den fleischig werdenden Blütenhüllblättern umgeben bleiben. Der schwarze Maulbeerbaum (*M. nigra*) stammt nun eigentlich aus Westasien, ist aber in Südeuropa und auch in Deutschland seiner eßbaren Früchte wegen schon längst eingebürgert. Der weiße Maulbeerbaum (*M. alba*) hin-

gegen, dessen Mutterland China ist, leistet uns andere Dienste. In Italien, Frankreich, der Türkei, China, Japan, aber auch in Österreich wird er seiner Unentbehrlichkeit für die Seidenraupenzucht halber angepflanzt, ist doch sein Laub die einzige auf die Dauer bekömmliche Nahrung für die Raupe des Seidenspinners. Sonst bietet das Gewächs nichts biologisch Interessantes von allgemeinem Wert. Aus seinem engeren Ver-

Ein wildes Hopfendickicht. (Naturaufnahme von W. Galdy, Wiesbaden.)

wandtschaftskreis wäre noch der Papiermaulbeerbaum (*Broussonetia papyrifera*) zu nennen, dessen Bast in Japan zu Papier verarbeitet wird, ebenso vielleicht *Chlorophora Maclura cinctoria*, ein natürliches Farbholz, welches das sog. Gelbholz oder gelbe Brasilholz liefert. Aber die Heimat dieses Baumes ist das tropische Amerika, und so brauchen wir seiner in diesem Abschnitt unseres Werkes nicht ausführlicher zu gedenken. Wohl aber wagen wir einige Worte über den vielgenannten Brotfruchtbaum (*Artocarpus incisa* und *integrifolia*).

Deffen Frucht ist eine ins Große übersekte Maulbeere. Er hat einen sehr großen Fruchtstand, dessen Hochblätter und Perianththeile fleischig werden, sagt davon der Botaniker.

Diese Früchte sind aller-

dings sehr ansehnlich. Sie erreichen Kopfgröße, bedeuten also, da sie sowohl roh als geröstet genossen werden, gar viel im Haushalt des Menschen. Der Brotfruchtbaum ist in Ostindien heimisch, wird aber jetzt besonders auf den Südseeinseln gebaut. Wer dort 7 Brotfruchtbäume besitzt, ist vor Not geschützt, sagt von ihm ein Spruch auf Samoa; und sein Ertragnis ist wirklich sehr reichlich, denn bei der Größe und Nahrhaftigkeit der Früchte genügen eigentlich schon 2—3 Bäume, um die Ernährung eines Menschen für ein ganzes Jahr zu decken. Am meisten geschätzt werden die Varietäten, bei denen die Fruchtknoten ganz verschwinden, und keine Samen zur Ausbildung gelangen, dafür

aber die übrigen Gewebe um so saftreicher werden. — Haben wir uns hier möglichster Kürze befleißigt, so geschah es, um Platz zu sparen für eines der biologisch merkwürdigsten Gewächse unserer Heimat, nämlich für den Hopfen, dem wir uns nun zuwenden wollen.

Die Biologie des Hopfens (*Humulus Lupulus*), als einer typischen einheimischen Pflanze, ist schon von vornherein interessant. Freilich ist er nicht eine Pflanze von jener Mächtigkeit, in der sich zahlreiche seiner Genossen im tropischen Walde entwickeln; aber er ist doch immerhin geeignet, uns eine ausreichende Vorstellung von der besonderen Organisation dieses biologischen Typus zu vermitteln. Insofern ist er für uns sogar die wichtigste der einheimischen Pflanz. Der Botaniker sagt von ihm, er sei eine Windepflanze. Das auf den Hopfenfeldern an Stangen und Drähten kultivierte Gewächs gibt zwar ein ausreichendes Bild von den Kletterkünsten und sonstigen Fähigkeiten des Hopfens, vermittelt aber doch keine genügende Anschauung der Pflanze als solcher. Dazu muß man den wilden Hopfen betrachten, wie er an Waldrändern, lebenden Zäunen und in Waldlichtungen zuweilen auftritt, d. h. unter Verhältnissen, unter denen er sich selbst seinen Weg suchen muß, empor zu Licht und Luft durch das Dickicht des Unterholzes. Dann erst gewinnt man das richtige Verständnis für die Qualen, die den Wanderer im Urwald erwarten, wenn man schon bei so kleinen natürlichen Hopfenbeständen die Erfahrung macht, wie schwer durchdringbar ein Gebüsch wird, wenn das Gewirr der Hopfenschlingen es umspinnt und seine Girlanden und Festons an die Äste der Büsche, sogar an die eigenen Sprosse heftet. Während die meisten Windepflanzen sog. Linkswinder sind, gehört der Hopfen zu der selteneren Kategorie der Rechtswinder, d. h. seine Windungen verlaufen derart, daß immer die rechte Flanke des Stengels der umwundenen Stütze zugeneigt ist; von oben, gleichsam in der Projektion betrachtet, bewegt sich also die windende Stütze im Sinne des Uhrzeigers. Diese Eigenschaft teilt der Hopfen unter den einheimischen Windepflanzen mit dem Geißblatt (*Lonicera*) und *Polygonum Convolvulus*. Der Windvorgang selbst ist eine ziemlich komplizierte Erscheinung, die wir, da der Hopfen als Schulbeispiel dafür betrachtet wird, wohl eingehender schildern müssen. Unsern Lesern ist bereits aus dem I. Bande bekannt, daß diese Bewegung auf der sog. „Zirkumnutation“ beruht. Das ist eine kreisende Bewegung der noch wachsenden Internodien, durch die der fortwachsende Endteil des Sprosses in einer mehr oder weniger elliptischen Bahn die Luft durchsucht. Diese Bewegung wird dadurch herbeigeführt, daß die Stengelflanken ein ungleich starkes Wachstum aufweisen, wobei die im Wachstum geförderte Seite in bestimmter Richtung rings um den Stengel herum vorrückt. Diese Bewegung ist autonom, d. h. durch innere Lebensbetätigungen bedingt, von den Einwirkungen der Umgebung unabhängig. Mit anderen Worten, sie hängt von ihnen nur insofern ab, als das Leben der Pflanze von ihrem Milieu beeinflusst wird. Solche Mutationen, die durchaus nicht immer kreisend sein müssen, sind in verschiedenem Grade der Intensität fast allen höheren Pflanzen eigen und von großer biologischer Wichtigkeit, denn die kreisende Mutation erleichtert gerade den Wind- und Kletterpflanzen das Auffinden in der Nähe befindlicher Stützen. Für die Lehren der Psychobiologie ist also die Mutation eines der besten Beweismittel. Es wäre nun aber ganz irrig, die gesamte Windebewegung nur durch solche Mutationen

zu erklären, denn es wirkt hier auch eine Reaktion auf Schwerkraftsreize mit. Nur vollzieht sie sich hier in Anpassung an die Bedürfnisse des Kletterns in ganz besonderer Art. Man nennt die Erscheinung „Lateral-Geotropismus“ und versteht darunter, daß durch die geotropische Reizung hier entweder die linke oder die rechte Flanke des bei der Mutation horizontal liegenden Stengelgliedes zu stärkerem Wachstum veranlaßt wird, nicht aber, wie beim positiven oder negativen Geotropismus, die obere oder untere. Naturgemäß muß sich hierdurch eine Krümmung nach der entgegengesetzten Seite einstellen. Durch die gleichzeitige selbständige Mutation des Sprosses krümmt er sich jedoch im Bogen. Dies hat wieder eine mechanische Folge. Es gelangen durch all diese Vorgänge stets andere Flanken des „lateral-geotropischen Sprosses“ in die Reizstellung, so daß sich auch die zweite rotierende Bewegung stets fortsetzt, ohne in die Ruhelage zu kommen. Doch nicht genug daran. Es kombiniert sich noch ein dritter Umstand mit dem Ganzen. Die jungen, flach verlaufenden Windungen umklammern ja die Stütze noch nicht genügend fest, daher muß die Pflanze noch durch ein Mittel nachhelfen. Der Botaniker sagt hiervon: Es tritt später in diesen flach verlaufenden Stengelteilen negativer Geotropismus auf, der eine nachträgliche Streckung und Aufrichtung dieser Stengelglieder bewirkt, wodurch sie nun natürlich der Stütze fest aufgepreßt werden. Es tritt also eine „Umstimmung“ ein. Und sie zeugt wieder laut für die Berechtigung einer Pflanzenpsychologie. Denn eine solche Umstimmung der geotropischen Reizbarkeit, wodurch die Pflanze befähigt wird, gerade im richtigen Zeitpunkt mit der allein richtigen Wachstumsbewegung zu antworten, ist etwas, was mit physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten allein niemals erklärt werden könnte. Man ersieht also: der dem bloßen Naturfreund eigentlich so selbstverständlich erscheinende Vorgang des Windens ist eine sehr verwickelte Sache. Autonome Mutation, lateraler Geotropismus und mit ihm abwechselnder negativer Geotropismus vereinigen sich da harmonisch zur Ausführung der für die Pflanze zur Erhaltung notwendigen Handlung. Durch unsere Analyse haben wir auch dafür Verständnis gewonnen, warum von den Windepflanzen nur aufrechte oder bis zu einem bestimmten Winkel geneigte Stützen ergriffen werden können, abwärts geneigte oder horizontale Stützen aber unverwendbar sind. Die Pflanze beschränkt sich zwar hierdurch selbst. Aber es liegt dem wieder eine neue Zweckmäßigkeit zugrunde. Denn es ist doch durchaus zweckmäßig, nur solche Stützen zu ergreifen, an denen man sich wirklich zu Licht und Freiheit emporheben kann.

Es haben nun die verschiedenen Kletterpflanzen zur Unterstützung des Kletterns und zur Verhinderung des Zurückgleitens an der Stütze mannigfache Einrichtungen ausgebildet (vgl. auch Bd. I, S. 330). Der Hopfen bedient sich dabei eines relativ einfachen Mittels: er besitzt nämlich sog. Klimmhaare (siehe das Bild). Diese gestatten durch die reihenweise Anordnung an den Ranten des Stengels und die vollständig zweckentsprechende Richtung der beiden hakenförmigen Fortsätze dem Stengel wohl überall ein unbehindertes Vordringen, sie verhindern jedoch das Zurückgleiten durch die Reibung der nach unten abstehenden Spitze an der Oberfläche der Stütze.

Wie alle Winde- und Kletterpflanzen, ist auch der Hopfen sehr raschwüchsig. Er wächst besonders in den jungen Stengelinternodien, während die Ausbildung der Blätter zurückbleibt und erst nachgeholt wird, wenn die Befestigung des Stengels weit genug vorgeschritten ist. Dadurch hat der wachsende Sproß einen bedeutenden Vor-

sprung. Man nennt nach Maciborskis Vorgang diese eigentümliche, bei tropischen Bienen vielfach noch viel auffälliger ausgeprägte morphologische Eigentümlichkeit eine „Vorläufer Spitze“. Auch sie ist wieder eine durchaus zweckmäßige Anpassung; denn solche Kletterpflanzen müssen vor allem trachten, rasch in die Höhe, an das Licht zu kommen. Solange sie diese Region nicht erreicht haben, nützt ihnen auch die Ausbildung des Laubes wenig, und deshalb sparen sie Kräfte und Baumaterial und verwenden beides zur Verwirklichung des zunächst Wichtigeren, nämlich des beschleunigten Stengelwachstums. Man gewinnt einen tieferen Einblick in diese Vorgänge, wenn man sie mit dem Verhalten „etiolierter“ Sprosse vergleicht (s. hierzu Bd. I, S. 92). Denn bei diesen tritt ebenfalls unter Einwirkung der Dunkelheit

eine auffällige Verlängerung der Stengelteile und ein Zurückbleiben der Blätter zu dem Zweck ein, um alles verfügbare Material zur raschen Überwindung des schädlichen dunklen Raumes auszunützen. Auch etiolierte Sprosse vernachlässigen das Blattwachstum ohne Nachteil, da ihnen die Blätter doch in dieser Zeit des Lichtmangels unnötig sind. Diese Parallele zeigt uns

so recht eindringlich die nicht mechanische Natur der pflanzlichen Lebensvorgänge. Denn wir sehen, wie unter ganz verschiedenartigen Bedingungen, aber zur Erreichung des gleichen Endzweckes, von der Pflanze das gleiche mechanische Mittel angewendet wird.

Unser Programm zwingt uns auch, über die Blütenbiologie des Hopfens das Wissenswerteste zu sagen.

Die Blüten des Hopfens sind vor allem unscheinbar und getrennt geschlechtig, außerdem zweihäufig. Schon die Unscheinbarkeit deutet auf Windbestäubung hin. Aber auch sonst sind alle üblichen Anzeichen einer solchen vorhanden, sowohl die langen fadenförmigen, reichlich mit Papillen besetzten Narben der weiblichen Blüten als die mit hängenden, leicht beweglichen Staubfäden versehenen Staubgefäße. Es genügen also schon leise Luftströmungen, um den trockenen, leicht beweglichen Pollen zu entführen, zu dessen Auffangen die zu einem kurzen Zapfen vereinigten weiblichen Blüten mit ihren gedrängten, lang hervorstehenden Narben eine geeignete Fläche darbieten. Zur Blütezeit sind die Hochblätter des weiblichen Blütenstandes, die in ihren Achseln je zwei Blüten tragen, klein, aber während des Heranreifens der kleinen Nüsschen vergrößern sie sich sehr bedeutend. Sie sind es, die dann dem Fruchtstande (dem Hopfenzapfen) das charakteristische Aussehen geben (siehe das Bild). Entsprechend der An-

Hopfen (*Humulus lupulus*).

1 = Klimmender Sproß. 2 = Vergrößertes Kletterhaar. (Nach Haberlandt.)
3 = Fruchtstand des Hopfens. 4 = Einzelfrucht. (Nach Baillon.)

ordnung der Blüten sitzen im reifen Fruchtstande am Grunde jedes dieser Blätter je zwei Früchtchen, welche die groß gewordenen Deckblätter als Flugapparat verwenden, indem sie sich zur Reifezeit mit ihnen zugleich loslösen.

Diese Deckblätter des Hopfenfruchtstandes haben einen ausgesprochenen bitteren Geschmack. Und deshalb haben wir den Hopfen zur Kulturpflanze gemacht. Er rührt von dem Inhalt zahlreicher kleiner, gelber, köpfchenförmiger, innen am Grunde der Deckblätter sitzender Drüsen her („Hopfenmehl“). Diese Bitterstoffe (Lupulin) sind es, derentwillen der Hopfen dem Bier zugesetzt wird; geben sie doch diesem den charakteristischen Geschmack, während ihm die Gerbstoffe, die ebenfalls im Inhalt der Lupulindrüsen vorhanden sind, zugleich größere Haltbarkeit verleihen. Das ist die Bedeutung des Lupulins für den Menschen. Was bedeutet es aber für die Pflanze? Wir haben uns damit befreunden müssen, daß die Bildung des Lupulins wohl als ein Schutzmittel gegen Schädigung durch Tiere, besonders durch Vögel, anzusehen sei. Aber es scheint ein unzureichendes Schutzmittel zu sein, denn trotz allem Lupulingehalt hat der Hopfen doch zahlreiche Feinde, die auch der Hopfenkultur sehr verderblich werden können. Mehltaupilze überziehen die Blätter mit einem spinnwebenartigen Schimmel; sie schädigen das Wachstum der ganzen Pflanze, und wenn sie sich auf die Zapfenschuppen ausbreiten, leidet auch die Ernte darunter. Man bekämpft sie durch Bestäuben mit Schwefelblumen. Auch durch den Rosttaupilz, der einen übel aussehenden, schwarzen Überzug bildet und mit verdünnter Kupfervitriollösung bekämpft wird, leidet das Wachstum der Pflanze. Der sogen. „Kupferbrand“ entsteht wieder durch das Saugen der roten Milbenspinne. Um diese Tiere von den Blättern abzuleiten, pflanzt man vielfach Kartoffeln und Bohnen zwischen den Hopfen. Auch die Hopfenblattlaus kann gefährlich werden. Sie saugt an der Unterseite der Blätter und sondert den als „Honigtau“ bekannten süßen Saft ab, der sich über die Blätter ausbreitet und, den „Rosttau“ nach sich ziehend, das Laub zu vorzeitigem Welken und Abfallen bringt. Die Hopfenblattlaus kann so unter Umständen eine vollständige Mißernte verursachen. Noch eine Reihe anderer Feinde bedrohen die Hopfenkulturen, indem sie teils den Blättern, teils den Knospen und jungen Trieben gefährlich werden. Sogar die Wurzeln haben ihre bössartigen Angreifer: Tausendfüße, Drahtwürmer und Engerlinge nagen an ihnen. Besonders die Drahtwürmer werden vom Hopfenbauer gefürchtet. Er sucht sich dadurch zu helfen, daß er Schnitzel von Möhren oder Kohlrüben in der Nähe des Hopfenstocdes eingräbt; dadurch lockt man die Würmer vom Hopfen weg und kann sie dann mit der Vockspeife zusammen vertilgen. Als schlimmster Feind der Wurzeln erscheint schließlich noch die Raupe des Hopfenwurzelspinners, denn sie frisst von August bis April und kann dadurch mitunter ganze Hopfenkulturen verwüsten. — Trotz aller dieser Plagen ist aber die Hopfenkultur dennoch ein lohnendes Geschäft, das in Deutsch-Böhmen (Saazer Hopfen), in Bayern (berühmt ist dafür die Gegend von Spalt in Franken und die Hollerndau in Oberbayern) im Spätsommer Tausende von „Hopfenzupfern“, eine ganze Völkerwanderung Baffermannscher Gestalten, in Bewegung setzt. Im allgemeinen gilt aber der bayrische Hopfen für weniger fein als der böhmische. In ganz Deutschland entfallen auf Hopfenkultur etwa 38 000 ha, davon auf Bayern allein an 25 000 ha, und zweifellos gehört dieser Zweig unserer Landwirtschaft zu den ältesten, da schon die Urkunden des Stiftes zu Freising im 9. Jahrhundert Hopfengärten erwähnen.

Allzu kostspielig ist ja die Hopfenkultur durchaus nicht, denn *Humulus* ist eine ausdauernde Pflanze. Sie überwintert leicht und treibt im nächsten Frühjahr zahlreiche Sprosse, und so kann ein Hopfensproß bis zu 15 Jahren auf seinem Platze bleiben.

Mit dem Hopfen gehört in die Familie der Cannabinaceae auch der Hanf (*Cannabis sativa*). Trotz der Familienähnlichkeit unterscheidet er sich aber biologisch in mancherlei Beziehung von jenem. Zunächst ist er bekanntlich keine Kletterpflanze.

Hanf (*Cannabis sativa*), weibliche und männliche Pflanzen (1).
2 = Männlicher Blütenstand und Einzelblüte (3). 4 = Weibliche Einzelblüte. (Nach Baillon.)

Dann ist er allerdings ebenso wie der Hopfen getrennt geschlechtig und zweihäufig, aber die beiden Stöcke sind schon äußerlich durch ihre Gestalt verschieden. Die männlichen Stöcke sind bedeutend niedriger, auch viel schwächer als die weiblichen, die bei gewissen Riesenhanfsorten (z. B. italienischer Hanf von Bologna und Ferrara) sogar bis doppelte Mannshöhe erreichen können. Die männlichen Blüten stehen in lockeren Rispen, die weiblichen in kurzen, gedrängten Ährchen. Auch zur Zapfenbildung, wie beim Hopfen, bringt es der Hanf nicht; die Deckblätter seines Fruchtstandes wachsen nicht aus, sondern die Früchte sitzen zur Zeit der Reife in dichten, kleinen Ähren. Auch der Hanf bedient sich, wie der Hopfen, als Bestäubungsvermittlers des Windes. Dementsprechend hängen die Staubbeutel an dünnen, pendelnden Staubfäden, und die Griffel sind lang, hervorragend, der Pollen hingegen glatt, trocken und in großer Menge vorhanden. Da die Hanfblüte niemand locken will, bedarf sie auch keines Duftes.

Sie hat aber trotzdem merkwürdigerweise einen sehr starken und zugleich sehr unangenehmen Geruch, der beim Arbeiten mit Hanfpflanzen oft bis zur Betäubung führen kann. Da besonders die Fruchthüllen mit den Drüsen gespickt sind, die diese widerlich riechenden Stoffe absondern, so wollte man darin einen Schutz für die Früchte, bzw. Samen sehen. Es wird nämlich von manchen Forschern angegeben, daß trotz der großen Vorliebe vieler Vögel für Hanfsamen (man denke an die Kanarienvögel) kein Vogel diesen Samen vom Stock hole. Aber wir müssen es dahingestellt sein lassen, ob man sich dieser Ansicht anschließen will, denn es gelang uns nicht, zuverlässige Angaben über diese Beobachtung zu erfahren. Es mag vielen fragwürdig erscheinen, wozu man eigentlich diese Pflanze im großen kultiviere. Die Hanfkultur dient jedoch verschiedenen Zwecken. Bei uns in erster Linie der Bastgewinnung und Samenernte; letztere wegen der Gewinnung des in den Samen bis zu 25—35% enthaltenen fetten Öles. Im ganzen aber ist die Hanfkultur allerdings eher im Ab- als im Zunehmen, trotzdem die Hanffaser in mancher Beziehung sogar die Flachsfaser übertrifft. Ist sie doch im allgemeinen länger, sehr fest und sehr dauerhaft. Hanffasern messen 1—2, bei den großen Sorten sogar bis zu 3 m Länge! Aber sie werden neuerdings durch mancherlei billigere tropische Fasern verdrängt und können ihren Platz eigentlich nur dort behaupten, wo besondere Festigkeit und Widerstandskraft gegen Nässe, wie z. B. bei den Schiffstauen oder dem Segeltuch, unerlässlich sind. Die Hanffaser wird sowohl von den männlichen Stöcken als von den weiblichen gewonnen; natürlich ist die Ausbeute bei diesen ihrer Größe wegen ergiebiger. Zur Gewinnung einer guten Faser gehört es, daß die Pflanzen nicht zu alt werden; deshalb holt man die feinsten Fasern aus den dünneren männlichen Stöcken; denn da diese keine Nebenverwertung durch Samen ergeben, kann man sie sofort nach dem Stäuben verarbeiten. Sie werden deshalb zu dem entsprechenden Zeitpunkte ausgerissen. Im Volksmunde werden die männlichen Pflanzen des Hanfes Fimel oder Femel genannt, in der falschen naiven Auffassung, daß die männlichen Stöcke als die kleineren und schwächeren das weibliche Geschlecht darstellen; die merkwürdige Bezeichnung rührt übrigens noch vom Lateinischen her, denn sie ist wohl auf femella = weiblich zurückzuführen. Mit Rücksicht auf diese Bezeichnung ist für das Ausraufen der männlichen Stöcke des Hanfes der seltsame Ausdruck „Fimeln“ gebräuchlich.

Die weiblichen Stöcke bleiben der Samengewinnung wegen bis nahe zur Frucht-reife stehen. Da bei völligem Ausreifen die Faser untauglich würde, so wählt man für die Ernte einen mittleren Zeitpunkt, an dem die Faser noch gut brauchbar ist, die Samen aber bereits Öl geben. Der meiste Hanf wird im europäischen Rußland gebaut, bei uns hauptsächlich um den Rhein und in Thüringen, außerdem viel in Frankreich und Italien.

Während aber in der abendländischen Hanfkultur vor allem die Sorten auf reichlichen und guten Bastertrag gezüchtet wurden, hat der Orientale seine Auslese nach anderem Gesichtspunkte vollzogen. Da die wahre Heimat der Pflanze vermutlich Indien ist, so ist er wohl auf sie überhaupt dadurch aufmerksam geworden, daß sie sich zu einem Genußmittel verwenden läßt. Der Hanf wurde dort schon seit langem auf seine stark narkotisch wirkenden Stoffe ausgebeutet zur Herstellung eines Betäubungsmittels, wie es dem Geschmack des sich nach seinem Nirwana sehnenenden Indiers entspricht. Und noch heute wird dort der Haschisch mit wahrer Leidenschaft genossen.

Was ist Haschisch? Das Wort bedeutet im Arabischen Kraut, eigentlich ist es aber ein Saft, der durch Auskochen der Hanfpflanze und Vermengung des Extraktes mit Honig und Butter unter Zusatz verschiedener Gewürze bereitet, auch wie Opium geraucht oder getrunken oder auch in Pillenform genossen wird. Und so ist er für nahezu 200 Millionen Menschen das große Berausungsmittel und der Linderer der irdischen Misere. Und fast wäre man versucht, Flauberts Beispiel zu folgen und ihn an Stelle des Alkohols zu empfehlen, denn der durch ihn erzeugte Rausch vertiert den Menschen nicht so widerlich wie der Schnaps. Die französischen Ärzte versichern sogar, daß guter und mäßig genossener Haschisch kaum schade; aber die Erfahrung bezeugt auch hier, daß der Genuß stets zum Übermaß verlockt, und dessen Strafe ist bei Haschisch der — Irrsinn.

Der indische Hanf, der als eine Varietät des gewöhnlichen gilt*, ist infolge der Auslese nach dem Reichtum an narkotischen Stoffen besonders nach dieser Seite hin ausgezeichnet. Um so minderwertiger ist seine Faser, leichtverständlich, da bei der Kultur auf diese Seite eben kein Wert gelegt wurde.

Welche Rolle spielt aber nun dieser Giftstoff in der Natur? Warum bereitet die Pflanze dieses schreckliche Alkaloid? Es hat einen sehr einfachen Zweck. Vor Weideweidern hat der Hanf in seinen narkotischen Stoffen einen guten Schutz, denn er wird von ihnen gründlichst verschmäht, belehrt uns darüber der Botaniker. Aber wie allenthalben, so haben auch hier wieder Gegenanpassungen Platz gegriffen, und es hat auch diese Pflanze trotz ihrer Schutzmittel ihre Feinde. An den Blättern fressen mehrere Raupen, und eine Fliegenlarve miniert die Blätter; die Wurzeln sind vor dem Angriff der Engerlinge nicht geschützt, und außerdem hat der Hanf auch noch zwei pflanzliche Parasiten zu tragen: eine Sommerwurzelart (*Orobancha ramosa*), auffällig durch ihre reizend blaugefärbten Blüten, und vor allem *Cuscuta europaea*, die gemeine Seide.

Ein anatomisches Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Morazeen ist, daß den Angehörigen dieser Familie durchweg Milchsaftgefäße fehlen. Sie teilt dies mit der dritten, nunmehr zu besprechenden Familie, nämlich mit den Nesseltgewächsen (*Urticaceen*).

Als ihren Vertreter wollen wir die gewöhnliche Brennessel (*Urtica dioica*) etwas eingehender betrachten. Sie tritt uns als ein Allerweltsbürger entgegen, indem sie sich, wie wenig andere Gewächse, sozusagen an die Fersen des Menschen heftet. Fast überall, wo der Europäer hingekommen ist, hat er die Brennessel nach sich gezogen, und man kann im Urwald, in der verlassensten Einöde mit Sicherheit behaupten, daß dort Europäer hausten, wenn ihre Brennessel im Dickicht steht. Man hat so etwas wirklich gewagt, in der Annahme, daß das Vorkommen von Brennesseln an der Küste Grönlands bei ihrer Entdeckung in der Neuzeit ein sicheres Zeichen dafür sei, daß bereits früher dort Siedlungen von Europäern bestanden haben. Die Erklärung für diese Anhänglichkeit der Brennessel an den Menschen, die allerdings von uns nur wenig gewürdigt wird, liegt nicht nur in den kleinen, überaus leichten Früchtchen, die auch schon mit dem leisesten Rüstchen auf die Reise gehen, sondern auch in der speziellen Vorliebe der Brennesseln für stickstoffreichen

* Wahrscheinlich muß man mit Rücksicht auf die mutmaßliche Abstammung den gemeinen Hanf unserer Zone als eine Varietät des indischen betrachten oder noch richtiger vielleicht die beiden als Varietäten einer gemeinsamen Stammform.

Boden. Sie gedeihen deshalb so gut in der Umgebung menschlicher Ansiedlungen, da sich eben dort die verschiedensten organischen Abfallsprodukte besonders reichlich ansammeln. Mit besonders freudigem Wachstum stellt sich die Brennessel namentlich auf den Dungstätten und Müllplätzen ein. Auch zählt sie, aus demselben Grunde, zu den beständigen Begleitern der Almhütten, in deren unmittelbarer Nähe sie im Verein besonders mit Rumex und Chenopodium schon deshalb ein fröhliches und ungestörtes Dasein führt, weil das Weidevieh den brennenden Kräutern scheu aus dem Wege geht. Man nennt solche nach Ammoniak und Nitraten hungrige Gewächse bekanntlich Nuderalpflanzen, und die Brennessel kann geradezu als ihr Typus gelten. Im übrigen darf man durchaus nicht glauben, daß sie wählerisch sei. Aber am üppigsten gedeihen sie doch nur dort, wo der Boden an assimilierbaren Stickstoffverbindungen reich ist, worüber man in Bd. I, S. 438 noch Näheres nachlesen möge.

Auch über den Bau und die Wirkungsweise der Brennhaare wurde bereits in Bd. II, Seite 120 u. ff. ausführlich berichtet, so daß ich mir hier Weiteres darüber sparen kann. Desgleichen wurde an der zitierten Stelle auch die Giftigkeit gewisser tropischer Verwandten, insbesondere der Laportea-Arten, geschildert. Wir werden solchen vegetabilischen Giftschlangen noch in anderen Verwandtschaftskreisen begegnen, und zwar solchen von nicht geringerer, zum Teil noch gesteigerter Bösartigkeit, wie z. B. gewisse Euphorbiazeen und Loasazeen. Diese „Schukwaffen“ geben dem denkenden Naturforscher eine nicht wenig harte Nuß zu knacken. Vor allem taucht da die Frage auf, wie konnte dieselbe Spezialität in verschiedenen, verwandtschaftlich so weit auseinanderstehenden Pflanzengruppen, wie Urtikazeen und Euphorbiazeen, sich entwickeln? Aber wir mögen noch so viel sinnieren, über das Wie der Entstehung vermag die Wissenschaft noch keine Antwort zu geben. Nur das eine sehen wir ein, die Selektionstheorie erklärt hierbei gar nichts. Denn damit Brennhaare als Schukmittel der Pflanze ein Übergewicht über ihre nicht wehrhaften Brüder verleihen konnten, mußten sie eben schon da sein, bevor irgendeine Auslese einzusetzen vermochte. Was aber veranlaßte dann die Entstehung solcher raffiniert angelegter Verteidigungswaffen? Man kann es sich nicht vorstellen, daß die Pflanzen sie absichtlich hervorgebracht haben, und so geziemt da der Wissenschaft wohl gegenwärtig nichts als ein ehrliches Eingeständnis, daß wir darüber noch nicht genug wissen. Allerdings liegt es nahe zu vermuten, daß diese Einrichtungen gar nicht als Schukmittel entstanden seien, sondern in irgendeinem anderen Zusammenhang. Denn wenn man sie näher betrachtet, findet man, daß es ja mit der Schukfunktion gar nicht einmal so viel auf sich habe. Uns Menschen ist das brennende Kraut freilich schmerzhaft, wenn wir unversehens in einen Busch hineingreifen, und auch das Weidevieh scheint ähnlich wie wir zu empfinden. Aber es ist doch allbekannt, daß ein kräftiges Zugreifen von unten herauf die Waffe der Brennessel unschädlich macht. Und es gibt eine Menge kleiner Tiere, die sich um diese Schukwaffen nicht im geringsten kümmern. So wagt sich die Weinbergschnecke (*Helix pomatia*) unerschrocken an das Laub der Brennessel, und die Raupe des Tagpfauenauges hat es sogar zu ihrer Lieblingspeise erklärt. Wir wollen damit durchaus nicht behaupten, daß es nicht tatsächlich in der Pflanzenwelt zahllose Schukmittel gebe, die auch wirklich solche sind und zweifellos auch als solche gebildet wurden; ob aber die Brennhaare zu diesen zu zählen sind, ist zum mindesten zweifelhaft. Es ist fürwahr

ein dunkles Blatt der Natur, das wir da vor uns aufgeschlagen haben; mit anderen Empfindungen können wir davon nicht scheiden.

Die Brennessel hat höchst unscheinbare Blüten. Dadurch ist schon ohne weiteres eine Verwechslung mit der im Habitus ihr allerdings etwas ähnlichen Taubnessel (*Lamium album*) ausgeschlossen; trotzdem findet eine solche Verwechslung öfters statt und läßt gewöhnlich den „naturkundigen“ Städter sehr überflüssiger Weise vor der harmlosen Labiate zurückfahren, die sich ja auch schon durch ihren vierkantigen Stengel zu erkennen gibt. Jene Unscheinbarkeit der Nesselblüte verrät uns aber auch zugleich wieder ihre Windblütigkeit. Es verhält

sich bei ihr alles im wesentlichen wie bei Hopfen und Hanf. Nur in einer Hinsicht tritt etwas Neues hinzu: bei den letztgenannten Pflanzen schüttelt der Wind aus den an dünnen Fäden hängenden Staubgefäßen den Pollen heraus; bei der Brennessel und ihren Verwandten aber kommt die Pflanze diesem Zweck selbst tatkräftig entgegen. Sie macht dies in folgender Weise: Ihre Staubgefäße sind in der Knospenlage nach dem Innern der Blüte eingerollt, schnellen jedoch im Stadium der Reife plötzlich nach außen und schleudern dadurch den Pollen in einer kleinen Wolke von sich. Eine Verwandte der Brennessel, das bei uns viel verbreitete Glasraut (*Parietaria officinalis*), verhält sich in gleicher Weise. Besonders schön jedoch ist diese Erscheinung an der ebendeshalb in Gewächshäusern viel gezogenen *Pilea muscosa* (auch *microphylla* genannt), die dem Naturfreund Gelegen-

Glasraut (*Parietaria officinalis*) im Unterholz des Ulmenwaldes. Motiv aus der Lobau bei Wien.
(Naturaufnahme von Fr. A. Mayer-Wien.)

heit zu einem ganz reizenden Versuch gibt. Wenn man sie nämlich mit Wasser besprengt und einen Moment in die Sonne stellt, sprühen von allen Seiten aus den Blütenknospen feine Wölkchen des weißen Blütenstaubes mit leisem Knistern in die Luft. Die Blüten dieser Gewächse gehören also zu dem „Explosionstypus“, der sich in der Welt der Blütenpflanzen noch in verschiedener Weise variiert findet. Der ausgeschleuderte und den feinen Luftströmungen preisgegebene Pollen wird dann von den langen, pinselförmigen Narben der weiblichen Blüten aufgefangen. Diese Staubblatter Explosionen lassen sich übrigens auch bei unseren einheimischen *Urtica*-Arten sowie bei dem Glasraut (*Parietaria*) beobachten, wenn man zur geeigneten Zeit in Wasser gestellte Pflanzen in die Morgen Sonne bringt. Es bietet also die vielverachtete Nessel in mehr als einer Hinsicht hervorragendes biologisches Interesse.

Einigen Urtifazeen kommt hervorragende Bedeutung als Gespinnstpflanzen zu. In geringerem Grade liefern auch unsere einheimischen Formen (namentlich *U. dioica*) der etwa 30 Arten zählenden Gattung *Urtica* spinnbaren Bast, allerdings von minderer Qualität. Früher hatten auch diese einheimischen Bastlieferanten große Bedeutung, und es hätte sich leicht eine Industrie mit großen Brennesselfeldern entwickeln können, wenn ihr nicht die Baumwolle den Rang abgelaufen hätte. Jetzt ist die einheimische Nessel ganz in den Hintergrund gedrängt, wohl aber hat man ausländische Arten in dieser Hinsicht schätzen gelernt. An erster Stelle steht hier die Gattung *Boehmeria* (speziell *B. nivea*), die in zwei Rassen kultiviert wird, von denen eine als die „forma

chinensis“ in Ostasien, die andere aber als „forma *indica*“ in Südasien verbreitet ist. *Boehmeria nivea* liefert das Chinagrass oder die „Namié-faser“

des Handels, zwei wohlbekannte Namen in der Textilindustrie, namentlich seitdem Algier in großem Maßstab die Kultur der Namié aufgenommen hat. Die Bastfasern dieser Pflanze besitzen eine ganz ungewöhnliche Länge, und das verleiht ihnen großen Wert. Während die einzelnen Bastzellen, z. B. beim Vindenbast, etwa 1 mm lang sind, beim Lein dagegen 2 bis 4 cm, erreichen sie bei unserer einheimischen Brennessel bereits die Länge bis zu 8 cm, bei *Boehmeria nivea* jedoch bis zu 22 cm! Da ist

Blütenstand von *Urtica atrovirens* (1).
2 = Männliche Blüte von *U. dioica*. (Nach Wettstein.)

es denn begreiflich, daß bei dieser Länge der einzelnen Bastzellen auch die Festigkeit des ganzen Bastbündels auf Grund der so vergrößerten Berührungsfläche der Zellen bedeutend zunimmt, und das daraus gefertigte Nesseltuch und die Stricke geradezu unverwundlich sind. Eine andere Varietät dieser Gespinnstpflanze (var. *tenacissima*), die hauptsächlich in rein tropischen Gebieten heimisch ist, liefert die sogen. Rheafaser, die aber bei weitem nicht zu der Bedeutung der Namié gelangte. Von den zahlreichen (500) anderen Gattungen und Arten der Familie, von denen nur etwa 20 in Europa heimisch, einige aber bis zu den Polen und höchsten Gebirgen verbreitet sind, ist nichts biologisch Interessantes zu berichten.

Mit der nun anschließenden Familie der Proteazeen wenden wir uns einem Verwandtschaftskreise zu, dem es gänzlich an einheimischen Vertretern mangelt. Es handelt sich hier aber um eine Familie, die für das Verständnis der anderen mehrfach bedeutungsvoll ist, so daß wir ihr wenigstens eine ganz kurze Betrachtung widmen müssen, wollen wir unser Werk nicht zu einem Bruchstück machen.

Die Proteazeen sind nämlich Charakterpflanzen für zwei an sich sehr eng begrenzte, dabei aber geographisch voneinander weit getrennte Florengebiete sowohl für die Südwestecke des Kaplandes als auch für Südwestaustralien. Dadurch bieten sie das treff-

lichste Beispiel, sich mit den Prinzipien der Pflanzengeographie in einer Weise bekannt zu machen, wie dies an keiner anderen Familie dermaßen möglich wäre. Die botanische Wissenschaft unserer Tage kennt zwei Gesichtspunkte, von denen aus sie Pflanzengeographie betreibt; als Pflanzengeographie im älteren Sinne gilt ihr, statistisches Material über die Verbreitung der einzelnen Pflanzen und bestimmter Pflanzengruppen beizubringen. Sie strebt an, Zusammenhänge mit der Lage der Verbreitungsgebiete und deren Beschaffenheit sowie, unter Berücksichtigung der Beziehungen zu den Nachbargebieten, die für die gegenwärtige Verteilung der Pflanzenformen entscheidenden Faktoren aufzufinden. Die moderne Pflanzengeographie dagegen, die man nach dem Vorgange Schimper's, ihres Begründers, auch die „physiologische“ Pflanzengeographie nennt, sucht ihre Aufgabe insbesondere in der Aufdeckung der Beziehungen zwischen den Lebensbedingungen der verschiedenen Erdstriche und Gebiete mit den Anpassungen, welche die Pflanzen dieser Gebiete erzeugt haben. Dieser Wissenszweig strebt also vor allem nach der Ergründung der äußeren Ursachen, welche die jeweilige Tracht, den „Habitus“ der Pflanzendecke, bestimmen. Die alte Schule führte zu einer geographisch-systematischen Betrachtungsweise, die neuere ist eine biologische Wissenschaft, die auf die Dauer ohne Physiologie und die mit ihr verbündete Psychologie nicht auskommen wird. Wie aber nirgends die Natur den starren Schematismen der Menschen entspricht, so dürfen wir deshalb durchaus nicht die alte Arbeitsart über Bord werfen; auch hier greifen naturgemäß beide Betrachtungsweisen vielfach und unvermeidlich ineinander.

Gehen wir nun nach diesen etwas spröden Feststellungen wieder zu unserem Ausgangspunkte, zu den Proteazeen zurück, denn diese Familie ist für beide Behandlungsarten pflanzengeographischer Probleme von höchstem Interesse. Betrachten wir nur einmal die physiologische Seite. Die Proteazeen sind im höchsten Grade ausgeprägte Hartlaubgewächse (Näheres hierüber siehe Bd. I, S. 36). Hartlaubgewächse aber sind typische Trockenheitspflanzen (Xerophyten), sie finden sich stets in Gegenden, die nur ab und zu Feuchtigkeit genießen, meist aber dürsten. Mit anderen Worten, sie leben in mildtemperierten Gegenden mit Winterregen und langer Sommerdürre. Solche Länder sind die Küstengebiete des Mittelmeeres, die Südwestecke Afrikas, Südwestaustralien, das mittlere Chile und der größere Teil des Küstenlandes von Kalifornien. Wo der Mensch dort die ursprünglichen Verhältnisse nicht zerstört hat, sind die Hartlaubhölzer stets zu großen Buschlandschaften, pflanzengeographisch gesprochen, zu zusammenhängenden und dichten Beständen vereinigt, die in der Mehrzahl der Fälle aber nicht aus Bäumen, sondern völlig oder wenigstens vorwiegend aus Sträuchern bestehen. Wenn es bis zur Baumbildung kommt, so bleiben die Hartlaubebäume immerhin niedrig, und ihr Astwerk wird knorrig. Auch ihre Blätter bleiben immer klein, höchstens kommt es zu einer Mittelgröße wie der des Lorbeers oder des Oleanders. Gewöhnlich aber sind sie sogar winzig. Wir wissen dies bereits zu deuten, denn das alles entspricht dem Bedürfnisse der Oberflächenverkleinerung zur Herabsetzung der Transpirationsgefahr. Aus demselben Grunde sind hier die Blätter auch niemals zusammengesetzt, sondern in der Regel schmal lanzettlich oder linealisch bis nadel förmig (man nennt das den pinoiden Typus) oder gleichzeitig mehr oder weniger eingerollt (erikoider Typus). Man ermesse nun das pflanzengeographische Interesse der Proteazeen daran, daß diese Familie alle die verschiedenen Typen der Hartlaubge-

wächse in reichster Ausgestaltung vereinigt. Es gibt darunter meist Sträucher oder kleine Bäume, selten Bäume von bedeutenderer Höhe (so z. B. *Knightsia excelsa* auf Neuseeland) und sehr selten ausdauernde Kräuter. Eine besondere Eigenheit sind die ganz ausgeprägten Transpirations- und Schutzrichtungen im Laube. Alle die bekannten Schutzmittel sind vorhanden; sowohl die Haarbekleidung, entweder dünn-frausig oder dichtfilzig und seidig glänzend (*Grevillea Leucadendron* und *Leucadendron argenteum* [Silberbaum] Kapland) als auch die lederartigen, manchmal außerordentlich harten und steifen, wie aus Blech gestanzten Blätter. Graugrün und fahl, wie bei den meisten Hartlaubgewächsen, geben sie aus der Ferne den von Proteazeen besiedelten Landschaften einen sehr düsteren Charakter.

Interessant ist aber gerade bei dieser Familie, die in der Kapflora besonders mit Heidekräutern, in der australischen mit *Acacia*-Arten vergesellschaftet ist, die geographische Lokalisierung. Man kennt etwa 960 Arten von Proteazeen, und davon entfallen auf Australien alle in 591 Arten, von denen die überwiegende Anzahl der Südwestecke angehört. Die Kapflora dagegen umfaßt 262 Arten, die ebenfalls merkwürdigerweise auf das südwestliche Kapland beschränkt sind. Die übrigen Proteazeen dagegen verteilen sich sehr spärlich; im tropischen Ostasien wachsen 25 Arten, in Neukaledonien 27, auf Neuseeland 2, in Chile 7, im tropischen Südamerika 36, auf Madagaskar 2, in den Gebirgen des tropischen Afrika etwa 5 Arten.

Ich habe diese Zahlen mit Bedacht hergesetzt, denn sie scheinen mir für die geographisch-systematische Betrachtung der Pflanzenverteilung von Wichtigkeit und geben mancherlei Anregung. Der Pflanzengeograph sucht ja die Verteilung und Absonderung charakteristischer Florengebiete vor allem durch die Wanderungsfähigkeit, bzw. durch die Unmöglichkeit solcher Wanderungen aus der Formation der Länder zu erklären. Große Wasserbecken, Wüstengebiete von beträchtlicher Ausdehnung, hohe Gebirgskzüge sind es, die er für Hemmnisse der Vegetation, also für natürliche Florengrenzen hält. Selbstverständlich muß sein forschender Blick aber auch oft in frühere geologische Epochen zurückgreifen, sonst versteht er die Gegenwart nicht. Und gerade hierfür sind nun die Proteazeen der merkwürdigste Beleg. Ihre eigentümliche Verteilung regt da zu mancherlei Gedanken an.

Der kolossale Reichtum Australiens an diesen Pflanzen bei gleichzeitiger Beschränkung auf die Südwestregion legt die Vermutung nahe, daß vor erdgeschichtlich „längeren“ Zeiten, also wohl vor vielen Jahrtausenden, eine Trennung zwischen den Ost- und Westgebieten Australiens bestanden haben muß, denn sonst wäre diese strenge Absonderung unbegreiflich. Und gleiches muß wohl auch für die Südwestecke Afrikas angenommen werden. Andererseits würde die floristische Übereinstimmung zwischen dem Kapland und Südwestaustralien auf eine frühere Landverbindung zwischen diesen beiden Kontinenten hinweisen. Allzuviel Gewicht darf man aber vielleicht dieser Übereinstimmung wieder insofern nicht zumessen, als sowohl das Kapland wie Australien ihre besonderen Gattungen besitzen, die der jeweils anderen Region fehlen. So sind die bedeutendsten Proteazeen des Kaplands die Gattungen *Leucadendron* (Silberbaum) und *Protea*, während für Australien die Gattungen *Banksia*, *Dryandra*, *Grevillea*, *Hakea* u. a. kennzeichnend, für die betreffenden Gebiete sogar endemisch sind.

Da haben wir also aus unseren pflanzengeographischen Studien ein gar merkwürdiges Ergebnis herausgelesen. Die Lebenden verraten noch die Geschichte der Urzeit, die Botanik erzählt Weltgeschichte und wirft Licht bis in entfernte Wissenschaften. So sind für den Erkennenden alle Dinge dieser Welt verknüpft, und darum gibt es keine Einzelheit der Wissenschaft, die „bedeutungslos“ wäre. In ihren richtigen Platz gestellt, sagt jede etwas aus über das Urgeheimnis der Welt, und die Größe eines Forschers bemißt sich danach, ob er imstande ist, die Kenntnisse in diesem fruchtbaren Sinn zu gruppieren.

Wir wollen jedoch von dieser uns so vielsagenden Familie nicht scheiden, ohne noch an ihr einen der merkwürdigsten Begriffe der Botanik erläutert zu haben. Nämlich den des „Endemismus“. Es leuchtet doch ohne weiteres ein, daß Gebiete, die geographisch abgeschlossen sind oder es in früheren Perioden gewesen sein müssen, besonders geeignet waren zur Entwicklung eines reichen endemischen Bestandes. In der Beziehung stehen nun die beiden oben genannten Gebiete, Australien und Afrika, obenan. Allerdings beschränkt sich dieser Reichtum an Endemismen sowohl im Kapland als in Australien (Südwesten) nicht auf die Proteazeen; immerhin bilden diese aber dort einen sehr bedeutenden Anteil. Australien ist ja überhaupt das biologische Wunderland. Seine lange geologische Absonderung hat ihm eine ebenso eigentümliche als altertümliche Fauna erhalten (man denke doch nur an das Schnabeltier, das Känguruh und andere Beuteltiere oder an den Molchfisch), und daselbe wiederholt sich auf botanischem Gebiete. Gerade die mehrfach genannte Südwestecke ist in dieser Beziehung hochinteressant; von über 3000 auf diesem kleinen Gebiete vorkommenden Blütenpflanzen sind doch gegen 82% endemisch. Woher rührt das? Wir finden keinen anderen Anhaltspunkt, als daß die großen Wüsten Inneraustraliens eine gründliche Trennung der südlichen und nördlichen Florengebiete bedingt haben mögen.

Von den Proteazeen möchte ich übrigens noch erwähnen, daß eine ganze Anzahl, z. B. Arten von *Protea* und *Grevillea*, als Vogelblütler beschrieben werden; als Bestäuber fungieren bei ihnen, mindestens neben geeigneten Insekten, auch Honigvögel. Im Zusammenhang damit sind die Einzelblüten zu besonders dichtgedrängten, auffälligen Blütenständen vereinigt, und das hat manchen Arten auch in unseren Glashäusern ein Plätzchen verschafft.

Wir treten nun an einen Verwandtschaftskreis heran, der nach der Meinung neuerer Systematik sich an die Proteales anschließt. Dieser Kreis, die „Santalales“, umfaßt biologisch hochinteressante Familien, größtenteils Schmarogergewächse von sehr verschiedenem Aussehen und teilweise auch höchst merkwürdigem Bau. Für unser Werk steht unter den hierhergehörigen Familien die der Loranthazeen mit der Mistel (*Viscum album*) und der Riemenblume (*Loranthus europaeus*) als einheimischer Vertreter an erster Stelle. Von diesen beiden erweckt allerorten die Wißbegierde des Naturfreundes

die Mistel (*Viscum album*).

Einiges Allgemeine über ihre Lebensgewohnheiten und das Eigentümliche ihres Lebens findet der Leser schon an verschiedenen Stellen der beiden ersten Bände; hier ist es aber Zeit, sich etwas eingehender mit dieser merkwürdigen Pflanze zu befassen. Ist sie es doch wahrlich wert, und wäre es nur, um an einem besonderen Beispiele zu zeigen, wie viele biologische Probleme eine einzige Pflanze vor den Augen des Forschers aufzurollen vermag.

Diese Besonderheit der Lebensweise hat denn auch schon die Aufmerksamkeit der Naturvölker erregt und sowohl zu einer abergläubischen oder religiösen Verehrung geführt wie auch den Glauben an besondere heilkräftige Wirkungen der Pflanze hervorerufen. Die hohe Verehrung, welche die Mistel im alten Druidendienst genoß,

Schwarzpappel mit *Viscum album*. (Naturaufnahme von P. Wolff-Bischheim.)

wäre ein Beispiel hierfür. Es sind auch die eigentümlichen grünen, im Alter meist fast kugelig erscheinenden Büsche fremden Laubes auf den befallenen Bäumen wahrlich auffällig genug. Besonders gilt dies für die Laubholz bewohnenden Misteln, die, da sie im Winter ihr Blattkleid behalten, zwischen dem kahlen Gezweige mit ihren Büschen Zeugnis

geben von Leben mitten im scheinbaren Tode, aber auch von der Gestaltungskraft der Natur, die da ein Gewächs schuf, das scheinbar mit dem Baume zu einem Individuum verwachsen ist und doch nur als tückischer Feind an dessen Lebensmark zehrt. Freilich nicht ganz so gefährlich wie manche andere Schmarotzer, aber doch zerstörend genug, wenn seiner Entfaltung nicht Einhalt geboten wird.

Die Mistel ist ein Parasit von sehr merkwürdigen Eigenschaften. Wir haben in Bd. II und III den pflanzlichen Parasitismus in seiner vollendetsten Ausgestaltung an dem großen Heere der Pilze kennen gelernt, als vollständigste Abhängigkeit des Schmarotzers von seiner Wirtspflanze. Wir sahen, daß dem Parasiten die Fähigkeit, aus den Elementarstoffen sich selbst die nötige Körpersubstanz zu bilden, gänzlich verloren geht. Und es wurde dort schon darauf hingewiesen, daß die Entstehung solcher unselbständiger Lebewesen aus ursprünglich sich „autotroph“ ernährenden Organismen sich durch Gewöhnung an die Aufnahme schon vorhandener organischer Nahrung gebildet haben muß. Die Mistel und mit ihr noch andere später zu besprechenden Schmarotzer unter den Blütenpflanzen liefern uns nun einen weiteren Beleg dafür, daß ein solcher Übergang zu schmarotzender Lebensweise auch bei hochentwickelten

Pflanzen noch möglich war und ist. Über die ersten Anstöße, über die Gelegenheiten und Bedürfnisse zu solchem Wechsel der Lebensweise kann man ja nichts Bestimmtes sagen, aber das eine läßt sich doch mit aller Sicherheit behaupten, daß höhere Pflanzen, wie die Mistel, nicht von vornherein als Parasiten entstanden sein können. Sehen wir die Gründe hierfür!

Als hauptsächlichstes Merkmal und in entwicklungsgeschichtlicher Beziehung wichtigste Eigentümlichkeit des Schmarokertums wurde schon mehrfach die Rückbildung jener Organe bezeichnet, die durch die schmarokende Lebensweise wertlos werden. Diese Erscheinungen bilden ja in ihrer Mannigfaltigkeit und doch so unverkennbaren Einheitlichkeit die ausgiebigste Stütze des Lamarckschen Gesetzes von der Wirkung des Nichtgebrauches auf die Organe. Mit der Preisgabe der eigenen Kohlenstoffassimilation sahen wir zunächst bei den Pilzen auch das Verschwinden des Blattgrüns. Bei den höheren Parasiten unter den Pflanzen ist naturgemäß auch die Rückbildung jenes Organs verbunden, das ja nur im Dienste der Assimilationstätigkeit seine charakteristische Form und seinen funktionsmäßigen Bau erhalten hat, nämlich des Laubblattes. Die Sommerwurz oder Schuppenwurz ist ein typisches Beispiel dafür. Daß auch Humuspflanzen aus gleichen Gründen dieselben Rückbildungen erfahren, haben wir schon gelegentlich der saprophytischen Orchideen (*Neottia*, *Epipogon*) erwähnt.

Die Mistel ist nun auch ein unzweifelhafter Parasit und besitzt dennoch grüne Blätter. Wie kommt das? Wir begegnen eben in ihr einem sogenannten Halbparasiten. Die ganze Familie der Loranthaceen, zu der die Mistel gehört, umfaßt beinahe ausschließlich Gewächse von solcher Lebensweise. Man bezeichnet sie deshalb so, weil sie die befallenen Pflanzen nur teilweise ausplündern; sie entziehen ihnen in der Hauptsache nur die rohen Nährsalze, die sie den Leitungsbahnen der Wirte entnehmen. Die Fähigkeit der Kohlenstoffassimilation ist hingegen der Mistel und ihren Verwandten noch erhalten geblieben. Sie üben diese Funktion auch noch in ausreichendem Maße aus und deshalb erfreuen sie sich auch noch schöner Blätter. Daß dieses Laub bei der Mistel sogar verschiedene Anpassungen an besondere Lebensverhältnisse zeigt, soll gleich zur Sprache kommen. Es gibt einen unwiderleglichen Beweis dafür, daß die Mistel hinsichtlich der Kohlenstoffgewinnung auf ihre eigene assimilatorische Tätigkeit angewiesen ist. Dieser Umstand ist das Lichtbedürfnis der Mistel. Wäre ihr Laub nur ein unnötiger Schmuck (eine Voraussetzung, die allerdings angesichts der Sparsamkeit der Natur, die nichts Unnützlichcs duldet, kein Naturforscher wagen würde) oder ein bloß nebensächlicher Ernährungsapparat, so müßte die Mistel auch bei Lichtmangel auf Kosten ihres Wirtes ihren Kohlenstoffbedarf decken können. Nun zeigt aber schon die Beobachtung der natürlichen Verhältnisse, daß ältere Mistelbüsche, wenn sie durch die Entwicklung der Baumkrone immer tiefer in den Schatten kommen, gerne eingehen, und Prof. Heinricher in Innsbruck, dem wir neuestens verschiedene interessante Aufschlüsse über die Biologie dieses Schmarokers verdanken, gibt Beweise dafür, daß die Misteln ohne Licht nicht leben können.

Aber die Mistel ist nicht nur als Halbparasit bemerkenswert; sie ist zugleich auch eine ausgesprochene Überpflanze, so wie ihre Verwandten. Für die entwicklungsgeschichtliche Aufklärung ergibt sich dabei die schwierige Frage, ob der Parasitismus sich hier aus ursprünglich reinem Epiphytismus (siehe Orchideen und Bromeliaceen)

entwickelt hat, oder ob diese Pflanzen erst als Parasiten epiphytisch geworden sind. Wenn man jedoch erwägt, daß die Änderung der Bedürfnisse, die mit dem Epiphytismus verbunden sind, viel geringere Organisationsänderungen erfordert als die der Parasiten, so dürfte wohl die erstere Annahme die richtigere sein. Jedenfalls liegt hier ein kompliziertes, entwicklungstheoretisches Problem vor, von dessen Lösung wir noch weit entfernt sind.

Wie kommt nun die Mistel (und die gleiche Frage gilt für ihre Verwandten) auf die Bäume? Was wir aber schon einmal über die reinen Epiphyten sagten, das gilt auch für diese epiphytischen Parasiten. Die Vorbedingung für die Annahme solcher Lebensweise ist geeignete Beschaffenheit der Früchte oder Samen für die Verbreitung. Sie müssen flugfähig sein oder Verschleppung durch Vögel angepaßt. Letzterer Fall trifft bei der Mistel zu. Es genügt aber natürlich nicht, daß die Früchte, bzw. Samen durch die Vögel in das Gezweige der Bäume getragen werden, sie müssen dort auch haften bleiben, da ja die Samen auf den Ästen zu keimen haben. Dafür ist nun allerdings bei der Mistel reichlich gesorgt. Die Klebrigkeit der Beeren ist jedem sattfam bekannt, der einmal eine solche Mistelfrucht zwischen den Fingern zerdrückt hat; es kostet die größte Mühe, die Finger von der überaus zähe haftenden, fadenziehenden Masse wieder zu befreien. Das „Biszin“, das diese klebrige Eigenschaft besitzt, bildet sich hier im Gewebe unter der äußeren Fruchthaut. Nun sind aber diese Mistelbeeren mindestens im Winter, wenn bessere Vorkerbissen fehlen, besonders von den Drosseln, allen voran von der deshalb so benannten Misteldrossel, gesucht. Diese Vögel besorgen die Verbreitung der Samen auf das ausgiebigste, sei es, daß sie die unverdaut abgehenden Samen mit den Exkrementen oder mit dem ausgeworfenen „Gewölle“ auf die Äste der Bäume bringen, auf denen sie sich niederlassen, oder auch, indem sie den beim Raschen in höchst lästiger Weise durch die Beeren verklebten Schnabel energisch an den Ästen abwehen. Im letzteren Falle werden dann die Samen gleich gründlichst an den Ästen angeleimt. Zuweilen werden wohl auch abfallende Beeren auf tieferen Ästen hängen bleiben; aber erstens kommen dadurch viele Samen in tiefere, schattige Lagen, und wir haben ja gesehen, daß die Mistel das schlecht verträgt; zweitens aber wäre damit die Erhaltung und Verbreitung der Mistel viel zu sehr von einem nicht gerade wahrscheinlichkeitsreichen Zufall abhängig gemacht. So dürfen wir annehmen, daß sich die Pflanze wohl auf einen sichereren Vermittler ihrer Weiterexistenz eingerichtet hat. Dies spricht sich auch in dem Umstande aus, daß wenigstens lokal eine unverkennbare Beziehung zwischen dem Vorkommen der Mistel und den speziellen Gewohnheiten, insbesondere der Drosseln, zutage tritt. So z. B. ist die große Scheu und Vorsicht der Drosseln, die sie bei jeder Störung sofort aufsteigen und entlegenere Zuflucht aufsuchen läßt, ein Grund, warum am Rande der Wälder, die sich in der Nähe von Obstgärten befinden, stehende Laubhölzer sich mitunter reichlicher mit Misteln besetzt finden. Als Verbreiter der Mistelfrüchte sind bekannt: die Drosselarten, die Seidenschwänze, die Holztauben; außerdem sind in diesem Sinne verdächtig: Fasanen, Dohlen, Krähen, Eichelhäher, Tannenhäher, Elstern, Rotkehlchen, Schwarzspechte, Wildtauben und Stare. Alle diese aber dürften wenig und nur im Falle der Not, bei mangelnder anderer Nahrung, in Betracht kommen. Die wesentlichste Bedeutung kommt den Drosselarten zu, und zwar am meisten der Misteldrossel, die bei uns im Oktober und November durch=

zieht und ebenso im März und April, dabei aber auch als Standvogel, den ganzen Winter über bleibt. Auch der Kramtsvogel, von Oktober bis November kommend und erst im Frühjahr verschwindend, und die Amsel, die zum großen Teile Standvogel ist und sich besonders in der Nähe von Ortschaften den ganzen Winter hält, sind wichtige Verschlepper. Die ersteren beiden kommen besonders für die Waldmistel (Kiefer, Tanne, Baldbäume), die Amsel für die Obstbaummistel in den Ortschaften in Betracht. Wir werden später sehen, daß einer schädlichen Ausbreitung der praktisch allein in Betracht kommenden Apfelbaummistel mit so einfachen Mitteln vorgebeugt werden kann, daß eine Verfolgung der sonst so nützlichen Amsel ihretwegen in keiner Weise zu rechtfertigen wäre. Nebenbei bemerkt, hat die Mistel neben diesen „Freunden“ auch wirkliche Feinde; die Meisen z. B. sind zu den letzteren zu rechnen, da sie nicht die Früchte, sondern die Samen der Mistel suchen und auffressen.

Daß die Mistel durch die genannten Vögel verbreitet wird, dürfte demnach außer Zweifel stehen. Gingegen ist der noch teilweise verbreitete Glaube, die Samen müßten den Darmkanal der Vögel passieren, um keimfähig zu werden, durchaus irrig. Schon die eine Erwägung spricht dagegen, daß ja ein großer Teil der keimenden Samen (oft reihenweise) einfach bloß vom Schnabel auf die Äste abgestreift wird. Vollends widerlegt wird diese Meinung aber durch die zahlreichen Keimungsversuche, die zur Ergründung der Beziehung der verschiedenen Mistelrassen zu ihren Wirten angestellt wurden. Man hat frisch gepflückte Früchte auf die Äste geklebt und dennoch ihre Keimung beobachtet. Diese erfolgt auf beliebigem toten oder lebenden Holze, ebenso auf Stein, Glas usw. Wohl aber ist für den Eintritt der Keimung eine bestimmte Temperatur notwendig sowie Licht und der Ablauf einer gewissen Ruheperiode. Hierüber hat Wiesner sehr interessante Ergebnisse mitgeteilt, insbesondere auch bezüglich des den Lebensbedingungen entsprechenden Verhaltens unserer europäischen Loranthazeen gegenüber den tropischen Arten. Gleich den Samen von *Viscum album* keimen nämlich auch die Samen der Riemenblume (*Loranthus europaeus*) nur im Lichte. Nur braucht dazu die letztere etwas höhere Lichtintensität. Ferner haben die beiden europäischen Arten die weitere Eigentümlichkeit gemeinsam, daß ihr Same eine bis in den Frühling hineinreichende Ruheperiode durchmachen muß, und zwar ist diese Ruheperiode durch direkte Einwirkung äußerer Faktoren nicht abkürzbar; auch die günstige Beleuchtung der Tropen konnte z. B. die Mistel dort nicht zu früherer Keimung bringen. Gingegen keimten die darauf untersuchten tropischen Loranthazeen (*Viscum articulatum* und *orientale* usw.) sowohl im Lichte als im Dunkeln, aber im Lichte rascher und mit höherem Keimprozent. Außerdem ist bei den letztgenannten Arten keine Ruheperiode vorhanden. Die Keimung erfolgt nach einigen Tagen der Fruchtreife. Bei manchen Arten (*L. pentandrus*) scheint die schwierigere Aufschließung der Reservestoffe einen Keimungsverzug von einigen Wochen zu bewirken. Es liegt hier also wohl eine ganz ähnliche Anpassungserscheinung vor, wie bei den Periodizitätsercheinungen tropischer und gemäßigter Holzgewächse überhaupt. In den Tropen kann die Keimung jederzeit (nötige Wasserversorgung vorausgesetzt) beginnen, daher hat sich dort keine Ruheperiode herausgebildet; hingegen erweist sich in unserem Klima eine solche wegen der erst spät eintretenden Keimungstemperatur als durchaus zweckmäßig, weil dadurch der Gefahr vorgebeugt ist, daß durch vorübergehende und dann wieder schädlicher Kälte weichende

Frühlingstemperatur die Keimlinge zu ihrem Verderben hervorge lockt werden könnten. Weitere sehr belehrende Gegenätze zwischen den europäischen und tropischen Loranthazeen hat Wiesner bezüglich des Feuchtigkeitsbedürfnisses bei der Keimung und des Viszinhaltendes der Beeren festgestellt: Die europäischen Loranthazeenfrüchte sind weitaus viszinreicher als die tropischen, unter denen die wenigen, nicht auf Bäumen parasitischen sogar gar kein Viszin enthalten. Die parasitisch-epiphytisch lebenden haben jedoch immer so viel Viszin, wie zur Anheftung der Samen nötig ist; dies ist ja, wie schon betont, eine Vorbedingung zur epiphytischen Lebensweise. Die reichliche Viszinsbildung unserer Loranthazeen muß also noch eine andere Bedeutung haben. Wiesner hat

darüber folgende Ansicht: Die Samen der Mistel keimen am besten, wenn sie vom Viszinschleim befreit sind. Es scheint, daß im Viszinschleim enthaltene Hemmungsstoffe schon in der Fruchtlage die Keimung der daselbst in gequollenem Zustande

vorhandenen Samen hintanhalten, also an dem Keimverzuga mitbeteiligt sind. Hier drängt sich die Vermutung auf, daß die von einigen Forschern aufrechterhaltene Erfahrung, daß Samen, die den Darmkanal von Vögeln passiert haben, in der Keimung wenigstens „gefördert“ seien, wohl daher rührt, daß diese Samen

Viscum album, unterer Teil einer älteren Mistel mit primären Senfern (i), Rindenwurzeln (f) und sekundären Senfern (e). (Nach Sachs.)

von ihrer Viszinhülle befreit sind! Der bisher unaufgeklärt langwährende Keimverzuga der Mistel scheint also hauptsächlich auf folgenden drei Ursachen zu beruhen: auf langsamer Aufschließung der Reservestoffe, phylogenetisch sich betätigenden Einflüssen des Lichtes auf den Keimprozeß und auf dem Auftreten von Hemmungsstoffen in dem umgebenden Viszinschleim.

Was endlich das Wasserbedürfnis der Samen betrifft, so ergibt sich, daß die Samen von *Viscum album* nur wenig flüssiges Wasser aufnehmen und es rasch wieder abgeben; sie sind also bei der Keimung vor allem auf jene Wassermenge angewiesen, die im reifen Samen enthalten ist. Sie keimen deshalb in trockener Luft und sind gegen Verdunstung so gut geschützt, daß schwache Keimung sogar im Trockenschrank zu erzielen ist. Geringe Keimung die Samen tropischer Loranthazeen selbst in feuchter Luft nicht oder sehr unvollkommen; zu ihrer normalen Keimung ist stets flüssiges Wasser erforderlich. Und dies entspricht auch durchaus den Lebensbedingungen, indem in dem Verbreitungsgebiet der tropischen Loranthazeen entweder Tag für Tag starke Regen niedergehen, oder eine langwährende Regenzeit herrscht, während der sich die Keimung vollzieht. Wiesner schließt demnach vollkommen berechtigt mit den Worten: „Wir sehen also, daß sowohl die Keimungsbedingungen unserer Mistel als die der tropischen *Viscum*-Arten den jeweiligen klimatischen Bedingungen auf das genaueste angepaßt sind.“

Wenn nun aber auch auf die Keimung der Mistel die Unterlage an und für sich ohne Einfluß ist, so ist es etwas ganz anderes um deren Bedeutung für die Weiterentwicklung des Keimlings. Da spielt nun die Trappflanze eine wichtige Rolle, und es herrscht mitunter weitgehende Spezialisierung hinsichtlich der Wirtsbäume, so sehr, daß sie zu einer zweifellosen Massenbildung geführt hat. Bevor wir uns dieser letzteren, biologisch interessanten und wichtigen Erscheinung zuwenden, müssen wir uns aber zuerst darüber klar werden, wie sich denn die Mistel überhaupt entwickelt und mit ihrem Wirt in Verbindung tritt.

Es ist von den Mistelsprossen bekannt, daß sie weder heliotropisch noch geotropisch reagieren. Die Gestaltung des Mistelbusches erfolgt nur nach inneren Wachstums-
gesetzen ohne Rücksicht auf Lage und Lichtrichtung. Daher stammt von diesem all-
seitig gleichmäßig gerichteten Wachstum die meist kugelige Gestalt älterer
Mistelbüsche. Doch ist dies, wie Hein-
richer mitteilt, nicht immer der
Fall. Dabei handelt
es sich aber fast sicher
um eine geotropische
Krümmung. Helio-
tropische Krümm-
ungen sind trotz der
Lichtfreundlichkeit
der Pflanze bisher
nicht konstatiert.
Um so auffälliger

1 = Keimung der Mistel (nach Wettstein). 2 = Erwachsener Mistelbusch.
3 = Männliche, weibliche Blüten und Früchte. (Nach Bailon.)

ist die Lichtscheu des Keimsprosses. Die meist zu zweien, mitunter auch in Einzahl oder zu dritt aus der Beere kommenden Keimsprosse (siehe das Bild) sind ausgesprochen negativ heliotropisch, sie wenden sich der beschatteten Unterlage zu, wodurch sie natürlich in jeder Lage am Ast die für die Weiterentwicklung günstige Stelle treffen. Bei Berührung mit der Unterlage bildet das Keimstämmchen zunächst eine „Keimscheibe“, die sich mittels papillöser, schlauchartig auswachsender Zellen befestigt. Von dieser Keimscheibe aus entwickelt sich dann erst das Saugorgan, das Haustorium, hier Senker genannt. Dieser „primäre“ Senker dringt nun durch die Rinde bis an und in den Holzkörper der Wirtspflanze und stellt auf diese Weise die Verbindung mit den Wasserleitungsbahnen des letzteren her. Im weiteren Wachstum der Pflanze (das übrigens sehr langsam vor sich geht: erst im zweiten Frühjahr kommt es zur Entwicklung der beiden ersten Laubblätter) bilden sich von der Basis des primären Senkers aus die sogen. „Rindenzurzel“, deren Aufgabe darin liegt, die Ausbreitung des Parasiten von seiner Ansatzstelle aus zu erzielen. Diese Rindenzurzel sind denn auch besonders befähigt, sich den Weg durch die Rinde des Tragastes zu bahnen; ihre freie, nicht von

einer Haube bedeckte Spitze ist schleimig und bildet durch haarartiges Auswachsen ihrer stark verlängerten, großen, gequollenen Endzellen eine Art Pinsel, der in seinem Vordringen das im Wege liegende Rindengewebe auflöst. Wir sehen hier wieder in schönster Weise, wie sich ein aufnehmendes Organ vergrößert. Eine ähnliche pinselartige Aufteilung werden wir bei der Seide (*Cuscuta*) wieder begegnen. Gleichzeitig findet man aber bei der Mistel auch eine im Dienste der so veränderten Funktion stehende ungewöhnliche Änderung im Bau der Wurzelspitze. Es mag dadurch eine teilweise Aufnahme der im Wege liegenden Nahrungsstoffe (Eiweiß und Kohlehydrate) stattfinden, aber das oben erwähnte Lichtbedürfnis der Mistel beweist, daß diese Aufnahme jedenfalls keine genügende ist; man hat darin also keinesfalls die Hauptaufgabe der Rindenwurzeln zu suchen. Diese suchen vielmehr für den vordringenden Parasiten den Weg zu bahnen. Auf der Oberseite bilden nämlich die Rindenwurzeln von Zeit zu Zeit Knospen (Adventivsprosse), die neue Mistelstämmchen nach außen entwickeln; von der Basis solcher Adventivsprosse gehen dann stets neue Systeme von Rindenwurzeln aus. Überdies bilden sich nun auch noch an der Unterseite der vordringenden Rindenwurzeln in ununterbrochener Reihenfolge neue Saugorgane, sogen. „sekundäre“ Senker, die wieder in das Holz dringen (s. das Bild auf S. 280). Für eine gründliche Durchdringung der Wirtspflanze durch den Parasiten ist also reichlich gesorgt. Damit hängt auch die später noch zu erwähnende Entwertung des Holzes zusammen. Das Bildungsgewebe für die Senker hält in seiner Tätigkeit Schritt mit der Holzbildung des Wirtes; dadurch kommt der Senker mit jedem Jahre natürlich tiefer in den Holzkörper hinein, ebenso wie er an seiner Basis stetig an Umfang gewinnt.

Die eigentümliche Tracht der Mistelbüsche ist zum guten Teil durch die gabelige Verzweigungsart mitbedingt, die wieder eine Folge der Blattstellung ist; jede Sproßachse bildet ein einziges Laubblattpaar. Aus den Achseln dieser beiden Blätter bildet sich dann im nächsten Jahre je ein neuer Seitensproß. Dadurch, daß jährlich nur ein Internodium mit zwei solchen Blättern gebildet wird, erklärt sich die Langsamkeit der Größenzunahme der Mistelbüsche. Auch das Laubblatt läßt mehrere bemerkenswerte biologische Beziehungen erkennen. Die Mistel ist bekanntlich wintergrün. Sie setzt also ihr Laub zeitweilig großen Transpirationsgefahren aus. Ob sie nun auf Laubholz oder Nadelbäumen wächst, jedenfalls ist die Mistel in ihrer Wasserversorgung auf diejenige ihres Wirtes angewiesen. Unsere Bäume können aber im Winter wegen der Kälte des Bodens nicht genügend Wasser aufnehmen. Deshalb schütten sich die zartlaubigen Gehölze durch Abwerfen des Laubes, die hartlaubigen aber durch entsprechende Schutteinrichtungen ihrer Blätter. Die sogen. Eichenmistel (*Loranthus europaeus*) schließt sich dem Verhalten unserer Laubbäume an, sie wirft ihr Laub im Winter ab; die Mistel hingegen huldigt der Lebensgewohnheit der Hartlaubgewächse, sie behält ihr Laub. Dieses ist aber lederig, transpiriert also nicht stark. Tatsächlich braucht ein abgeschnittener Mistelbusch sehr lange, bis er merklich welkt. Das hat ja die Mistel als Zimmerschmuck auch beliebt gemacht.

Die Blütenbiologie der Mistel ist noch nicht vollständig aufgeklärt. So viel dürfte wohl feststehen, daß die ältere, vermutlich durch die Unansehnlichkeit der Blüten hervorgerufene Auffassung der Mistel als einer windblütigen Pflanze nicht richtig ist. Schon Koelreuter, einer der Väter der Blütenbiologie, hatte diese Ansicht abgelehnt. Durch

ausgedehnte Beobachtung wurde dann durch Loew die Insektenblütigkeit nachgewiesen, und zwar hält dieser Forscher die Biene für die wesentlichste Bestäuberin. Da die Mistel schon im März und April blüht, also zu einer Zeit, da noch sehr geringe Blütenkonkurrenz vorhanden ist, erklärt sich ihr reichlicher Insektenbesuch. Die Honigbildung ist ausgiebig, aber bei den beiden Geschlechtern verschieden. Die männliche Blüte duftet reichlicher und gehört dem Typus der „offenen Honigblume“ an, während die schwächer duftende weibliche Blüte zu den „Honigblumen mit teilweise verdecktem Honig“ gehört. Kirchner behauptet nun in neuerer Zeit auf Grund aufmerksamer Beobachtungen, daß die Biene für die Mistel ein unnützer Besucher sei, da sie nur die männlichen, stärker duftenden Stöcke aufsuche, daß hingegen als wirkliche Bestäuber Fliegen anzusehen wären, die Stöcke beider Geschlechter gleichmäßig besuchen. Viele Arten von *Loranthus*,

deren es in den Tropen über 200 gibt, sind Honigvögeln und Kolibris als Bestäubern angepaßt und demnach auch durch Größe und Farbenpracht ihrer Blüten ausgezeichnet.

Niemenblume (*Loranthus*).

1 = Querschnitt der Hausfluren.

2 = Außenansicht eines Zweiges mit Saftschleiben.

(Nach Solms-Laubach.)

Nunmehr bleibt uns noch ein interessanter Punkt aus dem Lebensbilde unserer Mistel: die Bildung von Ernährungsraffen durch Gewöhnung an bestimmte Wirtspflanzen. A. v. Tübeuf unterscheidet in seiner neuesten Schrift über den Gegenstand drei Standortsvarietäten: die Tannenmistel, die Föhren- oder Kiefernmistel und die Laubholzmistel. Die Kiefernmistel ist schon äußerlich durch ihr kleineres Laub und ihre mehr gelblich-grünen Beeren gekennzeichnet und

wird als *Viscum laxum* bezeichnet. Bezüglich dieser drei Varietäten vertritt Tübeuf zunächst auf Grund umfassender Beobachtungen in der freien Natur die Ansicht, daß die Laubholzmistel, die ja auf verschiedenen Laubhölzern vorkommt, auch von einer Laubholzart auf die andere übergehen könne; dagegen gehe die Tannenmistel weder auf Kiefern und Fichten noch auf Laubhölzer über. Die Kiefernmistel hingegen könne auf die Fichte übergehen, aber niemals auf die Tanne oder Laubhölzer. In der letzten Zeit ist nun vielfach durch direkte Versuche (Hedke, Heinricher, Tübeuf) die Frage wohl in nachstehenden Punkten aufgeklärt: 1. Die Föhrenmistel geht nicht auf Laubhölzer über. 2. Die Laubholzmistel geht nicht auf Nadelhölzer. 3. Die Tannenmistel scheint weder auf Fichten noch auf Kiefern, die Kiefernmistel hingegen, wenn auch nicht leicht und häufig, auf Fichten übergehen zu können. 4. Es liegt zweifellos eine weit vorgeschrittene Spezialisierung dieser Mistelrassen vor. 5. Aber auch die Übergangsfähigkeit der Laubholzmistel von einer Laubholzart auf die andere erscheint vielfach weitgehend eingeengt und mit Schwierigkeiten verbunden zu sein.

Als Schädling kommt unter den Laubholzmisteln besonders die Apfelbaummistel in Betracht. Sie folgt vor allem der Kultur und ist am meisten im offenen Lande, an den Landstraßen, den Obstgärten, nahe den Ortschaften, verbreitet. Von da geht sie auf andere Laubhölzer in den Anlagen und an die Ränder der Laubwälder über. Sie

folgt aber der Kultur auch in die bewohnten Täler selbst großer geschlossener Laubwaldgebiete (Speßart) und ebenso in die Täler der großen Nadelwaldkomplexe (Bayr. Wald, Alpen); auch steigt sie mit der Kultur in die Höhen und bewohnt die Apfelbäume hochgelegener Ortschaften und Einzelhöfe bis zu 1000 m Meereshöhe. Sie geht über auf Wildapfelbäume (besonders gerne), Schlehen, Weißdorn, Haseln, Weiden, Eberesche u. a. Eichen meidet die Mistel im allgemeinen, ja sie ist auf Eichen in Deutschland geradezu selten (nicht zu verwechseln mit der Eichenmistel [*Loranthus europaeus*]), während sie in man-

Überreichlicher Mistelbefall an einem Apfelbaum.

chen Gegenden Frankreichs gerade auf Eichen häufig vorkommt; dort hat sich eben wieder eine andere biologische Masse herausgebildet. Die Laubholzmistel geht ferner besonders gerne auf Schwarzpappeln über, hingegen wurde sie selten auf der Silberpappel, niemals auf der Pyramidenpappel gefunden. Auf Linden ist sie häufig und geht von dort leicht auf den Apfelbaum über. Interessant ist bei alledem die Tatsache, daß das Vorkommen der Mistel auf verschiedenen Laubhölzern und, wie es scheint, auch die Übergangsfähigkeit nach Gegenden wechselt. Es scheint, „als ob sich lokal bestimmte Gewöhnungsrassen“ bilden würden, die an anderen Orten fehlen. Dies gilt vielleicht auch für die Birnen- und Eichenmistel. Es macht in solchen Fällen direkt den Eindruck, als habe sich die Mistel die betreffenden Wirte gewissermaßen durch Gewöhnung erobert.

Worauf ist aber nun diese Rassenbildung, die sich in den meisten Fällen äußerlich gar nicht ausprägt, also rein biologisch ist (vgl. im II. Bd. über Hefen und Rostpilze), zurückzuführen? Daß nicht bloß vorhandene oder mangelnde Verbreitungsgelegenheit das Entscheidende ist für die Bevorzugung bestimmter Bäume, lehrt einerseits die Seltenheit des Vorkommens auf gewissen, doch sehr häufigen Baumarten (z. B. Buche), andererseits die Leichtigkeit, mit der manche, ihr in der Natur kaum je zu Gebote stehende Wirte (wie z. B. Oleander) künstlich besiedelt werden können. Anatomische und stoffliche Eigenschaften der Wirte, vor allem aber spezifische Eigenschaften und Fähigkeiten des Plasmas dürften hier maßgebend sein. Denn wenn auch der Wirtspflanze anatomische Mittel zur Abwehr zur Verfügung stehen (dies wird z. B. von Hecke für die Tannenmistel gegenüber der Besiedelung durch die Apfelmistel angegeben), so ist doch nicht einzusehen, warum sie dieses rein histologische Mittel nur

bestimmten und nicht allen Mistelangriffen gegenüber anwendet. Das Entscheidende wird wohl sein, ob der Parasit befähigt ist, schädliche Stoffe im Wirt zu zerstören oder zu lindern; für den Wirt aber, ob er sich durch solche Abwehrstoffe des Parasiten erwehren kann. Für beides sind die Plasmacigenschaften maßgebend. Durch Gewöhnung kann sich dann eine solche vorhandene Fähigkeit steigern und festigen.

Diese „biologische Rassenbildung“ lehrt uns, wo immer wir sie entdecken, daß das Geheimnis der „Artbildung“ viel tiefer liegt als in den äußerlichen Merkmalen des Organismus, die dann erst abzuändern beginnen, wenn die veränderten Lebensgewohnheiten dies auch erfordern. Was für unendlich feine, unsichtbare Fäden spinnen sich da zwischen dem Angreifer und dem Angegriffenen hin und wieder! Hier kann man im wahren Sinne von einem Kampf ums Dasein sprechen, hier, wo der Zufall höchstens den ersten Anstoß gibt, die Entscheidung aber immer den aktiven Kräften der Kämpfenden überlassen bleibt. Deshalb ist die Feststellung solcher Rassenbildung auch bei der Mistel von großer Bedeutung, denn sie vermag uns einen Beweis zu liefern für die Vererbung erworbener Anpassungen und andererseits kann sie uns wieder recht eindringlich vor Augen halten, welchen Einfluß die Lebensbedingungen und die durch äußere Umstände aufgezwungenen Lebensgewohnheiten auf die Organisation ausüben! Deshalb kann die Mistel angesichts ihrer ausgebreiteten Fähigkeiten, Gewöhnungs- oder Ernährungsrasen zu bilden, vom Lamarckismus geradezu als Paradestück in Anspruch genommen werden.

Noch aber sind wir mit den biologischen Überraschungen dieser hochinteressanten Pflanze unserer Heimat nicht zu Ende. Die Mistel ist diözisch, d. h. männliche und weibliche Stöcke sind getrennt. Nun finden sich allerdings schon in der älteren Literatur Angaben über abnorme Fälle von Entwicklung männlicher Blüten auf weiblichen Stöcken und umgekehrt. Diese „Abnormitäten“ haben aber durch Heinricher eine sehr interessante Aufklärung gefunden. Die Mistel schmarokt gar nicht so selten auf sich selbst. Solches Verfahren ist allerdings in der Pflanzenwelt nicht ganz vereinzelt. Auch *Cuscuta* ergreift im Gewirre der Stengel oft ihre eigenen Glieder; Wurzelparasiten ergreifen sehr häufig Wurzelsfasern nebenstehender Artgenossen. Die Mistel bleibt darin nicht zurück. Hat sie ja doch Abwehrstoffe von ihrem eigenen Leibe nicht zu fürchten und auch keine solchen zu überwinden. Daß aber die Drosseln, die an großen Mistelbüschen naschen, sehr häufig die Samen mit dem Schnabel gleich am selben Mistelbusche wieder abstreifen werden, liegt auf der Hand. Heinricher beschreibt z. B. einen großen Birnmistelbusch, der auffälligerweise zwischen den überwiegend männlichen Zweigen einige Zweige mit Beeren aufwies. Genauere Untersuchung brachte den Beweis, daß hier einfach junge weibliche Pflanzen auf der großen männlichen als Sekundärparasiten schmarokten. Es ist kaum zu bezweifeln, daß alle früher beschriebenen Fälle von „Monözie“ bei der Mistel dieselbe Erklärung beanspruchen dürfen.

Es mag hier auch erwähnt sein, daß innerhalb der Familie der Loranthaceen solch „potenzierter“ Parasitismus in dem Maße ausgebildet ist, daß gewisse Loranthaceen sogar auf selbst parasitisch lebende Angehörige der gleichen Familie als Wirte spezialisiert angewiesen sind! So findet sich das javanische *Viscum articulatum* konstant auf parasitischen *Loranthus*-Arten schmaroktend vor.

Der Landwirt nimmt nun natürlich ein wesentlich anderes Interesse an biologisch interessanten Pflanzen als der Gelehrte und Naturfreund. So wird besonders der Obstzüchter die Mistel nicht mit Unrecht mit etwas gemischten Gefühlen sich in seiner Domäne ansiedeln sehen. Im wesentlichen kommt aber hierbei wohl nur der Apfelbaum als gefährdetes Objekt in Betracht. Indessen ist der Schaden, den der Baum durch junge oder durch einzelne größere Mistelbüsche erleidet, nicht bedeutend. Erst wenn zahlreiche Mistelbüsche auf einem Baum „parasitieren“, wird er in seiner Entwicklung und Tragfähigkeit gehindert. Dies tritt aber nur bei einer durch viele Jahre unterlassenen Reinigung des Baumes ein; bei dem langsamen Wachstum der Mistel reicht selbst eine geringe Sorgfalt als Schutz gegen Überhandnehmen aus. Übrigens betont Tübeuf nicht mit Unrecht, daß neuerdings — dank der von England herübergekommenen und nun bei uns immer mehr überhandnehmenden Weihnachtsfichte — der Erlös der Misteln (wenigstens bei minderwertigem Obste) mitunter mehr einbringen mag, als durch die Schädigung des Baumes verloren wurde. Durch sorgfältige Reinigung der Apfelbäume von stärker werdenden Mistelbüschen (durch Ausschneiden der Lagerstelle), bevor sie Beeren zu tragen beginnen, kann man die Mistel sehr wohl bekämpfen, ohne sie auszurotten. Letzteres hält Tübeuf z. B. für Bayern auf Grund seiner Erhebungen über die Häufigkeit und Verbreitung der Apfelmistel in allen Teilen des Landes und auf Grund ihres Zusammenhanges mit anderen Laubholzmisteln überhaupt kaum für möglich. Falls weitere künstliche Besiedelungsversuche die bis jetzt durchaus berechtigt erscheinende Annahme vom fehlenden Zusammenhange zwischen Laubholz- und Nadelholzmistel völlig erweisen, dann ist eine Infektionsgefahr für die Apfelbäume aus benachbartem Nadelwald sogar ganz ausgeschlossen. Die Mistel kann nämlich — und das dürfte ihre schlimmere Seite sein — an Nuthölzern durch Entwertung des Holzes schädlich werden. Die großen primären und zahlreichen sekundären Senker bedeuten eine ausgiebige Durchbohrung des Holzes (Bild in Bd. II, S. 214). Außerdem sterben altgewordene Senker ab und verhindern dadurch weitere Holzbildung des Nährastes. Auch die Rinde an der darüber gelegenen Stelle stirbt häufig ab, und es entstehen sogen. „Krebs“. Bei der Kiefer wird durch Zersetzung der abgestorbenen Senker eine Verkleinerung des umgebenden Holzes bewirkt, und durch das Zurückbleiben der Kanäle bei schließlichem Absterben der Mistel wird das Holz begreiflicherweise wesentlich verschlechtert und entwertet.

Von sonstigen einheimischen Pflanzen dieser Gruppe kommt außer dem *Arceuthobium Oxycedri* auf *Juniperus Oxycedris* in Südeuropa nur noch die schon genannte Riemenblume (*Loranthus europaeus*) in Betracht. Diese Loranthazee fehlt aber in Mitteleuropa in manchen Gebieten, z. B. in Bayern, vollständig. Sie befällt bei uns fast nur Eichen (auch die echte Kastanie), deren Entwicklung sie gefährlich werden kann. Im Winter wirft sie das Laub ab.

In den Tropen dagegen ist die Gattung *Loranthus* herrschend; man unterscheidet dort über 200 Arten. Der einzige *L. aphyllus* wird als blattlos und einziger Ganzparasit der Familie angegeben. Die übrigen Lebensbedingungen vieler Tropengegenden haben auch zu einer ganz andersartigen Ausbildung der *Loranthus*-Arten dort geführt. Die Blütenpracht der Vögel als Bestäuber angepassten Arten wurde

schon erwähnt, und wir können noch hinzufügen, daß auch der Habitus der tropischen *Loranthus*-Arten vielfach von dem unserer Mistel gänzlich abweicht. Eine besondere Eigentümlichkeit sind bei *Loranthus* die sogen. „Holzrosen“, nämlich Wucherungen der Wirtspflanze, mit denen diese auf den durch den Parasiten an der Angriffsstelle ausgeübten Reiz antwortet. Diese Wucherungen beschränken sich bei unserem einheimischen *Loranthus* auf eine bloße, allerdings oft bedeutende Anschwellung, führen bei den tropischen *L.* aber oft zu wunderlichen und zierlichen Bildungen. Mitunter scheint jedoch die Holzrosenbildung fast ausschließlich vom *Loranthus* selbst bestritten zu werden.

Da *Loranthus* an seinen oft schlängelig um die Tragäste kriechenden Wurzeln in rascher Reihenfolge seine Gaststüben und Senker bildet, so entstehen in solchen Fällen dadurch oft recht abenteuerlich aussehende Gebilde.

1 = Eine Gartenaristolochie (*A. macroura brasiliensis*). (Nach der „Gartenwelt“.)
 2 = *Aristolochia cymbalaria*, aufgeschnittene Blüte. (Naturaufnahme von Wolff-Bischheim.)

Das System Englers reißt der Santalales-Reihe eine relativ kleine Gruppe von kaum 250 Arten als Aristolochiales an. Von diesen wächst nur eine Familie, die der Osterluzeigewächse (*Aristolochiaceen*), auch in unserer Heimat. In ihr ist es vor allem die Blütenbiologie, die eingehendere Aufmerksamkeit verdient. Die Gattung *Aristolochia* ist in Europa hauptsächlich durch eine Art, die Osterluzei (*A. clematitis*), vertreten, die in Südeuropa verbreitet und stellenweise auch noch in Süddeutschland heimisch ist (siehe das Bild) als Staude mit herzförmigen Blättern,

in deren Achseln zahlreiche gelbe, röhrenförmige, am Grunde kugelig angeschwollene Blüten sitzen, die am oberen Ende in einen einseitigen, zungenförmigen Lappen auslaufen. Daran ist allerdings nicht viel zu sehen; aber in den Tropen gibt es zahlreiche Arten dieser Gattung, die fast durchweg die Bäume erklettern und dabei vielfach sehr große, wunderbar gestaltete Blüten tragen (vgl. auch die Abbildung von *A. ringens* in Bd. II, S. 533). Das Interessanteste an den Osterluzeiblüten ist jedoch deren Blume. Die *Aristolochia*-Blüte gehört nämlich zu den Steffelfallenblumen, d. h. in der Röhre der Blütenhülle, besonders in deren bauchigem Teil, fangen sich kleine Insekten. In dieser kugeligen Anschwellung liegen aber auch die Geschlechtsteile verborgen, und zwar eine niedrige Griffelsäule, die oben die Narbenlappen trägt, während die Staubblätter unter den Narben seitlich an der Säule sitzen. Bei dieser Lage der Geschlechtsorgane ist natürlich, namentlich bei der aufrechten Stellung der Blüten, die diese aktiv annehmen, Selbstbestäubung erschwert. Immerhin könnte aber durch die in der Falle umherkriechenden Insekten eine Bestäubung mit eigenem Pollen stattfinden, und schließlich wäre auch Selbstbestäubung deshalb allein noch nicht ausgeschlossen, weil ja die Blüte sich später doch nach abwärts wendet. So hatte auch seinerzeit Sprengel, der die Einrichtungen dieser Blüte bereits sehr genau beobachtete, die Sache aufgefaßt. Aber erst der berühmte Freiburger Blütenbiologe Hildebrand stellte die Tatsache fest, daß bei dieser Pflanze dennoch Selbstbestäubung ausgeschlossen, und die Blüte in vollendetster Weise für Fremdbestäubung eingerichtet sei. Sie ist nämlich protogyn, d. h. die Narben reifen früher als die Staubgefäße. Zur Zeit, da in der Blüte die Narben empfängnisfähig sind, bleiben die Pollensäcke noch durchaus geschlossen, im zweiten Stadium der Blüte aber, wenn die Pollensäcke aufspringen und den Pollen entlassen, sind die Narbenlappen bereits nach oben zurückgeschlagen und, wenigstens bei *A. clematitis*, nicht mehr empfängnisfähig. So kann also die Bestäubung doch nur mit dem Pollen fremder Blüten erzielt werden, den die einkriechenden Insekten bereits mitbringen. Fassen wir also alles in ein plastisches Bild zusammen, so ist der Vorgang bei *A. clematitis* etwa folgender: Im ersten Stadium der Entwicklung steht die Blüte aufrecht, und die Mündung der Röhre ist frei. Ihre Öffnung ist jedoch so winzig, daß nur sehr kleinen Fliegen der Zutritt möglich ist. Das Innere der engen Perigonröhre ist mit zahlreichen Neusenhaaren bekleidet, die schief nach innen und abwärts gerichtet sind, so daß sie den einkriechenden Fliegen wohl ungehinderten Eintritt gestatten, der Austritt ihnen aber vereitelt wird. Die Tiere sind demnach in der Blüte in ganz ähnlicher Weise gefangen, wie wir bereits im Kronstab kennen lernten. In diesem Stadium ist nun die Narbe empfängnisfähig. Die Gefangenschaft dauert zwar nur einige Zeit, beunruhigt aber die Blütengäste immerhin so sehr, daß sie rastlos die ganze Blüte von innen ablaufen. Kommen sie dabei schon von einer anderen Blüte her, so streifen sie natürlich den mitgebrachten Blütenstaub allmählich an den Narbenlappen ab. Nun tritt die Blüte ins zweite Stadium. Die Narbe schlägt sich nach oben und verliert ihre Bestäubungsfähigkeit. Dafür öffnen sich nun die Staubblätter, und die immer unruhiger herumwandernden Fliegen beladen sich mit neuen Pollen. Und dann geschieht wieder einmal das Mätselhafte. In dem Augenblick, da die Antheren verstäubt sind, werden die Fliegen aus ihrem Gefängnis entlassen, denn die Neusenhaare schrumpfen zusammen, und der Ausweg ist frei. Aber es kommt noch

wunderbarer! Der Blütenstiel führt in diesem Stadium eine Krümmung aus, infolge deren sich die ganze Blütenröhre nach abwärts neigt, und der früher absterbende, zungenförmige Endfortsatz legt sich nun über den Eingang der Röhre und verschließt ihn für weiteren Insektenbesuch! Die Pflanze wehrt sich also vor weiteren Gästen, von denen sie in der bestäubten Blume nichts mehr zu erwarten hat. Wer diese zielstrebigen, spontanen Bewegungen und ihre Koordination anders als mit psychischen Ursachen deuten kann, der kann an *Aristolochia* die ganze Pflanzenpsychologie zu Fall bringen, denn diese Pflanze ist eine der festesten Säulen unserer Lehre.

Correns hat die Neusenhaare auch auf ihren anatomischen Bau untersucht und fand, daß das einzelne Neusenhaar aus einem in das umgebende Gewebe eingesenkten Fuß, einem verdünnten, die Biegung ausführenden Gelenk und dem eigentlichen, dickeren und steiferen Haarteil besteht. Normalerweise liegen die Haare nach unten mit der Spitze gegen den Kessel gerichtet. Durch diese Einrichtungen wird bewirkt, daß das Haar, wenn es beim Durchkriechen des Insekts auch nach unten gebogen wird, doch kräftig beim Nachlassen des Druckes wieder zurückschnellt. Gegen das Biegen nach oben schützt jedoch eine „Arretiervorrichtung“. Das Haar besitzt nämlich an der Basis der Oberseite einen Buckel, mit dem es gegen die Wand der Blütenhülle stößt, und durch den es an der völligen Aufrichtung verhindert wird. Außerdem greifen beim Befreiungsversuche des Insekts noch die entgegengesetzten Haare der Neuse ineinander und versperren den Ausgang immer gründlicher. Wodurch erhalten aber nun die Haare die ursprüngliche Steifheit? Zellverdickung wäre hierfür ungeeignet, denn sie ist nicht wieder zu beseitigen, und später müssen ja die Haare die Steifheit verlieren, um das Insekt wieder freilassen zu können. Da greift die Pflanze zu einem Mittel, das sie in verschiedensten Kombinationen gerade für solche Regulationseinrichtungen zu verwerten gelernt hat, zu Schwankungen des Zellsaftdruckes. Correns hat den Turgor in der Gelenkzelle des Haares gemessen und fand, daß er bis zu 22 Atmosphären beträgt. Diese gewaltige, straffe Spannung der Gelenkzelle ist es, die das Haar steif erhält und die Einknickung auf der oberen Druckseite beim Versuche des Auswärtsbiegens verhindert. Es braucht also nur der Turgor nachzulassen, damit das Haar vollkommen schlaff werde. Die Haare schrumpfen übrigens, wenn sie alt werden, dann auch von selbst, ohne Rücksicht darauf, ob nun die Blüte bestäubt wurde oder nicht. Dies mindert aber die Zweckmäßigkeit der ganzen Einrichtung nicht im geringsten. Man kann höchstens sagen, daß die Handlung den „individuell variablen Charakter“ verloren habe und „mechanisiert“ wurde. Mit anderen Worten, unserer Überzeugung nach ist der Vorgang im Laufe der Zeit zu einem „mechanisierten Instinkte“ geworden. Angesichts der Zweckmäßigkeit und des präzisen Zusammenwirkens aller dieser Reguliervorrichtungen ist es ganz unmöglich, sich auch nur vorzustellen, wie solches durch reine Selektion zustande gekommen sein soll. Hier versagt der „Mechanismus“ der Erklärungen einmal gründlich, und was die Zelsentaube für Darwins Lehre bedeutete, das ist die Osterluzei für die neue Psychobiologie.

Trotz dieser raffinierten Einrichtungen und ungeachtet dessen, daß man fast in allen Blüten Fliegen findet, setzt nun die Pflanze merkwürdigerweise doch selten Früchte an. Aber das hat wohl seine ökonomische Ursache. Denn die Vermehrung durch den

Lebhaft wachsenden und sich verzweigenden Stamm ist so ausgiebig, daß die Pflanze dort, wo sie einheimisch ist, zu einem lästigen Unkraut werden kann. Wir haben bereits öfters gesehen (man denke an *Helodea* u. a.), daß die Vermehrung durch den Samen in den Hintergrund tritt, wenn vegetative Massenvermehrung leicht möglich ist. Freilich scheint dann der ganze komplizierte Blütenapparat nur ein Luxus, also eine „Unzweckmäßigkeit“ im Sinne der teleologiefreudigen Naturforscher zu sein. Aber man vergesse doch nicht, unter den Anpassungen sehr wohl zwischen „Neuerworbenem“ und „Erbstücken“ zu unterscheiden. Der Blütenapparat ist das mnemisch reproduzierte, wenn auch fast sinnlos gewordene „Herkommen“, die vegetativen Vermehrungsorgane dagegen sind die gewissermaßen „neue Kulturerrungenschaft“, die jetzt allein zweckmäßig ist.

Übrigens scheint die Fremdbestäubung nicht bei allen *Aristolochia*-Arten notwendig oder angestrebt zu sein; z. B. gibt Burck an, daß *A. ornithocephala* die eingefangenen Fliegen überhaupt nicht mehr freilasse, und daß *A. elegans* mit dem eigenen Pollen vollkommen fruchtbar sei. Es ist auch der Fangapparat nicht bei allen Arten gleichmäßig entwickelt. So ist bei *A. pallida*, die in Kroatien und Istrien wächst, der Verschluss durch die sich herabbiegende Lippe nur sehr unvollkommen, bei *A. rotunda* hingegen noch viel wirksamer als bei *A. clematitis*, indem die Lippe sich ganz um die Perigonröhre herumrollt. Bei dem Pfeifenkraut (*A. Siphon*) dagegen, einem bei

Längsschnitt durch die Blüte von *Aristolochia*.

1 = vor, 2 = nach der Befruchtung. Nähere Erklärung siehe im Text.
(Nach Sach s.) 3 = Blüte von *A. macrophylla*. (Nach Wettstein.)

uns vielfach kultivierten, aus Nordamerika stammenden kletternden Gewächse, fehlen die Keulenhaare vollständig. Dennoch müssen die Fliegen auch hier ihre Zeit der Gefangenschaft durchmachen. Dies ist nach neueren Untersuchungen von Prof. Heineck darauf zurückzuführen, daß zunächst den Fliegen bei der aufrechten Lage der Perigonröhre durch allerdings sehr kurze, an ihrer Innenseite befindliche spitzige Papillen das Hinaufkriechen unmöglich gemacht ist, während später durch Kugelzigwerden der Oberfläche und gleichzeitige Senkung der Röhre infolge Krümmung des Fruchtknotens dieses Hindernis beiseite geschafft wird.

Alle, namentlich die tropischen Formen der etwa 180 Arten zählenden Gattung *Aristolochia* zeichnen sich durch unangenehmen, mehr oder weniger aasartigen Geruch aus, Düfte, die in der Fliegenwelt nicht leicht ihre Anziehungskraft verleugnen.

In den Verwandtschaftskreis der Aristolochien, wenn auch als besondere Unterfamilie, gehört auch die Haselwurz (*Asarum*), von der aus Europa, Asien und Nord-

amerika etwa 13 Arten bekannt sind. Unsere Haselwurz (*A. europaeum* L., siehe das Bild) ist ein niederwüchsiges Bodenkraut, das den tiefsten Schatten der Wälder liebt und ein typischer Buchenbegleiter ist. Von ihren derben, nierenförmigen, sogar unter der winterlichen Schneedecke ausdauernden Blättern ist es bekannt, daß sie das dunkelste Grün aller heimischen Gewächse aufweisen. Die glodigen, außen bräunlichen und innen schmutzig dunkel-purpurnen, also wieder „Fleisch“ vortäuschenden Blüten locken durch ihren unangenehmen Geruch ebenfalls winzige Fliegen und Mücken zum Besuche an. Der Vorgang der Befruchtung beginnt damit, daß sich zwischen den drei Perigonzipfeln drei Spalten als Eingangspforten für die Besucher bilden; dicht hinter ihnen liegen dann die bereits empfängnisfähigen Narben, deren Lappen sechsstrahlig angeordnet sind. An dem nach außen gerichteten Ende tragen sie ein Büschel Narbenpapillen. Die Staubgefäße dagegen sind im ersten Blütenstadium sämtlich so nach außen und unten gebogen, daß die Narbe frei in der Mitte steht und von den Besuchern berührt werden muß. Später, nach völliger Öffnung der Blüte, führen die Staubblätter „gamotrope“ Bewegungen aus, d. h. es richten sich zunächst die sechs Staubgefäße des inneren Kreises auf, wobei das einzelne Staubgefäß sich zwischen je zwei Lappen der Narbe legt, und die Staubbeutel nach außen gerichtet sind. Da die Blüten abwärts geneigt sind, ist dadurch Selbstbestäubung möglich. Zulekt richten sich dann auch die Staubgefäße des äußeren Kreises auf und legen sich zwischen die älteren, wobei ihre geöffneten Antheren genau unterhalb der Narbenlappen zu liegen kommen. Nach Kirchner soll die Narbe auch in diesem Stadium noch frisch aussehen. Die Blütenbiologie dieser Pflanze ist jedoch nur sehr lückenhaft bekannt. Wir wissen weder, wie weit überhaupt Fremdbestäubung notwendig ist und tatsächlich eintritt, ebensowenig ist Sicheres über die Selbstbestäubung bekannt. Es ist auch noch zu erforschen, welche Bedeutung die geschilderte, in Perioden sich vollziehende gamotrope Bewegung der Staubfäden hat. Diese unschwer zu beschaffende Pflanze würde also mit wenig Mühe leicht mannigfache Ergebnisse liefern. Meinem Eindruck nach ist sie eine Fremdbestäuberin und gehört ebenso wie *Aristolochia* zu den Fliegenblumen.

Ich möchte jedoch nicht versäumen darauf hinzuweisen, daß gerade die Fliegenblumen keine so ausgesprochene Blumenklasse bilden, wie etwa die Bienen- oder Falterblumen. Vielmehr sind es biologisch recht verschiedene Anpassungen, die in dieser Gruppe vereinigt erscheinen. Es gehören hierher sowohl „Ekelblumen“, die durch widrigen Geruch vielfach namentlich Nas- und Kotfliegen anlocken, als auch „Kesselfallenblumen“ nach Art der von *Arum* und *Aristolochia*. Fliegenblumen sind auch die Klemmfallenblumen, so gut wie die Täuschblumen der *Parnassien* und *Ophrys*-Arten, und schließlich die Schwebefliegenblumen nach Art von *Veronica*, die wir alle noch im weiteren vorführen werden. Sogar innerhalb dieser Untergruppen gibt es noch Sonderanpassungen. So ist *Aristolochia*, wie im vorausgehenden geschildert wurde, eine ausgesprochene, nur von sehr kleinen Dipteren besuchbare Kesselfallenblume,

Blühende Haselwurz (*Asarum europaeum*). (Nach Baillon.)

Asarum europaeum hingegen wird zwar von G. Müller zu den Stelblumen gerechnet, kann aber nach Knuths Handbuch der Blütenbiologie als eine Art Übergang von den letzteren zu den Kesselfallenblumen betrachtet werden, weil die Insekten im ersten Stadium der Blüte, in dem nur die Narben reif sind, den Pollen von vorher besuchten älteren Blüten mitbringen müssen. In diesem Stadium finden die Besucher die oben beschriebenen Spalten, und da die Perigonzipfel einwärts gebogen sind, so können die kleinen Besucher zwar leicht hineinschlüpfen, der Ausgang wird ihnen aber so lange erschwert, bis sich im zweiten Stadium der Blüte die Perigonzipfel weiter nach außen gebogen haben. Es scheint also Knuth recht zu haben, und wenigstens der Anfang zur Bildung einer Kesselfallenblume gegeben zu sein. Wir können hieraus die Lehre ziehen, wie scholastisch alle solchen Kategorien sind, weil die Anpassungsfähigkeit der Pflanzenwelt geradezu individuell waltet.

Um unserem Programm gemäß das Lebensbild der Haselwurz zu vollenden, müssen wir auch noch kurz ihrer interessanten Fruchtbiologie gedenken. Als Früchte entstehen unregelmäßig aufspringende Kapseln, in denen zahlreiche Samen mit einem großen, fleischigen „Nahtanhang“ liegen. Kerner v. Marilaun hat nun beobachtet, daß die Ameisen diese Samen ebenso eifrig suchen wie die Veilchensamen und so genügend für deren Verschleppung sorgen.

Die Ampferpflanzen.

Polygonales mit der einzigen Familie der Polygonaceae ist die nächste „Reihe“ im System. Diese Familie wird zusammen mit den kleinen Familien der Piperazeen und Chloranthazeen, von denen wir die Piperazeen schon in anderem Zusammenhang behandelten, an die Brennesselgewächse angeschlossen, trotzdem direkte Übergänge, die eine unmittelbare phylogenetische Ableitung gestatten würden, fehlen. Woher nahm man also die Erlaubnis hierzu? Da erklärt uns der Systematiker, daß der Grundplan der Blüte mit dem der Urticales übereinstimme. Da er aber anderseits auch Beziehungen zu dem der nächst anschließenden Reihe der Centrospermae aufweise, sei hiermit der Platz im System für diese Familie von fast 750 Arten festgelegt.

Damit wüßte nun Naturliebe fast nichts zu beginnen. Zum Glück bieten aber die Ampferpflanzen in ihrem Leben denn doch manches Anziehende, und dem wollen wir uns zuwenden. Schon die Verbreitung dieser Familie ist eine sehr ausgedehnte, manche Arten des Knöterichs (*Polygonum*) sind direkt als Überallwohner zu bezeichnen. In ihrer äußeren Tracht zeigen sie viel Übereinstimmung. Sie sind zum allergrößten Teile krautige Gewächse mit einem Stengel, dessen Knoten einem ihrer Hauptvertreter den Namen verschafft haben. Eine besondere gestaltliche Eigentümlichkeit dieser Gewächse sind die zu einer geschlossenen, den Stengel oft weit hinauf umfassenden Düte („Ochrea“ genannt) verwachsenen Nebenblätter. Im großen und ganzen sind die Vegetationsorgane auch bei dieser Familie sehr mannigfach ausgebildet, was vor allem davon herrührt, daß besonders die *Polygonum*-Arten den verschiedensten Standortverhältnissen angepasst sind. Sie gedeihen wohl an den trockensten

wie auch an den sumpfigsten Orten. Eine der anspruchlosesten Arten ist der Vogelknöterich (*Polygonum aviculare*) mit seinem niederliegenden Stengel und seinen weißlich-purpurroten Blüten. Er gilt dem Gärtner als böses Unkraut, denn er gedeiht selbst auf hartgetretenen Wegen und zwischen Pflastersteinen durch seine weitkriechenden unterirdischen Rhizome. *Polygonum amphibium* ist hingegen wieder eine Pflanze, die sowohl völlig im Wasser gedeiht und nur ihre Blütenstände über dessen Spiegel hervorstreckt als auch das Wasser verläßt und als reine Landform auftritt.

Knöterich (*Polygonum*). Blütenstand (1) und Wurzelstock des Schlangenknoeters mit Einzelblüte (2) und Fruchtknoten.
(Nach Baillon.)

Polygonum Convolvulus umwindet auf Aekern andere Pflanzen. Andere Arten sind hingegen schattenlosen Gegenden, wieder andere dem tiefsten Gebüschschatten angepaßt. Aus solchen Lebensverhältnissen erklärt sich natür-

lich die Vielgestaltigkeit zur Genüge, ebenso daß diese Gattung auf dem ganzen Erdball 150 Arten entwickelt hat. Als nahe Verwandte dieser einfachen Gewächse treten uns dann mächtige Stauden mit riesigen Blättern entgegen, als Rhabarber (*Rheum* [s. Bild S. 294]) schon seit alters als Heilmittel, von uns freilich nur als Gartenpflanze und Gemüse (die jungen Stengel) geschätzt. Von den 20 *Rheum*-Arten ist keine bei uns heimisch; ihr wahres Vaterland ist Asien von Palästina bis Sibirien. Aber man hat sie (namentlich *Rh. officinale* Baill., *Rh. Rhaponticum* L. und *palmatum* L.) in unseren Gärten doch heimisch gemacht, denn sie dienen ihnen mit den mächtigen, tiefgelappten, prächtigen Blättern, ebenso mit den bald gelblich-weißen, bald purpurroten Blütenständen zu großer Zier. Das sich seit einiger Zeit unsere Küche erobernde Rhabarbergemüse stammt von den geschälten Blattstielen von *Rh. undulatum* L.

Leider ist die Kultur etwas umständlich, die Pflanzen verlangen tiefgründigen, fräftigen Boden, viel Gießen und fleißiges Düngen, außerdem aber, wenigstens als Zierpflanze, noch stete Pflege des Laubes durch Beschneiden.

Baum- und strauchartige Formen sind in den Tropen *Coccoloba* und *Triplaris*, in den Wüsten und Steppen Afrikas und Asiens dagegen *Calligonum*. Arten von *Triplaris* gehören zu den Ameisenpflanzen, und zwar zu deren vollkommenerem Typ, indem sie den betreffenden Ameisen nicht bloß Nahrung, sondern — wie z. B. die

Rhabarber (*Rheum*).

(Naturaufnahme von W. Salby in Wiesbaden.)

Cecropia-Arten — auch Wohnung bieten, was neuestens allerdings stark angezweifelt wird. — Ein merkwürdiger Tropenvertreter der Familie ist auch *Muehlenbeckia*, die bandartig verbreiterte Flachsprosse bei weitestgehender Blattreduktion zeigt. *Muehlenbeckia platyclada* von den Salomonsinseln wird z. B. häufig in Gewächshäusern gezogen.

Die pflanzengeographischen Verhältnisse der Knöterichgewächse sind so eigen, daß wir ihnen doch noch besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. Ihr geographisches Verbreitungsgebiet ist, wie schon gesagt, außerordentlich, im allgemeinen ist jedoch die nördliche gemäßigte Zone ihr Hauptwohntort, und auch in den Tropen ziehen sich die meisten Arten, bis auf einige besonders angepasste, meist auf die kühleren Gebirgsregionen zurück.

Während nun einzelne Gattungen und selbst Arten geradezu Überallwohner sind, so z. B. die Gattung *Koenigia* in der ganzen nördlichen Zone und der Knöterich selbst in allen fünf Erdteilen, sind wieder andere Gattungen in auffälligster Weise auf engbegrenzte Gebiete beschränkt. Ja, es mangelt dieser Familie sogar nicht an alpinen Charakterpflanzen. Eine solche ist der schildblättrige Ampfer (*Rumex scutatus*), der mit schlaffen Stengeln durch Grobschutt und Geröll kriecht und von den Vorbergen bis zu den Moränen und Schutthalden des Hochgebirges — nach Schröter im Schweizer Wallis sogar bis 2750 m — emporklettern kann. Knöteriche gehören sogar zu den Schneepflanzen; so die kleine zierliche *Oxyria digyna*, die von 1600

bis 3400 m gleichfalls als Geröllpflanze lebt und vorwiegend kalkarme Gesteine bevorzugt. Sie ist eine der wenigen Alpenpflanzen, die gleichzeitig auch die polaren Gegenden besiedeln. Die Knöterichgewächse sind sowohl Wind- wie Insektenblütler. Die 100 Arten des Ampfers (*Rumex*), aber auch die Arten von *Oxyria* sind z. B. alle windblütig. Demgemäß finden wir unscheinbare Blütenhüllen, häufig lange und zarte Blütenstiele als ein sinnreich verändertes Mittel zur Erzielung der leichten Beweglichkeit, die wir an anderen Windblütlern, z. B. dem Hanf, durch lange, pendelnde Staubfäden und große Narben ermöglicht sahen. Besonders interessant, geradezu als Musterbeispiel mannigfachster Bedürfnisanpassung in engem Verwandtschaftskreise, sind jedoch die Verbreitungseinrichtungen der Früchte bei den verschiedenen Ampferarten, deren wir bereits in Bd. II, S. 556 gedacht haben, wo sich auch die nötigen Abbildungen finden. Diese Flugsäcke, Fallschirme und Schwimmleisten gehen aus den unscheinbaren Blättern der Blütenhülle hervor, indem diese nach der Befruchtung bedeutend heranwachsen und, ihre Funktion wechselnd, nun zum Verbreitungsorgan werden. Die Frucht selbst ist bei allen Knöterichen eine dreikantige Nuß, die nur einen Samen enthält. Die heranwachsenden Blütenhüllblätter umgeben diese Frucht in der mannigfachsten Weise. Bei dem heimischen Sauerampfer (*R. acetosa* und *acetosella*) werden sie zu einem Flugapparat durch Ausbildung häutiger Flügel. Bei anderen *Rumex*-Arten dagegen werden aus demselben Organ auf der Rückseite der äußeren Blütenhüllteile von der Basis her schwammige Schwielen gebildet, die ein lufthältiges Schwimmorgan darstellen. Wieder andere machen daraus Stachel- und Hakenbildungen am Rande der Blütenhüllteile, oder ihr Fruchts蒂el erzeugt Haken, die auf das Anheften an Tiere berechnet sind. Zwischen diesen Gruppen gibt es nun noch Kombinationen, die gleichzeitig mehrere dieser Verbreitungsweisen ermöglichen. Besonders bemerkenswert dieserhalb erscheint *Rumex bucephalophorus*, bei dem sogar der Fruchts蒂el zum Flugorgan umgewandelt ist. Es ist also geradezu zu *Rumex* der klassische Fall für das Lamarckistische Phänomen des Funktionswechsels, da bei ihm dieselbe Blütenhülle je nachdem zum Flug-, Schwimm- oder Kletterorgan wird.

Früchtchen von *Rumex vesicarius* L. mit dem Gelenk am Fruchts蒂el.
(Nach Murbach.)

Für das Verständnis dieser Erscheinung gibt nun in neuerer Zeit der schwedische Botaniker Murbach einen sehr beachtenswerten Beitrag, über den sich im II. Bd. der „Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre“ Näheres findet. Gelegentlich der Untersuchung jener Formengruppe der Ampferarten, welche die nordafrikanische Wüstenregion und deren Fortsetzung ostwärts bis zum Indus bewohnt, gibt er für eine Reihe ihrer biologischen Eigentümlichkeiten bemerkenswerte neue Deutungen, von denen eine besonders für das Problem der Pflanzenpsychologie von größtem Wert ist. Bei der Gattung *Rumex* sind nämlich, wie man auch aus dem beigegebenen Bild ersieht, die Blütenstiele mit einem Gelenk versehen. Der biologische Wert dieser Bildung liegt nun nach Murbach darin, daß die Blüten mit der eingeschlossenen Frucht nach der Reife durch sie besonders leicht abgeworfen werden, was bei ihren Anpassungen an Wind=

verbreitung notwendig ist. Von besonderem Interesse ist es da zu sehen, daß dieses Gelenk bei einer Kulturform des Ampfers (*R. vesicarius*, var. *inarticulatus*), die, wie der Verfasser sagt, nirgends wild vorzukommen scheint, fehlt. Murbeck meint, die Kulturpflanze brauche offenbar nicht selbst für die Verbreitung der Früchte zu sorgen, und demgemäß unterließe sie gewisse anatomische Differenzierungen, die gerade für die *Vesicarius*-Gruppe hochcharakteristisch sind, sobald das Bedürfnis darnach von der Umgebung nicht mehr aufrechterhalten wird. Ein sprechenderer Zusammenhang zwischen Bedürfnis und Organbildung wäre, wenn seine Auffassung recht behält, im Pflanzenreich wohl nicht leicht zu finden. Erwähnt sei übrigens noch, daß Prof. Murbeck aus seinen vergleichend geographischen Studien zu dem Schluß kommt, daß die morphologischen Abweichungen der Typen bei dieser Gattung durch langsam wirkende äußere Faktoren, nämlich durch klimatische Differenzen, aufgelöst würden, was sich sogar durch Konvergenzerscheinungen bei geographisch getrennten Formen unter dem Einfluß des gleichen Klimas beweisen läßt. Man wird nicht umhinkönnen, an diese Erfahrungen anzuknüpfen, wenn man sich an das überaus schwierige Thema einer genetischen Erklärung der Verbreitungsanpassung von Pflanzenfrüchten wagt.

Die artenreichste Gattung der ganzen Familie ist zweifellos der Knöterich (*Polygonum*), der ihr den Namen gab. Wir haben seiner weiten Verbreitung in zahlreichen Formen und seiner mannigfaltigen Standortsanpassungen in den verschiedenen Arten bereits gedacht. Es wäre daher nur noch übrig, einiger in spezieller Hinsicht interessanter Formen kurz Erwähnung zu tun.

Der Schlangenknoeterich (*Polygonum Bistorta* [Bild S. 293]) ist auf feuchten und fetten Wiesen der Berg- und subalpinen Region weitverbreitet, führt aber seinen Namen nicht von irgendeiner Anwendung gegen Schlangenbiß, wie da und dort zu lesen, sondern von dem schlangenartig gewundenen, durch dichtstehende Blattnarben geringelt aussehenden Wurzelstock, von dem stets zahlreiche seitliche Ausläufer ihren Ursprung nehmen. Die kleinen rosaroten Blüten stehen dicht gedrängt in walzigen Blütenständen. Hochragend und schlankstengelig, oft zu Tausenden beisammenstehend, schmücken sie oft die Wiesen mit den herrlichsten Farben. Solche Bestände von *P. Bistorta* können mitunter auf Hochwiesen so dicht sein, daß die Talgründe auf die Entfernung in röthlichem Schimmer erstrahlen. Woher rührt dieses Massenwachstum? Die Pflanze verläßt sich eben nicht auf ihre Fruchtbildung allein, sondern sucht sich auch mit unterirdischen Ausläufern zu verbreiten. Prof. Schröter in Zürich führt die schlechte Keimfähigkeit der Samen direkt auf diese reichliche vegetative Vermehrungsfähigkeit zurück und bestätigt so eine Erfahrung, die auch bei anderen Pflanzen wiederholt gemacht wurde. Eine so schön gefärbte Blütenhülle verrät allemal, daß die Pflanze auf Insektenbesuch rechnet. Aber dies gilt nicht für alle *Polygonum*-Arten; es finden sich unter ihnen auch windblütige, wie z. B. die *Rumex*-Arten. *P. Bistorta*, die wir als Typus der Gruppe betrachten, ist aber eine Bestäubung durch Insekten trefflich angepasste Art. Die wichtigsten Blütenbesucher, die Bienen, sind auch so sehr ihre Freunde, daß die Pflanze von den Imkern hochgeschätzt wird. Die Verbreitung des Schlangenknoeterichs ist eine ziemlich große: er kann als Allereuweltsgebirgspflanze von ganz Europa bezeichnet werden, findet sich aber auch auf dem Kaukasus und Himalaja,

in Sibirien, Kamtschatka und dem arktischen Nordamerika. Obwohl sein Hauptgebiet zwischen 800 und 1900 m Seehöhe liegt, steigt er doch sowohl tiefer herab als auch in die Höhen hinauf, falls er sonst zuzugende Bedingungen findet.

Gerade unter seinen alpinen Verwandten findet sich eine biologisch sehr bemerkenswerte Form, die den kuriosen Namen des lebendig gebärenden Knöterichs (*Polygonum viviparum*) führt. Das niedrige, sehr zierliche, mit einer länglichen Ähre von weißen Blüten geschmückte Pflänzchen besitz als Alpenpflanze dickliche, am Rande eingerollte Blätter von mehr lederiger Beschaffenheit, denn das Alpenklima fordert von ihr ausgesprochen xerophile Anpassungen. Und tatsächlich findet man sie von den Seiden des bayrischen Alpenvorlandes und der Gebirgsregion der Alpen bis in die Höhen mit ewigem Schnee, also in Höhen von z. B. 3000 m auf dem Piz Costeinaz und 2850 m am Egishorn in der Schweiz. Die Pflanze hat für den Pflanzenforscher vor allem schon dadurch Interesse, daß sie nach Schröter einer der häufigsten arktischen Gäste unserer Flora ist, die von den Pyrenäen bis zum Kaukasus, Ural, Altai, Himalaja und den zentralasiatischen Gebirgen, so gut wie in den Rocky Mountains und den direkten Polgegenden heimisch ist. Sie scheint ihre weite Verbreitung in der Eiszeit gewonnen zu haben und hat von daher noch manche „Relikte“ hinterlassen, so z. B. auf einem Fundort bei Augsburg. Woher rührt aber ihr eigenartiger Name? Wir sind einem ähnlichen bereits bei den Gräsern begegnet, und da wie dort bedeutet er nichts anderes als das reichliche Vorkommen von Brutknospen an Stelle von Blüten. Die letzteren finden sich meist nur im oberen Teile des Blütenstandes und sind in ihren Bestäubungseinrichtungen in verschiedenen Gegenden sehr mannigfaltig; teils zwittrig und „vormännig“ (proterandrisch) oder homogam, teils rein weiblich, teils mit allen Abstufungen der Zwitterigkeit bis zur reinen Männlichkeit, wobei auch noch Verschiedenheiten hinsichtlich Ein- oder Zweihäusigkeit vorkommen können. Diese Blüte ist überhaupt ein biologisches Rätsel. An manchen Orten wird angegeben, sie sondere reichlich Nektar ab, an anderen Orten soll sie honiglos sein. Trotzdem dadurch die Möglichkeit reichlichen Insektenbesuches, durch ihre Einrichtung aber auch die der Selbstbestäubung gegeben ist, entwickeln sich doch nur selten Früchte. Die Pflanze verzichtet vielmehr oft ganz oder teilweise auf das Blühen und treibt ihre Brutknöllchen entweder nur in der unteren Hälfte des Blütenstandes oder in dessen ganzer Ausdehnung. Da nun diese Knöllchen sehr häufig noch an der Mutterpflanze keimen und ein kleines Erstlingsblatt treiben, wodurch dann ein solcher Blütenstand ein sehr merkwürdiges Aussehen erhält (vgl. übrigens die ganz analoge Erscheinung bei *Poa annua*), so hat man der Pflanze doch mit einigem Recht den sonderbaren Namen der „lebendig gebärenden“ gegeben. Nur dürfen wir nie vergessen, daß diese Viviparie keine echte sei, denn es handelt sich hier ja eigentlich nur um die Anlage und Ausbildung eines Blütentersakes in Form vegetativer Seitenprosse. Die völlige Analogie zum Lebendig gebären der Tiere wäre erst dann gegeben, wenn es sich um Samen handelte, deren Embryo noch an der Mutterpflanze zur Weiterentwicklung käme. Es gibt übrigens in der Pflanzenwelt auch einen solchen Fall „echter“ Viviparie, nämlich in der Familie der Rhizophoraceen, d. h. der tropischen Mangrove-Gewächse. Aber bei *Polygonum* ist nichts anderes vorhanden, als was uns auch die auf S. 20 abgebildeten Brutknöllchen vieler Farne u. a. zeigen. Die abfallenden Knöllchen, die auch vom Winde

weitergerollt werden können, treiben dann am Boden weiter. Schon die junge Pflanze vergesellschaftet sich mit Bodenpilzen, *P. viviparum* gehört also zu den Mykorrhizpflanzen. Interessanterweise gibt es sogar eine Biologie der Blütenerzorgane; so beschreibt z. B. Schröter in seinem prächtigen „Pflanzenleben der Alpen“, daß die Schneehühner die Brutknöllchen mit Vorliebe verzehren, dann aber bei zu reichlichem Genuße zum Teil wieder aus dem Stropfe abgeben und so verbreiten.

In ganz anderer Hinsicht ist hingegen der Wasserknüterich (*Polygonum amphibium*) bemerkenswert. Wie der lateinische Artnamen besagt, ist er eine Pflanze von amphibischer Lebensweise; teils zu Wasser, teils zu Lande spielt sich sein merkwürdiges Leben ab. Bei einer an ihren Standort gebundenen Pflanze kann dies natürlich nichts anderes bedeuten, als daß die Pflanze den Umständen gemäß sowohl eine Wasser- als eine Landform bildet, was uns schon bei manchen der in diesem Bande betrachteten Wasserpflanzen entgegentrat. Derartige ist nun gemäß dem Gesetz der Anpassungen nicht möglich, ohne daß die Wasser- und Landformen sowohl in der „Tracht“ als im anatomischen Bau zweckentsprechende Änderungen eingehen. Die Wasserform des *P. amphibium* bildet demgemäß langgestielte, breitlanzettliche, am Grunde herzförmige Schwimmblätter, während bei der Landform die dem Wurzelstock entspringenden Stengel aufrecht von unten an mit schmallanzettlichen, festigenden Blättern besetzt sind, deren Fläche nicht wie die der Wasserblätter glatt, sondern runzelig ist. Auch der anatomische Bau zeigt mancherlei Eigenheit. Die Wasserform entwickelt den Luftkanal des Stengels stärker, wodurch sowohl das spezifische Gewicht des Stengels erleichtert, als auch vor allem die bei der untergetauchten Lebensweise nötige Durchlüftung gewährleistet wird. Doch daran ist nichts Verwunderliches, denn diese ausgiebige Vermehrung der Luftzirkulationswege ist ja für die Wasserpflanzen allgemein charakteristisch. Das Lehrreiche für uns besteht darin, daß die Landform von *P. amphibium* diese Einrichtung wesentlich einschränkt, außerdem zur Erreichung der nötigen Festigung noch ein besonderes mechanisches Skelett bildet, das wir bei der Wasserform vergeblich suchen. Diesen Änderungen gemäß macht nun auch das Blattgewebe in Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse der Transpiration und Durchlüftung besondere Anstrengungen, was wir auch bei den verschiedensten Wasserpflanzen, die zugleich auch eine Landform bilden, wiederfinden werden. Ich hätte dies alles gar nicht erwähnt, wenn nicht bei unserem Knüterich noch etwas sehr Merkwürdiges hinzukäme. Seine Landform bildet nämlich ein besonderes Schutzmittel gegen ungeflügelte, aufstreichende Tiere aus, das der Wasserform völlig fehlt! Es ist das klassische Beispiel einer psychobiologisch zu bewertenden, weil direkt bedürfnismäßigen Anpassung. Denn bei den anderen Wasserpflanzen fehlen die besonderen Schutzmittel der Blüte, die bei Landpflanzen in so reichem Maße zur Entwicklung kommen, da sie ja durch das Wasser genügend gegen unberufene Blütengäste geschützt sind. Um nicht in den Verdacht einseitiger Darstellung zu kommen, will ich die Sachlage mit den Worten M. v. Kerner's schildern. Dieser treffliche Kenner der biologischen Verhältnisse der Pflanzen sagt darüber: „Die schön rosenroten Blüten dieser Pflanze sind zu kleinen Zymen vereinigt, und diese bilden eine dichte, zylindrische, ährenförmige, sehr reiche Infloreszenz von 2,5—3,5 cm Länge und 1—1,2 cm Breite. Die Blätter des Perianths sind fast bis zum Grunde getrennt; der Fruchtknoten ist von einem fleischigen, roten, fünflappigen, nektarabsondernden

Becher umgeben, und der Grund der Blüte auch reichlich mit Nektar gefüllt. Die mit der Basis des Perianthiums verwachsenen Pollenblätter sind sehr kurz, und die Pollenbehälter bleiben in der Tiefe der Blüte geborgen; die zwei Griffel des Gynäzeums sind dagegen sehr lang und ragen sogar über die Blätter des Perianthiums hinaus. Während der Anthese beträgt die Länge des Perianthiums 4 mm, die obere Weitung kaum 3 mm. Da der Nektar im Blüten Grunde durch kein besonderes Gebilde geschützt ist, so erscheint er selbst kleinen Insekten zugänglich und wird von diesen auch gerne abgeholt. Bei den angegebenen Dimensionen der Blüte können aber selbst sehr kleine anfliegende Insekten nicht vermeiden, daß sie beim Abholen des Nektars zuerst an die über das Perianthium vorstehenden und etwas spreizenden Narben und dann an die dicht über dem Nektar befindlichen Pollenbehälter streifen; und da die Blüten proterandrisch sind, so wird selbst durch sehr kleine anfliegende Insekten, welche mehrere Blüten und Blütenstände nacheinander besuchen, Kreuzung der Blüten veranlaßt. Die von unten kommenden flügellosen, aufkriechenden kleinen Insekten würden sich aber nicht die Mühe nehmen, über den oberen Rand des Perianthiums an den aus der Apertur hervorragenden Narben vorbei zum Blüten Grunde zu dringen, sondern auf dem kürzesten und für sie bequemsten Wege von unten durch die tiefen, die Perigonzipfel trennenden Spalten sich den Nektar holen. Sie würden daher auch eine Belegung der Narben nicht veranlassen, und es würde somit der Nektar geopfert, ohne daß zugleich der Vorteil der Allogamie erreicht wäre. Da zudem bei *P. amphibium* infolge der Dichogamie und der gegenseitigen Lage der Blütenteile eine Autogamie (Selbstbestäubung) unmöglich ist, würde durch den Besuch solcher aufkriechenden kleinen Insekten das Entstehen von Früchten überhaupt gänzlich vereitelt werden. Zu den Blüten der im Wasser wachsenden Stöcke des *P. amphibium* können nun sehr kleine ankriechende Insekten auch nicht kommen. Wie aber dann, wenn das Wasser abgelassen ist, und *Polygonum amphibium* aufs Trockene gesetzt wird?

Da ist es nun sehr merkwürdig, daß sich in solchem Falle besondere Schutzmittel ausbilden, welche der im Wasser wachsenden Pflanze bisher fehlten. Es entwickeln sich nämlich dann aus der Epidermis sowohl der Blätter als der Stengel eine Unzahl horizontal abstehender, im Mittel 0,7 mm langer Trichomzotten (Drüsenhaare), die insbesondere an dem Stengelteile, welcher durch eine Infloreszenz abgeschlossen ist, so dicht als nur möglich gestellt sind, und deren kugelige Schlußzellen einen klebrigen Stoff sezernieren, so daß sich die Achse, welche die Infloreszenz trägt, ganz schmierig anfühlt. Jene kleinen, flügellosen aufkriechenden Insekten, welche den Nektar rauben möchten, ohne dabei den Vorteil einer Kreuzung der Blüten zu vermitteln, können über diese klebrige Achse nicht emporkommen, sie würden an derselben wie an Leimspindeln kleben bleiben.“ — Soweit Kerner. Vor diesen Tatsachen verstummt menschlicher Witz, und ich gestehe, als ich — selbst anfänglich skeptisch — das mit eigenen Augen sah, da beschlich mich ein seltsam banges Gefühl. Wenn ein Leichnam auf der Bahre sich regt und die Augen aufschlägt, mag ein ähnliches Grauen vor dem Unfaßlichen und Wunderbaren seine Angehörigen überfallen. Man wird im ersten Augenblick des Erschreckens irre an dem Weltengang. Die Pflanze, stumm und tot, ein Spielball der Elemente, die sie umwittern, blickt uns in diesen Erscheinungen auf einmal wie ein dunkles, trauriges Auge an. In diesem Strunk voll grüner Blätter, der uns im Vorbei-

gehen ebenso bedeutungslos und wunderbar im tieferen Sinne den Fuß hemmt wie der Kieselstein, der neben ihm am Strande flimmert — in diesem leblosen Ding ist also etwas verzaubert, das begehrt und leidet und genießt! Sonst würde es sich ja nicht schüßen. Hat der rätselhafte, uralte deutsche Spruch also recht, der da sagt: „Vor Hollunder soll man die Mühe abnehmen und vor Wacholder das Knie beugen?“ Steckt darin wirklich etwas von der Majestät des Geistes, von dem Weltgenius, der mit dem Leben zusammen seine Flügel regt und nun, in uns seiner selbst zum erstenmal bewußt, auch an sich selbst irre wird, da ihm aus der verachteten Staube auf einmal eine unsichtbare Hand ein Menetekel in sein Verständnis schrieb, und er für einen Moment die Sprache der Pflanze versteht, die ihm deutlich ins Ohr raunt: Du gleichst dem Geist, den du begreifst — und begreifst du mich nun?

Wenn wir aber von dieser Aufwallung der Gefühle zurückkehren zum nüchtern kritischen Raisonnement des Wissenschaftlers, so können wir noch immer den „Boden unter den Füßen verlieren“ angesichts dieser Geschehnisse. Wenigstens den altgewohnten. Es gibt zwar Ähnliches auch bei anderen Landpflanzen, z. B. bei der unter den Caryophyllaceen zu besprechenden Bechnelke. In unserem vorliegenden Fall wird die Erscheinung aber dadurch besonders bemerkenswert und für die Beurteilung des pflanzlichen Reizlebens außerordentlich bedeutungsvoll, daß es sich hier nicht bloß um eine allmählich erworbene und erblich festgehaltene Abwehrfähigkeit handelt! Sondern je nach den Umständen veranlaßt die Umgebung die Pflanze zur Ausbildung oder Unterlassung ihrer Schutzeinrichtungen! Das ist das Außerordentliche daran. Denn wenn das trockengelegte *Polygonum amphibium*, das also Stengel mit der soeben geschilderten Klebevorrichtung produziert hatte, wieder einmal unter Wasser gesetzt wird, so entwickelt dasselbe Rhizom sogleich wieder die Wasserform ohne die Drüsenzotten, aber mit allen Anpassungen an das Wasserleben! Daß derartige nicht auf „physikalischer“ Beeinflussung durch das Wasser beruhen kann, wie eine gewisse Schule der Botaniker anzunehmen geneigt war, ist wohl ohne weiteres einleuchtend, aber ebenso, daß, vorsichtig ausgedrückt, „die vermittelnde und bestimmende Rolle der plasmatischen Empfindungsfähigkeit“ hier von niemandem geleugnet werden kann. Ich gebe zu, daß wir auch mit meiner Pflanzenpsychologie noch sehr wenig in das innere Getriebe dieser Handlungen hineinblicken, aber man muß auch mir zugeben, daß es in diesem Fall feststehe, daß die Pflanze den Wechsel des Mediums empfinde, weil sie darauf mit den erworbenen und erblich festgehaltenen entsprechenden Mitteln, über die sie verfügt, antwortet! Mehr aber verlangt meine Hypothese nicht, und wer dies zugibt, muß sich ihr anschließen.

Zu der nach Kerner vorhin wiedergegebenen Beschreibung der Blüten von *P. amphibium* bemerkt F. Ludwig, daß Kerner hierbei wohl nur die langgriffelige Form des Wasserknöterichs vor sich gehabt habe; Kerner hat aber bei der Landform dieser Pflanze auch eine kurzgriffelige Form entdeckt. Die Pflanze erzeugt also heterostyle Blüten gleich der Primel, worüber ich in Bd. II, S. 537 nachzusehen bitte. In ihrer Blütenbiologie sind überhaupt noch verschiedene Fragen offen; wir wissen weder etwas Bestimmtes über ihre „Blühfolge“ noch über ihre Bestäuber zu Wasser und zu Lande, und so wäre hier für einen Forscher mehr als ein dankbares Problem gegeben.

Als Nutzpflanze hätten wir in dieser Familie schließlich noch den Buchweizen (*Polygonum Fagopyrum*, auch *Fagopyrum esculentum* genannt) zu erwähnen. Er ist auch unter dem Namen „Heidekorn“ namentlich in Norddeutschland bekannt. Ursprünglich stammt er aus Zentralasien, wo er in China zu den wichtigsten Nahrungsmitteln gehört, wird aber jetzt auch in Europa vielfach angebaut, da er sich seiner Anspruchslosigkeit wegen namentlich als Frucht auf magerem Boden, in Sand- und Heidegegenden, eignet. Was ihn besonders wertvoll macht, ist, daß er die erste Kulturpflanze auf urbar gemachten Moorböden darstellt, die von da aus auch verwilderte. In höheren

Breiten vertritt er seiner Anspruchslosigkeit halber vielfach direkt den Getreidebau, wenn auch das aus seinen Früchten gewonnene Mehl (das sog. Heidemehl) an Nährwert hinter Weizen und Roggenmehl zurücksteht. Übrigens wird er zumeist als zweite Frucht, namentlich in südlicheren Gegenden, gebaut, wo sich die Reife des Getreides schon in der ersten Hälfte des Sommers vollzieht. Biologisch ist über ihn nicht viel zu sagen. Er hat weiß-rötlich bis rot gefärbte Blüten, die ein in voller Blüte stehendes Heidekornfeld zum wahren Schmuck der Landschaft machen und von den Bienen eifrigst besucht werden. Dieserhalb schätzen die Imker den bescheidenen Buchweizen so sehr, daß er von ihnen als „Bienenfutter“ sogar im großen angebaut wird.

Buchweizen (*Fagopyrum esculentum*).

1 = Blühender Sproß. 2 = Einzelblüte vergrößert. 3 = Früchtchen. 4–5 = Samen von außen und im Querschnitt.
(Nach Thomé.)

Gleich dem Wasserknöterich hat auch der Buchweizen zweigestaltige (heterostyle) Blüten mit derselben kurz- und langgriffeligen Form, über deren nähere Biologie aber ebenfalls nichts Genaueres bekannt ist.

Zweifelsohne haben die Knötericharten noch eine große wirtschaftliche Zukunft, und manche der über die ganze Erde zerstreuten Formen wird noch ähnliche Begeisterung erwecken, wie seinerzeit *P. cupidatum*, den Mitte der 40er Jahre v. Siebold als Pferdefutter empfahl, und der sich auch trefflich als solches bewährte, um so mehr, als er gar keine Kulturarbeit verlangt und schon nach zwei Jahren 3 m hohe Büsche bildet.

Die Melden (Chenopodiaceae).

Die Gänsefuß- und Meldegewächse (Chenopodiaceen), denen wir uns nun zuwenden müssen, bilden eine höchst interessante Familie, bei der allerdings der den Rätseln und Wundern des Pflanzenlebens nachspürende Forscher mehr auf seine Rechnung kommt als der Schönheit und Lieblichkeit suchende Naturfreund. Denn wahrlich, diese einförmigen und häßlich gefärbten Gewächse entbehren allen Reizes. Sie sind so unscheinbar, daß wir sie als die häßlichsten Unkräuter unserer Flora bezeichnen könnten. Als Vertreter extremer Anpassungen besitzen sie manchmal einfach monströse Formen. Aber sie entbehren dennoch nicht des Interessanten. Als Steppen- und Wüsten- oder Strandbewohner sind sie sogar äußerst charakteristisch. Bevor wir uns nun dieser ihrer hervorstechendsten Eigenschaft zuwenden, müssen wir allerdings erst ein allgemeines Bild ihrer sonstigen Eigenheiten gewinnen.

Das Auffälligste an ihnen, d. h. wenigstens an den einheimischen Unkräutern dieser Verwandtschaftsgruppe, ist, daß sie überhaupt keine hervorragenden Eigentümlichkeiten besitzen. Die unterirdischen Organe sind in der Regel als wenig verzweigte Pfahlwurzeln ausgebildet, die allerdings bei xerophytischen Wüsten- und Steppenformen außerordentlich tief in den Boden hinabsteigen können, der erschwerten Wasserversorgung angepaßt. Bei einigen krautigen Arten hat diese Pfahlwurzel, besonders in der Kultur, die Tendenz, durch Vermehrung ihrer parenchymatischen Elemente den Charakter von Rüben anzunehmen und sich zu einem Speicherorgan umzuwandeln, was sich der Mensch bei der Runkel- oder Zuckerrübe reichlich zunutze zu machen gewußt hat. Doch darüber werden wir später mehr zu hören bekommen. Eine besondere Stengelform tritt uns bei manchen halophytischen (Salzboden bewohnenden Formen) entgegen, in den „artikulierten“, d. h. gegliederten Stengeln, die ihnen ein ganz sonderbares Aussehen verleihen, wobei man an den wenigstens den Küstenbewohnern allbekannten Queller (*Salicornia*) denken möge. Die Belaubung ist bei den einheimischen Gänsefuß- (*Chenopodium*-) und Melden- (*Atriplex*-) Arten zwar gewöhnlich reichlich und lebhaft grün, bei der großen Masse der Wüsten- und Steppenbewohner dagegen meist ungemein reduziert und in fahles Weiß oder Grau gehüllt. Dieser unschöne Eindruck kommt entweder durch reichliche Haare zustande, oder er ist die Folge ausgiebiger Wachsausscheidungen an der Oberfläche der Blätter oder auch der Stengel, da bei den ausgeprägt xerophytischen Formen (*Salicornia*-Arten und manchen *Salsoleen*) die Reduktion der Blattfläche sich bis zum völligen Mangel aller „Blätter“ steigern kann. Natürlich dienen diese Eigenheiten dem Transpirationsschutz, und wenig Pflanzen erreichen darin solche Extreme, wie gerade die Chenopodiaceen. Gelegentlich ist sogar eine Art von Dornbildung entwickelt, mindestens laufen die Blätter der betreffenden Arten in eine stehende Spitze aus. Sonst sind an Stelle der gewöhnlich dreieckigen oder spießförmigen Blätter bei den Xerophilen meist ganz schmale Nadeln und Nuten getreten. Die gegliederten Stengel von *Salicornia*, *Haloxylon* oder *Anabasis* kommen stets nur völlig blattlosen Formen zu, deren jüngere Teile sich aus stockwerkartig übereinanderstehenden, kurzen, meist mehr oder weniger fleischigen Teilen derart aufbauen, daß jedes einzelne dem schüsselförmig ausladenden oberen Rande des darunter gelegenen eingefügt erscheint. Es umfaßt also

jedes Glied das folgende an seinem Grunde mit einem Ringwulste. Diesem läßt man nun eine in stammesgeschichtlicher Beziehung bemerkenswerte Deutung zukommen. Es führten nämlich sowohl Übergangsstadien (die Gattung *Halopeplis*) als auch anatomische Untersuchungen darauf, diesen Wulst als den äußerst reduzierten „freien Laminarteil zweier gegengestellter Laubblätter“ aufzufassen. Blätter, die, wie ein älterer Forscher sagt, „mit scheidiger, in eins verschmolzener Basis das eigentliche Stamminternodium mantelartig umgeben, dabei auch histologisch fest mit ihm verwachsen sind.“ Es wäre also dasjenige, was auf den Querschnitten durch ein solches Internodium als grüne Rinde erscheint, in Wahrheit ein Gewebekomplex von „Blattnatur“.

Mit solchen Problemen beschäftigte sich die Morphologie älteren Stiles, und das machte die Botanik so trocken. Denn für lebendiges Wissen läßt sich aus solchen Kenntnissen keinerlei Gewinn ziehen; ob die Auffassung eines Organes als „Blatt“, wenn es doch in Wirklichkeit keines mehr ist, irgendeinen vernünftigen Sinn habe oder nicht, darüber läßt sich auch weidlich streiten. Ganz wertlos war deshalb diese alte Gestaltungskunde durchaus nicht, wie man in der Überhebung der „Nachfolger“ zu leicht geneigt ist anzunehmen, denn diese Betrachtungsweise zeigte uns den Weg, wie die blattlosen Gebilde entstanden sein mögen. Wir drücken das nur kausal-denkend aus, wenn wir heute sagen: sie entstanden durch das stetig wirkende Bedürfnis nach Reduktion der Blattfläche, wodurch die seitliche Ausgliederung besonderer Gewebekomplexe mehr und mehr unterblieb und auf den Stengel selbst überging.

Die Gänsefußgattungen weisen auch sonst noch in mehr als einer sowohl anatomisch feineren wie grob gestaltlichen Bedeutung die wunderbarsten Anpassungen an „wasserarme“ Lebensverhältnisse auf, ja, man kann sagen, es gibt sonst keine Familie unter den Dikotylen, die ausgesprochenere Steppen- und Wüstenpflanzen in ihren Reihen zählte. Dieser Familie lag die Neigung zu solcher Anpassung wirklich gleichsam „im Blute“. Fast alle die mannigfachen Mittel, die man als Schutzmittel gegen die Schäden einer übermäßigen Transpiration überhaupt erkannt hat, kann man durch das Studium der Chenopodiaceen kennen lernen. Deshalb lohnt ihr anatomisches Studium auch ganz besonders, um so mehr, als außer diesen „epharmonischen“ Merkmalen, die in ihrer Gesamtheit eine bestimmte Lebensform kennzeichnen, hier auch noch systematische, spezifische Merkmale vorhanden sind. Allem voran eine Eigenart der Holzstruktur, die diese Familien allerdings mit noch einigen nahen Verwandten gemeinsam haben. Bei den krautigen Formen (*Chenopodium*, *Beta*) wird die Festigung des Stammes durch mächtige Kollenchymrippen bewirkt, und dementsprechend kommt es nur selten zu besonderer Bastentwicklung. Hingegen zeigen wieder die in die Dicke wachsenden Stämme ein Verhalten, das ganz an die wenigen in die Dicke wachsenden Monokotylen nach dem Typus der Drachenbäume erinnert; es wird nämlich kein einheitlicher, kompakter Holzkörper gebildet. Wenn wir die Sache rein wissenschaftlich darstellen sollen, so können wir über diesen Punkt etwa folgendes sagen: Die einzelnen Leitbündel sind isoliert und gleichsam inselartig in ein Zwischengewebe eingesprengt, und so ergänzt sich das ursprüngliche Kambium der einzelnen Bündel nicht durch Bildung eines Zwischenkambiums zu einem geschlossenen Kambiumring, sondern es stellt seine Tätigkeit frühzeitig ein. Dafür tritt dann, ganz wie bei *Dracaena*, außerhalb des ursprünglichen Bündelfreises ein Folgeremeristem auf, das nach außen gar keine oder sehr wenige paren-

chymatische Elemente, nach innen aber fortwährend sekundäre, kollaterale Bündel und Zwischengewebe bildet. Wenn die Bündelbildung an mehreren Punkten dieses sekundären Kambiumringes gleichzeitig beginnt, dann findet man am Querschnitt die Leitstränge später in konzentrischen Kreisen angeordnet, im anderen Falle spiralig oder auch ganz regellos. Diese merkwürdige Übereinstimmung mit den Monokotylen, bei ausgesprochener Anomalie des Verhaltens gegenüber dem sonst im allgemeinen bei den Dikotylen üblichen, läßt hier fast unwillkürlich einen Anknüpfungspunkt an die sonst phylogenetisch so schwer einzufügende Klasse der Monokotylen suchen.

Immerhin hat aber der Zusammenhang des Blütenbaues dennoch die Einreihung der Gruppe in die Dikotyledonen gesichert, denn wie Wettstein in seinem Handbuch bemerkt: die ganze Reihe der Centrospermae, bei denen ein analoger Bau der Gefäßbündel vorhanden ist, und zu denen man auch die Chenopodiaceen stellen muß, ist eine sehr natürliche, was schon daraus hervorgeht, daß innerhalb ihrer die einzelnen Familien sich nur schwer abgrenzen lassen.

Die Anatomie dieser Pflanzen weist auch sonst noch die merkwürdigsten Eigenheiten auf. So ist z. B. ihr Assimilations-system nach zwei Typen gebaut. Bei dem einen, zu dem die Chenopodien, Salicornien und die Mehrzahl der Atriplex-Arten gehören, finden sich keine besonders ge-

Der anatomische Bau der Chenopodiaceen.
1 = Blattquerschnitt von Salsola. 2 = Blattquerschnitt von Atriplex. 3 = Blasenhaare von Atriplex. (Nach Volkens.)

bauten „Sammelzellen“; bei dem anderen Typus dagegen ist eine besondere charakteristisch gebaute, stärkeführende Scheide von Sammelzellen in den Blättern vorhanden, welche die Bündel gegen die Palisadenzellen zu abgrenzt. So erklärt sich dann, daß diese stets stärkefrei gefunden werden, denn es wird hier offenbar alles im Blattgrün gebildete Kohlenhydrat-Material sofort in die Sammelzellen abgeführt und dort vorläufig als Stärke gespeichert, wie das der Pflanzenanatom leicht bei den heimischen Atriplex-Arten und bei Salsola finden kann.

Der innere Bau der Gänsefußarten ist sogar geradezu die Hochschule der physiologischen Anatomie. Dies zeigt auch folgendes Beispiel. Wo immer wir auf Einrichtungen gegen starke Transpiration stoßen, handelt es sich vornehmlich darum, das Chlorophyllgewebe, das ja bei seiner funktionellen Tätigkeit den größten Wasserverbrauch hat, vor dem Wassermangel zu schützen. Die Pflanzen wenden zu diesem Zweck mit Vorliebe das Mittel an, daß sie Wasserreservoirire für die Zeit der Trockenheit anlegen, die dann immer in ihrer Lagerung eine zweckmäßige Beziehung zum Blattgrün-gewebe zeigen. Da kann es uns denn nicht wundernehmen, daß so „hochxerophile“ Pflanzen, wie die Chenopodiaceen, auf dasselbe Mittel verfallen sind. Ihm verdanken sie ihr mehr oder minder ausgeprägtes fleischiges, gelehrt gesprochen, „sukkulentes“ Aussehen. Dieses Wasserspeichersystem ist entweder als peripher gelegener Wasser-

gewebemantel, der sich bei den Blättern an der Ober- oder Unterseite zu lagern pflegt, ausgebildet, oder es bildet sich ein zentraler Zylinder solchen Gewebes aus, in dem die Leitstränge verlaufen, und der nach außen zu von einem oft nur sehr schmalen Saum chlorophyllhaltigen Gewebes und der Epidermis umgeben ist. Ein ganz besonders verwunderliches Mittel zur Erzielung solcher Wasserspeicherung mit dem höchst praktischen „Nebennutzen“ einer Herabsetzung der Transpiration haben manche Chenopodiaceen in ihren Blasenhaaren entdeckt. Solche findet man bereits vielfach bei unseren einheimischen Chenopodien. Stets sind es einfache Haare als Anhangsorgane der Epidermis, die auf einem ein- oder mehrzelligen zylindrischen Stiele eine dünnwandige, wasserklaren Inhalt führende, kugelige oder auch mannigfach ausgebuchtete Endzelle tragen. Diese Endzellen brechen bei Berührung fast eben so leicht ab, wie das Köpfchen der Brennesselhaare. Das jedem Naturfreund bekannte „Mehl“ der Chenopodiaceen, das bei Berührung der Blätter in großer Menge an den Fingern bleibt und ein ganz eigentümliches Gefühl erzeugt, besteht lediglich aus solchen abgebrochenen Köpfchen. Zweifelsohne muß man in diesen Haaren eine Verstärkung der epidermalen Wasserspeicherung sehen. Jedem Zweifel entrückt ist dies bei einer gewissen Anzahl von Meerstrand- und Wüstenformen, wie *Atriplex coriaceum*, *Atriplex Halimus* oder *A. leucocladum*, wo dieses Mittel von den Pflanzen zu hoher Vollendung entwickelt wurde. Hier am Meere, wo die Gefahren des Wassermangels besonders gegeben sind, bilden diese Blasenhaare auf jungen Zweigen und Blättern, solange die Regenzeit währt, einen dichten, glasigen Überzug; denn alle Blasen sind prall mit Wasser gefüllt und stehen infolge der verschiedenen Stiellänge in mehreren Stockwerken übereinander. Sie sind einfach winzige „Feldflaschen“, denn in dem Maße, wie in der trockenen Jahreszeit die Hitze zunimmt, wird ihr Inhalt aufgebraucht; indem nun die entleerten Zellen zusammenfallen und miteinander verkleben, bilden sie ein weißlich-graues Gewebe, das wie eine pergamentartige, die Verdunstung hemmende Decke über alle assimilierenden Teile der Blattes ausgebreitet liegt. Noch im Tode, wenn die eine Funktion erschöpft ist, weiß die Pflanze sie also nochmals zu ihrem Nutzen zu verwenden.

Man könnte so ganze Bände füllen über die biologischen Wunder dieser unscheinbarsten Bürger unserer heimischen Flora. Volkenz nennt sie die „Salzpflanzen par excellence“, und er hat recht damit; denn ihr Vorkommen ist fast ausschließlich auf Lokalitäten beschränkt, an denen ein Überschuß von Kochsalz, mitunter auch von Nitraten, den Boden für andere Pflanzen ungenießbar macht. Dies drängte sie von vornherein auf den Strand der Meere und ganz besonders auf jene großen Steppen und Wüsten, deren mit Salz imprägnierte Oberfläche sie als ehemaligen Meeresgrund verrät. Bei uns sind es namentlich Salinen oder Solquellen im Binnenlande, endlich auch die Umgebungen menschlicher Wohnungen, die Dung- und Schuttstätten, die traurige Umgebung der Großstädte, die von den Gänsefußarten besiedelt werden. An dieser „Salzliebhaberei“ ist aber nun zu beachten, daß ein Teil der Chenopodiaceen wie überhaupt der Halophyten in der Tat des Chlornatriums ausdrücklich bedarf; es gibt aber auch einen Teil der Halophyten, der sich auch ohne Salz zu behelfen weiß und auch ohne solches zu vollkommener Entwicklung gelangt. Dann jedoch wird, wie sowohl durch Beobachtungen in der freien Natur als auch durch Kulturversuche im Laboratorium gezeigt wurde, das ganze Aussehen verändert. Ein treffliches Bei-

spiel für diese merkwürdige Erscheinung ist das gemeine Salzkraut (*Salsola Kali* L.) unseres Seestrandes. Es kommt sowohl am Strande als auch auf fast ganz salzfreien Sandfeldern und Hügeln des Binnenlandes vor, aber die Bewohner beider Standorte gleichen sich nicht. Die am Meere sind in allen ihren Vegetationsorganen plumper, massiger, sie sind saftiger und zeigen nicht nur ein anderes Grün als die Binnenlandpflanzen, sondern erscheinen auch gleichsam durchsichtiger, glasartig. Mit anderen Worten, der Salzgehalt des Bodens steigert das, was man die „xerophytischen Charaktere“ nennt. Wie soll man sich dies erklären? Daß die Bewohner der trockenen Salzsteppen und Salzwüsten an Wassermangel zu leiden haben und sich dagegen schützen müssen, ist ohne weiteres begreiflich; aber die Meerstrandpflanzen sind doch oft genug von Wasser überflutet, einzelne, so der Queller (*Salicornia*), sind sogar typische Bewohner der Watten, leben also zeitlebens im Wasser. Und sie sollen doch an Wassermangel leiden? Man hat sich diesen scheinbaren Widerspruch in folgender Weise zurechtzulegen gesucht. Man sagte sich: zweifelsohne spielen hier eben nicht bloß physikalische, sondern auch physiologische Momente mit. Zunächst muß man daran denken, daß hohe Konzentration einer den Wurzeln gebotenen Lösung die Wasserversorgung der Pflanze überhaupt erschwert. Dann aber kommt noch etwas in Betracht, das ohne Pflanzenpsychologie nicht zu verstehen wäre. Es wirkt eben ein Faktor mit, der für das innere Regulationsvermögen der Pflanze auf Grund „direkt wirkenden Bedürfnisses“ sehr berechtigt spricht. Schimper und Pfeffer haben nachgewiesen, daß konzentriertere Lösungen in den grünen Zellen die Assimilation verhindern. Und zwar vermögen die Assimilationszellen, wenn ihr Salzgehalt eine bestimmte Grenze überschreitet, keine Stärke mehr zu bilden. Die Salzboden bewohnenden Pflanzen sind also aus ernährungsphysiologischen Gründen genötigt, auch bei reichlicher Bewässerung die Aufnahme des salzhaltigen Bodenwassers möglichst zu beschränken, sonst würde ihre wichtigste Lebetätigkeit, ihre Ernährung, durch das Blattgrün leiden. Und zwar nicht durch Hunger, sondern durch einen „embarras de richesse“, durch zu große Anreicherung in den Zellen. Um dies zu verhindern und von der im Boden gebotenen Lösung so wenig als möglich aufzunehmen, gibt es nur ein Mittel: die Transpiration möglichst herabzusetzen. Die Halophyten lassen also zu dem gleichen Zwecke auch (in der Hauptsache wenigstens) die gleichen Mittel zur Ausbildung gelangen, wie die nicht halophytischen Xerophyten. Aber sie tun es aus anderer Ursache, und dies gibt viel zu denken. Die nicht halophytischen Xerophyten schützen sich gegen Transpiration, weil sie unter ihren Lebensbedingungen nicht genügend Wasser aufnehmen können, die Halophyten dagegen schützen sich teils auch aus gleichem Grunde, denn in den konzentrierten Lösungen ist die Aufnahme erschwert, hauptsächlich aber deshalb, weil sie das salzige Wasser nicht reichlicher aufnehmen dürfen, ohne sich zu schädigen! Wenn diese gleiche Handlung aus verschiedenen Motiven nicht ein vollgültiger Beweis gegen den „Mechanismus“ als Erklärungsmittel ist, der will sich nicht überzeugen lassen.

Ungeachtet der Tatsache, daß sich Halophyten doch auch vielfach ohne Salz entwickeln können, ist nun die Frage gerechtfertigt, wie sich denn diese eigenartige Standortverteilung der so reichlich halophytischen Chenopodiaceen erkläre. Schimper sagt hierüber: „Die Eigenschaft, Salz aufzuspeichern und auf Salzboden unverfehrt zu exi-

stieren, macht natürlich an sich nicht untauglich, auch an mehr bevorzugten Plätzen im Kampfe ums Dasein zu bestehen. . . . Selbstverständlich ist der Kampf um den Raum von jeher auf den Böden, welche den meisten Pflanzenarten günstige Bedingungen bieten, am heftigsten gewesen. Im Laufe der Zeit sind viele Sippen von den bevorzugten Plätzen durch kräftiger gewordene Konkurrenten verdrängt worden. Manche dieser Besiegten gingen zugrunde, während andere ihre Fortexistenz bestimmten Eigenschaften verdankten, durch welche sie befähigt wurden, ungesunde Ländereien zu kolonisieren. So vermochten solche unter den verdrängten Gewächsen eine Zuflucht auf Salzboden zu finden, die bereits auf gewöhnlichem Boden die Gewohnheit angenommen hatten,

Quellermiese an den Nordseeküsten bei Ebbe.

Kochsalz reichlich aufzuspeichern, und dadurch gegen seine giftigen Wirkungen immun geworden waren. Auf Salzboden gestattete die verminderte Konkurrenz ihr Fortbestehen.“ Diese Überlegenheit in der Anpassungsfähigkeit an Salzboden macht die Salzpflanzen auch wichtig für einen Prozeß, den wir hier schon viel besprochen haben, nämlich für die Verlandung. Auf flachem Strande, der längere Zeit dem Einfluß der Wellen entzogen geblieben ist, siedelt sich als erste Vegetation gewöhnlich zunächst vereinzelt, in weiten Zwischenräumen wachsend, der Queller (*Salicornia macrostachya*) an. Häufig gehen diese ersten kühnen Besiedler wieder zugrunde; mitunter jedoch vermögen sie sich zu behaupten, und dann ist dieser Fleck Festland endgültig der Pflanzenwelt erobert. Zwischen und an den buschigen Ästen dieser ersten Pioniere sammelt sich dann genügend Sand, der einigen neuen befreundeten Formen, darunter gewöhnlich *Salicornia sarmentosa* und *Atriplex portulacoides* usw., festes Fußfassen ermöglicht; dadurch kann sich wieder Sand ablagern und mit den absterben-

den Nesten der Pflanzen natürlich auch Humus. Um jede solche Pflanzengruppe bilden sich auf diese Weise nach einiger Zeit kleine Sandhügel (man nennt sie „touradons“), die durch den Hilz der Wurzeln und Ausläufer bereits erhebliche Widerstandsfestigkeit besitzen. Immer mehr Halophyten und Sandpflanzen kommen dazu, und langsam entsteht dem Meere ein neues Land in dem Maße, wie die Regengüsse den Boden mehr und mehr ausfüllen. Wir wissen noch nicht zuviel über diese eigenartigen Verlandungsvorgänge, denn man hat sie erst in neuerer Zeit genauer zu studieren begonnen, aber das, was wir hier erzählen, ist bereits sichergestellt.

Aus dieser Überlegenheit, welche die Chenopodiaceen sich erworben haben, folgt natürlich, daß sie weite geographische Verteilung erlangt haben. Bunge kommt in einer Arbeit über diesen Gegenstand zu dem Schluß, daß die Vertreter dieser Pflanzenfamilie zu den neueren Bildungen der Pflanzenwelt zu rechnen seien, die sich allmählich zu höheren Formen in dem Maße entwickelt hätten, als ihnen in geologisch neuerer Zeit ein in großen Strecken trockengelegter, ehemaliger Meeresboden als geeigneter Standort geboten wurde. Er sagt: „Solche Salzgebiete finden sich in allen Erdteilen, und jedes derselben hat seine eigene, von den übrigen ganz abweichende Halophytenvegetation, so daß deren Vertreter als erst in jüngerer Zeit aufgetretene endemische Bildungen anzusehen sind.“ Demgemäß unterscheidet er 10 Hauptbecken: 1. das Tiefland Australiens, 2. die Pampas Südamerikas, 3. die Prärien Nordamerikas, 4. und 5. die Uferländer des Mittelmeeresbeckens, 6. die Karu-Gegenden Südafrikas, 7. das Becken des Roten Meeres, 8. das kaspische Südwestufer, 9. das zentralasiatische Becken von den östlichen Ufern des Kaspisees und vom persischen Meerbusen bis zum Altai, Tianschan und den Westabhängen des Himalaja, 10. die Salzsteppen Ostasiens. Auf diese 10 Becken verteilen sich fast alle Chenopodiaceen; alle übrigen Länder ernähren fast nur kosmopolitische, meist der Schuttflora angehörige, also durch den Menschen verschleppte Arten oder durch Standortsverhältnisse veränderte Arten solcher.

Die einzelnen Salzpflanzenvereine haben dabei eben wegen des Reichtums an lokal einheimischen Formen immerhin noch sehr verschiedenartiges Gepräge. Sie bewohnen dabei vornehmlich Tonböden, Strandwiesen, Lagunengebüsche, Salzsteppen, Salzwüsten und Salzsümpfe. Als wichtigste Gattungen gelten: *Salicornia*, *Atriplex* und *Suaeda*, unter denen wieder unsere gemeine *Salicornia herbacea* als Strandpflanze die weiteste Verbreitung gefunden hat.

Nicht vorbeigehen kann ich auch, als an einem besonders interessanten und einzigartigen Vertreter der Familie, an dem Saxaulbaum (*Haloxylon Ammodendron*), den wir bereits in Bd. I, S. 61 abgebildet haben. Er ist geradezu die Charakterpflanze der innerasiatischen Steppe. Er bildet sogar wirkliche Halophytenwälder, die allerdings eher allem anderen gleichen als unserem Begriffe eines Waldes. Der Saxaul erreicht etwa 6 m und bildet sogar Stämme von 20 cm Durchmesser; aber seine grauen Stämmchen sind gekrümmt und gedreht und sehen mit ihren zahlreichen dünnen, schuppigen, *Salicornia* ähnlichen Zweigen nicht wie ein Baum, sondern wie ein „grün gefärbtes Bündel von Reisern“ aus. Der Baum bildet also einen Wald ohne Nadeln und Blätter, der aber doch grün ist und blüht und an die Kasuarinenwälder Australiens erinnert. Das Holz ist fest und schwer, die Rinde aber so reich an Saft, daß sie den Wüstentieren vielfach das Wasser ersetzen muß. So ist er in jenen Einöden ein Schatz,

um so mehr, als er für den Menschen auch als Brennholz von Nutzen ist. Gegen Europa zu reicht dieses eigenartige Gewächs nur etwa bis an die Bodenschwelle zwischen dem kaspischen und Uralsee; seine Hauptverbreitung hat er in der Wüste Gobi, der Dsungarei und in Turkestan, seine Höhengrenze scheint bei etwa 4000 m zu liegen, so daß er in dem größtenteils höheren Tibet nur vereinzelt vorkommt. Die Reisenden meinen allerdings, daß er trotz seiner baumbildenden Bestände nicht zur Verschönerung der Landschaft beiträgt, sondern deren trostlosen Anblick eher noch verstärkt.

Eine Pflanze von ähnlicher pflanzengeographischer Bedeutung ist auch *Atriplex nummularia*, die nach Jung „niedrige, kaum zwei Fuß hohe Büsche bildet, deren bläulich-grüne Blätter ein wertvolles Futter für Schafe und Rinder sind, oft das einzige, was ihnen in Zeiten der Not bleibt. Dieser Salzbusch ist schon rein biologisch eine höchst merkwürdige Pflanze, die trotz jahrelanger Dürre in ihren Blättern und Zweigen immer noch Nahrung und Frische bewahrt, wenn alle Vegetation rings um sie erlegen ist.“ In gewissen Strichen Australiens ermöglicht er so allein die ausgedehnte Schafzucht.

Wir haben jedoch noch nicht von der Blütenbiologie unserer Familie gesprochen. Die Blüten der Chenopodiaceen sind klein, durchweg unscheinbar, im übrigen aber bei den einzelnen Gruppen höchst verschiedenartig. Polygamie ist sehr verbreitet, so hat *Chenopodium* zwittrige oder polygame Blüten, *Atriplex* dagegen ist monözisch oder polygam und der gemeine Spinat (*Spinacia*), der auch hierher gehört, diözisch. Über die Bestäubung liegen noch wenig genaue Beobachtungen vor. Selbstbestäubung scheint nicht ausgeschlossen, und für Fremdbestäubung ist vielfach gesorgt. Manche der einheimischen Gänsefüße, von denen ja etwa 60 Arten in der ganzen Welt leben, entwickeln zuerst die weiblichen Geschlechtsorgane, bei dem Queller liegt dagegen die Sache umgekehrt. Bei *Salicornia* ist auch die Lage der Blüten bemerkenswert; sie liegen nämlich in einer Vertiefung der fleischigen Achse und sind von den flachgedrückten, verwachsenen Blütenhüllblättern umwachsen, woraus manche Forscher, so Kirchner und Warming, geschlossen haben, daß der Wind hier das Agens der Pollenübertragung sei. Volken's spricht sich nun zwar gegen diese Auffassung aus und führt dafür folgende Gründe an: Er meint, der Pollen sei nicht so leicht verstäubbar, wie dies bei windblütigen Pflanzen der Fall zu sein pflegt; dann mache auch das Fehlen leichtbeweglicher Staubfäden oder solcher Blütenstiele die Annahme der Windbestäubung unwahrscheinlich, und endlich stimme die Aufblühfolge der Blüten nicht damit; denn Windblütler öffnen ihre Blüten mehr oder weniger gleichzeitig. Schließlich aber spielt er den Haupttrumpf aus, denn er hat an den Blüten vielfach reichlichen Insektenbesuch bemerkt. Kleine Wanzen, Fliegen, Blattläuse nehmen sich dieser unscheinbaren Blüten dennoch an. Aber es gibt schließlich auch wieder Gegenargumente; ein solches ist vor allem der Mangel irgendwelcher Schauapparate. Immerhin ist die Möglichkeit gegeben, daß z. B. die vorhin genannten kleinen Besucher vielleicht in den knäuelig gedrängten Blütenständen willkommene Schlupfwinkel suchen und bei ihrem Herumkrabbeln wenigstens eine teilweise Pollenübertragung bewerkstelligen.

Auch die Biologie der Frucht ist je nach den verschiedenen Arten der Verbreitungsanpassung sehr mannigfaltig, wobei häufig auch die Blütenhülle noch biologisch herangezogen wird. Volken's gibt in seiner Flora der ägyptisch-arabischen Wüste (1887)

hiefür folgende Übersicht: Die Früchte eignen sich entweder zum Gefressenwerden, wobei sowohl die Fruchtknotenwandlung als auch die Blütenhülle beerenartig werden kann. Die Früchte eignen sich aber auch zum Verschlepptwerden im Felle der Tiere, was durch Dornbildungen der Perianthblätter (wie bei dem Knöterich) erzielt wird. Die Verbreitung wird schließlich auch durch den Wind besorgt, wobei als förderndes Mittel entweder die Umhüllung der Frucht mit Haaren oder Flügelbildung oder eine schwammige, luftthaltige Ausbildung der Frucht oder deren Umhüllung dient. Die Gattung *Chenopodium* selbst hat eigentümlich doppeltgestaltige Früchte. Sie erzeugt solche mit horizontalem Samen und andere mit vertikal oder schief gestelltem Samen,

letztere beiden Formen besonders häufig an den Endauszweigungen der Blütenstände, wo auch die rein weiblichen Blüten zu überwiegen pflegen. Ähnliches biologisch noch Unerklärliches findet sich auch bei den Gattungen *Atriplex* und *Suaeda*.

Unserem Programm gemäß sind wir verpflichtet, auch über die eigentlich sehr uninteressanten Arten der Gattung *Chenopodium* zu berichten. In unseren Gegenden verbreitet, aber zugleich auch ein kosmopolitisches Unkraut ist

Melbenarten.

1 = *Blitum capitatum* L. 2 = *Chenopodium Bonus Henricus* L.
3 = *Spinacia oleracea* L. (Nach Thomés Flora.)

Chenopodium (*Blitum*) *Bonus Henricus* mit seinen sehr mehligten Blättern. Ebenso gemein in mehr als einer Hinsicht ist *Ch. vulvaria*, *Ch. murale* und *Ch. album*. Als Nuckpflanzen kommen, abgesehen von den Vorteilen, welche die in großen Beständen auftretenden halophytischen *Chenopodiaceen* gewähren können, und die wir bereits genügend schilderten, in der Kultur nur einige wenige Formen in Betracht, so *Chenopodium Quinoa*, das seiner mehligten Früchte wegen angebaut wird, oder *Ch. ambrosioides*, das wegen seines Gehaltes an aromatischen Stoffen in Frankreich als „thé du Mexique“ geschätzt ist. *Atriplex hortense* und *A. Halimus* liefern Gemüse, desgleichen der jedermann bekannte und wegen seines Eisengehaltes hochgeschätzte Spinat (*Spinacia oleracea* [s. das Bild]). Eine rotblättrige Form des letzteren sowie auch der Gartenmelbe (*Atriplex hortense*) werden übrigens auch als Zierpflanzen gezogen. Von den halophytischen Arten wurden viele früher zur Sodabereitung verwendet, sind aber in dieser Hinsicht heute nur noch von geringer Bedeutung.

In diesem langweiligen und unbedeutenden Kreise steht nun ein Gewächs von welteroberndem Werte, freilich nicht weniger unscheinbar gekleidet als alle seine Verwandten. Das ist die Rübe (*Beta vulgaris*). Teils als Futtergewächs (Munkelrübe), teils als Zuckerrübe ist sie neben dem Getreide und den Kartoffeln heute in Deutschland die wichtigste landwirtschaftliche Pflanze. Für den Naturfreund sagt das allerdings nicht viel, doch kommt auch er auf seine Rechnung, denn diese Pflanze ist zugleich ein schönes Beispiel für die Wirkung künstlicher, mit bewußter und überlegter Absicht vollzogener Auslese. Darum möge mir gestattet sein, etwas ausführlicher bei ihr zu verweilen.

Vor allem ist die Rübe kein natürliches Gewächs mehr. Nach den Versuchen von Schindler und E. v. Proskowek ist jetzt wohl als sicher anzunehmen, daß als Stammpflanze aller Rübenrassen eine noch jetzt an den Küsten Europas, speziell des Mittelmeeres vorkommende Abart (*Beta vulgaris*, var. *maritima* Koch.) gelten könne. Diese Stammform, ein häßliches, sparriges Geschöpf, hat eine zwar etwas verdickte, aber noch immer holzige Wurzel. Wir wissen aber bereits, daß die *Chenopodiaceen* sehr zu Abänderungen in den verschiedenen Organen neigen, obwohl gerade *Beta* nur 6 Arten zählt. Und je nach den Zwecken, die sie verfolgten, lernten die Menschen schon frühzeitig die ausgeprägtesten Exemplare der Abänderungen zur Nachzucht auswählen und damit Kulturvarietäten erzeugen. Als solche gelten der Mangold (*B. vulgaris*, var. *cicla*) mit weichen Blättern und wenig verdickter Wurzel, eine Gemüsepflanze, die dem Spinat Konkurrenz macht, ferner die rote Rübe (*B. vulg.*, var. *Rapa*, f. *rubra*), ebenfalls eine Gemüsepflanze mit weicher, zarter, anthozyanreicher Wurzel. Hierher gehört die Munkelrübe oder Burgunderrübe (*B. vulg.*, var. *Rapa*, f. *crassa*), eine gemeine Futterpflanze, und endlich das verzogene kostbare Kind, die Zuckerrübe (*B. vulg.*, var. *Rapa*, f. *altissima*), über die es eine große Bücherei voll Schriften gibt.

Mit Ausnahme der Zuckerrübe haben wir diese Varietäten schon als alte Formen überkommen; ihre Entwicklung geschah, bevor noch die Wissenschaft das Werden registrierte. Dagegen hat sich die Zuckerrübe sozusagen vor unseren Augen entwickelt und ist in ihren Eigenschaften eines der am besten bekannten Gewächse. Der Zuckergehalt ist der Munkelrübe zwar von Natur aus eigen, aber die Menge, in der sich Zucker in den Wurzeln ursprünglich vorfand, war zu gering, als daß sich seine Fabrikation gelohnt hätte. Darum konnte die Rübe, trotzdem ihr Zuckergehalt schon seit Friedrich des Großen Zeiten bekannt war, nicht mit dem Kolonialzucker wetteifern und könnte es auch heute nicht, wenn nicht Napoleons Kontinentalsperre im Jahre 1806, welche die bis dahin durch den britischen Handel importierten Kolonialwaren im Preise ganz ungeheuerlich in die Höhe trieb, den Anlaß gegeben hätte, den Zuckerrübenbau energisch in die Hand zu nehmen. So war es der Zwang der Not, der zur sorgfältigen Selektion zuckerreicherer Rübensorten führte und zur Folge hatte, daß man heute Rüben baut, die 12—18, ja selbst 21 % Zucker enthalten. Nach Herzogs Monographie der Zuckerrübe (1899) stehen in Europa fast 3 000 000 ha Ackerland im Dienste des Zuckerrübenbaues, wobei Deutschland mit weit über 400 000 ha nicht bloß in Europa an erster Stelle zählt, sondern darin auch alle anderen außer-europäischen Länder übertrifft. Einige Zahlen mögen für den Gegenstand am besten

sprechen. Das deutsche Reich führt jährlich etwa 1500000 Tonnen Zucker im Werte von 230 Millionen Mark aus, während es heute ungefähr nur für eine halbe Million Kolonialzucker einführt!

So gewöhnlich nun auch der Name der Zuckerrübe klingt, so erzählt sie uns doch eine sehr fremdartige Geschichte. Sie ist nämlich sehr weit gereist und gleich dem Getreide das Kind eines fernen Himmelsstriches. Sie kommt von so weit her, daß man von ihr nicht einmal weiß, wo sie zu Hause ist.

In einem Grabe, das Ägypter vor etwa 4000 Jahren für einen ihrer Großen errichteten, malten sie an die Wand einen Feldarbeiter, der eine mächtige Kunkelrübe in einen Gemüsekorb legt.

Das ist die erste sichere Urkunde aus der Geschichte der Rübe und zugleich der Fingerzeig, wo die Heimat dieser Pflanze zu suchen sei. Dieser kulturgeschichtliche Beleg bestätigt also die von uns schon erwähnte Vermutung, daß die Rübe aus dem Süden stammt.

Man hat es nun versucht, den Weg der Kulturgeschichte auf dem Ackerfeld verkürzt zu wiederholen, und es gelang wirklich; aus der Meerstrandrübe ließ sich binnen wenigen Jahren eine zuckerreiche Pflanze ganz nach Art unserer Zuckerrübe züchten. Das war eine große Entdeckung für die Menschen,

Der Bau der Zuckerrübe (*Beta vulgaris*).

1 = Die zuckerhaltige Wurzel. 2 = Blütenstand. 3 = Einzelblütenhäuschen vergrößert. 4 = Ansicht der Blüte. 5 = Blüte im Längsschnitt. 6 = Fruchthäuschen. 7—8 = Samen von außen und im Längsschnitt. (Nach Baillon.)

als sie züchten lernten, vielleicht so wichtig wie das erste Feuer, das sie künstlich erzielten.

Im Jahre 1747 entdeckte der Berliner Chemiker Markgraf, daß in der Kunkelrübe, die man bis dorthin nur als Gemüse aß, ziemlich viel Zucker sei. In der fleischigen Wurzel der Pflanze fand er 6% Zucker. Und Vilmorin, damals Gärtner in Paris, der viele Jahre später davon las, kam auf den Gedanken, man solle doch untersuchen, ob alle Rüben gleichviel Zucker besitzen. Er unterzog sich der Mühe und fand, daß die eine Rübe süßer sei als die andere. Nun begann er unter Tausenden von Rüben die zuckerreichsten auszuwählen. Er pflanzte sie an und erhielt von neuem Rüben, die im Durchschnitt zuckerreicher waren als ihre Eltern. Wieder wählte er davon nur die besten und so setzte er sein Verfahren fort mit dem Erfolg, daß er nach einigen Jahren statt Rüben mit 7% solche hatte, in denen über $\frac{1}{5}$ des Inhaltes (21%) reiner Zucker war.

Farbenvarietäten der blütheligen Pelargonie,
als Beispiel gärtnerischer Züchtung.

So züchtet man, und hunderttausend fleißige Hände regen sich in jedem Herbst, um die Rüben aus dem Boden zu heben, tausend und aber tausend Wagen rollen in den Rübenländern auf den Straßen, hochbeladen mit Rüben, nach den Zuckerfabriken, wo die Rübe zerkleinert und mit heißem Wasser ausgelaugt wird. Der Zuckersaft wird dann gereinigt und filtriert und zu kristallinischem Zucker verwandelt, d. h. zu den blendend weißen Hüten und den hübschen Zuckerrüfeln, ohne die heute keiner von uns mehr sein möchte.

Und was vor 70 Jahren nur ein wissenschaftlicher Versuch war, das führen heute hundert Rübensamenzüchter und 400 Zuckerfabriken in Deutschland allein in solchem Maßstabe aus, daß damit nicht nur der viele Zucker, den man bei uns verzehrt, sondern noch außerdem etwa $1\frac{1}{2}$ Millionen Tonnen hergestellt werden, die nach anderen Ländern verkauft werden. So schafft die Wissenschaft Industrien, und ein einziger kluger Gedanke kann Millionen anderer Menschen zu Wohlstand und einem glücklichen Dasein verhelfen.

Was wir da so einfach erzählt haben, ist natürlich in Wirklichkeit viel verwickelter, doch können wir uns hier nicht in die Technik der Zuckerrübenzüchtung vertiefen.

So blendend nun derartige Zuchtwahlergebnisse auch sein mögen, so muß sich die biologische Forschung der Gegenwart dennoch hüten, in den Fehler Darwins zurückzufallen, der diese künstliche Zuchtwahl mit kühnen Schlußfolgerungen auch auf die Vorgänge in der freien Natur ausdehnen zu können glaubte. Denn die Rübenkultur lehrt, wie alle anderen Ergebnisse künstlicher Züchtung, daß nur eine Eigenschaft durch solche Zuchtwahl zu einer höheren Ausbildung gebracht werden kann, und zwar nur auf Kosten der anderen. Entweder man züchtete die Abweichungen mit weicheeren Blättern, aber dann mußte man auf eine Steigerung der Wurzeleigenschaften verzichten. Oder man steigerte den Futterwert der Rüben, dann konnte weder auf die Genießbarkeit der Blätter noch auf den Zuckergehalt der Wurzel Rücksicht genommen werden. Oder man legte schließlich nur auf die Zuckerproduktion Gewicht, dann entzogen sich die anderen Organe und Eigentümlichkeiten der Auslesewirkung. Das ist in der freien Natur ganz anders. Ein Organismus, der sich veränderten Lebensbedingungen anpaßt, macht doch gleichzeitig die verschiedensten Organveränderungen durch, verhält sich also grundverschieden von einem künstlich hochgezüchteten. Wie, um den Beweis vollständig zu machen, hat gerade die Zuckerrübe als wohl zu beherzigende Lehre gezeigt, daß eine solche auf „individueller Variation gewisser Eigenschaften“ sich aufbauende Steigerung weder über eine gewisse Grenze getrieben werden kann noch auf die Dauer festzuhalten ist. Es tritt schließlich ein Stillstand ein, und je höher gezüchtet die Nachkommen sind, desto mehr von ihnen und desto gründlicher fallen sie bei der Fortpflanzung in niedere überwundene Stadien zurück. Was wir schon in Bd. II bei der Schilderung der Früchte betonten, das gilt auch hier: die Verschiebung der Arteigenschaften sprengt nie den Artbegriff; die künstliche Selektion vergrößert nur die Schwingungsamplitude um den Durchschnittstypus, aber sie verändert nicht die Natur der Eigenschaften! Eine auf solchem Wege erzielte Eigenschaftshöhe läßt sich nur durch ununterbrochen fortgesetzte Selektion erhalten; die geringste Nachlässigkeit rächt sich durch sofortiges Zurückschlagen in die Ausgangsform.

Mit anderen Worten, es ist völlig unmöglich, Fluktuationseigenschaften zu fixieren. Und so ist aus den Laboratorien der Geschäftsleute eine große wissenschaftliche Einsicht erwachsen; denn diese praktischen Ergebnisse haben vor allem dazu beigetragen, unserer Wissenschaft den Glauben an die Allmacht der Selektion und ihrer Bedeutung als artbildender Faktor gründlichst zu zerstören. Das ist der Beitrag der Zuckerrübe für unsere floristischen Lebensbilder.

Wie wir schon vorhin betonten, werden die Chenopodiaceen von den Systematikern mit den im folgenden zu besprechenden Familien in die Reihe der „Centrospermae“ gestellt. Dieser Zusammenschluß hat seine guten Gründe, denn es hat nämlich bei allen hierhergehörigen Familien der Same denselben typischen Bau. Sein Embryo ist gekrümmt und umschließt das zentral gelegene Samennährgewebe (siehe Bild in Bd. II, S. 349). Dieses „Reihenmerkmal“ ist mit wenigen Ausnahmen sehr konstant. Aber auch der Blütenbau dieser Gewächse zeigt sehr weitgehende Übereinstimmung und nähere Beziehungen, obwohl äußerlich für den ersten Anblick z. B. zwischen der ganz unscheinbaren Blüte einer Gänsefußpflanze und der Prachtblume einer Nelke gar wenig Übereinstimmung vorhanden zu sein scheint. Mit diesen aber müssen wir die Chenopodiaceen verknüpfen, so absurd das klingt.

Bevor wir jedoch zu der zweiten Hauptfamilie dieser Reihe, nämlich den Meldegewächsen, übergehen, müssen wir in Kürze einige Familien wenigstens erwähnen, da sie bei uns durch Kultur- und Zierpflanzen vertreten sind. Aus der Familie der Amarantaceae wachsen gegenwärtig zwei Arten der Gattung *Amarantus*, nämlich *A. adscendens* (auch *viridis* genannt) und *A. retroflexus* sehr häufig, aber wahrscheinlich nicht ursprünglich bei uns wild. Diese Pflanzen zeichnen sich durch mehr oder weniger rote Stengel und Blätter aus, deren Färbung ebenso wie die der von uns erwähnten „Blut“-Varietäten der Hasel oder Buche durch Anthozyan im Zellsafte hervorgerufen wird. Natürlich sind diese Gewächse trotzdem ebenso grün wie andere ihresgleichen, sonst könnten sie sich ja nicht selbständig ernähren. Es läßt sich darüber ein hübsches und zugleich lehrreiches Schulerperiment machen, wenn man Zweige einer solchen Amarantacee (wie sie ja vielfach auch in Gärten und Gewächshäusern gezogen werden) abschneidet und unter kaltes Wasser getaucht hält; es ändert sich dadurch nichts an der Färbung des Sprosses, auch wenn der Versuch tagelang andauert, solange nur die Pflanze nicht an ihrem Leben leidet. Taucht man dagegen denselben Sproß in kochendes Wasser, so geht alsbald der rote Farbstoff in das umgebende Wasser über und färbt es rot. Aber die Pflanzen sind nun grün geworden, als Zeichen dessen, daß ihr Blattgrün nicht umgewandelt, sondern durch das Anthozyan nur verdeckt war. Dieses Experiment ist übrigens auch sehr geeignet, die osmotische Regulation durch das lebende Plasma im Gegensatz durch das tote (ein bloßes Stoffgemenge darstellende) offenkundig zu machen. Wir haben im physiologischen Teil dieses Werkes schon betont, daß das lebende Protoplasma nicht jeden beliebigen Stoff durchläßt, und können nun hinzufügen, daß gerade das im Zellsafte gelöste Anthozyan festgehalten wird und auch in wässriger Lösung das Plasma nicht passieren kann. Warum dies so ist, wissen wir nicht. Wendet man nun Wasser entziehende, aber nicht zugleich schädigende Mittel an, z. B. eine 5%ige Kochsalzlösung, so sieht man unter dem Mikro-

skop, daß die Färbung des zugleich unter der „Plasmolyse“ sich zusammenziehenden Zellsaftraumes intensiver wird. Mit anderen Worten, das lebende Protoplasma läßt unter der osmotisch anziehend wirkenden Kraft der Salzlösung wohl Wasser aus dem Zellsafte austreten, hält aber den Farbstoff zurück. Nicht so verhält sich der Pflanzenteil, wenn man ihn vorher kocht. Denn durch Siedehitze wird das Protoplasma getötet und büßt damit seine Regulationsfähigkeit ein als Zeichen, daß diese ein lebendiges, also nicht chemisch=physikalisches Phänomen sei. Deshalb dringt nun der rote Zellsaft sofort nach außen. Dasselbe Experiment läßt sich auch mit Stücken der roten Rübe machen. Schneidet man aus solchen Scheiben und legt sie nach oberflächlichem Abspülen (um das Anthozyan zu entfernen, das aus den angeschnittenen Zellen herauskommt) in kaltes Wasser, so bleiben sie rot, während, wie männiglich bekannt ist, ihre schöne Farbe beim Kochen sofort verloren geht. Diese einfachen Experimente sind wohl den Lehrern unter meinen Lesern besonders willkommen, da sie Gelegenheit geben, zwei sehr wichtige physiologische Beziehungen ohne irgendeinen Aufwand von Apparaten zur Anschauung zu bringen.

Was wir hier erzählten, gilt auch für den bekannten Fuchsschwanz (*Amarantus caudatus*) und Hahnenkamm (*Celosia cristata*), denen jeder Gartenfreund gerne ihr Plätzchen gönnt. Was an der letzteren Pflanze so eigen anmutet und ihr auch den Namen gab, ist der verbänderte (faszierte) Blütenstand, der ihr mit seiner breiten, gefräuſelten Form, vereint mit dem prachtvollen Rot, ein höchst groteskes Aussehen gewährt (s. das Bild).

Hier zu behandeln wären auch die Phytolakkazeen, von denen als Zierpflanze sowie auch der saftigen Beeren (Kermesbeeren) wegen *Phytolacca decandra* kultiviert wird, die ursprünglich in Nordamerika heimisch war. Die Beeren enthalten den bekannten dunkelroten Farbstoff, der zum Färben, vielfach z. B. von Weinen, Anwendung findet.

Zu den Nyktaginazeen gehört die vielgeschätzte Wunderblume (*Mirabilis Jalapa*), die auch ohne ihre Bedeutung als leicht zu ziehende, in verschiedenen Farben

Hahnenkamm (*Celosia cristata*).
(Originalaufnahme von P. Wolff-Bischheim.)

blühende Gartenpflanze physiologisch in neuerer Zeit zu größerer wissenschaftlicher Beachtung gelangte durch die Vererbungsversuche, die der Leipziger Botaniker Correns mit ihr in größerem Maßstabe durchgeführt hat. Aber wir wollen den Mendelschen Vererbungsgesetzen, zu deren Erkenntnis dies führte, ohnedies später ein ganzes Kapitel widmen, können es uns also ersparen, hier länger als nur vorübergehend dabei zu verweilen.

Die Portulakazeen sind in den Gärten des kleinen Mannes vertreten durch den gewöhnlichen Portulak (*Portulacca grandiflora*). Mit seinen vielen Farbenabänderungen und den gefüllten Blüten ist er mit Recht eine beliebte Zierpflanze schon seit alters, seitdem man ihn aus seiner wahren Heimat, den tropischen und subtropischen Gebieten, entführte. Er und seine Verwandten sind überwiegend einjährige, liegende Kräuter mit mehr oder weniger fleischigen Blättern, was den Kenner sofort an trockene oder sandige Standorte denken läßt.

Und wirklich sind die berücktigten Karugebiete Südafrikas und die wüsten Teile Kaliforniens reich mit diesen Pflanzen besiedelt. Nur *Montia*, von der in Europa *Montia fontana* und *minor* vorkommt, macht allerwärts eine Ausnahme, indem sie feuchte Standorte bewohnt, unter Umständen sogar direkt im Wasser flutet, wie z. B. *Montia rivularis*. Diese Pflanzen besitzen eine fruchtbiologische Eigenheit, die wir nicht unerwähnt lassen dürfen. Bei *Montia minor* findet sich nämlich nach Urban ein besonderer Schleuderapparat für die Ausbreitung der Samen. Gelegentlich der Fruchtreife trennen sich die drei Klappen der Fruchtkapsel bis zum Grunde und beginnen dann nach wenigen Augenblicken sich allmählich der Länge nach einzurollen. Dabei greifen sie unter die drei innenliegenden Samen, so daß diese immer mehr aneinander gepreßt werden. Diesem Druck leisten die Samen durch die warzenförmigen Unebenheiten ihrer Schale zunächst Widerstand, aber nur, um nach dessen Überwindung um so heftiger heraus- und fortgeschleudert zu werden. Durch diesen einfachen Mechanismus gelangen die Samen 50—80 cm, ja sogar bis zu 2 m weit von der Mutterpflanze, bei einer Schleuderhöhe bis zu 60 cm. Der ganze Vorgang, vom Aufspringen der Frucht bis zum Ausschleudern, währt etwa 10 Minuten. Im Zusammenhang damit soll der Blütenstiel bis zur Fruchtreife zu wiederholten Malen verschiedene Auf- und Abwärtskrümmungen durchmachen, sowohl eine Verlängerung als auch eine Aufrichtung der fruchttragenden Blütenstiele, damit bei der starken Verzweigung und der großen Zahl der ziemlich gedrängt stehenden Früchte die Samen beim Abschleudern sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Auch die Blumen- und Staubblätter werden bei dieser merkwürdigen Pflanze in besonderer Weise rechtzeitig abgeworfen, um dem Mechanismus nicht störend in den Weg zu treten. Es scheint also, daß *Montia*, wenn sich alle diese Angaben bestätigen (was ein dankbarer Untersuchungsgegenstand für einen Botaniker unserer Richtung wäre), eine mächtige Stütze für die von mir vorgetragene Pflanzenpsychologie ist.

Epidermale Wasserblase eines Eiskrautes (*Mesembryanthemum cristallinum*) im optischen Längsschnitt. Stark vergr. (Nach Haberlandt.)

Schließlich wäre hier noch der Familie der Aizoaceae zu gedenken, die wir allerdings nur ganz kurz streifen können, da es sich auch hier um eine ausschließlich tropisch-subtropische Familie handelt. Den größten Formenreichtum erreicht in ihr die Gattung *Mesembrianthemum*, die der Gärtner sehr wohl als Eis- oder Kristallkräuter kennt, und deren meist fleischiger Wuchs schon von vornherein auf Steppen und Wüsten als ihre Wohnorte verweist. In der Tat sind denn auch die hierhergehörigen 300 Arten von teils wirklich seltsamem Aussehen sehr verbreitete Wüstengewächse in Südafrika und in der ägyptisch-arabischen Wüste bis zu den kanarischen Inseln. Abgesehen von der sehr mannigfachen Art, wie ihre saftigen Blätter ausgebildet sind, treffen wir auch hier besondere Wasserspeicher in Form oberflächlicher Wasserblasen. Dies hat ihnen die Beliebtheit verschafft, deren sie sich erfreuen. Diese kristallenglikernden Kügelchen sind aber nicht die Köpfchen von Haargebilden wie bei Chenopodiaceen, sondern jedes entspricht einer einzelnen Epidermiszelle, die so gewaltig angeschwollen ist (siehe das Bild auf S. 316).

Die Nelkengewächse (Caryophyllaceae).

Nun sind wir bei den eigentlichen Nelkengewächsen. Der Systematiker sagt uns über sie vor allem folgendes: Die Caryophyllaceen stellen in der ganzen Reihe die im Blütenbau am weitesten differenzierte Gruppe dar. Man unterscheidet in dieser Familie hauptsächlich die beiden Gruppen der Silenoideen (wozu die mancherlei Nelkenarten, die wohlbekannten Gattungen *Dianthus*, *Silene*, *Lychnis*, *Melandrium*, ferner das Seifenkraut [*Saponaria*] u. a. gehören) und der Alsineen mit nicht minder häufigen Vertretern als *Miere* (*Stellaria*), *Hornkraut* (*Cerastium*), *Alsine*, *Moehringia* usw. Diese zusammen besiedeln in noch nicht 1000 Arten den ganzen Erdball als ausdauernde Kräuter oder Stauden, unter Umständen, namentlich in wärmeren Gebieten, auch als Sträucher. Der Pflanzenmorphologe rühmt an ihnen verschiedene „ausgezeichnete Merkmale“. So vor allem ihre „dekussierte“ Blattstellung, worunter er versteht, daß die Blätter, die hier sitzend und ungestielt sind, einander paarweise gegenüberstehen, d. h. in den einzelnen Wirteln immer um 90° gegeneinander verschoben sind. Diese gekreuzte Blattstellung wird uns von dem Physiologen erklärt, denn er fand, daß sie den bestmöglichen Lichtgenuß gewähre. Eine weitere Folge dieser Blattstellung ist die gabelige Verzweigung der Nelkengewächse, dadurch zustande kommend, daß die Seitensprosse immer in den Achseln der Laubblätter entspringen. Ferner sind die Sprosse dieser Gewächse durch Anschwellungen des Stengels an den Ansatzpunkten der Blätter mehr oder weniger knotig gegliedert, wofür wir noch keine befriedigende Deutung kennen. Die Wuchsform ist entweder eine aufrechte, wenig verzweigte, so bei *Silene*, oder breitrispig ausgebreitet wie bei dem Gipskraut (*Gypsophila*): Es gibt aber auch kletternd niederliegende Nelkengewächse (*Herniaria*) oder solche, die dichte, niedrige, polsterförmige Rasen bilden wie die alpinen Formen

von Silenoideen, von denen die reizende kleine *Silene acaulis* (Bild S. 320) jedem Alpinisten wohlbekannt ist. Eine Familie, deren Tracht so anpassungsfähig ist, entbehrt natürlich auch nicht der anatomischen Eigenheiten; so ist sie vor allem durch einen Festigungsring in der Rinde ausgezeichnet, der in verschiedener Mächtigkeit bei den Silenoideen am stärksten ausgebildet ist. An diesem Festigungsring, der einen Zentralzylinder umschließt, löst sich — wie Pax von ihm sagt — schon frühzeitig das nach außen grenzende Rindenparenchym los und umgibt den Zentralzylinder schließlich in Gestalt eines locker anliegenden, abgestorbenen Gewebemantels. Solche Stengel scheinen dann völlig tot zu sein, sind aber trotzdem sehr lebendig, wie die Achselprosse beweisen, die sie in der nächsten Vegetationsperiode entwickeln. Diese stehen dann mittels des frischen Achsenzylinders mit dem Wurzelsystem in Verbindung. Aber nicht ihre Anatomie ist das Anziehendste an ihnen, sondern Bau und Leben ihrer Blüten. Wir begegnen hier zum ersten Male der Ausbildung einer doppelten Blütenhülle, d. h. der Scheidung des „Perianths“ in Kelch und Krone. Die Nelke (*Dianthus*) mag dafür als typisches und jedem bekanntes Beispiel dienen. Wir sehen hier ferner die Blumenblätter in ihrem oberen freien Teile als flachen Teller ausgebreitet. Von unten her sind sie geschützt durch die zu einer mehr oder weniger langen, derben, ledrigen Röhre verwachsenen Kelchblätter, deren Zahl sich nach den freien Zipfeln am Rande dieser Röhre beurteilen läßt. Diese Röhre ist häufig noch durch mehr oder weniger starke Rippen gefestigt, in andren Fällen dagegen blasig aufgetrieben. Meist sehr eng, fordert sie auch eine entsprechende Verschmälerung der Kronblätter. Ziehen wir nun vorsichtig ein Kronblatt aus der Röhre heraus, so ergibt sich, daß es in seinem untern Teile (von der Mündung der Kelchröhre an gerechnet) in einen sehr schlanken, zugespitzten Fortsatz ausgezogen ist. Der Botaniker sagt hierzu: Die Kronblätter der Nelfengewächse seien „genagelt“. Dieser schwache Basalteil könnte aber die Kronblätter niemals in aufrechter Lage erhalten. Man öffne nur einmal vorsichtig eine Nelfenblüte durch Aufschlitzen und Entfernen der Kelchröhre, dann wird man sofort bemerken, wie die Kronblätter kraftlos herabsinken. Sie haben ihren Halt also an dem Kelch, der die feinen, duftenden Blumenblätter zusammenhält wie die Papiermanschette die Stengel eines Blumenstraußes. Daher wechselt die „Nagelung“ der Blumenblätter auch nach der Länge des Kelches. Bei den Silenoideen mit ihrer langen Kronröhre sind sie langgenagelt, und die Blüte ist im untern Teil in der charakteristischen Weise zusammengedrückt; der Eingang in den Blütengrund ist hier nur durch eine enge Schlundöffnung möglich. Bei den Alsineen mit ganz kurzer Kelchröhre sind auch die Blumenblätter kurzgenagelt, die ganze Blüte ist ausgebreitet, der Zugang offen. Warum ich diese etwas langweiligen Einzelheiten hier so breitspurig ausbreite? Weil ein enger Zusammenhang zwischen diesen Blütenformen und den die Bestäubung vermittelnden Insekten besteht, ohne den wir das Leben der Nelfenblüte nicht richtig beurteilen könnten.

Sehen wir uns daher auch das Innere der Blüten näher an! Innerhalb der Kelchröhre finden sich die in zwei Kreisen zu je fünf verteilten Staubgefäße, in der Mitte schließlich bei der *Dianthus* aus zwei Fruchtblättern bestehende Fruchtknoten, deren Narben so wie die Staubgefäße zur Zeit der Geschlechtsreife über die Mündung der Blütenröhre herausragen.

Wie haben wir nun diesen Blütenbau biologisch zu verstehen? Und wie haben wir ihn entwicklungsgeschichtlich zu deuten? Denn auch das ist ein Problem, das hier nach dem großen Sprunge von den Chenopodiaceen zu den Nelkengewächsen sich besonders auffällig vor Augen stellt. Wenn auch die Verwandtschaft der bisher erwähnten Familie mit den Karyophyllaceen, wie schon erwähnt, durch den charakteristischen Samenbau unzweifelhaft erwiesen wird, so ist es doch höchst unbegreiflich, woher diese nun auf einmal eine doppelte Blütenhülle besitzen.

Es erscheint, wenn wir uns solchen Gedanken hingeben, vor allem folgendes klar: Da das einfache Perianth aus 5 Blättern besteht, und diese Zahl sich im Kelche der Karyophyllaceen wiederholt, so muß dieser mit jenen als homolog zu setzen sein, so daß also nur die Krone neu hinzugekommen zu sein scheint. Es gibt nun Botaniker, die behaupten, daß die Krone der Nelke aus verwandelten Staubblättern abzuleiten sei. Und zu ihren Gunsten spricht, daß die Nelken stets zu einer solchen Umwandlung der Staubgefäße in Korollenblätter Neigung besitzen. Dies wird durch die vielen gefüllten Kulturformen der Nelke bezeugt. Auch das spricht zugunsten einer derartigen Ableitung, daß manche Familien der Centrospermae mit einer viel größeren Zahl von Staubgefäßen versehen sind als die Nelken, so daß sich aus ihnen recht wohl die Karyophyllaceenblüte entwickelt haben könnte. Nicht weniger interessant als dieser Einblick in die Geschichte der Blütenwerdung ist auch die Biologie der Nelkenblüte. Wir haben in der zweigestaltigen Blütenhülle jedenfalls eine höhere Form der Anpassung an die Insektenbestäubung zu erblicken, nämlich einen Schauapparat, wozu hier noch die bereits erwähnten gegenseitigen Beziehungen zwischen der Gestalt des Kelches und der Krone hinzukommen. Es ist kein Zweifel daran möglich, daß die Nelken mit ihrer hochgeschlossenen Röhre ganz hervorragend bestimmten Bestäubern angepaßt sind. Der Honig wird nämlich innerhalb dieser Röhre, am Grunde der Blüte, ausgeschieden; es ist also klar, daß bei der engen Mündung der Blüte nur langrüsselige Insekten zum Nektar gelangen können. Mit andren Worten, die Nelken sind Falterblumen an sich. Vergleichen wir damit die kurzen, offenen, dabei häufig mehr oder weniger unscheinbaren Blüten der Urtinoiden, so läßt sich daraus ohne weiteres auf eine viel größere Gastfreundschaft schließen, denn ihr offener Honig muß zweifelsohne mancherlei Insekten zugänglich sein. Und in der Tat überwiegen hier nach Hermann Müller auch die Fliegen und Bienen als Besucher. Bei den Silenoideen mit ihren geschlossenen Kelchen und zugleich sinnenfälligeren Blüten hingegen sind wieder die kurzrüsseligen Insekten ausgeschlossen; Schmetterlinge und Bienen besorgen hier die Übermittlung, abgesehen von solchen Insekten, die dem Pollen der hervorragenden Staubbeutel nachstellen. Bei der eigentlichen Nelke und dem Seifenkraut, bei denen der Honig noch mehr vertieft in der Blüte sich vorfindet, werden nun auch die Bienen vom Besuche ausgeschlossen und nur noch die Schmetterlinge zugelassen. Es zeigt sich demnach in der Familie der Karyophyllaceen auf das deutlichste der stufenweise Übergang von offenen, unscheinbaren, geruchlosen Blüten mit allgemein zugänglichem Honig und einem sehr gemischten Besucherkreise, der hauptsächlich aus Dipteren besteht, zu röhrenförmigen Blumenbildungen mit tief geborgenem Honig und einem beschränkten Besucherkreise mit immer mehr vorwiegender Beteiligung der Schmetterlinge, gleichzeitig damit immer entschiedenerer Ausprägung von Wohlgeruch, auffälliger Blumenfarbe,

feiner Zeichnung um den Blüteneingang und zierlicher Verschlingung des Blütenumrisses. Deshalb konnten wir mit gutem Rechte sagen, sie seien das klassische Beispiel für die Anpassung der Blüten an ihre Besucher.

Eine besonders interessante biologische Eigenheit weisen die alpinen Silenoideen auf. Diese Blumen sind speziell dem Falterbesuche angepaßt. Den Schlüssel hierzu

Polster von *Silene acaulis* im Hochgebirge.
(Originalaufnahme von P. Wolff-Bischheim.)

liefert die Tatsache, daß sich die alpine Insektenwelt durch besonderen Reichtum an Faltern auszeichnet. G. Müller sagt hierüber in seinem schönen Werke: „Der große Falterreichtum der Alpen spricht sich wie bei den Orchideen, so auch bei den Karyophyllazeen nicht bloß darin aus, daß eine verhältnismäßig große Zahl ihrer die Alpen bewohnenden Arten Falterblumen sind, sondern auch in dem außerordentlich reichen Falterbesuche, der einzelnen derselben (besonders *Saponaria ocymoides* und *Silene acaulis*) zuteil wird. Gleichwohl vermag die einzige *Macroglossa stellatarum* (Taubenschwanz) mit ihrer staunenswerten Leistung im Blumentkreuzen (bei *Dianthus silvestris* und *superbus*) das ganze Heer der Tagfalter aus dem Felde zu schlagen.“ Dieser auch bei Tage und selbst im

brennenden Sonnenscheine fliegende Schwärmer, „der mit unübertroffener Behendigkeit in wenigen Minuten Hunderte von langröhrigen Blumen auszusaugen und zu kreuzen pfllegt“, ist mit seinem 25—28 mm langen Rüssel nach den Beobachtungen Müllers unter den auf den Alpen Blumen besuchenden Schmetterlingen einzig und allein imstande, den bei den genannten *Dianthus*-Arten 20—25 mm tief verborgenen Honig auszubeuten, während unter den Tagfaltern höchstens der Schwalbenschwanz mit 18—20 mm Rüssellänge gerade noch nippen könnte. Wie nun dieser Tagsschwärmer dazu kam, die Konkurrenz mit den vorberechtigten Faltern aufzunehmen, ist allerdings

eine noch der Antwort harrende Frage; ebenso ist es ein schwieriges entwicklungs- geschichtliches und ökologisches Problem, wie sich diese Nelkenarten gerade diesem einen Schmetterling, der eigentlich gar nicht zu ihrem Besucher- kreis gehört, anpassen. Mit dem „Zufall“, der da gelegentlich eingesetzt und der Selektion Material geliefert hätte, ist schon aus dem einen Grunde nichts anzufangen, weil diese Blumen auf Fremdbestäubung direkt angewiesen sind. Sie müßten also längst ausgestorben sein, wenn sie erst auf einen günstigen Zufall hätten warten müssen, um ihren einzigen Bestäuber zu finden. G. Müller spricht allerdings von einer Züchtung der Röhrenlänge durch den Taubenschwanz, aber gerade er hebt hervor, daß die Geschlechterverteilung und die Entwicklungsfolge der Geschlechtsorgane bei *D. silvestris* und der alpinen Prachtnelke (*D. superbus*) mit Bestimmtheit auf eine gesicherte Kreuzung hinweisen. *D. superbus* tritt in zweierlei Stöcken auf, in groß- hülligen, zwittrblütigen, die so ausgeprägt proterandrisch sind, daß Selbstbestäubung ausgeschlossen erscheint, und in vielmal selteneren kleinhülligen, rein weiblichen! Wir stehen hier also derzeit noch vor einem Rätsel, und bloß so viel ist uns sicher, daß es nur mit der näheren Erkenntnis der Aktivität der Pflanze zu lösen sein wird.

Die merkwürdige Übereinstimmung zwischen dem Reichtum der Alpen an Schmet- terlingen und an falterblumigen Karyophyllazeen rollt notwendigerweise aber auch noch andere Fragen der alpinen Blütenbiologie auf, wie sie bereits Dr. A. Günthart in E. Schröters ausgezeichnetem Werke über „Das Pflanzenleben der Alpen“ er- örtert hat. Es handelt sich hierbei um folgendes: Hermann Müller hatte bekannt- lich auf Grund der Beziehungen zwischen den verschiedenen Bestäubern und den ihnen angepaßten Blumen eine Reihe von Blumenkategorien unter den Insektenblütlern aufgestellt, die von Löw später als „allotrope“, d. h. solche, die noch allseitig, nicht einem spezielleren Besucherkreis angepaßt sind, „hemitrope“, die halb angepaßt sind, und „eutrope“, einseitig, ganz bestimmten Bestäubern angepaßte Blumen unterschieden wurden. Ein solcher Schematismus ist nicht so überflüssig, wie es im ersten Augen- blick den Anschein hat. Denn blütenstatistische Betrachtungen gewinnen durch diese übersichtliche Vereinfachung bedeutend an Klarheit.

Wenn hier nun auch an ergänzenden Beobachtungen und gewissenhaften Re- gistrierungen noch manches nachzutragen ist, so dürfte doch schon so viel sicher sein, daß eine enge Beziehung zwischen der Verbreitung der Blumenkategorien und der- jenigen der Bestäuber besteht oder wenigstens in mancher Hinsicht bestehen kann. Aber ich brauche das Wie? und Warum? dieser Frage nicht zu erörtern, da meine Leser in Bd. II auf S. 508 alles das bereits gefunden haben, was sich darüber sagen läßt.

Sie wissen auch bereits, daß sich alle Nachtfalterblumen der Lebensweise ihrer Besucher anpassen. Denn sie blühen nur des Abends auf und duften dann stark. Als Anpassung muß es auch gelten, daß ihre Blüten stets hell, meist sogar schneeweiß gefärbt sind. Das hat seinen guten Nutzen, da blaue und auch rote Farben, selbst wenn sie am Tage intensiv leuchtend erscheinen, im Dämmerlicht oder im Dunkel der Nacht sehr bald verschwinden. Weiße Blüten dagegen sind gerade dann weithin bemerkbar und reflek- tieren selbst in schwachem Grade vorhandenes zerstreutes Licht noch ausgiebig. Als Typus solcher Nachtfalterblumen haben uns nun einige Silenoiden zu gelten, z. B.

Melandryum rubrum, *Silene nutans* oder *Silene inflata*. (Gingegen ist das rotblühende *Melandryum rubrum* merkwürdigerweise eine Tagfalterblume!) Bei dem nickenden Leimkraut (*Silene nutans*) entfaltet sich nach Kerner jede Blüte drei Nächte hindurch und schließt sich jeden Morgen. In der ersten Nacht öffnen sich hierbei die Staubgefäße des äußeren Kreises, in der zweiten Nacht die des inneren, in der dritten endlich auch die Narben. Sie locken damit jene Nachtfalter an, die der Insektenkundige als Eulen bezeichnet; doch liegen Nachrichten vor, daß an diese Blüten auch bei Tage Tagfalter, Hummeln und Wollschweber herankommen. Es wäre interessant,

darüber nähere Beobachtungen anzustellen, da es von vornherein nicht recht einzusehen ist, wie sie bei den geschlossenen Blüten ihr Glück versuchen. Möglicherweise sind diese Besucher bloße Honigräuber.

Gerade bei so ausgesprochen eutropen Blumen, wie es die Nelken sind, werden solche ungebetene Gäste, die auf Honigraub ausgehen, ohne gleichzeitig das Bestäubungsgeschäft zu vollziehen, besonders gefährlich. Der Honig liegt hier überall am Grunde der Kelchröhre; was

Silene nutans in Tag- und Nachtstellung.
(Originalaufnahme von Prof. Dr. D. Heinemann.)

kann also für ein mit kräftigen Mundwerkzeugen versehenes Insekt lohnender sein, als diese Kelchröhre am Grunde anzubeißen und sich schnöderweise mit dem Raube aus dem Staub zu machen? Hier lag offenbar ein Schutzbedürfnis vor, und es ist sehr vielversprechend, daß es die Nelken wirklich „gelernt“ haben, sich gegen derartige Räuber noch dazu in mehr als einer Weise zu schützen. Es ist schon die geschlossene Kelchröhre an sich in vielen Fällen ein genügendes Schutzmittel, und wenn dann der Kelch außerdem noch derbledrig gebaut ist wie bei den *Dianthus*-Arten, bedarf es keiner weiteren Maßregeln. In anderen Fällen schützt der Umfang der Kelchröhre. Sie wird blasig aufgetrieben und erschwert dadurch den Dieben das Eindringen. Eine besonders interessante derartige Einrichtung findet sich

bei der Platschnelle (*Silene inflata*). Besonders gefährlich werden als Räuber die Ameisen, die mit ihren scharfen Zangen kräftig zugreifen. Gegen diese und andre aufkriechende Schädlinge schützen sich einige Sileneen durch Anlegung von Leimringen, die den Zugang zu der Blütenregion völlig absperren. Die Pechnelke (*Lychnis Viscaria*, auch *Viscaria vulgaris* genannt) und ihre Verwandten (*Silene nutans*, *viscosa*, *muscipula*), dann auch *Alsine viscosa* sind jedem Floristen wohlbekannte Beispiele hierfür. Dieses Schutzmittel funktioniert ausgezeichnet, denn die Abspernung ist eine vollständige; und wer eine Pechnelke angreift, dem wird es klar, daß sie wenigstens für aufkriechende Insekten unüberschreitbar sein muß. Kleine Insekten, die an diesen Unglücksstellen anfliegen, büßen für diesen Wagemut sogar mit dem Leben, und man kann auf diesen Leimspindeln oft massenhaft gefangene Opfer finden, wie auf unserem Bildchen ersichtlich. Daß es dabei nicht nur fürwitzigen Ameisen an den Kragen geht, beweisen die Untersuchungen Kerner's, der an *Silene nutans* allein über 60 Arten von Insekten, nämlich 10 Arten von Ameisen, 15 kleine Hymenopteren, 6 Käfer, 1 Wanze, mehrere Blattläuse, 1 Zikade und über 22 Fliegen, fand.

Stengel von Pechnelken (*Lychnis Viscaria*) mit gefangenen Insekten.
(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Heineke-Wien.)

Unsere heimischen Nelfengewächse sind geradezu unererschöpflich an derartigen biologischen Eigenheiten. Dies zeigt sich auch schließlich bei ihren Fortpflanzungsverhältnissen. Es wurde z. B. bereits erwähnt, daß sich unter ihnen auch Trennung der Geschlechter vorfindet. Das ist eine Erscheinung, die entweder auf Windblütigkeit oder durchaus gesicherte Vermittlung der Bestäubung durch Insekten deutet. Eine solche gibt es aber nur bei den eutropen Silenoiden, und demgemäß finden wir auch bei *Silene acaulis*, dieser reizenden Gebirgspolsterpflanze, oder *S. inflata* die merkwürdige Triözie, über die ich in Bd. II, S. 497 das Nötige nachzulesen bitte, um hier nicht in Wiederholungen zu verfallen.

Bei den Alsineen mit ihren einfach weißen, wenig auffälligen Blüten mit offenem Honig stellen sich als Besucher vor allem kurzrüßelige Fliegen ein. Bei reichlichem Insektenbesuch ist es vielfach zur Ausbildung kleinblütiger weiblicher Stöcke gekommen, wie bei dem bekannten Hornkraut (*Cerastium arvense*) der Felder oder der Miere (*Stellaria graminea*), und in seltenen Fällen hat schwacher Insektenbesuch sogar zur Ausbildung kleistogamer, sich selbst befruchtender Blüten geführt.

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch die Frucht der Melkengewächse. Sie ist meist eine sich mit Zähnen öffnende Kapsel, doch kommen auch trockene Schließfrüchte (bei den Paronidhieen) oder sogar Beerenfrüchte (bei *Cuccubalus*) vor. Die darin eingeschlossenen, sehr zahlreichen Samen sind so klein und leicht, daß sie sehr leicht verschleppt werden können. Es mag uns daher nicht wundernehmen, daß gerade diese

Mieren (*Stellaria graminea*.) (Naturaufnahme von P. Wolff-Bischheim.)

Gruppe so viele Allweltsbewohner zählt, von denen einzelne, so die Kornrade oder die Vogelmiere, sogar durch den Menschen unabsichtlich weiter verbreitet werden.

Nur die Formen aus der Gruppe der Silenoideen haben einigermaßen beschränkte Verbreitung. Sie gehören vorwiegend der nördlichen gemäßigten Zone an und haben ihr eigentliches Verbreitungszentrum im Mittelmeergebiet, das sich sowohl durch erhöhte Artenzahl als auch durch streng endemische Gattungen kennzeichnet. Aber auch sie wurden dann mit Hilfe der Kulturpflanzen, unter denen sie als Unkraut wuchern, verschleppt, und zwar, wie die Funde von Samen der *Silene linicola* in den Kulturen der Pfahlbauern von Nobenhausen lehren, schon in vorgeschichtlichen Zeiten! Aber noch weiter als sie gelangte die Lichtnelke (*Melandryum*), die jetzt

in Sibirien ihr Hauptgebiet erlangt hat. Sonst ist das arktische Gebiet ja verhältnismäßig arm an Silenoideen, was sich aus dem über die Verbreitung der Schmetterlinge Bekannten hinreichend erklärt. Die Alsinoideen sind wieder mehr kosmopolitisch. Als solche gelten: *Stellaria*, *Cerastium*, *Alsine*, *Arenaria* u. a., die auf der ganzen Erde blühen. Besonders die Vogelmiere (*Stellaria media*) ist ein ausgesprochener Kosmopolit.

Andere *Alsineen* gehören zur Ruderalsflora und teilen dann die Schicksale der *Chenopodiaceen*. Einige besondere Worte verdient, bevor wir dieses Kapitel schließen, die Kornrade (*Agrostemma Githago*). Wer kennt sie nicht, dieses seltsame Unkraut der Getreidefelder, mit seinem durch sehr verlängerte Blattzipfel auffälligen Kelch und den violett-weißen Blüten? Aber da die Samen der Rade eine schädliche Beimengung der Getreidefrucht bilden, ist sie bei den Landwirten weniger beliebt als bei dem wandernden Naturfreunde. Ihre Heimat ist merkwürdigerweise unbekannt; man vermutet, daß sie von den Mittelmeerländern, wo auch die zweite Art (*A. gracilis*) vorkommt, zu uns gewandert sei. Jetzt ist sie in ganz Europa, im gemäßigten Asien, in Amerika, in Australien so gut wie in Neuseeland zuhause, aber überall nur im Kulturland und verschleppt durch den Menschen.

Von ihrer Biologie erzählt uns Höck eine merkwürdige Tatsache. Er sagt: „Gelangten Samen dieser Art unverletzt auf einen Acker, so vermögen die Keimblätter nicht nur wie bei der Vogel-Sternmiere den Keimling durch Zusammenklappen zu schützen, sondern sie führen ihm auch zuerst Nährstoffe aus dem Samen zu, um hernach selbst zu ergrünen und als erste Laubblätter zu dienen. Frost tötet die Keime nicht, sondern hält nur ihre Entwicklung auf. Es kann daher der im Herbst entstehende Keim auch den Winter überdauern.“

Kornrade (*Agrostemma Githago* L.).
(Nach einer Zeichnung von R. Deffinger.)

Von unserer Gartennelke, über die unsere Botaniker merkwürdigerweise nicht im reinen sind, ob sie 70 oder 230 Arten unterscheiden sollen, so sehr liegt ihre Systematik im argen, haben wir bereits das Ökologische dermaßen in unserer allgemeinen Übersicht erschöpft, daß wir nur noch das Kulturgeschichtliche und Gärtnerische dieser Lieblingsblume so vieler Menschen nachzutragen haben. Unsere Gartennelke (*D. Caryophyllus* L.) hat ihre wahre Heimat in der Grassur Italiens und Dalmatiens und lebt dort auch noch wild als ähnlicher Schmuck der trockenen Tristen, wie unsere typischen Kiefern begleitenden Sandnelken (*Dianthus Carthusianorum* L.) oder die

Stein- oder Heidenelle (*D. deltoides* L.) der trockenen Graslandschaft. Aus ihrem Verwandten, der Bartnelle (*D. barbatus* L.) Südeuropas, hat man nicht weniger Varietäten gezüchtet als aus der echten Nelfe, von der nach dem Weißmantelfchen Nelkensystem jetzt fast ebensoviel Formen unterschieden werden, wie von den Tulpen. Da gibt es Konfordinen, Pikotten, Klameusen und Feuerfagen, Salamander und Du-

Gruppe von Prachtnellen (*Dianthus superbus*).
(Naturaufnahme von P. Wolff-Bischheim.)

bletten, Bizarden und Einfarbige, Einmalblühende und Remontanten für das Beet und das Zimmer. Unter Umständen wurden für neue Farben sogar nicht viel geringere Preise bezahlt wie für Orchideen.*

Der Gärtner gibt ihnen mit Vorliebe einen mit verrottetem Dünger untermengten Lehm Boden und sonnigen Standort und weiß es zu schätzen, daß sie so wenig Pflege, sogar nur wenig Gießen bedürfen. Viele Arten braucht man nicht einmal im Winter zuzudecken.

Als Zimmerpflanzen lieben sie neue Töpfe mit gutem Wasserabzug, ab und zu einen Dungguß und gute, mit Lehm vermengte Lauberde. Dazu hellen Stand vor dem Fenster, aber nicht zuviel Sonne. Im Winter halten sie sich bei häufigem Lüften gut in einem kühlen Zimmer.

Wie herrlich wären aber erst unsere Nelkenstöcke, wenn es gelänge, die Prachtnellen (*D. superbus* L.) des Gebirges im Zimmer heimisch zu machen, diese entzückend geformten, großen, zerschligten Blüten, die ein besonderer Schmuck der Waldränder im Gebirge sind und mit den Alpennellen (*D. alpinus* L.) auch auf felsige und graßige Abhänge emporsteigen. Eine ihrer Schwestern scheut sogar die Nähe des Eises nicht und schmückt als Gletschnelle (*D. glacialis* Hænke) unsere höchsten Bergzinnen.

* Für die amerikanische Dunkelrosanellenneuheit „The Mrs. Lawson“ wurden nach der „Gartenwelt“ angeblich 6000 Pfund = 120 000 Mark bezahlt.

Neben ihnen nehmen auch manche der 300 *Silene*-Arten teil an dem Schmuck der Alpenflur, so vor allem die überaus reizende *Silene acaulis* L., das Steinkraut der Schweizer, das in dichten, rasenförmigen Polstern (siehe die Farbentafel in Bd. II, S. 528) bis zu 3600 m Höhe besonders auf Kalk entzückende Blumensträucher ins Gefilde der Hochwiesen sticht.

Neben ihr wären als verbreitetste und bekannteste, ausgesprochen alpine Vertreter der Familie noch zu nennen: *Dianthus alpinus*, *glacialis* und *neglectus*, *Viscaria alpina*, ferner die reizende *Hohenwarthia Pumilio* und das Alpen-

Verühmte englische Topfnellen, von Ch. Turner in Slough.

gipskraut (*Gypsophila repens*), das eine ausgesprochene Geröllpflanze, ja geradezu ein „Schuttdecker“ ist, der mit einer kräftigen Pfahlwurzel tief in den Grus eindringt. Vom Kopfe dieser Wurzel entspringen eine Menge parallel gestreckter, beblätterter Zweige, die sich ebenfalls festwurzeln und später, nach dem Abfallen der Blätter, zu Rhizomästen werden. Auf diese Weise besiedelt die Pflanze allmählich auch den unwirtlichsten Schutt und schroffe Felsen. Von den niederliegenden Zweigen erheben sich aufrechte, mit bläulich schimmernden Blättern besetzte Zweige, die in einen lockeren Blütenstand rötlich-weißer Blüten übergehen. Und dieses wunderbare Pflänzchen kommt mit dem abgeschwemmten Kies weit, selbst in die Ebenen herab, steigt aber auch sehr hoch. In den Alpen bringt es stellenweise bis gegen 3000 m, im Himalaja sogar bis zu 5000 m vor!

Von den übrigen Vertretern der Familie ist nicht viel zu sagen. Einer davon, der Sperk (*Spergula arvensis*), wird auf Sandboden seit uralten Zeiten als Futterpflanze gebaut, die andern sind mehr oder minder harmlose Unkräuter oder Alpenpflanzen.

Die Wasserrosen (Nymphaeaceae).

Wohl die prächtigsten Bewohner unserer Gewässer, insbesondere aber der südländischen Seen, Teiche und Ströme sind die Wasserrosen, die Familie der Nymphaeaceen. Sie sind ein uraltes Geschlecht, das nicht nur in sehr weit zurückliegenden, geologischen Epochen schon vertreten war, sondern dort geradezu einen längst überschrittenen Höhepunkt der Entwicklung gehabt haben muß. „In jener Erdperiode“, sagt hierüber

Gelbe Wasserrosen (*Nuphar luteum*) in einem Weiher der Lobau bei Wien.
(Naturaufnahme von Frä. A. Mayer-Wien.)

Henkel, „welche der Eiszeit vorausging, als Europa bis zum 51. Breitengrade mit subtropischem Wald bedeckt war, wo auf den Höhen des Taunus, des Westerwalbes, des Odenwalbes und auf den Hügeln der deutschen Mittelgebirge anstatt dunkler Tannen das duftende helle Grün von Zimt- und Kampferbäumen zwischen Palmen gedieh, da schmückten die Nymphaeaceen mit doppelt so großen Blumen, wie wir sie heute aus den Tropen kennen, die stillen Gewässer der Täler.“ Von diesem einst so prächtigen Wasserrosensflor geben uns die heute noch vorkommenden, wenigen europäischen Arten nur ein ganz blasses Bild. Ein ausgezeichnete Kenner der untergegangenen Pflanzen,

Prof. Saprota, schrieb hierüber einst sehr anschaulich: „Man muß nach den Savannen von Guyana oder an die Lagunen von Indien und China gehen, um auch dann erst abgeschwächte Beispiele von dem zu finden, was in Europa in der oligozänen Zeit die Seelilien waren. Nicht allein *Nelumbium Buchii* Ett. vom Monte Promina und die Fragmente von Wurzelstöcken, welche Heer auf der Insel Wight beobachtete, bezeugen die Gegenwart von europäischen oligozänen Lotosblumen. Die eigentlichen Nymphäazeen (*Nymphaea parvula* Sap., *N. Charpentieri* Mr.) beweisen nicht allein die Existenz von Pflanzen, doppelt so groß als unsere weiße Seelilie (*Nymphaea alba*); es gab auch in dem damaligen Europa Gattungen oder Sektionen von Gattungen, die heute ausgestorben sind, und deren Charaktere wir nur in sehr unvollkommener Weise analysieren können, die sich aber hinlänglich von unseren heutigen Arten unterscheiden, um uns glauben zu lassen, daß ihre Blumen uns überraschen und unsere Bewunderung erregen würden, wenn es uns möglich wäre, sie zu betrachten.“

Lieblieh muten uns die bescheidenen Seerosen unserer Teiche an — aber man muß wohl die Pracht des indischen Lotos, die großen, leuchtenden Blumen auf dem dunklen Wasserspiegel, gesehen haben, um zu begreifen, wie diese Erscheinung auf den Naturmenschen den Eindruck des Geheimnisvollen ausüben konnte bis zu jener Steigerung der Einbildungskraft, die in ihnen etwas Heiliges verehren ließ und die Wasserrose zur Blume der Tempel und des Götterkultes machte! Freilich gewannen ihnen auch der praktische Sinn und die Notdurft des Lebens etwas ab, nicht bloß dichterische Phantasie. In den Tropen liefern sie mehrlreiche Rhizome und manche der Samen seit Jahrtausenden wichtige Nahrung; das stärkereiche Rhizom des indischen Lotos bildet in Japan das tägliche Nahrungsmittel der ärmeren Klassen, und die eßbaren Samen dieser Pflanze waren schon im Altertum geschätzt als „pythagoreische Bohnen“. Diese Wertschätzung führte auch zur Ausrottung der Pflanze in Ägypten, wo sie früher reichlich vorkam; wenigstens kommt mir dies wahrscheinlicher vor als die mehrfach behauptete Verschlechterung des Klimas. In den Gärten Ägyptens und selbst des mittleren Italiens gedeiht und fruchtet der indische Lotos noch heutzutage, und der weiße und blaue Lotos der Ägypter, der viel mehr Wärme beansprucht als der indische, gedeiht heute noch dort in allen Kanälen. Aber wie sollte sich eine Pflanze erhalten in Ländern, wo keine abergläubische Verehrung und kein Naturfönn sie schützte, während die Wurzeln und die wenigen Samen stets den Forderungen des Magens zum Opfer fallen? Etwas von dieser praktischen „Verehrung“ ging übrigens auch auf unsere Vorfahren über; bei ihnen war der gerbstoffreiche Wurzelstock der weißen Wasserrose (*Nymphaea alba*) ein altes Heilmittel; wenigstens fand man von ihm Reste sogar in den Pfahlbauten der Schweiz.

Man unterscheidet in der Familie drei Untergruppen: *Nelumboideae* mit 2 Arten von *Nelumbo*, *Cabomboideae* mit 4 Arten von *Cabomba* und einer von *Brasenia*, *Nymphaeoidae* mit 33 Arten von *Nymphaea*, 7 von *Nuphar*, 3 von *Victoria*, 3 von *Barklaya* und 1 von *Euryale*. Es gehen jedoch hinsichtlich dieser Arten, neben denen es noch eine Reihe von Kulturvarietäten gibt, die Ansichten noch vielfach auseinander. So führt Henkel in seinem bereits erwähnten, prächtig ausgestatteten „Buch der Nymphäazeen“ auf Grund umfassender neuerer Studien allein 45 Arten unserer heimischen Wasserrose an.

Für alle Pflanzen aus dieser Familie sind die einzeln stehenden, meist großen, häufig sehr großen Blüten, mit zahlreichen, rein weißen oder mehr oder minder lebhaft gefärbten Blumenblättern kennzeichnend, die wir so wohl von unseren Weibern her kennen. Im einzelnen weicht jedoch dieser Bau der Blüten bei den verschiedenen Gattungen ab. Doch sind die Staubblätter stets in großer Zahl, mitunter in allen Übergangsstadien zu Blumenblättern vorhanden, was als Paradebeispiel dafür gilt, daß diese von den Staubblättern abzuleiten sind. Man darf jedoch nur die Blumenblätter als umgewandelte Staubblätter auffassen, während der hier bald vier-, bald fünfzählige Kelch als die umgewandelte, ursprünglich einfache Blütenhülle zu deuten ist. Die in größerer Zahl vorhandenen Fruchtblätter dagegen sind weniger umgebildet; sie sind zu einem mehr oder weniger oberständigen Fruchtknoten zusammengewachsen; aber in manchen Fällen tritt auch hier etwas Neues hinzu, denn es beteiligt sich auch die anschwellende Achse des Blütenbodens unter Umständen an der Fruchtbildung.

Die Nymphäazeen sind durchweg krautige Gewächse und besitzen einen mehr oder weniger knolligen oder verzweigten Wurzelstock. Dieser nach und nach sich bildende Stamm hat nun je nach den Gattungen eine verschiedenartige Beschaffenheit. In einem Fall ist er ein senkrecht, dickes, kurzes, dicht mit Blatt- und Blütenstielen besetztes, wenige Jahre lebendes, unverkorktes Rhizom, so z. B. bei der allbekannten, riesigen *Victoria regia*, oder einjährig, so bei *Euryale*, oder schließlich knollig, verkorkt, ausdauernd, wie dies bei den tropischen und subtropischen *Nymphaea*-Arten der Fall ist, die damit imstande sind, dürre Zeiten zu überstehen. Schließlich gibt es auch ausdauernde, aber verzweigte und unverkorkte Wurzelstöcke bei den *Nymphaea*- und *Nuphar*-Arten der gemäßigten und nördlichen Zonen. Diese Verhältnisse erklären sich von selbst, wenn man bedenkt, daß die Wurzelstockbildung ein Schutzmittel gegen Trockenheit ist. Auch die Blattbildung ist sehr charakteristisch, vor allem schon durch die großen, flach ausgebreiteten Schwimmblätter, mit denen z. B. selbst unsere Nymphäen weite Wasserstrecken fast vollständig zu bedecken vermögen. Manche dieser Wasserrosen bilden normalerweise Luftblätter, die über den Wasserspiegel treten, z. B. der dichterisch verherrlichte *Nelumbo*; bei andern (*Nymphaea* und *Nuphar*) geschieht dies aber nur bei niedrigem Wasserstand oder bei Kultur auf feuchtem Standorte. Bei manchen Arten ist eine ausgeprägte Zwiegestalt der Blätter vorhanden, indem entweder überhaupt zweierlei Blätter von ausgesprochen verschiedener Beschaffenheit gebildet werden, wie z. B. bei *Cabomba* mit ihren fein zerteilten, an die Wasser-*ranunkeln* erinnernden Wasserblättern und den ganzrandigen, schildförmigen Schwimmblättern. Oder es gehen (wie bei den Nymphäen) in der jugendlichen Entwicklung dünne, hellgrüne, bandförmige oder wenigstens bedeutend länglichere Blätter den späteren Luftblättern voraus. Bei der gelben Seerose (*Nuphar luteum*) und ihren Verwandten bilden sich jedoch jederzeit solche untergetauchte Wasserblätter, die stets viel weicher und durchscheinender sind als die Schwimmblätter, dazu kraus gefaltet und mit schleimbildenden Haaren bedeckt. Diese Schleimbildung ist nicht ohne ökologischen Nutzen, denn durch sie wird die Reibung in fließendem Wasser bedeutend abgeschwächt. In klaren Bächen mit schnell fließendem Wasser läßt sich sogar beobachten, daß *Nuphar* zuweilen überhaupt keine Luftblätter mehr bildet. Das kann auch dann der Fall sein, wenn das Wasser sehr seicht ist. Merkwürdigerweise wirkt sehr tiefes

Wasser ganz ähnlich, denn auch hier kann die Ausbildung der Schwimmblätter unterbleiben. Maciborski hat angegeben, daß *Nuphar* keine Schwimmblätter bildet, wenn die Temperatur des Wassers nicht mindestens 10° C erreicht. Wir hätten hier also drei verschiedene Außenweltfaktoren, die dieselbe Reaktion der Pflanze auslösen. In zwei Fällen ist der biologische Nutzen ohne weiteres offenkundig, denn in rasch fließendem Wasser würden die Luftblätter verletzt und abgerissen, sie könnten überhaupt nicht ungestört funktionieren. Auch das sehen wir leicht ein, daß kaltes Wasser hemmend wirkt; mindestens ist es nicht unbegreiflich, daß sich die Pflanze mit Rücksicht auf den Zusammenhang mit der Jahreszeit an eine bestimmte Temperatur für die Ausbildung der Schwimmblätter gewöhnt habe. Warum trachtet aber die Pflanze bei sehr tiefem Wasser nicht erst recht, an die Oberfläche und damit ans Licht zu kommen? Wir wissen es nicht. Vielleicht war hier der Umstand maßgebend, daß es bei größerer Tiefe in den tieferen Schichten nicht zu solcher Erwärmung des Wassers kommt, daß dadurch die Schwimmblattbildung ausgelöst wird. Man müßte das erst experimentell prüfen. Die meist übersehene, untergetauchte Blattform ist bei *Nuphar* sogar die häufigere, und es wird angegeben, daß diese Blattform unter der Eisdecke bis in den Januar dauert und schon im März-April wieder erscheint.

Von besonderem biologischen Interesse ist auch die Beziehung zwischen der Beschaffenheit der Blattspreite und dem Wachstum der Stiele. Bekanntlich haben die Blätter und natürlich auch die Blüten der Wasserrosen im tieferen Wasser lange und außerordentlich biegsame und schmiegsame Stiele, die durch ihre Nachgiebigkeit ein Losreißen der Blätter bei bewegtem Wasser verhindern. Goebel sagt hierüber bezüglich *Nuphar* folgendes: „Schon frühe (nämlich am Vegetationspunkt) wird bestimmt, welche Anlage zum Schwimmblatt, welche zum Wasserblatt sich ausbildet. Das letztere erreicht nie den Wasserspiegel, es vertrocknet an der Luft sehr rasch, und das erstere sucht durch Verlängerung seines Stieles denselben zu gewinnen, behält aber seine Eigenschaften auch bei, wenn es in zu tiefem Wasser nicht an die Oberfläche gelangen kann. Die Wachstumsverhältnisse des Stieles stehen also mit der Spreite in innigem Zusammenhang.“ Nach dieser Auffassung möchte es scheinen, als ob es sich in allen derartigen Fällen um eine direkte Einwirkung des Mediums handle. Dies scheint uns aber nicht der Fall zu sein. Wir stehen vielmehr auf dem Standpunkt, daß hier eine Beeinflussung des embryonalen Gewebes des Vegetationspunktes vorliege, der auf eine plötzliche Veränderung natürlich nicht so rasch reagieren kann.

Nelumbium entwickelt stets typische Luftblätter. Diese sind im Anfang eingerollt und oben spitz, so daß sie imstande sind, durch die eigenen Schwimmblätter oder solche anderer Wasserpflanzen (selbst durch die mächtigen von *Victoria regia*!) hindurchzuwachsen und so an die Luft zu kommen, was bei der dichten Lage, in der diese Blätter oft die Wasserfläche bedecken, sehr wichtig ist. Stets sind aber alle Schwimm- und Luftblätter der Wasserrosen durch glatte Oberfläche und daher häufig infolge Wachsausscheidung noch verstärkte Unbenegbarkeit ausgezeichnet, wodurch alles auffallende Regenwasser oder durch Wellenschlag herbeigeführte Übersflutungswasser rasch wieder abläuft. Dies wird auch noch durch andere Einrichtungen unterstützt. Das Luftblatt von *Nelumbium* ist in der Mitte trichterförmig vertieft, so daß sich hier das Wasser sammeln kann. Hat dies ein gewisses Maß überschritten, dann neigt

sich das Blatt unter dem Gewicht zur Seite und entleert das Wasser. Bei den eigentlichen Wasserrosen hingegen ist das Blatt an der Ansatzstelle des Stieles wieder etwas erhöht und bewirkt dadurch leichteres Abfließen des Wassers. Bei *Victoria* endlich, wo ein aufgestülpter Rand um das Blatt herumläuft (siehe die Farbentafel), ist dieser Rand in der Mitte unterbrochen, so daß an dieser Stelle der Abzug des Wassers stattfinden kann. Diese Unbenutzbarkeit und rasche Ableitung des auf der Blattoberfläche angesammelten Wassers ist für die Pflanze sehr wichtig, denn ohne diese Vorsichtsmaßregel würden die an der Oberseite befindlichen Spaltöffnungen verlegt und der Gasaustausch unterbunden werden. Aus diesem Grunde finden sich auch bei den Schwimmblättern der Nymphäazeen die Spaltöffnungen nur auf der Oberseite, hier allerdings mitunter in ungeheurer Anzahl. Wir können bei bestem Willen hierfür keine andere Erklärung finden, als daß sie auf der Unterseite zwecklos wären. Die untergetauchten Wasserblätter bilden überhaupt keine Spaltöffnungen aus. Da nun auch die Schwimmblätter unter Wasser angelegt werden, und die Entscheidung über die Ausbildung von Spaltöffnungen schon in die frühesten Entwicklungsstadien fällt, ist die Frage natürlich sehr interessant, was denn eigentlich darüber bestimmt, daß die zu Schwimmblättern bestimmten Anlagen den Impuls zur Spaltöffnungsbildung rechtzeitig erhalten. Aber auf diese Frage haben wir noch keine Antwort. Wir wissen nur, daß, wo immer es zur Bildung von Luftblättern kommt, ob unter natürlichen Verhältnissen bei sehr niederem Wasserstande oder in künstlicher Kultur in flachen Bottichen oder Tongefäßen, sich an der Blattunterseite trotzdem niemals Spaltöffnungen ausbilden. Es muß also die Unterseite diese Fähigkeit schon seit sehr langen Zeiten „verlernt“ haben. Wohl aber treten bei der Bildung von Luftblättern andere, anatomische Anpassungserscheinungen auf: das Blatt wird derber, die Oberhaut kräftiger, die Lusträume im Zwischengewebe werden verringert. Bei den Schwimmblättern ist das Blattgewebe so interzellularreich, wie bei allen Wasserpflanzen, und dieses Durchlüftungsbestreben macht sich ganz besonders in den Blatt- und Blütenstielen bemerkbar. Da sind reichliche, den Stiel in seiner ganzen Länge durchziehende Luftkanäle vorhanden, die durch Scheidewände von parenchymatischem Gewebe getrennt sind. Diese sogenannten Diaphragmen bestehen bei *Nuphar* sogar nur aus einer Zellschicht, sorgen aber trotzdem genügend für die nötige Durchlüftung. In diese Kanäle ragen die jedem Freund der Pflanzenanatomie wohlbekannten, dicken und verzweigten Sternhaare hinein, die so groß sind, daß man sie beim Hindurchsehen durch ein Stück solchen Blattstieles sogar mit freiem Auge wahrnehmen kann. Man hat sich lange um ihre Bedeutung gestritten, aber nach den Untersuchungen Stahls haben wir sie wohl als eine Schutzwaffe gegen die Angriffe der Wassersnellen zu betrachten. — Auch sonst bietet die Anatomie unserer Seerose viel Interessantes. Der Bau ihres Stammes ist insoweit bemerkenswert, als er so ausgesprochen den Charakter der Monokotylen zeigt, daß sich selbst gegenwärtig noch Forscher finden, die an der Ansicht einiger älterer Botaniker festhalten, welche die Nymphäazeen einst zu den Monokotyledonen rechneten. Und es gibt wirklich einiges (so Ähnlichkeiten bei der Keimung, im Bau der Wurzelhaube u. dgl.), was in gewissem Sinne diese Ansicht zu stützen scheint. Wenn wir aber trotzdem nicht in jenes Lager übertreten, so ist es der Bau der Blüte, der uns eben keine Zweifel an der Verwandtschaft einerseits mit den Ranunkulazeen, andererseits mit den Papaverazeen läßt.

Eine Besonderheit ist bei *Euryale ferox* zu erwähnen, die schon in Bd. II gestreift wurde. Die Keimungserscheinungen der Nymphaäzeen sind nämlich insofern von Interesse, als hier sich innerhalb der Familie die Hauptwurzel in merkwürdiger Weise ausbildet. *Nuphar*, *Nymphaea* und *Victoria* entwickeln z. B. eine Hauptwurzel, deren Wachstum zunächst bei der Keimung nur unbedeutend ist. Ihre Befestigung im Schlammboden erfolgt durch einen Kranz von Wurzelhaaren, und sie verlängert sich erst später. Bei *Euryale* ist dagegen die Hauptwurzel verkümmert; sie ist zwar der Anlage nach vorhanden, kommt aber entweder gar nicht oder nur zu spärlicher Entfaltung. Dies ist biologisch gerechtfertigt, denn der Same dieser Pflanze ist schon durch sein Gewicht genügend am Boden verankert. Bei *Nelumbium*, das noch größere und schwerere Samen hat, ist die Hauptwurzel nicht nur schon der Anlage nach sehr klein, sondern bleibt stets in der Samenschale stecken! Bei *Euryale* endlich finden sich um die verkümmerte Hauptwurzel herum vier verzweigte, mit Haaren besetzte Organe, die Goebel als „Kiemenorgane“ bezeichnet hat, weil ihre Aufgabe nach seiner Ansicht darin besteht, Sauerstoff aus dem Wasser aufzunehmen und dem Keimling zuzuführen. Es ist also hier ein regelrechtes Atmungsorgan vorhanden! Und unserer Ansicht nach hat Goebel recht. Es sprechen für ihn sowohl der anatomische Bau mit seiner Oberflächenvergrößerung und dem Reichtum an Lufträumen als auch die nur vorübergehende Existenz dieses Organs, das überflüssig wird, sobald die Keimpflanze selbst aus der Samenschale herausgetreten ist. Und auch das muß man zugestehen, daß während der ersten Keimungsstadien die dicke Samenschale die Aufnahme von Sauerstoff sehr erschwert. Bei *Euryale* wäre schließlich auch noch die Eigentümlichkeit zu erwähnen, daß an ihren großen Blättern zwischen den stark hervortretenden Rippen das Blattgewebe blasig aufgetrieben erscheint, was den Blättern ein sehr eigentümliches Aussehen verleiht, aber noch ohne Erklärung geblieben ist.

Blüte der weißen Wasserrose (*Nymphaea alba*).
(Teleobjektivaufnahme von Prof. Dr. D. Seined-Älzen.)

Liebreizend wie ihre ganze Erscheinung ist auch die Blütengeschichte der Seerosen. Sie sind teils Tag-, teils Nachtblüher. Bei *Nymphaea amazonum* öffnet sich nach

den vorhandenen Angaben die Blüte nur während 20—30 Minuten in der frühesten Morgendämmerung; Ventzel berichtet aber diese Ansicht dahin, daß die Pflanze zwei Nächte hindurch von morgens 3—6 Uhr blühe. Bei unserer weißen Teichrose (*Nymphaea alba*) öffnet sich die Blüte gegen 7 Uhr morgens und schließt sich nachmittags gegen 4 Uhr, doch wechselt dies je nach der geographischen Breite in einem gewissen Ausmaß. Die Seerosenblüten sind ihrem ganzen Bau nach der Bestäubung durch Tiere angepasst. Es scheint jedoch (und das früher über die Entwicklung der Familie in älteren Zeiten Gesagte läßt dies verständlich erscheinen), daß für manche — namentlich der erdgeschichtlich älteren — Formen die Bestäuber, denen sie vornehmlich angepasst waren, ausgestorben sind, wodurch die betreffenden Gattungen nun auf Selbstbestäubung angewiesen sind. So befruchtet sich die Unterabteilung *Hydrocallis* der Gattung *Nymphaea* stets selbst vor dem Öffnen der Blüte, wobei angeblich 10000 bis 30000 keimfähige Samen gebildet werden sollen. Auch *Euryale* befruchtet sich selbst, und zwar bei ganz geschlossener, ja häufig völlig unter Wasser bleibender Blüte. Hingegen ist bei *Victoria*, *Nuphar* und unseren *Nymphaea*-Arten die Selbstbefruchtung völlig ausgeschlossen. Diese Blüten sind protogynisch, die Narben bleiben nur am ersten Tage des 3—7 Tage währenden Blühens empfängnisfähig, woraus sich ohne weiteres ergibt, weshalb eine Bestäubung ohne Insekten nicht möglich ist. Delapino vermutet, daß *Victoria regia* und *Nymphaea alba* durch Rosenkäfer (*Cetonia*) und Glaphyriden befruchtet werden, aber nach mehrfachen neueren Beobachtungen scheinen bei den Seerosen vielmehr die Schilfkäfer die regelmäßigen Bestäubungsvermittler zu sein.

Über die Verbreitungseinrichtungen schreibt Prof. F. Ludwig: „Bei unseren weißen Teichrosen sind die Samen mit einem Samenmantel versehen, so daß sie, nach dem Plagen der Frucht an der Wasseroberfläche durch die zwischen ihnen und dem Samenmantel enthaltene Luft gehalten, umherschwimmen können. Dieser Schwimmantel umgibt den Samen lose als weiße Hülle. Zunächst sind nach dem Auseinanderfallen der Fruchtwände die Samen zu einem schleimigen Klumpen vereinigt, der sich aber schließlich auflöst, so daß die Samen sich frei umherbewegen. Zuletzt vergeht auch der Samenmantel, die Luftblasen entweichen, und der Same fällt vermöge seiner Schwere zu Boden. Anders verhält sich die gelbe Teichrose. Bei ihr findet sich die Vorrichtung zur Wasserverbreitung nicht an den Samen, sondern sie liegt in einer besonderen Konstruktion der Fruchtwände. Zur Reifezeit löst sich die Frucht gleichfalls von ihrem Stiele ab, aber die Samen werden dabei nicht sogleich frei, sondern es geschieht — wie es Hildebrand schildert — etwas dem Verfahren Ähnliches, das man einschlägt, wenn man eine Apfelsine in einzelne halbmondförmige Teile zerlegt. Von der äußeren Fruchtwand löst sich nämlich nur die äußere grüne Schicht los, während die innere mit den Scheidewänden der Frucht in Verbindung bleibt. Die Scheidewände spalten sich dann bald, von außen beginnend, in je zwei Lamellen, wodurch jene halbmondförmigen Scheiben entstehen, gebildet aus einer festen Außenhaut, welche die zahlreichen schweren Samen, in einen Schleim eingebettet, umschließt. Diese Scheiben sinken nicht unter, weil in dem Schlamm ihres Innern zahlreiche Luftblasen entstanden sind. Erst später, wenn die Scheiben länger umhergeschwommen sind, löst sich die innere Hülle auf, die Luftblasen entweichen aus dem Schleim, und die Samen werden auf den Grund des

Wassers ausgesät. Der Samenmantel der *Nymphaea* fehlt ganz. Noll hat darauf hingewiesen, daß die Wasserhühner die eigentlichen Verbreiter der Samen der Teichrosen von Teich zu Teich sind, denn die Früchte sind ihre Lieblingsspeise. Bei dem Verzehren der Früchte bleiben die klebrigen Samen den Vögeln an Haaren und Schnäbeln haften und werden, wie Noll fand, von ihnen verschleppt.“

Wir unterscheiden unter den heimischen Wasserrosen namentlich die Gattungen *Nymphaea* als die eigentliche Seerose und *Nuphar* (gewöhnlich Mummel genannt). Die beiden unterscheiden sich leicht und vielfach. Die wichtigsten biologischen Unterschiede haben wir bereits genannt; außerdem gibt es aber auch im Blütenbau eine Menge abweichender Merkmale. So ist z. B. der Kelch von *Nymphaea* vierblättrig und nur sehr selten fünfblättrig, die Kelchblätter sind ledrig, innen gefärbt, außen meist grün. Den Schauapparat bilden die zahlreichen, großen, entweder rein weißen oder verschiedenartig gefärbten Blumenblätter, die nach innen allmählich an Größe abnehmen und in die gleichfalls zahlreichen Staubblätter übergehen. Es sind also durchaus nicht alle Wasserrosen weiß, wie der Anfänger zu glauben geneigt ist. Bei *Nuphar* hingegen sind die Kelchblätter in der Fünffzahl (bei *N. luteum*, *pumilum*, *intermedium* u. a.) oder in noch größerer Zahl (*N. advena* u. a.) vorhanden, und da der Kelch hier die Aufgabe des Schauapparates übernommen hat, ist er auch lebhaft gefärbt. Meist schimmert er goldgelb, bisweilen auch in prächtigster Weise purpurrot. Die Blumenblätter sind bei dieser Gattung sehr klein und unscheinbar; die zahlreichen, meist gelben, unterhalb des Fruchtknotens angefügten Staubblätter haben auf der Rückseite Honiggrübchen, wie sie bei *Nymphaea* an der Fruchtknotensäule angewachsen sind.

Es läßt sich also streiten, welche von den beiden die schönere sei. *Nymphaea* ist in zahlreichen Arten in den tropischen, subtropischen und gemäßigten Zonen aller Erdteile verbreitet, *Nuphar* dagegen auf die nördliche Halbkugel beschränkt. Sie reicht von Nordafrika durch ganz Europa, Nordasien und Nordamerika und noch hoch in die kalte Zone hinein bis Sibirien und Lappland. Die Floristen machen als besondere Sehenswürdigkeit unter den Arten der Gattung *Nuphar* auf den Bastard *N. intermedium* aufmerksam, der zu einer sehr selbständigen Art geworden ist und in seiner Verbreitung nördlicher geht als die beiden Stammformen *N. luteum* und *pumilum*, aus deren Kreuzung er entstand. Dies erklärt sich daraus, daß er raschere Frucht reife erworben hat und daher auch eine etwas kürzere Vegetationszeit noch zur Samenreife ausnützen kann. So ist er den Stammformen überlegen geworden und kann noch in höhere geographische Breiten vordringen. Und merkwürdigerweise soll er gerade dort, wo er über den Verbreitungsbezirk der Stammeltern vorgedrungen ist, seine größte Fruchtbarkeit entfalten, worauf wir uns allerdings noch keinen Vers machen können.

Was uns nun die eine Pflanze lehrte, gilt für die ganze Familie. Die *Nymphaeaceen* sind überhaupt zur Bastardierung sehr geeignet, und die sehr vorgeschrittene gärtnerische Zucht dieser herrlichen Gewächse erzielt gerade durch Ausnützung dieser Eigenschaft Bedeutendes. Dabei hat sie sicher noch ein dankbares Arbeitsfeld vor sich und hat ihren Höhepunkt keineswegs überschritten. Die Gärtnerkunst kann da sogar die Wissenschaft fördern durch die Erforschung der Kreuzungsfähigkeit der verschiedenen Untergruppen, da diese nur wenig bekannt ist. Nur werden gerade die Floristen, die uns darauf aufmerksam machten, über diese Formulierung des Problems nicht wenig

ungehalten sein. Denn mit der Zunahme der Bastarde wird auch die systematische Übersicht der Gattung immer mehr erschwert, und die Fachleute, die sich damit beschäftigen, werden immer kritischer zu Werke gehen müssen und weidlich zu sorgen haben, daß nicht oberflächlicher Dilettantismus allzu viele Arten „macht“. Schon heute unterscheidet man nicht weniger als 100 Arten. Genkel erwähnt in seinem Wasserrosenwerk allein 6 Untergruppen, von denen einige wichtigere zu erwähnen ich mir doch nicht versagen kann. Da wäre vor allem die *stellata*-Gruppe. Hierher gehört zunächst *N. stellata*, deren Blüte verhältnismäßig klein ist, nur 5—10 cm Durchmesser hat, aber dafür herrlich blau blüht. Diese Art ist aus dem tropischen Süd- und Ostasien

Wasserrosen in einem Ententeich. (Anlage von Genkel in Darmstadt.)

und von den Sundainseln zu uns vorgeedrungen. Auch *N. coerulea*, die Lotospflanze der Ägypter, blüht blau, ist aber in der Mitte der Blumen heller, fast weiß; aus ihrer ägyptischen Heimat führte man sie zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bei uns ein, wo sie gegenwärtig die am meisten gezogene ausländische Seerose ist. Ferner kommt hier in Betracht die *Gigantea*-Gruppe, deren Vertreter aus Australien in unsere Gärten gelangten. Sie sind Tagblüher, die sich durch besonders lange Blütendauer auszeichnen; ihre Blumen sind blau, selten weiß oder rosa. Die Größe der Blüte schwankt bei *N. gigantea* zwischen 16 und 30 cm, ist also außerordentlich prächtig. Merkwürdigerweise ist aber diese köstliche Pflanze seit Ende der 50er Jahre aus der Kultur verschwunden und erst in neuerer Zeit wieder in der berühmten Gärtnerei Genkel in Darmstadt, die das Dorado der Wasserrosenzucht ist, zur Einführung gekommen. Die Wasserrosen der Lotos-Gruppe sind meist Nachtblüher mit weißen oder roten Blüten, die 10—20 cm hoch über dem Wasser stehen. *N. Lotos*, die weiße

Lotosblume, öffnet sich zwischen 6 und 8 Uhr abends und schließt sich gegen 11 Uhr mittags. Diese Pflanze ist als geographische Kuriosität von selbst in Europa eingeführt. Sie, die sich so häufig als weiße Lotus in ägyptischen Königsgräbern und auf den alten Denkmälern abgebildet findet und wegen der mehrlreichen Knollen trotz ihrer großen Fruchtbarkeit im Nilgebiet selbst stellenweise gänzlich ausgerottet ist, wächst wild in einigen ungarischen Teichen, als ob sie von je dort heimisch gewesen wäre. Sie findet sich dort namentlich in den 34—41° heißen Quellen von Großwardein sowie in dem dortigen Pecze-Bach. Von dem ungarischen Botaniker Kitaibel wurde sie 1800 in den kleinen See der Quellen des Lukasbades bei Budapest* verpflanzt, wo sie aber der niedrigeren Temperatur (26°) wegen nicht alljährlich blüht.

Nymphaea thermalis im warmen Lukasbader Teiche zu Ofen. (Nach Schilberszky.)

Das Vorkommen und die Identität mit *N. Lotus* wurde eine Zeitlang dahin aufgefaßt, daß diese „*N. thermalis*“ ein Relikt aus der Zeit sei, da tropische Seerosen auch Mitteleuropa besiedelten; während die übrige Nymphaeaceenflora mit Abnahme der Wärme verschwinden mußte, habe diese Art in diesen heißen Quellen einen Zufluchtsort gefunden und sich erhalten. Aber in Wirklichkeit lebt sie, welche die ungarischen Botaniker als *N. thermalis* bezeichneten, dort erst seit der Türkenzeit und verdankt ihren Import wohl irgendeinem blumenliebenden Pascha. Das ganze Geheimnis dieses pflanzengeographischen Rätsels besteht darin, daß jene Teiche mit natürlich warmem Wasser gefüllt sind. Diese Pflanze wurde 1802 auch nach England eingeführt und wird in zahlreichen Formen seit dieser Zeit allgemein kultiviert. Sie bedarf einer

* der nach meinen Untersuchungen auch durch eine sehr interessante Mikrofauna und Flora (Ritzien, sehr viele Planarien, Thermalkieselalgen und Blaualgen) ausgezeichnet war.
 France, Das Leben der Pflanze. IV.

Wasserwärme von 22—28°, bei der sie sowohl im Warmhaus als im Freien gut gedeiht. Noch dankbarer für die Kultur ist *N. dentata*, weil sie viel reichlicher blüht; Henkel bezeichnet sie dort, wo man ihr 26—30° Wasserwärme geben kann, als die dankbarste der tropischen Wasserrosen; im kühleren Wasser, wo z. B. der blaue *Notos* noch reichlich blüht, versagt sie jedoch.

Zu der Alba-Gruppe, die Henkel des weiteren unterscheidet, gehört unsere einheimische weiße Seerose, *N. alba*, nebst den Arten *N. candida*, *tetragona* und *fennica* als Hauptformen, von denen allen vielfache Varietäten bekannt sind. *N. alba* kommt in ruhigen Gewässern von 20 cm bis zu 2 m Tiefe durch das ganze südliche und mittlere Europa bis zum 62. Breitengrade in Schweden vor. Sie lebt aber auch in Nordafrika, Marokko, Asien, Syrien, am Schwarzen Meere, im Kaukasus, in Sibirien und in anderen Gebieten und bildet dort außerordentlich viele, zum Teil sogar noch wenig bekannte Formen.

Bei der Kultur der Nymphäen, die gegenwärtig immer größeren Umfang annimmt, mußten mancherlei Erfahrungen gesammelt werden, ehe sichere Resultate gewonnen werden konnten. Namentlich gilt dies von der Kultur der an warmes Wasser gewöhnten Seerosen, die in ihren Lebensgewohnheiten und Eigentümlichkeiten genau studiert werden müssen. Was für die eine Gruppe gut und ausreichend ist, braucht es nicht für eine andere zu sein und ist es auch häufig nicht. Wer sich hierfür näher interessiert, dem wird das hier des öfteren erwähnte Werk von Henkel wertvolle Aufschlüsse geben. Ich kann ihm natürlich nur einige Gesichtspunkte entnehmen, um beiläufig eine Vorstellung davon zu geben, daß Kulturen ausländischer Seerosen mit geheizten Häusern und Bassins zwar schwierig anzulegen sind, daß aber die einfache Zucht unserer einheimischen Seerosen eine sehr dankbare Sache ist, die mehr Verbreitung verdient, als sie jetzt hat.

Es sind bei der Seeblumenzucht verschiedene Dinge ins Auge zu fassen: sowohl die Anzucht der Samen wie die Vermehrung durch Knollen, die Auswahl der geeigneten Erde, die Düngung, Zubereitung der Pflanzbeete, Wassertiefe und Wasserwärme, sogar Bodenwärme; dann die Aufzucht in Gefäßen, Überwinterung und sonst noch verschiedene Erfordernisse der Pflege während der Entwicklung. Dies erscheint viel und kompliziert, ist es aber nicht.

Da die Samen der winterharten Arten und Hybriden bei trockener Aufbewahrung bald ihre Keimfähigkeit verlieren, hebt man sie in Gläsern auf, deren Wasser öfters erneuert werden muß, und die man frostfrei, am besten in einem Kalthause, überwintert. Bei Frühlingserwachen bringt man sie in einen Raum von 10—12° C Wärme. Höhere Wärme ist schädlich. Hier erwartet man die Keimung, die in der Regel nach 3—4 Wochen eintreten wird. Ein Teil der Samen „liegt über“, d. h. er geht erst im 2. Jahre auf. Das Aussäen in Schalen mit Erde in der üblichen Weise ist nach neueren Erfahrungen nicht zu empfehlen, sondern man „pikiert“ sie, nachdem die Sämlinge das zweite Blättchen gebildet haben, in lehmige Erde ohne jeden Dungzusatz und setzt sie dann 5—8 cm tief unter Wasser in flache Zinkkästen, die man in einem Mistbeetkasten oder Kalthause aufstellt, wo man ihnen reichlich Luft zukommen läßt. Natürlich hält man sie von Algen und Schmutz rein. Bis zum Nachsommer werden sich bei solcher Pflege bereits die ersten Schwimmblättchen zeigen. Winters über hält man sie dann gleichmäßig feucht

und setzt sie im zeitigen Frühjahr weiter, die kräftigen sogar schon einzeln in Töpfe. Im Sommer des zweiten Jahres, spätestens jedoch im dritten Jahre, erfolgt dann das Blühen. Eine andere Vermehrungsart ist die durch Teilung der Wurzelstöcke. Da jedoch deren Gewinnung und vor allem deren Teilung ohne schädigende Verwundung nicht leicht ist, so ist es vorteilhafter, junge Pflanzen gleich von zuverlässigen Spezialgeschäften zu beziehen. Der Erfahrene läßt sich hierbei nicht durch die Größe der Rhizome bestechen, denn er weiß, daß große, „mastig“ aufgewachsene Pflanzen erfahrungsgemäß viel schlechter wachsen als kleine, „wüchsig“ Pflanzen aus schwerem Boden. Das Rhizom darf auch nicht langgestreckt sein, es soll mehr die Form einer Knolle haben. Jüngere und in flachem Wasser gewachsene Pflanzen sind vorzuziehen.

Wichtig ist auch die Frage des Bodens und der Düngung. Man irrt sich, wenn man glaubt, durch reichliche Anwendung von Teichschlamm die natürlichen Verhältnisse möglichst nachahmen zu können. Dies wäre gänzlich verfehlt; denn es ist gar nicht Teichschlamm, was die Nymphaen brauchen. Daß sie stets in schlammigen Weihern wachsen, ist lediglich damit im Zusammenhang, daß die Seerosen nur in ruhigen Gewässern fortkommen, wo sich aller Detritus absetzt. Die Erfahrungen der Züchter haben vielmehr gezeigt, daß die Wurzeln sehr bald die Schlammsschicht durchwachsen und in den (am besten lehmig-sandigen) Untergrund eindringen. Darum empfiehlt Henkel als besten Boden lehmige Rasenerde mit verrottetem Kuhdung oder schwere kräftige Garten- oder Ackererde, die man ein Jahr vor dem Gebrauch, mit Kuhdung vermischt, auf Haufen setzt. Lehm von alten Gebäuden ist nur dann brauchbar, wenn er frei von Kalk ist, denn Kalk vertragen die Wasserrosen schlecht. Beim Auspflanzen in Teichen (und auch in Kübeln) achte man vor allem auf reichliche Sonne. Licht ist den Nymphaen ein Hauptbedürfnis. Es geht daher nicht an, sie im Schatten hoher Bäume anzupflanzen, wie sich gärtnerische Phantasie so hübsch ausmalt. Aber man kann an solchen Stellen Nuphar nehmen, das ja auch in der freien Natur dort, wo es mit *Nymphaea* vergesellschaftet ist, dieser die sonnige Mitte und die tieferen Stellen überläßt. Bei der Wahl der Plätze ist außer auf reichliches Licht auch auf Windschutz zu sehen, daher sind Springbrunnen im Wasserrosenbecken unmöglich. Über die Kultur in Kübeln sagt Henkel folgendes: „Sie hat den Vorteil, daß man durch sie stärkere Pflanzen zur Hand hat, wie man sich dieselben auch für vieles Geld nicht kaufen kann, wenn man Weihern oder anderen Wasserbehältern einen besonderen Schmuck geben will. Sodann aber bieten sie dem Liebhaber von Seerosen, welcher nicht in der Lage ist, sich größere Behälter für Wasserpflanzen zu bauen, ein wohlfeiles und bequemes Mittel, um sich auf kleinem Raume an ihren schönen, duftenden Blumen zu erfreuen, um Beobachtungen und Versuche an ihnen zu machen. Der französische Seerosenzüchter Marlic, dessen Seerosenhybriden den Anstoß zu der heutigen Liebhaberei gegeben haben, hat alle seine zahlreichen Pflanzen in halbierten Fässern gezogen. Hat man nur einen sonnigen, windgeschützten Raum, so ist auch die Möglichkeit zu ihrer Aufstellung gegeben. Man kann sie, wie wir bei den tropischen Arten bereits ausführten, entweder in den Rasen so weit eingraben, daß der obere Rand mit der Rasenoberfläche abschneidet. Man kann sie aber auch frei aufstellen; sauber gestrichen und immer randvoll mit reinem Wasser gehalten, bieten sie dem Blumenfreunde einen Genuß vom Frühjahr bis zum Herbst.“ In dem Verhalten zu Wassertiefe und Wasserwärme lassen sich drei Gruppen

von winterharten Seerosen unterscheiden: 1. solche, die tiefes, klares und kaltes Wasser lieben (die alpinen Arten: *N. biradiata*, *candida*, die nordischen: *N. alba rosea* Fries., *alba rubra* und *N. fennica*), 2. jene, die tiefes, wärmeres Wasser beanspruchen (*N. odorata* mit ihren großen Formen und Hybriden, *N. tuberosa* und *N. Gladstoniana*); auch die Mehrzahl der alba-Formen und Hybriden, mit Ausnahme der nordischen, und 3. solche, die warmes Wasser von 20—40 cm Tiefe voraussetzen. Senkel gibt für alles dies genaue Zusammenstellungen. Die meisten alba-Formen vertragen einen Wasserstand von 1,2—2 m Tiefe. Ihre Blumen werden dabei größer und schöner als in flachem Wasser.

Ich habe diese Anleitung deshalb mit solcher Liebe und Ausführlichkeit hergesetzt, da ich keinen reizenderen Schmuck der Gärten kenne als ein stilles, poetisches Wasserrosenbecken und daher möglichst viele aufmuntern möchte, sich mit diesen anmutigen Ge-

wächsen liebevoller zu befassen. Man gestatte mir daher auch, zum Schluß noch zwei Gattungen zu nennen, die zwar heute ausschließlich den tropischen Gebieten angehören, aber wegen der vielfachen künstlichen Kultur und ihrer biologischen Besonderheiten auch in die Gärten Europas eingedrungen und dort völlig volkstümlich geworden sind. Dies sind *Victoria* und *Nelumbium*.

Blüte der *Victoria regia*. (Nach Hochstetter-Mohl.)

Victoria regia, diese kolossale Wasserrose des Amazonas-Gebietes, ist vor allem bekannt durch ihre riesigen Blätter, die im ausgewachsenen Zustande kreisrund sogar Durchmesser von 2 m übertreffen! (Siehe die Farbensafel.) Ihr Rand ist aufgestülpt und ragt 4—6 cm empor. Aber nicht nur durch ihre Form, sondern auch durch ihre prächtigen Farben fesseln sie den Beschauer. Ist doch ihre Oberseite glänzend grün, glatt, die Unterseite hingegen kurz behaart, kupferrot, mit brettartig, etwa 5 cm hoch vorstehenden Rippen, die außerdem durch zahlreiche Querbänder miteinander verbunden sind. Es entsteht so ein sehr dichtes, massives Leistennetz an der Unterseite der Blätter, und dem verdankt das Blatt seine große Tragfähigkeit. Dazu sind noch fast alle sichtbaren Teile mit langen rötlichen, sehr spitzen Stacheln besetzt. Auch die Blüten sind gigantisch. Sie messen 25—40 cm im Durchmesser, sind sehr wohlriechend, blühen weiß auf, nehmen aber im Verblühen rosa bis karminrote Tinten an. Diese entzückende Blüte öffnet sich nachmittags gegen 4 Uhr und schließt sich am Vormittag des nächsten Tages zwischen 10 und 11 Uhr. Schon beim zweiten Aufblühen findet der Übergang in die rötliche Färbung statt, und am Morgen des dritten Tages ist die Blume fast dunkelrot. Sie senkt sich im Laufe des Vormittags unter den Wasserspiegel und reift, wenigstens in Europa, bei erfolgreicher künstlicher Bestäubung ihren Samen in etwa 8 Wochen. In ihrer Heimat ist die *Victoria* ausdauernd, in unserem Klima aber

auch bei der sorgfältigsten Pflege nur als einjährig zu betrachten. Sie muß also jährlich aus Samen immer neu gezogen werden. Dies ist nur bei der geradezu beispiellos raschen Entwicklung dieser riesigen Pflanze möglich. Man kann sagen, daß sie hierin alles übertrifft, was an Lebensenergie aus dem Pflanzenreiche bekannt ist. Neben der Victoria verblaßt selbst der Ruhm der Bambusen!

Die ursprüngliche Heimat der Pflanze ist in Brasilien, Bolivia, Britisch Guyana, vom 15. Grad südlicher bis 4. Grad nördlicher Breite. Dort lebt sie in ruhigen Gewässern, Sümpfen und den stillen Buchten von Landseen. Am allerschäufigsten ist sie aber in den Nebenflüssen des Amazonasstromes zu finden und dort war sie den Spaniern schon bald nach Besitzergreifung des südamerikanischen Kontinents bekannt geworden. Natürlich wurde sofort nach ihrem Nutzen gespäht, und bald wurden die mehrlreichen Samen unter dem Namen „Mais del agua“ als Nahrungsmittel verwendet. Wissenschaftlich wurde die Pflanze aber erst durch den deutschen Botaniker Gaenke im Jahre 1800 und 1801 entdeckt, aber tragischerweise ging der größte Teil seiner Arbeiten wieder verloren. Und so blieb es Bonpland, dem Begleiter A. v. Humboldts, vorbehalten, nebst D'Orbigny (im Jahre 1827) und Böppig (1836) sie neuerdings zu entdecken. Der letztere gab ihr zum erstenmal einen wissenschaftlichen Namen: *Euryale amazonica*. Doch schon 1837 erkannte Lindley, daß hier keine *Euryale*-Art, sondern eine neue Gattung vorliege, die er *Victoria regia* benannte.

Schon Bonpland hatte im Jahre 1819 Samen der Wunderpflanze mitgebracht, und auch später brachten verschiedene Expeditionen Samen mit; aber sie kamen meist nicht im keimfähigen Zustande an, teils genügten auch die mangelhaften Einrichtungen nicht, um die Pflanze zur Entwicklung zu bringen. Darum blühte *Victoria* in Europa zum ersten Male im Jahre 1849 im Garten des Herzogs von Devonshire, was natürlich nicht wenig Aufsehen erregte und bald zur Errichtung großer Gewächshäuser, ausschließlich zum Zwecke der Kultur dieser Pflanze, führte. Für das Viktoriahaus in New bei London wurden z. B. im Jahre 1851 nicht weniger als 70 000 Mark ausgegeben als Zeichen, wie großzügig die Engländer solches Interesse in die Wirklichkeit umsetzten. Aber im selben Jahre entstand auch das erste deutsche Viktoriahaus in Herrenhausen bei Hannover. Diesem folgte das im botanischen Garten zu Hamburg, bei Borsig in Berlin und bei Thomas in Ermatingen (bei Konstanz). In Nordamerika blühte die *Victoria* in Philadelphia aus Samen, der von New bezogen war, und von da ab wurde der Kultus des Prachtgewächses allgemein. Heute entbehren wenige der großen Gärten ein Viktoriahaus, so daß die Pflanze fast so gut bekannt ist wie eine einheimische. Aus ihrer Geschichte möge aber noch eine Notiz Platz finden, weil sie bezeugt, wie dankbar diese schönste aller Wasserrosen die Kultur lohnt, die in manchen milderen Ländern sogar auf das Haus verzichten kann (z. B. in Karlsruhe oder Ugram). In Adelaide begann eine Pflanze dieser Art, am 15. November eines Jahres zu blühen und blühte bis zum 2. November des nächstfolgenden Jahres ununterbrochen, wobei sie in dieser Zeit 112 Blüten erzeugte! Die Blätter wurden aber während des Blühens immer kleiner und verloren auch den aufrechten Rand. Erst nach dem Aufhören der Blütenentwicklung zeigte sich wieder kräftigeres Wachstum, und nun erschienen auch wieder Blätter mit hohen Rändern.

Wenn aber *Victoria* nur ein interessantes Schaustück, so ist die Lotosblume (*Nelumbium speciosum*) geradezu ein Naturfaktor geworden. Wie viel Poesie umwebt sie! Wie viel Dichter haben sie gepriesen! Ihre Geschichte ist so innig mit der Religionsgeschichte des Buddhismus verbunden, daß sie den Lehren des Gautama von ihrer Heimat über die Bergländer des südöstlichen Himalaja bis hinauf nach Tibet und über China bis nach Japan gefolgt ist, d. h. überallhin, wo nicht das Klima ein weiteres Vordringen unmöglich machte. Und wirklich, welche liebreizende Erscheinung ist sie auch! Die Blüte, 18—35 cm groß und wohlriechend, von weißem, rosa bis dunkelroten Samt, steht gleich den Blättern auf meist bestachelten Stielen hoch über dem Wasser (s. die Farbentafel). Nur die ersten Blätter der jugendlichen Pflanze sind Schwimmblätter. Besonders eigenartig ist auch die Frucht des Lotus. Der Blütenboden beteiligt sich hier nämlich sehr weitgehend an der Fruchtbildung, indem er zu einem verkehrt-kegelförmigen Gebilde heranwächst, in dessen flaches Ende die einzelnen Nüsschen in Gruben eingesenkt sind. Es ist also eine Sammelfrucht vorhanden, welche zur Zeit der Reife von derber, ledriger Konsistenz ist.

Die Gattung *Nelumbium* umfaßt zwei Arten: *N. speciosum* und *N. luteum*. Die erstere Art ist durch das ganze tropische und subtropische Asien verbreitet und reicht von Japan und Korea bis nach Australien und westlich bis an das kaspische Meer. Die zweite Art, die viel härter als *N. speciosum* ist und viele Jahre auf dem gleichen Plage stehen muß, wenn sie reichlich blühen soll, gehört Nordamerika an und reicht dort vom 42. Breitengrad an südwärts durch Westindien bis zur Mündung des Magdalenaenstromes in Kolumbien, also bis zum 11. Grad südlicher Breite. Diese merkwürdige Verbreitung deutet darauf, daß beide Arten als Reste einer in der Tertiärzeit weit verbreiteten und artenreichen Gattung anzusehen sind, die vor Eintritt der Eiszeit sogar ganz Europa, Asien und Nordamerika bewohnt zu haben scheint. Die Blüte der amerikanischen Art hat 20—24 cm Durchmesser, ist ebenfalls wohlriechend, aber hell-schwefelgelb. Die Pflanze wurde übrigens erst im Jahre 1838 eingeführt, während *Nelumbium speciosum* schon 1784 von Banks nach England gebracht wurde und dort im Jahre 1797 zur Blüte kam. Von *Nelumbium* kennt man jetzt übrigens bereits eine große Zahl Gartenformen und Hybriden; Henkel zählt z. B. 26 Gartenformen auf.

Die Zucht der Lotosblumen geschieht in großen, kostspieligen, mehr oder weniger eigens dafür eingerichteten Gewächshäusern (vielfach im Verein mit *Euryale* und *Victoria*) oder in Gefäßen. Aber sie sind auch einheimisch geworden, denn manche Arten gedeihen bei uns auch im Freien. Zur Vollkommenheit ist in unserem Klima *Nelumbium* jedoch nur unter Glas zu bringen, und stets erfordert die Anzucht, Wahl des Bodens, Wasserstandhöhe und Temperatur fast ebensoviel Aufmerksamkeit wie bei den tropischen Seerosen. Für Liebhaber sei noch erwähnt, daß so wie bei den Nymphen auch hier die Zucht in Kübeln und Tongefäßen mancherlei Vorteile gewährt; nur muß die Aufstellung auch in diesem Fall in einem Gewächshause erfolgen. Wenn wir jedoch bedenken, daß *Nelumbium* z. B. in Japan im Freien noch unter klimatischen Bedingungen gezogen wird, die denen von Mitteleuropa ziemlich gleichen, daß ferner *Nelumbium luteum* in Nordamerika in Teichen und Gräben vorkommt, die jeden Winter zufrieren, daß schließlich wiederholte Versuche die Widerstandsfähigkeit auch für unsere Verhältnisse außer Zweifel gesetzt haben, könnte man

eigentlich glauben, wir behandelten die schöne Pflanze viel zu umständlich, und sie gehöre vielleicht gar nicht in die Gewächshäuser. „Diese Auffassung wäre jedoch zu weitgehend“, meint hierzu Senkel. „Wie der Weinstock nicht überall da angebaut werden kann, wo er im Winter nicht erfriert, so können wir *Nelumbium* auch nur da im Freien ziehen, wo die Sommerwärme hinreicht, um die Pflanzen zur Blüte und die unterirdischen Teile zum Ausreifen zu bringen. Die Nordgrenze des Weinbaugebietes ist auch die äußerste Grenze, innerhalb deren man die *Nelumbium* im Freien bei uns ziehen kann. Weiter nördlich dauern sie nur wenige Jahre. Sie erfrieren weniger, sondern gehen ein, weil der Winter sie vor Abschluß der Vegetationszeit überrascht. Für Deutschland kommen demnach nur wenige, klimatisch besonders günstig gelegene Gegenden hierfür in Betracht. Für diese eignen sich außerdem nur eine beschränkte Anzahl von Sorten zum Auspflanzen. Am längsten erprobt ist *N. luteum*.“ Manche Gartenanlagen haben übrigens für die Seerosen heizbare Teiche, entweder durch Zuleitung von warmem Wasser oder in der Weise, daß bei niedrigerem Wasserstand Bodenheizung eingerichtet ist. Bei den tropischen Seerosen, also auch bei dem indischen Lotus, ist natürlich auf diesem Wege stets die üppigste Entfaltung der Pflanze zu erzielen. Einen solchen Teich stellt auch unsere das Karlsruher Viktoriabassin malende Abbildung dar.

Die Verwendung der Nymphäazeen beschränkt sich übrigens heute nicht mehr auf die Ausschmückung von Parkanlagen und Gewächshäusern, sondern sie spielen vor allem in der Blumenbinderei und Dekoration eine immer größere Rolle, die sich noch steigern wird, wenn durch fortschreitende Auszucht im großen die herrlichsten Erzeugnisse der Pflanzenwelt nicht mehr so großen Geldaufwand erfordern. Sie haben außerdem noch eine Eigenschaft an sich, welche die dekorative Verwendung der Seerosen etwas beeinträchtigt. Viele Arten schließen nämlich die abgeschnittenen Blüten, um sie nicht mehr zu öffnen, was bekanntlich auch die Nelkenzucht ziemlich schädigt. In neuerer Zeit hat man entdeckt, daß dieses „Schlafen“ der Nelken auf ihrer außerordentlichen Empfindlichkeit für Leuchtgas beruht, und vielleicht verhält es sich auch bei den Seerosen ähnlich. Um diesem Schließen der Blüten entgegenzuwirken, hat man auch zu verschiedenen Mitteln gegriffen, die Blüten künstlich offen zu halten; zunächst rein mechanisch, indem man Wachsmasse, Blumengummi, Paraffin und Ähnliches in flüssigem Zustand in die offene Blüte träufelt. Die erhärtende Masse verhindert dann das Schließen der Blüte. Da aber mit diesen Mitteln verschiedene Mißlichkeiten verbunden sind, werden sie nur noch selten angewendet. Üblicher sind jetzt Mittel, die auf eine Schwächung der Lebenskraft abzielen und dadurch die Bewegungen schwächen oder aufheben, also z. B. die Hinzufügung von Alaun, Borax, Kaliumchlorat oder auch Metallsalzen (in sehr verdünntem Grade) zum Wasser oder das Offenhalten der Blüten durch eine bestimmte, für die Nymphäazeen engbegrenzte Temperatur, bei der die Blüten in den Zustand der Wärmestarre versetzt werden. Es gelingt so immerhin, Blüten, die sich sonst des Abends schließen, 5—6 Tage lang offen zu halten. Daß es aber eigentlich eine Barbarei ist, mit lebenden Wesen zu Luxuszwecken in solcher Weise umzugehen, bedarf keiner Erwähnung.

Neben den Wasserrosen müssen wir noch einer heimischen Familie gedenken, die nicht ohne Bedeutung für den Naturfreund ist. Dies sind die *Geratophyllazeen*

mit der einzigen Gattung *Ceratophyllum*, die uns als Beispiel einer vollständig unter Wasser, also submers lebenden Pflanze dienen möge. Bei ihr vollzieht sich der ganze Lebensprozeß, das Blühen und die Befruchtung mit eingeschlossen, so wie bei *Helodea* stets in den Tiefen. Die Blüten dieser Pflanze sind, dem angemessen, unscheinbar. Die Blüten beiderlei Geschlechtes stehen an ganz kleinen Stielchen in verschiedenen Blattwirbeln ordnungslos durcheinander. Die männlichen überwiegen aus noch unbekannter Ursache. Prof. F. Ludwig, der eine hübsche Studie über sie veröffentlichte, meint, daß die spezifische Anpassung für die Übertragung des Pollens durch das Wasser im Bau der

Staubblätter liege. Die Staubgefäße bestehen — sagt er — im untern, dem kurzen Stiele aufsitzenden Teile aus zwei seitlich sich längs öffnenden Antheren und im oberen Drittel aus lockerem, lufthaltigem Gewebe. Dieses stellt ein Auftriebsorgan dar, das die zur Zeit des Aufspringens sich loslösenden Staubblätter nach oben treibt, bis sie die Wasseroberfläche erreicht haben oder irgendwo zwischen den hängigen Blättern hängenbleiben. Während dieses Aufstrebens werden die Staubbeutel entleert, und da die Pollenkörner das spezifische Gewicht des Wassers besitzen, so bleiben sie in jeder Wassertiefe schweben und erfüllen den ganzen von dem pollenerzeugenden Apparat bestrichenen Raum des

Natürlicher Bestand des Hornblattes (*Ceratophyllum*) mit etwas Tausendblatt (*Myriophyllum*) am Boden eines Weihers.
(Originalzeichnung von H. Deffinger.)

Wassers. Die weiblichen Blüten besitzen einen relativ langen, nach unten hakig gekrümmten Griffel, der an der Unterseite einen Klebestoff absondert und als Narbe funktioniert. Die Frucht ist eine Nuß mit bleibendem, pfriemenförmigem Griffel und erst später auswachsenden Stacheln, mit denen sich die Frucht im Schlamm verankert.

Wie alle echten Wasserpflanzen, sind nun natürlich auch die drei heimischen Hornblattarten ziemlich algenähnlich. In ihrem vegetativen Aufbau sind die Pflanzen mit stutenden, vielfach, aber unregelmäßig verzweigten Stengeln versehen, an denen in viel-

gliedrigen Quirlen die Blätter stehen, die doppelt oder mehrfach gabelig gestaltet, in der Jugend durchscheinend, im Alter von harter, knorplicher Beschaffenheit sind, woher auch ihr Name rührt. Im anatomischen Bau zeigt die Pflanze alles, was der Pflanzenanatom von einer untergetauchten Wasserpflanze erwartet: zunächst im Stamme den sonst nur bei den Wurzeln üblichen zentralen Leitstrang, der hier eine Befriedigung des bei untergetauchten Gewächsen durch den Wellenschlag so gut wie bei Wurzeln auftauchenden Bedürfnisses nach Zugfestigkeit ist. Gleichzeitig begegnen wir hier einer weitgehenden Reduktion des Leitstranges selbst. Auch hier ist die Ursache durchsichtig. Denn wie alle submersen Gewächse mehr oder weniger, so nimmt auch das Hornblatt das Wasser mit den Mineralstoffen durch seine ganze Oberfläche auf, was auch schon wegen der Wurzellosigkeit der Pflanze notwendig ist. Unter solchen Umständen wird ein vollkommener ausgebildetes Leitungssystem überflüssig; dementsprechend ist es auch gehörig rückgebildet. Ein Teil des zentralen Stammleitbündels geht sogar noch dadurch verloren, daß sich in dessen Mitte ein Luftkanal befindet, der „durch Resorption von Prokambiumzellen“ entsteht. Aus dem kann der physiologische Anatom ohne weiteres herauslesen, daß die Pflanze eben viel mehr Bedürfnis nach reichlicher Durchlüftung hat, während das Bedürfnis nach einem Transpirationsstrom begreiflicherweise ganz wegfällt. Dieses erwähnte Durchlüftungsbedürfnis spricht sich auch in den Luftgängen aus, die reichlich durch den Stengel ziehen. Nach alledem ist es schließlich begreiflich, daß auch die Epidermis ihre Funktion und damit ihren Bau ändert; es ist doch keinerlei Transpirationsschutz im Wasser nötig. Dagegen muß aber das Hautgewebe dünnwandig, mit andern Worten, wasserdurchlässig sein.

Was wir da im Stengel entdeckten, tritt nun auch im Blattbau zutage. Hierzu kommt vor allem noch die wieder im Dienste der Nahrungsaufnahme stehende Oberflächenvergrößerung durch die feine Verteilung der Blattspreite, eine Einrichtung, die sich — wie wir schon seit den Algen an verschiedenen Beispielen gesehen haben — bei untergetauchten Blättern häufig wiederholt. Die Blätter entbehren ferner vollständig der Spaltöffnungen, da die dem Luftverkehr dienenden Stomata hier gänzlich unnütz, ja im Gegenteil sogar schädlich wären, wenn sich durch sie die Lufträume des Blattgewebes mit Wasser füllen würden. Mit solchen Lufträumen ist das Blatt reichlich versehen; nur sind es hier nicht durchziehende Kanäle wie im Stengel, sondern Luftkammern. In den untern und mittleren Teilen der Blätter finden sich am Querschnitte 3—5 solcher Luftkammern, in den Endabschnitten stets nur eine, eine Verteilung, die sich aus Stabilitätsgründen wohl begreifen läßt. Das eigentliche Blattparenchym besteht bloß aus 2—3 Zellagen polygonaler Zellen, die lückenlos zusammenschließen. Dabei ist dieses Gewebe auf einer Seite mächtiger entwickelt, und hier liegt dann auch das sehr dürrstig ausgebildete, nur Phloem-Elemente führende Leitbündel. Das Blattgrün ist im ganzen Blattgewebe reichlich und gleichmäßig verteilt; am reichsten scheint in dieser Hinsicht die Epidermis zu sein.

Wir sagten vorhin, die Pflanze sei wurzellos. Morphologisch ist das unbedingt richtig. In physiologischer Hinsicht hat sich hier aber, wenigstens für die ersten Entwicklungsstufen, eine Art Ersatz gebildet. Der Botaniker Glück hat nämlich bei *Ceratophyllum* Organe gefunden, die zwar als umgewandelte Sprosse betrachtet werden müssen, biologisch aber dennoch die Funktion echter Wurzeln übernommen haben,

weshalb sie Glück als „Rhizoiden“ bezeichnet. Sie zeigen sich als besondere, weißliche, fast farblose Äste, deren Blätter außerdem noch dadurch ausgezeichnet sind, daß sie äußerst feine, fadenförmige Zipfel besitzen, die außerhalb des Wassers pinselförmig zusammenfallen. Wie sollen wir dies deuten? Nicht anders denn als eine erhöhte Anpassung an die Funktion der Nahrungsaufnahme durch Oberflächenvergrößerung. Diese Rhizoiden sollen sich nun bei den beiden einheimischen Arten des Hornblattes regelmäßig überall dort finden, wo die Pflanze im Schlamm verankert ist. Im anatomischen Bau zeichnen sich die Blätter dieser Rhizoiden außer ihrem Mangel an Chlorophyll noch weiter vor den Wasserblättern durch vorgeschrittene Rückbildung der Gewebe aus; die Blattabschnitte sind hier radiär gebaut und schließen keine Luftkammern, sondern nur ganz kleine Interzellularräume ein. Das Leitbündel liegt zentral, ist aber ebenfalls noch vereinfacht und von einer Scheide größerer Zellen umgeben. Das eigentliche Blattgewebe reduziert sich auf eine einzige Lage relativ großer Parenchymzellen, die nach außen von einer dünnwandigen, kleinzelligen Epidermis abgeschlossen sind. Glück, dessen Abhandlung wir diese Angaben entnehmen, ist der Ansicht, daß *Ceratophyllum demersum* wohl an jedem Standort ursprünglich eine im Boden des Gewässers vermittelst dieser Rhizoidäste festsetzende Pflanze ist, deren Äste erst später, infolge ihrer brüchigen Beschaffenheit, isoliert werden, um dann freischwimmend weiterzuleben.

Diese letztere Eigenschaft, in kleinen oder großen Bruchstücken weiter existenz- und entwicklungsfähig zu bleiben, der wir zum ersten Male bei *Helodea* begegnet sind, verdanken diese Gewächse eben ihrer Fähigkeit, mit der ganzen Oberfläche Nahrung aufnehmen zu können. Sie bildet für *Ceratophyllum* einen wichtigen Behelf der Vermehrung und Fortpflanzung. Denn wenn auch, wie wir oben gesehen haben, die Bestäubungseinrichtungen dem Wasserleben äußerst zweckmäßig angepasst sind, so macht doch die Pflanze von diesem Mittel verhältnismäßig selten Gebrauch. Hat sie doch in der rein vegetativen, so ungemein einfachen Vermehrungsart ein viel zuverlässigeres und ausgiebigeres Verbreitungsmittel gefunden. Und die fruktifikative Fortpflanzung ist um so leichter zu entbehren, als diese Vermehrung durch Bruchstücke der Pflanze nicht bloß während der Vegetationszeit die ausgiebigste Vervielfältigungs- und Verbreitungsmöglichkeit gewährt, sondern ihr auch über den Winter hinweghilft! Die ausgewachsenen, hart gewordenen und dadurch widerstandsfähigen Sproßstücke sinken zu Beginn des Winters einfach auf den Grund der Gewässer, um mit Eintritt der geeigneten Temperatur im Frühjahr die Weiterentwicklung wieder aufzunehmen. Es kommt also hier gar nicht zu der bei andern untergetauchten Wasserpflanzen eintretenden Bildung von besonderen Winterknospen („Turionen“) wie bei *Utricularia* oder *Myriophyllum*, sondern die Sache ist noch mehr vereinfacht. Diese Art der Fortpflanzung und Überwinterung hat sich bei *Ceratophyllum* so „bewährt“, daß, wie Glück schreibt, die beiden einheimischen *Ceratophyllum*-Arten sich fast ausschließlich auf diesem vegetativen Wege vermehren und fortpflanzen. *Ceratophyllum* hat sich die geschlechtliche Fortpflanzung fast ganz „abgewöhnt“. Gewöhnlich findet man die beiden Hauptarten *Ceratophyllum demersum* und *C. submersum* an den allermeisten Standorten steril. Glück äußert sich sogar dahin, daß die geschlechtliche Fortpflanzung bei ihrer relativen Seltenheit heute gar nicht mehr imstande wäre, das Dasein der Pflanze zu sichern. Das kann allerdings nicht immer so gewesen sein, denn

eine so ausgeprägte Anpassung an die Befruchtung durch Wasser ist wohl nur denkbar, wenn sie einmal in größerem Maße üblich war.

Ceratophyllum, als die einzige Gattung der gleichnamigen Familie, ist dank ihren vortrefflichen Anpassungen weit verbreitet; sie fehlt nur in den arktischen und antarktischen Gebieten. Sonst ist sie in stehenden Gewässern aller Zonen anzutreffen. Die Systematiker unterscheiden drei Arten: *C. demersum*, *submersum* und *platyacanthum* und fügen hinzu, daß von diesen die erste die weitaus häufigste sei; seltener ist *C. submersum*, am seltensten aber die dritte.

Die Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae).

Die beiden zuletzt besprochenen Familien gehören einer umfangreichen, sehr natürlichen Reihe an, welche die Systematik als die der *Polycarpicae* bezeichnet, weil bei ihr eine Blüte viele Einzel Früchte erzeugt. Allerdings verhalten sich gerade die Wasserrosen anders, doch wird dann die Zugehörigkeit zu der Reihe bei ihnen durch andere Merkmale erwiesen. Wettstein nennt in seinem Handbuch die Reihe eine sehr natürliche, da sie Familien umfaßt, die wohl zweifellos entwicklungsgeschichtlich zusammengehören. Der morphologische Abstand zwischen den extremsten Formen von den ursprünglichsten ist allerdings hierbei sehr groß, und eine scharfe Charakteristik der ganzen Reihe deshalb sehr schwierig. Es ist aber gerade dies stets ein Kennzeichen aller stammesgeschichtlich klaren Gruppen. Man verzeihe mir diese systematischen Abschwüfungen, aber sie gehören auch zum Ganzen der Botanik, und dieserhalb mußten wir diese ganze Reihe als solche erwähnen. Nicht nur weil sie an sich eine übersichtliche Gruppe darstellt, sondern auch, weil sie eine gute Überleitung zu den Reihen der Mohn- und Rosengewächse gibt und schließlich, wie wir noch näher zu erörtern haben werden, weil sie auch Anknüpfungspunkte an die Spitzkeimer bietet. Um zu zeigen, wie ungeheuer mannigfaltig sich eine einzige Reihe von Pflanzen entwickeln kann, erlaube man uns, ihre Charakteristik einmal ausführlich darzustellen:

Die Hahnenfußgewächse sind durch einfache Blütenhüllen nur selten ausgezeichnet, ihr Perianth besteht meist aus mehr oder minder zahlreichen blumenblattartigen Blättern oder aus Kelch und Krone. Im letzteren Fall sind die Kelchblätter oft zweifellos nichts anders als umgewandelte Hochblätter.

Die entwicklungsgeschichtliche Beziehung der Korollenblätter zu den Staubblättern ist vielfach hier besonders klar. Die Blütenteile sind entweder streng in Kreisen angeordnet (zyklisch) oder weisen schraubige (spiralige, azyklische) Stellung auf. Die Blüten sind in der Regel zwittrig; wenn sie aber eingeschlechtig sind, dann ist dies als Merkmal „abgeleiteter“, d. h. ursprünglich anderer Formen zu betrachten, desgleichen wenn neben der vorherrschenden Anpassung an Insektenbestäubung gelegentlich Windbestäubung vorkommt. Fruchtblätter finden sich in großer Zahl bis zu einem einzigen herab; wo sie in Mehrzahl vorkommen, sind sie häufig frei, seltener zu einem einheitlichen Fruchtknoten vereinigt. Nach diesen Vorbegriffen können wir uns wieder dem genüßreicheren Leben dieser Gewächse zuwenden:

Die umfangreichste Familie dieser Reihe ist die der Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse) selbst. Ranunkeln, welch wohlvertrauter Begriff! Wer kennt sie nicht, die Anemonen, Butterblumen, Rittersporne, die prächtigen Eisenhutarten, Schneerosen, die üppige Pfingstrose! Sie gehören alle hierher und führen die außergewöhnliche Formenmannigfaltigkeit vor Augen, die in dieser Gruppe herrscht.

Die Ranunkulazeen sind vor allem in den nördlichen gemäßigten Gebieten verbreitet, doch finden sie sich auch in den Tropen und auf der südlichen Halbkugel. Viele von ihnen sind starke Giftpflanzen; mindestens sind sie mit scharfen Stoffen erfüllt und dadurch gegen Weidetiere ausgiebig geschützt, ebenso, wenn auch nicht durchgängig, gegen Schneckenfraß. Den Unbilden der Witterung, namentlich der Winterkälte, mit der sie bei ihrer Bevorzugung gemäßigter Klimate zu rechnen haben, widerstehen sie ebenfalls durch Anpassungen. Durch unterirdische Wurzelstöcke wissen sie die kalte Jahreszeit so glücklich zu überstehen, daß einzelne von ihnen bis in die kalte Region

Zygomorphie der Blüte des Eisenhutes (*Aconitum Napellus*).
Die Blüte ist der Länge nach entzwei geschnitten.
(Originalaufnahme von Prof. Dr. D. Heineck-Alten.)

gehen können und bis an den ewigen Schnee des Hochgebirges emporsteigen. Dies bestimmt ihren Wuchs als Stauden mit ausdauernden unterirdischen Stammbildungen von verschiedenster Form, neben denen sich aber auch einjährige Formen

und sogar Holzpflanzen finden. Mit lebhaft gefärbten, oft sehr honigreichen Blumen locken sie zahlreiche Insekten als Bestäubungsvermittler an und entwickeln hierbei außerordentliche Fruchtbarkeit. Auch die Verbreitung wird durch mannigfache Einrichtungen an den verschieden gestalteten Früchten gefördert, und da außerdem noch bei einzelnen Formen zu der Verbreitung durch Samen sich eine solche durch Brutknospen gesellt, so ist es wohl begreiflich, daß diese rund 1200 Arten umfassende Familie sich so weite Gebiete des jetzigen Erdenrundes erobern konnte.

Aber angesichts dieser großen Mannigfaltigkeit des Blütenbaues wird es zweckmäßiger sein, die vielen Besonderheiten und Sonderanpassungen bei den einzelnen Gattungen zu besprechen. Nur auf einen gemeinsamen Punkt möchten wir nicht gerne verzichten. Der Blütenbau ist hier nämlich trotz der scheinbaren großen Verschiedenheiten ein höchst einfacher und übersichtlicher, und darum soll er noch in diesen Vorbemerkungen geschildert werden. Die Blüten sind meist zwittrig und entweder von regelmäßiger strahliger Anordnung der Blütenteile (daher der Ausdruck „aktinomorphe Blüte“), sind also so gestaltet, daß mehrere symmetrische Ebenen durch die Blüte gelegt werden können, oder der Blütentypus der Ranunkeln ist asymmetrisch (zygomorph)

mit nur einer einzigen Symmetrieebene (so z. B. die Blüten des Eisenhutes oder Ritterspornes). Die Anordnung der Blütenteile ist in vielen Fällen halbzyklisch, indem die Blütenhülle in abwechselnden Kreisen, die Staub- und Fruchtblätter aber in schraubiger Stellung angeordnet sind. In einigen Fällen, so bei *Delphinium* und *Aconitum*, herrscht durchgängige Schraubenstellung, in anderen, wofür die Akelei (*Aquilegia*) als Beispiel dienen möge, ist alles durchgängig zyklisch angeordnet. Die Blütenhülle selbst ist entweder einfach und dann blumenblattartig gefärbt oder doppelt; im letzteren Falle entsteht das doppelte Perianth entweder dadurch, daß zu den blumenblattartigen Blütenteilen eine kelchartige, aus Hochblättern gebildete Hülle hinzutritt (so bei *Hepatica*, *Pulsatilla* oder *Eranthis*), oder derart, daß aus Staubblättern mehr oder weniger blumenkronenartige „Hochblätter“ hervorgehen. Diese nehmen manchmal auch andere als blumenblattartige Formen an und sind dann gewöhnlich in ganz besonderer Weise mit der Funktion der Nektarabsonderung betraut. Die Blütenhüllblätter sind niemals miteinander verwachsen. Die Staubblätter sind stets in großer

Kuhschellen (*Pulsatilla*) als Beispiel einer aktinomorphen Blüte.

Zahl vorhanden und ebenso wie die Fruchtblätter mit wenigen Ausnahmen spiralig gestellt. Die manchmal sehr zahlreichen Fruchtblätter sind in den meisten Fällen frei, in einzelnen auch verwachsen (*Nigella*). Ebenso mannigfaltig ist auch der Fruchtbau. Die Hahnenfußgewächse tragen teils Schließfrüchte, zierliche Nüsschen, teils Balgkapseln, in einzelnen Fällen sogar Beeren, wie bei *Actaea*. Die Zahl der Samen, bzw. Samenanlagen ist auch nicht ein für allemal vererbt; bei den Balgfrüchtigen findet sich meist in jedem Fruchtblatt eine größere Zahl von Samen, die dann in zwei Reihen längs der Bauchnaht der Frucht angeordnet sind. Bei den Schließfrüchtigen dagegen ist nur eine einzige Samenanlage vorhanden. Ein teilweiser Ersatz für dieses Abfinden der Samenzahl ist aber hier in der Zahl der Fruchtknoten gegeben; von diesen sind bedeutend mehr vorhanden als bei den Balgfrüchtigen. Für die Verbreitung der Früchte und Samen ist durch verschiedene sinnreiche Einrichtungen gesorgt; der Verbreitung durch den Wind sind die verlängerten und behaarten Griffel der Kuhschelle (*Anemone Pulsatilla*) angepaßt, ebenso die der Walddrebe und verschiedener *Anemone*-Arten;

zu gleichem Zweck dienen bei anderen Anemone-Arten wollige Früchte und bei der Wiesenraute die häutigen Ränder der Früchte. Auf Verbreitung durch Tiere rechnen stehend bleibende, hakig gekrümmte Griffel, wie bei *Ranunculus*; die saftigen Anhängsel der Samen bei der Nieswurz hängen dagegen mit der Verbreitung durch Ameisen zusammen.

Eigenartig sind auch die Bauverhältnisse der ganzen Pflanze. Bei den ausdauernden Arten der Ranunculaceen wächst die Keimpflanze zunächst mit ihrer Gipfelknospe bis zur Blütenbildung weiter, mit der sie abschließt; für die nächste Vegetationsperiode bilden sich dann in den Achseln der grundständigen Blätter sog. „Erneuerungsprosse“, die im nächsten Frühjahr zu einer neuen oberirdischen Sprosse austreiben. Der Blütenstengel, der in einer Vegetationsperiode gebildet wurde, stirbt dann immer bis zu dieser basalen Region ab. Wenn nun die älteren Jahrgänge des unterirdischen

Die Entwicklung der Frucht bei *Nigella damascena*.
(Originalpräparat und -aufnahme von Prof. Dr. D. Heineck-Alzen.)

Rhizoms erhalten bleiben, dann entsteht ein sog. „sympodiales“ einfaches oder verzweigtes Rhizom; manchmal, z. B. bei *Ranunculus acer*, stirbt alles ab bis auf den Erneuerungspross, der dann das ganze Individuum vorstellt. In anderen Fällen erfolgt eine Knollenbildung am Wurzelstock, der als Speichersorgan dient. *Ranunculus bulbosus* ist hierfür ein bekanntes Schulbeispiel. Die Bewurzelung erfolgt bei einjährigen Arten durch Seitenwurzeln der Pfahlwurzel, bei den ausdauernden Arten aber entweder durch Erhaltenbleiben der Pfahlwurzel (*Aquilegia*, *Pulsatilla*, *Helleborus foetidus*), in welchem Falle dann vom Rhizom selbst keine oder nur sehr wenige Seitenwurzeln entspringen. Oder es stirbt die Pfahlwurzel früher oder später ab, und die Rhizome bewurzeln sich selbständig. Es kommen sogar knollig verdickte Wurzeln bei manchen Formen vor.

Die Blätter stehen am Grunde der Sprosse gewöhnlich zweizeilig, im übrigen Verlaufe jedoch meistens mehrzeilig. Quirlige Stellung findet sich nur bei der Gattung *Clematis*, deren Blätter gegenständig ausnahmsweise auch in dreizähligen Quirlen stehen. Die Form der Blätter ist innerhalb der Familie ziemlich mannigfaltig, und mehr oder weniger weitgehende Zerteilung der Blattfläche ist sehr verbreitet. Für dies alles gibt es derzeit noch keine befriedigende Erklärung. Besonders bemerkenswert

ist der bei den wasserbewohnenden Ranunkeln, nämlich bei der Untergattung *Batrachium*, vorkommende Blattdimorphismus (Abbild. Bd. I, S. 465). Unterschiede sind hier einerseits zwischen untergetauchten und Schwimmblättern, andererseits zwischen der Blattbildung von Land- und Wasserformen vorhanden. Die untergetauchten Blätter von *Ranunculus* (*Batrachium*) *aquaticus* und *fluitans* sind nämlich in feine linealische, einnervige Zipfel zerteilt; die obersten Blätter der Blütenregion dagegen werden bei *R. aquaticus* in der Regel, bei *R. fluitans* seltener zu Schwimmblättern mit zusammenhängender, netzaderiger Spreite. Zugleich gibt es aber auch Landformen, die sowohl aus den Wasserformen durch Austrocknen des Wassers als auch durch Keimen der Samen auf feuchtem Boden entstehen. In diesem Falle sind die Blätter zwar auch verzweigt, aber die hier in einer Ebene liegenden Abschnitte sind starr, breiter und auch von mehreren Nerven durchzogen.

Die Betrachtung des Stammbaues der Ranunkulazeen führt uns wieder auf die Frage nach der stammesgeschichtlichen Stellung dieser Familie und der ganzen Reihe. Bei vielen Ranunkula-

V Bestand von Wasserranunkeln (*Ranunculus aquaticus*) mit Schwimmblättern.
(Originalaufnahme von Obergärtner J. Hartmann-Dresden.)

zeen findet sich nämlich, wie auch bei vielen Nymphaeazeen, ein sehr stark an die Monokotylen erinnernder anatomischer Bau des Stammes. Wir erwähnen davon nur die mehr oder weniger zahlreichen, unregelmäßig über den Stammquerschnitt zerstreuten Gefäßbündel, das Fehlen eines Kambiumringes in den meisten Fällen und auch die Reduktion des Kambiums in den einzelnen Gefäßbündeln. Wenn man diese und andere Eigentümlichkeiten der Ranunkulazeen für eine Betrachtung ihrer entwicklungsgeschichtlichen Stellung heranziehen will, darf man aber nicht die Familie der Farnenfußgewächse allein berücksichtigen, sondern muß sich auf die ganze Reihe der „Polycarpicae“ stützen. Man stellte bisher immer bei der Darstellung des Angiospermen-Systems die Monokotylen an den Anfang; aus praktischen Gründen ist dies ja auch in diesem Werke geschehen. Aber phylogenetisch läßt sich diese Anordnung wahrlich nicht rechtfertigen, denn eine Ableitung der Dikotyledonen von den Monokotyledonen ist undurchführbar, hingegen bereitet die Ableitung der letzteren von den erstgenannten keine prinzipiellen Schwierigkeiten unter der Voraussetzung, daß eine

sehr frühe Abzweigung der Monokotyledonen angenommen wird. Dabei weisen alle derartigen Versuche zunächst auf eine Gruppe der Dicotyledonen, und zwar auf die Reihe der „Polycarpiceae“. Dieser Gedankengang, den zuerst Wettstein ausgetreten hat, stützt sich auf folgende Tatsachen: Der Bau des Stammes stimmt mit dem der Spitzkeimer überein, ebenso finden sich ähnliche Keimblattbildungen (z. B. nur ein Kotlebe bei *Ficaria*) in den gleichen Familien, die den für Dicotyledonen abnormen Stammbau aufweisen; nicht weniger eine den Verhältnissen bei den Monokotylen entsprechende Reduktion der Keimwurzel, worüber man das über die Keimung der Nymphaeaceen Gesagte vergleichen möge. Auch der Blütenbau innerhalb der Reihe zeigt zuweilen deutliche Anklänge an den der Monokotylen (z. B. die dreizählige Blüte bei *Cabomba aquatica*). Schließlich kommt hierzu noch der eigentümliche Vorgang der Pollenbildung der Monokotylen, nämlich die Teilung der Pollenmutterzellen in je zwei Zellen, die sich wieder in vier „Spezialmutterzellen“ scheiden. Dies wiederholt sich auch bei den Nymphaeaceen. Nur darf man bei solchen Erwägungen das eine nicht vergessen, daß dabei nie an eine Ableitung heute lebender Formen von anderen lebenden Arten zu denken ist, sondern stets nur an eine Ableitung des einen Typus von dem anderen. Und um der Beweise Maß vollzumachen, sprechen schließlich für eine Auffassung der Polycarpiceae als einer relativ ursprünglichen Gruppe auch noch das Fehlen von Holzgefäßen bei einigen Formen, z. B. den als Gartengewächsen so beliebten Magnoliaceen, das häufige Vorkommen von Holzpflanzen in der Reihe, die häufig nicht kreisförmige Anordnung der Blütenteile, die Unbestimmtheit in der Zahl der Blütenorgane, die Apokarpie und anderes mehr. Doch betont Wettstein unseres Erachtens mit Recht, daß die Merkmale der Polycarpiceae zwar auf eine frühe Entwicklung dieser Gruppe hinweisen, aber doch nicht auf eine so tiefe Stufe, daß es möglich wäre, die übrigen Angiospermen von ihnen abzuleiten, wenn er sagt: „Der frühen Entwicklung der Polycarpiceae wird vollauf Rechnung getragen, indem sie an den Beginn des Polypetalen-Systems gestellt werden; sie stellen nicht Anfänge der ganzen Angiospermen, sondern Anfangsglieder jener großen Gruppe dar, bei welcher sich bereits eine zwitterige Blüte mit Korolle herausbildete. Dieser Entwicklungsstufe mußten aber schon andere Formen vorausgehen, und solche erblicke ich in den Monochlamydeen.“

Nach diesem Einblick in die Methodik moderner systematischer Forschung erlaube man mir, Weiteres über die interessante Anatomie der Hahnenfußgewächse beizubringen. Da wäre vor allem, daß die Spaltöffnungen bei diesen Pflanzen keine besonderen Nebenzellen besitzen wie alle anderen. Bei einigen Ranunculaceen (*Aconitum Napellus*, *Caltha palustris*, *Clematis integrifolia*, *Paeonia corallina* und *tenuifolia*, *Trollius europaeus* und in besonderer Form, nämlich H-förmig bei *Anemone silvestris*) gibt Haberlandt in seiner physiologischen Pflanzenanatomie das Vorkommen von Armpalisaden an. Wasserspalten an den Korbzähnen der Blätter finden sich wieder nach Strasburger bei *Aconitum*, *Delphinium* und *Eranthis* einzeln, bei *Helleborus niger* gepaart, bei *Ranunculus lanuginosus* zu mehreren. Prof. M. Nestler gibt für die Arten von *Helleborus* und *Ranunculus* das Vorkommen von Wasserspalten als ganz allgemein an. Drüsig, schleimabsondernde Blattzähne werden von Reinke für *Caltha palustris*, *Helleborus intermedius* und *Ranunculus repens* verzeichnet. Die Behaarung der Hahnenfüße ist besonders

Berühmte Systematiker

A. Endlicher

A. de Candolle

C. v. Linné

interessant. Sie besteht aus Deck- und Drüsenhaaren, von denen die ersteren meist einzellig, verschieden lang, mitunter — so bei *Clematis* — sogar nur einseitig verdickt sind. Die Drüsenhaare der Ranunkeln selbst sind nach Nestler und Schilling einzellig, von keuliger Gestalt; Sekret wird in ihnen gewöhnlich nicht gebildet, sondern

sie haben meist nur farblosen Inhalt, was darauf deutet, daß sie wahrscheinlich zum Aufsaugen von Wasser dienen. Eine Ausnahme machen nur die Drüsenhaare von *Ranunculus* (*Batrachium*) *fluitans* und *Caltha palustris*, die nach Schilling gleich den Trichomen vieler anderer Wasserpflanzen Schleim ausscheiden, ebenso die Drüsenhaare von *Thalictrum*, die ein öliges Sekret von unbekannter biologischer Bedeutung bilden.

Diese Gruppe merkwürdiger Gewächse wird von der neueren Systematik in drei Unterfamilien geschieden, als deren Hauptmerkmale Prantl folgendes angibt: Die Samenanlagen sind zu beiden Seiten der Bauchnast gewöhnlich in je einer Reihe, selten einzeln; die Pflanzen bringen eine mehr- oder einsamige Balgfrucht hervor. Dies sind *Paeoniaeae*, wenn die Blüten fast stets einzeln

Der Blütenbau der Gahnenfußgewächse.

1 = Märzblumen (*Anemone Hepatica*). 2 = Meßwurz (*Helleborus viridis*). 3 = *Eranthis hiemalis*. 4 = Walbrebe (*Clematis Vitalba*). 5 = Alpenrebe (*Cl. alpina*). 6 = Akelei (*Aquilegia vulgaris*). 7 = Bittersporn (*Delphinium Staphysagria*); die vorderen Blätter sind weggenommen. 8 = Rauhschelle (*Anemone Pulsatilla*) im Durchschnitt. 9 = Eisenhut (*Aconitum Napellus*). 10 = *Myosurus minimus*.

(Nach Wettsteins Handbuch.)

stehen und keine Honigblätter besitzen. Das äußere Integument (die Eihülle) der Samenanlagen ist länger als das innere und mächtig entwickelt; die Fruchtknotenwand ist fleischig, die Narbe verbreitert. Die Helleboreae erkennt man wieder daran, daß die Blüten einzeln oder in zymösen oder traubigen Blütenständen angeordnet sind; ihr äußeres

Integument ist nicht länger als das innere, ihre Fruchtknotenwand nur selten fleischig.

Wenn schließlich die Samenanlagen einzeln am Grunde der Bauchnaht gebildet werden, und eine einsamige Schließfrucht vorhanden ist, rechnet man die betreffenden Gattungen zu den Anemoneae.

Nach dieser vielleicht ein wenig spröden, aber notwendigen allgemeinen Übersicht können wir nun auf die wichtigsten und verbreitetsten Gattungen in ihren besonderen Eigentümlichkeiten übergehen.

Von den Paeoniae müssen wir vor allem die liebliche Pfingstrose (*Paeonia*) erwähnen, deren etwa 15 Arten allerdings meist in Zentral- und Ostasien bis im subarktischen Gebiet und weniger in den mitteleuropäischen und mediterranen Ländern heimisch sind. Hierher gehören auch die etwa 16 Arten der Sumpfdotterblume (*Caltha*), die in zwei geographisch getrennten Untergattungen, die eine nördlich, die andere südlich von den Tropen, lebt. Unsere wohlbekannte *Caltha palustris* ist in Europa, Asien und dem atlantischen Nordamerika verbreitet; die Trollblume (*Trollius*) hat etwa 12 Arten vom arktischen bis zum mitteleuropäischen Gebiet, aber auch in Zentral- und Ostasien, im pazifischen und atlantischen Nordamerika. Die Nieswurz (*Helleborus*) lebt mit ungefähr 15 Arten im mediterranen und mitteleuropäischen Gebiet; das Teufelsauge (*Eranthis*) mit 7 Arten in Zentral- und Ostasien und an den Küsten des Mittelmeeres. Die zierliche Jungfer im Grünen (*Nigella*) entwickelt 16 Arten im Mittelmeergebiet, einzelne allerdings auch in Mitteleuropa, das Christophsraut (*Actaea*) seine 13 Arten von Japan bis Mitteleuropa, auch im arktischen Sibirien. Die prächtige Akelei (*Aquilegia*) ist in ungefähr 50, zum Teil unter sich sehr nahe verwandten Arten in Zentralasien, Sibirien so gut zu Hause wie in Mitteleuropa und in Nordamerika. Der Rittersporn (*Delphinium*), mit seinen ungefähr 120 Arten besonders formenreich, ist ein Kind des Mittelmeergebietes, aber auch der Alpen. Der stattliche Eisenhut (*Aconitum*) erlaubt, an 60 Arten zu unterscheiden, und schmückt Hochgebirge und Bergwald von den nördlichen Ländern bis zum blauen Küstenrand des klassischen Meeres. Welche Fülle wohlbekannter und ans Herz gewachsener Blumengesichter ist dies doch! Und dazu fast jedes bemerkenswert durch Schönes, Seltsames, eigene Lebensäußerung, verklärt durch Geschichte und Sage, so daß man einen Band dieses Werkes allein mit ihren Lebensbildern schmücken könnte!

Sehen wir uns zuerst die Pfingstrose (*Paeonia*) näher an. Als beliebte Zierpflanze wird sie namentlich in zwei Arten, als *P. officinalis* L. und *P. corallina* Retz, gezogen. Letztere mit ihren großen, roten Blumen und filzigen Balgkapseln ist verbreiteter, aber weniger bekannt. Eine andere, zuweilen kultivierte Art (*P. Moutan* Sims.), ist strauchartig und stammt aus Japan. Sie ist dadurch bemerkenswert, daß sie die Fähigkeit reichlicher Adventivsproßbildung aus den Wurzeln besitzt. So kräftig ist ihre Wiederherstellungskraft, daß ganze Pflanzen sich sogar aus einzelnen Wurzelfragmenten bilden können. *Paeonia officinalis* bildete übrigens früher in den Gärten einen eisernen Bestand, da sowohl ihre Wurzelstöcke wie auch die Blumen und Samen als heilkräftig, namentlich als Mittel gegen Epilepsie, galten. Jetzt hat sich dieser Ruf allerdings verloren, man schätzt sie nur noch als Schmuck und hat von ihr zahlreiche Spielarten, meist mit gefüllten Blüten, gezogen. Diese Füllung der Blüten, die gerade bei den Ranunkulazeen überhaupt nicht selten ist, kommt hier wie bei allen

Arten, die keine Honigblätter besitzen, dadurch zustande, daß an Stelle der Staubblätter Gebilde von der Gestalt der Blätter der Blumenhülle, jedoch oft mit schmalerem Ansatz, auftreten. Man findet jedoch Ähnliches zuweilen auch bei Formen mit Honigblättern, wobei dann diese ebenfalls durch Blätter der Blumenhülle ersetzt werden. In anderen Fällen nehmen auch Staubblätter die Form von Honigblättern an.

Eine ganz besonders ausgezeichnete Zierpflanze ist *Paeonia tenuifolia* mit ihren doppelt dreizähligen Blättern und vierteiligen Blättchen, noch dazu mit feinen, lineal-pfriemenförmigen Lappchen. Hierzu kommt noch, daß die Blumen purpurrot oder dunkelfarmesin sind und purpurne Staubfäden mit gelben Antheren besitzen.

Pfingstrosen (*Paeonia*). (Naturaufnahme von W. Salby-Wiesbaden.)

Die oben genannte Baumpäonie wird sogar über einen Meter hoch und entwickelt Blumen von fast doppelter Größe wie *P. officinalis*. Sie wird in verschiedenfarbigen Rassen gezogen, verlangt aber, wenigstens in Norddeutschland, Winterschutz. Man vermehrt sie auch durch Veredelung auf Wurzelstücke der *P. officinalis*.

Als allgemeine Kulturregeln nennt A. Lehmanns ausgezeichnetes Werk über die Gartenzierpflanzen etwa folgendes: Die Päonien eignen sich besonders gut als Einzel- oder Gruppenpflanzen auf sonnigen Rasenplätzen. Sie gedeihen in jedem, nicht zu schlechten Gartenboden. Am schönsten entwickeln sich die Pfingstrosen allerdings dann, wenn sie lange Zeit ungestört auf ihrem Plage belassen werden. Das kann aber nur dann geschehen, wenn man vorher den Boden tief umgegraben und ihn mit altem Kompost und anderen humusreichen Erdbarten untermengt hat. Blühen die Päonien

nicht mehr reichlich, und gehen auch die Blüten bezüglich der Größe zurück, dann ist es allerdings Zeit, an eine Verjüngung der Pflanzen zu gehen. Manche Gärtner verschneiden die staudenartigen Pfingstrosen bis zum Grunde, wenn die Blätter vergilben. Die leeren Beete werden dann mit Sommer- und Herbstblumen bepflanzt. Gar zu sehr ist allerdings dazu nicht zu raten, weil die Pflanzen unter diesem Verfahren doch mehr oder weniger leiden. Auch von einer Vermehrung durch Ausfaat ist abzuraten, weil die Samen sehr langsam keimen, und es lange dauert, ehe man blühbare Pflanzen herangezogen hat. Dagegen lohnt sich bei den Stauden die Vermehrung durch Teilung

Paeonia arborea. (Naturaufnahme von F. E. Peters†=Graz.)

des knollenförmigen Bodestockes sehr, wobei aber darauf zu achten ist, daß jede abgetrennte Knolle an ihrem „Halse“ eine Knospe zeigt. Die strauchartigen Päonien vermehrt man wieder durch Abtrennung schon bewurzelter Stengel. Die Bewurzelung eines jeden Stengels erreicht man dadurch, daß der ganze Stock etwas tief in die Erde gesetzt wird. Eine andere empfehlenswerte Vermehrungsart der Strauchpäonien ist die durch Pfropfen in den Spalt oder in dreieckigem Ausschnitt auf Wurzeln von *Paeonia albiflora*. Die beste Zeit dazu ist Anfang August bis Mitte September. Die Veredelungen läßt man unter Glasglocken oder in einem Kasten mit Fenstern so lange, bis die Edelreiser angewachsen sind. Eines besonderen Winterschutzes bedürfen die Päonien nicht. Nur die strauchartige *Paeonia arborea* (siehe das Bild) macht eine Ausnahme. Sie gefriert oft bis auf den Boden zurück. Deshalb behandelt man sie ähnlich wie die *Gunnera* oder umhüllt sie wenigstens dicht mit Fichtenreisig. Im

März, spätestens im April, muß allerdings die Hülle schon wieder entfernt werden, damit die jungen Triebe nicht vergeilen. Für kalte Mainächte sind aber noch Decken oder Bastmatten bereitzulegen.

Biologisch interessanter als die Pfingstrosen sind die Vertreter der Gattung Nießwurz (*Helleborus*). Sie enthalten in ihren Wurzeln betäubende giftige Stoffe, die seit dem Altertum medizinische Verwendung finden. Das Gift wirkt bei Menschen und Tieren hemmend auf die Atmung und den Herzschlag und kann nach vorausgegangener Muskelschwäche und Darmentzündung sogar den Tod herbeiführen. Schon der Volksname der Pflanze, der darauf zurückgeht, daß die pulverisierte Wurzel die Schleimhäute heftig angreift und dadurch zum Niesen reizt, deutet auf ihre medizinische Geschichte.

Ein anziehendes Bild entrollt sich, wenn man der Lebensgeschichte ihrer Blüten nachforscht. Sie sind stets groß, aber mitunter durch Unscheinbarkeit der Farben wenig auffällig. Die Blütenhülle besteht aus 5 großen Kelchblättern, die bei der stinkenden Nießwurz (*H. foetidus*) und der grünen Nießwurz (*H. viridis*) grün, bei der schwarzen Nießwurz (*H. niger*) jedoch weiß, zuweilen, namentlich beim Altern, rötlich angelauten sind. Diese unscheinbare Färbung so großer Blüten, die in ihrer Bestäubung doch Insekten angepaßt sind, könnte die Ansicht hervorrufen, daß hier eine unvollkommene Anpassung vorliege, und der „Schauapparat“ solcher Blüten unmöglich zur Anlockung der Insekten genügen könne. Aber demgegenüber ist doch zu bedenken, daß die *Helleborus*-Arten ausgesprochene Frühblüher sind (namentlich *H. viridis* und *foetidus*), die schon im März und April, wenn nicht in günstigen Jahren noch früher, ihre Blumen öffnen. Um diese Zeit haben sie sehr wenig Konkurrenz, werden also schon deshalb von frühfliegenden Insekten, z. B. der Honigbiene, ihres reichlichen Honigs wegen genügend aufgesucht. Nur eine Art, nämlich *H. niger*, deren Name auf die schwarze Farbe des Wurzelstockes zurückzuführen ist, hat in ihrem weißen Kelche einen auffälligen Schauapparat, blüht aber noch viel früher. Gerade diese Eigenschaft, die Blüten bereits vom Dezember ab zu entfalten, hat ihr ja den Namen Schne- oder Christrose eingetragen. Bei uns fliegen aber um Weihnachten die in Betracht kommenden Bestäuber nicht. Ist also hier nicht eine offenbare Unzweckmäßigkeit vorhanden? Das scheint indes nur auf den ersten Blick so. Nach Smalian ist der Schluß auf mangelnden Zusammenhang zwischen dem Schauapparat und Insektenbesuch auch hier nicht berechtigt, „denn“ — wie dieser Autor sagt — „in der eigentlichen Heimat der Pflanze, den östlichen Boralpen, sind diejenigen Insekten zu beobachten, welche dieser Blume ihre Dienste weihen; und es ist bekannt, daß Insekten den Blumen bis hoch in die Schneeregion folgen, daß sie hohe Kälte ertragen, sogar vorübergehend erstarren, um von den wärmenden Strahlen immer zu neuem Leben erweckt zu werden.“ Für diese Blütengäste entwickelt *Helleborus* große Nektarien in Form dütenförmiger Honigblätter, die meist zu 13 zwischen dem Kelche und den Staubblättern stehen und, wie alle Teile dieser Blüte, merkwürdigerweise eine schraubige Stellung aufweisen. Der in den Nektarien reichlich dargebotene Honig ist gegen eindringende Masse durch das Herabhängen der Blüten in zweckmäßigster Weise geschützt. Aus der Blütenbiologie dieser Pflanze ist auch noch merkwürdig, wie sie ihre Fremdbestäubung dadurch erzielt, daß die Blüten protogyn sind, d. h. die Narben vor den Staubbeuteln blühen, die sich später hervordrängen und dann den vorher engen Blüteneingang erweitern.

Aus der frühen Blütezeit, namentlich der schwarzen Nieswurz, ersieht der Kenner, daß diese Gewächse sehr kältehart sein müssen. Und gleiches verrät sich auch an den Blättern. Diese sind schöne und auffällige Gebilde, denn sie sind in sehr charakteristischer „fußförmiger“ Weise zerteilt. Bei *H. niger* und *viridis* finden sich allerdings nur wenige oder gar einzeln vom Rhizom entspringende Laubblätter; die Blätter der Blütenregion sind bei *H. viridis* und anderen verwandten Arten meist laubig, bei *H. niger* sogar nur schuppenförmig. Bei den Arten des Kaukasus und Kleasiens überdauern die Laubblätter den Winter, bei *H. viridis* und den südeuropäischen Arten sterben sie im Herbst ab. Bei *H. foetidus* stehen die Laubblätter zu mehreren am oberirdischen, meist holzigen Stengel. Auch diese sind winterhart und durch eine äußerst interessante Besonderheit ausgezeichnet. Der bekannte Blütenbiologe Prof. F. Ludwig hat dies näher studiert und folgendermaßen beschrieben. Er sagt: „Der wesentlichste Teil der Entwicklung der Vegetationsorgane und des umfangreichen Blütenstandes fällt bei dieser Nieswurz in das Winterhalbjahr. Der Hauptnutzen der winterlichen Entwicklung liegt in dem Mangel an Konkurrenz bei der Ausnützung des Wohnraumes, dann aber auch noch im ungeschmälernten Genuß des Lichtes während der Wintermonate. Da die Pflanze im und am Laubwalde wächst, so können Licht- und Wärmestrahlen, die im Sommer durch das Laubwerk der Bäume zurückgehalten werden, ungehindert auf das Laub der Nieswurz fallen. Um diese Vorteile ausnützen zu können, mußte natürlich eine große Widerstandsfähigkeit gegen die Winterkälte erworben werden. Tatsächlich strecken die Blätter der stinkenden Nieswurz, die an ihren basalen Gelenken beweglich sind, selbst bei sehr niedrigen Graden, wenn sich diese nur über Null halten, ihre Fläche noch breit in die Luft. Erst wenn die Lufttemperatur unter den Gefrierpunkt herabsinkt, senken sich die Blätter schlaff herab, nehmen „Schneestellung“ ein. Sobald die Temperatur wieder über den Nullpunkt steigt, richten sie sich neuerdings auf, und Assimilation sowohl wie Wachstum geht ungehindert vor sich. Die jungen Blättchen an der Sproßspitze wenden sich aber nur wenig zur Seite, und so hat man in der Abwärtsbewegung der älteren Blätter vielleicht nicht so sehr eine Vorrichtung zur Kälteflucht vor sich (die Einwirkung der Kälte würde ja auch dadurch nur in geringem Grade abgeschwächt) als vielmehr eine solche, die der Pflanze auf den tiefer liegenden Schneemassen zahlreiche Stützen schafft, durch welche Sproßspitze, Blütenstand und obere Blätter soweit als möglich über den Schnee gehalten werden, um ihren Lebenstätigkeiten nachgehen zu können.“ In dieser Beziehung ist auch das von Ludwig beobachtete Verhalten der Blütenstände von Interesse. Der genannte Forscher beobachtete nämlich, daß sich zur Frostzeit entfaltete Blütenstände stark abwärts bogen, bei Tauwetter aber nur dann sofort wieder aufrichteten, wenn auch der Boden aufgetaut war, im anderen Falle hingen sie schlaff und wie verwelkt herab und gewannen ihre Straffheit erst wieder, wenn auch der Boden auftaute. Die Blätter verhalten sich demnach ganz anders; für sie genügt schon die Erhöhung der Lufttemperatur über den Taupunkt. Ludwig ist der Meinung, daß diese Abnahme der Turgeszenz der Blütenstandachsen und der Blattgelenke ihren Grund in einem Rücktritt des Wassers der saftigen Gewebe in den blättertragenden unteren Teil des Stammes hat. Dieses Reservewasser reicht wohl unter gewöhnlichen klimatischen Verhältnissen dazu aus, um — auch bei dauerndem Bodenfrost — bei einer Lufttemperatur

über 0° die Turgeszenz des Gelenkpolsters wiederherzustellen, nicht aber um den gegen Verdunstung weniger geschützten, höher gelegenen (ca. 30 cm hohen) Blütenständen den erzeugten Wasserverlust völlig zu decken. Hierzu bedarf es unbedingt der Aufnahme neuen Bodenwassers, und diese ist bei gefrorenem Boden nicht möglich, um so mehr erscheint also die Stützenstellung der Blätter für den schlaff werdenden Stengel von Bedeutung. Seine Auffassung, daß diese Blattbewegungen nicht einen Kälteschutz, sondern eine Stützfunktion bedeuten, findet Ludwig unterstützt durch Beobachtungen, die er im Sommer und an im Zimmer gezogenen Pflanzen machte. Es heißt bei ihm: „Bei ersteren fand ich die unteren Blätter häufig nach unten zurückgebogen, so daß das vegetative Stammende oder der Blütenstand über das Laub, das den Boden bedeckte, emporgehoben wurde. Bei einem Keimlinge, der zwischen den dichten Ästen einer Stapelia im Blumentopf aufgegangen war, hat infolge Lichtmangels das hypokotyle Stengelglied eine Länge von 3—4 cm erreicht, die stark verlängerten Keimlappen hatten sich hakenförmig nach unten gebogen. Nachdem ich das Pflänzchen in einem größeren Topf isoliert hatte, entwickelte sich das erste Blatt mit langem Stiel, der sich mit dem Blatt nach unten zu, dann wieder nach oben, zu einem Dreiviertelkreis bog, als wenn er gleichfalls eine Stütze suchte. Eine andere Keimpflanze, die ich im Topf im Zimmer zog, trug die kürzeren Kotyledonen dicht am Boden. Die Achse blieb auch später nach üppiger Entfaltung des Blattwerkes stets senkrecht infolge zweckmäßiger Aufwärtskrümmungen der Blattstiele. Die Bewegungen der unteren Blätter nach außen und abwärts erfolgten so, daß der Schwerpunkt möglichst tief in oder nahe der Achse erhalten blieb, und die Pflanze trotz ihres noch dünnen Stengels ihre vertikale Lage beibehielt. Mag man nun diese Einrichtungen als Stütz- oder Klettervorrichtungen deuten oder als solche zur Erhaltung und Festigung des Gleichgewichtes (Verlegung des Schwerpunktes nach der mechanischen Unterstützungsfläche zu)—jedenfalls wird durch sie wie durch die winterharten Gewohnheiten der Pflanze eine Aufrechterhaltung der Achse erreicht, die im Sommer und Herbst durch Wind und Laubfall usw., im Winter durch Schneedruck gefährdet wird.“ Das ist ein sehr bemerkenswertes Ergebnis dieses zur Pflanzenpsychologie sich bekennenden Forschers. Denn durch sie ist es bewiesen, daß solche Bewegungen nur durch ein Stützbedürfnis auch ohne Mitwirkung der Kälte ausgelöst werden. Damit ist natürlich aber durchaus nicht bestritten, daß der Frost unter normalen Verhältnissen das wirksame, auslösende Moment ist.

Wir dürfen unser Lebensbild der Nieswurz nicht verlassen, ohne nicht auch der Samenverbreitung, speziell von *H. foetidus*, zu gedenken. Es gibt hierüber Untersuchungen von Sernander, die darzulegen haben, daß diese Pflanze eine der vorzüglichsten „Myrmekochoren“ sei. Mit anderen Worten, ihre Samen werden der ölhaltigen Nabelschwiele wegen von Ameisen gesammelt und ins Nest getragen. Die Ameisen legen sie auf den Wegen dahin in verschiedenen Lagern nieder; die ins Nest getragenen werden zum großen Teil an den Schwielen stark angefressen, ohne dadurch keimfähig zu werden, und dann von Zeit zu Zeit um das Nest herum verstreut. Dementsprechend findet sich die Pflanze längs der Ameisenstraßen, besonders an den „Depots“ und in dichter Ansiedelung um die Ameisenhaufen. Daß die Pflanze trotzdem keine allgemeine Verbreitung gefunden hat, liegt nach Ludwig darin, daß ihre Keimung sehr schwer erfolgt, wenn die Samenschale, aus der die Kotyledonen herausgezogen werden müssen,

nicht durch eine genügend schwere Bodendecke zurückgehalten wird. Wenn die Schale durch den Keimling aus Licht gezogen wird, entläßt sie die jungen Pflänzchen nicht, und diese gehen zugrunde. Eine weitere Ursache, warum die stinkende Nieswurz relativ selten ist, liegt darin, daß die jungen Pflanzen sehr stark von Schnecken angefressen werden als Beweis, daß die Anpassungen nicht vollkommen, sondern noch sehr verbesserungsbedürftig sind, was sehr gut mit der von uns vertretenen Anpassungstheorie, nicht aber mit der Zuchtwahllehre, übereinstimmt. In den Gärten wird besonders *Helleborus niger* als winterliche Schnittpflanze geschätzt. Außerdem werden mehrere der kaukasischen Arten nebst Bastarden dieser unter sich und mit *H. purpurascens* als Zierpflanzen kultiviert.

Jungfer im Grünen (*Nigella damascena*), mit Stiefmütterchen vergesellschaftet.
(Naturaufnahme von B. Galdy-Wiesbaden.)

Die zweite Gattung, die wir zu betrachten haben, der Schwarzkümmel (*Nigella*), schließt sich zwar im Blütenbau eng an die vorige Gattung an, weicht jedoch in der Fruchtbildung beträchtlich ab. Eine Art, der Acker-Schwarzkümmel (*N. arvensis*), ist ein verbreitetes Unkraut, aber eine zweite, aus dem Mittelmeergebiet stammende Form (*N. damascena*) ist eine der reizendsten Blumen mit ihrem pikant seltsamen Köpfchen und wird mit Recht vielfach in unseren Gärten gezogen. Ihre Blüte steht unmittelbar oberhalb eines Kranzes zarter, fein fiederteiliger Blätter, was unser Volk sehr sinnig verwendet hat, als es für diese Pflanze die Namen „Braut in Haaren“, „Gretel im Busch“, „Jungfer im Grünen“ schuf. Der Botaniker hat für diesen Kranz eine andere Deutung. Wie bei der Nieswurz, sagt er, so funktionieren auch hier die

bläulich-weiß gefärbten Kelchblätter als Anlockungsapparat, während die eigentlichen Kronblätter als Honigblätter zu Nektarien umgestaltet sind. Diese Nektarien haben hier eine ganz besondere Form. Sie sind wie kleine Schalen mit einem zarten Deckel und stecken an einem knieförmig gebogenen Stiele, der vom Knie aufwärts gespalten ist; das Nektarium wird dadurch zweilippig, und die Honigrube ist durch die Unterlippe wie durch einen Deckel verschlossen. Den solchermaßen verborgenen Nektar vermögen natürlich nur geschickte „blumentüchtige“ Insekten, wie die Bienen und Hummeln, durch Abheben des Deckels hervorzuholen. Dieser Deckel, der sich nicht seitlich verschieben kann, weil er beiderseits durch einen Wulst festgehalten wird, schließt sich noch dazu nach jedem Insektenbesuch sofort wieder, so daß der Honig dauernd geschützt wird. Jede einzelne Blume blüht lange Zeit hindurch, wobei die Staubblätter sich einzeln nacheinander öffnen, so daß reichliche Gelegenheit zur Fremdbestäubung geboten wird. Es ist also unsere „Braut in Haaren“ ein wahres Wunder geschicktester Blütenmechanik.

Auch in der Fruchtbildung weicht die Gattung von dem typischen Verhalten der Ranunkulazeen (die nämlich einzelne getrennte Früchte bilden) gänzlich ab. Durch vollständige Verwachsung der in der Fünzfahl vorhandenen Fruchtblätter entsteht hier eine gefächerte, urnenförmige, trockenhäutige Kapsel; sie springt an ihrer Oberseite mit Spalten auf und entläßt aus diesen die Samen, die bei manchen Arten mit trockenen Flügelsäumen versehen und somit der Verbreitung durch den Wind angepaßt sind. Die Frucht von *N. damascena* ist außerdem blasig aufgetrieben, weil die Kapsel in der Wandung große, lufthältige Hohlräume besitzt, über deren biologische Wertung wir noch nicht einig sind (Bild S. 350).

N. sativa war früher officinell, und ihre Samen werden als Schwarzkümmel namentlich in Südeuropa noch immer dem Brote beigemengt. Ähnlich dienen merkwürdigerweise auch in Afghanistan die Samen einer *Nigella* unter dem Namen „Siah-Dag“ als Gewürz.

Ein guter Bekannter tritt uns entgegen in der Trollblume, der Kugelranunkel (*Trollius*), bei uns vor allem durch die Art *T. europaeus* vertreten, die auf feuchten Wiesen, auch ziemlich hoch in die Bergregion steigend, an vielen Orten steht. Von weitem kann sie allenfalls mit einer Ranunkel verwechselt werden, denn der ausdauernde Wurzelstock ist von saftstrohenden Blättern umgeben, die in ihrer Form denen des scharfen Hahnenfußes ähneln. Die großen kugeligen, hochgelben Blüten sitzen auf langen Blütenstängeln und bieten in dichteren Beständen auf den saftig-grünen Wiesen ein prächtiges Bild. Wenn man sie näher betrachtet, bemerkt man bald den Unterschied von der Hahnenfußblüte. Abgesehen von der Größe der Blüte, gibt er sich in der viel größeren Zahl der gelben Kelchblätter kund, die außerdem die inneren Blütenteile mehr oder weniger umhüllen, indem sie sich über ihnen, sich gegenseitig teilweise deckend, zusammenwölben. Durch diese Eigentümlichkeit wird bei dieser Pflanze, die durch ihre feuchten Standorte nicht bloß dem Regen, sondern auch reichlicher Taubildung ausgesetzt ist, der Pollen und Honig ausgiebig gegen Benetzung geschützt. Von den glänzenden, glatten Kelchblättern, die bei ihrer erhöhten Zahl eine Füllung der Blüte vortäuschen, läuft jeder Wassertropfen nach außen ab. Geringegen können kräftigere Insekten, Hummeln und Bienen recht wohl durch Auseinanderbiegen diese Hülle durchbrechen und zum Honig und Pollen gelangen. Diesem einfachen Apparat ent-

sprechend, sind die zu Nektarien ausgebildeten Blumenblätter hier bedeutend einfacher gestaltet: sie sind schmal, zungen- oder spatelförmig und besitzen eine offene Honiggrube. Aber gerade dies machte einen ausgiebigen Schutz gegen Benetzung sehr angezeigt. Es war daher durchaus zweckmäßig, daß sich die Kelchblätter, obzwar sie auf jede Änderung der Luftwärme und Luftfeuchtigkeit reagieren, doch selbst im vollen Sonnenscheine niemals vollständig öffnen. Sämtliche Teile der Blüte, also auch die Kelchblätter, sind in Spiralstellung angeordnet; die Blüte ist also eine vollständig azyklische, was

ein weiteres Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Ranunkelblüte abgibt, da diese bekanntlich Kelch und Krone in Kreisen angeordnet hat. Zu erwähnen wäre noch, daß hier, wie bei vielen Ranunkulazeen mit einer aus einer größeren Zahl von Blättern bestehenden Blütenhülle, zwischen den äußeren und inneren Blättern dieser Übergangsformen auftreten, indem die in der Knospe gedeckten inneren Glieder häufig zarter, kronenartiger, die äußeren mehr feldartig, derber ausgebildet sind.

Über die Fruchtbildung ist nichts weiter zu sagen. In ihren Balgkapseln reifen viele schwarzglänzende Samen, über deren Verbreitung nichts Gewisses bekannt ist.

Die Gattung der Sumpfdotterblumen (*Caltha*) umfaßt 16 Arten, von denen jedoch nur eine, die eigentliche Sumpfdotterblume (*C. palustris*), bei uns vorkommt. Wie schon der Name besagt, findet sich die Pflanze auf feuchten, sog. „sauren“ Wiesen, insbesondere an Wassergräben und auf Boden, der von Frühjahrshochwässern vorübergehend überschwemmt zu sein pflegt. Da sie mit ihren leuchtend dunkelgelben Blüten in hohem Grade auf-

Sumpfdotterblume (*Caltha palustris*).
(Nach Thomas Flora.)

fällig ist, kann man zu ihrer Blütezeit auf Wiesen mit verschiedenen feuchten Stellen oder durchziehenden Wassergräben die Bodenverhältnisse schon von weitem erkennen. Das Farbenbild, das die Dotterblume gewährt, wird besonders dort sehr anziehend, wo sie im Verein mit der ebenfalls feuchteren Grund liebenden, hochstengeligen Schlüsselblume (*Primula elatior*) vergesellschaftet vorkommt, wenngleich diese ihr auf das eigentliche sumpfige Gelände nicht folgt. Dieser natürlich auch auf die Insekten sehr lockend wirkende Schauapparat wird von den 5—7 gefärbten Kelchblättern gebildet; wirkliche Blumenblätter fehlen dieser Pflanze, ja sie besitzt nicht einmal Nektarien. Der Honig wird von ihr in zwei seitlich am Grunde der Fruchtknoten befindlichen kleinen Drüsen abgesondert und fließt im Blütengrunde zusammen. Aber sie beschränkt sich nicht darauf, sondern bietet in den zahlreichen Staubgefäßen auch reichlichen Blütenstaub ihren Besuchern dar. Da nun hier alle die gesuchten Schätze

ziemlich frei und offen daliegen, ist natürlich der Besucherkreis einer so auffälligen, dabei in der frühen Jahreszeit noch unter geringer Konkurrenz stehenden Blume ein überaus reichlicher; nicht nur Bienen und Hummeln, sondern auch Fliegen und Käfer wissen sich den gastlichen Tisch zunutze zu machen.

In ihrer ausgesprochenen Vorliebe für sumpfigen Boden zeigt die Pflanze eine Reihe sehr charakteristischer Anpassungen. Zunächst einmal beherrscht sie das Gebiet, das sie sich erobert hat. Einerseits ist sie siegreich gegen die Gräser und sonstigen Wiesenpflanzen, die gerade den fettigen und sumpfigen Boden vermeiden; sie selbst aber ist durch den scharfen, unangenehm schmeckenden Saft der Stengel vor der Schädigung durch Weidetiere hinreichend geschützt. Dazu kommt noch, daß sie reichlichen Samen bildet und außerdem mittels eines mächtigen, unterirdischen Organsystems durch Jahre hindurch ausdauert; so ist es denn nicht verwunderlich, daß sie oft in solcher Üppigkeit anzutreffen ist.

Da die Pflanze an ihrem Standorte Wasser in Hülle und Fülle zur Verfügung hat, so ist sie nicht genötigt, gleich den Bewohnern wasserarmer Böden mit einem tiefgehenden Wurzelwerk den geringsten Spuren des belebenden Nasses nachzugehen; sie schöpft stets aus dem vollen. Wohl aber droht ihr der weiche, nachgiebige Sumpfboden mit einer anderen Gefahr, denn er nötigt sie, für eine ausreichende Verankerung zu sorgen. Wenn wir die Pflanze aus dem Boden ziehen, wobei wir sämtliche Blattstengel tief an der Erde fassen müssen, um sie nicht abzureißen, so bemerken wir erst, wie fest die Sumpfdotterblume im Boden wurzelt. Die sehr starken und dicken Wurzeln gehen zwar nicht tief, wohl aber verzweigen sie sich in oberflächlicher Lage nach allen Seiten, und bei dem meist dichten Bestande der Pflanze wirken so die einzelnen Individuen durch dichte Verflechtung des Wurzelwerks noch im Sinne der Befestigung als Verlandungspioniere. Die feinen Wurzelhaare, die so zahlreich bei den Pflanzen trockener Standorte entwickelt werden, sind hier nur schwach ausgebildet. Hat doch die Pflanze ein solches Aufsuchen des Bodenwassers nicht nötig.

Manches Interessante bietet auch der oberirdische Teil der Pflanze. Ihr junger, über den Erdboden tretender Sproß ist von einer Scheide häutiger Niederblätter umhüllt, aus der sich dann der kräftige, 15—50 cm hoch werdende eigentliche Trieb erhebt. Dieser entsendet mehrere, im unteren Teile hohle und glatte Stengel, die mehr oder weniger schräg nach oben steigen und sich mehrfach gabelig verzweigen; sie sind knotig angeschwollen, und an jedem solchen Knoten entspringt ein Laubblatt, das an seiner Ansatzstelle den Stengel mit scheidigem Grunde umfaßt. Die großen, nierenförmigen und meist schwach gekerbten Blätter sind in biologischer Hinsicht mit verschiedenen lehrreichen Eigenschaften ausgerüstet.² Zunächst einmal sind sie von fleischiger, saftiger Beschaffenheit, wie alle Organe dieser Pflanze, denn für Transpirationsschutz braucht hier nicht gesorgt zu werden. Und da die scharfen Inhaltsstoffe außerdem noch genügend gegen Angriffe sichern, so bedarf es auch keiner weiteren Abwehrmittel. Wir verstehen also, warum die Pflanze glatt und kahl ist. Bei der Größe ihrer Blätter und dem dichten Bestande der Pflanze würde für die tiefer liegenden Blätter in gefährlichster Weise Lichtmangel eintreten, wenn hier nicht, wie so ungemein häufig in der Pflanzenwelt, durch die Größenverhältnisse und die Stellung der Blätter diese Gefahr vermieden würde. Aus dem ist es verständlich, warum bei der Dotterblume die Blätter so ungleich gestielt

sind. Die großen Blätter, die direkt aus dem Wurzelstock entspringen, haben die längsten Stiele; je weiter oben an dem Stengel die Blätter stehen, desto kürzer werden ihre Stiele, so daß die obersten Blätter geradezu am Stengel sitzen; gleichzeitig werden aber auch die scheidigen Verbreiterungen des Blattgrundes, die im Anfang die Schutzfunktion für den heranwachsenden Gipfelteil der Sprosse übernehmen, entsprechend kleiner. Die kleineren Blätter der oberen Stengelteile stehen ferner abwechselnd um den Stengel herum; und da nun schließlich die Blattflächen auch nicht wagrecht ausgebreitet, sondern schräg nach oben gerichtet sind, so wirkt hier eine Reihe von Hilfsmitteln zusammen, um dem Dicht Hunger der Pflanze auch den nötigen Lichtgenuß zu sichern.

Die als Schauapparat funktionierenden Kelchblätter erhalten ihre Lockfarbe erst beim Aufblühen der Blume, also zu dem Zeitpunkte, da die Pollen- und Honigbildung in der Blüte beginnt. Solange die Blüte geschlossen ist, sind die Kelchblätter grün und umschließen in der Knospenlage die inneren Teile in fester Deckung. Im jugendlichen Zustande werden diese Blütenknospen übrigens vielfach gesammelt, ihrer scharfen Stoffe wegen „eingemacht“ und als „falsche Kapern“ in den Handel gebracht.

Nach der stets reichlichen Bestäubung schwellen die einzelnen Fruchtknoten sehr bald an und entwickeln sich zu aufspringenden, also die Samenausstreuerung begünstigenden Balgkapseln.

Von den ausländischen *Caltha*-Arten können wir auf die im andinen antarktischen Südamerika vorkommende *C. dionaeifolia* hinweisen, die sehr eigentümlich geformte Blattabschnitte besitzt. Sind sie doch am Rande mit Stacheln, an der Innenfläche mit Papillenhaaren besetzt (daher die Ähnlichkeit mit den Blättern von *Dionaea*), und diese Beschaffenheit legt die Vermutung nahe, daß es sich hier vielleicht um eine zum Insektenfang geeignete Pflanze handeln könnte! Doch liegen direkte Beobachtungen, die diese Vermutung bestätigen könnten, nicht vor.

Nebenbei erwähnen wollen wir auch die Gattung *Actaea*, das Christophskraut, leicht erkenntlich an seinen gefärbten, weißen, meist rasch abfallenden Blütenhüllblättern und fehlenden oder in unbestimmter Anzahl vorhandenen Kronenblättern sowie daran, daß sie nur ein Fruchtblatt (*A. spicata*) besitzt, welches zu einer Beere wird. Desgleichen *Eranthis hiemalis*, das gleich der vorgenannten Pflanze ein Frühblüher ist. Auch diese Gattung hat einen abfallenden, gelben Kelch, daneben 5—8 kürzere Honigblätter; besonders ausgezeichnet ist die Blüte durch das Vorhandensein einer von drei kleinen, sitzenden Laubblättern gebildeten Außenhülle dicht unter den äußeren Kelchblättern. *E. hiemalis* ist eine beliebte Zierpflanze, die in Deutschland bisweilen schon im Februar, lange vor dem Hervorbrechen des Laubes, blüht.

Die Akelei oder, noch poetischer benannt, die Ugleie, was beides allerdings nur aus dem lateinischen *Aquilegia* verderbt wurde, ist hinsichtlich des Blütenbaues wohl eine der schönsten Ranunkulazeen. Dieser Gattungsname wird übrigens nach der einen Auffassung abgeleitet von *aquam legere*, d. h. Wasser sammeln, weil sich in den jungen, trichterförmigen Blüten Wasser ansammelt; nach einer anderen Auffassung allerdings von dem Worte *aquila* (Adler) wegen der einwärts gekrümmten Spitze der Blüten (Adlerklaue). Unter ihren etwa 50 miteinander vielfach sehr nahe verwandten Arten kommen für uns nur drei in Betracht: *A. vulgaris* mit ihren meist blau gefärbten Blumen, *A. atrata*, die in höheren Gebirgslagen ihre kleineren, schwarz-violetten

Blüten entfaltet, und die ausgesprochene Hochgebirgspflanze *A. alpina* mit großen, wieder intensiv blauen Blumen, so schön, daß sie sogar nüchterne Wissenschaftler zu Dichterstimnungen verlockte. *A. alpina* trägt wohl die größte und reichste Blüte unter allen Alpenblumen und verdient wirklich die begeisterte Schilderung, die ihr einst *Rambert* widmete, als er schrieb: „Die Agleie der Tiefe ist grazios, etwas düster; die halbe Trauerfarbe, die sie oft annimmt, namentlich in den Bergwäldern, scheint ihr am meisten zu entsprechen. Die Alpenagleie ist weniger hoch und schlank, die Äste weniger zahlreich; sie trägt nur eine oder zwei Blumen, selten drei bis vier, aber große, vom reinsten und entschiedensten Blau, die sich, zart befestigt, majestätisch wiegen. Die Zeichnung dieser Blume ist von wunderbarer Arbeit und von glücklichster Fülle; sie hat 5 Blumenblätter, deren eine Spitze sich zurückkrümmt und in einen Sporn verlängert, während sie sich am anderen Ende in einen Saum erweitern und ein überhängendes Gefäß von gotischem Schnitt bilden; dann einen Kreis anderer Blumenblätter, mit den ersten abwechselnd, breiter, länger und seitlich abstehend, wie eben so viele offene Flügel. Eine solche Blume darf wohl groß sein, sie kann nicht schwerfällig werden, immer schwebt sie leicht einher, und ihre gewaltigen Verhältnisse lassen nur die seltene, ebenso harmonische als originelle Gestalt um so besser hervortreten, in welcher in kühnstem Schwunge der Genius des Schönen und Phantastischen sich erging.“ *Christ* fügt dieser von ihm zitierten Schilderung die Worte bei: „Wirklich bilden diese hohen Kräuter, denen die Pracht der kandelaberförmigen, mit goldgelben Blütenbüscheln beladenen Gentianen, der tiefstahlblauen Eisenhüte und der weißgefiederten Alpendistel (*Cirsium spinosissimum*) sich zugesellt, einen Schmuck unserer Alpenregion, welcher ihr stellenweise etwas entschieden Gartenartiges verleiht und die Fülle des Südens noch einmal zurückruft.“

Alpenagleie (*Aquilegia alpina* L.).
(Nach *Thomés Flora*.)

In der etwas nüchterneren Sprache der Wissenschaft stellt sich der Bau der Blüten folgendermaßen dar: Die Blüte ist vollständig „zyklisch“, d. h. nicht nur Kelch- und Kronblätter, sondern auch die Staub- und Fruchtblätter stehen in Quirlen angeordnet. Die Ausbildung der Blütenhülle als Schauapparat hat hier den höchsten Grad der Entwicklung erreicht, denn es sind nicht bloß die 5 Kelchblätter, sondern auch die als Nektarien ausgebildeten 5 Kronblätter blumenblattartig gestaltet. Die Kelchblätter sind abstehend, schmallänglich, die mit ihnen alternierenden Honigblätter sind mit langen Spornen versehen, in denen sich reichlich Nektar sammelt. Die Anpassungen sind hier bis zur Vollkommenheit gesteigert. Durch das Herabhängen der Blüten wird der Nektar sowohl wie der Pollen vor Rässe geschützt, und die nach abwärts hängenden Staub- und Fruchtblätter bieten bei dieser Lage der Blüten zugleich den Insekten eine bequeme Anflug- und Ansaßstelle. Die Staubbeutel blühen dazu noch vor den Narben,

so daß Fremdbestäubung gesichert ist, und plagen nach außen auf, wodurch den anfliehenden Insekten der Pollen wesentlich an der Bauchseite angeheftet wird. Als Bestäuber kommen bei dieser Blüteneinrichtung nur Hummeln in Betracht, und unter diesen ist es wieder die Gartenhummele (*Bombus hortarum*), die mit Erfolg auf normalem Wege, also unter gleichzeitiger Vollziehung der Bestäubung, den Honig zu erreichen vermag, da ihr 2 cm langer Rüssel sie dazu befähigt. Den dicken Kopf gerade in den Hohlraum zwängend und mit den beiden hinteren Beinpaaren sich an der Staubfruchtblattsäule festklammernd, reicht sie mit ihrem Rüssel tief in den Honigsporn hinein.

Eisenhut (*Aconitum Napellus*) im Gebirgswalde. (Naturaufnahme von J. E. Peters†-Graz.)

Die kurzrüßeligere Alderhummele (*B. agrorum*) muß ihren Kopf schon um einen halben Zentimeter tiefer einzwängen, die Erdhummele (*B. terrestris*) und die Biene vermögen den Honig auf normalem Wege überhaupt nicht mehr zu erreichen. Aber sie sind darob nicht verlegen, sondern greifen einfach zu dem bekannten Auskunftsmittel des Einbruchdiebstahls, wobei die Hummele mit ihren scharfen Mundteilen das Anbohren des Honigspornes besorgt, während die zu derartigen nicht befähigte Biene dann bloß als einfacher Dieb die schon vorhandenen Einbruchstellen benützt. Die Blütenbiologie der Alpenakelei ist übrigens noch nicht erforscht; eine dankbare Aufgabe für Naturfreunde bei längerem Aufenthalte in alpinen Höhen! Es ist zwar wahrscheinlich, daß es sich auch bei dieser Blume bezüglich der Besucher und wirksamen Bestäuber nicht anders wie bei den Formen der Ebene verhalten wird. Von den Früchten der Aquilegien ist nichts Besonderes zu sagen; es sind trockenhäutige Balgfrüchte mit zahlreichen Samen.

Eine so schöne Blume zog natürlich die Aufmerksamkeit der Gärtner auf sich. Verschiedene Arten der Aquilegien werden daher in mannigfachen Formen, besonders in allerlei Farbenvarietäten in den Gärten als Zierpflanzen gezogen. Und mit Recht, denn die Pflanze wirkt mit ihren Blüten sowohl als mit ihren doppelt-dreizähligen, in den Abschnitten wieder dreifach gelappten und geferbten Blättern so malerisch, daß sie sogar einen beliebten Vorwurf für Künstler abgibt.

Nahe verwandt ist der prächtige Eisenhut oder Sturmhut (*Aconitum*), der in ungefähr 60 Arten fast über die ganze nördliche Halbkugel verbreitet ist. Der bereits aus dem Altertum stammende griechische Name dieser Pflanze scheint nach den Angaben Panngießers verschiedene Ableitungen gefunden zu haben: entweder nach einem Ort oder einer Gegend ähnlichen Namens, wo die Pflanze in Massen wuchs, oder von „akenei“ — steile Felsen, auf denen ihr Standort ist, oder endlich, weil sie, auf Felsen wachsend, sich nur von Staub (konis) ernährt. (Bild S. 348 und 353.)

Besonderes Interesse erweckt die Blütenausbildung dieser schönen Pflanze, so daß wir auf sie etwas näher eingehen müssen. Die sämtlichen Teile der Blüte stehen vor allem in schraubiger Anordnung. Der gefärbte, der Anlockung der Insekten dienende Kelch besteht aus 5 freien Blättern, von denen das sehr große oberste jene Gestalt einer helmartigen Kappe hat, die der Pflanze den Namen verschaffte. Zwei kleinere Kelchblätter stehen, bauchförmig aufgeblasen, unter dem großen Blatte rechts und links, und zwei noch kleinere befinden sich am unteren Teile der Blüte, nach abwärts gewendet. Wir müssen sie beachten, denn sie bilden die Ansatzstelle für die anfliegenden Hummeln. In der Ausbildung der Krone als Honigblätter ist hier der Höhepunkt erreicht. Zwar sind nicht alle Blumenblätter als funktionierende Nektarien ausgebildet, sondern von den 8 Kronblättern sind nur 2 als solche umgewandelt, die anderen dagegen bleiben klein oder sind ganz unterdrückt. Die beiden Nektarien, d. h. die hintersten Blätter der Krone, sind hier zu langgestielten, helm- oder kapuzenförmigen Gebilden gestaltet, in denen sich reichlich Nektar ansammelt. Sie sind ganz unter dem helmförmigen Kelchblatte geborgen und dadurch vor der schädlichen Einwirkung des Regens sehr wirksam geschützt. Auch der Pollen ist in der allseits geschlossenen Blüte wohl verwahrt. Der lange Stiel der beiden Nektarien ist mit einer Hohlrinne versehen, die als Führungskanal für den Insektenrüssel dient. Wie aus dieser Schilderung des Blütenbaues hervorgeht, ist also die Sturmhautblüte ausgeprägt „zygomorph“, mit anderen Worten, es läßt sich nur eine einzige Symmetrieebene durch sie hindurchlegen. Die Staubblätter sind in großer Zahl vorhanden und bemerkenswert wegen der Drehungs- und Krümmungsbewegungen, die sie während des Aufspringens ausführen. Diese Bewegungen haben den von allen Insektenblüten erreichten Zweck, die aufspringenden und den Pollen entleerenden Antheren den in die Blüte eindringenden Insekten in den Weg zu stellen und sie an der Stelle mit dem Pollen zu beladen, mit der sie später an narbenreifen Blüten die ähnliche Bewegungen ausführenden Narben berühren müssen. Nur ist die Sturmhutblume hinsichtlich ihrer Bestäuber sehr einseitig angepaßt. Ihr Honig kann bei dem eigentümlichen Bau der Nektarien nur von langrüsseligen Insekten ausgebeutet werden. Unter diesen verfügt aber nur wieder die Hummel über entsprechenden Körperbau und auch über die nötigen Kräfte, um in die geschlossene Blüte eindringen zu können; sie allein vermag sich zwischen die großen Kelchblätter einzuzwängen. *Aconitum* ist also

eine typische Hummelblume. Aus diesen Gründen steht aber als Bestäuber auch unter den Hummeln wieder die stärkste, nämlich die langrüsselige Gartenhummel voran. Diese Zusammengehörigkeit der Sturmhutblume und der Hummel wird dadurch verraten, daß nach den bekannten Untersuchungen von Kronfeld das Verbreitungsgebiet der Eisenhutarten mit dem der Hummeln zusammenfällt; diese Pflanzengattung kommt auf der ganzen Erde nur dort vor, wo echte Hummeln verbreitet sind (vgl. die Karte in Bd. I, S. 141).

Für *A. variegatum* (und auch für *Delphinium elatum*) berichtet M. v. Kerner über ein besonders interessantes blütenbiologisches Eigenverhalten. Es treten dort nämlich nach seinen Angaben bei außergewöhnlichen Vorkommnissen zur richtigen Einstellung der Blütenkrümmungen der Blütenstandachse ein, die eine normale Orientierung der Blüten zur Folge haben. Wenn durch einen besonderen Umstand die aufrechten, steifen Stengel kurz vor der Entfaltung der Blüten ganz auf den Boden hingestreckt und niedergedrückt werden, und wenn der Stamm nicht mehr imstande ist, sich in seiner ganzen Länge zu erheben, so bildet er unterhalb des Blütenstandes jedesmal ein Knie, wodurch das mit den Blüten besetzte Stück so lange gehoben wird, bis es wieder aufrecht steht, und seine Blüten in die für den Insektenbesuch günstigste Lage versetzt sind. Dieses Krümmen, das ganz an entsprechende Beobachtungen Heinecks bei *Dicentra* erinnert (vgl. dort), ist keine Wachstumserscheinung, denn der betreffende, das Knie bildende Teil des Stammes hat sein Wachstum bereits abgeschlossen; auch erstreckt sich die Krümmung nicht über die Spindel des Blütenstandes, sondern findet unterhalb des letzteren statt. Sie ist dort streng lokalisiert, und die Spindel selbst, die ausgerichtet wird, bleibt zu allen Zeiten gerade. „Endlich ist an dem Stengelglied, an dem sich das Knie ausbildet, keinerlei besonderer Reiz nachweisbar, denn Kontakt mit dem Boden und die Beleuchtung von oben sind an den Stengelgliedern weiter abwärts und aufwärts nicht anders als dort, wo die Krümmung stattfindet. Äußere Ursachen sind für diese knieförmige Biegung des Stammes absolut nicht nachweisbar, und nur das eine ist sicher, daß nämlich die Biegung an keiner passenderen Stelle stattfinden könnte, als wo sie wirklich stattfindet, wenn es sich darum handelt, die Blüten aus ihrer ungünstigen in eine günstige Lage zu versetzen.“ Das sind Tatsachen, von denen der Pflanzenpsychologe mit Behagen Kenntnis nimmt.

Auch außer ihrer Blütenbiologie vermögen sie den Pflanzenfreund zu fesseln. Alle Arten sind ausdauernde, stielliche Gewächse, die bei uns namentlich die Gebirge schmücken und dort in zahlreichen Formen zur sog. Hochstaudenflora zählen. Über die am meisten verbreiteten Arten der Alpen sagt Schröter in seinem klassischen Werk: „Der blaue Eisenhut (*A. naphellus*) zieht den Kalk vor; er ist eine weit verbreitete, mittel- und nordeuropäische Gebirgspflanze, die feuchten und fetten Boden liebt und von den Marschen Hannovers (Glazialrelikt!) und der montanen Fazies der Flachmoore bis zu den obersten Sennhütten und den höchsten Schaflägern steigt (Wallis 2400 m, Bünden 2925 m); besonders gerne besiedelt er die Löcher der Karrenfelder und schmückt die ‚Wacholdergärtchen‘; auch in Nordamerika ist er verbreitet, fehlt aber der Arktis. Der gelbe Eisenhut (*A. lycoctonum*) hat ‚regional‘ und ‚zonal‘ eine engere Verbreitung; sein langer, gelber Helm wird fast stets an der Spitze von honigraubenden Hummeln angebissen.“

Lägerflora

auf der überdüngten Weidetrift einer Alm.

Als Charakterpflanzen sind dargestellt der Eisenhut (*Aconitum napellus* L.) — die Brennessel (*Urtica dioica* L.) und der Alpenampfer (*Rumex alpinus* L.).

(Nach einem Originalaquarell von Fritz Bergen.)

In der „strengerer Systematik“ ist übrigens die Bezeichnung *Napellus* nur ein Sammelname für eine größere Zahl unterscheidbarer Arten. *Napellus* ist also eigentlich eine Sektion der Gattung *Aconitum*, für die es kennzeichnend ist, daß sie rübenförmige Wurzeln besitzt, die mit jedem Erneuerungsproß gebildet werden, von diesem abwärts in den Boden wachsen und eigentlich ein Reservestofforgan darstellen, dessen Inhalt von dem sich entwickelnden Sproß aufgebraucht wird. Goebel berichtet, daß man unter besonderen Umständen sogar oberirdische Knollenbildung bei *Aconitum*-Pflanzen beobachten kann, und das ist nicht verwunderlich, denn es ist ja bekannt, daß Licht, bzw. Lichtmangel auf die Ausbildung normal unterirdischer Organe einen weitgehenden Einfluß ausübt. Der Botaniker Royer hat bei *Aconitum*-Pflanzen oberirdische Knollenbildung an solchen Exemplaren beobachtet, deren Sprosse sich an dunklen, feuchten Standorten befanden. Die Knollen bildeten sich hierbei 4—6 cm über dem Boden aus, wenn die Basis der Pflanze dicht von anderen Pflanzen beschattet war. Es war also die abnorme Knollenbildung in diesem Falle durch den begünstigenden Einfluß von Dunkelheit und Feuchtigkeit hervorgerufen. Bei der Sektion „*Lycocotnum*“ sind jedoch die Wurzeln nicht knollig verdickt, wofür es noch an Erklärungen fehlt.

Die Eisenhutarten sind alle starke Giftpflanzen. Die Knollen, die in Europa von *A. napellus* verwendet werden, und die der Apotheker unter dem Namen „*tubera aconiti*“ kennt, sind sogar noch von medizinischem Werte. Das aus ihnen hergestellte Präparat „*Aconitum*“ enthält zwei in der Pflanze vorkommende Alkaloide: Aconitin und Pseudaconitin nebst Spaltungsprodukten. In manchen Ländern sind auch die Blätter von *A. napellus*, die weniger Aconitin, außerdem Aconitsäure enthalten, officinell. Auch in Japan ist die Wirkung der dort einheimischen Arten, die dort ein noch giftigeres Alkaloid enthalten, ebenfalls bekannt. *Aconitum ferox* wird in Ostindien, besonders im Himalaja, als Arznei und als Pfeilgift verwendet.

In die Gärten ist sowohl *A. napellus* eingezogen als auch *A. variegatum*. Neben beiden ist noch eine dritte Form als Zierpflanze zu finden (*A. Stoerkeanum*), die als Bastardform der beiden vorigen geschildert wird. Alle drei werden als Einzel- oder Gruppenpflanzen halbschattig auf nicht zu feuchtem Boden gezogen und durch Teilung der Stöcke vermehrt.

Neben dem Eisenhut ist der Rittersporn (*Delphinium*) eines der volkstümlichsten Hahnenfußgewächse. Seine 120 Arten sind zum Teil unter sich verwandt; aber von diesen zahlreichen Arten sind bei uns nur ganz wenige weiter verbreitet. Bau und Biologie der Blüte erinnern sehr an *Aconitum*, und wie bei diesem ist bei *Delphinium* die Blüte zygomorph, vollständig azyklisch, wie dort übernimmt der Kelch auch hier ausschließlich die Aufgabe der Anlockung. Auch hier sind zwei Kronblätter als hochausgebildete Nektarien vorhanden und durch den Kelch ausgiebig geschützt. Der Unterschied liegt wesentlich in der morphologischen Ausgestaltung der ganzen Blüte, die ihren Namen von dem langen Sporne des hintersten Kelchblattes hat, namentlich in der Ausbildung der Nektarien, die ihren Honigsammelapparat eben in Form dieses Spornes entwickelt haben. Die Sporne der beiden, ganz wie bei *Aconitum* rückwärts unter dem großen Kelchblatte stehenden Honigblätter sind nämlich beide gemeinsam von dem Kelchblattsporne eingeschlossen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal

liegt darin, daß die vorderen rückgebildeten Kronblätter meist fehlen. Bei *D. elatum* tragen die hier vorhandenen beiden vorderen Kronblätter je ein Büschel gelber Haare, die durch die Kontrastfarbe zum blauen Kelche ein den Weg zum Honigweisendes

Gartenrittersporn (*Delphinium*).
(Originalaufnahme von P. Wolff-Bischheim.)

„Saftmal“ bilden und außerdem die anfliegenden Hummeln zwingen, den Rüssel an der allein passenden Stelle einzuführen. Für *D. tricornis* aus Nordamerika, das am meisten mit *D. elatum* übereinstimmt, aber zweigeteilt Honigsporne hat, schildert Knuth die Blütenbiologie nach den Untersuchungen Robertson's folgendermaßen: „Die beiden weißgefärbten oberen Kronblätter bilden oberhalb des Blüteneinganges der sonst blauen Blume einen auffallenden Wegweiser zum Honig, der von zwei Kronblattspornen abgesondert wird. Letztere haben eine Länge von 15—17 mm und werden von dem an der Spitze etwas gekrümmten Kelchblattsporn nur lose umschlossen. Die Ausbeutung von zwei getrennten Safthaltern ist ein Vorteil für intelligente Besucher wie *Bombus* und *Syphalonia*, die ihren Rüssel in jeden Sporn mit besonderem Saugakte einführen. Die seitlichen Kelchblätter, die völlig die zahlreichen Staubgefäße bedecken, müssen von normalen Bestäubern, wie Hummeln,

zur Seite gedrängt werden, wobei die Unterseite des Hummelförpers die Antheren oder Narben berührt. Zu teilweiser Ausbeutung des Honigs genügt ein Rüssel von 7—9 mm, zu völliger Ausschöpfung ist ein solcher von 15—17 mm notwendig.“ Die *Delphinium*-Blüte ist also ebenfalls eine ausgeprägte Hummelblume; Tagfalter können wohl ab und zu mit ihrem langen Rüssel zum Honig gelangen, da sie aber wegen der Kleinheit ihres

Kopfes keine Bestäubung herbeizuführen vermögen, sind sie für die Blume unnütze Gäste. Die Honigbiene wieder hat bekanntlich einen viel zu kurzen Rüssel für solche Blumen. Dafür beteiligt sie sich auch an Raub und Einbruch, und zwar, da sie ihn hier mit ihren schwachen Mundwerkzeugen nicht selbst bewerkstelligen kann, läßt sie sich auch diesmal, wie bei *Aquilegia*, von den Hummeln vorarbeiten. Trotz des doppelten Schutzes, den der Honig genießt (Sporenwand des Nektariums und des Nelsches), haben sie nicht viel Schwierigkeiten dabei; der Nelschsporn wird an der Stelle von ihnen mühelos durchgebissen, wo darunter die Nektariensporne liegen. Dies gelingt zwar nicht immer, wird jedoch stets von neuem versucht, und so findet man an jedem *Delphinium*-Blütenstande durchgebissene, angebissene und unversehrte Blüten. Ein ganz reizendes Naturbild läßt sich beobachten, wenn an einem solchen Rittersporn ein Bienlein angelogen kommt. Die Sicherheit, mit der es an die Stelle anfliegt, an der solche Einbrüche von den Hummeln gemacht werden, das Unterlassen jedes Versuches, an der Eingangsöffnung der Blume anzufliegen, verrät ebenso große Erfahrung hinsichtlich der normalen Unbrauchbarkeit dieser Blüte, wie die gleiche Gewiztheit über den Wert der Einbruchstellen. Dabei kann man auch beobachten, wie schnell sich die Biene von unangebissenen oder ungenügend geöffneten Spornen entfernt, während sie in die angebissenen ihren Rüssel mit Behagen verschwinden läßt. Der Pflanze schaden solche Räubereien nicht viel, denn trotz dieser starken Honigberaubung setzt sie doch reichlich Früchte an, woraus sich ergibt, daß doch auch ausreichende Bestäubung durch den normalen Hummelbesuch vorhanden sei. Diese Früchte sind auch hier Balgkapseln, die zur Zeit der Reife aufspringen und die Samen umherschleudern. Dies zu wissen, ist für den Landwirt wichtig, denn nun versteht er, warum *D. consolida* das gleiche Ackerstück immer wieder besiedelt, wenn nicht die Keimpflanzen durch tiefes Einpflügen erstickt werden.

Der Rittersporn ist übrigens noch aus einem anderen Grunde ein so schwer zu bekämpfendes Unkraut. Während nämlich zur Erntezeit fast alle größeren Ackerpflanzen vor der Sense fallen und vernichtet werden, kann der Schnitter dem Ackerrittersporn nicht ans Leben; dieser treibt vielmehr aus dem Stengelstumpfe neue Seitenzweige und blüht munter fort bis in den Herbst hinein. Solche Regenerationskraft schöpft er aus seiner tiefgehenden Pfahlwurzel, die ihn zugleich in den Stand setzt, diese trockenste Zeit des Jahres leicht zu überstehen. Hieraus ersieht der Pflanzenbiologe, daß, wie bei so vielen Pflanzen trockener Standorte, auch hier die lange Pfahlwurzel eine xerophytische Anpassung ist.

Ich mag unser Lebensbild des Rittersporns nicht schließen, ohne noch einer Beobachtung über die Abhängigkeit der Blütenfarbe von der Assimilationstätigkeit der Pflanze zu gedenken. Der Botaniker Curtel fand nämlich an entblätterten Pflanzen von *Delphinium Ajacis* (übrigens ebenso bei *Adonis vernalis*), daß sich an solchen nur kleine und teilweise farblose Blüten entwickelten. Er nimmt an, daß es der Mangel ausreichender Assimilationstätigkeit infolge der Beraubung des Blattschmuckes sei, der zu dieser Erscheinung führte. Und ich glaube, er hat recht, denn es ist ja bereits bekannt, daß besonders die Anthozyanentwicklung von der Zuckerbildung in der Pflanze abhängig ist; bei mangelnder Anhäufung der Assimilate kommt es nie zu so schönen roten Farben wie sonst. Derartiges hat man auch bei sehr feucht kultivierten Exem-

plaren des Ehrenpreises (*Veronica*) und Vergißmeinnichts (*Myosotis*) beobachtet, und Laurent fand sogar Gliederblüten, oberhalb deren sich eine Ringelung befand, nur sehr blaßblau entwickelt. Und so sprechen noch eine Reihe anderer Experimente für diese Abhängigkeit gewisser Blütenfarben von der Menge der verfügbaren Assimilate. Man versteht nun, daß Zwiebel- und Knollengewächse (z. B. Hyazinthen) ihre Blüten auch im Dunkeln deshalb ganz normal gefärbt entwickeln, weil sie eben in den unterirdischen Organen genügend Reservestoffe zur Verfügung haben, während Pflanzen, die in ihrem Bedarf auf die Deckung durch die tägliche Assimilation angewiesen sind, die Blüten bei Lichtabschluß natürlich nicht normal ausbilden können. Doch gelang es Sachs, auch bei solchen Pflanzen im Dunkeln normalfarbige Blüten zu erzielen, wenn er bloß die blütentragenden Sprosse dem Licht entzog, während die Blätter am Licht blieben, also ungehindert assimilieren konnten.

Von den praktischen Beziehungen unserer Pflanze ist nicht viel zu sagen. *Delphinium consolida* haben wir schon als sehr verbreitetes und lästiges Ackerunkraut erwähnt und können noch hinzufügen, daß es ebenso wie andere *Delphinium*-Arten von Europa nach Nordamerika eingeschleppt wurde. Manche Formen werden auch als Zierpflanzen gezogen, so verschiedene Abarten von *D. elatum*, ferner solche von *D. Ajacis* und dem nahestehenden *D. orientale*, desgleichen *D. Cashmirianum* und *triste*.

Alle diese sind gefüllt, was bei den Delphinien leicht dadurch zustande kommt, daß eine größere Anzahl Staubblätter die Form von Honigblättern annimmt.

Von den

Windröschen (*Anemoneae*)

haben wir zuerst das gewöhnliche Windröschen (*Anemone*) zu erwähnen, das in beiläufig 90 Arten weit verbreitet ist und sogar in den Tropen wächst. Manche davon sind jedoch auf bestimmte Regionen beschränkt, von denen sich einige allerdings z. B. durch die Anden bis ins antarktische Gebiet erstrecken, während andere wieder in außertropischen nördlichen Gebieten fehlen. Ein Teil der Anemonen lebt als ausgesprochene Gebirgspflanzen. Die einheimischen Formen verteilen sich hauptsächlich auf 2 Gruppen: die echten Anemonen, bei denen sich der Griffel zur Fruchtzeit nicht verlängert, die also keinen Flugapparat an ihren Nüsschen entwickeln, und bei denen auch die Pfahlwurzel frühzeitig abstirbt. In die zweite Gruppe gehören die Kuschellen (Untergattung *Pulsatilla*, mitunter auch als selbständige Gattung behandelt), mit zur Fruchtzeit verlängertem Griffel behaart, und ausdauernde Stauden mit bleibender Pfahlwurzel. Soweit belehrt uns der Systematiker. Sehen wir nun, was uns der Biologe zu sagen hat. Er stellt uns als Beispiel für die erste Gruppe das weitverbreitete Hainwindröschen (*Anemone nemorosa*) vor Augen und zeigt uns, daß das in seinen oberen Teilen überaus zarte Pflänzchen mit einem wagrecht verlaufenden, viele Jahre ausdauernden Wurzelstock überwintert, der zahlreiche Wurzeln in den Boden entsendet. Die in diesem Rhizom enthaltenen Reservestoffe ermöglichen der Pflanze, wie den anderen Frühblühern, schon im ersten Frühjahr die rasche Entwicklung des Laub- und Blütentriebes, und so erklärt er uns, warum das Windröschen einer unserer ersten Frühlingboten sein kann.

Diese rasche Entwicklungsfähigkeit ist für die Pflanze mit Rücksicht auf ihre Standorte (Waldboden, besonders Buchenwälder) ein unbedingtes Erfordernis, weil

nach erfolgter Belaubung der Gebüsch- und Bäume der Schatten ihre weitere Entwicklung verhindern würde. Der Wurzelstock trägt demgemäß im Herbst bereits in seiner Endknospe im vollständig angelegten Trieb auch die Blütenknospe geschützt durch die noch sehr kleinen und blassen Hüllblätter, und schon während der kurzen Lebensdauer des oberirdischen Sprosses wird von dem Wurzelstocke bereits von neuem die Endknospe für das nächste Jahr angelegt. Hierbei wächst aber das Rhizom zugleich weiter und sammelt an diesem vorderen Teile reichlich Stoffe an, während das hintere Ende allmählich durch den oberirdischen Sproß seiner Inhaltsstoffe beraubt wird und abstirbt. Auf diese Weise wandert die Anemone langsam vorwärts und kommt somit fortgesetzt in neuen Boden, dem sie die nährenden Bestandteile noch nicht entzogen hat.

Sainwindröschchen (*Anemone nemorosa*). (Naturaufnahme von F. Hartmann-Dresden.)

Und nicht genug daran, es verzweigt sich der Wurzelstock auch noch durch seitliche Knospen. Weil überall reichliche Wurzelbildung stattfindet, werden diese Seitenzweige schließlich ohne weiteres selbständig, wenn der Wurzelstock an der Verzweigungsstelle abstirbt. In diesen unterirdischen Organen hat die Pflanze also ein wichtiges Vermehrungsmittel, das sogar viel wichtiger ist als die Vermehrung durch Früchte. Bei der sehr nahestehenden *A. silvestris* wird diese Vermehrung sogar noch wesentlich unterstützt durch Bildung reichlicher Adventivsprosse aus den Wurzeln.

Der schwache und unverzweigte Stengel trägt an seinem Ende eine einzige Blüte. Unter dieser, aber in ziemlich bedeutendem Abstände, besitzt er drei in einem Quirl stehende Hochblätter von laubartiger Beschaffenheit, die mehrfach geteilt und an den Rändern gesägt sind. Diese stengelständigen Hochblätter, auch deshalb Hüllblätter genannt, weil sie die junge Endknospe einhüllen, sind manchmal der einzige Assimilationsapparat der Pflanze. Denn außer diesen Blättern wird nur noch ein den Hüllblättern durchaus ähnliches Blatt gebildet, das an einem langen Stiele aus einer neben dem Blütenproß zur Entwicklung kommenden Knospe hervorsteht, doch kann die Ausbildung dieses einzigen Laubblattes auch unterbleiben. Abgepflückt ist das Windröschchen sehr

hinfällig, denn seine Lebensbedingungen, der feuchte Waldboden und die frühe Jahreszeit, machen alle besonderen Einrichtungen gegen Verdunstung überflüssig.

Die Blüte hat eine einfache, aus 6 weißen, oft außen rötlich angehauchten Blättchen bestehende Hülle. Honigblätter fehlen, und da auch sonst keine Nektardrüsen vorhanden sind, bietet die Blume den Bestäubern lediglich Pollen dar. Smalian gibt jedoch an, daß man z. B. die Honigbiene auch den Blütengrund anbohren und ihm Saft entziehen sehen könne, mit dem sie den gesammelten Blütenstaub anfeuchte, damit er besser an ihrem Leibe haften. Die Antheren überragen zuerst die vor ihnen reifenden Narben, breiten sich dann aber aus, so daß auffliegende Insekten, namentlich Bienen und kleine Fliegen, sowohl mit dem Blütenstaube als mit den Narben in Berührung kommen können. Bei Ausbleiben des Insektenbesuches, was in der frühen Jahreszeit bei ungünstiger Witterung gewiß häufig der Fall ist, kann infolge der schräg überhängenden Lage der Blumen auch Selbstbestäubung eintreten. Nachts und bei feuchtem Wetter schließen sich die Blüten, schützen also den Pollen gegen Schädigung durch Feuchtigkeit. Die Früchte sind hier wie bei allen Anemonen trockene Schließfrüchte, eigentlich Nüsschen.

Nahe verwandt mit dieser Pflanze ist auch das schon erwähnte Waldwindröschen (*A. silvestris*), ferner die ganz ähnliche, nur mit kleineren gelben Blüten versehene *A. ranunculoides*, desgleichen von alpinen Formen die weitverbreitete *A. narcissiflora* und die rein südalpine *A. baldensis*. *A. narcissiflora* ist ein reizender Schmuck der Berge. Schröter sagt über diese wunderbar keusche Blume, daß dieser zweiaxige, ausdauernde Rosettenträger mit dauernder Primärknospe und seitlichen Blütenständen eine Dolde rötlich überhauchter weißer Blüten trägt, die den Apfelfrüchten auffallend ähnlich, honiglos und vormännig seien. „Sie werden von pollenfressenden Fliegen besucht, können aber am Schlusse der Blütezeit sich selbst bestäuben. Sie ist eine weitverbreitete Matten- und Weidepflanze, welche Kalk und kalkreichen Schiefer vorzieht und nur wenig über die Baumgrenze steigt.“ Dabei ist ihre Allgemeinverbreitung sehr ausgedehnt, denn sie lebt in Europa so gut wie in Asien und Nordamerika. *A. baldensis* ist wieder insofern nennenswert, als sie einen uralten, versprengten Typus auf Kalkschutt und steinigem Alpenmatten darstellt, der in den Pyrenäen, Alpen, Karpathen, Syrien und selbst in Nordamerika Reste eines zerstreuten Verbreitungsgebietes hat. Nach Ubrich soll diese Pflanze nämlich im Himalaja entstanden, west- und ostwärts gewandert, dann aber in der Eiszeit an allen übrigen außer den obigen Standorten vernichtet worden sein.

Zu den echten Anemonen gehört auch das mitunter als besondere Gattung behandelte Leber- oder Märzblümchen (*A. Hepatica* oder *Hepatica triloba*). Auch hier sind stengelständige Hüllblätter vorhanden; nur sind diese ungeteilt, klein und ebenfalls in Dreizahl so dicht an die Blüte herangerückt, daß sie einen echten Kelch vortäuschen. Dieser ist aber, so wie bei der vorbeschriebenen Art, blumenblattartig entwickelt. Das Leberblümchen ist bekanntlich eine der allerersten Frühlingspflanzen auf Waldboden unter dem Gebüsch, in der sonst noch winterlich-kahlen Umgebung ein herzerfreuendes Bild mit seinem intensiven Blau, das nur manchmal in Violett übergeht. In manchen Orten jedoch, z. B. allgemein in Nordtirol, blüht die Pflanze in buntem Durcheinander in Blau, Rosa und Weiß, was bei ihrem dichten Bestande ein

herrliches Farbenmosaik abgibt. Diese Art weicht auch im Laube von den vorherbesprochenen ab, denn die dreilappigen Blätter sind von derber Struktur; dadurch wird es ihnen ermöglicht, den Winter zu überdauern, wobei sie sich jedoch auf der Unterseite mehr oder weniger durch Anthozyan purpurrot färben. Auch das Leberblümchen ist lediglich eine Pollenblume, die durch früheres Reifen der Narben Fremdbestäubung ermöglicht. Falls diese aber bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wegen mangelnden Insektenbesuches ausbleibt, besorgen auch hier die innersten Staubblätter die Selbstbefruchtung, indem sie sich über die Narben krümmen und den Pollen übertragen. Für die amerikanische *H. acutiloba* vermutet Robertson übrigens, daß die Papillen des Fruchtknotens etwas Honig absondern, da er die Mehrzahl der Besucher an den Blüten das Saugorgan am Grunde der Staubblätter einführen sah; nach seinen Beobachtungen wurde der Pollen an der genannten Pflanze nur von Honigbienen gesammelt oder von Schwebefliegen gefressen, die übrigen Besucher dagegen schienen Honig zu finden.

Märzblumen (*Hepatica triloba*) im Walde.
(Naturaufnahme von F. Hartmann-Dresden.)

Die schöne Blume ist auch dem Gärtner nicht gleichgültig geblieben, und so sind in den Gärten eine Reihe von Varietäten mit dicht gefüllten blauen und roten Blumen entstanden. Den häßlichen Namen „Leberblümchen“ hat die Pflanze daher, daß in früheren Zeiten ihre Blätter, weil sie die Form einer Leber haben, nach der Theorie der Signaturlehre als Heilmittel gegen Leberleiden verwendet wurden.

Die nun folgenden Anemonen gehören in den Pulsatilla-Kreis. Bei ihnen allen ist der Fruchtstand „eine wilde, zerzauste Perücke“, zusammengesetzt aus den behaarten, als Wildfang dienenden Griffeln der Einzelsrüchte, ein zierliches Gebilde, das von den Alpenbewohnern vielfach als Hutschmuck getragen wird. Als Vertreter dieser Gruppe können wir vor allem den Rübengalsbart der Riesengebirgler (*A. alpina*) nennen, von dessen großen, außen bläulich überhauchten, innen reinweißen Blüten, die anfangs eine Glocke, später einen 5—6 strahligen Stern von 35—55 mm Durchmesser bilden. Schröter schreibt, daß neben den meist zweigeschlechtigen sich aber auch Stöcke

mit etwas kleineren, rein weiblichen Blüten finden. Er beobachtete auch Übergänge mit geringer Stempelzahl. Nach Schulz sind die männlichen Stöcke in den Alpen mit 80—95% vertreten, und dies erscheint als eine, streng genommen, nutzlose, ja sogar schädliche Einrichtung, da ja auch sonst genug Pollen da wäre. Die honiglosen Blüten bieten den zahlreichen Insekten nur Pollen dar, der aber in dem reichen Kranz der Staubgefäße in außerordentlicher Menge erzeugt wird. Doch ist auch Selbstbestäubung durch Zusammenschließen und Nicken der Blüten bei ungünstiger Witterung und bei Nacht leicht möglich. Nach Kerner sollen übrigens auch die Zwitterblüten zwei-

Die siebenbürgische Märzblume im Frühlingsflor der Karpathen (*A. transilvanica* Fuss.).
(Original von Prof. J. Römer-Kronstadt.)

gestaltig sein; es gibt nach ihm solche mit großen Stempelköpfen und kleinen Staubblättern, die der Fremdbestäubung dienen, und wieder andere mit kleinen Fruchtköpfchen und langen Staubblättern, die der Selbstbestäubung angepasst sind. Doch ist diese Angabe noch weiter zu prüfen.

Die schönste der großblumigen Alpenanemonen ist die Frühlingsanemone (*A. vernalis*), die ich auch nicht besser beschreiben könnte als Schröter, der sie nicht genug preisen kann „mit ihren außen zart violett überhauchten, meist halboffenen Blütenfeldchen, die nur an der vollen Sonne ihren innen ganz weißen Stern ganz öffnen, und mit ihrem goldglänzenden Pelz von schimmernden, langen Seidenhaaren, der die jungen Knospen völlig einhüllt. Die überwinternden trübgrünen Blätter liegen dem Boden fest an, ihre Scheiden dienen als Winterschutz des jungen Triebes; die neuen Blätter kommen erst nach dem Blühen zur Entwicklung; die Pflanze ist einachsig. Die Be-

stäubungseinrichtungen sind sehr wechselnd: stets reichlich Pollen anbietend, sondert die Blüte bald an zu Nektarien umgewandelten Staubblättern Honig ab (Graubünden), bald ist sie honiglos (Tirol), bald sind alle Stücke gleich, bald finden sich neben Blüten mit kurzen Staubblättern solche mit langen (Kerner); die Blüten sind protogyn bis homogam, Selbstbestäubung tritt überall beim Schließen der Blüte ein. Als Bestäuber figurieren Hautflügler, Fliegen, Falter und Käfer.“ Diese Anemone gehört der „Schneefleckflora“ an. Man versteht unter diesem sonderbaren Namen jene alpinen Blütenpflanzen, die mehr oder weniger unmittelbar am Rande der wegschmelzenden Schneefelder auftauchen oder überhaupt unmittelbar nach der Schneeschmelze blühen,

Die Flora eines Schneeflecks in den Alpen.

gleichgültig auf welcher Unterlage und in welcher Begleitung. Die unter diesem Begriffe zusammengefaßten Pflanzen der alpinen Florenbestände bilden mithin keine „ökologische Pflanzengesellschaft“, da sie nicht an besondere standörtliche Bedingungen gebunden sind, sondern sie stellen bloß eine „phänologische“ Gruppe innerhalb des alpinen Wiesenflors und der Gesteinsfluren dar. Diese den tiefen Regionen mangelnde Schnelligkeit des Blühens nach der Schneeschmelze, die am auffälligsten bei dem „frühlingsdurstigsten“ dieser Gewächse, dem Alpenglöckchen (*Soldanella*), zutage tritt, erklärt sich aus dem Umstande, daß zur Zeit der Schneeschmelze die Lufttemperatur mit der Höhenregion zunimmt. So beträgt die Lufttemperatur an der temporären Schneegrenze: bei 1000 m 5,1°, bei 1500 m 6,2°, bei 2000 m sogar 7°, dann sinkt sie wieder etwas, bei 2400 m auf 6,6°. Schröter sagt also mit Recht: „Wenn in der alpinen Region die weiße Decke von der ruhenden Pflanzenwelt weicht, dann finden die schwellenden Knospen gleich warme Frühlingslüfte! Drunten vergehen nach der Schneeschmelze noch Wochen, bis die braunen Wiesen ergrünen; auf dem Gebirge folgt dem starren Winter unmittelbar der jauchzende Alpenfrühling, der die Ränder schmelzender Schneefelder mit einem bunten Blütenkranz umsäumt.“

Während mit Ausnahme der schwefelgelben *A. sulfurea* die alpinen Formen der Pulsatillen einen mehr oder weniger weißen Kelch besitzen, ist der Kelch bei den bekanntesten zwei Arten *A. Pulsatilla* und *A. pratensis* violett gefärbt. Diese beiden Arten kennt man gewöhnlich unter dem Namen „Kuhschelle“. Irrtümlich sagt man auch zu ihnen „Rüchenschelle“, was wohl aus „Rüchenschelle“ entstanden ist. Sie unterscheidet der Florist in der Hauptsache bloß dadurch, daß die erstgenannte von blauvioletter Farbe der Blütenhülle ist, während *A. pratensis* dunkel schwarzviolette, am Ende umgerollte Kelchblätter besitzt; außerdem sind bei *Pulsatilla* die Staubblätter nur halb so lang als die der Blumenhülle, während sie bei *pratensis* fast ebenso lang sind. Beide Pflanzen wohnen an trockenen Orten, auf Hügeln und in Bergregionen mit lockerem Grunde. Dort sind sie Mitglieder einer ganz besonderen Pflanzengesellschaft, die alle ähnliche biologische Anpassungen am Leibe tragen. Sichelwöhre und andere Doldengewächse, von den Storbblütlern besonders die Flockenblumen und Habichtskräuter, auch Schmetterlingsblütler und Ehrenpreisarten, Braunelle und Sonnenröschen, dazu Fingerkräuter bilden mit ihnen eine besondere Formation der „sonnigen Hügel“. Die eigenartigen Lebensbedingungen dieser Pflanzengesellschaft sind in erster Linie durch die tiefgehende Trockenheit des Bodens bestimmt, indem bei der starken Bestrahlung durch die Sonne bei zugleich stark geneigtem Hange und sehr durchlässigem Boden, der bis in große Tiefen von den Sonnenstrahlen erwärmt wird, großer Wassermangel herrscht. Es sind deshalb alle hier wohnenden Gewächse durch sehr tiefgehende Pfahlwurzeln ausgezeichnet; können sie doch nur auf diese Weise einen so wenig gastlichen Boden ausdauernd besiedeln. Diese Anpassung genügt. Sie alle vermögen die trockenen Zeiten ohne merkliche Schädigung ihrer oberirdischen Teile zu überstehen und bewahren daher ihre grüne Farbe sogar dann, wenn ringsum alles schon verdorrt ist. Wer einmal eine Kuhschelle auszugraben versuchte, hat sich genügend belehrt, wie unglaublich tief und fest sie verankert ist. Und doch ist sie darin nicht der Primus, denn manche ihrer obgenannten Begleitpflanzen gehen noch viel tiefer, bis weit über einen Meter in den Erdboden hinunter. Nach Graebner kann diese Formation der sonnigen Hügel als letzter Ausläufer der Steppen des europäischen Binnenlandes nach Westen in das Gebiet des feuchten atlantischen Klimas betrachtet werden. Er meint hierüber: „Die zu diesen Pflanzengemeinschaften gehörigen Arten sind entweder identisch mit solchen, die im südöstlichen Europa weit verbreitet sind, oder sind ihnen doch nahe verwandt, sie gehören der ‚Pontischen‘ Pflanzengenossenschaft an, die Hügel werden auch deshalb oft als Pontische bezeichnet. In typischer Ausbildung, besonders im Osten unseres Vaterlandes, sind sie häufig den russischen oder ungarischen Steppen ganz außerordentlich ähnlich, nur von viel geringerer Ausdehnung. Diese Formation ist hauptsächlich auf den in den Eiszeiten durch die Gletscher abgelagerten Böden zu finden, am besten und typischsten ist sie auf dem geschiefbeführenden Diluvialmergel (oder =Lehm) zu finden, also auf schwererem, etwas sandigem, von Geschieben und Findlingen durchsetzten Boden. Wo dieser Boden flach liegt oder doch nur schwach geneigt ist, bzw. wo eine reichliche Wasserbewegung vorhanden ist, trocknet er nicht so aus, daß er steppenartige Formationen zur Ausbildung gelangen lassen kann. Deshalb sind die trockenen Hänge meist da zu finden, wo sich die größeren Flüsse tiefe Furchen in die Diluvialablagerungen gesägt haben, bzw. wo solche Furchen oder steilen Abhänge

in der Nähe sind, so daß das Wasser der Niederschläge schnell abgeleitet wird, und nachher im Sommer Wassermangel herrscht.“

Sonst ist von den Pulsatillen nicht viel zu sagen. Ihr Laub war früher wegen des in ihm enthaltenen scharfen Giftes (Anemonin) officinell.

Von der nächsten zu erwähnenden Pflanze, der Walldrebe (*Clematis*), sind etwa 170 Arten in fast allen Gebieten, insbesondere in den tropischen und subtropischen Regionen, zum Teil auch in den afrikanischen Steppen bekannt. Bei uns sind dies vor allem *Clematis Vitalba*, deren Name von *vitis* = Rebe und *alba* = weiß abgeleitet ist, dann *Cl. Flammula* in Südeuropa und *Cl. alpina*, die auch als Untergattung *Atragene* in den Gebirgen Europas unterschieden wird. *Cl. Vitalba* ist die am meisten verbreitete Form, die jedoch im Norden und Osten Deutschlands fehlt. Die Walddreben verdienen wirklich die ganz besondere Aufmerksamkeit des Biologen, stellen sie doch einen der wenigen Vertreter des einheimischen Lianentypus dar. Insofern sie, besonders *Cl. Vitalba*, einen verholzenden, ziemlich mächtig werdenden Stamm entwickeln, sind sie eigentlich in unseren Strichen die einzigen Holzpflanzen, die auch im anatomischen Bau die physiologischen Eigentümlichkeiten der tropischen Lianen, nämlich die auffallend großen Gefäße im Holzkörper, aufweisen. An einem Querschnitte durch den Stamm von *Cl. Vitalba* sind die Gefäße schon mit freiem Auge sofort wahrnehmbar, was sonst bei keiner einheimischen Holzpflanze der Fall ist. Insofern sollte *Clematis* im pflanzenanatomischen Unterricht überall gezeigt werden. Als Erklärung

Reizbewegungen der Blattstiele von *Clematis Vitalba* L.
a, a², a³ = Bindestellen. b = Stellen, an denen sich die Blätter um ihre Stütze schlingen. Zw = Zweige.
Bl = Blattstiele. (Nach Heineck.)

wäre dann etwa folgendes hinzuzufügen: Das Emporkklettern der Lianen erfolgt bekanntlich durch die verschiedenartigsten Hilfsmittel; *Clematis* gehört zu den Rankenpflanzen, und zwar sind es ihre kontaktreizbaren Blattstiele, mittels derer sich die Pflanze an Hecken und zwischen den Gebüschten befestigt. Mit anderen Worten, diese die Befestigung der Blattstiele herbeiführende Krümmung erfolgt, wie bei allen Ranken, infolge des Berührungsreizes durch irgendeine Stütze. Prof. D. Heineck hat nun durch einen einfachen und sehr lehrreichen Versuch bei dieser Pflanze festgestellt, daß diese Krümmungsbewegung lediglich dann eintritt, wenn für die Pflanze das Bedürfnis

der Befestigung vorliegt. Er schildert seine Versuche in der „Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre“ (1908) mit folgenden Worten: „Solange die Stämmchen klein sind und sich selbst tragen können, verschmäht dieser Klimmer die Befestigung mit Hilfe der Blattstiele, und selbst die Berührung mit einer Stütze reizt diese nicht. Werden die dünnen Nuten aber größer, so daß sie sich neigen müssen und im Winde baumeln, so fassen die Blattstiele auf den Berührungsreiz irgendeines dünnen Gegenstandes hin zu, indem sie sich eng um diesen herumkrümmen, sie werden hart und lassen ihn nun freiwillig nicht mehr los. Auf diese Weise werden die einzelnen Stengelstücke in dem Maße, wie sie wachsen, befestigt, und die Pflanze arbeitet sich so ans Licht. Ich band nun die dünnen Stämmchen an einem Stabe fest, so daß sie sich nicht neigen und auch nicht im Winde baumeln konnten. Ihre Blattstiele machten hierauf gar keinen Versuch, die Stütze zu umklammern, obgleich sie diese berührten. Dieses Verhalten ist im Sinne der pflanzenpsychologischen Hypothese nicht verwunderlich, denn es gab ja nichts festzuhalten. Die Blattstiele hingen vielmehr schlaff herab. Beim Weiterwachsen band ich die Pflanze noch zweimal fest und bemerkte dasselbe. Nun gab ich die Stämmchen frei. Die oberen Enden wuchsen weiter, neigten sich und baumelten im Winde, und jetzt faßten auch die Blattstiele zu, wickelten sich um den Stab und befestigten nun ihrerseits die Pflanze an demselben“ (siehe das Bild). Die Bewegungswahl ist hier so klar, daß wir uns jeder Bemerkung enthalten können.

Nicht ohne Interesse ist auch die Blütenbiologie der Walldrebe. Knuth sagt hierüber in seinem Handbuch, daß die Staubgefäße entweder „bei dichtem Zusammenschluß und unter Verbreiterung der Filamente an deren Innenseite Nektarien tragen, womit sich in der Regel eine introrse Stellung der sonst seitlich geöffneten Antheren verbindet (*Cl. alpina*, *integrifolia*). Oder es entwickeln sich die äußeren Glieder des Androeums zu fleischigen, auffallend gefärbten und die Kelchblätter bisweilen überragenden Honigblättern (z. B. *Cl. zeylanica*), oder endlich die Nektarien verkümmern, die Filamente werden stielartig und erscheinen locker gestellt, wie bei den Sektionen *Viticella* und *Flammula*. Im letzteren Falle liegen also Pollenblumen, in den ersteren beiden Fällen Nektarblumen mit mehr oder weniger vollständiger Honigbergung vor.“ Auch der Gärtner hat für diese schönen Blumen reges Interesse und verwendet verschiedene Walddrebenarten zu Lauben- und Wandbekleidungen, so namentlich die südeuropäische *Cl. viticella* mit ihren langgestielten, blauvioletten, kreuzförmigen Blüten, *Cl. viorna* aus Nordamerika, die violett oder purpurn blüht, *Cl. recta* aus Südeuropa, weißblütig und mit sechszähliger Kelche; *Cl. integrifolia* aus Ungarn hat ovale, ganzrandige Blätter und große violettblaue Blumen. Die gewöhnliche Walldrebe (*Cl. Vitalba*) hat zahlreiche kleine, weiße Blüten. Und dergleichen gibt es noch viele. Als wichtigste Gartenregeln können für sie etwa folgende gelten, die wir dem Werke von H. Lehmann über unsere Gartenzierpflanzen entnehmen: „Diese ausländischen Arten verlangen aber durchaus nicht einen südlichen Standort, im Gegenteil, in einer westlichen, nordwestlichen, nördlichen oder nordöstlichen Lage gedeihen sie am besten. Außerdem ist es ratsam, den Boden während des Winters zum Schutze gegen starke Kälte mit Reisig, Laub, Mist usw. zu bedecken. Es kommt nun ziemlich häufig vor, daß die Ranken junger Pflanzen bei starkem Frost bis zum Grund absterben. Dies schadet aber besonders dann nichts, wenn der Wurzelhals des Stockes

10—15 cm hoch mit Erde bedeckt war, und aus den unter der Erde befindlichen Augen neue Triebe hervorkommen können. Die Walddreben verlangen ferner zu ihrem guten Gedeihen einen kräftigen, nährhaften Boden (Mischung von Lehm, Lauberde und Sand). Wo dieser nicht vorhanden ist, hebt man ein Loch von 60 cm Tiefe und 50 cm Breite aus, das man mit der angegebenen Mischung wieder zufüllt. Zu beachten ist, daß die eingepflanzten Stöcke nicht angetreten werden. Die Walddreben brauchen zu einem üppigen Gedeihen viel Feuchtigkeit. Deshalb muß besonders in trockenen Zeiten tüchtig gegossen werden. (Auch Dunggüsse sind dann und wann einmal zu empfehlen.) Um den Erdboden vor einem zu raschen Austrocknen zu schützen, belegt man ihn mit verrottetem Dünger. Die Vermehrung geschieht durch Ausaat der Samen gleich nach ihrer Reise in Samenkästchen oder Töpfe (liegen lange!) oder durch Teilung der Stöcke oder durch Ableger.“

In freier Natur aber von besonders wirkungsvollem Reize ist die Alpenrebe (*Clematis [Atragene] alpina*), von der Schröter in seiner anmutig lebendigen Weise folgende treffliche Schilderung gibt: „Die Alpenrebe hängt ihre schönen Glocken bald im Gebüsch des Rhodoretums (Alpenrosengebiet) auf, wo es als Unterholz im Alpenwald auftritt, bald ziert sie bemoooste Felsen in schattigen Lagen und Waldschluchten, oder sie entspringt dem Boden kahler, leghöhrenbewachsener Schutthalben, oder endlich sie klettert an Arven und Fichten empor; allermeist also als Waldbpflanze. Mit holzigem, gewundenem Stengel strebt sie empor, von den reizbaren, rankenden Blattstielen und Fiederstielen am stützenden Zweige befestigt oder auch nur auf spreizenden Organen sich stützend; oder der Stengel ‚läuft‘ am felsigen oder schuttreichen Boden. Die gegenständigen Blätter sind doppelt dreischnittig, die schönen großen, blauen (selten weißen) Blütenglocken hängen an langen Stielen senkrecht oder schief herab. Innerhalb der vier glockig zusammenneigenden langen Blütenblätter, die bei der seltenen Spielart *Kraettliana* Schr. zierlich gefranst erscheinen, sitzt zunächst ein Kranz von vier hellen, spatelförmigen ‚Staminodien‘, dann folgen Übergänge zu Pollenblättern und endlich die zahlreichen, dicht zusammenschließenden Staubblätter, welche den das Zentrum einnehmenden Büschel von 40—50 dicht gedrängten Stempeln umhüllen und weit überragen. Der Honig wird von den rinnig gestalteten Basalpartien der Staubblätter ausgeschieden und geborgen und kann nur durch kräftige, von unten her die Staubblätter auseinander drängende Insekten geholt werden. Das sind nur Bienen und Hummeln imstande, die dann auch nach übereinstimmenden Beobachtungen von Müller, Ricca, Kerner und Schulz die einzigen Besucher derselben sind und Fremdbestäubung vermitteln. Zuletzt freilich schieben sich die noch empfängnisfähigen Narben so weit vor, daß sie vom Pollen der eigenen Blüte bestäubt werden können.“

Über die Fruchtbiologie können wir in Kürze hinweggehen. Wie bei allen Walddreben, bilden auch hier die aus einer Blüte hervorgehenden zahlreichen Nüsschen einen befenartigen Fruchtstand, dessen Einzelfrüchte schließlich, von dem Blütenboden sich loslösend, mittels des langen, hier auch noch gefiederten Griffels durch die Luft schweben.

Somit wären wir nun zu der weitaus stärksten Gattung der ganzen Familie, die mit ihren mindestens 250 Arten ihr auch den Namen gab, gelangt. Der Nahnfuß (*Ranunculus*) besitzt Vertreter in allen Gebieten, ist jedoch in seiner Verbreitung vorwiegend auf das nördlich außertropische Gebiet beschränkt. Der eigenartige Name

Ranunculus ist ein Diminutiv von rana — Frosch, übersetzt aus dem Griechischen batrachion von batrachos. Der Name bedeutet also Froschkraut, wohl damit im Zusammenhang, daß viele Arten an ausgeprägt feuchten, sumpfigen Orten leben. Wir Deutschen haben mit „Hahnenfuß“ dagegen offenbar auf die Blattform angespielt.

Ich bin nun wahrhaft in Verlegenheit, was ich aus der Fülle der heimischen Hahnenfüße hervorheben und was ich wissen soll. Die verbreitetsten Formen sind in erster Linie der scharfe Hahnenfuß (*R. acer*), dann *R. lanuginosus*, *bulbosus*, *sceleratus*, *arvensis* und *auricomus*, die alle von sehr großer Familienähnlichkeit sind, aber in mehrfacher Beziehung voneinander biologisch abweichen.

Als Typus der Landranunkeln mag uns *R. acer*, der scharfe Hahnenfuß, gelten, schon deshalb, weil er jedermann erreichbar ist als eine der häufigsten Wiesenpflanzen, die im Mai und Juni hoch und schlank ihre goldgelben Blüten über die Gräser emporhebt. Diese wahre Staude verankert sich im Boden mit flach sich ausbreitenden faserigen Wurzeln, die mit den ebenfalls flach wurzelnden Gräsern um Boden und Nahrung zu kämpfen haben. Ähnlich wie wir es bei der Dotterblume gefunden, streben auch hier die grundständigen Blätter mit langem Stiel zum Lichte, während die oberen Stengelblätter mehr und mehr sitzend werden; sie bedürfen eben der eigenen Stiele nicht mehr, da sie durch den hochwüchsigen, verzweigten Stengel selbst ans Licht geführt werden. Auch die uns bereits bekannte Verkleinerung der höheren Stengelblätter stellt sich hier ein, damit sie nicht durch Beschattung die unteren Blätter schädigen. Zugleich tritt aber etwas pflanzenpsychologisch sehr Merkwürdiges, nämlich eine Vereinfachung des Umrisses, ein. Während die unteren Blätter die charakteristische Fünfteilung zeigen, beschränkt sich bei den kleineren oberen Stengelblättern die Zahl der Zipfel auf drei! Das ist durchaus rationell, aber vorläufig in seiner Kausalität noch ganz unverständlich, ebenso wie die Längsfurchen des Stengels oder die Behaarung des Laubes noch unerklärt sind. Die Blüten, die an der Spitze der Stengeläste stehen, sind regelmäßig gebaut, d. h. sie haben, der Zahl der Blütenhüllblätter entsprechend, fünf Symmetrieebenen und bestehen aus Kelch und Krone, die beide zu je fünf in abwechselnden Kreisen stehen. Da nun die zahlreichen Staub- und Fruchtblätter spiralig angeordnet sind, gehört die Hahnenfußblüte zu den „halbzyklischen“ Blüten der Familie. Die etwas grünlichen Kelchblätter umschließen die junge Knospe schützend bis zum Augenblick des Öffnens, dann breiten sich die leuchtend goldgelben Blumenblätter breit und wagrecht aus und bilden mit ihrer durch die glänzend lackierte Oberfläche grell wirkenden Farbe ein vorzügliches Anlockungsmittel für die Bestäuber. Außer dieser Verstärkung der Leuchtkraft, die namentlich im vollen Sonnenlichte zur Geltung kommt, hat die eigenartig glatte, „lackierte“ Beschaffenheit der Blumenblätter auch noch den weiteren Vorteil, daß bei Regenwetter, wobei sich die Blüte ebenso wie in der Dunkelheit schließt, die Wassertropfen, ohne zu neken, abrinnen. Der dem Kenner des Pflanzenlebens so wohlverständliche Blüteneschluß bei Regen oder Nachtzeit ist ein vollständiger, da die Kronblätter genau in den Zwischenräumen der Kelchblätter stehen. Der Schutz der Blüte wird übrigens auch noch dadurch verstärkt, daß mit dem Schließen gleichzeitig infolge der Krümmung der Blütenstiele ein Ricken der Blüten eintritt.

Die Hahnenfußblüte ist in biologischer Hinsicht überaus interessant. Wie überall bei den Ranunkulazeen sind auch hier die Kronblätter als Honigblätter entwickelt.

Jedes Blumenblatt erscheint nach außen schwach ausgebuchtet und verschmälert sich nach der inneren Ansatzstelle zu, wofür wir schon in der Nelkenfamilie den Ausdruck „genagelt“ kennen gelernt haben. In der Gegend dieses „Nagels“ findet sich nun in Form eines muldenförmigen Grübchens eine Honigrube, die durch ein kleines Schüppchen nach oben zugedeckt ist. Diese Schuppe ist nur einseitig an der schmalen Innenseite dem Blatt angewachsen, so daß die Insekten mit ihrem Rüssel darunter und zu dem Honig gelangen können. Als Bestäuber lockt die Blume Bienen und Schwebefliegen an, die beim Hervorholen des verdeckten Honigs reichlich Gelegenheit haben, die Bestäubung zu vollziehen. Da die Narben reif werden, bevor die Staubgefäße sich zu öffnen beginnen, ist die Fremdbestäubung in jeder Weise gesichert. Der Öffnungsprozeß der Antheren schreitet dann von außen nach innen fort, die innersten Staubbeutel öffnen sich zuletzt, ein Vorgang, der nach Beobachtungen in der freien Natur 7 Tage lang andauert.

Gegen tierische Angriffe ist der Hahnenfuß durch seinen scharfen, giftigen Stoff geschützt. Dadurch verschreckt er nicht nur die stets lüfternen Schnecken, sondern sogar Weidetiere, die alle Ranken stets verschmähen. Jedoch scheinen diese Giftstoffe beim Trocknen unschädlich zu werden, da wenigstens die Verfütterung mit Heu, das doch stets reichlich derartige Pflanzen enthält, in keiner Weise nachteilig wirkt.

Auf nicht zu nassen Wiesen, in Grasgärten und im Gebüsch lebt häufig mit dem vorigen zusammen der goldhaarige Hahnenfuß (*R. auricomus*), der nicht nur weniger stattlich erscheint, sondern auch selten alle seine Blumenblätter vollzählig besitzt, da sie zum Teil oder auch ganz rückgebildet werden. Je mehr dies der Fall ist, desto vollkommener ist jedoch ihre Umbildung zu Honigblättern. Sie werden dabei nicht nur immer kleiner, sondern wölben sich auch nach dem Grunde zu immer mehr aus, wobei sich die Ränder zunehmend nach innen biegen, so daß die kleinsten und am meisten umgewandelten schließlich nur noch ein dütenförmiges Nektarium darstellen. Es ist aber sehr bezeichnend, daß mit dieser Umänderung der Kronblätter (wobei doch für sie nur noch die Nektarausscheidung als einzige Funktion übrigbleibt, während natürlich von einer Lockungswirkung nicht mehr viel die Rede sein kann) nun die Kelchblätter zu Schauapparaten werden und sich hellgelb färben. Daß etwas Derartiges, ein Funktionswechsel nach Bedürfnis, überhaupt möglich ist, bedeutet den Anhängern unserer Pflanzenanschauung sicherlich feste Gewähr, daß sich unsere Lehre zum Siege durchringen muß. Denn dieser Hahnenfuß stellt doch hinsichtlich der Arbeitsteilung innerhalb der Blüte eine ausgesprochen höhere Stufe dar und beweist dadurch, daß auch in der Pflanzenwelt ähnliche Abstufungen der inneren Befähigung vorhanden sind wie im Tierreich.

Wieder durch andere Arbeitsteilung ist *R. arvensis*, der gemeine Ackerhahnenfuß, erwähnenswert. Auf Äckern ziemlich gemein, zeichnet er sich durch hellere, schwefelgelbe Blüten von sehr wechselnder Größe aus, die sich teilweise in einem Übergang zur Eingeschlechtigkeit befinden. Die Zahl ihrer Staubblätter wechselt stark; bei einem Mittelwert von 10 steigt die Zahl bis auf 13, sinkt aber häufig weit herab, so daß nicht selten nur 5—2, ja mitunter auch gar keine Staubblätter vorhanden sind. Im letzteren Falle sind dann die Blüten natürlich lediglich auf Fremdbestäubung und dadurch auf eine ganz andere „Lebensweise“ angewiesen. Dieselben Standorte wie

R. arvensis, nämlich Aker und Tristen, bewohnt auch der knollige Hahnenfuß (*R. bulbosus*), so benannt, weil er seinen Stamm dicht am Boden zu einem fast kugelförmigen, knolligen Nährstoffbehälter verdickt. Ein Erkennungszeichen für diesen nach dem genannten Merkmal leicht zu bestimmenden Hahnenfuß sind übrigens auch die zurückgeschlagenen Kelchblätter. Über ihn und seine Verwandten ist nicht viel zu berichten. Der wollige Hahnenfuß (*R. lanuginosus*) findet sich in lichten Laubwäldern, blüht vom Mai bis August und ist mit einem bis 1 m hohen Blütenstengel wohl einer der stattlichsten Vertreter seines Genus. Stengel und Blätter sind bei ihm mit steifen, borstenartigen Haaren bekleidet, die wohl in erster Linie eine Schutzwanne gegen die großen Waldnaachtschnecken bilden. Die nächstgenannten drei Arten haben gemeinsam die Vorliebe für nasse Wiesen, sumpfige Stellen, Wassergräben usw. Der kriechende Hahnenfuß (*R. repens*) besitzt neben der Samenbildung noch eine ausgiebige Vermehrung durch „Ausläufer“, die als seitliche Auszweigungen (wie bei der Erdbeere) auf dem Boden liegend fortwachsen und sich mittels Adventiwurzeln in der Erde befestigen, wodurch die Pflanze häufig rasenartig dichte Bestände bilden kann. *R. Flammula* und *R. sceleratus*, die eigent-

Der kriechende Hahnenfuß (*Ranunculus repens* L.). (Nach Thomé.)

lichen Gifthahnenfüße, zeichnen sich wieder durch besonders kräftige Giftstoffe aus; aber auch für sie gilt

hinsichtlich der Verfütterung mit dem Heu dasselbe Unerklärliche, was wir vorhin über den scharfen Hahnenfuß sagten. Mehr Aufmerksamkeit verdient das gemeinbekannte Scharbockskraut (*R. Ficaria*, auch *Ficaria ranunculoides* genannt), das der Hauptsache nach zwar mit der allgemeinen Ranunkelblüte übereinstimmt, aber doch wieder so viel Abweichendes hat, daß die erwähnte Abtrennung als Untergattung *Ficaria* immerhin gerechtfertigt erscheinen mag. Der Blütenboden dieser Pflanze trägt drei weißlich-grünliche Kelchblätter und bis zu 12 glänzend gelbe, lackierte, schmale Honigblätter, die so wie bei den anderen Ranunkeln ihre Honiggrube und das deckende Schüppchen darüber besitzen. Aber nicht dadurch wurde sie bekannt, sondern durch ihre Einrichtungen zu reichlicher vegetativer Vermehrung. Die Feigwurz, wie sie in Süddeutschland heißt, ist eine der allerersten Frühlingspflanzen, die an schattigen Stellen unter Buschwerk,

aber auch im freien Felde oft weite Strecken als sehr niedriges, ausdauerndes Kraut überzieht, das den Winter mit Hilfe eigentümlicher, zwischen den Wurzeln entstehenden Knöllchen überdauert. Darum kann sie (vgl. übrigens auch das über *A. nemorosa* Gesagte) so früh in der Jahreszeit erscheinen. Die glänzend hellgrünen, rundlich-herzförmigen Blätter legen sich ganz flach und oft so dicht auf den Boden, daß sie gar keine Zwischenräume unter sich frei lassen. Dadurch erhalten sie der Erde im hohen Grade ihre Feuchtigkeit, und das Scharbockskraut bedarf daher außer den auch für das Windröschen angeführten Gründen um so weniger eines Transpirationsfehles. Nur an Orten stärkerer Beschattung richten sich die Blattflächen gegen das Licht auf. Auch der Blütenstengel erhebt sich nur wenig über die Laubdecke. Die vegetative Vermehrung durch die Wurzelknollen ist aber nicht das einzige Hilfsmittel dieser Pflanze. Da bei der sehr frühen Blütezeit der Insektenbesuch höchst unsicher ist, hat sich die Pflanze mit der Bildung reichlicher Brutknospen ein Mittel verschafft, sich in die nächste Vegetationsperiode zu retten und zugleich für ihre Vermehrung zu sorgen. Diese in den Blattachseln sich bildenden, reichlich mit Stärke versehenen Knöllchen sind offensichtlich eine regulative Maßregel der Pflanze! Dies erkennt man daran, daß die Ausbildung der Brutknöllchen unterbleibt, wenn die Pflanze Samen ansetzt. Hat jedoch die Insektenbestäubung versagt, dann wird zu dem anderen Rettungsmittel gegriffen. Es wäre demnach sehr interessant, diese Verhältnisse durch Experimente zu prüfen, die tieferen Einblick in die Ursachenverfettung dieser Anpassung verheißen. Solche Brutknöllchen werden nun bei dem dichten Bestande der Pflanze, namentlich in ungünstigen Jahren, oft in so großer Menge gebildet, daß im Volksmunde die Sage vom „Getreideregen“ wegen der Ähnlichkeit dieser Brutknospen mit den Weizenkörnern entstand. Der Regen spült diese Knöllchen nicht selten mit sich und trägt so auch zur Verbreitung dieser Pflanze bei.

Eine besonders interessante Abtheilung der Ranunkeln aus der Untergattung *Batrachium* bilden die wasserbewohnenden Formen, über deren Blattdimorphismus bereits dort einiges gesagt wurde, wo wir uns über die allgemeinen Eigenheiten der Ranunkeln verbreiteten. Hier können wir noch hinzufügen, daß diese Pflanzen dichte Bestände, oft ganze Inseln im Wasser bilden. Sie schmücken die Teiche mit zahlreichen, weißen, in der Mitte durch die Staubblätter gelb erscheinenden Blüten, die den Honig offen und nicht mit einer Schuppe bedeckt darbieten und so zahlreiche Insekten anlocken. Bei hohem Wasserstande bleiben jedoch die Blüten untergetaucht und bestäuben sich dann selbst. Die zahlreichen schwimmenden Früchtchen werden von den Wellen verschleppt; außer ihnen stehen im Dienste der Verbreitung auch zahlreich am Stode sich bildende Ableger, ja sogar losgerissene Stücke können, z. B. vom Hochwasser fortgetrieben, an entfernten Orten Wurzeln schlagen und auf diese Weise der Pflanze neue Wohnsitz erobern. Kein Wunder also, daß diese dort, wo sie einmal Fuß gefaßt hat, sich auch bald zum Herrscher aufwirft.

Die Mehrzahl der Ranunkeln blüht mit gelber Farbe. Nur die eben genannte *Batrachium*-Sektion, ferner *R. aconitifolius* sowie einige Alpenranunkeln, so *R. alpinus* und *glacialis*, blühen aus unbekannter Ursache weiß. Unter diesen letzteren ist unstreitig der Gletscherhahnenfuß (*R. glacialis*) der interessanteste, eine ausgesprochen hochalpine Pflanze, die normalerweise erst bei etwa 2300 m, seltener

schon bei 1900 m beginnt. Sie steigt aber bis 4275 m empor und hat den Ruhm, die höchstwachsende Blütenpflanze Europas zu sein. Dieses schwache Blümchen hat aber auch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Es ist zugleich eine Schuttpflanze und gehört zu den „Schuttstauern“. Sein häufigster Standort ist der feuchte Felschutt hochalpiner, ebener Lagen; es bevorzugt hierbei das Urgebirge, fehlt aber auch auf Kalk nicht, ebensowenig auf sonnigen Schutthalden und in Felspalten der Grate und Gipfel. Lindt berichtet über einen Fund von *R. glacialis* auf dem Gipfel des Finsteraarhorns bei 4275 m Höhe in vollkommen entwickelten Exemplaren; desgleichen fand Galberla 6 m unter derselben Spitze zwischen Felsen ein Exemplar voll erblüht. Es gilt also wirklich, was Christ einst in seinem prächtigen „Pflanzenleben der Alpen“ schrieb, daß die Vorstellung, als ob unsere Alpengipfel eine Höhe erreichten, welche die Pflanzengrenze absolut überrage, durch die Erfahrung widerlegt sei. Wo sich irgendein Plätzchen findet, das durch lokale Einflüsse von Schnee und Eis, sei es auch nur für wenige Wochen, frei wird, da erscheinen nicht bloß Moose und Flechten, sondern auch Phanerogamen. Dies bewährt sich sogar bis zu den größten in unseren Alpen vorkommenden Höhen, mehrere tausend Fuß über die Schneegrenze hinaus. Unter diesen „Hochalpinisten“ der Pflanzenwelt, zu denen eine ganze Anzahl, so z. B. *Saxifraga bryoides* und *muscoïdes*, *Achillea atrata* und andere, gehören, ist unsere Gletscherranunkel, wie es scheint, die am meisten befähigte, obwohl sie äußerlich eigentlich gar nicht hochalpines Gepräge an sich trägt. Schröter, der sie genau studiert hat, entwirft von ihrem Wuchs folgendes anschauliches Bild, das uns als Beweis dienen möge. Er sagt: „Von einem aufrechten, kurzen Rhizom aus entspringt ein tief im Schutt versenktes Büschel dichtgedrängter, langgestielter, vielteiliger Grundblätter, von einigen oder mehreren Niederblättern umgeben; und ein teils niederliegender, teils aufrechter Blütenstengel, alles saftig grün glänzend, in keiner Weise eine sichtbare Anpassung an hochalpines Klima zeigend; nur die kleinsten Formen der höchsten Gräte besitzen eine spinwebartige Behaarung (var. *holosericeus* Gaudin und *gelidus* Hoffmann). Die Anatomie zeigt in der schwachen Entwicklung der Palisaden, dem Reichtum an Interstitien, der dünnen Epidermis und den vorragenden Spaltöffnungen deutliche Anpassung an Feuchtigkeit. Die Hauptachse geht in eine endständige Blüte aus; die Erneuerungsprosse kommen aus den Achseln der grundständigen Laubblätter und des untersten Stengelblattes. Der Stengel legt sich auf den Boden, und sein Erneuerungsproß treibt schon früh einige Wurzeln, die ihn selbständig machen. Die Blüten sind von einem dunkelbraunen, pelzigen Kelch eingehüllt, die Kronblätter strahlen in allen Nuancen vom reinsten Weiß bis zum dunkeln Rosenrot.“ Es ist jedoch nicht nachweisbar, daß die Färbung vom Untergrund oder von der Meereshöhe in irgendwelcher Weise abhängig sei. Die Blumenblätter sind zugleich reichlich Nektar absondernde Honigblätter und bleiben samt dem Kelch bis nach dem Abfallen der Früchtchen, wenn auch vertrocknet, erhalten. Diese Eigentümlichkeit unterscheidet die Gletscherranunkel von allen anderen Ranunkeln Europas. Dies ist auch der Grund, weshalb sie sogar in eine besondere Gattung (nämlich *Oxigraphis* mit noch fünf anderen Arten, die durchweg den Gebirgen Asiens, Nordamerikas und der Arktis angehören) eingeteilt wurde. Jedenfalls ist jedoch unser Gletscherhahnenfuß keine endemische Gebirgspflanze, sondern findet sich ebenso in den

Gisregionen der arktischen Gegenden wie in denen der Hochgebirge. Er ist zirkumpolar, und schon das läßt darauf schließen, daß er wohl mit so vielen anderen Alpenpflanzen zur Zeit der großen Vereisung eingewandert sei.

Verwandt mit den Ranunkeln, wenn auch ganz anders im Habitus, ist die Wiesenraute (*Thalictrum*), ein ausdauernder, krautartiger, zum Teil sogar ziemlich stattlicher Bewohner unserer Wiesen und grasigen Hänge. Die Pflanze ist durch sehr gefälliges, vielfach zusammengesetztes Laub ausgezeichnet, wie das bei *Th. aquilegifolium* auch schon der Name andeutet. Die Blüten sind in verhältnismäßig großer Zahl zu rispigen Blütenständen vereinigt, machen aber ganz und gar nicht den Eindruck von Ranunkelblüten. Ihr ganz schwach gefärbter, kleiner und außerdem noch während des Blühens hinfälliger Kelch ist vielmehr ganz unauffällig, denn es ist keine Krone vorhanden, nicht einmal in Form unscheinbarer Nektarien. Die Blüte ist vollständig honiglos. Wodurch sichert sie sich also den Bestand? Sie erregt die Aufmerksamkeit der pollensuchenden Insekten durch die gefärbten Staubblätter, die in dichten Büscheln beisammenstehen und bei der akeleiblättrigen Wiesenraute lebhaft violett gefärbt sind. Aber sie verläßt sich nicht auf dieses Mittel! Bei *Th. minus* und *Th. alpinum* pendeln die Staubgefäße im Winde und brauchen die Hilfe der Insekten nicht, da bei ihnen die Pollenübertragung durch den Luftzug erfolgen kann. Da die Blüten aber teilweise „vormännig“ sind, so ist wieder die Autogamie nicht unbedingt erforderlich, und so hat die Pflanze sich zwei Wege gesichert. Einige amerikanische Arten sollen nach Britton und Brown übrigens polygame Geschlechterverteilung besitzen, und bei einer von diesen, nämlich *Th. purpurascens*, stellte Overton interessante Versuche an. Er kultivierte eine Anzahl im jugendlichen Zustande ausgewählter weiblicher Exemplare teils im Gewächshause, teils im Versuchsgarten unter den üblichen Schutzmaßregeln gegen Fremdbestäubung. Sie setzten nämlich reichliche Früchte an, und die genauere histologische Untersuchung bewies, daß die unbefruchtete Eizelle trotzdem einen Embryo bildete! Auch im Freien fanden sich vielfach Blüten, in denen trotz der Anfänge der Embryonalteilungen ein Pollenschlauch an der Mikropyle (dem Keimmund) der Samenanlagen nicht aufzufinden war; in anderen Fällen allerdings auch solche, die normal befruchtet worden waren. Overton schloß hieraus, daß die

Alpenwiesenraute (*Thalictrum alpinum*).
Blühende und fruchtende Pflanze.
(Nach Reichenbach.)

Pflanze noch nicht zur ausschließlichen Parthenogenese übergegangen sei, wie das in ähnlichen Fällen von *Alchemilla* und *Antennaria* bekannt ist.

Von den Arten der Wiesenraute ist nicht viel zu sagen. *Th. aquilegifolium* ist eine Boralpenpflanze, die bis zu einem Meter hoch wird, *Th. alpinum* dagegen eine bis 2500 m hinaufsteigende Alpenpflanze von sehr zierlichem Wuchse, deren fein-zerteilte, trübgrüne Grundblätter im Rasen verborgen sind, während der zarte, faden-dünne Stengel auf graziösen, schön geschwungenen Stielchen die kleinen Blüten dem Winde darbietet. Die alpine Raute ist übrigens auch in der Arktis verbreitet und findet sich dort wie in den Alpen sowohl auf Weiden als auch in den Flachmooren; ja sie sßt

sogar direkt auf den Torfmoospolstern.

Auch die größeren Arten, *Th. minus* und *foetidum*, gehen in bedeutende alpine Höhen; letztere Art ist durch Drüsenhaare auf den Stengeln und Blättern gekennzeichnet, durch welche die Pflanze meist klebrig-flaumig anmutet. Die Röschen der Wiesenrauten sind durch einen schmalen Flügelsaum der Verbreitung durch den Wind angepaßt.

Blüten des Sauerdorns (*Berberis vulgaris*). (Naturaufnahme von P. Wolff-Bischheim.)

Hierher gehört auch das liebeiche Adonisröschen (*Adonis*), von dessen 20 Arten allerdings nur einige wenige bei uns heimisch sind. Die stattlichste davon ist das Frühlings-Adonisröschen (*A. vernalis*), dessen Blume einen Durchmesser von 4–7 cm erreicht. Mit seinen zahlreichen schwefelgelben, außen gefranzten Blumenblättern sowie dem deutlich davon geschiedenen Kelch leuchtet es weit übers Gefilde und verdient es, als Stierpflanze gehegt zu werden, um so mehr, als es eine ausdauernde Staude ist, die auch mit ihren fein zerteilten Blättern gefällig wirkt. Das Frühlings-Adonisröschen ist übrigens ebenso, wie wir es vorhin von der Kuschelle erzählten, ein Steppenrelikt und liebt demgemäß noch immer kalkige Hügel. Zwei andere Arten, *A. aestivalis*, das Sommer-Adonisröschen mit kahlem Kelch, und *A. flammea*, das brennendrote Adonisröschen mit behaartem Kelche, kommen auch in Mitteleuropa als einjährige Saatunkräuter vor. *A. autumnalis* dagegen wurde mit seiner zusammenneigenden Krone auch schon von den Gärtnern entdeckt, die es im Herbst für gemischte Beete säen, wenn sie trockenen, kalkhaltigen Boden zu Gebote haben.

An die Anemonen schließt sich eng eine Familie (*Berberidaceae*), von deren zahlreichen Vertretern für uns eigentlich nur ein einziger, die Berberitze oder der Sauerdorn (*Berberis vulgaris*), in Betracht kommt. Er ist jedermann bekannt als dorniger

Strauch, der oft in großen Mengen auf sonnigen, steilen Hängen wächst und im Verein mit anderen Dornsträuchern, nämlich Schlehdorn, Weißdorn und Heckenrosen, die Formation der sonnigen Hügel beherrscht. Bei uns ist er der einzige Vertreter einer Gattung, die im übrigen weit über 100 Arten zum Teil im Mittelmeergebiet, zum Teil in Zentralasien, China und Japan, vor allem aber im amerikanischen Andengebiet hat. Aber diesem Fremdling hat man bei uns gar übel mitgespielt. Aus mehrfachen Gründen hat man ihm den Krieg erklärt, besonders dort, wo er sich in der Nähe von Äckern und Getreidefeldern niedergelassen hat. Der Mensch ist ihm feind, nicht nur weil er für das Kulturland ein unangenehmer Nachbar ist durch die Ausnützung des Bodens mit seinen weithin wandernden Wurzeln, sondern auch vor allem wegen seiner uns schon aus dem II. Bande bekannten Beziehungen zum Getreiderost, für dessen *Uzidiengeneration* er die Wirtspflanze darstellt. In der Entfernung aller Berberissträucher aus der Nachbarschaft der Äcker, die aber wegen der weitverzweigten Bewurzelung nicht leicht ist, liegt nach der Ansicht vieler Gelehrter die einzige Möglichkeit, der Rostkrankheit des Getreides Einhalt zu tun, da sich der Pilz natürlich nicht weiterentwickeln kann, wenn ihm die Ausbildung der *Uzidiengeneration* unmöglich gemacht wird. Dem Naturfreund ist es allerdings schmerzlich, daß dieser schöne, die Landschaft im Lenz mit goldigen, duftenden Blütentrauben, im Herbst mit roten, leuchtenden Fruchttrauben herrlich schmückende Strauch mehr und mehr verdrängt wird, und es wirkt ganz tragisch zu sehen, wie sich die Pflanze gegen ihre Ausrottung wehrt, wie sie aus ihrem mächtigen Wurzelwerk allüberall Wurzelschößlinge entsendet und auf diese Weise hartnäckig den eroberten Boden zu behaupten sucht. Sie ist darin so kräftig, daß sie dort, wo sie einmal in größeren Beständen Fuß faßte, mit ihrem Dorngestrüpp einen kleinen Vorgesmack von den als „Busch“ oder „Scrub“ bezeichneten Dornstrauchformationen heißer Länder zu geben vermag. Dabei kann der Naturkundige leicht beobachten, wie das Dorngewirr der Berberise um so ausgiebiger wuchert, je trockener der Standort ist. Ihre Dornen sind holzige, meist dreispitzige Gebilde, die man als umgewandelte Blätter gedeutet hat, da aus ihrer Achsel Seitensprosse entspringen. Es bieten übrigens namentlich junge, kräftige Wurzelschößlinge der Pflanze häufig Gelegenheit, die denkbar vollständigste Serie von Übergängen vom normalen Laubblatt bis zum typischen Dorn zu beobachten. Auch diese Dornbildung ist im gewissen Sinne „regulativ“, indem Versuche gelehrt haben, daß sie hier, wie bei vielen anderen Dorngewächsen, direkt von der Trockenheit des Bodens und der Luft so abhängig ist, daß größere Feuchtigkeit die Dornbildung herabmindert.

Besonderes Interesse bietet bei *Berberis* die Blütenbiologie. Die in überhängenden Trauben stehenden Blüten sind völlig regelmäßig gebaut und mit Kelch und Krone versehen; beide Bestandteile der Blütenhülle sind prächtig gelbgrün, funktionieren also als Lockungsapparat. In der Regel sind 6 Kelch- und ebenso viele Kronblätter, je in zwei dreizähligen Kreisen, vorhanden; die inneren Kelch- und die Kronblätter sind dabei auf der Innenseite hohl und bieten somit den Staubblättern Schutz vor Regen. Mitunter, namentlich an den Endblüten der Blütentraube, sind diese Zahlenverhältnisse verschoben. Alle Organe sind dann in der Fünffzahl vorhanden, und wir wissen uns weder Ursache noch Bedeutung dieser Erscheinung zu deuten. Die Kronblätter tragen nun zwei Nektarien in Form orangefarbener Wülste.

Der von diesen ausgeschiedene Honig sammelt sich beim Aufblühen zwischen den Kronblättern und den vor ihnen stehenden sechs Staubblättern. Die Insekten, vor allem Bienen und Hummeln, müssen also mit ihren Rüsseln zwischen die Staubfäden hineingreifen, außerdem ist für sie die Berührung der Staubfäden auch bei dem Festklammern an der Blüte unvermeidlich. Dabei verrät nun die Pflanze eine ganz wunderbare Reizbarkeit, die sie in der Botanik berühmt und zu einem Paradebeispiel der Pflanzenpsychologie gemacht hat. Kaum berührt nämlich das anfliegende Insekt mit seinen Beinchen den Grund der Staubfäden, da springt auch schon der berührte Staubfaden wie eine Feder zurück und schüttet dem Gaste den Pollen, den die Anthere aus zwei seitlichen Klappen entläßt, über den Kopf; der Besucher berührt einen zweiten Staubfaden, und wieder ergießt sich ein Pollenregen (s. das Bild). So bepudert, verläßt er die Blüte, fliegt an eine zweite und berührt dabei den Narbenkopf des einfachen, länglichen Fruchtknotens, der als kranzförmiger, vorspringender Wulst ausgebildet ist. Damit hat er die Bestäubung vermittelt. Wie vortrefflich dieser einfache Apparat funktioniert, wird schon dadurch bewiesen, daß fast alle Blüten des Strauches Früchte ansetzen.

Verberisblüte, von einem Insekt besucht.
(Originalzeichnung des Verfassers.)

Wie kann man sich nun diese Handlung der Pflanze mechanisch erklären? Man hat bemerkt, daß die Bewegung der Staubgefäße durch einen plötzlichen Turgorwechsel des „Bewegungsgewebes“ ausgelöst wird. Was aber reguliert diesen Wechsel? Wie kommt die Pflanze zur „Kenntnis“ dessen, daß eine solche Bewegung am Plage ist? Sie hat besondere Sinnesorgane dazu, als papillös vorgewölbte Epidermiszellen an der Oberseite der Filamente. G. Haberlandt hat diese sowie zahlreiche andere, der Vermittlung von „Stoßreizen“ dienende Sinnesorgane genau untersucht und beschrieben, und seit ihm wissen wir, daß diese Oberhautzellen durch ihre starke Vorwölbung der Berührung besonders ausgesetzt sind. Da sie nun an der Basis, gerade dort, wo sie mit den benachbarten Papillen zusammenstoßen, eine verdünnte „Gelenkstelle“ in der Außenwand besitzen, sind sie auch befähigt, jedem Drucke eines anstreifenden Gegenstandes leicht nachzugeben, und bei jeder solchen Bewegung wird der Protoplasmakörper durch den Druck oder Zug, der sich auf ihn fortpflanzt, gereizt. Diesen Reiz empfindet die Pflanze und reagiert darauf mit den entsprechenden Änderungen in der Zellsaftspannung des Bewegungsgewebes. Ihre Empfindlichkeit ist außerordentlich fein; wenn die Staubfäden in gut reizbarer Verfassung sind, so genügt schon die Berührung mit einem Menschenhaar, um die Bewegung prompt auszulösen. Aber es ist hierbei durchaus nicht gleichgültig, wo die Berührung erfolgt! Und in diesem Punkte tritt die ganz besondere Zweckmäßigkeit dieses Organs hell zutage. Die Staubblätter liegen im ungereizten Zustande der Hohlung der Kronblätter dicht an. Das anfliegende Insekt kann die Staubfäden also nur an ihrer nach oben gekehrten Innenseite berühren. Sie sind deshalb auch nur an dieser Seite reizbar, und auch nur an dieser Seite finden sich die Nühlpapillen! Und zwar wieder

in bester Übereinstimmung mit der Art der Berührung durch das Insekt, vor allem in einer mittleren Partie, während an der Ansatzstelle und oben gegen die Antheren zu die Papillen nur unvollkommen ausgebildet sind; an der Unterseite des Filamentes fehlen sie sogar vollständig. Diese Verteilung der Fühlpapillen widerlegt denn auch die ursprüngliche Meinung, als ob bloß die Berührungserschütterung den Mechanismus des Staubfadens auslöse, bleiben doch sogar viel kräftigere Berührungen ganz wirkungslos, wenn sie nicht an der mit den Papillen besetzten Stelle erfolgen! Es handelt sich also hier, wie auch noch in manch anderen ähnlichen Fällen, um eine wirkliche Sinneswahrnehmung, übermittelt durch besondere, für den Zweck eigens gestaltete und geeignete Sinneszellen, und damit ist der Beweis zugunsten von Pflanzenempfindungen für jeden Unvoreingenommenen geschlossen.

Berberis heißt zu deutsch Sauerdorn. Dieser Name rührt von dem reichen Gehalt der Blätter, besonders aber der Früchte an organischen Säuren, vor allem Apfelsäure, her, weswegen man auch die Beeren vielfach einkocht. Im frischen Zustande haben sie dadurch einen äußerst herben, zusammenziehenden Geschmack, der aber von Drosseln und verwandten Vögeln offenbar sehr geschätzt wird. Denn diese sind die Hauptverbreiter des schönen Strauches, da sie wohl das Fruchtfleisch, nicht aber die Samen verdauen, sondern letztere aus dem Propfe wieder entfernen. Nahe verwandt mit unserer Berberis ist ein der Sektion *Mahonia* angehöriger Strauch, (*Mahonia* [*Berberis*] *Aquifolium*), der seinen lateinischen Artnamen von der Ähnlichkeit seiner Blätter mit denen der Stechpalme (*Ilex aquifolium*) hat. Aus Nordamerika zu uns als Zierstrauch eingeführt, sieht man ihn jetzt häufig in städtischen Anlagen. Andere Arten finden wieder zum Gerben Verwendung, und auch unsere Berberis ist nicht ganz nutzlos, denn ihr ungemein hartes und zähes, mit einem gelben Farbstoffe imprägniertes Holz ist zu Drechslrarbeiten sehr geschätzt.

Im Englerschen System folgen nun eine Reihe ausländischer Familien, von deren Vertretern einer, die Magnolie (*Magnolia*), in früheren Erdperioden auch in Deutschland seine Heimat fand. Heute ist sie und der mit ihr verwandte Tulpenbaum (*Liriodendron tulipifera*) nur noch ein gern gesehener Gast in den Anlagen Süddeutschlands und der milderen Küstengegenden, und gewisse Arten, so *M. obovata* und die vor der Belaubung blühende japanische *M. conspicua*, sind als Einzelpflanzen nicht genug zu empfehlen. — Man gibt ihnen am besten einen Standort, der nicht der Mittagsonne ausgesetzt ist; auch bedürfen sie, besonders im Jugendzustande, eines leichten Winterschutzes. Humusreicher, kräftiger, feuchter Lehmboden ist für das gute Gedeihen der Magnolien unerlässlich. Sie vermehren sich durch Ableger; auch kann man die Samen gleich nach der Reife in Moor- oder Lehmerde aussäen. Da die älteren Magnolien sich nicht mehr verpflanzen lassen, ziehen die Gärtner die Bäumchen daher in Kübeln heran. Läßt man sich die Pflanzen aus einer Gärtnerei kommen, so beziehe man nur stärkere Exemplare, da diese dem Wetter mehr Trost zu bieten imstande sind.

Einer für die menschliche Kulturgeschichte hochwichtigen Familie gehört der Lorbeerbaum (*Laurus nobilis*) an, der in seiner auf die Griechen, bzw. kleinasiatischen Kulte zurückgehenden Bedeutung zu allgemein bekannt ist, als daß wir davon Ausführliches zu sagen brauchten. Aber wir wissen noch mehr über die Urgeschichte dieses berühmten Baumes, als uns Sagen aufbewahrten, denn Zeugnisse,

weit über die Zeit der Menschheitsüberlieferung hinausgehend, niedergelegt in den Erdschichten einstiger geologischer Epochen, beweisen uns, daß der Lorbeer einst sogar hoch im Norden sein Verbreitungsgebiet hatte. Schon aus dem Paläozän Europas, also in den ältesten Schichten des Tertiärs, liegen Blattfunde vor, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf Laurazeen hinweisen; viel sicherer noch sind die fossilen Reste im Miozän und Pliozän, wo außer wohlerhaltenen Blättern auch noch Blüten, Blütenstände und Früchte vorkommen. Nach diesen Funden zu schließen, reisten im mittleren Tertiär Arten der Gattungen *Laurus*, *Cinnamomum* u. a. ihre Früchte mitten in Europa, im Amurlande sowie am oberen Mississippi. Insgesamt erweist die Erdgeschichte, daß die Laurazeen und mit ihnen der Lorbeerbaum erst seit der Eiszeit nach dem Süden verdrängt worden waren. Wie weit dies jedoch reichte, und ob erst nachträglich durch die Völker des Altertums wieder eine neuerliche Besiedelung im Süden Europas vor sich ging, läßt sich natürlich nicht bestimmen; denn wenn auch der Lorbeerfult aus Kleinasien kam, so sagt dies nichts dagegen, daß der Lorbeer sich auch schon vorher wild in anderen Gegenden des Mittelländischen Meeres erhalten habe. Er zeigt doch noch jetzt, daß er das Klima des nördlicheren Europas sehr wohl verträgt, da er sogar bei Cherbourg in Frankreich und im südlichen Teile unseres Sprachgebietes, um Bozen, in der Südschweiz, um Görz, noch im verwilderten Zustande lebt. Im nördlicheren Deutschland kennen wir ihn allerdings nur als „Kübelpflanze“, und diese gibt kein richtiges Bild von seiner Natur. Denn dort, wo er sich frei entfaltet, bildet er Bäume von 5 bis 10 m Höhe bei einem Stammdurchmesser bis zu einem halben Meter. Er gehört zu den „immergrünen“ Gehölzen und nach der Beschaffenheit seiner Blätter zu den „Hartlaubpflanzen“. Dies gibt ihm das Schmutze, aber zugleich auch das Starre seines Wesens. Seine Hauptlebensbedingung ist ein 4 bis 6 Monate währender, regenloser Sommer, dem ein milder, feuchter Winter folgt, und dementsprechend ist auch sein Laub, trotz dessen sonst xerophytischer Struktur, nach Wiesner ombrophil. In Griechenland bildet er noch immer ganze Wälder, und in Italien sowie auf Korsika gehört er zu den wesentlichen Bestandteilen der xerophytischen *Macchia*, jener eigenen, aus Myrten, Buchs, Oleander, Ölbaum, Stechpalme u. a. bestehenden Wälder, deren Duft und Würze nicht über ihre Kahlheit hinwegtäuschen können. Dementsprechend sind auch die Blätter des Lorbeers gegen Verdunstung durch ihre lederartige Beschaffenheit geschützt und enthalten so viel ätherisches Öl, daß man sie als Gewürz verwendet. Großer Reichtum an einem fetten Öl kommt auch den Beeren dieser Pflanze zu, im Samen ist davon sogar bis zu 30 % enthalten, so daß es sich lohnt, diese auszupressen. Das stark riechende flüchtige Öl wirkt auf viele Tiere abschreckend, so daß die Pflanze darin vielleicht ein wirksames Schutzmittel gegen Tierfraß besitzt. Auch der Mensch macht sich dies zunutze und stellt in den südlichen Ländern Lorbeerzweige gegen die lästigen Fliegen auf. Aus gleichem Grunde bestreichen auch die italienischen Fleischer ihre Verkaufsläden mit Lorbeeröl. — Der Lorbeer hat in den heißen Ländern eine Reihe verwandter Gattungen, die als Nuzpflanzen von Wichtigkeit sind. Wir meinen die Zimt- und Kampferbäume, die ebenfalls durch derbe Blätter ausgezeichnet sind, so daß sie sich in Versteinerungen gut erhalten haben und uns dadurch den Beweis lieferten, daß sich diese Bäume in früheren Epochen sogar an der Bildung europäischer Wälder beteiligten.

Die Mohngewächse (Rhoeadales).

Zu den unentbehrlichen Bestandteilen ländlicher Idylle gehört von je das mit den leuchtenden Farben des roten Klatschmohns durchsetzte reisende Kornfeld, durchsticht mit dem Blau der Kornblumen und den kleinen, bunten Unkräutern. Aber der Landmann sieht mit scheelem Auge auf diese Herrlichkeiten der Natur, ihm sind die Schädlinge nichts mehr als schwer zu bekämpfende Unkräuter, die seinen Feldfrüchten nur Platz und Nahrung stehlen. Er ist froh, wenn sie bei dichtstehender Saat im Inneren des Getreidefeldes von der schnell wachsenden Kulturpflanze „erstickt“ werden und sich nur noch am Rande des Ackers erhalten, wo ihnen noch genügend Licht zu Gebote steht. Und so bekämpft auch im „süßen Frieden“ des Landes eines das andere, nicht anders als in den Städten, und die Idylle ist nur ein Traum der Gedankenlosigkeit. Das Lebensbild des Feldmohns will ich jetzt in Kürze meinen Lesern vor Augen halten; denn er belehrt als Vertreter über die ganze Familie der „Papaveraceae“.

Der Ackermohn (*Papaver Rhoeas*) ist im Gegensatz zu anderen Arten seiner Gattung eine einjährige Pflanze. Daß er trotzdem ein so schwer auszrottbares Unkraut bildet, hängt mit der außerordentlich ergiebigen Samenbildung und deren Ausstreuerung zusammen. Er befestigt sich mit einer langen Pfahlwurzel, die senkrecht in den Boden dringt. Die Belaubung der Pflanze wechselt nach den Lebensbedingungen. Mit seinem dichten Wachstum und in stetem Kampf mit anderen Wettbewerbern um das Licht schießt der Mohn gewöhnlich stark in die Höhe und erreicht unter Umständen bis zu einem Meter Höhe. Aus gleicher Ursache bildet er keine breiten Blattflächen, sondern zum Zwecke besseren „Lichtfanges“ nur schmales, in die Länge gezogenes Laub. Daraus läßt sich auch verstehen, warum sich die langen, tief fiederspaltigen Blätter möglichst in die Höhe recken, warum sie um so kleiner werden, je höher am Stengel sie stehen. Besonders lehrreich ist in dieser Hinsicht, daß gerade die Pflanzen, die noch im Herbst aus den Samen hervorgehen, vor Eintritt des Winters eine zierliche, dem Boden aufliegende Blattrosette bilden; erst im Frühjahr, wenn der Kampf mit der aufsprießenden Saat beginnt, entwickeln dann auch sie den rasch wachsenden Stengel. Diejenigen Pflanzen dagegen, die erst im Frühjahr keimen, also keine Winterruhe durchzumachen haben (weshalb sie auch nicht eine grundständige Rosette bilden müssen, um von der Schneedecke schützend verborgen werden zu können), strecken sich von Anfang an in die Höhe. So ist hier der Zusammenhang zwischen Form und Bedürfnis in klassischer Weise erläutert. Dazu kommt, daß ein günstiger Standort und fruchtbarer, lockerer Nährboden natürlich viel größere und kräftigere Blätter hervorbringen als ein Standort mit gegenteiligen Eigenschaften. So ist es leicht verständlich, warum der Klatschmohn so sehr verschiedenartiges Aussehen in den einzelnen Landschaften hat.

Auch seine Blüten belehren über die verschiedensten Äußerungen des pflanzlichen Innenlebens. Sie entspringen aus den Achseln der Blätter an sehr langen Stielen. Die von dem zweiblättrigen, gleich der ganzen Pflanze dicht behaarten Kelch eingehüllte Blütenknospe ist eiförmig, ziemlich schwer und daher in diesem Entwicklungsstadium auch überhängend. Diese Lage ändert sich jedoch sofort beim Ausblühen. Der Blütenstiel streckt sich dann in die Höhe und trägt die offene Blüte nun nach auf-

wärts. Das Öffnen der Blüte geschieht durch vollständiges Abfallen des Kelches, den man deshalb als „hinfällig“ bezeichnet. Wenn man nun eine noch geschlossene Blütenknospe öffnet, findet man im Innern die Blumenblätter in eigentümlicher, zerknitterter Knospenlage; erst während des Aufblühens glätten sie sich und breiten sich infolge ausgleichenden Wachstums aus, noch mehr aber durch Zufließen der nötigen Säfte für die Turgorsteigerung. Dies ist durchaus mechanisch verständlich; denn nur so ist es möglich, daß die sehr großen Blumenblätter in der Knospe Platz finden.

Die Mohnblüte ist in folgender Weise gebaut: Ihr Kelch und ihre Krone sind in zweizähligen Kreisen so angeordnet, daß vier kreuzweise gestellte Blumenblätter die Krone bilden. Die Staubgefäße sind in großer Zahl und in mehreren abwechselnden Kreisen vorhanden. Sie umgeben den aus vielen, bis zu zehn und mehr Fruchtblättern gebildeten Fruchtknoten. Dieser ist wieder, der Zahl der Fruchtblätter entsprechend, in Fächer geteilt, deren Scheidewände jedoch nicht im Zentrum zusammenstoßen. Sie ragen vielmehr bloß „kulissenartig“, aber ziemlich tief in den Hohlraum des Fruchtknotens hinein, und an den Wänden dieser Kulissen sitzen die sehr zahlreichen Samenanlagen. Der Fruchtknoten endlich besitzt die Form eines beiläufig eiförmigen Kegels, dessen Spitze nach unten gewendet ist, und dessen etwas sich vorwölbende Grundfläche die Narben in Form von Strahlen trägt, die vom Mittelpunkt zum Rande verlaufen und in ihrer Zahl jener der Fruchtblätter entsprechen.

Die Blumenblätter unseres Mohns haben an der Basis einen größeren, schwärzlichen Fleck, so daß sich bei ihrer gegenständigen Stellung am Grunde der Blume ein schwarzes Kreuz mit lebhaftem Kontrast abhebt. Das erinnert nun ohne weiteres an die sogenannten „Saftmale“ vieler Blumen. Aber gerade hier haben wir ein lehrreiches Beispiel, wie wenig man in der Natur verallgemeinern darf, denn die Mohnblume bietet ihren Besuchern ja gar keinen Honig, sondern nur Pollen! Sie bedarf also gar keines Saftmales. Was soll nun jedoch diese Zeichnung bedeuten? Ist sie nur ein freies Spiel der „Gestaltungskraft“, wie sich das die älteren Botaniker vorstellten? Wir wissen es nicht. Wir glauben nur, daß die Ansicht mancher Biologen, diese Zeichnung habe die Auffälligkeit der Blüte, ziemlich weit hervorgeholt sei, denn gegenüber dem aufdringlichen Rot der ganzen Blume dürfte doch diese Zierde des tiefliegenden Blütengrundes wenig mehr zu bedeuten haben. Bei der freien und weit offenen Stellung der Mohnblumen hat natürlich hier alles aus dem Insektenreiche Zutritt, was sich von Pollen nährt: Bienen sowohl wie Hummeln, Fliegen und pollenfressende Käfer, alle tummeln sich in den wohligen roten Blumen. Für Fremdbestäubung ist daher reichlich gesorgt, denn die Besucher finden an den zarten Blumenblättern keinen Halt, sie müssen sich auf dem derben Narbenkopfe niederlassen. Von anderen Blüten kommen sie, reichlich mit Blütenstaub beladen, an und setzen ihn dann in Menge auf der vorspringenden Narbenfläche ab. Aber diese ausgiebige Fremdbestäubung ist auch notwendig, denn wie durch Versuche feststeht, ist der Atermohn „selbststeril“, d. h. er setzt, mit dem Pollen der eigenen Blüte bestäubt, keine Samen an. Diese Befruchtungsarbeit der Insekten ist übrigens sehr bedeutend, muß doch eine gewaltige Menge Pollen auf einer solchen Narbe abgesetzt werden, um die ungeheure Menge von Samen zu erzielen, die in solch einer Mohnkapsel enthalten ist! Diese Samen lösen sich bei der Reife von den Scheidewänden los und füllen das

Innere der derben, holzigen Kapsel aus. Sie werden durch ringförmig angeordnete Löcher zwischen dem festbleibenden Deckel und den Scheidewänden ausgestreut, wenn die Kapsel im Winde auf ihrem langen und elastischen Stiel hin und her geschleudert wird.

P. Rhoeas ist nur ein Unkraut, die Edelpflanze seiner Gattung ist der Schlafmohn (P. somniferum), den man, namentlich im slawischen Teile Österreichs, vielfach auf Ackern der Samenernte wegen anbaut. Er wird jedoch, ebenso wie der Ackerohn in vielen Varietäten — darunter auch mit durch Umwandlung der Staubblätter in Blumenblätter reichlich gefüllten Blüten — in Gärten gehalten. Diese gefüllten Formen werden Pöonienmohn genannt und erinnern auch wirklich im Aussehen an Pfingstrosen. In Gärten wächst auch der orientalische Mohn

(P. orientale), der auf einem meterhohen borstigen Stengel eine bis zu 13 cm im Durchmesser erreichende brennendrote Blume trägt, also eine dekorativ sehr wirksame Staude ist. Wildlinge gleich dem Ackerohn, von ihm aber durch verschiedene Form und Behaarung der Kapseln unterschieden, sind der Sandmohn (P. Argemone) und die selteneren Arten P. hybridum und dubium. Alle diese Arten sind von ihm leicht zu unterscheiden, denn sie tragen ihr Geblätt am Stengel. Eine besonders

Zierblumen des Gartenmohns. Blüten des Papaver nudicaule und des Goldmohns (P. hybridum), die zwei Blüten oben.
(Nach der „Gartenwelt“ gezeichnet von H. Unkauf.)

schöne Art, wenn auch von zwerghaftem Wuchs, ist mit seinen stengellosen, grundständigen Blättern der Alpenmohn (P. alpinum), der prächtigste Schmuck der kahlen Kalkschutthalden und Riesflächen. Gerade in der Steinwildnis wirkt sein einsamer Rasen mit den fein zerschlitten, graugrünen Blättchen, aus denen sich zahlreich die zarten, rauhhaarigen, blattlosen und einblütigen Schäfte erheben. „Sie tragen zwischen zwei schwarzbehaarten, abfälligen Kelchblättern die feingefalteten grünlich-weißen Mohnblüten, die stets nickend und im Grunde die strahligen Narben der Fruchtknoten, umgeben vom dunkelgrünen Büschel der Staubfäden, bergen. Ein starker Moschusgeruch mit dem spezifischen Mohngeruch (und dem Nektenduft der Blüten) geht von der höchst

ausgezeichneten Pflanze aus“, sagt von ihm Christ, und wir könnten der trefflicherkurzen Charakteristik nur Überflüssiges hinzufügen, wollten wir sie erweitern. Bei Überdeckung durch nachrollenden Schutt strecken sich die gestauten Internodien dieser Pflanze und kommen auf diese Weise immer wieder an das Licht. Diese dichtgedrängten Horste gehören also zu den wirksamsten „Schuttstauern“ und haben so Bedeutung für das „Leben der Berge“. Faßt man übrigens den Begriff des *P. alpinum* im weiteren Sinne, so sind vier Klassen zu unterscheiden, zwei breitblättrige: *P. pyrenaicum* (aurantiacum) mit gelben, und *P. Sendtneri* mit weißen Blüten sowie zwei schmalblättrige: *P. alpinum* (im engeren Sinne) weißblühend und *P. Kerneri* gelbblühend, über deren Bildung wir jedoch noch nichts aussagen können.

Alle Papaveraceen sind durch den Besitz von Milchröhren ausgezeichnet; diese entstehen durch nachträgliche Verschmelzung ursprünglich getrennt angelegter Zellen (deshalb nennt sie der Anatom „gegliedert“) und bilden in der Pflanze ein vielfach verästeltes Netzwerk. Dieser Milchsaft, der sowohl im Stengel wie in den Blättern und vor allem auch in der unreifen Kapsel reichlich vorhanden ist, spielt eine große kulturgeschichtliche Rolle. Denn der eingedickte Milchsaft von *P. somniferum* (und zwar Varietät *album*) lieferte von jeher das berühmte Opium.

Der wirksame Bestandteil dieses Giftes ist neben anderen Alkaloiden das Morphin, das an Mekonsäure gebunden ist und bis zu 24% des Gesamtgewichtes ausmachen kann. Prof. Schumann erzählt über die Gewinnung des Opiums folgende interessante Einzelheiten: Der Mohnbau erfordert viel Kosten und Mühe, denn der sehr sorgfältig vorbereitete Boden muß sehr gut und stark gedüngt sein. Außerdem gehört noch eine gewisse Kunst des Mohnschneidens dazu. Kaum sind nämlich die Blumenblätter und Staubblätter abgefallen, so führt der Bauer mit einem Messer, dessen Klinge bis auf die Spitze mit Bindfaden umwickelt ist, in der unteren Hälfte der Kapsel einen Ringschnitt oder mehrere kleinere, wagrechte Schnitte aus. Schon am nächsten Tage ist der weißliche, reichlich hervorquellende Saft zu einer braunen, harzähnlichen Masse erhärtet, die mit dem Messer abgeschabt und auf Mohnblätter gestrichen wird. Von hier wird er wieder abgekratz und mit hölzernen Reulen in Klumpen vereint, die stark austrocknen müssen, damit sie nicht beim Transport gären oder faulen. Als Haupthäfen dieses für die Medizin allein in Betracht kommenden Opiums sind Konstantinopel und Smyrna bekannt. Im großartigsten Maßstabe wird aber Mohn in Ostindien gebaut, welches das Gift tonnenweise nach China und überhaupt Ostasien ausführt, wie der älteren Generation durch den schmachvollen Opiumkrieg der Engländer noch genugsam bekannt ist.

Die Samen des Mohns enthalten reichlich ein fettes Öl, das in besonderen Mühlvorrichtungen aus den Mohnkörnern gepreßt („geschlagen“) wird; es findet als gutes Speiseöl (Mohnöl) und zur Bereitung der Farben für die Ölmalerei Verwendung, und sogar der Preßrückstand der Samenmasse bietet als „Mohnkuchen“ ein vielfach verwendetes Futtermittel für das Vieh. Da der Same nämlich die giftigen Stoffe des Milchsaftes nicht enthält, kann der von seinem Ölgehalt befreite Same ohne jeden Nachteil zur Verfütterung benützt werden.

Dem Mohn nahe verwandt ist die Gattung *Glaucium*, die in Deutschland durch zwei Arten, das gelbblühende *G. flavum* und das rote *G. corniculatum*, ver-

treten ist. Die Blüte dieser Pflanzen ist der des Mohns überaus ähnlich, die Kapsel ist jedoch langgestreckt und schotenartig; da sie in ihrer Krümmung an Hörnchen erinnert, hat sie ja der Pflanze den deutschen Namen Hornmohn verschafft.

In die nähere Verwandtschaft gehört auch das auf Schutt, an Hecken und Zäunen sehr häufige Schellkraut (*Chelidonium majus*), das man oft irrtümlicherweise Schöllkraut nennt, trotzdem der Name doch von der Anwendung dieser Pflanze bei Knochenbrüchen herrühren soll, also von zerschellen abzuleiten wäre. Die Gattung ist „monotyp“, d. h. sie umfaßt nur eine einzige Art, die außer in Europa noch

Schellkraut (*Chelidonium majus*). (Naturaufnahme von F. Hartmann-Dresden.)

in Mittel-, Nord- und Ostasien vorkommt und von da aus auch nach Nordamerika eingeschleppt wurde. Die Pflanze, die den meisten wohl nur durch den orangefarbenen Milchsaft bekannt ist, der bei der geringsten Verletzung der Pflanze an allen Organen reichlich hervorquillt, ist ein sehr verbreitetes Unkraut, dessen Schönheit jedoch nicht genügend gewürdigt wird. Die lebhaft goldgelben Blüten heben sich von dem sehr zierlichen, saftgrünen Laube wirkungsvoll ab, namentlich wenn das Kraut den Boden in etwas gedrängteren Beständen bedeckt. Auch das Laub ist sehr schön geformt, in feinen Fiedern geschnitten und lappig gefeilt. Dem Botaniker fällt hierbei auf, daß die mittleren Abschnitte nahe der Mittelrippe einen nach der Basis des Blattes zu gerichteten Lappen tragen, während sich an der entgegengesetzten Seite des Abschnittes statt dessen eine Ausbuchtung befindet. Dies hat den Zweck, daß sich die Teile des Blattes nirgends decken, d. h. sich nirgends beschatten, was natürlich seine biologische Bedeutung hat. Die kleinen Blüten sind in doldigen Blütenständen vereinigt, wobei die Endblüten besonders entwickelt sind. Mit ihrer Vielzahl, der gekreuzten

Stellung der Blumenblätter und der zerknitterten Knospenlage haben sie den Typus der Mohnblüte. Eine stärkere Abweichung zeigt jedoch, so wie bei *Glaucium*, auch hier der Fruchtknoten. Er ist länglich, besteht nur aus zwei Fruchtblättern und entwickelt sich zu einer der Kreuziferenschote ganz ähnlichen Frucht, die sich mit zwei Klappen von unten nach oben öffnet. Die Samen besitzen einen kammartigen, weißen, fleischigen Anhang, eine Schwiele, die von den Ameisen sehr geschätzt wird. Es gehört demnach auch das Schellkraut zu den „myrmekochoren“ Gewächsen. Die nahe Verwandtschaft mit dem Mohn wird übrigens auch durch den Mangel an Honig verraten, nur ist bei diesem Gewächs die Selbstbestäubung nicht erfolglos wie dort, sondern tritt sogar regelmäßig ein. Nach Kerner führen die anfänglich von der Narbe entfernt stehenden Antheren infolge mannigfacher Bewegungen ihrer Träger Krümmungen aus, die man in neuerer Zeit als „gamotrope“ bezeichnet, und die den Erfolg haben, daß sich die stäubenden Antheren schließlich an die Narbe schmiegen und daselbst ihren Pollen absetzen. Auch hier gilt also die für die Pflanzenpsychologie höchst beweiskräftige Erfahrung von Löw, die er in folgende Worte kleidete: „Daß die autogamen Blüten im Hochgebirge und im hohen Norden an Zahl zunehmen, während die allogamen zurücktreten, steht im Zusammenhange mit inneren, im Pflanzenorganismus selbst liegenden Faktoren, die das Sexualsystem derselben zu der für die Erhaltung der Art günstigsten Form der Bestäubungseinrichtung bestimmen“. Diese Überzeugung hat sich ja in neuerer Zeit allgemein Bahn gebrochen, und auch in einem so hervorragenden Werke wie Schröters Pflanzenleben erklärt einer der Verfasser (A. Günthart) auf S. 717 ausdrücklich: „Auch wir sind geneigt, das Zunehmen der Autogamie im Gebirge, inneren, im Pflanzenorganismus selbst liegenden Faktoren oder Kräften‘ zuzuschreiben, dabei verstehen wir unter diesen Kräften eben die Fähigkeit noch nicht einseitig angepaßter Blüten, auf äußere Einflüsse zweckmäßig zu reagieren, z. B. bei ausgebliebener Fremdbestäubung Bewegungen usw. auszuführen, welche Autogamie bewirken müssen. Es darf jedoch nach dem heutigen Stand unseres Wissens nicht behauptet werden, daß jenes Anpassungsvermögen der niedrigen Blüten die alleinige Ursache des Vorwiegens autogamer Blüteneinrichtungen in den Alpen sei. Hier wie in jeder Naturwissenschaft muß man sich vor einseitiger Erklärung der Erscheinungen hüten. Natürliche Auslese spielt gewiß beim Zustandekommen des behandelten Unterschiedes zwischen Tieflands- und Alpenflora mit, wenigstens als ausmerzender Faktor, wenn auch vielleicht erst, nachdem das Vorhandensein oder Fehlen jener Selbstanpassungsfähigkeit ihr Gelegenheit zum Eingreifen geboten hat.“

Die nächste noch immer der Reihe der Rhoeadales angehörige Familie ist die der Erdrachgewächse (*Fumariaceae*), von deren zahlreichen Vertretern nur einige bei uns heimisch, allerdings besonders durch ihre blütenbiologischen Verhältnisse auch sehr interessant sind.

Hierher gehört vor allem die in Gärten sehr beliebte und daher allgemein bekannte Herzpflanze, die man Herzblume, auch „flammendes Herz“ genannt hat. Ihr lateinischer Name ist *Dicentra spectabilis*. Die Pflanze führt jedoch auch den Gattungsnamen *Dielytra*, dem das *Curiosum* anhaftet, daß er infolge eines Druckfehlers zu *Dielytra* wurde und in dieser Verunstaltung Eingang in viele botanische Bücher gefunden hat! Die Herzblume stammt aus Nordchina und wurde etwa um die

Mitte des 19. Jahrhunderts bei uns eingeführt. Aus einem strunkigen Wurzelstocke entwickelt sich alljährlich eine stattliche, frühblühende Stauden mit überaus zierlicher, auf schwankendem Stiele bogig sich neigender Blütentraube, die es verdient, daß sowohl die regelmäßige, herzförmige Gestalt der Einzelblüte als die Anmut in der Haltung des ganzen Blütenstandes so vielfach im ganzen Kunstgewerbe zu ornamentalen Motiven verwendet wird.

Der ziemlich verwickelte, aber sehr interessante Blütenbau wurde von Hildebrandt eingehend untersucht und beschrieben. Diesen Untersuchungen können wir folgendes entnehmen: Die beiden lanzettlichen Kelchblätter fallen schon sehr früh ab und sind auch an noch nicht völlig ausgewachsenen Blüten nicht mehr vorhanden. Die

Herzblume (*Dicentra spectabilis*). (Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Seineck-Alzey.)

beiden äußeren Blumenblätter haben zusammen in der Knospe die Form eines mit der Spitze nach unten gerichteten Herzens; sie tragen an der Basis eine sackartige Erweiterung, und ihre Spitzen biegen sich beim Aufgehen der Blüte auseinander und schlagen sich auf den hauchig erweiterten Teil zurück. Durch dieses Auseinandergehen wird der obere Teil der beiden inneren Blütenblätter sichtbar. Diese haben im ganzen eine lineare Gestalt, sind auch jedes in der Mitte durch ein eigentümliches Scharnier in zwei Teile geteilt, und zwar so, daß die oberen, an der Spitze fest miteinander vereinigten Teile durch einen seitlichen Druck gemeinschaftlich nach der entgegengesetzten Seite abgelenkt werden können, und zwar beliebig nach beiden Seiten. Das Scharnier ist wieder so eingerichtet, daß mit Aufhören des Druckes der obere Blatteil sogleich wieder in seine alte Lage zurückspringt. Unter dieser von den vereinigten oberen Blatteilen gebildeten Kapuze sind Staubblätter und Narbe geborgen und geschützt. Die Staubblätter sind sehr eigentümlich angeordnet: zu den inneren Blütenblättern abwechselnd gestellt, sind sie dreigliedrig, d. h. bilden je eine Staubgefäßgruppe, die aus einer mittleren zweifächerigen und je einer einfächerigen Anthere zur Seite besteht. Die

Antheren und ein Stück darunter auch die Filamente sind frei, bis etwa in der halben Höhe der Kapuze; von da bis zu der Stelle, wo die Filamente in die Kapuze eintreten, sind sie in jedem Staubgefäßkomplexe miteinander verwachsen. Von dieser Eintrittsstelle abwärts sind die Filamente wieder frei und nehmen einen bogigen Verlauf ungefähr in der Mitte der Höhlung des äußeren Blütenblattes. Das mittlere der drei Filamente ist dabei an der dem Zentrum der Blüte abgekehrten Seite rinnig vertieft, während die äußeren eine flache, bandartige Form haben und sich dem mittleren so anlegen, daß sie erhöhte Ränder der Rinne darstellen. Diese Rinne führt bis an den Grund der Blüte, woselbst das mittlere Filament eine halbtugelige Nektardrüse besitzt, die ihr Sekret in die Ausfackung des betreffenden äußeren Blütenblattes ergießt. Sehen wir nun zu, wie die Bestäubung einer so komplizierten Blüte verläuft. Schon bevor sie sich öffnet, brechen die Antheren auf, und der ausfallende Pollen wird auf den Narbenkopf und die inneren Wände der Kapuze niedergelegt, wobei infolge der Geschlossenheit der Kapuze kein Pollenkörnchen verloren gehen kann. Selbstbestäubung ist also in diesem ersten Stadium der Blüte notwendig und unvermeidlich. Nach der Bestäubung verschrumpfen die Antheren, und der mit Pollen bepuderte Narbenkopf wird frei, ist aber natürlich noch immer unter der Kapuze verdeckt. Anfliegende Insekten (wegen der tiefen Lage des Honigs kommen als Bestäuber nur langrüsselige Hummeln in Betracht) suchen den Rüssel längs der Führungsrinne der Filamente auf den Grund der Ausfackungen zu bringen. Wollte sich dabei das Insekt auf ein äußeres Blumenblatt setzen, so müßte es seinen Rüssel in abnormer Weise S-förmig umbiegen, während es den Rüssel in einer für ihn normalen Biegung zum Honigsafte bringt, wenn es sich auf die Kapuze der inneren Blumenblätter niederläßt und von hier aus den Rüssel in die einzige Öffnung, die sich an der Blüte findet, zwischen den äußeren und inneren Blumenblättern einführt. Genau dort beginnt auch die beschriebene Führungsrinne. Bei dem Niederlassen auf die Kapuze wird diese aber in dem Scharnier beiseitegeschoben, und der Narbenkopf kommt nun mit dem Unterleibe der Hummel in Berührung und streift daselbst wenigstens einen Teil des auf ihm abgelagerten Blütenstaubes ab. Kommt die Hummel nun an eine nächste Blüte, bei der vielleicht schon ein vorhergehender Besucher den eigenen Pollenstaub abgestreift hatte, so kann und muß hier die Narbe mit dem Pollen belegt werden, den die Hummel von der anderen Blüte mitgebracht hatte. Die auf diesem Wege gesicherte Fremdbestäubung wird noch zuverlässiger durch die Gewohnheit der bienenartigen Insekten, in jedem Blütenstande zuerst die untersten Blüten aufzusuchen. In unserem Falle hat dies zur Folge, daß eine Hummel, von der obersten, also jüngsten und noch mit dem eigenen Staube bepuderten Blüte eines Blütenstandes kommend, am nächsten Blütenstande die älteren, durch frühere Besucher des eigenen Blütenstaubes bereits beraubten Narben zuerst anfliegt. Soweit reicht Hildebrandts interessante Schilderung, die wir deshalb ausführlicher hergesetzt haben, da sie, in der Fachliteratur verborgen, so wenig bekannt ist und doch einen überaus lehrreichen Einblick in die wunderbare Komplikation des Blumenlebens gewährt, die noch auf lange hinaus der Botanik die schwersten Probleme stellen wird.

Es ist also bei *Dicentra* die Einrichtung der Blüte derartig, daß bei Anwesenheit und den Besuchen von geeigneten Insekten eine Fremdbestäubung ebenso unver-

meidlich ist wie die schon in der Knospe stattfindende Selbstbestäubung. Wie weit der eine oder andere Bestäubungsvorgang notwendig, bzw. ausreichend ist, läßt sich an der Pflanze, wie bei vielen Kulturgewächsen, nicht entscheiden, denn sie ist bei uns in ihren geschlechtlichen Verhältnissen beeinträchtigt und setzt weder bei behindertem Insektenbesuch noch bei künstlicher Kreuzbefruchtung Samen an.

Diese interessanten Blütenstände bieten aber auch eine für die Pflanzenpsychologie sehr beachtenswerte, erst in neuerer Zeit unter dem Gesichtspunkte psychobiologischer Fragestellung näher studierte Erscheinung. Die langen Blütenstandsspindeln werden durch das Gewicht der schweren Blütenknospen im Bogen nach unten gekrümmt, wodurch die an dem herabhängenden Teile stehenden Blüten so dicht aneinander zu liegen kommen, daß sie von den Hummeln schwer besogen werden können. Da hilft sich die Pflanze dadurch, daß sie die Spindel in der Mitte des Bogens schräg nach oben wendet und die Blüten nun in normale Lage bringt. Bloßer Schwerkraftsreiz kann dies nicht sein, weil das Charakteristische darin liegt, daß die Aufwärtskrümmung gerade dort erfolgt, wo die Lage der Blüten dies erforderlich macht.* Prof. D. Heineck ging nun von dieser Beobachtung aus und band zwei Blütenspindeln fest, indem er die eine hoch, die andere tief zog, so daß beide senkrecht standen, und überließ sie dann sich selbst. „Der freie Teil der Spindel wuchs nun sofort wagrecht und verlängerte sich, wodurch die Blüten auseinander kamen und sich nicht deckten. Dabei mußte sich die rechte nach unten und die linke nach oben krümmen (rechts und links hier nach der Lage der Versuchssprosse), was durch einseitiges Wachstum ja leicht geschehen konnte. Später zeigten sich dann auch noch beim Weiterwachsen die oben beschriebenen spontanen Krümmungen.“ Das Entscheidende ist hier, daß die Krümmung stets im Sinne der herbeizuführenden Blütenstellung erfolgte, das eine Mal nach aufwärts, das andere Mal nach abwärts, was eine geotropische Deutung vollständig ausschließt. Die individualisierte Wahl der Bewegungsrichtung liegt hier so klar zutage, daß es keiner weiteren Bemerkung darüber mehr bedarf.

Der Herzblume steht die einheimische Gattung der Lerchensporne (*Corydalis*) nahe, die gegen 90 meist im zentralen Nordostasien und dem Mittelmeergebiet verbreitete Arten umfaßt. Bei uns kommen nur wenig Arten vor, in der Mehrzahl erste Frühlingsblüher (*C. cava*, *solida*) und dementsprechend auch ausdauernde Gewächse mit unterirdischen Speicherorganen. Bei *C. cava* jungiert als solches die unbegrenzte Hauptachse; sie ist knollig verdickt und stirbt von rückwärts ab, wobei sie interessanterweise hohl wird. Bei *C. solid*a hingegen ist die Knolle eine Anschwellung der Wurzel, die zu dem blühenden Sprosse gehört, während bei *C. cava* die Blüten sprosse an der Spitze der Hauptachse entspringen. Mit der Entwicklung der Erneuerungsknospe aus einer Niederblattachsel bildet sich unter dieser im Innern der alten Knolle eine neue, oberwärts sich knollig verdickende Wurzel.

Die Blütenbiologie der Lerchensporne entspricht im wesentlichen jener von *Dicentra*, doch gibt es hier einige sehr interessante Abänderungen. Wie aus der umstehenden Abbildung ersichtlich, ist nämlich die Blüte des Lerchensporns einseitig zygomorph (unregelmäßig); die beiden äußeren Blumenblätter bilden eine Ober- und

* Man vgl. übrigens auch damit das für *Aconitum* berichtete Verhalten!

Unterlippe, und nur die erstere besitzt einen Honigsporn, d. h. eine Ausbuchtung. Die Unterlippe dagegen hat nichts Derartiges oder nur ganz unbedeutend. Die beiden inneren Blätter bilden auch hier wieder eine festschließende Kapuze um die Antheren und Narbe, wobei die Staubbeutel ebenfalls in den zwei Dreiergruppen, so wie bei *Dicentra*, verteilt sind. Aber das Scharnier, das dem oberen Teil der Kapuze die Beweglichkeit verleiht, ist hier einseitig, nur an der oberen Seite entwickelt, wodurch lediglich ein Herabbiegen der Kapuze möglich ist, und das entspricht der Anflugart der

Ein Stock von *Dicentra*, dessen Blütenstiel die Blüten durch geeignete Bewegungen bedürftismäßig stellt. (Nach Heinemann in der Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre. 1908.)

Insekten, da diese nur im oberen äußeren Blumenblatt Honig finden. Auch hier springt die Kapuze nach Aufhören des von oben geübten Druckes wieder in ihre schützende Lage zurück. Dadurch, daß nun bei dieser Blüte die oberen Blütenblätter mit dem unteren Teile der inneren und diese wieder mit den Filamentbändern in bestimmter Weise teilweise verwachsen sind, müssen alle diese Teile der Blüte eine ganz bestimmte Lage zueinander behalten, die auch durch ungestüme Bewegungen der Insekten nicht zerstört werden kann. Der Apparat muß aber in diesem Fall, wo nur Fremdbestäubung zur Samenbildung führt, mindestens zweimal in Tätigkeit treten; es ist deshalb gesorgt, daß er nicht beim ersten Besuche schon ruiniert werden kann. Hummeln können in die bedeutend kleineren Blüten der *Corydalis* nicht eindringen,

sondern die Lerchenspornblüten sind Bienenblumen. Der Vorgang der Bestäubung ist nun wohl ohne weiteres klar, wenn man sich an das erinnert, was uns Hildebrandt von der Herzblume erzählte. Die anfliegende und sich auf die Kapuze setzende Biene drückt diese herunter und bestäubt sich an ihrem Unterleib mit dem Pollen, den die Narbe schon vor dem Aufbrechen der Blüten erhalten hat. Diese Selbstbestäubung ist aber experimentell als wirkungslos festgestellt worden. Die Biene muß also jetzt eine ältere Blume aufsuchen, um an der „freigekehrten“ Narbe den fremden Blütenstaub abzugeben. Da nun ebenfalls durch Versuche sichergestellt ist, daß nur Bestäubung mit dem Pollen verschiedener Individuen zu ergiebiger Samenbildung führt, so wird nun ersichtlich, wie wichtig in diesem Falle die oben erwähnte Gewohnheit der Bienen wird, die Blütenstände von unten herauf abzusuchen: denn nur auf diese Weise ist es möglich, daß eine Biene sich mit dem Blütenstaub der

Blüten eines Individuums beladet und diesen auf den Narben eines anderen Individuums absetzt! Was wir hier nach den Untersuchungen Hildebrandts erzählten, bezieht sich auf *Corydalis cava*. Es verdient aber auch noch die abweichende Blüteneinrichtung bei *C. ochroleuca* besondere Erwähnung, da sie ein schönes Beispiel darbietet, wie der pflanzliche Organismus durch verschiedene Einrichtungen denselben Zweck zu erreichen wußte, was uns zu beweisen besonders wichtig ist! Es ist hier vor allem bemerkenswert, daß die ganze Geschlechts säule, d. h. der Griffel mit den umgebenden Filamentbändern, unter einer starken Spannung steht, die von der ungleichen Gewebespannung an der Ober- und Unterseite des oberen Filamentbandes herrührt und zur Folge hat, daß nach Befreiung von der zurückhaltenden Kapuze dieses obere Filamentband sich energisch nach oben krümmt und dabei die ganze Geschlechts säule mitnimmt. Diese Spannung wird nicht durch die beiden, hier nur lose miteinander verbundenen Kapuzenteile der inneren Blumenblätter zurückgehalten, sondern durch eine Leiste, die weiter nach der Spitze der Kapuzenblätter zu auf deren Innenseite verläuft. Diese Leisten schließen nun über den Geschlechtsteilen fest zusammen, und es ist ein bestimmter Druck nötig, um sie so voneinander zu bewegen, daß sie der von ihnen niedergehaltenen Geschlechts säule den Durchgang gewähren. Sobald dieser Druck jedoch durch das aufsitzende Insekt ausgeübt wird, schnellst ihm der Narbenkopf an den Bauch und bestreut ihn mit dem von der vorhergängigen Selbstbestäubung herrührenden Pollen. Nach dem Wegfliegen des Insektes folgt die Geschlechts säule wieder dem weiter wirkenden Spannungsdruck und schnellst noch weiter in die Höhe, den Narbenkopf unter der Oberlippe bergend. So sehen wir, daß der Narbenkopf seinen Regen- und Insektenschutz, den in den anderen Fällen die zurückkehrende Kapuze sicherte, mit ganz anderen Mitteln erreicht! Da durch die Auslösung der Spannung die Geschlechts säule endgültig aus ihrer ursprünglichen Lage kommt, hat ein Zurückkehren der Kapuze auch keinen Sinn mehr. Sie unterbleibt deshalb auch, und die Einrichtung, welche dieses Zurückkehren bei den anderen Formen vermittelt, fehlt hier. Alle diese Zusammenhänge sind mechanisch undeutbar und ebenso starke Stützen für die Pflanzenpsychologie.

Damit ist jedoch die „Individualisierung der Anpassung“ noch nicht vollendet. Denn offensichtlich bringen die Verhältnisse bei dieser *Corydalis*-Art es mit sich, daß der Narbenkopf nur einmal von einem Insekt berührt wird, wodurch die Fremdbestäubung, wenn auch nicht verhindert, doch viel weniger gesichert ist. Da ist es denn im höchsten Grade auffällig, daß gerade bei dieser Art nun auch die Selbstbestäubung, die bei der anderen versagt, wieder wirksam ist! Daran ist aber nicht zu zweifeln, daß, wenn ein von einer anderen Blume kommendes Insekt zu dem eigenen Pollen auch fremden auf die Narbe bringt, dieser gegenüber jenem natürlich der wirksamere sein wird. Jedenfalls müssen auch die Gegner der Psychobiologie zugeben, daß die Einrichtungen der *Fumaria*-een eine bewundernswerte Harmonie aufweisen, die denen die schwersten Rätsel aufgibt, die solche Erscheinungen als aus zufälliger Kombination kleiner Abweichungen und natürlicher Auslese zustande kommend betrachten wollen.

Ich kann diesen Abschnitt nicht schließen, ohne noch mit einigen Worten des Erdraches (*Fumaria*) zu gedenken. Diese Gattung wurde von Hammar monographisch bearbeitet und umfaßt nach ihm ungefähr 40 Arten, vorwiegend im Mittelmeergebiet,

einige auch in Mitteleuropa und am Kap. Von den sieben deutschen Arten, die sich nur durch untergeordnete Merkmale unterscheiden, ist der gemeine Erdrauch (*F. officinalis*) am meisten verbreitet. Er ist ein kleines saftiges, nach dem Abpflücken leicht welkendes Kraut mit doppelt fiederteiligen, zarten Blättchen. Seine rosarot gefärbten, kleinen und wenig auffallenden Blüten stimmen in Bestäubungseinrichtungen und Blütenbau fast genau mit denen der *Corydalis*-Arten überein, und zwar bei den meisten Arten mit den Verhältnissen bei *Corydalis cava*, bei einer, nämlich *Fumaria spicata*, jedoch mit denen bei *C. ochroleuca*. Hildebrandt betont, daß Versuche ihm hier die Wirksamkeit der Selbstbestäubung dargetan haben, und daß genügender Insektenbesuch in der freien Natur nicht nachgewiesen sei. Wenigstens habe er selbst niemals Insekten an der Pflanze gesehen. Da nun bei zwei anderen *Fumaria*-Arten die Elastizität der Kapuzenblätter an ihrem Scharnier eine so schwache ist, daß nach einem Drucke von oben die Kapuze nur langsam oder gar nicht über die Geschlechtsteile zurückflappt, und auch bei diesen Arten von ihm keine Insekten beobachtet werden konnten, wirft er mit Recht die Frage auf, ob dieser Mangel an Elastizität nicht vielleicht durch fortdauernde Nichtbenutzung eingetreten sei. Eine Frage, die für einen Lamarckisten ein wertvolles Experimentalproblem darstellt, aber gegenwärtig nur gestellt, jedoch nicht beantwortet werden kann.

Die Kreuzblütler (Kruziferen).

Ungeachtet der umfangreichsten Familie dieser Reihe stockt meine Feder. Sie scheut sich vor der Einförmigkeit, die sie jetzt schildern soll, denn die Kreuzblütler sind, so formenreich sie auch auftreten, eine der wenigen Pflanzengruppen, die Schönheit vermissen lassen. Rein botanisch sind sie zwar nicht uninteressant; sie sind vor allem außerordentlich gut charakterisiert, und ihre Eigentümlichkeiten sind trotz der großen Anzahl von Gattungen und Arten, die hierher gehören, sehr ausgeprägt und einheitlich. Die Angehörigen dieser Familie sind auch bei ihrer großen Zahl und weiten Verbreitung wichtig für das Pflanzenkleid der Erde, aber, abgesehen von gelegentlichen Ausnahmen, vermögen sie dennoch den Naturfreund kaum zu fesseln. Gegenüber anderen Erscheinungen der Pflanzenwelt ist ihnen das Los relativer Unscheinbarkeit zuteil geworden. Während andere Familien so häufig neben unansehnlichen Formen die herrlichsten Formen aufweisen, vermissen wir solche unter den Kruziferen fast ganz. Das Höchste, wozu sich diese Gewächse im äußeren Habitus aufschwingen, ist bei einigen Gattungen und Arten die Bildung von Halbsträuchern oder richtigen Büschen. In unseren Gegenden ist aber sogar solches selten. Denn zum weitaus größeren Teile sind unsere Kreuzblütler ein- und zweijährige oder ausdauernde Kräuter. Die letzteren sind „einachsig“, d. h. jede Jahresgeneration schließt mit einem Blütenstande ab, und die folgenden Jahresprosse entstehen seitlich von jenem. Doch finden sich in einzelnen Verwandtschaftskreisen auch „unbegrenzt“ fortwachsende Hauptachsen, welche die Blütenprosse als Seitenzweige erzeugen; so wird z. B. für *Thlaspi latifolium* ein unbegrenztes Rhizom angegeben.

Wenn aber auch die Kreuzblütler meist wenig zur Physiognomie der Landschaft beitragen, so gibt es doch einige Ausnahmen, und durch verschiedene Standortsanpassungen treten auch verschiedene biologische und pflanzengeographische Charaktere zutage. Einige Kreuziferen sind z. B. als ausgesprochene „Syngrophilen“ an feuchte, wenn nicht direkt nasse Standorte angepasst, so das Wiesen Schaumkraut (*Cardamine pratensis*), das auf feuchten Wiesen im ersten Frühling ein ganz bestimmtes physiognomisches Bild hervorbringt, ferner die Kressen (*Nasturtium*), die — wie bekannt — gerade an wassertriefenden Orten am besten gedeihen. Eine andere Gruppe gesellt sich zu den Ruderalpflanzen, den salpeterliebenden Bewohnern von Dung- und Abfallstätten,

Typen einheimischer Kreuzblütler.

1 = Leinbutter (*Camelina sativa*). 2 = Girtentäschel (*Capsella bursa-pastoris*). 3 = Frühlingshungerblümchen (*Erophila verna*). 4 = Meerfenchel (*Cakile maritima*). 5 = Gellertkraut (*Thlaspi arvense*). 6 = Gänsekresse (*Arabis turrita*). 7 = Raukensenf (*Sisymbrium officinale*).

(Nach Thomés Flora und der Natur.)

wieder andere lieben das Salz, schließen sich also den „Halophytenvereinen“ an, und eine große Anzahl ist überhaupt für die Besiedelung trockener und magerer Böden geeignet. Sie sind dann mitunter durch ihre Genügsamkeit und andererseits durch ihre Vermehrungskraft und Lebensfähigkeit zu äußerst gefürchteten Unkräutern im Kulturlande geworden. Manche Kreuziferen gehören der Felsflora an, steigen als Felsenbesiedler auch in bedeutende alpine Höhen und finden sich in der arktischen Felsflora wieder. Noch andere sind als Bestandteile der Steppenformation besonders in Asien zu finden und zeichnen sich dann, wie wir das schon wiederholt bei Steppen- und Wüstenpflanzen kennen gelernt haben, durch sehr tiefgehende Pfahlwurzeln und auch häufig durch graufilzig behaarte Sprosse aus. Dieser ausgesprochen xerophytische Charakter ist bei einigen Formen der Steppenvegetation noch durch Dornenbildung verstärkt (*Vella*-Arten in Spanien und Algier und *Zilla*-Arten in Ägypten, Tunis

und in der Sahara). Diese Dornen sind in der Hauptsache, wenn nicht ausschließlich, die Enden von Blütenständen oder deren Auszweigungen. Auch die „Jerichorose“ (*Anastatica hierochuntica*) ist in gewissem Sinne in diesem Kreise zu erwähnen.

So bietet denn diese Familie, wenn sie auch morphologisch-systematisch ziemlich einförmig ist, doch ökologisch ziemliche Mannigfaltigkeit. Dem entspricht auch ihre große Verbreitung; so kommt *Lepidium*, *Sisymbrium* und *Nasturtium* fast auf der ganzen Erdoberfläche vor. Einzelne ihrer Angehörigen fehlen sogar in keinem der geographischen Gebiete. Immerhin erreichen sie den Höhepunkt ihres Vorkommens in der nördlichen Halbkugel, wobei wir jedoch nicht vergessen dürfen, daß die Formen der südlichen Halbkugel vielfach noch ganz unerforscht sind. Ihr eigentliches Hauptverbreitungsgebiet sind die Länder um das Mittelmeer.

Gemäß der alten Erfahrung, daß die Nützlichsten gewöhnlich nicht die Schönsten sind, ist die Bedeutung der Kreuzblütler für uns Menschen ganz hervorragend. Ein Teil ihrer Arten zählt allerdings zu den bestgehaßten Unkräutern, die nur mit größter Mühe und Sorgfalt von den Äckern fernzuhalten sind. Dafür sind dann andere in hohem Grade als Nutzpflanzen geschätzt. Die „Grundachse“, wie der Botaniker es nennt, das Blattwerk und sogar der Blütenstand liefern schätzbare Gemüse, und auch die Samen finden durch ihren Ölgehalt nutzbringende Verwertung. So hat denn seit langem der Mensch an diesen Pflanzen gelernt, durch sorgfältigste künstliche Auslese Kulturrasen zu schaffen, die nun im weitesten Umfange angebaut werden.

Der Botaniker versichert uns übrigens, daß auch hinsichtlich des inneren Baues anatomisch-histologisch die Familie sehr gut gekennzeichnet sei. Ihr Spaltöffnungsapparat zeigt fast immer den gleichen Bau, weshalb er als „Kruziferentypus“ bezeichnet wird. Das Schließzellenpaar wird hier nämlich von drei Nebenzellen umgeben, von denen die eine kleiner ist als die anderen. Dies hängt mit einer konstant sich findenden Teilungsfolge im embryonalen Hautgewebe bei Bildung der Spaltöffnungen zusammen, über deren Ursache wir noch nichts wissen. Die Spaltöffnungen finden sich übrigens bei den Kruziferen gewöhnlich auf beiden Seiten der Blätter. Drüsenhaare sind selten; nach Prantl ist ihr Vorkommen auf die Gruppe der Hesperidinen beschränkt, was übrigens bei einer so ausgesprochen xerophilen Gruppe wundernimmmt. An ihrer Stelle sind eben Deckhaare sehr verbreitet. Diese sind immer einzellig, sonst aber von ziemlich wechselnder Gestalt; entweder einfach unverzweigt und gleich Borstenhaaren abstehend oder als Sternhaare, Schildhaare schüsselförmig oder baumartig verzastet ausgebildet. Besonders charakteristisch sind die „Feilhaare“ des Lades (*Cheiranthus*), zweiarmlige, der Oberfläche des Blattes dicht anliegende Haare, deren beide Arme von einem bauchigen, in der Epidermis versenkten Stielstück nach beiden Seiten genau entgegengesetzt abgehen, wie die Arme einer eisernen Mauerklammer. Diese Haare stehen sehr dicht, und da sie alle in der Längsrichtung des Blattes angeordnet sind, verwandeln sie diese Oberfläche in eine richtige Feile. Schnecken und andere blattbenagende Tiere weichen denn auch diesem wirkungsvollen Verteidigungsapparat gern aus. Sehr bemerkenswert ist eine anatomische Differenzierung des Hautgewebes, die in der Familie häufig, aber stets auf bestimmte Arten beschränkt ist und von Heinricher entdeckt und untersucht wurde. Sie besteht darin, daß zwischen den gewöhnlichen Epidermiszellen solche eingeschaltet sind, welche die übrigen an Volumen

um ein Vielfaches (10- bis 20-, ja 100faches) übertreffen und gleichzeitig beträchtlich aus der Ebene der übrigen Epidermiszellen, ja bisweilen im Querschnitt des Blattes fast haarartig vorspringen. Inhaltlich sind diese Zellen von den umliegenden gewöhnlichen Epidermiszellen nicht verschieden und haben gleich jenen farblosen Inhalt. Ihrer Funktion nach aber dienen sie der Wasserspeicherung. Diese anatomische Besonderheit wird besonders dann sehr auffällig, wenn diese vergrößerten Zellen in zusammenhängenden Bügen angeordnet sind, denn sie bilden dann mitunter ein schon mit freiem Auge erkennbares Netz an der Oberfläche des Blattes, in dessen Maschen sich dann die Gruppen von Spaltöffnungen mit ihren Nebenzellen wie Inseln eingestreut finden. Als Beispiel hierfür kann man in der Schule den Rettich (*Raphanus sativus*), noch besser freilich *Bruca cappadocica*, *Diploxys tenuifolia* oder *Moricandia arvensis* demonstrieren. Diese Differenzierung wiederholt sich auch am Stengel, wie wir durch die Untersuchungen von Dennert und Volkens wissen.

Eine weitere anatomische Eigenheit der Kreuziferen bilden die sog. Myrosinzellen. Auch sie wurden zuerst von Heinricher entdeckt und von ihm wegen der Eiweißreaktionen, die ihr wasserheller Inhalt bei mikrochemischen Reaktionen gibt, als Eiweißschläuche bezeichnet. Seine Versuche lassen sich leicht wiederholen; so tritt z. B. Rotfärbung beim Erwärmen des Schnittes mit dem Millonschen Reagens ein. Es handelt sich aber dabei nicht um die Speicherung eines Nahrungs-eiweißes, sondern, wie neuerdings Guignard u. a. feststellten, um ein eiweißartiges Ferment, das die Chemiker als Myrosin bezeichnen. Durch Einwirkung dieses Myrosins auf ein gleichfalls bei den Kreuziferen vorkommendes Glykosid, nämlich das myronsaure Kali, findet eine Spaltung des letzteren statt unter Bildung von Senföl, Zucker und saurem schwefelsaurem Kali, von denen das Senföl allen Teilen der Kreuziferen jene charakteristische, schwach rettichartige oder auch stark senfartige Schärfe verleiht, der zuliebe man Rettiche verzehrt und Senf bereitet. Diese Myrosinzellen sind stets leicht durch ihre mikrochemischen Reaktionen zu erkennen, vorausgesetzt, daß sie nicht allzu inhaltlos sind, wenn schon anatomisch nicht immer leicht zu finden, da sie gestaltlich kaum von den umgebenden Gewebezellen verschieden sind.

Diese Myrosinzellen finden sich in allen Organen der Pflanze, sowohl in den Wurzeln, Zweigen und Blättern wie in Blüte und Samen. Am reichsten oft in der Wurzel, daher denn auch diese Organe bei vielen Kreuziferen (Rettich!) besonders durch ihren scharfen Geschmack ausgezeichnet sind. Zuweilen sind sie in den vegetativen Organen außerordentlich spärlich, dann aber ziemlich leicht in den Samen oder im Fruchtknoten zu finden. Das klassische Untersuchungsobjekt hierfür ist natürlich der Rettich. Wenn nun auch die Zahl der Myrosinzellen und ihr Inhaltsreichtum wechselt, so ist doch ihr lokales Vorkommen in der Pflanze, ihre histologische Verteilung konstant, ein Umstand, der durch Schweidler näher auf seine systematische Verwertbarkeit geprüft wurde und in dieser Hinsicht Wichtigkeit erlangte. Denn auf Grund des Vorkommens der Myrosin-Idioblasten* unterscheidet Schweidler bei den Kreuziferen drei Gruppen. Zu der ersten gehören Kreuziferen, deren Idioblasten ausschließlich im

* Unter „Idioblasten“ versteht man in der botanischen Histologie bekanntlich Zellen, die sich nach Form oder Inhalt von dem Gewebe unterscheiden, in dem sie liegen.

Mesophyll lokalisiert (Mesophyll=Idioblasten) und chlorophyllführend sind (Exo-Idioblastae); zu den zweiten Kreuziferen mit an die Leitbündel gebundenen (Leitbündel=Idioblasten), chlorophyllfreien Idioblasten (Endo-Idioblastae), und schließlich gibt es solche, bei denen beide Typen der Lokalisation zugleich vorkommen: dies sind die Hetero-Idioblastae. So ändert die Pflanzenanatomie in neuerer Zeit sogar die systematischen Begriffe.

Die Blätter stehen bei den Kreuzblütlern fast „wechselständig“, bei einigen Gattungen sind jedoch alle oder wenigstens die unteren gegenständig. Die Blattfläche ist entweder ungeteilt, und in diesen Fällen sind die Blätter häufig dem Stengel mit mehr oder weniger umfassender Basis angefügt und am Rande mit drüsigen Zähnen besetzt; oder die Blattfläche ist fiederteilig, und zwar gewöhnlich „leierförmig“, d. h. mit größerem Endlappen. Das sind Beziehungen, denen wir allerdings nicht besonderen Geschmac abgewinnen können.

Die systematische Gliederung der Familie im Sinne der natürlichen Verwandtschaft ist wegen der Gleichartigkeit der Blütencharaktere sehr schwierig. Dazu kommt die große Ausdehnung der Familie — umfaßt sie doch in über 200 Gattungen bei 1800 Arten, soweit sie bisher erforscht ist. Die Einteilung der Familie, wie sie heute gehandhabt wird, geht in der Hauptsache auf De Candolle zurück, und dieser gründete die systematische Gruppierung auf die Eigentümlichkeiten des Frucht- und Samenbaues. Es leuchtet aber schon ohne weiteres ein, daß mit einem solchen Herausgreifen eines oder des anderen Merkmales als allgemeinem Einteilungsprinzip doch nur ein künstliches System geschaffen ist. Der moderne Systematiker geht nicht so vor; sondern bevor er sich klarmacht, in welcher Weise er irgendwelche Merkmale systematisch benützen kann, macht er sich mit dem Bau und allen Charakteren der betreffenden Gruppe vertraut und nimmt alle Kenntnisse zusammen, um auf das einzelne zu schließen. Ihm wollen wir also folgen und die „Naturgeschichte“ der Kreuziferen ihrem System voranstellen.

Da wäre denn vor allem bemerkenswert, daß bei dieser Pflanzengruppe die Blütenstände, zu denen die Einzelblüten vereinigt sind, fast stets als Traube ohne Endblüte, also als sog. „unbegrenzte“ Blütenstände erscheinen. Unter Traube versteht übrigens der Pflanzenmorphologe bekanntlich nicht nur einen hängenden Blütenstand, sondern eine Traube kann auch steif aufrecht sein; ihr morphologisches Merkmal liegt vielmehr darin, daß die Einzelblüten an einer einfachen Hauptachse ohne Verzweigung stehen, und zwar jede an einem besonderen, mehr oder weniger langen Stiele. Sie ist daher der Gegensatz zur „Ähre“, bei der unter sonst gleichen Verhältnissen die Einzelblüten, an der durchgehenden Achse seitlich sitzend, ohne Stiele angefügt sind. Bei manchen Arten der Kreuzblütler finden sich nun mehrere, in absteigender Folge sich entwickelnde und in Trauben endigende Zweige, die insgesamt einen rispigen Gesamtblütenstand bilden. Als besondere Eigentümlichkeit der Kreuziferentraube macht der Morphologe ferner auf die „Stauchung“ der Blüteninternodien in der jungen Spizenregion des Blütenstandes aufmerksam, die erst bei späterer Entwicklung einer entsprechenden Streckung weicht. Erwähnenswert ist dies deshalb, da der Blütenstand durch diese Unordnung an seiner Spitze, namentlich von oben betrachtet, eine Form erhält, die den Eindruck einer „Dolbe“ macht. Aber schon durch seitliches Betrachten dieses oberen

Teiles des Blütenstandes, noch mehr aber an den ausgewachsenen tieferen Teilen sieht man ohne weiteres die Charaktere der echten Traube, zu denen ja auch das allmähliche Aufblühen der Blüten in der Richtung von unten nach oben gehört. Wegen dieser Eigentümlichkeit bezeichnet der Systematiker den Blütenstand der Kreuziferen auch als „Doldentraube“. Diese Baueigentümlichkeit ist in ihrer biologischen Bedeutung bereits durchschaut. Denn biologisch wird durch sie zweierlei erreicht: durch die sukzessive Aufblühfolge erzielt die Pflanze besonders langes Blühen, indem noch immer neue Blüten an der Spitze des Blütenstandes aufbrechen, wenn in den unteren Teilen bereits die Früchte reifen, ja die Samen schon ausgestreut sind. Und zweitens wird die ganze Blumengesellschaft an der Spitze durch ihre „ebensträufige“ Zusammendrängung den Insektengästen viel aufständiger, was besonders bei Formen mit kleinen Einzelblüten ins Gewicht fällt. So vermag die neue biologische Betrachtungsart auch den trockensten morphologischen Kenntnissen Leben einzuhauchen.

Die manchmal ziemlich großen (so bei *Cheiranthus*, *Matthiola*, *Hesperis*,

Raphanus u. a.), oft aber auch sehr kleinen Einzelblüten der Kreuzblütler sind einfach und sehr regelmäßig gebaut. Der Umriss der Blüte ist radiär (aktinomorph), und die Blütenhülle besteht stets aus Kelch und Krone. Jeder dieser Teile zählt vier Blätter, wovon die Kelchblätter frei sind und einander zu je zwei gegenüberstehen. Auch die meist weiß oder gelb, seltener anders gefärbten Blumenblätter stehen in der Vierzahl gekreuzt, jedoch in einer Ebene, d. h. einem einzigen Kreise

Blütentypen der Kreuzblütler.

1 = Blüte von *Brassica nigra*. (Nach Wettstein.) 2 = Blüte von *Isatis tinctoria*, von der Seite und durchschnitten. (Nach Baillon.) 3 = Blütenstand von *Cheiranthus*. (Nach Baillon.) 4 = Blütenstand des *Heberichs*. (Nach Schmeil.)

angehörig.* Staubblätter sind im ganzen sechs vorhanden; von diesen stehen zwei dem äußeren Kreise angehörige vor zweien der Kelchblätter und sind auffällig kürzer als die übrigen vier, die vor den Kronblättern stehen. Diese Ausbildung des Androezeums bezeichnet man als „Viermännigkeit“ und eine solche Blüte als „tetradynam“. Im Linné'schen System bildeten daher die Kreuziferen die Klasse der Tetradynamia. Wie unnatürlich und künstlich aber die Zugrundelegung solcher äußerlicher Merkmale ist, wird schon dadurch bewiesen, daß innerhalb der Familie manche Abweichungen von diesem Typus vorkommen; einzelne Formen besitzen bloß zwei längere, andere

Diagramme von Kreuziferen.

- 1 = Cheiranthus.
- 2 = Chelidonium.
- 3 = Brassica.

wieder bloß die vier langen Staubfäden auf. Dadurch mußten dann diese allen anderen Eigenschaften nach zweifellos in die Familie gehörigen Formen von Linné aus ihrer natürlichen Verwandtschaft gerissen und in ganz fernstehende Gruppen eingeteilt werden. Solche Ungereimtheiten, die im Linné'schen System wiederholt zutage treten, waren die Hauptursache, warum heute kein wissenschaftlicher Botaniker mehr das Linné'sche Einteilungsmerkmal anders berücksichtigt als höchstens als bequemes mechanisches Bestimmungsmittel.

An der Basis der Staubblätter befinden sich, wechselnd in Form und Zahl, grünliche Honigdrüsen, die, von dem Blütenboden hervorgebracht, entweder den Grund der Staubfäden als ringsförmige Wulst umgeben oder auch als verschieden geformte Wülste neben den Staubfäden auftreten. Stets finden sich zwei größere, am Grunde der beiden äußeren kürzeren Staubgefäße, häufig jedoch auch kleinere zwischen den inneren längeren. Der ausgeschiedene Honig sammelt sich in kleinen Aussackungen der entsprechend stehenden Kelchblätter. Da nun meist die Honigdrüsen der äußeren Staubblätter stärker, wenn nicht ausschließlich, entwickelt sind, so besitzen auch dementsprechend nur die zugehörigen Kelchblätter diese Aussackung, die anderen dagegen nicht oder in viel schwächerem Grade. Im Inneren der Blüten findet sich stets der längliche, aus zwei Fruchtblättern bestehende Fruchtknoten, der sich in einen meist sehr kurzen Griffel zuspitzt. Der Fruchtknoten selbst ist zweifächerig, indem sein Innenraum durch eine dünne Scheidewand abgeteilt ist, die den Rändern der verwachsenen Fruchtblätter entspringt und durch Vereinigung dieser Vorsprünge in der Mitte zustande kommt. Die beiden im einzelnen verschiedenartig gebildeten Narbenlappen fallen durch die Eigentümlichkeit auf, daß sie an den Rändern der Fruchtblätter in der Richtung

* Von dieser gekreuzten Stellung der Teile der Blütenhülle hat die Familie den Namen „Kreuzblütler“, doch ist natürlich als Familiencharakteristikum diese Stellung der Blumenhüllblätter allein durchaus nicht entscheidend, sondern es müssen auch die übrigen Merkmale der Blüte übereinstimmen, wenn man eine Blüte zu den Kreuziferen rechnen soll. Blüten mit in Vierzahl kreuzweise gestellten Hüllblättern gibt es zahlreich auch in anderen Verwandtschaftskreisen. Als gutes Kennzeichen gilt übrigens, daß die Kronblätter der Kreuziferen genagelt sind. Sie bestehen aus einem mehr oder weniger wagrecht abstehenden oberen, ausgebreiteten, häufig eingebuchteten Teile und einem unteren, schmal ausgezogenen, wodurch sie zusammen eine Art Röhre bilden.

nach den beiden kürzeren Staubblättern stehen und in diesem Sinne mit der Scheidewand des Fruchtknotens gleich orientiert sind. Die Samenanlagen stehen in jedem Fache an der Scheidewand, in der Regel in zwei Reihen.

So ist der allgemeine typische Bau der Kreuziferenblüte, den man in der systematischen Botanik sich mit beistehendem Diagramm vergegenwärtigt. — Wir haben bisher noch nie von Diagrammen gesprochen, ohne die der ältere Botaniker sich gar nicht behelfen konnte, und die auch noch der moderne Biologe als gutes Orientierungsmittel schätzt. Man erlaube mir also, an diesem Punkte etwas ausführlicher zu werden.

Das Wort Diagramm bedeutet eigentlich Durchschnitt, und schon das verrät, daß ein Diagramm ein schematischer Durchschnitt durch eine Blüte ist, der alle ihre Teile in der natürlichen Gruppierung zeigt. Nun ist es aber wohl jedem Kenner des Blütenbaues ohne weiteres klar, daß es bei vielen Blüten ganz unmöglich ist, in irgendwelcher Höhe der Blüte einen Durchschnitt zu machen, der gleichzeitig alle Blütenteile enthielte. Denn Blüten mit unterständigem Fruchtknoten werden in einem Durchschnitte, der die Blütenhülle und Staubblätter enthält, natürlich keine Spur der Fruchtblätter zeigen und umgekehrt. Man muß sich also, um über den Sinn und die Darstellung eines Diagramms klar zu werden, vorstellen, daß man die Blüte von oben betrachtet, und sich dabei die einzelnen Teile, gleichgültig in welcher Höhe sie sich in Wirklichkeit befinden, alle in eine Horizontalebene projiziert denken.

Diese Projektion wird dann graphisch mittelst bestimmter konventioneller Zeichen in dieser Ebene ausgeführt. Es ist demnach jedes Blüten-diagramm stets eine Kombination entsprechend zahlreicher sukzessiver Querschnitte durch die ganze Blüte, etwa so wie die plastische mikroskopische Zeichnung eines Kleinwesens. Da nun mit wenigen Ausnahmen die Blüten bekanntlich zyklisch gebaut sind, haben sie auch die einzelnen Blütenteile in abwechselnden Kreisen angeordnet. Es liegt daher der Ausführung eines Diagrammes stets eine dem besonderen Falle entsprechende Anzahl konzentrischer Kreise zugrunde, in welche die Symbole, der Stellung der betreffenden Blütenteile gemäß, eingetragen werden. Diese Kreislinien selbst werden in der Regel nicht ausgezogen, um das Bild nicht durch zu viele Linien zu verwirren. Wenn dagegen in einer Blüte ganz oder teilweise Spiralstellung herrscht, so wendet man für den betreffenden Teil natürlich eine entsprechend gezogene Spirale als Grundlage an.

Auf solche Schemata konzentrischer Kreise und Spiralen kann man nun Zahl und Stellung der Blütenorgane meist leicht und übersichtlich eintragen und auch Besonderheiten der Gestalt durch zweckentsprechende Zeichen weitgehend andeuten. Die konventionellen Zeichen, die mit geringen Abänderungen allgemein verwendet werden, sind wohl aus obigen Figuren ohne weiteres verständlich. Es braucht daher auch nicht betont zu werden, daß solche diagrammatische Darstellungen namentlich bei komplizierteren Blüten die Übersicht ungemein erleichtern und dem Gedächtnis wirklich eine wesentliche Stütze sind. So ersetzen uns die auf S. 140 stehenden Diagramme der Kreuziferenblüte auf den ersten Blick eine langatmige Beschreibung, sagen sie uns doch unmittelbar, daß die Kelchblätter zu viert in zwei Kreisen, die Kronblätter ebenfalls zu viert, aber in einem Kreise angeordnet sind; daß die sechs Staubblätter zu zweien

Diagramm der Schwertlilie.

einem äußeren, zu vieren einem inneren Kreise angehören, wobei der äußere Staubblattkreis dem inneren Kelchblattkreise gegenübersteht, diesem „opponiert“ ist, während er mit dem äußeren Kelchblatt- und dem Kronblattkreise „alterniert“. Die Zweizahl der zu einem Fruchtknoten vereinigten Fruchtblätter, ihre Orientierung, die Scheidewand, die Lage der Plazenten und die Anordnung der Samenanlagen sowie die Stellung der Narben, das alles geht aus einer solchen „diagrammatischen“ Anordnung unmittelbar hervor, und trotzdem ist damit die Technik des Diagrammes noch immer nicht erschöpft. Denn wenn wir, wie im vorliegenden Falle, die Blütenteile genau in der Zahl und Stellung, in der wir sie auffinden, in das Schema eintragen, so erhalten wir dadurch ein sog. „empirisches“ Diagramm. Es gibt lediglich den gefundenen Tatbestand im Blütenbau wieder. Die Kombination in einem Diagramm kann aber noch weiter gehen, sie kann auch die Deutung, die man der betreffenden Blüte in entwicklungsgeschichtlich-systematischer Hinsicht zuteil werden läßt, mehr oder weniger mit zum Ausdruck bringen. Dann wird das Diagramm zu einem sog. „theoretischen“. In einem solchen muß es z. B. zum Ausdruck kommen, wenn man auf Grund vergleichender Studien zu der Überzeugung gekommen ist, daß im vorliegenden Falle bestimmte Glieder der Blüte ausbleiben, unterdrückt („abotiert“) sind, d. h. in dem bezüglichen engeren Verwandtschaftskreise fehlen, während sie im zugehörigen weiteren Verwandtschaftskreise normalerweise vorhanden sind. Ein gutes Beispiel hierfür bietet das Diagramm der *Tridazeen*. Meine Leser werden sich an den von uns geschilderten typischen Bau der *Liliiflorae* erinnern, deren Blüte zwei dreizählige, abwechselnde Staubblattkreise aufweist; sie werden sich auch des weiteren erinnern, daß die in diese Reihe gehörige Familie der *Tridazeen* sich gerade dadurch auszeichnet, daß normal nur ein solcher Staubblattkreis vorhanden ist. Die sonst zweifellose Zugehörigkeit der *Tridazeen* zu den *Liliengewächsen* sowie das gelegentliche abnorme Vorkommen des inneren Kreises (entweder in vollständig ausgebildeten Staubblättern oder in verkümmerten „*Staminodien*“) lehrt nun, daß tatsächlich dieser innere Staubblattkreis hier verloren gegangen ist, aber gelegentlich als „Rückschlag“ immer wieder auftreten kann. Die Stellung der normalen Staubgefäße in ihrer Abwechslung mit dem inneren Perigonkreise lehrt zugleich, daß der ausgefallene Staubblattkreis der innere sein muß. Derartige „Ausfälle“ von Blütenteilen, die aber theoretisch als dem Typus der Blüte angehörig zu betrachten sind, kann man nun im Diagramm ebenfalls bezeichnen und pflegt dies durch an die entsprechende Stelle gesetzte schiefe Kreuzchen zu tun oder auch durch Punkte und punktierte Linien. Wird also in dem *Tridazeen*-Diagramm der ausgefallene innere Staminalkreis durch solche Kreuzchen eingetragen, dann wird das Diagramm zu einem „theoretischen“. Verwachsungen, Spaltungen, Verschiebungen von Blütenteilen, die als aus einem verwandtschaftlich zugrunde liegenden Typus hervorgegangen betrachtet werden, lassen sich gleichermaßen im theoretischen Diagramm ausdrücken. Wollte man auch unsere *Kruziferen*-Diagramme theoretisch gestalten, so müßte man u. a. die beiden in den Diagrammen oben und unten stehenden inneren Staubblätter je durch eine punktierte Linie verbinden, um der gegenwärtig herrschenden, allerdings nicht allseitig geteilten Auffassung Ausdruck zu geben, daß die vier inneren größeren Staubblätter der *Kruziferenblüte* durch Spaltung („*Dedoublement*“) aus ursprünglich nur zwei inneren Staubblättern entstanden seien.

Damit sind wir bei der Deutung der Kreuziferenblüte angelangt und zugleich bei einer guten Gelegenheit, um eine kleine Probe vorzuführen, wie schwierig sich sehr häufig die morphologische und entwicklungsgeschichtliche Beurteilung einer Blüte gestaltet, die doch für die Erkenntnis weiterer verwandtschaftlicher Beziehungen äußerst wichtig ist.

Die bequemste und einheitlichste Deutung der Kreuziferenblüte wäre erreicht, wenn es gelänge, sie auf durchweg zweizählige Kreise zurückzuführen. Und dies wäre von vornherein nicht unmöglich, denn der Kelch umfaßt doch zweifellos zwei zweigliedrige Kreise. Die vier querüberstehenden, also nicht auf zwei abwechselnde, alternierende Kreise zurückführbaren Kronblätter könnten als durch Spaltung hervorgegangen betrachtet werden, ebenso wie die inneren Staubblätter. Die äußeren Staubblätter dagegen sind ohnedies wieder in einen besonderen zweigliedrigen Quirl gestellt, und der aus zwei Fruchtblättern bestehende Fruchtknoten schließt das Ganze im gleichen Sinne ab. Es fragt sich nur, ob die tatsächlichen Verhältnisse diese Auffassung rechtfertigen. Bezüglich der Kronblätter scheint dies nicht der Fall zu sein; wenigstens lassen sich keine Tatsachen geltend machen, die hier auf eine Spaltung hinweisen würden, und die Morphologen sind deshalb auch dageblieben, die Krone als einen diagonal gestellten viergliedrigen Quirl aufzufassen. Hingegen ist der Streit um die Deutung des viergliedrigen inneren Staminalkreises noch nicht entschieden. Die von uns oben angedeutete Erklärung hat sehr viel Bestechendes, und auch Prof. Wettstein tritt noch in seinem neuen Handbuch dafür ein, daß die Zurückführung des Andrözeums auf zweizählige Viertel, von denen der äußere unverändert ist, während die zwei Glieder des inneren verdoppelt sind, am meisten dem Sachverhalt entspreche. Die Beweise für diese Auffassung sucht man im Vergleiche mit verwandten Familien, namentlich den Fumariaceen, ferner in der weitergehenden Vereinigung von je zwei der längeren Staubblätter bei einzelnen Gattungen der Kreuzblütler und schließlich in der Entstehung der vier längeren Staubblätter aus zwei einheitlichen Höckern (s. das Bild auf S. 410). Dieser Deutung steht aber auch eine andere gegenüber, wonach die vier inneren Staubblätter tatsächlich in der Vierzahl angelegt werden, und die soeben geschilderten Erscheinungen nicht als Spaltung, sondern gerade umgekehrt als Verwachsungen aufzufassen seien. Besonders mein früherer Lehrer, Prof. Julius Klein, hat diese Auffassung vertreten, und zwar auf Grund anatomischer Verhältnisse. Da es geradezu typisch, außerdem höchst interessant und belehrend ist, an einem besonderen Falle zu sehen, wie der innere anatomische Bau von dem modernen Morphologen herangezogen wird, kann ich wohl auf Entschuldigung rechnen, wenn ich noch etwas ausführlicher bei diesem Gegenstand verweile. Klein hat (in der Hauptsache an *Cheiranthus* und *Matthiola*) den Blütenboden an Querschnitten untersucht und aus dem Verlaufe und der Zahl der in die Blütenteile abzweigenden Gefäßbündel seine Schlüsse gezogen. Er schildert uns, daß von dem zentralen Gefäßbündelkörper des Blütenbodens zuerst die Gefäßbündel für die transversal gestellten Kelchblätter, also für diejenigen abzweigen, welche in unserem Diagramm, der gewöhnlichen Auffassung entsprechend, als dem inneren Kreise angehörig bezeichnet sind. Hierdurch ist also schon die erste Korrektur der älteren Blütenauffassung erreicht. Denn da nach unseren Erfahrungen in jene Blattgebilde zuerst Gefäßbündel eintreten, die zuerst entstehen, so müssen deshalb hier die transversalen Kelchblätter als die äußeren aufgefaßt werden. Etwas später lösen sich

dann diejenigen Gefäßbündel ab, welche in die beiden anderen Melchblätter eintreten, und fast gleichzeitig auch die für die Kronblätter bestimmten; auf gleicher Höhe des Querschnittes sieht man auch schon die beiden seitlichen Staubgefäße mit den in sie eintretenden Gefäßbündeln. Weiter sondern sich nun vier Gefäßbündel in streng diagonalen Anordnung ab, um in die vier längeren Staubblätter einzutreten. Klein bemerkt hiezu: „Die Abzweigung dieser Gefäßbündel vom inneren Fibrovaskulärkörper erfolgt so deutlich in diagonalen Anordnung und ist die Entfernung derselben voneinander eine derartige, daß die Annahme, als entstünden je zwei dieser Staubgefäße aus je einer Anlage, die sich später spaltet, auf anatomischer Grundlage ganz unhaltbar ist. Wenn dennoch zwei dieser Staubgefäße bei vielen Kreuziferen einander mehr genähert und scheinbar in die Mediane gerückt sind, so ist das eine spätere Veränderung, die in den Raumverhältnissen vieler Kreuziferen und im Druck der Honigdrüsen ihre Erklärung findet. Die paarweise, scheinbar mediane Stellung der vier verlängerten Staubgefäße ist überhaupt nur bei jenen Kreuziferen deutlich vorhanden, deren Blumenblätter einen Nagel haben, und deren Blüten man geschlossene nennen könnte. Viele Kreuziferen haben daher unbenagelte Blumenblätter, die Blüten sind dann ganz offen mit auseinander gebreiteten Blumenblättern, und in diesen Blüten stehen die vier längeren Staubgefäße deutlich diagonal, sind auseinander gebreitet und den Blumenblättern opponiert.“ Er verweist dann auch auf das ganz andere Verhalten des Gefäßbündelverlaufs, der bei gefüllten Cheiranthus-Blüten zu konstatieren ist. Untersucht man solche gefüllte Blüten genauer, so findet man an Stelle der vier Blumenblätter vier Gruppen solcher, deren jede aus vielen unten durch einen kurzen Stiel zusammengehaltenen Blumenblättern besteht. In jede dieser Gruppen tritt bloß ein kräftiges Gefäßbündel ein, das sich erst kurz vor dem Austritt in mehrere Bündel teilt, „so gleichfalls anzeigend, daß die Füllung der Blüte in diesem Falle durch Spaltung der ursprünglichen Blumenblätter zustande kommt.“ Bei den vier inneren Staubgefäßen ist es aber ganz anders: hier tritt von Anfang an in jedes Staubblatt ein gesondertes Bündel, was doch mit Gewißheit darauf hindeutet, daß sie nicht durch Spaltung entstanden sind. Die Entstehung aus einem Höcker kann auch als ein Stadium beginnender Verwachsung gedeutet werden und ebenso die vereinigten Staubgefäße bei einzelnen Arten als eine weiter vorgeschrittene Verwachsung. Wir werden bei den Kürbispflanzen die Erscheinung kennen lernen, daß alle oder einzelne Gruppen der Staubgefäße vollständig miteinander verwachsen sind, und daß diese Verwachsung von Anbeginn an so innig (kongenial) ist, daß auch in den frühesten Anlagen keine Scheidung mehr festzustellen ist. Wenn also die Verwachsung so weit in die Embryonalstadien zurückgreifen kann, macht die Erklärung bei der Kreuziferenblüte in diesem Sinne wirklich gar keine Schwierigkeiten, und so vereinigt die Kleinsche Auffassung also alle Fälle widerspruchsfrei, was bei der gegenteiligen Auffassung nicht der Fall war. Auch zu einer veränderten Auffassung des Fruchtknotens ist Klein durch die anatomischen Tatsachen geführt worden. Er sieht sich nämlich durch die Stellung und Mächtigkeit der in die Scheidewand des Fruchtknotens eintretenden Gefäßbündel veranlaßt, sie als die Gefäßbündel eines zweiten Paares von Fruchtblättern aufzufassen, die jedoch wahrscheinlich infolge der Raumverhältnisse in der Kreuziferenblüte nicht zur Ausbildung kommen und, da sie sich in der Fläche nicht entwickeln können, in die Fruchtknotenwand hinein-

wachsen, so die Scheidewand bildend. Es würde dies die Rückkehr zu einer schon von älteren Autoren geäußerten Ansicht bedeuten, die aber durch Eichlers Autorität verworfen worden war. Nach Kleins Auffassung würde sich also das theoretische Diagramm der Kreuziferenblüte folgendermaßen gestalten: „Zwei äußere transversale, zwei innere mediane Kelchblätter; dann vier diagonal gestellte Blumenblätter; nachher die zwei kürzeren, transversal gestellten, den äußeren Kreis des Andrözeums darstellenden Staubgefäße, auf diese folgen in diagonalen Stellung die vier längeren Staubgefäße; schließlich zwei transversale Karpelle, die zur vollständigen Ausbildung gelangen, und zwei mediane Karpelle, die, in ihrer Ausbildung gehemmt, zur Scheidewand werden.“ Das war viel Fachwissenschaft, aber jedenfalls auch ein interessanter Einblick in die moderne Methodik botanischer Forschungsarbeit und darum auch für die Nichtfachleute nicht fruchtlos.

Auf Abweichungen und Reduktionen im Bau der Kreuziferenblüte wurde bereits teilweise hingewiesen. Der Kelch ist entweder offen, d. h. zur Blütezeit abstehend, aus meist verhältnismäßig kurzen Blättern gebildet, oder geschlossen, d. h. aus einander am Rande überdeckenden, verhältnismäßig langen und schmalen Blättern bestehend; eine Zwischenform wird als aufrecht bezeichnet. Die Kronblätter sind je nach Lage und Gestalt der Kelchblätter mehr oder weniger oder auch fast gar nicht genagelt. Bei *Iberis* entsteht eine Zygomorphie der Blüte dadurch, daß die im Blütenstande nach auswärts gefehrten Kronblätter größer werden, wie wir es zur Erhöhung des Schauapparates an den Randblüten der echten Doldenblütler kennen. Bei gewissen Arten mancher Gattungen (*Lepidium*, auch *Nasturtium* und *Cardamine*) sind die Kronblätter sehr klein, fehlen zuweilen auch gänzlich; bei *Capsella bursa pastoris* sind sie zuweilen durch vier Staubblätter ersetzt. Im Kreise der weiblichen Geschlechtssteile kommen auch Unregelmäßigkeiten vor: bei *Cardamine hirsuta* fehlen meist die seitlichen Staubblätter, bei Arten von *Lepidium* und *Senebiera* sind die inneren Staubblätter nur in Zweizahl vorhanden, so daß die Blume zweimännig wird; bei manchen Gattungen sind die längeren Staubfäden paarweise untereinander vereinigt. Als eine allerdings der ganzen Familie ausnahmslos zukommende Reduktion ist auch das Fehlen jeglicher Hochblatt-Bildungen zu bezeichnen; es fehlen sowohl Vorblätter als auch Deck-(Stütz-)blätter.

Abgesehen von diesen gelegentlichen Abweichungen, die aber niemals Gattungsmerkmale bilden, ist die Blüte von einer Einförmigkeit des Baues, daß sich auf ihr allein niemals eine systematische Gruppierung der Familie durchführen ließe. Deshalb hat schon De Candolle den Bau der Frucht und der Samen als systematisches Merkmal herangezogen. Man braucht nur einen Blick in eine Bestimmungstabelle zu werfen, um sofort zu sehen, welche große Rolle der Bau der Frucht bei der Unterscheidung der Gattungen spielt. Die Frucht der Kreuziferen ist eine sog. Schote, die mit zwei Klappen aufspringt, die sich von unten her nach der Spitze zu von der stehenbleibenden, die Samen tragenden Scheidewand aufröhlen und dann nahe unterhalb der Narbe vollständig ablösen. Die Samen haften zu dieser Zeit nur noch sehr lose an ihren Stielchen, so daß sie schon durch das Abrollen der Klappen oder durch leichte Windstöße abgelöst und fortgeschleudert werden. Man muß daher, wenn man von Kreuzblütlern reichlicher Samen sammeln will, die Früchte schon vor der vollständigen Reife abnehmen,

was für die Gartenkunst von Wichtigkeit ist. Mitunter können übrigens die Samen auch mit der abbrechenden leichten Scheidewand durch den Wind entführt und verbreitet werden. Für die Unterscheidung der Gattungen dient die Gestalt der Frucht, Behaarung, Anzahl der auf den Klappen verlaufenden Nerven und der feinere Bau der Scheidewand als Merkmal. Hinsichtlich der Gestalt ist die Frucht bei den einen Gattungen viel länger als breit; dies ist die Schote (siliqua); bei den anderen hingegen ist sie nicht viel länger als breit oder ebenso lang, also ein Schötchen (silicula). Einzelne Gattungen, bzw. Arten, z. B. der Ackerrettich (*Raphanus Raphanistrum*), bilden Gliederschoten, bei denen zwischen den einzelnen Samen nochmals Querwände vorhanden sind, die dann bei der Reife in ebenso viele Glieder zerfallen. Nur einige Gattungen, z. B. der Färberwaid (*Isatis*), haben statt der Schote eine Schließfrucht.

Früchte der Kreuziferen.

1 = Frucht der Mondviole (*Lunaria*). 2 = Früchte des Kohls (*Brassica*). 3 = Rettich (*Raphanus*). 4 = Ackersef (*Sinapis alba*). 5 = Offenes Fruchtkörnchen des Hirtentäschels (*Capsella*). 6 = Fruchtkörnchen des Färberwaides (*Isatis*).
(Nach Baillon und Wettstein.)

Als Unterscheidungsmerkmal und Einteilungsprinzip dient dem Systematiker auch die Lage der Keimblätter des Embryos im Samen zur Keimwurzel (mit dem hypokotylen Stamm). Diese ist nämlich je nach den Gattungen verschieden, und nach der gegenseitigen Lage der Organe des Keimlings am Samendurchschnitt unterscheidet man dann verschiedene Gruppen.

Doch sind alle diese Einteilungen, soweit sie bloß auf diese Merkmale Rücksicht nehmen, etwas gekünstelt und einseitig. Die Einteilung nach der Lage des Embryos gibt keine sicheren natürlichen Gruppen, die Abgrenzung der Begriffe „Schote“ und „Schötchen“ wird ebenfalls oft unsicher und willkürlich. Deshalb ist die neuere Systematik auch bemüht, andere Merkmale heranzuziehen, um einer natürlichen Einteilung der Familie möglichst näher zu kommen. So hat Prantl die Narbenbildung und Behaarung berücksichtigt, Celakovsky, Velenosky und Bayer die Form und Verteilung der Honigdrüsen in der Blüte, Schweidler endlich das Vorkommen der obengenannten Myrosinzen. Und tatsächlich scheint das letztere Merkmal in weitergehendem Maße systematisch verwertbar zu sein. Immerhin wartet diese Frage noch auf eine allseitigere eingehende Bearbeitung, wenn auch Schweidler die Sache in dem Sinne entschieden zu haben glaubt, daß er die Idioblasten zur Unterscheidung von Arten innerhalb wirklich natürlicher Gattungen für unbrauchbar hält, da nahe verwandte Arten Eiweißzellen besitzen, die hinsichtlich der systematisch zulässigen Merkmale vollkommen übereinstimmen. Ob die Idioblasten Gattungswert besitzen, läßt sich nach ihm noch nicht entscheiden, ist ihm aber wahrscheinlich. Hingegen kommt den Myrosinzen allem Anschein nach große Bedeutung für die Gliederung der Familie in Unterfamilien zu.

Auch hinsichtlich der Blütenbiologie haben wir einiges zu bemerken. Der Insektenbesuch ist bei vielen Blüten dieser Gruppen außerordentlich stark; welche Insekten aber bei ihnen gastliche Bewirtung finden, hängt natürlich von der Größe der Blüten und der Vergung des Honigs ab. Im allgemeinen ist dieser der großen Masse der Insekten zugänglich, so daß vielfach nicht bloß langrüsselige Insekten, sondern auch Fliegen und verschiedene andere Kerfe auf ihre Rechnung kommen. Bei der vorhandenen Stellung der Staubbeutel müssen die honigsuchenden Tiere mit der einen Seite an den Antheren, mit der anderen an den Narben anstreifen und besorgen so während des Herumkriechens die Pollenübertragung. Dadurch wird natürlich häufig Befruchtung durch den eigenen Staub erfolgen; es ist übrigens auch Selbstbestäubung verbreitet und der Regel nach auch wirksam. Bei *Subularia aquatica*, einer in Europa, Nordasien und Nordamerika vorkommenden Kreuzifere, die entweder an Ufern oder auch untergetaucht in stehenden Wässern sich vorfindet, ist sie sogar unerläßlich. Wenn dieses Gewächs eine untergetauchte Lebensweise führt, bleiben auch die Blüten unter Wasser und geschlossen, wobei natürlich nur Selbstbestäubung zur Samenbildung führen kann. *Subularia* ist also geradezu ein Typus von Kleistogamie.

Über die Stammesgeschichte dieser wichtigen Pflanzengruppe können wir die vorhandenen Kenntnisse etwa in folgender Weise zusammenfassen: Die Kreuzblütler schließen sich durch einige Merkmale des Blütenbaues unmittelbar den Mohngewächsen (Papaveraceen) und Fumariaceen an, weichen aber von ihnen doch durch die kelchartige Ausbildung zweier Hüllblattkreise und durch die Beschränkung in der Zahl der Staubblätter ab. Auch ihr aus bloß zwei Karpellen bestehender Fruchtknoten trennt sie von jenen, insofern sie ihn nur mit den Fumariaceen und einigen Papaveraceen (wie *Chelidonium* oder *Glaucium*) gemeinsam haben. Auch in der Schotenfrucht schließen sie sich durch *Chelidonium* an die Papaveraceen an. Andererseits leiten sie zu den Rapparidaceen über, die eigentlich nur durch die Vielzahl der Staubgefäße abweichen. Und schließlich verbindet auch noch ein anatomisches Merkmal die drei Hauptfamilien dieser Reihe, und das ist der Besitz von Sekretionsorganen. Bei den Papaveraceen fanden wir die reichgegliederten Milchröhren, die Fumariaceen zeichnen sich durch den Besitz von Schlauchzellen aus, und die Myrosin- oder Eiweißzellen der Kreuziferen haben wir ja soeben eingehend kennen gelernt. Aus dieser anatomischen Übereinstimmung wird der spekulierende Botaniker sicherlich die ganze Reihe als eine natürliche Gruppe erkennen. Was die weitere Verwandtschaft der ganzen Reihe betrifft, so schließt sie durch die Papaveraceen nach der einen Seite an die Polycarpicac, nach der anderen durch die Rapparidaceen und die Resedaceen an die Zistifloren an. In wie hohem Maße hier namentlich die Resedaceen ein Verbindungsglied darstellen, geht schon daraus hervor, daß ihre Stellung im System verschiedentlich beurteilt wird: die meisten Forscher stellen diese Familie bereits zu den Zistifloren, während z. B. Wettstein sie noch in die Reihe der Mohngewächse (*Rhoeadales*) aufnimmt.

Von den Papaveraceen und Fumariaceen unterscheiden sich die Kreuziferen schließlich auch noch dadurch, daß ihre Samen kein Nährgewebe enthalten; ihre Reservestoffe sind vielmehr in den Keimblättern selbst aufgespeichert. Geringe Mengen von Endosperm finden sich zwar nicht gerade selten, aber in der Regel besteht der Samen doch nur aus dem Embryo und der Samenschale. Letztere ist besonders durch den Besitz

einer verschleimenden Epidermis ausgezeichnet, was beim Veneyen besonders augenfällig zutage tritt. Entweder bildet sich dabei unter Abheben der Kutikula eine zusammenhängende Schleimschicht, oder der Schleim tritt in Form einzelner hervorquellender Zapfen auf. Biologisch bedeutet dieser Schleim regelmäßig ein Verbreitungsmittel, da die Samen im feuchten Zustande dadurch leicht von Tieren verbreitet werden können. Es ist übrigens damit auch das Festkleben der kleinen Samen am Erdboden

gesichert. Wie zweckmäßig dies ist, wird uns am besten dadurch demonstriert, daß gequollener Kressen- oder Senfsamen fast gar nicht von den Fingern zu bekommen ist. Dieser biologische Zusammenhang erhellt schließlich auch daraus, daß die Samen der schließfrüchtigen Kreuziferen keine Schleimbildung besitzen, denn sie brauchen dieses Verbreitungsmittel nicht.

Nach dieser allgemeinen Übersicht über die Familie der Kreuzblütler möge man mir nun gestatten, in Kürze noch die wichtigsten Gattungen zu schildern, um auch die interessanteren Einzelheiten und Beziehungen zur Sprache bringen zu können, die in der allgemeinen Übersicht nicht gut untergebracht werden konnten.

Als erste Gattung kommt für uns die gewöhnliche Kresse (*Lepidium*) in Betracht. Hierher gehören einjährige, ausdauernde Gewächse oder Halbsträucher, die ihre kleinen Blumenblätter weiß, selten gelblich färben, sofern sie überhaupt solche entwickeln. Diese Gattung ist in über 100 Arten über alle Gebiete, mit Ausnahme des Nordens und der Hochgebirgsregionen,

Heimische Kressenarten.
Links Gartenkresse (*Lepidium sativum* L.), rechts
ein Blüten- und Fruchtstand
der Feldkresse
(*L. campestre* R. Br.).
(Nach Thomas Flora.)

verbreitet. Als geschätzte Nuckpflanze gilt die so häufig als Salatpflanze angebaute Gartenkresse (*L. sativum*), deren Frucht ein herzförmiges Schötchen ist, dessen kleine, rotbraune Samen bei Zuführung von Wasser schon in wenigen Tagen keimen und daher auch zur Winterszeit im Zimmer jederzeit gezogen werden können. Da sie bei Wasseraufnahme infolge der sehr reichlichen Schleimbildung der Samenschale überall haften, benutzt man sie sogar mitunter zu dekorativem „Zimmerschmuck“: man umwickelt tönernerne Gefäße (das bekannte grüne Borstenschwein!) oder Flaschen mit Wollfäden, die man feucht hält und mit den Samen bestreut; die alsbald keimenden Samen umkleiden dann das ganze Gefäß mit ihrem saftigen Grün.

Eine ausgesprochene Ruderalpflanze ist *L. ruderale*, die an Schuttplätzen sich findende, übelriechende Schuttkresse.* Ähnliche Standorte bewohnt *L. Draba*, die gleich vielen anderen Schuttpflanzen mit der Eisenbahn wandert. Ursprünglich im Orient und in Südeuropa heimisch, wurde sie so bei uns vor 30 Jahren mit Luzerne-samen eingeschleppt. *L. sativum* ist übrigens für den Pflanzenpsychologen eine wichtige Pflanze. An ihr hat B. Fröschel in neuester Zeit hochinteressante reiz-

* Mit diesem deutschen Namen wird übrigens zuweilen auch *Sisymbrium sophia* bezeichnet.

physiologische Versuche ausgeführt, die in ihren Resultaten deshalb für die Psychobiologie von großer Wichtigkeit waren, weil sie uns Einsicht in die Gleichförmigkeit der psycho=physischen Gesetze auf allen Lebensstufen gewährten. Um diese Versuche zu verstehen, müssen wir uns jedoch daran erinnern, daß das Krümmen einseitig belichteter Pflanzenstengel gegen die Lichtquelle zu „induzierbar“ ist. Mit anderen Worten, um eine heliotropische Krümmung hervorzurufen, ist es nicht notwendig, ein Pflanzenorgan so lange mit Licht zu reizen, bis — nach Ablauf der sog. „Reaktionszeit“ — die Krümmung in Erscheinung zu treten beginnt, sondern es genügt dazu eine wesentlich kürzere Reizzeit, nach der beim Aufenthalt im Dunkeln nach einiger Zeit die Reaktion beginnt (Reiznachwirkung). Wiesner nannte die Zeit, während der ein Reiz wirksam sein muß, um auch bei nachfolgender Ausschließung der Reizwirkung eine Reaktion hervorzurufen, die „Induktionszeit“. Mit dem Ausdruck „Präsentationszeit“ bezeichnete man dann nach dem Vorgang von Czapek jene kürzeste Induktionszeit, während der im jeweiligen Falle ein Reizanlaß wirksam sein muß, um eben noch eine merkliche Reaktion zu veranlassen. Fröschel stellte sich nun die Aufgabe, zunächst durch Versuche mit Keimlingen von *L. sativum* festzustellen, welche Beziehungen zwischen der Intensität der Lichtquelle und der Präsentationszeit bestehen. Natürlich kann hier weder auf die genauere Versuchsanstellung noch auf die Entstehungsgeschichte dieser Versuche näher eingegangen werden, sondern wir müssen uns damit begnügen, die merkwürdigen Resultate zu beschreiben. Es zeigte sich, daß zwischen Lichtintensität und Präsentationszeit im großen und ganzen die Beziehung herrscht, daß das Produkt beider eine konstante Größe ist, d. h. sinkt die Intensität auf $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, so muß die Präsentationszeit 2, 3, 4mal so lange dauern. Mit anderen Worten, entscheidend für den Eintritt einer eben merklichen Reaktion ist lediglich die Lichtmenge, die während der Reizdauer in den Pflanzenkörper einstrahlt und einen bestimmten konstanten Wert hat (nämlich für eine bestimmte Pflanze und eine bestimmte Reizursache). Trägt man die Werte der Intensität und Reizdauer in ein Koordinatensystem ein, so erhält man als Kurve eine Hyperbel. Deshalb spricht Fröschel von einem von ihm entdeckten Hyperbelgesetz. Außerdem hat sich gezeigt, daß die bisherigen Anschauungen über die angebliche Länge der Präsentationszeit bei pflanzlichen Reizbewegungen immer mehr zugunsten einer überraschenden Kürze dieser Reizzeiten abgeändert werden müssen. Hatte Czapek noch im Jahre 1898 als kürzeste von ihm gefundene Präsentationszeit die Dauer von 7 Minuten angegeben, so ergab sich bei Fröschels Versuchen als kürzeste Präsentationszeit, für welche die Gültigkeit des Hyperbelgesetzes noch erprobt wurde, die Zeit von 2 Sekunden! Ja es gelang Blaauw, einem jungen holländischen Botaniker, der unabhängig von Fröschel gleichsinnige Versuche anstellte, bei Anwendung sehr hoher Intensitäten die Präsentationszeit sogar auf $\frac{1}{1000}$ stel Sekunde herabzudrücken. Damit fiel wieder ein angeblicher Unterschied zwischen dem tierischen und pflanzlichen Empfindungsleben! Das besonders Wichtige ist nun aber, wie auch Fröschel mit Betonung hervorhebt, daß dieses Hyperbelgesetz, wie die Versuche verschiedener Forscher (auf die wir hier nicht im einzelnen eingehen können) erweisen, auch auf andere sinnesphysiologische Gebiete (Geotropismus der Pflanzen, Lichtempfindung des menschlichen Auges) zutrifft, also, soweit sich dies bis jetzt beurteilen läßt, ein all=

gemeines Reizgesetz zu sein scheint. Das ist also nicht nur ein physiologisch hochwichtiges Resultat, sondern es ist auch psychologisch hochbedeutsam; denn es lehrt, daß das Auftreten einer pflanzlichen Reizreaktion und das einer menschlichen Sinnesempfindung von einem völlig identischen, mathematisch ausdrückbaren Universalgesetz beherrscht wird, und dadurch gewinnt der Analogieschluß auf die psychische Bedingtheit der Reaktion auch im ersteren Falle eine wohl nicht mehr abzuleitende Bestätigung! Fröschel selbst sagt hierüber: „Wir haben gesehen, daß zur Hervorrufung einer minimalen geotropischen Reaktion, zur Erzielung eines minimalen photochemischen Effektes bei Pflanzen je eine ganz bestimmt konstante Energiemenge erforderlich ist. Wir haben anderseits erfahren, daß zur Hervorrufung einer minimalen Sehempfindung ebenfalls eine fixe Energiemenge erforderlich ist. Gleiche Energiemengen rufen bei Pflanzen gleiche Reaktionen, beim menschlichen Auge gleiche Empfindungen hervor. Zur Durchführung einer vergleichenden Betrachtung ist es nun unbedingt nötig, eine gemeinsame Basis für alle diese Erscheinungen zu gewinnen. Die minimalen Reaktionen an den Pflanzen wurden objektiv konstatiert, die Gesichtsempfindungen aber, die wir durch unser Auge empfangen, sind doch rein subjektiv. Wir müssen daher bei der vergleichenden Betrachtung uns entweder auf den rein physiologischen oder rein psychologischen Standpunkt stellen. Die vergleichend psychologische Betrachtung könnte mit allem Rechte durchgeführt werden. Für den, der den Deszendenzgedanken konsequent verfolgt, ist die Existenz einer Pflanzenpsyche kein Problem, sondern ein spezieller Ausfluß des phylogenetischen Denkens.“ Weil wir jedoch, wie er sich ausdrückt, von dem Umfang und der Eigenheit der Pflanzenpsyche noch zu wenig wissen, um die vergleichende Betrachtung auf psychologischer Grundlage streng durchführen zu können, beschränkt sich Fröschel für jetzt auf eine bloß physiologische Betrachtung. Er spricht also nur im physiologischen Sinne von „Erregungen“ und fügt bei: „Gleiche Energiemengen rufen gleiche Erregungen hervor, woraus aber nicht folgt, daß die doppelte Energiemenge auch die doppelte Erregung hervorruft. Vielmehr sprechen auf botanisch-reizphysiologischem, als auch auf sinnesphysiologischem Gebiete eine ganze Reihe von Tatsachen dafür, daß die Erregung nur innerhalb bestimmter Grenzen der einstrahlenden Energie proportional wächst, um jenseits dieser Grenze in eine jedenfalls verwickeltere Abhängigkeit von letzterer zu geraten.“ Es ist aber kein Zweifel, daß die Übereinstimmung des Hyperbelgesetzes mit jenen Fällen, von denen wir wissen, daß es sich um subjektive psychische Vorgänge handelt, auch ohne weiteres jene „objektiven“ physiologischen Vorgänge zu Erscheinungen gleicher Art stempelt, und Fröschel selbst gesteht ja diesem Standpunkte seine wissenschaftliche Berechtigung unumwunden zu. Daß gerade die Gartenkresse das Versuchsobjekt war, das den Anlaß gab zu der Erkenntnis dieser allgemeinen hochwichtigen Beziehungen, ist ja Zufall; immerhin wird infolge dieses Zufalles nun dem kleinen, unscheinbaren Pflänzchen ein Ehrenplak in der Geschichte der neueren Botanik gesichert sein.

Ein sehr interessanter Kreuzblütler ist auch *Biscutella*, die etwa in 12 Arten fast nur in Süd- und Mitteleuropa heimisch ist. Am bekanntesten und verbreitetsten davon ist *B. laevigata*, unser Brillenschötchen, so benannt nach den eigentümlichen, flachgedrückten und eingeschnürten, aus zwei sich nicht öffnenden, einsamigen Hälften zusammengesetzten Fruchtschoten. Überdies ist die Pflanze durch eine Rosette steif-

haariger oder fast kahler Blätter und eine stattliche Rispe mit gelben Blüten ausgezeichnet. Sie ist vor allem eine Gebirgspflanze von ziemlich xerophytischem Charakter, bewohnt dementsprechend sonnige, trockene Halden, von denen sie auch auf Schutt, Geröll und Fels übergeht. Im großen und ganzen kann sie alle Bodenarten besiedeln und ist auch gegen Höhenunterschiede fast unempfindlich. So steigt das Brillenschötchen von der Küste der Adria und des Gardasees bis gegen die Schneegrenze. Drude schreibt von ihm, daß es seine weiteste Verbreitung auf den Bergwiesen der subalpinen Region der Alpen finde und von da in die Tiefe und in die Höhe gehe, und nach anderen Forschern kann man es sogar zu der „pontischen Steppenheidengenosenschaft“ rechnen. Bemerkenswert ist, daß dieses Pflänzchen keinen fetten und nassen Boden verträgt und daher durch Düngung und Bewässerung mit Sicherheit vertrieben wird.

Über dieses eigene Gewächs berichtet Dr. A. Günthart, ein neuerer Schweizer Botaniker, ein Verhalten, das ebenfalls schon seiner pflanzenpsychologischen Bedeutung wegen etwas nähere Betrachtung verdient. Nur muß ich, da es sich hierbei um das Verhältnis von Selbstbestäubung und Fremdbestäubung handelt, zuerst einige allgemeine Bemerkungen darüber vorausschicken. Es ist nämlich schon seit langem bekannt, daß in einer Gegend, wo viele Insekten sind, die Arten mit vorwiegender oder ausschließlicher Allogamie (Fremdbestäubung) vorherrschen; sind dagegen die Blumenbesucher spärlich, so finden wir dort hauptsächlich autogame (selbstbestäubende) Blüten. Ein zweiter Erfahrungssatz der Blütenbiologie lautet, daß dieselbe Pflanze, die in insektenreichen Gegenden vorwiegend allogam blüht, an Orten mit spärlichem Besuche die Selbstbestäubung stärker oder ausschließlich ausüben könne. Viele Blumen sind endlich auch so eingerichtet, daß sie am Anfang der Fremdbestäubung angepasst erscheinen, daß aber am Schluß der Blütezeit, falls bis dahin keine Fremdbestäubung eingetreten ist, mit größter Sicherheit Autogamie erfolgt. Man erkennt also ohne weiteres die Steigerung, die in diesen drei Sätzen gelegen ist. Die durch den ersten Satz ausgedrückte Tatsache läßt sich, wenn man eben die verschiedenen Blumeneinrichtungen schlechtweg als gegeben hinnimmt, noch selektionistisch verstehen; hingegen fordert schon der zweite, noch mehr aber der dritte Satz dieser sog. Müller'schen Gesetze unbedingt die Annahme einer direkten Anpassung als Erklärungsgrund.

Günthart erwähnt nun zunächst eine von ihm beobachtete andere Kreuzifere (*Alyssum montanum*), die diesen Unterschied der Beschaffenheit zwischen Anfang und Ende der Blütezeit aufweist. Er hat nämlich in zahlreichen Fällen beobachtet, daß — wie er sagt — „unter einer Menge von Blüten vereinzelte Exemplare keine Fruchtknotenanschwellungen aufwiesen und also nicht befruchtet waren. Es zeigten

Das Brillenschötchen (*Biscutella laevigata*). 1 = Blüten- und Fruchtstand. 2 = Die Blüteneinrichtung zur Verhinderung der Selbstbestäubung. (Nach Thomas' Flora und Günthart.)

sich nun öfters gerade unter diesen Blumen zur genannten Zeit Bewegungen, welche der Blüte sonst meist fremd waren, welche aber mit Sicherheit Autogamie herbeiführten (nämlich Verlängerung des Fruchtknotens, bis die Narben die Höhe der Staubbeutel erreichen, und Zusammenneigen der letzteren gegen die Narbe). Damit ist bewiesen, daß diese erst am Ende des Blühens und nur ausnahmsweise eintretende Autogamie wirklich eine direkte Folgeerscheinung der ausgebliebenen Fremdbestäubung ist.“ In diesen Fällen wäre also der Insektenmangel nicht einfach bloß als ein „die Fortpflanzung überhaupt schädigender“, sondern manchmal auch wirklich als ein Autogamie bewirkender Faktor anzusehen, „so daß also die wahrscheinlich bestehende Insektenarmut der Alpen doch, wenigstens zum Teil, die Ursache des Vorwiegens autogamer Blüteneinrichtungen in diesem Gebiete darstellen kann.“ Für andere Fälle sucht Günthart, in Übereinstimmung mit Voew, die Hauptursache in den physikalischen Lebensbedingungen der Alpenflora. Und hierfür führt er als Beispiel nun unser Brillenschötchen an, von dem er berichtet, daß es „bei Regenwetter seine Blütenteile so abändert, daß Autogamie eintritt; die Abänderung ist eine sehr ‚zweckmäßige‘, denn bei Regenwetter fliegen keine Insekten.“ Hier wäre ja nun allerdings eine dem Zweck selbst fremde Ursache der zweckmäßigen Bewegung vorhanden, aber immerhin muß diese durch die Feuchtigkeit ausgelöste Bewegung einmal von der Pflanze erworben worden sein! Und daß gerade sie im Dienste der Zweckmäßigkeit steht, gibt denn doch auch dem eingefleischtesten Gegner der Psychobiologie zu denken. Tatsächlich macht denn auch Günthart, zwar noch etwas vorsichtig, aber doch in aner kennenswerter Objektivität, der Psychobiologie folgendes Zugeständnis: „Immerhin darf nicht verschwiegen werden, daß gegenwärtig eine neue, trotz mancher Auswüchse da und dort, doch ernst zu nehmende Richtung besteht, die der Pflanze die Fähigkeit zuschreibt, direkt zweckmäßig zu handeln, also gewissermaßen den in der Zukunft liegenden Nutzen vor auszusehen.“ Dasselbe Zugeständnis enthalten auch seine Sätze: „Durch alle bisherigen Angaben der Literatur wird bewiesen, daß jedenfalls nur den noch nicht einseitig angepaßten, also den allotropen und hemitropen* Blumen jene Empfindlichkeit zukommt, jene Fähigkeit, auf gewisse äußere Einflüsse, bestehen diese nun in Insektenmangel oder seien sie klimatischer Natur, mit Autogamie bewirkenden Bewegungen einzelner Blütenteile oder mit anderen, jenen Zweck verfolgenden Abänderungen zu reagieren. Auch wir sind geneigt, das Zunehmen der Autogamie im Gebirge ‚inneren, im Pflanzenorganismus selbst liegenden Faktoren oder Kräften‘ zuzuschreiben; dabei verstehen wir unter diesen Kräften eben die Fähigkeit noch nicht einseitig angepaßter Blüten, auf äußere Einflüsse zweckmäßig zu reagieren, z. B. bei ausgebliebener Fremdbestäubung Bewegungen usw. auszuführen, welche Autogamie bewirken müssen.“ Wer nun von „zweckmäßig reagieren“ spricht, der gesteht die „Selbstanpassung“ und damit das psychobiologische Fundament ohne weiteres zu. Auch ist es ja logisch überhaupt kaum möglich, die in den zitierten Sätzen zugegebenen Fähigkeiten der Pflanzen anders als auf Empfindung der bedrohlichen Situation zurückzuführen, also psychobiologisch aufzufassen.

Schließlich faßt Günthart auch das Verhältnis der Allogamie zur Autogamie in den Gebirgen, das sich in so großen lokalen Unterschieden ausprägt, „daß manchmal

* Mit diesen Ausdrücken ist das bei den Nektar Gesagte zu vergleichen.

eine und dieselbe Art sich an jedem neuen Beobachtungsort wieder anders verhält“, in durchaus richtiger Weise auf. Natürliche Auslese spielt nach seiner Ansicht gewiß dabei mit, „wenn auch vielleicht erst, nachdem das Vorhandensein oder Fehlen jener Selbstanpassungsfähigkeit ihr Gelegenheit zum Selbsteingreifen geboten hat.“ Damit ist also in der logisch einzig zulässigen Form dem „Selbst“ der Pflanze bei der Anpassung der erste Platz eingeräumt und die Auslese an die ihr allein zukommende zweite Stelle zurückgestellt. So sehen wir denn — wenigstens ich mit großer Befriedigung —, wie sich stets mehr und mehr vorurteilsfreie Forscher den durch die Tatsachen unvermeidlich gewordenen neuen Gedankenbahnen zuwenden.

Ein sehr bekannter Kreuzblütler ist das Pfennigkraut (*Thlaspi*), das in etwa 60 Arten im Mittelmeergebiet, in Europa, Zentralasien und Sibirien, seltener auch in Nordamerika gedeiht. Diese Gattung ist dadurch ausgezeichnet, daß ihre flachen, länglich bis elliptisch geformten Schötchen mehr oder weniger geflügelt sind. Besonders bei dem verbreiteten Ackerunkraut (*T. arvense*) sind diese häutigen Flügelhäute so ansehnlich entwickelt, daß die Früchte durch den Wind weithin verweht werden können. *T. rotundifolium* dagegen ist ein Gebirgsbewohner, und zwar eine typische Schuttpflanze. Von ihrer ausdauernden, kräftigen und tief verankerten Pfahlwurzel gehen zahlreiche Triebe aus, die sich durch den Schutt winden und, locker besetzt mit runden, glänzenden Blättern von scharfem, kressenartigem Geschmack, ein Lieblingsgericht der Gamsen und der Gamsjäger sind. Diese zarten Blüten zeigen dasselbe blaue Violett wie das Wiesen Schaumkraut der Ebene. Sie scheinen jedoch in zwei biologischen Klassen ausgebildet zu sein; wenigstens fand sie Schulz auf Dolomitgeröll in Tirol mit gleich hochliegenden und gleichzeitig entwickelten Staubbeuteln und Narben, die ihre Selbstbestäubung durch Wegdrehen der langen Staubbeutel verhinderten; Günthart fand sie dagegen in einem Züricher Garten protogyn mit weit über die Staubbeutel hinausragenden Narben. Auch die Lage der Nektarien war verschieden. Bei der ebensträufigen Abart (*var. corymbosum* Gay), auf kalkarmem Gestein der penninischen Alpen, tritt nach Rerner eine dritte blütenbiologische Variante mit der Möglichkeit spontaner Selbstbestäubung auf. Auch diese dem schönen Werke von Schröter entnommenen Angaben bedeuten für den Pflanzenpsychologen einen wichtigen Wink.

Thlaspi rotundifolium gehört zugleich zu den „Schuttwanderern“. Als solche bezeichnet man Pflanzen, die von ihrem Wurzelhals aus zahlreiche lange Triebe durch die Schuttedecke emporsenden, die da und dort sich ans Licht arbeiten, um Blätter und Blüten zu bilden. „Wenn sie vom beweglichen Schutt zugedeckt werden“, sagt Schröter, „verlängern sie sich („vergeilen“) und dringen wieder zum Lichte durch. Wo sie mit erdigem Boden in Berührung kommen, bilden sie Wurzeln und können sich so vegetativ vermehren. So kann von einem Samen aus ein weitverzweigtes, den Schutt durchspinnendes Individuum entstehen, das durch passiven Widerstand, durch ein Sich-Ducken und nachheriges schlaues Durchkriechen, den Angriffen seines ständig mit Verschüttung drohenden Standortes entgeht.“

Unsere Familie stellt überhaupt mehrfach Vertreter der alpinen Geröll- und Felsenflora. Und zwar gibt es hierbei die verschiedensten Typen. Neben den Schuttwanderern tritt uns in der Alpen-Gemskresse (*Hutchinsia alpina*) ein „Schuttstauer“ entgegen — ein Begriff, der uns übrigens schon bei der Gletscher-Manunkel

begegnet ist. Die Pflanze hat feinverteilte, freissenartig schmeckende Blätter, eine zierliche Blütentraube leuchtend=weißer kleiner Blüten und ist eine unverwüßliche Besiedlerin des feuchten, kalkreichen Feingerölles. „Junge Exemplare bilden einfache Rosetten, bei älteren, tiefer überschütteten strahlen vom Wurzelhals radial gestreckte, halbhölzige, bis 4 mm dicke Triebe aus, die stockwerkartig angeordnete sekundäre Rosetten bilden; so entstehen große, lockere, dezimeterbreite Polster. Sie ist alpin=nival.“ Eine kurzstengelige Abart (*H. brevicaulis*) hockt in erbsen= bis kirschgroßen weißen Kügelchen auf dem Grunde.

Zwischen diesen verschiedenen Lebenstypen gibt es bedeutsame ökologische Unterschiede. „Die Schuttwanderer geben nach, die Schuttüberkriecher liegen lose oben auf, die Schuttstrecker dringen durch, die Schuttbedcker binden durch wurzelnde Rasen, die letzte Kategorie der Schuttkämpfer pflanzt sich mit festen Horsten in den Schutt oder auf den Schutt und staut ihn, wo er beweglich ist. Auch sie können ihre vergrabenen Teile strecken, aber sie lassen keinen Schutt dazwischen durch, sondern halten ihn auf.“ Mit diesen Worten unseres trefflichen Alpenführers ist diese Gesellschaft innerhalb der Gesteinflora der Gebirge auf das beste gekennzeichnet. Aber neben ihr finden wir noch eine andere Gemeinschaft, nämlich die der eigentlichen Felsenpflanzen, der auch eine Reihe sehr charakteristischer Kreuzblütler angehören, weshalb wir auf sie näher eingehen müssen.

Natürlich gehört nicht etwa alles, was gelegentlich auf Felsen vorkommen kann, zur Felsenflora. M. Dettli, ein jüngerer Schweizer Botaniker, der sie genau studierte, bezeichnet als Felsenpflanzen „alle diejenigen auf Felswänden oder Blöcken wachsenden Pflanzen, die imstande sind, als erste unter ihresgleichen den Fels dauernd zu besiedeln, und in Verbreitung und Bau eine mehr oder weniger ausgeprägte Abhängigkeit vom Fels als Unterlage erkennen lassen.“ Als Lebensbedingungen der Felsflora hat sich etwa folgendes ergeben: Sie sind an weite Extreme der Temperaturverhältnisse angepasst, bei Sonnenschein an starke Erwärmung des Felsens, des Nachts an rasche und starke Abkühlung. Nach Heim kommen ja in dieser Region zwischen Tag und Nacht Temperaturunterschiede von 40—60 Grad vor. Die Felsenpflanzen haben auch große Verschiedenheit der Feuchtigkeitsverhältnisse je nach der Wasserführung in den Spalten zu erleiden, weshalb es unter ihnen auch alle Abstufungen von Anpassung an Feuchtigkeit, bzw. Trockenheit gibt. Die Felspalten sind Wasserreservoirs, und zwar um so zuverlässigere, je tiefer sie gehen. Die trockensten Standorte haben diejenigen unter ihnen, die nur in dem ganz oberflächlichen Detritus wurzeln; die flachwurzeli gen Spaltenpflanzen sind am meisten der Trockenheit ausgesetzt, die tief eindringenden Spaltenwurzler dagegen am wenigsten. Gefäßpflanzen können auf den Felsen natürlich erst da auftreten, wo sich Verwitterungsrückstände und Verdauungsreste von Tieren (die Regenwürmer spielen nach neueren Untersuchungen auch in den hohen Felsregionen der Gebirge eine sehr bedeutende Rolle) anhäufen. Unter diesen eigenartigen Lebensverhältnissen gibt es nun zwei Haupttypen der spezifischen Anpassung an den Fels, und das sind die Rosetten= und die Polsterpflanzen. Die ersteren sind von vornherein an den flach ausgebreiteten, dem Fels anliegenden Blättern kenntlich. Von den alpinen Kreuziferen gehören hierher vor allem Hungerblümchen, die *Draba*-Arten, auf die wir noch weiter unten zurückkommen, ferner die Arten von *Arabis*.

Eine Rosetten=Felspflanze ist auch die schwächliche Kerneria (*Cochlearia*) *saxatilis*, aus deren Rosette sich ein zarter Stengel erhebt, der in lockeren Trauben weiße Blüten oder kugelige Schötchen emporhebt. Die Blüten dieser Pflanze zeigen übrigens eine ganz besondere Begünstigung der Fremdbestäubung „durch die eigenartige Abbiegung der längeren Staubfäden zu den kürzeren, so daß alle vom honigholenden Insekt berührt werden müssen.“ Die kleinen flachen Samen sind Windflieger, wie die fast aller Felsenpflanzen.

Der Polsterwuchs dagegen ist eine weit ausgebreitete Anpassungsform, die wir sowohl in der hochalpinen Region der Gebirge wie in der Ebene der Arktis, auf den antarktischen Inseln so gut wie in Wüsten und Steppengebieten finden. Er ist also ein treffliches Beispiel für die noch nicht besprochenen Erscheinungen der „ökologischen Konvergenz“. Man versteht darunter, daß Angehörige der verschiedensten Verwandtschaftskreise unter dem Zwang der gefährdrohenden Lebensbedingungen die gleiche Wuchsform annehmen. Für den Wuchs der echten Polsterpflanzen ist etwa kennzeichnend, daß bei ihnen vom Wurzelhals nach allen Seiten die Triebe dichtgedrängt ausstrahlen, die sich nach außen weiter verzweigen. So entsteht ein halbkugeliges oder auch völlig kugeliges Gebilde, dessen feste Oberfläche aus den dicht aneinanderschließenden, rosettenartig beblätterten Enden der Triebe gebildet wird. Stets sind die Polsterpflanzen immergrün und schützen sogar noch mit den abgestorbenen Blättchen dicht gedrängt die Stengeln bis zum Zentrum des Polsters. Die stets seitlich sprießenden Blüten sitzen meist unmittelbar der Oberfläche des Polsters auf, bilden daher eine einzige zusammenhängende Schauläche. Schröter hat recht, wenn er sagt, es sei „eines der ergreifendsten Bilder des felsstarrenden Hochgebirges, wenn uns aus einer Spalte des toten Gesteins ein solcher Miniaturgarten entgegenleuchtet!“

Unter den alpinen Kreuziferen gehört vor allem der Steinschmüchel (*Petrocallis pyrenaica*) zu diesem Typus, ein reizendes Pflänzchen mit seinen dreiteiligen Blattspreiten und rötlichen Blüten. Sein holziger Stamm wurzelt in Felsenspalten, die schön strahlig angeordneten Äste tragen dichtes Laubwerk. Da aber die Spreiten der letzten Blätter bald völlig zugrunde gehen und der Stengel dann nur noch von den scheidenartigen Basalpartien der Blätter bedeckt ist, erscheint das Polster außen von einer dichten Rinde bedeckt. Er ist aber im Innern hohl und von den dünnen Stämmchen durchzogen. Diese sowohl kalk- als felsentete Pflanze steht als „monotype Gattung“ in der europäischen Flora ganz einzig da, denn ihre nächstverwandten Gattungen sind erst in den Gebirgen Vorderasiens zu Hause. Man betrachtet sie daher als einen alten „tertiären Typus“, dessen Herkunft in letzter Linie auf Vorderasien verweist.

Ein hochinteressanter Kreuzblütler des Nordens und in dem Gebirge des östlichen Mittelmeergebietes ist das in etwa 15 Arten zersplitterte Löffelkraut (*Cochlearia*). Von diesen Arten ist *C. officinalis* (so benannt nach den löffelförmig gestalteten Niederblättern) hauptsächlich in den nördlichen bis arktischen Gegenden Europas und Asiens am Meeresstrande verbreitet. Da das frische Kraut ein scharfes Öl enthält, das sich als Mittel gegen den Skorbut bewährte, hat sich schon früh die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Die Pflanze ist aber in noch einer Beziehung merkwürdig. Daß sie als Nordlandspflanze unter Umständen stärker gegen Kälte gewappnet sein werde, war von vornherein zu erwarten; ein ganz überraschendes Verhalten berichtet jedoch

Kiellmann, der gelegentlich der Nordenskjöld'schen Expedition ein Löffelkraut (*C. fenestrata*) fand, das den sibirischen Winter blühend ertrug! Von dem Winter noch während des Blühens überrascht, vermochte die Pflanze mit den noch ungeöffneten Blütenknospen die furchtbare Kälte von mehr als 46° C, noch dazu an einer dem Wind ausgesetzten Stelle, zu überdauern und im nächsten Sommer die Blüten zu entfalten. Diese Widerstandskraft ist ganz unerklärlich und zweifelsohne in noch tief verborgenen Beschaffenheiten des Protoplasmas begründet, denn äußerlich scheint die Pflanze jeder besonderen Schutteinrichtung gegen die Kälte zu entbehren (Näheres hierüber siehe in Bd. I, S. 130).

Eine sehr artenreiche Gattung der Kreuziferen ist die gemeine Rauke (*Sisymbrium*), die leicht durch ihre länglichen, stielrunden, der Spindel dicht angebrückten Früchte kenntlich ist. Sie wächst bei uns als *S. officinale*, zu deutsch: gemeine Rauke und als *S. sophia*, die auch als Schuttkresse bezeichnet wird. Die erstere zeichnet sich durch sehr kleine gelbe Blüten aus, die der Pflanze ein höchst unscheinbares Aussehen verleihen, obgleich sie im vegetativen Teile je nach den Ernährungsverhältnissen zu ziemlich stattlicher Größe gelangen kann. Sie ist überhaupt ein Gewächs von recht wenig gefälligem Äußeren und auch wenig anmutender Lebensweise, denn fast alle Rauken besiedeln Schuttstätten, Mauern, Sandböden und sonst wüste Plätze. Sie sind so wie *Lepidium* *Draba*, *Capsella* und andere Kreuziferen typische Ruderalpflanzen und spiegeln in ihrem äußeren Ansehen gleichsam die Dürftigkeit ihres Standortes wieder. Gerade unsere gemeine Rauke bietet namentlich im Herbst, wenn die Blütenspindeln zu langen Ruten herangewachsen sind und das Laub häufig schon ganz abgefallen ist, ein besonders unschönes, sparriges und trauriges Aussehen, ja ich möchte sagen, sie sei die häßlichste aller Pflanzen.

Verwandt mit ihr ist der Färberwaid (*Isatis tinctoria*), der von Zentralasien bis Süd- und Mitteleuropa verbreitet ist. Dieses Gewächs verdient eigentlich nur deshalb besondere Erwähnung, da es früher nutzbringend als Färberpflanze angebaut wurde, um aus dem Kraute Indigo zu gewinnen. Namentlich in Frankreich und Deutschland, besonders in Thüringen, woselbst die fünf Städte Erfurt, Gotha, Langensalza, Tennstedt und Arnstadt wegen ihres Waidbaues und =Handels die fünf „Waidstädte“ hießen, wurde *Isatis* in ausgedehnterem Maße angebaut. Doch war von jeher der französische (*languedoc*sche) Waid farbenreicher als der deutsche. Hieran knüpft sich eine interessante kulturgeschichtliche Erinnerung, denn die Kenntnis dieser Pflanze als die Lieferantin eines Farbstoffes scheint bis ins Altertum zurückzugehen. Wenigstens berichtet Caesar, daß die Britannier einen blauen Farbstoff benützten hätten, mit dem sie sich die Gesichter in scheußlichster Weise bemalten, wenn sie zur Schlacht zogen. Und man hat allen Grund anzunehmen, daß sie zu diesem Zwecke den Waid benützten. Heute ist der „deutsche Indigo“ ohne jede praktische Bedeutung. Schon längst hat ihn der indische „echte“ Indigo, der von verschiedenen Indigofera-Arten (Schmetterlingsblütler) gewonnen wird, aus dem Felde geschlagen, und nicht genug daran, ist auch dieser bereits entwertet durch den mit den Fortschritten der Chemie aufgetauchten künstlichen Indigo. Und so fristet der Waid als „gefallene Größe“ nur noch als Unkraut sein Leben und wandert, wie so viele Ruderalpflanzen, mit der Eisenbahn, — besonders auffällig z. B. an den Dämmen der württembergischen Donaubahn.

Wohl der wichtigste aller Kreuzblütler ist der Kohl (*Brassica*), eine etwa 50 Arten umfassende Gattung, die hauptsächlich im Mittelmeergebiet, ja auch in Mitteleuropa, Zentral- und Ostasien verbreitet ist. Wie allbekannt, stellt *Brassica* unter allen Kreuziferengattungen die meisten Nutz- und Gemüsepflanzen. Auf ihre Nutzbarkeit deutet auch schon ihr Name, denn *Brassica* wird nach Kanningers Stymologie abgeleitet vom lateinischen *praesecare*, da die Pflanze vom Stengel allmählich abgeschnitten wird, oder vom griechischen *brasso* — knistern, weil die Blätter beim Abbrechen knistern; jedenfalls sind beides Bezeichnungen, die von den Kulturvarietäten genommen waren. Und „Gemüsepflanze an sich“ ist der Kohl denn auch bis heute geblieben.

Säufige einheimische Kreuzblütler. (Nach Thomé.)

1 = Schotenbotter (*Erysimum cheiranthoides*). 2 = Psennigtraut (*Thlaspi arvense*). 3 = Rauentsef (*Sisymbrium officinale* Scop.). 4 = Hirtentäschel (*Capsella bursa pastoris*).

Die Gattung *Brassica* ist aber auch dem Botaniker wichtig, denn sie ist ein Musterbeispiel dafür, wie weit die natürliche Variationsfähigkeit einer Pflanze unter der bewußten Leitung des Menschen ausgenützt werden kann. Ich betone hierbei den Ausdruck „die bewußte Absicht des Menschen“, denn es war nur seine überlegende Auswahl und Kulturmethode, die dieses Resultat erzielte. Alle Kohllarten, die in der Gärtnerei und Landwirtschaft gepflegt werden und im Laufe der Zucht zu samenbeständigen Massen geworden sind, bedürfen besonderer Kulturbedingungen. Die mutmaßliche Stammpflanze ist zwar sehr anspruchslos, nicht so jedoch ihre Abkömmlinge, deren Ansprüche — man gestatte das Wortspiel dieses Vergleiches — ebenso mit der

Kultur gestiegen sind wie die des Menschen. Der Kohl entzieht dem Boden sehr viele Nährstoffe und fordert deshalb stets starke Düngung. Wegen des gewaltigen Konsums an Kohlpflanzen finden sich große Pflanzungen namentlich in der Nähe großer Städte, wo auch in den Abfallstoffen der städtischen Latrinenanlagen gleich das Material für die Düngung vorhanden ist — auch ein Bild des „Stoffkreislaufes in der Natur“. Besonders gut gedeihen die Kohlarten, wenn große Anlagen, sog. „Kieselfelder“, geschaffen werden, wobei der Boden von den in Wasser fein verteilten Dungstoffen durchrieselt wird. Bei der Absorptionsfähigkeit des Bodens werden dann die Dungsalze von der Ackerkrume gespeichert und zurückgehalten, während das überschüssige Wasser gereinigt, ja geradezu „filtriert“ abläuft.

Alle diese sorgfältig gehegten Sprößlinge aus der Gattung *Brassica* lassen sich jedoch auf drei Stammpflanzen zurückführen. Dies sind die eigentlichen Kohlarten, die nur als Gemüsepflanzen in Betracht kommen; ferner Raps und Rüben, die vor allem der Ölgewinnung aus dem Samen dienen. Die Kohlarten im engeren Sinne, sei es nun Kohlrabi, Weißkohl oder Blumenkohl, werden alle auf eine einheitliche Stammpflanze zurückgeführt, die den botanischen Namen *Brassica oleracea* führt. Von dieser Urpflanze selbst weiß man übrigens nichts Bestimmtes; sie ist eigentlich nicht viel mehr als ein Sammelname, der bloß ausdrücken soll, daß alle hierher gehörigen

Blumenkohl. (Aus Bailion.)

Rassen zweifellos einen gemeinsamen Ursprung haben. Man bezeichnet mit dem Artnamen „oleracea“ häufig diese hypothetische Stammform selbst, die in Ligurien und Nordeuropa (Helgoland!) als Küstenpflanze vorkommt. Richtiger dürfte es vielleicht sein, wenigstens, dem hypothetischen Charakter des Artnamens entsprechend, diese wildwachsende Form schon als *var. silvestris* D. C. zu bezeichnen; denn es ist ja ebenso gut möglich, daß diese Form nicht „wild“, sondern „verwildert“ ist. Ihre zahlreichen Kulturvarietäten lassen sich wieder unter sechs Formen verteilen. Diese sind vor allem *Brassica oleracea*, *forma acephala*, d. h. der Blätterkohl, auch Grün-, Braun- oder Winterkohl genannt. Wie schon aus ihrem Namen hervorgeht, mangelt dieser Kohlform die für andere so charakteristische Kopfbildung. Die Blätter stehen vielmehr locker auf gestrecktem Stengel. Man unterscheidet hier wieder den grünen oder röt-

lichen Blattkohl, mit flachen, buchtig-fiederspaltigen Blättern, den Grünkohl mit gespikten, flachen, ungewellten Blättern und den Braunkohl mit feinen krausen und fiederspaltigen Blättern. Die zweite Varietät nennt der Botaniker *Brassica oleracea*, *forma capitata*, die Köchin nennt sie Kopfkohl, Weißkohl, Weißkraut oder kurz Kraut. Der Kopfkohl hat im Gegensatz zum vorigen einen durchaus gedrängten Wuchs und eine gestaute Achse, so daß die Blätter dicht beisammen in einem „Kopf“ stehen. Die äußeren Blätter treten etwas lockerer auseinander und werden bei der Küchenverwendung entfernt; die inneren aber bleiben geschlossen, schichten sich dicht übereinander und bilden so den massiven, harten Krautkopf. Der Name Weißkohl oder Weißkraut rührt übrigens von der gelblich-weißen Farbe der inneren Blätter her, die sich durch den Lichtmangel erklärt. Bei einer Farbenvarietät dieser Kohlform findet sich reichliche Entwicklung eines violetten Farbstoffes in den Blättern, weshalb man diese Varietät in Norddeutschland als Rotkohl und im deutschen Süden als Blaukraut unterscheidet. Die normale weiße Form ist jedenfalls die wichtigere und wohl auch überhaupt die verbreitetste und am meisten verwendete Kohllart, denn sie liefert das in manchen Gegenden so überaus geschätzte Sauerkraut. Dieses ist bekanntlich keine Kohllart für sich, sondern wird aus Kopfkohl hergestellt, indem man die feingehackten Krautköpfe mit Salz bestreut und in Tonnen einlegt, in denen sie durch einige Wochen einem durch Bakterien vermittelten Gärungsprozeß unterworfen werden. Die Kohlschnitzel nehmen unter diesem Gärungsprozeß, an dem sich namentlich der Milchsäurebakterium beteiligt, ihr kennzeichnendes gläsernes Aussehen an. *Brassica oleracea*, *forma sabauda*, zu deutsch Wirsingkohl, auch Savoyerkohl oder Welschkohl, in Österreich „Keld“ genannt, unterscheidet sich von der vorigen Form wieder wesentlich durch die blasig aufgeworfenen, krausen Blätter, durch deren Gestalt auch eine weniger dichte Beschaffenheit der Köpfe bedingt ist. Der Wirsing ist im Geschmack feiner als der Kopfkohl — und wird ihm daher vielfach vorgezogen, setzt wieder erläuternd die Köchin hinzu. *Brassica oleracea*, *forma gongylodes* ist der Kohlrabi, bei dem im Gegensatz zu den vorgenannten Formen der Stengel und in seinem untersten Teile der Wurzelhals als Gemüse verwendet wird. Von dieser „Rübe“ gehen die Blätter aus, was der Botaniker so deutet, daß der „Kohlrabikopf“ nichts anderes als die blättertragenden basalen Stengelpartien darstellt, die derartig anschwellen; daher sieht man denn auch an der entblätterten „Rübe“ noch die Narben der Blattstiele. Bei minderen Rassen, vor allem aber bei ungenügender Düngung des Bodens, unterbleibt übrigens diese Anschwellung oder erreicht wenigstens nicht den gewünschten Grad. Als vorletzte Form haben wir noch den Rosenkohl (*Brassica oleracea*, *forma gemmifera*) vorzustellen, der im Wuchs dem Blattkohl ähnlich ist, jedoch einen gestreckten Stengel besitzt, dessen Endblätter einen höchstens halbgeschlossenen Kopf bilden, während die tiefer stehenden Blätter frühzeitig abfallen. Dafür bilden sich in ihren Achseln kleine Seitentriebe reichlich aus, die zunächst als kleine geschlossene, kopfförmige Knospen stehenbleiben. Sie sind es, die man von dieser Pflanze erntet und als höchst zartes und schmackhaftes Gemüse zubereitet. Läßt man der Pflanze diese Seitentriebe, so wachsen sie im nächsten Frühjahr zu Blütenzweigen aus. Der Blumenkohl oder süddeutsch Karfiol (*Brassica oleracea*, *forma botrytis*) schließt diesen Reigen der Küchenschätze. Er ist durchaus ein Kunstprodukt, bei dem die Blüten-

standachse, und zwar sowohl die Hauptachse als die Nebenachsen, kurz, gestaut und fleischig werden. Sie geben wohl von allen Kohllarten das feinste und bekömmlichste Gemüse. Die Blüten, die an diesen monströs verdickten Blütenstengeln sitzen, kommen häufig nicht zur vollen Entwicklung. Hier ist der derbe Kohl, bis zur sublimen Feinschmeckerei veredelt, in zahllose „Stüchenrassen“ und Spielarten hochgezüchtet, daher auch empfindlich und, wie alle feineren Kohlvarietäten, in seiner Güte sehr von den Bodenverhältnissen abhängig.

Die zweite für die Landwirtschaft in Betracht kommende Brassica-Art ist der Raps, Keps oder Rapskohl (*Brassica Napus*), von dem drei Formen in Kultur stehen: *Br. Napus*, f. *annua*, der Sommerraps, die überwinternde Form *Br. Napus*, f. *oleifera*

Spielarten des Kohls.

1 = Kopfkohl. 2 = Rosenkohl. (Nach Baillon.)

(Winterraps) und endlich *Br. Napus*, f. *napobrassica*, die Bodenkohlrübe, Erdrübe, Stockrübe oder Wurke. Auch hier können wir unseren Lesern einige trockenere Erläuterungen nicht ersparen. Bei diesen Kohlformen ist der geschäkte rübenförmige, oft zu außerordentlicher Größe heranwachsende Teil nichts anderes als die Pfahlwurzel. Zum Unterschiede von der oben beschriebenen Form des Kohls, der dann als „Oberkohltrabi“ bezeichnet wird, nennt man zuweilen die Erdrübe auch „Unterkohltrabi“. Sie liefert ein bei uns allerdings nicht sehr geschätztes Gemüse, wird aber besonders in Nord- und Ostdeutschland als Viehfutter gezogen. Auch die beiden erstgenannten Formen der *Br. Napus* werden nicht als Gemüse- oder Futterpflanzen, sondern als Industrie-, nämlich als Ölpflanzen, gebaut. Eine ganz gleiche Verwendungsart finden wir auch bei den Formen der dritten Brassica-Art, dem Rübسن (*Brassica Rapa*). Auch bei dieser Pflanze gibt es eine Form mit rübenförmiger Anschwellung der Wurzel, die weiße Rübe, auch Stoppelrübe oder Turnips (*Br. Rapa*, f. *rapifera*) genannt. Die spindel- oder

zwiebel förmige Pfahlwurzel ist bei dieser Pflanze innen weiß, außen häufig rot gefärbt, besonders am Kopfsende. Die typische Form der großen Rübe wird wohl meist nur als Viehfutter verwendet; hingegen ist die kleinere, durch Dichtsaat erzielte länglich zartere, sog. Teltowerrübe neben anderen Unterrassen wieder als Gemüse geschätzt. Wie bei *Br. Napus*, gibt es dann auch bei *Br. Rapa* zwei Formen, von denen Öl liefernde Samen gezogen werden. Dies sind *Br. Rapa*, f. *annua*, der Sommerrübsen, und *Br. Rapa*, f. *oleifera*, der Winterrübsen. Außerdem ist bei *Br. Rapa* auch noch eine wilde, einjährige oder verwilderte Form bekannt, nämlich *Br. Rapa*, f. *campestris*.

Das sind allerdings keine erquicklichen Erörterungen, doch durfte ich sie nicht übergehen, da ich doch mein Werk nicht nur als Lesebuch, sondern ebensooft als Nachschlagewerk verwendet sehen möchte. Der Rübfsamen, der auch als Vogelfutter bekannt und geschätzt ist, enthält bei Raps und Rübfsen etwa 30—35% seines Gewichtes Öl, das, ähnlich wie wir es bei der Gewinnung des Mohnöls kennengelernt haben, auch hier aus den Samen geschlagen wird. Diese Technik ist noch ziemlich primitiv und beschränkt sich auf Zerquetschen der Körner mit Walzen und nachheriges Auspressen bei gewöhnlicher Temperatur oder auch durch Erwärmen. Die Samenschalen und ein Fett- und Schleimrest bleiben zurück und bilden den „Ölfuchen“, der bekanntlich als Viehfutter verwendet wird.

Das so gewonnene Rüböl muß jedoch weiter raffiniert werden. Wenn es sehr rein dargestellt wird, ist es allerdings wohlschmeckend und besitzt vor allem die gute Eigenschaft, nicht, wie manche andere Pflanzenöle, einzutrocknen und dick zu werden. Deshalb wurde es auch vor der Einführung des Petroleums mit Vorliebe zur Wohnungs- und Straßenbeleuchtung verwendet, was heute nur noch zu den Erinnerungen der Biedermeierzeit gehört. Jetzt ist es herabgesunken von der „leuchtenden“ Höhe zum simplen Schmieröl. Aber diese Verwendungsart sichert der Rapskultur im Zeitalter der Maschinen doch den weiteren Bestand und noch mehr Ausdehnung als früher. Eine andere, minder sympathische Verwendungsart ist übrigens die als Zusatz zu

Spiearten des kohls.

1 = Kohltrabi. 2 = Welschkohl.
3 = Blühende Samenpflanze des
Kohltrabis. (Nach Bailon.)

tierischen Fetten bei der Fabrikation der Kunstbutter oder Margarine. Die Kultur des Rapses erfordert viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit, auch abgesehen von den bedrohlichen Feinden aus Tier- und Pflanzenwelt. Rübsen und Raps stellen auch hohe Ansprüche an den Nährgehalt und Kulturzustand des Ackers und fordern entsprechendes Brachliegenlassen, wiederholtes Pflügen sowie reichliches Düngen. Die schon im Herbst austreibende Saat des Winterrapses widersteht den Einflüssen der rauhen Jahreszeit gut, wenn sie durch eine Schneedecke hinreichend geschützt ist; hingegen werden ihr die Nachtfrost im Vorfrühling, wenn die warme Sonne den Schnee bereits weggeschmolzt hat, mitunter sehr bedrohlich. Auch zur Blütezeit ist der Raps anspruchsvoll und will beständiges, sonniges Wetter. Dann ist er allerdings sogar eine einträgliche Bienenweide. Nicht ohne Gefahr ist schließlich für den Rapszüchter das Einbringen der Früchte. Denn nur große Vorsicht schützt ihn vor Samenverlusten. Müssen doch die Früchte in Sicherheit gebracht werden, noch bevor sie völlig ausreifen, denn mit dem Aufspringen der Klappen säen sich die meisten Samen von selbst auf dem Acker aus und gehen dann nutzlos verloren. Daher wendet man beim Einbringen, das mit Vorliebe in den Morgenstunden vorgenommen wird, ehe die Sonne die vom Tau genährten Schoten aufspringen läßt, die Vorsicht an, die Wagen mit Sackzeug zu belegen, um die während der Ernte ausfallenden Samen nicht zu verlieren.

Schließlich müssen wir als einer nicht unwichtigen Rapspflanze noch einer Brassica-Art, nämlich des schwarzen Senfes (*Brassica nigra*), gedenken. Seine Samen enthalten reichlich Myrosin und Myrosinsäure, die — wie bereits erwähnt — beim Aufeinanderwirken das Senföl erzeugen. Das Mehl dieser Samen wird medizinisch zur Bereitung von Senfpflastern verwendet; als Speisegewürz (englisches Senfmehl) ist es allerdings bekannter. Wer kennt nicht den Mostich, der aus dem durch Pressen von dem reichlichen Öl befreiten Mehl mit Essig und Zucker angerührt wird? Der eigenartige Name rührt übrigens davon her, daß man eigentlich jungen Wein, d. h. Most, dazu verwenden soll.*

An dem Winterraps und dem Winterrübsen hat jedoch nicht nur der Landwirt, sondern auch der Botaniker seine Freude, denn hier findet er mancherlei interessante biologische Erscheinungen. Da der Winterraps im Herbst keimt, so muß die Pflanze die Winterkälte überstehen, und dazu verhilft ihr, wie schon erwähnt, die schützende Schneedecke. Diese selbst aber wäre der hochwüchsigen, langstengeligen Pflanze unbedingt verderblich, denn sie würde sie niederdrücken und knicken. Da ist es denn eine ganz merkwürdige Anpassung, daß die Pflanze unter dem Einfluß der sinkenden Temperatur nur einen kurzen, gestauchten Trieb bildet, der ganz nahe dem Boden verbleibt. Da nun an dem Rapsstengel die Blätter in zerstreuter Stellung angeordnet sind, so muß bei der mit der „Stauchung“ der Zwischenglieder verbundenen „Drängung“ der Blätter eine bodenständige Rosette zustande kommen, und dieser vermag dann die Schneedecke durch ihr Gewicht nicht zu schaden. Sobald aber im Frühling die Temperatur ansteigt, streckt sich die Pflanze wieder in raschem Wachstum und erhält jene Wuchsform, die der erst im Frühling aus dem Samen kommende Sommerraps von

* Der weiße Senf (die Unterscheidung gründet sich auf die Farbe der Samen) gehört der Gattung *Sinapis* an. Nach älterer Nomenklatur wird übrigens auch der schwarze Senf als *Sinapis nigra* bezeichnet.

Anfang an besitzt.* Eine andere biologische Eigentümlichkeit des Rapses ist der Wachstumsüberzug der Blätter, der ihnen einen blaugrünen Anflug verleiht, der jedoch durch Wischen leicht zu entfernen ist. Tauchen wir eine Rapspflanze unter Wasser, so sehen wir an dem Glanze der Blattflächen, daß diese nicht benetzbar sind, beim Herausziehen rollen die Tropfen sogar glatt und ohne die Blätter naß zu machen ab. Das gleiche läßt sich bei Regen beobachten. Die Wachsschicht dient also zur Ableitung des Regenwassers, um eine Verstopfung der beiderseits befindlichen Spaltöffnungen zu verhindern; gleichzeitig schützt jedoch die Wachsschicht auch gegen Verdunstung des in den Blattgeweben aufgespeicherten Wassers. Das ablaufende Wasser fließt zum Stengel ab und diesem entlang in den Boden; dies wird durch die schief-aufrechte Lage der Blätter bewirkt, durch ihre etwas rinnenförmige Gestalt und durch den Umstand, daß die oberen kleineren Blätter dem Stengel dicht anliegen, während die unteren zwar etwas abstehen, aber dafür mit kleinen Lappen beiderseits zum Stengel herabreichen. Durch diese Wasserableitung begiebt die Pflanze sich sozusagen selbst. Wenn man bedenkt, daß der Raps eine Pfahlwurzel besitzt, also über kein ausgebreitetes Wurzelsystem verfügt, so begreift man erst so recht die Wichtigkeit und Zweckmäßigkeit einer derartigen möglichen „zentripetalen“ Wasserzuführung.

Über die Bestäubung habe ich bereits angedeutet, daß namentlich der honigreiche Raps und der Rübsen von den Bienen emsig besucht werden, der Rapsbau daher auch für die Bienenzucht nicht geringe Bedeutung hat. Zur Blütezeit sind die Rapsfelder bei sonnigem Wetter noch dichter umschwärmt als der Alee. Außer den Bienen kommen natürlich nur Insekten mit entsprechend langem Rüssel in Betracht, soweit nicht lediglich Pollenräuber sich am Besuche beteiligen, die aber bei der Stellung der Fortpflanzungsorgane ebenfalls Bestäubungsdienste leisten können.

Und um an dieser reizlosen Pflanze durch besonderes Interesse den Mangel ästhetischer Befriedigung zu ersetzen, können wir schließlich noch auf einige neuere Versuche verweisen, die von Nathanson und Pringsheim an *Brassica Napus* und *Sinapis alba* angestellt wurden und die überraschendsten Tatsachen aus dem Reizleben der Pflanze enthüllten. Es handelt sich diesmal um die „Summation intermittierender Lichtreize“, wie es der Fachmann nennt. Man versteht darunter etwa folgendes: Wenn man auf ein reizbares Organ einen Reiz, z. B. Licht, nicht konstant, sondern mit regelmäßigen Unterbrechungen und dabei abwechselnd in entgegengesetzter Richtung wirken läßt, so führt die Pflanze dementsprechende abwechselnde (pendelnde) Reaktionen aus, indem sie sich bald in ihren Wachstumskrümmungen nach der einen, bald nach der anderen Seite wendet. Solches tritt aber nur dann ein, wenn die abwechselnden Reizungen in so großen Zeitintervallen erfolgen, daß die vorhergehende Reizung, bzw. der die Bewegung erzeugende Erregungszustand völlig „abgelaufen“ war. In diesem Falle wirkt jeder Reiz einzeln für sich allein. Richtet man den Versuch aber so ein, daß der nächste Reiz eintritt, bevor der Erregungszustand der vorhergegangenen Reizung abgelaufen ist, dann müssen sich die beiden Erregungen irgend-

* Diese Rosettenbildung bei überwinterten Individuen findet man in der ganzen Familie nicht selten, namentlich häufig bei dem allgemein als Unkraut verbreiteten Girtentäschel (*Capsella*) u. a. Und jetzt verstehen wir erst, warum die Rosette bei einer gewissen Gruppe alpiner Kreuziferen zur ständigen Wuchsform wurde.

wie zusammenlegen, also „summieren“. Wenn dabei der eine Reiz in seiner Wirkung beständig größer ist als der entgegengesetzte, dann führt das Pflanzenorgan nicht die obige „pendelnde“ Bewegung aus, sondern die Reize summieren sich zu einer konstanten Wachstumskrümmung (wenn es sich um eine solche handelt) nach der gleichen Seite. Für solche Versuche eignet sich die heliotropische Reizung besonders gut, da sie uns die Möglichkeit in die Hand gibt, zwischen beliebig starken Reizen und völliger Reizlosigkeit abzuwechseln sowie auch Reizungen von entgegengesetzten Seiten durch die Versuchsanstellung vorzunehmen.

In dieser Beziehung sind nun besonders solche Versuche sehr lehrreich, bei denen der betreffende Pflanzenstengel von der einen Seite durch eine konstante Lichtquelle gereizt wird, von der anderen Seite aber durch intermittierende Belichtung. Aus den bei verschiedener Variation der Experimente sich ergebenden Reaktionen der Pflanze lassen sich dann mancherlei Gesetze dieser Reizsummation ermitteln. Für die Lichtempfindung des menschlichen Auges kennt man nun eine gesetzmäßige Beziehung schon seit dem dritten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts unter dem Namen des Talbotschen Gesetzes. Dieses Gesetz lautet: Der Effekt des intermittierenden Reizes ist gleich dem Produkt aus der Intensität des Lichtreizes und demjenigen Bruchteil der Periode, während dessen er wirksam ist. Das heißt: Ist z. B. der Reiz von der Intensität i und wechselt dieser innerhalb jeder Periode mit einer gleichlangen reizlosen Phase ab, so ergibt sich daraus eine Wirkung, die gleich ist einem konstant wirkenden Reiz von der Intensität $\frac{1}{2}$. Dieses Gesetz ist, wie gerade eingehende Versuche neuerer Zeit festgestellt haben, bis ins feinste bei dem Menschen gültig. Die beiden obengenannten Forscher legten sich nun die gewiß sehr bedeutungsvolle Frage vor, ob dieses Talbotsche Gesetz des Menschen auch für die Perception des Lichtes bei den Pflanzen Gültigkeit habe. Und sie fanden, daß es auch hier vollständig zu Recht besteht! In ihrem Bericht über ihre Untersuchungen heißt es darüber „Man sieht aus den mitgeteilten Zahlen, daß innerhalb der Grenzen, in denen sich die Versuchsbedingungen bewegen, die Abweichungen vom Talbotschen Gesetze nicht viel über den Fehler hinausgehen, mit denen die photometrische Messung selbst behaftet war.“ Bekanntlich darf das Zeitintervall zwischen den intermittierenden Reizen eine bestimmte Dauer nicht überschreiten, wenn die Lichteindrücke beim menschlichen Auge sich summieren, d. h. eine einheitliche Lichtempfindung geben sollen. Wird diese Intervallsdauer überschritten, so empfindet das Auge getrennte Lichtreize, die, wenn sie sich immerhin noch sehr rasch folgen, den Eindruck des Flimmerns erzeugen. Man nennt diese Grenze der Intervallsdauer die „kritische“ Periode des Talbotschen Gesetzes. Die Versuche Nathansons und Pringsheims ergaben, daß auch für die Pflanzen eine kritische Periode des Talbotschen Gesetzes besteht, jenseits deren die genannte Summationsregel zu wirken aufhört, und wir lernten dabei kennen, daß diese Geschwindigkeit der Reizaufeinanderfolge weit unterhalb derjenigen liegt, bei welcher die Pflanze in pendelnder Bewegung dem intermittierenden Reize zu folgen beginnt. Andererseits ist die kritische Geschwindigkeit bedeutend größer als bei dem menschlichen Auge. Es ist klar, daß dies mit der größeren Trägheit der Reaktion bei der Pflanze zusammenhängt. Endlich wurde auch festgestellt, daß das Talbotsche Gesetz bei schwacher Beleuchtung innerhalb bedeutend weiterer Grenzen gilt als bei intensiver.

Es sind also diese Versuche für die Psychobiologie von tiefster Bedeutung, denn es ist durch sie im Sinne eines allgemeinen Gesetzes das Empfindungsleben der Pflanze mit dem des Menschen auf eine prinzipiell gleiche Stufe gestellt. Das Talbotsche Gesetz bedeutet auch zugleich eine weitere Bestätigung des von uns vorhin besprochenen Hyperbelgesetzes, das übrigens aus ihm auch hervorgeht. Aber auch noch in anderer Hinsicht spielen hier bei dem Talbotschen Gesetze psychobiologisch sehr bedeutungsvolle Momente mit. Schon der Begriff der „Erregung“, der bei allen diesen Untersuchungen nicht ausgeschaltet werden kann, verweist uns, so „physiologisch“ er auch ausgesprochen wird, unmittelbar auf die unvermeidliche psychistische Analogie. Dann kommt aber hier noch die wichtige Gegenreaktion hinzu, nämlich die ja aus der pflanzlichen Reizphysiologie allgemein bekannte Erscheinung, daß jedem Reize, der eine Bewegung auslöst, sofort eine Gegenreaktion in der Pflanze begegnet, welche die durch den Reiz hervorgerufene Gleichgewichtsstörung zu beseitigen strebt; aus dem Zusammenwirken der Reaktion auf den Reiz und der Gegenreaktion geht dann, falls der Reiz ein vorübergehender war, schließlich wieder die normale Ruhelage hervor, in der die Pflanze neuerdings einem neuen Reizimpulse gleicher Wirkung zugänglich ist. Bei intermittierenden Reizen und den damit zusammenhängenden Summationserscheinungen verwickelt sich die Sache natürlich in sehr verschiedener Weise. Immer aber ist bei der Beurteilung des Ablaufes solcher Reizketten diese Gegenreaktion zu berücksichtigen. Das für uns Wichtige daran ist, daß zwar wohl die Reizreaktion und die ihr zugrunde liegende Erregung von außen induziert ist, die Gegenreaktion aber vollständig aus einem inneren Gleichgewichtstreben stammt, für das die Erregung nur die auslösende Ursache ist. Die Spontaneität im pflanzlichen Reizleben, also dasjenige, was in erster Linie die psychobiologische Hypothese hervorgerufen hat und sie allerwege stützt, ist damit wieder unumwunden zugestanden. „Dies ist der am längsten in der Pflanzenphysiologie bekannte Fall einer Gegenreaktion, d. h. eines selbstregulatorischen Vorganges, der nach Aufhören des Reizes den alten Zustand wiederherzustellen sucht.“

Gleichfalls, wenigstens zum Teil, hat Frau B. Polowzew mit Kreuzfereimlingen (*Brassica* und *Lepidium*) bei ihren Untersuchungen über die Reizwirkungen von Gasen u. a. auf die Pflanzen experimentiert. Auch in dieser umfangreichen Arbeit, die vor allem auch verschiedene methodische Fragen zu lösen sucht, wird in einem besonderen Abschnitte das psychobiologische Problem erörtert. Die Verfasserin, die — wie es scheint — bei Herausgabe ihrer Arbeit mit dem neueren psychobiologischen Schrifttum nicht bekannt war, kommt selbst zu beachtenswerten Zugeständnissen an die Zulässigkeit der psychobiologischen Hypothese, wenn sie auch vorher in der Behandlung des Problems einigen Widerspruch herausfordert. Aber gerade angesichts einer weitgehenden „Vorsicht“ in der Handhabung der psychobiologischen Frage sind die Zugeständnisse um so wertvoller. Diese werden in folgenden Schlüssen zusammengefaßt: 1. der Analogieschluß auf das Psychische im Pflanzenleben in dem oben erörterten Sinne und in der festgestellten Beschränkung ist logisch berechtigt, also in der Wissenschaft zulässig. 2. Als Analogieschluß kann er infolge der problematischen Modalität seines Schlusssatzes für niemanden obligatorisch sein. 3. Da er sich aber einen bestimmten Erkenntniswert in der Untersuchung der Reizerscheinungen erworben hat

und auch für die weitere Forschung verheißt, so kann er in vielen Fällen wünschenswert erscheinen. Der zweite dieser Sätze erscheint uns ziemlich überflüssig. Denn „obligatorisch“ in diesem Sinne sind ja überhaupt nur die unmittelbaren Wahrnehmungstatsachen. Auch die mechanistische Anschauung, die Atomhypothese, ja streng genommen, alle Theorien sind nur nach Maßgabe der Beurteilung der Tatsachen von seiten des einzelnen obligatorisch! Und dann liegt hierin geradezu ein Widerspruch zum ersten Satz: Wenn etwas in der Wissenschaft obligatorisch ist, dann sind es doch die Gesetze der Logik; wenn Frau Polowzew nun zuerst die Analogie mit dem Psychischen in uns für „logisch berechtigt“ erklärt, dann erklärt sie eigentlich diese doch auch zugleich für wissenschaftlich obligatorisch! Übrigens schwächt sie in dem dritten Satze ihr eigenes vorher gegebenes Zugeständnis ab, in dem sie, der Entwicklung der Wissenschaft und wissenschaftlichen Methoden vollständig gerecht werdend, selbst betont, daß eben erst der Analogieschluß auf das Psychische zur Entdeckung einer Reihe von Erscheinungen des pflanzlichen Empfindungslebens geführt hat, so zur Gültigkeit des Weberschen und des Talbotschen Gesetzes auch für die Pflanze. Und sie hat ganz recht. Man muß es allen Mechanisten gegenüber betonen, daß nur durch die vorhergehende Anwendung dieses Analogieschlusses jene Entdeckungen ermöglicht werden. Hätte man dies getan, wenn man nicht — eingestanden oder uneingestanden — das Gefühl gehabt hätte, dieser Analogieschluß sei berechtigt!

Nach diesen theoretisch so hochbedeutsamen Erörterungen zwingt der Gang unseres Werkes, sich einem der trivialsten Gegenstände zuzuwenden, nämlich dem Ackersenf (*Sinapis arvensis*), der als sehr verbreitete Unkrautpflanze nebst *S. alba*, dem weißen Senf, als verwilderte Kulturpflanze allenthalben die Felder besiedelt. Die hellgelben Samen dieses Gewächses finden ganz gleiche Verwendung, wie die schwarzen der oben beschriebenen *Brassica nigra*; es gilt also das über die medizinische und sonstige Verwendung dort Gesagte auch für den weißen Senf. Außerdem werden auch die Samenkörner als Gewürz verwendet, so in reichlichem Maße als Zugabe zu den verschiedenen marinierten Häringen usw. Der wirksame Bestandteil daran, das scharf schmeckende und auf der Haut Blasen ziehende Senföl, entsteht übrigens erst beim Verreiben und Anfeuchten der Samen infolge der Einwirkung des Myrosins auf das myronsaure Kali, wie wir bereits erwähnten. Die Samen entwickeln bei Berührung mit Wasser aus ihrer Schale in reichlichem Maße Schleim und sorgen so für ausreichende Befestigung der jungen Keimlinge. Der Ackersenf, der vielfach als Hederich bezeichnet wird, ist eines der am meisten gefürchteten Ackerunkräuter. Da sein Name aber eigentlich einer Angehörigen der nächsten Gattung zukommt, mit der er sehr leicht verwechselt werden kann, so wollen wir ihn in dieser Eigenschaft mit jener zusammen besprechen. Über seine Blütenbiologie gibt Knuth an, daß nach einem Berichte des Baron Eggers der Ackersenf auf einigen westindischen Inseln zwischen Kalkfelsen xero-kleistogam sei, infolge der Trockenheit und der dadurch gehemmten Entwicklung öffnen sich die Blüten nicht, sondern bestäuben sich selbst im geschlossenen Zustande. Dies wäre also wieder ein Beispiel einer individuell variierten direkten Anpassung.

Nahe verwandt mit dem Senf ist der gemeinbekannte Rettich (*Raphanus*), der in etwa 10 Arten, meist im Mittelmeergebiet und Europa, in einer Art auch in Japan, vorkommt. Der Gartenrettich (*R. sativa*), der in verschiedenen Varietäten (*R. radicle*, *R. radieschen*, *R. griseus*, Sommer- und *R. niger* Winterrettich) seiner scharf schmeckenden, rübenförmig anschwellenden Wurzel (samt Hypokotyl) wegen angebaut wird, unterscheidet sich vom Akerrettich (*R. Raphanistrum*) durch die gleichmäßige Schote, die bei dem letzteren perlschnurartig eingeschnürt ist. Der Gartenrettich kommt heute sicher nirgends wild vor, so daß man über die Heimat der Pflanze völlig im unklaren ist und die Auffassung berechtigt erscheint, daß sich diese Rettichart überhaupt erst und nur in der Kultur entwickelt habe, wie wir dies ja von den Kohlarten wissen.

Dafür wird er um so eifriger angebaut. Wenig bekannt ist, daß Deutschland ein Rettichdorf besitzt, das alle anderen Kulturplätze der edlen Wurzel übertrifft. Dies ist das Dörschen Weichs in Bayern, von wo fast alle Rettiche kommen, die man als bayrische Bierrettiche verzehrt. Den so verbreiteten Akerrettich, den Hederich, betrachtet man als eigentliche Stammform der Kulturrettiche, doch sind genügend systematische Unterschiede vorhanden, um auch diese Auffassung als nicht genügend gewährleistet betrachten zu können.

Die Anschwellung der Wurzel oder beim *Radieschen* des Hypokotyls ist jedenfalls erst eine durch die Kultur erzeugte Eigenschaft. Immerhin scheint die Fähigkeit der Knollenbildung nicht auf diese unterirdischen Organe beschränkt zu sein, denn Goebel berichtet auch über gelegentliche oberirdische Knollenbildung beim *Radieschen*. Er entfernte im Herbst an einem 50 cm langen Sproß dessen Spitze, die eine Blütenanlage enthielt. Er sagt über die Folgen: „Es bildeten sich drei kräftige Seitensprosse aus, die an ihrer Basis zu außen lebhaft rot gefärbten Knollen anschwellen. Die eine Knolle hatte über 2 cm Durchmesser. Es waren hier oberirdische *Radieschen* (mehr als 30 cm über dem Boden) entstanden, offenbar in Verbindung damit, daß in der alternden Pflanze die Stoffleitung nach unten eine gehemmte war. Jeder der Seitensprosse verhielt sich deshalb ähnlich, wie wenn darunter eine Ringelung angebracht gewesen wäre, er verwandte also die in ihm gebildeten Assimilate (die Sprosse hatten kräftige Blätter gebildet) zur Anschwellung seiner eigenen Basis, während sonst nur das Hypokotyl zur *Radieschenknolle* anschwillt.“

Der Akerrettich ist auch unter dem Namen Hederich als eines der schlimmsten Unkräuter gefürchtet. Er wird als solches allerdings — wie erwähnt — häufig mit

Rettich (Fig. 1) und Hederich (Fig. 2). (Nach Thomas Flora.)

dem Ackersenf verwechselt, dem er auch in der Tat sehr ähnlich sieht. Die systematischen Unterschiede kümmern eben den Landmann wenig; er sieht in beiden Pflanzen in gleicher Weise nur einen höchst unwillkommenen Gast, der ihm die Früchte seiner Arbeit bedroht und zu seiner Fernhaltung einen gewaltigen Aufwand von Mühe und Sorgfalt erheischt. Die beiden Gederiche sind aber an ihren Blüten leicht zu unterscheiden. Beim Ackersenf sind die Blüten von leuchtend gelber Farbe und die Kelchblätter abstehend, so daß der Honig ziemlich frei daliegt; beim Ackerrettich sind die Blumenblätter hellgelb, seltener weiß gefärbt und mit dunkelgelben oder violetten Adern durchzogen, außerdem sind die Kelchblätter aufrecht und decken den Honig. Die perlschnurartige Einschnürung der Schoten ist beim Rettich viel auffälliger, und die Früchte, die beim Senf zu einem langen, oft kantigen Schnabel ausgezogen sind, lassen bei jenem kaum derartiges bemerken. Ohne Blüten und Früchte aber sind die beiden Pflanzen wirklich kaum zu unterscheiden, da beide ihre Blätter je nach den Beleuchtungsverhältnissen ziemlich wechselnd in Größe und Umriß entwickeln.

Der Gederich ist ein sehr hartnäckiger Eindringling, wenn er sich einmal eingenistet hat. Reichliche Samenbildung fördert seine Verbreitung, und die Reproduktionskraft der Wurzel, die, wenn sie im Boden steckenbleibt, immer wieder von neuem aus schlägt, ist unbeschreiblich. Wenn auch in den Schüttelwerken und Sieben der Dreschmaschine die meisten Samen des Gederichs von der Getreidesaat getrennt werden, so kommen doch immer noch genügende Mengen mit in das Feld, um im Verein mit den schon dort abgefallenen Samen jedes Jahr die reichlichste Unkrautvegetation vorzubereiten. Dazu haben die Samen eine große Keimfähigkeit, die sie auch in größeren Tiefen, wohin sie vor allem durch die Wühlarbeit der Regenwürmer gebracht werden, sehr wohl längere Zeit behalten. (Angeblich sogar 25 bis 100 Jahre lang, was wir jedoch bezweifeln.) Wird dann der Acker tief aufgepflügt, so kommen alle diese Samen wieder in höhere Lagen, wo ihnen genügend Luft zur Keimung zur Verfügung steht. Die Reinhaltung eines Ackers vom Gederich kostet dann mühsame Jätarbeit. Von der Entwicklung der Kultursaat hängt dabei auch manches ab. Ist der Boden genügend vorbereitet, locker geeggt und dadurch für Wasser und Luft gut zugänglich gemacht, dann kann die Saat das Kraut des Gederichs allerdings wenigstens zum großen Teile überholen und durch Licht- und Luftmangel ersticken; wenn aber heftige Regengüsse mit darauffolgendem austrocknendem Sonnenschein die Ackerkrume zusammenfließen und krustig erhärten lassen, dann bleibt die Saat zurück, und es beginnen die Festtage für den Gederich und seine Genossen, den Klatzmohn, die Kornblume, Disteln und Melken. Dann muß der Mensch im Schweiße seines Angesichts den Eindringlingen zu Leibe gehen.

Für die Unterscheidung des Ackersenfs, des „falschen“ und des Ackerrettichs, des „echten“ Gederichs nach der Form des Kelches, gibt Säurich übrigens ein gutes Merksprüchlein für die Schule, und das lautet: Senf senkt, Gederich hebt die Kelchblätter.

Der wichtigste Bestäuber des Ackerrettichs ist bei seinem durch den aufrechten Kelch verborgenen Honig die Biene, und auch bei *R. sativus* berichtet Johow über die in Amerika eingeführte Pflanze, daß sie von der Honigbiene besucht wird. Nach Meehan soll sie sich außerdem je nach den Ernährungsverhältnissen auto- oder allogam verhalten.

Das uns zunächst interessierende Schaumkraut (*Cardamine*) ist eine der wenigen Kreuziferengattungen, deren Verbreitung sich über beide Halbkugeln erstreckt. Sie umfaßt eine Fülle von Gestalten, oft schön, oft unscheinbar, aber meist schwer zu unterscheiden, weshalb es besonders zu schätzen ist, daß sie in neuester Zeit monographisch ausführlich durch Schulz behandelt wurde. Ihr bekanntester Vertreter ist *C. pratensis*, unser gewöhnliches Wiesenschaumkraut, das schon im ersten Frühling, von Ende März bis Mai, die nassen Wiesen in reichlicher Menge mit seinen weißen oder rosa-violett gefärbten Blüten schmückt. Den volkstümlichen Namen „Schaumkraut“ hat die Pflanze übrigens daher, daß die Schaumgirpe, ein Tier aus der Gruppe der Zikaden, ihre schaumige Eihülle mit Vorliebe an den Stengeln dieser Pflanze absetzt.

Die Gattung *Cardamine* bietet mancherlei biologisch Bemerkenswertes. So ist sie vor allem ein Musterbeispiel für akzessorische Sproßbildungen. Diese erhalten mitunter eine besondere Bedeutung dadurch, daß sie — wie Schulz in seiner Monographie sagt — „sich bei perennierenden Arten in Ableger verwandeln können. Häufig werden sie nämlich durch die eintretende kalte Witterung verhindert, Blüten zu erzeugen. Trotzdem gehen sie nicht verloren, da sie sich an ihrem Grunde, nachdem sich der Hauptstengel niedergelegt hat, festwurzeln und im nächsten Jahre neue Pflanzen zeitigen. Bei den Arten, welche exquisit zu vegetativer Vermehrung neigen, z. B. bei *C. amara*, *lyrata*, *prorepens*, *tenera*, kommen selbst aus den obersten Stengelblättern lange Sprosse, welche sich bogig abwärts krümmen und den Erdboden zu erreichen suchen. Während sie aus ihren Blattachseln Wurzeln und häufig wiederum Stolonen treiben, drängen sie nach der Spitze zu die Blätter zusammen, um sich in der folgenden Periode aufs neue zu verlängern und zu blühen. Derartige Triebe werden bis 40 cm lang. Ja, es ist bei diesen Pflanzen keine seltene Erscheinung, daß sich die Spindel der Blütentraube am Ende verbreitert und sich zum wurzeltragenden, beblätterten Ausläufer umbildet. Zu dieser Sprossung neigt besonders die nordamerikanische *C. rotundifolia*.“

Besondere akzessorische Sprosse in Gestalt von Adventivknospen auf den Blättern bilden *C. californica*, *hirsuta*, *impatiens*, *macrophylla*, *pratensis* (häufig), *raphanifolia*, *uliginosa*. „Sie entstehen exogon aus den Epidermiszellen. Auf der Oberseite des Endblättchens findet sich in der Achsel, welche durch die Gabelung zweier Gefäßbündel gebildet wird, ein Höckerchen. Aus ihm entwickelt sich, sobald die Blätter der Pflanze mit dem nackten Erdbreich in Berührung kommen, ein neues Pflänzchen, welches Wurzeln treibt und in seinem Aufbau völlig mit der Keimpflanze übereinstimmt. Nach der Verwitterung des Mutterblattes vegetiert es weiter, gleich als ob es aus Samen hervorgegangen sei. Manchmal treten mehrere Rosetten auf einer Blattfläche auf.“ Goebel berichtet hiezu in seiner experimentellen Morphologie, daß man das gleiche Verhalten an feucht gehaltenen Exemplaren auch künstlich hervorrufen kann; doch gelinge dies nicht an beliebig feucht gehaltenen Pflanzen, sondern nur an solchen, deren Blätter durch die Bedingungen, denen sie vorher ausgesetzt waren, reich sind an organischen, zur Sproßbildung geeigneten Substanzen. So ist z. B. anzunehmen, daß bei etiolierten Exemplaren, auch wenn man sie noch so feucht hält, keine Entwicklung von Adventivsprossen eintreten wird. Von Interesse sind hierzu übrigens auch die Angaben von Niehm, daß an der Basis der Fiederblättchen ein Komplex embryonaler Zellen vorhanden sei. Die übrigen Adventivknospen entstehen aus „Dauergewebe“, das aber eine

ganz bestimmte Lage hat, meist an den Gabelungstellen der Nerven, seltener über einem einfachen Nerv. Niehm beobachtete aber an einer im Gewächshause kultivierten Pflanze, daß hier auch über den Nervenverzweigungsstellen die Zellgruppe ihren embryonalen Charakter behalten hatte, — „ein Beweis dafür“, — wie Goebel beifügt, „wie wenig scharf die Abgrenzung von ‚embryonalem‘ und Dauergewebe ist; sie läßt sich wahrscheinlich auch durch die Bedingungen, unter denen die Blätter sich entwickeln, beeinflussen.“

Hinsichtlich der Bestäubung hat nach Schulz für die Gattung als Regel zu gelten, daß sie die Fremdbestäubung vorzieht, trotzdem die Stellung der wesentlichen Organe die Selbstbestäubung ermöglichen würde. Für *C. pratensis* hat sich nach den Versuchen von Hildebrand sogar herausgestellt, daß diese Pflanze, mit dem Pollen der eigenen Blüte oder auch nur einer anderen desselben Individuums bestäubt, völlig steril blieb, hingegen, mit dem Pollen eines anderen Individuums belegt, reichlich fruchtete. Um eine Selbstbestäubung zu vermeiden, wenden sich hier die Beutel der längeren Staubgefäße bei schönem Wetter sogar aktiv von der Narbe ab. Zur Anlockung der Honigfreunde dienen bei einigen Arten die purpurnen Antheren und der angenehme Geruch der großen Blüten. Bei den einjährigen Arten ist Autogamie übrigens für die Erhaltung der Art oft notwendig.

Durch das Aufspringen der Früchte erfolgt, wie Hildebrand berichtet, ein beträchtliches Hinwegschleudern der Samen; die Schleimschicht um den Samen ist beim Öffnen der Frucht noch etwas feucht, weshalb der Same stets ein wenig an den Klappen haftet und bei deren schnellem, uhrfederartigem Aufrollen leicht von den Nabelsträngen losgerissen wird. Bei *C. chenopodiifolia*, die in Südamerika verbreitet ist, umgibt die Schleimschicht den Samen im trockenen Zustande als ein dünnhäutiger Flügelsaum und macht sie dadurch zur Windverbreitung geeignet.

Manche Arten zeichnen sich übrigens auch durch kleistogame Blüten aus. Wir lesen darüber bei Schulz folgendes: Sobald die Keimpflanze die ersten drei Laubblätter, die dem Erdboden fest anliegen, produziert hat, kommt in der Achsel zwischen dem vierten Laubblatt und dem Hauptsproß eine Nebenachse, die sich sofort nach unten krümmt, in senkrechter Richtung in das Erdreich eindringt und mit einer unterirdischen Blüte abschließt. Aus den Achseln der folgenden Rosettenblätter werden ebenfalls geophile, nackte Achsen ausgesandt, so daß von ihnen im ganzen etwa 6—10 vorhanden sind. Diese Sprosse sind 1—3 cm lang, ohne Blattgrün an der Spitze ein wenig verdickt und grünlich gefärbt. Eine genaue Untersuchung dieser Anschwellung (die etwa 3 bis 4 mm im Durchmesser mißt) läßt eine sehr winzige, 0,5—1 mm lange unterirdische Blüte erkennen, in der vier Kelchblätter vorhanden sind. Diese Blüte ist dauernd geschlossen und enthält zwei Staubgefäße, deren sehr kleine, grünlich-gelbe Antheren der Narbe anliegen; sie enthalten in jedem Fache ungefähr 10 Pollenkörner. Nach Drude treiben diese ihren Schlauch (ohne daß die Antheren aufspringen!) durch deren Wandung hindurch in die Narbe. Nach der Befruchtung öffnet dann die rasch heranwachsende Frucht die Blüte und erscheint als ein weißes, etwas fleischiges, glänzendes Schötchen von 6—8 mm Länge und 3—3,5 mm Breite, dessen Samen im Gegensatz zu den oberirdisch entwickelten fast oder ganz flügellos sind. Diese unterirdischen Samen sind schon reif, wenn die oberirdischen Stengel erst zu blühen beginnen. Darauf und auf den Umstand, daß die Stiele dieser unterirdischen Früchte sehr leicht abreißen und die

Frucht im Boden zurücklassen, wenn die oberirdischen Teile der Pflanze abgehoben werden, gründet Schulz seine Auffassung, daß in dieser Einrichtung ein Erhaltungsschutz der Pflanze zu sehen sei gegen die Vernichtung durch Weidetiere, von denen die Pflanze sehr geschätzt sei. Andere Forscher, so Grisebach und später Lindmann, hatten darin eine Schutzmaßregel gegen rauhe klimatische Verhältnisse erblicken wollen; aber Schulz weist mit Recht darauf hin, daß alle *Cardamine*-Arten ein kaltes Klima lieben, und daß *C. chenopodiifolia*, bei der sich diese Verhältnisse finden, in ihrer Heimat im Winter blühe.

Die Gattung *Dentaria*, die gewöhnliche Zahnwurz, wird von Schulz mangels zureichender systematischer Charaktere bloß als Sektion der vorigen Gattung betrachtet. Die meisten Botaniker behandeln sie aber der weitgehenden habituellen Verschiedenheiten wegen als besondere Gattung, als deren bekannteste Arten *D. digitata*, *enneaphylla* und *bulbifera* gelten. Sie alle sind ausgezeichnet durch ein mehr oder weniger mächtiges unterirdisches Rhizom mit fleischigen Schuppenblättern, die Reservestoffe speichern und durch Verkümmern der Blattspitze und Verbreiterung der Stiele entstehen. Die *Dentaria*-Arten sind durch unterirdische Keimung ausgezeichnet; sie senden auch keine Hauptwurzel aus, und die ersten Blätter sind oft nur Niederblätter. Auch zur Bildung eines blühenden Sprosses kommt es im günstigsten Falle erst während der dritten Vegetationsperiode. *D. bulbifera* ist in der Schule ein Lieblingsbeispiel für Brutknospen-(Bulbillen-)bildung, da sich solche an den Pflanzen „akzessorische Sprosse“ in den Achseln der Blätter stets finden als kugelige, aus Niederblättern zusammengesetzte Gebilde. Sie fallen überaus leicht ab und wachsen im Frühjahr

Monardelle (*Lunaria annua*). (Originalaufnahme von G. Dopfer-München.)

ohne weiteres zu einem neuen Wurzelstock aus. Diese Bulbillenentwicklung soll mit dem im Waldschatten häufigen Unterbleiben der Befruchtung in Wechselbeziehung stehen; andererseits gibt aber Hildebrandt an, und Schulz bestätigt es, wenn auch mit einiger Einschränkung, daß der Fall gerade umgekehrt gelagert sei, weil mit Rücksicht auf die reichliche vegetative Vermehrung die Staubblätter verkümmern und so die Pflanze gleichsam freiwillig auf die Bestäubung verzichte. Bei den übrigen Arten der Zahnwurz stimmt die Blütenbiologie im allgemeinen mit der des Schaumkrautes überein. Nur über *D. laciniata*, die sonst am meisten an *C. pratensis* erinnert, berichtet Knuth, daß ein Unterschied zwischen der Ausbildung der Honigdrüsen am Grunde der langen und kurzen Staubfäden nicht bestehe, weshalb die als Safthalter dienende Ausfackung der Kelchblätter bei allen vieren gleich ausgebildet sei.

Als Zierpflanzen werden in Gärten vielfach die beiden Arten von *Lunaria*, unserer Mondviole (s. Bild), gezogen. Diese so schön benannte Gattung ist besonders bemerkenswert durch ihre großen, flachgedrückten Schötchen. Nach dem Abfallen der Klappen bleibt in diesen die Scheidewand bestehen, und diese dünnen, pergamentartig durchscheinenden Häutchen mit ihrem Silberglanze haben der Pflanze den Namen „Silberblatt“ (auch Silberscheide) verschafft. Und in der Tat bilden die Fruchts tiele, in größerer Zahl zu einem Trockenstrauch vereint, einen reizenden und originellen Zimmerschmuck. Von den beiden bei uns vorkommenden Arten ist *L. rediviva* mit spizigeren Früchten eine Bewohnerin der mittel- und süddeutschen Bergwälder, während *L. biennis* mit stumpferen Schötchen nur in Süddeutschland wild vorkommt.

Wem wäre nicht aus der Kindheit das Hirtentäschel in Erinnerung! Gibt es doch kein gewöhnlicheres Unkraut als dieses zierliche Pflänzchen, das je nach den Boden- und Ernährungsverhältnissen von kümmerlichstem Zwangwuchs bis zu üppiger Entfaltung gelangt. Der deutsche Name stammt von der eigentümlichen Schötchenform und ist nichts als die Übersetzung des lateinischen *Capsella bursa pastoris*. Oft findet man, zuweilen auf größere Strecken, die Stengel, namentlich in der Blütenregion, wie mit Kalkmilch bespritzt. Dies gehört nicht zum Wesen der Pflanze, sondern ist nichts anderes als die nach Absprengen der Epidermis frei liegenden Sporenlager des Pilzes *Cystopus candidus*, der übrigens auch andere Kreuziferen befällt und meist eine Deformation der befallenen Teile, namentlich der Früchte und Blüten, bewirkt.

Cheiranthus, der Goldlack, und Matthiola, die Levkoje, sind allbekannte, beliebte Zierpflanzen, denen die großen, oft gefüllten, verschieden gefärbten Blüten zu Gartenrechten verholfen haben. Die Gattung *Cheiranthus* wird übrigens von Wettstein neuerdings mit der Gattung *Erysimum* vereinigt, nachdem ein Bastard zwischen *Cheiranthus Cheiri*, dem gewöhnlich kultivierten Goldlack, und *Erysimum odoratum* beobachtet wurde. Die *Cheiranthus*-Arten sind jedoch eigentlich keine Bürger der deutschen Flora, sondern gehören dem Mittelmeergebiete an. Auf ihre besonders charakteristischen Feilhaare haben wir schon an früherer Stelle hingewiesen. Von den Levkojenarten dürfte die Winter-Levkoje (*Matthiola incana*) die Stammart und die einjährige Sommer-Levkoje (*M. annua*), die gleich der ersteren in vielen hundert Farbenvarietäten unsere Gärten schmückt, nur als eine ihrer Abarten zu betrachten sein.

Ähnlich wie *Cheiranthus* und *Matthiola*, wird die Nachtviole (*Hesperis*) in zwei Arten (*H. matronalis* mit roten, lila oder weißen Blüten und *H. tristis* mit schmutziggelben, rot geränderten Blütenblättern) als Gartenblume ihres veilchenartigen Geruches wegen kultiviert. Diese schönen Blumen strömen ihren Geruch erst abends aus, sie sind also Nachtblüher, was über ihre Blütenbiologie zur Genüge belehrt. Auch sie stammen aus dem östlichen Mittelmeergebiet, doch findet sich *H. matronalis* auch in Süd- und Mitteleuropa häufig als Gartenflüchtling.

Die Gattung *Draba* hingegen bevölkert in etwa 150 Arten die Gebirge fast aller Gebiete und ist besonders boreal und arktisch. Ihr deutscher Name Hungerblümchen ist sehr treffend, denn diese kleinen Pflänzchen leisten Erstaunliches an Anspruchslosigkeit und nehmen wirklich selbst mit dem „hungrigsten“ Boden vorlieb. Am bekanntesten ist aus dieser Reihe das Frühlings-Hungerblümchen (*Draba verna* [*Erophila verna*] nach De Candolle), das gleich nach der Schneeschmelze aus der winzigen Rosette seine zarten Stengel mit den überaus kleinen, weißen Blüten entfaltet und seine Früchte und Samen schon längst gereift hat, wenn der Sommer mit seiner gefährlichen Trockenheit kommt. Das zarte Ding übersät oft selbst die trockensten und sonnigsten Felsen, es überzieht Sandhügel und Felder, und was ihm an Auffälligkeit im einzelnen mangelt, ersetzt es durch seine Massenwirkung. Meekhan schreibt von *Draba verna*, daß sie ihre Blüten unter Sonnenschein etwa gegen 9 Uhr morgens öffne und bereits ungefähr um 2 Uhr nachmittags schließe. Bei bewölktem Himmel sollen die Blüten überhaupt meist geschlossen bleiben. Die Pflanze wurde von Coville während des Winters kleistogam blühend gefunden, erstreckt ihre Anspruchslosigkeit also sogar auf das Sexualgebiet.

Goldlack (*Cheiranthus Cheiri*).
(Naturaufnahme von G. Dopfer-München.)

Im Hochgebirge spielen die *Draba*-Arten eine große Rolle in der Felsflora. Auch hier bewahrheiten sie ihren volkstümlichen Namen, denn auch im Gebirge sehen

sie kümmerlich wie hungrig aus. Mit vereinzelt oder gehäuften Zwergrosetten kleben sie am Gestein und entfalten auf niederen Schäften die gelben oder weißen Blüten. Ihr Honig wird hier besonders von Fliegen genascht; doch können sich alle *Draba*-Arten auch selbst beistäuben. Durch ihre Kleinheit sind die Samen der Windverbreitung angepasst. Die gelbblühende *D. aizoides* mit starren, borstlich gewimperten, sonst aber fahlen Rosettenblättern ist, wie viele Felsenpflanzen, gegen Höhenunterschiede wenig empfindlich und geht, allerdings in leicht abändernden Formen, von der Ebene bis in

Nachtviole (*Hesperis matronalis*) im Münchener botanischen Garten. (Original von G. Dopfer-München.)

die Schneegebiete, liebt aber doch am meisten die eigentliche Alpenregion. Sie gehört aber gleichzeitig mit *Hutchinsia alpina* und *Petrocallis* zu den typischen „nivalen und subnivalen Gratpflanzen“ der Kalkgebirge. Nur in den Zentralketten der Alpen, also auf Urgestein, haust dagegen *Draba Hoppeana*. Von den weißblühenden alpinen *Draba*-Arten ist wieder *D. tomentosa* mit ihren filzigen, von schönen Sternhaaren bedeckten Blättern die häufigste, aber wieder nur auf Kalk, auf dessen Felsen sie oft ansehnliche Polster bildet.

Höchst artenreich (über 100) ist auch die Gattung *Arabis*, unsere Gänsekresse, die vorzugsweise in den nördlichen Gebieten und in den Mittelmeerländern gedeiht. Auch diese Gattung stellt zahlreiche alpine Arten, die zum Teil, so *A. alpina*, zu den Schuttpflanzen (Schuttüberkriecher nach Schröter), zum Teil (*A. coerulea* und *pumila*) zu den Rosetten- Felsenpflanzen gehören.

Eine lieblich weiß und violett blühende Art (*A. verna*), die z. B. in Süddeutschland (um Stuttgart) allenthalben die Weingärten schon im Februar und März schmückt, gehört zu unseren frühesten Gartenzierden.

Ihres Artenreichtums wegen sei auch die gleichfalls 100gestaltige Gattung *Alyssum*, das Steinkraut, erwähnt. Verbreitet ist das gelbblühende *A. montanum*, das zu der Formation der „sonnigen Hügel“ gehört und seine Blüten entfaltet, sobald nur die ersten warmen Sonnenstrahlen den Beginn des Frühlings ankündigen.

Wir dürfen von den Kreuzblütlern nicht scheiden, ohne eines ihrer berühmtesten Vertreter zu gedenken, nämlich der Zerichorose (*Anastatica Hierochuntica*), von der schon Gilg sagte, daß sie ihren Namen in zweifacher Weise zu Unrecht trage; denn erstens

sei sie keine
Rose und
zweitens
wachse sie
nicht bei

Zericho.
Aber wenigstens ist sie doch in jenem Lande zu Hause, nämlich in den Wüsten von Ägypten bis zum Roten Meere und Arabien. Zur

Arabis pumila aus den bayrischen Boralpen. (Naturaufnahme von G. Dopfer-München.)

Fruchtzeit verholzt die Pflanze, und die Zweige des Fruchtstandes zeichnen sich dann durch große „Hygrokopizität“ (Neigung zum Aufsaugen der Luftfeuchtigkeit) aus; da nun die Wasseraufnahme und -Abgabe an der Ober- und Unterseite der Zweige ungleich ist, führen diese dabei Bewegungen aus, die natürlich nur physikalisch bedingte, also rein mechanische sind. Die trockenen Zweige schließen sich zu einem mehr oder minder kugelförmigen Ballen; dieser wird häufig von den Wüstenstürmen losgerissen und weit über die Ebenen getrieben. Dabei stoßen sich die an den Zweigen haftenden nierenförmigen Schötchen los, wodurch die Pflanze ausgiebig verbreitet wird. Am Standorte selbst schützt die im trockenen Zustande geschlossene Traube die Früchte. Beim ersten Wüstenregen öffnet sie sich dann, und die benehten Samen keimen. Die Sage, nach der diese Pflanze, in der Weihnacht ins Wasser gebracht, „aufblühe“, hat also einen richtigen Kern; nur handelt es sich nicht um ein Aufblühen, und auch das Wunderbare daran verflüchtigt sich; denn es muß nicht gerade die Weihnacht sein, sondern die Erscheinung kann natürlich jederzeit hervorgerufen werden. Sie ist an sich nicht einmal eine besondere Lebenserscheinung, sondern nur ein einfaches physikalisches Experiment.

Anhangsweise möchte ich hier einiges auch über die in die gleiche Reihe gehörige Familie der *Capparidaceae* sagen. Die Angehörigen dieser Pflanzengruppe gehören allerdings fast ausschließlich den tropischen und außertropischen Regionen an; aber eine Pflanze davon, nämlich der Kapernstrauch, *Capparis spinosa*, reicht als eine sehr formenreiche Art bis in unser Florengebiet heran und wird um das Mittelmeer bereits kultiviert. Er ist jedermann bekannt, denn die Kapern (Kappern), als namentlich in der österreichischen Küche vielfach gebrauchtes Gewürz, sind nichts anderes als die unreifen, in Essig eingelegten Blütenknospen dieser Pflanze. Auf die Verfälschung dieses Handelsproduktes durch die jungen Blütenknospen von *Caltha palustris* haben wir übrigens bereits hingewiesen. Die Vertreter der Kapernfamilie sind gewöhnlich Kräuter oder Sträucher mit einfachen oder fingerig zusammengesetzten Blättern. Die strauchartigen unter ihnen sind dabei nicht selten kletternd, wobei die häufig gekrümmten Nebenblätter als Kletterorgane fungieren. Diese Formen gehören demnach zu dem biologischen Typus der „Hakenkletterer“. Bei einzelnen, trockenen Klimaten angehörigen Formen zeigt sich ferner weitgehende Verkümmern der Blätter, die bei *Capparis decidua* den höchsten Grad erreicht. Diese Pflanze bildet nur noch rutenförmige Zweige, an denen die Nebenblätter als Dornen entwickelt sind, während die Blätter, an sich schon höchst unscheinbar, bereits vor der Blütezeit abfallen.

Wie nahe die Familie den Kreuziferen steht, sieht man daraus, daß sich ihre Blüte von demselben Typus ableiten läßt, wie die der Kreuzblütler. Nur erweisen sie sich in ihren Blütenbildungen phylogenetisch vorgeschrittener, was schon aus der großen Veränderlichkeit der Blüte gegenüber der großen Einförmigkeit des Blütenbaues bei den Kreuziferen hervorgeht. Neben strahligem Bau (Aktinomorphie) kommt in der Regel auch mehr oder weniger ausgeprägte Zygomorphie der Blüten vor. Ferner gibt es Schwankungen in der Zahl der Blütenteile, namentlich bei den Staubblättern. Zwei äußere und zwei innere Staubblätter sind nur bei einigen wenigen Formen vorhanden, viel häufiger tritt der reine Kreuziferentypus mit 24 Staubgefäßen auf. Dann folgen zwei weitere Typen; bei dem einen bleiben die „transversalen“ Staubblätter noch einfach, die „medianen“ dagegen sind in verschiedener Weise weiter gespalten, während beim zweiten Typus alle Staubblätter gespalten sind, wodurch die Zahl der Staubgefäße sehr bedeutend werden kann. Die Fruchtblätter sind vorwiegend in Zweizahl vorhanden, erreichen aber bei manchen Arten auch höhere Zahlen (10—12). Bemerkenswert sind hier die Bildungen, welche die Blütenachse erzeugt. Diese verlängert sich häufig zwischen den Staubblättern und dem Fruchtknoten zu einem mehr oder weniger, oft aber auffällig langen „Träger“ des Fruchtknotens, einem sog. Gynophor, wodurch der Fruchtknoten in manchen Fällen weit aus den Staubgefäßen herausgehoben wird. Mitunter werden durch diese Verlängerung der Blütenachse auch die Staubgefäße mit emporgehoben, und man spricht dann von einem „Androgynophor“. Andererseits erzeugt die Achse auch häufig mehr oder minder ausgeprägte „Discus-Bildungen“, die als ringförmige Wülste, Schuppen oder röhrenförmige Gebilde meist zwischen Kronblättern und Staubgefäßen liegen. Eine Erklärung für diese Erscheinungen vermögen wir bislang jedoch nicht zu geben, sondern können sie nur im Interesse der Systematik in dem Sinne deuten, daß die Kaparideen durch die Stellung der Kronblätter, durch die Beschaffenheit des Androeums und durch den Samenbau ihre nahe Verwandtschaft mit

den Kreuziferen erweisen, durch diese Diskusbildungen sowie das Gynophor jedoch auch engere Beziehungen zu den Resedazeen erlauben.

In anatomischer Beziehung zeigt unsere Familie auch manches Bemerkenswerte, wenn auch einheitliche Strukturverhältnisse, welche die ganze Familie auszeichnen, allerdings nur in geringer Zahl vorhanden sind. Als solche wären zu nennen sowohl einfache Durchbrechungen der Holzgefäße wie einfache Tüpfelung des Holzprosenchyms. Die Epidermiszellen, welche die Spaltöffnungen umgeben, sind am ausgewachsenen Blatt nicht besonders gekennzeichnet, nach Besque soll aber doch auch hier ein besonderer Entstehungstypus vorhanden sein, der nur am ausgebildeten Blatt verwischt ist. Oxalsaurer Kalk tritt sehr selten in Form der gewöhnlichen großen Einzelkristalle auf, sondern meist nur in der Form von Drüsen oder kleinen prismatischen Kristallen. Bei einigen Gattungen (darunter *Capparis*) sind Myrosinzellen bekannt, die von Heinricher entdeckt wurden und deswegen erwähnenswert sind, da durch sie auch in anatomischer Beziehung die große Verwandtschaft zu den Kreuziferen bezeugt wird. Milchsaftgefäße fehlen hier natürlich, ebenso wie bei letzteren. Eine weitere Beziehung zu den Kreuzblütlern liegt auch in dem Vorkommen von zweiarmligen und verzweigten einzelligen Haaren. Schuppenförmige Schildhaare sind, soweit sie vorkommen (also nicht bei allen Gattungen und Arten), kennzeichnend für die Erkennung der betreffenden Formen als Familienangehörige. Nach Nadtsofer besitzen nämlich diese „Schülferhaare“ allgemein die charakteristische Eigentümlichkeit, daß sie eine Verdoppelung aufweisen; oberhalb der eigentlichen Schuppe ist noch eine besondere oberflächliche Zellschicht vorhanden, die selbst wieder ein kleines, dem eigentlichen Schülferchen aufsitzendes Schüppchen darstellt.

Wir sehen hier also eine im inneren Bau äußerst mannigfaltige Pflanzengruppe vor uns, auf die sich die Aufmerksamkeit jener lenken sollte, die mit Neigung zur Pflanzenanatomie sich nach günstigen Gegenständen für ihre Liebhaberei umsehen. Hier wäre noch manches zu forschen und zu klären.

Die Reseden.

Wir haben mit dem Obigen zugleich den Beweis erbracht, daß sich an diese Gruppe unmittelbar die Familie der Resedazeen anschließt. Diese Familie, die außer der über 50 Arten zählenden Gattung *Reseda* noch fünf andere, meist außereuropäische Gattungen umfaßt, stellt die Charakterpflanzen an den Küsten des blauen Mittelmeeres mit einer geradezu „größeren Anhäufung der Arten“, sowohl in Spanien und Nordwestafrika als auch in Ägypten, den Gegenden des Roten Meeres und in Palästina bis Persien. Überall sind dort die Resedazeen vorzugsweise Bewohner niederer, trockener, sandiger und warmer Gegenden. Für den Blütenbau und die Biologie der einzigen, auch bei uns einheimischen Gattung mag zunächst die allbekannte wohlriechende *Reseda* (*Reseda odorata*) als Beispiel dienen. An ihren niederliegenden, aber stets aufstrebenden und oft auch aufrechten, ästigen und häufig sogar holzigen Stengeln sitzen die Blätter, fast stiellos, eilanzettlich, die unteren ungeteilt, die oberen oft dreispaltig.

An den Enden des Hauptstengels und auch der Äste entwickelt sich die lange Blüten-
traube mit ihren zahlreichen Blüten, die an der Spitze der Traube im jugendlichen
Zustande sehr dicht gedrängt stehen. Später, d. h. in den tieferen, älteren Teilen,
wird diese Traube durch Streckung der Blütenstiele allerdings ziemlich locker. Alle

Reseda odorata. (Original von S. Dopfer-München.)

Nefeden blühen be-
kanntlich sehr lange,
und da die Kapseln
ebensolange grün und
am Stengel stehen-
bleiben, trägt die
Blütenstandachse im
unteren Teile meist
schon zahlreiche heran-
reifende Kapseln, wäh-
rend an der Spitze
immer noch neue
Blüten zur Entfaltung
kommen. Die Blüten
selbst sind bei der
Nefeda zwar recht un-
scheinbar, doch was
ihnen an Auffälligkeit
mangelt, ersetzen sie
durch überaus ange-
nehmen und weit-
reichenden Duft. Die
Blütenhülle besteht
zunächst aus sechs un-
scheinbaren Kelch-
blättern von gelblich-
grüner Farbe, dann
aus ebenso vielen
gleichgefärbten Kron-
blättern von un-
gewöhnlicher Gestalt,
denn sie lassen in der
Regel einen unteren
schuppenartigen Teil

(eine Art „Nagel“) und eine obere Platte unterscheiden, die letztere ist mehr oder weniger
tief, häufig bis zum Grunde herab in zahlreiche, feurig verdickte Strahlen zerschlitt.
Durch diese ungleiche Ausbildung der pinselförmigen Blumenblätter wird natürlich
Zygomorphie der Blüte bewirkt; die oberen Blumenblätter sind stets stärker entwickelt,
sowohl in ihrer Gesamtgröße als auch in ihrem Reichtum an Abschnitten. Diese För-
derung der Oberseite erstreckt sich häufig auch noch auf die seitlich stehenden Blumen-

Blätter in der Art, daß an diesen wieder eine Bevorzugung der nach oben gerichteten Seite zu erkennen ist. Diese mittleren und vor allem die oberen Kronblätter haben dabei einen erweiterten Nagel, mit dem sie die hintere glatte Fläche des viereckigen, fleischigen Blütenbodens überwölben. Hierdurch erreichen sie den durch alle diese Besonderheiten angestrebten biologischen Zweck: sie schützen den Honig, der an dieser Stelle reichlich ausgeschieden wird, sowohl vor Wasser als auch vor unberufenen Gästen. Das Nektarium, das diesen Honig liefert, ist übrigens nur eine wulstige Diskusbildung des Blütenbodens, die an der offenen Vorderseite der Blüte nur sehr schwach, an der eben genannten bedeckten Rückseite aber ansehnlich entwickelt ist. Auch diese Ungleichheit in der Diskusbildung erhöht noch die Zygomorphie der ganzen Blüte, die übrigens äußerlich noch gesteigert wird durch die am äußeren Rande des Blütenbodens befestigten Staubgefäße, die häufig etwas nach unten gedrängt erscheinen. Diese Staubgefäße sind in größerer Zahl vorhanden (10—20) und mit ihren weißen Staubfäden und braunroten Staubbeuteln recht auffällig. Solange sie geschlossen sind, hängen sie mit schlaffen Beuteln herab, aber während des Aufspringens richten sie sich aus inneren Ursachen, den Fruchtknoten überragend, auf und bieten so den anfliegenden Insekten den Pollen dar. Diese Aufrichtung ist zugleich das Zeichen des „Ausblühens“, denn hier liegen die Blütenteile schon im Anospenzustande offen. Und wie merkwürdig: gerade im Augenblick des Aufspringens und Aufrichtens der Antheren beginnt auch die Honigabsonderung! Der Geruch lockt die Insekten schon aus großer Entfernung an; in der Nähe wirkt dann die Blüte durch den Kontrast der mehr weißlichen Zipfel der Blumenblätter und der braunroten Staubbeutel immerhin auffällig genug für die als Besucher hauptsächlich in Betracht kommenden, kurzrüsseligen Bienen, die an dem aus der Mitte der Blüte hervorstrebenden Fruchtknoten einen bequemen Anflugspunkt finden. Indem sie teils den Pollen aus den geöffneten und nach innen gewendeten Staubbeuteln nehmen, teils durch Beiseitedrücken der Kronblätter den Honig gewinnen, drehen sie sich im Kreise um den Fruchtknoten und vermitteln dadurch ausgiebig die der Blüte günstige Fremdbestäubung. Der aus drei Fruchtblättern gebildete Fruchtknoten ist insofern bemerkenswert, als es hier zu keiner vollständigen Schließung der Fruchtknotenhöhle kommt, sondern diese vielmehr an der Spitze offen bleibt. Dementsprechend finden sich die Narben, die sich zur Zeit des Aufspringens der Antheren zu entwickeln beginnen, über den Samenträgern, wodurch sie bei den geschilderten Bewegungen der Bestäuber leicht mit Pollen beladen werden können. Infolge der Aufrichtung der Staubbeutel und deren überragender Stellung tritt aber auch leicht Selbstbestäubung ein, die von manchen Autoren als wirksam, von anderen allerdings als vergeblich bezeichnet wird. Die aus dem Fruchtknoten sich entwickelnden Früchte sind Kapselfrüchte, die zuletzt eine hängende Stellung einnehmen und auf solche Weise die kleinen Samen leicht austreuen.

Die wohlriechende Reseda, deren Namen von *resedare* — beruhigen abgeleitet wird, kommt wohl ab und zu am Rhein und in Österreich als Gartenslüchtling verwildert vor, ist aber in ursprünglich wildem Zustande nicht bekannt. Ihre Herkunft ist unsicher; als wahrscheinliche Heimat wird Nordafrika angesehen, doch läßt sich nichts Bestimmtes sagen, da nicht einmal mehr die Stammpflanze festgestellt werden konnte. Zippel und Bollmann geben an, daß die Pflanze seit der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zuerst in Frankreich als Zierpflanze kultiviert wird. Gegenwärtig sind

namentlich die Gärtner von Gent und Lüttich wegen ihrer Reseden berühmt, die sie im Winter züchten. Durch eine Mischung von Kuhmist und Kalk sollen sie es erreichen, daß die Pflanze bei ihnen zu einer Pyramide von zwei Metern emporsteigt. Zugleich läßt sie sich in die verschiedensten Formen bringen, so daß man in Gent Girandolen, Kugeln und hohe Bäumchen der prächtig duftenden Reseda sieht.

Von einheimischen Reseda-Arten wäre auch die gelbe Reseda (*R. lutea*) zu erwähnen, die an Wegen, auf Schutt und steinigten Hügeln zerstreut vorkommt und manchmal eine Höhe bis zu einem halben Meter erreicht. Sie blüht grünlich-blaßgelb und unterscheidet sich von der vorigen leicht dadurch, daß ihre Blätter doppelt fiederspaltig oder auch dreispaltig sind; ihr Kelch ist allerdings sechszählig, wie bei der wohlriechenden Reseda. Hierher gehört auch die Färber-Reseda oder der Färber-Wau (*Reseda luteola*), der 1,2—11,4 m Höhe erreicht. Diese Art besitzt im Gegensatz zu den vorgenannten Arten einen bloß vierzähligen Kelch, der dadurch zustande kommt, daß ein Kelchblatt des normalerweise sechsblättrigen Kelches unterdrückt ist, während die beiden hinteren Blätter miteinander verwachsen. Diese Reseda enthält in allen ihren Teilen einen gelben Farbstoff (Waugelb, Luteolin), der als Extraktivstoff färbende Eigenschaften besitzt und deshalb von Landleuten zum Gelbfärben benützt wird. Deshalb wird die Pflanze in Thüringen, Sachsen, namentlich aber auch in Holland und England angebaut. Vom Weidevieh soll sie gemieden werden. In Südtirol findet sich übrigens auch noch eine weißblütige Reseda (*R. alba*) mit fünfblättrigem Kelch und Krone.

Die Sonnentau-Arten.

Im II. Bande dieses Werkes sind meine Leser bereits mit der biologisch hochinteressanten Pflanzengruppe bekannt geworden, die man als Karnivoren oder fleischverdauende (besser als „insektenfressende“) Pflanzen bezeichnet. Meine der natürlichen Verwandtschaft als Leitfaden folgende Besprechung der Familien legt mir nun die ausführlichere Schilderung einer solchen Gesellschaft „animalisch“ lebender Gewächse, nämlich der Familie der Sonnentau-Gewächse (*Droseraceae*), auf.

Drosera, *Drosophyllum*, *Aldrovanda* und *Dionaea* sind die allbekannten Hauptvertreter dieses Verwandtschaftskreises. Sie besitzen alle eine Reihe der merkwürdigsten Anpassungen, deren Entstehungsgeschichte für uns zwar größtenteils im dunkeln liegt, die wir aber dennoch bereits recht wohl in Zusammenhang mit den besonderen Lebensbedingungen dieser Gewächse bringen und als aus dem „Zwange der Not“ hervorgegangen betrachten können. Im Vordergrund des Interesses stehen unter all diesen Einrichtungen natürlich die, durch welche die Sonnentaupflanzen Tiere fangen. Bei all ihren Formen sind es die Blätter, denen diese Aufgabe zukommt, doch sind auch innerhalb der Familie der *Droseraceen* diese Einrichtungen nicht immer die gleichen. Immerhin kommen für den Tierfang stets drei Faktoren in Betracht, nämlich: Einrichtungen zur Anlockung, zur Festhaltung und zur Tötung, bzw. Verdauung. Aber schon die Anlockungsmittel der Blätter sind sehr verschieden. Bei manchen *Drosera*- und *Dionaea*-Arten machen die rotgefärbten

Drüsen das Blatt den Tieren sichtbar; bei anderen Droseren und *Drosophyllum* wirken die im Sonnenlichte glitzernden Schleimtröpfchen an den Drüsen im gleichen Sinne, und wahrscheinlich unterstützt bei *Drosophyllum* auch der starke Honigduft der Pflanze die Anlockungsfähigkeit; bei *Aldrovanda* dürfte wahrscheinlich Schleim das Anlockungsmittel sein. Sehr verschieden ist dann die Art und Weise der Festhaltung der angelockten Tiere. An den Blättern von *Drosera* und *Drosophyllum* bleiben die Opfer wie an Leimspindeln kleben und verstricken sich nur um so fester, je mehr sie sich bemühen, von ihnen loszukommen; bei *Aldrovanda* und *Dionaea* fehlt diese Klebevorrichtung, dafür sind hier prächtig funktionierende Klappfallen vorhanden, die sich so blitzschnell schließen, daß das anstoßende Insekt keine Möglichkeit mehr hat, sein Heil in der Flucht zu suchen. Die dritte Phase ist dann bei allen Sonnentau-pflanzen am gleichmäßigsten ausgebildet: überall sind es wesentlich gleichgeartete

Drüsen, die auf Reize hin ein eiweißlösendes Enzym aussondern. Am meisten Bewunderung erregt natürlich stets der blitzschnell arbeitende Apparat von *Dionaea*; aber am schönsten und lehrreichsten ist doch das Zusammenwirken der verschiedenen Reizbarkeiten

und Reaktionen bei *Drosera*, bei der eigentlich alle in der Familie vorkommenden Fangmittel vereint sind. Nur sind die Bewegungen, die dabei vollführt werden, ihrer größeren Langsamkeit wegen nicht so verblüffend, wie bei jener Gattung. Da *Drosera* nun auch zugleich ein einheimischer Vertreter der Familie ist, wollen wir also an ihr die näheren Einzelheiten der Vorgänge studieren.

Die drei deutschen *Drosera*-Arten.

Links *Drosera rotundifolia* L., in der Mitte (Hintergrund) *Drosera intermedia* Hag., rechts *Drosera longifolia* Hag. (Nach Brude.) Natürliche Größe.

Die Gattung umfaßt 90 Arten, deren Bereich sich, mit Ausnahme der arktischen Regionen, über alle Florenreiche erstreckt. Einzelne Arten besitzen ein weites Verbreitungsgebiet, so auch unsere einheimischen Arten *D. rotundifolia*, *longifolia* und *intermedia* (s. die Farbensafel). Australien ist mit 43 *Drosera*-Arten am reichsten von ihnen besiedelt. Fast alle *Drosera*-Arten finden sich auf moorigem und moosigem Standorte, eine Tatsache, die, wie sofort gezeigt werden wird, für das Verständnis des Tierfanges von Bedeutung ist. Sie sind in überwiegender Zahl Rosettenpflanzen. Natürlich erleichtert es den Fang kriechender Insekten, daß ihre Blätter dem Boden aufliegen. Den Namen „Sonnentau“ hat die Pflanze von den gleich Tautröpfchen gligernden Schleimhüllen der Fangdrüsen. Diese rotgefärbten Drüsen befinden sich bei *Drosera* an der Spitze mehr oder weniger langer Blattwucherungen, und da ihre Stiele beweglich sind und sich mit entsprechenden Krümmungen am Fange der Tiere beteiligen, werden die ganzen Gebilde als „Tentakeln“ oder Fruchtfäden bezeichnet. Diese Tentakeln befinden sich stets auf der Oberseite der Blätter, und zwar sind die randständigen bedeutend länger und stehen weit nach außen ab, während die auf der Blattmitte stehenden kürzer und aufrecht gestellt sind. Wenn das Blatt sich in guten Lebensumständen befindet, sondern die Drüsen reichlich Schleim ab, der sie als tröpfchenförmige Hülle rings umgibt. Diese zunächst spontan stattfindende Sekretion wird durch Berührungsreize stets wesentlich verstärkt. Ein Tier, das mit diesen sehr klebrigen Schleimtröpfchen in Berührung kommt, wird sogleich festgehalten. Für kleine Insekten, und solche kommen ja in der Hauptsache in Betracht, wird die Berührung schon einiger weniger Tentakeln, ja selbst eines einzigen, genügen, es seinem Schicksal zu überliefern. Stärkere Insekten werden sich wohl mitunter wieder losmachen können, wenn sie nicht das Unglück hatten, gleich mit allzu vielen Tentakeln in Berührung zu kommen. Daß in diesem Falle aber auch größere Insekten festgehalten und dann verdaut werden, dafür liegen mehrfache Zeugnisse vor. Schon Darwin berichtet in seinem Werk über die insektenfressenden Pflanzen: „Die größte Art, die ich habe fangen sehen, war ein kleiner Schmetterling (*Caenonympha pamphilus*); aber Mr. G. M. Wilkinson teilte mir mit, daß er zweimal eine große, noch lebende Libelle gefunden habe, deren Körper von zwei Blättern festgehalten wurde.“ Auch ich habe von *Droseren* gefangene Tagfalter beobachtet, und neuestens hat Prof. Kellermann in der Zeitschrift „Aus der Natur“ berichtet, daß in den bayrischen Mooren den *Droseren* öfters größere Tiere, u. a. auch Libellen, zum Opfer fallen; meine mehrfach angegriffene Darstellung dieses Vorganges in einem Werke über „Das Sinnesleben der Pflanzen“ war somit durch die Naturtatsachen gerechtfertigt.

Es ist also außer Zweifel, daß *Drosera* auch größere Tierkörper festzuhalten vermag, wenn sie sich genügend in den Schleimmassen verstricken, denn dafür, daß die Sicherung der Beute auch bei Berührung nur weniger Tentakeln eine gründlichere werde, sorgt die Pflanze schon von selbst.

Als nächste Folge der Berührung folgt nämlich ein Einkrümmen der unmittelbar berührten Tentakeln. Der Reiz zu dieser Krümmungsbewegung wird lediglich von der Drüse aufgenommen, sie ist also das Sinnesorgan für diese Wahrnehmung. Dagegen wird die Krümmung von einer basalen Partie des Stieles ausgeführt, womit hier ein sehr schöner Fall von Reizleitung gegeben ist. Die Reizleitung beschränkt sich nicht

einmal hierauf, denn bald beginnen sich auch andere Tentakeln, die gar nicht unmittelbar durch die Berührung gereizt waren, gegen das gefangene Insekt hinzukrümmen! Hieraus geht hervor, daß die Fortleitung des Reizes sich also auch durch das Blattgewebe hindurch fortpflanzt und — das ist für die psychobiologische Konsequenz dieser Erscheinungen wichtig — zugleich den benachbarten Tentakeln, auf die sich der Reiz fortpflanzte, einen bestimmten Eindruck übermittelt, nach welcher Richtung sie sich zu neigen haben! Zweck all dieser Krümmungen ist doch, das gefangene Insekt immer fester zu verstricken und zugleich immer mehr Drüsen mit seinem Körper in Berührung zu bringen. Reichen die bloßen Tentakelkrümmungen dazu nicht aus, dann wird sogar das ganze Blatt mobil gemacht, es krümmt sich auch die Blattfläche und bildet dann vorübergehend einen mehr oder weniger geschlossenen „Magen“. Erst wenn die Beute gesichert ist, beginnt die verdauende Tätigkeit. Die Drüsen, die zuerst nur Schleim aussonderten, lassen jetzt ein eiweißlösendes Enzym austreten, das die Verdauung der stickstoffhaltigen Teile des Tieres bewirkt. Die verdauten Stoffe werden dann im gelösten Zustande von den Drüsen wieder aufgenommen und dem übrigen Pflanzenkörper zugeführt. Man hat mithin ein Recht, von einer regelrechten „Verdauung“ zu sprechen. Die Übereinstimmung mit dem gleichnamigen Vorgang im Tierkörper wird vollständig dadurch, daß dieser „Verdauungssaft“ durchaus identisch mit dem Pepsin des tierischen Magens zu sein scheint und gleich diesem seine verdauende Funktion nur bei gleichzeitiger Anwesenheit von Säure zu vollziehen vermag. Dementsprechend sondern auch die *Drosera*-Drüsen zugleich mit dem Enzym eine freie Säure (Ameisensäure) aus, die antiseptische Wirkung äußert und die Mitwirkung einer Bakterienverdauung verhindert.

Man war lange der Ansicht, die Verdauung gehe mit Hilfe von Spaltpilzen vor sich, indem zuerst eine Zersetzung der toten Tierleiber durch Bakterien stattfinde und die Pflanze nur diese Zersetzungsprodukte aufnehme. Dies scheint nun allerdings bei manchen anderen tierfangenden Pflanzen (*Sarrazenien*) der Fall zu sein; für *Drosera* ist es jedoch zweifellos festgestellt, daß hier echte Verdauung und keine Bakterienzersetzung vorliegt. Darüber war schon Darwin im reinen, der die Erscheinung mit der ihm eigenen Gründlichkeit durch zahllose Beobachtungen und Experimente studiert hat. Schon er machte Parallelversuche mit der Aussetzung von Fleischstückchen auf *Drosera*-Blätter und auf Moospflänzchen und stellte fest, daß letztere der Bakterienzersetzung anheimfielen, während die auf *Drosera*-Blättern liegenden während der ganzen Verdauungsprozedur nicht die geringste Bakterienansammlung zeigten. Darwins Untersuchungen verdankt die Wissenschaft überhaupt alle grundlegenden Kenntnisse über diese und auch andere insektenfressende Pflanzen. So hatte er bereits festgestellt, daß nur die Drüsen selbst reizbar sind, und zwar, daß es der direkten Berührung der Drüsenoberfläche bedarf, um den Reiz auszulösen, sowie daß dieser Reiz ein andauernder sein muß, während ein vorübergehender Stoßreiz unwirksam bleibt; auch die biologische Erklärung hierfür blieb ihm nicht verborgen, denn er meint, es wäre für die Pflanze sehr schädlich, wenn ihre Drüsen bei jeder flüchtigen Berührung eines Grashalmes oder bei jedem Regenschauer zur Einkrümmung veranlaßt würden. Sie habe sich daran „gewöhnt“, nur auf andauernde Berührungsreize zu reagieren.

Nun aber ist es natürlich nicht ausgeschlossen, daß auch anorganische oder nicht verdauliche Körper mit den Droserablättern in Berührung kommen. Aber die Pflanze läßt sich in ihrem Empfindungsleben auch da nicht so recht täuschen. Zwar reagieren die Tentakeln auf Berührung anorganischer Körper — vorausgesetzt, daß diese Berührung die Drüse selbst trifft und das Körperchen nicht im Schleimtropfen schweben bleibt — aber die Bewegung ist viel langsamer und vorübergehender. Auch das hatte Darwin bereits ergründet. Es heißt bei ihm: „Aus diesen und zahlreichen anderen

Blühende Droseren.

Experimenten läßt sich gewiß ableiten, daß unorganische Substanzen oder solche organische Substanzen, die von der Absonderung nicht ergriffen werden, viel weniger schnell und wirksam reizen als organische Substanzen, welche lösliche Stoffe hergeben, die aufgesaugt werden. Außerdem bin ich sehr wenigen Ausnahmen von der Regel begegnet, daß die Tentakeln viel längere Zeit über organischen Körpern von der eben erst angeführten Art geschlossen bleiben als über denjenigen, auf welche die Absonderung nicht wirkt, oder über unorganischen.“

Das bedeutet, in die Sprache der Psychobiologie übersetzt, daß die Pflanze „merkt“, es sei für sie nichts zu holen, und deshalb von dem unverdaulichen Gegenstand abläßt.

Goebel sagt von *Drosera rotundifolia*, daß die Säureabscheidung bei einem Reize, der von unorganischen Substanzen herrührt, ebenfalls eintritt, bei anderen Arten sogar ohne jeden Reiz; aber auch er muß zugeben, daß das verdauende Enzym sich immer erst dann abscheidet, wenn eine lösliche stickstoffhaltige Substanz die Pflanze „reizt“. Versuche haben ergeben, daß eine solche von den Opfern wirklich ausgeht, denn tote Fliegen, die man in mit Ameisensäure versetztes Wasser legt, geben winzige Mengen von Eiweißstoffen ab. Man muß sich also wohl vorstellen, daß *Drosera* ihre Ameisensäure gewissermaßen als „Probiermittel“ in jedem Fall bereit hat, um dadurch zu erfahren, ob etwas zu holen sei oder nicht.

Die Feinheit dieser Reaktionen ist bei dem Sonnentau ganz außerordentlich. Schon Darwin bemerkte, daß die kleinsten Teilchen, z. B. Körnchen von präzipitierter Kreide, einen Bewegungsreiz ausüben, wenn sie bis an die Oberfläche der Drüse ge-

langen. Seinen Messungen nach reicht dazu ein Gewicht von $\frac{1}{78740}$ Gramm aus. Völl Verwunderung schreibt er: „Es ist außerordentlich zweifelhaft, ob irgendwelcher Nerv im menschlichen Körper, selbst wenn er in einem entzündeten Zustande ist, in irgendeiner Weise durch solch ein Teilchen affiziert würde, das von einer dichten Flüssigkeit getragen und langsam mit dem Nerv in Berührung gebracht würde.“ Uns neueren sind solche Beweise außergewöhnlicher Empfindlichkeit der Pflanze schon geläufig; haben wir doch feststellen können, daß Lichtreize von $\frac{1}{1000}$ Sekunde Dauer bereits imstande sind, Keimpflanzen zu reizen (Blaauw und Trüschel). Dies aber erhöht nur die Wichtigkeit des Sages, daß die Pflanzenzellen (namentlich im jugendlichen Zustande) dieselbe feine Reizbarkeit besitzen wie die Nervenzellen der Tiere. Und im Lichte dieses Gedankens glaubt man auch zu verstehen, warum sich bei den Pflanzen das Nervensystem nicht in derselben Vollkommenheit ausbildete wie bei den Tieren, namentlich warum sie kein besonderes Gehirn besitzen. Die feststehende Lebensweise hat andere Orientierungsbedürfnisse im Gefolge wie die der freibeweglichen Tiere. Und deshalb konnte das „Gehirn“ gewissermaßen dezentralisiert bleiben, in zahllose, über den ganzen Körper verstreute, sehr reizbare Zellen verteilt. Es hat durchaus den Anschein, als ob die Forschung des nächsten Jahrzehntes diese Vorstellungen rechtfertigen würde.

Tentakelköpfchen von
Drosera im vergr.
Längsschnitt.

(Nach N i e m a n n.)

Man kann sich schon deswegen nicht von diesen Gedanken befreien, weil man allenthalben beobachtet, daß die Pflanze dort, wo ein Bedürfnis an sie herantritt, dieses stets in genügender Weise durch Ausbildung geeigneter Strukturen befriedigen kann.

Dafür ist *Drosera* ein besonders gutes Beispiel. In den Tentakelköpfchen hat sie, die so fein Empfindende, besondere Sinnesorgane angelegt, deren Entdecker G. Haberlandt war. In seiner „Physiologischen Pflanzenanatomie“ schreibt er darüber: „Als Sinneszellen fungieren die oberflächlich gelegenen Drüsenzellen des Köpfchens, die demnach sehr verschiedene Funktionen in sich vereinigen: sie sezernieren reichlich Schleim und das verdauende Enzym, sie perzipieren mechanische und chemische Reize und absorbieren schließlich die aufgelösten Substanzen. Die Perzeption der mechanischen (und vielleicht auch der chemischen) Reize ist, allem Anscheine nach, kleinen papillenartigen Plasmafortsätzen übertragen, die bei *Drosera rotundifolia* und *longifolia* nur an den Rändern der Außenwände auftreten. Sie ragen hier in randständige Tüpfelkanäle hinein, die dadurch zustande kommen, daß von den Radialwänden aus, an die Außenwände sich ansetzend, kleine Membranleisten vorspringen, die nach unten und innen zu rasch schmaler werden und sich schließlich ganz verlieren (s. das Bild).“ Da diese eigenartigen plasmaerfüllten Tüpfelkanäle bei anderen Insektivoren nicht vorkommen, glaubt Haberlandt, daß sie nur der mechanischen Reizbarkeit dienen.

Mit diesen Hilfsmitteln mordet der Sonnentau so eifrig, daß man auf einem einzigen seiner Blätter, die sich nach vollendeter „Mahlzeit“ wieder flach ausbreiten, die Überreste von 13 verzehrten Insekten gezählt hat. In Australien, wo es 55 verschiedene Arten unserer Pflanze gibt, lebt eine bis zu einem drittel Meter hohe Form (*D. dichotoma*), an der man oft ein halbes Hundert Mücken haften sehen soll.

Merkwürdiger — oder soll man sagen — begreiflicher Weise hat man alle diese Dinge, die dem Wesen nach schon über 130 Jahre lang bekannt sind, den Gelehrten, die solches behaupteten, nicht glauben wollen. Es wird interessieren, daß auch Goethe zu ihnen gehörte. Prof. F. Sohn erzählt in seinem schönen und sehr geschmackvoll geschriebenen Werke „Die Pflanze“, daß er in seinem Besitz ein noch ungedrucktes Manuskript von J. G. Dietrich hatte, der seinerzeit Goethe als botanischer Gehilfe diente. In diesem schildert Dietrich, wie er mit dem noch jugendlichen Dichtersfürsten am 29. Juni 1785 den Ochsenkopf im Fichtelgebirge bestieg und dort in einem Moor eine ungeheure Menge von *D. rotundifolia* traf. „Goethe, der damals sein Werk (Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären) angefangen hatte, suchte sich näher mit den Pflanzen zu befreunden, nahm eine *Drosera* in die Hand und sprach sich über die wunderbare Gestalt und regelmäßige Stellung der mit reizbaren Drüsenhaaren bekränzten Blätter belehrend aus, insonderheit über die Irritabilität (Reizbarkeit) der Pflanzen im allgemeinen. Wir fanden einige Sonnentaupflanzen, in deren Blättern kleine Insekten von den Drüsenhaaren eingeschlossen waren, und bemerkten zugleich, daß, solange die eingeschlossenen Insekten leben und durch die Bewegung ihres Körpers und der Füße die Drüsen reizen, die Haare desto kräftiger und fester sich zusammenziehen und nicht eher wieder aufrichten, bis das Insekt getötet ist.“

Wenngleich diesem großen Naturforscher die Erscheinungen nicht verborgen blieben, so fand doch auch er nicht den Schlüssel dieses Verhaltens. Es war bis Darwin überhaupt unbekannt, daß die Karnivoren die gefangenen Insekten auch verdauen; sogar Darwin selbst glaubte man das noch lange nicht, ja manche botanische Autoritäten lassen ihren ganzen Spott über diese bizarre Idee aus.* Deshalb unternahm der Sohn Darwins, Sir Francis Darwin, der jetzt als einer der angesehensten englischen Botaniker an der Hochschule zu Cambridge wirkt, besondere Versuche, um namentlich den öfters geäußerten Einwand zu widerlegen, die „Insektenfütterung“ schade den Sonnentaupflanzen. Unter gleichen Verhältnissen wurden Pflanzen gezüchtet, denen er gebratenes Fleisch reichte, und solche, die sich nur rein vegetabil ernähren mußten. Es ergab sich bei diesen wie auch späteren Versuchen von Reeb, Büsgen und Goebel, daß die Fleischkost für die Karnivoren zwar nicht unbedingtes Erfordernis sei, aber die Pflanzen sehr stärkt. Die Gefütterten blühen reichlicher, bilden viel mehr und kräftigere Früchte und lebensfähigere Nachkommen.

Und so setzte sich denn, wenn auch erst zu Beginn der 90er Jahre, die Ansicht fest, die auch wir in diesem Buche vertreten.

Diese Tatsachen waren so wunderbar, daß Darwin durch sie direkt auf den Weg geleitet wurde, eine Beseelung der Pflanzen anzunehmen. In seinen Briefen bezeichnet er *Drosera* als ein „scharfsinniges Tier“, voll Ernst suchte er in ihren Tentakeln nach Muskeln und Nerven, denn er konnte sich nicht vorstellen, daß alle diese wunderbaren Leistungen ohne die entsprechenden Hilfsmittel der Tiere möglich seien. Aber er fand nichts, außer Anzeichen, daß eine Reizleitung diese pflanzlichen Fühler durchzieht. Man kann sie unter dem Mikroskop unmittelbar sehen. In den Zellen der Tentakeln ist roter Zellsaft enthalten, der, sobald ein Reiz das Tentakelköpfchen trifft,

* Vgl. darüber Bd. II, S. 216—217.

Insektenfresser im heimischen Moor.

Im Moor links Fettkraut (*Pinguicula vulgaris*), rechts Sonnentauarten (*Drosera rotundifolia* und *D. longifolia*). Im Wasser links der Wasserhelm (*Utricularia vulgaris*).

(Nach einem Originalaquarell von Fritz Bergen.)

sich in Ballen und unregelmäßige Tropfen „aggregiert“. Diese Zusammenballung schreitet in den Zellen, von den Köpfchen nach abwärts, vor, geht von Tentakel zu Tentakel über und hält so lange an, bis die letzte Reizwirkung erloschen ist.

Wenn nun aber auf diese Weise die Empfindung auch sichtbar wird, so kennt man doch nicht ihre Drähte und hat auch mit den vervollkommenen Hilfsmitteln der neuesten Zeit nicht mehr gefunden als Plasmodemesmen, also plasmatische Verbindungsfäden von Zelle zu Zelle, und die uns schon weiter oben bekannt gewordenen Sinnesorgane. Aber im Laufe der Jahre ist trotzdem der Eindruck immer mächtiger geworden, daß diese Pflanze ein klassisches Beweisstück für Empfindung und Reizleitung im Pflanzenreich, für zielstrebige Bewegungen, Koordination und Handlungen, kurz gesagt also für ein Seelenleben der Pflanze sei. Die letzteren zwei Punkte sind noch in keinem botanischen Werk erörtert, obwohl sie von zwingender Beweiskraft sind. Deshalb sei es mir gestattet, noch ein wenig bei ihnen zu verweilen.

Die Tentakeln eines Sonnentaublattes unterstützen einander, sie arbeiten nicht rein maschinenmäßig auf die unmittelbare Auslösung, sondern wenn eines gereizt wurde, bewegen sich auch die anderen, und zwar im wohlberechneten Nach- und Nebeneinander. Die Beobachtung eines gereizten Blattes zeigt zwar, daß sich alle Tentakeln nach der Stelle beugen, von der der Reiz ausgeht; dies geschieht aber nicht mit der Sinnlosigkeit eines Reflexes, denn als Darwin an die entgegengesetzten Ränder eines Blattes zwei Insekten gleichzeitig brachte, bogte sich je nur die Hälfte der Wimpern nach rechts und links, es trat also eine Arbeitsteilung ein. Ich möchte hier übrigens bemerken, daß wir noch immer nicht wissen, durch welche Kraft sich die Tentakeln bewegen, eine Frage, deren Beantwortung eine schwierige, aber höchst dankbare Aufgabe bilden würde.

Noch beweiskräftiger für unseren Gedankengang ist es, daß sich in der Überwältigung eines besonders ausgiebigen Bissens mehrere Blätter unterstützen. Sie schweben an ihren Stielen heran wie von einer magnetischen Kraft gezogen und beteiligen sich ebenfalls an dem Verdauungswerk. Dies setzt eine gewisse Entscheidungsfähigkeit voraus, die in jeder Handlung da ist (vgl. die Analyse der Handlung in Bd. II, S. 149), denn irgendwo muß in diesem Fall eine Entscheidung getroffen werden, ob ein Blatt ausreicht oder nicht. Man wird als Freund der einfachsten Erklärung sich nun freilich entgegenhalten, daß diese „Entscheidung“ durch das den Reiz ausübende Objekt selbst getroffen werden könne, da es eben, wenn es größer sei, mehr „Reizwellen“ von sich aussenden würde als ein kleineres und dadurch auch fernestehende Blätter zu Reizbewegungen veranlaßt. Aber dieser Gedankengang würde voraussetzen, daß hier durch die Luft sich fortpflanzende Reizwellen, also Geruch, besser gesagt, Witterung der Pflanze mit im Spiele sei, und davon ist bei Gewächsen nichts bekannt. Durch einen sehr interessanten Versuch ließe sich hier ein Entscheid herbeiführen. Man müßte Nahrungsbissen in der Nähe ausgehungertter Blätter anbringen, um zu erproben, ob eine solche Reizung auf die Ferne wirklich vorhanden sei. Wenn — wie vorauszusetzen — sie nicht erfolgt, bleibt für die unzweifelhafte, auch von mir gesehene Beteiligung mehrerer Blätter an einem Objekt nur noch die Annahme, daß hier eine „angestrebte Arbeitsteilung“, also eine koordinierte Handlung, vorliegt. Und damit wäre ein neuer trefflicher Beweis für die Existenz eines pflanzlichen Seelenlebens erbracht.

Neben diesen biologischen Erscheinungen verbläht an Interesse alles übrige, was sich noch über *Drosophyllum* sagen läßt. Die Blüten sind höchst unansehnlich, ebenso die Früchte, die sich reichlich bilden, da der Sonnentau stets von allerlei Kerbtieren besucht wird.

Von der interessanten nordamerikanischen Verwandten, der „Venus-Fliegenfalle“, haben wir bereits gesprochen. Auch bei *Dionaea muscipula* (Bild Bd. II, S. 219), die heute ein häufiger Gast in allen botanischen Gärten ist, gelang es Haberlandt, besondere Sinnesorgane zu entdecken, die in diesem Fall sehr kompliziert gebaut sind. Eigentlich hätten sie schon seit 1804, da sie Sydenham Edwards in ihrer Funktion richtig erkannte, die Botaniker auf das Vorhandensein von Fühlborsten bei Pflanzen aufmerksam machen müssen.

Auch *Drosophyllum* (Bild Bd. II, S. 226), das nur in einer Art (*D. lusitanicum* Lk.) das südliche Europa, namentlich dessen Südosten, besiedelt und als

Das Blasenkraut (*Aldrovanda*). (Original von H. S. Francis.)

stattlichste Form der ganzen Gruppe, nämlich als $1\frac{1}{2}$ m hoher Halbstrauch, auch dem Volke auffiel, so daß es in seiner Heimat vielfach als Fliegenleimrute an den Fenstern in Töpfen gezogen wird, ist ein gewaltiger Insektenvertilger. Man hat an ihren langen Blättern bei einer einzigen kleinen Pflanze 233 gefangene und getötete Fliegen gezählt.

Eine einheimische Wasserpflanze der Familie ist auch *Aldrovanda** *vesiculosa*, die nicht nur den Biologen, sondern auch den Floristen schon deswegen interessiert, da sie, als Sprößling eines wärmeren Himmels und hauptsächlich in Süd-

frankreich und Italien und von da bis Indien verbreitet, dennoch als Spezialität in deutschen Gewässern vorkommt. Am häufigsten ist sie noch in den schlesischen Teichen (Pleiß, Ratibor, Proskau, Teschen), in Posen und Westpreußen, ganz selten aber im übrigen Deutschland, wo man sie bei Pindau in Bayern, sonst noch in Tirol und Vorarlberg gefunden hat. Dort blüht sie im Juli oder August als weißes, unansehnliches Blümchen, dessen zugehörige Pflanze untergetaucht lebt und einen wurzellosen, dichten Klumpen von dicht wirtelständigen, muschelförmig-zweiflappigen Blättern darstellt. Am Vorderende sind diese Blätter gewöhnlich dicht zusammengedrängt und bilden eine Knospe, die auch im Herbst überbleibt (Hibernatel), auf den Boden sinkt (es wäre zu untersuchen, wodurch das periodische Untersinken und Auftauchen ausgelöst und bewirkt wird) und erst im Frühling wieder neuerdings austreibt.

Die Blätter der Pflanze sind zu sehr eigenartigen Fangapparaten umgestaltet, die Prof. Cohn in der Botanischen Zeitung (1859) zuerst sehr ausführlich beschrieben

* Die weitverbreitete Schreibweise *Aldrovandia* ist sprachlich unrichtig.

hat. Auf einen flügelartig verbreiterten, mehrere Borsten tragenden Stiel ist eine rundliche Spreite eingelenkt, die sie zusammenklappen kann, wenn die an ihrer Innenseite emporstehenden Reizborsten berührt werden. Haberlandt hat sie untersucht und fand, daß sie aus einem Gelenk und abwechselnd langen und kurzen Zellen bestehen, deren Bau darauf abzielt, die mechanische Wirkung einer Berührung auf die den Reiz wahrnehmende Stelle des Haares zu konzentrieren.

Die Empfindlichkeit dieser Einrichtungen ist außerordentlich, *Aldrovanda* ist in unserer Heimat diejenige Pflanze, welche die schnellste Beweglichkeit der Organe besitzt. Cohn schreibt darüber: „Im Sommer 1873 machte der damalige Obergärtner des Proskauer botanischen Gartens, Berthold Stein, auf einer Exkursion, die er zur Beobachtung der *Aldrovanda* nach einem ihrer heimatlichen Teiche bei Rybnik unternommen hatte, eine überraschende Beobachtung: im warmen Sonnenschein sind die Blätter der *Aldrovanda* nicht zusammengefalted und geschlossen, sondern vollständig ausgebreitet; aber mit einer Nadel berührt, schlagen sie augenblicklich zusammen, so daß die Nadel zwischen den geschlossenen Lippen des Randes festgehalten und erst nach 24 Stunden beim Öffnen des Blattes fallen gelassen wird. Als ich nun im folgenden Sommer (1874) *Aldrovanda*-pflanzen in ein Glasgefäß setzte, in welchem zahllose kleine Wassertrebse (*Cypris*) umherschwammen, fand ich am folgenden Morgen in jedem Bläschen ein, zwei oder mehrere dieser Tierchen eingeschlossen; offenbar hatten die lüsternden Geschöpfe in den fremden Pflanzen ein leckeres Futter erwartet; vielleicht waren sie durch die auffallende Ähnlichkeit mit verwandten Muscheltrebse (*Cypris*) getäuscht worden und ahnungslos in die offenen Fallen geraten. Ich konnte sie tagelang unruhig in ihren festgeschlossenen Gefängnissen umherschwimmen sehen, die sie lebendig nicht wieder verlassen sollten; denn sie starben im Innern der Blätter und wurden bis auf das Hautskelett verdaut.“

Die Betrachtung dieser Pflanze führt uns zu einer Einsicht von allgemeiner Bedeutung. Denn daraus, daß *Aldrovanda* sogenannte „bliksschnelle“ Bewegungen ausführt, ersieht man, daß die Langsamkeit der sonstigen pflanzlichen autonomen oder Reizbewegungen nicht im Wesen der Pflanze begründet sein kann. Wahrscheinlich liegt ihr nichts anderes zugrunde, als das auch sonst in der Natur allenthalben zutage tretende Gesetz der Zweckerreichung mit den geringsten Mitteln. Wenn es mit langsamen Bewegungen geht, vollführt man keine raschen. Wenn aber nur plötzliches Zuklappen ein flüchtiges Tierchen in dem Blatt festhalten kann, dann ist die *Aldrovanda* hurtiger denn ein bewegliches und flinkes Tier. Das muß man sich stets vor Augen rücken, bevor aus der relativen Unbeweglichkeit der Pflanze oder aus der scheinbaren Schwerfälligkeit der Bewegungen einer *Drosera* Folgerungen abgeleitet werden.

Die Rosenblütler (Rosales).

Wir treten nun in eine neue Welt, in jene, zu deren Bewohnern die schönsten, lieblichsten und nützlichsten der Pflanzen gehören. Wie viel Blätter der Kulturgeschichte, Volkswirtschaft und Gartenkunst werden nicht aufgeschlagen, wenn man die Namen Hortensie, Johannisbeere, Platane, Rose, Apfel und Birne, Erdbeere und Pflaume, Mimose und Akazie, Bohnen, Indigo, Klee und Wicke nennt. Dieser Strauß scheinbar verschiedenartigster Gewächse gehört zusammen in eine Gruppe, zu den Rosales, die mit annähernd 14000 Arten mit den Tubifloren wetteifert und die Reihe der Campanulaten übertrifft, obzwar diese die artenreichste aller Familien, nämlich die 1000 Arten zählenden Korbchenblütler, in sich birgt.

Es wird dem Laien im hohen Grade verwunderlich erscheinen, auf Grund welcher Merkmale man denn so heterogene Erscheinungen wie Rose und Bohne oder Platane und Klee in eine Reihe stellen konnte; er wird es aber einsehen, wenn er ihre Charakteristik vernimmt. Sie lautet nach Wettsteins Auffassung etwa folgendermaßen: Die Blüten aller Rosales sind zwittrig, in der Regel pentamer und mit doppelter, also in Kelch und Blumenblätter geschiedener Blütenhülle versehen. Alle übrigen Merkmale sind so sehr von Ausnahmen durchbrochen, daß sich kaum etwas Weiteres, für alle Formen Gültiges, sagen läßt; außer etwa, daß die Blüten fast stets zyklisch gebaut sind. Trotzdem liegt hier eine „sehr natürliche Reihe“ in dem Sinne vor uns, als die Familien durch Zwischenformen verbunden sind, und die eine sich ungezwungen aus der anderen ableiten läßt.

Sie selbst ist nach Wettsteins Ansicht aus den Polycarpicae, also der Pflanzenreihe, hervorgegangen, zu der die Magnolien, Rafflesia, der Sauerdorn (Berberis), die Manunkeln und Wasserrosen gehören. In ihr selbst tritt etwas Neues auf, nämlich die Tendenz, die weiblichen Geschlechtsorgane, das Gynäzeum, in den Grund der Blüte zu versenken. Um das zu illustrieren, habe ich später Abbildungen eingestreut, welche die verschiedenen Blütentypen der Rosales darstellen. Bei den Kraussulazeen, als deren Vertreter eine Hauswurzblüte aufgenommen ist, steht das Gynäzeum noch „oberständig“, bei den Rosazeen — als deren Typus *Rosa* gelten möge — sind schon unterständige Fruchtknoten da. Eine weitere Eigenheit der Reihe ist die Umbildung von strahligen Blüten zu zygomorphen. Den Übergang markieren hier die tropischen Chrysobalanazeen, die Kotospflaumen Südamerikas, die in jeder Beziehung den Rosazeen, namentlich der Gattung *Prunus*, gleichen, aber bereits zygomorphe Blüten tragen, also ungezwungen zu den Schmetterlingsblütlern (Papilionazeen) überleiten, mit denen sie sogar eine lückenlose Formenreihe verbindet.

Das ist der Grund, warum man Schmetterlingsblütler und Rosen zu einer Verwandtschaftsgruppe im natürlichen System zusammenschließen muß.*

In diesem Kreise ziehen als die einfachsten vor allem

die Kraussulazeen

die Aufmerksamkeit auf sich. Zwei ihrer Vertreter, Hauswurz (*Sempervivum*)

* Vgl. hierüber auch die ausgezeichnete Abhandlung von C. Maximowicz, „Adnotationes de Spireaceis“ (Act. Hort. Petropolit. VI.)

und Fetthenne (*Sedum*), sind jedermann wenigstens vom Sehen bekannt; die Gattung *Bryophyllum* dagegen hat im physiologischen Lehrsaal einen berühmten Namen erworben.

Sempervivum ist merkwürdigerweise eigentlich nicht bei uns, sondern auf den kanarischen Inseln zu Hause, denn von ihren 50 Arten lebt die Mehrzahl (etwa 40) dort, im deutschen Florengebiet nur ganz wenige (*S. tectorum* L., *S. montanum* L., *S. arachnoideum* L. u. a.), mehr allerdings in den Alpen und besonders in Siebenbürgen. Unser Volk hat zu ihrer Verbreitung ja viel beigetragen, da es sie mit Vorliebe als eine dem Donar heilige Pflanze auf das Hausdach pflanzte und sich dann vor Bliggefahr behütet glaubte, woher auch der ältere Name Donnerkraut rührt. Was man gemeinhin sieht, die dickfleischige Rosette der so regelmäßig gestellten Blätter, das ist nur die eine Wachstumsform der Pflanze, der „Kurztrieb“. Aus ihm entwickeln sich „Langtriebe“, wenn die Pflanze blüht, an denen sich die zahlreichen prächtigen, rosenrot gefärbten Blüten erheben. Die Kurztriebe scheinen eine Anpassung an das grelle Licht der Felsenhöhen zu sein, auf denen das Gewächs mit Vorliebe sein Quartier aufschlägt, denn wie bereits in Bd. I, S. 94 erzählt und auch mit Abbildungen belegt wurde, gelang es Wiesner, die Rosette von *Sempervivum* ohne weiteres im Dunkeln aufzulösen und die Pflanze in ein schwächliches, langstengeliges Gewächs zu verwandeln. G. Klebs hingegen hat in neuerer Zeit die Bedingungen der Blütenbildung erforscht und gefunden, daß diese in erster Hinsicht von der Intensität der Kohlenstoffassimilation abhängig ist. Er fand z. B., daß bei Schwächung der Produktion organischer Substanz, etwa durch Züchtung der Pflanzen in blauem Licht, lebhaftes vegetatives Wachstum eintritt; wenn man die Herstellung organischer Substanz dagegen begünstigt, tritt rasche Blütenbildung ein. Man hat versucht, dieses Ergebnis so zu deuten, als ob damit der ursächliche Zusammenhang lückenlos aufgedeckt sei. Nichts irriger als das. Nichts anderes ist durch solche Versuche erkannt, als daß die Pflanze zum Blühen Reservestoffe, d. h. Baumaterial, braucht. Zu sagen, die bessere Ernährung erkläre das Blühen, würde dem entsprechen, wenn ein Volkswirtschaftler, der bemerkt, daß reichgewordene Menschen sich gern Villen bauen, daraus das „Gesetz“ konstruierte: Geldzufluß zwingt den Menschen zur Anlegung von Gebäuden. In Wirklichkeit hat man in beiden Fällen nur erkannt, daß man ohne Geld nicht bauen kann.

Die Auflösung der Rosette der Hauswurz bei der Blütenbildung.
(Nach Exemplaren im Münchner botanischen Garten aufgenommen
von H. Dopfer.)

Wertvoller ist schon, daß Klebs erkannte, durch gute Düngung ließen sich bei *Sempervivum* Blütenvariationen erzielen, eine Tatsache, die besonders die Gärtner unter meinen Lesern interessieren wird. Er erhielt auf diese Weise Blüten ohne Kelch oder fast ohne Blumenkrone oder solche, denen fast alle Staubblätter fehlten, oder

Blühende *Sempervivum*.

deren Blütenteile verschiedentlich verändert waren. Allerdings konnte er die Untersuchungen nicht so weit bringen, um durch bestimmte Düngung einen Zwang auf die Pflanze auszuüben, gewisse Änderungen hervorzubringen. Der Pflanzenanatom weiß von der Hauswurz und ihren Verwandten auch mancherlei Interessantes zu sagen. Er hat erkannt, daß alle *Krassulaceen* reich an Gerbstoff sind — dem Schutzstoff gegen Schneckenfraß —, der sich gern in besonderen Zellen, in der Epidermis oder der Gefäßbündelscheide, ansammelt. Außerdem enthalten sie reichlich oxalsaure Kalkkristalle und freie organische Säuren. Daher rührt der scharfe beißende Geschmack, der der Gattung *Sedum* z. B. den deutschen Namen Mauerpfeffer verschafft hat. Ihr ganzer Bau ist an das Ertragen von Trockenheit angepaßt. Die Blätter sind in ihrer Dicke förmliche Wasserspeicher mit einem regelrechten „Wassergewebe“, starker Kutikula, eingesenkten Spaltöffnungen und einem Wachüberzug oder langen Haaren, die sich zu einem spinnwebartigen Filz verweben (*Sempervivum arachnoideum*), wie man besonders an den in greller Sonne lebenden Exemplaren dieser in den Alpen bis 3000 m Höhe lebenden Art bemerken kann.

Der Pflanzenbiologe wird uns wieder besonders auf die eigentümliche ungeschlechtliche Vermehrung der *Sempervivum*-Arten durch Brutknospen und fadenförmige Ausläufer verweisen, die an ihrem Ende neue Rosetten treiben und dann absterben. Eine Hauswurz bringt auf diese Weise eine ganze Generation von kleinen Rosettenknöllchen hervor, die im Gebirge von Felsstufe zu Stufe rollen, sogar vom

Wind verweht werden und auf diese Weise wesentlich zur Verbreitung der Pflanze beitragen. Eine beachtenswerte und zu Untersuchungen anreizende Tatsache hierbei ist, daß die Ausläufer meistens erst dann absterben, wenn die neue Pflanze bereits festgewurzelt ist. Was ihm besonders auffällig erscheint, ist die ganz beispiellose Lebensfähigkeit dieser Pflanzen. H. De Candolle, der eine Monographie der *Crassulaceen* verfaßt hat, erzählt darin, daß er im Herbarium 18 Monate lang eine *S. caespitosum* gepreßt hielt, daß sie aber wieder auflebte, als man sie einpflanzte. Deshalb muß man diese „fettblättrigen“ Gewächse auch noch stets mit kochendem Wasser abbrühen, bevor man sie ins Herbarium einlegt, sonst treiben sie sogar unter der Pflanzenpresse weiter, wie mir ein befreundeter Botaniker von einem Exemplar von *Sedum boloniense* mitteilte.

Zu dieser Lebensfähigkeit gehört auch, daß die *Sempervivum*-Pflanzen, die also ihren lateinischen Namen nicht bloß als ausdauernde Gewächse verdienen, unglaubliche Hitzegrade ertragen. So maß *Askenasy* einmal im Innern einer an der Felsenwand von der Sonne durchglühten Rosette 51°C ! Unter solchen abnormen Verhältnissen scheinen die Pflanzen auch zu eigentümlichen Selbsthilfen

Sedum acre. (Originalaufnahme von H. Dopfer-München.)

greifen zu können. Wenigstens berichtete in der „Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre“ R. D. Hoffmann folgende merkwürdige Tatsachen: Während in seiner vieljährigen Kultur von *Sempervivum arachnoideum* von den Pflanzen alljährlich nur die größeren Rosetten blühten, waren einmal gerade die jüngsten Exemplare mit entsprechend zarten und kleinen Blüten geschmückt. Nach dieser Jugendblüte trieben aus den ausgewachsenen Exemplaren plötzlich Knospen hervor, ohne irgendwelchen Stengel, nur auf dünnen, $1-1\frac{1}{2}$ cm langen Blütenstielen sitzend, die sich zu normalgroßen, kräftigroten Blüten entwickelten. Während aber bei normalem Verlauf die Rosette regelmäßig im Blütenstiele aufgeht, blieben diesmal die blühenden Pflanzen völlig unverändert und sproßten auch nach der Blüte in gewöhnlicher Form, von den weißen Fäden dicht umspinnen, weiter. Dies hält unser Gewährsmann für ein „teleologisches Phänomen“. Er meint, „die Pflänzchen, die am Fenster den ganzen Tag in glühendster Sonnenhitze stehen, unterließen die Stengelbildung, um den Wasserverbrauch zu verringern und eine möglichst geringe Fläche der Bestrahlung darzubieten. In diesen Gedankengang paßt es, daß auch die Behaarung eine ungemein dichte ist.“

Über die Gattung *Sedum* ist nicht viel anderes zu sagen wie über *Semprevivum*. Der deutsche Sprachgebrauch hat für sie zwei Namen. Mauerpfeffer nennt er die Arten mit schmalen, walzenförmigen Blättern (Bild S. 463), wie *S. album*; Zetthenne sagt man hingegen zu den Formen, die sich durch breite und flache Blätter auszeichnen, z. B. die Art *S. Telephium*.

Der gemeine Mauerpfeffer erfreut den Naturfreund mit einer sehr nachdenklich stimmenden Eigenheit. Diese Pflanze enthält bekanntlich reichlich freie organische Säuren und Gerbsäure. Daß dies aber nicht ohne biologische Bedeutung ist, geht daraus hervor, daß die Blütenstengel besonders scharf schmecken, und zwar je höher an der Blüte, desto heißender. Die Blüte ist der Pflanze kostbarstes Organ, sie ist auch am besten geschützt. Diese Parallele enthält für die Botanik der Zukunft eines der schwierigsten Probleme, an dessen Lösung wir heute noch nicht von weitem denken können.

Eine sehr interessante Eigenart des Mauerpfeffers ist auch, daß durch die Ausbildung seiner schönen, meist leuchtend gelben und von den Insekten (in den Tropen sogar von Vögeln) reichlich besuchten Blüten der Inhalt der obersten Blätter völlig verzehrt wird. Sie hängen nach dem Blühen schlaff, als runzelige, leere Häute herab. Deshalb blühen auch entwurzelte Exemplare ungestört weiter, wenn ihnen nur noch ein Teil der Blätter zu Gebote steht.

Die Gattung *Bryophyllum* überbietet aber alle Seltsamkeiten dieser an Wunderbarem so reichen Gruppe. *Bryophyllum calycinum* ist mindestens in jedem botanischen Garten zu sehen, da sie aus jedem abgelösten Blatt in den Stücken des Blattrandes neue Pflänzchen sprießen läßt, wie an jeder Universität demonstriert wird. Johow erzählt von ihr folgendes: „Einen wunderbaren und überraschenden Anblick gewährt es, wenn man den Stamm einer reichbelaubten Pflanze mit der Hand gelinde schüttelt. Es prasseln dann sämtliche entwickelte Blattfiedern der Pflanze wie reife Früchte zu Boden, während die ungeteilten Blätter am Stamme sitzenbleiben und sich auch durch heftige Erschütterungen nicht zum Abfall bewegen lassen.“ Dieser Verlust an Blättern wird eben dadurch ausgeglichen, daß jedes abgefallene Blatt reichlich neue Pflänzchen erzeugt, die sich prompt bewurzeln.

Die Steinbrechgewächse (Saxifragaceae)

bilden die nächste Familie, der sich jetzt unsere Aufmerksamkeit zuwenden muß. Während die Krassulazeen eine ziemlich einheitlich gestaltete Pflanzengruppe darstellen, zeigt sich bei den Steinbrechen bereits jene außergewöhnliche Mannigfaltigkeit der äußeren Erscheinung, die wir bereits bei der allgemeinen Betrachtung der Rosales bewunderten. Wer sich unter Steinbrechgewächsen nur jene bescheidenen alpinen Kräuter vorstellt, die man gemeinhin als Steinbrech bezeichnet, der irrt gar sehr. Denn zur Familie gehören auch Sträucher und Bäume und liebliche Blumen. Die *Parnassie* der Herbstwiesen, das *Milzkraut* des Vorfrühlings, *Jasmin*, *Hortensie*, *Johannisbeere*, *Stachelbeere* und tropische Bäume, sie sind alle Steinbrechgewächse, zusammen wohl an 600 Arten, die über die ganze Welt zerstreut sind.

Die artenreichste Gattung ist zwar freilich der einheimische Steinbrech (*Saxifraga*) mit seinen 200 Arten, und darum geizt es auch, die ganze Familie nach ihm zu benennen. Er führt uns in die reine Luft der Hochberge, auf die Felsengrate und zwischen das Geröll der Alpen, denn dort (so wie auch in der Arktis und den Anden) hat er seine wahre Heimat. Schon die Griechen kannten ihn, und Dioskorides, ihr größter Botaniker, leitet den Samen *Saxifraga* von *frangere* und *saxum*, vom Zerklüften der Felsen, ab. Der praktische Plinius allerdings denkt aber an die Steinleiden, die man mit der Pflanze kurierte.

Als Hochgebirgspflanze ist der Steinbrech natürlich eine Rosette. Das gehört einmal zum alpinen Habitus. Und namentlich wenn er zur Blütezeit diese Rosette auflöst, sieht er (besonders *Saxifraga aizoon*) den Hauswurzeln außerordentlich ähnlich und bildet auch, wie diese, ansehnliche Polster. Auch er besitzt, wie *Sempervivum*, reichliche vegetative Vermehrung. Eine Art (*S. granulata*), die auch im deutschen Flachland an Eisenbahndämmen und auf feuchten Wiesen lebt, hat sogar ihren Artnamen von den winzigen Knöllchen der Brutknospen, die am Grunde des Stengels sitzen, ebenso *S. bulbifera* von den Brutzwiebeln, die sie ausbildet. *S. flagellaris* sendet zarte Ausläufer aus, *S. stellaris* bildet Adventivsprosse im Blütenstand, und so ließen sich noch viele Beispiele anführen.

In pflanzenanatomischer Hinsicht sind die Saxifragen besonders durch eine Erscheinung berühmt. Zahlreiche Arten sind an den Blatträndern weiß umrahmt, mit hellen Punkten übersät. Untersucht man diese Abscheidungen, so findet man, daß sie aus Kalk bestehen. Sie werden durch innere Wasserpalten (*Hydathoden*) abgesondert, und man betrachtet sie als Mittel zu gesteigerter Wasseraufsaugung.

Von den 46 deutschen *Saxifraga*-Arten wachsen fast alle nur in den Gebirgen, und zwar mit Vorliebe auf den höchsten Felsen der alpinen Region. Andere gehen allerdings auch tief herab, so z. B. die sehr verbreitete *S. aizoides*.

Sie wollen wir als Vertreter ihrer Gattung etwas eingehender betrachten. Schon tief unten, namentlich entlang der Alpenbäche, an den „Reißen“, auf von Wasser berieseltem Schutt und Sand, schlägt sie ihre prachtvolle und leuchtende Blume auf als typischer Vertreter der „Quellfluren“, oft in Massen zu triefenden Polstern beisammenstehend.

Die Blüte von *S. aizoides* ist ein wahres Juwel der Alpenflora. Goldgelb oder karminrot, mit rotgelben Punkten übersät, mit feuerrotem Pollen geschmückt, duftend von honiggelben Nektarien, ist sie eine richtige Fliegenblume, entsprechend der merkwürdigen Anziehungskraft, die gelbe und rote Farben, namentlich rote Sprengelung, auf Fliegen ausüben. Eigenartig mutet es den Pflanzkenner an, daß gelbe und rote Blüten oft dicht beisammen vorkommen, denn er hat sich daran gewöhnt anzunehmen, daß die Blütenfarbe eine gewisse Standortsvarietät anzeigt, wobei er voraussetzt, daß die Blütenfarbe der gesetzmäßige Ausdruck gewisser, allerdings noch unbekannter äußerer Einwirkungen sei. Das gemeinsame Vorkommen von gelben und roten Steinbrechblüten spricht jedoch gegen diese Begriffe, und ich möchte mich da Prof. Goebel anschließen, wenn er angesichts solcher Vorkommnisse die Ansicht äußert, sie seien ein Hinweis, daß die Formen innerhalb derselben Art auf äußere Einwirkungen ungleich reagieren. Aus solchen Erfahrungen erbaut sich eines der anziehendsten und wichtigsten Probleme der neueren Botanik, nämlich der Begriff der Individualität, der offenbar

der Pflanze ebenso zukommt wie dem Tiere und dem Menschen, freilich auch hier ebenso wie bei jenen ein psychisches Leben als Ursache der verschiedenen Reaktion auf gleiche Reize voraussetzt.

Eine ähnlich veränderliche Art wie *S. aizoides* ist auch *S. stellaris* sowie die große *S. rotundifolia* und *S. Aizoon*. Von der letzteren möchte ich hervorheben, daß sie merkwürdig anspruchslos ist und alle Gesteinarten ohne Unterschied bewohnt, während sonst die Steinbreche gewöhnlich mehr Zuneigung zu Kalkboden verraten.

Saxifraga Aizoon. (Original nach Paul Wolff, Bischheim.)

Vielleicht liegt die Gleichgültigkeit von *S. Aizoon* gegen den Boden daran, daß sie, wie Dettli gezeigt hat, mit Vorliebe auf Moosrasen keimt; sie kam wenigstens auf Kalkfelsen nur dort vor, wo sich Moos in den Spalten einnistete. Da sie sich nur sehr oberflächlich verankert, ist sie wohl nicht imstande, den ganzen, ohnedies stark wechselnden und nur ausnahmsweise reichen Wassergehalt solcher Felsenspalten auszunützen. Damit mag es wohl zusammenhängen, daß die Pflanze durchaus xerophilen Habitus trägt: dickliche Blätter, starke Oberhaut, reichliche Kalkabsonderung.

Von den einheimischen Arten der Gattung möchte ich namentlich noch zwei hervorheben, die prachtvolle, bis 60 cm hohe Blütenstengel treibende *S. Cotyledon*, die gleich den Pechneffen heraufkriechende Insekten festhält und nach A. v. Kerner's allerdings noch nicht durch Versuche erhärteter Ansicht auch verdaut.

Eine reizende kalkstete Hochgebirgsform ist auch die zierliche *S. caesia* (Bild S. 466), schon auffällig durch ihre winzigen blaugrünen, starren Rosetten und schneeweißen Blüten, die immerhin einen stattlichen Schauapparat abgeben, wenn sie, wie es meist der Fall, sich dicht aneinander drängen. Diese Steinbreche sind echte Rosettenpflanzen, die unter Umständen dicke Polster bilden und dadurch imstande sind, auch die höchsten Grate bis nahe an die 4000 m zu besiedeln. Eine andere ökologische Rolle spielen die Steinbreche aus der Gruppe *Porphyrium*, also die Arten, die sich um

Saxifraga caesia. (Original nach Paul Wolff, Wiesheim.)

S. oppositifolia gruppieren. Sie bezeichnet C. Schröter als „Schuttdecker“, denn sie werden Herr über die Schutthalben einfach dadurch, daß sie sie mit vielfach wurzelnden Zweigen überwachsen und so darauf lockere Rasen bilden.

So ließe sich noch vieles über das interessante Leben der Steinbreche, denen kein Geringerer als Engler die Ehre einer besonderen Monographie antat, erzählen, von ihrem staubleichten Samen, der so recht dazu geeignet ist, vom Wind über die Bergeswelt verbreitet zu werden, von ihrer eigenartigen Verbreitung über die Erde, die in allen Hochgebirgen eigentümliche Arten, insgesamt an 200, zählt. Auch der Gärtner geht nicht teilnahmslos an ihnen vorüber und wählt sie gerne zur Bepflanzung von Felsgruppen, wobei er an 30 Arten in reichster Auswahl wählt. Sogar als Ampelpflanze im Zimmer eignen sich manche Steinbreche, namentlich *S. sarmentosa*, der ran-

fende und sehr anspruchslose Judenbart. Er treibt reichlich Stolonen, wenn sein einziges Bedürfnis, nämlich viel Licht, dadurch gestillt ist, daß man ihn dicht aus Fenster hängt.

Etwas Fremdartiges, an das Gebirge Erinnerndes, hat auch ein näher Verwandter der Steinbreche, der liebliche Frühlingsbote *Chrysosplenium alternifolium* L., der wirklich einen schöneren deutschen Namen verdiente als den häßlichen: Milzkraut, der ihm noch aus den Zeiten anhaftet, da man die Pflanzen nur nach ihrer Nützlichkeit als Heilkraut schätzte. Alles ruft an diesem Pflänzchen danach, daß in seinem Namen das goldige Schimmern erwähnt sei, das es, namentlich in seiner Blütenregion, so sehr auszeichnet und den Mangel an Blütenblättern reichlich aufwiegt. Was man an manchen tropischen Gewächsen, z. B. den Poinsettien oder *Dalechampia*-Arten (Farbenbild Bd. II, S. 512), so sehr bewundert, die Herstellung eines wirkungsvollen Schauapparates durch Zuhilfenahme der Laubblätter, dafür bietet *Chrysosplenium*, das allervorsten verbreitete, ein treffliches einheimisches Beispiel, denn auch hier beteiligen sich die obersten Blätter an der Anlockung der Bestäuber (in diesem Falle Fliegen) durch ihr Gleißeln und die gelbliche Färbung. Ein solches „Vikariieren der Funktion“, wie sie dieses bescheidene Blümchen zeigt, gibt dem Naturfreund viel Stoff zum Nachdenken. Was veranlaßt die Hochblätter zu den anatomischen Veränderungen, durch die der Goldglanz zustande kommt? Er ist zu auffällig auf seinen Zweck hin angelegt, als daß man hier an einen zufälligen Nebeneffekt glauben könnte. Die Wege der Naturgesetzmäßigkeit, auf denen das Schauapparatbedürfnis der Blüte in solcher Weise befriedigt wurde, muten hier so verworren und geheimnisvoll an, daß man ganz verzagt wird angesichts der Größe des Lebensproblems, das sich darin dem forschenden Geist aufdrängt. Er fragt hier noch vergebens, aber er ringt nicht ohne Nutzen mit seiner Aufgabe. Denn er kehrt aus dem Kampf mit der sehr wertvollen Einsicht zurück, daß es geradezu kindlich ist, schon jetzt zu hoffen, es werde sich das „Leben“ gleich beim nächsten Fortschritt entschleiern, es sei bereits die elfte Stunde des Tages erreicht, an dessen Mittag das Lebensrätsel vor aller Augen offen daliege. Diese Ansicht ist gerade in Gelehrtenkreisen weit verbreitet und hat ihre begeistertsten Herolde in den Anhängern der mechanischen Lebenserklärung. Das kleine Milzkraut protestiert dagegen und gibt zu verstehen, als sei noch kaum der Morgen jenes Tages angebrochen, an dessen Mittag die lebende Substanz kein Geheimnis mehr vor dem Menschen hat.

Ein gleiches sagt uns eine andere Blume aus der Familie der Steinbrechgewächse, die den Herbst verkündet, so wie das Milzkraut des Lenzes Bote ist. Ich meine das Studentenröschen (*Parnassia palustris*), eine der wunderbarsten Blumen der ganzen deutschen Flora.

Parnassia ist auf nassen, schlammigen Wiesen und auf trockenen Gebirgsbergen durch ganz Deutschland verbreitet. Besonders häufig entfaltet es seine schöne, reinweiße Blume in den Boralpen, wo es vom August bis in die ersten Oktobertage oft noch als letzte Blume blüht, während sein Flor im Flachland gewöhnlich schon im Juli einsetzt. Den deutschen Namen Herzblatt verschafften ihm die kleinen, prächtig herzförmigen Blätter; ebensogut könnte die Parnassie aber auch Einblatt heißen, denn im blühenden Zustand sieht man nicht viel mehr von den Vegetationsorganen als ein einziges stengelumfassendes Blättchen an dem Stiel, der die große Blüte bis über zwei Dezimeter hoch über den Nasen emporträgt.

Diese Blüte ist ein wahres Wunderwerk der pflanzlichen Gestaltungskraft. Da ich sie und ihr Leben mit viel Liebe studiert habe, sei es mir gestattet, ihrer hier etwas ausführlicher zu gedenken.*

Parnassia wird von dem Blütenbiologen als proterandrisch dichogam bezeichnet. Das heißt, ihre Blüte hat zwei Stadien, sie blüht zuerst männlich, dann weiblich. Sie sichert sich ihre Befruchtung dadurch, daß sie den Besuchern die reifen Staubbeutel durch aktive Bewegungen entgegenstellt. Dies tun viele Pflanzen, und es genügt, von den jedem Blumenfreund zugänglichen nur die Kapuzinerkresse zu nennen, um zu eigener Beobachtung der Erscheinung jedermann eine Gelegenheit zu zeigen. Wenn aber bei den verschiedenen Ranunkulazeen, Krassulazeen, Karyophyllazeen, bei denen sich solches zeigt, hierdurch nur das erreicht wird, daß die besuchenden Insekten den Nektar nur durch Berührung der höher gestellten Antheren gewinnen, so ist bei Parnassia (auch bei Ruta) die Sachlage dadurch kompliziert, daß durch Bewegungen zu richtiger Zeit den Besuchern abwechselnd bald die Anthere, bald die Narbe entgegengestellt wird. Dies vollzieht sich so auffällig, daß schon der erste Beobachter, nämlich der Altmeister der Blütenbiologie, G. Chr. Sprengel, davon wußte. Wie diese Bewegungen stattfinden, zeigen besser denn jede Beschreibung meine Zeichnungen S. 470, welche die Veränderungen in einer Blüte im Ablauf von 83 Stunden festhalten. Ein Staubfaden nach dem anderen wächst heran, beugt sich tagsüber über die Narbe und rückt im Laufe der Nacht von ihr ab, um dem Nachfolger Platz zu machen, dies geht so 5—7 Tage hindurch. Es wird dadurch den zahlreichen Insektenbesuchern, die vorwiegend Fliegen sind, stets reifer Pollen auf der Stelle aufgeladen, mit der sie die Narbe berühren müssen, wenn sie ältere Blüten des weiblichen Stadiums besuchen, denn die Narbe blüht erst am 6.—8. Tage auf (vgl. Bild Bd. II, S. 543).

Parnassia palustris. Eine sich autogam befruchtende Blüte.
(Original nach H. Dopfer-München.)

davon wußte. Wie diese Bewegungen stattfinden, zeigen besser denn jede Beschreibung meine Zeichnungen S. 470, welche die Veränderungen in einer Blüte im Ablauf von 83 Stunden festhalten. Ein Staubfaden nach dem anderen wächst heran, beugt sich tagsüber über die Narbe und rückt im Laufe der Nacht von ihr ab, um dem Nachfolger Platz zu machen, dies geht so 5—7 Tage hindurch. Es wird dadurch den zahlreichen Insektenbesuchern, die vorwiegend Fliegen sind, stets reifer Pollen auf der Stelle aufgeladen, mit der sie die Narbe berühren müssen, wenn sie ältere Blüten des weiblichen Stadiums besuchen, denn die Narbe blüht erst am 6.—8. Tage auf (vgl. Bild Bd. II, S. 543).

* Vgl. meine Abhandlung: Die gamotropen Bewegungen von Parnassia palustris L. (Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre. Bd. III.)

Nun fand sich in Knuths Blütenbiologie eine höchst merkwürdige Mitteilung dieses sonst sehr gewissenhaften Beobachters, wonach Parnassien, die im Zimmer in einem Wasserglase gehalten wurden, ihre Tätigkeit anders regulierten. Die Staubblätter vollführten keine Bewegungen, die Narbe entwickelte sich mit ihnen gleichzeitig, und so kam es zur Selbstbefruchtung, wie ich das in Bd. II, S. 542—43 ausführlicher geschildert habe.

Diese Beobachtung veranlaßte mich im Jahre 1907, mich dem Studium der Parnassien zuzuwenden. Vor allem ergab sich, daß sich die Autogamie auf die angegebene Weise wirklich provozieren ließ. Sie kommt allerdings auch in der Natur vor, aber unter künstlich hergestellten ungünstigen Verhältnissen etwa viermal häufiger als sonst. Aber ich gewann auch den Eindruck, daß dies auf physiologischen Störungen beruhe.

Blüte von *Parnassia palustris* in den einzelnen Entwicklungsstadien.

Fig. 1 = Entfaltung der Knospe am 1. Okt. 9 Uhr morgens. 2 = Zustand der Blüte am 2. Okt. 8 Uhr morgens. 3 = Stellung der Staubgefäße am 3. Okt. 8 Uhr morgens. 4 = 3. Okt. 7 Uhr abends. 5 = 4. Okt. 8 Uhr morgens. 6 = 4. Okt. 8 Uhr abends. (Originalzeichnung des Verfassers.)

Dagegen stellten sich eine Menge neuer Erkenntnisse bei diesen Untersuchungen ein. Als deren wichtigste erscheint mir, daß die Befruchtung auf die Filamentbewegungen hemmenden Einfluß hat. Amputationsversuche zeigten schließlich, daß diese Bewegungen automatisch ablaufen und nicht individuell variabel sind. Dies trifft aber durchaus für die instinktiven Tätigkeiten der Tiere zu, und so war erstmalig für die „gamotropen Bewegungen“ von *Parnassia* experimentell eine triebartige, eine Instinkthandlung nachgewiesen und damit das Gebäude der Pflanzenpsychologie wieder an einem neuen Punkte in Angriff genommen.

Eine bemerkenswerte Eigenheit der Parnassia-Blüte, die der Blume besonderen Reiz verleiht, ist ihr Täuschapparat, nämlich die zahlreichen, mit drüsigen Borsten endenden Staminodien, die nach der herrschenden und wohl auch gerechtfertigten Ansicht zum Anlocken der Bestäuber dienen.

In naher Verwandtschaft zu dieser eigenartigen Blume befindet sich ein Strauch, der zwar ursprünglich aus Asien, dann aus Nordamerika — angeblich aus dem Staate New York — zu uns gekommen ist, jetzt aber so sehr Bürgerrecht auf deutschem Boden erlangte, daß die meisten ihn wohl für ein einheimisches Gewächs halten, um so mehr, als er ja in Süddeutschland auch verwilderte. Dies ist der Jasmin (*Philadelphus coronarius* L.), das unentbehrliche Requisit schwüldestender Sommernächte bei der älteren Generation zuckersüßer Tyrik. Er trägt diesen Namen übrigens zu Unrecht, denn es gibt einen echten Jasmin (*Jasminum Sambac*), der aber bei uns nicht im Freien wächst. Deshalb ziemte ihm auch besser der allerdings äußerst nüchterne Name Pfeifenstrauch*, weil man seine Schößlinge als Pfeifenrohr verwendet. Mag der Geruch seiner großen weißen Blüten vielen auch unerträglich erscheinen, wir würden

* Pfeifenstrauch nennt man aber auch *Aristolochia macrophylla*.

den schönblättrigen, üppigen Busch im Park doch ungern entbehren. So haben denn auch die Gärtner ein ganzes Duzend Arten in ihrem Arsenal, darunter solche, die, wie *Ph. latifolius* Schrad., erst im Juli dann blühen, wenn das Parkgebüsch schon blütenleer ist, andere auch geruchlos oder mit gefüllten Blüten oder weiß- und gelb- bunten Blättern. Diese Verwandtschaft hat überhaupt dem Gärtner viel zu sagen, denn hierher gehört auch die ursprünglich japanische Deukie (*Deutzia*), die mit ihren schönen Bastarden im Garten längst heimisch ist, wie auch die aus gleicher Heimat stammenden Hortensien (*Hydrangea* [*Hortensia*] *opuloides* Koch), deren allgemeiner Verbreitung nur im Wege steht, daß sie nicht winterhart sind. Man kann sie ja in milden Gegenden unter einer starken Reisigdecke ganz gut überwintern, aber Lehmann hat doch vollkommen aus der Praxis gesprochen, wenn er empfiehlt, sie im Herbst mit den Wurzelballen auszuheben, wenn man sie nicht gleich als Kübelpflanze behandelt, wie das zumeist geschieht.

Philadelphus coronarius in Blüte. (Naturaufnahme von B. Galdy.)

Den Pflanzenfreund fesselt an diesen Gewächsen gar mancherlei, und er hat in Park und Wohnstube durch sie Gelegenheit zu allerlei belehrenden Beobachtungen. So besitzt der Pfeifenstrauch eine höchst seltsame Art der Rindenablösung. Im Frühling zerreißen die holzigen Zweige ihren Rindemantel so gründlich, daß er in ringförmig gerollten Schuppen völlig abfällt. Darunter sitzt aber schon wieder eine neue weiße Rindenschicht, die sich im Laufe des Sommers bräunt. Auch sonst hat der Strauch seine Besonderheiten. Seine Blattknospen legt er unter dem Stiel der Blätter so an, daß dieser ihnen wie eine Kappe übergestülpt ist

und sie auch noch nach dem Laubfall schügt. Die Hortensien hingegen — die man zu deutsch auch Wasserstrauch nennen hört — sind ein prächtiges Musterbeispiel für „Schaublüten“, obwohl viele unserer einheimischen Doldenpflanzen hierfür ebensogut zu verwenden sind. Die randständigen Blüten der Trugdolden entwickeln sich als Lockapparat. Sie verwenden ihr ganzes „Kapital“ nur auf die Ausbildung der Blumenblätter und werden im Dienste des Gesamtinteresses dadurch unfruchtbar. Diese Tendenz hat die Gärtnerkunst sich zunutze gemacht und Abarten herangezogen, die fast aus lauter Schaublüten bestehen. Mit den Hortensien ist gärtnerischer Kunst ein kurioses Kunststück gelungen. Man kann die gewöhnlich grünlichweißen oder rosaroten Blüten künstlich himmelblau färben. Dies erfolgt, wenn man der Topferde — am besten Moorerde mit Sand und Lehm — etwas Eisenvitriol oder Eisenfeilspäne zusetzt und sie ab und zu mit Alaunwasser gießt. Nach anderen soll man zu der übrigens sehr reichlichen Bewässerung Wasser wählen, in dem längere Zeit rostiges Eisen lag. Auch kann man eine besondere „Hortensienerde“, namentlich von den Leipziger Gärtnern, beziehen. Die Physiologie der Erscheinung ist noch völlig im dunkeln.

Ich möchte von den Hortensien nicht scheiden, ohne noch ein Wort einzulegen zugunsten der *Hydrangea* (*Hortensia*) *paniculata*. Verdient sie doch angesichts der geringen Pflege und vollkommenen Widerstandsfähigkeit gegen den Winterfrost einen ersten Rang unter den Ziersträuchern namentlich dadurch, daß wir kein Parkgehölz haben, das ebensolange blüht. Ich habe keinen Zweifel, daß die herrliche, etwa 20 Jahre alte *Hydrangea*-Gruppe, die den Frankfurter Palmengarten schmückt, dem prachtvollen Gewächs viele Freunde unter den gärtnerischen Lesern meines Buches werben wird.

In das Kapitel der Ziersträucher gehören auch zwei andere Gewächse aus der nächsten Verwandtschaft der Hortensien, von denen die meisten nicht ahnen, daß sie auch Schönheit und nicht nur gemeinen Nutzen bedeuten können. Dies sind die Johannisbeere und die Stachelbeere, beide dem Geschlecht *Ribes* angehörig. Wir machen uns von der Bedeutung solcher Beerensträucher nur einen recht geringen Begriff, entsprechend dem bescheidenen Gartenwinkel, in den wir sie gewöhnlich verweisen. Um sie ganz zu würdigen, müssen wir nördliche Länder aufsuchen, Skandinavien oder Nordamerika, dort, wo der Baumwuchs schon mit Schwierigkeiten kämpft. Dort ist das Dorado der Beeren, und dort gedeihen sie auch merkwürdigerweise in einer Üppigkeit, die unserer Zone ganz fremd ist. Prof. H. Erdmann entrollt in seinem Reisebericht über Alaska, dem neuen Goldmarchenland im scheinbar ödesten Teil des nordwestlichen Amerika, ein Bild von dieser Üppigkeit, das unser Staunen erregt. Es heißt bei ihm: „Ganz besonders charakteristisch für die kleine Flora ist aber die Fülle von essbaren Beeren, die hier überall anzutreffen sind. Von den köstlichen Himbeeren war schon die Rede; Blaubeeren gibt es überall und Preiselbeeren pflegen den ‚Möck‘ in unerschöpflicher Fülle zu bedecken. . . . Aber noch edleres Wildobst findet sich in den üppigen Waldgründen des inneren Alaska, nämlich die Stachelbeere und drei verschiedene Sorten von Johannisbeeren. Außer der schwarzen Johannisbeere bemerkt man zwei Arten von Sträuchern mit roten Trauben. Die eine Sorte, die in unserer Heimat nicht kultiviert wird, ist in Alaska selbst auf mäßig fruchtbarem Tieflandboden in großer Menge

anzutreffen; sie ist freilich die weniger wohlgeschmeckende. Auf dem besten Waldboden, namentlich da, wo alte Baumstämme vermodern und eine reiche Humusschicht befruchten, finden wir in der vollen Wildnis stattliche Sträucher der echten Johannisbeere unserer Kunstgärten. Und zwar sind dort die Sträucher so voll von Trauben und die einzelnen Trauben so reich an leuchtenden, fast kirschgroßen Beeren, wie ich Ähnliches nur in den besten Kunstgärten Hollands gesehen zu haben mich erinnere. Dazu sei bemerkt, daß auch die von Alaska sehr weit entfernten östlichen Teile Nordamerikas, die Grönland benachbart sind, ihren skandinavischen Entdeckern durch das massenhafte Vorkommen einer der Weintraube nicht ganz unähnlichen Wildbeere auffielen und infolge des Vorkommens so köstlichen Obstes als Weinland (nordisch Vinland) bezeichnet wurden. Auch dort scheint es sich um unsere Johannisbeere gehandelt zu haben.“

Die Ribesarten, die einen scheinbar so unwirtlichen großen Teil der Erde dermaßen verschönern, sind an sich ziemlich unaussehliche Sträucher. Ihre Heimat haben sie auf dem ganzen Erdball in der nördlich gemäßigten Zone, am meisten in der Mandschurei und in Nordamerika, von wo auch die wertvollsten der etwa 125 Arten (Engler gibt allerdings nur 50 Arten an) zu uns gekommen sind. Merkwürdigerweise gibt es noch keine monographische Bearbeitung einer so wichtigen Pflanzengattung, und so sind wir denn auf sehr vielfach zerstreute Angaben angewiesen, wenn wir uns ein einigermaßen plastisches Bild ihrer Naturgeschichte einprägen wollen.

Rein botanisch ist sehr wenig von ihnen zu sagen. Die eigentliche Grundform, der wir das Hauptaugenmerk zuwenden müssen, ist die Stachelbeere (*Ribes grossularia* L.), die heute überall in Gärten angebaut wird, sich aber auch in Gehölzen und Wäldern breit macht, dort allerdings verwildert. Es ist eine noch offene Streitfrage, ob sie wirklich wild in Deutschland heimisch sei. Tatsache ist, daß sowohl sie wie die Felsenjohannisbeere (*R. petraeum* Wulf.), die schwarze und rote Johannisbeere (*R. nigrum* L. und *R. rubrum* L.) in ganz Deutschland, mit Ausnahme des Nordwestens, scheinbar wild wachsen, während die Alpenform (*R. alpinum* L.), auf Felsen wachsend, durchaus den Eindruck eines erbeingesehnen Alpenstrauches macht, der die Wälder bis zur Baumgrenze, also etwa 1700 m Höhe, schmückt (im Kaukasus sogar bis 2130 m). Noch höher geht übrigens die Felsenjohannisbeere, die mit ihren dunkelgrünen Blättern und blutroten Beeren die Gehänge des Engadins bis 2300 m Höhe schmückt.* Sie blüht dort allerdings erst Mitte Juli, während sonst die Ribes-Arten zu den ersten Frühblühern der heimischen Flora gehören. Schon im Vorfrühling entfalten sie im Schutze scharfer Stacheln mit den Blättern zusammen die unscheinbaren Blütenglöckchen, mit weißrosigen Blütenblättern, die allerdings reichlich besucht werden. Aus dieser einfachen Blüte hat man eine schönere Form durch Bastardierung gezogen, außerdem hochstämmige Nordamerikaner, namentlich die Goldjohannisbeere (*Ribes aureum*) und ihre Verwandten eingeführt, die heute mit gelben und roten Blüten beliebte Ziersträucher darstellen.

Biologisch — oder wie nach der neuesten Übereinkunft der Botaniker richtiger zu sagen ist: ökologisch ist von den Ribes-Arten sehr wenig Gemeininteressantes zu vermelden. Nur eine Tatsache verdient hervorgehoben zu werden. Die einheimischen

* Im Himalaja geht *R. luridum* und *glaciale* sogar bis 4000 m.

Arten haben durchweg unscheinbare grüngelbe, grün-rotgesäumte Blüten und ganz leichten Duft. Sie bieten aber den Bienen die erste Tracht im Jahre, werden daher reichlich besucht. Die nordamerikanischen *Ribes* blühen hingegen erst spät, im Mai, sogar erst im Juni (z. B. *R. divaricatum* Dougl.). Solche Spätblüher treiben nun stets schöngefärbte, auffällige Blüten, dunkelpurpur bei *R. sanguineum*, prachtvoll goldgelb bei *R. aureum*. Zugleich duften sie stark und würzig wie Nelken. Der Zusammenhang, die Zunahme der Vorkmittel mit der Schwierigkeit der Anlockung beziehentlich dem Wettbewerb mit anderen Blüten, ist so auffällig, daß man hier ein Paradebeispiel für direkte Anpassung vor sich hat.

Für die Obstwirtschaft ist die Gattung *Ribes* auch bei uns nicht ohne Bedeutung, sowohl was den Konsum der rohen Früchte wie die Herstellung von Johannisbeerwein betrifft. Demgemäß wurden aus der Stachelbeere (*Ribes grossularia* L., der österreichische Dialektname Agrasel kommt von der slawischen Bezeichnung *agresch*) an 300 Garten-

1 = Goldjohannisbeere (*Ribes aureum*). 2 = Rotjohannisbeere (*R. sanguineum*).
(Nach B. F. Zschulz.)

weniger aus der Johannisbeere (*Ribes rubrum* L., das österreichische Ribisel ist eine Verballhornung des Lateinnamens), die man sowohl in rosenroten, grünlichweißen wie kirschgroßen, dunkelpurpurnen Varietäten der Früchte kennt. Eine schwarze Johannisbeere von wangenartigem Geruche, die sog. Albeere, ist eine besondere Art, gelehrt als *R. nigrum* L. bezeichnet. Der Sage nach soll die Johannisbeere ein Geschenk der Normannen sein, die sie von ihrer Heimat an die französischen Küsten

brachten, von wo sie sich verbreitete. Tatsache ist, daß sie vor dem 15. Jahrhundert von den Schriftstellern nicht erwähnt wird. Allerdings soll sie nach anderer Ansicht wieder ein Geschöpf der Gartenkunst sein, durch Kreuzung aus dem einheimischen *R. domesticum* gewonnen — wie bei fast allen Kulturpflanzen, verwißt sich also auch hier der Ursprung.

Eine höchst gefährliche Krankheit des Strauches, dem am meisten Leimboden und sonnige Lagen zusagen, ist der Schmarogerpilz (*Gloiosporium Ribis* Montg.), der auch auf die Stachelbeere übergeht, aber durch Bespritzen mit Bordeauxbrühe (vgl. Bd. III, S. 425) abgehalten werden kann.

Anspruchsvoller ist die Stachelbeere, die sowohl guten Boden wie geschützte Lagen braucht, um entsprechende Ertragnisse zu liefern, die besonders die Engländer schätzen und aus deren großbeerigen Sorten auch Obstwein bereitet wird.

Eine höchst verheerende Krankheit, der Stachelbeermeltau, verursacht durch den Pilz *Sphaerotheca mors uvae* Berk., gelangte aus Nordamerika zuerst nach Rußland und verbreitete sich von dort über Europa. Wie allen Meltaupilzen, kann auch ihm durch Schwefeln Gehalt geboten werden (vgl. darüber Bd. III, S. 429).

Schließlich möchte ich jenen, die Neigung haben, in ihrem Garten sich der noch sehr ausdehnungsfähigen und rentablen Beerenobstzucht zu widmen, als Führer hierin das gute Buch von Barfuß (Der Beerenbau, Paderborn 1892) empfehlen.

Von den Steinbrechgewächsen, deren wichtigste einheimische Vertreter hiermit vorgeführt sind, führt eine große Anzahl kleiner, meist tropischer Übergangsfamilien

(*Cunoniaceae*, *Myrothamnaceae*, *Pittosporaceae*, *Hamamelidaceae* u. a.) zu einem wohl bekannten Baum unserer Heimat, nämlich der echten Platanen (*Platanus*, als Hauptarten *Pl. orientalis* L. wild von Italien bis zum Himalaja und *Pl. occidentalis* L. ursprünglich von Kanada bis Mexiko, jetzt aber auch in ganz Mitteleuropa verwildert, deren Eigenart zuliebe die Systematik die Familie der Platanaceen errichtete).

Man könnte demjenigen, der behaupten wollte, die Platanen sei der schönste aller Bäume, nur schwer widersprechen, so sehr besticht der mächtige Stamm mit seiner prachtvollen Rinde, das feingeschnittene malerische Laub, der breite ausladende und doch wieder edel, bis zur Höhe von 30 m strebende Wuchs dieses Baumes, der diesen vielen Vorzügen noch den der Schnellwüchsigkeit und eines wertvollen, dem Ahornholz gleichkommenden Holzes anreicht. Im Orient, wo er von altersher mit Recht als heiliger Baum gefeiert wurde, erreicht er Maße, die alles Gewohnte in Schatten stellen. Die größte Platanen Europas steht bei Konstantinopel, im Tal von Bujukdere. Man schätzt sie, dementsprechend, daß ihr Stammumfang 50 m beträgt, auf ein Alter von 2000—3000 Jahren. Aber man braucht gar nicht so weit zu gehen, um außergewöhnliche Schaustücke dieser Art zu sehen. Auch Österreich hegt ein derartiges Naturdenkmal. Im südlichen Dalmatien, im Ausflugsgebiete von Makarska, schattet eine ganze Anzahl solcher uralter Platanen (bei Camosa), die mit denen von Bujukdere sehr wohl den Wettbewerb aushalten.

Gartenformen der Johannisbeere. (Nach Revue horticole.)

Als Park- und Alleebaum ist die Platane dem Gärtner stets willkommen, dort, wo er ihr die nötige reichliche Bewässerung zuteil werden lassen kann, um so mehr, als sie den für die Aneinanderlage von Parks und Gärten um Villen unbezahlbaren Vorteil hat, daß sich auch noch ältere Bäume ohne Schaden umpflanzen lassen. Nur ganz jung ist die Platane sehr empfindlich. Man kann sich zwar helfen, indem man die jungen

Stämme mit Stroh umwickelt, doch hindert diese Zartheit vielerorts dennoch die Einbürgerung des Baumes.

Die Platane ist einer der wenigen Bäume, die auch der Laie nie mit anderen verwechselt. So auffallend ist ihr Merkmal, daß sich ihre Borke in großen Platten abschlüpfert, wodurch die Bäume auch glatt wie eine Säule dastehen. An der Borke kann man die morgenländische Art auch leicht von der abendländischen unterscheiden, denn ihre Borke ist rissig.

Eine merkwürdige ökologische Eigenart der Platanen ist ihr Haarfilz, durch den sie in gewisser Hinsicht beinahe gesundheitschädlich wirken. Die jungen Blätter sind nämlich mit 3—5 strahligen, schönen Quirlhaaren dicht besetzt, die im Laufe der Blattentfaltung abfallen. Dadurch wird um diese Zeit der häufige Besuch

Riesenplatane aus dem botanischen Garten zu Padua.
(Naturaufnahme von S. Dopfer-München.)

von Platanenalleen vergällt, da die Haare, in die Atnungswege gelangend, dort, aber auch in der Augenbindehaut lästige Entzündungen hervorrufen. — Auch die Geschichte dieser Bäume verdient in einer Notiz festgehalten zu werden. Die fossilen Blattabdrücke beweisen, daß die Platane einst nicht nur in Deutschland Wälder bildete, sondern bis in den höchsten Norden vordrang. Sie war zwar hier nicht eingeboren, denn ihre wahre Heimat scheint Nordamerika zu sein. Von dort sind sie offenbar auf einer zur Tertiärzeit bestandenen Landverbindung zwischen Nordamerika und Europa zu uns gelangt und erst durch die Eiszeiten nach Süden zurückgedrängt worden, von wo sie dann der Mensch wieder bis an die skandinavischen Grenzen verbreitete. Hierfür liegen geschichtliche Beweise vor, aber eine Tatsache würde auch ohne sie schon daraus hervorgehen, daß sie in unseren Gegenden nur in heißen Sommern keimfähige Samen hervorbringen.

Für den botanischen Unterricht bieten die Platanen ein äußerst belehrendes Beispiel. Denn sie sind, obwohl sonst in jeder Hinsicht hochentwickelt, in der Ausbildung ihrer Blüten so zurückgeblieben, daß man sie deshalb früher für Verwandte der Brennesseln hielt, wovon man heute allerdings abgekommen ist. Niedenzu sagt von ihnen, sie seien durch ihre Blütenverhältnisse ein auf der tiefsten Stufe der Entwicklung stehengebliebener Typus der ganzen Gruppe der Rosifloren. Und er weist auch auf den Schlüssel der seltsamen Erscheinung hin. Die Platanen sind Windblütler und durch diese bequeme und mühelose Lebensweise sind sie dem Zwange höherer Entwicklung entgangen. Dies spricht gar trefflich zugunsten des Lamarckistischen Satzes, daß die Bedürfnisse der Lebewesen die Ursache ihrer Höherentwicklung seien.

Die Rosen und ihre Verwandten.

Es ist zwar kühn, als Überschrift eines Kapitels: Die Rosen und ihre Verwandten zu wählen, wenn diese Verwandtschaft 1650 Arten zählt und die den Namen gebende Gattung nur 100. Aber auch hier wie im Menschenleben entscheidet nicht die Kopfzahl, sondern die Bedeutung des Führers, der der Zeit den Namen gibt. Und welche der Rosenverwandten könnte an Ruhm, Vollkommenheit und kulturgeschichtlicher Bedeutung an die Rose, die unbestrittene Königin der Blumenwelt, heranreichen, mögen auch Apfel und Birne, Pfirsich und Kirsche, Erdbeere und Himbeere, die ihren systematischen Hofstaat bilden, noch viel mehr Nationalvermögen jedes Jahr schaffen als der Rosenflor. Es sind das ungezählte Millionen, von deren Vorbedingungen hier die Rede sein soll als Beweis, daß die Zeiten längst vorbei sind, in denen Botanik artiger Zeitvertreib und Stubengelehrsamkeit war. Viele Menschen sind noch heute dieser Meinung, daß nur Chemie und Physik sich in technische Werte und Industrien umsetzen lassen, daß von den Naturwissenschaftlern nur der Chemiker und der Elektrotechniker ein Mann der Praxis sei. Ihnen will ich einmal einige Zahlen entgegensetzen, die den Beweis liefern, daß Blumen und Obst Millionen und aber Millionen bedeuten, so daß jeder, der nur eine kleine Verbesserung durch botanische Studien erzielt, sei das nun ein Fortschritt in der Erkenntnis der Kreuzungs- und Fortpflanzungs- oder Artbildungsgesetze, also durch bloßes „Theoretisieren“, oder in der Ernährung oder ein Mittel, um Obstbaumkrankheiten zu bekämpfen, das Vermögen der Menschheit um ungezählte Summen bereichert. Trotzdem auf jeden Deutschen 3 Obstbäume kommen (was also etwa 180 Millionen Obstbäumen entspricht), muß das Deutsche Reich dennoch jährlich um fast 58 Millionen Mark (im Jahre 1906) Obst (am meisten Äpfel und Birnen) einführen. Diese Millionen können im Lande verdient werden, wenn sich Freude und Kenntnis der Natur noch mehr verbreiten und auch bei uns ein ähnlicher Eifer erwacht wie in Nordamerika, das sich zum größten Obstland der Erde entwickelt, so daß von dort z. B. berichtet werden kann, daß eine einzige Handelsgesellschaft 5000 Morgen Land ankauft, um darauf eine Viertelmillion Obstbäume zu pflanzen.

Und was vom Obste gilt, paßt, wenn auch mit geringeren Ziffern, für die Rose. Die 4000 Rosenarten, die in den Katalogen der Gärtner verzeichnet sind, stellen ein immenses Vermögen dar. Seine Zinsen spiegeln sich in der deutschen Handelsstatistik, die 15 Millionen für die jährliche Ausfuhr und 3 Millionen für die Einfuhr von Rosen rechnet. Dabei ist aber nicht Deutschland das Rosenland an sich, sondern Bulgarien, wo 5000 Hektar mit Rosen bebaut sind, und Persien, seit alters hochberühmt durch seine Zentifolie, sein Rosenöl und Rosenwasser.

Es mag wohl verwunderlich erscheinen, daß ich dieses duftigste aller botanischen Kapitel mit so nüchterner Geschäftsmäßigkeit, statt mit Poesie und Sage, einleite. Aber man hat so lange zuckerige und fade Gedichte geboten, wenn es galt, Botanik mundgerecht zu machen, daß dadurch wohl am meisten der Glaube aufkam, Pflanzenkunde sei gerade nur ein Aufputz am Tische der Kultur, wie der Rosenstrauch auf der Tafel, den man auch weglassen könne, ohne dadurch an seiner Bildung Schaden zu leiden.

Früchte der Rosazeen.

- 1 = Frucht von Dryas mit offenem Ovar. (Nach Baillon.) 2 = Frucht der Rose. 3 = Erdbeere (Fragaria). 4 = Himbeere (Rubus). 5 = Apfel (Pirus). 6 = Kirsche (Prunus). 7 = Fingertraut (Potentilla) reife Frucht. 8 = Potentilla, reifer Samen. 9 = Frucht von Exochorda. 10 = Steinkern in der aufgeschnittenen Frucht des Mandelbaumes. (2–5 = Nach der Natur. 6–7 = Nach Baillon. 9–10 = Nach Focke.)

Daß dies nicht wahr sei, galt es zu beweisen, und mit nichts kann man heute besser beweisen als mit dem Beweisgrunde, den jeder versteht, mit den klingenden Ziffern der Handelsstatistik. Wenn wir nun den durch solche Einführung in die große Geschäftswelt zu einer gewichtigen Persönlichkeit gewordenen Botaniker wieder zu Worte kommen lassen, so kann er uns so viel erzählen von der Rosenfamilie Art und Eigenschaften, daß wir nur mit peinlichster Auswahl das festhalten mögen, was uns davon als gemeinwissenswert dünkt.

Da wäre vor allem die Antwort auf die Frage: Woran erkennt man die Mitglieder der Rosenfamilie? Sie haben alle eine strahlig-symmetrische Blüte. Wenigstens gilt dies von allen einheimischen, während es unter den tropischen Rosazeen (aus der Unterfamilie der Chrysobalanoideen), namentlich in Südamerika, Formen gibt, deren Blüte, vermutlich durch Anpassung an langrüsselige Bestäuber, also an Falter

und Kolibris, sich im Typus durch ihre Zygomorphie bereits den Schmetterlingsblütlern nähert. So wird das unglaublich Scheinende wahr gemacht und ein, wenn auch noch lockeres Verwandtschaftsband um Rose und Bohne, die ja sonst wie Gegenpole anmuten, geschlungen.

Auf der anderen Seite knüpfen sich Verwandtschaftsmerkmale ganz unverkennbar an die Steinbrechgewächse, als deren höher entwickelte Form sich nun die Rosen erweisen. Gemeinsam ist ihnen allen, daß ihre Blütenhülle stets Kelch und Krone zu unterscheiden erlaubt. Ein Kennzeichen ist ferner die große Zahl der Staubblätter, die stets ein Vielfaches der Blumenblätter ist und manchmal an 400 betragen kann.

Auch im vegetativen Aufbau ist ein Gemeinsames vorhanden, wenn auch der Wuchs so verschieden sein kann, wie sich Erdbeere und Apfelbaum darstellen. Ihre Blätter sind stets wechselständig und mit Nebenblättern versehen.*

In äußerst verschiedener Weise ist aber ihr Gynäum und dementsprechend ihre Frucht gestaltet. Eine „karpologische“ Sammlung der Rosazeen vereinigt fast alle Typen von Früchten in sich (s. das Bild). Da gibt es Steinfrüchte, beerenartige Scheinfrüchte, Schließfrüchte, Kapseln,

Bergnymph (Dryas octopetala) auf alpinem Rasen in den nördlichen Kalkalpen.
(Naturaufnahme von S. Dopfer-München.)

Kletten, Flugfrüchte, da sind Früchte an Tiere, an Vögel, Schnecken an Windverbreitung angepaßt. Man denke, um sich dies zu vergegenwärtigen, nur an Apfel, Erdbeere, Nispel, Mandel, Rose, Pflrsich und Vogelbeere, Dryas und Geum.

Ein merkwürdiges negatives Merkmal aller Rosazeen ist, daß sie, die großen Meister der Blumenfarbe, die mehrere Hundert Farbennuancen in der einzigen Rose hervorgebracht haben, vom blendenden Weiß bis zum fast schwarzen satten Rot, niemals imstande sind, eine blaue oder violette Blüte zu erzeugen. Die viel angestrebte blaue Rose ist nach wie vor ein unerfüllter Traum der Gärtner geblieben. Dagegen dürfte es nicht schwer sein, immergrüne Rosen und Obstbäume bei uns heimisch zu machen, denn viele Arten — man denke nur an die lederartigen Blätter der Birnbäume — zeigen große Neigung, ihre Blätter mehrjährig zu gestalten, und zahlreiche Rosen sind bereits halb immergrün. Unsere Kirschbäume wandeln sich sofort in immergrüne Gewächse, wenn man sie in tropisches Klima versetzt, und sind dadurch zu klassischen Zeugen der direkten Anpassung geworden.

* Nur manche, z. B. Spiraea, entbehren sie.

Auch einige anatomische Merkmale machen die Rosazeen besonders auffällig. Da wäre vor allem zu nennen die merkwürdige Gummibildung in der Gruppe der *Prunoidae*, dem Obstzüchter unliebsam genug bekannt als Gummifluß der Kirschbäume, über dessen Ursache noch nichts Sicheres gesagt werden kann. Die Erscheinung selbst kommt durch eine Zerlösung des Holzparenchyms und der Gefäße zustande.

Für den Systematiker und Pflanzengeographen bilden sie schließlich einen uner schöpflischen Gegenstand des Entzückens, sei es, daß er sich in die fabelhafte Formenwelt der 4000 Rosenvarietäten vertieft oder in die nicht minder mannigfaltige der *Potentillen*- und *Alchemillenbastarde* oder gar in das undurchdringlichste Dickicht aller Systematik, nämlich in die *Rubi*, die *Brombeeren*, denen an Vielgestalt im ganzen weiten Pflanzenreich vielleicht nur noch zwei Pflanzengattungen, nämlich die *Segge* (*Carex*) und das *Habichtskraut* (*Hieracium*), an die Seite gestellt werden können.

Dieser Gestaltenreichtum verrät schon, welch vielgewandte und lebenskräftige Pflanzen sich in dieser Gruppe vereinen. Dementsprechend bestätigt der Pflanzengeograph, daß die Rosen und ihre Verwandten sich die ganze Erde erobert haben und vom rauhesten Norden, wo sie noch als Zwergsträucher den Boden schmücken und als *Eberesche* auf Island den höchsten aller Bäume bilden, bis in die Tropen — die von *Rubus*, *Geum*, *Alchemilla* und *Agrimonia* wenigstens in den Gebirgen besiedelt werden — in allen Ländern der Erde heimisch sind. Im allgemeinen scheint ihnen, dem Idealtyp einer harmonisch entwickelten Pflanze, auch das ausgeglichene, von Extremen verschonte Klima der gemäßigten Zone besser zu behagen als das der heißen Länder. Es läßt sich sogar wie bei der menschlichen Kultur eine gewisse Hinneigung zu den rauheren Ländern nicht verkennen, nur geht sie bei den Rosazeen noch weiter als bei dem Menschen. Der von uns schon erwähnte Prof. Erdmann erzählt z. B., daß die nicht nur aus ihren Blüten, sondern sogar mit den Blättern duftende *Alaskarose* (*Rosa cinnamomae*) ein echtes Wahrzeichen jenes Nordlandes sei. Und *Dryas*, die Bergnymphe, der reizende Schmuck der heimischen Hochgebirge, bedeckt mit ihrem schöngekerbten Laub und den prachtvoll silberschimmernden Blüten in der arktischen Tundra bis hoch hinauf nach Grönland weite Flächen. Gewöhnlich aber bilden Rosen keine Massenvegetation, sondern sind in das Pflanzenkleid als Schmuck eingestickt, auch damit verratend, daß sie Kinder des edelsten Maßhaltens sind. Merkwürdigerweise zeigt sich diese goldene mittlere Linie, die ihr ganzes Wesen bestimmt, auch noch in ihrer Lebensweise selbst, denn sie meiden alle Extreme und Besonderlichkeiten, so wie sich die Patrizier einer Stadt scheuen vor ungewohntem Beruf. Die Rosen gehen weder als Schwimmer in das Wasser, sie vermeiden den Sumpf, sie leben niemals parasitär, es gibt keine Epiphyten, keine Saprophyten unter ihnen — sie wurzeln fest im Boden, nähren sich auf durchaus normale Weise und sind in allem der Idealtypus des hergebrachten Begriffes einer Pflanze.

Am nächsten an die Steinbrechgewächse schließt sich in dieser Familie *Spiraea*, die *Spierstaude* des Bachufers und der Gärten, an (s. das Bild). Besser eignete ihr der Name *Zierstaude*, denn fürwahr, sie ist die prächtigste Zier des Waldes mit ihren mächtigen weißlichen bis rosenroten Blütenrispen, die sich natürlich der Gärtner nicht entgehen lassen konnte. Für seine Zwecke verwendete er weniger die heimische *Sp. salicifolia* L. als vielmehr eine Reihe nordasiatischer Arten mit ihren vielen

Berühmte Systematiker

A. v. Kerner

A. Engler

R. v. Wettstein

Bastarden, die sich mit gefüllten, reinweißen, gelblichen oder Rosablüten als anspruchslose Sträucher längst in jedem Parke eingeführt haben.

In manchen Lehrbüchern findet man unter dem Namen Spierstaude ein anderes, allerdings verwandtes Gewächs, *Filipendula ulmaria*, bezeichnet, das ebenfalls an feuchten Standorten wächst, sich aber durch seine Fiederblätter sowie seine stets gelblichweißen Blütenrispen leicht von dem vorigen unterscheiden läßt. Allen diesen Bewohnern so feuchter Standorte, an denen selbst an Sommermorgen die Nebel ziehen und alles

Spiraea Aruncus in einer feuchten Waldschlucht. (Naturaufnahme von E. S. Peters† = Graz.)

vor Masse trieft, ist es eigen, daß ihre Blätter an der Unterseite mit einem dichten Filz grauer Haare überkleidet sind. Das hat seine ökologische Bedeutung als Schutz vor dem Verschließen der Spaltöffnungen, so gut wie die Vereinigung der Blüte in eine weithin sichtbare und duftende Rispe in dem Falle, da die einzelne Blüte zu klein ist, um auffällig zu sein.

Auf unserem weiteren Wege durch das System der Rosaceen treffen wir einen alten Bekannten aus der Kinderzeit: die Mispel, das aromatische Obst, das man erst dann essen kann, wenn sich sein Fruchtfleisch, wie bei gewissen Winterbirnen, faulig erweicht.

Mespilus germanica L. nennt sie der Botaniker und deutet damit an, daß sie ein echt deutsches Gewächs ist, vielfach verknüpft mit Gebrauch und Sage. Dazu will es allerdings gar wenig passen, daß neuere Forschung als ihre Heimat nicht deutschen Boden, sondern den Orient erkennen will. Jedenfalls muß sie sehr früh (vielleicht mit der Einwanderung der Griechen) von dort zu uns gelangt sein. Auf diesen Weg deuten

verschiedene Anzeichen, am meisten, daß sie der romanischen Kulturwelt folgte und noch heute in Frankreich und Italien besonders gehegt wird. Sie bildet in der Kultur einen bis 6 m hoch werdenden Strauch, an dem sich eine prächtige Anpassung beobachten läßt. Man kann die Mispel auch als Baum kultivieren und wird dann bemerken, daß sie, die vielstachelige, auf dem Hochstamm die Dornen verliert! Wer kann das anders erklären als mit den in diesem Werke vertretenen Begriffen? Die Dornen sind Schutzmittel, die abgelegt werden, wenn das Bedürfnis dazu schwindet.

Riesenweißdorn (*Mespilus oxyacantha*) in Blüte bei Niedenburg im Altmühltal.
(Naturaufnahme von G. Dopfer=München.)

Von den etwa 40 Mispelarten ist sonst botanisch nichts Besonderes bekannt. Nur die eine Bemerkung dürfte nicht überflüssig sein, daß die gemeinbekannten Weißdorne und Rotdorne, die man auch in den modernsten Lehrbüchern als *Crataegus* bezeichnet findet, von der systematischen Forschung schon seit längerem als Mispeln betrachtet werden.

Gärtnerisch bieten die Mispeln auch nicht allzuviel des Erwähnenswerten. Die eßbaren Mispeln haben es zu keiner besonderen volkswirtschaftlichen Bedeutung gebracht, noch weniger zu einer gärtnerischen, obwohl ihre schönen großen, heckenrosenähnlichen Blüten ihnen im Lenz ein überaus gefälliges Ansehen geben. Die Weißdornarten hingegen, die zu alten und schönen Bäumen heranwachsen können und von denen der Gärtner als Sträucher in Anlagen eine ganze Reihe von Arten (*M. oxyacantha* [L.], *M. azarolus* L. u. a.), auch rote gefüllte Hängeformen und buntblättrige verwendet, deren Früchte unsere Jugend schon längst als zwar verbotenes, aber schmackhaftes „Parkobst“ erkannt hat, werden auf dem Lande mit Vorliebe zu Hecken benützt ob der zahlreichen

Dornen (daher auch Hagedorn genannt). Man kommt jedoch davon immer mehr ab, seitdem man die große Zahl schädlicher Insekten erkannt hat, denen man dadurch sichere Zufluchtsstätten bereitet, von wo aus sie Raubzüge auf die Obstbäume unternehmen.

Eine Form schätzt jedoch der Parkgärtner besonders hoch, wenn sie auch erst, um etwa zwei Wochen später als die übrigen, zur Maienzeit blüht, in der ohnedies der Garten nicht Mangel an Blüten leidet. Dies ist *M. monogyna* Jacq., kenntlich daran, daß ihre Blüte nicht zwei bis fünf, wie bei den anderen Arten, sondern nur einen Griffel hat. Aber dieser Strauch ist auch zu reizend, wenn er so über und über bedeckt mit gefüllten rot-schimmernden Blütendolden dasteht im hellen Sonnenschein, den er unbedingt braucht, umsummt von Hunderten von Bienen, ein echtes rechtes Bild holdesten Maienpracht und Fülle.

An Mispel und Weißdorn schließen sich ein paar Vettern der Rosensippe an, von denen wir wenigstens der Gattungen *Amelanchier*, *Cotoneaster* und *Cydonia* gedenken müssen. Von ihnen schmückt *Amelanchier vulgaris* Mönch. die Waldregion der deutschen Alpen mit den weißen nickenden Trauben seiner Blüten und ging von da als Zierstrauch in die Gärten über, ebenso gilt dies *Cotoneaster vulgaris* und *tomentosa*, die Felsenmispel. *Amelanchier* ist einer der klassischen Waldzeugen, der es verrät, wenn irgendwo der Alpenwald künstlich zur Alm umgewandelt wurde. Die Felsenmispel wieder, die bis 2400 m die Berghänge, am liebsten die sonnigen, grassdurchwachsenen Schrofen und Geröllhänge, erklettert, ist eine Charakterpflanze des Alpenherbstes. Prächtig heben sich dann vom hellen Gestein die blutroten Früchte und das niederliegende filzige Laub ab und stiften ihre Farbe in das überbunte Prangen der schönsten Tage, die der Alpenhöhe beschieden sind.

Die *Cotoneaster*-Arten, die der Gärtner Steinquitten nennt, sind eine der wenigen Pflanzen, die man nicht ihrer Blüten oder Blätter wegen, sondern der Schönheit ihrer Früchte halber hegt. Im dunklen, dicklederigen Laub schimmern die roten oder schwarzblauen mehligten Früchte im November, wenn aller andere Gartenschmuck verwelkt ist, noch auf das entzückendste. Besonders gilt dies vom Feuerdorn (*Cotoneaster pyracantha* [L.] Röm.), da dieser immergrüne, feingefägte Blätter mit einer Fülle in Rispen stehender scharlachroter Früchte vereinigt, ein unübertreffliches Bild, wenn ein solcher Strauch mit Schnee überzuckert ist. Die japanische Kunst hat sich das bei ihrer Feinsinnigkeit für solche dekorative Wirkungen nicht entgehen lassen, und „Früchte des Feuerdorns im Schnee“ sind ein beliebtes Motiv der Japonerien, da der Strauch (*C. crenulata* [Roxb.]) auch im Osten eine Heimat gefunden hat. Bei uns ist er ja am Mittelmeer überhaupt heimisch und wird an Mauern im Rheintal reichlich angepflanzt, aber oft genug verliert er in strengen Wintern bei uns seine Blätter und kann auch am wärmsten süddeutschen Standort kaum ohne Schutz überwintert werden.

Ein ostasiatischer Verwandter ist auch die Quitte (*Cydonia*), derjenige unserer Obstbäume, dem man getrost die schönsten Blüten zusprechen kann. *Cydonia vulgaris* Pers. gehört auch zu den vielen Gewächsen, über deren Heimat die Wissenschaft nicht zur Klarheit kommen kann. Manche lassen sie ein orientalisches Gewächs sein, andere verlegen ihr Vaterland ins südliche Österreich, jedenfalls ist sie heute ein guter eingestammter Bürger der Flora von Mitteleuropa, dem in der Kulturgeschichte eine größere Rolle zufiel, als die meisten denken.

Gewöhnlich hält man die Orangen für die „Äpfel der Hesperiden“. Das ist aber falsch, denn es ist nach neueren Forschungen der „kydonische Apfel“ darunter zu verstehen, wobei sich der Beinamen auf die Kydonen, die Kreter, beziehen soll. Dieser aromatische Apfel, den man noch heute im Orient roh ißt, wozu wir uns schon der vielen Steinzellen halber, die seine Frucht durchsetzen, nicht verstehen können, war der Aphrodite geweiht und spielte in ihrem Kult seine ganz bestimmte Rolle. Wahrscheinlich — für einen Chemiker wäre es eine lohnende Arbeit — erfüllt er die Dienste eines Aphrodisiakums, und dies erklärt es auch, warum die späteren Römer so leidenschaftlich gern die spanischen Marmeladen aßen, die aus der Quitte gefertigt waren. Noch heute sind Quittenmarmeladen ein Lieblingsgericht der Südländer, namentlich der Griechen.

Hier ist auch der Ursprung des Wortes Marmelade zu suchen, denn Marmelo bedeutet in Portugal nichts anderes denn Quittenkäse, und der Ausdruck wurde dann nur auf andere ähnliche Obsterzeugnisse übertragen.

Was hat nun der Botaniker von dieser seit so langem die Sympathien der Kulturmenschheit besitzenden Frucht zu sagen? Er kennt sie als das Erzeugnis eines Baumes, der in merkwürdiger Weise die Merkmale des Apfels mit denen der Birne vereinigt. Dementsprechend unterscheidet man Apfel- und Birnquitten, daneben auch eine Frucht, die eine Zwitterstellung zwischen beiden einnimmt und oft riesige Maße erreicht.

Im Bau entspricht die Quitte vollkommen einem Apfel mit folgenden geringfügigen anatomischen Unterschieden: so wie die Blätter des Baumes, sind auch die Früchte mit Filzhaaren besetzt und dadurch wollig. Sie enthalten ein flüchtiges ätherisches Öl, durch das sie den durchdringenden, angenehmen Geruch erhalten, der sie auszeichnet. In der Mittelschicht der Frucht sind, wie bereits flüchtig gestreift wurde, sehr viele Steinzellen enthalten. Es sind dies dieselben Gebilde, die auch minderwertige Birnen „körnig“ machen. Der Pflanzenanatom nennt sie Sklerenchymzellen, und der Leser kann Näheres über sie auf S. 148 und ff. in Bd. II dieses Werkes nachlesen. Man hat Grund anzunehmen, daß sie in der Birne und Quitte nichts anderes als rudimentäre Organe, Überbleibsel einer einstmaligen harten Kapsel, und die Samen sind, wie man sie noch bei verwandten Gattungen, so bei Kirsche, Pfirsich, Pflaume und Mandel, intakt erhalten findet.

Auch den Samen der Quitte, die zu 6—12 in den Fächern der Frucht liegen, kommt eine Besonderheit zu. Sie können bei Wasserzusatz mächtig aufquellen und eine Menge Quittenschleim liefern, den man sich auch gewerblich nutzbar gemacht hat.

Was der Obstzüchter an dem Baume nicht beachtet, nämlich die herrlichen rosenroten Blüten, daraus wußte wieder der Gärtner Kapital zu schlagen, indem er die Quitte zu einem Zierstrauch umzüchtete. Diese *Cydonia japonica* Pers. oder, wie sie neuere Systematik nennt: *Chamameles japonica* Ldl., ist ein wunderschönes Gewächs, von dem Alfred Lehmann in seinem Werke über die Gartenzierpflanzen mit Recht sagt, daß es in keinem Garten fehlen sollte. Es ist nur ein wenig Sorgenkind, denn es verlangt sowohl möglichst sonnige Lage wie kräftigen Boden und Winterschutz. Dafür entfaltet diese Scharlachquitte schon im April oder Mai noch vor Ausbildung der Blätter in Dolden eine Fülle der schönsten feuerroten Blüten, und noch später erfreut sie den Sinn mit einem ungemein lieblichen Duft der Früchte, aus denen man in Japan eines der feinsten Parfüms zu bereiten versteht.

Von der Quitte ist es nur noch ein kleiner Schritt zu dem wichtigsten aller Obstpflanzen, dem Apfelbaum. Ihm wurde schon eine ganze Bibliothek von Werken gewidmet, von ihm und durch ihn leben Tausende und aber Tausende von Obstzüchtern, seine 600 Sorten sind für viele Länder ein wichtiger Handelsartikel, er ist mit der Geschichte der Menschheit verknüpft seit ihrer grauesten Urzeit. Ich bin wahrhaft in Verlegenheit, wie ich seiner Bedeutung gerecht werden kann. So streng auch der tägliche Gebrauch zwischen Birne und Apfel unterscheidet, so schwer fällt dies dem Botaniker. Er vereinigt beide in eine Gattung (*Pirus*, nicht *Pyrus*, wie oft fälschlich geschrieben wird) und hat ihnen eine Menge gemeinsamer Züge nachzusagen, wie denn überhaupt das, was für alle Rosaceen gilt, nämlich daß Mittelglieder und fruchtbare Mischlinge die Formen verknüpfen, im besonderen für die Gattung *Pirus* in Kraft ist. Ich werde also nicht umhinkönnen, eine Menge Angaben für Apfel und Birne gemeinsam zu erwähnen. Sie beide entsprechen zwei Arten einer Gattung, unter deren etwa 60 Arten sich sowohl laubwechselnde wie immergrüne Bäume und auch Sträucher von so mannigfaltiger Art befinden, daß man sich schon versucht gefühlt hat, die Gattung in viele (bis acht!) Gattungen zu zerlegen. Auch W. D. Focke, einer der bedeutendsten Kenner der Rosaceen der Jetztzeit, dem ich hier in der Systematik folge, nimmt fünf Untergattungen an und rechnet den Apfelbaum in die Untergattung *Malus*, die Birne dagegen zu *Piophorum*. Hierzu berechtigen verschiedene Unterschiede, die der Praktiker etwa in folgendes zusammenfaßt: Die Blüten des Birnbaumes sind kleiner, rein weiß, die Früchte sind, wenn auch nicht immer „birnförmig“, so doch nie am Stielansatz vertieft. Auch stehen die fünf Griffel der Birnblüte ganz frei. Der Apfelbaum dagegen hat größere, an den Rändern der Blumenblätter rötlich angelaufene Blüten, in denen die Griffel am Grunde verwachsen sind. Die Früchte sind am Stielansatz stets vertieft. Aus der Ferne unterscheidet man Apfel- und Birnbäume schon durch den Wuchs, da jene eine viel breitere Krone haben als die Birnen. In Stamm und Laub sind ebenfalls Unterschiede da. Gegenüber der glatten Rinde des Apfelbaumes ist die Stammrinde des Birnbaumes rissig. Grobgesägte Blätter, die auch noch im Alter etwas behaart sind und auf kürzeren Blattstielen sitzen, kennzeichnen den Apfelbaum, feingesägte, langgestielte, lange Blätter dagegen die Birnen. Außerdem blühen die Birnbäume früher und geraten dadurch oft in Frostgefahr. In Württemberg, einem der wichtigsten Apfelländer Deutschlands, beginnt die Apfelblüte nach langjähriger Erfahrung frühestens am 18. April, spätestens am 12. Mai, sie kann daher unter Umständen bis in den Juni das Herz des Naturfreundes erfreuen. Denn abgesehen von aller Nützlichkeit, ist der Apfelblüten rosiger Gewand über der Hügelandschaft ein ästhetisch vollkommen befriedigender Anblick, und man versteht es, warum aus den Großstädten (z. B. von München an die Gestade des Bodensees) besondere Blütenzüge abgelassen werden, warum eine wahre Wallfahrt von Berlin nach Werder (dort handelt es sich allerdings noch mehr um Kirschblüten) alljährlich anhebt, um den Zauber blütenübersäter Obstbaumfluren zu genießen.

Eine solche Apfelblüte ist auch, aus der Nähe betrachtet, ein wahres Meisterwerk der Kleinkunst. Sie stehen in Büscheln beisammen, und da sie schon zu einer Zeit entfaltet sind, wenn die Blätter das rosige Weiß nur gerade mit zartest-hellgrünen Spitzchen durchstickern, außerdem von süßem Honig duften, gewährt ein solcher blühender

Apfelzweig einen herzbezwingenden Eindruck keuscher und bräutlicher Schönheit. Die Malerei hat das ja weidlich ausgenüßt. — Der Blütenboden bildet von vornherein in jeder Apfelblüte einen kleinen Becher, dessen Rand mit fünf Kelchblättern geziert ist. Sie sind es, die an der reifen Frucht das vertrocknete Schöpfchen bilden, in dem man manchmal auch noch Reste der Staubblätter findet. In dem Becher erheben sich noch fünf Blumenblätter und etwa 20 Staubgefäße, außerdem die fünf Griffel. Ein Querschnitt des Fruchtknotens führt wieder auf die heilige Fünfszahl, denn er ist aus fünf Fruchtblättern so zusammengewachsen, daß auf dem Querschnitt daraus ein schöner Stern entsteht.

Die Befruchtung der Apfel- wie der Birnblüte wird von Insekten, namentlich Bienen, besorgt, die denn auch blühende Obstbäume stets so reichlich umschwirren, daß ihr Gesumm unerläßlich zur Stimmung des richtigen Frühlingbildes ist. Die Pflanze ist auf ihre Hilfe angewiesen. Dies bezeugt eine Anekdote, die uns Schmeißl überliefert hat. Er erzählt, daß die Obstbäume in Australien trotz aller Mühe der Ansiedler keine Früchte tragen wollten. Da wurden von einem deutschen Imker Bienen eingeführt — und in demselben Jahre zeigten die Bäume jener Gegend reichen Fruchtansatz.

Aus diesem fünffächerigen Fruchtknoten wird nach der Befruchtung ein fünffächeriges Kernhaus, von dem jedes einzelne Fach je zwei Samen enthält, die sich bekanntlich erst dann bräunen, wenn die Baumreife eingetreten ist. Vor dieser Zeit enthält auch das Fruchtfleisch viel freie Obstsäuren, die schädliche Tiere abhalten sollen. Erst zur Zeit der Samenreife erfolgt auch das „Weichwerden“ der Frucht, erst dann bildet sie ihr feines Aroma aus, nämlich den Lockduft, und erst um diese Zeit wird der Apfel rotbackig und die Birne gelb — botanisch gesprochen, sie entfalten ihren Lockapparat. Denn es kann kein Zweifel daran sein, alles am Obst ist darauf angelegt, einem Hungrigen Appetit zu machen, die Frucht „will“ verspeist sein, und dies ist eines der allergrößten Rätsel, die die Pflanzennatur dem Menschengesicht unterbreitet. Wir sehen nur die Tatsachen, daß der Apfel sich nicht verbreiten kann, wenn sich nicht die Tiere seiner annehmen. Wir sehen, daß seinem Lebenszweck das Verspeisen der Früchte nicht schadet, denn die hartschaligen Samen passieren den Verdauungskanal unbeschädigt. Wir sehen, daß der Baum Anstrengungen macht, damit die Tiere seine Frucht verzehrend finden, er macht sie im richtigen Zeitpunkt, in einer wahren Koordination der Handlungen, und wenn wir um diese Tatsachen eine Erklärung, ein geistiges Band, schlingen wollen, versagt unsere Botanik vollständig. Der Apfel hat ein Mysterium für den Menschengesicht erhalten, der sich nicht anders zu helfen weiß, als indem er voraussetzt, daß auch im Apfel etwas wirkt wie in seinem eigenen Gehäuse — ein psychisches Element, ein Trieb, ein Unbewußtes, jenes rätselhafte tausendnamige Ding, das alle Philosophen, großen Naturforscher, Dichter und Propheten dunkel empfanden und noch nie anders denn in Bildern umschreiben konnten. . . .

Über den Apfel wartet uns der Botaniker mit noch einer Erkenntnis auf. Schon vorhin hörten wir von ihm, aus dem Fruchtknoten werde nur das Kerngehäuse. Woraus wird denn dann das Fruchtfleisch, worauf es dem Apfellihaber doch eigentlich ankommt? Aus dem Blütenboden, dessen Wand wird dick, fleischig, erfüllt ihre Zellen mit Zuckersäften, Apfelsäure, aromatischen Stoffen. Sie erfüllt die ökologischen Zwecke und täuscht eine Frucht um die Frucht vor. Dies will der Pflanzenkundige damit ausdrücken, daß er solche Früchte, wie Apfel, Birne, als „Scheinfrüchte“ bezeichnet.

Man nimmt aber alle diese Seltsamkeiten und Fragen, die der Obstbaum uns auferlegt, so selbstverständlich hin wie die Tatsache seines Daseins überhaupt. Wer fragt sich: Woher kommt denn Apfel- und Birnbaum? Und wenn sich schon einer die Frage vorlegt, so beruhigt er sich mit der in allen Schullehrbüchern stehenden Antwort: die Urform sei der Holzapfelbaum und die Holzbirne, die noch jetzt wild in den heimischen Wäldern gedeihen.

Die botanische Forschung kann sich hiermit nicht einverstanden erklären. Focke ist der Ansicht, daß *P. silvestris* Mill., der Holzapfel, sehr wenig mit den heutigen Kulturformen zu schaffen habe. Es seien vielmehr auch hier orientalische Pflanzen, die aus dem Morgenland stammende *P. dasyphyla* Borkh. und der im Kaukasus und Altai-gebirge verbreitete

Apfelstrauch (*P. pumila* Mill.), aus denen man die wohlschmeckenden Apfelsorten durch Kreuzung gewann. Wann dies geschah, ist noch sehr dunkel. Wenn

Französische und holländische Obstsorten.

- 1 = Portugiesische Quitte. 2 = Kernlose Mispeln. 3 = Renette, carrée-Apfel.
4 = Ananasapfel. 5 = Verdun d'automne-Apfel. (Nach der Revue horticole.)

man zur Erhellung dieser Frage den Sagenschatz der Kulturvölker durchmustert, gerät man um unermeßliche Zeiten zurück. Zwar ist der „Apfel“, den Eva vom Baum der Erkenntnis pflückte, nach jüdischer Auffassung kein Apfel gewesen, sondern eine süße Zitrone (*Citrus Limetta* Risso), wie man sie noch heute in Palästina baut als Paradiesäpfel und wie sie noch heute von orthodoxen Juden zur Ausschmückung ihres Laubhüttenfestes verwendet werden, allerdings nur von den reicheren, da das Stück 6—30 Mark kostet. Aber der „Zanapfel“ der drei ersten Göttinnen, die drei goldenen

Äpfel der Aphrodite, deuten auf nicht weniger fernliegende Zeiten zurück, allerdings ist es auch nicht sicher, ob sich die Griechen hierunter wirklich Äpfel vorgestellt haben. Von den „Äpfeln der Hesperiden“ hörten wir schon, daß sie Quitten gewesen seien.

Dagegen war die von Iduna, als dem Vorbild aller Obstlerinnen, behütete „Speise der Asen“ sicher weder eine Zitrone noch eine Quitte, sondern ein richtiger Apfel. Diese Gewißheit gibt uns das deutsche Klima. Ja, die Kunde bezeugen es handgreiflich. Mit Ehrfurcht stand ich in Konstanz vor den halbverkohlten Apfelresten, die man in den Pfahlbaudörfern des Bodensees gefunden hat.

Aus der antiken Literatur ist es belegt, daß die Römer bereits 24 Apfelsorten kannten. Die Kreuzung, das heute beliebte Mittel der Sortenbildung, war ihnen also schon bekannt, damit aber auch die Vermehrung durch Pfropfreiser, denn der Apfelbaum hat die Eigentümlichkeit, keine samenbeständigen Sorten zu besitzen. Der edelste Apfel (auch die Birne) gibt aus seinem Samen eine mißratene Nachkommenschaft mit herben, ungenießbaren Früchten, ein vollständiger Rückfall und damit ein ganz unbegreifliches Problem für die theoretische Botanik. Darum werden alle Obstbäume durch Ableger vermehrt. Kleine Zweige („Reiser“) pflanzt man dabei auf Bäume, die aus Samen gezogen sind. Es entstand so eine komplizierte Kunst der Obstbaumpflege, die eines der Haupthindernisse ist, um dem Obst die ihm für Kulturvölker zukommende und noch lange nicht erreichte Massenverbreitung zu verschaffen. Der Apfelbaum ist leider nicht so weit verbreitet, wie es der Volksfreund wünscht. Schon im westlichen und südlichen Europa ist er nicht mehr der „erste“ Obstbaum und auch in Asien erreicht er bald seine Grenzen, schon am Kaspiischen Meere. China, Japan, ganz Afrika (mit Ausnahme des Kaplandes) kennen ihn nicht. Wohl aber hegt ihn Ostindien, Australien und vor allem Nordamerika, wo Kanada und Kalifornien Äpfel hervorbringen, die das Entzücken der Hausfrau bilden und in Unmengen (England allein bezieht jährlich über 1 Million Fässer) nach Europa verschifft werden. — In Mitteleuropa gelten als erste Apfelländer Württemberg, Baden, Thüringen, Sachsen, Hessen, auch die Küsten der Ostsee, dann Böhmen, Oberösterreich, Tirol, was natürlich nicht ausschließt, daß auch die Nachbarn dieser Länder von dem Apfelsegen noch reichlich abbekommen.

Was man aber produziert, ist noch immer zu wenig, um den Bedarf zu decken und den Apfel, der heute noch unverhältnismäßig teuer ist, zu einem wirklichen Nahrungsmittel zu machen. Die Obstbaumzucht steckt eben noch — wie ein sehr erfahrener Züchter schreibt — durchaus in den Kinderschuhen, und man begeht zahlreiche Fehler dabei, die sich bei Verbreitung botanischer Bildung leicht vermeiden ließen.

Vielerorts wird darüber geklagt, es ließen sich keine besseren Sorten ziehen, der Boden sei ungeeignet, „hier sei kein Obststrich“ und wie derartige Klagen denn immer lauten mögen, mit denen man so gerne Mangel an wahrem Bestreben verdeckt. Gefündigt wird sehr häufig dadurch, daß man ungeeigneten Boden zwingen will, feines Obst zu tragen. Der Apfelbaum gedeiht nicht in sehr feuchtem Boden oder in reinem Sand, er verlangt lockeren, tiefgrundigen, humusreichen Lehm, mit Sand untermischt, und vor allem freie Lage und reichliche Bewässerung, die aber durch den Boden durchsickert. (Birnen sind etwas weniger empfindlich.) Wenn Apfelbäume, wie das oft vorkommt, auf einmal alle heranwachsenden Früchte abwerfen, so ist die Ursache gewöhnlich die, daß man den Baum in der heißen Zeit dursten ließ.

Vor allem empfiehlt P. Gupfer, dessen sehr praktischem Werke über die Obstbaumzucht ich hierin folge*, zu beachten, daß der Obstbaum, und dies gilt nicht für die Äpfel allein, in gebautes Land und nicht auf jeden beliebigen Platz gehöre. Am besten wäre es, wenn man das Baumland jährlich umarbeiten könnte, so wie es mit dem Acker geschieht. Das Zeitwort einer erfolgreichen Obstzucht ist und bleibt: graben und düngen! Gerade in bezug auf die Düngung wird auch vielfach gefehlt, indem man den unentbehrlichen natürlichen Dünger durch Kunstmittel ersetzt, während sie höchstens nur als Ergänzungsmittel in Betracht kommen können.

Der größte und häufigste Fehler aber, durch den man den Obstbau schädigt, ist das Zutiefsetzen junger Obstbäume. Daran frankten Tausende junger und alter Bäume, und ihr Pfleger sucht die Ursache überall anderswo, nur nicht in seiner mangelnden Erfahrung beim Pflanzen.

Der Laie richtet an den Pflanzkenner oft die Frage, warum denn die Obstbäume jetzt in den Gärten so häßlich weiß angestrichen werden. Dies ist ein Schutzmittel, das allerdings dem Obstgarten von seiner Poesie raubt, aber den Bäumen äußerst gut bekommt. Die Stämme werden von einem sorgfamen Züchter von Zeit zu Zeit mit einer Drahtbürste von Überpflanzen (namentlich Flechten und Moos) gereinigt und dann mit Kalkmilch bepinselt. Dies erhält den Baum rein und schützt ihn auch vor den verderblichen Wirkungen der Winter-

Durch Flechtenbefall abgestorbener Obstbaum.
(Original von H. Dopfer=München.)

* P. Gupfer, Der Obstbaum als Lebewesen. Wiesbaden. 8°.

sonne, die durch plötzliches Auftauen „Frostplatten“ erzeugt, was durch die langsame Absorption der Sonnenstrahlen bei weißem Anstrich verhindert wird.

Eine besonders wichtige Frage stellt für den Obstgärtner das richtige Beschneiden der Apfel- und Birnbäume dar. Dies richtet sich nach folgender Eigenschaft der Bäume:

Wenn man einen Apfelbaum im Winter betrachtet, entdeckt man bald, daß er zweierlei Knospen trägt, dicke große und kleinere spitze. Aus den ersteren bilden sich „Kurztriebe“, die neben Blättern auch Blütenbüschel tragen; aus den letzteren (Langtriebe) gehen nur Blätter an langen Zweigen hervor. Die Kunst des Gärtners besteht nun darin, den Baum so zu beschneiden, daß keine Kurztriebe verloren gehen, denn mit ihnen würde er seine Ernte vermindern. Dieses Streben führte mit der Zeit dazu, daß jeder einsichtige Obstzüchter heute den „Formobstbäumen“, nämlich den Zwergbäumen, den Vorzug gibt. Damit verschwindet zwar wieder ein Stück Poesie um das Dorf, nämlich der dichte Wald prächtiger alter Bäume, in dem sich die roten Dächer so behaglich lagerten, aber der Landmann trauert nicht darum, wenn ihm seine Zwergbäume größere und edlere Früchte, reichere Ernten gewähren, wenn ihr Wachstum leichter zu überwachen ist und ihre Krankheiten erfolgreicher bekämpft werden können. Dies alles rühmt man den Formobstbäumen nach, ob sie nun im „Freistand“ als Pyramide, Busch- oder Säulenbaum oder „als Spalier“, als Kordon (also in Schnüren), in U-Form oder Palmetten gezogen werden, was so heute etwa die beliebtesten Formen sind.

Alle diese Kunstgriffe und Anstrengungen sind aber vergebens, wenn man es nicht versteht, die richtigen Sorten zu wählen, sei es, daß man Zwergbäume oder Hochstämme in seinem Garten hegt. Dies führt uns zur Frage, wie viele Sorten des Apfels man denn überhaupt kennt. Wir haben diese Frage schon beantwortet, als wir eingangs unseres Lebensbildes des Apfelbaumes erwähnten, daß etwa an 600 Sorten herangezüchtet seien. Eine solche Mannigfaltigkeit läßt sich natürlich ohne System nicht überblicken, und so hat man denn innerhalb der Art *Pirus malus* besondere Systeme ausgearbeitet und Bestimmungsschlüssel entworfen, die besondere Sachverständige, die Pomologen, erfordern. Eine wahre Zweigwissenschaft, die Pomologie, ist da entstanden, die zwar gewöhnlich auf die ganze Obstbaumkunde ausgedehnt wird. Mit ihr können wir uns hier in unseren floristischen Lebensbildern natürlich nicht einmal in den Grundzügen befassen, da schon diese den Rahmen sprengen würden, der in diesem Werke einer einzelnen Pflanzenart eingeräumt werden kann. Daher kann ich es nur in Kürze erwähnen, daß von allen vorhandenen Apfelsystemen das von Dill-Lucas am meisten Eingang gefunden hat. Es unterscheidet 15 Familien je nach Gestalt, Färbung der Schale, Konsistenz und Geschmack des Fleisches. Von diesen Familien sind die aromatischen Kalvillen, die süßen würzigen Rosenäpfel, die sauren Pfundäpfel, die süßweinigen Borsdorfer, die sehr feinen Goldrenetten fast jedermann bekannt. Von ihnen ist der Borsdorfer (nach einem Dorf bei Grimma benannt) ein echt deutscher Apfel von größter Gebrauchsfähigkeit, der bei uns seit mehr denn 400 Jahren geschätzt wird. Die bekannten Südtiroler Äpfel, meist hochrotbackig und überaus würzig (Edelrote und Rosmarinäpfel), gedeihen bei uns, mangels genügender Sonnenreife, leider nicht.

Gewöhnlich unterschätzt man den Nährwert des Apfels, darum sind wohl einige Worte darüber sowie über seine physiologischen Wirkungen auf den Apfelesser wohl am Platze.

Es ist zwar wahr, daß man mit dem Gewicht der Äpfel 80—87 % Wasser kauft und verzehrt, aber anderseits ist der Zuckergehalt eines guten Apfels immerhin mit 7—11 % so beträchtlich, daß ihm Nährwert nicht abgesprochen werden kann. Als Beispiel stehe hier die Analyse eines süßen (Gravensteiner) und eines säuerlichen (Borsdorfer) Apfels: Gravensteiner 10,9 % Zucker, 85,15 % Wasser, 1,35 % Pektinstoffe, 0,44 %

Äpfelsäure,
2,17 % unverdauliche Faserstoffe.
Borsdorfer =
7,6 % Zucker,
82,49 % Wasser,
6,85 % Pektin,
0,61 % Äpfelsäure,
2,44 % Wasser.

Die Vegetarier schreiben dem Genuß des Apfels außerordentliche Wirkungen zu und sind in einer extremen Richtung der Überzeugung, daß Äpfel und Nüsse auch auf die Dauer eine einwandfreie Ernährung verbürgen. Wenn wir nun zwar auch nicht dieser Überzeugung sind, so wollen wir doch von Herzen dafür eintreten, daß das Obst in unserer Ernährung eine größere Rolle

spielen solle als bisher. Es ist besonders geeignet, ein Gegengewicht zur einseitigen Fleischnahrung zu bilden, wie sie vielfach üblich ist. Zum Glück hat auch der Volksglaube diese Überzeugung aufgenommen, wenn er, wohl noch als Nachklang eines römischen Brauches, es für äußerst gesund hält, vor dem Schlafengehen einen Apfel zu essen. Der Verfasser dieses ist seit Jahren vor dem Schlafengehen oft nichts anderes als ein halbes Duzend Äpfel und befindet sich nie wohler als nach solchem frugalen Abendbrot.

Apfelsorten.

1 = Roter Herbst-Galville. 2 = Roter Rosmarin, mit Blüten und Blütenlängsschnitt.
3 = Bleinheimer Pipinapfel. 4 = Maschanster. 5 = Mantuaner, mit Blüte.

Die alten Botaniker und Mediziner schrieben über den Apfel auch gar Wunderbares. Man höre: Der Genuß des Apfels wirkt vorteilhaft auf das Gehirn, er regt die Leber und die Nieren an, hindert die Steinbildung, schützt gegen Verdauungsbeschwerden, denn er bindet die überschüssige Magensäure. Apfelsaft schützt vor Halskrankheiten. Äpfel sind sogar ein Sympthiemittel, um Warzen zu vertreiben.

Bei so viel Ruhm und Schätzung mag es denn auch am Plage sein, ein Wort über die beste Art des Obstgenusses zu sagen. Der Kulturmensch genießt Apfel und Birne nur geschält. Das ist appetitlich, bringt aber um manche Vorteile. Vor allem soll das Verhältnis zwischen geschältem und ungeschältem Apfel das gleiche sein wie zwischen Weißbrot und Schwarzbrot. Alle Vorzüge, die zugunsten des letzteren sprechen, gelten auch für die Apfelschale. Sicher ist jedenfalls, daß man Apfel und Birne mit der Schale auch des feinen Aromas beraubt, das eines der Hauptreizmittel beim Obstgenusse ist.

Und da wir von praktischer Botanik handeln, so wollen wir nicht schließen, ohne einen Wink über die beste Aufbewahrungsart. Die allerbeste ist jedenfalls die, nicht vorzeitig zu ernten. Je länger die Früchte am Baume bleiben (dies gilt aber nur für Winterobst*), desto haltbarer und besser sind sie. Von Vorteil ist es auch, sie vor dem Lagern „schwiken“ zu lassen. Die Früchte werden zu diesem Zweck im Freien zu Bergen von etwa 60 cm Höhe gehäuft oder in hellen, luftigen Räumen ausgelegt. Man bezweckt damit die Verdunstung des überflüssigen Wassergehaltes. Erst nach dieser Vorlagerung bringt man das Obst in den Überwinterungskeller, der aber rein, lustig und überhaupt so sein muß, daß ein lebendes Wesen darin nicht zugrunde geht, denn man vergesse nicht: Obstfrüchte sind lebende, atmende Wesen!

Wenn man sich solches vor Augen hält, wird man sich auch im Hausgebrauch vor manchem Schaden schützen, denn das Obst ist gar vielen Krankheiten unterworfen, wie alle hochgezüchteten und durch Kultur verzärtelten Pflanzen.

Wie Dr. E. Voges im Jahrgang II der „Kleinwelt“ (Zeitschrift der deutschen mikrobiologischen Gesellschaft) schreibt, sind die gefährlichsten Pilzkrankheiten der Apfel- und Birnbäume der Schorfpilz (*Fusicladium pirinum* und *dendriticum*), die Blattfleckenpilze (*Septoria*), der Monilia- (*Sclerotinia fructigena*) und der Krebspilz (*Nectria ditissima*). Es ist hier nicht der Ort, um eingehender über diese Schädlinge zu sprechen. Einiges hierüber findet der Leser in Bd. II, S. 203 sowie in Bd. III, S. 412—418 dieses Werkes, eine ausführliche, für den Praktiker bestimmte Darstellung jedoch in der obgenannten Abhandlung von Dr. Voges, der auch eine Bestimmungstabelle der in Frage kommenden Krankheiten beigelegt ist.

Aber nicht nur pflanzliche Schädlinge, zu denen auch die Mistel gehört, bedrohen unseren Obstbestand, sondern auch eine ganze Schar tierischer Parasiten, von denen ich wenigstens zur Abrundung unseres Lebensbildes in Kürze die Blutlaus, die Gespinnstmotte, den Apfelblütenstecher und die Spannerraupen als die schädlichsten erwähnen muß.

Die Frostspanner (*Cheimatobia brumata*) finden sich auf allen Obstbäumen als grüne und bräunliche Raupen und können nicht gut anders als durch Abfangen der ungeflügelten weiblichen Schmetterlinge bekämpft werden. Dies geschieht durch die bekannten Leimringe.

* Sommeräpfel und Birnen werden „mehlig“, wenn man sie baumreif werden läßt.

Die Geispinstmotten (*Hyponometa malinella*) suchen vornehmlich den Apfelbaum heim und verderben von Ende Mai seine Blätter und Früchte durch die grauen Schleier, mit denen sie sie überziehen. Ihnen ist nur mit der Raupenfackel beizukommen.

Der Apfelblütenstecher (*Anthonomus pomorum*) ist wieder ein freundlicher, kleiner Rüsselkäfer, der den guten Geschmack hat, seine Eier in die appetitlichen Apfelblütenknospen zu legen, die dann von seiner Larve völlig ausgenagt werden. Ihm kann man wenig zuleibe. Frühblühende Apfelsorten sind der Frostgefahr ausgesetzt, wenn sie auch dem Käfer entgehen. Das Abklopfen der Käfer ist zeitraubend und unzuverlässig. Am besten hilft noch das Sauberhalten von Stamm und Ast, denn der Käfer überwintert an ihnen, im Moose verkrochen.

Ein jedermann bekannter Obstschädling ist der Apfelwickler (*Carpocapsa pomonella*), denn seine Raupe ist die Obstmade in den wurmstichigen Äpfeln und Birnen. Er richtet nicht nur das Lagerobst zugrunde, sondern stiftet noch weit mehr Schaden dadurch, daß die Früchte unreif abfallen, sobald die Larve das Kernhaus verzehrt hat. Seine Bekämpfung ist umständlich; man legt Madenfallen, d. h. Fanggürtel an den Stämmen, an, hängt Fanggläser auf und beseitigt die Rindenschuppen der Bäume. Das letztere Verfahren ist besonders erfolgreich, denn die Raupen lassen sich zur Zeit der reifenden Äpfel an Fäden auf die Rinde herab, um unter ihren Schuppen den Winter zu verbringen.

Ein neuerer, sehr gefürchteter Feind des Apfelbaumes ist die Blutlaus (*Schizoneura lanigera*), leicht kenntlich an den weißwolligen Anflügen an den Zweigen, die beim Zerdrücken einen Blutstich hinterlassen. Dieser amerikanische Gast, der auch auf Birnen, Quitten und andere Obstbäume und sogar auf deren Wurzeln übergeht, ist vorläufig noch nicht allgemein verbreitet, ein Glück angesichts der Schwierigkeiten seiner Vertreibung. Der feuergefährliche Schwefelkohlenstoff, die Raupenfackel, aufgepinselte Lösungen (wir wandten in unserem Versuchsgarten mit Erfolg einen Brei von 150 g Seife [in 1 l kochendem Wasser] und 2 l Petroleum an) müssen dazu herhalten, kostspielige, mühsame und unappetitliche Arbeiten.

So ist auch des Obstzüchters Beruf nicht eitel Freude und reiner Gewinn, und auch für seine Pfleglinge gilt der alte Satz der Menschenärzte: vorbeugen ist leichter denn heilen! Seine besten Freunde hierbei sind gutes Düngen und mit ihm gute Ernährung, denn sie machen die Bäume widerstandsfähig. Und nicht weniger wertvoll: Schutz und Pflege der insektenfressenden Vögel. Sie leisten Außerordentliches, und schon ihnen zuliebe muß als Mistplaz eine Fichten- oder Weißbuchenhecke um jeden Obstgarten stehen. Ein wenig Liebe für die kleinen Wächter unserer Bäume macht sich tausendfach bezahlt.

Und dieses „tausendfach“ bedeutet Millionen im Leben der Nation. Vor mir liegt eine Handelsstatistik der Obstein- und Ausfuhr im Spezialhandel der Jahre 1902 bis 1906. Da sehe ich denn, daß der Apfel mit 1660045 Doppelzentnern Einfuhr im Wert von 17908000 Mark, der nur 19947 Doppelzentner Ausfuhr im Wert von 697000 Mark gegenübersteht, alle anderen Obstsorten überragt, aber eine bedenklich passive Bilanz zeigt. Nach ihm kommt gleich die Birne, deren entsprechende Zahlen lauten:

Einfuhr* 365584 Doppelzentner, Wert 5417000 Mark

Ausfuhr 28243 " " 848000 "

Aktiv ist unsere Obstkilanz nur in puncto Zwetschgen, bei denen 155201 Doppelzentner (1210000 Mark) Einfuhr ein Export in der Höhe von 221142 Doppelzentner (2211000 Mark) gegenübersteht.**

Es ist also wirklich traurig: Deutschland, eines der gesegnetsten Obstkünder des Erdballs, gibt jährlich viele Millionen aus, um seinen Obstbedarf zu decken. Es könnte also der Volkswohlstand bedeutend gehoben werden, wenn man Landwirte und Gartenbesitzer dazu bringen könnte, intensiveren Obstbau zu treiben. Und dieses Endziel trieb mich dazu, diesen Abschnitt besonders ausführlich und auf das praktische Leben berechnet zu bearbeiten.

Bevor ich mich von ihm abwende, muß ich noch eines Apfelerzeugnisses gedenken, das, wenigstens in gewissen Gegenden Deutschlands und Österreichs, keiner missen möchte. Ich meine hierbei den Apfelwein. Was wäre des Altfrankfurters, des Schwaben, des Österreichers Festtag ohne sein Schöppchen „Hohenastheimer“? Und der Franzose ohne Cidre! Merkwürdig genug, daß auch er zuerst verboten wurde, wie alles, was dem Menschen schmeckt. Im 17. Jahrhundert verboten die weisen Regierungen die damals eben erst aufgekommene Apfelweinbereitung, um „Verfälschungen des echten Weines“ zu verhindern.

Man wählt zur Bereitung am besten ein Gemisch süßer und saurer Herbstfrüchte, die in Obstmühlen, in neuerer Zeit in hydraulischen Pressen zerquetscht werden, wobei man aus 100 kg Obst bis 80 Liter Saft gewinnen kann. Dann wird der Most genau wie Traubenmost behandelt, und es ist denn auch das Enderesultat ein ganz entsprechendes Getränk. Nur ist es durchaus nicht so alkoholfrei und harmlos, wie man in weiten Kreisen glaubt. Deutscher Apfelwein hat im Durchschnitt folgende Zusammensetzung:

Alkohol	7,20	% (Volumen)
Zucker	0,16	% "
Apfelsäure	0,64	% "
Essigsäure	0,015	% "
Extrakt	2,85	% "
Aschenbestandteile	0,30	% "

Die Schweizer und englischen Apfelweine, namentlich aber der wenig verbreitete Birnwein sind ärmer an Alkohol; allerdings wird auch der deutsche Apfelwein bedeutend noch von den als tüdtsch bekannten Beerweinen übertroffen, von denen Johannisbeerwein 13%, Stachelbeerwein sogar 14% Alkohol zu enthalten pflegt. Es spielt also auch der Obstwein seine Rolle als Sorgenbrecher und Betäubungsmittel, und die Menschen hängen auch an ihm mit nicht weniger Beharrlichkeit als an Bier und Wein, in denen so viele noch immer ihre Wohltäter sehen. Eine geschichtliche Anekdote sagt darüber Bände. Als in England der Apfelwein besteuert wurde, versammelten sich die Unzufriedenen in Devonshire unter einem Apfelbaum und hielten

* einschließlich Quitten.

** Dazu kommt noch eine Einfuhr von 641077 Doppelzentner (= 25264000 Mark) und eine Ausfuhr von 4185 Doppelzentner (168000 Mark) in getrocknetem Obst.

ein Volksgericht, bei dem der unpopuläre Minister, dem ein solches Steuergesetz zu verdanken war, in effigie hingerichtet wurde.

So steht hinter all dem Segen des Apfelbaumes auch wieder ein düsterer Hintergrund, Licht und Schatten beisammen auch hier, wie bei allem, was im Menschenleben Gestalt gewinnt.

Mit dem Apfelbaum zusammen haben wir beinahe auch die ganze Kultur- und

Naturgeschichte der Birne abgehandelt, und es bleibt uns nur noch sehr wenig nachzutragen.

Auch ihr Ursprung verliert sich in Zweifel und Unsicherheiten.

Man hat es wahrscheinlich gemacht, daß der wilde Birnbaum (*Pirus achras* Gärtn.), der sich auch jetzt in den Wäldern findet, eigentlich ein Einwanderer aus China sei. Neben ihm sind aber auch noch andere Arten (*P. persica* Pers.,

P. cordata Desv.) Stammväter der etwa 700 Birnensorten,

die der Obstzüchter als Sommer-, Herbst- und Winterbirnen jetzt kennt und die von Lucas ebenfalls in ein System gebracht wurden.

Die Birne ist als Obst ungleich edler denn der Apfel, auch durch ihren Zuckergehalt nahrhafter, dagegen, da sie bedeutend mehr unlösliche Substanzen (4—8½%) enthält, nicht so bekömmlich wie dieser. Merkwürdigerweise werden die edelsten und besten Birnen, die derzeit aus Belgien und Frankreich kommen, nicht auf Birnwild-

Birnensorten.

1 = Winterbutterbirne. 2 = Birne von Tongres. 3 = Pastorenbirne.

lingen, sondern auf Quitten veredelt, wie sie denn überhaupt Ansprüche an den Boden machen und sorgfältigerer Pflege bedürfen als der Apfelbaum. Die köstlichsten Sorten, deren auf der Zunge zerschmelzendes Fleisch unentbehrlich für die Genüsse der feinen Tafel ist, scheinen mehr im Westen heimisch zu sein, obwohl seit einiger Zeit auch Südafrika und Kalifornien die Feinschmecker mit den herrlichsten Birnen überraschen, deren Transport angesichts ihrer geringen Haltbarkeit nicht billig kommt.

Amelanchier vulgaris aus Mödling bei Wien.
(Naturaufnahme von Fr. A. Mayer-Wien.)

Auch der Birnbaum hat nicht weniger Feinde denn sein Gattungsverwandter. Es sind zum großen Teil dieselben Pilze und tierischen Schädlinge, zu denen sich aber auch noch speziell Birnschmarözer gesellen. Als solcher gilt z. B. der Gitterrost (*Gymnosporangium*), abgebildet und beschrieben in Bd. III, S. 415, gegen den es außer den üblichen Besprühungen guten Schutz gewährt, in der Umgebung keine Wacholdersträucher zu dulden und die befallenen Blätter zu sammeln und zu verbrennen.

Die Familie der Pomazeen enthält außer Mispel, Quitte, Apfel und Birne keine Obstbäume, will man nicht die Himbeere als solche deshalb betrachten, weil ihre Früchte vielenorts frisch und eingemacht verzehrt werden.

Bevor wir uns ihr jedoch zuwenden, ziemt es, noch einiger Bäumchen zu gedenken, die den

Äpfeln in ihrer Erscheinung denn doch noch näher stehen als die Himbeeren. Das sind der Apfelbeerstrauch (*Aronia arbutifolia* Sp.) und die Felsenbirne (*Amelanchier rotundifolia* Pers.), beide von dem Gärtner im Boskett geschätzt. Der erste wegen seiner schönen Herbstfärbungen, der letztere, der zwar nur auf Kalkboden gut gedeiht, mehr ob seiner ganzen Erscheinung, die auch den höheren alpinen Lagen zum Schmuck gereicht.

Ihnen nahestehend sind gewisse Formen der Gattung *Rubus*, so die Himbeere und Brombeere, die ihrerseits wieder eine Brücke zwischen den Apfelblütigen und den fingerkrautartigen Pflanzen (*Potentillae*) schlagen.

Die Rubi sind der Prüfstein jedes wahren Systematikers. Wer sich vermißt, ein Kenner der heimischen Flora in dem alten Sinn des Wortes zu sein, da sich die

„Kenntnis“ der Pflanzen vornehmlich darauf beschränkte, den ihnen verliehenen Namen zu wissen, den führe man vor den Waldesrand, an das Dickicht der wuchernden Brombeeren, und wenn da seine Namenskenntnis besteht, verdient er die Krone, die einst Linné dem namengebenden Systematiker vorbehielt. Man nimmt nach Focke an, daß derzeit aus Europa an 1500 *Rubus*-Arten beschrieben sind, deren Merkmale so sehr ineinander übergehen, so sehr im Flusse sind, daß manche Kenner sich erkühnen, sie in etwa 180—200 Arten zusammenzuziehen.

Es sind die Arten dieser Gattung ein glänzendes Beispiel für jene Erscheinung, die man als „Explosion der Arten“ oder „Nebelflecken des Systems“ bezeichnet hat.

In meinem Buche „Über den heutigen Stand der Darwin'schen Fragen“* schrieb ich hierüber folgendes: „Unter diesem etwas absonderlichen Ausdruck versteht man die Tatsache, daß gewisse Arten von Tieren und Pflanzen eine so ungeheure Variabilität zeigen, daß es fast unmöglich ist, sie zu klassifizieren, weil fast jedes Individuum seine abweichenden Merkmale hat. Solcherart sind unter den Tieren z. B. der bekannte Laufkäfer (*Carabus auratus*), unter den Pflanzen das Frühlingshungerblümchen (*Draba verna*) oder das Habichtskraut (*Hieracium*), die Rosen (*Rosa*), die Brombeeren (*Rubus*) und viele andere. Diese formenreichen Arten machen den Eindruck, als sei ein gemeinsamer Eigenschaftskomplex einst explodiert, gewissermaßen aufhundert Formen verteilt worden, welche alle zusammen ein großes Artindividuum bilden. Sie verhalten sich wie die Mitglieder einer großen Familie.“

Dies trifft ganz besonders auf die Rubi zu, deren Charaktere, wie man am allerlehrreichsten aus Krauses „*Nova synopsis Ruborum*“ erkennen kann, in ununterbrochenen Übergängen und einer fast schrankenlosen Plastizität eine ganz außergewöhnliche Anpassungs- und Gestaltungskraft verraten. Dementsprechend konnte sich die Gattung mit Ausnahme der reinen Wüsten und der heißesten Gegenden auch über die ganze Erde verbreiten, wenn sie auch im allgemeinen die Laub- und Nadelwälder vorzieht und, wie wir schon im vorigen aus Erdmanns Maskabuche erfuhren, sogar in polaren Ländern eine so üppige Ausbildung erreichen, wie sie uns gar nicht geläufig ist. *Rubus arcticus* L., die „Malerbäre“ der Norweger, ist eine der köstlichsten Erscheinungen der nordischen Flora, ein dornenloser, schöner, krautiger Strauch mit entzückenden roten Blüten und einer würzigen Frucht, welche die Kenner höher bewerten denn alle einheimischen Himbeeren und Brombeeren, und mit der höchstens die von dem erfolgreichen Pflanzenzüchter Luther Burbank in Kalifornien angeblich durch Kreuzungen erzielten *Rubus*-Früchte wetteifern können.

Im allgemeinen ist aus der Biologie der Gattung *Rubus* nicht allzuviel zu merken. Daß sie dornige Sträucher mit bei uns meist weißen oder rötlichen Blüten darstellt, ist jedermann bekannt, weniger aber, daß die Himbeersträucher (*R. idaeus*) nach der Fruchtreife absterben und ihre Blüten stets nur an den im Jahre neugebildeten Trieben ansetzen. Dies ist die Ursache, warum sie erst so spät im Jahre erscheinen und warum hier Früchte und Blüten im Spätsommer oft gleichzeitig denselben Strauch schmücken.

Bekannt sind auch die weit auslaufenden Schößlinge dieser Sträucher, mit deren Hilfe sie sich vermehren. Wenn solche Sprosse die Erde berühren, erzeugen sie knollen-

* 2. Aufl. Leipzig (Theod. Thomas Verlag). 8°. 1907.

NOV 6 1911

förmige, mit Niederblättern besetzte Anschwellungen, aus denen im nächsten Jahre neue Sprosse hervorgehen. Derselbe Vorgang kann aber nach Goebel auch über dem Boden eintreten, falls sich die Sprosse an dunkeln, feuchten Standorten befinden. Mit Hilfe ihrer bestachelten Sprosse sind die Rubi auch imstande zu klimmen, und namentlich in Auen und Vorgebirgswäldern bilden sie dadurch dornige Hecken, die hoch bis in die Wipfel der Bäume reichen. Interessant ist es auch zu beobachten, wie die zusammen-
gesetzten Blätter dieser lichtliebenden Pflanze prachtvolle Mosaiken bilden, sich in Form und Stellung aneinander anpassen, um das Licht möglichst auszunutzen. Unter Um-

Rubus caesius L. Blühender Zweig; b eine Frucht, a ein vergrößerter Samen. (Nach Thomas Flora.)

unterklärlich bei dem heutigen Stande der Botanik ist die Tatsache, daß die Gattung nicht nur weiß-, rot- und gelbblütige Arten hervorbringt, sondern auch in ihren Früchten die allergrößte Farbenmannigfaltigkeit aufweist, denn es gibt Rubi sowohl mit den uns bekannten roten (Himbeere) wie mit schwarzen (Brombeere), aber auch mit gelben und sogar mit grünen Scheinfrüchten, die so wie bei der Erdbeere zu einer Sammelfrucht vereinigt sind. Dabei aber sind noch die Früchte sehr vieler ausländischer Arten unbekannt, weitere Überraschungen also sehr wohl möglich.

Von den zahllosen Arten haben für das praktische Leben nur einige wenige Bedeutung

gewonnen. Dies sind namentlich, außer der bereits genannten Himbeere und Akerbeere, vornehmlich noch die Brombeere (*R. fruticosus* L.) und außerdem die nordische Moltebeere (*R. Chamaemorus*), die in Lappland weite Länderstrecken bedeckt, bei uns als Relikt der Eiszeit nur noch an wenigen Stellen, so im Riesengebirge (Elbwiese, Herwiese), in Pommern bei Stolp und bei Swinemünde, gedeiht. Die gewöhnliche Preisbeere (*R. caesius*) ist wohl mit *R. plicatus* W. u. N. die gemeinste der wilden Brombeerarten. In Gärten werden auch gefülltblühende und besondere Arten gezogen, so namentlich der wohlriechende *R. odoratus* L., den man auch die Zimtbrombeere nennt, der seine schönen roten Blüten den ganzen Sommer hin entwickelt.

Der Obstgärtner hingegen schätzt eine Reihe von Kreuzungen, so besonders neuestens die kalifornische Loganbeere, die aus der Vermischung von Himbeeren und Brombeeren hervorging; aber auch eine Reihe deutscher Sorten, die im Jahre zwei Ernten geben, um so mehr, als sie von auffallend wenig Feinden heimgesucht werden. Nur der Himbeerkäfer kommt hier ernstlich in Betracht, dessen „Maden“ überall häufig sind.

Da Himbeerwein und noch mehr der so außergewöhnlich aromatische Himbeersaft in immer steigendem Maße Freunde gewinnen, werden hier auch Analysen über die Zusammensetzung der Früchte Interesse erwecken:

Es enthält die Himbeere:

85,74 %	Wasser
3,86 %	Zucker
1,42 %	freie Säure
1,06 %	Eiweiß und Pektin
7,44 %	unverdauliche Substanzen
0,48 %	Aschenbestandteile.

Für die Brombeere stellen sich die entsprechenden Zahlen folgendermaßen:

86,41 %	Wasser
4,14 %	Zucker
0,19 %	freie Säure
2,33 %	Eiweiß und Pektin.

Die Veredelung und der Anbau der Himbeere wäre für den Gärtner noch ein recht dankbares Gebiet, um so mehr, als sich die Himbeere leicht züchten läßt und Sämlinge schon in zwei Jahren tragbar sind und sich bei der großen Anpassungskraft aller Rosazeen auch sofort veränderten Boden- und Lageverhältnissen anpassen, dann aber zu den rentabelsten aller Obstkulturen zählen.

Himbeere und Brombeere gelten dem Volke auch als Heilmittel, und namentlich über die letztere wissen die Heilpflanzenbücher zahlreiche Rezepte mitzuteilen, wie man die Blätter gegen Durchfall, Husten und Bleichsucht verwenden könne. Von allen diesen Empfehlungen hat sich aber nur eine bewährt, und das ist die Verwendung der Blätter zu einem Tee, der wirklich chinesischen Tee ersetzen kann.

An Kostlichkeit der Frucht wetteifert mit der Himbeere ein anderes „Walddobst“, ohne das keiner sich einen vollkommenen Sommer vorstellen kann. Das ist die Erdbeere (*Fragaria*). Ihre acht Arten sind nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, Südindien und in Amerika, namentlich in Chile, verbreitet, überall ein köstliches Labfal bietend mit den aromatischen Früchten, von denen die des deutschen Waldes zwar die kleinsten, aber in ihrer Würzigkeit auch zugleich die köstlichsten sind.

Die Erdbeerpflanze bietet in verschiedener Hinsicht ökologische Eigenheiten von einigem Interesse.

Dem Gärtner kommt es sehr zugut, daß die Erdbeere ein ausdauerndes Kraut ist, das außerordentlich leicht Ausläufer treibt (s. deren Bild in Bd. I, S. 180), die, aus den Blattachseln entspringend, bis an 20 cm weit kriechen und an der Spitze Wurzeln und Knospen bilden. Manchen Formen fehlen diese Ranken allerdings, und der Gärtner sieht sie auch nur bei der Neuanlage der Beete gerne. Später tritt er ihnen entgegen; er schneidet sie ab, weil sie dem Hauptstock Kraft entziehen und sein Ertragnis mindern.

Die dreizähligen Blätter der Erdbeere, die im Spätsommer so schön rot verfärben, kennt jedermann. Das Volk schätzt sie seit alters auf das höchste, und in dem Maße, als sich die Überzeugung von der Schädlichkeit des dauernden Genußes von chinesischem Tee verbreitet, blüht das Gewerbe der Erdbeerblattsammler auf. Denn das würzige Blatt der Erdbeere ist (nebst Brombeerblättern und einigen Blüten) der Hauptbestandteil

der unschädlichen „deutschen“ oder „Sneipp“-Teesorten. Man muß hierzu die Blätter, die so wie die Früchte viel Natriumsalze, Gerbsäure und andere organische Säuren enthalten, noch im April und Mai sammeln und trocknen. Sie haben ihren ganz ansehnlichen Preis, denn 100 kg trockenen Erdbeerkrautes werden mit 75—80 Mark gehandelt.

Die im Mai sich entfaltende Erdbeerblüte ist eine echte Rosenblüte, gewöhnlich weiß, auf steinigem Untergrunde aber gelblich. Ihr Honig wird im Kelchgrunde von einem schmalen, fleischigen Ring abgesondert, so daß der Blütenbesucher (gewöhnlich sind es Schwebefliegen und Blumenbienen, auch gewöhnliche Fliegen und die Honigbiene) den Kopf durch alle Staubblätter hindurchstecken und dabei auch an den Narben anstreifen muß. Da die Blüten protogyn sind, wird dadurch Fremdbestäubung gewährleistet. Übrigens kommt bei ausbleibendem Besuch auch Selbstbestäubung vor.

Die sich entwickelnde Frucht wächst vom fleischigen Blütenboden aus, der weich, saftig und aromatisch wird. Es kommt eine richtige Scheinfrucht zustande, auf deren Oberfläche, wie die schwarzen Flammen im Hermelin, die Nüsschen, d. h. die eigentlichen Früchte,

Ananaserdbeere, mit aus den Wasserspalten ausgetretenen Wassertropfen.
(Naturaufnahme von Prof. Dr. D. Heineck-Alzen.)

sitzen, die aber merkwürdigerweise sehr häufig taub sind. Man gerät hierdurch auf die Vermutung, ob nicht ein innerer Zusammenhang zwischen der reichlichen vegetativen und der sparsamen Vermehrung durch Früchte bestehe, und es lohnte sich wohl, dies durch Versuche zu prüfen.

Die Erdbeere, die also gar keine wirkliche Beere ist, hat nach König folgende chemische Zusammensetzung:

87,66 %	Wasser
0,93 %	freie Säure
1,07 %	Proteinstoffe
6,28 %	Zucker
0,18 %	sonstige stickstofffreie Stoffe
2,32 %	Holzfasern und Kerne
0,81 %	Aschensubstanz.

Wie diese Zusammensetzung verrät, ist die Erdbeere also nicht nur wohlschmeckend, sondern auch nahrhaft und namentlich in der beliebten Zusammensetzung mit Milch eine geradezu unübertreffliche Kost. Um so sonderbarer erscheint es, daß Erdbeeren bei gewissen Personen einen Frieselausschlag hervorrufen.

Was wir hier vorbrachten, gilt von der gemeinen Erdbeere (*Fragaria vesca* L.) unserer Wälder und buschigen Orte. Neben ihr gibt es noch zwei einheimische Arten (*F. elatior* und *F. collina*), von denen die letztere mit weißlichen, harten Früchten (daher Knäfelbeere genannt) besonders auf Staffbergen gedeiht. In Gärten baut man andere Arten an. So die besonders wohlschmeckende Scharlacherdbeere (*F. virginiana*), die große Ananaserdbeere (*F. grandiflora*) und die Chelieerdbeere (*F. chiloensis*). Durch Kreuzung erzielte die Gartenkunst aus diesen etwa 400 Spielarten, wobei man trachtete, das herrliche Aroma der deutschen Walderdbeere mit der Größe und Saftigkeit der amerikanischen Arten zu verbinden. Die Erdbeerzucht ist an sich überaus lohnend, und wenn wir lesen, daß in Baden ein Morgen Erdbeerbeete 950 Mark Ertrag abwirft und daß die 300 Erdbeerbauer in Bagnolet bei Paris jährlich über 30000 Körbe ihrer duftenden Früchte in die Weltstadt liefern, mag man es für sehr empfehlenswert halten, in der Umgebung unserer Großstädte mehr Erdbeerzucht zu treiben. Es gibt bereits heute eine Erdbeersorte (Laxtons Noble), die eine Marktsorte ersten Ranges darstellt, wenn sie auch mit ihrer Empfindlichkeit gegen Frost

Erdbeersorten.

1 = Fraise Noctem Nicense. 2 = Fr. du Chili. 3 = Fr. Cuthills black Prince. 4 = Fr. Béhnes d'Automne.

dem Züchter manche Sorgen bereitet. Sie ist eben aus einer Kreuzung mit den amerikanischen Arten hervorgegangen, und diese sind an keinen Frost gewöhnt. Das zauberhafte Stück Land, nach dem sich in seinen Kindesräumen jeder einmal gesehnt hat, die Insel des Robinson, Juan Fernandez, ist die wahre Heimat der großen Erdbeeren, deren Abkömmlinge bei uns als Ananaserdbeeren ihre Liebhaber finden. Ein französischer Gelehrter brachte aus Südchile im Jahre 1712 fünf Pflänzchen mit, aus denen alle heutigen europäischen Züchtungen dieser Art erwachsen, bei denen diese Chileerdbeere (*F. chiloensis*) und die nordamerikanische *F. virginiana* die Eltern waren.

In der Blüte nahe verwandt, daher von dem Laien auch oft verwechselt, steht der Erdbeere das Fingerkraut (*Potentilla*) nahe, das nach Lehmanns „Revisio Potentillarum“ (1856) an 200 Arten unterscheiden läßt. Es ist ein mehr an den Norden gewohntes Gewächs, bei uns jedem Botaniker bekannt als niedriges Gefräut, aber als *P. fruticosa* L. auch als ein aus den Pyrenäen in die heimischen Gärten eingewandelter Zierstrauch erscheinend.

Den deutschen Namen Fingerkraut verdankt es dem Umstand, daß manche, aber durchaus nicht alle Arten ihre Tracht vornehmlich durch die gefingerten Blätter erhalten.

Eine solche Art ist *Potentilla caulescens* L., das mit seinen herrlich seidenglänzenden, behaarten Blättern in der subalpinen Region der Alpen ebenso gewöhnlich ist wie das gemeine Gänsefraut (*P. anserina* L.) auf den Wüstplätzen der ganzen Erde, mit Ausnahme der Tropen, oder die ebenfalls gefingerte *P. reptans* L. und *P. argentea* L. Wenn ich nun noch erwähne, daß die *Potentillen* in den Hochgebirgen bis

Ein Beet voll *Potentilla fructinosa*. (Naturaufnahme von G. Dopfer-München.)

in die Gletscherregion emporsteigen und in den Alpen manche wunderschöne Pflanze

hervorgebracht haben, so z. B. die sehr niedrige rosablühende und in feines Seidenhaar gekleidete *P. nitida* L., in den Dolomiten die prachtvoll goldgelb blühende *P. aurea* L., die schönblumige *P. villosa* L. in den mittleren Bergregionen und als reine Gletscher- und Schneeformen auf den höchsten Bergen noch *P. frigida* Vill. und *P. nivea* L., so habe ich wohl meinen Lesern einen genügenden Begriff von der Systematik der Gattung, ihrer großen Anpassungsfähigkeit und dadurch bedingten außerordentlichen Mannigfaltigkeit beigebracht.

Von ihnen allen ist uns eine Form, das schön gelbblumige *Potentilla verna*, ein lieber Frühlingsherold, und da um diese Zeit des ersten Blütenregens jedermann, auch der sonst gegen die Pflanzenwelt Gleichgültigste, Liebe und Interesse für die Kinder Floras empfindet, wollen wir diese Form als den Typus der Gattung etwas liebevoller betrachten.

Das Frühlingsfingerkraut ist ein Bewohner des Rains und Wiesenhanges. Dementsprechend hat es den Habitus einer „Trampelpflanze“. Der Stengel ist niedrig,

die 5—7fach zerschnittenen Blätter schmiegen sich dem Boden mit Vorliebe an, als ob sie schon dem schweren Tritt der über sie hinwegschreitenden vorbeugen wollten. Auch prägt sich im Wuchse die Trockenheit des Standortes aus: in allen ihren Teilen ist die Pflanze klein geblieben und dicht behaart. Ich möchte nämlich das Haarkleid als Transpirationsschutz deuten und nicht als „Sonnenschirm“, wie dies von manchen Forschern geschieht. Im vollen Gegensatz zu den unscheinbaren oberirdischen Teilen ist das Wurzelwerk unserer Pflanze enorm entwickelt. Die Wurzeln greifen nicht nur weit aus, sondern gehen vor allem in die wasserhaltige Tiefe. Dem Kenner ist das sowie der Umstand, daß der Wurzelstock ausdauernd ist, eine weitere Anpassung an xerophile Lebensweise.

Unberührt von diesen Anpassungen bleibt jedoch die goldgelbe Blüte, die sich schon im April und Mai öffnet. Sie ist bei allen *Potentilla*-Arten zwitтерig ausgebildet und trägt nebst einer großen Zahl Fruchtblätter etwa 20 Staubblätter. Beide reifen zu gleicher Zeit, und so ist der Selbstbestäubung Tür und Tor geöffnet. Zwar wird ziemlich viel Nektar am rotgelben Ring der inneren Kelchwand ausgeschieden, und demgemäß besuchen alle Insektenklassen, von den Fliegen bis zu den Schmetterlingen, die mit prächtigem Schauapparat lockende Blüte. Aber sie, die sich des Nachts schließt und auch an den kühlregnerischen Tagen des Vorfrühlings wenigstens zum Teil geschlossen bleibt, bedarf ihrer eigentlich kaum, so leicht ist ihr die Selbstbestäubung möglich.

Die Früchte des Frühlingsfingerkrautes sind ein lehrreiches Beispiel aus der Anpassungslehre. Sie sind in jeder Hinsicht so gebaut, wie die Nüsschen der Erdbeere, bleiben aber trocken und unansehnlich und entbehren der fleischigen Anschwellung des Blütenbodens. Sie werden auch nicht durch Vögel verbreitet wie jene, sondern müssen sich zur Verbreitung dem Wind überlassen. Man fragt sich nun, ob die Anpassung voranging oder der Herbstwind, der die Nüsschen über das Feld zerstreute, mit anderen Worten, es ließen sich aus dem vergleichenden Studium der *Potentillen*-familie wichtige Anhaltspunkte zur Entscheidung der Anpassungsfrage gewinnen. Solche Studien sind aber noch nicht unternommen worden. Andere Anpassungserscheinungen als das Tieflandsfingerkraut offenbaren wieder die Gebirgsformen dieser Gattung.

So überrascht z. B. *Potentilla caulescens*, eine der felsentesten Rosettenpflanzen der Alpenkette, durch ganz besondere Wurzelanpassungen. M. Oettli, der sie daraufhin untersucht hat, schreibt darüber, daß diese Pflanze in den Felsenspalten aus ihren Wurzeln unter Umständen dichte, stoffartige Gewebe von etwa Taschentuchgröße webt, um nur ja jedes Krümchen Detritus auszunützen. Besonders merkwürdig ist hierbei „die Fähigkeit der *Potentillen*wurzel, selbst in unmeßbar feine Sprünge des Felsens einzudringen und sich darin reichlich zu verzweigen. Ich möchte die Feinheit dieser Sprünge mit denen eines gesprungenen Glases vergleichen.“ Ja, die Wurzel leistet sogar noch mehr. Diese feinsten Spalten, in die sie sich zwängt, erscheinen zwar detritusleer, aber feucht; „unter dem Mikroskop erkennt man jedoch, daß der sie begrenzende Fels oberflächlich voll Kalkschülferchen ist, und nur die Orte, die von Würzelchen bestrichen werden, erscheinen als reingefegte Wege, wie Regenwurmspuren im leichten Straßenstaub. Es ist also nicht unwahrscheinlich, daß Anäugung des Felsens mit im Spiele ist.“

Zu der alpinen Wiesenflora gehören durchweg leuchtend gelbblühende Fingerkräuter mit gefiederten oder gefingerten Blättern, die durchaus Rosettenhabit anlegen (s. das Bild). Von ihnen kommen manche Arten, so das Goldfingerkraut (*Potentilla aurea*), auch in den deutschen Mittelgebirgen, so z. B. im Riesengebirge und auf dem Giesenge sowie auf dem Feldberg im Schwarzwalde, vor als alpine Relikten vergangener Zeiten. Die *aurea*-Form besitzt wohl überhaupt das schönste Goldgelb, das eine Pflanze zu erzeugen imstande ist, und es ist ein wahrlich märchenhafter Anblick, einen solchen Fingerkrautbestand auf dem kurzen Rasen der sonnigen Tristen zu sehen, mit dem silber-

Fingerkraut (*Potentilla aurea*). (Zeichnung von Rud. Seiffinger.)

haarig umsäumten Kraute und den leuchtend-gelben Blüten der Sonne entgegenblickend. Nicht weniger schön ist das sehr seltene, in Höhen bis über 3000 m noch den Kampf mit dem Alpenklima siegreich bestehende Schneefingerkraut (*P. nivea* L.), dessen Blätter unterseits in ihrer Behaarung schneeweiß er-schimmern. Diese Pflanze war einer der Zeugen, auf die sich die ältere Meinung, wonach arktische und Alpenflora identisch sein sollten, berufen konnte, denn *P. nivea* ist allüberall in den Polargegenden verbreitet. Sie teilt diesen Zug mit einem anderen reizenden Bewohner unserer Berges-welt, der von A. v. Kerner

so poetisch benannten Bergnympe (*Dryas octopetala* L.), die ebenfalls in den Familienkreis der Rosazeen gehört. Was ich über diese schöne Blume in meinem Büchlein „Die Natur in den Alpen“* schrieb, kann ich auch hier wiederholen, da ich nichts Besseres über ihre Bedeutung im Kranz der Bergflora zu sagen weiß.

Dryas octopetala lebt im Felsgeröll mit großen weißen Blumen „als rasen-bildender Spalierstrauch, stets bereit, aus den Zweigen mit neuen Wurzeln in den Boden zu greifen. Mit ihrem tief in der Erde wühlenden mächtigen Wurzelwerk ist sie einer der besten Befestiger des Kalkgerölles. Wo ihr silbernes Fruchthaarschöpfchen, der „wilde Mann“** der Touristen, im Winde weht, da ist dem Kar der Schrecken

* Leipzig. (Theod. Thomas Verlag.) 8°. 1910.

** Als „wilder Mann“ bezeichnet man aber auch die ähnlichen Fruchtschöpfe der Verganemonen.

genommen. Unter der Hut dieser Schutztruppe, nachdem die Steinbreche und Fetteräuter vorgearbeitet und mit ihren verwesenden Blättern etwas Humus geschaffen und dann die Zwergweiden und Dryaden ihr Werk kraftvoll aufgenommen haben, wagt endlich der erste richtige Busch das Felsenland zu besiedeln: die Alpenrose erhebt ihr derbes, saftiges Laub.“

„So sind die Klare der Ort, wo sich am meisten von dem Leben der Berge abspielt, von den Schicksalen der Steine und dem echten wirklichen Leben, das täglich hier sich neu erobern muß, was es nie sicher besitzt. Es ist so ein Ort der Schicksale voll stummer Tragik und einer Heldengröße ohne Gesten und Worte, ohne Zuschauer und Kritiker. Es mangelt uns an Verständnis für den Inhalt des einsamen Daseins so einer Felsenpflanze hoch oben im Geröll, für die der Frühling im Juni beginnt und deren Sonnentage so karg bemessen sind und auch dann stets undroht von der Wucht der über ihr hängenden Felsen, und die trotzdem alles besiegt mit Leiden und Dulden, mit Blühen und Treiben und innerer Arbeit im erbärmlichsten Leben. Denn sie siegen, diese Horste der Schutzpflanzen, der Zunderwald, das Alpenrosendickicht und die Dryas-Polster, die jene nach sich gezogen haben, denn sie ziehen wieder den Wald nach sich, sie überwachsen alle zusammen die Trümmersfelder und mildern ihre Schrecken, sich selbst zum Heil. Die Alpenwälder, soweit sie nicht in weiten Tälern ihr Lied rauschen, sind alle einst diesen Weg der Märtyrer geschritten, und wo Frohsinn, heitere Waldespracht, Blumen und Lieblichkeit sind in den Alpen, da wurden sie abgetrozt den Felsen und dem Steintod. Wohl wehrt sich der Berggrieß immer wieder und schüttet Bäche voll Vernichtung auf das Grün, das ihn überwachsen will. Aber Bergstürze, Muren und Klare verschwinden immer wieder im Grün. Auf die Dauer siegen doch die Pflanzen, der tiefschwarze Alpenhumus deckt liebevoll das alte Felsen skelett, und am Fuße der höchsten Berge dehnt sich überall der schwere grüne Schmelz der Forste, über die alten Schutthalden und Täler gebreitet voll Feier und Ruhe.“

Diese den Felsen oft wie ein Mantel ausliegenden Polster von Dryas waren aber nicht immer auf das Hochgebirge und dessen Vorland beschränkt, wohin es oft Flüsse bringen, z. B. die Isar bis Wolfratshausen und früher bis München. Dryas wuchs zur Eiszeit in ganz Deutschland, und noch findet man in diluvialen Mooren seine fossilen Nester. Auch in der Arktis, in der Flora Spitzbergens, Grönlands, in der asiatischen Tundra ist die Dryade noch immer massenhaft vorhanden, auf Island bildet sie eine wahre Dryasheide, und wir müssen annehmen, daß sie sich nach der Eiszeit als nordischer Einwanderer nur notgedrungen in die Berge zog. Dort wächst sie, die der Schweizer auch Silberwurz nennt, zu alten, oft hundertjährigen immergrünen Sträuchern heran, die allerdings stets am Boden liegen bleiben. Die silberige Behaarung der Blätter, die sich meist nur an der Unterseite bemerkbar macht, greift bei der seltenen var. *vestita* auch auf die Oberseite über. Die Wurzeln greifen weit im Boden umher; stets sind sie mit einem Pilzmantel überzogen, ohne den das Gewächs nicht bestehen kann.

Die Blüten sind feusch und schön, ein reines Kunstwerk. In tiefen Lagen blüht Dryas schon im Mai, in ihrer eigentlichen Zone erst im Juli, im Klar der Benediktenswand in Oberbayern sah ich sie noch in den ersten Oktobertagen blühen. Oft sind sie zwittrig, daneben gibt es auch rein männliche Blüten, die sowohl für Fremd- wie gegen Ende der Blütenperiode auch für Selbstbestäubung eingerichtet sind.

Der schon erwähnte Fruchtschopf kommt aus den langbehaarten Griffeln zustande, die bei sonnigem Wetter die Haare sträuben. Offenbar ist das Ganze eine Anpassung an die Windverbreitung, auf die sich die Pflanze verlassen muß.

Wir können *Dryas* nicht verlassen, ohne noch einige Worte über ihre geologische Bedeutung gesagt zu haben. Denn dem Erdforscher ist sie eine gar wichtige Pflanze, und die Ausdrücke „*Dryasperiode*“ und *Dryasflora* sind in geologischen Werken gang und gäbe. Sie reden von jenem Stadium der Eiszeit, in dem die Urstromtäler von den gewaltigen Wassermassen der abschmelzenden Gletscher durchbraust wurden, in denen Renn- und Riesenhirsch, dickbepelzte Elefanten und Nashörner die Zwergstrauchtundra abweideten, die sich auf Kosten der zurückgehenden Gletscher immer mehr ausbreitete. Damals war, wie die Funde beweisen, *Dryas* geradezu eine deutsche Charakterpflanze, die den Boden massenhaft bedeckt zu haben scheint, wie noch heute in Island und Grönland, wo ihre Blätter die Hauptnahrung des Schneehuhns bilden. Was wir heute sehen, sind nur die letzten Überreste des einstigen Teppichs, und so wird es uns gewiß, daß die Bergnymphe gar keine echte Gebirgspflanze sei, sondern ein Flüchtling aus dem Norden, der dort Asyl gefunden hat.

Mit *Dryas* zusammen lebt an ähnlichem Standorte ein naher Verwandter, die Nelkenwurz, von der wissenschaftlichen Botanik *Geum* genannt. Ihre etwa 36 Arten verteilen sich von den Polarländern bis in den Süden, im ganzen ist aber auch diese Pflanze keine Ausnahme unter den Rosazeen und bevorzugt die kühleren Klimate. Man erkennt die Nelkenwurz, von der 5 Arten im deutschen Florengebiet verbreitet sind, daran, daß die bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdenden Staudenpflanzen bei den Arten der ebenen Wälder mehrere gelbe Blüten am gleichen Stengel tragen, die bei dem auf Wiesen und in feuchten Wäldern ziemlich häufigen *Geum rivale* L. nickten, bei dem in allen Wäldern ganz gemeinen *Geum urbanum* L. und dem spätblühenden *Geum strictum* Ait. der Nasenpläze aufrecht stehen. Das auffallendste Merkmal sind aber die Fruchtköpfchen, in denen zahlreiche, in einen Hakenborsten auslaufende Fruchthchen vereinigt sind, wodurch sie sich wie Kletten anhängen und durch Weidetiere verbreitet werden.

Unerfindlich bleibt dem Naturfreund, woher der Name Nelkenwurz stammt, denn die Blüten strömen keineswegs Nelkenduft aus. Aufklärung gibt hier der Apotheker, denn er führte im alten Arzneibuch *Radix caryophyllata*, und das war nichts anderes als der Wurzelstock von *G. urbanum*, in dem ein nelkenwürziges Öl enthalten ist.

Die Gebirgsarten *G. montanum* L.* und *G. reptans* L. sind niedriger und erheben an einem Stiel aus ihrer Rosette nur eine gelbe Blüte. Die erstere Form schmückt auch das Riesengebirge und in Bayern alle Gebirgswiesen, die letztere findet sich im deutschen Florengebiet nur im Algäu, sonst aber in den österreichischen und Schweizer Alpen, wo sie bis an die höchsten Grenzen des Pflanzenlebens heranreicht. Beide gehören auch zum „Wilden Mann“ des Alplers durch ihre Fruchtperücke, die von einem reizenden roten Schimmer umflossen ist.

Wir müssen uns nun einigen Pflanzen von sehr verschiedener Gestalt zuwenden, um die systematische Brücke zu der Blumenkönigin zu finden. Dies sind die Wiesenkönigin, der Frauenmantel, das Heil aller Welt und der Pimpernell. Gewiß

* Neuerdings auch als *Sieversia montana* (L.) Spreng. bezeichnet.

eine eigenartige Gesellschaft naiver Volksnamen, die aber gleich verrät, daß alle diese Gewächse durch Besonderheiten das Auge des Landmannes auf sich gezogen haben.

Von ihnen ist die Wiesenkönigin noch am wenigsten beachtet, ist sie doch nur hübsch, aber nicht nützlich. Und bekanntlich ist das letztere in den Augen des Volkes ein größeres Verdienst als alle ästhetischen Werte der Welt. Lateinisch ist sie nicht so schön benannt wie *Ulmaria*, und der praktische Botaniker weiß von ihr auch nichts so Poetisches zu vermelden wie der Volksfreund. Während diesem die hohe Wertschätzung unseres Volkes für die Wiesenkönigin auffällt, die so weit geht, daß z. B. die duftenden Blütensträucher von *Ulmaria palustris* Mönch. in wenigen nordischen Bauernhäusern fehlen, ist von *U. Filipendula* (L.) der praktischen Pflanzenkunde nur bekannt, daß ihre Knollen eifrigst von Schweinen gesucht werden. Allerdings schätzt sie und ihre Verwandten auch der Gärtner, der sie zu deutsch als Mädefuß, auf lateinisch als *Filipendula* bezeichnet, gefüllte Spielarten gezogen hat und sie sogar in der Blumenbinderei zu verwenden weiß. Und fürwahr, sie sind auch entzückend, diese rosigen, oft tiefkarmesinfarbenen, wohlriechenden Blütenspirren mit ihren zahlreichen Staubgefäßen als Krone über schön gestalteten Blättern. Man sieht der Pflanze an, daß sie zum Hofstaat, ja zur nächsten Verwandtschaft der Blumenkönigin gehört, in der sich alle Vorkommenheiten einen.

Weniger gilt dies für den Frauenmantel, der *Alchemilla* (oder *Alchimilla*), so benannt wohl ob der tausend schätzenswerten Eigenschaften, die ihr die Alchimisten einst — andichteten. Heute ist die Pflanze wieder bei den Botanikern in höchstem Aufbruch durch die merkwürdigen Fortpflanzungserscheinungen, die man an ihr entdeckt hat. Bevor wir jedoch darauf eingehen, müssen wir sie wohl erst vorstellen. Die Alchemillen sind bergbewohnende Kräuter oder niedrige Sträucher mit unansehnlichen grünlichen Blüten, meist einem kleinblumigen Fingerkraut so ähnlich, daß sie von einem mäßigen Pflanzenkenner damit verwechselt werden können. Sie scheinen fremde Gäste zu sein, denn die große Mehrzahl ihrer Arten ist außereuropäisch; am besten gedeihen sie in den tropisch-amerikanischen Berglandschaften, wo sie eine ganz absonderliche Tracht annehmen; so nimmt z. B. die peruanische *Alchemilla nivalis* H. B. K. die „Tracht“ der Schachtelhalme an, und andere erinnern an Bärlappe, eine Erscheinung, für die es uns noch an Erklärungen mangelt.

In der heimischen Flora kommen nur zwei Arten als bedeutsamer in Betracht. Dies sind *A. vulgaris* L., die der Leser auf der Farbentafel zu S. 20 in Bd. I dieses Werkes abgebildet findet, und der Alpenfrauenmantel (*A. alpina* L.), leicht kenntlich an den silbergrau behaarten und gefingerten Blättern.

Der Frauenmantel des Niederlandes wird im Volksmunde häufig auch als Taubecher bezeichnet als Zeichen dessen, daß auch die unangelehrten Naturfreunde die Eigentümlichkeit der Blätter wahrgenommen haben, auf deren Grunde des Morgens oft ein blinkender Taupropfen liegt. Der Pflanzenkenner weiß, worauf dies beruht: daß dieser Tropfen aus zusammengefloßenen kleineren Tröpfchen entstanden ist, die aber nicht vom Tau herrühren, sondern aus Wasserspalten von der Pflanze selbst ausgeschieden wurden, wie man solches von vielen Gewächsen, namentlich aus der Familie der Rosazeen, so von Erdbeeren und Potentillen, kennt. Solche Wasserspalten findet der Leser auf S. 328 im II. Bande beschrieben und kennt sie von dort her wohl als mechanisch

unbegreifliche Regulationsvorrichtungen des Wasserhaushaltes. Bei *Alchemilla*, *Potentilla* und *Clematis*, wo sie Haberlandt studierte, beschreibt sie dieser Forscher als aus zahlreichen Poren bestehend, die in einer dichten Gruppe beisammenstehen.

Alchemilla alpina ist eine sehr häufige und kennzeichnende Form der Alpenweiden, leicht kenntlich an dem großen Kontrast zwischen der silberhaarigen Unterseite und dunkelgrünen Oberseite der Blätter. Man unterscheidet zwei Formen, *A. alpina* (auch *Eualchemilla* genannt) und *A. Hoppeana*, von denen die erste nur auf Urgestein, die letztere nur auf Kalk gedeiht. Die Alchemillen werden vom Weidevieh nicht gefressen, gelten daher als alpines Unkraut. Man versteht dies, wenn man sie verkostet. Sie schmecken bitterlich, zusammenziehend nach der Gerbsäure, welche die Blätter reichlich enthalten. Um so merkwürdiger berührt es, daß die ebenfalls bittere Form der Ebenen (*A. vulgaris*) vom Weidevieh leidenschaftlich begehrt wird, daher als „milchtreibendes“ Futtermittel höchlichst geschätzt wird. Auch die Naturheilkunde hat es schätzen gelernt als Tee, und so kommt *Herba Alchemillae concisa* sogar in den Handel und wird mit etwa 100—120 Mark das Kilo bewertet. Dieser Wertschätzung gemäß hat das unscheinbare Pflänzchen zahlreiche Volksnamen erhalten. Taumantel nennt es der Süddeutsche, aber auch Marienmantel, Gänsefuß, Löwentapp, Regendächle, Sonnenblättele, Taublatt sind verbreitet, wobei auf die Form der Blätter, bzw. die *Gynadotoden*, angespielt ist, während Milchkraut einen richtigen Nukungsnamen der Praxis darstellt.

Trotz der nahen Verwandtschaft mit der Rose hat dieses Gewächs in seinen Blüten nichts Rosenhaftes. Man kann sich kaum etwas Unansehnlicheres denken als diese winzigen, grünlich-gelben Trugdolden, deren Einzelblüten der Krone entbehren, daher auch trotz der Häufung unansehnlich bleiben. In dem achtspaltigen Kelch steht nur ein einziges Staubgefäß (bei den alpinen Formen 4). Bei so geringen Anlockungsmitteln war von vornherein zu erwarten, daß trotz der Honigabsonderung sich nur ein geringer Insektenbesuch einstellt. Und wirklich berichten Knuth und andere Beobachter, daß gar kein regelmäßiger Besuch stattfindet. Wie erhält sich aber dann die Pflanze?

Hier ist der Punkt, wo das große wissenschaftliche Interesse einsetzt. Der nordische Botaniker Murbach und nach ihm Prof. Strasburger haben nämlich beobachtet, daß *Alchemilla* „apogam“ sei, d. h. daß sie ihre Samen jungfräulich, ohne vorausgegangene Befruchtung, ausbilde! Ich folge hierbei der schönen Abhandlung Strasburgers vom Jahre 1904*, durch die nachgewiesen wurde, daß sich in der Frauenmantelblüte meist nicht einmal die Staubbeutel öffnen, daß also eine Befruchtung schon dadurch ausgeschlossen sei. Der Keimling bildet sich gar nicht einmal aus dem Ei, sondern aus einer Embryosackmutterzelle, er stellt also eigentlich nichts anderes dar als eine Art Brutknospe oder einen „Steckling in Samenform“. Dies gilt nun nicht für alle Arten der Gattung, aber dennoch läßt sich wohl sagen, daß der Frauenmantel eine Pflanze sei, die sich auf die Dauer nicht erhalten kann. Gerade solche, sich dem Aussterben nähernde Lebewesen entfalten einen besonderen Reichtum an Abänderungen, etwa wie Ammoniten, als sie in der Kreidezeit der Erde ausstarben. So hat man auch

* G. Strasburger, Die Apogamie der Eualchemillen. (Jahrb. f. wiss. Botanik. Bd. LXI.)

von *Alchemilla* eine sehr große Anzahl „kleiner Arten“ beschrieben, für deren Entstehung und biologische Erklärung es uns an Verständnis fehlt, will man nicht den oben angedeuteten Wegen folgen.

Das „Heil aller Welt“ heißt in der botanischen Fachsprache, weniger bombastisch wie im Volksmunde, *Agrimonia Eupatoria* L., woraus der Schulname oder auch Adernennig vererbt wurde. Es ist eine bescheidene, gelb- oder weißblühende Staude mit Klettenfrüchten, einem aufgeschossenen Fingerkraut nicht unähnlich, an buschigen Hügeln und am Waldrande weder häufig noch selten. Mit seinen oft kurz-grauhaarigen Fiederblättern war es aber in der alten Apotheke und ist es noch jetzt in der Volksmedizin geschätzt bei „Brustkrankheiten“, Halserkältung und Leberleiden, wozu auch eine Wurzelabkochung dient. Den alten Ruf hat das Heil aller Welt zwar schon eingebüßt, und schnöderweise hat man sogar versucht, es zur Industriepflanze zu erniedrigen und aus den Blüten einen Farbstoff zu bereiten, dem man große Dauerhaftigkeit nachrühmt.

Auch der Pimpernell ist so degradiert zum Suppengemüse, während er einst in der Signaturlehre als Panazee gegen „Blutflüsse“ eifrig begehrt war. Das kam natürlich daher, daß der Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis* = *Poterium Sanguisorba* L.), wie er eigentlich heißt, die Blüten in dunkelbraunroten, also blutfarbenen Köpfchen beisammensteht. Der Name Pimpernell ist anscheinend aus Bibernell vererbt, worin wohl eine Anspielung auf die Purpurfarbe zu suchen war.

Es gibt wohl wenig feuchte Wiesen, auf denen man vom Juni an diese dunkel schimmernden „Knöpfe“ vermissen würde, die in dem Sichzusammendrängen der Blüten ein treffliches Beispiel für das Kapitel Schauapparat abgeben. *S. minor* ist eine nahestehende Art der trockenen Hügel, deren Blütenfugel zunächst grün und erst im geeigneten Moment rot gefärbt ist, gewissermaßen als Übergang zu den grünblütigen Arten, die kennzeichnenderweise stets durch den Wind befruchtet werden. Dem Pflanzenpsychologen gewährt also diese Gattung ein sehr geeignetes Untersuchungsobjekt für seine Anschauungen. Die Windblütler derselben Gattung haben lange Staubfäden und lange Narbenpapillen, weil sie den Pollen in die freie bewegte Luft hinausbringen müssen und ihn von dort auch wieder aufzufangen haben. Dagegen ist bei ihnen keine Vorrichtung getroffen, um auf der grünen Wiese die Pflanze irgendwie kenntlich zu machen. Ganz anders bei jenen Arten, die auf Insektenbesuch angewiesen sind. Sie haben kurze Narbenpapillen und kurze Staubfäden, dagegen sind verschiedene Einrichtungen vorhanden, durch welche die Aufmerksamkeit der Kerfe auf die Blume gelenkt

Pimpernell (*Sanguisorba minor*).
(Nach Thomes Flora.)

werden kann. Die Blütenköpfchen sind rot überlaufen oder ganz braunrot gefärbt. Manchmal sind auch die Staubfäden im Kontrast dazu schneeweiß und in diesem Fall auch länger.

Dies sind Gegenstände von solcher Bedeutung, daß man glauben sollte, kein Botaniker habe Naht noch Ruhe, bevor er für sie eine Stausalerklärung beigebracht habe. Statt dessen nahm man aber bisher die Tatsachen hin, ohne auch nur den Versuch einer Erklärung zu unternehmen.

Wie anders wäre dies, wenn dieses Problem rein praktische oder auch nur künstlerische Interessen berührte! Wie als Illustration zu dieser Frage mutet es an, daß über die Nahverwandten des Wiesentknopfes,

die Rosen,

so viel geforscht, gedacht, erzählt und gestrebt wurde, daß man, wollte man ein wirklich erschöpfendes Lebensbild der Blumenkönigin entwerfen, damit eine Bibliothek füllen könnte. Darin würde allerdings das rein Botanische nur den geringsten Teil ausmachen.

Es klingt banal, von der „Blumenkönigin“ zu reden. Aber der Ausdruck ist mehr als eine dichterische Redewendung. Er hat seine Berechtigung, denn die Rose ist wirklich diejenige Pflanze, in der sich die Gestaltungskraft der Pflanze zur vollkommenen Harmonie der Eigenschaften erhoben hat. Wohl ist die Rose weder die größte noch die komplizierteste der Pflanzen; deshalb stellt das natürliche System nicht sie als Schlusstein der Pflanzenentwicklung hin, sondern die Körbchenblütler, aber sie ist der goldene Mittelweg, die Verkörperung der Harmonie in allem, gewissermaßen der Idealtypus der Blütenpflanzen, sei es nun im Ebenmaß der Entwicklung ihrer grünen Glieder oder in dem Bau von Blüte und Frucht. Alles ist an ihr auch ästhetisch vollkommen befriedigend, was schon durch diese Harmonie des Baues gewährleistet wird. Deshalb griff auch die Kunst dieses Gewächs wie kein zweites auf und schuf es als Ornament wieder, symbolisierte es und erhob es zu einem Ideal, das die Dichtkunst ganzer Literaturen, z. B. der türkischen und persischen oder auch der Minnesängerzeit, beherrscht.

Der Pflanzenkundige hat für diese Wertschätzung nur die eine Ausdrucksform einer Charakteristik der Gattung, in der sich Epitheta, wie ansehnlich, harmonisch, duftend, wohl umgrenzt häufen. Er kennzeichnet die Gattung *Rosa* als eine zwitterige Blütenpflanze mit unpaarig gefiederten, oft immergrünen Blättern und mit Nebenblättern. Sie besitzt also die am höchsten entwickelte Blattgestaltung. Daß die Blätter bei vielen Arten immergrün sind, findet sich bei den veredelten Gartenformen schon häufig darin angedeutet, daß deren Blätter in milden Herbstwochen so lange unverändert an den Zweigen bleiben, bis man die Sträucher eindeckt, und auch die wilde Hundsrose hat oft noch im Schnee einen Teil ihres Laubes erhalten, ähnlich wie die Brombeeren der Wälder.

Die Nebenblätter der wilden Rosen stehen am Grunde der Blätter und sind ihrer ganzen Länge nach mit der Mittelrippe verwachsen. Sie sind nicht bedeutungslos, wie wohl viele Pflanzenfreunde meinen, sondern dienen zum Schutze der jungen Blätter, die sie wie eine Scheide umfassen. Eine bemerkenswerte ökologische Erscheinung ist auch die Einfaltung der ganz jungen Blättchen. Sie sind ungemein geschickt auf ganz engem Raum zusammengelegt und verbleiben in diesem Zustande, in dem sie wie gepreßt erscheinen, auch noch einige Zeit, nachdem sie bereits dem Knospenzustande entwachsen sind; offenbar ist dies von Nutzen für sie.

Die Zweige, an denen die Blätter sitzen, sind bekanntlich mit Stacheln bewehrt. Dies gilt zwar nicht für alle Rosenarten. So ist beispielsweise die Alpenrose (*R. alpina*) unserer Hochgebirge fast ganz stachellos. Der Alltag spricht zwar nicht von Rosenstacheln, sondern Dornen — aber er irrt eben darin. Denn Dornen sind Zweige, müßten also Holz enthalten. Die Rose wehrt sich aber nur mit Rindenauswüchsen, d. h. Stacheln, und so darf auch das bekannte Sprichwort vor den Augen des Botanikers keine Gnade finden. Die Stacheln sind abwärts gebogen. Schon das deutet darauf, daß sie nicht gegen den Menschen, der die Rose von oben bricht, schützen, sondern gegen aufstreichende Tiere, wohl also Schnecken, gegen die auf die Früchte lüfternen Mäuse u. dgl. mehr. Es ist übrigens bemerkenswert und gibt mancherlei zu denken, daß die älteren Stämme dornenlos sind. Schmeil meint hierzu in seinem prächtigen Lehrbuch, sie seien ja durch die harte, trockene Rinde geschützt. Nun fressen aber Schnecken, Mäuse und Weidetiere ja auch an jungen Stämmen nicht die Rinde, sondern Blätter und Früchte, also hält sie eine derbe Rinde davon nicht ab. Man fühlt sich demnach versucht zu glauben, daß die Stacheln nicht des Schutzes halber entstanden, sondern so wie die des Stechginsters (*Ulex*)

Wilde Rosen der Heimat.

1 = *Rosa pimpinellifolia* L. 2 = *R. cinnamomea* L.
3 = *R. canina* L. (Nach Thomas Flora.)

als Unpassung an Trockenheit, wie wir dies in Bd. I, S. 16 dieses Werkes ausführten. Eigenartig ist es aber allerdings, daß die Stacheln sich gegen die Blüten zu häufen.

Rosenkenner werden sich an diesem Punkte dessen erinnern, daß es eine Rosenart gibt, die an den Blütenstielen mit einem dichten grünen Haarfilz umwachsen ist, der sich auch auf den Kelch fortsetzt und namentlich den Knospen ein ganz allerliebstes Aussehen verleiht. Sie meinen hierbei die „Moosrose“. Diese ist aber eigentlich keine Art im botanischen Sinn, sondern eine Gartenzüchtung, bei der die auch an anderen Rosenformen zu findenden Stieldrüsen besonders entwickelt sind. An Drüsen ist die Rose überhaupt reich, und manchmal enthalten sie ätherisches Öl. Dann duften auch die Laubblätter auf das angenehmste, wie z. B. bei der auch wild wachsenden *Rosa rubiginosa* L.

Eine Eigenart der Rosen ist auch die Heckenbildung. So wie Brombeere und Himbeere, ist auch die wilde Rose ein guter Kletterer. Im heimischen Walde ist sie leider schon zu sehr gemäßregelt, als daß sie noch mit der lieblichen Ungebundenheit wuchern dürfte wie im Märchen vom Dornröschen, das andeutet, daß einst auch bei uns ähnliche Rosendickichte blühten, wie noch jetzt in den Wäldern um das Schwarze Meer, wo namentlich in der Krim und in Kaukasien herrliche Wildnisse voll Rosen duften. Schon im Osten des deutschen Sprachgebietes, in den Donauauen, kann man solche natürliche Rosenhecken bewundern, die, an den Schwarzpappeln bis hoch hinauf rankend, manchmal den Eingang in den Wald auf das schönste versperren. Die

Hecken bilden sich dadurch, daß die Wurzelschößlinge sich mit Vorliebe zum Boden neigen. Von der himmelwendigen Seite aus treiben sie wieder Zweige, die einen neuen Bogen über den Strauch spannen. Die so entstandenen Bogengänge werden dann durch neue, aus dem Boden sprießende Wurzelschößlinge durchspinnen und undurchdringlich gemacht. Diese Tendenz, die Zweige in elegantem Bogen abwärts und auswärts zu spreizen, hat auch die Edelrose beibehalten, und sie trägt nicht zum wenigsten dazu bei, der Rose als Hochstrauch schöne Gestalt zu verleihen.

Zentifolien.

1 a Panaschierte Rose. (Nach der Revue horticole und l'illustration horticole.)

An diesen Zweigen erheben sich die Blüten, die sowohl voll erschlossen wie als Knospe ohne Zweifel das ästhetisch Befriedigendste darstellen, was die lebende Natur hervorgebracht hat. Rein wissenschaftlich betrachtet, ist die Blüte nach dem Typ der Birnblüte gestaltet, wobei man natürlich nicht an die Zentifolie, sondern an das bescheidene Heckenröslein des Wegrains denken muß. An ihm erkennt man, daß der Blütenboden trugförmig gestaltet ist. Neben fünf sehr verschiedengestaltigen Kelchblättern finden sich fünf rosige Blumenblätter und eine sehr große Zahl Staubfäden sowie aus dem Blütenboden hervorragende Fruchtblätter (Bild S. 512). Die Befruchtung, an der vornehmlich die bekannten Rosenkäfer und Immen beteiligt sind, ist durch das dichte Beisammenstehen so vieler Staub- und Fruchtblätter sehr erleichtert, wie auch Selbstbestäubung im Bauplan der Rosenblüte vorgesehen ist. Deshalb sind besondere Anstrengungen zur Ermöglichung der Bestäubung überflüssig, und die Rosenblüte hat nicht einmal Zuckerast, sondern befriedigt ihre Gäste nur mit Blütenstaub. Als

Pollenblume aber ist es für sie vorteilhaft, ihr Inneres vor den Einwirkungen des Taues zu schützen. Sie schließt die Blüte des Abends und auch vor Regenwetter.

Interessante Anpassungen zeigt auch die Frucht. Aus der Tatsache, daß der Blütenboden fleischig und süß wird und sich in brennendes Rot umfärbt, läßt sich bereits schließen, daß er für Vögel bestimmt ist, und so bestätigt es auch die Beobachtung. Im Innern birgt die Frucht eine Anzahl hartschaliger Nüsschen, die in eine Menge feiner Haare eingelagert sind.

Diese allgemeinen Charakterzüge wechseln nun in ziemlich weiten Grenzen. Das System der wilden Rosen unterscheidet nach Focke an 100 Arten, während andere Rosenkenner sogar mehrere hundert Arten unterschieden sehen wollen. Man zerlegt sie in die zwei Untergattungen *Hulthemia* (wächst in Persien), die keine Nebenblätter besitzt, und die eigentliche Rose, die *Eurosa*, deren verschiedene Typen als die Stammformen der Edelrose gelten. *Rosa gallica* L. ist ein in Südeuropa und im Morgenlande wild wachsender, niedriger Strauch mit feurigroten Blüten. Ihn hält man für die Mutter aller gefüllten älteren Gartenrosen, und wahrscheinlich sind auch *R. damascena* Mill. und *R. centifolia* L. aus ihr hervorgegangene Kulturformen.

Die Asiaten haben ihre berühmten chinesischen und Teerosen, die im Altertum in Europa unbekannt waren, aus einer anderen Art (*R. indica*) gezüchtet, die der deutschen Hundsrose (*R. canina*) nahesteht. Wieder eine andere Gruppe bilden die nordischen Rosen, denn wie fast alle Rosenblütler, geht auch die Rose mit einer gewissen Vorliebe in die Eisländer. Von Alaska schildert uns Bergmann, daß dort *R. cinnamomea* mit ihren duftenden Blättern ein echtes Wahrzeichen des Landes sei, in Sibirien ist eine andere feinlaubige und nadelstachelige Rose (*R. pimpinellifolia* L.) heimisch. Beide Arten sind Vertreter besonderer Gruppen und Ausgangspunkt von Rosenzüchtungen, die dem Nordländer den Blumenzauber südlicher Länder ersetzen.

Von den kletternden Arten haben wir ebenfalls zumeist Asiaten bei uns heimisch gemacht. Die Bankiarose (*Rosa Banksiae* R. Br.) der Veranden entstammt dem südlichen China, deshalb ist sie auch bei uns empfindlich geblieben. Alle diese Rosenformen, die das neue System von F. Crépin in 16 Sorten scheidet, wurden jedoch durch die Kultur miteinander gekreuzt, wozu sich die Rose besonders eignet; die Eigenschaften wurden durcheinandergewürfelt, und die 4000 Spielarten (andere wollen sogar 6000 unterscheiden) bedürfen neuerdings wieder eines Systems, damit man sich darin zurechtfinden könne.

Das ausgezeichnete Werk von Meyer und Nies („Die Gartenkunst in Wort und Bild“. 4°. 1904) gibt eine treffliche derartige Einteilung, die sich sowie das von dem „Vater der deutschen Rosenzucht“, von Herrn P. Lambert, entworfene System eng an das von Crépin entworfene anschließt und vernünftigerweise danach trachtet, die gärtnerischen Züchtungen auf ihren Stammbaum zurückzuführen, d. h. auf die wilden Arten, aus denen sie hervorgegangen sind. Es wird natürlich alle Rosenfreunde unter meinen Lesern zu erfahren interessieren, wie es um das Pedigree ihrer Lieblinge steht, wobei ich mich allerdings, um in Harmonie mit den übrigen Darstellungen dieses Werkes zu bleiben, nur auf die bekanntesten Sorten beschränken muß. Die Monatsrosen (*Rosa semperflorens* Curt.), eigentlich Bengalrosen, sind indische Rosen, die so wie die Noisette- und Bourbonrosen aus Kreuzungen der *Rosa indica* Francé, Das Leben der Pflanze. IV.

hervorgegangen zu sein scheinen. Ihr Vorzug besteht bekanntlich darin, daß sie die ganze gute Jahreszeit hindurch und namentlich im Herbst reichlich blühen. Die altbekannte La France-Rose ist eine „Teehybride“ (auch Maréchal Niel), d. h. sie wurde erzogen aus einer Kreuzung der Teerosen mit Arten der Sektion *R. gallica*. Die Teerose selbst heißt auf botanisch *Rosa fragrans* Red. und ist eine Unterart der *R. indica* sowie alle bisher besprochenen Formen. Merkwürdigerweise wissen viele Gebildete den Namen der Teerose nicht zu deuten. Manche, die ich frug, meinten, „weil sie die Farbe des Tees hätten“, hätte man ihr den Namen beigelegt. Solche wissen offenbar nicht, daß die Teerose die Farbenskala vom reinsten Weiß bis blutigen Rot durchlaufen kann. Der Name rührt von dem feinen, an Tee erinnernden

Aroma her, dessen sich gewiegte Händler auch bedienen, um durch Beimischung von Rosenblättern das Aroma minderer Teesorten zu verbessern.

Die Remontantrosen bezeichnet der wissenschaftlich gebildete Gärtner als „*R. hybrida bifera* Hort.“ und sieht sie als Kreuzung der indischen Rose mit *Rosa gallica* an. Den französischen Namen haben sie vom wiederholten Blühen, und da sie den europäischen Winter leicht aushalten, sind sie jetzt die wichtigste aller Rosengruppen, von der man die meisten Sorten gezüchtet hat.

Teerosen

Rechts: Maréchal Niel; links: Isabelle Grey;
unten: „The sweet little queen of Holland“.

Diese Sorten werden aus Handelsinteresse meist nicht nach botanischen Grundsätzen, sondern nach Persönlichkeiten bezeichnet. Wir finden in den Katalogen der Gärtner Namen wie: „Frau Geheimrat von Bach, Dr. Grill, Leonie Lamesch, Papa Gontier und Mama Cochet“, oder auch: „Grüß an Tepliz, Sultan of Zanzibar, Ma petite Andrée“ u. dgl., was natürlich allerlei Unzuträglichkeiten im Gefolge hat und auf die Dauer wohl nicht bestehen bleiben wird. Übrigens tauchen immer wieder längstbekannte Sorten mit neuer Etikette im Handel auf. Im allgemeinen hat auch hier die Mode ein Wort mitzureden, und zu jeder Zeit waren andere Rosenliebhaber an der Tagesordnung. Erst das 19. Jahrhundert hat die große Rosenmannigfaltigkeit geschaffen; bis zum Jahre 1795 waren nur 30 Sorten bekannt, und das Altertum kannte gar nur einige Formen. Noch unsere Großväter ergötzen sich fast ausschließlich an den Zentifolien und den Monatsrosen. Dann kam die Zeit der Remontantrosen, und ihr feuriges — übrigens unübertroffenes — Rot war Modefarbe. Sie wurden abgelöst durch die ätherische Teerose, die gerade in den gelben Nuancen sehr wohl zum

fränkelsnden Teint der Modedame vor 30 Jahren paßte, als „Nerven“ und Zimperlichkeit Trumpf waren. Da die Teerose Frost jedoch nicht vertragen kann, sann man auf Verbesserungen, und die heutige Rosenmode bevorzugt die Teehybriden, als deren Gipfel Madame Caroline Testout und ihre Nachkömmlinge gerühmt werden. Allerdings fehlt ihnen sowohl die Farbenslut der Remontanten wie das herrliche Gelb der Maréchal Niel. Und schon kommt ein neuer Rosenliebbling, wenigstens in den Gärten, auf: die üppig blühende Schlingrose Crimson Rambler, die der Rosenzüchter Turner auf den Markt gebracht hat.

Edelrosen.

1 = „Ruhm der Gartenwelt“ (Remontant-Rose). 2 = „Madame Furtado“ (Remontant-Hybride). 3 = Rose mit variierten Blüten. (Nach den Originalen in der Illustration horticole, Flore des Serres und Gartenwelt.)

Eine zweite Frage, die auf allgemeines Interesse rechnen kann, ist die, auf welche Weise man neue Rosenforten gewinnt, wie man überhaupt aus der einfachen wenigblättrigen Blüte der wilden Rose die üppigen Gebilde der Edelrose erzeugt hat. Dies ging auch nicht anders vor sich wie bei Rübe und Getreide. Man selektionierte, d. h. man hielt sich an die zufällig auftretenden Abänderungen, die man dann festhielt, indem man solche Pflanzen vermehrte. Außerdem kreuzte man die verschiedenen Arten, indem man fremden Blütenstaub auf die Narben brachte. Diese Kreuzung ist heute der beliebteste Weg und wird bei wachsender Sortenzahl immer aussichtsreicher. Von den ältesten Sorten weiß man allerdings nicht mehr, wie sie zustande gekommen sind,

ebensowenig wie die erste gefüllte Rose entstand; wahrscheinlich hat man hierbei glückliche Zufälle benützt, so nachweislich bei der Moosrose oder der Dijonrose. Gegenwärtig werden die meisten Rosen durch Edelreiser fortgepflanzt, die man einer wilden Rose aufspießt. Gewöhnlich dient die Hundsröse als Unterlage.

Wer in der Rosenzucht arbeiten will, bedarf gar vieler Erfahrungen, und Fachmänner, wie z. B. M. Löbner in seinem soeben erschienenen „Leitfaden für gärtnerische Pflanzenzüchtung“, beklagen mit Recht die allgemeine Planlosigkeit der Züchter, die versuchen, Sorten, deren Vererbungskraft sie gar nicht kennen, zu vereinigen. Daraus erklärt sich, daß jährlich Hunderte neuer Rosenarten angepriesen werden und in den Handel kommen, die aber ebenso rasch verschwinden, wie sie auftauchten.

Der Gärtner unterscheidet Formrosen von Parkrosen und versteht hierbei unter den ersteren das, was man gemeinhin Rosenstöcke nennt. Die Parkrosen dagegen läßt man in ihrem natürlichen Zustand wuchern, verwendet sie also in Boskettts, einzeln oder in Gruppen, läßt sie auf Bäume und Lauben klettern und bevorzugt sie neuestens immer mehr, seitdem man erkannt hat, daß sie namentlich vor Koniferengruppen etwas ungemein Romantisches in den Park bringen. Rosen verlangen Sonne und sandigen, humusreichen Boden. Die Düngung sei reichlich; Jauche und verrostete Misterte wandeln sich in Schönheit und Duft, auch Kainit und Thomasschlacke machen sich bezahlt.

Die Formrosenkultur hat besonders in Frankreich ihre Liebhaber gefunden, wo die Rose schon zur Troubadourzeit eine größere Rolle spielte als bei uns und wo es zu Montpellier schon im 18. Jahrhundert Rosengärten gab, in denen man 40 000 Stöcke pflegte. Einen neuen Aufschwung nahm die französische Rosenliebhaberei durch die Kaiserin Josephine, und sie blieb auch heimisch, so daß schon um 1870 die 90 großen Rosenzüchtereien von Paris einen Bestand von über 1 Million Rosenstämmchen besaßen. Frankreich ist daher trotz des starken Wettbewerbes von England, Holland, Belgien und Deutschland noch immer tonangebend in der Züchtung.

Berühmte Rosengärten hat es zu allen Zeiten gegeben. Die Pfaueninsel zu Potsdam hatte ihr französisches Gegenstück in Malmaison und im Pariser Luxembourg weniger wie in Broxbournebury, dem schönsten Rosarium Englands. Jetzt gelten als berühmte Rosarien die des Herrn Graveraux in L'Hay bei Paris, ferner das des Vereins deutscher Rosenfreunde in Sangershausen, das etwa 15 500 qm bedeckt, also etwa 5mal größer als das französische ist. Ein berühmter Rosengarten blüht auch zu Geisenheim a./Rh. im Besitze des Herrn v. Lade, und ein besonders schönes Rosarium ist in dem glücklichen Klima von Karlsruhe im neuen Stadtgarten im Flächenraum von rund 5500 qm in Ausführung und bietet in reichster Auswahl hochstämmige, niedrige Trauerrosen sowie Rankrosen aller Spielarten.

Auch einzelne Rosenstöcke haben es zu großer Berühmtheit gebracht. M. Schleiden erzählt in seinem schönen Buche über die Rose, das alles zusammenfaßt, was bis zu seiner Zeit über die Kulturgeschichte der Rose bekannt wurde, daß die Bankrose die prachtvollsten Exemplare aufzuweisen habe. „In dem Jardin de la marine zu Toulon“, sagt er, „steht eine der ältesten weißen Bankrosen. 1842 hatte der Stamm über der Erde einen Umfang von 2 Fuß 4 Zoll.“ . . . Zur Zeit, wenn der Baum in voller Blüte steht, trägt er nicht weniger als 50—60 000 Blumen! Ähnliche schöne Rosen bewundert man in England, bei Neapel, im Luxemburggarten zu Paris.

Als größter Rosenbaum Europas gilt jener im Wehrleschen Garten zu Freiburg i./B. Er wurde als Wildstamm im Jahre 1881 mit einer Teerose okuliert. Schon im Jahre 1900 erreichte er einen Flächenraum von 83 Quadratmetern und trug 6200 Knospen. Gegen das Jahr 1905 überstieg die Zahl seiner Blüten 10000. Er ist in eine Laube gezogen. Der Umfang des Stammes beträgt 34 cm, der Durchmesser der Krone aber gerade das Hundertfache.

Als „ältester“ Rosenstock besitzt der an dem Dome zu Hildesheim Weltruß. Schon Alex. von Humboldt erwähnt ihn in den „Ansichten der Natur“ als 800jährigen Baum, von dem eine Urkunde aus dem 11. Jahrhundert meldet, daß er schon um 1061 ansehnlich gewesen sei. Eine erste Beschreibung dieser Pflanze findet sich aber doch erst im 17. Jahrhundert, und daher mag es rühren, daß von manchen behauptet wird, der Hildesheimer Rosenstock sei nachweislich nur 300 Jahre alt. Er klettert an der Außenmauer des Domes empor und bedeckt sie in einem Umfang von 6,5—7,5 m. Der Stamm ist nicht allzu dick (50 cm), und so mag der Rosenstock in seinem heutigen Zustand nur noch einen Rest seiner einstigen Pracht darstellen (s. das Bild S. 518).

All diese Schaustücke Europas geben aber keinen Begriff von der Pracht und dem Duft der Rosen im Osten, in Bulgarien und Persien, den eigentlichen Rosenländern, wo sie feldmäßig angebaut und industriell zur Herstellung von Rosenöl und Rosenwasser verwendet werden. Kaschmirs Rosenreichtum ist schon seit dem Altertum berühmt, und bei Schiras, gerade wo das einstige Persopolis seine Ruinen breitet, ist das Land im Mai in ein rotes Blütenmeer getaucht. Die Rosen werden in Baumform gezogen, und erstaunt sieht man 5—10 m hohe Rosenbäume mit Tausenden duftiger Blüten übersät in einem Lande, das sonst durch seine Salzwüsten und Versunkenheit nur einen trostlosen Eindruck macht. Nur dort (in Europa höchstens an der Riviera, wo Veilchen und Rosen in Massen zur Parfümbereitung verwendet werden) lohnt sich auch eine industrielle Ausnützung der schönen Blume.

Im „europäischen Gültistan“, wie man im Orient Kasanlik, den bulgarischen Hauptort der Rosenölindustrie, nennt, wird die Hälfte alles bulgarischen Rosenöles, etwa 1000—1500 Kilo, gewonnen, eine Menge, die man nur dann richtig abschätzen kann, wenn man bedenkt, daß erst 400 Blüten zwei Tropfen Rosenöl liefern! Wenn es trotzdem nicht teuer ist, so rührt dies daher, daß das meiste Rosenöl mit Geranium- oder „Idris-Öl“ (aus Gräsern gewonnen!) versetzt ist. Ähnliches gilt vom Rosenwasser, das dem Orientalen als Schönheitsmittel unentbehrlich ist und auch bei uns in der Apotheke und Zuckerbäckerei verwandt wird, dem Wesen nach aber meist Santelöl als wirksamen Bestandteil erhält.

An diesem Punkte, wo Pflanzenkunde in Kulturgeschichte übergeht, ziemt es auch, einiges aus der „Geschichte der Rose“ zu erzählen, wenn auch auf die Gefahr hin, den der Rose zugemessenen Platz zu überschreiten. Aber diese Pflanze hat zu tief in das Leben der Menschen eingegriffen, als daß man ganz darüber schweigen könnte.

Wenn Nero bei einem Gastmahl um 600 000 Mark Rosen verschwendet, wenn Heliogabal auf Betten schläft, deren Lager und Decke aus frischen Rosenblättern verfertigt, deren Kissen aus Veilchen zusammengesetzt war, so mag dagegen der Rosenkult des Türken, der Legendenhaft des deutschen und französischen Mittelalters mit seinem „Roman von der Rose“, seinen Rosenfesten, dem „Rosenkranz“, der goldenen Tugend=

rose, mit der Verwendung der Rose in der Architektur, mit seinen „Rosenkreuzern“, Rosenspeisen nur mehr wie ein verhallender Nachklang erscheinen, so sehr auch die Rose das ganze Denken und Empfinden des mittelalterlichen Menschen beeinflusste. Noch heute finden wir diese Beziehungen tausendfach in unser sonst so nüchtern gewordenen Leben verwebt, dort, wo der ausgesprochene Niederschlag alles dessen zu finden ist, was die Seele des Volkes jemals bewegt hat, nämlich in der Sprache. Es ist doch auffällig, daß keine Blume, kein Tier, kein Natur- oder Geschichtsereignis so sehr die Sprache beeinflusst hat wie die keusche, nur durch Schönheit das Herz bewegende Rose. Die Frauennamen (Rosa, Rosamunda, Rosalinde, Rosalie), die zahllosen aus der Rose abgeleiteten Familiennamen, die vielen Orts- und Bergbezeichnungen (Ritter führt 150 aus Deutschland auf!), die Windrose der Schiffer, die Rosette als Ornament, die Rose als Krankheitsbezeichnung, der Rosenstock in der Jägersprache, Rosenquarz, Rosenaffe, Rosenkoralle, Alpenrose, Pappelrose, Adonisröschen, hunderterlei Sprachgebräuche (sub rosa) und Sprichwörter bezeugen dies vernehmlich.

Da ist es denn nur selbstverständlich, daß auch der Erbe dieser rosen-

verehrenden Vergangenheit, der moderne Mensch, die Rose trotz aller Wettbewerberinnen zu seiner Lieblingsblume erkoren hat, so daß sie nach wie vor doch die wichtigste der Gartenpflanzen geblieben ist. Man hat sie sogar zur Stubenpflanze erzogen, und es gibt wohl nur wenig Blumenfreunde, die an ihrem „grünen Fenster“ nicht auch dem einen oder anderen Monatsröslein seinen Platz gönnen würden. Braucht es doch nur einen kleinen Topf, allerdings mit schwerer Erde und wenigstens winters über fast gar

Der „1000-jährige“ Rosenstock am Dome zu Hildesheim.
(Nach einer Photographie.)

kein Gießen. Der Stand der Rosen muß möglichst hell und lustig sein; an einem Ostfenster mit voller Sonne gedeihen sie am besten. — Ein Nachteil der Zimmerrosen, den auch der Rosengärtner nur zugut kennt, sind die Blattläuse, die auf das hartnäckigste den Stock besiedeln, wenn sie sich einmal eingenistet haben. Man empfiehlt dagegen Bestäuben mit Tabaksstaub, der aber auch nicht immer hilft. Auch fleißiges Spritzen gilt als Panazee, nur hat es den Nachteil im Gefolge, daß es den Rosenmeltau (*Sphaerotheca pannosa*) begünstigt, einen Schmarogerpilz, der noch gefährlicher als die zwei anderen Rosenschädlinge, der Rußtau und der Rosenrost, schon manchen Rosengarten zugrunde gerichtet hat. Gegen ihn hilft nur Schwefeln, wie es auf S. 422 im 3. Band dieses Werkes geschildert ist. Die anderen Rosenschädlinge, deren es eine ganze Anzahl gibt, sind mehr oder weniger bedeutungslos; über sie orientiert ein gutes neueres Werkchen von Dr. Laubert und Schwarz (*Die Rosenkrankheiten*. Jena. 1910), das hiermit jedem Rosenfreund zur Anschaffung empfohlen sei.

Nach den Rosen sich der Pflaume zuzuwenden, mutet nahezu trivial an, aber dennoch zwingt uns das „System“ dazu, und näher betrachtet, ist es gar kein so großer Sprung, denn die liebliche Pfirschenblüte oder die in Rosenschimmer erstrahlende Blume des Pfirschenbaumes oder der Mandel reihen sich den Schönheiten der Rose würdig an, nicht weniger als der poetische Frühjahrsgruß der Schlehe. Und sie alle sind Vertreter der Gattung *Prunus*, mit der sich die Familie der Rosen abrundet.

Wir haben nicht mehr zu viel über sie zu sagen, da wir alles Praktische über Obstbäume, was im Rahmen dieses Bandes vorzubringen war, bereits im Kapitel des Apfel- und Birnbaumes abgehandelt haben. Wir können uns demnach auf das rein Botanische und Biologische beschränken.

Die Gattung *Prunus* umfaßt 75 Arten, die in der ganzen nördlichen Halbkugel, auch im tropischen Amerika und Asien, gedeihen und ein seltenes Beispiel von Vielgestaltigkeit innerhalb einer Gattung abgeben. Sie verhalten sich in dieser Hinsicht unter den Gewächsen so, wie etwa die Hunde im Tierreiche. Man erinnere sich daran, daß Dachshund, Foxterrier, Barsoi, Spitz, Bulldogg, Neufundländer, Collie und Pudel alle nur Arten der Gattung *Canis* sind, und wird sich nicht mehr wundern, wieso man denn Aprikose (*P. Armeniaca* L.), Pflaume (*P. domestica* L.), Zwetschge (*P. oeconomica* Borkh.), Meine-Claude (*P. italica* Borkh.), Schlehe (*P. spinosa* L.), Mandel (*P. Amygdalus* Stokes), Pfirsich (*P. Persica* [L.] Sieb.), Kirsche (*P. Avium* L.), Weichsel (*P. Cerasus* L.), Kirschlorbeer (*P. Laurocerasus* L.) alle in den Gattungsbegriff von *Prunus* einspannen konnte. Für sie alle gilt es, daß sie zwittrige Blüten haben, daß von ihrer Blüte nach dem Verblühen ganz oder teilweise die 5 Kelch- und die 5 Blumenblätter abfallen, daß sie nur ein Fruchtblatt mit zwei hängenden Samen besitzen. Allerdings sind die Unterschiede in diesem Rahmen doch so bedeutend, daß sich die Zerlegung in die Untergattungen *Prunophora* (hierher Aprikose und Pflaume), *Amygdalus* (Mandel und Pfirsich), *Emplectocladus*, *Cerasus* (Kirsche), *Padus* (Malkirsche, Kirschlorbeer) u. a. als notwendig erwiesen, aber diese sind wieder durch die mannigfachsten Übergänge, und zwar oft so innig, verbunden, daß man z. B. in ihren Früchten so verschiedene Bäume, wie Mandel und den Pfirsich, nur mit Willkür in zwei Arten bringen konnte. Viele Gelehrte halten beide für dieselbe Art

Demgemäß sind auch die ökologischen Verhältnisse nicht sehr mannigfaltig, und was für die eine Form gilt, paßt so ziemlich auch für die anderen. Alle *Prunus*-Arten sind, wie schon die prächtige Blütenhülle verrät, Insektenblütler und werden namentlich von den Insekten auf das eifrigste umsummt. Ihre Früchte aber sind der Vogelverbreitung angepaßt; demgemäß erfährt die Wand des Fruchtknotens bei der

Blühende *Prunus avium*. (Originalaufnahme von G. Dopfer-München.)

Reife eine sehr eigenartige Umgestaltung. Sie bildet eine Haut, die sich häufig auffällig färbt, wie bei der Kirsche, den „Backen“ von Pflaume und Aprikose, und die Vögel anlockt, namentlich die Stare, Drosseln und Sperlinge; ihre Mittelschicht wird fleischig und süß (Schlehe, Kirsche, Pflaume) und bleibt nur bei der Mandel saftarm und unschmackhaft. Diese wird offenbar auch nicht von Vögeln, sondern baumbewohnenden Bierflüglern dort verbreitet, wo die Mandel wild gedeiht. Die innerste Schicht der Wand des Fruchtknotens wird hart, wird zum Steinkern und dient, ökologisch betrachtet, zum Schutz des Samens, namentlich vor den scharfen Verdauungssäften. Dem gleichen Zwecke dienlich ist auch die Blausäure der Bittermandel, des Pflaumen-, Pflaumen- und

Aprikosenkernes. Sie soll verhindern, daß Tier und Mensch sich an den Samen vergreifen. Der Mensch wußte sich freilich zu helfen und zog aus der Bittermandel die Süßmandel, deren harte Schale er auch noch bei der Krachmandel papierdünn zu gestalten wußte. Aber die Tiere respektieren meist das durch den bitteren Geschmack erteilte Verbot, und auch der naschhafte Junge, der die Pflaumen- oder Pflaumenkerne aufschlägt, um sich an ihrer „Mandel“ zu laben, bemerkt bald üble Folgen, wenn er nicht sehr mäßig war. Immerhin wußten sich auch manche Tiere in dem ewigen Kampfe,

den Pflanze und Tier mit List und Unpassungen gegeneinander führen, über das Giftverbot hinwegzusehen, und unter den Vögeln zerbeißt der Kirschkernbeißer die steinharte Schutzhülle und vernichtet schadlos die Samen des wehrlosen Baumes.

Suchen wir nun Einzelbilder der in Frage kommenden Pflanzen zu entwerfen, so haftet unser Blick vor allem auf dem Kirschbaum, dem man lange als asiatischen Einwanderer das Bürgerrecht in Europa weigern wollte, bis sich herausstellte, daß er in Skandinavien vor der Vereisung des Landes heimisch war. Die wilden Kirschbäume, die leider selten genug den Wald schmücken, sind kein Beweismittel hierfür, sondern wohl nur Gartenflüchtlinge. Die Millionen Kirschbäume, die Deutschland hegt und die ihm als erste blühende Bäume jedes erwachende Jahr verschönen, sind aber nur ein schwaches Abbild der Kirschblütenpracht in Ostasien, namentlich in Japan, wo die Kirschenblüte geradezu zum nationalen Symbol geworden ist. Aber auch so ist ein Apriltag in Werder, dem Berliner Kirschendorado, oder im Neckartale oder am Bodensee verbracht, in der träumerisch frühlingsbangen Landschaft voll Blüten Schnee und heimlich-trautem Summen der Bienen, ein Höhepunkt in den Genüssen, die die Natur bieten kann.

Der Kirschbaum wird in Natur und Kultur zum stattlichen, edel- und hochgewachsenen Baum mit lebhaft grünen, eiförmigen und gesägten Blättern. Aufmerksame Betrachtung eines blühenden Zweiges ergibt alsbald, daß die Blüten besonderen Knospen entspringen, die nur Blüten, und zwar stets ein ganzes Büschel, enthalten. Darum sind ja auch die reifen Früchte gewöhnlich mit den Stielen zu 2—5 miteinander verwachsen. An diesem Merkmal kann man Kirsche und Weichsel sofort sondern, denn die Weichsel (*P. Cerasus*) treibt Blatt und Blüte aus derselben Knospenanlage.

Die Kirsche als Obstbaum wurde von den Pomologen in 12 Klassen geteilt, von denen einige Sorten, wie die schwarzen Herzkirschen, die Glaskirsche, Knorpelkirsche, Amarelle, jedermann bekannt sind. Der Geschmacksunterschied zwischen Süßkirsche und Weichsel beruht darauf, daß in ersterer bis an 13% Zucker und nur 0,35 vom Hundert freie Säure, in den Sauerkirschen 1,28 Säure und nur an 9% Zucker vorhanden sind. Da der Kirschbaum einen warmen, kalk- und sandhaltigen Boden verlangt, gedeiht er nicht überall gleich gut, wenn er auch sonst nicht empfindlich und anspruchsvoll ist. Die Kultur benützt meist Vogelkirschen, die aus den Steinen ausgefät und dann veredelt werden.

Eine eigene Spezialität hat die Felsenkirsche (*P. Mahaleb* L.) ins Leben gerufen, deren Holz und Rinde äußerst wohlriechend ist. Sie liefert die geschätzten echten Weichselrohre — die in Baden bei Wien massenhaft gezogen und dann von „Bozniaken“ als „türkische Rohre“ vertrieben werden — und bei der älteren Generation ob ihres Geruches, der durch Kumin, den Duftstoff des Heues, erzeugt wird, besonders beliebt sind. Auch das Holz des Vogelkirschbaumes wird von dem Schreiner und Drechsler hochgeschätzt, und manch altes Möbelstück aus Wiedermeiers Zeiten aus rötlichem Kirschholz steht noch hoch in Ansehen und im Preise.

Die 22 Millionen Kirschbäume, die im deutschen Reiche blühen, sind aber nicht Holz-, sondern Obstlieferanten, die am dichtesten in Thüringen, an der Bergstraße und auch sonst im deutschen Süden und Westen stehen. Ihr Ertragnis ist ungeheuer, da ein guter Baum 150—250 Kilo Kirschen gibt; ein Kirschgarten liefert also mehr Ertragnis

als der beste Acker, was sich alle meine Leser auf dem Lande gesagt sein lassen sollten.

Troßdem ist nicht die Kirsche, sondern Pflaume und Zwetschge der wichtigste deutsche Obstbaum.

Es geht eigentlich nicht an, die Pflaume nur als Baum zu bezeichnen, denn wenn schon manche der Weichseln Strauchform annimmt, so gilt dies um so mehr von dem Geschlecht der Pflaumen, die auch als Bäume niedrig bleiben und 6—8 m nicht überwachsen. Die Kriechpflaume (*P. insititia* L.) ist überhaupt nur ein Strauch, der im Südosten und in Kleinasien die kleine Damascener Pflaume liefert. Aber auch die einheimische wilde Pflaume, nämlich die Schlehe (*P. spinosa* L.), ist nur ein Dornstrauch. Sie ist der Pflaumenlieferant der Vögel, die sich im Herbst in der Waldhecke der Schlehen an den blaubereiften schwarzen Beeren gütlich tun. Als Fruchtbaum des Menschen kommt eigentlich nur die Pflaume (*P. domestica* L. und *oeconomica* L.) und die Reine-Claude (*P. italica* Borkh.) in Betracht, diese allerdings in ungeheuren Mengen, da sie in Deutschland, Osterreich-Ungarn, namentlich in den südlichen Donauländern, geradezu ein Nationalsymbol geworden ist. In Kroatien und Serbien lebt zur Pflaumenernte fast die ganze Bevölkerung von den eigentlich sehr wenig Nahrungsstoffe (nur 3—6% Zucker, 0,40—0,78% Eiweiß, 80—85% Wasser) enthaltenden Früchten, die auch getrocknet (Backpflaumen) und als Mus (in Ungarn *lekwar*, in Osterreich *Powidl* genannt) in großen Mengen versandt und auch zur Branntweinbereitung (*Sli-*

bowitz) verwendet werden. Ähnlich liegen die Verhältnisse auch in Böhmen und Mähren. Zwischen Zwetschge und Pflaume gibt es keine durchgreifenden Unterschiede; wohl unterschieden sind dagegen Mirabelle und Reine-Claude. Beide gehören zur Haferpflaume (*P. insititia*); die erstere Frucht ist gelb und klein, die letztere grün und groß. Die Unterschiede zwischen Pflaume und Zwetschge faßt Hochstetter in folgende wichtigste Punkte:

Steinkernlose Pflaume. (Nach Burbank.)

Der Pflaumenbaum ist kleiner, hat samtige Ästchen, geferbte, größere Blätter, mehr kugelige Früchte. Der Zwetschgenbaum dagegen hat kahle Ästchen, meist gesägte Blätter, meist längliche Früchte; doch sind allerlei Übergänge vorhanden.

Als eine gärtnerische Neuschöpfung von allerhöchstem Werte wurde vor einigen Jahren eine steinkernlose Pflanze von Luther Burbank angepriesen, bei der der Samen unmittelbar im süßen Fruchtfleisch liegt. Doch ist es merkwürdig still um diese epochale Neuerung geworden, während doch anzunehmen wäre, daß sie heute bereits alle Pflaumen „alten Stiles“ verdrängt hätte, wenn sie so ausgefallen wäre, wie die ersten Berichte versprochen. Es scheint also ein Haken an der Sache zu sein, der zumindestens, wie bei so vielen wissenschaftlichen Entdeckungen, verhindert, daß sich aus dem Befund des Gelehrten praktischer Nutzen ergebe.

Neben den Formen der eigentlichen Gattung *Prunus* ist für die deutsche Flora auch noch die Aprikose von Bedeutung, wenn sie auch, wie schon ihr früherer Gattungs-

name *Armeniaca* besagt, ihre Heimat nicht bei uns, sondern im mittleren Asien, angeblich in Armenien, wahrscheinlicher aber in Turkestan, hat.

Sie ist ja von dem Obstfeinschmecker nicht so geschätzt als der köstlichere Pfirsich, dem sie aber in der Zusammensetzung der Frucht durchaus nicht wesentlich nachsteht. Ergab doch die chemische Analyse ihrer Früchte folgende Bestandteile:

81,22 %	Wasser,
4,69 %	Zucker,
1,16 %	freie Säure,
0,49 %	Eiweißstoffe,
6,35 %	Pektinstoffe usw.,
5,27 %	Holzfasern, Schale, Kern,
0,82 %	Mineralstoffe.

Die Aprikose ist ein sehr eigenwilliger Baum, denn sie will im allgemeinen noch mehr Wärme als der Pfirsich, wenngleich sie nicht so empfindlich ist wie dieser. Demgemäß bevorzugt sie ein Klima, das dem der Wüste nahesteht, in dem also heiße Tage mit oft empfindlich kalten Nächten abwechseln. In die praktische Obstbaumzucht übersezt, bedeutet dies, daß die besten Aprikosen in der Alten Welt in Syrien, in der Neuen aber in den südlicheren der Vereinigten Staaten gedeihen, wo eine ungeheure Aprikosenkultur, die allerdings keinen edleren Zwecken als der Branntweinbereitung dient, um sich gegriffen hat.

Dem deutschen Obstbaumzüchter empfehlen sich als ertragreichste Sorte etwa die „Aprikose von Nancy“, die von Syrien oder die Sorte „von Breda“, immerhin erwirbt er aber mit ihnen einen Baum, der ihm oft genug Sorge bereiten wird, namentlich durch den Gummifluß, dem die Aprikose noch mehr ausgesetzt ist als die Kirschkäule.

Gleiche Sorgfalt muß er dem anderen verwöhnten Zärtling des deutschen Gartens, dem Pfirsichbaum, zuwenden, dessen älterer lateinischer Name *Persica* auch auf das ferne Morgenland als dessen Heimat hinweist, allerdings mit ebensowenig Recht wie die Aprikose, da nach De CandoUe der Pfirsich auch in Persien nur eingewandert ist, ursprünglich aber dem Reich der Mitte entstammen soll. Jedenfalls war er einst das Ereignis der Schlemmer und Prasser Italiens, die mit dieser köstlichsten aller Früchte just um die Zeit bekannt wurden, da der Luxus des Lebens aufs höchste gestiegen war.

Wenn man einen Botaniker auf die Probe stellen will, so führe man ihn vor einen blühenden Pfirsichbaum und befrage ihn um die Unterschiede zwischen ihm und der Mandel. Er wird keinen nennen können, denn die beiden Bäume sind ohne Früchte kaum voneinander zu unterscheiden. Schon das deutet auf die allernächste Verwandtschaft zur Mandel, und es hat sich ein wissenschaftlicher Streit darüber erhoben, ob nicht die Blendlinge der Mandel mit dem Pfirsich die gemeinsame Urform beider seien.

Der Pfirsichbaum gilt für den verwöhntesten aller heimischen Obstbäume; er lebt bei uns überhaupt nur 30 Jahre lang und wird demgemäß nie höher als 4—6 m. Seine außerordentlich frühe Blütezeit deutet auf seine wärmere Heimat hin. Wohl ist es das schönste Frühlingsversprechen, wenn an den östlichen Abhängen des Wienerwaldes oder im Rheintale schon im Februar und März sich die Weingärten, in die man mit Vorliebe Pfirsich- und Mandelbäume pflanzt, mit dem zarten Rosenrot ihrer Blüten schmücken. Bei unserem Klima bedeutet das aber, daß diese Blütenpracht fast

jedes Jahr noch vom Schnee verschüttet wird, und demgemäß kommt man immer mehr darauf, namentlich den Pfirsich nur im Spalier zu ziehen. Erst neuestens mehrten sich die Stimmen, daß er denn doch mehr ertrage und bei freiem Stande besser fortkomme als an der Wand, wo er besonders viel von seinem gefährlichsten Feind, der Kräuselkrankheit, zu leiden habe (vgl. S. 414, Bd. III), gegen die ja allerdings das Spritzen mit Kupferlösungen einigermaßen hilft, was aber wieder das Budget des Obstaumzüchters übermäßig belastet.

Der Pfirsich kann demnach ebensowenig wie die Mandel in Deutschland Fuß fassen. Anders in Frankreich, wo um Montreuil bei Paris ein wahrer Pfirsichwald blüht. Noch glücklicher ist Kalifornien daran, das heute das eigentliche Pfirsichland der Erde ist, da dort nicht weniger als $5\frac{1}{2}$ Millionen dieser Bäume gedeihen sollen.

Und nun zur letzten Pflanze, die wir aus diesem Kreise noch zu betrachten haben. Ihr werden vielleicht viele auch die Palme

der Schönheit zusprechen, wenn sie im grauen Einerlei der Häusermassen einer Großstadt auf einmal in einem Vorgärtchen ihrer ansichtig werden. Denn ein so reizender Strauch ist es, der schon blüht, da seine Blätter nur als freudig grüne Spitzchen hervorlugen, ganz zurückgedrängt durch die Überfülle der lieblich rosenroten Blüten, die den Strauch zu einem lebendigen Blumenstrauch umgestalten, wie ihn delikater und geschmackvoller

Pfirsich Gouverneur Garland. (Nach L'illustration horticole.)

kein Gärtner erjinnen könnte. Das ist die Zwergmandel (*Amygdalus nana*), die mit ihrer Verwandten, der *Prunus triloba*, und noch einigen Ziersträuchern aus der Gruppe der Rosazeen, entschieden zu den schönsten Ziersträuchern gerechnet werden muß, die uns Gartenkunst bieten kann.

Ihre große Schwester, der Mandelbaum, ist ebenfalls ein Einwanderer aus dem Orient. Wir besitzen Dokumente darüber, daß die Mandel erst im Jahre 716 in Deutschland bekannt war. Es hat fast den Anschein, als ob damals ein milderes Klima gewaltet hätte, wofür ja bekanntlich auch sonst manche andere Anzeichen sprechen. Hätte denn Karl der Große sich sonst so eifrig für den Anbau der Mandel in deutschen Landen verwenden können? Heute ist sie nur auf ganz wenige glückliche Lagen, so

Prunus triloba im Großstadtpark. (Naturaufnahme von S. Dopfer-München.)

ziemlich auf dieselben angewiesen, in denen auch der Pfirsich gedeiht, und wir sind gezwungen, wenn wir wirklich vorzügliche süße Mandeln essen wollen, die Sorten zu wählen, die aus der Dauphiné oder aus Süditalien und Portugal stammen.

Über die Mandel besitzt wohl jedermann einige botanische Kenntnisse, da er mit Eifer seinerzeit Vielliebchen=Studien getrieben hat. Die einfache Erklärung der Erscheinung ist die, daß solche Früchte von Blüten entstammen, in denen nicht nur eine, sondern zwei der Samenanlagen befruchtet worden sind, wie das ja, vom Menschen oft weit weniger freudig aufgenommen, auch bei seinem Geschlecht vorkommen kann.

Jedermann bekannt ist es, daß auch die süßen Mandeln wie alles in der Welt ihn bitter enttäuschen können, bitter im vollen Sinne des Wortes, da sich auch solche Mandeln fast stets zwischen die süßen mischen. Wir haben noch keine Erklärung hierfür, warum gewisse Früchte das gefährliche *Amgdalin* enthalten, das durch das Zerreiben der Mandeln mit Wasser in Blausäure, Bittermandelöl und Zucker zerlegt wird.

Von der biologischen Bedeutung dieses Stoffes war in diesem Abschnitt bereits die Rede. Die Fähigkeit, Blausäure hervorzubringen, scheint übrigens mehr oder minder allen Rosazeen eigen zu sein, gibt es doch unter ihnen welche, die sogar in den Blättern ganz erhebliche Mengen des Giftes speichern. Dies gilt namentlich vom Kirschlorbeer (*Prunus laurocerasus*), den man dessentwillen nur sehr unbegründeterweise als Gewürz schätzt. Ist doch die Blausäure so sehr zu fürchten, daß angeblich sechs bittere Mandeln bei einem Kind schon eine tödliche Vergiftung herbeiführen können. Und auch bei einem Erwachsenen genügen hierzu schon 50—60.

Damit ist unsere Betrachtung der Rosenfamilie zu ihrem Ende gelangt. Was wir zu Beginn des Abschnittes behauptet haben, dafür wurde wohl vollauf der Beweis erbracht: Die Rosen sind in jeder Beziehung der Höhepunkt des Pflanzenreiches, nicht nur durch die Zahl der Eigenschaften, die vollkommene anatomische und gestaltliche Durchbildung aller Organe, sondern auch durch das Höchste, wozu ein lebendes Wesen befähigt ist: die vollkommene Harmonie, zu der in der Rose alles, das Kleinste mit dem Ganzen, in schönster Wechselwirkung gelangt ist.

Verzeichnis der Werke, die zu weiterem Studium der Pteridophyten, Gymnospermen und Angiospermen (Monokotyledonen-Rosazeen) geeignet sind
(soweit solche nicht bereits im Text zitiert sind).

- Misner, P. und Graebner, P., Synopsis der mitteleuropäischen Flora. IV. Bd. 1900—1905.
- Weyer, A., Beiträge zur systematischen Gliederung der Kreuziferen. Beiheft zum botanischen Zentralblatt. XVIII. Abt. II. 1905.
- Beck, G. v., Die Gattung Nepenthes. Wien, Illustrierte Gartenzeitung. 1895.
- Reichner, L., Handbuch der Nadelholzkunde. Berlin. 1891.
- Braun, R., Die Agaven, ihre Kultur und Verwendung usw. Der Pflanze. II. 1906.
- Burgerstein, A., Zur Kenntnis der Holzstruktur der Pomazeen. Sitzungsberichte der Wiener Akademie. CVII. Bd. 1898.
- Celakovsky, J., Theorie der Blütenstände auf deduktiver Grundlage. 1892.
- Christ, G., Die Farnkräuter der Erde. Jena 1897.
- Coulter, J. M. and Chamberlain, Ch. J., Morphology of Angiosperms. 1903.
- Crepin, Nouvelle classification des Roses. Journal of the Royal. Hort. Soc. 1889.
- De Candolle, A. P., Organographie végét., p. 400 ff. in der Übers. 1827, bzw. 1828.
- Delpino, Fr., Applicazione di nuovi criterii per la classificazione delle piante. I.—VI. Memoir. Accad. Bologna. 1888—1896.
- Diels, L., Die Orchideen. Osterwies 1908.
- Dingl, M., Die spinnwebigen Haare an den Blattspreiten von Sempervivum arachnoideum. Österr. botan. Zeitschrift. 1905.
- Dubois, F., Les Cypripediums, leur monographie. Gand. 1899.
- Eichler, A., Blüten diagramme. Leipzig 1875.
- Englers, Das Pflanzenreich. 8°. (Noch unvollendet.)
- , A., Monographie der Gattung Saxifraga. Breslau 1872.
- Engler-Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien. Leipzig. (Noch unvollendet.)
- Fée, A. L., Memoires sur la famille des fougères. I—XI. Straßburg. 1844—1866.
- Folger, B., Beiträge zur Systematik usw. d. Pomazeen. Österr. botan. Zeitschr. 1897.
- Franchet, Monographie du genre Chrysosplenium. Nouv. Arch. de Mus. Paris 1890.
- Fritsch, R., Die Stellung der Monokotyledonen im Pflanzenreich. Englers Jahrbuch. Bd. XXXIV. Beibl. Nr. 79.
- Giesenhagen, R., Die Hymenophyllaceen. Flora. 1890.
- Glück, G., Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. I. Jena 1905.
- Goebel, R., Organographie der Pflanzen. Jena 1898—1901.
- , R., Pflanzenbiologische Schilderungen. II. Marburg 1893.
- Goffart, J., Recherches sur l'anatomie des feuilles dans les Ranunculacees. 1902.
- Gravis, A., Recherches sur l'anatomie et physiologie sur el Tradescantia virginica. Mem. de l'académie royale de Belgique. LVII. 1898.
- Günthart, M., Beiträge zur Blütenbiologie der Kreuziferen, Araliaceen und der Gattung Saxifraga. Bibliotheca botan. Nr. 58. 1902.

- Hayek, M. v., Monographische Studien über die Gattung Saxifraga. I. Sect. Porphyryon. Denkschrift. Wiener Akademie. LXXVII. 1900.
- Hedlund, J., Monographie der Gattung Sorbus. N. Sv. Vetensk. Akad. Handling. XXXV. 1901.
- Heinricher, G., Vorläufige Mitteilungen über die Schlauchzellen der Fumariaceen. Berichte der deutschen botan. Gesellschaft. V. S. 233. 1887.
- , G., Die Eiweißschläuche der Kreuziferen usw. Mitteilungen aus dem botanischen Institute Graz. I. 1886.
- Hempel, G. in Wilhelm R., Die Bäume und Sträucher. I. Abt. Wien und Olmütz.
- Henkel, J. B. und Hochstetter, W., Synopsis der Nadelhölzer. Stuttgart. 1865.
- Hirasé, S., Etudes sur la fécondation et l'embryog. de Gingko biloba. Journal Coll. Scie. Imp. Univ. Tokyo. VIII. 1895 et XII. 1898.
- Hooker, J. D., On Welwitschia, a new Genus of Gnetaceae. Transact. Linné Soc. London XXIV. 1863.
- Ikeno, B., Das Spermatozoid von Cycas revoluta. Bot. Mag. Tokyo. X. 1896.
- Janczewski, E., Essai d'une disposition naturelle des espèces dans le genre Ribes. Anzeiger der Akademie. Krafau. 1903.
- Kirchner, Loew und Schröter, Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. I. 1906.
- Klein, J., Der Bau der Kreuziferenblüte auf anatomischer Grundlage. Berichte der deutschen botan. Gesellschaft. XII. 1894.
- Knoblauch, G., Anatomie des Holzes der Laurineen. Flora. 1888.
- Knoch, G., Untersuchungen über die Morphologie, Biologie und Physiologie der Blüte von Victoria regia. Dissertation. Marburg 1897.
- Knuth, P., Handbuch der Blütenbiologie. III.
- Kny, L., Über die Entwicklung des Prothalliums u. d. Geschlechtsorgane. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturf. Freunde Berlin. 1868.
- Koehne, G., Die Gattungen der Pomaceen. Berlin 1890.
- Körnike und Werner, Handbuch des Getreidebaues. I. und II. Bonn 1885.
- Krause, G. H. L., Nova synopsis Ruborum Germ. et Virg. 1899.
- Lecoyer, J. G., Monographie du genre Thalictum. Gand. 1885.
- Lindenia, Monographie der Orchideen. 1884 ff.
- Lohauß, R., Der anatomische Bau des Laubblattes der Festsukazeen. Bibliothek. Botan. Heft 63. 1905.
- Querssen, Ch., Die Farnpflanzen in Rabenhorsts Kryptogamen-Flora. 2. Aufl. Leipzig. 1884—1889.
- , Ch., Handbuch der systematischen Botanik. Leipzig. 1882.
- Milde, Monographia generis Osmunda. Wien 1868.
- , Monographia Equisetorum. Nova Acta Leop. Carol. Acad. XXXII. 1867.
- Miquel, J. M. B., Monographie Cycadearum. Utrecht 1842.
- Mohl, G. v., Über den Bau des Cycadeen-Stammes. Denkschr. der kgl. Akademie zu München. X. 1832.
- Motelay, L. et Vendryès, Monographie des Isoëteae. Archiv Soc. Linn. Bord. VI. 1882.

- Payer, *Traité d'organogénie comparée de la fleur*. Paris. 1857.
- Par, F., *Allgemeine Morphologie der Pflanzen*. Stuttgart. 1890.
- Perdrigeat, C. A., *Anatomie comparée des Polygonées et ses rapp. avec la morphologie etc.* Act. Soc. Linné Bord. LV. 1900.
- Porsch, O., *Der Spaltöffnungsapparat im Lichte der Phylogenie*. Jena 1905.
- , O., *Beiträge zur historischen Blütenbiologie*. Österr. botan. Zeitschr. 1905 u. 1906.
- Potonié, S., *Lehrbuch der Pflanzenpaläontologie*. Berlin 1897—1899.
- Prantl, R., *Beiträge zur Morphologie und Systematik der Ranunkulaceen*. Botan. Jahrbuch. IX.
- Raciborski, M., *Die Morphologie der Rabombeen und Nymphaeaceen*. Flora. 78. Bd. 1894.
- Ragers, W. M., *Handbook of British Rubi*. 1900.
- Reichenbachia. (*Zeitschrift für Orchideenkunde*.)
- Rostowzew, S., *Zur Biologie und Morphologie der Wasserlinsen*. Moskau. 1905. (Russisch.)
- Schaffnith, *Über die Nektarien der Ranunkulaceen*. Erlangen 1904.
- Schiffner, B., *Monographia Helleborum*. Nova Acta Leop. Carol. Academie. Bd. LVI, Nr. 1. 1890.
- Schneider, C. R., III. *Handbuch der Laubholzkunde*. I. Bd. 1906.
- , C. R., *Die Gattung Berberis*. Bulletins de l'herb. Boiss. 2. Ser. V. 1905. S. 33.
- Schulz, O. G., *Monographie der Gattung Kardamine*. Botan. Jahrb. XXXII. 1903.
- Schweidler, J. S., *Die systematische Bedeutung der Eiweiß- oder Myrosinzellen der Kreuziferen*. Berichte der deutschen botan. Gesellschaft. XXIII. Heft 7. 1905.
- Solms-Laubach, H., Graf, *Über unsere Erdbeeren und ihre Geschichte*. Botan. Zeitung 1907. Heft 3 und 4.
- , Grf., *Kreuziferen=Studien*. I—IV. Botanische Zeitung. 1900.
- , H., *Herkunft, Domestikation usw. des gewöhnlichen Feigenbaumes*. 1882.
- , H., Graf, *Weizen und Tulpen und deren Geschichte*. 1899.
- Spring, A., *Monographie de la famille des Lycopodiacees*. Mem. de l'Acad. roy. Belg. 1841 und 1848.
- Stein, B., *Orchideenbuch*, Berlin 1892.
- Strassburger, E., *Über Azolla*. Jena 1873.
- , E., *Die Angiospermen und Gymnospermen*. Jena 1879.
- , E., *Die Koniferen und Gnetaceen*. Jena 1872.
- , E., *Die Befruchtung bei den Koniferen*. Jena 1869.
- , *Die Apogamie der Eualchemillen usw.* Jahrb. für wissenschaftl. Botanik. 41. 1904.
- Thellung, A., *Die Gattung Lepidium. Eine monographische Studie*. Zürich. 1906.
- Tischer, G., *Die Berberidaceen und Podophyllaceen. Versuch einer morphologisch-biologischen Monographie*. Botan. Jahrbuch für Systematik usw. XXXI. 1902.
- Treub, M., *Sur les Casuarinées et leur place dans le système naturelle*. Ann. Jardin botanique de Buitenzorg. X. 1891.
- Tschirch, A., *Studien über den Mhabarber u. seine Stammpflanzen*. Pharmaz. Post. XXXVII. 1904.
- Tubeuf, C. Fr., v., *Die Nadelhölzer*. Stuttgart. 1897.
- Francé, *Das Leben der Pflanze*. IV.

- Ulbrich, G., Über die systematische Gliederung und geographische Verbreitung der Gattung *Anemone*. *Jahrbuch für Systematik* usw. XXXVII. 1905.
- Van Tieghem, Ph., Sur l'organisation florale des Balanophorées et sur la place de cette famille. *Bull. soc. bot. fr.* XLIII.
- , Anatomie comparée de la fleur femelle et des fruits des Cycadées, Conifères et Gnécées. *Ann. de soc. nat. Bot. Ser. V. Tom. 10.* 1869.
- Veitch, J., *Manual of Orchidees pl. cultiv. under glass.* I—IX. 1887.
- Ward, H. M., *Grasses, a Handbook for use in the field and lab.* Cambridge. 1904.
- Wettstein, R. v., Die Gattung *Erysimum* und *Cheiranthus*. *Österr. botan. Zeitschr.* 1889. Nr. 7.
- , R. v., *Handbuch der Botanik.* Wien. 1908.
- Williams, J. N., *Enumeratio specier. variet. gen. Dianthus.* *Jour. of Bot.* XXIII, p. 340.
- Wolff, Th., *Potentillen-Studien.* I und II. Dresden. 1901 und 1903.
-

laut vertraglicher Übereinkunft wird Herr Dr. A. Roelich in Rülchberg bei Zürich mit dem Bd. V den systematischen Teil dieses Werkes zu Ende führen, und der Verfasser bittet, seinem Nachfolger die gleichen Sympathien entgegenzubringen, die er genossen hat.

Register.

Das Sternchen (*) hinter einer Ziffer verweist auf eine Textabbildung.

Abies alba 87.
— *firma* 701.*
— *pectinata* 81.
Abietineae 66.
Adsorptionsgewebe der
Grasfrüchte 143.
Aecia 274.
Aceras 221.
— *anthropophora* 222.
Ackerhahnenfuß, gemeiner
383.
Ackerhummel als Bestäuber
der Akelei 366.
Ackerreitich 416. 437.
Acker-Schwarzfummel 560.
Ackerseif 416.* 436.
Aconitum 369. 401.
— als Beweis für Pflanzen-
psychologie 368.
— als Gartenpflanze 369.
— Artenzahl 354.
— Blütenausbildung 367.
— Blütenbiologie 367.
— Cymologie 367.
— *ferox* 369.
— Hummelblume 368.
— *lycoctonum* 368.
— *Napellus* 352.* 353.* 366.
368.
— *napellus*, medizinische
Verwendung 369.
— *napellus*, Zygomorphie
der Blüten von 348.*
— oberirdische Knollenbil-
dung 369.
— *Stoeckianum* 369.
— *variegatum* 368. 369.
— —, blütenbiologisches
Eigenverhalten 368.*
— Verbreitungsgebiet 368.
— Wasserpalten bei 362.
— zygomorphe Blüten 367.
Acorus Calamus 156. 160.
Actaea 108.* 364.
— Artenzahl 354.
— *spicata* 190.* 364.
Aconitin 369.
Adiantum 31.
— *acutum* Lindl 12.*
— *Capillus Veneris* 19.* 31.
— *macrophyllum* Sw. 12.*
— *Wagneri* Mett 12.*
— *Veitchianum* 66.
Adersfarn 14.* 27.
— Ameisenschutz 28.
Adersflaue 364.
Adonis vernalis 371.
Ihre, Definition der 408.
Apfel, Südtiroler 490.
Agathis 68.
Agave 196.
— *americana* L. 196.
— *mexicana* 196.
— *rigida* 176.

Agaven als Weinst-
pflanzen 196.
Agavoiden 196.
Aglate 364.
Agnus scythicus 22.
Agrafel 474.
Agrimonia 480.
Agropyrum repens 135.
Agrostemma, Biologie 325.
— *Githago* 325.*
— *gracilis* 325.
Agrostis alpina 136.*
Aira caespitosa 137.
Aizoaceae 317.
Akelei 349. 353.*
—, Artenzahl 354.
—, Cymologie der 364.
attnomorphe Blüten der
Ranunculaceae 348.
aktive Bewegungen der
Orchideenblüte 216.
Alasfaroje 480.
Alaska, Wildobst in 472.
Alba-Gruppe 338.
Albeere 474.
Alchemilla 480.
Alchemillenblatte 480.
Aldrovanda 450.
— *vesiculosa* 458.
Alisma Plantago 121.
— — *vargraminifolium* 121.
Allioideae 178.
Allium Cepa 178.
— *histulosum* 178.
— *Porrum* 178.
— *sativum* 178.
Allotomie 422.
allotrope Pflanzen 371.
Ainus 245.
— als Überpflanze 246.
— Biologie 246.
— Embryosack 59.*
— forstwirtschaftliche Be-
deutung 246.
— *glutinosa* Willd. 245.
— *incana* Willd. 245.
— Verbreitung 246.
— *viridis* d. C. 245. 246.
Aloucasia 108.*
— *cuprea* 162.*
— *macrorrhiza* 162.
Alou 176.
—, baumartige 178.*
— hundertjährige 176. 196.
Alou arborescens 173.* 178.
— *vera* 176.
Alpengeinstreife 432.
Alpenpflanzstrauch 327.
Alpenjohannisbeere 246.
Alpennefeln 326.
Alpenrebe 353. 380.*
Alpen, Reichthum an
Schmetterlingen 321.
Alpenwindkalm 136.*

Alsine 317. 324.
— *viscosa* 323.
Alfneen 317.
— Blütenbiologie 323.
Alfnoideen, als Kosmopo-
liten 324.
Alsophila 17.
— Arten 18.*
Alyssum 445.
— *montanum* 421. 445.
Amarantaceae 314.
Amarantus 314.
— *adscendens* 314.
— *caudatus* 315.
— *retroflexus* 314.
— *viridis* 314.
Amaryllidaceae 169.
Amaryllidaceae 192.
Amaryllis Belladonna 194.
Ameisenpflanzen 261.
Amelanchier 483.
— *rotundifolia* Pers. 496.
— *vulgaris* 483.* 496.
Amentaceae 236.
Ammophila 135.
*Amorphophallus campanu-
latus* 157.* 158.
— *titanus* 166.
Amper 294.
Amperpflanzen 292.
Ameisenpflanzen 294.
Amygdalus 524.
Anabasis 302.
Anacamptis 222. 223.
Analogieschluß auf das
Pflanzliche im Pflanzen-
leben 435.
Anastatica hieracuntica
406. 445.
Anatomie der Graspflanze
137.
— der Schachtelhalm 40.*
— physiologisch der Cheno-
podaceen 394.
Anberßen, G. 247.
Androgynophor 446.
Andropogon 137.* 142.
— *Sorghum* 146.
Anemone 372.
— *alpina* 375.
— *baldensis* 374.
— *Blütenbau* 373.
— *Blütenbiologie* der 374.
— Früchte 374.
— *Hepatica* 353.* 374.
—, —, Blütenbiologie 374.
— *narcissiflora* 374.
— *nemorosa* 372. 373.*
— *pratensis* 378.
— *Pulsatilla* 349. 353.* 378.
— *ranunculoides* 374.
— *silvestris* 352. 374.
—, Adventivprosse bei
373.

Anemone sulfurea 373.
— *vernalis* 376.
— Wurzelstock der 373.
Anemoneae 354.
— Artenzahl 372.
— Biologie der 372.
— Systematik der 372.
Anemone 379.
Angiospermen 53.
—, doppelte Befruchtung
110.
— Anpassung an das Land-
leben 55.
— Anpassungshöhe 108.
— Eigenarten 107.
— Samenanlage 109.
— Stammesgeschichte 109.
— strukturelle Intelligenz
108.
— System 112.
—, Ursprung der 57.
Angiospermenblüten, Ty-
pen 108.*
Angraecum 229.
— *sesquipedale* 212.*
Annularia 9.
Annulus 15.
Anpassung an Standort-
verhältnisse bei Poly-
gonum 292.
— der Blüten an ihre Be-
sucher, *Caryophyllaceae*
als klassisches Beispiel
für 320.
— direkte als Erklärungs-
grund für Selbst- oder
Fremdbestäubung 421.
—, Erwerbung erworbenener
295.
— Individualisierung der
403.
—, individuell variierte di-
rekte 436.
—, Ursache 110.
—, xerophytische des Nitter-
sporns 371.
Anpassungen der Salz-
pflanzen 305.
Anpassungsbedürfnis bei
Polygonum amphibium
298.
Anpassungsfähigkeit von
Potamogeton 119.
Anpassungshöhe d. Angio-
spermen 108.
Anthonomus pomorum 493.
Anthophanten 53.
Anthoxanthum 314.
Anthurium 157.
— *Scherzerianum* 159.* 160.
Antiaris toxicaria 260.
Apetalae 235.
Apfelbäume, Beschneiden
490.

- Apfelbäume, Pilzkrankheiten der 492.
 Apfelbaum 485.
 — Blütenbau 485.
 — Blütenbiologie 486.
 — Fruchtbiologie 486.
 — Kultur 488.
 — Wurtriebe 490.
 — Samtriebe 490.
 —, tierische Parasiten 492.
 —, Ursprung 487.
 Apfelbaummistel als Schädling 283.
 Apfelbeerstrauch 496.
 Apfelblütenscheer 493.
 Apfel der Gesperiden 484.
 Apfel, sydonischer 484.
 — Nährt 490.
 Apfelsorten 487.*
 Apfelsstrauch 487.
 Apfelsysteme 490.
 Apfelmeln 491.
 Apfelmelbereitung 494.
 Apfelmittler 493.
 Aponogeton fenestralis 120.
 Apritose, Ökologie 522.
 Apisporie der Farne 15.
 Aquarienbewohner, Pflanzen 121.
 Aquilegia 349, 350.
 — alpina 365.
 — — Blütenbiologie 366.
 — als Zierpflanze 367.
 — Artenzahl 354.
 — atrata 364.
 — Bau der Blüten 365.
 —, Bestäuber der 366.
 — Blütenbiologie 366.
 — Bombus hortorum als Bestäuber 366.
 — Cytomologie 364.
 — vulgaris 353.* 364.
 Arabis 424, 444.
 — alpina 444.
 — conrulea 444.
 — pumila 444.* 445.
 — turrita 405.
 — verna 445.
 Arachnites Murr. 221.
 Araucaria 64, 66.
 — compacta 67.
 — excelsa 66.
 — imbricata Pav. 67.
 — imbricata Tafel.
 Araceae 108.*
 Araceen 156.
 — Anatomie 160.
 — Artenzahl 156.
 — Blütenscheide 157.
 — Früchte 158.
 — Habitus 156.*
 — Luftwurzeln 159.
 Araceenblüten 158.
 Arber, C. 67.
 Arceuthobium Oxycedri 286.
 Archegoniaten 7.
 — Vorfahren der 7.
 Archegontheorie 59.
 Arenaria 324.
 Arillus 100.
 Arisarum 108.*
 Aristida caryoleuca 142.*
 Aristolochia 287.
 — als Beleg für Pflanzenphysiologie 289.
 — als Beweis für Psychobiologie 289.
 —, Arretiervorrichtung bei 289.
 — Blütenbiologie 288.
 — clematitis 287, 288, 290.
 — cymbalaria 287.*
 — elegans 290.
 — eupracum L. 291.
 — Früchte 289.
 — macrophylla 290.* 470.
 — macroura brasiliensis 287.*
 Aristolochia, mechanisierte Infinitie 289.
 — ornithocephala 290.
 — pallida 290.
 — Regulationseinrichtungen 289.
 — ringens 288.
 — rotunda 290.
 — Siphon 290.
 —, spontane Bewegungen bei 289.
 — Tropenarten 288.
 —, Zellstichdruck 289.
 Aristolochiales 287.
 Aristolochiaceen 287.
 Aronia arbutifolia 496.
 Aronskib 156.
 Arretiervorrichtung bei Aristolochia 289.
 Arrow-root, ostindisches 205.
 —, westindisches 205.
 artbildender Faktor 24.
 Artbildung 285.
 Artocarpus incisa 262.
 — integrifolia 262.
 Arum 108.*
 — maculatum 156, 161, 163.*
 Arundinaria japonica 131.
 Arundo Phragmites 140.*
 Asarum 290.
 —, Blütenbiologie 291.
 —, Fruchtbiologie 292.
 —, Abhängigkeit der Samen 292.
 Astenasys 193, 463.
 Asparagus officinalis 188.
 — plumosus 189.
 — Sprenger 189.
 Aspidium 20.
 — Filix mas 14, 15.* 20, 21.*
 — thelypteris 113.
 Aspidol 22.
 Aspidium adulterinum 23.*
 — bulbiferum 19.*
 —, Mutationsform von 30.*
 — Nidus L. 25.*
 — Ruta muraria 24.*
 — Trichomanes 23, 31.
 — viride 23.*
 Atemhöhlen der Potamogetonblätter 118.
 Atemwurzeln 93.
 Athyrium 16.
 — alpestre 26.*
 — Filix femina Roth 25.
 Atragene 379.
 Atriplex 302, 304.* 308, 309, 310.
 — coriaceum 305.
 — Halimus 305, 310.
 — hortense 310.
 — leucocladum 305.
 — nummularia 309.
 — portulacoides 307.
 Auferstehungsanlage 48.
 Austere, künstliche 311.
 Austereinstellung 313.
 Ausläuferanlagen der Gräser 142.*
 Australien, Endemismen 275.
 —, Pflanzengeographie 274.
 Autogamie 422.
 —, durch innere Faktoren bedingt 422.
 —, Insektenmangel als bewirkender Faktor 422.
 Autotrophie 276.
 Avena fatua 147.
 — sativa 138, 145.
 — sterilis L. 142.
 Azolla 9.
 — caroliniana 34.
 — alleculoides 33.*
 Bärentlauch 178.
 Bärlappe 43.
 Baillon 409.
 Balanophora, Embryosack 59.*
 Balaninus 248.
 Bambusa verticillata 130.*
 — violascens 129.*
 Bambuspflanzen, Verwendung 130.
 Bananen 205.
 —, Kulturfragen 206.
 Bananenkultur 205.
 Banksia 274.
 Banfflarose 513.
 Banyans 260.
 Barfuß 475.
 Barklaya 329.
 Bartneise 326.
 Baskistück der Orchideen 211.
 Baumaloe 173.
 Bau als Ausdruck der Lebensweise 135.
 Baum des Vließenden 205.
 Baumfarne 19.
 Baumkitten 173.
 Baumpäonie 355.
 Baumwürger, Ficus als 269.
 Baper 416.
 Beccari 218.
 Becherfrüchtler 249.
 Bedürfnisanpassungen bei Clematis 379.
 Bedürfnis, direkt wirkendes bei der Pflanze 306.
 — und Organbildung im Pflanzenreich 296.
 Beerne 494.
 Befruchtung, doppelte 110.*
 Befruchtungsförderung 117.
 Belajoff 40.
 Belichtung, intermittierende 434.
 Benettites 58.*
 Benettitinae 60.
 Berberis 460.
 Berggren 79.
 Bergnymphe 480.
 Bergstrüßler 255.
 Berg, v. 89.
 Befestigung der Pflanzen 456.
 Beseitigung 243.
 Beta, Anatomie 303.
 — vulgaris 311, 312.*
 — var. cicla 311.
 — var. maritima Koch. 311.
 — var. Rapa, f. altissima 311.
 — var. Rapa, f. crassa 311.
 — var. Rapa, f. rubra 311.
 Betula 243.
 — alba 244.
 — als Kultbaum 243.
 —, Blütenbiologie 244.
 —, Fruchtbiologie 244.
 —, Harzbrühen 243.
 — nana 243, 245.
 — pubescens 243.
 —, Saftfluß 244.
 — verrucosa 243.
 Betulaceae 243.
 Beutnerel 74.
 Bewegung, autonome 263.
 Bewegungen, spontane bei Aristolochia 289.
 Bewegungsrichtung, Wahl der bei Pflanzen 401.
 Bewegungswahl bei Clematis 380.
 Blütenblumen 291.
 Billbergia 166.
 Binsen 171.
 Biologie der Buchen 254.
 — der Eiche 252.
 Biologie der Gräser 139.
 — der Mistel 277, 284.
 — der Nessel 323.
 — der Nymphaeaceen 331.
 — der Weide 238.
 — des Hopfens 263.
 — von Alnus 246.
 — von Juglans 242.
 biologische Variabilität der Orchideen 223.
 Birnbaum, Beschneiden der 490.
 —, Pilzkrankheiten der 492.
 Birnbaum, Blütenbau 485.
 —, Blütenbiologie 486.
 —, Fruchtbiologie 486.
 —, Kultur 488.
 —, tierische Parasiten 492.
 —, Ursprung 487.
 —, wilder 495.
 Birnbaumkrankheiten 496.
 Birne 485.
 —, chemische Zusammensetzung 496.
 Birnenorten 495.*
 Birnenstiel 495.
 Birnnein 494.
 Birne 243.
 Birnenheide 243.
 Birnenrinde 244.
 Birnenwälder 243.
 Bismarckazithie 185.
 Biscutella 420.
 — laevigata 420, 421.*
 — als Beweis für Pflanzenphysiologie 421.
 Bizarden 326.
 Blaauw 455.
 Blätter der Gräser 139.
 Blasenfarne 19.
 Blastophaga grossorum als Bestäuber von Ficus 266.
 Blattanpassungen der Farne 13.
 Blattdimorphismus der Ranunculaceen 351.
 Blätterfahl 428.
 Blattbiologie der Gumpfbutterblume 363.
 Blattfleckenpilze 492.
 Blattflecken, defussierte der Nesselgewächse 317.
 Blaulagen im Lufschad bei Bubapest 337.
 Blaukraut 429.
 Blechnum 19.
 — Spicant 32.
 Blaukraut 429.
 Blitum capitatum 310.*
 Blüte, beschränkte Zweckmäßigkeit 199.
 Blütenbau der Anemone 373.
 — der Caryophyllaceae 318.
 — der Drüts 214.
 — der Resedaceen 448.
 Blütenbildung, Bedingungen der 461.
 Blütenbiologie 417.
 — der Akelei 366.
 — der Alpenfahle 366.
 — der Altheen 323.
 — der Anemone 379.
 — der Brenneffe 271.
 — der Clematis 380.
 — der Gräser 140.
 — der Hahnenwurz 291.
 — der Iris 197.
 — der Kerchensporne 401.
 — der Lilien 180.
 — der Nessel 309.
 — der Mistel 282.
 — der Narzissen 195.
 — der Nessel 321.
 — der Nesswurz 358.
 — der Passaria 469, 470.
 — der Polygonaceen 295.
 — der Pulsatilla 376.

- Blütenbiologie der Sumpfbutterblume 362, 364.
 — der Ulmen 255.
 — der Victoria regia 340.
 — der Wasserrosen 334.
 — des Apfelbaums 486.
 — des Birnbaums 486.
 — des Eisenhutes 367.
 — des Gahnenfusses 382.
 — des Ganes 267.
 — des Kopfes 265.
 — des Warblüchchens 374.
 — des Witterhornes 369, 370.
 — vom Wasserfütterich 299, 300.
 — von Cardamine 440.
 — von Castanea 250.
 — von Dentaria 442.
 — von Galanthus 192.
 — von Gladiolus 203.
 — von Nigella 361.
 — von Paris 191.
 — von Platanus 477.
 — von Ribes 474.
 — von Saxifraga 465.
 — von Trollius 362.
 — von Zostera 120.
 Blütenbimorphismus von Catasetum tridentatum Lindl. 218.*
 Blüteneinrichtung von Cyripedium 220.
 — von Orchis 216.
 Blüten, Explosionsstypus 271.
 Blütenfarbe der Syazinthen 372.
 — des Witterhornes 371.
 Blütenleben der Akelei 72.
 Blüten, Schließen der 343.
 Blütenstiel 321.
 Blütenwachs als Bodmittel der Orchideenblüte 217.
 Blütenpflanzen, Einteilung der 53.
 —, Entfaltung der 53.
 —, Generationswechsel 53.
 —, Phylogenie der 54.
 Blütenkategorien 321.
 — allotrope 321.
 — eutrope 321.
 — hemitrope 321.
 Blütenrohr 205.
 Blütenföhl 428.* 429.
 Blumenmal 184.
 Blutzahnhautbeere 474.*
 Blutlaus 493.
 Blutzahnhautb. d. Buche 314.
 — der Gafel 314.
 Boet, Hieronymus 21.
 Bodkäfer auf Eichen 252.
 Bodschäfer 225.
 Bodentrostkräbe 431.
 Boehmeria 272.
 — nivea, forma chinensis 272.
 — nivea forma indica 272.
 — var. tenacissima 272.
 Bohrgrannenfrucht 142.*
 Bolobophyll 213.
 — Beccarii 217.
 Bollmann 449.
 Bombus 370.
 — agrorum 366.
 — hortorum als Bestäuber der Akelei 366.
 — terrestris 366.
 Bonpand 341.
 Borsdorfer 490.
 Botrychium 16, 37.
 — Lunaria 38.
 — virginianum 37.
 Bowlea volubilis 147.
 Brachsenkraut 48.
 Braeklein 219.
 Bränlein 226.
 Brasenia 329.
 Brasilholz, gelbes 262.
 Brassica 427, 435.
 —, Diagramm von 410.*
 —, Etymologie 427.
 —, Früchte 416.*
 —, Küchenkräuter 439.
 — Napus 431, 433.
 —, forma annua 431.
 —, napobrassica 431.
 —, oleifera 431.
 — nigra 409.* 432, 436.
 — oleracea 428.
 —, forma acephala 428.
 —, botrytis 429.
 —, capitata 429.
 —, gemmifera 429.
 —, gongyloides 429.
 —, sabauda 429.
 — var. silvestris D. C. 428.
 — Rapa 431.
 —, f. annua 431.
 —, f. campestris 431.
 —, f. oleifera 431.
 —, f. rapifera 431.
 — Stammflanzen 428.
 Braun, M. 38, 48.
 Braut in Haaren 360.
 Brennef 269.
 Brennefelfgewächse 256.
 Brennefelle der Brennefelle 270.
 Breton-Bonnard 239.
 Brüllschichten 420.
 Briza media 136.*
 — minor 143.
 Brombeere 496.
 Bromelzägen 166.
 Brongniart, M. 25, 53.
 Brotschiffbaum 262.
 Broussonetia papyrifera 262.
 Bruegel Jan 184.
 Brunsfeld, D. 42, 202.
 Brunnföhlchen bei Polygonum 297.
 Brunnföhlchenbildung bei Farnen 20.*
 Brunnföhlchen der Farne 16.
 Bryophyllum 461, 464.
 — calycinum 464.
 Buche 253.
 —, Blutzahnhautblätter der 314.
 Bucheck 254.
 Buchen, alte Bäume 253.
 Buchenau 172.
 Buchloe dactyloides 127.
 Buchweizen 301.
 Büffelgras 127.
 Büschelfarn 33.*
 Bulbiföhlchen der Lilien 180.
 Bulbiföhlchenbildung bei Dentaria 441.
 Bunge 308.
 Burbank, E. 522.*
 Burd 290.
 Burggunderrübe 311.
 Burke, R. 36.
 Büschen 456.
 Butomus umbellatus 121.
 Butternußbaum 243.
 Cabomba 330.
 — aquatica 352.
 Cabomboidea 329.
 Caenonympha pamphilus 452.
 Cakile maritima 405.*
 Caladenia, reizbare Lippen 217.
 Caladium 157.
 — bicolor 161.
 — bulbosum 161.
 Calamites 9, 38.
 — ramosus 10.*
 Caldwell 165.
 Calla aethiopica 161.
 — pallustris 156, 161.
 Calligonum 294.
 Callitris 78.
 Caltha, Anpassungen 363.
 —, Artenzahl 354.
 —, Blattbiologie von 363.
 —, Blütenbiologie von 362, 364.
 —, albaefolia 364.
 —, Infestanz 364.
 —, falsche Kaspern 364.
 — palustris 352, 353, 364, 362.*
 —, Schauapparat von 362.
 Camellia sativa 405.*
 Campanula latifolia als Buchenbegleiter 254.
 Campbell 33, 57.
 Cannabinaceae 267.
 Cannabineae 256.
 Cannabis Abtammung 269.
 —, Wassertrag 268.
 —, Blütenbiologie 267.
 —, Fehnde 269.
 —, Fehnde 268.
 —, Fehnde 268.
 —, Kultur 268.
 —, Samengewinnung 268.
 — sativa 267.*
 Cannaceae 205.
 Canna indica 205.
 — als Dekorationspflanze 205.*
 Capparidaceae 446.
 —, Abfaltung 446.
 —, Anatomie 447.
 Capparidaceae 446.
 — spinosa 446.
 Caprifolius 257.
 Capsella 416.* 426, 433.
 — bursa pastoris 405.* 415, 427.* 442.
 Cardamine 415, 439.
 —, Adventivknospen auf den Blättern 439.
 —, akzessorische Sprossbildungen 439.
 — amara 439.
 —, Blütenbiologie 440.
 — californica 439.
 — chenopodiifolia 440, 441.
 —, Fruchtbiologie 440.
 — hirsuta 415, 439.
 — impatiens 439.
 —, fleistige Blüten 440.
 — lyrata 439.
 — macrophylla 439.
 — pratensis 405, 439.
 — prorepens 439.
 — raphanifolia 439.
 — rotundifolia 439.
 — tenera 439.
 — uliginosa 439.
 Carex 480.
 — acutiformis 154.
 — limosa 152.
 — riparia 154.
 — rostrata 152.
 — stricta 152, 153, 164.
 Caricetum 152.
 Carpinus als Waldbaum 248.
 — Betulus 248.
 —, Stodauschlag 248.
 Carpocapsa pomonella 493.
 Caryophyllaceae als Winterwäldchenbewohner 324.
 Caryophyllaceae als Kaffisches Beispiel für die Anpassung der Blüten an ihre Besucher 320.
 —, Anatomie der 318.
 —, Blütenbau der 318.
 —, befruchtete Blattstellung 317.
 —, Frucht der 324.
 —, Morphologie der 317.
 Caryopsis 141.
 Castagno dei cento cavalli 249.
 Castanea, alte Bäume 249.
 —, Blütenbiologie 250.
 — sativa 249.*
 Castilleja elastica 261.
 Casuarina 59, 109, 235.
 — (torulosa Dryand) 109.*
 Catasetum 217.
 — Ornithorhynchus 214.*
 — tridentatum Lindl., Blütenbimorphismus 218.*
 Catasetum-Form 218.
 Cattleya 213, 219, 229.
 Cavolini 119.
 Cecropia 261, 294.
 Cedrus Deodara 95.*
 — Libani 79.
 Celba pentandra 126.*
 Celakovsky 416.
 Celosia cristata 315.*
 Celtis australis 256.
 Centrospermae 292, 304, 314, 319.
 Cephalanthera 227.
 — rubra Rich. 226.
 Cephalotaxus 66.
 Cerambyx heros auf Eichen 252.
 Cerastium 317, 324.
 — arvense 323.
 Ceratophyllum 344.*
 —, Anatomie von 345.
 —, Blattbau von 345.
 —, Blütenbiologie von 344.
 —, demersum 346, 347.
 —, geschlechtliche Fortpflanzung von 346.
 —, Fruchtbiologie 344.
 —, Hüllblätter von 346.
 — platyacanthum 347.
 — submersum 347.
 Ceratopteris 29.*
 — thalictroides 15.* 30.
 Ceratostylis robusta 62.*
 Ceterach officinarum 25.*
 Cetonia als Befruchter der Wasserrosen 334.
 Chamaecyparis Lawsoniana 102.
 Chamaecyparis 223.
 Chamameles japonica 484.
 Cheimantia brumata 492.
 Cheiranthus 413, 442.
 —, Blütenbau von 409.*
 — Cheiri 442.
 —, Diagramm von 410.*
 —, Fehnde bei 406.
 Chelidonium 417.
 —, Diagramm von 410.*
 Chenopodiaceae 302.
 Chenopodiaceae 302.
 — als Beweismittel der Pflanzenphysiologie 308.
 — als Strandbewohner 302.
 — als Wäldchenbewohner 302.
 —, Anatomie 303.
 —, anatomischer Bau 304.*
 —, Anpassungen der 303.
 —, Blütenbiologie der 309.
 —, Fruchtbiologie der 309.
 —, Wehl der 305.
 —, phylogenetische Anatomie 304.
 —, suffultentes Aussehen der 304.
 Chenopodium 302, 303.
 — album 310.
 — ambrosioides 310.
 — (Bittu) Bonus Henricus 310.
 — Bonus Henricus L. 310.*
 — murale 310.
 — Quinoa 310.
 — vulvaria 310.
 Chinagrass 272.
 Chlorophora Maclura cinctoria 262.

- Embryosack 54, 110.
 — der Erle 59.*
 — der Zypressen 59.*
 — von Balanophora 59.*
 — Ephedra 69.*
 Embryosacke von Zamia 57.*
 Embryoträger von Lycopodium 43.
 Emmer 148.
 Empfindung bei Pflanzen 422.
 — der Pflanze 457.
 Empfindungsfähigkeit, plasmatische 300.
 Endemismus 276.
 Endoprotektanten 53.
 Endosperm, Definition 54.
 Engel 253.
 Engler, M. 7. 161, 467.
 Engler-Griseb., Systematik 111.
 Englischer System 169, 235.
 Endosperm 110.
 Entfaltungsfähigkeit der 457.
 Entwicklungsgang, Umkehr 29.
 Ephedra 104.
 —, Embryosack 59.*
 Epidendrum 223.
 Epipactis 227.
 — latifolia 227, 228.
 — palustris 228.*
 — rubiginosa Gaud. 227.
 Epipogon 212, 223, 226, 277.
 — aphyllus 227.
 Equisetum 38, 42.
 — arvense 39.* 40.* 41.
 — giganteum 39.
 — hiemale 39, 40.*
 — himosum 39.
 — myriochaetum 39.*
 — pratense 39.*
 — Telmateja 39.* 41.
 Granthia 349.
 —, Artenzahl 354.
 — hiemale 353.* 364.
 —, Wasserpalten bei 352.
 Erdbeere 478.*
 Erdhummel als Honigdieb 366.
 Erdmann, G. 472, 480.
 Erdrauch 403.
 Erdribe 431.
 Eriophorum 154.
 — latifolium 153.*
 Erle 245.
 —, Mythologie 245.
 Erlengröße 245, 246.
 Erlendruck 245.
 Erophila verna 405.*
 Erregung, Begriff der 435.
 Erregungen bei Pflanzen 420.
 Errera 84.
 Eruca cappadocica 407.
 Erysimum 442.
 — cheiranthoides 427.*
 — odoratum 442.
 Erve 239.
 Eßige 257.
 Etiofilerte Sprosse 265.
 Ethnologie der Pappel 240.
 Eucalyptus 108.
 Eucomis punctata 171.*
 Euphorbia 261.
 Euphorbiaceen 270.
 Euryale 329.
 — amazonica 341.
 —, Befruchtung 334.
 — serox 333.
 —, Stemenorgane 333.
 Eusporangiate Farnpflanzen 37.
 Eutrope Pflanzen 321.
 Exochorda 478.
 Färber-Weißb. 450.
 Färber-Wau 450.
 Färberwaid 416, 426.
 —, Früchtchen 416.*
 Fagaceae 243.
 Fagales 243.
 Fagopyrum esculentum 301.*
 Fagus, Abarten 255.
 — als Schattenbaum 254.
 —, Biologie 254.
 —, Buchenbegleiter 254.
 —, Fruchtbiologie 254.
 —, Lichtbedürfnis 254.
 —, Myrtorhiza 254.
 —, purpurea Ait. 255.
 —, Nadelbäume 253.
 Fagus sylvatica L. 253.
 —, Verbreitung 253.
 —, Verwertung 255.
 Farnblätter 148.
 Farnblumen 291.
 Farnreichtum der Alpen 320.
 Farlow 15, 29.
 Farnarten, Zahl der 12.
 Farn, Anatomie der 14.
 —, Apophyse der 15.
 —, Blattanpassungen der 13.
 —, Brutknospen der 16.
 —, eusporangiate 37.
 —, Fortpflanzung der 15.
 —, Kulturanleitung 29.
 —, leptosporangiate 37.
 —, Lichtgenuss der 25.
 —, Sorusbildungen der 19.*
 —, Sporen der 15.*
 Farnhaar 23.
 Farnland 18.
 Farnmännchen 25.
 Farnpalmen 60, 61.
 —, Anatomie der 61.
 —, Blüthenzweige 62.*
 Farnpflanzen 7.
 —, fossile 11.*
 Farnweiden 25.
 Farnwurzeln 22.
 Farn als Kulturbaum 257.
 Farnbaum, Blütenstände 258.
 —, Früchte 257.
 —, wilber 257.
 Farnwurzeln 384.
 Farnberg 136.
 Farnbeere des Landes 406.
 Farnkreise 418.*
 Farnblätter 255.
 Farnbirne 496.
 Farnjohannisbeere 473.
 Farnkirsche 621.
 Farnmispel 483.
 Farnpflanzen 424.
 Festuca 137, 139.
 — glauca 139.
 Festheime 461.
 Feuerborn 483.
 Feuerfarn 326.
 Feuerlilie 180.
 Ficaria 352.
 —, Blütenbau 384.
 —, ranunculoides 384.
 —, Untergattung von Ranunculus 384.
 Fichte, berühmte Bäume 86.
 —, höchstes Alter 89.
 —, innere Sekretionen 84.
 —, Keimling der 85.
 —, Nutzung der 87.
 —, schönste deutsche 86.*
 —, Stelzenbildungen 83.
 —, Unterschied zur Tanne 81.
 —, Verbreitung 82.
 —, Vielgestaltigkeit der 85.
 —, Wachstumsforrelation 84.
 Fichten, blühende 84.
 Fichtenpargel 82.
 Fichtenwald 82.
 Fichtenurwälder 83.
 Ficus 256.
 — als Baumwürger 259.
 — als Überpflanze 259.
 — bengalensis 259, 260.
 —, Befruchtungsverhältnisse 256.
 —, Blastophaga grossorum als Befruchter 256.
 —, carica 256, 259.
 —, fossile Formen 259.
 —, dreierlei Blütenarten 256.
 —, elastica 257, 261.
 —, Wallwiese als Befruchter 256.
 —, Geschlechtsarten 258.
 —, indica 259, 260.
 —, religiosa 259, 260.
 —, scandens 261.
 —, Stammform 258.
 —, Stützwurzeln 260.
 —, sycamorus 261.
 —, tropische Arten 259.
 Fickler 27.
 Filices 7.
 Filipendula ulmaria 481.
 Filius ante patrem 176.
 Finken des Farnes 268.
 Fittling 111, 163, 215.
 Flachs, neuseeländischer 176.
 Flammenf. 326.
 Flammula, Gruppe von Clematis 380.
 Flatterrüscher 265.
 Flaubert 269.
 Fleischverbundene Pflanzen 460.
 Fliegenblumen 291.
 Fliegenfänger 221.
 Flora der ägyptisch-arabischen Wüste 309.
 Florengebiet von Kapland 272.
 — von Südwestaustralien 272.
 Flugrannchenfrucht von Aristida caerulea 142.*
 Fluktuationseigenschaften 314.
 Foote, W. D. 485, 513.
 Föhrenmilch 283.
 Folia linguae cervinae 27.
 Formosibäume 490.
 Fortpflanzung d. Farnes 15.
 — der Schachtelhalme 40.*
 Fourcroya 196.
 — gigantea 176.
 Fragaria 478.*
 Frant 254.
 Frantlin, J. 147.
 Frauenhaar 31.
 Frauenschuh 219.
 Fremdbefruchtung der Pflanzen, Nutzen 198.
 Freundlich, G. F. 66.
 Freycinetia 117.
 Frillaria 173.
 Frösche, B. 418, 455.
 Frösche 121.
 Frostpanzer 492.
 Fruchtbecher 249.
 Fruchtbiologie der Buchen 254.
 — der Farnwurzeln 292.
 — der Nelken 309.
 — der Waldbere 381.
 — von Cardamine 440.
 Fruchtblätter, Definition 54.
 Frühlingsanemone 376.
 Frühlingsungerblümchen 405.* 443.
 Fruchtschwanz 315.
 Fumaria 403.
 — officinalis 404.
 — spicata 404.
 Funktionswechsel nach Bedürfnis bei Ranunculus 383.
 —, Rumex als lamartineisches Phänomen 295.
 Fuscladium dendriticum 492.
 — pirinum 492.
 Futterhaare bei Orchideenblüten 217.
 Gagea 186.
 — pratensis 179.*
 Galanthus 192.
 —, Blütenbiologie 192.
 —, Medjanomorphose 192.
 —, nivalis L. 192.*
 —, Septaldrüsen 193.
 Gellen an Quercus 252.
 Gellwiese als Ficus-Befruchter 256.
 Gellwiesen 252.
 Gametophyt 8.
 gamotrope Bewegungen von Convolvulus 191.
 Gänsefuß 302.
 Gänsekreuz 405.* 444.
 Galactodendron utile 260.
 Gartenaristolochie 287.*
 Gartenhummel als Befruchter der Astele 366.
 Gartenkreuz 418.*
 Gartenkrokus 202.*
 Gartenlilie 182.*
 Gartenlilien 181.
 Gartenmelle 325.
 —, Artenzahl 325.
 —, Systematik der 325.
 Gartenreich 437.
 Gartenrittersporn 370.*
 Gartenulme 182.
 Gattung, monotype 425.
 Gedächtnis, unbewußtes der Pflanzen 9.
 Gefährtpflanzen 14.
 Gegenreaktion bei den Pflanzen 435.
 Gefährtpflanzen der Dracheneinnahme 216.
 Gelbblatt 263.
 Gelbbolz 262.
 Gelbwurzel 205.
 Gelenknoten d. Gräser 138.
 Generationswechsel 7, 8.*
 — bei Blütenpflanzen 53.
 Geotropismus der Gräser 138.
 Gerste, Herkunft 145.
 Geschlechtsgeneration, Rückentwicklung 54.
 Gesner, M. P. 183.
 Gelpfinkmotten 493.
 Getreidearten 146.
 —, Leben 145.
 —, Varietäten der 147.
 Getreide, Aufrichten von gelagertem 138.
 Getreidegräser, Befruchtung 136.
 Getreide, Herkunft 145.
 — in den Pflanzbauten 145.
 —, Kulturmerkmale 148.
 Geum 480.
 — montanum 246.
 Gigantea-Gruppe 336.
 Gilg 64, 445.
 Ginger-Ale 206.
 Gingko biloba L. 63.*
 Ginkgoale 60.
 Gipsstrahl 317.
 Gitterpflanze 120.
 Gitterrost 496.
 Gladiolus sp. 199.* 203.
 —, Blütenbiologie 203.
 —, communis 203.
 —, Freilandkultur 201.
 —, Frucht 204.
 —, imbricatus L. 203.
 —, paluster Gaud. 203.

- Glaphyriden als Befruchter der Wasserrosen 394.
 Glasraut 271.*
 Glanclum 417.
 Glasialtreiff 368.
 Gliefchermelle 326.
 Gliederfnoten, Definition 416.
 Gloeosporium Ribis Montg. 474.
 Glück 345.
 Glückshändchen 211.
 Glumiflorae 125.
 Gnetazeen 104.
 Gnetinae 60.
 Goebel 24, 29, 32, 48, 49, 68, 100, 134, 139, 331, 333, 369, 437, 439, 454, 466, 465.
 Goethe 456.
 Goethes Metamorphosenlehre 111.
 Goldjohannisbeere 473, 474.*
 Goldbandfille 181.
 Goldblat 442.
 Goldnetten 490.
 Goldfarn 179.*
 Goodyera repens 227.
 Grabener, P. 69, 83, 127, 248.
 Gräfer 125.
 —, Anatomie 137.
 —, als Verlanbungspflanzen 149.
 —, Ausfüngseintrichtungen 142.*
 —, Bedeutung 125.
 —, Biologie 139.
 —, Blätter 139.
 —, Blütenbiologie 140.
 —, Daffale 144.
 —, Gelenkfnoten 138.
 —, Grannen 142.
 —, Kleberfchicht 144.
 —, Knoten 138.
 —, Laubwedelfel 139.
 —, Lebenbiggebären 143.
 —, Lichtgenuß 126, 139.
 —, pflanzengeographifche Verbreitung 127.
 —, Schwefelförper 140.
 —, Sinneorgane 138.
 —, Stützorgane 137.
 —, Verdauungsdrüfe 144.
 —, Vermehrung der Selbstbefäubung 141.
 Grannen der Gräfer 142.
 — der Stipa-Arten 142.
 Grasarten, Zahl 128.
 Grasbaum, australifcher 177.*
 Grasblüte 141.
 Grasfluren, Charakter 127.
 Grasflur im Amurland, Tafel.
 Grasfrüchte 143.
 —, Abforptionsgewebe 143.
 —, Geotropismus 138.
 Grasflam, Bau 137.
 Gratzpflanzen, nivale 444.
 —, fubnivale 444.
 Granerle 245.
 Gray, W. 223.
 Grelt im Buch 360.
 Grevillea 274.
 — als Vogelblütler 275.
 — Leucandron 274.
 Griffel 109.
 Grifebach 441.
 Grossi 258.
 Grunerle 245, 246.
 Grüb 144.
 Günthart, W. 321, 421.
 Gulnard 68, 110, 407.
 Gummibildung bei Kirfchbäumen 480.
 Gummifluß der Kirfchbäume 480.
 Gunnera 356.
 Guttenberg, R. v. 217.
 Gymnadenia 221, 226.
 — albida 223.*
 — conopsea 225.*
 — cucullata 223.
 — tridentata 226.
 Gynnospermen 63, 60.
 Gynnosperme, Staubblatt 110.
 Gynnosporangium 496.
 Gynandren 210.
 Gynlerium argenteum 144.*
 Gypsophila 317.
 — repens 327.
 Habenaria 223.
 Haberlandt 84, 134, 143, 144, 316, 352, 455, 469.
 Händelwurz 225.*
 Haken 274.
 Häfel 137, 138, 142.
 Hängebirne 243.
 Haente 341.
 Hafer 145.
 —, Hafer, wilder 147.
 Hagebuche 248.
 Hageborn 483.
 Hagenfuß 381.
 Hagenfußgewächfe 347, 348.
 Hagenfuß, goldhaariger 383.
 —, fcharf 382.
 Hagenfamm 315.*
 Hainbinfe 171.
 Hainbuche 248.
 Hainmotdrüfchen 372, 373.*
 Hafenfletterer 446.
 Halocephalus 303.
 Halophila 125.
 Halophyten 305.
 Halophytenveretne 405.
 Halophytenwälder 308.
 Haloxylon 302.
 — Ammodendron 308.
 Hanf, Fimeln 268.
 Hanfultur 268.
 Hamamelidaceae 475.
 Hammar 403.
 Hanfen 144.
 Hansgig 111.
 Harfenbäume 84.
 Hartlaubgewächfe 273.
 Hartmann, J. 351.
 Hasbruch 252.
 Hasbruch-Urwald 251.*
 Häflich 268.
 Häfel 247.
 —, Aberglaube 247.
 —, Blutvarietäten der 314.
 Häfelbäume 247.
 Häfelwurz 290.
 Hausrath 68.
 Hausflorium der Mifel 281.
 Hauswurz 460.
 —, Auflösung der Hofette 461.*
 Hautfarbe 17.
 Hecistopteris pumila 18.
 Hede 283, 284.
 Heberich 409.*
 Heer 329.
 Hegelemaier 165.
 Hehl 148.
 Heidemelle 301.
 Heidenelfe 326.
 Helm 424.
 Helms 39, 176, 181, 290, 322, 350, 368, 379, 401, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
 Heliocharis 154.
 Helleborae 353.
 Helleborus als Gartenpflanze 360.
 —, Artenzahl 354.
 Helleborus, Bewegungen der unteren Blätter bei 359.
 —, Blütenbiologie von 358.
 — foetidus 350, 357, 358.
 —, Myrmecochorie 359.
 —, Samenverbreitung 359.
 — intermedius 352.
 —, Stützvorrichtungen bei 359.
 —, Lebensgefichte der Blüten 357.
 —, medifinifche Berwendung von 357.
 —, Nektarien bei 357.
 — niger 357.
 —, Wafferfalten bei 352.
 — purpurascens 360.
 —, Schaufapparat bei 357.
 —, Schneefellung bei 358.
 —, Stützbedürfnis der Pflanze 359.
 —, Stützvorrichtungen bei 359.
 — viridis 353, 357, 368.
 —, Wafferfalten bei 352.
 Hellertraut 405.*
 heliotropifche Reizung bei Pflanzen 434.
 Helix pomatia 270.
 Helodea 290.
 — canadensis 121, 122.*
 — densa 122.*
 — (fälfchlich) Elodea canadensis 123.
 Hemerocallis 173.
 — flava 176.
 — fulva L. 176.
 Gentel 328, 329, 334, 340.
 hemitrophe Pflanzen 321.
 Hepatica 349.
 — acutiloba 375.
 —, Gartenvarietäten 375.
 — transilvanica Fuss 376.*
 — triloba 374, 375.*
 —, Blütenbiologie 374.
 Herba Equiseti 40.
 Herbit-Gebilde 491.*
 Herbitzeile 171.
 —, Blütenleben 175.
 —, Infinitbewegungen 175.
 —, Verbreitung 175.
 Herzblatt 468.
 Herzog 311.
 Hesperis 409, 443.
 — matronalis 443, 444.*
 — tristis 443.
 Heterosporie der Wafferfarne 33.
 Herenmehl 48.
 Herenrinne bei Moosfarne 46.
 Hibernafel 468.
 Hieracium 480.
 Hieronymus 46, 47.* 48.
 Hildebrand, F. 133, 288, 334, 402, 404, 440.
 Hilbesheim, Hofenftod 517.*
 Himantoglossum 221, 222.
 — hircinum 214.* 224.* 225.
 Himbeere 496.
 Hirfchjunge 27.
 Hirfchjungenfarne 16.
 Hirtenäfel 405.* 427.* 442.
 —, offenes Früchtchen 416.*
 Höf 69, 83, 246, 252, 254, 325.
 Hölzefönig 88.
 Hoffmann, R. D. 463.
 Hoffmeyer 7, 63.
 Holzfofen 287.
 Hohenvarthia Pamilio 327.
 Hollarbau, Hopfenultur 266.
 Holzäfel 487.
 Holzkörper 303.
 Homologien 53.
 Honigbiene 371.
 Honigblätter der Hahnenfußgewächfe 349.
 Honigdiebftähle bei Iris 199.
 Honigraub 322.
 Honigtau 266.
 Hofer 91.
 —, J. D. 79.
 Hopfen als Kulturpflanze 266.
 —, Biologie 263.
 —, Stimmhaare 264.
 —, Saazer 266.
 —, Umftimmung des 264.
 —, Vorläuferfpige 265.
 Hopfenblattaus 266.
 Hopfenbuche 247.
 Hopfenfeinde 266.
 Hopfenfrucht, Kupferbrand 266.
 Hopfenultur 266.
 Hordeum maritimum 147.
 Hopfenmehl 266.
 Hopfenmurelfpinner als Hopfenfeind 266.
 Hordeum maritimum 147.
 — secalinum 147.
 Hornblatt 344.*
 Horntraut 317, 323.
 Hortenfien 471.
 Humboldt, W. v. 17, 93, 127, 147, 187, 252, 341.
 Hummelblume 368.
 —, Delphinium 370.
 Humulus, Stimmhaare 264.
 — als Kulturpflanze 266.
 —, Blütenbiologie 265.
 —, Fruchtbiologie 266.
 —, Kranfheiten 266.
 — Lupulus 263, 265.*
 Humuspflanzen, Rückbildungen 277.
 Hungerblüthen 443.
 Supfer, F. 489.
 Hutchinsia alpina 444.
 — als Schuttpflanze 423.
 — brevicaulis 424.
 — Petrocallis 444.
 Huftum, J. v. 184.
 Hyacinthella leucophaea 185.
 Hyazinthen, Blütenfarbe 372.
 —, Pflege 185.
 Hyazinthe, wilde 185.
 Hyacinthus orientalis 185.
 Hydathoden 465.
 Hydrangea, Kultur 471.
 — opuloides, Koch 471.
 — paniculata 472.
 Hydrilla 121.
 Hydrocallis 334.
 Hydrocharis morsus ranae L. 122.
 Hydrocharitaceen, Befruchtung 125.
 Hydromystris (Trianea) 121.
 Hydropteriden 9.
 Hydropterides 33.
 Hydropteris 16.
 Hydrosma 158.
 Huggrofpitalität 446.
 Hymenophyllaceae 17.
 Hymenophyllum Tunbridgense Sm. 17.
 Hyperbelfgefey 419, 435.
 Hypnometula malinella 493.
 Iberis 415.
 Ictoblasten 407.
 Ictoblasten 114.*
 Indigo, deutlicher 426.
 —, echter 426.
 Indigofera 426.
 Individuallität der Pflanze 466.
 Infunditionszeit 419.

- Induktionszeit, kürzeste 419.
 Indusium der Farnе 15.*
 Indufriegelraser 129.
 Ingwer 205, 206.
 —, echter 204.*
 Insektenblütigkeit, Ursache der 111.
 Insektenfressende Pflanzen 450.
 Insektenmimikry der Orchideen 221.
 Insektenbewegungen der Pflanzen 175.
 Instrukte, mechanisierte der Pflanze 289.
 Iridaceae 169.
 Iridazeen 197.
 —, Diagramm der 412.
 Iris 197.
 — alata 200.
 —, Arten 200.
 —, Blütenbiologie 197.
 — florentina 200.
 — germanica 200.
 —, Königblume 198.
 — Lorelei 200.
 —, Nutzen der Fremdbestäubung 198.
 — persica 200.
 — pseudocorus L. 197.* 200.
 — pumila 200.
 —, Schuttblase 200.
 — susiana 200.
 —, Vegetationsorgane 199.
 —, xerophile Anpassungen 200.
 Jernisch 190.
 Isatis 416.
 —, Früchtchen 416.*
 — tinctoria 409.* 426.
 Isoetes S.* 9, 48.
 — echinospora 49.
 — lachustris 49.
 — malinverniana Hs. 48.* 49.
 Jardin des Plantes 107.
 Jasmin 470.
 —, echter 470.
 Jasminum Sambac 470.
 Jeyffrey 37.
 Jerschdorff 406, 445.
 Johannsbeere 472.
 —, Gartenformen der 475.*
 Johannsbeermwein 474.
 Johow 438, 464.
 Jonquillen 195.
 Judenbart 467.
 Juglandaceae 242.
 Juglandales 236, 242.
 Juglans, alte Bäume 242.
 —, Biologie 242.
 — cinerea 243.
 —, Früchte 243.
 — nigra 243.
 — regia L. 242.
 Juncaceae 169, 171.
 Juncus 171.
 — balticus 172.
 —, Blütenbiologie 172.
 — bufonius 172.
 — capitatus 172.
 — effusus 172.
 —, Kleifgamie 172.
 Jung 309.
 Jungfer im Grünen 360.*
 — —, Artenzahl 354.
 Juniperus communis 95.*
 — excelsa 98.
 — nana 98.
 — Oxycedris 286.
 — phoenicea 98.
 — Sabina 95.
 — virginiana 99.
 Jussieu, B. de 80.
 Jussieu-Zeder 79.*
 Käschenträger 236.
 Kalabien, Hierpflanzen 162.
 Kalifornien, Flora 316.
 Kalms 156.
 Kalvillen 490.
 Kampanulaten 460.
 kanadische Fappel 241, 242.*
 Kanbelerbäume 84.
 Kandra 242.
 Kanneleier 74, 250, 427.
 Kapern 446.
 —, falsche 364.
 Kapfara 274.
 Kapland, Erdemismen 275.
 —, Proteazeen im 274.
 Kapofbaum 126.*
 Kapparidazeen 417.
 Kappern 446.
 Kappernstrauch 446.
 Kaprififikation 259.
 Kapuzinertreffe 469.
 Karniboren 450.
 karpologische Sammlung von Kofazeen 479.
 Karhol 429.
 Karpelle, Definition 64.
 Karpgebiete, Flora der 316.
 Karp-Vegenden 308.
 Karpophylazeen 300.
 Karstanenbaum des Atina 249.
 Kasuarinenwälder 308.
 Kaurifichten 68.
 Kaurifopal 68.
 Kaurifopf 261.
 Kaurifopfblume 261.
 Kaurifopfblatifikation 261.
 Kaurifopfblatpflanzen 261.
 Kaurifopfblat der Mittel 281.
 Keld 429.
 Kellermann, Chr. 85, 452.
 Kermesbeeren 315.
 Kern, G. 241.
 Kerner v. Marilaun 89.
 153, 175, 292, 298, 322.
 323, 368, 376, 377, 381, 423, 466.
 Kerner (Cochlearia) saxatilis 425.
 Kesselfallenblume 162.
 Kesselfallenblumen 288, 291.
 Keulenbärlapp 43.
 Kew 341.
 Kiefer, Bedeutung der 70.
 —, Blütenleben 72.
 —, feiner Bau 71.*
 —, Lichtanpassung 71.
 —, Mykorrhiza 70.
 Kiefernbegleitgenossenschaft 97.
 Kieferngenossen 69.
 Kieferngenossenschaft 69.
 Kiefernmittel 283.
 Kiefernnutzung 73.
 Kiefernwälder 69.
 Kiehlmann 426.
 Kienig-Verlof 55.
 Kiehlmann 85.
 Kiehlner 291, 300, 309.
 Kiehlbäume, Biologie 521.
 —, Gummißuß der 480.
 —, immergrüne 479.
 Kiehlchlorbe, Biologie 526.
 Kiehlblat 337.
 Kiehlblat 323.
 Kiehlblat der Gräser 144.
 Kiehl, G. 461.
 Kiehl 35.
 Kiehlarne, australische 35.*
 Klein, G. 413.
 Kleifgamie bei Cardamine 440.
 — bei Juncus 172.
 — bei Kreuzfieren 417.
 — von Potamogeton 119.
 Klemmfallenblumen 291.
 Klemmhaare des Hopfens 264.
 Kneuelgras 136.* 137, 139.
 Knepp 97.
 Kneppfches Heilverfahren 40.
 Knightia excelsa 274.
 Knoderich 292, 293.*
 — als liberalwohner 294.
 —, lebendiggebärender 297.
 Knopperr an Quercus 252.
 Knuth 162, 166, 198, 292, 370, 380, 436, 442, 470.
 Kny 15, 32.
 Koelreuter 282.
 Koenigia als liberalwohner 294.
 Königsfarn 18, 31.*
 Körnide, G. 133.
 Kobl 427.
 —, Früchte 416.*
 Kobltrab 429.
 —, blühende 430.*
 —, Samenpflanze 430.*
 Kofospflanzen 460.
 Kolbenbärlapp 43.*
 Kolbenblume 145.
 Kolchisin 174.
 Kolofaffen, Blütenbiologie 163.
 Kommelinazeen 167.
 Koniferen, ausländische 101.
 — als Forstbäume 102.
 —, Gierarten 102.
 Konforben 326.
 Kontinentalpferre 311.
 Konvergeng, ökologische 425.
 Koordination der Beweigung 289.
 Kopfschl 430.*
 Kopfschlengel 136.*
 Korallenwurz 226.
 Korbmelbe 238.
 Korbdatten 64.
 Korbdattene 490.
 Korfche 250.
 Kormophyten 53.
 Kornrade 325.
 Korrelation d. Wachstums 84.
 Kofsch 250.
 Kraulazeen 460.
 Kraul, G. 129.
 Kraut 429.
 Krebs der Bäume 286.
 Krebspfl 492.
 Krefte 405, 418.
 „Kreuterbuch“ 202.
 Kreuzblütler 404.
 Kreuzbren 246.
 Kreuzungsgefetze der Pflanzen 209.
 Kriechweide 238.
 Kristallfräuter 317.
 Krosusflor bei Bavelstein 201.
 Krosus, Gattungsmertmale 200.
 Kronfeld 368.
 Krümmungsbewegung bei Drosera 452.
 Krüppelfichten 85.*
 Kreuzfieren 404.
 —, alpine 424.
 — als Bestandteil der Steppenformation 405.
 — als Krunderpflanzen 426.
 —, Anatomie 406.
 —, Bau der Frucht 415.
 —, der Samen 417.
 —, Bedeutung der 406.
 —, Blatstellung bei 408.
 —, Blütenbau der 408.
 Kreuzfierenblüte, Abweichungen im Bau 415.
 —, Bau der 411.
 —, Deutung der 413.
 —, Blütenbiologie 417.
 —, theoretisches Diagramm der 415.
 —, Diagramme von 410.*
 —, Dolben 408.
 Kreuzfierenblüte, Ginteilung der 408.
 —, Habitus der 404.
 —, Sonigdrüsen der 410.
 —, Kleifgamie 417.
 —, Mikrofilamen 407.
 —, Selbstbestäubung 417.*
 —, Spaltöffnungen der 406.
 —, Stammesgeschichte der 417.
 —, Stauchung der Blüteninternodien 408.
 —, systematische Gliederung der 408.
 —, Traube 408.
 —, Verbreitung 406.
 Kreuzfierenfrüchte 416.
 Kryptogamen, Definition 53.
 Kuchschblume 223, 224.*
 Kuchschblume 378.
 Kugelkranz 361.
 Kuchbaum 260.
 Kuch 27.
 Kuchschale 349, 353.*
 Kuchschellen 372.
 Kupferbrand als Hopfenfrant 266.
 Kurlumpapier 205.
 Laelia 219, 229.
 Lächelglorie 81.
 Lachtraut 117.
 Lamarckismus 285.
 Lambert, B. 513.
 Lamberttrug 247.
 Lamin album 271.
 Laportea 270.
 Larix decidua 80.*
 — europaea 80.
 — leptolepis 102.
 Lateral-Geotropismus 264.
 Laubholzmittel 283.
 Laubwedel der Gräser 139.
 Lauch 178.* 179.
 Lauche, ätherische Öle 179.
 —, Brutnölchen 179.
 Laurent 372.
 Lebendiggebären der Gräser 143.
 Lebensbaum 94.
 Leberblumen 374.
 — als Buchenbegleiter 254.
 L'Ecluse, Ch. de 161.
 Lehmann, W. 28, 120, 355, 380, 471, 484.
 Leimtraut 322.
 Leimbutter 405.*
 Lemna, Anatomie 165.
 —, Blütenbiologie 165.
 — gibba 164.*
 — minor 164.*
 —, Tochterproffie 165.
 — trisulca 164.*
 Lemnazeen 164.
 —, Befruchtung 166.
 Leuorechtung 95.
 Lepidid 406, 415, 418, 435.
 — campestris G. Br. 418.
 — Draba 418, 426.
 — ruderalis 418.
 — sativum L. 418.*
 —, als Beweis für Pflanzenphysiologie 418.
 Lepidobodenren 9.
 Lepidodendron 10.*
 leptosporangiate Farnpflanzen 37.
 Lerchenporne 401.
 —, Blütenbiologie 401.
 Lenandendron 274.
 — argenteum 274.
 Lencium aestivum 193.
 — roseum Lois., als Gartenpflanze 194.
 — vernum 193.
 Levkoje 442.
 Liane 263.
 Liane, tropische 265.

- Pflanzen, Vorläufer Spitze 265.
 Planetenpus 379.
 Pflanzanpassung der Kiefer 71.
 Pflanzengröße der Farne 25.
 — der Gräser 139.
 Pflanzenteile 324.
 Ligulae der Moosfarne 47.
 Ligulatae 47.
 Lilaea subulata 120.
 Lilaceae 169, 173.
 Lilia als Zimmerpflanze 181.
 —, Kultur 182.
 Litten 169, 170, 173.
 — als Gartenpflanzen 181.
 —, Anatomie 173.
 —, Bau 173.
 —, Blütenbiologie 180.
 —, Brutknospen 180.
 —, Bulbillen 180.
 —, Gartenkissen 181.
 —, Zimmereleben 176.
 —, Defolationsmus 176.
 —, System 170.
 —, Zucht 181.
 Littenarten 179.
 Littengrün 176.
 Liliiflorae 169, 170, 412.
 Lilium auratum 181.
 — bulbiferum 180.
 — candidum 179.
 — Embryofide 57.*
 — giganteum Wall. 179.
 — lancifolium 181.
 — martagon 8.* 173, 179.
 180.* 252.
 — speciosum 181.
 — var. hort. 182.*
 — tigrinum 179, 181.*
 Limncharis Humboldtii 121.
 Limodorum 223.
 — abortivum Sw. 223.
 Lindenia 210.
 Lindley 229, 341.
 Lindmann 441.
 Linsenswinder 263.
 Linné 37, 161, 185, 229, 250.
 Linné'sches System 410.
 Listeria 218.
 — ovata 222, 225, 226.*
 Llanos 127.
 Lobb, B. 92.
 Löffelkraut 425.
 Loebe 283, 321, 422.
 Lonicera 263.
 Loranthaceen 275.
 —, tropische 279.
 Loranthus 283.* 284, 286.
 — aphyllus 286.
 — europaeus 275, 282, 286.
 — pentandrus 279.
 Loranthus-Arten, tropische 286.
 Lotos 329.
 —, Frucht des 342.
 —, Gruppe 336.
 —, indischer 329.
 Lotosblume 337.
 —, Kultur der 342.
 Lotosblumen, Zucht der 342.
 Lotospflanze 336.
 Ludwig, F. 300, 334, 344.
 358, 369.
 Luerßen, Chr. 12, 17, 32.
 33, 40.
 Luftknochen der Orchideen 213.
 Luftwurzel der Arazeeen 159.
 — der Bandanen 117.
 Luftbad bei Budapest, Flora vom 337.
 —, Mikrofauna im 337.
 Lunaria 442.
 Lunaria annua 441.*
 — biennis 442.
 —, Frucht 416.*
 —, rediviva 442.
 Lupulin 266.
 Luteola 450.
 Lutterbuche 253.
 Luzula 171, 172.
 Lycaste 219, 229.
 Lychnis 317.
 — Viscaria 323.
 Lycotomum 369.
 Lycopodiales 43.
 Lycopodium cernuum 44.*
 — clavatum 43.* 44.*
 —, Embryoträger von 43.
 — inundatum 44.*
 — Selago 43.
 — volanicum 44.
 Lymnaea 166.
 MacroGLOSSA stellatarum 320.
 Macrozamia 62.*
 Märzblühen 374.
 Märzblumen 353.*
 Märzborn 189.
 Märzgerste 147.
 Magnoliaceen 352.
 Magnolien 460.
 Malanthemum bifolium 189.
 Malgoböden 189.
 Mais 133.
 — als Kulturgegenstand 147.
 —, Bedeutung 146.
 —, del. aqua 341.
 —, Stelenwurzel 133.*
 —, Stülpwurzel 134.
 Matroforangien der Wasferfarne 33.
 Matul 485.
 Mamme 258.
 Mammoni 258.
 Mammutbäume 91.
 Mandelbaum, Ökologie 524.
 Mangob 311.
 Mangrove 297.
 Mantel-Nischenblätter 14.
 Mantianora 491.*
 Marantaceen 205.
 Marattiales 16, 36.
 Maropteris 10.*
 Mariposa Grove 91.
 Margraf 312.
 Marmelade 484.
 Maroni 260.
 Marsilia 9.
 — elata 35.*
 — hirsuta 35.
 — Nardu 35.*
 — Drummondii 36.
 — quadrifoliata 34.
 Martius 66, 196.
 Maschansker 491.
 Masdevallia 229.
 Masdevallien 217.
 Matoufisch 20.
 Mattenfische 85.
 Matthiola 406, 413, 442.
 — annua 442.
 — incana 422.
 Matthiols 94.
 Mauerrante 25.
 Maulbeerbäume 256.
 Maulbeerbaum 261.
 —, schwarzer 261.
 —, weißer 261.
 Maulbeere 261.
 Mauritiusbanan 176.
 Maxillaria 217.
 Maximowicz, P. 460.
 Mayr, S. 102.
 mechanisierte Institute der Pflanze 289.
 Mechanomorphose der Pflanzen 192.
 Medullosa 11.
 Meekhan 438.
 Meerträubchen 104.
 Meerzwiebel 185.
 Megachilium 217.
 Meigenberg, K. v. 95.
 Mehan 443.
 Meersenf 405.*
 Meierhofer 215.
 Melandrium 317.
 Melandrium 324.
 — rubrum 322.
 —, rotblühendes 322.
 Melisen 302.
 Melica, als Buchenbegleiter 254.
 Mendel 209.
 Mendelsche Vererbungsgesetze 316.
 Mer 49.
 Mesembryanthemum 317.
 Mesembryanthemum 316.*
 Mespilus azarolus L. 482.
 — germanica 481.
 — mongiana Jacq. 483.
 — oxycantha 482.*
 Mere 317, 323.
 Migula 23.
 Mikroforangien der Wasferfarne 33.
 Milbenpinne als Kopfenfeind 266.
 Milchbaum 260.
 Milchtieren 186.
 Milbe 23.
 Milchsäure 28.
 Milkskraut 468.
 Mirabilis Jalapa 315.
 Mirbel 481.
 Mistel 276.
 — als Parabelstiel des Larmardismus 285.
 Mistelbrofel 278.
 Miyoshi 101.
 Moderorchideen 227.
 Moehringia 317.
 Mohrbirke 147.
 Monanthusform 218.
 Monastrose 513.
 Mondraute 38.*
 Mondviole 441.* 442.
 —, Frucht 416.*
 Monitapila 492.
 Monochlamydae 235.
 Monochlamydeen 59, 110.
 — als Vorläufer der Polycarpicae 352.
 Monofotoneben 108.
 Mononychus vulpeculus 199.
 Monotropa 92.
 monotype Gattung 425.
 Monstera deliciosa 159, 160.*
 Montia 316.
 — fontana 316.
 — minor 316.
 — rivularis 316.
 Moosfarne 45.
 —, Serenringe 46.
 Moraceae 256.
 Moraceen 260.
 Moricandia arvensis 407.
 Morphologie der Caryophyllaceae 317.
 — der Mesobazeen 448.
 Morus alba 261.
 — nigra 261.
 Muehlenbeckia 294.
 — platyclada 294.
 Müller, F. 256.* 258.
 —, S. 55, 292, 319, 320, 321.
 381.
 Müllersche Gesetze 421.
 Muntzweihen 145.
 Mummel 335.
 Musa Ensete 204.* 205.
 —, paradisica 205.
 Muscari 185.
 — botryoides Mill. 185.
 — comosum 185.
 Mutation 26.
 Mutationen von Tüpfelfarnen 31.
 Mutationsform von Asplenium 30.*
 Myanthusform 218.
 Mylorrhiza bei Ophioglossum 37.
 — der Kiefer 70.
 Mylorrhizenpflanzen 298.
 Myosurus minimus 353.*
 Myrmecophoren 359.
 Myriophyllum 334.*
 —, Winterknospen bei 346.
 Myrofin 407.
 Myrorrhizellen 447.
 — der Kreuzkifer 407.
 Myosotis 372.
 Myriophyllum 27.
 Myrothamaceae 475.
 Nachtschlafblumen, Lebensweise der 321.
 Nachtschlaf 246.
 Nachtschlaf 443, 444.*
 Nadelbäume 60.
 —, Befruchtung 66.
 —, Früchte 66.
 —, Verbreitung 65.
 Nadelbäume 64.
 —, Urform der 11.
 Nadelung der Nadelblüte 318.
 Nasturtium 405, 406, 415.
 Nasturtium der Salswurmsamen 292.
 Najas 119.
 Namensklärung der Pflanzen 42.
 Napellus 369.
 Narbe 109.
 Narbu 36.
 Narzissen als Zimmerpflanzen 195.
 —, Blütenbiologie 195.
 —, Kulturgeschichte 195.
 —, Nebentrone 195.
 —, Pflege 195.
 Narcissus 170.* 194.
 —, Arten 194.
 — Jonquilla L. 194.
 — poeticus L. 195.
 — pseudonarcissus L. 195.
 — Tazetta L. 194.
 Nathanjung 433.
 Nathanjung 37.
 Nawadhin 58.
 Nebentrone bei Narzissen 195.
 Nectria ditissima 492.
 Neebham 198.
 Nees 150.
 Nektarium bei Ranunculus 383.
 Nefse 318.
 Nefsen als Zimmerpflanzen 326.
 —, Biologie der 323.
 —, Kultur 326.
 —, Schalen der 343.
 Nefsenblüte, Nefsen der 318.
 —, Blütenbau der 319.
 —, Blütenbiologie der 321.
 Nefsenformen 326.
 Nefsengewächse 317.
 — als Überlebensbewohner 324.
 —, Frucht der 324.
 Nefsenpreise 326.
 Nefsenstiel, Weißmantel-fische 326.
 Nefsenwurzel 246.
 Nelumbium 340.
 —, Blütenbiologie 342.
 —, Buchii Pitt. 329.
 —, Gartenformen 342.
 —, Syniden 342.
 —, Luftblätter 331.
 —, Internum 342, 343.

Nelumbium, Samen 333.
— speciosum, Kultus von 342.
Nelumbo 329.
Nelumboidae 329.
Nemec 38.
Neottia 226, 277.
Nephrodium 19.
Nephrolepis 16.
— acuta 16.*
Nervenzellen der Tiere, seine Reizbarkeit der 455.
Nervilla 212.
Nesselgewächse 269.
Nessler, M. 352, 353.
Nestour 226.
Niedenzu 477.
Nierenfarn 16.* 19.
Nieswur 202.* 353.* 357.
—, Artenzahl 354.
—, grüne 357.
—, schwarze 357.
—, stinkende 357.
Nigella 349, 360.
—, Artenzahl 354.
—, arvensis 360.
—, Blütenbiologie von 361.
—, Nymphaeaceae bei 361.
—, damascena, Entwicklung der Frucht bei 350.*
—, — 360.*
—, Fruchtbildung 361.
—, sativa 361.
Nigritella 221.
— angustifolia Rich. 223, 226.
Noll 335.
Norfolkfichten 64.
Nostor-Algen 34.
Nuphar 329, 333.
—, advena 335.
—, biologische Unterschiede von Nymphaea 335.
—, Blütenbiologie 334.
—, cornuta 336.
—, gigantea 336.
—, intermedium 335.
—, Lotos 336.
—, luteum 323.* 330, 335.
—, —, untergetauchte Blätter bei 330.
—, pumilum 335.
—, Schwimmblätter 331.
—, stellata 336.
Nutation als Beweismittel für Psychobiologie 263.
Nymphaea 329, 333.
—, alba 333.* 334, 338.
—, — rosea Fries. 340.
—, rubra 340.
—, amazonum 333.
—, Arten von 335.
—, biologische Unterschiede von Nuphar 335.
—, biradiata 340.
—, Blütenbiologie 334.
—, candida 338, 340.
—, Charpentieri Mr. 329.
—, dentata 338.
—, fennica 338, 340.
—, Gladstoniana 340.
—, Feld von 335.
—, odorata 340.
—, parvula Sap. 329.
—, Samenmantel der 335.
—, Schaulapparat von 335.
—, thermalis 337.*
—, tetragona 338.
—, tuberosa 340.
Nymphaeaceae 328.
Nymphaeaceen 328.
—, Anatomie 332.
—, Bastardbildung der 335.
—, Biologie der 331.
—, Blattbildung 330.
—, Blütenbau 330.
—, Blütenbiologie der 334.

Nymphaeaceen in der Blumenbinderlei 343.
—, Keimfähigkeit der 338.
—, Keimung bei 333.
—, Kreuzungsfähigkeit der 335.
—, Systematik der 330.
—, tropische Formen 329.
—, Verbreitungseinschränkungen der 334.
—, Verwendung der 343.
—, Wurzelstod der 330.
Nymphaeaceen, Kultur der 338.
Nymphaeoidae 329.
Nyctaginaceen 315.
—, Wurzelstod der 330.
Obst, Aufbewahrungsart 492.
Obstausfuhr, Handelsstatistik der 493.
Obstbäume, Züchtungen junger 489.
Obstbaum, Flechtenbefall 489.*
Obstbaumpfleger 488.
Obstbaumzucht 488.
Obstleinfuhr, Handelsstatistik der 493.
Obstgenuss 492.
Obstkultur, Ausbreitung in Deutschland 477.
— in Nordamerika 477.
Obstmade 493.
Obstwirtschaft, Bedeutung von Ribes für die 474.
Obstauch, in U-Form 490.
—, Kordon 490.
—, Palmetten 490.
—, Spalter 490.
—, Zwergebäume 490.
Ochrea 292.
Odontoglossum 229.
—, crispum 207, 231.
ökologische Konvergenz 425.
—, Pflanzengesellschaft 377.
Ökologismus der Pflanzen 176.
Ölflehen 431.
Ölbaum 243.
Ölpflaster 118.
Oetli, M. 424, 466.
Oncidium 215, 217, 223, 229.
—, varicosum 214.
Onoclea Struthiopteris 19.* 23, 32.
Ophioglossaceae 37.
Ophioglossales 16, 37.
Ophioglossum 16, 37.
—, Mykorrhiza 37.
—, pedunculatum 37.*
Ophrydineen 220.
Ophrys 220, 221, 291.
—, apifera L. 221.
—, aranifera Huds. 221.*
—, muscifera Huds. 221, 222.
Ophrys-Arten 221.
Orchideen 206.
—, Ableitung 210.
—, Arten 229.
—, Artenzahl 208, 219.
—, Artenzerpflüchterung 223.
Orchideenausstellung 206.
—, Basalfuß 211.
—, Bedürfnisanpassungen 214.
—, Befruchtung 216.
—, biologische Variabilität 223.
—, Blattfall 213.
—, Blütezeit 215.
—, Glanzbewegungen der Lippe 217.
—, Charakter 223.
—, Früchte 218.
—, Insektenmimikry 221.
—, Keimung 218.
—, künstliche Befruchtung 208.

Orchideen, künstliche Kreuzung 208.*
—, Literatur 210.
—, Luftgewebe 213.
—, Luftknollen 213.
—, Merkmale 210.
—, Nektarfunktionen 216.
—, Nektarabsonderung 217.
—, Perzeptionsorgan 216.
—, Pseudomorphie 218.
—, Protomer 218.
—, Refpiration 228.
—, Rhizome 211.
—, Sämlinge 209.
—, saprophytische 277.
—, Scheinzwiebeln 213.
—, terrestrische 212.
—, trigonische Arten 208.
—, Velamen 213.
—, Wurzeln 213.
Orchideenarten 229.
Orchideenblüte, Lockmittel 217.
—, reißbare Lippen 217.
—, Rutenhaare 217.
—, Dauer 217.
—, aktive Bewegungen 215.
Orchideengattungen 222.
Orchideenhandel 231.
Orchideenhäuser 231.
Orchideenhäuser 231.
Orchideenhaus 210.
Orchideenindustrie 230.
Orchideenkultur 219.
Orchideenfunde, Gesellschaft für 210.
Orchideenpresse 207.
Orchideensamen 218.
Orchideenzucht 209, 218.
Orchideae sympodiales 212.
Orchis 210, 220, 222.
—, Bau 211.
—, Blütenbau 214.
—, Blütenrichtung 216.
—, (coriophora) 217.
—, latifolia 211.*
—, maculata 211, 215.*
—, mascula 211.
—, morio 211, 214.*
—, Pollinien 215.
Orchis-Arten 211.
Organbildung und Bedürfnis im Pflanzenreich 296.
Ornithidium, Blütenwachs als Lockmittel 217.
Ornithogalum lacteum Jacq. 186.
—, latifolium 186.
—, umbellatum 186.*
Orbanche ramosa 269.
Oryza (sativa) L. 146.
Osmunda 18, 37.
—, regalis 15.* 31.* 32.
—, Vorkeim von 32.
Osterblumen 195.
Osterluzet 287.
Ostrya carpinifolia 247.
Ouvirandra fenestralis 120.
Oxyria 295.
—, digyna 294.
Padua, botanischer Garten 476.
Paeonia 354, 355.*
—, Adventsprossbildung bei 354.
—, albiflora 356.
—, arborea 356.*
—, corallina 352, 354.
Paeoniae 353.
Paeonia, Kulturregeln der 355.
—, Moutan Sims. 354.
—, officinalis L. 354.
—, tenuifolia 352, 355.
—, Veredelungen der 356.
Palmenwald 20.
Palmettenbäume 490.
Palmschäben 237.

Palmstiele 186.
Pampas 127, 305.
Pampasgras 144.*
Pandanus 115.* 116.
—, furcatus, Stelzengerüst 116.*
—, Luftwurzeln 117.
Panicum 138.
Papaveraceen 417.
Paphiopedilum 217, 220.
—, caudatum 220.
—, concolor 230.
Papiermaulbeerbaum 262.
Papilionaceen 460.
Pappel, Etymologie 240.
—, tanabische 239.
—, Meiserausschlag 240.
Papyrusstauden 150, 151.*
Paracolla der Narzissen 195.
Parietaria officinalis 271.*
Paris, Blütenbiologie 191.
—, quadrifolia L. 189, 190.*
Parnassia als Beweis für Pflanzenpsychologie 470.
—, Blütenbiologie 469, 470.
—, Instinkthandlung 470.
—, palustris 468.
—, gamotrope Bewegungen von 469.
Patin, G. 57.
Paronchies 324.
Pistorenbirne 495.*
Pax 318.
Pechne 323.*
Pedagnuoli 258.
Pellagra 146.
Pennisetum benthami 126.*
Perianth 318.
Perizwiebel 176.
Perzeption des Lichtes bei den Pflanzen 434.
Perzeptionsorgan der Orchideen 216.
Peters, H. 29.
Petersen 206.
Petrocallis pyrenaica 425.
Peziza Willkommii 81.
Pfeffer 306.
Pfefferrohr 130.
Pfefferstrauch 235.
Pfefferstrauch 470.
Pfeiffer 121.
Pfeifferstrauch 423, 427.*
Pfeifferstrauch 354.
Pfeifferbaum, Ökologie 523.
Pfeiffer, G. 210, 216, 219.
Pfeifferstrauch 488.
Pfeiffer 98, 240, 252.
Pfeiffer 490.
Pfeiffer, Aktivität der 321.
—, Empfindung der 457.
—, Entscheidungsfähigkeit der 457.
—, Seelenleben der 457.
—, Variationsfähigkeit der 427.
Pflanzen, allotrope 321.
—, älteste aller 93.
—, Aquarienbewohner 121.
—, Beseelung der 456.
—, entropie 321.
—, Fleischverdaunende 450.
—, Gegenreaktion bei 435.
—, hemitrope 321.
—, Perzeption des Lichtes bei 434.
—, Reizwirkungen von Gasen auf 435.
—, selbstregulatorischer Vorgang bei 435.
—, Selbsttätigkeit bei 259.
Pflanzenformation 378.
Pflanzenkunde im Quartär 259.
Pflanzengeossenschaft, pontische 378.

- Pflanzengeographie Australiens 274.
 —, physiologische 273.
 pflanzengeographische Verhältnisse der Polygonaceae 294.
 Pflanzengesellschaft, ökologische 377.
 —, Innenleben 176.
 —, Insektenfressende 450.
 Pflanzenmilch 260.
 Pflanzennerven 38.
 Pflanzenphysiologie, Abkürzungen der inneren Befähigung 383.
 —, Aconitum als Beweis für 368.
 —, Aristolochia als Beleg für 289.
 —, Verechtigung 264.
 —, Biscutella laevigata als Beweis für 421.
 —, Clematis als Beweis für 380.
 —, Corydalis als Beweis für 403.
 —, Dicotyla als Beweis für 401.
 —, Funktionswechsel nach Bedürfnis 383.
 —, Lepidium sativum als Beweis für 418.
 —, Parnassia als Beweis für 470.
 —, Ranunculus als Beweis für 382.
 Pflanzenzucht 22.
 Pflaume, Ökologie 522.
 —, Rassen 523.
 Phänologische Gruppe 377.
 Phalaenopsis Lowii 230.
 Phalaris 138.
 Phanerogamen 53.
 Phaeopteris 10.*
 Phagopterus 12.
 Philadelphus coronarius L. 470.
 —, latifolius Schrad. 471.
 —, Ökologie 471.
 —, Wundenablösung 471.
 Philodendron 157.
 —, pertusum 159.
 Phileum alpinum 136.*
 Phormium tenax 176.
 Phyllospadix Scouleri Hook 119.*
 Phyllostachys 131.
 phylogenetische Anatomie 56.
 — Morphologie 56.
 physiologische Anatomie der Chenopodiaceen 304.
 — Pflanzengeographie 273.
 Phytolacca decandra 315.
 Phytolaccaceen 315.
 Picea excelsa Link 81.
 —, pungens glauca 102.*
 —, sitchensis 102.
 —, succinifera Como 87.
 —, var. viminalis 85.
 Pitoffen 326.
 Pilea microphylla 271.
 —, muscosa 271.
 Pflentraut 36.
 Pillularia 9.
 —, globulifera 36.
 Pinetum 102.
 Pinoideae 66.
 Pinus Banksiana 102.
 —, Cembra L. 76.
 —, densifolia 101.*
 —, Laricio 65.*
 —, austriaca 68.
 —, halepensis 74.
 —, montana 70, 75.
 —, nigra 68, 69.*
 —, pinea 68, 77.
 —, ponderosa 74.
 Pinus silvestris 68, 71.*
 —, Strobus 74.
 —, Taeda L. 74.
 —, Thunbergii 101.*
 Pipal 260.
 Piper nigrum 235.
 Bismarck 491.*
 Pirola rotundifolia 228.*
 Pirophorum 485.
 Pirus 478.* 485.
 —, achras Gärtner. 495.
 —, cordata 495.
 —, dasycarpa 487.
 —, persica Pers. 495.
 —, pumila 487.
 —, silvestris 487.
 Pissang 205.
 Pistia Stratiotes 158.
 Pittosporaceae 475.
 Planorbis 166.
 plasmatische Empfindungs-fähigkeit 300.
 Plasmodemesen 457.
 Plasmolyse 315.
 Platanaceen 475.
 Platanus 476.
 Platanthera 221, 223.
 —, bifolia Rich. 223, 224.*
 —, Hookeri Lindl. 224.
 —, hyperborea Lind. 225.
 Platanus 475.
 —, alte Bäume 475.
 —, Blütenbiologie 477.
 —, occidentalis 475.
 —, Ökologie 476.
 —, orientalis 475.
 Platycerium 13.
 —, alcinore Desv. var. Hilli Moore 13.*
 Platycerium biforme Blume 13.* 14.
 Pleiomorphie der Orchideen 218.
 Plinius 259.
 Pneumathoden 61, 93.
 Poa 137.
 —, alpina 143.*
 —, annua 297.
 —, bulbosa 143.
 —, pratensis 137.
 —, stricta 143.
 Pöppig 341.
 Poinsettia 468.
 Pollenhammer 62.
 Pollenform, Definition 54.
 Pollenmutterzellen bei Ranunculaceen 352.
 Pollenfad, Definition 54.
 Pollinien der Orchideen 215.
 Polowgen, B. 435.
 Polsterpflanzen 424.
 Polsterwuchs 425.
 Polycarpaceae 347, 351, 417, 460.
 Polygonaceae 292.
 —, Blütenbiologie 295.
 —, pflanzengeographische Verhältnisse der 294.
 —, Verbreitungseigenschaften der Früchte 295.
 Polygonales 292.
 Polygonatum multiflorum All. 189.
 —, officinale All. 189, 190.*
 —, verticillatum 189.
 Polygonum 392, 293.*
 —, amphibium 293, 298.
 —, Anatomie von 298.
 —, bedürftisgemäße Anpassung bei 298.
 —, Blütenbiologie 299, 300.
 —, heterostyle Blüten bei 300.
 —, Anpassung an Standortverhältnisse 292.
 —, aviculare 293.
 —, Bistorta 296.
 Polygonum, Brutknoschen 297.
 —, Convolvulus 263, 293.
 —, cupulatum 301.
 —, Eragrostis 301.
 —, Fruchtbildung 296.
 —, viviparum 297.
 Polyopodiaceae 18.
 Polypodium aureum 31.
 —, lepidopteris Kunze 29.*
 —, quercifolium 14.
 —, vulgare L. 15.* 23, 30.*
 —, var. trichomanoides 30.*
 Polyrhiza funalis 214.
 Polystichum 19, 20.
 Pomologie 490.
 Pontederiaceen 168.
 Populus 239.
 —, alba L. 239, 241.
 —, als Parkbaum 241.
 —, canadensis Mch. 239, 241.
 —, große Bäume 240.
 —, italica Mch. 239.
 —, nigra L. 239.
 —, pyramidalis 239.
 —, Stodauschlag 241.
 —, tremulata 239.
 Porée 178.
 Porphyron 467.
 Porphy, D. 56, 57, 59, 104, 217, 219.
 Portulacca grandiflora 316.
 Portulac 316.
 Portulacaceen 316.
 Posidonia oceanica L. 119.*
 Potamogeton 117.
 —, acutifolius 117.
 —, Anpassungsfähigkeit 119.
 —, Anatomie der Blätter 118.
 —, Atemhöhlen der Blätter 118.
 —, Bau der Blätter 118.
 —, Blütenleben 118.
 —, coloratus 118.*
 —, compressus 118.*
 —, crispus 118.*
 —, densus 118.*
 —, diversifolius 119.
 —, fluitans 118.*
 —, glatte Zweige 118.
 —, Kleisigamie 119.
 —, lanceolatus 118.
 —, longifolia 118.
 —, lucens 117.
 —, natans 117.
 —, pusillus 118.*
 Potentilla 478.*
 Potentillae 496.
 Potentillenfarbe 480.
 Potonié 10.
 Prachtstiele 181.
 Prachtstiele 321.
 Prachtstiele 326.*
 Prärien 127, 308.
 Präsentationszeit 419.
 Prantl 353, 416.
 Primula elatior 362.
 Bringsheim 433.
 Brigel 44.
 Prochi 258.
 Bronia 187.
 Prostraw, G. v. 311.
 Prosopis als Sonstiges 199.
 Protea 274.
 —, als Vogelkutter 275.
 Proteales 275.
 Proteaceen 272.
 —, als Trockenheitspflanzen 273.
 —, als Xerophyten 273.
 —, Artenzahl 274.
 —, erlösende Typus 273.
 —, geographische Bedeutung 273.
 Proteaceen, Hartlaubgewächse 273.
 —, pinobiter Typus 273.
 Protoform der Orchideen 218.
 Prunoidae, Gummibildung 480.
 Prunus 460, 478.*
 —, Amygdalus 519.
 —, Armeniaca 519.
 —, Avium 519, 521.
 —, Cerasus 519.
 —, domestica 522.
 —, italica 519.
 —, laurocerasus 526.
 —, Mahaleb 521.
 —, oconomica 522.
 —, spinosa 519.
 —, triloba 524.
 Pseudacanth 369.
 Pseudocorolla bei Narzissen 194.*
 Pseudotsuga Douglasii 102.
 Pflanzliche Bedingtheit der Reaktion, Analogieschluss auf die 420.
 — Ursachen von Pflanzenbewegungen 289.
 Pflanzbiologie 454.
 —, Aristolochia als Beweis für 289.
 —, Mutation als Beweismittel 263.
 —, Versuche an Naps als Beweis für 435.
 Psycho-physische Gefühle, Gleichförmigkeit 419.
 Pteridium 19.
 —, aquilinum 11.* 19.* 27.
 Pteris chinensis 29.
 —, cretica L. 29.
 —, Gartenformen 29.
 —, lineata 29.
 Pterostylis 217.
 Pterostylis, reizbare Lippen 217.
 Pulque 196.
 Pulsatilla 349.* 350, 372.
 —, biologische Anpassungen 378.
 —, Blütenbiologie 376.
 —, Formation der fönigen Gügel 378.
 Puntfarn 19.
 Pundt, G. de 210.
 pythagoreische Bohnen 329.
 Quartär, Pflanzenkunde 259.
 Quercus, Kussläufer 135.
 Queller 302.
 Quellerwiese 307.*
 Quercus 250.
 —, Artenzahl 250.
 —, Bau der Blüte 253.
 —, Biologie 252.
 —, Cerris L. 250.
 —, Eichenbegleiter 252.
 —, Eichenengenschaft 252.
 —, Gallen 252.
 —, Gallsen 252.
 —, Hauptverbreitung 251.
 —, Selma 250.
 —, Flex L. 250.
 —, Knoppert 252.
 —, occidentalis Gay 250.
 —, pedunculata Ehrh. 250.
 —, Stenobäume 252.
 —, Robur L. 250.
 —, sessiliflora Sm. 250.
 —, Suber L. 250.
 Quitt 483.
 Naciborski 265, 331.
 Radieschen 437.
 Radix polyodii 30.
 Radlofer 447.
 Radlesia 460.
 Raimbert 365.
 Ramifaser 272.

- Ranunculaceae 348.
 —, Artenzahl 348.
 —, äquifolige Stellung der Blütenstiele 347.
 —, Blätterstellung 350.
 —, Blütenbau von 348.
 —, Charakteristik der 347.
 —, zylindrische Stellung der Blütenstiele 347.
 Ranunculagen, Anatomie der 352.
 —, Bauverhältnisse der 350.
 —, Blattdimorphismus der 351.
 —, Blütenbau 352, 353.*
 —, Blütenhaare der 353.
 —, Erneuerungsspross der 350.
 —, Fruchtbau der 349.
 —, Keimblattbildungen bei 352.
 —, Knollenbildung bei 350.
 —, Pollenmutterzellen bei 352.
 —, Stammbaum der 351.
 —, Systematik 353.
 —, Verbreitung der 348.
 —, der Früchte 349.
 —, durch Tiere 350.
 —, Wasserpalten an den Blättern der 352.
 Ranunculus, Abflutungen der inneren Befähigung bei 383.
 —, acer 350, 382.
 —, als Beweis für Pflanzenphysiologie 382.
 —, aquatilis 351.*
 —, arvensis 382, 383.
 —, auricomus 382, 383.
 —, Ausläufer von 384.
 —, (Batrachium) aquatilis 351.
 —, hians 351, 353.
 —, Blütenbiologie von 382.
 —, bulbosus 350, 382, 384.
 —, Drüsenhaare von 353.
 —, Etymologie von 382.
 —, Ficaria 384.
 —, Flammula 384.
 —, hians 351.
 —, Funktionswechsel nach Bedürfnis 383.
 —, Giftstoffe als Schutzmittel 383, 384.
 —, lanuginosus 382, 384.
 —, als Buchenbegleiter 254.
 —, Wasserpalten bei 352.
 —, Morphologie 382.
 —, Nektariumbildung 383.
 —, repens 352, 384.
 —, scleratus 382, 384.
 —, Schutzwaffen 384.
 —, Untergattung Ficaria 384.
 —, Verbreitung von 381.
 —, Wasserpalten bei 352.
 —, Raphanus 409, 416.* 437.
 —, griseus 437.
 —, niger 437.
 —, radicola 437.
 —, Raphanistrum 416, 437.
 —, sativa 437.
 —, sativus 407.
 Raps 431.
 —, biologische Eigentümlichkeit des 433.
 —, Kultur 432.
 —, zentripetale Wasserzuführung beim 433.
 Rapskohl 431.
 Raupenfackel 493.
 Raufe 426.
 Raufenfenz 405.* 427.*
 Ravenala madagascariensis 205.
 Rechtswinden 263.
 Reeb 466.
 Regenerationskraft von Delphinium 371.
 Regulationseintrichtungen bei Aristolochia 289.
 regulative Plastik im Bau der Botanogonoblasten 118.
 Reichenbach 119, 210.
 Reichenbachia 210.
 Reinecke 20.
 Reinte 352.
 Reiss 146.
 Reiseranschlag der Pappeln 240.
 Reissgenus 146.
 Reizfortleitung bei Drosera 463.
 Reizleben, pflanzliches 300.
 Reizleitung bei Drosera 462.
 Reiznachwirkung 419.
 Reizung, heliotropische 434.
 Reizverwertung der Lannennadeln 87.
 Reizwirkungen von Gasen auf Pflanzen 435.
 Remontanten 326.
 Remontantrosen 514.
 Reseda 447, 449.
 —, alba 450.
 Resedaceae, Blütenbau 448.
 —, Morphologie 448.
 —, lutea 450.
 —, luteola 450.
 —, odorata 447, 448.*
 Resedaceen 447.
 Respiration bei Orchideen 328.
 Rettich 416.* 437.
 Rhubarber 293, 294.*
 —, als Gartenpflanze 293.
 Rhubarbergemüse 293.
 Rhamnus frangula 246.
 Rheinfaser 272.
 Rheum 294.*
 —, als Gartenpflanze 293.
 —, officinale Baill. 293.
 —, palmatum 293.
 —, Rhaiponticum L. 293.
 —, undulatum 293.
 Rhizoma Calami 161.
 —, Filicis 22.
 Rhizome der Orchideen 211.
 Rhoeoadales 417.
 Rhynchospora 150, 154.
 Ribes 472.
 —, alpinum L. 473, 474.
 —, als Ziersträucher 473.
 —, aureum 473, 474.*
 —, Artenzahl 473.
 —, Bedeutung für die Obstwirtschaft 474.
 —, Blütenbiologie 474.
 —, divaricatum Dougl. 474.
 —, domesticum 474.
 —, glaciale 473.
 —, grossularia L. 473.
 —, Ribes-Grantarbeiten 474.
 —, Ribes luidum 473.
 —, nigrum L. 473, 474.
 —, Oologie 473.
 —, petraeum Wulf. 473.
 —, rubrum L. 473, 474.
 —, sanguineum 474.*
 Ribisel 474.
 Ricca 381.
 Richard 62.
 Richardia 161.
 Riedformation 155.
 Riedgräfte, Abflutung 150.
 —, Artenzahl 150.
 Riehm 439.
 Riemenblume 275, 279, 283, 286.
 Riesenbuche bei Alen 253.
 —, Birnbaum 253.
 Riesenbuche bei Mönchs-
 molschelt 253.
 —, in der Oberförsterei Neu-
 stadt 253.
 Riesenbuden im Speffart 253.
 Riesenelchen 252.
 Ristien im Lufabab bei
 Budapest 337.
 Riten 187.
 Rindenwurzeln von Vis-
 cum 281.
 Rittenfarn 19, 32.
 Rittenfarn 148.
 Rittenfarn 353.* 369.
 —, Abhängigkeit der Wü-
 stenfarbe von der Wü-
 stensalinität 371.
 —, Anpassung an trockene
 Standorte 371.
 —, Artenzahl 364.
 —, Blütenfarbe 371.
 —, Unkraut 371.
 Robertfon 370, 376.
 Römer, J. 200, 376.
 Roggen, alte Stichen 262.
 Roggen 145.
 —, Stammart 148.
 —, wilder Zustand 145.
 Roggengerle 147.
 Roggenfollen 114.* 116.
 Rosa Banksiae 513.
 —, canina 513.
 —, centifolia 513.
 —, cinnamomea 480.
 —, gallica 513.
 —, hybrida 514.
 —, indica 513.
 —, pimpinellifolia 513.
 —, semperlorens 513.
 Rosalee 460.
 Rotarien 516.
 Rosagen, Anatomie 480.
 —, Früchte der 478.*
 —, farpologische Sammlung
 von 479.
 —, Pflanzengeographie 480.
 —, Systematik 480.
 —, vegetativer Aufbau 479.
 —, Verwandtschaftsmerk-
 male 479.
 Rosenapfel 490.
 Rosenmeltau 519.
 Rosenfobl 429, 430.*
 Rosenfobl 517.
 Rosenföde 517.
 Rosenfucht 516.
 Rosettenbildung bei Pfan-
 zen 433.
 Rosetten-Felsenpflanzen
 444.
 Rosettenpflanzen 424.
 Rose, Oologie 509.
 —, volkswirtschaftliche Be-
 deutung 478.
 Rosmarin 491.*
 Rosmarinapfel 490.
 Rotdorn 482.
 Rothert, W. 138.
 Rotkraut 429.
 Roter 369.
 Ruderalpflanzen 270.
 Rübe, rote 311.
 Rübenraffen, Stammpflan-
 ze der 311.
 Rübenabfärbart 376.
 Rübol 431.
 Rüblamen 431.
 Rüblen 431.
 Rüffelfäfer in der Fafel-
 nuf 248.
 Rüster 255.
 Rubus 478.* 480, 496.
 Rumex acetosa 295.
 —, acetosella 295.
 —, als lamarktisches
 Phänomen des Funk-
 tionswechsels 295.
 Rumex bucephalophorus 295.
 —, scutatus 294.
 —, vesicularis 295.*
 —, var. articulatus 296.
 Rutenfrühe 311.
 —, Zudergerhale der 311.
 Ruppia 119.
 Rupprecht 119.
 Ruscus 188.
 —, aculeatus 189.
 —, androgynus 188.*
 Ruffeger, J. v. 79.
 Ruftau 266.
 Ruftaupfl., als Hopfen-
 feind 266.
 Ruta 469.
 Ruyfch Rachel 184.
 Saager Hopfen 266.
 Saeccharum officinarum 131.
 132.*
 Sack 38, 56, 280, 372.
 Sadebeck 23, 40, 42.
 Saurich 22, 438.
 Safran 201.
 —, echter 201.*
 Sagittaria Montevicensis
 121.
 —, sagittifolia 121.
 Sagopalme 61.
 Salamander 326.
 Salicines 236.
 Salicornia 302, 306, 308.
 —, herbacea 308.
 —, macrostachya 307.
 —, sarmentosa 307.
 Salix 236.
 —, alba 239.
 —, babylonica L. 239.
 —, Blütenbiologie 237.
 —, caprea 237.*
 —, fragilis 239.
 —, purpurea 239.
 —, repens 238.
 —, reticulata 237, 238.
 —, retusa 238.
 —, viminalis 238.
 —, vitellina 239.
 Salomonsinseln, Flora der
 294.
 Salomonsfegel 189.
 Salsola 304.*
 —, Kali L. 306.
 Salsolen 302.
 Salvinia 9.
 —, natans 33.*
 Salweide 237.
 Salzgebiete 308.
 Salztraut 306.
 Salzpflanzen, Anpassungen
 der 305.
 Salzleppen 308.
 Samenanlage der Anglo-
 spermen 109.
 Samen, Definition 54.
 Samenmatte 100.
 —, der Nymphaea 335.
 Sander 210.
 Sanders 207.
 Sandneffen 325.
 Sandroggen 147.
 Sanguis als Buchenbeglei-
 ter 254.
 Santalales 275, 287.
 Saponaria 317.
 —, oeymoides 320.
 Saporta 329.
 Saprophten 212.
 Sarragenen 453.
 Satansfinger 211.
 Sauerampfer 295.
 Sauerborn 460.
 Sauertraut 429.
 Saurotram 157.
 —, guttatum 161.
 —, pedatum 161.
 —, venosum 161.
 Saurbaum 308.
 Saxifraga 465.

- Saxifraga aizoides* 465.
 — *Aizoon* 465, 466.
 — als Schuttdede 467.
 — *bullifera* 465.
 — *caesia* 467.
 — *Cotyledon* 466.
 —, *Etymologie* 465.
 — *flagellaris* 465.
 — *granulata* 465.
 —, *Morphologie* 465.
 —, *Otologie* 467.
 — *oppositifolia* 467.
 —, *Pflanzenanatomie* 465.
 — *rotundifolia* 466.
 — *sarmentosa* 467.
 — *stellaris* 465, 466.
 —, *Blutenbiologie* 465.
Schachtelhalm 38.
Schachtelhalme, *Anatomie* 40.*
 —, *Fortpflanzung* 40.*
 —, *Spaltöffnungen* der 41.
Saxifragaceae 464.
Schaffdingel 137, 139.
Scharbockstrauch 384.
Schattenblümchen 189.
Schamkraut 439.
Schröter 425.
Scheinfüchte 486.
Schneidgräser 149.
 —, *Blüten* 150.*
Schneizwiebeln der Orchideen 213.
Scheitelzelle 56.
Schenk, G. 7.
Schilberisfisch 337.
Schilbfarn 20, 21.
Schilbarme 23.
Schilffaser als *Verstärkungsmittel* der *Wasserrofen* 334.
Schilfrohr 140.*
Schilling 350.
Schimper, F. W. 167, 273, 306.
Schindler 311.
Schizoneura lanigera 493.
Schlammfischschutthalm 39.
Schlangenfische 85.
Schlangenfische 70.
Schlangenfisch 296.
Schleiden, *Zaf.* 92, 153, 165.
Schleier der *Farne* 15.*
Schleuderapparat zur Ausbreitung der Samen 316.
Schleiffrucht 416.
Schmell 70, 140, 193, 197.* 486.
Schmiele 137.
Schmucklilien 173.
Schneefledflora 377.
Schneeglöckchen 192.
Schnittlauch 178.
Schoenus 164.
Scholz 70, 98, 124, 245.
Schorfholz 492.
Schote, *Definition* 415.
Schotenbutter 427.*
Schraubenbaum 115.
Schröter 75, 294, 296, 297, 298, 321, 368, 374, 375, 376, 377, 381, 423, 467.
Schülferhaare 447.
Schuttdede, *Saxifraga* 467.
Schuttkresse 418, 426.
Schuttkraut 423.
Schuttkübelrieder 444.
Schuttkübelrieder gegen die *Kälte* bei *Pflanzen* 426.
Schulz 376, 381, 439, 441.
Schumann 100.
Schuttwaner 423.
Schwabenblume 121.
Schur 200.
Schwappack 102, 251, 253.
Schwarzjerle 245.
Schwarzstummel 360.
Schwarzpappel 239.
Schwebefliegenblumen 291.
Schweibler 407, 416.
Schweintraut 166.
Schwellkörper der *Gräser* 140.
Schwendener, C. 118.
Schwertlilie 197.
 —, *Diagramm* der 411.*
Schwimmapparat von *Azolla* 34.
Schwimmantel der *Wasserrofen* 334.
Sella 185.
 — *amoena* 185.
 — *autumnalis* 185.
 — *bifolia* 185.
 — *maritima* 185.
 — *peruviana* 185.
Scirpus 150, 154.
 — *fluitans* 154.
 — *lacustris* 150.*
 — *littoralis* 150.*
 — *uniglumis* 154.*
Sclerotinia fructigena 492.
Scopolendrium 16.
 — *vulgare* 23.
Scott, E. 203.
Scutellum 144.
Sedum 461.
 — *boloniense* 463.
 — *Telephium* 464.
Secale cereale 145.
 — *fragile* 147.
 — *montanum* 148.
Seebäumen 338.
Seegräser 119.*
Seegrass 117.
Seegrasswiesen 119.
Seelenleben der *Pflanze* 467.
Seerose 329, 535.
Seerosen, *winterharte* 340.
Segge 152, 153.
 —, *steife* 153.
Seghers, D. 184.
Seifenkraut 317.
Selektionen, *innere* als *Ursache* der *Wachstumsfortleitung* 84.
Selaginella 8.* 9, 45, 56.*
 — *erythropus* 46.*
 — *Golenchoti* 46.*
 — *helvetica* 47.*
 — *lepidophylla* (Hook.) *Spring* 47.* 48.
 — *selaginoides* 47.*
Selaginellaceae 45.
Selbstbestäubung der *Gräser*, *Vermeldung* 141.
 — von *Corydalis* 402.
 — von *Dicentra* 401.
Selbsttätigkeit, *pflanzliche* 259.
Selbstregulatorischer Vorgang bei *Pflanzen* 435.
Selektion 321.
 —, *künstliche* 313.
Selektionstheorie 270.
Semen Lycopodii 45.
Sempervivum 460, 462, 465.
 — *arachnoideum* 461.
 — *caespitosum* 463.
 —, *Sturzwild* 461.
 —, *Langtriebe* 461.
 — *montanum* 461.
 — *tectorum* L. 461.
Senebiera 415.
Senf 436.
Senf, *schwarzer* 432.
 —, *weißer* 436.
Septaldrüsen bei *Galanthus* 492.
Sequola 59.* 90.* 102.
 — *gigantea* 90, 95.*
 —, *schönste Deutschlands* 92.
 — *sempervirens* 90.
Sernander 359.
Sesleria coerules 139.
Setaria 138.
 — *italica* Beauv. 145.
Shaw 36.
Siah-Dag 361.
Siegwurz 119.* 203.
Sigillaria 10.*
Sigillarien 9.
Silberbaum, *Kapland* 274.
Silberblatt 442.
Silberblattfichte 102.*
Silberpappel 239, 241.
Silberfische 442.
Silene 317.
 — *acaulis* 318.
Silene-arten 327.
Silene inflata 322, 323.
 — *muscipula* 322.
 — *nutans* 322, 323.
 — in *Nachtstellung* 322.*
 — in *Nachtstellung* 322.*
 — *viscosa* 323.
Silenobiden 317.
 —, *Verbreitung* der 324.
Silicula 416.
Siliqua 416.
Sims 154.*
Sinapis 432.
 — *alba* 416.* 433, 436.
 — *arvensis* 436.
 — *nigra* 432.
 — *retrofracta* 436.
Sinnesorgan der *Gräser* 138.
Sinnesorgane der *Drosera* 456.
Sisalban 176.
Sisymbrium 406, 426.
 — *officinale* 405.* 426, 427.*
 — *sophia* 418, 426.
Smalian 357, 374.
Sodabereitung 310.
Sohns 42, 45.
Solanum dulcamara 246.
Soldanella 377.
Solms-Laubach 58, 256, 258, 293.
Sommerreife 250.
Sommerreife 442.
Sommerraps 431.
Sommerrettich 437.
Sommerrögen 148.
Sommerrüben 431.
Sommertürchen 193.
Sommerröze 269.
Sonnentau 450.
Sorusbildungen der *Farne* 19.*
Sori 13.
Spalierbäume 490.
Sparganium ramosum Huds. 116.
 — *simplex* 114.*
Spatha der *Urticeen* 157.
 — der *Bromeliaceen* 166.
Spargel 188.
Spelt 148.
Spergula arvensis 328.
Sperk 328.
Spermatophyten 53.
Sphaerotherca mors uvae Berk 475.
Sphenophyllum 9, 10.*
Sphenophytus 10.*
Spiralstaude 480, 481.
Spinacia 309.
 — *oleracea* 310.*
Spinat 309, 310.
Spinnenstängel 221.
Spiraea 479, 480.
 — *Aruncus* 481.*
 — *salicifolia* 480.
Spiranthes 227, 228.
 — *aestivalis* Rich. 228.
 — *autumnalis* Rich. 228.
Spirodela 165.
 — *polyrrhiza* 165.*
Spigelmeyer, *Anatomie* des *Stammes* 112.
 —, *Blätter* der 112.
Spontanität im *pflanzlichen* *Leben* 435.
Sporangien, *Morphismus* 55.
Sporen der *Farne* 15.*
Sporophylle 24.
Sporophyt 9.
Sprengel, G. Chr. 469.
 — St. 225, 228.
Stachelbeere 472.
Stachelbeermelldau 475.
Staminoblen 381.
Stanhopea 218, 229.
Stapella 359.
Statoxystenorgan der *Gräser* 137.
Staubblätter, *Definition* 54.
Staubblätterpollen der *Brennerei* 271.
Staurostigma 163.
Stein, B. 459.
Steinbrech 465.
Steinbrechgewächse 464.
Steinbleibend 9.*
Steinbleibend 10.*
Steinfraut 445.
Steinmelle 326.
Steinquitten 483.
Steinschmied 425.
Stellaria 317, 324.
 — *graminea* 323, 324.*
 — *media* als *Kosmopolit* 324.
Stellata-Gruppe 336.
Stelzenbildungen der *Fische* 83.
Stelzenfische 83.*
Steppenflora 378.
Steppengräser 142.
Steppenvegetation 405.
Sternberg 145.
Stendner 158.
Stiele 250.
Stigma 109.
Stigmarien 9.
Stipa 142.
Stipa-arten, *Grannen* 142.
Stipa capillata 142.*
 — *pernata* 142.
Stodauschlag von *Carpinus* 248.
Strandgerste 147.
Strandhafer 135.
Strandrieder
Strassburger 33, 34, 72, 352.
Stratiotes alios 124.* 125.
Streifenfarn 23.
Strindberg 243.
Strobilus 58.
Studentenröschen 468.
Stüger, F. 76, 88.
Strukturelle Intelligenz der *Angiospermen* 108.
 — — *Pflanzen* 118.
Sturmhut 367.
Suaeda 308, 310.
Subularia aquatica 417.
Succinea 166.
Succinifisch 15.
Summation *intermittierender* *Rhythmen* 433.
Stumpfbutterblume 362.*
Stumpfschraube 123.
Stumpfhaut 227.
Stumpfsprengel 92, 93.
Swamps 92.
Sycomotor 261.
 — *antiquorum* D. C. 261.
Sydenham Edwards 468.
Sykomotor 261.
Symphytum 56.*
Sympetalae 235.
Synergiden 58.
Syphalonia 370.

- Sittamineen 204.
 Taeniophyllum 214.
 Täuschblumen 291.
 Taglilie 176.
 Talbotisches Gesetz 434.
 —, kritische Periode 434.
 Tangli 144.
 Tanne 87.
 — in der Volkslage 89.
 Tannen, alte 88.
 Tannenbarklapp 43.
 Tannenmittel 283.
 Tannennadeln, Reizver-
 wertung 87.
 Tanne, schlechte 88.*
 Taubenschwanz 320.
 Taubnessel 271.
 Taufendblatt 344.*
 Taxin 100.
 Taxodiaceae 66.
 Taxodium distichum 92, 95.*
 — mexicanum 93.
 Taxus baccata 99.
 —, Befruchtung 100.
 Tazetten 195.
 Teerose 514.
 Teldrose 334.
 Teleologie-Phänomen 463.
 Tentakeln bei Drosera 452.
 tetradyname Blüte 410.
 Tertiärfpflanzen 272.
 Thallitrum, Drüsenhaare
 von 353.
 Thermoelastischen im Lu-
 tasbad bei Budapest 337.
 thè du Mexique 310.
 Thlaspi 423.
 — arvense 403.* 423, 427.*
 — latifolium 404.
 — rotundifolium 423.
 — var. corymbosum Gay
 423.
 Thomé 164.
 Thuja occidentalis 94, 102.
 — orientalis 94, 95.*
 Tierfang bei Droseraceae
 450.
 Tigerlilie 179.
 —, Brutnischen 180.*
 Tillandsia 167.
 Tongressbirne 495.*
 Topfnissen, englische 327.
 Touradons 308.
 Tradescantia 167.
 — virginica 168.
 Träubel 185.
 Tragus racemosus 142.*
 Traubeneiche 250.
 Trauerbuchen 255.
 Trauerfichte 85.
 Trauerkiefer 70.
 Trauerweide 239.
 Trelease 166.
 Treviranus 203.
 Trichomanus 15, 16.
 Trichophorum 154.
 — alpinum 153.*
 Trigonerische Arten von
 Orchideen 208.
 Triplaris 294.
 Triticum compositum 146.*
 — 148.
 — dicoccum 148.
 — monococcum 148.
 — polonicum 148.
 — Spelta 145, 148.
 — trinciale 142.*
 — vulgare 145, 148.
 Trockenheitspflanzen 273.
 Trollblume 361.
 —, Artenzahl 354.
 Trollius 361.
 —, Artenzahl 354.
 —, Blütenbau 361.
 —, Blütenbiologie von 362.
 — europaeus 352, 361.
 —, Fruchtbildung 362.
 Tüchermat 209.
 Tubera aconiti 369.
 Tubeuf, M. v. 283, 286.
 Tubifloren 460.
 Tüpfelfarn 18, 19, 30.
 Tüpfelfarne, Mutationen
 von 31.
 Türkenbund 173, 179, 180.*
 Tulipa Gesneriana 182, 183.
 — silvestris 182.
 — suaveolens 182.
 Tulpe 182.
 —, Befruchtungsorgane
 182.
 —, Darmtulpen 181.
 —, Geschichte 182.
 —, moderne Ziertulpen
 183.*
 —, Spielarten 184.
 Tulpenfrach 184.
 Tulpen, Kultur 184.
 —, Zimmertulpe 184.
 Tulpenliebhaberei 184.
 Tulpenpreise 184.
 Tulpenwissenschaft 183.
 Tulpomantie 184.
 Tumboa Bainesii 104.*
 Tubera Salep 222.
 Turgor 289.
 Turionen bei Myriophyllum
 346.
 — Utricularia 346.
 Turnips 431.
 Typha als Erdbildner 115.
 — als Feldfrucht 115.
 — angustifolia 114.
 —, Biologie 115.
 —, Blütenbiologie 116.
 — latifolia 114.*
 —, Zeitangabe 116.
 Überpflanze, Alnus als 246.
 Überpflanzen 167.
 —, Ficus-Arten als 259.
 Überallwobner, Knötchen-
 gewächse als 294.
 Urteil von 261.
 Ulbrich 374.
 Ulmaceae 255.
 Ulme 255.
 — zu Schinshelm 255.
 Ulmus 255.
 — alte Bäume 255.
 — Blütenbiologie 255.
 — campestris 255.
 — effusa 255.
 — montana 255.
 — Verwertung 255.
 Umfassung des Kopfs 264.
 Unzweckmäßigkeit bei
 Pflanzen 290.
 Urtasbaum 260.
 Urban 316.
 Urtica als Gespinnstpflanzen
 272.
 — atrovirens 272.*
 —, Blütenbiologie 271.
 —, Brennhaare 270.
 Urticaceae 256.
 Urtica dioica 269, 272.
 — Dodartii 272.*
 —, Nuderalpflanzen 270.
 —, Schutzwaffen 270.
 —, Staubblattproportionen
 271.
 Urticales 256.
 Urtikafarne 269.
 Utricularia, Winterknospen
 bei 346.
 Vallisneria spiralis 123.
 Vallisneria, Befruchtung
 der 124.
 Vanda 229.
 — tricolor 214.* 207.*
 Vanilla planifolia Andr. 218.
 Vanille 212.
 Variationsfähigkeit der
 Pflanze 427.
 Vegetationspunkt 56.
 Vegetationspunkt als Re-
 gulationszentrum 27.
 Veitch, J. 210.
 Velamen 158.
 Velamen bei Orchideen 213.
 Velenosty 416.
 Vella 405.
 Veratrum album 174.*
 — nigrum 174.
 Verdaunung bei Drosera 453.
 Verdaunungsdrüse der Grä-
 ser 144.
 Vererbung erworbener An-
 passungen 285.
 Vergiftungsmittel 372.
 Verlanbung 307.
 Verlanbungspflanzen 113.
 114.
 Verlanbungsvorgang 113.
 Veronica 291, 372.
 Versälfes, Schloßgarten
 103.*
 Victoria 329, 332, 333, 340.
 —, Blütenbiologie 334.
 —, Heimat der 341.
 — regina 330, 331, 334, 340.*
 341.
 —, Blätter der 340.
 —, Blütenbiologie der
 340.
 Victoriabau im botani-
 schen Garten zu Ham-
 burg 341.
 — in Gerrenhausen 341.
 Vieltierchen 248.
 Viskarien der Funktion
 468.
 — Pflanzen 194.
 Vilmorin 312.
 Viscaria alpina 327.
 — vulgaris 323.
 Viscum, Monomitäten 285.
 — album 275, 276, 280.*
 — als Halbsparasit 277.
 — als Schädling 283.
 — als Überpflanze 277.
 —, Apfelbaummittel 283.
 — articulatum 279, 285.
 —, Biologie 277, 284.
 —, Blütenbiologie 282.
 —, Ködnemittel 283.
 —, Früchte 278.
 —, Gewöhnungsaffen 284.
 —, Haustorium von 281.
 —, Keimfische 281.
 —, Keimung 279.
 —, Keimungsbedingungen
 280.
 —, Kiefernmittel 283.
 —, Laubholzmittel 283.
 —, Lichtbedürfnis 277.
 —, orientale 279.
 —, Parasit 276.
 —, Rassen 281.
 —, Rassenbildung 284.
 —, Rindenwurzeln von 281.
 —, Schädigung durch 286.
 —, Schuttmittel gegen 286.
 —, Senfer von 281.
 —, Standortsvarietäten
 283.
 —, Tannenmittel 283.
 —, Tracht 282.
 —, Verbreiter der Früchte
 278.
 —, Verehrung.
 —, Witte 284.
 Viscin 278.
 Viticella, Gruppe von Cle-
 matis 380.
 Viriparis 297.
 — der Gräser 143.
 Vösching 68.
 Vogelblütter 205.
 Vogelknötchen 203.
 Vogelmiere 324.
 Voages, G. 492.
 Volkens 304, 305, 309, 407.
 Vorfeim von Osmunda 32.
 Vorläuferspige des Sop-
 fens
 Vriesen 167.
 Wacholder 94.
 —, alte Bäume 98.
 Wacholdergärten 368.
 Wacholder im Überglauben
 95.
 — in der Volkshelkunde 96.
 —, Ökologie 97.
 Wächter, W. 87.
 Wagner, M. 27.
 Waldfäule 426.
 Waldbreite 353.* 379.
 Waldbogeln 226.
 Waldbirnbröschchen 374.
 Walnussbäume 236.
 Walnussbaum, edler 242.
 Warburg 117.
 Warming 309.
 Warzenbirne 244.
 Wasserblätter, unterge-
 tauchte bei Nuphar
 luteum 330.
 Wasserfarn 33.
 —, Seterosporie der 33.
 —, Mikrosporangien der
 33.
 —, Mikrosporangien der
 33.
 Wasserhühner als Samen-
 verbreiter der Teld-
 rosen 335.
 Wasserhyazinthe 169.
 Wasserlöcher 298.
 Wasserlinien 164.
 —, Anatomie 165.
 —, Tochterprosse 165.
 Wasserpest 123.
 Wasserrose, Arten der 329.
 —, weiße 329.
 Wasserrosen 328.
 —, Blütengeschichte 333.
 —, Düngung der 339.
 —, gelbe 328.* 330.
 —, Kultur der 339.
 —, Kultur in Kuebin 339.
 —, Ökologie der 331.
 —, Systematik der 329.
 —, Verbreitungseindrich-
 tungen der 334.
 Wasserrosenzucht 338.
 Wasserfische 125.
 Wasserpalmen bei den Ra-
 nunculaceen 352.
 Wasserpeisen 122.
 Wasserführung, zentripe-
 tale des Kaps 433.
 Waageb 450.
 Washingtonia 90.
 Webber, S. 62, 133, 169.
 Weber 137.
 Wedel 12.
 Weide, Biologie 238.
 —, Handelswert 239.
 —, in der Gartenkunst 239.
 —, Zählbarkeit 238.
 Weidenau 237.*
 Weidengewächse 236.
 Weidenregion 238.
 Weibuche 248.
 Weißbarn 452.
 Weißbobl 429.
 Weißkraut 429.
 Weismantelisches Nesten-
 system 326.
 Weizen 145.
 —, eigentlicher 14.*
 —, Herkunft 145.
 —, polnischer 148.
 —, Ursprünge 145.
 Weizenbalm, Knoten 137.
 Wellingtonia 90.
 Weisbobl 429, 430.*
 Weisbobl 104.
 Weisbobl 104.
 Wendelordis 229.

- Wetterarve 75.
 Wettstein, K. v. 7, 49, 64,
 59, 109, 170, 210, 255,
 290, 347, 352, 413, 417,
 442, 460.
 —, Systematik 111.
 Wilderbart 220.
 Wiesen, Bedienung 127.
 Wiesengräser, Biologie 135.
 Wiesenland, achtfache Ty-
 pen 127.
 Wiesenrispengras 137.
 Wiscenschaumkraut 405,
 439.
 Wiese, Wasserverhältnisse
 136.
 Wiesner, J. 25, 27, 71, 94,
 139, 254, 279, 280, 419,
 461.
 Wilkinon, G. W. 452.
 Williams, W. R. 210.
 Willkomm 68.
 Willis 36.
 Wimmer 90.
 Windbestäubung der Pflan-
 zen 111.
 Windpfeiler 241.
 Windröschen, Artenzahl
 372.
 Winterbutterbirne 495.*
 Winterreife 250.
 Winterknospen bei Utricu-
 laria 346.
 Wintersohl 428.
 Winter-Leroseje 442.
 Winterrops 431.
 Winterrettich 437.
 Winterroggen 148.
 Winterrüben 431.
 Winterstachelhalim 39.
 Witsingsohl 429.
 Wittmach 167.
 Wolfsha arrhiza 164.*
 Wolfsmilch 261.
 Wriesen 238.
 Wüste, ägyptisch-arabische,
 Flora der 317.
 — Gobi 309.
 Wüstengewächse 317.
 Wunderblume 315.
 Wunderweizen 146.*
 Wurmfarn 21.*
 Wurzelstock der Anemone
 373.
 Xanthorrhoea hostile 177.*
 Xenien 133.
 Xenodochien 133.
 Xerophile Anpassungen bei
 Iris 200.
 Xerophyten 273.
 Xerophileisogamie bei Sinapis
 436.
 Yucca 173, 186.
 —, Bestäubung 187.
 — filamentosa 186.
 — gloriosa 187.*
 Zahnwurz 441.
 Zamia, Embryosäde 57.*
 Zannichellia 119.
 Zantedeschia 161.
 Zapfenpalmen 60.
 Zea Mays L. 133.
 Zebрина pendula 167.
 Zeder 79.
 Zedernholz 99.
 Zeitnappung der Typha
 116.
 Zellastdruck bei Aristo-
 lochia 289.
 Zeratophyllaceen 343.
 Zerreiche 250.
 Zierkoniferen 102.
 Zierorchideen 229.
 Zierspargel 189.
 Ziersräucher, heimische 472.
 Ziertulpen, moderne 183.*
 Zilla 405.
 Zimmertanne 66.
 Zingiber 205.
 Zingiberaceae 205.
 Zingiber Mioga (Thunb.)
 Roscoe 206.*
 — officinalis 204.*
 Zippel 449.
 Zirben, älteste Deutschlands
 76.*
 Zirkummutation 263.
 Zistifloren 417.
 Zittergras 136.* 143.
 Zostera 117.
 —, Blütenbiologie 120.
 — marina L. 119.*
 — nana Roth, 119.
 —, Nutzung 120.
 Zombélfornation 153.
 Zuchtwahllehre 360.
 Zuderrohr 131.
 —, Kulturmerkmale 132.
 Zuderrübe 311.
 Zuderrübenbau 311, 312.
 Zuderrübe, Geschichte der
 312.
 Zuderrübenzucht 313.
 Zügelbaum 256.
 Zufall als Ursache der
 Selektion 321.
 Zweiblatt 225.
 Zwergbäume 490.
 Zwergbirke 245.
 Zwetsche 522.
 Zweibelgewächse, Kultur
 182.
 zygomorphe Blüten der
 Ranunculaceae 348.
 Zygomorphie der Eisen-
 hutblüte 348.*
 Zylamen 108.
 Zypressen des Montezuma
 93.
 Zypressen, Embryosack 59.*
 Zypressen 220.

An die Leser!

Außerstande, die zahlreichen Anfragen persönlich zu beantworten, bitte ich im Einvernehmen mit der Franckh'schen Verlagshandlung, freundl. folgende Erklärung zur Kenntnis zu nehmen.

Da die Schwierigkeiten, die der raschen Beendigung des Werkes im Wege standen, nunmehr behoben sind, werden die zur Fertigstellung von Bd. IV. noch fehlenden Lieferungen in kurzen Zwischenräumen erscheinen.

Die von Dr. A. Koelsch u. anderen bearbeitete Fortsetzung des Werkes wird sich nach den getroffenen Vereinbarungen organisch an die von mir bearbeiteten Bde. I–IV anschließen.

R. H. Francé.

- Wetterarve 76.
 Wettstein, R. v. 7. 49. 54.
 59. 109. 170. 210. 255.
 290. 347. 352. 413. 417.
 442. 460.
 —, Systematik 111.
 Wiberbart 226.
 Wiesen, Bedingung 147.
 Wiesengräser, Biologie 135.
 Wiesenland, achtfache Ty-
 pen 127.
 Wiesenripengras 137.
 Wiesenrauschraut 405.
 439.
 Wiese, Wasserverhältnisse
 136.
 Wiesner, A. 25. 27. 71. 94.
 Winterfahl 428.
 Winter-Levkoje 442.
 Winterrops 431.
 Winterreith 437.
 Winterropen 148.
 Winterrüben 431.
 Winterachtelhalm 39.
 Wirtstuch 429.
 Wittmad 167.
 Wolfina arhiza 164.*
 Wolfsmilch 261.
 Wrezen 238.
 Wüste, ägyptisch-arabische,
 Flora der 317.
 — Gobi 309.
 Wüstengewächse 317.
 Wunderblume 315.
 Zahnrurz 441.
 Zamia, Embryosäde 57.*
 Zannichellia 119.
 Zantedeschia 161.
 Zapsenpaimen 60.
 Zea Mays L. 133.
 Zebрина pendula 167.
 Zeder 79.
 Zedernholz 99.
 Zeitanpassung der Typha
 116.
 Zellfaßdruck bei Aristo-
 lochia 289.
 Zeratophyllaceen 343.
 Zerreiche 250.
 Zierfontänen 102.
 Zierorchideen 220.
 Zosteria 117.
 —, Blütenbiologie 120.
 — marina L. 119.*
 — nana Roth. 119.
 —, Nutzung 120.
 Zombelformation 153.
 Zuchtwahltheorie 360.
 Zuckerröhre 131.
 —, Kulturmerkmale 132.
 Zuckerrübe 311.
 Zuckerrübenbau 311. 312.
 Zuckerrübe, Geschichte der
 312.
 Zuckerrübenzucht 313.
 Zürgelbaum 256.
 Zufall als Ursache der
 Selektion 221.

1-10

R. H. FRANCÉ DAS LEBEN DER PFLANZE

Zweite Abtheilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abtheilung (Das Pflanzenleben Deutschlands)
umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W.
Die zweite Abtheilung (Floristische Lebensbilder) umfasst

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Verlagsbuchhandlung

R. S. Francé

Sinnesleben der Pflanzen.

In farb. Umschlag, reich illustr. M 1.—,
fein geb. M 2.—.

Dahleim: In diesem entzückenden Büchlein legt Francé die Pflanze dem denkenden, fühlenden Menschen geradezu ans Herz. Das kleine, geist- und talentvolle Buch voll köstlicher Beobachtungen des regen Instinktlebens unserer Pflanzenwelt sei allen wissensdurstigen Laien ganz besonders warm empfohlen.

Liebesleben der Pflanzen.

In farb. Umschlag, reich illustr. M 1.—, fein geb. M 2.—.

Leipziger Abendzeitung: Das ist ein Buch, dem wir von Herzen die weiteste Verbreitung wünschen. In höchst spannender Weise enthält es wunderbare Geheimnisse der Natur. Es ist außerordentlich frisch, man kann sagen, mit dem Herzen geschrieben. Nirgends ist ein öder, trockener Beirton angeschlagen. Wir sind überzeugt, jeder Leser wird dadurch eine frohe, glückliche Stunde haben.

Philosophie und Naturwissenschaft

von **J. W. Camerer,**

Doktor der Medizin und Ehrendoktor der Universität Tübingen.

Preis geb. M 2.—, fein geb. M 3.—.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ schreibt darüber in seiner Literaturbeilage vom 29. 9. 06: Für denjenigen, der sich erst in das allgemeine Verhältnis, in welchem die beiden Disziplinen miteinander stehen, einführen will, hat die „Kosmos-Gesellschaft“ ein vorzügliches Bändchen herausgegeben: einen objektiven Leitfaden, der glücklicherweise keinen modernen Fachphilosophen, sondern einen Naturwissenschaftler zum Verfasser hat. In klarer Form und im Verhältnis zur Fülle des Stoffes auch in recht fesselnder Art entwickelt er zunächst die Ansichten der großen Denker des Altertums und später die Philosophie des christlichen Abendlandes. Hauptsache des Werkes bleibt die eingehende Darlegung des menschlichen Seelenlebens im Lichte der heutigen Naturwissenschaft und des Kampfes zwischen Monismus und Dualismus, der mit Heftigkeit geführt wird. Zum Schluß wird der Leser in die exakte Wissenschaft, in die Lehre von Kraft und Stoff in ihrer jetzigen Entwicklung eingeführt, während das Schlußkapitel den Einfluß von Philosophie und Naturwissenschaft auf die Weltanschauung des Menschen beleuchtet. In der Abfassung dieser schwierigen Darstellung

hat sich der Verfasser als ein wahrer Philosoph erwiesen: er ist kühl geblieben und hat jede Polemik vermieden. Nicht wenig wird dies zum aufklärenden Wert dieser neuesten Publikation der Kosmos-Gesellschaft beitragen.

Junge Ägypterin.

Die ägyptische Finsternis.

Meine Reise nach Oberägypten zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am 30. August 1905.

Von **Dr. M. Wilhelm Meyer.**

Ein ganz eigenartiges Werkchen. Dr. Meyer schildert uns in seiner bekannten lebendigen und humorvollen Weise seine Erlebnisse und Eindrücke auf jener mit ungewöhnlichen Strapazen verbundenen Reise, die ihn Ägypten im Hochsommer kennen lernen ließ, wobei er Gelegenheit hatte, die ganze wunderbare Eigenart des Pharaonenlandes besonders eindrucksvoll zu erfassen. Auf diese Weise entstand eine an wechselnden Szenen reiche, hochinteressante Reiseschilderung, die jedermann mit großem Genuß lesen wird. — Hochleg. geb. M 3.—.

40. Lieferung des Gesamtwerkes (Leben d. Pflanze).

14. Lieferung der Florist. Lebensbilder.

M 1.— = K 1.20 h ö. W.

17-64

R. H. FRANCÉ DAS LEBEN DER PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abteilung (Das Pflanzenleben Deutschlands)

umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W.

Die zweite Abteilung (Floristische Lebensbilder) umfasst

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde

Vor vierzig Jahren

1866

F. Regensburg

1906

Von Skalitz bis Königgrätz.

Mit Illustrationen und Karten. Geh. M 2.—, hochfein geb. M 3.—. Der Verfasser führt uns in lebendiger, nicht wie Schatten auf beiden Seiten gerecht vertellender Darstellung zunächst das gegen Benedels Willen entbrannte Treffen von Skalitz und anschließend daran das Gefecht bei Schweinfürth vor. Dann folgt Bursfelde-Soor, wo nach heldenhaftem Ringen die tags zuvor siegreich gewesenenen Truppen Gabelns das Feld räumen mußten, und das Gefecht bei Königshof.

Von Dresden bis Münchengrätz. Illustriert, Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Schildert den Ursprung des Krieges von 1866 und den Einmarsch des preussischen Heeres in Sachsen, die Besetzung Dresdens und Leipzigs und die ersten Zusammenstöße zwischen Preußen und Austro-Sachsen in Böhmen.

Königgrätz. Mit Illustr. und Karten, nur M 1.—, hochf. illustriert, in farbigen Umschlag M 2.—. Urteile der Presse: F. Regensberg bietet uns hier eine selten klare, durchaus übersichtliche und unterhaltende Darstellung der größten Schlacht des 19. Jahrhunderts. — . . . Regensberg vermeidet in seinen glänzenden, mit dramatischem Schwung geschriebenen Schlachtenbildern vor allem jedes phantastische Beiwerk und hält sich nur an historisch erwiesene Tatsachen.

Ennsdörfer. Illustriert, in farbigen Umschlag M 2.—, fein gebunden M 3.—. Die Ruhmeshalle Erzherzog Albrechts und seiner Braven in Oberitalien finden hier erstmals eine äußerst packende populäre Darstellung.

Nachod. Illustriert, in farbigen Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Gleich übersichtlich wird darin der Kampf der II. oder Schlesiens Armee (unter dem Kronprinzen) in Böhmen vorgeführt, wo Sietemes unter den schwierigsten Verhältnissen über Komau siegte.

Gitschin. Illustriert, in farbigen Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. In vorrätiger Weise und lichtvoller Art behandelt der Verfasser den Kampf der am 29. Juni von zwei Divisionen der preuß. I. Armee angegriffenen Iserarmee, wo den Austro-Sachsen statt des bereits wintenden Sieges eine schmerzliche Niederlage zuteil wurde.

Trautenau. Illustriert, mit 2 Karten versehen, in farbigen Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Gabelns Sieg, den er dank der Bravour seiner Truppe über das I. preussische Korps errang, findet hier eine eingeübende, packende Schilderung.

Langensalza ..

und das Ende des
Königreichs Hannover.

Mit Illustrationen und 2 Karten.
Geh. M 1.50, hochfein geb. M 2.50.

Eine übersichtliche Darstellung des blutigen Treffens von Langensalza, jenes Ehrentages der althannoverschen Armee, die alle seither erschienenen Aufklärungen und Enthüllungen darüber klar und objektiv zusammenfaßt, darf wohl auf allgemeines Interesse zählen. Der Verfasser berichtet zunächst anschaulich und ohne Voreingenommenheit die politische und diplomatische Vorgeschichte, um uns dann den mörderischen Bruderkampf an jenem heißen 27. Juni 1866 im Geiste mit erleben zu lassen. Die tapferen Hannoveraner schlugen die allerdings in der Minderzahl befindlichen Preußen unter General Fries, trotzdem aber mußte König Georg am 29. kapitulieren.

Im Laufe des Jahres 1907 erscheinen: Die Seeschlacht bei Lissa, geh. M 1.—, fein geb. M 2.—; Der Mainfeldzug (Frankfurt a. M. — Tauberbischofsheim — Kissingen — Aschaffenburg etc.) geh. M 2.—, fein geb. M 3.—.

pg. 55-112

R. H. FRANCÉ DAS LEBEN DER PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Tolstois Romane.

Jeder Gebildete
sollte
Tolstois
Werke
kennen.

6 Bände, fein gebunden
nur M 17.40.

Diese Ausgabe
ist
bei vorzüglicher
Ausstattung
sehr preiswert.

Jeder Band ist auch
einzeln zu dem
beigesetzten Preise
käuflich.

Graf Leo Tolstoi

nach dem berühmten Gemälde von Repin.

Ausschnitt aus einem ganzseitigen Holzschnitt in Scherr's Weltliteratur.

Auferstehung.

Tolstois neuester Roman. Bei bester Ausstattung und größtem Umfang billigste Ausgabe. Hochinteressant, besonders wegen der ergreifenden Schilderungen aus dem Gefängnisleben. Einzelpreis geh. M 2.—, fein geb. M 3.—.

Anna Karenina.

Vollständige Ausgabe dieses berühmten Romans, in dem Tolstoi eine moderne Ehebruchgeschichte — aber nicht im Sinne französischer Schriftsteller, sondern vom Standpunkte des strengen Moralisten — mit meisterhafter Realistik behandelt. Erst die Lektüre dieses Romans und der „Kreutzerersonate“ machen uns den Entwicklungsgang der Tolstoischen Lehren und Anschauungen, wie er sie in der „Auferstehung“ ausspricht, verständlich. Geh. M 3.50, fein geb. M 4.50.

Kreutzerersonate.

Weltbekannte Tendenznovelle, einzige illustrierte Ausgabe. Geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Husarenstreiche.

Eine hübsche Jugendnovelle des greisen Dichters, in der er von dem lustigen Soldatenleben am Anfang des 19. Jahrhunderts erzählt. Geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Krieg und Frieden.

Historischer Roman von packendster Lebendigkeit. — Schildert in ergreifenden Zügen das Schicksal Napoleons und der großen Armee auf ihrem unglücklichen Zuge nach Rußland. Einzelpreis geh. M 3.50, fein geb. M 4.50.

Roman einer jungen Frau.

Interessante Novelle. Einzelpreis geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

R. H. FRANCÉ
DAS LEBEN DER
PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Regensburg 1870/71

erscheint in etwa 10 einzeln käuflichen Abteilungen (à 6—7 Bogen).

Jährlich werden 3—4 Abteilungen zum Preise von je M 2.60 ausgegeben.

Abteilung I: Vorgeschichte des Krieges

(Rache für Sadowa! — Die spanische Bombe. — Die Emser Depesche).

Abteilung II: Die Vorbereitungen zum Kriege

(Kriegserklärung Frankreichs. — Alles mobil! — Kriegspläne und der Aufmarsch der beiden Heere).

Abteilung III: Die ersten Kämpfe im Elsass

Erscheint
Januar 1907

(Die Komödie von Saarbrücken — Weissenburg — Wörth — Spichern).

Regensburg 1870/71 ist die erste umfangreiche Gesamtdarstellung des grossen Krieges, worin die neuesten

Forschungen und Enthüllungen

aus jener Zeit berücksichtigt worden sind. Nach dem Urteil erster Zeitungen „die beste Geschichte des Krieges von 1870“.

Strassburg 1870

von

Ed. von Schmid

Oberstleutnant a. D.

Mit zahlreichen Illustrationen
und zwei Karten.

In farbigem Umschlag, gelb.
M 1.—, fein geb. M 2.—.

Stimmen der Presse: Eine hochwillkommene Erzählung der denkwürdigen Belagerung, durch welche die „wunderschöne Stadt“ nach heldenmütiger Verteidigung und nach unsäglichem Leiden ihrer tapferen Bewohner dem Deutschen Reiche wiedergewonnen wurde. Jeder Geschichtsfreund und jeder Liebhaber passender Kriegeschilderungen wird seine Freude an dem interessanten Buche haben, das besonders auch durch die zahlreichen seltenen, zur Zeit der Belagerung aufgenommenen Photographien einen außerordentlichen Wert hat.

R. F. FRANCÉ DAS LEBEN DER PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

R. S. Francé

Sinnesleben der Pflanzen.

In farb. Umschlag, reich illustr. M 1.—,
sein geb. M 2.—.

Dahleim: In diesem entzückenden Büchlein legt Francé die Pflanze dem denkenden, fühlenden Menschen geradezu ans Herz. Das kleine, geist- und talentvolle Buch voll köstlicher Beobachtungen des regen Instinktlebens unserer Pflanzenwelt sei allen wissensdurstigen Vätern ganz besonders warm empfohlen.

Liebesleben der Pflanzen.

In farb. Umschlag, reich illustr. M 1.—, fein geb. M 2.—.

Leipziger Abendzeitung: Das ist ein Buch, dem wir von Herzen die weiteste Verbreitung wünschen. In höchst spannender Weise enthält es wunderfame Geheimnisse der Natur. Es ist außerordentlich frisch, man kann sagen, mit dem Herzen geschrieben. Nirgends ist ein über, trockener Behrion angeschlagen. Wir sind überzeugt, jeder Leser wird dadurch eine frohe, glückliche Stunde haben.

Philosophie und Naturwissenschaft

von **J. W. Camerer**,

Doktor der Medizin und Ehrendoktor der Universität Tübingen.

Preis geh. M 2.—, fein geb. M 3.—.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ schreibt darüber in seiner Literaturbeilage vom 29. 9. 06: Für denjenigen, der sich erst in das allgemeine Verhältnis, in welchem die beiden Disziplinen miteinander stehen, einführen will, hat die „Kosmos-Gesellschaft“ ein vorzügliches Bändchen herausgegeben: einen objektiven Leitfaden, der glücklicherweise keinen modernen Fachphilosophen, sondern einen Naturwissenschaftler zum Verfasser hat. In klarer Form und im Verhältnis zur Fülle des Stoffes auch in recht fesselnder Art entwickelt er zunächst die Ansichten der großen Denker des Altertums und später die Philosophie des christlichen Abendlandes. Hauptsache des Werkes bleibt die eingehende Darlegung des menschlichen Seelenlebens im Lichte der heutigen Naturwissenschaft und des Kampfes zwischen Monismus und Dualismus, der mit Heftigkeit geführt wird. Zum Schluß wird der Leser in die exakte Wissenschaft, in die Lehre von Kraft und Stoff in ihrer jetzigen Entwicklung eingeführt, während das Schlußkapitel den Einfluß von Philosophie und Naturwissenschaft auf die Weltanschauung des Menschen beleuchtet. In der Abfassung dieser schwierigen Darstellung hat sich der Verfasser als ein wahrer Philosoph erwiesen: er ist kühl geblieben und hat jede Polemik vermieden. Nicht wenig wird dies zum aufklärenden Wert dieser neuesten Publikation der Kosmos-Gesellschaft beitragen.

Junge Ägypterin.

Die ägyptische Finsternis.

Meine Reise nach Oberägypten zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am 30. August 1905.

Von **Dr. M. Wilhelm Meyer**.

Ein ganz eigenartiges Werkchen. Dr. Meyer schildert uns in seiner bekannten lebendigen und humorvollen Weise seine Erlebnisse und Eindrücke auf jener mit ungewöhnlichen Strapazen verbundenen Reise, die ihn Ägypten im Hochsommer kennen lernen ließ, wobei er Gelegenheit hatte, die ganze wunderbare Eigenart des Pharaonenlandes besonders eindrucksvoll zu erfassen. Auf diese Weise entstand eine an wechselnden Szenen reiche, hochinteressante Reiseschilderung, die jedermann mit großem Genuß lesen wird. — Hoheleg. geb. M 3.—.

R. H. FRANCÉ DAS LEBEN DER PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abteilung (Das Pflanzenleben Deutschlands)
umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W.
Die zweite Abteilung (Floristische Lebensbilder) umfasst
30 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W.

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Brandt'sche Verlagshandlung.

Vor vierzig Jahren

1866.

f. Regensburg

1906

Von Skalitz bis Königgrätz.

Mit Illustrationen und Karten. Geh. M 2.—, hochfein geb. M 3.—. Der Verfasser führt uns in lebendiger, Licht wie Schatten auf beiden Seiten gerecht verteilender Darstellung zunächst das gegen Benedels Willen entbrannte Treffen von Skalitz und anschließend daran das Gefecht bei Schweinschädel vor. Dann folgt Bursfersdorf-Soor, wo nach heldenhaftem Ringen die tags zuvor siegreich gereisenen Truppen Gablens' das Feld räumen mußten, und das Gefecht bei Königgrätz.

Von Dresden bis Münchengrätz. Illustriert, in farbigem Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Schildert den Ursprung des Krieges von 1866 und den Einmarsch des preussischen Heeres in Sachsen, die Besetzung Dresdens und Leipzig und die ersten Zusammenstöße zwischen Preußen und Austro-Sachsen in Böhmen.

Königgrätz. Mit Illustr. und Karten, nur M 1.—, hochf. geb. M 2.—. Urteile der Presse: f. Regensburg bietet uns hier eine selten klare, durchaus übersichtliche und unterhaltende Darstellung der größten Schlacht des 19. Jahrhunderts. — . . . Regensburg vermeidet in seinen glänzenden, mit dramatischem Schwung geschriebenen Schlachtenbildern vor allem jedes phantastische Beiwerk und hält sich nur an historisch erwiesene Tatsachen.

Enstosa. Illustriert, in farbigem Umschlag M 2.—, fein gebunden M 3.—. Die Ruhmesstaten Erzherzog Albrechts und seiner Braven in Oberitalien finden hier erstmals eine äußerst passende populäre Darstellung.

Nachod. Illustriert, in farbigem Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Gleich übersichtlich wird darin der Kampf der II. oder Schlessischen Armee (unter dem Kronprinzen) in Böhmen vorgeführt, wo Steinmetz unter den schwierigsten Verhältnissen über Namming siegte.

Gitschin. Illustriert, in farbigem Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. In vorurteilsfreier und lichtvoller Art behandelt der Verfasser den Kampf der am 29. Juni von zwei Divisionen der preuß. I. Armee angegriffenen Iserarmee, wo den Austro-Sachsen statt des bereits winkenden Sieges eine schmerzliche Niederlage zuteil wurde.

Trautenau. Illustriert, mit 2 Karten versehen, in farbigem Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Gablens' Sieg, den er dank der Bravour seiner Truppe über das I. preussische Korps errang, findet hier eine eingehende, passende Schilderung.

Langensalza

und das Ende des
Königreichs Hannover.

Mit Illustrationen und 2 Karten.
Geh. M 1.50, hochfein geb. M 2.50.

Eine übersichtliche Darstellung des blutigen Treffens von Langensalza, jenes Ehrentages der althannoverschen Armee, die alle seither erschienenen Aufklärungen und Enthüllungen darüber klar und objektiv zusammenfaßt, darf wohl auf allgemeines Interesse zählen. Der Verfasser berichtet zunächst anschaulich und ohne Voreingenommenheit die politische und diplomatische Vorgeschichte, um uns dann den mörderischen Bruderkampf an jenem heißen 27. Juni 1866 im Geiste mit erleben zu lassen. Die tapferen Hannoveraner schlugen die allerdings in der Minorität befindlichen Preußen unter General Fließ, trotzdem aber mußte König Georg am 29. kapitulieren.

Im Laufe des Jahres 1907 erscheinen: Die Seeschlacht bei Lissa, geh. M 1.—, fein geb. M 2.—; Der Mainfeldzug (Frankfurt a. M. — Taubertschheim — Kissingen — Aschaffenburg etc.) geh. M 2.—, fein geb. M 3.—.

R. F. FRANCÉ
DAS LEBEN DER
PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Tolstois Romane.

Jeder Gebildete
sollte
Tolstois
Werke
kennen.

6 Bände, fein gebunden
nur M 17.40.

Diese Ausgabe
ist
bei vorzüglicher
Ausstattung
sehr preiswert.

Jeder Band ist auch
einzeln zu dem
beigesetzten Preise
käuflich.

Graf Leo Tolstoi

nach dem berühmten Gemälde von Repin.

Ausschnitt aus einem ganzseitigen Holzschnitt in Scherr's Weltliteratur.

Auferstehung.

Tolstois neuester Roman. Bei bester Ausstattung und größtem Umfang billigste Ausgabe. Hochinteressant, besonders wegen der ergreifenden Schilderungen aus dem Gefängnisleben. Einzelpreis geh. M 2.—, fein geb. M 3.—.

Anna Karenina.

Vollständige Ausgabe dieses berühmten Romans, in dem Tolstoi eine moderne Ehebruchgeschichte — aber nicht im Sinne französischer Schriftsteller, sondern vom Standpunkte des strengen Moralisten — mit meisterhafter Realistik behandelt. Erst die Lektüre dieses Romans und der „Kreutzer-sonate“ machen uns den Entwicklungsang der Tolstoischen Lehren und Anschauungen, wie er sie in der „Auferstehung“ ausspricht, verständlich. Geh. M 3.50, fein geb. M 4.50.

Kreutzer-sonate.

Weltbekannte Tendenznovelle, einzige illustrierte Ausgabe. Geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Husarenstreiche.

Eine hübsche Jugendnovelle des greisen Dichters, in der er von dem lustigen Soldatenleben am Anfang des 19. Jahrhunderts erzählt. Geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Krieg und Frieden.

Historischer Roman von packendster Lebendigkeit. — Schildert in ergreifenden Zügen das Schicksal Napoleons und der großen Armee auf ihrem unglücklichen Zuge nach Rußland. Einzelpreis geh. M 3.50, fein geb. M 4.50.

Roman einer jungen Frau.

Interessante Novelle. Einzelpreis geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

46. Lieferung des Gesamtwerkes (Leben!d. Pflanze).

20. Lieferung der Florist. Lebensbilder.

M 1. — = K 1.20 h ö. W.

R. H. FRANCE
DAS LEBEN DER
PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abteilung (Das Pflanzenleben Deutschlands)
umfasst 26 Lieferungen à M 1. — = K 1.20 h ö. W.

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde

Regensburg 1870/71

erscheint in etwa 10 einzeln käuflichen Abteilungen (à 6—7 Bogen).

Jährlich werden 3—4 Abteilungen zum Preise von je M 2.60 ausgegeben.

Abteilung I: Vorgeschichte des Krieges

(Rache für Sadowa! — Die spanische Bombe. — Die Emser Depesche).

Abteilung II: Die Vorbereitungen zum Kriege

(Kriegserklärung Frankreichs. — Alles mobil! — Kriegspläne und der Aufmarsch der beiden Heere).

Abteilung III: Die ersten Kämpfe im Elsass

Erscheint
Januar 1907

(Die Komödie von Saarbrücken — Weissenburg — Wörth — Spichern).

Regensburg 1870/71 ist die erste umfangreiche Gesamtdarstellung des grossen Krieges, worin die neuesten

Forschungen und Enthüllungen

aus jener Zeit berücksichtigt worden sind. Nach dem Urteil erster Zeitungen „die beste Geschichte des Krieges von 1870“.

Strassburg 1870

von

Ed. von Schmid

Oberstleutnant a. D.

Mit zahlreichen Illustrationen
und zwei Karten.

In farbigem Umschlag, geb.
M 1.—, fein geb. M 2.—.

Stimmen der Presse: Eine hochwillkommene Erzählung der denkwürdigen Belagerung, durch welche die „wunderschöne Stadt“ nach heldenmütiger Verteidigung und nach unsäglichem Leiden ihrer tapferen Bewohner dem Deutschen Reiche wiedergewonnen wurde. Jeder Geschichtsfreund und jeder Liebhaber packender Kriegsfilderungen wird seine Freude an dem interessanten Buche haben, das besonders auch durch die zahlreichen seltenen, zur Zeit der Belagerung aufgenommenen Photographien einen außerordentlichen Wert hat.

He 287-320

R. F. FRANCÉ DAS LEBEN DER PFLANZE

Zweite Abtheilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abtheilung (Das Pflanzenleben Deutschlands)
umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W.
Die zweite Abtheilung (Floristische Lebensbilder) umfasst

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Verlag der Kosmos-Verlagsgesellschaft

R. S. Francé

Sinnesleben der Pflanzen.

In farb. Umschlag, reich illustr. M 1.—,
fein geb. M 2.—.

Daheln: In diesem entzückenden Büchlein legt Francé die Pflanze dem denkenden, fühlenden Menschen geradezu ans Herz. Das kleine, geist- und talentvolle Buch voll köstlicher Beobachtungen des regen Instinktlebens unserer Pflanzenwelt sei allen wissenschaftlichen Lesern ganz besonders warm empfohlen.

Liebesleben der Pflanzen.

In farb. Umschlag, reich illustr. M 1.—, fein geb. M 2.—.

Leipziger Abendzeitung: Das ist ein Buch, dem wir von Herzen die weiteste Verbreitung wünschen. In höchst spannender Weise enthält es wunderbare Geheimnisse der Natur. Es ist außerordentlich frisch, man kann sagen, mit dem Herzen geschrieben. Nirgends ist ein öder, trockener Beirton angeschlagen. Wir sind überzeugt, jeder Leser wird dadurch eine frohe, glückliche Stunde haben.

Philosophie und Naturwissenschaft

von J. W. Camerer,

Doktor der Medizin und Ehrendoktor der Universität Tübingen.

Preis geb. M 2.—, fein geb. M 3.—.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ schreibt darüber in seiner Literaturbeilage vom 29. 9. 06: Für denjenigen, der sich erst in das allgemeine Verhältnis, in welchem die beiden Disziplinen miteinander stehen, einführen will, hat die „Kosmos-Gesellschaft“ ein vorzügliches Bändchen herausgegeben: einen objektiven Leitfaden, der glücklicherweise keinen modernen Fachphilosophen, sondern einen Naturwissenschaftler zum Verfasser hat. In klarer Form und im Verhältnis zur Fülle des Stoffes auch in recht fesselnder Art entwickelt er zunächst die Ansichten der großen Denker des Altertums und später die Philosophie des christlichen Abendlandes. Hauptfache des Werkes bleibt die eingehende Darlegung des menschlichen Seelenlebens im Lichte der heutigen Naturwissenschaft und des Kampfes zwischen Monismus und Dualismus, der mit Heftigkeit geführt wird. Zum Schluß wird der Leser in die exakte Wissenschaft, in die Lehre von Kraft und Stoff in ihrer jetzigen Entwicklung eingeführt, während das Schlußkapitel den Einfluß von Philosophie und Naturwissenschaft auf die Weltanschauung des Menschen beleuchtet. In der Abfassung dieser schwierigen Darstellung hat sich der Verfasser als ein wahrer Philosoph erwiesen: er ist kühl geblieben und hat jede Polemik vermieden. Nicht wenig wird dies zum aufklärenden Wert dieser neuesten Publikation der Kosmos-Gesellschaft beitragen.

Junge Ägypterin.

Die ägyptische Finsternis.

Meine Reise nach Oberägypten zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am 30. August 1905.

Von Dr. M. Wilhelm Meyer.

Ein ganz eigenartiges Werkchen. Dr. Meyer schildert uns in seiner bekannten lebendigen und humorvollen Weise seine Erlebnisse und Eindrücke auf jener mit ungewöhnlichen Strapazen verbundenen Reise, die ihn Ägypten im Hochsommer kennen lernen ließ, wobei er Gelegenheit hatte, die ganze wunderbare Eigenart des Pharaonenlandes besonders eindrucksvoll zu erfassen. Auf diese Weise entstand eine an wechselnden Szenen reiche, hochinteressante Reiseschilderung, die jedermann mit großem Genuß lesen wird. — Hochleg. geb. M 3.—.

R. H. FRANCÉ
DAS LEBEN DER
PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abteilung (Das Pflanzenleben Deutschlands)
umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W.
Die zweite Abteilung (Floristische Lebensbilder) umfasst

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Verlag des Zentralvereins

Vor vierzig Jahren

1866

f. Regensburg

1906

Von Skalitz bis Königgrätz.

Mit Illustrationen und Karten. Geh. M 2.—, hochfein geb. M 3.—. Der Verfasser führt uns in lebendiger, Licht wie Schatten auf beiden Seiten gerecht vertellender Darstellung zunächst das gegen Benedek's Willen entbrannte Treffen von Skalitz und anschließend daran das Gefecht bei Schweinshädel vor. Dann folgt Burkersdorf-Soor, wo nach heldenhaftem Ringen die tags zuvor siegreich gegenseitigen Truppen Gabelnz' das Feld räumen mußten, und das Gefecht bei Königshof.

Von Dresden bis Münchengrätz. Illustriert, in farbigem Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Schildert den Ursprung des Krieges von 1866 und den Einmarsch des preussischen Heeres in Sachsen, die Besetzung Dresdens und Leipzig und die ersten Zusammenstöße zwischen Preußen und Oesterreich in Böhmen.

Königgrätz. Mit Illustr. und Karten, nur M 1.—, hochf. geb. M 2.—. Urteile der Presse: f. Regensburg bietet uns hier eine selten klare, durchaus übersichtliche und unterhaltende Darstellung der größten Schlacht des 19. Jahrhunderts. — . . . Regensburg vermeidet in seinen glänzenden, mit dramatischem Schwung geschriebenen Schlachtenbildern vor allem jedes phantastische Beiwerk und hält sich nur an historisch erwiesene Tatsachen.

Eustoza. Illustriert, in farbigem Umschlag M 2.—, fein gebunden M 3.—. Die Ruhmesraten Erzherzog Albrechts und seiner Braven in Oberitalien finden hier erstmals eine äußerst packende populäre Darstellung.

Nachod. Illustriert, in farbigem Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Gleich übersichtlich wird darin der Kampf der II. oder Schleisschen Armee (unter dem Kronprinzen) in Böhmen vorgeführt, wo Steinmetz unter den schwierigsten Verhältnissen über Raming siegte.

Gitschin. Illustriert, in farbigem Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. In vorurteilsfreier und lichtvoller Art behandelt der Verfasser den Kampf der am 29. Juni von zwei Divisionen der preuß. I. Armee angegriffenen I. Armee, wo den Oesterreichern statt des bereits winkenden Sieges eine schmerzliche Niederlage zuteil wurde.

Trautenau. Illustriert, mit 2 Karten versehen, in farbigem Umschlag M 1.—, fein geb. M 2.—. Gabelnz' Sieg, den er dank der Bravour seiner Truppe über das I. preussische Korps erlangt, findet hier eine eingehende, packende Schilderung.

Langensalza ..

und das Ende des Königreichs Hannover.

Mit Illustrationen und 2 Karten.
Geh. M 1.50, hochfein geb. M 2.50.

Eine übersichtliche Darstellung des blutigen Treffens von Langensalza, jenes Ehrentages der althannoverschen Armee, die alle seither erschienenen Aufklärungen und Enthüllungen darüber klar und objektiv zusammenfaßt, darf wohl auf allgemeines Interesse zählen. Der Verfasser berichtet zunächst anschaulich und ohne Voreingenommenheit die politische und diplomatische Vorgeschichte, um uns dann den mörderischen Bruderkampf an jenem heißen 27. Juni 1866 im Geiste mit erleben zu lassen. Die tapferen Hannoveraner schlugen die allerdings in der Minderzahl befindlichen Preußen unter General Fließ, trotzdem aber mußte König Georg am 29. kapitulieren.

Im Laufe des Jahres 1907 erscheinen: Die Seeschlacht bei Lissa, geh. M 1.—, fein geb. M 2.—; Der Mainfeldzug (Frankfurt a. M. — Taubertshausheim — Kissingen — Aschaffenburg etc.) geh. M 2.—, fein geb. M 3.—.

49. Lieferung des Gesamtwerkes (Leben d. Pflanze).

23. Lieferung der Florist. Lebensbilder.

M 1.— = K 1.20 h. ö. W.

353-384
R. H. FRANCÉ
DAS LEBEN DER
PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abteilung (Das Pflanzenleben Deutschlands)
umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h. ö. W.
Die zweite Abteilung (Floristische Lebensbilder) umfasst

Stoffgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Frankfurt, Verlagsanstalt

Tolstois Romane.

Jeder Gebildete
sollte
**Tolstois
Werke**
kennen.

6 Bände, fein gebunden
nur M 17.40.

Diese Ausgabe
ist
bei vorzüglicher
Ausstattung
sehr preiswert.

Jeder Band ist auch
einzeln zu dem
beigesetzten Preise
käuflich.

Grat Leo Tolstoi

nach dem berühmten Gemälde von Repin.

Ausschnitt aus einem ganzseitigen Holzschnitt in Scherers Weltliteratur.

Auferstehung.

Tolstois neuester Roman. Bei bester Ausstattung und größtem Umfang billigste Ausgabe. Hochinteressant, besonders wegen der ergreifenden Schilderungen aus dem Gefängnisleben. Einzelpreis geh. M 2.—, fein geb. M 3.—.

Anna Karenina.

Vollständige Ausgabe dieses berühmten Romans, in dem Tolstoi eine moderne Ehebruchgeschichte — aber nicht im Sinne französischer Schriftsteller, sondern vom Standpunkte des strengen Moralisten — mit meisterhafter Realistik behandelt. Erst die Lektüre dieses Romans und der „Kreutzersonate“ machen uns den Entwicklungsgang der Tolstoischen Lehren und Anschauungen, wie er sie in der „Auferstehung“ ausspricht, verständlich. Geh. M 3.50, fein geb. M 4.50.

Kreutzersonate.

Weltbekannte Tendenznovelle, einzige illustrierte Ausgabe. Geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Husarenstreiche.

Eine hübsche Jugendnovelle des greisen Dichters, in der er von dem lustigen Soldatenleben am Anfang des 19. Jahrhunderts erzählt. Geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Krieg und Frieden.

Historischer Roman von packendster Lebendigkeit. — Schildert in ergreifenden Zügen das Schicksal Napoleons und der großen Armee auf ihrem unglücklichen Zuge nach Rußland. Einzelpreis geh. M 3.50, fein geb. M 4.50.

Roman einer jungen Frau.

Interessante Novelle. Einzelpreis geh. M 1.—, fein geb. M 1.80.

Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

Ap 584-452

R. H. FRANCÉ DAS LEBEN DER PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abteilung (Das Pflanzenleben Deutschlands) umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W. Die zweite Abteilung (Floristische Lebensbilder) umfasst

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Francé'sche Verlagsanstalt.

Regensburg 1870/71

erscheint in etwa 10 einzeln käuflichen Abteilungen (à 6—7 Bogen).
Jährlich werden 3—4 Abteilungen zum Preise von je M. 2.60 ausgegeben.

Abteilung I: Vorgeschichte des Krieges

(Rache für Sadowa! — Die spanische Bombe. — Die Emser Depesche).

Abteilung II: Die Vorbereitungen zum Kriege

(Kriegserklärung Frankreichs. — Alles mobil! — Kriegspläne und der Aufmarsch der beiden Heere).

Abteilung III: Die ersten Kämpfe im Elsass

Erscheint
Januar 1907

(Die Komödie von Saarbrücken — Weissenburg — Wörth — Spichern).

Regensburg 1870/71 ist die erste umfangreiche Gesamtdarstellung des
grossen Krieges, worin die neuesten

Forschungen und Enthüllungen

aus jener Zeit berücksichtigt worden sind. Nach dem Urteil erster Zeitungen
„die beste Geschichte des Krieges von 1870“.

Strassburg 1870

von

Ed. von Schmid

Oberstleutnant a. D.

Mit zahlreichen Illustrationen
und zwei Karten.

In farbigem Umschlag, geh.
M 1.—, fein geb. M 2.—.

Stimmen der Presse: Eine hochwillkommene Erzählung der denkwürdigen Belagerung, durch welche die „wunderschöne Stadt“ nach heldenmütiger Verteidigung und nach unfäglichen Leiden ihrer tapferen Bewohner dem Deutschen Reiche wiedergewonnen wurde. Jeder Geschichtsfreund und jeder Liebhaber packender Kriegsbilderungen wird seine Freude an dem interessanten Buche haben, das besonders auch durch die zahlreichen seltenen, zur Zeit der Belagerung aufgenommenen Photographien einen außerordentlichen Wert hat.

51. Lieferung des Gesamtwerkes (Leben d. Pflanze).

25. Lieferung der Florist. Lebensbilder.

M L = K 1.20 h ö. W.

R. H. FRANCÉ
DAS LEBEN DER
PFLANZE

Zweite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abteilung (Das Pflanzenleben Deutschlands)
umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W.
Die zweite Abteilung (Floristische Lebensbilder) umfasst
25 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W.

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Franch'sche Verlagsbuchhandlung.

R. S. Francé

Sinnesleben der Pflanzen.

In farb. Umschlag, reich illustr. M 1.—,
fein geb. M 2.—.

Dahelm: In diesem entzückenden Büchlein legt Francé die Pflanze dem denkenden, fühlenden Menschen geradezu ans Herz. Das kleine, geist- und talentvolle Buch voll köstlicher Beobachtungen des regen Instinktlebens unserer Pflanzenwelt sei allen wissensdurstigen Valen ganz besonders warm empfohlen.

Liebesleben der Pflanzen.

In farb. Umschlag, reich illustr. M 1.—, fein geb. M 2.—.

Leipziger Abendzeitung: Das ist ein Buch, dem wir von Herzen die weiteste Verbreitung wünschen. In höchst spannender Weise enthält es wunderbare Geheimnisse der Natur. Es ist außerordentlich frisch, man kann sagen, mit dem Herzen geschrieben. Nirgends ist ein öder, trockener Lehrsatz angeschlagen. Wir sind überzeugt, jeder Leser wird dadurch eine frohe, glückliche Stunde haben.

Philosophie und Naturwissenschaft

von J. W. Camerer,

Doktor der Medizin und Ehrendoktor der Universität Tübingen.

Preis geh. M 2.—, fein geb. M 3.—.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ schreibt darüber in seiner Literaturbeilage vom 29. 9. 06: Für denjenigen, der sich erst in das allgemeine Verhältnis, in welchem die beiden Disziplinen miteinander stehen, einführen will, hat die „Kosmos-Gesellschaft“ ein vorzügliches Bändchen herausgegeben: einen objektiven Leitfaden, der glücklicherweise keinen modernen Fachphilosophen, sondern einen Naturwissenschaftler zum Verfasser hat. In klarer Form und im Verhältnis zur Fülle des Stoffes auch in recht fesselnder Art entwickelt er zunächst die Ansichten der großen Denker des Altertums und später die Philosophie des christlichen Abendlandes. Hauptfache des Werkes bleibt die eingehende Darlegung des menschlichen Seelenlebens im Lichte der heutigen Naturwissenschaft und des Kampfes zwischen Monismus und Dualismus, der mit Heftigkeit geführt wird. Zum Schluß wird der Leser in die exakte Wissenschaft, in die Lehre von Kraft und Stoff in ihrer jetzigen Entwicklung eingeführt, während das Schlußkapitel den Einfluß von Philosophie und Naturwissenschaft auf die Weltanschauung des Menschen beleuchtet. In der Abfassung dieser schwierigen Darstellung

hat sich der Verfasser als ein wahrer Philosoph erwiesen: er ist kühl geblieben und hat jede Polemik vermieden. Nicht wenig wird dies zum aufklärenden Wert dieser neuesten Publikation der Kosmos-Gesellschaft beitragen.

Junge Ägypterin.

Die ägyptische Finsternis.

Meine Reise nach Oberägypten zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am 30. August 1905.

Von Dr. M. Wilhelm Meyer.

Ein ganz eigenartiges Werkchen. Dr. Meyer schildert uns in seiner bekannten lebendigen und humorvollen Weise seine Erlebnisse und Eindrücke auf jener mit ungewöhnlichen Strapazen verbundenen Reise, die ihn Ägypten im Hochsommer kennen lernen ließ, wobei er Gelegenheit hatte, die ganze wunderbare Eigenart des Pharaonenlandes besonders eindrucksvoll zu erfassen. Auf diese Weise entstand eine an wechselnden Szenen reiche, hochinteressante Reiseschilderung, die jedermann mit großem Genuß lesen wird. — Hochleg. geb. M 3.—.

52. Lieferung des Gesamtwerkes (Leben d. Pflanze).

26. Lieferung der Florist. Lebensbilder.

M 1.— = K 1.20 h ö. W.

R. H. FRANCÉ DAS LEBEN DER PFLANZE

3weite Abteilung:

Floristische Lebensbilder

Die erste Abteilung (Das Pflanzenleben Deutschlands) umfasst 26 Lieferungen à M 1.— = K 1.20 h ö. W. Die zweite Abteilung (Floristische Lebensbilder) umfasst

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Verlagsgesellschaft

New York Botanical Garden Library

3 5185 00244 1739