SYNOPSIS AVIUM

3400
C
12

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU

MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,
CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,
OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD.

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,
DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,
MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

DEUXIÈME PARTIE

(1902-1904)

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1904

D816
& Birds

POSTFACE

La rédaction du *Synopsis avium* a été arrêtée le 1^{er} juin 1905, ne pouvant davantage retarder la mise sous presse du supplément, comprenant les additions et les corrections, paru encore la même année. Les espèces et les variétés nouvelles décrites depuis cette date, et même un peu avant, n'ont donc pu être signalées. Je suis cependant assez disposé à publier dans un an ou deux un second supplément, qui tiendra les Ornithologistes au courant des nouvelles découvertes ornithologiques.

Dans l'ensemble des deux volumes, j'ai signalé 12.509 espèces et 5969 variétés, soit en tout 16.478 espèces et sous-espèces ou variétés, le tout réparti dans 2252 genres (1). G. R. Gray, dans son « *Hand-list of genera and species of Birds* » ne mentionne que 11.162 espèces. Comme on le voit, les découvertes ont été nombreuses depuis 1871.

En écrivant ces lignes finales, je ne puis m'empêcher de remercier les honorables souscripteurs, dont le soutien m'a permis de mener à bonne fin ce grand et laborieux travail. Je remercie aussi la Presse scientifique, dont les encouragements ne m'ont pas fait défaut.

A. D.

Bruxelles, juillet 1904.

(1) Je dois faire remarquer qu'à partir de la page 613, le numérotage des genres est erroné, par suite d'une erreur typographique dont je me suis aperçu trop tard, et qui fait que ces numéros sont reculés de 300 unités.

TABLE SYSTÉMATIQUE

DES ORDRES ET DES FAMILLES

	PAGES		PAGES
ORD. VI. — COLUMBÆ	751	<i>Fam. II. — Cracidæ</i>	789
<i>Fam. I. — Treronidæ</i>	751	<i>Fam. III. — Opisthocomidæ</i> . .	794
Subf. 1. — Treroninæ	751	<i>Fam. IV. — Phasianidæ</i>	794
Subf. 2. — Ptilopodinae	753	Subf. 1. — Pavoninae	794
Subf. 3. — Carpophaginae	745	Subf. 2. — Meleagrinae	796
<i>Fam. II. — Columbidae</i>	748	Subf. 3. — Phasianinae	796
Subf. 1. — Columbinæ	748	Subf. 4. — Numidinae	804
Subf. 2. — Macropygiinae	754	Subf. 5. — Perdicinae	805
Subf. 3. — Ectopistinae	756	<i>Fam. V. — Odontophoridæ</i> . . .	818
<i>Fam. III. — Peristeridæ</i>	757	<i>Fam. VI. — Tetraonidæ</i>	823
Subf. 1. — Zenaidinae	757	ORD. X. — ACCIPITRES	827
Subf. 2. — Turtarinae	758	<i>Fam. I. — Serpentinidæ</i>	827
Subf. 3. — Geopeliinae	762	<i>Fam. II. — Cathartidæ</i>	827
Subf. 4. — Chamepeliinae	765	<i>Fam. III. — Vulturidæ</i>	829
Subf. 5. — Phabinae	765	<i>Fam. IV. — Falconidæ</i>	851
Subf. 6. — Geotrygoninae	768	Subf. 1. — Gypætinæ	851
Subf. 7. — Calœnadinae	774	Subf. 2. — Gypohieracinae . . .	851
<i>Fam. IV. — Gouridæ</i>	775	Subf. 3. — Polyborinae	852
<i>Fam. V. — Didunculidæ</i>	775	Subf. 4. — Circaëtinæ	853
SUCL. II. — PTILOPÆDES	776	Subf. 5. — Gymnogenynæ	853
ORD. VII. — HETEROCLITE	776	Subf. 6. — Circinæ	853
<i>Fam. I. — Pteroclidæ</i>	776	Subf. 7. — Accipitrinae	857
<i>Fam. II. — Hemipodiidæ</i>	778	Subf. 8. — Aquilinae	847
<i>Fam. III. — Thinocoridæ</i>	780	Subf. 9. — Buteoninae	854
<i>Fam. IV. — Chionidæ</i>	780	Subf. 10. — Milvinae	862
ORD. VIII. — CRYPTURI	781	Subf. 11. — Falconinae	868
<i>Fam. I. — Tinamidæ</i>	781	<i>Fam. V. — Pandionidæ</i>	877
Subf. 1. — Tinaminae	781	<i>Fam. VI. — Asionidæ</i>	877
Subf. 2. — Tinamotidinae	786	Subf. 1. — Asioninae	877
ORD. IX. — GALLINÆ	786	Subf. 2. — Ketupinae	879
<i>Fam. I. — Megapodiidæ</i>	786	Subf. 3. — Buboninae	880

	PAGES		PAGES
Subf. 4. — Syrniinae	890	<i>Fam. — Palamedeidae</i>	979
Subf. 5. — Surniinae	895	ORD. XIV. — ANSERES	979
Subf. 6. — Phodilinae	898	<i>Fam. I. — Anatidae</i>	979
<i>Fam. VII. — Strigidae</i>	898	Subf. 1. — Anseranatinae	979
ORD. XI. — HERODIONES	900	Subf. 2. — Cereopsinae	980
<i>Fam. I. — Ibididae</i>	900	Subf. 3. — Plectropterinae	980
<i>Fam. II. — Plataleidae</i>	904	Subf. 4. — Anserinae	982
<i>Fam. III. — Ciconiidae</i>	905	Subf. 5. — Chenonettinae	985
Subf. 1. — Tantalinae	905	Subf. 6. — Cygninae	986
Subf. 2. — Ciconiinae	905	Subf. 7. — Anatinae	987
<i>Fam. IV. — Phænicopteridae</i>	908	Subf. 8. — Fuligininae	996
<i>Fam. V. — Scopidae</i>	909	Subf. 9. — Erismatulinae	1001
<i>Fam. VI. — Balænicepidae</i>	909	Subf. 10. — Merganettinae	1002
<i>Fam. VII. — Ardeidae</i>	909	Subf. 11. — Merginae	1005
ORD. XII. — GRALLATORES	920	ORD. XV. — STEGANOPODES	1004
SUBORD. I. — ALECTORIDES	920	<i>Fam. I. — Phaethontidae</i>	1004
<i>Fam. I. — Aramidae</i>	920	<i>Fam. II. — Pelecanidae</i>	1005
<i>Fam. II. — Eurypygidæ</i>	921	<i>Fam. III. — Phalacrocoracidae</i>	1006
<i>Fam. III. — Rhinochetidae</i>	921	Subf. 1. — Phalacrocoracinae	1006
<i>Fam. IV. — Gruidæ</i>	921	Subf. 2. — Plotinae	1010
<i>Fam. V. — Psophiidae</i>	925	<i>Fam. IV. — Sulidae</i>	1011
<i>Fam. VI. — Cariamidae</i>	924	<i>Fam. V. — Fregatidae</i>	1012
<i>Fam. VII. — Otidae</i>	924	ORD. XVI. — GAVLE	1012
SUBORD. II. — LIMICOLÆ	927	<i>Fam. I. — Sternidae</i>	1012
<i>Fam. VIII. — Oedienemidae</i>	927	Subf. 1. — Sterninae	1012
<i>Fam. IX. — Dromadidae</i>	929	Subf. 2. — Rhynchopinae	1020
<i>Fam. X. — Glareolidæ</i>	929	<i>Fam. II. — Laridae</i>	1020
<i>Fam. XI. — Cursoriidae</i>	950	<i>Fam. III. — Stercorariidae</i>	1027
<i>Fam. XII. — Charadriidae</i>	952	ORD. XVII. — TUBINARES	1028
Subf. 1. — Hematopodinae	952	<i>Fam. I. — Procellariidae</i>	1028
Subf. 2. — Charadriinae	955	<i>Fam. II. — Puffiniidae</i>	1050
<i>Fam. XIII. — Scolopacidae</i>	942	Subf. 1. — Puffiniinae	1050
Subf. 1. — Himantopodinae	942	Subf. 2. — Fulmarinae	1056
Subf. 2. — Totaninae	944	<i>Fam. III. — Halodromidae</i>	1057
Subf. 3. — Scolopacinae	949	<i>Fam. IV. — Diomedeidae</i>	1059
Subf. 4. — Phalaropinae	956	ORD. XVIII. — PYGPODES	1059
SUBORD. III. — FULICARÆ	957	<i>Fam. I. — Colymbidae</i>	1059
<i>Fam. XIV. — Parridae</i>	957	<i>Fam. II. — Podicipedidae</i>	1040
<i>Fam. XV. — Mesornitidae</i>	959	<i>Fam. III. — Alcidae</i>	1042
<i>Fam. XVI. — Rallidae</i>	959	Subf. 1. — Alcinae	1042
Subf. 1. — Rallinae	959	Subf. 2. — Fraterculinae	1045
Subf. 2. — Gallinulinae	975	ORD. XIX. — IMPENNES	1047
Subf. 3. — Fulicinae	977	<i>Fam. — Spheniscidae</i>	1047
<i>Fam. XVII. — Heliornithidae</i>	978	SUBCL. III. — RATITÆ	1049
ORD. XIII. — PALAMEDEÆ	979	ORD. XX. — APTERYGES	1049

	PAGES		PAGES
<i>Fam. — Apterygidæ</i>	1049	<i>Heterodactylæ</i>	1059
ORD. XXI. — CASUARI. . . .	1050	<i>Amphibolæ</i>	1060
<i>Fam. I. — Dromæidæ</i>	1050	<i>Anisodactylæ</i>	1060
<i>Fam. II. — Casuariidæ</i> . . .	1050	<i>Macrochires</i>	1065
ORD. XXII. — RHEÆ	1052	<i>Passeres tracheophonæ</i>	1068
<i>Fam. — Rheidæ</i>	1052	<i>Passeres oligomyodæ</i>	1075
ORD. XXIII. — STRUTHIONES. .	1052	<i>Passeres oscines</i>	1078
<i>Fam. — Struthionidæ</i>	1052	<i>Crypturi</i>	1115
		<i>Gallinæ</i>	1115
SUPPLÉMENT :		<i>Accipitres</i>	1116
<i>Psittaci</i>	1055	<i>Herodiones</i>	1117
<i>Zygodactylæ</i>	1055	<i>Grallatores</i>	1117
		<i>Steganopodes</i>	1118

TABLE DES PLANCHES

Planche XIII.	1.	<i>Ptilopus ponapensis</i> .
	2.	— <i>pelewensis</i> .
	3.	<i>Globicera rufigula</i> .
» XIV.	1.	<i>Carpophaga westermanni</i> .
	2.	<i>Columba uncinata</i> .
» XV.		<i>Lophura sumatrana</i> .
» XVI.		<i>Pulsatrix maximiliani</i> .

SYNOPSIS AVIUM

ORD. VI. — COLUMBÆ ⁽¹⁾

FAM. I. — TRERONIDÆ

SUBF. I. — TRERONINÆ

1558. SPHENOCERCUS

Sphenurus, Sw. (1857, nec *Sphenura*, Licht., 1825); *Sphenocercus*, Gray (1840);
Rhombura, Glog. (1842); *Sphenæna*, *Sphenotreron*, Bp. (1854).

9418. APICICAUDA (Hodgs. = *apicauda* MS; Gray, *List Gull. B. M.*, p. 4; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 4; Rehb., *Tauben*, I, p. 111; *phasianellus*, Licht. Himalaya, de Kumaon à l'Assam, Birmanie, Ténassérin.

9419. OXYURUS (Reinw.), MS.; Tem., *Pl. Col.* 240; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 50; *semitorquatus*, Sw. Java, Sumatra, Bornéo.

9420. SPHENURUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 175; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 57; *cantillans*, Blyth; *turturoides*, *macronotus*, Hodgs.; *minor*, Brooks, *Str. Feath.*, 1875, p. 255. Himalaya, du Cachemire à l'Assam, Birmanie, Ténassérin.

9421. KORTHALSI (Tem. *ubi*?) in Gray, *List Gull. B. M.*, p. 4 (1844); Bp., *Consp. Av.* II, p. 9; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 60; *sphenura*, Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 49; *etorques*, Salvad. Java, Sumatra.

9422. SIEBOLDI (Tem.), *Pl. Col.* 549; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 10; Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 102, pl. 60^d. Japon.

9425. SORORIUS, Swinh., *Ibis*, 1866, pp. 311, 406; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 580; *chæroboatis*, Swinh., *l. c.*, pp. 515, 406. Formose.

9424. FORMOSÆ, Swinh., *Ibis*, 1865, p. 596, 1866, p. 512; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 579; Salvad., *Cat. B. B. M.* XXI, p. 15, pl. 1. Formose (Montagnes).

9425. PERMAGNUS (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 657; Salvad., *Cat.*, p. 14. Iles Loo-Choo ou Liou-Kiou.

1559. VINAGO

Vinago, Crv. (1817); *Phalacrotreron*, Bp. (1854).

9426. WAALIA (Gm.), *Bruce's Reis.* V, 2, *Zusät.*, p. 51 (1791); Afrique N.-E. et équator.

(1) Voy.: Salvadori, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXI (1893).

- Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 555; *abyssinica*, Lath.; Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 151, pl. 9; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 532, pl. 195; *humeralis*, Wagl. (nec Tem.)
9427. *CRASSIROSTRIS* (Fras.), *P. Z. S.*, 1845, p. 55; id., *Zool. Typ.*, pl. 60; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 2; ? *sanctæ-thomæ*, Gm.; *abyssinica*, Hartl. (nec Lath.); *nudi-rostris* (pt.), Schlég.; *calva* (pt.), Schl. et Pol.; *mocrorhyncha*, Schl.
9428. *AUSTRALIS* (Lin.), *Mant.*, p. 526; *Pl. Enl.* 141; M.-Edw. et Grand., *Hist. Mad. Ois.*, p. 470, pl. 190; *madagascariensis*, Gm.; *abyssinica* (pt.), auct. plur.; *waalia*, Vieill. (fem.)
9429. *CALVA* (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 55, pl. 7; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 5; *australis* (pt.), auct. plur.; *pyttriopsis*, Bp.; *nudifrons*, Heugl.
2478. *Var. NUDIROSTRIS*, Sw., *B.-W. Afr.* II, p. 205; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 192; Rehw., *Vög. Deutsch-O.-Afr.*, p. 72; *calva* (pt.), Salvad.; *salvadorii*, Dubois, *P. Z. S.*, 1897, p. 784.
9450. *WAKEFIELDI* (Sharpe), *P. Z. S.*, 1875, p. 715, pl. 58, f. 2.
2479. *Var. SCHALOWI*, Rehw., *Orn. Centralbl.*, 1880, p. 108; id., *J. f. O.*, 1880, p. 208; *calva*, *wakefieldi* (pt.), auct. plur.
9451. *DELALANDEI* (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 6; id., *Icon. Pig.*, pl. 4; Salvad., *Cat.*, p. 24; *australis* et *calva* (pt.), auct. plur.
- tor., ile Socotra.
- Iles St-Thomas et Rol-las (Afrique W.)
- Madagascar.
- Afr. W. de Sierra-Leone au Benguela, à l'E. jusq. Viet. Nyanza. Sénégal, Afrique N.-E., E. et centr.
- Afrique E.
- Du Matabeleland au Ovampoland.
- Afrique E. et S., Nyasaland.

4560. CROCOPUS

Crocopus, Bp. (1854).

9452. *PHOENICOPTERUS* (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 597; Bp., *Consp.* II, p. 41; *militaris*, Tem. (pt.), *Pig.*, pl. 4 (nec pl. 2); *st-thomæ* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); *hardwickii*, Gray.
9453. *VIRIDIFRONS* (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 849; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 9; Salvad., *Cat.*, p. 28; *phonicoptera* (pt.), auct. plur.
9454. *CHLOROGASTER* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, 1, p. 167; Salvad., *l. c.*, p. 50; *militaris* (pt.), Tem., *Pig.*, pl. 2; *phonicoptera* et *st-thomæ* (pt.), Vieill.; *jerdoni*, Strickl.
- Inde N. et centr.
- Indo-Ch., de la Cochinchine à Cachar.
- Inde, Ceylan.

4561. BUTRERON

Butreron, Bonap. (1854).

9455. *CAPELLEI* (Tem.), *Pl. Col.* 145; Steph., *Gen. Zool.* XIV, 1, p. 275, pl. 52; *gigantea*, Vig.; *magnirostris*, Strickl.
- Malac., Sum., Bornéo, Java, îles Mergui.

1562. TRERON

Treron, Vieill. (1816); *Thoria*, Hodgs. (1856); *Romeris* Hodgs. (1841); *Rhamphotreron*, Heine (1890).

9456. NIPALENSIS (Hodgs.), *As. Res.* XIX, p. 164, pl. 9; Bengal E., Him.S.-E.,
Jerd., *B. Ind.* III, p. 445; ?*curvirostra*, Gm.; Indo-Chine, Malac.,
aromatica, auct. plur. (nec Gm.); *nasica*, auct. Sum., Born., Palaw.
plur. (nec Schleg.)
9457. NASICA, Schleg., *Ned. Tijdschr. Dierk.* I, p. 67; id., Sumatra, Engano,
Mus. P.-B. Col., p. 55; *curvirostra*, Wall. Bangka, ? Bornéo S.

1565. OSMOTRERON

? *Dendrophassa*, Glog. (1842); *Osmotreron*, Bp. (1854).

9458. GRISEICAUDA (Gray), *List B. B. Mus., Col.*, p. 10; Sal- Java.
vad., *Cat. B.* XXI, p. 40, pl. 2, f. 1; *aromatica*,
Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 29, pl. 5, et auct. plur.
(nec Lin.); *pulverulenta*, Wall., *Ibis*, 1863, p. 319;
javanica, Schl.
2480. Var. WALLACEI, Salvad., *Cat.*, l. c., p. 42, pl. 2, Célèbes, îles Soula.
f. 2; *griseicauda*, Wall., *P. Z. S.*, 1862,
p. 255 et auct. plur.; *sulaensis*, Schl.
2481. Var. PALLIDIOR, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 178. Îles Djampea et Kalas.
2482. Var. SANGHIRENSIS (Brügg.), *Abh. nat. Ver. Brem.*, Îles Sanghir.
1876, p. 79; *griseicauda* (pt.), Schleg.
9459. VORDERMANI (Finch), *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 162; Îles Kangean.
griseicauda, Vorderm.
9440. PHAYREI, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1862, p. 544; Sal- Bengal E., Indo-Chine
vad., l. c., p. 45; *malabarica* (pt.), Blyth (1845); W.
Bp., *Icon. Pig.*, pl. 11, f. 2 (fem.); *nepalensis*,
Bp. (nec Hodgs.), l. c., pl. 8 (mas.)
9441. MALABARICA (Jerd.), *Ill. Orn.*, pl. 21; Schl., *Mus.* Inde.
P.-B., Col., p. 52; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 12; *affi-*
nis, Jerd. (fem.)
9442. AROMATICA (Gm.); Salvad., *Cat.*, l. c., p. 47, pl. 5; Bourou, ? Amboine,
? amboinensis, Müll. (nec Lin.) ? Céram.
2483. Var. AXILLARIS (Bp.), *Compt. Rend.* XXXIX, Philippines.
p. 875; Salvad., l. c., p. 48, pl. 4; *aroma-*
tica (pt.), auct. plur.
2484. Var. EVERETTI, Rothschi., *Novit. Zool.* I, p. 41; Îles Soulou.
axillaris (pt.), Salvad.
9445. CHLOROPTERA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, 2, p. 852; Îles Nicobar et Anda-
Legge, *B. Ceyl.*, p. 729; Salvad., l. c., p. 49. man.
9444. POMPADORA (Gm.); Bp., *Icon. Pig.*, pl. 11, f. 1 (fem.); Ceylan.
Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 52; *aromatica* et *ma-*
labarica (pt.), auct. plur.; *flavogularis*, Blyth.

9445. *FULVICOLLIS* (Wagl.), *Syst. Av., Col.*, sp. 8; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 57; *aromatica*, var., Tem. et Knip, *Pig. I*, p. 50, pl. 6; *ferruginea*, Wagl. (nec Forsl.); *cinnamomea*, Tem. (nec Sw.); *tenuirostre*, Eyt.
2485. *Var. BARAMENSIS* (Mey.), *J. f. O.*, 1891, p. 75; *fulvicollis* (pl.), Sharpe.
9446. *TEYSMANNI* (Schl.), *Notes Leyd. Mus.* I, p. 105.
9447. *PSITTACEA* (Tem. et Knip), *Pig. I*, p. 28, pl. 4; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 59; Salvad., *l. c.*, p. 55.
9448. *FLORIS* (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, pp. 486, 496; Schl., *l. c.*, p. 59.
9449. *BICINCTA* (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1840, p. 15; Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 851; Schl., *l. c.*, p. 51; *vernans*, Tem. et Knip (nec Lin.), *Pig.*, pl. 10 et 11; *unicolor*, Jerd. (fem.); *multicolor*, Rehb.; *domvili*, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 554.
9450. *VERNANS* (Lin.); *Pl. Enl.* 158; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 15; Schl., *l. c.*, p. 49; *viridis*, Müll. (nec Lin.); *purpurea*, Gm.; *griseicapilla*, Schl.; *chlorops*, Salvad.
9451. *OLAX* (Tem.), *Pl. Col.* 241; Schl., *l. c.*, p. 56.
- Ténass. S., Cochinch., Malacca, Sumatra, Nias, Bangka, Bililiton, Bornéo.
- Bornéo N.
- Ile Sumba.
- Timor, Semaó.
- Flores, Solor, Sumbawa.
- Inde E., Ceylan, Indochine, Malacca, Haïnan.
- Indo-Chine, Malacca, archip. Indo-malais, Célèbes.
- Malacca, Sumatra, Bornéo.

1564. PHABOTRERON

Phapitreron, Bp. (1854); *Phapiscus*, Sundev. (1872); *Phabotreron*, Wald. (1875); *Phabisca*, Salv. 1879); ? *Dendrophaps*, Blyth (ubi), Bp., *C. A.* II, p. 28.

9452. *AMETHYSTINA*, Bp., *Consp. Av.* II, p. 28; Schl., *l. c.*, p. 80; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 214, pl. 54, f. 2.
9453. *CINEREICEPS*, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Acad.* I, p. 8.
9454. *BRUNNEICEPS*, Bourns et Worc., *l. c.*, p. 9.
9455. *FRONTALIS*, Bourns et Worc., *l. c.*, p. 10.
9456. *LEUCOTIS* (Tem.), *Pl. Col.* 189; Schl., *l. c.*, p. 79; Salvad., *Cat.*, *l. c.*, p. 67.
2486. *Var. OCCIDENTALIS*, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 68; *brevirostris*, Tweed. (1879, nec 1877).
2487. *Var. NIGRORUM*, Sharpe, *Tr. Linn. Soc., Zool.* I, pp. 546, 555; Salvad., *l. c.*, p. 68.
2488. *Var. BREVIROSTRIS*, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 549, 852; id. *Voy. Chall., B.*, p. 22, pl. 6; *leucotis* (pl.), Gray.
9457. *MACULIPECTUS*, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Acad.* I, p. 10.
- Luçon, Samar, Leyte, Dinagat, Panaon, Mindanao (Philipp.)
- Ile Tawi-Tawi (Soul.)
- Basilan (Philippines).
- Cébu (Philippines).
- Luçon, Mindoro.
- Basilan.
- Négros, Cébu, Guimaras, Panay.
- Mindanao, Dinagat, Bohol, Leyte, Samar, Soulou.
- Négros (Montagnes).

SUBF. II. — PTILOPODINÆ

1363. PTILOPUS (1)

Ptilinopus, Sw. (1825); *Ptilopus*, Strickl. (1841); *Leucotreron*, *Ramphiculus*, *Omeotreron*, *Jambotreron*, *Thouarsitreron*, *Kurutreron*, *Ptilotreron*, *Lamprotreron*, *Cyanotreron*, *Sylphitreron*, *Iotreron*, Bonap. (1854); *Kurukuru*, Des M. et Prév. (1855); *Trerolæma*, Bonap. (1855); *Silphidæna*, Gray (1855); *Laryngogramma*, Rehb. (1862); *OEdirhinus*, Cab. et Rehw. (1876); *Kranocera*, Rams. (1876); *Xenotreron*, Tweed. (1877); *Eutreron*, *Ptilopodiscus*, *Chlorotreron*, *Thoracotreron*, *Spilotreron*, Salvad. (1882); *Terenotreron*, *Curotreron*, *Phassa*, *Poecilotreron*, Heine (1890); *Mezotreron*, Sharpe (1899).

a. *Leucotreron*.

9458. OCCIPITALIS, Gray, *List B. B. Mus. Gal.*, p. 1 (1841); Luçon, Cebu, Leyte, id., *Gen. B.* II, pl. 118; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 14; Mindanao, Basilan
batilda, Bp. (juv.); *porphyrea*, Bp., *Icon. Pig.*, (Philippines).
pl. 15 (juv.); *incognita*, Tweed.
9459. FISCHERI, Brügg., *Abh. naturw. Ver. Bremen*, V, Célèbes N.
p. 82, pl. 4; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 602.
2489. Var. MERIDIONALIS, Mey. et Wg., *Orn. Monatsb.*, Célèbes S.
1895, p. 12; id., *B. Cel.*, p. 604; *fischeri*,
Mey. (1879-81 nec Brügg.); Gould, *B. New*
Guin., pt. XI, pl. 4.
9460. MARCHEI, Oust., *Le Natural.*, 1880, p. 524; id., *Nouv.* Luçon (Philippines).
Arch. du Mus. VIII, 1884, p. 503, pl. 15.
9461. ROSEICOLLIS (Wagl.), *Syst. Av., Col.*, n° 27; Gray, Sumatra, Java.
Gen. B. II, p. 467; *porphyrea*, Reinw. et auct.
plur. (nec *porphyracea*, Forst.); Prév. et Knip,
Pig. II, pl. 4; Steph., *Gen. Zool.* XIV, p. 277,
pl. 55; *erythrocephalus*, Sw.
9462. ALBOCINCTUS, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 496, pl. 59; Flores.
florensis, Schl., *N. T. D.* IV, p. 20; id., *Mus.*
P.-B., Col., p. 54.
2490. Var. BALIENSIS, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 555. Bali.
9463. CINCTUS (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 58, pl. 25; Schl., Timor, Wetter.
Mus. P.-B., Col., p. 54.
9464. ALLIGATOR, Coll., *P. Z. S.*, 1898, p. 554, pl. 29. Australie N.
9465. EVERETTI, Rothsch., *Ibis*, 1898, p. 295. Ile Alor.
9466. LETTIENSIS, Schl., *N. T. D.* IV, p. 20; id., *Mus. P.-B.*, Lettie, îles Ténimber.
Col., p. 55; Ell., *P. Z. S.*, 1878, p. 572.

(1) Je ne puis admettre les nombreux genres admis en dernier lieu par M. Sharpe, et qui n'offrent pas de caractères bien sérieux. Afin que chacun puisse reconnaître les espèces qui en font partie, j'indiquerai en tête de chaque groupe la dénomination sous-générique en italique.

9467. GULARIS (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol.*, *Zool.* I, p. 247, pl. 29; Prév. et Knip, *Pig.*, pl. 11; Schleg., *l. c.*, p. 57; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 605. Célèbes N.
2491. *Var.* SUBGULARIS, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, n° 2, pp. 4, 6, 19; id., *B. Cel.*, p. 606. Iles Peling et Banggai (Célèbes E.)
9468. MANGOLIENSIS, Rothsch., *Ibis*, 1898, p. 295. Soula Mangoli.
9469. LECLANCHERI (Bp.), *Compt. Rend.* XLII, p. 247; id., *Icon. Pig.*, pl. 16; *gironieri*, Verr. et Des M., *Ibis*, 1862, p. 542, pl. 12; *hugoniana*, Schl. (juv.) Luçon, Guimaras, Né-gros, Cebu, Pala-
wan (Philippines).
9470. JAMBU (Gm.); Tem. et Knip, *Pig.*, p. 65, pl. 27, 28; Schl., *l. c.*, p. 56; *jambos*, Lath. Malac., Sum., Bangka, Billiton, Bornéo.

β. *Mezotreron*.

9471. DOHERTYI, Rothsch., *Ibis*, 1896, p. 566; Hart., *Nov. Zool.* III, p. 589, pl. 12. Ile Sumba.

γ. *Ptilopus*.

9472. GREYI, Gray, *List B. B. Mus.*, *Col.*, p. 4; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 20; Schl., *l. c.*, p. 7; *purpuratus*, Bp. (nec Gm.); *apicalis*, Rams.; ? *fasciatus*, Schal. (juv.?) Nouv.-Calédonie, îles Loyalty, Nouv.-Hébrides.
9475. PELEWENSIS, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1868, pp. 7, 118; Gräffe, *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft I, pl. 7, f. 5; Salvad., *Cat. B.*, p. 86. Iles Pelew.
9474. PEROUSEI, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, p. 195, pl. 54 (1848); Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, pl. 29, f. 2; Schleg., *l. c.*, p. 10; *mariaæ*, Jacq. et Puch.; *samoensis*, Des M. et Prév.; *casarinus*, Hartl. Iles Samoa, Tonga, Fidji.
9475. DUPETIT-THOUARSI (Nebohn), *Rev. Zool.*, 1840, p. 289; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, pl. 29, f. 1; Schl., *l. c.*, p. 15; *purpureleucocephalus* et *leucocephalus*, Gray; *emiliaæ*, Less. Iles Marquises.
9476. XANTHOGASTER (Wagl.), *Syst. Av.*, *Col.*, p. 29; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 4, 554; *purpurata*, Tem. (nec Gm.); *diademata*, Tem., *Pl. Col.* 254; *flavigaster*, Sw.; *aurantiiventris*, Rosenb.; *flavovirescens*, Mey. Iles Banda, Khoor, Key, Ténimber, Timorlaut, Lettie.
9477. RICHARDSI, Rams., *Pr. Linn. S. N. S. W.*, 1881, p. 722; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 554; Gould, *B. New-Guin.*, pt. XVIII, pl. 5; *rhodostictus*, Tristr., *Ibis*, 1882, pp. 159, 144, pl. 5. Ugi (îles Salomon).
9478. PONAPENSIS, Finsch, *P. Z. S.*, 1877, p. 779; Salvad., *Cat.*, p. 95; *fasciatus* (pt.), auct. plur. (nec Peale). Ile Ruck (Carolines E.), ile Ponapé.
9479. HERNSHEIMI, Finsch, *J. f. O.*, 1880, p. 505; Salvad., *Cat.*, p. 94. Ile Kushi (Carol. E.)
9480. SWAINSONI, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 18; id., *B. Austr.* Austr., du Cap York à la

- V, pl. 55; *purpurata*, var. *regina*, Sw.; *purpurata*, Jard. et Sel. (nec auct.), *Ill. Orn.* II, pl. 70; *regina*, Ell., *P. Z. S.*, 1878, p. 551.
9481. EWINGI, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 19; id., *B. Austr.* V, pl. 56; *roseicapillus* (pt.), Des M.; *swainsoni*, Els. (nec Gd.)
2492. Var. FLAVICOLLIS, Bonap., *Consp. Av.* II, p. 20; id., *Icon. Pig.*, pl. 20^a; Salvad., *Cat.*, p. 97; *purpurata*, auct. plur. (nec Gm.); *flavipectus*, Rehb.; *ewingi* (pt.), auct. plur. (nec Gd.)
9482. FASCIATUS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 195, pl. 55; Schleg., *Mus. P.-B., Col.*, p. 6; *clementinæ*, Des M. et Prév.; *apicalis*, Bp.; *pictiventris*, Ell., *P. Z. S.*, 1878, p. 550, pl. 55.
9483. PORPHYRACEUS (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1821, p. 150; Bp., *Consp. Av.* II, p. 21; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 8; *purpurata* (pt.), auct. plur.; *kurucuru*, var., Tem. et Kuip, *Pig.*, pl. 55; *tabuensis*, Lath.; *viridissima*, Tem.; *forsteri*, Desm.; *clementinæ*, Jacq. et Puch.; *fasciatus* (pt.), auct. plur. (nec Peale); *bonapartei*, Gray; *porphyracrus*, Feh. et Hartl.; *whitmeei*, Rams. (1).
9484. RAROTONGENSIS, Hartl. et Feh., *P. Z. S.*, 1871, p. 50; Gräffe, *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft. I, p. 49, pl. 2, f. 4; *neglectus*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 7.
9485. CORALENSIS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 190, pl. 51; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 278, pl. 52; Salvad., *Cat.*, p. 104; ? *chalcurus*, Gray; Feh. et Hartl., *Orn. Centralpol.*, p. 151.
9486. SMITHSONIANUS, Salvad., *Cat. B. B. Mus.* XXI, p. 105; *coralensis* (pt.), Cass.
9487. PURPURATUS (Gm.); Schl., *l. c.*, p. 15; *taitensis*, Less.; *oopa*, Wagl.; *porphyraea* (pt.), Forst.; *furcatus*, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, B., p. 191, pl. 52; *nebouxii*, Des M., et Prév., *Voy. Vénus, Zool.*, p. 255, pl. 7.
9488. CHRYSOGASTER, Gray, *P. Z. S.*, 1853, p. 48, pl. 54; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 29, f. 2; *taitensis*, Rehb. (nec Less.); *coralensis* (pt.), Schleg.; ? *purpurata* (jeune), Tem., *H. N. Pig.* I, p. 284; ? *oopa*, juv., Bp.
9489. ROSEICAPILLUS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 472; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 25; Schl., *l. c.*, p. 8; *purpurata*, Kittl. (nec Gm.); *purpureocinctus*, Gr., *P. Z. S.*, 1853, p. 48, pl. 55.
- Nouv.-Galles du S.,
îles du détroit de Torres,
N.-Guin. S.-E.
Australie N. et N.-W.
Timor, Flores.
Îles Samoa.
Îles Tonga, Fortuna,
Savage, Fidji.
Île Rarotonga (îles Cook).
Hervey (îles Cook).
Îles Paumotu.
Tahiti (îles Société).
Huachine et Raiatea
(îles Société).
Îles Mariannes.

(1) *Quid? Columba porphyraea*, Wagl., *Isis*, 1829, p. 742; Colombe de Tafti, Neboux, *Rev. Zool.*, 1840, p. 289; *porphyraea* (pt.), Forst., *Descr. an.*, p. 167 (ex Ulietea).

9490. *MERCIERI* (Des M. et Prév.), *Voy. Vénus, Orn.*, p. 266; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 22, f. 2. Nouka Hiva (îles Marquises).
 2495. *Var. TRISTRAMI*, Salvad., *Bull. Mus. Zool. Tor.* VII, n. 155; id., *Cat.*, p. 110; *mercieri* (pt.), auct. plur. (nec Des M.) Ouavoa (îles Marquises).
 9491. *HUTTONI*, Finsch, *P. Z. S.*, 1874, p. 92; Salvad., *Cat.*, p. 111. Îles Oparo.

δ. *Lamprotreron*.

9492. *SUPERBUS* (Tem. et Knip), *Pig.*, p. 73, pl. 55; Gould, *B. Austr.* V, pl. 57; *cyanovirens*, Less.; *leucogaster*, Sw.; *porphyrostictus*, Gould (fem.); *swainsoni* (pt.), Sharpe (1884). Moluques, îles Papous, Australie N.
 2494. *Var. TEMMINCKI* (Des M. et Prév.), *Voy. Vénus, Zool.*, pp. 256, 268 (fem.); Blas., *Zeitschr. f. ges. Orn.*, 1885, p. 502, pl. 14; *superba* (pt.), auct. plur.; *formosus*, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 560; *celebensis*, Wall. Célèbes, ? Soulou.

ε. *Eutreron*.

9495. *PULCHELLUS* (Tem.), *Pl. Col.* 564; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 2; Salvad., *l. c.*, p. 117. Nouv.-Guinée, Waigiou, Batanta, Salawatti, Mysol.

ζ. *Ptilopodiscus*.

9494. *CORONULATUS*, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 158, 193, pl. 158; Schl., *l. c.*, p. 9 (pt.); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 15; id., *Cat.*, p. 119. Îles Arou, Nouv.-Guinée S.-E.
 2495. *Var. HUONENSIS*, Mey., *J. f. O.*, 1892, p. 265. Golfe Huon (Nouv.-Guinée E.)
 2496. *Var. TRIGEMINA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, pp. 787, 855; *coronulatus* (pt.), auct. plur.; *marginalis*, Brügg.; ? *pulchelloides* et *flavigaster*, Bernst. Nouv.-Guinée N.-W., Salawatti.
 2497. *Var. GEMINA*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, pp. 786, 971; id., *Orn. Pap.* III, p. 19; *coronulatus* (pt.), Schl.; *senex*, Brügg. Nouv.-Guinée N., îles Jobi et Krudu.
 2498. *Var. QUADRIGEMINA*, Mey., *Ibis*, 1890, p. 421. Nouv.-Guinée N.-E.

η. *Cyanotreron*.

9495. *MONACHUS* (Reinw.), in Tem., *Pl. Col.* 255; Schl., *l. c.*, p. 12; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 20; id., *Cat.*, p. 121. Halmahera, Batjan, Ternate, Kaisa.

θ. *Chlorotreron*.

9496. HUMERALIS, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 166, pl. 21; Schl., *l. c.*, p. 16; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 25. Nouv.-Guin. N.-W. et centr., Salaw., Waig.
 2499. Var. JOBIENSIS, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 16; Becc., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 715. Nouv.-Guinée N., île Jobi.
 9497. BIROI, Madar., *Termes. Füzetek*, XX, p. 47, pl. 1 (1897). Nouv.-Guinée.
 9498. IOZONUS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 186, 195; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 25; id., *Cat.*, p. 124; *iozonus*, Schl., *l. c.*, p. 17. Nouv.-Guinée S.-E., îles Arou.

ι. *OEdirhinus*.

9499. INSOLITUS, Schleg., *Ned. Tijdschr. D.* 1, p. 61, pl. 3, f. 5; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 26; Gould, *B. New-Guin.*, pt. VIII, pl. 2; *globifer*, Cab. et Rehw. Nouv.-Irlande, Nouv.-Bret., île Due York.

κ. *Sylphitreron*.

9500. TANNENSIS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 600; Salvad., *Cat.*, p. 127; *xanthura*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 158; *aromatica et vernans* (pt.), Gray; *curvirostra* (pt.), Rehb.; *corriei*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* I, p. 155. Nouv.-Hébrides.
 9501. AURANTIFRONS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 185, 195, pl. 157; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 28; *auranticollis*, Gr.; Schl., *l. c.*, p. 18; *nova-guineae*, Mey. Îles Arou, Nouv.-Guinée, Jobi, Batanta, Salawatti, Mysol.
 9502. WALLACEI, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 185, 195, pl. 156; Salvad., *l. c.*, p. 50; id., *Cat.*, p. 129. Arou, Key, Timorlaut, Babbar.
 9505. ORNATUS, Schl. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 52; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 19; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 52. Nouv.-Guinée N.-W.
 9504. GESTROI, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 854; Ell., *P. Z. S.*, 1878, p. 557, pl. 54. Nouv.-Guinée S.-E.
 9505. PERLATUS (Tem.), *Pl. Col.* 559; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 17 (pt.); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 55; id., *Cat.*, p. 152. Nouv.-Guinée W., Jobi, Salawatti.
 2500. Var. ZONURA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 197; id., *Orn. Pap.* III, p. 56; *perlatus* (pt.), auct. plur. Nouv.-Guinée S., S.-E. et centr., îles Arou.
 9506. PLUMBEICOLLIS, Mey., *Ibis*, 1890, p. 422; Salvad., *Cat.*, p. 155. Nouv.-Guinée E.

λ. *Thoracotreron*.

9507. STROPHIUM, Jard. (ex Gould), *Contr. Orn.*, 1850, p. 105; Schl., *l. c.*, p. 27; Salvad., *Cat.*, p. 155; *rivoli* (pt.), auct. plur. Louisiades, Nouv.-Guinée S.-E.

9508. RIVOLI (Prév. et Knip), *Pig.* II, pl. 57; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 4; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 40. Archipel Bismarek.
9509. MIQUELI, Schleg. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. D.* IV, p. 22; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 26; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 60, pl. 88. Iles Jobi et Miosnom.
9510. PRASINORRHUS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 185, 195; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 41; id., *Cat.*, p. 157; *rivoli* (pt.), auct. plur. Iles Papous W., Mo-Iuques.
9511. BELLUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1875, pp. 696, 698, pl. 57; Salvad., *Cat.*, p. 158; *patruelis*, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, p. 27, pl. 6. Nouv.-Guinée.
2501. *Var. ORIENTALIS*, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 6. Nouv.-Guinée S.-E.
9512. SPECIOSUS, Schleg. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. D.* IV, p. 25; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 27; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 171, pl. 104. Iles de la baie de Geelvink (Nouv.-Guinée N.-W.)
9513. SALOMONENSIS, Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 528; Gould, *B. New-Guin.*, pt. XIX, pl. 8; *ceraseipectus*, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 442; *johannis*, Rams. (nec Schl.) Iles Salomon.
2502. *Var. JOHANNIS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 556; id., *Voy. Challenger, B.*, p. 52, pl. 10. Iles de l'Amirauté.

μ. *Spilotreron.*

9514. MELANOCEPHALUS (Forst.), *Zool. Ind.*, p. 16, pl. 7; Salvad., *Cat.*, p. 142; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 58, f. 1; *indica*, Müll. (nec Lin.); *melanau-chen*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 671. Java, Flores, Sumbawa, Sumba, Lombok.
2505. *Var. BANGUEYENSIS*, Mey., *J. f. O.*, 1891, p. 70; Salvad., *Cat.*, p. 145; *melanocephalus* (pt.), auct. plur.; *purpureinucha*, Mey., *J. f. O.*, 1891, p. 71. Iles Philippines et Soulou.
2504. *Var. MELANOSPILA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 671; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 608; *melanocephalus* (pt.), auct. plur.; *celebensis*, Brügg., *Abh. Naturw. Ver. Brem.*, 1876, p. 80. Célèbes, Togian.
2505. *Var. CURVSORRHUA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 671; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 58, f. 2; *melanocephalus* (pt.), auct. plur.; *sulaensis*, Brügg., *l. c.*, p. 81. Iles Soula et Céram.
2506. *Var. PELINGENSIS*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 155 (1898). Iles Peling, Banggai.
2507. *Var. XANTHORRHOA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 671; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 58, f. 5; *melanocephalus* (pt.), auct. plur.; *nuchalis*, Brügg., *l. c.*, p. 80. Iles Sanghir.

v. *Ionotrogon*.

9515. NANUS (Tem.), *Pl. Col.* 564 (*nana* pro *nana*); Schleg., *l. c.*, p. 21; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 55. Nouv.-Guinée centr. et S., Salawat., Mysol.
9516. IONOGASTER (Tem. ex Reinw.), *Pl. Col.* 252 (*hyogastra*); Hart., *Nov. Zool.* VI, pl. 4, f. 8; *ionogaster*, Rehb.; Salvad., *Cat.*, p. 148. Halmahera, Batjan.
9517. GRANULIFRONS, Hart., *Ibis*, 1898, p. 296; id., *Nov. Zool.* VI, pl. 4, f. 9. Ile Obi.
9518. PECTORALIS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 740; Schleg., *l. c.*, p. 25; *cyanovirens*, Less., *Voy. Coq.* I, 2, p. 715, pl. 42, f. 2 (nec f. 1); *virens*, Less.; *viridis*, juv., Müll.; *roseipectus*, Gray. Nouv.-Guin. W., Waigiou, Gagie, Gucbeh, Mysol, Koffiao.
9519. SALVADORII, Rothsch., *Bull. Brit. Orn. Cl.*, 1892, p. x; Salvad., *Cat.*, p. 150. Ile Jobi.
9520. VIRIDIS (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 17; Eydl. et Gerv., *Mag. de Zool.*, 1856, pl. 76; Schl., *l. c.*, p. 22; *asiatica*, Müll. Amboine, Céram, Bourou.
9521. MUSSCHENBROEKI, Schleg. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 23; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 115, pl. 95; *viridis geelvinkianus*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 25. Iles de la baie de Geelvink (Nouv.-Guinée N.-W.)
2508. Var. LEWISI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 724; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 556; *viridis* (pt.), auct. plur.; *geelvinkianus*, Lay. (nec Schl.); *eugeniæ* (fem.), Rams. Iles Salomon.
2509. Var. VICINA, Hart., *Nov. Zool.* II, p. 62 (*vicinus*). Ile Fergusson.
9522. EUGENIÆ (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 157; Salvad., *Cat. B.*, p. 155, pl. 5. Ugi (iles Salomon).

1566. CHRYSOENAS

Chrysæna, *Chrysotrogon* et *Chrysœnas*, Bp. (1854).

9523. LUTEOVIRENS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.* XVI, 1841, p. 515; id., *Voy. Pôle Sud*, pl. 12, ff. 1, 2; Schl., *l. c.*, p. 41; *felicix*, Hombr. et Jacq., *l. c.*, p. 516 (juv.); *flava*, Gr.; *gouldiæ*, Rehb. (nec Gr.) Ovalau, Viti-Levu (Fidji).
9524. VICTOR, Gould, *P. Z. S.*, 1871, p. 642; Rowl., *Orn. Misc.* I, p. 25, pl. 59; Feh., *Voy. Challenger, B.*, pl. 15; Salvad., *Cat.*, p. 157. Iles Fidji.
9525. VIRIDIS, Layard, *P. Z. S.*, 1875, p. 151; Feh., *Voy. Challenger, B.*, p. 5, pl. 16; *luteovirens* (pt.), Lay. Kandavu (Fidji).

1567. DREPANOPTILA

Drepanoptila, Bp. (1855); *Drepanoptera*, Bp. (1856; err. ?); *Calyptomenænas*, Verr. et Des M. (1862).

9526. HOLOSERICÆ (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 75, pl. 52; Nouv.-Calédonie et

Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 41; Salvad., *Cat.*, p. 158; *oceanica*, Jouan. ile des Pins.

1568. ALECTROENAS

Alectranas, Gray (1840); *Alectoranas*, Agass. (1846); *Columbigallus*, Furningus, Des M. (1854); *Chlamydena*, Furningus, *Erythrana*, *Erythrotreron*, *Erythrolemma*, Bp. (1854).

9527. PULCHERRIMA (Scop.), *Del. Flor. et Faun. Ins.* II, p. 94; Iles Seychelles.

Schl., *l. c.*, p. 44; Salvad., *Cat.*, p. 161; *rubricapilla*, Gm.; Tem. et Kuip, *Pig.* I, pl. 20.

9528. SGANZINI (Des M.), *Enc. H. N. Ois.* VI, p. 52; Schl. Iles Comores.

et Pol., *Rech. Faun. Madag.*, p. 115, pl. 57; Salvad., *Cat.*, p. 162.

2510. Var. MINOR, Berl., *Abh. Senckenb. naturf. Ges.* Ile Aldabra.

XXI, p. 495.

9529. NITIDISSIMA (Scop.); Salvad., *Cat.*, p. 165; *francie*, Ile Maurice (éteint).

Gm.; Tem. et Kuip, *Pig.* I, p. 50, pl. 19; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 267; *batafica*, Bon.; *jubata*, Wagl.

9550. MADAGASCARIENSIS (Lin.); *Pl. Enl.* 11; Tem. et Kuip, Madagascar, ile Nos-

l. c., pl. 17; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 266; Schl., *l. c.*, p. 45; *phanicura*, Wagl. sibé.

1569. MEGALOPREPIA

Megaloprepia, Rehb. (1852).

9551. FORMOSA, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 560; Salvad., *Orn.* Halmahera, Ternate,

Pap. III, p. 64; *bernsteini*, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* I, p. 59, pl. 5, f. I (fem.); *ochrogaster*, Bernst.

9552. MAGNIFICA (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 125; id., Australie E.

Pl. Col. 165; Gould, *B. Austr.* V, pl. 58.

9555. ASSIMILIS (Gould), *P. Z. S.*, 1850, p. 201; id., *B. Austr.*, Du Cap York à la baie

Suppl., pl. 67; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 58; de Rockingham.

puella (pt.), Bp.

2511. Var. POLIURA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, Nouv.-Guinée centr.

p. 426; id., *Orn. Pap.* III, pp. 68, 557; (vallée du Fly).

puella et *assimilis* (pt.), auct. plur.

2512. Var. SEPTENTRIONALIS, Mey., *Abh. K. Zool. Mus.* Nouv.-Guinée N., E.

Dresd., 1892-95, n° 5, p. 25; *poliura* (pt.), et ile de Jobi.

Salvad.

9554. PUELLA (Less.), *Bull. Univ. Sc. Nat.*, 1827, p. 400; Nouv.-Guinée W., Sa-

Prév. et Kuip, *Pig.* II, pl. I; Salvad., *Orn. Pap.* lawati, Batanta,

III, p. 66; Schl., *l. c.*, p. 58. Waigiou, Ghemien.

SUBF. III. — CARPOPHAGINÆ

1570. SERRESIUS

Serresius, Bonap. (1855).

9555. GALEATUS, Bp., *Compt. Rend.* XLI, p. 1110 (1855); Iles Marquises.
id., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, p. 592, 1856,
pl. 48; id., *Icon. Pig.*, pl. 55.

1571. CARPOPILAGA

Carpophaga, Selby (1855); *Ducula*, Hodgs. (1856); *Rhinopus*, Hodgs. (1841);
Zonarnas, Rehb. (1852); *Globicera*, *Ptilocolpa*, Bp. (1854); *Muscadivora*,
Schl. (1864); *Zonophaps*, *Cryptophaps*, Salvad. (1895).

a. *Globicera*.

9556. PACIFICA (Gm.); Schl., *Mus. P.-B. Col.*, p. 87; *globicera*, Reinh.; *ænea* (pt.), Wagl.; *oceanica*, Selb.,
Nat. Libr., Pig., p. 117, pl. 7; *microcera*, Cass.,
U. S. Expl. Exp., Orn., p. 265, pl. 29; *tarrati*,
Bp.; *sundevalli* (pt.), Bp.; *samoensis*, Brm.;
frauenfeldi, Pelz. Iles Samoa, Tonga,
Fidji, Nouv.-Hé-
brides, Louisiades,
Nouv. Guinée S.-E.
9557. FARQUHARI (Sharpe), *Ibis*, 1900, p. 549. Erromanga (Nouv.-
Hébrides).
9558. OCEANICA (Less.), *Voy. Coq., Zool.* I, p. 452, pl. 41; Iles Carolines et Pe-
Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 24; Bp., *Consp.* II, lew.
p. 51; *pacifica* (pt.), Harth. et Fch.
9559. MYRISTICIVORA (Scop.); Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 74; Nouv.-Guinée W. et
ænea, Gm.; Quoy et Gaim., *Voy. Uran., Zool.*, iles Papous occid.
p. 119, pl. 29 (nec Lin.); *pacifica* (pt.), Bp.; id.,
Icon. Pig., pl. 55; *globicera*, Gr.; *sundevalli* (pt.),
Gr.; *tumida*, Wall.; *roseinucha* (pt.), Schl.;
temmincki, Tristr. (I).
9560. RUBRICERA, Gray, *List B. Br. Mus.*, p. 18 (1856); Bp., Nouv.-Irlande, Nouv.-
Consp. II, p. 51; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 79; Bretagne, Nouv.-
Sh. in *Gould's B. New-Guin.*, pt. XIX, pl. 7; Hanovre, île Duc
lepada, Cass.; *pinon*, Less. (nec Q. et G.) York.
9561. RUFIGULA, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1878, p. 556; Iles Salomon.
id., *Orn. Pap.* III, p. 80; *rubricera* (pt.), Gr.;
richardsi, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 445.
9562. AURORÆ, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 201, Iles Aurora et Maitea
pl. 56; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 256, (iles Société).
pl. 24; Salvad., *Cat. B.*, p. 180.

(1) A cette espèce se rapporte probablement la *Columba australis*, Chamisso (nec Lin.),
Kotzeb. Reise, III, p. 113.

9545. WILKESI, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 205, pl. 58; Salvad., *Cat. B.*, p. 181; *forsteri* (pt.), Bp., Rehb., Gieb., Gr. Tahiti (îles Société).
9544. ?FORSTERI (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 739; Salvad., *Cat. B.*, p. 172 (en note); *glocicera* (pt.), Forst. Tahiti.
- β. *Carpophaga*.
9545. WHARTONI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 515, pl. 43; Salvad., *Cat.*, p. 184. Ile Christmas.
9546. OENOTHORAX, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1892, p. 159; id., *Cat.*, p. 184, pl. 6. Ile Engano (Sumatra W.)
9547. INSULARIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1858, p. 270; Salvad., *Cat.*, p. 185; *sylvatica*, var., Blyth (1846); *ænea* (pt.), Bp.; *ænea*, var. *nicobarica*, Pelz. Iles Nicobar.
9548. CONSOBRINA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1887, p. 558; Modigl., *Viag. a Nias*, p. 441, pl. 15; *ænea*, Rosenb. (nec Lin.) Ile Nias.
9549. CONCINNA, Wall., *Ibis*, 1865, p. 585; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 59, f. 1; *ænea*, Wall. (1857 nec Lin.); *chalybura*, Gr. (nec Bp.); *chalybea*, Rosenb.; *roseinucha* (pt.), Schl. Iles Arou, Moluques, petites îles de la Sonde, îles Ténimb., Sanghir, Célèbes S.
2515. Var. SEPARATA, Hartl., *Nov. Zool.* III, p. 180. Iles Key.
9550. INTERMEDIA, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894, p. 249; id., *B. Cel.*, pl. 59, f. 2. Ile Talaut.
9551. GEELVINKIANA, Schleg., *Mus. P.-B., Columbæ*, p. 86; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 84; id., *Cat.*, p. 188; *roseinucha*, Rosenb. (nec Schl.) Iles Miosnon, Mafoor, Misori.
9552. VANDEPOLLI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVIII, p. 190. Ile Nias.
9553. PAULINA (Bp. ex Tem.), *Consp. Av.* II, p. 55; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 84; *ænea* (fem.), Tem. et Kuip, *Pig.*, pl. 4 et auct. plur.; *rufinuchalis*, Cass.; *sylvatica*, Schl. (nec Tick.); *rufinucha*, Bp. Iles Célèbes et Soula.
2514. Var. PULCHELLA, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1874, p. 157; Salvad., *Cat.*, p. 189. Iles Togian (Célèbes E.).
2515. Var. NUCHALIS, Cab., *J. f. O.*, 1882, p. 126; Salvad., *l. c.*, p. 190; *paulina* (pt.), auct. plur. Ile Luçon.
9554. ÆNEA (Lin.); Tem. et Kuip, *Pig.* I, pl. 5; Salvad., *Cat.*, p. 190; Schl., *l. c.*, p. 85; *moluccensis*, Briss.; *pusilla*, Blyth. Inde, Indo-Ch., Andaman, Haïnan, îles de la Sonde et Soula.
2516. Var. SYLVATICA, Tick., *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 581; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 86; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 581. Inde S., Ceylan.
2517. Var. CHALYBURA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 52; id., *Icon. Pig.*, pl. 42. Philippines.
2518. Var. PALAWANENSIS, Blas., *Ornis*, IV, p. 516. Palawan.

9555. RHODINOLEMA, Scat., *P. Z. S.*, 1877, p. 555; id., *Voy. Challeng. Birds*, p. 51, pl. 9; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 85. Iles de l'Amirauté.
9556. VANWYCKI, Cass., *Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.*, 1862, p. 520; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 87; *Gould's B. New-Guin.*, pt. XXV, pl. 8. Nouv.-Irlande, ile Duc York, Nouv.-Bretagne.
9557. PISTRINARIA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 56; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 86, 558; id., *Cat.*, p. 197. Iles Salomon.
9558. ROSACEA (Tem.), *Pl. Col.* 578; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 89; *cineracea*, Rosenb. (nec Tem.) Célèbes, Halmahera, iles Key, Ténimber, Timor, Flores, etc.
9559. PERSPICILLATA (Tem.), *Pl. Col.* 246; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 45; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 89; *temmincki*, Wall., *Ibis*, 1865, p. 584. Halmahera, Batjan, Bourou.
9560. NEGLECTA, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, pp. 195, 544; id., *Mus. P.-B.*, p. 90; *perspicillata* (pt.), Gray, Wall. Céram, Amboine.
9561. PICKERINGI, Cass., *Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.*, 1854, p. 228; id., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 267, pl. 27; *anea*, Peale (nec Lin.), *chalybura* (pt.), Gray; *everetti*, Grant. Iles Soulou, Mantanani et la côte N.-W. de Bornéo.
9562. CINERACEA (Tem.), *Pl. Col.* 565; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 91. Timor.
9563. LATRANS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 200, pl. 55; Cass., *ibidem*, 1858, pl. 26; *ocropygia*, Bp. Iles Fidji.
9564. ZOÆ (Less.), *Voy. Coq., Zool.* I, p. 205, pl. 59; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 94; id., *Cat. B.*, p. 204. Nouv.-Guinée, Jobi, Salawatti, Arou.
2549. ? *Var. ORIENTALIS*, Mey., *Abh. u. Ber. Kgl. Zool. Anthropol. Mus. Dresd.*, n° 2-4, p. 15 (1891). Nouv.-Guinée N.-E.

γ. *Ptilocolpa*.

9565. GRISEIPECTUS, Bp. (ex Gray), *Consp. Av.* II, p. 54; id., *Icon. Pig.*, pl. 51; Schleg., *Mus. P.-B., Col.*, p. 88; *pectoralis*, Gray. Luçon, Mindoro, Mindanao (Philipp.).
9566. NIGRORUM, Whiteh., *Ibis*, 1897, p. 459; *carola*, Grant. Negros (Philippines).
9567. CAROLA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 54; Salvad., *Cat.*, p. 206; *griseipectus* (pt.), auct. plur. Luçon.

δ. *Zonophaps*.

9568. FORSTENI (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 59; Schleg., *Mus. P.-B., Col.*, p. 95; *forsteri* (err.), Tem. et Knip, *Pig.* II, pl. 47. Célèbes N.
9569. POLIOCEPHALA, Gray, *List B. Br. Mus.* III, *Gallinæ*, p. 6; id., *Gen. B.* II, pl. 119; Schleg., *l. c.*, p. 92. Negros, Dinagat, Mindanao, Basilan.

9570. MINDORENSIS, Whiteh., *Ann. and Mag. N. H.*, 1896, p. 189; Grant, *Ibis*, 1896, p. 476, pl. 11. Mindoro (Philippines).
9571. RADIATA (Quoy et Gaim.), *Voy. Astr., Zool.* I, p. 244, pl. 26; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 29; Schl., *l. c.*, p. 55. Célèbes, Sanghir.
9572. FINSCH, Rams., *Journ. Linn. Soc., Zool.*, 1881, p. 129; *Gould's B. New-Guin.*, pt. XVII, pl. 2. Nouv.-Irlande.
9575. BASILICA, Bp. (ex Sundev.), *Consp. Av.* II, p. 55; Schl., *l. c.*, p. 96; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 96; *basalis*, Gray; *basilis*, Rehb., *basileus*, Finsch. Halmahera, Ternate, Morotai, Batjan.
2520. *Var.* OBIENSIS, Hart., *Ibis*, 1898, p. 296. Ile Obi.
9574. RUFIGASTRA (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol.*, p. 245, pl. 27; Prév. et Knip, *Pig.*, pl. 9; Schl., *l. c.*, p. 97; *rufiventris*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 790. Nouv.-Guinée, Wai-giou, Salawatti, Mysol, Jobi.
9575. CHALCONOTA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1874, p. 87, 1875, p. 790; id., *Orn. Pap.* III, p. 100; id., *Cat. B.*, p. 215. Nouv.-Guinée N.-W.

ε. *Ducula*.

9576. LACERNULATA (Tem.), *Pl. Col.* 194; Schl., *l. c.*, p. 95; Salvad., *Cat. B.*, p. 215; ? *concolor*, Bp. Java.
9577. WILLIAM, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 552. Bali.
9578. SASAKENSIS, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 564. Lembock.
9579. CUPREA (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1840, p. 12; Hume, *Str. F.*, 1875, p. 528; Salvad., *Cat. B.*, p. 215; *insignis* (pt.), auct. plur. Inde S.
9580. INSIGNIS (Hodgs.), *As. Res.* XIX, p. 162, pl. 9; Salvad., *Cat. B.*, p. 216; *badia* (pt.), Schl., *l. c.*, p. 96. Himalaya E., du Né-paul à l'Assam.
9581. GRISEICAPILLA (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1875, p. 228; Davis., *Str. F.*, 1877, p. 460; Salvad., *Cat. B.*, p. 217; *insignis* (pt.), Blyth. Du Manipour au Té-nassérim.
9582. BADIA (Rall.), *Tr. Linn. Soc.* XIII (1822), p. 517; Salvad., *Cat. B.*, p. 218; *capistrata*, Tem., *Pl. Col.* 165; Prév. et Knip, *Pig.*, pl. 57. Malacca, Sumatra, Bornéo et Java (Mus. Brux.)

ζ. *Cryptophaps*.

9583. POECILORRHOA, Brügg., *Abh. Naturw. Ver. Brem.* V, p. 84; Gould, *B. New-Guin.*, pt. XI, pl. 5. Célèbes N.

η. *Zonænas*.

9584. MULLERI (Tem.), *Pl. Col.* 566; Schl., *l. c.*, p. 95; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* III, p. 101; id., *Cat. B.*, p. 221; *muelleri*, Wall. Nouv.-Guinée S., îles Arou.
2521. *Var.* ACRANTIA, A. B. Mey., *Abh. Mus. Dresd.*, 1892-95, n° 5, p. 25. Nouv.-Guinée N.

9585. PINON (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Uran.*, Zool., p. 118, pl. 28; Schl., *l. c.*, p. 94; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 105; *pinona*, Brügg.
 2522. Var. RUBIENSIS, Mey., *Sitzb. u. Abh. d. Ges. Isis*, 1884, I, p. 51; Salvad., *Cat. B.*, p. 225. Ile Rubi et Nouv.-Guinée S.-E.
 9586. SALVADORII, Triste., *P. Z. S.*, 1881, p. 996; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 559; id., *Cat. B.*, p. 225. Louisiades.
 9587. WESTERMANI, Schl. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. D.* IV, p. 27; Salvad., *Cat. B.*, p. 224; *C. pinon jobiensis*, Schl., *N. T. D.* IV, p. 26; *astrolabiensis*, Mey. Jobi, Nouv.-Guinée N.-E.
 9588. MELANOCHROA, Sclat., *P. Z. S.*, 1878, p. 672, pl. 42; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 106; id., *Cat. B.*, p. 225. Archipel Bismarck.
 9589. BRECHLEYI, G. R. Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 528; id., *Cruise of the Curaçoa*, B., p. 588, pl. 18; Salvad., *Cat.*, p. 225. Iles Salomon.

1572. PHÆNORHINA

Phænorhina, Gray (1859).

9590. GOLIATH, G. R. Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 165, pl. 155; Schl., *l. c.*, p. 95; Salvad., *Cat. B.*, p. 226. Nouv.-Calédonie, île des Pins.

1573. MYRISTICIVORA

Myristicivora, Rehb. (1852).

9591. BICOLOR (Scop.); Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 98 (pt.); Salvad., *l. c.*, p. 227; *alba*, Gm.; *littoralis*, Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 7; *myristicivora*, Gr.; *casta*, Peale; *luctuosa* (pt.), auct. plur. (nec Reinw.); *melanura* (pt.), auct. plur. (nec Wall.) Indo-Ch. centr. et S., îles Andamans, Nicobars, Malacca, îles Indo-Malaises, Moluques, Ténimber.
 2525. Var. SPILORRHOA (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 186, 196; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 111; id., *Cat.*, p. 231; *bicolor* et *luctuosa* (pt.), auct. plur.; Gould, *B. Austr.* V, pl. 60. Nouv.-Guinée, îles Arou, Australie N.
 2524. Var. SUBFLAVESCENS (Finsch), *Ibis*, 1886, p. 2; Gould's *B. New-Guin.*, pt. XXV, pl. 7; *luctuosa* (pt.), auct. plur. Nouv.-Irlande.
 2523. Var. MELANURA, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 561; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 178; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 116; *bicolor* (pt.), auct. plur. Halmahera, Batjan, Bourou, Cérám, Amboine, Goram.
 9592. LUCTUOSA (Tem., ex Reinw.), *Pl. Col.* 247; Schl., *l. c.*, p. 102; Salvad., *Cat.*, p. 255. Célèbes, îles Soula.

1574. LOPHOLÆMUS

Lophorhynchus, Sw. (1837, nec Vieill., 1816); *Lopholaimus*, G. R. Gray (1841);
Lopholæmus, Agass. (1846).

9595. ANTARCTICUS (Shaw), *Zool. of New-Holl.*, p. 15, pl. 5; Australie E., Tasma-
Gould, *B. Austr.* V, pl. 61; *dilopha*, Tem.; id., nie.
Pl. Col. 162.

1575. HEMIPIAGA

Hemiphaga, Bonap. (1854).

9594. NOUVE-ZELANDIE (Gm.); Schl., *I. c.*, p. 98; Bull., Nouv.-Zélande.
Hist. B. of New-Zeal., p. 157, pl. 18; id. *B. New-*
Zeal., p. 229, pl. 24 (1888); *zealandica*, Lath.;
?brunnea, Lath.; *spadicea*, Less. (nec Lath.);
leucophæa, Il. et Jacq.; *argetræa*, Forst.; *novæ*
zealandicæ, Gray.

9595. SPADICEA (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. ix; Selb., Ile Norfolk (éteint ?)
Nat. Libr., Pig., p. 127, pl. 9; Salvad., *Cat.*,
p. 258; *gigas*, Ranz.; *leucogaster*, Wagl.; *prin-*
ceps, Vig.

9596. CHATHAMENSIS (Rothsch.), *P. Z. S.*, 1891, p. 312, Iles Chatham.
pl. 28; Salvad., *Cat.*, p. 259; *novæ-zealandicæ*
(pt.), auct. plur.; *chathamica*, Forb.

FAM. II. — COLUMBIDÆ

SUBF. I. — COLUMBINÆ

1576. GYMNOPIAPS

Gymnophaps, Salvad. (1874).

9597. ALBERTISH, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1874, p. 86; Nouv.-Guinée S.-E.
id., *Orn. Pap.* III, pp. 178, 560.

1577. COLUMBA

Columba, Lin. (1766); *Palumbus*, Kp. (1829); *Alsocomus*, Tick. (1842); *Dendro-*
treron, Hodgs. (1844); *Patagiænas*, *Lepidornas*, *Lithanas*, *Tenipænas*,
Chlorænas, *Stictænas*, *Janthanas*, Rehb. (1852); *Picazurus*, Ch. et Des M.
(1853); *Leucomelana*, *Trocaza*, *Palumbænas*, *Crossopthalmus*, Bp. (1854);
Leucotænia, Rehb. (1862); *Rupicola*, *Sylvicola*, Bogd. (1884); *Carlotreron*,
Heine (1890).

9598. GRISEA (Gray), *List of Gal. B. M.*, p. 5 (nec Bonn.); Bornéo, Sumatra.
Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 105; Salvad., *Cat. B.*,
p. 248, pl. 7.

9599. UNICINCTA, Cass., *Pr. Ac. Philad.*, 1859, p. 145; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* VII, p. 226, pl. 6.
9600. LEUCONOTA, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 25; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 59; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 50; Schl., *l. c.*, p. 69; *leucomena*, Bp.
9601. RUPESTRIS, Pall., *Zoogr.* I, p. 560; Bp., *Consp. Av.* II, p. 48; id., *Icon. Pig.*, pl. 75; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 54; *leucozonura*, Swinh.; *livia*, var. *rupicola daurica*, Radde; *rupicola*, Hend. et Hume.
2526. Var. PALLIDA, Rothsch. et Hart., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 41.
2527. Var. TACZANOWSKII, Stejd., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 624.
9602. LIVIA, Briss.; Dress., *B. of Eur.* VII, p. 41 (pt.), pl. 457 (fig. sup.); Dubois, *Fne. ill.*, *Ois.* II, p. 15, pl. 169; *saxatilis*, Briss.; *anas*, Lin. (pt.); *domestica*, Gm.; *amaliae*, Brm.; *affinis*, Blyth; *elegans*, *glauconotus*, *unicolor*, *dubia*, Brm.; *plumipes*, Gray.
2528. Var. NEGLECTA, Hume, *Str. F.* I, p. 218; *livia* (pt.), Salvad.
2529. ? Var. TURRICOLA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 47; Selys, *Ibis*, 1870, p. 455. (Aberr. ?)
2530. Var. GYMNOCYCLA, Gray, *List B. Br. Mus. Columbæ*, p. 28; Salvad., *Cat.*, p. 257; *livia* (pt.), Licht.; *senegalensis*, Bp.
2531. Var. SCHIMPERI, Bp., *Consp. Av.* II, p. 48; Shell., *B. of Egypte*, p. 212; *anas*, Savig. (nec Lin.), *Descr. de l'Égypte*, p. 290, pl. 15, f. 7; *livia* (pt.), auct. plur.; *turricola*, Tristr.
2532. Var. INTERNEDIA, Strickl., *Ann. and Mag. N. II.*, 1844, p. 59; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 584; *livia* et *anas* (pt.), auct. plur.; *cyanotus*, Severtz.
9605. ANAS, Lin.; Naum., *Vög. Deutschl.* VI, p. 215, pl. 151; Dubois, *Fne. ill.*, *Ois.* II, p. 9, pl. 168; *cavorum*, *arborea*, Brm.; *columbella*, Bp.
9604. EVERSMAINI, Bp., *C.-R.* XLIII, 1856, p. 858; Jerd., *B. Ind.* III, p. 467; *anicapilla*, Blyth; *fusca*, Severtz.; ? var. *brachyura*, Severtz.; *intermedia*, Dress. (nec Strickl.)
9605. ALBITORQUES, Rüpp., *Neue Wölb.*, p. 65, pl. 22, f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 826; Schleg., *Mus. P.-B., Col.*, p. 72.
9606. GUINEA, Lin.; Edw., *Birds* I, pl. 75; Schl., *l. c.*, p. 72; *guineensis*, Briss.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 822; *trigonigera* (pt.), Wagl.; *dilloni*, Bp.
2535. Var. UHRENSIS, Rehw., *Orn. Monatsb.* VI, p. 82.
- Gabon, Congo Indépendant, Libéria.
- Yarkand, Thibet, Himalaya, du Cachemire au Boutan.
- Himalaya, du Cachemire au Sikkim, Turkestan, Thibet, Chine N.
- Sibérie E.
- Corée, Ussuri.
- Europe S., Afrique N., Asie centr., Turkestan, Chine N.
- De la Perse au N.-W. de l'Inde.
- Italie, Palestine, Perse.
- Afrique W.
- Égypte, Nubie, Palestine.
- Du S. de la Perse jusqu'à l'Inde, Ceylan, Chine et Japon.
- Europe jusqu'au Turkestan à l'E.
- Sibérie W., Turkestan, Afghanistan, Inde N.-W.
- Abyssinie, Choa.
- Afrique du 16° l. N. au 6° l. S.
- Afrique E. allemande.

2354. *Var. PILEONOTA*, Gray, *List B. Br. Mus., Col.*, p. 52; Bp., *C.-R. XLIII*, p. 858; *guinea* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *trigonogera* (pt.), Wagl.
9607. *MADA*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 511. M^t Mada, ile Bourou.
9608. *GYMNOPHTHALMA*, Tem. et Knip, *Pig. I*, p. 48, pl. 18; *Salvad., Cat.*, p. 269; ?*corensis*, Jacq.; *loricata* (pt.), Wagl. Iles Curaçoa, Aruba et Bonaire.
9609. *PICAZURO*, Tem., *Pig. et Gallin. I*, pp. 444, 449; *Salvad., Cat.*, p. 271; *leucoptera*, Max. (nec Lin.); *loricata*, Licht.; *pæciloptera*, Max. (nec Vieill.); *gymnophthalmus* (pt.), auct. plur.; *maculosa*, Burm. (nec Tem.) Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, ? Bolivie E.
9610. *ALBIPENNIS*, Sch. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 18; *Tacz., Orn. Pér. III*, p. 252; *Salvad., Cat.*, p. 272, pl. 8; *maculosa*, auct. plur. (nec Tem.) Pérou S. et Bolivie.
9611. *MACULOSA*, Tem., *Pig. et Gallin. I*, pp. 115, 450; *Salvad., l. c.*, p. 275; *pæciloptera*, Vieill.; *maculipennis*, Licht.; *gymnophthalmus*, Rehb.; *reichenbachi*, Bp.; Rehb., *Tauben*, I, p. 67, pl. 226, f. 1268; *fallax*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 80. Uruguay, Argentine, Patagonie N.
9612. *HODGSONI*, Vig., *P. Z. S.*, 1852, p. 16; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 61; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 581; *nipalensis*, Hodgs. Himalaya, du Cachemire au Boutan et Setchuan W.
9613. *ARQUATRIX*, Tem. et Knip, *Pig. I*, p. II, pl. 5; Levaill., *Ois. d'Afr. VI*, p. 67, pl. 264; *arquatricula*, Bp., *Consp. II*, p. 50. Afrique S., S.-W. et E. jusqu'au Kilima Ndjaro.
2355. *Var. THOMENSIS*, Boc., *Jorn. Sc. Lisb.*, 1888, p. 250. I. St-Thomas (Afr. W.)
9614. *SJOESTEDTI*, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1898, p. 158 (*sjöstedti*); *arquatrix*, Sjöst. Caméron.
9615. *LEUCOCEPHALA*, Lin.; Tem. et Knip, *Pig. I*, pl. 15; Vieill., *Cat. Ois. I*, p. 551, pl. 194; Audub., *B. Amer. IV*, p. 515, pl. 280. Antilles, Bahama, Florida Keys, Honduras, Cozumel.
9616. *SQUAMOSA*, Bonn., *Tabl. Enc. méth. I*, p. 254; *Salvad., Cat.*, p. 280; *corensis*, Tem. (nec Jacq.), *Pig. et Gallin. I*, pp. 214, 461; Schleg., *Mus. P.-B., Col.*, p. 68; *portoricensis*, Tem. et Knip, *Pig. I*, p. 41, pl. 15; Sagra, *H. N. Cuba, Ois.*, p. 172, pl. 27; *monticola*, Vieill.; *imbricata*, Wagl. Antilles.
9617. *SPECIOSA*, Gml.; *Pl. Enl.* 215; Tem. et Knip, *l. c.*, p. 59, pl. 14; *Tacz., Orn. Pér. III*, p. 251; *spilodera*, Bp. Mexique, Amér. centr. et mér. jusque vers le 12° l. S.
- ✓9618. *INORNATA*, Vig., *Zool. Journ.*, 1828, p. 446; d'Orb. in *Sagra, Hist. N. Cuba, Ois.*, p. 175, pl. 28; *Salvad., Cat.*, p. 284; *rufina*, Gosse (nec Tem.) Grandes Antilles.
9619. *FLAVIROSTRIS*, Wagl., *Isis*, 1851, p. 519; Baird, *B. N. Am.*, p. 598, pl. 61; id., *Mex. Bound. II*, États-Unis du S. jusqu'au Costa-Rica.

- B.*, p. 24, pl. 25; *erythrina*, Licht.; *dorsalis*, Gray; *solitaria*, Mc Call.
2556. *Var. MADRENSIS*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, p. 6. Iles Tres-Marias.
9620. *VINA*, Godm., *Ibis*, 1900, p. 565. Pérou N.
9621. *OENOPS*, Salv., *Nov. Zool.* II, p. 20. Pérou.
9622. *RUFINA*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 59, pl. 24; *Tacz.*, *Orn. Pér.* III, p. 256; *sylvestris*, Vieill.; *melanoptera*, Tem. (nec Mol.); *plumbescens*, Lawr. (juv.) Du Guatémala à la Colombie, Ecuador, Pér., Guyane, Brés.
9625. *CARIBÆA*, Jacq., *Beytr.*, p. 50, n° 24; Tem. et Knip, *l. c.*, p. 22, pl. 10; Salvad., *Cat.*, p. 290; *lampirauchen*, Wagl.; *caribbæa*, Den. Jamaïque, ? Porto-Rico.
9624. *FASCIATA*, Say, *Long's Exp. R. Mts.* II, p. 10; Bp., *Am. Orn.* I, p. 77, pl. 8; Audub., *B. Am.* IV, p. 512, pl. 279; *monilis*, Vig. États-Unis W. jusqu'au Guatémala et Nicaragua.
2557. *Var. VIOSCÆ*, Brewst., *Auk*, 1888, p. 86. Basse-Californie.
9625. *ALBILINEA*, Gray, in Bp., *Consp. Av.* II, p. 51; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 67; *albilineata*, Gr.; *denisea*, *Tacz.*; *guayaquilensis*, Ridgw. Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie, Guyane anglaise.
2558. *Var. CRISSALIS*, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 294; *albilinea* (pt.), auct. plur. Costa-Rica, Veragua.
9626. *TUCUMANA*, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, X, n° 208, p. 22 (1895). Tucuman.
9627. *ARAUCANA*, Less., *Voy. Coq.* I, 2, p. 706, pl. 40; *denisea*, Tem., *Pl. Col.* 502; *fitzroyii*, King; *?meridionalis*, Peale. Pérou centr. et du Chili à Magellan.
9628. *LAURIVORA*, Webb et Berth. (pt.), *Orn. Can.*, p. 26, pl. 5 (fig. infér.); Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 45; Dress., *B. Eur.* VII, p. 51, pl. 460; *trocac* (pt.), Gray. Iles Canaries (Gomera et Palma).
9629. *BOLLEI*, Godm., *Ibis*, 1872, p. 217; Dress., *B. Eur.* VII, p. 29, pl. 459; *bollii*, auct. plur. Canaries (Gomera, Ténériffe, Palma).
9650. *TROCAZ*, Heinck., *Brewst. Journ. of Sc.*, 1829, p. 228; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 98; Dress., *l. c.*, p. 55, pl. 461; *laurivora*, Webb et Bert. (pt.), *Orn. Can.*, pl. 5 (fig. supér.); *bouvryi*, Bp. Madeire.
9651. *PALUMBUS*, Lin.; Naum., *Vög. Deutschl.* VI, p. 168, pl. 149; Dress., *l. c.*, p. 5, pl. 456; Dubois, *Fne ill. Vert. Belg.*, Ois. II, p. 4, pl. 167; *arborea*, Pall.; *torquata*, Leach; *pinetorum*, Brm.; *palumbaria*, Körn.; *excelsus*, Bp. Europe, Asie W. jusqu'en Perse, Palestine, Afrique N.-W., Açores, Baléares, Madeire.
2559. *Var. CASIOTIS* (Bp.), *Consp.* II, p. 42; id., *Icon. Pig.*, pl. 58; *palumbus* et *torquatus* (pt.), auct. plur.; *himalayana*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 66; *pulchricollis*, Severtz. Turkestan jusqu'au N.-W. de l'Himalaya, Cachemire, Punjab, Perse S.-E.
9652. *TORRINGTONIE* (Kelaart), *Pr. Faun. Ceyl.*, p. 107; Legge, *B. Ceyl.*, p. 695, pl. 50; *torringtonii*, Kel.; Schl., *Mus. P.-B.*, p. 71. Ceylan.

9655. *ELPHINSTONEI* (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 149; Jerd., *Ind. Orn.*, pl. 48; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 59; Schl., *l. c.*, p. 70. Inde S. (montagnes).
9654. *PULCHRICOLLIS*, Hodgs., in *Gray's Zool. Misc.*, p. 85; Gould, *B. of Asia*, VI, pl. 58; Schleg., *l. c.*, p. 71. Himalaya E., ? Chine S., Formose.
9655. *PUNICEA* (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 461; Legge, *B. of Ceyl.*, p. 696; Salvad., *Cat.*, p. 506. Inde centr. E., Indo-Ch.W., Malae., Ceyl.
9656. *PALUMBOIDES* (Hume), *Str. Feath.*, 1875, p. 502; Wald., *Ibis*, 1875, p. 515, pl. 15; *nicobarica*, Wald. Iles Andamans et Nicobars.
9657. *VERSICOLOR*, Kittl., *Kupfert.* 1, p. 5, pl. 5, f. 2; *kittlitzii*, Tem., *Pl. Col.*; id., *Tabl. méth.*, p. 80; *metallica*, Vig.; *iris*, Kittl.; *jaunthina*, Schl. (pt.); *splendida*, Stejn. Iles Bonin.
9658. *JOUYI* (Stejn.), *Amer. Natural.*, 1887, p. 585; Salvad., *Cat.*, p. 510; *jaunthina*, Seeb. (pt.) Iles Loo-Choo.
9659. *JANTHINA*, Tem., *Pl. Col.* 505; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 16; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 161, pl. 60, 100. Japon, Corée.
2540. *Var. NITENS* (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 421; Salvad., *Cat.*, p. 511; *jaunthina*, Kittl. (nec Tem.); *Kupfert.* 1, p. 5, pl. 5, f. 1. Iles Bonin.
9640. *METALLICA*, Tem., *Pl. Col.* 562; Schl., *l. c.*, p. 75; Salvad., *Cat.*, p. 512. Timor et petites îles voisines.
9641. *GRISEIGULARIS* (Wald. et Lay.), *Ibis*, 1872, p. 104, pl. 6; Salvad., *Cat.*, p. 515; *luzoniensis*, Schleg., *l. c.*, p. 75. Philippines, îles Soulo, Bornéo N.
9642. *ALBIGULARIS* (Bp.), *C.-R.* XXXIX, p. 1105; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 120, 560; Sharpe, in *Gould's B. New-Guin.*, pt. XXV, pl. 6; *halmakeira*, *leucoloma*, Bp.; *rawlinsonii*, Sharpe. Moluques, Nouv.-Guinée et îles voisines, Louisiades.
9643. *HYPOENOCHROA* (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 156; Schleg., *l. c.*, p. 77; *hypoinochroa*, Gr.; *vitiensis*, Verr. et Dès M., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1862, p. 150 (nec Q. et G.) Nouv.-Caléd., île des Pins, îles Loyalty.
9644. *VITIENSIS*, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol.*, *Zool.* I, p. 246, pl. 28; Feh. et Hartl., *Faun. Centralpolyn.*, pp. 157, 279, pl. 11, f. 2; Schl., *l. c.*, p. 77. Iles Fidji.
9645. *LEOPOLDI* (Tristr.), *Ibis*, 1879, p. 195; Salvad., *Cat.*, p. 517; *hypoinochroa*, Lay. (nec Gould), *Ibis*, 1878, p. 276. Nouv.-Hébrides.
9646. *CASTANEICEPS*, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 187, pl. 50; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 252, pl. 25; Schl., *l. c.*, p. 77; *vitiensis* (pt.), Cass. (juv.) Iles Samoa.
9647. *PALLIDICEPS* (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 248; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 125; id., *Cat.*, p. 519. Ile du Duc York.
9648. *PHILIPPANA* (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, Ile Ugi (Salomon).

- p. 721 (*philippina*); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 560; id., *Cat.*, p. 519.
9649. LEUCOMELA, Temm., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 126; id., *Pl. Col.* 186; Gould, *B. Austr.* V, pl. 59; *norfolciensis*, Lath. Australie E.
9650. POLLENI, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 87; id. et Poll., *Faun. Madag.*, p. 112, pl. 57; Salvad., *Cat.*, p. 521. Iles Comores.
9651. VINACEA, Tem. et Knip (nec Gm.), *Pig.* I, p. 87, pl. 44 (1808-11); *bicolor* et *plumbea*, Vieill., *N. Dict.* XXVI, pp. 545, 558 (1818); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 254; Salvad., *Cat.*, p. 524; *locutrix*, Max.; Tem., *Pl. Col.* 166; *infuscata*, Licht.; *purpureo-tincta*, Ridgw.; *subsp. bogotensis*, Berl. et Leverk., *Ornis*, 1890, p. 52. Guyane, Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie, Brésil.
9652. NIGRIROSTRIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1859, p. 590; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 78; Salvad., *Cat.*, p. 522. Mexique S., Amérique centr.
9653. SUBVINACEA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1868, p. 155; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 75, pl. 91; Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 217. Costa-Rica, Veragua, Colombie, Ecuador.
2541. *Var.* BERLEPSCHI, Hartl., *Nov. Zool.* V, p. 504. Ecuador N.-W.

1578. NESOENAS

Nesenas, Salvad. (1895); *Trocaza*, Shell. (1885, nec Bp.)

9654. MAVERI (March.), *Mus. March.*; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 60; *meyeri*, Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, p. 111, pl. 56; Salvad., *l. c.*, p. 527. Ile Maurice.

1579. TURTUROENA

Tuturæna, Bp. (1854); *Peleianas*, Rehb. (1862); *Trizusa*, Heine (1890).

9655. DELEGORGUEI (Deleg.), *Voy. Afr. Austr.* II, p. 615; Salvad., *Cat.*, p. 528, pl. 9, ff. 1, 2; *johanna*, Bp., *Consp. Av.* II, p. 45; *lunigera*, Gray. Afrique S.-E.
9656. SHARPEI, Salvad., *Cat.*, p. 529, pl. 11, f. 5; Rothsch., *Novit. Zool.* I, p. 41, pl. 5; *delegorguei*, Hartl. (nec Deleg.), *Abh. Naturw. Ver. Brem.*, 1891, p. 57. Nguru (Afr. équat. E.).
9657. HARTERTI, Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 287, pl. 2. Kilima-Ndjaru.
9658. INCERTA, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 550. ?
9659. MALHERBEI (Verf.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 514; Salvad., *l. c.*, p. 551; *chlorophæa*, Hartl., *P. Z. S.*, 1866, p. 529. Iles Principe et St-Thomas (Afrique W.).
9660. IRIDITORQUES (Cass.), *Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.*, 1856, Du Gabon à Libéria

p. 254; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 69; Forb. et Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, pl^e 2 et 3; *chalcauchia*, Gray; *malherbei* (pt.), auct. plur. (nec Verr.); *büttikoferi*, Rehw., *J. f. O.*, 1891, p. 575. (Afrique W.)

SUBF. II. — MACROPYGIINÆ

1580. TURACOENA

Turacana, Bp. (1854); *Haploenas*, Heine (1890).

9661. MENADENSIS (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Astrol.* I, Célèbes, îles Togian.
p. 248, pl. 50; Schleg., *l. c.*, p. 166; ? *var. major*, W. Blas., *Zeitschr. Ges. Orn.* II, p. 509.
2542. *Var.* SULAENSIS, Forb. et Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 135. Îles Soula.
9662. MODESTA (Tem.), *Pl. Col.* 552; Prév. et Knip, *Pig.* II, Timor et îles voisines.
pl. 51; Schl., *l. c.*, p. 107.

1581. MACROPYGIA

Macropygia, Sw. (1857); *Coccyzura*, Hodgs. (1845).

9665. LEPTOGRAMMICA (Tem.), *Pl. Col.* 560 (1855); Schl., Java, Sumatra, Malac.
l. c., p. 107; *walik-mehia*, Rehb., *Tauben, Suppl.*,
pl. 5, f. 29; *walichæhra*, Gray; *tusalia*, Sharpe,
P. Z. S., 1887, p. 445.
2545. *Var.* TUSALIA (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 957; Himal. E., du Népaül
Salvad., *l. c.*, p. 558; *leptogrammica* (pt.), au Ténass., Moupin.
auct. plur.
2544. *Var.* MINOR, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 555; Grant, Haïnan.
P. Z. S., 1900, p. 502; *tusalia* (pt.), Gray;
swinhoei, Rams., *Ibis*, 1890, p. 218.
9664. MAGNA, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 497; Schl., *l. c.*, Timor et îles voisines.
p. 108; Salvad., *Cat.*, p. 542.
9665. TIMORLAOENSIS, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 214; Timor-Laut.
Salvad., *l. c.*, p. 542; *keiensis*, Mey. (nec Salvad.)
9666. MACASSARIENSIS, Wall., *Ibis*, 1865, p. 589; Wald., Célèbes S.
Tr. Zool. Soc. VIII, p. 85; *amboinensis*, *var. albi-*
capilla, Brüggm.
9667. CINNAMOMEA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1892, Engano.
p. 140; id., *Cat. B.*, p. 544.
9668. RUFIPENNIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1846, p. 571; Îles Andaman et Nico-
Salvad., *Cat.*, p. 544. bar.
9669. TENCUIROSTRIS, Bp., *Consp. Av.* II, p. 57; Salvad., Îles Philippines et Sou-
l. c., p. 546; *phasianella*, Tem., *Pl. Col.* 100; lou.
Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 52; *amboinensis* (pt.),
auct. plur.; *eurycerca*, Tweedd.

2545. *Var. MODIGLIANI*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1887, p. 559, pl. 8, f. 2; id., *Cat.*, p. 549. Ile Nias.
2546. *Var. EMILIANA*, Bp., *Consp. Av.* II, p. 58; Salvad., *l. c.*, p. 547; *unchall*, Gr. (nec Wagl.); *tenuirostris* (pt.), Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 109. Java, Bornéo N., Lombok.
9670. *PHASIANELLA* (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1821, p. 129 (nec 1824, *Pl. Col.*; Gould, *B. Austr.* V, pl. 75; *amboinensis* (pt.), auct. plur.; *Turtur phasianellus*, Schl. Australie E. et S.
9671. *AMBOINENSIS* (Lin. ex Briss.); Rehb., *Tauben*, I, p. 86, pl. 251, f. 1565; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 152; ? *macroura*, Gm.; *albiceps*, Tem., in Bp., *Consp. Av.* II, p. 56; *turtur* (pt.), Schl.; *buruensis*, Salvad. Amboine, Céram, Bourou.
2547. *Var. KEYENSIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 204; id., *Orn. Pap.* III, p. 146; *phasianella* (pt.), auct. plur. (nec Tem.); *turtur* (pt.), Schl. Iles Kei.
2548. *Var. ALBICAPILLA*, Bp., *Consp. Av.* II, p. 57; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 40; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 154; *turtur* (pt.), Schl., *Mus. P.-B., Col.*, pp. 111, 112. Iles Célèbes, Soula et Togian.
2549. *Var. SANGHIRENSIS*, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1878, p. 1185; Blas., *Ornis*, 1888, p. 619, pl. 5; *turtur* (pt.), Schl. Sanghir.
2550. *Var. MAFORENSIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 429; id., *Orn. Pap.* III, p. 148; *turtur* (pt.), Schl.; *doreya*, Rosenb. (nec Bp.); *griseinucha* (pt.), Salvad. (1876). Ile Mafoor (baie de Geelwink).
2551. *Var. DOREYA*, Bp., *Consp. Av.* II, p. 57; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 141, 561; *amboinensis* (pt.), Less.; *phasianella*, auct. plur. (nec Tem.); *turtur* (pt.), Schl.; *griseinucha* (pt.), Salvad.; ? *batchianensis*, Hein. et Rehw. (nec Wall.) Nouv.-Guin., Waigiou, Guebeh, Batanta, Salawatti, Mysol, Mysori, Jobi, Arou.
2552. *Var. CUNCTATA*, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 214. St-Aignan (Lousiades).
2553. *Var. CINEREICEPS*, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 558; Salvad., *Cat.*, p. 557; *amboinensis* et *doreya* (pt.), auct. plur. Nouv.-Guin. S.-E., îles D'Entrecasteaux.
2554. *Var. GRISEINUCHA*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 204 (pt.); id., *Cat.*, p. 557. Ile Miosnom (baie de Geelwink).
2555. *Var. BATCHIANENSIS*, Wall., *Ibis*, 1865, p. 589; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 156; *amboinensis* (pt.), auct. plur.; *albicapilla*, var., Gr.; *turtur* (pt.), Schl. Batjan, Halmahera, Ternate, Morty, Kajoa.
2556. *Var. KERSTINGI*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1897, p. 25. Nouv.-Guinée N.-E.
2557. *Var. GOLDIEI*, Salvad., *Cat. B.*, p. 558; *doreya* (pt.), Sharpe. Nouv.-Guinée S.-E.

2558. *Var. CARTERETIA*, Bp., *Consp. Av.* II, p. 57; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 158; *turtur* (pt.), Cab. et Rehw.; *amboinensis* (pt.), Rams.; *nigrirostris*, De Vis (nec Salvad.) Nouv.-Bret., Nouv.-Irl., ile Duc York, Nouv.-Hanovre, Nouv.-Guin. S.-E.
9672. *RUFICEPS* (Tem.), *Pl. Col.* 561; Schl., *Mus. P.-B.*, p. 110; *assimilis*, Hume, *Str. Feath.* II, p. 441. Iles de la Sonde, Malac., Birm., Ténass.
2559. *Var. ORIENTALIS*, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 575. Tambora, Sambawa.
9675. *NIGRIROSTRIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 972; id., *Orn. Pap.* III, pp. 149, 561. Nouv.-Guinée, archip. Bismarck.
9674. *RUFICASTANEA*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 514; Salvad., *l. c.*, pp. 149, 561; *arossii*, Tristr.; *castanea*, Salvad.; *arossiana*, Tristr. Iles Salomon.
9675. *KUFA*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 287; Salvad., *Cat.*, p. 565. Nouv.-Hébrides.
9676. *MACKINLAYI*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 286; Salvad., *Cat.*, p. 564. Ile Tanna (Nouv.-Hébrides).

1582. REINWARDTOENAS

Reinwardtœnas, Bp. (1854); *Reinwardtœna*, G. R. Gr. (1856); *Coccyzonas*, Heine (1890).

9677. *REINWARDTI* (Tem.), *Pl. Col.* 248 (*reinwardtsi*); Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 104; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 125; *typica*, Bp. Célèbes, Moluques, Céram, Amboine, Waigiou.
2560. *Var. GRISEITINCTA*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 18. Nouv.-Guinée.
2561. *Var. ORIENSIS*, Hart., *Ibis*, 1898, p. 296. Iles Obi.
2562. *Var. MINOR* (Schl.), *Mus. P.-B., Col.*, p. 106; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 129. Ile Mysori (baie de Geelwink).
9678. *BROWNII* (Sclat.), *P. Z. S.*, 1877, p. 110; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 150, 561. Ile Duc York, Nouv.-Bretagne.

1583. CORYPHOENAS

Coryphanas, Wardl. Rams. (1890).

9679. *CRASSIROSTRIS* (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 156; Gray, *Cruise of the Curaçoa*, p. 590, pl. 19; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 131. Iles Salomon.

SUBF. III. — ECTOPISTINÆ

1584. ECTOPISTES

Ectopistes, Sw. (1827); *Trygon*, Brm. (1851, nec Adans.)

9680. *MIGRATORIUS* (Catesb.), *Car.* I, p. 25, pl. 25; Wils., *Am. Orn.* I, p. 102, pl. 44, f. 1; Gould, *B. Eur.*, pl. 247; *americana*, Kalm.; *canadensis*, Briss.; *histrion*, *centralis*, Müll.; *gregoria*, Brm. (hybride). Amérique du Nord, régions or. et centr.

FAM. III. — PERISTERIDÆ

SUBF. I. — ZENAINIDINÆ

1585. ZENAIIDURA

Zenaidura, Bp. (1854); *Perissura*, Cab. (1856); *Zenaidura*, Cones (1874).

9681. CAROLINENSIS (Lin. ex Catesb.), *Car.* I, p. 24, pl. 24; Amér. du N. et centr.
Audub., *B. Am.* V, p. 56, pl. 286; *macroura*, (du S. du Canada à
Edw.; *marginata*, Lin.; *fusca*, Müll.; *hoiottl*, Panama, Antilles).
neria, Gm.; *marginellus*, Woodh.; *macroura*,
Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1883, p. 555.
9682. CLARIONENSIS, TOWNS., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, Ile Clarion (Mex. W.)
p. 155; Salvad., *Cat. B.*, p. 578.
9685. YUCATANENSIS, LAW., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1869, p. 208; Yucatan.
Salvad., *l. c.*, p. 575 (en note).
9684. GRAYSONI, LAW., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1871, p. 17; B., Iles Socorro.
B. et R., *N. Am. B.* III, p. 582; Salvad., *l. c.*, p. 578.

1586. ZENAIDA

Zenaida, Bp. (1858); *Stenurana*, *Platypternana*, Rehb. (1862).

9685. MARTINICANA (Briss.); Bp., *Consp. Av.* II, p. 82; *mar-* Petites Antilles et ile
tinica, var. β , Gm.; *aurita*, Tem. et Knip, *Pig.* I, S^e-Croix.
p. 60, pl. 25; Salvad., *Cat.*, p. 580; *castanea*,
Wagl.; *bimaculata*, Gray.
- ✓ 9686. MERIDIONALIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 60, n^o 4; Iles Bahama, Florida
Bp., *Consp. Av.* II, p. 97; Forb. et Rob., *Bull.* Keys, Antilles,
Liverp. Mus. I, p. 56; *zenaida*, Bp.; Audub., Yucatan.
B. Am. V, p. 4, pl. 281; *amabilis*, Bp.; Salvad.,
Cat., p. 582; *richardsoni*, Cory.
2565. Var. SPADICEA, Cory, *Auk*, 1886, pp. 498, 502; Grand Cayman.
id., *B. W. Ind.*, p. 245; Salvad., *l. c.*, p. 585.
2564. Var. YUCATANENSIS, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 584; Côtes du Yucat. et les
amabilis, Boucard (nec Bp.) îles du golfe de Hond.
9687. MACULATA (Vicill., nec Gm.), *Enc. méth.* I, p. 576; Amér. mér. occid. de
Bp., *Consp.* II, p. 82; *meridionalis*, King (nec l'Ecuad. à la Patag.,
Lath.); *aurita* (pt.), Tem.; *auriculata*, Des M., Brésil, Paraguay,
in Gay, *Hist. de Chile*, I, p. 581, pl. 6; Salvad., Urug., Argentine
l. c., p. 584; *chrysauchenia* et *chileensis*, Rehb.;
hypoleuca et *noronha*, Gr.
9688. RUFICAUDA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 85; Schl., *Mus.* Colombie, Vénézuéla,
P.-B., Col., p. 141; Salvad., *l. c.*, p. 587; *mexi-* ? Rio-Branco.
cana, *penthalia*, *castanea*, Bp.; *bogotensis*, Lawr.

9689. VINACEO-RUFA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 176, Salvad., *l. c.*, p. 589; *rubripes*, Lawr., *Auk*, 1885, p. 557; *wellsi*, Lawr. Guyane angl., Vénéz., Curaçao, Grenada, Grenadines.
 9690. JESSIEÆ, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 527; Salvad., *l. c.*, p. 589. Bas-Amazone (Diamantina).
 9691. ?STENURA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 84; Hein. et Rehw., *Nomencl. Mus. Hein. Orn.*, p. 284. Colombie.

1587. NESOPELIA

Nesopelia, Sundev. (1872).

9692. GALAPAGOENSIS (Gould), *Voy. Beagl., Zool.*, p. 115, pl. 46; Des M. et Prév., *Voy. Vénus, Ois.*, p. 270, pl. 8; Schl., *l. c.*, p. 140. Iles Galapagos.
 2565. *Var. EXSUL*, Rothsch. et Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 184. Culpepper et Wenman (Galapagos).

1588. MELOPELIA

Melopelia, Bp. (1854); *Melopeleia*, Rehb. (1862).

- ✓ 9695. LEUCOPTERA (Lin.); Bp., *Consp.* II, p. 81; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 152; *aurita* (pt.), Tem.; *trudeaui*, Aud., *B. Am.* VII, p. 552, pl. 496. Ét.-Unis du S., Amér. centr. jusqu. Costa-Rica, Gr. Antilles.
 2566. *Var. MELODA* (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1845, I, p. 585; id., *Faun. Per.*, pp. 44, 276, pl. 29; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 241; *souleyetiana*, Des M., in Gay, *Hist. de Chile*, I, p. 580, pl. 7; *leucoptera* (pt.), Schl. Pérou, Chili N.

SUBF. II. — TURTURINÆ

1589. TURTUR

Peristera, Boie (1828, nec Sw., 1827); *Turtur*, Selby (1855); *Streptopelia*, Bp. (1854); *Spilopelia* et *Stigmatopelia*, Sundev. (1872); *Homopelia*, Salvad. (1895); *Onopopelia*, Blauf. (1898).

a. Turtur.

9694. COMMUNIS, Selb., *Nat. Libr., Pige.*, pp. 155, 171 (1855); *Col. turtur*, Lin.; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 246; *tenera* (aberr.) et *dubia*, Brm.; *lugubris* et *maxima*, Landb. (aberr.); *vulgaris*, Eyl. (1856); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 20, pl. 170; *mingratorius*, Sw.; *auritus*, Gr. (1840, ex Ray, 1715); *afra*, Webb et Berth. (nec Lin.); *sylvestris*, *cyano-*notus, Rehb.; *glauconotus*, Brm. Europe, Afrique N. et N.-E., Sénégalie, Ténériffe.

2567. *Var. ARENICOLA*, Hartl., *Novit. Zool.* 1, p. 42. Golfe Persique, Asie W., Tunisie.
9695. *ISABELLINUS*, Bp., *C. R.* XLIII, p. 942; id., *Icon. Pig.*, pl. 102; Schl., *l. c.*, p. 117; *auritus* (pt.), auct. plur.; *turturoides, leoninus*, Würt.; *sharpii*, Shell.; id., *B. Egypt.*, p. 215, pl. 10, f. 2. Afrique N.-E.
9696. *ORIENTALIS* (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 606; Schl., *l. c.*, p. 118; Dress., *B. Eur.*, pl. 465; *rupicola*, Pall.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 385; *meena*, Syk.; *agricola*, Tick.; *gclastis*, Tem., *Pl. Col.* 550; *erythrocephalus*, Gray; *stimpsoni*, Steju. Himalaya E., Indo-Chine, Mandchourie, Corée, Japon, Formose.
2568. *Var. FERRAGO* (Eversm.), *Add. ad Zoogr. Rosso-As.*, fasc. III, p. 17; id., *J. f. O.*, 1855, p. 292; *pulehrata*, Hodgs.; *vitticollis*, Hume; *rupicolus* (pt.), auct. plur. (nec Pall.); *gelastes*, Severtz. (nec Tem.) Sibérie S.-W., Asie centr., Inde, Ceylan.
9697. *LUGENS* (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 64, pl. 22, f. 2; Schl., *l. c.*, p. 119; Salvad., *Cat.*, p. 408. Afrique E., de l'Abysinie au 7° l. S.

β. *Homopelia*.

9698. *PICTURATUS* (Tem.), *Pig. et Gal.* I, pp. 515, 480; id., *Pl. Col.* 242; *dufresnii*, Leach; *picta* (pt.), Less.; *versicolor*, Kittl.; *prevostianus*, Bp.; ? *cinerea*, Scop.; ? *phonicorhyncha*, Wagl. Madagascar, Réunion, Maurice.
2569. *Var. ABBOTTI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 515. Seychelles.
9699. *CHUNI* (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 140. Ile Chagos.
9700. *ALDABRANUS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1874, pp. 625, 692, pl. 75; Salvad., *Cat.*, p. 411. Ile Aldabra.
2570. *Var. COMORENSIS*, E. Newt., *P. Z. S.*, 1877, p. 500; Salvad., *l. c.*, p. 412; *picturatus* (pt.), auct. plur. Iles Comores.
2571. *Var. COPPINGERI*, Sharpe, *Rep. Voy. Alert.*, p. 484; Salvad., *l. c.* Ile Glorioso.
2572. *Var. SATURATA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 600. Ile Poivre.
9701. *ROSTRATUS*, Bp., *Consp. Av.* II, p. 62; Hartl., *Faun. Madag.*, p. 67; Schl., *l. c.*, p. 150; *picturata*, var. Prév., *Pig.* II, texte de la pl. 55; *picturatus* (pt.), Schl. et Pol.; ? *miniata*, Tem., *Pig. et Gal.* I, pp. 569, 460; ? *cinereus* (pt.), Bp. Iles Seychelles.

γ. *Streptopelia*.

9702. *RISORIUS* (Lin.), *Pl. Enl.* 244; Selby, *Nat. Libr.*, *Pig.*, p. 170, pl. 17; *alba*, Tem. et Knip (aberr.); var. *cicurata*, Wagl. Plus ou moins domestique (descend du suivant).

9705. ROSEOGRISEUS (Sundev.), *Krit. om Levaill.*, p. 54; Shell., *Ibis*, 1885, p. 509; *risoria*, Rüpp. (nec Lin.); *albiventris*, auct. plur. (nec Gr.); *fallax*, Schl., *l. c.*, p. 124. Afrique N.-E., Arabie.
9704. SEMITORQUATUS (Rüpp.), *Neue Wirbelth., Vög.*, p. 66, pl. 25, f. 2; Salvad., *Cat.*, p. 416; *levaillanti*, Tem. (*ubi*), Less., *Tr. Orn.*, p. 475; *erythrophrys* (pt.), auct. plur. (nec Sw.); *vinaceus* (pt.), Gr.; *gumri*, Rehb. Presque toute l'Afrique jusqu'au 14° l. N.
2573. Var. ERYTHROPHRYS, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 207, pl. 22; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 121. Côte-d'Or.
2574. Var. SMELLEYI, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXI, p. 449; *erythrophrys*, Antin. (nec Sw.); *semitorquatus*, var., Shell. Du Niger au Haut-Nil Blanc.
9705. DECIPIENS, Feh. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 544; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* 1, 2, p. 855; *risoria* (pt.), auct. plur.; *collaris*, Hempr. Dongola.
2575. Var. AMBIGUA, Boc., *Orn. Ang.*, p. 586 (*ambiguus*); Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 13; *semitorquatus*, Kirk (nec Rüpp.); *decipiens* (pt.), auct. plur. Afrique austr. et N.-E., du 20° l. S. au 9° l. N.
9706. PERSPICILLATUS, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 179; Fisch., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 377; *albiventris*, Böhm (nec Gr.); *capicola* (pt.), Schal. Massaland (Afrique centr. E.)
9707. BITORQUATUS (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 86, pl. 40; Schl., *l. c.*, p. 121; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 155; id., *Cat.*, p. 421. Java, Lombock, Sumbawa, Flores, Solor, Timor.
9708. DUSSUMIERI (Tem.), *Pl. Col.* 188; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 20; Schl., *l. c.*, p. 120; Salvad., *Cat.*, p. 425; *gaimardi*, Bp., *Consp.* II, p. 66. Bornéo N.-E., Philippines, îles Soulou et Marianne.
9709. CAPICOLA (Sundev.), *Krit. om Levaill.*, p. 54 (*C. vinacea*, var. *capicola*); Feh. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 548; Salvad., *Cat.*, p. 424; *risoria* (pt.), auct. plur.; *humilis* (fem.), Tem., *Pl. Col.* 258; *vinaceus* (pt.) et *semitorquatus* (pt.), auct. plur.; *albiventris* (pt.), Gray; *delalandii*, Schl. Colonie du Cap, Natal, Transvaal.
2576. Var. DAMARENSIS, Feh. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 550; Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 14; Salvad., *l. c.*, p. 426; *risoria*, *vinaceus*, *albiventris*, *semitorquatus* et *capicola* (pt.), auct. plur. Angola, Damaras, Afrique E., Madag. et îles Comores.
2577. Var. REICHENOWI, Erl., *Orn. Mon.*, 1901, p. 182. Afrique N.-E.
9710. VINACEUS (Gm.); *Pl. Enl.* 161; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 123; Salvad., *Cat.*, p. 428; *senegalensis*, Müll. (nec Lin.); *risoria* (pt.), Tem.; *semitorquatus*, Sw. (nec Rüpp.); *albiventris*, Gray; *barbara*, Antin. Afrique W. (de Séné-gambie au Loango) et N.-E.

9711. *DOURACA*, Hodgs., in *Gr. Zool. Misc.*, p. 85; Schleg., *l. c.*, p. 125; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 427; *risoria*, Pall. et auct. plur. (nec Lin.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 587; Dress., *B. Eur.* VII, p. 51, pl. 464, f. 2; *ridens*, *intercedens*, Brm.; *vitticollis*, Prjew. (nec Tem.); *chinensis*, Severtz.; *torquata*, Bogd. (1).
2578. *Var. STOLICZKÆ*, Hume, *Str. Feath.* II, p. 519; *douraca* (pt.), Salvad. Europe S.-E., Palestine, Perse, Inde, Birmanie, Chine et Japon.
- Asie centr.

δ. *Onopopelia*.

9712. *HUMILIS* (Tem.), *Pl. Col.* 259 (nec pl. 258); Salvad., *Cat.*, p. 454; *terrestris*, Rehb.; *humilior*, Hume, *Pr. As. Soc. Beng.*, 1874, p. 241.
2579. *Var. TRANQUEBARICA* (Herm.), *Obs. Zool.*, p. 200 (1804); Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 219; Salvad., *l. c.*, p. 437; *humilis*, auct. plur. (nec Tem.); *murcensis*, Hodgs.
- Inde.

ε. *Spilopelia*.

9713. *CHINENSIS* (Scop.); Gr., *Gen. B.* II, p. 472; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 586; Rehb., *Taub. Novit., Suppl.*, pl. 5, f. 26; *tigrina* (pt.), Tem.; *sinensis*, Blyth.
9714. *TIGRINUS* (Tem. et Knip), *Pig.* I, pl. 45; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 127; Salvad., *l. c.*, p. 440; *suratensis*, Boie (nec Gm.); *inornata* (juv.), Gr. et auct. plur.; *chinensis* (pt.), auct. plur.
9715. *SURATENSIS* (Gm.); Schl., *l. c.*, p. 129; Salvad., *l. c.*, p. 444; *tigrina* (pt.), auct. plur.; *vitticollis*, Hodgs.; *chinensis* (pt.), Gray; *ceylonensis*, Rehb.; ? *mala-barica*, Gm.
- Chine E., Formose, Haïnan.
- Indo-Chine, Malacca, îles de la Sonde, Célèbes, Moluques.
- Afghanistan, Inde, Ceylan.

ζ. *Stigmatopelia*.

9716. *SENEGALENSIS* (Lin.); Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 82, pl. 270; Bp., *Ucc. Eur.*, p. 52; Dress., *B. Eur.* VII, pl. 465; *testacco-incarnata*, Forsk.; *egyptiaca*, Lath.; *cambayensis*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 100 (pt.), pl. 45; ? *afra*, Webb et Berth.; *rufescens*, *pygmea*, Brm.; *savignii*, Rehb.
2580. *Var. CMBAYENSIS* (Gm.); Bp., *Consp.* II, p. 62; Europe S.-E., Asie

(1) Plusieurs auteurs ont pensé que le *T. douraca* était l'ancêtre de la Tourterelle domestique (*T. risorius*, Lin.); mais d'après M. Shelley, cette dernière descendrait plutôt du *T. roseogriseus*.

- Schl., *l. c.*, p. 120; *senegalensis* (pt.), auct. centr., Inde.
 plur. (nec Lin.)
 2581. ? *Var. ERMANNI*, Bp., *Compt. Rend.* XLIII, pp. 942, Boukara.
 949; ?*egyptiaca*, Severtz.; ?*senegalensis*,
 Dress., *Ibis*, 1876, p. 522.

SUBF. III. — GEOPELIINÆ

1590. GEOPELIA

- Geopelia*, Sw. (1857); *Tomopeleia*, *Geopeleia*, *Stictopeleia*, Rehb. (1852); *Erythrauchena*, *Tomopelia*, *Stictopelia*, Bp. (1854); *Chrysauchena*, Bp. (1855).
 9717. *NUMERALIS* (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 128; id., Australie, Nouv.-Gui-
Pl. Col. 192; Gould, *B. Austr.* V, pl. 72; née S.
erythrauchen, Wagl.
 9718. *PLACIDA*, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 55; id., *Handb.* Australie.
B. Austr. II, p. 145; *tranquilla*, Gould; id., *B.*
Austr. V, pl. 75; Salvad., *Cat.*, p. 456.
 9719. *STRIATA* (Lin.); Edw., *Birds*, I, pl. 16; Salvad., *Orn.* Siam, Ténassérin S.,
Pap. III, p. 155; id., *Cat.*, p. 458; *sinica*, Lin.; Malacca, îles de la
malaccensis, Gm.; *bantamensis*, Sparrm., *Mus.* Sonde, Philippines,
Carls., pl. 57; *lunulata*, fowat, Bonn.; *lineata*, Sw. Cél., Amboine (1).
 9720. *MAUGEI* (Tem.), *Pig. Index*, p. 49; Schl., *l. c.*, p. 152; Timor, Flores, Sum-
 Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 157; id., *Cat.*, p. 461; bawa, Wetter, Let-
maugeus, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 115, pl. 52; tie, Ténimber, Kei,
albiventris, Blyth; *multicincta*, Bp. Koohr.
 9721. *CUNEATA* (Lalh.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 61; Gould, Australie.
B. Austr. V, pl. 74; *macquarie*, Q. et G., *Voy.*
Uran., *Ois.*, p. 122, pl. 51; *spiloptera*, Vig.

1591. SCARDAFELLA

Scardafella, Bp. (1854); *Micropelia*, Heine (1890).

9722. *SQUAMOSA* (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 127, pl. 59; Bp., Brésil, Guyane fr.,
Consp. II, p. 85; B., Br. et Rid., *Hist. N. Am.* Vénézuéla, Colomb.
B. III, p. 587; ? *fusca*, Gm., *squammata*, Less.
 2582. *Var. RIDGWAYI*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.* Ile Margarita, Vénéz.
 XVIII (1895), p. 660.
 2583. *Var. INCA* (Less.), *Descr. Mam. et Ois.*, p. 214; Ét.-Unis S.-W., Basse-
 Bp., *Consp.* II, p. 85; Ridgw., *Man. N. Am.* Californie, Mexique
B., p. 216; Cones, *Check-list*, n° 575; *squa-* jusqu'au Nicaragua.
mosa (pt.), auct. plur. (nec Tem.)

(1) Introduit à Madagascar, aux îles Seychelles, Maurice, Réunion et St^e-Hélène.

1592. GYMNOPELIA

Gymnopelia, ScL. et Salv. (1875).

9725. ERYTHROTHORAX (Meyen), *Nov. Act. Ac. Leop.* XVI, Pérou, Bolivie, Chili
Suppl., p. 98, pl. 16; ScL. et Salv., *Nomencl. Av.* N.
Neotr., pp. 155, 156; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 249;
monticola, Tsch.; *anaïs*, Less.; *gymnops*, Gray.

SUBF. IV. — CHAMEPELIINÆ

1593. COLUMBULA

Columbina, Spix (1825); *Columbula*, Bp. (1854).

9724. PICUI (Tem.), *Pig. et Gall.* I, pp. 455, 498; Knip et Brésil S., Paraguay,
Prév., *Pig.* II, p. 71, pl. 59; Bp., *Consp.* II, Bolivie, Argentine,
p. 80; *strepitans*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 57, pl. 75, Chili.
I. 1; Burm., *Th. Bras.* III, p. 299.

1594. COLUMBIGALLINA

Columbigallina, Boie (1826); *Chamepelia*, Sw. (1827); *Columbina*, Gr. (1840,
nec Spix); *Chamepelia*, Gray (1841); *Chamapeleia*, Rehb. (1852); *Talpa-*
cotia, Bp. (1854); *Pyrgitarnas*, Rehb. (1862); *Leptopelia*, Heine (1890).

- ✓ 9725. PASSERINA (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, pl^s 15, 14; Antilles.
Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 555, pl. 196; Audub., *Orn.*
Biogr. V, p. 558, pl. 182; *hortulana*, Würtl.;
trochila, Bp., *Consp.* II, p. 77; *insularis*, Ridgw.,
Pr. U. S. Nat. Mus., 1887, p. 574 (1).
2584. *Var. GRANATINA* (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 77; Burm., Amér. mér. de Panama
Th. Bras. III, p. 296; ScL., *P. Z. S.*, 1858, et des Guyanes jus-
p. 556, *albivittata*, Bp., *l. c.* qu'au 27° l. S.
2585. *Var. PURPUREA* (Mayn.), *Am. Exch. and Mart.* III, États-Unis S.-E.
1887, p. 55; Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.*,
1892, p. 295; *terrestris*, Chapm., *l. c.*
2586. *Var. PALLESCENS* (Baird), *Pr. Philad. Acad.*, 1859, Ét.-Unis S.-W., Basse-
p. 505; Coop., *Orn. Calif.*, p. 517; *pusilla*, Californie, Mexique
Licht. (*descr. nulla*). et Amérique centr.

(1) Les auteurs américains divisent cette espèce en plusieurs variétés et je veux bien les suivre. Mais le Comte Salvadori, qui a eu à sa disposition les nombreux spécimens des Musées de Londres et de Turin, n'admet pas ces divisions, et il les rapporte toutes à un type unique, offrant cependant de nombreuses variations individuelles. M. Sharpe, au contraire, fait de toutes ces variétés des espèces distinctes, mais il oublie de nous dire à laquelle de ces espèces appartiennent les sujets de l'Amérique méridionale; je pense qu'on peut les rapporter au type *granatina*, de Bonaparte. Quoi qu'il en soit, le *C. passerina* et ses variétés demandent à être réétudiés avec soin.

2587. *Var. SOCORROENSIS*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, Ile Socorro.
p. 586.
2588. *Var. BAHAMENSIS* (Mayn.), *Am. Exch. and Mort*, Iles Bahama.
III, 1887, p. 55.
2589. *Var. BERMUDIANA*, Bangs et Brad., *Auk.*, 1901, Iles Bermudes.
p. 250.
2590. *Var. PERALLIDA*, Hart., *Ibis*, 1895, p. 504. Aruba, Bonaire, Cur.
9726. *MINUTA* (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 28, pl. 16; Mexique S., Amérique
grisea, Bonn.; *griseola*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 58, centr. et Amérique
pl. 75^a, f. 2 (juv.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 244; mér. jusqu'au 24°
chalcostigma, Rehb.; *rachidialis*, Schiff; *ama-*
zilia, Bp. l. S. environ.
9727. *CRUZIANA* (Prév. et Knip), *Pig.* II, p. 89, pl. 48; Tacz., Ecuador, Bolivie, Pé-
Orn. Pér. III, p. 248; *gracilis*, Tsch.; id., *Faun.* rou, Chili N.
Per., pp. 45, 277, pl. 50.
9728. *BUCKLEVI* (Sch. et Salv.), *P. Z. S.*, 1877, p. 21; Sal- Ecuador, Pérou.
vad., *Cat.*, p. 484, pl. 10, f. 2.
9729. *TALPACOTI* (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 22, pl. 12 (*mi-* Guyane, Vénézuéla,
nuta, err.); Selby, *Nat. Libr.*, *Pig.*, p. 200, Pérou, Bolivie, Bré-
pl. 22; *cabocola*, Spix; *cinnamomina*, Sw.; *cinna-* sil, Paraguay.
momea et *godina*, Bp., *Consp.* II, p. 79.
9750. *RUFIPENNIS* (Bp.), *Consp.* II, p. 79; id., *Icon. Pig.*, Du Mexique à Panama,
pl. 121; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 156. Col., Vénéz., Guyane.

1595. UROPELIA

Uropelia, Bp. (1854); *Uropeleia*, Rehb. (1862).

9751. *CAMPESTRIS* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 57, pl. 75, f. 2; Brésil, Bolivie.
Bp., *Consp.* II, p. 85; Schl., *l. c.*, p. 158; *venusta*,
Tem., *Pl. Col.* 341, f. 1; *turturina*, Desm.;
flavipes, Natt.

1596. OXYPELIA

Oxytelia, Salvad. (1895).

9752. *CYANOPIS* (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 277, 356; Salvad., Cujaba (Brésil centr.)
Cat., p. 490, pl. 10, f. 1.

1597. CLARAVIS

Peristera, Sw. (1827, nec Rafin., 1815); *Claravis*, Oberh. (1899).

9753. *CINEREA* (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 126, pl. 58 (nec Mexique S., Amérique
Scop.); Tem., *Pl. Col.* 266 (fem.); Bp., *Icon.* centr. et Amérique
pl. 125, f. 1 (fem.); Salvad., *Cat.*, p. 491; ? *ustu-* mér. jusqu'au Para-
lata, Licht.; *pretiosa*, F.-Perez, *Pr. U. S. Nat.* guay et Pérou.
Mus., 1886, p. 175; Oberh., *Pr. Ac. N. S. Phi-*
lad., 1899, p. 205.

9734. GEOFFROYI (Tem. et Knip), *Pig.* I, pl. 57 (mas.); Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 159; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 250; *godefrida*, Tem. et Knip, *l. c.*, p. 125; *trifasciata*, Rehb. (fem.) Brésil S., E.
9735. MONDETURA (Bp.), *Compt.-Rend.* XLII, pp. 765, 957; id., *Icon. Pig.*, pl. 126, ff. 1, 2; Tacz., *l. c.*, p. 251; Oberh., *Pr. Ac. N. S. Philad.*, 1899, p. 205; *lansbergii*, Schl., *l. c.*, p. 159; ? *melancholica*, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 506; id., *Fna. Per.*, pp. 45, 277. Du S. du Mexique au Pérou, Vénézuéla.

1598. METRIOPELIA

Metriopelia, Bp. (1854); *Metriopeleia*, Rehb. (1862).

9736. MELANOPTERA (Mol.), *Hist. Nat. Chili*, p. 508; Bp., *Consp.* II, p. 75; Schl., *l. c.*, p. 155; *boliviana*, Eyd. et Gerv., *Mag. de Zool.*, 1856, p. 53, pl. 75; d'Orb. et Lafr., *Voy. Favor.* II, p. 59, pl. 25; *innodata*, Hartl.; *melanura*, Rehb. De l'Ecuador au Chili, Mendoza.
9737. AYMAR (Knip et Prév.), *Pig.* II, p. 62, pl. 52; Bp., *l. c.*, p. 76; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 240; *aurisquamata*, Leyb. Bolivie, Pérou, Chili N., Argentine.

SUBF. V. — PHABINÆ

1599. OENA

OEna, Selby (1857); *Æna*, Layard (1867).

9738. CAPENSIS (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, pl^s 53, 54; Tem., *Pl. Col.* 541, f. 2 (juv.); Schl., *l. c.*, p. 145; Salvad., *Cat.*, p. 501; *atricollis*, Müll.; *atrogu-laris*, Wagl.; *ocellata*, Württ. Afrique trop. et S., Arabie, Madagasc.

1400. TYMPANISTRIA

Tympanistria, Rehb. (1852).

9739. BICOLOR, Rehb., *Av. Syst. Nat.*, p. xxv (1852); Bp., *l. c.*, p. 67; *Col. tympanistria*, Tem. et Knip, *l. c.*, p. 80, pl. 56; Schl., *l. c.*, p. 145; Hartl., *Vög. Madag.*, p. 271; *fraseri*, Bp., *l. c.*, p. 67. Afrique austr., Madagascar, Comores, Fernando-Po.
9740. VIRGO, Hartl., *Ibis*, 1886, p. 2; id., *Zool. Jahrb.* II, p. 551. Djanda (Afr. équat. E.)

1401. CHALCOPELIA

Chalcopelia, Bp. (1854); *Chalcopeleia*, Rehb. (1862); *Calopelia*, Salvad. (1895).

9741. AFRA (Lin.); Tem. et Knip, *l. c.*, p. 85, pl^s 58, 59; Toute l'Afrique au S.

- Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 84, pl. 271; Schl., *l. c.*, p. 144; Bp., *Consp.* II, p. 67; Fch. et Harll., *Vög. Ostaf.*, p. 554; *senegalensis*, Rüpp.; *crusiana*, Rehb.; *parallinostigma*, Württ.
2591. *Var.* CHALCOSPILUS (Wagl.), *Syst. Av. Col.*, sp. 85; Sw., *B. W. Afr.* II, p. 210; Schl., *l. c.*, p. 144; Rehb., *Tauben*, I, p. 79, pl. 257, ff. 1427-28; v. Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 185. Afrique au S. du 17° l. N. (parties boisées).
9742. PUELLA (Schl.), *Bijdr. tot de Dierk.*, 1848, p. 17, pl.; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 154; Salvad., *Cat.*, p. 525. l. N. (régions des steppes).
2592. *Var.* BREHMERI, Harll., *Ibis*, 1863, p. 256; id., *J. f. O.*, 1863, p. 97. De la Côte-d'Or au Gabon (Afr. W.)
- Var.* Du Gabon au Loango.

1402. CHALCOPHAPS

Chalcophaps, Gould (1845); *Monornis*, Hodgs. (1844).

9745. CHRYSOCHLORA (Wagl.), *Syst. Av. Col.*, sp. 79; Gould, *B. Austr.* V, pl. 62; *javanica*, Tem. et Knip, *l. c.*, pl. 26; *javanicoidea*, *timorensis*, Bp.; *moluccensis* (pl.), Finsch.; *indica* (pl.), Schl.; *sandwichensis*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 288. Petites îles de la Sonde, Mol., Nouv.-Guinée S.-E., Nouv.-Hébr., N.-Calédon., Austr.
2595. *Var.* LONGIROSTRIS, Gould, *B. Austr., Introd.*, p. 69; Bp., *l. c.*, p. 92. Port Essington.
9744. INDICA (Lin.); *Pl. Enl.* 177; Bp., *l. c.*, p. 91; Rowl., *Orn. Misc.* I, p. 119, pl. 51; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 584; *javanensis*, Müll.; *pileata*, Scop.; *albicapilla*, *javanica*, Gm.; *caruleocephala*, Lath.; *cyanopileata*, *griseocapillata*, Bonn.; *superciliaris*, Wagl.; *perpulchra*, Hodgs.; *augusta*, Bp.; *bornensis*, S. Müll.; *moluccensis*, Gr.; *formosana*, Swinh. Inde, Ceylan, Chine, Formose, Indo-Ch., Malac., îles Andam., Nicobar, de la Sonde, Célèbes, Moluques, Nouv.-Guinée.
2594. *Var.* SANGHIRENSIS, W. Blas., *Russ' Isis*, 1888, p. 78; id., *Ornis*, 1888, p. 625; Salvad., *Cat.*, p. 515. Grande Sanghir.
2595. *Var.* NATALIS, List., *P. Z. S.*, 1888, p. 522. Ile Christmas.
9743. STEPHANI, Rehb., *Syn. Av. Columb., Novit.*, pl. 259, f. 2595; Puch. et Jacq., *Voy. Pôle S., Zool.* III, p. 419, Atl., pl. 28; Schl., *l. c.*, p. 151; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 655; *albifrons*, *etiennei*, Bp.; *hombroni*, Wall. (fem.); *wallacci*, Brügg., *Abh. Nat. Ver. Brem.* V, p. 464. Célèbes, îles Papous, arch. Bismarck, île du Duc York.
9746. MORTONI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 725; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 562; id., *Cat.*, p. 522; *chrysochlora*, Rams. (1879, nec Gould; *stephani*, Grant (nec Rehb.)). Îles Salomon (Guadalcanar).

1403. HENICOPHAPS

Henicophaps, G. R. Gray (1861); *Ryncharnas*, Rosenb. (1862).

9747. ALBIFRONS, G. R. Gray, *P. Z. S.*, 1861, pp. 452, 457, Nouv.-Guin., Waigiou,
pl. 44; Schl., *l. c.*, p. 156; Salvad., *Orn. Pap.* III, Ghemien, Salawatti,
p. 185; *schlegeli*, Rosenb. Arou.

1404. PHAPS

Phaps, Selby (1835); *Peristera*, Sw. (1837, nec Rafin.); *Cosmopelia*, Sund. (1872);
Histriophaps, Salvad. (1895).

9748. CHALCOPERA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 604; Tem. et Australie et Tasmanie.
Knip, *Pig.* I, p. 17, pl. 8; Selb., *Nat. Libr.*,
Pig., p. 195, pl. 21; Gould, *B. Austr.* V, pl. 64.
9749. ELEGANS (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 56, pl. 22; Selb., Australie S. et Tasma-
l. c., p. 194; Gould, *B. Austr.* V, pl. 65; *law-* nie.
sonii, Sieber.
9750. HISTRIONICA (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 114; id., *B. Australie centr. jus-*
Austr. V, pl. 66; Schl., *l. c.*, p. 154; ?*Col. me-* qu'au Port Darwin,
ridionalis, Lath. Australie N.-W.

1405. PETROPHASSA

Petrophassa, Gould (1840).

9751. ALBIPENNIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 175; id., *B. Australie N.-W.*
Austr. V, pl. 71; Salvad., *Cat.*, p. 550.
9752. RUFIPENNIS, Coll., *P. Z. S.*, 1898, p. 554, pl. 28. Australie N.

1406. GEOPHAPS

Geophaps, Gould (1842).

9753. SCRIPTA (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 127; id., *Pl. Australie N.-W. et E.*
Col. 187; Gould, *B. Austr.* V, pl. 67; Schl., *Mus.*
P.-B., *Col.*, p. 455; *inscripta*, Wagl.
9754. SMITHI (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.* II, pl. 104; Gould, Australie N. et N.-W.
B. Austr. V, pl. 68; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 455.

1407. LOPHIOPHAPS

Lophophaps, Rehb. (1852); *Geophaps* (pt.), auct. plur.

9755. PLUMIFERA (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 19; id., *B. Australie N.-W.*
Austr. V, pl. 69; Schl., *l. c.*, p. 155.

2596. *Var. FERRUGINEA*, Gould, *Handb. B. Austr.* II, p. 137; id., *B. Austr., Suppl.*, pl. 69; *plumifera* (pt.), Schl.
 9756. *LEUCOGASTER*, Gould, *B. Austr., Suppl.*, pl. 69; Australie N.-W.
 Salvad., *Cat.*, p. 555.

1408. OCYPHAPS

Ocyphaps, Gould (1842).

9757. *LOPHOTES* (Tem.), *Pl. Col.* 142; Gould, *B. Austr.* V, Australie N., E. et S.
 pl. 70; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 156.

SUBF. VI. — GEOTRYGONINÆ

1409. HAPLOPELIA

Aplopetia, Bp. (1854); *Haplopeteia*, *Sericopetelia*, Rehb. (1862); *Haplopetia*,
 Sundev. (1872).

9758. *LARVATA* (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 71, pl. 51; Levaill., Afrique S., de la colo-
Ois. d'Afr. VI, p. 80, pl. 269; Bp., *Consp.* II, nie du Cap au Trans-
 p. 66; ? *erythrothorax*, Tem. et Knip, *l. c.*, p. 15, vaal.
 pl. 7; ? *angustipennis*, Bp.; *sylvestris*, Forst.;
erythrogastra, Rehb.; ? *rufaxilla*, Hart.
 2597. *Var. KILIMENSIS*, Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 289. Kilima Ndjaro.
 9759. *BRONZINA* (Rüpp.), *Neue Wirbelth.*, p. 65, pl. 25, f. 1; Abyssinie, Choa.
 Bp., *l. c.*, p. 66; Salvad., *Cat.*, p. 540; *larvata*
 (pt.), Shell., 1885, Salvad., 1884-88, Hart., 1891.
 9760. *JOHNSTONI*, Shell., *Ibis*, 1895, p. 28, pl. 5. Nyassaland.
 9761. *INORNATA*, Rehw., *Allg. deutsch. Orn. Ges., Bericht*, Caméron.
 1892, p. 6; id., *J. f. O.*, 1892, p. 179.
 9762. *PRINCIPALIS* (Hartl.), *P. Z. S.*, 1866, p. 350; Gray, Ile Principe (Afr. W.)
Hand-list, n° 9405; Shell., *Ibis*, 1885, p. 295.
 9765. *SIMPLEX* (Hartl.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1849, p. 497; Ile St. Thomas (Afr. W.)
 id., *Beitr. Orn. Westafr.*, p. 55, pl. 10; Bp.,
l. c., p. 67; Salvad., *Cat.*, p. 542.

1410. LEPTOPTILA

- Leptotila*, Sw. (1857); *Leptoptila*, Gray (1844); *Homoptila*, Salvad. (1871);
Engyptila, Sundev. (1872); *Echmoptila*, Coues (1878).
 9764. *FULVIVENTRIS*, Lawr., *Ann. N. Y. Ac.* II, 1882, p. 287; Texas, Mexique jus-
brachyptera, Gray (*descr. nulla*); Salvad., *Cat.*, qu'au Nicaragua.
 p. 545; *albifrons*, Schl. (nec Bp.), *P. Z. S.*, 1857,

- p. 214; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 214, pl. 62, f. 5; ?*verreauxi*, Nutt. (nec Bp.); *vinaceifulva*, Lawr. (aberr.)
2598. *Var. CAPITALIS*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 6; *brachyptera* (pt.), Salvad. Iles Tres Marias.
9765. VERREAUXI, Bp., *Consp. Av.* II, p. 75; *Tacz., Orn. Pér.* III, p. 256; Salvad., *Cat.*, p. 548; *jamaicensis*, Jard. (nec Lin.); *brevipennis*, Gray; *rufaxilla* (pt.), Gr., *Tacz.* (1874); *albifrons*, Scl. (1860); Berl. (1885, nec Bp.); *riottei*, Lawr.; *ochroptera*, Salv. et Scl. Du Costa-Rica à la Colombie, Ecuador, Pérou, Vénézuéla, Guyane.
2599. *Var. INSULARIS*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 659. Ile Margarita (Vénéz.)
9766. RUFAXILLA (Rich. et Bern.), *Act. Soc. H. N. Paris*, I, p. 118 (1792); Selby, *Nat. Libr., Pig.*, pl. 24; *frontalis*, Tem. et Kuip, *Pig.* I, p. 48, pl. 10; *jamaicensis*, auct. plur. (nec Lin.); *dubusi*, Bp. Guyane, Amazone, Pérou, Ecuador, Colombie.
9767. PLUMREICEPS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 59; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 160; *rufaxilla*, Bp. (nec Rich. et Bern.); *bonapartii*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1871, p. 15. Mexique E., Guatémala.
9768. REICHENRACHI, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 279, 357, 451; Salvad., *Cat.*, p. 555; *rufaxilla*, Max (nec auct.); *macroductylus*, Gray (*descr. nulla*); *frontalis*, Burm. (nec Tem.); *erythrothorax*, auct. plur. (nec Tem.); *rufescens*, Berl., *J. f. O.*, 1874, p. 246. Brésil S., Uruguay.
2600. *Var. BAHÆ*, Salvad., *Cat. B. XXI*, p. 555; *reichenbachii*, Berl. (nec Pelz.) Bahia (Brésil).
9769. CHLOROACHENIA, Gigl. et Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1870, p. 274; Salv. et Scl., *Ibis*, 1871, p. 455; *jamaicensis* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *frontalis* (fem.), Burm. (nec Tem.); *chalcauchenia*, Scl. et Salv.; Scl., *Arg. Orn.* II, p. 144; *rufaxilla*, Reinh. (nec R. et B.); ?*megalura*, White. Brésil S., Paraguay, Uruguay, Argentine, Bolivie.
9770. CALLAUCHEN, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1897, n° 292, p. 55. San-Lorenzo (Argentine).
9771. OCHROPTERA, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 278, 451; *Tacz., Orn. Pér.* III, p. 255; Salvad., *Cat.*, p. 555; *brasiliensis*, Gray (*descr. nulla*); *brevipennis* (pt.), Gr.; *decipiens*, Salvad. Brésil.
9772. MEGALURA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 640; Salvad., *Cat.*, p. 556, pl. 15. Bolivie.
9775. SATURATA, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1897, n° 292, p. 55. San-Lorenzo (Argentine).
9774. DECOLOR, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 21. Pérou N.
9775. JAMAICENSIS (Lin.); Gosse, *B. Jam.*, p. 515; Bp., *Icon.* Jamaïque.

- Pig.*, pl. 119; Salvad., *Cat.*, p. 557; *albifrons*, Bp., *Consp.* II, p. 74.
9776. GAUMERI (Lawr.), *Ann. N. Y. Ac.*, 1884, p. 157; Yucatan N., îles Cozumel, Jolbox et Mug. Salvad., *Cat.*, p. 557; *jamaicensis* (pt.), Salv.
2601. *Var. COLLARIS* (Cory), *Auk*, 1886, p. 498; Salvad., Grand Cayman. *l. c.*, p. 559.
2602. *Var. NEOXENA* (Cory), *Auk*, 1887, p. 179; Salvad., Ile S^t-Andrew. *l. c.*
9777. WELLSI (Lawr.), *Auk*, 1884, p. 180; Cory, B. W. Ile Grenada (Antilles). *Ind.*, p. 212.
9778. PALLIDA, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 575, Ecuador W. 1885, pp. 111, 117, 121; Salvad., *l. c.*, p. 560.
9779. CASSINI, Lawr., *Pr. Ac. N. S. Philad.*, 1867, p. 94; Costa-Rica, Vêragua, id., *Ibis*, 1868, p. 250; Rowl., *Orn. Misc.* III, Panama. p. 8, pl. 92; *verreauxi*, Cass. (nec Bp.)
2603. *Var. VINACEIVENTRIS* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Honduras, Nicaragua. 1887, p. 585; Salvad., *l. c.*, p. 561.
2604. *Var. CERVINIVENTRIS*, Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, Honduras angl., Gua- p. 60; *cassini*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, témala. p. 159 (nec Lawr.)
9780. RUFINICHA, Schl. et Salv., *Nomencl. Av. Neotrop.*, Vêragua. pp. 155, 162; Salvad., *l. c.*, p. 562.

1411. OSCULATIA

Osculatia, Bonap. (1854).

9781. SAPPHIRINA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 75; id., *Icon. Pig.*, Ecuador E. pl. 116; Salvad., *l. c.*, p. 565.
9782. PURPUREA, Salv., *Ibis*, 1878, p. 448; Salvad., *l. c.*, Ecuador. p. 565, pl. 14.

1412. GEOTRYGON

Geotrygon, Gosse (1847); *Oreopeleia*, Rehb. (1852); *Oropeleia*, Bp. (1854).

9783. VIOLACEA (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 67, pl. 29; Bp., Brésil, Guyane, Amé- *Consp.* II, p. 72; Schl., *l. c.*, p. 165; *cayanensis*, rique centr. Burm.; *albiventer*, Lawr.; *albiventris*, Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 78.
- ✓ 9784. MONTANA (Lin.); *Pl. Enl.* 141; Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, Amérique centr. et p. 114, pl. 282; Schl., *l. c.*, p. 165; Salvad., mérid. jusqu'au Pa- *l. c.*, p. 567; *martinica*, Tem. et Knip (nec Lin.) raguay, Antilles.
9785. MARTINICA (Lin.); Selby, *Nat. Libr., Pig.*, p. 209, Petites Antilles. pl. 25; Salvad., *l. c.*, p. 570; *cuprea*, Wagl.; *montana* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *mystacea*, Lemb. (nec Tem.); ?*martinicana*, Rehb.

9786. CHRYSIA, Bp., *Consp.* II, p. 72; Burm., *Thier. Bras.* III, p. 507; *montana*, Tem. et Knip, *l. c.*, p. 10, pl. 4 et auct. plur. (nec Lin.); *martinica* (pt.), auct. plur.
9787. MYSTACEA (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 124, pl. 56; Burm., *Th. Bras.* III, p. 507; Bp., *l. c.*, p. 71; Schl., *l. c.*, p. 164. Petites Antilles.
9788. CRISTATA (Tem. et Knip, nec Gm.), *Pig.* I, p. 20, pl. 9 (1); Cory, *B. W. Ind.*, p. 218; Schl., *l. c.*, p. 164; *pacifica*, Vieill.; *versicolor*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 321; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 47; *sylvatica*, Gosse, *B. Jam.*, p. 516. Jamaïque.
- ✓ 9789. CANICEPS, Gundl., *Journ. Bost. Soc. N. H.*, 1852, p. 515; id., *J. f. O.*, 1856, p. 110, 1861, p. 556, 1870, p. 282; Richb., *Taub.* I, p. 52, *Novit.*, pl. I, f. 7. Cuba.
9790. VERAGUENSIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1866, p. 549; Salv., *Ibis*, 1874, p. 528, pl. 12; *rufiventris*, Lawr., *l. c.*, 1874, p. 90; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 77, pl. 95. Du Costa-Rica à Panama.
2605. *Var.* CACHAVIENSIS, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 504. Ecuador N.-W.
9791. LAWRENCEI, Salv., *Ibis*, 1874, p. 529; *veraguensis* (pt.), Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 159. Véragua W.
9792. COSTARICENSIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1868, p. 156; Salv., *Ibis*, 1869, p. 517; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 45, pl. 87. Costa-Rica.
9795. FRENATA (Tschudi), *Arch. f. Naturg.*, 1845, I, p. 586; id., *Faun. Per.*, pp. 45, 278, pl. 28; Bp., *Consp.* II, p. 71; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 257. Pérou, Bolivie.
2606. *Var.* ERYTHROPAEIA (Bp.), *Compt.-Rend.* XLIII, 1856, p. 944; Salvad., *Cat.*, p. 578; *bourcierii*, Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 79 (pt.), pl. 40 (nec Bp.) Ecuador.
2607. *Var.* BOURCIERI, Bp., *Consp.* II, p. 71; Salvad., *Cat.*, p. 577; ? *frenata*, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 215 (nec Tsch.) Ecuador, Pérou N.
9794. CHIRIQUENSIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1856, p. 145; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 125, pl. 62; *caruleiceps*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1868, p. 156. Véragua, Costa-Rica.
9795. LINEARIS (Prév. et Knip), *Pig.* II, p. 104, pl. 55; Bp., *Consp.* II, p. 71; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 164; Salvad., *Cat.*, p. 580. Colombie.
2608. *Var.* VENEZUELENSIS, Salvad., *Cat.*, p. 581; *frenata*, Jard. (nec Tsch.); *linearis*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 782 (nec Prév.) Vénézuéla.
9796. ALBIFACIES, Sclat. (ex Gr.), *P. Z. S.*, 1858, p. 98; Schl., Mexique S., Guaté-

(1) Il n'y a pas lieu d'abandonner le nom de *cristata*, car l'oiseau désigné par Gmelin sous le nom de *Columba cristata* n'est pas un Pigeon, c'est le *Rollulus roulroul* (Scop.)

l. c., p. 164; *mexicana* et *albifacies*, Gray (*descr. nulla*); *chiriquensis*, Bp. (nec Schl.); Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 77, pl. 59. mala, Nicaragua.

1415. PHLOGOENAS

Phleganas, Rehb. (1851); *Pampusana*, Puch. (1855); *Pampusan*, Bp. (1856); *Phloganas*, Schl. (1861).

9797. *LUZONICA* (Scop.); Rehb., *Syn. Av. Columb., Novit.*, pl. 227, f. 2479; Schl., *l. c.*, p. 157; *cruenta*, Gm.; Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 16, pl. 8; *cruentata*, Tem.; Garr., *P. Z. S.*, 1875, p. 468; *aberr.* : *nivea*, Scop.; *sanguinea*, Gm. Ile Luçon (Philippines).
9798. *CRINIGERA* (Puch. et Jacq.), *Voy. Pôle S.* III, p. 118, pl. 27, f. 2; Bp., *Consp.* II, p. 88; Gould, *B. of As.* VI, pl. 52; *bartletti*, Schl., *P. Z. S.*, 1865, p. 577, pl. 54. Mindanao, Basilan (Philippines).
9799. *MENAGEI*, BOHRNS et WORE., *Occ. Pap. Min. Ac.* I, p. 10. Tawi-Tawi (Soulou).
9800. *PLATENÆ*, Salvad. (ex W. Blas. *in litt.*), *Cat. B. Br. Mus.* XXI, p. 588. Mindoro (Philippines).
9801. *KEAVI*, Clarke, *Ibis*, 1900, p. 559, pl. 8. Négros (Philippines).
9802. *RUFIGULA* (Jacq. et Puch.), *Voy. Pôle S.* III, p. 118, pl. 27, f. 4; Hartl., *J. f. O.*, 1854, p. 166; Bp., *Consp.* II, p. 89; Schl., *l. c.*, p. 157; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 161, 561 (pt.) Nouv.-Guinée, Wai-giou, Salawatti, Mysol, Jobi.
2609. *Var. HELVIVENTRIS* (Rosenb.), *Nat. Tydschr. Ned. Ind.*, 1867, p. 144; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 164; id., *Cat.*, p. 590; *rufigula* (pt.), auct. plur. Nouv.-Guinée S.-E., iles Arou.
9803. *TRISTIGMATA*, Bp., *Consp.* II, p. 88; Wall., *Ibis*, 1865, pp. 595, 400, pl. 9; Schl., *l. c.*, p. 158; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 654; *tristigma*, Fch., *Neu-Guin.*, p. 178; Salvad., *Cat.*, p. 590. Célèbes N.
2610. *Var. BIMACULATA*, Salvad., *Bull. Br. Orn. Cl.* III, p. 10; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 656; *tristigmata* (pt.), auct. plur. (nec Bp.); Gould, *B. Asia*, VI, pl. 59. Célèbes S.
9804. *CANIFRONS*, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1872, p. 101; Finsch, *Journ. Mus. Godeffr.* IV, Heft VIII, p. 27, pl. 5, f. 4; Salvad., *Cat.*, p. 592. Iles Pelew.
9805. *?YAPENSIS*, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1872, p. 102 (juv.); Salvad., *Cat.*, p. 595 (note). Ile Uap (Mackenzie).
9806. *BECCARDI*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 974; id., *Orn. Pap.* III, p. 168; id., *Cat.*, p. 595, pl. 11, f. 1. Ile Jobi?

9807. JOHANNÆ, Selat., *P. Z. S.*, 1877, p. 112, pl. 16; Gould, *B. New-Guin.*, pt. VII, pl. 9; *stairii*, Rams (nec Gray). Ile du Duc York.
9808. GRANTI, Salvad., *Cat.*, p. 594, pl. 11, f. 2; *johannæ*, Tristr. (nec Sel.); *solomonensis*, Grant, *P. Z. S.*, 1888, p. 186. Guadalcanar/iles Salomon).
9809. STAIRI, Gray, *P. Z. S.*, 1856, p. 7, pl. 115; Hartl. et Fch., *Orn. Centralpol.*, p. 147; *erythroptera* (pt.), Bp.; *vitiensis*, Finsch, *J. f. O.*, 1872, p. 50. Iles Fidji et Tonga.
2611. *Var.* SAMOENSIS, Finsch, *J. f. O.*, 1872, p. 50; Salvad., *Cat.*, p. 596; *stairii* (pt.), auct. plur. Iles Samoa.
9810. SALOMONIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1882, p. 299; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 562; id., *Cat.*, p. 597 (note). San Christoval? (iles Salomon).
9811. JOBIENSIS, Mey., *Mitth. Zool. Mus. Dresd.* I, p. 10 (aug. 1875); Gould, *B. New-Guin.*, pt. VII, pl. 8; *margaritæ*, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 856 (21 nov.); Salvad., *Cat.*, p. 597. Nouv.-Guinée, Jobi, archipel Bismarck.
9812. KUBARYI, Finsch, *J. f. O.*, 1880, p. 292; Salvad., *l. c.*, p. 599; *erythroptera* (pt.), auct. plur. (nec Gm.) Iles Carolines.
9813. ERYTHROPTERA (Gm.); Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 125, pl. 35; Salvad., *Cat.*, p. 600, pl. 12, f. 2; *leucophrys*, Forst. Ile Eiméo (Société)? ile Bow,?iles Paumotu.
9814. ALBICOLLIS, Salvad., *Cat.*, p. 601, pl. 12, f. 1; *erythroptera* (pt.), auct. plur. (nec Gm.) Ile Bow, iles Paumotu.
9815. XANTHURA (Tem.), *Pl. Col.* 190; Hart., *Nov. Zool.* V, p. 60; *pampusan*, Quoy et G., *Voy. Uran. Zool.*, pl. 50; *xanthura*, auct. plur. (nec Forst.); *erythroptera* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); *virgo*, Rehw., *J. f. O.*, 1885, p. 110. Iles Mariannes.
9816. ?PECTORALIS (Peale), *U. S. Expl. Exp.*, B., p. 205, pl. 59; *erythroptera* (pt.), auct. plur. Ile Carlshoff (Paumotu).
9817. ?FERRUGINEA (Forst.), *Icon. ined.*, 142; *curvirostra*, Licht. (nec Gm.); *fulvicollis* (pt.), Gr., Bp. Ile Tanna (Nouv.-Hébrides).
9818. ?RUBESCENS (Vieill.), *N. Dict.* XXVI, p. 546; Krusenst., *Voy.*, pl. 17, f. 1. Ile Nukahiva (Marquises).
9819. ?EIMEENSIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 784, n° 60. Ile Eiméo (Société).

1414. ALOPECOENAS

Alopecanas, Finsch (1899).

9820. HOEDTI (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 50; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 165; Salvad., *Cat.*, p. 592; Finsch, *Not. Leyd. Mus.* XXII, p. 500, pl. 5. Ile Wetter (au N.-E. de Timor).

1415. LEUCOSARCIA

Leucosarcia, Gould (1845).

9821. PICATA (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 59; Gould, *B. Austr.* V, pl. 65; *melanoleuca*, Lath.; *armillaris*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 15, pl. 6; *jamiesoni*, Desm. Australie E. et centr.

1416. EUTRYGON

Trugon (1) Gray (1849); *Trygon*, Rehb. (nec Andans.); *Eutrygon*, Sclat. (1858).

9822. TERRESTRIS (Jacq. et Pucher.), *Voy. Pôle S., Zool.* III, p. 125, *Atlas, Ois.*, pl. 28, f. 1; Sclat., *Journ. Pr. Linn. Soc.*, 1858, p. 168; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 186; Schl., *l. c.*, p. 166. Nouv.-Guinée W., Satawatti.
2612. Var. LEUCOPAREIA, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, p. 29; Salvad., *Cat.*, p. 610; *terrestris* (pt.), Sharpe. Nouv.-Guinée S.-E.

1417. OTIDIPIHAPS

Otidiphaps, Gould (1870).

9823. NOBILIS, Gould, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 62; id., *B. Asia*, pt. XXIII, pl. 7; Schl., *l. c.*, p. 170; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 188. Nouv.-Guinée W. et Batanta.
9824. CERVICALIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 470 (*nobilis*, var. *cervicalis*); Scl. et Salv., *Ibis*, 1881, p. 179; Sharpe, *Gould's B. New-Guin.*, pt. XIII, pl. I; *regalis*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 564, pl. 11. Nouv.-Guinée S.-E.
9825. INSULARIS, Salv. et Godm., *P. Z. S.*, 1885, p. 55; Salvad., *Cat.*, p. 612, pl. 15. Ile Fergusson.

1418. STARNOENAS

Starnas, Bp. (1858); *Sternas*, Rehb. (1847); *Perdicopelia*, Van der H. (1855).

- ✓ 9826. CYANOCEPHALA (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 8, pl. 5; Bp., *Comp. List.*, p. 41; Audub., *B. Am.* V, p. 25, pl. 284; *tetraoides*, Scop. Cuba, Florida Keys.

SUBF. VII. — CALOENADINÆ

1419. CALOENAS

Geophilus, Selby (1855, nec Leach, 1812); *Calonas*, Gray (1840); *Phabalectryo*, Glog. (1842); *Calona*, *Calliarnas*, Agass. (1846); *Callarnas*, Rehb. (1852).

9827. NICOBARICA (Lin.); *Pl. Ent.* 491; Tem. et Knip, *l. c.*, Iles Nicobar, archipel

(1) *Trugon* est le nom français.

p. 3, pl. 2; *gallus*, Wagl.; *gouldiae*, Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 37 (juv.)

Mergui, gr. îles de la Sonde, Moluques, Nouv.-Guinée, archipel Bismarck.

2615. *Var. PELEWENSIS*, Finsch, *Journ. Mus. Godeff.* IV, p. 159; Salvad., *Cat.*, p. 618. Iles Pelew.

9828. ?*MACULATA* (Gm.), *S. N.* I, p. 780, n° 52; Forbes, ?
Bull. Liverp. Mus. I, p. 85, *Columba*, pl. 4.

FAM. IV. — GOURIDÆ

1420. GOURA

Lophyrus, Vieill. (1816, nec Latr., 1802); *Goura*, Steph. (1819); *Megapelia*, Kp. (1856); *Philophyrus*, Sw. (1857).

9829. *CORONATA* (Lin.); Tem. et Knip, *l. c.*, p. I, pl. I; Nouv.-Guinée W.,
Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 107, pl. 280; Vieill., Waigiou, Batanta,
Gal. Ois. I, p. 555, pl. 197; *mugiens*, Scop.; Salawatti, Mysol.
indicus, Steph.; *cristata*, Bp.; *minor*, Schl.

9850. *SCLATERI*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, Nouv.-Guinée S. et
pp. 45, 207; id., *Orn. Pap.* III, p. 199; id., centr.
Cat., p. 622.

9851. *ALBERTSH*, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1876, Nouv.-Guinée S.-E.
pp. 628, 680, pl. 7; id., *Orn. Pap.* III, p. 202; id.,
Cat., p. 625; *scheepmakeri*, Salvad. et d'Alb.
(1875, nec Finsch.)

9852. *SCHEEPMAKERI*, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 651, pl. 68. Nouv.-Guinée S.-W.?

9853. *VICTORIA* (Fras.), *P. Z. S.*, 1844, p. 156; Schl., *l. c.*, Iles Jobi et Mysori.
p. 169; *steursii*, Tem.; Gray, *Gen. B.* II, p. 479,
pl. 120.

9854. *BECCARI*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VIII, p. 406 Nouv.-Guinée N.
(1876); id., *Orn. Pap.* III, p. 268; *victoriae*, var.
comata, Oust.

2614. *Var. HUONENSIS*, Mey., *Orn. Jahresb.* I, 1895, n° 4. Nouv.-Guinée E.

9855. *CINEREA*, Hart., *Nov. Zool.* II, p. 67. Nouv.-Guinée N.-W.
(Arfak).

FAM. V. — DIDUNCULIDÆ

1421. DIDUNCULUS

Didunculus, Peale (1844); *Gnathodon*, Jard. (1845); *Pleiodus*, Rehb. (1847);
Knathodon, Peale (1848).

9856. *STRIGIROSTRIS* (Jard.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1845, Iles Samoa.
p. 175, pl. 9; Gould, *B. Austr.* V, pl. 76; Peale,
U. S. Expl. Exp. B., 1848, p. 209, pl. 60.

SUBCL. II. — PTILOPÆDES

ORD. VII. — HETEROCLITÆ

FAM. I. — PTEROCLIDÆ (1)

1422. SYRRHAPTES

Syrrhaptes, Illig. (1814); *Nematura*, Fisch. (1812); *Heteroclitus*, Vieill. (1816).

9857. *PARADOXUS* (Pall.), *Russ. Reichs*, II, p. 712, pl. F.; *Asie centr. de la mer*
 Illig., *Prodr.*, p. 245; Dress., *B. Eur.* VII, p. 75, *Caspienne au N.-E.*
 pl. 468; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, *de la Chine; accid.*
 p. 27, pl. 174; *arenaria*, Pall., *Zoogr.* II, pl. 55; *Europe, Belgique.*
tartaricus, Vieill.; *pallasii*, Tem.; *heteroclitus*,
 Vieill., *Gal. Ois.* III, p. 64, pl. 222; *fischeri*, Karel.
 9858. *TIBETANUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 92; id., *B. Asia*, VI, *Thibet.*
 pl. 61; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 45, pl.

1425. PTEROCLURUS

OEnas, Vieill. (1816, nec Latr., 1802); *Pteroclorus*, Bonap. (1856); *Pterygoclius*,
 Heine (1890).

9859. *ALCHATUS* (Lin.); Jerd., *B. Ind.* II, p. 500; Hume et *Asie S.-W., de Pales-*
 Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 77, pl.; *caudacutus*, *tine et la Perse au*
 Gm.; *chata*, Pall.; *arenarius*, Guér.-Men. (nec *N.-W. de l'Inde.*
 Pall.); *caspicus*, Ménétr.; *severzovi*, Bogd.; *severt-*
zovi, Zar.
 2615. *Var. PYRENAICA* (Briss.); Seeb., *Ibis*, 1885, p. 26; *Afrique N., Europe*
setarius, Tem.; *cata*, Vieill.; *alchata*, Bp. *S., à l'E. jusqu'à*
 (nec Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 67, pl. 467. *Chypre.*
 9840. *NAMAQUA* (Gm.); Bocage, *Orn. Angola*, p. 596; *tachy-* *Afrique S. jusqu'au*
petes, Tem.; *Pig. et Gal.* III, pp. 274, 715; *Transv. et l'Angola.*
simplex, Roux.

(1) Voy. : Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 2-32 (1893).

9841. EXUSTUS (Tem.), *Pl. Col.* 28, 29; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 64; *senegalensis*, Licht. (nec Lin.); *elliotti*, Bogd.
 2616. *Var. SOMALICA*, Harl., *Novit. Zool.* VII, p. 28. Somaliland.
 2617. *Var. ORIENTALIS*, Harl., *Novit. Zool.* VII, p. 28. Inde.
 9842. SENEGALLUS (Lin.), *Mantis.*, p. 526; Shell., *B. Egypt.*, p. 220; *senegalensis*, Rüpp.; *guttatus*, Licht.; Afr.N., N.-E. et N.-W.,
 Tem., *Pl. Col.* 545; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 62. Asie S.-W. jusqu'au
 N.-W. de l'Inde.

1424. PTEROCLES

Pterocles, Tem. (1815); *Pteroclis*, Sharpe (1899).

9845. ARENARIUS Pall., *Nov. Com. Petrop.* XIX, p. 418, pl. 8; Tem., *Pl. Col.* 52, 55; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 122; Dress., *B. Eur.* VII, p. 61, pl. 466, *var. magna*, Zaroudn.; *fasciatus*, Desf. (nec Scop.); *aragonica*, Lath. Afrique N., Europe S.,
 Asie S.-W. et centr.
 9844. DECORATUS, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 445, 1870, pl. 5; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* III, p. 870. Afr. E. (Kilima Ndjaro
 et pays voisins.)
 9845. VARIEGATUS, Burch., *Trav. S. Afr.* II, p. 345; Smith, *Zool. S. Afr.*, pl. 10. Afr. S. jusqu'au Trans-
 vaal et le Damara.
 9846. CORONATUS, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 65; Tem., *Pl. Col.* 559, 540; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 65. Afr. N.-E. et Asie S.-W.
 jusqu'à l'Inde N.-W.
 2618. *Var. ATRATA*, Harl., *Bull. Br. Orn. Club*, fév. 1902. Perse E.
 9847. GUTTURALIS, Smith, *Rep. Exped. Afr.*, p. 56; id., *Zool. S. Afr.*, pls 3 et 51; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* III, p. 862. Afr. N.-E., E. et S. (du
 Transv. à l'Abyss.)
 2619. *Var. SATURATION*, Harl., *Novit. Zool.* VII, p. 29. Athi (Afrique E. angl.)
 9848. PERSONATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 15; id., *Voy. Sulph. Zool.*, p. 49, pl. 50; Miln.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, p. 48, pls 196-98. Madagascar.
 9849. FASCIATUS (Scop.), *Del. Fl. et Faun.* II, p. 92; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 65; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 59; *indicus*, Gm.; *bicinctus*, Wagl.; *pictus*, Hodgs.; *quadricinctus*, Jerd. (nec Tem.), *Ind. Orn.*, pls 10 et 56. Inde.
 9850. BICINCTUS, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 247, 715; Str. et Sel., *Contr. Orn.*, 1852, p. 157; Grant, *Cat. B.*, p. 50. Afrique centr. S. jus-
 qu'au Mossamedes.
 9851. QUADRICINCTUS, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 252, 715; *bicinctus*, Licht.; Vieill., *Gal. Ois.* III, p. 60, pl. 220; *tricinctus*, Sw., *Orn.-W. Afr.*, p. 222, pl. 25 (fem.) De Sénégalie à
 l'Abyssinie.
 9852. LICHTENSTEINI, Tem., *Pl. Col.* 555, 561; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* III, p. 865; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 66. Afrique N.-E., Asie
 S.-W.

FAM. II. — HEMIPODIIDÆ (1)

1425. TURNIX

Turnix, Bonn. (1790); *Tridactylus*, Lacép. (1801); *Ortygis*, Ill. (1811); *Hemipodius*, Tem. (1815); *Ortyx*, Oken (1816); *Ortygodes*, Vieill. (1816); *Arcoturnix*, Bp. (1856); *Arcortyx*, Heine (1887).

9853. PUGNAX (Tem.), *Pig. et Gal.* III, p. 612, 754; Schinz, Billiton, Java, Sumatra, Ceylan S.-W.
Nat. Vög., p. 165, pl. 80; ? *suscitator*, Gm.;
luzoniensis, Horsf.; *taigoor* (pt.), Holdsw., Legge;
plumbipes, Vorderm. (nec Hodgs.)

2620. Var. TAIGOOR (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 155; Hume Inde, Ceylan N., Chine,
et Marsh., *Game B.* II, p. 169, pl.; ? *nigri-* Indo-Chine, Malacca, Formose et îles
collis, Jard. (nec Gm.), *Nat. Lib., Orn.* IV, Loo-choo.
p. 191, pl. 28; *plumbipes*, Hodgs.; *atrogularis*, Eyl.; *ocellatus*, Blyth (nec Scop.);
pugnax (pt.), auct. plur.; *rostrata*, *blakistoni*, Swinh.

9854. FASCIATA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 654, 757; *nigrescens*, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 765; *haynaldi*, Blas., *Ornis*, 1888, p. 517. Philippines.

9855. BUFILATA, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 480; Mey. et Célèbes.
Wg., *B. Cel.* II, p. 686; *fasciatus*, Gould (nec Tem.); *B. Asia*, VII, pl. 11; *rufilateralis*, Rosenb.

9856. POWELLI, Guillem., *P. Z. S.*, 1883, p. 510, pl. 29. Sumbawa.

9857. SYLVATICA (Desf.), *Mém. Ac. R. Sc. Paris*, 1787, p. 500, Europe S., Afrique N.
pl. 15; Dress., *B. Eur.* VII, p. 249, pl. 494;
andalusicus et *gibraltarius*, Gm.; *africanus*, Bonn.; *tachydromus* et *lunatus*, Tem.; *albicularis*, Malh.

2621. Var. LEPURANA (Smith), *Rep. Exp., App.*, p. 55; Afrique austr. jusqu'au 13° l. N.
id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 16.

9858. DUSSUMIERI (Tem.), *Pl. Col.* 454, f. 2; Gould, *B. Asia*, Inde, Indo-Ch. N.-W.,
VII, pl. 10; *variabilis*, Hodgs.; *sykesi*, Sm.; Pégou, Haïnan, Formose.
joudera, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 50 (nec Hodgs.)

9859. HOTTENTOTTA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 656, 757; Colonie du Cap.
Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 607 (pt.)

2622. Var. NANA (Sundev.), *Oefv. Vet.-Akad. Förhandl.*, Afrique S., du 10° au
1850, p. 110; Grant, *Ibis*, 1889, pp. 450, 30° l. S.
463; *hottentotta* (pt.), Sharpe, Shell.

9860. WHITEHEADI, Grant, *Handb. to the Game Birds*, II, p. 276. Luçon.

9861. BLANFORDI, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1865, p. 80; *maculatus*, Vieill. (pt., nec Tem.); Dav. et Oust., Du Bengal E. au Ténassérin, Siam,

(1) Voy. Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 526-55 (1893).

- Ois. Chine*, p. 598; *maculosa*, Gray; Hume et Marsh., *Game B. II*, p. 185, pl.; *viciarius*, *chrysostomus* et *cathareus*, Swinh.; *variabilis*, Prjev.
9862. TANKI, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 180; *joudera*, Hodg.; Hume et Marsh., *Game B. II*, p. 187, pl.; *dussumieri*, Jerd. (nec Tem.), *B. Ind. II*, p. 599.
9865. ALBIVENTRIS, Hume, *Str. Feath. I*, p. 510; Hume et Marsh., *l. c.*, p. 199, pl.
9864. MACULOSA (Tem.), *Pig. et Gal. III*, pp. 651, 757; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 687; *maculatus*, Vieill., *Gal. Ois. II*, p. 51, pl. 217 (fem.); *melanotus*, Gould; id., *B. Austr. V*, pl. 84; *beccarii*, Salvad.
2625. Var. SATURATA, Forb., *Ibis*, 1882, p. 428, pl. 12; *melanotus* (pt.), auct. plur.
2624. Var. RUFESCENS, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 497.
9865. OCELLATA (Scop.), *Del Fl. Faun. Insubr. II*, p. 88; Mey., *Nov. Act. Acad. C. L.-C. Nat. Cur.*, 1854, *Suppl.*, p. 101, pl. 17; *luzoniensis*, Gm.; *thoracicus*, Tem.; *rufus*, Vieill.
9866. NIGRICOLLIS (Gm.); Vieill., *N. Diet. XXXV*, p. 45; M.-Edw. et Grand., *Madag., Ois.*, p. 494, pl. 202.
9867. MELANOGASTER, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 7; id., *B. Austr. V*, pl. 81.
9868. VARIA (Lath.); Gould, *Syn. B. Austr.*, pl., f. 1; id., *B. Austr. V*, pl. 82; *scintillans*, Gould; id., *B. Austr. V*, pl. 85.
2625. Var. NOVE-CALÉDONIE, Grant, *Cat. B. XXII*, p. 552 (en note); *varia* (pt.), Grant, *Ibis*, 1889, p. 474.
9869. CASTANONOTA (Gould), *P. Z. S.*, 1859, p. 145; id., *B. Austr. V*, pl. 85; Grant, *Ibis*, 1889, pp. 455, 474.
9870. PYRRHOTHORAX, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 150; id., *B. Austr. V*, pl. 86; id., *Handb. B. Austr. II*, p. 186.
9871. EVERETTI, Hart., *Nov. Zool. V*, p. 476.
9872. LEUCOGASTER, North, *Ibis*, 1895, p. 542.
9875. OLIVEI, Rob., *Bull. Br. Orn. Cl.*, 1900, p. 45.
9874. VELOX, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 150; id., *B. Austr. V*, pl. 87; id., *Handb. B. Austr. II*, p. 184.
- Chine, Mandchourie.
- Inde, Himalaya.
- Iles Andamans et Nicobars.
- Australie N. et E.,
Nouv.-Guinée S.,
Célèbes S.-E.
- Nouv.-Bretagne, ile
Duc York.
- Iles Sémao et Timor.
Luçon (Philippines).
- Madagascar.
- Australie E.
- Australie.
- Nouv.-Calédonie.
- Australie N.
- Australie N.-E., E.,
S. et centr.
- Ile Sumba.
- Australie centr.
- Queensland N.
- Australie.

1426. PEDIONOMUS

Pedionomus, Gould (1840); *Turnicigralla*, Des M. (1845).

9875. TORQUATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 114; id., *B. Austr. V*, pl. 80; *microurus*, Gould; *gouldiana*, Bp.
- Australie E., S. et centr.

FAM. III. — THINOCORIDÆ (1)

1427. ATTAGIS

Attagis, Geoffr. St-Hil. et Less. (1850).

9876. GAYI, Geoffr. St-Hil. et Less., *Cent. Zool.*, p. 155, Pérou, Chili.
pl. 47; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 158; Tacz.,
Orn. Pér. III, p. 284; *latreillii*, Less., *Ill. Zool.*,
pl. 11.
9877. CHIMBORAZENSIS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 75, 82; Ecuador.
Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 157, pl. 79.
9878. MALOUINUS (Bodd.), *Tabl. Pl. Ent.*, p. 15; *Pl. Ent.* Iles Malouines, Magel-
522; Gray, *List Grall. Br. Mus.*, p. 51; *falklan-* lan.
dicus, Gm.

1428. THINOCORUS

Thinocorus, Eschs. (1829); *Ocypetes*, Wagl. (1829); *Thinocorys*, Sharpe (1899).

9879. ORBIGNYANUS, Geoffr. et Less., *Cent. Zool.*, p. 157, Chili, Bolivie, Pérou.
pl. 48; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 281; *inga*, Tschudi;
cuneicauda, Peal.
9880. RUMICIVORUS, Eschs., *Zool. Atl.*, p. 2, pl. 2; Burm., Pérou, Bolivie, Chili,
Reise La Plata-St. II, p. 501; *torquatus*, Wagl.; Argent., Patagonie.
swainsoni, Less., *Ill. Zool.*, pl. 16; *eschscholtzii*,
Geoff. et Less., *Cent. Zool.*, p. 140, pl. 50.

FAM. IV. — CHIONIDÆ (2)

1429. CHIONIS

Chionis, Forst. (1788); *Vaginalis*, Gm. (1788); *Coleorhamphus*, Dumt. (1818).

9881. ALBA (Gm.); Quoy et Gaim., *Voy. Uranie*, p. 151, Amérique au S. du 51°
pl. 55; *chionis*, Lath.; *nivalis*, Dum.; *vaginalis*, l. S., îles Malouines.
Tem., *Pl. Col.* 509; *forsteri*, Steph.; *necrophaga*,
Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 146, pl. 258; *lactea*, Forst.

1450. CHIONARCHUS

Chionis (pt.), auct. plur.; *Chionarchus*, Kidd. et Coues (1876).

9882. MINOR (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1841, p. 5, 1842, pl. 2, Iles Kerguelen et Ma-
II. 2, 2a; Gray, *Gen. B.* III, pl. 156; Kidd. et rion.
Coues, *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1876, pp. 85, 116.
9885. CROZETTENSIS, Sharpe, *Bull. B. O. Club* V, n° XXXVI, Ile Crozette.
p. 44; *minor* (pt.), auct. plur. (nec Hartl.)

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXIV, pp. 714-720 (1896).

(2) Voy.: Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXIV, pp. 710-713 (1896).

ORD. VIII. — CRYPTURI ⁽¹⁾

FAM. I. — TINAMIDÆ

SUBF. 1. — TINAMINÆ

1451. TINAMUS (2)

Tinamus, Lath. (1790); *Cryptura*, Vieill. (1816); *Pezus*, Spix (1825); *Trachypelmus*, Cab. (1848).

9884. TAO, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 569, 749; Schl., *Mus.* Guyane, Vénézuéla, P.-B., *Tinami*, p. 8; *solitaria* (pt.), Vieill.; *brasiliensis* (pt.), Tem.; *canus*, Wagl.; *kleei*, Tsch., Amazone, Colombie, Arch. f. *Naturg.*, 1845, 1, p. 387; id., *Faun.* Pérou, Bolivie, Per., pp. 47, 284, pl. 52; *weddelii*, Bp., *C. R.* ? Chili N. XLIII, p. 881; *blasi*, Bp., *l. c.*, p. 575; *plumbeus*, Natt.; *blasiusi*, Dub., *Mém. Soc. Zool. de Fr.*, 1994, p. 404 (= *kleei*).
9885. ROBUSTUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1860, p. 255; Scl. et Mexique, Guatémala. Salv., *Exot. Orn.*, p. 87 (pt.), pl. 44; ? *major*, Moore (nec Gm.).
2626. Var. FUSCIPENNIS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXVII, Du Nicaragua à Panama. p. 500; *robustus* (pt.), auct. plur.
2627. Var. SALVINI, Underw., *Ibis*, 1898, p. 612. Costa-Rica.
9886. SOLITARIUS (Vieill.), *Nouv. Dict.* XXXIV, p. 105; id., Brésil S., Paraguay. *Enc. méth.* I, p. 575; Salvad., *Cat.*, p. 501, pl. 7; *tao* (pt.), auct. plur.; *serratus*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 61, pl. 76; *brasiliensis* (pt.), auct. plur. (nec Lath.); *major*, Rehb. (nec Gm.); *guttulatus*, Gray.
9887. MAJOR (Gm.); *Pl. Enl.* 476; Gray, *Gen. B.* III, p. 524; Brésil N. et centr. *brasiliensis*, Lath.; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 562, 748; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 291, 455; *magoua*, Vieill.; *subcristatus*, Pelz. (nec Cab.), *l. c.*, p. 291; *cristatellus*, Natt.
9888. SUBCRISTATUS (Cab.), *Schomb. Reis. Br. Guian.* III, Guyane. p. 749; Bp., *C. R.* XLIII, p. 881; Schl., *Mus.* P.-B., *Tinami*, p. 15; *major* (pt.), Gray.
9889. LATIFRONS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXVII, p. 506. Ecuador W.
9890. PERUVIANUS, Bp., *C. R.* XLIII, p. 575 (1856); Dubois, Colombie, Ecuador, *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1894, p. 404; *ruficeps*, Scl. Pérou, Haut-Amazone. et Salv. (pt.), *Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 152, 162; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 292.

(1) Voy. : Salvadori, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXVII, pp. 494-569 (1895).

(2) Quid? *Trachypelmus intermedius* (Cab.), Heine et Rehw., *Nomencl. Mus. Hcin. Orn.*, p. 303 (*descr. nulla*), ex Bogota.

2628. *Var. CASTANEICEPS*, Salvad., *Cat. B.*, p. 507, pl. 6; *robustus* (pt.), Lawr., *Scl. et Salv.*; *ruficeps* (pt.), *Scl. et Salv.* Véragua, Panama.
9891. *GUTTATUS* (Thien. ex Natt.), *Fortpflanz.*, p. 24; Pelz., *Verh. z.-b. Ges. Wien*, 1865, pp. 1126; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 295. Ecuador, Pérou, Amazonie.

1452. NOTHOCERCUS

Nothocercus, Bonap. (1856).

9892. *JULIUS*, Bp., *C. R.* XXXVII, p. 665, XLII, p. 881; Schl., *Mus. P.-B., Tinami*, p. 18; Salvad., *Cat.*, p. 509; *bourcierii*, Bp. Colombie, Ecuador.
9895. *NIGRICAPILLUS* (Gray), *List Gall. Br. Mus.*, p. 98; *Scl. et Salv., Nomencl.*, p. 152; Salvad., *Cat.*, p. 511, pl. 8. Chili?
9894. *BONAPARTEI* (Gray), *List. Gall. Br. Mus.*, p. 97; *Scl. et Salv., Nomencl.*, p. 152. Vénézuéla, Colombie, Ecuador.
2629. *Var. FRANTZII* (Lawr.), *Ann. Lyc. N. V.*, 1868, p. 140; *bonapartii*, auct. plur. (nec Gray); *nigricapillus* (pt.), Schl. De Costa-Rica à Panama.
2650. *Var. INTERCEDENS*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 515; *banapartii* (pt.), *Scl. et Salv.* Antioquia (Colombie).

1455. CRYPTURUS

Crypturus, Illig. (1811); *Tinamus* (pt.), auct. plur.

9895. *CINEREUS* (Gm.); Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 574, 750; Burm., *Th. Bras.* III, p. 517; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 500; ? *caruleus*, Less.; *megapodius*, Bp.; *ussimilis*, Schl. (aberr.) De la Guyane au Rio-Madeira, Pérou E., Haut-Amazone.
9896. *BERLEPSCHI*, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Club*, 1897, p. v; id., *Nov. Zool.* V, pl. 5. Ecuador N.
9897. *OBSOLETUS* (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 588, 751; id., *Pl. Col.* 196; Burm., *Th. Bras.* III, p. 516; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 296; *carulescens*, Vieill.; *rufus*, Less.; *obscurus*, Licht. Brésil, Bolivie, Pérou.
9898. *CERVINIVENTRIS*, *Scl. et Salv., P. Z. S.*, 1875, p. 512. Vénézuéla.
9899. *GRISEIVENTRIS*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXVII, p. 521. Amazonie (Brésil).
9900. *CASTANEUS* (Scl.), *P. Z. S.*, 1857, p. 277; Salvad., *Cat.*, p. 521, pl. 9; *obsoletus* (pt.), Gray. Colombie.
9901. *SOLI* (Herm.), *Tabula Affin. Anim.* (1785), pp. 164, 255; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 597, 752; Richm., *Auk*, 1900, p. 179; *pileatus*, Bodd.; *Pl. Enl.* 829; Schl., *Mus. P.-B., Tinami*, p. 24; Salvad., *Cat.*, Amérique centr. et mérid., du 20° l. N. au 20° l. S. environ.

- p. 522; *sovi*, Gm.; *parvirostris*, Gr. (nec Wagl.); *meserythrus*, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 592; id., *Exot. Orn.*, p. 95, pl. 47; *modestus*, Cab.
9902. TATAUPA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 590, 752; id., *Pl. Col.* 415; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 297; *niumbu*, Spix; *plumbeus*, Less.; *lepidotus*, Sw. Brésil, Paraguay, Bolivie, Pérou.
9905. PARVIROSTRIS, Wagl., *Syst. Av.*, *Crypturus*, sp. 15; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 294, 454; Tacz., *l. c.*, p. 298; ?*pallescens*, Licht.; *exiguus*, Olb.; ?*cervinus*, Bp. Amérique mérid., du 10° au 20° l. S. environ.
9904. KERBERTI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVIII, p. 1. Argentine.
9905. UNDULATUS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 582, 751; Salvad., *Cat.*, p. 527; *sylvicola*, Vieill. Paraguay, Argentine N.-E.
9906. SCOLOPAX (Bonap.), *Tabl. Parall. Ord. Gal.*, p. 12, n° 555, p. 18, n° 15; Salvad., *Cat.*, p. 528, pl. 12; *radiatus*, Gray; *undulatus*, Pelz. (nec Tem.) Bolivie et Brésil centr.
9907. ADSPERSUS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 585, 751; Burm., *Th. Bras.* III, p. 519; *vermiculatus*, Tem., *Pl. Col.* 569. Brésil, ? Colombie.
2651. *Var. SIMPLEX*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 551. Guyane angl.
2652. *Var. BALSTONI*, Bartl., *P. Z. S.*, 1882, p. 574; Salvad., *Cat.*, p. 551, pl. 15; *adpersus*, Tsch. (nec Tem.); Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 511. Pérou E.
9908. ATRICAPILLUS, Tschudi, *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 507; id., *Faun. Per.*, pp. 47, 284; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 294; *erythropus* (pt.), Schl. Pérou.
2655. *Var. GARLEPPI*, Berl., *Ber. Allg. Deutschl. Orn. Ges.*, 1892, p. 15; id., *J. f. O.*, 1892, p. 454. Bolivie.
9909. RUBRIPES, Tacz., *Orn. du Pérou*, III, p. 505 (1886). Pérou.
9910. STRIGULOSUS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 594, 752; Burm., *Th. Bras.* III, p. 522; Schl., *Mus. P.-B., Tinami*, p. 27; *strigulatus*, Less. Bas-Amazone.
9911. ERYTHROPUS (Pelz., ex Natl.), *Verh. z.-b. Ges. Wien*, 1865, p. 1127; id., *Orn. Bras.*, pp. 295, 455; Schl., *l. c.*, p. 54; Salvad., *Cat.*, p. 554, pl. 10; *longirostris*, Gray. Brésil dans la vallée de l'Amazone.
9912. VARIEGATUS (Gm.); *Pl. Enl.* 828; Burm., *Th. Bras.* III, p. 521; Schl., *l. c.*, p. 52; *sylvicola*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 49, pl. 216 (nec Dict.); *bimaculatus*, Gr. (juv.) Guyane, Bas-Amazone.
2654. *Var. SALVINI*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 557. Ecuador E.
9913. BREVIROSTRIS (Pelz., ex Natl.), *Verh. z.-b. Ver. Wien*, 1865, p. 1128; id., *Orn. Bras.*, pp. 294, 455; *variegatus* (pl.), Schl., *l. c.*, p. 52. Brésil centr. (Rio-Né-gro, Amazone).
9914. BARTLETTI, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 511; Tacz., Haut-Amazone.

- Orn. Pér.* III, p. 501; Salvad., *Cat.*, p. 558, pl. 11.
9915. *NOCTIVAGUS* (Max.), *Reise nach Bras.* I, pp. 160, 175; Brésil E., ? Pérou,
id., *Beitr.* IV, p. 504; Spix, *Av. Bras.* II, p. 62, ? Montevideo.
pl. 77; Burm., *Th. Bras.* III, p. 520; Tacz.,
l. c., p. 502.
2655. *Var.* *DISSIMILIS*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 541; Guyane angl.
noctivagus (pt.), Cab.; Salv., *Ibis*, 1886, p. 181.
9916. *CINNAMOMEUS* (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 210; *del-* Du S. du Mexique à la
lattrii et *sallari*, Bp., *C. R.* XLII, p. 881; Scl. et Colombie et Véné-
Salv., *Exot. Orn.*, p. 89, pl. 45. zuéla.
- 2655^{bis}. *Var.* *GOLDMANI*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, Yucatan.
1901, p. 169.
9917. *BOUCARDI* (Scl., ex Sallé), *P. Z. S.*, 1859, p. 591; Scl. Du S. du Mexique au
et Salv., *Exot. Orn.*, p. 91, pl. 46; Schl., *l. c.*, p. 26. Costa-Rica.
9918. *COLUMBIANUS*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 545. Colombie.
9919. *MEXICANUS*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 545. Mexique N.-E.
2656. *Var.* *INORNATA*, Nels., *Auk*, 1900, p. 255. Véra-Cruz N.
2657. *Var.* *OCIDENTALIS*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, Mexique N.-W.
p. 546.
9920. *TRANSFASCIATUS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 141, Ecuador W.
pl. 15; Salvad., *Cat.*, p. 546.

1454. RHYNCHOTUS

Rhynchotus, Spix (1825); *Nothurus*, Sw. (1857); *Rhynchotis*, Rehb. (1848).

9921. *RUFESCENS* (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 552, 747; id., Argentine, Uruguay,
Pl. Col. 412; *guazu*, Vieill.; *fasciatus*, Spix, *Av.* Paraguay et Brésil
Bras. II, p. 60, pl. 76 a. jusqu'à Bahia.
9922. *MACULICOLLIS*, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 102; Bolivie.
Schl., *l. c.*, p. 58; Salvad., *Cat.*, p. 550, pl. 14.

1455. NOTHOPROCTA

Nothura, Fras. (1845); *Nothoprocta*, Scl. et Salv. (1875).

9925. *TACZANOWSKII*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1874, pp. 564, Pérou centr. et S.
679, pl. 84; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 504; *god-*
mani, Tacz., *l. c.*, p. 505 (juv.)
9924. *CINERASCENS* (Burm.), *J. f. O.*, 1860, p. 259; id., *La* Argentine W.
Plata Reise, II, p. 498; Schl., *l. c.*, p. 40.
9925. *PERDICARIA* (Kittl.), *Mém. des Sav. étrang.* I, p. 192, Chili N. et centr.
pl. 12; Schl., *l. c.*, p. 40; Scl. et Salv., *Nomencl.*,
p. 155; *perdix*, Mol. (nec Lin.); ? *punctulata*, Des M.
2658. *Var.* *COQUIMBICA*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 554, Chili S.
pl. 15; *perdicaria* et *cinerascens* (pt.), auct.
plur.

9926. *PENTLANDI* (Gray), *List Gall. Br. Mus.*, p. 105; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 155; Salvad., *Cat.*, p. 555; pl. 16; ?*punctulata*, Bp. (nec Des M.); ?*curvirostris*, Bp.; *doeringi*, Cab., *J. f. O.*, 1878, p. 158; *moebiusi*, Berl. (juv.) Bolivie, Argentine N.-W.
9927. *CURVIROSTRIS*, Scl. et Salv. (nec Bp.), *Nomencl.*, pp. 155, 165; id., *P. Z. S.*, 1874, p. 680; Schl., *l. c.*, p. 41. Ecuador.
2659. *Var. PERUVIANA*, Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 507. Pérou.
9928. *ORNATA* (Gray), *List Gall. Br. Mus.*, p. 102; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 155; id., *P. Z. S.*, 1874, p. 680; Salvad., *Cat.*, p. 557, pl. 17. Bolivie.
9929. *BRANICKII*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 565; id., *Orn. Pér.* III, p. 508. Pérou centr.

1456. NOTHURA

Nothura, Wagl. (1827); *Nothera*, Gray (1840).

9950. *MACULOSA* (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 557, 748; Gray, *Gen. B.* III, p. 525; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 211; *fasciata*, Vieill.; *major*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 64, pl. 80 (nec auct.); *maculatus*, Less. Argentine, Paraguay, Uruguay, Brésil S.
2640. *Var. NIGROGUTTATA*, Salvad., *Cat.*, p. 560. Argentine centr.
2641. *Var. BOLIVIANA*, Salvad., *Cat.*, p. 561; *media*, Gray (nec Spix). Bolivie.
9951. *MARMORATA*, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 104; Schl., *l. c.*, p. 44; Salvad., *Cat.*, p. 561, pl. 18; *maculosa*, Blas. Bolivie.
9952. *ROBAQUIRA* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 65, pl. 79; Wagl., *Syst. Av.*, *Nothura*, sp. 1; Burm., *Th. Bras.* III, p. 529; Schl., *l. c.*, p. 44. Brésil, Argentine W.
9953. *DARWINI*, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 104; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 215, pl. 20; Salvad., *Cat.*, p. 562, pl. 19; *minor*, Darw. (nec Spix); *maculosa* (pt.), auct. plur. Patagonie et Argentine jusqu'à Cordova.
9954. *MEDIA* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 65, pl. 81, 82; Salvad., *Cat.*, p. 565; *minor*, Spix; Burm., *Th. Bras.* III, p. 531; Schl., *l. c.*, p. 45; *maculosa* (pt.), auct. plur.; *assimilis*, Gray; *brevipes*, Natt.; ?*nana*, Hart. Brésil S.

1457. TAONISCUS

Taoniscus, Glog. (1842); *Pavuncula*, Bp. (1856).

9955. *NANUS* (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 600, 755; id., *Pl. Col.* 516; *pavoninus*, Glog. Brésil E., Paraguay.

SUBF. II. — TINAMOTIDINÆ

1458. CALOPEZUS

Eudromia, I. Geoff. (1852, nec *Eudromias*, Boie); *Calodromas*, Scl. et Saly. (1873, nec *Calodromus*, Guér., 1852); *Calopezus*, Ridgw. (1884).

9956. ELEGANS (d'Orb. et Geoff. St-Hil.), *Mag. de Zool.*, Argentine, Patagonie. 1852, pl. 1; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 214; Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1884, p. 97.

1459. TINAMOTIS

Tinamotis, Vig. (1856).

9957. PENTLANDI, Vig., *P. Z. S.*, 1856, p. 79; Gray, *Gen. B. III*, p. 523, pl. 157; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 310; *andecola*, d'Orb., *Voy.* II, p. 68 (note 2), p. 502. Bolivie, Chili N., Pérou, Ecuador.

9958. INGOUFI, Oust., *Ann. Sc. Nat., Zool.*, 1890, p. 18; Patagonie E. id., *Miss. Sc. Cap Horn., Ois.*, p. 105, pl. 1; Salvad., *Cat.*, p. 569.

ORD. IX. — GALLINÆ

FAM. I. — MEGAPODIIDÆ (1)

1440. MEGAPODIUS

Megapodius, Quoy et Gaim. (1824); *Alecthelia*, Less. (1826); *Amelous*, Glog. (1842); *Eulipoo*, Grant (1895).

9959. NICOBARIENSIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1846, pp. 52, 572; Pelz., *Reise Novara, Vög.*, p. 110, pl. 4; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 119, pl.; *trinkutensis*, Sh., *Ann. Mag. N. H.*, 1874, p. 448. Iles Nicobars.

9940. TENIMBERENSIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 57. Iles Ténimber.

9941. CUMINGI, Dillwyn, *P. Z. S.*, 1851, p. 118, pl. 59; Philippines, îles Soulou, Célèbes et Tojian. Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 671, pl. 41, f. 1; *rubripes*, Wagl. (pt.); *rufipes*, Gr.; *gilbertii*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 289; *lowi*, Sharpe; *pusillus*, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 763, pl. 78; *dillwyni*, Tweed., *l. c.*

9942. SANGHIRENSIS, Schl., *Notes Leyd. Mus.* II, p. 91; Sanghir, Talaut. Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 675, pl. 41, f. 2.

(1) Voy. : Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 445-472 (1893); id., *Handb. Game Birds*.

9945. BERNSTEINI, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 261; Iles Soula.
Grauf, *Cat.*, p. 450.
9944. FORSTENI, Gray, *Gen. B.* III, p. 491, pl. 124; Salvad., Moluques.
Orn. Pap. III, p. 255; *duperreyi*, Schl. (part.)
2642. Var. AFFINIS, Mey., *S. B. Ak. Wien*, 1874, p. 215; Nouv.-Guinée N.-W.,
Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1881, p. 95; Salvad.,
Orn. Pap. III, p. 257; *jobiensis*, Schl.; *de-*
collatus, Oust., *Bull. Ass. Sc. Fr.*, 1878, p. 248. Iles Jobi et d'Ur-
ville.
9945. BRUNNEIVENTRIS, Mey., *Abh. Zool. Mus. Dresd.*, Nouv.-Guinée S.-E.
1890-91, n° 4, p. 15; Grant, *Cat.*, p. 452.
9946. EREMITA, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, p. 850; Sci., *Voy.* Iles de l'Amir., Nouv.-
Challenger, p. 52, pl. 11; Salvad., *Orn. Pap.* III, Hanov., Nouv.-Irl.,
p. 258; *hueskeri*, Cab. et Rehw., *J. f. O.*, 1876, Duc Yerk, Nouv.-
p. 526; *rubrifrons*, Sci., *P. Z. S.*, 1877, p. 556. Bretagne.
2645. Var. BRENCHELEYI, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1870, Iles Salomon.
p. 528; id., *Cruise Curaçoa*, p. 592, pl. 20;
Sharpe in *Gould's B. New-Guin.*, pt. XXII,
pl. 11.
9947. MACGILLIVRAVI, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 289; Sal- Nouv.-Guinée S.-E.,
vad., *Orn. Pap.* III, p. 225; Sci., *P. Z. S.*, 1876, Louisiades.
p. 460, pl. 45; *duperreyi*, Macg.
9948. DUPERREYI, Less. et Garn., *Bull. Sc. Nat.*, 1826, Iles Kangean, Lom-
p. 115; Less., *Voy. Coq.* I, 2, p. 700, pl. 56; id., bock, Flores, Sumba,
Traité d'Orn., p. 478, pl. 87, f. 1; Salvad., *Orn.* Banda, Key, Arou,
Pap. III, p. 220; *rubripes*, Tem., *Pl. Col.* 411; Salawatti, Nouv.-
reinwardtii, Wagl.; *rufipes*, Müll.; *urvillei*, Wall. Guinée S. et W.
(nec Less.); *gouldii*, *amboinensis*, Gray.
2644. Var. TUMULUS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 20; id., Australie N.
B. Austr. V, pl. 79; Gray, *P. Z. S.*, 1861,
p. 290, pl. 54; *assimilis*, Mast.
9949. FREYCINETI, Quoy et Gaim., *Voy. Uranie*, p. 125, Moluques, Nouv.-
pl. 52; Tem., *Pl. Col.* 220; ?*novæ-guinæ*, Gm.; Guinée W.
urvillii, Less.; id., *Voy. Coq.* I, 2, p. 705, pl. 57;
quoyi, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 289, pl. 52;
alecthelis, Q. et G.
9950. GEELVINKIANUS, Mey., *S. B. Ak. Wien*, 1874, p. 88; Iles de la baie de Geel-
Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 227; ?*rubripes*, Ro- vink (Nouv.-Guinée
senb.; *affinis*, Salvad. N.-W.)
9951. LAYARDE, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 194; Grant, *Handb.* Nouv.-Hébrides.
Game B. II, pl. 55; *brazieri*, Schl.; *brenchleyi*,
Salv., *Ibis*, 1874, p. 457 (nec Gr.)
9952. LAPEROUSH, Tem., *Pl. Col.*, (texte); Quoy et Gaim, *Voy.* Iles Mariannes.
Uranie, p. 127, pl. 55; Schl., *Mus. P.-B.* VIII, p. 65.
2645. Var. SENEX, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, p. 850; Finsch, Iles Pelew.
J. Mus. Godef. IV, pt. VIII, p. 29, pl. 5,
ff. 2, 5; Hart., *Novit. Zool.* V, p. 62.

9953. PRITCHARDI, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1864, p. 578; Ile Ninafou.
Fch. et Harth., *Orn. Centralpol.*, p. 155; Schl.,
l. c., p. 64; *stairi* et *burnabyi*, Gray; *huttoni*, Bull.
9954. WALLACEI, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 562, pl. 171; Moluques.
Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 241; Grant, *Cat.*, p. 462.

1441. LIPOA

- Leipoa*, Gould (1840); *Lipou*, Sundev. (1872).
9955. OCELLATA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 126; id., *B. Austr.* V, pl. 78. Australie S. et W.

1442. TALEGALLUS

- Talegallus* et *Talegalla*, Less. (1828).
9956. CUVIERI, Less., *Voy. Cog.*, *Zool.* I, 2, p. 716, pl. 58; Nouv.-Guinée W.,
Quoy et Gaim., *Voy. Astrol.*, *Ois.*, pl. 25, ff. 5, 6; Salawatti, Mysol,
Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 245. Gilolo.
2646. Var. FUSCIROSTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Nouv.-Guinée, îles
1877, pp. 552, 554; id., *Orn. Pap.* III, Arou.
p. 248; *cuviéri* (pt.), auct. plur. (nec Less.)
9957. JOBIENSIS, Mey., *S. B. Ak. Wien*, 1874, *Abth.* I, pp. 74, Ile Jobi, Nouv.-Gui-
87; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 244. née.
2647. Var. LONGICAUDA, Mey., *Abh. Mus. Dresd.*, 1890-91, Nouv.-Guinée S.-E.
n° 4, p. 15 (*longicaudus*).

1443. CATHETURUS

- Alectura*, Lath. (1824); *Catheturus*, Swains. (1857); *Alectrorura*, Agass.
9958. LATHAMI (Lath.), *Gen. Hist. B.* X, p. 455; Jard. et Australie E.
Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 140; Gould, *B. Austr.* V,
pl. 77; *lindesayi*, James.; *australis*, Sw.; *novæ-*
hollandiæ, Bp.
2648. Var. PURPUREICOLLIS (Le Sonéf), *Ibis*, 1898, p. 51. Cap York.

1444. ÆPYPODIUS

- Æpypodius*, Oustal. (1880).
9959. BRUNNI, Oust., *C. R.* XC (1880), p. 906; id., *Le Nat.*, Waigiou.
1880, p. 525; id., *Ann. Sc. Nat.*, 1881, p. 58,
ff. 53, 54; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 255.
9960. ARFAKIANUS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1877, Nouv.-Guinée.
p. 553; id., *Orn. Pap.* III, pp. 251, 564; *pyrrho-*
pygius, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, p. 159;
arfaki, Schl., *l. c.*, p. 160.

1445. MEGACEPHALON

Megacephalon, Tem. (1846); *Macrocephalon*, Müll. (1846); *Megacephala*, Heine (1887).

9961. MALEO, Tem., *Pl. Col.* (texte); Hartl., *Verz.*, p. 101; Célèbes, Sanghir.
Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 678; *rubripes*, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol. Zool.* 1, p. 259, pl. 25.

FAM. II. — CRACIDÆ

1446. CRAX

Crax, Liu. (1766); *Mituporanga*, *Crossolaryngus*, *Spherolaryngus*, Rehb. (1862).

9962. ALECTOR, Liu.; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 27, 689; Guyane angl., Brésil
Burm., *Th. Bras.* III, p. 544; Sci., *Trans. Z. S.* IX, au N. de l'Amazone.
p. 277, pl. 45; *mitu*, Vieill., *Gal. Ois.* II, pl. 199;
sloanei, Rehb.
2649. Var. ERYTHROGNATHA, Sci. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, Colombie.
p. 22; id., *Trans. Z. S.* X, p. 545, pl. 90.
9963. FASCIOLATA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 48, pl. 62^a; *alector*, Brésil, Bolivie, Para-
Hartl. (1847, nec Lin.); *sclateri*, Gray; Sci. et guay, Argentine N.
Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 515; Sci. et Huds.,
Argent. Orn. II, p. 145; *circinatus*, Licht.; *discors*
et *azara*, Natt.
9964. ?SULCIROSTRIS, Goeldi, *Boll. Mus. Paraense*, III (1899), Brésil S.-E.
p. 409; Grant, *Ibis*, 1902, p. 244; ?*pinima* (fem.)
9965. PINIMA, Pelz. (ex Natt.), *Orn. Bras.*, pp. 287, 541; Amazone.
Sci. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 518; *incommoda*,
Sci., *P. Z. S.*, 1872, p. 690; id., *Trans. Z. S.* IX,
p. 281, pl. 49, X, pl. 95.
9966. GLOBICERA, Lin.; *Pl. Enl.* 125; Sci., *Trans. Z. S.* IX, Mexique, Honduras,
p. 274, pl. 40; *rubra*, Liu.; *alector*, Lath. (fem.); Guatémala et île
blumenbachi, Spix; *temminckii*, Tsch.; *edwardsii* Cozumel.
et *pseudalector*, Rehb.
2650. Var. PANAMENSIS, Grant, *Cat. B. Br. Mus.* XXII, Nicaragua, Costa-
p. 479; *globicera* (pt.), auct. plur.; Sci., Rica, Panama.
Trans. Z. S. X, p. 545, pl. 89; *rubra*, Steph.
(nec Lin.); *alberti*, Fras., *P. Z. S.*, 1850,
p. 246, pl^r 27, 28 (pt. fem.)
9966^{bis}. CHAPMANI, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 170. Yucatan, ? Bélize,
? Guatémala.
9967. GRAYI, Grant, *Cat. B. Br. Mus.*, p. 480; id., *Handb.* ?
Game Birds, II, pl. 57.
9968. CARUNCULATA, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 44, 690; Brésil.
Sci., *Trans. Z. S.* IX, p. 279; *rubrirostris*, Spix,
Av. Bras. II, p. 51, pl. 67; *yarrellii*, Benn.; *blu-*
menbachii, Burm., *Th. Bras.* III, p. 545.

2651. ? *Var.* GLOBULOSA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 50, pl^s 65, 66; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 515; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 279, pl. 46, X, p. 544, pl. 91; *globicera*, Bat. (nec Lin.) Haut-Amazone.
9969. DAUBENTONI, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 15; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 276, pl^s 41, 42; *globicera*, Tem. (nec Lin.); ?*aldrovandi*, Rehb.; *mikani*, Pelz. (mas., nec fem.) Vénézuéla.
9970. ALBERTI, Fras., *P. Z. S.*, 1850, p. 246, pl^s 27, 28 (nec fem.); Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 280, pl. 48; ?*mikani*, Pelz. (fem., nec mas.); *viridirostris*, Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 282, X, p. 544, pl. 92. Colombie.
9971. HECKI, Rehw., *J. f. O.*, 1894, p. 251, pl. 2 (fem.) ?

1447. NOTHOCRAX

Nothocrax, Burm. (1856).

9972. URUMUTUM (Spix), *Av. Bras.* II, p. 49, pl. 62; Burm., *Th. Bras.* III, p. 547; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 282, pl. 50, X, p. 545, pl. 94; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 265. Guyane, Amazone, Ecuador, Pérou.

1448. MITUA

Mitu, Less. (1851); *Mitua*, Strickl. (1841).

9975. TUBEROSA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 51, pl. 67^a; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 285, pl. 51; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 266; *mitu*, Lin.; Grant, *Cat. B.*, p. 485; Tem., *Pl. Col.* 155; *erythrorhynchus*, Sw.; *brasiliensis*, Rehb. Guyane, Amazone, Bolivie, Pérou.
9974. TOMENTOSA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 49, pl. 68; Burm., *Th. Bras.* III, p. 549; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 280, pl. 52. Guyane, Amazone.
9975. SALVINI, Reinhardt, *Vid. Medd. N. F. Kjöbenh.*, 1879, pp. 1-6; id., *P. Z. S.*, 1879, p. 108; Scl., *Trans. Z. S.* X, p. 545, pl. 95. Ecuador.

1449. PAUXIS

Pauxi, Tem. (1815); *Ourax*, Cuv. (1829); *Lophocerus*, Sw. (1857); *Urax*, Rehb. (1852); *Pauxis*, Scl. (1875).

9976. GALEATA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 624; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 1, 685; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 285, pl. 55, f. 1; *pauxi*, Lin.; Grant, *Cat.*, p. 488; var. RUBRA, Scl., *l. c.*, pl. 55, f. 2. Guyane, Vénézuéla, Colombie, Pérou, ?Ecuador.

1450. OREOPHASIS

Oreophasis, Gray (1844).

9977. DERBIANUS, Gray, *Gen. B.* III, p. 485, pl. 121; Scl. Guatémala, Mexique S.
et Salv., *Ibis*, 1859, p. 224; *fronticornis*, v.d. Hoev.

1451. PENELOPE

Penelope, Merr. (1786); *Salpiza*, Wagl. (1852); *Stegnotema*, Scl. et Salv. (1870);
Salpizusa, Heine (1887).

9978. SUPERCILIARIS, Ill., Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 72, 695; Brésil.
Burm., *Th. Bras.* III, p. 557; *jacupemba*, Spix,
Av. Bras. II, p. 53, pl. 72.
9979. MONTAGNI (Bp.), *C. R.* XLII, p. 875; Scl., *P. Z. S.*, Vénézuéla, Colombie,
1857, p. 19; Gray, *List Gall.*, p. 8; Scl. et Salv., Ecuador.
P. Z. S., 1870, p. 521.
9980. SCLATERI, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 270; Grant, *Cat.*, Pérou, Bolivie.
p. 495.
9981. JACUPEBA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 54, pl. 71; *jacucaca*, Colombie, Guyane,
Gray; *cristata*, Cal.; *greeyi*, Gray, *P. Z. S.*, Amazone.
1866, p. 206, pl. 22.
9982. MARAIL, Gm., *S. N.* 1, 2, p. 754; Bonn., *Tabl. Enc.* Guyane.
méth. I, p. 171, pl. 84, f. 4; Tem., *Pig. et Gal.* III,
pp. 56, 692; ?*jacupema*, Merr.; *jacucaca*, Gr. (pt.);
purpurascens, Gray (nec Wagl.), *Knowsl. Menag.* •
II, pl. 11.
9985. ORTONI, Saly., *Ibis*, 1874, p. 525; Berl. et Tacz., Ecuador W.
P. Z. S., 1885, pp. 557, 576.
9984. PURPURASCENS, Wagl., *Isis*, 1850, p. 1110; Scl., *P.* Mexique, Yucatan,
Z. S., 1859, pp. 569, 591; *cristata*, Bonn. (nec Guatémala, Hondu-
Lin.), *Tabl. Enc. méth.* I, p. 171, pl. 84, f. 2. ras.
9985. OBSCURA, Ill., Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 68, 695; Bolivie, Brésil S.,
Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 146; *bridgesi*, Uruguay, l'araguay,
Gr., *P. Z. S.*, 1860, p. 270; *nigricapilla*, Gr., Argentine N.
l. c., p. 269; *jacucaca* (pt.), Gr.; *jacupeba*, Scl.
et Salv. (nec Spix), *P. Z. S.*, 1870, p. 524.
9986. CRISTATA (Lin.); Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 46, 691; Du Nicaragua à la Co-
Burm., *Th. Bras.* III, p. 559; *brasiliensis*, Bp.; lombie, Ecuador.
jacuaca, Gr.; *purpurascens*, Lawr. (nec Wagl.)
9987. BOLIVIANA, Bonap., *C. R.* XLII, p. 877; Grant, *Cat.*, Amazone, Pérou, Bo-
p. 499; ?*jacuacu*, Spix, *l. c.* II, p. 52, pl. 68; livie.
rufescens (Natt.), Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 282, 559.
9988. PILEATA, Wagl., *Isis*, 1850, p. 1109; Des M., *Icon.* Amazone.
Orn., pl. 25; *leucothrix* (Natt.), Pelz., *Orn. Bras.*,
pp. 282, 540.

9989. OCHROGASTER, Pelz. (ex Natt.), *Orn. Bras.*, pp. 282, 557; *Sci. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 527; Grant, *Game B. II*, pl. 58. Matto Grosso (Brés.N.)
9990. JACUCACA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 53, pl. 69; *Sci. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 525; *superciliaris*, Gray (nec Illig.), *Knowsl. Menag.* II, pl. 8. Brésil.
9991. ARGVROTIS (Bonap.), *C. R.* XLII, p. 875; *Sci. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 528; *montana*, Licht.; *lichtensteini*, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 269. Vénézuéla, Colombie, Ecuador.
9992. ALBIPENNIS, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 746. Pérou W.

1452. PENELOPINA

Penelopina, Rehb. (1862).

9995. NIGRA (Fraser), *P. Z. S.*, 1850, p. 246, pl. 29; *Rehb.*, *Tauben*, p. 152; *Sci. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 528. Guatémala, Nicaragua.

1455. ORTALIDA

Ortalida, Merr. (1786); *Canix*, Raf. (1815); *Ortalidia*, Flem. (1822); *Ortalis*, Glog. (1842, nec Fall., 1810); *Penelops*, Rehb. (1855).

9994. МОТМОТ (Lin.); *Pl. Enl.* 146; *Wagl.*, *Isis*, 1852, p. 1227; *Guyane*, Amazone. *katraca*, Bodd.; *parraka*, Gm.; *parraqua*, Lath.; *parrakoua*, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 85, 695; *Burm.*, *Th. Bras.* III, p. 541.
9995. ARAUCUAN (Spix), *Av. Bras.* II, p. 56, pl. 74; *Wagl.*; *Isis*, 1852, p. 1227; *Grant, Cat.*, p. 506; *superciliaris*, Pelz. (nec Gr.) Brésil.
9996. RUFICEPS (Wagl.), *Isis*, 1850, p. 1111, 1852, p. 1227; *Sci. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 555. Brésil.
9997. WAGLERI, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 12; *Sci. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 554; *Grant, Handb. Game B. II*, pl. 59. Mexique W.
9998. RUFICAUDA, Jard., *Ann. Mag. N. H.*, 1847, p. 574; *Sci. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 554; *bronzina*, Gray. Vénézuéla, île Tobago.
9999. CANICOLLIS (Wagl.), *Isis*, 1850, 1112, 1852, p. 1227; *Burm.*, *Reise La Plata*, II, p. 499; *caraguata*, Natt.; *guttata*, White, *P. Z. S.*, 1882, p. 627. Paraguay, Argentine.
- 10.000. ALBIVENTRIS (Wagl.), *Isis*, 1850, p. 1111, 1852, p. 1227; *Sci. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 555; *aracuan*, Max. (nec Spix.) Brésil.
- 10.001. SQUAMATA, Less., *Dict. Sc. Nat.* LIX (1829), p. 195; *id.*, *Tr. Orn.*, p. 481; *Sci. et Salv.*, *l. c.*, p. 555. Brésil S.
- 10.002. CARACCO, Wagl., *Isis*, 1852, p. 1227; *Sci. et Salv.*, *l. c.*, p. 556; *adpersa*, Gray. Colombie, Haut-Amazone.

- 10.003. GUTTATA (Spix), *Ar. Bras.* II, p. 55, pl. 75; Burm., *Th. Bras.* III, p. 541; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 278; *adpersa*, Tsch.; *maculata*, Natt.; *albiventris*, Pelz. (nec Wagl.) Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie, Amazone.
- 10.004. SUPERCILIARIS, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 40; ?
Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 557.
- 10.005. POLIOCEPHALA, Wagl., *Isis*, 1850, p. 1112, 1852, p. 1227; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 364, 1870, p. 557. Mexique.
- 10.006. VETULA, Wagl., *Isis*, 1850, p. 1112, 1852, p. 1227; Du S. du Mexique à la
poliocephala, Scl. (1856, nec Wagl.); Cass., Colombie.
Illustr., pl. 44; *plumbiceps*, Gr.; *ruficrissa*, Scl.
et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 558.
2652. Var. MACCALLI, Baird, *B. N. Am.*, p. 611; Cones, Texas S. à Tamaulipas.
Key to N. Am. B., p. 575; Bendire, *N. Am.*
B., p. 119, pl. 5, f. 16.
2653. Var. PALLIDIVENTRIS, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, Yucatan.
p. 209.
- 10.007. LEUCOGASTRA (Gould), *P. Z. S.*, 1845, p. 105; Scl. Guatémala W., et de
et Salv., *Ibis*, 1859, p. 224; *albiventer*, auct. plur. San Salvador au Ni-
(nec Wagl.); Gould, *Voy. Sulph. Zool.*, p. 48, pl. 51. caragua.
- 10.008. GARRULA (Humb.), *Obs. de Zool.* I, p. 4; Wagl., Colombie, Vénézuéla.
Isis, 1850, p. 1111, 1852, p. 1227; Scl. et Salv.,
P. Z. S., 1870, p. 559.
- 10.009. CINEREICEPS, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 12; Scl. Du Costa-Rica à Pa-
et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 540; *poliocephala* nama.
(pt.), auct. plur. (nec Wagl.); *frantzii*, Cab.,
J. f. O., 1869, p. 211.
2654. Var. STRUTHOPUS, Bangs, *Pr. New Engl. Zool.* Iles de la baie de Pa-
Club, III, p. 61; Grant, *Ibis*, 1902, p. 245. nama.
- 10.010. ERYTHROPTERA, Licht. (ex Natt.), *Nomencl.*, p. 87; Ecuador W.
Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 540; *ruficeps*,
Scl. (1860, nec Wagl.)

1454. CUMANA

- Pipile*, Bp. (1856, nec *Pipilo*, Vieill., 1816); *Cumana*, Cones, *Auk*, 1900,
p. 65 (1).
- 10.011. PIPILE (Jacq.), *Beytr.*, p. 26, pl. 11; Tem., *Pig. et* Guyane, Vénézuéla,
Gal. III, pp. 76, 694; Gray, *Knowsl. Menag.* II, * Colombie, Ecuador,
pl. 10; *cumanensis*, Jacq., *l. c.*, p. 25, pl. 10; Bolivie, Pérou,
Léot., *Ois. de Trin.*, p. 585; Bonn., *Tabl. Enc.* Amazone.
méth. I, p. 174, pl. 86, f. 2; *leucolophos*, Merr.;

(1) Je partage l'avis de M. E. Coues : *Pipile* est incorrect et ressemble trop à *Pipilo* pour être maintenu.

- nattereri*, Rehb.; *jacquinii*, Gray; *grayi*, Pelz.,
Orn. Bras., p. 284.
- 10.012. JACUTINGA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 55, pl. 70; Scl. Brésil S., E. et Para-
et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 550; *pipile*, Burm., guay.
Th. Bras. III, p. 556 (nec Jacq.); *nigrifrons*,
Tem.; *leucoptera*, Max.
- 10.015. CUCUBI (Pelz., ex Natl.), *S. B. Ak. Wien*, 1858, Bas-Amazone.
p. 528; id., *Orn. Bras.*, p. 284; Scl. et Salv.,
P. Z. S., 1870, p. 550.

1455. ABURRIA

- Aburria*, Rehb. (1852); *Opetioptila*, Sundev. (1872).
- 10.014. CARUNCULATA, Rehb., *Syst. Av.*, p. xxvi; Scl. et Colombie, Ecuador.
Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 551; *aburri*, Less.

1456. CHAMÆPETES

- Chamæpetes*, Wagl. (1852).
- 10.015. COUDOTI (Less.), *Man. d'Orn.* II, p. 217; id., *Traité*, Colombie, Ecuador,
p. 481; Wagl., *Isis*, 1852, p. 1227; Scl. et Salv., Pérou.
l. c.; *rufiventris*, Tsch.; id., *Faun. Per.*, p. 291,
pl. 51; *tschudii*, Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 275.
- 10.016. UNICOLOR, Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 159, 1870, De Costa-Rica à Pa-
p. 551. nama.

FAM. III. — OPISTHOCOMIDÆ

1457. OPISTHOCOMUS

- Opisthocomus*, Illig. (1811); *Orthocorys*, Vieill. (1816); *Sasa*, Vieill. (1819).
- 10.017. NOAZIN (Müll.), *S. N. Suppl.*, p. 125; *Pl. Enl.* 557; Guyane, Amazone, Co-
cristatus, Gm.; Vieill., *Gal. Ois.* 1, 2, p. 525, lombie, Ecuador,
pl. 195; Gray, *Gen. B.*, pl. 98. Pérou, Bolivie.

FAM. IV. — PHASIANIDÆ (1)

SUBF. I. — PAVONINÆ

1458. PAVO

- Pavo*, Lin. (1766); *Pavianus*, Raf. (1815); *Spiciferus*, Bp. (1856).
- 10.018. CRISTATUS, Lin.; *Pl. Enl.* 455, 454; Elliot, *Monogr.* Inde, Ceylan.
Phasianidæ, pl. 5; *assamensis*, Mc Clell., *Ind.*
Rev., 1858, p. 515.

(1) Voy. aussi : Elliot, *Monogr. Phasianidæ* (1872).

2655. *Var. NIGRIPENNIS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1860, p. 221; ? (Race domestique?)
id., *Ibis*, 1897, p. 117; Ell., *l. c.*, pl. 4.
10.019. *MUTICUS*, Lin.; Elliot, *l. c.*, pl. 5; *japonensis*, Bonn.; Indo-Chine, Malacca,
spiciferus, Shaw et Nod.; Vieill., *Gal. Ois.* II, Java.
p. 14, pl. 202; *javanicus*, Horsf.; *aldrovandi*,
Wils.; *spicifer*, Schinz.

1459. RHEINARDTIUS

- Rheinardius*, Oust. (1882); *Rheinhardius*, Scl. et Saund. (1885); *Rheinartius*,
Oust. (1885); *Rheinardtius*, Grant (1895).
10.020. *OCELLATUS* (Bp. ex Verr.), *C. R.* XLII, p. 878; Ell., Tonkin (Montagnes).
l. c., pl. 15; Oust., *N. Arch. Mus.*, 1885, VIII,
p. 256, pl. 2; *rheinardti*, Maing.

1460. ARGUSIANUS

- Argus*, Tem. (1813, nec Scop., 1777); *Argusianus*, Raf. (1815); *Argusanus*, Bp.
(1836); *Argusa*, Kellh. (1881); *Argusinius*, Oust. (1882).
10.021. *ARGUS* (Lin.); Gould, *B. Asia*, VII, pl. 52; *gigan-* Siam, Ténassérim S.,
teus, Tem.; Ell., *l. c.*, pl. 11; *pavonius*, Vieill.; Malacca, Sumatra.
pavoninus, Gray.
2656. *Var. GRAYI* (Elliot), *Ibis*, 1865, p. 425; id., *Mon.*, Bornéo.
pl. 12; *giganteus* (pt.), Müll.
2657. *Var. BIPUNCTATA* (Wood), *An. Mag. N. H.*, 1874, ?
p. 67; Ell., *Mon.*, pl. 13.

1461. CHALCURUS

- Chalcurus*, Bonap. (1854).
10.022. *INOCELLATUS* (Less. ex Cuv.), *Traité d'Orn.*, p. 487; Sumatra.
Bp., *C. R.* XLII, p. 878; *chalcurum*, Less.; Tem.,
Pl. Col. 519; Ell., *l. c.*, pl. 10; *chalcurus*, Grant,
Cat., p. 561.

1462. POLYPECTRON

- Polyplectron*, Tem. (1813); *Diplectron*, Vieill. (1816); *Polyplectron*, Less. (1831);
Diplectropus, Glog. (1842); *Diplectrum*, Agass. (1846); *Emphania*, Rehb.
(1852).
10.025. *CHUNQUIS* (Müll.), *S. N. Suppl.*, p. 121; Tem., *Pig.* Himalaya E., Indo-
et Gal. II, p. 365; Scl., *P. Z. S.*, 1879, pl. 8, f. 2; Chine.
tibetanus, Gm.; Ell., *l. c.*, pl. 6; *bicalcaratus*,
Lath. (nec Lin.); *iris*, Bonn.; *albocellatum*, Cuv.;
atelospilum, *cyclospilum* et *enicospilum*, Gray;
helenæ, Oat. (juv.)

- 10.024. GERMAINI, Elliot, *Ibis*, 1866, p. 56; id., *Mon.*, pl. 8; *intermedius*, Hume, *Str. F.*, 1873, p. 56; Ell., *Ibis*, 1878, p. 124. Cochin-Chine, Lushai.
- 10.025. BICALCARATUM (Lin.); Ell., *l. c.*, pl. 7; *malaccensis*, Scop.; *hardwickii*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 57; *lineatum*, Gray, *l. c.*, pl. 58. Ténassérin S., Malacca, Sumatra.
- 10.026. SCHLEIERMACHERI, Brügg., *Abh. Ver. Brem.* V, p. 461, pl. 9; Pelz., *Verh. Z.-B. Wien*, 1881, p. 27. Bornéo (Montagnes).
- 10.027. NAPOLEONIS, Less., *Traité d'Orn.*, p. 487; *emphanum*, Tem., *Pl. Col.* 540; Ell., *l. c.*, pl. 9; *emphanes*, Sci.; *nehrkorner*, Blas., *Mitth. Orn. Ver. Wien*, 1891, p. 1. Palawan (Philippines).

SUBF. II. — MELEAGRINÆ

1465. MELEAGRIS

- Meleagris*, Lin. (1766); *Gallopavo*, Brünn. (1772); *Cenchrarnus*, Gray (1841); *Agriocharis*, Chapm. (1896).
- 10.028. GALLOPAVO, Lin.; Grant, *Cat.*, p. 587; *mexicana*, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 61; Ell., *l. c.*, pl. 52. Mexique N.-E., Nouv.-Mexique, Texas W.
2658. *Var. INTERMEDIA*, Senn., *Bull. U. S. Geol. Surv.*, 1879, p. 428; *gallopavo* et *mexicanus* (pt.), auct. plur.; *elliotti*, Senn., *Auk*, 1892, p. 167, pl. 5. Texas S.-E., Mex. E.
2659. *Var. MERRIAMI*, Nels., *Auk*, 1900, p. 120-25. Ariz., Nouv.-Mex. W.
2660. *Var. AMERICANA*, Bart., *Trav.*, p. 290; *gallopavo* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *palawa*, Barton; *sylvestris* et *fera*, Vieill., *Cat. Ois.* II, p. 10, pl. 201; *var. occidentalis*, Allen. États-Unis E. jusqu'au Dakota à l'Ouest.
2661. *Var. OSCEOLA*, Scott, *Auk*, 1890, p. 576; *gallopavo* (pt.), auct. plur. Floride.
- 10.029. OCELLATA, Cuv., *Mém. Mus. d'H. N.* VI, p. 1, pl. 1; Tem., *Pl. Col.* 112; Ell., *l. c.*, pl. 55; *aureus*, Vieill. Guatémala, Honduras, Yucatan.

SUBF. III. — PHASIANINÆ

1464. ITHAGENES

- Ithaginis*, Wagl. (1852); *Plectropus*, Less. (1856); *Plectrophorus*, Gray (1840); *Ithagenes*, Sund. (1872).
- 10.050. CRUENTUS (Hardw.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 257; Tem., *Pl. Col.* 552; Ell., *l. c.* II, pl. 50; *gardneri*, Hardw. Himalaya, Thibet.

- 10.051. GEOFFROYI, Verr., *Bull. Soc. d'Acclim.*, 1867, p. 706; Thibet E., Setchuan.
Gould, *B. As.* VII, pl. 42; Ell., *l. c.*, pl. 51; Dav.
et Oust., *Ois. Chine*, p. 401, pl. 115.
10.052. SINENSIS, David, *Ann. Sc. Nat.*, 1875, art. 5, p. 1; Chensi mérid. (Chine
id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 402, pl. 114. W.)

1465. TRAGOPAN

Satyra, Less. (1828, nec Meig., 1805); *Tragopan*, Cuv. (1829); *Cerionis*, Sw.
(1857); *Ceratornis*, Cab. (1846).

- 10.053. SATYRA (Linn.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 25, pl. 206; Himalaya.
Cuv., *Rég. an.* I, p. 479; Gould, *Cent. B. Him.*,
pl. 62; Ell., *l. c.*, pl. 22; *cornutus*, Müll.; *nepau-*
lensis, *pennanti* et *lathamii*, Gray, *Ill. Ind. Zool.*,
pl^s 40, 49, 51.
10.054. MELANOCEPHALUS (Gray), in *Griff. ed. Cuv.* III, p. 29; Himalaya W.
id., *Ill. Ind. Zool.*, pl^s 46, 48; Gould, *B. As.* VII,
pl. 45; Ell., *l. c.*, pl. 25; *hastingsi*, Vig.
10.055. TEMMINCKI, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 50; Gould, Chine S.-W. et centr.
B. As. VII, pl. 46; Dav. et Oust., *Ois. Chine*,
p. 118, pl. 112.
10.056. BLYTHI (Jerd.), *Pr. As. Soc. Beng.*, 1870, p. 60; Assam N.-E., Mani-
Sci., *P. Z. S.*, 1870, pp. 165, 219, pl. 15; Ell., pour.
l. c., pl. 26.
10.057. CABOTI (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 161; id., *B. As.*, Chine S.-E.
pl. 48; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 419, pl. 111;
modestus, Dav.

1466. LOPHIOPHORUS

Lophophorus, Tem. (1815); *Monaulus*, Vieill. (1816); *Lophofera*, Flem. (1822);
Impeyanus, Less. (1851); *Chalcophasis*, Ell. (1871).

- 10.058. REFULGENS, Tem., *Pig. et Gal.* II, p. 555; id., *Pl.* Himalaya, de l'Afgha-
Col. 508, 515; Grant, *Cat.*, p. 278; *impeyanus*, nistan au Boutan.
auct. plur. (nec Lath.); Gould, *Cent. Him. B.*,
pl^s 60, 61 (1).
2662. Var. MANTOU, Oust., *Bull. Soc. Zool. Fr.* XVIII, Himalaya ?
p. 19; Grant, *Handb. Game B.* I, p. 256;
refulgens, Rothsch., *Ibis*, 1899, p. 441.
2665. Var. OBSCURA, Oust., *l. c.*; Grant, *l. c.*; *refulgens*, Himalaya ?
Rothsch., *l. c.*

(1) M. Sharpe n'admet pas la manière de voir de M. O. Grant, qui considère l'*impeyanus* (Lath.) comme étant identique au *chambanus* de M. Marshall. Mais en examinant la description et la planche de Latham, on constate que cette dernière, pas plus que la diagnose, n'indique le blanc caractéristique du bas du dos du *L. refulgens*. Je confirme donc l'opinion de M. Grant.

- 10.039. IMPEYANUS (Lath., nec auct. plur.), *Ind.* II, p. 652; Chamba (Himalaya
id., *Suppl. Gen. Syn.*, p. 208, pl. 114; Vieill., N.-W.)
Gal. Ois. II, p. 51, pl. 208; *chambanus*, Marsh.,
Ibis, 1884, p. 421, pl. 10.
- 10.040. LUHUSH, J. Verr., *Bull. Soc. d'Acclim.*, 2^e sér. IV, Moupin, Kokonoor E.,
p. 706; Sclat., *P. Z. S.*, 1868, p. 1, pl. 1; Gould, Setchuan W. (Ch.)
B. Asia, VII, pl. 54; Dav. et Oust., *Ois. Chine*,
p. 405, pl. 110.
- 10.041. SCLATERI, Jerd., *Ibis*, 1870, p. 147; Sclat., *P. Z. S.*, Assam N.-E. (Monts
1870, p. 162, pl. 14; Ell., *l. c.*, pl. 20; Gould, Mishmi).
B. As. VII, pl. 55.

1467. ACOMUS

- Houppifer*! Guér. (1829-58); *Alectryon*, Cab. (1846, nec Montf., 1810); *Acomus*,
Rehb. (1852); *Houppiferus*, Ell. (1872).
- 10.042. ERYTHROPHthalmus (Rafll.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, Malacca S., Sumatra.
p. 521; Scl. et Wolf, *Zool. Sket.* II, pl. 54; Ell.,
l. c. II, pl. 28; *diardi*, Guér.-Mén., *lc. Rég. An.*,
Ois., p. 26, pl. 45, f. 2; *purpureus*, Gray, *Ill.*
Ind. Zool. I, pl. 42.
- 10.043. PYRONOTUS (Gray), *List of B. Gall.*, p. 26 (1844); Bornéo N.-E.
Ell., *l. c.* II, pl. 29; Salvad., *Ucc. Born.*, p. 507;
erythrothalmus (sic), Gray, *Ill. Ind. Zool.* II,
pl. 58, f. 1 (1854, nec Rafll.); *personatus*, Tem.
- 10.044. INORNATUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, Sumatra W.
p. 250; id., *P. Z. S.*, 1879, p. 651, pl. 48.

1468. LOPHURA

- Lophura*, Flem. (1822); *Euplocomus*, Tem. (1850, nec Latr., 1809); *Macartneya*,
Less. (1851); *Spicifer*, Kp. (1856); *Lophalector*, Cab. (1846); *Lophora*, Gr.
(1870).
- 10.045. IGNITA (Shaw et Nodd.), *Nat. Misc.* IX, pl. 521; ?
Flem., *Philos. of Zool.* II, p. 250; Büttik., *Notes*
Leyd. Mus. XVII, p. 170; *macartneyi*, Tem. (pt.);
? *sumatranus* (fem.), Dub.
- 10.046. NOBILIS (Sclat.), *P. Z. S.*, 1865, p. 119, pl. 16; Bornéo, Banka.
Ell., *l. c.*, pl. 27; *ignitus*, auct. plur. (nec Shaw
et Nodd.); *ignita*, Grant, *Cat.*, p. 288.
- 10.047. SUMATRANA (DuBois), *Bull. Ac. R. Belg.* XLII (1879), Sumatra S.-E.
p. 825; Vorderm., *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 1890,
p. 98; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVII, p. 177;
ignitus (pt.), auct. plur.; *rufa* (pt.), Grant, *Cat.*,
p. 287; *Lophura sp.*, Grant, *l. c.*, p. 289 (en note).

- 10.048. VIEILLOTI (Gray), *List Gen. B.*, p. 77; Gould, *B. As.* VII, pl. 15; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 215, pl.; *macartneyi* (pt.), Tem.; *ignitus* (pt.), auct. plur.; Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 59; Ell., *l. c.* II, pl. 26; *castaneus*, Gray; *rufus*, Hume; *rufa* (pt.), Grant. Siam, Ténassérim, Malacca, Sumatra.

1469. DIARDIGALLUS

Diardigallus, Bonap. (1856).

- 10.049. PRÆLATUS, Bonap., *C. R.* XLIII, p. 415; Gould, *B. As.* VII, pl. 21 (mas.); Sclat., *List Phas.*, p. 6, pl. 6; Ell., *l. c.* II, pl. 24; *diardi*, Tem., *MS.*; Grant, *Cat.*, p. 290; *fasciolatus*, Blyth; *crawfurdi*, Schomb. Siam, Cambodge, Cochinchine.

1470. LOBIOPHASIS

Lobiophasis, Sharpe (1874).

- 10.050. BULWERI, Sharpe, *Ann. Mag. N. H.*, 1874, p. 575; Gould, *B. As.* VII, pl. 15; Sclat., *P. Z. S.*, 1876, p. 465, pl. 44; *castaneicaudatus*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1877, p. 96 (juv.); Gould, *l. c.*, pl. 12. Bornéo.

1471. CROSSOPTILON

Crossoptilon, Hodgs. (1858).

- 10.051. TIBETANUM, Hodgs., *J. A. S. Beng.* VII, p. 864, pl. 46; Sclat., *List Phas.*, p. 6, pl. 4; Ell., *l. c.* I, pl. 14; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 407, pl. 107; *auritum*, Gray, *Gen. B.*, pl. 125; *drouynii*, Verr. Chine W., Thibet E.
- 10.052. LEUCURUM, Seeb., *Bull. Br. Orn. Club*, IV (1892), p. xvii; id., *Ibis*, 1895, p. 250; *tibetanum* (pt.), Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1892, p. 515. Thibet E.
- 10.053. MANTCHURICUM, Swinh., *P. Z. S.*, 1862, p. 287; Ell., *l. c.* I, pl. 16; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 405, pl. 106; *auritum* (pt.), auct. plur. (nec Pall.); Gould, *B. As.* VII, pl. 22. Mandchourie.
- 10.054. AURITUM (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* II, p. 86; Ell., *l. c.* I, pl. 17; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 406, pl. 108; *cærulescens*, Dav.; M.-Ew., *C. R.* LXX, p. 558. Chine W.
- 10.055. HARMANI, Elwes, *Ibis*, 1881, p. 399, pl. 15; Grant, *Cat.*, p. 296. Thibet.

1472. GENNÆUS

Gennæus, Wagl. (1852); *Nycthemerus*, Sw. (1857); *Alectrophasis*, Gray (1841); *Grammatoptilus*, Rehb. (1882); *Hierophasis*, Ell. (1872); *Euplocamus* (pt.), auct. plur.

- 10.056. *ALBROCRISTATUS* (Vig.), *P. Z. S.*, 1850, p. 9; Gould, *Cent. B. Him.*, pls 66, 67; Wagl., *Isis*, 1852, p. 1228; Ell., *l. c.* II, pl. 18; *hamiltonii*, Gray; *leucomelas*, Hodgs. (pt.) Himalaya W., de Hazara au Népal.
- 10.057. *LEUCOMELANUS* (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 635; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 185, pl.; *leucomelas*, Hodgs. (pt.), *Icon. ined.*, *Gall.*, pl. 14, f. 79. Népal.
- 10.058. *MELANONOTUS* (Blyth), *Hutt.*, *J. A. S. Beng.*, 1848, 2, p. 694; Mitch., *P. Z. S.*, 1858, p. 544, pl. 149, f. 2; Ell., *l. c.* II, pl. 119; Beav., *Ibis*, 1868, p. 581; *muthura*, Grant. Himalaya E., du Sikkim au Boutan.
- 10.059. *EDWARDSI*, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 516; id., *Arch. Mus.* (4), I, pl. 10. Annam.
- 10.060. *HORSFIELDI* (Gray), *Gen. B.* III, p. 498, pl. 126; Ell., *l. c.* II, pl. 20; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 198, pl. Boutan E., Assam, Haute-Birmanie.
- 10.061. *WICKHAMI*, Oates, *Man. Game B. Ind.* II, *App.* (1898). Haute-Birmanie.
- 10.062. *ANDERSONI* (Ell.), *P. Z. S.*, 1871, p. 157; id., *Mon.* II, pl. 22; Anders., *B. W. Yun.*, p. 670, pl. 55; *crawfurdi*, Hume et Dav.; *davisoni*, Grant, *Cat.*, p. 504. Monts Kachin (Yunnan).
- 10.063. *RELI*, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1898, n° 6, p. 259. Annam.
- 10.064. *WILLIAMSII*, Oates, *Man. Game B. Ind.* I, p. 542. Haute-Birmanie.
- 10.065. *CUVIERI* (Tem.), *Pl. Col.* 1; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 202; *melanion*, Vieill. Monts du N. de l'Arakan.
- 10.066. *LINEATUS* (Vig.), *Phil. Mag.*, 1851, p. 147; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* (n. s.), pl. 12; Sel. et Wolf, *Zool. Sket.* II, pl. 58; Ell., *l. c.* II, pl. 25; *reynaudii*, Less.; *fasciatus*, Mc Clell. Pégou, Ténassérin N.
2664. *Var.* *OATESI*, Og.-Grant, *Cat.*, p. 506; *cuvieri* (pt.), auct. plur.; *lineatus*, Feild. (nec Vig.) Arakan S.-E.
- 10.067. *SHARPEI*, Oates, *Man. Game B. of Ind.* I, p. 557. Monts Karin (Ténass.)
- 10.068. *NYCTHEMERUS* (Lin.); *Pl. Enl.* 125, 124; Gould, *B. As.* VII, pl. 17; Ell., *l. c.* II, pl. 21; ? *crawfurdi*, Gray (mas. juv. ?); *argentatus*, Sw. Chine S.
- 10.069. *WHITEHEADI*, Grant, *Ibis*, 1899, p. 586; id., *P. Z. S.*, 1900, p. 505, pl. 54. Haïnan.
- 10.070. *RUFIPES*, Oates, *Man. Game B. of Ind.* I, p. 562. Birmanie.
- 10.071. *SWINHOEI* (Gould), *P. Z. S.*, 1862, p. 284; Gould, *B. As.* VII, pl. 16; Sel. et Wolf, *Zool. Sket.* II, pl. 57; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 417, pl. 102; Grant, *Cat.*, p. 509. Formose.

1473. PUCRASIA

Eulophus, Less. (1836, nec Geoff., 1764); *Pucrasia*, Gray (1841); *Gallophasis*, Hodgs. (1845); *Lophotetrax*, Cab. (1846); *Lochmophasis*, Heine (1890).

- 10.072. MACROLOPHA (Less.), *Dict. Sc. N.* LIX, p. 196; Gould, Himalaya W.
B. As. VII, pl. 26; Ell., *l. c.* I, pl. 28; *pucrasia*,
 Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 40.
 2665. Var. BIDDULPHI, Marsh., *Ibis*, 1879, p. 461; id., Cachemire.
J. f. O., 1879, p. 424; *macrolopha*, Adams
 (nec Less.)
 10.073. NIPALENSIS, Gould, *P. Z. S.*, 1854, p. 100; id., Népaul.
B. As. VII, pl. 28; Hume et Marsh., *Game B.*
Ind. I, p. 166, pl.; *pucrasia* et *macrolopha* (pt.),
 auct. plur.; *duvauceli*, Bp.; Ell., *l. c.* I, pl. 29.
 10.074. CASTANEA, Gould, *P. Z. S.*, 1854, p. 99; id., B. Afghanistan N., Kafir-
As. VII, pl. 27; *duvauceli*, Gr. (nec Bp.) ristan.
 10.075. MEYERI, Madar., *Ibis*, 1886, p. 145; Grant, *Cat.*, Thibet centr., Haut-
 p. 513; *darwini*, Oust. (nec Swinh.), *Le Natur.*, Mékong.
 1886, p. 276.
 10.076. XANTHOSPILA, Gray, *P. Z. S.*, 1864, p. 259, pl. 20; Chine N.-W., Mand-
 Gould, *B. As.* VII, pl. 24; Ell., *l. c.* I, pl. 50; chourie et Thibet.
 Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 407, pl. 104; *davi-*
diana, A. M.-Edw.; var. *ruficollis*, Dav. et Oust.
 10.077. DARWINI, Swinh., *P. Z. S.*, 1872, p. 552; Ell., Tchékiang et Fokien
Mon. I, pl. 50^{bis}; Gould, *B. As.* VII, pl. 25; Dav. (Chine E.)
 et Oust., *Ois. Chine*, p. 409.

1474. CATREUS

- Catreus*, Cab. (1851); *Lophophasianus*, Rehb. (1852); *Phasianus* (pt.), auct. plur.
 10.078. WALLICHII (Hardw.), *Tr. Linn. Soc.* XV, 1827, p. 166; Himalaya, du Népaul
 Gould, *B. Asia*, VII, pl. 48; *stacei*, Vig.; Gould, au Chamba.
Cent. B. Him., pl. 68.

1475. PHASIANUS (1)

- Phasianus*, Lin. (1766); *Syrmaticus*, Wagl. (1852); *Graphephasianus*, Rehb.
 (1852); *Calophasis*, Ell. (1872).
 10.079. COLCHICUS, Lin.; Ell., *Mon. Phas.* II, pl. 2; Dubois, Europe S.-E., Trans-
Fne. ill. Vert. Belg., *Ois.* II, p. 55, pl. 175; Dress., caucasie (introd. d^s
B. Eur. VII, p. 85, pl. 469; *marginatus*, Mey. l'Eur. cent. et occid.)
 et Wolf.
 2666. Var. SEPTENTRIONALIS, LORENZ., *J. f. O.*, 1888, p. 572. Caucase N.
 2667. Var. TALISCHENSIS, LORENZ., *J. f. O.*, 1888, p. 571. Talisch (Casp. S.-W.)

(1) Voy. aussi : Seebohm, *Ibis*, 1887, pp. 163-173, 1888, pp. 312-316.

- 10.080. *PERSICUS*, Severtz., *Bull. Mosc.*, 1875, p. 208; id., *J. f. O.*, 1875, p. 225; *shawi*, Ell., *Ibis*, 1876, p. 152. Perse.
2668. *Var. PRINCIPALIS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 522, pl. 22; *komarowi*, Bogd., *Bull. Ac. St-Petersb.*, 1886, p. 556. Afghanistan N.-W., Perse N.-E.
2669. *Var. ZERAFSHANICA*, Tarnowski, Field, LXXVII, p. 409; *klossowskii*, Tarn., *l. c.*; *tarnowskii*, Seeb., *P. Z. S.*, 1892, p. 271. Zérafshan.
- 10.081. *SHAWI*, Ell., *P. Z. S.*, 1870, p. 405; id., *Mon.* II, pl. 1; Gould, *B. As.* VII, pl. 55; *insignis*, Ell. Turkestan E.
2670. *Var. TARIMENSIS*, Przev., *Dritte Reise in cent. As.*, p. 95; Pleske, *P. Z. S.*, 1888, p. 415. De Karaschar à Lob-nor.
2671. *Var. CHRYSOMELAS*, Severtz., *Bull. Mosc.*, 1875, pt. 5, p. 207; id., *Ibis*, 1875, p. 495; Gould, *B. As.* VII, pl. 56; *dorrandti* et *oxianus*, Severtz., *J. f. O.*, 1875, p. 225; *insignis*, Ell. Amou-Daria.
- 10.082. *MONGOLICUS*, Brandt, *Bull. Ac. St-Petersb.* III, p. 51; Gould, *B. As.* VII, pl. 41; Ell., *l. c.* II, pl. 4; *colchicus*, Licht. (nec Lin.); *torquatus*, Kar. (nec Gm.) Asie centr., Turkestan.
2672. *Var. TURCESTANICA*, Lorenz., *Orn. Monatsb.* IV, p. 189. Vallée du Syr-Daria (Turkestan).
2675. *Var. SEMITORQUATA*, Severtz., *Ibis*, 1875, p. 491; Pleske, *Bull. Acad. St-Petersb.*, 1892, p. 295. Dzungarie.
- 10.083. *HOLDERERI*, Schalow, *J. f. O.*, 1901, p. 414, pl. 4. Min-tschou.
- 10.084. *TORQUATUS*, Gm., *S. N.* 1, 2, p. 742; Gould, *B. As.* VII, pl. 59; Ell., *l. c.* II, pl. 5; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 409; *albotorquatus*, Bonn. Sibérie E., Mongolie E., Corée, Chine.
2674. *Var. SATSCHEUNENSIS*, Przev., *Reis. in Tibet*, p. 59; Dedit., *J. f. O.*, 1886, p. 527; *shawi* (pt.), Seeb. Sa-tschen (au N. des Monts Nan-Shan).
- 10.085. *FORMOSANUS*, Ell., *P. Z. S.*, 1870, p. 406; id., *Mon.* II, pl. 6; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 410; *torquatus* (pt.), Swinh. (1865). Ile Formose.
- 10.086. *DECOLLATUS*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 155; Ell., *l. c.* II, pl. 7; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 411, pl. 100. Chine W. et centr.
2675. *Var. STRAUCHI*, Przev., *Mongol.* II, 2, p. 119, pl. 17. Kansu N.-W.
- 10.087. *ELEGANS*, Ell., *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 512; id., *Mon.* II, pl. 8; *sladeni*, Ell. (ex Anders.), *P. Z. S.*, 1870, p. 408; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 411. Setchuan W., Yunnan W.
2676. *Var. VLANGALI*, Przev., *Mongol.* II, 2, p. 116, pl. 16; Grant, *Cat.*, p. 550. Tsaidam (au S. des Monts Koko-nor).
- 10.088. *VERSICOLOR*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 25, pl. 205; Tem., *Pl. Col.* 486, 495; Ell., *l. c.* II, pl. 9; *diardi*, Tem. Japon.
- 10.089. *SOEEMERRINGI*, Tem., *Pl. Col.* 487, 488; Gould, *B. As.* VII, pl. 57; Ell., *l. c.* II, pl. 12. Japon.
2677. *Var. SCINTILLANS*, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1866, p. 150; id., *B. Asia*, VII, pl. 58. Japon.

- 10.090. REEVESII, Gray, in *Griff. ed. Cuv.* III, p. 25; id., Chine.
Ill. Ind. Zool. I, pl. 59; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 55;
 Ell., *l. c.* II, pl. 11; ?*superbus*, Vieill. (nec Lin.);
veneratus, Tem., *Pl. Col.* 483.
- 10.091. ELLIOTI, Swinh., *P. Z. S.*, 1872, p. 530; Dav. et Chine S.-E
 Oust., *Ois. Chine*, p. 412, pl. 101; Ell., *l. c.* II,
 pl. 15^{bis}.
- 10.092. HUMIE (Hume), *Str. F.*, 1880, p. 461; id., *Ibis*, Manipour.
 1881, p. 608; Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1882,
 p. 715, pl. 51.
2678. *Var.* BURMANICA (Oates), *Ibis*, 1898, p. 124. Birmanie.

1476. CHRYSOLOPHUS

Thaumalea, Wagl. (1852, nec Ruthe, 1851); *Chrysolophus*, J.-E. Gray (1855);
Epomia, Hodgs. (1844).

- 10.095. PICTUS (Lin.); *Pl. Enl.* 217; Ell., *l. c.* II, pl. 15; Chine S. et W.
 Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 414; Gray, *Ill. Ind.*
Zool. II, pl. 41, f. 2.
2679. ? *Var.* OBSCURA (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* II, ?
 p. 152; Ell., *l. c.* II, pl. 16 (aberr.?).
- 10.094. AMHERSTII (Leadb.), *Tr. Linn. Soc.*, 1828, p. 129, Chine W., Thibet E.
 pl. 15; Gould, *B. As.* VII, pl. 20; Ell., *l. c.* II,
 pl. 14; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 415, pl. 105.

1477. GALLUS

Gallus, Lin. (1746); *Alector*, Klein (1750); *Creagrius*, Glog. (1842).

- 10.095. FERRUGINEUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 761; Ell., *l. c.* II, Inde, Indo-Chine, Ma-
 pl. 52; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 420; Hume lacca, îles Indo-
 et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 217, pl. : *Ph. gallus*, malaises.
 Lin.; *spadicea*, Bonn.; *bankiva*, Tem.
- 10.096. LAFAYETTEI, Less., *Traité d'Orn.*, p. 491; Des M., Ceylan.
Icon. Orn., pl. 18; Ell., *l. c.* II, pl. 55; *stanleyi*,
 Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 45, f. 4.
- 10.097. SONNERATI, Tem., *Pig. et Gal.* II, p. 246; id., *Pl.* Inde S. et centr.
Col. 252, 255; Ell., *l. c.* II, pl. 54; *Ph. gallus*,
 Scop. (nec Lin.); *indicus*, Leach.
- 10.098. VARIUS (Shaw et Nodd.), *Nat. Misc.* X, pl. 555; Java, Lomboek, Flo-
 Ell., *l. c.* II, pl. 55; *furcatus*, Tem., *Pl. Col.* 483; res, Bornéo.
javanicus, Horsf. (1).

(1) Hybrides : *Gallus xneus*, Tem., *Pl. Col.* 374, = *varius* × *domesticus*; *temmincki*, Gray,
P. Z. S., 1849, p. 62, pl. 7, = *ferrugineus* × *varius*. Le *Gallus stramineicollis*, Sharpe, *P. Z. S.*,
 1879, p. 317 (îles Soulou) est une race domestique, de même que le *G. violaceus*, Kels.
J. straits As. Soc. XXIIV, p. 167 (Bornéo ?)

SUBF. IV. — NUMIDINÆ

1478. PHASIDUS

Phasidus, Cass. (1836).

- 10.099. NIGER, Cass., *Pr. Ac. Philad.*, 1836, p. 522 : id., Afrique W., du Gabon
Journ. Ac. Phil., 1838, p. 7, pl. 3; Ell., *l. c.* II, au Congo.
pl. 36.

1479. AGELASTES

Agelastes, Bonap. (1849); *Agelastus*, Hartl. (1855).

- 10.100. MELEAGRIDES, Bp. (ex Tem.), *P. Z. S.*, 1849, p. 115; Du Gabon à Libéria.
Ell., *l. c.* II, pl. 57; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* VII,
p. 250, X, p. 98.

1480. NUMIDA (I)

Numida, Lin. (1766); *Numidia*, Flem. (1822); *Querelea*, Rehb. (1832).

- 10.101. MELLAGRIS, Lin.; *Pl. Enl.* 108; Ell., *Mon. Phas.* II, Afrique W., de Séné-
pl. 59; *galeata*, Pall.; *rendalli*, Ogilby; *macu-* gambia au Niger,
lipennis, Sw.; *orientalis*, Cab. (domest.) îles du Cap Vert.
2680. Var. MARCHEI, Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1882, art. 4^{bis}; Gabon, Bas-Congo.
id., *N. Arch. Mus.*, 1885, p. 505, pl. 14.
10.102. CORONATA, Gray, *List of B. Gall.*, p. 29; Ell., Cafrerie, Natal.
l. c. II, pl. 40; *cornuta*, Feh. et Hartl., *Vög.*
O.-Afr., p. 569.
10.103. TRANSVAALENSIS, Neum., *Orn. Monatsb.* VII, p. 26. Transvaal.
10.104. PAPILLOSA, Rehw., *Orn. Monatsb.* II, p. 145; Fleck, Afr. S.-W., du Ben-
J. f. O., 1894, p. 590 (fig. col. de la tête); *mi-* guela au fl. Orange et
trata, Gr. (nec Pall.); *cornuta*, Gurn. (nec Hartl.); le désert de Kala-
Granl, *Cat.*, p. 578 (pt.) hari.
10.105. REICHENOWI, Grant, *Ibis*, 1894, p. 555; Fleck, *J.* Kilima Ndjaro jus-
f. O., 1894, p. 590 (fig. col. de la tête). qu'au Massailand et
Kikuyu (Afr. E.)
10.106. ANSORGEI, Hartl., in *Ansorge « Under the Afr. Sun »* Afrique équat. angl.
App., p. 551.
10.107. UHEHENSIS, Rehw., *Orn. Monatsb.* VI, p. 88. Uhehe (Afr. E. allem.)
10.108. MARUNGENSIS, Schalow, *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 105. Marungu (Tangan. W.)
10.109. MAXIMA, Neum., *Orn. Mon.*, 1898, p. 21, 1899, p. 26. Benguela.
10.110. INTERMEDIA, Neum., *l. c.*, 1898, p. 21, 1899, p. 26. Viotor.-Nyanza W., au
S. jusqu'à Kagera.
10.111. MITRATA, Pall., *Spic. Zool.* I, 4, p. 18, pl. 3; Ell., Afrique E., Madagas-
Mon. Phas. II, pl. 41; *tiarata*, Bp.; *tiara*, Gray. car, îles Comores.

(1) Voy. aussi : Neumann, *Orn. Monatsb.* VI, pp. 17-22.

- 10.112. *PTILORHYNCHA*, Licht. in Less., *Tr. d'Orn.*, p. 498; Afrique N.-E.
Gray, *Gen. B.* III, pl. 128; Rüpp., *Syst. Uebers.*,
pp. 102, 105, pl. 59; Ell., *l. c.* II, pl. 42.
10.115. *SOMALIENSIS*, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 25. Somatiland.

1481. GUTTERA (1)

Guttera, Wagl. (1852).

- 10.114. *CRISTATA* (Pall.), *Spic. Zool.* I, 4, p. 15, pl. 2; Ell., Afrique W., de Sierra-
l. c. II, pl. 45; Finsch et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, 572. Leone au Togo.
2681. *Var. GRANTI* (Ell.), *P. Z. S.*, 1871, p. 584; id., Afrique E. allem.
Mon. II, pl. 45; *pucherani* (pt.), Grant, *Cat.*,
p. 585.
2682. *Var. EDOUARDI* (Hartl.), *J. f. O.*, 1867, p. 56; id., Mozambique, Zambé-
Ibis, 1870, p. 444; *cristata* (pt.), auct. plur.; zie, Natal.
pucherani, Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 586;
verreauxi, Ell., *Ibis*, 1870, p. 500; id.,
Mon., pl. 44.
10.115. *PUCHERANI* (Hartl.), *J. f. O.*, 1860, p. 541; Ell., Afrique E. allem. et
Mon. II, pl. 46; Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, angl., Zanzibar.
p. 574; *elliotti*, Bartl., *P. Z. S.*, 1877, p. 652,
pl. 65; *cristata* (pt.), Layard.
10.116. *SCLATERI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 115. Caméron (Edea).
10.117. *PLUMIFERA* (Cass.), *Pr. Ac. Philad.*, 1856, p. 521; id., Du Caméron au Loan-
Journ. Ac. Phil. IV, p. 6, pl. 2; Ell., *l. c.* II, pl. 47. go.

1482. ACRYLLIUM

Acryllium, Gray (1840); *Agryllium*, Gray (1867).

- 10.118. *VULTURINUM* (Hardw.), *P. Z. S.*, 1854, p. 52 (*vul-* Afrique E., du Soma-
turina); Gray, *List Gen. B.*, p. 61; Hartl., *Vög.* liland au Kilima
O.-Afr., p. 575; Ell., *l. c.* II, pl. 58. Ndjaro.

SUBF. V. — PERDICINÆ

1485. LERWA

- Lerwa*, Hodgs. (1857); *Tetraoperdix*, Hodgs. (1844); *Tetraonoperdix*, Agass. (1846); *Lerva*, Blyth (1849); *Tetraoperdix*, Heine (1887).
10.119. *NIVICOLA*, Hodgs., *Madr. Journ.*, 1857, p. 501; Himalaya, Chine W.
Gould, *B. Asia*, VII, pl. 75; Day. et Oust., *Ois.* (Montagnes).
Chine, p. 592; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II,
p. 1, pl.; *Perdix lerwa*, Hodgs. (1855).

(1) Voy. aussi : Reichenow, *Orn. Monatsb.*, 1898, pp. 1-3.

1484. TETRAOPHISIS

Tetraophasis, Elliot (1871).

- 10.120. *OBSCURUS* (Verr.), *N. Arch. Mus., Bull.*, 1869, p. 55, Thibet E.
pl. 6; Ell., *Mon. Phas.*, pl. 21; Gould, *B. Asia*,
VII, pl. 44.
- 10.121. *SZECHENYI*, Madar., *Zeit. Ges. Orn.* II, p. 50, pl. 2; Thibet, Chine W.
id., *Ibis*, 1886, p. 145; *desgodinsi*, Oust., *Le Nat.*,
1886, p. 276.

1485. TETRAOGALLUS (1)

Tetraogallus, Gray (1855); *Chourtka*, Motsch. (1859); *Megaloperdix*, Brandt (1845); *Oreotetrax*, Cab. (1846).

- 10.122. *TIBETANUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 47; id., *B.* Thibet, Chine W.
Asia, VII, pl. 52; Dav. et Oust., *Ois. Chine*,
p. 591; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 275, pl.
- 10.125. *HENRICI*, Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1891, pp. 295, Chine W.
515; Grant, *Cat.*, p. 106.
- 10.124. *ALTAICUS* (Gabl.), *Bull. Acad. St-Petersb.*, 1857, Monts Altaï.
p. 51; Gray, *P. Z. S.*, 1842, p. 105; Gould,
B. Asia, VII, pl. 51.
- 10.125. *HIMALAYENSIS*, Gray, *P. Z. S.*, 1842, p. 105; Gould, Himalaya, Altaï.
B. Asia, VII, pl. 50; Hume et Marsh., *Game B.*
Ind. I, p. 267, pl.; *nigellii*, Jard. et Sel. (pt.);
Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 46.
2685. *Var. GROMBCEWSKII*, Bianchi, *J. f. O.*, 1899, p. 429; Kuen-Lun W.
himalayensis (pt.), auct. plur.
2684. *Var. KOSLOVI*, Bianchi, *l. c.*, p. 450. Altyn-tagh, Nan-schan.
- 10.126. *CASPIUS* (Gm.), *Reise*, IV, p. 67, pl. 40; Gould, *B.* Asie Mineure, Cau-
Asia, VII, pl. 29; *nigelli*, Jard. et Sel. (pt.); *raddei*,
Bolle et Brm., *J. f. O.*, 1875, p. 4; *challayei*,
Oust.; *tauricus*, Dress.
- 10.127. *CAUCASICUS* (Pall.), *Zoogr.* II, pp. 76, 87, pl.; Radde, Caucase.
Orn. Cauc., p. 553, pl. 21, ff. 1, 2; *alpina*,
Motsch.; *caspius*, Gould (pt.).

1486. CACCABIS

Caccabis, *Alectoris*, Kaup (1829); *Chacura*, *Pycetes*, Hodgs. (1844).

- 10.128. *SAXATILIS* (Mey. et Wolf), *Tasch. Deuts.* I, p. 503, Montagnes de l'Europe
pl.; Naum., *Vög. Deutschl.* VI, p. 546, pl. 164; centr. et mérid.
Dress., *B. Eur.* VII, p. 95, pl. 470; *rufa*, Lath.
(nec Lin.); *graca*, Steph.; *rupestris*, Brm.; *mela-*
nocephala, Fatio (nec Rüpp.), aberr.

(1) Voy. aussi : Bianchi, *Journ. f. Orn.*, 1899, pp. 421-434.

2685. *Var.* CHUKAR (Gray), *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 54; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 71; *saxatilis* (pt.), auct. plur.; *pugnax*, Hodgs.; *græca* (pt.), auct. plur.; *synaica*, *altaica*, Bp.; *sinaïtica*, Hengl.; *chukor*, Hodgs.; *var. pubescens*, Swinh.; *arenarius*, *pallescens* et *pallidus*, Hendl. et Hume; *hyemalis*, Severtz.
2686. *Var.* MAGNA, Przew., *Mongolia*, II, p. 127; Dedit., *J. f. O.*, 1886, p. 551. Thibet N., Chine W.
- 10.129. RUFÀ (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 105, pl. 471, f. 1; *rubra*, Briss.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, Ois. II, p. 64, pl. 176; *rufidorsalis*, *intercedens*, Brm.; *atrorufa* et *xanthopleura*, Vinc.; *var. australis*, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 28. Europe S.-W. et centr., Madeire, Açores, Canaries.
2687. *Var.* HISPANICA, Seoane, *Mém. Soc. Zool. Fr.* VII, p. 95. Espagne.
- 10.130. PETROSA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 758; Dress., *B. Eur.* VII, p. 111, pl. 471, f. 2; *barbara*, Bonn. Europe S.-W., Afrique N.-W., Canaries.
2688. *Var.* SPATZI, Rehw., *Journ. f. Orn.*; 1895, p. 110. Tunisie S.
2689. *Var.* KOENIGI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 189. Ténériffe.
- 10.151. ? BARBATA, Rehw., *Orn. Mon.*, 1896, p. 76 (aberr.?) ?
- 10.152. MELANOCEPHALA (Rüpp.), *N. Wirbelth. Vög.*, p. 11, pl. 5; Hengl., *Vög. N.-O. Afr.* III, p. 919; *yemensis*, Nichols., *P. Z. S.*, 1851, p. 128, pl. 40. Arabie.

1487. AMMOPERDIX

Ammoperdix, Gould (1851).

- 10.155. BONHAMI (Fras.), *P. Z. S.*, 1845, p. 70; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 29; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 1; *griseogularis*, Brandt; Radde, *Orn. Cauc.*, p. 552; *cinnereogularis*, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 458. Arabie, Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde.
- 10.154. HEYI (Tem.), *Pl. Col.* 528, 529; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 2; *rupicola*, Licht.; *flavirostris*, Heugl. Arabie, Palestine.
- 10.155. CHOLMLEYI, Og.-Grant, *Handb. Game B.* II, App., p. 295. Egypte, Nubie.

1488. FRANCOLINUS (1)

Francolinus, Steph. (1819); *Chatopus*, Sw. (1857); *Attagen*, Keys. et Bl. (1840); *Scleroptila*, *Clamator*, Blyth (1849); *Didymacis*, *Ortygornis*, Rehb. (1852); *Scleroptera*, Bp. (1856); *Perdicidens*, Heine (1860).

- 10.156. VULGARIS, Steph., in *Shaw's Gen. Zool.* XI, p. 519; Dubois, *Ois. Eur.* II, p. et pl. 127; Dress., *B. Eur.* VII, p. 125, pl. 475; *francolinus*, Lin.; *var. brevipes*, Hodgs.; *tristriatus*, *heurici*, *asiae*, Bp. Chypre, Sicile, Palestine, Asie Mineure, Perse jusqu'à l'Inde N. et centr.

(1) Voy. aussi : F. de Schaeck, *Monogr. des Francolins* (*Mém. Soc. Zool. de Fr.* IV, p. 272).

- 10.157. CHINENSIS (Osbeck), *Voy. en Chine*, II, p. 526; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 400; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 27, pl.; *pintadeanus*, Scop.; *perlatus*, *madagascariensis*, Gm.; *maculatus*, Gray; *phayrei*, Blyth; *sinensis*, Spal.; *pictus*, Schomb. (nec J. et S.) Indo-Ch. (sauf Ténass. et Malac.), Chine S. (introd. aux îles de la Réun. et Maurice).
- 10.158. PICTUS (Jard. et Selb.), *Ill. Orn.*, pl. 50; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 49, pl.; *hepburnii* et *pallida*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 55, f. 1, 2. Inde W. et centr., Ceylan.
- 10.159. LATHAMI, Hartl., *J. f. O.*, 1854, p. 210; id., *Orn. W.-Afr.*, p. 202; Grant, *Cat.*, p. 159; *peli*, Tem., *Bijdr. Dierk.* I, p. 50, pl. Afrique W.
- 10.140. PONDICERIANUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 760; Tem., *Pl. Col.* 215; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 51, pl.; *orientalis*, Gray, *Ill. Ind. Zool.*, pl. 56, f. 2. Arabie et de la Perse jusqu'à l'Inde et Ceylan.
- 10.141. COQUI (Smith), *Rep. Exp. Cent. Afr.*, p. 55; *subtorquatus*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 15; *schlegeli*, Boc. (nec Hengl.); *stuhlmanni*, Rehw. Afrique S. et E.
- 10.142. HUBBARDI, Og.-Grant, *Ibis*, 1895, p. 578. Victoria-Nyanza.
- 10.143. SCHLEGELI, Heugl., *J. f. O.*, 1865, p. 275; id., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 898, pl. 50; ?*buckleyi*, Grant, ex Shel. Afrique équator.
- 10.144. STREPTOPHORUS, Grant, *Ibis*, 1891, p. 126; id., *Cat. B.*, p. 145, pl. 1. M^e Elgon, Massailand.
- 10.145. SEPILENA (Smith), *Rep. Exp. Centr. Afr.*, p. 55 (1856); *pileatus*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 14 (1858); Hengl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 890, pl. 29, f. 2. Afrique S. et S.-W.
2690. Var. GRANTI, Hartl., *P. Z. S.*, 1865, p. 665, pl. 59, f. 1; *pileatus* (pt.), auct. plur. (nec Smith); *rovuma* (mas.), Gray; *schoensis* et *schoanus*, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 891, pl. 29, f. 2; *ochrogaster*, Hartl., *J. f. O.*, 1882, p. 527. Afrique E.
- 10.146. KIRKI, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, p. 827; Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 588, pl. 10, f. 1; *rovuma* (fem.), Gray; *granti*, Nichols. Afr. E., de la Rovuma au Somaliland.
2691. Var. SPILOGASTRA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1888, p. 541; Grant, *Ibis*, 1890, p. 547. Harar, Choa.
- 10.147. ALEOGULARIS, Gray, *List Gall. B.* III, p. 55; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 201; Grant, *Cat. B.*, p. 149, pl. 2. Sénégal.
- 10.148. SPILOLEMUS, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 50 (*psilolemus* ?); Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 897; Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 586; Grant, *Cat. B.*, p. 150, pl. 5. Choa.
- 10.149. GUTTURALIS (Rüpp.), *N. Wirb.*, p. 45; id., *Vög. N.-O. Afr.*, p. 105, pl. 40; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 895. Afr. N.-E., de l'Abysinie au Somaliland.

2692. *Var.* LORTI, Sharpe, *Bull. Br. Orn. Club*, VI, p. xlii; Lort Phil., *Ibis*, 1898, p. 423, pl. 10. Somaliland.
2695. *Var.* ULUENSIS, Grant, *Ibis*, 1892, p. 44; id., *Cat. B.*, p. 151, pl. 4. Ulu (Afrique E. angl.)
- 10.150. AFRICANUS, Steph., in *Shaw's Gen. Zool.* XI, p. 525; *afra*, Lath. (nec Müll.); *afer*, Gray; Sharpe, in *Lay. B. S. Afr.*, p. 595; *perlata* (pt.), Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 526, 721. Afrique S., du Cap au Transvaal.
- 10.151. FINSCHI, Bocage, *Orn. Angola*, p. 406; Rehw. et Schal., *J. f. O.*, 1882, p. 116. Angola, Benguela.
- 10.152. CASTANEICOLLIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1888, p. 542; Grant, *Ibis*, 1890, p. 550, pl. 11. Choa.
2694. *Var.* BOTTEGI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1898, p. 652. Choa S.-W.
- 10.153. LEVAILLANTI (Valenc.), *Dict. Sc. Nat.* XXXVIII, p. 441; Tem., *Pl. Col.* 477; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 85; *levaillantoides*, Sm. Afrique S., du Cap au Transvaal.
- 10.154. CRAWSHAWI, Grant, *Ibis*, 1896, p. 482, pl. 12. Nyassaland W.
- 10.155. KIKUYUENSIS, Grant, *Bull. Br. Orn. Club*, 1897, p. xxiii. Afrique équat. E. angl.
- 10.156. GARIOENSIS, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl^s 85, 84; Grant, *Cat.*, p. 153. Afrique S.-E.
2695. *Var.* JUGULARIS, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XI, p. 76, pl. 4; Grant, *Ibis*, 1890, p. 548; *garioensis*, auct. plur. (nec Smith). Afrique S.-W.
2696. *Var.* SHELLEYI, Grant, *Ibis*, 1890, p. 548; id., *Cat.*, p. 157, pl. 6; *garioensis*, auct. plur. (nec Smith). Afrique S.-E.
- 10.157. ELGONENSIS, Grant, *Ibis*, 1891, p. 126; id., *Cat.*, p. 157, pl. 5. M^t Elgon (Afr. centr. E.)
- 10.158. GULARIS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 401, 751; Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 56, f. 1; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 59, pl.; *monogrammica*, Less. Inde N.-E.
- 10.159. ADSPERSUS, Waterh., in *Alex. Exp.* II, p. 267, pl.; Bocage, *Orn. Angola*, p. 410; Sharpe, in *Lay. B. S. Afr.*, p. 590; Grant, *Cat. B.*, p. 159, pl. 7. Afrique S.-W.
- 10.160. GRISEOSTRIATUS, Grant, *Ibis*, 1890, p. 549, pl. 10, 1892, p. 46. Quanza (Afr. S.-W.)
- 10.161. BICALCARATES (Lin.); *Pl. Enl.* 157; Gray, *List Gall.*, p. 55; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 201; *senegalensis*, Bonn.; *adansonii*, Tem.; *albiscapus*, Rehb. Afrique W., du Niger au Maroc.
- 10.162. CLAPPERTONI, Childr., Denh. et Clap., *Trav. App.* XXI, p. 198; Gray, *Gen. B. III*, pl. 150; Cretschm., *Rüpp. Zool. Atlas*, p. 15, pl. 9; *ruppelli*, Gray (pt.) Soudan centr. et E.

2697. Var. GEDGEI, Grant, *Ibis*, 1891, p. 124; Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 551, pl. 14. Elgon (Afr. centr. E.)
2698. Var. HARTLAUBI, Bocage, *J. Sc. Lisb.*, 1869, p. 550; id., *J. f. O.*, 1876, p. 505; id., *Orn. Ang.*, p. 408. Mossamedes (Afrique S.-W.)
- 10.165. DVBOWSKII, Onst., *Le Natural.* XIV, p. 252 (1895). Haut-Congo.
- 10.164. ICTERORHYNCHUS, Heugl., *J. f. O.*, 1865, p. 275, 1864, p. 27; id., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 894, pl. 29, f. 1. Afrique équator.
- 10.165. HARWOODI, Weld-Bl. et Lav., *Ibis*, 1900, p. 197; Grant, *Ibis*, 1900, p. 555, pl. 6. Abyssinie S.
- 10.166. NIGROSQUAMATUS, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 8. Ethiopie S.
- 10.167. SHARPEI, Grant, *Ibis*, 1892, p. 47; id., *Cat.*, p. 164; *ruppelli* (pt.), Gray et auct. plur. Abyssinie, Choa.
- 10.168. CAPENSIS (Gm.), *S. N.* 1, 2, p. 759; Grant, *Cat.*, p. 165; *clamator*, Tem.; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 591; *nudicollis*, Tem. (pt.); *clamosus*, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 504, pl. 87, f. 2. Afrique S., du Cap à l'Orange.
- 10.169. NATALENSIS, Smith, *S. Afr. Journ.*, 1855, p. 48; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 15; *lechoko*, Sm. Afrique S.-E.
- 10.170. HILDEBRANDTI, Cab., *J. f. O.*, 1878, pp. 206, 245, pl. 4, f. 2; *altami*, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 179, pl. 2 (fem.) Afrique E. trop.
- 10.171. JOHNSTONI, Shell., *Ibis*, 1894, p. 24. Nyassaland.
- 10.172. FISCHERI, Rehw., *J. f. O.*, 1887, f. 51; Grant, *Ibis*, 1892, p. 49. Ussere (Afr. E.)
- 10.175. SQUAMATUS, Cass., *Pr. Ac. Philad.*, 1857, p. 521; Bocage, *Orn. Angola*, p. 409; *ashantensis*, Rehw., *J. f. O.*, 1877, p. 15; *petiti*, Boc.; *modestus*, Cab., *J. f. O.*, 1889, p. 89. Gabon, Congo.
- 10.174. SCHUETTI, Cab., *J. f. O.*, 1880, p. 551, 1881, pl. 2. Afrique E. et Angola.
- 10.175. TETRAONINUS, Weld-Bl. et Lav., *Ibis*, 1900, p. 197; Grant, *Ibis*, 1900, p. 556, pl. 5. Abyssinie S.
- 10.176. AHANTENSIS, Tem., *Bijdr. tot de Dierk.* I, p. 49, pl. 14; *ashantensis*, Gr. Côte-d'Or, Libéria (Afr. W.)
- 10.177. JACKSONI, Grant, *Ibis*, 1891, p. 125, 1892, p. 51, pl. 1. Afrique équat. E.
- 10.178. ERCKELI (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 12; Des M., in *Lef. Voy. en Abyss.*, p. 144, pl. 11; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 882; *icteropus*, Heugl.; Hartl., *P. Z. S.*, 1865, p. 666, pl. 59, f. 2. Afrique N.-E.

1489. PTERNISTES

Pternistis, Wagl. (1852); *Pternistes*, Gray (1840).

- 10.179. NUDICOLLIS (Bodd.); Gray, *List Gall. B.* III, p. 52; Cap, Cafrerie, Trans-

- Sharpe, *Lay. B.S. Afr.*, p. 589; Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 500, pl. 5, f. 4. vaal.
2699. *Var. MELANOCASTRA*, Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 299, pl. 5, f. 1. Tanga, Usambara (Afr. E.)
2700. *Var. HUMBOLDTI* (Peters), *M. B. Akad. Wiss. Berl.*, 1854, p. 154; Bocage, *J. f. O.*, 1876, p. 504; Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 500, pl. 5, f. 2; *nudicollis* (pt.), Fisch. et Rehw. Mosambique.
2701. *Var. LEUCOPARÆA*, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 265; Neum., *J. f. O.*, 1898, pl. 5, f. 5; *humboldti* (pt.), Grant. Kipini (Afr. E.)
- 10.180. *AFER* (Müll.), *S. N., Suppl.*, p. 129; *Pl. Enl.* 180; Grant, *Ibis*, 1892, p. 55; *rubricollis*, Gm.; *nudicollis*, Tem. (pt.); *slateri*, Boc., *J. Sc. Lisb.* I, p. 527, pl. 6; id., *J. f. O.*, 1876, p. 505. Afrique S.-W.
2702. *Var. BENGUELLENSIS*, Bocage, *J. Sc. Lisb.* XI, p. 154. Galanga, Angola.
- 10.181. *CRANCHI* (Leach), *Tuck. Narrat. Explor. Riv. Zaire, App.*, p. 108; Wagl., *Isis*, 1852, p. 1229; *punctulata*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 45, f. 5; *lucani*, Boc., *J. Sc. Lisb.*, 1879, p. 68. Loango, Congo.
2705. *Var. BOENNI*, Rehw., *J. f. O.*, 1885, p. 465 (*böhmî*); *cranchi* (pt.), auct. plur.; Feh. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 579, pl. 9; *rubricollis*, Böhm; *boehmi*, Schaeck. Afrique centr. E.
- 10.182. *SWAINSONI* (Smith), *Rep. Exp. Cent. Afr.*, p. 54; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 12; Gray, *List Gall. B.* III, p. 52. Afrique S. et S.-E., Damaraland.
- 10.185. *RUFOPICTUS*, Rehw., *J. f. O.*, 1887, p. 52; Schaeck, *Mém. Soc. Zool. de Fr.* IV, p. 566. Afrique équat. E.
- 10.184. *LEUCOSCEPUS* (Gray), *List Gall. B. M.*, 1867, p. 48; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 899; Grant, *Cat. B. B. M.* XXII, p. 181, pl. 8; *rubricollis*, auct. plur. (nec Gm.); Cretzschm., *Rüpp. Atl.*, p. 44, pl. 50. Afrique N.-E. jusqu'au Somaliland.
- 10.185. *INFUSCATUS*, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 415; id., *v. d. Deck. Reis.* III, p. 44, pl. 14; *rubricollis*, Rüpp. (nec Gm.); *clappertoni*, Shell. Du Kilima Ndjaro au Somaliland.

1490. RHIZOTHERA

Rhizothera, Gray (1841).

- 10.186. *LONGIROSTRIS* (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 525, 721; Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 45, f. 2; id., *List Gen. B.*, p. 79; Salvad., *Ucc. Borneo*, p. 510; *curvirostris*, Rafll. Malacea, Sumatra, Bornéo.
2704. *Var. DULITENSIS*, Grant, *Ibis*, 1895, p. 578. M^t Dulit (Bornéo N.)

1491. PERDIX

Perdix, Briss. (1760); *Perdrix*, Brünn. (1772); *Starna*, Bonap. (1838); *Sacfa*, Hodgs. (1857).

- 10.187. CINEREA, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 645; Dress., *B. Eur.* VII, p. 151, pl^s 474, 475; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, Ois. II, p. 69, pl. 177; *Tet. perdix*, Lin.; *cineracea, sylvestris*, Brm.; *var. sphagnetorum, scanica et lucida*, Altum, *J. f. O.*, 1894, pp. 254-269. Europe, Asie centr.
2705. *Var. ROBUSTA*, Homey. et Tancré, *Mitth. orn. Ver.* Wien, 1885, p. 92, 1885, pl., ff. 5-5. Europe E., Sibérie S.
2706. *Var. HISPANIENSIS*, Richw., *Ber. Allg. Deutsch. Orn. Ges.*, 1895, p. 5; *charreola*, Seoane, *Mém. Soc. Zool. Fr.* VII, p. 94. Espagne.
2707. ? *Var. MONTANA*, Briss., *Orn.* I, p. 224, pl. 21, f. 2; Jard., *Nat. Lib.*, *Orn.* IV, p. 101, pl. 2; *europæus*, P.-L.-S. Müll.; *torquata et varia*, Bechst. Lorraine (Montagnes), France N.-W.
2708. *Var. DAMASCENA*, Briss., *l. c.*, p. 225; de la Font., *Fne. Luxemb.*, Ois., p. 177; Grant, *Cat.*, p. 192; *minor*, Brm.; *peregrina*, Tschusi, *Ornis*, 1888, p. 250. Europe centr. et mérid. (région Alpine ?)
2709. ? *Var. PALLIDA*, Demeez., in *Olphe-Gal.*, *Faune orn. Eur. Occ.*, fasc. XXXIX, p. 55; *palustris*, Demeez., *Ibis*, 1864, p. 225. France N.-W. (côtes).
- 10.188. DAURICA (Pall.), *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 78; *sibirica*, Pall.; *cinerea*, Lamp.; *barbata*, Verr. et Des M., *P. Z. S.*, 1865, p. 62, pl. 9; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 75; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 592; *melanothorax*, Tegetm. Asie N.-E. et centr., Mongolie, Chine N.
- 10.189. TURCOMANA, Stolz., *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1897, p. 79. Ferghana.
- 10.190. HODGSONI, Gould, *B. Asia*, VII, pl. 74; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 65, pl. Thibet, Himalaya.
- 10.191. SIFANICA, Prjev., *Mongolia*, II, p. 124; Grant, *Cat.*, p. 195. Thibet, Chine W.

1492. MARGAROPERDIX

Margaroperdix, Rehb. (1852).

- 10.192. MADAGASCARIENSIS (Scop.), *Del. Fl. et Faun. Insubr.* II, p. 95; Grant, *Cat.*, p. 196; *striatus*, Gm.; Tem., *Pl. Col.* 82; Hartl., *Orn. Madag.*, p. 65; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag.*, Ois. I, pl^s 199-201; *griseus*, Gm.; *perlata*, Tem.; *strictus*, Cuv. Madagascar (introd. à la Réunion).

1495. PERDICULA

Perdicula, Hodgs. (1857).

- 10.195. ASIATICA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 469; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 109, pl.; *cambayensis*, Tem., *Pl. Col.* 447; *pentah*, Syk.; *rupicola*, *rupicolor*, Hodgs.; *rubiginosa*, Gray; *argoondah*, Gould (nec Syk.) Inde, Ceylan.
- 10.194. ARGOONDA (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 155; id., *Tr. Z. S.* II, p. 17, pl. 2; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 117, pl.; *asiatica*, Jerd. (nec Lath.), *B. Ind.* III, p. 585. Inde.

1494. MICROPERDIX

Microperdix, Gould (1862).

- 10.195. ERYTHORRHYNCHA (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 155; id., *Tr. Z. S.* II, p. 16, pl. 1; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 5. Inde S.-W.
2740. *Var.* BLEWITTI, Hume, *Str. F.* II, p. 512; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 150, pl.; *erythrorhyncha*, Ball (nec Syk.) Inde centr.
- 10.196. MANIPURENSIS, Hume, *Str. F.*, 1880, p. 467; Rehw. et Schal., *J. f. O.*, 1885, p. 408. Manipour.

1493. ARBORICOLA

Arborophila, Hodgs. (1857); *Arboricola*, Hodgs. (1844; *Tropicoperdix*, Blyth (1859); *Phaenicoperdix*, Blyth (1861); *Oreoperdix*, Swinh. (1864); *Peloperdix*, Blyth (1866 ?); *Ilyloperdix*, Sundev. (1872).

- 10.197. TORQUEOLA (Valenc.), *Dict. Sc. N.* XXXVIII, p. 455; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 69, pl.; *megapodia*, Tem., *Pl. Col.* 462, 465; *olivacea*, Gray; id., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 57; *torquata*, Less. Himalaya et Monts Naga.
- 10.198. HENRICI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 517; id., *Arch. du Mus.*, 1899, I, pl. 9. Annam.
- 10.199. ATROGULARIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1849, p. 819; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 79, pl.; Grant, *Cat.*, p. 209. Tippera, Assam, Manipour, Cachar et Monts Kachin.
- 10.200. ARDENS, Styan, *Bull. Orn. Cl.*, 1892, p. vi; id., *Ibis*, 1895, pp. 56, 456, pl. 12. Haïnan.
- 10.201. CRUDIGULARIS (Swinh.), *Ibis*, 1864, p. 426; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 595; Blyth, *Ibis*, 1867, p. 160. Formose.
- 10.202. INTERMEDIA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1856, p. 277; id., *Ibis*, 1867, p. 159; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 85, pl. Manipour, Assam, Birmanie (montagnes).

- 10.203. *RUFUGULARIS*, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1849, p. 819; Hume et Marsh., *l. c.* II, p. 73, pl.; *rufipes*, Hodg.; *tickelli*, Hume. Himalaya, de Kumaon à l'Assam, Ténass.
- 10.204. *GINGICA* (Gm.), *S. N.* I, p. 760; Blyth, *Ibis*, 1870, p. 174; Grant, *Ibis*, 1892, p. 595, pl. 9; *scutata*, Gray. Luçon ??
2711. *Var. RICKETTI*, Grant, *Ibis*, 1899, p. 444. Fohkien.
- 10.205. *MANDELLI* (Hume), *Str. F.*, 1874, p. 449; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 85, pl. Sikkim, Boutan, Assam.
- 10.206. *JAVANICA* (Gm.), *S. N.* I, p. 761; Tem., *Pl. Col.* 448; Grant, *Cat.*, p. 214. Java.
- 10.207. *RUBRIROSTRIS* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 251; Snellm., in *Veth's Midd.-Sum.* IV, p. 46, pl. 5; *vethi*, Schl. Sumatra.
- 10.208. *BRUNNEOPECTUS*, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 276; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 87, pl. Indo-Chine W.
- 10.209. *HYPERYTHRA* (Sharpe), *Ibis*, 1879, p. 266; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 71; Grant, *Ibis*, 1892, p. 597; *erythrophrys*, Sharpe, *Ibis*, 1890, pp. 159, 284, pl. 4. Bornéo N.-W.
- 10.210. *ORIENTALIS* (Horsf.), *Trans. Linn. Soc.*, 1822, p. 184; Grant, *Ibis*, 1892, p. 597; *personata*, Horsf., *Zool. Res.*, pl. 61. Java.
- 10.211. *SUMATRANA*, Grant, *Ann. Mag. N. H.*, 1891, p. 297; id., *Ibis*, 1892, p. 598; *personata*, Gray (nec Horsf.) Sumatra.
- 10.212. *CHLOROPUS*, Tick., *J. A. S. Beng.*, 1859, pp. 415, 435; Hume et Marsh., *l. c.* II, p. 91, pl. Indo-Chine W. et S.
- 10.213. *CHARLTONI* (Eyton), *Ann. Mag. N. H.*, 1845, p. 250; Hume et Marsh., *l. c.*, p. 95, pl.; *pyrrhogaster*, Rehb. Siam, Malacca, Bornéo N. et N.-E.

1496. *HAEMATORTYX*

Haematortyx, Sharpe (1879).

- 10.214. *SANGUINICEPS*, Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 266; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 70. Bornéo N.-W.

1497. *CALOPERDIX*

Caloperdix, Blyth (1867).

- 10.215. *OCULEA* (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 408, 752; Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 58; Hume et Marsh., *l. c.*, p. 101, pl.; *ocellatus*, Vig. Ténassérin S., Malacca.
2712. *Var. SUMATRANA*, Grant, *Bull. Orn. Cl.* II, p. v; id., *Ibis*, 1895, p. 118; id., *Cat.*, p. 224; *oculea* (pl.), auct. plur. Sumatra, Java.
2713. *Var. BORNEENSIS*, Grant, *Bull. Orn. Cl.* II, p. v; id., *Ibis*, 1895, p. 117; *oculea* (pl.), Salvad. Bornéo N.-W.

1498. ROLLULUS

Rollulus, Bonn. (1790); *Cryptonyx*, Tem. (1815); *Liponyx*, Vieill. (1816).

- 10.216. ROULROUL (Scop.), *Del. Fl. et Faun. Insubr.* II, p. 95; Gray, *List Gall. B.* III, p. 42 (1844); Hume et Marsh., *l. c.*, p. 105, pl.; *cristatus*, Sparrm.; *viridis*, Gm.; *porphyrio*, Shaw; *coronata*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 550, 551; *nigrifrons*, Drap. Cochinchine, Ténassérim S., Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.

1499. MELANOPERDIX

Melanoperdix, Jerd. (1864).

- 10.217. NIGRA (Vig.), *Zool. Journ.*, 1829, p. 549; Jerd., *B. Ind.* III, p. 580; Salvad., *Ucc. Borneo*, p. 509; ?*cambaiensis*, Lath.; ?*rufus*, Tem.; *ferrugineus*, Vig.; Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 45, f. 1; *dussumieri*, Less., *Bél. Voy. Ind.*, p. 275, pl. 7; *aruginosus*, Eyt. Malacca, Sumatra, Bornéo.

1500. COTURNIX

Coturnix, Moeh. (1752), Bonn. (1791); *Ortygion*, Keys. et Blas. (1840); *Perdortyx*, Montess. (1886).

- 10.218. COMMUNIS, Bonn., *Tabl. Encycl. méth.* I, p. 217, pl. 96; Dress., *B. Eur.* VII, p. 145, pl. 476; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, Ois. II, p. 76, pl. 178; *alba*, *nigra*, *varia*, *major*, Bechst.; *dactylisonans*, Tem.; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 265; *media*, *minor*, Brm.; *europæus*, Sw.; *vulgaris*, Bout.; *baldami*, Naum.; Madar., *Aquila*, III, pl. 2; *leucogenys*, Brm.; *chinensis*, Swinh.; *lodoisia*, Verr. (aberr.); *ypsilophorus*, Bosc.; *communis orientalis*, Bodg. Europe, Asie (excepté l'Indo-Ch.), au Nord jusqu'au 63° (en été); Afrique (en hiver).
2714. Var. AFRICANA, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, Aves, p. 105; *coturnix* (pt.), auct. plur.; *dactylisonans*, auct. plur. (nec Tem.); *communis* (pt.), auct. plur. (nec Bonn.); *capensis*, Licht.; Grant, *Cat.*, p. 257. Afrique au S. du 15° l. S., Madagascar, îles Comores, Maurice, du Cap Vert, Canar., Madeire, Açores.
2715. Var. JAPONICA, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 105, pl. 61; *coturnix*, Radde; *muta*, Dyb.; *communis* (pt.), auct. plur.; *ussuriensis*, Bodgs., *Consp. Av. Imp. Ross.* I, p. 45. Japon, Sibérie E., Chine, Boutan, Karen-nee.
- 10.219. COROMANDELICA (Gm.), *S. N.* I, p. 76½; Bonn., *Tabl. Encycl. méth.* I, p. 221; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 9; Hume et Marsh., *l. c.* II, p. 152, pl.; *textilis*, Tem., *Pl. Col.* 55; *olivacea*, Bueh.; *pluvialis*, Hodgs. Inde, Ceylan, Birmanie.

- 10.220. DELEGORGUEI, Deleg., *Voy. Afr. austr.* II, p. 615; Afrique, du 15° l. N.
histrionica, Hartl.; id., *Beitr. Orn. W.-Afr.*, au Cap, et Arabie S.
 pp. 1, 58, pl. 11; *fornasini*, Bianc., *Spec. Zool.*
Mos., fasc. XVI, p. 599, pl. 1, f. 2; id., *Mem. Acc.*
Sc. Bolog., 1865, p. 521, pl. 2, f. 2; *crucigera*,
 Heugl.
- 10.221. PECTORALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 8; id., *B. Australie, Tasmanie.*
Austr. V, pl. 88; *australis*, Rams., *Ibis*, 1865, p. 86.
- 10.222. NOUVE-ZEALANDIE, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol.*, Nouv.-Zélande (éteint.)
Zool. I, p. 242, pl. 24, f. 1; Bull., *Man. B. N.-*
Zeal., p. 45, pl. 19; id., *B. N.-Zeal.*, I, p. 225,
 pl. 25.

1501. SYNOECUS (1)

- Synoicus*, Gould (1845); *Synæcus*, Agass. (1846); *Synæcus*, Müll. (1869).
- 10.223. AUSTRALIS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 474, 740; Australie, Tasmanie,
 Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 46, pl. 215; Gould, *B. Nouv.-Guinée S.-E.*
Austr. V, pl. 89; *sordidus*, Gould; id., *B. Austr.* V,
 pl. 91; *diemenensis*, Gould, *B. Austr.* V, pl. 90;
cervinus, Gould.
- 10.224. RAALTENI (Müll. et Schl.), *Land-en Volkenk.*, p. 458; Timor, Flores.
 Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 486; Grant, *Cat.*, p. 249.
2716. Var. PALIDIOR, Hartl., *Novit. Zool.* IV, p. 271. Ile Savu.
- 10.225. PLUMBEUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1894, Vakena, Nouv.-Gui-
 p. 152; Grant, *Handb. Game B.*, p. 192. née S.-E.

1502. EXCALFACTORIA

- Excalfactoria*, Bonap. (1856); *Compsortyx*, Heine (1890).
- 10.226. CHINENSIS (Lin.); Bp., *C. R.* XLII, p. 881; Gould, Inde, Ceylan, Indo-
B. Asia, VII, pl. 6; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, Chine, Malacca,
 p. 597; *sinensis*, Bonn.; *flavipes*, Blyth; *minima*, Formose, Célèbes,
 Gould; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 255; *caineana*, Moluques.
 Swinh.
2717. Var. LINEATA (Scop.), *Del Fl. et Faun. Insubr.* II, Philippines, Bornéo,
 p. 87; Grant, *Cat.*, p. 255; *manillensis*, Java, Sumatra,
 Gm.; *philippensis*, Hodgs.; *chinensis* (pt.), Australie.
 auct. plur. (nec Lin.); Gould, *B. Austr.* V,
 pl. 92; *nana*, Schinz; *australis*, Gould.
- 10.227. LEPIDA, Hartl., *Sitz. Ver. Hamb.*, 1879, *Unterh.*; Archipel Bismarek,
 Salv. et Sel., *Ibis*, 1880, p. 155; Salvad., *Orn.* Nouv.-Guin. S.-E.
Pap. III, p. 256; *chinensis* (pt.), Sel.

(1) Le *S. lodoisix*, Verr. et Des M., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1862, p. 225, pl. 11, est tout simple-
 ment une aberration du *Coturnix communis*.

- 10.228. ADANSONI (Verf.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 515; Afrique tropicale.
Grant, *Cat.*, p. 255; *emini*, Rehw., *J. f. O.*,
1892, p. 18, pl. 1, f. 5.

1503. PTILOPACHYS

Ptilopachus, Sw. (1857); *Petrogallus*, Gray (1857); *Ptilopachys*, Strickl. (1841).

- 10.229. FUSCUS (Vieill.), *Tabl. Enc. méth.* I, p. 566; id., De Sénégal à la
Gal. Ois. II, p. 40, pl. 212; Jard. et Selby, *Ill.* Côte-d'Or, et Afri-
Orn., 1857, pl. 16; *ventralis*, Valenc.; Hengl., que N.-E.
Orn. N.-O. Afr. III, p. 879; *erythrorhynchus*, Sw.
2718. Var. FLORENTIÆ, Grant, *Bull. Br. Orn. Cl.*, 1899, Afrique E. angl.
p. 107; id., *Ibis*, 1900, p. 676.

1504. BAMBUSICOLA

Bambusicola, Gould (1862).

- 10.250. FYTCHI, Anders., *P. Z. S.*, 1871, p. 214, pl. 11; Assam, Haute-Birma-
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 594; Anders., *Yun-* nie, Setchuan (Ch.)
nan, II, p. 675, pl. 54; Hume et Marsh., *Game*
B. Ind. II, p. 97, pl. ; *hopkinsoni*, Godw.-Aust.,
P. Z. S., 1874, p. 44.
10.251. THORACICA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 555, 725; Chine S.
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 595; *sphenura*, Gray;
id., *Fasc. B. China*, pl. 8; *bambusæ*, Swinh.
10.252. SONORIVOX, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 285; id., *B.* Formose.
Asia, VI, pl. 63; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 594.

1505. GALLOPERDIX

Galloperdix, Blyth (1844); *Hepburnia*, Rehb. (1852); *Plectroperdix*, Heine (1890).

- 10.255. SPADICEA (Gm.), *S. N.* I, p. 759; Gould, *B. Asia*, Inde (introd. à Mada-
VI, pl. 68; *northiae*, Gray, *Ill. Ind. Orn.* II, pl. 45, gascar).
f. 1; *madagascariensis*, Gray.
10.254. LUNULATA (Valenc.), *Dict. Sc. Nat.* XXXVIII, p. 446; Inde.
Hume, *N. and E. Ind. B.*, p. 553; Hume et Marsh.,
Game B. Ind. I, p. 255, pl. ; *hardwickii*, Gray;
nivosus, Deless., *Mag. Zool.*, *Ois.*, 1840, pl. 18;
lunulosa, Blyth; Schl. et W., *Zool. Sket.* II, pl. 44.
10.255. BICALCARATA (Penn.), *Ind. Zool.*, p. 40, pl. 7; Legge, Ceylan.
B. Ceyl. III, p. 741, pl. ; Hume et Marsh., *l. c.* I,
p. 261, pl. ; *zeylonensis*, Gm.; *ceylonensis*, Lath.

1506. OPHRYSIA

Ophrysia, Bonap. (1856); *Malacortyx* et *Malacoturnix*, Blyth (1867).

- 10.256. SUPERCILIOSA Gray), *Knowls. Menag.*, *Aves*, p. 8, Himalaya N.-W.
 pl. 16; Bp., *C. R.* XLIII, p. 414; Ilume et Marsh.,
l. c. II, p. 103, pl.; Grant, *Cat.*, p. 266.

FAM. V. — ODONTOPHORIDÆ (1)

1507. DENDRORTYX

Dendrortyx, Gould (1844).

- 10.257. MACROURUS (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.* I, pl^s 58, 49; Mexique S., Colima,
 Gould, *Mon. Odontoph.*, pt. I, pl. 20; *griseipectus*, Guerrero, Morelos.
striatus, Nels., *Auk*, 1897, p. 44; *dilutus*, Nels.,
l. c. 1900, p. 254.
 2719. *Var.* OAXACÆ, Nels., *Auk*, 1897, p. 45. Oaxaca.
 10.258. BARBATUS, Licht., Gould, *Mon. Odont.*, pt. II, pl. 22. Mex.S.-E., Vera-Cruz.
 10.259. LEUCOPHYRS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 152; id., Guatém., Costa-Rica.
Mon., pt. II, pl. 21.
 10.240. HYPOSPODIUS, Salv., *Ibis*, 1897, p. 112. Costa-Rica.

1508. CALLIPEPLA

Callipepla, Wagl. (1852).

- 10.241. SQUAMATA (Vig.), *Zool. Journ.*, 1850, p. 275; Gould, Nouv.-Mexique, Ari-
l. c., pt. I, pl. 19; Cass., *Ill. B. Cal.*, p. 129, zona, Texas S.-W.,
 pl. 19; *cristata*, La Llave; *strenua*, Wagl.; *pal-* Mexique N. et centr.
lida, Brewst.
 2720. *Var.* CASTANOGASTRIS, Brewst., *Bull. Nutt. Orn.* Rio Grande, Texas,
Cl., 1885, p. 54; Bendire, *N. Am. B.*, p. 22, Mexique N.-E.
 pl. 1, II, 6, 7.

1509. OREORTYX

Oreortyx, Baird (1860).

- 10.242. PICTUS (Dougk.), *Trans. Linn. Soc.* XVI, p. 145; États-Unis W. (Côtes).
 Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 107; Gould, *l. c.*,
 pt. I, pl. 15; Baird, *B. N. Am.*, p. 642; Ridgw.,
Auk, 1894, p. 195, pl. 6.
 2721. *Var.* PLUMIFERA (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 42; Sierra-Nevada, Oré-
 Audub., *B. Am.* V, p. 69, pl. 291; Ridgw., gon, Californie E.
Auk, 1894, p. 195, pl. 6; *pictus* (pt.), Grant.

(1) Voy. : Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 392-444 (1893); Gould, *A Monograph of the Odontophorinæ* (1844-50).

2722. *Var. CONFINIS*, Anth., *Pr. Calif. Ac. Sc.*, 1889, Basse-Californie.
p. 74; *pictus* (pt.), Grant.

1510. LOPHORTYX

Lophortyx, Bonap. (1858); *Callipepla* (pt.), auct. plur.

- 10.245. *CALIFORNICUS* (Shaw et Nodd.), *Nat. Misc.* IX, pl. 545; États-Unis W., Basse-Californie.
Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 152, pl. 413; id., *B. Am.* V, p. 67, pl. 290; Bp., *Comp. List*, p. 42;
Gould, *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 16; *californianus*,
Gray; *virginianus*, Hutt.; *brunnescens*, Ridgw.
2725. *Var. VALLICOLA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VIII, Californie centr.
p. 555; Towns., *l. c.* X, pp. 200, 255.
10.244. *GAMBELI*, Nutt., Gamb., *Pr. Ac. Philad.*, 1845, États-Unis W., de
p. 260; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 17; Bend., *N. l'Utah jusqu'au N.*
Am. B., p. 29, pl. 1, ff. 11-14; *venusta*, Gould; du Mexique.
californicus (pt.), Cones; *deserticola*, Steph., *Auk*,
1893, p. 571.
2724. *Var. FULVPECTUS*, Nels., *Auk*, 1899, p. 26. Mexique N.-W.
10.243. *DOUGLASI* (Vig.), Dougl., *Trans. Linn. Soc.*, 1828, Mexique W.
p. 143; Grant, *Cat.*, p. 404; *elegans*, Less., *Cent.*
Zool., p. 189, pl. 61; Gould, *l. c.*, pt. I, pl. 18;
spilogaster, Vig.
2725. *Var. BENSONI* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Sonora (Mexique N.)
p. 148.
10.246. ? *LEUCOPROSPON*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1895, ?
pp. 10, 11 (hybride ?)

1511. PHILORTYX

Philortyx, Gould (1846).

- 10.247. *FASCIATUS*, Gould (ex Natt.), *P. Z. S.*, 1845, p. 155; Mexique S.
id., *Mon. Odont.*, pt. II, pl. 14; *perrotiana*, Des
M.; *personatus*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 555.

1512. EUPSYCHORTYX

Eupsychortyx, Gould (1844).

- 10.248. *CRISTATUS* (Lin.); *Pl. Enl.* 126; Less., *Ill. Zool.*, Iles Curaçao et Aruba.
pl. 52; Gould, *l. c.*, pt. II, pl. 9; *temminckii*,
Steph.; *neozenus*, Vig.; Audub., *Orn. Biogr.* V,
p. 228, pl. 425; *gouldi*, Berl., *J. f. O.*, 1892, p. 100.
10.249. *LEUCOPOGON* (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 175; Des Véragua, Colombie.

- M., *Icon. Orn.*, pl. 56; *leucotis*, Gould; id., *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 10.
- 10.250. SONNINI (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 451, 757; id., *Pl. Col.* 73; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 11; *cristatus*, Cab. (nec Lin.) Vénézuéla, Guyane angl., Rio-Négro.
2726. Var. PALLIDA, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 657. Ile Margarita.
- 10.251. MOCQUERYSI, Hart., *Ibis*, 1894, p. 450; id., *Novit. Zool.* I, p. 675, pl. 15, f. 2; Grant, *Handb. Game B.* II, p. 151. Cumana (Vénézuéla N.)
- 10.252. PARVICRISTATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 106; id., *Mon. Odont.*, pt. II, pl. 12. Colombie.
- 10.253. LEYLANDI (Moore), *P. Z. S.*, 1859, p. 62; Grant, *Cat.*, p. 411; *leucofrenatus*, Ell., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1860, p. 106, pl. 5. Honduras, Nicaragua, Costa-Rica.
- 10.254. HYPOLEUCUS, Gould, *P. Z. S.*, 1860, p. 62; Grant, *Cat.*, p. 415; *leucopogon*, Salv. et Schl. (nec Less.), *Ibis*, 1860, p. 277. Guatémala.

1515. COLINUS

Ortyx, Steph. (1819, nec Oken, 1816); *Colinus*, Less. (1828); *Ortygia*, Boie (1828); *Colinia*, Nutt. (1852).

- 10.255. VIRGINIANUS (Lin.); *Pl. Enl.* 149; Audub., *Orn. Biogr.* I, p. 588, pl. 76; Gould, *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 1; Stejn., *Auk*, II, p. 43; *marilandicus* et *mexicanus*, Lin.; *minor*, Bartr.; *borealis*, Tem.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 44, pl. 214. États-Unis E. jusqu'au Dakota et le Texas à l'Ouest.
2727. Var. FLORIDANA (Cooper), *Key N. A. B.*, pp. 257, 591; Stejn., *Auk*, 1885, p. 43. Florida (Cuba, introd.?)
2728. Var. TEXANA (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1855, p. 1; Baird, *B. N. Am.*, p. 641, pl. 24; B., Br. et Rid., *B. N. Am.* III, p. 474; *maculata*, Nels., *Auk*, 1899, p. 26. Texas S., W., Mex.
- ✓ 10.256. CUBANENSIS (Gould), in Gray, *Gen. B.* III, p. 514; id., *Mon. Odont.*, pt. III, pl. 2; Cory, *List B. West Ind.*, p. 24; *virginianus*, d'Orb. (nec Lin.) Cuba.
- 10.257. PECTORALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 182; id., *Mon. Odont.*, pt. III, pl. 5; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 189. Vera-Cruz (Mex. E.)
2729. ? Var. NIGRIPECTUS, Nels., *Auk*, 1897, pl. 47. Plénes de Puebla (Mex.)
2750. ? Var. MINOR, Nels., *Auk*, 1901, p. 47; Grant, *Ibis*, 1902, p. 240. Chiapas, Tabasco (Mex. S.)
- 10.258. GRAYSONI (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1867, p. 476; Stejn., *Auk*, 1885, p. 43; Grant, *Game B.* II, pl. 52. Jalisco (Mex. W.)

- 10.259. GODMANI, Nels., *Auk*, 1897, p. 45, 1898, pl. 2. Véra-Cruz (Mex.)
 10.260. NIGROGULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 181; id., Yucatan, Honduras.
Mon., pt. II, pl. 4; Gray, *Gen. B.* III, pl. 152;
 Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 190; *segoiensis*,
 Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 595.
 10.261. RIDGWAYI, Brewst., *Auk*, 1885, p. 199; Grant, Arizona, Sonora.
Cat., p. 422.
 10.262. INSIGNIS, Nels., *Auk*, 1897, p. 46. Guatémala, Chiapas.
 10.263. COYOLCOS (Müll.), *S. N. Suppl.*, p. 129; Gould, Mexique S. (Oaxaca).
l. c., pt. III, pl. 6; Ridgw., *Man. N. Am. B.*,
 p. 189; *nigrogularis*, Gr. (nec Gould.)
 10.264. ATRICEPS (Grant), *Cat. B.* XXII, p. 424; id., *Handb.* Mexique W. (Putla).
Game B. II, p. 144, pl. 55; *coyolcos*, Gould (pt.),
l. c., pt. III, pl. 6 (fig. de gauche).
 10.265. SALVINI, Nels., *Auk*, 1897, p. 45; Grant, *Ibis*, Chiapas (Mex.)
 1902, p. 241.
 10.266. CASTANEUS (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 182; id., ?
Mon., pt. III, pl. 5.

1514. CYRTONYX

Cyrtonyx, Gould (1844).

- 10.267. MONTEZUMÆ (Vig.), *Zool. Journ.*, 1850, p. 275; Mexique, Arizona,
 Stejn., *Auk*, 1885, p. 46; *massena*, Less., *Ill.* Texas S.-W.
Zool., pl. 52; Gould, *l. c.*, pt. I, pl. 7; *guttata*,
 La Llave; *meleagris*, Wagl., *Isis*, 1852, p. 278;
perspicillata, Licht.; *mearnsi*, Nels., *Auk*, 1900,
 p. 255.
 10.268. SALLEI, Verr., *Arcana Nat.* I, p. 55, pl. 4; Ridgw., Guerrero, Véra-Cruz
Man. N. Am. B., p. 194; *merriami*, Nels., *Auk*, (Mex.)
 1897, p. 48; Grant, *Ibis*, 1902, p. 242.
 10.269. OCELLATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 75; id., *Mon.* Mexique S. (Tehuante-
Odont., pt. II, pl. 8; *sumichrasti*, Lawr. pec), Guatémala.

1515. DACTYLORTYX

Dactylortyx, Og.-Grant (1891).

- 10.270. THORACICUS (Gamb.), *P. Ac. Philad.*, 1848, p. 77; Mexique S., Yucatan,
 Grant, *Cat.*, p. 429; *lineolatus*, Gould, *Mon.* Guatémala, San-
Odont., pt. III, pl. 52; Nels., *Pr. Biol. Soc.* Salvador.
Wash., 1898, p. 66.
 2751. Var. CHIAPENSIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, Chiapas (Mex. S.)
 1898, p. 66.
 2752. Var. DEVIUS, Nels., *l. c.*, p. 68. Jalisco (Mex. W.)

1516. ODONTOPHORUS

Odontophorus, Vieill. (1816); *Dentophorus*, Merr. fide Gray (1870); *Strophiorityr*, Bp. (1856); *Rhynchortyx*, Grant (1895).

- 10.271. GUIANENSIS (Gm.), *S. N.* 1, 2, p. 767; Gould, *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 25; *dentata*, Tem.; *rufina*, Spix; *rufus*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 58, pl. 211. Guyane angl., Bas-Amazone.
2755. Var. MARMORATA, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 107; De Panama au Pérou et Bolivie.
Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 571; *pachyrhynchus*, Tsch., *Faun. Per.*, p. 282; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 24; *castigatus*, Bangs, *Auk*, 1901, p. 556; Grant, *Ibis*, 1902, p. 245.
- 10.272. CAPUEIRA (Spix), *Av. Sp. Nov.* II, p. 59, pl. 76^a; Brésil E., de Bahia au Rio Grande do Sul.
Grant, *Cat.*, p. 454; *dentatus*, Max.; Gould, *l. c.*, pt. II, pl. 26; *capistrata*, J. et S., *Ill. Orn.* I, pl. 58.
- 10.275. MELANOTIS, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 586, 1867, Nicaragua, Costa-Rica, p. 161. Véragua.
- 10.274. ERYTHROPS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 99; Tacx., Ecuador.
ibid., 1885, p. 576.
- 10.275. HYPERYTHRUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 225; *hypospodius*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 165. Colombie.
- 10.276. SPECIOSUS, Tsch., *Arch. f. Nat.*, 1845, p. 587; id., Ecuador, Pérou.
Faun. Per., p. 281, pl. 55; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 25.
- 10.277. MELANOTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1860, p. 582. Ecuador.
- 10.278. LEUCOLÆMUS, Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 161. Costa-Rica, Véragua.
- 10.279. PARAMÆ, Rothsch., *Ibis*, 1898, p. 145; Hart., *Nov. Colombie, Ecuador N.*
Zool. V, p. 505, pl. 5, f. 1.
- 10.280. ATRIFRONS, Allen, *Bull. Amer. Mus.* XIII, p. 127. Valparaiso (Colombie).
- 10.281. STELLATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 185; id., Haut-Amazone, Ecuador E.
Mon. Odont., pt. II, pl. 27; *leucostictos*, Natt.
- 10.282. GUTTATUS (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 79; Gray, *List Amériq. centr., du*
Gall., p. 45 (1844); Gould, *l. c.*, pt. II, pl. 28; S. du Mexique à
consobrinus, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, Panama.
p. 469 (fem.); Grant, *Ibis*, 1902, p. 244.
- 10.285. VERAGUENSIS, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 107; Zel., Du Costa-Rica à Pa-
Pr. U. S. Nat. Mus., 1886, p. 112. nama.
- 10.284. BALLIVIANI, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 69; id., Bolivie, Pérou.
Mon. Odont., pt. III, pl. 29; Tacx., *Orn. Pér.* III, p. 290.
- 10.285. STROPHIUM, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 154; id., Colombie.
Mon. Odont., pt. I, pl. 31.
- 10.286. COLUMBIANUS, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 94; id., Vénézuéla.
Mon. Odont., pt. III, pl. 50.
- 10.287. SPODIOSTETHUS, Salv., *Ibis*, 1878, p. 447. Du Nicarag. à Panama.
- 10.288. CINCTUS, Salv., *Ibis*, 1876, p. 579; Rowl., *Orn. Véragua.*
Misc. III, p. 59, pl. 86.

FAM. VI. — TETRAONIDÆ (1)

1517. BONASA

Bonasa, Steph. (1819); *Bonasia*, Bp. (1850).

- 10.289. UMBELLUS (Lin.); *Pl. Enl.* 104; Steph., *Gen. Zool.* XI, p. 500; Baird, *B. N. Am.*, p. 650; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 1; *tympanus*, Bartr.
2754. Var. TOGATA (Lin.); Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* 1885, p. 555. Canada et le N. des États-Unis.
2755. Var. UMBELLOIDES (Dougl.), *Tr. Linn. Soc.* XVI, p. 148; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 2; Cones, *Key*, p. 585. Amérique N.-W., Alaska.
2756. Var. SABINEI (Dougl.), *Tr. Linn. Soc.* XVI, p. 157; Baird, *B. N. Am.*, p. 651; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 5. De la Californie au 55° 1. N. (Amér. N.-W.)

1518. TETRASTES

Tetrastes, Keys. et Blas. (1840).

- 10.290. BONASIA (Lin.); Keys. et Blas., *Wirbelth. Eur.*, p. 200; *betulinus*, Scop.; Dress., *B. Eur.* V, p. 195, pl. 486; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, Ois. II, p. 50, pl. 174; *canus*, Sparrm.; *sylvestris*, Brm.; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 4; *rupestris*, Brm.; *europæa*, Gd. Europe, Asie N. et centr., Japon.
2757. Var. SEPTENTRIONALIS, Seeb., *Ibis*, 1884, p. 450. Zone arct. de Russie et Sibérie.
- 10.291. GRISEIVENTRIS, Menzb., *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, 1880, I, p. 105, pl. 4; Seeb., *Ibis*, 1884, p. 450, pl. 11; id., *P. Z. S.*, 1884, p. 409. Russie E. (gouv^t de Perm.)
- 10.292. SEVERTZOWI, Pejev., *Mongolia*, II, p. 150, pl. 18; id., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 450, pl. 52; Dedit., *J. f. O.*, 1886, p. 558. Chine W.

1519. PEDIOECETES

Pediocetes, Baird (1858); *Pedircetes*, Hayd. (1861).

- 10.295. PHASIANELLUS (Lin.); Ell., *P. Ac. Philad.*, 1862, p. 403; id., *Mon. Tetr.*, pl. 15; *kennicotti*, Suckl. Amérique du Nord angl.

(1) Voy. : Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 35-93 (1893); Elliot, *A Monograph of the Tetraoninæ or family of the Grouse* (1864-65).

2738. *Var. COLUMBIANA* (Ord.), *Guthrie's Geog.* II, p. 517 (1815); Ell., *l. c.*, pl. 14; Grant, *Cat.*, p. 85; *phasianellus* (pt.), auct. plur.
 2739. *Var. CAMPESTRIS*, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1884, p. 95; *A. O. U. Check-L.*, p. 176; *columbianus* (pt.), Grant.
- Amér.N.-W., du Nouv.-Mex. à l'Alaska (à l'O. des M^{nes} Roch.)
 Région des prairies de l'Amérique du Nord.

1520. CENTROCERCUS

Centrocerus, Swains. (1851).

- 10.294. *UROPHASIANUS* (Bonap.), *Zool. J.* III, p. 215; id., *Am. Orn.* III, p. 55, pl. 21, f. 1; Audub., *B. Am.* V, p. 106, pl. 297; Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 538, pl. 58; Ell., *l. c.*, pl. 15.
- Amérique N.-W., du Nouv.-Mexique et Californie jusqu'au 60° l. N. environ.

1521. TYMPANUCHUS

Tympanuchus, Glog. (1842); *Cupidonia*, Rehb. (1852).

- 10.295. *CUPIDO* (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 55, pl. 219; Baird, *B. N. Am.*, p. 628 (pt.); Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 555; *brewsteri*, Coues.
 2740. *Var. AMERICANA* (Rehb.), *Nat. Syst. Vög.*, p. xxix; Ridgw., *Auk*, 1886, p. 152; *cupido* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); Audub., *Am. Orn.* V, p. 95, pl. 296; Ell., *l. c.*, pl. 16; *pinnata*, Brewst., *Auk*, 1885, p. 82.
 2741. *Var. ATTWATERI*, Bend., *For. and Stream*, XL, 1895, p. 425; id., *Auk*, 1894, p. 150.
 2742. *Var. PALLIDICINCTA*, Ridgw. in B. B. et Rid., *N. Am. B.* III, p. 446; id., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 555; id., *Man.*, p. 205.
- Ile Martha Vineyard (Massachusetts).
 Vallée du Mississippi.
 Louisiane et Texas (côtes).
 Du Texas au Kansas.

1522. DENDRAGAPUS

Dendragapus, Elliot (1864).

- 10.296. *OBSCURUS* (Say), *Long's Exp.* II, p. 14; Bp., *Am. Orn.* III, p. 27, pl. 18; Ell., *Pr. Ac. Philad.*, 1864, p. 25; id., *Mon. Tetr.*, pl. 7.
 2743. *Var. FULIGINOSA* (Baird, Br. et Rid.), *N. Am. B.* III, p. 425; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 555; *obscurus* (pt.), auct. plur. (nec Say).
 2744. *Var. RICHARDSONI* (Dougl.), *Trans. Linn. Soc.* XVI, p. 140; Wils., *Ill. Zool.*, pl^s 50, 51; Ell., *l. c.*, pl. 8; B., Br. et Rid., *N. Am. B.* III, p. 427.
- M^{nes} Roch. du Nouv.-Mex. et Ariz. jusque Montana et Idaho.
 Amérique N.-W., de Californie au 55° l. N.
 Montagnes Rocheuses au N. de Montana.

1525. FALCIPENNIS

Canace, Rehb. (1852, nec Curtis, 1858); *Falcipennis*, Elliot (1864); *Canachites*, Stejn. (1885).

- 10.297. HARTLAUBI, Ell., *Pr. Ac. Philad.*, 1864, p. 25; id., *Mon. Tetr.*, pl. 41; *T. canadensis*, var. *franklinii*, Midd., *Sib. Reis.*, *Aves*, p. 202, pl. 17, f. 4; *T. falcipennis*, Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 39; *canadensis*, Radde (nec Lin.) Sibérie N.-E., Kamtchatka.
- 10.298. CANADENSIS (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 85, pl. 294; Baird, *B. N. Am.*, p. 622; Ell., *l. c.*, pl. 9; *canace*, Lin. Amérique sept. entre le 43° et le 60° l. N., à l'E. des M^{nes} Roch.
2745. Var. LABRADORIA (Bangs), *New Engl. Zool. Club*, I (1899), p. 47. Labrador.
2746. Var. FRANKLINI (Dougl.), *Trans. Linn. Soc.* XVI, p. 459; Sw. et Rich., *F. Bor.-Am.* II, p. 548, pl. 61; Ell., *l. c.*, pl. 10; *canadensis* (pt.), Bp.; *osgoodi*, Bishop. Amérique septentr. à l'Ouest des Montagnes Rocheuses.

1524. TETRAO

Tetrao, Lin. (1766); *Urogallus*, Scop. (1777).

- 10.299. UROGALLUS, Lin.; Ell., *l. c.*, pl. 5; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, p. 56, pl^s 172, 172^b; Mey., *Auer-, Rack. u. Birkw.*, pp. 1-15, pl^s 1-5; *eremita*, Thunb.; *vulgaris*, Flem.; *major*, *crassirostris*, Brm.; *taczanowskii*, Mey., *l. c.*, p. 10; *thelyides* (aberr.), Mey., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, n° 5, p. 1, pl. (1). Europe, Asie N. et centr. jusqu'au lac Baïkal.
2747. Var. URALENSIS, Nazar., *Bull. Mosc.*, 1886, p. 565; Menzb., *Ibis*, 1887, p. 502. Monts Ourals.
- 10.300. PARVIROSTRIS, Bp., *C. R.* XLII, p. 880; Grant, *Cat.*, p. 66; *urogallus*, var. *rupestris* et *minor*, Pall., *Zoogr.* II, p. 58; *urogalloides*, Midd., *Sibir. Reise*, II, 2, p. 195, pl. 18, et auct. plur. (nec Nilss.); Ell., *l. c.*, pl. 6; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 590; *sachalinensis*, Bogd. Sibérie E., Amourland, Mantchourie, Chine N.
2748. Var. KAMTSCHATICA, Kittl., *Reise Kamtsch.* II, p. 555; Tacz., *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1885, p. 555. Kamtschatka.

(1) Les dénominations suivantes se rapportent à des hybrides des *T. urogallus* + *tetrix*: *hybridus*, Sparrm., *urogallides* et *urogalloides*, Nilss.; *medius*, Mey. (1811); *intermedius*, Langsd.; *maculatus* et *pseudourogallus*, Brm.; *T. tetrix urogallus*, Mey., *Unsere Auer-Rack* pl^s 8-13.

1525. LYRURUS

Lyrurus, Swains. (1831); *Lyrurus*, Gould (1837).

- 10.501. TETRIX (Lin.); Sw. et Rich., *F. Bor.-Am.* II, p. 497; Europe, Asie N. et
Dubois, *l. c.* II, p. 45, pl. 175; ?*nemesianus*, Gm.; centr.
juniperorum, *ericus*, Brm.; *derbianus*, Gould (1).
2749. Var. VIRIDANA, Lorenz, *J. f. O.*, 1891, p. 566 Du S. de la Russie
(*viridanus*); *tetrix* (pl.), Granl. jusqu'au Turkestan.
2750. Var. TSCHUSU, Johan., *Orn. Jahrb.*, 1898, *Beilage*. Sibérie W.
10.502. MŁOKOSIEWICZI (Tacz.), *P. Z. S.*, 1875, p. 266; Dress., Caucase.
B. Eur. V, p. 219, pl. 488; Radde, *Orn. Cauc.*,
p. 558, pl. 25; *acutoptricus*, Radde, *l. c.*

1526. LAGOPUS

Lagopus, Briss. (1760); *Keron*, Mont. (1776; *Oreias*, *Attagen*, Kp. (1829); *Ace-*
tinornis, Bonap. (1856).

- 10.505. SCOTICUS (Lafll.), *Gen. Syn.*, *Suppl.* I, p. 290; Leach, Iles Britanniques. (In-
Syst. Cat., p. 27; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 62, pl. 221; trod. dans l'Ardenne
Dress., *B. Eur.* V, p. 165, pl. 479; *saliceti* (pl.), belge.)
Tem.; *persicus*, Gray; Ell., *l. c.*, pl. 20; *albus*,
β. *scoticus*, Dubois, *Consp. Av. Eur.*, p. 21.
10.504. ALBUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 750; Audub., *B. Am.* V, Zone arctique.
p. 114, pl. 299; Ell., *l. c.*, pl^s 17, 18; *T. lagopus*,
Lin.; *lapponicus*, Gm.; *rehusak*, Bonn.; *cachin-*
naus, Reiz.; *saliceti*, Tem.; *subalpinus*, Nilss.;
brachydactylus, Gould, *B. Eur.* IV, pl^s 255, 256.
2751. Var. ALLENI, Stejn., *Auk*, 1884, p. 569; id., *Pr.* Terre-Neuve.
U. S. Nat. Mus., 1885, p. 20; Granl, *Cat.*,
p. 44.
10.505. MUTUS (Montin), *Phys. Sölsk. Hand.* I, p. 155 Montagnes de l'Europe
(1776-86); Leach, *Syst. Cat.*, p. 27; Ell., *l. c.*, et Monts Ourals.
pl^s 21, 22; Dress., *B. Eur.* V, p. 157; pl^s 477,
478; *T. lagopus*, Scop. (nec Lin.); *rupestris*,
Bechst. (nec Gm.); *alpinus*, Nilss.; Dubois, *Ois.*
Eur. II, p. et pl. 125; *vulgaris*, Vieill.; *mutans*,
Forst.; *montanus*, Brm.; *cinereus*, Macg.; *scan-*
dinavica, *meridionalis*, Sundev.
2752. Var. RUPESTRIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 751; Audub., Nord de l'Amérique et
B. Am. V, p. 122, pl. 501; *mutus*, Sw. et de l'Asie (parties
Rich.; *americanus*, Aud.; *alpinus*, Midd. arctiques), Islande.
(nec Nilss.); *islandorum*, Faber.

(1) Hybrides : *L. tetrix* + *Lagopus albus* = *lagopoides* et *lagopides*, Nilss. = *tetrici-albus*,
Coll.; *L. tetrix* + *L. scoticus* = *dicksonii*, Malm.; *L. tetrix* + *T. bonasia* = *bonasides*, Nilss.
= *bonasiotetrix*, Bogd.

2755. *Var.* REINHARDTI (Brm.), *Lehrb. Eur. Vög.*, p. 440; Groenland, Labrador.
groenlandicus, Brm., Naum., 1855, p. 287;
occidentalis, Sundev.
2754. *Var.* NELSONI, Stejn., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 91; Ile Unalaska.
id., Auk, 1884, p. 226.
2755. *Var.* RIDGWAYI, Stejn., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 89, Iles du Commandeur
 pl. 5; *insularis*, Bogd., *Consp. Av. Ross.*, p. 54. et de Behring.
2756. *Var.* ATKHENSIS, Turn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, Ile Atkha.
 p. 250.
2757. *Var.* TOWNSENDI, Elliot, Auk, 1896, p. 26. Iles Kyska et Adak.
2758. *Var.* WELCH, Brewst., Auk, 1885, p. 195. Terre-Neuve.
2759. *Var.* EVERMANNI, Elliot, Auk, 1896, p. 25, pl. 5. Ile Attu (Aléoutes).
- 10.506. HYPERBOREUS, Sundev., in *Gaim. Voy. Scand.*, All., Spitzberg.
 liv. XXXVIII, pl.; Stejn., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884,
 p. 89; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 24; *hemileucurus*,
 Gould; Dress., *B. Eur.* V, p. 179, pl. 482.
- 10.507. LEUCURUS, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. Montagnes Rocheuses,
 556, pl. 65; Audub., *B. Am.* V, p. 125, pl. 502; du Nouv.-Mex. à la
 Ell., *l. c.*, pl. 25. Colombie angl.
2760. *Var.* ALTIPTENS, Osg., Auk, 1901, p. 180. Colorado.

ORD. X. — ACCIPITRES ⁽¹⁾

FAM. I. — SERPENTARIIDÆ

1527. SERPENTARIUS

- Serpentarius*, Cuv. (1798); *Secretarius*, Daud. (1800); *Gypogeranus*, Ill. (1811);
Ophiotheres, Vieill. (1816).
- 10.508. SECRETARIUS (Scop.), *Del Faun. et Fl. Insubr.* II, Afrique S. et E.
 p. 95; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 25; *serpentarius*,
 Mill.; *reptilivorus*, Daud.; *africanus*, Shaw;
eristatus, Vieill.; *capensis*, *philippensis*, Ogilby.
2761. *Var.* GAMRIENSIS, Ogilby, *P. Z. S.*, 1855, p. 105; Sénégal, Soudan
orientalis, Verr., *P. Z. S.*, 1856, p. 552. jusqu'au Choa.

FAM. II. — CATHARTIDÆ

1528. SARCORHAMPHUS

- Sarcoramphus*, Dumér. (1806); *Gryphus*, Bonap. (1854).
- 10.509. GRYPHUS (Lin.); Tem., *Pl. Col.* 155, 408, 494; Andes, de l'Ecuador à

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* I (1874); J.-H. Gurney, *A List of the Diurnal Birds of Prey* (1884); *id.* (jun.), *Catalogue of the Birds of Prey* (1894).

- Steph., *Gen. Zool.* XIII, p. 6; *magellanicus*, la Patagonie.
 Shaw; *condor*, Shaw, *Gen. Zool.* I, p. 2, pl^s 2-4;
cuntur, Bp.
 10.510. *ÆQUATORIALIS*, Sharpe, *Cat. B.* I, p. 21; *Scl.*, *P.* Ecuador, ? Colombie.
Z. S., 1883, pl. 35; ? *gryphus*, Eyd. et Soul.,
Voy. Bonite, *Zool.*, p. 73, pl. 2.

1529. CATHARTES

- Cathartes*, Illig. (1814); *Gypagus*, Vieill. (1816); *Gyparchus*, Glog. (1842).
 10.511. *PAPA* (Lin.); Illig., *Prodr.*, p. 256; Vieill., *Gal. Ois.* Amérique tropicale.
 I, p. 11, pl. 5; Schl., *Mus. P.-B.*, *Vult.*, p. 1.

1550. CATHARISTA

- Catharista*, Vieill. (1816); *Cathartes*, Gray (1844) et auct. plur. (nec Illig.);
Coragyps, Bp. (1854); *Catharistes*, Sharpe (1874).
 10.512. *ATRATA* (Bartr.), *Trav. N. et S. Carol.*, etc., p. 289; Amérique mérid. tro-
 Wils., *Am. Orn.* IX, p. 104, pl. 75, f. 2; *aura*, pic., Amér. centr.,
 Daud. (nec Lin.); *urubu*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, États-Unis S.-E.
 pl. 11; *fatens*, Licht.; *iota*, Jard.; *brasiliensis*, Bp.

1551. RHINOGRYPHUS

- Rhinogryphus*, Ridgw. (1875); *OEnops*, Sharpe (1874); *Cathartes*, Sharpe (1899,
 nec Illig).
 10.513. *ACRA* (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 2; id., *Gal.* Amérique sept., centr.
Ois. I, p. 16, pl. 4; *iota*, Mol.; *ruficollis*, Spix; et tropic.
urbicola, *ricordi*, Des M.; *septentrionalis*, Max.;
burroviana, Sharpe.
 2762. *Var. FALKLANDICA* (Sharpe), *Ann. N. H.*, 1875, Iles Malouines ou Falk-
 p. 155; id., *Cat. B.* I, p. 27, pl. 2, f. 4; land.
aura (pt.), auct. plur.
 2765. *Var. PERNIGRA* (Sharpe), *Cat.* I, p. 26; *aura* (pt.), Guyane, Amazone, Pé-
 auct. plur.; *iota*, Cass., *U. S. Expl. Exp.*, rou.
 p. 85, pl. 4 (nec Mol.); *urubitinga*, *Scl.* et
Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 589 (nec Pelz.)
 2764. *Var. BURROVIANA* (Cass.), *Pr. Phil. Acad.*, 1843, Guyane, Amazone jus-
 p. 212; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 26; *urubi-* qu'au Mexique E.
tinga, Pelz., *Sitz. Akad. Wien.*, 1861, p. 7
 (ex Natt.); Schl., *Mus. P.-B. Vult.*, p. 4;
 Sharpe, *Cat.*, p. 28, pl. 2, f. 2; *aura*, *Scl.*
 et *Salv.* (1867-75).

1552. GYMNOGYPS

Gymnogyps, Less. (1842); *Pseudogryphus*, Ridgw. (1874).

- 10.514. CALIFORNIANUS (Shaw et Nod.), *Nat. Misc.* IX, p. 1, pl. 501; Audub., *B. Am.* I, p. 12, pl. 1; Less., *Echo du Monde sav.*, 1842, p. 1057; Gray, *Gen. B.* I, pl. 2; *columbianus*, Ord.; *vulturinus*, Tem., *Pl. Col.* 51. Californie S. et Basse-Californie.

FAM. III. — VULTURIDÆ

1553. VULTUR

Vultur, Briss. (1760); *Ægyptius*, Savig. (1808); *Polypteryx*, Hodgs. (1844).

- 10.515. MONACHUS (Lin.); Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 12; Dress., *B. Eur.* V, p. 585, pl. 521; *cinereus*, Gm.; *chincou*, *vulgaris*, *arrianus* et *niger*, Daud. Afr. N.-E., Eur. S., Asie S.-W. et centr. jusqu'en Chine.

1554. LOPHOGYPS

Vultur (pt.), auct. plur.; *Lophogyps*, Bonap. (1854).

- 10.516. OCCIPITALIS (Burch.), *Trav.* II, p. 529; Tem., *Pl. Col.* 15; Cretzschm., in *Rüpp. Atl.*, p. 55, pl. 22; *galericulatus*, Less.; *eulophus*, Ehr.; *chincou*, Strickl (nec Daud.) Afrique tropicale.

1555. OTOGYPS

Otogyps, Gray (1841); *Hemigyps*, Hodgs. (1844).

- 10.517. AURICULARIS (Daud.), *Traité*, II, p. 40; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 56, pl. 9; *auriculatus*, Shaw.; *tracheliotus*, Wolf; *ægyptius* et *imperialis*, Tem., *Pl. Col.* 407, 426; *nubicus*, H. Smith. Afrique trop., Égypte, Europe S.
- 10.518. CALVUS (Scop.), *Del. Faun. et Fl. Insubr.* II, p. 85; Gould, *B. Asia*, pt. XII, pl.; *pondicerianus*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 2; Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 15, f. 2. Inde, Indo-Chine.

1556. GYPS

Gyps, Savig. (1809).

- 10.519. FULVUS (Gm.); Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 2; Dress., *B. Eur.* V, p. 575, pl. 519, 520; *percnopterus*, Shaw et Nod.; *trencales*, Bechst.; *vulgaris*, Savig.; *leucocephalus*, Mey. et W.; *persicus*, Pall.; *albi-* Europe centr. et S., Afrique N. et N.-E.

- collis*, Linderm.; *occidentalis*, Schl.; *egyptius*, Licht.; *orientalis*, Schl.; *hispaniolensis*, Sharpe.
2765. *Var. FULVESCENS*, Hume, *Ibis*, 1869, p. 556; Afghanistan, Inde N.
Sharpe, *Cat. B.* 1, p. 7.
- 10.520. *HIMALAVENSIS*, Hume, *Rough Notes*, 1, p. 14; Jerd., Himalaya, Thibet, Tur-
Ibis, 1871, p. 255; *indicus*, Tem., *Pl. Col.* 26 kestan.
(nec Scop.); *nivicola*, Severtz.
- 10.521. *KOLBI* (Daud.), *Traité*, II, p. 15; Levaill., *Ois. d'Afr.* Afrique S.
1, p. 44, pl. 10; Schl., *Mus. P.-B. Vultures*, p. 7;
Sharpe, *Cat.* 1, p. 8, pl. 4; *fulvus* (pt.), auct.
plur.; *indicus*, Cass. (nec Scop.)
- 10.522. *RUPPELLI* (Brm.), *Naum.*, 1852, 5, p. 44; Bp., Égypte, Afrique N.-E.
Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 550; *kolbii*, et E. jusqu'au Trans-
Cretzschm., *Rüpp. Atlas*, p. 47, pl. 52; *vulgaris*, vaal, Damara.
Bp.; *magnificus*, Müll., *Beitr. Orn. Afr.*, pl. 5.
- 10.525. *INDICUS* (Scop.), *Del. Faun. et Fl. Insubr.* II, p. 85; Inde, Indo-Chine, Ma-
Jerd., *B. of Ind.* 1, p. 9; Sharpe, *Cat.* 1, p. 10; lacca.
tenuiceps, Hodgs.; *tenuirostris*, Gray, *Gen. B.* 1,
pl. 5.
2766. *Var. PALLESCENS*, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 150; Inde N.-W.
Sharpe, *l. c.*, p. 11.

1557. PSEUDOGYPS

Pseudogyps, Sharpe (1875).

- 10.524. *BENGALENSIS* (Gm.), *S. N.* 1, p. 245; Gray, *Ill. Ind.* Inde, Indo-Chine, Ma-
Zool., pl. 15, f. 1; *leucocephalus*, var. β , Lath.; lacca.
Levaill., *Ois. d'Afr.* 1, p. 50, pl. 11; *changoun*,
Daud.; *leuconotus*, Gray, *l. c.*, pl. 14; *indus*, Less.
- 10.525. *AFRICANUS*, Salvad., *Not. Stor. R. Accad. Torino*, Afrique tropicale.
1865, p. 155; Sharpe, *l. c.*, p. 12; Du Boc., *Orn.*
Angola, p. 1, pl. 9; *bengalensis* (pt.), Rüpp.,
Brm., Hengl.; *moschatus*, Wurtl., *Naum.*, 1857,
p. 452 (*descr. nulla*); *indicus*, Hartl.; *tenui-*
rostris, Antin.

1558. NEOPHRON

Neophron, Savig. (1808); *Pernopterus*, Steph. (1825); *Necrosyrtes*, Glog. (1842);
Gypiscus, Sundev. (1873).

- 10.526. *PERNOPTERUS* (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 522; Afrique, Europe S.,
fuscus, Bodd.; *leucocephalus*, Gm.; *stercorarius*, Asie S.-W.
La Peyr.; *albus*, Daud.; *meleagris*, Pall.; *melea-*
grides, Tem.; *egyptiacus*, Steph.; *europæus*,
capensis, Brm.

2767. *Var. GINGINIANA* (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 7; Blyth, Inde.
Ibis, 1866, p. 233; *percnopterus* (pt.), auct.
 plur.
- 10.527. *MONACHUS* (Tem.), *Pl. Col.* 222; Sharpe, *l. c.*, Afrique tropicale.
 p. 19; *pileatus* (pt.), auct. plur.
2768. *Var. PILEATA* (Burch.), *Trav.* II, p. 193 (*Vultur* Afrique S.
pileatus); Sharpe, *l. c.*, p. 18; *earuncula-*
tus, Smith.

FAM. IV. — FALCONIDÆ

SUBF. I. — GYPÆTINÆ

1559. GYPÆTUS

Gypætus, Storr. (1784); *Gyptus*, Dumér. (1806); *Phene*, Savig. (1809).

- 10.528. *BARBATUS* (Lin.); Naum., *Vög. Deutschl.* I, pl^s 5, 6; Europe centr. et mérid.
 Dub., *Ois. Eur.* I, pl^s 5 et 5^a; Dress., *B. Eur.* V, (montagnes), Asie
 p. 401, pl^s 525-528; *magnus*, *barbarus*, Gm.; centr., Himalaya,
grandis, Storr; *aureus*, *alpinus*, *castaneus*, Chine N.
 Daud.; *leucocephalus*, *melanocephalus*, Mey. et
 W.; *ossifraga*, Vieill. (nec Savig.); *hemalacha-*
nus, Hut.; *subalpinus*, *altaicus*, Gebl.; *occiden-*
talis, Schl.; *orientalis*, Blyth.
2769. *Var. ATLANTIS*, Erl., *J. f. O.*, 1898, p. 595, pl^s 4, Maroc, Algérie, Tuni-
 5; *barbatus* (pt.), auct. plur.; *meridionalis*, sie.
 Keys. et Bl.; *occidentalis*, Tacz.
2770. *Var. OSSIFRAGA* (Savig.), *Ois. d'Égypte*, p. 245; Afrique N.-E., E. et S.
 Sharpe, *Cat.* I, p. 250; *barbatus* (pt.), auct.
 plur.; *meridionalis* (pt.), auct. plur.; Rüpp.,
Syst. Uebers., p. 9, pl. 1; *nudipes*, Brm.

SUBF. II. — GYPOHIERACINÆ

1540. GYPOHIERAX

Gypohierax, Rüpp. (1855); *Racama*, Gray (1840).

- 10.529. *ANGOLENSIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 252; Gray, *Gen. B.* Afrique tropicale.
 I, pl. 4; *hypoleucus*, Benn.; *Jard. et Sel.*, *Ill.*
Orn., sér. 2, pl. 15.

SUBF. III. — POLYBORINÆ

1541. POLYBORUS

Polyborus, Vieill. (1816); *Caracara*, Less. (1851).

- 10.550. *THARUS* (Mol.), *Saggio St. Nat. Chil.*, p. 264; Amérique mérid., de Strickl., *Orn. Syn.*, p. 18; Sharpe, *Cat.* I, p. 51; l'Amazonie à Magellan.
plancus, brasiliensis, Gm.; Sw., *Zool. Ill.*, sér. 2, pl. 2; *cheriway*, Lath. (nec Jacq.); *vulgaris*, Spix; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 25, pl. 7; *caracara*, Gr.
- ✓ 10.551. *CHERIWAY* (Jacq.), *Beitr.*, p. 17, pl. 4 (1784); Cab., S. des États-Unis, Calif., Amér. centr., *Schomb. Reis. Guin.* III, p. 741; *brasiliensis*, Colombie, Ecuador, Audub., *B. Am.* I, p. 21, pl. 4; *tharus*, Cass. Vénézuéla, Guyane, (1855); *auduboni*, Cass. (1865). Trinidad, Cuba.
2771. *Var. PALLIDA*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 8. Iles Tres-Marias.
- 10.552. *LUTOSUS*, Ridgw., *Bull. U.S. Geol. Surv.* I, p. 489; Guadeloupe (Californie).
id., *Orn. of Guadeloupe Isl.*, p. 192.

1542. IBYCTER

- Ibycter*, *Daptrius*, Vieill. (1816); *Gymnops*, Spix (1824); *Phalcobænus*, Lafr. (1845); *Senex*, Gray (1859); *Aetriorchis*, Kaup (1844); *Helotriorchis*, Rehb. (1850).
- 18.555. *ATER* (Vieill.), *Anal.*, p. 22; *id.*, *Gal. Ois.*, pl. 5; Guyane, Brésil, Amazonie, Ecuador.
 Sw., *Classif. B.* II, p. 209; *aterrimus*, Tem., *Pl. Col.* 57, 542; Burm., *Th. Bras.* II, p. 59; ? *fasciatus*, Spix (juv. ?)
- 10.554. *AMERICANUS* (Bodl.), *Tabl. Pl. Ent.*, p. 25; *Pl. Ent.* 417; Schl., *Mus. P.-B., Polyb.*, p. 9; Sharpe, Colombie jusqu'au *Cat.* I, p. 55; *aquilinus*, Gm.; *formosus*, Lath.; Guatémala et l'Honduras.
nudicollis, Daud.; Burm., *Th. Bras.* II, p. 57.
- 10.555. *MEGALOPTERUS* (Meyen), *Beitr.*, p. 64, pl. 7; Tsch., Pérou, Chili, Bolivie (Andes).
Fauna Per., pp. 16, 78; Schl., *l. c.*, p. 4; *montanus*, d'Orb., *Voy. Am. mér., Ois.*, p. 51, pl. 2; *crassirostris*, Pelz.; ? *gymnocephalus*, d'Orb., *Voy.*, p. 50.
- 10.556. *ALBIGULARIS* (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 9; Darw., Patagonie.
Voy. Beagle, B., p. 15, pl. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 57.
- 10.557. *CARUNCULATUS* (Des M.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, Colombie, Ecuador.
 p. 154; Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 81; *id.*, *Ibis*, 1861, p. 19, pl. 1.
- 10.558. *AUSTRALIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 259; Gr. in Jard. et Iles Malouines ou Falkland.
 Sel., *Ill. Orn.*, sér. 2, pl. 24; *novæ-zealandiæ*, Cuv.; Tem., *Pl. Col.* 192, 224; *antarcticus*, Less.;

brasiliensis, King; *leucurus*, Darw.; *plancus*, Forst.

1543. MILVAGO

Milvago, Spix (1824).

- 10.539. CHIMACHIMA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 239; d'Orb., *Brésil, Amaz., Guyane*,
Voy. Ois., p. 65; Schl., *l. c.*, p. 5; *crotophagus*, Vénézuéla, Colom-
Max.; *degener*, Licht.; *ochrocephalus*, Spix, *Av.* bie, Panama.
Bras. I, p. 12, pl. 5; *strigilatus*, Spix, *l. c.*,
p. 10, pl. 4.
- 10.540. CHIMANGO (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 260; Gray, *Gen.* Amér. mérid. du 20° l.
B. I, pl. 5; Schl., *l. c.*, p. 6; *pezopora*, Meyen. S. à la Terre de Feu.

SUBF. IV. — CIRCAËTINÆ

1544. HERPETOTHERES

Herpetotheres, Vieill. (1817); *Cachinna*, Flem. (1822); *Macagua*, Less. (1831).

- 10.541. CACHINNANS (Lin.); Spix, *Av. Bras.* I, p. 8, pl. 5^a; Amérique centr. et
Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 26; Vieill., *Gal.* mérid., du S. du
Ois. I, p. 47, pl. 19; Sharpe, *Cat.* I, p. 278; Mexique au Para-
Cachinna herpetotheres, Gray. guay.

1545. CIRCAËTUS

Circuëtus, Vieill. (1816).

- 10.542. GALLICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 293; Vieill., *N. Dict.* Europe mér. et centr.,
VII, p. 157; Dubois, *Fnc. ill. Vert. Belg., Ois.* I, Afrique N. et N.-E.,
p. 22, pl. 5; Dress., *B. Eur.* V, p. 563, pl. 549, Asie centr.
550; *leucamphomma*, Bek.; *leucopsis*, Bechst.;
brachydactyla, Wolf; *anguium, meridionalis*,
Brm.
2772. Var. HYPOLEUCA (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* I, Inde, Chine, au S. jus-
p. 554; *gallicus* (pt.), auct. plur.; Dav. et qu'aux îles de la
Oust., *Ois. Chine*, p. 21; *orientalis*, Brm. Sonde.
- 10.543. CINEREUS, Vieill., *N. Dict.* XXIII, p. 443; id., *Gal.* Afrique tropicale.
Ois., pl. 12; Schl., *Mus. P.-B., Buteones*, p. 23;
pectoralis, Smith; *thoracicus*, Less.; *funereus*,
Rüpp., *Neue Wörb., Vög.*, p. 551, pl. 14.
- 10.544. BEAUDOUINI, Verr. et Des M., *Ibis*, 1862, p. 212, Sénégal, Afrique
pl. 7; Schl., *l. c.*, p. 23; *fasciatus*, Heugl. (descr. N.-E.
nulla).
- 10.545. FASCIOLATUS, Gray, *Cat. Accipitr.*, p. 18; Ayres, Natal.
Ibis, 1862, p. 53, pl. 3; Sharpe, *Cat.* I, p. 283.

- 10.546. CINERASCENS, Müll., *Naum.*, 1851, p. 27; id., *Beitr. Vög. Afr.*, Lief. 2, pl. 6; *zonurus*, Würt.; Heugl., *Ibis*, 1860, p. 410, pl. 15; *melanotis*, Verr., in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 7. Afrique tropicale.

1546. SPILORNIS

Hæmatornis, Vig. (1850, nec Sw.); *Spilornis*, Gray (1840); *Ophoaëtus*, Jerd. (1844).

- 10.547. CHEELA (Lath.), *Ind. Orn.* 1, p. 14; Schl., *Mus. P.-B.*, *Buteones*, p. 25; Bp., *Consp.* 1, p. 17; *undulatus*, Vig.; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 1; *nipalensis*, Hodg.; *orientalis*, Gurn.; *hoya*, Swinh. Himalaya, Inde.
2775. Var. ALBIDA (Tem. ex Cuv.), *Pl. Col.* 19; *melanotis*, Jerd., *Madr. Journ.*, 1844, p. 165; Sharpe, *Cat.* 1, p. 289 (pt.); *spilogaster*, Blyth; Legge, *B. Ceyl.*, p. 61. Inde S., Ceylan.
2774. Var. RUTHERFORDI, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 85; *melanotis* (pt.), Sharpe, *l. c.* Assam, Indo-Chine, Aïnan.
2775. Var. DAVISONI, Hume, *Str. Feath.*, 1875, pp. 505, 422; *melanotis* (pt.), Sharpe, *l. c.* Iles Andaman.
- 10.548. MINIMUS, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 464. Iles Nicobar.
- 10.549. PALLIDUS, Wald., *Ibis*, 1872, p. 565; Sharpe, *l. c.*, p. 290, pl. 9. Bornéo.
- 10.550. BACHA (Daud.), *Traité*, II, p. 45; Levaill., *Ois. d'Afr.* 1, p. 69, pl. 15; Schl., *Valk Vog.*, pl. 22; *bido*, Horskf., *Tr. Linn. Soc.*, 1822, p. 157. Philippines, Malacca, Java, Sumatra.
- 10.551. ELGINI (Tytl.), *J. A. S. B.*, 1865, p. 87; Hume, *Str. Feath.* II, p. 144. Iles Andaman, Nicobar.
- 10.552. RAJA, Sharpe, *Bull. Br. Orn. Club*, 1, p. 4. Sarawak (Bornéo).
- 10.555. SALVADORI, Berl., *Nov. Zool.* II, p. 75. Ile Nias.
- 10.554. RUFIPLECTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 222; id., *B. As.*, pt. XII, pl.; Schl., *Valk Vogels*, pp. 57, 72, pl. 25, ff. 4-5; *celebensis*, Schl. Célèbes.
- 10.555. SULAENSIS (Schl.), *Valk Vog.*, pp. 58, 72, pl. 25, ff. 4-6; Wald., *Ibis*, 1868, p. 16. Iles Soula.
- 10.556. HOLOSPIUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1850-51, p. 96; Gray, *Cat. Accipitr.*, p. 10; id., *Gen. B.* I, pl. 7; Schl., *Mus. P.-B.*, *Buteones*, p. 28. Philippines.
- 10.557. PANAYENSIS, Steere, *List Birds and Mam. Philipp.*, p. 7. Panay, Guimaras, Negros (Philipp.)
- 10.558. ASTURINUS, Mey., *S. B. Ges. Isis, Dresden*, p. 1884, p. 15. ?

1547. PITHECOPHAGA

Pithecophaga, O. Grant (1896).

- 10.559. JEFFERYI, Grant, *Bull. B. O. Club*, VI, p. 17; id., *Ibis*, 1897, pl. 5. Samar (Philippines).

1548. DRYOTRIORCHIS

Dryotriorchis, Shell. (1874).

- 10.560. *SPECTABILIS* (Schl.), *Nederl. Tijdschr.* I, p. 15, Afrique W.
pl. 6; Shell., *Ibis*, 1874, p. 91; Gurn., *P. Z. S.*,
1880, p. 621, pl. 58.

1549. EUTRIORCHIS

Eutriorchis, Sharpe (1875).

- 10.561. *ASTUR*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1875, p. 70, pl. 13; M.-
Edw. et Grand., *Ois. Madag.* I, p. 31, pl^s 9^b, 9^c.

1550. HELOTARSUS

Helotarsus, Smith (1850); *Terathopius*, Less. (1851).

- 10.562. *ECAUDATUS* (Daud.), *Traité*, II, p. 54; Levaill., *Ois.* Toute l'Afrique au S.
d'Afr. I, p. 51, pl^s 7, 8; Des M., *Voy. Abyss.*, du Sahara.
p. 66, pl. 11; Sharpe, *Cat.* I, p. 500; *typus*,
Smith; *leuconotus*, Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 10;
brachyurus, Brm.; *brevicaudatus*, Pelz.; *var.*
fasciatus, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 81.

SUBF. V. — GYMNOGENYNÆ

1551. GYMNOGENYS

Polyboroides! Smith (1850); *Gymnogenys*, Less. (1851).

- 10.563. *RADIATUS* (Scop.), *Del. Faun. et Fl. Insubr.* II, p. 85; Madagascar.
Kp., *Mus. Senck.* III, p. 260; Sharpe, *Cat.*, p. 48;
madagascariensis, Daud.; Less., *Traité*, p. 64;
gymnogenys, Tem., *Pl. Col.* I, pl. 507.
10.564. *TYPICUS* (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl^s 81, 82; Sharpe, Afrique trop.
Cat., p. 48; *melanostictus*, Licht.; *radiatus* (pt.),
auct. plur.; *malzacii*, Verr., *Rev. et Mag. de*
Zool., 1855, p. 549, pl. 13.

SUBF. VI. — CIRCINÆ

1552. CIRCUS

Circus, Lacép. (1806); *Pygargus*, Koch (1816); *Strigiceps*, Bp. (1851); *Glaucopteryx*, Kp. (1844); *Spizacercus*, Kp. (1845); *Spilocircus*, Kp. (1847); *Pterocircus*, Kp. (1850).

- 10.565. *CYANEUS* (Lin.); Gould, *B. Eur.* I, pl. 55; Dubois, Europe et Asie au S.
Fne. ill. Vert. Belg., *Ois.* I, p. 87, pl. 20; *griseus*, du 60°1. N., Afrique

- Gm.; *gallinarius*, Savig.; *variabilis*, Pall.; *variegatus*, Vieill.; *dispar*, Koch; *agithus*, Leach; *strigiceps*, Nilss.; *pygargus*, Naum.; *nigripennis*, *pallens* et *cinereus*, Brm. N. et N.-E.
- ✓ 10.566. HUDSONIUS (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl^s 8, 9; Sharpe, *Cat.*, p. 55; *fuliginosus*, Gm.; *europogistus*, Daud.; *variegatus*, *uliginosus*, Vieill.; *cyaneus*, Audub., *B. Am.*, pl. 556; *var. americanus*, Sw. et Rich., *F. Bor.-Am.*, p. 55, pl. 29. Amérique, du 55° l. N. à Panama, îles Bahama, Cuba.
- 10.567. MACRURUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 269; Dubois, *l. c.* 1, p. 90, pl. 21; *swainsoni*, Smith; Dress., *B. Eur. V.*, p. 441, pl. 550; *superciliaris*, Smith; *albescens*, Less.; *pallidus*, Syk.; *dalmatinus*, Rüpp.; *aquipar*, Puch.; *desertorum*, Brm. Europe et Asie, entre le 51° et le 10° l. N., Afrique.
- 10.568. CINERARIUS (Mont.), *Tr. Linn. Soc.*, 1808, p. 188; Dubois, *l. c.* 1, p. 95, pl. 22; ? *pygargus*, Lin.; Sharpe, *Cat.*, p. 64; *ater* et *montagui*, Vieill.; *cineraceus*, Tem.; Dress., *B. Eur. V.*, p. 425, pl. 528; *cinerascens*, Steph.; *nipalensis*, Hodgs.; *pratorum*, *elegans*, Brm. Europe tempérée, Asie centr. et mérid., Afrique.
- 10.569. MAURUS (Tem.), *Pl. Col.* 461; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 58; *lalandii*, Smith; *ater*, Gray. Afrique S.
- 10.570. CINEREUS, Vieill., *N. Dict.* IV, p. 454; Sharpe, *Cat.*, p. 56; *campestris*, Bonn. et V.; *histrionicus*, Quoy et G., *Voy. Uranie*, p. 95, pl^s 15, 16; *poliopterus*, Cab. in *Tsch. Faun. Per.*, p. 115, pl. 5. S. de l'Amérique mérid. jusqu'au 15° l. S. environ, Malouines.
- 10.571. MACULOSUS (Vieill.), *Ois. Am. sept.*, pl. 5^{bis}; *macrop-terus*, *albicollis* et *leucophrys*, Vieill., *N. Dict.* IV, pp. 456, 458, 464; *palustris*, Tem., *Pl. Col.* 22; *superciliosus*, Less.; *megaspilus*, Gould; Gray, *Gen. B.*, pl. 11. Amérique mérid.
- 10.572. MELANOLEUCUS (Forst.), *Ind. Zool.*, p. 12, pl. 11; Vieill., *N. Dict.* IV, p. 465; Jerd., *B. Ind. I.*, p. 98; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 155, pl. 52 (Tchong). Asie or., de Sibérie E. à l'Indo-Chine, Inde E., Ceylan.
2776. Var. PHILIPPINENSIS, Steere, *List. B. and Mam. Phil.*, p. 7. Philippines.
- 10.575. MAILLARDI, Verr., in *Mail.*, *L'île de la Réunion*, II, p. 12; Sel., *Ibis*, 1865, p. 163, pl. 4. Îles de la Réunion et Comores.
2777. Var. MACROSCALES, A. Newt., *P. Z. S.*, 1865, p. 186; id., *Ibis*, 1865, p. 557; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.* I, p. 90, pl^s 27, 28, 29^b, f. 2, 29^c, f. 2. Madagascar.
- 10.574. WOLFI, Gurn., *P. Z. S.*, 1865, p. 825, pl. 44; id., *Ibis*, 1875, p. 421; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 72; *gouldi* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 72. Nouv.-Calédonie, îles Fidji.
- 10.575. APPROXIMANS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 64; Australie S. et E.,

- Gurn., *Ibis*, 1870, p. 556, 1875, p. 225; *assimilis*, Gould, *B. Austr.* 1, pl. 26 (nec J. et S.); *gouldi*, Bp.; Sharpe, *Cat.*, p. 72 (pt.) Nouv.-Zélande.
- 10.576. *SPILOTHORAX*, Salvad. et D'Alb., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1875, p. 807; Salvad., *Orn. Pap.* 1, p. 71. Nouv.-Guinée S.-E.
- 10.577. *SPILONOTUS*, Kaup, *Contr. Orn.*, 1850, p. 59; Swinh., *Ibis*, 1865, p. 215, pl. 5. Sibér. E., Chine, Indo-Chine, arch. Malais.
- 10.578. *ERUGINOSUS* (Lin.); Savig., *Ois. d'Egypte*, p. 90; Dress., *B. Eur.* V, p. 415, pl^s 526, 527; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 50; *rufus*, Gm. (ex Briss.); Dubois, *Fne. ill.*, *Ois.* 1, p. 84, pl. 49; *arundinaceus*, Bechst.; *Ac. circus*, Pall.; *variegatus*, Syk.; *aquaticus*, Brm.; *sykesii*, Less. Europe jusqu'au 60°, Asie jusqu'au 52° l. N., Japon, Formose, Philippines, Afrique N. et N.-E.
2778. *Var.* *UNICOLOR*, Radde, *Orn. Cauc.*, p. 106, pl. 3; *abdulla*, Floer., *Orn. Monatsb.* IV, p. 155. Caucase.
- 10.579. *RANIVORUS* (Daud.), *Traité*, II, p. 170; Cuv., *Rég. an.* 1, p. 558; Levaill., *Ois. d'Afr.* 1, pl. 25; *levaillanti*, Sm.; *pygargus*, Kp. (nec Lin.) Afrique S.
- 10.580. *HUMBLLOTI*, M.-Edw. et Grand., *Ois. Madag.* 1, p. 747, pl^s 29^a, 29^b, f. 1, 29^c, f. 1. Iles Comores.
- 10.581. *ASSIMILIS*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* 1, 1826, pl. 51; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pp. 29, 67, pl. 20, ff. 2, 5; *jardinii*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 141; id., *B. Austr.* 1, pl. 27. Australie E. jusqu'au Cap York, Célèbes.

SUBF. VII. — ACCIPITRINÆ

1555. MICRASTUR

- Brachypterus*, Less. (1856, nec Kugel; *Carnifex*, Less. (1842, nec Sundev.); *Micrastur*, Gray (1841); *Climacocercus*, Cab. (1845); *Rhynchomegas*, Bp. (1854).
- 10.582. *MELANOLEUCUS* et *semitorquatus* (Vieill.), *Nouv. Dict.* X, p. 522; Gurn., *Ibis*, 1879, p. 171 (en note); *leucomelas*, Licht.; *brachypterus*, Tem., *Pl. Col.* 116, 141; *naso*, Less.; *percontator*, Cabot. Amérique centrale et mérid.
- 10.583. *AMAUROS*, Gurn., *Ibis*, 1879, p. 171; id., *List of Diurn. B. of Prey*, p. 24. De Panama à l'Ecuador.
- 10.584. *MIRANDOLLEI* (Schl.), *Ned. Tijdschr.*, 1865, p. 151; id., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 27; *microrhynchus*, Pelz., *Reis. Nov. Vög.*, p. 11. Guyane, Amazone.
- 10.585. *GUERILLA*, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1848, p. 87; id., *Journ. Phil. Acad.* 1, pl. 40; Sharpe, *l. c.*, p. 79; *concentricus*, Schl., *P. Z. S.*, 1856, p. 285; *gilvicollis* et *xanthothorax*, Schl. (1859). Amérique centr. jusqu'à l'Ecuador.

2779. *Var. JUGULARIS*, Gurn., *List of Diurn. B. of Prey*, pp. 25, 118. Brésil, Vénézuéla, Colombie.
- 10.586. *RUFICOLLIS* (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 522; Cab., *J. f. O.*, 1865, p. 40; *leucauchen*, Tem., *Pl. Col.* 36; *xanthothorax*, Tem., *l. c.*, pl. 92; Burm., *Th. Bras.* II, p. 85. Guyane, Vénézuéla, Brésil, Amazone.
- 10.587. *ZONOTHORAX* (Cab.), *J. f. O.*, 1865, p. 406; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 566; Ridgw., *Pr. Ac. N. S. Phil.*, 1875, p. 489. Colombie, Vénézuéla.
- 10.588. *GILVICOLLIS* (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 525; Pelz., *Reis. Nov. Vög.*, p. 10; id., *Orn. Bras.*, pp. 7, 599; *concentricus*, Less.; *pelzelni*, Ridgw. Brésil, Amazone, Colombie, Pérou.

1554. GERANOSPIZIAS

- Ischnosceles*, Strickl. (1844, nec Burm.); *Geranospiza*, Kp. (1847); *Geranopus*, Kp. (1850); *Geranospizias*, Sundelev. (1872).
- 10.589. *CÆRULESCENS* (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 518; Sharpe, *Cat. B.*, p. 81 (pt.); *hemidactylus*, Tem., *Pl. Col.* 5; Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 55. Amérique mérid. trop.
2780. *Var. GRACILIS* (Tem.), *Pl. Col.* 91; Burm., *Th. Bras.* II, p. 124; Ridgw., *Cat. Falc. Bost. Mus.*, p. 45. Brésil E., Paraguay.
- 10.590. *NIGER* (Du Bus), *Bull. Acad. R. Brux.* XIV, 1847, p. 102; id., *Esq. Orn.*, pl. 16; *aterrimus*, Licht.; *gracilis et caeruleus*, Scl. (1856-59). Amérique centr., du Mex. S. à Panama.

1555. UROTRIORCHIS

- Urotriorchis*, Sharpe (1874); *Astur* (pt.), auct. plur.
- 10.591. *MACRURUS* (Hartl.), *J. f. O.*, 1855, p. 555; Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 25; Sharpe, *Cat. B. I.*, p. 85. Afrique W.

1556. MELIERAX

Melierax, Gray (1840).

- 10.592. *CANORUS* (Risl.), in *Thunb. Diss. Ac.* III, 1799, p. 264; Fch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 92; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 117, pl. 27; *musicus*, Daud.; Schl., *l. c.*, p. 20; *cantans*, Kp. Afrique E.
- 10.595. *POLIOPTERUS*, Cab., in *v. d. Decken's Reis.* III, p. 40; Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 505; *somaliensis*, Neum., *Orn. Mon.*, 1897, p. 192. Afrique E., du Kilima-Ndjar au Somalil.
- 10.594. *POLYZONUS* (Rüpp.), *Neue Wirbelth.*, p. 56, pl. 15; id., *Syst. Uebers.*, p. 12; *musicus* (pt.), Vig., Horsf., Moore, Hartl. (1857). Afrique N.-E., Soudan, Séné gamb., Arab. S.

2781. *Var. MECHOWI*, Cab., *J. f. O.*, 1882, p. 229; Angola, Damara jus-
Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, p. 27. qu'au Mashonaland.
2782. ? *Var. METABATES*, Heugl., *Ibis*, 1861, p. 72; id., Nil Blanc.
Orn. N.-O. Afr. I, p. 65.
- 10.595. GABAR (Daud.), *Traité*, II, p. 87; Levaill., *Ois. Afrique, sauf la région*
d'Afr. I, p. 156, pl. 55; Schl., *l. c.*, p. 48; Du occid.
Boc., *Orn. Angola*, p. 15; *leucorrhous*, Bonn. et
V.; *erythrorhynchus*, Sw.; *niloticus*, Sund.;
sphenurus, Strickl. (juv.); *gabarinus*, Bp.; *micro-*
nisus, Beaum.
- 10.596. NIGER (Bonn. et V.), *Enc. méth.* III, p. 1269; Vieill., Afrique, sauf la région
Gal. Ois. I, pl. 22; Lay., *B. S. Afr.*, p. 51; id., occid.
éd. Sharpe, p. 20; Du Boc., *Orn. Ang.*, p. 55;
carbonarius, Licht.; *maurus*, Rüpp.; *mitopus*,
Heugl., *J. f. O.*, 1861, p. 129.

1557. ASTURINULA

- Kaupifalco!* Bp. (1854); *Asturinu*l, Fch. et Hartl. (1870).
- 10.597. MONOGRAMMICA (Tem.), *Pl. Col.* 514; Sw., *B. W. Afrique trop.*
Afr. I, pl. 4; Schl., *l. c.*, p. 24; Sharpe, *Cat.*,
p. 275.
2785. *Var. MERIDIONALIS* (Hartl.), *P. Z. S.*, 1860, p. 109; Afrique S.
monogrammicus (pt.), auct. plur.

1558. ASTUR

Astur, Lacép. (1801); *Dædalion*, Savig. (1809); *Sparvius*, Vieill. (1816); *Tachy-*
spiza, *Lophospiza*, Kp. (1844); *Nisastur*, Blyth (1844); *Scelopspiza*, Kp.
(1847); *Erythrospiza*, Kp. (1867); *Lophospizias*, *Urospizias*, etc. Sund. (1872).

a. *Astur*.

- 10.598. PALUMBARIUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, p. 587, Europe et Asie centr.
pl. 554; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 76, jusqu'au 60° l. N.,
pl. 17; *incertus*, *marginatus*, Lath.; *albescens*, au S. jusqu'à l'Himal.
Bodd.; *dubius*, Sparrm.; *gallinarius*, *nævius*, et la Corée, Afr. N.
Gm.; *astur*, Pall.; *indicus*, Hodgs.
- 10.599. HENSTI, Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev. Accipitr.*, p. 62 Madagascar.
(1875); Sharpe, *Cat.*, p. 97; M.-Edw. et Grand.,
H. Madag. Ois. I, p. 98, pl. 50.
- 10.400. CANDIDISSIMUS, Dybowski, *Bull. Soc. Zool. de France*, Kamtschatka.
1885, p. 555, 1884, p. 149.
- 10.401. ATRICAPILLUS (Wils.), *Am. Orn.* VI, pl. 52, f. 5; Amérique du Nord.
regalis, Tem., *Pl. Col.* 495; *palumbarius*, Sw. et
Rich. (nec Lin.); Aud., *B. N. Am.*, fol. pl. 144;
pictum, Less.
2784. *Var. STRIATULA*, Ridgw., *B. N. Am.*, p. 240. Amérique N.-W.

β. *Lophospizias*.

- 10.402. TRIVIRGATUS (Tem.), *Pl. Col.* 505; Schl., *l. c.*, *Astures*, p. 22; Sharpe, *Cat.*, p. 105; *cristatus*, Gray; *indicus*, Hodgs. Inde, Ceylan, archipel Malais, Formose, Haïnan.
2785. Var. RUFITINCTA, McClell., *P. Z. S.*, 1859, p. 155. Himal. E., Indo Chine.
- 10.405. GRISEICEPS, Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 25; Wall., *Ibis*, 1864, p. 184, pl. 5; Schl., *Vog. Ned. Ind. Valkr.*, pp. 19, 58, pl. 11, ff. 1, 2; *tenuirostris*, Brügg. (juv.) Célèbes.

γ. *Scelospizias*.

- 10.404. FRANCESI (Smith), *S. Afr. Q. Journ.* II, p. 280; Kaup, *Isis*, 1847, pp. 175, 566; *francisea*, Bp.; var. *typicus*, M.-Edw. et Grand., *II. Madag.*, *Ois.* I, p. 99, pl^s 51, 52, f. 1; *madagascariensis*, Hartl., *Faun. Madag.*, p. 20. Madagascar.
2786. Var. PUSILLA (Gurn.), *Ibis*, 1875, p. 558; *francesi*, Schl., *Ibis*, 1864, pl. 7. Iles Comores.
- 10.405. BRUTUS (Poll.), *Ned. Tijdschr.*, 1866, p. 80; Schl. et Poll., *Faun. Madag.*, *Ois.*, p. 58, pl. 12, f. 2; Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev. Acc.*, p. 95; Sharpe, *Cat.*, p. 107. Ile Mayotte (Comores).
- 10.406. POLYZONOIDES (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 11; Du Boc., *Orn. d'Angola*, p. 19; *badius*, Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 81 (nec Gm.) Afrique S. jusqu'au Nyassaland au N.
- 10.407. ?TIBIALIS, Verr., *J. f. O.*, 1861, p. 100; Sharpe, *Cat.* I, p. 108; *hartlaubi*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1871, p. 615 (nec Verr.) Afrique W.
- 10.408. BUTLERI, Gurn. jun., *Ibis*, 1898, pp. 290, 515. Ile Car Nicobar.
- 10.409. RADIUS (Gm.), *S. N.* I, p. 280; Kp., *Isis*, 1847, p. 190; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 48; *brownii*, Shaw; *dassumieri*, Tem., *Pl. Col.* 508, 556; *dukhunensis*, Syk.; *scutarius*, *fringillaroïdes*, Hodgs.; *bifasciatus*, Peale.
2787. Var. POLIORSIS (Hume), *Str. Feath.*, 1874; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 24; *badius* (pl.), Schl. (1864), Swinh. (1870-71). Indo-Chine, Haïnan, Formose.
2788. Var. CENCHROIDES, Severtz., *Turk. Jevotr.*, p. 65; id., *Ibis*, 1875, p. 104; Blanford, *Zool. and Geol. E. Persia*, p. 108; Bild., *Ibis*, 1881, p. 40. Asie centr., Belouchistan.
2789. Var. SPHENURA (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 42 (*sphenurus*); id., *Syst. Uebers.*, pp. 6, 11, pl. 2; *brachydactylus*, Sw.; *ruppellii*, Kp.; *hybris*, Licht.; *polioparejus*, *guttatus*, Heugl., *J. f. O.*, 1861, pp. 428, 450. Afrique N.-E., et du Soudan à la Sénégalie.

- 10.410. *BREVIPES* (Severtz.), *Bull. Soc. I. Nat. Mosc.*, 1850, Europe S.-E., Pales-
p. 254, pl^s 1-5; Tristr., *Ibis*, 1865, p. 260; Dress., tine, Égypte.
B. Eur. V, p. 655, pl^s 559, 560; *gurneyi*, Bree;
badius, auct. plur. (nec Gm.)
- 10.411. *TACHIRO* (Daud.), *Traité*, II, p. 90; Tem., *Pl. Col.* Afrique S.-E.
577, 420; Schl., *l. c.*, p. 46; *polyzonus*, Less.;
Des M., *Icon. Orn.*, pl. 61.
2790. *Var. UNDULIVENTER* (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 40, Afrique N.-E.
pl. 18, f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 67;
tachiro (pt.), Sharpe, *Cat.* I, p. 99.
2791. *Var. SPARSINFASCIATA*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, Ile Zanzibar.
1895, p. 97.
2792. *Var. CASTANILIA* (Bp.), *Rev. Zool.*, 1855, p. 578 Afrique W.
(*castanilius*); Schl. et Salv., *Exot. Orn.*,
pl. 18; *macroscelides*, Hartl.; Sharpe, *Cat.*,
p. 100, pl. 5; *zonarius*, Hartl.
- 10.412. *TOUSSENELI* (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, Afrique W.
p. 558; Sharpe, *Cat. B.* I, p. 101, pl. 6, f. 1.

δ. *Erythrospizias*.

- 10.415. *TRINOTATUS* (Bp.), *Consp.* I, p. 55; Schl., *Mus.* Célèbes N.
P.-B., *Astures*, p. 45; id., *Vog. Ned. Ind. Falkr.*,
pp. 27, 65, pl. 19, ff. 1-5; Sharpe, *Cat.*, p. 101;
Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 4.
2795. *Var. HÆSITANDA* (Hartl.), *Nov. Zool.* III, p. 162. Célèbes S.

ε. *Tachyspizias*.

- 10.414. *SOLOENSIS* (Lath.), *Gen. Hist.* I, p. 209; Sharpe, Chine, Indo-Chine,
Cat. I, p. 114, pl. 4, f. 1; Schl., *l. c.*, p. 44; Malacca, Moluques
cuculoides, Less. (nec Tem.); *minutus*, Less.; et les îles Indo-
badius et *virgatus* (pt.), Swinh. malaises.
2794. ? *Var. CUCULOIDES* (Tem.), *Pl. Col.* 110, 129; Chine S. jusqu'à l'ar-
Sharpe, *Cat.*, p. 115, pl. 4, f. 2; Dav. et chipel Indo-malais.
Oust., *Ois. Chine*, p. 24; *soloensis*, Salvad.,
Orn. Pap. I, p. 66.

1559. *LEUCOSPIZIAS*

Leucospiza, Kaup (1844); *Leucospizias*, Sundev. (1872).

- 10.415. *NOVÆ-HOLLANDIÆ* (Gm.), *S. N.* I, p. 264; Gould, B. Australie S. et E.,
Austr. I, pl. 15; *albus*, White; *clarus*, Lath.; Tasmanie.
niveus, Vieill.; *candidum*, Less.; *leucæetus*, Forst.
2795. *Var. LEUCOSOMA* (Sharpe), *Cat.* I, p. 119 (*leucoso-* Nouv.-Guinée, Wai-
mus); Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 42; *novæ-hol-* giou.

- landiae* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, pp. 49, 58, pl. 11, f. 5, et auct. plur. (nec Gm.)
- 10.416. CINEREUS (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 558; Sharpe, *Cat.* I, p. 117; *rayi*, Vig.; *novæ-hollandiæ* (pt.), Gould, *B. Austr.* I, pl. 14. Australie S., E.
- 10.417. POLIOCEPHALUS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, p. 170; Schl., *P. Z. S.*, 1860, p. 522, pl. 10; ?*contumax*, Rosenb. (*descr. nulla*); *rufitorques* (pt.), Schl.; *spilothorax*, Salvad. Nouv.-Guinée, Arou, Jobi, Salawati, Mysol, Waigiou.
1560. UROSPIZIAS
- Urospiza*, Kp. (1845); *Urospizias*, Sundev. (1872).
- 10.418. HAPLOCHROUS (Schl.), *Ibis*, 1859, p. 275, pl. 8; Schl., *Mus. P.-B., Rev. Accip.*, p. 91; Shpe, *Cat.* I, p. 119. Nouv.-Calédonie.
- 10.419. ALRIGULARIS (Gray), *Ann. N. H.*, 1870, p. 527; id., *Cruise of the Curaçoa*, p. 554, pl. 1. Iles Salomon.
2796. ?*Var.* WOODFORDI (Sharpe), *P. Z. S.*, 1888, p. 185; Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.*, 1901, p. 579. Ile Guadalcanar (Salomon).
- 10.420. VERSICOLOR (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 718; *holomelas*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 182. Iles Ugi, Guadalcanar (Salomon).
- 10.421. MEYERIANUS (Sharpe), *Journ. Linn. Soc.*, 1877, p. 458, pl. 22; *albigularis* (pt.), Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 44. Ile Jobi.
- 10.422. PULCHELLUS (Rams.), *Journ. Linn. Soc.*, 1885, p. 151; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 508; *soloensis*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* IV, p. 66 (nec Lath.); *shebæ*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 185; Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.*, 1901, p. 580. Iles Salomon.
- 10.425. JARDINEI, Gurn., *Ibis*, 1887, p. 96, pl. 5. Guyane angl. ?
- 10.424. ETORQUES, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1875, p. 191; id., *Orn. Pap.* I, p. 49, III, p. 508; *poliocephalus*, Gr. (juv.); *æquatorialis* (pt.), Wall.; *griseogularis* (pt.), Kp.; *rufitorques* (pt.), Schl.; *henicogrammus* (pt.), Sharpe; *hiogaster*, Rams. (nec Müll.); *novæ-guinææ*, Madar. Nouv.-Guinée, Sorong, Salawati, Jobi, Mafor.
- 10.425. DAMPIERI, Gurn., *Ibis*, 1882, p. 455; *etorques*, Schl., *P. Z. S.*, 1877, p. 109 (nec Salvad.). Archipel Bismarck.
- 10.426. MISORIENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1875, p. 904; id., *Orn. Pap.* I, p. 49. Iles Misori et Jobi.
- 10.427. PALLUDICEPS, Salvad., *Ibis*, 1879, p. 474; id., *Orn. Pap. Mol.* I, p. 64 (1880); *wallacei* (pt.), Sharpe; *cruentus*, *torquatus* et *rufitorques* (pt.), auct. plur. Ile Bourou (Moluques).
- 10.428. MOGASTER (Müll. et Schl.), *Nat. Gesch.*, p. 110 (1859-44); Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle S., Zool.*, p. 48, pl. 2, f. 1; Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 45; Sharpe, *Cat.* I, p. 104. Amboine, Céram (Moluques).

- 10.429. *HENICOGRAMMUS* (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 545; Halmahera, Morotai
Sharpe, *Cat.*, p. 124; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 54; (Moluques).
muelleri, Wall.; Sharpe, *l. c.*, p. 102; *cruentus*
(pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 14, f. 1,
pl. 15, f. 1.
- 10.450. *GRISEIGULARIS* (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 545; Batjan, Halmahera,
Sharpe, *Cat.*, p. 122; Salvad., *l. c.*, p. 57; *cruen-* Ternate, Tidore,
tus (pt.), Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 40; id., Morotai, Obi, Gue-
Vog. Ned. Ind., *Valkv.*, pl. 14, ff. 3, 4, pl. 15, beh (Moluques).
ff. 2, 3, pl. 16, ff. 1, 2; *aequatorialis*, Wall.; *heni-*
cogrammus (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 124; *halma-*
herce, A. B. Mey., *Sitz. Ges. Isis. Dresd.*, 1884,
Abh. I, p. 11.
- 10.451. *ALBIVENTRIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, Iles Key.
p. 985; id., *Orn. Pap.* I, p. 56; *poliocephalus*
(pt.) et *rufitorques* (pt.), Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev.*
Acc., pp. 80, 85.
- 10.452. *SHARPEI* (Oust.), *Bull. Soc. Philom.* II, p. 25; Sal- Iles Mariannes.
vad., *Ibis*, 1881, p. 607.
- 10.453. *RUFITORQUES* (Peale), *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 68, Iles Fidji.
pl. 19; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 90,
pl. 2, ff. 1, 2; Sharpe, *Cat.*, p. 121; *cruentus*,
Feh. et Hartl., *Fna. Centr. Pol.*, p. 5.
- 10.454. ? *HAWAII* (Dole), *Hawaiian Annual*, 1879, p. 45; Iles Hawaï.
Ibis, 1880, p. 241.
- 10.455. *POLIONOTUS*, Salvad., *Mem. Accad. Torino*, XL, Ile Ténimber.
1889, p. 19.
- 10.456. *NATALIS* (Lister), *P. Z. S.*, 1888, p. 525. Ile Christmas.
- 10.457. *MELANOCHILAMYS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Nouv.-Guinée N.-W.
1875, p. 905; id., *Orn. Pap. Mol.* I, p. 65.
- 10.458. *SYLVESTRIS* (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, pp. 484, 487; Flores.
id., *Ibis*, 1868, p. 10; *torquatus* (pt.), Schl., *Vog.*
Ned. Ind., *Valkv.*, pl. 17, f. 5 (juv.)
- 10.459. *TORQUATUS* (Tem.), *Pl. Col.* 45; Kp., *Contr. Orn.*, Nouv.-Guinée, Wai-
1850, p. 64; Schl., *l. c.*, pl. 17, ff. 1-4; Sharpe, giou, Timor, Savu.
Cat., p. 125; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* I, p. 60
(pt.); *aequatorialis* (pt.), Wall.
2797. *Var.* *WALLACEI* (Sharpe), *Cat. B.* I, p. 128, pl. 5; Lombok, Flores, Djam-
Gurn., *Ibis*, 1875, p. 565; Hart., *Nov. Zool.* pea, Kalao, Bourou.
V, p. 122.
2798. *Var.* *SUMBAENSIS* (A. B. Mey.), *Abh. Ber. Mus.* Sumba.
Dresd., 1892-95, p. 7; *torquatus* (pt.), Hart.
(ex Sumba).
2799. *Var.* *CRUENTA* (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 115; id., Australie W.
B. Austr. I, pl. 18; Sharpe, *Cat.* I, p. 127;
torquatus (pt.), Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 60.

- 10.440. APPROXIMANS (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XV, Australie.
p. 181; Gould, *B. Austr.* I, pl. 17; *radiatus*,
Tem., *Pl. Col.* 125; *fasciatus*, Vig. et Horsf.;
sharpii, Rams. (nec Oust.); *maculosus*, Coles,
Vict. Nat., 1897, p. 45.

1561. COOPERASTUR

Cooperastur, Bp. (1854); *Astur* et *Accipiter* (pt.), auct. plur.

- 10.441. POLIOGASTER (Tem. ex Natt.), *Pl. Col.* 264; Schl., Brésil.
Mus. P.-B., *Astures*, p. 45; Sharpe, *Cat. I*, p. 120.
- 10.442. PECTORALIS (Bp.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, Brésil.
p. 490, 1854, p. 558; Schl., *l. c.*, p. 18; Sharpe,
l. c., p. 121.
- 10.443. PILEATUS (Tem.), *Pl. Col.* 205; Sharpe, *Cat. I*, Brésil.
p. 155; *beskii*, Licht.
- 10.444. BICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 525; Bp., *Rev. et* Amérique centr., Co-
Mag. de Zool., 1854, p. 558; Sel. et Salv., *Exot.* lombie, Ecuador,
Orn., pp. 157, 170, pl. 69; *variegatus*, Less.; Guyane.
sexfasciatus, Sw.; *dynastes*, Verr.
- 10.445. COOPERI (Bp.), *Am. Orn.* I, pl. 10, f. 1; Schl., Amérique du Nord
Mus. P.-B., *Rev. Accip.*, p. 75; Sharpe, *Cat. I*, tempérée.
p. 157; *stanleyi*, Audub., *B. Am.*, pl^s 56 et 141, f. 5.
2800. Var. MEXICANA (Sw.), *Faun. Bor.-Am.*, p. 45; États-Unis W., Mexi-
Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 92. que.
- ✓ 10.446. GUNDLACHI (Lawf.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1862, p. 252; Cuba.
Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 170; Gundl., *J. f. O.*,
1871, p. 567; *cooperi* et *pileatus*, Lemb. (nec auct.)
- 10.447. GUTTATUS (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 525; Sel. et Salv., Paraguay, Bolivie.
Exot. Orn., p. 169, pl. 85.
- 10.448. CHILENSIS (Phil. et Landb.), *Arch. f. Naturg.*, 1864, Chili jusqu'à Magel-
p. 45; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, pp. 75, 170, lan.
pl. 57; *cooperi*, Pelz., *Reise Nov. Vög.*, p. 15.

1562. ACCIPITER

Accipiter, Briss. (1760); *Nisus*, Cuv. (1799); *Ierax*, Leach (1816); *Hieraspiza*,
Kp. (1844); *Teraspiza*, Kp. (1867).

- 10.449. NISUS (Lin.); Pall., *Zoogr.* I, p. 570; Dress., *B.* Europe et Asie centr.
Eur. V, p. 599, pl^s 555-58; Dubois, *Fne. Ill. Vert.* jusqu'au cercle po-
Belg., *Ois.* I, p. 80, pl. 18; *minutus*, Lin.; *nisus* laire.
major et *minor*, Bek.; *fringillarius*, Savig.; *com-*
munis, Less.; *elegans*, *peregrinus*, Brm.; *brehmii*,
C. Dub., *Orn. Gal.*, p. 170, pl. 112; *nisosimilis*,
Tick.; *subtypicus*, Hodgs.; *intercedens*, Brm.
2801. Var. PALLENS, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, Kamtschatka, Japon.
p. 623.

2802. *Var.* MELANOSCHISTA, Hume, *Ibis*, 1869, p. 556. Himalaya.
2805. *Var.* PUNICA, Erlang., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 187. Tunisie (tout le N. de l'Afrique ?)
2804. *Var.* GRANTI, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, 1890, p. 485; Grant, *Ibis*, 1890, pl. 14. Madeire.
2805. *Var.* WOLTERSTORFFI, Klschm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 168. Sardaigne.
- 10.450. FUSCUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 280; Audub., *B. Am.*, pl. 574; Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 50; *dubius*, Gm.; *striatus*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 14; *vicillotinus*, Shaw; *velox* et *pennsylvanicus*, Wils.; *ardesiaceus*, Bonn. et V.; *malfini*, Less.
2806. *Var.* RUFILATA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 92. Amérique N.-W. jusqu'aux M^gnes Rocheuses, Mex. W. Cuba, Haïti.
- ✓10.451. FRINGILLOIDES, Vig., *Zool. Journ.*, 1828, p. 454; d'Orb., in *Ram. de la Sagra, N. H. Cuba, Ois.*, p. 18; Ridgw., *Stud. of Amer. Falconide*, pp. 95, 117.
- 10.452. TINUS (Lath.), *Ind. Orn.* 1, p. 50; Bp., *Consp.* 1, p. 52; Sharpe, *Cat.* 1, p. 159; *subniger*, *minutus*, Vieill.; *fontanieri*, Bp.; *superciliosus*, Strickl.
- 10.453. MINULLUS (Dand.), *Traité*, II, p. 88; Levaill., *Ois. d'Afr.* 1, pl. 54; Schl., *l. c.*, p. 54; Sharpe, *Cat.*, p. 140; *satrapa*, *binotatus*, Licht.; *polyzonoides*, Bianc., *Spec. Zool. Mosamb.* XVIII, p. 518, pl. 5.
2807. *Var.* TROPICALIS, Rehw., *J. f. O.*, 1898, p. 159. Afrique trop. E.
2808. *Var.* ERYTHROPUS (Hartl.), *J. f. O.*, 1855, p. 554; Schl., *l. c.*, p. 55; *zenkeri*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1894, p. 125; id., *J. f. O.*, 1896, pl. 1. Afrique W. de la Côte d'Or au Caméron.
- 10.454. OVAMPENSIS, Gurn., *Ibis*, 1875, p. 567, pl. 6. Afrique S.-W. à l'E. jusqu'au Zambèze.
- 10.455. CIRRHOCEPHALUS (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 529; Schl., *l. c.*, p. 58; Salvad., *Orn. Pap.* 1, p. 67; *torquatus*, Vig.; Gould, *B. Austr.* I, pl. 19; *melanops*, Strickl.
- 10.456. MADAGASCARIENSIS, Verr., *S. Afr. Q. Journ.*, 1854, p. 282; M.-Edw. et Grand., *Madag.*, *Ois.*, p. 106, pl^s 55, 56; *lantzii*, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1866, p. 555, pl. 18. Madagascar.
- 18.457. COLLARIS (Kaup), *MS.*; Schl., *Ibis*, 1860, p. 148, pl. 6; Ridgw., *Stud. of Am. Falc.*, p. 127. Colombie.
- 10.458. CERAMENSIS (Schl.), *Mus. P.-B., Astures*, p. 59 (*N. cirrhocephalus ceramensis*); Finsch., *Neu-Guin.*, p. 155; *rubricollis*, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 19, pl. 4; Sharpe, *Cat.* 1, p. 144; Salvad., *Orn. Pap.*

- 1, p. 69; *erythrauchen* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind., Valkv.*, pp. 22, 60, pl. 15, f. 2.
- 10.459. BRACHYURUS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 465. Nouv.-Bretagne.
- 10.460. ERYTHRAUCHEN, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 544; Schl., *Vog. Ned. Ind., Valkv.*, pp. 22, 60, pl. 15, ff. 1, 3, 4; Sharpe, *Cat.*, p. 145; Salvad., *Orn. Pap.* 1, p. 68. Halmahera, Morty, Batjan.
- 10.461. RHODOGASTER (Schl.), *Mus. P.-B., Astures*, p. 50 (*N. virgatus rhodogaster*); Gurn., *Ibis*, 1865, p. 450; Schl., *Valkvogels*, pp. 21, 60, pl. 12, ff. 5, 6; Wald., *Trans. Z. S.* VIII, p. 109, pl. 11 (juv.); Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 25. Célèbes.
2809. *Var. SULAENSIS* (Schl.), *Vog. Ned. Ind., Valkv.*, pp. 26, 64, pl. 16, ff. 5, 4; Wall., *Ibis*, 1868, p. 40; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 26. Iles Soula et Péling.
- 10.462. ERYTHROCNEPIS, Gray, *Cat. Accip. B. M.*, p. 70; Bp., *Consp.* 1, p. 52; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 53, pl. 17; *striatus*, Burm., *Th. Bras.* II, p. 71. Brésil, Bolivie.
2810. *Var. SALVINI*, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. Surv.* II, 1876, p. 121; id., *Stud. Am. Falc.*, pp. 95, 121. Vénézuéla.
- 10.463. CHIONOGASTER (Kaup), *P. Z. S.*, 1851, p. 41; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 558; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 27, pl. 14; *erythrocnemis* (pt.), Schl. et Salv. (1859-61). Guatémala, Nicaragua.
- 10.464. RUFIVENTRIS, Smith, *S. Afr. Q. Journ.* 1, p. 251; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 95; *exilis*, Tem., *Pl. Col.* 496; *perspicillaris*, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 41, pl. 18, f. 2. Afrique S. et N.-E.
- 10.465. VENTRALIS, Schl., *P. Z. S.*, 1866, p. 505; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 25, pl. 15; Sharpe, *Cat.*, p. 149. Vénézuéla, Colombie.
2811. *Var. NIGRIPLUMBEA*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1869, p. 270; Salv., *Ibis*, 1874, p. 525; Ridgw., *Stud. Am. Falc.*, pp. 95, 122; *ventralis* (pt.), Sharpe. Ecuador, Pérou.
- 10.466. HARTLAUBI (Verr.), in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 15; id., *J. f. O.*, 1861, p. 104; Dubois, *Rev. et Mag. de Zool.*, 1874, p. 1, pl. 4; Sharpe, *Cat.*, p. 150, pl. 6, f. 2. Afrique W., de Sénégal au Gabon.
- 10.467. BUTTIKOFERI, Sharpe, *Notes Leyd. Mus.*, 1888, p. 199; Büttik., *Reiseb. Liberia*, II, pl. 50. Libéria (Afr. W.)
- 10.468. VIRGATUS (Tem.), *Pl. Col.* 109; Vig., *Zool. Journ.* 1, p. 558; Legge, *B. Ceyl.*, p. 26. Inde S., Ceylan, Java, Sum., Mal., Andam.
2812. *Var. AFFINIS*, Hodgs., in *Gr. Zool. Misc.*, 1844, p. 81; Gurn., *Diurn. B. of Prey*, p. 59; *vir-* Himalaya, Formose, Haïnan.

- gatus* (pt.), Sharpe; Hart., *Nov. Zool.*, 1894, p. 482.
2815. *Var.* MANILENSIS, Meyen, *Nov. Acta Acad. Leop.*, 1854, *Suppl.*, p. 69, pl. 9; Gurn., *l. c.*, p. 40; *stevensoni*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 958, pl. 57. Philippines.
2814. *Var.* GULARIS (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 5, pl. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 28; *nisoides*, Blyth; Gurn., *l. c.*, p. 40; *stevensoni*, Gurn., *Ibis*, 1863, p. 447, pl. 11; *virgatus*, Sharpe (pt.); Dav. et Oust., *Dis. Chine*, p. 26. Sibérie, Mandchourie, Chine, Japon, Indoch., Malacca, Sum., Java, Timor, Palawan, Bornéo, Célèbes N., Djampea.
2815. *Var.* RUFOTIBIALIS, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 457, 1889, p. 68, pl. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 29. Bornéo N.-W. (Kini Balu).
- 10.469. MELANOLEUCUS, Smith, *S. Afr. Q. Journ.*, 1850, p. 229; id., *Ill. S. Afr. Zool.*, pl. 18; Sharpe, *Cat.*, p. 156; *smithii*, Kp.; *apoxypterus*, *hypoxanthus*, Licht.; *temminckii*, Harth.; *verreauxi*, Schl., *Mus. P.-B., Ast.*, p. 37. Afrique trop., îles du Cap Vert.

1563. ERYTHROTRIORCHIS

- Urospizias*, Sharpe (1874, nec Kp.); *Erythrotriorchis*, Sharpe (1875); *Megatriorchis*, Salvad. et D'Alb. (1875).
- 10.470. RADIATUS (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.* II, p. 12; Gould, *B. Austr.* I, pl. 16; Schl., *l. c.*, p. 15; *caleyi*, Vig. et Horsf.; *testaceus*, Kp. Australie E., centr. et N.
- 10.471. DORLE (Salvad. et D'Alb.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 803; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 41; Sharpe, *Hand.-L.* I, p. 234. Nouv.-Guinée S.-E.

SUBF. VIII. — AQUILINÆ

1564. MORPHNUS

- Morphnus*, Cuv. (1817).
- 10.472. GUIANENSIS (Daud.), *Traité*, II, p. 78; Cuv., *Rég. an.* I, p. 318; Burm., *Th. Bras.* II, p. 66; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* III, pl. 63; *sonnini*, *delicatus*, Shaw; *variegatus*, Bonn. et V.; *cristatus*, Less. Amazone, Guyane, Panama.
- 10.473. TENIATUS, Gurn., *Ibis*, 1879, p. 173, pl. 5. Ecuador.

1565. HARPYOPSIS

Harpyopsis, Salvad. (1875).

- 10.474. NOVÆ-GUINÆÆ, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, Nouv.-Guinée.
p. 682; Sharpe, *Mitth. Zool. Mus. Dresd.* I, p. 555,
pl. 29; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 40.

1566. THRASAËTUS

Harpyia (Vieill., 1816, nec Ochsenh., 1810); *Thrasaëtus*, Gray (1857); *Nothrophrontes*, Glog. (1842).

- 10.475. HARPYIA (Lin.); Gray, *P. Z. S.*, 1857, p. 108; *coro-* Texas, Mexique, Amé-
natus, Jacq.; *jacquini*, *cristatus*, Gm.; *destruc-* rique centr. et mé-
tor, Daud.; Tem., *Pl. Col.* 14; *imperialis*, *regal-* rid. jusqu'au Pa-
is, *caracca*, Shaw; *calquin*, Mol.; *maxima*, Bonn. raguay.
et V.; *ferox*, Less.

1567. SPIZAËTUS

Spizaëtus, Vieill. (1816); *Plumipeda*, Flem. (1822); *Limnaëtus*, Vig. (1850);
Pternura, Kp. (1845).

- 10.476. ORNATUS (Daud.), *Traité*, II, p. 77; Vieill., *Gal.* Amérique centr. et
Ois., pl. 21; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 2; mérid. jusqu'au Pa-
mauduyti, Daud.; Sharpe, *Cat.* I, p. 262; *super-* raguay.
bis, Shaw; *urutaaurana*, Dum.
10.477. DEVILLEI, Dubois, *Bull. Acad. R. Belg.* XXXVIII, Ecuador.
1874, p. 129, pl^s 1, 2; *isidori* (pt.), Gurn. (1).
10.478. TYRANNUS (Max.), *Reis. Bras.* I, p. 560; Tem., *Pl.* Amérique centrale et
Col. 75; Gr., *Gen. B.* I, p. 14; Burm., *Th. Bras.* mérid. jusqu'au S.
II, p. 62; *bracchata*, Spix, *Av. Bras.* I, pl. 5; du Brésil.
spixii, Des M.
10.479. BELlicosus (Daud.), *Traité*, II, p. 58; Levaill., *Ois.* Afrique S. et E., au
d'Afr., pl. 1; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 42; N. jusqu'au Choa.
armiger, Shaw.
10.480. CORONATUS (Lin.); Levaill., *l. c.*, pl. 5; Smith, *Ill.* Afrique S. et W.
Zool. S. Afr., pl^s 40, 41; Bp., *Consp.* I, p. 28;
albescens, Daud.
10.481. NIPALENSIS (Hodgs.), *J. As. Soc. B.*, 1856, p. 229, Himalaya, Inde, Chine,
pl. 7; Jerd., *B. Ind.* I, p. 75; *pulcher* et *pallid-* Japon.
us, Hodgs.; *grandis*, Gray; *orientalis*, Tem. et
Schl., *Faun. Jap.*, pl. 5.

(1) M. Gurney considère les figures des planches indiquées ci-dessus comme représentant le jeune et l'âge moyen du *Lophotriorchis isidori*; il peut avoir raison, mais cela demande à être confirmé. Dans son *Hand-list* (1899), M. Sharpe maintient le *devillei* comme espèce distincte.

2816. *Var.* KELAARTI, Legge, *Ibis*, 1878, p. 202; id., *B. Ceyl.*, p. 51, pl. Inde S., Ceylan.
- 10.482. CIRRHATUS (Gm.), *S. N.* 1, p. 274; Sharpe, *Cat.* 1, p. 269; *ceylanensis*, Gm.; *crisatellus*, Tem., *Pl. Col.* 282. Inde, Ceylan.
- 10.485. SPHINX, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 521; *ceylonensis*, Gurn., *Ibis*, 1877, p. 450; Legge, *B. Ceyl.*, p. 55, pl. Inde S., Ceylan.
- 10.484. PHILIPPENSIS, Gurn., in *Gould's B. Asia*, pt. XV (1865); Wald., *Tr. Z. S.*, IX, p. 141, pl. 24; *philippinensis*, Sharpe, *Cat.* 1, p. 261. Philippines.
- 10.485. LANCEOLATUS, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, 1845, p. 8; Bonap., *Consp.* 1, p. 29 (pt.); Salvad., *Orn. Pap.* 1, p. 5; Wald., *Ibis*, 1868, p. 15; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 52; *cirrhatus* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 7, ff. 2, 5; *fasciolatus*, Schl., *Mus. P.-B., Ast.*, p. 9. Iles Célèbes et Soula.
- 10.486. ALBONIGER, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 175, 1850, p. 555; Gould, *B. Asia*, pt. XV, pl.; Sharpe, *Cat.*, p. 271; *borneonensis*, Gray; *nanus*, Wall., *Ibis*, 1868, p. 14, pl. 1. Ténassérim, Malacca, Sumatra, Bornéo.
- 10.487. LIMNAËTUS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 158; id., *Zool. Res. Java*, pl. 56; Tem., *Pl. Col.* 154; *caligatus*, Raffl.; *niveus*, Tem., *Pl. Col.* 127; *horskfieldi*, Vig.; *unicolor*, *nipalensis*, Blyth. Himalaya, Bengal, Indo-Chine, Malacca, Sumatra, Bornéo, Java.
2817. *Var.* FLORIS, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 46. Flores.
- 10.488. ANDAMANENSIS, Tytl., *Pr. A. S. B.*, 1865, p. 112; Hume, *Str. Feath.* II, p. 142, IV, p. 280; Sharpe, *Cat.*, p. 260. Iles Andaman.
- 10.489. GURNEYI (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 542, pl. 169; Schl., *Mus. P.-B., Ast.*, p. 14; id., *Valkvog.*, pp. 17, 56, pl. 9; Salvad., *Orn. Pap.* 1, p. 5. Batjan, Ternate, Halmah., Morotai, Waigiou, Nouv.-Guinée, Jobi, Arou.

1568. LOPHOTRIORCHIS

Lophotriorchis, Sharpe (1874).

- 10.490. KIENERI (Geoff. St-Hil.), *Mag. de Zool.*, 1855, pl. 55; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, p. 5, pl. 1; Sharpe, *Cat.* 1, p. 255; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 55; *crisatellus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 66; *albogularis*, Tick. Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacc., Iles de la Sonde, Philippines, Célèbes.
- 10.491. ISIDOREI (Des M.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 176; id., *Icon. Orn.*, pl. 1; Gurn., *Ibis*, 1877, pp. 424, 455; Sharpe, *Cat.* 1, p. 256. Colombie.

- 10.492. LUCANI, Sharpe et Bouv., *Bull. Soc. Zool. de Fr.*, Afrique trop.
1877, p. 471 (1); Sushk., *B. B. O. C.* XI, p. 51.

1569. LOPHOAËTUS

Lophoaëtus, Kaup (1847).

- 10.495. OCCIPITALIS (Daud.), *Traité*, II, p. 40; Levaill., *Ois.* Toute l'Afrique, Ma-
d'Afr. I, p. 8, pl. 2; Kp., *Isis*, 1847, p. 165; Schl., dagascar.
Mus. P.-B., *Ast.*, p. 25; Sharpe, *Cat.* I, p. 274;
senegalensis, Daud.

1570. ICTINAËTUS

Heteropus, Hodgs. (1845, nec Dum. et Bibr., 1859); *Ictinaëtus*, Jerd. (1844);
Neopus, Hodgs. (1844); *Onychaëtus*, Kp. (1844).

- 10.494. MALAYENSIS (Tem.), *Pl. Col.* 117; Schl., *Vog. Ned.* Inde, Ceylan, Indo-
Ind., *Valkv.*, pp. 8, 49, pl. 5, II. 1, 2; Beav., Ch. W., Malacca,
P. Z. S., 1868, p. 596, pl. 54; Blanf., *Faun. Br.* gr. îles de la Sonde,
Ind., *B.* III, p. 547; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 58; Célèbes, Ternate,
pernigra, Hodgs.; *ovivorus*, Jerd. Halmahera, Nias.

1571. SPIZIASTUR

Spiziastur, Gray (1841).

- 10.495. MELANOLEUCUS (Vieill.), *N. Dict.* IV, p. 482; id., Amérique centr. et
Cat. Ois., pl. 14; Sharpe, *Cat.* I, p. 258; *atri-* mérid. jusqu'au Bré-
capillus, Tem., *Pl. Col.* 79. sil.

1572. NISAËTUS

Nisaëtus, Hodgs. (1856); *Eutolmaëtus*, *Butaëtus*, Blyth (1845); *Hieraëtus*, Kp.
(1845); *Tolmaëtus*, Blyth (1846); *Pseudaëtus*, Bp. (1856); *Aquilastur*, Brm.
(1860).

- 10.496. FASCIATUS (Vieill.), *Mém. Soc. Linn. Paris*, 1822, Europe S. (accident.
p. 152; Dress., *B. Eur.* V, p. 575, pl. 551, f. 1. Belg.), Afrique N.
pl. 552, 555; Du Bois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* et N.-E.; Asie S.-
II, p. 705, pl. 521; *bonellii*, Tem., *Pl. Col.* 288; W., Inde.
intermedia, Boit.; *grandis*, Hodgs.; *niveus*, Jerd.;
nipalensis, *rubriventer*, Hodgs.; *strenuus*, Jerd.,
wiedii, Brm.

- 10.497. SPILOGASTER (Bp. ex Du Bus), *Rev. et Mag. de Zool.*, Afrique tropicale.
1850, p. 487; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ast.*, p. 12;

(1) M. Gurney (*List of Diurnal B. of Prey*, p. 52) considère cet oiseau comme étant un
jeune du *Nisaëtus spilogaster*.

Sharpe, *Cat. I*, p. 252; *zonurus*, Müll.; id., *Beitr. Orn. Afr.*, pl. 1; *bonellii* (pt.), auct. plur.; *leucostigma*, Heugl.; *ayresii*, Gurn., *Ibis*, 1862, p. 149, pl. 4 (juv.); *Linn. africanus*, Cass., *P. Phil. Acad.*, 1865, p. 4.

- 10.498. *PENNATUS* (Gm.), *S. N. I*, p. 272; Tem., *Pl. Col.* 55; Bureau, *Ass. fr. pour l'avancem. des Sc.*, IV, pl. 15; Dress., *B. Eur. V*, p. 481, pl^s 556, 557; *minuta*, Brm.; *milvoides*, Jerd.; *brehmii*, Müll.; *longicaudata*, Heugl.; *albipectus*, Severtz.
- 10.499. *MORPHINOIDES* (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 161; id., *B. Austr. I*, pl. 2; Sharpe, *Cat. I*, p. 254; *cristatus*, Blyth.
- 10.500. *WEISKEI*, Richw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 185.
- Europe mér., Afrique, Asie S.-W. et centr., Inde, Ceylan.
- Australie.
- Nouv.-Guinée S.-E.

1575. AQUILA (1)

Aquila, Briss. (1760); *Pteroaëtus*, Kaup. (1844).

- 10.501. *CHRYSAËTUS* (Lin.): Dress., *B. Eur. V*, p. 555, pl. 545; Dubois, *Fne. ill.*, *Ois. I*, p. 11, pl. 5; *fulvus*, Lin.; *melanoaetus*, *canadensis*, *albus*, *niger*, Gm.; *cygneus*, *melanonotus*, Lath.; *nobilis*, Pall.; *regalis*, Tem.; *regia*, Less.; *fuscicapilla*, Brm.
2818. *Var. BARTHELEMYI*, Jaub., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 545; id. et Lap., *Rich. Orn.*, p. 54, pl. 2; Murie, *P. Z. S.*, 1870, p. 80.
2819. *Var. DAPHNEA*, Hodgs., in *Gray's Zool. Misc.*, p. 81; Sharpe, *Hand-l. I*, p. 261; *chrysaetus*, auct.
- 10.502. *VERREAUXI*, Less., *Cent. Zool.*, p. 105, pl. 58; Des M., in *Lef. Voy. Abyss.*, *Zool.*, p. 49, pl. 4; Sharpe, *Cat.*, p. 254; *vulturina*, Smith (nec Daud. ?); Schl., *Mus. P.-B. Aq.*, p. 9; *nigra*, James; *leucoprymna*, Licht.
- 10.503. *ADELBERTI*, Brm. (*major* et *minor*), *Ber. Vers. deutsch. Orn. Ges.*, 1860, p. 55; Dress., *B. Eur. V*, p. 517, pl^s 542, 543 (fig. de gauche); *heliaca*, Boc.; *imperialis*, Saund.; *leucolena*, Dress.
- 10.504. *MOGILNIK* (Gm.), *Nov. Com. Petrop. XV*, p. 445; Dress., *B. Eur. V*, p. 521, pl^s 545 (fig. de droite), 544; *heliaca*, Savig., *Descr. Égypte*, p. 459, pl. 12; Sharpe, *Cat.*, p. 258; *imperialis*, Bechst. et auct. plur.; *crassipes*, Hodgs.
- Europe, N. de l'Asie jusqu'au N. de la Chine, Amérique du N. jusqu'au Mex.
- Midi de la France.
- Himalaya et autres montagnes de l'Asie centr.
- Afrique S. et N.-E.
- Europe S.-W., Afrique N.
- Europe S. et S.-E., Asie centr., Inde N., Chine.

(1) Quid : *Aquila boliviara*, Boeck. (Guerney, *Cat. of the Birds of Prey*, 1891, p. 23).

- 10.505. BIFASCIATA, Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 17; *nipalensis*, Hodgs., *As. Res.* XVIII, 2, p. 15, pl. 1; *mogilnik*, Sharpe (nec Gm.), *Cat.*, p. 240. Europe S.-E., Asie centr. jusqu'au N.-W. de l'Inde.
2820. *Var.* ORIENTALIS, Cab., *J. f. O.*, 1854, p. 569; Dress., *B. Eur.* V, pl. 540; *mogilnik* (pt.), Alleen, *Rev. et Mag. de Zool.*, 1866, p. 275, pl. 20; *nipalensis*, Dress., *l. c.* V, p. 507. Steppes de l'Asie et de l'Europe or.
2821. ? *Var.* AMURENSIS, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 558; Prjev., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 144; Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, p. 55. Amour, Mongolie.
- 10.506. RAPAX (Tem.), *Pl. Col.* 455; Dress., *B. Eur.* V, p. 515, pl. 541; *senegala* et *naevioides*, Cuv., *Reg. An.* I, p. 526; *choka*, Smith; *belasirius*, Levaill.; *raptor*, *variegata*, Brm.; *substriata*, *isabellina*, Heugl.; *lestris*, L. Brm.; *cullenii*, Bree. Afrique, Espagne, Asie centr., Inde N.-W.
2822. *Var.* ALBICANS, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 54, pl. 15; Gurn., *List Diurn. B. of Pr.*, p. 50; Erlang., *J. f. O.*, 1898, p. 418, pl. 7; Sushk., *B. B. O. C.* LXXIV, p. 7; *rapax* (pt.), auct. plur. Afrique N.-E. et N.-W.
2823. *Var.* VINDHIANA, Frankl., *P. Z. S.*, 1851, p. 114; Hume, *Nest and Eggs Ind. B.*, p. 29; *punctata*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 16; ?*fusca*, id., pl. 26. Inde.
2824. *Var.* MURINA, Sushk., *Bull. Br. Orn. Cl.* LXXIV, p. 8. Himalaya E., (Darjiling).
- 10.507. FULVESCENS, Gray et Harw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 29; Jerd., *B. Ind.* I, p. 60; Gurn., *Ibis*, 1877, pp. 225, 525-29; Sushk., *l. c.*, p. 9; *vindhiana* (pt.), Sharpe; *naevia* var. *pallida*, Licht., *J. f. O.*, 1855, p. 69, pl. 4 (juv.) Russie, Sibérie W., Altaï, Turkestan, Inde N.-W.
- 10.508. ? GLITSCH, Severtz., *Str. Feath.*, 1875, p. 422. Steppes de l'Europe or. et de l'Asie.
- 10.509. MACULATA (Gm.), *S. N.* I, p. 258; Blanf., *Ibis*, 1894, p. 287; *clanga*, Pall., *Zoogr.* I, p. 551; Dress., *B. Eur.* V, p. 409, pl. 559; *vittata*, Hodgs.; *fuscoater*, Wod.; *unicolor*, Brm.; *naevia* (pt.), auct. plur. Europe centr., Afrique N.-E., Asie centr., Inde.
2825. *Var.* POMARINA, Brm., *Vög. Deutschl.*, p. 27; Dress., *B. Eur.* V, p. 491, pl. 558; *naevia*, auct. plur. (nec Gm.); Dubois, *Fne. ill.*, Ois. I, p. 16, pl. 4; *fusca*, *subnaevia*, Brm.; *maculata*, Sharpe (nec Gm.), *Cat.*, p. 246; *boeki*, Hom. Europe centr. et mérid.
- 10.510. HASTATA (Less.), *Voy. Bél.*, p. 217; Anders., *P. Z. S.*, 1875, p. 25, pl. 5; *unicolor*, Blyth; *punctatus*, Jerd. Inde.
- 10.511. WAHLBERGI, Sundev., *Öfve. K. Akad. Stockh.*, Afrique tropicale.

1850, p. 100; Sharpe, *Cat.*, p. 243; *brehmii*, Müll.;
desmursi, Verr., in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 4;
 Gurn., *Tr. Z. S.* IV, p. 366, pl. 77.

1574. UROAËTUS

Uroaëtus, Kaup (1844).

- 10.512. AUDAX (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 2; Sharpe, *Australie, Tasmanie.*
Cat., p. 251; *albirostris*, Vieill.; *fucosus*, Tem.,
Pl. Col. 52; Gould, *B. Austr.* I, pl. 1; *cuneicaudata*, Brm.

1575. THALASSOAËTUS

Thalassoaëtus, Kaup (1844); *Haliaëtus* (pt.), auct. plur.

- 10.515. PELAGICUS (Pall.), *Zoogr. Rosso-As.* I, p. 545, pl. 18; Kamtschatka, Japon.
 Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 11, pl. 4 (juv.); *leucop-
 copterus*, Tem., *Pl. Col.* 489 (ad.); *imperator*, Kittl.
 2826. Var. BRANICKII (Tacz.), *P. Z. S.*, 1888, p. 451; Corée, ? Chine N.
 Schl., *P. Z. S.*, 1896, p. 784, pl. 57; ? *pela-
 gicus*, Dav. et Oustl., *Ois. Chine*, p. 15.
 2827. Var. MACRURA, Menzb., in *Bull. Br. Orn. Club.* Sibérie E. (Yakutsk.)
 XI, p. 4.

1576. HALIAËTUS

Haliaëtus, Savig. (1809); *Cuncuma*, Hodgs. (1857); *Pontoaëtus*, Kp. (1844);
Blagrus, Blyth (1849).

- 10.514. ALBICILLA (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, p. 531, pl^s 547, Europe, Asie N.,
 548; Dubois, *Fne. ill.*, *Ois.* I, p. 4, pls. 1, 1^b; Groenland, Islande,
ossifragus, Lin.; *albicaudus*, Gm.; *hinnularius*, N. de l'Inde et de
 Lath.; *pygargus*, Daud.; *nisus*, Savig.; *leucocce- la Chine.*
phala, Wolf (nec Lin.); *borealis*, Fab.; *orientalis*,
islandicus, *groenlandicus*, *cinereus*, *funereus*, *ger-
 manicus*, Brm.; *pelagicus* (nec Pall.) et *brooksi*,
 Hume.
 2828. Var. HYPOLEUCA, Ridgw. (ex Stejn.), *Pr. U. S.* Ile de Behring (1).
Nat. Mus., 1885, p. 90.
 10.515. LECOCEPHALUS (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 111; Amérique du N. jus-
 Audub., *B. Am.* I, pl. 51; Gould, *B. Eur.* I, qu'en Floride.
 pl. 11; *ossifragus*, Wils.; *washingtonianus*, Null;
washingtonii, Audub.
 2829. Var. ALASCANA, Towns., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, Alaska.
 1897, p. 145.

(1) M. Ridgway pense que la var. *Hypoleuca* est une forme orientale de l'*albicilla*, propre au Kamtschatka, aux îles Aléoutiennes, au Japon et à la Chine.

- 10.516. *VOCIFER* (Daud.), *Traité*, II, p. 65; Levaill., *Ois. Afr. I*, p. 17, pl. 4; Des M., *Icon. Orn.* pl. 8; *clamans*, Brm.; *var. orientalis*, Heugl.
- 10.517. *VOCIFEROIDES*, Des M., *Rev. Zool.*, 1845, p. 175; id., *Icon. Orn.* pl. 7; *vociferator*, Schl. et Pol., *Faun. Madag. Ois.*, p. 42, pl. 15. Afrique tropicale. Madagascar.
- 10.518. *LEUCORYPHUS* (Pall.), *Reise Russ. Reichs*, I, p. 454; Dress., *B. Eur.* V, p. 545, pl. 546; *fulviventris*, Vieill.; *macci*, Tem., *Pl. Col.* 8, 225 (juv.); *unicolor*, Gray; *albipes*, *lanceolatus*, Hodgs.; *deserticola*, Eversm.; *pallasi*, C. Dub., *Ois. Eur.* I, p. et pl. 5^e. Russie S., Asie centrale.
- 10.519. *LEUCOGASTER* (Gmel.), *S. N.* I, p. 257; Tem., *Pl. Col.* 49; Gould, *B. Austr.* I, pl. 5; ?*blagrus*, Daud.; *dimidiatus*, Rall.; *oceanica*, Less.; *sphenurus*, Gould; *cultrungius*, Blyth. Inde, Ceylan, Indochine, Arch. Indien, Australie.

SUBF. IX. — BUTEONINÆ

1577. ARCHIBUTEO

- Archibuteo*, Brm. (1828); *Triorchis*, Kaup (1829); *Butaëtes*, Less. (1831); *Lagopus*, Fras. (1844, nec Briss., 1760); *Hemiaëtus*, Hodgs. (1844).
- 10.520. *LAGOPUS* (Brünn.), *Orn. Bor.*, p. 4 (1764); Dress., *B. Eur.* V, p. 471, pl^s 554, 555; DuBois, *Fne. ill.*, *Ois.* I, p. 50, pl. 7; *slavonicus*, *norwegicus*, Lath.; Seeb., *Ibis*, 1885, p. 122; *pennatus*, *plumipes*, Daud.; *africanus*, *planiceps*, *alticeps*, *sublagopus*, Brm.; *buteo*, Less. (nec Lin.) Europe N. et centr., Sibérie, Alaska.
2850. *Var. SANCTI-JOANNIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 275; Sharpe, *Cat.* I, p. 197; *spadiceus*, Gm.; *lagopus* (pt.), auct. plur.; Audub., *B. Am.*, pl^s 166, 422; *niger*, Wils.; *ater*, Vieill. Amérique sept.
- 10.521. *FERRUGINEUS* (Licht.), *Abh. K. Akad. Berlin*, 1858, p. 428; Cass., *B. Calif. and Tex.*, pp. 104, 159, pl. 26; *regalis*, Gray, *Gen. B.*, pl. 6; *californicus*, Huteh. Amérique N.-W. jusqu'au Texas et Mexique.
- 10.522. *HEMIPHILOPUS*, Blyth, *J. A. S. B.*, 1846, p. 4; Schal., *J. f. O.*, 1901, pl. 5; *strophiatius*, Hodgs. (*nomen nudum*); Sharpe, *Cat.* I, p. 199, pl. 7, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 20, pl. 7; *cryptogenys*, Hodgs.; *aquilinus*, Strickl.; *asiaticus*, Gr.; *leucoptera*, Hume; *hemilasius*, Przew. Sibérie, Népal, Thibet, Chine.
2851. *Var. HOLDERERI*, Schal., *J. f. O.*, 1901, p. 426. Asie centr. (1).

(1) La synonymie et la répartition géographique de l'espèce et de sa variété *Holdereri* ne sont pas encore bien établies.

1578. BUTEO

Buteo, Cuv (1800); *Craxirex*, Gould (1841); *Tachytriorchis*, Kaup (1844);
Butaquila, Hodgs. (1844); *Pacilopternis*, Kaup (1847); *Onychotes*, Ridgw.
 (1870); *Dromolestes*, Sund. (1874).

- 10.525. LEUCOCEPHALUS, Hodgs., in *Gr. Zool. Misc.*, p. 81; Sibérie E., Chine, Ja-
 id., *P. Z. S.*, 1845, p. 57; Gurn., *List Diurn.* pon.
B. of Prey, pp. 62, 154; *aquilinus*, Hodgs.; *hemi-*
lasius, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 18, pl. 7;
asiaticus, Blyth; *ferox* (pt.), Sharpe, *Cat.* I,
 p. 176, pl. 8.
- 10.524. FEROX (Gm.), *N. Comm. Ac. Petrop.* XV, p. 442, Europe S.-E., Afrique
 pl. 10; Thien., *J. f. O.*, 1855, p. 108; Dress., N.-E., Asie S.-W.
B. Eur. V, p. 465, pl. 555; *rufinus*, Cretz. in et centr. jusqu'au
Rüpp. Atl., p. 40, pl. 27; *canescens*, Hodgs.; N.-W. de l'Inde.
longipes, Jerd.; *leucurus*, Naum. (nec Vieill.);
eximius, Brm.; *pectoralis*, Strickl.; *africanus*,
 Würt.; *var. obscura*, Pelz.; *fuliginosus*, Hume;
nigricans, Severtz.
- 10.525. MENETRIESI, Bogd., *Tr. Soc. Kazan*, VIII (1879), Europe S.-E.
 p. 45; Ehmecke, *J. f. O.*, 1898, p. 140.
2852. *Var.* ZIMMERMANNÆ, Ehmecke, *J. f. O.*, 1895, Europe E. et centr.
 p. 117, 1898, p. 140-146; Schalow, *J. f. O.*,
 1900, p. 249; ? *vulpina*, Licht., *Nomencl.*
Av., p. 5 (1854).
- 10.526. PLUMIPES, Hodgs., *P. Z. S.*, 1845, p. 57; Sharpe, Himalaya E., Chine,
Cat., p. 180, pl. 7, f. 1; *japonicus*, Tem. et Schl., Japon.
Faun. Jap., p. 16, pl^s 6 et 6^b.
- 10.527. DESERTORUM (Daud.), *Traité*, II, p. 164; Dress, Eur. S. et E., Afrique,
B. Eur. V, p. 457, pl. 552; *rufiventer*, Jerd., *Ill.* Inde.
Ind. Orn., pl. 27; *cirtensis*, Levaill. juv., *Expt.*
sc. de l'Alg., pl. 3; *capensis*, Tem. et Schl.;
minor, Heugl.; *tachardus*, Bp.; *vulgaris*, Jerd.
 (nec Leach); *delalandi*, Des M.; *rufinus*, Tacz.
 (nec Cretzsch.)
- 10.528. VULGARIS, Leach, *Syst. Cat. Mam. and B.*, p. 10; Europe.
 Dress., *B. Eur.* V, p. 449, pl. 551; Dubois, *Fne.*
Ill., Ois. I, p. 26, pl. 6; ? *glaucopis* et *versicolor*,
 Gm.; *albus*, Daud.; *fasciatus*, *mutans*, Vieill.;
pojana, Savi; *communis*, Less.; *septentrionalis*,
medius, *murum*, *major*, *minor*, Brm.; *fuscus*,
 Macg.; *albidus*, *variegatus*, Selys (nec Gm.);
cinereus, Bp.; *variabilis*, Bail.; *var. obscura*,
etrusca, Pelz.
- 10.529. BRACHYPTERUS, Hartl. (ex Pelz.), *Faun. Madag.*, Madagascar.

- p. 4; Roch et Newt., *Ibis*, 1862, p. 266, pl. 8; Sharpe, *Cat.*, p. 185.
- 10.550. SOLITARIUS (Peale), *Zool. U. S. Expl. Exp.*, B., p. 62 (1848); Cass., *l. c.*, 1858, p. 97, pl. 4; Sci., *P. Z. S.*, 1878, p. 548; id., *Rep. on Voy. « Challenger » Zool.* II, pl. VIII, p. 96, pl. 21; *Onychotes gruberi*, Ridgw., *Pr. Phil. Acad.*, 1870, p. 142; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 596-98, pl. 12; Sharpe, *Handl.* I, p. 256, n° 20. Iles Hawaï ou Sandwich.
- 10.551. AUGURALIS, Salvad., *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.*, 1865, p. 577; Sharpe, *Cat.*, p. 175; Du Boc., *Orn. Angola*, p. 22; *augur*, Brm. (nec Rüpp.); *desertorum*, Antin; *delalandi*, Boc.; *anceps*, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 95. Afrique W. et N.-E.
- 10.552. AUGUR, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 58, pl. 16; Heugl., *l. c.*, p. 92; Sharpe, *Cat.*, p. 175; *hydrophilus*, Rüpp., *l. c.*, p. 59, pl. 17. Afrique N.-E. et équateur.
- 10.553. JAKAL (Daud.), *Traité*, II, p. 161; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 75, pl. 16; Ayres, *Ibis*, 1859, p. 240, 1860, p. 204, 1877, p. 540. Afrique S.
- 10.554. BOREALIS (Gm.), *S. N. I.*, p. 266; Audub., *B. Am.*, pl. 51; Gosse, *B. Jam.*, p. 11, pl. 2; *leverianus*, Gm.; *ruficaudus*, *ferruginicaudus*, *americanus*, Vieill. Amérique N.-E., Antilles.
2853. *Var.* HARLANI (Audub.), *B. Am.*, pl. 86; Salvin, *Ibis*, 1874, p. 514; Sharpe, *Cat.*, p. 191. Sud des États-Unis, Amérique centr.
2854. *Var.* CALURUS, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1855, p. 281; Baird, *B. N. Am.*, p. 22, pl. 14; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 256-241; *montanus*, Null. Amérique N.-W., Mexique.
2855. *Var.* KRIDERI, Hoopes, *Pr. Phil. Acad.*, 1875, p. 258, pl. 5; Ridgw., *B. N. Am.*, p. 258. Du Minésota au Texas.
2856. *Var.* LUCASANA, Ridgw., *Hist. N. Am. B.* III, p. 285. Basse-Californie.
2857. *Var.* SOCORROENSIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, p. 220. Ile Socorro.
2858. *Var.* FUMOSA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 7 (*fumosus*). Tres-Marias.
- 10.555. ? VENTRALIS (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 10; Darw., *Zool. Beagle B.*, p. 27; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 94, pl. 5, f. 2; Philippi, *Arch. f. Naturg.*, 1899, I, p. 166. Chili, Patagonie.
- 10.556. COSTARICENSIS, Ridgw., *Hist. N. Am. B.* III, p. 285. Costa-Rica.
- 10.557. ? COOPERI, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1856, p. 255; Baird, Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 51, pl. 16. Californie.
- 10.558. LINEATUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 268; Wils., *Am. Orn.* VI, p. 86, pl. 55, f. 5; Cass., *B. Cal.*, p. 99; Sharpe, *Cat.*, p. 191 (pt.); *hyemalis*, Gm.; Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 7; *fuscus*, V., *l. c.*, pl. 5. Amérique N.-E.

2859. *Var. ELEGANS*, Cass., *Pr. Phil. Ac.*, 1853, p. 281 ;
Baird, Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 28, pl. 2, 5. Amérique N.-W.
2840. *Var. ALLENI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, Floride.
p. 514.
- 10.539. *ABREVIATUS*, Cab., in *Schomb. Reis. Guian.* III, États-Unis S., Basse-
p. 759 ; *albonotatus*, Gray (*descr. nulla*) ; *zonocercus*, Sel., *Tr. Z. S.* IV, p. 265, pl. 59 ; Ell., Calif., Amér. centr.
B. N. Am. II, pl. 55 ; *cabanisii*, Schl. et N. de l'Amér.
mérid.
- 10.540. *PENNSYLVANICUS* (Wils.), *Am. Orn.* VI, p. 92, pl. 54, Amér. N.-E., Amér.
f. 1 ; Baird, *B. N. Am.*, p. 50 ; *latissimus*, Wils. ; centr. et N. de
Sharpe, *Cat.*, p. 198 ; *wilsoni*, Bp. ; *platypterus*, l'Amér. mérid.
Bonn. et V.
- 10.541. *SWAINSONI*, Bp., *Comp. List B.*, p. 5 ; id., *Consp.* I, Amérique du N., centr.
p. 49 ; *F. buteo*, Audub. ; *vulgaris*, Sw. et Rich., et mérid. jusqu'à la
Faun. Bor.-Am., p. 47, pl. 27 ; *bairdii*, Hoy ; Patagonie.
Cass., *B. Cal.*, pp. 99, 237, pl. 41 ; *oxypterus*,
Cass., id., in *B. N. Am.*, p. 25, pl. 15, f. 2 ;
insignatus, Cass., *B. Cal.*, p. 102, pl. 51 ; *obso-*
letus, Sharpe (nec Gm.), *Cat.*, p. 184 ; *harlani*,
Bryant (nec Audub.)
- 10.542. *ALBICAUDATUS*, Vieill., *N. Dict.* IV, p. 477 ; Sharpe, Amérique trop. mérid.
Cat., p. 162 ; *leucurus*, Vieill. ; *pteroles*, Tem.,
Pl. Col. 56, 159 ; Schl., *Mus. P.-B.*, *Buteones*,
p. 15 ; *albicauda*, Less. ; *tricolor*, Harth.
2841. *Var. SENNETTI*, Allen, *Bull. Amer. Mus.*, 1895, Amérique centr. jus-
p. 144. qu'au Texas.
2842. *Var. COLONA*, Berl., *J. f. O.*, 1892, pp. 90-91. Iles Curaçoa, Bonaire.
- 10.543. *HYPOSPIDIUS*, Gurn., *Ibis*, 1876, p. 75, pl. 5 ; Sel. Colombie, Vénézuéla,
et Salv., *P. Z. S.*, 1877, pp. 487, 540. Amazone, Brésil.
- 10.544. *POECILOCHROUS*, Gurn., *Ibis*, 1879, pp. 176-78. Ecuador.
- 10.545. *ERYTHRONOTUS* (King.), *Zool. Journ.*, 1827, p. 424 ; Amérique S.-W., de
Darw., *Voy. Beagle*, B., p. 26 ; Sclat., *Ibis*, 1860, Patagonie au Pérou,
p. 25, pl. 1, f. 5 ; Sharpe, *Cat.*, p. 172 ; *braccata*, îles Malouines.
Meyen ; *varius*, Gould ; *tricolor*, d'Orb., *Voy. Am.*
mér., pp. 69, 106, pl. 50 ; *leucurus*, Lafr. (nec V.) ;
polyosoma, Schl. ; *albicaudatus*, Sel. et Sal.,
P. Z. S., 1875, p. 186.
- 10.546. ? *MELANOSTETHUS*, Phil., *Arch. f. Nat.*, 1899, I, p. 167. Santiago (Chili).
- 10.547. ? *POECILOGASTER*, Phil., *l. c.* Chili.
- 10.548. ? *MACRONYCHUS*, Phil., *l. c.*, p. 168. Valdivia (Chili).
- 10.549. ? *ATER*, Phil., *l. c.* Valdivia (Chili).
- 10.550. *UNICOLOR*, d'Orb. et Lafr., *Syn. Av.*, p. 7 ; d'Orb., Bolivie, Chili.
Voy. Ois., p. 109 ; Gurn., *Ibis*, 1876, pp. 69,
242 ; Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 657 ;
erythronotus (pt.), Sharpe.
- 10.551. *EXSUL*, Salv., *Ibis*, 1875, p. 571 ; Gurn., *Ibis*, 1876, Ile Juan Fernandez.
pp. 69, 76.

- 10.552. *POLIOSOMUS* (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Uran.*, Ois., p. 92, pl. 14; Less., *Traité*, p. 82; Sharpe, *Cat.*, p. 171. Chili, Patagonie, Malouines.
- 10.553. ?*PICTUS*, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1899, 1, p. 169; *ventralis*? Chili.
- 10.554. ?*ALBIGULA*, Phil., *l. c.*, p. 170. Valdivia (Chili).
- 10.555. *GALAPAGOENSIS* (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 9; *leucops*, Gray; *infulatus*, Kp.; *galapagensis*, Sund., *P. Z. S.*, 1871, p. 125; Sharpe, *Cat.*, p. 170. Iles Galapagos.

1579. PARABUTEO

- Antenor*, Ridgw. (1875, nec Montf.); *Parabuteo*, Ridgw. (1874); *Erythrocnema*, Sharpe (1874).
- 10.556. *UNICINCTUS* (Tem.), *Pl. Col.* 515; Sharpe, *Cat.*, p. 85; *teniurus*, Tsch., *Faun. Per.*, pl. 1. Amérique mérid. trop.
2845. *Var. HARRISI* (Audub.), *B. N. Am.*, pl. 592; *Ridgw.*, *Stud. Am. Falc.*, pp. 162, 502; *unicinctus* (pt.), auct. plur. États-Unis du S., Basse-Calif., Amér. centr.

1580. BUTEOLA

Buteola, Bonap. (1855).

- 10.557. *BRACHYURA* (Vieill.), *N. Dict.* IV, p. 477; *albifrons*, Max.; *melanoleucus*, Less.; *poliogaster*, Gray; *diadema*, Kp.; *minutus*, Pelz. Amér. centr., Guyane, Amazone jusqu'au Pérou.
- 10.558. *FULIGINOSA* (Scl.), *P. Z. S.*, 1858, p. 556; id., *Tr. Z. S.* IV, p. 267, pl. 62; Cass., in *Baird's, B. N. Am.*, pl. 15, f. 4; Ridgw., *Man. N. Am. B.* (1896), p. 256; *obsoletus* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 184. Amér. trop. jusqu'au N. du Mexique et la Floride.

1581. RUPORNIS

Rupornis, Kaup (1844).

- 10.559. *RUFICAUDA* (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1869, p. 155; id., *Ex. Orn.*, pl. 88; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 482; Sharpe, *Cat.*, p. 205. Du Nicaragua à Panama.
2844. *Var. GRISEICAUDA*, Ridgw., *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1875, p. 47; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 482. Du Mexique au Nicaragua.
2845. *Var. GRACILIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 578. Ile Cozumel (Yucatan).
- 10.560. *PUCHERANI* (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, p. 550; Scl. et Salv., *Ex. Orn.*, pp. 177, 180, pl. 89; Sharpe, *Cat.*, p. 205; *magnirostris*, d'Orb. (nec Gm.); *gularis*, Licht. Brésil S., Paraguay, Argentine.

- 10.561. SATURATA (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1876, p. 557; Bolivie, Argentine N.
Gurn., *Ibis*, 1876, p. 481.
- 10.562. RIDGWAYI, Cory, *Journ. Bost. Zool. Soc.*, 1885, Haïti, St.-Domingue.
p. 46; id., *Auk*, 1884, p. 4.
- 10.563. MAGNIROSTRIS (Gm.), *S. N. I.*, p. 282; *Pl. Enl.* 464; Amazone, Guyane,
Scl. et Salv., *Ex. Orn.*, p. 180; *insectivorus* (pl.), Colombie, petites
Spix; *macrorhynchus*, Pelz. Antilles.
- 10.564. NATTERERI (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1869, p. 152; Brésil S. et E., Pérou.
id., *Exot. Orn.*, pp. 175, 180, pl. 87; *magni-*
rostris, Tem., *Pl. Col.* 86 et auct. plur.
- 10.565. LEUCORRHŒA (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Uran.*, p. 91, Colombie, Vénézuéla,
pl. 15 (*leucorrhous*); Schl., *Mus. P.-B.*, *Asturina*, Brésil jusqu'au Pé-
rou, p. 5; Scl. et Salv., *Ex. Orn.*, p. 180.

1582. ASTURINA

Asturina, Vieill. (1816); *Asturisca*, Sundev. (1872).

- 10.566. NITIDA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 41; Tem., *Pl. Col.* 87, Brésil, Guyane, Co-
294; Cab., *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 757; lombie, Amazone.
cinerea, Vieill.; *striolatus*, Cuv.
- 10.567. PLAGIATA (Licht.), *Nomencl.*, p. 5; Schl., *Mus.* États-Unis S.-W.,
P.-B., *Astures*, p. 1; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, Amérique centr.
pl. 90; *nitida*, Cass. (nec Lath.)
- 10.568. ?ÆTHIOPS, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1899, I, p. 168. Chili.
- 10.569. ?ELEGANS, Phil., *l. c.*, p. 169. Chili.

1585. BUTASTUR

Butastur, Hodgs. (1845); *Poliornis*, Kp. (1844).

- 10.570. TEESA (Frankl.), *P. Z. S.*, 1851, p. 115; Gr. et Inde, Indo-Chine
Harw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 50; Oat., *B. Br.* N.-W.
Burmah, II, p. 193; *hyder*, Syk.
- 10.571. INDICUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 264; Sharpe, *Cat.* I, Asie E., Japon, For-
p. 297; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 45; *javanicus*, mose, Philippines,
Lath.; *poliogenys*, Tem., *Pl. Col.* 525; *fasciatus*, Célèbes, Moluques,
Hay; *barbatus*, Eyl.; *pygmæus*, Blyth; *pyrrho-* Malac., Born., Java.
genys, Gray.
- 10.572. LIVENTER (Tem.), *Pl. Col.* 458; Sharpe, *Cat.*, p. 296; Indo-Chine, Célèbes S.,
Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 49; *pallidus*, Less. Born., Java, Timor.
- 10.573. RUFIPENNIS (Sund.), *OEfr. Vet. Akad. Förh. Stockh.*, Afrique N.-E.
1850, p. 151; Strickl., *P. Z. S.*, 1850, p. 214,
pl. 22; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 95; *percnopsis*,
Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 29; *mulleri*, Heugl.

1584. GERANOAËTUS

Geranoaëtus, Kaup (1844); *Heteroaëtus*, Kp. (1850).

- 10.574. MELANOLEUCUS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 57; Patagonie, Chili, Pér.,
Sharpe, *Cat.*, p. 169; Schl., *l. c.*, p. 5; *fusces-* Colombie, Brésil.
sens, Vieill.; *aguia*, Tem., *Pl. Col.* 502.

1585. LEUCOPTERNIS

Leucopternis, Kaup (1847); *Pseudastur*, Blyth (1849).

- 10.575. PRINCEPS, *Scl*, *P. Z. S.*, 1865, p. 429, pl. 24; Costa-Rica.
Salv., *Ibis*, 1872, pp. 244-45; Sharpe, *Cat.*, p. 220.
10.576. PALLIATA, Pelz. (ex Nalt.), *Sitz. Akad. Wien*, 1861, Brésil S.
p. 11; *Scl* et Salv., *Exot. Orn.*, p. 97, pl. 49;
Salv., *Ibis*, 1872, p. 242; *polionotus*, Gr. (*descr.*
nulla); *melanonota*, Schl. (nec Vieill.).
10.577. GHIESBREGHTI (Du Bus), *Esq. Orn.*, pl. 4; *Scl* et Amérique centr., du S.
Salv., *Exot. Orn.*, p. 121; Gurn., *Ibis*, 1876, du Mex. à Panama.
p. 470 (4).
10.578. ALBICOLLIS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 56; Kp., *Isis*, Amazone, Guyane, Vé-
1847, p. 210; *picatus*, Shaw; *melanotus*, Vieill.; nézuéla, Trinidad.
paecilnotus, Tem., *Pl. Col.* 9.
10.579. OCCIDENTALIS, Salv., *Ibis*, 1876, p. 496. Ile Puna (Ecuador W.)
10.580. LACERNULATA (Tem.), *Pl. Col.* 457; Sharpe, *Cat.*, Brésil S.
p. 218; *skotopterus*, Max.; *scotoptera*, Kp.;
Schl., *Mus. P.-B., Astur.*, p. 41.
10.581. MELANOPS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 57; Tem., *Pl. Col.* Amazone, Guyane.
105; Kp., *Isis*, 1847, p. 210; Sharpe, *Cat.*, p. 220.
10.582. KAUP, Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 481; Amazone.
Sharpe, *l. c.*, p. 219; *kuhlü*, Bp. (*laps.*); *super-*
ciliaris, Pelz.; *Scl* et Salv., *Exot. Orn.*, p. 75,
pl. 58.
10.585. SEMIPLUMBEA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1861, p. 288; Amér. centr., de Costa-
Scl et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 61; Salv., *Ibis*, Rica à Panama.
1872, p. 245.
10.584. PLUMBEA, Salv., *Ibis*, 1872, p. 240, pl. 8; Sharpe, De l'Ecuad. à Panama.
l. c., p. 216.
10.585. SCHISTACEA (Sundev.), *Oefv. K. Vet. Akad. Förh.*, Amazone, Colombie.
1849, p. 152; *Scl*, *Tr. Z. S.* IV, p. 261, pl. 58;
Salv., *Ibis*, 1872, p. 245; Sharpe, *l. c.*, p. 216;
ardesiacus, Licht.

(1) M. Sharpe écrit "*ghiesbreghti*", mais cette orthographe n'est pas exacte. Aug. Ghiesbreght, de Bruxelles, explora le Mexique en 1838 et 1839 par ordre du Gouvernement belge, et il découvrit à cette époque l'oiseau qui lui fut dédié par le Vicomte B. Du Bus.

1586. URUBITINGA

Urubitinga, Lafr. ex Less. (1842); *Hypomorphnus*, Cab. (1844); *Spizigeranus*, Kaup (1844).

- ✓ 10.586. ANTHRACINA (Nitzsch ex Licht.), *Pteryl.*, p. 85; Amérique trop., Cuba, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 241; *M. urubitinga*, États-Unis S.-W. Lemb., *Aves de Cuba*, pl. 5, f. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 215; *mexicanus*, Du Bus; *gundlachii*, Cab., *J. f. O.*, 1854, extrah., p. 80; *unicinctus*, Léot.
- 10.587. ZONURA (Shaw), *Gen. Zool.* VII, p. 62; Sci., *P. Z. S.*, Amér. mérid., du Pa- 1858, p. 129; *urubitinga*, Gm.; Tem., *Pl. Col.* raguay au Vénézuéla 55; *fulvus*, *niger*, *ater*, Vieill.; *pieta*, Spix; *longipes*, Illig.; *brasiliensis*, Strickl. et jusqu'au Costa- Rica.
2846. *Var. RIDGWAYI*, Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, Mexique, Guatémala. pp. 77, 148; *zonura* (pl.), Lawr. et Sum., *B. S.-W. Mexico*, in *Bull. U. S. Mus.*, n° 4, p. 42.

1587. HARPYHALIAËTUS

Harpyhaliaëtus, Lafr. (1842); *Urubitornis*, Verr. (1856); *Plangus*, Sund. (1874).

- 10.588. CORONATUS (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 257; Tem., De la Patagonie à la *Pl. Col.* 254; Lafr., *R. Z.*, 1842, p. 175; Sharpe, Bolivie et le S. du *Cat.*, p. 221; *azara*, Kp.; *Pl. neogaus*, Sund. Brésil.
2847. *Var. SOLITARIA* Cab. et Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, Chili, Pérou, Colombie 1844, p. 264; Tsch., *Faun. Per.*, p. 94, jusqu'au Guatémala. pl. 2; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 490.

1588. HETEROSPIZIAS

Spizigeranus, Gray (1869, nec Kaup); *Heterospizias*, Sharpe (1874).

- 10.589. MERIDIONALIS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 56; Sharpe, Amérique mérid. trop. *Cat.*, p. 160; *rufulus*, Vieill.; *rutilans*, Licht.; jusqu'au Paraguay. Tem., *Pl. Col.* 25; *buzon*, Spix.

1589. BUTEOGALLUS

Buteogallus, Less. (1851).

- 10.590. ÆQUINOCTIALIS (Gm.), *S. N.* I, p. 265; Levaill., *Ois.* Guyane, Vénézuéla, *d'Afr.* I, p. 86, pl. 21; Sci. et Salv., *Nomencl.*, Colombie. p. 119; Sharpe, *Cat.*, p. 212; *buzon*, Dand.; *canthartoides*, Less.

1590. BUSARELLUS

Busarellus, Lafr. (1842); *Ichthyoborus*, Kaup (1850).

- 10.591. *NIGRICOLLIS* (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 53; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 84, pl. 20; Burm., *Th. Bras.* II, p. 47; *F. busarellus*, Daud.; *melanobronchos*, Shaw; *leucocephalus*, V.; *milvoides*, Spix, *Av. Bras.* I, pl. 1 d. Brésil, Amazone, Guyane.

SUBF. X. — MILVINÆ

1591. HALIASTUR

Haliastur, Selby (1840); *Dentiger*, Hodgs. (1844); *Ictinoaëtus*, Kp. (1850); *Milvaquila*, Burm. (1850).

- 10.592. *INDUS* (Bodd.), *Tabl., Pl. Ent.* 23; Bull., *Pl. Ent.* 416; Gr., *Gen. B.* I, p. 18; Jerd., *B. Ind.* I, p. 101; Sharpe, *l. c.*, p. 515; *pondicerianus*, Gm.; *garuda*, Less.; *rotundicauda*, Hodgs. Inde, Ceylan, Birmanie.
2848. *Var. INTERMEDIA*, Gurn., *Ibis*, 1863, p. 28, 1878, pp. 460-66; *indus* et *pondicerianus* (pl.), anct. plur.; *var. ambiguus*, Brügg.; *girrenera* (pl.), Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 54. Indo-Chine, Malacca, grandes îles de la Sonde, Philippines, Célèbes.
2849. *Var. GIRRENERA* (Vieill.), *Gal. Ois.* I, pl. 10; Sharpe, *l. c.*, p. 515; Gurn., *Ibis*, 1878, pp. 460-66; *leucosternus*, Gould; id., *B. Austr.* I, pl. 4; *indus* (pl.), Schl., *Vog. Ned. Ind., Valkv.*, p. 51, pl. 4, f. 5. Australie, Nouv.-Guinée, Moluques, Ténimber, Cérám, Amboine, Arou.
- 10.595. *SPHENURUS* (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 564; id., *Gal. Ois.* I, pl. 13; Gr., *Gen. B.* I, p. 18; Sharpe, *l. c.*, p. 516; *canorus*, Vig. et Horsf. Australie, Nouv.-Calédonie.

1592. MILVUS

Milvus, Cuv. (1800); *Hydroictinia*, Kaup (1844); *Lophoictinia*, Kp. (1847).

- 10.594. *ICTINUS*, Savig., *Ois. d'Égypte*, p. 239; Dress., *B. Eur.* V, p. 643, pl. 561; *F. milvus*, Lin.; *regalis*, Briss.; Dubois, *Fnc. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 43, pl. 10; *ruber*, Brm.; *vulgaris*, Selby (ex Lin., 1749). Europe, Asie Mineure, Afrique N.
- 10.595. *MELANOTIS*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 14, pl. 3 et 5^b; *niger*, *var. melanotis*, Schr.; *niger*, Radde, *Reis. Sibir.*, p. 153, pl. 1, f. 1; *major*, Hume; *govinda*, Swinh. (nec Syk.) Asie N.-E., Japon, Formose, Himalaya, Inde, Birmanie.

- 10.596. GOVINDA, Sykes, *P. Z. S.*, 1852, p. 81; Dubois, *Ois. Eur.* II, pl. 195; Brooks, *Ibis*, 1879, p. 282; *cheela*, Jerd.; *ater*, Blyth; *palustris*, Anders., *Pr. As. Soc. Beng.*, 1875, p. 142. Inde, Birmanie.
2850. Var. AFFINIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 40; id., *B. Austr.* I, pl. 21; Sharpe, *Cat.*, p. 525; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 60. Australie, petites îles de la Sonde, Célèbes.
- 10.597. MIGRANS (Bodd.), *Tabl. Pl. Ent.*, p. 28; Dress., *B. Eur.* V, p. 651, pl. 562; ? *korschun*, Gm.; Sharpe, *Cat.*, p. 522; *ater*, *austriacus*, Gm.; *russicus*, *castaneus*, Daud.; *fuscoater*, Mey. et Wg.; *regalis*, Pall.; *fuscus*, Brm.; *niger*, Bp. (ex Briss.); Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 48, pl. 11; *ætolius*, Schl.; *reichenowi*, Erl. Europe centr. et mérid., Asie centr., Afrique.
- 10.598. EGYPTIUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 261; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 22; *forskahli*, Gm.; *parasitus*, Daud.; *parasiticus*, Lath.; *ætolius*, Savig., *Ois. d'Égypte*, p. 260, pl. 5, f. 1; *leucorhynchus*, Brm. Europe S.-E., Afrique, Madagascar.
- 10.599. ISURUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 140; id., *B. Austr.* I, pl. 22; Schl., *Mus. P.-B.*, *Milvi*, p. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 526; *pacificus*, Strickl. Australie.

1595. GYPOICTINIA

Gypoictinia, Kaup (1850).

- 10.600. MELANOSTERNON (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 162; id., *B. Austr.* I, pl. 20; Kp., *Contr. Orn.*, 1850, p. 61; Sharpe, *Cat.*, p. 555. Australie.

1594. ELASAS

Elanoides!, Vieill. (1818); *Elasas*, Heine (1890).

- 10.601. FURCATUS (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 58, pl. 10; Audub., *B. Am.* I, p. 78, pl. 18; *yetapa*, Bonn. et Vieill.; *forficatus*, Ridgw. États-Unis, Amérique centr. et mérid. jusqu'au Brésil.

1595. NAUCLERUS

Naclerus, Vig. (1825); *Chelictinia*, Less. (1845); *Chelidopteryx*, Kp. (1845); *Cypselopteryx*, Kp. (1851).

- 10.602. RIOCOURI (Vieill.), *Gal. Ois.* I, p. 45, pl. 16; Tem., *Pl. Col.* 85; Vig., *Zool. Journ.*, 1825, p. 586; *africanus*, Sw. Afrique N.-E. et Sénégal.

1596. GAMPSONYX

Camponyx, Vig. (1825); *Chondrohierax*, Less.

- 10.605. SWAINSONI, Vig., *Zool. Journ.*, 1825, p. 69; Gray, *Gen. B.* I, p. 26, pl. 9; Forb., *Ibis*, 1881, p. 555; Ridgw., *Stud. Am. Falc.*, p. 150; *rufifrons*, Boie; *torquatus*, Less. Brésil, Guyane, Vénézuéla, Colombie, jusqu'au Nicaragua.

1597. ELANUS

Elanus, Savig. (1809).

- 10.604. CÆRULEUS (Desf.), *Mém. Ac. R. des Sc.*, 1787, p. 505, pl. 15; Strickl., *Orn. Syn.*, p. 157; Dress., *B. Eur.* V, p. 665, pl. 565; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. I, p. 41, pl. 9; *rociferus*, Lath.; *melanopterus*, Dand.; *clamosus*, Shaw; *cassius*, Savig.; *minor*, Bp. Europe mérid., Afrique, Inde, Ceylan, Indo-Chine W., Malacca.
- 10.605. HYPOLEUCUS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 127; id., *B. Asia*, pt. XII, pl. ; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 62; *intermedius*, Schl., *Mus. P.-B.*, *Milvi*, p. 7; id., *Vog. Ned. Ind.*, pp. 51, 68, pl. 24, ff. 2, 5. Philippines, Célèbes, Java, Bornéo, Sumatra.
- 10.606. AXILLARIS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.* I, p. 9; Gray, *Ann. N. H.*, 1845, p. 189; Gould, *B. Austr.* I, pl. 25; Sharpe, *l. c.*, p. 558; *notatus*, Gould. Australie.
- 10.607. LEUCURUS (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 565; Bp., *Comp. List.*, p. 4; *dispar*, Tem., *Pl. Col.* 519; Audub., *B. Am.*, pl^s 551, 552. S. des États-Unis, Amérique centr. et méridion. jusqu'au Chili et l'Argentine.
- 10.608. SCRIPTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 80; id., *B. Austr.* I, pl. 24. Australie.

1598. ICTINIA

Ictinia, Vieill. (1816); *Nertus*, Boie (1828); *Pacilopteryx*, Kaup (1845).

- 10.609. PLUMBEA (Gm.), *S. N.* I, p. 285; Tem., *Pl. Col.* 180; Vieill., *N. Dict.* XVI, p. 76; *cenchrus*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 58, pl. 10^{bis}. Amérique centrale et mérid. jusqu'au Brésil.
- 10.610. MISSISSIPPIENSIS (Wils.), *Am. Orn.* III, p. 80, pl. 25, f. 1; Gr., *Gen. B.* I, p. 26; *ophiophagus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, p. 44, pl. 17; *plumbeus*, Audub., *B. Am.*, pl. 117 (nec Gm.) S. des États-Unis jusqu'au Guatemala.

1599. ROSTHIRAMUS (1)

Rosthramus, Less. (1851); *Hamirostrum*, Sundev. (1872).

- 10.611. SOCIABILIS (Vieill.), *N. Dict.* XVIII, p. 518; d'Orb., Mexique, Amérique

(1) Les auteurs ne sont pas d'accord sur la nomenclature et la synonymie de ce genre ; j'ai suivi M. Gurney père ; son fils réduit le tout à deux espèces : *hamatus* et *sociabilis* et il a peut-être raison (Voy. *Cat. B. of Prey*, p. 26).

Voy. Am. mér., Ois., p. 75; Gurn., *Ibis*, 1879, p. 541; *hamatus*, Tem., *Pl. Col.*, texte de la pl. 61; Burm., *Th. Bras.* II, p. 46; id., *La Plata-Reise*, II, p. 455; *leucopygus*, Spix, *Av. Bras.*, p. 7, pl. 2; Schl., *Mus. P.-B.*, *Polybori*, p. 8; Sharpe, *Cat.*, p. 528.

- ✓2851. Var. PLUMBEA, Baird, Brew. et Ridgw., *Birds N. Am.* III, p. 208; Gurn., *Ibis*, 1879, p. 541; *hamatus*, Gundl.; *sociabilis* (pl.), auct. plur.; Mayn., *B. Florida*, pl. 1. Floride, Cuba.
- 10.612. HAMATUS (Tem.), *Pl. Col.* 61 et peut-être 251; Baird, Brew. et Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 209; Gurn., *Ibis*, 1879, p. 540; *sociabilis*, auct. plur. (nec Vieill.); Sharpe, *Cat.*, p. 527; *leucopygus*, Sharpe, *Hand-list*, I, p. 269. Nord de l'Amérique mérid.
2852. Var. TENIURA, Cab., *J. f. O.*, 1854, p. 80; Sharpe, *Cat.*, p. 528; Gurn., *l. c.*, p. 540. Amazone.

1600. MACHÆRHAMPHUS

Machæramphus, Westerm. (1848); *Machærorhamphus*, Hartl. (1854); *Stringonyx*, Gurney (1865).

- 10.615. ALCINUS, Westerm., *Bijl. tot de Dierk.* I, p. 29, pl. 12; Schl., *Handl. Dierk.* I, p. 168, pl. 1, f. 6; Sharpe, *Cat.*, p. 542; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 25. Ténassérin S., Malacca, Bornéo, Sumatra, Nouv.-Guinée.
- 10.614. ANDERSSONI (Gurn.), *P. Z. S.*, 1865, p. 618; id., *Tr. Z. S.* VI, p. 117, pl. 29; Anders., *B. Damara Land*, p. 25, ff. 4-5; Sharpe, *Cat.*, p. 545; *alcinus*, Bartl. (nec West.). Madagascar, Afrique S.-W.
- 10.615. REVOILI, Oust., *Bibl. Hautes études*, XXXI, art. X, p. 1 (1886). Somaliland.

1601. PERNIS

Pernis, Cuv. (1817); *Pterochalinus*, Glog. (1842).

- 10.616. APIVORUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 5, pl^s 564-66; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 54, pl^s 8 et 8^b; *polyorhynchus*, Bechst.; *lacertarius*, Pall.; *variabilis*, Koch; *tachardus*, Bonn. et V.; *communis*, Less.; *apium*, *vesparum*, *platyura*, Brm. Europe, Asie centr. jusqu'en Chine, Afrique, Madagascar.
2855. Var. ORIENTALIS, Tacz., *Mém. Acad. St-Petersb.*, 1891, p. 50; *apivorus*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 24. Sibérie E., Japon.
- 10.617. PTILONORHYNCHUS (Tem.), *Pl. Col.* 44; Steph., *Gen. Zool.* XIII, pl. 55; Sharpe, *Cat.*, p. 547; *cristata*, Cuv.; *torquata*, *ruficollis*, *albigularis* et *maculosa*, Less.; *elliotti*, Jam.; *bharatensis*, Hodgs. Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Java, Sumatra, Banka.

- 10.618. TWEEDDALEI, Hume, *Str. Feath.*, 1881, p. 446, Malacca.
1882, p. 515, pl.; *ptilorhynchus*, Tweed., *Ibis*,
1877, p. 286.
- 10.619. CELEBENSIS, Wall., *Ibis*, 1868, p. 17; Sharpe, *l. c.*, Célèbes.
p. 549; Mey. et Wg., *B. Col.* I, p. 65, pl^s 2 et 5;
cristatus (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*,
pl. 26, f. 4; *ptilorhyncha* (pt.), Wald.

1602. HENICOPERNIS

Dædalion, Bp. (1854, nec Savig., 1809); *Henicopernis*, Gray (1859).

- 10.620. LONGICAUDA (Garn.), *Voy. Coq. Zool.* I, p. 588, Nouv.-Guinée, Sala-
pl. 10; Sclat., *Ibis*, 1860, p. 522; Sharpe, *Cat.*, wati, Waigiou, My-
p. 541; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 22. sol, Arou, Misori.
2854. Var. INFUSCATA, Gurn., *Ibis*, 1882, p. 128; Sal- Nouv.-Bretagne.
vad., *Orn. Pap.* III, p. 505; *longicauda*,
Gurn., *Ibis*, 1879, p. 469.

1603. LEPTODON

Cymindis, Cuv. (1817, nec Latr., 1806); *Leptodon*, Sundev. (1855); *Odontrior-
chis*, Kaup (1844); *Regerhinus*, Kaup (1845).

- 10.621. CAYENNENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 265; *Pl. Enl.* 475; Amér. centr., Guyane,
Tem., *Pl. Col.* 270 (juv.); Sharpe, *Cat.*, p. 555; Amazone, Brésil.
*palliatu*s, Tem., *Pl. Col.* 204 (juv.); *cyanopus*,
Bonn. et V.; *buteonides*, Less.
- 10.622. UNCINATUS (Tem.), *Pl. Col.* 105, 104, 105; Sharpe, Amérique centr., Co-
Cat., p. 550; *vitticaudatus*, Max.; *cuculoides*, lombie, Vénézuéla,
Sw.; *pucherani*, Léot., *Ois. Trin.*, p. 40; *boli- Guyane, Brésil, Bo-
viensis*, Burm. livie, Ecuador.
- 10.623. MEGARHYNCHUS (Des M.), in *Casteln.*, *Voy. Zool.* Pérou.
Ois., p. 9, pl. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 552; Gurn.,
Ibis, 1880, p. 518.
- ✓ 10.624. WILSONI (Cass.), *Journ. Ac. Philad.* 1847, p. 21, Cuba.
pl. 7; Gurn., *Ibis*, 1880, p. 521; Sharpe, *l. c.*,
p. 555.

1604. BAZA

Lophotes, Less. (1851, nec Giorna); *Baza*, Hodgs. (1856); *Avicida*, Sw. (1857);
Lepidogenys, Gray (1859); *Hytiopus*, Hodgs. (1841); *Lophastur*, Blyth (1842).

- 10.625. LOPHOTES (Tem.), *Pl. Col.* 10; Gray, *List Gen. B.*, Inde, Ceylan, Indo-
p. 4; Schl., *Mus. P.-B.*, *Milvi*, p. 4; Sharpe, Chine, Malacca.
Cat., p. 552; *cristatus*, Bonn. et V.; *latham*i,
Gr.; *indicus*, Less.; *syama*, Hodgs.

- 10.626. MADAGASCARIENSIS (Smith), *S. Afr. Q. Journ.*, 1855, p. 285; Schl., *P. Z. S.*, 1866, p. 420; Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, p. 45, pl. 16; M.-Edw. et Grand., *Ois. de Madag.*, p. 68, pls 19-21; *verreauxii*, Hartl. (nec Lafr.) Madagascar.
- 10.627. CUCULOIDES (Sw.), *B. W. Afr.* 1, p. 104, pl. 1; Sharpe, *Cat.* 1, p. 554, pl. 11, f. 2. Afrique W. et équator.
- 10.628. EMINI, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1894, p. 165. Afrique équator.
- 10.629. VERREAUXI (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 150; Gray, *Gen. B.* 1, pl. 9, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 554; *buteoides*, Lafr.; *cafer*, Sundev. Afrique S.-E.
- 10.650. MAGNIROSTRIS, Gray, *Cat. Accip. Br. Mus.*, p. 19; Sharpe, *l. c.*, p. 556, pl. 10, f. 1; *crassirostris*, Kp., *Isis*, 1847, p. 559. Philippines.
- 10.651. ERYTHROTHORAX, Sharpe, *P. Z. S.*, 1875, p. 625; id., *Cat. B. Br. Mus.* 1, p. 557, pl. 10, f. 2; *magnirostris*, Schl., *Ned. Ind., Valkv.*, pl. 28, f. 4; *celebensis*, Schl., *Mus. P.-B., Rev. Accipitr.*, p. 155; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 75. Célèbes, Banggai, Soula.
- 10.652. JERDONI (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 464; *reinwardti* (pl.), Müll. et Schl.; *sumatrensis*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 210; Sharpe, *Cat. B.* 1, p. 557, pl. 11, f. 1; *incognita*, Hume. Sumatra, Malacca, Ténassérin, Birm., Himalaya E.
2855. Var. BORNEENSIS, Brüggem., *Abh. nat. Ver. Bremen*, 1878, p. 47; Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 557; *reinwardti* et *magnirostris* (pl.), Schl.; *jerdoni*, Salvad., *Ucc. Born.*, p. 11 (nec Blyth). Bornéo.
- 10.655. CEYLONENSIS, Legge, *Str. Feath.*, 1876, p. 247; id., *B. Ceyl.*, p. 94, pl.; Gurn., *Ibis*, 1880, pp. 462, 470. Inde S., Ceylan.
- 10.654. LEUCOPAIS, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 195. Palawan (Philippines).
- 10.655. SUBCRISTATA (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 140; id., *B. Austr.* 1, pl. 25; Gray, *Gen. B.* 1, p. 25; Gurn., *Ibis*, 1880, p. 462. Australie, Nouv.-Guinée S.-E.
- 10.656. REINWARDTI (Müll. et Schl.), *Nat. Versch. Av.*, p. 55, pl. 5; Schl., *Valk Vogels*, pp. 40, 77, pl. 27, ff. 1-5; Gr., *Gen. B.* 1, p. 25; Sharpe, *Cat.* 1, p. 558. Moluques.
2856. Var. STENOZONA, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 169, 1859, p. 155; Schl., *Ibis*, 1860, p. 522. Iles Key, Arou, Nouv.-Guin., Salawati, Misol, Misori, Timor.
2857. Var. GURNEYI, Rams., *Journ. Linn. Soc., Zool.*, 1881, p. 150. Iles Salomon.
2858. Var. BISMARCKI, Sharpe, in *Gould's B. N. Guin.* 1, pl. 4 (1888). Archipel Bismarck, Nouv.-Guinée N.-E.
2859. Var. TIMORLAOENSIS, Mey., *Abhandl. Ber. Zool. Mus. Dresden*, 1892-95, n° 5, p. 5. Ile Ténimber.

- 10.637. *REFA*, Schl., *Vog. Ned. Ind., Valkr.*, pp. 41, 78, Ternate, Batjan, Hal-
pl. 27, f. 4, pl. 28, ff. 1-5; Sharpe, *Cat.*, p. 560; mahera, Tidore,
Salvad., *Orn. Pap.* 1, p. 50; *reinwardti* (pt.), Morty (Moluques).
auct. plur.

SUBF. XI. — FALCONINÆ

1605. HARPAGUS

Harpagus, Vig. (1824); *Bidens*, Spix (1824); *Diodon*, Less. (1851); *Diplodon*, Nitzsch (1840).

- 10.658. *DIONON* (Tem.), *Pl. Col.* 198; Vig., *Zool. Journ.*, Brésil, Argentine.
1825, p. 558; Burm., *Th. Bras.* II, p. 402; *femo-*
ralis, Spix, *Av. Bras.* I, p. 45, pl. 8.
10.659. *BIDENTATUS* (Lath.), *Ind. Orn.* 1, p. 58; Tem., *Pl.* Brésil N., Guyane, Vé-
Col. 58, 228; Vig., *l. c.*; Sharpe, *l. c.*, p. 562; nézuéla, Trinidad,
rufiventer, Spix, *l. c.*, p. 44, pl. 6; *albiventer*, Colombie, Eeuador,
Spix, *l. c.*, pl. 7; *brasiliensis*, Less.; *rufipes*, Sw. Pérou.
10.640. *FASCIATUS*, Lawr., *Pr. Philad. Acad.*, 1868, p. 429; Du Guatémala à Pa-
Salvin, *Ibis*, 1870, p. 115; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 125. nama.

1606. MICROHIERAX

Hierax, Vig. (1824, nec Leach, 1816); *Microhierax*, Sharpe (1874).

- 10.641. *CERULESCENS* (Lin.); Sharpe, *Cat.*, p. 566; *benga-* Himalaya, Indo-Chine.
lensis, Blyth; *eutobnus*, Gray; Blanf., *Faun. Br.*
Ind., B. III, p. 452; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 274.
10.642. *FRINGILLARIUS* (Drap.), *Dict. class. H. N.* VI, p. 412, Malaeca, Sumatra,
pl. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 567; Gurn., *Ibis*, 1881, Java, Bornéo.
p. 274; *cærulescens*, auct. plur. (nec Lin.); Horsf.,
Zool. Res. Java, pl. 55; Tem., *Pl. Col.* 97; Schl.,
Mus. P.-B., *Falc.*, p. 55; *malayensis*, Strickl.
10.645. *LATIFRONS*, Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 257, pl. 7; Bornéo N.-W., ? îles
Gurn., *Ibis*, 1881, p. 274. Nicobar.
10.644. *MELANOLEUCUS* (Blyth), *J. As. Soc. Beng.* XII, pt. 1, Assam, Cachar, Chine
p. 179; Sharpe, *Cat.*, p. 568; Hume, *Str. Feath.* S.
II, p. 525; *sinensis*, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 254.
10.645. *ERYTHROGENYS* (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 96; Fras., Luçon (Philippines).
Zool. Typ., pl. 51; Sharpe, *l. c.*, p. 569; *sericeus*,
Kittl., *Kupf. Vög.*, p. 4, pl. 5, f. 5; *gironnieri*,
Eyd. et Soul., *Voy. Bonite, Ois.* I, p. 71, pl. 1.
10.646. *MERIDIONALIS*, Og.-Grant, *Ibis*, 1897, p. 220. Samar, Cebu, Mindan.

1607. POLIOHIERAX

Poliohierax, Kaup (1847).

- 10.647. *SEMITORQUATUS* (Smith), *Rep. Exp. Centr. Afr.*, Afrique N.-E., E. et S.

p. 44; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 1; Kp., *Isis*, 1847, p. 47; Sharpe, *l. c.*, p. 570; *castanonotus*, Hengl.; Sel., *Ibis*, 1864, p. 546, pl. 15.

- 10.648. *INSIGNIS*, Wald., *P. Z. S.*, 1871, p. 627; id., *Ibis*, Indo-Chine.
1872, pp. 200, 471; Tweed., in *Rowl. Orn. Misc.*
III, p. 169, pl. 105.

1608. SPIZIAPTERYX

Spiziapteryx, Kaup (1851); *Hemihierax*, Burm. (1861).

- 10.649. *CIRCUMCINCTUS*, Kaup, *P. Z. S.*, 1851, p. 45; Sharpe, Argentine.
l. c., p. 571; Sel., *Ibis*, 1862, p. 25, pl. 2; *puncti-*
pennis, Burm.

1609. NESHIERAX

Harpe, Bp. (1855, nec Lacép., 1802); *Harpa*, Sharpe (1874, nec Lamarek, 1799);
Nesierax, Oberh. (1899).

- 10.650. *NOVE-ZEALANDIE* (Gm.), *S. N. I.*, p. 268; Schl., *l. c.*, Nouv.-Zélande.
p. 55; Sharpe, *l. c.*, p. 572; Bull., *B. N. Zeal.*,
p. 1, pl. 1; Oberh., *Pr. Acad. N. Sc. Philad.*,
1899, p. 205; *australis* (pt.), H. et Jacq.

2860. *Var. BRUNNEA* (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 158; Nouv.-Zélande.
Bull., *l. c.*, p. 6; *australis*, Sharpe, *l. c.*,
p. 575; *ferox*, Peale; *novæ-zealandiæ*, Cass.

1610. DISSODECTES

Dissodectes, Selat. (1864); *Cerchneis* (pt.), Sharpe (1874).

- 10.651. *ARDESIACUS* (Bonh. et V.), *Encycl. méth.* I, p. 1258; Afrique trop.
Fritsch, *Vög. Eur.*, pl. 5, f. 4; Schl., *l. c.*, p. 21;
Sel., *Ibis*, 1864, p. 506; *concolor*, Tem., *Pl. Col.*
556; Sw., *B. W. Afr.* I, p. 112, pl. 5; *unicolor*, Sw.

- 10.652. *DICKINSONI*, Sel., *P. Z. S.*, 1864, pp. 248, 249; id., Zambèze, Nyasaland,
Ibis, 1864, p. 505, pl. 8; *dickersoni*, Sharpe,
l. c., p. 447 (*laps.*) Angola.

- 10.653. *ZONIVENTRIS* (Peters), *Sitz. K. Akad. Wiss. Berl.*, Madagascar.
1855, p. 7; Sharpe, *Cat.*, p. 447, pl. 14, f. 2;
M.-Edw. et Grand., *Ois. de Madag.* I, p. 55,
pl. 10; Sel., *Ibis*, 1864, p. 506.

1611. HIERACIDEA

Hieracidea, Gould (1857).

- 10.654. *BERIGORA* (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XV, 1827, Australie.
p. 184; Sharpe, *l. c.*, p. 421; *occidentalis*, Gould,
P. Z. S., 1844, p. 105; id., *B. Austr.* I, pl. 12.

- 10.655. *ORIENTALIS* (Schl.), *Naum.*, 1855, p. 254; Sharpe, *Australie, Tasmanie. l. c.*, p. 422; *berigora*, Gr. et auct. plur. (nec Vig. et H.); Gould, *B. Austr.* I, pl. 11.
2861. *Var. NOUVE-GUINEE*, Mey., *J. f. O.*, 1894, p. 89. *Nouv.-Guinée E.*

1612. *TINNUNCULUS* (1)

Tinnunculus, Vieill. (1807); *Cerchneis*, Boie (1826); *Egyptius*, Kp. (1829); *Falcu-*
cula, Hodgs. (1857); *Tichornis*, *Pacilornis*, Kp. (1844).

- 10.656. *ALAUDARIUS* (Gm.), *S. N. I.*, p. 279 (ex Briss., 1760); Europe, Asie au S.
Dubois, *Fne. ill., Ois.* I, p. 72, pl. 16; Dress., jusqu'à l'Inde, Afri-
B. Eur. VI, p. 113, pl. 584; *tinnunculus*, Lin.; que.
fasciatus, Retz.; *brunneus*, Bechst.; *murum*,
media, etc., Brm.; *rufescens*, Sw.; *interstinctus*,
M'Clel.
2862. *Var. NEGLECTA* (Schl.), *Mus. P.-B., Rev. Accip.*, Iles du Cap Vert.
p. 45.
2863. *Var. CANARIENSIS*, Koenig, *J. f. O.*, 1889, p. 265, Iles Madeire et Cana-
1890, pl. 1. rics.
2864. *Var. JAPONICA* (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 2, Japon, Chine N.
pls 1 et 1^b; Gurn., *Ibis*, 1881, pp. 456-465.
2865. *Var. SATURATA*, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1859, Himalaya, Chine S.,
p. 277; id., *Ibis*, 1866, p. 258; *atratus*, Indo-Chine, Afrique
Blyth; *interstinctus*, Gurn., *Ibis*, 1881, N.-E. (Montagnes).
pp. 456-465 (nec M'Clel.)
10.657. *RUPICOLUS* (Dard.), *Traité*, II, p. 155; Levaill., *Ois.* Afrique S.
d'Afr. I, p. 444, pl. 53; Sharpe, *Cat.* I, p. 429;
id., *P. Z. S.*, 1874, p. 581, pl. 68; *capensis*, Shaw.
10.658. *MOLUCCENSIS*, Hombt. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, Amboine, Bourou, Cé-
Zool. III, p. 46, pl. 1, f. 2; Gurn., *Ibis*, 1881, ram, Goram, Peling
p. 469; Sharpe, *l. c.*, p. 450; *tinnunculus*, Horsf. (Moluques).
(nec Lin.)
2866. *Var. ORIENTALIS*, Mey. et Wig., *B. Celebes*, p. 79; Halmahéra, Morty,
moluccensis (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, Ternate, Tidore,
Valke., pp. 6, 47, pl. I, f. 5. Batjan.
2867. *Var. OCCIDENTALIS*, Mey. et Wig., *Abh. Mus.* Célèbes, îles de la
Dresd., 1896, n° 2, p. 8; id., *B. Cel.*, p. 79; Sonde.
moluccensis (pt.), Schl., *Valke.*, pl. I, ff. 4, 5.
10.659. *RUPICOLOIDES* (Smith), *S. Afr. Q. Journ.*, 1850, Afrique S.
p. 258; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 92; Sharpe,
l. c., p. 452; *smithii*, Schl.
2868. *Var. ARTHURI*, Gurn., *List Diurn. B. of Pr.*, p. 156. Mombasa (Afrique E.)
10.660. *FIELDI*, Elliot, *Field Columb. Mus. Orn.* I, p. 58. Somalil., Afr. E. angl.

(1) Pour la priorité du genre *Tinnunculus*, voy. Gurney, *Ibis*, 1881, p. 455.

- 10.661. *ALOPEX*, Heugl., *Syst. Uchers.*, p. 10; id., *Orn. N.-O. Afr.* 1, p. 41; id., *Ibis*, 1861, p. 69, pl. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 452, pl. 14, f. 1, *rupicolus*, Antin. (nec Daud.) Afrique N.-E.
2869. *Var. REICHENOWI*, Dubois; *deserticola*, Rehw., *Orn. Monatsb.* VII, 1899, p. 190 (nec Mearns, 1892). Togoland, Côte d'Or. +
- 10.662. *CENCHROIDES* (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 185; Gould, *B. Austr.* 1, pl. 15; Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 29. Australie, Tasmanie.
- 10.663. *PUNCTATUS* (Tem.), *Pl. Col.* 45; Schl. et Pol., *Faun. Madag., Ois.*, p. 55, pl. 11, f. 5; Schl., *Rev. Accip.*, p. 44. Ile Maurice.
- 10.664. *NEWTONI*, Gurn., *Ibis*, 1865, p. 54, pl. 2; Schl. et Pol., *l. c.*, pl. 11, ff. 1, 2; *gracilis*, Hartl. (nec Less.); *punctatus* (pt.), Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 28. Madagascar.
- 10.665. *GRACILIS* (Less.), *Traité*, p. 95; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 25; Schl. et Pol., *l. c.*, p. 54, pl. 11, ff. 4, 5. Seychelles.
- 10.666. *NAUMANNI* (Fleisch), in *Fisch., Jahrb. f. Forstm., Jäg. u. Jagdfr.*, 1818, pp. 175-176; Sharpe, *l. c.*, p. 455; Rehw., *Orn. Mon.*, 1898, p. 142; *xanthonyx*, Natl.; *tinnunculoides*, Tem.; *cenchris*, Naum., *Vög. Deutschl.* 1, p. 518, pl. 29 (1822); Dress., *B. Eur.* VI, p. 125, pl. 585; *tinnuncularius*, Roux. Europe S. et S.-E., Afrique, Asie S.-W.
2870. *Var. PEKINENSIS* (Swinh.), *P. Z. S.*, 1870, pp. 442, 448, 1871, p. 541; *cenchris* (pt.), auct. plur. Himalaya, Chine.
- 10.667. *SPARVERIUS* (Linn.); Audub., *B. Am.* 1, p. 94, pl. 22; Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 45; Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 12, 15; *novaboracensis*, Gm. Amérique sept. jusqu'au N. de l'Amérique mérid.
2871. *Var. BREVIPENNIS*, Berl., *J. f. O.*, 1892, p. 91. Iles Curaçao, Bonaire, Aruba.
2872. *Var. DESERTICOLA* (Mearns), *Auk*, 1892, p. 265. Amérique N.-W.
2873. *Var. PENINSULARIS* (Mearns), *l. c.* Basse-Californie.
2874. *Var. CINNAMOMINA* (Swains.), *An. in Menag.*, p. 281; Sharpe, *l. c.*, p. 459; *sparverius* (pt.), auct. plur.; *australis*, Ridgw., *Pr. Phil. Acad.*, 1870, p. 149. Amérique mérid. jusqu'au détroit de Magellan.
2875. *Var. AEQUATORIALIS* (Mearns), *Auk*, 1892, p. 269. Ecuador.
- 10.668. *CARIBBEARUM* (Gm.), *S. N.* 1, p. 284; Gurn., *Ibis*, 1881, pp. 547-61; Grisb., *Ibis*, 1882, p. 491. Petites Antilles.
- 10.669. *ISABELLINUS* (Sw.), *An. in Menag.*, p. 281; *Pl. Ent.* 444; Sharpe, *l. c.*, p. 441; Gurn., *Ibis*, 1881, pp. 547, 561. Guyane, Vénézuéla.
- ✓ 10.670. *DOMINICENSIS* (Gm.), *S. N.* 1, p. 288; Ridgw., *Pr.* Antilles, Floride.

- ✓ *Phil. Acad.* 1870, p. 149; Sharpe, *l. c.*, p. 459.
 10.671. SPARVERIOIDES (Vig.), *Zool. Journ.*, 1828, p. 456; Cuba.
 d'Orb., in *Ram. de la Sagra, H. N. Cuba, Ois.*,
 p. 50, pl. 1; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 50; Sharpe,
l. c., p. 445; *leucophrys*, Ridgw.

1615. ERYTHROPUS

- Erythropus*, Brehm (1828); *Pannyschistes*, Kaup (1829); *Cerchneis* (pt.), Sharpe.
 10.672. VESPERTINUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 95, Europe S. et S.-E.,
 pl. 582; *rufus*, Scop.; *rufipes*, Beseke; Naum., Afrique W.
Vög. Deutschl. I, p. 511, pl. 28; *erythrourus*,
 Raf.; *rubripes*, Less.; *pallidus* et *minor*, Brm.
 2876. Var. AMURENSIS, Radde, *Reis. Sibir.* II, p. 102, Amour, Chine, Afri-
 pl. 1; Gurn., *Ibis*, 1868, p. 41, pl. 2; Dav. que E. et S.-W.
 et Oust., *Ois. Chine*, p. 54; Sharpe, *Cat.*,
 p. 445; *vespertinus* (pt.), auct. plur.; *con-*
color, Gurn.; *raddei*, F. et Hartl.

1614. HYPOTRIORCHIS

- Falco* (pt.), auct. plur.; *Hypotriorchis*, Boie (1826); *Æsalon*, Kaup (1829); *Den-*
dروفalco, Gray (1840); *Lithofalco*, Blas. (18 ?); *Chicquera*, Bp. (1854);
Turantia, Blyth (1865); *Rhynchofalco*, Ridgw. (1875); *Tolmerus*, Heine
 (1890).
 10.675. CONCOLOR (Tem.), *Pl. Col.*, texte de la pl. 550; Afrique N.-E. et E.,
 Gould, *B. Eur.* I, pl. 25; Dubois, *Ois. Eur.* I, Arabie, Madagas-
 p. et pl. 22; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, car.
Ois., p. 57, pls 11, 12; *schistaceus*, Hemp. et Ehr.,
Symb. Phys., Aves, pl. 19; *tibialis*, Kp.
 10.674. ELEONORÆ (Gené), *Rev. Zool.*, 1859, p. 105; Dress., Europe mérid., Pa-
B. Eur. VI, p. 105, pl. 585; Sharpe, *Cat.*, p. 404; lestine, Afrique N -
arcadicus, Linderm.; *plumbeus*, Brm.; *dichrous*, E., Madagascar.
 Erh.; *radama*, Roch et Newt.
 10.675. SUBBUTEO (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 69, pl. 579; Europe et Asie jus-
 Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 65, pl. 14; qu'au 63° I. N.,
barletta, Daud.; *hirundinum* et *arboreus*, Brm. Afrique.
 2877. Var. GRACILIS, Brm., *Vogelf.*, 1855, p. 27; Erl., Afrique N.
J. f. O., 1898, p. 461, pl. 10; *horus*, Hengfl.,
Ibis, 1860, p. 409; *subbuteo* (pt.), auct. plur.
 10.676. CUVIERI (Smith), *S. Afr. Q. Journ.*, 1850, p. 592; Afrique S. et W.
 Sharpe, *Cat.*, p. 400; *boschii*, Schl., *Nederl.*
Tijdschr., 1861, p. 125, pl. 5; id., *Mus. P.-B.*,
Falc., p. 25.
 2878. Var. FASCHINUCHA (Ridgw. et Neum.), *Orn. Mo-* Afrique E.
natsb., 1895, p. 114, 1899, pl. 1.

- 10.677. SEVERUS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1822, p. 155; Schl., *Vog. Ned. Ind., Valkv.*, pp. 4, 45, pl. 2, ff. 2, 5; *aldrovandi*, Tem., *Pl. Col.* 128; *rufipedioides*, Hodgs.; *guttata*, Gray. Himal., Bengal, Ceylan, Birm., Malacca, Philipp., îles de la Sonde, Célèbes, Ternate, Halmah., Céram, Salawati, Jobi, Nouv.-Guinée S., Nouv.-Bretagne.
2879. *Var.* PAPUANA (Mey. et Wg.), *Abh. Mus. Dresd.*, 1895, n° 5, p. 6; id., *B. Cel.*, p. 84. Nouv.-Guinée.
2880. *Var.* INDICA (Mey. et Wg.), *B. Cel.*, p. 84. Inde.
- 10.678. RELIGIOSUS (Sharpe), *Cat.* I, p. 597; Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, p. 102; *frontatus*, Schl. (nec Gould), *Vog. Ned. Ind., Valkv.*, pl. 2, ff. 5, 6 (nec f. 4). Céram, Halmahera.
- 10.679. LUNULATUS (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.* II, p. 15; Wal., *Ibis*, 1868, p. 5; *longipennis*, Sw.; *frontatus*, Gould; id., *B. Austr.* I, pl. 10. Australie, Tasmanie.
- 10.680. FUSCO-CERULESCENS (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 90; Sharpe, *Cat.*, p. 400; *thoracicus*, Licht.; *femorialis*, Tem., *Pl. Col.* 121, 545; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 5; *aurantius*, Heerm. Texas S., Amérique centr. et mérid.
2881. *Var.* OPHRYOPHANES, Salvad., *Boll. Musei Torino*, X, n° 208, p. 20 (1895). Colonia (Paraguay).
- 10.681. RUFIGULARIS (Daud.), *Traité*, II, p. 151; Gr., *Gen. B.* I, p. 20; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 5, 597; *albicularis*, Daud.; ? *aurantius*, Lath.; Elliot, *B. N. Am.* II, pl. 52; Schl., *Rev. Acc.*, p. 40; *thoracicus*, Don.; *cucullatus*, Sw.; *aurantiacus*, Kp.; *haemorrhoidalis*, Hahn et Kust. Amérique centr. et mérid.
- 10.682. DEIROLEUCUS (Tem.), *Pl. Col.* 548; Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 24; Pelz., *l. c.*, p. 597; ? *aurantius*, Gm.; Sharpe, *Cat.*, p. 402. Du Guatémala au Brésil et Pérou.
- 10.685. CHICQUERA (Daud.), *Traité*, II, p. 121; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 2; Schl., *l. c.*, p. 20; *typus*, Bp.; Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, p. 105. Inde.
- 10.684. RUFICOLLIS (Swains.), *B. W.-Afr.* I, p. 107, pl. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 404; *macroductylus*, Sw.; *chicquera*, Heugl. (nec Daud.) Afrique trop.
- 10.685. ÆSALON (Tunst. ex Briss.), *Orn. Brit.*, p. 1 (1771); Dress., *B. Eur.* VI, p. 85, pl. 580, 581; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* I, p. 67, pl. 15; *regulus*, Pall.; *lithofalco* et *falconiarum*, Gm.; *smirilus*, Savig.; *sibiricus*, Shaw; *cæsius*, Mey.; *orientalis*, Brm.; *alaudarius*, Severtz.; *merillus*, Sharpe (1899). Europe et Asie jusqu'au 72° l. N., Afrique N.
2882. *Var.* PALLIDA, Sushk., *Bull. Br. Orn. Club*, XI, p. 5. Steppes des Kirghiz.

- ✓ 10.686. COLUMBARIUS (Lin.); Audub., *B. Am.* I, p. 88, pl. 21; Schl., *l. c.*, p. 19; Vieill., *Ois. Am. sept.* I, p. 59, pl. 11; *obscurus*, Gm.; *intermixtus*, Daud.; *temerarius*, Audub.; *auduboni*, Blackw. Amérique sept., Antilles, N. de l'Amérique mérid.
2883. Var. SUCKLEYI (Ridgw.), *Bull. Essex Inst.* V, p. 201 (1875); Baird, Brew. et Rid., *Land B. of N. Am.* III, p. 147. Amérique N.-W. (De Sitka à la Californie).
2884. Var. RICHARDSONI, Ridgw., *Pr. Phil. Acad.*, 1870, p. 147; B., Br. et Rid., *l. c.*, p. 148; Bish., *N. Am. Fauna*, XIX, 1900, p. 75; *salon*, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, pt. 2, p. 57, pl. 25 (fem.) Intérieur de l'Amérique du N. jusqu'au Texas et l'Arizona.

1615. FALCO

Falco, Lin. (1766); *Gennaia*, Kaup (1847); *Gennadas*, Heine (1890).

- 10.687. PEREGRINATOR, Sundev., *Physiogr. Tidsskr. Lund.* 1857, p. 177; Gould, *B. of Asia*, pt. III, pl.; Sharpe, *l. c.*, p. 582; *shaheen*, Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl^s 12, 28; *sultaneus*, Hodgs.; *ruber*, Schl., *l. c.*, p. 5. Inde.
2885. Var. ATRICEPS, Hume, *Ibis*, 1869, p. 556; Gurn., *Ibis*, 1882, p. 291, pl. 10. Inde N. et N.-W.
- 10.688. PEREGRINUS, Tunst., *Orn. Brit.*, p. 4 (1774, ex Briss.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 51, pl. 572; *orientalis*, *hornotinus*, *communis*, Gm. (1788); Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 59, pl. 45; *calidus*, Lath.; *lunulatus*, Daud. (nec Lath.); *abietinus*, Bechst.; *pinetarius*, Shaw; *gentilis*, Wils.; *cornicum*, *griseiventris*, *leucogenys*, Brm.; *anatum*, Bp.; *micrurus*, Hodgs.; *peregrinoides*, Vian. Europe, Asie, Amérique sept., Afrique.
2886. Var. PEALEI, Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1875, p. 201; Bd., Br. et Rid., *Land B. N. Am.* III, p. 157; *polyagrus*, Cass., *B. Calif.*, pl. 16 (fig. d'arrière). Amérique N.-W. jusqu'à l'Orégon, îles Aléoutes et du Com-mandeur.
2887. Var. CASSINI, Sharpe, *Ann. N. H.* XI, 1875, p. 255; id., *Cat.*, p. 584; ? *nigriceps*, Cass., *U. S. Astr. Exped.*, 1855, p. 176, pl. 14. Chili, Malouines.
- 10.689. MELANOGENYS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 159; id., *B. Austr.* I, pl. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 585; *peregrinus*, Vig. et Horsf. (nec auct.); *macropus*, Sw.; *communis* (pt.), Schl., *Falk Vog.*, pl. 1, f. 2. Australie.
2888. Var. ERNESTI, Sharpe, *Ibis*, 1894, p. 545; Gurn., *Cat. B. of Prey*, p. 29; *melanogenys* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 586. Java, Bornéo, Sumatra, Philippines, Nouv.-Guinée, îles Fidji.

- 10.690. MINOR, Bonap., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 484; Sharpe, *Cat.*, p. 585, pl. 12; Gurn., *Ibis*, 1882, p. 506; Dress., *B. Eur.* VI, p. 45, pl. 575; *peregrinoides*, Sm. (nec Tem.); *radama*, Bp.; *var. capensis*, Grill.
2889. *Var.* PUNICA, Levaill. jun., *Expl. de l'Algérie, Ois.*, pl. 4 (*punicus*); Gurn., *Ibis*, 1882, p. 507; *brookei*, Sharpe, *Ann. Mag. N. H.* XI, 1875, pp. 20, 222; *barbarus* (pt.), Shpe, *Cat.*, p. 586. Europe S., Afrique N.
- 10.691. BARBARUS (Lin.); Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 5; Salv., *Ibis*, 1859, pl. 6; Dress., *B. Eur.* VI, p. 47, pl. 574; *peregrinoides*, Tem., *Pl. Col.* 479; *F. lanarius alphanet*, Schl. Afrique N. et N.-E., Sénégal, Europe S., Asie S.-W., Inde N.-W.
- 10.692. BABYLONICUS, Gurn., *Ibis*, 1861, p. 218, pl. 7; Gould, *B. Asia*, pt. XX, pl.; Anders., *P. Z. S.*, 1876, pl. 25; Sharpe, *Cat.*, p. 587; *peregrinoides*, Hodgs.; *tsherniaievi*, Severtz. Mésopotamie, Asie centr. jusqu'au N.-W. de l'Inde.
- 10.695. FELDEGGII, Schl., *Abhandl. Geb. Zool.*, p. 5, pl. 10, 11 (1841); Sharpe, *l. c.*, p. 589; *lanarius*, Schl., *Crit. Uebers.*, p. 2; Jaub. et Lap., *Rich. Orn.*, p. 54, pl. 5; *rubens*, Thien.; *peregrinoides*, Fritsch (nec Tem.); *biarmicus*, Tayl. (nec Tem.); *tanypterus*, König-Warth.; *lanarius graecus*, Schl.
2890. *Var.* TANYPTERA, Schl., *Abh. Geb. Zool.*, p. 8, pl. 12, 15; *biarmicus*, Rüpp., *Neue Wrb.*, p. 44 (nec Tem.); *cervicalis*, Horsf. et M.; *lanarius nubicus*, Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 15. De la Sénégal jusque dans le N.-E. de l'Afrique.
- 10.694. BIARMICUS, Tem., *Pl. Col.* 524; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 58, pl. 2; *chicqueroides*, Smith; *lanarius cervicalis* et *lanarius capensis*, Schl. Afrique S.
- 10.695. JUGGUR, Gray, *Ill. Ind. Orn.* II, pl. 26; Schleg., *Abh. Geb. Zool.*, p. 15, pl. 15; Sharpe, *Cat.*, p. 595; *thermophilus*, Hodgs.; *cherrug*, Blyth (nec Gray). Belouchistan, Afghanistan, Inde, Assam.
- 10.696. HYPOLEUCUS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 462; id., *B. Austr.* I, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 594; Gurn., *Ibis*, 1882, p. 451. Australie.
- 10.697. SUBNIGER, Gray, *Ann. N. H.*, 1845, p. 571; id., *Gen. B.* I, pl. 8; Gould, *B. Austr.* I, pl. 9. Australie.

1616. HIEROFALCO

Hierofalco, Cuv. (1817); *Pnigohierax*, Cab. (1872).

- 10.698. SACER (Cm. ex Briss.), *S. N.* I, p. 273; Schl., *l. c.*, p. 16; Dress., *B. Eur.* VI, p. 59, pl. 576, 577; Europe S.-E., Asie centr. jusqu'en Chine

- lanarius*, Pall.; Gould, *B. Eur.* I, pl. 20; *cherrug*, Gray, *Ill. Ind. Orn.*, pl. 25; *cyanopus*, Thien.; *saker*, Sharpe, *Cat.*, p. 417; *gurneyi*, Menzb., *Orn. Turkest.*, p. 285. et le N.-W. de l'Inde.
2891. *Var. MULVIFES* (Hodgs.), in *Gr. Zool. Misc.*, p. 81; Thibet, Mongolie, Né-
Jerd., *Ibis*, 1871, p. 240; Gurn., *Ibis*, 1882, paul, Belouchistan,
p. 445; Blauf., *Faun. Brit. Ind.*, B. III, Turkestan.
p. 424; *hendersoni*, Hume, *Ibis*, 1871, p. 407;
id. et Hend., *Lahore to Yark.*, p. 171, pl. 4;
Menzb., *Orn. Turk.*, pl. 6; *saker* (pt.), Sharpe,
Cat., 417.
2892. *Var. LORENZI*, Menzb., *Bull. Br. Orn. Club*, XI, Sibérie centrale.
p. 5 (1900-1901).
- 10.699. *MEXICANUS* (Schl.), *Abhandl. Geb. Zool.*, p. 15; id., États-Unis W., Mexi-
Mus. P.-B., Falc., p. 18; Sharpe, *l. c.*, p. 420; que.
polyagrus, Cass., *B. Calif.*, p. 88, pl. 16.
- 10.700. *CANDICANS* (Gm.), *S. N.* I, p. 273; Schl., *l. c.*, p. 7; Groenland, Amérique
Sharpe, *P. Z. S.*, 1873, p. 417, pl. 59; Dress., N.-E. (arctique),
B. Eur. VI, p. 21, pl. 368, 369; *islandus*, Brün. Europe N.-W.
(pt., nec Gm.); *rusticolus* (pt.), Mohr; *islandus*
albus et maculatus, Gm.; *groenlandicus*, Turt.
(nec Dand.); *uralensis*, Menzb.
- 10.701. *RUSTICOLUS* (Lin.); Stejn., *Auk*, 1885, p. 187; Amérique arctique.
islandus (pt.), Brün.; *islandus fuscus*, Müll.;
groenlandicus, Dand.; *arcticus*, Holb.
2893. *Var. GYRFALCO* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 15, N. de l'Europe, acci-
pl. 367; Schl., *Vog. Nederl.*, pl. 4, 5; *nor-* dentellement l'Eu-
wegicus, Tristr.; Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, rope centrale.
p. 42.
2894. *Var. OBSOLETA* (Gm.); Stejn., *Auk*, 1887, p. 187; Labrador, baie d'Hud-
labradora, Audub., *B. Am.*, pl. 196; *labra-* son, Canada.
dorus, Dress., *Rowl. Orn. Misc.* I, p. 185,
pl. 5; Gurn., *Ibis*, 1882, pp. 579-81.
2895. ?*Var. HOLBOELLI*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1873, p. 415; Groenland S.
id., *Cat. B. I.*, p. 415, pl. 15; *groenlandicus*,
Schl. (pt.); *arcticus*, auct. plur. (nec Gm.);
islandus (pt.) et *rusticolus* (pt.), Stejn., *Auk*,
1885, pp. 187, 188.
2896. *Var. ALTAICA*, Menzb., *Orn. Turk.*, p. 272. M^{ts} Altaï, Turkestan.
- 10.702. *ISLANDUS* (Gm.), *S. N.* I, p. 271 et auct. plur. (nec Islande.
Brünn); Gould, *B. Gl. Br.*, pt. XII, pl.; *islandi-*
cus, Hauc.; Schl., *l. c.*

FAM. V. — PANDIONIDÆ

1617. PANDION

Pandion, Savig. (1809); *Triorches*, Leach (1816); *Balbuzardus*, Flem. (1828).

- 10.703. *NALIAËTUS* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 159, pl. 586, Europe et Asie jus-
587; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. I, p. 8, pl. 2; *arun-* qu'au 68° l. N.,
dinaceus, Gm.; *fluvialis*, Savig.; *balbuzardus*, Afrique.
Dumt.; *alticeps*, *planiceps*, Brm.; *indicus*, Hodgs.;
albigularis, *minor*, *fasciatus*, Brm.
2897. *Var.* *CAROLINENSIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 265; Audub., Amérique du 65° l. N.
B. N. Am., pl. 81; Bd., Brew. et Rid., *B.* au 18° l. S.
N. Am. III, p. 182; *cayennensis*, Gm.; *pisca-*
trix et *americana*, Vieill., *Ois. Am. sept.* I,
pp. 29, 51, pl. 4.
2898. *Var.* *LEUCOCEPHALA*, Gould, *Syn. B. Austr.* III, Australie, Océanie,
pl. 6; id., *B. Austr.* I, pl. 6; Schl., *Vog. Ned.* Malacca.
Ind, pp. 42, 52, pl. 5, f. 5; *gouldi*, Kp.

1618. POLIOAËTUS

Ichthyaëtus, Lafr. (1859 sans indication du type); *Polioaëtus*, Kaup (1850).

- 10.704. *ICHTHYAËTUS* (Hors.), *Tr. Linn. Soc.*, 1822, p. 156; Inde, Ceylan, Indo-
id., *Zool. Res. Java*, pl. 54; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, Chine, Malacca,
pp. 15, 62, pl. 5, ff. 1, 2; *unicolor*, Gray, *Ill. Ind.* grandes îles de la
Zool. I, pl. 49; *plumbeus*, Hodgs.; *bicolor*, Gray; Sonde, Célèbes, Phi-
horsfieldi, Blyth; *hucarius*, Hodgs. lippines.
- 10.705. *HUMILIS* (Müll. et Schl.), *Verh. Nat. Ges. Natuurk.* Cachar, Birmanie, Ma-
Comm., *Aves*, 1859-44, p. 47, pl. 6; Sharpe, *Cat.*, lacca, Bornéo, Cè-
p. 454; *nanus*, Blyth; *plumbeus humilis*, Mey, et lèbes, Peling.
Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, n° 2, p. 7.
2899. *Var.* *MAJOR*, Mey. et Wg., *B. Celebes*, p. 44. Rég. subhimalayenne,
de l'Afgh. à l'Assam.

FAM. VI. — ASIONIDÆ (1)

SUBF. I. — ASIONINÆ

1619. ASIO

Asio, Briss. (1760); *Otus*, Cuv. (1799); *Nyctalops*, Wagl. (1852); *Brachyotus*,
Gould (1857); *Phasmoptyx*, Kp. (1848); *Rhinoptynx*, Kp. (1852); *Nisuelia*,
(pt.), Bp. (1854).

10.706. *OTUS* (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, p. 251, pl. 503; Europe et Asie jus-

(1) Voy.: Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* II (1875).

- Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. I, p. 128, pl. 29; *albicolis*, *italicus*, Daud.; *O. asio*, Leach; *europæus*, Steph.; *vulgaris*, Flem.; *communis*, Less.; *aurita*, Ren.; *sylvestris*, *arboreus*, *gracilis*, *major*, *minor*, *assimilis*, Brm.; *verus*, Finsch.
2900. *Var.* CANARIENSIS, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 54. Canaries.
2901. *Var.* WILSONIANA (Less.), *Traité*, p. 110; Baird, *B. N. Am.*, p. 55; *otus*, Wils. (nec Lin.); Audub., *B. Am.*, pl. 585; *americanus*, Steph.; *zonurus*, Kp.; *peregrinator*, Strickl. Amérique sept. tempérée jusqu'au plateau Mexicain.
- 10.707. CLAMATOR, Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 52, pl. 20; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, *Aves*, II, p. 5; *mexicana*, Gm.; Sharpe, *Cat.* II, p. 251; *maculata*, Vieill.; *longirostris*, Spix; *americanus*, Burm., *Th. Bras.* II, p. 125. Amérique mérid., du Brésil à Panama.
2902. *Var.* MIDAS (Licht.), *Nomencl. Av.*, p. 6; Schleg., *Mus. P.-B.*, Oti, p. 2. Brésil S., E., Argentine.
- 10.708. MADAGASCARIENSIS (Smith), *S. Afr. Q. Journ.* II, p. 516; Puch., *Arch. du Mus.* IV, p. 528, pl. 25; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, Ois., pl. 58. Madagascar.
- 10.709. ACCIPITRINUS (Pall.), *Reise Russ. Reichs*, I, p. 455; Dress., *B. Eur.* V, p. 257, pl. 504; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. I, p. 151, pl. 50; *minor*, Gm.; *brachyotus*, Forst.; *arctica*, Sparrm.; *palustris*, Bechst.; *tripennis*, Schr.; *caspia*, Shaw; *agolius*, Pall.; *microcephalus*, Leach; *brachyura*, Nilss.; *sandwichensis*, Bloxh.; *uhula*, Less.; *palustris*, *agrarius*, *leucopsis*, Brm.; *breviarius*, Licht.; *cassinii*, Brew.; *gmelini*, Malm.; *mcilhennyi*, Stone. Cosmopolite.
2905. *Var.* PORTORICENSIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* IV, 1882, p. 566. Porto-Rico.
2904. *Var.* GALAPAGOENSIS (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 10; Darw., *Voy. Beagl.*, B. III, p. 52, pl. 5; *accipitrinus* (pt.), Sharpe. Iles Galapagos.
- 10.710. CAPEXSIS (Smith), *S.-Afr. Q. Journ.* II, 1855, p. 516; id., *Zool. S. Afr.*, pl. 67; Dress., *B. Eur.* V, p. 265, pl. 505; *nisuella*, Daud. (teste Richw.) Afrique, Espagne S.
2905. *Var.* MAJOR (Schl.), *Mus. P.-B.*, *Rev. Accip.*, p. 5; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, Ois., pl. 57. Madagascar.
- 10.711. BUTLERI, Hume, *Str. Feath.* VII, p. 516, VIII, p. 416. Méran, Sinaï.
- 10.712. STYGUS (Wagl.), *Isis*, 1852, p. 1221; Sharpe, *l. c.*, p. 241; *siguapa*, d'Orb., in *Ram. de la Sagra*, qu'au 64° l. N., et l'Himalaya au S., Japon, Afrique N.

- H. N. Cuba*, p. 51, pl. 2; *metanopsis*, Licht.
 10.715. ? *MACRURUS* (Kaup), *Tr. Z. S.* IV, p. 252; Sharpe, Mexique.
Cat. II, p. 242.

1620. PSEUDOSCOPS

Pseudoscops, Kaup (1848).

- 10.714. *GRAMMICUS* (Gosse), *B. Jamaica*, p. 19, pl. 4; Kp., Jamaïque.
Isis, 1848, p. 769; Sharpe, *Cat.* II, p. 242.

SUBF. II. — KETUPINÆ

1621. KETUPA

Ketupa, Less. (1851); *Cultrunguis*, Hodgs. (1856); *Smilonyx*, Sundev. (1872).

- 10.715. *CEYLONENSIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 287; Gr., *Gen. B.* I, Palestine, Inde, Cey-
 p. 58; Schl., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 19; Sharpe, *l.* lan, Indo-Chine,
c., p. 4; *leschenaulti*, Tem., *Pl. Col.* 20; *hard-* Chine S.
wickii, Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 51; *dumeti-*
cola, Tick.; *nigripes*, Hodgs.
 10.716. *FLAVIPES* (Hodgs.), *J. A. S. B.* V, p. 56½; Gr., *Gen.* Himalaya, Chine.
B. I, p. 58; Sharpe, *l. c.*, p. 5; *magnifica*, Swinh.,
Ibis, 1875, p. 127.
 10.717. *JAVANENSIS*, Less., *Traité d'Orn.*, p. 114; Schl., Ténassérin, Malacca,
l. c., p. 18; *ketupa*, Horsf.; *ceylonensis*, Tem., *Pl.* Java, Sum., Bornéo.
Col. 74 (nec Gm.)
 10.718. *MINOR*, Buttik., *Notes Leyd. Mus.* XVIII, 1896, p. 165. Ile Nias.

1622. SCOTOPELIA

Scotopelia, Bp. (1850); *Megapelia*, Kaup (1851); *Scotoglaux*, Heine (1860).

- 10.719. *PELI*, Bonap., *Consp.* I, p. 44; Gurn., *Ibis*, 1859, De Sénégalie au
 p. 445, pl. 15; Feh. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, Gabon et Afrique
 p. 100; Sharpe, *l. c.*, p. 10; *typica*, Bp. S.-E.
 10.720. *USSNERI*, Sharpe, *Ibis*, 1871, pp. 101, 417, pl. 12; Côte d'Or.
id., *Cat.* II, p. 11.
 2906. *Var.* *OSTALETI*, Rochebr., *Bull. Soc. Philom.* VII, Sénégalie.
 1885, p. 165.
 10.721. *BOUVIERI*, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 261; *id.*, *Cat.* II, Gabon.
 p. 11, pl. 1.

SUBF. III. — BUBONINÆ

1652. BUBO

- Bubotus*, Rafin. (1815, teste Gray); *Bubo*, Cuv. (1817); *Ascalaphia*, Geoff. St.-Hil. (1850); *Heliaptex*, Sw. (1857); *Urrua*, Hodgs. (1857); *Mesomorpha*, Hodgs. (1841); *Aibryas*, *Nyctactus*, Glog. (1842); *Megaptynx*, *Pachyptynx*, *Nisuelia* (pt.), Bp. (1854).
- 10.722. *IGNAVUS*, Forst., *Syn. Cat. Brit. B.*, p. 5; Dress., Europe.
B. Eur. V, p. 559, pl. 515; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. I, p. 124, pl. 28; *Str. bubo*, Lin.; *microcephalus*, Steph.; *maximus*, Flem.; *europæus*, Less.; *germanicus*, *septentrionalis*, *grandis*, *melanotus*, Brm.; *atheniensis*, Bp.
2907. *Var. SIBIRICA*, Licht., *Nomencl. Av.*, p. 7; Menzb., Sibérie N.-W., Baski-
Ibis, 1885, p. 262; Dub., Ois. Eur. I, p. et ria.
pl. 29^a; *turcomanus* (pt.), auct. plur. (nec Eversm.); *scandiacus*, Cab.; *pallidus*, Brm.
2908. *Var. TURCOMANA* (Eversm.), *Add. Pall. Zoogr.*, Sibérie S.-W. au N.
p. 5; Sharpe, *Cat.* II, p. 17 (pt.); Menzb., jusqu'au 54°, Tur-
Ibis, 1885, p. 262; *cinereus*, Gray, *Gen. B.* kestan, Pamir,
I, pl. 15; *hemuchalana*, Hume; *maximus* (pt.), Thibet, Himalaya,
Dav. et Oust., Ois. Chine, p. 59. Chine.
- 10.725. *ASCALAPHUS*, Savig., *Descr. Égypte*, p. 295, pl. 5, Afrique N. et N.-E.
f. 2; Gould, Ois. Eur. I, pl. 57; Tem., *Pl. Col.* 57; *savignyi*, Geoff.; *ascalaphus barbarus* et *desertorum*, Erlang., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 192; id., *J. f. O.*, 1898, pl^s 12 et 15.
- 10.724. *BENGALENSIS* (Frankl.), *P. Z. S.*, 1851, p. 115; Inde.
Gould, *Cent. B. Himal.*, pl. 5; Schl., *l. c.*, p. 8; *caveuria*, Hodgs.
- 10.725. *CAPENSIS*, Smith, *S. Afr. Q. Journ.* II, 4, p. 517; Afrique S.
id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 70; *dilloni*, Prév. et Des M.; id., in *Lef., Voy. Abyss. Zool.*, p. 75, pl. 5; *ascalabotes*, Licht.
- 10.726. *MACKINDERI*, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 564; id., *P. M^e Kenia (Afrique E.)*
Z. S., 1900, pl. 45.
- 10.727. *ABYSSINICUS* (Guér.-Men.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 521; Abyssinie, Choa, So-
id. et Lafr., *Voy. Abyss.* III, Ois., p. 185, pl. 3; maliland.
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 107; Gurn., *Ibis*, 1890, p. 262; *montanus*, Heugl.
2909. *Var. MILESI*, Sharpe, *Ibis*, 1886, p. 165, pl. 7. Arabie S.-E.
- 10.728. *MACULOSUS* (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 44; id., *Gal.* Afrique S. jusqu'au
Ois. I, pl. 25^{bis}; Bp., *Consp.* I, p. 49; ? *nisuelia*, 12° l. S. environ.
Daud.; *africana*, Tem., *Pl. Col.* 50.
- 10.729. *LETHU*, Buttik., *Notes Leyd. Mus.* XI, pp. 54, 115, pl. 6. Libéria (Afrique W.)

- 10.750. *MAGELLANICUS* (Gm.), *S. N.* I, p. 286; *Pl. Enl.* 585; Sharpe, *Cat.* II, p. 29; *nacurutu*, Vieill.; *crassirostris*, Burm., *Th. Bras.* II, p. 121; *virginianus*, Sch. et Salv. (pt.). S. de l'Amérique mérid. jusqu'au 14° l. S. environ.
- 10.751. *VIRGINIANUS* (Gm.), *S. N.* I, p. 287; Wils., *Am. Orn.* VI, p. 52, pl. 50, f. 1; Audub., *B. N. Am.* I, p. 145, pl. 59; *icapacuthu*, Gm.; *maximus*, Bartr.; *ludovicianus*, Daud.; *pinicola*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 19; *crassirostris*, V.; *macro-rhyncha*, Tem., *Pl. Col.* 62; *atlanticus*, Cass. Amérique N.-E., Amérique centr. jusqu'au Costa-Rica.
2910. *Var.* *PALLESCENS*, Stone, *Amer. Nat.*, 1897, p. 275; *subarcticus*, A. O. U. *Check-l.*, p. 148 (1895, nec Hoy); *occidentalis*, Stone. États-Unis W., Colombie angl., Manitoba.
2911. *Var.* *MAYENSIS*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 170. Yucatan.
2912. *Var.* *ARCTICA*, Sw., *Faun. Bor.-Am.*, p. 86, pl. 50 (*arcticus*); *subarcticus*, Hoy, *Pr. Ac. N. Sc. Phil.* VI, p. 211; Allen, *Auk*, 1898, p. 71; *virginianus* (pt.), Sharpe. Amérique arctique, États-Unis N.-W.
2913. *Var.* *SATURATA*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, 1896, p. 265 (*saturatus*). Du Labrad. à l'Alaska, Californie S.
2914. *Var.* *PACIFICA*, Cass., *B. N. Am.*, p. 49; Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 65; *virginianus* (pt.), Shpe. Amérique N.-W.
2915. *Var.* *NIGRESCENS*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1884, p. 509. Ecuador.
- 10.752. *COROMANDUS* (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 55; Sharpe, *l. c.*, p. 55; *umbrata*, Blyth; *sinensis*, Hende. Inde, Chine.
- 10.755. *CINERASCENS*, Guér.-Men., *Rev. Zool.*, 1845, p. 521; Des M., in *Lefeb., Voy. Abyss.*, *Zool.*, p. 74, pl. 4; Gurn., *Ibis*, 1868, p. 149; *africanus*, Rüpp. (nec Tem.); *maculosus*, Horsf. et Moore (nec V.); Feh. et Harth., *Vög. Ostaf.*, p. 105; *melanotus* et *selenotis*, Heugl. Afrique N.-E. et W.
- 10.754. *LACTEUS* (Tem.), *Pl. Col.* 4; Schl., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 41; Sharpe, *l. c.*, p. 55; *sultaneus*, Less. Afrique S.
2916. *Var.* *VERREAUXI*, Bonap., *Consp.* I, p. 49; Buckl., *Ibis*, 1874, p. 562; Gurn., in *Anders. B. Dam.*, p. 41; *lacteus* (pt.), Sharpe. Afrique N.-E., Niger.

1624. HUHUA

Huhua, Hodgs. (1856); *Etoglaux*, Hodgs. (1841); *Ptiloskelos*, Tick. (1859).

- 10.753. *ORIENTALIS* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Schl., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 12; Sharpe, *Cat.* II, p. 59; *sumatrana*, Rafll.; *strepitans*, Tem., *Pl. Col.* 174, 229. Ténassérim S., Malacca, Java, Sumatra, Bornéo.

2917. *Var. MINOR* (Schl.), *Mus. P.-B., Oti*, p. 15; id., *Rev. Accip.*, p. 5. Bangka.
- 10.756. *SHELLEYI*, Sharpe et Uss., *Ibis*, 1872, p. 482; Sharpe, *Cat. II*, p. 57, pl. 2. Côte d'Or (Afr. W.)
- 10.757. *POENSIS* (Fras.), *P. Z. S.*, 1855, p. 15; Sharpe, *Ibis*, 1869, p. 494, pl. 4; *fasciolatus*, Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 554; Sclat., *P. Z. S.*, 1865, p. 576, pl. 55. De la Côte d'Or au Gabon.
- 10.758. *LEUCOSTICTA* (Hartl.), *J. f. O.*, 1855, p. 554; id., *Orn. W. Afr.*, p. 18; Schl., *l. c.*, p. 46; Sharpe, *Cat. II*, p. 41. De la Côte d'Or au Gabon.
- 10.759. *NIPALENSIS* (Hodgs.), *As. Res.* XIX, p. 472; id., *J. A. S. B.* VI, p. 562; Sharpe, *l. c.*, p. 57; *pectoralis*, Jerd., *Madr. Journ.* X, p. 89, pl. 4; *orientalis*, Blyth (nec Horsf.) Himalaya, Inde S. et Ceylan (Montag^{nes}).

1625. PSEUDOPTYNX

Pseudoptynx, Kaup (1848).

- 10.740. *PHILIPPENSIS* (Gray), *Cat. Accipitr.*, 1844, p. 45; Kaup, *Contr. Orn.*, 1852, p. 417; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 144, pl. 25, f. 2; *philippinensis*, Schl.; Sharpe, *l. c.*, p. 45. Ile Luçon (Philipp.)
- 10.741. *GURNEYI*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 940. Mindanao (Philipp.)
- 10.742. *BLAKISTONI* (Seeb.), *P. Z. S.*, 1885, p. 466. Japon (Yéso).
- 10.745. *DOERRIESI* (Seeb.), *B. B. O. C.* V, p. 4; id., *Ibis*, 1896, p. 155. Sibérie E., Ussuri S.-W.

1626. SCOPS

Scops, Savig. (1809; *Ephialtes*, Keys. et Bl. (1840; *Pisorhina*, *Megascops*, *Acnemis*, *Ptilopsis*, Kaup (1848); *Lempijius*, Bp. (1854); *Scototheres*, Heine (1890).

- 10.744. *GU* (Scop.), *Ann.* I, p. 19; Dress., *B. Eur.* V, pl. 514; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 155, pl. 51; *S. scops*, Lin.; *zorca*, *carniolica*, *pulchella*, Gm.; *ephiates*, Savig; *aldrovandi*, Flem.; *europæus*, Less.; *senegalensis*, Sw.; *longipennis*, Kp; *kamt-schatkensis*, Bp.; *minor*, *rupestris*, *rufescens*, *pygmaea*, Bern.; *vera*, Fch. Europe mérid., occid. centr., Asie centr., Asie Mineure, Afrique N., N.-E. et N.-W.
2918. *Var. SOCOTRANA*, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 2. Ile Socotra.
2919. *Var. CAPENSIS*, Smith, *S.-Afr. Q. Journ.*, ser. 2, n° 4, I, p. 514; Sharpe, *Cat. II*, p. 52, pl. 5, f. 1; *latipennis*, Kp.; *senegalensis*, auct. plur. (nec Sw.); *fazoglensis*, Würt.; *S. zorca africanus*, Schl. Afrique trop. et mérid.

2920. *Var. UGANDÆ* (Neum.), *J. f. O.*, 1898, p. 500. Uganda.
2921. *Var. HENDERSONI* (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 186; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 20; Sharpe, *l. c.*, p. 52. Angola.
2922. *Var. PENNATA*, Hodgs., *J. A. S. Beng.* VI, p. 569; Jerd., *B. Ind.* I, p. 156; Sharpe, *l. c.*, p. 55. Himalaya, Inde.
2925. *Var. STICTONOTA*, Sharpe, *l. c.*, p. 54, pl. 5, f. 2; *bakkamæna*, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 47 (nec Forst.); *japonicus*, Swinh., *Ibis*, 1865, p. 89; *sunia*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 545. Sibérie E., Japon, Chine, Indo-Chine, Himalaya E.
2924. *Var. RUFIPENNIS*, Sharpe, *l. c.*, p. 60; *pennatus*, Jerd., *Madr. Journ.* XIII, p. 119, pl. 2 (nec Hodgs.) Madras.
2925. *Var. ELEGANS* (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 185; Sharpe, *l. c.*, p. 87 (part.); *japonicus*, Sharpe (nec Tem. et Schl.), *l. c.*, p. 56. Japon, îles Liu Kiu.
2926. *Var. MALAYANA*, Hlay, *Madr. Journ.* XIII, 2, p. 147; *gymnopus*, Gray (*descr. nulla*); Kp., *Contr. Orn.*, 1852, p. 111; Sharpe, *l. c.*, pp. 58, 65, pl. 4, ff. 1, 2. De Malacca jusqu'en Chine.
2927. *Var. NICOBARICA* (Hume), *Str. Feath.*, 1876, p. 285. Iles Nicobar.
2928. *Var. MINUTA*, Legge, *Ann. Mag. N. H.*, 1878, p. 175. Ceylan.
- 10.745. *BRUCEI* (Hume), *Str. Feath.* I, p. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 62; *obsoletus*, Cal., *J. f. O.*, 1875, p. 126. Transcasp., Asie centr., Afghanistan, Sindh., Inde centr.
- 10.746. *SPILOCEPHALA* (Blyth), *J. A. S. B.* XV, p. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 65; *pennata* (pt.), Hodgs.; *nepalensis*, Gray; *gymnopus*, Hume (nec Gr.) Himalaya, Birmanie (montagnes).
2929. *Var. HAMBROECKI* (Swinh.), *Ann. N. H.*, sér. 4, VI, p. 155; id., *P. Z. S.*, 1871, p. 544; Sharpe, *l. c.*, p. 64; *japonicus*, Swinh., *Ibis*, 1865, p. 548 (nec T. et Schl.) Formose.
- 10.747. *SUNIA*, Hodgs., *As. Research.* XIX, p. 175; Jerd., *Ill. Ind. Zool.*, pl. 41; *bakkamæna*, Blyth, *Ibis*, 1866, p. 255 (nec Forst.); *pennatus* (pt.), Gould; *giu* (pt.), Blanf., *F. B. I.*, B. III, p. 292. Inde, Indo-Chine W., Malacca.
- 10.748. *NOVÆ-ZEELANDIÆ*, Bonap. ex Schl., *Consp.* I, p. 47; Schl., *Mus. P.-B.*, Oti, p. 27; ?*parvissima*, Ellm., *Zoologist*, 1861, p. 272. Nouv.-Zélande.
- 10.749. *SCAPULATA*, Bocage, *Jorn. Sc. Lisb.*, 1888, p. 229. St-Thomas (Afr. W.)
- 10.750. *LEUCOPSIS* (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1849, p. 496; id., *Beitr. Orn. W.-Afr.*, p. 16, pl. 1; Shpe, *l. c.*, p. 511. St-Thomas (Afr. W.)
- 10.751. *MEGALOTIS*, Gray, *Cat. Accip.*, 1844, p. 45; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 145, pl. 25, f. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 69. Philippines.
- 10.752. *PODARGINA* (Hartl. et Fsch.), *P. Z. S.*, 1872, p. 90; Iles Pelew.

- Finsch, *Journ. Mus. Godeffr.*, p. 2, pl. 1; Sharpe, *l. c.*, pp. 151, 155.
- 10.755. BECCARDI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 906; id., *Orn. Pap.* I, p. 77. Ile Misori.
- 10.754. MENADENSIS (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol., Ois.* I, p. 170, pl. 2, f. 1; Bp., *Consp.* I, p. 47; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 105. Célèbes.
2950. Var. MAGICA (Mull.), *Nat. Gesch. Land u. Vogelk.*, p. 110; Schl., *Mus. P.-B., Oti*, p. 22; Sharpe, *l. c.*, p. 70, pl. 5. Cérám, Amboine.
2951. Var. LEUCOSPILA (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 544; Sharpe, *l. c.*, p. 72, pl. 6; *magicus* (pt.), Schl. Halmaheira, Batjan.
5952. Var. BOURUENSIS, Sharpe, *l. c.*, p. 75, pl. 7, f. 2; *leucospila* (pt.), Salvad.; *magicus* (pt.), Schl. Ile Bouru.
2955. Var. MOROTENSIS, Sharpe, *l. c.*, p. 75, pl. 7, f. 1. Ile Morty.
2954. Var. BROOKEL, Sharpe, *Bull. B. O. Club*, I, p. 4 (1892); Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 107. Bornéo N.-W.
2955. Var. SIBUTUENSIS, Sharpe, *Bull. B. O. C. II*, p. 9 (1895); Mey. et Wg., *l. c.* Iles Soulou.
2956. Var. SIAOENSIS, Schl., *Mus. P.-B., Rev. Accip.*, p. 15. Sanghir.
2957. Var. RUTILA (Puch.), *Rev. Zool.*, 1849, p. 29; Sharpe, *Cat.* II, p. 80; *menadensis* (pt.), auct. plur.; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.*, p. 155, pl. 40. Madagascar.
2958. Var. CAPNODES, Gurn., *Ibis*, 1889, p. 104. Anjouan (Comores).
2959. Var. ALBIVENTRIS, Sharpe, *l. c.*, p. 78, pl. 8, f. 1. Flores.
- 10.753. SULAENSIS (Hart.), *Novit. Zool.* V, 1898, p. 126. Ile Soula.
- 10.756. SYLVICOLA, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 487; Sharpe, *l. c.*, p. 82; Hart., *Novit. Zool.* V, pl. 1, f. 1. Flores.
- 10.757. PEYERI, Gurn., *Ibis*, 1889, p. 502. Iles Liu Kiu (Japon).
- 10.758. SEMITORQUES (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 25, pl. 8; Schl., *Mus. P.-B., Oti*, p. 25; Sharpe, *l. c.*, p. 85. Japon.
- 10.759. PLUMIPES (Hume), *Rough Notes*, II, p. 597; id., *Nests and Eggs Ind.* B. I, p. 68; *semitorques*, Jerd. Himalaya.
- 10.760. BAKKAMUNA (Forst), Blauf., *Faun. Br. Ind.*, B. III, p. 297; *malabaricus*, Jerd.; Sharpe, *l. c.*, p. 94; *griseus*, Jerd.; *lettoides*, Blyth; *jerdoni*, Wald.; *bakkamuna*, Holdsw. Inde S., Ceylan.
- 10.761. LETTIA, Hodgs., *As. Research*, XIX, p. 176; Sharpe, *l. c.*, p. 85; *Tempiji*, Gray (nec Horsf.) Himalaya.
- 10.762. GLABRIPES (Swinh.), *Ann. N. H.*, ser. 4, VI, p. 152; id., *P. Z. S.*, 1872, p. 545; id., *Ibis*, 1874, p. 269; *elegans* (pt.), Sharpe (nec Cass.) Chine, Formose.
2940. Var. ERYTHROCAMPA (Swinh.), *Ibis*, 1874, p. 269; Chine.

- Sharpe, *l. c.*, p. 89; *lempiji*, Schl., *Ibis*, 1861, p. 29 (nec Horsf.)
- 10.765. *LEMPJI* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Blyth, *J. A. S. B.* XV, 1, p. 182; *noctula*, Tem., *Pl. Col.* 99; Schl., *l. c.*, p. 24; *javanicus*, Less.; *indicus*, Bp.
2941. *Var. UMBRATILIS* (Swinh.), *Ibis*, 1870, p. 542; id., *P. Z. S.*, 1871, p. 544; Sharpe, *l. c.*, p. 95.
- 10.764. *EVERETTI*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 492; *fuliginosa*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 197.
- 10.765. *MANTANANENSIS*, Sharpe, *Bull. B. O. Club*, 1, 1892, p. 4.
- 10.766. *SOLOKENSIS* (Hart.), *Bull. B. O. Club*, II, 1895, p. 59.
- 10.767. *LONGICORNIS*, Grant, *Bull. B. O. Club*, III, 1894, p. 51.
- 10.768. *MINDORENSIS*, Whiteh., *Ibis*, 1899, p. 98.
- 10.769. *WHITEHEADI*, Grant, *Bull. B. O. Club*, IV, 1895, p. 40; id., *Ibis*, 1895, pp. 440, 485.
- 10.770. *ALFREDI*, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 527, V, pl. I, f. 1.
- 10.771. *LEUCOTIS* (Tem.), *Pl. Col.* 16; Schl., *l. c.*, p. 17; Sharpe, *Cat.* II, p. 97.
- 10.772. *SAGITTATA* (Cass.), *Journ. Ac. Philad.* II, p. 96, pl. 12; Sharpe, *l. c.*, p. 98.
- 10.773. *BALLI* (Hume), *Str. Feath.* 1, p. 407; Sharpe, *l. c.*, p. 400; *spilocephalus*, Ball., *Str. Feath.* 1, p. 55.
- 10.774. *RUFESCENS* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Schl., *Rev. Accip.*, p. 10; Sharpe, *l. c.*, p. 102; *mantis*, Tem. et Schl.
- 10.775. *ICTERORHYNCHA*, Shell., *Ibis*, 1875, p. 158; Sharpe, *l. c.*, p. 105.
- 10.776. *LATOUCHI*, Rick., *Ibis*, 1900, p. 555.
- 10.777. *IDAHOENSIS*, Merr., *N. Am. Faun.*, n° 5, p. 96, pl. 1.
- 10.778. *BARBARA*, Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 57; id., *Exot. Orn.*, p. 101, pl. 51; Sharpe, *l. c.*, p. 107.
2942. *Var. ASPERSA* (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 87 (*Megascops aspersus*).
- 10.779. *BRASILIANA* (Gm.), *S. N.* 1, p. 289; Bp., *Consp.* I, p. 46; Schl., *l. c.*, p. 21; *choliba*, Vieill.; *decussata*, Licht.; *crucigera*, *undulata*, Spix, *Av. Bras.* I, pp. 22, 25, pl^s 9 et 10; *lophotes*, *portoricensis*, Less.; *watsoni*, Cass.; *argentina*, Licht.
2943. *?Var. AFRICAPILLA* (Tem.), *Pl. Col.* 45; Burm., *Th. Bras.* II, p. 128.
2944. *Var. USTA*, Schl., *Tr. Z. S.* IV, p. 265, pl. 61; Sharpe, *l. c.*, p. 111.
2945. *Var. GUATEMALAE*, Sharpe, *Cat.* II, p. 112, pl. 9; *marmoratus*, Nels, *Auk*, XV, p. 49; *cerni-*
- Indo-Chine, Malacca, Java, Bornéo, Sumatra.
- Hainan.
- Mindanao, Palawan, Samar (Philipp.)
- Ile Mantanani (Bornéo N.-W.)
- Solok (Sumatra W.)
- Luçon (Philippines).
- Mindoro (Philippines).
- Luçon.
- Flores.
- Afrique tropicale.
- Ténassérim S., Malacca.
- Iles Andaman.
- Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.
- Côte d'Or.
- Fohkien (Chine).
- Idaho.
- Guatémala.
- Chihuahua (Mexique).
- Amérique mérid. de l'Uruguay à la Colombie et jusqu'au Costa-Rica, Vénézuéla, Guyane.
- Brésil S. et E.
- Haut-Amazone.
- Amérique centr., du Mexique à Panama.

- culatus*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 267.
2946. *Var.* RORAIMÆ, Salv., *Ibis*, 1897, p. 441. Guyane angl.
2947. *Var.* SANCTÆ-CATHARINÆ, Salv., *Ibis*, 1897, p. 440. Brésil S.
2948. *Var.* CASSINI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, I, p. 102. Vera-Cruz (Mexique).
2949. *Var.* HASTATA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 268. Mexique W.
- 10.780. INGENS, Salv., *Ibis*, 1897, p. 440. Ecuador.
- 10.781. ASIO (Lill.); Wils., *Am. Orn.* VI, pl. 42, f. 1; Tem., *Pl. Col.* 80; *nævia*, Gm.; *striatus*, Vieill. Amérique N.-E., au S. jusqu'en Géorgie.
2950. *Var.* FLORIDANA, Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 51; Coues, *Birds N.-W.*, p. 505; Sharpe, *l. c.*, p. 118. Basse-Géorgie, Floride, etc.
2951. *Var.* TRICHOPSIS, Wagl., *Isis*, 1852, p. 276; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* III, pl. 62; *maccallii*, Cass., *B. Calif. Tex.*, p. 180; *enano*, Lawr. Texas, Mexique E.
2952. *Var.* RIDGWAYI (Nels. et Palm.), *Auk*, 1894, p. 40. Michoacan (Mexique).
2953. *Var.* PINOSA (Nels. et Palm.), *Auk*, 1894, p. 59. Vera-Cruz (Mexique).
2954. *Var.* CINERACEA (Ridgw.), *Auk*, XII, p. 590; *trichopsis*, Sharpe et auct. plur. (nec Wagl.) Arizona, Mexique N. et centr.
2955. *Var.* AIKENI (Brewst.), *Auk*, 1891, p. 159. Colorado.
2956. *Var.* BENDIREI (Brewst.), *Bull. Nutt. Orn. Club*, VII, 1882, p. 51. Californie.
2957. *Var.* KENNICOTTI, Ell., *Pr. Philad. Acad.*, 1867, p. 69; id., *B. N. Am.*, pl. 27; Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 55. Amérique N.-W., de l'Orégon à Sitka.
2958. *Var.* MAXWELLII (Ridgw.), *Field and Forest*, 1877, pp. 210, 215. M^{ts}es Rocheuses, du Color. au Montana.
2959. *Var.* MACFARLANEI (Brewst.), *Auk*, 1891, p. 140; *saturatus*, Brewst., *l. c.*, p. 141. S. de la Colombie angl. jusqu'à l'Orégon centr. et le Montana.
2960. *Var.* VINACEA (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 88. Chihuahua (Mex. N.)
2961. *Var.* COOPERI (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, p. 116. Mex. W., Salvador, Nicaragua., Costa-Rica.

1627. LOPHOSTRIX

Lophostrix, Less. (1857); *Scops* (pt.), auct. plur.

- 10.782. CRISTATA (Daud.), *Traité*, II, p. 207; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 45; Sharpe, *Cat.* II, p. 122; *super-ciliosa*, Shaw; *griseatus*, Cuv.; Schl., *Mus. P.-B. Oti*, p. 16. Bas-Amaz. et Guyane jusqu'à l'Ecuador.
- 10.785. STRICKLANDI, Schl. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 229; Sharpe, *l. c.*, p. 124; *cristata var.*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 60, pl. 10. Amérique centr. du Mexique à Panama.

1628. PSILOSCOPS

Psilosops, Coues (1898).

- 10.784. *FLAMMEOLA* (Kp. ex Licht.), *Tr. Z. S.* IV, p. 226; De la Californie au
 Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 50; Ell., *B. N.* Guatémala.
Am. I, pl. 28; Sharpe, *l. c.*, p. 105.
 10.785. *NUDIPES* (Vieill.), *Ois. Am. sept.*, pl. 22; Sharpe, Du Costa-Rica à Pa-
l. c., p. 121; *psilopoda*, Vieill. nama.

1629. HETEROSCOPS

Heteroscops, Sharpe (1889).

- 10.786. *LUCLE*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 478, 1889, p. 77, pl. 5. Bornéo N.-W.

1650. GYMNOSCOPS

Gymnoscops, Tristr. (1880).

- 10.787. *INSULARIS*, Tristr., *Ibis*, 1880, p. 556, pl. 14. Ile Mahé (Seychelles).

1651. SCELOGLAUX

Sceloglaux, Kaup (1848).

- 10.788. *ALBIFACIES* (Gray), *Voy. Ereb. and Ter.*, B., p. 2; Nouv.-Zélande.
 Kp., *Isis*, 1848, p. 768; Bull., *B. New Zeal.*, pl. 20;
 Sharpe, *Voy. Ereb. and Ter.*, 2^e éd., B., p. 25,
 pl. 1; *haasti*, Bull.; *ejulans*, Potts.

1652. NINOX

Ninox, Hodgs. (1857); *Hieracoglaux*, *Spiloglaux*, Kp. (1848); *Cephaloptynx*,
Ctenoglaux, Kp. (1852); *Rhabdoglaux*, Bp. (1854).

- 10.789. *SCUTULATA* (Rafll.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 280; Inde S., Ceylan.
 Sharpe, *l. c.*, p. 156; *hirsuta*, Tem., *Pl. Col.* 289;
malaccensis, Eyl.
 2962. *Var. LUGUBRIS* (Tick.), *J. A. S. B.* II, p. 575; Himalaya, Malabar,
 Sharpe, *l. c.*, p. 154; *nipalensis*, Hodgs., Birmanie, Malacca.
Madr. Journ. V, p. 24, pl. 14; *jeridius*,
 Hodgs.; *scutellatus*, Blyth; *hirsuta*, *mada-*
gascariensis, Bp.; *burmanica*, Hume.
 2965. *Var. BORNEENSIS* (Bp.), *Conspect. Av.* I, p. 41; id., Bornéo, Java.
Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 545; Schl.,
Mus. P.-B., *Strig.*, p. 25; *scutulata* (pt.),
 Sharpe.
 2964. *Var. JAPONICA* (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 29, Japon, Chine, Corée,
 pl. 9; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 545; Bornéo N., Célèbes,

- scutulata* (Pl.), Sharpe; *florensis*, Wall.; Sanghir, Soula, Ternate.
macroptera, W. Blas., *Ornis*, 1888, p. 545.
2965. *Var. AFFINIS*, Beavan, *Ibis*, 1867, pp. 516, 554; Iles Andaman, Nicobar.
Walden, *Ibis*, 1874, p. 129, pl. 5.
- 10.790. *ochracea* (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 185; Célèbes.
Sharpe, *Cat. B.* II, p. 167, pl. 11, f. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 94, pl. 4.
- 10.791. *PHILIPPENSIS*, Bp., *C. R.* XLI, p. 654; Wald., *Tr. Philippines.*
Z. S. IX, p. 144, pl. 25, f. 1; Schl., *l. c.*, p. 26;
Sharpe, *l. c.*, p. 167.
- 10.792. *EVERETTI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* VI, p. 47; id., Ile Siassi (Soulou).
Ibis, 1897, p. 449.
- 10.795. *SPILLOCEPHALA*, Tweeddl., *P. Z. S.*, 1878, p. 940. Mindanao, Basilan.
- 10.794. *SPILONOTA*, Bonpus et Wore, *Oce. Pap. Minnes. Cebu, Mindanao.*
Acad. I (1894), p. 8.
- 10.795. *REVI*, Oust., *Bull. Ass. Sc. France*, 1880, n° 59, Iles Soulou.
p. 206.
- 10.796. *MINDORENSIS*, Grant, *Ibis*, 1896, p. 465. Mindoro (Philippines).
- 10.797. *BOOBOK* (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.* II, p. 15; Gould, Australie.
B. Austr. I, pl. 52; Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 258;
marmorata, Gould.
2966. *Var. ALBARIA*, Rams., *Tab. List Austr. B.*, p. 57 Ile Lord Howe.
(1888).
2967. *Var. OCELLATA* (Hombr. et Jacq.), *Voy. Pôle Sud, Australie N.-W.*
Zool. III, p. 51, pl. 5, f. 2; Sharpe, *Ibis*,
1875, p. 258; id., *Cat.*, p. 170.
- 10.798. *ROSSELLIANA*, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 557. Ile Rossel (Louiadias).
- 10.799. *FUSCA* (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 22; Sharpe, *Cat. Timor.*
II, p. 172, pl. 12, f. 1; *maugei*, Tem., *Pl. Col.*
46; *guteruhi*, Müll.
- 10.800. *NOUVE-ZEALANDIE* (Gm.), *S. N.* I, p. 296; Sharpe, Nouv.-Zélande.
l. c., p. 175; *fulva*, Lath.; *zelandica*, Quoy et G.,
Voy. Astr. I, p. 168, pl. 2, f. 1; *venatica*, Peale.
- 10.801. *MACULATA* (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XV, Tasmanie, Australie
p. 189; Gould, *B. Austr.* I, pl. 55; Sharpe, *l. c.*, S. et S.-E., ile
p. 174; Gurn., *Ibis*, 1885, p. 159. Norfolk.
- 10.802. *DIMORPHA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1874, Nouv.-Guinée.
VI, p. 508; Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 258; Salvad.,
Orn. Pap. I, p. 85.
- 10.805. *CONNIVENS* (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.* II, p. 12; Gould, Australie.
B. Austr. I, pl. 54; Sharpe, *l. c.*, p. 175; *frontata*, Less.; *fortis*, Gould.
2968. *Var. OCCIDENTALIS*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S.* Australie N.-W.
W., 2^e sér., I, p. 1086.
2969. *Var. PENINSULARIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Cap York (Austr. N.)
1875, p. 992.

- 10.804. *RUFISTRIGATA* (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 544; Sharpe, *l. c.*, p. 177. Halmahéra.
- 10.805. *ASSIMILIS*, Salvad. et D'Alb., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 809; *albomaculata*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 249. Nouv.-Guinée S.-E.
- 10.806. *THEOMACHA* (Bonap.), *C. R.* XLI, p. 654; Wall., *Ibis*, 1868, p. 24; Sharpe, *l. c.*, p. 178; *hoedtii*, Schl., *N. T. D.* IV, p. 5. Nouv.-Guinée, Mysol, Waigiou.
2970. *Var. OBSCURA*, Hume, *Str. Feath.* I, pp. 11, 421; Wald., *Ibis*, 1874, p. 129, pl. 4. Iles Andaman, Nicobar.
- 10.807. *GOODENOVIENSIS*, De Vis, *Ann. Rep. Brit. New-Guin.*, p. 58 (1890). Ile Goodenough.
- 10.808. *STRENUA* (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 142; id., *B. Austr.* I, pl. 55; Schl., *Mus. P.-B., Str.*, p. 40; *rufa*, Gould, *l. c.*, pl. 56. Australie.
- 10.809. *HUMERALIS* (Bp.), *Consp.* I, p. 40; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud, Zool.* III, p. 55, pl. 4, f. 1; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 84; *fransenii*, Schl., *N. T. D.* III, p. 256; *undulata*, Rams. Nouv.-Guinée, Waigiou.
- 10.810. *ARUENSIS* (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 529; Sharpe, *l. c.*, p. 181; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 86. Iles Arou.
- 10.811. *ODIOSA*, Schl., *P. Z. S.*, 1877, p. 108; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 86. Nouv.-Bretagne.
- 10.812. *SUPERCILIARIS* (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 55; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, pl. 59; *sonnerati*, Tem., *Pl. Col.* 21; *polleni*, Schl.; id. et Pol., *Faun. Mad., Ois.*, p. 49, pl. 17. Madagascar.
- 10.815. *PUNCTULATA* (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Astrol., Zool.* I, p. 165, pl. 1, f. 1; Schl., *M. P.-B., Str.*, p. 29; Sharpe, *Cat.*, p. 185; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 109. Célèbes.
2971. *Var. PLATENI*, W. Blas. (in Lit.); Hartl., *Abh. nat. Ver. Brem.* XVI, 1899, p. 270. Mindoro (Philippines).
- 10.814. *GRANTI*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 185; *punctulata*, Rams. (nec Q. et G.). Guadalcanar (Salomon).
- 10.815. *HYPOGRAMMA* (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 544; Sharpe, *Cat.* II, p. 185, pl. 10; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 87. Baljan, Halmahera, Ternate.
- 10.816. *SQUAMPILA* (Bp.), *Consp.* I, p. 41; Sharpe, *l. c.*, p. 184, pl. 12, f. 2; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 89. Cérám, Mysol.
- 10.817. *VARIEGATA* (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol., Zool.* I, p. 166, pl. 1, f. 2; Salvad., *l. c.*, p. 88; Sharpe, *l. c.*, p. 185; *nova-britanniae*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 405. Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne.
2972. *Var. SOLOMONIS*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1876, p. 657, pl. 62. Iles Salomon.
- 10.818. *RUDOLFI*, A.-B. Mey., *Ibis*, 1882, p. 252, pl. 6. Ile Sumba.

- 10.819. HANTU (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 22; Sharpe, *Cat.*, Ile Bourou.
p. 185, pl. 11, f. 1; Salvad., *l. c.*, p. 90.
- 10.820. FORBESI, Sel., *P. Z. S.*, 1885, p. 51. Ile Ténimber.
- 10.821. NATALIS, Lister, *P. Z. S.*, 1888, p. 525. Ile Christmas.
- 10.822. JACQUINOTI (Bp.), *Consp.* I, p. 42; Hombr. et Jacq., Iles Salomon.
Voy. Pôle Sud, pl. 5, f. 1; Salvad., *l. c.*, p. 84;
teniata, Jacq. et Puch., *Voy. Zool.* III, p. 50;
Sharpe, *l. c.*, p. 186.
- 10.825. TERRICOLOR, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 466; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 511; *goldiei*.
Gurn., *Ibis*, 1885, p. 169.

SUBF. IV. — SYRNIINÆ

1655. SYRNIUM

- Syrnium*, Savig. (1809); *Ulula*, Cuv. (1817); *Aluco*, Kp. (1829); *Bulaca*, Hodgs. (1856); *Meseidus*, Hodgs. (1841); *Ptynx*, Bp. (1850); *Myrtha*, Macabra, Bp. (1854); *Tybo*, Heine (1890).
- 10.824. ALUCO (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 506; Dubois, Europe, Asie Mineure,
Fne. ill. Vert. Belg., Ois. I, p. 115, pl. 26; *stri-* Afrique N.
dula, Lin.; *sylvestris*, *rufa*, Scop.; *soloniensis*,
Gm.; *sylvatica*, Steph.; *ululans*, Savig.; *adum*,
rufescens, Brm.
2975. Var. NIVICOLA (Hodgs.), in *Gray's Zool. Misc.*, Himalaya, Chine.
p. 82; *nivicolum*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV,
pp. 185, 550.
2974. Var. WILLKOWSKII, Menzb., *Ibis*, 1897, p. 115. Transcaucasie.
- 10.825. BIDDULPHI, Scully, *Ibis*, 1881, p. 425, pl. 14. Asie centr., Inde N.-
W., Afghanistan.
- 10.826. DAVIDI, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 256; id., *Cat.*, Moupin (Chine).
p. 251; *fuscescens*, Dav. (nec Tem.); *fulvescens*,
Swinh. (nec Tem. et Schl.)
- 10.827. URALENSE (Pall.), *Reise*, I, p. 455; Tem., *Pl. Col.* Europe N., Sibérie.
27; Dress., *B. Eur.* V, pl. 507; *liturata*, Tengm.;
macroura, Mey. et Wolf.; *macrocephala*, Meisn.
2975. Var. FUSCESCENS, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, Aves, Japon.
pl. 10; *rufescens*, T. et S., *l. c.*, p. 50; Schl.,
Mus. P.-B., *Str.*, p. 11.
- 10.828. NEBULOSUM (Forsl.), *Phil. Trans.* XXII, p. 586; Vieill., Canada E., États-
Ois. Am. sept., pl. 17; Audub., *B. Am.*, pl. 46; Unis E. jusqu'au
Dubois, *Ois. Eur.*, pl. 27^a; *varius*, Bart. Texas.
2976. Var. ALLENI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, Caroline S.
p. 8.
2977. Var. HELVEOLA, Bangs, *Pr. New Eng. Zool. Club*, Texas S.
1899, p. 51.

2978. *Var. SARTORI*, Ridgw., *N. Am. B.* III, p. 29. Mexique E.
- 10.829. *occidentale*, Nant., *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 195; Baird, *B. N. Am., App.*, pl. 66; Sharpe, *l. c.*, p. 260. États-Unis S.-W., Californie, Mexique.
2979. *Var. CAURINA*, Merr., *Auk*, 1898, p. 59. Colombie angl., Washington (État).
- 10.850. *FULVESCENS*, Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 58; Sharpe, *l. c.*, p. 258; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* III, pl. 61. Mexique S., Guatemala.
- 10.851. *RUFIPES* (King), *Zool. Journ.* III, p. 426; Sharpe, *l. c.*, p. 261; *fasciata*, Des M., *Icon. Orn.*, pl. 57. Chili, Patagonie.
- 10.852. *SELOPUTO* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Schl., *Mus. P.-B., Str.*, p. 22; *sinensis*, Lath.; Sharpe, *l. c.*, p. 261; *orientalis*, Shaw; *pagodarium*, Tem., *Pl. Col.* 250. Indo-Chine, Malacca, Java, Sumatra.
- 10.853. *ocellatum*, Less., *Rev. Zool.*, 1859, p. 289; Gould, *B. As.*, pt. XXII, pl.; *sinensis*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 21 (nec Lath.); Schl., *l. c.*, p. 21. Inde.
- 10.854. *WHITEHEAD*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 196, pl. 5; *wiepkeni*, W. Blas., *Ornis*, 1888, p. 504. Palawan (Philippines).
- 10.855. *LEPTOGRAMMICUM* (Tem.), *Pl. Col.* 525; Schl., *l. c.*, p. 20; Sharpe, *l. c.*, p. 264. Bornéo.
- 10.856. *MYRTUA* (Bonap.), *Consp.* 1, p. 44; Salvad., *Ucc. Bornéo*, p. 21; Schl., *l. c.*, p. 19; *leptogrammicum*, Cass. (nec Tem.); *sumatrana*, Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 541. Sumatra.
- 10.857. *NIASENSE*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1887, p. 526. Ile Nias.
- 10.858. *WOODFORDI* (Smith), *S. Afr. Q. Journ.*, ser. 2, pt. 1, p. 512; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 71; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 122. Afrique S. du Cap au Nyassaland.
2980. *Var. STAEHELICA*, Rehw., *Mittl. Hochl. N. Deutsch. Ost-Afr.*, 1898, p. 272. Afrique E. allem.
2981. *Var. UMBRINA*, Heugl., *J. f. O.*, 1863, p. 12; *woodfordi* (pt.), Sharpe. Afrique N.-E.
2982. *Var. ZANSIBARICA*, Rehw., *Mittl. Hochl. N. Deutsch. Ost-Afr.*, p. 272. Zanzibar.
- 10.859. *NUCHALE*, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 487; id., *Cat.*, p. 265; *woodfordi*, Harth. (nec Smith). De la Côte d'Or à l'Angola (Afr. W.)
- 10.840. *BOHNDORFFI*, Sharpe, *Journ. Linn. Soc., Zool.*, 1884, p. 459. Niam-Niam.
- 10.841. *NIGRICANTILEM*, Sharpe, *Ibis*, 1897, p. 449. Afrique E. allem.
- 10.842. *NEWARENSE* (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 168; Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 544; Sharpe, *Cat.*, p. 281; *indrancee*, Gray (nec Syk.); *indrani*, Schl., *l. c.*, p. 19; *caligatus*, Swinh. Himalaya, Birmanie, Formose.

2985. *Var. MAINGAYI*, Hume, *Str. Feath.*, 1878, p. 27; Malacca.
Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 478.
10.845. *INDRANI* (Sykes), *P. Z. S.*, 1852, p. 82 (*indranee*); Inde, Ceylan.
Sharpe, *l. c.*, p. 282; *monticola*, Jerd.; *ochro-*
genys, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 451.

1654. SCOTIAPTEX

Scotiaptex, Swains. (1857).

- 10.844. *CINEREA* (Gm.), *S. N. I.*, p. 291; Sw. et Rich., *Faun.* Amérique arctique,
Bor.-Am., p. 77, pl. 51; Audub., *B. N. Am.*, États-Unis,
pl. 551; *acclamator*, Bartr.
10.845. *LAPPONICA* (Retz.), *Faun. Succ.*, p. 79; Naum., *Vög.* Nord de l'Europe,
Deutschl., pl. 549; Dress., *B. Eur.* V, pl. 508; Sibérie.
barbata, Pall.; *cinereum*, Bp. (nec Gm.); *mi-*
crophthalmos, Tyzenh.

1655. PULSATRIX

Pulsatrix, Kaup (1848).

- 10.846. *PERSPICILLATA* (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 58; Sharpe, Amérique tropicale.
Cat. B., p. 277 (pl.); *personata* et *torquata*,
Daud., *Traité*, II, pp. 492-5; Levaill., *Ois. d'Afr.*
I, pl^s 42, 44; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 180; *larvata*,
Shaw et Nod., *Nat. Misc.* XIX, p. 801; *melanota*,
Puch. (nec Tsch.)
10.847. *MAXIMILIANI*, Dubois (1); *Strix pulsatrix*, Max., *Reise* Brésil.
Bras. I, p. 566; id., *Beitr. z. Naturg. Bras.* III,
268; Schl., *Mus. P.-B.*, *Strig.*, p. 17 (en note).
10.848. *MELANONOTA* (Tschudi), *Arch. f. Nat.*, 1844, p. 267; Pérou, Brésil.
id., *Faun. Per.*, p. 114, pl. 4; Sharpe, *l. c.*,
p. 280; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 184.
10.849. *FASCIATIVENTRIS*, Salvad. et Festa, *Boll. Musei To-* Ecuador.
rino, XV, n^o 568, p. 52.

(1) C'est bien à tort que certains auteurs ont réuni le *Strix pulsatrix* du Prince de Wied au *perspicillata* avec lequel il n'a aucun rapport. Le *pulsatrix* est d'une taille plus forte, ses teintes générales sont d'un brun roussâtre fauve; la raie sourcilière peu distincte, et les parties ventrales sont d'un roux jaunâtre; à la gorge existe une tâche blanche peu développée. Les doigts n'ont que deux écailles nues, tandis qu'il y en a trois chez le *perspicillata*. Longueur totale 46 centimètres; ailes 35; queue 20; tarses 5.

D'après Schlégel, deux sujets de cette espèce se trouvent au Musée du Prince de Wied à Frankfort, et un au Musée de Bruxelles; c'est probablement ce dernier qui a servi à la description de Schlégel; j'en donne une figure sur l'une des planches de mon *Synopsis*. Comme le terme *Pulsatrix* est devenu générique, je dédie l'espèce à Maximilien Prince de Wied, qui l'a découverte et décrite pour la première fois.

1556. CICCABA

Ciccaba, Wagl. (1852).

- 10.850. ALBIGULARIS (Cass.), *Pr. Philad. Ac.* IV, p. 124; id., *Colombie, Ecuador.*
Journ. Philad. Ac. II, p. 52, pl. 4; Sharpe, *l. c.*,
p. 270; *albipunctatum*, Kp.; *macabrum*, Bp.
- 10.851. SI PERCILIARIS (Pelz.), *Verh. z.-b. Wien*, 1865, *Brésil, Amazone.*
p. 1125; Sharpe, *l. c.*, p. 271; *zonocercum*, Sel.
et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 590 (nec Gr.); *poly-*
grammicum, Gr.
- 10.852. SUINDA (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 54; Sharpe, *l. c.*, *Brésil.*
p. 272; *dominicensis*, Tsch.; *cayennensis* (pt.), Schl.
- 10.855. VIRGATA (Cass.), *Pr. Philad. Ac.* IV, p. 124; id., *Amérique centr., Co-*
Journ. Ph. Ac. II, p. 51, pl. 5; Schl., *Mus. P.-*
B., Strig., p. 15; *zonocercum*, Gray; *cayennensis*
(pt.), Kp.; *lineatum*, Lawr.
2984. *Var.* SQUAMULATA (Bp., ex Licht.), *Consp.* I, p. 55. *Mexique.*
- 10.854. HUHULA (Daud.), *Traité*, II, p. 190; Levaill., *Ois.* *Guyane, Brésil.*
d'Afr. I, pl. 41; Wagl., *Isis*, 1852, p. 1222;
Schl., *l. c.*, p. 17; *lineata*, Shaw; *albomarginata*,
Spix, *Ac. Bras.*, pl. 10^a.
- 10.855. NIGROLINEATA (Sel.), *Tr. Z. S.* IV, p. 268, pl. 65; *Amérique centr.*
Sel. et Salv., *Nomencl.*, p. 117; Shpe, *l. c.*, p. 276.
2985. *Var.* SPILONOTA, Sharpe, *Cat.* II, p. 277 (ex Gray). *Colombie.*

SUBF. IV. — SURNIINÆ

1657. GISELLA

Gisella, Bonap. (1854).

- 10.856. HARRISI (Cass.), *Pr. Philad. Ac.* IV, p. 157; id., *Colombie.*
Tr. Phil. Ac. II, p. 55, pl. 5; Schl., *l. c.*, p. 9;
lathamii, Bp.; *albipunctatus*, Bp. (nec Kp.)
- 10.857. JHERINGI, Sharpe, *Ibis*, 1899, p. 459; v. Jhering, *St-Paul, Rio-Grande*
Ibis, 1900, p. 217. *do Sul (Brésil S.-E.)*

1658. NYCTALA

Nyctala, Brehm (1828); *Egolius*, Kp. (1829); *Scotophilus*, Sw. (1857).

- 10.858. TENGMALMI (Gm.), *S. N.* I, p. 291; Dress., *B. Eur.* *Europe sept. et centr.,*
V, pl. 515; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, *Sibérie.*
p. 106, pl. 24; *dasypus*, Bechst.; *planiceps*, *pine-*
torum, *abietum*, Brm.; *funerea*, Bp.; *minor*,
bædekeri, Brm.
2986. *Var.* RICHARDSONI, Bp., *Comp. List B. Eur. and* *Amérique arctiq., Ca-*
N. Am., p. 7; Ridgw., *Am. Nat.*, 1871, p. 285. *nada, États-Unis N.*

- 10.859. *ACADICA* (Gm.), *S. N.* I, p. 296; Audub., *B. Am.*, États-Unis, Mexique.
pl. 199; Bp., *l. c.*, p. 7; *passerina*, Penn.; Wils.,
Am. Orn. IV, p. 66, pl. 54, f. 1; *acadiensis*, Lath.;
albifrons, Shaw; *wilsoni*, Boie; *frontalis*, Licht.;
kirtlandi, Hoy.

1659. SURNIA

Surnia, Dumér. (1806); *Nycthierax*, Sund. (1872).

- 10.860. *ULULA* (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 511; DuBois, Europe N., Sibérie,
Fne. Ill., Ois. I, p. 401, pl. 25; *funerea*, Lin.; Kamtsch., Alaska.
nisoria, Mey. et Wg.; *uralensis*, Shaw; *doliata*,
Pall.
2987. *Var. CAPAROCU* (P. L. S. Mull., nec *caparacoch*), Amérique sept., N. des
S. N., *Suppl.*, p. 69; Stejn., *Auk*, 1884, États-Unis.
p. 562; *canadensis*, Briss.; *funerea*, auct.
plur. (nec Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 512;
hudsonia, Gm.; *borealis*, Less.; *ulula*, Cass.
(nec L.)

1640. NYCTEA

Nyctea, Steph. (1826); *Nyctia*, Sw. (1857); *Leuchybris*, Sund. (1872).

- 10.861. *SCANDIACA* (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl^s 509, 510; Toute la zone arctique,
S. nyctea, Lin.; Audub., *B. Am.*, pl. 121; *arctica*, en hiver dans la
Bartr.; *nivea*, Thunb.; *albus*, Dand.; *candida*, zone plus tempérée.
Lath.; *erminea*, Shaw; *nivea europæa* et *nivea*
americana, Brm.; *var. arctica*, Ridgw.

1641. ATHENE

Noctua, Savig. (1809, nec Fabr.); *Athene*, Boie (1822); *Carine*, Kp. (1829).

- 10.862. *NOCTUA* (Scop.), *Ann.* I, p. 22; Dress., *B. Eur.* V, Europe centr et mérid.
pl. 517; DuBois, *Fne. Ill.*, Ois. I, p. 410, pl. 25;
passerina, Gm.; *psilodoctyla*, *nudipes*, Nilss.;
indigena, Brm.; *veterum*, Schl.; *minor*, Degl. et
Gerbe; ?*chiaradia*, Gigl.
2988. *Var. GLAUX* (Savig.), *Descr. de l'Égypte*, Ois., Les contrées côtoyant
p. 287; Dress., *l. c.*, pl. 518; *persica*, Vieill.; la Méditerranée,
meridionalis, Less.; *bactriana*, Hutt.; Asie S.-W.
numida, Levaill. jun.; *noctua*, *passerina* et
veterum (pt.), auct. plur.
2989. *Var. BACTRIANA*, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1847, Mongolie, Chine N.,
p. 771; Blandf., *Faun. Brit. Ind.*, *Birds*, III, Thibet, Turkestan
p. 505; *plumipes*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, et Afghanistan.
p. 448; *persica*, Dav. (nec Vieill.); *orienta-*
lis, Severtz.

- 10.863. *SPILOGASTRA*, Hengl., *J. f. O.*, 1865, pp. 14-15; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 119, pl. Afrique N.-E.
 10.864. *BRAMA* (Tem.), *Pl. Col.* 68; Schl., *Mus. P.-B.*, Inde.
Strig., p. 29; Sharpe, *l. c.*, p. 138; *indica*,
 Frankl.; *tarayensis*, Hodgs.
 2990. *Var. PRILCHURA*, Hume, *Str. Feath.* I, p. 469, III, Birmanie, Pégou.
 p. 59; Sharpe, *l. c.*, p. 140.

1642. HETEROGLAUX

Heteroglaux, Hume (1875).

- 10.865. *BLEWITTI*, Hume, *Str. Feath.* I, p. 468; Sharpe, Inde centr.
l. c., p. 141.

1645. SPEOTYTO

Speotyto, Glog. (1842); *Pholeoptynx*, Kp. (1848).

- 10.866. *CUNICULARIA* (Mol.), *Stor. Chil.*, p. 545; Audub., *B. Amérique mérid.*
N. Am., pl. 422; *grallaria*, Spix; Tem., *Pl. Col.*
 146; *urucurea*, Less.; *socialis*, Gamb.
 2991. *Var. FLORIDANA*, Ridgw., *A. O. U. Check-liste*, Floride, iles Bahama.
 2^e éd., 1895, p. 150; Palm., *Auk*, 1896, p. 99,
 pl. 2; *bahamensis*, Cory, *Auk*, 1891, p. 548.
 2992. *Var. CAVICOLA*, Bangs, *Auk*, 1900, p. 287; *baha-* Nouv.-Providence (Ba-
hamaensis, Mayn. (nec Cory). hama).
 2995. *Var. HYPOGÆA* (Bp.), *Amer. Orn.* I, p. 72; Cass., Amérique N.-W. et
B. Cal. and Texas, p. 118; id., *B. N. Am.*, centr.
 p. 59; *cunicularia* (pt.), Sharpe et auct. plur.;
obscura, Steph., *Auk*, 1895, p. 272.
 2994. *Var. DOMINICENSIS* (Gm.), *S. N. I*, p. 296; Cory, Haïti et St-Domingue.
Bull. Natl. Orn. Club, VI, p. 154 (1881).
 2995. *Var. GUADELOUPENSIS*, Ridgw., *B. N. Am.* III, Petites Antilles.
 p. 90; Sharpe, *l. c.*, p. 147.
 2996. *Var. AMAURA*, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, Antigua (pet. Antilles).
 p. 254.
 2997. *Var. ROSTRATA*, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Ile Clarion (Basse-Ca-
 1890, p. 155. lifornie).
 2998. *Var. BRACHYPTERA*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Ile Margarita.
 1896, p. 665.
 2999. *Var. TOLIMA*, Stone, *Pr. Acad. Philad.*, 1899, Tolima (Colombie).
 p. 505.

1644. GYMNASIO

Gymnasio, Bonap. (1854); *Gymnoglaux*, Cab. (1855).

- 10.867. *NUDIPES* (Daud.), *Traité*, II, p. 199; Vieill., *Ois.* Petites Antilles.
Am. sept. I, p. 45, pl. 16; Bp., *Rev. et Mag. de*

- Zool.*, 1854, p. 545; Newt., *Ibis*, 1859, p. 64,
pl. 1; *newtoni*, Lawr.; *krugi*, Gundl.
10.868. LAWRENCEI (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1868, p. 528, Cuba.
pl. 29; *nudipes*, Lemb., *Aves Cuba*, p. 25, pl. 4,
f. 2 (nec Daud.)

1645. GLAUCIDIUM

Glaucidium, Boie (1826); *Nyctipetes*, Sw. (1857); *Tenioptynx*, *Microglaux*,
Kaup (1848); *Microptynx*, Kp. (1852); *Phalacroptysis*, Bonap. (1854).

- 10.869. NANUM (King), *Zool. Journ.* III, p. 427 (*Str. nana*); Chili, Patagonie.
Boie, *Isis*, 1826, p. 970; Gray, *Gen. B.* I, pl. 12;
ferox, Fras. (nec V.); *leucolaima*, Bp.; *chilensis*,
Licht.
10.870. PASSERINUM (Linn.); Boie, *Isis*, 1826, p. 976; Dress., Europe sept. et centr.
B. Eur. V, pl. 516; *pusilla*, Daud.; *pygmaea*,
Bechst.; *acadica*, Tem. (nec Gm.); *microrhyn-*
chum, Brm.
5000. Var. ORIENTALIS, Tacz., *Mém. Acad. St.-Petersb.* Sibérie.
XXXIX, p. 128 (1891).
✓ 10.871. SJU (D'Orb.), in *Ram. Sagra*, II. N. Cuba, Ois., Cuba.
p. 55, pl. 5; Shpe, *l. c.*, p. 195; *havanensis*, Licht.
10.872. GNOMA, Wagl., *Isis*, 1852, p. 275; Sharpe, *Ibis*, Amérique N.-W., de la
1875, pp. 58, 259, pl. 1, II 1, 2; id., *Cat.*, Colombie angl. aux
p. 194; *passerinoides*, Audub.; *infuscatum*, Mgnes Rocheuses et
Cass. le plateau mexicain.
5001. Var. CALIFORNICA, Scl., *P. Z. S.*, 1857, pp. 4, Amér. N.-W., des côtes
126; Ridgw., *Pr. Bost. Soc. N. H.* XVI, de la Colombie angl.
p. 95; *gnoma* (pt.), Sharpe. à celles de la Calif.
5002. Var. HOSKINSI, Brewst., *Auk*, 1888, p. 156. Basse-Californie.
5005. Var. FISHERI, Nels. et Palm., *Auk*, 1894, p. 41; Puebla, Mexique.
gnoma (pt.), Salv. et Godm., *Biol. Aves*, II,
p. 55.
5004. Var. PALMARUM, Nels., *Auk*, 1901, p. 46. San Blas (Mexique).
5005. Var. COBANENSIS, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 259; id., Guatémala.
Cat., p. 199, pl. 15, f. 1; *gnoma* (pt.), Salv.
et Godm., *l. c.*, p. 55.
10.873. GRISEICEPS, Sharpe, *Ibis*, 1875, pp. 41, 259, pl. 2, Amérique centr.
f. 2; id., *Cat.*, p. 196; *pumilum* (pt.), auct. plur.
10.874. PUMILUM (Tem.), *Pl. Col.* 59; Kp., *Contr. Orn.*, Brésil.
1852, p. 105; Sharpe, *l. c.*, p. 198; *minutissima*,
Max.; *ferox*, Strickl. (nec V.)
10.875. FEROX (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 22; Sharpe, *l. c.*, Amérique mérid. trop.
p. 200; *ferruginea*, Max.; Tem., *Pl. Col.* 199;
passerinoides, Tem., *l. c.*, pl. 544; *infuscata*,
Tem.; *phalanoides* (pt.), Scl. et Salv.

5006. *Var. PHALENOIDES* (Daud.), *Traité*, II, p. 206; Sharpe, *l. c.*, p. 203; *ferrugineum*, Tayl.; *infuscata*, Finsch. Trinidad.
5007. *Var. RIDGWAYI*, Sharpe, *Ibis*, 1873, pp. 53, 259; id., *Cat.*, p. 203; *infuscata*, *jardini*, *gnoma*, *phalenoides* (pt.), anct. plur. Texas, Nouv.-Mex., Arizona, Mexique, Amérique centr.
- 10.876. *JARDINEI* (Bonap.), *C. R.* XLI, p. 634; Cab., *J. f. O.*, 1869, p. 208; Sharpe, *l. c.*, p. 207; *langsborgii*, Ridgw. (nec Bp.) Vénézuéla, Ecuador, Colombie jusqu'au Costa-Rica.
- 10.877. *TEPHRONOTUM* (Sharpe), *Ibis*, 1873, p. 260; id., *Cat.*, p. 211, pl. 13, f. 2. ? (Amérique mérid.)
- 10.878. *PERLATUM* (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 26; Sharpe, *l. c.*, p. 209; *occipitalis*, Tem., *Pl. Col.* 34; *licua*, Licht.; *pusilla*, Heugl.; *capensis*, Schl.; *senegalensis*, Chapm. Afrique N.-E., E. et S.
- 10.879. *KILIMENSE*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 178. Kilima-Ndjaru.
- 10.880. *SJOESTEDTI* (*sjöstedti*), Rehw., *Orn. Mon.*, 1893, p. 65. Caméron.
- 10.881. *BRODIEI* (Burton), *P. Z. S.*, 1853, p. 132; Schl., *Mus. P.-B., Strig.*, p. 33; Jerd., *B. Ind.* I, p. 146; *tubiger*, *badia*, Hodgs.; *minutilla*, Gould, *B. Asia*, pl. XXII, pl. Himalaya, Assam, Ténassérin, Malacca et le S. de la Chine.
- 10.882. *PARDALOTUM* (Swinh.), *Ibis*, 1863, p. 216; Sharpe, *Ibis*, 1873, p. 259; id., *Cat.*, p. 214. Formose.
- 10.883. *SYLVATICUM* (Bp. ex Müll.), *Consp.* I, p. 40; Schl., *Mus. P.-B., Strig.*, p. 36; Sharpe, *l. c.*, p. 213; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XXI, pl. 13; *borneense*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* I, p. 33. Sum., Bornéo N.-W.

1646. TAENIOGLAUX

Tenioglaux, Kamp (1848); *Smithiglaux*, Bp. (1854).

- 10.884. *CAPENSIS* (Smith), *S. Afr. Q. Journ.* (2), n° 4, 1, p. 313; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 33; Kp., *Isis*, 1848, p. 769; Sharpe, *l. c.*, p. 225. Afrique S. du Cap au Nyassaland.
- 10.885. *CASTANEA* (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 62. Andundi (Afr. centr.)
- 10.886. *CASTANOPTERA* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Tem., *Pl. Col.* 98; Kp., *Contr. Orn.*, 1852, p. 106. Java.
- 10.887. *CASTANONOTA* (Blyth), *Cat. B. Mus. A. S. B.*, p. 39; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 344; Schl., *l. c.*, p. 34. Ceylan.
- 10.888. *RADIATA* (Tick.), *J. A. S. Beng.* II, p. 372; Bp., *l. c.*, p. 344; Schl., *l. c.*, p. 34; *perlineata*, Hodgs.; *erythroptera*, Gould; *undulata*, Blyth. Inde.
5008. *Var. MALABARICA* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XV, p. 280; Sharpe, *l. c.*, p. 218; *radiata* (pt.), Inde S., Ceylan.

- Blanf., *Faun. Br. Ind.*, B. III, p. 506;
cuculoides, spadicea, Jerd.
 10.889. *CUCULOIDES* (Gould), *Cent. Himal. B.*, pl. 4; Schl., Himalaya, Assam, Bir-
l. c., p. 55; *auribarbis*, Hodgs. manie.
 10.890. *WHITELVI* (Blyth), *Ibis*, 1867, p. 515; Sharpe, *l. c.*, Chine, Haïnan.
 p. 222; *cuculoides*, Swinh. (nec Gould).

1647. MICROPALLAS

Microthene, Coues (1866, nec Sundev.); *Micropallas*, Coues (1889).

- 10.891. *WHITNEVI* (Coop.), *Pr. Calif. Acad. Sc.*, 1861, États-Unis S.-W.,
 p. 118; Coues, *Pr. Philad. Acad.*, 1866, p. 15; Mexique, Basse-Cal-
 Elliot, *B. N. Am.*, pl. 29.ifornie.
 10.892. *GRAYSONI* (Ridgw.), *Auk*, 1886, p. 555; *socor-* Ile Socorro (Mex. W.)
roensis, Sharpe, *Hand-List* I, p. 299.

SUBF. V. — PHODILINÆ

1648. PHODILUS

Phodilus, J. Géof. St.-Hil. (1851); *Photodilus*, Gurn. (1894),

- 10.895. *BADIUS* (Horsf.), *Zool. Research. Java*, pl. 57; Tem., Himalaya E, Indo-
Pl. Col. 518; Géof. St.-Hil., *Ann. Sc. Nat.* XXI, Chine W., Malacca,
 p. 201; Schl., *l. c.*, p. 25; *nipalensis*, Hume. Java, Bornéo.
 10.894. *ASSIMILIS*, Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 158. Ceylan.

FAM. VII. — STRIGIDÆ

1649. HELIODILUS

Heliodilus, Milne-Edw. (1878).

- 10.895. *SOU MAGNEL*, Grandid., *Bull. Soc. Philom.*, 1878, Madagascar.
 p. 65; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, Ois.,
 p. 112, pl^s 56a, b et c.

1650. STRIX

- Strix*, Lin. (1766); *Aluco*, Flem. (1828); *Hybris*, Nitzsch (1840); *Stridula*, Selys
 (1842); *Eustrinx*, Webb et Berth. (1844); *Megastrix*, Kp. (1848); *Glaux*,
 Blyth (1850); *Scelostrix*, *Dactylostrix*, Kp. (1852); *Glyphidiura*, Rehb. (?).
 10.896. *FLAMMEA* (Lin.); Naum., *Vög. Deutschl.*, pl. 47, f. 2; Scandinavie S., Eu-
 Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. I, p. 119, pl. 27; *alba*, rope centr. jusqu'en
 Scop.; *guttata*, Brm.; *bakkamma*, Forst.; France.
adpersa, vulgaris, obscura, Brm.

5009. Var. KIRCHHOFFI, Brm., *Naumannia*, 1858, p. 219; *paradoxa* et *splendens*, Brm.; *meridionalis*, Koel.; ?*africana*, Bp.; *flammea* (pt.), Dress., *B. Eur.* V, pl. 502. Iles Britanniques, Europe mérid., Afrique N., îles Canaries.
5010. Var. MACULATA, Brm., *Naum.*, 1855, p. 270; *margaritata*, Brm. Soudan, Afrique N.-E.
5011. Var. ERNESTI, Kleinsch., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 168. Sardaigne.
5012. Var. SCHMITZI, Hartl., *Novit. Zool.* VII, p. 554. Madeire.
5015. Var. INSULARIS, Pelz., *J. f. O.*, 1872, p. 23. Iles du Cap Vert.
5014. Var. POENSIS, Fras., *P. Z. S.*, 1842, p. 189; *affinis*, Layard, *B. S. Afr.*, p. 42. Fernando-Po, Afrique austr., Madagascar.
5015. Var. JAVANICA, Gm., *S. N.* 1, p. 295; Jerd., *B. Ind.* 1, p. 177; *indica*, Blyth, *Ibis*, 1860, p. 251; Gould, *B. Asia*, pt. XXIV, pl.; ?*pusilla*, Blyth. Inde, Indo-Chine, îles de la Sonde.
5016. Var. SUMBAENSIS, Hartl., *Nov. Zool.* IV, p. 270. Ile Sumba.
5017. Var. PERLATA, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 59; D'Orb., *Voy. Am. mér.*, Ois., p. 155; Burm., *Th. Bras.* II, p. 157; var. *guatemalæ*, Ridgw. Amérique centr. et mérid.
5018. Var. PRATICOLA, Bp., *Comp. List*, p. 7; De Kay, *Zool. N. Y.*, B., p. 51, pl. 15, f. 28. Amér. sept. temp., au S. jusqu'au 41° N.
5019. Var. FURCATA, Tem., *Pl. Col.* 452; Gundl., *J. f. O.*, 1874, p. 577. Jamaïque.
5020. Var. CONTEMPTA, Hartl., *Nov. Zool.* V, p. 500. Ecuador N.-W.
5021. Var. BARGEI, Hartl., *Bull. B. O. C.* I, p. 15. Ile Curaçao.
5022. Var. PUNCTATISSIMA, Gould, in *Darw. Zool. Beagle*, B., p. 54, pl. 4; Bp., *Consp.* I, p. 55. Iles Galapagos.
5023. Var. NIGRESCENS, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.* 1 (1878), p. 64. Ile Dominica (Antilles).
5024. Var. GLAUCOPS, Kaup, *Contr. Orn.*, 1852, p. 118; *dominicensis*, Cory, *Bull. Nutt. O. C.*, 1885, p. 95. St-Domingue.
5025. Var. DERGEPSTORFFI, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 590. Iles Andaman.
5026. Var. DELICATULA, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 140; id., *B. Austr.* 1, pl. 51. Australie, Nouv.-Calédonie, Nouv.-Hébrides, îles Loyalty.
5027. Var. LULU, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, B., 1848, p. 74, pl. 21. Iles Tahiti, Tonga et Samoa.
5028. Var. ROSENBERGI, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 181; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 109 (1). Célèbes.

(1) Dans son *Cat. of Birds* (II, p. 291) M. Sharpe réunit ces variétés au type spécifique et ne reconnaît qu'une espèce très variable. Je pense cependant qu'il y a lieu de distinguer ces différentes formes climatiques. Dans son *Hand-list* (1899), M. Sharpe tombe dans un excès contraire : il considère toutes ces variétés comme autant d'espèces distinctes.

- 10.897. *INEXPECTATA*, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, p. 59; Célèbes N.
Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 112.
- 10.898. *NOVÆ HOLLANDIÆ*, Steph., *Gen. Zool.* XIII, 2, p. 61; Australie, Nouv.-Calé-
Sharpe, *l. c.*, p. 505; *personata*, Vig.; Gould, donie, îles Loyalty.
B. Austr. I, pl. 29; *cyclops*, Gould, *Syn. B.*
Austr., pl. 5, pl. 50, f. 2.
5029. *Var. CAVELII*, Hartl., *Nov. Zool.* VII, p. 228. Bourou (Kayeli).
- 10.899. *SORORCULA*, Schl., *P. Z. S.*, 1885, p. 52. Ile Ténimber.
- 10.900. *CASTANOPS*, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 140; id., *B.* Tasmanie.
Austr. I, pl. 28; Schl., *Mus. P.-B., Strig.*, p. 7.
- 10.901. *AURANTIA*, Salvad., *Atti R. Acc. Torino*, XVI, 1881, Nouv.-Bretagne.
p. 619; id., *Orn. Pap.* III, p. 512.
- 10.902. *TENEBRICOSA*, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 80; id., Australie.
B. Austr. I, pl. 50; Schl., *l. c.*, p. 7.
- 10.905. *ARFAKI*, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, p. 101 (1879). Nouv.-Guinée (Monts
Arfak).
- 10.904. *CAPENSIS*, Smith, *S.-Afr. Q. Journ.*, ser. 2, n° 4, Afrique S.
pl. 1, p. 517; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 45;
Schl., *l. c.*, p. 6; *punctata*, Licht.; Shell., *Ibis*,
1875, p. 66.
- 10.905. *CABRÆ*, Dubois, *sp. nov.* (1). Congo indépendant.
- 10.906. *CANDIDA*, Tick., *J. A. S. Beng.* II, p. 572; Jerd., Inde, Indo-Chine, For-
Ill. Ind. Orn., pl. 50; Schl., *l. c.*, p. 6; *longi-* mose, Philippines,
membris, Jerd.; *amauronota*, Cab.; *pithecops*, Célèbes, Australie
Swinh.; *walleri*, Digg.; *oustaleti*, Hartl., *P. Z. S.*, E. et S.-E., Fidji.
1879, p. 295.
- 10.907. *THOMENSIS*, Hartl., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, Ile St-Thomas (Afrique
p. 2; id., *Orn. W.-Afr.*, p. 21; de Mull., *Descr.* W.)
de nouv. Ois. d'Afr., pl. 15.

ORD. XI. — HERODIONES (2)

FAM. I. — IBIDIDÆ (5)

1651. IBIS

Ibis, Cuv. (1817); *Threskiornis*, Gray (1842); *Pseudibis*, Hodgs. (1844); *Carphibis*,
Inocotis, *Nipponia*, Rehb. (1852); *Crptocephalus*, Elliot (1877).

10.908. *ÆTHIOPICA* (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 706; Rüpp., Afrique, Asie S.-W.

(1) *Supra nigricante-brunnea, maculis albis notata; facie alba, regione periophthalmica nigra; corpore subtus rufo, maculis cordiformibus nigricantibus; subcaudalibus albis; rectricibus brunneis, lateralibus albis immaculatis.* Taille : 37 centimètres; ailes 30; queue 10; tarses 87 millimètres. — Cette espèce est dédiée au Commandant Alph. Cabra, qui l'a découverte au sud des Cataractes en octobre 1901. Le type se trouve au Musée du Congo, à Tervueren.

(2) Voy. : Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 1-327 (1898).

(3) Voy. aussi : Elliot, *P. Z. S.*, 1877, pp. 477-510.

- S. U.*, p. 122; *religiosa*, Cuv.; Dub., *Ois. Eur.* II, pl. 143; *egretta*, Tem.; *sacer*, Böhm.
5050. *Var.* BERNIERI, Bp., *Consp.* II, p. 131; Schl. et Pol., *Faun. Madag.* II, p. 126; Milne-Edw. et Grand., *H.-N. Madag.* II, p. 551, pl^s 218-221. Madagascar.
5051. *Var.* ABBOTTI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 599; Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 264. Ile Aldabra.
- 10.909. MELANOCEPHALA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 709; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 120; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ibis*, p. 15; *leucon*, Tem., *Pl. Col.* 481; *macei*, Wagl.; *bengala*, Cuv.; *aimolene*, Hodgs.; *propinqua*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 428. Inde, Ceylan, Indo-Chine, Chine, Japon, Java.
- 10.910. MOLECCA, Cuv., *Règn. an.* I, p. 520; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 580; *strictipennis*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 46; *stricticollis*, Jerd. (err.) Australie, Nouv.-Guinée, Salawati, Waigiou, Céràm.
- 10.911. SPINICOLLIS, James., *Edinb. New-Phil. Journ.*, 1853, p. 215; Jerd. et Sel., *Ill. Orn.*, 1857, pl. 17; Schl., *l. c.*, p. 12; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 43. Australie.
- 10.912. PAPILLOSA, Tem., *Pl. Col.* 504; Schl., *l. c.*, p. 11; *papillata*, Wagl. Inde, Bornéo.
- 10.913. DAVISONI (Hume), *Str. Feath.*, 1873, p. 500; *papillosus*, Oat. (nec Tem.); *armandi*, Oust. Indo-Chine.
- 10.914. NIPPON, Tem., *Pl. Col.* 551; id. et Schl., *Fna. Jap.*, p. 117, pl. 71; *temmincki*, Rehb. Sibér. E., Mandchour., Japon, Form., Haïn.
5052. *Var.* SINENSIS, David, *C. R.* LXXV, p. 64; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 454, pl. 117. Chine.
- 10.915. GIGANTEA, Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1877, p. 23. Cochinchine.

1632. GERONTICUS

Geronticus, Wagl. (1832); *Comatibis*, Rehb. (1852).

- 10.916. CALVUS (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 52; Wagl., *Isis*, 1852, p. 1252; *Pl. Enl.* 867; *niger*, Gm.; *gonoccephala*, Wag. Afrique S.
- 10.917. COMATUS (Ehr.); Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 49; Schl., *l. c.*, p. 9; Dress., *B. Eur.* VI, p. 529, pl. 408; *eremita* (Lin.), Rothsch., Hart. et Kleinschm., *Novit. Zool.* IV, pp. 571-577, pl^s 8, 9, 10; *calvus* (pt.), Levaill., Blanf., Danf. Asie mineure, Afrique N.-E.

1633. BOSTRYCHIA

Bostrychia, Rehb. (1852).

- 10.918. CARUNCULATA (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 49, pl. 19; Schl., *l. c.*, p. 10; Rehb., *Grallæ*, pl. 83, f. 1014. Afrique N.-E.

1654. HAGEDASHIA

Hagedashia, Bp. (1855); *Parnopio*, Heine et Rehw. (1890).

- 10.919. CAFFRENSIS (Licht.), Cat. Mus. Hamb. ; Bp., *Consp.* II, p. 152; *hagedash* et *chalcoptera*, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, pl. 246; *leucocephalus*, Rehw., *Vög. Deut.-Ost Afr.*, p. 55. Afrique tropicale et S.

1655. THERISTICUS

Theristicus, Wagl. (1852).

- 10.920. CAUDATUS (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 57; *Pl. Enl.* 976; Salvad., *Ibis*, 1900, p. 506; *albicollis*, Gm.; *mandurria*, Drap.; *melanopsis* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); *columbianus*, Finsch, *Not. Leyd. Mus.* XXI, p. 25 (juv.); *melanopsis* (pt.), Sharpe. Guyane, Vénézuéla, Colombie, Brésil, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argent.N.
- 10.921. MELANOPSIS (Gm.), *S. N.* 1, 2, p. 655; Salvad., *Ibis*, 1900, p. 511; *albicollis*, Less. (nec Gm.), *Voy. Coq.* I, p. 242; *melanops*, Darw.; *melanopsis*, Bibra; *caudatus* (pt.), auct. plur. (nec Bodd.) Magellan, Patagonie, Argentine S., Chili, Pérou W.
- 10.922. BRANICKII, Berl. et Stolz., *Ibis*, 1894, p. 404; Salvad., *Ibis*, 1900, p. 515, pl^s 9 et 10; *melanopsis* (pt.), auct. plur.; *caudatus* (pt.), Ell., Tacz.; *melanopsis* (pt.), Sharpe, *Hand.-l.* I, p. 186. Haut-Pérou, Ecuador.

1656. HARPIPRION

Harpiprion, Wagl. (1852); *Molybdophanes*, Rehb. (1852).

- 10.923. CAYENNENSIS (Gm.), *S. N.* 1, p. 652; *Pl. Enl.* 820; Schl., *l. c.*, p. 8; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 420; *sylvatica*, Vieill.; *dentirostris*, Wagl. Brésil, Guyane, Vénézuéla, Colombie, Ecuador.
- 10.924. CERULESCENS (Vieill.), *N. Dict.* XVI, p. 18; Schl., *l. c.*, p. 9; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 419; *plumbea*, Tem., *Pl. Col.* 255. Du Brésil centr. au Paraguay et Argentine.

1657. PHIMOSUS

Phimosus, Wagl. (1852).

- 10.925. INFUSCATUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 75; Burm., *Th. Bras.* III, p. 422; *nudifrons*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 69, pl. 86. Argentine, Brésil jusqu'en Colombie.

1658. LOPHOTIBIS

Lophotibis, Rehb. (1852).

- 10.926. CRISTATA (Bodd.), *Tabl.*, p. 51; *Pl. Enl.* 841; Schl., *l. c.*, p. 6; M.-Edw. et Grand., *H.-N. Madag.*, p. 556, pl^s 222-23. Madagascar E. et N.-E.

- 10.927. OLIVACEA (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.*, 1857, p. 105; Guinée, île Principe,
id., *Esq. Orn.*, pl. 5; ?Büttik., *Notes Leyd.* ? Gabon.
Mus. VII, p. 245; *ochracea*, Bp. (1).

1659. LAMPTRIBIS

Lamptribis, Elliot (1877).

- 10.928. RARA, Rothschild, Hart. et Kleinschm., *Novit. Zool.* Afrique W. (Libéria?).
IV, p. 577; *olivacea*, Ell. (nec Du Bus), *P. Z. S.*,
1877, p. 507, pl. 51.

1660. CERCIBIS

Cercibis, Wagl. (1852).

- 10.929. OXYCERCA (Spix), *Av. Bras.*, p. 69, pl. 87; Schl., Amazone, Guyane.
l. c., p. 8; Wagl., *Isis*, 1852, p. 1252.

1661. PLEGADIS (2)

Plegadis, Kaup (1829); *Tantalides*, Wagl. (1852); *Falcinellus*, Gray (1841, nec
Bechst., 1805, nec Vieill., 1816); *Plegadornis*, Brm. (1855).

- ✓ 10.950. FALCINELLUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 555, Europe S., acc. centr.,
pl. 409; *castaneus*, Briss.; Dubois, *Fne. ill.*, Ois. II, Asie S., Australie,
p. 576, pl. 244; *rufa*, Scop.; *igneus*, *viridis*, Gm.; îles de la Sonde,
sacra, Tem.; *chichi*, Dumt.; *mexicanus*, Ord.; Afrique, États-Unis
cuprea, Brm.; *ordi*, *bengalensis*, *peregrina*, Bp.; E. jusqu'en Floride,
major, *minor*, Brm.; *erythrorhynchus*, Cab.; Jamaïque, Cuba.
autumnalis, Doderl.

5055. Var. GUARAUNA (Lin.); Burm., *Th. Bras.* III, De l'Oregon au S. des
p. 425; Bd., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, États-Unis, grandes
pl. 87; *mexicanus*, Gm.; *chichi*, Vieill.; Antilles, Amérique
chalconotus, Tem., *Pl. Col.* 51; *erythro-* centr. et mérid.
rhyncha, Gould; *ordi*, auct. plur. (nec Bp.); jusqu'en Patagonie,
brevirostris, Peale; *falcinellus* (pt.), auct. îles Sandwich.
plur.; *igneus*, Schl. et Salv. (nec Gm.); *th-*
lassina, Ridgw.

(1) MM. Rothschild, Hartert et Kleinschmidt pensent que l'*Ibis olivacea* de Du Bus n'est autre chose qu'un *Hagedashia caffrensis*, tandis que l'Ibis décrit et figuré sous le même nom par M. Elliot est une autre espèce pour laquelle ils proposent le nom de "*rara*", (*Novit. Zool.* IV, pp. 376-77). Le type de l'*Ibis olivacea* est au Musée de Bruxelles et n'a que fort peu de rapport avec l'*Hagedash*, mais il diffère également de l'oiseau figuré dans le mémoire de M. Elliot (*Proc. Zool. Soc.*, 1877, pl. 51). Les deux espèces sont donc parfaitement distinctes quoique provenant toutes deux de l'Afrique occidentale; mais comme elles ont été confondues jusqu'ici, il n'est pas encore possible de dire exactement l'habitat de chacune d'elles. M. le C^{te} Salvadori m'informe qu'il a reçu de M. Fea un Ibis provenant de l'île Principe, qui est parfaitement semblable à celui figuré par Du Bus; ceci tranche définitivement la question.

(2) Voir la note à la page 520 au sujet du terme de *Falcinellus* adopté par beaucoup d'auteurs.

3054. *Var. RUDGWAYI* (Allen), *Bull. Mus. C.-Z.*, 1876, Pérou, Bolivie.
p. 555; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 416; *ordi*,
falcinellus et *igneus*, auct. plur. (pt.)
3055. *Var. HUMERALIS*, De Vis, *Rep. Brit. New-Guin.*, Nouv.-Guinée S.-E.
1898, p. 90.

4662. EUDOCIMUS

Eudocimus, Wagl. (1852); *Guara*, *Leucibus*, Rehb. (1852).

- 10.951. *ALBUS* (Lin.); Wagl., *Isis*, 1852, p. 1252; Audub., États-Unis du S., Amér.
B. Am. VI, p. 54, pl. 560; Burm., *Th. Bras.* III, centr., Amazone,
p. 426; *coco*, Jacq.; *griseus*, Gm.; *longirostris*, Pérou, gr. Antilles.
Wagl.
- ✓ 10.952. *RUBER* (Lin.); Audub., *B. Am.* VI, p. 55, pl. 559; Haut-Amazone, Brésil
Dubois, *Orn. Gal.*, p. 55, pl. 25; *fuscus* et *mi-* N., Guyane, grandes
nutus, Lin.; *leucopygus*, Spix, *Av. Bras.*, p. 70, Antilles et S. des
pl. 88. États-Unis.

FAM. II. — PLATALEIDÆ

4665. PLATALEA

Platea, Briss. (1760); *Platalea*, Lin. (1766); *Spatherodia*, *Leucero dia*, Rehb.
(1852); *Platibis*, Bp. (1855).

- 10.953. *LEUCEROMA*, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 519, pl. 407; Europe centr. et mér.,
Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 574, pl. 240; *leu-* Afrique E., Asie
copodius, Gm.; *nivea*, Cuv.; *leucero dius*, Naum.; centr., Chine, Ja-
pyrrhops, Hodgs.; *major*, Tem. et Schl., *F. J.*, pon, Inde.
p. 419, pl. 75.
- 10.954. *REGIA*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 106; id., *B. Austr.* Australie jusqu'aux
VI, pl. 50; *melanorhynchos*, Rehb.; *latirostrum*, Moluques.
Ellm.; *intermedia*, Grant, *Ibis*, 1889, p. 52,
pl. 4, ff. 2, 2^a.
- 10.955. *TENUIROSTRIS*, Tem., *Man. d'Orn.* I, p. 105 (1820); Afrique, Madagascar.
Hengl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 1126, pl. 50, f. 4;
M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 524,
pls 215-17; ? *alba* et ? *cristata*, Scop.; *nivea*,
Burch.; *chlororhynchos*, Drap.; *telfairii*, Vig.;
nudifrons, Less.; *luzoniensis*, Bp.
- 10.956. *MINOR*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 120, pl. 76; Corée, Chine, Japon,
Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 50; Grant, *Ibis*, 1889, Formose.
p. 54, pl. 1; ff. 5, 5^a, 6; *japonica*, Rehw., *J. f. O.*,
1877, p. 159.

- 10.957. FLAVIPES, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 106; id., *B. Austr.* VI, pl. 49; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ciconiæ*, p. 24; Sharpe, *l. c.*, p. 51. Australie.

1664. AJAJA

Ajaja, Rehb. (1852); *Mystrohamphus*, Heine (1890).

- 10.958. MEXICANA (Gamb.), *Journ. Phil. Acad.* I, 1849, p. 222; *ajaja*, Lin.; Audub., *B. Am.* VI, p. 72, pl. 562; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 412; *rosea*, Rehb. (ex Briss.); Rehw., *J. f. O.*, 1877, p. 157. États-Unis S.-E., Amérique centr. et mér. jusqu'à l'Argentine.

FAM. III. — CICONIIDÆ

SUBF. I. — TANTALINÆ

1665. TANTALUS

Tantalus, Lin. (1766); *Tantalides*, Rehb. (1852); *Tantalops*, Coues (1884).

- 10.959. LOCULATOR, Lin.; Audub., *B. Am.* VI, p. 64, pl. 561; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ciconiæ*, p. 17; *nandapoa*, Vieill.; *plumicollis*, Spix. S. des États-Unis, Amérique centr. et mér.

1666. PSEUDOTANTALUS

Pseudotantalus, Ridgw. (1885).

- 10.940. LEUCOCEPHALUS (Forst.), *Ind. Zool.*, p. 20, pl. 10; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 125, pl. 247; Schl., *l. c.*, p. 17; *rodopteron*, Hodgs.; *indicus*, Cuv.; *longinembris*, Swinh. Inde, Indo-Chine, Chine.
- 10.941. CINEREUS (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1822, p. 527; Sharpe, *Cat.*, p. 526; *lacteus*, Tem., *Pl. Col.* 552; Schl., *l. c.*, p. 18. Malacca, Java, Sumatra.
- 10.942. IBIS (Lin.); *Pl. Enl.* 589; Schl., *l. c.*, p. 18; Fch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 729; *rhodinopterus*, Wagl.; *longirostris*, Brm. Afrique trop., Madagascar.

SUBF. II. — CICONIINÆ

1667. CICONIA

Ciconia, Briss. (1760); *Sphenorhynchus*, Hempr. et Ehr. (1852, nec Max., 1851) *Melanopelargus*, Rehb. (1852); *Abdimia*, Bp. (1855).

- 10.943. ALBA, Bechst., *Naturg. Deutschl.* IV, p. 82 (1795); Dress., *B. Eur.* VI, p. 297, pl. 405; Dubois, *Fne.* Europe centr. et mér., Asie S.-W. jusqu'au

- Ill.*, *Ois.* II, p. 558, pl. 258; *A. ciconia*, Lin.; *N. del'Inde, Afrique.*
albescens, *nivea*, *candida*, *major*, Brm.; *asiatica*,
azretti, *orientalis*, *mycteriorhyncha*, Severtz.;
azreth, Bogd.
- 10.944. BOYCIANA, Swinh., *P. Z. S.*, 1873, p. 515; *Scl.*, Sibérie E., Corée, Ja-
P. Z. S., 1874, pp. 2, 506, pl. 1; Dav. et Oust., pon.
Ois. Chine, p. 450.
- 10.945. NIGRA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 509, pl. 406; Europe, à l'E. jusqu'en
fusca, Briss.; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 566, Mongolie, Chine et
pl. 259; *Melanop. niger*, Rehb.; *chrysopelargus*, Inde; Afrique.
Light.
- 10.946. ABDIMM, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 76; Cretzschm. in Afrique trop., Arabie
Rüpp. Atl., p. 11, pl. 8; Empr. et Ehr., *Symb.* (accid. Espagne).
Phys., fol. F, pl. 5; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ciconia*,
p. 5; *sphenorhyncha*, Bp.

1668. DISSOURA

- Dissoura*, Cab. (1850); *Diplocercus*, Jerd., ex Blyth (1864); *Dissura*, Butl. (1879).
- 10.947. EPISCOPUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Ent.* 906; *leu-* Afrique tropic., Inde,
cocephala, Gm.; Schl., *l. c.*, p. 9; *umbellata*, Ceylan, Indo-Chine,
Wagl.; *biclavata*, Hodgs.; *bicaudata*, Tick.; Malacca, iles Indo-
microscelis, Gray; *pruyssenaerii*, Hengl., *J. f. O.*, Malaises, Célèbes.
1865, p. 29.
5056. Var. STORMI (W. Blas.), *Geogr. Ges. u. Naturh.* Bornéo S.
Mus. Lübeck, II, 1896, p. 90; id., *Orn.*
Monatsb., 1896, p. 180.

1669. EUXENURA

Euxenura, Ridgw. (1878).

- 10.948. MAGUARI (Gm.), *S. N.* I, p. 625; Vieill., *Gal. Ois.*, Amérique mérid. jus-
p. 158, pl. 254; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 285; qu'au Chili et Ar-
pillus, Mol.; *jaburu*, Spix; *dicrura*, Rehw., gentine.
J. f. O., 1877, p. 169.

1670. ANASTOMUS

- Anastomus*, Bonn. (1790); *Hians*, Lacép. (1801); *Rynchoschasmus*, Herm. (1804);
Empharis, Raf. (1815); *Charnorhamphe*, Dumt. (1817); *Chenorhamphus*,
Gray (1848); *Hiator*, Rehb. (1852).
- 10.949. OSCITANS (Bodd.), *Tabl.*, p. 55; *Pl. Ent.* 952; Jerd., Inde, Ceylan, Cochin-
B. Ind. III, p. 765; *coromandeliana*, Gm.; Vieill., chine.
Gal. Ois. II, p. 155, pl. 251; *pondiceriana*, Gm.;
albus, *cinerus*, Vieill.; *indicus*, Less.; *typus*, Tem.

- 10.950. LAMELLIGERUS, Tem., *Pl. Col.* 256; *capensis*, Less. Afrique tropicale.
 5057. Var. MADAGASCARIENSIS, M.-Edw., *C. R.* XCI, Madagascar.
 p. 1057 (1881); id. et Grand., *H. N. Madag.*,
 p. 519, pls 211-14.

1671. XENORHYNCHUS

Xenorhynchus, Bonap. (1855).

- 10.951. ASIATICUS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 670; Hume et Inde, Birmanie, Malacca, Nouv.-Guin.,
 Davis., *Str. F.*, 1878, p. 469; *indica*, Lath.; Australie N.,
australis, Shaw; Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 64; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 54; *leucoptera*
 et *xenorhynchus*, Wagl.

1672. EPHIPIORHYNCHUS

Ephippiorhynchus, Bonap. (1855).

- 10.952. SENEGALENSIS (Shaw), *Tr. Linn. Soc.* V, p. 55, pl. 5; Afrique tropicale.
 Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 459, pl. 255; *ephippiorhyn-*
cha, Tem.; Cretzschm., in *Rüpp. Atl.*, p. 5, pl. 5.

1675. MYCTERIA

Mycteria, Lin. (1766).

- 10.955. AMERICANA, Lin.; *Pl. Enl.* 817; Schl., *l. c.*, p. 11; Amér. mérid. et centr.
 Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 411; *C. mycteria*, Licht. jusqu'au Texas.

1674. LEPTOPTILUS

Leptoptilos, Less. (1851); *Argala*, Hodgs. (1858); *Cranopelargus*, Glog. (1842);
Osteorophea, Hodgs. (1844).

- 10.954. DUBIUS (Gm.), *S. N.* I, p. 624; *argala*, Lath.; Schl., Inde, Indo-Chine.
l. c., p. 15; *marabou*, Tem., *Pl. Col.* 500; *migra-*
toria, Hodgs.; *nudifrons*, Jerd.; *immigratoria*,
 Hodgs.
 10.955. JAVANICUS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 188; Inde, Ceylan, Chine S.,
 Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 449; *crinita*, Buch.; Indo-Chine, Malac.,
capitata, Tem., *Pl. Col.* 512; *nudifrons*, *cristata*, gr. îles de la Sonde.
 Me Clell.; *calva*, Jerd.
 10.956. CRUMENIFERUS, Less. (ex Cuv.), *Traité d'Orn.*, Afrique tropicale.
 p. 585; Hengl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1114;
argala, Tem., *Pl. Col.* 501 et auct. plur. (nec
 Lath.); *marabou*, Denh. et Clapp.; *vetula*, Sund.
 5058. Var. RUPPELLI, Wirth., *Naum.*, 1852, pl. 2, p. 56; Région du Nil Blanc.
 Rehw., *J. f. O.*, 1877, p. 165.

FAM. IV. — PHÆNICOPTERIDÆ (1)

1675. PHOENICOPTERUS

Phenicopterus, Lin. (1766); *Phenikorodias*, *Pheniconaias*, Gray (1869).

- 10.957. *RUBER* (Lin., pl.; Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 45, pl. 66; Audub., *B. Am.* VI, p. 169, pl. 575; *bahamensis*, Less.; *americanus*, Max.; *erythraus* (pt.), Verr.; Gray, *Ibis*, 1869, p. 442, pl. 14, f. 6; *glyphorhynchus*, Gr., l. c., pl. 14, f. 5; ?*ignipalliat*us, Berl. Amérique trop. et sub-trop., du Sud des États-Unis au Para et les îles Galapagos.
- 10.958. *ROSEUS*, Pall. (ex Barr., 1745), *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 207; Dress., *B. Eur.* VI, p. 545, pl. 410; *ruber* (pt.), Lin. et auct. plur.; *major*, Dum.; *europæus*, Sw.; *ignipalliat*us, Gray (nec d'Orb.); *antiquus*, Tem.; *plinii*, Rehb.; *erythraus* (pt.), Verr. et auct. plur.; *platyrhynchus*, minor, *pygmaeus*, Brm.; *antiquorum*, Gray; *andersoni*, Brooks; *roseus*, var. *parva*, Severtz. Europe mérid. jusqu'en Asie centr. et le lac Baïkal, Inde, Ceylan, Afrique.
- 10.959. *CHILENSIS*, Mol., *Hist. Nat. Chili*, p. 214; *Pl. Enl.* 65; Schl., *Mus. P.-B., Anseres*, p. 417; *ruber* (pt.), Vieill.; *ignipalliat*us, d'Orb. et Geoff. St.-Hil., *Ann. Sc. Nat.* XVII, 1829, p. 454; id., *Mag. de Zool.*, 1852, pl. 2; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 422. Sud de l'Amér. mérid., au N. jusqu'à l'Uruguay, le Chili et le Pérou central.
- 10.960. *MINOR*, Geoffr., *Bull. Sc. Soc. Philom.*, 1798, p. 98, pl., ff. 1, 2, 5; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 185, pl. 275; Tem., *Pl. Col.* 419; *parvus*, Vieill.; *capensis*, Smith; *blythi*, Bp.; *erythraus*, Harl. et auct. plur. (nec Verr.); *rubidus*, Feild. Afrique S.-E. et N.-E., Madagascar, Inde N.-W.

1676. PHOENICOPARRUS

Phenicoparrus, Bonap. (1856); *Lipocentrus*, Sundev. (1872); *Phenicoparra*, Stejn. (1885).

- 10.961. *ANDINUS* (Philippi), *Anal. Univ. de Chile*, 1854, p. 557; id., *Reise Wüste Atacama*, p. 164, *Zool.*, pls 4, 5, f. a; Schl., *Argent. Orn.* II, p. 419; Salvad., *Cat. B.*, p. 21. Chili.
- 10.962. *JAMESI* (Rahmer), *Anal. Univ. de Chile*, 1886, p. ?; Selat., *P. Z. S.*, 1886, p. 599, pl. 56; Salvad., l. c., p. 22; *andinus* (pt.), auct. plur. (nec Philippi). Tarapacá (Chili), Pérou S.

(1) Voy. : Salvadori, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXVII, pp. 8-22 (1895).

FAM. V. — SCOPIDÆ (1)

1677. SCOPUS

Scopus, Gm. (1788); *Cepphus*, Wagl. (1827).

- 10.965. UMBRETTA, Gm., *S. N.* I, p. 618; *Pl. Enl.* 796; Afrique trop., Arabie,
Schl., *Mus. P.-B., Ciconie*, p. 15; Fsch. et Madagascar.
Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 727; M.-Edw. et Grand.,
H. N. Madag., Ois., p. 514, pl. 208; *Cepphus*
scopus, Wagl.; *fusca*, Forst.

FAM. VI. — BALÆNICEPIDÆ

1678. BALÆNICEPS

Balæniceps, Gould, 1851.

- 10.964. REX, Gould, *P. Z. S.*, 1851, p. 1, pl. 55; Jard., Haut-Nil Blanc.
Contr. Orn., 1851, p. 11, pl. 68; Park., *Tr. Z.*
S. IV, pp. 269-551, pls 64-67.

FAM. VII. — ARDEIDÆ

SUBF. I. — ARDEINÆ

1679. ARDEA

Ardea, Lin. (1766); *Lepterosas*, Hemp. et Ehr. (1852); *Demiegretta*, Blyth (1846);
Typhon, *Agamia*, Rehb. (1852); *Ardeomega*, *Audubonia*, Bonap. (1855);
Florida, *Hydranassa*, Baird (1858); *Megerodius*, Heine (1860); *Pyrhero-*
dias, Fch. et Hartl. (1870); *Doryphorus*, Rehw. (1877); *Dichromanassa*,
Ridgw. (1878); *Phoyx*, Stejn. (1887); *Glaucerosodius*, *Lepterosodius*, *Doriponus*,
Heine et Rehw. (1890); *Melanophoyx*, Sharpe (1894); *Notophoyx*, Sharpe
(1898).

- 10.965. GOLIATH, Cretzschm., in *Rüpp. Atl.*, p. 59, pl. 56; Afrique, Madagascar,
Tem., *Pl. Col.* 474; *nobilis*, Blyth; *gigantodes*, ? Inde.
Licht.
- 10.966. SUMATRANA, Rall., *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1822, p. 525; Aracan, Ténass., Ma-
Jerd., *B. Ind.* III, p. 740; *typhon*, Tem., *Pl. Col.* lac., îles de la Sonde,
475; *rectirostris*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 54; Célèbes, Australie.
robusta, *nobilis*, Bp.; *temmincki*, Rehb.
- 10.967. INSIGNIS, Hodgs., *Icon. ined. Gall.*, pl. 61, f. 2; Himalaya E.
Sharpe, *Cat.*, p. 70; *nobilis*, Gray (nec Blyth).

(1) Voy.: Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXVI (1898).

- 10.968. HUMBLLOTI, M.-Edw. et Grand., *Hist. N. Madag.*, Madagasear E.
Ois., p. 546.
- 10.969. MELANOCEPHALA, Vig. et Childr., in *Denh. et Clapp.* Afrique (accid. Eu-
Voy. II, App., p. 201; Dress., *B. Eur.* VI, p. 225, rope S.)
pl. 597; *atricollis*, Wagl.; Des M., *Jc. Orn.*, pl. 50.
- 10.970. COCOI, Lih.; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 590; *caru-* Amérique mérid.
lescens, coco et *fuscicollis*, Vieill.; *plumbea*,
Merr.; *maguari*, Spix, *Av. Bras.*, pl. 90; *major*,
Fras.; *palliat*a, Harth.
- 10.971. CINEREA, Lih.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 207, pl. 595; Europe, Asie, Archipel
Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 515, pl. 250; *major*, Indien, Afrique, Ma-
Lin.; *johanne*, Gm.; *shenana*, Sand.; *vulgaris*, dagascar, Australie.
Bechst.; *brag*, Geoff.; *leucophara*, Gould; *cine-*
racea, *minor*, etc., Brm.
- 10.972. HERODIAS, Lin.; Audub., *B. Amer.* VI, p. 122, Amér. du N. et centr.,
pl. 569; *hudsonius*, Lin. Ant., Vén., Colomb.
5059. Var. WURDEMANNI, Baird, *B. N. Am.*, p. 669, Floride S.
pl. 86; *occidentalis* (pt.), B., Br. et Rid.,
Wat. *B. N. Am.*, p. 6.
5040. Var. WARDI, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Cl.* VII, Floride.
p. 5; Ridgw., *Man. N.-Am. B.*, p. 129.
- ✓ 10.975. OCCIDENTALIS, Audub., *B. Am.*, pl. 281; id., *B.* Floride S., grandes
Am. in-8°, VI, p. 410, pl. 568; Ridgw., *Man. N.* Antilles.
Am. B., p. 128.
- 10.974. PURPUREA, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 217, pl. 596; Europe centr. et mér.,
purpurascens, Briss.; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, Asie S.-W., Afrique,
p. 521, pl. 251; *rufa*, *variegata*, Scop.; *caspia*, Madagascar.
purpurata, *botaurus*, *badia*, Gm.; *monticola*,
La Peyr.; *pharaonica*, Bp.
5041. Var. MANILENSIS, Meyen, *Acta Acad. Leop.-Car.* Inde, Ceylan, Chine,
XVI, *Suppl.*, p. 102; Sharpe, *Cat.* XXVI, Malacca, gr. îles de
p. 65, pl. 1; *purpurea* (pt.), auct. plur. la Sonde, Célèbes.
- ✓ 10.975. CERULEA, Lin.; *Pl. Ent.* 549; Audub., *B. Am.* VI, États-Unis E., Amér.
p. 148, pl. 572; Schl., *Mus. P.-B. Ardea*, p. 22; centr., Antilles, Co-
? *thula*, Mol.; ? *ohula*, Gm.; *cyanopus*, Gm.; lombie, Vénézuéla,
? *plumbea*, Brown; *carulescens*, Lath.; *chalybea*, Guyane, Brésil,
Steph.; *ardesiaca*, Less. (nec Wagl.); ? *nivea*, Ecuador.
Gosse; *poucheti*, Bp.
- 10.976. ARDESIACA, Wagl., *Syst. Av.*, *Ardea*, p. 189, sp. 20; Afrique trop., Mada-
Schl. et Pol., *Faune de Madag.* II, p. 122; *albi-* gascar.
collis, Vieill. (fem.); *calceolata*, Du Bus, *Bull.*
Acad. Brux. IV, 1858, p. 40, pl. 2; *flavimana*,
Sund.; *concolor*, *puella*, Hengl.
5042. Var. VINACEIGULA (Sharpe), *Cat. B.* XXVI, p. 105; Transvaal.
pl. 1^a; *ardesiaca* (pt.), Gurn., *Ibis*, 1871,
p. 264.

- ✓10.977. *Rufa*, Bodd, *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 902; Schl., *l. c.*, p. 24; ?*aquinoctialis*, Lin.; *rufescens*, Gm.; *pealei*, Bp.; id., *B. Am.* IV, p. 96, pl. 26, f. 1; *cubensis*, Lemb., *Av. Cuba*, p. 84, pl. 15, f. 1. Sud des États-Unis, Mexique, Guatém., grandes Antilles.
- 10.978. *NOVÆ-HOLLANDIÆ*, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 701; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 55; Schl., *l. c.*, p. 28; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 542; *leucops*, Wagl. Austr., Nouv.-Zélande, Nouv.-Calédonie, Nouv.-Guinée, Mol.
- 10.979. *PACIFICA*, Lath., *Ind. Orn., Suppl.*, p. 65; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 90; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 52; *bullaragang*, Wagl. Australie.
- 10.980. *ARUENSIS*, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 188, 197 (*juv.*); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 544; Sharpe, *Cat.*, p. 115, pl. 1^b; *picata*, Gould (nec Radl.); id., *B. Austr.* VI, pl. 62; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 816; *landsbergi*, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, p. 115 (*juv.*); *flavirostris*, Sharpe, *l. c.*, p. 654. Australie N., Nouv.-Guinée, îles Arou, Ténimber, Timorl., Amboine, Célèbes.
- 10.981. *GULARIS*, Bosc, *Act. de la Soc. d'H. N. de Paris*, I, 1792, p. 4, pl. 2; Schl., *l. c.*, p. 25; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 551; *albicollis*, Vieill. (mas.); *jugularis* (pl.), Less.; *schistacea*, Hempr. et Ehr., *Symb. Phys. Zool.* II, fol. 1, pl. 6; *affinis*, Gray; *cineracea*, Cab. (nec Brm.), *Von der Deck. Reis.* III, p. 49, pl. 17. Afrique trop., Madagascar.
5045. *Var. ASHA*, Syk., *P. Z. S.*, 1852, p. 157; Jerd., *B. Ind.* III, p. 747; *gularis*, auct. plur. (nec Bosc.) Asie S.-W., de la Perse jusqu'à Ceyl. (côtes).
- 10.982. *TRICOLOR*, P.-L.-S. Müll., *S. N., Anh.*, p. 111; *Pl. Enl.* 550; Sharpe, *l. c.*, p. 126; *leucogaster*, Bodd.; Schl., *l. c.*, p. 9. Guyane, Brésil, ? Vénézuéla.
- ✓5044. *Var. RUFICOLLIS* (Gosse), *B. Jam.*, p. 558, pl. 95 (*juv.*); *ludoviciana*, auct. plur. (nec Gm.); Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 15, pl. 64, f. 1; *leucogaster*, d'Orb.; *leucoprymna*, Licht.; *tricolor*, auct. plur. (nec Müll.); *cyanirostris*, Cory. États-Unis tempér. E., Amérique centrale, Antilles.
- 10.983. *AGAMI*, Gm., *S. N.* I, p. 629; *Pl. Enl.* 858 et 859; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 596; *fusca*, Lath.; *gamia*, Sw.; *picta*, Rehb. Amérique centr., Colombie, Guyane, Amazone, Pérou.
- 10.984. *SACRA*, Gm., *S. N.* I, p. 640; *Pl. Enl.* 926; Bull., *B. New Zeal.*, p. 228, pl. 24, f. 1; *nova-guinææ*, Gm.; *matook*, Vieill.; *nigerrima*, Wagl.; *jugularis*, Forst. et auct. plur.; Schl., *l. c.*, p. 25; *aquinoctialis*, *nova-hollandiæ*, Forst.; *greyi*, Gray; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 61; *concolor*, Blyth; *atra*, Cuv.; *albolineata*, Gray; *andamansensis*, Beav.; *ringeri*, Stejn. Australie, Nouv.-Zélande, Océanie, Archipel Indien, Asie S.-E., îles Andaman et Nicobar.

1680. HERODIAS

Herodias, Boie (1822); *Garzetta*, Kaup (1829); *Egretta*, Bp. (1850); *Casmerodius*, Glog. (1842); *Leucophoyx*, *Mesophoyx*, Sharpe (1894).

- 10.985. ALBA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 251, pl. 598; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 525, pl. 252; *candida*, Briss.; *egrettoïdes*, Gm.; *egretta*, Bechst.; *flavirostris*, *melanorhynchos*, Wagl.; *modesta*, Gray; *torra*, Frankl.; *orientalis*, *nigrirostris*, Bp.; *victoriæ*, Macg.; *latiefi* et *brachyrhynchus*, Brm. Europe S. et centr., Asie centr. et S., Afrique, Madagascar.
5045. Var. TIMORIENSIS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 575; Sharpe, *l. c.*, p. 98; *flavirostris*, auct. plur. (nec Vieill.); *longicollis*, Meyen; *symmorphus*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 56; *egretta*, auct. plur. (pt., nec Gm.); *alba*, auct. plur. (pt., nec Lin.); *intermedia*, Fsch. (nec Wagl.); *modesta*, Swinh. (nec Gray); *torra*, Salvad. (nec Frankl.) Chine N., Japon, Formose, Archipel Indien, Nouv.-Guin., Australie, Tasman., Nouv.-Zélande.
- 10.986. EGRETTE (Gm.), *S. N. I.* p. 629; Wils., *Am. Orn.* VII, p. 106, pl. 61, f. 4; Audub., *B. Am.* VI, p. 152, pl. 570; ?*galatea*, Mol.; ?*thula*, Gm.; *leuce*, Licht.; *americana*, Sw.; *alba* (pt.), auct. plur. (nec L.); *californica*, Bd., Cass. et Lawr. Amérique tempérée, centr. et mérid. jus-qu'en Patagonie.
- 10.987. INTERNEDIA (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 659; Fsch. et Hartl., *Vög. N.-O. Afr.*, p. 686; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 852; Sharpe, *l. c.*, p. 85; *melanopus*, Wagl.; *egrettoïdes*, Tem. (nec Gm.); *plumiferus*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 57; Sharpe, *l. c.*, p. 87; *brachyrhynchus*, Brm.; Sharpe, *l. c.*, p. 87. Afrique N.-E., E. et S., Asie mérid., Japon, Arch. Indien, Philipp., Célèbes, Mol., Nouv.-Guin., Austr.
- 10.988. EULOPHOTES, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 64; id., *P. Z. S.*, 1865, p. 520; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 824, pl. 44; ?*melanopus*, Blyth (nec Wagl.); *nivea* (pt.), Rehw.; *sacra* (pt.), Sharpe; ?*immaculata*, Mey. et Wg. (syn.) Japon, Formose, Chine S., Ténass., Andam., Célèb., Nouv.-Guin. S., Australie, Tasm.
- 10.989. GARZETTA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 259, pl. 599; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 551, pl. 255; *nivea*, Gm.; *xanthodactyla*, Raf.; *orientalis*, Gray; *jubata*, *lindermayeri*, Brm.; *nigrirostris*, Hodgs. (nec Gr.) Europe mérid., Asie centr. et S., Japon, Philipp., Afrique.
5046. Var. NIGRIPES (Tem.), *Man. d'Orn.* IV, p. 576 (1840); Sharpe, *l. c.* p. 122; *immaculata*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 58; *garzetta* (pt.), auct. plur.; *melanopus*, Bp. Java, Archipel Malais, Australie.
- 10.990. CANDIDISSIMA (Gm.), *S. N. I.* p. 655; Audub., *B. Am.* VI, p. 165, pl. 574; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 595; *nivea*, Jacq. (nec Gm.); *carolinensis*, Ord.; *lactea*, Less.; ?*thula*, Bp. États-Unis, Amérique centr. et mérid. jus-qu'au Chili et Argentine.

1681. BUBULCUS

Bubulcus, Bp. (1854).

- 10.991. *LUCIDUS* (Rafin.), *Caratteri*, p. 3; Salvad., *Ucc. Ital.*, p. 245; Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 215; *ibis*, Lin. (pt.); *ruficapilla*, Vieill.; *A. bubulcus*, Aud.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 245, pl. 400, f. 1; *veranii*, Roux; *russata*, Wagl. (pt.); Gould, *B. Eur.* IV, pl. 278; *coromanda* (pt.), auct. plur. (nec Bodd.); *coromandelica*, Rüpp.; *ruficrista*, Bp. Europe mérid. jusqu'en Asie centr., Afrique, Madagascar.
- 10.992. *COROMANDUS* (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 910; Schl., *Mus. P.-B.*, p. 50; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 441; *coromandeliensis*, Steph.; *affinis*, Horsf.; *flavirostris*, Vieill.; *russata* (pt.), Wagl.; *caboja*, Frankl.; *flavicans*, Hodgs.; *coromandensis*, Bp.; *coromandelianus*, Swinh. Asie orient., Inde, Ceylan, Moluques, Célèbes, îles de la Sonde, Japon S., Formose, Philipp.

1682. ARDEOLA

Ardeola, Boie (1822); *Buphus*, Boie (1826); *Erythrocnus*, Sharpe (1894).

- 10.995. *RALLOIDES* (Scop.), *Ann.* I, p. 88; Dress., *B. Eur.* VI, p. 251, pl. 400, f. 2; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 553, pl. 254; *marsigli* et *pumila*, Lép.; *comata*, Pall.; *castanea*, Gm.; *grisea*, Bodd. (nec L.); *squaiotta*, *senegalensis*, ?*erythropus*, Gm.; *botaurulus*, Schr.; *griseo-alba*, Bosc; *audax*, Lap.; *deaurata*, Merr.; *illyricus*, Brm.; *subralloides*, Würl.; *leucoptera*, Chapm.; *luteus*, Dod. Europe mérid. accid. centr., à l'E. jusqu'à la Mer Caspienne, Afrique.
5047. *Var.* *IDE* (Hartl.), *J. f. O.*, 1860, p. 167; *elegans*, Roch et Newt., *Ibis*, 1863, p. 170; *leucoptera*, Schl. (nec Bodd.) Madagascar.
- 10.994. *GRAYI* (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 158; Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 207; ?*leucoptera*, Bodd.; ?*malaccensis*, Gm.; *macronata*, Hodgs.; *leucoptera*, auct. plur. Asie S.-W., Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca.
- 10.995. *BACCHUS* (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 127; Sharpe, *l. c.*, p. 211; *leucoptera* (pt.), auct. plur.; *prasinoscelis*, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 64. Sibér. E., Japon, Chine, Birm., Malac., Bornéo, Andaman.
- 10.996. *SPECIOSA* (Horsf.), *Trans. Linn. Soc.* XIII, p. 189; id., *Zool. Research. in Java*, pl. 62; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 858; *pseudoralloides*, Brm.; *malaccensis*, Less.; *A. leucoptera speciosa*, Schl. Java, Lomboek, Sumbawa, Sumba, Bornéo, Célèbes.
- 10.997. *RUFIVENTRIS* (Sundev.), *OEfvers. K. Vet.-Akad.*, *Stockh.*, 1850, p. 110; Ayres, *Ibis*, 1871, p. 265, pl. 9; *semirufa*, Schl., *l. c.*, p. 53. Afrique S. jusqu'au Zambèze, Damara.

1685. ARDETTA

Ardetta, Gray (1842); *Erodiscus*, Glog. (1842); *Nannocnus*, Stejn. (1887).

- 10.998. *MINUTA* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 259, pl. 401; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 559, pl. 255; *pusillus*, Brm. (nec V.) Europe centr. et mér.,
Asie S.-W., Afrique.
3048. *Var. PAYESI* (Hartl. ex Verr.), *J. f. O.*, 1858, p. 42; Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 285. Afrique W. et S.
3049. *Var. PODICEPS* (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 154; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 708; M.-Edw. et Grand., *II. Madag. Ois.*, p. 559, pl^s 229^a, 250, 250^a; *minuta* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *australis*, Schl., *l. c.*, p. 59; *pusilla*, Rehw. (nec V.); *podicipes*, Shpe, *l. c.*, p. 225. Afrique E. et centr.,
Madagascar.
- 10.999. *SINENSIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 642; Schl., *l. c.*, p. 40; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 448; *lepidota*, Horsf.; *melanophis*, *melanoptera*, Cuv.; *pulchra*, Hume. Japon, Corée, Chine,
Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Archipel Malais, Nouv.-Guin., Austr.
- 11.000. *EXILIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 645; Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 57, pl. 65, f. 4; Audub., *B. Am.* VI, p. 100, pl. 566; ? *spadicea*, Gm. Amér. sept., au N. jusqu'aux gr. lacs, Am. centr., gr. Antilles.
3050. *Var. NEOXENA*, Cory, *Auk*, 1886, p. 262; Sharpe, *l. c.*, p. 255; *neoxerius*, Scott, *Auk*, 1892, p. 141. Du Canada E. à la Floride.
- 11.001. *ERYTHROMELAS* (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 422; Burm., *Th. Bras.* III, p. 415; *exilis* (pt.), Gr., Schl. et Salv.; *variegata*, Léot. (nec Scop.); *involucris*, Tacz. (nec V.), *Orn. Pér.* III, p. 599. Amérique mérid., de
Panama et Guyane au S. du Brésil.
- 11.002. *PUSILLA* (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 452; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 68; *maculata*, Lath. (nec Bodd.) et auct. plur.; *punctata*, Gray; *novæ-zelandiæ*, Purdie. Australie, Nouv.-Zélande.
- 11.005. *INVOLUCRIS* (Vieill.), *Enc. méth.* III, p. 1127; Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 654; Schl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 401, pl. 17; *exilis* (pt.), Gr.; *erythromelas* (pt.), Hartl., Burm., Rehw. Brésil S., Paraguay,
Chili, Patagonie N., Argentine.
- 11.004. *CINNAMOMEA* (Gm.), *S. N.* I, p. 645; Gr. et Har dw., *Ill. Ind. Zool.*, pl. 66, f. 1 (*juv.*); Schl., *l. c.*, p. 40; Schrenck, *Reis. Amurl.*, p. 447, pl. 14, ff. 1, 2; *nebulosa*, Horsf. Inde, Ceylan, Nicobar,
Sib. E., Chine, Indo-Ch., Form., Phil., Cél., îles de la Sonde.
- 11.005. *EURHYTHMA*, Swinh., *Ibis*, 1875, p. 75, pl. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 856, pl. 45; *cinnamomea*, Schr., *Reis. Amurl.* II, p. 447, pl. 15, f. 5 (*juv.*); *sinensis*, Tacz. (nec Gm.); *riedeli*, Mey. et Wg. Japon, Sibérie E.,
Chine, Cochinchine, Bornéo N., Célèbes N., Java.

1684. ARDEIRALLA

Ardeiralla, Verr. (1855); *Dupetor*, Heine (1890); *Xanthocnus et Erythrophoyx*, Sharpe (1894); *Ardeirallus*, Sharpe (1898).

- 11.006. STURM (Wagl.), *Syst. Av., Ardea*, p. 191, sp. 57; Afrique trop., Cana-
Gray, *Gen. B.* III, pl. 150; Schl., *l. c.*, p. 45; ries.
gutturalis, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 91;
plumbea, Sw.; *gularis*, Rehb.; *pusilla*, Heugl.
(nec V.); *eulopha*, Heugl., *J. f. O.*, 1862, p. 407.
- 11.007. FLAVICOLLIS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 701; Gr. et Inde, Ceylan, Chine S.
Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 66, f. 2; Jerd., *Ill.* et centr., Indo-Ch.,
Ind. Orn., pl. 16; Schl., *l. c.*, p. 45; Salvad., Malacca, gr. îles de
Orn. Pap. III, p. 564; *nigra*, Vieill.; *picata*, la Sonde, Célèbes.
Rall.; *australis*, *bilineata*, Less. ex Cuv.
5051. Var. GOULDI (Bonap.), *Consp. Av.* II, p. 152; Australie.
Finsch, *Neu-Guin.*, p. 185; Sharpe, *Cat.*,
p. 249; *flavicollis*, Gould, *B. Austr.* VI,
pl. 65 (et auct. plur., nec Lath.); *australis*,
Schl., *l. c.*, p. 46; *javanica*, Scl. (nec Horsf.)
5052. Var. NESOPHILA (Sharpe), *Bull. B. O. C.* III, n° XVI, Archipel Bismarck.
p. 52; id., *Cat. B.* XXVI, p. 250, pl. 5, f. 1;
flavicollis (pt.), Scl., Finsch.
5053. Var. MELANA (Salvad.), *Atti B. Accad. Sc. Torino*, Moluques.
XIII, 1877-78, p. 1186; id., *Orn. Pap.* III,
p. 567; *flavicollis* (pt.), auct. plur.; *melas*,
Sharpe, *l. c.*, p. 251, pl. 5, f. 2.
- 11.008. WOODFORDI, Grant, *P. Z. S.*, 1888, p. 202; Sharpe, Îles Salomon.
l. c., p. 252, pl. 4.
- 11.009. PRÆTERMISSA (Sharpe), *B. O. Cl.* III, n° XI, p. 4; Batjan, Cérâm (Molu-
id., *Cat.*, p. 255, pl. 5. ques).

1685. ZEBRILUS

Zebrilus, Bonap. (1855); *Microcnus*, Rehw. (1877).

- 11.010. PUMILUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 765; Scl. Guyane, Brésil.
et Salv., *Nomencl.*, p. 126; Sharpe, *l. c.*, p. 241;
Forb., *Bull. Liverp. Mus.* III, pl. 1, 2; *undulata*,
Gm.; Schl., *l. c.*, p. 56; *philippensis*, Gm.;
radiolata, Wagl.

1686. BUTORIDES

Butorides, Blyth (1849); *Ocniscus*, Cab. (1856).

- 11.011. ATRICAPILLA (Afzel.), *Acta Acad. Stockh.* XXV, 1804, Afrique tropicale.
p. 264; Schl., *l. c.*, p. 42; Fsch. et Hartl., *Vög.*
Ostaf., p. 701; *thalassina*, Sw.; *sturmi*, Licht.,
Brm., Hartl. (nec Wagl.)

5054. *Var. RUTENBERGI* (Hartl.), *P. Z. S.*, 1880, p. 59; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, p. 557, pl. 227 d; *atricapilla* (pt.), Sharpe. Madagasc., ?Comores.
5055. *Var. BREVIPES* (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys.*, fol. m, note 2; Bp., *Consp.* II, p. 429; Sharpe, *l. c.*, p. 278; *atricapilla* (pt.), auct. plur. (nec Afzel.) Côtes de la mer Rouge, Arabie, Socotra.
- 11.012. *STRIATA* (Lin.); *Pl. Ent.* 908; Bd., Br. et Ridgw., *Water. B. N. Am.* I, p. 50; Sharpe, *l. c.*, p. 175; *grisea*, Bodd.; *torquata*, Shaw; *cyanura*, *fusci-collis*, Vieill.; *scapularis*, Licht.; Schl., *l. c.*, p. 42. Amérique mérid. trop. jusqu'à l'Argentine.
5056. *Var. ROBINSONI*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 655. Ile Margarita.
- 11.013. *JAVANICA* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 190; Schl., *l. c.*, p. 45; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 422; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 559; *chloriceps* vel *virescens*, Hodgs., *Icon. ined. Grallæ, App.*, pl. 42; *thalassina*, Kel. (nec Sw.); *atricapilla* (pt.), E. Newt. Inde, Ceylan, Chine S., Indo-Ch., Malacca, Philippines, îles de la Sonde, Célèbes.
5057. *Var. AMURENSIS* (Schrenck), *Reis. Amurl.* I, p. 441; Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 181; *scapularis*, Tem. et Schl., *F. J.*, p. 116 (nec Licht.); *macrorhyncha*, auct. plur. (nec Gould); *javanica*, Swinh. (nec Horsf.); *griseus*, Blak. et Pryer; *schrenkii*, Bogd. Amour, Japon, Chine (Philippines, Formose, gr. îles de la Sonde en hiver).
5058. *Var. SPODIOGAстра*, Sharpe, *Bull. B. O. Club*, III, p. 17; id., *Cat.*, p. 182, pl. 2; *javanica* (pt.), auct. plur. Iles Andaman et Nicobar.
5059. *Var. STAGNATILIS* (Gould), *P. Z. S.*, 1847, p. 221; id., *B. Austr.* VI, pl. 67; *macrorhyncha*, Gould, *l. c.*, pl. 66; *patruelis*, Peale; *viridiceps*, Gray; *javanica* (pt.), auct. plur. Austr., Nouv.-Guin., Mol., Timor, Flores, îles Salom., Nouv.-Caléd., Fidji, etc.
5060. *Var. ALBOLINEATA*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1900, p. 140. Iles Chagos.
- 11.014. *SUNDEVALLI* (Rehw.), *J. f. O.*, 1877, p. 255; Sharpe, *l. c.*, p. 185; *javanicus*, Schl. et Salv. (1870, nec Horsf.); *plumbea*, auct. plur. (nec Merr.) Iles Galapagos.
- 11.015. *VIRESCENS* (Lin.); *Pl. Ent.* 909 et 912; Audub., *B. Am.* VI, p. 105, pl. 567; Schl., *l. c.*, p. 41; *chloroptera*, *maculata*, Bodd.; *ludoviciana*, Gm. Amérique du Nord et centr., Vénézuéla, Antilles.
5061. *Var. FRAZARI* (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 85. Basse-Californie.
5062. *Var. ANTHONYI* (Meapns), *Auk*, 1895, p. 257. Ét.-Unis S.-W., Mex.
5063. *Var. BAHAMENSIS* (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 85. Iles Bahama.
5064. *Var. SATURATA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 577. Ile Swan (mer Caraïbe).
- ✓ 5065. *Var. BRUNNESCENS* (Lemb.), *Av. Cuba*, p. 84; Rehw., *J. f. O.*, 1877, p. 255; *virescens* (pt.), Sharpe. Cuba.

1687. SYRIGMA

Syrigma, Ridgw. (1878); *Syrictor*, Heine et Rehw. (1890).

- 11.016. SIBILATRIX (Tem.), *Pl. Col.* 271; Burm., *Th. Bras.* III, p. 407; Schl., *l. c.*, p. 56; *cianocephalus*, Heine et Rehw. (nec Mol.); *cianocephalum*, Sharpe, *l. c.*, p. 170. Brésil S., Uruguay, Paraguay, Argentine.

1688. NYCTICORAX

Nycticorax, Ralin. (1815); *Nyctiardea*, Sw. (1857); *Scotæus*, Keys. et Blas. (1840); *Nycterodius*, Macg. (1842); *Caltherodius*, Bp. (1855).

- 11.017. GRISEUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 269, pl. 402; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 551, pl. 257; *Ard. nycticorax*, Lin.; *krakwa* et *ferruginea*, S. Gm.; *nævia*, Bodd.; *jamaicensis*, *hoactli*, *gardeni*, *maculata*, Gm.; *europæus*, Steph.; *vulgaris*, *brevipes*, Ehr.; *orientalis*, *badius*, *meridionalis*, Brm.; *discors*, Nutt.; *americana*, Bp.; *ardeola*, Tem.; *guttatus*, Heugl.; *egyptius*, Gurn. Europe centr. et mér., Asie centr. et mér., Japon, les îles de la Sonde jusqu'à Célèbes, Afrique, Madagascar, Amér. du 50° l. N. à l'Écuador.
- 11.018. CYANOCEPHALUS (Molina), *Saggio St. Chili*, p. 260; Sharpe, *l. c.*, p. 156; *nycticorax*, Kittl., *Kupf. Vög.*, pt. 5, p. 26, pl. 55, f. 1 (nec L.); *americanus*, Gould (nec Bp.); *gardeni* et *nævius* (pt.), Gr.; *obscurus*, Licht.; Schl., *l. c.*, p. 59. Du Chili à Magellan.
5066. *Var.* TAYAZUGUIRA (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 417; Sharpe, *l. c.*, p. 155; *gardeni* (pt.), Gr. et auct. plur.; *americanus*, Tsch., *Faun. Per.*, pp. 50, 297 (nec Bp.); *obscurus*, Schl. et auct. plur. (nec Licht.); Tacz., *Orn. Per.* III, p. 406; Schl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 105. Brésil centr., Pérou jusqu'en Patagonie et les îles Malouines.
- 11.019. LEUCONOTUS (Wagl.), *Syst. Av.*, *Ardea*, p. 189, sp. 55; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1088; Cab. in *v. d. Deck. Reis.* III, p. 50, pl. 18; *cucullata*, Wagl.; Schl., *l. c.*, p. 60; *ocularia*, Müll., *Naum.*, 1851, Heft 4, p. 29. Afrique tropicale.
- 11.020. MAGNIFICUS, Grant, *Ibis*, 1899, p. 586; id., *P. Z. S.*, 1900, pl. 55. Haïnan.
- 11.021. CALEDONICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 626; Schl., *l. c.*, p. 59; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 65; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 841; *maculata*, Lath.; *novæ-hollandiæ*, *australis*, Vieill.; *sparmanni*, Wagl.; *ferruginea*, Forst.; *australasiæ*, Gray; *manillensis* (pt.), Gr.; Hartl. et Finsch., *P. Z. S.*, 1872, pp. 89, 117. Australie, îles de l'Amirauté et Pelew, Célèbes.

5067. Var. *CRASSIROSTRIS*, Vig., *Voy. Blossom, Zool.*, Iles Bonin.
p. 27; Seeb., *P. Z. S.*, 1889, p. 586; Sharpe,
l. c., p. 161; *caledonica*, Kittl., *Kupf. Vög.*
III, p. 27, pl. 55, f. 2 (nec Gm.)
- 11.022. *MANILLENSIS*, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 98; Frasn., Philippin., Bornéo N.,
Zool. Typ., pl. 66; Schl., *l. c.*, p. 60; Mey. et Labuan, Célèbes N.
Wg., *B. Cel.*, p. 845; *caledonica*, Meyen (nec Gm.); *minahassæ*, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894,
p. 115.
5068. Var. *MANDIBULARIS*, Grant, *P. Z. S.*, 1888, p. 205; Iles Salomon et Archi-
Sharpe, *l. c.*, p. 161; *manillensis* (pt.), auct. pel Bismarck.
plur.; *caledonicus*, Salvad., *Orn. Pap.* III,
p. 572 (pt., nec Gm.)

1689. NYCTANASSA

Nycterodius, Rehb. (1852, nec Macg.); *Nyctanassa*, Stejn. (1887).

- 11.023. *VIOLACEA* (Lin.); *Pl. Enl.* 899; Audub., *B. Am.* VI, Amér. N.-E. et centr.,
p. 89, pl. 564; *jamaicensis*, *cayennensis*, Gm.; Antilles, Amér. mé-
sexsetacea, Vieill.; *callocephala*, Wagl. rid. jusqu'au Brésil.
- 11.024. *PAUPER* (Sch. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, pp. 525, Iles Galapagos.
527; Sharpe, *Cat.*, p. 154, pl. 1^c; *violaceus*, Gould
(nec L.)

1690. GORSACHIUS

Gorsachius, Puch. (1851); *Gorsakius*, Bp. (1855); *Butio*, Rehw. (1877).

- 11.025. *MELANOLOPHUS* (Rafll.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 526; Assam, Indo-Chine,
Blyth, *Ibis*, 1865, p. 38, 1867, p. 175; Sharpe, Inde, Ceylan, îles
l. c., p. 166; *limnophilax*, Tem., *Pl. Col.* 581; Nicobar, Andaman,
limnicola, Rehb.; *typus*, Puch.; *philippensis*, de la Sonde, Philip.,
Mart.; *goisagi*, Hartl. et Fsch. (nec Tem.); Haïnan, Formose.
kutteri, Cab.
- 11.026. *GOISAGI* (Tem.), *Pl. Col.* 582; id. et Schl., *Faun.* Japon (Philippines et
Jap., p. 116, pl. 70; *melanolophus*, auct. plur. Formose en hiver).
(nec Rafll.)

1691. BOTAURUS

Botaurus, Briss. (1760); *Butor*, Sw. (1857).

- 11.027. *STELLARIS* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 281, pl. 405; Eur., Asie et Afr., du
Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 545, pl. 256; *lacustris*, 59° au 20° env. l. N.,
arundinaceus, Brm.; *tarayensis*, Hodgs. plus au S. en Afr.
5069. Var. *CAPENSIS* (Schl.), *Mus. P.-B.*, *Ardeæ*, p. 48; Afrique australe.
Ayres, *Ibis*, 1869, p. 500; *stellaris* (pt.), auct.
plur. (nec Lin.)

- 11.028. POECILOPTILUS (Wagl.), *Syst. Av.*, *Ardea*, sp. 28; Bp., *Consp.* II, p. 155; Bull., *B. New Zeal.* (éd. 2), II, p. 142, pl. 57; *melanotus*, Gray; *australis*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 64; *poiocoptera*, Hatt.; *pacilopterus*, Walk.
- 11.029. LENTIGINOSUS (Montag.), *Orn. Dict., Suppl.*; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 281; Dress., *B. Eur.* VI, p. 289, pl. 404; *stellaris*, var. Gm.; *minor*, Wils.; Audub., *B. Am.* VI, p. 94, pl. 565; *mokoko*, Vieill.; *hudsonius*, Merr.; *americana*, Sw.; *mugitans*, Cab.; *adpersus*, Licht.; *freti hudsonis*, Schl., *l. c.*, p. 49.
- 11.050. PINNATUS (Wagl., ex Licht.), *Isis*, 1829, p. 665; Schl., *l. c.*, p. 49; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 181, pl. 91; *brasiliensis*, Max. (nec Lin.); *lentiginosus*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 408 (nec Mont.)
- Australie, Nouv.-Zélande, Nouv.-Calédonie.
- Amérique septentr. et centr. jusqu'au 58° l. N. (accidentellement aux îles Britanniques).
- Brésil, Guyane (accid. Nicaragua).

1692. TIGRISOMA

Tigrisoma, Swains. (1828); *Heterocnus*, *Tigrornis*, Sharpe (1898).

- 11.051. BRASILIENSE (Lin.); *Pl. Ent.* 790 (juv.) et 860; Gr., *List Grall. Br. Mus.*, p. 81; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 401; Rehw., *J. f. O.*, 1877, p. 250; *cocoi* et *lineata*, Bodd.; *lineatum*, Sharpe, *l. c.*, p. 194; *tigrina*, *flava*, Gm.
- 11.052. EXCELLENS, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1887, p. 595.
- 11.053. NARMORATUM (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 415; Berl., *J. f. O.*, 1887, pp. 50, 125; Schl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 104; *brasilense*, Hartl., White (nec L.); *tigrina*, Hartl. (nec Gm.); *fasciatum*, Salv. (nec Such).
- 11.054. BAILE, Sharpe, *Cat. B.* XXVI, p. 196, pl. 2^a; *tigrinum*, Bp., *Consp.* II, p. 556 (nec Gm.)
- 11.055. FASCIATUM, Such, *Zool. Journ.* II, p. 117; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 92; *lineata*, Max. (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 55.
- 11.056. SALMONI, Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 58, 1879, p. 542; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 402.
- 11.057. CABANISI, Heine, *J. f. O.*, 1859, p. 407; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 95, pl. 48; Schl., *l. c.*, p. 51; *tigrinum*, Schl. (1858-60); *brasiliense*, Moore (nec L.)
- 11.058. LEUCOLOPHUM, Jard., *Ann. Mag. N. H.*, 1846, p. 86; Hartl., *Orn.-W. Afr.*, p. 225; Schl., *l. c.*, p. 50.
- Guyane, Amazone jusqu'au Pérou, Ecuador, Colombie, Trinidad.
- Costa-Rica, Honduras. Paraguay, Argentine.
- Bahia (Brésil).
- Brésil S., E.
- Colombie, Ecuador, Pérou.
- Amérique centr., du Mexique à Panama.
- Afrique W.

1695. ZONERODIUS

Zonerodius, Salvad. (1882).

- 11.059. HELIOSYLUS (Less.), *Voy. Coq., Zool.* I, p. 722, pl. 44; id., *Traité d'Orn.*, p. 572; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 568, 565; *phaethon*, Rehw. Nouv.-Guinée, Salawati, ? îles Arou.

1694. COCHLEARIUS

Cochlearius, Briss. (1760); *Cancroma*, Lin. (1766); *Cymbops*, Wagl. (1827).

- 11.040. CANCROPHAGUS (Lin.); *Pl. Enl.* 38, 869; Heine et Rehw., *Nomencl. Mus. Hein.*, p. 510; *Cancroma cochlearia*, Lin.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 129, pl. 249; Sharpe, *Cat.*, p. 165. Amérique mérid. trop.
5070. Var. ZELEDONI (Ridgw.), *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1885, p. 95; Stejn., *Stand. Nat. Hist.* IV, p. 178; Sharpe, *l. c.*, p. 165; *cochlearia* (pt.), auct. plur. (nec L.) Amérique centr. du Mexique à Panama.

ORD. XII. — GRALLATOIRES

SUBORD. 1. — ALECTORIDES (1)

FAM. I. — ARAMIDÆ

1693. ARAMUS

Aramus, Vieill. (1816); *Notherodius*, Wagl. (1829).

- 11.041. SCLOPACEUS (Gm.), *S. N.* I, p. 647; *Pl. Enl.* 848; Vieill., *N. Dict.* VIII, p. 501; Audub., *B. Am.*, pl. 577; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 587; *carau*, V.; *gigas*, Licht. (1825); *ardeoides*, Spix; *guarauna*, Max. Amérique mérid., des Guyane, Vénézuéla et Pérou jusqu'au N. de l'Argentine.
- ✓ 11.042. PICTUS (Bartr.), *Trav. Florida*, p. 291 (1792); Coues, *Pr. Philad. Acad.*, 1875, p. 554; *scolopaceus* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 154, pl. 252; *giganteus*, Bp., *Journ. Acad. Philad.*, 1825, p. 51 (nec Licht.); *guarauna*, Wagl. (nec Max.); *holostictus*, Cab. Floride S., Amérique centr., gr. Antilles, Colombie, Ecuador.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXIII (1894).

FAM. II. — EURYPYGIDÆ

1696. EURYPYGA

Eurypyga, Illig. (1814); *Helias*, Rafin. (1815).

- 11.045. *HELIAS* (Pall.), *Neue Nord. Beytr.* II, p. 48, pl. 5 (1781); *Pl. Enl.* 782; Illig., *Prodr.*, p. 257; Schl., *Mus. P.-B.*, Ralli, p. 75; Tacz., *Orn. Për.* III, p. 588; *solaris*, Bodd.; *phalœnoides*, Vieill.
Vénézuëla, Guyane, Amazone, Bolivie, Brésil.
- 11.044. *MAJOR*, Hartl., *Syst. Verz. Mus. Bremen*, p. 108; Schl., *l. c.*, p. 74; Sharpe, *Cat.*, p. 242; *helias*, Schl. et Salv. (nec Pall.)
Amérique centr., Colombie, Ecuador.

FAM. III. — RHINOCHETIDÆ

1697. RHINOCHETUS

Rhinochetus, Verr. et Des M. (1860).

- 11.045. *JUBATUS*, Verr. et Des M., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, p. 440, pl. 21; Bartl., *P. Z. S.*, 1868, p. 115, pl. 12; Sharpe, *l. c.*, p. 246.
Nouv.-Calédonie.

FAM. IV. — GRUIDÆ

1698. GRUS

Grus, Pall. (1767); *Megalornis*, Gray (1841); *Antigone*, Rehb. (1852); *Leucogeranus*, Bp. (1855); *Limnogeranus*, *Sarcogeranus*, *Pseudogeranus*, Sharpe (1895).

- 11.046. *COMMUNIS*, Bechst., *Naturg. Deutschl.* III, p. 60 (1795); Dress., *B. Eur.* VII, p. 557, pl. 505; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 508, pl. 229; *A. grus*, L.; *cinerea*, Mey. et W.; *vulgaris*, Pall.; *canorus*, Forst.; *cineracea*, Brm.; *nostras*, Olphe-Gal.
Europe jusqu'au 65° l. N., Afrique N. et N.-E.
5071. *Var. LILFORDI*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 252; *cinerea* et *communis* (pt.), auct. plur.; *longirostris*, Blyth (nec Tem. et S.); *cineracea*, Severtz., *J. f. O.*, 1875, p. 182 (nec Brm.); *orientalis*, Tegetm. (nec Frankl.)
Sibérie orient. à l'ouest jusqu'à l'Obi, Chine, Inde N.-W.
- 11.047. *CANADENSIS* (Lin.); Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, p. 575; Schl., *Mus. P.-B.*, Ralli, p. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 236; *fusca*, Vieill.; *americana*, Gr. (nec L.); *fraterculus*, Cass. (juv.)
Sibérie N.-E., Amér. arct., Alaska, États-Unis W.

5072. *Var. MEXICANA* (P. L. S. Müll.), *S. N.*, *Suppl.*, p. 110; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 356; *pratensis*, Bartr.; *poliophæa*, Wagl.; *americana* (pt.), Audub., *B. Am.*, pl. 261 (juv.); *longirostris*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 117, pl. 72; *canadensis* (pt.), auct. plur.; *schlegeli*, Blyth; *cinerea*, Seeb. (nec Mey. et W.) États-Unis, Mexique.
- 11.048. *MONACHUS*, Tem., *Pl. Col.* 555; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 119, pl. 75; Schl., *l. c.*, p. 4; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 434. Sibérie orient., Chine, Japon.
- 11.049. *NIGRICOLLIS*, Przew., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 456, pl. 9; Tegetm., *Monogr. Cranes*, p. 70, pl. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 258. Kokonoor.
- 11.050. *JAPONENSIS* (P. L. S. Müll.), *S. N.*, *Suppl.*, p. 110; Seeb., *B. Japan. Emp.*, p. 351; *viridirostris*, Vieill.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 455; *collaris*, Tem. (nec Bodd.); *montignesia*, Bp.; Schl. in *Wolf's Zool. Sket.*, ser. I, pl. 46; *leucauchen*, Blak. et Pr. (nec Tem.) Sibérie orient., Corée, Chine, Japon.
- 11.051. *AMERICANA* (Lin.); *Pl. Enl.* 889; Audub., *B. Am.* V, p. 188, pl. 313; Schl., *l. c.*, p. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 259; *struthio*, Wagl.; *hoyanus*, Dudl. Amérique du N., du Saskatchewan au Mexique centr.
- 11.052. *LEUCOGERANUS*, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, II, *Anh.*, p. 744, pl. F; id., *Zoogr.* II, p. 105; Tem., *Pl. Col.* 467; Dress., *B. Eur.* VII, p. 359, pl. 507; *gigantea*, Gm.; *polii*, Yule. Europe S.-E., Asie centr., Jap., Chine, Inde N.-W.
- 11.053. *ANTIGONE* (Lin.); *Pl. Enl.* 865; Schl., *l. c.*, p. 5; *collaris*, Bodd.; Sharpe, *l. c.*, p. 262; *torquata*, Vieill.; *orientalis*, Frankl. Asie centr., Inde N. et centr.
5073. *Var. SHARPEI*, Blanf., *Bull. Br. O. Cl.* V, 1895, p. 6; id., *Ibis*, 1896, p. 456; *antigone*, Sharpe, *Cat.*, p. 264 (pt., nec Lin.) Indo-Chine, Malacca.
- 11.054. *AUSTRALASIANA*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 48; Schl., *l. c.*, p. 5. Australie E.
- 11.055. *LEUCAUCHEN*, Tem., *Pl. Col.* 449; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 455; *antigone*, Pall. (nec Lin.); ? *vipio*, Pall.; Schl., *l. c.*, p. 5. Japon, Sibérie E. jusque dans la Chine centrale.

1699. BUGERANUS

Bugeranus, Glog. (1842); *Laomedontia*, Rehb. (1852).

- 11.056. *CARUNCULATUS* (Gm.), *S. N.* I, p. 645; Vieill., *Gal. Ois.* II, *Suppl.*, pl. 20; Gray, *Gen. B.* III, pl. 149; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1255; *palearis*, Forst. Afr. S., du Benguélé au Zambèze, Afr. E. jusqu'au Choa.

1700. TETRAPTERYX

Anthropoides! Vieill. (1816); *Tetrapteryx*, Thunb. (1818); *Philorchemon*, Glog. (1842); *Scops!* Gray (1845); *Geranus*, Bp. (1854).

- 11.057. *PARADISEA* (Licht.), *Cat. Rer. Rariss. Hamb.*, p. 28 (1795); Schl., *l. c.*, p. 6; *capensis*, Thunb.; *stanleyanus*, Vig., *Zool. Journ.*, 1826, p. 254, pl. 8; *caffra*, Fritsch.
- Afrique S. du Cap au 20° l. S.
- 11.058. *VIRGO* (Lin.); *Pl. Enl.* 241; Naum., *Vög. Deutschl.* IX, p. 586, pl. 252; Dress., *B. Eur.* VII, p. 555, pl. 506; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 456; *ornata*, Brm.
- Europe S., Asie centr. jusqu'au N. de la Chine et le N.-W. de l'Inde, Afrique N. et N.-E.

1701. BALEARICA

Balearica, Briss. (1760); *Geranarchus*, Glog. (1842).

- 11.059. *PAYONINA* (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II, pl. 257 (*juv.*); Schl., *l. c.*, p. 7; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 667; *G. balearica*, Vieill.
- Afrique W. jusqu'au N.-E. et équator.
5074. *Var. REGULORUM* (Benn.), *P. Z. S.*, 1835, p. 118; Gray, *Knowsl. Menag.*, pl. 15; *Pl. Enl.* 265; *chrysopelargus*, Teget. (nec Licht.); Sharpe, *l. c.*, p. 274 (1); *pavonina*, Chapm. (nec L.)
- Afrique S. jusqu'au Zambèze.
5075. *Var. GIBBERICEPS*, Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 125; *regulorum*, Böhm, *J. f. O.*, 1885, p. 52 (nec Ben.); *pavonina*, Rchw., *J. f. O.*, 1887, p. 48 (nec L.); *chrysopelargus*, Shell. (nec Sharpe).
- Afrique E.

FAM. V. — PSOPHIIDÆ

1702. PSOPHIA (2)

Psophia, Lin. (1766).

- 11.060. *CREPITANS*, Lin.; *Pl. Enl.* 169; Vieill., *Gal. Ois.* III, pl. 162; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 385; Sharpe, *l. c.*, p. 279.
- Guyane, Amazone jusqu'à Yquitos.
5076. *Var. NAPENSIS*, Schl. et Salv., *Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 141, 162; Sharpe, *l. c.*, p. 280.
- Ecuador.

(1) Le Dr Reichenow fait remarquer que l'*Ardea chrysopelargus*, Licht., ne se rapporte pas à la Grue royale, mais à la *Ciconia nigra*, L. (*Orn. Mon.*, 1898, p. 119.)

(2) Voy. aussi : W. Blasius, *Journ. für Orn.*, 1884, pp. 203-210.

- 11.061. LEUCOPTERA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 67, pl. 84; Haut-Amazone, Pérou.
Gray, *Gen. B.* III, pl. 148; Pelz., *Orn. Bras.*,
pp. 299, 455.
5077. *Var. OCHROPTERA*, Pelz. (ex Natt.), *Sitz. k. Akad.* Rio-Négre.
Wien, 1857, p. 571; Scl. et Salv., *P. Z. S.*,
1867, p. 592.
- 11.062. VIRIDIS, Spix, *Av. Bras.* II, p. 66, pl. 85; Pelz., Amazone.
Orn. Bras., pp. 299, 455; Sharpe, *l. c.*, p. 281.
- 11.065. OBSCURA, Pelz. (ex Natt.), *Sitz. k. Akad. Wien*, Amazone.
1857, p. 575; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 592;
Scl., *Ibis*, 1898, p. 520, pl. 11; Finseh, *Notes*
Leyd. Mus. XX, p. 81; *viridis* (pt.), Sharpe.
- 11.064. ? CANTATRIX, W. Blas., *J. f. O.*, 1884, p. 205. Bolivie.

FAM. VI. — CARIAMIDÆ

1705. CARIAMA

- Cariama*, Briss. (1760); *Microdactylus*, Geoffr. (1809); *Dicholophus*, Illig. (1811);
Lophorhynchus, Vieill. (1816); *Sariama*, Bp. (1857); *Chunga*, Rehb. (1860);
Chunnia, Burm. (1861).
- 11.065. CRISTATA (Lin.); Tem., *Pl. Col.* 257; Sharpe, *Cat.* Brésil, Paraguay.
B. I., p. 42; *marcgravii*, Geoffr., *Ann. du Mus.*
XIII, 1809, p. 570, pl. 26; *saurophaga*, Vieill.,
Gal. Ois. II, p. 148, pl. 259.
- 11.066. BURMEISTERI (Hartl.), *P. Z. S.*, 1860, p. 555; Scl., Argentine N.
P. Z. S., 1870, p. 666, pl. 56; Burm., *La-Plata*
Reis. II, p. 508.

FAM. VII. — OTIDÆ

1704. AFROTIS

- Lophotis*, Rehb. (1849, nec *Lophotes*, Less.); *Afrotis*, Bonap. (1854); *Compsotis*,
Heine (1890).
- 11.067. RUFICRISTA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, B., pl. 4; Afrique S. jusqu'au
Schl., *Mus. P.-B. Cursores*, p. 5; Shpe, *l. c.*, p. 291. Transv. et Benguela.
- 11.068. GINDIANA (Oust.), *Bull. Soc. Phil.*, 1881, p. 165; Somaliland, Afrique
Sharpe, *l. c.*, p. 292; *fulvicrista*, Cab., *Orn. Cen-* équatoriale jusqu'au
tralbl., 1882, p. 14; *maculipennis*, Shell. (1889, Kilima-Ndjaru.
nec Cab.)
- 11.069. AFRA (Forst.), *Icon. ined. in Brit. Mus.*, n° 154; Afrique S.
Rehb., *Handb., Gall.*, pl. 254, ff. 2165-67;
Sharpe, *l. c.*, p. 294.

5078. *Var.* AFROIDES (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 19; Afrique S.-E.
leucoptera, Rehb., *l. c.*, ff. 2168-70; Sharpe,
l. c., p. 294; *afra*, Barr. (nec Forst.); *atra*,
 Bryd.

1705. HETEROTETRAX

Heterotis, Sharpe (1895, nec Ehrenb.); *Heterotetrax*, Sharpe (1894).

- 11.070. VIGORSI (Smith), *P. Z. S.*, 1850, p. 11; Schl., *l. c.*, Afrique S.
 p. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 296; *scolopacea*, Tem., *Pl.*
Col. 576.
 11.071. RUPPELLI (Wahlb.), *J. f. O.*, 1857, p. 1; Sharpe, Afrique S.-W.
l. c., p. 297; *picturata*, Hartl., *P. Z. S.*, 1863,
 p. 88, pl. 6.
 11.072. HUMILIS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1856, p. 505; Somaliland.
 Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 618.

1706. OTIS

Otis, Lin. (1766); *Tetrax*, Leach (1816); *Lissotis*, *Trachelotis*, Rehb. (1849);
Neotis, Sharpe (1895).

- 11.073. TARDA, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 569, pl. 508; Europe centr. et mér.,
 Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 84, pl^s 179, 179^b; Asie centr., Inde
major, Brm.; *barbata*, C. Dub. N.-W., Afrique N.
 5079. *Var.* DYBOWSKI, Tacz., *J. f. O.*, 1874, p. 531; Sibérie E., Mandchou-
 Bogd., *Consp. Av. Imp. Ross.*, p. 61; Menzb., rie, Corée, Japon.
Orn. Turkest., pl. 64; Sharpe, *l. c.*, p. 286;
tarda (pt.), auct. plur. (nec Lin.)
 11.074. TETRAX, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 582, pl. 509; Dubois, Europe S., Afrique N.,
l. c., p. 89, pl^s 180, 180^b; *campestris*, Leach; Asie centr. jusqu'au
tetrao, Macg.; *minor*, Brm. N.-W. de l'Inde.
 11.075. LUDWIGI, Rüpp., *Mus. Senck.* II, p. 225, pl. 14; Afrique S.
 Schl., *l. c.*, p. 7; Shpe, *l. c.*, p. 299; *colei*, Smith.
 11.076. BURCHELLI (Heugl., ex Württ.), *J. f. O.*, 1867, Afrique N.-E.
 p. 501; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 945, pl. 51.
 11.077. CAFFRA, Licht., *Cat. Rer. Nat. Hamb.*, p. 56; Afrique S., à l'Ouest
 Schl., *l. c.*, p. 7; Bryden, *Kloof and Karroo*, jusqu'au Benguela,
 pl. 14, f. 1; *stanleyi*, Gray; *ruficollis*, Wagl. à l'Est jusqu'à
 l'Équateur.
 11.078. DENHAMI, Childr., in *Denh. and Clapp. Trav.* II, Soudan, Kordofan,
App., p. 199; Gray, *Gen. B.* III, pl. 141; *caffra* Sennaar.
 (pt.), Rüpp.; *arabs*, Ant. (nec L.)
 11.079. HEUGLINI, Hartl., *Ibis*, 1859, p. 544, pl. 11; Fsch. Somaliland.
 et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 615; Sharpe, *l. c.*, p. 505.
 11.080. NUBA, Rüpp., *Atl. Vög.*, p. 1, pl. 1; Heugl., *Orn.* Afrique N.-E.
N.-O. Afr., p. 945; Sharpe, *l. c.*, p. 505.

- 11.081. MELANOGASTER, Rüpp., *Mus. Senckenb.* II, p. 240; id., *Neue Wirb.*, *Vög.*, p. 16, pl. 7; Schl., *l. c.*, p. 9; Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 55. Afrique tropicale, à l'E. jusqu'au Natal.
- 11.082. LOVATI (Grant), *Bull. Br. Orn. Club*, X, p. 59; id., *Ibis*, 1900, p. 526. Abyssinie.
- 11.083. HARTLAUBI, Heugl., *J. f. O.*, 1865, p. 4; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 954, pl. 52; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 616. Afrique N.-E., E. jusqu'au Natal.
- 11.084. MACULIPENNIS, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 415; id., in *Vonder Deck. Reis.* III, p. 45, pl. 15; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 616. Afrique E.
- 11.085. CÆRULESCENS, Vieill., *Enc. méth.* I, p. 554; Tem., *Pl. Col.* 552; Schl., *l. c.*, p. 4; *veroxii* et *ferox*, Smith; *cana*, Licht. Afrique S.
- 11.086. CANICOLLIS, Rehw., *Orn. Centralbl.*, 1881, p. 79; id., *J. f. O.*, 1881, p. 554; Sharpe, *l. c.*, p. 509. Afrique N.-E. et E.
- 11.087. SENEGALENSIS, Vieill., *Enc. méth.* I, p. 555; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 959; *rhaad*, Rüpp., *Mus. Senckenb.* II, p. 250, pl. 15; *semitorquata*, Heugl. De Sénégambie à l'Afrique N.-E.
- 11.088. BARROVII, Gray, in *Griff. An. Kingd., Birds*, III, p. 502; Sharpe, *l. c.*, p. 511; *torquata*, Cuv. (*descr. nulla*); Schl., *l. c.*, p. 4; *senegalensis*, auct. plur. (nec Vieill.); *cærulescens*, Butl., Feild. et Reid (nec Vieill.) Afrique S., du Natal au Zambéze.

1707. SYPHEOTIS

Sypheotides, Less. (1859); *Comatotis*, Rehb. (1850); *Sypheotis*, Bonap. (1856); *Houbaropsis*, Sharpe (1895).

- 11.089. INDICA (Gm.), *S. N.* I, p. 725; *aurita*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 555; Less., in *Bélang. Voy.*, pl. 10; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl^s 40 (mas.), 92 (fem.); Sharpe, *Cat.*, p. 515; *atriceps*, Gr.; *marmorata*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 60; *fulva*, Syk. Inde.
- 11.090. BENGALENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 724; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 23, pl. 5; *delicosa*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl^s 61, 62; *himalayanus*, Gould, *Cent. B. Him.*, pl^s 75-75. Inde.

1708. HOUBARA

Houbara, Bp. (1851); *Chlamydotis*, Less. (1859).

- 11.091. MACQUEENII (Gr. et Hardw.), *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 47; C. Dub., *J. f. O.*, 1856, p. 501, pl. 5; Dress., *B.* Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde

- Eur.* VII, p. 595, pl. 511; Dubois, *Fne. Ill. Vert.* (accid. Europe centrale, Belgique).
Belg., Ois. II, p. 95, pl. 181; *O. houbara*, auct. plur. (nec Desf.); *undulata*, Gr. (1865), (nec Jacq.)
 11.092. *UNDULATA* (Jacq.), *Beytr.*, p. 24, pl. 9 (1784); Dress., Les contrées entourant
B. Eur. VII, p. 591, pl. 510; *O. houbara*, Desf., la Méditerranée, à
Mém. Acad. R. Sc., 1787, p. 496, pl. 10; *ornata*, l'E. jusqu'en Armé-
 Brm. nic.
 5080. *Var.* FUERTAVENTURÆ, Rothsch. et Hart., *Nov. Ile Fortaventura (Ca-*
Zool. I, p. 689, II, p. 54. naries).

1709. EUPODOTIS

- Eupodotis*, Less. (1859); *Choristis*, Bp. (1854).
 11.095. *ARABS* (Lin.); Rüpp., *Atlas*, pl. 16; Levaill. jun., Afrique N., N.-E. et
Expl. sc. de l'Alg., Ois., pl. 10; Schl., *l. c.*, p. 8; Arabie.
abyssinica, Gr.; ?*rhaud*, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 660.
 11.094. *KORI* (Burch.), *Trav. S. Afr.* I, pp. 595, 402; Afr. S. jusqu'au Ben-
 Rüpp., *Mus. Senckenb.* II, p. 215, pl. 15; Sharpe, guela à l'O., le So-
l. c., p. 524; *cristata*, Gray (nec Scop.?) mal. et le Choa à l'E.
 11.095. *EDWARDSI* (Gr. et Hardw.), *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 59; Inde.
 Schl., *l. c.*, p. 8; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 7, pl. 5; *migriceps*, Vig.; Gould, *Cent. B.*
Himal., pl. 72; *leuconiensis*, Gr.
 11.096. *AUSTRALIS* (Gray), in Griff. ed. Cuv., *An. Kingd.*, Australie.
Birds, III, p. 505; Schl., *l. c.*, p. 9; *australa-*
siana, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 4.

SUBORD. II. — LIMICOLÆ (1)

FAM. VIII. — ŒDICNEMIDÆ

1710. ŒDICNEMUS

- Œdicnemus*, Tem. (1815); *Fedoa*, Leach (1816).
 11.097. *SCOLOPAX* (Gm.), *Reis. Russl.* III, p. 87, pl. 16; Europe centr. et mé-
 Dress., *B. Eur.* VII, p. 401, pl. 512; Dubois, rid., Asie centrale
Fne. Ill., Ois. II, p. 100, pl. 182; *illyricus*, Pill.; W., Inde, Birmanie,
crepitans, Tem.; *griseus*, Koch; *europæus*, Vieill.; Ceylan, Afr. N.-E.
belonii, Roux; *desertorum*, *arenarius*, Brm.;
indicus, Salvad.; *senegalensis*, Severtz. (nec Sw.)
 5081. *Var.* SAHARÆ, Rehw., *J. f. O.*, 1894, p. 102. Sahara.

(1) Voy.: Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXIV (1896); Seebohm, *The geographical distribution of the Charadriidæ* (1887).

- 11.098. *SENEGALENSIS*, Swains, *B. W. Afr.* II, p. 228; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 78; *crepitans* (pt.), auct. plur. (nec Tem.); *inornatus*, Salvad.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 989. Sénégalie, Gabon, Afrique N.-E. jusqu'en Égypte.
- 11.099. *VERMICULATUS*, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 413; id., in *Von der Deck. Reis.* III, p. 46, pl. 16; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 80; *natalensis*, Gr. (descr. nulla); *senegalensis* (pt.), auct. plur. (nec Sw.) Afrique S.E. et S.-W. jusqu'au Congo, à l'E. jusqu'au Victoria-Nyanza.
- 11.100. *RUTTIKOFERI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 182; *vermiculatus*, Büttik. (nec Cab.) Libéria (Afrique W.)
- 11.101. *BISTRIATUS* (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 648; Seeb., *l. c.*, p. 83; *vocifer*, L'Herm., *Magas. de Zool.*, 1837, pl. 84; *americanus*, Sw.; *mexicanus*, Licht. Amérique centrale et méridionale jusqu'à l'Amazone.
5082. *Var. DOMINICENSIS*, Cory, *Journ. Bost. Zool. Soc.*, 1883, p. 46; id., *Auk*, 1884, p. 4; id., *B. S. Domingo*, p. 140, pl. 19. Saint-Domingue.
- 11.102. *SUPERCILIARIS*, Tschudi, *Arch. f. Naturg.*, 1843, 4, p. 387; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 59, pl. 30; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 333. Pérou W.
- 11.103. *CAPENSIS*, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 69; Seeb., *l. c.*, p. 81; *maculosus*, Tem., *Pl. Col.* 292; *macrocnemus*, Licht.; *affinis*, auct. plur. (nec Rüpp.) Afrique S., S.-W. et E.
5083. *Var. AFFINIS*, Rüpp., *Mus. Senck.* II, p. 210; id., *Syst. Uebers.*, p. 117, pl. 42; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 990; Seeb., *l. c.*, p. 82. Afrique N.-E. et équat.
5084. *Var. DONSONI*, Grant, *Ibis*, 1900, p. 195. Arabie S.

1711. BURHINUS

Burhinus, Illig. (1811).

- 11.104. *GRALLARIUS* (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 66; Rehb., *Av. Syst. Nat.*, p. 17; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 5; Seeb., *l. c.*, p. 85; *magnirostris*, Lath. (nec Vieill.); *frenatus*, Lath.; *longipes*, Vieill.; *novæ-hollandiæ*, Steph.; *giganteus*, Licht.; *australis*, Schl. Australie.

1712. ESACUS

Esacus, Less. (1831); *Carvanaca*, Hodgs. (1836); *Pseudops*, Hodgs. (1841); *Orthorhamphus*, Salvad. (1874).

- 11.105. *RECURVIROSTRIS* (Cuv.), *Rég. An.* I, p. 500; Less., *Tr. d'Orn.*, p. 347; Gray, *Gen. B.* III, pl. 145; *grisea*, Hodgs.; id., *Icon. ined. in Br. Mus.*, *Grallæ*, pl. 45. Inde, Ceylan, Birmanie, Ténassérim.

- 11.106. MAGNIROSTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XXIII, p. 251; Australie jusqu'à l'archipel Bismarck et Bornéo.
 Tem., *Pl. Col.* 587; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 6;
major, Brm.

FAM. IX. — DROMADIDÆ

1715. DROMAS

Dromas, Payk. (1805); *Erodia*, Salt (1814).

- 11.107. ARDEOLA, Payk., *K. Vet.-Akad. Handl. Stockh.*, 1805, pp. 182, 188, pl. 8; Tem., *Pl. Col.* 562; Les côtes et les îles de la mer Rouge et de l'Océan Indien (Afr. E., Madag., Inde, Ceylan, etc.).
 Sharpe, *Cat.* XXIV, p. 28; *amphilensis*, Salt;
charadrioides, Jerd.

FAM. X. — GLAREOLIDÆ

1714. STILTIA

Stiltia, Bonap. (1856); *Rhinphalea*, Heine et Rehw. (1890).

- 11.108. ISABELLA (Vieill.), *Analyse*, p. 69; id., *Gal. Ois.* II, Austr., Nouv.-Guinée, Arou, Key, Moluques, Célèb., Flores, Java, Bornéo.
 p. 159, pl. 263; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 286;
grallaria, Tem.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 22;
australis, Leach.

1715. GLAREOLA

Glareola, Briss. (1760); *Trachelia*, Scop. (1769); *Pratincola*, Degl. (1845, nec Koch); *Dromochelidon*, Landl. (1846); *Galachrysia*, Bp. (1856); *Galactochrysea*, H. et Rehw. (1890).

- 11.109. PRATINCOLA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 411, Europe mérid., Asie centr., Inde N.-W., Afrique.
 pl. 515, f. 1; *torquata*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, p. 145, pl. 192; *fusca*, L.;
austriaca, *senegalensis*, *nævia*, Gm.; *natrophila*, Landb.; *limbata*, Gray.
 11.110. MELANOPTERA, Nordm., *Bull. Soc. I. Nat. Moscou*, Europe S.-E., Caucase, Afrique.
 1842, p. 514, pl. 2; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 65;
 Dress., *B. Eur.* VII, p. 419, pl. 515, f. 2; *pratincola*, Pall. (nec L.); *nordmanni*, Fisch.; *pallasi*, Bruch.
 11.111. ORIENTALIS, Leach, *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 152, Asie orientale jusqu'à l'Inde et Ceylan, archipel Malais, Australie.
 pl. 15; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 25; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 284; *torquata*, Jerd. (nec Briss.);
thermophila vel longipes, Hodggs.; *pratincola*, Radde (nec L.)

- 11.112. OCULARIS, Verr., *S. Afr. Q. Journ.*, 1855, p. 80; Schll. et Pol., *Faune Madag., Ois.*, p. 150, pl. 58; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 645, pl^s 256-58; *geoffroyi*, Puch., *Mag. Zool.*, 1845, pl. 57. Afrique E., Madagascar.
- 11.115. MARCHEL, Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1877, p. 104; *megapoda*, Gr. (*descr. nulla*); *nuchalis*, Hartl. (nec Gr.); *G. nuchalis liberice*, Schl., *Notes Leyd. Mus.*, 1881, p. 58; Sharpe, *Cat.* XXIV, p. 65, pl. 5, f. 1. Afrique W., de Libéria au Niger.
- 11.114. EMINI, Shell., *P. Z. S.*, 1888, p. 49; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 209; Sharpe, *l. c.*, p. 64, pl. 5, f. 2. Afrique équatoriale.
- 11.115. NUCHALIS, Gray, *P. Z. S.*, 1849, p. 65, pl. 9; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 984; Seeb., *l. c.*, p. 266. Haut-Nil Blanc.
- 11.116. CINEREA, Fras., *P. Z. S.*, 1845, p. 26; Gray, *Gen. B.* III, pl. 144; Seeb., *l. c.*, p. 265. Afrique W., du Niger au Congo.
- 11.117. LACTEA, Tem., *Man. d'Orn.* II, p. 505 (1820); id., *Pl. Col.* 599; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 64; *orientalis*, Jerd. (nec Leach); *nipalensis vel cinerascens et gangetica*, Hodgs. Inde jusqu'à l'Assam et Manipour, Ceylan.

FAM. XI. — CURSORIIDÆ

1716. ORTYXELUS

Ortyxelus, Vieill. (1854); *Torticella*, *Psilocnemis*, Glog. (1842); *Helortyx*, Agass. (1846); *Oxytelus*, Rehb. (1852).

- 11.118. MEIFFRENI (Vieill.), *N. Dict.* XXXV, p. 49; Tem., *Pl. Col.* 60, f. 1; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 92, pl. 500; *nivosus*, Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 165; *isabellinus*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 52. Afrique W., N.-E. et équatoriale.

1717. PLUVIANUS

Pluvianus, Vieill. (1816); *Hyas*, Glog. (1827); *Ammoptila*, Sw. (1837); *Cheilodromus*, Rüpp. (1857).

- 11.119. ÆGYPTIUS (Lia.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 521, pl. 527; *melanocephalus*, Gm.; *africanus*, Lath.; *chlorocephalus*, Vieill.; *charadrioides*, Wagl.; *egyptiacus*, Brm. Contrées entourant la Méditerranée, Afrique W. et N.-E.

1718. CURSORIUS

Cursorius, Lath. (1790); *Tachydromus*, Illig. (1811); *Cursor*, Wagl. (1827).

- 11.120. GALLICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 692; Dress., *B. Eur.* VII, p. 425, pl. 514; Dubois, *Fue. Ill.*, *Ois.* II, Afrique N., Asie S.-W. jusqu'à l'Inde N.-W.,

- p. 714, pl. 182^b; *europæus*, Lath.; *corrira*, Bonn.;
isabellinus, Mey.; *pallidus*, *brachydactylus*, Brm.;
jamesoni, Jerd.; *bogolulovi*, Zarudn. îles Canaries et du
 Cap Vert (accid.
 Europe, Belgique).
- 11.121. *SOMALENSIS*, Shell., *Ibis*, 1885, p. 415; Seeb., Somaliland.
Geogr. Distr. Charadr., p. 257, pl. 11.
- 11.122. *RUFUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 81; id., *Icon.* Afrique S.
Av., pl. 10; Schl., *l. c.*, p. 15; Seeb., *l. c.*,
 p. 258; *capensis*, *burchelli*, Sw.
- 11.125. *COROMANDELICUS* (Gm.), *S. N. I.*, p. 692; *Pl. Enl.* 892; Inde, Ceylan.
 Gould, *B. Asia*, VII, pl. 65; Seeb., *l. c.*, p. 241;
asiaticus, Lath.; *orientalis*, Sw.; *taragensis*, Hodgs.
- 11.124. *TEMMINCKI*, Swains., *Zool. Ill.* II, pl. 106; *senega-* Afrique trop.
galensis, Licht.; Sw., *B. W. Afr.* II, pl. 24;
 Seeb., *l. c.*, p. 259.

1719. RHINOPTILUS

- Rhinoptilus*, Strickl. (1850); *Macrotarsius*, Blyth (1848, nec Lacép.); *Chal-*
copterus, Rehb. (1852); *Hemerodromus*, Heugl. (1865).
- 11.125. *BICINCTUS* (Tem.), *Man. d'Orn.* II, p. 515 (1820); Afrique S.
 Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 48; Seeb., *l. c.*,
 p. 242; *africanus*, Tem.; *collaris*, Vieill.; *gral-*
lator, Leadb.
5085. *Var. BISIGNATA* (Hartl.), *P. Z. S.*, 1865, p. 87; Afrique E. et S.-W.
 Sharpe, *Cat.*, p. 45, pl. 1; *gracilis*, Fisch.
 et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 178; *bicinctus*
gracilis, Seeb., *l. c.*, p. 244.
5086. *Var. HARTINGI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* III, p. 14; Somaliland.
 id., *Cat.*, p. 46, pl. 2.
- 11.126. *CINCTUS* (Heugl.), *Syst. Uebers.*, p. 54; id., *Orn.* Afrique N.-E. et E.
N.-O. Afr., p. 792; Seeb., *l. c.*, p. 245; Sharpe,
Cat., p. 46, pl. 5, f. 2; *bicinctus* (pt.), Schl., Salvad.
5087. *Var. SEEBOHMI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* III, p. 15; Afrique S.-W.
 id., *Cat.*, p. 47, pl. 5, f. 1; *cinctus* (pt.),
 auct. plur. (nec Heugl.); Seeb., *l. c.*, p. 245
 (pt.), pl. 12.
- 11.127. *CHALCOPTERUS* (Tem.), *Pl. Col.* 298; Sharpe, *Cat.*, De Sénégal au N.-E.
 p. 48, pl. 4, f. 1; *temmicki*, Rehb.; *supercilia-* del'Afrique, Afr. E.,
ris, Heugl., *J. f. O.*, 1865, p. 98. S. et S.-W.
5088. *Var. ALBOFASCIATA*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* III, Natal, Transvaal, Da-
 p. 14; id., *Cat.*, p. 49, pl. 4, f. 2; *chal-* marama, Benguela.
copterus (pt.), auct. plur.
- 11.128. *BITORQUATUS* (Blyth), *J. A. S. Beng*, 1848, p. 254; Inde centr.
 Jerd., *B. Ind.* III, p. 628; Seeb., *l. c.*, p. 247, pl. 15.

FAM. XII. — CHARADRIIDÆ (1)

SUBF. I. — HÆMATOPODINÆ

1720. HÆMATOPUS

Hæmatopus, Lin. (1758); *Ostralega*, Briss. (1760); *Melanibyx*, Rehb. (1852).

- 11.129. *OSTRALEGUS*, Lin.; Dress., *l. c.* VII, p. 567, pl. 555; Europe, Asie S.-W. et
Dubois, *l. c.* II, p. 157, pl. 190; *pica*, Scop.; centr., Afr. N. et E.
europæa, vulgaris, Less.; *bathicus, orientalis*, Brm. jusqu'au Mozamb.
- 11.130. *OSCUANS*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 405; Dav. Sibérie E., Kamtschat-
et Oust., *Ois. Chine*, p. 452; Seeb., *l. c.*, p. 505; ka, Japon, Formose,
ostralegus (pt.), auct. plur. (nec L.); *longirostris* Chine, Birmanie.
(pt.), Swinh. (1865).
- 11.131. *LONGIROSTRIS*, Vieill., *N. Dict.* XV, p. 410; Gould, Australie, Tasmanie,
B. Austr. VI, pl. 7; Seeb., *l. c.*, p. 504; *picatus*, Nouv.-Zél., Nouv.-
Vig.; *australasianus*, Gould; *finschi*, Mart., *Orn.* Guin. et Moluques.
Monatsb., 1897, p. 190 (aberr.)
- 11.132. *REISCHEKI*, Rothschild, *Ibis*, 1900, p. 181. Nouv.-Zél. (Kaiparu).
- 11.133. *LEUCOPUS* (Garn. et Less.), *Voy. Coq.* I, p. 721; Magellan, îles Ma-
Seeb., *l. c.*, p. 506; *leucopodus*, Garn.; *luctuosus*, louines.
Cuv.; *arcticus*, Jard., ed. *Wils. Am. Orn.* III,
p. 55, pl. 64; id. et Selby, *Ill. Orn.*, pl. 125.
- 11.134. *PALLIATUS*, Tem., *Man. d'Orn.* II (1829), p. 552; États-Unis, Amérique
Audub., *B. Am.* V, p. 256, pl. 524; Jard. et Sel., centr., Antilles,
Ill. Orn., pl. 7; Seeb., *l. c.*, p. 505; *ostralegus*, Amér. mérid. jus-
Wils. (nec L.); *brasiliensis*, Licht. qu'au S. du Brésil.
5089. *Var. GALAPAGENSIS*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 531; Îles Galapagos.
Sharpe, *l. c.*, p. 116; *palliatus*, Sel. et Salv.
(nec Tem.); *leucopus galapagensis*, Seeb.,
l. c., p. 507.
5090. *Var. FRAZARI*, Brewst., *Auk*, 1888, p. 84; Sharpe, Du S. de la Californie
l. c., p. 117; *palliatus* (pt.), Sel. et Salv. jusqu'au Chili, îles
Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 550. Tres-Marias.
5091. *Var. DURNFORDI*, Sharpe, *Cat. B.* XXIV, p. 117, Patagonie.
pl. 6; *palliatus* (pt.), Durnf.; Sel. et Huds.,
Arg. Orn. II, p. 176.
- 11.135. *UNICOLOR*, Wagl., *Isis*, 1852, p. 1250; Gray, *Voy.* Australie, Nouv.-Zé-
Er. and Terr. B., p. 12, pl. 40; Seeb., *l. c.*, lande.
p. 508; *fuliginosus*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 8;
niger, Ellm.; *ophthalmicus*, Rams.

(1) Voy. aussi : Seebohm, *The Geographical distribution of the Charadriidæ* (1887).

5092. *Var. CAPENSIS* (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 75; Seeb., *l. c.*, p. 509; *niger*, auct. plur. (nec Pall.); Gray, *Gen. B.* III, pl. 146; *moquini*, Bp.; Hengl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1041; Sharpe, *l. c.*, p. 119. Afrique, Canaries, Madeire.
- 11.136. *NIGER*, Pall., *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 151; Seeb., *l. c.*, p. 540; Sharpe, *l. c.*, p. 120; *bachmani*, Audub., *B. Am.* V, p. 245, pl. 525. Amér. N.-W. des îles Aléoutes et de l'Alaska jusqu'en Calif.
5093. *Var. ATRA* (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 548; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 88, pl. 250; Seeb., *l. c.*, p. 511; *niger*, Q. et G. (nec Pall.); *townsendi*, Audub., *B. Amer.*, pl. 427, f. 5; id., *B. Am.* V, p. 245, pl. 526. Du S. du Pérou jusqu'en Patagonie (côte W.) et îles Malouines.

SUBF. II. — CHARADRIINÆ

1721. OREOPHILUS

Oreophilus, Jard. et Selby (1855); *Dromicus*, Less. (1844).

- 11.157. *RUFICOLLIS* (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 655; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 547; Sch. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 174; *totanirostris*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 151; Seeb., *l. c.*, p. 111, pl. 4; *lessoni*, Bp. Pérou, Chili, Argentine, Patagonie, Malouines.

1722. ERYTHROGONYS

Erythrogonyx, Gould (1857).

- 11.158. *CINCTUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 155; id., *B. Austr.* VI, pl. 21; *rufiventer*, Less.; *rufiventris*, Seeb., *l. c.*, p. 108. Australie.

1725. SARCIOPHORUS

Sarciophorus, Strickl. (1841); *Niphidiopterus*, *Tylibyx*, Rehb. (1852); *Lobipluvia*, Bp. (1856); *Dilobus*, Heine et R. (1890); *Zonifer*, *Anomalophrys*, Shpe (1896).

- 11.159. *TECTUS* (Bodd.), *Tabl.*, p. 51; *Pl. Enl.* 854; Seeb., *l. c.*, p. 197; *pileatus*, Gm.; Schl., *Mus. P.-B., Cursores*, p. 65. Sénégal, Afrique N.-E.
5094. *Var. LATIFRONS*, Rehw., *J. f. O.*, 1881, p. 554; id., *Vög. Deutsch Ost-Afr.*, p. 56. Du Somalil. à la région du Teita (Afrique E.)
- 11.140. *TRICOLOR* (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 147; Strickl., *P. Z. S.*, 1841, p. 55; *pectoralis*, Wagl.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 11; Seeb., *l. c.*, p. 200; *vaneloides*, Peale. Australie, Tasmanie.

- 11.141. *SUPERCILIOSUS* (Rehw.), *J. f. O.*, 1886, p. 116, pl. 5, f. 2, 1890, p. 407, 1891, p. 572; Shpe, *l. c.*, p. 456. Afr. W. du Togoland au Congo et le Tangan.
- 11.142. *MELANOCEPHALUS* (Rüpp.), *Syst. Ueb.*, p. 115, pl. 44, Seeb., *l. c.*, p. 194; Sharpe, *l. c.*, p. 155. Afrique N.-E.
- 11.143. *ALBICEPS* (Gould), *P. Z. S.*, 1854, p. 45; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 64; Seeb., *l. c.*, p. 193, pl. 8; *speciosus*, Antin. Afr. W. de Libéria au Congo, à l'E. jusqu'au Nil Blanc.
- 11.144. *MALABARICUS* (Bodd.), *Tabl.*, p. 53; *Pl. Ent.* 880; Seeb., *l. c.*, p. 198; Sharpe, *l. c.*, p. 150; *bilobus*, Gm.; *myops*, Less.; *fuscus*, Hodgs, *Icon. ined. Grall.*, pl. 50. Inde, Ceylan.

1724. LOBIVANELLUS

Lobivanellus, Strickl. (1841); *Sarcogrammus*, Rehb. (1852); *Lobibyx*, Heine et Rehw. (1890); *Microsarcops*, Sharpe (1896).

- 11.145. *LOBATUS* (Lalh.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 65; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 9; Seeb., *l. c.*, p. 190; *novæ-hollandiæ*, Steph.; *gallinaceus*, Wagl.; *personatus*, Kirk (nec Gould). Australie.
- 11.146. *MILES* (Bodd.), *Tabl.*, p. 51; *Pl. Ent.* 855; Schl., *l. c.*, p. 66; *ludoviciana*, Gm.; *callæas*, Wagl.; *personatus*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 10; Seeb., *l. c.*, p. 188. Australie, Nouv.-Guinée, îles Arou et Moluques.
- 11.147. *SENEGALUS* (Lin.), *Pl. Ent.* 362; Schl., *l. c.*, p. 68; *senegalensis*, Müll.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1000; Seeb., *l. c.*, p. 191; *albicapillus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.* II, p. 400, pl. 236; *strigilatus*, Sw. Afrique W. et N.-E.
- 11.148. *LATERALIS* (Smith), *Ill. Zool. S. Afr. B.*, pl. 25; Fsch. et Harll., *Vög. Ostaf.*, p. 645; Seeb., *l. c.*, p. 195; *senegalensis*, Kirk (nec L.). Afrique S.-W. et S.-E. jusqu'au Vict.-Nyanza et le Benguélé.
- 11.149. *CUCULLATUS* (Tem.), *Pl. Col.* 505; Seeb., *l. c.*, p. 187; Sharpe, *l. c.*, p. 148; *tricolor*, Horsf. et auct. plur. (nec V.); *macropterus*, Wagl. Java, Sumatra, Bornéo, Timor.
- 11.150. *INDICUS* (Bodd.), *Tabl.*, p. 50; *Pl. Ent.* 807; Schl., *l. c.*, p. 68; Seeb., *l. c.*, p. 184; *goensis*, Gm.; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 78; *atrogularis*, Wagl. Arabie, Asie S.-W., Inde, Ceylan.
5095. *Var. ATRONUCHALIS*, Jerd., *B. Ind.* III, p. 648; Seeb., *l. c.*, p. 186; Sharpe, *l. c.*, p. 152. Indo-Chine, Malacca, Sumatra.
- 11.151. *CINEREUS* (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 587; id., *Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 261; Schl., *l. c.*, p. 69; Seeb., *l. c.*, p. 185; *inornatus*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 106, pl. 65. Asie orient., Japon, à l'Ouest jusqu'au Bengale.

1723. HOPLOPTERUS

Hoplopterus, Bonap. (1851); *Hoploxypterus*, Bonap. (1856).

- 11.152. *SPINOSUS* (Lin.); *Pl. Enl.* 801; Dress., *B. Eur.* VII, p. 559, pl. 550; Seeb., *l. c.*, p. 219; *persicus*, Bonn.; *senegalensis*, Steph. (nec L.); *cristatus*, Steph. (nec Mey.); *melasomus*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 257, pl. 26; *armatus*, Brn. Europe S.-E., Afrique W., N.-E. et E.
- 11.153. *VENTRALIS* (Wagl.), *Syst. Av., Charadrius*, p. 59, sp. 11; Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 50; *duvaucellii*, Less.; *bicolor*, Tem. Inde, Indo-Chine, Haïnan.
- 11.154. *SPECIOSUS* (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 649; Finsch et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 659; Seeb., *l. c.*, p. 221; *albiceps*, Tem., *Pl. Col.* 526 (nec Gd.); *armatus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 54. Afrique S.-E. et E.
- 11.155. *CAYANUS* (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 749; *Pl. Enl.* 855; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 555; Seeb., *l. c.*, p. 229, pl. 10; *stolatus*, Wagl.; *spinus*, Max. (nec L.) Amérique méridionale jusqu'au S. du Brésil.

1726. BELONOPTERUS

Belonopterus, Rehb. (1852).

- 11.156. *CAYENNENSIS* (Gm.), *S. N. I.*, p. 706; *Pl. Enl.* 856; Seeb., *l. c.*, p. 216; Sharpe, *l. c.*, p. 165; *lampronotus*, Wagl. Amér. mérid. de la Colombie et la Guyane jusqu'à l'Uruguay.
3096. *Var. CHILENSIS* (Mol.), *Sag. St. Chili*, p. 259; Seeb., *l. c.*, p. 218; *cayennensis*, auct. plur. (nec Gm.); *occidentalis*, Harting, *P. Z. S.*, 1874, p. 451; *grisescens*, Praz., *Orn. Monatsb.*, 1896, p. 25. Pérou, Chili, Patagonie, îles Malouines.

1727. PTILOSCELIS

Ptiloscelis, Bonap. (1856).

- 11.157. *RESPLENDENS* (Tschudi), *Arch. f. Nat.*, 1845, p. 588; id., *Faun. Per.*, pp. 49, 295; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 556; Seeb., *l. c.*, p. 228; *ptiloscelis*, Gray, *Gen. B.* III, pl. 145. Amérique S.-W. de l'Ecuador au Chili.

1728. VANELLUS

Vanellus, Briss. (1760).

- 11.158. *CAPELLA*, Schaeff., *Mus. Orn.*, p. 49 (1789); Bd., Br. et Ridgw., *Water. B. N. Am.* I, p. 150; T. Europe, Asie et Afrique, entre le 65° et

vanellus, Lin. ; *vulgaris*, Bechst. ; Dress., *B. Eur.* VII, p. 545, pl. 551 ; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, Ois. II, p. 129, pl. 189 ; *cristatus*, Mey. et Wolf ; *gavia*, Leach ; *bicornis*, etc., Brm. ; *candidus*, *pallidus*, *varius*, Naum. (aberr.) le 30^e l. N.

1729. CHÆTUSIA

Chætusia, Bonap. (1841) ; *Hemiparra*, De Fil. (1865) ; *Defilippia*, Salvad. (1865, nec Lioy, 1864) ; *Limnetes*, Fsch. et Hartl. (1870) ; *Nomusia*, Heugl. (1875) ; *Eurypterus*, Sharpe (1896, nec De Kay, 1826) ; *Euhyas*, Sharpe (1896, nec Fitz., 1845) ; *Zapterus*, Oberh. (1899).

- 11.159. GREGARIA (Pall.), *Reis. Russ. Reichs*, I, p. 456 ; Dress., *B. Eur.* VII, p. 527, pl. 528 ; Seeb., *l. c.*, p. 211 ; *fasciata*, Gm. ; *keptuschka*, Lepech. ; *coronatus*, Rüpp. ; *ventralis*, Jerd. (nec Wagl.) ; *pallidus*, Heugl. ; *wagleri*, Gr. Europe S.-E., Asie centrale jusqu'à l'Altaï, Inde, Afrique N.-E.
- 11.160. LEUCURA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 70 ; Dress., *B. Eur.* VII, p. 551, pl. 529 ; Seeb., *l. c.*, p. 215 ; *villotari*, Sav., *Descr. Eg.*, pl. 6, f. 2 ; *flavipes* et *grallarius*, Less. ; *aralensis*, Eversm. Europe S.-E., Asie S.-W. jusqu'à l'Inde, Égypte.
- 11.161. CRASSIROSTRIS, De Fil., in Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 427 ; De Fil., *Atti Soc. Ital. Sc. N.*, 1865, p. 570 ; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 994, pl. 55 ; Seeb., *l. c.*, p. 214 ; Sharpe, *l. c.*, p. 126, pl. 7, f. 2 ; *macrocerus*, Heugl. ; *nivifrons*, Ogd. Afrique N.-E. et du Haut-Nil Blanc jusqu'au Victoria Nyanza.
- 11.162. LEUCOPTERA (Rchw.), *J. f. O.*, 1889, p. 265 ; Sharpe, *l. c.*, p. 127, pl. 7, f. 1 ; *crassirostris*, auct. plur. (nec De Fil.) ; *albiceps*, Hol. et Pelz. (nec Gd.) ; *burrowsii*, Sharpe. Afrique S.-E. et E.

1750. STEPHANIBYX

Stephanibyx, Rehb. (1852).

- 11.163. CORONATUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 49 ; *Pl. Enl.* 800 ; Schl., *l. c.*, p. 82 ; Seeb., *l. c.*, p. 222 ; *atricapillus*, Gm. ; *dinghami*, Verr. Afrique S.-W., S. et E. jusqu'au Somaliland et le Choa.
- 11.164. MELANOPTERUS (Cretzschm.), in Rüpp., *Atlas*, p. 46, pl. 51 ; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1010 ; Seeb., *l. c.*, p. 224 ; *spixii*, Wagl. ; *frontalis*, Sundev. ; *inornatus*, Shell. (nec Sw.) Afrique N.-E. et E., Arabie.
- 11.165. INORNATUS (Sw.), *B. W. Afr.* II, p. 259 ; Schl., *l. c.*, p. 63 ; Seeb., *l. c.*, p. 225 ; Bocage, *Orn. Angola*, p. 425 ; *melanopteroides*, Tem. De Libéria au Congo et du Natal à Zanzibar.

1751. SQUATAROLA

Squatarola, Leach (1816).

- 11.166. *HELVETICA* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, pl^s 517-519; Presque cosmopolite.
Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 125, pl. 184; *varia*
et *squatarola*, Lin.; *hypomelas*, *pardela*, Pall.;
nævius, Gm.; *melanogaster*, Bechst.; *aprica-*
rius, Wils. (nec L.); *grisea*, Leach; *cinerea*, Flem.;
wilsoni, Licht.; *longirostris*, etc., Brm.; *rhyn-*
chochomega, Bp.; *subtridactyla*, Gr.; *megalo-*
rhynchus, Rehw.; *australis*, Olphe-Gal.

1752. CHARADRIUS

Charadrius, Lin. (1758); *Pluvialis*, Briss. (1760); *Ochthodromus*, Rehb. (1852);
Cirripidesmus, *Pluviorhynchus*, Bonap (1856); *Podasocys*, Cones (1866);
Hyetoceryx, Heine (1890).

- 11.167. *PLUVIALIS*, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 455, Europe et Asie occi-
pl. 515, f. 1; *apricarius*, L.; *aureus*, Briss.; dentale jusqu'à la
Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 105, pl. 185; *aura-* Nouvelle-Zemble et
tus, Suck.; *altifrons*, Brm. l'Islande.
- ✓ 11.168. *DOMINICUS*, P. L. S. Müll., *S. N.*, *Anhang.*, p. 116; Amérique septentrio-
pluvialis, Wils., *Am. Orn.* VII, p. 71, pl. 59, f. 5 nale, centrale et mé-
(nec L.); *virginicus*, Licht.; Baird, *B. N. Am.*, ridionale jusqu'au
p. 690; *marmoratus*, Wagl.; *americanus*, Schl., Chili, Antilles.
l. c., p. 55; Seeb., *l. c.*, p. 100.
5097. *Var. FULVA*, Gm., *S. N.* I, p. 687; Dress., *B. Eur.* Asie orientale, Japon,
VII, p. 445, pl^s 516, 517, ff. 2, 3; *xantho-* Archipel Indien,
cheilus, Wagl.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 15; Australie, Océanie.
taitensis, Less.; *glaucopus*, Licht.; *orien-*
talis et *longipes*, Tem.
- 11.169. *OBSCURUS*, Gm., *S. N.* I, p. 686; Bull., *B. New* Nouvelle-Zélande.
Zeal., p. 208; Seeb., *l. c.*, p. 151, pl. 6; Bull.,
B. New Zeal., 2^e éd., II, p. 1, pl. 25, f. 1; *gla-*
reola, Licht.
- 11.170. *BICINCTUS*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 28; Schl., Austr., Tasmanie, îles
l. c., p. 57; Bull., *l. c.*, p. 9; Seeb., *l. c.*, p. 149. Norfolk, Lord Howe.
- 11.171. *WILSONI*, Ord., in *Wils. Am. Orn.* IX, p. 77, Amérique N.-E., cen-
pl. 75, f. 5; Seeb., *l. c.*, p. 154; *wilsonius*, Vieill.; trale et méridionale
Audub., *B. Am.* V, p. 214, pl. 519; *crassirostris*, jusqu'au Pérou et
Spix; *rufinuchus*, Ridgw. Brésil.
- 11.172. *GEOFFROYI*, Wagl., *Syst. Av.*, *Charadr.*, p. 61, Asie orientale, Japon,
n° 19; Kittl., *Kupfert. Vög.*, p. 26, pl. 54, f. 2; Formose, Haïnan,
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1020, pl. 54, f. 3; Chine, Inde, Archi-
leschenaulti, Less.; *columbinus*, Wagl.; *griseus*, pel Malais, Austra-

- Less.; *rufinus*, Blyth; *inornata* (pt.), Gould, *B. Austr.* VI, pl. 19; *fuscus*, Puch.; *gigas*, Brm.; *asiaticus*, Tristr. (nec Pall.); *crassirostris*, Severtz. (nec Spix); *magnirostris*, Severtz.
- 11.175. *MONGOLICUS*, Pall., *Zoogr.* II, p. 156; Middend., *Reis. Sibir., Zool.*, p. 211, pl. 19, ff. 2, 3; Seeb., *l. c.*, p. 147; *mongolus*, Pall., *Reis. R. R.* III, p. 700; Sharpe, *l. c.*, p. 225; *cirrhepidemus*, *gularis*, Wagl.; *sanguineus*, Less.; *inornata*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 19 (fig. de droite); *mastersi*, Rams.
5098. *Var. PYRRHOTHORAX*, Gould, *B. Eur.* IV, pl. 299; Sharpe, *Cat.*, p. 226; *leschenaulti* (nec Less.) et *rufinellus*, Blyth; *subrufinus*, Hodgs.; *ruficollis*, Schl.; *mongolicus*, auct. plur. (nec Pall.); *pamirensis*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 590.
- 11.174. *ASIATICUS*, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, II, p. 715; Schl., *l. c.*, p. 58; Dress., *B. Eur.* VII, p. 479, pl. 520, f. 1, 522; Seeb., *l. c.*, p. 144; *caspicus*, Pall.; *jugularis*, Wagl.; *damarensis*, Strickl.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1018, pl. 54, ff. 1, 2.
- 11.175. *MONTANUS*, Towns, *Journ. Acad. Philad.*, 1857, p. 192; Audub., *B. Am.* V, p. 215, pl. 518; Seeb., *l. c.*, p. 155; *asiaticus* (pt.), Schl., *l. c.*, p. 58.
- 11.176. *VEREDUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1848, p. 58; id., *B. Austr.* VI, pl. 14; Seeb., *l. c.*, p. 115; *xanthocheilus*, Bp. (nec Wagl.); *asiaticus* (pt.), Schl.; Harting, *Ibis*, 1870, p. 209, pl. 6.
- lie, Afrique, Madagascar.
- Asie N.-E., côtes de la mer de Béring, Alaska, Chine, Japon, Archipel Malais, Australie.
- Asie centrale, Inde W., Indo-Chine W., Malacca, Java, Bornéo, Afrique N.-E.
- Asie centrale, Inde W., Afrique.
- États-Unis W., Mexique, Basse-Californie.
- Mongolie, Chine jusqu'aux Moluques et l'Australie.

1755. EUDROMIAS

- Eudromias*, Brm. (1851); *Zonibyx*, Rehb. (1852); *Morinellus*, Bp. (1856); *Peltohyas*, Sharpe (1896).
- 11.177. *MORINELLUS* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 507, pl. 526; Dubois, *Enc. Ill., Ois.* II, p. 109, pl. 185; *tartaricus*, Pall.; *anglus*, Müll.; *sibiricus*, Lepech.; *montana*, *stolida*, Brm.
- 11.178. *MODESTUS* (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 71; Sel. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 471; *urvillii*, Garn.; *cincta*, Less., *Voy. Coq.* I, p. 126, pl. 45; *nebulosus*, Less.; *rubecola*, King.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 110; *fusca*, Gould.
- 11.179. *AUSTRALIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 174; id., *B. Austr.* VI, pl. 15; Seeb., *l. c.*, p. 110.
- Europe, Asie et Afrique N. du 30° l. N. au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble.
- Argentine, Chili, Patagonie, îles Malouines.
- Australie.

1754. OXYECHUS

Oxyechus, Rehb. (1852).

- 11.180. VOCIFERUS (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 207, pl. 517; Seeb., *l. c.*, p. 420; Rehb., *Grall.*, p. 48, pl. 172, ff. 725-26; *torquatus*, L.; ?*jamaicensis*, Müll. Amérique sept. temp., Amérique centr. et mérid. (accidentellement Europe W.)
- 11.181. TRICOLLARIS (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 147; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1027, pl. 54, f. 5; Seeb., *l. c.*, p. 154; *indicus*, Lath.; *bitorquatus*, Licht.; *cinereicollis*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 56. Afrique N.-E., E. et S.
- 11.182. BIFRONTATUS (Cah.), *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 14; id., *J. f. O.*, 1882, p. 112, 1885, pl. 6, f. 5; Seeb., *l. c.*, p. 157; *tricollaris* (pt.), auct. plur. (nec Vieill.) Madagascar.
- 11.185. FORRESI (Shell.), *Ibis*, 1885, p. 560, pl. 14; Seeb., *l. c.*, p. 156; *tricollaris* (pt.), auct. plur. (nec V.); *indica*, Schl.; *nigris*, Harting. Afrique W. de Sénégal au Gabon.

1755. ÆGIALEUS

Ægialeus, Rehb. (1852).

- 11.184. SEMIPALMATUS (Bonap.), *Obs. Wils.*, 1825, n° 219; Audub., *B. Am.* V, p. 218, pl. 520; Seeb., *l. c.*, p. 125; *hiaticula*, Wils. (nec L.); *brevirostris*, Max. Amérique septentrionale, centrale et méridionale, Groenland, Sibérie N.-E.

1756. ÆGIALITIS

Ægialitis, Boie (1822); *Leucopolius*, Bp. (1856); *Ægialophilus*, Gould (1865).

- 11.185. HIATICULA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 467, pl. 525; *torquatus*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 115, pl. 186; *egyptiacus*, L.; *septentrionalis*, Brm.; *annulata*, Gr.; *arabs*, Licht.; ?*homeyeri*, Brm.; *auritus*, *hiaticuloides*, Heugl.; *intermedius*, Gurn. (nec Ménétr.); *hiaticula major*, Seeb., *l. c.*, p. 126. Europe jusqu'au Spitzberg, à l'E. jusqu'au Baikal et le N.-W. de l'Inde, Groenland, Afrique.
- 11.186. PLACIDA (Gray), *Cat. Mam., etc.*, *Nepal pres. Hodgs.*, p. 70; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 428; Seeb., *l. c.*, p. 507; *indicus*, Schl.; *longipes*, Dav. (nec T. et S.); *hartingi*, Swinh.; *hiaticula*, Blyth (nec L.); *tenuirostris*, Hume, *Str. F.* I, p. 17. Japon, Sibérie E., Mandchourie, Corée, Chine, Himalaya E.
- 11.187. DUBIA (Scop.); Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 117, pl. 187; *curonicus*, Gm.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 491, pl. 524; *philippinus*, Lath.; *minor*, Mey. et Wolf; *fluvialis*, Bechst.; *minutus*, Pall.; *pusillus*, Horsf.; *hiaticuloides*, Frankl.; *interme-* Europe et Asie entre le 60° et le 20° l. N., Japon, Philippines, Afrique.

- dius*, Ménétr.; *zonatus*, Sw.; *alexandrinus*, Thien. (nec L.); *simplex*, Licht.; *gracilis*, *pygmaeus*, Brm.; *microrhynchus*, Ridgw.; *hiaticula*, Rams. (nec L.)
5099. *Var.* JERDONI, Legge, *P. Z. S.*, 1880, p. 59; id., *B. Ceylon*, p. 956; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 505; Seeb., *l. c.*, p. 152. Inde, Ceylan, Indo-Ch., îles de la Sonde, Nouvelle-Guinée.
- 11.488. PERONI (Bonap.), *C. R.* XLIII, p. 417; Schl., *l. c.*, p. 55; Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 159; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 90, pl. 10, f. 2; *alexandrinus*, Motl. et Dillw. (nec L.); *philippinus*, Pelz. Grandes îles de la Sonde jusqu'à Célèbes.
- 11.489. ALEXANDRINA (Lin.); Blyth et Wald., *B. Burma*, p. 154; *cantianus*, Lath.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 485, pl. 525; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 121, pl. 188; *albifrons*, Mey. et Wolf; *littoralis*, Bechst.; *albigularis*, Brm.; *niveifrons*, Blanf.; *marginatus*, Fsch.; *cantianus minutus*, Seeb., *l. c.*, p. 169. Europe, Asie et Afrique (côtes), au N. jusqu'au 60° 1. N.
5100. *Var.* DEALBATA, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 561; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 451; Seeb., *l. c.*, p. 170; *alexandrina* (pt.), Sharpe. Chine S., Formose, Haïnan.
5101. *Var.* NIVOSA, Baird, Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 696; Coues, *Check-l. N. Am. B.*, p. 97; Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 55; *cantianus* et *tenuirostris* (pt.), auct. plur. Côtes de l'Amérique occidentale de la Californie jusqu'au Chili.
- 11.490. OCCIDENTALIS, Cab., *J. f. O.*, 1872, p. 158, 1885, pl. 6, f. 1; Seeb., *l. c.*, p. 174. Chili N.
- 11.491. MARGINATA (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 158; Gurn., *Ibis*, 1860, p. 218; Seeb., *l. c.*, p. 161; *leucopolius*, Wagl.; *nivifrons*, Cuv.; *albidipectus*, Ridgw. Afrique S.
5102. *Var.* MECHOWI, Cab., *J. f. O.*, 1884, p. 457, 1885, pl. 6, ff. 2^a, 2^b. Angola.
5105. *Var.* PALLIDA (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 158; Sharpe, *Cat.*, p. 284; *marginata* (pt.), auct. plur. (nec V.); *tenellus*, Hartl., *Faun. Madag.*, p. 72; *niveifrons*, Schl. (nec Cuv.); *marginatus var. tenellus*, M.-Edw. et Grand., *II. N. Madag.*, Ois., p. 509; Seeb., *l. c.*, p. 165, pl. 7. Afrique tropicale, Madagascar.
- 11.492. VENUSTA (Fisch. et Rehw.), *J. f. O.*, 1884, p. 178, 1885, pl. 6, ff. 4^a, 4^b; Cab., *J. f. O.*, 1884, p. 457; Sharpe, *l. c.*, p. 286. Afrique E.
- 11.495. RUFOCINCTA (Richw.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 125. Afrique S.-W.
- 11.494. RUFOCAPILLA (Tem.), *Pl. Col.* 147, f. 2; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 17; *canus*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 154. Austr., Tasm., Nouv.-Zél., Nouv.-Guin. S.
- 11.495. COLLARIS (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 156; Tacz., Amérique centrale et

- Orn. Pér.* III, p. 544; Seeb., *l. c.*, p. 175; *azaræ*, Tem., *Pl. Col.* 184; *larvatus*, Less.; *nivosa*, Salv. (nec Cass.); *gracilis*, Cab.; Rehw., *J. f. O.*, 1885, pl. VI, ff. 5^a, 5^b. méridionale jusqu'à l'Argentine, petites Antilles.
- 11.196. MELODA (Ord.), in Wils., *Amer. Orn.* VII, p. 74; Amériq. N.-E., du Audub., *B. Amer.* V, p. 225, pl. 321; Seeb., *l. c.*, S. du Labrador aux p. 121; *hiaticula* var., Wils.; *okeni*, Wagl. Antilles.
5104. Var. CIRCUMCINCTA, Coues, *Check-l. N. Am. B.*, Vallée du Mississippi, 1875, p. 155; Seeb., *l. c.*, p. 122. au N. jusqu'au lac Winnipeg.
- 11.197. FALKLANDICA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 747; Sci., Chili, Argentine, Pa- *P. Z. S.*, 1860, p. 586; Sci. et Huds., *Arg. Orn.* II, tagonie, îles Ma- p. 172; Seeb., *l. c.*, p. 156; *trifasciatus*, Licht.; louines. *pyrocephalus*, Garn.; *annuligerus*, Wagl.; *bifasciata*, Fras.
- 11.198. PECUARIA (Tem.), *Pl. Col.* 185; Heugl., *Orn. N.-O.* Afrique, au N. jusqu'au *Afr.*, p. 1055, pl. 54, f. 7; Seeb., *l. c.*, p. 158; Delta du Nil. *varius*, Vieill. (nec L.); Harting, *Ibis*, 1875, p. 262, pl. 8; *pastor*, Cuv.; *killittzi*, Rehb.; *isabellinus*, Müll.; *pectoralis*, *frontalis*, Licht.; *longipes*, Heugl.
5105. Var. SANCTÆ-HELENÆ, Harting, *Ibis*, 1875, p. 266, Ile St^e-Hélène. pl. 9; Seeb., *l. c.*, p. 160; *pecuarius*, auct. plur. (nec Tem.).
- 11.199. THORACICA, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1896, Madagascar. p. 55.
- 11.200. MELANOPS (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 159; Sharpe, Australie. *l. c.*, p. 500; *nigrifrons*, Tem., *Pl. Col.* 47, f. 1; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 20; Seeb., *l. c.*, p. 158; *russatus*, Jerd., *Madr. Journ.* XII, p. 215.
- 11.201. CUCULLATA (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 156; Sharpe, Australie, Tasmanie. *l. c.*, p. 502; *monachus*, Wagl.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 18; Seeb., *l. c.*, p. 127, pl. 15.

1757. PLUVIANELLUS

Pluvianellus, Jacq. et Pucher. (1855).

- 11.202. SOCIABILIS, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud, Zool.* III, Patagonie. p. 125, pl. 50; Seeb., *l. c.*, p. 107, pl. 2.

1758. THINORNIS

Thinornis, Gray (1846).

- 11.205. NOVÆ-ZEALANDIÆ (Gm.), *S. N.* I, p. 684; Gray, *Voy. Nouv.-Zélande, île *Ereb. and Terr.*, B., p. 12, pl. 2; Bull., *B. N. Chatham. Zeal.*, p. 214, pl. 25; Seeb., *l. c.*, p. 128; *dudoroa*, Wagl.; *torquatula*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 121; ? *atricinctus*, Ellm.*

5106. *Var.* Rossi, Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., Iles Auckland.
p. 12, pl. 11; Sharpe, *l. c.*, p. 503; *novæ-*
zealandiæ (pt.), Seeb., *l. c.*, p. 129.

1759. ANARHYNCHUS

Anarhynchus, Quoy et Gaim. (1850).

- 11.204. *FRONTALIS*, Quoy et Gaim., *Voy. de l'Astrol.*, Zool. I, Nouv.-Zélande.
p. 252, pl. 51, ff. 2-5; Bull., *B. New Zeal.*, 2^e éd.,
p. 9, pl. 26, f. 2; Seeb., *l. c.*, p. 152; *albifrons*,
Rehb.

FAM. XIII. — SCOLOPACIDÆ

SUBF. I. — HIMANTOPODINÆ

1740. HIMANTOPUS

Himantopus, Briss. (1760); *Macrotarsus*, Lacép. (1801); *Himantellus*, Rafin.
(1815); *Hypsibates*, Nitzsch (1827).

- 11.205. *PLINII*, Gerini, *Orn. meth. Dig.* IV, p. 67 (1775); Europe centrale et
Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 274, pl. 221; *Char.* méridionale, Asie
himantopus, Lin.; *hamatopus*, Bodd.; *candidus*, centrale et méridio-
Bonn. (1790); Dress., *B. Eur.* VII, p. 587, nale, Afrique, Ma-
pl^s 555, 556; *vulgaris*, *rufipes*, Bechst.; *atropte-* dagascar.
rus, *melanopterus*, Mey.; *albicollis*, Vieill.; *asia-*
ticus, Less.; *intermedius*, Blyth; *longipes*, *melano-*
cephalus, etc., Brm.; *minor*, Natt.; *autumnalis*,
Fsch. (ex Hasselq.); *nigricollis*, Severtz.
- 11.206. *BRASILIENSIS*, Brm., *Vög. Deutschl.*, p. 684; Seeb., Brésil, Chili, Argen-
l. c., p. 281; Sch. et Huds., *Argent. Orn.* II, tine.
p. 179; *melanurus*! Vieill.; Sharpe, *l. c.*, p. 516;
mexicanus, Max. (nec Müll.); *nigricollis*, Gould
(nec V.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 582.
- 11.207. *LEUCOCEPHALUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 26; id., Australie, Nouv.-Gui-
B. Austr. VI, pl. 24; Seeb., *l. c.*, p. 285; *mela-* née, Moluques, îles
nopterus, S. Müll. (nec Mey.); *novæ-hollandiæ*, de la Sonde.
Bp.; *rufipes*, Mart. (nec Bechst.); *autumnalis*,
Wald. (nec Hasselq.)
5107. *Var.* *PICATA*, Elhn., *Zool.*, 1861, p. 7470; *pica-* Nouv.-Zélande.
tus, Seeb., *l. c.*, p. 284; *novæ-zealandiæ*,
Rehb. (nec Gould); *leucocephalus*, auct. plur.
(nec Gould); *albicollis*, Bull. (nec V.)

- 11.208. MEXICANUS (P. L. S. Müll.), *S. N.*, *Ank.*, p. 117; Lath., *Ind. Orn.* II, p. 741; Seeb., *l. c.*, p. 279; *himantopus*, Wils. (nec L.); *nigricollis*, Vieill. et auct. plur.; Audub., *B. Am.* VI, p. 51, pl. 554; *leucurus*, Vieill. États-Unis, Amérique centrale et méridionale jusqu'au Pérou et Amazone, Antilles, Galapagos.
- 11.209. KNUDSEN, Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 81, pl. 6, f. 2; Seeb., *l. c.*, p. 280; Rothsch., *Avif. Lays.*, pl. 67; *nigricollis*, Pelz. (nec V.); *candidus*, Dole (nec Bonn.) Iles Sandwich.
- 11.210. MELAS, Hombt. et Jacq., *Ann. Sc. Nat.* XVI, 1841, p. 520; Seeb., *l. c.*, p. 285; *novae-zealandiae*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 25; Bull. *New-Zeal.*, éd. 2, p. 24, pl. 27, f. 4; *niger*, Ellm. Nouvelle-Zélande.

1741. CLADORHYNCHUS

Leptorhynchus, Du Bus (1855, nec Ménélr., 1852); *Cladorhynchus*, Gray (1841); *Xiphidiorhynchus*, Rehb. (1845).

- 11.211. LEUCOCEPHALUS (Vieill.), *N. Dict.* III, p. 105; id., *Gal. Ois.* II, pl. 274; Salv., *Ibis*, 1874, p. 252, note; *orientalis*, Cuv.; *pectoralis*, Du Bus, *Bull. Acad. R. Belg.*, 1855, 2, p. 420, pl. 7; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 26; *palmatus*, Gd. Australie.

1742. RECURVIROSTRA

Recurvirostra, Lin. (1752); *Avocetta*, Briss. (1766); *Himantopus*, Seeb. (pt., 1887).

- 11.212. AVOCETTA, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 577, pl. 554; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 270, pl. 220; *Avoc. recurvirostris*, Bodd.; *europaea*, Dum.; *tephroleuca*, Vieill.; *fissipes*, etc., Brm.; *sinensis*, Swinh. Europe centrale et méridionale, Asie centrale, Inde, Ceylan, Afrique, Madagascar.
- ✓ 11.215. AMERICANA, Gm., *S. N.* I, p. 695; Audub., *B. Am.* VI, p. 24, pl. 555; Seeb., *l. c.*, p. 291; *occidentalis*, Vig. Amérique sept. tempérée, Amér. centr., grandes Antilles.
- 11.214. NOVE-HOLLANDIÆ, Vieill., *N. Dict.* III, p. 105; Bull., *B. New Zeal.*, éd. 2, II, p. 20, pl. 27, f. 4; *rubricollis*, Tem.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 27; Seeb., *l. c.*, p. 292. Australie, Nouvelle-Zélande.
- 11.215. ANDINA, Phil. et Landb., *Arch. f. Naturg.*, 1865, p. 151; Harting, *Ibis*, 1874, p. 257, pl. 9; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 584; Seeb., *l. c.*, p. 286. Chili (Andes).

SUBF. II. — TOTANINÆ

1743. IBIDORHYNCHUS

Ibidorhynchus, Vig. (1850); *Clorhynchus*, Hodgs. (1855); *Falcistrostra*, Severtz. (1875).

- 11.216. STRUTHERSI, Vig., *P. Z. S.*, 1850, p. 174; Gould, Himalaya, Asie centr.
B. Himalaya, pl. 79; id., *B. Asia*, VII, pl. 61; jusqu'en Mongolie
strophiatius, Hodgs.; *kaufmanni*, *longipes*, Severtz. et le N. de la Chine.

1744. NUMENIUS

Numenius, Briss. (1760); *Phœopus*, Cuv. (1817); *Cracticornis*, Gray (1841);
Mesoscolopax, Sharpe (1896).

- 11.217. ARQUATUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VIII, p. 245, Europe, Asie S.-W.,
 pl. 565; Dubois, *Enc. Ill.*, Ois. II, p. 249, pl. 215; Afrique, Madagas-
madagascariensis, Lin.; *major*, Steph.; *virga-* car.
tus, Cuv.
 5108. Var. LINEATA, Cuv., *Rég. An.* I, p. 521; Seeb., Asie orientale, centrale
l. c., p. 524; *nasicus*, Tem.; *arquatulula*, Hodgs.; et méridionale, Ar-
cassini, Swinh., *Ibis*, 1867, p. 598. chipel Malais.
 11.218. TENUIROSTRIS, Vieill., *N. Dict.* VIII, p. 802; Dress., Europe méridionale et
B. Eur. VIII, p. 257, pl. 562; Dubois, *l. c.* II, centrale, Afrique
 p. 254, pl. 216; Seeb., *l. c.*, p. 525; *syngenicus*, N., région Aralo-
 v. d. Mühl., *Orn. Griechent.*, p. 111. Caspienne.
 11.219. CYANOPUS, Vieill., *N. Dict.* VIII, p. 506; Salvad., Asie orientale, Japon,
Orn. Pap. III, p. 550; *australis*, Gould; id., *B.* Archipel Indien,
Austr. VI, pl. 42; *major*, Tem. et Schl., *Faun.* Australie.
Jap., p. 110, pl. 66; *rostratus*, Licht.; *austra-*
lasiianus, Gr.; *rufescens*, Gd.; *tahitiensis*, Swinh.,
P. Z. S., 1871, p. 410 (nec Gm.)
 ✓ 11.220. LONGIROSTRIS, Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 25, pl. 64, Amérique sept. tem-
 f. 4; Audub., *B. Am.* VI, p. 55, pl. 555; *melan-* pérée, Amér. centr.,
nopus, Vieill.; *occidentalis*, Woodh. grandes Antilles.
 11.221. PILEOPUS (Lin.); Dress., *l. c.*, VIII, p. 227, pl. 561; Europe, Islande, Groen-
 Dubois, *l. c.* II, p. 257, pl. 217; *minor*, Leach; land, Afrique, Inde,
vulgaris, Flem.; *islandicus*, Brm.; *melanorhyn-* Indo-Chine, Ma-
chus, Bp.; *hesitatus*, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 255. lacca.
 5109. Var. VARIEGATA (Scop.), *Del Fl. et Faun. Insubr.* Asie orientale, Japon,
 II, p. 92; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 552; Archipel Indien,
luzoniensis, Gm.; *phœopus* (pt.), auct. plur. Australie.
 (nec L.); *atricapillus*, V.; *uropygialis*, Gould;
 id., *B. Austr.* VI, pl. 45; *tahitensis*, Cass.
 (nec Gm.); *minor*, Rosenb. (nec Leach);
melanorhynchus, Tacz. (nec Bp.)

11.222.	Hudsonicus, Lath., <i>Ind. Orn.</i> II, p. 712; Audub., <i>B. Am.</i> VI, p. 42, pl. 556; <i>borealis</i> , Gm. (nec Forst.); <i>rufiventris</i> , Vig.; <i>brasilienis</i> , Max.; <i>intermedius</i> , Nutt.; <i>phæopus</i> (pt.), Cal.; Pelz., <i>Orn. Bras.</i> , p. 508.	Amérique septentrionale, centrale et méridionale.
11.223.	TAHITIENSIS (Gm.), <i>S. N.</i> I, p. 636; Seeb., <i>l. c.</i> , p. 552; <i>femoralis</i> , Peale, <i>U.S. Exped.</i> , B., 1848, p. 255, pl. 64; <i>phæopus</i> (pt.), Schl.; <i>australis</i> , Dole (nec Gd.); <i>tibialis</i> , Layard.	Amérique N.-W., îles Hawaï et autres du Pacifique.
11.224.	BOREALIS (Forst.), <i>Phil. Trans.</i> , 1772, pp. 411, 451; Audub., <i>B. Am.</i> VI, p. 45, pl. 557; Dress., <i>B. Eur.</i> VIII, p. 221, pl. 560; Dubois, <i>Ois. Eur.</i> II, p. et pl. 144 ^a ; <i>brevirostris</i> , Licht.; Tem., <i>Pl. Col.</i> 581; <i>microrhynchus</i> , Phil. et Landb.	Amérique septentrionale, centrale et méridionale.
11.225.	MINUTUS, Gould, <i>P. Z. S.</i> , 1840, p. 176; id., <i>B. Austr.</i> VI, pl. 49; Tem. et Schl., <i>Faun. Jap.</i> , p. 411, pl. 67; Sharpe, <i>Cat.</i> XXIV, p. 374; <i>minor</i> , S. Müll. et auct. plur. (nec Leach).	Asie orientale, Japon, Archipel Indien, Australie.

1745. LIMOSA

Limosa, Briss. (1760); *Limicula*, Vieill. (1816); *Fedoa*, Steph. (1824).

- 11.226. LAPPONICA (Lin., 1758); Dress., l. c. VIII, p. 205, pl. 558, f. 1, 559, f. 2; *rufa*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 244, pl. 214; *agocephala*, Lin.; *leucophæa*, Lath.; *gregaria*, Otto; *ferrugineus*, Mey.; *meyeri*, Leisl.; *noveboracensis*, Leach; *pectoralis*, Steph.
5110. Var. BAUERI, Naum., *Vög. Deutschl.* VIII, p. 429 (1856); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 459; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 529; *brevipes*, *australasiana*, Gr.; *novæ-zealandiæ*, Gray; *uropygialis*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 29; *foxii*, Peale; *rufa* et *lapponica* (pt.), auct. plur.; *punctata*, Ellm.; *melanuiroides*, Tristr., *Ibis*, 1876, p. 265 (nec Gd.)
- 11.227. BELGICA (Gm.), *S. N.* I, p. 665; Salvad., *Elenco Ucc. Ital.*, p. 228; Saund., *Man. Br. B.*, p. 609; *S. limosa*, Lin.; *agocephala*, auct. plur. (nec Lin.); Dress., l. c. II, pl. 558, f. 2, 559, f. 1; *melanura*, Leisl.; Dubois, l. c. II, p. 240, pl. 215; *islandica*, Brm.
5111. Var. MELANUIROIDES, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 84; id., *B. Austr.* VI, pl. 28; *agocephala*, Pall. (nec L.); *melanura*, Horsf. (nec Leisl.); *brevipes*, auct. plur. (nec Gr.)
- Europe et Sibérie occidentale jusqu'au 74° latitude N., Afrique N. et N.-W.
- Alaska, Asie orientale, Japon, Archipel Indien, Australie, Nouvelle-Zélande, îles Fidji et Samoa.
- Europe jusqu'au 68° 1/2 latitude N., Islande, Groenland, Asie occidentale, Inde, Ceylan, Afrique N. et N.-E.
- Asie or. jusqu'au 55° latitude N., Japon, à l'Ouest jusqu'au Japon, Arch. Indien, Austr.

- 11.228. HUDSONICA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 720; Audub., *B. Am.* V, p. 553, pl. 549; *edwardsi*, Sw.; *australis*, Gr.; *hamastica*, Coues, et auct. plur. amer. Amér. sept., centr. et mérid., de l'Alaska aux Malouines.
 11.229. FEDOA (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 551, pl. 548; Amérique septentr. de l'Alaska au Guatémala et Cuba.
marmorata, Lath.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 115, pl. 543; *americana*, Steph.; *adspersa*, Naum.

1746. MACRORHAMPHUS

Macrorhamphus, Leach (1816); *Limnodromus*, Max (1855); *Pseudoscolopax*, Blyth (1859).

- 11.250. GRISEUS (Gm.), *S. N.* I, p. 658; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 187, pl. 556; *noveboracensis*, Gm.; Audub., *B. Am.* VI, p. 10, pl. 551; *ferrugineicollis*, *leucophaea*, Vieill. (nec Lath.); *paykullii*, Nilss.; *scolopacea*, Say; *punctatus*, Less.; *longirostris*, Bell. Sibérie E., Amérique septentrionale et centrale, au S. jusqu'au Brésil.
 11.251. TACZANOWSKI, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, p. 206, pl. 14; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 599; *semipalmatus*, auct. plur. (nec Gm.) Sibérie E., Bengale N.-E., Birmanie, Bornéo.

1747. MICROPALAMA

Hemipalma, Bp. (1827, nec 1826); *Micropalama*, Baird (1858).

- ✓ 11.252. HIMANTOPUS (Bonap.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1826, p. 157; Audub., *B. Am.* V, p. 271, pl. 554; Baird, *B. N. Am.*, p. 726; *douglasii*, Sw.; *auduboni*, Nutt.; *multistriata*, Gray; *multifasciata*, Licht. Amérique N.-E., centrale et Antilles, au Sud jusqu'au Chili et l'Uruguay.

1748. SYMPHEMIA

Symphemia, Rafin. (1819); *Catoptrophorus*, Bp. (1826); *Hodites*, Kp. (1829).

- 11.253. SEMIPALMATA (Gm.), *S. N.* I, p. 659; Audub., *l. c.* V, p. 524, pl. 547; Seeb., *l. c.*, p. 558; *crassirostris*, Vieill.; *atlantica*, Rafin.; *speculifera* Cuv., *Rég. Anim.* I, p. 551; Seeb., *l. c.*, p. 559; *inornata*, Brewst., *Auk*, 1887, p. 145. Amér. sept. jusqu'au 56° l. N., Amér. centr. et Nord de l'Amér. mérid., Antilles (accidentellement Europe W.)

1749. TOTANUS

Totanus, Bechst. (1805); *Glottis*, Koch (1816); *Limicola*, Leach (1816); *Gambetta*, *Erythroscelis*, *Helodromas*, *Rhyacophilus*, Kp. (1829); *Heteroscelus*, Baird (1858, nec Lath.); *Pseudototanus*, Hume (1878); *Heteractitis*, *Pseudoglottis*, Stejn. (1884); *Egialodes*, Heine (1890).

- 11.254. FUSCUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VIII, p. 163, pl. 568, II, 2, 5, 569, f. 1; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, Europe et Asie jusqu'au 70° lat. N.,

- p. 197, pl. 204; *maculata*, Tunst.; *cantabrigiensis*, Lath.; *nigra*, curonica, Gm.; *atra*, Sand.; *natans*, Otto; *longipes*, Leisl.; *raii*, Leach; *indicus*, Rehb.; *ocellatus*, Bp.; *obscurus*, C. Dub.
- 11.253. CALIDRIS (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 157, pl. 568, f. 1, 569, l. 2; Dubois, *l. c.*, p. 202, pl. 203; *striata*, gambetta, Lin.; *littoralis*, etc., Brm. Europe jusqu'au 70° et en Asie jusqu'au 55° l. N., Archipel Malais, Afrique.
- 11.256. STAGNATILIS, Bechst., *Orn. Taschenb.* II, p. 292; Dress., *l. c.*, p. 151, pl. 566; Dubois, *l. c.*, p. 195, pl. 205; *tenuirostris*, Horsf.; *guinetta*, Pall.; *lathamii*, Gr. et Har dw.; *gracilis*, Brm. Europe et Asie jusqu'au 50° l. N., Archipel Malais, Australie.
- 11.257. MELANOLEUCUS (Gm.), *S. N.* I, p. 639; Audub., *Orn. Biogr.* IV, p. 68, pl. 508; Tacx., *Orn. Pér.* III, p. 565; *vociferus*, Wils., *Am. Orn.* VII, p. 57, pl. 58, f. 5; *solitarius*, Vieill. (nec Wils.); *chilensis*, Phil.; *vociferans*, Heine et Rehw. Amérique septentrionale, centrale et méridionale, Antilles.
- 11.258. FLAVIPES (Gm.); Audub., *B. Am.* V, p. 515, pl. 544; *natator*, *fuscocupillus*, Vieill. Amér., du cercle arctique au Chili et Argent. (acc. Europe.)
- 11.259. OCHROPUS (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 153, pl. 564; Dubois, *l. c.*, p. 214, pl. 207; *leucurus*, *rivalis*, Brm.; *punctulatus*, C. Dub., *Pl. Col.*, *Ois. Belg.* II, p. 186 (1837). Europe et Asie jusqu'au cercle polaire, Afrique.
- 11.240. SOLITARIUS (Wils.), *Amer. Orn.* VII, p. 55, pl. 58, f. 5; Audub., *B. Am.* V, p. 509, pl. 545; *chloropygius*, *punctatus*, Vieill.; *caligatus*, Licht.; *glareola*, Ord. (nec L.); *macroptera*, Spix. Amérique sept., centr. et mérid., du cercle polaire arctique à l'Argent., Antilles.
- 11.241. INCANUS (Gm.), *S. N.* I, p. 638; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 560; *glareola*, Pall. (nec L.); *solitarius*, Blox. (nec Wils.); *fuliginosus*, Gould; *undulata*, *pacifica*, Forst.; *polynesiæ*, Peale, *U. S. Expl. Exped.*, p. 237, pl. 65, f. 1; *oceanicus*, Less.; *brevipes*, Cass. (nec V.); Baird, *B. N. Am.*, p. 754, pl. 88. Amérique N.-W. jusqu'au Mexique, Galapagos, Océanie.
5112. Var. BREVIPES, Vieill., *N. Dict.* VI, p. 410; Seeb., *l. c.*, p. 561; *pulverulentus*, Müll.; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 109, pl. 63; *griseopygius*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 58; *incanus* (pt.), auct. plur. (nec Gm.) Asie E. jusqu'au Kamtschatka, Japon, Archipel Malais, Australie.
- 11.242. GUTTIFER, Nordm., in *Erman's Reise um die Erde*, p. 17; Stejn., *Zeitschr. ges. Orn.* I, p. 225, pl. 10; Seeb., *l. c.*, p. 554; *haughtoni*, Armstr., *Str. F.* IV, p. 544; Harting, *Ibis*, 1885, p. 155, pl. 4. Kamtschatka, Asie E., Birmanie, Bengale N.-E., Haïnan.
- 11.245. GLOTTIS (Lin., 1758); Dubois, *Fuc. Ill.*, *Ois.* II, p. 188, pl. 202; *nebularius*, Gmn. (1767); Sharpe, Europe et Asie jusqu'au cercle polaire,

Cat. B. XXIV, p. 481; *cineracea*, Lath.; *canescens*, Gm.; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 175, pl. 570; *fistulans*, *griseus*, Bechst.; *chloropus*, Mey.; *natans*, Koch; *glottoides*, Vig.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 56; *horsfieldi*, Syk.; *floridanus*, Bp.; *vigorsi*, Gr.; *nivigula*, Hodgs.; *albicollis*, Brm.; *litoreus*, Rehw.

Japon, Archipel Malais, Australie, Afrique (accidentellement Amérique).

3115. *Var. EURHINA*, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1900, p. 207. Asie centrale.

11.244. *GLAREOLA* (Gm.), *S. N.* I, p. 677; Dress., *l. c.* VIII, p. 145, pl. 565; Dubois, *l. c.* II, p. 207, pl. 206; *litorea*, Pall.; *grallatoris*, Mont.; *affinis*, Horsf.; *sylvestris*, *palustris*, etc., Brm.; *glareoloides*, Hodgs.

Europe et Asie jusqu'au 70° latitude N., Japon, Archipel Malais, Afrique.

1750. ACTITIS

Actitis, Ill. (pt., 1811); *Tringoides*! Bp. (1831); *Guinetta*, Gr. (1840).

11.245. *HYPOLEUCA* (Lin.); Illig., *Prodr.*, p. 262; Dress., *l. c.* VIII, p. 127, pl. 565; *guinetta*, Briss.; Dubois, *l. c.*, p. 215, pl. 208; *leucoptera*, Pall.; *cinclus*, *stagnatilis*, etc., Brm.; *empusa*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 55; *schlegeli*, Bp.

Europe et Asie jusqu'au cercle polaire, Océanie, Australie, Afrique, Madagascar.

11.246. *MACULARIA* (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 505, pl. 542; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 218, pl. 208^b; *notata*, Bp.; *hypoleucos*, var. *macularius*, Ridgw.; *T. solitarius cinnamomeus*, Brewst.

Amérique, du cercle polaire arctique au 20° l. S. (accid. Europe W., Belgique.)

1751. TEREKIA

Xenus, Kamp (1829, nec Ross.); *Terekia*, Bp. (1858); *Simorhynchus*, Keys. et Blas. (1840); *Rhynchosimus*, Heine et Rehw. (1890).

11.247. *CINEREA* (Güld.), *Nov. Comm. Petrop.* XIX, p. 475, pl. 49; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 195, pl. 572; *recurvirostra*, Pall.; *javanicus*, Horsf.; *sumatrana*, Rafll.; *terek*, Vieill.; *terekensis*, Steph.; *indiana*, Less.; *terekius*, Seeb., *l. c.*, p. 569.

Europe N.-E., Asie, Archipel Indien, Australie, Afrique.

1752. PAVONCELLA

Pavoncella, Leach (1816); *Machetes*, Cuv. (1817); *Philomachus*, Gray (1841).

11.248. *PUGNAX* (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 87, pl^s 557, 558; Dubois, *l. c.* II, p. 185, pl^s 201, 201^b; *litorea*, L.; *grenovicensis*, *equestris*, Lath.; *alticeps*, *planiceps*, Brm.; *indica*, *hardwickii*, Gray; *optatus*, Hodgs.; *cinerea*, Butl.

Europe jusqu'au 70° l. N., en Asie depuis la mer Caspienne jusqu'au Kamtschatka, au S. jusqu'à l'Inde (pas en Chine et Indo-Ch.), Afrique.

1753. BARTRAMIA

Bartramia, Less. (1851); *Actidurus*, Bp. (1851); *Euliga*, Nutt. (1854); *Actiturus*, Bp. (1858).

- 11.249. *LONGICAUDA* (Bechst.), *Kurze Uebers. Lath.*, p. 455, pl. 184; Dress., *l. c.*, p. 119, pl. 562; *bartramia*, Wils., *Amer. Orn.* VII, p. 65, pl. 59, f. 2; Audub., *B. Am.* V, p. 248, pl. 527; *variegatus*, *melanopygius*, Vieill.; *laticauda*, Less. Amérique septentrionale, centrale et méridionale jusqu'à l'Uruguay (accid. Europe W.)

1754. EREUNETES

Ereunetes, Illig. (1814); *Hemipalama*, Bp. (1825); *Heteropoda*, Nutt. (1854).

- 11.250. *PUSILLUS* (Lin.); Cass., *Pr. Acad. Philad.*, 1860, p. 196; *petrificatus*, Ill.; *semipalmata*, Wils., *Amer. Orn.* VII, p. 151, pl. 65, f. 4; Audub., *B. Am.* V, p. 277, pl. 556; *brevirostris*, Spix; *brissoni*, Less.; *minor*, Lemb. Amérique septentr., centrale et méridionale jusqu'au 43° latitude Sud.
5114. *Var. MAURI* (Bp.), *Comp. List B.*, p. 49; Gundl., *J. f. O.*, 1856, p. 419; *cabanisi*, Licht.; *occidentalis*, Lawr., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1864, p. 107. Amérique N.-W. de l'Alaska à l'Amérique centrale (côtes), Sibérie N.-E.

SUBF. III. — SCOLOPACINÆ

1755. ARENARIA

Arenaria, Briss. (1760); *Morinella*, Mey. et Wolf (1810); *Strepsilas*, Illig. (1811); *Cinclus*, Gr. (1841).

- 11.251. *INTERPRES* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 553, pl. 552; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg. Ois.* II, p. 155, pl. 191; *morinella*, Lin.; *hudsonica*, P. L. S. Müll.; *collaris*, Mey. et Wolf; *cinclus*, Pall.; *oahuensis*, Blox.; *borealis*, *littoralis*, etc., Brm.; *cinerea*, Ol.-Gal. Cosmopolite.
- 11.252. *MELANOCEPHALA* (Vig.), *Zool. Journ.*, 1829, p. 556; Cass., *B. N. Am.*, p. 702, pl. 7; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 414; *interpres*, *var. melanocephalus*, Coues, *Key N. Am. B.*, p. 247; Stejn., *Auk*, 1884, p. 129. Amérique N.-W., de l'Alaska à la Californie.

1756. APHRIZA

Aphriza, Audub. (1859).

- 11.255. *VIRGATA* (Gm.), *S. N.* I, p. 674; Gr., *Gen. B.* III, pl. 147; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 412; Amérique W., de l'Alaska au Chili.

borealis, Gm.; *townsendi*, Audub., *B. Amer.*,
pl. 428; *winterfeldti*, Temm.; id., *Faun. Per.*,
p. 296, pl. 54.

1757. TRYNGITES

Tryngites, Cab. (1856).

- 11.254. *SUBRUFICOLLIS* (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 465; Amérique, de la zone
Turn., *Contr. Nat. Hist. Alaska*, p. 189; *rufes-* arctique jusqu'au
cens, Vieill., *l. c.*, p. 470; Audub., *B. Am.* V, Paraguay (acciden-
p. 264, pl. 551; Dress., *B. Eur.* VIII, pl. 561; *bre-* tellement Europe).
virostris, Licht.; *nævus*, Heerm.; *squalida*, Natl.

1758. CALIDRIS

Calidris, Cuv. (1800), Illig. (1811); *Arenaria*, Bechst. (1805, nec Briss. (1860).

- 11.255. *ARENARIA* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 555, Europe, Asie, Amé-
pl. 552; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 150, pl. 195; rique jusqu'au 82°
calidris, L.; *rubidus*, Gm.; *vulgaris*, *grisea*, latit. N., Afrique,
Bechst.; *tridactyla*, Pall.; *tringoides*, Vieill.; Madagascar (côtes),
americana, mulleri, Brm. presque cosmopol.

1759. EURHYNORHYNCHUS

Eurhynorhynchus, Nilss. (1821).

- 11.256. *PYGMEUS* (Lin.); Boie, *Isis*, 1826, p. 979; Gray, Asie N.-E. jusqu'en
Gen. B. III, p. 580, pl. 156; Harting, *Ibis*, 1869, Chine, Inde et Birm.,
p. 427, pl. 12; *griseus*, Nilss.; *orientalis*, Blyth. Japon, Amér. N.-W.

1760. TRINGA

Tringa, Lin. (1758); *Erolia*, Vieill. (1816); *Pelidna*, Cuv. (1817); *Falcinellus*,
Cuv. (1829, nec Vieill.); *Leimonites*, *Ancylocheilus*, *Actodromas*, Kp. (1829);
Canutus, Brm. (1851); *Scharniclus*, Gray (1844); *Arquatella*, Baird (1858);
Delopygia, *Heteropygia*, Coues (1861); *Limnocinclus*, Gould (1865); *Actia*,
H. et Rehw. (1890).

- 11.257. *SUBARQUATA* (Guld.), *Nov. Comm. Petrop.* XIX, Europe, Asie, Afrique,
p. 471; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 59, pl. 555; Du- Archipel Indien,
bois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 162, pl. 196; *africana*, Australie (sur les
pygmaea, Gm.; *dethardingi*, Siemss.; *islandica*, côtes et les rives des
Retz.; *pusillus*, Bechst.; *ferrugineus*, Mey.; *fal-* fleuves; accidentel-
cinella, Pall.; *variegata*, *varia*, Vieill.; *cursorius*, lement Amérique
Tem., *Pl. Col.* 510; *macrorhyncha*, *arquata*, N.-W.)
Brm.; *chinensis*, Gr.; *curieri*, Bp.
11.258. *CANUTUS*, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 77, pl^s 555, 556; Zone arctique, côtes de
Dubois, *l. c.*, p. 154, pl. 194; *cinerea*, Brünn.; l'Europe, de l'Afr.
calidris et *islandica*, Lin.; *australis*, *nævia*, Gm.; N. et W., Amér. E.

- ferruginea*, Mey. et Wolf; *rufa*, Wils.; *rufescens*, Brm.; *lomatina*, Licht.; *cooperi*, Bd., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 716.
- 11.259. *CRASSIROSTRIS*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 107, pl. 64; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 468; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 512; *magnus*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 55; *tenuirostris*, Swinh. (nec Horsf.)
- 11.260. *ALPINA*, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 21, pl. 548; *cinclus*, Briss.; Dubois, *l. c.*, p. 166, pl. 197; *variabilis*, Bechst.; *schinzi*, Brm.; *minor*, Schl.; *torquata*, Degl.
5115. *Var. PACIFICA*, Cones, *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1861, p. 189; *variabilis*, *cinclus*, *alpina* (pt.), auct. plur.; Audub., *B. Am.* V, p. 266, pl. 552; *americana*, Baird., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 719 (nec Brm.)
- 11.261. *MARITIMA*, Brünn., *Orn. bor.*, p. 54 (1764); Gm., *S. N.* I, p. 678; Dubois, *l. c.*, p. 159, pl. 195; *lincolniensis*, *canadensis*, Lath.; *nigricans*, Mont.; *arquatella*, Pall.; *striata*, Flem. (nec Lin.); Dress., *l. c.*, p. 69, pl. 554; *littoralis*, Brm.
5116. *Var. COUESI* (Ridgw.), *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1880, p. 160; Seeb., *l. c.*, p. 450; *maritima* (pl.), auct. plur.
5117. *Var. PTILOCNEMIS*, COUES, *Birds N.-W.*, p. 491; Seeb., *l. c.*, p. 451; *crassirostris*, Dall (nec T. et S.); *gracilis*, Harting.
- 11.262. *TEMMINCKI*, Leisl., in *Bechst., Naturg. Deutschl., Nachtr.* II, p. 78; Dress., *l. c.*, pl. 549, f. 1, 551, f. 2; Dubois, *l. c.*, p. 175, pl. 199; *gracilis*, Brm.; *damacensis*, Tacz. (1882).
- 11.265. *MINUTA*, Leisl., in *Bechst., Naturg. Deutschl., Nachtr.* I, p. 74; Dress., *l. c.*, p. 29, pl. 549, f. 1, 550, f. 1, 551, f. 1; Dubois, *l. c.*, p. 171, pl. 198; *pusilla* (pt.), Mey. et W. (nec L.); *damacensis*, Tacz. (1876); *orientalis*, Tacz. (1895).
5118. *Var. RUFICOLLIS*, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 700; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 742; Seeb., *l. c.*, p. 457, pl. 15; *salina*, Pall.; *albescens*, Tem., *Pl. Col.* 41; *australis*, Less.; *minuta* (pt.), auct. plur. (nec Leisl.); *damacensis*, Swinh.; *minutilla*, Bean (nec V.)
- 11.264. *SUBMINUTA*, Middend., *Reis. in N. u. O. Sibir.*, *Zool.* II, p. 222, pl. 19, f. 6; Seeb., *l. c.*, p. 458; ? *damacensis*, Horsf.; Sharpe, *Cat.*, p. 555 et auct. plur. (nec Horsf.); *minuta*, Blyth (nec Leisl.);
- jusqu'au 32° l. S.,
Asie E., Archip. jus-
qu'à la Nouv.-Zél.
- Asie orientale, Japon,
Inde, Archipel Ma-
lais, Australie.
- Europe, Asie entre le
20° et le 72° lati-
tude N., Afrique
N. et N.-E.
- Amérique septentrio-
nale et centrale,
Sibérie E. jusqu'en
Chine.
- Europe jusqu'au Spitz-
berg, Sibér. N.-W.,
Groenland, Améri-
que N.-E.
- Amérique N.-W., îles
Aléoutiennes.
- Îles Pribilof et de la
mer de Behring,
Alaska en hiver.
- Europe et Asie jus-
qu'au 70° lat. N.,
Japon, Afrique N.
et N.-E.
- Europe jusqu'à la
Nouvelle - Zemble,
Asie occidentale,
Inde, Ceylan, Afri-
que.
- Asie orientale, Japon,
Indo-Chine, Archi-
pel Malais jusqu'à
l'Australie.
- Asie orientale, îles de
la mer de Behring,
Japon, Indo-Chine,
Bengale, Archipel

- salina*, Gr. (nec Pall.); *ruficollis*, Wald. (nec Pall.); Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 472. Malais jusqu'en Australie.
- 11.265. *MINUTILLA*, Vieill., *N. Dict.* XXXIV, p. 466; Dress., Amérique septentr.,
l. c., p. 51, pl. 552, ff. 2, 3; *pusilla*, Wils. (nec Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 280, pl. 557; *wil-* centr. et mérid. jus-
soni, Nutt.; *temmincki*, D'Orb. (nec Leisl.); *nana*, qu'au Brésil, An-
georgica, Licht. tilles (accidentelle-
ment Europe).
- 11.266. *MACULATA*, Vieill., *N. Dict.* XXXIV, p. 465; Dress., Amérique sept., centr.
l. c., p. 41, pl. 556; *pectoralis*, Say; Gould, *B.* et mérid., de l'A-
Eur. IV, pl. 527; *fuscicollis*, Tsch. (nec Vieill.); laska à la Patagonie
dominicensis, Degl.; *maculosa*, Moore. (accid. Europe).
- 11.267. *ACUMINATA* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.*, 1821, p. 192; Asie orientale, Japon,
Swinh., *P. Z. S.*, 1865, p. 516; Salvad., *Orn.* Archipel Indien,
Pap. III, p. 515; Seeb., *l. c.*, p. 441; *australis*, Australie, Nouvelle-
Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 91 (nec Gm.); Gould, Zélande, Alaska.
B. Austr. VI, pl. 50; *subarquata*, S. Müll. (nec Güld.); *rufescens*, Midd. (nec V.)
- 11.268. *BAIRDI* (Cokes), *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1861, Amérique W. de
p. 194; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 559; Seeb., l'Alaska au Chili.
l. c., p. 444; *schinzi*, Gr. (nec Brm.); *pectoralis*,
Cass. (nec Say); *dorsalis*, Licht.; *bonapartii*, Baird.
- 11.269. *FUSCICOLLIS*, Vieill., *N. Dict.* XXXIV, p. 461; Dress., Amérique N.-E., Antil-
B. Eur. VIII, p. 15, pl. 547; *schinzi*, Bp. (nec les, Amér. centr. et
Brm.); *bonapartii*, Schl.; Seeb., *l. c.*, p. 444; mérid. E. jusqu'aux
americana, Brm.; *melanotos*, Bp. (nec V.) îles Malouines.

1761. LIMICOLA

Limicola, Koch (1816); *Tringa* (pt.), auct. plur.

- 11.270. *PLATYRHYNCHA* (Tem.), *Man. d'Orn.*, p. 598 (1815); Europe sept. et Sibérie,
Dress., *B. Eur.* VIII, p. 5, pl. 545; Dubois, *Fne.* hiverne dans le N.
Ill., *Ois.* II, p. 179, pl. 200; *pygmaeus*, Bechst. de l'Afrique, le S.
(nec Lall.); *pusillus*, Bechst. (nec L.); *eloroides*, de l'Asie et dans
Vieill.; *hartlaubi*, Verr.; *sibirica*, Dress. l'Archipel Indien.

1762. GALLINAGO

Gallinago, Leach (1816); *Felmatias*, Boie (1826); *Pelorhynchus*, Kp. (1829);
Nemorivola, Hodgs. (1857); *Homoptilura*, Gray (1840); *Xylocota*, Bp. (1855);
Cunocorypha, Gray (1855); *Spilura*, Bp. (1856).

- 11.271. *STENURA* (Kuhl), in *Bp.*, *Ann. Stor. Nat. Bolog.* IV, Asie orientale, à l'ouest
1850, p. 555; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 478; jusqu'au Jenisseï et
Seeb., *l. c.*, p. 477; *stenoptera*, Kl.; *horsfieldi*, l'Inde.
Gray; id. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 54,
f. 5; *heterura*, *biclavus*, Hodgs.; *pectinicauda*,
Peale; *indica*, Licht (nec Hodgs.); *sthenura*, Le
Mess.; *heterocerca*, Prjev. (nec Cab.)

- 11.272. MEGALA, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 545; Schl., *Mus. P.-B., Scolop.*, p. 12; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 479; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 557; *solitaria*, Swinh. (1860, nec Hodgs.); *uniclavus*, Gr. (1860, (nec Hodgs.)); *stenura*, Radde, *Reis. Sibir.* II, p. 554, pl. 15 (nec Kl.); *burka* et *australis*, Fsch. (nec Lath.); *heterura*, Cab. (nec Hodgs.); *heterocercu*, Cab., *J. f. O.*, 1870, p. 255. Sibérie E., Japon, Chine, Philippines, Bornéo, Moluques.
- 11.273. MEDIA (Frisch), *Vorst. Vög. Deutschl.*, pl. 228 (1765); Gerini, *Orn. Meth. Dig.* IV, p. 39, pl. 446 (1775); Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 225, pl. 209; *major*, Gm.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 651, pl. 541; *paludosa*, Retz.; *palustris*, Pall.; *leucurus*, Sw.; *nisoria*, etc., Brm.; *montagui*, Bp. Europe jusqu'au 70° latitude N., Sibérie occidentale jusqu'au Jenisseï, Afrique.
- 11.274. NIGRIPENNIS, Bonap., *Icon. Faun. Ital., Ucc.*, p. 4; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 769; *aequatorialis*, Rüpp.; Seeb., *l. c.*, p. 500; *angolensis*, Bocage. Afrique tropicale jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.
5149. Var. MACRODACTYLA, Bp., *Icon. Faun. Ital., Ucc.*, p. 5 (1852); id., *C. R.* XLIII, p. 579; Sharpe, *Cat.*, p. 649; *elegans*, *mauritiana*, Desj.; *bernieri*, Puch., *Rev. Zool.*, 1848, p. 279; *nigripennis* (pt.), Fsch. et Hartl.; *nigripennis*, var. *bernieri*, M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 657, pl. 260. Madagascar, ile Maurice.
- 11.275. GALLINARIA, O. F. Müll., *Zool. Dan. Prodr.*, p. 25 (1776); *Scolopax gallinago*, Lin.; *caelestis*, Frenz. (1801); Dress., *B. Eur.* VII, p. 641, pls 542, 545; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 226, pl. 211; *media*, Leach et auct. plur. (nec Frisch); *sakhalina*, Vieill.; *brehmi*, Kp.; *subinii*, Vig.; *faeroensis*, etc., Brm.; *delamottii*, *pygmaea*, Bail.; *uniclavus*, Hodgs.; *scolopacina*, *burka*, Bp.; *peregrina*, Tem.; *latipennis*, Hartl.; *vulgaris*, C. Dub.; *rusata*, Gould; *wilsoni*, Swinh. (nec Tem.) Europe, Asie jusqu'au 70° latitude Nord, Islande, Afrique N. et N.-E., Sénégal-bie.
- 11.276. DELICATA (Ord.), ed. Wils. *Amer. Orn.* IX, p. 218 (1825); Turn., *Contr. N. H. Alaska*, p. 146; Sharpe, *Cat.*, p. 642; *gallinago*, Wils. (nec L.); *wilsoni*, Tem.; Audub., *B. Amer.* V, p. 559, pl. 550; *drummondi*, *douglasii*, Sw.; *gallinaria*, var. *wilsoni*, Ridgw. Amérique septentrionale jusqu'au cercle arctique, Amérique centrale et Nord de l'Amérique méridionale.
- 11.277. PARAGUAYE (Vieill.), *N. Dict.* III, p. 556 (1816); Schl., *Mus. P.-B., Scolop.*, p. 11; Sharpe, *Cat.*, p. 650 (part.); *frenata*, Ill. (*descr. nulla*); Burm., *Th. Bras.* III, p. 577; Seeb., *l. c.*, p. 494; *longirostris*, Cuv.; *wilsoni*, Léot. (nec Tem.); *S. frenata brasiliensis*, Seeb. Amérique méridionale jusque l'Argentine.

5120. *Var. ANDINA* (Tacz.), *P. Z. S.*, 1874, p. 561; id., *Orn. Pér.* III, p. 575; *frenata* (pt.), auct. plur.
5121. *Var. MAGELLANICA* (King), *Zool. Journ.*, 1855, p. 95; Seeb., *l. c.*, p. 496; Deichl., *J. f. O.*, 1897, p. 152; *paraguayæ*, Sharpe, *l. c.*, p. 650 (nec Vieill.)
5122. *Var. CHILENSIS* (Seeb.), *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 496; Deichl., *J. f. O.*, 1897, p. 152.
- 11.278. *NOBILIS*, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 51; Schl., *l. c.*, p. 9; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 196, pl. 98; *granadensis*, Bp.
- 11.279. *AUSTRALIS* (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 65; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 40; Seeb., *l. c.*, p. 475; *hardwickii*, Gray.
- 11.280. *DUBIA*, Deichl., *J. f. O.*, 1897, p. 151.
- 11.281. *SOLITARIA*, Hodgs., *Glean. in Science*, III, p. 258; id., *Icon. ined. in Br. Mus., Grall.*, pl. 104, *App.*, pl. 48; Sharpe, *Cat.*, p. 654 (pt.); *hyemalis*, Eversm., *Bull. Soc. Mosc.*, 1845, p. 257, pl. 6.
5125. *Var. JAPONICA* (Bp.), *C. R.* XLIII, p. 715 (1856); Swinh., *Ibis*, 1875, p. 564; Seeb., *Ibis*, 1886, p. 129; id., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 476; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 129; *solitaria* (pt.), auct. plur.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 476, pl. 122.
- 11.282. *NEMORICOLA*, Hodgs., *P. Z. S.*, 1856, p. 8; id., *Icon. ined. Br. Mus., Grall.*, pl^s 96^b, 97, 98; Schl., *l. c.*, p. 16; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* III, p. 525, pl. ; *nepalensis*, Bp.
- 11.285. *GIGANTEA* (Tem.), *Pl. Col.* 405; Schl., *l. c.*, p. 8; *lacunosa*, Licht. ; *undulata gigantea*, Seeb., *l. c.*, p. 495.
- 11.284. *UNDULATA* (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 895; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 196; Seeb., *l. c.*, p. 492; *paludosa*, Gm. ; Schl., *l. c.*, p. 8.
- 11.285. *STRICKLANDI*, Gray, *List Grall. Brit. Mus.*, p. 112; id., *Voy. Erebus and Terr., B.*, pl. 25; Schl., *l. c.*, p. 15; *meridionalis*, Peale; *spectabilis*, Hartl. ; *paludosa*, Sel. (1857, nec Gm.); *nobilis*, Oust. (1891, nec Sel.)
- 11.286. *JAMESONI* (Bp.), *C. R.* XLI, p. 660; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 196; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 576; Seeb., *l. c.*, p. 489.
- 11.287. *AUCKLANDICA* (Gray), *List Grall. Br. Mus.*, p. 112; id., *Voy. Erebus and Terr.*, p. 15, pl. 15; Seeb., *l. c.*, p. 472; *holmesii*, Peale; *tristrami*, Rothsch.

Pérou.

Magellan, Malouines.

Chili, Patagonie.

Colombie, Ecuador.

Japon, Formose, Australie, Tasmanie.

Japon.

Himalaya, du Turkestan à l'Altai au S. jusqu'à l'Assam.

Japon, Sibérie S.-E., Chine.

Himalaya, Inde, Assam, Birmanie.

Brésil, Paraguay.

Guyane.

Du Chili à Magellan.

Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

Iles Auckland et Antipodes.

5124. *Var.* HUEGELI, Tristr., *Bull. Br. Orn. Club*, I, Ile Snares.
1895, p. 47; id., *Ibis*, 1895, p. 447.
5125. *Var.* PUSILLA, Bull., *Ibis*, 1869, p. 41; id., *B. New* Ile Chatham.
Zeal., ed. 2, II, p. 55, pl. 28, f. 1; Forb.,
Ibis, 1895, p. 529, pl. 14; *aucklandica* (pt.),
auct. plur. (nec Gr.)
- 11.288. IMPERIALIS, Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 419; Colombie.
id., *Exot. Orn.*, p. 195, pl. 97; Seeb., *l. c.*, p. 491.

1765. LIMNOCRYPTES

Limnocryptes, Kaup (1829); *Philolimnos*, Brm. (1851); *Ascalopax*, Keys. et Blas. (1840).

- 11.289. GALLINULA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 655, Europe et Asie jus-
pl. 544; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 251, pl. 210; qu'au 70° latit. N.,
stagnatilis et *minor*, Bechst.; *minima*, Leach. Afrique N.

1764. SCOLOPAX

Scolopax, Lin. (1766); *Rusticola*, Vieill. (1816); *Neoscolopax*, Salvad. (1882).

- 11.290. RUSTICOLA, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 615, pl. 540; Europe et Asie jus-
Dubois, *l. c.*, p. 254, pl. 212; *rusticula*, Bodd.; qu'au 60° latit. N.
vulgaris, Vieill.; *major*, Leach (nec Gm.); *pine-* à l'E. et jusqu'au
torum, *sylvestris*, *orientalis*, etc., Brm.; *europæa*, cercle polaire à
Less.; *indicus*, Hodgs.; *communis*, Selby; *sco-* l'Ouest, Afrique N.
paria, Bp.
- 11.291. SATURATA, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 191; id., Java, Nouvelle-Guinée.
Zool. Research., Java, pl. 65; Seeb., *l. c.*, p. 506,
pl. 21; *javanica*, Less.; *russata*, Blyth; *rosen-*
bergi, Schl.; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 355.
- 11.292. ROCHUSSENI, Schl., *Nederl. Tijdschr. Dierk.* III, Ile Obi (Moluques).
p. 254; Seeb., *l. c.*, p. 505, pl. 20; Salvad., *Orn.*
Pap. III, p. 356.

1765. PHILOHELA

Microptera, Nutt. (1854, nec *Micropterus*, Less. 1851); *Philohela*, Gray (1841).

- 11.295. MINOR (Gm.), *S. N. I.*, p. 661; Wils., *Am. Orn.* VI, Amérique septentrio-
p. 40, pl. 48, f. 2; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 112, nale jusqu'au 50°
pl. 242; *americana*, Audub., *B. Am.* VI, p. 15, latitude Nord.
pl. 552.

1766. PHIEGORNIS

Leptopus, Fras. (1844, nec Rafin., 1815); *Leptodactylus*, Fras. (1844, nec Fitz., 1826); *Leptoscelis*, Des M. (1846, nec Hall., 1855); *Phegornis*, Gray (1847); *Prosobonia*, Bp. (1850); *Echmorhynchus*, Coues (1874).

- 11.294. MITCHELLI (Fras.), *P. Z. S.*, 1844, p. 157; id., *Zool.* Chili, Bolivie, Pérou.
Typ., pl. 65; Des Murs, *Icon. Orn.*, pl. 41;
 Seeb., *Geogr. Distr. Char.*, p. 450, pl. 16.
- 11.295. CANCELLATUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 675; Seeb., *l. c.*, Iles Paumotu et
 p. 451, pl. 17; *parvirostris*, Peale, *U. S. Expl.* Christmas.
Exp., *B.*, p. 255, pl. 66, f. 2; *rufescens*, var. β ., Bp.
- 11.296. LEUCOPTERA (Gm.), *S. N. I.*, p. 678; Schl., *Handl.* Ile Tahiti.
Dierk. I., p. 455, pl. 7, f. 89; Seeb., *l. c.*, p. 452,
 pl. 18; *pyrrhetrea*, Licht.

1767. RHYNCHÆA (1)

Rostratula, Vieill. (1816); *Rhynchæa*, Cuv. (1817).

- 11.297. CAPENSIS (Lin.), *Pl. Enl.* 881, 922; Cuv., *Rég.* Afrique, Madagascar,
An. I., p. 488 (1817); Shell., *B. Egypt.*, p. 250, Asie méridionale
 pl. 11; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 480; *ben-* jusqu'en Chine et
galensis, L.; *chinensis*, *madagascariensis*, Bodd.; Japon, îles de la
indica, *maderaspatana*, Gm.; *sinensis*, Lath.; Sonde.
viridis, *alba*, Vieill.; *orientalis*, Horsf.; *afri-*
cana, Less.; *picta*, Gr.; *variegata*, Vieill., *Gal.*
Ois. II., p. 109, pl. 240; *variabilis*, Tem.; *caf-*
fra, Licht.
- 11.298. AUSTRALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 155; id., *B.* Australie.
Austr. VI., pl. 44; Stejn., *Stand. N. II. IV, Birds*,
 p. 110.
- 11.299. SEMICOLLARIS (Vieill.), *N. Dict. VI.*, p. 402; Schl., Amérique méridionale
Mus. P.-B., Scolop., p. 18; Seeb., *l. c.*, p. 459, au S. jusqu'à l'Ar-
 pl. 19; *atricapilla*, Vieill.; *hilaræa*, Valene.; gentine.
 Less., *Ill. Zool.*, pl. 18; *occidentalis*, King;
hilaræa et *hilaræi*, Burm.; *curvirostris*, Licht.

SUBF. VI. — PHALAROPINÆ

1768. CRYMOPHILUS

Phalaropus (pt.), auct. plur.; *Crymophilus*, Vieill. (1816).

- 11.500. FULICARIUS (Lin.); Dress., *B. Eur. VII.*, p. 606, Zone arctique jusqu'au
 pl. 558, 559, f. 1; Dubois, *Fne. Ill., Ois. II.*, 82 $\frac{1}{2}$ ° latitude N.,

(1) Le terme générique de *Rostratula* a priorité sur celui de *Rhynchæa*, mais ce dernier a été adopté par tous les auteurs, même par Vieillot après 1816. Il me semble donc qu'il n'y a pas lieu de ressusciter une dénomination abandonnée par son propre auteur, comme l'ont fait MM. Stejneger et Sharpe.

p. 261, pl^s 218 et 219, f. 1; *lobatus*, auct. plur. (nec L.); *glacialis*, Gm.; *hyperboreus*, Lath. (nec L.); *rufus*, Bechst.; *platyrhynchus*, Tem.; *griseus*, Leach; *rufescens*, Keys. et Blas.; *platyrostris*, Nordm.

en hiver dépasse rarement vers le Sud le 50° lat. N.

1769. PHALAROPUS

Phalaropus, Briss. (1760); *Lobipes*, Cuv. (1817); *Steganopus*, Vieill. (1819); *Holopodius*, Bp. (1828).

- 11.501. **HYPERBOREUS** (Lin.); Dress., l. c. VII, p. 597, pl^s 557, 559, f. 2; *lobata*, L.; *cinereus*, Briss.; Dubois, l. c., p. 266, pl^s 218 et 219, f. 2; *fusca*, Gm.; *vulgaris*, Bechst.; *williamsii*, Sim.; *ruficollis*, *cinerascens*, Pall.; *angustirostris*, Naum.; *lobipes*, Keys. et Bl.; *australis*, *moluccensis*, Tem.; *asiaticus*, *tropicus*, Hume. Zone arctique jusqu'au 75° l. N., en hiver au S. jusqu'au 45° en Europe, à l'E. jusqu'à la Nouv.-Guinée et en Amérique jusqu'au Guatemala.
- 11.502. **TRICOLOR** (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 156; Stejn., *Auk*, 1885, p. 185; *lobatus*, Wils. (nec L.); *wilsoni*, Sabine; Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 405, pl. 69; Gray, *Gen. B.* III, pl. 158; *fimbriatus*, Tem., *Pl. Col.* 570; *frenatus*, Vieill.; *incanus*, Jard. et S.; *stenodactylus*, Wagl. Amérique : au N. jusqu'au lac Winnipeg, descend vers le S. en hiver jusqu'en Patagonie.

SUBORD. III. — FULICARIÆ

FAM. XIV. — PARRIDÆ (1)

1770. HYDROPHASIANUS

Hydrophasianus, Wagl. (1852); *Hydrophasis*, Sharpe (1896).

- 11.503. **CHIRURGUS** (Scop.), *Del. Flor. et Faun. Insubr.* II, p. 92; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 485; *luzoniensis*, *sinensis*, Gm.; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 68; *indica*, Hodgs., *Icon. ined.*, Grall., pl. 109, f. 1 (nec Lath.). Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, îles de la Sonde, Philippines, Formose.

1771. METOPIDIUS

Metopidius, Wagl. (1852).

- 11.504. **INDICUS** (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 765; Schl., *Mus. P.-B.*, Ralli, p. 67; Jerd., *B. Ind.* III, p. 708; *cuprea*, Valent.; *cristata*, Vieill.; *ænea*, Cuv.; *superciliosa*, Horsf.; id., *Zool. Res. Java*, pl. 64; *phanicura*, Hodgs.; *arata*, Tick.; *melanochloris*, *melanoviridis*, Vieill. Inde, Indo-Chine, grandes îles de la Sonde.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXIV, pp. 68-89 (1896).

1772. ACTOPHILUS

Phyllopezus, Sharpe (1896, nec Peters, 1877); *Actophilus*, Oberh. (1899).

- 11.505. AFRICANUS (Gm.), *S. N.* 1, p. 709; Sw., *Zool. Ill.*, ser. 2, pl. 6; Schl., *l. c.*, p. 69; M.-Edw. et Grand., *II. N. Madag.*, *Ois.*, p. 581. Afrique.
- 11.506. ALBINUCHA (L. Geoff.), *Mag. de Zool.*, 1852, *Aves*, pl. 6; Schl., *l. c.*, p. 70; M.-Edw. et Grand., *II. N. Madag.*, *Ois.*, p. 579, pls 257-259; *atri-collis*, Sw. Madagascar.

1773. HYDRALECTOR

Hydralector, Wagl. (1852).

- 11.507. GALLINACEUS (Tem.), *Pl. Col.* 464; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 75; *cristatus*, Rehb. (nec V.); Schl., *l. c.*, p. 68; *novæ-hollandiæ*, Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 509. Australie, Célèbes, Bornéo S.
5126. Var. NOVÆ-GUINÆE (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S.* W., 1878, p. 298; Sharpe, *Cat.*, p. 81; *gallinacea* et *cristata* (pt.), auct. plur. Nouvelle-Guinée.

1774. PARRA

Parra, Lin. (1766); *Jacana*, Schäll. (1774); *Asarcia*, Sharpe (1896).

11508. JACANA, Lin.; *Pl. Enl.* 522; Schl., *l. c.*, p. 66; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 551; *jassana*, Cab.; *intermedia*, Schl.; *spinosa*, Ridgw. (nec L.) Amérique méridionale.
11509. MELANOPYGIA, Schl., *P. Z. S.*, 1856, p. 285; Sharpe, *l. c.*, p. 84. Colombie, Panama.
- 11.510. NIGRA, Gm., *S. N.* 1, p. 708; Schl., *l. c.*, p. 65; *hypomelæna*, Gray, *Gen. B.* III, pl. 159; Schl., *P. Z. S.*, 1856, p. 285. Panama, Colombie, Vénézuéla.
- ✓ 11.511. GYMNOTOMA, Wagl., *Isis*, 1851, p. 517; Schl., *l. c.*, p. 66; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 185; ? *variabilis*, Lin.; Sharpe, *l. c.*, p. 86; ? *spinosa*, L.; Ell., *Auk*, 1888, p. 297; Cones, *Auk*, 1897, p. 88; *cordifera*, Less.; Des Murs, *Icon. Orn.*, pl. 42; *punicea*, Licht.; *violacea*, Cory. Du Texas au Costa-Rica et grandes Antilles.

1775. MICROPARRA

Microparra, Cab. (1877); *Aphalus*, Elliot (1888).

- 11.512. CAPENSIS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, B., pl. 52; Cab., *J. f. O.*, 1877, p. 550; Elliot, *Auk*, 1888, p. 501; Sharpe, *Cat.*, p. 89. Afrique S. et E.

FAM. XV. — MESŒNATIDÆ (1)

1776. MESOENAS

Mesites, Geoff. S^t-Hil. (1858, nec Schönh.); *Mesitornis*, Bp. (*ubi?* teste Gray);
Mesœnas, Rehb. (1850).

- 11.515. VARIEGATA (Geoff. S^t-Hil.), *C. R.* VI (1858), p. 443; Madagascar.
id., *Rev. Zool.*, 1858, p. 50; id., *Mag. de Zool.*,
1859, p. 10, pl^s 5 et 6; Des M., *le. Orn.*, pl. 11;
M.-Edw. et Grand., *H. Madag., Ois.*, p. 601,
pl^s 246-251; *unicolor*, Des M., *l. c.*, pl. 12.

FAM. XVI. — RALLIDÆ (1)

SUBF. I. — RALLINÆ

1777. RALLUS

Rallus, Lin. (1766); *Biensis*, Pucher. (1845); *Limnopardalus*, Cab. (1856); *Par-*
dirallus, Bp. (1856); *Ortygonax*, Heine et Rehw. (1890).

- ✓ 11514. ELEGANS, Audub., *B. Am.*, pl. 215; id., *B. Am.* 8^o, Amérique septentr.,
V, p. 160, pl. 309; Baird, *B. N. Am.*, p. 746; du Canada au Texas
crepitans, Wils. (nec Gm.) et Floride, Cuba.
5127. Var. BELDINGI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, Basse-Californie.
p. 545; Bd., Brew. et Ridgw., *Water-B. N.*
Am. I, p. 556.
5128. Var. TENUIROSTRIS, Ridgw., *Amer. Nat.* VII, 1874, Mexique.
p. 14; id., *Man. N. Am. B.*, p. 158.
11.515. LEVIPES, Bangs, *P. New Engl. Zool. Club*, I, p. 45. Californie.
11.516. LONGIROSTRIS, Bodd., *Tabl.*, p. 52; *Pl. Ent.* 849; DesGuyanes au Pérou.
Schl., *l. c.*, p. 11; *crepitans*, Cab. (nec Gm.);
cypereti, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 747; id., *Orn.*
Pér. III, p. 315.
5129. Var. CRASSIROSTRIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1869, Brésil.
p. 19; *longirostris* (pt.), auct. plur.
5150. Var. CREPITANS, Gm., *S. N.* I, p. 715; Audub., Amérique N.-E.
B. Am. V, p. 165, pl. 510; Ridgw., *Bull.*
Nutt. Orn. Club V, 1880, p. 140; *longirostris*
(pt.), auct. plur. (nec Bodd.)
5151. Var. WAYNEI, Brewst., *Bull. New Engl. Zool.* Géorgie.
Club, I, p. 49.
✓ 5152. Var. CARIBEA, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, V, Antilles.
1880, p. 140; Bd., Brew. et Ridgw., *Water-B.*
N. Am. I, p. 559; *longirostris*, auct. plur.

(1) Voy.: Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXIII (1894).

- (nec Bodd.); *crepitans*, auct. plur. (nec Gm.);
elegans, March (nec Audub.)
- ✓ 5153. *Var. CUBANA*, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1892, p. 288. Cuba.
5154. *Var. CORYI*, Mayn.; Cory, *B. W. Ind.*, p. 254; North., *Auk*, 1891, p. 77; Cory, *Auk*, 1891, p. 291; *caribæus* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 15. Iles Bahama.
5155. *Var. SCOTTI*, Sen., *Auk*, 1888, p. 505. Floride.
5156. *Var. SATURATA*, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1880, p. 140; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.*, p. 559; Sharpe, *l. c.*, p. 15, pl. 1; *crepitans*, Tayl. (nec Gm.); *scottii*, auct. plur. (nec Sen.) Louisiane (côtes).
5157. *Var. OBSOLETA*, Ridgw., *Amer. Nat.* VIII, 1871, p. 211; id., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1880, p. 159; *elegans*, Newb. (nec Audub.) Amérique N.-W. de l'État de Washington à la Californie.
- 11.517. *VIRGINIANUS*, Lin.; Aud., *B. Am.* V, p. 174, pl. 511; Schl., *l. c.*, p. 10; Sharpe, *Cat.*, p. 17, pl. 2, f. 2; *limicola*, Vieill. Amérique du Nord et centrale jusqu'au Guatemala.
5158. *Var. ÆQUATORIALIS*, Sharpe, *Cat. B.* XXIII, p. 18, pl. 2, f. 1; *virginianus* (pt.), auct. plur. (nec L.) Colombie, Ecuador, Pérou.
- 11.518. *SEMIPLUMBEUS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1856, p. 51; Schl., *l. c.*, p. 11; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 514; Sharpe, *l. c.*, p. 19, pl. 5. Colombie.
- 11.519. *ANTARCTICUS*, King, *Zool. Journ.*, 1828, p. 95; Scl., *P. Z. S.*, 1867, p. 555, 1868, p. 445; Sclat. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 148; *rufopennis*, Gray; *uliginosus*, Phil. Chili, Argentine, Patagonie.
- 11.520. *PERUVIANUS*, Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 515. Pérou.
- 11.521. *AQUATICUS*, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 257, pl. 495; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 279, pl. 222; *obscura*, Gm.; *sericeus*, Leach; *germanicus*, *minor*, *fusci-lateralis*, Brm. Europe W. jusqu'au 66° l. N., Islande, Eur. E. et Asie W. jusqu'au 55°, Afr. N.
5159. *Var. INDICA*, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1849, p. 820; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 489; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* III, p. 257, pl. 44; *aquaticus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *var. japonicus*, Bp. Sibérie E., Japon, Chine, Indo-Chine, Inde E., Ceylan.
- 11.522. *CÆRULESCENS*, Gm., *S. N.* I, p. 716; Schl., *l. c.*, p. 9; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 777; *casser*, Forst., *Icon. ined.*, f. 129; *aquaticus*, Gurn. (1859, nec L.) Afrique S., jusque l'Angola à l'Ouest et le Tanganika à l'Est.
- 11.525. *MADAGASCARIENSIS*, Verr., *S. Afr. Q. Journ.* II, p. 80; Schl., *l. c.*, p. 10; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, Ois., p. 568, pl. 250^b, f. 1, 251; *poliocephalus*, Gray; *typus*, Puch.; *bernieri*, Gray. Madagascar.

- 11.524. *MACULATUS*, Bodd., *Tabl.*, p. 48; *Pl. Enl.* 775; Argentine, Paraguay, Schl., *l. c.*, p. 15; Schl. et Huds., *Argent. Orn.* II, Brésil, Guyane, Vénézuéla, Colombie. p. 148, pl. 19; *variegatus*, Gm.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 582; *nivosus*, Sw.; Gundl., *Orn. Cuba*, p. 561.
- 11.525. *RYTIRHYNCHUS*, Vieill., *N. Dict.* XXIII, p. 549; Schl. Brésil S., Argentine, et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 149; *setosus*, King.; Mendoza, Pérou central; *casius*, Tsch. (nec Spix); *zelebori*, Pelz.
5140. *Var. SANGUINOLENTA*, Sw., *An. in Menag.*, p. 555; Du Chili central au Sharpe, *l. c.*, p. 50; *casius*, Cass. (nec Spix); Pérou. Schl., *l. c.*, p. 8; *bicolor*, Gray; *ricordi*, Bp.; *rytirhynchus*, Schl. et Salv. (nec V.); Oust., *Miss.Sc. Cap Horn, Zool.* VI, Ois., p. 151, pl. 2.
5141. *Var. VIGILANTIS*, Sharpe, *l. c.*, p. 51, pl. 4; Magellan. *rytirhynchus* (pt.), auct. plur. (nec V.); *antareticus*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 14.
- 11.526. *NIGRICANS*, Vieill., *N. Dict. d'Il. N.* XXVIII, p. 560; Brésil jusqu'au Pérou et la Colombie. Schl., *l. c.*, p. 8; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 517; *immaculatus*, Licht.; *casius*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 75, pl. 95.

1778. HYPOTÆNIDIA

Hypotænidia, Rehb. (1852); *Lewinia*, Bp. (1856); *Donacius*, Heine et Rehw. (1890).

- 11.527. *STRIATA* (Lin.); Jerd., *B. Ind.* III, p. 726; Schl., Inde S., Ceylan, Indo-*l. c.*, p. 24; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 488; Chine, Malacca, Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 692; Hume et Marsh., Formose, Archipel *Game B. Ind.* II, p. 245, pl. 45, f. 2; *gularis*, Indo-Malais, Célèbes. Horsf.; *albiventer*, Sw.; *indicus*, Rehb. (nec Blyth); *celebensis*, Pelz. (nec Q. et G.); *jouyi*, Stejn.
5142. *Var. OBSCURIOR*, Hume, *Str. F.* II, 1874, p. 502, Iles Andaman. 1879, p. 115; id. et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 255, pl. 45, f. 4; *striata* (pt.), auct. plur. (nec L.); *ferrea*, Wald; *abnormis*, Hume.
- 11.528. *OWSTONI*, Rothsch., *Nov. Zool.* II, p. 481; *marchei*, Iles Mariannes. Oust., *Arch. Mus. Paris*, VIII, 1896, p. 52.
- 11.529. *PACIFICA* (Gm.), *S. N.* I, p. 717; Forst., *Icon. Tahiti (éteint).* *ined.*, pl. 128.
- 11.550. *BRACHYPUS* (Sw.), *An. in Menag.*, p. 556; Gould, Australie, Tasmanie, *Handb. B. Austr.* II, p. 556; *pectoralis*, Less. (nec îles Auckland. Gould); *lewini*, Sw.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 77.
5145. *Var. EXSUL*, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 50. Flores.
- 11.551. *MUELLERI* (Rothsch.), *Bull. Brit. Orn. Club*, VIII, Iles Auckland, Nouvelle-Zélande S. p. 40 (1895); Sharpe, *l. c.*, p. 550.
- 11.552. *PHILIPPENSIS* (Lin.); *Pl. Enl.* 774; Bull., *B. N.* Archipel Malais, Australie, Nouvelle-*Zeal.*, p. 176, pl. 20, f. 2; id., *l. c.*, éd. 2, II,

- p. 95, pl. 55, f. 2; *assimilis*, Gray; *pacificus*, var. Forst.; *pectoralis*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 76 (nec Cuv.); *forsteri*, Hartl.; *etorques*, Bp.; *R. hypotaenidia*, Verr. et Des M.; *rufopes*, Ellm.; *hypoleucus*, Hartl. et Fsch.; *pictus*, Potts; *australis*, Pelz.
5144. Var. MACQUARIENSIS (Hutton), *Ibis*, 1879, p. 454; Ile Macquarie.
Schl., *P. Z. S.*, 1881, p. 968.
- 11.353. TORQUATA (Lin.); Mey., *N. Acta Acad.*, C. L.-C. Philippines.
Cur. XXVI, *Suppl.* I, p. 108, pl. 19; Schl., *l. c.*,
p. 22; *lineatus*, Less.
- 11.354. CELEBENSIS (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Astrol. Zool.* I, Célèbes.
p. 250, pl. 24, f. 2; Schl., *l. c.*, p. 22; Mey. et
Wg., *B. Cel.*, p. 697.
- 11.355. SATURATA, Salvad., *M. S.*; Schl., *Ibis*, 1880, p. 510, Nouvelle-Guinée N.-
note; Salvad., *Ann. Mus. Gen.*, 1882, p. 519; W., Salawati.
id., *Orn. Pap.* III, p. 260.
- 11.356. SULCIROSTRIS (Wall.), *P. Z. S.*, 1862, p. 546; Schl., Iles Soula.
Ibis, 1880, p. 511, pl. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 46.
5145. Var. JENTINKI, Sharpe, *Notes Leyd. Mus.*, 1895, Ile Soula-Mangola.
XV, p. 268; id., *Cat.*, p. 550; *sulcirostris*
(pt.), Hartl., *Nov. Zool.* V, p. 156; Mey. et
Wg., *B. Cel.*, p. 698.
- 11.357. INSIGNIS, Schl., *P. Z. S.*, 1880, pp. 66 et 512, pl. 8; Nouvelle-Bretagne.
Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 261.

1779. CABALUS

Cabalus, Hutton (1875); *Nesolimnas*, Andr. (1896).

- 11.538. DIEFFENBACHI (Gray), in *Dieffenb. Trav. N. Zeal.* II, Ile Chatham (*etcint*).
App., p. 197; Gray, *Voy. Erebus and Terror*, B.,
p. 14, pl. 15; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 179, pl. 20, f. 2.
- 11.539. MODESTUS, Hutton, *Ibis*, 1872, p. 247, 1875, p. 549; Ile Mangare (Cha-
id., *Tr. N. Zeal. Inst.* VI, 1874, p. 108; *dieffen-* tham).
bachi (juv.), Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII,
p. 47, pl. 6; *pygmaeus*, Forb.
- 11.540. SYLVESTRIS (Schl.), *P. Z. S.*, 1869, p. 472, pl. 55; Ile Lord Howe.
Sharpe, *l. c.*, p. 48.

1780. EULABEORNIS

Eulabeornis, Gould (1844); *Tricholimnas*, Sharpe (1895).

- 11.541. CASTANEIVENTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 56; id., Australie N., îles
B. Austr. VI, pl. 78; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 267. Arou.
- 11.542. PORCILOPTERUS (Hartl.), *Ibis*, 1866, p. 174; Fsch. et Iles Fidji.
Hartl., *Faun. Centralpolyn.*, p. 156, pl. 12, f. 1;
Sharpe, *l. c.*, p. 50.

- 11.545. WOODFORDI (Og.-Grant), *Ann. Mag. N. H.*, 1889, Iles Salomon.
p. 520; Sharpe, *l. c.*, p. 50, pl. 7.
11.544. LAFRESNAYANUS (Verr. et Des M.), *Rev. et Mag. de* Nouvelle-Calédonie.
Zool., 1860, p. 457; Gray, *Cruise of Curaçoa*,
pl. 21; Sharpe, *l. c.*, p. 51.

1781. GYMNOCREX

Gymnocrex, Salvad. (1875); *Schizoptila*, Brüggem. (1876).

- 11.545. ROSENBERGI (Schl.), *Ned. Tydschr. Dierk.* III, p. 212; Célèbes.
Brügg., *Abh. Nat. Ver. Bremen*, V, p. 94; Mey.
et Wg., *B. Cel.*, p. 689, pl. 42, f. 1.
11.546. PLUMBEIVENTRIS (Gray), *P. Z. S.*, 1861, pp. 452, Halmahera, Morotai,
458; Schl., *Mus. P.-B., Ralli*, p. 17; Salvad., Nouvelle - Guinée,
Orn. Pap. III, p. 268; *hoeveni*, Rosenb.; *intactus*,
Schl., *P. Z. S.*, 1869, p. 420, pl. 10. Mysol, îles Arou et
Salomon.

1782. ARAMIDOPSIS

Aramidopsis, Sharpe (1895).

- 11.547. PLATENI (W. Blas.), in *Russ., Isis*, 1886, p. 403; Célèbes.
Sharpe, *Cat.*, p. 551; Mey. et Wg., *B. Cel.*,
p. 690, pl. 42, f. 2.

1783. ARAMIDES

Aramides, Pucher. (1845); *Ortygarchus*, Cab. (1848).

- 11.548. MANGLE (Spix), *Av. Bras.* II, p. 74, pl. 97; Barm., Brésil.
Th. Bras. III, p. 585; Sharpe, *l. c.*, p. 54; *rufi-*
collis, Bp. (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 15.
11.549. WOLFI, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 576; Ecuador.
Sharpe, *l. c.*, p. 55.
11.550. AXILLARIS, Lawr., *Pr. Philad. Acad.*, 1865, p. 107; Colombie, Vénézuéla,
Sharpe, *l. c.*, p. 56; *mangle*, Cab. (nec Spix); Guyane, Honduras,
?ruficollis, Licht. (nec Gm.) Mexique S.
11.551. GUTTURALIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 57, Pérou.
pl. 5; *?ruficollis*, Gm. et auct. plur.; *ruficeps*
(pt.), Gray (nec Spix).
11.552. CAYANEA (P. L. S. Müll.), *S. N., Suppl.*, p. 119; Colombie, Guyane an-
Pl. Ent. 552; *major*, Bodd.; *cayennensis*, Gm. et glaise, Brésil N.
auct. plur.; *ruficeps* (pt.), Gr.; *maximus*, Schl.,
l. c., p. 14.
5146. Var. CHIRICOTE (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 551; Brésil, Amazone, Pé-
Sharpe, *l. c.*, p. 58; *maximus*, V.; *ruficollis*,
var., Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 175; *ruficeps*,
Spix, *Av. Bras.* II, p. 74, pl. 96; *cayennensis*
(pt.), auct. plur. (nec Gm.)

5147. *Var. ALBIVENTRIS*, Lawr., *Proc. Philad. Acad.*, 1867, p. 254; Sharpe, *l. c.*, p. 59; *cayennensis* (pl.), auct. plur. Mexique, Guatémala, Honduras anglais.
5148. *Var. PLUMBEICOLLIS*, Zeledon, *Ann. Mus. Nac. Costa-Rica* I, p. 151, II, p. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 552. Honduras, Costa-Rica, Nicaragua.
- 11.555. VPACANA (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 568; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 150; *melampyga*, Licht.; *gigas*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 75, pl. 99; Burm., *Th. Bras.* III, p. 585; Schl., *l. c.*, p. 14. Brésil S., Argentine.
- 11.554. SARACURA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 75, pl. 98; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 449; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 519; *nigricans*, Bp. (nec V.); *melanurus*, Bp.; *plumbea*, Max. Brésil, Pérou.
- 11.555. CALLOPTERA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 459, pl. 28. Ecuador.

1784. MEGACREX

Megacrex, D'Alb. et Salvad. (1879).

- 11.556. INEPTA, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1879, p. 150; Gould, *B. New-Guin.* V, pl. 69; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 272. Nouvelle-Guinée S.-E.

1785. HABROPTILA

Habroptila, Gray (1860).

- 11.557. WALLACEI, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 565, pl. 172; Schl., *l. c.*, p. 78; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 271. Halmahera (Molues).

1786. OCYDROMUS

Ocydromus, Wagl. (1850); *Gallirallus*, Lafr. (1841).

- 11.558. AUSTRALIS (Sparrm.), *Mus. Carls.* I, pl. 14; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, p. 15, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 75; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 116, pl. 55, f. 1; *troglodytes*, Forst. (*deser. nulla*); *brachypterus*, Schl., *l. c.*, p. 75 (nec Lafr.); *hectori*, Hutt.; *earli*, Fsch. (nec Gr.) Nouvelle-Zélande (île S.)
- 11.559. EARLI, Gray, *Ibis*, 1862, p. 528; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 165, pl. 19, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 66; *greyi*, Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 105, pl. 54, f. 1. Nouvelle-Zélande (îles N. et S.)
- 11.560. BRACHYPTERUS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1841, p. 245; id., *Mag. de Zool.*, 1842, pl. 24; *fuscus*, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 2; *nigricans*, Bull.; *finschi*, Hutt. Nouvelle-Zélande (île S.)

1787. HIMANTORNIS

Himantornis, Hartl. (1855); *Psammocrex*, Oust. (1884).

- 11.561. *HEMATOPUS*, Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 557; id., *Orn. W. Afr.*, p. 242; Schl., *l. c.*, p. 28; *himantopus*, Schl., *Handl. Dierk.* II, p. 448, pl. 7; *Psammocrex petiti*, Oust., *Le Nat.* II, 1884, p. 509. Afrique W., de Libéria au Bas-Congo.

1788. ROUGETIUS

Rougetius, Bp. (1856); *Calamodromus*, Rehw. (1890); *Dryolimnas*, Sharpe (1895)

- 11.562. *ABYSSINICUS* (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, p. 127, pl. 46; Abyssinie, Choa. Schl., *l. c.*, p. 46; *rougeti*, Guér., *Rev. Zool.*, 1845, p. 522; Des M., in *Lef., Voy. Abyss.*, p. 167, pl. 15.
11.565. *CUVIERI* (Puch.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 279; Sharpe, Madagascar, ile Maurice. *l. c.*, p. 70; *gularis*, Less. (nec Horsf.); Guér.-Mén., *Icon. Règ. An. Ois.*, pl. 58, f. 1; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 569, pl. 252; *bernieri*, Bp.; *kioloides*, Roch et Newt. (nec Puch.)
5149. *Var. ALDABRANA* (Günt.), *Ann. Mag. N. H.*, 1879, Ile Aldabra. p. 164; Sharpe, *l. c.*, p. 71.

1789. CANIRALLUS

Canirallus, Bp. (1856, *descr. nulla*); Hartl. (1877).

- 11.564. *OCULEUS* (Hartl.), *J. f. O.*, 1855, p. 557; id., *Orn. W. Afr.*, p. 241; Bp., *C. R.* XLIII, p. 600; Hartl., *Faun. Madag.*, p. 80; Schl., *l. c.*, p. 20. Afrique W., de Libéria à la Côte d'Or.
5150. *Var. BATESI*, Sharpe, *Bull. Br. O. Club*, LXX, Congo français et Caméron. 1900, p. 56.
11.565. *KIOLOIDES* (Pucher.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 279; Bp., Madagascar. *l. c.*, p. 600; Schl. et Pol., *Faun. Madag. Ois.*, p. 155, pl. 56; *griseifrons*, Gray, *Gen. B.* III, pl. 161; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 571, pl. 255.

1790. RALLINA

Rallina, Rehb. (1846); *Euryzona*, Bp. (1856); *Limnobœnus*, Sund. (1872); *Castanolimnas*, Sharpe (1895).

- 11.566. *FASCIATA* (Rall.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 528; Schl., Indo-Chine, Malacca, *l. c.*, p. 19; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, Archipel Indo-Malais, Halmahera, îles p. 255, pl.; Oates, *Handb. B. Br. Burm.* II, p. 541; *euryzona*, Tem.; *ruficeps*, Cuv. Pelew.

- 11.567. *SUPERCILIARIS* (Eyt.), *Ann. Mag. N. H.*, 1845, p. 250; Hodge, *Icon. ined. in Br. Mus., Grallae*, pl. 116; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 275; *nigrolineata*, Gray (*descr. nulla*); *ceylonica*, Blyth (nec Gm.); *amauroptera*, Jerd.; *euryzonoides*, Bp. et auct. plur. (nec Lafr.); *telmatophila*, Hume.
- 11.568. *EURYZONOIDES* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 568; Tweed, *P. Z. S.*, 1877, p. 767; Sharpe, *Cat.*, p. 78, pl. 8, f. 1.
5151. *Var. MINAHASA* (Wall.), *P. Z. S.*, 1862, pp. 555, 546; Sharpe, *l. c.*, p. 78, pl. 8, f. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 699; *tricolor* (pt.), Schl.
- 11.569. *SEPIARIA* (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 595. Liu Kiu (Japon).
- 11.570. *FORMOSANA*, Seeb., *Ibis*, 1895, pp. 146, 211. Formose.
- 11.571. *TRICOLOR*, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 188; Schl., *l. c.*, p. 18; Gould, *B. Austr., Suppl.*, pl. 78; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 265. Arou, Waigiou, Mysol, Nouv.-Guinée, Duc York, Austr. N.-E.
5152. *Var. VICTA*, Hartl., *Nov. Zool.* VIII, p. 175. Ile Ténimber.
- 11.572. *CANNINGI* (Blyth), *Ibis*, 1865, p. 419; Sharpe, *l. c.*, p. 80. Iles Andaman.
- 11.573. *FUSCA* (Lin.); *Pl. Ent.* 775; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 217, pl.; Schl., *l. c.*, p. 20; *rufiginosus*, Tem., *Pl. Col.* 557; *flammeiceps*, Hodge.
5153. *Var. ERYTHROTHORAX* (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, *Acas*, p. 121, pl. 78; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 486; Seeb., *Ibis*, 1892, p. 490; *fusca* (pl.), auct. plur. (nec L.)
5154. *Var. PLEOPYGA* (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 594; Sharpe, *l. c.*, p. 148. Ile Liu Kiu.
- 11.574. *PAYKULLI* (Ljungh.), *Sver. Vet.-Akad. Handl.*, 1815, p. 258; Hume, *Str. F.*, 1879, p. 406; *erythrothorax*, Radde (nec T. et S.); *rufigenis*, Wall.; *mandarina*, Swinh., *Ann. Mag. N. H.*, 1870, p. 175; id., *P. Z. S.*, 1871, p. 415; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 488, pl. 125. Sibérie E., Chine, Indo-Chine, Malacca, Java, Bornéo, Philippines.
- 11.575. *MARGINALIS* (Bp.), *C. R.* XLIII, p. 599 (*descr. nulla*); Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 241; Sharpe, *l. c.*, pp. 92, 555; *suahelensis*, Tristr., *P. Z. S.*, 1882, p. 95; Sharpe, *l. c.*, p. 150. Afrique tropicale.

1791. CREX

Crex, Bechst. (1805); *Ortygometra*, Leach (1816); *Creccopsis*, Sharpe (1895).

- 11.576. *PRATENSIS*, Bechst., *Ornith. Taschenb.*, p. 557 (1805); Dress., *B. Eur.* VII, p. 291, pl. 499; Dubois, *Fuc. Ill.*, *Ois.* II, p. 285, pl. 225; *crex*, Lin.; *herbarum*, *alticeps*, Brn. Europe jusqu'au cercle pol. à l'Ouest, Sibérie W. jusqu'à Jenisseï, Asie S.-W., Afrique.

- 11.577. EGREGIA, Peters, *M. B. k. Akad. Berl.*, 1854, p. 154; Afrique tropicale.
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1241; *fasciata*,
Heugl.; *angolensis*, Hartl.; Sharpe, *P. Z. S.*,
1870, p. 147; id., *Cat.*, p. 81.

1792. STICTOLIMNAS

Stictolimnas, Bütlik. (1895).

- 11.578. SHARPE, Bütlik., *Notes Leyd. Mus.*, 1893, p. 274. Amér.mérid.(loc.ign.)

1793. PORZANA

Porzana, Vieill. (1816); *Zapornia*, Leach (1816); *Phalaridion*, Kp. (1829);
Mustelirallus, Bp. (1856); *Neocrex*, Sch. et Salv. (1868); *Phalaridium*, Sund.
(1872); *Galeolimnas*, Heine (1890); *Amaurolimnas*, *Poliolimnas*, *Anuro-*
limnas, Sharpe (1893).

- 11.579. FULICULA (Scop.), *Ann.* I, p. 108; Salvad., *Elench.* Eur. jusqu'au 65° l. N.,
Ucc. Ital., p. 254; *R. porzana*, Lin.; *maruetta*, Sibér. occ. jusqu. 55°
Leach; Dress., *B. Eur.* VII, p. 267, pl. 496; l. N.; Asie S.-W. et
Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 287, pl. 204; *macu-* S. jusqu. Birmanie,
lata, *punctata*, *leucothorax*, *gracilis*, Brm. Afrique.
✓ 11.580. CAROLINA (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 143, pl. 306; Amérique septentrion.
Baird., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 749; Schl., et centr., Antilles,
l. c., p. 28; *stolidus*, Vieill. Colombie, Ecuador.
11.581. FLUMINEA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 139; id., *B.* Australie.
Austr. VI, pl. 79; *novæ-hollandiæ*, Chv., *M. S.*
11.582. ALBICOLLIS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 561; Schl., Brésil, Guyane, Véné-
l. c., p. 54; *olivaceus*, V.; *mustelina*, Licht.; zuéla, Trinidad;
gularis, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 59.
11.583. PUSILLA (Pall.), *Reise Russ. Reichs*, III, *App.*, p. 700; Europe jusqu'au 55° l.
Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 294, pl. 226; *mi-* N., à l'E. jusqu'au
nuta, Pall. (pt.); *intermedius*, Herm.; Sharpe, lac Baikal, Afrique,
Cat., p. 105; *bailloni*, Vieill.; Dress., *l. c.*, Madagascar.
pl. 497; *stellaris*, Tem.; *pygmaea*, Brm. et auct.
plur.; *foljambei*, Eyt.
3153. Var. AURICULARIS, Rehw., *J. f. O.*, 1898, p. 159; Sibér.E., Japon, Chine,
pusilla, Sharpe (nec Pall.), *Cat.*, p. 106; Birm., Inde, Ceylan,
pygmaea, auct. plur. (nec Brm.); *minuta*, Philippines, Bor-
Radde; *bailloni*, auct. plur. (nec V.) néo.
3156. Var. AFFINIS (Gray), *Voy. Erech. and Terr.*, B., Nouvelle-Zélande.
p. 14; Bull., *B. New Zeal.*, p. 182, pl. 22, f. 1;
punctatus, Ellm.; *pygmaea*, Fsch. (nec Brm.)
3157. Var. OBSCURA, Neum., *Orn. Mon.*, 1897, p. 191. Massailand (Afr. E.)
11.584. PALUSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 139; id., *B.* Australie.
Austr. VI, pl. 80.

- 11.585. *PARVA* (Scop.), *Ann.* I, p. 108; Dress., *B. Eur.* VII, p. 285, pl. 498; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 291, pl. 225; *pusillus*, Gm. (nec Pall.); *mixtus*, Lapeyr.: *minuta*, *foljambii*, Mont.; *peyrousei*, V.; *olivacea*, Leach; *minutissima*, Brm. Europe centr. et mér., Turkest., Afghanistan jusqu'à l'Inde N.-W., Afr. N.-W.
- 11.586. *SPILOPTERA*, Durnf., *Ibis*, 1877, p. 194, pl. 3; *salinazi*, Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 155 (nec Phil.) Argentine.
- ✓ 11.587. *FLAVIVENTRIS* (Bodd.), *Tabl.*, p. 52; *Pl. Enl.* 847; Schl., *l. c.*, p. 51; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 455; *minutus*, Gm. (nec Pall.); Gosse, *B. Jam.*, p. 572, pl. 104; *superciliaris*, Vieill.; *gossii*, Bp. Cuba, Jamaïque, Guyane, Brésil.
- 11.588. *TABUENSIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 717; Sharpe, *Cat.*, p. 111 (pt.); Finsch, *MT. Orn. Ver. Wien*, XVII, p. 4; ? *umbrina*, Cass.; ? *minor*, Ellm. Ile Tongatabu (*éteint?*)
- 11.589. *PLUMBEA* (Gray), in *Griff. ed. Cuv.* III, p. 410; *immaculata*, Sw.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 82; *vitensis*, Hartl.; *tabuensis* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 111, 555. Iles Philipp., Samoa, Fidji, Nouv.-Hébr., Nouv.-Cal., Austr., Nouv.-Zél., Chath.
- 11.590. *TAITIENSIS* (Gm.), *S. N.* I, p. 717; Hartl., *Arch. f. Naturg.*, 1852, p. 156; id., *J. f. O.*, 1854, p. 169; Fsch. et Hartl., *Orn. Centralpol.*, p. 170; *minutus*, Forst. (pt., nec Pall.) Tahiti.
- 11.591. *GALAPAGOENSIS*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 115; *spilonota* (pt.), Salv., *Tr. Z. S.* IX, p. 500. Iles Galapagos.
- 11.592. *BICOLOR*, Wald., *Ann. Mag. N.* II, 1872, p. 47; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 225, pl. 58, f. 1; *elwesi*, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 285. Himalaya E. jusqu'à Manipour.
- 11.593. *CONCOLOR* (Gosse), *B. Jamaica*, p. 569, pl. 105; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 452; *castaneus*, Cuv. (*descr. nulla*); *boeckii*, Bp.; *cayennensis*, Moore (nec Gm.); *guatemalensis*, Lawr. Jamaïque, Guatémala jusqu'au Pérou W., le Brés. et la Guyane.
- 11.594. *CASTANEICEPS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 455; id., *Exot. Orn.*, pl. 78; Sharpe, *l. c.*, p. 88; *verreauxii*, Bp. (*descr. nulla*). Ecuador.
- 11.595. *HAUXWELLI*, Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 105, pl. 55; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 524; *sclateri*, Bp. (*descr. nulla*); *fasciata*, Scl. et Salv. (1867, nec Rall.) Haut-Amazone.
- 11.596. *CINEREA* (Vieill., nec *Rallus cinereus*), *N. Dict.* XXVIII, p. 29; Schl., *l. c.*, p. 52; *quadristrigatus*, Horsf.; *leucosoma*, Sw.; *tannensis*, Forst.; *quadristriata*, Licht.; *ocularis*, Gr.; *sandwichensis*, Rchb. (nec Gm.); *leucophrys*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 81; *var. media et minima*, Bp.; *superciliaris*, Fsch. (nec V.) Malacca, Philippines, archipel Indien, Australie et la plupart des îles du Pacifique.

- 11.597. *ERYTHROPS*, Schl., *P. Z. S.*, 1867, p. 545, pl. 21; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 325; *schomburgki*, Schl., *l. c.*, p. 57 (nec Cab.) De l'Argentine au Vénézuéla et Pérou.
- 11.598. *UNIFORMIS* (Hartl.), *Nov. Zool.* VIII, p. 369. Ecuador N.-W.
- 11.599. *COLOMBIANA* (Bangs), *Pr. Biol. Soc. of Washington*, 1898, p. 171. Colombie.

1794. *PENNULA*

Pennula, Dole (1879); *Kittlitzia*, Hartl. (1892, nec Hartl.); *Aphanolimnas*, Sharpe (1892).

- 11.400. *ECAUDATA* (King), in *Cook's Voy. Pacif. Ocean*, III, p. 119; Hartl., *Abh. nat. Ver. Brem.*, 1892, p. 396; Sharpe, *l. c.*, p. 114 (pt.); *obscurus*, Gm. Hawaï (Sandwich).
- 11.401. *SANDWICHENSIS* (Gm.), *S. N. I.*, p. 525; Hartl., *l. c.*, p. 397; Rothsch., *Avif. Lays.*, pl. 76; *millsi*, Dole, *Haw. Ann.*, 1879, p. 14; *ecaudata* (pt.), Sharpe, *l. c.*, p. 114; *wilsoni*, Fsch., *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 79. Iles Sandwich.
- 11.402. *MONASA* (Kittl.), *Denkw. Reis. russ. Amer.* II, p. 50; Hartl., *Abh. nat. Ver. Brem.*, 1892, p. 391; Sharpe, *Bull. Br. Orn. Cl.*, 1892, p. 20; id., *Cat.*, p. 115. Ile Kuschai.

1795. *SAROTHRURA*

Alechthelia, Sw. (1857, nec Less., 1851); *Corethrura*, Rehb. (1849, nec Gray, 1846); *Sarothrura*, Heine et Rehw. (1890).

- 11.403. *PULCHRA* (Gray) in *Griff. ed. Cuv., Aves*, pp. 410, 542; Sharpe, *Cat.*, p. 116, pl. 9; *cinnamomeus*, Less.; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 242. Afrique W. (de Sénégal au Congo) et Afrique équator.
- 11.404. *INSULARIS* (Sharpe), *P. Z. S.*, 1870, p. 400, 1874, p. 51; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 575, pl. 256. Madagascar.
- 11.405. *LINEATA* (Sw.), *An. in Menag.*, p. 559; Sharpe, *l. c.*, p. 118; *jardini*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 21; Schl., *l. c.*, p. 27; *ruficollis* (pt.), Gr.; Lay., *B. S. Afr.*, p. 559. Afrique S., de Knysna au Natal.
- 11.406. *WATERSI* (Bartl.), *P. Z. S.*, 1879, p. 772, pl. 65; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 577, pl. 254. Madagascar.
- 11.407. *ELEGANS* (Smith), *Ill. Zool. S. Afr., Aves*, pl. 22; Rehb., *Handb., Fulicariæ*, pl. 125, f. 1221; Sharpe, *l. c.*, p. 120; *pulchra* (pt.), Gray. Afrique S., de Knysna au Natal.
5158. *Var. REICHENOWI*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 121; *elegans*, Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 178. Caméron.

- 11.408. RUFFA (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 564; Sharpe, *l. c.*, p. 121; *dimidiata*, Tem.; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 20; Schl., *l. c.*, p. 27; *ruficollis*, Gray (nec V.) Afrique S. et S.-W., du Cap au Transvaal.
5159. *Var.* LUGENS (Boelim), *J. f. O.*, 1884, pp. 176, 244; Matsch., *J. f. O.*, 1887, pp. 159, 145. Lac Tanganika.
- 11.409. BONAPARTEI (Bp. ex Hartl.), *C. R.* XLIII, p. 599; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 242; Sharpe, *l. c.*, p. 125. Gabon.

1796. RALLICULA

Rallacula, Schl. (1871); *Corethruopsis*, Salvad. (1875).

- 11.410. RUBRA, Schl., *Ned. Tydschr. Dierk.* IV, p. 55; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 270; Guillem., *P. Z. S.*, 1885, p. 664, pl. 59. Nouv.-Guinée N.-W., (Monts Arfak).
- 11.411. LEUCOSPILA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 975, 1878, p. 546; id., *Orn. Pap.* III, p. 270. Nouv.-Guinée N.-W., (Monts Arfak).
- 11.412. FORBESI, Sharpe, in *Gould's B. New Guin.* V, pl. 70; id., *Cat.*, p. 124; *rubra*, Sharpe (1886, nec Schl.) Nouv.-Guinée S.-E.

1797. THYRRORHINA

Thyrrorhina, Schl. et Salv. (1868).

- 11.415. SCHOMBURCKI (Cab.), in *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 760; Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 458; id., *Exot. Orn.*, pl. 67; Sharpe, *l. c.*, p. 125. Guyane, Vénézuéla, Brésil.

1798. COTURNICOPS

Coturnicops, Bp. (1856); *Ortygops*, Heine et Rehw. (1890).

- ✓ 11.414. NOVEBORACENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 704; Audub., *B. Amer.* V, p. 152, pl. 507; Bd., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 750; *hudsonica*, Lath.; *ruficollis*, Vieill. Amérique septentr., Cuba, Bermudes.
- 11.415. EXQUISITA (Swinh.), *Ann. Mag. N. H.*, 1875, p. 576; id., *Ibis*, 1875, p. 155, pl. 5; *erythrothorax*, auct. plur. (nec Tem. et Schl.); *undulata*, Tacx., *J. f. O.*, 1874, p. 555. Sibérie E., Chine N.-E., Japon.
- 11.416. NOTATA (Gould), *Voy. Beagle*, B., p. 152, pl. 48; Schl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 155; Sharpe, *Cat.*, p. 128. Uruguay, Argentine, Patagonie.
- 11.417. AYRESI, Gurn., *Ibis*, 1877, p. 552, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 129. Afrique S.-E.

1799. PORZANULA

Porzanula. Frohawk (1892).

- 11.418. PALMERI, Froh., *Ann. Mag. N. H.*, 1892, p. 247; Ile Laysan (Pacif. N.)
Hartl., *Abh. nat. Ver. Brem.* XII, p. 599.

1800. CRECISCUS

Creciscus, Cab. (1856); *Rufirallus*, *Laterirallus*, Bp. (1856); *Donacophilus*,
Erythrolimnas, Heine et Rehw. (1890).

- 11.419. JAMAICENSIS (Gm.), *S. N. I.*, p. 718; Audub., *B. Am.* Amérique sept. temp.,
V, p. 157, pl. 508; Schl., *l. c.*, p. 67; Bd., Br. Amérique centrale,
et Ridgw., *Water-B. N. Am.* I, p. 577; *pygmæa*, grandes Antilles.
Blackw.
5160. *Var.* SALINAZI (Phil.), *Arch. f. Nat.*, 1857, p. 262; Chili, Pérou.
Sharpe, *l. c.*, p. 156; *chilensis*, Bp. (*descr.*
nulla); *jamaicensis* (pt.), auct. plur. (nec
Gm.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 521.
5161. *Var.* COTURNICILUS (Ridgw.), *Amer. Nat.* VIII, Iles Faralon (Califor-
p. 111; id., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, nie).
pp. 202, 222; Cones, *B. N.-West*, p. 540.
- 11.420. SPILONOTUS (Gould), in Darw., *Voy. Beagle*, B., Iles Galapagos.
p. 152, pl. 49; Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868,
p. 456, 1871, p. 525; Sharpe, *Cat.*, p. 157.
5162. *Var.* SHARPEI, Rothsch. et Hartl., *Nov. Zool.* VI, Ile Indéfaticable (Gala-
p. 183; *spilonotus* (pt.), auct. plur. pagos).
- 11.421. CINEREUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 556 (nec De l'Amazone à la
Porphyrio cinereus); Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, Guyane, Trinidad.
p. 456; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 522; *exilis*, Tem.,
Pl. Col. 525; Schl., *l. c.*, p. 53; Sharpe, *l. c.*,
p. 158; *ruficollis*, Sw.
5165. *Var.* VAGANS (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Honduras.
p. 595.
- 11.422. MELANOPHEUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 549 Brésil.
(*melanophaius*); Schl., *l. c.*, p. 53; Schl. et Salv.,
Exot. Orn., p. 107, pl. 54; *lateralis*, Licht.;
albifrons, Sw.
5164. *Var.* ÆNOPS (Schl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1880, p. 161; Ecuador.
Sharpe, *l. c.*, p. 140.
- 11.425. ALBIGULARIS (Lawf.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1861, p. 502; Colombie jusqu'au Vé-
Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 109, pl. 53. ragua.
5165. *Var.* ALFARI (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Costa-Rica.
p. 111.
5166. *Var.* CINEREICEPS, Lawf., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1875, Costa-Rica E., Nica-
p. 90; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, ragua N.-E.

- p. 111; Sharpe, *l. c.*, p. 557; *leucogastra*, Ridgw., *l. c.*, 1883, p. 408, 1887, p. 111.
- 11.424. LEUCOPYRRHUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 550; Brésil S., Paraguay, Argentine.
Burm., *Reise La Plata*, II, p. 505; Schl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 154; *hypoleucos*, Licht.
- 11.425. LEVRAUDI (Schl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1868, p. 452, Vénézuéla.
pl. 53, 1875, p. 512; Sharpe, *l. c.*, p. 142.
- 11.426. RUBER (Schl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1860, p. 500; id., Du Yucatan au Guatémala.
Exot. Orn., p. 51, pl. 16; Sharpe, *l. c.*, p. 145.
- 11.427. CAVANENSIS (Bodd.), *Tabl.*, p. 22; *Pl. Enl.* 568 et Brésil, Amazone, Guyane, Vénézuéla, Colombie.
755; *cayennensis*, Gm.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 586; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 525; *viridis*, Müll.; *kiolo*, Vieill.; *aurita*, Gr.; *pileata*, Max.; *ecaudata*, Sw. (nec King); *poliotis*, Tem.
- 11.428. FACIALIS (Tschudi), *Faun. Per.*, pp. 52, 501; Schl. Pérou.
et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 445; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 524.

1801. LIMNOCORAX

Limnocorax, Peters (1854).

- 11.429. NIGER (Gm.), *S. N. I.*, p. 717; Schl., *l. c.*, p. 54; Afrique tropicale et
Gurn., *Ibis*, 1868, p. 470; Sharpe, *Layard's B. méridion., Madcire.*
S. Afr., p. 618; *carinata*, Sw.; *flavirostra*, Sw.,
B. W. Afr. II, p. 244, pl. 28; *athiops*, Forst.;
capensis, *senegalensis*, *mosambicus*, Peters.; *erythrophus*, *atterrima*, Heugl.

1802. AMAURORNIS

Amaurornis, *Erythra*, Rehb. (1852); *Pisynolimnas*, Heine (1890); *OEnolimnas*, Sharpe (1894).

- 11.450. OLIVACEA (Meyen), *Nova Acta C. L.-C. Acad. Nat. Philippines.*
Cur. XVI, *Suppl.*, I, p. 109, pl. 20; Wald., *Tr.*
Z. S. IX, p. 251, pl. 55, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 155.
- 11.451. MOLUCCANA (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 480; Salvad., Moluques, Nouvelle-
Orn. Pap. III, p. 276; *olivacea*, Schl. (nec Mey.), Guinée, archipel
l. c., p. 45; *ruficrissa*, Gould; id., *Suppl. B.* Bismarek, Australie
Austr., pl. 79; *frankii*, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, N.-E.
p. 165.
- 11.452. AKOOL (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 164; Jerd., *B. Inde jusqu'aux mon-
Ind.* III, p. 722; Sharpe, *l. c.*, p. 155; *niger*, tagnes de l'Assam.
Frankl.; *modesta*, Sw.; *griseopectus*, Gr.; Hodgs.,
Icon. ined., *Grallae, App.*, pl. 185; *coccineipes*,
Schl., *Ibis*, 1891, p. 44.

- 11.453. *PHOENICURA* (Forst.), *Zool. Ind.*, p. 19, pl. 9 (1781); Inde, Ceylan, Chine,
Schl., *l. c.*, p. 41; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 67; Indo-Chine, Malac.,
Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 708; *chinensis*, Bodd.; Formose, îles de la
erythrura, Bechst.; *javanica*, Horsf.; *sumatranus*, Raffles.; *leucomelena*, S. Müll.; *thermophila*,
Hodgs.; *major*, Bp.
5167. *Var. INSULARIS*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, Îles Andaman et Nico-
p. 162; *phœnicura*, Hume (nec Forst.) bars.
11.454. *ISABELLINA* (Bp.), *C. R.* XLIII, p. 599 (*descr. nulla*); Célèbes.
Schleg., *Mus. P.-B.*, *Ralli*, p. 16; Mey. et Wg.,
B. Cel., p. 712, pl. 45, f. 2.

SUBF. II. — GALLINULINÆ

1803. TRIBONYX

- Tribonyx*, Du Bus (1840); *Brachytrallus*, Lafr. (1840); *Microtribonyx*, Sharpe (1895).
- 11.455. *MORTIERI*, Du Bus, *Bull. Acad. Roy. Brux.* VII, Australie S., Tasma-
1840, p. 214, pl. 2; id., *Esq. Orn.*, pl. 5; Gould, nie.
B. Austr. VI, pl. 74; *ralloides*, Lafr.; *gouldi*, Schl.
- 11.456. *VENTRALIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 85; id., *B. Australie N., W. et S.*
Austr. VI, pl. 72; Sharpe, *Cat.* XXIII, p. 165.

1804. PAREUDIASTES

- Pareudiastes*, Hartl. et Finsch. (1871).
- 11.457. *PACIFICUS*, Hartl. et Fsch., *P. Z. S.*, 1871, p. 25, Îles Samoa.
pl. 2; Fsch., *J. f. O.*, 1872, pp. 55, 54.

1805. PORPHYRIORNIS

- Porphyriornis*, Allen (1892).
- 11.458. *NESIOTIS* (Schl.), *P. Z. S.*, 1861, p. 261, pl. 50; Allen, Ile Tristan d'Acunha.
Bull. Am. Mus. N. H. IV, art. VI, p. 58.
5168. *Var. COMERI*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* IV, Ile Gough.
art. VI, p. 57.

1806. GALLINULA

- Gallinula*, Briss. (1760); *Hydrogallina*, Lacép. (1801); *Stagnicola*, Brm. (1851).
- 11.459. *TENEБROSA*, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 20; id., *B. Australie E. et S.*
Austr. VI, pl. 75. Nouvelle-Guinée S.
- 11.440. *FRONTATA*, Wall., *P. Z. S.*, 1865, pp. 35, 487; Austr., Nouv.-Guin.,
Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 279; Mey. et Wg., *B. Moluques, Célèbes,*
Cel., pl. 45, f. 1; *tenebrosa*, Bp., Rams. (nec Born.S.-E., Flores.
Gould); *hematopus*, Tem. (*descr. nulla*).

- 11.441. ? LEPIDA, Brügg., *Abhandl. nat. Ver. Bremen*, 1877, p. 91. ?
- 11.442. CHLOROPUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 515, pl. 505; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 298, pl. 227; *fusca*, L.; *fistulans*, Gm.; *septentrionalis*, minor, *flavipes*, Brm.; *akool*, Jerd. (nec Syk.); *parvifrons*, *burnesi*, Blyth. Europe, Asie, Afrique.
5169. ? Var. ORIENTALIS, Horsf., *Tr. Z. S.* XIII, p. 195 (1820); Salvad., *Ucc. Born.*, p. 542; Blas., *J. f. O.*, 1884, p. 218. Asie S.-E., Malacca, Bornéo.
5170. Var. PYRRHOROHA, A. Newt., *P. Z. S.*, 1861, p. 18; M.-Edw. et Grand., *II. N. Madag., Ois.*, p. 241, pl. 240. Madagascar, îles Maurice et Réunion.
- 11.443. GALEATA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 80; Bp., *Amer. Orn.* IV, p. 128, pl. 57, f. 1; *chloropus*, Audub., *B. Am.*, pl. 224 (nec L.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 527; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 156. La majeure partie de l'Amérique, Antill.
5171. Var. GERMANI, Allen, *Bull. Mus. C. Z.*, 1876, p. 557; Hart., *Nov. Zool.* V, p. 65. Lac Titicaca, Chili.
- 11.444. SANDWICHENSIS, Streets, *Ibis*, 1877, p. 25; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 78, 1889, p. 580; Hart., *l. c.* V, p. 65; *chloropus*, auct. plur. (nec L.) Îles Sandwich.
- 11.445. ANGULATA, Sundev., *Öfvs. K. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1850, p. 110; Schl., *Mus. P.-B., Ralli*, p. 49; *pumila*, Scl., *Ibis*, 1859, p. 249, pl. 7; *minor*, Hartl. Afrique tropicale.

1807. PORPHYRIOPS

Porphyriops, Pucher. (1845); *Hydrocicca*, Cab. (1847).

- 11.446. MELANOPS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 555; Cab., *Arch. f. Nat.*, 1847, p. 551; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 461; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 526; *crassirostris*, Gray, in *Grif. An. Kingd. B.* III, p. 542, pl.; *femoralis*, Tschudi; *leucopterus*, Salvad. Amérique méridionale, de l'Argentine et le Chili jusqu'en Colombie.

1808. GALLICREX

Gallixerex, Blyth (1849); *Hypnodes*, Rehb. (1852); *Gallinulopha*, Bp. (1854).

- 11.447. CINEREA (Gm.), *S. N.* I, p. 702; Wald., *Ibis*, 1875, p. 517; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 484; *G. cristata*, Lath. (nec *Fulica cristata*); Schl., *l. c.*, p. 59; *plumbea*, Vieill.; *gularis*, *lugubris*, Horsf.; Gray, *Fasc. B. China*, pl. 10; *navia*, *porphyrioides*, Less.; *rufescens*, Jerd. Inde, Ceylan, Chine, Japon, Indo-Chine, Malacca, grandes îles de la Sonde.

1809. PORPHYRIOLA

Porphyrola, Blyth (1849, *descr. nulla*); *Ionornis*, *Glaucestes*, Rehb. (1852);
Hydrornia, Hartl. (1857); *Porphyriola*, Sundev. (1872, *porphyrola* rect.);
Ionocicca, Salvad. (1887).

- 11.448. ALLENI (Thomps.), *Ann. Mag. N. H.*, 1842, p. 204; Afrique tropicale, Ma-
 Gray, *Gen. B.* III, pl. 162; Dress., *B. Eur.* VII, dagascar, Rodri-
 p. 507, pl. 502; *chloronotus*, Blyth; *mutabilis*, guez (accident. Eu-
 Sundev.; *porphyrio*, Bp.; *variegatus*, Guir. rope S. et Canaries).
 11.449. MARTINICA (Lin.); Aud., *B. Amer.* V, p. 128, pl. 505; Texas, Floride, Amé-
 Schl., *l. c.*, p. 58; *martinicensis*, Gm.; *cyani- rique* centrale, An-
collis, Vieill.; *porphyrio*, Wils., *Amer. Orn.* IX, tilles, Amérique mé-
 p. 67, pl. 75, f. 2; *tavoua*, Vieill., *Gal. Ois.* II, ridionale tropicale.
 p. 170, pl. 267.
 11.450. PARVA (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 897; Schl., Guyane, Amazone,
l. c., p. 59; *flavivrostris*, Gm.; *simplex*, Gould. Brésil.

1810. PORPHYRIO

Porphyrio, Briss. (1760); *Cæsarornis*, Rehb. (1852).

- 11.451. CÆRULEUS (Vandelli), *Mem. Acad. Real. Lisb.* I, Europe méridionale,
 1797, p. 57; Schl., *Ibis*, 1879, p. 187; *hyacin- Mésopotamie, Afri-*
thus, Tem.; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 540; *chlory- que* N.
nothus, Roux (nec V.); *antiquorum*, Bp.; *vete- rum*, Gr. (nec Gm.); Dress., *B. Eur.* V, p. 299,
 pl. 500; *cæsius*, Schl., *l. c.*, p. 52.
 11.452. MADAGASCARIENSIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 68; Afrique jusqu'à Égypte,
 Gray, *Gen. B.* III, p. 598; *F. porphyrio*, Lin.; Madagascar.
chloronothos, Vieill.; *smaragnotus*, Tem.; M.-
 Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 587,
 pl. 242-244; *erythropus*, Steph.; *hyacinthinus*,
 Rüpp. (nec Tem.); *ægyptiacus*, Hengl.; *smarag- donotus*, Gurn.
 11.453. VETERUM, S. G. Gm., *Reis. Russl.* III, p. 79, pl. 12; Caucase, Mésopotamie,
 Radde, *Orn. Cauc.*, pp. 40, 580, pl. 24; *polioce- Afghanistan, Inde,*
phala, Lath.; *F. porphyrio*, Pall. (nec L.); *polio- Ceylan, Birmanie.*
cephalus, Vieill.; Jerd., *B. Ind.* III, p. 745; Sharpe,
l. c., p. 179; *hyacinthinus*, Nordm. (nec Tem.);
indicus, Gr. (nec Horsf.); *neglectus*, Schl., *l. c.*,
 p. 55.
 11.454. BEMMELENI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XI, p. 191. Sumatra.
 11.455. CALVUS, Vieill., *N. Dict.* XXVIII, p. 28; Mey. et Java, Sumatra, Bor-
 Wg., *B. Cel.*, p. 747; *indicus*, Horsf.; Schl., *l. c.*, néo, Célèbes S.
 p. 55; Salvad., *Ucc. Born.*, p. 542.

5172. *Var.* EDWARDSI, Ell., *Ann. N. II.*, 1898, p. 98 ; Indo-Chine, Malacca.
calvus, Kellh. (nec V.)
5173. *Var.* ELLIOTI, Salvad., *Atti R. Accad. Torino*, Iles de l'Amirauté.
1879, p. 1168; id., *Orn. Pap.* III, p. 285 ;
indicus et *calvus*, Scl. (pt.)
5174. *Var.* NEOBRITANNICA, Mey., *Abhandl. Mus. Dresd.*, Nouvelle-Bretagne.
1891, n° 4, p. 15.
5175. *Var.* PALLIATA, Brüggem., *Abhandl. nat. Ver.* ?
Bremen, 1876, p. 89.
- 11.456. BELLUS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 176; id., *B.* Australie W.
Austr. VI, pl. 70.
5176. *Var.* CHATHAMENSIS, Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 351 ; Ile Chatham.
id., *Cat.*, p. 202.
- 11.457. SMARAGDINUS, Tem., *Pl. Col.* 421 ; *vitiensis*, Peale, Célèbes, petites îles
U. S. Expl. Exp., B., 1848, p. 221, pl. 62, f. 2 ; de la Sonde, Nou-
melanopterus, Bp. ; *melanotus*, Fsch. (nec Tem.) ; velle-Guinée, archi-
aneiteumensis, Tristr. ; *samoensis*, Fsch. (nec pel Bismarck, îles
Peale) ; *indicus*, Lenz (nec Horsf.) Fidji, etc.
5177. *Var.* SAMOENSIS, Peale, *U. S. Expl. Exp., B.*, Iles Samoa.
1848, p. 220, pl. 62, f. 1 ; Sharpe, *l. c.*, p. 204 ;
indicus (pt.), auct. plur. (nec Horsf.)
- 11.458. MELANONOTUS, Tem., *Man. d'Orn.* II, p. 701 (1820) ; Australie, Tasmanie,
Gould, *B. Austr.* VI, pl. 69 ; Bull., *B. New Zeal.*, Nouv.-Zélande, îles
ed. 2, II, p. 79, pl. 51 ; *stanleyi*, Rowl. ; *cyano-* Norfolk, Lord Howe,
cephalus, Ell. Nouv.-Guinée.
5178. *Var.* PELEWENSIS, Hartl. et Fisch., *P. Z. S.*, 1872, Iles Pelew.
p. 107 ; *melanotus*, Hartl. et Fisch. (1868,
nec Tem.)
- 11.459. PULVERULENTUS, Tem., *Pl. Col.* 405 ; Mey. et Wg., Philippines, Karkel-
B. Cel., p. 721 ; *poliocephalus*, Schl., *l. c.*, p. 54 lang.
(nec Lath.)

1811. NOTORNIS

Notornis, Owen (1848).

- 11.460. MANTELLI, Owen, *Trans. Z. S.* III, p. 577, pl. 56, Nouvelle-Zélande.
II. 7-11 ; Gould, *B. Austr., Suppl.*, pl. 76.
- 11.461. HOCHSTETTERI, Mey., *Abbild. Vog.-Skel.*, pl^s 54-57 ; Nouvelle-Zélande (île
id., *Zeitschr. ges. Orn.* II, p. 45, pl. 1. Sud).
- 11.462. PARKERI, Forb., *Tr. N. Z. Inst.* XXIV, 1892, Nouvelle-Zélande (île
p. 187. Nord, éteint).
- 11.465. CERULESCENS (Sél.-Longch.), *Rev. Zool.*, 1848, Ile de la Réunion
p. 294 ; *erythrorhynchus*, Bp., *Consp.* II, p. 5. (éteint).
- 11.464. ALBA (White), *Journ. Voy. N. S. W.*, p. 238, Iles Norfolk et de Lord
pl. (1790) ; Salv., *Ibis*, 1875, p. 295, pl. 10 ; Howe (éteint).
P. melanotus var. *alba*, Gray.

SUBF. III. — FULICINÆ

1812. FULICA

Fulica, Lin. (1755); *Phalaria*, *Lysca*, *Lupha*, Rehb. (1835); *Lycornis*, Bp. (1854);
Lophophalaris, Heine (1890).

- 11.465. *ATRA*, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 527, pl. 504, l. 2; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 504, pl. 228; *aterrima*, L.; *fuliginosa* et *albiventris*, Scop.; *leuconyx* et *æthiops*, Sparrm.; *atrata*, *pullata*, Pall.; *lugubris*, Müll.; *platyuros*, Brm.; *japonica*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 120, pl. 77. Europe et Asie jusqu'au 68° latitude N., Japon, Philippines, Java, Sumatra, Célèbes, Afrique N.
5179. *Var. AUSTRALIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 2; id., *B. Austr.* VI, pl. 74; *tasmanica*, Grant; *atra* (pt.), Schl., Seeb. Australie, Tasmanie.
- 11.466. ?*NOVÆ-ZEALANDIÆ*, Colenso, *Tasm. Journ. N. Sc.*, 1845, p. 285. Nouvelle-Zélande.
- 11.467. *CRISTATA*, Gm., *S. N. I.* p. 704; Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 269; Dress., *B. Eur.* VII, p. 525, pl. 504, l. 1; *mitrata*, Licht. Afrique, Madagascar, Europe S.-W.
- 11.468. *CORNUTA*, Bonap., *C. R.* XXXVIII, p. 925, XLIII, p. 600; Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 465. Potosi (Bolivie).
- 11.469. *ARDESIIACA*, Tschudi, *Arch. f. Naturg.*, 1851, p. 589; id., *Faun. Per.*, p. 505; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 115, pl. 57; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 528; *chilensis*, Des M. in Gay, *Faun. Chil.* VIII, p. 474, pl. 11. Ecuador, Pérou, Bolivie, Chili N.
- 11.470. *ARMILLATA*, Vieill., *N. Dict.* XII, p. 47; Burm., *Th. Bras.* III, p. 590; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 115, pl. 58; *chloropoides*, King; *frontata*, Gr.; *chilensis*, Landb. (nec Des M.); *leucopyga*, Sharpe (1880, nec Licht.) Brésil S., Bolivie et Chili jusqu'en Patagonie.
- 11.471. *GIGANTEA*, Eyd. et Soult., *Voy. Bonite*, p. 102, pl. 8; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 120; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 529; *gigas*, Rehb.; *maxima*, Brm. Pérou, Bolivie, Chili N.
- 11.472. *RUFIFRONS*, Phil. et Landb., *Arch. f. Naturg.* XXVIII, 1862, p. 225; *leucopyga*, auct. (nec Wagl.); Schl., l. c., p. 64; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 117, p. 59; Sharpe, *Cat.*, p. 220; *leucopygia*, Harl.; *chloropoides*, Abb. (nec King). De la Patagonie jusqu'au 24° latitude S., îles Malouines.
- ✓ 11.475. *AMERICANA*, Gm., *S. N. I.* p. 704; Audub., *B. Am.* V, p. 158, pl. 505; Sharpe, l. c., p. 222; *wilsoni*, Steph.; *atra*, D'Orb. (nec L.) Amérique du Nord et centrale, Antilles.
5180. *Var. CARIBÆA*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 558. Petites Antilles.

- 11.474. LEUCOPTERA, Vieill., *N. Dict.* XII, p. 48; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 119, pl. 60; *gallinuloides*, King; *leucopyga*, Wagl. (1851, nec auct.); *stricklandi*, Hartl.; *chloropoides*, Landb. (nec King). Amérique méridionale, de la Patagonie jusque vers le 10° latitude S.
- 11.475. ALAI, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, B., p. 224 (1848); Cass., *U. S. Expl. Exp.*, B., p. 506, pl. 56 (1852); Sharpe, *l. c.*, p. 225; *atra*, Bloxh. (nec L.) Iles Sandwich.

1815. LEGUATIA

Leguatia, Schl. (1858).

- 11.476. GIGANTEA, Schl., *Ibis*, 1866, pp. 146-168; id., *Ann. Sc. Nat.*, ser. 5, VI, pp. 25-49, pl. 1, ff. 1, 2. Ile Maurice (éteint).

FAM. XVII. — HELIORNITHIDÆ (1)

1814. PODICA

Podica, Less. (1851); *Rhigelura*, Wagl. (1852); *Podoa*, Bp. (1855, nec Illig.)

- 11.477. SENEGALENSIS (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 277; id., *Cal. des Ois.* II, pl. 280; Less., *Tr. d'Orn.*, p. 596; Gray, *Gen. B.* III, pl. 175; Schl., *Mus. P.-B., Urinatores*, p. 49; *josephina*, pucherani, Bp. Afrique W., de Sénégambie au Congo.
5181. *Var.* PETERSI, Hartl., *Abh. nat. Ver. Hamburg*, II, p. 62; Finsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 790; Sharpe, in Lay., *B. S. Afr.*, p. 625, pl. 12; *mosambicana*, Pet.; *impipi*, Licht. Afrique S.-E., E. et Damaraland.
- 11.478. CAMERUNENSIS, Sjöst., *Svenska Ak. Handl.* XXVII, n° 1, p. 29, pl. 1. Caméroun.

1815. HELIOPAIS

Heliopais, Sharpe (1895); *Podica* (pt.), auct.

- 11.479. PERSONATA (Gray), *P. Z. S.*, 1848, p. 90, pl. 4; Schl., *l. c.*, p. 49; Sharpe, *Cat.*, p. 252. Indo-Chine, Malacca, Sumatra.

1816. HELIORNIS

Heliornis, Bonn. (1790); *Podoa*, Illig. (1811).

- 11.480. FULICA (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 895; Gray, *Gen. B.* III, p. 654; Schl., *l. c.*, p. 48; *surinamensis*, Gm.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 591; *fulicarius*, Bonn. Brésil, Amaz., Guyane, Vénéz., Colombie jusque l'Honduras.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXIII, p. 229 (1894).

ORD. XIII. — PALAMEDEÆ (1)

FAM. I. — PALAMEDEIDÆ

1817. PALAMEDEA

Palamedea, Moehr. (1752), Lin. (1766); *Anhima*, Briss. (1760).

- 11.481. CORNUTA, Lin.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 454, pl. 261; Guyane, Vénézuéla,
Burm., *Thier. Bras.* III, p. 596; Salvad., *Cat. B.* Amazone, Ecuador,
Br. Mus. XXVII, p. 5; *bispinosa*, Humb. Pérou.

1818. CHAUNA

Chauna, Illig. (1811); *Chavaria*, Rafin. (1815); *Opistholophus*, Vieill. (1816);
Ischyornis, Rehb. (1852); *Ischyornis*, Bp. (1856).

- 11.482. CHAVARIA (Lin.); Salvad., *l. c.*, p. 4; *fidelis* (pt.), Vénézuéla, Colombie.
Vieill.; *derbiana*, Gray, *Gen. B.* III, p. 591, pl. 160;
Schl., *Mus. P.-B.*, Ralli, p. 72; *nigricollis*,
Selat., *P. Z. S.*, 1864, p. 75, pl. 11.
3182. Var. CRISTATA, Sw., *Classif. B.* II, p. 551; Salvad., Brésil S., Uruguay,
l. c., p. 6; *chavaria* (pt.), auct. plur.; Tem., Paraguay, Argen-
Pl. Col. 219; Schl. et Illuds., *Argent. Orn.* II, tine.
p. 119; *fidelis* (pt.), Vieill.; *lophyra*, Natt.

ORD. XIV. — ANSERES (1)

FAM. I. — ANATIDÆ

SUBF. I. — ANSERANATINÆ

1819. ANSERANAS

Anseranas, Less. (1828); *Choristopus*, Eyt. (1858).

- 11.485. SEMIPALMATA (Lath.), *Tr. Linn. Soc.*, 1798, p. 105; Australie, Tasmanie.
Eyt., *Mon. Anat.*, p. 78; *melanoleuca*, Lath.;
Gould, *B. Austr.* VII, pl. 2; Schl., *Mus. P.-B.*,
Anseres, p. 92.

(1) Voy.: Salvadori, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXVII (1895).

SUBF. II. — CEREOPSINÆ

1820. CEREOPSIS

Cereopsis, Lath. (1804).

- 11.484. NOVÆ-HOLLANDIÆ, Lath., *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 67; Australie S., Tasmanie., *Pl. Col.* 206; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 4; nie.
Schl., *l. c.*, p. 115; *cinereus*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 211, pl. 284; *griseus*, V.; *australis*, Sw.

SUBF. III. — PLECTROPTERINÆ

1821. PLECTROPTERUS

Plectropterus, Steph. (1824); *Plectrophanes*, Griffl. (1829).

- 11.485. GAMBENSIS (Lin. ex Briss.); Shaw., *Mus. Lever.*, Afrique W. et E.
p. 229, pl. 56; Lafr., *Mag. de Zool.*, 1854,
pl. 29, 50; Steph., *Gen. Zool.* XII, 2, p. 7, pl. 56;
spinus, Bonn.; *slateri*, Sousa.
5185. Var. RÜPPELLI, Sclat., *P. Z. S.*, 1859, p. 152, Afrique N.-E. et équatoriale.
pl. 155, f. 1; *gambensis*, Rüpp. et auct. plur.
(nec Lin.); ? *brevirostris*, Brm.
11.486. NIGER, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 47, pl. 7, 1880, Afrique S.-E.
p. 498; *gambensis* (pl.), auct. plur.; *gariensis*,
Eckl. (nom. nud.)
5184. Var. SCIOANA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1884, Choa.
p. 259, 1888, p. 518; id., *Cat.*, p. 51.

1822. CAIRINA

Cairina, Flem. (1822); *Moschatus*, Less. (1828); *Gymnathus*, Nutt. (1854);
Carina, Eyl. (1858); *Hyonetta*, Sund. (1872).

- 11.487. MOSCHATA (Lin.); Flem., *Phil. of Zool.* II, p. 260; Amérique tropicale du
Dub., *Ois. Eur.* II, pl. 178; Tacz., *Orn. Pér.* III, Mexique au Parag-
p. 472; Schl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 129; guay.
indica, Ger.; *regia*, Mol.; *merianæ*, Shaw, *Nat.*
Misc. II, pl. 69; *sylvestris*, Steph. (1).

1825. SARCIDIORNIS

Sarkidiornis, Eyl. (1858); *Sarcidiornis*, Agass. (1846).

- 11.488. MELANONOTA (Penn.), *Ind. Zool.*, p. 12, pl. 11; Pl. Inde, Ceylan, Birmanie, Afrique au S.
Ent. 957; Vieill., *Cat. Ois.* II, p. 215, pl. 285; nie, du Sahara, Madagascar.
tricolor, Bodd.; *melanotos*, Gm.; *regia*, Hartl.
(nec Mol.); *africanus*, Eyl.

(1) Hybrides : *Anas bicolor*, Donovan; *purpureo-viridis*, Schinz; *æneo-rufa*, Bp.; *maxima*, Gosse; *viola*, Bell; *viridi-ænea*, Bp.; *iopareia*, Phil.

- 11.489. CARUNCULATA (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1816-17, p. 176; *Scl. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1876, pp. 577, 695, pl. 68; *regius* (pl.), *Eyt.*; *melanotus*, *Burm.* (nec *Penn.*) Brésil, Paraguay, Argentine N.

1824. ASARCORNIS

Asarcornis, *Salvad.* (1895).

- 11.490. SCUTULATA (S. Müll.), *Verh. Land- u. Volkenk.*, p. 159; *Schl.*, *l. c.*, p. 64; *Salvad.*, *Cat.*, p. 60. Sumatra, Java.
5185. *Var.* LEUCOPTERA (Blyth), *J. A. S. B.*, 1849, p. 820; De l'Assam à Malacca.
Jard., *Contr. Orn.*, 1850, p. 141, pl. 64;
Hume et Marsh., *Game-B. Ind.* III, pp. 147,
172, pl. 20; *Oates*, *Man. Game-B. Ind.* II,
p. 159.

1825. RHODONESSA

Rhodonessa, *Rehb.* (1852).

- 11.491. CARYOPHYLLACEA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 866; *Gray*, *Inde.*
Gen. B. III, pl. 167; *Jerd.*, *Ill. Ind. Orn.*, pl. 54;
Schl., *l. c.*, p. 62; *Hume et Marsh.*, *Game-B.*
Ind. III, pp. 174, 455, pl. 25; *erythrocephala*, *Bonn.*

1826. PTERONETTA

Pteronetta, *Salvad.* (1895).

- 11.492. HARTLAUBI (Cass.), *Pr. Ac. Philad.*, 1859, p. 175; Afrique W. et équato-
Oust., *Nouv. Arch. Mus.* II, 1879, p. 122, pl. 6; riale.
Salvad., *Cat.*, p. 65; *cyanoptera*, *Tem.* (nec *V.*);
cuprea, *Schl.*, *Mus. P.-B.*, *Anseres*, p. 62.

1827. NETTOPUS

Nettapus, *Brandt* (1856); *Anserella*, *Sw.* (1857); *Cheniscus*, *Eyt.* (1858, nec *Moehr.*); *Microcygna*, *Gray* (1840); *Nettopus*, *Agass.* (1846).

- 11.495. AURITUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 48; *Pl. Ent.* 770; M.- Afrique tropicale, Ma-
Edw. et Grand., *II. N. Madag.*, *Ois.*, p. 714, dagascar.
pl. 264; *madagascariensis*, *Gm.*; *minuta*, *C. Dub.*,
Orn. Gal., p. 110, pl. 70.
11.494. PULCHELLUS, *Gould*, *P. Z. S.*, 1841, p. 89; *id.*, Australie, Nouvelle-
B. Austr. VII, pl. 4; *Scl.*, *P. Z. S.*, 1880, p. 505; Guinée, Moluques,
Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 584. Ténimber, Célèbes.
11.495. COROMANDELIANUS (Gm.), *S. N. I.*, 2, p. 522; *Pl. Ent.* Inde, Indo-Chine,
949, 950; *Schl.*, *l. c.*, p. 76; *Dav. et Oust.*, *Ois.* Chine, Philippines,
Chine, p. 501; *coromandelica*, *Bonn.*; *girra*, *Gr.*, grandes îles de la
in *Hardw.* *Ill. Ind. Zool.*, pl. 68; *affinis*, *Jerd.*; Sonde, Célèbes.
kopschii, *Swinh.*

5186. *Var. ALBIPENNIS*, Gould, *B. Austr.* VII, texte de Australie E.
la pl. 5; Schl., *l. c.*, p. 77; Schl., *P. Z. S.*,
1880, p. 505; *coromandelianus*, Gould, *B.*
Austr. VII, pl. 5; *bicolor*, Less.

1828. *ÆX*

Aix, Boie (1828); *Dendronessa*, Sw. (1851); *Lampronessa*, Wagl. (1852); *Cosmo-*
nessa, Rehb. (1852, nec Kp.); *Æx*, Schl. (1885).

- 11.496. *SPONSA* (Lin.); Audub., *B. Am.* VI, p. 271, pl. 591; Amérique septentrio-
Schl., *l. c.*, p. 74; Salvad., *Cat.*, p. 75; *pro-* nale jusqu'au Mexi-
missa, Brm., *Nauman.*, 1855, p. 298. que, gr. Antilles.
11.497. *GALERICULATA* (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 217, Sibérie S.-E., Chine,
pl. 287; Schl., *l. c.*, p. 70; Gould, *B. Asia*, VII, Japon, Formose.
pl. 69; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 501.

SUBF. IV. — ANSERINÆ

1829. *CHEN*

Chen, Boie (1822); *Chionoche*n, Rehb. (1852); *Exanthemops*, Ell. (1868).

- 11.498. *CÆRULESCENS* (Lin.); Gundl., *Rep. Fis.-Nat.* I, Amérique N.-E.; en
p. 587; Ell., *B. N. Am.*, pl. 45; *hyperboreus* (pt.), hiver les îles Ba-
auct. plur. (nec Pall.) hama et Cuba.
11.499. *HYPERBOREUS* (Pall.), *Spic. Zool.* VI, p. 25; Dress., Asie N., Japon, Améri-
B. Eur. VI, pl. 417; *albatus*, Cass.; Ell., *New and* que N.-W., États-
unfig. B. N. Am. II, pl. 42; Dress., *l. c.*, f. 2. Unis S.-W. en hiver.
5187. *Var. NIVALIS* (Forst.), *Phil. Trans.*, 1772, p. 415; Amérique N.-E. jus-
Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.* II, p. 107; qu'au S.-E. des
hyperboreus (pt.), auct. plur. États-Unis en hiver.
11.500. *ROSSI* (Cass.), *Pr. Acad. Philad.*, 1861, p. 75; Amérique arctique, en
Schleg., *l. c.*, p. 108; Ell., *Ill. Am. B.* IV, pl. 44. hiver jusqu'en Calif.

1850. *ANSER*

Anser, Briss. (1760); *Anseria*, Rafin. (1815); *Mari-lochen*, *Eulabeia*, Rehb. (1852);
Eulabia, Newt. (1895); *Melanonyx*, Boutourl. (1901).

- 11.501. *FERUS*, Schaeff., *Mus. Orn.*, p. 67 (1789); Steph., Europe jusqu'au cercle
Gen. Zool. XII, 2, p. 28, pl. 41; *cinereus*, Mey. polaire, Palestine,
et W. (nec Bonn.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 355, Algérie, Maroc.
pl. 411; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II,
p. 395, pl. 244; *Anas anser*, Lin.; *vulgaris*, Pall.;
palustris, Flem.; *sylvestris*, Brm. (nec Briss.)
5188. *Var. RUBRIROSTRIS*, Hodgs., *Icon. Ined. in Mus.* Sibérie, en hiver jus-
Brit., pl. 579; Tacz., *Bull. Soc. Zool. Fr.*, qu'au N. de l'Inde et
1877, p. 41; *ferus*, Adams; *cinereus* (pt.), le S. de la Chine.
auct. plur. (nec Mey. et W.); *subalbifrons*,
Severtz., *J. f. O.*, 1875, p. 184.

- 11.502. ALBIFRONS (Scop.), *Ann. I. Hist. Nat.*, p. 69; Dress., *l. c.* VI, p. 575, pl. 414; Dubois, *l. c.* II, p. 405, pl. 247; *lombardella*, Gerini; *albicans*, Gm.; *erythropus*, Flem. (nec Lin.); *medius*, Bruch (nec Mey.); *bruchii*, Brm.; *intermedius*, Naum., *Vög. Deutschl.* XI, p. 540, pl. 288; *roseipes*, Schl.; *pallipes*, de Sélvs.
5189. *Var.* GAMBELL, Harth., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 7; Baird, *B. N. Am.*, p. 761; Coues, *Key*, p. 282; *albifrons* (pt.), auct. plur.; *erythropus* (pt.), Eyl.; *frontalis*, Baird.
- 11.505. ERYTHROPUS (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 585; Dubois, *l. c.* II, p. 405, pl. 247^b; *finmarchicus*, Gunn.; *albifrons* (pt.), auct. ant.; *temminckii*, Boie; *cine-raceus*, *brevirostris*, Brm.; *minutus*, Naum., *Vög. Deutschl.* XI, p. 564, pl. 290.
5190. *Var.* RHODORHYNCHUS, Boutourl., *Dukie icyu*, p. 19. — *Les Oies sauvages*, etc. (en russe).
- 11.504. NEGLECTUS, Suschk., *Ibis*, 1896, p. 155, 1897, p. 8, pl. 2, f. 1; *segetum* (pt.), auct. plur.
- 11.505. SYLVESTRIS, Briss.; Dubois, *l. c.* II, p. 598, pl. 245; *salvatica*, Ger.; *fabalis*, Lath.; *segetum*, Gm.; Dress., *l. c.*, pl. 412; *rufescens*, *platyuros*, *arvensis*, etc., Brm.; *paludosus*, Strickl.
5191. *Var.* SERRIROSTRIS (Swinh. ex Gould), *P. Z. S.*, 1871, p. 417; *segetum* (pt.), auct. plur.
5192. *Var.* MIDDENDORFFI, Severtz., *Turkest. Jevotn.*, pp. 70, 149; *grandis*, Midd. (nec Gm.); id., *Reise Sibir.* II, 2, p. 225, pl. 20, f. 1; *segetum* et *serrirostris* (pt.), auct. plur.
5195. *Var.* MENTALIS, Oates, *Man. Game-B. Ind.* II, p. 77.
- 11.506. CARNEIROSTRIS, Boutourl., *Dukie icyu*, etc. — *Les Oies sauvages de l'Emp. russe*, p. 28 (en russe).
- 11.507. BRACHYRHYNCHUS, Baill., *Mém. Soc. R. d'Abbev.*, 1855, p. 74; Dress., *l. c.* VI, p. 569, pl. 415; Dubois, *l. c.*, p. 401, pl. 246; *phœnicopus*, Barth.; *segetum* (pt.), auct. ant.; *cinereus*, Thor.; *rufescens*, Palm. (nec Brm.)
- 11.508. INDICUS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 859; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 80; *undulata*, Bonn.; *melanocephalus*, Vieill.; *skorniakovi*, Severtz., *Turkest. Jevotn.*, pp. 70, 149, pl. 10, ff. 5, 4; id., *J. f. O.*, 1875, pp. 546, 577.

Europe, Islande, Sibérie, Groenland; en hiver Europe S., Inde et Chine.

Amérique sept., en hiv. jusqu'au Mex. et Cuba, la Côte or. de l'Asie jusqu. Japon.

Europe N. et Sibérie W., en hiver Europe W., Inde N.

Sibérie, en hiver Inde, Chine, Japon.

Russie orientale (lac Thoungak).

Europe sept., en hiver dans le Midi jusqu'au N. de l'Afrique.

Sibérie, Corée et Chine.

Sibérie E., île Behring, en hiver Asie centr., Chine et Japon.

Japon.

Nouvelle-Zemble, en hiver Russie.

Spitzberg; Europe W. en hiver.

Asie centrale, en hiver Inde.

1851. CYGNOPSIS

Cygnopsis, Brandt (1856); *Cynopsis*, Heine et Rehw. (1890).

- 11.509. *CYGNOIDES* (Lin.); Pall., *Zoogr.* II, p. 218, pl. 64; Sibérie E., Chine, Japon.
Schl., *l. c.*, p. 106; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*,
pl. 81; *australis* et *orientalis*, Lin.; *moscoviticus*,
guineensis, Briss.; *sinensis*, Steph.; *ferus*, Rehb.;
tuberculosis, Schast.
- 11.510. ?*GRANDIS* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 504; Pall., *Zoogr.* II, Sibérie.
p. 221; Salvad., *Cat.*, p. 107 (en note).

1852. PHILACTE

Philacte, Bann. (1870).

- 11.511. *CANAGICA* (Sevast.), *Nova Acta Ac. St.-Petersb.*, Asie N.-E., Amérique
1800, p. 546, pl. 10; Schl., *Mus. P.-B.*, *Anseres*, N.-W., en hiver
p. 115; Elliot, *Ill. Am. B.*, pl. 45; *pictus*, Pall. jusqu'en Californie.

1855. BRANTA

Branta, Scop. (1769); *Bernicla*, Boie (1822); *Leucopareia*, Rehb. (1852); *Rufibrenta*, Bp. (1856); *Leucoblepharon*, Baird (1858); *Brenthus*, Sund. (1872); *Ptocas*, Heine et Rehw. (1890); *Nesochen*, Salvad. (1895).

- 11.512. *CANADENSIS* (Lin.); *Pl. Enl.* 546; Audub., *B. Am.* VI, Amérique sept. tem-
p. 178, pl. 576; Bann., *Pr. Ac. Phil.*, 1870, pérée, en hiver jus-
p. 451; ?*parripes*, Cass.; ?*leucolama*, Murr.; qu'au Mexique.
? *barnstoni*, Ross.
5194. *Var. HUTCHINSI* (Rich.), *Faun. Bor.-Am.* II, p. 470; Amérique arctique et
Audub., *B. Am.* VI, p. 198, pl. 577; Schl., subarctique, Sibérie
l. c., p. 105; *canadensis*, Pall. (nec L.); *leucopareius*, Brandt; *leucoparia*, Blak. et Pr. N.-E., en hiver les
Ét.-Unis et le Japon.
5195. *Var. OCCIDENTALIS* (Baird), *B. N. Am.*, p. 766; Amér. N.-W. jusqu'à
Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 22; Sitka au N. et la Ca-
canadensis (pl.), Cass. (nec L.); *leucopareia*, Coues. lifornie au S. en hiv.
5196. *Var. MINIMA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, Amérique N.-W. jus-
pp. 22, 555; *leucopareia*, Cass., *Ill. B. Cal.*, qu'en Californie, îles
Tex., p. 272, pl. 45 (nec Brandt) et auct. Sandwich.
plur.; *munroii*, Rothsch.; id., *Avif. Lays.*,
pl. 80.
- 11.515. *LEUCOPSIS* (Bechst.), *Orn. Taschenb.* II, p. 424; Groenl., Islande, Spitz-
Dress., *l. c.* VI, p. 597, pl. 415, f. 1; Dubois, berg, Nouv.-Zemble,
l. c. II, p. 585, pl. 242; *erythropus*, Gm. (nec en hiver Europe W.
L.); *bernicla*, Pall. (nec L.) (accid. Amér. N.-E.)
- 11.514. *BERNICLA* (Lin.); Scop., *Ann. I. H. N.*, p. 67; Taimyr, Nouv.-Zemb.,
brenta, Briss.; Dress., *l. c.* VI, p. 589, pl. 415, Terre de François-

- f. 2; Dubois, *l. c.* II, p. 588, pl. 245; *monachus*, Beseke; *torquatus*, Bechst.; *platyuros*, *pallida*, Brm.; *melanopsis*, Macg.
5197. *Var.* GLAUCOGASTER, C. L. Brm., *Isis*, 1850, p. 996; id., *Vög. Deutschl.*, p. 849; *micropus*, *col-laris*, Brm.; *berniela* (pt.), auct. plur.
5198. *Var.* NIGRICANS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. H.*, 1846, p. 171, pl. 12; Cass., *Ill. B. Calif.*, p. 52, pl. 10; Coues, *Key*, p. 284; *berniela* (pt.), auct. plur.
- 11.515. RUFICOLLIS (Pall.), *Spic. Zool.* VI, p. 21, pl. 5; Naum., *Vög. Deutschl.* XI, p. 408, pl. 295; Dress., *l. c.*, pl. 416; *torquata*, Gm.; *minor*, Lepech.
- 11.516. SANDVICENSIS (Vig.), *List of Anim. in the Gard. Z. S.*, 1855, p. 4; id., *P. Z. S.*, 1855, p. 65; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, ser. 2, pl. 8; *hawaiiensis*, Eyd. et Soult., *Voy. Bonite, Zool.* I, p. 104, pl. 10; *hauaiensis*, Peale, *U. S. Expl. Exp., B.*, p. 249, pl. 59.
- Joseph, Spitzberg, en hiver Europe N. et W.
- Amérique N.-E., Groenland W.
- Amérique N.-W. jusqu'en Californie, Sibér. N.-E., Japon.
- Sibérie W., Turkestan N., en hiver la mer Caspienne (acc. Eur.)
- Iles Sandwich.

SUBF. V. — CHENONETTINÆ

1854. CHLOËPHAGA

- Chloëphaga*, Eyt. (1858); *Tanidiestes*, Rehb. (1852); *Oressothen*, *Chloetrophus*, Bann. (1870); *Chloophaga*, Sund. (1872); *Tanidiesthes*, Heine (1890).
- 11.517. MELANOPTERA (Eyt.), *Mon. Anat.*, p. 95; Gould, *Voy. Beagle*, p. 154, pl. 50; Schl., *l. c.*, p. 100; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 467; *montana* et *antico-la*, Tschudi.
- 11.518. HYBRIDA (Mol.), *Sagg. Stor. Nat. Chili*, p. 215; Salvad., *Cat.*, p. 150; *magellanica*, Sparrm.; *antarctica*, Gm.; Less., *Voy. Coq.* I, p. 551, pl. 50 (fem.); Cass., *U. S. Astron. Exp.* II, p. 200, pl. 25; *ganta*, Forst.
- 11.519. MAGELLANICA (Gm.), *S. N. I.*, 2, p. 505; Brown, *Ill.*, pl. 40 (mas.); *Pl. Enl.* 1006 (fem.); Schl., *l. c.*, p. 99; Salvad., *Cat.*, p. 152; *leucoptera*, Gm.
5199. *Var.* INORNATA (King.), *P. Z. S.*, 1850-51, p. 15; Bp., *C. R.* XLIII, p. 648; Sharpe, *Zool. Ereb. and Terr.*, B., p. 57, pl. 50; *?picta*, Gm.; *magellanica* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); *dispar*, Ph. et Landb.; Sel. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 125 (pt.)
- 11.520. RUBIDICEPS, Schl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 587, 415, pl. 175; *inornata*, Gray (nec King.)
- Amérique S.-W., du Pérou et Bolivie à Magellan.
- Patagonie, Magellan, Terre-de-Feu, îles Malouines.
- Patagonie, Magellan, Terre-de-Feu, Malouines.
- Chili centr. et S., Argentine S. jusqu'à Magellan.
- Iles Malouines.

- 11.521. *POLIOCEPHALA*, Selat. (ex Gray), *P. Z. S.*, 1857, p. 128; Chili S., Argentine S.,
Sel., *Argent. Orn.* II, p. 124; *inornata*, Gr. (nec Patagon., ile Chiloe.
King.), *Gen. B.* III, pl. 165; ? *leucopterus*, Licht.
(nec Gm.); *chiloensis*, Ph. et Landb.

1855. CYANOCHEN

Cyanochen, Bonap. (1856); *Cyanauchen*, Schl. (1867).

- 11.522. *CYANOPTERUS* (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, pp. 129, 157, Abyssinie, Choa.
pl. 49; Des M., in *Lcf., Voy. Abyss.* VI, p. 169,
pl. 14; Bp., *C. R.* XLIII, p. 648; Schl., *l. c.*, p. 96.

1856. CHENONETTA

Chenonetta, Brandt (1856); *Chlamydochen*, Bp. (1856).

- 11.523. *JUBATA* (Lath.), *Ind. Orn., App.*, p. 69; Gould, *B.* Australie.
Austr. VI, pl. 48; Schl., *l. c.*, p. 97; *lophotus*,
Brandt.

SUBF. VI. — CYGNINÆ

1857. CYGNUS

Cygnus, Briss. (1760); *Olor*, Wagl. (1852); *Sthenclus*, Stejn. (1882); *Sthenelides*,
Stejn. (1885).

- 11.524. *FERUS*, Briss.; Sal., *Orn.*, p. 405 (1767); Dubois, Europe et Asie du 33°
l. c. II, p. 410, pl. 248; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, au 74 1/2° l. N.,
p. 495; *musicus*, Bechst.; Dress., *B. Eur.* VI, Afrique N.
p. 455, pl. 419, f. 4; *canorus*, Humb.; *melano-*
rhynchus, Mey.; *olor*, Pall. (nec Gm.); *islandicus*,
Brm.; *xanthorhinus*, Naum.; *linnæi*, Malm.
11.525. BEWICKI, Yarr., *Tr. Linn. Soc.*, 1850, II, p. 455; Asie, au N. jusqu'à la
Dress., *l. c.* VI, p. 441, pl. 419, f. 5; Dubois, Nouv.-Zemble, au
l. c. II, p. 414, pl. 250; *minor*, Keys. et Bl.; S. jusqu'en Chine et
melanorhinus, Naum.; *ferus*, Gr. (nec Briss.); Japon (accid. Eu-
americanus, Hartl. (nec Sharpl.); *altumi*, Baedek.; rope, Belgique).
islandicus, C. Dub. (nec Brm.).
5200. ? *Var. DAVIDI*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 450; Chine N.
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 494.
11.526. *COLUMBIANUS* (Ord.), *Guthr. Geogr.*, 2° Am. ed., Amérique septentr.
p. 519 (1815); Coues, *Bull. U. S. Geol. Surv. Terr.*,
1876, p. 444; *musicus*, Bp. (nec Bechst.); *bewickii*,
Sw. et Rich. (nec Yarr.); *ferus*, Shr.; *americanus*,
Sharpl.; Audub., *B. Am.* VI, p. 226, pl. 584.
11.527. *BUCCINATOR*, Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 464; Amérique N.-W. jus-
Audub., *B. Am.* VI, p. 219, pl. 582, 585; *pas-* qu'en Californie.
smori, Hncks.

- 11.528. *MANSUETUS*, Salerne, *Orn.*, p. 404 (1767 ex Lin.); Dubois, *l. c.* II, p. 416, pl. 249; *olor*, Gm.; Dress., *l. c.* VI, p. 419, pl^s 418, 419, ff. 5, 6; *gibbus*, Bechst.; *sibilus*, Pall.; *mutus*, Forst.; *gibbosus*, Kuhl; *sibilans*, Nilss.; *tuberculirostris*, C. Dub.; *immutabilis*, Pelz. (nec Yarr.); *unwini*, Hume; *pelzelni*, Stejn.; *immutabilis*, Yarr. (race domestique). Suède S., Danemark, Russie S., Caspien., Turk., Mong. (acc. Eur. centr. et mér. et dans le N.-W. de l'Inde); domestique partout en Europe.
- 11.529. *MELANOCORYPHUS* (Mol.), *Sagg. Stor. Nat. Chili*, p. 207; Salvad., *Cat.*, p. 59; *nigricollis*, Gm.; Des M., in Gay, *Hist. Chile*, I, p. 445, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 79; *melanocephala*, Gm. Amérique mérid. du 20° l. S. à Magellan et Malouines.

1858. CHENOPIS

Chenopis, Wagl. (1852); *Chenopsis*, Rehb. 1852).

- 11.530. *ATRATA* (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 854; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 215, pl. 286; Schl., *l. c.*, p. 80; *novæ-hollandiæ*, Bonn.; *plutonia*, Shaw. Australie, Tasmanie.

1859. COSCOROBA

Coscoroba, Rehb. (1852); *Pseudolor*, Gray (1855); *Pseudocynus*, Sund. (1872).

- 11.531. *CANDIDA* (Vieill.), *N. Dict.* XXIII, p. 551; Rehb., *Av. Syst. Nat.*, p. 10; Schl., *Argent. Orn.* II, p. 126; *A. coscoroba*, Mol., *Sagg. Stor. Nat. Chili*, p. 207; Gray, *Gen. B.* III, pl. 166; *anatoïdes*, King.; *hyperboreus*, D'Orb.; *chionis*, Illig. Paraguay, Uruguay, Argentine, Chili, Patagonie, Malouines.

SUBF. VII. — ANATINÆ

1840. DENDROCYGNA

Dendronessa, Wagl. (1852, nec Sw., 1851); *Dendrocygna*, Sw. (1857); *Leptotarsis*, Eyt. (1858); *Dendrocygna*, Schl. (1880).

- ✓ 11.532. *VIDUATA* (Lin.); *Pl. Enl.* 808; Eyt., *Mon. Anat.*, p. 110; C. Dub., *Orn. Gal.*, p. 71, pl. 44; Schl., *l. c.*, p. 90; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 471; *leucopsis*, Vieill. (nec Bechst.); *personata*, Württ.; ?*multicolor*, Scop.; ?*manillensis*, Gm. Antilles, Amérique mérid. jusqu'à l'Argentine, Afrique au S. du Sahara, Madagascar.
- 11.533. *FULVA* (Gm.), *S. N. I.*, p. 550; Hartl., *Syst. Verz. Ges. Mus.*, p. 118; Baird, *B. N. Am.*, 1860, pl. 65, f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1501; Hume et Marsh., *Game B.* III, p. 119, pl. 16; *bicolor*, Vieill.; *virgata*, Max.; *major*, Jerd.; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 731, pl. 272; *arcuata*, Gray (nec Horsf.); *africana*, Bp. États-Unis S., Amérique trop.; Inde, Birmanie, Afrique trop., Madagascar.

- 11.534. *ARCUATA* (Horsf. ex Cuv.), *Zool. Res. in Java*, pl. 65; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 14; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 585; *badia*, S. Müll.; *vagans*, Eyt.; *gouldi*, Bp.; *javanica*, Jerd. (nec Horsf.) Philip., Célèb., Born., Java, Timor, Sumba, Moluques, Nouv.-Guinée, Australie, Nouv.-Caléd., Fidji.
- 11.535. *JAVANICA* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 199; Rehb., *Syn. Av., Natatores*, pl. 89, ff. 171-72; Hume et Marsh., *Game Birds*, III, p. 109, pl. 15; *arcuata* (pt.), auct. plur.; *awsuree*, Syk.; *caryophyllacea*, Sund.; *var. minor*, Bp. Inde, Ceylan, Indochine, Malacca, Sumatra, Bornéo, Java.
- 11.536. *AUTUMNALIS* (Lin.); Baird, *B. N. Amer.*, p. 770, pl. 63, f. 2; id., *Mex. B. Surv.* II, 2, p. 26, pl. 25; Cory, *B. W. Ind.*, p. 261. Du Texas à Panama.
5201. *Var. DISCOLOR*, Sel. et Salv., *Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 129, 161; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 469; *autumnalis* (pt.), auct. plur. (nec L.) Amérique méridionale tropicale.
- ✓ 11.537. *ARBOREA* (Lin.); *Pl. Enl.* 804; Schl., *l. c.*, p. 84; Cory, *B. W. Ind.*, p. 50; Salvad., *Cat.*, p. 162; ?*jacquini*, Gm. Antilles et Bahama.
- 11.538. *GUTTULATA*, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 36; *guttata*, Forst., *M. S.*; Schl., *l. c.*, p. 85; Salvad., *Cat.*, p. 164, pl. 1; *punctata*, Finsch; *arcuata*, Rosenb. (nec Horsf.); *vagans*, Rosenb. (nec Eyt.) Mindanao, Célèbes, Moluques, Nouv.-Guinée.
- 11.539. *EYTONI* (Eyt. ex Gould), *Mon. Anat.*, p. 111; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 15; *versicolor*, Hartl. Australie, Nouv.-Zélande W.

1344. ALOPOCHEN

Chenalopex, Steph. (1824, nec Vieill., 1819); *Alopochen*, Stejn. (1885).

- 11.540. *ÆGYPTIACA* (Lin.); *Pl. Enl.* 579, 982, 985; Steph., *Gen. Zool.* XII, p. 43, pl. 42; Gould, *B. Eur.*, pl. 553; Shell., *B. of Egypt*, p. 279; Stejn., *Stand. N. H. B.*, p. 141, f. 66; *africanus*, Bonn.; *merganser*, Naum.; *varia*, Bechst.; *varius*, Brm. Afrique, Palestine.
- 11.541. *JUBATA* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 84, pl. 108; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 468; *polycomos*, Less. ex Cuv.; *pollicaris*, Licht. Amérique méridionale tropicale.

1842. TADORNA

Tadorna, Flem. (1822); *Vulpanser*, Keys. et Blas. (1840); *Radjah*, Rehb. (1852); *Gennawochen*, Heine (1890).

- 11.542. *CORNUTA* (S. G. Gm.), *Reis. Russl.* II, p. 185, pl. 19 (1774); Dress., *B. Eur.* VI, p. 451, pl. 420; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, Ois. II, p. 425, pl. 251; *A. tadorna*, L.; *damiatica*, Gm.; *fami-* Europe, Sibérie S., Chine N., Japon, en hiver le N. de l'Inde, le S. de la Chine et

liaris, Boie; *bellonii*, Steph.; *vulpanser*, Flem.; le N. de l'Afrique.
gibbera, etc., Brm.

- 11.545. RADJAH (Garn.), *Voy. Coq.*, Zool. I, 2, p. 502, Moluques, îles Papous,
Atlas, pl. 49; Schl., *l. c.*, p. 69; Gould, *B. Austr.* Australie.
VII, pl. 8; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* III, p. 591;
eytoni, Rchb.; *leucomelas*, Bp.

1843. STICTONETTA

Stictonetta, Rchb. (1852).

- 11.544. NEVOSA (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 177; id., *B.* Australie S. et W.,
Austr. VII, pl. 10; Schl., *l. c.*, p. 65; Salvad., Tasmanie.
Cat., p. 524.

1844. CASARCA

Casarca, Bonap. (1858); *Nettalopex*, Heine et Rchw. (1890).

- 11.545. RUTILA (Pall.), *Nov. Comm. Petrop.* XIV, I, p. 579, Eur. S. et E., Afr. N.
pl. 22, f. 1; Dress., *l. c.* VI, p. 641, pl. 421; et N.-E., Asie centr.,
casarca, L.; *rubra*, Brm. Jap., Inde N., Birm.
11.546. CANA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 510; Schl., *l. c.*, p. 67; Afrique S., du Cap au
Salvad., *Cat.*, p. 182; *ferrugineus*, Bonn.; *mon-* Transvaal.
tana, Forst., *Icon. ined.*, pl^s 69, 70; *rutila* (pt.),
Gray, Layard, Holub.
11.547. VARIEGATA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 505; Gray, Zool. Neuv.-Zélande.
Ereb. and Terr., B., p. 15, pl. 16; Schl., *P. Z. S.*,
1864, p. 491, pl. 19; Bull., *B. New Zeal.*, p. 241,
pl. 25; *picta*, Vieill. (nec Gm.); *castanea*, Eyt.;
cheneros, Forst.
11.548. TADORNOIDES (Jard. et Selby), *Ill. Orn.* II, pl. 62; Australie S. et W.,
Gould, *B. Austr.* VII, pl. 7; *kasarkoides*, Lafr.; Tasmanie.
tadornina, Heine et Rchw.

1845. ANAS

Anas, Lin. (1766); *Anassus*, Rafin. (1815); *Boschas*, Sw. (1831); *Elasmonetta*,
Salvad. (1895); *Polionetta*, Oates (1899).

- 11.549. BOSCHAS, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, pl. 422; Dubois, Europe et Asie entre le
Fne. Ill., Ois. II, p. 452, pl. 255; *fera*, *domestica*, 30° et le 70° l. N.,
Briss.; *boschas*, *adunca*, L.; *monacha*, Scop.; Islande, Greenland,
curvirostra, Pall.; *cirrhata*, *persica*, *major*, *grisea*, Amér. du 10° au 70°
naevia, *nigra*, Gm. (Aberr.); *archiboschas*, etc., l. N., Afr. N. et N.-E.
Brm.; *pallascens*, Ol.-Gall. (I).

(1) Hybrides : *A. breweri*, Aud., *Orn. Biogr.* IV, p. 302, pl. 338; = *auduboni*, Bp.; *maxima*,
Gosse, *B. Jam.*, p. 399.

- 11.550. WYVILLIANA, Sclat., *P. Z. S.*, 1878, p. 550; id., *Iles Sandwich.*
Voy. Chall., B., p. 98, pl. 22 (juv.); Rothsch.,
Avif. Lays., pl^s 78, 79; *boschas* (pt.), auct. plur.;
superciliosa, Dole (nec Gm.); *sandwichensis*, Bp.
(nom. nudum).
- 11.551. LAYSANENSIS, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, n° 4, 1892, *Ile Laysan* (Sandwich).
p. 17; id., *Ibis*, 1895, p. 250; id., *Avif. Lays.*, pl. 80.
- 11.552. MELLERI, Sclat., *P. Z. S.*, 1864, p. 487, pl. 54; *Madagascar.*
M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, Ois., p. 724,
pl. 269; *xanthorhynchus*, Roch et Newt. (nec
Forst.); *erythrorhyncha*, Scl., 1865 (nec Gm.);
morelii, Grand.; *masarina*, Vins.
- 11.555. OBSCURA, Gm., *S. N. I*, 2, p. 544; Audub., *B. Amérique N.-E., Ber-*
Am. VI, p. 244, pl. 586; Schl., *l. c.*, p. 41. *mudes.*
5202. *Var. RUBRIPES*, Brewst., *Auk*, 1902, p. 184. *De Terre-Neuve à la*
Virginie.
- 11.554. FULVIGULA, Ridgw., *Am. Nat.* VIII, 1874, p. 111; *Floride, ? Antilles.*
id., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, p. 251; *obscura* (pt.),
auct. plur.
5205. *Var. MACULOSA*, Senn., *Auk*, 1889, p. 265; *Salvad.,*
Cat., p. 205; *obscura* et *fulvigula* (pt.), *Du Texas E. au Kan-*
auct. plur. *sas.*
- 11.555. DIAZI, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 552; id., *Man. N. Mexique.*
Am. B., p. 52.
- 11.556. ABERTI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, p. 250, *Mazatlan* (Mexique).
IX, p. 175; *Salvad., l. c.*, p. 204.
- 11.557. LUZONICA, Fras., *P. Z. S.*, 1859, p. 115; id., *Zool. Philippines.*
Typ., pl. 67; Schl., *l. c.*, p. 42; *luconica*, Fsch.
- 11.558. SUPERCILIOSA, Gm., *S. N. I*, p. 557; Gould, *B. Iles de la Sonde, Nouv.-*
Austr. VII, pl. 9; *leucophrys*, Forst. (nec V.); *Guinée, Australie,*
mulleri, Bp. *Nouv.-Zélande.*
5204. *Var. PELEWENSIS*, Harth. et Fsch., *P. Z. S.*, 1872, *Iles Pelew.*
p. 108; Fsch., *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft VIII,
p. 40; *superciliosa* (pt.), auct. plur.
- 11.559. OUSTALETI, *Salvad., Bull. Br. O. Club*, XX, p. 1; *Iles Mariannes.*
id., *Cat.*, p. 189 (en note); *?freycineti*, Bp.
- 11.560. POECILORHYNCHA, Forst., in *Penn. Zool. Ind.*, p. 25, *Inde, Ceylan, Birma-*
pl. 15, f. 1; Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, *nie.*
pl. 67; Schl., *l. c.*, p. 45; Hume et Marsh., *Game*
B. Ind. III, p. 168, pl. 22; *pækilorhyncha*, Gm.;
erythrorhyncha, Vieill. (nec Gm.)
- 11.561. ZONORHYNCHA, Swinh., *Ibis*, 1866, p. 594; Dav. et *Sibérie E., Mongolie,*
Oust., *Ois. Chine*, p. 496; Seeb., *B. Jap. Emp.*, *Chine, Japon, îles*
p. 245; *pæcilorhyncha*, auct. plur. (nec Forst.); *Kouriles.*
Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 126, pl. 82.
- 11.562. UNDULATA, C. Dubois, *Orn. Gal.*, p. 119, pl. 77 *Afrique S., à l'Ouest*

- (1859); Salvad., *Cat.*, p. 212; *flavirostris*, Smith (nec Vieill.); id., *Ill. Zool. S. Afr.*, B., pl. 96; *xanthorhyncha*, Forst.; Schl., *l. c.*, p. 45; *capensis*, Licht. (nec Gm.); *rueppelli*, Blyth.
- 11.565. SPARSA, Smith, *Cat. S. Afr. Mus.*, p. 56; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, B., pl. 97; *leucostigma*, Rüpp., *Syst. Uebers.*, pp. 150, 158, pl. 48; *guttata*, Licht.
- 11.564. SPECULARIS (King), *Zool. Journ.*, 1828, p. 98; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* IV, pl. 40; *chalcoptera*, Kittl., *Mém. Acad. St-Petersb.* II, 1855, p. 471, pl. 5; Schl., *l. c.*, p. 46.
- 11.565. CRISTATA, Gm., *S. N.* I, p. 540; Schl., *l. c.*, p. 59; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 475; *specularioides*, King; *pyrrhogastra*, Meyen; *lophyra*, Forst., *Icon. Ined.*, pl. 78.
- 11.566. CHLOROTIS, Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., p. 15, pl. 20; Bull., *Man. B. New Zeal.*, p. 68; id., *Hist. B. New Zeal.*, 2^e éd. II, p. 257, pl. 42; Salvad., *Cat.*, p. 287; *aucklandica*, Hect. (nec Gr.)
- jusqu'à Angola, à l'E. jusqu'à l'Abyssinie.
- Afrique S. et E. jusqu'à l'Abyssinie.
- Du Chili central à Magellan.
- Du Pérou à Magellan, Malouines.
- Nouvelle - Zélande, Chatham.

1846. EUNETTA

Eunetta, Bonap. (1856).

- 11.567. FALCATA (Georgi), *Reise Russ. Reichs*, I, p. 467; Dress., *B. Eur.* VI, p. 525, pl. 429; Hume et Marsh., *Game B. of Ind.* III, p. 251, pl. 50; *falcata*, Pall.; *javana*, Bodd.; *javanensis*, Bonn.; *drepanopteros*, Mess.; *major*, Gm.; *multicolor*, Swinh. (nec Scop.)
- Sibérie, Japon, Chine, Inde (accidentellement Europe).

1849. CHAULELASMUS

Chauliodus, Sw. (1851, nec Bloch, 1801); *Chauliodes*, Eyt. (1858, nec Latr., 1798); *Chaulelasmus*, Gray (1858); *Ktinorhynchus*, Eyt. (1858); *Ctenorhynchus*, Agass. (1846).

- 11.568. STREPERUS (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 487, pl. 424; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 458, pl. 254; *cinearea*, *kekuschka*, Gm.; *canapiglia*, Ger.; *americanus*, Brm.
5205. Var. COUESI, Streets, *Bull. Nutt. Orn. Club*, I, p. 46; id., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1877, n° 7, p. 21; Salvad., *Cat.*, p. 226.
- Europe, Asie, Afrique entre le 60° et le 20° l. N., en Amérique du 55° au 20° l. N.
- Iles Fanning.

1848. MARECA

Mareca, Steph. (1824); *Penelops*, Kp. (1829).

- 11.569. PENELOPE (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 541, pl^s 452-55; Europe et Asie, au S.

- Dubois, *l. c.*, p. 441, pl. 225; *fistularis*, Briss.; *cogolca*, Gm.; *marigiana*, Ger.; ? *melanura*, Gm.; *kagolca*, *fistulans*, Brm.; *bimaculata*, Gray (Hybride).
- ✓ 11.570. AMERICANA (Gm.), *S. N. I.*, p. 526; Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 86, pl. 69; Audub., *B. Am.* VI, p. 259, pl. 589; Steph., *Gen. Zool.* XII, 2, p. 155.
- 11.571. SIRILATRIX (Poepp.), *Fror. Not.* XXXI, p. 10; Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 595; Sel. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 155; *chiloensis*, King; Schl., *Mus. P.-B.*, *Anseres*, p. 46; *parvirostris*, Merr.
- jusqu'à Bornéo, Afrique N. et N.-E. (accidentellement Amérique N.-E.)
- Amérique septentr. et centr., Antilles (accident. Sibérie E.)
- Chili, Paraguay, Argentine, Patagonie, Malouines.

1849. QUERQUEDULA

Querquedula, Steph. (1824); *Nettion*, Kp. (1829); *Cyanopterus*, Eyt. (1858, nec Halid., 1855); *Pterocyanea*, Bp. (1841); *Punanetta*, Bp. (1856); *Virago*, Newt. (1871); *Adelonetta*, Heine (1890).

- 11.572. VERSICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 109; Schl., *l. c.*, p. 57; Sel. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 151; *maculirostris*, Licht.; Rehb., *Syn. Av.*, *Nat.*, pl. 89, f. 181; *fretensis*, King.
- 11.573. PUNA (Licht.), *Mus. Ber.*; Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, I, p. 515; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 197, pl. 99; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 478.
- 11.574. CIRCIA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 515, pl. 429; Dubois, *Fne. Ill. Vert.*, *Ois.* II, p. 448, pl. 257; *A. querquedula*, L.; *bulbul*, Gm.; *glaucopterus*, *scapularis*, Brm.; *humeralis*, S. Mull.; *vulgaris*, Hodgs.; *pterocyanea*, Goeld.
- ✓ 11.575. DISCORS (Lin.); *Pl. Enl.* 966 et 405; Audub., *B. Am.* VI, p. 287, pl. 595; Schl., *l. c.*, p. 50; *inornatus*, Gosse, *B. Jam.*, III, pl. 111 (fem.)
- 11.576. CYANOPTERA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 104; Schl., *l. c.*, p. 51; *rafflesi*, King., *Zool. Journ.* IV, p. 97, *Suppl.*, pl. 29 (1828); Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, 1858, pl. 25; *caruleata*, Fras., *P. Z. S.*, 1845, p. 118.
- 11.577. FORMOSA (Georgi), *Reise Russ. Reich.*, p. 168; Dress., *l. c.* VI, p. 521, pl. 428; Dubois, *l. c.* II, p. 456, pl. 258^b; *glocitans*, Pall.; *baikal*, Bonn.; *torquata*, Messer.; *picta*, Stel.; *perpulchra*, Yarr.; *cucullata*, Fisch.
- 11.578. CRECCA (Lin.); Dress., *l. c.*, pl. 426; Dubois, *l. c.* II, p. 452, pl. 258; *subcrecca*, *creccoides*, Brm.; *bimaculata*, Penn. (hybride).
- Paraguay, Uruguay, Argentine, Chili, Patagonie, Malouines.
- Pérou, Bolivie, Chili N.
- Europe et Asie jusqu'au 60° latitude N., Japon, Archipel Malais, Afrique N. et N.-E.
- Amér. sept. et centr., Antilles, Colombie, Ecuador, Pérou.
- Amér. N.-W., Mexique, Amér. S.-W., Argentine, Patagonie, Malouines.
- Asie orientale jusqu'au 70° l. N., Japon, au S. jusqu'au 28° l. N. (accid. Asie W., Europe, Belgique).
- Europe et Asie jusqu'au 70° l. N., au S. jusqu'à Ceylan, Japon, Afrique N.

- ✓ 5206. *Var. CAROLINENSIS* (Gm.), *S. N. I*, p. 555; *Jard. et Sel., Ill. Orn.* III, pl. 146; *Audub., B. Am.* VI, p. 281, pl. 592; *americana*, Bonn.; *migratoria*, Bartr.; *crecca*, auct. plur. (nec L.); *sylvatica*, Vieill.; *groenlandica*, Brm. Amérique, de l'Honduras au 70° latitude N., Groenland, Antilles (accidentellement Europe).
- 11.579. *CASTANEA* (Eyt.), *Mon. Anat.*, p. 119, pl. 22; A. Newt., *P. Z. S.*, 1871, p. 649; *punctata*, Cuv. (nec Burch.); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 11. Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande.
- 11.580. *SALVADORII*, Büttik., *Notes Leyd. Mus.*, 1896, p. 59. Ile Sumba.
- 11.581. *GIBBERIFRONS* (S. Müll.), *Verh. Land- en Volkenk.*, p. 159; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 185; Schl., *l. c.*, p. 58; *Scl., P. Z. S.*, 1882, p. 455, pl. 55; *Salvad., Orn. Pap.* III, p. 598; *id., Cat.*, p. 254, pl. 2, f. 2; *punctata*, Gould; *gracilis*, Bull.; *castanea*, auct. plur. (nec Eyt.) Célèbes, îles de la Sonde, Nouv.-Guinée, Nouv.-Calédonie, Australie, Nouv.-Zélande.
5207. *Var. ALBOGULARIS* (Hume), *Str. Feath.* I, p. 505; *Salvad., Cat.*, p. 257, pl. 2, f. 1; *andamensis*, Tytl. (*descr. nulla*); *gibberifrons*, auct. plur. (nec Müll.) Iles Andaman.
- 11.582. *BERNIERI*, Hartl. (ex J. Verr.), *J. f. O.*, 1860, p. 173; *id., Vög. Madag.*, p. 365; M.-Edw. et Grand., *H. Madag., Ois.*, p. 726, pl. 270; *assimilis* (pt.), Schl.; *vinsoni*, Grand.; *gibberifrons*, Grand. (nec Müll.) Madagascar.
- 11.583. *CAPENSIS* (Gm.), *S. N. I*, 2, p. 527; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 758; *larvata*, Cuv.; *georgica*, Gr. (nec Gm.); *assimilis*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 75. Afrique S. jusqu'à l'Angola à l'Ouest et le Choa à l'Est.
- 11.584. *FLAVIROSTRIS* (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 107; *Scl. et et Huds., Argent. Orn.* II, p. 151; *creccoides*, King.; Cass., *U. S. Astron. Exped.* II, p. 205, pl. 26; *oxyptera*, Hartl. (nec Meyen). Brésil S., Argentine, Chili, Patagonie, îles Malouines.
5208. *Var. OXYPTERA* (Meyen), *Nov. Act. XVI, Suppl.*, p. 121, pl. 26; Tsch., *Faun. Per.*, pp. 55, 509; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 476; *creccoides* (pt.), Gr.; *angustirostris*, Ph. et Landb. (nec Ménétr.); *flavirostris* (pt.), Schl. Chili septentrional et Pérou (Andes).
- 11.585. *ANDIUM*, *Scl. et Salv., Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 129, 162; *id., P. Z. S.*, 1875, p. 257, 1876, p. 587, pl. 54. Ecuador et Vénézuéla (Andes).
- 11.586. *GEORGICA* (Gm.), *S. N. I*, 2, p. 516; *N. georgicum*, *Salvad., Cat.*, p. 264; *xanthorhyncha*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 71; *eatoni*, Cab. (nec Sharpe); *antarctica*, Cab., *J. f. O.*, 1888, p. 118, pl. 1. Géorgie S.
- 11.587. *PUNCTATA* (Burch.), *Travels.* I, p. 285 (1822); *Scl., P. Z. S.*, 1880, pp. 522, 554; *hottentota*, Smith (1857); *id., Ill. S. Afr. Zool.*, pl. 105; *pileata*, Afrique S., à l'Ouest jusqu'à l'Angola, à l'Est jusqu'au Choa,

- Licht.; *madagascariensis*, Grand.; *cyanorhyn-* Madagascar.
cha, Böhm.
- 11.588. *BRASILIENSIS* (Briss.); Gm., *S. N.* I, 2, p. 517; Burm., Amérique méridionale
Th. Bras. III, p. 459; Schl., *l. c.*, p. 61; *mareca*, de la Colombie et
Bonn.; *ipecutiri*, Vieill.; *paturi*, Spix, *Av. Bras.* des Guyanes à Ma-
II, p. 85, pl. 109; *erythrorhyncha*, Eyt. (nec Gm.); gellan.
novæ-hispaniæ, Rehb. (nec Gm.)
- 11.589. *TORQUATA* (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 110 (nec Briss. Brésil S., Paraguay,
neque Gm.); Schl., *l. c.*, p. 61; Schl., *Argent.* Uruguay, Argen-
Orn. II, p. 152; *leucophrys*, Vieill.; *manillensis*, tine.
Eyt. (nec Gm.); *rubidoptera*, C. Dub., *Orn. Gal.*,
p. 90, pl. 57; *rhodopus*, Merr.
1850. DAFILA
- Dafila*, Leach (1824); *Trachelonetta*, Kp. (1829); *Phasianurus*, Wagl. (1852);
Pacilonitta, Eyt. (1858); *Pacilonetta*, Agass. (1842-46); *Daphila*, Cones
(1874); *Dafilula*, Cones (1897).
11590. *ACUTA* (Lin., 1758); Dress., *B. Eur.* VI, p. 551, Europe, Asie et Amé-
pl² 450, 451; Dubois, *Fuc. Ill.*, *Ois.* II, p. 445, rique entre le 70° et
pl. 256; *longicauda*, Briss.; *subulata*, Gm.; le 10° lat. N., Afri-
alandica, Sparrm.; *sparrmanni*, Lath.; *cauda-* que N., Groenland,
cuta, Pall.; *tzitzihua*, Vieill.; *caudata*, Brm.; Islande, Japon.
americana, Bp.; ?*modesta*, Tristr., *P. Z. S.*, 1886,
p. 79, pl. 7.
- 11.591. *SPINICAUDA* (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 155; Schl., *l. c.*, Du S. du Brésil et du
p. 58; Sclat., *P. Z. S.*, 1870, p. 665, pl. 58; Pérou jusqu'à Ma-
oxyura, Licht.; *urophasianus* (Schl., 1860, nec gellan et les îles
Vig.); *caudacuta*, Burm. (nec Pall.) Malouines.
- 11.592. *EATONI* (Sharpe), *Ibis*, 1875, p. 528; id., *Trans.* Iles Kerguelen et Cro-
Ven. Exp., Zool., Birds, p. 5, pl. 6; Salvad., zette.
Cat., p. 278, pl. 5; Cones, *Auk*, 1897, p. 207.
- ✓ 11.595. *BAHAMENSIS* (Catesb.), *Carolina*, I, p. 95, pl. 95 Bahama, Antilles, Amé-
(1754); Lin., *S. N.* (1766); Tacz., *Orn. Pér.* III, rique méridionale,
p. 482; *ilathera*, Bonn.; *rubrirostris*, Vieill.; îles Malouines.
urophasianus, Vig.; id., *Zool. Beechey's Voy.*,
Orn., p. 51, pl. 14; *vigorsii*, Wagl.; *fimbriata*,
Merr.
5209. *Var. GALAPAGENSIS* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Iles Galapagos.
1889, p. 115; *bahamensis* (pl.)₂ auct. plur.
- 11.594. *ERYTHORHYNCHA* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 517; Smith, Sud de l'Afrique jus-
Ill. S. Afr. Zool., B., pl. 104; Schl., *l. c.*, p. 56; qu à l'Angola à
melanura, Vieill. (nec Gm.); *punctata*, Rehb. (nec l'Ouest et l'Abyssinie
Burch.); *pyrrhorhyncha*, Holub. à l'Est, Madagascar.

1851. NESONETTA

Nesonetta, Gray (1844).

- 11.595. AUCKLANDICA, Gray, *Gen. B.* III, p. 627; id., *Voy. Ereb. and Terr.*, B., p. 16, pl. 17; *Salvad., Cat.*, p. 289. Ile Auckland.

1852. SPATULA

Spatula, Boie (1822); *Rhynchaspis*, Steph. (1824); *Spatulea*, Flem. (1828); *Clypeata*, Less. (1828); *Rhynchasmus*! Koenig, 1895.

- 11.596. CLYPEATA (Briss., 1760; Lin. 1766); Dress., *B. Eur.* VI, p. 497, pl. 425; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 428, pl. 252; *mestolone*, Ger.; *rufigaster*, Lath.; *mexicana*, *rubens*, Gm.; *macrorhynchos*, etc., Brm.; *virescens*, Syk.; *spatulata*, C. F. Dub. Europe, Asie et Amérique du 10° latitude N. au cercle polaire, Afrique N. et N.-E.
- 11.597. RHYNCHOTIS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 70; Schl., *l. c.*, p. 55; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 12; Legge, *B. Ceyl.*, p. 1088; *variegata*, Gould; id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 80. Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande.
- 11.598. PLATALEA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 157; Schl., *l. c.*, p. 55; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 480; *maculatus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 147; *caesiocapula*, Rehb.; *caesiocapulata*, Bibra; *mexicana*, Licht. (nec Gm.) Amérique méridionale, du Pérou et du Paraguay à Magellan et Malouines.
- 11.599. CAPENSIS (Smith), *Cat. S. Afr. Mus.*, p. 56; id., *Ill. S. Afr. Zool.*, B., pl. 98; Boc., *Orn. Angola*, p. 504; *clypeata* (pt.), Schl.; *smithii*, Hart. Afrique S. jusqu'à l'Angola et le Transvaal.

1853. MALACORHYNCHUS

Malacorhynchus, Sw. (1851).

- 11.600. MEMBRANACEUS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 69; Sw., *Journ. R. Inst.* II, n° IV, p. 18; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 15; *fasciata*, Shaw.; *iodotis*, Less.; *malacorhyncha*, Schl., *l. c.*, p. 56 (nec Gm.) Australie, Tasmanie.

1854. MARMARONETTA

Marmaronetta, Rehb. (1852); *Marmonetta* (laps.), Marl. (1868).

- 11.601. ANGUSTIROSTRIS (Méuétr.), *Cat. rais. Cauc.*, p. 58; Schl., *l. c.*, p. 65; Dress., *B. Eur.* VI, p. 479, pl. 425; *marmorata*, Gould; id., *B. Eur.* V, pl. 573; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 182. Canaries, Eur. S.-W., Afrique N., Palestine, Caucase, Perse jusqu'à l'Inde.

1855. HETERONETTA

Heteronetta, Salvad. (1865).

- 11.602. MELANOCEPHALA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 165; Cass., Brésil S., Uruguay,
U. S. Astron. Exp. II, p. 202, pl. 25; Salvad., Argentine, Chili.
Atti Soc. Ital. Sc. Nat. VIII, p. 574; Sci. et
Huds., *Argent. Orn.* II, p. 150; *atricapilla*, Merr.;
Salvad., *Cat.*, p. 525; *nigriceps*, Licht.

SUBF. VIII. — FULIGULINÆ

1856. NETTA

Branta, Boie (1822, nec Scop., 1769); *Netta*, Kaup (1829); *Callichen*, Brm. (1830);
Mergoides, Eyl. (1856).

- 11.603. RUFINA (Pall.), *Reise*, II, *App*, p. 715; Dress., *B.* Europe méridionale
Eur. VI, p. 559, pl. 455; Dubois, *Fne.* III, et centrale, et de la
Ois. II, p. 462, pl. 259; *cinerea*, Gm.; *ruficeps*, mer Caspienne au
Pall.; *subrufinus*, *micropus*, Brm.; *ruficrista*, Turkestan jusqu'au
C. Dub. N.-W. de l'Inde.

1857. METOPIANA

Metopiana, Bonap. (1856); *Metopius*, Heine (1890).

- 11.604. PEPOSACA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 152; Bp., *C. R.* Brésil S., Paraguay,
XLIII, p. 649; Sci., *P. Z. S.*, 1870, p. 666, pl. 57; Uruguay, Argen-
Sci. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 157; *metopias*, tine, Chili.
Pöpp.; *albipennis*, Licht.

1858. AETHYIA

Aythia, Boie (1822); *Nyroca*, Flem. (1822); *Aethyia*, Agass. (1846); *Marila*,
Rehb. (1852); *Aristonetta*, Baird (1858); *Ilyonetta*, Heine (1890).

- 11.605. FERINA (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 551, pl. 454; Dubois, Europe et Asie du 62°
l. c., p. 472, pl. 262; *ruficollis*, Scop.; *erythro-* au 20° l. N., Japon
cephala, S. Gm.; *rufa*, Gm.; *ruficeps*, Brm. (4). (accident. Islande);
Afrique N. et N.-E.
✓ 5210. Var. AMERICANA (Bp.), fide Eyl., *Mon. Anat.*, Du Mexique au 55°
p. 155; *ferina* (pl.), Gm. et auct. plur.; latitude N., Antil-
Audub., *B. Am.* VI, p. 511, pl. 596; *ery-* les, Bahama.
throcephala, Bp. (nec Brm.)

(1) Hybrides : *marilloides*, Yarr.; *ferinoides*, Bartl.; *leucoptera*, A. Newt.; *homeyeri*, Bäd.;
intermedia, Jaub.

- 11.606. *BAERI* (Radde), *Reis. S. O. Sibir.* II, p. 376, pl. 43; *Ibis*, 1866, p. 118; Salvad., *Cat.*, p. 544; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 507; *leucophthalmos*, Kittl. (nec Borkh.); *ferina*, Swinh. (err.); *nyroca*, Dav. (nec Güld.); *ferruginea*, Blak. et Pry. (nec Gm.)
- 11.607. *NYROCA* (Güld.), *Nov. Comm. Petrop.* XIV, 1, p. 405 (1769); Dubois, *l. c.* II, p. 477, pl. 265; *rutila*, *scandiaca*, Lath.; *africana*, *ferruginea*, Gm.; Dress., *l. c.* VI, p. 581, pl. 458; *egyptiaca*, Bonn.; *leucophthalmus*, Borkh.; *leucopis*, Naum.; *glaucon*, Pall. (nec L.); *obsoleta*, Brm.
5211. *Var. INNOTATA* (Salvad.), *Bull. Br. Orn. Club*, 1894, p. 2; id., *Ibis*, 1895, p. 156; id., *Cat.*, p. 550, pl. 4; *nyroca*, A. M.-Edw. (nec Güld.)
- 11.608. *AUSTRALIS* (Eyt.), *Mon. Anat.*, p. 160; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 16; Schl., *l. c.*, p. 50; *baeri*, Rothsch. et Harl., *Zool. Res.* I, p. 684 (nec Radde).
- 11.609. *ERYTHROPHALMA* (Max.), *Beitr.* IV, p. 929; Burm., *Syst. Uebers. Th. Bras.* III, p. 458; Salvad., *Ibis*, 1896, p. 99.
5212. *Var. NATONI* (Schl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1877, p. 522, 1878, p. 477, pl. 52; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 484.
5213. *Var. BRUNNEA* (Eyt.), *Mon. Anat.*, p. 161, pl. 25; Salvad., *Cat.*, p. 551; *capensis*, Cuv. (nec Gm.); Schl., *Mus. P.-B., Anseres*, p. 51; *mariloides*, Blyth (nec Yarr.); *meridionalis*, Hart.
- ✓ 11.610. *VALLISNERIA* (Wils.), *Am. Orn.* VIII, p. 108, pl. 70, f. 5; Audub., *B. Am.* VI, p. 299, pl. 595; *erythrocephala*, Licht. (nec Brm.); *valisneriana*, Schl., *l. c.*, p. 25.

Asie orientale du Kamtschatka jusqu'en Chine et Japon et le N.-E. du Bengale.

Europe, Asie et Afrique entre le 20° et le 56° latitude N., rarement plus au Nord.

Madagascar.

Australie, Tasmanie, Nouv.-Zél., Nouv.-Guinée, Waigiou. Brésil S. et central.

Pérou.

Afrique S. jusqu'à l'Angola et le Choa.

Amérique septentrionale et centrale, de l'Alaska au Guatemala et Antilles.

1859. FULIGULA

Fuligula, Steph. (1824); *Fulix*, Sundev. (1856); *Marila*, Bp. (1856, nec Rehb., 1852); *Nettarion*, Baird (1858).

- 11.611. *MARILA* (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 563, pl. 456; Dubois, *l. c.* II, p. 468, pl. 261; *frenata*, Sparrm.; *islandica*, *leuconotos*, Brm.; *gesneri*, Eyt.; *marina*, Sw.; *mariloides*, Vig.; *marila nearctica*, Slejn.
- ✓ 5214. *Var. AFFINIS*, Eyt., *Mon. Anat.*, p. 157; Baird, *Birds N. Amer.*, p. 791; Schl., *l. c.*, p. 28; *marila* (pt.), auct. plur.; Audub., *B. Am.* VI, p. 516, pl. 597; *minor*, Bell; *marila americana*, Schl.; *mariloides*, auct. plur. (nec Vig.)

Europe, Asie, Amérique et Afrique du 20° au 70° latit. N.

Amérique septentrionale et centrale du Guatemala et des Antilles au 70° latitude N.

- 11.612. CRISTATA (Leach), *Syst. Cat. M. and B. Br. Mus.*, p. 59; Dress., *l. c.*, VI, p. 575, pl. 457; Dubois, *l. c.* II, p. 465, pl. 260; *A. fuligula*, L.; ?*colymbis*, Pall.; *vulgaris*, Hodgs.; *patagiata*, Brm.; *latirostris*, Bp.; *arctica*, Degl. et G.; *linnei*, Malm. Europe, Asie et Afrique du 10° au 70° l. N., Philippines, gr. îles de la Sonde, Mariannes et Pelew.
- 11.613. NOVÆ-ZEALANDIÆ (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 542; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., p. 16, pl. 18; Schl., *l. c.*, p. 29; Bull., *Hist. B. New Zeal.*, p. 259, pl. 27, f. 2; *atricilla*, Forst. Nouvelle-Zélande.
- ✓ 11.614. COLLARIS (Donov.), *Brit. B.* VI, pl. 147; Schl., *l. c.*, p. 26; *fuligula*, Wils. (nec L.); *ruftorques*, Bp.; Audub., *B. Am.* VI, p. 520, pl. 398. Amér. sept. et centr. jusqu'au Guatémala et les Antilles.

1860. TACHYERES

Micropterus, Less. (1828, nec Lacép., 1802); *Tachyeres*, Owen (1875).

- 11.615. CINEREUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 506; Scf. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 402; *brachyptera*, Lath.; Quoy et Gaim., *Voy. Uran.*, Zool., p. 159, pl. 59; *patachonica*, King; *pteneros*, Forst.; *macropterus*, Gigl. Du Chili à Magellan et îles Malouines.

1861. CLANGULA

Clangula, Leach (1819); *Glaucion*, Kp. (1829, nec Oken, 1816); *Bucephala*, Baird (1859); *Glaucionetta*, *Charitonetta*, Stejn. (1885).

- 11.616. GLAUCION (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 595, pl. 440; Dubois, *l. c.* II, p. 482, pl. 264; *A. clangula*, L.; *peregrina*, S. Gm.; *melanocephala*, Herm. (nec Gm.); *hyemalis*, Pall. (nec L.); *chrysophthalmos*, Steph.; *vulgaris*, Flem.; *peregrina*, *leucomelus*, Brm. (1). Europe et Asie du 30° au 71° l. N., Japon.
5215. Var. AMERICANA, Bp., *Comp. List*, p. 58; Baird, *B. N. Am.*, p. 796; *clangula* et *glaucion* (pl.), auct. plur. Amérique septentrionale du 70° l. N. au Mexique et Cuba.
- 11.617. ISLANDICA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 541; Dress., *l. c.* VI, p. 605, pl. 441; Dub., *l. c.* II, p. 486, pl. 265; *scapularis*, Brm.; *barrowi*, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 456, pl. 70. Islande, Groenland, Amérique arctique, jusqu'au centre des États-Unis en hiver.
- 11.618. ALBEOLA (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 589, pl. 459; Audub., *B. Am.* VI, p. 569, pl. 408; *bucephala*, *rustica*, Lin. Amér. sept. de l'Alaska et du Labrador jusqu'au Mexique (accident. Europe).

(1) Hybrides : *anatarsus*, Eimb.; *angustirostris*, Brm.; *mergoïdes*, Kjārb.; *mergiformis*, Cabot.

1862. HARELDA

Harelda, Steph. (1824); *Pagonetta*, Kp. (1829); *Crymonessa*, Macg. (1842); *Melonetta*, Sundev. (1872).

- 11.619. *GLACIALIS* (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 617, pl^s 445, 444; Dubois, *l. c.* II, p. 489, pl. 267; *hyemalis*, Lin.; *miclonia*, Bodd.; *brachyrhynchos*, Beseke; *leucocephala*, Bechst.; *longicauda*, Leach; *faberi*, etc., Brm. Zone arctique jusqu'au Spitzberg et la Nouv.-Zemble, descend en hiver jusque vers le 40° l. N.

1863. HISTRIONICUS

Histrionicus, Less. (1828); *Cosmonessa* et *Cosmonetta*, Kp. (1829); *Phylaconetta*, Brandt (1847); *Phylaconetta*, Baird (1858).

- 11.620. *MINUTUS* (Lin.); Dress., *B. of Eur.* VI, p. 615; *histrionica*, Lin.; Dubois, *Fne. Ill. Vert.*, Ois. II, p. 488, pl. 266; *histrionis*, Midd.; *torquata*, Brm. Islande (accid. Europe), Asie N.-E., Japon, Amér. arct. jusqu'au centre des Ét.-Unis.

1864. OEDEMIA

Oidemia, Flem. (1822); *Melanitta*, Boie (1822); *Ania*, Leach (1824); *Maceranas*, *Macrorhamphus*, Less. (1828); *Pelionetta*, Kp. (1829); *OEdemia*, Strickl. (1841); *Melanonetta*, Sundev. (1872).

- 11.621. *NIGRA* (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 665, pl. 449; Dubois, *l. c.* II, p. 500, pl. 270; ?*cinerea*, S.Gm.; *cinerascens*, Bechst.; *atra*, Pall.; *nigripes*, etc., Brm. Europe et Asie jusqu'au 74° l. N.; dépasse rarem. le 50° en hiv.
5216. *Var. AMERICANA*, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 450; Baird, *B. N. Amer.*, p. 807; *nigra* (pt.), auct. plur. (nec L.); Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 155, pl. 72; *wilsoni*, Gieb.; *nigra*, *var. americana*, Ridgw. Amérique septentrionale et N.-E. de l'Asie, en hiver jusqu'en Californie et le Japon.
- 11.622. *FUSCA* (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 657, pl. 448; Dubois, *l. c.* II, p. 505, pl. 271; *notata*, Bodd.; *carbo*, Pall.; *fuliginosa*, Bechst.; *hornschuchii*, *megapus*, etc., Brm.; *lugubris*, C. Dub. Europe et Sibérie W. jusqu'au Spitzberg et Nouv.-Zemble, au S. jusq. 40° en hiv.
5217. *Var. DEGLANDI*, Bonap., *Rev. crit.*, p. 108; *fusca*, auct. plur. (nec L.); *velvetina*, Cass.; Baird, *B. N. Am.*, p. 805; *bimaculata*, Bd. Amérique septentrionale, en hiver jusqu'au 40° l. N.
5218. *Var. STEJNEGERI*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 112; Seeb., *B. Jap. Emp.*, p. 250; *fusca*, *deglandi*, *velvetina* (pt.), auct. plur.; *carbo*, Salvad., *Cat.*, p. 441 (nec Pall.) Asie N.-E., en hiver Chine et Japon; ?Amérique N.-W.
- 11.625. *PERSPICILLATA* (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 669, pl. 450; Dubois, *l. c.* II, p. 506, pl. 272; *latirostris*, Bodd.; *troubridgii*, Baird, *B. N. Am.*, p. 806. Amér. jusq. 70° l. N., en hiver jusqu'à la Jamaïque et la Basse Calif.; Asie N.-E. (accid. Eur. N.-W.)

1863. CAMPTOLÆMUS

Kamptorhynchus, Eyt. (1838, nec Cuv.); *Camptorhynchus*, Bp. (1838); *Camptolæmus*, Gray (1841); *Camptolæmus*, Licht. (1854).

- 11.624. *LABRADORIUS* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 537; *labradora*, Amér. N.-E., en hiver
Lath.; Aud., *B. Am.* VI, p. 529, pl. 400; Schl., jusqu'à la Nouv.-
l. c., p. 19; *grisea*, Leib. (juv.); *labradorica*, Jersey et les grands
Hall. lacs (*éteint*).

1866. SOMATERIA

Somateria, Leach (1819); *Ganza*, Merr. (1819); *Platypus* (pt.), Brm. (1824); *Macropus*, Nutt. (1854, nec Spix, 1824); *Polysticta*, Eyt. (1856); *Eniconetta*, Gray (1840); *Stelleria*, Bp. (1842); *Heniconetta*, Agass. (1846); *Erionetta*, Coues (1884).

- 11.625. *MOLLISSIMA* (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 629, pl. 445; Europe arct. et N.-W.,
Dubois, *l. c.* II, p. 495, pl. 268; *septentrionalis*, en hiver jusque sur
Ger.; *cuthberti* (pt.), Pall.; *lanuginosus*, Leach; les côtes de Belgi-
danica, etc., Brm.; *thulensis*, Malmgr. que et de France.
5219. ? *Var. BOREALIS* (Brm.), *Lehrb. eur. Vög.*, p. 815; Amér. arct., Groenland,
leisleri et *planifrons*, Brm.; *mollissima* (pt.), en hiver jusq. côtes
auct. plur. (nec L.) N.-E. des Ét.-Unis.
5220. *Var. DRESSERI*, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, Amérique N.-E., en
1877, p. 51, f. 2 (tête); Dress., *l. c.* VI, hiver les côtes orien-
p. 642, f. 2 (tête); Coues, *B. N.-West*, p. 580; tales des États-Unis
Salvad., *Cat.*, p. 424; *mollissima* (pt.), et les grands lacs.
auct. plur.
11.626. *V-NIGRA*, Gray, *P. Z. S.*, 1855, p. 212, pl. 107; Amérique N.-W.,
Baird, *B. N. Am.*, p. 810; Ell., *Ill. Am. B.*, Asie N.-E.
pl. 48; *cuthberti* (part.), Pall.; *mollissima*, Tacz.
(nec L.)
11.627. *SPECTABILIS* (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 645, pl. 446; Europe arct. W. et
Dubois, *l. c.* II, p. 499, pl. 269; *beringii*, Gm.; acc. Europe N.-W.;
megarhynchus, etc., Brm.; *superba*, Leach. Amér. arct., en hiv.
jusqu'aux gr. lacs.
11.628. *STELLERI* (Pall.), *Spic. Zool.*, fasc. VI, p. 55, pl. 5; Zone arct. et subarct. :
id., *Zoogr.* II, p. 258, pl. 68; Dress., *l. c.* VI, Alaska, Groenland,
p. 649, pl. 447; *dispar*, Sparrm.; *occidua*, Bonn. Islande, Norwège
jusq. Kamtschatka.

1867. LAMPRONETTA

Lampronetta, Brandt (1849); *Arctonetta*, Gray (1855).

- 1.629. *FISCHERI*, Brandt, *Mém. Acad. St-Petersb.*, 1849, Côtes de l'Alaska, mer
pp. 6, 10, 14, pl. I, ff. 1-4; Gray, *P. Z. S.*, 1855, de Behring, Asie
p. 211, pl. 108; Baird, *B. N. Am.*, p. 805. N.-E. jusqu'au Delta
de la Lena.

SUBF. IX. — ERISMATURINÆ

1868. THALASSIORNIS

Thalassornis, Eyt. (1858); *Thalassiornis*, Gray (1844).

- 11.650. LEUCONOTA (Smith), *Cat. S. Afr. Mus.*, p. 57; Afrique S. jusqu'au
Eyt., *Mon. Anat.*, p. 168; Gray, *Gen. B.* III, Loango à l'Ouest et
pl. 169, f. 1; Smith, *Ill. S. Afr. Zool.*, pl. 107; le Choa à l'Est.
brevipennis, Licht.
5221. *Var. INSULARIS*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Madagascar.
1897, p. 678; *leuconotus* (pl.), auct. plur.
(nec Smith).

1869. NOMONYX

Nomonyx, Ridgw. (1880).

- ✓ 11.651. DOMINICUS (Lin.); *Pl. Enl.* 967, 968; Burm., *Th. Amér. trop., Antilles,*
Bras. III, p. 459; Baird, *B. N. Am.*, pp. 811, au S. jusqu'au Chili
925; id., ed. 1860, pl. 92; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. et l'Argentine (acci-*
Mus., 1880, p. 15; *spinosa*, Gm.; *ortygoides*, dentellement États-
Gosse, *B. Jum.*, p. 406. Unis E.)

1870. ERISMATURA

Oxyura, Bp. (1828, nec Sw., 1827); *Erismatura*, Bonap. (1852); *Cerconectes*,
Wagl. (1852); *Gymnura*, Nutt. (1854); *Undina*, Gould (1857); *Bythoessa*,
Glog. (1842).

- 11.652. LEUCOCEPHALA (Scop.), *Ann. I. Hist. Nat.*, p. 65; Afrique N., Europe S.
Savig., *Descr. de l'Égypte*, I, 4, p. 515, pl. 10, jusqu'au Turkestan,
f. 2; Shell., *B. of Eg.*, p. 291, pl. 12; *mersa*, le S. de la Sibérie et
Pall.; *hyberna*, Ger.; *ruthenica*, Holl.; *uni- le N.-W. de l'Inde.*
fusciata, Eyt., *Mon. Anat.*, pl. 24, f. 1.
✓ 11.653. JAMAICENSIS (Gm.), *S. N.* 1, 2, p. 519; *rubida*, Wils., Amérique septentr.,
Am. Orn. VIII, p. 128, pl. 71, ff. 5, 6; Audub., de la baie d'Hudson
B. Am. VI, p. 524, pl. 599; Schl., *l. c.*, p. 11; jusqu'à la Colombie
ferruginea, Frantz. et Antilles.
11.654. MACCOA (Smith), *Cat. S. Afr. Mus.*, p. 57; id., *Ill. Afrique S., à l'E. jus-*
Zool. S. Afr., pl. 108, 109; Eyt., *Mon. Anat.*, qu'au Choa.
p. 169; Schl., *l. c.*, p. 10; *africana*, Rehb.
11.655. FERRUGINEA, Eyt., *Mon. Anat.*, p. 170; Gray, *Gen. Bolivie, Pérou.*
B. III, pl. 169; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 484.
5222. *Var. ÆQUATORIALIS*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* Ecuador.
XXVII, p. 450.
5225. *Var. VITTATA*, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1860, 1, Chili, Uruguay, Ar-
p. 26; Salvad., *l. c.*, p. 450; *ferruginea*, gentine, Patagonie.
auct. plur. (nec Eyt.); Schl., *Argent. Orn.* II,
p. 158; *cyanorhyncha*, Licht.

- 11.636. AUSTRALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 85; id., *B. Austr.* VII, pl. 17; Eyt., *Mon. Anat.*, p. 172; Schl., *l. c.*, p. 11. Australie S. et W., Tasmanie.

1871. BIZIURA

Biziura, Steph. (1824); *Hydrobates*, Tem. (1826).

- 11.637. LOBATA (Shaw), *Nat. Misc.* VIII, pl. 255; Tem., *Pl. Col.* 406; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 18; *carunculata*, Vieill.; *novæ-hollandiæ*, Steph. Australie, Tasmanie.

SUBF. X. — MERGANETTINÆ

1872. SALVADORINA

Salvadorina, Rothsch. et Hart. (1894).

- 11.638. WAIGUENSIS, Rothsch. et Hart., *Novit. Zool.* I, p. 685, II, p. 22, pl. 5; Salvad., *Cat.*, p. 454. Waigiou.

1875. HYMENOLÆMUS

Malacorhynchus, Wagl. (1852, nec Sw., 1851); *Hymenolaimus*, Gray (1845); *Hymenolemus*, Agass. (1846).

- 11.639. MALACORHYNCHUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 526; Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1845, p. 570; id., *Gen. B.* III, pl. 168; Bull., *B. New Zeal.*, ed. 2, p. 276, pl. 45; *forsterorum*, Wagl. Nouvelle-Zélande.

1874. MERGANETTA

Merganetta, Gould (1844); *Raphipterus*, Gay (1844).

- 11.640. ARMATA, Gould, *P. Z. S.*, 1841, p. 95; Gray, *Gen. B.* III, pl. 170 (mas.); Des M., *Icon. Orn.*, pl. 48 (fem.); *chilensis*, Gay; Des M., *l. c.*, pl. 5 (mas.)
5224. *Var.* FRENATA, Salvad., *Cat. B.* XXVII, p. 458, pl. 5. Chili (Andes).
11.641. TURNERI, Sclat. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 600; id., *Exot. Orn.*, p. 199, pl. 100. Chili central.
11.642. GARLEPPI, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1894, p. 110; Salvad., *l. c.*, p. 460; *leucogenys* (pt.), Rehw. (1882). Andes du S. du Pérou.
11.643. LEUCOGENYS (Tsch.), *Arch. f. Nat.*, 1845, I, p. 590, 1844, I, p. 516; id., *Faun. Per.*, pp. 55, 511, pl. 56; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 486; *armata* (pt.), auct. plur. Bolivie et Tucuman (Andes).
11.644. COLUMBIANA, Des Murs, *Rev. Zool.*, 1845, p. 179; id., *Icon. Orn.*, pl. 6; Salvad., *Cat.*, p. 462; *armata* et *leucogenys* (pt.), auct. plur. Pérou (Andes).
Vénézuéla, Colombie, Ecuador (Andes).

SUBF. XI. — MERGINÆ

1875. MERGUS

Mergus, Lin. (1766); *Mergellus*, Selby (1840).

- 11.645. ALBELLUS, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 699, pl^e 454, 455; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 509, pl. 273; *glacialis*, Brünn.; *minutus*, Lin.; *albulus*, *pannonicus*, Scop.; *cinereus*, *minor*, Ger.; *furcifer*, Bes.; *mustelinus*, *panocicus*, *maculatus*, Bechst. Europe et Asie jusqu'au cercle polaire, au S., en hiver, jusqu'à 30° l. N., Afr. N., Japon (accid. Amér. sept.)

1876. LOPHODYTES

Lophodytes, Rehb. (1852).

- ✓ 11.646. CUCULLATUS (Lin.); Audub., *B. N. Am.* VI, p. 402, pl. 415; Schl., *l. c.*, p. 5; Baird, *B. N. Am.*, p. 816; Gould, *B. Gr. Brit.* V, pl. 36; *fuscus*, Steph. Amér. sept., du Groenland et de l'Alaska au Mexique et Cuba (acc. Europe occid.)

1877. MERGANSE

Merganser, Briss. (1760); *Mergus* (pt.), auct. plur.; *Prister*, Heine (1890).

- 11.647. CASTOR (Lin.); Schaeff., *Mus. Orn.*, p. 67; *merganser*, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 685, pl. 452; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 515, pl. 274; *gulo*, Scop.; *asiaticus*, S. Gm.; *rubricapillus*, Gm.; *raucedula*, *æthiops*, Schaeff.; *raii*, Leach; *orientalis*, Gould (pt.); *aldrovandi*, Rehb.; *major*, C. F. Dub.; *pusillus*, Eyt. Europe et Asie jusqu'au 70° latit. N.; en hiver dans le S. de l'Europe, en Chine et au Japon.
3225. Var. COMATA, Salvad., *Cat. B.*, p. 475; *serrator*, Hodgs. (nec L.); *orientalis* (pt.), Gould; *castor* et *merganser* (pt.), auct. plur. (nec L.); Hume et Marsh., *Game B. of Ind.* III, p. 299, pl. 40. Asie centrale, Himalaya jusqu'à l'Assam, Mongolie W.
3226. Var. AMERICANA (Cass.), *Pr. Ac. Philad.*, 1855, p. 187; Baird, *B. N. Am.*, p. 815; Stejn., *Orn. Expl. Kamtsch.*, p. 177; *merganser*, Wils. (nec L.); Audub., *B. Am.* VI, p. 387, pl. 441; *castor*, Bp. (nec L.) Amérique septentrionale jusqu'au 70° latitude N., en hiver jusqu'au 30° (accid. Bermudes).
- 11.648. SQUAMATUS (Gould), *P. Z. S.*, 1864, p. 184; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 511; Salvad., *Cat.*, p. 478; Grant, *Ibis*, 1900, p. 602, pl. 12. Chine S.
- 11.649. SERRATOR (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 695, pl. 455; Dubois, *l. c.* II, p. 518, pl. 275; *leucomelas*, *niger*, Gm.; *cristatus*, Leach (ex Briss.) Europe, Asie, Amér. du 70° au 33° l. N. (accid. Afrique N.)

- 11.650. AUSTRALIS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.*, 1841, Iles Auckland.
p. 520; id., *Voy. Pôle S., Ois.*, pl. 51, f. 2; Bull.,
Hist. B. New-Zeal., ed. 2, II, p. 279; *aucklandica* (pl.), Gray.
- 11.651. BRASILIANS (Vieill.), *Gal. Ois.* II, p. 209, pl. 285; Brésil S.-E.
Burm., *Th. Bras.* III, p. 441; *octosetaceus* et *octo-*
setælus, Vieill.; *lophotes*, Cuv.

ORD. XV. — STEGANOPODES (1)

FAM. I. — PHAËTHONTIDÆ

1878. PHAËTON

Phaëton, Lin. (1766); *Phaëthon*, Illig. (1811); *Tropicophilus*, Steph. (1826);
Phœnicurus, Bp. (1855).

- 11.652. RUBRICAUDA, Bodd., *Tabl.*, p. 57; *Pl. Enl.* 979; La partie tropicale du
Schl., *Mus. P.-B., Pelec.*, p. 44; Heugl., *Orn.* Pacifique et Océan
N.-O. Afr., p. 1472; M.-Edw. et Grand., *H. N.* Indien.
Madag., Ois., p. 697, pl^s 281, 281^a; *phœnicurus*,
Gm.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 499, pl. 279; *mela-*
norhynchus, Gm.; *æthereus*, auct. plur. (nec L.);
novæ-hollandiæ, Brandt; *candidus*, Verr.; *rubri-*
caudatus, Fsch. et Hartl.
5227. Var. ERUBESCENS, Banks, *Icon. ined.*, pl. 51; Iles Kermadec, Nor-
Rothsch., *Avif. Lays.*, part. III, p. 296. folk, Lord Howe.
- 11.653. LEPTURUS, Lacép. et Dand., in *Buff. Hist. Nat.* XVI Zone tropicale des
(1799), p. 280; *candidus*, Tem., *Man. d'Orn.* I, océans Atlantique,
p. 112 (1820); Gray, *Gen. B.* III, pl. 185; M.-Edw. Indien et Pacifique.
et Grand., *H. Madag., Ois.*, p. 699, pl^s 279, 280;
albus, Schinz; *flavirostris*, *edwardsii*, Brandt;
leucurus, Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 155^b.
5228. Var. AMERICANA, Grant, *Bull. B. O. Club*, 1897, Côte E. de l'Amérique
p. 25; id., *Cat.*, p. 456; *æthereus*, Audub., septentrionale, des
B. Am. VII, p. 225, pl. 427; *flavirostris*, Bermudes aux An-
auct. plur. (nec Brandt). tilles.
- 11.654. FULVUS, Brandt, *Mém. Acad. St.-Petersb.* V, 2, Ile Christmas, Océan
1840, p. 269; Grant, *l. c.*, p. 455; *flavirostris*, Indien.
Rehb.; *flavo-aurantius*, Lawr., *Ann. Lyc. N.*
York, 1862, p. 142.
- 11.655. ÆTHEREUS, Lin.; Brandt, *Mém. Acad. St.-Pét.* V, 2, Partie tropicale des
1840, p. 257, pl. 2; Schl., *l. c.*, p. 45; Tacz., *Orn.* océans Pacifique et
Pér. III, p. 456; *catesbyi*, Brandt, *l. c.*, p. 270. Atlantique.

(1) Voy.: Ogilvie-Grant, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 330-483 (1898).

- 11.656. *INDICUS*, Hume, *Str. F.*, 1876, p. 481; Legge, *B. Ceyl.* III, p. 1175; Grant, *l. c.*, p. 459, pl. 6; *athereus*, auct. plur. (nec L.); *rubricauda*, Blauf. (nec Bodd.) Océan Indien.

FAM. II. — PELECANIDÆ (1)

1879. PELECANUS

Pelecanus, Lin. (1755); *Onocrotalus*, Briss. (1766); *Cyrtopelicanus*, *Leptopelicanus* et *Catoptropelicanus*, Reib. (1855).

- 11.657. *ONOCROTALUS*, Gm., *S. N.* I, 2, p. 569; Dress., *B. Eur.* VI, p. 195, pl. 595; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 157 et 157^a; *brissonii*, Childr.; *phœnix*, Less.; *longirostris*, Hume. Europe, Afrique N., Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde.
5229. *Var. ROSEA* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 570; Grant, *l. c.*, p. 466; *manillensis*, Gm.; *javanicus*, Horsf.; *minor*, Rüpp.; id., *Vög. N.-O. Afr.*, p. 152, pl. 49; *mitratus*, Licht.; Dav. et Oustl., *Ois. Chine*, p. 551; *calirhynchus*, Hodgs.; *onocrotalus* (pt.), auct. plur.; *pygmæus*, Brm.; *megalophus*, Heugl.; *onocrotalus var. minor*, A. Dub., *Consp. Av. Eur.*, p. 51, n° 499; *rufescens*, Pelz. (nec Gm.) Inde, Chine, Indo-Chine, Java, Bornéo, Sumatra, Philippines, Afrique (accidentellement Europe S.-E.)
5250. *Var. SHARPEI*, Barb., *P. Z. S.*, 1870, pp. 175, 409; Sclat., *P. Z. S.*, 1871, pl. 51; Dub., *Bull. Mus. R. H. N. Belg.*, 1885, p. 8; ? *giganteus*, A.-E. Brm., *J. f. O.*, 1855, p. 94. Angola, Congo Indépendant.
- 11.658. *CRISPUS*, Bruch, *Isis*, 1852, p. 1109; Wern., *Atl. Ois. d'Eur.*, pl. 86; Dress., *l. c.* VI, p. 199, pl. 594; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 158; *onocrotalus*, Pall. (nec L.); *patagiatus*, Brm.; *orientalis*, Wright. Europe S.-E. jusqu'au N.-W. de l'Inde, la Mongolie et la Chine.
- 11.659. *PHILIPPENSIS*, Gmel., *S. N.* I, 2, p. 571; Schl., *l. c.*, p. 55; Dav. et Oustl., *Ois. Chine*, p. 551; *gangeticus*, Hodgs.; id., *Icon. ined.*, pl. 149; *brevirostris*, Bp.; *philippinensis*, Blyth et Wald.; *manillensis*, Oat. (nec Gm.); *rufescens* (pt.), Hume (nec Gm.) Inde, Ceylan, Chine Indo-Chine, Malacca, Haïnan, Philippines.
5251. *Var. RUFESCENS*, Gm., *S. N.* I, 2, p. 571; Cretzschm., in Rüpp. *Atl.* II, p. 51, pl. 21; Heugl., *Orn.*, *N.-O. Afr.*, p. 1505; *cristatus*, Less.; *phæospilus*, Wagl.; *philippensis* (pt.), Schl.; *philippensis var. rufescens*, A. Dub., *Bull. Mus. H. N. Belg.*, 1885, p. 9. Afrique tropicale, Madagascar.

(1) Voy. aussi : A. Dubois, *Remarques sur les Oiseaux du genre Pélican* (*Bull. Mus. R. H. N. Belg.*, 1883, pp. 1-11).

- 11.660. *ERYTHORHYNCHUS*, Gm., *S. N.* I, 2, p. 571; Baird, *B. N. Am.*, p. 868; Schl., *l. c.*, p. 55; *onocrotalus*, Forst. (nec L.); *trachyrhynchus*, Lath.; *hernandezii*, Wagl.; *americanus*, Audub., *Orn. Biogr.* IV, p. 88, pl. 511; id., *B. Am.* VII, pp. 20, 179, pl. 422; *brachydactylus*, Licht.; *occipitalis*, Ridgw.
- 11.661. *CONSPICILLATUS*, Tem., *Pl. Col.* 276; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 74; *australis*, Steph.
- ✓ 11.662. *FUSCUS*, Gm., *S. N.* I, 2, p. 570; Audub., *B. Am.* VII, pp. 52, 191, pl. 425, 424; Schl., *l. c.*, p. 28; *carolinensis*, Gm.; *occidentalis*, Richm., *Auk*, 1899, p. 178.
5252. *Var. CALIFORNICUS*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 267; Grant, *l. c.*, p. 478; *fuscus* (pt.), auct. plur.
5253. *Var. MOLINÆ*, Gray, *List of Birds*, pt. III, p. 189; Schl., *P. Z. S.*, 1868, p. 269; Ell., *P. Z. S.*, 1869, p. 588, pl. 44; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 424; *thagus*, auct. plur. (nec Mol.); Grant, *Cat.*, p. 480, pl. 5^b (1); *barbieri*, Oust., *Bull. Soc. Phil.*, 1878, p. 208; *fuscus*, var. *molinæ*, A. Dub., *l. c.*, p. 11.
- Amérique du Nord jusqu'au 50° latit. N., en hiver l'Amérique centrale.
- Australie, Tasmanie, Nouvelle-Guinée.
- Côtes du golfe du Mexique et Antilles.
- États-Unis W., Amérique centr. jusqu'à Panama, Galapagos.
- Chili, Pérou, ? îles Galapagos.

FAM. III. — PHALACROCORACIDÆ

SUBF. I. — PHALACROCORACINÆ

1880. PHALACROCORAX

Phalacrocorax, Briss. (1760); *Carbo*, Lacép. (1801); *Halieus*, Ill. (1811); *Gulosus*, Mont. (1815); *Carbonarius*, Rafin. (1815); *Hydrocorax*, Vieill. (1816, nec Briss., 1760); *Cormoranus*, Baill. (1835); *Graucalus*, Gray (1844, nec Cuv., 1817); *Gracalus*, Gray (1845); *Graculus*, *Hypoleucus*, Rehb. (1850-52); *Stietocarbo*, *Urile*, *Leucocarbo*, *Microcarbo*, Bp. (1855); *Haliotor*, Heine (1860); *Melanocarbo*, Berust. (1885); *Compsohalieu*, Ridgw. (1884); *Gripeus*, *Enygrothreres*, Heine (1890).

- 11.663. *CARBO* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 151, pl. 588; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 529, pl. 277; *vulgaris*, Lacép.; *sinensis*, Shaw et Nod.; *cormora-*
- Europe, Islande, Asie jusqu'au delà du 60° l. N., Groenland,

(1) C'est bien à tort que certains auteurs ont adopté pour ce Pélican la dénomination de *thagus*, car l'oiseau décrit sous ce nom par Molina est évidemment un oiseau imaginaire, puisque Molina dit " que le corps n'est pas plus grand que celui d'une Bécasse, les pieds hauts de 22 pouces, la poche gulaire couverte de fines plumes grises, et que les bords des mandibules sont dentelés dans toute leur étendue. " — Comme on le voit, ces caractères ne peuvent se rapporter au Pélican qui nous occupe.

- nus*, Mey. et W.; *crassirostris*, Baill.; *gracilis*, Amériq. N.-E.,
leucogaster, Meyen; *medius*, Nilss.; *albiventris*, Afrique.
Tick.; *leucocephala*, *raptensis*, Hodgs.; *americanus*, Rehb.; *flavirostris*, *major*, Ellm.; *nudigula*,
Brandt; *continentalis*, Severtz.
5254. *Var. NOVE-HOLLANDIÆ*, Steph., in Shaw, *Gen. Australie, Tasmanie,*
Zool. XIII, I, p. 95; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, Nouvelle-Zélande.
II, p. 145; *carboides*, Gould; id., *B. Austr.*
VII, pl. 66.
- 11.664. *FILAMENTOSUS* (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 129; Sibérie orient., Chine,
Swinh., *Ibis*, 1861, p. 264; *capillatus*, Tem. et Japon.
Schl., *l. c.*, pl^s 85 et 85^b.
- 11.665. *LUCIDUS* (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 86; Schl., *Mus.* Afrique tropicale, îles
P.-B., *Pelec.*, p. 12; *melanogaster*, Cuv.; *macro-* du Cap Vert.
rhynchos, Less.; *lugubris*, Rüpp., *Vög. N.-O.*
Afr., pp. 134, 140, pl. 50; *lalandi*, Pucher.;
gutturalis, Rehw., *J. f. O.*, 1892, pp. 5, 155.
- 11.666. *CAPENSIS* (Sparrrn.), *Mus. Carls.* III, pl. 61; Schl., Ariq. S. jusqu'au
l. c., p. 19; *cristatus*, Puch. (nec Gm.); *tenui-* Natal et le Bas-
rostris, Tem. et S. Congo.
Socotra.
- 11.667. *NIGROGULARIS*, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 5.
- 11.668. *GAIMARDI* (Garn.), *Voy. Cog.*, p. 601, pl. 48; Tacz., Amérique S.-W. du
Orn. Pér. III, p. 451; *cirriger*, King. Pérou à Magellan.
- 11.669. *PUNCTATUS* (Sparrrn.), *Mus. Carls.* I, pl. 10; Bull., Nouvelle-Zélande.
B. N. Zeal., ed. 2, II, p. 164, pl. 59, f. 1; Schl.,
l. c., p. 21; *nævius*, Gm.; *dilophus*, Vieill.; *cir-*
rhatus, Ellm.
- 11.670. *FEATHERSTONI*, Bull., *Ibis*, 1875, p. 90; id., *B. N.* Îles Chatham.
Zeal., ed. 2, II, p. 166, pl. 59, f. 2; *africanus*,
Hutt. (nec Gm.)
- 11.671. *PERSPICILLATUS*, Pall., *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 505; Ile Behring (éteint).
Gould, *Zool. Voy. Sulph.*, p. 49, pl. 52; Schl.,
l. c., p. 17; *urile* (pt.), Gm. et auct. plur.
- 11.672. *BICRISTATUS*, Pall., *Zoogr.* II, p. 501, pl. 75; *urile* Sibérie orient., Kam-
(pt.), Gm. et auct. plur.; *violaceus*, Gm. (nec tschatka, îles Kou-
Pend. ?); Tacz., *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1885, p. 542. riles, Alaska.
- 11.673. *PELAGICUS*, Pall., *Zoogr.* II, p. 505, pl. 76; Dav. et Kamtschatka, îles Alé-
Oust., *Ois. Chine*, p. 555; *violaceus*, Rehb. et outes, Kouriles, Ja-
auct. plur. (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 17; *bicrista-* pon N., Chine.
tus, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 150, pl^s 84 et
84^b (nec Pall.); *æolus*, Swinh.
5255. *Var. ROBUSTA*, Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N.* Amérique N.-W., de
Am. II, p. 160; *violaceus* et *pelagicus* (pt.), l'Alaska à l'État de
auct. plur.; ? *leucurus*, Audub. Washington.
5256. *Var. RESPLENDENS*, Aud., *Orn. Biog.* V, p. 148, Amérique N.-W. de

- pl. 412, f. 1; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 160; *bairdi*, Coop., *Pr. Ac. Phil.*, 1865, p. 5; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 49.
- 11.674. *PENICILLATUS* (Brandt), *Bull. Acad. St.-Petersb.*, III, p. 55; Heerm., *P. Ac. Phil.*, 1854, p. 178; *townsendi*, Aud., *Orn. Biog.* V, p. 150, pl. 412, f. 2; id., *B. N. Am.* VII, p. 149, pl. 418.
- 11.675. *GRACULUS* (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 165, pl. 589; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 555, pl. 278; *cristatus*, Gm.; *brachyuros*, Brm.; *linnei*, Gray.
5257. *Var. DESMARESTI*, Payraud., *Ann. Sc. Nat.* VIII, 1826, p. 464; Gould, *B. Eur.* V, pl. 441; *graculus*, *cristatus* (pt.), auct. plur.; *leucogaster*, Cara, Glog. (nec Vieill.); *croaticus*, Brus., *Orn. Jahrb.*, 1891, p. 22.
- 11.676. *CHALCONOTUS* (Gray), *Voy. Erech. and Terr.*, B., p. 20, pl. 21; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 162; ? *ater*, Less.; *glaucus*, Rehb.; Jacq. et Puch., *Voy. Pôle S.*, Zool. III, p. 127, *Atl.*, pl. 51, f. 1.
- ✓ 11.677. *AURITUS* (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 605; Grant, *Cat.*, p. 570; *dilophus*, Vieill. (1825, nec V., 1817), *Gal. Ois.* II, pl. 275 (nec descr.); Aud., *B. Am.* VII, p. 154, pl. 416; *floridanus*, Aud., *Orn. Biog.* III, p. 587, pl. 252; *brasiliensis*, Bp. (nec Gm.)
5258. *Var. CININATA* (Brandt), *Bull. Ac. St.-Pét.*, 1857, p. 55; Baird, *B. N. Am.*, p. 877; Schl., *l. c.*, p. 22; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 51; *dilophus* (pt.), auct. plur.; *albociliatus*, Ridgw.
- 11.678. *NEGLECTUS* (Wahlb.), *J. f. O.*, 1857, p. 4; Sharpe, in *Lay. B. S. Afr.*, p. 779.
- 11.679. *FUSCICOLLIS*, Steph., *Gen. Zool.* XIII, 1, p. 91; Legge, *B. Ceyl.* III, p. 1182; *leucotis*, Blyth; *sinensis*, Blyth; Jerd., *B. Ind.* II, p. 862; *egretta*, Bp.
- 11.680. *SULCIROSTRIS* (Brandt), *Bull. Ac. St.-Pét.*, 1857, p. 56; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 67; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 408; *purpuragula*, Peale; *stictocephalus*, Bp.
- 11.681. *VIGUA* (Vieill.), *N. Dict.* VIII, p. 90; Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 158; *graculus*, Tem. (nec L.); *brasilianus*, Lichl.; Spix, *Av. Bras.* II, p. 85, pl. 106; Schl., *l. c.*, p. 22; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 429; Sel. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 91; *niger*, King; *mystacalis*, Less.; *magellanicus*, Rehb.
- 11.682. *MEXICANUS* (Brandt), *Bull. Acad. St.-Pét.*, 1857,
- l'État de Washington au Mexique W.
- Amérique N.-W. de la Colombie britannique à la Californie.
- Europe W. (côtes), de la Laponie russe et cap N. au Portugal, îles Britanniques, Foeroé et Islande.
- Côtes et îles de la Méditerranée et des mers Noire et Caspienne.
- Nouvelle-Zélande.
- Amérique N.-E. du Labrador à la Floride, à l'Ouest jusqu'au Texas, Amérique centrale, Antilles.
- Amérique N.-W., de l'Alaska au Mexique W., îles Aléoutes.
- Afrique S.
- Inde, Ceylan, Indochine.
- Australie, Nouvelle-Zélande, archipel Austro-Malais jusqu'au S. de Bornéo.
- Côtes de l'Amérique méridionale et centrale, au nord jusqu'au Texas.
- Vallée du Bas-Missis-

- p. 56; Baird, *B. N. Am.*, p. 879; *graculus*, D'Orb. (nec L.); *resplendens* et *townsendi*, Lemb. (nec Aud.); *lacustris*, Gundl.
- 11.685. *CARUNCULATUS* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 576; Forst., *Icon. ined.*, pl. 104; Bull., *Tr. N. Zeal. Inst.* IX, p. 558, pl. 15, f. 2; *purpurascens*, Brandt; *cirrhatulus*, Gr. (nec Gm.) Nouvelle-Zélande (Dé-
troit de la reine
Charlotte).
- 11.684. *ONSLOWI*, Forb., *Ibis*, 1895, p. 555; Grant, *Cat.*, p. 585; *carunculus*, Hutt. (nec Gm.); *cirrhatulus*, Bull. (nec Gm.); *imperialis*, Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 155, pl. 58, f. 2 (nec King). Iles Chatham.
- 11.685. *STEWARTI*, Grant, *Cat. B.* XXVI, p. 585, pl. 5^a; *cirrhatulus* (pt.), auct. plur.; *carunculus* et *colensoi* (pt.), Bull. Nouvelle-Zélande, ile
Sud, ile Stewart.
- 11.686. *COLENSOI*, Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 160; Forb., *Ibis*, 1895, pp. 558-40; Grant, *l. c.*, p. 586; *rothschildi*, Forb. Ile Auckland.
- 11.687. *CAMPBELLI* (Filliol), *Bull. Soc. Philom.*, 1878, p. 152; Grant, *l. c.*, p. 587; *magellanicus*, Hutt. (nec Gm.); *nycthemerus*, Bp. (*descr. nulla*). Ile Campbell.
- 11.688. *BOUGAINVILLEI* (Less.), *Voy. Thét. et de l'Espér.* II, p. 551; Tacx., *Orn. Pér.* III, p. 450; *albigula*, Brandt; *atriceps*, Cass. (nec King). Pérou, Chiti.
- 11.689. *MAGELLANICUS* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 576; Forst., *Icon. ined.*, pl. 105; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle S., Ois.*, pl. 51^{bis}; *leucogaster*, Vieill.; *sarmientonus*, *erythrops*, King; *leucotis*, Less.; *mentalis*, Bp.; *penicillatus*, Schl. (pt.) Sud de l'Amérique
méridionale et îles
Malouines.
- 11.690. *ATRICEPS*, King, *Zool. Journ.*, 1828, p. 102; Grant, *Cat.*, p. 590, f. 5 (tête); *imperialis*, King; Schl. et Salv., *Voy. Chall., Zool.*, pt. VIII, p. 120, pl. 25, f. 1; *carunculus*, Gould (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 20; *cirrhatulus*, Gray; *elegans*, Phil. Amérique méridio-
nale S.-W.
5259. *Var.* TRAVERSI, Rothsch., *Ibis*, 1899, p. 502. Iles Macquaries.
5240. *Var.* VERRUCOSA (Cab.), *J. f. O.*, 1875, p. 540, 1876, pl. 1, f. 1; Schl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 652; id., *Voy. Chall., Zool.*, pt. VIII, p. 122, pl. 26; *carunculus*, Cones et Kid. (nec Gm.) Iles Kerguelen.
5241. *Var.* ALBIVENTRIS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 604; Schl. et Salv., *Voy. Chall., Zool.*, pt. VIII, p. 157, pl. 25, f. 2; *cirrhatulus*, Gray (nec Gm.); *purpurascens*, Bp.; *carunculus*, auct. plur. (nec Gm.); *verrucosus*, Burm. (nec Cab.) Magellan, îles Ma-
louines.
- 11.691. ?EUMEGETHES, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1899, p. 173. Chili.

- 11.692. ?*PROMAUCANUS*, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1899, p. 173. Chili.
- 11.695. *VARIUS* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 576; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 149, pl. 58; Schl., *l. c.*, p. 20; *fuscescens*, Vieill.; *pica*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 106; *fucosus*, Peale; *hypoleucus*, Cass. (nec Brandt); *leucogaster*, Cass. (nec Vieill.); ? *huttoni*, Bull.
- 11.694. *HYPOLEUCUS* (Brandt), *Bull. Ac. St.-Pét.*, 1857, p. 55; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 68; Grant, *Cat.*, p. 597, f. 9 (tête); *varius*, auct. plur. (nec Gm.)
5242. *Var.* GOULDI (Salvad.), *Orn. Pap.* III, p. 415; Grant, *Cat.*, p. 596, f. 8 (tête); *leucogaster*, Gould et auct. plur. (nec Vieill.); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 69; Schl., *l. c.*, p. 20. Australie E. et S., Tasmanie, archipel de Louisiade.
- 11.695. *MELANOLEUCUS* (Vieill.), *N. Dict.* VIII, p. 88; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 70; Schl., *l. c.*, p. 15; *dimidiatus*, Less.; *flavirhynchus*, Gould; *flavirostris*, Gray; *melanurus*, Bernst. Australie, Nouv.-Zélande, Nouv.-Guinée, Moluques, petites îles de la Sonde.
- 11.696. *BREVIROSTRIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 26; Bull., *Man. B. N. Zeal.*, p. 94, pl. 54, f. 2; *melanoleucus*, Gr. (nec V.); *flavagula*, Peale; *carboides*, Ellm.; *finchii*, Sharpe, *Voy. Ereb. and Terr.*, *B., App.*, p. 54. Nouvelle-Zélande et îles Chatham.
- 11.697. *JAVANICUS* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.*, 1822, p. 197; Jerd., *B. Ind.* II, 2, p. 865; *africanus*, Less. (nec Gm.); *pygmaeus*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 56 (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 15; *melanognathos*, *nudigula*, Brandt; *indicus*, Rehb.; *niger*, Bp. Inde, Ceylan, Indochine, Malacca, Java, Bornéo, Sumatra.
- 11.698. *PYGMEUS* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 574; Shell., *B. Egypt.*, p. 295; Dress., *B. Eur.* VI, p. 175, pl. 591 (pt.); *algiensis*, Rehb.; *niepcei*, Malh.; *pumilio*, Bp. Europe centr. et méridion., Afrique N., Asie S.-W. et centr.
- 11.699. *AFRICANUS* (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 577; Hengl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1495; Dress., *B. Eur.* VI, p. 169, pl. 590; *africanoides*, Smith; *longicaudus*, Sw.; *coronatus*, Wahlb. Afrique, Madagascar.

1881. NANNOPTERUM

Phalacrocorax (pt.), Rothsch.; *Nannopterum*, Sharpe (1899).

- 11.700. *HARRISI* (Rothsch.), *Bull. B. O. Club*, VII, 1898, p. 52; id., *Ibis*, 1898, p. 456; Sharpe, *Handlist*, I, p. 255. Ile Narborough (Galapagos).

SUBF. II. — PLOTINÆ

1882. PLOTUS

Anhinga, Briss. (1760); *Plotus*, Lm. (1766).

- 11.701. *RUFUS*, Lacép. et Daud., in Buff., *Hist. nat.*, 1799, Afrique jusque vers le

- Ois.* XVII, p. 81; Grant, *Cat.*, p. 412; *congen-*
sis, Cranch; *levaillantii*, Licht.; Tem., *Pl. Col.*
 120; *melanogaster*, Childr. (nec Gm.); *capensis*,
 Lay.; *chantrei*, Onst.
- 11.702. *MELANOGASTER*, Gm., *S. N.* 1, 2, p. 580; Schl.,
Mus. P.-B., *Pelec.*, p. 26; Legge, *B. Ceyl.* III,
 p. 1194; *levaillanti*, Griff. (nec Licht.); *novæ-hol-*
landiæ, Gray, *Gen. B.* III, pl. 184 (nec Gould).
- 11.703. *NOVÆ-HOLLANDIÆ*, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 54;
 id., *B. Austr.* VII, pl. 75; Salvad., *Orn. Pap.* III,
 p. 406; *melanogaster*, Schl. (nec Gm.)
- 11.704. *ANHINGA*, Liu.; Audub., *Orn. Biogr.* IV, p. 156,
 pl. 316; id., *B. Am.* VII, p. 154, pl. 420; Tacz.,
Orn. Pérou, III, 454; *melanogaster*, Wils. (nec
 Gm.); *leucogaster*, Vieill.
- 20° lat. N., Mada-
 gascar, Syrie N.
 (lac Antioch).
- Mésopotamie, Inde,
 Ceylan, Indo-Chine,
 Malacca, Bornéo,
 Célèbes, Philippin.
- Australie, Nouvelle-
 Zélande, Nouvelle-
 Guinée S.-E.
- Amérique tropicale et
 subtropicale.

FAM. IV. — SULIDÆ

1885. SULA

Sula, Briss. (1760); *Dysporus*, Ill. (1811); *Plaucus*, *Sularius*, Rafin. (1815);
Moris, Leach (1816); *Morus*, Vieill. (1817); *Piscatrix*, Rehb. (1850); *Abel-*
tera, Heine (1890).

- 11.705. *BASSANA* (Lin.); Dress., *Birds. Eur.* VII, p. 181,
 pl. 592; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 524, pl. 276;
maculatus, Gm.; *major*, *vulgaris*, Lacép. et Daud.;
alba, Mey. et W.; *melanura*, Gould, *B. Eur.* V,
 pl. 415; *americana*, Bp.; *lefevrii*, Bald.
- 11.706. *SERRATOR*, Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., p. 19;
 Schl., *l. c.*, p. 58; *australis*, Gould (nec Steph.);
 id., *B. Austr.* VII, pl. 76; *plumigula*, Natt.
- 11.707. *CAPENSIS* (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 86; Schl., *l. c.*,
 p. 59; Fsch. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 842;
melanura, Macg. (nec Gould.)
- 11.708. *CYANOPS* (Sundev.), *Physiogr. Sällsk. Tidsk.* I, p. 218;
 Bp., *Consp. Avium*, II, p. 166; Schl., *l. c.*, p. 59;
 Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 416; ? *dactylatra*, Less.;
personata, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 77;
bassana, Newb. (nec L.); *elegans*, Bryant; *mela-*
nops, Hengl.
5245. *Var. ABBOTTI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895,
 p. 599; *cyanops* (pt.), Grant.
11709. *PISCATRIX* (Lin.); Rehb., *Natut.*, pl. 29, ff. 2294-5;
 Schl., *l. c.*, p. 40; Seeb., *B. Jap.*, p. 215; *pisca-*
tor, L.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 79; *fiber*, L.;
candida, Steph.; *erythrorhyncha*, Less.; *rubripes*,
- Côtes de l'Atlantique
 jusqu'au 70° l. N.,
 en hiver le golfe du
 Mex., le N. de l'Afr.,
 Madeire, Canaries.
- Côtes de l'Australie
 et de la Nouvelle-
 Zélande.
- Afrique S. jusqu'à Zan-
 zibar à l'Est et le
 Loango à l'O. (côtes).
- Mers australes tropi-
 cales.
- Iles de l'Assomption et
 Christm. (Oc. Ind.).
- Atlantique tropical et
 subtropical, Océan
 Indien, Océanie.

- Gould; *rubripeda*, Peale; *brasiliensis*, Rchb. (nec Spix); *hernandezii*, Gundl.; *coryi*, Mayn.
- 11.710. WEBSTERI, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, VII, p. 55; Ile Clarion (Galapagos).
Ibis, 1898, p. 437.
- 11.711. ? NESIOTES, Hell. et Snodg., *Condor*, III, p. 73. Ile Clipperton.
- 11.712. VARIEGATA (Tschudi), *Faun. Per.*, p. 315; Tacz., Côtes du Chili et du
Orn. Pér. III, p. 435; *cyanops*, Rchb. (nec Sund.) Pérou.
- 11.715. NEBOUXI, M.-Edw., *Ann. Sc. Nat.* XIII, 1882, art. 4, Côtes de l'Amérique
p. 57, pl. 14; Grant, *Cat.*, p. 455; *gossi*, Goss occidentale, de la
(ex Ridgw.), *Auk*, 1888, p. 241; Rchw. et Schal., Basse-Californie au
J. f. O., 1885, p. 400. Chili.
- 11.714. LEUCOGASTRA (Bodd.), *Tabl.*, p. 57; *Pl. Enl.* 975; Côtes des mers tropi-
Sch. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 651; Salvad., cales et subtropi-
Orn. Pap. III, p. 421; *sula*, L.; Grant, *Cat.*, cales, excepté les
p. 456; *parvus*, Gm.; *brasiliensis*, Spix, *Av. Bras.* côtes américaines
II, p. 85, pl. 107; *fusca*, Vieill.; *australis*, Steph.; du Pacifique.
fulica, Less.; *fiber*, auct. plur. (nec Lin.); *sini-*
cadvena, Swinh.
5244. Var. BREWSTERI, Goss, *Auk*, 1888, p. 242; Grant, Des côtes de la Californ.
Cat., p. 440; *leucogastra* (pt.), auct. plur. aux îles Galapagos.

FAM. V. — FREGATIDÆ

1884. FREGATA

- Fregata*, Briss. (1760); *Tachypetes*, Vieill. (1816); *Attagen*, Kp. (1829).
- 11.715. AQUILA (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 187, pl. 274; Mers tropicales et sub-
Audub., *B. Am.* VII, p. 169, pl. 421; *minor*, tropicales.
leucocephalus et *palmerstoni*, Gm.; *caroliniana*,
Less.; *strumosa*, Kittl.
- 11.716. ARIEL (Gould), in *Gray's Gen. B.* III, p. 669, pl. 184; Océans Indien et Pa-
id., *B. Austr.* VII, pl. 72; *minor*, auct. plur. (nec cifique tropicaux et
Gm.); Schl., *l. c.*, p. 5; Salvad., *Orn. Pap.* III, subtropic.
p. 404; *chambeyroni*, Montr.

ORD. XVI. — GAVIÆ ⁽¹⁾

FAM. I. — STERNIDÆ

SUBF. I. — STERNINÆ

1885. HYDROCHELIDON

- Hydrochelidon*, Boie (1822); *Viralva*, Steph. (1826); *Pelodes*, Kaup (1829).
- 11.717. LEUCOPTERA (Meisn. et Schinz), *Vög. der Schweiz*, Europe centr. et mérid.
p. 264, pl.; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 521, pls 590, jusqu'au 53° l. N.;

(1) Voy.: How. Saunders, *Catalogue of the Birds Brit. Mus.* XXV, pp. 1-334 (1896).

- 591 ; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, Ois. II, p. 568, pl. 287; *fissipes*, Pall. (nec L.); *grisea*, Horsf.; *nigra*, auct. plur. (nec Lin.); *subleucoptera*, Brm.; *javanica*, Swinh. (nec Horsf.); *hybridus*, Tacz. (nec Pall.)
- 11.718. HYBRIDA (Pall.), *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 558; Dress., l. c., p. 515, pl. 588, 589; Dubois, l. c., p. 571, pl. 288; *leucopareia*, Tem.; *javanica*, Horsf.; *delamotta*, Vieill.; *indica*, Steph.; *similis*, Gray; *fluviatilis*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 51; *similis*, *leucogenys*, Boie; *marginata*, Blyth; *meridionalis*, *nilotica*, Brm.; *delalandii*, Bp.; *innotata*, Beav.; *melanogastra*, Salvad.
- 11.719. NIGRA (Lin.); Dress., l. c., p. 527, pl. 592; Dubois, l. c., p. 565, pl. 286; *naevia*, *fissipes*, L.; *merulinus*, Scop.; *nubilosa*, Sparrm.; *boysii*, Lath.; *obscura*, *nigricans*, *pallida*, Brm.; *minuta*, Feild.
5245. Var. SURINAMENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 604; Bd., Brew. et Rid., *Water-B. N. Am.* II, p. 518; *plumbea*, Wils., *Am. Orn.* VII, p. 85, pl. 60, f. 5; *nigra*, auct. plur. (nec L.); *exilis*, Tsch.; *frenata*, Salv.; *fissipes*, auct. plur.; *lariformis*, Coues, *B. N.-West*, p. 704.
- Asie centr. jusqu'en Chine, Australie, Nouv.-Zélande et l'Afrique en hiver.
- Europe et Asie centrale et méridionale jusque vers le 55° latitude N., Archipel Indien, Australie, Afrique.
- Europe et Asie occid. jusqu'au 60° l. N.; en hiver, l'Afrique jusqu'au 25° l. N.
- États-Unis, Amérique centrale et méridionale jusqu'au 40° latitude S.

1886. PHAËTHUSA

Phaëtusa, Wagl. (1852); *Thalassites*, Sw. (1857).

- 11.720. MAGNIROSTRIS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 81; Spix, *Av. Bras.* II, p. 81, pl. 104; Schl., *Mus. P.-B.*, *Stern.*, p. 12; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 458; ?*simplex*, Gm.; ?*chloripoda* et ?*brevirostris*, Vieill.; *speculifera*, Less.; *albifrons*, Cuv.
- Amérique méridionale tropicale.

1887. GELOCHELIDON

Gelochelidon, Brm. (1851); *Laropsis*, Wagl. (1852).

- 11.721. ANGLICA (Mont.), *Orn. Dict. Suppl.*, 1815; Dress., l. c., p. 295, pl. 585; Dubois, l. c. II, p. 545, pl. 280; ?*nilotica*, Gm.; *aranea*, Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 143, pl. 72, f. 6; *affinis*, Horsf.; *risoria*, *meridionalis*, *balthica*, *agraria*, Brm.; *macro-tarsa*, Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 81; *palustris*, Macg.; *nuttalli*, Boie; *nilotica*, auct. plur.
- Europe et Asie jusqu'au 55° l. N., Archip. Indien, Australie, Afrique N., côtes occident. de l'Amérique du 50° l. N. au 40° l. S.

1888. HYDROPROGNE

Thalasseus (pt.), Boie (1822); *Hydroprogne*, Kp. (1829); *Sylochelidon*, Brm. (1851); *Helopus*, Wagl. (1852).

- 11.722. CASPIA (Pall.), *Nov. Comm. Petrop.* XIV, 1, p. 582, Europe et Asie jus-
pl. 22; Dress., *l. c.*, p. 289, pl. 584; Dubois, qu'au 60° l. N.,
l. c., p. 541, pl. 279; *tschegrava*, Lep.; *atricilla*, Malaisie, Australie,
S. G. Gm.; *caspiica*, Sparrm.; *megarhynchos*, Nouvelle-Zélande,
Mey. et Wolf.; *schillingi*, Brm.; *melanotis*, Sw.; Afrique, Amérique
macrorhyncha, Boie; *strenuus*, Gould; *cayana*, septentr. et centr.
Rich.; *major*, Ellm.; *imperator*, Coes. jusqu'au 60°.

1889. SEENA

Seena, Blyth (1849); *Potamochelidon*, Heine (1890).

- 11.725. AURANTIA, J. E. Gray, *Hardw. Ill. Ind. Zool.* I, Inde, Ceylan, Indo-
pl. 69, f. 2; Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.*, 1849, Chine, Malacca.
p. 291; Jerd., *B. Ind.* III, p. 858; *Sterna seena*,
Syk., *P. Z. S.*, 1852, p. 171; Legge, *B. Ceyl.*,
p. 1005; *brevirostris*, Gray, *l. c.*, pl. 69, f. 1;
roseata, Hodgs.

1890. STERNA

Sterna, Lin. (1766); *Thalasseus* (pt.) et *Sternula*, Boie (1822); *Actochelidon*,
Thalassaa, Kp. (1829); *Pelecanopus*, *Onychoprion*, *Planetis*, *Haliplana*,
Wagl. (1852); *Hydrocecropis* (pt.), Boie (1844); *Thalassipora*, Rüpp. (1845).

- 11.724. MELANOGASTER, Tem., *Pl. Col.* 454; Schl., *l. c.*, Afghanistan, Inde,
p. 21; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 70; *javanica*, Indo-Chine.
Horsf.; *acuticauda*, Gray; *minuta*, *jerdoni*, Beav.
11.725. FORSTERI, Nutt., *Man. Orn.* II, p. 274; Bd., Brew. Amérique septentrio-
et Rid., *Water-B. N. Am.* II, p. 292; *hirundo*, nale et centrale.
Sw. et Rich. (nec L.); *havelli*, Aud., *B. N. Am.*
VIII, p. 105, pl. 454.
11.726. ALBISTRIATA (Gray), *Foy. Ereb. and Terr.*, B., p. 19, Nouvelle-Zélande, ile
pl. 24; Saund., *Cat.*, p. 48; *antarctica*, Wagl. Norfolk.
(nec Less.); Bull., *B. N. Zool.*, ed. 2, II, p. 70,
pl. 50; *cinerea*, Ellm.; *breviunguis*, Pelz.
11.727. VIRGATA, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 449; Saund., Iles Kerguelen, Cro-
P. Z. S., 1876, p. 646; id., *Cat.*, p. 50; ?*austra-* zet.
lis, Gm.; *macrura* (pt.), Gray; *meridionalis*, Lay.
(nec Brm.); *vittata*, Coes (nec Gm.)
11.728. VITTATA, Gm., *S. N. I.*, p. 609; Saund., *Cat.*, p. 51; Iles du S. de l'Atlanti-
coronata, Bonn.; *macrura*, Gr. (pt.); *melano-* que (St-Paul, Am-
rhyncha, Gould (pt.); *sancti-pauli*, Gould; *mela-*sterdam, Kergue-
noptera, Vél. len, etc.)

- 11.729. HIRUNDINACEA, Less., *Traité*, p. 621; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 440; *hirundo*, Max; *acutirostris*, Tsch.; *antarctica*, Peale (nec Less.); *wilsoni*, Brm.; *meridionalis*, Cass. (nec Brm.); Schl., *l. c.*, p. 15; *cassini*, Schl., *P. Z. S.*, 1860, p. 591. Amérique méridionale.
- 11.750. FLUVIATILIS, Naum., *Isis*, 1819, p. 1847; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 265, pl. 580; Dubois, *Fnc. Ill.*, Ois. II, p. 554, pl. 284; *hirundo* (pt.), Lin. et auct. plur.; *bicolor*, *sterna*, Scop.; *nitzschii*, Kp.; *pomarina*, Brm.; *marina*, Eyt; *senegalensis*, Sw.; *wilsoni*, Bp.; ? *nilotica*, Rüpp.; *blasii*, Brm.; *macrodactyla* et *macroptera*, Blas.; *dougalli*, Lay.; *major*, Ol.-Gal. Europe, Asie tempérée W. et Amér. jusqu. Texas à l'Ouest; en hiver: Inde, Ceylan, Afrique et l'Amér. mér. jusqu'à Bahia (pas du côté du Pacifique).
3246. Var. TIBETANA, Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 649; Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 485, 1879, p. 158. Asie centrale jusqu'en Mandchourie; Malacca en hiver.
- 11.751. PARADISEA, Brünn., *Orn. Bor.*, p. 46 (1764); Schl., *Mus. P.-B.*, *Stern.*, p. 15; Dubois, *l. c.* II, p. 551, pl. 282; *hirundo* (pt.), Lin. et auct. plur.; Dress., *l. c.*, p. 255, pl. 579; *maerura*, Naum.; *arctica*, Tem.; *argentata*, Brm.; *brachytarsa*, Graba; *brachypus*, Sw.; *coccineirostris*, Rehb.; *pikci*, Lawr.; *longipennis*, Coues; *portlandica*, Ridgw.; ? *atrofasciata*, Phil. et Landb. Zone arctique (côtes) jusqu'au 82° l. N.; descend en hiver dans l'Atlantique jusqu'au 35° l. S., et dans le Pacifique jusqu'au Chili.
- 11.752. LONGIPENNIS, Nordm., in *Erm. Verz. v. Th. u. Pfl.*, p. 17; Middend., *Reis. Sib.*, *Zool.*, p. 246, pl. 25, f. 4; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 526; ? *camtschatica*, Pall.; *glacialis*, Kittl.; *melanorhyncha*, Fsch. Asie orientale, Kamtschatka, Japon, Chine jusqu'à la Nouv.-Guin. en hiv.
- 11.753. ALBIGENA, Licht., *Nomencl. Av.*, p. 98; Schl., *l. c.*, p. 20; Fsch. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 854, pl. 10, f. 2; *senegalensis*, Heugl. (nec Sw.) Mer Rouge, Mékanran, Laccadives, Malabar (côtes).
- 11.754. DOUGALLI, Mont., *Orn. Dict. Suppl.*; Dress., *l. c.* VIII, p. 275, pl. 581; Dubois, *l. c.* II, p. 558, pl. 285; *paradisea*, auct. plur. (nec Brünn); *macdougalli*, Macg.; *bicuspis*, *tenuirostris*, Licht.; *douglasii*, Schl., *l. c.*, p. 24; *melanorhyncha*, E. Newt.; *korustes*, Hume. Côtes et îles de l'Eur. W. jusqu'au 57° lat. N., de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique N.-E. et des Antilles.
3247. Var. GRACILIS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 76; id., *B. Austr.* VII, pl. 27; Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1896, p. 115; *dougalli* (pt.), Saund. Côtes de l'Australie.
- 11.755. CANTIACA, Gm., *S. N.* I, p. 606; Dress., *l. c.* VIII, p. 501, pl. 586; Dubois, *l. c.* II, p. 548, pl. 281; *sandvicensis*, *boysi*, Lath.; *stubberica*, Bechst.; ? *columbina*, Schr.; *canescens*, Mey. et W.; *candicans*, Brm.; *acuflavida*, Cabot. Côtes de l'Atlant. jusque vers le 60° l. N., au Sud jusqu'au cap de B.-Esp. et le Honduras; Méditerr., mers Noire, Casp. et Rouge, golfe Persiq.

- ✓ 11.736. *MAXIMA*, Bodd., *Tabl.*, p. 58; *Pl. Enl.* 988; *Scl.* et *Salv.*, *P. Z. S.*, 1871, p. 567; *Tacz.*, *Orn. Pér.* III, p. 459; *Scl.* et *Huds.*, *Argent. Orn.* II, p. 193; *cayana*, Lath.; *Audub.*, *B. Am.* VII, p. 76, pl. 429; *cayennensis*, Gm.; *galericulata*, Licht.; *Schl.*, *l. c.*, p. 7; *erythrorhynchos*, Max.; *cristata*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 247, pl. 30; *regia*, Gamb.; *bergii*, Hartl.; *elegans*, Léol. Amérique septentrionale jusqu'au 50° l. N. et Antilles; en hiver jusqu'au Brésil et l'Afrique occidentale jusqu'à l'Angola.
- 11.737. *ELEGANS*, Gamb., *Pr. Philad. Ac.*, 1848, p. 129; *Bd.*, Cass. et Lawr., *B. N. Amer.*, p. 860 et ed. 1860, *Atl.*, pl. 94; *Tacz.*, *Orn. Pér.* III, p. 442; ? *gayi*, Bp.; *comata*, Phil. et Landb.; *galericulata*, auct. plur. (nec Licht.) Côtes américaines du Pacifique, de Californie au Chili, et côte du Texas.
- 11.738. *EURYGNATHA*, Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 654; *id.*, *Cat.*, p. 83; *cayennensis* (pt.), Gray; *galericulata* (pt.), Pelz.; *elegans* (pt.), H. et Rehw. Côtes améric. de l'Atlantique du Vénézuéla au 47°30' l. S.
- 11.739. *MEDIA*, Horsf., *Tr. Linn. Soc.*, 1820, p. 198; *Fsch.* et *Hartl.*, *Vög. Ost-Afr.*, p. 850; *Dress.*, *l. c.* VIII, p. 283, pl. 385; *affinis*, Cretzs., in *Rüpp. Atl.*, p. 25, pl. 14; *bengalensis*, Less.; *arabica*, Ehrenb.; *torresii*, Gould; *id.*, *B. Austr.* VII, pl. 23; *maxuriensis*, Licht. Côtes de la Méditerranée, de l'Afrique et du Sud de l'Asie jusqu'à Célèbes et l'Australie.
- 11.740. *BERGH*, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 80; *Schl.*, *l. c.*, p. 11; *Salvad.*, *Orn. Pap.* III, p. 452; *novæ-hollandiæ*, *cristata*, Steph.; *velox*, Cretzs., in *Rüpp. Atl.*, p. 21, pl. 15; *pelecanoides*, King.; *Gould*, *B. Austr.* VII, pl. 23; *Schl.*, *l. c.*, p. 9; *longirostris*, Less.; *poliocerca*, Gould; *Schl.*, *l. c.*, p. 12; *rectirostris*, Peale; *nigripennis*, Bp.; *bergeri*, Rams. Côtes de l'Afrique (E. et W.), du Sud de l'Asie jusque Chine et Japon, Australie, Polynésie et les îles du Pacifique jusqu'aux îles Sandwich.
- 11.741. *BERNSTEINI*, *Schl.*, *Mus. P.-B.*, *Stern.*, p. 9; *Salvad.*, *Orn. Pap.* III, p. 453; *Saund.*, *Cat.*, p. 96; *maxima*, M.-Edw. et Grand. (nec Bodd.) Îles Mascareigne, Seychelles, Bornéo N., Halmahera.
- 11.742. *FRONTALIS*, Gray, *Zool. Voy. Ereb. and Terr.*, p. 19, pl. 20; *Bull.*, *B. New Zeal.*, ed. 2, II, p. 68, pl. 50, f. 2; ? *striata*, Gm.; *albifrons*, Peale; *melanorhyncha*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 26; *atripes*, Ellm.; *longipennis* (pt.), *Fsch.* et *Hartl.* Nouvelle-Zélande, Australie.
- 11.743. *ALEUTICA*, Baird, *Trans. Chicago Acad.*, 1869, p. 521, pl. 51, f. 1; *Saund.*, *Cat.*, p. 98; *camtschatica*, *Fsch.* (nec Pall.) Alaska, détroit de Behring jusqu'au Japon.
- 11.744. *LUNATA*, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, *B.*, p. 277; *Schl.*, *l. c.*, p. 27; *Fsch.* et *Hartl.*, *Faun. Centralpolyn.*, p. 251, pl. 15, f. 5; *Rothsch.*, *Avif. Laysan*, I, p. 37, pl. Îles du Pacifique jusqu'aux Moluques.
- 11.745. *ANÆSTHETA*, Scop., *Del Faun. et Fl. Ins.* I, p. 92; Antilles, golfe du Mexi-

- Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 449; M.-Edw. et Gr., *H. N. Madag.*, Ois., p. 658; *panayensis*, Gm.; Schl., *l. c.*, p. 26; *panaya*, Lath.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 55; *antarctica*, Less.; *melanoptera*, Sw.; ? *keri*, Boie; *fuligula*, Licht.; *infuscata*, Heugl. (nec Licht.); *discolor*, Coues; *nubilosa*, Sund. (nec Sparrm.)
- 11.746. *FULIGINOSA*, Gm., *S. N. I.*, p. 605; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 90, pl. 452; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 507, pl. 587; ? *fuscata*, L.; *spadicea*, Gm.; *infuscata*, Licht.; *oahuensis*, Blox.; *serrata*, *guttatus*, Wagl.; *melanura*, Gould; *herminieri*, Less.; *gouldi*, Rehb.; *luctuosa*, Phil. et Landb.; *somalensis*, Heugl.
5248. *Var. CRISSALIS*, Baird, *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1871, pp. 285, 301; Lawr., *Mem. Bost. Soc. N. H.*, 1874, p. 518; *fuliginosa* (pt.), Saund.
- 11.747. *BALENARUM* (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 160; Boc., *Orn. Angola*, p. 490; Saund., *Cat.*, p. 411.
- 11.748. *NEREIS* (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 140; id., *B. Austr.* VII, pl. 29; *parva*, Ellm.; *minuta*, Fsch. (nec L.); *alba*, Potts; *placens*, Lay. (nec Gd.)
- 11.749. *SINENSIS*, Gm., *S. N. I.*, p. 608; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 527; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 445; *minuta*, auct. plur. (nec L.); *pusilla*, Tem.; *placens*, Gould; id., *B. New Guin.* V, pl. 72; *inconspicua*, Mast.
- 11.750. *MINUTA*, Lin.; Dress., *l. c.* VIII, p. 279, pl. 582; Dubois, *l. c.* II, p. 561, pl. 285; *metopoleucos*, S. Gm.; *fissipes*, *pomarina*, *danica*, etc., Brm.; *orientalis*, Licht.; *gouldi*, Hume (nec Rehb.)
5249. *Var. SAUNDERSI*, Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 524; Legge, *B. Ceyl.*, p. 1025; *minuta*, auct. plur. (nec L.); *sumatrana*, Saund. (nec Ratll.); *balenarum*, E. Newt. (nec Strickl.); ? *novella*, Hartl.
5250. *Var. INNOMINATA*, Jar. et Loud., *Orn. Mon.*, 1902, p. 150.
- 11.751. *ANTILLARUM* (Less.), *Descr. Mam. et Ois.*, p. 256; Coues, *Pr. Phil. Acad.*, 1862, p. 552; Saund., *Cat.*, p. 422; *minuta*, auct. plur. (nec L.); Audub., *B. Am.* VII, p. 419, pl. 459; *argentea*, Nutt. (nec Max.); *melanorhyncha*, Less.; *frenata*, Gamb.; *superciliaris*, Cab. (nec Vieill.); *minuta americana*, Sund.
5251. *Var. AUSTRALIS* (Licht.), *Nomencl. Av.*, p. 98;
- que, Afrique, Madagascar, Asie S. jusqu'au Japon, Moluques, Australie N. et îles du Pacifique.
- Côtes de toutes les mers tropicales et subtropicales (accidentellement Europe et Amérique septentr.)
- Tres Marias, Socorro, Mexique W.
- Sud de l'Afrique.
- Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Calédonie.
- Golfe du Bengale, mer de Chine, Japon, Archipel Indien jusqu'à l'Australie.
- Europe jusqu'à 60° N., Asie centr. jusqu'à N. de l'Inde; en hiver, Birm., Java, Afr.
- Mer Rouge, Afrique E. jusqu'à Natal, Madag., Mascar., Seychelles, golfe Persique, Inde, Ceylan, Birmanie.
- Béloutchistan.
- Amérique septentrionale et centrale, au N. jusqu'à Terre-Neuve et Labrador; Antilles, Afrique W. en hiver.
- Afrique S.

- Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1896, p. 115; *antillarum* (pt.), Saund.
- 11.752. *SUPERCILIARIS*, Vieill., *N. Dict.* XXXII, p. 126; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 444; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 197; *maculata*, V.; *argentea*, Max.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 542. Amérique méridionale.
- 11.755. *LORATA*, Phil. et Landb., *Arch. f. Naturg.*, 1865, 1, p. 124; Saund., *Cat.*, p. 126; *exilis*, Scl. (nec Tschudi), *P. Z. S.*, 1867, pp. 536, 544, 1871, p. 572; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 445; *loricata*, Gray. Côtes du Chili et du Pérou.
- 11.754. *MELANAUCHEN*, Tem., *Pl. Col.* 427; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 28; *marginata*, Blyth; *decorata*, Hartl.; *sumatranus*, Salvad.; *cinereus*, Layard. Iles Mascar., Seychell., Nicobar, Andaman, Ténassér., Malacca, Australie N., îles du Pacif. jusq. Liu-Kiu.
- 11.755. *TRUDEAUI*, Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 125; id., *B. N. Am.* VII, p. 105, pl. 455; Scl., *l. c.*, p. 29; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 445; *sellovii*, Licht.; *frobeenii*, Phil. et Landb.; ? *chloropoda*, Heine et Rehw. Amérique méridionale.

1891. NÆNIA

- Nænia*, Boie (1844); *Sternolophota*, Less. (teste Gray, 1871); *Larosterna*, Blyth (1849); *Inca*, Jard. (1850).
- 11.756. *INCA* (Less.), *Voy. Coquille*, p. 751, *Atl.*, pl. 47; Tacz., *l. c.* III, p. 446; Saund., *Cat.*, p. 152; Côtes du Pérou et du Chili.
mystacalis, Jard., *Contr. Orn.*, 1850, p. 35.

1892. ANOUS

- Anous*, Steph. (1826); *Megalopterus*, Boie (1826); *Stolida*, Less. (1831); *Gavia*, Sw. (1857); *Aganaphron*, Glog. (1842); *Procelsterna*, Lafr. (1842); *Micranous*, Saund. (1895).
- 11.757. *STOLIDUS* (Lin.); Gould, *B. Eur.* V, pl. 421; Degl. et Gerbe, *Orn. Eur.* II, p. 445; *senex*, Leach; *niger*, Steph.; *tenuirostris*, Boie (nec Tem.); *unicolor*, Nordm.; *leucoceps*, Sw.; *superciliosus* et *plumbeigularis*, Sharpe. Les mers tropicales et subtropicales de l'Atlantique.
5252. *Var. PILEATA* (Scop.), *Del Faun. et Flor. Insubr.* II, p. 92; Hartl., *Novit. Zool.* VII, p. 9; *stolidus* (pt.), auct. plur.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 54; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 529; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 455; *philippina*, Lath.; *rousseaui*, Hartl., *Beitr. Orn. Madag.*, Mers tropicales et subtropicales du Pacifique et de l'Océan Indien.

p. 86; *frater*, Coues; *stolidus rousseaui*, Ridgw. (1).

5255. *Var.* RIDGWAYI, Anth., *Auk*, 1898, p. 56. Iles Cocos et Socorro.
- 11.758. GALAPAGENSIS, Sharpe, *Phil. Tr.* CLXVIII, p. 469; Iles Galapagos.
Salv., *P. Z. S.*, 1885, p. 450; Saund., *Cat.*, p. 145.
- 11.759. CERULEUS (F. D. Benn.), *Narr. Whaling-Voy.* I, Iles Paumotu, Marquises, Société, Ellice, Phoenix et Fannigs (Polynésie centr.)
p. 585, II, p. 248; Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 671, 1878, p. 214; *teretirostris*, Lafr.; *tereticollis*, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1842, p. et pl. 29; *cinerea*, Néb., *Voy. Vénus, Atl.*, pl. 9; *parvulus*, Gould; *plumbeus*, Peale; *tephrodes*, Rehb.; *cinereus*, Prév. et Des M. (nec Gould).
- 11.760. CINEREUS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 104; id., Australie, Nouvelle-Zélande, îles Lord B. Austr. VII, pl. 57; Schl., *l. c.*, p. 58; *pelecanoides*, Gr. (nec King); *albivitta*, Bp.; *albivittatus*, Fsch.; *ceruleus* (pt.), Saund. (1876), Rams. et Tristr.
- 11.761. PULLUS, Bangs., *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 258. Iles Liu-Kiu.
- 11.762. TENUIROSTRIS (Tem.), *Pl. Col.* 202; Schl., *l. c.*, p. 57; Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 670, pl. 61, f. 1; id., *Cat.*, p. 144; *melanops*, Gould; id., B. Austr. VII, pl. 55; *senex*, Bp. (nec Leach). Seychelles, Madagascar, Mascareignes, Australie W., détroit de Torres.
- ✓ 11.765. LEUCOCAPILLUS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 105; id., Mer des Antilles, Afrique S., Océan Indien jusqu'au Nord de l'Australie et les îles de la Société.
B. Austr. VII, pl. 56; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 457; *tenuirostris*, auct. plur. (nec Tem.); *melanogenys*, Gray, *Gen. B.* III, p. 661, pl. 182; *leucocephalus*, Rehb.; *senex*, Hume (nec Leach); *atrofuscus*, Stone.
- 11.764. DIAMESUS (Hell. et Snodg.), *Condor*, III, p. 76. II. Cocos et Clipperton.
- 11.765. HAWAIIENSIS, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Club*, n° X, Iles Sandwich ou Hawaï.
1895, p. 47; id., *Ibis*, 1895, p. 574; id., *Avif. Laysan*, pt. I, p. 45, pl.; *tenuirostris*, Gr. (nec Tem.); *melanogenys*, Stejn. (nec Gr.)

1895. GYGIS

Gygis, Wagl. (1852).

- 11.766. ALBA (Sparrm.), *Mus. Carls.* II, fasc. 1, n° 11; Iles du S. de l'Atlantique, Océan Indien jusqu'à l'Australie et les îles du Pacifique.
Schl., *l. c.*, p. 55; Hartl., *Vög. Madag.*, p. 589; *candida*, Gm.; Gould, B. Austr. VII, pl. 50; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 529; *semi-alba*, Bonn.; *pacifica*, Less.; *nivea*, F. D. Benn.

(1) La plupart des auteurs ont confondu la var. *Pileata* et son type *stolidus*. D'après M. Hartert, la var. *Pileata* a la queue plus longue et plus étagée, le dessus de la tête plus gris, le plumage général plus fuligineux et moins brun, les rémiges généralement plus longues.

5254. *Var.* KITLITZI, Hart., *Katal. Vogelsam. Senck.*, Iles Carolines.
p. 257; id., *Nov. Zool.* V, p. 67; *candida*
(pt.), Saund.
11.767. MICRORHYNCHA, Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 668; Iles Marquises.
id., *Cat.*, p. 152.

SUBF. II. — RHYNCHOPINÆ

1894. RHYNCHOPS

Rynchops, Lin. (1758); *Rhynchopsalia*, Briss. (1760); *Psolidoramphos*, *Anisoramphos*, Dumt. (1826).

- 11.768. NIGRA, Lin.; *Pl. Enl.* 557; Audub., *B. N. Am.* VII, Amérique septentrio-
p. 67, pl. 428; Ridgw., *Man. N. Amer. B.*, p. 49; nale et centrale,
? *fulva*, Lin.; *borealis*, Sw. Antilles.
5255. *Var.* INTERCEDENS, Saund., *Bull. Br. Orn. Club*, Côtes orientales de
n° XXV, p. 26 (1895); id., *Cat.*, p. 155; l'Amérique méridio-
nigra (pt.), auct. plur. (nec L.); *melanura*, nale entre le 20° et
Sch. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 195 (nec Sw.) le 40° l. S.
5256. *Var.* MELANURA, Sw., *Classif. B.* II, p. 575; Tacz., Amérique méridionale
Orn. Pér. III, p. 457; *nigra* (pt.), auct. plur. et centrale jusqu'au
(nec L.); *cinerascens* et *brevirostris*, Spix, Yucatan.
Av. Bras. II, p. 80, pl^s 102, 105.
11.769. FLAVIROSTRIS, Vieill., *N. Dict.* III, p. 585; id., Afrique, au N. jusqu'à
Gal. Ois. II, p. 257, pl. 291; Schl., *l. c.*, p. 40; l'Égypte et la Mer
Fsch. et Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 857; *albistrostris*, Rouge.
Licht.; *orientalis*, Cretzschm., in *Rüpp. Atlas*,
p. 57, pl. 24.
11.770. ALBICOLLIS, Sw., *An. in Menag.*, p. 560; Gray, Inde, Ceylan, Birma-
Gen. B. III, pl. 181; Schl., *l. c.*, p. 40; Legge, nie.
B. Ceyl., p. 1004; *nigra*, Burg. (nec L.)

FAM. II. — LARIDÆ

1895. XEMA

Xema, Leach (1819); *Creagrus*, Bp. (1854); *Chema*, Rehw. (1889).

- 11.771. SABINEI (J. Sab.), *Trans. Linn. Soc.*, 1818, p. 520, Amérique arctique, Si-
pl. 29; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 427, pl. 441; bérie E.; en hiver
Dress, *B. Eur.* VIII, p. 557, pl. 595; *collaris*, jusqu'au Pérou.
Sab.; *minutus*, Bolsm.
11.772. FURCATA (Néboix), *Voy. Venus*, pl. 10; Bruch, *J. f.* Des îles Galapagos au
O., 1855, p. 105; Saund., *P. Z. S.*, 1878, p. 215, Pérou.
1882, p. 525, pl. 54; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 457;
furcatus et *furcatum* suivant les auteurs.

1896. RHODOSTETHIA

Rossia, Bp. (1858, nec Owen 1855); *Rhodostethia*, Macg. (1842); *Rhodesethia*, Tacz. (1895).

- 11.775. ROSEA (Macg.), *Mem. Wern. Soc.* V, 1824, p. 249; Régions arctiques.
Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 14; Dress., *B. Eur.*
VIII, p. 545, pl. 594; *rossii*, Rich.; *richardsoni*, Less.

1897. LARUS

Larus, Lin. (1766); *Gavia*, Gm. (1770); *Leucus*, *Hydrocoleus*, *Ichthyaëtus*, Kp. (1829); *Laroides*, Brm. (1850); *Chroicocephalus*, Eyt. (1857); *Plautus*, Rehb. (1852); *Glaucus*, *Dominicanus*, *Adelarus*, *Blasipus*, Bruch (1855); *Gavina*, *Gelastes*, *Atricilla*, *Melagavia*, *Cirrhocephala*, Bp. (1854); *Bruchigavia*, *Clupearus*, Bp. (1857); *Lambruschinia*, Salvad. (1864); *Adelolarus*, *Einalia*, *Melanolarus*, *Epitelolarus*, Heine et Rehw. (1890).

- 11.774. MINUTUS, Pall., *Reise Russ. Reichs*, III, p. 702; Europe et Sibér. jusq.
Dress., *B. Eur.* VIII, p. 575, pl. 599; Dubois, 62°1.N. environ (pas
Faune Ill., Ois. II, p. 602, pl. 296; *atricilloides*, en Scand.in.); Tur-
Falck.; *d'orbigny*, Audouin, *H. N. de l'Égypte*, kest., côtes des mers
pl. 9, f. 5; *nigrotis*, Less.; *pygmaeus*, Gr. Casp. et Méditerr.
- 11.775. ICHTHYAËTUS, Pall., *Reise Russ. Reichs*, II, p. 715; Europe S.-E., Médi-
Dress., *l. c.* VIII, p. 569, pl. 598; Shell., *B. terranée E.*, Asie
Egypt, p. 507, pl. 15; *ridibunda pharnicopos*, centrale jusqu'au
S. Gm.; *leucomelas*, Less. (nec V.); *kroicocephalus*, James.; *pallasi*, Bp.; *minor*, Schl., *Mus.*
P.-B., *Lari*, p. 54; *innominatus*, Hume; *affinis*, l'Inde.
Bidd.
- 11.776. MELANOCEPHALUS, Natt., *Isis*, 1818, p. 816; Schl., Côtes de la Mer Noire,
l. c., p. 45; Ileugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 1407; de la Méditerranée
Dress., *l. c.* VIII, p. 565, pl. 597, f. 2; *atricilla*, et du S.-W. de
Natt. (nec L.); *plumbiceps*, Kp.; *caniceps*, Brm.; l'Europe.
michahelli, *leucophthalmus*, v. d. Mühle; *affinis*,
Nardo.
- 11.777. SAUNDERSI (Swinh.), *P. Z. S.*, 1871, pp. 275, 421; Corée, Chine N., Mon-
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 522; Saund., *P. Z. S.*, golie, Japon.
1878, p. 205; *kittlitzii*, Swinh. (1860, nec Bruch);
schimper, Schl., *l. c.*, p. 40 (nec Bruch).
- 11.778. PHILADELPHIA (Ord.), in *Guthrie's Geogr.*, 2^e ed. Amérique du Nord.
Amer. II, p. 519; Baird., Cass. et Lawr., *B. N.*
Amer., p. 852; Gould, *B. Gr. Brit.* V, pl. 65;
minutus, Sab. (nec Pall.); *capistratus*, Bp. (nec
Tem.); *melanorhynchus*, Tem., *Pl. Col.* 504;
bonapartii, Sw. et Rich.; Audub., *B. Am.* VII,
p. 151, pl. 442; *subulirostris*, Bruch.

- 11.779. SERRANUS, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 514; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 452; Saund., *Cat.*, p. 188; *cirrhocephalus*, Peale (nec Vieill.); *personatus*, Bruch; *glaucotes*, Cass. (nec Meyen). Ecuador, Pérou, Chili.
- 11.780. FRANKLINI, Swains. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, B., p. 424, pl. 71; Audub., *B. Amer.* VII, p. 145; Schl., *l. c.*, p. 56; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 451; *pipixcan*, Wagl.; *cucullatus*, Rehb.; *kittlitzii*, Bruch (nec Swinh.); *schimperi*, Bruch (nec Schl.); *cinereo-caudatus*, Phil. et Landb. Amérique septentrionale et centrale; en hiver longe les côtes améric. du Pacifique jusqu'au Chili.
- ✓ 11.781. ATRICILLA, Lin.; Audub., *Orn. Biogr.* IV, p. 118, pl. 514; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 450; *ridibundus*, Wils. (nec L.); *catesbyi*, *megalopterus*, *micropterus*, Bruch; *catesbeii*, *macroptera*, *minor*, Bp. Amérique septentr. et centr., Antilles; en hiver jusqu'au Brésil et Pérou.
- 11.782. CIRRHOCEPHALUS, Vieill., *N. Dict.* XXI, p. 502; id., *Gal. Ois.* II, p. 225, pl. 289; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 453; *poliocephalus*, Tem.; *poiocephalus*, Sw.; *phoecephala*, Strickl.; *plumbiceps*, Bruch; *major*, Bp.; *maculipennis*, Burm. (nec Licht.); *polionotus*, Pelz.; ? *hartlaubi*, Rochebr. Amérique méridionale, Afrique.
- 11.783. MACULIPENNIS, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 85; Bruch, *J. f. O.*, 1855, p. 105; Schl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 198; Saund., *Cat.*, p. 200; *cirrhocephalus* (pt.), auct. plur. (nec V.); *serranus*, Burm. (nec Tschudi); *glaucodes* (pt.), Saund. Amérique méridionale.
- 11.784. GLAUCODES, Meyen, *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop.* XVI, p. 115, pl. 24; id., *Beitr. Zool.*, p. 259, pl. 54; Saund., *Cat.*, p. 205; *ridibundus*, King (nec L.); *albipennis*, Gr. (nec Licht.); *roseiventris*, Gould; *cirrhocephalus* (pt.), auct. plur. (nec V.) Du Cap Horn au 38° l.S., îles Malouines.
- 11.785. RIDIBUNDUS, Lin.; Naum., *Vög. Deutschl.* X, p. 264, pl. 260; Dress., *l. c.* VIII, p. 557, pl. 596 et 597, f. 4; Dubois, *l. c.* II, p. 598, pl. 295; ? *cinerarius*, L.; *erythropus*, Gm.; *atricilla*, Retz. (nec L.); *canescens*, Bechst.; *navius*, Pall.; *capistratus*, Tem.; *pileatum*, Brm.; *minor*, Schl.; *pallida*, Hodgs.; *brunneicephalus*, Gray (pt.); *cahiricus* et *cahirinus*, Saund. Europe, Asie et Afrique entre le 60° et le 10° latitude N., Philippines, Japon.
- 11.786. BRUNNEICEPHALUS, Jerd., *Madr. Journ.*, 1840, p. 25; Schl., *Mus. P.-B.*, *Lari*, p. 55; Legge, *B. Ceyl.*, p. 1049; Hume et Henders., *Lahore to York*, p. 500, pl. 52; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 521; *brunneiceps*, Cal.; *lacrymosus*, Licht.; *tibetanus*, Gould. Asie centrale, du Turkestan au Thibet et Mongolie; en hiver Inde, Ceylan et Indo-Chine W.
- 11.787. LEUCOPHTHALMUS, Tem., *Pl. Col.* 566; Schl., *l. c.*, p. 52; Shell., *B. Egypt*, p. 508; *masauanus*, Hengl. Europe S.-E., côtes de la Mer Rouge.

- 11.788. HEMPRICH (Bruch), *J. f. O.*, 1855, p. 106, 1855, p. 278; Schl., *l. c.*, p. 52; Finsch, *Tr. Zool. Soc.* VII, p. 502, pl. 27; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, 2, p. 1599, pl. 56, f. 2; Saund., *Cat.*, p. 221; *crassirostris*, Boie (nec V.)
Côtes de la Mer Rouge, de l'Afrique E., du Béloutchistan et de l'Inde.
- 11.789. FULIGINOSUS, Gould, in *Darw. Voy. Beagle*, B., p. 141; Salv., *Tr. Zool. Soc.* IX, p. 503, pl. 87; Saund., *Cat.*, p. 222; *neptunus*, Bp.; *belcheri*, Blas. (pt., nec Vig.); *heermanni* (pt.), Gr.
Iles Galapagos.
- 11.790. MODESTUS, Tschudi, *Arch. f. Naturg.*, 1845, I, p. 589; id., *Faun. Per.*, pp. 55, 506, pl. 55; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 449; *bridgesi*, Fras.; id., *Zool. Typ.*, pl. 69; *polios*, Nalt.
Côtes du Chili et du Pérou.
- 11.791. HEERMANNI, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1852, p. 187; id., *B. Calif.*, p. 28, pl. 5; Bd., Brew. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 252; *belcheri*, Schl. (nec Vig.)
Amérique N.-W. de l'île Vancouver à la Basse-Calif., en hiv. jusqu'au Guatémala.
- 11.792. BELCHERI, Vig., *Zool. Journ.*, 1829, p. 558; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 448; *melanurus*, Licht. (nec Tem.); *fuliginosus*, Cass. (nec Gd.); *frobeenii*, Phil. et Landb.
Côtes du Chili et du Pérou jusqu'au 12° latitude S.
- 11.793. CRASSIROSTRIS, Vieill., *N. Dict.* XXI, p. 508; Schl., *l. c.*, p. 8; David et Oust., *Ois. Chine*, p. 519; *melanurus*, Tem., *Pl. Col.* 459; T. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 152, pl. 88; *fuscus*, Pelz. (nec L.)
Côtes des mers de Chine et du Japon.
- 11.794. GELASTES, Thien., *Fortpflanz. Vög. Eur.*, pt. V, p. 22; Shell., *B. Egypt.*, p. 506; Dress., *l. c.* VIII, p. 589, pl. 601, f. 2; *genei*, Brème; *leucocephalus*, Boiss.; *tenuirostris*, Tem.; *lambruschini*, Bp.; *columbinus*, Golow.; *rubriventris*, Bp.; *subroseus*, *brehmi*, Heugl.; *arabicus*, Hempr. et Ehr.
Méditerranée, mers Noire, Caspienne et Rouge, et Nord de l'Océan Indien.
- 11.795. BULLERI, Hutt., *Cat. B. N. Zeal.*, p. 44; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 58, pl. 29, f. 1; Saund., *Cat.*, p. 255; *pomare*, Bruch (1855, nec 1855); *melanorhynchus*, Bull. (nec Tem.)
Nouvelle-Zélande.
- 11.796. NOVE-HOLLANDIÆ, Steph., *Gen. Zool.* XIII, pt. 1, p. 196; Saund., *l. c.*, p. 255; *scopulinus*, var. *major*, Forst.; *jamesoni*, J. Wils., *Ill. Zool.*, pl. 25; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 20; *pomare*, Bruch (1855); *andersonii*, Bruch; *gouldi*, *corulinus*, Bp.; *longirostris*, Mast.
Australie, Tasmanie, Nouvelle-Calédonie.
- 11.797. SCOPULINUS, Gray, in *Dieffenb. N. Zeal.* II, App., p. 200; Schl., *l. c.*, p. 28; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 55, pl. 29, f. 2; *novæ-hollandiæ*, auct. plur. (nec Steph.); *jamesoni* et *andersoni* (pt.), Gray.
Nouvelle-Zélande, îles Chatham et Auckland.

- 11.798. **HARTLAUBI** (Bruch), *J. f. O.*, 1855, p. 102, 1855, p. 286; Saund., *P. Z. S.*, 1874, p. 295, 1878, p. 188; *poiocephalus*, Lay. (nec Sw.); *cirrhocephalus*, Hartl. (nec V.); *ridibundus*, Schl. et Pol. (nec L.), *Faune Madag.*, Ois., p. 146. Afrique S. du Cap au Natal, Madagascar.
- 11.799. **MARINUS**, Lin.; Dress., *l. c.* VIII, p. 427, pl. 604; Dubois, *l. c.* II, p. 585, pl. 291; *nævus*, L.; *maculatus*, Bodd.; *giganteus*, Ben.; *maximus*, Leach; *mülleri*, *fabricii*, Brm.; *nigripallus*, C. Dub., *Pl. Col. Ois. Belg.* III, p. et pl. 240. Côtes de l'Eur. N. et W. jusq. Cap Nord et la Petschora, Islande, Groenl., Amér. N.-E. jusq. Flor., en hiv. Canar. et Méditerr.
5257. *Var. SCHISTISAGA*, Stejneger., *Auk*, 1884, p. 251 (*schistisagus*); id., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 419, pl. 8, f. 1 (rémiges); *argentatus* (pt.), Midd.; *cachinnans*, Kittl. (nec Pall.); *marinus* (pt.), auct. plur.; *pelagicus*, Tacz. (nec Bruch); *marinus schistisagus*, Seeb., *B. Jap.*, p. 291. Mers de Behring, d'Okhotsk, N. du Pacifique, îles Kouriles, Japon N.
- 11.800. **DOMINICANUS**, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 82; Gray, *Gen. B.* III, pl. 180; Schl., *l. c.*, p. 12; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 270, pl. 28, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 205; *marinus*, Lath. (pt., nec L.); *fuscus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *littoreus*, Forst.; *antipodus*, Gr.; *pelagicus*, *vetula*, *vociferus*, *fritzei*, Bruch; *verreauxi*, *azaræ*, Bp.; *antartcticus*, Ellm.; *pacificus*, Lay. Afrique S., Amérique méridionale du 10° latitude S. aux régions antarctiques, îles Kerguelen, Nouvelle-Zélande.
- 11.801. **FUSCUS**, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 421, pl. 605; Dubois, *l. c.* II, p. 587, pl. 292; *flavipes*, Mey. et W.; *melanotus*, *harengorum*, *gracillii*, Brm.; *fuscescens*, Bruch (part.) Europe occid. jusqu'au Cap N. et mer Blanche; Méditerranée, Mer Rouge.
- 11.802. **AFFINIS**, Reinl., *Vidensk. Meddel.*, 1855, p. 78; id., *Ibis*, 1861, p. 17; Saund., *P. Z. S.*, 1878, p. 171; Dress., *l. c.* VIII, p. 417; *fuscus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *cachinnans*, auct. plur. (nec Pall.); *rufescens*, *fuscescens*, Bp.; *leucophæus*, Heugl. (nec Licht.); *occidentalis*, Hume (nec Audub.) Russie N., Sibérie W. jusqu'au Jenisseï; en hiver l'Océan Indien et les côtes E. et N.-E. de l'Afrique.
- 11.805. **occIDENTALIS**, Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 520; id., *B. N. Amer.* VII, p. 161; Schl., *l. c.*, p. 15; Ell., *New and Unfig. B. N. Am.* II, pl. 52; *argentatus*, *var. occidentalis*, Coues. Côtes de l'Amérique N.-W. de l'État de Washington à la Basse-Californie.
- 11.804. **ARGENTATUS**, Brünn., *Orn. bor.*, p. 44; Dress., *l. c.* VIII, p. 599, pl. 602, f. 2; Dubois, *l. c.* II, p. 590, pl. 295; *varius*, Brünn.; *fuscus*, Pen. (nec L.); *glauucus*, Retz. (nec Brünn., nec Fabr.); *argenteus*, Boie; *argentatoides*, *americanus*, etc., Brm.; *marinus*, Lemb. (nec L.) Europe, Amér. N.-E.

5258. *Var.* SMITHSONIANA, Coes., *Key N. Am. B.*, p. 512; Ridgm., *Man. N. Amer. B.*, p. 51; *argentatus* (pt.), Saund.
5259. *Var.* CACHINNANS, Pall., *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 518; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, 2, p. 1592; *argentatus* (pt.), auct. plur.; *leucophaeus*, Licht., *Nomencl. Av.*, p. 99; Dress., *l. c.* VIII, p. 411, pl. 602, f. 1; *michahellesii*, Bruch; *epargyrus*, Licht.; *fuscescens*, Schl.
5260. *Var.* VEGÆ, Palm., *Vega Exped., Vetensk. V.*, p. 570; Stejn., *Auk*, 1888, p. 510; *argentatus* et *cachinnans* (pt.), auct. plur.; ? *borealis*, Bruch, Bp., Baird; *occidentalis*, Swinh. (nec Audub.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 520.
- 11.805. AUDOUINI, Payraud., *Ann. Sc. Nat.* VIII, 1826, p. 462; Gould, *B. Eur.* V, pl. 458; Dress., *l. c.* VIII, p. 595, pl. 601, f. 1; *atricilla* (pt.), Tem. (1820); *payraudei*, Vieill.
- 11.806. DELAWARENSIS, Ord., *Guthr. Geogr.*, 2^e amer. ed. II, p. 519; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 244; Saund., *Cat.*, p. 275; *argentatoides*, Bp. (nec Brm.); *zonorhynchus*, Rich. et Sw., *Faun. Bor.-Am.*, B., p. 421; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 152, pl. 446; *occidentalis*, Bruch (nec Aud.); *bruchi*, *mexicanus*, Bp.
- 11.807. CALIFORNICUS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VI, 1854, p. 79; Ell., *New and Unfig. B. N. Am.* II, pl. 52; Coes., *Key N. Am. B.*, p. 515.
- 11.808. CANUS, Lin. (1758); Dress., *l. c.* VIII, p. 581, pl. 600; Dubois, *Faune Ill. Ois.* II, p. 594, pl. 294; *cinereus*, Scop.; *hybernus*, Tunst.; *procellosus*, Beclist.; *cyanocephalus*, Mey. et W.; *niveus*, Pall. (nec Bodd.); *major*, Midd., *Reis. Sib.*, Zool., p. 245, pl. 24, f. 4; *lacrymosus*, Bruch (nec Licht.); *heinei*, Hom.; *kamtchatchensis*, *farroensis*, *islandicus*, Bp.; *suckleyi*, Schl. (nec Lawr.); *audouini* (pt.), Tristr.
- 11.809. BRACHYRHYNCHUS, Rich., *F. Bor. Am.*, B., p. 422; Ell., *New and Unfig. B. N. Am.* II, pl. 55; *canus*, Rich. et Sw. (nec L.); *suckleyi*, Lawr.; *septentrionalis*, Lawr., *var. brachyrhynchus*, Coes.
- 11.810. GLAUCESCENS, Naum., *Vög. Deutschl.* X, p. 551; Coes., *B. N.-West*, p. 622; Seeb., *B. Japan. Emp.*, p. 290; ? *glaucopterus*, Kltl.; *chalcophterus*, Bd., Cass. et Lawr. (nec Licht.)
- 11.811. NELSONI, Hensh., *Auk*, 1884, p. 250; Ridgw., *Man.*
- Sud des États-Unis, Basse-Californie, golfe du Mexique.
- Europe S., Mer Noire jusqu'au lac Baïkal, Afrique W., Mer Rouge jusqu'au N.-W. de l'Inde.
- Sibérie arctique, mer de Behring, en hiver jusqu'aux côtes de Chine.
- Méditerranée W.
- Amérique septentr., en hiver le Mexique et la Basse-Californie (accid. Cuba et Bermude.)
- Amérique N.-W., en hiver Mexique W.
- Europe jusqu'au Cap N. et l'Islande, en Asie jusqu'au 65° l. N., en hiver la Méditer., le N. de l'Afr. jusqu'au golfe Persiq., la Chine et le Japon.
- Amérique W. arct. et subarct., en hiver les côtes du Pacifique jusqu'en Californie.
- Nord du Pacifique, en hiver Japon et Californie S.
- Amérique N.-W.,

- N. Am. B.*, p. 27; Saund., *Cat.*, p. 287; *chalcopertus*, Bp.; *glaucescens* (pt.), Gr. Alaska.
5261. Var. KUMLIENI, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1885, p. 216; Baird, Br. et Ridgw., *W.-B. N. Am.* II, p. 219; *glaucescens*, Kuml. Amérique N.-E., en hiver Terre-Neuve jusqu'à New-York.
- 11.812. GLAUCUS, Brünn., *Orn. Bor.*, p. 44; Fabr., *Faun. Groenl.*, p. 100; Dress., *l. c.* VIII, p. 455, pl. 605; Dubois, *l. c.* II, p. 577, pl. 289; *hyperboreus*, Gunn.; *maximus*, O'Reil. (nec Leach); *consul*, Boie; *islandicus*, Edm.; *leucopterus*, auct. plur. (nec Fab.); *glacialis*, Brm.; *hutchinsi*, Rich.; *barrovianus*, Ridgw.; *glaucescens*, Tacz. (nec Naum.) Zone arctique, en hiver les côtes jusqu'au 40° l. N.
- 11.815. LEUCOPTERUS, Faber, *Prodr. Isl. Orn.*, p. 91; Dress., *l. c.* VIII, p. 459, pl. 606; Dubois, *l. c.* II, p. 580, pl. 290; *glaucoides*, Mey.; *arcticus*, Macg.; *islandicus*, Edm. (pt.); *minor*, *subleucopterus*, Brm.; *glacialis*, Bruch; *chalcopertus*, Licht. Ile Jean Mayen, Groenland, Amér. N.-E., Islande, Europe W. (rare au S. du 60° l. N.)

1898. GABIANUS

Gabianus, Bruch (1855).

- 11.814. PACIFICUS (Lathl.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 68; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 19; Schl., *l. c.*, p. 7; *frontalis*, *leucomelas*, Vieill.; *bathyrinchus*, Macg.; *georgii*, King. Australie, Tasmanie.

1899. LEUCOPHÆUS

Leucophæus, Bruch (1855); *Procellarus*, *Epitelarus*, Bp. (1854).

- 11.815. SCORESBYI (Traill.), *Mem. Wern. Soc.* IV, p. 514; Schl., *l. c.*, p. 55; Oust., *Miss. Sc. Cap Horn*, VI, p. 179, pl. 5; *hamatorhynchus*, Vig.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 106; *neglectus*, Bp. Patagonie, Magellan, Cap Horn, Malouines, Ile Chiloë.

1900. PAGOPHILA

Pagophila, Kaup (1829); *Cetosparactes*, Macg. (1842); *Catosparactes*, Gray (1846); *Gavia* (pt.), auct. plur.

- 11.816. EBURNEA (Phipps), *Voy. N. Pole, App.*, p. 187; Dress., *l. c.* VIII, p. 549, pl. 595; Dubois, *l. c.* II, p. 610, pl. 299; *candidus*, Müll.; *niveus*, Bodd.; *albus*, Schäffl.; *brachytarsus*, Rollb. Zone arctique, Europe N.-W. et Amérique N.-E.

1901. RISSA

Rissa, Steph. (1826); *Cheimonea*, Kp. (1829); *Laroides*, Brm. (1850).

- 11.817. TRIDACTYLA (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 447, pl. 595; Zone arctique jusqu'au
 Dubois, *l. c.* II, p. 606, pl. 298; *L. rissa* et *na-* 80° l. N., descend
rius, L.; *riga*, Gm.; *torquatus*, *gavia*, Pall.; en hiver jusqu'au
brunnichii, Steph.; *minor*, *borealis*, Brm.; *cine-* 30° l. N.
rea, Eyt.; *kotzebui*, Bp.; *pollicaris*, Stejn.
 11.818. BREVIROSTRIS (Bruch), *J. f. O.*, 1855, p. 105; Baird, Merde Behring, Kamt-
 Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 207; schatka, îles Aléou-
brachyrhynchus, Gould (nec Rich.); *nivea*, Gr. tes et Prybiloff.
 (nec L., nec Pall.); Ell., *New and Unf. B. N. Am.*
 II, pl. 54; *citrirostris*, Bruch; *warnecki*, Coinde.

FAM. III. — STERCORARIIDÆ

1902. MEGALESTRIS

- Catharacta*, Brünn. (1764, nec Moehr., 1752); *Lestris* (pt.), Illig. (1811); *Catâr-*
ractes, Flem. (1822); *Megalestris*, Bp. (1856); *Buphagus*, Coues (1865).
 11.819. SKUA (Brünn.), *Orn. Bor.*, p. 55; Cones, *B. N.-West.*, Europe N.-W., Islande,
 p. 604; *fuscus*, Briss.; *catarrhactes*, L.; Dress., Groenland, Amé-
B. Eur. VIII, p. 457, pl. 609; Du Bois, *Fne. Ill.*, rique N.-E.
Ois. II, p. 611, pl. 500; *vulgaris*, Flem.; *poma-*
rinus, Vieill. (nec Tem.); *minor*, Brm.
 11.820. CHILENSIS (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 207; Saund., Côtes de l'Amér. mér.,
P. Z. S., 1876, p. 525, pl. 24; Tacz., *Orn. Pér.* III, de Rio-de-Janeiro à
 p. 458; *antarcticus*, Gay (nec Less.); *catarractes*, Magellan et de là
 Licht. (nec L.) au Pérou.
 11.821. ANTARCTICA (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 616; Bull., Îles de l'océan antarct.:
B. N. Zeal., ed. 2, II, p. 65; M.-Edw. et Grand., des Malouines aux
II. N. Madag., *Ois.*, p. 645; *catarrhactes*, auct. Kerguelen et Nouv.-
 plur. (nec L.); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 21. Zél., Madagascar.
 5262. Var. MACCORMICKI, Saund., *Bull. Br. Orn. Club*, Zone antarctique du
 III, 1895, p. 12; id., *Cat.*, p. 521, pl. 1. 71° au 76° l. S.

1903. STERCORARIUS

- Stercorarius*, Briss. (1760); *Lestris* (pt.), Illig. (1811); *Labbus*, Rafin. (1815);
Prædatrix, Vieill. (1816); *Oceanus*, Kaup (1816); *Coprotheres*, Rchb. (1852).
 11.822. POMARINUS (Tem.), *Man. d'Orn.*, p. 514 (1815); Zone pol. arct. jusqu'au
 Dubois, *l. c.* II, p. 615, pl. 501; *parasiticus*, Mey. 82° l. N.; en hiver
 et W. (nec L.); *parasita*, var. *camtschatica*, Pall.; sur presque toutes
sphæriuros, Brm.; *striatus*, Eyt.; *pomatorhinus*, les côtes jusqu'au
 Sci., *Ibis*, 1862, p. 297; Dress., *l. c.* VIII, p. 465, Pérou, l'Afrique et
 pl. 595; *pomarinus*, Prey. l'Australie.

- 11.823. *CEPPHUS* (Brünn.), *Orn. Bor.*, p. 56 (1764); *coprotheres*, Brünn., *l. c.*, p. 58; *crepidatus*, Banks; Dress., *l. c.* VIII, p. 471, pl^s 596 et 597, f. 2; Dubois, *l. c.*, II, p. 619, pl. 502; *parasiticus*, Bodd. et auct. plur. (nec L.); *boji*, *schleepi*, *benickii*, Brm.; *richardsoni*, Sw.; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 190, pl. 452; *spinicauda*, Hardy; *thuliaca*, Prey.; *tephras*, Malmgr.; *asiaticus*, Hume. Zone pol. arct. jusqu'au 82° l. N.; en hiver jusque sur les côtes du Brésil, du S. de l'Afrique et de la Nouvelle-Zélande.
- 11.824. *PARASITICUS*, Lin. (1758); Dress., *Birds Eur.* VIII, p. 481, pl. 97, f. 1; *longicauda*, Briss., *Orn.* VI, p. 155 (1760); Dubois, *l. c.* II, p. 622, pl. 505; *cepphus*, auct. plur. (nec Brünn.); *buffonii*, Boie; *microrhynchus*, Brm.; *lessoni*, Less.; *longicauda*, Rehb.; *hardyi*, Bp. Zone pol. arct. jusqu'au 80° l. N.; dépasse rarement en hiver le 40° l. N.

ORD. XVII. — TUBINARES (1)

FAM. I. — PROCELLARIIDÆ

1904. PROCELLARIA

Procellaria, Lin. (1758); *Hydrobates*, Boie (1822); *Thalassidroma*, Vig. (1825).

- 11.825. *PELAGICA*, Lin.; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 658, pl. 505; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 491, pl. 599, f. 1; *pelagina*, Kuhl; *foeroensis*, Brm.; *melitensis*, Schembri; *lugubris*, Natt.; *minor*, Kjerb.; *tenuirostris* et *albifasciata*, Brm. Europe N.-W. jusqu'au 69° l. N. et vers le S. jusqu'à la Méditerranée et l'Afrique occid.
- 11.826. *TETHYS*, Bonap., *J. f. O.*, 1855, p. 47; id., *Consp.* II, p. 197; Salv., *Trans. Z. S.* IX, p. 507, pl. 88, f. 2; id., *Cat.*, p. 546. Iles Galapagos et côtes occid. de l'Amérique méridionale.

1905. HALOCYPTENA

Halocyptena, Coues (1864).

- 11.827. *MICROSOMA*, Coues, *Pr. Ac. Philad.*, 1864, pp. 79, 90; Ell., *B. of N. Amer.* II, pl. 61, f. 2; Salv., *Cat.*, p. 546. Amérique W., de la Basse-Californie à Panama.

1906. OCEANODROMA

Oceanodroma, Rehb. (1852); *Cymochorea*, Coues (1864).

- 11.828. *LEUCORHOA* (Vieill.), *N. Dict.* XXV, p. 422; Schl., *Mus. P.-B.*, *Procellariæ*, p. 5; Dress., *l. c.* VIII, Mers de l'hémisphère boréale.

(1) Voy. : Osb. Salvin, *Catalogue of the Birds Brit. Mus.* XXV, pp. 340-458 (1896).

- p. 497, pl. 599, f. 2; Dubois, *l. c.* II, p. 642, pl. 506; *leachi*, Tem.; Gould, *B. Eur.* V, pl. 447; *bullocki*, Flem.; *scapulata*, Kittl.
5265. *Var.* KAEDINGI, Anth., *Auk*, 1898, p. 57. Iles Socorro, Clarion; Basse-Californie.
- 11.829. CASTRO (Harc.), *A Sketch of Madeira*, pp. 125, 166 (1851); id., *Ann. Mag. N. II.*, 1855, p. 456; Grant, *Ibis*, 1898, p. 514; *cryptoleucura*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 537; Salv., *Cat.*, p. 550. Iles du Cap Vert, S. de l'Atlantique jusqu'à Madeire, Galapagos et Iles Sandwich.
- 11.850. MACRODACTYLA, Bryant, *Bull. Calif. Ac. Sc.* II, p. 276; Salv., *Cat.*, p. 551. Ile Guadalupe, Basse-Californie.
- 11.851. SOCORROENSIS, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 154; Salv., *l. c.*, p. 552. Ile Socorro (Mexique).
- 11.852. FULIGINOSA (Gm.), *S. N.* I, p. 562; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 620; Salv., *l. c.*, p. 552. Mers du Japon.
- 11.853. MELANIA (Bonap.), *C. R.* XXXVIII, p. 662; id., *Consp.* II, p. 196; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 61, f. 1; *townsendi*, Ridgw. Californie.
- 11.854. MARKHAMI (Salv.), *P. Z. S.*, 1885, p. 450; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 462; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 71. Pérou.
- 11.855. TRISTRAMI, Stejn., *MS.*; Salv., *Cat. Birds*, p. 554; *melania*, Seeb. (nec Bp.), *B. Jap. Emp.*, p. 270; *markhami*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 621 (nec Salv.) Japon.
- 11.856. HOMOCYROA (Coues), *Pr. Ac. Philad.*, 1864, pp. 77, 90; Baird., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 411; *melania*, Lawr. Californie.
- 11.857. MONOMIS (Swinh.), *Ibis*, 1867, p. 586, 1869, p. 548; David et Oust., *Ois. Chine*, p. 515; Salv., *Cat.*, p. 556, pl. 2. Chine et Japon.
- 11.858. HORNBYI (Gray), *P. Z. S.*, 1855, p. 62; Bp., *Consp.* II, p. 195; Salv., *Cat.*, p. 556, pl. 5. Amérique N.-W.
- 11.859. FURCATA (Gm.), *S. N.* I, p. 561; Gould, *Zool. Voy. Sulphur*, p. 50, pl. 55; Gray, *Gen. B.* III, pl. 178; Schl., *l. c.*, p. 5; *orientalis*, Pall. N. du Pacifique, au S. jusqu'à l'Orégon.

1907. OCEANITES

Oceanites, Keys. et Blas. (1840); *Garrodia*, Forb. (1881).

- 11.840. OCEANICUS (Kuhl), *Beitr.*, p. 156; Bp., *Consp.* II, p. 199; Dress., *l. c.* VIII, p. 505, pl. 614; *willsoni*, Bp.; Audub., *B. N. Am.* VIII, p. 106, pl. 460; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 164. Océans Atlantique et Indien jusqu'aux mers antarct., Australie, Nouv.-Zél.

- 11.841. GRACILIS (Ell.), *Ibis*, 1859, p. 591; Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1864, p. 85; *wilsoni*, Gigl. (nec Bp.) Côtes occid. de l'Amérique méridionale.
 11.842. NEREIS (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 178; id., *B. Austr.* VII, pl. 64; Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 449. Des îles Kerguelen à la Nouv.-Zélande et les îles Malouines.

1908. PELAGODROMA

Pelagodroma, Richb. (1852); *Pealea*, Ridgw. (1886).

- 11.845. MARINA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 826; Vieill., *Cat. Ois.* II, p. 250, pl. 292; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 61; *hypoleuca*, Moq.-Tand.; *fregata*, Bp.; Schl., *l. c.*, pp. 5, 6; *aquorea*, Sol. Mers australes au N. jusqu'aux Canaries (accid. Gr. Bret. et Massachusetts.)
 11.844. LINEATA (Peale), *U. S. Expl. Exp.* VIII, pp. 295, 557, pl. 79 (1848); Cass., *Op. cit.*, ed. 2, p. 405, pl. 59; Salv., *Cat.*, p. 564. Upolu (îles Samoa).

1909. FREGETTA

Fregetta, Bonap. (1855); *Cymodroma*, Ridgw. (1884).

- 11.845. MELANOGASTER (Gould), *Ann. and Mag. N. H.*, 1844, XIII, p. 567; id., *B. Austr.* VII, pl. 62; Bp., *Consp.* II, p. 198; *tropica*, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 566. Mers australes, dans l'Atlantique jusqu'au 10° l. N.
 11.846. GRALLARIA (Vieill.), *N. Dict.* XXV, p. 418; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 459; *fregetta*, Gray; *leucogaster*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 65; *segethi*, Phil. et Landb.; ? *fregata*, L.; ? *lawrencii*, Bp. Mers australes, au N. jusqu'en Floride.
 11.847. ALBIGULARIS (Finsch), *P. Z. S.*, 1877, p. 722; Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 150; *tropica*, Bp. (nec Gould); *torquata*, Gray (nec Macg.) S. du Pacifique (Nouv.-Hébrides, Phoenix, etc.)
 11.848. MOESTISSIMA, Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 150; id., *Cat.*, p. 567. Îles Samoa.

FAM. II. — PUFFINIDÆ

SUBF. I. — PUFFININÆ

1910. PUFFINUS

- Puffinus*, Briss. (1760); *Nectris*, Kuhl (1820); *Thyellas*, Glog. (1827); *Thiellus*, Gray (1840); *Cymotomus*, Macg. (1842); *Ardenna*, Reib. (1852); *Thyellodroma*, Stejn. (1888); *Zalias*, Heine (1890).
 11.849. LEUCOMELAS, Tem., *Pl. Col.* 587; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 151, pl. 85; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 461. Côtes du Japon, Corée, Philipp., Moluques, Bornéo, Austral. N.

- 11.850. CUNEATUS, Salv., *Ibis*, 1888, p. 555; Seeb., *Ibis*, 1891, p. 191; *knudseni*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 95. N. du Pacif., des Sandwich au S. du Japon.
- 11.851. BULLERI, Salv., *Ibis*, 1888, p. 554; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 240, pl. 41, f. 2; *zealandicus*, Sand. Nouv.-Zélande.
- 11.852. CHLORORHYNCHUS, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 612; M.-Edw. et Grand., *H. Mag., Ois.*, p. 680, pl. 297, 298; *sphenurus*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 58; *gama*, Bp.; *carneipes*, Cheesem. (nec Gould). Océan Indien, Austr., N.-Zél. jusqu'aux îles Société, Pacifique centr.
- 11.853. GRAVIS (O'Reil.), *Voy. to Greenl.*, etc., p. 140, pl. 12, f. 1 (1818); Salv., *Cat.*, p. 575; *major*, Fab.; Gould, *B. Gr. Brit.* V, pl. 88; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 527, pl. 616, f. 2; *cinereus*, Nutt.; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 212, pl. 456. Océan Atlantique, des îles Féroé et Groenland au Cap Bonne-Espér., Malouines.
- 11.854. KUHLE (Boie), *Isis*, 1853, p. 257; Bp., *Consp.* II, p. 202; Dress., *l. c.* VIII, p. 515, pl. 615, f. 2; *cinereus*, Gould, *B. Eur.*, pl. 445; *flavirostris*, Gould; *macrorhyncha*, Heugl. Méditerranée, océan Atlant., de Madeire aux Canaries, îles Kerguelen.
5264. Var. BOREALIS, Cory, *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1881, p. 84; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 579; *kuhle* (pt.), Salv. Nouv.-Angleterre.
5265. Var. MARLE, Alex., *Ibis*, 1898, p. 95. Îles du Cap Vert.
- 11.855. CREATOPUS, Cones, *Pr. Ac. Phil.*, 1864, pp. 151, 144; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 585; Salv., *Cat.*, p. 576. Amérique W. de Californie au Chili.
- 11.856. ANGLORIUM, Briss. (1760); Tem. (1820); Dress., *l. c.* VIII, p. 517, pl. 615, f. 1; Dubois, *l. c.* II, p. 645, pl. 507; *arcticus*, Faber. Atlantique, depuis l'Islande jusqu'au Brésil.
5266. Var. YELKOUANA, Salv., *Cat.*, p. 579; *yelkouan*, Acerbi, *Bibl. Ital.*, 1827, p. 294; Bp., *Consp.* II, p. 205; Degl. et Gerbe, *Orn. Eur.* II, p. 579; *anglorum* (pt.), auct. plur. Méditerran. jusqu'aux côtes Britanniques.
- 11.857. OPISTHOMELAS, Cones, *Pr. Ac. Phil.*, 1864, pp. 159, 144; id., *Key N. Am. B.*, p. 551; Salv., *Cat.*, p. 580; *gavia*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, pp. 12, 250. Basse-Californie, île Santa-Barbara.
- 11.858. AURICULARIS, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 155; Salv., *Cat.*, p. 580. Ile Clarion (Mex. W.)
- 11.859. NEWELLI, Hensh., *Auk*, 1900, p. 246. Îles Sandwich.
- 11.860. GAVIA (Forst.), *Descr. Av.*, p. 148; Hutt., *Ibis*, 1867, p. 189; Bull., *B. New-Zeal.*, ed. 2, II, p. 256; Salv., *Cat.*, p. 581. Côtes de Nouv.-Zél. et d'Australie.
- 11.861. OBSCURUS (Gm.), *S. N.* I, p. 559; Salv., *Cat.*, p. 582 (pt.); Rothsch. et Hartl., *Nov. Zool.* VI, p. 194; *dichrous*, Hartl. et Fsch., *P. Z. S.*, 1872, p. 108; *opisthomelas*, var. *minor*, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, Océan Pacifique centr.: îles Fanning, Christmas, Pelew, Carolines (? Nouv.-Hé-

- p. 582; *tenebrosus*, Pelz. (ex Natt.), *Ibis*, 1875, p. 47. brides et Samoa).
5267. *Var. SUBALARIS*, Ridgw. (ex Towns., MS.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1896, p. 650; Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VI, p. 194; *tenebrosus*, Towns. (nec Pelz.); *obscurus* (pt.), Salv. Iles Galapagos.
- ✓ 5268. *Var. AUDUBONI*, Fsch., *P. Z. S.*, 1872, p. 111; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 586; *obscurus* (pt.), auct. plur.; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 99, pl. 458. Amérique N.-E., de Nouv.-Jersey à la Floride, Antilles, Bermudes.
5269. *Var. BAILLONI*, Bp., *C. R. Ac. Sc.* XLII, p. 769; id., *Consp.* II, p. 205; *obscurus* (pt.), auct. plur.; *gama*, Hartl. (nec Bp.); *assimilis* (pt.), Salv. (nec Gould); *elegans*, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, p. 67; Salv., *l. c.*, p. 585; id., in *Rowl. Orn. Mis.* I, p. 256, pl. 54. Côtes d'Afrique, îles Madeire, Canaries, du Cap Vert, Madagascar, Seychelles, Maurice, etc.
5270. *Var. ASSIMILIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 156; id., *B. Austr.* VII, pl. 59; *nugax*, Bp. Nouv.-Zélande, Australie.
- 11.862. *PERSICUS*, Hume, *Stray F.* I, p. 5, V, p. 292, VIII, p. 115; Salv., *Cat.*, p. 581, pl. 4. Golfe Persique.
- 11.865. *CARNEIPES*, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 57; id., *B. Austr.* VII, pl. 57; Bull., *B. New-Zeal.*, ed. 2, II, p. 254; Salv., *l. c.*, p. 585. Nouv.-Zélande, Australie jusqu'au Japon.
- 11.864. *GRISEUS* (Gm.), *S. N.* I, p. 564; Finsch, *J. f. O.*, 1874, p. 209; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 525, pl. 616; *tristis*, Forst.; *fuliginosus* et *chilensis*, Bp.; *carneipes*, Schl. (nec Gould); *amaurosoma*, Coues. Atlantique et Pacifique, au S. jusqu'à l'Australie et Magellan.
5271. *Var. FULIGINOSA*, Strickl., *P. Z. S.*, 1852, p. 129; Degl. et Gerbe, *Orn. Eur.* II, p. 581; *stricklandi*, Ridgw.; *griseus* (pt.), Salv. Nord de l'Atlantique.
- 11.865. *TENUIROSTRIS* (Tem.), texte de la *Pl. Col.* 587; T. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 151, pl. 86; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 462; *brevicaudus*, Brandt; *curilicus*, Bp.; *brevicaudatus*, Fsch. Austral. et Nouv.-Zél., au N. jusqu'au Japon et Alaska; Samoa.
5272. *Var. NATIVITATIS* (Streets), *Bull. U. S. Nat. Mus.*, n° 7, p. 29; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 62; List., *P. Z. S.*, 1891, pp. 295, 500. Pacifique centr. N., de Christmas aux îles Krusenst. et Phœnix.
- 11.866. ? *MUNDA*, Kuhl, *Beitr. Zool. Procel.*, p. 148; Bp., *Consp.* II, p. 205; Banks, *Icon.*, pl. 24. Océan Pacifique.

1911. PRIOFINUS

Priofinus, Hombr. et Jacq. (1844); *Adamastor*, Bp. (1855).

- 11.867. *CINEREUS* (Gm.), *S. N.* I, p. 565; Smith, *Ill. Zool.* *S. Afr.*, Aves, pl. 56; ? *gelida*, Gm.; *melanura*, Vieill.; *hesitata*, Forst. (nec Kuhl); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 47; *typus*, Bp.; *kuhli*, Cass.; *adamastor*, Schl., *Mus. P.-B.*, *Procel.*, p. 25. Mers australes.

1912. THALASSOECA

Thalassoca, Rehb. (1852); *Acipetes*, Forb. (1882).

- 11.868. ANTARCTICA (Gm.), *S. N. I.*, p. 565; Schl., *l. c.*, p. 15; Mers australes.
 Bull., *B. N.-Zéal.*, ed. 2, II, p. 229; Sharpe,
Voy. Ereb. and Terr., Birds, App., p. 57, pl. 55.

1915. PRIOCELLA

Priocella, Hombr. et Jacq. (1844).

- 11.869. GLACIALOIDES (Smith), *Ill. Zool. S. Afr., Av.*, pl. 51; Mers australes, dans le
 Gould, *B. Austr.* VII, pl. 48; *glacialis*, var. β ,
 Gm.; *antarcticus*, Steph. (nec Gm.); *tenuirostris*,
 Audub. (nec Tem.); *garnoti*, Hombr. et J., *Voy.*
Pôle S. III, p. 148, pl. 52; *polaris*, Bp.; *smithi*,
 Schl., *l. c.*, p. 22. Pacifique jusqu'aux
 côtes N.-W. des
 États-Unis.

1914. MAJAEQUEUS

Majaequeus, Rehb. (1852); *Cymatobulus*, Heine (1890).

- 11.870. EQUINOCTIALIS (Lin.); Burm., *S. U. Thiere Bras.* III, Mers australes, au N.
 p. 445; Schl., *l. c.*, p. 18; M.-Edw. et Grand.,
 jusq'au 30° l. S.
II. Madag., Ois., p. 671; *nigra*, Forst. environ.
 5275. Var. CONSPICILLATA (Gould), *Ann. Mag. N. II.*, Mers australes.
 1844, p. 562; id., *B. Austr.* VII, pl. 46;
 Schl., *l. c.*, p. 20; *equinoctialis* (pt.), Salv.
 11.871. PARKINSONI (Gray), *Ibis*, 1862, p. 245; Coues, *Pr.* Mers de la Nouv.-
Ac. Phil., 1866, p. 192; Salv., *Cat.*, p. 597, pl. 5. Zélande.

1915. OESTRELATA

Æstrelata, *Cookilaria*, *Pterodroma*, Bonap. (1855); *OEstrelata*, Newt. (1870).

- 11.872. MACROPTERA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr., Av.*, pl. 52; Mers australes.
 Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1866, pp. 155, 174; *fuli-*
ginosa, Kuhl et auct. plur. (nec Gm.); Schl., *l. c.*,
 p. 8; *atlantica*, Gd.; *pacificus*, Gray; *gouldi*, Hutt.
 11.875. ATERRIMA (Bp.), *C. R.* XLII, p. 768; id., *Consp.* Iles Mascareignes
Av. II, p. 191; Schl., *l. c.*, p. 9; Coues, *l. c.*,
 pp. 158, 174. (océan Indien W.)
 11.874. LESSONI (Garnot), *Ann. Sc. Nat.*, 1826, p. 54, pl. 4; Côtes de l'Australie et
 Gould, *B. Austr.* VII, pl. 49; *sericeus*, Less.;
 de la Nouvelle-Zé-
leucocephala, Forst. lande.
 11.875. HESITATA (Kuhl), *Beitr.*, p. 142; Tem., *Pl. Col.* 416; Mer des Antilles.
 Gould, *B. Austr.* VII, pl. 47; *diabolica*, Lafr.;
meridionalis, Lawr.; *rubritarsi*, Gould.

- 11.876. JAMAICENSIS (Bancr.), *Zool. Journ.*, 1826, p. 81; Jamaïque.
Newt., *Handb. Jamaica*, p. 117; *caribbæa*, Carte,
P. Z. S., 1866, p. 95, pl. 10; Gigl. et Salvad.,
Ibis, 1869, p. 66.
- 11.877. ROSTRATA (Peale), *U. S. Expl. Exp.* VIII, pp. 296, Pacifique central
558, pl. 82; Bp., *Consp.* II, p. 189; Salv., *Cat.*,
p. 404. (Tahiti).
- 11.878. PARVIROSTRIS (Peale), *U. S. Expl. Exp.* VIII, pp. 298, Pacifique central
558, pl. 85; Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1866, pp. 146,
470; Salv., *l. c.*, p. 405. (Phoenix).
- 11.879. INCERTA (Schl.), *Mus. P.-B., Procel.*, p. 9; Coues, Sud de l'Atlantique
l. c., pp. 147, 170; Bull., *B. New Zeal.*, ed. 2,
II, p. 220; *inexpectata*, Bp. (nec Forst.) (Cap Bonne-Espér.)
- 11.880. MOLLIS (Gould), *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 565; Mers australes, au N.
id., *B. Austr.* VII, pl. 50; *philippi*, Saund. (nec de l'Atlant. jusqu'à
Gray); ?*melanopus*, Gm. Madeire.
5274. Var. FEE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XX (1899), Iles du Cap Vert.
p. 505; id., *Ibis*, 1900, p. 502.
- 11.881. MAGENTÆ, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, pp. 61, 66; Sud du Pacifique.
Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* I, p. 251, pl. 50; id.,
Cat., p. 407.
5275. Var. WORTHENI, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, XII, Pacifique (Galapagos).
p. 62.
- 11.882. PILEOPYGIA, Salv., *Trans. Zool. Soc.* IX, p. 507, Pacifique, des îles Ga-
pl. 88, f. 1; id., *Cat.*, p. 407; ?*alba*, Bloxh.; lapagos aux Sand-
? *rostrata*, Mosel.; *sandwichensis*, Ridgw., *Pr. U.* wick.
S. Nat. Mus., 1886, p. 95.
- 11.885. BREVIPES (Peale), *U. S. Expl. Exp.* VIII, pp. 294, Pacifique W. : Nouv.-
557, pl. 80; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, Hébrides, Fidji jus-
p. 617; *torquata*, Macg.; *cooki*, Cass.; *desolata*, qu'au 68° lat. S.
Schl., *l. c.*, p. 15; *aneiteimensis*, Gray; *leucop-* (accid. Europe).
ptera, Salv., *Ibis*, 1876, p. 595; Salvad., *Orn.*
Pap. III, p. 466.
5276. Var. HYPOLEUCA, Salv., *Ibis*, 1888, p. 559; id., N. du Pacif. (îles Bonin,
Cat., p. 409; Seeb., *B. Japan. Emp.*, p. 269. Krusenst., Japon).
- 11.884. NIGRIPENNIS, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, 1895, Sud du Pacifique (îles
p. 57; id., *Ibis*, 1895, p. 571; Salv., *Cat.*, p. 409; Kermadec).
cooki, Cheesem. (nec Gray).
- 11.885. BREVIROSTRIS (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 611; Salv., in Sud de l'Atlantique et
Rowl. Orn. Misc. I, p. 255; *lugens*, Banks (apud de l'océan Indien.
Kuhl); *grisea*, Kuhl (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 12;
unicolor, *macroptera*, Bp. (nec Smith); *kidderi*,
Coues; *mollis*, Cab. et Rchw. (nec Gould).
- 11.886. SOLANDERI (Gould), *P. Z. S.*, 1844, p. 587; id., *Handb.* Côtes de l'Australie.
B. Austr. II, p. 450; Salv., *Cat.*, p. 410; *mela-*
nopus, Natt. (nec Gm.)

- 11.887. EXTERNA, Salv., *Ibis*, 1875, p. 575; id., *Cat.*, p. 411; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 68. Côtes du Chili (île Masafuera).
5277. Var. CERVICALIS, Salv., *Ibis*, 1891, p. 192; id., *Cat.*, p. 411, pl. 6. Sud du Pacifique (îles Kermadek).
- 11.888. NEGLECTA (Schl.), *Mus. P.-B., Procel.*, p. 10; Cones, *l. c.*, pp. 147, 170; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 465; ? *alba*, Gm.; ? *grisea*, ? *variegata*, Bonn.; *raoulensis*, Bp. (*descr. nulla*); *philippi*, Gray; *mollis*, Finsch (nec Gould); *leucophrys*, Nutt., *P. Z. S.*, 1895, p. 752, pl. 65. Sud du Pacifique (îles Kermadek, Juan Fernandez).
- 11.889. ARMINJONIANA, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, pp. 62, 66; Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* 1, pp. 254, 252, pl. 51; *sandalinata*, Sol.; *mollis*, Saund. (nec Gould). Sud de l'Atlantique (île Trinidad).
5278. Var. WILSONI, Sipe. *Bull. B. O. Club*, XII, p. 49. S. de l'Atl. (Trinidad).
- 11.890. TRINITATIS, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, p. 65; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 67; Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* 1, p. 255, pl. 52. Sud de l'Atlantique (Trinidad).
- 11.891. HERALDICA, Salv., *Ibis*, 1888, p. 557; id., *Cat.*, p. 414; *leucoptera*, Schl. (nec Gould); *philippi*, Gray (1871, nec 1862). Pacifique W. (îles Chesterfield).
- 11.892. GULARIS (Peale), *U. S. Expl. Exp.*, p. 299; Bp., *C. R.* XLII, p. 768; *mollis*, Cass. (nec Gd.); *affinis*, Bull.; id., *B. New Zeal.*, ed. 2, II, p. 225, pl. 41. Mers australes (Nouv.-Zélande).
- 11.895. FISHERI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 656; id., *Auk*, 1895, p. 519, pl. 4; Salv., *l. c.*, p. 415. Nord du Pacifique (Alaska).
5279. ? Var. SCALARIS, Brewst., *Auk*, 1886, p. 590, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 68; *gularis*, Brewst. (1881). ? (accid. New-York.)
- 11.894. LEUCOPTERA (Gould), *P. Z. S.*, 1844, p. 57; id., *Handb. B. Austr.* II, p. 454; *cooki*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 51 (nec Gr.) Australie E.
5280. Var. DEFILIPPIANA, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, pp. 65, 66; Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* 1, p. 255, pl. 55. Pacifique (côtes du Chili).
- 11.895. COOKI (Gray), in *Dieffenb. N. Zeal.* II, p. 99; id., *Voy. Ereb. and Terr.* I, *Birds*, p. 17, pl. 53; Bull., *B. New-Zeal.*, p. 507; *velox*, Bp. Nouv.-Zélande.
- 11.896. LONGIROSTRIS, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 618; Salv., *l. c.*, p. 418; *leucoptera*, Stejn. (1891). Pacifique N. (Japon).
- 11.897. AXILLARIS, Salv., *Ibis*, 1895, p. 264; id., *Cat.*, p. 418, pl. 7. Îles Chatham.

1916. PAGODROMA

Pagodroma, Bonap. (1855).

- 11.898. NIVEA (Gm.), *S. N.* I, p. 562; Bp., *Consp. Av.* II, Mers australes.

p. 192; Sharpe, *Voy. Ereb. and Terr. I, Birds, App.*, p. 57, pl. 54; *candida*, Peale; *major*, *minor* et *navia*, Bp.; *novægeorgica*, Stein.

1917. BULWERIA

Bulweria, Bonap. (1842).

- 11.899. COLUMBINA (Webb et Berth.), *H. N. Canar.* II, p. 44, pl. 4, f. 2; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 551, pl. 614; *bulweri*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 65. Zone tempérée bor. de l'Atlantique et du Pacifique.
- 11.900. MACGILLIVRAYI (Gray), *Cat. B. trop. Is. Pac.*, p. 56; Fsch. et Harth., *Faun. Centralpol.*, p. 242. Océan Pacifique centr. (Fidji).

SUBF. II. — FULMARINÆ

1918. OSSIFRAGA

Ossifraga, Hombr. et Jacq. (1844).

- 11.901. GIGANTEA (Gm.), *S. N.* I, p. 565; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 45; Schl., *l. c.*, p. 18; *ossifraga*, Forst. Mers australes, au N. jusqu'au 30° l. S.

1919. FULMARUS

Fulmarus, Steph. (1826); *Rhantistes*, Kp. (1829); *Wagellus*, Gray (1840).

- 11.902. GLACIALIS (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 555, pl. 617; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 655, pl. 504; *hiemalis*, *borealis*, Brm.; *minor*, Bp. Atlantique du 80° au 50° l. N.
5281. Var. COLUMBA, Anth., *Auk*, 1895, p. 105. Côtes de Californie.
5282. Var. GLUPISCHA, Stejn., *Auk*, 1884, p. 254; id., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, n° 29, p. 91, pl. 6, ff. 1, 2; *glacialis*, Pall. (nec L.); *pacifica*, Aud. et auct. plur. (nec Gm.) Nord du Pacifique, au S. jusqu'aux côtes occid. du Mexique.
5285. Var. RODGERSI, Cass., *Pr. Ac. Phil.*, 1862, p. 290; Baird, *Trans. Chic. Ac. Sc.*, 1869, p. 525, pl. 54, f. 1; Coues, *Check-l. N. Am. B.*, p. 125; Nels., *Rep. N. H. Alaska*, p. 62, pl. 2, f. 2. Nord du Pacifique jusqu'au détroit de Béhring.

1920. DAPTION

Daption, Steph. (1826); *Calopetes*, Sund. (1872); *Daptrion*, Tacz. (1886).

- 11.905. CAPENSIS (Lin.); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 55; Schl., *l. c.*, p. 14; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 465; *punctata*, Ellm. Mers australes (accid. Ceylan et Pérou).

1921. HALOBÆNA

Halobæna, Is. Geoffr. St-Hil. (1856); *Zaprium*, Coues (1875).

- 11.904. CÆRULEA (Gm.), *S. N. I.*, p. 560; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 52; Bp., *C. R.* XLII, p. 768; *forsteri*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 54 (nec Lath.); *similis*, Forst.; *typica*, Bp. Mers australes, du 40° au 60° l. S.

1922. PRION

Prion, Lacép. (1801); *Pachyptila*, Illig. (1811); *Priamphus*, Rafinesq. (1815); *Pseudoprion*, Coues (1866).

- 11.905. VITTATUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 560; Schl., *l. c.*, p. 16; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 53; *forsteri*, Lath.; *latirostris*, Bonn.; *maguirostris*, Gould; *australis*, Potts. Mers australes du 60° au 42° l. S.
- 11.906. BANKSI, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 566; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 55; Schl., *l. c.*, p. 17; *rossii*, Gray. Mers australes jusque près de l'Équateur.
- 11.907. DESOLATUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 562; Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 758; *turtur*, Banks; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 54; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 54; *fastiata*, Bonn. Mers australes entre le 35° et le 66° l. S.
- 11.908. ARIEL, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 566; id., *Handb. B. Austr.* II, p. 475; Schl., *l. c.*, p. 18; *brevirostris*, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 88, pl. 95. Mers australes du 35° au 66° l. S. (accid. Madeire).

FAM. II. — HALODROMIDÆ

1925. HALODROMA

Pelecanoides!, Lacép. (1801); *Haladroma*, Illig. (1811); *Puffinuria*, Less. (1826); *Halodroma*, Sund (1872).

- 11.909. URINATRIX (Gm.), *S. N. I.*, p. 560; Schl., *l. c.*, p. 57; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 60; *berardi*, Tem., *Pl. Col.* 517; *tenuirostris*, Eyt.; *tridactyla*, Forst. Australie, Nouv.-Zélande, Malouines, cap Horn (côtes).
5284. *Var.* EXSUL (Salv.), *Cat.*, p. 459; *urinatrix* (pt.), auct. plur. Sud de l'océan Indien (des îles Crozettes aux Kerguelen).
- 11.910. GARNOTI (Less.), *Voy. Coquille*, I, 2, p. 750, pl. 46; Tschudi, *Faun. Per., Orn.*, p. 54; Schl., *l. c.*, p. 57; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 465. S.-E. du Pacifique (Pérou, Chili).

FAM. III. — DIOMEDEIDÆ

1924. DIOMEDEA

- Diomedea*, Lin. (1766); *Phaebastria*, *Thalassarche*, Rehb. (1852); *Thalassogeron*, Ridgw. (1884).
- 11.911. *EXULANS*, Lin.; *Pl. Enl.* 257; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 254, pl. 295; DuBois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 627, pl. 505^b; *spadacea*, Gm.; *epomophera*, Less.; *albatros*, Forst.; *adusta*, Tsch. Mers australes (accid. au N. de l'Équateur, Belgique).
5285. *Var.* REGIA, Bull., *Trans. N. Zeal. Inst.*, 1891, p. 250; *exulans* (pt.), Bull. (1890). Sud du Pacifique (Nouv.-Zélande).
5286. *Var.* CHONOPTERA, Salv., *Cat.*, p. 445; Hall, *Ibis*, 1900, p. 12; *exulans* (pl.), auct. plur. S. de l'Océan Ind. (îles Marion et Kerguel.)
- 11.912. ALBATRUS, Pall., *Spic. Zool.* V, p. 28; id., *Zoogr.* II, p. 508; *Pl. Enl.* 965; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 516; *chinensis*, Tem.; *brachyura*, Tem., *Pl. Col.* 554; Schl., *l. c.*, p. 52; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 59; *derogata*, Swinh., *P. Z. S.*, 1875, p. 786. Nord du Pacifique.
- 11.913. IRRORATA, Salv., *P. Z. S.*, 1885, p. 450; id., *Cat.*, p. 445, pl. 8; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 461. Côtes du Pérou et des Galapagos.
- 11.914. NIGRIPES, Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 527; id., *B. Amer.* VII, p. 198; Cass., *B. Calif., Tex.*, p. 210, pl. 59; Schl., *l. c.*, p. 55; *brachyura*, auct. plur. (nec Tem.); *chinensis*, Rothsch. (nec Tem.) N. du Pacifique (île Laysan, Basse Californie).
- 11.915. IMMUTABILIS, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Club*, I, p. 48; id., *Ibis*, 1895, p. 448; id., *Avif. of Laysan*, etc., p. 57, pl. Ile Laysan et îles voisines.
- 11.916. MELANOPHRYS, Tem., *Pl. Col.* 456; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 45; Schl., *l. c.*, p. 55; *gilliana*, Coues. Mers australes (accid. N. de l'Atlantique).
- 11.917. BULLERI, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Club*, I, p. 58; id., *Ibis*, 1895, p. 572; Salv., *Cat.*, p. 448; *culminata*, Bull. (nec Gould). Côtes de la Nouvelle-Zélande.
- 11.918. PLATEL, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 190; id., *J. f. O.*, 1899, p. 119. Côtes du Chili.
- 11.919. CAUTA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 177; id., *B. Austr.* VII, pl. 40; Schl., *l. c.*, p. 54; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 55. Côtes de Tasmanie.
5287. *Var.* SALVINI (Rothsch.), *Bull. Br. Orn. Club*, I, p. 58; id., *Ibis*, 1895, p. 572; *cauta*, Bull. (nec Gould). Côtes de la Nouvelle-Zélande.
5288. *Var.* LAYARDI (Salv.), *Cat. B. Br. Mus.* XXV, p. 450. Cap Bonne-Espérance.
- 11.920. CULMINATA, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 561; id., *B. Austr.* VII, pl. 41; Schl., *l. c.*, p. 55; *chlororhynchos*, Audub. (nec Gm.) Mers australes jusqu'aux côtes de l'Amér. centr. W.

- 11.921. CHLORORHYNCHA, Gm., *Syst. Nat.* I, p. 568; Tem., Mers australes.
Pl. Col. 468; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 42; *chrysostoma*, Forst.; *olivaceorhyncha*, Gould; *oliveceirostris*, Bp., *profuga*, Gray.
 5289. Var. EXIMIA (Verrill), *Tr. Connect. Ac.*, 1895, Sud de l'Atlantique
 p. 440, pl. 8, ff. 4, 2. (île Gough).

1925. PHOEBETRIA

Phaebetria, Rehb. (1852).

- 11.922. FULIGINOSA (Gm.), *S. N.* I, p. 568; Tem., *Pl. Col.* Mers australes.
 469; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 44; *spadacea*, Less.; *fusca*, Audub.; *palpebrata*, Forst.; var. *cornicoides*, Hult.; *antarctica*, Sol. (1).

ORD. XVIII. — PYGOPODES (2)

FAM. I. — COLYMBIDÆ

1926. COLYMBUS

Colymbus, Lin. (pt., 1758); *Gavia*, Forst. (1788, nec Gm., 1770); *Urinator*, Cuv. (1799); *Eudytes*, Ill. (1811).

- 11.925. SEPTENTRIONALIS, Lin.; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 621, Zone polaire arctique,
 pl. 628; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 678, pl. 515; en hiver jusqu'au
lumme, Gunn.; *borealis* et *stellatus*, Brünn.; 35° latit. N.
claudicans, Scop.; *nevvia*, Tunst.; *striatus*, *bail-
 loni*, Lac. et Daud.; *rufogularis*, Mey. et Wolf;
microrhynchus, Brm.
 11.924. ARCTICUS, Lin. (1758); Dress., *l. c.* VIII, p. 615, Nord de l'Europe et de
 pl. 627; Dubois, *l. c.* II, p. 674, pl. 514; *ignotus*, l'Asie jusqu'au 70°,
leucopus, Bechst.; *atrogularis*, Mey. et Wolf; dépasse rarement en
balthicus, Horn. et Schil.; *macrorhynchus*, Brm. hiver le 50° l. N.
 5290. Var. PACIFICA, Lawr., in Baird, *B. N. Am.*, p. 889; Amér. N. et N.-W., en
 Ross, *Nat. Hist. Rev.*, 1862, p. 289; *arcticus* hiver jusqu'en Cali-
 (pt.), auct. plur.; *striatus*, Bonn. fornie (acc. Japon).
 11.923. GLACIALIS, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 609, pl. 626; Dubois, Amérique N., Groenl.,
l. c. II, p. 674, pl. 515; *imber*, Gunn.; *immer*, Islande, Fœroé, Eur.
 Lin.; *torquatus*, Brünn.; *hyemalis*, *maximus*, Brm. N.-W. dét. de Behr.

(1) Les Procellariens suivants sont douteux : *Procellaria brasiliiana*, Gm., *S. N.* I, p. 564; *Thalassidroma fasciolata* et *dubia*, Tsch., *J. f. O.*, 1856, pp. 180, 190; *Puffinus bicolor*, Tsch., *l. c.*, p. 187; *Procellaria nigra*, *lugubris*, *maculata*, Tsch., *l. c.*, pp. 185, 190; *Diomedea gibbosa*, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 361; *D. leptorhyncha*, Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1866, p. 178.

(2) Voy. : Og.-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 485-558 (1898).

5291. *Var.* ADAMSI, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 167; Coll., *Amér. et Asie polaires,*
Ibis, 1894, p. 269, pl. 8; Dress., *l. c.* IX, *en hiver Japon N.*
Suppl., p. 415, pl. 721. *(accid. Norwège).*

FAM. II. — PODICIPEDIDÆ

1927. PODICIPES (1)

Podicipes, Salerne (1767); *Podiceps*, Lath. (1787); *Dytes*, *Pedetaithya*, *Proctopus*, *Lophaithya*, Kaup (1829); *Dasyptilus*, Sw. (1857); *Polioccephalus*, Selby; *Pedeathya*, Gr. (1846); *Tachybaptus*, *Otodytes*, Rehb. (1852); *Calipareus*, Bp. (1855); *Rollandia*, Bp. (1856); *Centropelma*, Scl. et Salv. (1869); *Colymbetes*, Heine (1890).

- 11.926. FLUVIATILIS (Tunst.), *Orn. Brit.*, p. 5 (1771); Dress., *Europemérid. et centr.*
B. Eur. VIII, p. 659, pl. 655; *minutus*, *hebridalis*, jusqu'au 62° lat. N.,
Lath.; *minor*, Gm. (ex Briss.); Dubois, *Fne. Ill.*, *Asie centr., Japon.*
Ois. II, p. 698, pl. 520; *hebridicus*, Gm.; *erythro-*
cephalus, Herm.; *pygmaeus*, *pallidus*, Brm.; *euro-*
pæus, Macg.; *philippensis*, Swinh. (nec Bonn.);
nigricans, Stejn.
5292. *Var.* PHILIPPENSIS (Bonn.), *Tabl. Encycl. Méth.* I, *Chine S., Birmanie,*
p. 58, pl. 46; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, *Formose, Haïnan,*
p. 512; *minor* et *fluviatilis* (pt.), auct. plur.; *Bornéo, Philipp.*
noctivagus, Tem.
5295. *Var.* CAPENSIS, Licht., *Nomencl.*, p. 104; Grant, *Afrique, Madagascar,*
Cat., p. 515, pl. 7 et 8; *pandubia*, Hodgs.; *Asie S.-W., Inde,*
philippensis, *minor* et *fluviatilis* (pt.), auct. *Ceylan, Birmanie.*
plur.; *albipennis*, Sharpe.
5294. *Var.* TRICOLOR, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 566; Mey. *Nouv.-Guinée, Arou,*
et Wg., *B. Cel.*, p. 915; *minor*, Wald., Rosenb. *Moluques, Célèbes,*
et Mey. (nec Gm.); *gularis*, Rosenb. (nec Gd.) *Flores, Timor.*
- 11.927. ALBESCENS, Blauf., *Str. F.*, 1877, p. 486; id., *Faun.* *Sikhim.*
Br. Ind. B. IV, p. 476; Grant, *Cat.*, p. 518.
- 11.928. PELZELNI, Hartl., *Orn. Madag.*, p. 85; Schl. et *Madagascar.*
Pol., *Rech. Madag.* II, pp. 151, 160, pl. 40; Grant,
l. c., p. 518.
- 11.929. NOUË-HOLLANDÆ, Steph., *Gen. Zool.* XIII, 1, p. 48; *Austr., Tasm., Nouv.-*
gularis, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 81; Mey. *Caléd., Nouv.-Guin.,*
et Wg., *B. Cel.*, p. 917. *Sangi, Talaut, Java.*
- ✓ 11.950. DOMINICUS (Lin.); Spix, *Av. Bras.* II, p. 78, pl. 101; *Amérique centr. et*
Baird, *B. N. Am.*, pl. 99, f. 1; Schl., *Mus. P.-B.*, *mérid. jusqu'en Pa-*
Urinat, p. 47; *dominicensis*, D'Orb. *tagonie, Antilles.*

(1) *Podiceps* est une contraction vicieuse du mot *Podicipes* (pieds au derrière), de *podex*, *podicis* et de *pes*.

5295. *Var. BRACHYRHYNCHA*, Chapm., *Bull. Amer. Mus.* XII, p. 255. Matto Grosso (Brésil).
5296. *Var. BRACHYPTERA*, Chapm., *Bull. Am. Mus.* XII, p. 256. Texas.
- 11.951. *POLIOCEPHALUS*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, p. 15, pl. 15; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 82; *nestor*, Gould. Australie, Tasmanie.
- 11.952. *RUFPECTUS*, Gray, in *Dieff.*, *Trav. N. Z. App.*, p. 198; id., *Voy. Ereb. and Terr.*, B., p. 16, pl. 19; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 280. Nouv.-Zélande.
- 11.955. *AMERICANUS*, Garn., *Voy. Coquille, Zool.* I, p. 599; Schl., *l. c.*, p. 42; *chiliensis*, Garn., *l. c.*, p. 601; *albicollis*, Less.; *rollandi*, auct. plur. (nec Q. et G.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 494; Schl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 204; *micra*, Bp.; *leucotis*, Tacz. Pérou, Chili, Paraguay, Argentine jusqu'au détroit de Magellan.
5297. *Var. ROLLANDI*, Gould (pt., ex Q. et G.); Quoy et Gaim., *Voy. Uranie*, p. 155, pl. 56; Gould, *Voy. Beagle*, III, p. 157 (pt.); Schl., *l. c.*, p. 42. Iles Malouines ou Falkland.
- 11.954. *CALIPAREUS*, Less., *Voy. Coq., Zool.* I, p. 727, pl. 45; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 495; *occipitalis*, Less. Du Pérou et Argentine au détroit de Magellan; Malouines.
5298. *Var. JUNINENSIS*, Berl. et Stolz., *Ibis*, 1894, p. 112; Grant, *Cat.*, p. 558. Pérou central et S.
5299. *Var. TACZANOWSKII*, Berl. et Stolz., *Ibis*, 1894, p. 109. Pérou central.
- 11.955. *AURITUS* (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 645, pl. 651; *nigricans*, Scop.; *duplicatus*, Müll.; *cornutus*, Gm. (ex Briss.); Dubois, *l. c.* II, p. 695, pl. 519; *obscurus*, *caspicus*, Gm.; *comosus*, Bonn.; *arcticus*, Boie; *ambiguus*, Less.; *bicornis*, Brm.; *selavus*, Bp.; *korejevi*, Zarud. et Har. Europe, Asie et Amérique sept., entre le 65° et le 40° latit. N. environ.
- 11.956. *NIGRICOLLIS*, Brm., *Handb. Vög. Deutschl.*, p. 965; Dress., *l. c.* VIII, p. 651, pl. 652; Dubois, *l. c.* II, p. 692, pl. 518; *auritus*, auct. plur. (nec Lin.); *recurvirostris*, Brm. Europe centr. et mér., Asie centr. jusqu'au Japon; l'Afr. en hiv.
5500. *Var. CALIFORNICA*, Heerm., *Pr. Ac. Phil.*, 1854, p. 179; Baird, *B. N. Am.*, p. 896; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 64; *auritus*, Aud. (nec L.), *B. Am.* VII, p. 522, pl. 482. Amér. N.-W. jusqu'au 60° l. N.; en hiver Mexique, Guatémal.
- 11.957. *MICROPTERUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1868, p. 220; *micropterum*, Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 189, pl. 95; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 497. Pérou S. (lac Titicaca).
- 11.958. *CRISTATUS* (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 629, pl. 619; Dubois, *l. c.* II, p. 685, pl. 516; *urinator*, L.; *cornutus*, Bonn. (nec Gm.); *mitratus*, *patagiatus*, Brm.; *australis*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 80; *hectori*, Bull.; *widhalmi*, Goeb.; *rostratus*, Mans.-Pley.; *infuscatus*, Salvad. Europe et Asie centr., jusqu'au Japon sans dépasser le 63° l. N., Afrique, Australie, Tasmanie, Nouv.-Zélande.

- 11.959. *GRISEIGENA* (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 55; Dress., *l. c.* VIII, p. 659, pl. 620; Dubois, *l. c.* II, p. 688, pl. 517; *subcristatus*, Jacquin; *parotis*, Sparrm.; *ruficollis*, Lath.; *rubricollis*, Gm.; *longirostris*, Bonn.; *cucullatus*, *nævius*, Pall.; *canogularis*, Brm. Europe et Asie W. jusqu'au cercle arct.; au S. jusqu'au N. de l'Afrique et les mers Noire et Caspienne.
5501. *Var.* HOLBOELLI, Reinh., *Vidensk. Meddel.*, 1855, p. 76; id., *Ibis*, 1861, p. 14; *cristatus* et *rubricollis* (pt.), auct. plur. amer.; *cucullatus* (pt.), Pall.; *major*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 122, pl. 78^b; *subcristatus*, Schr., *Reis. Amurl.*, p. 495, pl. 15, l. 5; *griseigena*, Baird (nec Bodd.); *cooperi*, Lawr.; *affinis*, Salvad.; *occidentalis*, Tristr. (nec Lawr.) Amérique septentr. et Groenland jusqu'au Cercle arct., Sibérie E., Japon, au S. jusque vers le 42° latit. N.

1928. ÆCHMOPHORUS

Æchmophorus, Coues (1862).

- 11.940. *MAJOR* (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 24; Schl., *l. c.*, p. 58; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 492; Schl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 202; *cayennensis*, Gm.; *cayanus*, Lath.; *bicornis*, Licht.; *leucopterus*, King.; Jard. et S., *Ill. Orn.*, pl. 107; *longirostris*, Bp.; *salvadorii*, Stejn. Amérique mérid., du N. du Pérou à Magellan.
- 11.941. *OCCIDENTALIS* (Lawr.), in Baird's *B. N. Am.*, p. 894; Coop. et Suckl., *N. H. Wash. Terr.*, p. 281, pl. 58; Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1862, p. 229; *clarkii*, Lawr. Amérique N.-W. au S. jusqu'au Mexique.

1929. PODILYMBUS

Podilymbus, Less. (1851); *Sylbeocyclus*, Bp. (1852); *Hydroka*, Nutt. (1854); *Nexiteles*, Glog. (1842).

- ✓ 11.942. *PODICEPS* (Lin.); Baird, *B. N. Am.*, p. 898; *ludovicianus*, Bodd.; *thomensis*, Gm.; *carolinensis*, Lath.; Spix, *Av. Bras.* II, p. 78, pl. 100; Aud., *B. Am.* VII, p. 524, pl. 485; *antarcticus*, Less.; *brevirostris*, Gr.; *anisodactylus*, Rehb.; *lineatus* Heerm. Amérique sept., centr. et mérid., Antilles.

FAM. III. — ALCIDÆ (I)

SUBF. I. — ALCINÆ

1950. ALCA

Alca, Lin. (1758); *Plautus*, Brünn. (1772); *Pinguinus*, Bonn. (1790); *Torda*,

(1) Voy. : Og.-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 559-622 (1898).

Dumér. (1806) ; *Utamania*, Leach (1816) ; *Chenalopex*, Vieill. (1819) ; *Mutaeoptera*, Glog. (1842) ; *Gyalca*, Steenstr. (1855).

- 11.945. IMPENNIS, Lin. ; Gould, *B. Eur.* V, pl. 400 ; id., *B. Gr. Brit.* V, pl. 46 ; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 565, pl. 620 ; *borealis*, Forst. ; *major*, Merr. Nord de l'Atlantique (éteint).
- 11.944. TORDA, Lin. ; Dress., *l. c.* VIII, p. 557, pl. 619 ; Dubois, *Fne. Ill.*, Ois. II, p. 662, pl. 511 ; *unisulcata*, *balthica*, Brünn. ; *pica*, L. ; *glacialis*, *islandica*, *microrhynchos*, Brm. Europe W., du Cap N. à la Méditerranée, Islande, Groenland, Amér. N.-E. (côtes).

1951. MERGULUS

Alle ! Link (1806) ; *Mergulus*, Vieill. (1816, ex Ray, 1715) ; *Arctica*, Gray (1844).

- 11.945. ALLE (Lin.) ; Dress., *l. c.* VIII, p. 591, pl. 624 ; Dubois, *l. c.* II, p. 659, pl. 510 ; *alce*, Gm. ; *nigricans*, Link ; *melanoleucos*, Leach ; *minor*, Merr. ; *arcticus*, Brm. N. de l'Atlant. jusqu'au 81° l. N., dépasse rarement en hiver vers le S. le 55°.

1952. URIA

Uria, Briss. (1760) ; *Cepphus*, Pall. (1769) ; *Grylle*, Leach (1819) ; *Lomvia*, Brandt (1857) ; *Cataractes*, Gray (1841) ; *Pseuduria*, Sharpe (1899).

- 11.946. TROILE (Lin.) ; Dress., *l. c.* VIII, p. 567, pl. 621 ; Dubois, *l. c.* II, p. 655, pl^s 509 et 509^b ; *minor*, Tunst. ; *ringvia* et *alga*, Brünn. ; *lomvia*, auct. plur. (nec Pall.) ; *leucophthalmos*, Fab. ; *lacrimans*, Valenc. ; *leucopsis* et *norvegica*, Brm. ; *intermedia*, Nilss. ; *leucotis*, C. Dub. Eur. jusqu'au cap N., Islande, Groenland, Amér. N.-E., descend vers le Sud en hiver jusque vers le 40° l. N.
5502. *Var.* CALIFORNICA (Bryant), *Pr. Bost. Soc.* VIII, p. 142, ff. 5, 5 ; Bd., Brew. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 485. Amérique N.-W., en hiver Californie.
- 11.947. LOMVIA (Pall.), *Zoogr.*, *Rosso-As.* II, p. 545 ; *svarbag*, Brünn. ; *brunnichi*, Sab., *Tr. Linn. Soc.*, 1817, p. 558 ; And., *B. Am.* VII, p. 265, pl. 472 ; Dress., *l. c.* VIII, p. 575, pl. 622 ; *francesii*, Leach ; *polaris*, Brm. Mers arctiques, Nord de l'Atlantique.
5505. *Var.* ARRA (Pall.), *Zoogr.* II, p. 547 ; Naum., *Vög. Deutschl.* XII, p. 555, pl. 555 ; *lomvia* (pt.), Grant. Nord de l'Océan Pacifique.
- 11.948. GRYLLE (Lin.) ; Dress., *l. c.* VIII, p. 581, pl. 625 ; Dubois, *l. c.* II, p. 651, pl. 508 ; *grylloides*, *balthica*, Brünn. ; *lacteolus*, Pall. ; *gryllus*, Müll. ; *nivea*, Bonn. ; *leucoptera*, Vieill. ; *arctica*, Brm. ; Nord de l'Atlantique, descend en hiver jusque sur les côtes du N. de la France

- motzfeldi*, Benick.; *unicolor*, Faber; *scapularis*, Steph.; *groenlandicus*, Gray; *variegata*, Rehb.; *carbo*, Newt. (nec Pall.); *columba*, Fitz. (nec Pall.); *mansfeldi*, Seeb. et du Massachusetts.
5504. *Var.* MANDT, Licht., in *Mandt, Observat., etc.*, p. 50; Dress., *l. c.* VIII, p. 587; *glacialis*, Brm.; ?*meisneri*, Brm.; *grylle* (pt.), auct. plur. (nec L.) Terres entourant le Pôle arctique.
- 11.949. COLUMBA (Pall.), *Zoogr.* II, p. 548; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 17; Baird, *B. N. Am.*, p. 912, pl. 96, f. 1; *grylle*, Killl. (nec L.) Nord du Pacifique, du détroit de Behring et des îles Aléoutes à la Californie, Sibérie E.
5505. *Var.* SNOWI (Stejn.), *Auk*, 1897, p. 201; *columba* (pt.), auct. plur. (nec Pall.) Îles Kouriles, Kamtschatka, Japon.
- 11.950. CARBO (Pall.), *Zoogr.* II, p. 550, pl. 79; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 71; Baird, *B. N. Am.*, p. 915, pl. 97; Schl., *l. c.*, p. 17. Nord du Pacifique jusqu'au Japon au S.

1953. BRACHYRHAMPHUS

Brachyramphus, *Apobapton*, Brandt (1857); *Anobapton*, Bp. (1856).

- 11.951. MARMORATUS (Gm.), *S. N.* I, p. 585; Brandt, *Bull. Acad. St-Petersb.*, 1857, p. 546; *wrangeli*, Brandt, *l. c.*; townsendi, Aud., *Orn. Biogr.* V, p. 251, pl. 429; id., *B. Am.* VII, p. 278, pl. 475. Côtes de l'Amérique N.-W., de l'Alaska à la Californie.
- 11.952. PERDIX (Pall.), *Zoogr.* II, p. 551, pl. 80; Stejn., *Zeitschr. ges. Orn.* III, p. 215, pl. 7; *marmoratus* et *wrangeli* (pt.), auct. plur.; *killitzi*, Swinh. (nec Brandt). Côtes du N.-E. de l'Asie, Kouriles, Kamtschatka, Japon.
- 11.953. BREVIROSTRIS (Vig.), *Zool. Journ.* IV, p. 557; Stejn., *Zeitschr. ges. Orn.* III, p. 211; Seeb., *B. Jap.*, p. 279; *killitzi*, Brandt; Nels., *Rep. N. H. Alaska*, p. 44, pl. 1; *antiqua*, Aud. (nec Gm.), *Orn. Biogr.* V, pl. 402, f. 2. Nord du Pacifique : détroit de Behring, Kamtschatka, Aléoutes, Japon.

1954. ENDOMYCHURA

Micruria, Grant (1898, nec Reit., 1875); *Endomychura*, Oberh. (1899).

- 11.954. NYPOLEUCUS (Xantus), *Pr. Ac. Phil.*, 1859, p. 299; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 72; Oberh., *Pr. Ac. Phil.*, 1899, p. 201. Basse-Californie.
- 11.955. ?CRAVERI (Salvad.), *Atti Soc. Ital.* VIII, 1865, p. 587; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 502. Basse-Californie.

1955. SYNTHLIBORHAMPHUS

Synthliboramphus, Brandt (1857).

- 11.956. ANTIQUUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 554; Aud., *Orn. Biogr.* V, Nord du Pacifique :
p. 100, pl. 402, f. 1; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, Asie N.-E., Amé-
p. 124, pl. 80; Brandt, *Bull. Ac. St. Pétersb.*, rique N.-W., Japon
1857, p. 547; *senicula*, Pall.; *brachypterus*, Brl.;
cirrhocephalus, Vig.; *cana*, Kill.; *temminckii*,
Coop. et Suckl. (nec Brl.)
- 11.957. WUMZUSUME (Tem.), *Pl. Col.* 121; *wumzusume*, Tem. Côtes du Japon.
et Schl., *Faun. Jap.*, p. 125, pl. 79; *temminckii*,
Brl.; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 74.

SUBF. II. — FRATERCULINÆ

1956. PTYCHORHAMPHUS

Ptychoramphus, Brandt (1857).

- 11.958. ALEUTICUS (Pall.), *Zoogr.* II, p. 570; Brl., *Bull. Ac.* Côtes de l'Am. N.-W.,
St-Pétersb., 1857, p. 547; Ell., *B. N. Am.* II, des îles Aléoutes à
pl. 69; *cassini*, Gamb. la Basse-Californie.

1957. SIMORHYNCHUS

Simorhynchus, Ersch. et Grub. (1819); *Tyloramphus*, Brand (1857); *Ciceronia*,
Rehb. (1852).

- 11.959 CRISTATELLUS (Pall.), *Spicil. Zool.*, fasc. V, p. 18, Nord du Pacifique :
pl^s 5 et 5, ff. 7-9; id., *Zoogr.* II, p. 570, pl. 86; détroit de Behring.
Aud., *Orn. Biogr.* V, p. 102, pl. 402; id., *B. Am.* Alaska, Kamtschat-
VII, pl. 467; Schl., *Mus. P.-B. Urinat.*, p. 25; ka, Kouriles, Japon.
tetracula, *dubia*, Pall.; *cristata*, Mull.; *supercil-*
liosa, Bp.; *superciliata*, Aud.
- 11.960. PYGMEUS (Gm.), *S. N. I.*, p. 555; Brl., *Mél. Biol.* VII, Nord du Pacifique :
p. 228; *kamtschatica*, Lepech.; Baird, *B. N. Am.*, détroit de Behring,
p. 908; Schl., *l. c.*, p. 25; *crinita*, *mystacea*, Pall.; Alaska, Kamtschat-
cristatella, auct. plur. (nec Pall.); Tem., *Pl. Col.* ka, Japon, etc.
122; *superciliosa*, Licht. (nec Bp.); *cassini*, Coues.
- 11.961. PUSILLUS (Pall.), *Zoogr.* II, p. 575, pl. 90; Ell., *B.* Nord du Pacifique :
N. Amer. II, pl. 68; *corniculatus*, Esch.; *micro-* Alaska, Kamtschat-
ceros, Brl.; *occidentalis*, Vig.; *nodirostris*, Bp.; ka, Japon, etc.
pygmaeus, Schl. (nec Gm.), *l. c.*, p. 25.

1958. PHALERIS

Phaleris, Tem. (1820); *Cyclorrhynchus*, Kp. (1829); *Ombria*, Eschs. (1831).

- 11.962. PSITTACULA (Pall.), *Spicil. Zool.*, fasc. V, p. 15, Nord du Pacifique :
 pls 2 et 3, ff. 4-6; id., *Zoogr.* II, p. 566, pl. 84; des Kouriles à l'A-
 Schl., *l. c.*, p. 24; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 175^c. laska.

1959. CERATORHYNCHA

Cerorhinca, Bp. (1826); *Chimerina*, Eschs. (1829); *Ceratorrhina*, Bp. (1850);
Cerorhina, Brt. (1857); *Ceratorhyncha* et *Cerorhynca*, Bp. (1858).

- 11.965. MONOCERATA (Pall.), *Zoogr.* II, p. 562; Cass., in Nord du Pacifique :
Perry Exped. Jap. II, p. 255; Schl., *l. c.*, p. 26; du dét. de Behring
Cerorhyncha occidentalis, Bp.; Aud., *B. Am.* VII, et Japon, etc., à la
 p. 264, pl. 471; *cornuta*, Eschs.; *orientalis*, Brt.; Basse-Californie en
suckleyi, Cass. hiver.

1940. LUNDA

Lunda, Pall. (1811); *Gymnoblepharum*, Brt. (1857); *Sagmatorrhina*, Bp. (1851);
Cheniscus, Gray (1871).

- 11.964. CIRRHATA (Pall.), *Spicil. Zool.*, fasc. V, p. 7; id., Nord du Pacifique :
Zoogr. II, p. 565, pl. 82; Vieill., *Gal. Ois.* II, Kamtsch., Alaska
 p. 240, pl. 296; Schl., *l. c.*, p. 27; *carinata*, jusqu. Basse-Calif.,
 Vig.; *lathamii*, Bp.; *labradoria*, Cass. Japon, etc., Groenl.
 (accid. Maine).

1941. FRATERCULA

Fratercula, Briss. (1760); *Mormon*, Ill. (1811); *Larva*, Vieill. (1816); *Cerato-*
blepharum, Brandt (1837).

- 11.965. ARCTICA (Lin., 1758); Dress., *l. c.* VIII, p. 599, Nord de l'Atlantique :
 pl. 625; Dubois, *l. c.* II, p. 666, pl. 512; *deleta*, Europe N. et W.,
 Brünn.; *labradorica*, Gm.; *labradora*, Lath.; Amér.N.-E., Groen-
canogularis, Mey. et Wolf.; *polaris* et *grava*, Brm. land, Islande.
 5506. Var. GLACIALIS (Naum.), *Isis*, 1821, p. 782, pl. 7, Zone polaire jusqu'au
 f. 2; Elliot, *B. N. Am.* II, pl. 65; *arcticus*, 80° l. N., Spitzberg,
 Malmgr. (nec L.); *corniculata*, Degl. et Gerbe Nouv.-Zemble, etc.
 (nec Naum.)
 11.966. CORNICULATA (Naum.), *Isis*, 1821, p. 782, pl. 7, Nord du Pacifique, en
 ff. 5, 4; Gray, *Gen. B.* III, pl. 174; Ridgw., hiver Japon et Co-
Man. N. Am. B., p. 41; Seeb., *B. Japan*, p. 280; lombie anglaise.
arctica, Pall. (nec L.); *septentrionale*, Kittl.; *glac-*
ialis, auct. plur. (nec Naum.); Gould, *B. Eur.* V,
 pl. 404.

ORD. XIX. — IMPENNES (1)

FAM. SPHENISCIDÆ

1942. APTENODYTES

Aptenodytes, Forst. (1781); *Apterodita*, Scop. (1786); *Pinguinaria*, Shaw (1792).

- 11.967. PATAGONICA, Forst., *Comment. Gotting.* III, p. 157, pl. 2; id., *Icon. ined.*, pl. 81 (*patachonica*); *longirostris*, Scop.; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 506; *pennantii*, Gray; id., *Voy. Ereb. and Terr.*, B., pl. 52; *rex*, Bp.; *forsteri*, Schl. (pt.) Magellan, îles Malouines, Géorgie du S., Marion, Kerguelen, Macquarie, Snares et Stewart.
- 11.968. FORSTERI, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 515; id., *Gen. B.* III, pl. 176, f. 2; id., *Voy. Ereb. and Terr.*, B., pl. 51; *imperator*, Bp.; *patagonicus*, Schl., Coues (nec Forst.) Mers antarctiques.

1943. PYGOSCELIS

Pygoscelis, Wagl. (1852); *Dasyrhamphus*, Hombr. et Jacq. (1855); *Pygoscelys*, Bp. (1856).

- 11.969. PAPUA (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 140, pl. 5; Rchb., *Nat.*, pl. 2, f. 758; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., pl. 25; Schl., *l. c.*, p. 5; *teniata*, Peale; *wagleri*, Sclat. Îles Malouines, Géorgie du S., Marion, Kerguelen, Heard, Macquarie, etc.
- 11.970. ADELLE (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.*, 1841, p. 520; id., *Voy. Pôle Sud*, Zool. III, p. 155, pl. 55, f. 1; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., pl. 28; Schl., *l. c.*, p. 4; *brevirostris*, Gray; *longicaudata*, Peale, *Zool. U. S. Expl. Exp.*, B., p. 264, pl. 70, f. 2; *herculis*, Finsch. Terres antarctiques.
- 11.971. ANTARCTICA (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 141, pl. 4; id., *Icon. ined.*, pl. 82; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., pl. 26; Schl., *l. c.*, p. 5. Îles Malouines, Weddell, Géorgie du S., Seymour.

1944. CATARRHACTES

Catarractes, Briss. (1760); *Eudyptes*, Vieill. (1816); *Chrysocoma*, Steph. (1825); *Microdyptes*, M.-Edw. (1880).

- 11.972. CHRYSOCOME (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 155, pl. 1; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 245, pl. 298; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 85; *demersus*, L. (nec *Diomedemsa*); *catarractes*, Forst.; *gorfua*, Bonn.; *cirrhatta*, *cristata*, Shaw; *saltator*, Steph.; *chryso-* Terre de Feu, Malouines, Géorgie du S. et îles voisines, Cap B.-Esp., Austr. S., Tasmanie, Nouv.-

(1) Voy.: Ogilvie Grant, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 623-653 (1898).

- lopha*, Rehb.; *nigrivestis*, Gould; *filhohi*, Hutt.; *serresiana*, Oust. Zélande.
- 11.975. *PACHYRHYNCHUS* (Gray), *Voy. Ereb. and Terr.*, B., p. 17; id., *Gen. B.* III, pl. 176; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 287; *chrysocome* (pt.), auct. plur. (nec Forst.); *atrata*, Hutt. (mélanisme); ? *novae-hollandiae*, Steph. Nouvelle-Zélande, îles Snares, Bounty, Chatham.
5507. *Var. VITTATA* (Finsch), *Ibis*, 1875, p. 112; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 299. Nouvelle-Zélande (île Sud).
5508. *Var. SCLATERI* (Bull.), *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 289; id., *P. Z. S.*, 1889, p. 82, pl. 9, f. 1. Îles Campbell, Auckland, Antipodes et Bounty.
- 11.974. *CHRYSOLOPHUS*, Brandt, *Bull. Acad. St-Petersb.*, 1857, p. 515; Gray, *Gen. B.* III, pl. 176, f. 4; Schl. et Salv., *Voy. Chall.*, *Zool.*, B., p. 127, pl. 29; ? *diadematus*, Gould, *P. Z. S.*, 1860, p. 449. Îles Malouines, Géorgie du S., Prince Edward, Marion, Kerguelen, Heard.
- 11.975. *SCHLEGELI* (Finsch), *Trans. N. Zeal. Inst.* VIII, 1876, p. 204; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 298; *diadematus*, Schl., *Mus. P.-B., Urinat.*, p. 8 (pt., nec Gould ?); *chrysolophus*, Fsch. (1872, nec Brt.); *albigularis*, M.-Edw., *Ann. Sc. Nat.*, 1880, art. 9, p. 55, pl. 49. Nouv.-Zélande : îles Macquarie et Campbell.

1945. MEGADYPTES

- Catarrhactes*, Hombr. et Jacq. (1841, nec Briss., 1760); *Megadyptes*, M.-Edw. (1882).
- 11.976. *ANTIPODUM* (H. et A.), *Ann. Sc. Nat.*, 1841, p. 520 (antipodes); Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., p. 17, pl. 27; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 294, pl. 46, f. 1; *flavilarrata*, Peale. Nouv.-Zélande, îles Auckland, Stewart, Chatham, Campbell.

1946. EUDYPTULA

Eudyptula, Bonap. (1856).

- 11.977. *MINOR* (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 147; id., *Icon. ined.*, pl^s 84, 85; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 84; *undina*, Gould, *l. c.*, pl. 85. Australie S., Tasmanie, Nouv.-Zélande, îles Chatham.
5509. *Var. ALBOSIGNATA*, Finsch, *P. Z. S.*, 1874, p. 207; id., *J. f. O.*, 1874, pp. 174, 219; *minor*, Bull. (pt.) Nouv.-Zélande.

1947. SPHENISCUS

Spheniscus, Briss. (1760); *Dypsicles*, Glog. (1842).

- 11.978. *DEMERSUS* (Lin.); *Pl. Enl.* 58; Steph., *Gen. Zool.* XIII, 1, p. 64, pl. 9; Schl., *l. c.*, p. 10; Schl. et Côtes S. et S.-W. de l'Afrique.

- Salv., *Voy. Chall., Zool., B.*, p. 124, pl. 27;
palpebrata, Licht.; *fuscirostris*, Illig.; ?? *torquata*,
 Forst. (aberr. ?); ? *platirhingos*, Scop.
- 11.979. HUMBOLDTI, Meyen, *Nov. Act. Acad. Caes. Leop.-*
Car. XVI, *Suppl.*, p. 21; Tschudi, *Faun. Per.*,
 p. 515; Tacx., *Orn. Pér.* III, p. 499; *demersus*
 (pl.), Schleg.; ? *chilensis*, Mol.; ? *molinae*, Lath. Côtés du Pérou et du Chili.
- 11.980. MAGELLANICUS (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 145,
 pl. 5; id., *Icon. ined.*, pl. 85; Schl. et Salv., *Voy.*
Chall., Zool. B., p. 125, pl. 28; *brasiliensis*,
 Licht.; *magnirostris*, Peale; *demersus* (pl.), auct.
 plur. (nec L.); *trifasciatus*, Philip.; ? *modestus*
 et *flavipes*, Philip., *Arch. f. Naturg.*, 1899, p. 171. Côtés de l'Amérique mérid., de Magellan au Chili et au Rio-Grande do Sul, îles Malouines et de Géorgie du S.
- 11.981. MENDICULUS, Sundev., *P. Z. S.*, 1871, p. 126; Salv.,
Trans. Zool. Soc. IX, pl. 89; Grant, *Cut.*, p. 655. Iles Galapagos.

SUBCL. III. — RATITÆ ⁽¹⁾

ORD. XX. — APTERYGES

FAM. APTERYGIDÆ

1948. APTERYX

Apteryx, Shaw (1815); *Apternyx*, Sw. (1857).

- 11.982. AUSTRALIS, Shaw, *Nat. Misc.* XXIV, pl. 1037, 1038;
 Gray, *Gen. B.* III, pl. 159; Bull., *Hist. B. N.*
Zeal., ed. 2, II, p. 522; *novæ-zelandiæ*, Less.;
fusca, Potts. Nouvelle-Zélande (île Sud).
- 11.985. LAWRYI, Rothsch., *Ibis*, 1895, pp. 575-76; *maxima*,
 Bull. (nec Bp.), *Tr. N. Z. Inst.*, 1890, p. 602. Nouvelle-Zélande (île Stewart).
- 11.984. MANTELLI, Bartl., *P. Z. S.*, 1850, p. 275, pl. 50,
 ff. 3, 4, pl. 51, f. 2; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 537,
 pl. 55; *australis*, auct. plur. (nec Shaw); Gould,
B. Austr. VI, pl. 2; *bulleri*, Sharpe. Nouvelle-Zélande (partie or. de l'île Nord).
- 11.985. OWENI, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 94; id., *B.*
Austr. VI, pl. 5; id., *Tr. Z. S.* III, p. 579, pl. 57;
mantelli, juv., Schl.; *mollis*, Potts; *fuscus*, Rowl.
 (nec Potts). Nouvelle-Zélande (île Sud).
5310. *Var.* OCCIDENTALIS, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Cl.* X,
 p. 59; *Ibis*, 1895, pp. 575, 576; *oweni*,
 Finsch (nec Gould). Nouv.-Zélande (partie occid. des îles Nord et Sud).
- 11.986. HAASTI, Potts, *Tr. N. Z. Inst.*, 1871, p. 204; id., Nouvelle-Zélande (île

(1) Voy. : Salvadori, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXVII, pp. 570-612 (1895).

Ibis, 1872, p. 35; Rowl., *Orn. Misc.* 1, pp. 5-17, pl. 1; ? *maxima*, Bp. (*descr. nulla*); ? *major*, Ellm.; *australis*, Haast (nec Shaw). Sud centr. et partie occid. de l'île Nord)

ORD. XXI. — CASUARI

FAM. I. — DROMÆIDÆ

1949. DROMÆUS

- Dromaius*, Vieill. (1816); *Dromæus*, Ranz. (1821); *Tachea*, Flem. (1822); *Dromiceus*, Sw. (1857); *Dromiceus*, A. Newt. (1895).
- 11.987. NOVÆ-HOLLANDIÆ (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 665; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 1; Schl., *Mus. P.-B., Struthiones*, p. 7; *emu*, Steph.; *australis*, Sw. Australie E., Tasmanie.
- 11.988. ATER, Vieill., *N. Dict.* X, p. 212; id., *Gal. Ois.* II, p. 79, pl. 226; ? *parvulus*, Gould. Ile Decrès ou Kangaroo (éteint).
- 11.989. IRRORATUS, Bartl., *P. Z. S.*, 1859, p. 295; Schl., *l. c.*, p. 7; Salvad., *Cat.*, p. 589. Australie W.

FAM. II. — CASUARIIDÆ (1)

1950. CASUARIUS

- Casuarius*, Briss. (1760); *Hippalectryo*, Glog. (1842).
- 11.990. EMEU, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 664; Schl., *l. c.*, p. 9; *galeatus*, Bonn.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 77, pl. 225; *casuarius*, Lin.; Rothsch., *Tr. Z. S.* XV, p. 115, pl. 22; *indicus*, Glog.; *orientalis*, S. Müll.; *javanensis*! Gulliv.; *beccarii*, Pelz. (nec Schl.) Céram.
5511. Var. BECCARI, Sclat., *P. Z. S.*, 1875, p. 87, ff. 1, 2; Rothsch., *l. c.*, p. 116, pl. 25; *bica-runculatus*, Becc. (nec Schl.) Ile Vokan (Arou).
5512. Var. SCLATERI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XII, 1878, p. 422; *beccarii*, Scl., *P. Z. S.*, 1875, p. 527, pl. 58 (nec Schl., p. 87); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 484 (pt.) Nouv.-Guinée S.
5513. Var. SALVADORI, Oust., *Bull. Assoc. Sc. de France*, Bull., n° 559, 1878, p. 550; Rothsch., *l. c.*, p. 120, pl. 24; Salvad., *Cat.*, p. 595; *trica-runculatus*, Salvad. (pt.) Nouv.-Guinée N.-W.
5514. Var. ALTIJUGUS, Schl., *Nature*, 1878, p. 575; Rothsch., *J. f. O.*, 1901, p. 561; *intensus*, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, 1898, VIII, Wandammen (Nouv.-Guinée).

(1) Voy. aussi : W. Rothschild, *A Monograph of the genus Casuarius* (*Trans. of the Zool. Soc. of London*, XV, pt. 5 (1900)).

- pp. 21, 55; id., *Monogr.*, p. 121, pl. 27;
salvadorii (pt.), Rothsch., *l. c.*, p. 120.
5515. *Var. VIOLICOLLIS*, Rothsch., *Bull. B. O. C.* VIII, ? Ile Trangan (Arou).
 pp. 27, 55; id., *Monogr.*, p. 122, pl. 26.
5516. *Var. AUSTRALIS*, Wall., *Sydn. Herald*, 1854; Gould, Queensland N. (Austra-
P. Z. S., 1857, p. 269; id., *B. Austr., Suppl.*, lie).
 pls 70, 71; Rothsch., *l. c.*, p. 125, pl. 25;
johansonii, F. Müll.; ? *regalis*, Rosenb.
- 11.991. *BICARUNCULATUS*, Schl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 211, 248; Iles Wammer et Ka-
 Schl., *Mus. P.-B., Struth*, p. 10; Rothsch., *l. c.*, broor (Arou).
 p. 129, pl. 28; *aruensis*, Schl.; *galeatus*, Rosenb.
 (nec V.)
- 11.992. *UNAPPENDICULATUS*, Blyth, *Journ. As. Soc. Beng.*, Salwatti.
 1860, p. 112; Benn., *Ibis*, 1860, p. 405, pl. 14;
 Schl., *l. c.*, p. 10; Salvad., *Mém. R. Ac. Sc. Tor.*,
 1881, p. 205, pl. 2, f. 6; Rothsch., *l. c.*, p. 152
 (pt.); *kaupii*, Rosenb.
5517. *Var. ROTHSCHULDI*, Matsch., *Journ. f. Orn.*, 1901, Presqu'île Beran (N.-
 p. 268; *unappendiculatus* (pt.), Rothsch., Guinée N.-W.)
l. c., p. 152, pls 29, 50.
5518. *Var. OCCIPITALIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Ile Jobi.
 1875, p. 718 (note), 1878, p. 425; Oust.,
Arch. Mus. VIII, 1896, p. 264, pl. 14;
 Rothsch., *l. c.*, p. 155, pl. 51; *westermanni*,
 Rey (nec Schl.); *laglaizeii*, Oust., *Bull. Soc.*
Philom., 1895, n° 9, pp. 1-5 (aberr.), id.,
Nouv. Arch. Mus., 1896, VIII, p. 265, pl. 15.
5519. *Var. ACRANTIACA*, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, VIII, Nouv.-Guinée alle-
 p. 1; id., *Monogr.*, p. 156, pl. 52. mande.
5520. *Var. RUFOTINCTA*, Rothsch., *Monogr.*, p. 157. ?
- 11.995. *PHILIPPI*, Rothsch., *Nov. Zool.* V, p. 418; id., ? Nouv.-Guinée E.
Monogr., p. 158, pl. 55.
- 11.994. *PAPUANUS*, Schleg., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, 1871, Nouv.-Guinée N.-W.
 p. 54; id., *Mus. P.-B., Str.*, p. 11; Rothsch.,
l. c., p. 159, pl. 54; *kaupii*, Schl. (nec Rosenb.);
papuensis, Schl.; *westermanni*, Schl.
5521. *Var. EDWARDSI*, Oust., *P. Z. S.*, 1878, p. 589, Nouv.-Guinée allem.
 pl. 21; Rothsch., *l. c.*, p. 141, pl. 55; *pa-* N.-W
puanus (pt.), Salvad., *Cat.*, p. 600.
- 11.995. *LORIE*, Rothsch., *Nov. Zool.*, 1898, p. 515; id., Nouv.-Guinée S.-E.
Monogr., p. 142, pl. 58; *picticollis*, Salvad. (nec Schl.)
- 11.996. *PICTICOLLIS*, Schl., *Rep. Brit. Assoc.*, 1874, p. 158; Nouv.-Guin. anglaise.
 id., *P. Z. S.*, 1875, p. 84, pl. 18; Rothsch., *l. c.*,
 p. 145, pl. 56.
5522. *Var. HECKI*, Rothsch., *Bull. B. O. C.* VIII, p. 49; Nouv.-Guinée allem.
 id., *Monogr.*, p. 144, pl. 57.

- 11.997. BENNETTI, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 269, pl. 129; Nouv.-Bretagne.
 id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl^s 72, 75; Schl., *l. c.*,
 p. 4; Rothsch., *l. c.*, p. 145, pl. 59.
 3525. *Var. MACULATA*, Rothsch., *Monogr. Cas.*, p. 148. ?

ORD. XXII. — RHEÆ

FAM. RHEIDÆ

1951. — RHEA

- Rhea*, Lath. (1790); *Toujou*, Lacép. (1801); *Tujus*, Rafin. (1815); *Pterocnemis*,
 Gray (1871); *Pterocnemys*, Schl. et Salv. (1875).
 11.998. AMERICANA (Lin.); Lath., *Ind. Orn.* II, p. 665; Vieill., Brésil centr., Bolivie,
Gal. Ois. II, p. 74, pl. 224; *nandu*, Less.; *al-* Paraguay, Urug.,
bescens, Arrib. (aberr.) Argentine.
 3524. *Var. MACRORHYNCHUS*, Schl., *P. Z. S.*, 1860, p. 207; Brésil N.-E.
 id., *Tr. Z. S.* IV, p. 556, pl. 69; Salvad.,
Cat., p. 581; *americana* (pt.), auct. plur.
 (nec L.)
 11.999. DARWINI, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 55; id., *Voy.* Chili, Argentine, Pa-
Beagle, B., p. 125, pl. 47; Gray, *Gen. B.* III, tagonie.
 pl. 158; *pennata*, D'Orb.

ORD. XXIII. — STRUTHIONES

FAM. STRUTHIONIDÆ

1952. STRUTHIO

- Struthio*, Lin. (1758).
 12.000. CAMELUS, Lin.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 70, pl. 225; Soudan, Arabie, Pales-
 Salvad., *Cat.*, p. 572. tine.
 3525. *Var. MOLYBDOPIANES*, Rehw., *Mith. Orn. Ver.* Somaliland.
Wien, 1885, p. 205, pl.; id., *Journ. f. Orn.*,
 1885, p. 599; Salvad., *Cat.*, p. 574; *camelus*
 (pt.), auct. plur.
 3526. *Var. AUSTRALIS*, Gurn., *Ibis*, 1868, p. 255; Afrique S.
 Anderss., *B. Damaral.*, p. 251; Salvad., *Cat.*,
 p. 575; *camelus* (pt.), auct. plur.; *meridio-*
nalis, Schl.
 3527. *Var. MASSAICA*, O. Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 245. Massailand.

SUPPLÉMENT

ADDITIONS ET CORRECTIONS (1)

PSITTACI

3. *Microglossa salvadorii*, Mey. = *M. aterrimus*, juv.
11. (Gen.) Au lieu de *Chrysotis* il faut : *AMAZONA*, Less. (1851, nec 1847).
34. *Amazona imperialis*, Richm., *Auk*, 1899, p. 186 = *A. AUGUSTA* (Vig.)
1. *AMAZONA SCHMIDTI*, Ihering, *Rev. Mus. Paulista*, III, Brésil central.
p. 521.
48. Au lieu de *levallanti* il faut : *ORATRIX*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 587.
1. *AMAZONA ORATRIX*, var. *TRESMARIE*, Nels., *Auk*, Tres Marias.
1900, p. 256.
2. — *ALRIFRONS*, var. *SALTUENSIS*, Nels., *Pr. Biol. Mexique N.-W.*
Soc. Wash. XIII, p. 26.
12. (Gen.) Au lieu de *Pachynus*, Rehw. (1881, nec Stål., 1866) il faut : *GRAYDI-*
DASCALUS, Bp. (1854).
24. Var. *Lacera*, Heine = *PIONUS MAXIMILIANI* (Kuhl).
2. *POICEPHALUS SATURATUS*, Shpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 67. Ankole N. (Afr. éq.)
5. — *KINTAMPOENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 10. Côte d'Or, Hinterland.
36. Var. *Erythraea*, Neum. = *P. MEYERI* (Rüpp.)
37. Var. *Transvaalensis*, Neum. = *P. MEYERI*.
130. (p. 11.) Au lieu de *Texas* lisez *Arizona* S.
4. *PYRRHURA HYPOXANTHA*, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, Matto-Grosso (Brésil).
XIV, n° 365, p. 1 ; id., *Ibis*, 1900, pl. 14.
5. — *GRISEIPECTUS*, Salvad., *Ibis*, 1900, p. 672. Hab. ?
191, pl. *PSITTACULA PALLIDA*, Brewst., *Auk*, 1889, p. 85, Senora.
est une var. du *P. CYANOPYGIA*.
191, pl. — *INSULARIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Tres Marias.
p. 541, est une espèce distincte.
193, pl. — *DELICIOSA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Bas-Amazone.
p. 545, est une espèce distincte.

(1) Les numéros imprimés en caractères gras se rapportent aux dénominations indiquées antérieurement dans le *Synopsis avium*; pour les additions, le numérotage recommence par le n° 1, aussi bien pour les espèces que pour les variétés nouvelles.

5. *ECLECTUS PECTORALIS*, var. *ARUENSIS* (Gray), *P. Z. S.*, 1858, p. 182; Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* III, p. 555. Iles Arou.
4. — *PECTORALIS*, var. *SOLOMONENSIS*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 82. Iles Salomon.
5. *GEOFFROYUS PERSONATUS*, var. *EXPLORATOR*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 4. Goram.
6. — *PERSONATUS*, var. ? *LANSBERGI*, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 225. (N'est-ce pas le *sumbavensis*, Salvad.?) Sumbawa.
7. — *PERSONATUS*, var. *CYANICARPUS*, Hart., *Nov. Zool.* VI, p. 81. Ile Rossel.
6. *PRIONITURUS MADA*, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 250. Ile Bourou.
8. *TANYGNATHUS MEGALORHYNCHUS*, var. *VIRIDIPENNIS*, Hart., *Nov. Zool.* X, p. 22. Ile Tukang-Besi (au S.-E. de Célèbes).
9. *PALÆORNIS ALEXANDRI*, var. *MAJOR*, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 188. Sumatra W.
7. *PSITTINUS ABBOTTI*, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 188. Ile Simalur (Sumatra W.)
8. *NASITERNA VIRIDIFRONS*, Rothsch. et Hart., *Orn. Mon.*, 1899, p. 158. Nouv.-Hanovre.
9. — *TRISTRAMI*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 589. Ile Kulambangra (Salomon).
40. — *PUSIO*, var. *SALVADORII*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 81. Nouv.-Guinée N.-W.
10. — *ORIENTALIS*, De Vis, *Ann. Rep. Brit. New Guin.*, 1898, *App.*, p. 81. Nouv.-Guinée S.-E.
11. ? *PLATYCEBCUS PARADISEUS*, Russ., *J. f. O.*, 1874, p. 256. Hab. ?
12. — *MAGGILLIVRAVI*, North, *Victor. Natural.* VII, 1900, pp. 91, 115; Sclat., *Ibis*, 1902, p. 610, pl. 15. Queensland N.
15. *BARNARDIUS OCCIDENTALIS*, North, *Rec. Austr. Mus.* II, p. 85. Australie N.-W.
14. *PSEPHOTUS DISSIMILIS*, Coll., *P. Z. S.*, 1898, p. 556. Australie N.
15. *PEZOPORUS FAIRCHILD*, Hecl., *Tr. N. Z. Inst.*, 1895, p. 285. Ile Antipode.
16. *NESTOR SEPTENTRIONALIS*, Lorenz., *Verh. z.-b. Ges. Wien*, 1896, p. 198. Nouv.-Zélande, ile N.
365. Au lieu de *Eos riciniata* il faut : *E. VARIEGATA* (Gm.), qui a priorité.
11. *EOS VARIEGATA*, var. *OBSENSIS*, Rothsch., *Bull. B. O. C.*, 1899, p. 16; id., *Ibis*, 1900, p. 191. Ile Obi (Moluques).
12. *LORIUS LORY*, var. *MAJOR*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 66. Waigiou.
15. *TRICHOGLOSSUS ILEMATODES*, var. *INTERMEDIA*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 70. Nouv.-Guinée allem.
17. *TRICHOGLOSSUS ALORENSIS*, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 226. Ile Alor.

14. TRICHOGLOSSUS NOYE-HOLLANDIE, var. SEPTENTRIONALIS, Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, 1900, p. 115. Queensland N.
18. HYPOCHARMOSYNA MEEKI, Rothschild et Hartl., *Nov. Zool.* VIII, p. 187. Kulambangra (Salom.)
19. CHARMOSYNA BELLA (De Vis), *Ann. Queensl. Mus.*, N^{lle}-Guin., Wharton. n^o 5, p. 12, pl. 8.
20. OREOPSITTACUS FRONTALIS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 186. Nouv.-Guinée S.-E.
415. — *chlorigaster*, Sharpe, *Zool. Rec.*, 1898, *Aves*, p. 45 = O. GRANDIS, Grant.

SCANSORES ZYGODACTYLÆ

436. INDICATOR MAJOR, Steph. Afr. N.-E., E., S.-E. et Sénégalie.
21. — BARIANUS, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 48; *böhmi*, Rehw. — 436, pl. et var. 142. Afrique équator. jusqu'au Zambèze.
22. — WILLCOCKSI, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 11; id., *Ibis*, 1902, p. 564, pl. 8. Côte d'Or.
25. — POENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 55. Fernando Po.
15. — MINOR, var. TEITENSIS, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 195. Teita (Afrique E.)
24. — LOVATI, Grant, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 59. Abyssinie.
25. — FEE, Salvad., *Ann. Mus. Gen.* XX, 1901, p. 785. Guinée portug.
26. — USSHERI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 80. Fantée.
27. PRODOTISCUS PEASEI, Grant, *Bull. B. O. C.* XI, p. 67; id., *Ibis*, 1901, p. 667, pl. 15. Abyssinie.
28. — ELLENBECKI, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 182. Arrussi (Afrique N.-E.)
- 80^{bis} (Gen.) LYRIUS, Herm. (1885); ce genre comprend les *Pogonorhynchus*, n^{os} 449 à 461 (pp. 55, 56), formant le g. *Melanobucco* de Shelley.
29. LYBIUS THIOGASTER, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 59; *undatus* (pl.), auct. Abyssinie N.
50. — LEUCOGENYS (Blund. et Lovat), *Bull. B. O. C.* X, p. 21. Konduro (Abyssinie).
148. TRICHOLEMA HIRSUTUM, var. FLAVIPUNCTATA, Verr.; *gabonense*, Shell. Gabon, Caméron.
149. *Tr. hirsutum*, var. *Stictilema*, Rehw. = 147, var. ANSORGH, Shell. Uganda.
51. TRICHOLEMA NIGRIFRONS, Rehw., *J. f. O.*, 1899, p. 418. Afrique E. allem.
52. GYMNBUCCO PELI, Hartl. (473, pl.), est une espèce distincte. Afrique W.
- 83 (Gen.) *Smilorhis* = STACTOLEMA (85, p. 58).
496. STACTOLEMA LEUCOMYSTAX, Sharpe, est un BARBATULA.
55. — BOCAGEI (Souza), *Jorn. Lisb.*, 1886, p. 158. Benguela.
54. BARBATULA XANTHOSTICTA, Blund. et Lovat, *Bull. B. O. C.* X, p. 21. Abyssinie S.
55. — CENTRALIS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 40. Ndussuma (Afrique E.).

56. BARRATULA KANDTI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 23. Lac Kiwu, Kandt.
- 87 (Gen.) *Thereiceryx*, Blanf., *Ibis*, 1895, p. 254 = MEGALÆMA.
57. XANTHOLEMA ROBUSTIROSTRIS, Stuart Bak., *J. Bomb.* Cachar N.
N. H. Soc. X, 1896, p. 536.
16. CAPITO AURATUS, var. INTERMEDIA, Berl. et Hart., Nericagua.
Nov. Zool. IX, p. 98.
17. — — var. AGRANTHICINCTA, Dalm., *Bull. Soc.* Caura.
Zool. de France, 1900, p. 177.
18. — SHELLEYI, Dalm., *l. c.*, p. 179. Ecuador.
- 92 (Gen.) Au lieu de *Tetragonops*, Jard. (nec Gaerst), il faut : SEMNORNIS, Richm.,
Auk, 1900, p. 179; Pan, Richm. (nec Oken), *Auk*, 1899, p. 77.
58. RHAMPHASTOS HEMATORHYNCHUS, Berl. et Hart., *Nov.* Caura, Orénoque.
Zool. IX, p. 99.
59. AULACORHAMPHUS LAUTUS, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* Colombie.
 XII, p. 165.
19. GALBULA RUFICAUDA, var. PALLENS, Bangs, *l. c.* XII, Santa Martha (Col.)
 p. 155.
630. Au lieu de *Jac. grandis*, Gm.; il faut : JACANEROPS AUREUS (P. L. S. Müll.).
685. Supprimez dans la syn. : *vagans*, Müll. et *nisicolor*, Hodgs. (p. 50).
40. HIEROCOCCYX NISICOLOR (Hodgs.); Blanf., *Faun. Br.* Népaul.
Ind., B. III, p. 214; Finsch, *Notes Leyd. Mus.*,
 1901, p. 98; *varius* (pt.), Schl.; *fugax* (pt.), Shell.
686. HIEROCOCCYX VAGANS (Müll.), *Ver. Nat. Gesch. Land-* Ténassérin, Salanga,
en Volk., 1859-44, p. 255; *varius* (pt.), Schl.; Born, N.-W., Java.
nanus, Hume.
41. CUCULUS CONCRETUS, S. Müll., *Verh. Nat. Gesch. Land-* Malacca, Sumatra,
en Volk., 1859-44, p. 256 (688, pt.) est une espèce Java et Bornéo.
 distincte.
698. Au lieu de *C. pallidus*, auct. plur. (nec Lath.), il faut : C. VARIEGATUS, Vieill.
42. CUCULUS JACKSONI, Shpe. *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 7. Toro, Ruwenzori.
43. CACOMANTIS ADDENDUS, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* Kulambangra (iles Sa-
 1901, p. 185. lomon).
44. — WEBSTERI, Hart., *Trough New Guin.*, p. 570; id., Nouv.-Hanovre.
Orn. Monatsb., 1899, p. 158.
45. — SCHISTACEIGULARIS, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 558. Nouv.-Hébrides.
46. — WEISKEI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 186. Nouv.-Guinée S.-E.
47. — MEEKI, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.*, 1902, p. 586. Ile Isabelle (Salomon).
48. CHRYSOCOCCYX RUFOMERUS, Hart., *Nov. Zool.*, 1900, Ile Dammer.
 p. 21.
49. — INNOMINATUS (Finsch), *Notes Leyd. Mus.* XII, p. 94. Ile Kisser, Timor.
50. — NIETUWENHUISE, Vorderm., *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* Halmahera.
 LVIII, 1898, p. 196.
51. COCCYZUS EULERI, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 75; Stone, Amazone, Guyane,
Ibis, 1899, p. 476; *americanus* (pt.), auct. plur. Brésil.
 (nec L.); *tindeni*, Allen (729, pt.)
52. — ABBOTTI, Stone, *Pr. Philad. Acad.*, 1899, p. 501. Ile St-Andrews.

20. *EUDYNAMIS ORIENTALIS*, var. *SALVADORII*, Hart., *Nouv. Zool.*, 1900, p. 252. Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne.
21. — *CYANOCEPHALA*, var. *EVERETTI*, Hart., *l.c.*, p. 251. Alor, Sumba, Tim., Key.
22. — *MELANORHYNCHA*, var. *FACIALIS*, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 539; Hart., *Nouv. Zool.*, 1898, p. 127; *melanorhyncha* (pt.), Shell. A biffer au n° 739: *socialis* et îles Soula.
23. *CENTROPUS NIGRORUFUS*, var. *THIERRYI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 190. Togo (Afrique N.-W.)
24. *RIAMPHOCOCYX CALORHYNCHUS*, var. *MERIDIONALIS* (Mey. et Wg.), *B. Cel.* I, p. 227. Célèbes S. et W.
25. — — var. *RUFILORIS* (Hart.), *Nouv. Zool.*, 1905, p. 24. Ile Buton.
840. *COLAPTES AURATUS*, Lill. États-Unis S.-E.
26. — — var. *LUTEA*, Bangs (840, pt.) Amérique N.-W., de l'Alaska au Texas).
842. — *MEXICANUS*, Sw. Mexique.
27. — — var. *COLLARIS*, Vig.; Nels., *Auk*, 1900, p. 125 (842, pt.) De la Colombie angl. à la Californie.
28. — — var. *SATURATOR*, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1884, p. 90. Colomb. angl., Alaska.
29. — — var. *RUFIPILEUS*, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. Surv.*, 1876, n° 2, p. 191 (842, pt.) Ile Guadelupe.
844. — *AYRESI* est un hybride, à supprimer de la liste.
53. *GECCINUS RABIERI*, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1898, p. 12; id., *Arch. Mus. Paris* (4) 1, pl. 7. Tonkin.
54. — *HAINANUS*, Grant, *Ibis*, 1899, p. 584. Hainan.
55. — *CITRINOCRISTATUS*, Rick., *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 46. Chine S.
56. *CHLORONERPES LITE*, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 70. Ecuador N.
57. — *RUBRIPILEUS*, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Torino*, XV, n° 368, p. 14. Ecuador.
58. *CAMPTOTHERA NIGRA* (Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 9. Ethiopie S.
59. — *MALHERBEI* (Cass.); *imberbis*, Sund. (890, pt.) Zanzibar.
50. — — var. *NYANSÆ* (Neum.), *J. f. O.*, 1900, p. 204. Nyansa (Afrique E.)
51. — — var. *FÜLLEBORNI* (Neum.), *l. c.* Région du lac Nyassa.
60. — *HAUSBURGI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 56. M^t Kenya (Afr. équat.)
52. — *PERMISTA*, var. *KAFFENSIS* (Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 9. Kaffa (Ethiopie S.)
53. — *CAROLI*, var. *ARIZELA* (Oberh.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1900, p. 29. Libéria.
61. — *POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 55. Fernando Po.
62. *CHRYSOPILEGMA STYANI*, Grant, *Ibis*, 1899, p. 585. Hainan.
54. *CENTURUS DURIUS*, var. *VERÆCRUCIS* (Nels.), *Auk*, 1900, p. 259. Vera-Cruz, Tabasco.

938. Au lieu de *C. tricolor* il faut : *CENTURUS SUBELEGANS*, Vénézuéla, Tohago.
Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 109 (938 et 940, pt.)
55. *CENTURUS SURELEGANS*, var. *WAGLERI* (Salv. et Chiriqui, Panama,
Godm.), *Biol. Centr. Am.* II, p. 416; *tricolor*, Colombie N.
Wagl. (nec Gm.), 938, pt.
56. — — var. *SEDUCTA* (Bangs), *Auk*, 1901, p. 26. Ile San-Miguel.
57. — — var. *NEGLECTA* (Richm). Bogota.
58. — — var. *SANCTE MARTE*, Bangs, *Pr. Biol.* S. Martha (Colombie).
Soc. Wash., 1898, pp. 151-44.
65. — *FRONTALIS* (Nels.), *Auk*, 1900, p. 257. Chiapas, Mexique.
59. — *AURIFRONS*, var. *FUMOSA* (Nels.), *Auk*, 1900, Chiapas, Guatémala.
p. 258.
40. *SPHYROPICUS VARIUS*, var. *DAGGETTI*, Grinn., Californie S.
Condor, III, p. 12.
41. *PICUS MAJOR*, var. *ANGLICA* (Hart.), *Nov. Zool.*, Angleterre.
1900, p. 528.
42. — *CABANISI*, var. *LUCIANI*, Mall. (951, pt.) Mongolie W., Chine N.
45. — *VILLOsus*, var. *HYLOSCOPA* (Cab. et H.), *Mus.* Arizona, Californie,
Hein. IV, p. 68 (238, pt.) Basse-Californie.
44. — — var. *INTERMEDIA* (Nels.), *Auk*, 1900, Mexique.
p. 259.
962. — *PUBESCENS*, L. ; *meridionalis*, Sw. Sud des États-Unis.
45. — — var. *MEDIANA*, Sw. (962, pt.) Ét.-Unis centr. et sept.
- Supprimez la var. *Meridionalis* (245) qui est remplacé par :
243. — — var. *OREOECA*, Batch., *Auk*, 1889, p. 255. Montagnes Rocheuses.
980. Au lieu de *tridactylus* il faut : *HIRSUTA*, Steph., *Gen. Zool.* IX, p. 219, pl. 58.
46. *TRIDACTYLIA HIRSUTA*, var. *ALBIDIOR*, Stejn., *Bull.* Kamtschatka.
U. S. Nat. Mus., n° 29, 1885, pp. 521, 558,
542 ; id , *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 168.
981. — *DORSALIS*, Baird, est une var. de *AMERICANA*, Brm.
255. Var. *ALASCENSIS* = *T. AMERICANA*.
47. *TRIDACTYLIA AMERICANA*, var. *BACATA* (Bangs), Amérique N.-E.
Auk, 1900, p. 156.
48. — — var. *LABRADORIA* (Bangs), *Auk*, 1900, Labrador.
p. 158.
49. — *ARCTICUS*, var. *TENUIROSTRIS* (Bangs), *Auk*, Sierra Nevada de Ca-
1900, p. 151. lifornie.
986. *DENDROPICUS GUINEENSIS* (Scop.), a priorité sur *D. cardinalis* (Gm.)
256. — — var. *HARTLAUBI*, Mall. = *Zanzibari*, Mall.
50. — — var. *MASSAICA*, Neum., *J. f. O.*, 1900, Massailand N.
p. 206.
51. — — var. *CENTRALIS*, Neum., l. c. Nyassa N., Ubehe.
64. — *NANDENSIS*, Neum , *Orn. Mon.*, 1901, p. 184. Nandi.
991. — *simoni*, Grant, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 58 = *D. LEPIDUS*
(Cab. et H.)
65. — *STIERLINGI*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1901, p. 166. Nyassa N.

995. *DENDROPICUS LACUUM*, Rehw. = *REICHENOWI*, Sjöst. (996).
 52. — *OBSOLETUS*, var. *INGENS* (Hart.), *Nov. Zool.* Nairobi (Afr. E. angl.)
 VII, p. 55.
- 169 (Gen.) *VENILIORNIS*, Bonap. (1854), au lieu de *Eleopicus*, Bp. (1854).
 265. Au lieu de var. *Peruviana*, Tacz. (1886), il faut: var. *MAJOR*, Tacz. (1885).
 66. *VENILIORNIS NEGLECTUS*, Bangs, *P. New Engl. Zool.* Chiriqui.
Club, II, p. 99.
67. — *ORENOCENSIS*, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, Orénoque.
 1902, p. 95.
- Répartition géographique à rectifier de la manière suivante :
1045. *MESOPICUS GOERTAN* (S. Müll.) Sénégal.
 267. — — var. *POLIOCEPHALA* (Sw). De la Gambie au Loango (Afrique W.)
53. — — var. *ABESSINICA*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 58. Abyssinie, Kordofan, Sennaar.
54. — — var. *CENTRALIS*, Rehw., *l. c.*, p. 59. Du Niam-Niam au fl. des Gazelles.
1046. — *SPODOCEPHALUS* (Bp.) Choa, Ethiop. S., Harar.
 53. — — var. *RHODEOGASTER*, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 180; Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 185; (1046, pt.) Montagnes Mau, Kenia et Maeru.
68. *MESOPICUS RUWENSORII*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, Ruwenzori.
 1905, p. 8.
69. *BLYTHIPICUS HAINANUS* (Gräbf), *Ibis*, 1899, p. 585. Haïnan.
1069. *TIGA JAVANENSIS* (Ljungb.). Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.
56. — — var. *INTERMEDIA* (Blyth), *J. A. S. B.*, 1845, p. 195 (1069, pt.) Ténass. jusqu'au Bengale et le S. de l'Inde.
57. — — var. *Exsul*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, Bali.
 1901, p. 51.
58. *CAMPOPHILUS GUATEMALENSIS*, var. *BUXANS*, Chiriqui.
 Bangs, *Auk*, 1901, p. 560.
- 182 (Gen.) Au lieu de *Hemilophus*, Sw. (1857, nec Serville, 1855), il faut :
MULLERIPICUS, Bp. (1854).
59. *THRIPONAX JAVENSIS*, var. *PARVA*, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 189. Ile Simalur (Sumat. W.)
70. *PICUMNUS MACCONNELLI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, Guyane angl.
 1901, p. 4.
71. — *STELLE*, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, 1902, p. 96. Orénoque.
- 187 (Gen.) *Blacops*, Richm., 1899 = *VERREAUNIA*.
 60. *SASIA ARNORMIS*, var. *MAGNIROSTRIS*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, 1901, p. 41; (1177, pt.) Ile Nias.

HETERODACTYLÆ

72. *PHAROMACRUS FESTATUS*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 92. Sierra Nevada de Sta-Marta (Colombie).
- II. — 1903 42

75. *TROGON VIRGINALIS*, Cab. et H., *Mus. Hein.* IV, Ecuador.
p. 175; Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Tor.*,
n° 364, p. 17; (1191, *collaris*, pt.)
61. *TROGON AMBIGUUS*, var. *GOLDMANNI*, Nels., *Pr.* Tres Marias.
Biol. Soc. Wash., 1898, p. 8.
- 195 (Gen.) *Heterotrogon*, Richm. (1894) = *HAPALODERMA*.
62. *HAPALODERMA NARINA*, var. *ÆQUATORIALIS*, Cameron.
Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 3.
- 196 (Gen.) *PYROTROGON*, Bp. (1854) au lieu de *Harpactes*, Sw. (1857, nec
Templet., 1854).
74. *PYROTROGON NEGLECTUS*, Forb. et Rob., *Bull. Liverp.* Malacca, Sumatra.
Mus. II, 1899, p. 54.
65. — *ERYTHROCEPHALUS*, var. *YAMAKANENSIS* (Grf.), Fo-kien (Chine S.)
Bull. B. O. C. VIII, 1899, p. 48.
75. — *HAINANUS* (Grant), *Ibis*, 1900, p. 571; id., *P. Z.* Haïnan.
S., 1900, p. 485.

AMPHIBOLÆ

64. *TURACUS EMINI*, var. *FINSCHI*, Rehw., *Orn.* Niam-Niam.
Monatsb., 1899, p. 190.
65. — *LIVINGSTONI*, var. *HYBRIDA*, Rehw., *J. f. O.*, Nyassaland, Uhehe.
1898, p. 814.
76. — *DONALDSONI*, Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 581. Somalil. W. jusqu'au
S. de l'Abyssinie.
77. *GALLIREX JOHNSTONI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.*, 1901, Afrique équator
p. 57; id., *Ibis*, 1902, p. 112, pl. 5.
66. *SCHIZORHIS CONCOLOR*, var. *PALLIDICEPS* (Neum.), Angola, Benguela.
J. f. O., 1899, p. 66.
67. *COLIUS LEUCOTIS*, var. *BERLEPSCHI*, Hart., in Afrique E. allem.
Ansorges Afr. Sun, p. 554; id., *Nov. Zool.*
VII, p. 51.
68. — *CAPENSIS*, var. *DAMARENSIS*, Rehw., *J. f. O.*, Damara.
1899, p. 418.
69. — *MACROURUS*, var. *PULCHRA*, Neum., *J. f. O.*, Teita, Taweta (Afr. E.)
1900, p. 190.

ANISODACTYLÆ

70. *CORACIAS GARRULA*, var. *LOQUAX*, Licht. (1269, Afrique tropic. et S.
pt.), Rehw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 191.
1270. — *ABYSSINICA*, Bodd. — Rectifiez l'habitat : Abyssinie, Arabie.
71. — — var. *SENEGALENSIS*, Gm. (1270, pt.); Sénégalie.
Rehw., *l. c.*
72. — *SPATULATA*, var. *DISPAR*, Boc., *Jorn. Lisb.*, Benguela.
1880, p. 227; Rehw., *l. c.*; (1273, pt.)

75. *CORACIAS NÆVIUS*, var. *SHARPEI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 192. Afrique E. allem.
78. *EURYSTOMUS NEOHANOVERANUS*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, 1901, p. 185; *solomonensis*, Hart. (1899, nec Sharpe). Nouv.-Hanovre.
- 213 (Gen.) *PRIONORNIS*, Salv. et Godm. (1895), au lieu de *Prionirhynchus*, Schl. (1857, nec Jacq. et Luc., 1854).
74. *MOMOTUS ÆQUATORIALIS*, var. *CHLOROLEMA*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 55. Pérou centr.
75. — *LESSONI*, var. *GOLDMANI*, Nels., *Auk*, 1900, p. 256. Vera-Cruz, Oaxaca.
1306. *Melittophagus ocularis*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1900, p. 87 = *M. pusillus*.
76. *MELITTOPHAGUS PUSILLUS*, var. *SHARPEI*, Hart., *Nov. Zool.* VII, 1900, p. 598. Somaliland, Abyssinie, Choa.
315. — — var. *Cyanosticta*, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 540; Finsch, *Not. Leyd. Mus.*, 1901, p. 4; *minutus* (pt.), Finsch (1870); *erythropterus*, Hengl. (nec Gm.); *meridionalis*, Sharpe (voir 314). Afr. S.-W., S. et S.-E., du Loango au Dam. et du Pangani au Natal.
79. *MEROPS NORTHCOTTI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 49. Côte-d'Or.
80. — *MERIONIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 55. Fernando Po.
81. — *BATESIANUS*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 48. Congo français.
82. — *SUMBAENSIS*, A. B. Mey., *Sitz. Ges. Isis, Dresden*, 1884, pp. 6, 19; Hart., *Nov. Zool.*, 1896, pp. 570, 586. Sumba.
77. *IRRISOR VIRIDIS*, var. *GUINEENSIS*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, pp. 78, 79. De la Guinée portug. au Niger.
78. — — var. *DAMARENSIS*, Grant, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 57; id., *Ibis*, 1902, p. 454, pl. 10, f. 1. Damara, Afrique E. et Afrique E. angl.
79. — — var. *MELANORHYNCHIA* (Licht.); *sene-galensis*, Vieill.; *erythrorhynchus* (pt.), Salv. (322, pt.). Afrique N.-E. et Sénégal.
80. — — var. *SOMALIENSIS*, Grant, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 58; id., *Ibis*, 1902, p. 455, pl. 10, f. 2. Somaliland.
81. *RUINOPOMASTUS CYANOMELAS*, var. *SCHALOWI*, Nehm., *J. f. O.*, 1900, p. 221. Afrique tropicale E.
82. *UPUPA EPOPS*, var. *PALLIDA*, Erl., *J. f. O.*, 1900, p. 15. Tunisie.
85. — *SOMALENSIS*, var. *INTERMEDIA*, Grant et Reid, *Ibis*, 1901, p. 674. Abyssinie S.
85. *PHOLIDOPHALUS KETHULLEI*, Dubois, *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 69. Haut-Congo.
- 243 (Gen.) *Rhabdotorrhinus*, Mey. et Wg. (1898) = *HYDROCISSA*.

- 245** (Gen.) *Horizocerus*, Oberh. (1900) = *ALOPHIUS*.
- 339.** *Alophius sibbensis* (Sharpe) = *A. DECKENI* (**1397**).
- 1404.** *DACELO GIGAS* (Bodd.); *minor*, Robins.
 84. *HALCYON RADIUS*, var. *LOPEZI*, Alex., *Bull. B.* Fernando Po.
 O. C. XIII, 1905, p. 55.
- 1437.** — *semicaruleus* (Forsk.); supprimez dans la syn. Afrique N.-E.
 actæon, Less. et *rufiventer*, Sw.
85. — — var. *HYACINTHINA*, Rehw., *J. f. O.*, Zanzibar, Useguha.
 1900, p. 249.
86. — — var. *RUFIVENTRIS*, Sw. Afrique W.
- 356.** — — var. *ACTÆON*, Less.; Oust., 5^e Congrès Iles du Cap Vert.
 Orn., p. 228; *erythrogastra*, Gd.; *jagoensis*,
 Bolle.
84. — *FARQUHARI*, Sharpe, *Bull. B. O. C. X*, 1899, p. 29. Nouv.-Hébrides.
85. — *ELISABETHÆ*, Heine, *J. f. O.*, 1885, p. 222; Berl., Nouv.-Guinée allem.
 l. c., 1897, p. 90.
87. — *AUSTRALASIE*, var. *DAMMERIANA*, Hart., *Nov.* Ile Dammer.
 Zool. VII, p. 19.
- 371.** — var. *PACHYRHYNCHA*, Rehw. = *H. TRISTRAMI*, Layard (**1464**).
88. — *CHLORIS*, var. *NUSE*, Heine, *J. f. O.*, 1902, Nouv.-Hanov., Nouv.-
 p. 457, pl. 8, f. 2. Mecklenb.
86. — *MATTHIÆ*, Heine, *J. f. O.*, 1902, p. 458, pl. 8, f. 1. Ile St-Matthias.
89. *SYMA TOROTORO*, var. *MEEKI*, Rothsch., *Nov.* Nouv.-Guinée N.-E.
 Zool. VIII, p. 147.
90. — — var. *UCHRACEA*, Rothsch., *l. c.*, p. 145. Iles D'Entrecasteaux.
- 1482.** — *weiskei*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 186 = *S. MEGARHYNCHA* (fem.)
- 1489.** *CEYCOPSIS FALLAX* (Schl.) Célèbes.
91. — — var. *SANGHIRENSIS*, Mey. et Wg., *B.* Sanghir.
 Celebes, p. 278, pl. 10, ff. 2, 5.
92. *CEYX LEPIDA*, var. *COLLECTORIS*, Rothsch. et Guadalecanar.
 Hart., *Nov. Zool. VIII*, p. 576.
- 1499.** — — var. *SACERDOTIS*, Rams.
87. — *MEEKI*, Rothsch., *Bull. B. O. C. XII*, 1901, p. 23; Ile Ysabelle (Salomon).
 id., *Nov. Zool.*, IX, p. 585, pl. 11, f. 1.
88. — *LÆTA*, De Vis, *Rep. Orn. Spec. N. Guin.*, 1894, p. 2. Nouv.-Guinée S.-E.
89. — *SAMARENSIS*, Steere, *List B. Mam. Philipp.*, p. 10; Samar, Leyte.
 melanura (pt.) (**1494**).
- 1506.** *Alcedo spatzi*, Kg., *J. f. O.*, 1892, p. 567 = *A. ISPIDA*.
90. *CORYTHORNIS THOMENSIS*, Salvad., *Ibis*, 1902, p. 568, Ile St-Thomas (Afri-
 pl. 15. que W.)
95. *ALCYONE AZUREA*, var. *YANDENÆ*, Rothsch., Timor-Laut.
 Bull. B. O. C. XI, p. 65.
- 402.** *Pelargopsis sasak*, Vorderm. = *P. FLORESIANA*, Sharpe.
- 1527.** *CERYLE LUGUBRIS* (Tem.) pour habitat : Japon.
94. — — var. *GUTTULATA*, Stejn., *Pr. U. S. Nat.* Himalaya, Birmanie,
 Mus., 1892, p. 294; *continentalis*, Hart., Chine, Corée.
 Nov. Zool. VII, p. 554.

MACROCHIRES

91. *ÆGOTHELES RUFUS*, Hall., *Vict. Natural.* XVIII, p. 89; *rufescens*, Hall.,
l. c., p. 60 (nec Salvad.)
92. *PODARGUS INEXPECTATUS*, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, Ile Ysabelle (Salomon).
p. 24; id., *Nov. Zool.* IX, p. 585.
93. *NYCTIBIUS JAMAICENSIS*, var. *MEXICANA*, Nels., Mexique.
Auk, 1900, p. 260.
95. *LYNCORNIS ELEGANS*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1899, Nouv.-Guinée allem.
p. 150.
1593. *SCOTORNIS CLIMACURUS* (Vieill). Sénégal, Nigeria,
Soudan, Nubie.
96. — — var. *NIGRICANS*, Salvad.; id., *Ann.* Du Nil Blanc au Choa.
Mus. Civ. Gen. (2) VI, p. 226, note; (1593, pt.)
97. *NYCTIDROMUS ALBICOLLIS*, var. *INSULARIS*, Nels., Tres Marias.
Pr. Biol. Soc. Wash., 1898, p. 9.
98. — — var. *YUCATANENSIS*, Nels., *l. c.*, 1901, Yucatan.
p. 171.
99. — — var. *GILVA*, Bangs, *Pr. New Eng. Zool.* ? (1)
Club, 1902, p. 82.
100. *PHALENOPTILUS NUTTALLI*, var. *CALIFORNICA*, Californie.
Ridgw. (1605, pt.)
Nyctagreus, Nels. (1901) = *ANTROSTOMUS*.
94. *ANTROSTOMUS CHIAPENSIS*, Nels., *Auk*, 1900, p. 261. Chiapas (Mexique S.)
95. — *GOLDMANI*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, Mazatlan.
1901, p. 26.
96. — *OAXACÆ*, Nels., *Auk*, 1900, p. 260. Oaxaca (Mexique S.)
101. *CAPRIMULGUS RUFICOLLIS*, var. *DESERTORUM*, Tunisie.
Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 521, pl. 11, f. 1.
1629. — *TRIMACULATUS* (Sw.) a priorité sur *C. tristigma*, Rüpp.
97. — *SHARPEI*, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 29. Côte-d'Or (Hinterland).
1630. — *MACROURUS*, Horsf.; *schlegeli*, Gr. (436, pt.); Gr. îles de la Sonde,
salvadori, Sharpe, appartiennent à la même Palaw., îles Papous
forme dont voici l'habitat : jusqu'au N.-E. de
l'Australie.
- 436 (pt.) — — var. *AMBIGUA*, Hart. Himal. E., Indo-Ch.,
Malac., Sum. N.-E.
98. — *STELLATUS*, Weld-Blund. et Lov., *Bull. B. O. C.* Abyssinie.
X, p. 21; Grant, *Ibis*, 1900, p. 511, pl. 4.
99. — *FULLEBORNI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 98. Nouv.-Helgoland (Afr.
E. allem.)
100. — *JONESI*, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.*, Ile Sokotra.
1899, p. 5.
102. — *EGYPTIUS*, var. *SAHARÆ*, Erl., *J. f. O.*, 1899, Tunisie.
p. 525, pl. 12, f. 1.

(1) Cette variété m'a été indiquée par M. Oberholzer, mais sans indication d'habitat.

A corriger la synonymie et l'habitat du :

- 1658.** CYPSELUS APUS (Lin.) Europe, Afrique N.
442. — — *var.* ACUTICAUDA, Jerd. Inde.
105. — — *var.* PEKINENSIS, Swinh., *P. Z. S.*, La majeure partie de
1870, p. 455; (**442**, pt.) l'Asie continentale.
443. — — *var.* MURINA, Brn. Égypte jusqu'au golfe
Persique.
104. — — *var.* BREHMORUM, Hart., in *Naum.* Madeire, Canaries,
Vög. Deut. IV (1901), p. 255; id., *Nov. Zool.* Afrique N.-W.
VIII, p. 526.
105. — — *var.* SHELLEYI, Salvad., *Ann. Mus.* Afrique N.-E.
Civ. Gen., 1888, p. 227 (**1658**, pt.)
106. — UNICOLOR, *var.* ALEXANDRI, Hart., *Nov.* Iles du Cap Vert.
Zool. VIII, p. 528.
107. — — *var.* POENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* Fernando Po.
XIII, 1905, p. 55.
101. — ALFREDI, Shell., *B. Afr.* II, p. 545. Mbara (Afrique équat.)
108. — AFFINIS, *var.* GALILEGENSIS, Ant., *Naum.*, Palestine.
1855, p. 507, pl. 5, ff. 1, 2; Hart., *Tierreich*,
p. 88; (**1666**, pt.)
102. CHLETURA ANDREI, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, Orén. centr. (Cumana).
1902, p. 91.
105. — THOMENSIS, Hart., *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 55; Ile St-Thomas (Afr. W).
id., *Nov. Zool.* VIII, p. 425, pl. 7, f. 1.
109. NEPHOCETES BRUNNEITORQUES, *var.* GRISEI- Tepic, Jalisco, Zacate-
FRONS (Nels.), *Auk*, 1900, p. 262. cas W., Durango S.
(Mexique).
104. COLLOCALIA GIGAS, Hart. et Butl., *Bull. B. O. C.* XI, Malacca, Java.
p. 65; Finsch, *I. c.* XII, p. 50.
110. GLAUCIS HIRSUTA, *var.* COLUMBIANA, Bouc., Rio Dagua (Col. W.)
Hamm. B., p. 402 (**1736**, pt.)
111. — — *var.* AFFINIS, Lawr.; Oberh., *Pr. U.* Ecuador E.
S. Nat. Mus., 1902, p. 511 (**1736**, pt.)
1748. PHAETHORNIS SUPERCILIOSUS (Lin.); Less., *H. N. Coli-* Guyane fr., Brésil N.
bris, p. 55, pl. 6; *affinis*, Pelz.; *fraterculus*,
Gould, *Monogr. Troch.* I, pl. 18.
112. — — *var.* MALARIS (Nordm.), in *Erm. Reise*, Guyane fr.
pp. 2, 16; Hart., *Thierr.*, p. 20; *supercilio-*
sus, Gd., *Mon. Troch.* I, pl. 17; (**1748**, pt.)
115. — LONGIROSTRIS, *var.* SUSURRA, Bangs, *P. New* Sta-Marta (Colombie).
Engl. Zool. Club, II, p. 64.
105. — FULIGINOSUS, Simon, *III^e Congr. Orn.*, C. R., Colombie.
p. 201.
106. — HYALINUS, Bangs, *Auk*, 1901, p. 27. Ile S.-Miguel (Panama.)
107. — VIRIDICAUDATUS, Gd., *Mon. Troch.* I, pl. 55; Brésil S. et centr.
Hart., *Thierr.*, p. 26 (**1763**, pt.)

- 1769.** PHAETHORNIS RUFIGASTER (Vieill.) a priorité sur *pygmaeus* (Spix); *rufiventris*, Cab. et H.
 114. — — *var. LONGIPENNIS*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 19. Pérou centr.
108. — CAURENSIS, Sim. et Dalm., *III^e Congr. Orn.*, *C. R.*, p. 208. Caura (Vénézuéla).
- 1771.** EUTOXERES AQUILA (BOHRC.) Colombie et Ecuador.
 468. — — *var. Salvini*, Gd. = *var. HETERURA*. Costa-Rica, Panama, Colombie, Ecuador.
 115. — CONDAMINEI, *var. GRACILIS*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 19. Pérou centr.
- 1785.** FLORISUGA *sallei*, BOHC. = MELLIVORA (Lin.)
 116. APHANTOCHROA CUVIERI, *var. SATURATION*, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 55. Ile Coiba (Panama).
109. LEUCIPPUS BAERI, Simon, *III^e Congr. Orn.*, *C. R.*, p. 202. Pérou N.-W.
- 1798.** Doit être remplacé par :
 AGYRTIA VIRIDISSIMA (Less.), *H. N. Ois.-Mouches*, p. 207, pl. 75; Hart., *Thierr.*, p. 45; ?*maculatus*, V.; *viridipectus*, Rehb.; *linnaei*, Gd., *Mon. Troch.* V, pl. 502; *malvinæ*, Rehb. Vénézuéla, Trinidad, Guyane, Bas-Amaz.
 117. — — *var. MACULICAUDA* (Gd.), *Intr. Troch.*, p. 154. Guyane angl.
475. — *var. Terpna*, Heine = VIRIDISSIMA (Less.)
 118. — FLUVIATILIS, *var. LAETA*, Hart., *J. f. O.*, 1900, p. 560. Pérou E.
 119. — LEUCOGASTER, *var. BAILE*, Hart., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 140. Bahia.
- 1816.** — SALVINI, Brewst. appartient au genre AMAZILIA.
 110. — TENEBROSA, Hart., *Bull. B. O. C.* X, 1899, p. 15. Colombie.
 111. SAUCEROTTEA WARSCEWICZI (Cab. et H.), *Mus. Hein.* III, p. 58; Salv., *Cat.*, p. 222; (1829, pt.) Colombie N.
 120. — — *var. BRACCATA* (Heine), *J. f. O.*, 1865, p. 195; (1829, pt.) Andes du Vénézuéla.
- 1829.** — SOPHIE (BOHRC. et Muls.); Gd., *Mon. Troch.*, pl. 522; *caligatus*, Gd.; *hoffmanni*, Cab. et H. Costa-Rica.
481. — ERYTHRONOTA, *var. WELLSI*, BOHC. = ? *tobaci*, Gm.
 121. — — *var. CAURENSIS*, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 84. Caura (Orénoque).
- 1843.** AMAZILIA FUSCICAUDATA (Fras.), *P. Z. S.*, 1840, p. 17, a priorité sur *riefferi* (BOHC., 1845). Andes de Vénézuéla, Colomb. et Ecuad., au N. jusq. Panama.
 122. — — *var. JACUNDA* (Heine), *J. f. O.*, 1865, p. 188; (1843, pt.) Ecuad. W., Col. S.-W.
 125. — — *var. DUBUSI* (BOHC. et Muls.), *Ann. Soc. Agr. Lyon*, IV, 1852, p. 141; (1843, pt.) Du Mexique au Costa-Rica.

124. *AMAZILIA CINNAMOMEA*, var. *SATURATA*, Nels., Mexique S., Guatémala.
Pr. Biol. Soc. Wash., 1898, p. 63.
1870. *HYLOCHARIS CYANEA* (Vieill.) Brésil.
125. — — var. *ROSTRATA*, Bouc., *Gen. Hum. B.*, Pérou E., Bolivie.
 1894, p. 400.
486. — — var. *VIRIDIVENTRIS*, Berl. Guyane, Vénézuéla.
126. — *SAPPHIRINA*, var. *GUIANENSIS*, Bouc., *Gen. Hum. B.*, 1891, p. 52; (1869, pl.) Guyane, Vénézuéla.
127. *CHRYSERONIA OENONE*, var. *INTERMEDIA*, Hart., Haut-Amazone.
Nov. Zool. V, p. 519.
487. — — var. *JOSEPHINÆ* (Bourc. et Muls.) au Bolivie.
 lieu de *Necra* (nom. nud.)
128. — — var. *LONGIROSTRIS*, Berl., *J. f. O.*, Andes de Colombie.
 1887, p. 555; (1871, pl.)
489. *CHLORESTES*, var. *Subcarulea* (Elliot) = *C. HYPOCYANEUS* (Gould).
1876. *CHLOROSTILBON AUREIVENTRIS* (D'Orb. et Lafr.) Bolivie, Paraguay,
 Argentine N.
129. — — var. *EGREGIA*, Heine, *J. f. O.*, 1865, Brésil S.-E.
 p. 197; (1877, pl.)
1877. — — var. *PUCHERANI* (Bourc. et Muls.) Brésil centr. et E.
150. — *AURICEPS*, var. *FORFICATA*, Ridgw.; (1878, Iles Cozumel, Muges,
 pl.) Holbox (baie de Yuc.)
1881. — *HAEBERLINI* (Rehb.) au lieu de *habertini*.
1886. — *CARRIBEUS*, Lawf. Iles Aruba, Cur., Bon.,
 Margarita et Trinid.
151. — — var. *LESSONI*, Sim. et Dalm., *III^e Congr. Vénézuéla N.*
Orn., C. R., p. 212.
152. — — var. *NANA*, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* Orénoque.
 IX, p. 86.
155. *SPORADINUS RICORDI*, var. *ÆNEOVIRIDIS* (Palm. Abaco (Bahama).
 et Ril.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 54.
- 331 (Gen.) Au lieu de *Timolia* il faut : *AUGASMA*, Gould (1860).
- 1914 (pt.) *THALURANIA FANNYI* (Del. et Bourc.), *Rev. Zool.*, Colombie.
 1846, p. 510.
154. — — var. *VERTICEPS*, Gould, *Contr. Orn.*, Ecuador.
 1851, pl. 71; id., *Mon. Troch.*, pl. 107.
498. — *HYPOCHLORA*, Gd., est une espèce distincte.
112. — *RIDGWAYI*, Nels., *Auk*, 1900, p. 262. Jalisco (Mexique).
155. — *FURCATA*, var. *FISSILIS*, Berl. et Hart., Caura (Vénézuéla).
Novit. Zool. IX, p. 87.
- 340 (Gen.) *Crinis*, Muls. (1875) = *CHRYSOLAMPIS*, Boie.
1952. *POLYTOMUS THERESLE* (Da Silva), au lieu de *viridissimus*, V. (nec Gm.)
115. *AITHURUS SCITILUS*, Brewst. et Bangs, *P. New Engl. Jamaïque.*
Zool. Club, II, p. 49.
156. *TOPAZA PELLA*, var. *PAMPREPTA*, Oberh., *Pr. Rio Napo (Ecuador).*
U. S. Nat. Mus., 1902, p. 521.

157. *EUGENES SPECTABILIS*, var. *CHIRIQUENSIS*, Nehrck., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 152. Chiriqui.
158. *HELIODOXA LEADBEATERI*, var. *PARVULA*, Berl., *J. f. O.*, 1887, p. 520. Andes de Colombie et de Vénézuéla.
1987. — *JACULA*, Gd. a pour habitat : Colombie.
1986. — — var. *JAMESONI* (BOHFC.) Ecuador.
159. — — var. *HENRYI*, Lawr., *Ann. Lyc. N. York*, 1867, p. 402 (1987, pt.); *berlepschi*, Bouc. Costa-Rica, Panama.
- 362 (Gen.) *Leucuria*, Bangs (1898) = *HELIANTHEA* (p. 150).
114. *HELIANTHEA HAMILTONI*, Goodf., *Bull. B. O. C. X.*, p. 48. Ecuador E.
2006. — *IRIS*, Gd. a pour habitat : Pér. N., Boliv. N.-W.
140. — — var. *BUCKLEYI*, Berl., *Ibis*, 1887, p. 295; (2006, pt.) Ecuador.
115. — *PHALERATA* (Bangs), *Pr. Biol. Soc. Wash.* 1898, p. 474. Colombie N.
141. *LAFRESNAYA SAULÆ*, var. *RECTIROSTRIS*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 24. Pérou centr.
142. *LAMPROPYGIA COLUMBIANA*, var. *OBSCURA*, Berl. et Stolz., *l. c.*, p. 25. Pérou centr.
2021. *AGLÆACTIS CUPREIPENNIS* (BOHFC. et Muls.) Colombie.
145. — — var. *ÆQUATORIALIS*, Cab. et Hein.; (2021, pt.) Ecuador.
144. *PANOPLITES FLAVESCENS*, var. *TINOCILORA* (Oberh.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 529. Ecuador W.
2050. *ERIOCNEMIS AURELIÆ* (B. et M.) a pour habitat : Colombie.
145. — — var. *RUSSATA*, Gd., *P. Z. S.*, 1874, p. 505; (2050, pt.) Ecuador.
116. *PHILOGOPHILUS HARTERTI*, Berl. et Stolz., *Ibis*, 1901, p. 717. Pérou S.-E.
2056. *ADELOMYIA MELANOGENYS* (Fras.), *P. Z. S.*, 1840, p. 18. Colombie, Ecuador E.
146. — — var. *MACULATA*, Gd.; 2056, pt. Ecuador W.
147. — — var. *CHLOROSPILA*, Gd., *Ann. N. II.*, 1872, p. 452; (2056, pt.) Pérou.
516. — — var. *CERVINA*, Gd. Colombie.
2057. — — var. *ÆNEOTINCTA*, E. Simon. Vénézuéla.
148. *HELIANGELUS EXORTIS*, var. *SODERSTROMI*, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 554. Corazon (Ecuador).
117. *METALLURA THERESLE*, Simon, *Nov. Zool. IX*, p. 181. Pataz (Pérou).
118. — *DISTRICTA*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash. XIII*, 1899, p. 94. Colombie.
2101. *PSALIDOPRYMNA VICTORLE* (BOHFC. et Muls.) Colombie.
149. — — var. *ÆQUATORIALIS* (BOHFC.), *Humm. B.*, 1895, p. 6 (2101, pt.) Ecuador.
119. — *PALLIDIVENTRIS*, Simon, *Nov. Zool. IX*, p. 182. Cojabamba (Pérou).
- II. — 1903

120. ZODALIA THAUMASTA, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Chillo (Ecuador).
1902, p. 558.
2120. HELIOTHRIX BARROTI (BOUFC. et Muls.) Colombie, Ecuador.
150. — — *var.* ALINCIA, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 559. Amérique centr.
- 396 (Gen.) ANTHOSCENUS, Richm. (1902), au lieu de *Floricola*, EH. (1878, nec Gisl., 1848).
2126. — SUPERRUS (Shaw., 1802), a priorité sur *longirostris* (Vieill., 1817).
533. — — *var.* STEWARTÆ (Lawr.) au lieu de *Stuartæ*, Gray (err.)
2127. — CONSTANTI (Del.) a pour habitat : De Costa-Rica au Guat.
151. — — *var.* LEOCADLE (BOUFC. et Muls.); *leo-* Mexique.
cardia, Salv., *Cat.*, p. 252; (2127, pt.)
121. SELASPHORUS ALLENI, Hensh., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1877, p. 54; (2152, pt.) Californie (1).
122. POLYNEMUS HARTERTI, Simon, *III^e Congrès Orn.*, Colombie W.
C. R., p. 202.
152. LOPHORNIS VERREAUXI, *var.* KLAGESI, Berl. et Caura (Vénézuéla).
Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 89.
- 420 (Gen.) POPELAIREA, Rchb. (1854), au lieu de *Prymnacantha*, Cab. (1860).
2189. — TRICHOLOPHA, Rchb. au lieu de *popelairei*, devenu terme générique.
2191. — CONVERSI (BOUFC. et Muls.) Col., Pan., Costa-Rica.
155. — — *var.* ÆQUATORIALIS (Berl. et Tacz.), Ecuador.
P. Z. S., 1885, p. 567.

PASSERES TRACHEOPHONÆ

123. SCYTALOPUS LATEBRICOLA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, 1899, p. 101. Colombie.
154. — FEMORALIS, *var.* MACROPUS, Berl. et Stolz.; Pérou.
(2205, pt.)
155. CORYTHOPIS ANTHOIDES, *var.* HUMIVAGANS, Tacz., Pérou centr.
P. Z. S., 1874, pp. 156, 531; id., *Orn. Pér.* II, p. 91; (2223, pt.)
124. CONOPOPHAGA BROWNI, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, p. 100. Colombie.
2233. — RUSEYI, Allen, au lieu de *rushyi*.
125. GRALLARICULA CUMANENSIS, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, Cumana (Vénézuéla).
1900, p. 37.
126. GRALLARIA PERIOPHTHALMICA, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Tor.* 1898, n° 550, p. 2. Ecuador W.
127. — BANGSI, Allen, *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1900, Sta-Marta (Colombie).
p. 159.

(1) Dans la note, à la p. 162, j'ai suivi M. E. Simon, pour qui le *S. allenii* n'est qu'un plumage de saison. M. H. C. Oberholzer m'écrit que c'est une erreur, que le *S. allenii* est une espèce parfaitement distincte; M. Hartert est également de cet avis (voy. Hartert, *Trochilidae in Das Tierreich*, Berlin, 1900).

128. GRALLARIA PARAMRE, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XI, 1903, p. 56. Ecuador N.
129. — SORORIA, Berl. et Stolz., *III^e Congrès Orn.*, C. R., p. 194. Pérou centr. E.
150. PITTASOMA RUFOPILEATUM, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 570. Ecuador N.-W.
- 2277-78.** Au lieu de *F. colma* et *nigrifrons*, il faut :
- 2277.** FORMICARIUS RUFICEPS (Spix), *Av. Bras.* I, p. 72, pl. 72, l. 4; Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 54; ? *fuscicapilla*, Vieill.; *colma*, auct. plur. (nec Gm.) Brésil E., de Bahia à St-Paul.
156. — — var. AMAZONICA, Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 54. Bas-Amazone.
- 2278.** — — var. CAYENNENSIS (Bodd.); *Pl. Enl.* 821; *colma*, Gm.; *nigrifrons*, Gould; *glaucopectus*, Ridgw. Guyane, Amazone, Colombie.
- 2288.** PHLOGOPSIS NIGROMACULATA, var. NOTATA, Allen.
157. GYMNOPTHYIS BICOLOR, var. ÆQUATORIALIS (Hellm.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 55. Ecuador N.
- 443** (Gen.) *Manikup*, Richm. (1900, nec Desm.) = PITHYS. — M. Richmond a pris la dénomination française de *Manikup* pour un terme générique latin.
151. PITHYS SALVINI, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 98. Bolivie N.
152. HYPOCNEMIS MARGARITIFERA, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 88, 163; (**2313**, pl.) Haut-Amazone.
- 2330.** HETEROCNEMIS HYPOLEUCA, Ridgw., appartient au genre HYPOCNEMIS.
- 2317.** MYRMECIZA SWAINSONI, Berl., *Ibis*, 1888, p. 150, au lieu de *longipes*, auct. (nec Vieill.)
158. — — var. GRISEIPECTUS, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 76. Orénoque et Guyane anglaise.
- 2321.** — *marginata*, Salvad., *Atti Soc. Ital. S. N.* VII, p. 158 = M. RUFICAUDA (Max.)
- 446** (Gen.) Au lieu de *Heterocnemis*, Scl. (1855, nec Albers, 1852), il faut : SCLATERIA, Oberh., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1899, p. 209.
155. SCLATERIA ALBIVENTRIS (Pelz.), *Orn. Bras.*, p. 161. Brésil centr., H¹-Amaz.
- 450^{bis} (Gen.) RHOPORNIS, Richm. (1902); *Rhopocichla*, Allen (1891, nec Oat., 1889).
154. RHOPORNIS ARDESIACA (Max.), *Beitr. Nat. Bras.* III, p. 1055; Allen, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* III, p. 199; *myiotherina* (pt.), auct. plur. (nec Spix). Brésil.
159. CERCOMACRA TYRANNINA, var. CREPERA, Bangs, *Auk*, 1901, p. 565. Nicaragua, Chiriqui.
160. RHAMPHOCENUS RUFIVENTRIS, var. SANCTÆ-MARTHE, Scl.; (**2348**, pl.) Sta-Marta (Colombie).
155. TERNURA XANTHONOTA, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1901, p. 228. Inca Mine (Pérou S.-E).
156. — SHARPEI, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 97. Bolivie E.

- 2360.** FORMICIVORA RUFA (Max., 1851) a priorité sur *rufatra* (Lafr. et D'Orb. 1837).
 157. — TOBAGENSIS, de Dalm., *Mém. Soc. Zool. de France*, Ile Tobago.
 1900, p. 141.
- 2362.** — SPECIOSA, Salv.; id., *Nov. Zool.* IV, pl. 1, f. 3, et
2363. — SUBSPECIOSA (Salvad. et F.), sont tous deux des SYNALLAXIS.
158. MYRMOTHERULA CHERRIEI, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* Orénoque et Guyane
 IX, p. 92. française.
159. — GUAYARAMBÆ, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 2. Guayabamba (Pérou).
 140. — ROLIVIANA, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 96. Bolivie N.
 141. — SANCTÆ-MARTÆ, Allen, *Bull. Amer. Mus. N. H.*, Sta-Marta (Colombie).
 1900, p. 160.
- 2411.** *Thamnistes affinis*, Salvad., *Atti Soc. Ital. S. N.* VII, p. 154 = THAMNO-
 MANES GLAUCUS.
142. DYSITHAMNUS FLEMMINGI, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, Ecuador N.
 1900, p. 58.
- 2435.** Au lieu *M. corvinus*, Lawr. il faut :
- 2435.** MYRMELASTES LAWRENCEI, Salv. et Godm., *Biol. C.-* Nicaragua, Véragua.
A. Aves, II, p. 226; *corvinus*, Lawr. (nec Gd.)
145. — CETERUS, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Club*, 1900, Panama.
 p. 25; *corvinus*, pt., Lawr.
144. ? THAMNOPHILUS NIGRESCENS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, Vénézuéla.
 1867, p. 469.
161. — DOLIATUS, var. FRATERCULA, Berl. et Hart., Vénézuéla.
Nov. Zool. IX, p. 70.
162. — CÆRULESCENS, var. OCHRA, Oberh., *Pr. Biol.* Paraguay.
Soc. Wash. XIV, p. 188.
165. — NÆVIUS, var. ALBIVENTRIS, Tacz., *Orn. Pér.* Pérou.
 II, p. 9; (**2462**, pt.)
145. — ?STICTOCEPHALUS, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 146. Brésil centr.
146. — VIRGATUS, Lawr.; Salv. et Godm., *Biol. C.-A.* Panama.
Aves, II, p. 199.
- 2492.** — JANI, Phil. = NÆVIUS (Gm.)
164. DENDROCOLAPTES CERTHIA, var. OBSOLETA, Bas-Amazone.
 Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 527;
 (**2499**, pt.)
147. DENDROCINCLA PILEOCHROA, Berl. et Hart., *Novit.* Orénoque et Caura.
Zool. IX, p. 67.
- 2512.** — *anguina*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 158 = D. LAFRESNAYEI.
165. — FULIGINOSA, var. RUFO-OLIVACEA, Ridgw.; Diamantina (Bas-Ama-
 zone.
 (**2513**, pt.)
148. XIPHORHYNCHUS VENEZUELENSIS, Chapm., *Bull. Am.* Vénézuéla.
Mus. N. H. II, 1889, p. 156.
149. ? PICOLAPTES OBTECTUS, Allen, *Bull. Am. Mus. N.* ?
 II, 1889, p. 94.
166. — TENUIROSTRIS, var. APOTHETA, Oberh., *Pr.* Paraguay.
Biol. Soc. Wash., 1901, p. 188.

- 2540.** *Picolaptes gracilis*, Ridgw. = *P. COMPRESSUS*, Cab. (2538).
 150. ? — *LINEATICEPS*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1850, p. 277. ?
 167. *XIPHOCOLAPTES ALBICOLLIS*, var. ARGENTINA, Argentine.
 Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 5.
2546. — *EMIGRANS*, Schl. et Salv. (2546, pt.) Guatémala.
 168. — — var. *SCLATERI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 6. Mexique S.
 169. — — var. *COSTARICENSIS*, Ridgw., *l. c.*, 1888, Costa-Rica.
 p. 541.
 151. — *COMPRESSIROSTRIS*, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 28; Ecuador S., Pérou N.
 id., *Orn. Pér. II*, p. 172; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 15; (2548, pt.)
 152. — *ORENOCENSIS*, Berl. et Hart., *Nov. Zool. IX*, p. 63. Orénoque.
 153. ? *DENDREXETASTES CAPITOIDES*, Eyt., *Contr. Orn.*, ?
 1851, p. 76; Forb., *Nature*, 1895, p. 619;
 (2554, pt.)
 170. *DENDROORNIS ROSTRIPALLENS*, var. *SORORIA*, Berl. Orénoque.
 et Hart., *Nov. Zool. IX*, p. 63.
2564. — *FLAVIGASTER* (Sw., 1827) au lieu de *eburneirostris* Du Mexique au Costa-
 (Less., 1845). Rica.
 171. — — var. *MEGARYNCHA*, Nels., *Auk*, 1900, Mexique S.-W.
 p. 265.
 154. — *STRIATIGULARIS*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus. XXII*, p. 317. Mexique N.-E.
 172. — *TRIANGULARIS*, var. *PUNCTIGULA*, Ridgw., Costa-Rica, Panama.
Pr. U. S. Nat. Mus., 1888, p. 544; (618, pt.,
 p. 189).
2568. — *fratercula*, Ridgw. = *SUSURRANS* (Jard.), 2567.
 155. — *OBSOLETA* (Licht.), *Abh. Akad. Berl.*, 1820, Brésil.
 p. 263; *notatus*, Eyt., *Contr. Orn.*, 1852, p. 26;
similis, Pelz.; (2575, pt.)
 175. *SITTASOMUS ERITHACUS*, var. *JALISCENSIS*, Nels., Jalisco (Mexique),
Auk, 1900, p. 264.
 156. *MARGARORNIS STICTONOTA*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 95. Bolivie W.
 174. *SCLERURUS ALBIGULARIS*, var. *PROPINQUA*, Bangs, Sta-Marta (Colombie).
Pr. Biol. Soc. Wash. XIII, p. 99.
 175. — *MEXICANUS*, var. *OBSCURIOR*, Hart., *Nov. Ecuador N.-W.*
Zool. VIII, p. 370.
 176. — *CAUDACUTUS*, var. *OLIVACENS*, Cab., *J. f. O.*, Pérou W.
 1875, p. 67; (628, pt.)
 157. — *FUSCUS* (Max.), *Beitr. III*, p. 1106 (mas., nec fem.); Haut-Amazone.
 Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 28.
 177. — *GUATEMALENSIS*, var. *LAWRENCEI*, Ridgw., Bahia?
l. c., p. 29.
 158. *XENOPS HETERURUS*, Cab. et H., *Mus. Hein. II*, Ecuador, Pérou.
 p. 53; Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Torino*,
 1899, n° 362, p. 23.

159. *XENOPS TENUIROSTRIS*, Pelz., *S. B. K. Akad. Wien*, Rio Madeira (Brésil).
XXXIV, p. 112; id., *Orn. Bras.*, p. 41.
178. *ANARAZENOPS RUFO-SUPERCILIATUS*, var. *CARANISI*, Tacz. (2599, pl.) Pérou.
179. — — — var. *ACRITA*, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 187. Paraguay.
160. — *AUXUS* (Bangs), *Pr. New Engl. Zool. Club*, 1902, ? (1).
p. 85.
180. *PHILYDOR CONSORINUS*, var. *RUFIPILEATA* Para, Vénézuéla, Co-
(Pelz.), *Sitzber. Acad. Wien*, 1889, p. 109; lombio.
id., *Orn. Bras.*, p. 41.
161. — *EUOPHRYUS*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 575. Pérou centr.
162. *AUTOMOLUS EXERTUS*, Bangs, *Auk*, 1901, p. 567. Chiriqui.
181. — *PALLIDIGULARIS*, var. *ALBIDIOR*, Hartl., *Nor. Zool.* VIII, p. 569. Ecuador N.-W.
182. — *SCLATERI*, var. *PARAENSIS*, Hartl., *Nov. Zool.* Para (Brésil).
IX, p. 61.
- 493 (Gen.) *PSEUDOSEISURA*, Rehb. (1855) au lieu de *Homorus*, Rehb. (1855, nec Albers, 1850).
165. *THRIPOPHAGA CHERRIEL*, Berl. et Hartl., *Nor. Zool.* Orénoque.
IX, p. 60, pl. 12, f. 2.
- 499 (Gen.) *THYVOLEGUS*, Oberh., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1899, p. 210, au lieu de *Limnophyes*, Schl. (1889, nec Eaton, 1875).
185. *SYNALLANIS ALBESCENS*, var. *NEBIOTIS*, Clark, Ile Margarita.
Auk, 1902, p. 264.
164. — *OMISSA*, Hartl., *Bull. B. O. C.* XI, p. 71. Para (Brésil).
165. *SIPTORNIS OTTONIS*, Berl., *III^e Congrès Orn., C. R.*, Pérou centr.
p. 197.
184. — *MODESTA*, var. *SAJAMAE*, Berl., *J. f. O.*, 1901, Sajama (Bolivie).
p. 94.
185. — — — var. *ROSTRATA*, Berl., *J. f. O.*, 1901, Bolivie E.
p. 94.
166. — *HETERURA*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 95. Bolivie W.
167. — *PUNENSIS*, Berl., *Ibis*, 1901, p. 718. Pérou S.-E.
168. — *MACULICALDA*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 92. Iquico (Bolivie W.)
2744. — *SINGULARIS* (Berl. et Tacz.) appartient au genre *XENIPESTES*, Voy. Berl.,
Ibis, 1905, p. 106.
169. *SCHIZOFAGA HARTERTI*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 91. Bolivie N. et W.
- 509 (Gen.) *APHRASTURA*, Oberh., *I. c.* (1899) au lieu de *Oxyurus*, Sw. (1827, nec Rafines., 1810).
170. *HEXICORNIS WALLISI*, Scott, *Bull. B. O. C.* X, 1900, Patagonie.
p. 65.
650. *CINCLODES sparsimstriatus*, Scott, *I. c.* = var. *TACZANOWSKII*.

(1) Cette espèce m'est signalée par M. Oberholzer sans indication d'habitat, et je n'ai pas pu consulter les *Proceedings* en question.

171. CINCLODES OUSTALETI, Scott, *l. c.*, p. 62. Chili S.
 172. — MOLITOR, Scott, *l. c.*, p. 62. Chili centr.
 651. — FUSCUS, *var.* MINOR (Cab.) = *rivularis*, Cab. Pérou, Bolivie, Chili.
 186. — — *var.* ALBIDIVENTRIS, Sel., *P. Z. S.*, Ecuador, Colombie,
 1860, p. 77; (651, pl.) Vénézuéla.
 175. — OREORATES, Scott, *Bull. B. O. C. X*, 1900, p. 62. Colombie (Andes).
 174. — LONGIPENNIS (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, Détroit de Magellan.
 p. 155.
 175. UPOCERTHIA DARWINI, Scott, *Bull. B. O. C. X*, 1900, Mendoza (Argentine).
 p. 65.
 176. — SATURATION, Scott, *l. c.* Chili.
 177. — FITZGERALDI, Scott, *l. c.* Argentine W.
 178. GEOSITTA BREVIROSTRIS, Scott, *l. c.* Chili centr., Patagonie.
 179. — FORTIS, Berl. et Stolz., *III^e Congrès Orn.*, C. Pérou W.
R., p. 194.

PASSERES OLIGOMYODÆ

2815. CYMBORHYNCHUS MACRORHYNCHUS (Gm.) Ténass., Siam, Camb.
 187. — — *var.* MALACCENSIS, Salvad., *Atti R. Malacca, Sumatra,*
Ac. Sc. Tor. IX, p. 425; (2815, pl.) Bornéo.
 180. PITTA LONGIPENNIS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1901, Niassa.
 p. 117; Sharpe, *Ibis*, 1905, p. 91, pl. 4, f. 2.
 181. — REICHENOWI, Madar., *Orn. Mon.*, 1901, p. 155; Congo centr.
 Sharpe, *Ibis*, 1905, p. 92, pl. 4, f. 1.
 2849. — GRANATINA, Tem. a pour habitat : Bornéo.
 188. — — *var.* COCCINEA, Eyt., *P. Z. S.*, 1859, Malacca, Ténassérim.
 p. 104; Gd., *B. As. V*, pl. 68; (2849, pl.)
 182. — ANERYTHRA, Rothsch., *Bull. B. O. C. XII*, 1901, p. 22. Ile Ysabelle (Salomon).
 189. — MACKLOTH, *var.* KUEHNI, Rothsch., *Bull. B.* Iles Key.
O. C., 1899, p. 5; id., *Nov. Zool.* VIII, p. 5.
 190. — — *var.* ARUENSIS, Rothsch. et Hart., *Nov.* Wokan (iles Arou).
Zool. VIII, p. 65.
 185. CORACOCICHLA GIGANTEA (Rothsch.), *Orn. Monatsb.*, Nouvelle-Guinée N.
 1899, p. 157.
 537 (Gen.) PLATYPSARIS, Sel. (1857) au lieu de *Hadrostomus*, Cab. et H. (1859).
 191. — AGLALE, *var.* ALBIVENTRIS, Lawt., *Ann. L.* Mexique W. et S.,
N. Y. VIII, p. 475; Sel., *Cat. B. Br. Mus.* Arizona.
 XIV, p. 555; (2894, pl.)
 192. — — *var.* INSULARIS, Ridgw., *Man. N. Am.* Iles Tres Marias.
B., p. 582; (2894, pl.)
 184. PACHYRHAMPHUS NOTIUS, Brewst. et Bangs, *Pr. N.* Argentine, Bas-Uru-
Engl. Zool. Club, II, 1901, p. 55. guay.
 195. — MAJOR, *var.* ITZENSIS, Nels., *Pr. Biol. Soc.* Yucatan N.
Wash., 1901, p. 175.
 675. — ALBOGRISEUS, *var.* SALVINI, Richm. (1899), Dub. (1900).

194. *LATHRIA UNIRUFA*, var. *CASTANEOTINCTA*, Hart., Ecuadar.
Nov. Zool. IX, p. 610.
185. *AULIA TERTIA*, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 609. Ecuador N.
195. *ATTILA BRASILIENSIS*, var. *PARAMBE*, Hart., Ecuador N.
Bull. B. O. C., 1900, p. 59.
186. — *MEXICANUS*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, Tabasco (Mexique E.)
p. 172.
187. — *PARVIROSTRIS*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.*, Sta-Marta (Colombie).
1900, p. 155.
188. — *RUFPECTUS*, Allen, *l. c.*, 1900, p. 155. Sta-Marta (Colombie).
189. — — *PHOENICURUS*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 96, 177. Brésil.
196. *PIPREOLA AUREIPECTUS*, var. *DECORA*, Bangs, Sta-Marta (Colombie).
Pr. Biol. Soc. Wash., 1899, p. 98.
- 562 (Gen.) *CALYFRONS*, Dand. (1804), au lieu de *Gymnocephalus*, Géof. St-Hil.
(1809, nec Bloch et Schn., 1801); *Perissocephalus*, Oberh. (1899).
190. *XENOPHO SUBALARIS*, Godm., *Bull. B. O. C.*, 1899, Pérou N.
p. 27; id., *Ibis*, 1900, p. 565.
- 570 (Gen.) *ANTILOPHIA*, Relib. (1850), au lieu de *Metopia*, Sw. (1852, nec
Meigen, 1805).
197. *MASIVS CHRYSOPTERUS*, var. *BELLA*, Hellm., Colombie.
Orn. Monatsb., 1905, p. 55.
- 572 (Gen.) *METOPOTHRIX*. — Ce genre doit venir dans la famille des *Dendroc-*
laptidae, près du genre *Xenerpestes* (Berl., *Ibis*, 1905, p. 108).
198. *PIPRA MENTALIS*, var. *IGNIFERA*, Bangs, Auk, Chiriqui.
1901, p. 565.
191. ? — *DURIA*, Madar., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, ?
p. 270, pl. 9.
199. *CHIROXIPPIA PAREOLA*, var. *ATLANTICA*, de Ile Tobago.
Dalm., *Mém. Soc. Zool. de Fr.*, 1900, p. 159.
577. *MANACUS*, Briss. (1760), au lieu de *Chiromachoris*, Cab. (1847).
3037. — *EDWARDSI*, Bp., *Consp.* I, p. 117, au lieu de *manacus* devenu terme
générique.
200. — — var. *ADDITIVA* (Bangs), *Pr. New Engl.* Colombie.
Zool. Cl. I, p. 55.
201. — — var. *PURA* (Bangs), *l. c.*, p. 56. Bas-Amazone.
579. *SCOTOOTHORUS*, Oberh. (1899), au lieu de *Heteropelma*, Bp. (1854, nec
Wesm., 1849).
- 579^{bis} (Gen.) *SAPAYOA*, Hart. (1905), *gen. nov.*
192. *SAPAYOA ENIGMA*, Hart., *Nov. Zool.* X, p. 171. Ecuador N.-W.
202. *AGRIORNIS MARITIMA*, var. *LEUCURA*, Gould; Patagonie.
(3064, pt.)
195. — *POLIOSOMA*, Scott, *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 55. Patagonie.
194. ? — *ALRICAUDA*, Ph. et Landb., *Arch. f. Naturg.*, Pérou W.
1865, 1, p. 152.
195. *OCITHOLETA PERNIX*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, Sta-Marta (Colombie).
1899, p. 95.

- 3089.** *UCHTHOECA FRONTALIS*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 67; Stone, *Auk*, 1899, p. 78; a priorité sur : *citrinifrons*, Schl. (voir p. 226).
196. — *OLIVACEA*, Allen, *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1900, p. 52. Sta-Marta (Colombie).
197. — *JESUPI*, Allen, *l. c.*, p. 51. Sta-Marta (Colombie).
198. — *KEAYSI*, Chapm., *l. c.*, 1901, p. 227. Pérou.
199. *MECOCERCULUS NIGRICEPS*, Chapm., *l. c.*, 1899, p. 154. Vénézuéla.
200. — *URICHI*, Chapm., *l. c.*, 1899, p. 155. Vénézuéla.
205. *SAYORNIS SAVA*, var. *YUKONENSIS*, Bish., *Auk*, 1900, p. 115. Alaska.
- 3108.** — *NIGRICANS* (Sw.) a pour habitat : Arizona, Texas, Nouv.-Mexique, Mexique.
204. — — var. *SEMIATRA* (Vig.), *Zool. Beech. Voy.*, p. 17; Nels., *Auk*, 1900, p. 124; Mex. W., Ét.-Unis de Colima à l'Oregon. (3108, pt.)
- 3109.** — — var. *AQUATICA*, Schl. (voir p. 227).
201. *LICHENOPS ANDINA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1879, p. 485. Bolivie S.-E., Chili, Patagonie.
- 3131.** — *PERSPICILLATA* (Gm.) a pour habitat : Uruguay, Paraguay, Brésil S.-E.
202. *MUSCISAXICOLA HATCHERI*, Scott, *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 55. Patagonie.
205. — *OCCIPITALIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 450. Titicaca (Pérou).
- 3146.** — *garretti*, Scott, *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 55 = *M. CAPISTRATA* (Burm.)
204. *PLATYRHYNCHUS BIFASCIATUS*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1889, p. 141. Matto Grosso.
205. — *INSULARIS*, Allen, *l. c.*, p. 145. Ile Tobago.
- 606^{bis} (Gen.) *TÆNIOTRICCUS*, Berl. et Hart. (1902). — *Gen. nov.*
206. — *ANDREI*, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 58. Orénoque (Vénézuéla).
207. *EUSCARTHUS SPODIOPS*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 87. Bolivie W.
208. — *UCHROPTERUS*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, 1889, p. 145. Brésil.
209. *CENOTRICCUS SIMPLEX*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 88. Bolivie.
210. *LOPHOTRICCUS ZELEDONI*, Cherr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1891, p. 557. Costa Rica.
211. *HEMITRICCUS FLAMMULATUS*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 87. Bolivie N.
212. *HAPALOCERCUS PAULUS*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 96. Sta-Marta (Colombie).
215. *POGONOTRICCUS OTTONIS*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 89. Bolivie W.
205. *SERPHOPHAGA CINEREA*, var. *GRISEA*, Lawr., *Ann. L. N. Y.*, X, p. 159 (3229, pt.) Costa Rica.
214. — *ORENOCENSIS*, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 40. Orénoque.
206. *MIONECTES OLEAGINEUS*, var. *PARCA*, Bangs, *Pr. N. Engl. Z. C.*, 1900, p. 20. Panama.
207. — — var. *GALBINA*, Bangs, *l. c.*, 1902, p. 85.

- 731.** MIONECTES ASSIMILIS, Scl., est une espèce distincte (p. 257).
 208. — — var. DYSCOLA, Bangs, *Auk*, 1901, Chiriqui.
 p. 362.
 209. LEPTOPOGON AMAUROCEPHALUS, var. INCASTA, Paraguay.
 Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 187.
 215. PHYLLOMYIAS SCLATERI, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 90. Bolivie N. et E.
 216. — VENEZUELENSIS, Hart., *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 59. Cumana (Vénézuéla).
3261. — CRISTATA, Berl. (nec Cab.) Brésil S. et S.-E.
3264. — INCANESCENS (Max.), *Beitr. Nat. Bras.* III, 2, p. 286; *berlepschi*, Scl.
630 (Ger.) PILEOMYIAS, Berl. (1902), au lieu de *Myiopatris*, Cab. et H. =
Ornithion.
3310. — INCOMTA (Cab. et H.); Berl., *Nov. Zool.* IX, 1902, Vénéz., Guyane, Col.,
 p. 41; *semifusca*, Scl. (**3265**). Bolivie, Brésil E.
 217. — MONTENSIS (Bangs), *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, Sta-Marta (Colombie).
 1899, p. 97.
3271. ORNITHION CINERASCENS (Max.), *Beitr. z. Nat. Bras.* Brésil S. et E.
 III, p. 725; *obsoleta*, Tem., *Pl. Col.* 275, f. 4;
incanescens, Cab. et H. (nec Max.)
3270. — IMBERBE (Scl.) a pour habitat : Tex., Am. centr., Mex.
 E. jusq. Nicaragua.
 210. — — var. SCLATERI, Berl. et T.; (**3270**, pt.) Ecuador W.
 211. — — var. RIDGWAYI, Brewst., *Bull. Nutt.* Arizona S.-E. jusqu'au
Orn. Cl. VII, p. 208; (**3270**, pt.) Mexique.
742. *Tyrannulus semiflavus*, var. *brunneicapilla*, est une espèce distincte
 du genre précédent, et doit donc prendre le nom de : ORNITHION
 BRUNNEICAPILLUM (Lawr.); Hart., *Nov. Zool.* V, p. 487.
3281. *Tyranniscus acer*, Salv. et Godm., est également un ORNITHION (O. ACER).
3282. — GRISEICEPS, Scl. et Salv., appartient au genre PHYLLOMYIAS.
 218. ELAINEA CRISTATA, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 107, 177; Vénézuéla, Brésil N.
 Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 45; (**3290**, pt.)
 212. — ALBICEPS, var. PARVIROSTRIS, Pelz., *l. c.*, Brésil N., Orénoque.
 pp. 107, 178; Berl. et Hart., *l. c.*, p. 44;
 (**3290**, pt.)
 215. — VIRIDICATA, var. JALISCENSIS (Nels.), *Auk*, Mex. W., Tres Marias.
 1900, p. 264.
 214. — — var. MINIMA (Nels.), *Pr. Biol. Soc.* Mexique W.
Wash., 1898, p. 9.
 219. — YUCATANENSIS (Nels.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, Yucatan (Mexique).
 1901, p. 172.
 215. — GAIMARDI, var. MACHIVAINI, Lawt., *Ann. L.* Panama.
N. Y. X, p. 10; Salv. et Godm., *Biol. C.-A.*,
Aves, II, p. 27.
3314. — cinerascens, Ridgw. = E. MARTINICA (Lin.)
3311. *Arenarum* (Salv.) = SUBLEGATUS GLABER Scl. et Costa-Rica, Colombie,
 Salv., **3322**; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-* Vénézuéla.
Am., *Aves*, II, p. 57.

220. MYIOZETETES VIRESCENS (Allen), *Bull. Amer. Mus.* Matto Grosso (Brésil).
N. H. II, p. 149.
- 639 (Gen.) *Craspedoprion*, Hart. (1902) = RHYNCHOCYCLUS.
216. RHYNCHOCYCLUS SULPHURESCENS, var. MARGI- Panama.
NATA, Lawr., *Pr. Ac. Philad.*, 1868, p. 428;
(3333, pt.)
754. — PERUVIANUS, Tacz. (p. 242); id., *Orn.* Pérou, Ecuador.
Pér. II, p. 281. Est une espèce distincte.
217. — — var. AEQUATORIALIS, Berl. et Tacz., *P.* Ecuador.
Z. S., 1883, p. 556, 1885, p. 90; (754, pt.)
218. — CINEREICEPS, var. FLAVO-OLIVACEA, Lawr., Panama.
Ann. L. N. Y. VIII, p. 8; (3334, pt.)
219. — MEGACEPHALUS, var. FLAVOTECTA, Hart., Ecuador N.-W.
Nov. Zool. IX, p. 608.
762. *Myiodynastes* var. *nobilis*, Scl. et *insolens*, Ridgw., *Man.*, p. 152 =
M. AUDAX (Gm.)
- 645 (Gen.) ONYCHORHYNCHUS, Fischer (1815), au lieu de *Muscivora*, Cuv. (1800,
nec Lacép., 1799).
3357. — REGIUS (Gm.), *S. N.* I, p. 445, au lieu de *regia*.
3358. — MEXICANUS (Scl.), au lieu de *mexicana*.
766. *Cnipodectes* var. *minor*, Scl. = C. SUBBRUNNEUS, Scl.
3365. MYIOBIUS SULPHUREIPYGIUS, Scl., au lieu de *sulphureipygia*.
221. — ASSIMILIS, Allen, *Bull. Am. Mus.* XIII, p. 144. Sta-Marta (Colombie).
222. — LITÆ, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 40. Ecuador N.-W.
220. PYROCEPHALUS RURINEUS, var. SATURATA, Berl. Orénoque, Cumana
et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 54. (Vénézuéla).
3383. — NANUS, Gd.; supprimez dans la syn. : *dubius*, Gd. et *minimus*, Ridgw.
221. — — var. DUBIA, Gd., in *Zool. Voy. Beagle*, Ile Chatham (Galapa-
III, p. 46; *minimus*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat.* gos).
Mus., 1890, p. 115.
779. EMPIDOCANES VIREONINUS, Ridgw., *Ibis*, 1886, p. 461; *canescens*,
Chapm. (1894).
225. MITREPHANES BEBLEPSCHI, Hart., *Nov. Zool.* IX, Ecuador N.-W.
p. 608.
3394. EMPIDONAX FULVIERONS (Gir.) a pour habitat : Mexique N. et E.
222. — — var. PYGMÆA, Cones, *Ibis*, 1865, Nouv.-Mexique, Ari-
p. 557. zona S., Mex. W.
225. — — var. RUBICUNDA, Cab. et H., *Mus.* Mexique S.
Hein. II, p. 70.
224. — ALBIGULARIS, var. TIMIDA, Nels., *Auk*, 1900, Durango (Mexique).
p. 265.
224. — LAWRENCEI, Allen, *Bull. Am. Mus.* N. H. II, ?
p. 150; *Oetheca flaviventris*, Lawr. (nec Baird.)
786. — *pusillus*, var. *Trailli* (Audub.) = PUSILLUS Ecuador.
(Sw. et Rich.)
- 786 (pt.) — — var. ALNORUM, Brewst., *Auk*, 1895, Amér. N.-E. et centr.
p. 61.

225. EMPIDONAX MINIMUS, var. GRACILIS, Ridgw., Ile Cozumel.
Pr. Biol. Soc. Wash. III, p. 25.
3401. — *virescens*, Vieill. = ACADICUS (Gm.)
788. — BAIRDI, var. *occidentalis*, Nels. = BAIRDI, Sel. Mexique S.
 226. — — var. *INSULICOLA*, Oberh. (3403, pt.) Ile Sta-Barbara (Calif.)
 227. — — var. *PERPLEXA*, Nels., *Auk*, 1900, Oaxaca (Mexique).
 p. 265.
228. — FLAVIVENTRIS, var. *DIFFICILIS*, Baird, *B. N. Am.*, p. 198. Amérique N.-W. jusqu'à l'Ecuador W.
225. — *TREPIDUS*, Nels., *Auk*, 1901, p. 47. Chiapas et Guatemala.
 226. — *GRISEUS*, Brewst., *Auk*, 1889, p. 87. Basse-Californie.
- 655 (Gen.) NUTTALLORNIS, Ridgw. (1887), au lieu de *Contopus*, Cab. (1855, nec de Mars.); *Syrichta*, Bp., nec *Syrictus*, Boisd.; *Horizopus*, Oberh. (1899).
3410. — *MUSICUS* (Sw.), a priorité sur *pertinax*, Cab. et H.; Salv. et Godm., *Biol. C.-A., Aves*, II, p. 81.
229. — *VIRENS*, var. *SATURATA*, Bishop, *Auk*, 1900, Alaska.
 p. 116.
- 3416 (pt.) — *BRACHYTARSUS* (Sel.) a pour habitat : Am. cent. jusqu'à Panama.
 250. — — var. *PUNENSIS* (Lawr.), *Ann. L. N. Y.* IX, p. 257. Ile Puna (Ecuador).
 251. — — var. *ANDINA* (Tacz.), *P. Z. S.*, 1874, Du Nicaragua au Pérou.
 p. 559; *depressirostris*, Ridgw. (3418).
227. *BLACICUS FLAVIVENTRIS*, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Grenada (Antilles).
 1886, p. 617; Oberh., *Auk*, 1899, p. 555.
657. (Gen.) *Planchesia*, Bp. = *MYIOCHANES*, Cab. et H.
228. *MYIARCHUS MEXICANUS* (Kaup), *P. Z. S.*, 1851, p. 51. Texas, Mexique E. jusqu'à l'Honduras.
- 3434-35. — *FEROX* (Gm.); *swainsoni*, Cab. et H. et *venezuelensis*, Lawr. (3435). Amérique méridionale jusqu'à l'Argentine.
252. — — var. *PANAMENSIS*, Lawr.; Allen, *Bull. Veragua, Panama.*
Am. Mus. N. H., 1892, p. 547.
808. — — var. *CEPHALOTES*, Tacz. (voy. p. 250).
 809. — — var. *PELZELNI*, Berl. (voy. p. 251).
- 3440 (pt.) — *LAWRENCEI* (Gir.) a pour habitat : Mexique E.
 255. — — var. *OLIVASCENS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1899, p. 607. Arizona, Mexique W.
254. — — var. *NIGRICAPILLA*, Ridgw., *l. c.*, 1885, Amérique centr.
 pp. 584, 595.
255. — — var. *PLATYRHYNCHA*, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.* III, p. 25. Ile Cozumel.
811. — *coalei*, Ridgw., *P. U. S. N. M.*, 1886, p. 520 = *TRICOLOR*, Pelz.

OSCINES

256. *HIRUNDO RUSTICA*, var. *UNALASCHKENSIS* (Gm.), Alaska.
 Allen, *Auk*, 1901, p. 176.

- 825.** *Hirundo rufula*, var. *Togoensis*, Rehw. = var. *DOMICELLA* (830).
 237. — *SEMIROFA*, var. *NEUMANNI*, Rehw., *J. f. O.*, Massailand.
 1901, p. 282.
- 229.** *TACHYGINETA LEPIDA*, Mearns, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, Amér. N.-W. de l'A-
 1902, p. 31. laska au Costa-Rica.
- 666** (Gen.) *CHELIDONARIA*, Rehw., au lieu de *Chelidon*, Boie (nec Forst.)
 238. *CHELIDONARIA URBICA*, var. *ORIENTALIS*, Somow, Charkow (Russie).
Orn. Faun. Gouv. Charkow, 1897, p. 650;
 Hürms, *O. M.*, 1899, p. 95.
- 667** (Gen.) *CLIVICOLA*, Forst. (1817) a priorité sur *Cotyle*, Boie (1822).
 239. *CLIVICOLA PALUDICOLA*, var. *MAURITANICA*, Maroc.
 (Meade-Waldo), *Bull. Br. O. C.* XII, p. 27.
 240. — *FULIGULA*, var. *ANDERSSONI*, Sharpe et Damaraland.
 Wyatt., *Mon. Hirund.* I, p. 119.
- 250.** — *PENBERTONI* (Hart.), *Bull. B. O. C.* XII, p. 76. Angola.
 241. *PETROCHELIDON FULVA*, var. *PALLIDA*, Nels., Mexique N.-E.
Pr. Biol. Soc. Wash., 1902, p. 211.
- ✓ **242.** *PROGNE PURPUREA*, var. *CRYPTOLEUCA*, Baird, Floride, Cuba.
Rev. Am. B., p. 277; (3530, pt.)
 243. — — ? var. *FLORIDANA* (Mearns), *Pr. U. S.* Floride S.
Nat. Mus., 1902, p. 918.
- 251.** *PSALIDOPROCNE FULIGINOSA*, Shell., *P. Z. S.*, 1887, Caméron.
 p. 125.
- 252.** — *POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.*, 1903, p. 54. Fernando Po (Afr. W.)
253. — *BLANFORDI*, Weld-Bl., *Ibis*, 1900, pp. 178, 193. Bilo (Abyssinie).
254. *STELGIDOPTERYX RIDGWAYI*, Nels., *Pr. Biol. Soc.* Yucatan, Mex. S.-E.
Wash., 1901, p. 174.
 244. — *RUFICOLLIS*, var. *ÆQUALIS*, Bangs, *Pr. New* Sta-Marta (Colombie).
Engl. Zool. Cl. II, p. 58.
- 3560.** *HEMICHELIDON SIBIRICA* (Gm.); Day. et Oust., *Ois.* Altaï, Sibérie E., Chine,
Chine, p. 122; *fuscedula*, Pall. Japon.
 245. — — var. *FULIGINOSA*, Hods., *P. Z. S.*, Asie mérid., Malacca,
 1845, p. 52; Hume et Hend., *Lahore to* Bornéo, Palawan.
Yark, p. 184, pl. 4; (3560, pt.)
- 3563.** *BUTALIS GRISEOSTICTA*, Swinh. et sa var. *PALLENS*, Stejn. (848) appar-
 tiennent au genre *HEMICHELIDON*.
- 3562.** *BUTALIS GRISOLA* (Lin.) Europe, Afrique.
 246. — — var. *SIBIRICA*, Neum., *J. f. O.*, 1900, Sibérie, Asie centr.,
 p. 359. Afrique E.
- 3566.** — *ussheri* (Sharpe) = *SYLVIA HORTENSIS* (Gm.), voy. p. 374.
 255. — *FÜLLEBORNI* (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 122. Nyassaland.
 — *TORUENSIS* (Hart.), *Nov. Zool.* VII, p. 57. Toru (Afrique équat.)
 256. — *INFULATA* (Hartl.), *P. Z. S.*, 1880, p. 626; id., Afrique centr.
J. f. O., 1882, p. 224.
 247. *MUSCICAPA ATRICAPILLA*, var. *SPECULIGERA*, Bp.; Tunisie.
 (3573, pt.); Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 506.

248. *MICROECA FLAVIGASTRA*, var. *LÆTA*, Salvad., Wandammen (Nouv.-
Ann. Mus. Civ. Genov., 1878, p. 525; Guinée).
(3582, pl.)
257. — *ADDITA*, Hart., Nov. Zool. VII, p. 254. Ile Bourou.
258. *ALSEONAX GAMBAGLE*, Alex., Bull. B. O. C. XII, p. 11. Côte-d'Or (hinterland).
3599. *Batis orientalis minor*, Erl., Orn. Monatsb., 1901, p. 181 = *B. ORIENTALIS*.
3601. — *bella* (Ell.) = *B. ORIENTALIS* (Heugl.); Grant, Ibis, 1902, p. 662.
249. — *MINULLA*, var. *POENSIS*, Alex., Bull. B. O. Fernando Po.
XIII, p. 54.
- 695^{bis} (Gen.) *MUSCITREA*, Blyth (1847).
259. — *CINEREA*, Blyth, Journ. As. Soc. Beng., 1847, Indo-Chine, Malacca,
p. 122; Oates, Faun. Br. Ind. II, p. 51. Andaman.
240. *ERYTHROMYIAS RIEDELI*, Büttik., Not. Leyd. Mus., Ile Ténimber.
1886, p. 62, pl. 5, f. 4.
241. *GERYGONE TENKATEI*, Büttik., Not. Leyd. Mus., Flores.
1892, p. 195.
242. — *KÜHNII*, Hart., Nov. Zool. VII, p. 15. Ile Dammier.
245. — *INSULARIS*, Rams., Pr. Linn. Soc. N. S. W., Ile Lord Howe.
1878, p. 117.
244. — *RAMUENSIS*, Rehw., Orn. Monatsb., 1897, p. 26. Nouv.-Guinée allem.
245. — *PLACIDA*, Madar., Orn. Monatsb., 1900, p. 5. Nouv.-Guinée allem.
246. — *INCONSPICUA*, Rams., Pr. Linn. Soc. N. S. W., Nouv.-Guinée S.-E.
1878, p. 116.
247. — *GIULIANETTI*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen., Nouv.-Guinée S.-E.
1896, p. 81.
248. — *TENERROSA* (Hall.), Viet. Natural. XIII, p. 79. Australie N.-W.
- 699 (Gen.) *Eugerygone*, Finsch (1900) = *GERYGONE*.
861. *CHASIEMPIS dolei*, Stejn. = var. *SCLATERI*, Ridgw. (864).
862. — *ridgwayi*, Stejn. = *SANDWICHENSIS* (Gm., 3699).
865. — *ibidis*, Stejn. = *SANDWICHENSIS* (Gm.)
250. *POECILODRYAS CYANA*, var. *CYANOPSIS*, Sharpe, Nouv.-Guinée S.-E.
II.-I. B. III, p. 255; *salvadorii*, Roth. et
Hart., B. B. O. C. XI, p. 26 (nec Madar.)
249. — *PACHYDEMAS*, Rehw., Orn. Monatsb., 1901, p. 5. Nouv.-Guinée S.-E.
3723. — *ARMITI*, De Vis; *Pachycephalopsis armiti*, Salvad., est un *HETEROMYIAS*
(Sharpe, Bull. B. O. C. XI, p. 60).
3727. — *PAPUANA*, A. B. Mey.; *viridiflava*, Rothsch. et Hart., Bull. B. O. C.,
1900, pp. 26, 40, est un *MICROECA*.
- 707^{bis} (Gen.) *PHOLIA*, Rehw. (1900), gen. nov.
250. — *HIRUNDINEA*, Rehw., Orn. Monatsb., 1900, p. 99. Rungwe (Nyassal. N.)
868. *HYLIOTA marginalis*, Rehw. = *H. BARBOZE*, Benguéla, Nyassaland.
Hartl. (3737).
251. ? *XANTHOPYGIA OWSTONI*, Bangs, Bull. Mus. Har- Iles Liu-Kiu.
vard, XXXVI, p. 265.
- 712 (Gen.) *LIPTILUS*, Cab.; *Alcippe*, Shell. (nec Blyth).
3755. — *ABYSSINICUS* (Rüpp.), Neue Wirb., p. 108, pl. 40, Afrique N.-E.
f. 2; *kilimensis*, Shell. (4910).

252. LIOPTILUS CLAUDEI, Alex., *Bull. B. O. C.*, 1905, p. 54. Ile Fernando-Po.
3756. — GALINIERI (Guér.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 162; Abyssinie, Choa.
frontalis, Rüpp.; *melodus*, Heugl.
251. PARISOMA SUBCERULEUM, var. CINERASCENS, Damaraland.
Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 77.
253. — LUGENS (Rüpp.), *Neue Wirb. Vög.*, p. 115, Abyssinie.
pl. 44, f. 2.
254. — JACKSONI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, p. 28. M^t Elgon (Afr. équat.)
5317. — BLANFORDI (Seeb.); Grant, *Ibis*, 1900, p. 154; Abyssinie, Somaliland.
id., *Nov. Zool.* VII, p. 235.
252. CHLOROPETA NATALENSIS, var. UMBRINICEPS, Ethiopie S.
Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 10.
255. — — var. KENYA, Sharpe, *Bull. B. O. C.* Mont Kenya (Afr. E.)
XII, p. 55.
255. HYPOTHYMIS ABBOTTI, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, Pulô Babi (Sum. W.)
1902, p. 189.
256. — CONSOBRINA, Richm., *l. c.* Ile Simalur (Sum. W.)
257. — ERYTHROCERCUS HOLOCHLORUS, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 181. Juba inférieur (Afrique N.-E.)
3797. RHIPIDURA DEVISI, North, *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1898, p. 444; Dubois (1900).
254. — ALBICOLLIS, var. ATRATA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* 1879, p. 205; *schlegeli*, Sharpe; *vidua*, Schl. (nec Salvad.); (**3804**, pl.)
258. — REICHENOWI, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, Babber (Moluques).
p. 237, pl. 4, f. 5.
255. — RUFIFRONS, var. TORRIDA, Wall., *P. Z. S.*, Ternate (Moluques).
1865, p. 477, pl. 28; (**3824**, pt.)
3807. — *castaneothorax*, Rams. = HYPERVTHRA, Gr.
259. — ALBINA, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.*, 1901, Kulambangra (Salom.)
p. 185.
260. — MATTHIE, Heinr., *J. f. O.*, 1902, p. 457, pl. 9, f. 2. St-Matthias.
3802. — *fallax*, Rams. = ATRA, Salvad. (**3803**); Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*,
1896, p. 78.
878. — var. *meyeri*, Büttik. = ATRA; Salvad., *l. c.*
3834. — *cinnamomea*, Mey. = ATRA; Salvad., *l. c.*
3852. — *hoedti*, Büttik. = BUETTIKOFERI, Sharpe (**3855**); Fsch., *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 256.
3858. — *finshi*, Salvad. = SETOSA (Q. et G.), **3854**.
261. TERPSIPHONE SMITHI (Fraser), *P. Z. S.*, 1845, p. 54; Afrique W.
Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 788.
262. — MELANURA (Rehw.), *J. f. O.*, 1901, p. 285. Duki (Afrique équat.)
265. — IGNEA (Rehw.), *l. c.* Benguêla.
264. — ILLEX, Bangs, *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 264. Liu-Kiu.
3898. *Muscicapa infusata*, Blyth, *Ibis*, 1870, p. 165 = RHINOMYIAS PECTORALIS (Salvad.)

- 897.** *CULICICAPA*, var. *Panayensis*, Sharpe = *C. HELIANTHEA* (Wall.)
- 3912.** *MYIAGRA nupta*, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 526 = *NITIDA*, Gould.
- 3913.** — *NOVEPOMERIANÆ* au lieu de *novæ-pomerianæ* (laps.)
- 3923.** — *pallida*, Rams. = femelle du *FERROCZYANEA*, Rams. (**3922**).
256. — *CALEDONICA*, var. *VIRIDINITENS*, Gray, *P. Z.* Iles Loyalty.
S., 1859, p. 162 (**3918**, pl.)
265. — *PERSPICILLATA*, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 161 Nouvelle-Calédonie.
(**3918**, pt.)
- 3924.** — *LATIROSTRIS*, Gould; *ruficollis*, Salvad. (nec Vieill.)
- 3925.** — *RUFICOLLIS* (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 21; *rufi-* Timor, Sumba, Bo-
gula, Wall.; Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1881, nerate, Djampea,
p. 71. Kalao.
266. — *FREYCINETI*, Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1881, p. 75. Iles Mariannes.
267. — *FEMININA*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, Ile Kulambangra (Sa-
pp. 185, 375. lomon)
- 6720.** *MEGARIAS ATRILATUS* (Cass.); *flammulatus*, Verr. (**3934**); Sharpe, *II. I.*
III, p. 247 (note).
268. *SMITHORNIS ZENKERI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1905, Caméron.
p. 41.
269. — *SHARPEI*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 54. Fernando Po.
270. *CRYPTOLOPHA KINABALUENSIS*, Sharpe, *Bull. B. O.* Bornéo N.-W.
C. XI, 1901, p. 60.
271. — *RURMANICA*, Berez. et Bianchi, *Aves Exped.* Pégou, Ténassérim.
Potan., p. 75.
257. — *XANTHOSCHISTA*, var. *JERDONI*, Brooks, *Str.* Népaul, Assam, Monts
F., 1871, p. 248, 1875, p. 245. Khasi, Manipour.
272. — *DORCADICHOA*, Rehw. et Neum., *Orn. Monatsb.*, Kilimanjaro (Afr. E.)
1895, p. 76.
258. — *SCHISTICEPS*, var. *RIPPONI* (Sharpe), *Bull.* Yun-nan W.
B. O. C. XIII, 1905, p. 41.
275. — *LETA*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 9. Ruwenzori.
274. — *HERBERTI*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 55. Fernando Po.
- 3968.** — *DAVISONI*, et non *davinsoni* (laps.)
740^{bis} (Gen.) *DAMMERIA*, Hart. (1899), *gen. nov.*
275. — *HENRICI*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 646; id., *Nov.* Ile Dammer (mer de
Zool., VII, p. 14, VIII, pl. 6, ff. 1, 2. Banda).
276. *DIPTORNIS TROTILE*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, Rungwe (Afrique E.)
p. 5.
- 3993.** *BRADYORNIS woodwardi*, Sharpe = *SYLVIA HORTENSIS* ou *simplex* (**5305**).
- 3994.** — *traversi*, Gigl. = *B. CHOCOLATINUS* (Rüpp.)
277. — *REICHENOWI* (Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 10. Budda (Ethiopie S.)
- 3997.** — *oatesi*, Sharpe = *B. MURINUS*, H. et F. (**3990**).
745^{bis} (Gen.) *EMPIDORNIS*, Rehw. (1901), *gen. nov.*
- 3986.** — *SEMPARTITUS* (Rüpp.), etc.
278. — *KAYIROMDENSIS* (Neum.), *J. f. O.*, 1900, p. 257. Kavirondo (Afr. équat.)
- 745^{ter} (Gen.) *MYOPORNIS*, Rehw., *J. f. O.*, 1901, p. 285 (*gen. nov.*)

3998. MYOPORNIS BOEHMI (Rehw.)
 3999. — SHARPEI (Bocage).
 4008. ARSES *batantæ*, Sharpe = A. TELESCOPHTHALMUS (Garn.), 4003.
 4011. — *terra-regiæ*, Gamb. = A. KAUP, Gould (4009).
 910. MONARCHA, var. *Commutata*, Brügg. = M. INORNATUS (Garn.); Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 258.
 911. — var. KISSERENSIS, Mey. = M. INORNATUS (4016); Finsch, *l. c.*
 4026. — MOBOTENSIS (Sharpe) = M. BIMACULATUS, Gr. (4025); Finsch, *l. c.*, p. 205.
 279. — ALRIVENTRIS, Gould, (912, pt. p. 289). Australie N.-E.
 280. — KULAMBANGRE, Roth. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, Kulambangra (Salom.) p. 185.
 259. — BRODIEI, var. FLORIDANA, Roth. et Hart., Florida (Salomon). *l. c.*, p. 182.
 281. — MENCKEI, Heinr., *J. f. O.*, 1902, p. 451, pl. 9, f. 1. Ile St-Matthias.
 4060. — FUSCESCENS, Mey. = M. INORNATUS (4016); Sharpe, *H.-l.*, p. 285.
 4061. — GEELYNKIANUS, Mey. = M. INORNATUS (4016); Sharpe, *l. c.*
 748^{bis} (Gen.) HETERANAX, Sharpe (1885).
 4029. — MUNDUS (Scl.); Sharpe, in *Gd. B. New Guin.* II, pl. 59. — Appartient-drait, d'après Finsch, aux *Laniidæ*.
 260. PELTOPS BLAINVILLEI, var. MINOR, De Vis, *Ann. Nouv.-Guinée S.-E. Rep. Br. New Guin.*, 1894, *App.*, p. 400.
 282. POMAREA RUFOCASTANEA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. San Cristoval (Salomon)* S. W., 1879, p. 79; (4065, pt.)
 752 (Gen.) Pomareopsis, Oust. = GRALLINA (1176).
 4070. — *semi-atra*, Oust. = GRALLINA BRUIJII, Salvad. (6806).
 4083. Siphia enganensis, Grant = mâle du S. HERIOTI (Rams.), 4090; Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 60.
 285. SIPHIA RUECKI (Oust.), *Bull. Soc. Philom.*, 1881, p. 78. Malacca.
 284. — HAINANA (Grant), *P. Z. S.*, 1900, p. 480. Haïnan.
 285. — BEVIROSTRIS (Bingh.), *Ann. N. H.*, 1900, p. 559. Siam.
 4093. — BANYUMAS (Horsf.); Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 55. Java.
 261. — — var. RUFIGASTRA, Rall.; (4093, pt.) Malac., Born., Lingga.
 919. — — var. Philippinensis, Sharpe = var. Philippines.
 SIMPLEX, Blyth, *Ibis*, 1870, p. 165.
 286. — RUFIFRONS (Wall.); 4096, pt.; Finsch, *Notes Leyd. Mus.*, 1901, p. 45.
 287. — HOSEI (Finsch), *Notes Leyd. Mus.*, 1901, p. 48. Bornéo.
 4099. — *turcosa* (Brügg.) = femelle de S. ELEGANS (4089).
 4106. — *vordermani*, Shpe. = femelle de ERYTHRONIAS DUMETORIA (Wall.), 3637.
 4916. MUSCICAPULA BASILANICA (Sharpe) = M. mindanensis, W. Blas. 4115.
 4111. ANTHIPES LEUCOPS (Sharpe), *P. Z. S.*, 1888, p. 246 = Monts Khasi, Mani-albifrons, Sharpe (*nom. nud.*), 4126. pour, Karen-nee.
 4129. SIPHIA VIVIDA (Swinh.) au lieu de Nitalva vivida.
 758 (Gen.) STIZORHINA, Oberh. (1899) au lieu de Cassinia, Hartl. (1860, nec Rafin., 1815).
 4141. GRAUCALUS purus, Sharpe, = G. CÆSIUS (Licht.), 4140; Grant, *Ibis*, 1900, p. 171.

288. *GRAUCALUS CÆRULEUS*, Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1884, Bas-Congo.
art. 8, p. 1.
4146. — *pusillus*, Rams. = *G. SOLOMONIS*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879,
p. 514.
289. — *CORNIX*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 187. Nouv.-Guinée S.-E.
4147. — *HOLOPOLIUS* (Sharpe) appartient au genre *EDOLISOMA*; Roth. et Hart.,
Nov. Zool. VIII, p. 574.
4148. — *elegans*, Rams. = *G. HYPOLEUCUS*, Gd. (4161).
4149. — *lettienssis*, Mey. = *G. PERSONATUS* (S. Müll.), 4183; Finsch, *Notes*
Leyd. Mus. XXII, p. 249.
4162. — *timorlaensis*, Mey. = *G. HYPOLEUCUS*, Gd. (4161); Finsch, *l. c.*, p. 250.
290. — *VORDERMANI*, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, Ile Kangean.
p. 52.
4214. *EDOLISOMA TRISTRAMI*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S.* Guadalcanar (iles Sa-
W., 1882, p. 22; *salomonis*, Tristr. (nec Rams.) lomon).
262. — *ERYTHROPYGIUM*, var. *SATURATIA*, Roth. et Iles Ysabelle, Kulam-
Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 582. bangra et Short-
land (Salomon).
291. *CAMPOCHÆRA FLAVICEPS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ.* Nouv.-Guinée S.-E.
Gen., 1879, p. 58.
938. *CAMPOPHAGA*, var. *Intermedia* (Hume) = *C. MELANOPTERA* (Rüpp.), 4244.
939. — var. *Saturata* (Swinh.) = *C. MELANOPTERA*.
- 4246 (pt.) — *innominata*, Oates = *C. MELANOPTERA*.
- 4248 (pt.) *PERICROCOTUS elegans* (Mc Clell.) = *P. SPECIOSUS* Himalaya, Inde, Birm.
(Lath.); 4247.
- 4248 (pt.) — *FRATERCULUS*, Swinh.; Oates, *Faun. Br. Ind.*, Indo-Chine.
B. I, p. 481.
4259. — *MONTANUS*, Salvad. a pour habitat : Sum., Bornéo N.-W.
292. — *WRAYI*, Sharpe (4259, pt.) Pérak (Malacca).
295. — *CROCEUS*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 269; Pérak (Malacca).
(4259, pt.)
4271. — *immodestus*, Hume = *P. CANTONENSIS* (4270). Ch.S., Haïnan, Ténass.
- 768 (Gen.) *DIAPHOROPTERUS*, Oberh. (1899), au lieu de *Symmorphus*, Gd. (1857,
nec Wesm., 1855).
- 772^{bis} (Gen.) *HAPALOPTERON*, Bonap. (1854).
294. — *FAMILIARE* (Kittl.), *Mém. Ac. St. Pétersb. des sav.* Ile Bonin (mer du
étr., I, 1851, p. 255, pl. 15; Bp., *C. R.* XXXIX, Japon).
p. 59; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* VI, p. 120
(note).
265. *PYCNOXOTUS TRICOLOR*, var. *MINOR*, Heugl., Afrique N.-E.
Orn. N.-O. Afr. I, p. 598; (4316, pt.)
264. — *XANTHOPYGUS*, var. *REICHENOWI*, Lor. et Arabie S.
Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 50.
265. *LÆDÜROSA SIMPLEX*, var. *PRILLWITZI* (Hart.), Pahang (Malacca E.)
Nov. Zool. IX, p. 561,
- 781 (Gen.) *Pinarocichla* = *EUPHILOSUS* (782).

- 782** (Gen.) *Euptilosus*, Rehb. (1857) au lieu de *Poliolophus*, Sharpe (1876).
- 4345**. — *ENTYLOTUS* (Eyt.), *P. Z. S.*, 1859, p. 103, au lieu de *euptilosus*, devenu terme générique.
295. — *NIEUWENHUISI* (Finsch), *Notes Leyd. Mus.* XXIII, Bornéo centr. 1901, p. 95.
- 4353**. *IXIDIA CYANIVENTRIS* (Blyth), a pour habitat : Ténassérim S., Malacca, Sumatra.
266. — — *var. PAROTICALIS* (Sharpe); **4353**, pt. Bornéo.
296. *BRACHYPODIUS RAWEANUS*, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 209. Ile Bawean (Java).
- 788^{bis} (Gen.) *PYRRHURUS*, Cass. (1859); *Trichites*, Heine (1860); *Ptyrticus*, Hartl. (1885); *Xenocichla* (pt.), *Syn. Av.*, **789**. — Ce genre comprend :
297. *PYRRHURUS TURDINUS* (Hartl.), *J. f. O.*, 1885, p. 425; Afrique équat. E. id., *Zool. Jahrb.*, 1887, p. 515, pl. 11, f. 1.
- 4375**. — *SCANDENS* (Sw.)
948. — — *var. ORIENTALIS* (Hartl.)
- 4376**. — *MULTICOLOR* (Bocage).
- 4407**. — *TRICOLOR* (Cass.)
953. — — *var. CABANISI* (Sharpe).
- 4377**. — *SERINUS* (Verr.)
267. *XENOCICHLA ALBIGULARIS*, *var. LEUCOLEMA*, Toro (Ruwenzori). Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 10.
268. — *TEPHROLEMA*, *var. KAKAMEGÆ*, Sharpe, Kakamega. *Bull. B. O. C.* XI, p. 29.
269. — *FLAVICOLLIS*, *var. SHELEVI*, Neum., *J. f. O.*, Muansa (Afrique E.) 1900, p. 292.
- 790** (Gen.) *Alophoixus*, Oates (1889) = *CRINIGER*.
270. *CRINIGER GRISEICEPS*, *var. BURMANICA*, Oat., Birmanie. *Faun. Br. Ind. B.* I, p. 256; (**4394**, pt.)
298. — *SALANGLE*, Sharpe, *Hand-list*, III, p. 316; *cabanisi*, A. Müll., *J. f. O.*, 1882, p. 384 (nec Sharpe). Salanga (Matacca N.)
- 4398**. — *TEPHROGENYS* (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.*, pl. 127; *gutturalis*, Bp.; etc.
- 4404**. — *olivaceiceps*, Shell. = *XENOCICHLA STRIIFACIES*, Rehw. (**4374**).
299. — *SORDIDUS*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, Bas-Siam. p. 520.
500. — *CONRADI*, Finsch, *Verh. z.-b. Ges. Wien*, 1875, p. 9. Siam.
501. *IOLE NICOBARIENSIS*, Moore, in *Horsf. et M., Cat.* Iles Nicobar. *B. Mus. E. I. Co.* I, p. 257.
502. — *LUCASI* (Hart.), *Nov. Zool.* X, 1905, p. 15. Ile Obi Major.
- 4421**. — *guimarasensis*, Steere = *J. PHILIPPENSIS* (Gm.), **4420**.
- 793** (Gen.) *Eurillas*, Oberh. (1899) = *ANDROPADUS*.
- 794** (Gen.) *Stelgidillas*, Oberh. (1899) = *CHLOROCICHLA*.
505. *CHLOROCICHLA POENSIS* (Alex.), *Bull. B. O. C.* XIII, Fernando Po. p. 55.
504. — *MARCHEI*, Oust., *N. Arch. Mus.* II, 1879, p. 100. Gabon.
- 4451**. *PHYLLOSTROPHUS CAPENSIS*, Sw. = *Ph. terrestris*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 270.

271. *PHYLLOSTROPHUS STREPITANS*, var. *PLACIDA*, Kilima Ndjaro.
Shell., *P. Z. S.*, 1889, p. 565.
272. — — var. *SHARPEI*, Shell. (4452, pt.) Afrique E. angl.
275. — — var. *POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* Fernando Po.
XIII, 1905, p. 55.
505. *MACROSPHENUS POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, Fernando Po.
1905, p. 56.
506. — *ZENKERI* (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 25; Jaunde (Afrique W.)
(4460, pt.)
4475. *HEMIXUS STRIOLATUS* (S. Müll.), *Bp. Consp.* 1, p. 262; Sumatra.
sumatranus, Rams.
4476. — *MALACCENSIS* (Blyth). Supprimez *Tr. striolatus*, Bp. Indo-Chine, Bornéo.
802^{bis} (Gen.) *CERASOPHILA*, Bingham, (1900). *Gen. Nov.*
507. — *THOMPSONI*, Bingham, *Ann. N. H.*, 1900, p. 558. Siam.
274. *HYPSSIPETES AMAUROTIS*, var. *HENSONI*, Stejn. Japon.
(4484, pt.)
275. — — var. *PRYERI*, Stejn. (var. 963, pt.) Îles Liu-Kiu.
276. *CHLOROPSIS VIRIDIS*, var. *VIRIDITECTA*, Hartl., Bornéo.
Nov. Zool. IX, pp. 212, 557.
5505. — *ZOSTEROPS*, Vig. est une var. de *C. VIRIDIS* (Horsf.) Sumatra.
277. *EUPETES CASTANOTUS*, var. *PULCHRA*, Sharpe; Nouv.-Guinée S.-E.
4526, pt.; Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*,
1896, p. 100.
508. *TROCHALOPTERON RIPPONI*, Oates, *Bull. B. O. C.* XI, Siam S.
1900, p. 10.
509. — *SHARPEI*, Ripp., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 15. Kauri-Kachin.
4586. *Ianthocinclia cinereiceps* (Styan) = *TROCHALOPTERON* NINGPOENSE, Dav. et
Oust. (4548); *Bull. Mus. Paris*, 1898, n° 6, p. 254.
510. *CAMPSORHYNCHUS SATURATION*, Sharpe, *P. Z. S.*, Perak (Malacca).
1888, p. 275.
278. *ARGYA RUBIGINOSA*, var. *SHARPEI*, Gr. et Reid, Schebeli (Somaliland).
Ibis, 1901, p. 662; *rubiginosa* (pt.), Sharpe,
P. Z. S., 1895, p. 488.
511. *MELANOCICHLA PENINSULARIS*, Sharpe, *Pr. Zool. Soc.*, Perak (Malacca).
1888, p. 274.
512. *GARRULAX SCHISTOCHLAMYS*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 479. Kina Balu (Bornéo).
515. *DRYONASTES KAURENSIS*, Ripp., *Bull. B. O. C.* XII, Kauri-Kachin.
1901, p. 15.
514. *CRATEROPUS HINDEI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, Athi (Afrique E.)
1900, p. 29.
515. — *STICTILEMA*, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, De la Côte d'Or au
p. 10. Niger.
516. *BATHMOCERCUS JACKSONI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* Kibero (Ruwendzori).
XIII, 1902, p. 10.
517. *TURDINULUS HUMELI*, Hartl., *Nov. Zool.* IX, p. 564. Pahang (Malacca E.)
518. — *GRANTI*, Richm., *Pr. U.S. Nat. Mus.* XXII, p. 520. Bas-Siam.

519. *TURDINULUS SQUAMATUS* (Pak.), *J. Bombay Soc.* XIII, Cachar.
p. 403.
4739. *MALACOCINCLA ABBOTTI*, Blyth; supprimez *Bornéo* de l'habitat.
520. — *RÜTTIKOFERI*, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, Bornéo.
p. 218; *abbotti* (pt.), auct. plur. (nec Blyth).
521. *CRATEROSCELIS PECTORALIS*, Rothsch. et Hart., *Bull.* Caméron.
B. O. C. XI, 1900, p. 25.
522. — *RUFOPRUNNEA*, Rothsch. et Hart., *l. c.* = ? *Sericornis salvadorii*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1901, p. 4. Nouv.-Guinée allem.
- 851 (Gen.) *AETHOSTOMA*, Sharpe (1902), au lieu de *Trichostoma*, Blyth (1842, nec Pictet, 1854).
525. *DRYMOCATAPHUS CINNAMOMEUS*, Ripp., *Bull. B. O.* Siam.
C. XI, p. 12.
524. *ANDROPHILUS DISTURRANS*, Hart., *Nov. Zool.* VII, Ile Bourou.
p. 258.
525. *ILLADOPSIS ATRICEPS* (Sharpe), *Bull. B. O. C.* XIII, Ruwenzori (Afr. W.)
1902, p. 10.
526. — *JACKSONI* (Sharpe), *l. c.* XI, p. 29. Nandi.
527. — *BATESI* (Sharpe), *l. c.* XII, 1901, p. 2; *Ibis*, 1902, Caméron, Bas-Congo.
p. 94, pl. 4, f. 2.
528. — *CERVINIVENTRIS*, *l. c.*, p. 5. B.-Congo, Gabon, Cam.
529. — *ROCAGEI* (Salvad.), *Boll. Mus. Tor.*, 1905, n° 442, Fernando Po.
p. 1; id., *Mem. R. Acc. Sc. di Tor.*, 1905, p. 110.
530. — *PUVELI* (Salvad.), *Ann. Mus. Gen.* XX, 1901, Guinée portugaise.
p. 767.
531. *MALACOPTERON NOTATUM*, Richm., *Pr. Biol. Soc.* Ile Banjak (Sum. W.)
Wash., 1902, p. 190.
- 870 (Gen.) *NESOBATES*, Sharpe (1902) au lieu de *Oxylabes*, Sharpe (1870, nec Forst., 1836).
279. *STRACHYRHIS MACULATA*, var. *BANJAKENSIS*, Banjak (Sumatra W.)
Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 190.
- 4824 (pt.) *TIMALIA PILEATA*, Horsf. a pour habitat : Java.
280. — — var. *JERDONI*, Wald., *Ann. Mag. N.* Indo-Chine, Malacca.
H., 1872, p. 61; (8424, pt.)
281. — — var. *BENGALENSIS*, Godw.-Aust., *J. A.* Himalaya, Assam,
S. Beng., 1872, pt. 2, p. 145; (8424, pt.) Cachar.
4828. *PYCTORHIS GRACILIS*, Styan = *MOUPINIA POECILOTIS* (Verr.), 4915.
532. *MIXORNIS FRIGIDA* (Hartl.); *Heleia frigida*, Hartl., *J.* Sumatra.
f. O., 1865, p. 27; *Zosterops frigida*, Gad.,
Cat. B. IX, p. 205.
533. — *PRILLWITZI*, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 52; id., Ile Kangean (mer de
Nov. Zool. IX, p. 456, pl. 15, f. 1. Java).
- 883 (Gen.) Syn. : *Drymochaeres*, Gd. (1868, nec Muls., 1847); *Heteroxenicus*,
Sharpe (1902, *Bull. B. O. C.* XII, p. 55.
534. *BRACHYPTERYX FLORIS*, Hart., *Nov. Zool.* IV, Flores.
pp. 170, 516.

555. CYANODERMA SULPHUREA (Ripp.), *Bull. B. O. C.* XI, Siam S.
p. 11.
556. — DAVIDI (Oust.), *Bull. Mus. Paris*, 1899, n° 5, p. 119. Setchuen.
557. — CHRYSOPS (Richm.), *Pr. B. S. Wash.*, 1902, p. 157. Trong (Bas-Siam).
- 884^{bis} (Gen.) PSEUDOXENICUS, Finsch, *Not. Leyd. Mus.* XXII, 1900, p. 215;
Gen. nov.; *Orthnocichla* (pt.), Hart.
4874. PSEUDOXENICUS SUPERCILIARIS (Bp.); *leptura*, Kuhl. Java.
— EVERETTI (Hart.); *Orthnocichla everetti*, Hart., Flores.
Nov. Zool. IV, p. 170.
- 886 (Gen.) Syn. : *Sittiparus*, Oat. (1899, nec de Selys, 1884); *Pseudominla*,
Oat. (1894); *Semiparus*, Hellm. (1901).
558. MINLA INTERMEDIA (Ripp.); *Schœniparus interme-* Nanoi (Siam S.)
dus, Ripp., *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 11.
559. ALCIPE FRATERCULA, Ripp., *Bull. B. O. C.* XI, Siam S.
1900, p. 11.
- 4908^{bis}. — *variegatus* (Styan) = A. GENESTIERI, Oust. (4908).
- 892 (Gen.) *Dendrobiastes* = MUSCICAPULA, 755 (p. 294).
4916. MUSCICAPULA BASILANICA a pour syn. *M. mindanensis*, Blas., 4115.
282. YUHINA GULARIS, var. YANGPIENSIS, Sharpe, Yang-pi (Yunnan).
Bull. B. O. C. XIII, 1902, p. 12.
540. — AMPELINA, Ripp., *Bull. B. O. C.* XI, p. 12. Warar Bum (Siam).
285. SIVA STRIGULA, var. MALAYANA, Hart., *Nov. Pahang (Malacca E.)*
Zool. IX, p. 567.
284. — CYANUROPTERA, var. SORDIDIOR, Sharpe, Pérak (Malacca).
P. Z. S., 1888, p. 276; *sordida*, Sharpe
(1887, nec Hume.)
285. CUTIA NIPALENSIS, var. CERVINICRISSA, Sharpe, Pérak (Malacca).
P. Z. S., 1888, p. 276.
- 905 (Gen.) DIAPHORILLAS, Oberh. (1899), *Pr. Ac. Phil.*, p. 219, au lieu *Amytis*,
Less. (1851, nec Savig., 1826).
541. ? DIAPHORILLAS GIGANTURA (Millig.), *Victorian Natu-* Australie W.
ral., XVIII, p. 27.
- 906^{bis} (Gen.) EREMORNIS, North (1900), *Gen. nov.*
542. — CARTERI, North, *Victorian Natural.* XVII, 1900, Australie.
pp. 78, 95; *Selat.*, *Ibis*, 1902, p. 608, pl. 14.
- 907 (Gen.) CRYPTILLAS, Oberh., *l. c.*, 1899, au lieu de *Phlexis*, Hartl. (1866,
nec Erichs., 1841).
545. — RUFESCENS (Sharpe), *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 9. Ruwenzori.
286. — — var. LOPEZI, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, Fernando Po.
p. 48.
287. BRADYPTERUS CINNAMOMEUS, var. SALVADORII, Gurui, Kilima Ndjaro.
Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 504.
- 912 (Gen.) NESILLAS, Oberh., *l. c.*, 1899, p. 211, au lieu de *Ellisia*, Hartl.
(1860, nec Forb. et Goods., 1840).
288. MEGALURUS MACRURUS, var. INTERSCAPULARIS, Nouv.-Hanovre.
Scl.; Roth. et Hart., *Orn. Monatsb.*, 1899,
p. 159 (4967, pt.)

- 497 1.** *Megalurus punctatus*, De Vis, est probablement le jeune du *M. MACRURUS*;
Roth. et Hart., *l. c.*
- 544.** *CALAMOCICHLA POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C. XIII*, Fernando Po.
1905, p. 57.
- 289.** — *LEPTORHYNCHA*, var. *JACKSONI*, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 185. Uganda.
- 545.** *CALAMONASTES STIERLINGI*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, Rowuma (Afrique E.
1901, p. 59. allemande).
- 546.** *APALIS LOPEZI*, Alex., *Bull. B. O. C. XIII*, 1905, p. 55. Fernando Po.
290. — *CINEREA*, var. *SCLATERI*, Alex., *l. c.*, p. 56. Fernando Po.
- 920^{bis}** (Gen.) *UROLAIS*, Alex. (1905), *l. c.*, p. 55. (*Gen. nov.*)
- 547.** — *MARLE*, Alex., *Bull. B. O. C. XIII*, 1905, p. 55. Fernando Po.
- 1026.** *CHLORODYTA FLAVIDA*, var. *FLORISUGA* (Rchw.), Afrique S.-E.
J. f. O., 1898, p. 514; *neglecta*, Alex.;
Jack., *Ibis*, 1901, p. 67.
- 291** — *BINOTATA*, var. *PERSONATA* (Sharpe), *Bull. Ruwenzori.*
B. O. C. XIII, 1902, p. 9.
- 924** (Gen.) *NEOMIXIS*, Sharpe (1881) au lieu de *Eroessa*, Hartl. (1866, nec
Doubled., 1847)
- 548.** *SYLVIELLA GAIKWARI*, Sharpe, *Bull. B. O. C. XI*, Somaliland.
1901, p. 47.
- 925^{bis}** (Gen.) *POLIOLAIS*, Alex. (1905). *Gen. nov.*
- 549.** — *ELEONORE*, Alex., *Bull. B. O. C. XIII*, 1905, p. 56. Fernando Po.
- 292.** *CAMAROPTERA BREVICAUDATA*, var. *CHRYSOCE-*
NEMIS (Licht.), *Nom. Av. Berol.*, p. 55 **5055**,
pt.); Grant, *Ibis*, 1901, p. 648.
- 1035.** Pour M. O. Grant, la var. *TINCTA* (Cass.) serait synonyme de
Chrysocnemis, *l. c.*
- 293.** *CAMAROPTERA CONCOLOR*, var. *GRANTI*, Alex., Fernando Po.
Bull. B. O. C. XIII, 1905, p. 56.
- 5061.** — *dorcadichroa*, Rchw. et Neum. serait synonyme de *CRYPTOLOPHIA*
MACKENZIANA, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 155; 1901, p. 91, pl. 5, f. 1
(**905**, p. 286).
- 550.** *HYLIA POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C. XIII*, 1905, p. 56. Fernando Po.
- 551.** *SUYA WATERSTRADTI*, Hart., *Nov. Zool. IX*, p. 568. Pahang (Malacca E.)
- 552.** *BURNESIA BRUNNEICEPS*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, Rupira (Nyassa).
1900, p. 122.
- 553.** *SCOTOCERCA INQUIETA*, var. *BURYI*, Grant, *Bull. B. Arabie S.*
O. C. XIII, p. 22.
- 554.** *CALAMANTHUS RUBIGINOSUS*, Campb., *Victorian Na-* Australie N.-W.
tural. XVI, p. 5.
- 555.** *CISTICOLA LAVENDULÆ*, Grant et Reid, *Ibis*, 1901, p. 650. Somaliland.
- 556.** — *ARIDULA*, Witherby, *Bull. B. O. C. XI*, p. 15; Soudan.
Rothsch. et Woll., *Ibis*, 1902, p. 16, pl. 1.
- 294.** — *NUCHALIS*, var. *AMBIGUA*, Sharpe, *Bull. B. Mau (Afrique E. an-*
O. C. XI, p. 28. glaise).

557. CISTICOLA PRINIODES, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 504. Mau (Afrique E.)
558. — NEUMANNI, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 15; Kenya.
procera, Jacks. (nec Pet.)
559. ACANTHIZA TENUIBOSTRIS, Zietz, *Tr. R. Soc. S. Austr.* Victoria (Australie).
XXIV, p. 112.
560. — MARSTERSI, North, *Agr. Gaz. N. S. W.* XII, Australie W.
p. 1425.
561. ? SERICORNIS SALVADORII, Rehw., *Orn. Monatsb.*, Nouv.-Guinée S.-E.
1901, p. 4 = ? *Crateroscelis rufobrunnea*, Roth.
et Hart.
295. MALURUS CYANEUS, var. ELIZABETHLE, Campb., Tasmanie.
Ibis, 1901, p. 10.
562. — ASSIMILIS, North, *Victorian Natural.* XVIII, p. 29. Australie.
565. — EDOUARDI, Camb., *Vict. Nat.* XVII, p. 255. Australie N.-W.
564. ACROCEPHALUS CELEBENSIS, Heinr., *J. f. O.*, 1905, Makassar (Célèbes).
p. 125.
565. — INEXPECTATUS, Berez. et Bianchi, *Ann. Mus.* Chine W.
St. Pétersb. V, p. 210.
566. — VAUGHANI (Sh.); *Tatare vauhani*, Sharpe, *Bull.* Ile Pitcairn (Pacifi-
B. O. C. XI, p. 2. que).
5244. — *concinens* (Swinh), *P. Z. S.*, 1870, p. 452 = A. AGRICOLA (Jerd.)
567. LUSCINIOLA BREVIPENNIS (Verr.), *Nouv. Arch. Mus.*, Chine centr. et E.
1871, *Bull.* VII, p. 65; Dav. et Oust, *Ois.*
Chine, p. 245; La Tonche, *Ibis*, 1900, p. 51.
568. — BIANCHI (Sharpe), *Zool. Rec.*, 1900, *Aves*, p. 54; Chine W.
davidi, Ber. et Bianchi, *Ann. Mus. St. Pé.* V,
p. 211 (nec Swinh).
5265. — ABYSSINICA, Weld-Bl. et Lovat. (nec Grant, err.)
569. CETTIA BIVITTATA, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, Timor.
p. 209.
296. SYLVIA HORTENSIS, var. CLARE, Kleinschm., Tunisie.
Orn. Monatsb., 1901, p. 167.
297. — CONSPICILLATA *bella*, Tschusi, *Orn. Mo-* Madeire, etc.
natsb., 1901, p. 150 = CONSPICILLATA; Hart.,
Nov. Zool. VIII, p. 518 (note).
1071. — ATRICAPILLA *obscura*, Tschusi, *l. c.*, p. 129 = var. HEINEKENI (Jard.)
5313. — — *gularis*, Alex., *Ibis*, 1899, pp. 81, 279 = Iles du Cap Vert.
ATRICAPILLA (aberr.)
5317. *Melizophilus blanfordi* (Seeb.) est un PARISOMA (voy. p. 1081 du supplé-
ment).
298. MELIZOPHILUS MELANOCEPHALUS, var. LEUCO- Iles Canaries.
GASTRA (Ledru), *Voy. Ténér.*, etc. I p. 182;
Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 518.
570. — ROTHSCHILD, Madar., *Termes. Fuzetek*, XXIV, Palestine.
p. 551.

299. ACANTHOPNEUSTE EVERETTI, *var.* WATERSTRADTI (Hartl.), *Nov. Zool.* X, 1905, p. 9 (1). Batjan et Obi Major.
500. PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX, *var.* FLAVESCENS, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 254, pl. 5, f. 1. Tunisie, Maroc.
5347. — RUFUS, *var.* CANARIENSIS (Hartw.), *J. f. O.*, 1886, p. 486; *fortunatus*, Tristr. (1889). Iles Canaries.
1076. REGULUS SATRAPA, *var.* OLIVACEA, Baird au lieu de *olivascens*, Bd.
571. — OBSCURUS, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. and Geog. Surv. Terr.* II, n° 2, 1876, p. 184. Ile Guadalupe (Basse-Californie).
501. POLIOPTILA CÆRULEA, *var.* OBSCURA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 555. Arizona, Calif., Basse-Calif., Mexique W.
502. — — *var.* MEXICANA, Bp. (5372, pt.); Nels., *Auk*, 1898, p. 160. Mexique S., ? Yucatan.
505. — DUMICOLA, *var.* BERLEPSCHI, Hellm., *Nov. Zool.* VIII, p. 556; *dumicola*, Pelz. (nec V.); *boliviana*, auct. plur. (nec Schl.) Matto-Grosso.
572. — PLUMBICEPS, Lawt., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1865, p. 57; Rob. et Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 681. Vénézuéla.
5379. — NIGRICEPS, *var.* SCLATERI, Sharpe. Sta-Marta (Colombie), Vénézuéla N.-W.
504. — — *var.* ANTEOCULARIS, Hellm., *Nov. Zool.* VII, p. 558. Colombie (Bogota).
505. — — *var.* MAJOR, Hellm., *l. c.* Pérou.
5378. — — *var.* PARVIROSTRIS, Sharpe. Haut-Amazone.
506. — BUFFONI, *var.* INNOTATA, Hellm., *Nov. Zool.* VIII, p. 559. Brésil N., Guyane anglaise.
5397. ACCENTOR COLLARIS *reiseri*, Tschusi, *Orn. Mon.*, 1901, p. 151 = COLLARIS.
507. — — *var.* CAUCASICA, Tschusi, *l. c.*, 1902, p. 186. Caucase.
508. ERITHACUS RUBECULA, *var.* MELOPHILA, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 517. Iles Britanniques.
5427. *Tarsiger guttifer*, Rehw. = ORIENTALIS, Fisch. et Rehw. (5426) et rem-placé sous le même n° par :
5427. TARSIGER INTENSUS, Shpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 67. Uganda.
1097. RUTICILLA PHOENICURA, *var.* MESOLEUCA (H. et E.) Asie Min., Arabie E.
509. — — *var.* BONAPARTEI, v. Müll.; (1097, pt.); Abyssinie.
- Nehm., *J. f. O.*, 1902, p. 155.
510. — RUFIVENTRIS, *var.* PLESKEI, Schal., *J. f. O.*, 1901, p. 454; *rufiventris*, pt., auct. plur. (nec V.) Chine.
511. SIALIA SIALIS, *var.* BERMUDENSIS, Verrill, *Am. J. Sc.* XII, p. 65. Iles Bermudes.

(1) M. E. Hartert place aujourd'hui l'*A. everetti* et sa variété dans le genre *Cryptolopha* (*Nov. Zool.* X, p. 9, note).

512. *SIALIA MEXICANA*, var. BAIRDI, Ridgw., *Auk*, Montagnes Rocheuses
1894, pp. 151, 157. du Mexique.
515. — — var. ANABELÆ, Anth., *Pr. Cal. Ac. Sc.* Basse-Californie.
1889, p. 79; Ridgw., *Auk*, 1894, p. 159.
514. *PRATINCOLA RURETRA*, var. SPATZI, Erl., *J. f.* Tunisie.
O., 1900, p. 101.
- 986 (Gen.) *Diplootocus*, Hart., *Nov. Zool.* IX, 1902, p. 524 = PINAROCHROA.
5478. *Saxicola somalica*, Sharpe = *S. VITTATA* (H. et E.), juv. (5497); Grant,
Ibis, 1901, p. 658.
1109. — *oreophila*, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, p. 221 = MONTANA, Gd.
515. *SAXICOLA GALTONI*, var. LÜBBERTI, Rehw., *Orn.* Damaraland,
Monatsb., 1902, p. 77.
575. — SEMENOWI, Bianchi et Zar., *Ann. Mus. St. Pétersb.* Perse E.
V, 1900, p. 187.
516. — OENANTHE, var. LEUCORHOA, Gm.; Stejn., Groenland, Europe W.,
Auk, 1901, p. 186; (5495, pt.) Afrique.
517. — *pileata albinotata*, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 515 = PILEATA;
Jacks., *Ibis*, 1901, p. 77.
1113. — — var. *Livingstonii*, Tristr. = PILEATA (Gm.); Jacks., *l. c.*
574. *THAMNOLEA CORONATA*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, Togoland.
p. 157.
5536. *CATHARUS FUSCATER* (Lafr.), à rectifier l'habitat : Colombie.
1119. — — var. BERLEPSCHI, Ridgw. Ecuador W., Pérou N.
et centr.
5537. — — var. MENTALIS, Sel. et Salv. Bolivie.
518. — — var. HELLMAYERI, Berl., *Orn. Mo-* Véragua, Costa-Rica.
natsb., 1902, p. 69; *fuscater*, pt., auct. plur.
(nec Lafr.)
519. — MELPOMENE, var. COSTARICENSIS, Hellm., Costa-Rica.
J. f. O., 1902, p. 45; 5541, pt. (suppri-
mez : Costa-Rica.)
1121. — — var. CLARA (Gouy). Mexique W.
5551. *MERULA NIGRA*, Leach.; rectifiez l'habitat : Europe.
520. — — var. CABRERÆ (Hart.), *Nov. Zool.* VIII, Canaries, ? Madeire.
p. 515.
521. — — var. MAURITANICA (Hart.), *l. c.* X, p. 525. Afrique N. et N.-W.
522. — — var. SYRIACA (Hemp. et Ehr.), *Symb.* Syrie, Palestine.
Phys.; Hart., *l. c.* IX, p. 524.
525. — FUSCATA, var. AMOENA (Hellm.), *J. f. O.*, Mendoza.
1902, p. 68.
524. — GIGAS, var. PALLIDIVENTRIS, Berl., *Orn.* Vénézuéla (Andes).
Monatsb., 1902, p. 71.
1136. — FLAVIPES, var. *Polionota* (Sharpe) = var. Vénézuéla, Guyane
VENEZUELENSIS (1135). anglaise, Trinidad.
1137. — — var. *Melanopleura*, Sharpe = var. VENEZUELENSIS, Sharpe;
(1135); Hellm., *J. f. O.*, 1902, p. 67.

525. *TURDUS ILIACUS*, var. *CORURNI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 28. Islande.
526. — *OLIVACEOFUSCUS*, var. *XANTHORHYNCHA*, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, XVI, n° 414, 1901, p. 2. Ile Principe.
527. — — var. *POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 57. Fernando Po.
528. — *MIGRATORIUS*, var. *ACHRUSTERA*, Batch., *Pr. N. Engl. Zool. Club*, I, p. 107; Allen, *Auk*, 1901, p. 178. Caroline, Géorgie.
5643. — *GRAYI*, Bp. a pour habitat : Amérique centr.
1156. — — var. *TAMAULIPENSIS*, Nels. Mex.E., Yucatan, Cozumel, Muges, Meco.
529. — — var. *LURIDA*, Bp., *C. R.*, 1854, p. 4; (5643, pt.) *incompta*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* V, 1898, p. 144. Colombie N.-E.
530. — *ALBIVENTER*, var. *FUSCA*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 107. Colombie N.-E.
531. — *OBOLETUS*, var. *COLUMBIANA*, Hart. et Hellm., *Nov. Zool.* VIII, p. 492. Colombie W.
532. — *PLEBEIUS*, var. *DIFFERENS* (Nels.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 175. Chiapas S. (Mexique.)
533. — *GYMNOPHTHALMUS*, var. *CARRIRÆA*, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 267 (5651, pt.)
534. — *TRISTIS*, var. *ASSIMILIS*, Cab.; (5654, pt.) Xalapa (Mexique).
535. — *MACULIROSTRIS*, var. *AMAUROCHALINA*, Cab., *Mus. Hein.* V, p. 5; (5650, pt.); *leucomelas*, pt., auct. plur.; *crotopezus*, Burm. (nec Licht.); *albicollis*, Enl. (nec V.); *rufiventris* et *chochi*, D'Orb.; *albiventris*, pt., auct. plur. (nec Spix); Hellm., *J. f. O.*, 1902, p. 58. Bolivie, Brésil S. et centr., Paraguay, Uruguay, Argentine.
536. — *IGNOBILIS*, var. *GOODFELLOWI*, Hart. et Hellm., *Nov. Zool.* VIII, p. 492. Vallée du Cauca (Colombie).
537. — — var. *DEBILIS*, Hellm., *J. f. O.*, 1902, p. 56 (1). Ecuador E., Pérou, Rio Madeira.
538. — *CROTOPEZUS*, var. *CONTEMPTA*, Hellm., *l. c.*, p. 61; *crotopezus*, pt., auct. plur. (nec Licht.) Bolivie, Pérou.
1161. — *PILEOPYGUS*, var. *PILEOPYGOIDES* a pour habitat : Trinidad, Tobago.
539. — *MINOR*, var. *FULIGINOSA* (Howe), *Auk*, 1900, p. 271. Terre-Neuve.
540. — *SWAINSONI*, var. *ALME*, Oberh., *Auk*, 1898, p. 504. M^{nes} Roch. des États-Unis, en hiver Mex.

(1) M. C. E. Ellmayr admet trois espèces distinctes : 1° *leucomelas*; 2° *ignobilis* avec ses var. *Goodfellowi*, *debilis* et *murina*; 3° *maculirostris* et sa var. *Amaurochalina* (*J. f. O.*, 1902, pp. 53, 60). Il y a donc lieu de rectifier dans ce sens les n°s 1157 et 1158 (p. 401).

541. *TURDUS SWAINSONI* var. *OEDECA*, Oberh., *Auk*, Californie, Orégon, 1899, p. 25. Arizona, Mexique.
542. — *AONALASCHKE*, var. *SLEVINI*, Grinn., *Auk*, Californie. 1901, p. 258.
5661. — *verecunda*, Osg., *Auk*, 1901, p. 185 = *T. AONALASCHKE*.
545. *OREOCINCLA MALAYANA*, var. *AFFINIS*, Richm., Bas-Siam. *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 158.
- 1002 (Gen.) *Ixoreus*, Bp. (1854) = *Hesperocichla*, Bd. = *GEOCICHLA*, Kuhl.
544. *GEOCICHLA GUTTATA*, var. *FISCHERI* (Hellm.), Afrique E. *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 54.
545. — *GURNEVI*, var. *KILIMENSIS*, Neum., *J. f. O.*, Kilima Ndjaro. 1901, p. 310.
1172. — *peronii*, var. *Audacis*, Hart. = *PERONI*; Timor, Flores, Wetter, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 265. Babber, Dammer.
575. — *FRONTALIS*, Madar., *Termész. Füzetek*, XXII, Célèbes. 1899, p. 111, pl. 8.
576. — *DUMASI*, Rothsch., *Ibis*, 1899, p. 509. Ile Bourou.
546. — *NEVIA*, var. *MERULOIDES* (Sw.), *Faun. Bor.-* Alaska N., en hiver *Am.*, p. 187; Grinn., *Auk*, 1901, p. 145; Californie. (5698, pt.)
547. *MYIADECTES OBSCURUS*, var. *OCCIDENTALIS*, S.-W. du Mexique et Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, p. 572. du Guatémala.
548. — — var. *INSULARIS*, Stejn., *l. c.*, p. 575. Iles Tres Marias.
5719. — *CORACINUS*, Berl.; Goodf., *Ibis*, 1901, p. 311, pl. 8. Colombie, Ecuador.
577. *CALLENE CYORNITHOPSIS*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, Caméron. p. 4; id., *Ibis*, 1902, p. 95, pl. 4, f. 1.
549. — — var. *ROBERTI*, Alex., *Bull. B. O. C.* Fernando Po. XIII, 1905, p. 57.
578. — *POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 57. Fernando Po.
1184. *Cossypha caffra mawensis*, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 509 = var. *IOLEMA*, Richw.; Jack., *Ibis*, 1901, p. 71.
550. — *ALBICAPILLA*, var. *OMOENSIS*, Sharpe, *Bull.* Omo (Afrique équat.) *B. O. C.* XI, p. 28.
579. *ALETHE POLIOPHRYS*, Sharpe, *l. c.* XIII, 1905, p. 10. Ruwenzori.
551. — *POLIOCEPHALA*, var. *ALEXANDRI*, Sharpe, *l. c.* Caméron. XII, 1901, p. 4.
580. — *MOORI*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 57. Fernando Po.
552. *CICHLADUSA GUTTATA*, var. *RUFIPENNIS*, Sharpe, Afrique E. (côtes). *l. c.* XII, 1901, p. 55.
581. — *ARCHERI* (Sharpe), *l. c.* XIII, 1902, p. 9. Ruwenzori.
582. *ERYTHROPVGIA UKAMRENSIS*, Sharpe, *l. c.* XI, p. 28. Ukambani (Afrique E. anglaise).
585. — *GRISEISTRIATA* (Sharpe), *l. c.* XIII, p. 8. Ruwenzori.
5799. *CITTOCINCLA MACRURUS* (Gm.) et ses var. à rectifier Indo-Chine S., Ma- l'habitat : lacca, Sumatra.
555. — — var. *TRICOLOR* (Vieill.), *N. Dict.* XX, Inde, Ceylan, Birmanie. p. 291 (5799, pt.)

1197. *CITTOCINCLA MACRURUS*, *var. SUAVIS*, Scl. Bornéo.
 554. — — *var. OMISSA*, Hart., *Nov. Zool.* IX, Java.
 p. 572.
 555. — — *var. MINOR*, Swinh. (5799, pt.) Haïnan.
 556. *GALEOSOPTES CAROLINENSIS*, *var. BERMU-* Bermuda.
DIANA, Bangs et Brad., *Auk*, 1901, p. 255.
 557. *MIMUS GILVUS*, *var. MELANOPTERA*, Lawt., *Ann.* Rio Négro, Colombie,
Lyc. N. Y. V, p. 55, pl. 2; *columbianus*, Trinidad.
Cab. (5831, pt.)
 558. — — *var. GRACILIS*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 85. Guatémala, Honduras.
 559. — — *var. TOBAGENSIS*, Dalm., *Mém. Soc.* Tobago.
Zool. de France, 1900, p. 154.
 560. *NESOMIMUS MELANOTIS*, *var. DIERYTHRA*, Hell., Indéfaticable et Sey-
 et Snodg., *Condor*, III, p. 74. mour (Galapagos).
 561. *HARPORHYNCHUS CURVIROSTRIS*, *var. MACULATA*, Mexique.
 Nels., *Auk*, 1900, p. 269.
 562. *RHODINOCICHLA ROSEA*, *var. EXIMIA*, Ridgw., De Panama au Costa-
Bull. 50, *U. S. Nat. Mus.* 1902, p. 770. Rica.
 563. *CINCLUS AQUATICUS*, *var. OLYMPICA*, Madar., Chypre.
Orn. Monatsb., 1903, p. 6.
 564. *CAMPYLORHYNCHUS ZONATUS*, *var. RESTRICTA*, Tabasco (Mexique).
 Nels., *Auk*, 1901, p. 49.
 5879. — *BRUNNEICAPILLUS*, *var. COUESI*, Sharpe. Texas, Mexique.
 565. — — *var. AFFINIS*; Xant. (5881, pt.) Basse-Californie S.
 1235. — — *var. BRYANTI* (Anth.) Calif. S., B^{se}-Calif. N.
 566. — — *var. ANTHONI*, Mearns, *Auk*, 1902, Ét.-Unis S.-W., Mexi-
 p. 145. que N., B^{se}-Calif. N.
 567. *ODONTORHYNCHUS BRANICKII*, *var. MINOR*, Hart., Ecuador N.
Bull. B. O. C. XI, p. 40.
 568. *THRYOPHILUS LEUCOTIS*, *var. TENIOPTERA*, Bas-Amazone.
 Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 518.
 584. — *ALRIPECTUS* (Cab.), in *Schomb. Reis. Guian.* III, Guyane, Orénoque.
 p. 675.
 569. — — *var. HYPOLEUCA*, Berl. et Hart., *Bull.* Orénoque centr.
B. O. C. XII, p. 12; id., *Nov. Zool.* IX, p. 6.
 570. — — *var. BOGOTENSIS*, Hellm., *Ver. Zool.-* Bogota.
Bot. Gesel. Wien, 1901, p. 774.
 571. *THRYOTHORES FELIX*, *var. GRANDIS*, Nels., *Auk*, Puebla, Morelos, Guer-
 1900, p. 269. rero.
 572. — *AMAZONICUS*, *var. CAURENSIS*, Berl. et Hart., Caura (Orénoque).
Nov. Zool. IX, p. 7.
 573. — *EUOPHRYS*, *var. GOODFELLOWI*, Sclat., *Bull.* Ecuador W.
B. O. C. IX, p. 47.
 574. *CISTOTHORUS PALUSTRIS*, *var. DISSAËPTA*, Bangs, États-Unis E., Canada.
Auk, 1902, p. 552.
 575. — *POLYGLOTTUS*, *var. ELEGANS*, Scl. (5939, pt.). Amérique centr.

- 1277.** *TROGLODYTES DOMESTICUS*, var. *MARIANÆ*, Scott. = var. *AZTECA* (1278).
585. — *PENINSULARIS*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, Yucatan N.
p. 174.
576. — *MUSCULUS*, var. *CLARA*, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 8. Guyane anglaise, Orénoque.
577. — *SOLSTITIALIS*, var. *MACROURA*, Berl. et Pérou centr.
Stolz., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 55.
- 1052** (Gen.) *Olbiorchilus*, Oberh., *Auk*, 1902, p. 177 = *ANORTHURA*.
- 5963.** *Anorthura bergensis*, Stejn., *Zeit. ges. Orn.*, 1884, p. 9 = *TROGLODYTES*.
578. *ANORTHURA TROGLODYTES*, var. *CYPRIOTES*, Bate, Chypre.
Bull. B. O. C. XIII, 1905, p. 51.
579. — *HIEMALIS*, var. *HELLERI*, Osg., *Auk*, 1901, Ile Kadiak (Alaska).
p. 181.
- 5965.** — *FUMIGATA* (Tem.), à rectifier pour les var. et hab.: Japon.
- 1301.** — — var. *KURILENSIS*, Stejn. Iles Kouriles et Japon.
- 1297.** — — var. *DAURICA*, Dyb. et Tacz. Sib.E., Mong., Chine N.
- 5966.** — — var. *NIPALENSIS* (Blyth). Himalaya, Chine.
580. — — var. *TALIFUENSIS*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 11. Tali-fu (Yunnan).
- 5967.** — — var. *NEGLECTA* (Brooks). Du Cachemire à Gilgit.
- 1295.** — *PALLESCENS*, Ridgw. est une espèce distincte, d'après Oberh.,
Auk, 1902, p. 178, de même que les deux suivantes :
- 1299.** — *MELIGERA*, Oberh.
- 1298.** — *ALASCENSIS* (Baird).
581. *CATHERPES MEXICANUS*, var. *POLIOPTILA*, Oberh., Ét.-Unis S.-W., Mex.
Auk, 1905, p. 197. N.-W., Basse-Calif.
582. — — var. *PUNCTULATA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 545. Californie.
586. *MICROCERCULUS CAURENSIS*, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 5. Caura (Orénoque).
587. — *PECTORALIS*, Rob. et Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 178. Vénézuéla.
- 1061^{bis} (Gen.) *CATHAROEPEZA*, ScL (1880). *Gen. nov.*
- 6003.** — *BISHOPI* (Lawr.); ScL, *Ibis*, 1880, pp. 40, 75, pl. 1. Ile Saint-Vincent.
585. *HELMINTHOPHAGA RUFICAPILLA*, var. *GUTTURALIS*, Ridgw. in Bd., Br. et Ridgw., *H. N. Am. B.* I, p. 191. États-Unis W.
- 1314.** — *CELATA*, var. *Obscura*, Ridgw. = *H. CELATA*.
- 6021.** *PARULA AMERICANA* (L.). — Pour habitat : États-Unis E.
584. — — *RAMALINÆ*, Ridgw., *B. N. and Middle Amer.* II, p. 486 (1902); *americana*, pt. auct. États-Unis S., Mexique, Guatémala.
585. — *PITIAYUMI*, var. *SPECIOSA* (Ridgw.), *Auk*, 1902, p. 69. Nicaragua à Chiriqui.
- 6026.** *DENDROECA ÆSTIVA*, var. *DUGESI*, Coale.
- 6027.** — *RUFICAPILLA* (Gm.) Guadeloupe, Dominica.

586. *DENDROECA RUFICAPILLA*, var. *RUFIVERTEX*, Ile Cozumel (Yucatan).
Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1885, p. 21
(6028, pt.)
1330. — — var. *FLAVIDA*, Cory.
6031. — — var. *RUFOPILEATA*, Ridgw.
6030. — — var. *CAPITALIS*, Lawf.
587. — *PETECHIA*, var. *BARTHOLEMICA*, Sundev., Porto-Rico et petites
Ofv. K. Vet.-Ak. Stockh., 1870, p. 607; Antilles.
cruciana, Sund. (6027, pt.)
6033. — *ERITHACHORIDES*, Baird (1858) a priorité sur *vieilloti*, Cass. (1860).
588. — — var. *CASTANEICEPS*, Ridgw., *Pr. U. S.* Mexique W., Améri-
Nat. Mus., 1885, p. 550. que centr. W.
6044. — *GRACIÆ*, var. *DECORA*, Ridgw. Mex.S., Guat., Hondur.
1336. — *coronota*, var. *Hooveri*, Mc Greg. = *CORONOTA* (L.)
6051. — *AUDUBONI*, var. *NIGRIFRONS*, Brewst. Arizona, Mexique N.
6052. — — var. *GOLDMANI*, Nels. Guatémala.
589. — *PINUS*, var. *ACHRUSTERA*, Bangs, *Auk*, 1900, Nouvelle-Providence
p. 292; *bahamensis*, Mayn. (nec Cory). (Bahama).
590. — — var. *ABACOENSIS*, Ridgw., *Auk*, 1902, Abaco (Bahama).
p. 69.
1340. *PEUCEDRAMUS OLIVACEUS*, var. *AURANTIACA*, Ridgw. = *P. OLIVACEUS*.
- 1070 (Gen.) *Exochocichla*, Van der H. (1852-56) = *IIENICOCICHLA*.
- ✓6068. *IIENICOCICHLA NÆVIA* (Bodd.); *noveboracensis* (Gm.); Amér. N.-E., Antilles,
a pour habitat : Amer. centr. et
N. de l'Amér. mér.
591. — — var. *NOTABILIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat.* Amér. N.-W., Amér.
Mus., 1880, p. 12. centr. et Colombie.
- 1071 (Gen.) *OPORORNIS*. — Ajoutez aux deux espèces de ce genre :
6087. — *MACGILLIVRAYI* (Aud.); *tolmiei*, Towns.
6088. — *PHILADELPHIA* (Wils.); *agilis*, Wools. (nec Wils).
- 1072 (Gen.) *MICROLIGEA*, Cory (1884) au lieu de *Ligea*, Cory (1884, nec Dyb.,
1876); *Ligia*, Sharpe (1885, nec Fabr., 1798).
6072. *GEOTHLYPIS TRICHAS* (L.); ajoutez à l'habitat : Canada, Terre-Neuve,
Labrad. et îles vois.
592. — — var. *MODESTA*, Nels., *Auk*, 1900, p. 269. Mexique W. et centr.
595. — — var. *SINUOSA*, Grinn., *Condor*, 1901, Baie San-Francisco
p. 65. (Californie).
6074. — — var. *MELANOPS*, Bd.
594. — — var. *Scirpicola*, Grinn., *Cond.*, 1901, p. 65 = var. *ARIZELA*,
Oberh.
595. — *ROSTRATA*, var. *MAVNARDI*, Bangs, *Auk*, Nouvelle-Providence
1900, p. 290. (Bahama).
596. — — var. *INCOMPTA*, Ridgw., *Birds N. and* Abaco (Bahama).
Midd. Am. II, p. 677.
597. — — var. *EXIGUA*, Ridgw., *l. c.*, p. 677. Andros (Bahama).
598. — — var. *FLAVIDA*, Ridgw., *l. c.*, p. 678. Nouv.-Provid. (Bah.)

599. *GEOTHLYPIS SEMIFLAVA*, var. BAIRDI, Nutt., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 598; (6079, pt.) Honduras, Nicaragua E., Costa-Rica.
6080. — NELSONI, Richm., *Auk*, 1900, p. 197; *cucullata*, Salv. et God. (nec Lath.) Mexique.
400. — — var. *MICRORHYNCHA*, Ridgw., *Birds N. and midd. Am.* II, p. 685. Mexique S.-E.
401. — *POLIOCEPHALA*, var. *PALPERRALIS*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 526. Mexique S.-E.
1348. — — var. *Icterotis*, Ridgw. = var. *CANINUCHA*, Ridgw. Du Guatémala à Chiriqui.
- 1073 (Gen.) *Chamaethlypis*, Ridgw. (1887) = *GEOTHLYPIS*.
402. *BASILEUTERUS CULICIVORUS*, var. BRASHERI, Gir. (6101, pt.) Mexique N.
405. — — var. *FLAVESCENS*, Ridgw., *Birds N. and midd. Am.* II, p. 755. Mexique S.-W.
6109. — *conspicillatus*, Salv. et Godm. = *CINEREICOLLIS*, Scl. (6100); Allen, *Bull. Am. Mus.* XIII, p. 175.
6116. — BELLI (Gir.), a pour habitat le S.-E. du Mexique.
404. — — var. *SCITULA*, Nels., *Auk*, 1900, p. 268. Chiapas et Guatémala (Montagnes).
405. — var. *CLARA*, Ridgw., *Birds N. and midd. Am.* II, p. 745. Mexique S.-W.
406. — *LEUCOLEPHARUS*, var. *CALA*, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 188. Paraguay.
588. ?*MYIODICTES MICROCEPHALUS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 554; *minuta*, Wils. (nec Gm.), *Am. Orn.* VI, p. 62, pl. 50, f. 5; *pumilia*, Nutt. (nec Vieill.) Pennsylvanie, New-Jersey, Kentucky.
407. — *PUSILLUS*, var. *CHRYSEOLA*, Ridgw., *Birds N. and midd. Am.* II, p. 714. Colombie anglaise, États-Unis W.
589. *MOTACHILA SUBPERSONATA*, Mead-Waldo, *Bull. B. O. C.* XII, p. 27. Maroc.
408. — *BOARULA*, var. *SCHMITZI*, Tochusi, *Orn. Jahrb.* XI, p. 225. Ile Madeire.
409. — — var. *CANARIENSIS*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 522. Iles Canaries.
6184. *ANTHUS INFUSCATUS* (Bl.). — Supprimez la syn. *Kiangsinensis*, Dav. et Oust. qui se rapporte au 6209.
410. — *RUFULUS*, var. *CAMAROONENSIS*, Shell., *B. Afr.* II, p. 520. Caméron (Montagn.)
6235. *Otocorys transcaspica*, Flör. et *iranica*, Zarud. et Härms = *O. PENICILLATA*.
1401. *OTOCORYS PENICILLATA*, var. *OREODRAMA*, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 876; *pallida*, Sharpe (pt., nec Dwight.); *diluta*, Sharpe (pt.) Pamir, Ferghana, Turkestan W.
411. — — var. *DILUTA*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XIII, p. 670; Oberh., *l. c.*, p. 877. Turkestan E.

412. *OTOCORYS LONGIROSTRIS*, var. *ELWESI* (Blanf.), Thibet, Sikkim.
J. As. Soc. Beng., 1872, p. 62; *nigrifrons* et
teleschowi, Prejw. (1403, pt.)
415. — — var. *PERISSA*, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 869. Ladak (Asie centr.)
414. — — var. *ARGALEA*, Oberh., *l. c.*, p. 874. S.-W. du Turkest. or.
415. — *ALPESTRIS*, var. *ARCTICOLA*, Oberh., *l. c.*, De l'Alaska aux États-
p. 816; *leucolama*, Hensh. (nec Coues). Unis W.
416. — — var. *ENTHYMIA*, Oberh., *l. c.*, p. 817. Amérique anglaise, en
hiver États-Unis.
1409. — — var. *Arenicola*, Hensh. = var. *LEUCOLEMA* (1405). États-Unis W.
417. — — var. *DIAPHORA*, Oberh., *l. c.*, p. 829. Miquilhuana, Tamaulipas (Mexique).
418. — — var. *MERRILLI*, Dwight, *Auk*, 1890, Colombie anglaise S.,
p. 155; (1415, pt.) États-Unis W.
419. — — var. *INSULARIS*, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 140. Ile San Clemente (Californie).
1412. — — var. *CHRYSOLEMA* (Wagl.); *minor*, Gir. Mexique.
(1407, pt.)
420. — — var. *ACTIA*, Oberh., *l. c.*, p. 845; Californie, N. de la
rufa, Audub. (nec Gm.); *rubeus*, Hensh. (pt.); Basse-Californie.
pallida, Dw. (pt.)
421. — — var. *AMPHIPHILA*, Oberh., *l. c.*, p. 849. Calif. S. E., Mex. N.-W.
422. — — var. *OCCIDENTALIS*, Mc Call, *Pr. Ac. N. Sc. Phil.*, 1851, p. 218. Nouv.-Mex., Arizona,
Texas, Mex. N.-E.
1411. — — var. *ADUSTA*, Dw. Arizona S., Mex. N.
425. — — var. *APHRASTA*, Oberh., *l. c.*, p. 860. Arizona S.-E., Nouv.-
Mexique, Sonora.
424. — — var. *LEUCANSIPTILA*, Oberh., *l. c.*, Calif. S., Ariz. S.-W.,
p. 864. Basse-Californie.
425. *CALANDRELLA PISPOLETTA*, var. *RUFESCENS* (Vicill.), *Tabl. Encyc. et Méth.* I, p. 522; Hart.,
Nov. Zool. VIII, p. 525; *tigrina*, M. S., *Mus. Paris*; Puch., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854,
p. 64; *brachyductyla* (err.), auct. plur.;
canariensis, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, p. 64. Iles Canaries.
- 1098^{bis} (Gen.) *AETHOCORYS*, Sharpe (*gen. nov.*), *Bull. B. O. C.* XII, p. 62 (1902).
6254. — *PERSONATA* (Sharpe).
6271. *Mirafra marginata*, Hawk. = *M. CANTILLANS*, Blyth (6288).
590. *MIRAFRA WOODWARDI*, Millig., *Victorian Natural.* Australie W.
XVIII, p. 25.
- 1102 (Gen.) *Corydus*, Dress. (1900) = *GALERIDA*, Boie.
426. *GALERIDA CRISTATA*, var. *CYRENAICA*, Whitak., Tripoli.
Bull. B. O. C. XIII, 1905, p. 17.

427. *GALERIDA ARBOREA*, var. *PALLIDA* (Zarud.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 54. Transcaspie.
428. *AMMOMANES CINCTURA*, var. *ASSABENSIS*, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1902, n° 423, p. 2. Assab.
429. — — var. *ZARUDNYI*, Harl., *Bull. B. O. C.* XII, p. 45. Perse E.
591. — *HETERURA*, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 91 (= *zarudnyi*?). Perse E.
- 6306^{bis}. *Pyrrhulauda harrisoni*, Grt. = *SIGNATA*, Oust. (6309), qui est bien une espèce distincte.
592. *PYRRHULAUDA OTOLEUCA* (Tem.), *Pl. Col.* 269, f. 25; Sennaar.
Grant, *Bull. B. O. C.* XII, p. 14; *melanoccephala*, Licht.; (6308, pt.)
6308. — *LEUCOTIS* (Stanl.) a pour hab. : Afrique N.-E.
450. — — var. *MADARASZI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 78. Afrique E.
- 1107 (Gen.) *Penthornis*, Hellm. (1901) = *MELANOPARUS*.
- 1108 (Gen.) *Sittiparus*, *Periparus*, de Selys (1884) et *Proparoides*!, Bianchi (1902) = *PARUS*.
451. *PARUS MAJOR*, var. *CORSA*, Kleinschm., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 6. Corse.
452. — — var. *EXELSA*, Bfm.; Buvry, *J. f. O.*, 1856, p. 197. Afrique N., Espagne, Grèce.
453. — — var. *BLANFORDI*, Praz., *Orn. Jahrb.*, 1894, p. 240; *newtoni*, Praz., *l. c.*, p. 259. Perse, Palestine.
454. — — var. *APHRODITA*, Madar., *Thermes. Fuzetek*, XXIV, p. 272. Chypre.
455. — *AFER*, var. *DAMARENSIS*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 77. Damara.
595. — *MOLTCHANOWI*, Menzb., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 49. Monts Yaïla (Taurus).
594. — *ATLAS*, Meade-Waldo, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 27; id., *Ibis*, 1905, p. 207, pl. 6. Atlas (Maroc).
6341. — *kleinschmidti*, *tchusii* et *italicus*, Hellm. = *PALUSTRIS*, L.
456. — *PALUSTRIS*, var. *KOREJEWI*, Zarud. et Härms, *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 54. Turkestan.
595. — *NIGRILORIS*, Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 159. Iles Liu-Kiu.
596. — *STEJNEGERI*, Bangs, *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 257 (1). Iles Liu-Kiu.
457. — *LUGUBRIS*, var. *GRÆCA*, Reis., *Orn. Jahrb.* XII, p. 216. Presqu'île des Balcons.
458. — *CINCTUS*, var. *ALASCENSIS*, Praz.; (1498, pt.) Alaska.
459. — *GAMBELI*, var. *THAYERI*, Birlw., *Auk*, 1901, p. 166. Albuquerque (Rio-Grande).

(1) Les *P. nigriloris*, Hellm. et *stejnegeri*, Bangs, ne seraient-ils pas une seule et même espèce?

440. *PARUS RUFESCENS*, *var. NEGLECTA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 485. Californie (côtes).
441. — — *var. BARLOWI*, Grinn., *Condor*, 1900, p. 127; *Auk*, 1981, p. 178. Californie S.-W.
442. — *CERULEUS*, *var. DEGENEREA*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 509; (1511, pt.) Fortaventura et Lanzarote (Canaries).
1511. — — *var. ULTRAMARINA* (Bp.) Maroc, Algérie, Tunis.
1516. — *pallescens*, Hellm. = *var. PLESKEI*, Cab.
445. *LOPHOPHANES RUFOUCHALIS*, *var. POECILOPSIS*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 11. Yun-nan W.
444. — *INORNATUS*, *var. RIDGWAYI*, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 155; *griseus*, Ridgw. (nec Müll.) États-Unis centr.
6372. *PSALTRIPARUS MELANOTIS*, *var. LLOYDI*, Senn. Arizona S., Texas W.
1527. — *var. Helviventris* (Cab.) = *P. MELANOTIS* (6369).
1528. — *var. Santarita*, Ridgw. = *var. LLOYDI*.
1526. — *var. PLUMBEA* (Baird) est une espèce distincte.
597. *ACREDULA PULCHELLA* (Ripp.), *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 11. Siam S.
445. — *CAUDATA*, *var. TAURICA* (Menzb.), *Bull. B. O. C.* XIII, p. 49. Monts Yaïla (Taurus).
446. — *TEPHRONOTA*, *var. SICULA* (Whitak.), *l. c.* XI, 1901, p. 52; *id.*, *Ibis*, 1902, p. 54, pl. 2; (1535, pt.) Sicile.
- 1115 (Gen.) *Aegithospiza*, Hellm. (1901) = *ÆGITHALUS*, Boie.
- 1117 (Gen.) *APHELOCEPHALA*, Oberh. (1899) au lieu de *Xerophila*, Gd. (1840, nec Held., 1857).
- 1119 (Gen.) *Phyllodytes*, Finsch (nec Wagl., 1850) et *Finschia*, Hutton (1905) = *CERTHIPARUS*.
447. *CHAMEA FASCIATA*, *var. INTERMEDIA*, Grinn., *Condor*, 1900, p. 86. Baie de San Francisco.
- 1125^{bis}. *SCÆORHYNCHUS*, Oat. (1889); *Suthora*, pt. (Sharpe, 1885); *Heteromorpha*, pt. (1125).
6411. — *GULARIS* (Gray), a pour habitat : Sikhim, Buthan.
448. — — *var. TRANSFLUVIALIS*, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 548. Cachar, Monts Khasia, ? Karennée.
449. — — *var. FOKIENSIS* (David), *Ann. Sc. Nat.*, 1874, art. n° 9; *id.* et *Onst.*, *Ois. Chine*, p. 206, pl. 61 (6411, pt.) Fokien (Chine).
6412. — *RUFICEPS* (Blyth), a pour habitat : Sikhim, Buthan.
450. — — *var. BAKERI*, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 548. Cachar, Assam jusqu'au Ténassérin.
598. *SUTHORA CRADDOCKI*, Bingham, *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 54. Vallée du Mékong.
451. — *BRUNNEA*, *var. STYANI*, Ripp., *l. c.*, p. 54. Yun-nan.

452. *VIREO CALIDRIS*, var. *BARBADENSIS*, Bd., Br. et Iles Barbades.
Ridgw., *N. Am. B.* I, p. 559; (6429, pt.)
453. — *OLIVACEUS*, var. *AGILIS* (Licht.), *Verz. Doubl.*, Brésil, Santa-Marta
p. 526; Baird, *Rev. Am. B.*, p. 558. (Colombie).
454. — *AMAURONOTUS*, ? var. *STRENUA*, Nels., Auk, Chiapas (Mexique).
1900, p. 268.
455. — *NOVEBORACENSIS*, var. *PERQUISITOR*, Nels., Vera-Cruz N.
l. c., p. 267.
456. — — var. *BERMUDIANA*, Bangs et Brad., Iles Bermudes.
Auk, 1904, p. 252.
457. — — var. *FLAVESCENS*, Ridgw. (1560, pt.) Nassau (Bahama).
1565. — *HUTTONI*, var. *Insularis*, Rh. = var. *OBSCURA* (1564).
6459. *HYLOPHILUS THORACICUS*, Tem., a pour habitat : Matto Grosso, Amaz.
458. — — var. *GRISEIVENTRIS*, Berl. et Hart., Vénézuéla, Guyane
Nov. Zool. IX, p. 11. anglaise, Colombie.
1568. — *PECTORALIS*, Sel., est espèce distincte et a Matto Grosso, Amaz.,
pour habitat : Guyane anglaise.
599. — *BULUNENSIS*, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 617. Ecuador N.-W.
400. — *BRUNNEUS*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* XIII, Sta-Marta (Colombie).
p. 171.
459. — *FLAVIPES*, var. *ACUTICAUDA*, Lawr., *Pr. Ac.* Vénézuéla.
N. Sc. Philad., 1865, p. 57; (6468, pt.)
401. *VIREOLANIUS BOLIVIANUS*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 82. Bolivie N.-E.
402. *CYCLORHISCOIBE*, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 55. Ile Coiba (Panama).
460. *PACHYCEPHALA MELANURA*, var. *DAHLI*, Richw., Archipel Bismarck.
Orn. Monatsb., 1897, p. 178; (6498, pt.)
6543. — *RUFINUCHA*, var. *GAMBLEI*, Rothsch.
405. — *MOROKÆ*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* X, Moroka (Nouv.-Guinée
1905, p. 107. anglaise).
6547. — *HYPERYTHRA*, var. *SALVADORII*, Rothsch.
404. — *JOHNI*, Hart., *Nov. Zool.* X, 1905, p. 12. Ile Obi Major.
461. — *LEUCOGASTRA*, var. *TIANDUANA*, Hart., *Bull.* Tiandu (iles Key).
B. O. C. XI, p. 55.
6573. — — var. *ARCTITORQUIS*, Sel.
462. *PACHYCEPHALOPSIS FORTIS*, var. *DISCOLOR*, De Ile Sudest.
Vis, Rep. on New Guin., 1889, *Birds*, p. 5
(6579, pt.)
1600. *LANIUS sibiricus, europæus et asiaticus*, Bogd. = var. *MAJOR* (1599).
465. — *ELEGANS*, var. *HEMILEUCURA*, Fsch. et Hartl. Algérie, Tunisie.
(6604, pt.)
464. — — var. *DEALBATA*, De Fil. (6604, pt.); S. de l'Algérie et de la
leuconotus, Brm.; *leucopygus*, H. et Ehr.; Tunisie, Afr. N.-E.
pallens, Cass.; *grimmi*, Bogd. (1604). Asie centr. jusqu'à
l'Amour.
465. — — var. *ASSIMILIS*, Brm., *J. f. O.*, 1854, Afr. N.-E., Asie S.-W.
p. 146.

1605. *LANIUS ELEGANS*, var. *PALLIDIROSTRIS*, Cass., Afrique N. et N.-E.,
Pr. Ac. Phil., 1851, p. 244; *orbitalis*, Licht.; Palest., Asie S.-W.
pallidus, Ant.; *fallax*, Finsch (1605); *dod-* jusqu'au N.-W. de
soni, Whitak. (1602); *buryi*, Lor. et Hellm. l'Inde.
405. — LÜBBERTI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 76. Damaraland.
1603. — LAHTORA (Syk.) est une espèce distincte.
6606. — LUDOVICIANUS, L. a pour habitat : Canada, É.-Unis, Mex.
1607. — — var. *Excubitoroides*, Sw. = L. LUDOVICIANUS.
1608. — — var. *Gambeli*, Ridgw. = L. LUDOVICIANUS.
1609. — — var. *Anthonyi*, Mearn. = L. LUDOVICIANUS.
1610. — — var. *Migrans*, Palm. = L. LUDOVICIANUS.
6603. — *algeriensis kœnigi*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 309 = L. ALGERIENSIS, Less.
1602. — — var. *Dodsoni*, Whit. = var. *PALLIDIROSTRIS*, Cass.
6609. — *shalowi*, Böhm. = L. EXCUBITORIUS, Des M.
406. — MARWITZI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 90. Ngomingi (Uhehe W.)
- 1614 — *subcoronatus*, var. *Capelli* (Boc.) = L. SUBCORONATUS, Smith.
6623. — NIGRICEPS (Frankl.) a pour habitat : Inde, Indo-Chine W.
466. — — var. *LONGICAUDATA*, Gould, *P. Z. S.*, Siam.
1859, p. 151.
467. — — var. *NASUTA*, Scop., *Del Fl. Faun.* Philippines, Bornéo.
Insubr. II, p. 85; *antiguanus*, Gm. (6623, pt.)
6624. — *cephalomelas*, Bp. = var. *NASUTA*, Scop.
1617. ENNEOCTONUS *isabellinus*, var. *Speculigera* (Tacz.) = E. ISABEL-
LINUS.
1619. — — var. *Karelini* (Bogd.) = var. PHOENICUROIDES (Severtz.)
1620. — — var. *Romanovi* (Bogd.) = var. PHOENICUROIDES.
6630. — *varius* (Zrdn.), *varia* (err.) = var. PHOENICUROIDES.
1621. — RUFUS, var. *Rutilans* (Tem.) = L. RUFUS OU POMERANUS (Sparrm.)
6635. — *reichenowi* (Shell.); *affinis*, F. et Rehw. = L. COLLURIO (L.)
6638. — *elæagni* (Suschk.) = L. BOGDANOWI (Bianchi).
407. — RADDEI (Dress.), *P. Z. S.*, 1888, p. 291; id., *B.* Transcaspie jusqu'au
Eur. IX, p. 171, pl. 669; (6637, pt.); *infus-* lac Zaïssan.
catus, Suschk.
6639. — *dichrourus* (Mensb.) = L. RADDEI (Dress.)
408. — DARWINI (Severtz.), *Tashkent-Zapiski*, I, 4, p. 51 Turkestan (1).
(1879).
409. PTERTHYRIUS *TAHANENSIS*, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 576. Pahang (Malacca E.)
410. ANTICHRONUS *POTTERI*, Oust., *Bull. Mus. Paris*, Haut-Nil.
1900, p. 225.
6667. MALACONOTUS *CRUENTUS*, var. *GABONENSIS*, Shell.
6668. — *hematothorax*, Neum. = var. *GABONENSIS*.
6670. — *POLIOCEPHALUS*, var. *MONTEIRI* (Sharpe).
6671. — — var. *CATHAROXANTHA*, Neum.
6674. — — var. *APPROXIMANS* (Cab.) Afr. E. allem. et angl.

(1) Voy.: Og-Grant, *A review of Shrikes*, etc. (*Nov. Zool.* IX, pp. 449-486).

468. *MALACONOTUS POLIOCEPHALUS*, *var.* *BLANCHOTI*, Steph., *Gen. Zool.* XIII, p. 161 ; (6672, pl.) Afrique S. et S.-E. jusqu'au Vict. Nyansa.
469. — — *var.* *SCHOANA*, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 89. Choa.
411. *COSMOPHONEUS DOHERTYI* (Rothsch.), *Bull. B. O. C.* XI, p. 52 ; Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 655, pl. 9. Nandi (Afr. E. angl.)
470. *LANIARIUS RUFICEPS*, *var.* *KISMAVENSIS* (Erl.), *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 182. Kismayu (Afrique E.)
6698. — — *var.* *RUFINUCHALIS* (Sharpe).
412. — *POENSIS* (Alex.), *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 57. Fernando Po.
415. — *MURINUS* (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 101. Muhanga.
414. *DRYSCOPUS JACKSONI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 57. M^t Elgon (Afr. équat.)
6720. — *atriolatus*, Cass. = *MEGABIAS FLAMMULATUS*, Verr. (3934).
471. *RHECTES CIRRHOCEPHALUS*, *var.* *DOHERTYI* (Rothsch. et Hart.), *Nov. Zool.* X, 1905, p. 95. Ile Ron (baie Geelvink).
415. — *MEYERI* (Rothsch. et Hart.), *Nov. Zool.* X, 1905, p. 96. Nouv.-Guinée N.
472. *COLLURICINCLA MEGARHYNCHA*, *var.* *ARUENSIS* (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 180, 195 ; (6758, pl.) Iles Arou.
6761. — — *var.* *TAPPENBECKI*, Rehw. ; *dissimilis*, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 2.
475. — — *var.* *MADARASZI* (Rothsch. et Hart.), *Nov. Zool.* X, p. 100. Nouv.-Guinée allem.
474. — — *var.* *DESPECTA* (Rothsch. et Hart.), *l. c.* Nouv.-Guinée angl.
6760. — — *var.* *RUFOGASTRA*, Gould.
6762. — — *var.* *AFFINIS* (Gray).
- 1164 (Gen.) *HORIZORHINUS*, Oberh., *l. c.*, 1899, p. 216, au lieu de *Cuphopterus*, Hart. (juin 1866, nec Moraw., janv. 1866).
475. *PRIONOPS POLIOCEPHALUS*, *var.* *MARTENSI*, Rehw., *Arch. f. Nat.*, 1901, p. 550 ; id., *J. f. O.*, 1902, p. 55. Caméron E.
416. — *MELANOPTERUS*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 46. Somaliland.
417. — *INTERMEDIUS*, Sharpe, *l. c.*, p. 47. Afrique E. angl.
476. *CORVUS CORAX*, *var.* *CANARIENSIS*, Hart. et Kleinschm., *Nov. Zool.* VIII, p. 45. Iles Canaries.
477. — — *var.* *HISPANA*, Hart. et Kleinschm., *l. c.* Espagne.
478. — — *var.* *LEPTONYX*, Pacl. ; *tingitanus*, Irby (6835). Algérie, Tun., Maroc.
6832. — — *var.* *Umbrina*, Sundev.
6833. — — *var.* *RUFICOLLIS*, Less.
6831. — — *var.* *LAWRENCEI*, Hume. De Palestine au N.-W. de l'Inde.
6846. — — *var.* *EDITHÆ*, Phillips. Somaliland.
479. — — *var.* *CLARIONENSIS*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 581. Clarion (Galapagos).

418. *CORVUS BENNETTI*, North, *Victorian Natural.*, 1901, p. 170. Nouv.-Galles du S.
480. — *CORNIX*, var. *SHARPEI*, Oat, *Faun. Br. Ind.* I, p. 20; Schal., *J. f. O.*, 1901, p. 452. Sibérie, Afghanistan, Turkestan.
481. — *ORRU*, var. *INSULARIS*, Heimp., *J. f. O.*, 1905, p. 69. Presq.-Gazelle, ?arch. Bism., Waig., Cél.N.
419. — *UNICOLOR* (Rothsch. et Hart.), *Bull. B. O. C.* XI, p. 29. Banggai (îles Soula).
- 1187** (Gen.) *Eupodoces* et *Pseudopodoces*, Zar. et Loud., *O. M.*, 1902, p. 185 = *PODOCES*, Fisch.
482. *PERISOREUS OBSCURUS*, var. *GRISEA*, Ridgw. Colombie angl. jusqu'à (6932, pt.) Californie N.
485. *CYANOCITTA CRISTATA*, var. *FLORINCOLA*, Coues, *Key N. A. Birds*, 1884, p. 421. Floride, Louisiane.
484. — *STELLERI*, var. *CARBONACEA*, Grinn., *Condor*, II, p. 127; Allen, *Auk*, 1901, p. 174. Orégon, Californie (côtes).
485. — — var. *CARLOTTÆ*, Osg., *Bull. U. S. Dep. Agr. Biol.*, n° 51, p. 46. Ile Reine Charlotte.
486. — — var. *BOREALIS*, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1902, p. 240. Alaska.
487. *APHELOCOMA CALIFORNICA*, var. *IMMANIS*, Grinn., *Auk*, 1901, p. 188. Orégon.
488. — — var. *TEXANA*, Ridgw., *Auk*, 1902, p. 70. Texas S.-W.
489. *XANTHOURA LUXUOSA*, var. *SPECIOSA*, Nels., *Auk*, 1900, p. 265. Jalisco W., Sinaloa S., Tepic.
420. *PARADISEA MIRABILIS*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 188 (hybride?); *J. f. O.*, 1902, pl. 1. Nouv.-Guinée allem.
421. *CICINNURUS LYOGYRUS*, Cuff., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, 1900, p. 497, pl. 17, f. 2. Nouv.-Guinée.
- 1255^{bis} (Gen.) *LOBORHAMPHUS*, Rothsch. (1901). *Gen. nov.*
- *NOBILIS*, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 54; id., *Nov. Zool.* X, p. 72, pl. 1. Nouv.-Guinée allem.
422. *ORIOLUS SZALAYI* (Madar.), *Termes. Fuzetek*, XXIV, p. 76. Nouv.-Guinée allem.
490. — *BRODERIPI*, var. *OSCILLANS*, Hart., *Nov. Zool.* X, p. 52. Iles Tukang-Besi (Gé-lèbes S.-E.)
- 7062.** — — var. *BONERATENSIS*, Mey. et Wg.
- 7087.** — *meneliki*, Weld-Bl. et Lov. = *O. MONACHUS*, Gm. (**7085**); Salvad., *Ibis*, 1900, p. 598.
425. *DICRURUS KÜHNII*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 170. Ténimber.
424. — *MEEKI*, Rothsch. et Hart., *l. c.* X, 1905, p. 110. Guadalcanar (Salom.)
425. — *SULUENSIS*, Hart., *l. c.* IX, p. 441. Iles Soulou.
426. — *DOHERTYI*, Hart., *l. c.* IX, p. 441. Obi Major.
491. *DISSEMURUS PARADISEUS*, var. *JOHNI*, Hart., *l. c.* IX, p. 580. Haïnan.
427. *APLONIS MAXWELLI*, Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 116. Santa-Cruz (Nouv.-Hébrides).

428. *AMYDRUS CANOLIMRATUS*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, Afrique E. allem.
1900, p. 99.
7274. — (*Pilorhinus*) *hadramauticus*, Hellm., l.c., 1901, p. 50 = A. TRISTRAMI, Scl.
429. *LAMPROCOLIUS CHURRI*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, Fernando Po.
1905, p. 48.
450. — *MASSAICUS*, Nehm., *J. f. O.*, 1900, p. 280. Massailand.
492. *ZARHYNCHUS WAGLERI*, var. *MEXICANA*, Ridgw., Mexique S., Guatémala.
Bull. U. S. Nat. Mus., n° 50, II, p. 178.
7338. *CASSIDIX ORYZIVORA* (Gm.) a pour habitat : Amér. mér. de Guyane
au Paraguay.
495. — — var. *VIOLEA*, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Cl.*, 1900, p. 41. Colombie, Panama.
494. — — var. *MEXICANA* (Less.), *Traité*, p. 455; Mexique S., Amérique centr.
Bangs, l. c.
495. *MOLOTHRUS ÆNEUS*, var. *ASSIMILIS*, Nels., *Auk*, Mexique W.
1900, p. 266.
496. — — var. *ROBUSTA*, Cab. (7341, pl.) Mexique.
- 1311 (Gen.) *Pseudogelaeus*, Ridgw. (1901) = *AGELÆUS*.
497. *AGELÆUS PHOENICEUS*, var. *FORTIS*, Ridgw., États-Unis W.
Pr. Wash. Ac. Sc. III, 1901, p. 455.
498. — — var. *FLORIDANA*, Mayn., *B. East. N. Am.*, ed. II, pt. 40, pl. 689. Floride.
499. — — var. *NEUTRALIS*, Ridgw., l. c. De la Colombie angl.
à la Californie.
500. — — var. *CAURINA*, Ridgw., l. c. De la Colombie angl.
au N. de la Californie.
- 1312 (Gen.) *Xanthopsar*, Ridgw. (1901) = *XANTHOSOMUS*, Cab.
501. *STURNELLA MAGNA*, var. *ALTICOLA*, Nels., *Auk*, Mexique W.
1900, p. 266.
502. — — var. *ARGUTULA*, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Cl.* I, 1899, p. 28; Allen, *Auk*, 1901, Floride.
p. 174.
505. — — var. *PARALIOS*, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Cl.* II, p. 55. San Sebastian (Col.)
7390. *Pendulinus mexicanus* (Ridgw.), *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 451 =
P. WAGLERI (Scl.)
1844. — *wagleri*, var. *Castaneopectus* (Brewst.) = *P. WAGLERI*.
504. *PENDULINUS CUCULLATUS*, var. *SENNETTI* (Ridgw.), *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 452. Rio-Grande (Texas).
505. — — var. *DUPLEXA* (Nels.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 172. Ile Mujeres (Yucatan).
506. — — var. *COZUMELÆ* (Nels.), l. c. Ile Cozumel (Yucatan).
507. — *MESOMELAS*, var. *TACZANOWSKII* (Ridgw.), Ecuador W.
Pr. Wash. Ac. Sc. III, 1901, p. 455.
508. — — var. *SALVINI* (Cass.), *Pr. Ac. Sc. Phil.*, Nicaragua, Colombie,
1867, p. 51. Vénézuéla.

509. *PENDULINUS XANTHORNUS*, var. *HELIOEIDES*, Ile Margarita.
Clark, *Auk*, 1902, p. 265.
510. *ICTERUS VULGARIS*, var. *RIDGWAYI* (Hart.), Nov. Aruba, Curaçao.
Zool. IX, p. 299.
511. — *GULARIS*, var. *TAMAULIPENSIS*, Ridgw., *Pr.* Tamaulipas (Mex. E.)
Wash. Ac. Sc. III, 1901, p. 152.
- Lisez à la page 559 : Subf. V. — *QUISCALINE* au lieu de *Quisqualina*.
512. *QUISCALUS MAJOR*, var. *NELSONI*, Ridgw., *Pr.* Mexique N.-W.
Wash. Ac. Sc., 1901, p. 151.
515. — *MACRURUS*, var. *OBSCURA*, Nels., *Auk*, 1900, Mexique S.-W.
p. 267.
514. — *INFLEXIROSTRIS*, var. *MARTINIGENSIS*, Ridgw., Martinique.
Pr. Wash. Ac. Sc., 1901, p. 151.
- 1331 (Gen.) *AAPTUS*, Richm., *Pr. B. S. W.*, 1902, p. 85, au lieu de *Aphobus*,
Cab. (1851, nec Gist., 1848).
515. *HYPHANTORNIS VITELLINUS*, var. *ULUENSIS*, Ulu (Afrique E.)
Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 282.
516. — *VELATUS*, var. *FINSCI* (Rehw.), *Orn. Mo-* Mossamedes.
natsb., 1905, p. 25.
517. — *CABANISI*, var. *LÜBBERTI* (Rehw.), *Orn. Mo-* Damaraland.
natsb., 1902, p. 77.
451. — *SCHILLINGSI* (Rehw.), *I. c.*, 1902, p. 158. Afrique E. allem.
452. — *ORPHINOCEPHALUS* (Erl.), *I. c.*, 1905, p. 25. Somaliland S.
455. *SITAGRA ALIENA*, Shpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 21. Ruwenzori.
- 1554^{bis} (Gen.) *BRACHYCOPE*, Rehw. (1900). *Gen. nov.*
454. — *ANOMALA*, Rehw., *J. f. O.*, 1900, p. 249. Afrique E.
455. *HETERHYPHANTES ZAPHIROI* (Grf.), *Bull. B. O. C.* Abyssinie S.
XIII, p. 22.
456. *SYCOBROTUS POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 58. Fernando Po.
518. *PLOCEUS BAYA*, var. *MEGARHYNCHA*, Hume, *Ibis*, Naini Tal (Subhimal.)
1869, p. 557; Finn, *Ibis*, 1901, p. 52, pl. 1 ;
(7521, pl.)
519. — — var. *INFORTUNATA*, Hart., Nov. *Zool.* Birm., Ténass., Ma-
IX, p. 578. lacca, Sumatra.
7521. — — var. *ATRIGULA*, Hodgs., a pour habi- Inde N.-E., du Ben-
tat : gale au Ténassérim.
7524. — — *RUTLEDGH*, Finn = var. *MEGARHYNCHA*.
457. *MELANOPTERYX MAXWELLI*, Alex., *Bull. B. O. C.* Fernando Po.
XIII, 1905, p. 54.
520. *ANAPLECTES MELANOTIS*, var. *RUFIGENA*, Shell., Nyassaland.
Birds Afr. II, p. 541.
- 1349 (Gen.) *Neospiza*, Salvad. = *AMELYOSPIZA*, Sundev.
521. *AMELYOSPIZA ÆTHIOPICA*, Neum., *Orn. Mo-* Ethiopie S.
natsb., 1902, p. 9.
- 1555^{bis} (Gen.) *ANOMALOSPIZA*, Shell., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 29. (*Gen. nov.*)
7899. — *RENDALLI* (Tristr.), *Ibis*, 1895, p. 150 (voy. p. 600). Transvaal.

522. *PYROMELANA FRANCISCANA*, var. *PUSILLA*, Hart., Somaliland.
Bull. B. O. C. XI, p. 71.
458. — *XANTHOCHLAMYS*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, Hoima (Ruwenzori).
 1905, p. 10.
525. — *TAHA*, var. *INTERCEDENS*, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 25. Arrussigallaland.
524. *UROBRACHYA PHOENICEA*, var. *QUANZE*, Hart., Angola.
Bull. B. O. C. XIII, 1905, p. 56.
525. — — var. *MEDIA*, Sharpe, *Ibis*, 1902, p. 118. Ankole W. (Afr. trop.)
526. *PENTHETRIA MACROCERCA*, var. *HUMERALIS* (Sharpe), *Bull. B. O. C.* XI, p. 57. Mont Elgon.
527. *HYPOCHLERA FUNEREA*, var. *WILSONI*, Hart., Niger.
Nov. Zool. VIII, p. 542.
- Rectifiez l'habitat des suivants :
7609. *HYPOCHLERA FUNEREA* (De Tar.) Du Natal au Zambèze.
7610. — *NIGERRIMA*, Sharpe. De l'Angola au Congo.
528. *NIGRITA EMILLE*, var. *DOHERTYI*, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 12. Afrique E. angl.
529. — *BICOLOR*, var. *BRUNNESCENS*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 175. Caméron, Gabon, île Principe.
550. — — var. *SATURATION*, Rchw., *l. c.* Haut-Congo, Uwamba.
551. *CRYPTOSPIZA REICHENOWI*, var. *OCULARIS*, Shpe, Ruwenzori.
Bull. B. O. C. XIII, p. 8.
552. — — var. *ELIZÆ*, Alex., *l. c.*, p. 58. Fernando Po.
459. — *SHELLEYI*, Sharpe, *l. c.*, p. 21. Ruwenzori.
440. — *JACKSONI*, Sharpe, *l. c.*, p. 8. Ruwenzori.
555. *SPERMESTES NIGRICEPS*, var. *MINOR*, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 22. Somaliland S.
- 1564^{bis} (Gen.) *NESOCHARIS*, Alex. (1905), *Gen. nov.*
441. — *SHELLEYI*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 48. Fernando Po.
554. *LAGONOSTICTA SENEGALA*, var. *RUBERRIMA* (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 24. Victoria Niansa.
442. *COCCOPYGIA BOCAEI*, Shell., *Bull. B. O. C.* XIII, Benguela.
 1905, p. 56.
7680. *Sporaginus margaritæ*, Weld-Bl. = *ESTREDA OCHROGASTER*, Salvad. (7691); Grl., *Ibis*, 1900, p. 504 (note); Salvad., *l. c.*, p. 599.
555. *ESTREDA ASTRILD*, var. *DAMARENSIS*, Rchw., Damara.
Orn. Monatsb., 1902, p. 175.
556. — — var. *ANGOLENSIS*, Rchw., *l. c.* Angola, Loango.
445. — *KANDTI*, Rchw., *l. c.*, p. 184. Kandt (lac Kiwu).
444. — *POLIOPAREIA*, Rchw., *l. c.*, p. 185. Congo.
445. — *ELIZÆ*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 54. Fernando Po.
7737. *Aidemopsyne orientalis*, Lor. et Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 59 = A. CANTANS (Gm.); Grl., *Ibis*, 1901, pp. 519, 618.
557. *CANNABINA BREVIROSTRIS*, var. *PYGMEÆ* (Stol.), Du Turkestan au Pamir.
Journ. As. Soc. Beng., 1868, pt. 2, p. 62;

- Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, p. 226.
558. *CANNABINA LINOTA*, var. *NANA* (Tschusi), *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 150. Madeire.
559. — — var. *MEADEWALDOI*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 525; (= *nana*?) Ténérife (Canaries).
540. *CARDUELIS ELEGANS*, var. *PARVA* (Tschusi), *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 151. Madeire.
446. *MONTIFRINGILLA KADIKA* (McGreg.), *Condor*, III, n° 1. Ile Kadiak (Alasca).
447. *RHYNCHOSTRUTHUS PERCIVALI*, Grt., *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 50; Lor. et Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 254. Arabie S.
541. *PETRONIA STULTA*, var. *INTERMEDIA* (Hart.), *Nov. Zool.* VIII, p. 524. Cachemire, Kandahar.
542. *PASSER DOMESTICUS*, var. *BURVI*, Lor. et Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 255. Arabie S.
545. — — var. *RUFIDORSALIS*, Bfm., *Naumannia*, 1856, p. 576; Witherby, *Ibis*, 1901, p. 246. Soudan.
1964. — *HISPANIOLENSIS* (Tem.) doit être considéré comme espèce distincte.
544. — — var. *TRANSCASPICA*, Tschusi, *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 96. Transcaucasie.
545. — — var. *MALTE*, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 552. Ile de Malte.
546. — *ARCUATUS*, var. *DAMARENSIS*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 77. Damaraland.
547. — *DIFFUSUS*, var. *GONGONENSIS* (Oust.), *Natural.*, 1890; Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 45. Gongoni, Witu, Lamu, Nairobi (Afr. E.)
7875. — — var. *SWAINSONI* (Rüpp.)
7877. — *AMMODENDRI korejewi*, Zar. et Härms, *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 53 = *P. AMMODENDRI*, Severtz.
- 1408 (Gen.) *Pseudostruthus*, Oust. (1890) = *PASSER*.
7899. *Serinus rendalli* (Tristr.) est un *Plocéide*. (Voy. *ANOMALOSPIZA RENDALLI*, p. 4107.)
448. *SERINUS SHARPEI*, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 287. Kilima Ndjaro.
449. — *SIMPLEX*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 184. Afrique E. allem.
450. — *MADARASZI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 8. Niassa N.
451. — *ROTHSCHILDI*, Grant, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 21. Arabie S.
- 1412 (Gen.) *Serinopsis*, Ridgw. (1898) = *SYCALIS*, Boie.
452. *CARPODACUS RIPPONI* (Shpe), *Bull. B. O. C.* XIII, p. 11. Yun-nan W.
548. *PYRRHOSPIZA OLIVACEA*, var. *CAMERUNENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 58. Caméron.
455. — *KILIMENSIS* (Rehw. et Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 74; Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 289, pl. 2, f. 5. Kilima Ndjaro.
- 1416 (Gen.) *Hyphantospiza*, Rehw. et Neum. (1895) = *PYRRHOSPIZA*, Hodgs.
549. *LOXIA CURVIROSTRA*, var. *GUILLEMARDI*, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 5. Ile de Chypre.
- 1422 (Gen.) *Telespiza* au lieu de *Telespyza*.
454. *PYRRHULA WATERSTRADTI*, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 69. Pahang N. (Malac. E.)

550. *GEOSPIZA STRENUA*, var. *PACHYRHYNCHA*, Ridgw. Ile Tower (Galapagos).
(7972, pt.)
7973. — *CONIROSTRIS*, var. *DARWINI*, R. et H.
551. — *FORTIS*, var. *PLATYRHYNCHA*, Hell. et Snod., Galapagos.
Condor, III, p. 175.
455. — *HELIOBATES*, Snodgr. et Hell., *Condor*, III, p. 96. Albem., Narborough.
456. — *HARTERTI*, Ridgw., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1901, Chatham (Galapagos).
p. 507.
552. — *SCANDENS*, var. *BREVIROSTRIS*, Ridgw., *Pr.* Chatham.
U. S. Nat. Mus., 1889, p. 108.
555. — — var. *ROTHSCHILDI*, Hell. et Snodgr., Bindloe (Galapagos).
Condor, III, p. 75.
554. *HEDYMELES MELANOCEPHALUS*, var. *MICRORHYN-* États-Unis W. (côtes).
CHA, Grinn., *Condor*, II, p. 128; Allen, *Auk*,
1901, p. 176.
- 1439 (Gen.) ? *Goniaphea*, Bowd (1825) et *Cyanocompsa*, Cab. (1861) = *GUIRACA*.
555. *GUIRACA CYANEA*, var. *STEREA*, Oberh., *Pr.* Paraguay.
Biol. Soc. Wash., 1911, p. 188 (1).
- 1141 (Gen.) *Melanospiza*, Ridgw. (dans la syn.) = *MELOSPIZA*, Baird (Gen. 1177).
556. *CARDINALIS RUBER*, var. *SOMERSII*, Verrill, *Am.* Iles Bahama.
J. Sc., 1904, p. 65.
8093. — — var. *BERMUDIANA*, Bangs et Brad.
457. *EMBERIZA YUNNANENSIS*, Shpe, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 12. Tali-fu (Yun-nan W.)
557. *FRINGILLARIA TAHAPISI*, var. *ARABICA*, Lof. et Arabie S.
Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 55.
458. — *PTHALÆ*, Grabl, *Bull. B. O. C.* XII, p. 80. Dthala (Arabie S.-W.)
459. *ZONOTRICHIA MACCONNELLI*, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.* Roraima (Guyane an-
London, Zool., 1900, p. 55, pl. 4, f. 1. glaise).
558. *AMPHISPIZA BILINEATA*, var. *PACIFICA*, Nels., Sonora S., Sinaloa N.
Auk, 1900, p. 267. (côtes).
559. *PASSERCULUS SANDWICHENSIS*, var. *XANTHO-* Ile Kadiak.
PIREYS, Grinn., *Condor*, III, p. 21.
- 1176 (Gen.) *Myospiza*, Ridgw. (1898) = *AMMODRAMUS*, Sw. (et non *Ammodromus*).
560. *AMMODRAMUS CAUDACUTUS*, var. *DIVERSA*, Bis- Ile Roanoke (Carol. N.)
hop, *Auk*, 1901, p. 269.
561. — *SAVANNARUM*, var. *FLORIDANA*, Mearns, *Auk*, Floride.
1902, p. 915.
562. — — var. *CARIBÆA*, Hart., *Nov. Zool.* IX, Iles Bonaire et Curaç.
p. 298.
565. *MELOSPIZA FASCIATA*, var. *Cleonensis* (Mc Greg.), Mendocino (Californ.)
Bull. Coop. Orn. Club, 1899, p. 87; Allen,
Auk, 1901, p. 175.
564. — — ? var. *SANTECRUCIS*, Grinn., *Condor*, Santa-Cruz (Californ.)
III, p. 92.

(1) A la p. 613, après le genre 1440, on a repris par erreur le n° 1141 et suivants. Le numérotage des genres est donc à rectifier.

565. *MELOSPIZA FASCIATA*, var. *CORONATORUM*, Grinn. et Dagg., *Auk*, 1905, p. 54. Ile Coronados (Basse-Californie).
566. — *CINEREA*, var. *SANAKA*, Mc Greg., *Condor*, III, p. 8; Allen, *Auk*, 1901, p. 175. Ile Sanak (Alaska).
567. *PIPILO MACULATUS*, var. *FALCIFER*, Mc Greg., *Condor*, II, p. 45; Allen, *Auk*, 1901, p. 176. Baie San-Francisco (Californie).
460. ?*PAROARIA HUMBERTI*, Angel., *Avicula* V, p. 142; *Boll. Soc. Zool. Ital.*, 1901, II, p. 17. ?
568. *SALTATOR MAGNOIDES*, var. *MEDIANA*, Ridgw., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1901, p. 666. Guatémala, Costa-Rica.
569. *ARREMON POLIONOTUS*, var. *CALLISTA*, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 188. Paraguay.
461. *BUARREMON SIMONSI*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 2. Loja (Ecuador).
462. — *PALLIDICEPS*, Sharpe, *l. c.* Oña (Ecuador).
465. *CHLOROSPINGUS ALBITEMPORALIS*, var. *FULVIGULARIS*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 86. Bolivie E.
570. — *OPHTHALMICUS*, var. *SUMICHRASTI*, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 150; id., *Bull. 50, U. S. Nat. Mus.* II, p. 162. Mexique S.-E.
- 1227 (Gen.) *Mitrospingus*, Ridgw. (1898) = *EUCOMETIS*.
464. *MALACOTHRAUPIS GUSTAVI*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 85. Bolivie W.
2226. *PHOENICOTHRAUPIS SALVINI*, Berl., est une espèce distincte qui a pour habitat : Mexique S., Guatém., Honduras N.
571. — — var. *DISCOLOR*, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 150. Hondur. S., Nicarag.
572. — — var. *PENINSULARIS*, Ridgw., *l. c.*; *salvini* (pt.), Berl. Yucatan.
575. — *RUBICOIDES*, var. *NELSONI*, Ridgw., *Bull. 50, U. S. Nat. Mus.* II, p. 145. Yucatan.
8513. *PYRANGA FLAMMEA*, Ridgw., est une var. du *P. BIDENTATA*, Sw.
574. — *ROSEIGULARIS*, var. *COZUMLE*, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 149. Ile Cozumel.
2233. — var. *LATIFASCIATA*, Ridgw., est une var. du *P. ERYTHROMELÆNA*, Sel., et non de *P. ardens*.
575. *RHAMPHOCELUS DIMIDIATUS*, var. *ISTHICA*, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 150; id., *Bull. 50, U. S. Nat. Mus.* II, p. 118. Panama.
576. — — var. *LIMATA*, Bangs, *Auk*, 1901, p. 51; Ridgw., *l. c.*, p. 119. Ile San-Miguel (Panama).
2239. *SPINDALIS ZENA*, var. *Stejnegeri*, Cory, = *S. ZENA*.
2248. *BUTHRAUPIS ARCEI*, var. *CERULEIGULARIS*, Cherrie (nec Ridgw., err.)
- 1249 (Gen.) *CALOSPIZA*, Gray (1840), au lieu de *Calliste*, Boie (1826, nec Poli, 1791); *Aglaia*, Sw. (1827, nec Ren., 1804).
8593. *CALOSPIZA CYANOCEPHALA* (Müll., nec V.) a priorité sur *festiva* (Shaw).
577. — — var. *CORALLINA*, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 18. Bahia.

578. *CALOSPIZA FLORIDA*, var. *ARCEI*, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 149. Véragua.
579. — *PULCHRA*, var. *SOPHIE*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 85. Bolivie W.
465. — *EMILÆ* (Dalm.), *Bull. B. O. C.* XI, p. 55; *Sci.*, Colomb., Ecuad. N.-W. *Ibis*, 1901, p. 595, pl. 12, f. 1.
466. — *JOHANNÆ* (Dalm.), *l. c.*, p. 56; *Sci.*, *l. c.*, pl. 12, f. 2. Colomb., Ecuad. N.-W.
580. — *FLAVIVENTRIS*, var. *MEDIA* (Berl. et Hart.), Orénoque. *Nov. Zool.* IX, p. 19.
- EUPHONIA FULVICRIS*, var. *PURPURASCENS*, Ecuador N.-W. Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 570.
467. *DICÆUM KÜHNII*, Hart., *Nov. Zool.* X, 1905, p. 28. Ile Tukang-Besi (Célèbes S.-E.)
468. — *ARFAKIANUM*, Finsch, *Not. Leyd. Mus.* XXII, p. 70. M^{ls} Arfak (Nouv.-Guin.)
469. — ? *SOLLICITANS*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 52. Java.
581. *SITTA EUROPEA*, var. *BRITANNICA*, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 526. Angleterre, Écosse.
582. — *CAROLINENSIS*, var. *NELSONI*, Mearns, *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 925. États-Unis S.-W.
585. *CERTHIA FAMILIARIS*, var. *ZELOTES*, Osg., *Auk*, 1901, p. 182. Orég., Sierra-Nevada.
- 2306.** — *rhenana*, Kleinschm. = var. *BRACHYDACTYLA*, Brm.
470. — *YUNNANENSIS*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 11. Yun-nan.
- 8846.** Remplacez ce qui est sous ce n° par :
- 8846.** *CLIMACTERIS PICUMNUS*, Tem., *Pl. Col.* 281, f. 1; Australie N.-E., E. Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXIII, p. 60; *scandens*, Gd (nec Tem.), *B. Austr.* IV, pl. 95; et S. *leucophæa*, Gad. (nec Lath.) — Le *Certhia leucophæa*, Lath., se rapporte à un *Meliphaga* qui ne peut être identifié.
471. *CONIROSTRUM LUGENS*, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 82. Bolivie E.
- 1283** (Gen.) *Iridophanes*, Ridgw. (1901) = *DACNIS*, Chv.
584. *ARBELORHINA CERULEA*, var. *MICRORHYNCHA* (Berl.), *J. f. O.*, 1884, p. 287; (8904, pt.) Colombie.
585. — — var. *CHERRIEI* (Berl. et Hart.), *Nov. Zool.* IX, p. 16. Orénoque.
586. *COEREBE CABOTI*, var. *SHARPEI* (Cory), *Auk*, 1886, p. 497. Iles Cayman (Antilles).
472. — *CERINOCLUNIS*, Bangs, *Pr. New-Engl. Zool. Club*, 1901, p. 52. San-Miguel (Panama).
- 8946.** *Hedydipna muelleri* (Lor. et Hellm.) = H. *METALLICA* (Licht.)
- 8985.** *CINNYRIS PURPUREIVENTRIS*, Rehw., appartient au genre *NECTARINIA* et a pour synonyme *Nect. barakæ*, Shpe, *Bull. B. O. C.* XIII, pp. 8, 50, de Ruwenzori.
475. *CHALCOMITRA BOOTHII*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1902, p. 8. Niassa.
474. — *DOGGETTI* (Sharpe), *Ibis*, 1902, p. 116. Ravine (Afr. équat.)

475. *CYANOMITRA POENSIS*, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 58. Fernando-Po.
 476. — *URSULE*, Alex., *l. c.* Fernando-Po.
 587. *CYRTOSTOMUS FRENATA*, var. *FLAVA* (Heinr.), *J. f. O.*, 1905, p. 85. Nouv.-Poméranie.
 477. — *INFRENATA* (Hart.), *Nov. Zool.* X, p. 29. Ile Tukang-Besi.
 9077. *ANTHREPTES MALACCENSIS* (Scop.) a pour habitat : Ténass., Malac., Sum.,
 Bornéo, Java.
 588. — — var. *CELEBENSIS*, Shell., *Monogr. Nect.*, Célèbes.
 pl. 105, f. 5; (9077, pt.)
 589. — — var. *RHODOLEMA*, Shell., *l. c.*, pl. 101, Malacca, Sumatra.
 f. 1; (9077, pt.)
 590. — — var. *WIGLESWORTHII*, Hart., *Nov. Zool.* Iles Soulou.
 IX, p. 209.
 591. *ARACHNOTHERA LONGIROSTRIS*, var. *PRILLWITZI*, Java.
 Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 51.
 592. — *ROBUSTA*, var. *UROPYGIALIS*, Gray, *Gen. B. I.* Java.
 pl. 55; Hart., *l. c.*, p. 52; (9086, pt.)
 9099. *Zosterops arabs*, Hellm. = *Z. ABYSSINICA*, Guér.
 478. *ZOSTEROPS FLORIDANA*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* Ile Florida (Salomon).
 VIII, p. 180.
 595. — *SENEGALENSIS*, var. *SMITHI*, Neum., *Orn. Somaliland.*
Monatsb., 1902, p. 159; *flavilateralis*, Sharpe
 (nec Rehw.)
 479. — *KULAMBANGRE*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* Kulambangra (Salom.)
 VIII, p. 180.
 480. — *FLAVISSIMA*, Hart., *Nov. Zool.* X, 1905, p. 29. Ile Tukang-Besi.
 481. — *FEE*, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1901, Ile St-Thomé.
 n° 414, p. 1; *ficedulina*, Sousa (nec Hartl.)
 482. — *BRUNNEA* (Salvad.), *Boll. Mus. Zool. Torino*, n° 442, Fernando-Po.
 1905, p. 1; id., *Mem. R. Acc. Sc. Tor.*, 1905,
 p. 106.
 485. *MYZOMELA BATJANENSIS*, Hart., *Nov. Zool.* X, 1905, Batjan.
 p. 56.
 484. — *KUEHNII*, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XIII, 1905, p. 42. Ile Wetter.
 485. — *EICHUORNI*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, Kulambangra (Salom.)
 p. 181.
 9377. *PHILEMON CINERACEUS* (Bp. ex S. Müll.), *Consp.* I, Iles Kisser, Letti, Ti-
 p. 590; Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 272; mor.
kisserensis, Mey.; *inornatus* (pt.), Gad. (nec
 Gray); 9376, pt.
 Il faut à la p. 729 : FAM. ATRICHORNITHIDE au lieu de ATRICHIDE.
 1355 (Gen.) *ATRICHORNIS*, Stejn. (1885) au lieu de *Atrichia*, Gould (1844, nec
 Schrank).

COLUMBÆ

486. SPHENOCERCUS MEMOXIMUS, Bangs, *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 261. Ile Liu-Kiu.
9497. *Ptilopus biroï*, Madar. = *P. IOZONUS*, Gr. (9498).
594. PTILOPUS MELANOCEPHALUS, *var. AURESCENTIOR*, Hart., *Nov. Zool.* X, 1905, p. 55. Iles Tukang-Besi, Buntou.
595. — — *var. TALAUTENSIS*, Hart., *l. c.*, p. 54. Ile Talaut.
596. GYMNOPHAPS ALBERTISH, *var. EXSUL* (Hart.), *l. c.*, p. 60. Batjan.
597. COLUMBA GUINEA, *var. LONGIPENNIS*, Rehw., *Vög. Afr.* I, p. 402, pl. 2. Afrique E.
598. — VINACEA, *var. PURPUREOTINCTA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 594 (9651, pl.) Guyane anglaise.
487. — GOODSONI, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 42. Ecuador N.-W.
9664. MACROPYGIA MAGNA, Wall.
9665. — — *var. TIMORLAOENSIS*, Mey.
9666. — — *var. MACASSARIENSIS*, Wall.
9669. — PHASIANELLA, *var. TENUIROSTRIS*, Bp.
2557. — *amboinensis*, *var. Goldiei*, Salvad. = *var. CINEREICEPS*, Tristr. (2553).
599. — RUFICEPS, *var. ASSIMILIS*, Hume (9672, pt.)
600. — — *var. SIMALURENSIS*, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 187. Sumatra W.
601. REINWARDTOENAS REINWARDTI, *var. ALBIDA*, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 240. Ile Bourou.
- ✓ 602. ZENAUDURA CAROLINENSIS, *var. BELLA* (Palm. et Ril.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 55. Cuba.
603. TURTER COMMUNIS, *var. GREGORIEWI*, Zarud. et Loud., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 149. Beloutchistan.
604. — CAPICOLA, *var. TROPICA*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 159. Afrique E.
488. GYMNOPELIA MORENOI, Shpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 54. Salta (Argentine).
- ✓ 605. COLEMBIGALLINA PASSERINA, *var. AFLAVIDA*, Palm. et Ril., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 55. Cuba.
606. — RUFIPENNIS, *var. ELUTA*, Bangs, *Auk*, 1901, p. 258. Sinaloa (Mexique).
2591. CHALCOPELIA AFRA, *var. CHALCOSPILOS* (Wagl.) a pour habitat : Afrique E.
607. — — *var. ERLANGERI*, Rehw., *J. f. O.*, 1902, p. 154. Angola.
608. — — *var. VOLKMANNI*, Rehw., *l. c.* Damaraland.
609. — — *var. CAFFRA*, Rehw., *l. c.* Afrique S.-E.
610. — — *var. ABYSSINICA*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 85. Bogosland.

611. CHALCOPELIA AFRA, *var.* DELICATULA, Sharpe, Région du Nil Blanc.
l. c., p. 84.
 612. HAPLOPELIA PRINCIPALIS, *var.* POENSIS, Alex., Fernando-Po.
l. c. XIII, p. 55.
 489. — HYPOLEUCA, Salvad., *Mem. R. Accad. Sc. Torino*, 1905, p. 96. Ile Anno Bom (Afr.W.)
 490. LEPTOPTILA BATTYI, Rothschi., *Bull. B. O. C.* XII, Ile Coiba (Panama).
 p. 55.
 9835. *Goura cinerea*, Hart. = CORONATA (aberr.); Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 154.
 9832. GOURA CHEEPMAKERI, Finsch, a pour habitat : Nouv.-Guinée S.-E.
 9830. — — *var.* SCLATERI, Salvad. Nouv.-Guin. (Riv. Fly
 et Kataw).
 9834. — VICTORIA, *var.* BECCARI, Salvad. N.-Guin. (golfe Huon).

CRYPTURI

491. NOTHOPROCTA OUSTALETI, Berl. et Stolzm., *III^e Congrès Orn., C. R.*, p. 191. Pérou W.
 492. — KALINOWSKII, Berl. et Stolzm., *l. c.*, p. 192. Pérou central.

GALLINÆ

9944. MEGAPODUS DUPERREYI, *var.* FORSTENI, Gray. Moluques méridion.
 9945. — — *var.* BRUNNEIVENTRIS, Mey.
 9946. — — *var.* EREMITA, Hartl.
 9947. — — *var.* MACGILLIVRAYI, Gray.
 9950. — FREYCINETI, *var.* GEELYINKIANUS, Mey.; Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 153-158.
 9964. *Crax sulcirostris*, Goeldi = MINIMA, Pelz. (fem.)
 615. PENELOPE SCLATERI, *var.* PLUMOSA, Berl. et Pérou central.
 Stolzm., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 45.
 614. RHEINARDTHS OCELLATUS, *var.* NIGRESCENS, Ulu Pahang (Malac.E.)
 Rothschi., *Bull. B. O. C.* XII, p. 55.
 495. CHALCURIUS INOPINATUS, Roth., *l. c.* XIII, 1905, p. 41. Ulu Pahang.
 494. GENNEUS DAVISONI, Grt., *Cat. B. B. M.* XXII, Bahmo N.-E.
 p. 504; Oat., *Ibis*, 1905, p. 105; *andersoni*, pt.,
 10.062.
 10.064. — *turneri*, Finn., *Journ. As. Soc. Beng.*, 1901, p. 146 = WILLIAMS, Oat.
 — *crawfordi*, Hume et Dav. (10.062, pt.) = SHARPE, Oat.
 495. — NISBETI, Oat., *Ibis*, 1905, p. 99. M^{ts} Kachin (Birmanie).
 496. — JONESI, Oat., *Ibis*, 1905, p. 97. Siana, Yun-nan.
 10.082. PHASIANUS BRANDTI, Rothschi., *Bull. B. O. C.* XII, p. 20, au lieu de
mongolicus, Brandt (nec Pal.)
 10.084. — TORQUATUS, Gm., a pour habitat : Chine S.
 615. — — *var.* MONGOLICUS, Pall. (nec Brandt). Mong. N.-E., Amour,
 Corée.

616. PHASIANUS TORQUATUS, *var.* HAGENBECKI, Roth, Mongolie N.-W.
Bull. B. O. C. XII, p. 20.
497. — BEREZOWSKYI, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, Chine N.-W.
p. 20.
617. CACCABIS RUFa, *var.* AUSTRALIS, Tristr. Gr. Canarie, ? Açores.
(10.129, pt.)
618. FRANCOLINUS COQUI, *var.* ANGOLENSIS, Roth., Angola.
Bull. B. O. C. XII, p. 76.
619. — BICALCARATUS, *var.* THORNEI, Grant, *Bull.* Sierra-Leone.
B. O. C. XIII, p. 22.
2724. *Lophortyx gambeli*, *var.* *Fulcipectus*, Nels. = GAMBELI, Nutt.
620. LAGOPUS LEUCURUS, *var.* PENINSULARIS, Chapm., M^{ts} Kenai (Alaska).
Bull. Am. Mus. N. H., 1902, p. 256.
2760. — — *var.* *Altipetens*, Osg. = LEUCURUS, Sw. et Rich.

ACCIPITRES

621. PSEUDOGYPS AFRICANUS, *var.* SCHILLINGSI, Erl., Afrique E. allemande.
Orn. Monatsb., 1905, p. 22.
622. — — *var.* FÜLLEBORNII, Erl., *l. c.* Nyassa, Angola.
625. — — *var.* ZECHI, Erl., *l. c.* Togo (Côte-d'Or).
624. NEOPHRON PERCNOPTERUS, *var.* RURRIPERSONATA, Zar. et Hähms, *Orn. Monatsb.*, 1902,
p. 52.
625. GYMNOGENYS TYPICUS, *var.* PECTORALIS (Shpe), Caméron.
Bull. B. O. C. XIII, 1905, p. 50.
626. ASTUR TACHIRO, *var.* NYANSE, Nehm., *Orn.* Victoria-Nyansa N. et
Monatsb., 1902, p. 158. W.
627. — TOUSSENELI, *var.* LOPEZI, Alex., *Bull. B.* Fernando-Po.
O. C. XIII, p. 49.
2796. *UROSPIZIAS woodfordi* (Sharpe) = ALBIGULARIS (10.419).
498. — RUFOSCISTACEUS (Rothsch. et Hart.), *Nov. Zool.* Ile Ysabel (Salomon).
IX, p. 590.
628. — GRISEIGULARIS, *var.* OHIENSIS, Hart., *l. c.* X, Ile Ohi.
1905, p. 5.
499. ACCIPITER SHARPEI, Rehw., *Vög. Afr.* I, p. 564, pl. 2.
629. — HARTLAUBI, *var.* BATESI, Sharpe, *Bull. B.* Caméron.
O. C. XIII, p. 50.
2836. *Buteo borealis*, *var.* *Lucasana*, Ridgw. = *var.* CALURUS (2834).
650. — — *var.* UMBRINA, Bangs, *Pr. New Engl.* Floride.
Zool. Club, II, p. 68.
651. FALCO FELDEGGII, *var.* ERLANGERI, Kleinschm., Tunisie.
Aquila, VIII, p. 55, pl. 1, f. 5.
500. PSEUDOPTYNX SOLOMONENSIS, Hart., *Bull. B. O. C.* Ile Ysabel (Salomon).
XII, p. 25; id., *Nov. Zool.* IX, p. 591.

652. *SCOPS GIU*, var. *CYPRIA*, Madar., *Thermes*. Chypre.
Fuzet. XXIV, p. 272.
653. — — var. *FEE*, Salvad., *Mem. R. Accad. Sc. Torino*, 1903, p. 93. Ile Anno-Bom (Afr.W.)
654. — *BRUCEI*, var. *SEMENOWI*, Zar. et Härms, *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 49. Beloutchistan persan.
655. — *MENADENSIS*, var. *KALIDUPE* (Hart.), *Nov. Zool.* X, p. 21. Kalidupa (Célèbes S.)
- 2939.** — — var. *Albiventris*, Sharpe = *MENADENSIS* (Q. et G.)
501. — *HOLERYTHRA*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 5. Caméron.
502. — *RALIA* (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 40. Caméron.
503. *PULSATRIX* SHARPEI, Berl., *Bull. B. O. C.* XII, p. 6; *melanonota* (pt.), auct. plur. (nec Tsch.) Brésil E.
504. *CICCABA HYLOPHILA* (Tem.), *Pl. Col.* 375; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* II, p. 269 (pt.) Brésil.
505. — *ALBITARSUS* (Gray), *Cat. Accipitr.*, 1848, p. 105 (nom. nud.); Sci., *Trans. Z. S.* IV, 1862, p. 265, pl. 9; Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 68; *hylophilum* (pt.), Sharpe, *l. c.* Colombie, Vénézuéla.
- 1638** (Gen.) *Cryptoglaux*, Richm. (1901) = *NYCTALA*, Brm.
656. *NYCTALA ACADICA*, var. *SCOTEA*, Osg., *Bull. U. S. Dep. Agr. Biol.*, n° 21, p. 44. Ile reine Charlotte.
657. *ATHENE NOCTUA*, var. *CHIARADIE*, Gigl., *Avicula*, IV, 1900, p. 57; id., *Ibis*, 1903, p. 4, pl. 4; (**10.862**, pt.) Udine (Alpes ital.)
658. *SPEOTYTO CUNICULARIA*, var. *BECKI*, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 405. Guadeloupe.
506. *GLAUCIDIUM ALBIVENTER*, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 10; id., *Ibis*, 1902, p. 571, pl. 9. Côte-d'Or (Hinterl.)

HERODIONES

507. *DISSOURA MORTONI*, Grant, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 26; id., *Ibis*, 1903, p. 146, pl. 5; *episcopus* (pt.), Sharpe. Sarawak (Bornéo).
659. *ARDEA HERODIAS*, var. *FANNINI*, Chapm., *Bull. Amer. Mus.* XIV, p. 87. Colombie anglaise.

GRALLATORES

640. *EURPYGA MAJOR*, var. *MERIDIONALIS*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 50. Pérou central.
508. *EGIALITIS ALTICOLA*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 51; *occidentalis* (pt.), Sharpe. Pérou central.

641. *RALLUS NIGRICANS*, *var. HUMILIS*, Berl. et Pérou central E.
Stolzm., *l. c.*, p. 48.
509. *HYPOTENDIA KUEHNII*, Rothsch., *Bull. B. O. C.* Ile Tukan-Bessi (Cél.
XII, p. 75. S.-E.
- 11.427.** *CRECISCUS VIRIDIS* (Müll., 1776) a priorité sur *cayanensis* (Bodd., 1785).
642. — — *var. SUBRUFESCENS*, Berl. et Stolzm., Pérou central E.
P. Z. S., 1902, II, p. 49.

STEGANOPODES

510. *SULA GRANTI*, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 7; Iles Galapagos.
variegata (pl.), Grt.
-

TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES

- AAPTUS*, 1107.
Abdimia = *Ciconia*, 905.
ABEILLIA, 164.
Abeltera = *Sula*, 1011.
Abrornis = *Gryptolopha*, 285.
ABURRIA, 794.
Acalanthe = *Erythrura*, 583.
ACANTHIDOPS, 593.
ACANTHIDOSITTA, 206.
Acanthinotus = *Lalage*, 302.
Acanthiparus = *Acredula*, 466.
Acanthis = *Carduelis*, 591.
ACANTHIZA, 366, 1090.
Acanthochæra = *Anthochæra*, 724.
ACANTHOGENYS, 724.
ACANTHOPNEUSTE, 376, 1091.
ACANTHOPTILA, 322.
ACANTHOTHYNCHUS, 716.
ACANTHORNIS, 367.
Acanthylis = *Chætura*, 127.
ACCENTOR, 381, 1091.
ACCIPITER, 844, 1116.
Acentetus = *Taccocua*, 58.
ACEROS, 102.
ACESTRUBA, 163.
Acetinornis = *Lagopus*, 826.
Acis = *Pericrocotus*, 301.
Acmonorhynchus = *Prionochilus*, 674.
Acnemis = *Scops*, 882.
ACOMUS, 798.
Acontistes = *Rhamphocœnus*, 176.
Actia = *Tringa*, 950.
Actidurus = *Bartramia*, 949.
ACTINODURA, 230.
ACTITIS, 948.
Actiturus = *Bartramia*, 919.
Actochelidon = *Sterna*, 1014.
Actodromas = *Tringa*, 950.
ACTOPHILUS, 958.
ACREDULA, 466, 1101.
Acridiornis = *Locustella*, 370.
ACRIDOTHERES, 537.
ACROCEPHALUS, 368, 1090.
Acrocompsa = *Chlorophonia*, 670.
Acroleptes = *Euphonia*, 671.
ACROPTERNIS, 168.
Acrulocercus = *Moho*, 727.
ACRYLLIUM, 805.
Ada = *Cuipolegus*, 228.
Adamastor = *Priofinus*, 1032.
Adelurus = *Larus*, 1021.
Adelinus = *Elæocerthia*, 702.
Adelisca = *Adelomyia*, 154.
Adelolarus = *Larus*, 1021.
ADELOMYIA, 154, 1067.
Adeloutta = *Querquedula*, 992.
Adelura = *Ruticilla*, 385.
Adophoneus = *Sylvia*, 374.
Adornis = *Sylvia*, 374.
ÆCHMOPHORUS, 1042.
Æchmoptila = *Leptoptila*, 768.
Æchmorhynchus = *Phegornis*, 956.
ÆDON, 382.
ÆDONOPSIS, 412.
ÆGIALEUS, 939.
ÆGIALITIS, 939, 1117.
Ægialodes = *Totanus*, 946.
Ægialophilus = *Ægialitis*, 939.
ÆGINTHA, 583.
Ægiotus = *Cannabina*, 589.
Ægithaliscus = *Acredula*, 466.
Ægithalopsis = *Parisoma*, 273.
ÆGITHALUS, 467.
ÆGITHINA, 341.
Ægithospiza = *Ægithalus*, 1101.
Ægolius = *Nyctala*, 893.
ÆGOTHELES, 116, 1063.
Ægyptius = *Tinnunculus*, 870.
Ægyptius = *Vultur*, 829.
Æiipetes = *Thalassoeca*, 1033.
ÆLURÆDUS, 522.
ÆPYPODIUS, 788.
ÆRONAUTES, 126.
Aerops = *Merops*, 96.
Æsalon = *Hypotriorchis*, 872.
Æstrelata = *Oestrelata*, 1033.

- Aetenoides* = Haleyon, 106.
Æthiops = Nigrita, 575.
ÆTHOCICHLA, 330.
ÆTHOCORYS, 1099.
ÆTHOMYIAS, 274.
ÆTHOPYGA, 695.
ÆTHORHYNCHUS, 341.
ÆTHOSTOMA, 1087.
ÆTHYIA, 996.
Aetriorchis = Ihycter, 832.
ÆX, 982.
AFROTIS, 924.
Agaclyta = *Psalidoprymna*, 158.
Agamia = *Ardea*, 909.
Aganaphron = *Anous*, 1018.
Aganus = *Trogon*, 86.
AGAPETA, 149.
AGAPORNIS, 22.
Agathopus = *Scyalopus*, 166.
AGELÆUS, 553, 1106.
Agelaioides = *Molothrus*, 552.
Agelaius = *Agelæus*, 553.
AGELASTES, 804.
Agelasticus = *Agelæus*, 553.
AGLÆACTIS, 152, 1067.
Aglaia = *Calliste*, 665.
AGRICOLA, 288.
Agrilorhinus = *Diglossa*, 685.
Agriocharis = *Meleagris*, 796.
AGRIORNIS, 224.
Agriospiza = *Cannabina*, 589.
Agripicus = *Geocolaptes*, 62.
AGROBATES, 374.
Agrodroma = *Anthus*, 445.
Agromyias = *Diaphorophya*, 265.
Agrophilus = *Ploceipasser*, 569.
AGYRTIA, 135, 1065.
Aibryas = *Bubo*, 880.
Aidemonia = *Cinnyris*, 697.
AIDEMOSYNE, 585, 1108.
Ailurædus = *Ælurædus*, 522.
Aimophila = *Hæmophila*, 633.
AITHURUS, 147, 1066.
Air = *Æx*, 982.
AJAJA, 905.
Ajax = *Cinclosoma*, 318.
ALÆMON, 450.
Alario = *Crithologus*, 599.
ALAUDA, 454.
Alaudula = *Calandrella*, 453.
ALCA, 1042.
ALCEDO, 112, 1062.
Alcemerops = *Nyctiorhis*, 97.
Alcidius = *Oreotrochilus*, 147.
ALCIPPE, 345, 1088.
Alcopus = *Sibia*, 324.
ALCURUS, 307.
ALCYONE, 113, 1062.
Alcyonides = *Gabaleorhynchus*, 46.
Alechthelia = *Sarothrura*, 969.
Alechthia = *Megapodius*, 786.
Alecto = *Textor*, 569.
Alector = *Gallus*, 803.
Alectoris = *Caccabis*, 806.
Alectorænas = *Alectroenas*, 742.
Alectorops = *Phoenicophaës*, 59.
ALECTROENAS, 742.
Alectrophasis = *Gennæus*, 800.
Alectornis = *Textor*, 569.
Alectorurura = *Catheturus*, 788.
ALECTURUS, 228.
Alectryon = *Acomus*, 798.
Alectura = *Catheturus*, 788.
ALETHE, 410, 1094.
Alle = *Mergulus*, 1043.
ALLOCOTOPS, 326.
Allocoturus = *Henicurus*, 449.
Allotrius = *Pterythrius*, 487.
ALOPECENAS, 773.
ALOPHIUS, 103, 1062.
Alophoixus = *Criniger*, 1085.
Alophonerpes = *Hemilophus*, 81.
ALOPOCHEN, 988.
Alosia = *Panoplites*, 152.
Alsæcus = *Sylvia*, 374.
ALSEONAX, 264, 1080.
Alsocomus = *Columba*, 748.
Aluco = *Strix*, 898.
Aluco = *Syrnium*, 890.
AMADINA, 579.
Amalusia = *Doricha*, 162.
Amandara = *Sporæginthus*, 581.
Anathusia = *Doricha*, 162.
AMATOCICHLA, 406.
Amauresthes = *Spermestes*, 576.
Amaurocichla = *Crateroscelis*, 333.
Amaurodryas = *Petroeca*, 266.
Amaurolimnas = *Porzana*, 967.
AMAUORNIS, 972.
AMAUROSPIZA, 619.
AMAZILIA, 138, 1065.
AMAZONA, 4, 1053.
Amazonis = *Ceryle*, 114.
AMBLYCERCUS, 551.
Amblycorax = *Corvus*, 502.
Amblyura = *Erythura*, 583.
AMBLYORNIS, 525.
AMBLYOSPIZA, 570, 1107.
Amblypterus = *Heleothreptus*, 120.
AMBLYRHAMPHUS, 554.

- Amblyrhynchus* = *Amblyrhamphus*, 554.
Amelous = *Megapodius*, 786.
Ametrornis = *Phaethornis*, 131.
AMMODRAMUS, 631, 1110.
AMMOMANES, 458, 1100.
AMMOPERDIX, 807.
Ammoptila = *Pluvianus*, 930.
AMPELICEPS, 540.
AMPELION, 215.
AMPELIS, 260.
Amphibolura = *Phibalura*, 215.
AMPHISPIZA, 627, 1110.
AMYDRUS, 545, 1106.
AMYTIS, 349.
Anabasitta = *Margarornis*, 191.
Anabates = *Synallaxis*, 197.
Anabatoides = *Anabatoxenops*, 192.
ANABATOXENOPS, 192.
ANABAZENOPS, 192.
Anactoria = *Heliangelus*, 155.
Anadænus = *Rhinortha*, 59.
ANÆRETES, 236.
Anaimos = *Prionochilus*, 674.
ANALCIPUS, 528.
ANAPLECTES, 568, 1107.
ANARHYNCHUS, 942.
ANAS, 989.
Anassus = *Anas*, 989.
ANASTOMUS, 906.
ANCISTROPS, 193.
Ancylocheilus = *Tringa*, 950.
ANDIGENA, 43.
Andriopsar = *Icterus*, 558.
ANDRODON, 131.
Androglossa = *Psittacus*, 3.
Androglossus = *Chrysotis*, 4.
ANDROPADES, 313.
ANDROPHILUS, 335, 1087.
ANELLOBIA, 724.
Anepsia = *Ixocinclæ*, 316.
Angaladiana = *Cinnyris*, 697.
Anhima = *Palamedea*, 979.
Anhinga = *Ptolus*, 1010.
Ania = *Oedemia*, 999.
Anisognathus = *Pœcilothraupis*, 664.
Anisoramphos = *Rhynchops*, 1020.
Anisoterus = *Phaethornis*, 131.
Anobapton = *Brachyrhamphus*, 1044.
ANODORHYNCHUS, 9.
Anomalocorax = *Corvus*, 502.
Anomalophrys = *Sarciophorus*, 933.
ANOMALOSPIZA, 1107.
Anoplops = *Gyrinopithys*, 173.
ANORRHINUS, 102.
ANORTHURA, 427, 1096.
ANOUS, 1018.
ANSER, 982.
ANSERANAS, 979.
Anserella = *Nettopus*, 981.
Anseria = *Anser*, 982.
Antenor = *Parabuteo*, 858.
ANTHIPES, 294, 1083.
ANTHOBAPHES, 695.
ANTHOCEPHALA, 146.
ANTHOCHÆRA, 724.
ANTHOCINCLA, 206.
Anthodiata = *Anthreptes*, 703.
Authomiza = *Anthornis*, 723.
ANTHORNIS, 723.
ANTHOSCENUS, 1068.
Anthoscopus = *Egithalus*, 467.
Anthothreptes = *Anthreptes*, 703.
ANTHRACOCEROS, 100.
Anthracothorax = *Lampornis*, 145.
ANTHREPTES, 703, 1113.
Anthrobaphes = *Anthobaphes*, 695.
Anthropoides = *Tetrapteryx*, 923.
ANTHUS, 445, 1098.
ANTICHROMUS, 489, 1103.
Anticorys = *Masius*, 220.
Antigone = *Grus*, 921.
ANTILOPHIA, 1074.
Antimimus = *Harporhynchus*, 417.
Antisianus = *Pharomacrus*, 85.
ANTROSTOMUS, 122, 1063.
ANUMBUS, 197.
Anura = *Phœpyga*, 430.
Anurolimnas = *Porzana*, 967.
ANUROPSIS, 333.
APALIS, 352, 1089.
Aphalharpactes = *Hapalarpactes*, 88.
Aphalus = *Microparra*, 958.
Aphanolimnas = *Pennula*, 969.
APHANTOCHROA, 134, 1065.
APHELOCEPHALA, 1101.
APHELOCOMA, 512, 1105.
APHORUS, 561.
APHRASTURA, 1072.
APHRIZA, 949.
APLONIS, 541, 1105.
Aplopelia = *Haplopelia*, 768.
Apobapton = *Brachyrhamphus*, 1044.
Apolites = *Pilangus*, 243.
Aporophantes = *Pendulinius*, 556.
APROSMICTUS, 20.
APTENODYTES, 1047.
Apternus = *Tridactylia*, 72.
Apterynx = *Apteryx*, 1049.
Apterodita = *Aptenodytes*, 1047.
APTERYX, 1049.

Apus = Gypselus, 125.
Aquatis = Cinclus, 418.
AQUILA, 851.
Aquilastur = Eutolmæetus, 850.
ARA, 10.
Aracari = Pteroglossus, 43.
Arachucclura = Cinnyris, 697.
Arachnoestra = Arachnothera, 705.
Arachnophila = Anthreptes, 703.
Arachnoraphis = Arachnothera, 705.
ARACHNOTHERA, 705, 1113.
Aracianga = Ara, 10.
ARAMIDES, 963.
ARAMIDOPSIS, 963.
ARAMUS, 920.
Arapunga = Chasmorhynchus, 219.
Aratinga = Conurus, 11.
ARBELORHINA, 689, 1112.
ARBORICOLA, 813.
Arborophila = Arboricola, 813.
Arceuthornis = Turdus, 399.
ARCHIBUTEO, 854.
Archicorax = Corvultur, 591.
Archilochus = Trochilus, 162.
Archimerops = Merops, 96.
Archolestes = Malacoptilus, 489.
Arctica = Mergulus, 1043.
Arctonetta = Lampronetta, 1000.
ARDEA, 909, 1117.
ARDEIBALLA, 915.
Ardenna = Puffinus, 1030.
ARDEOLA, 913, 1117.
Ardeomega = Ardea, 909.
ARDETTA, 914.
ARENARIA, 919.
Areortyx = Turnix, 778.
Areoturnix = Turnix, 778.
Argala = Leptoptilus, 907.
Argicus = Bucco, 46.
Argurocitta = Uroleuca, 515.
Argus = Argusianus, 795.
Argusa = Argusianus, 795.
ARGUSIANUS, 795.
Argusinius = Argusianus, 795.
ARGYA, 323, 1086.
Ariana = Amazilia, 138.
Ariana = Saucerotlea, 137.
Arinia = Polyerata, 136.
Aristonetta = Ethya, 996.
Arquatella = Tringa, 950.
ARREMON, 646, 1111.
Arremonops = Embernagra, 638.
Arrenga = Myiophonus, 407.
ARSES, 288, 1083.
ARTAMIA, 498.

Artamides = Graucalus, 295.
ARTAMUS, 533.
ARTOMYIAS, 265.
Arundinaceus = Acrocephalus, 368.
Arundinax = Luscinola, 371.
ARUNDINICOLA, 228.
Asarcia = Larra, 958.
ASARCORNIS, 981.
Ascalaphia = Bufo, 880.
Ascalopax = Limnocyphus, 955.
Asilus = Phylloscopus, 377.
ASIO, 877.
Aspasta = Heliodoxa, 149.
ASPATHA, 95.
Atacophilus = Halcyon, 106.
Asthenes = Siptornis, 199.
Asthenurus = Picumnus, 83.
Astragalinus = Chrysomitris, 591.
ASTRAPIA, 519.
Astrarchia = Astrapia, 519.
Astrilda = Estrela, 581.
ASTUR, 839, 1116.
ASTURINA, 859.
ASTURINULA, 839.
Asturisca = Asturina, 859.
ASYNDESMUS, 68.
Atalochrous = Malimbus, 568.
Atelodaenis = Dacnis, 687.
Atelopsar = Pendulinus, 556.
ATELORNIS, 92.
ATHENS, 894, 1117.
ATLAPETES, 636.
Atopornis = Nigrita, 575.
Atraphornis = Scotocerca, 360.
Atraphornis = Sylvia, 374.
ATRICHIA, 729, 1113.
ATRICHORNIS, 1113.
Atricilla = Larus, 1021.
Attagen = Fregata, 1012.
Attagen = Lagopus, 826.
Attagen = Francolinus, 807.
ATTAGIS, 780.
ATTHIS, 163.
ATTICORA, 257.
ATTILA, 214, 1074.
Auchmalea = Lessonia, 230.
Audubonia = Ardea, 909.
AUGASMA, 1066.
AUGASTES, 159.
AULACORHAMPHUS, 44, 1056.
Aulacorhynchus = Aulacorhamphus, 44.
Aulanax = Sayornis, 227.
AULIA, 213, 1074.
Aurinia = Lophornis, 165.
AUBIPARUS, 468.

Auripasser = *Passer*, 597.
Australasia = *Trichoglossus*, 30.
AUTOMOLUS, 194, 1072.
Avicida = *Baza*, 866.
Avocetta = *Recurvirostra*, 943.
Avocettinus = *Avocettula*, 145.
Avocettinus = *Opisthoprora*, 156.
AVOCETTULA, 145.
Aythia = *Aethya*, 996.
BABAX, 320.
Bæocerca = *Sylvicola*, 334.
Bæolophus = *Lophophanes*, 465.
Bæopipo = *Yungipicus*, 74.
Bæopogon = *Xenocichla*, 309.
Bæoscelis = *Eremomela*, 355.
Bahila = *Liothrix*, 347.
Bainopus = *Niltava*, 294.
BALÆNICEPS, 909.
Balbuzardus = *Pandion*, 877.
BALEARICA, 923.
Balicassius = *Dicrurus*, 529.
BAMBUSICOLA, 817.
Bananivorus = *Pendulinus*, 556.
Banksianus = *Calyptorhynchus*, 1.
BARBATULA, 37, 1055.
Barita = *Cracticus*, 500.
BARNARDIUS, 25, 1054.
Barrabandius = *Polytelis*, 20.
BARTHAMIA, 949.
Baruffius = *Oriolus*, 525.
Baryphonus = *Momotus*, 94.
BARYPHTHENGUS, 95.
Basanistes = *Urolestes*, 482.
BASILEORNIS, 538.
BASILEUTERUS, 438, 1098.
BASILINNA, 139.
Basilornis = *Basileornis*, 538.
BATARA, 184.
BATHILDA, 585.
Bathmidura = *Leptasthenura*, 201.
Bathmidurus = *Pachyrhamphus*, 212.
BATHMISYRNA, 291.
BATHMOCERCUS, 331, 1086.
Bathyrhynchus = *Paradoxornis*, 470.
BATIS, 264, 1080.
BATRACHOSTOMUS, 116.
Baucis = *Abeillia*, 164.
BAZA, 866.
Beauharnaisius = *Pteroglossus*, 43.
BEBRORNIS, 349.
Bellatrix = *Lophornis*, 165.
Bellona = *Othorhynchus*, 164.
Belocercus = *Palæornis*, 18.
BELONOPTERUS, 935.
Belurus = *Palæornis*, 18.

Berenicornis = *Anorrhinus*, 102.
BERLEPSCHIA, 196.
Bernicla = *Branta*, 984.
BERNIERIA, 314.
Bessethera = *Drymocataphus*, 334.
BESSONORNIS, 410.
Bessonornis = *Irania*, 383.
Bessoruis = *Bessonornis*, 410.
Bethylus = *Cissopis*, 644.
BHIRINGA, 532.
BIAS, 265.
BIATAS, 181.
Biastes = *Biatas*, 181.
Biblis = *Cotyle*, 256.
Bidens = *Harpagus*, 868.
Biensis = *Rallus*, 959.
BIZIURA, 1002.
BLAGICUS, 249, 1078.
Blacops = *Verreauxia*, 1059.
Blagnus = *Haliaeetus*, 853.
Blanfordius = *Suya*, 358.
Blasipus = *Larus*, 1021.
Blax = *Verreauxia*, 84.
Blechropus = *Tænioptera*, 225.
Bleda = *Xenocichla*, 309.
Blepharomerops = *Merops*, 96.
BLYTHPICUS, 77, 1059.
Bocagia = *Antichromus*, 489.
Boissonneaua = *Panoplitus*, 152.
Boissonneauxia = *Panoplitus*, 152.
BOLBOPSITTACUS, 22.
BOLBORHYNCHUS, 14.
Bombycilla = *Ampelis*, 260.
Bombycistomas = *Batrachostomus*, 116.
Bombycivora = *Ampelis*, 260.
Bombylonax = *Merops*, 96.
BONAPARTIA, 307.
BONASA, 823.
Boschas = *Anas*, 989.
Boscis = *Pastor*, 537.
BOSTRYCHIA, 901.
BOSTRYCHOLOPHUS, 304.
BOTAURUS, 918.
BOURCIERIA, 151.
BOWDLERIA, 337.
Brachonyx = *Mirafr*, 455.
Brachycex = *Brachygalba*, 45.
BRACHYCOPE, 1107.
BRACHYGALBA, 45.
Brachylophus = *Gecinus*, 63.
Brachyotus = *Asio*, 877.
BRACHYPODIUS, 308, 1085.
Brachyprorus = *Struthidea*, 515.
BRACHYPTERACIAS, 92.
Brachypternopicus = *Brachypternus*, 78.

- BRACHYPTERNUS, 78.
Brachypterus = *Micrastur*, 837.
 BRACHYPTERYX, 342, 1087.
Brachyptallus = *Tribonyx*, 973.
Brachypus = *Cypselus*, 125.
Brachypus = *Pycnonotus*, 305.
Brachypus = *Rubigula*, 308.
 BRACHYRHAMPHUS, 1044.
Brachyspiza = *Zonotrichia*, 625.
Brachystoma = *Struthidea*, 545.
Brachyurus = *Pitta*, 207.
Bradybates = *Hodgsonius*, 384.
 BRADYORNIS, 287, 1082.
 BRADYPTERUS, 350, 1088.
Bradypterus = *Hodgsonius*, 384.
Brahmapicus = *Brachypternus*, 78.
 BRANTA, 984.
Branta = *Netta*, 996.
Brenthus = *Branta*, 984.
Brissonia = *Philepitta*, 210.
Broderipus = *Oriolus*, 525.
 BROTOGERYS, 15.
Bruchigavia = *Larus*, 1021.
Brunhilda = *Estrela*, 581.
 BUARREMON, 647, 1111.
Bubalornis = *Textor*, 569.
 BUBO, 880.
Bubotus = *Bubo*, 880.
 BUBULCUS, 913.
Bubutus = *Rhinortha*, 59.
Bucanetes = *Erythrospiza*, 596.
Buccanodon = *Barbatula*, 37.
 BUCCO, 46.
Buccotrogon = *Psilopogon*, 40.
Bucephala = *Clangula*, 998.
 BUCEROS, 100.
Buceroturus = *Rhinoplax*, 99.
Buchanga = *Dicrurus*, 529.
Bucia = *Nyctiornis*, 97.
Bucorax = *Bucorvus*, 99.
 BUCORVUS, 99.
Buddinghia = *Philepitta*, 210.
Budytes = *Motacilla*, 442.
 BUGERANUS, 922.
Buglodytes = *Campylorhynchus*, 419.
Bulaca = *Syrnium*, 890.
Bulestes = *Cracticus*, 500.
 BULWERIA, 1036.
 BUPHAGA, 519.
Buphagus = *Megalestris*, 1027.
Buphus = *Ardeola*, 913.
 BURIINUS, 928.
Burhynchus = *Rhamphastos*, 42.
 BURNESIA, 359, 1089.
Burtonia = *Callacanthis*, 593.
 BUSARELLUS, 862.
Buscarla = *Emberiza*, 620.
Buserinus = *Serinus*, 599.
Bustamentia = *Catamblyrhynchus*, 618.
Butaëtes = *Archibuteo*, 854.
Butaëtus = *Eutolmaëtus*, 850.
 BUTALIS, 262, 1079.
Butaquila = *Buteo*, 855.
 BUTASTUR, 859.
 BUTEO, 855, 1116.
 BUTEOGALLUS, 861.
 BUTEOLA, 858.
 BUTHIRAUPIS, 663, 1111.
Butio = *Gorsachius*, 978.
Butor = *Botaurus*, 918.
 BUTORIDES, 915.
 BUTRERON, 732.
 BYCANISTES, 101.
Byrseus = *Loxops*, 594.
Bythoneasa = *Eristatura*, 1001.
 CABALUS, 962.
Cabanisia = *Hemipus*, 497.
Cucangelus = *Surniculus*, 50.
 CACATUA, 2.
 CACCABIS, 806, 1116.
Cachinna = *Herpetotheres*, 833.
 CACOMANTIS, 52, 1056.
Cacopitta = *Turdus*, 331.
Cactocraugus = *Melanerpes*, 68.
Cactornis = *Geospiza*, 608.
Cactospiza = *Geospiza*, 608.
Cælebs = *Fringilla*, 589.
 CÆNOTRICCUS, 233, 1075.
Cæsarornis = *Porphyrio*, 975.
 CAICA, 8.
 CAIRINA, 980.
Calamanthella = *Cisticola*, 363.
 CALAMANTHUS, 360, 1089.
 CALAMOCICHLA, 352, 1089.
Calamodromus = *Rougetius*, 965.
Calamodus = *Acrocephalus*, 368.
Calamodyta = *Acrocephalus*, 368.
Calamoherpe = *Acrocephalus*, 368.
 CALAMONASTES, 352, 1089.
Calamophilus = *Panurus*, 469.
 CALAMOSPIZA, 625.
Calandra = *Melanocorypha*, 452.
 CALANDRELLA, 453, 1099.
Calandrina = *Melanocorypha*, 452.
Calandritis = *Calandrella*, 453.
Calao = *Rhytidoceros*, 101.
 CALCARIUS, 625.
 CALENDULA, 458.
Calendulauda = *Alæmon*, 450.
Catherodius = *Nycticorax*, 917.

- CALICALICUS, 487.
 CALIDRIS, 950.
Calipareus = Podicipes, 1010.
Calipyga = Liothrix, 347.
Calisitta = Dendrophila, 681.
 CALLACANTHIS, 593.
Callæas = Glaucopis, 516.
 CALLEOPS, 288.
 CALLENE, 408, 1094.
Callialcyon = Halcyon, 106.
Callichelidon = Tachycineta, 255.
Callichen = Netta, 996.
Callidera = Chlamydera, 523.
Callidice = Panoplitæ, 152.
 CALLIECHTHRUS, 50.
Calligenia = Helianthea, 150.
Callienas = Calenas, 774.
 CALLIOPE, 383.
Calliornis = Lamprocorax, 542.
Calliparæa = Chlorochrysa, 669.
 CALLIPEPLA, 818.
Calliperidia = Heliomaster, 160.
Callipharus = Eupherusa, 144.
 CALLIPHLOX, 161.
Callipicus = Eleopicus, 75.
Callipsittacus = Calopsitta, 3.
Calliptilus = Phigys, 30.
Callirhynchus = Neorhynchus, 614.
 CALLISTE, 665.
Callithorax = Calothorax, 160.
Callithraupis = Orthogonys, 658.
 CALLOCEPHALON, 2.
Callopsaris = Pachyrhamphus, 212.
Callothrux = Molothrus, 552.
Calobates = Motacilla, 442.
 CALOCHÆTES, 659.
 CALOCITTA, 509.
Calocitta = Urocissa, 507.
Calodera = Chlamydera, 523.
Calodromas = Calopezus, 786.
 CALENAS, 774.
Calopelia = Chalcopelia, 765.
 CALOPERDIX, 814.
Calopetes = Daption, 1036.
 CALOPEZUS, 786.
Calophasis = Phasianus, 801.
Calopicus = Chrysophlegma, 67.
 CALOPSITTA, 3.
 CALORHAMPHUS, 38.
Calornis = Lamprocorax, 512.
 CALOSPIZA, 1111.
Calospiza = Calliste, 665, 1111.
 CALOTHORAX, 160.
Calurus = Pharomacrus, 85.
 CALVIFRONS, 1074.
 CALYPTE, 163.
 CALYPTOMENA, 204.
Calyptomenænas = Drepanoptila, 741.
 CALYPTOPHILUS, 652.
 CALYPTORHYNCHUS, 1.
Calyptrophorus = Paroaria, 612.
 CALYPTURA, 218.
Camarophagus = Tachyphonus, 655.
 CAMAROPTERA, 356, 1089.
Camarhynchus = Geospiza, 608.
Campias = Eleopicus, 75.
Campicola = Saxicola, 388.
 CAMPOCHERA, 299, 1084.
Camponomus = Mesopicus, 76.
 CAMPOPHAGA, 300, 1084.
 CAMPOPHILUS, 80, 1059.
 CAMPOUTHERA, 65, 1057.
 CAMPTOLEMUS, 1000.
Camptolophus = Cacatua, 2.
Camptostoma = Ornithion, 238.
Campylops = Diglossa, 685.
 CAMPYLOPTERUS, 133.
 CAMPYLORHYNCHUS, 419, 1095.
Canace = Falcipennis, 825.
Canachites = Falcipennis, 825.
Cancroma = Cochlearius, 920.
Cancrophaga = Ha'cyon, 106.
 CANIRALLUS, 965.
 CANNABINA, 589, 1108.
Canutus = Tringa, 950.
 CAPITO, 41, 1056.
Capnopicus = Eleopicus, 75.
 CAPRIMULGUS, 122, 1063.
 CAPSIEMFIS, 237.
Caracara = Polyborus, 832.
Carbo = Phalacrocorax, 1006.
Carbonarius = Dryocopus, 83.
Carbonarius = Phalacrocorax, 1006.
 CARCINEUTES, 110.
 CARDELLINA, 440.
 CARDINALIS, 619, 1110.
 CARDUELIS, 591, 1109.
Carenochrous = Pipilopsis, 618.
 CARIAMA, 924.
Caricicola = Acrocephalus, 368.
Caridagrus = Halcyon, 106.
Caridonax = Monachalcyon, 105.
Carina = Cairina, 980.
Carine = Athene, 894.
Carmelita = Chalcomitra, 701.
Carnifex = Micrastur, 837.
Carphibis = Ibis, 900.
 CARPOCOCCYX, 61.
 CARPODADUS, 602, 1109.
 CARPODECTES, 217.

- CARPOPHAGA, 743-44.
Carpornis = Ampelion, 215.
Carpospiza = Petronia, 596.
Carvanaca = Esacus, 928.
Caryocatactes = Nucifraga, 506.
Caryothraustes = Pitylus, 643.
 CASARCA, 989.
 CASIORNIS, 214.
Casmarhynchos = Chasinorhynchus, 219.
Casmerodius = Herodias, 912.
 CASSICULUS, 551.
 CASSICUS, 550.
Cassiculoides = Pendulinus, 556.
 CASSIDIX, 551, 1106.
Cassidix = Cranorrhinus, 99.
 CASSINIA, 295.
Castanolimnas = Rallina, 965.
 CASUARIUS, 1050.
 CATAMBLYRHYNCHUS, 618.
 CATAMENIA, 617.
 CATAPONERA, 328.
Cataractes = Megalestris, 1027.
Cataractes = Uria, 1043.
 CATARRHACTES, 1047.
Catharacta = Megalestris, 1027.
 CATHARISTA, 828.
Catharistes = Catharista, 828.
 CATHARMA, 161.
 CATHAROPEZA, 1096.
 CATHARTES, 828.
 CATHARUS, 393, 1092.
 CATHERPES, 428, 1096.
 CATHETURUS, 788.
Catoptropelicanus = Pelecanus, 1005.
Catoptrophus = Symphemia, 946.
Catosparactes = Pagophila, 1026.
 CATREUS, 801.
Catriscus = Schoenicola, 349.
Cauar = Jacamaraleyon, 46.
Caucalius = Galbula, 45.
Caucacias = Gabalyorhynchus, 46.
Caulodromus = Rimator, 332.
Ceblepyris = Graucalus, 295.
Cecropis = Hirundo, 253.
Celeopicus = Celeus, 79.
 CELEUS, 79.
Cenchramus = Meleagris, 796.
Centrites = Lessonia, 230.
 CENTROCERCUS, 824.
Centrococcyx = Centropus, 55.
Centrolophus = Bostrycholophus, 304.
Centronyx = Passerculus, 631.
Centropelma = Podicipes, 1040.
Centrophanes = Lessonia, 230.
Centrophunes = Calcarius, 625.
 CENTROPUS, 55, 1057.
Centrourus = Nestor, 27.
 CENTURUS, 69, 1057.
 CEOPHLEUS, 82.
Cephalanius = Conopias, 242.
Cephallepis = Cephalolepis, 164.
 CEPHALOLEPIS, 164.
Cephalophoneus = Lanius, 483.
 CEPHALOPTERUS, 218.
Cephalopteryx = Ninox, 887.
Cephalopyrus = Egithalus, 467.
Cephus = Scopus, 909.
Cephus = Uria, 1043.
 CERASOPHILA, 1086.
Ceratoblepharum = Fratercula, 1046.
 CERATOGYMNA, 101.
 CERATOPHRA, 220.
 CERATORHYNCHA, 1046.
Ceratornis = Tragopan, 797.
Ceratorrhina = Ceratorhyncha, 1046.
 CERATOTRICUS, 233.
Cerchneipicus = Celeus, 79.
Cerchneis = Tinnunculus, 870.
 CERCIBIS, 903.
 CERCOCOCYX, 51.
 CERCOMACHA, 176, 1069.
 CERCOMELA, 391.
Cerconectes = Erismatura, 1001.
Cercophæna = Chiroxiphia, 222.
Cercoronus = Corcorax, 517.
 CERCOTRICHAS, 413.
 CEREOPSIS, 980.
Cerionis = Tragopan, 797.
Ceropia = Turnagra, 329.
Cerorhina = Ceratorhyncha, 1046.
Cerorhinea = Ceratorhyncha, 1046.
 CERTHIA, 683, 1112.
 CERTHIDEA, 688.
 CERTHILAUDA, 450.
Certhiola = Cœreba, 690.
 CERTHIONYX, 719.
 CERTHIPARUS, 469.
Certhiipitta = Pitta, 207.
 CERYLE, 114, 1062.
Cetosparactes = Pagophila, 1026.
 CETTIA, 372, 1090.
 CEUTIMOCHARES, 59.
Ceyx = Ceyx, 111.
 CEYCOPSIS, 111, 1062.
 CEYX, 111, 1062.
Chacura = Caccabis, 806.
Chæmepelia = Columbigallina, 763.
Chænorrhamphe = Anastomus, 906.
Chætolema = Eurocephalus, 494.
 CHÆTROCERCUS, 163.

CHÆTOPS, 320.
 CHÆTOPTILA, 725.
Chætopus = Francolinus, 807.
 CHÆTORHYNCHUS, 531.
 CHÆTORNIS, 352.
 CHÆTURA, 127, 1064.
 CHÆTUSIA, 936.
Chaimarrhornis = Chimarrhornis, 386.
Chaitaris = Nillava, 294.
Chalcites = Chrysococcyx, 52.
Chalcococcyx = Chrysococcyx, 52.
 CHALCOMITRA, 701, 1112.
Chalcoparia = Anthreptes, 703.
 CHALCOPELIA, 765, 1114.
Chalcophanus = Quiscalus, 559.
 CHALCOPHAPS, 766.
Chalcophasis = Lophophorus, 797.
Chalcopsar = Lamprotornis, 514.
 CHALCOPSITTA, 28.
Chalcopsittacus = Chalcopsitta, 28.
Chalcopterus = Rhinoptilus, 931.
 CHALCOSTETHA, 695.
 CHALCOSTIGMA, 156.
Chalcothraupis = Calliste, 665.
 CHALCURUS, 795, 1115.
Chalybeus = Phonygamnus, 517.
 CHALYBURA, 144.
 CHAMÆA, 469, 1101.
 CHAMÆOSPIZA, 635.
 CHAMÆPETES, 794.
Chamæthlypis = Geothlypis, 1098.
Chamætylus = Geocichla, 404.
 CHAMÆZA, 171.
Chamæpelia = Columbigallina, 763.
 CHAPTIA, 532.
 CHARADRIUS, 937.
Charidhyla = Xanthopygia, 272.
Chariessa = Cœligena, 148.
Charitonutta = Clangula, 998.
 CHARITORNIS, 544.
 CHARMOSYNA, 32, 1055.
Charmosynopsis = Charinosyna, 32.
 CHASIEMPIS, 270, 1080.
 CHASMORHYNCHUS, 219.
Chatorhæa = Argys, 323.
 CHAULELASMUS, 991.
Chauliodes = Chaulelasmus, 991.
Chauliodus = Chaulelasmus, 991.
 CHAUNA, 979.
 CHAUNOPROCTUS, 610.
 CHAUNONOTUS, 493.
Chaunornis = Bucco, 46.
Chavaria = Chauna, 979.
Cheilodromas = Pluvianus, 930.
Cheimonea = Rissa, 1027.

Chelictinia = Naclerus, 863.
Chelicutia = Haleyon, 106.
Chelidis = Phibalura, 215.
 CHELIDON, 256, 1079.
 CHELIDONARIA, 1079.
Chelidonaria = Chelidon, 256, 1079.
Chelidonia = Macropteryx, 130.
 CHELIDOPTERA, 49.
Chelidopteryx = Naclerus, 863.
 CHELIDORHYNX, 274.
Chema = Xema, 1020.
 CHEN, 982.
Chenalopex = Alca, 1043.
Chenalopex = Alopochen, 988.
Cheniscus = Lunda, 1046.
Cheniscus = Nellopus, 981.
 CHENONETTA, 986.
 CHENOPIS, 987.
 CHENORHAMPHUS, 275.
Chenorhamphus = Anastomus, 906.
Chera = Diatropura, 573.
 CHERAMOECA, 258.
Chersomanes = Certhilauda, 450.
Chersophilus = Certhilauda, 450.
Chibia = Dierurus, 529.
Chicquera = Hypotriorchis, 872.
 CHIMARRHORNIS, 386.
Chimerina = Ceratorhyncha, 1046.
 CHIONARCHUS, 780.
 CHIONIS, 780.
Chionochen = Chen, 982.
Chionospiza = Montifringilla, 594.
 CHIROCYLLA, 213.
 CHIROMACHERIS, 222.
Chiroprion = Chiroxiphia, 222.
 CHIROXIPHIA, 222, 1074.
 CHLAMYDERA, 523.
 CHLAMYDOCHERA, 299.
Chlamydochen = Chenonella, 986.
Chlamydodera = Chlamydera, 523.
Chlamydæna = Alectrænas, 742.
Chlamydotis = Houbara, 926.
Chleuasicus = Suthora, 470.
Chloanges = Chlorostilhon, 141.
Chloebia = Poeophila, 584.
 CHLOËPHAGA, 985.
Chloëtrophus = Chloëphaga, 985.
Chloophaga = Chloëphaga, 985.
 CHLONESTES, 140, 1066.
 CHLORIDOPS, 606.
Chloris = Ligurinus, 609.
Chloris = Parula, 432.
Chloroceryle = Geryle, 114.
Chlorocharis = Zosterops, 705.
 CHLOROCHRYSA, 669.

- CHLOROCICHLA, 313, 1085.
CHLORODREPANIS, 692.
CHLORODYTA, 353, 1089.
Chlorænas = Columba, 748.
Chlorolampis = Chlorostilbon, 141.
Chloromyias = Oreocharis, 674.
CHLORONERPES, 64, 1057.
CHLOROPETA, 274, 1081.
CHLOROPHANES, 689.
CHLOROPHONEUS, 490.
CHLOROPHONIA, 670.
Chloropicoides = Tiga, 78.
Chloropicos = Chrysophlegma, 67.
Chloropicus = Gecinus, 63.
CHLOROPIPO, 219.
Chloropsaris = Pachyrhamphus, 212.
CHLOROPSIS, 317, 1086.
Chloroptila = Chrysomitris, 591.
Chloropygia = Brachypteracias, 92.
Chlorornis = Psittospiza, 646.
Chlorosima = Cissa, 508.
CHLOBOSPINGUS, 650, 1111.
Chlorospiza = Ligurinus, 609.
CHLOROSTILBON, 141, 1066.
CHLOROTHAUPIS, 657.
CHLOROTRERON, 739.
CHLORURA, 584.
Chlorura = Atlapeles, 636.
CHLORNIS, 470.
CHONDESTES, 625.
Chondrohierax = Gampsonyx, 864.
CHORDELES, 118.
CHORIOTIS, 927.
Choristopus = Anseranas, 979.
Chotorhea = Megalæma, 38.
Choucalcyon = Dacelo, 104.
Chourtku = Tetraogallus, 806.
Chroicocephalus = Larus, 1021.
Chromatophora = Cinnyris, 697.
Chrysauchæna = Geopelia, 762.
Chrysobronchus = Polytmus, 146.
CHRYSOCOCYX, 52, 1056.
CHRYSOCOLAPTES, 80.
Chrysocoma = Catarrhactes, 1047.
CHRYSOENAS, 741.
CHRYSOLAMPIS, 146.
CHRYSOLOPHUS, 803.
Chrysolophus = Mactornis, 229.
Chrysomirus = Chlorostilbon, 141.
CHRYSOMITRIDOPS, 594.
CHRYSOMITRIS, 591.
Chrysomna = Pectorhis, 340.
Chrysomus = Xanthosomus, 553.
Chrysonotus = Tiga, 78.
CHRYSOPHLEGMA, 67, 1057.
Chrysopicos = Campothera, 65.
Chrysopicus = Chloronerpes, 64.
Chrysopicus = Chrysoptilus, 66.
Chrysopoga = Buarreimon, 647.
Chrysopteryx = Tijuca, 215.
CHRYSOPTILUS, 66.
Chrysospiza = Passer, 597.
Chrysothraupis = Calliste, 665.
CHRYSTOTIS, 4, 1053.
Chrysotreron = Chrysænas, 741.
Chrysursisca = Chrysuronion, 140.
CHRYSURONIA, 140, 1066.
CITHONICOLA, 366.
Chunga = Cariama, 924.
Chunna = Cariama, 924.
Cia = Emberiza, 620.
CICCAEA, 893, 1117.
Ciceronia = Simorhynchus, 1045.
CICHLADUSA, 411, 1094.
Cichlalopia = Cichlherminia, 403.
Cichlalopia = Rhodinocichla, 418.
CICHLHERMINIA, 403.
Cichlerminia = Margarops, 414.
Cichlocolaptes = Anabazenops, 192.
Cichlocolaptes = Automolus, 194.
Cichloides = Merula, 394.
CICHILOPASSER, 406.
Cichlops = Anthus, 445.
CICHILOPSIS, 407.
Cichloselys = Merula, 394.
CICINNURUS, 519, 1105.
CICONIA, 905.
Cillurus = Cinclodes, 202.
Cinaidium = Anthus, 445.
Cinclidia = Pellorneum, 336.
Cinclidium = Callene, 408.
CINCLOCENTHIA, 414.
CINCLODES, 202, 1072.
Cinclops = Rhamphocinclus, 414.
CINCLORHAMPHUS, 361.
CINCLOSOMA, 318.
CINCLUS, 418, 1095.
Cinclus = Arenaria, 949.
Cinnamolegus = Falcinellus, 520.
CINNAMOPTERUS, 545.
CINNAMOPTERYX, 561.
CINNICERTHIA, 419.
Cinnyricinclus = Anthreptes, 703.
Cinnyricinclus = Pholidauges, 541.
CINNYRIS, 697, 1112.
CIRCAËTUS, 833.
Circe = Phaeoptila, 139.
Circinnurus = Cicinnurus, 519.
CIRCUS, 835.
CIRIDOPS, 693.

Cirlus = *Emberiza*, 620.
Cirrcpidasmus = *Charadrius*, 937.
CIRRHIPERA, 220.
Cirrhocephala = *Larus*, 1021.
Cissa, 508.
Cissomela = *Myzomela*, 714.
Cissolopha = *Cyanolyca*, 513.
CISSOPIS, 614.
Cissurus = *Pitylus*, 643.
CISTICOLA, 363, 1089.
Cistodyta = *Cisticola*, 363.
CISTOTHORUS, 424, 1095.
Citrinella = *Chrysomitris*, 591.
Citrinella = *Emberiza*, 620.
Citta = *Cissa*, 508.
Citta = *Pitta*, 207.
CITTOCINCLA, 413, 1094.
Cittocinclu = *Cossypha*, 409.
CITTUNA, 105.
CLADORHYNCHUS, 943.
Cladoscopus = *Dendrexelastes*, 188.
Cladoscopus = *Sphyrapicus*, 69.
Cladurus = *Barbatula*, 37.
Clais = *Klais*, 164.
Clamator = *Francolinus*, 807.
CLANGULA, 998.
CLARAVIS, 764.
CLAUDIA, 127.
Cleptes = *Pica*, 506.
CLEPTONNIS, 722.
CLIBANORNIS, 202.
Climacocercus = *Micrastur*, 837.
CLIMACTERIS, 684, 1112.
CLITONYX, 469.
CLIVICOLA, 1079.
Clivicola = *Cotyle*, 256, 1079.
Clorhynchus = *Ibidorhynchus*, 944.
Clotho = *Eupherusa*, 144.
Clupeilarus = *Larus*, 1021.
Clypeata = *Spatula*, 995.
CLYPEICTERUS, 549.
CLYTOCEYX, 104.
CLYTOCTANTES, 180.
CLYTOLEMA, 149.
CLYTOMYIAS, 275.
CLYTORHYNCHUS, 499.
CLYTOSPIZA, 570.
CNEMOPHILUS, 524.
CNIPODECTES, 245, 1077.
CNIPOLEGUS, 228.
Cnipotheres = *Campothera*, 65.
Cocoborus = *Guiraca*, 612.
Coccolarynx = *Melittophagus*, 96.
Coccopsis = *Paroaria*, 642.
COCCOPYGIA, 580, 1108.

COCCOTHAUSTES, 610.
COCCYCOLIUS, 547.
Coccyua = *Piaya*, 58.
Coccygus = *Coccyzus*, 53.
Coccygon = *Coccyzus*, 53.
Coccygus = *Coccyzus*, 53.
COCCYSTES, 49.
Coccyzenas = *Reinwardtœnas*, 756.
Coccyzura = *Macropygia*, 754.
COCCYZUS, 53, 1056.
Coccyzusa = *Piaya*, 58.
COCHLEARIUS, 920.
Cochlothaustes = *Coua*, 60.
COCHOA, 284.
COCORNIS, 609.
Codonistris = *Grallaria*, 169.
COELIGENA, 148.
Coelotreron = *Columba*, 748.
Cœnocorypha = *Gallinago*, 952.
COEREA, 690, 1112.
Cœreba = *Arbelorhina*, 689.
COLEUS, 505.
COLAPTES, 62, 1057.
Colaris = *Eurystomus*, 93.
Coleorhamphus = *Chionis*, 780.
Colinia = *Colinus*, 820.
COLINUS, 820.
Coliostruthus = *Penthetria*, 573.
COLIUS, 90, 1060.
Coliuspasser = *Penthetria*, 573.
COLLOCALIA, 129, 1064.
COLLURICINCLA, 495, 1104.
Colluricisoma = *Colluricincla*, 495.
Collurio = *Lanius*, 483.
Colluriocinclu = *Colluricincla*, 495.
Collurisoma = *Colluricincla*, 495.
Colobathris = *Grallaria*, 169.
Coloburis = *Pitta*, 207.
Colophimus = *Schizorhis*, 90.
Colopterus = *Colopteryx*, 234.
COLOPTERYX, 234.
Colorhamphus = *Serphophaga*, 235.
COLUMBA, 748, 1114.
COLUMBIGALLINA, 763, 1114.
Columbigallus = *Alectrœnas*, 742.
Columbina = *Columbula*, 763.
Columbipicus = *Melanerpes*, 68.
COLUMBULA, 763.
Colymbetes = *Podicipes*, 1040.
COLYMBUS, 1039.
Comatibis = *Geronticus*, 901.
Comatotis = *Sypheotis*, 926.
Comeris = *Sasia*, 85.
Cometes = *Dieruius*, 529.
Cometes = *Leshia*, 158.

- COMPSOCOMA, 663.
Compsohalius = Phalacrocorax, 1006.
Compsortyx = Excalfactoria, 816.
 COMPSOSPIZA, 623.
Compsothlypis = Parula, 432.
Compsotis = Afrotis, 924.
 CONIROSTRUM, 686, 1112.
 CONOPIAS, 242.
 CONOPOPHAGA, 168, 1068.
Conopophila = Entomophila, 719.
 CONOSTOMA, 470.
 CONOTHAUPIS, 646.
Conradinia = Bourcieria, 151.
 CONTOPUS, 248, 1078.
Conuropsis = Conurus, 11.
 CONURUS, 11.
Cookilaria = Estrelata, 1033.
 COOPERASTUR, 844.
Coporthumplus = Todirhamplus, 110.
Coprotheres = Stercorarius, 1027.
Coprotretis = Upucerthia, 203.
Copsichus = Merula, 394.
 COPSICHUS, 411.
 COPURUS, 229.
Coracia = Fregilus, 516.
 CORACIAS, 92, 1060.
Coracina = Graucalus, 295.
Coracina = Pyroderus, 218.
Coraeiura = Coracias, 92.
 CORACOCICHLA, 210, 1073.
Coracopitta = Coracocichla, 210.
 CORACOPSIS, 4.
Coragyps = Catharista, 828.
Coraphidea = Calandrella, 453.
Coraphites = Pyrrhulauda, 459.
Corapica = Cissa, 508.
Corapipo = Pipra, 220.
Corapitta = Atelornis, 92.
 CORCORAX, 517.
Corethrura = Sarothrura, 969.
Corethruopsis = Rallacula, 970.
 CORIPHILUS, 30.
Cormoranus = Phalacrocorax, 1006.
Cornopio = Eurystomus, 93.
Corone = Corvus, 502.
Coronica = Strepera, 501.
Coronideus = Cyanocorax, 513.
Coronis = Gymnoderus, 219.
Corospiza = Passer, 597.
Corthylis = Regulus, 379.
 CORVINELLA, 482.
 CORVULTUR, 501.
 CORVUS, 502, 1104.
Corydalla = Anthus, 445.
Corydallina = Calamospiza, 625.
 CORYDON, 205.
Corydon = Melanocorypha, 452.
Corydonyx = Centropus, 55.
Corydospiza = Phrygilus, 640.
Corydus = Galerida, 1099.
Coryllis = Loriculus, 22.
Corypha = Mirafra, 455.
Coryphegnathus = Amblyospiza, 570.
 CORYPHISTERA, 197.
 CORYPHENAS, 756.
 CORYPHOSPINGUS, 642.
 CORYPHOSPIZA, 638.
Corys = Galerida, 457.
 CORYTHAOLA, 90.
Corythaire = Turacus, 88.
Corythairexoides = Schizorhis, 90.
Corythocichla = Turdinulus, 332.
Corythophilus = Coriphilus, 30.
 CORYTHOPIS, 168, 1068.
 CORYTHORNIS, 113, 1062.
Corythix = Turacus, 88.
Corythus = Pinicola, 606.
 COSCOROBA, 987.
Cosmarops = Merops, 96.
Cosmoteira = Myzomela, 714.
Cosmotornis = Macrodipteryx, 120.
Cosmonessa = Aex, 982.
Cosmonessa = Histrionicus, 999.
Cosmonetta = Histrionicus, 999.
Cosmopelia = Phaps, 767.
 COSMOPHONEUS, 490, 1104.
 COSMOPSARUS, 544.
Cosmurus = Pharomacrus, 85.
 COSSYPHA, 409, 1094.
Cossypha = Irania, 383.
 COTINGA, 216.
 COTURNICOPS, 970.
Coturniculus = Ammodromus, 631.
 COTURNIX, 815.
 COTYLE, 256, 1079.
 COUA, 60.
Cracticornis = Numenius, 944.
 CRACTICUS, 500.
Craniolaema = Siptornis, 199.
Cranoceros = Rhinoplax, 99.
Cranopelargus = Leptoptilus, 907.
 CRANORRHINUS, 99.
Cratoccephalus = Ibis, 900.
Craspedophora = Ptilorhis, 521.
 CRASPEDOPRION, 1077.
Crataionyx = Melanichlora, 460.
 CRATEROPUS, 329, 1086.
 CRATEROSCELIS, 333, 1087.
Craugasus = Chloronperpes, 64.
Craugiscus = Picumnus, 83.

CRAX, 789, 1115.
Craxirex = Buteo, 855.
 CREADION, 516.
Creacion = Antochaera, 724.
Creagrius = Gallus, 803.
Creagrus = Xema, 1020.
 CRECISCUS, 971, 1118.
Crecopsis = Crex, 966.
 CREURGOPS, 655.
Creurgus = Tephrodornis, 493.
 CREX, 966.
 CRINGER, 310, 1085.
Criniger = Chlorocichla, 313.
Crinis = Chrysolampis, 1066.
Crinis = Lampornis, 145.
Crithagra = Serinus, 599.
 CRITHOLOGUS, 599.
Crithophaga = Miliaria, 623.
Crocias = Laniellus, 483.
Crocomorphus = Celcus, 79.
 CROCOPSIS, 306.
 CROCOPUS, 732.
Crombus = Leptosoma, 91.
 CROSSLEYIA, 338.
Crossodera = Psarisomus, 205.
Crossolaryngus = Crax, 789.
Crossophthalmus = Columba, 748.
 CROSSEOPTILON, 799.
 CROTOPHAGA, 62.
Crucirostra = Loxia, 604.
Crymonessa = Harelda, 999.
 CRYMOPHILUS, 956.
 CRYPTIRHINA, 508.
Crypticus = Prionirhynchus, 94.
 CRYPTILLAS, 1088.
Cryptoglaux = Nyctala, 1117.
 CRYPTOLOPHA, 285, 1082.
Cryptolopha = Culicicapa, 282.
Cryptonyx = Rollulus, 815.
 CRYPTOPHAPS, 746.
 CRYPTORHINA, 507.
 CRYPTOSPIZA, 576, 1108.
Cryptura = Tinamus, 781.
 CRYPTURUS, 782, 1056.
Ctenoglaux = Ninox, 887.
Ctenorhynchus = Charleasmus, 991.
 CUCULUS, 51, 1056.
Cucupicus = Colaptes, 62.
Cucupicus = Trachyphonus, 40.
Cuiparchus = Campephilus, 80.
 CULICICAPA, 282.
Culicipeta = Cryptolopha, 285.
 CULICIVORA, 235.
Cultrides = Neomorphus, 61.
Cultrunguis = Ketupa, 879.

CUMANA, 793.
Cucumau = Haliaetus, 853.
 CUPHOPTERUS, 496.
Cupidonia = Tympanuchus, 824.
 CUREUS, 555.
Cureus = Coccyzus, 53.
Curotreron = Ptilopus, 735.
Curruca = Pratincola, 387.
Curruca = Sylvia, 374.
Cursor = Cursorius, 930.
 CURSORIUS, 930.
Curucujus = Trogon, 86.
Curvirostra = Loxia, 604.
 CUTIA, 348, 1088.
Cyanalcyon = Halcyon, 106.
 CYANECULA, 383.
Cyanerpes = Arbelorhina, 689.
Cyanicterus = Orthogonys, 658.
Cyanistes = Parus, 461.
Cyanocephalus = Gymnokitta, 515.
 CYANOCHEM, 986.
Cyanochloris = Chalybura, 144.
Cyanocinclia = Monticola, 392.
 CYANOCITTA, 511, 1105.
Cyanocitta = Cyanolyca, 513.
Cyanocompsa = Guiraca, 1110.
 CYANOCORAX, 513.
Cyanodacnis = Dacnis, 687.
 CYANODERMA, 342, 1088.
Cyanodiglossa = Diglossa, 685.
Cyanogarrulus = Cyanocitta, 511.
Cyanograculus = Graeculus, 295.
Cyanolanus = Artamia, 498.
 CYANOLESBIA, 157.
Cyanolestes = Artamia, 498.
Cyanoliseus = Conurus, 11.
 CYANOLYCA, 513.
 CYANOMITRA, 702, 1112.
 CYANOMYIA, 138.
Cyanomyias = Hypothymis, 274.
 CYANOPHAGA, 137.
Cyanophonia = Euphonia, 671.
 CYANOPICA, 507.
Cyanopitta = Pitta, 207.
Cyanopolius = Cyanopica, 507.
Cyanops = Megalæma, 38.
Cyanopsitta = Anodorhynchus, 9.
Cyanopsittacus = Anodorhynchus, 9.
Cyanopterus = Querquedula, 992.
 CYANOPTILA, 272.
 CYANORHAMPHUS, 26.
 CYANOSPIZA, 626.
Cyanothrus = Molothrus, 552.
 CYANOTIS, 236.
 CYANOTRERON, 738.

- Cyanura* = *Cyanocitta*, 511.
Cyanurus = *Calocitta*, 509.
 CYBERNETES, 228.
 CYCLOPSITTA, 33.
Cyclopsittacus = *Cyclopsitta*, 33.
Cyclopteros = *Zosterops*, 705.
 CYCLORHIS, 475, 1102.
Cyclorhynchus = *Rhynchocyclus*, 242.
Cyclorrhynchus = *Phaleris*, 1046.
 CYGNOPSIS, 984.
 CYGNUS, 986.
Cymatobulus = *Majaqueus*, 1033.
 CYMBILANIUS, 185.
Cymbops = *Cochlearius*, 920.
 CYMBORHYNCHUS, 206, 1073.
Cymindis = *Leptodon*, 866.
Cymochorca = *Oceanodroma*, 1028.
Cymodroma = *Fregetta*, 1030.
Cymotomus = *Puffinus*, 1030.
Cynanthus = *Cyanolestia*, 157.
Cynanthus = *Trochilus*, 162.
Cynchramus = *Emberiza*, 620.
Cynura = *Ephthianura*, 376.
Cyornis = *Siphia*, 292.
 CYPHORHINUS, 429.
Cyphos = *Bucco*, 46.
Cypseloides = *Nephæcetes*, 129.
Cypselopteryx = *Nauclerus*, 863.
 CYPSELUS, 125, 1064.
Cypsiurus = *Tachornis*, 126.
 CYPNAGNA, 654.
Cyrtes = *Campophaga*, 300.
 CYRTONYX, 821.
Cyrtopelicanus = *Pelecanus*, 1005.
 CYRTOSTOMUS, 703, 1113.
 DACELO, 104, 1062.
Dacnidea = *Chlorospingus*, 650.
 DACNIS, 687.
Daeryophorus = *Picolaptes*, 187.
 DACTYLOPTYX, 821.
Dactylostrix = *Strix*, 898.
Dædalion = *Astur*, 839.
Dædalion = *Henicopernis*, 866.
 DAFILA, 994.
Dafilula = *Dafila*, 994.
Dahila = *Copsychus*, 411.
Damia = *Eroessa*, 354.
 DAMMERIA, 1082.
 DAMOPHILA, 140.
Damophila = *Polyerata*, 136.
Dandulus = *Erithacus*, 382.
 DAPHENOSITTA, 682.
 DAPTION, 1036.
Daptrion = *Daption*, 1036.
Daptrius = *Ibycter*, 832.
Daseocharis = *Prinia*, 358.
Dasycephala = *Attila*, 214.
 DASYCROTOPHA, 338.
 DASYLOPHUS, 60.
Dasyneetopa = *Pipra*, 220.
Dasyopsis = *Attila*, 214.
Dasyornis = *Sphenura*, 319.
Dasyptilops = *Pithys*, 173.
 DASYPTILUS, 4.
Dasyptilus = *Podiceps*, 1040.
Dasyrhamphus = *Pygoscelis*, 1047.
Dasyrrhinus = *Microsittace*, 13.
Daulias = *Aëdon*, 382.
 DECOXYCHURA, 190.
Decurus = *Suya*, 358.
Defilippia = *Chætusia*, 936.
Delattria = *Celigena*, 148.
Delichon = *Chelidon*, 256.
Delopygia = *Tringa*, 950.
 DELOTHRAUPIS, 664.
Deltarhynchus = *Myiarchus*, 250.
Demiegretta = *Ardea*, 909.
 DENDRAGAPUS, 824.
 DENDREXETASTES, 188, 1071.
Dendrobates = *Eleopicus*, 75.
 DENDROBIASTES, 346, 1088.
Dendrochelidon = *Macropteryx*, 130.
 DENDROCINCLA, 186, 1070.
 DENDROCITTA, 508.
 DENDROCOLAPTES, 185, 1070.
Dendrocopos = *Picus*, 70.
Dendrocops = *Dendrocolaptes*, 185.
Dendrocoptes = *Picus*, 70.
Dendrocopus = *Dendrocolaptes*, 185.
 DENDROCYGNA, 987.
Dendrodramus = *Pygarrichus*, 190.
Dendrodromas = *Picus*, 70.
 DENDROECA, 433, 1096-97.
Dendrofalco = *Hypotriorchis*, 872.
Dendroica = *Dendroeca*, 433.
Dendroma = *Philydor*, 193.
Dendromanes = *Dendrocinclæ*, 186.
Dendromus = *Campothera*, 65.
Dendronanthus = *Anthus*, 445.
Dendronessa = *Ex*, 982.
Dendronessa = *Dendrocygna*, 987.
Dendrophaps = *Phabotreron*, 734.
Dendrophassa = *Osmotreron*, 733.
 DENDROPHILA, 681.
 DENDROPICUS, 73, 1058.
 DENDROPLEX, 189.
 DENDROPNIS, 189, 1071.
 DENDROPTYX, 818.
Dendrotreron = *Columba*, 748.
Dendrotypes = *Picus*, 70.

- Dentiger* = *Haliastur*, 862.
Dentophorus = *Odontophorus*, 822.
Derbyomyia = *Engyete*, 153.
Dermophrys = *Munia*, 586.
DEROPTYUS, 7.
Derotypus = *Deroptylus*, 7.
Dertroides = *Textor*, 569.
Despotes = *Milvulus*, 252.
Despotina = *Myiarchus*, 250.
Diachmura = *Munia*, 586.
Dialia = *Lophornis*, 165.
Diallactes = *Thamnophilus*, 182.
DIAPHORILLAS, 1058.
DIAPHOROPHYIA, 265.
DIAPHOROPTERUS, 1084.
DIARDIGALLUS, 799.
DIATROPURA, 573.
DICEUM, 676, 1112.
DICHOCEROS, 100.
Dicholophus = *Cariamama*, 924.
Dichrognathus = *Psittinus*, 21.
Dichromanassa = *Ardea*, 909.
Dichrozona = *Myrmotherula*, 178.
DICRANOSTREPTUS, 532.
DICROCERCUS, 95.
Dicruropsis = *Dicrurus*, 529.
DICRURUS, 529, 1105.
Dictyopipo = *Picus*, 70.
DIDUNCULUS, 775.
Didymacis = *Francolinus*, 807.
Digenea = *Anthipes*, 294.
Digenea = *Siphia*, 292.
DIGLOSSA, 685.
DIGLOSSOPIS, 686.
Dilobus = *Sarciphorus*, 933.
Dilophus = *Perissornis*, 536.
Dimorpha = *Siphia*, 292.
DINEMELLIA, 570.
Diodon = *Harpagus*, 868.
DIOMEDEA, 1038.
DIOPTRORNIS, 287, 1082.
Diotima = *Helianthus*, 155.
DIPHYLLODES, 519.
Diplectron = *Polyplectron*, 795.
Diplectropus = *Polyplectron*, 795.
Diplocercus = *Dissoura*, 906.
Diplodon = *Harpagus*, 868.
Diplootocus = *Pinarochroa*, 1092.
DIPLOPTERUS, 61.
Discosura = *Discura*, 166.
DISCURA, 166.
Dissemuroides = *Dissemuropsis*, 532.
DISSEMUROPSIS, 532.
DISSEMURUS, 532, 1105.
DISSODECTES, 869.
DISSOURA, 906, 1117.
Dissura = *Dissoura*, 906.
DIUGA, 641.
DIUCOPIS, 646.
Diva = *Procnopis*, 669.
DIVES, 559.
Dixiphia = *Pipra*, 220.
Dnophera = *Threnetes*, 131.
DOCIMASTES, 152.
Dolerisca = *Leucippus*, 135.
Doleromyia = *Leucippus*, 135.
DOLICHONYX, 552.
DOLIORNIS, 217.
Dolometis = *Cyanopica*, 507.
DOLOSPINGUS, 617.
Domicella = *Lorius*, 29.
Dominicanus = *Larus*, 1021.
Donacias = *Hypotaenidia*, 961.
Donacicola = *Munia*, 586.
DONAGOBIVS, 418.
Donacola = *Munia*, 586.
Donacophilus = *Creciscus*, 971.
Donacospiza = *Coryphospiza*, 638.
DORICHA, 162.
Doriponus = *Ardea*, 909.
Doryfera = *Hemistephania*, 130.
Doryphora = *Hemistephania*, 130.
Doryphorus = *Ardea*, 909.
Drepananax = *Drepanornis*, 520.
DREPANIS, 691.
Drepanophorus = *Drepanornis*, 520.
Drepanoplectes = *Penthetria*, 573.
Drepanoptera = *Drepanoptila*, 741.
DREPAOPTILA, 741.
Drepanorhamphus = *Drepanis*, 691.
Drepanorhynchus = *Nectarinia*, 694.
Drepanorhynchus = *Spermophilopsis*, 614.
DREPANORNIS, 520.
Drinoica = *Cisticola*, 363.
Drinoica = *Prinia*, 358.
DROMEOCERCUS, 348.
DROMÆUS, 1050.
Dromaius = *Dromæus*, 1050.
DROMAS, 929.
Dromeicus = *Dromæus*, 1050.
Dromiceus = *Dromæus*, 1050.
Dromicus = *Oreophilus*, 933.
Dromochelidon = *Glareola*, 929.
DROMOCOCCYX, 62.
Dromodendron = *Pygarrhichus*, 190.
Dromolwa = *Saxicola*, 388.
Dromolestes = *Buteo*, 855.
Drymaedus = *Drymoedus*, 319.
DRYMOCATAPHUS, 334, 1087.
DRYMOCHÆRA, 364.

- Drymochaeres* = *Brachypteryx*, 342, 1087.
Drymocichla = *Eminia*, 353.
Drymodes = *Drymoedus*, 319.
Drymodyla = *Cisticola*, 363.
Drymeca = *Prinia*, 358.
DRYMOEDUS, 319.
Drymoica = *Dryodromas*, 354.
Drymoipus = *Prinia*, 358.
Drymonax = *Tyrannus*, 252.
Drymophila = *Myrmeciza*, 174.
DRYMORNIS, 187.
Drymos = *Drymoedus*, 319.
Drymoterpe = *Apalis*, 352.
Dryobates = *Picus*, 70.
Dryococcyx = *Rhamphococcyx*, 59.
DRYOCOPUS, 83.
Dryocopus = *Dendrocincla*, 186.
DRYODROMAS, 354.
Dryolinnas = *Rougetius*, 965.
DRYONASTES, 328, 1086.
Dryopicus = *Dryocopus*, 83.
DRYOSCOPIUS, 492, 1104.
Dryospiza = *Serinus*, 599.
Dryotomus = *Dryocopus*, 83.
DRYOTRIORCHIS, 835.
DUBUSIA, 663.
Ducorpsius = *Cacatua*, 2.
DUCULA, 746.
DULUS, 261.
DUMETIA, 340.
Dumeticola = *Luscinola*, 371.
Dupetor = *Ardeiralla*, 915.
Duraucelius = *Harpactes*, 88.
DYBOWSKIA, 359.
Dyctiopicus = *Picus*, 70.
Dynamene = *Eudynamis*, 54.
Dypsicles = *Spheniscus*, 1048.
Dyrinia = *Mellisuga*, 164.
DYSITHAMNUS, 180, 1070.
Dysornithia = *Perisoreus*, 511.
Dysporus = *Sula*, 1011.
Dytes = *Podicipes*, 1040.
Ebucco = *Capito*, 41.
ELECTUS, 16, 1054.
ECTOPISTES, 756.
Edela = *Orthotomus*, 361.
EDOLISOMA, 298, 1084.
Edolius = *Diernus*, 529.
Egolia = *Philodice*, 161.
Egretta = *Herodias*, 912.
Eidopsarus = *Melithreptus*, 714.
Einaliu = *Larus*, 1021.
Elachura = *Anorthura*, 427.
Elania = *Elainea*, 239.
ELEOCERTHIA, 702.
ELAINEA, 239, 1076.
Elanoides = *Elasas*, 863.
ELANUS, 864.
ELAPHORNIS, 335.
ELASAS, 863.
Elasmonetta = *Anas*, 989.
Eleophonus = *Hypolais*, 373.
ELEOPICUS, 75.
Elisa = *Doricha*, 162.
Ellipura = *Formicivora*, 177.
ELLISIA, 351.
ELMINIA, 281.
Elcira = *Eupherusa*, 144.
EMARGINATA, 391.
EMBERIZA, 620, 1110.
Emberizoides = *Tardivola*, 639.
EMBERNAGRA, 638.
EMBLEMA, 580.
Emilia = *Cyanophaia*, 137.
EMINIA, 353.
Emphania = *Polyplectron*, 795.
Empharis = *Anastomus*, 906.
EMPIDAGRA, 241.
EMPIDIAS, 251.
Empidivora = *Stenosira*, 273.
EMPIDCHANES, 246, 1077.
EMPIDONAX, 247, 1077.
EMPIDONOMUS, 252.
EMPIDORNIS, 1082.
Empidothera = *Culicicapa*, 282.
ENDOMYCHURA, 1044.
ENGETE, 153.
Engyptila = *Leptoptila*, 768.
Enicocichla = *Henicocichla*, 436.
Eniconetta = *Somateria*, 1000.
Enicurus = *Henicurnus*, 449.
ENNEOCTONUS, 485, 1103.
ENODES, 548.
Entima = *Lafresnaya*, 151.
Entomedestes = *Myiadectes*, 406.
Entomobia = *Halcyon*, 106.
Entomoletes = *Chaptia*, 532.
Entomophagus = *Fluvicola*, 227.
ENTOMOPHILA, 719.
Entomophila = *Aethomyias*, 274.
Entomothera = *Halcyon*, 106.
ENTOMYZA, 725.
Enucleator = *Pinicola*, 606.
Engygrotheres = *Phalacrocorax*, 1006.
Eolophus = *Cacatua*, 2.
EOPHONA, 610.
EOPSALTRIA, 481.
Eos, 28.
Eparnetes = *Acrocephalus*, 368.
Ephialtes = *Scops*, 882.

EPHIPIORHYNCHUS, 907.
 EPHTHIANURA, 376.
Epilais = Sylvia, 374.
Epimachus = Falcinellus, 520.
Epitelarus = Leucophaeus, 1026.
Epitelolarus = Larus, 1021.
Epomia = Chrysolophus, 803.
Erana = Calendula, 458.
Eranna = Amazilia, 138.
Erasmia = Sporadinus, 142.
Erasuria = Saucerottea, 137.
Eratina = Saucerottea, 137.
Eratopsis = Saucerottea, 137.
Erator = Tityra, 210.
Erebenna = Engyete, 153.
 EREMIORNIS, 1088.
Eremita = Phaethornis, 131.
Eremobius = Henicornis, 202.
 EREMOMELA, 355.
Eremophila = Otecorys, 451.
 EREUNETES, 949.
 ERGATICUS, 440.
Eribates = Myiarchus, 250.
 ERIOCNEMIS, 153, 1067.
Eriona = Eriocnemis, 153.
Erionetta = Somateria, 1000.
Erionotus = Thamnophilus, 182.
Eriopus = Eriocnemis, 153.
 ERISMATURA, 1001.
 ERITHACUS, 382, 1091.
Erodia = Dromas, 929.
Erodiscus = Ardetta, 914.
 EROESSA, 354.
Erolia = Tringa, 950.
Erolla = Peltops, 291.
Erpornis = Herpornis, 347.
Erucivora = Lalage, 302.
Erythra = Amaurornis, 972.
Erythrauchæna = Geopelia, 762.
Erythrobuco = Pogonorhynchus, 35.
 ERYTHROCERCUS, 275, 1081.
 ERYTHROCICHLA, 336.
Erythrocnema = Parabuteo, 858.
Erythrocnus = Ardeola, 913.
Erythrodryas = Petroeca, 266.
Erythræna = Alectrænas, 742.
 ERYTHROGONY, 933.
Erythrolæma = Alectrænas, 742.
Erythrolanius = Analcipus, 528.
Erythroleuca = Sylvia, 374.
Erythrolimnas = Creciscus, 971.
 ERYTHROMYIAS, 267, 1080.
Erythroneipes = Dendropicus, 73.
Erythronota = Saucerottea, 137.
Erythrophox = Ardeiralla, 915.

Erythrophrys = Coccyzus, 53.
Erythropitta = Pitta, 207.
Erythrops = Pyctorhis, 340.
Erythropars = Xanthosomus, 553.
 ERYTHROPUS, 872.
 ERYTHROPYGIA, 412, 1094.
Erythroscelis = Totanus, 946.
 ERYTHROSPIZA, 596.
Erythrospizias = Astur, 841.
Erythrosterina = Muscicapa, 262.
Erythrostromus = Tanygnathus, 18.
Erythrothorax = Carpodacus, 602.
Erythrotreton = Alectrænas, 742.
 ERYTHROTRIORCHIS, 847.
 ERYTHRURA, 583.
 ESACUS, 928.
 ESTREDA, 581, 1108.
Etoglaux = Huhua, 881.
Eucapripodus = Nyctidromus, 121.
 EUCEPHALA, 139.
Euchates = Calochætes, 659.
Euchloridia = Anthreptes, 703.
Euchlorites = Oriolus, 525.
Euchlorinis = Pipreola, 216.
Euchlorornis = Pipreola, 216.
Euchroua = Urochroma, 8.
 EUCICHLA, 209.
Eucinetus = Pionopsitta, 7.
Euclosia = Lafresnaya, 151.
Eucnemidia = Fraseria, 497.
 EUCOMETIS, 654.
Eucorax = Manucodia, 518.
Eucorystes = Zarhynchus, 549.
Eudacnis = Dacnis, 687.
 EUDOCIMUS, 904.
Eudusia = Helianthea, 150.
Eudusia = Myrtis, 161.
Eudoca = Lampornis, 145.
Eudrepanis = Ethopyga, 695.
Eudromia = Calopezus, 786.
 EUDROMIAS, 938.
 EUDYNAMIS, 54, 1057.
Eudyptes = Catarrhactes, 1047.
 EUDYPTULA, 1048.
Eudytes = Colymbus, 1039.
Euethia = Phonipara, 618.
 EUGENES, 148, 1067.
 EUGENIA, 150.
Eugerygone = Gerygone, 1080.
Euhyas = Chælusia, 936.
Eulabeia = Anser, 982.
 EULABEORNIS, 962.
Eulabes = Gracula, 539.
 EULAMPIS, 146.
Eulidia = Myrtis, 161.

- Euliga* = Bartramia, 949.
Eulipoa = Megapodius, 786.
Eulophus = Puerasia, 801.
Eulopogon = Chasmorhynchus, 219.
Eumyias = Stoparola, 291.
EUMOMOTA, 94.
EUNETTA, 991.
Euodice = Aidemosyne, 585.
Eupsar = Icterus, 558.
EUPETES, 319, 1086.
EUPETOMENA, 134.
Euphagus = Scolecophagus, 559.
EUPHEMA, 25.
EUPHERUSA, 144.
EUPHONIA, 671.
Euplectes = Pyromelana, 571.
Euplocamus = Gennæus, 800.
Euplocamus = Lophura, 798.
Eupodes = Sycobrotus, 565.
Eupodoces = Podoces, 1105.
EUPODOTIS, 927.
Eupogonius = Chalcostigma, 156.
Euprepiste = Calliste, 665.
Euprinodes = Apalis, 352.
Eupsilostoma = Pogonotriccus, 235.
Eupsittaca = Conurus, 11.
Eupsittula = Conurus, 11.
EUPSYCHONTYX, 819.
EUPTILOSUS, 1085.
EUPTILOTIS, 86.
EURHYNORHYNCHUS, 950.
Eurillas = Andropadus, 1085.
EUROCEPHALUS, 494.
Eurostopodus = Eurostopus, 119.
EUROSTOPUS, 119.
Eurycercus = Laticilla, 350.
EURYCEROS, 498.
EURYLEMUS, 205.
Eurhynchus = Microglossus, 1.
Eurypterus = Chælusia, 936.
EURYPTILA, 350.
EURYPYGA, 921, 1117.
EURYSTOMUS, 93, 1061.
Euryzona = Rallina, 965.
EUSCANTHUS, 232, 1075.
Euschemon = Calliste, 665.
Euspina = Spiza, 639.
Euspiza = Spiza, 639.
EUSTEPHANUS, 157.
Eustrinx = Strix, 898.
EUTHLYPIS, 442.
Euthraupis = Iridornis, 664.
Euthyrhynchus = Timeliopsis, 727.
EUTOLMAËTUS, 850.
EUTOXERES, 133, 1065.
EUTRERON, 738.
EUTRIORCHIS, 835.
EUTRYGON, 774.
EUXENURA, 906.
Evopsitta = Conurus, 11.
Exanthemops = Chen, 982.
EXCALFACTORIA, 816.
Exetastus = Tityra, 210.
Exochocichla = Henicocichla, 1097.
Falcator = Drepanis, 691.
FALCINELLUS, 520.
Falcinellus = Plegadis, 903.
Falcinellus = Tringa, 950.
FALCIPENNIS, 825.
Falcirostra = Ibidorhynchus, 944.
FALCO, 874, 1116.
Falcula = Tinnunculus, 870.
FALCULIA, 728.
FALCUNCULUS, 482.
Fedoa = Limosa, 945.
Fedoa = Œdienemus, 927.
Ficedula = Muscicapa, 262.
Ficedula = Phylloscopus, 377.
Figulus = Furnarius, 203.
Finschia = Certhiparus, 1101.
Fiscus = Lanius, 483.
Floresia = Lampornis, 145.
FLORICOLA, 160.
Florida = Ardea, 909.
FLORISUGA, 134, 1065.
FLUVICOLA, 227.
FORMICARIUS, 171, 1069.
FORMICIVORA, 177, 1070.
FOUDIA, 566.
Foulchaio = Ptilotis, 719.
FRANCOLINUS, 807.
Franklinia = Cisticola, 363.
FRASERIA, 497.
FRATERCULA, 1046.
FREGATA, 1012.
FREGETTA, 1030.
FREGILUS, 516.
FREGILUPUS, 548.
FRINGILLA, 589.
FRINGILLARIA, 623.
Fringillauda = Montifringilla, 594.
Fringilloparus = Liothrix, 347.
Fruticicola = Pratincola, 387.
FULICA, 977.
FULIGULA, 997.
Fulix = Fuligula, 997.
FULMARUS, 1036.
FULVETTA, 346.
Funingus = Alectroenas, 742.
Furcuvia = Liothrix, 347.

- FURNARIUS, 203.
Furningus = *Alectroenas*, 742.
 GABALCYORHYNCHUS, 46.
 GABIANUS, 1026.
Galuchrysia = *Glareola*, 929.
Galactochrysea = *Glareola*, 929.
 GALEBULA, 45, 1056.
Galbulus = *Oriolus*, 525.
Galenia = *Panoplites*, 152.
Galeolimnas = *Porzana*, 967.
 GALEOPSAR, 546.
 GALEOSCOPTES, 415, 1095.
 GALERIDA, 457, 1099.
Galerita = *Galerida*, 457.
Galgulus = *Coracias*, 92.
Galgulus = *Hypsipetes*, 315.
Galgulus = *Picathartes*, 516.
 GALLICREX, 974.
 GALLINAGO, 952.
 GALLINULA, 973.
Gallinulopha = *Gallicrex*, 974.
Gallirallus = *Ocydromus*, 964.
 GALLIREX, 89, 1060.
Gallita = *Alectrurus*, 228.
Gallopavo = *Meleagris*, 796.
 GALLOPERDIX, 817.
Gallophasis = *Pucrasia*, 801.
 GALLUS, 803.
Gambetta = *Totanus*, 946.
 GAMPSONYX, 864.
 GAMPSORHYNCHUS, 323, 1086.
Ganic = *Ortalida*, 792.
Ganza = *Somateria*, 1000.
Garrodia = *Oceanites*, 1029.
 GARRULAX, 327, 1086.
Garrulaxis = *Garrulax*, 327.
 GARRULUS, 510.
Garzetta = *Herodias*, 912.
Gauropicoides = *Mesospilus*, 67.
Gavia = *Anous*, 1018.
Gavia = *Colymbus*, 1039.
Gavia = *Larus*, 1021.
Gavina = *Larus*, 1021.
Gazzola = *Corvus*, 502.
Geciniscus = *Gecinulus*, 67.
 GECINULUS, 67.
 GECINUS, 63, 1057.
Gelastes = *Larus*, 1021.
 GEOCHELIDON, 1013.
Gennadas = *Falco*, 874.
 GENNAEUS, 800, 1115.
Gennaia = *Falco*, 874.
Gennæochen = *Tadorna*, 988.
Geobamon = *Geositta*, 204.
Geobasileus = *Acanthiza*, 366.
 GEOBATES, 204.
 GEOBIASTES, 92.
 GEOCICHLA, 404, 1094.
 GEOCOCYX, 61.
 GEOCOLAPTES, 62.
Geocoraphus = *Mirafr*, 455.
 GEOFFROYUS, 16, 1054.
Geopelia = *Geopelia*, 762.
 GEOPELIA, 762.
 GEOPHAPS, 767.
Geophilus = *Calenas*, 774.
Geopicus = *Colaptes*, 62.
 GEOPSITTACUS, 27.
 GEOSITTA, 204, 1073.
 GEOSPIZA, 608, 1110.
Geospiza = *Montifringilla*, 594.
Geospizopsis = *Phrygilus*, 640.
Geotacco = *Dromococcyx*, 62.
 GROTHLYPIS, 437, 1097-98.
 GEOTRYGON, 770.
Geranarchus = *Balearica*, 923.
 GERANOÆTUS, 860.
Geranopus = *Geranospizias*, 838.
 GERANOSPIZIAS, 838.
Geranus = *Tetrapteryx*, 923.
 GERONTICUS, 901.
Gervaisia = *Copsychus*, 411.
 GERYGONE, 268, 1080.
 GIGANTIPITTA, 207.
 GISELLA, 893.
 GLAREOLA, 929.
Glandarius = *Garrulus*, 510.
Glaucerosdus = *Ardea*, 909.
Glaucestes = *Porphyriola*, 975.
 GLAUCIDIUM, 896, 1117.
Glaucion = *Clangula*, 998.
Glaucionetta = *Clangula*, 998.
 GLAUCIS, 131.
Glaucococcyx = *Coua*, 60.
Glaucomyias = *Stoparola*, 291.
 GLAUCOPIS, 516.
Glaucopis = *Dendrocitta*, 508.
Glaucopis = *Thalurania*, 143.
Glaucopteryx = *Circus*, 835.
Glaucus = *Larus*, 1021.
Glaux = *Strix*, 898.
Glenargus = *Platysmurus*, 509.
Gliciphila = *Glycyphila*, 717.
 GLOBICERA, 743.
 GLOSSIPTILA, 689.
 GLOSSOPSITTA, 31.
Glossopsittacus = *Glossopsitta*, 31.
Glottis = *Totanus*, 946.
Glycispina = *Emberiza*, 620.
 GLYCYCHÆRA, 717.

- GLYCYPHILA, 717.
Glyphidiura = *Strix*, 898.
 GLYPHORHYNCHUS, 190.
Gmelinus = *Tinolia*, 143.
Gnathodon = *Didunculus*, 775.
Gnathosittaca = *Conurus*, 11.
 GNATHOSPIZA, 602.
Goldana = *Brachypteryx*, 342.
Goniaphea = *Guiraca*, 1110.
 GORSACHIUS, 918.
Gorsakius = *Gorsachius*, 918.
Gouldia = *Prymnacantha*, 165.
Gouldomyia = *Prymnacantha*, 165.
 GOUBA, 775, 1115.
 GRACULA, 539.
Graculus = *Phalacrocorax*, 1006.
 GRACULIPICA, 537.
Graculus = *Fregilus*, 516.
Graculus = *Phalacrocorax*, 1006.
Gracupica = *Graculipica*, 537.
 GRALLARIA, 169, 1068.
 GRALLARICULA, 169, 1068.
 GRALLINA, 500.
Grallipes = *Grallina*, 500.
 GRAMINICOLA, 362.
Grammarhynchus = *Pteroglossus*, 43.
 GRAMMATOPTILA, 329.
Grammatoptilus = *Gennæus*, 800.
Grammicus = *Lophoceros*, 103.
 GRANATELLUS, 438.
Granatina = *Uræginthus*, 582.
Granatirora = *Emberiza*, 620.
 GRANDALA, 386.
Graphephasianus = *Phasianus*, 801.
 GRAUCALUS, 295, 1083-84.
Graucalus = *Phalacrocorax*, 1006.
 GRAYDIDASCALUS, 6, 1053.
Gripeus = *Phalacrocorax*, 1006.
 GRUS, 921.
Grylle = *Uria*, 1043.
Gryllivora = *Copsychus*, 411.
Gryphus = *Sarcorhamphus*, 827.
Grypus = *Rhamphodon*, 131.
Guara = *Eudocimus*, 904.
 GUBERNATRIX, 620.
Gubernetes = *Cybernetes*, 228.
Guimetia = *Klais*, 164.
Guinetta = *Actitis*, 948.
 GUIRA, 62.
 GUIRACA, 612, 1110.
Gulosus = *Phalacrocorax*, 1006.
 GUTTERA, 805.
Guyornis = *Phaethornis*, 131.
 GYGIS, 1019.
 GYMNASIO, 895.
Gymnathus = *Cairina*, 980.
Gymnoblepharum = *Lunda*, 1046.
 GYMNObUCCO, 37, 1055.
 GYMNOCePHALUS, 218, 1074.
 GYMNOCICHLA, 175.
 GYMNOCORAX, 505.
Gymnocorvus = *Gymnocorax*, 505.
Gymnocranus = *Gymnobucco*, 37.
 GYMNOCREX, 963.
Gymnocrotaphus = *Bonapartia*, 307.
 GYMNODENUS, 219.
 GYMNOPENY, 835, 1116.
Gymnoglaux = *Gymnasio*, 895.
 GYMNOGYPS, 829.
 GYMNOKITTA, 815.
Gymnolæmus = *Anthræceros*, 100.
 GYMNOMYSTAX, 556.
 GYMNOPELIA, 763, 1114.
 GYMNOPHAPS, 748, 1114.
Gymnophrys = *Melithreptus*, 714.
 GYMNOPITHYS, 173, 1069.
Gymnops = *Ibycter*, 832.
Gymnops = *Sarcops*, 538.
Gymnopus = *Cacomantis*, 52.
 GYMNORHINA, 500.
Gymnorhinus = *Gymnokitta*, 515.
Gymnorhis = *Petronia*, 596.
 GYMNOSCHIZORHIS, 90.
 GYMNOSCOPI, 887.
 GYMNOSTINOPS, 549.
Gymnura = *Erismatura*, 1001.
 GYPAËTUS, 831.
Gypagus = *Cathartes*, 828.
Gyparchus = *Cathartes*, 828.
Gypiscus = *Neophron*, 830.
Gypogeranus = *Serpentarius*, 827.
 GYPOMERAX, 831.
 GYPOICTINIA, 863.
 GYPOPSITTA, 8.
Gypopsittacus = *Gypopsitta*, 8.
 GYPS, 829.
 GYPSOPHILA, 338.
Gyptus = *Gypaëtus*, 831.
Gyralca = *Alca*, 1043.
Gyrinorhynchus = *Spermophila*, 614.
Gyrola = *Calliste*, 665.
Habia = *Hedymeles*, 612.
 HABROPTILA, 964.
Habropyga = *Estrela*, 581.
 HAERURA, 234.
Hadropezus = *Turdinus*, 331.
 HADROSTOMUS, 211.
 HÆMATODERUS, 218.
Hæmatops = *Melithreptus*, 714.
 HÆMATOPUS, 932.

Hæmatornis = *Spilornis*, 834.
HÆMATORTYX, 814.
Hæmatospiza = *Carpodacus*, 602.
HEMOPHILA, 633
Hæmorrhous = *Carpodacus*, 602.
HAGEDASHIA, 902.
Hagiopsar = *Amydrus*, 545.
HALCYON, 106.
Halia = *Chlorestes*, 140.
HALIAËTUS, 853.
HALIASTUR, 862.
Halictor = *Phalacrocorax*, 1006.
Halius = *Phalacrocorax*, 1006.
Haliplana = *Sterna*, 1014.
HALOBENA, 1037.
HALOCYPTENA, 1028.
HALODROMA, 1037.
Hamirostrum = *Rosthramus*, 864.
HAPALARPACTES, 88.
HAPALOCERCUS, 234, 1075.
HAPALODERMA, 87, 1060.
Hapalophorus = *Trogon*, 86.
HAPALOPTERON, 1084.
HAPALOPTILA, 48.
Hapalura = *Culicivora*, 235.
Hapalurus = *Harpactes*, 88.
Haplenas = *Turacœna*, 754.
HAPLOPELIA, 768, 1114.
Haplopyga = *Estrela*, 581.
HAPLOSPIZA, 627.
HARELDA, 999.
Harpa = *Nesihierax*, 869.
HARPACTES, 88, 1060.
HARPAGUS, 868.
Harpe = *Nesihierax*, 869.
Harpes = *Harporynchus*, 417.
HARPIPRION, 902.
Harpolestes = *Telephonus*, 488.
HARPORYNCHUS, 417, 1095.
HARPYHALIAËTUS, 861.
Harpyia = *Thrasaëtus*, 848.
HARPYPSIS, 848.
HARTLAUBIUS, 540.
HEDYDIPNA, 694, 1112.
Hedyglossa = *Diuca*, 641.
Hedymela = *Muscicapa*, 262.
HEDYMELES, 612, 1110.
Heileura = *Chiroxiphia*, 222.
Heilaia = *Pseudozosterops*, 713.
Heleia = *Pseudozosterops*, 713.
Heleodytes = *Campylorhynchus*, 419.
Heleornis = *Hydrornis*, 207.
HELEOTHPREPTUS, 120.
HELIACTIN, 159.
Heliactinia = *Heliactin*, 159.

HELIANGELUS, 155, 1067.
HELIANTHEA, 150, 1067.
Heliapter = *Bubo*, 880.
Helias = *Eurypyga*, 921.
Helinaia = *Helmitherus*, 431.
HELIORLETUS, 193.
Heliobucco = *Gymnobucco*, 37.
HELIOCHERA, 217.
Heliocorys = *Galerida*, 459.
HELIODILUS, 898.
HELIODOXA, 149, 1067.
HELIOMASTER, 160.
HELIOPAIS, 978.
Heliopædica = *Basilinna*, 139.
Heliopsitta = *Conurus*, 11.
HELIORNIS, 978.
HELIOTHRIX, 159, 1068.
Heliotrypha = *Heliangelus*, 155.
Helmintherus = *Helmitherus*, 431.
HELMINTHOPHAGA, 431, 1096.
Helminthophila = *Helminthophaga*, 431.
Helminthotherus = *Helmitherus*, 431.
HELMITHERUS, 431.
Helodromas = *Totanus*, 946.
Helonæa = *Helmitherus*, 431.
Helopus = *Hydroprogne*, 1014.
Helortyx = *Ortyxelus*, 930.
Helospiza = *Melospiza*, 632.
HELOTARSUS, 835.
Helotriorchis = *Ibycter*, 832.
Helymus = *Heliangelus*, 155.
Hemerodromus = *Rhinophilus*, 931.
Hemiaëtus = *Archibuteo*, 854.
Hemicecrops = *Hirundo*, 253.
HEMICERCUS, 81.
HEMICHELIDON, 262, 1079.
HEMIDACNIS, 687.
HEMIGNATHUS, 693.
Hemigyps = *Otogyps*, 829.
Hemihierax = *Spizapteryx*, 869.
HEMILOPHUS, 81, 1059.
Hemipalama = *Ereunetes*, 949.
Hemipalma = *Micropalama*, 946.
Hemiparra = *Chætusia*, 936.
Hemiparus = *Siva*, 347.
Hemipenthica = *Tenioptera*, 225.
Hemipipo = *Piprites*, 219.
Hemipodius = *Turnix*, 778.
Hemiproche = *Chætura*, 127.
Hemipteron = *Pellorneum*, 336.
Hemipteryx = *Cisticola*, 363.
HEMIPUS, 497.
Hemirhynchus = *Heteromorpha*, 470.
Hemispingus = *Chlorospingus*, 650.
HEMISTEPHANIA, 130.

Hemistilbon = Saucerottea, 137.
Hemithylaca = Saucerottea, 137.
Hemithraupis = Nemosia, 653.
Hemithraupis = Tanagra, 661.
HEMITRICCUS, 234, 1075.
Hemiura = Uropsila, 428.
HEMIXUS, 315, 1086.
HENICOCICHLA, 436, 1097.
HENICOGNATHUS, 13.
HENICOPERNIS, 866.
HENICOPHAPS, 767.
HENICORHINA, 428.
HENICORNIS, 202, 1072.
HENICURUS, 449.
Hepburnia = Galloperdix, 817.
Herbivocula = Luscinola, 371.
Herbivox = Cettia, 372.
Hermiuierus = Cinclocerthia, 414.
HERMOTIMIA, 700.
HERODIAS, 912.
HERPETOTHERES, 833.
HERPORNIS, 347.
HERPSILOCHMUS, 178.
Herpystera = Burnesia, 359.
HESPERIPHONA, 610.
Hesperocichla = Geocichla, 404.
Heterodes = Prodotiscus, 35.
Heteractitis = Totanus, 916.
HETERALOCHA, 516.
HETERANAX, 1083.
HETERHYPHANTES, 564, 1107.
Heteroaëtus = Geranoaëtus, 860.
HETEROCERCUS, 224.
Heteroclitus = Syrrhaptes, 776.
HETEROCNEMIS, 175, 1069.
Heterocnus = Tigrisoma, 919.
Heterocorax = Corvus, 502.
Heterocorys = Alæmon, 450.
HETEROGLAUX, 895.
HETEROMORPHA, 470.
HETEROMYIAS, 271.
HETERONETTA, 996.
HETEROPELMA, 223.
Heterophasia = Sibia, 324.
Heteropoda = Ereunetes, 949.
Heterops = Galerida, 457.
Heteropsar = Lamprocolius, 546.
Heteropus = Ictinaëtus, 850.
Heteropygia = Tringa, 950.
Heterorhina = Henicorhina, 428.
Heterorhynchus = Hemignathus, 693.
Heterorhynchus = Sphenocichla, 428.
Heterornis = Cutia, 348.
Heterornis = Sturnornis, 536.
Heterosclus = Totanus, 946.

Heteroscenes = Cuculus, 51.
HETEROSCOPI, 887.
Heterospingus = Tachyphonus, 655.
HETEROSPIZIAS, 861.
HETEROTETRAX, 925.
Heterotis = Heterotetrax, 925.
Heterotrogon = Hapaloderma, 1060.
Heteroxeniens = Brachypteryx, 1087.
Heterura = Oreocorys, 449.
Hians = Anastomus, 906.
Hiator = Anastomus, 906.
HIERACIDEA, 869.
Hieracoglaux = Ninox, 887.
Hieraëtus = Eulomaëtus, 850.
Hieraspiza = Accipiter, 844.
Hierax = Microhierax, 868.
HIEROCOCCYX, 50, 1056.
HIEROFALCO, 875.
Hierophasis = Gennæus, 800.
Himalia — Spathura, 153.
Himantellus = Himantopus, 912.
HIMATONE, 692.
HIMANTOPUS, 912.
HIMANTORNIS, 965.
Himelia — Coeligena, 148.
Hippalectryx = Casuarius, 1050.
Hirundapus = Chætura, 127.
Hirundinapus = Chætura, 127.
HIRUNDINEA, 244.
HIRUNDO, 253, 1078-79.
HISTRIONICUS, 999.
Histriophaps = Paps, 767.
HISTURGORS, 569.
HODGSONIUS, 384.
Hodites = Symplemia, 946.
Holocnemis = Heterocnemis, 175.
Holopodius = Phalaropus, 957.
Holoquiscalus = Quiscalus, 559.
Homochlamis = Cettia, 372.
Homopelia = Turtur, 759.
Homophantia = Lampropygia, 152.
Homoptila = Leptoptila, 768.
Homoptilura = Gallinago, 952.
HOMORUS, 195, 1072.
Homrains = Dichoceros, 100.
HOPLOTERUS, 935.
Hoploxypterus = Hoplopterus, 935.
Horcites = Cettia, 372.
Horizocercus = Alopius, 1062.
Horizopus = Nuttallornis, 1078.
HORIZORHINUS, 1104.
HORORNIS, 372.
HOUBARA, 926.
Houbaropsis = Sypheotis, 926.
Houppifer = Acomus, 798.

Houppiferus = Acomus, 798.
HUHUA, 881.
HUMBLOTIA, 284.
Hyas = Pluvianus, 930.
Hybris = Strix, 898.
Hybristes = Acrocephalus, 368.
HYDRALECTOR, 958.
Hydranassa = Ardea, 909.
Hydrobata = Cinclus, 418.
Hydrobates = Biziura, 1002.
Hydrobates = Procellaria, 1028.
Hydrocecropis = Sterna, 1014.
HYDROCHELIDON, 1012.
Hydrocicca = Porphyriops, 974.
Hydrocichla = Henicurus, 449.
HYDROCISSA, 103.
Hydrocolæus = Larus, 1021.
Hydrocopsicus = Acrocephalus, 368.
HYDROCORAX, 100.
Hydrocorax = Phalacrocorax, 1006.
Hydrogallina = Gallinula, 973.
Hydroictinia = Milvus, 862.
Hydroka = Podilymbus, 1012.
HYDROPHASIANUS, 957.
Hydrophasis = Hydrophasianus, 957.
HYDROPROGNE, 1014.
HYDROPSALIS, 120.
Hydrornia = Porphyriola, 975.
HYDRORNIS, 207.
Hyetoceryx = Charadrius, 937.
Hyetomantis = Hyetornis, 57.
HYETORNIS, 57.
HYLACOLA, 320.
HYLACTES, 168.
Hylasspiza = Emberiza, 620.
Hylatomus = Dryocopus, 83.
Hyldaon = Pelargopsis, 114.
Hylenathous = Troglodytes, 425.
HYLIA, 357, 1089.
HYLIOTA, 272, 1080.
Hyliotis = Hyliota, 272.
HYLOCHARIS, 139, 1066.
Hylocharis = Pachycephala, 476.
Hylochelidon = Petrochelidon, 258.
Hylocichla = Turdus, 399.
Hylocosmia = Cotinga, 216.
HYLOMANES, 95.
HYLONYMIA, 150.
Hyloperdix = Arboricola, 813.
Hylophila = Pseudozosterops, 713.
HYLOPHILUS, 473, 1102.
Hylophorba = Callicalicus, 487.
Hyloorchilus = Cathepes, 428.
Hylotherpe = Pachycephala, 476.
Hylypsornis = Salpornis, 684.

HYMENOLEMUS, 1002.
Hyonetta = Cairina, 980.
Hyppedaleus = Thamnophilus, 182.
HYPPARGUS, 579.
Hyppenites = Panurus, 469.
HYPERGERUS, 320.
Hypermetra = Patagona, 135.
Hypermitres = Myiodynastes, 243.
HYPHANTES, 556.
Hyphantica = Quelea, 591.
HYPHANTHORNIS, 561, 1107.
Hyphantospiza = Pyrrhospiza, 1109.
Hyphanturgus = Sitagra, 564.
Hypherpes = Hypositta, 683.
Hyphnelus = Bucco, 46.
Hyphnodes = Gallierex, 974.
Hypobletis = Molothrus, 552.
Hypocanthis = Chrysomitris, 591.
Hypocentor = Emberiza, 620.
HYPOCHERA, 574, 1108.
HYPOCHARMOSYNA, 32, 1055.
Hypochloreus = Hypergerus, 320.
Hypochrysis = Helianthea, 150.
HYPOCNEMIS, 173, 1069.
HYPOCOLIUS, 497.
Hypogramma = Anthreptes, 703.
HYPOLAIS, 373.
Hypoleucus = Phalacrocorax, 1006.
Hypolia = Heliodoxa, 149.
Hypolia = Montifringilla, 594.
Hypolophus = Thamnophilus, 182.
Hypoloxias = Loxops, 594.
Hypomorphnus = Urubitinga, 861.
HYPOPHEA, 671.
Hypophania = Lampornis, 145.
HYPOPICUS, 70.
HYPOPYRRHUS, 561.
HYPOSITTA, 683.
HYPOTENIDIA, 961, 1118.
Hypothlypis = Tanagrella, 670.
HYPOTHYMIS, 274, 1081.
Hypotrichas = Cuiiger, 310.
HYPOTRIORCHIS, 872.
HYPOXANTHUS, 63.
Hypsibates = Himantopus, 942.
Hypsibemon = Grallaria, 169.
HYPSIPETES, 315, 1086.
Hypsipus = Lanioturdus, 270.
Hyppuroptila = Chalybura, 144.
Hytiopus = Baza, 866.
Iache = Phæoptila, 139.
Ianthia = Tarsiger, 384.
IANTHOCINCLA, 322, 1086.
IBIDORHYNCHUS, 944.
IBIS, 900.

- IBYCTER, 832.
Icoturus = Erithacus, 382.
Ichhierax = Schizorhis, 90.
Ichthyaëtus = Larus, 1021.
Ichthyaëtus = Polioaëtus, 877.
Ichthyomus = Ceryle, 114.
Ichthyoborus = Busarellus, 862.
ICTERIA, 438.
Icterioides = Pendulinus, 556.
Icteropsis = Sitagra, 564.
ICTERUS, 558, 1107.
ICTINAETUS, 850.
ICTINIA, 864.
Ictiniscus = Muscipira, 229.
Ictinoaëtus = Haliastur, 862.
Idas = Lophornis, 165.
Idiococcyx = Rhinortha, 59.
IDIOPSAR, 641.
Idiotes = Basileuterus, 438.
Idopsarus = Melithreptus, 714.
Iduna = Hypolais, 373.
Ierapterhina = Rhamphocorys, 451.
Ierax = Accipiter, 844.
IFRITA, 319.
Iliacus = Turdus, 399.
Ilicura = Chiroxiphia, 222.
Iliolopha = Euphonia, 671.
ILLADOPSIS, 336, 1087.
Ilyonetta = Aethya, 996.
Impeyanus = Lophophorus, 797.
Inca = Nænia, 1018.
Incaspiza = Hæmophila, 633.
INDICATOR, 34, 1055.
Indopicus = Chrysocolaptes, 80.
Inocotis = Ibis, 900.
IODOPLEURA, 217.
IOLÆMA, 150.
IOLE, 312, 1085.
Ionocicca = Porphyriola, 975.
Ionolaima = Iolæma, 150.
Ionornis = Porphyriola, 975.
IONOTRERON, 741.
Iora = Aegithina, 341.
Ioropus = Siva, 347.
Ipagrus = Campothera, 65.
Ipnodomus = Furnarius, 203.
Ipoborus = Automolus, 194.
Ipocrantor = Campephilus, 80.
Ipoctonus = Dendropicus, 73.
Ipopatis = Dendropicus, 73.
Ipopulus = Yungipicus, 74.
IRANIA, 383.
IRENA, 317.
Iridipitta = Pitta, 207.
Iridophanes = Dacnis, 1112.
Iridoprocne = Tachycineta, 255.
IRIDORNIS, 664.
Iridosornis = Iridornis, 664.
IRRISOR, 98, 1061.
Ischnosceles = Geranospizias, 838.
Ischyropodus = Crateropus, 329.
Ischyornis = Chauna, 979.
Ispida = Ceryle, 114.
ISPIDINA, 111.
ITHAGENES, 796.
Ithaginis = Ithagenes, 796.
IXIDIA, 308, 1085.
Ixocherus = Microtarsus, 309.
IXOCINCLA, 316.
Ixocossyphus = Turdus, 399.
IXONOTUS, 309.
Ixops = Actinodura, 330.
Ixoreus = Geocichla, 1034.
Icos = Pycnonotus, 305.
Ixothraupis = Calliste, 665.
IXULUS, 344.
Iyngipicus = Yungipicus, 74.
Iynx = Yunx, 85.
JACAMARALCYON, 46.
Jacamamaralcyonides = Gabalecyorynchus, 46.
JACAMEROPS, 46, 1056.
Jacana = Parra, 958.
Jacapa = Rhamphocælus, 660.
Jambotreron = Ptilopus, 735.
Janthenas = Columba, 748.
JANTHOTHORAX, 521.
Jerdonia = Hypolais, 373.
Juida = Lamprotornis, 544.
Juliamyia = Damophila, 140.
JUNCO, 629.
Junco = Acrocephalus, 368.
Kamptorhynchus = Camptolæmus, 1000.
Kaupifalco = Asturinula, 839.
Kaupornis = Myiarchus, 250.
KELAARTIA, 307.
KENOPIA, 338.
Keron = Lagopus, 826.
Keropia = Turnagra, 329.
Keroula = Tephrodornis, 493.
KETUPA, 879.
Kieneria = Pyrgisoma, 635.
Kitta = Cissa, 508.
Kittacincla = Cittocincla, 413.
Kittasoma = Grammatoptila, 329.
Kültitzia = Pennula, 969.
KLAIS, 164.
Knathodon = Didunculus, 775.
Kranocera = Ptilopus, 735.
Krimnochelidon = Cotyle, 256.
Ktinorhynchus = Chauleasmus, 991.

Kurukuru = *Ptilopus*, 735.
Kurutreron = *Ptilopus*, 735.
Labbus = *Stercorarius*, 1027.
Lacedo = *Garcineutes*, 110.
LEDORUSA, 305, 1084.
LAFRESNAYA, 151, 1067.
Lagenoplastes = *Petrochelidon*, 258.
LAGONOSTICTA, 577, 1108.
LAGOPUS, 826, 1116.
Laimodon = *Pogonorhynchus*, 35.
Laiscopus = *Accentor*, 381.
LALAGE, 302.
LALETES, 475.
Lambruschinia = *Larus*, 1021.
LAMPORNIS, 145.
LAMPRASTEN, 149.
LAMPRIIBIS, 903.
Lamprococcyx = *Chrysococcyx*, 52.
LAMPROCOLIUS, 546, 1106.
LAMPROCORAX, 542.
LAMPROLEMA, 149.
LAMPROLIA, 392.
Lamptomorpha = *Chrysococcyx*, 52.
Lampronessa = *Aex*, 982.
LAMPRONETTA, 1000.
Lampropicus = *Chloronerpes*, 64.
Lampropogon = *Chalcostigma*, 156.
LAMPROPSAR, 559.
LAMPROPYGIA, 152, 1067.
LAMPROSPIZA, 644.
LAMPROTES, 652.
LAMPROTHORAX, 521.
Lamprotita = *Jacamerops*, 46.
LAMPROTORNIS, 544.
LAMPROTRETON, 738.
Lamprurus = *Augastes*, 159.
Laniagra = *Cyclorhis*, 475.
LANIARIUS, 491, 1104.
Lanicterus = *Campophaga*, 300.
LANIELLUS, 483.
Laniisoma = *Ptilochloris*, 223.
LANIO, 656.
Laniocera = *Aulia*, 213.
LANIOTURDINUS, 332.
LANIOTURDUS, 270.
LANIUS, 483, 1102-3.
Lanivireo = *Vireo*, 471.
Lantzia = *Vanga*, 499.
Laomedontia = *Bugeranus*, 922.
Laphytes = *Tyrannus*, 252.
Laroides = *Larus*, 1021.
Laroides = *Rissa*, 1027.
Laropis = *Gelochelidon*, 1013.
Larosterna = *Nænia*, 1018.
LARUS, 1021.

Larra = *Fratercula*, 1046.
LARVIVORA, 383.
Laryngogramma = *Ptilopus*, 735.
Laterirallus = *Creciscus*, 971.
Lathamus = *Nanodes*, 27.
LATHRIA, 213, 1074.
Lathrisoma = *Aulia*, 213.
LATICILLA, 350.
Lavinia = *Metallura*, 155.
LAWRENCIA, 248.
Laurentius = *Eupherusa*, 144.
Layardia = *Argya*, 323.
Leadbeatera = *Heliodoxa*, 149.
LECTYHOPLASTES, 258.
LEGATUS, 241.
Legriocinclus = *Rhamphocinclus*, 414.
LEGUATIA, 978.
Leimoniptila = *Anthus*, 445.
Leimonites = *Tringa*, 950.
Leiocinclia = *Actinodura*, 330.
Leiopicus = *Picus*, 70.
Leioptila = *Lioptila*, 413.
Leiothrix = *Liothrix*, 347.
Leipoa = *Lipoa*, 788.
LEISTES, 554.
Lempijius = *Scops*, 882.
Leobia = *Polyonomus*, 157.
Lepocestes = *Blythipicus*, 77.
Lepidocolaptes = *Picolaptes*, 187.
Lepidænas = *Columba*, 748.
Lepidogenys = *Baza*, 866.
LEPIDOGRAMMUS, 60.
Lepidolarynx = *Helimaster*, 160.
Lepidopyga = *Cyanophaia*, 137.
Lepidopygia = *Spermestes*, 576.
Lepidoria = *Pterophanes*, 152.
Lepidothrix = *Pipra*, 220.
Lepterosdas = *Ardea*, 909.
Lepterodius = *Ardea*, 909.
LEPTASTHENURA, 201.
Leptocercus = *Hapalocercus*, 234.
LEPTOCOMA, 699.
Leptodactylus = *Phegornis*, 956.
LEPTODON, 866.
Leptoglossus = *Acanthorhynchus*, 716.
Leptolophus = *Calopsitta*, 3.
Leptonyx = *Goryphospiza*, 638.
Leptonyx = *Hylactes*, 168.
Leptopelia = *Columbigallina*, 763.
Leptopelicanus = *Pelecanus*, 1005.
LEPTOPÆCILE, 379.
LEPTOPOGON, 237, 1076.
Leptopterus = *Artamia*, 498.
Leptopteryx = *Artamus*, 533.
LEPTOPTILA, 768, 1115.

- LEPTOPTILUS, 907.
Leptopus = *Phegornis*, 956.
Leptorhynchus = *Cladorhynchus*, 943.
Leptorhynchus = *Psilorhamphus*, 177.
 LEPTORNIS, 724.
Leptoscelis = *Phegornis*, 956.
 LEPTOSITTACA, 12.
 LEPTOSOMA, 91.
Leptosoma = *Geococcyx*, 61.
Leptosomus = *Leptosoma*, 91.
Leptotarsis = *Dendrocygna*, 987.
 LEPTOTRICCUS, 235.
Leptoxyura = *Synallaxis*, 197.
Leptuas = *Euphilotis*, 86.
Lepturus = *Hapalocercus*, 234.
 LERWA, 805.
 LESBIA, 158.
 LESSONIA, 230.
Lestris = *Megalestris*, 1027.
Leucaria = *Calypte*, 163.
Leuceroëia = *Platalea*, 904.
Leuchybris = *Nyctea*, 894.
Leucibus = *Eudocimus*, 904.
 LEUCIPFUS, 135, 1065.
Leucoblepharon = *Branla*, 984.
Leucocarbo = *Phalacrocorax*, 1006.
Leucocerca = *Rhipidura*, 276.
Leucochloridia = *Cyanomitra*, 702.
 LEUCOCHLORIS, 147.
Leucodipteron = *Trochilopteron*, 321.
Leucogeranus = *Grus*, 921.
Leucolia = *Agyrtria*, 135.
Leucomelæna = *Columba*, 748.
Leucometopon = *Enneoctonus*, 485.
Leucomimus = *Mimus*, 415.
Leuconerpes = *Melanerpes*, 68.
Leuconotopicus = *Picus*, 70.
Leucopareia = *Branla*, 984.
 LEUCOPEZA, 430.
 LEUCOPHÆUS, 1026.
Leucophantes = *Pœcilodryas*, 271.
Leucophoyx = *Herodias*, 912.
Leucophrys = *Ploceipasser*, 569.
Leucopitta = *Pitta*, 207.
Leucopolius = *Ægialitis*, 939.
 LEUCOPTERNIS, 860.
 LEUCOSARCIA, 774.
 LEUCOSPIZIAS, 841.
Leucosticte = *Montifringilla*, 594.
Leucotænia = *Columba*, 748.
 LEUCOTRETON, 735.
Leucuria = *Helianthea*, 1067.
Leucus = *Larus*, 1021.
Lewinia = *Hypotænidia*, 961.
 LICHENOPS, 229, 1075.
Lichenostomus = *Ptilotis*, 719.
Lichmera = *Meliornis*, 723.
Lichtensteinipicus = *Hemilophus*, 81.
 LICMETIS, 3.
Licmetulus = *Loriculus*, 22.
 LIGEA, 436.
Ligia = *Ligea*, 436.
Lignobucco = *Barbatula*, 37.
 LIGURINUS, 609.
Lillia = *Hirundo*, 253.
 LIMICOLA, 952.
Limicola = *Totanus*, 916.
Limicula = *Limosa*, 945.
Limnaëtus = *Spizaëtus*, 848.
Limnætes = *Chætusia*, 936.
Limnobænus = *Rallina*, 965.
Limnocinclus = *Tringa*, 950.
 LIMNOCORAX, 972.
 LIMNOCRYPTES, 955.
Limnodromus = *Microrhamphus*, 946.
Limnogeranus = *Grus*, 921.
Limnopardalus = *Rallus*, 959.
Limnophalus = *Anthracceros*, 100.
 LIMNOPHYES, 196.
 LIMNORNIS, 196.
Limnospiza = *Embernagra*, 638.
Limnæres = *Dinemellia*, 570.
 LIMONIDROMUS, 445.
 LIMOSA, 945.
Linucanthus = *Cannabina*, 589.
Linaria = *Cannabina*, 589.
Linnaipicus = *Melanerpes*, 68.
Linota = *Cannabina*, 589.
Linura = *Vidua*, 574.
Linurgus = *Pyrhospiza*, 604.
 LIOCICHLA, 347.
Lioparus = *Alcippe*, 345.
Liopipo = *Picus*, 70.
 LIOPTILA, 413.
 LIOPTILUS, 273, 1080-81.
 LIOSCELES, 167.
 LIOTHRIX, 347.
 LIPAUGUS, 213.
 LIPOA, 788.
Lipocentrus = *Phœnicoparrus*, 908.
Liponyx = *Rollulus*, 815.
Lisoria = *Saucerottea*, 137.
Lissotis = *Otis*, 925.
Lithænas = *Columba*, 748.
Lithofalco = *Hypotriorchis*, 872.
Lithotentha = *Certhionyx*, 719.
Lobibyx = *Lobivanellus*, 934.
 LOBIOPHASIS, 799.
Lobiospiza = *Erythrura*, 583.
Lobipes = *Phalaropus*, 957.

- Lobipluvia* = Sarciphorus, 933.
 LOBIVANELLUS, 934.
 LOBOPARADISEA, 524.
Lobopsis = Paradigalla, 524.
 LOBORHAMPHUS, 1105.
 LOBORNIS, 357.
 LOBOSPINGUS, 584.
 LOBOTUS, 300.
Lochites = Thamnophilus, 182.
 LOCHMIAS, 202.
Lochmophasis = Pucrasia, 801.
 LOCUSTELLA, 370.
 LODDIGESIA, 166.
Loddigesiornis = Loddigesia, 166.
Loidorusa = Lælorusa, 305.
Lomvia = Uria, 1043.
Lonchura = Uroloncha, 585.
Londra = Melanocorypha, 452.
Lophaithya = Podicipes, 1040.
Lophalector = Lophura, 798.
Lophastur = Baza, 866.
 LOPHOAETUS, 850.
 LOPHOCEROS, 103.
Lophocerus = Pauxis, 790.
Lophochroa = Cactalua, 2.
Lophocitta = Platylophus, 509.
Lophocorax = Cyanocitta, 511.
Lophocoryphus = Gubernatrix, 620.
 LOPHODYTES, 1003.
 LOPHOGYPS, 829.
Lophoietinia = Milvus, 862.
 LOPHOLEMUS, 748.
Lopholaimus = Lopholæmus, 748.
Lophophalaris = Fulica, 977.
 LOPHOPHANES, 465, 1101.
 LOPHOPHAPS, 767.
Lophophasianus = Catreus, 801.
Lophophera = Lophophorus, 797.
 LOPHOPHORUS, 797.
Lophopsarus = Fregilupus, 548.
 LOPHORNINA, 522.
Lophorhynchus = Cariama, 924.
Lophorhynchus = Lopholæmus, 748.
Lophorinus = Lophornis, 165.
 LOPHORNIS, 165.
 LOPHORTYX, 819, 1116.
Lophospingus = Coryphospingus, 642.
Lophospiza = Coryphospingus, 642.
Lophospizias = Astur, 840.
 LOPHOSTRIX, 886.
Lophotes = Baza, 866.
Lophotctrax = Pucrasia, 801.
 LOPHOTIBIS, 902.
Lophotis = Afrotis, 924.
 LOPHOTRICCUS, 233, 1075.
 LOPHOTRIONCHIS, 849.
 LOPHOZOSTENOPS, 713.
 LOPHURA, 798.
Lophyrus = Goura, 775.
 LORIA, 524.
 LORICULUS, 22.
 LORIUS, 29, 1054.
 LOXIA, 604, 1109.
 LOXIGILLA, 613.
 LOXIMITRIS, 593.
 LOXIOIDES, 605.
Loxipasser = Loxigilla, 613.
 LOXOPS, 594.
Loxopterus = Campylopterus, 133.
Lucifer = Calothorax, 160.
Lucotoa = Saxicola, 388.
Lullula = Galerida, 457.
 LUNDA, 1046.
Lupha = Fulica, 977.
 LUROCALIS, 118.
Luscinia = Aëdon, 382.
 LUSCINIOLA, 371, 1090.
Lusciniopsis = Locustella, 370.
Lusciola = Aëdon, 382.
Lusciola = Hypolais, 373.
 LYBIUS, 1055.
Lychnidospiza = Lagonosticta, 577.
 LYCOCORAX, 517.
Lycornis = Fulica, 977.
Lycos = Colæus, 505.
 LYNCORNIS, 119, 1063.
Lypornix = Monasa, 48.
Macabra = Syrniun, 890.
Macagua = Herpetotheres, 833.
Macartneya = Lophura, 798.
Maccranas = Oedemia, 999.
 MACGREGORIA, 524.
 MACHÆRHAMPHUS, 865.
 MACHÆRIRHYNCHUS, 285.
 MACHÆROPTERUS, 221.
Macheirhamphus = Machærirhynchus, 285.
Machetes = Pavoncella, 948.
 MACHETORNIS, 229.
 MACHLOLOPHUS, 464.
 MACRAGELÆUS, 561.
Macroagelaius = Macragelæus, 561.
Macrocephalon = Megacephalon, 789.
Macrocerus = Ara, 10.
Macrocorax = Corvus, 502.
 MACRODIPTERYX, 120.
 MACRONUS, 341.
 MACRONYX, 449.
Macropicus = Hemilophus, 81.
 MACROPSALIS, 120.
 MACROPTERYX, 130.

- Macropus* = Somateria, 1000.
MACROPYGIA, 754, 1114.
MACRORHAMPHUS, 946.
Macrorhamphus = Oedemia, 999.
MACROSPHENUS, 314, 1086.
Macrotrarsius = Rhinoptilus, 931.
Macrotrarsus = Himantopus, 942.
MACEUROPSAR, 543.
MAGALESTRIS, 1027.
Maia = Munia, 586.
Maina = Gracula, 539.
Mainatus = Gracula, 539.
MAJAQUEUS, 1033.
MALACIAS, 324.
Malacocercus = Acanthoptila, 322.
Malacocercus = Crateropus, 329.
Malacocichla = Catharus, 393.
MALACOCINCLA, 332, 1087.
MALAGONOTUS, 489, 1103-4.
Malacopteron = Malacopteron, 337.
MALACOPTERON, 337, 1087.
MALACOPTILA, 47.
MALACORHYNCHUS, 995.
Malacorhynchus = Hymenolæmus, 1002.
Malacorhynchus = Merulaxis, 167.
Malacortyx = Ophrysia, 818.
MALACOTHPRAUPIS, 655, 1111.
Malacoturnix = Ophrysia, 818.
Malcirops = Zosterops, 705.
Malcola = Phoenicophaës, 59.
Malcolmia = Argya, 323.
Maltherbipicus = Colaptes, 62.
MALIA, 342.
MALIMBUS, 568.
MALURUS, 367, 1090.
MANACUS, 1074.
Manacus = Chiromachæris, 222.
Mangusia = Anthreptes, 703.
Manikup = Pithys, 1069.
Manilia = Calothorax, 160.
MANORHINA, 723.
MANUCODIA, 518.
Maracana = Conurus, 11.
MARECA, 991.
Margaroehrysis = Lampornis, 145.
MARGAROPERDIX, 812.
MARGAROPS, 414.
MARGARORNIS, 191, 1071.
Marila = Ethya, 996.
Marila = Fuligula, 997.
Marilochen = Anser, 982.
Mariposa = Ureghinus, 582.
MARMARONETTA, 995.
Marquetia = Pytelia, 578.
Marsyas = Sporadinus, 142.
MASCARINUS, 18.
MASUS, 220, 1074.
Matæoptera = Alca, 1043.
Mecistura = Acredula, 466.
MECOCERCULUS, 227, 1075.
MEGABIAS, 284, 1082.
Megacephala = Megacephalon, 789.
MEGACEPHALON, 789.
Megaceryle = Ceryle, 114.
MEGACREX, 964.
MEGADYPTES, 1048.
MEGALEMA, 38.
Megalestes = Pœcilodryas, 271.
Megalonyx = Hylactes, 168.
Megaloperdix = Tetraogallus, 806.
Megalophonus = Mirafræ, 455.
Megalophonus = Tephrocorys, 454.
Megalophus = Muscivora, 244.
MEGALOPREPIA, 742.
Megalopterus = Anous, 1018.
Megalopterus = Lamprolornis, 544.
Megalorhynchus = Calorhamphus, 38.
Megalornis = Grus, 921.
Megalotis = Pyrrhulauda, 459.
MEGALURULUS, 324.
MEGALURUS, 351, 1088.
Megapelia = Goura, 775.
Megapelia = Scotopelia, 879.
Megapicus = Campephilus, 80.
MEGAPODIUS, 786, 1115.
Megaptynx = Bubo, 880.
Megaquiscalus = Quiscalus, 559.
MEGARHYNCHUS, 244.
Megascops = Scops, 882.
Megastoma = Megarhynchus, 244.
Megastrix = Strix, 898.
Megatriorchis = Erythrotriorchis, 847.
Megerodius = Ardea, 909.
Meiglyptes = Miglyptes, 77.
MELANORNIS, 286.
Melagavia = Larus, 1021.
Melampicus = Melanerpes, 68.
Melampitta = Coracocichla, 210.
MELANERPES, 68.
Melanibyx = Hæmatopus, 932.
MELANICHLORA, 460.
Melanitta = Oedemia, 999.
Melanobucco = Pogonorhynchus, 35.
Melanocarbo = Phalacrocorax, 1006.
MELANOCHARIS, 676.
MELANOCICHLA, 327, 1086.
MELANOCORYPHA, 452.
Melanodera = Phrygilus, 640.
Melanodiglossa = Diglossa, 685.
Melanodryas = Petroeca, 266.

Melanolarus = *Larus*, 1021.
Melanomitris = *Chrysomitris*, 591.
Melanonetta = *Edemia*, 999.
Melanonyx = *Anser*, 982.
Melanoparcia = *Synallaxis*, 197.
MELANOPANUS, 460.
Melanopelargus = *Ciconia*, 905.
Melanopepla = *Melanornis*, 286.
MELANOPERDIX, 815.
Melanophoyx = *Ardea*, 909.
Melanopitta = *Pitta*, 207.
Melanopsar = *Pendulinus*, 556.
MELANOPTERYX, 567, 1107.
MELANOPTILA, 414.
MELANOPYRRHIUS, 540.
MELANORHECTES, 495.
Melanospiza = *Loxigilla*, 613.
MELANOTIS, 417.
Melanotrochilus = *Florisuga*, 134.
Melasoma = *Melæornis*, 286.
MELEAGRIS, 796.
Meliarchus = *Philemon*, 726.
Melias = *Phoenicophaes*, 59.
Melichara = *Anellobia*, 724.
Melicophila = *Certhionyx*, 719.
MELIDECTES, 727.
Melidipnus = *Melilestes*, 718.
MELIDORA, 105.
MELIERAX, 838.
MELIGNOMON, 35.
Melignotheres = *Indicator*, 34.
MELILESTES, 718.
MELIORNIS, 723.
MELIPHAGA, 719.
MELIPOTES, 728.
MELIRRHOPHETES, 728.
Melissens = *Bhringa*, 532.
Melisympotes = *Meliornis*, 723.
MELITHREPTUS, 714.
MELITOGRAIS, 726.
Melittarchus = *Tyrannus*, 252.
Melittias = *Melittophagus*, 96.
MELITTOPHAGUS, 96, 1061.
Melittophas = *Merops*, 96.
Melittotheres = *Merops*, 96.
MELIZOPHILUS, 375, 1090.
MELLISUGA, 164.
MELOCICHLA, 362.
Melodes = *Calliope*, 383.
Melonetta = *Harelda*, 999.
Melopelia = *Melopelia*, 758.
MELOPELIA, 758.
MELOPHUS, 624.
MELOPSITTACUS, 27.
MELOPYRRHA, 618.

MELOSPIZA, 632, 1110-11.
Melozone = *Pyrgisoma*, 635.
Melpoda = *Sporæginthus*, 581.
Menetica = *Siphia*, 292.
Meniceros = *Buceros*, 100.
MENURA, 729.
MERGANETTA, 1002.
MERGANSER, 1003.
Mergellus = *Mergus*, 1003.
Mergoides = *Netta*, 996.
MERGULUS, 1043.
MERGUS, 1003.
Merion = *Chlorostilbon*, 141.
Meristes = *Malaconotus*, 489.
Meropicus = *Melanerpes*, 68.
Meropiscus = *Melittophagus*, 96.
Meropiscus = *Ixidia*, 308.
MEROPOGON, 97.
MEROPS, 96, 1061.
MERULA, 394, 1092.
MERULAXIS, 167.
Merva = *Rimator*, 332.
Meseidus = *Syrnium*, 890.
Mesia = *Liothrix*, 347.
Mesites = *Mesoenas*, 959.
Mesitornis = *Mesænas*, 959.
Mesobucco = *Xantholæma*, 39.
MESOENAS, 959.
MESOLOPHUS, 308.
Mesomorpha = *Bubo*, 880.
Mesophila = *Phaethornis*, 131.
Mesophoyx = *Herodias*, 912.
MESOPICUS, 76, 1059.
Mesoscolopax = *Numenius*, 944.
MESOSPILUS, 67.
METABOLUS, 271.
Metallococcyx = *Chrysococcyx*, 52.
METALLURA, 155, 1067.
Methon = *Chalybura*, 144.
METOPIA, 220.
METOPIANA, 996.
Metopias = *Metopiana*, 996.
METOPIDIUS, 957.
Metoponia = *Serinus*, 599.
METOPOTHRIX, 220, 1074.
METRIOPELIA, 765.
Methriopterus = *Harporhynchus*, 417.
MEZOTRERON, 736.
Micranous = *Anous*, 1018.
MICRASTUR, 837.
Micrathene = *Micropallas*, 898.
Microbates = *Rhamphocænus*, 176.
Microcarbo = *Phalacrocorax*, 1006.
MICROCERCULUS, 429, 1096.
Microcreus = *Oligura*, 343.

- Microchelidon* = Atticora, 257.
Microchelidon = Dicaeum, 676.
 MICROCHERA, 164.
Microcichla = Henicurus, 449.
Microcnus = Zebtilus, 915.
Microcolaptes = Picumnus, 83.
Microcolaptes = Sasia, 85.
Microcorax = Corvus, 502.
Microcygna = Nettopus, 981.
Microductylus = Gariama, 924.
 MICRODYNAMIS, 55.
Microdyptes = Catarrhactes, 1047.
 MICROECA, 263, 1080.
Microglaux = Glaucidium, 896.
 MICROGLOSSUS, 1, 1053.
 MICROHIERAX, 868.
 MICROLESTES, 268.
 MICROLIGEA, 1097.
 MICROMONACHA, 48.
 MICROPALAMA, 916.
 MICROPALLAS, 898.
 MICROPARRA, 958.
Micropelia = Scardafella, 762.
 MICROPERDIX, 813.
Micropicus = Hemicercus, 81.
Micropogon = Capito, 41.
Micropogon = Trachyphonus, 40.
Micropsitta = Nasiterna, 23.
Micropsites = Nasiterna, 23.
Microptera = Philohela, 955.
 MICROPTERNUS, 78.
Micropterus = Philohela, 955.
Micropterus = Tachyeres, 998.
Microptynx = Glaucidium, 896.
Micropus = Brachypodius, 308.
Micropus = Gypselus, 125.
Microrhopias = Formicivora, 177.
Microsarcops = Lobivanelus, 934.
Microscelis = Hypsipetes, 315.
 MICROSITTACE, 13.
 MICROSPINGUS, 650.
Microstictus = Hemilophus, 81.
 MICROTARSUS, 309.
Microtribonyx = Tribonyx, 973.
Microura = Pnoepyga, 430.
Micruria = Endomychura, 1044.
 MIGLYPTES, 77.
 MILIARIA, 623.
Milornis = Phaethornis, 131.
 MILVAGO, 833.
Milvaquila = Haliastur, 862.
 MILVULUS, 252.
 MILVUS, 862.
Mimcta = Oriolus, 525.
Mimctes = Mimus, 415.
Mimetes = Oriolus, 525.
 MIMOCICHLA, 394.
Mimocitta = Mimocichla, 394.
Mimokitta = Mimocichla, 394.
 MIMUS, 415, 1095.
 MINLA, 343, 1088.
 MINO, 540.
 MIONECTES, 236, 1075-76.
 MIRAFRA, 455, 1099.
 MIRO, 270.
 MISOCALIUS, 52.
 MITREPHANES, 247, 1077.
Mitrephorus = Mitrephanes, 247.
Mitrospingus = Eucometis, 1111.
Mitu = Mitua, 790.
 MITUA, 790.
Mituporanga = Crax, 789.
 MIXORNIS, 310, 1087.
Mixornis = Zosterornis, 339.
 MNIOTILTA, 432.
 MOHO, 727.
Mohoua = Clitonyx, 469.
Molobrus = Molothrus, 552.
 MOLOTHRUS, 552, 1106.
 MOLPASTES, 304.
Molybdophanes = Harpiprion, 902.
 MOMOTUS, 94, 1061.
Momus = Phaethornis, 131.
Monacha = Monarcha, 289.
Monacha = Monasa, 48.
 MONACHALCYON, 105.
 MONACHELLA, 271.
Monachus = Sylvia, 374.
 MONARCHA, 289, 1083.
Monarches = Monarcha, 289.
 MONASA, 48.
Monastes = Monasa, 48.
Monaulus = Lophophorus, 797.
Monedula = Colaesus, 505.
Monornis = Chalcophaps, 766.
 MONTICOLA, 392.
 MONTIFRINGILLA, 594, 1109.
Morinella = Arenaria, 949.
Marinellus = Eudromias, 938.
Moris = Sula, 1011.
Mormolyca = Lagonosticta, 577.
Mormon = Fratercula, 1046.
 MOROCOCCYX, 61.
 MORPHNUS, 847.
Morus = Sula, 1011.
Moschatus = Cairina, 980.
 MOTACILLA, 442, 1098.
 MOUPINIA, 346.
 MULLERIA, 335.
 MULLERIPICUS, 1059.

Mulleripicus = Hemilophus, 81.
Mulsantia = Loddigesia, 166.
MUNIA = 586.
Muscadivora = Carpophaga, 743.
MUSCICAPA, 262, 1079, 1081.
MUSCICAPULA, 294, 1083.
MUSCIGRALLA, 230.
MUSCIPARUS, 267.
Muscipeta = Acrocephalus, 368.
Muscipeta = Muscivora, 244.
Muscipeta = Tersiphone, 280.
MUSCIPIPRA, 229.
MUSCISAXICOLA, 230, 1075.
Muscisylvia = Notodela, 384.
MUSCITREA, 1080.
Muscitrea = Pachycephala, 476.
MUSCIVORA, 244, 1077.
Muscivora = Tersiphone, 280.
MUSCULVA, 270.
Musicus = Dicrurus, 529.
MUSOPHAGA, 90.
Mustelirallus = Porzana, 967.
Myazanthæ = Dicæum, 676.
MYCEROBAS, 611.
MYCTERIA, 907.
Myiabeillia = Abeillia, 164.
Myiacleptes = Conopias, 242.
MYIADECTES, 406, 1094.
Myiadestes = Myiadectes, 406.
Myiætina = Eutoxeres, 133.
MYIAGRA, 282, 1082.
Myiagroides = Megabias, 284.
Myialestes = Culicicapa, 282.
MYIARCHUS, 250, 1078.
MYIOBIUS, 245, 1077.
Myioborus = Setophaga, 441.
MYIOCEYX, 111.
MYIOCHANES, 249.
Myiocichla = Cichlopsis, 407.
Myioctonus = Myiodiotes, 442.
MYIODIOTES, 442, 1098.
MYIODYNASTES, 243, 1077.
Myiolestes = Hemipus, 497.
Myiomela = Notodela, 384.
Myiomoira = Petroeca, 266.
Myionax = Myiarchus, 250.
Myiopagis = Elaïnea, 239.
MYIOPATIS, 238, 1076.
Myiophaga = Myiophoneus, 407.
Myiophila = Diaphorophya, 265.
Myiophila = Fluvicola, 227.
Myiophobus = Myiobius, 245.
MYIOPHONEUS, 407.
Myiopsar = Pœoptera, 546.
MYIOPSITTA, 14.

Myiopsittacus = Myiopsilla, 14.
Myioscopus = Miro, 270.
Myiosobus = Tricholestes, 315.
Myiosympotes = Hapalocercus, 234.
Myiothera = Formicarius, 171.
MYIOTHERETES, 225.
Myiothlypis = Basileuterus, 438.
Myiotrichas = Grallaria, 169.
Myioturdus = Grallaria, 169.
Myiozeta = Myiozetetes, 241.
MYIOZETETES, 241, 1077.
Myletes = Amazilia, 138.
Myocinclæ = Formicarius, 171.
Myolestes = Colluricincla, 495.
Myoptila = Colluricincla, 495.
MYOPORNIS, 1082.
Myospiza = Ammodramus, 1110.
Myothera = Pitta, 207.
MYRISTICIVORA, 747.
MYRMECIZA, 174, 1069.
MYRMECOCICHLA, 391.
MYRMELASTES, 181, 1070.
MYRMIA, 161.
Myrmoborus = Hypocnemis, 173.
MYRMOCHANES, 176.
Myrmonax = Myrmeciza, 174.
Myrmophila = Myrmotherula, 178.
Myrmornis = Formicarius, 171.
Myrmoterium = Myrmotherula, 178.
Myrmothera = Grallaria, 169.
MYRMOOTHERULA, 178, 1070.
Myrtha = Syrnium, 890.
MYRTIS, 161.
Mystacinus = Panurus, 469.
MYSTACORNIS, 314.
Mystrothamphus = Ajaja, 905.
Mytina = Prymnacantha, 165.
MYZA, 724.
Myzantha = Manorhina, 723.
MYZOMELA, 714, 1113.
MYZORNIS, 347.
Nabouroupus = Amydrus, 545.
NÆNIA, 1018.
Nandayus = Conurus, 11.
Nania = Eriocnemis, 153.
NANNOCHORDEILES, 119.
Nannocnus = Ardetta, 914.
Nannopipo = Verreauxia, 84.
NANNOPTERUM, 1010.
Nannothera = Malacocinclæ, 332.
NANODES, 27.
Napodes = Timelia, 339.
Napophila = Nyctiornis, 97.
Napothera = Erythrocichla, 336.
Napothera = Trichixus, 409.

NASICA, 187.
 NASITERNA, 23, 1054.
 NAUCLERUS, 863.
Necrosyrtes = Neophron, 830.
 NECTARINIA, 694.
Neectarophila = Leptocoma, 699.
Nectris = Puffinus, 1030.
 NELICURVIUS, 567.
Nematophora = Seleucides, 520.
Nematura = Syrrhaptēs, 776.
Nemoricola = Gallinago, 952.
Nemoricola = Limonidromus, 445.
Nemoriraga = Limonidromus, 445.
 NEMOSIA, 653.
Nemura = Tarsiger, 384.
 NENEBA, 719.
Nengetus = Tænioptera, 225.
Neochelidon = Atticora, 257.
 NEOCHLOE, 473.
 NEOCHMIA, 583.
 NEOCICHLA, 412.
 NEOCORYS, 448.
 NEOCOSSYPHUS, 410.
Neocrex = Porzana, 967.
 NEOCTANTES, 181.
 NEODREPANIS, 694.
 NEOLESBIA, 143.
 NEOLESTES, 488.
 NEOMIXIS, 1089.
Neomixis = Eroessa, 354.
Neomorpha = Heteralocha, 516.
 NEOMORPHUS, 61.
Neomyias = Rhipidura, 276.
 NEOPELMA, 223.
Neophema = Euphema, 25.
 NEOPHRON, 830, 1116.
 NEOPIPO, 221.
Neops = Neositta, 682.
Ncops = Xenops, 192.
 NEOPSITTACUS, 33.
Ncopus = Ictinaëtus, 850.
 NEORHYNCHUS, 614.
Neornis = Cettia, 372.
Neornis = Glossiptila, 689.
Neoscolopax = Scolopax, 955.
 NEOSITTA, 682.
Neospiza = Amblyospiza, 1107.
Neotis = Otis, 925.
 NEPHECETES, 129.
Nertus = Ictinia, 864.
Nesacanthis = Foudia, 566.
Neshyphantes = Foudia, 566.
Nesierax = Nesihierax, 869.
 NESIHIERAX, 869.
 NESILLAS, 1088.

NESOBATES, 1087.
 NESOCELEUS, 79.
Nesocentor = Centropus, 55.
 NESOCHARIS, 1108.
Nesochen = Branta, 984.
 NESOCICHLA, 406.
Nesococcyx = Coccyzus, 53.
Nesocittes = Picumnus, 83.
 NESGENAS, 753.
Nesolimnas = Cabalus, 962.
 NESOMIMUS, 416, 1095.
 NESONETTA, 995.
 NESOPELIA, 758.
 NESOPSAR, 555.
 NESOSPINGUS, 647.
 NESOSPIZA, 640.
 NESOTRICHUS, 251.
 NESTOR, 27, 1054.
 NETTA, 996.
Nettalopez = Casarca, 989.
Nettarion = FULIGULA, 997.
Nettion = Querquedula, 992.
 NETTOPUS, 981.
 NEWTONIA, 266.
Nexitelcs = Podilymbus, 1042.
 NICATOR, 493.
Niche = Eriocnemis, 153.
Nicoclarius = Cuculus, 51.
Nigrilanda = Melanocorypha, 452.
 NIGRITA, 575, 1108.
 NILAUS, 488.
 NILTAVA, 294.
 NINOX, 887.
Niobe = Penthetria, 573.
Nipponia = Ibis, 900.
Nisaëtus = Eutolmaëtus, 850.
Nisastur = Astur, 839.
Nisius = Thamnophilus, 182.
Nisoria = Sylvia, 374.
Nisucella = Asio, 877.
Nisucella = Bubo, 880.
Nisus = Accipiter, 844.
Nitidula = Tarsiger, 384.
Nitiocorys = Anthus, 445.
Nocthura = Nothoprocta, 784.
Noctua = Athene, 894.
Nodalia = Heliangelus, 155.
Nomadites = Pastor, 537.
 NOMONYX, 1001.
Nomusia = Chaëtusia, 936.
 NONNULA, 48.
 NOTAUGES, 548.
Notharcus = Bucco, 46.
Nothera = Nothura, 785.
Notherodius = Aramus, 920.

NOTHOCERCUS, 782.
 NOTHOCRAX, 790.
 NOTHOPROCTA, 784, 1115.
Nothriscus = Bucco, 46.
Nothrophrontes = Thrasaelus, 848.
 NOTIUBA, 785.
Nothurus = Rhynchotus, 784.
Notiochelidon = Atticora, 257.
 NOTODELA, 384.
Notophox = Ardea, 909.
 NOTORNIS, 976.
 NUCIFRAGA, 506.
 NUMENIUS, 944.
 NUMIDA, 804.
 NUTTALLORNIS, 1078.
Nuttallornis = Contopus, 248.
Nyctaeus = Bubo, 880.
Nyctagreu = Antrostomus, 1063.
 NYCTALA, 893, 1117.
Nyctalops = Asio, 877.
 NYCTANASSA, 918.
 NYCTEA, 894.
Nycterodius = Nyctanassa, 918.
Nycterodius = Nycticorax, 917.
Nycthemerus = Gennæus, 800.
Nycthierax = Surnia, 894.
Nyctiardea = Nycticorax, 917.
 NYCTIBIUS, 117, 1063.
Nycticeyx = Dacelo, 104.
Nyctichelidon = Caprimulgus, 122.
 NYCTICORAX, 917.
 NYCTIDNOMUS, 121, 1063.
Nyctinomus = Nyctiornis, 97.
 NYCTIORNIS, 97.
Nyctipetes = Glaucidium, 896.
 NYCTIPROGNE, 118.
Nyctornis = Nyctibius, 117.
Nymphæus = Rhyacornis, 273.
 NYMPHICUS, 26.
Nyroca = Ethya, 996.
Nystactes = Bucco, 46.
Nystalus = Bucco, 46.
Nystastes = Capito, 41.
 OCEANITES, 1029.
 OCEANODROMA, 1028.
Oceanus = Stercorarius, 1027.
Ochetorhynchus = Upucerthia, 203.
Ochromela = Siphia, 292.
Ochthites = Muscigralla, 230.
 OCHTHODIETA, 225, 1074.
Ochthodromus = Charadrius, 937.
 OCHTHOECA, 226, 1075.
 OCHTHONNIS, 227.
Ocuiscus = Bulorides, 915.
Octopteryx = Guira, 62.

OCYALUS, 549.
Ocyeros = Lophoceros, 103.
 OCYDROMUS, 964.
Ocypetes = Thinocorus, 780.
 OCYPHAPS, 768.
Ocypterus = Artamus, 533.
Ocyris = Emberiza, 620.
Odonterus = Yuhina, 346.
 ODONTOPHORUS, 822.
 ODONTORHYNCHUS, 421, 1095.
Odontriorchis = Leptodon, 866.
 ŒDEMA, 999.
 ŒDICNEMUS, 927.
 ŒDIRHINUS, 739.
 ŒDISTOMA, 718.
 ŒNA, 765.
Enanthe = Saxicola, 358.
Enas = Pteroclorus, 776.
Enolimnas = Amaurornis, 972.
Enops = Rhinogryphus, 828.
 ESTRELATA, 1033.
Ogonorhynchus = Conurus, 11.
Oidemia = Œdemia, 999.
Olbiorchilus = Anorthura, 1096.
Oligocercus = Sylviella, 354.
Oligomyodrus = Cinnamopterus, 545.
 OLIGURA, 343.
Oligura = Sylviella, 354.
Ololygon = Cacomantis, 52.
Ombria = Phaleris, 1046.
Omeotreron = Ptilopus, 735.
Ommatornis = Acropternis, 168.
 ONCOSTOMA, 232.
Onochrus = Chrysotis, 4.
Onocrotalus = Pelecanus, 1005.
Onopopelia = Turtur, 761.
Onychætus = Ictinaëtus, 850.
Onychoprion = Sterna, 1014.
Onychopterus = Myiarchus, 250.
 ONYCHORHYNCHUS, 1077.
Onychorhynchus = Muscivora, 244.
Onychospina = Emberiza, 620.
Onychospiza = Montifringilla, 594.
Onychotes = Buteo, 855.
 ONYCOGNATHUS, 545.
Opæthus = Turacus, 88.
Opetioptila = Aburria, 794.
Opetiorhynchus = Furnarius, 203.
Ophiotheres = Serpentarius, 827.
Ophoætus = Spilornis, 834.
Ophrydornis = Malacopteron, 337.
 OPHRYSIA, 818.
 OPISTHOCOMUS, 794.
Opistholophus = Chauna, 979.
 OPISTHOPRORA, 156.

- Opopsitta* = *Cyclopsitta*, 33.
OPORORNIS, 436, 1097.
Orwigithus = *Serinus*, 599.
ORCHESTICUS, 644.
ORCHILUS, 233.
Orcas = *Cochoa*, 284.
Oreias = *Lagopus*, 826.
OREICOLA, 273.
OREOCHARIS, 674.
OREOCINCLA, 403, 1094.
OREOCORYS, 449.
Oreoctistes = *Lædorusa*, 305.
OREOICA, 482.
OREOMANES, 686.
OREOMYZA, 692.
OREONYMPHA, 159.
Oreopeleia = *Geotrygon*, 770.
Oreoperdix = *Arboricola*, 813.
OREOPHASIS, 791.
OREOPHILUS, 933.
Oreopneuste = *Lusciniola*, 371.
OREOPSITTACUS, 32, 1055.
OREOPYRA, 148.
OREORTYX, 818.
OREOSCOPTES, 415.
Oreospiza = *Atlapetes*, 636.
Oreospiza = *Oreostruthus*, 584.
Oreosterops = *Zosterops*, 705.
OREOSTRUTHUS, 584.
Oreotetrax = *Tetraogallus*, 806.
Oreothlypis = *Parula*, 432.
OREOTHRAPUS, 644.
OREOTROCHILUS, 147.
Orescius = *Harpactes*, 88.
Oreskios = *Harpactes*, 88.
Oressochen = *Chloëphaga*, 985.
Oricocercus = *Diphyllodes*, 519.
ORIGMA, 352.
ORIOIA, 499.
Oriolinus = *Hyphantornis*, 561.
ORIOLUS, 525, 1105.
Orites = *Acredula*, 466.
Orites = *Montifringilla*, 594.
ORNITHON, 238, 1076.
Ornithomyia = *Heliomaster*, 160.
Orocetes = *Monticola*, 392.
Oropcleia = *Geotrygon*, 770.
Orospina = *Emberiza*, 620.
Orospina = *Pseudochloris*, 639.
Orpheus = *Hypsipetes*, 315.
Orpheus = *Minus*, 415.
Orphryzone = *Arses*, 288.
ORTALIDA, 792.
Ortalis = *Ortalis*, 792.
ORTHNOCICHLA, 430.
Orthnocichla = *Pseudoxenicus*, 1088.
Orthocolaptes = *Dendrocolaptes*, 185.
Orthocorys = *Opisthocornus*, 794.
ORTHOGONYX, 658.
Ortholophus = *Anorrhinus*, 102.
ORTHONYX, 729.
Orthorhamphus = *Esacus*, 928.
Orthorhinus = *Pomatorhinus*, 325.
ORTHORHYNCHUS, 164.
Orthornis = *Phaethornis*, 131.
ORTHOTOMUS, 361.
Ortygarchus = *Aramides*, 963.
Ortygia = *Colinus*, 820.
Ortygion = *Coturnix*, 815.
Ortygis = *Turnix*, 778.
ORTYGOCICHLA, 335.
Ortygodes = *Turnix*, 778.
Ortygometra = *Crex*, 966.
Ortygonax = *Rallus*, 959.
Ortygops = *Coturnicops*, 970.
Ortygornis = *Francolinus*, 807.
ORTYGOSPIZA, 577.
Ortyx = *Colinus*, 820.
Ortyx = *Turnix*, 778.
ORTYXELUS, 930.
Orynx = *Pyromelana*, 571.
Oryx = *Pyromelana*, 571.
ONYZOBORUS, 613.
Oryzornis = *Padda*, 588.
Osalia = *Chaetocercus*, 163.
OSCULATIA, 770.
OSMOTRERON, 733.
OSSIIFRAGA, 1036.
Osteorophea = *Leptoptilus*, 907.
OSTINOPS, 550.
Ostralega = *Hæmatopus*, 932.
Otagon = *Turnagra*, 329.
Othello = *Thamnophilus*, 182.
Othyphantes = *Heterhyphantes*, 564.
OTIDIPHAPS, 774.
Otipne = *Pseudocolaptes*, 196.
OTIS, 925.
OTOCOMPSA, 304.
OTOCORYS, 451, 1098-99.
Otocoryx = *Otocorys*, 451.
Otodytes = *Podicipes*, 1040.
OTOGYPS, 829.
Otomela = *Enneoctonus*, 485.
OTOPHANES, 121.
Otostilus = *Parotia*, 522.
Otothrix = *Batrachostomus*, 116.
Otus = *Asio*, 877.
Ourax = *Pauxis*, 790.
Oxycerca = *Munia*, 586.
OXYECHUS, 939.

- Oxyglossus* = *Mniotilta*, 432.
 OXYLABES, 338.
Oxylophus = *Coccytes*, 49.
Oxynotus = *Lalage*, 302.
 OXYPELIA, 764.
 OXYPOGON, 158.
Oxypyga = *Sclerurus*, 191.
 OXYRHAMPHUS, 224.
Oxyrhynchus = *Oxyrhamphus*, 224.
Oxystomus = *Creadion*, 516.
Oxytelus = *Ortyxelus*, 930.
Oxyura = *Erisimatura*, 1001.
 OXYURUS, 201.
 PACHYGARE, 481.
 PACHYCEPHALA, 476, 1102.
 PACHYCEPHALIXUS, 306.
 PACHYCEPHALOPSIS, 481, 1102.
 PACHYCOCCYX, 50.
Pachyglossa = *Prionochilus*, 674.
 PACHYNUS, 6, 1053.
 PACHYPHANTES, 567.
Pachyprora = *Batis*, 264.
Pachyptila = *Prion*, 1037.
Pachyptynx = *Bubo*, 880.
 PACHYRHAMPHUS, 212, 1073.
Pachyrhynchus = *Pachyrhamphus*, 212.
Pachysylvia = *Hilophilus*, 473.
 PADDA, 588.
 PAGODROMA, 1035.
Pagonetta = *Harelda*, 999.
 PAGOPHILA, 1026.
Pagurothera = *Halcyon*, 106.
Paictes = *Philepitta*, 210.
 PALEORNIS, 18, 1054.
Palastra = *Macropteryx*, 130.
 PALAMEDEA, 979.
Palaënas = *Turturæna*, 753.
Pallasia = *Melanocorypha*, 452.
Pallene = *Chætura*, 127.
Pallenua = *Motacilla*, 442.
Pallestre = *Macropteryx*, 130.
 PALMERIA, 692.
Paludicola = *Hydornis*, 207.
Palumbœnas = *Columba*, 748.
Palumbus = *Columba*, 748.
Pampa = *Sphenoproctus*, 133.
Pampusana = *Phlogœnas*, 772.
Pan = *Semnornis*, 1056.
Panæola = *Nectarinia*, 694.
Pandicilla = *Cyanecula*, 383.
 PANDION, 877.
Pannyschistes = *Erythropus*, 872.
 PANOPLITES, 152, 1067.
 PANTERPE, 142.
 PANURUS, 469.
Panychlora = *Chlorostilbon*, 141.
 PANYPTILA, 126.
Paphosia = *Lophornis*, 165.
 PARABUTEO, 858.
Paracus = *Ara*, 10.
 PARADIGALLA, 524.
 PARADISEA, 518, 1105.
Paradisornis = *Paradisea*, 518.
 PARADOXORNIS, 470.
Paralcyon = *Dacelo*, 104.
 PARAMYTHIA, 261.
 PARPALOTUS, 674.
Pardipicus = *Dendropicus*, 73.
Pardirallus = *Rallus*, 959.
 PARUDIASTES, 973.
Parinia = *Zosterops*, 705.
 PARISOMA, 273, 1081.
Parkinsonius = *Menura*, 729.
 PARMOPTILA, 357.
Parnopia = *Locustella*, 370.
Parnopio = *Hagedashia*, 902.
 PAROARIA, 642, 1111.
Paroides = *Acredula*, 466.
 PAROTIA, 522.
 PARRA, 958.
 PARULA, 432, 1096.
Parulus = *Synallaxis*, 197.
 PARUS, 461, 1100.
 PARYPHEPHORUS, 521.
Parzudakia = *Heliangelus*, 155.
 PASSER, 597, 1109.
 PASSERCULUS, 631, 1110.
 PASSERELLA, 635.
Passerina = *Cyanospiza*, 626.
 PASTOR, 537.
 PATAGONA, 135.
Patagiœnas = *Columba*, 748.
Pauri = *Pauxis*, 790.
 PAUXIS, 790.
Parianus = *Pavo*, 794.
 PAVO, 794.
 PAVONCELLA, 948.
Paruncula = *Taoniscus*, 785.
Pealea = *Pelagodroma*, 1030.
Pecuaris = *Pastor*, 537.
Pedeaithya = *Podicipes*, 1040.
Pedetaithya = *Podicipes*, 1040.
 PEDILORHYNCHUS, 266.
Pedicorys = *Anthus*, 445.
 PEDIECETES, 823.
 PEDIONOMUS, 779.
Pedopsaris = *Sturnella*, 555.
 PELAGODROMA, 1030.
 PELARGOPSIS, 114, 1062.
Pelecanoides = *Halodroma*, 1037.

- Peleeonopus* = *Sterna*, 1014.
 PELECANUS, 1005.
 PELICINIUS, 491.
Pelidna = *Tringa*, 950.
Pelocichia = *Turdus*, 399.
Pelionetta = (*Edemia*), 999.
 PELLORNEUM, 336.
Pellorneum = *Scotocichla*, 334.
Pelodes = *Hydrochelidon*, 1012.
Peloperdix = *Arboricola*, 813.
Pelorhynchus = *Gallinago*, 952.
Peltohyas = *Eudromias*, 938.
 PELTOPS, 291, 1083.
 PENDULINUS, 556, 1106-7.
Pendulinus = *Ægithalus*, 467.
 PENELOPE, 791, 1115.
 PENELOPIDES, 102.
 PENELOPINA, 792.
Penelope = *Mareca*, 991.
Penelope = *Ortalida*, 792.
 PENNULA, 969.
Pentheres = *Melanoparus*, 460.
Penthestes = *Melanoparus*, 460.
 PENTHETRIA, 573, 1108.
Penthetriopsis = *Penthetria*, 573.
Penthoeryx = *Cuculus*, 51.
Penthodyta = *Pentholea*, 392.
 PENTHOLEA, 392.
Penthornis = *Melanoparus*, 1100.
Pepoaza = *Tenioptera*, 225.
Peratus = *Helianthus*, 155.
Pernopsis = *Nigrita*, 575.
Perenopterus = *Neophron*, 830.
 PERCNOTOLA, 175.
Perdicidens = *Francolinus*, 807.
Perdieopelia = *Starnonas*, 774.
 PERDICULA, 813.
 PERDIX, 812.
Perdortyx = *Coturnix*, 815.
 PERICNOTOTUS, 301, 1084.
Periparus = *Parus*, 1100.
Periporphyrus = *Pitylus*, 643.
 PERISOREUS, 511, 1105.
 PERISSOGLOSSA, 435.
 PERISSORNIS, 536.
Perissura = *Zenaidura*, 757.
Peristera = *Turtur*, 758.
 PERNIS, 865.
Perspicilla = *Lichenops*, 229.
 PETASOPHORA, 144.
 PETROCHELIDON, 258.
Petrocincla = *Monticola*, 392.
Petrocosyphus = *Monticola*, 392.
Petrodroma = *Tichodroma*, 684.
 PETROECA, 266.
Petrogallus = *Ptilopachys*, 817.
Petroica = *Petroeca*, 266.
 PETRONIA, 596, 1109.
 PETROPHASSA, 767.
Petrophila = *Monticola*, 392.
Peucea = *Hæmophila*, 633.
 PEUCEDRAMUS, 436, 1097.
Pezites = *Trupialis*, 555.
 PEZOPETES, 649.
 PEZOPORUS, 27, 1054.
Pezus = *Tinamus*, 781.
Phabalectryo = *Calenas*, 774.
Phabisea = *Phabotreron*, 734.
 PHABOTRERON, 734.
Phacelias = *Kelaartia*, 307.
 PHACELDOMUS, 196.
Phænicoperdix = *Arboricola*, 813.
 PHENORHINA, 747.
Phæochroa = *Aphantochroa*, 134.
 PHÆOLÆMA, 149.
 PHÆOMYIAS, 1076.
Phæoprogne = *Progne*, 259.
 PHÆOPTILA, 139.
Phæopus = *Numenius*, 944.
 PHÆORNIS, 284.
 PHAËTHORNIS, 131, 1064-65.
 PHAËTON, 1004.
 PHAËTHUSA, 1013.
 PHAINOPEPLA, 261.
 PHAINOPTILA, 261.
Phaiolaina = *Phæolæma*, 149.
Phaiopicus = *Micropternus*, 78.
 PHALACROCORAX, 1006.
Phalacrotreron = *Vinago*, 731.
Phalænosis = *Glaucidium*, 896.
 PHALÆNOPTILUS, 121, 1063.
Phalaria = *Fulica*, 977.
Phalaridion = *Porzana*, 967.
Phalaridium = *Porzana*, 967.
 PHALAROPUS, 957.
Phalcoænus = *Ibycter*, 832.
 PHALERIS, 1046.
Phapiscus = *Phabotreron*, 734.
Phapitreron = *Phabotreron*, 734.
 PHAPS, 767.
 PHAROMACRUS, 85, 1059.
Phasianurus = *Dafila*, 994.
 PHASIANUS, 801, 1115-16.
 PHASIDUS, 804.
Phasmoptynx = *Asio*, 877.
Phassa = *Ptilopus*, 735.
 PHEDINA, 259.
 PHEGORNIS, 956.
Phemonæ = *Eriocnemis*, 153.
Phene = *Gypætus*, 831.

PHEUCTICUS, 611.
 PHIBALURA, 215.
 PHIGYS, 30.
Philacantha = Sylvia, 374.
 PHILACTE, 984.
 PHILATERUS, 575.
Philagrus = Ploceipasser, 569.
Philamnus = Otocorys, 451.
Philedon = Leptornis, 724.
 PHILEMON, 726, 1113.
Philemonopsis = Philemon, 726.
 PHILENTOMA, 281.
 PHILEPITTA, 210.
Phileremos = Otocorys, 451.
Philocalix = Liothrix, 347.
 PHILODICE, 161.
 PHILOHELA, 955.
Philolinnos = Limnocryptes, 955.
Philomachus = Pavoncella, 948.
Philomela = Aëdon, 382.
Philorchemon = Tetrapteryx, 923.
 PHILORTYX, 819.
 PHILYDOR, 193, 1072.
 PHIMOSUS, 902.
Phimus = Musophaga, 90.
Phlæceastes = Campephilus, 80.
Phlegænas = Phlogænas, 772.
Phlegopsis = Phlogopsis, 172.
 PHLEOCRYPTES, 201.
 PHLEXIS, 319.
Phlæotomus = Dryocopus, 83.
 PHLOGENAS, 772.
 PHLOGOPHILUS, 154, 1067.
 PHLOGOPSIS, 172, 1069.
 PHLOGOTHRAUPIS, 655.
Phlothrux = Merops, 96.
Phylaconetta = Histrionicus, 999.
 PHODILUS, 898.
Phæbæstria = Diomedea, 1038.
 PHÆBETRIA, 1039.
 PHÆNICOCERCUS, 215.
Phænicocichla = Pitta, 207.
Phænicomanes = Aethorhynchus, 341.
Phæniconaias = Phænicopterus, 908.
Phænicoparra = Phænicoparrus, 908.
 PHÆNICOPARRUS, 908.
 PHÆNICOPHÆS, 59.
 PHÆNICOPHILUS, 652.
 PHÆNICOPTERUS, 908.
Phænicornis = Pericrocotus, 301.
Phænicorodias = Phænicopterus, 908.
Phænicosoma = Pyrranga, 658.
Phænicospiza = Carpodacus, 602.
 PHÆNICOTHRAUPIS, 657, 1111.
Phænicura = Ruticilla, 385.

Phænicurus = Phaëton, 1004.
Phænisoma = Pyrranga, 658.
Phæonerpes = Eleopicus, 75.
Pholeoptynx = Speotyto, 895.
 PHOLIA, 1080.
 PHOLIDAUGES, 541.
Pholidocoma = Sporopipes, 570.
 PHOLIDOPHALUS, 101, 1061.
 PHOLIDORNIS, 357.
Pholoë = Eriocnemis, 153.
Phonasca = Euphonia, 671.
Phoneus = Enneoctonus, 485.
Phonutria = Hirundinea, 244.
 PHONIPARA, 618.
Phonygama = Phonygammus, 517.
 PHONYGAMMUS, 517.
Photodilus = Phodilus, 898.
Phoyx = Ardea, 909.
Phragmaticola = Luscinola, 371.
Phrenopicus = Picus, 70.
Phrenotrix = Crypsirhina, 508.
 PHRYGILUS, 640.
Phylaconetta = Histrionicus, 999.
Phylidonyris = Meliornis, 723.
Phylidonyris = Myzomela, 714.
Phyllastrephus = Phyllostrophus, 314.
 PHYLLERGATES, 362.
 PHYLLOBASILEUS, 378.
Phyllodytes = Certhiparus, 1101.
 PHYLLOLAIS, 354.
Phyllomanes = Vireo, 471.
 PHYLLOMYIAS, 237, 1076.
Phyllopezus = Actophilus, 958.
Phyllopneuste = Phylloscopus, 377.
Phyllopseuste = Phylloscopus, 377.
Phyllornis = Chloropsis, 317.
 PHYLLOSCARTES, 234.
 PHYLLOSCOPUS, 377, 1091.
 PHYLLOSTROPHUS, 314, 1085-86.
Phymatoblepharus = Melanerpes, 68.
Physocorax = Corvus, 502.
 PHYTOTOMA, 210.
 ΠΙΑΥΑ, 58.
 PICA, 506.
 PICATHARTES, 516.
Picaçurus = Columba, 748.
Picerthia = Lochmias, 202.
Picicorvus = Nucifraga, 506.
Picnorhamphus = Sphecotheres, 528.
Picoides = Tridactylia, 72.
 PICOLAPTES, 187, 1070.
Piculus = Picumnus, 83.
Piculus = Picus, 70.
Picumnoides = Sasia, 85.
 PICUMNUS, 83, 1059.

Picus, 70, 1058.
Piezorhina, 614.
Piezorhynchus = *Monarcha*, 289.
Pilonia = *Lampropygia*, 152.
Pilorhinus, 546.
Pinarochroa, 388.
Pinarocichla, 307, 1084.
Pinarolæma = *Petasophora*, 144.
Pinarolestes = *Colluricincla*, 495.
Pinaroloxias, 594.
Pinarornis, 324.
Pindalus = *Cryptolopha*, 285.
Pinguinaria = *Aptenodytes*, 1047.
Pinguinus = *Alca*, 1042.
Pinicola, 606.
Pionias = *Pionus*, 6.
Pionites = *Caica*, 8.
Pionopsitta, 7.
Pionopsittacus = *Pionopsitta*, 7.
Pionus, 6, 1053.
Pipastes = *Anthus*, 445.
Piperivorus = *Selenidera*, 44.
Pipile = *Cumana*, 793.
Pipilo, 636, 1111.
Pipilopsis, 648.
Pipiscus = *Picumnus*, 83.
Pipodes = *Tridactylia*, 72.
Pipra, 220, 1074.
Pipraidea = *Pipridea*, 669.
Pipreola, 216, 1074.
Pipridea, 669.
Pipripicus = *Picus*, 70.
Piprisoma = *Prionochilus*, 674.
Piprites, 219.
Pipromorpha = *Mionectes*, 236.
Piscatrix = *Sula*, 1011.
Pisorhina = *Scops*, 882.
Pisynolimnas = *Amaurornis*, 972.
Pitangus, 243.
Pithecophaga, 834.
Pithys, 173, 1069.
Pitohui = *Rhectes*, 494.
Pitta, 207, 1073.
Pittasoma, 171, 1069.
Pituipecus = *Colaptes*, 62.
Pitylus, 643.
Pityriasis, 501.
Pityriopsis = *Pityriasis*, 501.
Placophorus = *Agapeta*, 149.
Plagiospiza = *Hæmophila*, 633.
Planchesia = *Myiochanes*, 1078.
Planesticus = *Turdus*, 399.
Planetis = *Sterna*, 1014.
Plangus = *Harpyhaliaëtus*, 861.
PLATALEA, 904.

Platibis = *Platalea*, 904.
Platurus = *Discura*, 166.
PLATYCERCUS, 21, 1054.
Platyceros = *Hydrocorax*, 100.
PLATYCICHLA, 407.
Platydiptna = *Hedydiptna*, 694.
Platygnathus = *Myiagra*, 282.
PLATYLOPHUS, 509.
PLATYPSARIS, 1073.
Platypsaris = *Hadrostomus*, 211.
Platypteraena = *Zenaida*, 757.
Platypus = *Somateria*, 1000.
Platyrhynchus = *Eurylæmus*, 205.
PLATYRHYNCHUS, 231, 1075.
Platyrhynchus = *Megarhynchus*, 244.
Platyrhynchus = *Myiobius*, 245.
PLATYSMURUS, 509.
Platyspiza = *Geospiza*, 608.
PLATYSTIRA, 266.
Platystomus = *Peltops*, 291.
Platystylopterus = *Campylopterus*, 133.
Platyurus = *Merulaxis*, 167.
Plaucus = *Sula*, 1011.
Plantus = *Alca*, 1042.
Plantus = *Larus*, 1021.
Plectolophus = *Nymphicus*, 26.
Plectorhamphus = *Plectrorhynchus*, 714.
Plectorhyncha = *Plectrorhynchus*, 714.
Plectrofringilla = *Montifringilla*, 594.
Plectroperdix = *Galloperdix*, 817.
PLECTROPHANES, 624.
Plectrophanes = *Plectropterus*, 980.
Plectrophenax = *Plectrophanes*, 624.
Plectrophorus = *Ithagene*, 796.
PLECTROPTERUS, 980.
Plectropus = *Ithagene*, 796.
PLECTORHYNCHUS, 714.
PLEGADIS, 903.
Plegadornis = *Plegadis*, 903.
Pleiodus = *Didunculus*, 775.
Plinthopicus = *Blythipicus*, 77.
Plocealauda = *Mirafr*, 455.
PLOCELLA, 567.
PLOCEIPASSER, 569.
PLOCEUS, 566, 1107.
PLOTUS, 1010.
Plumipeda = *Spizaëtus*, 848.
Pluvialis = *Charadrius*, 937.
PLUVIANELLUS, 941.
PLUVIANUS, 930.
Pluviorhynchus = *Charadrius*, 937.
Plyctolophus = *Cacatua*, 2.
Pnigocichla = *Colluricincla*, 495.
Pnigohierax = *Hierofalco*, 875.
PNOEPYGA, 430.

- PODAGER, 118.
 PODARGUS, 117, 1063.
Podasocys = Charadrius, 937.
 PODICA, 978.
Podiceps = Podicipes, 1040.
 PODICIPES, 1040.
 PODILYMBUS, 1042.
Podoa = Heliornis, 978.
 PODOCES, 506.
Podochætes = Nyctiprogne, 118.
Pœcile = Parus, 461.
Pœcilodryas, 271, 1080.
Pœcilonitta = Dafila, 994.
Pœcilopternis = Buteo, 855.
Pœciloptyx = Ictinia, 864.
Pœcilornis = Iridornis, 664.
Pœcilornis = Tinnunculus, 870.
Pœcilothraupis, 664.
Pœcilotreron = Ptilopus, 735.
Pœcilotriccus = Todirostrum, 231.
Pœkilis = Parus, 461.
 PŒOPTERA, 546.
 POEPHILA, 584.
Pogonias = Pogonorhynchus, 35.
Pogonocichla = Tarsiger, 384.
Pogonomerops = Meropogon, 97.
Pogonorhamphus = Pogonorhynchus, 35.
 POGONORHYNCHUS, 35.
 POGONORNIS, 722.
Pogonothraupis = Lanio, 656.
 POGONOTRICCUS, 235, 1075.
 POICEPHALUS, 8, 1053.
Polemistria = Lophornis, 165.
Polidacnis = Daenis, 687.
 POLIOAËTUS, 877.
Poliocephalus = Podicipes, 1040.
Poliococcyx = Rhopodytes, 58.
 POLIOHIERAX, 868.
 POLIOLAIS, 1089.
Poliolimnas = Porzana, 967.
 POLIOLOPHUS, 307.
Poliomyias = Muscicapa, 262.
Polionetta = Anas, 989.
Poliopsar = Pendulinus, 556.
Poliopsar = Spodiopsar, 535.
Poliopsitta = Agapornis, 22.
Poliopsittacus = Agapornis, 22.
 POLIOPTILA, 380, 1091.
Poliornis = Butastur, 859.
 POLIOSPIZA, 599.
Polipicus = Mesopicus, 76.
Polophilus = Centropus, 55.
Polyæna = Bourcieria, 151.
Polyboroides = Gymnogenys, 835.
 POLYBORUS, 832.
Polychlorus = Eclectus, 16.
 POLYERATA, 136.
Polymitra = Emberiza, 620.
Polymnia = Acestrura, 163.
Polyodon = Andropadus, 313.
Polyodon = Yuhina, 346.
 POLYONOMUS, 157.
Polypeira = Copsychus, 411.
Polyphasia = Cacomantis, 52.
 POLYPLANCTA, 150.
 POLYPLECTRON, 795.
Polypteryx = Vultur, 829.
Polysticta = Somateria, 1000.
Polysticte = Trachyphonus, 40.
 POLYTELIS, 20.
 POLYTMUS, 146, 1066.
 POLYXEMUS, 163, 1068.
 POMAREA, 291, 1083.
 POMAREOPSIS, 291, 1083.
 POMATORHINUS, 325.
Pomatorhynchus = Telephonus, 488.
Pomatostomus = Pomatorhinus, 325.
Pontoætus = Haliaëtus, 853.
Poœcetes = Poocætes, 630.
 POOCETES, 630.
Poodytes = Megalurus, 351.
 POOSPIZA, 628.
 PEPELAIREA, 1068.
Popelairia = Pymnacanthe, 165.
 PORPHYRIO, 975.
 PORPHYRIOLA, 975.
 PORPHYRIOPS, 974.
 PORPHYRIOPNIS, 973.
 PORPHYROCEPHALUS, 25.
Porphyrolæma = Cotinga, 216.
 PORPHYROSPIZA, 627.
Porphyrola = Porphyriola, 975.
 PORZANA, 967.
 PORZANULA, 971.
Potamochelidon = Seena, 1014.
Potamodus = Locustella, 370.
Potamopsar = Lampropsar, 559.
Pothinus = Trogon, 86.
Prædatrix = Stercorarius, 1027.
Prasitis = Chlorostilbon, 141.
Praticola = Calamanthus, 360.
Praticola = Pratincola, 387.
 PRATINCOLA, 387, 1092.
Praxilla = Petasophora, 144.
Premnecopus = Dendrocolaptes, 185.
Premnoplex = Margarornis, 191.
Presbys = Cinnicerthia, 419.
Priamphus = Prion, 1037.
Primolius = Ara, 10.
 PRINIA, 358.

- Priocella*, 1033.
Priofinus, 1032.
Prion, 1037.
Prionirhynchus, 94.
Prionites = *Momotus*, 94.
Prioniturus, 17, 1054.
Prionochilus, 674.
Prionodura, 524.
Prionops, 497, 1104.
Prionornis, 1061.
Prionotelus, 86.
Priotelus = *Prionotelus*, 86.
Prister = *Merganser*, 1003.
Pristorhamphus, 676.
Pristoptera = *Psalidoprocne*, 259.
Procarduelis, 590.
Procellaria, 1028.
Procellarus = *Leucophaeus*, 1026.
Procelsterna = *Anous*, 1018.
Procnias, 670.
Procnopis, 669.
Proctopus = *Podiceps*, 1040.
Prodotes = *Indicator*, 34.
Prodotiscus, 35, 1055.
Progne, 259, 1079.
Prognornis = *Eupetomena*, 134.
Promerops, 727.
Proparoides = *Parus*, 1100.
Proparus = *Alcippe*, 345.
Proparus = *Fulvetta*, 346.
Propasser = *Carpodacus*, 602.
Propyrrhula, 607.
Prosecusa = *Brachypodius*, 308.
Prosobonia = *Phegornis*, 956.
Prosopæa = *Pyrhulopsis*, 21.
Prosorinia = *Cochoa*, 284.
Prospotetus = *Xenopsaris*, 215.
Prothemadera, 723.
Protonotaria, 432.
Prunella = *Accipiter*, 381.
Prymnacantha, 165.
Prynorhamphus = *Smithornis*, 285.
Psalidoprocne, 259, 1079.
Psalidoprymna, 158, 1067.
Psalidoramphos = *Rhynchops*, 1020.
Psalidura = *Alectrurus*, 228.
Psaltria, 466.
Psaltriparus, 466, 1101.
Psaltrites = *Psaltriparus*, 466.
Psalurus = *Hydropsalis*, 120.
Psamathia, 348.
Psammocrex = *Himantornis*, 965.
Psaris = *Tityra*, 210.
Psarisomus, 205.
Psarites = *Sturnopastor*, 536.
Psarocolius = *Ostinops*, 550.
Psaroglossa = *Saroglossa*, 540.
Psaroides = *Pastor*, 537.
Psaropholus, 528.
Pseliophorus = *Buarremon*, 617.
Psephotus, 25, 1054.
Pseudaëtus = *Eutolmaëtus*, 850.
Pseudalæmon = *Alæmon*, 450.
Pseudastur = *Leucopternis*, 860.
Pseudibis = *Ibis*, 900.
Pseudobias, 234.
Pseudobucco = *Psilopogon*, 40.
Pseudochelidon, 534.
Pseudochloris, 639.
Pseudocolaptes, 196.
Pseudocossyphus, 410.
Pseudocycnus = *Coscoroba*, 987.
Pseudodacnis, 665.
Pseudofringilla = *Indicator*, 34.
Pseudogelaus = *Agelaus*, 1106.
Pseudogeranus = *Grus*, 921.
Pseudogerygone = *Gerygone*, 268.
Pseudoglottis = *Totanus*, 946.
Pseudogryphus = *Gymnogyps*, 829.
Pseudogyps, 830, 1116.
Pseudolalage = *Lalage*, 302.
Pseudoleistes, 554.
Pseudolor = *Coscoroba*, 987.
Pseudoluscinia = *Locustella*, 370.
Pseudominla = *Minla*, 1088.
Pseudomitris = *Chrysomitris*, 591.
Pseudomyiobius, 246.
Pseudonestor, 606.
Pseudopodoces = *Podoces*, 1105.
Pseudoprion = *Prion*, 1037.
Pseudoprocne = *Panyptila*, 126.
Pseudops = *Esacus*, 928.
Pseudoptynx, 882, 1116.
Pseudorectes = *Rhectes*, 494.
Pseudornis = *Surniculus*, 50.
Pseudoscolopax = *Macrorhamphus*, 946.
Pseudoscops, 879.
Pseudoseisura, 1072.
Pseudoseisura = *Homorus*, 195.
Pseudospingus = *Chlorospingus*, 650.
Pseudospiza = *Indicator*, 34.
Pseudostruthus = *Passer*, 1109.
Pseudotantalus, 905.
Pseudotharrhaleus, 335.
Pseudototanus = *Totanus*, 946.
Pseudotriccus, 233.
Pseudoxenicus, 1058.
Pseudozosterops, 713.
Pseuduria = *Uria*, 1013.
Psilocnemis = *Ortyxelus*, 930.

- Psilomycter* = Polytmus, 146.
 PSILOPOGON, 40.
Psilopus = Gerygone, 268.
 PSILORHAMPHUS, 177.
 PSILORHINUS, 515.
 PSILOSCOPS, 887.
Psithyradus = Locustella, 370.
Psittacara = Conurus, 11.
 PSITTACELLA, 21.
Psittacirostra = Psittirostra, 605.
Psittacodis = Eclectus, 16.
 PSITTACULA, 15, 1053.
Psittaculus = Loriculus, 22.
 PSITTACUS, 3.
Psitteutes = Trichoglossus, 30.
 PSITTINUS, 21, 1054.
 PSITTIROSTRA, 605.
 PSITTOSPIZA, 646.
Psittovius = Brotogerys, 15.
Psittrichas = Dasyptilus, 4.
 PSOPHIA, 923.
 PSOPHOCICHLA, 406.
 PSOPHODES, 320.
Ptenædus = Cinclorhamphus, 361.
 PTERIDOPHORA, 521.
 PTERNISTES, 810.
Pternura = Spizaetus, 848.
Pteroaëtus = Aquila, 851.
Pterochalinus = Pernis, 865.
Pterocircus = Circus, 835.
 PTEROCLES, 777.
 PTEROCLURUS, 776.
Pterocnemias = Rhea, 1052.
Pterocnemys = Rhea, 1052.
Pterocorax = Corvus, 502.
Pterocyanea = Querquedula, 992.
Pterocyclus = Trochalopteron, 321.
Pterodroma = Estrelata, 1033.
 PTEROGLOSSUS, 43.
 PTERONETTA, 981.
 PTEROPHANES, 152.
 PTEROPODOCYS, 300.
 PTEROPTOCHUS, 167.
 PTERORHINUS, 320.
Pteruthius = Pterythrius, 487.
Pterygocius = Pteroclorus, 776.
 PTERYTHRIUS, 487, 1103.
Ptiladela = Graucalus, 295.
Ptilinopus = Ptilopus, 735.
Ptiliogonys = Ptilogonys, 261.
Ptilobaphus = Melanichlora, 460.
 PTILOALPA, 745.
Ptilocarpus = Analcippus, 528.
 PTILOCHLORUS, 223.
 PTILOCICHLA, 331.
Ptilocorys = Galerida, 457.
Ptilolæmus = Anorrhinus, 102.
 PTILOGONYS, 261.
Ptiloleptus = Guira, 62.
 PTILONORHYNCHUS, 522.
 PTILOPACHYS, 817.
Ptilophyrus = Goura, 775.
 PTILOPODISCUS, 738.
Ptilopsis = Scops, 882.
 PTILOPUS, 735-36, 1114.
 PTILOPYGA, 332.
 PTILORHIS, 521.
 PTILOSCELIS, 935.
Ptilosclera = Trichoglossus, 30.
Ptiloskelos = Huhua, 881.
Ptilostomus = Cryptorhina, 507.
 PTILOTIS, 719.
Ptilotreron = Ptilopus, 735.
Ptiloturus = Promerops, 727.
Ptilurus = Promerops, 727.
Ptionura = Muscisaxicola, 230.
 PTISTES, 20.
Ptocas = Branta, 984.
 PTOCHOPTERA, 142.
 PTYCHORHAMPHUS, 1045.
Ptynx = Syrnium, 890.
Ptyonoprogne = Cotyle, 256.
Ptyonornis = Phaethornis, 131.
 PTYRTICUS, 408.
Pucherania = Pachycephala, 476.
 PUCRASIA, 801.
Puffinuria = Halodroma, 1037.
 PUFFINUS, 1030.
 PULSATRIX, 892, 1117.
Punanetta = Querquedula, 992.
Purpureicephalus = Porphyrocephalus, 25.
Purpureipitta = Pitta, 207.
 PYCNONOTUS, 305, 1084.
 PYCNOPTILUS, 319.
 PYCNOPYGIUS, 728.
 PYCNORHAMPHUS, 611.
Pycnosphrys = Cryptolopha, 285.
Pycetes = Caccabis, 806.
 PYCTORHIS, 340, 1087.
Pygargus = Circus, 835.
 PYGARRHICHUS, 190.
Pygmornis = Phaethornis, 131.
Pygochelidon = Atticora, 257.
 PYGOPTILA, 181.
Pygornis = Phaethornis, 131.
 PYGOSCELIS, 1047.
 PYRANGA, 658, 1111.
 PYRENESTES, 576.
Pyrgilauda = Montifringilla, 594.
 PYRGISOMA, 635.

Pyrgita = Passer, 597.
Pyrgitænas = Columbīgallina, 763.
Pyrgitopsis = Passer, 597.
 PYRIGLENA, 175.
Pyrilia = Pionopsitta, 7.
 PYROCEPHALUS, 246, 1077.
 PYRODERUS, 218.
 PYROMELANA, 571, 1108.
Pyrope = Tænioptera, 225.
Pyrophthalma = Melizophilus, 375.
Pyrosterna = Pteroglossus, 43.
 PYROTROGON, 1060.
Pyrotrogon = Harpactes, 88.
Pyroupicus = Picus, 70.
Pyrrherodias = Ardea, 909.
Pyrrhocentor = Centropus, 55.
Pyrrhococcyx = Piaya, 58.
 PYRRHOCOMA, 654.
 PYRRHOCORAX, 517.
Pyrrhodes = Charmosyna, 32.
Pyrrhodiglossa = Diglossa, 685.
 PYRRHOLEMUS, 366.
Pyrrhomitris = Chrysomitris, 591.
Pyrrhomyias = Myiobius, 245.
Pyrrhophæna = Amazilia, 138.
Pyrrhopicus = Blythipicus, 77.
 PYRRHOPECTES, 602.
Pyrrhorhynchus = Pipreola, 216.
 PYRRHOSPIZA, 604, 1109.
 PYRRHULA, 607, 1109.
Pyrrhulagra = Loxigilla, 613.
 PYRRHULAUDA, 459, 1100.
Pyrrhulina = Carpodacus, 602.
Pyrrhuloides = Pyrrhoptectes, 602.
 PYRRHULOPSIS, 21.
Pyrrhulorhyncha = Emberiza, 620.
 PYRRHULOXIA, 619.
 PYRRHUPHONIA, 671.
 PYRRHURA, 13, 1053.
 PYRRHURUS, 1085.
Pyrrhurus = Xenocichla, 309.
Pyrocheira = Amydrus, 545.
Pyrrota = Tachyphonus, 655.
 PYTELIA, 578.
Pythis = Pipra, 220.
 QUELEA, 571.
Querelea = Numida, 804.
 QUERQUEDULA, 992.
 QUERULA, 218.
Quiscal = Quiscalus, 559.
 QUISCALUS, 559, 1107.
Racama = Gypohierax, 831.
Radjah = Tadorna, 988.
 RALLICULA, 970.
 RALLINA, 965.

RALLUS, 959, 1118.
Ramphastoides = Selenidera, 44.
Ramphiculus = Ptilopus, 735.
Ramphocelus = Rhamphocœlus, 660.
Ramphodryas = Rhamphastos, 42.
Ramphomelus = Andigena, 43.
Ramphopsis = Rhamphocœlus, 660.
Ramphotrigon = Rhynchoecylus, 242.
Ramphoxanthus = Aulacorhamphus, 44.
Raphipterus = Merganetta, 1002.
Raya = Psarisomus, 205.
Rectes = Rhectes, 494.
Rectirostrum = Macrosphenus, 314.
 RECURVIROSTRA, 943.
Regerhinus = Leptodon, 866.
Reguloides = Phyllobasileus, 378.
 REGULUS, 379, 1091.
Reinwardtipicus = Chrysocolaptes, 80.
 REINWARDTOENAS, 756, 1114.
Remiza = Ægithalus, 467.
Rhabdocolius = Colius, 90.
 RHABDOCHLAMYS, 351.
Rhabdoglaux = Ninox, 887.
 RHABDORNIS, 685.
Rhabdotorrhinus = Hydrocissa, 1061.
Rhamphaleyon = Pelargopsis, 114.
 RHAMPHASTOS, 42, 1056.
 RHAMPHOCÆNUS, 176, 1069.
 RHAMPHOCHARIS, 676.
 RHAMPHOCINCLUS, 414.
 RHAMPHOCOCCYX, 59, 1057.
 RHAMPHOCÆLUS, 660, 1111.
 RHAMPHOCORYS, 451.
 RHAMPHODON, 131.
 RHAMPHOMANTIS, 55.
 RHAMPHOMICRON, 158.
Rhamphotreron = Treron, 733.
Rhantistes = Fulmarus, 1036.
Rhaphidornis = Ægithalus, 467.
Rhaphidura = Chætura, 127.
 RHEA, 1052.
 RHECTES, 494, 1104.
Rhegmatorhina = Gymnopathys, 173.
Rheinardius = Rheinardtius, 795.
 RHEINARDTIUS, 795, 1115.
Rhigelura = Podica, 978.
Rhimamphus = Dendroeca, 433.
Rhimphalea = Stiltia, 929.
 RHINOCETUS, 921.
 RHINOCICHLA, 327.
Rhinococcyx = Rhamphococcyx, 59.
Rhinocorax = Corvus, 502.
 RHINOCRYPTA, 167.
 RHINOGRYPHUS, 828.
Rhinomya = Rhinocrypta, 167.

RHINOMYIAS, 282.
 RHINOPLAX, 99.
 RHINOPOMASTUS, 98, 1061.
 RHINOPTILUS, 931.
Rhinoptynx = Asio, 877.
Rhinopus = Carpophaga, 743.
 RHINORTHA, 59.
Rhipidornis = Diphylloides, 519.
 RHIPIDURA, 276, 1081.
 RHIZOTHERA, 811.
 RHODACANTHIS, 606.
 RHODINOCICHLA, 418, 1095.
Rhodocephalus = Geoffroyus, 16.
Rhodocichla = Rhodinocichla, 418.
 RHODONESSA, 981.
 RHODOPECHYS, 596.
Rhodophila = Oreicola, 273.
Rhodophoneus = Pelicinius, 491.
 RHODOPIS, 160.
Rhodopyga = Lagonosticta, 577.
 RHODORNIS, 357.
 RHODOSPINGUS, 642.
Rhodospiza = Erythrospiza, 596.
 RHODOSTETHIA, 1021.
Rhodurus = Psittacus, 3.
Rhombura = Sphenocercus, 731.
Rhondella = Erithacus, 382.
Rhopias = Myrmotherula, 178.
Rhopochares = Thamnophilus, 182.
Rhopocichla = Alcippe, 345.
 RHOPODYTES, 58.
 RHOPOPHILUS, 350.
 RHOPORNIS, 1069.
Rhopospina = Phrygilus, 640.
 RHOPOTERPE, 172.
Rhyacophilus = Totanus, 946.
 RHYACORNIS, 273.
 RHYNCHÆA, 956.
Rhynchasmus = Spatula, 995.
Rhynchaspis = Spatula, 995.
Rhynchoceros = Lophoceros, 103.
 RHYNCHOCYCLUS, 242, 1077.
Rhynchænas = Henicophaps, 767.
Rhynchofalco = Hypotriorchis, 872.
Rhynchomegus = Micrastur, 837.
Rhynchophanes = Plectrophanes, 624.
 RHYNCHOPS, 1020.
Rhynchopsalia = Rhynchops, 1020.
 RHYNCHOPSITTA, 11.
Rhynchopsittacus = Rhynchopsitta, 11.
Rhynchortyx = Odontophorus, 822.
Rhynchosimus = Terekia, 948.
Rhynchospiza = Hæmophila, 633.
 RHYNCHOSTRUTHUS, 596, 1109.
Rhynchotis = Rhynchotus, 784.

RHYNCHOTUS, 784.
 RHYTIDOCEROS, 101.
Rhytipterna = Lipaugus, 213.
Ricordia = Sporadinus, 142.
 RIMATOR, 332.
 RISSA, 1027.
Rollandia = Podiceps, 1040.
 ROLLULUS, 815.
Romeris = Treron, 733.
Rossia = Rhodostethia, 1021.
 ROSTHRAMUS, 864.
Rostratula = Rhynchæa, 956.
 ROUGETIUS, 965.
Rubecula = Erithacus, 382.
Rubetra = Pratincola, 387.
 RUBIGULA, 308.
Rufibrenta = Branta, 984.
Rufirallus = Creciscus, 971.
 RUPICOLA, 215.
Rupicola = Columba, 748.
 RUPORNIS, 858.
Rusticola = Scolopax, 955.
 RUTICILLA, 385, 1091.
Rynchoschasmus = Anastomus, 906.
Sacfa = Perdix, 812.
Sapiopterus = Campylopterus, 133.
Sagmatorrhina = Lunda, 1046.
Salangana = Collocalia, 129.
Salicaria = Acrocephalus, 368.
Salicipasser = Passer, 597.
 SALPINCTES, 426.
Salpiza = Penelope, 791.
Salpizusa = Penelope, 791.
 SALPORNIS, 684.
 SALTATOR, 644, 1111.
 SALTATRICULA, 636.
 SALVADORINA, 1002.
 SAPAYOA, 1074.
Sapheopipo = Blythipicus, 77.
Sapphironia = Hylocharis, 139.
 SAPPHO, 158.
 SARCIIDIORNIS, 980.
 SARCIOPHORUS, 933.
Sarcogeranus = Grus, 921.
Sarcogrammus = Lobivanellus, 934.
 SARCOPHANOPS, 205.
 SARCOFS, 538.
 SARCORHAMPHUS, 827.
 SARGANURA, 722.
Sariama = Cariama, 924.
Sarochalinus = Merulaxis, 167.
 SAROGLOSSA, 540.
 SAROTHRURA, 969.
Sasa = Opisthocomus, 794.
 SASIA, 85, 1059.

- Satellus* = Tyrannus, 252.
Saturia = Eugenia, 150.
Satyra = Tragopan, 797.
SAUCEROTTEA, 137, 1065.
Sauloprocta = Rhipidura, 276.
Sauromarptis = Dacelo, 104.
Sauropatis = Halcyon, 106.
Saurophagus = Pitangus, 243.
SAUROTHERA, 57.
SAXICOLA, 388, 1092.
Saxicoloides = Thamnobia, 410.
SAVORNIS, 227.
SCÆORHYNCHUS, 1101.
Scæorhynchus = Heteromorpha, 470.
Scapaneus = Campephilus, 80.
Scaphidura = Cassidix, 551.
Scaphidurus = Cassidix, 551.
Scaphidurus = Quiscalus, 559.
Scaphorhynchus = Megarhynchus, 244.
SCARDAFELLA, 762.
SCELOGLAUX, 887.
Scelopipias = Astur, 840.
Scelostrix = Strix, 898.
SCENOPEETES, 523.
Scenopæus = Scenopæetes, 523.
Schetba = Lalage, 302.
SCHIFFORNIS, 223.
SCHISTES, 159.
SCHISTOCHLAMYS, 644.
Schistospiza = Coryphospingus, 642.
SCHIZÆACA, 201, 1072.
Schizoptila = Gymnocyrex, 963.
SCHIZORHIS, 90, 1060.
Schizura = Sylviorthorhynchus, 201.
SCHLEGELIA, 519.
SCHÆNICOLA, 349.
Schænicola = Emberiza, 620.
Schæniclus = Tringa, 950.
Schœniparus = Alcippe, 345.
Schœniparus = Minla, 343.
Schwaneria = Siphia, 292.
SCISSIROSTRUM, 548.
SCLATERIA, 1069.
Scleroptera = Francolinus, 807.
Scleroptila = Francolinus, 807.
SCLERURUS, 191, 1071.
SCOLECOPHAGUS, 559.
Scolecotheres = Mesopicus, 76.
Scolopacinus = Rhamphocœnus, 176.
SCOLOPAX, 955.
SCOPS, 882, 1117.
SCOPTELUS, 98.
SCOPUS, 909.
Scotæus = Nycticorax, 917.
SCOTIAPTEX, 892.
SCOTOCERCA, 360, 1089.
Scotocharis = Monasa, 48.
SCOTOCICHLA, 334.
Scotoglaux = Scotopelia, 879.
SCOTOPELIA, 879.
Scotophilus = Nyctala, 893.
SCOTORNIS, 120, 1063.
Scotospiza = Loxigilla, 613.
Scototheres = Scops, 882.
SCOTOOTHORUS, 1074.
SCYTALOPUS, 166, 1068.
SCYTHROPS, 55.
Secretarius = Serpentarius, 827.
SEENA, 1014.
Seisura = Sisura, 288.
Seiurus = Henicocichla, 436.
SELASPHORUS, 162, 1068.
SELENIDERA, 44.
SELEUCIDES, 520.
Semeiophorus = Macrodipteryx, 120.
SEMIOPTERA, 519.
Semiparus = Minla, 1088.
SEMNORNIS, 1056.
Senex = Ibycter, 832.
Sephanoïdes = Eustephanus, 157.
Sericopeleia = Haplopela, 768.
Sericoptila = Cnipoïegus, 228.
SERICORNIS, 366, 1090.
Sericornis = Ethomyias, 274.
SERICOSSYPHA, 652.
Sericotes = Eulampis, 146.
SERICULUS, 525.
Sericulus = Melanopyrrhus, 540.
SERILOPHUS, 205.
Serinopsis = Sycalis, 1169.
SERINUS, 599, 1109.
Serisomus = Coua, 60.
SERPENTARIUS, 827.
SERPAPHAGA, 235, 1075.
SERRESIUS, 743.
Serrirostrum = Diglossa, 685.
Setaria = Malacopteron, 337.
Setaria = Rhinomyias, 282.
SETOPHAGA, 441.
Sharpia = Anaplectes, 568.
SIALIA, 386, 1091-92.
Sialis = Sialia, 386.
SIBIA, 324.
Sibilatrix = Phylloscopus, 377.
Sicalis = Sycalis, 601.
Sigelus = Bradyornis, 287.
SIGMODUS, 498.
Silphidæna = Ptilopus, 735.
SIMORHYNCHUS, 1045.
Simorhynchus = Terekia, 948.

Simornis = *Psarisomus*, 205.
Simotes = *Calliechthrus*, 50.
Sinius = *Psarisomus*, 205.
SIPHIA, 292, 1083.
SIPHONORHIS, 121.
SIPTORNIS, 199, 1072.
SIRYSTES, 243.
SISOPYGIS, 228.
SISURA, 288.
SITAGRA, 564, 1107.
SITTA, 680, 1112.
Sittace = *Ara*, 10.
Sittacilla = *Glyphorhynchus*, 190.
SITTASOMUS, 190, 1071.
Sittella = *Neositta*, 682.
Sittella = *Sitta*, 680.
Sittiparus = *Minla*, 343, 1088.
Sittiparus = *Parus*, 1100.
Siurus = *Henicocichla*, 436.
SIVA, 347, 1088.
Skotiomimus = *Mimus*, 415.
Smaragdites = *Lampornis*, 145.
SMARAGDOCHRYsis, 142.
SMICRORNIS, 267.
Smilonyx = *Ketupa*, 879.
SMILORHIS, 37, 1055.
Smithiglaux = *Tænioglaux*, 897.
SMITHORNIS, 285, 1082.
Solenoglossus = *Microglossus*, 1.
SOMATERIA, 1000.
Sorella = *Passer*, 597.
Soroplex = *Colaptes*, 62.
Spaniopicoides = *Gecinulus*, 67.
Sparganura = *Lesbia*, 158.
Sparvius = *Astur*, 839.
Spasornis = *Vanga*, 499.
Spatherodia = *Platalea*, 904.
Spathophorus = *Eunomota*, 94.
SPATHOPTERUS, 20.
SPATHURA, 153.
SPATULA, 995.
Spatulea = *Spatula*, 995.
Speculipastor = *Pholidanges*, 541.
Speirops = *Zosterops*, 705.
SPELEORNIS, 426.
Spelectos = *Turacus*, 88.
SPEOTYTO, 895, 1117.
SPERMESTES, 576, 1108.
Spermolegus = *Accentor*, 381.
Spermophaga = *Spermospiza*, 571.
SPERMOPHILA, 614.
SPERMOPHILOPSIS, 614.
SPERMOSPIZA, 571.
Sphagolobus = *Ceralogymina*, 101.
Spheconax = *Melittophagus*, 96.

Sphecophobus = *Melittophagus*, 96.
SPHECOTHERES, 528.
Sphenæna = *Sphenocercus*, 731.
SPHENISCUS, 1048.
SPHENOCERCUS, 731, 1114.
SPHENOCICHLA, 428.
SPHENÆACUS, 337.
SPHENOPROCTUS, 133.
Sphenopyga = *Anumbius*, 197.
Sphenorhynchus = *Ciconia*, 905.
Sphenorhynchus = *Glyphorhynchus*, 190.
SPHENOSTOMA, 469.
Sphenotelus = *Ptilogonys*, 261.
Sphenotreron = *Sphenocercus*, 731.
SPHENURA, 349.
Sphenurus = *Sphenocercus*, 731.
Sphærolaryngus = *Crax*, 789.
SPHYROPICUS, 69, 1058.
Spicifer = *Lophura*, 798.
Spiciferus = *Pavo*, 794.
Spilocircus = *Circus*, 835.
SPILOCORYDON, 457.
Spiloglaux = *Ninox*, 887.
Spilopelia = *Turtur*, 761.
SPILOPTILA, 362.
SPILORNIS, 834.
SPILOTRERON, 740.
Spilura = *Gallinago*, 952.
Spina = *Emberiza*, 620.
SPINDALIS, 661, 1111.
Spinites = *Spizella*, 630.
Spinus = *Chrysomitris*, 591.
Spipola = *Anthus*, 445.
SPIZA, 639.
Spiza = *Cyanospiza*, 626.
Spizacercus = *Circus*, 835.
SPIZAËTUS, 848.
Spizampelis = *Spindalis*, 661.
SPIZELLA, 630.
SPIZIAPTERYX, 869.
SPIZIASTUR, 850.
Spizigeranus = *Heterospizias*, 861.
Spizigeranus = *Urubitinga*, 861.
Spizilauda = *Galerida*, 457.
SPIZIXUS, 304.
SPIZOCORYS, 454.
SPODIOPSAR, 535.
SPODIORNIS, 641.
Sporadicus = *Sporadinus*, 142.
SPORADINUS, 142, 1066.
SPORÆGINTHUS, 581, 1108.
Sporathraupis = *Tanagra*, 661.
Sporophila = *Spermophila*, 614.
SPOROPIPES, 570.
Sporothlastes = *Amadina*, 579.

- Spreo* = *Notauges*, 548.
SQUATAROLA, 937.
Stachyridopsis = *Cyanoderma*, 342.
Stachyridhynchus = *Sphenocichla*, 428.
Stachyris = *Cyanoderma*, 342.
Stachyris = *Strachyrhis*, 339.
Stactocichla = *Garrulax*, 327.
STACTOLEMA, 38, 1055.
STAGANOPLEURA, 579.
Stagnicola = *Gallinula*, 973.
STAPHIDIA, 344.
Starna = *Perdix*, 812.
STARNAENAS, 774.
STASIASTICUS, 335.
STEATORNIS, 115.
Steganopus = *Phalaropus*, 957.
Steganura = *Vidua*, 574.
Steganurus = *Spathura*, 153.
Stegnotama = *Penelope*, 791.
Stelgidillas = *Chlorocichla*, 1085.
STELGIDOPTERYX, 260, 1079.
Stelgidostomus = *Saltator*, 644.
STELLULA, 163.
Stellura = *Stellula*, 163.
STENOPSIS, 121.
Stenorhynchus = *Cinclocerthia*, 444.
STENOSTIRA, 273.
Stenuræna = *Zenaida*, 757.
STEPHANIBYX, 936.
STEPHANOPHORUS, 664.
Stephanoxis = *Cephalolepis*, 164.
STERCORARIUS, 1027.
STERNA, 1014.
STERNOCLYTA, 148.
Sternænas = *Starnænas*, 774.
Sternolophata = *Nænia*, 1018.
Sternula = *Sterna*, 1014.
Sthenelides = *Cygnus*, 986.
Sthenelus = *Cygnus*, 986.
Stictocarbo = *Phalacrocorax*, 1006.
Stictocraugus = *Campothera*, 65.
Stictænas = *Columba*, 748.
Stictognathus = *Pachycephalix*, 306.
STICTOLIMNAS, 967.
STICTONETTA, 989.
Stictopelia = *Geopelia*, 762.
Stictopicus = *Campothera*, 65.
Stictoptera = *Stizoptera*, 580.
STICTOSPIZA, 579.
Stigmatopelia = *Turtur*, 761.
STIGMATOPS, 748.
STIGMATURA, 235.
STILBOPSAE, 546.
STILTIA, 929.
STIPHORNIS, 358.
STIPITURUS, 348.
STIZOPTERA, 580.
STIZORHINA, 1083.
Stokesiella = *Eustephanus*, 157.
Stoliczkana = *Leptopœcile*, 379.
Stolida = *Anous*, 1018.
Stomioptera = *Ptilotis*, 719.
STOPAROLA, 291.
Stoparola = *Sylvia*, 374.
STRACHYRHIS, 339, 1087.
Streblorhamphus = *Avocettula*, 145.
STREPERA, 501.
Strepsilas = *Arenaria*, 949.
Streptoceryle = *Ceryle*, 114.
STREPTOCITTA, 543.
Streptopelia = *Turtur*, 759.
Stridula = *Strix*, 898.
Strigiceps = *Circus*, 835.
Strigops = *Stringops*, 1.
Strigopsis = *Stringops*, 1.
Stringonyx = *Machærhamphus*, 865.
STRINGOPS, 1.
Striphomyias = *Diaphorophya*, 265.
STRIX, 898.
Strobilophaga = *Pinicola*, 606.
Strophortyx = *Odontophorus*, 822.
STRUTHIDEA, 515.
STRUTHIO, 1052.
Struthus = *Fringilla*, 589.
Stugnopicus = *Miglytes*, 77.
STURNELLA, 555, 1106.
STURNIA, 537.
Sturnoides = *Aplonis*, 541.
STURNOPASTOR, 536.
STURNORNIS, 536.
STURNUS, 534.
Stylorhynchus = *Henicognathus*, 13.
SUBLEGATUS, 241.
Suiriri = *Empidagra*, 241.
SULA, 1011, 1118.
Sularius = *Sula*, 1011.
SURNIA, 534.
SURNICULUS, 50.
SUTHORA, 470, 1101.
SUTORIA, 361.
SUYA, 358, 1039.
SYCALIS, 601.
Sycalis = *Pseudochloris*, 639.
Sycobius = *Malimbus*, 568.
SYCOBROTUS, 565, 1107.
Sylbeocyclus = *Podilymbus*, 1042.
Sylochelidon = *Hydroprogne*, 1014.
SYLPHITRERON, 739.
Sylvania = *Setophaga*, 441.
SYLVIA, 374, 1090.

Sylviaxis = *Scytalopus*, 166.
Sylvicola = *Columba*, 748.
Sylvicola = *Parula*, 432.
Sylvicola = *Phylloscopus*, 377.
SYLVIELLA, 354, 1089.
Sylvietta = *Sylviella*, 354.
SYLVIORTHORHYNCHUS, 201.
SYLVIPARUS, 465.
SYMA, 110.
SYMMORPHUS, 303.
Symplectes = *Sycobrotus*, 565.
SYMPHEMIA, 946.
Symposiachrus = *Monarcha*, 289.
SYNALLAXIS, 197, 1072.
Syncopta = *Camaroptera*, 356.
SYNÆCUS, 816.
Synoicus = *Synæcus*, 816.
Synornis = *Muscicapa*, 262.
SYNTHLIBORHAMPHUS, 1045.
Sypheotides = *Sypheotis*, 926.
SYPHEOTIS, 926.
Syricta = *Contopus*, 248.
Syricta = *Nuttallornis*, 1078.
Syrictes = *Syrigma*, 917.
SYRIGMA, 917.
Syrmaticus = *Phasianus*, 801.
SYRNIUM, 890.
SYRRHAPTES, 776.
TACCOCUA, 58.
Tachea = *Dromæus*, 1050.
TACHORNIS, 126.
Tachuris = *Cyanotis*, 236.
Tachybaptus = *Podicipes*, 1040.
TACHYGINETA, 255, 1079.
Tachydromus = *Cursorius*, 930.
TACHYERES, 993.
Tachypetes = *Fregata*, 1012.
TACHYPHONUS, 655.
Tachyspizias = *Astur*, 841.
Tachytriorchis = *Buteo*, 855.
TADORNA, 988.
Tænidiestes = *Chloëphaga*, 985.
TÆNIOGLAUX, 897.
TÆNIOPTERA, 225.
Tæniopteryx = *Glaucidium*, 896.
TÆNIOPYGIA, 580.
TÆNIOTRICCUS, 1075.
Tænipænas = *Columba*, 748.
Tata = *Pyromelana*, 571.
TALAPHORUS, 135.
TALEGALLUS, 788.
Talpacotia = *Columbigallina*, 763.
Tamatia = *Bucco*, 46.
Tamatia = *Trachyphonus*, 40.
Tamnolanius = *Agriornis*, 224.

TANAGRA, 661.
TANAGRELLA, 670.
Tantalides = *Plegadis*, 903.
Tantalides = *Tantalus*, 905.
Tantalops = *Tantalus*, 905.
TANTALUS, 905.
TANYGNATHUS, 18, 1054.
Tanypeplus = *Pharomacrus*, 85.
Tanypus = *Grallina*, 500.
TANYSIPTERA, 105.
TAONISCUS, 785.
Taraba = *Thamnophilus*, 182.
TARDIVOLA, 639.
TARSIGER, 384, 1091.
Tatao = *Calliste*, 665.
Tatare = *Acrocephalus*, 368.
Tchitrea = *Terpsiphone*, 280.
Tectonornis = *Scenopæetes*, 523.
Telamon = *Lophornis*, 165.
Teleonema = *Cirrihippra*, 220.
TELEPHONUS, 488.
Telesiella = *Petasophora*, 144.
Telesilla = *Petasophora*, 144.
TELESPIZA, 606, 1109.
Telmatias = *Gallinago*, 952.
Telmatodytes = *Cistothorus*, 424.
Telephonus = *Telephonus*, 488.
Telephorus = *Pelicius*, 491.
TEMENUCHUS, 537.
Temnoris = *Suthora*, 470.
TEMNOTROGON, 86.
TEMNURUS, 509.
Tenthaca = *Tephrodornis*, 493.
Tenthera = *Tephrodornis*, 493.
Tephrarops = *Merops*, 96.
Tephras = *Zosterops*, 705.
TEPHROCORYS, 454.
Tephrodiglossa = *Diglossa*, 685.
TEPHRODORNIS, 493.
Tephrolæma = *Anthreptes*, 703.
Tephrolanius = *Tephrodornis*, 493.
Tephrospiza = *Poliospiza*, 599.
Teraspiza = *Accipiter*, 844.
Tetrathopius = *Helotarsus*, 835.
TEREKIA, 948.
Terenotreron = *Ptilopus*, 735.
TERENURA, 177, 1069.
TERETISTRIS, 438.
TERPSIPHONE, 280, 1081.
Tersa = *Procnias*, 670.
Tersina = *Procnias*, 670.
Tesia = *Oligura*, 343.
Tesia = *Pnoepyga*, 430.
Tetrænura = *Vidua*, 574.
TETRAGONOPS, 42, 1056.

- TETRAO, 825.
 TETRAOGALLUS, 806.
Tetraoerdis = Lerwa, 805.
 TETRAOPHASIS, 806.
 TETRAPTERYX, 923.
 TETRASTES, 823.
Tetrax = Otis, 925.
 TEXTOR, 569.
Thalassæa = Sterna, 1014.
Thalassarche = Diomedea, 1038.
Thalasseus = Sterna, 1014.
Thalassidroma = Procellaria, 1028.
 THALASSIORNIS, 1001.
Thalassipora = Sterna, 1014.
Thalassites = Phaëthus, 1013.
 THALASSOAËTUS, 853.
 THALASSOECA, 1033.
Thalassogeron = Diomedea, 1038.
 THALURANIA, 143, 1066.
Thamniarchus = Batara, 181.
 THAMNISTES, 181, 1070.
 THAMNOBIA, 410.
 THAMNOCHARIS, 171.
Thamnocichla = Thamnolea, 391.
Thamnodus = Melizophilus, 375.
 THAMNOLEA, 391, 1092.
 THAMNOMANES, 180, 1070.
 THAMNOPHILUS, 182, 1070.
 THAMNORNIS, 362.
Tharrhaleus = Accentor, 381.
Thaumalea = Chrysolophus, 803.
Thaumantoessa = Loddigesia, 166.
Thaumasius = Talaphorus, 135.
Thaumaste = Eustephanus, 157.
 THAUMASTURA, 160.
Thaumantias = Agyrtia, 135.
Thiopicus = Colaptes, 62.
Thelydrias = Cinnicerthia, 419.
Thereiceryx = Megalæma, 1056.
 THERISTICUS, 902.
Theromyias = Sayornis, 227.
Therosa = Ceyx, 111.
Thiellus = Pullinus, 1030.
Thilius = Ageleus, 553.
 THINOCORUS, 780.
 THINORNIS, 941.
Thinotretis = Certhilauda, 450.
 THLYPOPSIS, 653.
Thoracocincla = Merula, 394.
 THORACOTRERON, 739.
Thoria = Treron, 733.
Thouarsitreron = Ptilopus, 735.
 THRASAËTUS, 848.
Thraupis = Tanagra, 661.
Thremnophilus = Pastor, 537.
 THRENETES, 131.
Threuetria = Locustella, 370.
Threnoëdus = Querula, 218.
Threnopipo = Picus, 70.
Threptia = Eriocnemis, 153.
Threskiornis = Ibis, 900.
Thringorhina = Strachyrhis, 339.
 THRIPADECTES, 193.
Thripas = Dendropicus, 73.
Thripobrotus = Picolaptes, 187.
 THRIPONAX, 82, 1059.
 THRIPOPHAGA, 195, 1072.
 THRYOLEGUS, 1072.
 THRYOMANES, 421.
 THRYOPHILUS, 421, 1095.
 THRYOTHORUS, 422, 1095.
Thyellas = Puffinus, 1030.
Thyellodroma = Puffinus, 1030.
 THYRORHINA, 970.
 TIARIS, 642.
 TICHODROMA, 684.
Tichornis = Tinnunculus, 870.
Tickellia = Cryptolopha, 285.
 TIGA, 78, 1059.
 TIGRISOMA, 919.
Tigrornis = Tigrisoma, 919.
 TIJUCA, 215.
 TILMATURA, 162.
Timalia = Timelia, 339.
 TIMELIA, 339, 1087.
 TIMELIOPSIS, 727.
 TIMOLIA, 113, 1066.
Tinactor = Sclerurus, 191.
 TINAMOTIS, 786.
 TINAMUS, 781.
 TINNUNCULUS, 870.
Tiricu = Brotogerys, 15.
 TITYRA, 210.
Tmetoceros = Bucorvus, 99.
 TMETOTHYLACUS, 448.
Tmetotrogon = Temnotrogon, 86.
Tockus = Alopheus, 103.
 TODIRHAMPHUS, 110.
 TODIROSTRUM, 231.
 TODOPSIS, 275.
 TODUS, 95.
Todus = Muscivora, 244.
Tolmaëtus = Eutolmaëtus, 850.
Tolmerus = Hypotriorchis, 872.
Tomopeleia = Geopelia, 762.
 TOFAZA, 147, 1066.
Torda = Alca, 1042.
Torquilla = Yunx, 85.
Torticella = Ortyxelus, 930.
 TOTANUS, 946.

Toujou = Rhea, 1052.
Toxocorys = Certhilauda, 450.
Toxostoma = Harporhynchus, 417.
Toxoteuches = Phaethornis, 131.
Trachelia = Glareola, 929.
Trachelonetta = Dafila, 994.
Trachelotis = Otis, 925.
 TRACHYCOMUS, 315.
Trachylæmus = Trachyphonus, 40.
Trachypelmus = Tinamus, 781.
 TRACHYPHONUS, 40.
 TRAGOPAN, 797.
Tragopan = Bucorvus, 99.
 TRAVERSIA, 206.
Trerolæma = Ptilopus, 735.
 TRERON, 733.
 TRIBONYX, 973.
Tribura = Luscinola, 371.
Triccus = Todirostrum, 231.
Trichas = Criniger, 310.
Trichas = Geothlypis, 437.
Trichites = Xenocichla, 309.
 TRICHIXUS, 409.
 TRICHOCICHLA, 335.
 TRICHOGLOSSUS, 30, 1054.
Trichogramoptila = Uroloncha, 585.
 TRICHOLÆMA, 36, 1055.
Tricholais = Eremomela, 355
 TRICHOLESTES, 315.
Tricholimnas = Eulaheornis, 962.
Tricholopha = Prymnacantha, 165.
Trichometopus = Dierurus, 529.
Trichoparadisea = Paradisea, 518.
 TRICHOPHOROPSIS, 315.
Trichophorus = Chlorocichla, 313.
Trichophorus = Criniger, 310.
Trichopicus = Melanerpes, 68.
 TRICHOSTOMA, 333.
Trichostoma = Erythrochichla, 336.
 TRICHTHRAUPIS, 654.
 TRICLARIA, 7.
 TRIDACTYLIA, 72, 1058.
Tridactylus = Turnix, 778.
Triglyphidia = Chlorophonia, 670.
 TRINGA, 950.
Tringoides = Actitis, 948.
Triorches = Pandion, 877.
Triorchis = Archibuteo, 854.
Tripsurus = Melanerpes, 68.
 TRIPTORHINUS, 168.
Trizusa = Turturæna, 753.
Trocaza = Columba, 748.
 TROCHALOPTERON, 321, 1086.
 TROCHILUS, 162.
Trochilus = Phylloscopus, 377.

TROCHOCERCUS, 275.
Troctes = Trogon, 86.
 TROGLODYTES, 425, 1096.
Troglodytes = Anorthura, 427.
 TROGON, 86, 1060.
Trogonurus = Trogon, 86.
Tropicoperdix = Arboricola, 813.
Tropicophilus = Phaëton, 1004.
 TROPIDORHYNCHUS, 725.
Trugon = Eutrygon, 774.
 TRUPIALIS, 555.
Trygon = Ectopistes, 756.
Trygon = Eutrygon, 774.
 TRYNGITES, 950.
 TRYPANOCORAX, 505.
Tryphæna = Tilmatura, 162.
Tucalus = Rhamphastos, 42.
Tucanus = Rhamphastos, 42.
Tujus = Rhea, 1052.
 TURACÆNA, 754.
 TURACUS, 88, 1060.
 TURDINULUS, 332, 1086-87.
 TURDINUS, 331.
Turdinus = Illadopsis, 336.
Turdirostris = Trichixus, 409.
Turdulus = Geocichla, 404.
 TURDUS, 399, 1093.
 TURNAGRA, 329.
Turnicigralla = Pedionomus, 779.
 TURNIX, 778.
 TURTUR, 758, 1114.
 TURTURÆNA, 753.
Turumtia = Hypotriorchis, 872.
Tybo = Syrnium, 890.
 TYLAS, 316.
Tylibyx = Sarciphorus, 933.
Tyloramphus = Simorhynchus, 1045.
 TYMPANISTRIA, 765.
 TYMPANUCHUS, 824.
Typhon = Ardea, 909.
Tyranneutes = Pipra, 220.
 TYRANNISCUS, 239, 1076.
Tyrannula = Myiobius, 245.
 TYRANNULUS, 238, 1076.
 TYRANNUS, 252.
Uula = Syrnium, 890.
Ulysses = Eucephala, 139.
Uncirostrum = Diglossa, 685.
Undina = Erismatura, 1001.
 UPUCFRTHIA, 203, 1073.
 UPUPA, 99, 1061.
 URÆGINTHUS, 582.
 URAGUS, 608.
Uralcyon = Tanyptera, 105.
Uralia = Spathura, 153.

- Uranomitra* = *Agyrtria*, 135.
Uranomitra = *Cyanomyia*, 138.
Uranornis = *Paradisea*, 518.
URATELORNIS, 92.
Urauges = *Lamprotornis*, 544.
Urax = *Pauxis*, 790.
URIA, 1043.
Urile = *Phalacrocorax*, 1006.
Urinator = *Colymbus*, 1039.
UROAËTUS, 853.
UROBRACHYA, 572, 1108.
Urocec = *Urogalba*, 45.
UROCHARIS, 675.
UROCHROA, 148.
Urochroa = *Urochroma*, 8.
UROCHROMA, 8.
UROCICHLA, 426.
UROCISSA, 507.
Urococyx = *Rhamphococyx*, 59.
Urocolius = *Colius*, 90.
UROCYNCHRAMUS, 620.
Urodiscus = *Prioniturus*, 17.
Urodrepanis = *Æthopyga*, 695.
URODYNAMIS, 54.
UROGALBA, 45.
Urogallus = *Tetrao*, 825.
Urohipis = *Dryodromas*, 354.
UROLAIS, 1089.
Urolampra = *Metallura*, 155.
UROLESTES, 482.
UROLEUCA, 515.
UROLONCHA, 585.
Uromitrus = *Hirundo*, 253.
UROPEDIA, 764.
UROSILA, 428.
UROSPATHA, 93.
Urospheua = *Horornis*, 372.
UROSPIZIAS, 842, 1116.
Urospizias = *Astur*, 839.
Urospizias = *Erythrotriorchis*, 847.
UROSTICTE, 154.
UROTHRAUPIS, 650.
UROTRIORCHIS, 838.
Urrua = *Bubo*, 880.
URUBITINGA, 861.
Urubitornis = *Harpyhaliaëtus*, 861.
Utamania = *Alca*, 1043.
Vaginalis = *Chionis*, 780.
Vagabunda = *Dendrocitta*, 508.
VANELLUS, 935.
VANGA, 499.
Vaza = *Coracopsis*, 4.
Venilia = *Gecinus*, 63.
VENILIORNIS, 1059.
Vermivora = *Helmitherus*, 431.
VERREAUDXIA, 84.
VESTIARIA, 692.
Videstrela = *Vidua*, 574.
VIDUA, 574.
Vigorsia = *Coracopsis*, 4.
VINAGO, 731.
VINI, 30.
Virago = *Querquedula*, 992.
Viralva = *Hydrochelidon*, 1012.
VIREO, 471, 1102.
VIREOLANIUS, 475, 1102.
Vireonella = *Vireo*, 471.
Vireosylvia = *Vireo*, 471.
VIRIDONIA, 693.
Vitia = *Drymochaera*, 334.
Vitiflora = *Saxicola*, 388.
Vivia = *Picumnus*, 83.
VOLATINIA, 619.
Volvicivora = *Campophaga*, 300.
Vulpanser = *Tadorna*, 988.
VULTUR, 829.
Wagellus = *Fulmarus*, 1036.
Waldenia = *Hirundo*, 253.
Warzeuiczia = *Heliangelus*, 155.
Wilsonia = *Myiodiotes*, 442.
XANTHIXUS, 307.
Xanthixus = *Pycnonotus*, 305.
XANTHOCEPHALUS, 554.
Xanthochlamys = *Amblyornis*, 525.
Xanthocitta = *Xanthoura*, 514.
Xanthocnus = *Ardeiralla*, 915.
Xanthocorys = *Anthus*, 445.
Xanthodira = *Petronia*, 596.
Xanthogenyx = *Heliodoxa*, 149.
XANTHOLEMA, 39, 1056.
Xantholestes = *Culicicapa*, 282.
XANTHOMELUS, 524.
Xanthomixis = *Bernieria*, 314.
Xanthomyza = *Meliphaga*, 719.
Xanthonotus = *Oriolus*, 525.
Xanthophilus = *Hyphantornis*, 561.
Xanthopicus = *Celeus*, 79.
Xanthopsar = *Xanthosomus*, 1106.
XANTHOPYGIA, 272, 1080.
Xanthornus = *Icterus*, 558.
XANTHOSOMUS, 553.
Xanthotis = *Ptilotis*, 719.
XANTHOURA, 514, 1105.
XEMA, 1020.
XENERPESTES, 200.
XENOCICHLA, 309, 1055.
Xenicopsis = *Anabatoxenops*, 192.
XENICUS, 206.
Xenocrangus = *Xenopicus*, 73.
XENODACNIS, 687.

Xenogenys = Cochoa, 284.

XENOPICUS, 73.

XENOPIPO, 220, 1074.

XENOPIROSTRIS, 499.

XENOPS, 192, 1071-72.

XENOPSALIS, 215.

XENORHYNCHUS, 907.

XENOSPINGUS, 641.

Xenotreron = Ptilopus, 735.

Xenurus = Alectrurus, 228.

Xenus = Terekia, 948.

XEROPHILA, 468.

Xilexetastes = Dendrexetastes, 188.

XIPHIDIOPICUS, 77.

Xiphidiopterus = Sarciphorus, 933.

Xiphidiorhynchus = Cladorhynchus, 943.

XIPHOCOLAPTES, 188.

XIPHOLENA, 217.

XIPHORHAMPHUS, 326.

XIPHORHYNCHUS, 186, 1070.

Xiphorhynchus = Xiphorhamphus, 326.

Xolmis = Tænioptera, 225.

Xylobucco = Barbatula, 37.

Xylocopus = Picus, 70.

Xylocota = Gallinago, 952.

Xylolopes = Chrysocolaptes, 80.

Xylurgus = Hypopicus, 70.

Yetapa = Alectrurus, 228.

Yphantes = Hyphantes, 556.

Ypophæa = Hypophæa, 671.

YUHINA, 346, 1088.

YUNGIPICUS, 74.

YUNX, 85.

Zalias = Puffinus, 1030.

Zamelodia = Hedymeles, 612.

ZANCILOSTOMUS, 58.

Zanthomiza = Meliphaga, 719.

Zanthopygia = Xanthopygia, 272.

Zapornia = Porzana, 967.

Zaprium = Halobæna, 1037.

Zapterus = Chætusia, 936.

ZARHYNCHUS, 549, 1106.

Zebrapicus = Centurus, 69.

ZEBRILUS, 915.

ZELEDONIA, 167.

ZENAIIDA, 757.

ZENAIIDURA, 757, 1114.

Zenadura = Zenaidura, 757.

Zenophasia = Glyphorhynchus, 190.

ZEOCOPHUS, 280.

Zephyritis = Myrtis, 161.

Zetetes = Pachyrhamphus, 212.

ZODALIA, 158, 1068.

ZONÆGINTHUS, 580.

ZONERODIUS, 920.

Zonibyx = Eudromias, 938.

Zonifer = Sarciphorus, 933.

ZONÆNAS, 746.

Zonogastris = Pytelia, 578.

ZONOPHAPS, 745.

ZONOTRICHIA, 625, 1110.

ZOOTHENA, 404.

Zosteropsisylvia = Zosterops, 705.

ZOSTEROPS, 705, 1113.

ZOSTERORNIS, 339.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES ET DES VARIÉTÉS (1)

- abacoensis* (*Dendroeca*), 1097.
abbas (*Tanagra*), 662.
abbotti (*Cinnyris*), 698.
 — (*Coccyzus*), 1056.
 — (*Cosmophoneus*), 490.
 — (*Cyanecula*), 383.
 — (*Hypothymis*), 1081.
 — (*Ibis*), 901.
 — (*Malacocincla*), 332, 1087.
abbotti (*Pogonorhynchus*), 35.
abbotti (*Psittinus*), 1054.
 — (*Sula*), 1011.
 — (*Turtur*), 759.
abbreviatus (*Buteo*), 857.
abdimii (*Ciconia*), 906.
abditiva (*Manacus*), 1074.
abeillei (*Abeillia*), 164.
abeillei (*Arremon*), 647.
 — (*Orchesticus*), 644.
abeillii (*Hesperiphona*), 610.
 — (*Hyphantes*), 556.
aberti (*Anas*), 990.
 — (*Pipilo*), 637.
abessinica (*Mesopicus*), 1059.
abessinicus (*Cinnyris*), 697.
abieticola (*Dryocopus*), 83.
abingdoni (*Campothera*), 66.
 — (*Geospiza*), 609.
abnormis (*Hypotaenidia*), 961.
abnormis (*Sasia*), 85.
abrekiana (*Merula*), 397.
abyssinica (*Chalcopelia*), 1114.
 — (*Coracias*), 92, 1060.
 — (*Halcyon*), 109.
 — (*Lusciniola*), 371, 1090.
 — (*Turdus*), 399.
abyssinica (*Vinago*), 732.
abyssinica (*Zosterops*), 706, 1113.
abyssinicus (*Bubo*), 880.
 — (*Bucorvus*), 99.
 — (*Dendropicus*), 73.
 — (*Hyphantornis*), 563).
 — (*Lioptilus*), 273, 1080.
 — (*Pogonorhynchus*), 36.
 — (*Rougetius*), 965.
acaciæ (*Argya*), 324.
acadica (*Nyctala*), 894.
academicus (*Empidonax*), 248, 1078.
accentor (*Androphilus*), 335.
accipitrinus (*Asio*), 878.
 — (*Deropterus*), 7.
acclamator (*Scotiaptex*), 892.
acer (*Ornithion*), 1076.
 — (*Tyranniscus*), 239.
achrusteria (*Dendroeca*), 1097.
 — (*Turdus*), 1093.
acik (*Chalcomitra*), 701.
acis (*Tanysiptera*), 106.
acrita (*Anabazenops*), 1072.
acrorhynchus (*Oriolus*), 526.
actæon (*Halcyon*), 1062.
actia (*Otocorys*), 1099.
aculeata (*Sitta*), 681.
acuminata (*Hæmophila*), 633.
 — (*Tringa*), 952.
acunhæ (*Nesospiza*), 640.
acuta (*Chætura*), 128.
 — (*Dafila*), 994.
acuticauda (*Cypselus*), 125, 1064.
 — (*Hylophilus*), 1102.
 — (*Poephila*), 584.
 — (*Uroloncha*), 586.

(1) Les synonymies mentionnés dans l'ouvrage ne sont pas indiqués dans cette table, sauf quelques rares exceptions imprimées en italiques.

- acuticaudatus* (Anumbius), 197.
 — (Conurus), 11.
acuticaudus (Lamprocolius), 547.
acutipennis (Chordeiles), 119.
 — (Hapalocercus), 234.
acutirostris (Calandrella), 453.
 — (Geospiza), 608.
 — (Heteralocha), 516.
 — (Scytalopus), 166.
adamsi (Calandrella), 454.
 — (Colymbus), 1040.
 — (Montifringilla), 594.
 — (Nesomimus), 416.
adansoni (Excalfactoria), 817.
addæ (Spathura), 153.
addendus (Cacomantis), 1056.
addita (Microeca), 1080.
adela (Oreotrochilus), 147.
adelaidæ (Dendroeca), 434.
 — (Platycercus), 24.
adelberti (Aquila), 851.
 — (Chalcomitra), 701.
adelia (Pygoscelis), 1047.
admiralitatis (Halcyon), 108.
adolphi (Phaetornis), 133.
adolphina (Myzomela), 715.
adorabilis (Lophornis), 165.
adspersus (Batrachostomus), 117.
adspersus (Crypturus), 783.
 — (Francolinus), 809.
adusta (Otocorys), 452, 1099.
 — (Synallaxis), 198.
aedon (Luscinola), 371.
ægithaloides (Leptasthenura), 201.
ægocephala (Limosa), 945.
ægyptiaca (Alopochen), 988.
ægyptius (Caprimulgus), 124.
 — (Milvus), 863.
 — (Pluvianus), 930.
æmodia (Parus), 462.
æmodium (Conostoma), 470.
ænea (Carpophaga), 744.
 — (Chaptia), 532.
ænea (Hypochæra), 574.
ænea (Quiscalus), 560.
æneicauda (Chalybura), 144.
æneicauda (Metallura), 156.
æneicaudus (Rhamphococcyx), 59.
æneotincta (Adelomyia), 155, 1067.
æneoviridis (Sporadinus), 1066.
æneum (Dicæum), 678.
æneus (Gallus), 803.
 — (Lamprolornis), 544.
æneus (Molothrus), 552.
ænigma (Sapayoa), 1074.
ænobarbus (Pterythrion), 487.
ænochoa (Lagonosticta), 577.
ænops (Creciscus), 971.
æqualis (Stelgidopteryx), 1079.
æquatorialis (Aglæactes), 1067.
 — (Amaurospiza), 619.
 — (Anæretes), 236.
 — (Androdon), 131.
 — (Calliste), 666.
 — (Calamenia), 617.
 — (Ceryle), 115.
 — (Chalcomitra), 701.
 — (Chlorodyta), 353.
æquatorialis (Cistothorus), 425.
æquatorialis (Cypselus), 125.
 — (Dacnis), 688.
æquatorialis (Dendroornis), 189.
æquatorialis (Erismatura), 1001.
æquatorialis (Gallinago), 953.
æquatorialis (Gymnophithys), 1069.
 — (Hapaloderma), 1060.
 — (Herpsilochmus), 178.
æquatorialis (Hypoxanthus), 63.
æquatorialis (Malacoptila), 48.
 — (Momotus), 94.
 — (Phæolama), 149.
 — (Pogonorhynchus), 35.
 — (Popelairea), 1068.
æquatorialis (Prymnacantha), 165.
æquatorialis (Psolidoprymna), 1067.
 — (Rallus), 960.
 — (Rhynchoecylus), 1077.
 — (Sarcorhamphus), 828.
 — (Sittasomus), 191.
 — (Spermophila), 616.
 — (Thamnistes), 181.
 — (Tinnunculus), 871.
 — (Urolestes), 482.
æquatorialis (Urospizias), 843.
æquatorialis (Yunx), 85.
æquinoctialis (Acrocephalus), 369.
 — (Buteogallus), 861.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Majaqueus), 1033.
 — (Rhynchoecylus), 242.
æralatus (Pterythrion), 487.
æreus (Ceuthmochares), 60.
æruginosus (Cacomantis), 52.
æruginosus (Circus), 837.
 — (Conurus), 12.
 — (Chloronertes), 65.
 — (Prionochilus), 675.
æsalon (Hypotriorchis), 873.
æstiva (Chrysotis), 5.
 — (Dendroeca), 433.

- aestiva* (Pyranga), 658.
aestivalis (Hæmophila), 634.
aethereus (Nyctibius), 118.
 — (Phaeton), 1004.
aethiopica (Amblyospiza), 1107.
 — (Hirundo), 254.
 — (Ibis), 900.
 — (Quelea), 571.
aethiopicus (Laniarius), 491.
aethiops (Asturina), 859.
 — (Myrmecocichla), 391.
 — (Pœcilodryas), 271.
 — (Thamnophilus), 184.
ætolius (Milvus), 863.
afer (Cinnyris), 698.
 — (Dicrurus), 529.
 — (Eurystomus), 93.
 — (Nilaus), 488.
 — (Parus), 461.
 — (Piernistes), 811.
affine (Malacopteron), 337.
 — (Tricholæma), 36.
 — (Trochalopteron), 321.
affinis (Accipiter), 846.
 — (Aegotheles), 116.
 — (Agyrtia), 136.
 — (Alcyone), 113.
 — (Anthracoceros), 101.
 — (Arachnothera), 705.
 — (Barbatula), 37.
affinis (Batis), 265.
affinis (Batrachostomus), 117.
 — (Campylorhynchus), 1095.
 — (Caprimulgus), 124.
 — (Cinnyris), 698.
 — (Colius), 91.
 — (Colluricincla), 496, 1104.
 — (Coracias), 92.
 — (Corvinella), 482.
 — (Corvus), 504.
affinis (Crateropus), 329.
affinis (Cryptolopha), 285.
 — (Cyanocorax), 514.
 — (Cymborhynchus), 206.
 — (Cypselus), 126.
 — (Dissemurus), 533.
 — (Dryoscopus), 493.
 — (Dysithamnus), 180.
 — (Elaïnea), 240.
 — (Eleopicus), 76.
 — (Emberiza), 621.
 — (Empidonax), 248.
affinis (Eriocnemis), 154.
affinis (Eucometis), 655.
 — (Euphonia), 672.
affinis (Fuligula), 997.
 — (Geococcyx), 61.
 — (Geospiza), 609.
affinis (Gerygone), 269.
affinis (Hemignathus), 693.
 — (Iole), 312.
 — (Larus), 1024.
affinis (Luscinola), 371.
affinis (Megapodius), 787.
 — (Melilestes), 718.
 — (Milvus), 863.
 — (Mirafr), 457.
 — (Monticola), 393.
 — (Nesomimus), 416.
 — (Nilaus), 488.
 — (Ninox), 888.
 — (Œdicnemus), 928.
affinis (Estrelata), 1035.
affinis (Oreocincla), 1094.
 — (Pachycephala), 477.
 — (Pardalotus), 674.
 — (Parus), 463.
 — (Penelopides), 102.
 — (Phœnicothraupis), 657.
 — (Phylloscopus), 378.
 — (Picolaptes), 187.
 — (Porzana), 967.
 — (Pycnorhamphus), 611.
 — (Pytelia), 578.
 — (Serinus), 600.
 — (Sylvia), 374.
 — (Symmorphus), 304.
 — (Tanygnathus), 18.
 — (Tephrodornis), 494.
 — (Terpsiphone), 280.
affinis (Thamnistes), 1070.
aflavida (Columbigallina), 1114.
afra (Afrotis), 924.
 — (Chalcopelia), 765, 1114.
 — (Cryptorhina), 597.
 — (Pyromelana), 572.
 — (Pytelia), 578.
africana (Aëdon), 382.
 — (Buphaga), 519.
 — (Coturnix), 815.
 — (Cypselus), 125.
 — (Mirafr), 455.
 — (Schizorhis), 90.
 — (Upupa), 99.
 — (Verreauxia), 84.
africanoides (Mirafr), 456.
africanus (Actophilus), 958.
 — (Francolinus), 809.
 — (Mesopicus), 77.
 — (Phalacrocorax), 1010.

- africanus* (*Pseudogyps*), 830.
 — (*Sphenoeacus*), 337.
afroides (*Afrotis*), 925.
agami (*Ardea*), 911.
agassizi (*Coccornis*), 609.
agilis (*Anæretes*), 236.
 — (*Chrysotis*), 6.
 — (*Eleopicus*), 76.
 — (*Oporornis*), 436.
 — (*Parus*), 463.
 — (*Vireo*), 1102.
aglæa (*Quiscalus*), 560.
aglaia (*Hadrostromus*), 211.
agnata (*Furnarius*), 203.
agrestis (*Geoffroyus*), 17.
agricola (*Acrocephalus*), 369.
 — (*Colaptes*), 63.
ahantensis (*Francolinus*), 810.
aignani (*Zosterops*), 710.
aikeni (*Junco*), 629.
 — (*Scops*), 886.
ajaja (*Ajaja*), 905.
ajax (*Cinclosoma*), 319.
akahige (*Erithacus*), 382.
akeleyi (*Ammomanes*), 459.
akool (*Amaurornis*), 972.
alai (*Fulica*), 978.
alario (*Crithologus*), 599.
alascana (*Haliaëtus*), 853.
alascensis (*Anorthura*), 427, 1096.
 — (*Calcarius*), 625.
alascensis (*Parus*), 463, 1100.
alascensis (*Tridactylia*), 73, 1058.
alaschanica (*Ruticilla*), 385.
alaudarius (*Tinnunculus*), 870.
alaudina (*Coryphistera*), 197.
 — (*Passerculus*), 631.
alaudinus (*Phrygilus*), 641.
alaudipes (*Alæmon*), 450.
alba (*Cacatua*), 2.
 — (*Ciconia*), 905.
 — (*Chionis*), 780.
 — (*Gygis*), 1019.
 — (*Herodias*), 912.
 — (*Motacilla*), 442.
 — (*Notornis*), 976.
alba (*Seleucides*), 520.
 — (*Sula*), 1011.
albaria (*Ninox*), 888.
albata (*Neositta*), 682.
albatrus (*Diomedea*), 1038.
albatus (*Chen*), 982.
albellus (*Mergus*), 1003.
albemarlei (*Certhidea*), 689.
albemarlei (*Geospiza*), 608.
albeola (*Clangula*), 998.
alberti (*Crax*), 790.
 — (*Menura*), 729.
 — (*Pachycephala*), 480.
 — (*Pteridophora*), 521.
 — (*Ptilorhis*), 521.
albertina (*Calliste*), 667.
 — (*Charitornis*), 544.
albertisi (*Aegothales*), 116.
 — (*Drepanornis*), 520.
albertisii (*Goura*), 775.
 — (*Gymnophaps*), 748.
albescens (*Certhia*), 683.
 — (*Podicipes*), 1040.
 — (*Synallaxis*), 197.
albibrunneus (*Campylorhynchus*), 420.
albicans (*Aquila*), 852.
 — (*Saxicola*), 390.
 — (*Thamnophilus*), 182.
 — (*Troglodytes*), 425.
albicapilla (*Cossypha*), 409.
 — (*Macropygia*), 755.
 — (*Siptornis*), 200.
albicapillus (*Notauges*), 548.
albicauda (*Agriornis*), 224, 1074.
 — (*Elminia*), 281.
 — (*Mirafra*), 456.
 — (*Pogonorchynchus*), 35.
 — (*Rhipidura*), 276.
albicaudata (*Stoparola*), 291.
albicaudatus (*Buteo*), 857.
albiceps (*Elaïnea*), 240.
 — (*Merula*), 397.
 — (*Psolidoproctus*), 260.
 — (*Sarciophorus*), 934.
 — (*Siptornis*), 200.
albicilla (*Haliaëtus*), 853.
 — (*Muscicapa*), 263.
albicillus (*Certhiparus*), 469.
 — (*Halcyon*), 108.
albicincta (*Chætura*), 127.
albicollis (*Contopus*), 249.
 — (*Corvultur*), 501.
 — (*Eucometis*), 654.
 — (*Legatus*), 241.
 — (*Leucochloris*), 147.
 — (*Leucopternis*), 860.
 — (*Merops*), 97.
albicollis (*Muscicapa*), 263.
albicollis (*Nyctidromus*), 121.
 — (*Phlogœnas*), 773.
 — (*Porzana*), 967.
 — (*Pteroptochus*), 167.
 — (*Rhipidura*), 277.
 — (*Rhynchops*), 1020.

- albicollis* (Saltator), 646.
 — (Streptocitta), 543.
albicollis (Theristicus), 902.
albicollis (Turdus), 401.
 — (Xiphocolaptes), 188.
 — (Zonotrichia), 625.
albicrissa (Floricola), 160.
 — (Thamnophilus), 184.
albida (Spilornis), 834.
 — (Reinwardtoenas), 1114.
albidema (Ochthoeca), 226.
albidior (Automolus), 1072.
 — (Tridactylia), 1058.
albidipectus (Ægialitis), 940.
albidiventris (Cinclodes), 1073.
albifacies (Geotrygon), 771.
 — (Pœcilodryas), 272.
 — (Sceloglaux), 887.
albifrenatus (Pipilopsis), 649.
albifrons (Amblyospiza), 570.
 — (Anser), 983.
 — (Anthipes), 294.
albifrons (Argya), 324.
albifrons (Catherpes), 428.
 — (Chlorospingus), 650.
 — (Chrysotis), 6.
 — (Conirostrum), 687.
 — (Coryphospiza), 638.
 — (Ephthianura), 376.
 — (Glycyphila), 717.
 — (Henicophaps), 767.
albifrons (Leptoptila), 770.
albifrons (Machaerirhynchus), 285.
 — (Merula), 396.
 — (Miro), 270.
 — (Muscisaxicola), 230.
 — (Neositta), 682.
albifrons (Notodola), 384.
albifrons (Pentholæa), 392.
 — (Pericrocotus), 302.
 — (Pithys), 173.
 — (Platystira), 266.
 — (Scytalopus), 166.
 — (Serinus), 600.
 — (Setophaga), 441.
 — (Sitta), 680.
albifrontata (Gerygone), 269.
 — (Rhipidura), 279.
albigena (Chelidon), 256.
 — (Sterna), 1015.
albigula (Buteo), 858.
 — (Myzomela), 716.
albigula (Otocorys), 451.
albigula (Pipilo), 637.
albigulare (Malacopteron), 337.
albigularis (Automolus), 195.
 — (Brachygalba), 46.
 — (Callene), 408.
albigularis (Catarrhactes), 1048.
 — (Chlorodyta), 354.
albigularis (Ciccaba), 893.
 — (Columba), 752.
 — (Creciscus), 971.
 — (Dumetia), 340.
 — (Empidonax), 247.
 — (Entomophila), 719.
 — (Eurostopus), 119.
 — (Fregetta), 1030.
 — (Furnarius), 203.
 — (Garrulax), 327.
 — (Gerygone), 268.
 — (Hirundo), 254.
albigularis (Hypotriorehis), 873.
albigularis (Ibycter), 832.
 — (Melithreptus), 714.
 — (Microcerculus), 429.
 — (Nemosia), 654.
 — (Pomatorhinus), 325.
 — (Pygarrhichus), 190.
 — (Rhinomyias), 282.
 — (Sclerurus), 191.
 — (Serinus), 600.
 — (Spermophila), 614.
 — (Suya), 358.
 — (Thryothorus), 423.
 — (Urospizias), 842.
 — (Xenocichla), 309.
albilateralis (Diglossa), 686.
albilimbata (Rhipidura), 277.
albilinea (Columba), 751.
 — (Tachycineta), 256.
albilora (Dendroeca), 434.
 — (Synallaxis), 198.
albiloris (Grallaria), 170.
 — (Oriolus), 527.
 — (Polioptila), 380.
albina (Rhipidura), 1081.
albinotata (Pœcilodryas), 271.
albinucha (Actophilus), 958.
 — (Buarremon), 648.
 — (Melanopteryx), 567.
 — (Thryothorus), 422.
 — (Tityra), 211.
 — (Xenopsaris), 215.
albinuchalis (Thamnophilus), 183.
albipectus (Illadopsis), 336.
 — (Thryophilus), 1095.
albipennis (Columba), 750.
 — (Entomyza), 725.
 — (Nettopus), 982.

- albipennis* (Penelope), 792.
 — (Petrophassa), 767.
albipennis (Podiceps), 1040.
albirostris (Cassicus), 551.
 — (Galbula), 45.
 — (Pilorhinus), 546.
 — (Textor), 569.
albiscapa (Rhipidura), 276.
albiscapulata (Thamnolæa), 392.
albiscapulatus (Malurus), 368.
albispectularis (Pachycephala), 479.
albistriata (Sterna), 1014.
albitarsus (Ciccaba), 1117.
albitemporalis (Chlorospingus), 650.
albitorques (Columba), 749.
 — (Philemon), 726.
 — (Tityra), 211.
albitorquis (Spermophila), 616.
albiventer (Glaucopteryx), 1117.
 — (Turdus), 401.
albiventris (Aramides), 964.
 — (Callene), 408.
 — (Cinnyris), 698.
 — (Cittocincla), 413.
albiventris (Cryptolopha), 286.
albiventris (Elanæa), 239.
 — (Fluvicola), 227.
 — (Halcyon), 107.
 — (Henidacnis), 687.
albiventris (Heterocnemis), 175.
albiventris (Melanoparus), 460.
albiventris (Monarcha), 289, 1083.
albiventris (Myiagra), 283.
 — (Myrmeciza), 174.
 — (Orchilus), 233.
 — (Ortalia), 792.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Phalacrocorax), 1009.
 — (Platypsaris), 1073.
 — (Pnoepyga), 430.
 — (Rhamphocœnus), 176.
 — (Rhipidura), 278.
 — (Sclateria), 1069.
 — (Scops), 884, 1117.
 — (Tachycineta), 255.
albiventris (Thamnophilus), 183, 1070.
albiventris (Thryothorus), 423.
 — (Trochocercus), 276.
 — (Turnix), 779.
 — (Urospizias), 843.
 — (Zosterops), 708.
albivertex (Elanæa), 240.
albivittatus (Anous), 1019.
albivittatus (Aulacorhamphus), 44.
albo-auricularis (Stigmatops), 718.
albociliaris (Saltator), 645.
albicincta (Merula), 395.
albicinctus (Acridotheres), 538.
 — (Ptilopus), 735.
albicinerea (Sirystes), 243.
albicoronata (Microchæra), 164.
albicristata (Sericosypha), 652.
albicristatus (Anæretes), 236.
 — (Anorrhinus), 102.
 — (Gennæus), 800.
albofasciata (Certhilauda), 450.
 — (Pratincola), 388.
 — (Rhinoptilus), 931.
albofasciatus (Laniarius), 491.
albofrontata (Microeca), 264.
albogrisea (Serphophaga), 235.
albogriseus (Pachyrhamphus), 212.
 — (Sirystes), 243.
albogularis (Cryptolopha), 286.
albogularis (Eriocnemis), 154.
albogularis (Francolinus), 808.
 — (Geocichla), 405.
 — (Platyrhynchus), 231.
albogularis (Prinia), 359.
albogularis (Querquedula), 993.
albogularis (Rhipidura), 277.
albogularis (Schistes), 159.
 — (Tyrannus), 252.
 — (Zosterops), 712.
albolaryvatus (Xenopicus), 73.
albolimbata (Butorides), 916.
albolimbatus (Megalurus), 351.
albolineatus (Picolaptes), 187.
albomaculata (Ninox), 889.
alboniger (Spizaetus), 549.
albonigra (Saxicola), 388.
albonotata (Caprimulgus), 123.
 — (Penthetria), 573.
 — (Ptilotis), 720.
albonotatus (Buteo), 857.
albonotatus (Coccyzus), 50.
 — (Halcyon), 108.
 — (Trochocercus), 276.
albo-olivacea (Cyornis), 282.
albo-olivacea (Siphia), 293.
albo-punctatum (Dicaeum), 678.
albosignata (Eudynamis), 1048.
albospectularis (Copsychus), 411.
albosquamatus (Picumnus), 84.
albostrigatus (Rimator), 332.
albosuperciliaris (Cryptolopha), 286.
albosuperciliaris (Dryonastes), 328.
albosuperciliaris (Rhopophilus), 350.
albotæniata (Pencilodryas), 271.
alboterminata (Melanocorypha), 452.

- alboterminata* (Stiphornis), 358.
alboterminatus (Lophoceros), 103.
albotibialis (Bycanistes), 101.
albovittatus (Donacobius), 418.
 — (Pitangus), 243.
albus (Eudocimus), 904.
 — (Lagopus), 826.
alchatus (Pteroclorus), 776.
alcinus (Machæramphus), 865.
alcocki (Dissemurus), 533.
alcyon (Ceryle), 115.
aldabrana (Dicrurus), 529.
 — (Foudia), 566.
 — (Rougetius), 965.
aldabranus (Turtur), 759.
aldabrensis (Caprimulgus), 123.
 — (Cinnyris), 698.
 — (Zosterops), 707.
aldrovandi (Hypotriorchis), 873.
aldunatei (Phrygilus), 610.
alecto (Microglossus), 1.
alecto (Monarcha), 290.
 — (Textor), 569.
alector (Crax), 789.
alantica (Sterna), 1016.
aleuticus (Ptychorhamphus), 1045.
alexandræ (Spathopterus), 20.
alexandri (Alethe), 1094.
 — (Andropadus), 313.
 — (Cypselus), 1064.
 — (Lobornis), 357.
 — (Palæornis), 19.
 — (Trochilus), 162.
alexandrina (Ægialitis), 940.
alfari (Creciscus), 971.
alfaroana (Saucerottea), 137.
alfredi (Bradypterus), 350.
 — (Cypselus), 1064.
alfredi (Halcyon), 108.
alfredi (Ostinops), 550.
 — (Scops), 885.
 — (Tylas), 316.
alfrediana (Graucalus), 297.
algeriensis (Ammomanes), 459.
 — (Lanius), 484.
aliciæ (Aglæactis), 152.
 — (Chlorostilbon), 142.
 — (Saucerottea), 137.
 — (Turdus), 402.
aliena (Rhodopechys), 596.
 — (Sitagra), 1107.
alinæ (Engyete), 153.
alincia (Heliothrix), 1068.
alixi (Clyctactes), 180.
alle (Mergulus), 1043.
alleni (Agyrtia), 136.
 — (Buteo), 857.
 — (Chrysomitris), 592.
 — (Lagopus), 826.
 — (Pipilo), 636.
 — (Porphyrion), 975.
alleni (Selasphorus), 162, 1068.
alleni (Syrnium), 890.
 — (Vireo), 473.
alligator (Ptilopus), 735.
almæ (Turdus), 1093.
alnorum (Empidonax), 1077.
alopecias (Synallaxis), 198.
alopex (Mirafr), 456.
 — (Tinnunculus), 871.
alorensis (Trichoglossus), 1054.
alpestris (Merula), 395.
 — (Otocorys), 452.
alphonsiana (Suthora), 471.
alpicola (Montifringilla), 594.
alpina (Accentor), 381.
alpina (Muscisaxicola), 230.
 — (Tringa), 951.
alpinus (Cyanorhamphus), 26.
alpinus (Pyrrhocorax), 517.
altaica (Hierofalco), 876.
 — (Montifringilla), 595.
altaicus (Accentor), 381.
 — (Tetraogallus), 806.
altera (Edolisoma), 298.
althæa (Sylvia), 374.
alticola (Ægialitis), 1117.
 — (Amazilia), 138.
 — (Campylorhynchus), 420.
 — (Catharus), 394.
 — (Certhia), 683.
 — (Chamaospiza), 635.
 — (Cisticola), 363.
 — (Cistothorus), 425.
 — (Cyanotis), 236.
 — (Junco), 629.
 — (Poospiza), 628.
 — (Sturnella), 1106.
 — (Vireo), 472.
altijugus (Casuarus), 1050.
altipetens (Lagopus), 827, 1116.
altirostris (Dendrocolaptes), 185.
 — (Empidonax), 247.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Pyctorhis), 340.
altumi (Francolinus), 810.
aluco (Syrnium), 890.
amabilis (Carcineutes), 110.
amabilis (Cotinga), 216.
 — (Cyclopsitta), 34.

- amabilis* (Hypocharmosyna), 32.
amabilis (Loriculus), 23.
 — (Malurus), 368.
 — (Parus), 461.
 — (Polyerata), 136.
amabilis (Zenaida), 757.
amæna (Copsychus), 411.
amandava (Sporæginthus), 581.
amathusia (Platycercus), 24.
amaura (Speotyto), 895.
amaurocephalus (Hylophilus), 474.
 — (Leptopogon), 237.
 — (Sycobrotus), 565.
amaurochalina (Turdus), 1093.
amauronotus (Heterhyphantes), 565.
amauronotus (Vireo), 472.
amauroptera (Pelargopsis), 114.
amauropteryx (Hypochæra), 575.
amaurotis (Anabazenops), 193.
 — (Hypsipetes), 316.
amauroura (Argya), 324.
amaurus (Micrastur), 837.
amazona (Ceryle), 115.
 — (Heteropelma), 223.
 — (Sittasomus), 191.
amazonica (Chrysotis), 5.
 — (Formicarius), 1069.
 — (Spermophila), 617.
amazonicus (Thamnophilus), 183.
 — (Thryothorus), 423.
amazonina (Pionopsitta), 7.
amazonum (Thlypopsis), 653.
 — (Urogalba), 45.
ambigua (Ara), 10.
 — (Caprimulgus), 1063.
 — (Chrysomitris), 591.
 — (Cisticola), 1089.
 — (Turtur), 760.
ambiguus (Caprimulgus), 123.
ambiguus (Carpodacus), 604.
 — (Thamnophilus), 183.
 — (Trogon), 86.
 — (Rhamphastos), 42.
amboinense (Edoliisoma), 298.
amboinensis (Aprosmictus), 21.
 — (Dicrurus), 531.
 — (Macropygia), 755, 1114.
 — (Megalurus), 351.
ambryensis (Petroeca), 267.
amelia (Macronyx), 449.
americana (Æthya), 996.
 — (Certhia), 683.
 — (Ceryle), 115.
 — (Clangula), 998.
 — (Fulica), 977.
americana (Grus), 922.
americana (Herodias), 912.
americana (Loxia), 605.
 — (Mareca), 992.
 — (Meleagris), 796.
 — (Merganser), 1003.
 — (Mycleria), 907.
 — (Oedemia), 999.
 — (Parula), 432, 1096.
 — (Phælon), 1004.
 — (Recurvirostra), 943.
 — (Rhea), 1052.
 — (Spiza), 639.
 — (Tridactylia), 73.
 — (Tympanuchus), 824.
americanus (Charadrius), 937.
americanus (Coccyzus), 54.
 — (Corvus), 503.
americanus (Cygnus), 986.
americanus (Ihycter), 832.
americanus (Nycticorax), 917.
 — (Phenicopterus), 908.
americanus (Podiceps), 1041.
 — (Siphonorhis), 121.
amethysticollis (Heliangelus), 155.
amethystina (Calliphlox), 161.
 — (Chalcomitra), 701.
 — (Phaboteron), 734.
amethystoides (Calliphlox), 161.
amherstiae (Chrysolophus), 803.
amicta (Nyctiornis), 98.
ammodendri (Passer), 598.
ammophila (Otocorys), 1099.
amœna (Cyanospiza), 626.
 — (Merula), 1092.
ampelina (Yuhina), 1088.
ampelinus (Hypocolius), 497.
amphilecta (Cisticola), 365.
amphichroa (Newtonia), 266.
ampla (Carpodacus), 604.
amurensis (Aquila), 852.
 — (Butorides), 916.
 — (Erythropus), 872.
 — (Loxia), 605.
 — (Sitta), 680.
anabatina (Dendrocincla), 186.
anabatinus (Thamnistes), 181.
anabatoides (Anabatoxenops), 192.
anabeke (Sialia), 1092.
anachoreta (Halcyon), 109.
anæsthera (Sterna), 1016.
anais (Melanopyrrhus), 540.
anais (Petasophora), 145.
anale (Edoliisoma), 299.
analis (Catamenia), 617.

- analis* (Dacnis), 688.
analis (Formicarius), 172.
 — (Iridornis), 665.
 — (Lædorus), 305.
 — (Picus), 72.
 — (Scytalopus), 167.
analoga (Ptilotis), 720.
analoides (Catamenia), 617.
anatoliæ (Garrulus), 510.
anchietæ (Anthreptes), 704.
 — (Antichromus), 489.
 — (Chætura), 128.
anchietæ (Hirundo), 254.
anchietæ (Scoptelus), 98.
 — (Stactolæma), 38.
andamanensis (Centropus), 57.
 — (Copsychus), 411.
 — (Dissemuropsis), 532.
 — (Geocichla), 405.
 — (Gracula), 539.
 — (Oriolus), 526.
 — (Pericrocotus), 301.
 — (Picus), 72.
 — (Spizaetus), 849.
 — (Spodiopsar), 536.
andamanica (Cyrtostomus), 703.
andamanicus (Caprimulgus), 123.
andecola (Agriornis), 224.
 — (Atticora), 258.
anderssoni (Clivicola), 1079.
 — (Gennæus), 800.
anderssoni (Graucalus), 296.
anderssoni (Machærhampus), 865.
anderssoni (Oriolus), 525.
anderssoni (Tephrocorys), 454.
 — (Zosterops), 709.
andicola (Bolborhynchus), 14.
 — (Grallaria), 170.
 — (Leptasthenura), 201.
 — (Upucerthia), 203.
andicolus (Cypselus), 126.
andina (Gallinago), 954.
 — (Lichenops), 1075.
 — (Nuttallornis), 1078.
 — (Polytmus), 147.
 — (Recurvirostra), 943.
andinus (Contopus), 249.
andinus (Phoenicoparrus), 908.
andium (Querquedula), 993.
andrei (Chætura), 1064.
 — (Taniotriccus), 1075.
andria (Saurothera), 57.
andromeda (Zoothera), 404.
anerythra (Pitta), 1073.
angaladiana (Cinnyris), 697.
angasizæ (Zosterops), 709.
angelæ (Cyanolyca), 513.
angelica (Dacnis), 688.
anglica (Gelocheledon), 1013.
 — (Picus), 1058.
anglorum (Puffinus), 1031.
angolensis (Anaplectes), 568.
angolensis (Anthus), 445.
angolensis (Chalcomitra), 701.
 — (Cisticola), 365.
angolensis (Crex), 967.
angolensis (Estrelida), 1108.
 — (Dryoscopus), 492.
 — (Francolinus), 1116.
 — (Gypohierax), 831.
 — (Hirundo), 254.
 — (Mirafr), 455.
 — (Monticola), 393.
 — (Pitta), 207.
 — (Poicephalus), 9.
 — (Serinus), 601.
 — (Uræginthus), 582.
angosturæ (Heterocercus), 224.
anguina (Dendrocincla), 1070.
anguitimens (Eurocephalus), 494.
angulata (Gallinula), 974.
angusticauda (Cisticola), 363.
angustifrons (Graucalus), 296.
angustifrons (Melanerpes), 68.
 — (Ostinops), 550.
angustipennis (Chlorostilbon), 141.
angustipluma (Chæoptila), 725.
angustirostris (Marmaronetta), 995.
 — (Phytotoma), 210.
 — (Picolaptes), 188.
 — (Sayornis), 227.
anbinga (Plotus), 1011.
ani (Crotophaga), 62.
anjuanensis (Foudia), 566.
anjuanensis (Zosterops), 706.
anna (Ciridops), 693.
annabellæ (Myzomela), 715.
annæ (Artamia), 498.
 — (Calypte), 163.
 — (Euphonia), 673.
 — (Prionochilus), 675.
 — (Psamathia), 348.
 — (Spathura), 153.
annamensis (Hydornis), 207.
annectans (Dicrurus), 529.
 — (Lioptila), 413.
annectens (Junco), 629.
 — (Passerella), 635.
 — (Pseudomyiobius), 246.
annulosa (Stizoptera), 580.

- annulosa* (Zosterops), 706.
anomala (Æthopyga), 695.
 — (Callene), 408.
 — (Zosterops), 707.
anomala (Brachycope), 1107.
anomalus (Heleothreptus), 120.
 — (Hyphantornis), 564.
anophrys (Acredula), 466.
anoxantha (Loxigilla), 614.
anseli (Centropus), 56.
anserriensis (Chordeiles), 118.
ansorgei (Numida), 804.
 — (Pyromelana), 572.
 — (Pytelia), 578.
ansorgii (Cinnyris), 699.
ansorgii (Tricholæma), 36, 1055.
antarctica (Chloëphaga), 985.
antarctica (Megalestris), 1027.
 — (Pygoscelis), 1047.
antarctica (Sterna), 1017.
antarctica (Thalassoeca), 1033.
antarcticus (Anthus), 448.
 — (Cinclodes), 202.
 — (Lopholæmus), 748.
 — (Rallus), 960.
anteocularis (Polioptila), 1091.
anthina (Passerculus), 631.
anthoides (Corythopsis), 168.
 — (Siptornis), 200.
anthoni (Campylorhynchus), 1095.
anthonyi (Butorides), 916.
 — (Lanius), 484.
anthopeplus (Polytelis), 20.
anthophilus (Phaethornis), 132.
anthracina (Urubitinga), 861.
anthracinus (Cnipolegus), 229.
antigone (Grus), 922.
antillarum (Myiarchus), 251.
 — (Sterna), 1017.
antinorii (Cisticola), 363.
 — (Lanius), 484.
 — (Psalidoprocne), 260.
antipodum (Megadyptes), 1048.
antiquorum (Phœnicopterus), 908.
antiquus (Synthliborhamphus), 1045.
antisienensis (Pharomacrus), 85.
 — (Siptornis), 199.
antonie (Carpodectes), 217.
 — (Threnetes), 131.
aolæ (Nasiterna), 24.
aonolaschkæ (Turdus), 402.
aphanes (Cassicus), 551.
apheles (Phaethornis), 132.
aphrasta (Otocorys), 1099.
aphrodita (Parus), 1100.
apiaster (Merops), 97.
apiata (Mirafr), 455.
apicalis (Acanthiza), 366.
 — (Agyrtia), 136.
apicalis (Ceratotriccus), 233.
apicalis (Loriculus), 23.
 — (Moho), 727.
 — (Myiarchus), 251.
 — (Schœnicola), 349.
apicicauda (Sphenocercus), 731.
apivorus (Pernis), 865.
apoda (Paradisea), 518.
apolites (Tyrannus), 252.
apophœnica (Chrysotis), 6.
apotheta (Picolaptes), 1070.
apricarius (Charadrius), 937.
approximans (Cercomacra), 176.
 — (Circus), 836.
 — (Malaconotus), 490.
approximans (Rhamphastos), 42.
approximans (Urospizias), 844.
 — (Vireo), 473.
apus (Cypselus), 125, 1064.
aquatica (Butalis), 262.
 — (Sayornis), 227, 1075.
aquaticus (Anthus), 447.
aquaticus (Acrocephalus), 369.
 — (Cinclus), 418.
 — (Rallus), 960.
aquila (Eutoxeres), 133, 1065.
 — (Fregata), 1012.
arabica (Fringillaria), 1110.
arabs (Eupodotis), 927.
 — (Zosterops), 711, 1113.
aracari (Pteroglossus), 43.
arana (Gelocheidon), 1013.
ararauna (Ara), 10.
araucana (Columba), 751.
araucan (Ortalia), 792.
arborea (Dendrocygna), 988.
 — (Galerida), 458.
arborea (Petrochelidon), 258.
arboreus (Anthus), 415.
arcæi (Butorides), 663, 1111.
 — (Calospiza), 1111.
archeri (Cichladusa), 1094.
archipelagicus (Indicator), 34.
arctica (Bubo), 881.
 — (Fratereula), 1016.
 — (Pipilo), 637.
 — (Sialia), 386.
arctica (Sterna), 1015.
arctica (Tridactylia), 73.
arcticincta (Hirundo), 254.
Arcticola (Otocorys), 1099.

- arcticus* (Colymbus), 1039.
arcticus (Hierofalco), 876.
arclilorquis (Pachycephala), 481, 1102.
arctoa (Montifringilla), 595.
arcuata (Cicladusa), 411.
— (Dendrocygna), 988.
— (Pitta), 208.
arcuatus (Ampelion), 216.
— (Passer), 598.
ardens (Arboricola), 813.
— (Harpactes), 88.
— (Penthetria), 573.
ardens (Pericrocotus), 301.
ardens (Psaropholus), 528.
— (Pyranga), 659.
— (Selasphorus), 162.
— (Xanthomelus), 521.
ardeola (Dromas), 929.
ardesiaca (Ardea), 910.
— (Conopophaga), 169.
— (Fulica), 977.
— (Mimocichla), 394.
— (Platylophus), 509.
— (Rhopornis), 1069.
ardesiacea (Spermophila), 616.
ardesiacus (Cinclus), 419.
— (Contopus), 249.
— (Dissodectes), 869.
— (Dysithamnus), 180.
arenacea (Empidonax), 247.
arenacea (Mimus), 416.
— (Spizella), 630.
arenaria (Calidris), 950.
arenarius (Pterocles), 777.
arenarum (Elafnea), 240, 1076.
arenicola (Galerida), 458.
— (Harporhynchus), 417.
— (Otocorys), 452, 1099.
— (Turtur), 758.
arenicolor (Ammomanes), 459.
arequipæ (Siptornis), 200.
arfaki (Oreocharis), 674.
— (Oreopsittacus), 32.
— (Strix), 900.
arfakiana (Gerygone), 269.
— (Sericornis), 367.
arfakianum (Dicæum), 1112.
arfakianus (Ælurædus), 523.
— (Epypodius), 788.
arfakianus (Cacomantis), 52.
arfakianus (Microlestes), 268.
argala (Leptoptilus), 907.
argalea (Otocorys), 1099.
argentalis (Ceyx), 112.
— (Thamnolæa), 392.
argentatus (Heterocnemis), 175.
— (Larus), 1024.
argenteus (Liothrix), 348.
— (Stigmatops), 718.
argentea (Calliste), 669.
argenteus (Cracticus), 500.
argenteiceps (Tropidorhynchus), 725.
argenticincta (Momotus), 94.
argenlifrons (Scytalopus), 167.
argentigula (Cyanolyca), 513.
argentina (Empidonax), 247.
— (Guiraca), 612.
— (Xiphocolaptes), 1071.
argoonda (Pardaliparus), 813.
argus (Argusianus), 795.
— (Eurostopus), 119.
arguta (Strepera), 501.
argutula (Sturnella), 555, 1106.
argyrophenges (Calliste), 669.
argyrotis (Penelope), 792.
aridula (Cisticola), 1089.
ariel (Fregata), 1012.
— (Petrochelidon), 259.
— (Prion), 1037.
— (Rhamphastos), 42.
arizela (Campothera), 1057.
— (Geothlypis), 437.
arizonæ (Antrostomus), 122.
arizonæ (Aphelocoma), 512.
— (Chrysomitris), 591.
— (Hæmophila), 634.
— (Picus), 71.
armandi (Ibis), 901.
armandi (Luscinola), 371.
— (Pomatorhinus), 326.
armata (Merganetta), 1002.
armenti (Molothrus), 552.
armillaris (Megafæma), 39.
armillata (Cyanolyca), 513.
— (Fulica), 977.
armillatus (Myiadectes), 406.
arminjoniana (Estrelata), 1035.
armiti (Heteromyias), 1080.
— (Pœcilodryas), 271.
armitiana (Poephila), 585.
armstrongi (Haleyon), 109.
arnaudi (Philæterus), 575.
arnotti (Thamnolea), 392.
arolasi (Æthopyga), 696.
aromatica (Osmotreron), 733.
arquatrix (Columba), 750.
arquatus (Numenius), 944.
arra (Uria), 1043.
arremonops (Oreothraupis), 644.
arsinoe (Pyrenonotus), 305.

- artemisiæ (Ianthocincla), 322.
 arthuri (Tinnunculus), 870.
 arthusi (Calliste), 666.
 arubensis (Conurus), 12.
 aruense (Edoliisoma), 298.
 aruensis (Ardea), 911.
 — (Arses), 288.
 aruensis (Casuarius), 1051.
 aruensis (Centropus), 55.
 — (Colluricincla), 1104.
 — (Cyclopsitta), 33.
 aruensis (Dacelo), 105.
 aruensis (Eclectus), 1054.
 — (Geoffroyus), 17.
 — (Gerygone), 269.
 — (Monarcha), 290.
 aruensis (Nasiterna), 24.
 aruensis (Ninox), 889.
 — (Pitta), 1073.
 — (Ptilotis), 722.
 — (Rhectes), 494.
 — (Tropidorhynchus), 725.
 arundinaceus (Acrocephalus), 368.
 arundinaceus (Cistothorus), 424.
 arvensis (Alauda), 454.
 — (Sycalis), 601.
 ascalaphus (Bubo), 880.
 asha (Ardea), 911.
 asio (Asio), 878.
 asio (Scops), 886.
 aspasiæ (Hermotimia), 700.
 aspasioides (Hermotimia), 700.
 aspersa (Scops), 885.
 aspersiventris (Thamnophilus), 182.
 assabensis (Ammomanes), 1100.
 assamensis (Drymocataphus), 334.
 assamica (Mirafr), 456.
 asiatica (Alcedo), 113.
 asiatica (Megalæma), 39.
 — (Pardicula), 813.
 asiaticus (Caprimulgus), 124.
 — (Charadrius), 938.
 — (Cinclus), 418.
 — (Cinnyris), 699.
 asiaticus (Lanius), 1102.
 — (Loriculus), 23.
 asiaticus (Xenorhynchus), 907.
 assimile (Dicæum), 678.
 assimilis (Agelæus), 553.
 — (Automolus), 194.
 — (Buarremon), 647.
 — (Chlorostilbon), 141.
 — (Circus), 837.
 — (Cyanoderma), 343.
 assimilis (Dicrurus), 530.
 assimilis (Eriocnemis), 154.
 — (Furnarius), 203.
 — (Lampropygia), 152.
 — (Lanius), 1102.
 — (Macropygia), 1114.
 — (Malurus), 1090.
 — (Megaloprepia), 742.
 — (Microeca), 263.
 — (Mionectes), 237, 1076.
 — (Molothrus), 1106.
 — (Myiobius), 1077.
 — (Ninox), 889.
 — (Oriolus), 527.
 — (Pardalotus), 674.
 — (Passer), 598.
 — (Phodilus), 898.
 — (Picus), 71.
 — (Poospiza), 628.
 — (Puffinus), 1032.
 assimilis (Quiscalus), 560.
 assimilis (Rhipidura), 279.
 assimilis (Rhynchocyclus), 242.
 assimilis (Turdus), 1093.
 asterias (Picumnus), 84.
 astigma (Muscicapula), 294.
 astrapioides (Falcinellus), 520.
 astrild (Estrela), 581.
 astrolabi (Pachycephala), 478.
 — (Rhipidura), 277.
 astur (Eutriorchis), 835.
 asturinus (Spilornis), 834.
 asymmetrura (Penthetria), 573.
 atacanensis (Rhodopsis), 160.
 ataeta (Dicrurus), 529.
 atalu (Chlorostilbon), 141.
 ater (Buteo), 857.
 — (Chalcopsitta), 28.
 — (Dicrurus), 529.
 — (Dromæus), 1050.
 — (Ibycter), 832.
 ater (Melanornis), 287.
 ater (Parus), 462.
 ateralbus (Centropus), 55.
 aterrima (Diglossa), 686.
 — (Estrelata), 1033.
 aterrimus (Cnipolegus), 228.
 — (Curæus), 555.
 — (Microglossus), 1.
 — (Platysmurus), 509.
 aterrimus (Rhinopomastus), 98.
 aterrimus (Scoptelus), 98.
 athensis (Spizocorys), 454.
 athi (Mirafr), 456.
 atkhensis (Lagopus), 827.
 atkinsi (Sitta), 681.

- atlantica (Chiroxiphia), 1074.
atlantis (Gypaëtus), 831.
atlas (Otocorys), 452.
— (Parus), 1100.
atmorei (Zosterops), 706.
atra (Fulica), 977.
— (Hæmatopus), 933.
atra (Lophorhina), 522.
atra (Manucodia), 518.
— (Myiagra), 283.
— (Pyriglena), 175.
— (Rhipidura), 277, 1081.
— (Schistochlamys), 644.
atrata (Catharista), 828.
— (Ceratogymna), 101.
— (Charmosyna), 32.
— (Chenopsis), 987.
— (Chrysomitris), 592.
— (Cereba), 691.
— (Montifringilla), 595.
— (Pterocles), 777.
— (Pipilo), 637.
— (Rhipidura), 1081.
atratus (Picus), 72.
atrialatus (Dryoscopus), 493.
atricapilla (Butorides), 915.
— (Calliste), 669.
atricapilla (Chlorophanes), 689.
atricapilla (Estrela), 582.
atricapilla (Heteronetta), 996.
atricapilla (Munia), 588.
— (Muscicapa), 262.
atricapilla (Myiodiodes), 442.
atricapilla (Pitta), 208.
— (Scops), 885.
— (Sylvia), 375, 1090.
— (Zosterops), 710.
atricapillus (Astur), 839.
— (Buarremon), 648.
— (Crypturus), 783.
— (Donacobius), 448.
— (Garrulus), 510.
— (Hadrostromus), 211.
— (Herpsilochmus), 178.
— (Lanio), 656.
atricapillus (Lotus), 29.
atricapillus (Molpastes), 305.
— (Orchilus), 234.
— (Pachyrhamphus), 213.
— (Parus), 463.
— (Philydor), 193.
— (Thamnophilus), 182.
— (Vireo), 472.
atricauda (Melocichla), 363.
— (Myiobius), 245.
atriceps (Alcippe), 345.
— (Chlorospingus), 650.
— (Chrysomitris), 591.
— (Colinus), 821.
— (Falco), 874.
— (Graucalus), 297.
— (Hypergerus), 320.
— (Hypoxanthus), 63.
— (Illadopsis), 1087.
— (Mitrephanes), 247.
— (Myiarchus), 251.
— (Phalacrocorax), 1009.
— (Phrygilus), 640.
— (Saltator), 644.
— (Zosterops), 711.
atrachalybea (Terpsiphone), 281.
atricilla (Larus), 1022.
atricollis (Ardea), 910.
atricollis (Chrysoptilus), 67.
— (Eremomela), 356.
— (Ortygospiza), 577.
— (Saltator), 645.
— (Trogon), 86.
atricissa (Pœcilothraupis), 664.
atricristatus (Lophophanes), 465.
atrifrons (Myiodynastes), 244.
atrifrons (Odontophorus), 822.
— (Zosterops), 710.
atrifusca (Aplonis), 542.
atrigula (Ploceus), 566, 1107.
atrigularis (Accentor), 381.
— (Merula), 397.
— (Metallura), 156.
— (Orthotomus), 361.
atrigularis (Rhipidura), 277.
atrigularis (Spizella), 630.
— (Suya), 358.
— (Thryothorus), 423.
— (Turdinus), 331.
atrilatus (Dryoscopus), 493.
— (Megabias), 1082.
atrimentalis (Phaethornis), 133.
atrinucha (Thamnophilus), 183.
atripennis (Caprimulgus), 123.
— (Crateropus), 330.
— (Dicrurus), 529.
— (Fluvicola), 228.
— (Saltator), 645.
atripileus (Chlorospingus), 651.
atristrois (Cyclorhis), 476.
— (Dendrocincla), 186.
— (Oryzoborus), 613.
atristrois (Suhlegatus), 241.
atrocærulea (Hirundo), 254.
— (Procnopis), 669.

- atrocæruleus* (Dicurus), 531.
atrococcineus (Laniarius), 492.
atrocroceus (Laniarius), 492.
atrocyaneum (Conirostrum), 687.
atroflavus (Laniarius), 492.
atrogularis (Arboricola), 813.
 — (Aulacorhamphus), 44.
 — (Myrmotherula), 179.
atrogularis (Pyrrhulopsis), 21.
atronitens (Aplonis), 541.
 — (Melanornis), 287.
 — (Molothrus), 552.
 — (Xenopipo), 220.
atronuchalis (Lobivanellus), 934.
atropurpurea (Xipholena), 217.
atropygialis (Poephila), 585.
atrosericea (Merula), 395.
atrosericeus (Rhamphocelus), 660.
atrothorax (Myrmeciza), 174.
atroviolaceus (Dives), 559.
atrovirens (Lalage), 302.
 — (Ostinops), 550.
atterloni (Nyctiornis), 97.
attwateri (Tympanuchus), 824.
aubryana (Poicephalus), 9.
aubryanus (Leptornis), 725.
aucklandica (Cyanorhamphus), 26.
 — (Gerygone), 268.
 — (Gallinago), 954.
 — (Nesonetta), 995.
audacis (Geocichla), 404, 1094.
audax (Hadrostomus), 211.
 — (Myiodynastes), 243, 1077.
 — (Troglodytes), 426.
 — (Uroaëtus), 853.
audeberti (Pachycoecyx), 50.
audouini (Larus), 1025.
auduboni (Dendroeca), 435, 1097.
 — (Pendulinus), 557.
 — (Puffinus), 1032.
 — (Turdus), 402.
augur (Buteo), 856.
auguralis (Buteo), 856.
augusta (Chrysotis), 4.
augustævictoriæ (Paradisea), 518.
augusti (Phaethornis), 131.
aura (Rhinogryphus), 828.
auranteiventris (Trogon), 86.
aurantia (Anthreptes), 704.
 — (Carpophaga), 746.
 — (Merula), 396.
 — (Seena), 1014.
 — (Strix), 900.
aurantiaca (Casuarius), 1051.
 — (Chiromachæris), 222.
aurantiaca (Monarcha), 290.
 — (Pencedramus), 436, 1097.
 — (Pheucticus), 611.
 — (Pyrrhula), 607.
 — (Setophaga), 441.
aurantiacus (Metopothrix), 220.
aurantiicincta (Capito), 1056.
aurantiicollis (Capito), 41.
aurantiifrons (Hylophilus), 474.
 — (Loriculus), 23.
 — (Ptilopus), 739.
aurantiigula (Hyphantornis), 564.
aurantiigula (Macronyx), 449.
aurantiistrostris (Arremon), 647.
 — (Catharus), 394.
aurantiistrostris (Cuculus), 51.
aurantiistrostris (Saltator), 645.
aurantiiventris (Mitrephanes), 247.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Yungipicus), 74.
aurantiivertex (Heterocercus), 224.
aurantio-atro-cristatus (Empidonomus), 252.
aurantius (Brachypternus), 78.
 — (Chætops), 320.
 — (Hyphantornis), 563.
aurantius (Hypotriorchis), 873.
aurantius (Lanio), 656.
 — (Trogon), 87.
aurata (Arachnothera), 705.
 — (Geocichla), 405.
auratus (Capito), 41.
 — (Colaptes), 62, 1057.
 — (Oriolus), 525.
 — (Pendulinus), 558.
aurea (Conurus), 12.
 — (Lalage), 303.
 — (Loxops), 594.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Pyromelana), 572.
aureiloris (Zosterops), 710.
aureinucha (Dacnis), 688.
aureipectus (Pipreola), 216.
aureiventris (Chlorostilbon), 141, 1066.
 — (Myiobius), 215.
 — (Pheucticus), 611.
 — (Pseudochloris), 639.
aureliæ (Eriocnemis), 154, 1067.
aureocincta (Hypochaeris), 32.
aureofastigata (Chalcostigma), 156.
aureoflavus (Hyphantornis), 563.
aureola (Dendroeca), 433.
 — (Emberiza), 622.
 — (Pipra), 220.
aureolimbatu (Prionochilus), 675.
aurescens (Polyplanta), 150.

- aurescentior* (Ptilopus), 1114.
aureus (Charadrius), 937.
aureus (Iole), 312.
 — (Jacamerops), 1056.
 — (Xanthomelus), 524.
auricapilla (Conurus), 11.
 — (Dendroeca), 433.
 — (Pipra), 221.
auricapillus (Pendulinus), 557.
auriceps (Chlorostilbon), 141.
 — (Cyanorhamphus), 26.
 — (Hermotimia), 700.
 — (Pharomacrus), 85.
auricollis (Ara), 10.
auricomis (Ptilotis), 721.
auricomus (Sycobrotus), 566.
auricrisa (Tanagra), 662.
auricularis (Basileuterus), 439.
 — (Chloronerpes), 65.
 — (Chlorospingus), 651.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Malacias), 324.
 — (Orchilus), 233.
 — (Otogyps), 829.
 — (Porzana), 967.
 — (Puffinus), 1031.
 — (Rhipidura), 279.
 — (Uropsila), 428.
auriculata (Ptilotis), 720.
auriculata (Zenaida), 757.
auriculatus (Heliothrix), 159.
aurifrons (Bollborhynchus), 14.
 — (Centurus), 69.
 — (Chloropsis), 317.
 — (Ephthianura), 376.
 — (Neopelma), 223.
 — (Picumnus), 84.
aurigaster (Molpastes), 305.
aurita (Conopophaga), 168.
 — (Spermophila), 617.
aurita (Sypheotis), 926.
auritus (Batrachostomus), 116.
 — (Heliothrix), 159.
auritus (Leptopogon), 237.
auritus (Nettopus), 981.
 — (Phalacrocorax), 1008.
 — (Podicipes), 1041.
 — (Turdus), 399.
 — (Yungipicus), 75.
auritum (Crossoptilon), 799.
auriventer (Zosterops), 707.
aurivillii (Cuculus), 51.
aurocapilla (Basileuterus), 439.
aurocapilla (Henicocichla), 436.
aurora (Cyrlostomus), 723.
aurora (Helianthea), 151.
aurora (Iodopleura), 217.
aurora (Carpophaga), 743.
aurorea (Ruticilla), 385.
europallata (Chrysotis), 5.
aurovirens (Capito), 41.
aurulenta (Calliste), 666.
aurulenta (Campochæra), 299.
aurulentus (Chloronerpes), 65.
austeni (Alcippe), 345.
 — (Anorrhinus), 102.
austeni (Grammatoptila), 329.
 — (Paradoxornis), 470.
austeni (Pomatorhinus), 325.
 — (Trochalopteron), 321.
 — (Zosterops), 708.
australasie (Halcyon), 108.
australasiana (Grus), 922.
 — (Meliornis), 723.
australis (Acrocephalus), 369.
 — (Æthya), 997.
 — (Alauda), 455.
 — (Ammodromus), 632.
 — (Anthus), 448.
 — (Apteryx), 1049.
australis (Ardeiralla), 915.
 — (Ardeia), 914.
 — (Botaurus), 919.
australis (Caccabis), 1116.
 — (Casuarius), 1051.
 — (Ceuthmochares), 60.
 — (Corvus), 503.
 — (Cryptospiza), 576.
 — (Eopsaltria), 481.
 — (Erismatura), 1002.
 — (Eudromias), 938.
 — (Eupodotis), 927.
australis (Eurystomus), 93.
australis (Fulica), 977.
 — (Gallinago), 954.
australis (Grallina), 500.
australis (Hæmophila), 631.
 — (Hylia), 272.
 — (Ibycter), 832.
 — (Lamprolornis), 544.
 — (Melittophagus), 96.
 — (Merganser), 1004.
 — (Miro), 270.
 — (Montifringilla), 595.
 — (Nesihierax), 869.
australis (Numenius), 944.
australis (Ocydromus), 964.
australis (Podicipes), 1041.
australis (Pyrrhuloxia), 459.
 — (Rhynchæa), 956.

- australis* (Sphenura), 349.
australis (Sterna), 1017.
australis (Struthio), 1052.
 — (Synœcus), 816.
 — (Telephonus), 488.
 — (Vinago), 732.
 — (Vini), 30.
 — (Xantholæma), 40.
australis (Xenorhynchus), 907.
autumnalis (Chrysotis), 5.
 — (Dendrocygna), 988.
autumnalis (Himantopus), 942.
auxius (Anabazenops), 1072.
avensis (Geocichla), 405.
avocetta (Recurvirostra), 943.
awokera (Gecinus), 64.
axillaris (Amaurospiza), 619.
axillaris (Aramides), 963.
 — (Arremon), 647.
 — (Camaroptera), 357.
 — (Dicrurus), 531.
 — (Elanus), 864.
axillaris (Empidonax), 247.
axillaris (Graucalus), 295.
 — (Herpsilochmus), 178.
 — (Monarcha), 290.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Estrelata), 1035.
 — (Osmotreron), 733.
 — (Pratincola), 387.
 — (Urobrachya), 572.
aylmeri (Argya), 323.
aymara (Bolborhynchus), 14.
 — (Metriopelia), 765.
ayresi (Colaptes), 63, 1057.
 — (Coturnicops), 970.
azaræ (Ægialitis), 941.
 — (Ara), 10.
azaræ (Pteroglossus), 43.
 — (Pyrranga), 658.
azaræ (Tænioptera), 225.
azorica (Regulus), 379.
aztec (Conurus), 12.
azteca (Cyanocitta), 512.
 — (Regulus), 379.
 — (Troglodytes), 425.
azurea (Alcyon), 113.
 — (Calocitta), 509.
 — (Cochoa), 284.
 — (Dendrophila), 681.
 — (Hypothymis), 274.
 — (Sialia), 386.
azureicapilla (Myiagra), 283.
azureus (Eurystomus), 93.
 — (Graucalus), 295.
babæcula (Eurypila), 350.
babelo (Zosterops), 707.
babylonicus (Falco), 875.
bacata (Tridactylia), 1058.
bacchus (Ardeola), 913.
bacha (Spilornis), 834.
bachmani (Hæmophila), 634.
 — (Helminthophaga), 431.
bactriana (Athene), 894.
badia (Carpophaga), 746.
 — (Enneoctonus), 486.
 — (Hirundo), 255.
badiceps (Drymochæra), 334.
 — (Eremomela), 356.
badius (Micropternus), 78.
badius (Astur), 840.
 — (Halcyon), 106.
 — (Hyphantornis), 562.
 — (Molothrus), 552.
 — (Phodilus), 898.
baeri (Æthyia), 997.
 — (Leucippus), 1065.
bætica (Calandrella), 453.
bæticatus (Acrocephalus), 369.
baglafecht (Heterhyphantes), 565.
bahamensis (Blacicus), 249.
 — (Butorides), 916.
 — (Centurus), 69.
 — (Chrysotis), 6.
 — (Cœreba), 690.
 — (Columbigallina), 764.
 — (Dafila), 994.
 — (Dendroeca), 435.
 — (Loxigilla), 613.
 — (Mimus), 415.
bahamensis (Philodice), 161.
bahamensis (Pitangus), 243.
 — (Saurothera), 57.
bahamensis (Speotyto), 895.
bahia (Agyrtria), 1065.
 — (Empidagra), 241.
 — (Leptoptila), 769.
 — (Tigrisoma), 919.
baicalensis (Motacilla), 442.
 — (Parus), 462.
bailleui (Loxioides), 605.
bailloni (Andigena), 43.
bailloni (Porzana), 967.
bailloni (Puffinus), 1032.
bairdi (Acanthidops), 593.
 — (Burnesia), 360.
 — (Campophilus), 80.
 — (Empidonax), 248, 1078.
 — (Geothlypis), 1098.
 — (Icterus), 559.

- bairdi* (Junco), 629.
 — (Lanius), 484.
 — (Myiodynastes), 244.
 — (Oreomyza), 692.
 — (Passerculus), 631.
bairdi (Phalacrocorax), 1008.
bairdi (Setophaga), 441.
 — (Sialia), 1092.
 — (Thryomanes), 424.
 — (Tringa), 952.
 — (Trogon), 87.
 — (Vireo), 472.
bakeri (Scaerorhynchus), 1101.
bakkamæna (Scops), 884.
bakkamma (Strix), 898.
balænarum (Sterna), 1017.
balcanica (Otocorys), 451.
balfouri (Cyanomitra), 702.
balia (Campothera), 65.
 — (Scops), 1117.
balicassius (Dicrurus), 529.
baliensis (Ptilopus), 735.
 — (Rhinomyias), 282.
balli (Scops), 885.
balliviani (Odontophorus), 822.
balstoni (Crypturus), 783.
balteatus (Campylorhynchus), 420.
baltimore (Hyphantès), 556.
balzani (Thalurania), 143.
bambla (Microcerculus), 429.
bananivora (Cœreba), 691.
bangkana (Pitta), 208.
bangsi (Grallaria), 1068.
bangueyensis (Ptilopus), 740.
banjakensis (Strachyrhis), 1087.
banksi (Calyptorhynchus), 2.
 — (Prion), 1037.
banksiana (Lalage), 303.
banyumas (Siphia), 292, 1083.
baraka (Sylviella), 354.
baramensis (Osmotreron), 734.
barbadensis (Cœreba), 691.
 — (Elainea), 239.
 — (Loxigilla), 614.
 — (Vireo), 1102.
barbara (Pelronia), 596.
 — (Scops), 885.
barbarus (Falco), 875.
 — (Laniarius), 492.
barbata (Caccabis), 807.
 — (Chrysomitris), 592.
barbata (Drymocapthus), 334.
barbata (Erythropgyia), 412.
barbata (Perdix), 812.
barbatula (Vireo), 471.
barbatus (Criniger), 311.
 — (Cypselus), 125.
 — (Dendrotyx), 818.
 — (Gypaëtus), 831.
 — (Myiobius), 245.
barbatus (Palæornis), 19.
 — (Panurus), 469.
barbatus (Pycnonotus), 305.
barbirostris (Blacicus), 249.
barbozæ (Ilyliota), 272, 1080.
bargei (Strix), 899.
barianus (Indicator), 1055.
baritula (Diglossa), 685.
baritus (Quiscalus), 560.
barklyi (Coracopsis), 4.
barlowi (Parus), 1101.
barnardi (Barnardius), 25.
barnesi (Saxicola), 388.
baroni (Eutoxeres), 133.
 — (Metallura), 156.
 — (Phaethornis), 132.
 — (Pipilopsis), 649.
 — (Siptornis), 199.
barrabandi (Pionopsitta), 8.
 — (Polytelis), 20.
barrali (Heliangelis), 155.
barratti (Bradypterus), 350.
barringtoni (Nesomimus), 416.
barroti (Heliathrix), 159, 1068.
barrowi (Clangula), 998.
barrowi (Otis), 926.
barthelemyi (Aquila), 851.
bartholemica (Cœreba), 691.
 — (Dendroeca), 1097.
bartletti (Agyrtia), 136.
 — (Crypturus), 783.
 — (Malimbus), 568.
 — (Momotus), 94.
bartteloti (Cossypha), 409.
basalis (Chrysococcyx), 53.
basilanica (Ceyx), 111.
 — (Dendrobiastes), 346.
 — (Muscicapula), 1083.
 — (Oriolus), 527.
 — (Penelopides), 102.
 — (Ptilocichla), 331.
basilanica (Yungipicus), 75.
basilanica (Zosterops), 707.
basilanicus (Poliolophus), 307.
basilica (Carpophaga), 746.
basilicus (Buarremom), 647.
bassana (Sula), 1011.
bassetti (Zosterops), 708.
batantæ (Arses), 288, 1083.
batassiensis (Tachornis), 126.

- balchianensis* (Macropygia), 755.
batesi (Accipiter), 1116.
 — (Canirallus), 965.
 — (Illadopsis), 1087.
 — (Melirrhophetes), 728.
batesianus (Merops), 1061.
batjanensis (Myzomela), 1113.
batuensis (Gracula), 539.
battyi (Leptoptila), 1115.
baudi (Eucichla), 209.
baudini (Calyptorhynchus), 1.
baueri (Limosa), 945.
baumanni (Criniger), 311.
 — (Eremomela), 356.
bauri (Geospiza), 608.
 — (Nesomimus), 416.
baya (Ploceus), 566.
bayleyi (Dendrocitta), 508.
beani (Troglodytes), 425.
beaudouini (Circaetus), 833.
beauharnaisi (Pteroglossus), 43.
beavani (Alcedo), 113.
 — (Lophophanes), 465.
 — (Prinia), 359.
beccariana (Siphia), 293.
beccarii (Casuarius), 1050.
 — (Cochoa), 284.
 — (Drymoedus), 319.
 — (Goura), 775, 1115.
 — (Nasiterna), 24.
 — (Phlogoenas), 772.
 — (Scops), 884.
 — (Sericornis), 367.
becki (Ammodramus), 632.
 — (Certhidea), 689.
 — (Speotyto), 1117.
beecheyi (Cyanolyca), 513.
behni (Myrmotherula), 179.
belringianus (Corvus), 502.
belangeri (Garrulax), 327.
belcheri (Larus), 1023.
beldingi (Geothlypis), 437.
 — (Rallus), 959.
belfordi (Melirrhophetes), 728.
belgica (Limosa), 945.
beli (Gennæus), 800.
bella (Æthopyga), 696.
 — (Batis), 265, 1080.
 — (Charmosyna), 1055.
 — (Masius), 1074.
 — (Myiobius), 246.
bella (Sylvia), 1090.
bella (Zenaidura), 1114.
belli (Amphispiza), 627.
 — (Basileuterus), 439, 1098.
 — (Vireo), 473.
bellicosa (Hirundinea), 245.
 — (Trupialis), 555.
bellicosus (Spizaetus), 848.
bellulus (Cybernetes), 228.
bellus (Porphyrio), 976.
 — (Ptilopus), 740.
 — (Zonæginthus), 580.
bemmeleni (Porphyrio), 975.
bemmeleni (Trichophoropsis), 315.
bendirei (Harporhynchus), 417.
 — (Scops), 886.
benedicti (Spindalis), 661.
bengalensis (Alcedo), 112.
 — (Bubo), 880.
 — (Centropus), 56.
bengalensis (Crateropus), 330.
bengalensis (Graminicola), 362.
 — (Palæornis), 19.
 — (Ploceus), 566.
 — (Pseudogyps), 830.
bengalensis (Syphæotis), 926.
bengalensis (Timalia), 1087.
benguelensis (Bradyornis), 287.
benguellensis (Pternistes), 811.
benjamini (Urosticte), 154.
bennetti (Aegothies), 116.
 — (Campothera), 66.
 — (Casuarius), 1052.
 — (Corvus), 1105.
bensbachii (Janthothorax), 521.
bensoni (Lophortyx), 819.
bentet (Lanius), 485.
berardi (Halodroma), 1037.
berezowskii (Parus), 464.
bergensis (Anorthura), 1096.
bergii (Sterna), 1016.
berigora (Hieracidea), 869.
berlandieri (Thryothorus), 422.
berlepschi (Anthocephala), 146.
 — (Calliste), 667.
 — (Catharus), 393, 1092.
 — (Chlorospingus), 652.
 — (Colius), 1060.
 — (Columba), 753.
 — (Crypturus), 782.
 — (Cyanolesbia), 157.
 — (Dacnis), 688.
 — (Erioenemis), 154.
 — (Mitrephanes), 1077.
 — (Otocorys), 452.
 — (Parotia), 522.
 — (Phaethornis), 132.
 — (Phyllomyias), 238.
 — (Polioptila), 1091.

- berlepschi (Polyxemus), 163.
 — (Pyrglena), 176.
 — (Pyrhura), 13.
 — (Tanagra), 661.
 — (Thamnophilus), 182.
 bermudensis (Sialia), 1091.
 bermudiana (Cardinalis), 1110.
 — (Columbigallina), 764.
 — (Galeoscoptes), 1095.
 — (Vireo), 1102.
 bermudianus (Cardinalis), 620.
 bernicla (Branta), 984.
 bernieri (Gallinago), 953.
 bernieri (Ibis), 901.
 — (Oriolia), 499.
 — (Querquedula), 993.
 bernsteini (Centropus), 55.
 — (Chalcopsitta), 28.
 — (Megapodius), 787.
 — (Monarcha), 289.
 — (Sterna), 1016.
 bertæ (Pitta), 207.
 bertheloti (Anthus), 447.
 berthemyi (Ianthocincla), 323.
 bertrandi (Chlorophoneus), 491.
 — (Hyphantornis), 562.
 beryllina (Alcedo), 113.
 — (Sauceroteia), 138.
 besti (Dicæum), 679.
 betulinus (Tetrastes), 823.
 bewicki (Cygnus), 986.
 bewickii (Thryomanes), 424.
 bewsheri (Turdus), 400.
 bezerowskyi (Phasianus), 1116.
 bianchii (Luscinola), 1090.
 biarcuatum (Pyrgisoma), 636.
 biarmicus (Falco), 875.
 — (Panurus), 469.
 bicalcarata (Galloperdix), 817.
 bicalcaratum (Polyplectron), 796.
 bicalcaratus (Francolinus), 809.
 bicarunculatus (Casuarius), 1051.
 bichenovii (Stizoptera), 550.
 bicincta (Osmotreron), 734.
 bicinctus (Bucco), 47.
 — (Charadrius), 937.
 — (Pterocles), 777.
 — (Rhinoptilus), 931.
 bicknelli (Turdus), 402.
 bicolor (Artamia), 499.
 — (Calamospiza), 625.
 — (Campylorhynchus), 419.
 — (Chimarrhornis), 386.
 bicolor (Columba), 753.
 bicolor (Cooperastur), 844.
 bicolor (Cossypha), 409.
 — (Crateropus), 330.
 — (Cyanoderma), 343.
 bicolor (Dacnis), 688.
 bicolor (Erythroicichla), 336.
 — (Formicivora), 178.
 — (Garrulax), 327.
 — (Graucalus), 297.
 — (Gymnopathys), 173.
 — (Laniarius), 491.
 — (Lophophanes), 465.
 — (Melanocharis), 676.
 — (Merops), 96.
 — (Merula), 396.
 — (Microcerculus), 430.
 — (Myristicivora), 747.
 — (Nigrita), 575.
 — (Notauges), 548.
 — (Petroeca), 267.
 — (Pholidauges), 541.
 — (Phonipara), 618.
 — (Porzana), 968.
 — (Pratincola), 388.
 — (Prionochilus), 675.
 — (Spermestes), 576.
 — (Spermophila), 617.
 — (Sycobrotus), 565.
 — (Tachycineta), 256.
 — (Timolia), 143.
 — (Tympanistria), 765.
 bicornis (Dichoceros), 100.
 — (Otocorys), 451.
 bicristatus (Phalacrocorax), 1007.
 biddulphi (Podoces), 506.
 — (Puerasia), 801.
 — (Syrnium), 890.
 bidentata (Pyrausta), 659.
 bidentatus (Harpagus), 868.
 — (Pogonorhynchus), 35.
 bieti (Alcippe), 345.
 — (Chrysomitris), 593.
 — (Ianthocincla), 322.
 bifasciata (Alaemon), 450.
 bifasciata (Aquila), 852.
 — (Certhidea), 659.
 bifasciata (Cinnyris), 698.
 bifasciata (Loxia), 605.
 — (Myrmecocichla), 391.
 bifasciatus (Cinclodes), 202.
 — (Cinnyris), 697.
 — (Gymnostinops), 550.
 — (Platyrrhynchus), 1075.
 bifrontatus (Oxyechus), 939.
 bilineata (Amphispiza), 627.
 — (Barbatula), 37.

- bilineata* (Poliophtila), 380.
bilopha (Otocorys), 452.
bimaculata (Gerygone), 269.
 — (Melanocorypha), 452.
 — (Phlogoenas), 772.
 — (Pœcilodryas), 271.
bimaculatus (Crocopsis), 306.
 — (Empidonax), 247.
 — (Monarcha), 289, 1083.
bimaculatus (Palaornis), 19.
bimaensis (Dicrurus), 531.
hindloei (Nesomimus), 416.
binotata (Chlorodyta), 354.
binotatus (Caprimulgus), 124.
hipunctata (Argusianus), 795.
birchalli (Catharus), 394.
biroi (Ptilopus), 739, 1114.
birostris (Lophoceros), 103.
biscutata (Chaetura), 127.
bishopi (Catharopeza), 1096.
 — (Leucopeza), 430.
 — (Molio), 727.
bisignata (Rhinoptilus), 931.
bismarcki (Baza), 867.
bispecularis (Garrulus), 510.
 — (Lamprocolius), 547.
bistriatus (Edicnemus), 928.
bistrigiceps (Acrocephalus), 370.
bitorquatus (Pteroglossus), 43.
 — (Turtur), 760.
 — (Rhinoptilus), 931.
bivittata (Cettia), 1090.
 — (Mulleria), 335.
 — (Petroeca), 267.
bivittata (Pyrranga), 659.
bivittatus (Basileuterus), 439.
 — (Picolaptes), 188.
 — (Trochocercus), 276.
blackburniæ (Dendroeca), 434.
blainvillei (Peltops), 291.
blakei (Centurus), 69.
blakistoni (Alauda), 454.
 — (Anthus), 447.
 — (Motacilla), 443.
 — (Pseudoplynx), 882.
blanchoti (Malaconotus), 489, 1104.
blancoi (Blacicus), 249.
blandi (Tricholæma), 36.
blanfordi (Cisticola), 364.
 — (Lædonusa), 306.
 — (Melizophilus), 375, 1090.
 — (Montifringilla), 595.
 — (Parisonia), 1081.
 — (Parus), 1100.
 — (Prinia), 359.
blanfordi (Psalidoprogne), 1079.
 — (Telephonus), 488.
 — (Turnix), 778.
blasii (Hypothymis), 274.
 — (Stigmatops), 719.
blewitti (Microperdix), 813.
 — (Speotylo), 895.
blighi (Myiophoneus), 408.
blissetti (Diaphorophya), 265.
bloxami (Phytotoma), 210.
blundelli (Anaplectes), 568.
blythi (Amydrus), 545.
 — (Cyclopsitta), 33.
 — (Spodiopsar), 536.
 — (Suya), 358.
 — (Tragopan), 797.
 — (Trochalopteron), 321.
boarula (Motacilla), 444.
bocagei (Alophius), 103.
bocagei (Anthus), 447.
 — (Chlorophoneus), 491.
 — (Cichladusa), 412.
 — (Coccyzygia), 1108.
 — (Crateroscelis), 333.
 — (Cyanoderma), 343.
 — (Hladopsis), 1087.
 — (Nectarinia), 695.
 — (Stactolæma), 1055.
 — (Turdus), 400.
 — (Urobrachya), 573.
boccharensis (Parus), 461.
bocki (Hierococcyx), 50.
bodini (Chrysotis), 6.
boehmi (Bradyornis), 288.
 — (Chaetura), 128.
 — (Dinemellia), 570.
 — (Merops), 97.
 — (Myopornis), 1083.
 — (Parisoma), 273.
 — (Pternistes), 811.
 — (Trachyphonus), 40.
bogdanowi (Enneoctonus), 487.
bogolulovi (Cursorius), 931.
bogotensis (Anthus), 448.
 — (Cinnicerthia), 419.
bogotensis (Dendroornis), 189.
bogotensis (Thryophilus), 1095.
bogotensis (Vireo), 472.
böhmi (Aedon), 382.
 — (Indicator), 34, 1055.
böhmi (Musophaga), 90.
bohndorffii (Crateropus), 330.
bohndorffii (Cyanomitra), 702.
bohndorffii (Hyphantornis), 563.
bohndorffii (Poicephalus), 9.

- bohndorffi* (Syrnium), 891.
boiei (Myzomela), 715.
boissoneauti (Pseudocolaptes), 196.
bojeri (Hyphantornis), 564.
boleslavskii (Melittophagus), 96.
boliviana (Basileuterus), 440.
 — (Calliste), 667.
 — (Empidonax), 217.
 — (Chiroxiphia), 222.
 — (Chrysomitris), 592.
 — (Lampropygia), 152.
 — (Leptasthenura), 201.
 — (Myrmotherula), 1070.
 — (Nothura), 785.
 — (Penelope), 791.
 — (Pitangus), 243.
 — (Polioptila), 380.
 — (Poospiza), 628.
boliviana (Psalidoprymna), 158.
 — (Thalaurania), 143.
bolivianus (Attila), 214.
 — (Oreotrochilus), 147.
 — (Phaethornis), 132.
 — (Scytalopus), 167.
 — (Trogon), 87.
 — (Tyranniscus), 239.
 — (Vireolanius), 1102.
bollei (Columba), 751.
 — (Irrisor), 98.
bombus (Polyxemus), 163.
bonana (Pendulinus), 556.
bonapartei (Gymnobleco), 37.
 — (Helianthea), 151.
 — (Loriculus), 23.
 — (Nothocercus), 782.
 — (Poospiza), 628.
 — (Ruticilla), 1091.
 — (Sarothrura), 970.
 — (Todopsis), 275.
 — (Turdus), 399.
bonapartii (Larus), 1021.
 — (Tringa), 952.
bonariensis (Molothrus), 552.
bonasia (Tetrastes), 823.
bonasides (Lyrurus), 826.
bonasiotetrix (Lyrurus), 826.
bonellii (Eutolmaëtus), 850.
bonellii (Phylloscopus), 377.
bonensis (Pachycephala), 479.
boneratiensis (Oriolus), 526, 1105.
bonhami (Ammoperdix), 807.
bonita (Æthopyga), 696.
bonthaina (Pachycephala), 479.
 — (Siphia), 293.
bonthainensis (Trichoglossus), 31.
bonvaloti (Acridula), 467.
 — (Babax), 320.
 — (Trochaloxyteron), 321.
boobook (Ninox), 888.
boothi (Chalcomitra), 1112.
boraquira (Nothura), 785.
borbæ (Picumnus), 84.
 — (Thamnophilus), 184.
borbonica (Pratincola), 387.
 — (Ixocincla), 316.
 — (Phedina), 259.
 — (Zosterops), 712.
borbonicus (Trochocercus), 276.
borea (Myiarchus), 250.
borealis (Acanthopneuste), 376.
 — (Anorthura), 427.
 — (Buteo), 856.
borealis (Cannabina), 590.
borealis (Contopus), 248.
 — (Cyanocitta), 1105.
 — (Lanius), 483.
 — (Motacilla), 444.
 — (Nephæcetes), 129.
 — (Numenius), 945.
 — (Parus), 462.
 — (Picus), 71.
 — (Puffinus), 1031.
 — (Somateria), 1000.
borelli (Buarremon), 648.
borellii (Pyrrhura), 13.
borneense (Glaucidium), 897.
borneensis (Baza), 867.
 — (Calopodix), 814.
 — (Chlorura), 584.
 — (Dicrurus), 531.
 — (Henicurus), 449.
borneensis (Lalage), 303.
 — (Megalaema), 38.
borneensis (Myiophoneus), 408.
 — (Ninox), 887.
 — (Pitta), 208.
 — (Pomathorinus), 325.
 — (Rhopodytes), 58.
 — (Strachyrhis), 339.
bornensis (Mixornis), 340.
borneonensis (Orthotomus), 361.
borneonensis (Tiga), 78.
boscas (Anas), 989.
boschi (Eucichla), 209.
bottæ (Saxicola), 390.
bottegi (Francolinus), 809.
botterii (Hæmophila), 634.
boucardi (Crypturus), 784.
 — (Formicivora), 178.
 — (Granatellus), 438.

- boucardi (Hæmophila), 634.
 — (Myrmeciza), 174.
 — (Polyerata), 137.
 bougainvillei (Phalacrocorax), 1009.
 bougueri (Urochroa), 148.
 bouboul (Merula), 396.
 bouqueti (Chrysotis), 4.
 bourcieri (Capito), 42.
 — (Chlorochrysa), 669.
 — (Geotrygon), 771.
 — (Phaethornis), 132.
 bourdilloni (Alcippe), 345.
 bourdilloni (Lycornis), 119.
 bourdilloni (Merula), 396.
 bourkei (Euphema), 25.
 bournsii (Ceyx), 112.
 bouruensis (Oriolus), 537.
 — (Scops), 884.
 — (Rhipidura), 279.
 bouvieri (Cinnyris), 698.
 — (Scotopelia), 879.
 boweri (Colluricincla), 496.
 bowmani (Phlogopsis), 172.
 boiemani (Sylvia), 375.
 boyciana (Ciconia), 906.
 boyeri (Graucalus), 295.
 braccata (Saucerottea), 1065.
 braccatus (Moho), 727.
 brachchata (Spizaetus), 848.
 brachydactyla (Calandrella), 453.
 — (Certhia), 683, 1112.
 — (Petronia), 597.
 brachyotus (Asio), 878.
 brachyptera (Cisticola), 363.
 — (Leptoptila), 768.
 brachyptera (Sitagra), 564.
 — (Speotyto), 895.
 — (Sphenura), 349.
 brachyptera (Tachyeres), 998.
 brachypterus (Bradypterus), 350.
 — (Buteo), 855.
 — (Ocydromus), 964.
 — (Podicipes), 1041.
 — (Quiscalus), 560.
 brachypus (Hypotaenidia), 961.
 brachyrhyncha (Rhipidura), 278.
 brachyrhynchos (Herodias), 912.
 brachyrhynchus (Anser), 983.
 — (Contopus), 248.
 — (Larus), 1025.
 — (Oriolus), 528.
 — (Podicipes), 1041.
 brachytarsus (Contopus), 249, 1078.
 brachyura (Buteola), 858.
 brachyura (Diomedea), 1038.
 brachyura (Myiarchus), 250.
 — (Pipra), 221.
 — (Pitta), 207.
 — (Pœcilodryas), 271.
 — (Sylviella), 355.
 brachyurus (Accipiter), 816.
 brachyurus (Ægotheles), 116.
 brachyurus (Anthus), 446.
 — (Idiopsar), 641.
 — (Micropternus), 78.
 — (Pachynus), 6.
 — (Rhamphocinclus), 414.
 — (Troglodytes), 426.
 bracteatus (Dicrurus), 531.
 — (Nyctibius), 117.
 bradshawi (Chalcomitra), 701.
 brama (Athene), 895.
 brancoensis (Passer), 598.
 brandti (Garrulus), 510.
 — (Montifringilla), 595.
 — (Otocorys), 451.
 — (Parus), 463.
 — (Phasianus), 1115.
 branickii (Lampraster), 149.
 — (Leptosittaca), 12.
 — (Nothoprocta), 785.
 — (Odontorhynchus), 421.
 — (Procnopis), 669.
 — (Thalassoaetus), 853.
 — (Theristicus), 902.
 brasheri (Basileuterus), 1098.
 brasieri (Basileuterus), 439.
 brasiliana (Scops), 885.
 brasilianus (Merganser), 1004.
 brasilianus (Phalacrocorax), 1008.
 brasiliense (Tigrisoma), 919.
 brasiliensis (Attila), 214.
 — (Calliste), 667.
 — (Chelidoptera), 49.
 — (Chloronerpes), 65.
 — (Chrysotis), 5.
 — (Himantopus), 942.
 — (Momotus), 94.
 — (Pitylus), 643.
 brasiliensis (Polyborus), 832.
 brasiliensis (Querquedula), 991.
 brasiliensis (Sycalis), 601.
 — (Sula), 1012.
 brasiliensis (Tachyphonus), 656.
 brasiliensis (Tinamus), 781.
 brasiliensis (Tityra), 211.
 brasilius (Rhamphocœlus), 660.
 brauniana (Chaptia), 532.
 brazzæ (Phedina), 259.
 brazzæ (Pachycoccyx), 50.

- brehmeri* (Chalcopelia), 766.
brehmi (Psittacella), 21.
brehmii (Monarcha), 290.
brehmorum (Cypselus), 1064.
brenchleyi (Carpophaga), 747.
brenchleyi (Megapodius), 787.
— (Rhipidura), 276.
brenta (Branta), 984.
brevicarinata (Rhamphastos), 42.
brevicauda (Burnesia), 360.
brevicauda (Chamaeza), 171.
— (Cittocinclu), 413.
— (Drymoedus), 319.
— (Grallaria), 170.
— (Muscigralla), 230.
— (Myrmotherula), 179.
brevicauda (Pitta), 208.
brevicauda (Thryomanes), 424.
brevicaudata (Camaroptera), 356.
— (Lamprolornis), 544.
brevicaudatus (Turdinulus), 332.
brevipennis (Calamocichla), 352.
— (Campylorhynchus), 421.
— (Luscinola), 1090.
— (Myiarchus), 250.
— (Neochloe), 473.
— (Rhectes), 495.
— (Tinnunculus), 871.
brevipes (Arbelorhina), 690.
— (Astur), 841.
— (Butorides), 916.
— (Conurus), 12.
— (Monticola), 393.
— (Estrelata), 1034.
— (Platycichla), 407.
— (Tolanus), 947.
brevirostris (Agyrtia), 136.
— (Aplonis), 541.
— (Brachyrhamphus), 1044.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Cannabina), 590.
— (Cinnyris), 699.
brevirostris (Cistothorus), 425.
brevirostris (Collocalia), 129.
— (Crypturus), 783.
— (Drymoedus), 319.
— (Empidagra), 241.
— (Geositta), 1073.
— (Geospiza), 1110.
— (Hypoxanthus), 63.
— (Melithreptus), 714.
— (Molothrus), 552.
brevirostris (Numenius), 945.
brevirostris (Estrelata), 1034.
— (Pericrocotus), 301.
brevirostris (Petronia), 596.
— (Phabotreron), 734.
— (Phalacrocorax), 1010.
— (Phyllomyias), 237.
— (Rissa), 1027.
— (Rhynchocyclus), 242.
brevirostris (Schœnicola), 349.
brevirostris (Siphia), 1083.
— (Smicrornis), 267.
— (Thamnophilus), 184.
breviunguis (Alaemon), 451.
breweri (Merops), 97.
— (Spizella), 630.
brewsteri (Sula), 1012.
briceni (Thripadectes), 193.
bricenoi (Spathura), 153.
— (Thamnophilus), 182.
bridgesi (Drymonis), 187.
— (Pionus), 7.
— (Thamnophilus), 183.
— (Upucerthia), 203.
britannica (Certhia), 683.
— (Parus), 462.
— (Sitta), 1112.
broadbenti (Aprosmictus), 20.
broadbenti (Sphenura), 349.
broderipi (Oriolus), 526.
brodiei (Glaucidium), 897.
— (Monarcha), 290.
bronzina (Haplopetia), 768.
bronzinus (Cacomantis), 52.
brookeanus (Hemicercus), 81.
brookei (Falco), 875.
brookei (Scops), 884.
browni (Conopophaga), 1068.
— (Elainea), 241.
— (Malurus), 368.
— (Monarcha), 290.
— (Platycercus), 24.
— (Reinwardtœnas), 756.
— (Sycalis), 601.
bruante (Foudia), 566.
brubru (Nilas), 488.
brucei (Scops), 883.
brunnea (Æthya), 997.
— (Alcippe), 345.
— (Colluricincla), 495.
brunnea (Dendrocinclu), 186.
brunnea (Dioptrornis), 287.
— (Eopsaltria), 482.
— (Gerygone), 269.
— (Larvivora), 383.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Nesihierax), 869.
— (Nonnulla), 48.

- brunnea* (Sclerurus), 192.
 — (Suthora), 471.
 — (Zosterops), 1113.
brunneata (Siphia), 293.
brunneicapilla (Tyrannulus), 239, 1076.
brunneicapillum (Ornithion), 1076.
brunneicapillus (Blacicus), 249.
 — (Campylorhynchus), 420, 1095.
brunneicauda (Margarornis), 191.
brunneicauda (Minla), 344.
 — (Newtonia), 266.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Rhectes), 495.
 — (Synallaxis), 197.
brunneicauda (Zosterops), 709.
brunneicaudalis (Synallaxis), 197.
brunneiceps (Brachypteryx), 342.
 — (Burnesia), 1089.
 — (Cisticola), 364.
 — (Cistothorus), 425.
 — (Erythropygia), 412.
brunneiceps (Hemixus), 315.
brunneiceps (Hylophilus), 474.
 — (Lagonosticta), 577.
 — (Munia), 588.
 — (Phabotreron), 734.
 — (Rhectes), 495.
 — (Setophaga), 441.
brunneifrons (Cettia), 372.
 — (Euphonia), 672.
 — (Ochthoeca), 226.
 — (Picus), 72.
brunneicephalus (Larus), 1022.
brunneicollis (Troglodytes), 426.
brunneinucha (Buarremon), 618.
 — (Conopophaga), 169.
 — (Montifringilla), 595.
brunneipectus (Gerygone), 269.
brunneitorques (Nephæcetes), 129.
brunneiventris (Chlorura), 584.
brunneiventris (Crateroscelis), 333.
brunneiventris (Diglossa), 685.
 — (Megapodius), 787, 1115.
brunneopectus (Arboricola), 814.
brunneopygius (Drymoedus), 319.
brunnescens (Aplonis), 541.
 — (Butorides), 916.
 — (Colaptes), 63.
 — (Cyphorhinus), 429.
 — (Herpornis), 347.
 — (Margarornis), 191.
 — (Nigrita), 1108.
 — (Passerculus), 631.
brunneus (Dromæocercus), 348.
brunneus (Empidonax), 247.
brunneus (Hylophilus), 1102.
 — (Pyrrholæmus), 366.
brunneus (Thryophilus), 422.
brunnicchi (Uria), 1043.
brutus (Astur), 840.
bruijuii (Epypodius), 788.
bruijnii (Chalcopsitta), 28.
bruijnii (Drepanornis), 520.
 — (Grallina), 500, 1083.
 — (Nasiterna), 23.
bruijnii (Ptiloris), 521.
bryantæ (Philodice), 161.
bryanti (Agelæus), 553.
 — (Campylorhynchus), 420, 1095.
 — (Dendroeca), 433.
bryanti (Mimocichla), 394.
bryanti (Phonipara), 618.
buaensis (Ptilotis), 720.
bubulcus (Bubulcus), 913.
buccinator (Bycanistes), 101.
 — (Cygnus), 986.
buccoides (Elurædus), 523.
bucephalus (Lanius), 485.
buceroïdes (Tropidohynchus), 725.
buchanani (Acanthiza), 366.
buchanani (Cisticola), 363.
 — (Emberiza), 622.
buckleyi (Columbigallina), 764.
buckleyi (Francolinus), 808.
 — (Helianthea), 151, 1067.
buckleyi (Mirafr), 455.
 — (Petasophora), 145.
 — (Ptilochloris), 223.
 — (Tityra), 211.
buditoides (Stigmatiura), 235.
buensis (Collucicla), 496.
buettikoferi (Rhipidura), 279, 1081.
buffoni (Cacatua), 2.
buffoni (Chalybura), 144.
 — (Picumnus), 84.
 — (Polioptila), 380.
 — (Turacus), 89.
bulgeri (Rhipidura), 276.
bulleri (Apteryx), 1049.
bulleri (Diomedea), 1038.
 — (Puffinus), 1031.
 — (Larus), 1023.
bullockii (Calocitta), 509.
bullockii (Hyphantæ), 556.
 — (Melittophagus), 96.
bullockoides (Melittophagus), 96.
bulomachus (Suthora), 471.
bulunensis (Hylophilus), 1102.
bulweri (Bulweria), 1036.
bulweri (Lobiophasis), 799.

- bungurensis* (Graucalus), 297.
 — (Malacopteron), 337.
burbidgei (Tanygnathus), 18.
burchelli (Centropus), 57.
 — (Otis), 925.
burkii (Cryptolopha), 285.
burmanica (Cryptolopha), 1082.
 — (Ninox), 887.
 — (Pelargopsis), 114.
 — (Phasianus), 803.
burmanicus (Criniger), 311, 1085.
burmanicus (Molpastes), 305.
 — (Spodiopsar), 535.
burmeisteri (Cariama), 924.
 — (Chaetocercus), 163.
 — (Phyllomyias), 238.
burnesi (Laticilla), 350.
burroviana (Rhinogryphus), 828.
burrowsii (Chaetusia), 936.
burtoni (Callacanthus), 593.
 — (Eustephanus), 157.
 — (Serinus), 600.
buruensis (Aprosmictus), 21.
 — (Erythromyias), 267.
 — (Monarcha), 290.
 — (Pachycephala), 476.
 — (Zosterops), 709.
buryi (Passer), 1109.
 — (Scotocerca), 1089.
butleri (Anthus), 445.
butleri (Asio), 878.
 — (Astur), 840.
 — (Cryptolopha), 286.
buttikoferi (Accipiter), 846.
 — (Cyrtostomus), 703.
 — (Malacocincla), 1087.
 — (Edicnemus), 928.
 — (Trichostoma), 334.
buttikoferi (Turturona), 754.
büttneri (Turdus), 89.
bulyrceus (Serinus), 600.
buxans (Campophilus), 1059.
buxtoni (Crateropus), 329.
buxtoni (Trichostoma), 333.
byroni (Conurus), 11.
cabanidis (Pelasophora), 145.
cabanisi (Anabazenops), 192, 1072.
cabanisi (Basileuterus), 439.
 — (Calliste), 667.
 — (Ceryle), 115.
 — (Cnipolegus), 229.
 — (Criniger), 311.
 — (Emberiza), 621.
 — (Empidochanes), 247.
 — (Hyphantornis), 562.
cabanisi (Munia), 587.
 — (Nigrita), 575.
cabanisi (Pelasophora), 145.
cabanisi (Picus), 70.
 — (Pyrgisoma), 636.
 — (Rhinopomastus), 98.
 — (Synallaxis), 197.
 — (Tigrisoma), 919.
cabanisi (Turdus), 89.
cabanisi (Turdus), 399.
caboclinho (Spermophila), 616.
caboti (Cœreba), 690.
 — (Eleopicus), 75.
caboti (Melospiza), 632.
caboti (Tragopan), 797.
cabræ (Strix), 900.
cabrerae (Merula), 1092.
cachabiensis (Thamnophilus), 183.
cachariensis (Siphia), 293.
cachaviensis (Geotrygon), 771.
cachinnans (Herpetotheres), 833.
 — (Larus), 1025.
 — (Trochalopteron), 322.
cacozela (Merula), 395.
cactorum (Conurus), 12.
 — (Melanerpes), 68.
cælebs (Fringilla), 589.
cæulatra (Amaurospiza), 619.
cæulatus (Dryonastes), 329.
cæulea (Arbelorhina), 690.
 — (Ardea), 910.
 — (Campophaga), 300.
 — (Cotinga), 216.
 — (Coua), 60.
 — (Dendroeca), 435.
 — (Gigantipitta), 207.
 — (Guiraca), 612.
 — (Halobæna), 1037.
cærulea (Hypothymis), 274.
cærulea (Polioptila), 350.
cærulea (Procnias), 670.
cærulea (Urocissa), 507.
cæruleata (Siphia), 293.
cærulecula (Cyanecula), 383.
cæruleiceps (Chrysura), 140.
cæruleiceps (Momotus), 94.
 — (Trichoglossus), 31.
cæruleicinctus (Aulacorhamphus), 44.
cæruleigaster (Chalybura), 144.
cæruleigularis (Aulacorhamphus), 44.
 — (Buthraupis), 663, 1111.
 — (Gyanophaia), 137.
cæruleirostris (Chrysomitridops), 594.
cæruleitorques (Pitta), 209.
cæruleocapilla (Myiagra), 283.

- cæruleocapilla* (Pipra), 221.
cæruleocephala (Calliste), 668.
cæruleocephala (Muscicapa), 263.
cæruleocephala (Xanthoura), 514.
cæruleogriseus (Graucalus), 297.
cæruleo-lavata (Thalurania), 143.
cærulescens (Butalis), 262.
 — (Chen), 982.
 — (Cercomacra), 176.
 — (Chlorophanes), 689.
 — (Dendroeca), 435.
 — (Dicrurus), 530.
 — (Diglossopsis), 686.
 — (Edoliisoma), 298.
 — (Esirelda), 582.
 — (Eupetes), 319.
 — (Geranospizias), 838.
 — (Harpiprion), 902.
 — (Melanotis), 417.
 — (Microhierax), 868.
 — (Notornis), 976.
 — (Otis), 926.
 — (Rallus), 960.
 — (Saltator), 645.
 — (Spermophila), 616.
 — (Thamnophilus), 183.
cærulescens (Zosterops), 712.
cæruleus (Anous), 1019.
 — (Chlorestes), 140.
 — (Cyanocorax), 514.
 — (Elanus), 864.
 — (Graucalus), 1084.
 — (Myiophonus), 408.
 — (Parus), 464.
 — (Porphyrio), 975.
cæruligena (Chrysolis), 5.
cæruleocephala (Ruticilla), 386.
cæsar (Poospiza), 628.
cæsia (Emberiza), 622.
 — (Sitta), 680.
cæsiogastra (Polioptila), 380.
cæsius (Graucalus), 295, 1083.
cæsius (Rallus), 961.
cæsius (Thamnomanes), 180.
cafer (Bucorvus), 99.
 — (Coccytes), 49.
 — (Promerops), 727.
 — (Trachyphonus), 40.
caffer (Amydrus), 545.
 — (Cypselus), 125.
caffer (Lophoceros), 103.
caffra (Chalcopelia), 1114.
 — (Cossypha), 409, 1094.
 — (Hyphantornis), 563.
 — (Otis), 925.
caffrensis (Hagedashia), 902.
cagayanensis (Mixornis), 341.
cahirica (Hirundo), 253.
cahooni (Troglodytes), 426.
cairii (Ruticilla), 385.
cairnsi (Dendroeca), 435.
cajeli (Ceyx), 112.
cala (Basileuterus), 1098.
calandra (Melanocorypha), 452.
calcarata (Corythopsis), 168.
calcarata (Motacilla), 444.
calceolata (Ardea), 910.
caledonica (Myiagra), 283.
 — (Myzomela), 715.
 — (Pachycephala), 478.
caledonicus (Graucalus), 297.
 — (Nycticorax), 917.
calendula (Regulus), 379.
calidris (Totanus), 947.
 — (Vireo), 472.
californianus (Gymnogyps), 829.
californica (Agelaius), 553.
 — (Carpodacus), 603.
 — (Glaucidium), 896.
californica (Herodias), 912.
californica (Phalacroptilus), 1063.
 — (Pinicola), 606.
 — (Podiceps), 1041.
 — (Polioptila), 380.
 — (Psaltriparus), 466.
 — (Uria), 1043.
 — (Vireo), 472.
californicus (Larus), 1025.
 — (Lophorhynchus), 819.
 — (Pelecanus), 1006.
californicus (Phalacroptilus), 121.
caligata (Hypolais), 373.
caligatus (Syrnium), 891.
caligatus (Trogon), 87.
caliparens (Podiceps), 1041.
calipyga (Liothrix), 348.
calita (Myiopsittacus), 14.
callainus (Malurus), 367.
callauchen (Leptoptila), 769.
calliaudi (Campothera), 66.
callinota (Terenura), 177.
calliope (Stellula), 163.
 — (Pachycephala), 478.
calliparæa (Chlorochrysa), 669.
calliptera (Pyrrhura), 13.
callista (Arremon), 1111.
callogenys (Conurus), 12.
callonotus (Eleopicus), 75.
callophrys (Chlorophonia), 671.
 — (Tanagra), 670.

- calloptera (Aramides), 964.
callopterus (Aprosmictus), 20.
— (Chloronerpe), 65.
calolæma (Oreopyra), 149.
calonyx (Eurystomus), 93.
calophona (Thuyomanes), 424.
calophrys (Chlorospingus), 651.
calopterum (Todiostrom), 231.
calopterus (Mecocerculus), 227.
calorhynchus (Aulacorhamphus), 44.
— (Rhampococcyx), 59.
calosoma (Chrysolampis), 146.
calotropiphila (Ægithalus), 468.
calthorpæ (Anthus), 446.
calthropæ (Palæornis), 19.
calurus (Buteo), 856.
— (Criniger), 310.
calurus (Psalidoprymna), 158.
calva (Acredula), 467.
— (Vinago), 732.
calvus (Allocotops), 326.
— (Geronticus), 901.
— (Gymnobucco), 37.
— (Gymnocephalus), 218.
— (Otogyps), 829.
— (Porphyrio), 975.
— (Sarcops), 538.
camaronensis (Ægithalus), 468.
— (Anthus), 1098.
cambaiensis (Thamnobia), 410.
cambayensis (Turtur), 762.
cambodianus (Spodiopsar), 535.
camburni (Hyphantornis), 564.
camelus (Struthio), 1052.
cameranoi (Pterythrus), 487.
cameronensis (Chlorocichla), 314.
camerunensis (Pedilorhynchus), 266.
— (Podica), 978.
— (Pyrrhospiza), 1109.
campbelli (Petroeca), 266.
— (Phalacrocorax), 1009.
campestris (Anthus), 446.
— (Calamanthus), 360.
— (Colaptes), 63.
— (Motacilla), 444.
— (Pedicetes), 824.
— (Uropelia), 764.
camtschatcensis (Tridactylia), 73.
camtschatkensis (Calliope), 383.
camtschatica (Sterna), 1015.
camurus (Alopius), 104.
cana (Casarca), 989.
— (Tanagra), 662.
canadensis (Branta), 934.
— (Falcipennis), 825.
canadensis (Grus), 921.
— (Myiodioides), 442.
— (Perisoreus), 511.
— (Pinicola), 606.
— (Sitta), 681.
canadensis (Thamnophilus), 182.
canagica (Philacte), 984.
canaria (Serinus), 601.
canariensis (Asio), 878.
— (Corvus), 1104.
— (Fringilla), 589.
— (Motacilla), 1098.
— (Phylloscopus), 1091.
— (Picus), 70.
— (Tinnunculus), 870.
cancellatus (Phegornis), 956.
— (Picus), 72.
cancroma (Platyrhynchus), 231.
cancrominus (Platyrhynchus), 231.
cancrophagus (Cochlearius), 920.
candæi (Chiromachæis), 222.
— (Synallaxis), 198.
candicans (Hierofalco), 876.
— (Stenopsis), 121.
candida (Agyrtria), 136.
— (Coscoroba), 987.
candida (Gygis), 1019.
candida (Strix), 900.
canidissima (Embernagra), 638.
candidissimus (Astur), 839.
candidus (Himantopus), 942.
candidus (Melanerpes), 68.
candidus (Pagophila), 1026.
— (Phaeton), 1004.
canens (Embernagra), 638.
canente (Hemicercus), 81.
canescens (Centurus), 69.
— (Empidonax), 247.
— (Empidonax), 248.
canescens (Eremomela), 356.
canescens (Merula), 397.
— (Monarcha), 289.
— (Vireo), 472.
canicapilla (Nigrita), 575.
— (Poliospiza), 599.
— (Xenocichla), 309.
— (Zonotrichia), 626.
canicapillum (Trichostoma), 334.
canicapillus (Yungipicus), 74.
canicauda (Cardinalis), 620.
caniceps (Carduelis), 591.
— (Elainea), 210.
— (Eremomela), 356.
— (Geotrygon), 771.
— (Junco), 629.

- caniceps* (Lanius), 485.
 — (Megalæma), 39.
 — (Munia), 587.
 — (Palæornis), 19.
 — (Phrygilus), 640.
 — (Pœcilodryas), 272.
 — (Sigmodus), 498.
 — (Sitta), 681.
 — (Uroloncha), 586.
canicollis (Ortalia), 792.
 — (Otis), 926.
 — (Serinus), 599.
canicularis (Conurus), 12.
canifrons (Chrysotis), 5.
 — (Philogenas), 772.
 — (Spizixus), 304.
canigularis (Chlorospingus), 650.
 — (Sclerurus), 191.
caninde (Ara), 10.
caninucha (Geothlypis), 437.
canipalliat (Chrysotis), 5.
canipennis (Hemixus), 315.
canipileus (Chlorospingus), 651.
caniveti (Chlorostilbon), 141.
canningi (Rallina), 966.
canobrunnea (Thryothorus), 423.
canolimbatus (Amydrus), 1106.
canonicus (Serinus), 601.
canora (Phonipara), 618.
canorinus (Cuculus), 51.
canoroides (Cuculus), 51.
canorum (Trochalopteron), 322.
canorus (Crateropus), 330.
 — (Cuculus), 51.
 — (Melierax), 838.
cantans (Aidemosyne), 585.
 — (Cettia), 372.
 — (Telespiza), 606.
cantarella (Alauda), 454.
cantalor (Cryptolopha), 285.
 — (Hypocnemis), 173.
 — (Thryothorus), 423.
cantatrix (Psophia), 924.
cantatrix (Siphia), 292.
cantiac (Sterna), 1015.
cantianus (Ægialitis), 940.
cantica (Cyclorhis), 475.
cantillans (Cettia), 372.
cautillans (Cinclorhamphus), 361.
cantillans (Mirafr), 456.
cantonensis (Pericrocotus), 302, 1084.
cantor (Lamprocorax), 543.
cantoroides (Lamprocorax), 542.
canluriens (Cettia), 372.
canus (Agapornis), 22.
canus (Gecinus), 61.
 — (Larus), 1025.
canulus (Tringa), 950.
caparoch (Surnia), 894.
capella (Vanellus), 935.
capellana (Corvus), 503.
capellei (Butorion), 732.
capelli (Lanius), 485.
capensis (Ægithalus), 468.
 — (Asio), 878.
 — (Batis), 264.
 — (Bolaurs), 918.
 — (Bubo), 880.
capensis (Bucco), 46.
capensis (Certhilauda), 450.
 — (Colius), 91.
 — (Corvus), 502.
 — (Daption), 1036.
 — (Francolinus), 810.
 — (Fringillaria), 624.
 — (Hæmatopus), 933.
 — (Hyphantornis), 563.
 — (Macronyx), 449.
 — (Microparra), 958.
 — (Motacilla), 443.
 — (Nilais), 488.
 — (Edicnemis), 928.
 — (Ena), 765.
 — (Phalacrocorax), 1007.
 — (Phyllostrophus), 314, 1085.
 — (Podiceps), 1040.
 — (Pycnonotus), 305.
 — (Pyromelana), 572.
 — (Querquedula), 993.
 — (Rhynchæa), 956.
 — (Scops), 882.
 — (Smithornis), 285.
 — (Spatula), 995.
 — (Strix), 900.
 — (Sula), 1011.
 — (Tanioglaux), 897.
capensis (Upupa), 99.
 — (Zosterops), 706.
capicola (Turtur), 760.
capistrata (Malacias), 324.
 — (Muscisaxicola), 230.
 — (Pytelia), 578.
 — (Saxicola), 388.
 — (Schistochlamys), 644.
capistratoides (Drymocapthus), 334.
capistratus (Campylorhynchus), 420.
 — (Chloronotus), 65.
 — (Drymocapthus), 334.
capistratus (Larus), 1022.
capistratus (Serinus), 600.

- capistratus* (Thamnophilus), 182.
capitalba (Amblyospiza), 570.
capitale (Todiostrom), 232.
capitalis (Chrysomitris), 592.
 — (Dendroeca), 433, 1097.
 — (Hedymeles), 612.
 — (Hemipus), 497.
 — (Hyphantornis), 562.
 — (Leptoptila), 769.
 — (Myiobius), 216.
 — (Perisoreus), 511.
 — (Pezopetes), 649.
 — (Rhamphocelus), 660.
 — (Thamnophilus), 183.
 — (Zosterornis), 339.
capitanea (Chrysomitris), 591.
capitata (Paroaria), 613.
capito (Pœcilotryas), 272.
capitoides (Dendrexetastes), 1071.
capnodes (Scops), 884.
caprata (Pratincola), 387.
capricorni (Campothera), 66.
capucinus (Monachalcyon), 105.
capueira (Odontophorus), 822.
cara (Æthopyga), 695.
caracco (Ortalia), 792.
carbo (Oedemia), 999.
carbo (Phalacrocorax), 1006.
 — (Uria), 1044.
carboides (Phalacrocorax), 1007.
carbonacea (Cyanocitta), 1105.
carbonaria (Cercomacra), 176.
 — (Diglossa), 685.
carbonarius (Dicrurus), 531.
 — (Phrygilus), 640.
carbonata (Dendroeca), 435.
cardinalis (Dendropicus), 73, 1058.
 — (Eclectus), 16.
 — (Eos), 28.
 — (Myzomela), 715.
 — (Quelea), 571.
cardis (Merula), 397.
caribæa (Ammodramus), 1110.
 — (Columba), 751.
 — (Fulica), 977.
 — (Rallus), 959.
caribbæa (Estrelata), 1034.
caribbæarum (Tinnunculus), 871.
carilæus (Blacicus), 249.
carinata (Monarcha), 289.
carinatus (Prionirhynchus), 91.
 — (Rhamphastos), 42.
caripensis (Steatornis), 115.
carlottæ (Cyanocitta), 1105.
carmani (Pipilo), 637.
carmioli (Chalybura), 144.
carmioli (Chlorothraupis), 657.
 — (Vireo), 473.
carnapi (Sylvia), 355.
carnea (Cardinalis), 620.
carneipes (Arbelorhina), 690.
 — (Puffinus), 1032.
 — (Pycnorhampus), 611.
carneirostris (Anser), 983.
carnifex (Phœnicocercus), 215.
carnivora (Corvus), 502.
carola (Carpophaga), 745.
carolæ (Parotia), 522.
carolæ (Pipilo), 637.
caroli (Ægithalus), 468.
 — (Campothera), 66.
 — (Coccytes), 49.
 — (Polyononius), 157.
carolina (Porzana), 967.
carolinæ (Brachypteryx), 312.
 — (Galerida), 457.
 — (Tanyptera), 106.
carolinensis (Autrostomus), 122.
 — (Conurus), 11.
 — (Galeoscoptes), 415.
carolinensis (Herodias), 912.
carolinensis (Junco), 629.
 — (Pandion), 877.
 — (Parus), 463.
carolinensis (Podilymbus), 1042.
carolinensis (Querquedula), 993.
 — (Sitta), 681.
 — (Tyrannus), 252.
 — (Zenaidura), 757.
carolinus (Centurus), 69.
carpalis (Hæmophila), 635.
carri (Synallaxis), 198.
carribæa (Turdus), 1093.
carribæus (Chlorostilbon), 141, 1066.
carteretia (Macropygia), 756.
carteri (Eremiornis), 1088.
 — (Ptilotis), 720.
carunculata (Aburria), 794.
 — (Anthochaera), 724.
 — (Bostychia), 901.
carunculata (Chasmorhynchus), 219.
carunculata (Crax), 789.
 — (Paradigalla), 524.
 — (Ptilotis), 719.
 — (Sarcidiornis), 981.
carunculatus (Bugeranus), 922.
 — (Creadion), 516.
 — (Ibycter), 832.
 — (Perissornis), 536.
 — (Phalacrocorax), 1009.

- carycinurus* (Psittacus), 3.
caryocatactes (Nucifraga), 506.
caryophyllacea (Rhodonessa), 981.
cashmeriensis (Cinclus), 418.
cashmiriensis (Chelidon), 256.
cashmirensis (Sitta), 681.
casiotis (Columba), 751.
caspia (Garrulus), 510.
 — (Hydroprogne), 1014.
caspicus (Egithalus), 467.
caspicus (Tetraogallus), 806.
cassicus (Cracticus), 500.
cassidix (Cranorhinus), 99.
 — (Ptilotis), 721.
cassini (Aplonis), 541.
cassini (Bulalis), 262.
 — (Carpodacus), 603.
 — (Chaetura), 128.
 — (Eleopicus), 76.
 — (Eucometis), 655.
 — (Falco), 874.
 — (Gymnostinops), 519.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Halcyon), 109.
 — (Leptoptila), 770.
 — (Malimbus), 568.
 — (Molothrus), 552.
cassini (Numenius), 944.
cassini (Pyrrhula), 607.
 — (Scops), 886.
 — (Vireo), 472.
castanea (Alethe), 410.
 — (Dendroeca), 435.
 — (Hapaloptila), 48.
 — (Merula), 397.
 — (Pucrasia), 801.
 — (Querquedula), 993.
 — (Synallaxis), 198.
 — (Tænioglaux), 897.
castaneicapilla (Setophaga), 441.
castaneicauda (Basilinna), 139.
castaneicauda (Siva), 347.
castaneiceps (Basileuterus), 439.
 — (Buarremon), 648.
 — (Columba), 752.
 — (Conopophaga), 169.
 — (Cryptolopha), 286.
 — (Dendroeca), 1097.
 — (Emberiza), 623.
 — (Hyphantornis), 563.
castaneiceps (Laniarius), 491.
castaneiceps (Malacothraupis), 655.
 — (Minla), 344.
 — (Momotus), 94.
 — (Orthotomus), 361.
castaneiceps (Porzana), 968.
 — (Scoptelus), 98.
 — (Staphidia), 344.
 — (Tinamus), 782.
castaneicollis (Chlorospingus), 651.
 — (Francolinus), 809.
castaneifrons (Lophophanes), 465.
 — (Pipilopsis), 649.
castaneigularis (Myiagra), 283.
castaneithorax (Munia), 557.
castaneiventris (Amazilia), 138.
 — (Cacomantis), 52.
 — (Chalcomitra), 702.
 — (Delothraupis), 664.
 — (Eulabeornis), 962.
castaneiventris (Myiagra), 283.
 — (Oreopyra), 148.
castaneiventris (Parus), 461.
 — (Pomarea), 291.
 — (Spermophila), 615.
castaneocoronata (Oligura), 343.
castaneofusca (Cinnamopteryx), 561.
castaneopectus (Pendulinus), 557. 1106.
castancosoma (Cinnamopteryx), 561.
castaneothorax (Cinclosoma), 318.
castaneothorax (Rhipidura), 1031.
castaneotincta (Lathria), 1074.
castaneoventrtris (Sitta), 681.
castaneus (Egithalus), 467.
 — (Androphilus), 335.
castaneus (Batrachostomus), 117.
castaneus (Bradypterus), 350.
 — (Celeus), 79.
 — (Colinus), 821.
 — (Crypturus), 782.
 — (Hylactes), 165.
 — (Myiophoneus), 408.
castaneus (Philepitta), 210.
 — (Plegadis), 903.
castaneus (Thryophilus), 422.
castanilia (Astur), 841.
castanogastris (Callipepla), 818.
castanonota (Alethe), 411.
castanonota (Tænioglaux), 897.
 — (Thryophilus), 421.
 — (Turnix), 779.
castanonotum (Cinclosoma), 318.
castanonotus (Colius), 91.
 — (Eupetes), 319.
 — (Hemixus), 315.
castanops (Hyphantornis), 563.
 — (Strix), 900.
castanoptera (Dendrocicla), 186.
castanoptera (Tænioglaux), 897.
castanopterus (Malacias), 324.

- castanopterus* (Passer), 598.
castanotis (Dryonastes), 328.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Tæniopygia), 580.
castanurus (Campylopterus), 134.
castelnaudi (Aglaëctis), 152.
 — (Glyphorhynchus), 190.
castelnaui (Picumnus), 83.
castigatus (Odontophorus), 822.
castor (Merganser), 1003.
castro (Oceanodroma), 1029.
castus (Monarchia), 290.
casuarinus (Bycanistes), 101.
catamene (Loriculus), 23.
catarrhactes (Megalestris), 1027.
caterinæ (Saxicola), 390.
catharina (Eriocnemis), 154.
catharoxanthus (Malaconotus), 489, 1103.
cathemagmenus (Pelicius), 491.
cathœca (Dicurus), 529.
cathpharius (Picus), 70.
catolencum (Parisoma), 273.
caucasica (Accentor), 1091.
 — (Acredula), 467.
 — (Galerida), 458.
 — (Sitta), 680.
 — (Sturnus), 535.
causicus (Tetraogallus), 806.
caudacuta (Chætura), 127.
caudacutus (Ammodramus), 632.
 — (Sclerurus), 191.
caudata (Acredula), 466.
 — (Argya), 323.
 — (Basileuterus), 439.
 — (Bowdleria), 338.
 — (Casiempis), 237.
 — (Chiroxiphia), 222.
 — (Coracias), 92.
 — (Cyanolestia), 157.
 — (Formicivora), 178.
 — (Pica), 506.
 — (Pnoepyga), 430.
caudatus (Lamprotornis), 544.
 — (Lanius), 484.
 — (Pseudotharrhaleus), 335.
 — (Ptilogonys), 261.
 — (Theristicus), 902.
caudifasciatus (Pitangus), 243.
caumatonta (Aglaëctis), 152.
caurensis (Microcerulus), 1096.
 — (Phaethornis), 1065.
 — (Saucerottea), 1065.
 — (Thryothorus), 1095.
caurina (Agelæus), 1106.
 — (Melospiza), 633.
caurina (Syrnium), 891.
caurinus (Corvus), 503.
cauta (Diomedea), 1038.
 — (Hylacola), 320.
cavendishi (Estrela), 581.
cavicola (Speotyto), 895.
cayana (Calliste), 666.
 — (Cotinga), 216.
 — (Dacnis), 687.
 — (Euphonia), 673.
 — (Piaya), 58.
 — (Tityra), 210.
cayanea (Aramides), 963.
cayanensis (Capito), 41.
 — (Creciscus), 972.
 — (Myiozetetes), 241.
 — (Panyptila), 126.
 — (Pendulinus), 556.
cayanus (Cyanocorax), 514.
 — (Hoplopterus), 935.
cayelii (Strix), 900.
cayennensis (Echmophorus), 1042.
 — (Aramides), 963.
cayennensis (Belonopterus), 935.
 — (Formicarius), 1069.
 — (Harpiprion), 902.
 — (Leptodon), 866.
 — (Stenopsis), 121.
caymanensis (Centurus), 69.
 — (Chrysotis), 6.
 — (Quiscalus), 560.
 — (Vireo), 473.
cearensis (Cyclorhis), 476.
cebuensis (Cittocinclia), 413.
 — (Cryptolopha), 286.
 — (Graucalus), 297.
ceciliæ (Eleopicus), 76.
cedrorum (Ampelis), 260.
celæno (Pitylus), 643.
celænops (Merula), 398.
celata (Helminthophaga), 431, 1096.
celebense (Trichostoma), 333.
celebensis (Acrocephalus), 1090.
 — (Anthreptes), 704, 1113.
celebensis (Artamus), 533.
celebensis (Basileornis), 538.
celebensis (Baza), 867.
celebensis (Caprimulgus), 123.
 — (Centropus), 57.
 — (Chætura), 127.
 — (Hypotaenidia), 962.
celebensis (Lalage), 302.
celebensis (Melilestes), 718.
celebensis (Merops), 97.
celebensis (Merula), 398.

- celebensis* (Oriolus), 526.
 — (Pernis), 866.
 — (Pitla), 209.
 — (Rhipidura), 278.
celebicum (Dicæum), 677.
cenchris (Tinnunculus), 871.
cenchroides (Astur), 810.
 — (Tinnunculus), 871.
centralis (Barbatula), 1055.
 — (Chlorocichla), 313.
 — (Dendropicus), 1058.
 — (Malimbus), 568.
 — (Mesopicus), 1059.
cephalomelas (Lanius), 485, 1103.
cephalotes (Myiarchus), 250, 1078.
cephus (Stercorarius), 1028.
ceramense (Edoliisoma), 298.
ceramensis (Accipiter), 815.
ceramensis (Riæctes), 494.
cerinoelunis (Cœreba), 1112.
cerroensis (Thryomanes), 424.
certhia (Dendrocolaptes), 185.
certhiola (Locustella), 370.
cervicalis (Apalis), 353.
 — (Cyclopsitta), 33.
 — (Garrulus), 510.
 — (Estrelata), 1035.
 — (Otidiþaps), 774.
 — (Paroaria), 643.
 — (Philydor), 194.
cervina (Adelomyia), 155, 1067.
 — (Dacelo), 104.
 — (Rhipidura), 276.
cervinicauda (Drepanornis), 520.
 — (Myiagra), 233.
 — (Threneles), 131.
cerviniceps (Lyncornis), 119.
cervinicrissa (Culia), 1088.
cervinigularis (Automolus), 195.
 — (Phæokæma), 149.
cerviniventris (Amazilia), 138.
cerviniventris (Blacicus), 249.
cerviniventris (Chlamydera), 523.
 — (Colluricincla), 496.
 — (Crypturus), 782.
 — (Eminia), 353.
 — (Hladopsis), 1087.
 — (Leptoptila), 770.
 — (Pœcilodryas), 271.
 — (Phyllostrophus), 314.
 — (Rhectes), 495.
 — (Siphia), 292.
 — (Stoparola), 291.
cervinus (Acrocephalus), 370.
 — (Anthus), 447.
ceterus (Myrmelastes), 1070.
cetti (Cettia), 372.
ceylonensis (Raza), 867.
 — (Culicicapa), 282.
 — (Dissemurus), 533.
ceylonensis (Hypothymis), 274.
ceylonensis (Ketupa), 879.
 — (Oriolus), 527.
ceylonensis (Spizaetus), 849.
 — (Stoparola), 292.
ceylonensis (Zosterops), 706.
chabert (Artamia), 499.
chacuru (Bucco), 47.
chaleauchenia (Leptoptila), 769.
chalcocephalus (Brachypodius), 308.
chalcophus (Turacus), 89.
chalconota (Amazilia), 138.
 — (Carpophaga), 746.
chalconotus (Phalacrocorax), 1008.
chalcoptera (Phaps), 767.
chalcopterus (Larus), 1025.
chalcopterus (Pionus), 7.
chalcopterus (Plegadis), 903.
chalcopterus (Rhinoptilus), 931.
chalcospilos (Chalcopelia), 766, 1114.
chalcothorax (Galbula), 45.
chalcurus (Lamprocolius), 547.
chalibea (Centropus), 55.
challayi (Tetraogallus), 806.
challengeri (Eos), 28.
chalybæus (Lophornis), 165.
chalybea (Argya), 324.
 — (Diaphorophya), 265.
 — (Hypophæa), 671.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Progne), 259.
 — (Psalidoprocne), 260.
chalybeata (Manucodia), 518.
chalybeocephalus (Monarcha), 290.
chalybeus (Cinnyris), 699.
 — (Lamprocolius), 547.
chalybura (Carpophaga), 744.
chambanus (Lophophorus), 798.
chapadensis (Sittasomus), 190.
chapmani (Chordeiles), 118.
 — (Grax), 789.
 — (Sycalis), 602.
charientura (Thryomanes), 424.
chariessa (Apalis), 353.
charltoni (Arboricola), 814.
charmosyna (Estrela), 582.
chathamensis (Hemiphaga), 748.
 — (Porphyrio), 976.
chavaria (Chauna), 979.
chazaliei (Loxigilla), 614.

- cheela (*Spilornis*), 834.
cheeleensis (*Calandrella*), 453.
chelicuti (*Halcyon*), 107.
chendoola (*Galerida*), 458.
cheniana (*Mirafra*), 455.
cherina (*Cisticola*), 364.
cheriway (*Polyborus*), 832.
chermesina (*Myzomela*), 716.
cherriei (*Arbelorhina*), 1112.
— (*Elaïnea*), 210.
— (*Myrmotherula*), 1070.
— (*Nephæetes*), 129.
— (*Thripophaga*), 1072.
cherrug (*Hierofalco*), 876.
chiapensis (*Antrostomus*), 1063.
— (*Campylorhynchus*), 419.
— (*Dactylortyx*), 821.
— (*Guiraca*), 612.
chiaradiæ (*Athene*), 1117.
chicquera (*Hypotriorchis*), 873.
chiguanco (*Turdus*), 400.
chiguancoïdes (*Turdus*), 400.
chii (*Anthus*), 448.
chilensis (*Belonopterus*), 935.
— (*Cooperastur*), 844.
chilensis (*Creciscus*), 971.
chilensis (*Cyanocorax*), 514.
— (*Gallinago*), 954.
— (*Megalestris*), 1027.
— (*Phœnicopterus*), 908.
— (*Zonotrichia*), 626.
chiloensis (*Chloëphaga*), 986.
— (*Mareca*), 992.
chimachima (*Milvago*), 833.
chimæra (*Uratelornis*), 92.
chimango (*Milvago*), 833.
chimborazo (*Oreotrochilus*), 147.
chimborazensis (*Attagis*), 780.
chinensis (*Diomedea*), 1038.
chinensis (*Dryonastes*), 328.
— (*Excalfactoria*), 816.
— (*Francolinus*), 808.
chinensis (*Oriolus*), 526.
chinensis (*Picumnus*), 84.
— (*Turtur*), 761.
chiniana (*Cisticola*), 365.
chinquis (*Polyplectron*), 795.
chionogaster (*Accipiter*), 846.
— (*Leucippus*), 135.
chionoptera (*Diomedea*), 1033.
chionura (*Eupherusa*), 144.
— (*Trogon*), 87.
chiricote (*Aramides*), 963.
chiripepe (*Pyrhura*), 13.
chiriquensis (*Elaïnea*), 239.
chiriquensis (*Eugenes*), 1067.
— (*Geothlypis*), 437.
— (*Geotrygon*), 771.
chiroleuca (*Gymnocichla*), 175.
chirurgus (*Hydrophasianus*), 957.
chistochlamys (*Garrulax*), 1086.
chivi (*Vireo*), 472.
chlorates (*Zosterops*), 706.
chlorepscica (*Myiarchus*), 250.
chlorigaster (*Oreopsittacus*), 1055.
chlorigula (*Xenocichla*), 310.
chlorion (*Piprites*), 219.
chloris (*Acanthidositta*), 206.
— (*Anthus*), 445.
— (*Chlorodrepanis*), 692.
— (*Halcyon*), 109-110.
— (*Iole*), 312.
— (*Ligurinus*), 609.
— (*Nicator*), 493.
— (*Piprites*), 219.
— (*Stigmatops*), 718.
— (*Zosterops*), 709.
chloroauchenia (*Leptoptila*), 769.
chlorocephala (*Chloropsis*), 318.
— (*Saucerottea*), 137.
chlorocephalus (*Chloronerpes*), 65.
chlorocephalus (*Oriolus*), 528.
chlorocercus (*Lorius*), 29.
— (*Talaphorus*), 135.
chlorochlamys (*Gallirex*), 90.
chlorogaster (*Crocopus*), 732.
— (*Gecinus*), 64.
chlorogastra (*Anthreptes*), 704.
chlorolæma (*Eulampis*), 146.
— (*Momotus*), 1061.
chlorolæmus (*Chrysolampis*), 146.
chlorolepidotus (*Trichoglossus*), 31.
chlorolophus (*Gecinus*), 64.
chloromeros (*Pipra*), 221.
chloronota (*Camaroptera*), 356.
— (*Buthraupis*), 663.
— (*Chrysotis*), 6.
— (*Embernagra*), 638.
— (*Gerygone*), 269.
— (*Zosterops*), 711.
chloronotus (*Criniger*), 310.
— (*Orthotomus*), 361.
— (*Phrygilus*), 640.
chloronotus (*Phyllobasileus*), 378.
— (*Zosterops*), 706.
chloropetoides (*Thamornis*), 362.
chlorophæa (*Rhinortha*), 59.
chlorophana (*Thalaurania*), 143.
chloropogon (*Metallura*), 156.
chloroptera (*Ægithina*), 341.

- chloroptera* (Ara), 10.
 — (Chalcopsitta), 28.
 — (Melanocharis), 676.
 — (Myzomela), 715.
 — (Osmotreron), 733.
chloropterus (Aprosmictus), 20.
 — (Conurus), 12.
 — (Lamprocolius), 547.
chloropus (Arboricola), 814.
 — (Gallinula), 974.
chloropyga (Cœreba), 691.
chloropygius (Cinnyris), 699.
chlororhyncha (Diomedea), 1039.
chlororhynchus (Centropus), 56.
 — (Puffinus), 1034.
chlorospila (Adelomyia), 1067.
chlorotica (Euphonia), 672.
 — (Ligurinus), 609.
chlorotis (Anas), 991.
chloiura (Pachycephala), 477.
 — (Psalidoprymna), 158.
chlorurus (Atlapeles), 636.
cholmleyi (Ammoperdix), 807.
chocolatinus (Bradyornis), 287, 1082.
chopi (Aphobus), 561.
christophori (Pachycephala), 478.
chrysæa (Alcippe), 345.
 — (Cyanoderma), 343.
chrysaëtus (Aquila), 851.
chrysæus (Tarsiger), 384.
chrysauchen (Melanerpes), 68.
chryseola (Myiodiotes), 1098.
chrysia (Geotrygon), 771.
chrysocarpa (Agelæus), 553.
chrysocaulosa (Colaptes), 63.
chrysocephalum (Heteropelma), 223.
chrysocephalus (Myiodynastes), 244.
 — (Pendulinus), 556.
chrysochlora (Chalcophaps), 766.
chrysochlorus (Chloronerypes), 64.
chrysocnemis (Camaroptera), 1089.
chrysocoma (Barbatula), 37.
chrysocome (Catarrhactes), 1047.
chrysogaster (Basileuterus), 439.
chrysogaster (Chlorospingus), 651.
 — (Pheucticus), 611.
 — (Ptilopus), 737.
chrysogastra (Euphema), 26.
 — (Gerygone), 269.
chrysogenys (Arachnothera), 705.
chrysoides (Colaptes), 63.
chrysokema (Otocorys), 452, 1099.
 — (Zosterops), 710.
chrysolæus (Merula), 398.
chrysolophus (Catarrhactes), 1048.
chrysolophus (Dendrocolaptes), 185.
chrysoma (Embernagra), 638.
chrysomelas (Chrysophilus), 66.
 — (Monarcha), 290.
 — (Phasianus), 802.
 — (Tachyphonus), 656.
 — (Trogon), 87.
chrysonotus (Cassicus), 550.
 — (Loriculus), 23.
 — (Rhamphocelus), 660.
chrysoparia (Dendroeca), 434.
chrysopasta (Euphonia), 673.
chrysopelargus (Balearica), 923.
chrysoplepa (Pheucticus), 611.
chrysophrys (Chlorospingus), 651.
 — (Conurus), 12.
 — (Emberiza), 621.
chrysopsis (Thlypopsis), 653.
chrysopleurus (Merula), 397.
chrysopogon (Megalaema), 38.
chrysops (Cyanocorax), 513.
 — (Cyanoderma), 1088.
 — (Ptilotis), 721.
 — (Setophaga), 411.
 — (Sycalis), 602.
 — (Tyranniscus), 239.
chrysopsis (Megalaema), 38.
chrysoptera (Brotogerys), 16.
chrysoptera (Diphyllodes), 519.
chrysoptera (Helminthophaga), 431.
 — (Neositta), 682.
chrysopterum (Trochalopteron), 321.
chrysopterus (Masius), 220.
 — (Rhamphocelus), 661.
chrysopterygius (Psephotus), 25.
chrysopyga (Barbatula), 37.
chrysopygia (Saxicola), 390.
chrysorama (Eriocnemis), 154.
chrysorrhœa (Acanthiza), 366.
 — (Ptilopus), 740.
chrysorrhœa (Ptilonopus), 261.
chrysorrhœum (Dicæum), 679.
chrysorrhœoides (Molpastes), 305.
chrysorrhous (Eopsaltria), 481.
chrysosema (Brotogerys), 16.
chrysotis (Calliste), 668.
 — (Ptilotis), 721.
chrystianæ (Hermotimia), 700.
christinæ (Æthopyga), 696.
chubbi (Cisticola), 363.
 — (Lamprocolius), 1106.
chukar (Caccabis), 807.
chuni (Turtur), 759.
cia (Emberiza), 623.
cinchoneti (Conopias), 242.

- cinchoneti* (Sisopygis), 228.
cincinata (Phalacrocorax), 1008.
cineinnatiensis (Helminthophaga), 431.
cinclorhyncha (Monticola), 393.
cinclus (Tringa), 951.
cincta (Cotinga), 216.
 — (Cotyle), 257.
 — (Poephila), 584.
 — (Pogonornis), 722.
cinctura (Ammomanes), 459.
cinctus (Ampelion), 216.
 — (Erythrogonyx), 933.
 — (Microcerculus), 429.
 — (Odontophorus), 822.
 — (Parus), 463.
 — (Ptilopus), 735.
 — (Rhinoptilus), 931.
cineracea (Carpophaga), 745.
cineracea (Grus), 921.
cineracea (Lophophanes), 465.
 — (Myzomela), 716.
 — (Nonnula), 48.
cineracea (Pyrrhula), 607.
cineracea (Sayornis), 227.
 — (Scops), 886.
cineraceum (Trochalopteron), 321.
cineraceus (Circus), 836.
 — (Dicrurus), 530.
cineraceus (Orthotomus), 361.
 — (Philemon), 1113.
 — (Spodiopsar), 535.
cinerarius (Circus), 836.
cinerascens (Aplonis), 541.
 — (Bubo), 881.
 — (Butalis), 262.
 — (Cercomacra), 176.
 — (Certhidea), 689.
 — (Circaëtus), 834.
 — (Cisticola), 363.
 — (Dendrocitta), 508.
 — (Elaëna), 210, 1076.
 — (Fraseria), 497.
 — (Gerygone), 268.
 — (Laticilla), 350.
cinerascens (Monarcha), 289.
cinerascens (Myiarchus), 250.
 — (Nothoprocta), 784.
 — (Ornithion), 1076.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Parisoma), 1081.
cinerascens (Parus), 461.
cinerascens (Synallaxis), 198.
 — (Turdus), 399.
cinerea (Alcippe), 345.
 — (Amphispiza), 627.
cinerea (Apalis), 353.
 — (Ardea), 910.
cinerea (Alticora), 258.
cinerea (Batara), 184.
 — (Claravis), 764.
cinerea (Collocalia), 129.
cinerea (Cracticus), 501.
 — (Elaëna), 240.
 — (Emarginata), 391.
 — (Emheriza), 622.
 — (Estrela), 581.
 — (Gallicrex), 974.
 — (Geocichla), 405.
 — (Gerygone), 269.
 — (Glareola), 930.
 — (Glaucopsis), 516.
 — (Goura), 775, 1115.
cinerea (Grus), 921.
cinerea (Lathria), 213.
 — (Melospiza), 633.
 — (Minla), 344.
 — (Muscisaxicola), 230.
 — (Muscitrea), 1080.
cinerea (Muscylva), 270.
cinerea (Myiadectes), 407.
 — (Perdix), 812.
 — (Piezothina), 614.
cinerea (Pœcilodryas), 271.
cinerea (Poospiza), 628.
 — (Porzana), 968.
 — (Ptilotis), 722.
 — (Rhipidura), 279.
 — (Scotiaptex), 892.
 — (Serphophaga), 236.
 — (Struthidea), 515.
 — (Sylvia), 374.
 — (Tephrocorys), 454.
 — (Terekia), 948.
 — (Thryophilus), 422.
 — (Zosterops), 713.
cinereicapilla (Phyllomyias), 238.
 — (Rhinomyias), 282.
cinereicapillus (Colaptes), 63.
 — (Spizixus), 304.
cinereicauda (Chætura), 128.
 — (Oreopyra), 148.
cinereiceps (Anuropsis), 333.
 — (Creciscus), 971.
 — (Fulvella), 346.
 — (Gerygone), 269.
 — (Gymnobucco), 37.
cinereiceps (Hemichelidon), 262.
cinereiceps (Lanthocincla), 323, 1086.
 — (Iole), 312.
 — (Macropygia), 755.

- cinereiceps* (Ortalida), 793.
 — (Orthotomus), 361.
 — (Oxylabes), 338.
 — (Phabotreron), 734.
 — (Rhynchocyclus), 242.
 — (Thamnophilus), 183.
 — (Tyranniscus), 239.
cinereicollis (Basileuterus), 439.
 — (Phyllergates), 362.
cinereifrons (Elaeina), 240.
 — (Garrulax), 323.
 — (Heteromyias), 271.
 — (Lædorus), 306.
cinereigula (Pericrocotus), 301.
cinereigulare (Dicæum), 679.
 — (Oncostoma), 232.
cinereinucha (Thamnophilus), 183.
cinereiventris (Brachypodius), 308.
 — (Chætura), 128.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Rhamphocænus), 176.
cinereocapilla (Culicicapa), 282.
cinereocapilla (Motacilla), 444.
 — (Prinia), 359.
cinereocephalus (Chlorospingus), 651.
cinereogenys (Oriolus), 527.
cinereola (Butalis), 262.
cinereola (Cisticola), 363.
cinereo-niger (Thamnophilus), 183.
cinereovinacea (Estrela), 582.
cinereum (Conirostrum), 687.
 — (Malacopteron), 337.
 — (Todiostrostrum), 231.
cinereus (Acridotheres), 538.
 — (Anous), 1019.
cinereus (Anser), 982.
cinereus (Artamus), 534.
 — (Attila), 214.
 — (Calamonastes), 352.
 — (Circaëtus), 833.
 — (Circus), 836.
 — (Cnipolegus), 229.
 — (Coccyzus), 54.
 — (Creciscus), 971.
 — (Crypturus), 782.
 — (Graucalus), 296.
 — (Harporhynchus), 417.
 — (Hemixus), 315.
 — (Junco), 629.
cinereus (Larus), 1025.
cinereus (Leucospizias), 841.
 — (Lobivanellus), 934.
 — (Myiochanes), 249.
 — (Odontorhynchus), 421.
cinereus (Pachyrhamphus), 212.
 — (Parus), 461.
 — (Pericrocotus), 302.
cinereus (Phalaropus), 957.
cinereus (Priofinus), 1032.
 — (Pseudotantalus), 905.
 — (Ptilogonys), 261.
cinereus (Puffinus), 1031.
cinereus (Tachyeres), 998.
cineritia (Empidonax), 248.
cingulata (Urochroma), 8.
cinnamomea (Amazilia), 138.
 — (Ardetta), 914.
 — (Macropygia), 754.
 — (Myrmeciza), 174.
 — (Neopipo), 221.
 — (Rhipidura), 278, 1081.
 — (Spermophila), 615.
 — (Synallaxis), 198.
 — (Zeocephus), 280.
cinnamomeiventris (Ochthoeca), 226.
 — (Thamnolæa), 392.
 — (Sitta), 681.
cinnamomeum (Cinclosoma), 318.
 — (Trochalopteron), 322.
cinnamomeus (Anthus), 447.
cinnamomeus (Attila), 214.
 — (Bradypterus), 350.
 — (Crypturus), 784.
 — (Drymocataphus), 1087.
 — (Furnarius), 204.
 — (Myiobius), 245.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Passer), 598.
 — (Picumnus), 83.
cinnamomeus (Sarothrura), 969.
cinnamomeus (Xiphocolaptes), 188.
cinnamomina (Tinnunculus), 871.
cinnamominus (Halcyon), 108.
cioides (Emberiza), 623.
ciopsis (Emberiza), 623.
circia (Querquedula), 992.
circumcincta (Ægialitis), 941.
circumcinctus (Spizapteryx), 869.
ciris (Cyanospiza), 626.
cirlus (Emberiza), 622.
cirrhatà (Lunda), 1046.
cirrhatùs (Phalacrocorax), 1009.
cirrhatùs (Picumnus), 83.
 — (Spizaëtus), 849.
cirrhatùs (Thamnophilus), 182.
cirrhocephalus (Accipiter), 845.
 — (Larus), 1022.
 — (Rhectes), 494.
cirrhochloris (Aphantochroa), 134.

- cirris* (Picus), 72.
cisandina (Siptornis), 199.
cissa (Picus), 70.
citerior (Pytelia), 578.
citrea (Protonotaria), 432.
citreogularis (Philemon), 726.
 — (Sericornis), 366.
citreola (Motacilla), 444.
citreolæmus (Rhamphastos), 42.
citreoloides (Motacilla), 444.
citreolus (Trogon), 87.
citreopygia (Celeus), 79.
citreopygius (Attila), 214.
citrina (Geocichla), 405.
 — (Pseudochloris), 639.
citrinella (Chrysomitris), 593.
 — (Emberiza), 622.
 — (Zosterops), 707.
citrinelloides (Chrysomitris), 593.
citrinellus (Pipilopsis), 649.
citriniceps (Eremomela), 356.
citrinifrons (Catamblyrhynchus), 618.
 — (Ochthæca), 226.
citriniventris (Attila), 214.
citrinocapillus (Poicephalus), 9.
citrinocristata (Cacatua), 2.
citrinocristatus (Gecinus), 1057.
clamans (Camareptera), 356.
clamans (Spiloptila), 362.
 — (Xenocichla), 309.
clamator (Asio), 878.
clamosa (Atrichia), 729.
clamosus (Cuculus), 51.
clanga (Aquila), 852.
clappertoni (Francolinus), 809.
clara (Basileuterus), 1098.
 — (Caprimulgus), 124.
 — (Catharus), 394, 1092.
 — (Rheetes), 495.
 — (Troglodytes), 1096.
clara (Zosterops), 711.
claræ (Arachnothera), 705.
 — (Sylvia), 1090.
clarescens (Bathilda), 585.
clarionensis (Corvus), 1104.
 — (Zenaidura), 757.
clarissæ (Heliangelus), 155.
clathratus (Trogon), 87.
claudei (Liophilus), 1081.
claudie (Heliangelus), 155.
cleaveri (Alethe), 411.
clementæ (Melospiza), 633.
 — (Pipilo), 637.
clementæ (Amphispiza), 627.
clementiæ (Coeligena), 148.
clementis (Carpodacus), 604.
cleonensis (Melospiza), 1110.
clericalis (Pentholæa), 392.
climacocercus (Hydropsalis), 120.
clinacura (Fluvicola), 228.
climacurus (Scotornis), 120, 1063.
clio (Pachycephala), 477.
clot-bey (Rhamphocorys), 451.
clypeata (Spatula), 995.
coulei (Myiarchus), 1078.
cobaltina (Pionus), 6.
cobanensis (Glaucidium), 896.
cobanensis (Vireo), 472.
coburni (Turdus), 1093.
coccinea (Ara), 10.
coccinea (Cardinalis), 619.
 — (Loxops), 594.
 — (Myzomela), 716.
 — (Pitta), 1073.
coccinea (Pyrrangia), 658.
coccinea (Pyrenestes), 576.
coccinea (Pyrrhula), 607.
coccinea (Vestiaria), 692.
coccineicollaris (Pionopsitta), 7.
coccineifrons (Cicinnurus), 519.
coccineifrons (Cyclopsitta), 33.
coccineifrons (Trichoglossus), 31.
coccineipes (Amaurornis), 972.
coccineoptera (Plistes), 20.
coccineum (Dicæum), 676.
coccineus (Calochætes), 659.
cochinchinensis (Chætura), 127.
cochinchinensis (Chloropsis), 318.
cochlearia (Cancroma), 920.
cockburniæ (Anthus), 446.
cockerelli (Philemon), 726.
 — (Ptilotis), 721.
 — (Rhipidura), 279.
cocoi (Ardea), 910.
cælestis (Cyanolestia), 157.
cælestis (Gallinago), 953.
cælestis (Hypothymis), 274.
 — (Psittacula), 15.
 — (Tanagra), 661.
cælicolor (Calliste), 665.
 — (Grandala), 386.
cæligena (Lampropygia), 152.
cælivox (Alauda), 455.
cærebicolor (Dacnis), 687.
coihæ (Cyclorhis), 1102.
colardeaui (Chætura), 128.
colchicus (Phasianus), 801.
colensoi (Phalacrocorax), 1009.
colimæ (Aphelocoma), 512.
colius (Colius), 91.

- collaria* (Chrysotis), 6.
 — (Spermophila), 616.
collaris (Accentor), 381, 1091.
 — (Accipiter), 845.
 — (Anthreptes), 704.
 — (Ægialitis), 940.
 — (Bucco), 46.
 — (Colæus), 505.
 — (Colaptes), 1057.
 — (Fuligula), 998.
collaris (Grus), 922.
collaris (Hyphantornis), 563.
 — (Lanius), 454.
 — (Leptoptila), 770.
collaris (Melidora), 105.
 — (Melirrhophetes), 723.
 — (Minla), 344.
collaris (Miraфра), 455.
 — (Muscicapa), 263.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Rhamphocænus), 177.
collaris (Thamnolæa), 392.
collaris (Trogon), 86.
collectoris (Ceyx), 1062.
colletti (Spodiopsar), 535.
collei (Calocitta), 509.
collurio (Enneoctonus), 486.
collurioceph (Chætornis), 352.
collurioides (Enneoctonus), 487.
colma (Formicarius), 171.
colombiana (Porzana), 969.
colona (Halcyon), 109.
 — (Myiagra), 283.
colonus (Buteo), 857.
 — (Copurus), 229.
 — (Rhinomyias), 282.
colorata (Calcarius), 625.
colubris (Trochilus), 162.
columba (Fulmarus), 1036.
 — (Uria), 1044.
columbarius (Hypotriorchis), 874.
columbiæ (Trogodytes), 425.
columbiana (Chamaea), 171.
 — (Chrysomitris), 592.
 — (Cœreba), 690.
 — (Lampropygia), 152.
 — (Merganetta), 1002.
 — (Nucifraga), 506.
 — (Parus), 464.
 — (Pediœceles), 824.
 — (Spermophila), 615.
 — (Sycalis), 601.
 — (Turdus), 1093.
columbianus (Crypturus), 784.
 — (Cygnus), 986.
columbianus (Odontophorus), 822.
 — (Philydor), 193.
columbianus (Theristicus), 902.
columbica (Thalurania), 143.
columbina (Bulweria), 1036.
columboides (Palaornis), 19.
comata (Macropteryx), 130.
 — (Merganser), 1003.
 — (Pipra), 221.
comatus (Anorrhinus), 102.
 — (Cnipolegus), 228.
 — (Geronticus), 901.
comeri (Porphyriornis), 973.
comice (Dicrurus), 531.
comitata (Alseonax), 264.
commixta (Parus), 461.
communis (Coturnix), 815.
communis (Falco), 874.
communis (Grus), 921.
 — (Turtur), 758.
commutata (Monarchia), 289, 1083.
comorensis (Artamia), 499.
 — (Cinnyris), 698.
 — (Coracopsis), 4.
 — (Terpsiphone), 280.
 — (Turdus), 400.
 — (Turtur), 759.
 — (Zosterops), 706.
complexa (Pipilo), 637.
comptus (Chlorostilbon), 141.
comptus (Pipilopsis), 649.
compressirostris (Colluricincla), 496.
 — (Xiphocolaptes), 188, 1071
compressus (Picolaptes), 187.
componota (Geocichla), 404.
comrii (Manucodia), 518.
concinna (Acredula), 466.
 — (Carpophaga), 744.
 — (Euphonia), 672.
 — (Glossopsitta), 31.
concinna (Graucalus), 296.
concinna (Myiagra), 283.
 — (Pitta), 207.
 — (Rhipidura), 279.
concinna (Acrocephalus), 1090.
concolor (Amaurospiza), 619.
 — (Amblyospiza), 570.
 — (Arachnothera), 705.
 — (Camaroptera), 356.
 — (Cotyle), 257.
 — (Dendrocolaptes), 185.
 — (Dicaeum), 679.
concolor (Dissodectes), 869.
concolor (Hypotriorchis), 872.
 — (Hypsipetes), 316.

- concolor* (*Penthetria*), 573.
 — (*Porzana*), 968.
 — (*Progne*), 259.
 — (*Schizorhis*), 90.
 — (*Xenospingus*), 641.
concreta (*Diaphorophya*), 265.
concreta (*Guiraca*), 612.
 — (*Siphia*), 292.
concretus (*Caprimulgus*), 124.
 — (*Cuculus*), 1056.
 — (*Halcyon*), 110.
 — (*Hemicercus*), 81.
condaminei (*Eutoxeres*), 133.
confinis (*Oreortyx*), 819.
 — (*Poocates*), 630.
 — (*Turdus*), 401.
congener (*Andropadus*), 313.
congica (*Camaroptera*), 357.
 — (*Cotyle*), 257.
 — (*Lagonosticta*), 577.
 — (*Pogonorhynchus*), 36.
congicus (*Campothera*), 66.
conirostris (*Embernagra*), 638.
 — (*Geospiza*), 608.
 — (*Indicator*), 34.
 — (*Spizocorys*), 454.
connectens (*Hemixus*), 315.
 — (*Junco*), 629.
 — (*Rhamphocelus*), 660.
connivens (*Ninox*), 888.
conradi (*Bourcieria*), 151.
 — (*Criniger*), 1085.
 — (*Turdus*), 400.
consanguinea (*Analcipus*), 528.
consobrina (*Egithalus*), 467.
 — (*Carpophaga*), 744.
 — (*Formicivora*), 178.
 — (*Hypothymis*), 1081.
 — (*Oriolus*), 527.
 — (*Phaethornis*), 132.
 — (*Pipilo*), 637.
consobrinus (*Foudia*), 566.
consobrinus (*Mecocerculus*), 227.
consobrinus (*Odontophorus*), 822.
consobrinus (*Philydor*), 193.
conspersa (*Catherpes*), 428.
conspicillata (*Gerygone*), 269.
 — (*Majaqueus*), 1033.
 — (*Psittacula*), 15.
 — (*Suthora*), 471.
 — (*Sylvia*), 375.
 — (*Zosterops*), 711.
conspicillatus (*Basileuterus*), 439, 1098.
 — (*Pelecanus*), 1006.
conspicuous (*Myiagroides*), 284.
constanti (*Floricola*), 160, 1068.
constantia (*Hapaloderma*), 87.
contempta (*Pachycephala*), 477.
 — (*Strix*), 899.
 — (*Turdus*), 1093.
continentalis (*Ceryle*), 1062.
contra (*Sturnopastor*), 536.
contrerasi (*Cyclorhis*), 476.
conversi (*Prymnacantha*), 165, 1068.
convexus (*Anthracoceros*), 100.
cooki (*Cyanopica*), 507.
 — (*Cyanorhamphus*), 26.
 — (*Estrelata*), 1035.
cooperi (*Buteo*), 856.
 — (*Cooperastur*), 844.
 — (*Melospiza*), 633.
 — (*Pyranga*), 658.
 — (*Scops*), 886.
coppingeri (*Turtur*), 759.
coquereli (*Coua*), 60.
 — (*Cinnyris*), 698.
coqui (*Francolinus*), 808.
coquimbica (*Nothoprocta*), 784.
cora (*Thaumastura*), 160.
coracina (*Pipra*), 221.
coracinus (*Myiadectes*), 407, 1094.
 — (*Phrygilus*), 640.
coralensis (*Ptilopus*), 737.
corallina (*Calospiza*), 1111.
corallinus (*Pionus*), 6.
corallipes (*Dendrophila*), 682.
corallirostris (*Hypositta*), 683.
corax (*Corvus*), 502.
coraya (*Thryothorus*), 423.
cordata (*Hemicercus*), 81.
cordofanica (*Mirafra*), 455.
coreensis (*Galerida*), 458.
corinnæ (*Hermotimia*), 700.
cornelia (*Hermotimia*), 700.
corneliæ (*Eclectus*), 16.
corniculata (*Fratercula*), 1046.
corniculatus (*Tropidorhynchus*), 725.
cornix (*Corvus*), 503.
 — (*Graucalus*), 1084.
cornuta (*Ceratopipra*), 220.
 — (*Fulica*), 977.
cornuta (*Numida*), 804.
cornuta (*Nyctibius*), 118.
cornuta (*Otocorys*), 452.
cornuta (*Palamedea*), 979.
 — (*Tadorna*), 988.
cornutus (*Heliactin*), 159.
 — (*Nymphicus*), 26.
cornutus (*Podicipes*), 1041.
coromandeliana (*Anastomus*), 906.

coromandelianus (Nettopus), 981.
coromandelica (Coturnix), 815.
coromandelicus (Cursorius), 931.
coromandus (Bubo), 881.

— (Bubulcus), 913.
— (Coccystes), 49.
— (Halcyon), 106.

coronatorum (Melospiza), 1110.
coronata (Acanthopneuste), 377.

— (Ægithalus), 467.
— (Chiromachæris), 222.
— (Cyanocitta), 511.
— (Dendroeca), 435, 1097.
— (Goura), 775.
— (Ifrita), 319.
— (Macropteryx), 130.
— (Numida), 804.

coronata (Pyrocephalus), 246.

coronata (Tænioptera), 225.
— (Thamnolæa), 1092.
— (Todopsis), 275.
— (Zeledonia), 167.
— (Zonotrichia), 625.

coronatus (Ampeliceps), 540.
— (Anthracoceros), 100.
— (Basileuterus), 439.
— (Harpyhaliaëtus), 861.
— (Malurus), 368.

coronatus (Oriolus), 526.

coronatus (Phyllergates), 362
— (Platylophus), 510.
— (Platyrhynchus), 231.
— (Pterocles), 777.
— (Spizaëtus), 848.
— (Stephanibyx), 936.
— (Tachyphonus), 656.

corone (Corvus), 503.

coronoides (Corvus), 503.

coronulata (Masius), 220.

coronulatus (Ptilopus), 738.

correndera (Anthus), 448.

corrugatus (Cranorrhinus), 100.

corsa (Parus), 1100.

corsica (Emberiza), 622.

cortapau (Antrostomus), 122.

coruscans (Neodrepanis), 694.

— (Petasophora), 145.

corvina (Corvinella), 482.

— (Megalema), 38.
— (Spermophila), 617.
— (Terpsiphone), 281.

corvinus (Lamprocorax), 543.

— (Myrmelastes), 181.

corydon (Corydon), 205.

coryi (Geothlypis), 437.

coryi (Loxigilla), 614.

— (Phonipara), 618.

— (Rallus), 960.

— (Schizæaca), 201.

coryphæa (Aedonopsis), 412.

— (Barbatula), 38.

corythaix (Basileornis), 538.

— (Turacus), 89.

coscoroba (Coscoroba), 987.

costæ (Calypte), 163.

costaricensis (Buteo), 856.

— (Campylorhynchus), 420.

— (Catharus), 1092.

— (Geotrygon), 771.

costaricensis (Grallaricula), 169.

costaricensis (Malacoptila), 48.

costaricensis (Pharomacrus), 85.

costaricensis (Rhamphocœlus), 660.

— (Thryophilus), 422.

— (Xiphocolaptes), 1071.

cotta (Elafæa), 240.

coturniculus (Creciscus), 971.

couesi (Campylorhynchus), 420, 1095.

— (Chauleasmus), 991.

— (Tringa), 951.

couloni (Ara), 10.

cowani (Cotyle), 257.

coxeni (Cyclopsitta), 33.

coyolcos (Colinus), 821.

cozumelæ (Attila), 214.

— (Pendulinus), 1106.

— (Pyrranga), 1111.

craddocki (Suthora), 1101.

cranchi (Pternistes), 811.

crassa (Corythocichla), 332.

crassa (Poicephalus), 9.

crassirostris (Elurædus), 522.

crassirostris (Arachnothera), 705.

— (Buarremon), 648.

— (Calendula), 458.

— (Chætusia), 936.

crassirostris (Charadrius), 937.

crassirostris (Chrysococcyx), 53.

— (Corvultur), 502.

— (Coryphænas), 756.

— (Dendrocolaptes), 185.

— (Embernagra), 638.

— (Eurystomus), 93.

— (Geositta), 204.

— (Geospiza), 609.

— (Hierococcyx), 50.

— (Ixocinclæ), 316.

— (Larus), 1023.

— (Nycticorax), 918.

— (Oriolus), 527.

- crassirostris* (*Oryzoborus*), 613.
 — (*Pitta*), 208.
 — (*Pseudozosterops*), 713.
 — (*Psittacula*), 15.
 — (*Rallus*), 959.
 — (*Rhamphocharis*), 676.
 — (*Tringa*), 951.
 — (*Turnagra*), 329.
 — (*Tyrannus*), 252.
 — (*Vinago*), 732.
 — (*Vireo*), 473.
 — (*Xiphocolaptes*), 188.
crassus (*Lamprocorax*), 542.
 — (*Lanioturdinus*), 332.
cratitia (*Ptilotis*), 721.
craveri (*Endomychura*), 1044.
crawshayi (*Francolinus*), 809.
creatopus (*Puffinus*), 1031.
crecca (*Querquedula*), 992.
crecoides (*Querquedula*), 993.
crenatus (*Anthus*), 445.
crepera (*Cercomacra*), 1069.
crepidatus (*Stercorarius*), 1028.
crepitans (*Edicnemus*), 927.
crepitans (*Psophia*), 923.
 — (*Psophodes*), 320.
 — (*Rallus*), 959.
crinifrons (*Aegothales*), 116.
criniger (*Tricholestes*), 315.
crinigera (*Irena*), 317.
 — (*Phlogœnas*), 772.
 — (*Suya*), 358.
crinitus (*Myiarchus*), 250.
crispifrons (*Gypsophila*), 338.
crispus (*Pelecanus*), 1005.
crissalis (*Columba*), 751.
 — (*Formicarius*), 172.
 — (*Graucalus*), 297.
 — (*Harporhynchus*), 417.
 — (*Helminthophaga*), 432.
 — (*Loxigilla*), 613.
 — (*Pheucticus*), 612.
 — (*Pipilo*), 637.
 — (*Sterna*), 1017.
 — (*Strepera*), 501.
 — (*Zosterops*), 708.
crissoleuca (*Tridactylia*), 73.
cristata (*Anas*), 991.
 — (*Calyptura*), 218.
 — (*Cariama*), 924.
 — (*Chauna*), 979.
 — (*Corythæola*), 90.
 — (*Corythornis*), 113.
 — (*Coua*), 60.
 — (*Cyanocitta*), 511.
cristata (*Elaïnea*), 240, 1076.
 — (*Eucometis*), 655.
 — (*Fulica*), 977.
 — (*Fuligula*), 998.
 — (*Galerida*), 457.
cristata (*Gallicrex*), 974.
cristata (*Geolrygon*), 771.
 — (*Gubernatrix*), 620.
 — (*Guttera*), 805.
 — (*Lophostrix*), 886.
 — (*Lophotibis*), 902.
 — (*Oreocica*), 482.
 — (*Penelope*), 791.
cristata (*Pernis*), 865.
cristata (*Phœnicotheraupis*), 657.
 — (*Phyllomyias*), 238, 1076.
 — (*Pithys*), 173.
 — (*Terpsiphone*), 280.
cristatellus (*Acridotheres*), 538.
 — (*Coryphospingus*), 642.
cristatellus (*Serphophaga*), 235.
cristatellus (*Simorhynchus*), 1045.
cristatum (*Sphenostoma*), 469.
cristatus (*Bycanistes*), 101.
cristatus (*Cacatua*), 2.
cristatus (*Chrysoptilus*), 66.
 — (*Enneoctonus*), 485.
 — (*Eupsychortyx*), 819.
 — (*Furnarius*), 203.
 — (*Homorus*), 195.
cristatus (*Hydralector*), 958.
cristatus (*Lophophanes*), 465.
 — (*Malimbus*), 568.
cristatus (*Merganser*), 1003.
 — (*Opisthocomus*), 794.
cristatus (*Orthorhynchus*), 164.
cristatus (*Ostinops*), 550.
cristatus (*Pavo*), 794.
cristatus (*Phalacrocorax*), 1008.
cristatus (*Podicipes*), 1041.
 — (*Prionops*), 497.
 — (*Regulus*), 379.
 — (*Rhectes*), 495.
cristatus (*Rollulus*), 815.
cristatus (*Tachyphonus*), 656.
 — (*Thamnophilus*), 182.
cristatus (*Tyranniscus*), 239.
 — (*Vanellus*), 936.
crocea (*Ephthianura*), 376.
 — (*Rupicola*), 215.
croceus (*Macronyx*), 449.
croceus (*Perierocotus*), 301.
croconotus (*Heterhyphantes*), 565.
 — (*Icterus*), 558.
crocopygius (*Serinus*), 600.

- crossleyi* (Atelornis), 92.
 — (Geocichla), 404.
 — (Mystacornis), 314.
crotopezus (Turdus), 401.
crozellensis (Chionarchus), 780.
cruciger (Pyrrhuloxia), 459.
crudigularis (Arboricola), 813.
cruenta (Querula), 218,
 — (Urospizias), 843.
cruentata (Chalcomitra), 701
 — (Myzomela), 716.
 — (Pyrrhura), 13.
cruentatum (Dicæum), 676.
cruentatus (Melanerpes), 68.
cruentatus (Picus), 70.
cruentus (Analcipus), 528.
cruentus (Ithagenes), 796.
 — (Malaconotus), 489, 1103.
 — (Pelicinus), 491.
 — (Rhodospingus), 642.
crueniferus (Leptoptilus), 907.
cruvialis (Brachypteryx), 342.
 — (Cinclorhamphus), 361.
cruziana (Columbigallina), 764.
crypta (Thryomanes), 424.
crypterythra (Myiobius), 246.
cryptoleuca (Myrmecocichla), 391.
 — (Progne), 1079.
cryptoleucura (Oceanodroma), 1029.
cryptoleucus (Corvus), 502.
cryptolopha (Lathria), 213.
cryptopyrrha (Pæoptera), 546.
cryptopyrrhus (Turdus), 400.
cryptoxanthus (Myiobius), 246.
cryptoxanthus (Poicephalus), 9.
crysocolaptes (Todiostrostrum), 231.
cubana (Rallus), 930.
cubanensis (Antrostomus), 122.
 — (Colinus), 820.
cubicularis (Palæornis), 19.
cubla (Dryoscopus), 492.
cucullata (Ægialitis), 941.
 — (Butorapids), 663.
 — (Calliste), 666.
 — (Chrysomitris), 593.
 — (Crypsirhina), 508.
 — (Cyanolyca), 513.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Grallaricula), 169.
 — (Hirundo), 254.
cucullata (Nycticorax), 917.
cucullata (Paroaria), 642.
 — (Pitta), 208.
 — (Spermestes), 576.
cucullata (Spermophila), 616.
cucullatus (Ampelion), 215.
 — (Andigena), 43.
 — (Coryphospingus), 642.
 — (Graucalus), 296.
 — (Hyphantornis), 563.
 — (Lobivanellus), 934.
 — (Lophodytes), 1003.
 — (Pendulinus), 557.
 — (Phyllergates), 362.
cuculoides (Astur), 841.
 — (Baza), 867.
 — (Tænioglaux), 598.
cucui (Zosterops), 709.
cujubi (Cumana), 794.
culicivora (Gerygone), 269.
culicivorus (Basileuterus), 439.
culminata (Diomedea), 1038.
 — (Lalage), 303.
culminatus (Corvus), 503.
 — (Rhamphastos), 42.
cumanensis (Cumana), 793.
cumanensis (Grallaricula), 1068.
cumingi (Lepidogrammus), 60.
 — (Megapodius), 786.
cunningi (Saxicola), 359.
cunctata (Macropygia), 755.
cuneata (Geopelia), 762.
 — (Oreocincla), 403.
cuneatus (Glyphorhynchus), 190.
 — (Puffinus), 1031.
cuneicaudata (Strepera), 501.
cunicularia (Geositta), 204.
 — (Speotyto), 895.
cupido (Tympanuchus), 824.
cuprea (Carpophaga), 746.
cupreicauda (Saucerottea), 137.
cupreicaudus (Centropus), 57.
 — (Lamprocolius), 547.
cupreiceps (Eupherusa), 144.
cupreipennis (Aglæactis), 152, 1067.
cupreiventris (Eriocnemis), 154.
cupreonilens (Nectarinia), 694.
cupreus (Cinnyris), 697.
 — (Chrysococcyx), 53.
curasoensis (Pendulinus), 558.
curonicus (Ægialitis), 939.
curruca (Sylvia), 374.
cursitans (Cisticola), 364.
cursor (Coua), 60.
curtata (Siptornis), 199.
curvipennis (Sphenoproctus), 133.
curvirostra (Loxia), 605.
curvirostris (Andropadus), 313.
 — (Campylorhynchus), 420.
 — (Harporhynchus), 417.

- curvirostris* (Limnophyes), 196.
 — (Nothoprocta), 785.
 — (Rhamphococcyx), 59.
 — (Vanga), 499.
cuvieri (Aphantochroa), 134.
 — (Gennæus), 800.
 — (Hypotriorchis), 872.
 — (Rhamphastos), 42.
 — (Rongelius), 965.
 — (Talegallus), 788.
cyana (Monticola), 393.
 — (Cyanopica), 507.
 — (Pœcilodryas), 271.
cyanauchen (Lorius), 29.
cyanea (Arbeorhina), 689.
 — (Cyanospiza), 626.
 — (Eucichla), 209.
 — (Guiraca), 612.
 — (Hylocharis), 140, 1066.
 — (Irena), 317.
 — (Larvivora), 383.
cyanea (Muscitrea), 292.
cyanea (Platystira), 266.
cyaneiceps (Prioniturus), 17.
cyaneicollis (Agyrtia), 136.
 — (Calliste), 668.
 — (Galbula), 45.
cyaneifrons (Erythrura), 584.
cyaneiventris (Calliste), 665.
cyanella (Porphyraspiza), 627.
cyaneocapilla (Pipra), 221.
cyaneoviridis (Tachycineta), 256.
cyanescens (Calliste), 667.
 — (Cinnyris), 698.
 — (Guiraca), 612.
cyanescens (Halcyon), 107.
cyanescens (Zeocephus), 280.
cyaneum (Conirostrum), 686.
cyaneus (Circus), 835.
 — (Myiophoneus), 408.
 — (Malurus), 367.
 — (Parus), 464.
cyanicarpus (Geoffroyus), 1054.
cyaniceps (Rhipidura), 278.
cyanicollis (Geoffroyus), 17.
cyanicterus (Orthogonys), 658.
cyanifrons (Saucerottea), 137.
cyanipectus (Sternoclyta), 148.
cyanirostris (Ardea), 911.
cyanirostris (Cnipolegus), 229.
cyaniventris (Halcyon), 107.
 — (Ixidia), 308, 1085.
 — (Oligura), 343.
cyanocampter (Cossypha), 409.
cianocephala (Calospiza), 1111.
cianocephala (Cyanomyia), 138.
 — (Eudynamis), 54.
 — (Palaornis), 19.
 — (Starnoenas), 774.
 — (Tanagra), 662.
 — (Todopsis), 275.
 — (Gymnokitta), 515.
cianocephalum (Syrigma), 917.
cianocephalus (Monachalcyon), 105.
 — (Nycticorax), 917.
 — (Scolocophagus), 559.
 — (Uraginthus), 582.
cianochlamys (Malurus), 367.
cyanodorsalis (Euphonia), 671.
cyanodorsalis (Xanthoura), 514.
cyanogastra (Coracias), 93.
 — (Irena), 317.
 — (Triclaria), 7.
cyanogastra (Uraginthus), 582.
cyanogenys (Chlorestes), 140.
 — (Eos), 28.
cyanogrammus (Trichoglossus), 30.
cyanoides (Guiraca), 612.
cyanolæma (Cyanomitra), 702.
cyanolæmus (Aulacorhamphus), 44.
 — (Oxygogon), 159.
cyanoleuca (Atticora), 258.
 — (Halcyon), 107.
 — (Uroleuca), 515.
cyanolysea (Conurus), 11.
cyanomelas (Cyanocorax), 514.
 — (Rhinopomastus), 98.
 — (Tanagrella), 670.
 — (Trochocercus), 275.
cyanomelæna (Cyanoptila), 272.
cyanonota (Butorapis), 663.
 — (Geocichla), 405.
 — (Pitta), 209.
cyanonotum (Dicæum), 679.
cianopectus (Ceyx), 112.
cianopectus (Chenorhamphus), 275.
cianocephrys (Dacelo), 105.
cianocephrys (Merops), 97.
 — (Suthora), 471.
cianoepis (Oxypelia), 764.
cianopegon (Chloropsis), 318.
 — (Cyanocorax), 514.
cianoops (Sula), 1011.
cianoopsis (Pœcilodryas), 1080.
cianoptera (Calliste), 669.
 — (Compsocoma), 663.
 — (Pitta), 207.
 — (Querquedula), 992.
 — (Tanagra), 662.
cianopterus (Cyanochen), 986.

- cyanopterus* (Pyrrhura), 13.
cyanopus (Agelæus), 553.
 — (Numenius), 944.
cyanopygia (Calliste), 668.
 — (Psittacula), 15, 1053.
cyanopygius (Aprosmictus), 20.
cyanosticta (Melittophagus), 96, 1061.
cyanostigma (Corythornis), 113.
cyanotis (Aphelocoma), 512.
 — (Calliste), 668.
 — (Cittura), 105.
 — (Enlomyza), 725.
 — (Petasophora), 145.
 — (Xantholæma), 40.
cyanovirens (Erythrura), 583.
cyanura (Cyanorhamphus), 26.
 — (Eucichla), 209.
 — (Saucerottea), 138.
cyanuroptera (Siva), 347.
cyanurus (Tarsiger), 334.
cygnoides (Cygnopsis), 984.
cylindricus (Bycanistes), 101.
cyornithopsis (Callene), 1094.
cypereti (Rallus), 959.
cypria (Scops), 1117.
cyprioles (Anorthura), 1096.
 — (Parus), 462.
cyrenaica (Galerida), 1099.
dabryi (Æthopyga), 696.
dacotiæ (Pratincola), 387.
dactylisonans (Coturnix), 815.
daflaensis (Actinodura), 331.
daggetti (Sphyrapicus), 1058.
daguæ (Turdus), 401.
dahlî (Pachycephala), 476, 1102.
dahlî (Rhipidura), 279.
dalhousiæ (Psarisomus), 205.
damacensis (Tringa), 951.
damascena (Perdix), 812.
damarensis (Alopius), 104.
 — (Chalcomitra), 701.
 — (Chlorodyta), 354.
 — (Colius), 1060.
 — (Estrela), 1108.
 — (Irrisor), 1061.
 — (Mirafr), 456.
 — (Parus), 1100.
 — (Passer), 1109.
 — (Poicephalus), 9.
 — (Turtur), 760.
damii (Xenopirostris), 499.
dammeriana (Halcyon), 1062.
 — (Pachycephala), 476.
dampieri (Uroszipias), 842.
danæ (Tanyptera), 105.
danfordi (Picus), 72.
dannefaerdi (Miro), 270.
daphanea (Aquila), 851.
daphne (Chlorostilbon), 141.
darnaudi (Trachyphonus), 41.
darwini (Enneotonus), 1103.
 — (Geospiza), 608, 1110.
 — (Nothura), 785.
 — (Pucrasia), 801.
 — (Rhea), 1052.
 — (Tanagra), 662.
 — (Upocerthia), 1073.
dasytus (Chelidon), 256.
daubentoni (Crax), 790.
daulias (Microcerculus), 430.
dauma (Oreocincla), 403.
daurica (Anorthura), 427, 1096.
 — (Hirundo), 255.
 — (Perdix), 812.
daurica (Sturnia), 537.
dauricus (Colæus), 505.
dauidi (Alcippe), 345.
 — (Calliope), 383.
 — (Cyanoderma), 1088.
 — (Cygnus), 986.
dauidii (Luscinola), 371.
dauidi (Parus), 463.
 — (Pterorhinus), 320.
 — (Syrnium), 890.
dauidiana (Montifringilla), 595.
dauidiana (Pucrasia), 801.
dauidiana (Suthora), 471.
davisoni (Acanthopneuste), 377.
 — (Crotopsis), 307.
 — (Cryptolopha), 286, 1082.
 — (Gennæus), 800, 1115.
 — (Geocichla), 405.
davisoni (Gigantipitta), 207.
davisoni (Halcyon), 110.
 — (Hemixus), 315.
 — (Ibis), 901.
davisoni (Lioptila), 413.
davisoni (Megalaema), 39.
 — (Spilornis), 834.
 — (Strachyrhis), 339.
dea (Tanyptera), 106.
dealbata (Ægialitis), 940.
 — (Lanius), 1102.
debilirostris (Geospiza), 609.
debilis (Thamnophilus), 184.
 — (Turdus), 1093.
 — (Xenocichla), 310.
decipiens (Niltava), 295.
 — (Oriolus), 527.
 — (Rhectes), 494.

- decipiens* (Turtur), 760.
deckeni (Alophius), 103, 1062.
 — (Turdus), 399.
decollatus (Megapodius), 787.
decollatus (Phasianus), 802.
decolor (Leptoptila), 769.
decora (Dendroeca), 434, 1097.
 — (Paradisea), 518.
 — (Pipreola), 1074.
 — (Polyerata), 136.
decoratus (Pterocles), 777.
decumanus (Ostinops), 550.
decurtatus (Hylophilus), 474.
decussata (Stenopsis), 121.
dedekensi (Pomatorhinus), 326.
defilippiana (Estrelata), 1035.
defilippii (Lamprocolius), 547.
 — (Trupialis), 555.
degenera (Parus), 1101.
deglandi (Oedemia), 999.
deichleri (Galerida), 457.
 — (Turdus), 399.
deiroleucus (Hypotriorchis), 873.
dejeani (Cryptolopha), 285.
 — (Parus), 461.
 — (Rhabdochlamys), 351.
delalandei (Cephalolepis), 164.
 — (Coua), 60.
 — (Vinago), 732.
delamerei (Alæmon), 451.
 — (Estrela), 582.
delattrei (Lophornis), 165.
 — (Tachyphonus), 656.
delattreii (Basileuterus), 449.
delawarensis (Larus), 1025.
delegorguei (Coturuix), 816.
 — (Turturoena), 753.
delesserti (Garrulax), 328.
delicata (Dendroeca), 434.
 — (Gallinago), 953.
delicatula (Chalcopelia), 1115.
 — (Strix), 899.
 — (Zosterops), 710.
deliciosa (Psittacula), 1053.
deliciosus (Machæropterus), 222.
delphinæ (Petasophora), 145.
deltæ (Galerida), 458.
demersus (Spheniscus), 1048.
deminuta (Chalcomitra), 701.
demissa (Synallaxis), 197.
dendrocolaptoides (Clibanornis), 202.
denhami (Otis), 925.
dennistouni (Zosterornis), 339.
densirostris (Margarops), 414.
densus (Dicrurus), 531.
dentata (Malacothraupis), 655.
 — (Petronia), 597.
dentirostris (Geospiza), 608.
 — (Scenopæetes), 523.
depressirostris (Contopus), 249.
derbiana (Chauna), 979.
derbianus (Aulacorhampus), 44.
 — (Oreophasis), 791.
 — (Orthotomus), 361.
 — (Pitangus), 243.
derbyana (Palæornis), 19.
derbyi (Engyete), 153.
deroepstorfli (Strix), 899.
deserti (Ammomanes), 459.
deserti (Rhopophilus), 350.
deserti (Saxicola), 389.
deserticola (Amphispiza), 627.
deserticola (Lophortyx), 819.
deserticola (Tinnunculus), 871.
deserticolor (Galerida), 458.
deserticolus (Melizophilus), 375.
desertorum (Alæmon), 450.
 — (Buteo), 855.
 — (Caprimulgus), 1063.
desgodinsi (Malacias), 325.
desgodinsi (Tetraophasis), 806.
desmaresti (Calliste), 667.
 — (Cyclopsitta), 33.
 — (Phalacrocorax), 1008.
desmursi (Sylviorthishynchus), 201.
desolatus (Prion), 1037.
despecta (Colluricincla), 1104.
destructa (Formicarius), 172.
destructor (Cracticus), 501.
 — (Thrasaëtus), 848.
deva (Galerida), 458.
devillei (Arremon), 646.
 — (Brotogerys), 15.
 — (Dendrexetastes), 188.
 — (Pyrrhura), 14.
 — (Saucerottea), 138.
 — (Spizaëtus), 848.
devisi (Rhipidura), 276, 1081.
devittata (Lorius), 29.
devius (Dactylortyx), 821.
devronis (Neorhynchus), 614.
diabolica (Nigrita), 575.
diabolicus (Melæornis), 287.
diadema (Catamblyrhynchus), 618.
diadema (Chrysotis), 5.
diadema (Ochthoeca), 226.
diademata (Alethe), 410.
 — (Chrysotis), 5.
 — (Cyanocitta), 511.
 — (Glossopsitta), 31.

- diademata* (Pyromelana), 572.
 — (Yuhina), 346.
diadematum (Tricholema), 36.
diadematus (Catarrhactes), 1048.
 — (Henicurus), 450.
diadematus (Monarcha), 289.
dialilæma (Siphia), 292.
diamesus (Anous), 1019.
diana (Notodela), 384.
diaphora (Otocorys), 1009.
diardii (Acomus), 798.
diardi (Criniger), 311.
diardi (Diardigallus), 799.
diardi (Garrulax), 327.
 — (Harpactes), 88.
 — (Rhopodytes), 58.
diazii (Anas), 990.
dickinsoni (Dissodectes), 869.
dicksonii (Lyrurus), 826.
dicolorus (Rhamphastos), 43.
dichroa (Lamprocorax), 543.
dichroides (Lophophanes), 465.
dichrorhyncha (Pelargopsis), 114.
dichrourea (Helianthea), 151.
dichroureus (Enneoctonus), 487, 1103.
dichrous (Cyphorhinus), 429.
 — (Lophophanes), 465.
 — (Monarcha), 290.
dichrous (Puffinus), 1031.
dichrous (Rhectes), 494.
dicrocephalus (Hyphantornis), 563.
dicrorhynchus (Myiophoneus), 408.
dicruriformis (Dissemuropsis), 532.
didyma (Pteroglossus), 43.
dieffenbachii (Cabalus), 962.
diemenensis (Acanthiza), 366.
 — (Rhipidura), 276.
dierythra (Nesomimus), 1095.
diesingi (Cyanocorax), 514.
differens (Turdus), 1093.
difficilis (Empidonax), 1078.
 — (Geospiza), 608.
 — (Graucalus), 297.
diffusus (Oriolus), 525.
diffusus (Passer), 598.
digglei (Pitta), 209.
dignissima (Thamnocharis), 171.
dignus (Eleopicus), 76.
dilectissima (Urochroma), 8.
dillwynni (Ceyx), 111.
dilophus (Phalacrocorax), 1008.
diluta (Atlapetes), 636.
 — (Cotyle), 257.
 — (Otocorys), 1098.
 — (Passer), 597.
diluta (Rhipidura), 278.
diluta (Saxicola), 389.
dilutior (Arachnothera), 705.
dilutus (Dendrotyx), 818.
dimidiata (Aulacorhampus), 44.
 — (Hirundo), 254.
dimidiata (Sarothrura), 970.
dimidiatus (Hyphantornis), 562.
 — (Monarcha), 289.
 — (Rhamphocelus), 660.
dimorpha (Batis), 265.
 — (Ninox), 888.
dinemelli (Dinemellia), 570.
diodon (Harpagus), 868.
diophthahna (Cyclopsitta), 33.
diops (Halcyon), 108.
 — (Hemitriccus), 234.
 — (Ptilotis), 721.
discolor (Cathia), 684.
 — (Cisticola), 364.
 — (Colluricincla), 496.
 — (Dendroeca), 434.
 — (Dendrocygna), 988.
 — (Leptosoma), 91.
 — (Nanodes), 27.
 — (Pachycephalopsis), 1102.
 — (Phænicothraupis), 1111.
discors (Querquedula), 992.
discurus (Prioniturus), 17.
dispar (Chloëphaga), 985.
dispar (Cisticola), 363.
 — (Coracias), 92, 1060.
 — (Edolisoma), 298.
 — (Rubigula), 308.
dispar (Somateria), 1000.
dissaëpta (Cistothorus), 1095.
dissentiens (Cyrstostomus), 703.
dissimilis (Crypturus), 784.
 — (Psephotus), 1054.
districta (Metallura), 1067.
disturbans (Androphilus), 1087.
divaga (Monarcha), 289.
diversa (Ammodramus), 1110.
dives (Grallaria), 170.
dixonii (Oreocincla), 404.
djampeana (Cacatua), 2.
 — (Siphia), 293.
 — (Trichoglossus), 30.
dobsoni (Graucalus), 298.
docilis (Palæornis), 19.
dodsoni (Cisticola), 365.
 — (Lanius), 484, 1103.
 — (Edicnemus), 928.
 — (Pycnonotus), 305.
doerriesi (Pseudopteryx), 882.

- doerriesi* (Yungipicus), 74.
doggetti (Chalcomitra), 1112.
dohertyi (Cosmophoneus), 1104.
 — (Dierurus), 1105.
 — (Edoliisoma), 298.
 — (Geocichla), 405.
 — (Lophozosterops), 713.
 — (Nigrita), 1108.
 — (Pitta), 209.
 — (Ptilopus), 736.
 — (Rhectes), 1104.
dohrni (Cuphopterus), 496.
 — (Glaucis), 131.
dolei (Chasiempis), 270, 1080.
 — (Palmeria), 692.
doliatus (Thamnophilus), 182.
dombeyi (Baryphthengus), 95.
domestica (Progne), 259.
domesticus (Passer), 597.
 — (Troglodytes), 425, 1096.
domicella (Hirundo), 255, 1079.
 — (Lorius), 29.
dominica (Dendroeca), 434.
dominica (Lalage), 302.
dominica (Mimus), 415.
dominicæ (Coccyzus), 54.
dominicana (Cereba), 691.
 — (Loxigilla), 613.
 — (Myiadectes), 407.
 — (Paroaria), 642.
 — (Tænioptera), 225.
dominicanus (Larus), 1024.
dominicensis (Chrysotis), 6.
 — (Ciccaba), 893.
dominicensis (Cichlherminia), 403.
 — (Loximitris), 593.
 — (Edicnemus), 928.
 — (Myiarchus), 251.
 — (Pendulinus), 557.
 — (Progne), 259.
 — (Saurothera), 57.
 — (Speotyto), 895.
 — (Tinnunculus), 871.
 — (Tyrannus), 252.
dominicus (Coccyzus), 54.
dominicus (Charadrius), 937.
 — (Dulus), 261.
 — (Lampornis), 146.
 — (Nomonyx), 1001.
 — (Podicipes), 1040.
donaldsoni (Caprimulgus), 123.
 — (Colius), 91.
 — (Cossypha), 409.
 — (Ploceipasser), 569.
 — (Serinus), 600.
donaldsoni (Turacus), 1060.
dorcadichroa (Camaroptera), 357, 1089.
 — (Cryptolopha), 1082.
doreya (Macropygia), 755.
doriæ (Erythrotriorchis), 847.
doris (Tanysiptera), 106.
dorsalæ (Rhamphomicron), 158.
dorsale (Dicæum), 679.
dorsalis (Acredula), 467.
 — (Aprosmictus), 21.
 — (Automolus), 195.
 — (Conopophaga), 169.
 — (Geoffroyus), 17.
 — (Gerygone), 268.
 — (Gymnorhina), 500.
 — (Junco), 629.
 — (Lanius), 484.
 — (Mimus), 415.
 — (Phacelodonus), 196.
 — (Philæterus), 575.
 — (Rhamphocœlus), 660.
 — (Tridactylia), 73, 1058.
dorsalis (Zosterops), 712.
dorsimaculatus (Herpsilochmus), 178.
dorsoimmaculatus (Xiphorhynchus), 186.
dorsomaculatus (Heterhyphantes), 565.
dorsostriatus (Serinus), 601.
doubledayi (Phæoptila), 139.
dougalli (Sterna), 1015.
douglasi (Lophortyx), 819.
douraca (Turtur), 761.
dowi (Calliste), 667.
draschi (Rectes), 299.
dresseri (Pipilopsis), 649.
 — (Somateria), 1000.
drownei (Certhidea), 689.
dryas (Catharus), 394.
 — (Halcyon), 107.
 — (Rhipidura), 278.
drymæca (Thryomanes), 424.
dthalæ (Fringillaria), 1110.
dubia (Ægialitis), 939.
 — (Cercomela), 391.
 — (Dysithamnus), 180.
 — (Gallinago), 954.
 — (Geospiza), 608.
 — (Gracula), 539.
dubia (Lophoceros), 103.
dubia (Minla), 344.
 — (Motacilla), 444.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Philetonoma), 282.
 — (Pipra), 1074.
 — (Pyrocephalus), 1077.
dubiosus (Laniarius), 492.

- dubium* (Scissirostrum), 548.
dubius (Aegotheles), 116.
 — (Amydrus), 515.
 — (Carpodacus), 604.
 — (Centurus), 69.
dubius (Heliangelus), 155.
dubius (Leptoptilus), 907.
dubius (Merula), 397.
dubius (Pogonorhynchus), 35.
dubius (Proparus), 344.
 — (Pyrocephalus), 246.
dubois (Hyphantornis), 562.
 — (Mascarinus), 18.
dubusia (Iridornis), 664.
dubusi (Amazilia), 138, 1065.
dubusi (Pendulinus), 558.
dubusii (Chlorochrysa), 669.
duchailui (Barbatula), 37.
ducorsi (Cacatua), 3.
dufresneana (Chrysotis), 5.
dufresnii (Coccyzygia), 580.
dugesi (Basileuterus), 439.
 — (Dendroeca), 433, 1096.
dukhunensis (Calandrella), 453.
dulitensis (Harpactes), 88.
 — (Rhizothera), 811.
dumasi (Geocichla), 1094.
 — (Phyllergates), 362.
dumerili (Amazilia), 138.
dumetoria (Erythromyias), 267.
 — (Upucerthia), 203.
dumetorum (Acrocephalus), 369.
dumicola (Poliophtila), 380.
dumonti (Mino), 540.
dunstalli (Rhamphocelus), 660.
duperreyi (Megapodius), 787.
dupetit-thouarsi (Ptilopus), 736.
duplexa (Pendulinus), 1106.
duponti (Certhilauda), 450.
 — (Tilmatura), 162.
durnfordi (Hematopus), 932.
dussumieri (Cyanomitra), 702.
 — (Turnix), 778.
 — (Turtur), 760.
duvauceli (Harpactes), 88.
duvauceli (Pucrasia), 801.
duvauceli (Xantholoma), 39.
duyenbodei (Elthopyga), 696.
 — (Chalcopsitta), 28.
 — (Parotia), 522.
 — (Parypophorus), 521.
dybowskii (Acrocephalus), 369.
 — (Engyete), 153.
 — (Francolinus), 810.
 — (Hypargus), 579.
dybowskii (Otis), 925.
dyscola (Mionectes), 1076.
dyscelius (Eriocnemis), 154.
dysoni (Bucco), 47.
dytiscivorus (Caprimulgus), 124.
earlii (Argya), 323.
earli (Ocydrampus), 964.
eatonii (Dafila), 994.
eburnea (Pagophila), 1026.
eburneirostris (Dendroornis), 189, 1071.
ecaadata (Pennula), 969.
ecaadatus (Helotarsus), 835.
 — (Orchilus), 234.
eckloni (Sitta), 680.
eclipses (Argya), 323.
edela (Sutoria), 361.
edithae (Corvus), 503, 1104.
edoliiformis (Dissemuopsis), 532.
edolioides (Melaenornis), 286.
edouardi (Guttera), 805.
 — (Malurus), 1090.
eduardi (Tylas), 316.
Edwardi (Saucerottea), 137.
edwardsi (Buthraupis), 663.
 — (Carpodacus), 603.
 — (Casuaris), 1051.
 — (Cyclopsitta), 33.
edwardsi (Euphema), 26.
edwardsi (Eupodotis), 927.
 — (Gennæus), 800.
 — (Manacus), 1074.
 — (Nilas), 488.
 — (Porphyrio), 976.
egertoni (Actinodura), 330.
egregia (Crex), 967.
 — (Chlorostilbon), 1066.
 — (Dacnis), 688.
 — (Eupherusa), 144.
 — (Pyrrhura), 13.
egretta (Herodias), 912.
eichhorni (Myzomela), 1113.
eimeensis (Phlogœnas), 773.
elæagni (Enneactonus), 487, 1103.
elæoprurus (Pipilopsis), 649.
elaopteryx (Terenura), 177.
elata (Ceratogymna), 101.
elatus (Tyrannulus), 238.
elconensis (Francolinus), 809.
elegans (Alopius), 104.
elegans (Ardeola), 913.
elegans (Asturina), 859.
 — (Buteo), 857.
 — (Calopezus), 786.
 — (Carduelis), 591.
 — (Celeus), 79.

- elegans* (Cistothorus), 425, 1095.
elegans (Dendrorhina), 190.
 — (Emberiza), 621.
 — (Eremomela), 356.
 — (Euphema), 26.
 — (Graucalus), 295, 1084.
 — (Hypocnemis), 174.
elegans (Hypoxanthus), 63.
elegans (Lanius), 484, 1103.
 — (Leptopæcile), 379.
 — (Lyncornis), 1063.
 — (Malurus), 368.
 — (Mimus), 415.
 — (Parus), 461.
 — (Pericrocotus), 301, 1084.
 — (Phaps), 767.
 — (Phasianus), 802.
 — (Pipreola), 216.
 — (Platycecus), 24.
 — (Psittospiza), 646.
elegans (Puffinus), 1032.
elegans (Rallus), 959.
 — (Sarothrura), 969.
 — (Saucerottia), 137.
 — (Scops), 883.
 — (Siphia), 292.
 — (Sporadinus), 142.
 — (Sterna), 1016.
 — (Trogon), 86.
elegantior (Synallaxis), 197.
elegantissima (Euphonia), 672.
elegantula (Rhipidura), 277.
eleonoræ (Cacatua), 2.
eleonoræ (Hypotrionchis), 872.
 — (Poliolais), 1089.
elgini (Spilornis), 834.
elgonensis (Amydrus), 545.
 — (Trachyphonus), 41.
 — (Turdus), 399.
eliciæ (Hylocharis), 140.
elisabethæ (Halcyon), 1062.
elizabethæ (Malurus), 1090.
 — (Myiadectes), 407.
elizæ (Cryptospiza), 1108.
 — (Doricha), 162.
 — (Estrela), 1108.
ellæ (Irena), 317.
ellenbecki (Prodotiscus), 1055.
elliotti (Atthis), 163.
 — (Eucichla), 209.
 — (Falcinellus), 520.
 — (Galerida), 457.
 — (Mesopicus), 77.
 — (Phasianus), 803.
 — (Porphyrio), 976.
elliotti (Tanyptera), 106.
 — (Trochalopteron), 321.
ellisia (Ellisia), 351.
ellisianus (Hemignathus), 693.
elongatus (Rhopodytes), 58.
elopurensis (Siphia), 293.
elphinstonei (Columba), 752.
eluta (Columbigallina), 1114.
elwesi (Otocorys), 1099.
emancipatum (Edolisoma), 298.
emeria (Otocompsa), 304.
emeu (Casuarius), 1050.
emigraus (Xiphocolaptes), 188, 1071.
emiliæ (Calospiza), 1112.
 — (Nigrita), 575.
 — (Phaethornis), 132.
 — (Tanyptera), 106.
 — (Zosterops), 713.
emiliana (Macropygia), 755.
emilii (Melidectes), 727.
eminentissima (Foudia), 566.
emini (Baza), 867.
 — (Cisticola), 363.
emini (Excalfactoria), 817.
emini (Glareola), 930.
 — (Heterhyphantus), 565.
 — (Hirundo), 255.
 — (Passer), 598.
 — (Philaterus), 575.
 — (Pytelia), 578.
 — (Salpornis), 684.
 — (Telephonus), 488.
 — (Terpsiphone), 281.
 — (Trachyphonus), 41.
 — (Turacus), 89.
emma (Pyrrhura), 13.
emmæ (Cyanolesbia), 157.
 — (Pratincola), 387.
 — (Urochroma), 8.
emphanum (Polyplectron), 796.
emprichii (Alopius), 103.
enarratus (Caprimulgus), 124.
enca (Corvus), 504.
enganensis (Gracula), 539.
 — (Graucalus), 297.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Siphia), 292, 1053.
ensiferus (Docimastes), 152.
ensipennis (Campylopterus), 134.
enthymia (Otocorys), 1099.
entylotus (Euptilosus), 1085.
enucleator (Pinicola), 606.
eoæ (Dendroeca), 433.
eogaster (Pogonorhynchus), 35.
eos (Helianthea), 151.

- epauletta* (Pyrrhoptes), 602.
ephippiorhyncha (Ehippiorhynchus), 907.
epichlora (Burnesia), 360.
epilepidotus (Turdinulus), 332.
epirhina (Lophoceros), 103.
episcopalis (Rhipidura), 278.
episcopus (Dissoura), 906.
 — (Phaethornis), 133.
 — (Tanagra), 661.
epomidis (Centropus), 56.
epops (Upupa), 99.
epulata (Alseonax), 264.
eques (Myzomela), 716.
 — (Palæornis), 19.
 — (Penthetria), 573.
erckeli (Francolinus), 810.
eremita (Geronticus), 901.
eremita (Megapodius), 787, 1115.
 — (Nesocichla), 406.
eremophila (Thryomanes), 424.
eriphile (Thalaurania), 143.
erithachorides (Dendroeca), 1097.
erithacus (Liosceles), 167.
 — (Psittacus), 3.
 — (Pyrrhula), 607.
 — (Siphia), 293.
 — (Sittasomus), 190.
erlangeri (Chalcopelia), 1114.
 — (Falco), 1116.
ermanni (Turtur), 762.
ernesti (Falco), 874.
 — (Pinarochroa), 388.
 — (Strix), 899.
erromangæ (Rhipidura), 276.
erubescens (Phaeton), 1004.
erythraea (Saxicola), 390.
erythræus (Phœnicopterus), 908.
erythrauchen (Accipiter), 846.
erythraea (Dryoscopus), 492.
 — (Poicephalus), 9, 1053.
erythrina (Myzomela), 716.
erythrinus (Carpodacus), 602.
erythrocampa (Scops), 884.
erythrocephala (Acredula), 466.
 — (Amadina), 579.
 — (Cisticola), 364.
erythrocephala (Foudia), 566.
erythrocephala (Myzomela), 715.
erythrocephala (Pipra), 221.
erythrocephala (Pyrrhula), 607.
erythrocephala (Pyrrhula), 607.
erythrocephalum (Trochalopteron), 321.
erythrocephalus (Chrysocolaptes), 80.
 — (Harpactes), 88.
 — (Melanerpes), 68.
erythrocephalus (Trachyphonus), 40.
erythrocerus (Philydor), 194.
erythroceria (Cinnyris), 698.
erythrochlamys (Ammomanes), 459.
erythrocnemis (Accipiter), 846.
 — (Pomatorhinus), 326.
erythrogaster (Laniarius), 492.
 — (Malimbus), 568.
erythrogastra (Halcyon), 107.
 — (Hirundo), 253.
 — (Monticola), 393.
erythrogastra (Petroeca), 266.
erythrogastra (Pitta), 208.
 — (Ruticilla), 385.
erythrogenys (Cisticola), 365.
 — (Conurus), 11.
 — (Microhierax), 868.
 — (Pomatorhinus), 326.
erythrogina (Brachypteryx), 342.
erythrognaetha (Crax), 789.
erythrognaethus (Aulacorhamphus), 44.
 — (Rhamphococcyx), 59.
erythroloema (Trochalopteron), 321.
erythroleuca (Grallaria), 170.
erythrolophus (Turacus), 89.
erythromelæna (Pyrrhula), 607.
erythromelas (Ardeotis), 914.
 — (Myzomela), 714.
 — (Pitylus), 643.
erythromelon (Colius), 91.
erythronota (Barbatula), 37.
 — (Estrela), 582.
 — (Geocichla), 404.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Rhipidura), 277.
 — (Ruticilla), 385.
 — (Saucerottea), 137, 1065.
erythronotum (Cyanoderma), 343.
erythronotus (Anthus), 446.
erythronotus (Brachypterus), 78.
 — (Buteo), 857.
 — (Cyanorhamphus), 26.
 — (Lanius), 485.
 — (Philydor), 194.
 — (Phrygilus), 641.
erythropareia (Geotrygon), 771.
erythropeplus (Platycercus), 24.
erythrophrys (Arboricola), 814.
erythrophrys (Enodes), 548.
 — (Poospiza), 628.
 — (Turtur), 760.
erythrophthalma (Æthya), 997.
 — (Thripophaga), 195.
erythrophthalmus (Acomus), 798.
 — (Coccyzus), 54.

- erythrophthalmus (Pipilo), 636.
 erythropleura (Ptilotis), 722.
erythropleura (Suya), 358.
 erythropleura (Zosterops), 706.
 erythropleurus (Turdus), 400.
 erythrops (Geophleus), 82.
 erythropsis (Chloronerpes), 65.
 erythrops (Cisticola), 363.
 — (Climacteris), 685.
 — (Leptopogon), 237.
 — (Myiagra), 283.
 — (Odontophorus), 822.
 — (Porzana), 969.
 — (Quelea), 571.
 — (Siptornis), 199.
 erythroptera (Cercotrichas), 413.
 — (Cisticola), 363.
 — (Mirafr), 456.
 — (Myiozetetes), 241.
 — (Ortalia), 793.
 — (Phlogoenas), 773.
 — (Phlogopsis), 172.
 — (Terpsiphone), 281.
 erythropterum (Cyanoderma), 342.
 erythropterus (Philydor), 193.
 — (Pterythriss), 487.
 — (Ptistes), 20.
 — (Telephonus), 488.
 erythropus (Accipiter), 845.
 — (Anser), 983.
 — (Crypturus), 783.
 erythropygia (Accentor), 381.
 — (Dendroornis), 189.
 — (Hirundo), 255.
 — (Mirafr), 456.
 erythropygium (Edolisoma), 299.
 erythropygius (Gecinus), 64.
 — (Myiotheretes), 225.
 — (Pericrocotus), 302.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Spodiopsar), 536.
 erythropygus (Morococcyx), 61.
 erythrorhyncha (Buphaga), 549.
 — (Dafila), 994.
 — (Irrisor), 98.
 — (Microperdix), 813.
 — (Urocissa), 507.
 erythrorhynchum (Dicæum), 679.
 erythrorhynchus (Alopius), 104.
 — (Pelecanus), 1006.
 erythrostieta (Poniarea), 291.
 erythrothorax (Baza), 867.
erythrothorax (Coturnicops), 970.
 erythrothorax (Dicæum), 678.
 — (Gymnopelia), 763.
 erythrothorax (Lorius), 29.
 — (Rallina), 966.
 — (Stiphornis), 358.
 — (Synallaxis), 199.
erythrote (Malac.), 334.
 erythrotis (Cyanorhamphus), 26.
 — (Grallaria), 170.
 — (Merula), 396.
 erythrura (Myrmotherula), 179.
 erythrurus (Myiobius), 245.
 esculenta (Collocalia), 130.
 esslingi (Nestor), 27.
 estellæ (Oreotrochilus), 147.
 etorques (Urospizias), 842.
 encharis (Psilidoprymna), 158.
 euchloris (Chlorostilbon), 142.
 euchlorus (Passer), 599.
 euchrysea (Hirundo), 255.
euerythra (Ceyx), 111.
 eugenei (Myiophoneus), 408.
 eugenia (Andropadus), 313.
 eugeniæ (Ptilopus), 741.
 euleri (Coccyzus), 1056.
 eulophotes (Herodias), 912.
 eumegethes (Phalacrocorax), 1009.
 euophrys (Basileuterus), 439.
 — (Philydor), 1072.
 — (Thryothorus), 423.
 euops (Conurus), 12.
 eupatria (Palæornis), 18.
 eupogon (Metallura), 156.
 euptilosa (Pinarocichla), 307.
 eurhina (Totanus), 948.
 eurhythma (Ardetta), 914.
 europæa (Miliaria), 623.
 — (Pyrrhula), 607.
 — (Sitta), 680.
europæus (Anorthura), 427.
europæus (Caprimulgus), 122.
europæus (Lanius), 1102.
 — (Scops), 882.
 eurycricota (Zosterops), 710.
 eurygnatha (Sterna), 1016.
 eurynome (Phaethornis), 132.
 euryptera (Opisthoprora), 156.
 eurystomina (Pseudochelidon), 534.
 euryura (Rhipidura), 278.
 euryzona (Alcedo), 113.
 — (Merula), 397.
euryzona (Rallina), 965.
 euryzonoides (Rallina), 966.
 euteles (Trichoglossus), 31.
eutolmus (Microhierax), 868.
 eutrepatorhyncha (Pelargopsis), 114.
 eva (Helianthea), 151.

- evelynæ (Philodice), 161.
everetti (Acanthopneuste), 377.
everetti (Androphilus), 335.
everetti (Arachnothera), 705.
— (Cettia), 372.
— (Dicaeum), 679.
— (Edoliisoma), 299.
— (Eudynamis), 1057.
— (Geocichla), 405.
— (Gerygone), 268.
— (Iole), 312.
— (Mixornis), 340.
— (Monarcha), 289.
— (Ninox), 888.
— (Orthnocichla), 430.
— (Osmotreron), 733.
— (Pachycephala), 477.
everetti (Pitta), 207.
everetti (Phyllergates), 362.
— (Pnoepyga), 430.
— (Prionochilus), 675.
— (Pseudoxenicus), 1088.
— (Ptilopus), 735.
— (Rhytidoceros), 102.
everetti (Sasia), 85.
everetti (Scops), 885.
— (Siphia), 292.
— (Staphidia), 344.
— (Tanygnathus), 18.
— (Tiga), 78.
— (Turnix), 779.
— (Uroloncha), 586.
— (Zosterops), 707.
eversmanni (Columba), 749.
— (Lagopus), 827.
evura (Parus), 464.
ewingii (Acanthiza), 366.
ewingi (Ptilopus), 737.
examinata (Pachycephala), 480.
exaratus (Hydrocissa), 103.
excellens (Cyrtostomus), 703.
excellens (Tigrisornis), 919.
excelsa (Grallaria), 171.
excelsior (Upucerthia), 203.
— (Yungipicus), 75.
excubitor (Lanius), 483.
excubitorius (Lanius), 484.
excubitoroides (Lanius), 484, 1103.
exelsa (Parus), 1100.
exigua (Geothlypis), 1097.
exile (Calopteryx), 234.
exilipes (Cannabina), 590.
exilis (Ardetta), 914.
— (Cisticola), 364.
exilis (Creciscus), 971.
exilis (Indicator), 34.
— (Loriculus), 23.
— (Orthorhynchus), 164.
exilis (Picumnus), 84.
exilis (Psaltia), 466.
eximia (Æthopyga), 695.
— (Buthraupis), 663.
— (Diomedea), 1039.
— (Eupherusa), 144.
— (Rhodinocichla), 1095.
— (Xantholæma), 40.
eximium (Dicaeum), 678.
eximius (Caprimulgus), 124.
— (Criniger), 311.
— (Platycercus), 24.
— (Pogonotriccus), 235.
— (Vireolanius), 475.
exortis (Heliangelus), 155.
explorator (Geoffroyus), 1054.
— (Monticola), 393.
— (Zosterops), 706.
exquisita (Coturnicops), 970.
exquisita (Psittacula), 15.
exsertus (Automolus), 1072.
exsul (Buteo), 857.
— (Chlorophanes), 689.
— (Gymnophaps), 1114.
— (Halodroma), 1037.
— (Hypotaenidia), 961.
— (Myrmelastes), 181.
— (Nesopelia), 758.
— (Palæornis), 19.
— (Pericrocotus), 301.
— (Tiga), 1059.
— (Turdinulus), 332.
extensicauda (Prinia), 359.
externa (Estrelata), 1035.
extoni (Barbatula), 37.
exulans (Diomedea), 1038.
exustus (Pteroclorus), 777.
eytoni (Dendrocygna), 988.
— (Dendroornis), 189.
— (Lamprotornis), 544.
fabalis (Anser), 983.
faber (Megalema), 39.
faceta (Pyrranga), 658.
facialis (Creciscus), 972.
— (Eudynamis), 1057.
fagani (Serinus), 601.
fairbanki (Trochalopteron), 322.
fairchildi (Pezoporus), 1054.
falcata (Eunetta), 991.
— (Pachycephala), 478.
— (Ptilocichla), 331.
falcifer (Pipilo), 1111.

- falcinella* (Picolaptes), 187.
falcinellus (Plegadis), 903.
falcistrotris (Spermophilopsis), 614.
falcularius (Xiphorhynchus), 187.
falkensteini (Cinnyris), 698.
 — (Griniger), 311.
 — (Saxicola), 390.
falklandica (Ægialitis), 941.
 — (Rhinogryphus), 828.
 — (Trupialis), 555.
falklandicus (Turdus), 400.
fallax (Ceycopsis), 111, 1062.
fallax (Columba), 750.
fallax (Elainea), 240.
 — (Glycyhæra), 717.
 — (Lanius), 484.
 — (Leucippus), 135.
 — (Melospiza), 633.
 — (Rhipidura), 277, 1081.
familare (Haplopteron), 1084.
familiaris (Agrobates), 374.
 — (Certhia), 683.
 — (Prinia), 358.
famosa (Nectarinia), 694.
fannini (Ardea), 1117.
fannyæ (Myrtis), 161.
 — (Thalurania), 143.
fannyi (Thalurania), 1066.
fantensis (Anthreptes), 704.
fantisiensis (Alseonax), 264.
farinosa (Chrysotis), 4.
farquhari (Carpophaga), 743.
 — (Halcyon), 1062.
fasciata (Amadina), 579.
 — (Atticora), 257.
 — (Chamaea), 469.
 — (Columba), 751.
 — (Diucopis), 646.
 — (Glycyphila), 717.
 — (Melospiza), 632.
 — (Palæornis), 19.
 — (Pipra), 221.
 — (Rallina), 965.
 — (Salpinctes), 427.
 — (Turnix), 778.
fasciatiiventris (Pulsatrix), 892.
 — (Thryothorus), 422.
fasciatum (Tigrisoma), 919.
fasciatus (Campylorhynchus), 421.
 — (Eutolmaëtus), 850.
 — (Harpactes), 88.
 — (Harpagus), 868.
 — (Lophoceros), 103.
 — (Philorhynchus), 819.
 — (Pterocles), 777.
fasciatus (Ptilopus), 737.
fasciinucha (Hypotriorchis), 872.
fasciopygialis (Centropus), 57.
fasciiventris (Parus), 462.
fascinans (Microeca), 263.
fasciogularis (Ptilotis), 721.
fasciolata (Crax), 789.
 — (Locustella), 370.
fasciolatus (Calamonastes), 352.
 — (Circæetus), 833.
fasciolatus (Huhua), 882.
fastuosa (Calliste), 665.
fatigata (Geospiza), 609.
feadensis (Lamprocorax), 542.
feæ (Indicator), 1055.
 — (Merula), 398.
 — (Estrelata), 1034.
 — (Scops), 1117.
 — (Suthora), 471.
 — (Zosterops), 1113.
featherstoni (Phalacrocorax), 1007.
fedoa (Limosa), 946.
feldeggii (Falco), 875.
feldeni (Thriponax), 82.
feliciæ (Picus), 70.
feliciæ (Saucerottea), 137.
felivox (Galeoscoptes), 415.
felix (Thryothorus), 423.
feminina (Myiagra), 1082.
femoralis (Hypotriorchis), 873.
 — (Numenius), 945.
femoralis (Pholidauges), 541.
 — (Scytalopus), 167.
fenicheli (Arses), 288.
fergussonis (Melilestes), 718.
ferina (Æthya), 996.
fernandensis (Eustephianus), 157.
fernandezianus (Anæretes), 236.
fernandinæ (Nesocoleus), 79.
 — (Teretistris), 438.
ferox (Buteo), 855.
 — (Glaucidium), 896.
 — (Myiarchus), 250, 1078.
ferrago (Turtur), 759.
ferrea (Oreicola), 273.
ferreirostris (Chaunoproctus), 610.
ferrocyanæa (Myiagra), 283, 1082.
ferruginea (Æthya), 997.
ferruginea (Ammomanes), 459.
 — (Cisticola), 363.
 — (Erismatura), 1001.
 — (Formicivora), 177.
ferruginea (Glaucidium), 896.
 — (Gymnocichla), 175.
ferruginea (Hemichelidon), 262.

- ferruginea* (Hirundinea), 244.
 — (Lophophaps), 768.
 — (Phlogœnas), 773.
ferrugineiceps (Myiobius), 246.
ferrugineifrons (Brotogerys), 15.
 — (Hylophilus), 474.
ferrugineipectus (Grallaricula), 169.
ferrugineiventre (Conirostrum), 687.
ferrugineus (Archibuteo), 854.
 — (Coccyzus), 53.
 — (Gallus), 803.
 — (Laniarius), 491.
 — (Microsittace), 13.
 — (Rhectes), 495.
 — (Scoleophagus), 559.
ferruginolentus (Automolus), 194.
ferruginosa (Munia), 588.
ferruginosus (Pomatorhinus), 325.
ferus (Anser), 982.
 — (Cygnus), 986.
fervida (Accentor), 381.
fervidus (Caprimulgus), 123.
festæ (Rhamphocœlus), 660.
festatus (Pharomacrus), 1059.
festiva (Calliste), 665.
 — (Chrysotis), 6.
festivus (Chrysocolaptes), 80.
fiber (Sula), 1011.
ficedulina (Zosterops), 711.
fidelis (Chauna), 979.
fidelis (Eleopicus), 76.
fieldi (Hyetornis), 57.
 — (Tinnunculus), 870.
figlina (Pyranga), 658.
figulus (Furnarius), 203.
filamentosus (Phalacrocorax), 1007.
filholi (Catarrhactes), 1018.
filicauda (Circus), 220.
filicum (Ellisia), 351.
filifera (Hirundo), 254.
filigera (Ptilotis), 721.
fimbriata (Lalage), 303.
finlaysoni (Crotopsis), 306.
finschi (Rutalis), 262.
 — (Carpophaga), 746.
 — (Cassinia), 295.
 — (Chrysotis), 5.
 — (Conurus), 12.
 — (Criniger), 311.
 — (Euphonia), 672.
 — (Francolinus), 809.
finschi (Hæmatopus), 932.
finschi (Hyphantornis), 1107.
 — (Nasiterna), 23.
 — (Pachycephala), 477.
finschi (Palæornis), 19.
 — (Paradisea), 518.
 — (Pitta), 209.
 — (Rhipidura), 279, 1081.
 — (Trichostoma), 333.
 — (Turacus), 1060.
 — (Zosterops), 713.
finschii (Phalacrocorax), 1010.
 — (Scotornis), 120.
fischeri (Agapornis), 22.
 — (Barbatula), 38.
fischeri (Calamonastes), 352.
fischei (Centropus), 57.
 — (Cisticola), 365.
 — (Dioptrornis), 287.
 — (Elæocerthia), 702.
 — (Francolinus), 810.
 — (Geocichla), 1094.
 — (Hyphantornis), 562.
 — (Lampronetta), 1000.
 — (Mirafrax), 455.
 — (Pholidauges), 544.
 — (Phyllostrophus), 314.
 — (Ptilopus), 735.
 — (Sylviella), 355.
 — (Turacus), 89.
 — (Vidua), 574.
fisheri (Ammodromus), 631.
 — (Glaucidium), 896.
 — (Oestrelala), 1035.
fissilis (Thalaurania), 1066.
fissipes (Hydrochelidon), 1043.
fistularis (Mareca), 992.
fistulator (Pholidophalus), 101.
fitzgeraldi (Upocerthia), 1073.
flabellifera (Rhipidura), 276.
flabelliformis (Cacomantis), 52.
flagrans (Cyrtostomus), 703.
 — (Harpactes), 88.
flammaxillaris (Cyrtostomus), 703.
flammea (Loxops), 594.
 — (Pyranga), 659, 1111.
 — (Setophaga), 441.
 — (Strix), 898.
flammeola (Psiloscops), 887.
flammeum (Dicæum), 676.
flammeus (Pericrocotus), 301.
flammiceps (Egithalus), 468.
 — (Oxyrhamphus), 224.
 — (Pyromelana), 571.
flammifer (Pericrocotus), 301.
flammifera (Arachnothera), 705.
flammigerus (Rhamphocœlus), 660.
flammula (Pinicola), 606.
 — (Selasphorus), 162.

- flammulata* (Siptornis), 200.
flammulatus (Attila), 214.
 — (Hemitricens), 1075.
 — (Megabias), 284.
 — (Myiarchus), 251.
 — (Thripadectes), 193.
flava (Calliste), 666.
 — (Cyrtostomus), 1113.
 — (Galerida), 458.
 — (Motacilla), 444.
 — (Ptilotis), 722.
 — (Zosterops), 708.
flavala (Hemixus), 315.
flaveola (Capsiempis), 237.
 — (Chiromacharis), 222.
 — (Cœreba), 690.
 — (Gerygone), 268.
flaveola (Motacilla), 444.
flaveola (Sycalis), 601.
flaveolus (Basileuterus), 438.
 — (Criniger), 311.
 — (Hylophilus), 475.
 — (Passer), 598.
 — (Platycercus), 24.
flavescens (Andropadus), 313.
 — (Basileuterus), 1098.
 — (Celeus), 79.
 — (Empidonax), 248.
 — (Hypocnemis), 173.
 — (Panoplitus), 153.
 — (Phylloscopus), 1091.
 — (Pseudocolaptes), 196.
 — (Psittacula), 15.
 — (Ptilotis), 722.
 — (Smicromis), 267.
 — (Vireo), 473, 1102.
 — (Xanthixus), 307.
flavibuccale (Tricholæma), 36.
flavicans (Foudia), 566.
 — (Macrosphenus), 314.
 — (Myiobius), 245.
 — (Prinia), 358.
 — (Prioniturus), 17.
 — (Trichoglossus), 31.
flavicanthus (Acanthogenys), 721.
flavicapilla (Chloropipo), 219.
flavicapillum (Heteropelma), 223.
flavicaudata (Lafresnaya), 151.
flaviceps (Auriparus), 468.
 — (Campochæra), 1084.
 — (Dendroeca), 433.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Rhodacanthus), 606.
 — (Zosterops), 712.
flavicincta (Pœcilodryas), 271.
flavicollis (Ardeiralla), 915.
 — (Ixulus), 344.
 — (Macronyx), 449.
 — (Mixornis), 340.
 — (Nemosia), 654.
 — (Petronia), 597.
 — (Pipra), 220.
 — (Ptilopus), 737.
 — (Xenocichla), 310.
flavicrissalis (Eremomela), 355.
flavicrissus (Cassicus), 550.
flavida (Dendroeca), 433, 1097.
 — (Chlorodyta), 353, 1089.
 — (Geothlypis), 1097.
flavida (Gerygone), 269.
flavidicollis (Saltator), 646.
flavidiventris (Sporæginthus), 581.
flavifrons (Ægithalus), 468.
 — (Amblyornis), 525.
 — (Euphonia), 672.
 — (Megalæma), 39.
 — (Melanerpes), 68.
 — (Picumnus), 84.
 — (Poicephalus), 9.
flavifrons (Tyranniscus), 239.
flavifrons (Vireo), 472.
 — (Zosterops), 710.
flavigaster (Dendroica), 1071.
 — (Microeca), 264, 1080.
flavigastra (Arachnothera), 705.
 — (Basileuterus), 439.
 — (Emberiza), 621.
 — (Eopsaltria), 482.
 — (Hylota), 272.
flavigastra (Stelgidopteryx), 260.
flavigula (Chloronerpes), 65.
 — (Manorhina), 724.
 — (Melanerpes), 68.
flavigula (Petronia), 597.
flavigula (Ptilotis), 721.
 — (Serinus), 601.
 — (Timeliopsis), 727.
 — (Xenocichla), 310.
flavigularis (Apalis), 352.
 — (Camaroptera), 357.
 — (Chlorospingus), 650.
 — (Cryptolopha), 286.
 — (Chrysococcyx), 52.
 — (Platyrhynchus), 231.
flavilateralis (Gerygone), 269.
 — (Zosterops), 708.
flavinucha (Compsozona), 663.
 — (Chrysophlegma), 67.
 — (Muscisaxicola), 230.
flavipectus (Æthopyga), 696.

- flavipectus* (*Chlorospingus*), 650.
 — (*Cyclorhis*), 475.
 — (*Parus*), 464.
flavipennis (*Chloropsis*), 318.
flavipes (*Hylophilus*), 474.
 — (*Ketupa*), 879.
flavipes (*Larus*), 1024.
flavipes (*Merula*), 396, 1092.
 — (*Platalea*), 905.
 — (*Totanus*), 947.
flaviprymna (*Munia*), 587.
flaviricta (*Ptilotis*), 720.
flavirostris (*Allophus*), 104.
 — (*Anæretes*), 236.
flavirostris (*Ardea*), 911.
flavirostris (*Arremon*), 646.
flavirostris (*Bubulcus*), 913.
flavirostris (*Cannabina*), 589.
 — (*Ceuthmochares*), 59.
 — (*Chlorophonia*), 671.
 — (*Columba*), 750.
flavirostris (*Gecinys*), 64.
flavirostris (*Grallaria*), 169.
flavirostris (*Herodias*), 912.
flavirostris (*Humblotia*), 284.
flavirostris (*Hypopicus*), 70.
flavirostris (*Monasa*), 48.
 — (*Myiophoneus*), 407.
 — (*Paradoxornis*), 470.
flavirostris (*Phaeton*), 1004.
flavirostris (*Phibalura*), 215.
 — (*Pteroglossus*), 43.
flavirostris (*Puffinus*), 1031.
flavirostris (*Querquedula*), 993.
 — (*Rhynchops*), 1020.
 — (*Syma*), 110.
 — (*Turdus*), 400.
 — (*Urocissa*), 507.
flaviscapis (*Pterythrus*), 487.
flavissima (*Telespiza*), 606.
flavissima (*Zosterops*), 1113.
flavistriata (*Xenocichla*), 310.
flavitincta (*Chiromachæris*), 222.
flaviventer (*Dicaeum*), 679.
 — (*Machæirrhynchus*), 285.
flaviventre (*Ornithion*), 238.
flaviventris (*Arachnothera*), 705.
flaviventris (*Blacicus*), 1078.
 — (*Brachypteryx*), 342.
 — (*Burnesia*), 359.
 — (*Calliste*), 667.
 — (*Chlorocichla*), 313.
 — (*Cyclorhis*), 475.
 — (*Dacnis*), 688.
 — (*Emberiza*), 621.
flaviventris (*Empidonax*), 248.
 — (*Eremomela*), 355.
flaviventris (*Gerygone*), 268.
flaviventris (*Hapalocercus*), 234.
 — (*Horornis*), 373.
 — (*Hylophilus*), 474.
 — (*Leptotriccus*), 235.
 — (*Mesolophus*), 308.
 — (*Motacilla*), 443.
 — (*Platycercus*), 24.
 — (*Poizana*), 968.
 — (*Rhynchochocylus*), 242.
 — (*Serinus*), 600.
 — (*Sphæcotheres*), 528.
 — (*Sylviella*), 355.
flavivertex (*Elainea*), 240.
 — (*Heterocercus*), 224.
 — (*Serinus*), 599.
 — (*Setophaga*), 441.
flavo-aurita (*Ptilotis*), 720.
flavocincta (*Chlorodyta*), 353.
flavocincta (*Chloropsis*), 318.
flavocinctus (*Oriolus*), 526.
flavo-cinerea (*Stigmatura*), 235.
flavocristatus (*Melanichlora*), 460.
flavogrisea (*Pachycare*), 481.
flavolivacea (*Cettia*), 372.
flavo-olivacea (*Rhynchochocylus*), 1077.
flavo-olivaceus (*Rhynchochocylus*), 242.
flavopalliatæ (*Lorius*), 29.
flavostriata (*Ethopyga*), 696.
 — (*Ptilotis*), 720.
flavotecta (*Rhynchochocylus*), 1077.
flavotincta (*Glycyphila*), 717.
 — (*Grallaria*), 170.
 — (*Lalage*), 303.
flavotinctus (*Picumnus*), 84.
flavotorquata (*Eremomela*), 356.
flavovellatus (*Geothlypis*), 437.
flavovirens (*Chlorospingus*), 651.
 — (*Leptopogon*), 237.
flavovirescens (*Microeca*), 264.
flavoviridis (*Trichoglossus*), 31.
flavoviridis (*Vireo*), 472.
flavus (*Celeus*), 79.
 — (*Xanthosomus*), 553.
flecki (*Centropus*), 56.
 — (*Sylviella*), 355.
flegeli (*Polioptila*), 599.
flemmingi (*Dysithamnus*), 1070.
floccosus (*Pycnophilus*), 319.
florencie (*Monarcha*), 290.
florensis (*Corvus*), 504.
florentiæ (*Ptilopachys*), 817.
floresiana (*Alcedo*), 112.

floresiana (Geoffroyus), 16.
 — (Pelargopsis), 114.
floresii (Selasphorus), 162.
floriceps (Anthocephala), 146.
florida (Calliste), 666.
floridana (Agelæus), 1106.
 — (Ammodramus), 1110.
 — (Aphelocoma), 512.
 — (Cardinalis), 620.
 — (Colinus), 820.
 — (Corvus), 503.
 — (Lophophanes), 465.
 — (Monarcha), 1083.
 — (Progne), 1079.
 — (Scops), 886.
 — (Speotyto), 895.
 — (Zosterops), 1113.
florincola (Cyanocitta), 1105.
floris (Acanthopneuste), 377.
 — (Brachypterus), 1087.
 — (Cryptolopha), 286.
 — (Graucalus), 297.
 — (Osmotreron), 734.
 — (Spizaetus), 849.
 — (Terpsiphone), 280.
florisuga (Chlorodyta), 1089.
floseulus (Loriculus), 22.
floweri (Sturnopastor), 536.
flumenicola (Ceyx), 112.
fluminea (Porzana), 967.
fluviatilis (Agyrtia), 136.
fluviatilis (Hydrochelidon), 1013.
fluviatilis (Locustella), 370.
 — (Muscisaxicola), 230.
 — (Podiceps), 1040.
 — (Sterna), 1015.
fluvicola (Petrochelidon), 259.
færoensis (Sturnus), 535.
fætidus (Gymnoderus), 219.
fokiensis (Heteromorpha), 470.
fokiensis (Micropternus), 78.
 — (Scæorhynchus), 1101.
forbesi (Agelæus), 553.
 — (Cyanorhamphus), 26.
 — (Emberiza), 621.
 — (Erythrura), 584.
 — (Halcyon), 107.
 — (Munia), 587.
 — (Myzomela), 715.
 — (Ninox), 890.
 — (Oxyechus), 939.
 — (Rallacula), 970.
forcipata (Macropsalis), 120.
forficata (Chlorostilbon), 1066.
forficatus (Dicrurus), 530.

forficatus (Chlorostilbon), 141.
forficatus (Milvulus), 253.
formicivora (Myrmecocichla), 391.
formicivorus (Melanerpes), 68.
formosa (Anorthura), 428.
 — (Calocitta), 509.
 — (Dendrophila), 682.
 — (Megaloprepia), 742.
 — (Oporornis), 436.
 — (Pipreola), 216.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Querquedula), 992.
 — (Stictospiza), 579.
formosæ (Dendrocitta), 508.
 — (Lanius), 485.
 — (Sphenocercus), 731.
formosana (Munia), 588.
 — (Rallina), 966.
formosanus (Phasianus), 802.
formosum (Trochalopecteron), 321.
formosus (Oriolus), 526.
 — (Pezoporus), 27.
fornsi (Teretistris), 438.
forreri (Amazilia), 138.
 — (Chrysomitris), 593.
 — (Vireo), 473.
forsteni (Carpophaga), 745.
 — (Halcyon), 109.
 — (Megapodius), 787, 1115.
 — (Meropogon), 97.
 — (Oriolus), 526.
 — (Pitta), 208.
 — (Trichoglossus), 30.
forsteri (Aptenodytes), 1047.
 — (Carpophaga), 744.
 — (Sterna), 1014.
fortipes (Horornis), 372.
fortirostris (Dendrocolaptes), 185.
 — (Quiscalus), 560.
fortis (Agelæus), 1106.
 — (Geositta), 1073.
 — (Geospiza), 608.
 — (Graucalus), 297.
 — (Halcyon), 107.
 — (Pachycephalopsis), 481.
 — (Percnostola (175)).
 — (Tityra), 211.
 — (Trichoglossus), 30.
 — (Xiphocolaptes), 188.
fortunæ (Aplonis), 541.
 — (Colluricincla), 496.
fortunatus (Phylloscopus), 378, 1091.
forwoodi (Motacilla), 442.
fossii (Caprimulgus), 124.
frænata (Merganetta), 1002.

- frænatus* (Caprimulgus), 123.
frailhii (Himatione), 692.
francescæ (Granatellus), 438.
francesi (Astur), 840.
francica (Collocalia), 129.
franciæ (Agyrtia), 136.
franciscæ (Calliste), 668.
franciscana (Pyromelana), 572.
francisi (Erythrocerus), 275.
frankii (Amauornis), 972.
franklini (Falcipennis), 825.
 — (Larus), 1022.
 — (Megalæma), 39.
frantzii (Catharus), 394.
 — (Elaine), 240.
 — (Nothocercus), 782.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Telragonops), 42.
fraseri (Anthreptes), 704.
 — (Basileuterus), 439.
 — (Cassinia), 295.
 — (Conirostrum), 687.
 — (Oreomanes), 686.
 — (Pelargopsis), 114.
 — (Threnetes), 131.
frater (Amydrus), 545.
 — (Griniger), 311.
 — (Herpsilochmus), 178.
 — (Monarcha), 289.
 — (Oxyrhamphus), 224.
 — (Trogodytes), 426.
frater (Yungipicus), 75.
fratercula (Alcippe), 1088.
 — (Dendornis), 189, 1071.
 — (Geospiza), 608.
 — (Thamnophilus), 1070.
fraterculus (Anthracoceros), 100.
fraterculus (Pericrocotus), 301, 1084.
frazari (Butorides), 916.
 — (Hæmatopus), 932.
fremantlii (Alæmon), 451.
frenata (Cyrlostomus), 703.
frenata (Gallinago), 953.
frenata (Geotrygon), 771.
 — (Melittophagus), 96.
 — (Ptilotis), 720.
 — (Siphia), 292.
 — (Tephrodornis), 494.
frenatus (Chætops), 320.
frenatus (Garrulax), 328.
 — (Graucalus), 296.
frelorum (Pachycephala), 476.
freycineti (Megapodius), 787.
 — (Myiagra), 1082.
friedrichseni (Pyromelana), 572.
frigida (Mixornis), 1087.
fringillaceus (Vini), 30.
fringillaria (Molothrus), 553.
fringillaris (Empidochanes), 247.
 — (Mirafr), 455.
fringillarius (Microhierax), 868.
fringillinus (Egithalus), 468.
fringillirostris (Cannabina), 590.
fringilloides (Accipiter), 845.
 — (Amauospiza), 619.
 — (Spermestes), 577.
frobeni (Geositta), 204.
frontalis (Anarhynchus), 942.
 — (Callene), 408.
 — (Carpodacus), 603.
 — (Centurus), 1058.
 — (Chlorophonia), 671.
 — (Chlorospingus), 651.
 — (Cyanocitta), 511.
 — (Dendrocitta), 508.
 — (Dendrophila), 682.
 — (Eleopicus), 76.
 — (Geocichla), 1094.
 — (Henicurus), 450.
 — (Nonnula), 48.
 — (Ochoeca), 1075.
 — (Oreopsittacus), 1055.
 — (Oriolus), 526.
 — (Orlhotomus), 361.
 — (Phabotreron), 734.
 — (Pipreola), 216.
 — (Ruticilla), 386.
 — (Sericornis), 367.
 — (Spermophilopsis), 614.
 — (Sporopipes), 570.
 — (Sterna), 1016.
 — (Sublegatus), 241.
 — (Synallaxis), 197.
 — (Tyranniscus), 239.
 — (Xanthosomus), 554.
 — (Zosterops), 711.
frontata (Gallinula), 973.
frontatum (Tricholæma), 36.
frontatus (Conurus), 11.
 — (Falcunculus), 482.
frontatus (Hypotriorchis), 873.
frugilegus (Trypanocorax), 505.
frugivorus (Calypophilus), 652.
fruticeti (Phrygilus), 640.
fruticicola (Synallaxis), 197.
fucata (Atticora), 258.
 — (Emberiza), 621.
 — (Fulvetta), 346.
fucatus (Cuculus), 51.
fuciphaga (Collocalia), 129.

- fuertaventuræ* (Houbara), 927.
fugax (Hierococyx), 50.
fugensis (Hypsipetes), 316.
fulgens (Eugenes), 148.
fulgentissima (Chlorochrysa), 669.
fulgida (Campophaga), 300.
fulgidigula (Bourcieria), 151.
fulgidum (Dicæum), 677.
fulgidus (Monachalcyon), 105.
 — (Onycognathus), 545.
fulica (Heliornis), 978.
fulicarius (Crymophilus), 956.
fulicata (Thamnobia), 410.
fulicula (Porzana), 967.
fuliginiceps (Leptasthenura), 201.
fuliginiveniris (Luscinola), 371.
fuliginosa (Acredula), 467.
 — (Artomyias), 265.
 — (Buteola), 858.
 — (Chalcomitra), 701.
 — (Dendragapus), 824.
 — (Dendrocincla), 186.
 — (Geospiza), 608.
 — (Hemichelidon), 1079.
 — (Malacoptila), 48.
 — (Oceanodroma), 1029.
fuliginosa (Estrelata), 1033.
fuliginosa (Oreostruthus), 584.
 — (Passerella), 635.
 — (Phœbetria), 1039.
 — (Phonipara), 618.
 — (Psalidoprogne), 1079.
 — (Puffinus), 1032.
 — (Rhipidura), 277.
 — (Rhyacornis), 273.
 — (Schizæaca), 201.
fuliginosa (Scops), 885.
fuliginosa (Sterna), 1017.
 — (Strepera), 501.
 — (Turdus), 1093.
fuliginosus (Calamanthus), 360.
 — (Calorhamphus), 38.
fuliginosus (Hæmatopus), 932.
fuliginosus (Hemilophus), 82.
 — (Larus), 1023.
 — (Phaethornis), 1064.
 — (Pitylus), 643.
 — (Thamnophilus), 184.
fuligula (Cotyle), 257.
fulleborni (Alethe), 411.
 — (Butalis), 1079.
 — (Campothera), 1057.
 — (Caprimulgus), 1063.
 — (Cinnyris), 699.
 — (Hyphantornis), 563.
fulleborni (Laniarius), 492.
 — (Macronyx), 449.
 — (Melanoparus), 460.
 — (Pseudogyps), 1116.
fulva (Argya), 324.
 — (Bowdleria), 338.
 — (Charadrius), 937.
 — (Dendrocygna), 987.
 — (Petrochelidon), 258.
fulvescens (Accentor), 381.
 — (Aquila), 852.
 — (Catharus), 394.
 — (Chamæza), 171.
 — (Gerygone), 268.
 — (Gyps), 830.
 — (Illadopsis), 336.
 — (Junco), 629.
fulvescens (Phylloscopus), 378.
fulvescens (Syrnium), 891.
fulvicapilla (Dryodromas), 354.
fulvicauda (Myiosobus), 315.
fulvicauda (Suthora), 471.
fulviceps (Hapalocercus), 234.
 — (Pipilopsis), 649.
 — (Thlypopsis), 653.
fulvicervix (Calliste), 668.
fulvicollis (Osmotreron), 734.
fulvicrissa (Euphonia), 673.
fulvidus (Bucco), 47.
fulvifacies (Cryptolopha), 286.
fulvifasciatus (Yungipicus), 75.
fulvifrons (Cisticola), 365.
 — (Empidonax), 247.
 — (Glycyphila), 717.
 — (Suthora), 471.
fulvigula (Anas), 990.
 — (Timeliopsis), 727.
fulvularis (Chlorospingus), 1111.
 — (Malacoptila), 48.
 — (Myiobius), 245.
fulvipectoris (Crateroscelis), 333.
fulvipectus (Lophortyx), 819, 1116.
 — (Rhynchocyclus), 242.
fulviventris (Cryptolopha), 285.
fulviventris (Brachygalba), 46.
 — (Caprimulgus), 124.
 — (Grallaria), 170.
 — (Leptoptila), 768.
 — (Myiagra), 283.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Pachycephala), 477.
 — (Phyllostrophus), 314.
 — (Timeliopsis), 727.
 — (Tylas), 317.
fulvocinerea (Ptilotis), 722.

- fulvolateralis* (Acrocephalus), 368.
fulvolincta (Pachycephala), 477.
fulvus (Drymocataphus), 334.
fulvus (Gyps), 829.
 — (Hemilophus), 81.
 — (Phaelon), 1004.
fumicolor (Ochthæca), 226.
fumida (Merula), 398.
fumifrons (Euscarthmus), 232.
 — (Perisoreus), 511.
fumigata (Anorthura), 427, 1096.
 — (Uroloncha), 586.
fumigatus (Eleopicus), 75.
 — (Melipotes), 728.
 — (Nephæcetes), 129.
 — (Ochthodiæta), 225.
 — (Turdus), 401.
fumosa (Buteo), 856.
 — (Catharus), 393.
 — (Centurus), 1058.
 — (Chætura), 128.
fumosus (Automolus), 195.
funebria (Laniarius), 492.
 — (Halcyon), 110.
 — (Hemilophus), 82.
 — (Percnostola), 175.
 — (Tridactylia), 73.
funerea (Drepanis), 691.
 — (Hypochoæra), 574, 1108.
 — (Lanius), 483.
funerea (Surnia), 894.
fenereus (Calyptrorhynchus), 2.
 — (Melanoparus), 460.
 — (Oryzoborus), 613.
furcata (Dicrocerus), 95.
 — (Oceanodroma), 1029.
 — (Progne), 259.
 — (Siptornis), 199.
 — (Strix), 899.
 — (Thalurania), 144.
 — (Xema), 1020.
furcatoides (Thalurania), 144.
furcatus (Anthus), 448.
 — (Ceratotriccus), 233.
 — (Elasas), 863.
furcifer (Helimaster), 160.
furcifera (Hydropsalis), 120.
furvus (Trogodytes), 425.
fusca (Alcippe), 345.
fusca (Aplonis), 541.
 — (Casiornis), 214.
fusca (Ciconia), 906.
fusca (Cercomela), 391.
 — (Certhidea), 689.
 — (Elæocerthia), 702.
fusca (Florisuga), 134.
 — (Gerygone), 269.
 — (Glycyphila), 717.
 — (Iodopleura), 217.
 — (Malacoptila), 47.
 — (Myiochanes), 250.
 — (Ninox), 888.
 — (Oedemia), 999.
 — (Ptilotis), 720.
 — (Rallina), 966.
 — (Rhinocrypta), 167.
 — (Turdus), 1093.
fusca (Zosterops), 269.
fuscans (Uroloncha), 586.
fusca (Eos), 29.
 — (Lusciniola), 371.
 — (Margarops), 414.
 — (Merula), 397.
 — (Padda), 558.
fuscater (Catharus), 393, 1092.
fuscitra (Merula), 395.
fuscatus (Empidochænes), 246.
fuscatus (Empidonax), 247.
fuscatus (Lanius), 485.
fuscescens (Leptasthenura), 201.
 — (Monarcha), 290, 1083.
fuscescens (Turdus), 402.
fuscescens (Syrnium), 890.
fuscicapilla (Galbula), 45.
 — (Nemosia), 653.
 — (Scotocichla), 334.
 — (Zosterops), 711.
fuscicapillus (Copurus), 229.
fuscicapillus (Corvus), 504.
 — (Hylophilus), 474.
 — (Philemon), 726.
 — (Picolaptes), 188.
 — (Poicephalus), 9.
fuscicauda (Phænicothraupis), 657.
fuscicaudata (Amazilia), 1065.
 — (Cercomela), 391.
 — (Otocompsa), 304.
fusciceps (Thripophaga), 195.
 — (Xenocichla), 310.
fuscicollis (Phalacrocorax), 1008.
 — (Poicephalus), 9.
 — (Tringa), 952.
fusciflavescens (Brachypodius), 308.
fuscifrons (Cyclopsitta), 34.
fuscifrons (Zosterops), 711.
fuscipennis (Ceophlæus), 82.
 — (Dicrurus), 530.
 — (Philydor), 194.
 — (Tinamus), 781.
fuscirostris (Talegallus), 788.

- fusciventris* (Ptilotis), 721.
fusco-caerulescens (Hypotriorchis), 873.
fuscocinerea (Lathria), 213.
fuscoflava (Pachycephala), 478.
fusconota (Nigrita), 575.
fuscorufa (Rhipidura), 278.
fusco-rufa (Synallaxis), 198.
fusco-rufus (Ochthodiaeta), 225.
fuscovirescens (Lamprocorax), 542.
fuscus (Accipiter), 845.
 — (Acridotheres), 538.
 — (Anabatoxenops), 192.
 — (Anthus), 448.
 — (Artamus), 534.
 — (Cinclodes), 202, 1073.
 — (Empidias), 251.
 — (Larus), 1024.
fuscus (Megalestris), 1027.
fuscus (Melirrhophetes), 728.
fuscus (Ocydromus), 964.
fuscus (Pelecanus), 1006.
 — (Picumnus), 83.
 — (Pionus), 7.
 — (Pipilo), 637.
 — (Ptilopachys), 817.
 — (Sclerurus), 1071.
 — (Totanus), 946.
fythii (Bambusicola), 817.
gabar (Melierax), 839.
gabbii (Pitangus), 243.
gabonensis (Cuculus), 51.
 — (Dendropicus), 73.
 — (Malaconotus), 489, 1103.
 — (Pycnonotus), 305.
 — (Siphornis), 358.
 — (Tricholæma), 36, 1055.
gabonica (Anthreptes), 704.
gaikwari (Sylviella), 1089.
gaimardi (Elaiëna), 240, 1076.
 — (Phalacrocorax), 1076.
gairdneri (Picus), 71.
galactodes (Agrobates), 374.
galactotes (Megalur), 351.
galapagensis (Anous), 1019.
 — (Dafila), 994.
 — (Hæmatopus), 932.
galapagoensis (Asio), 878.
 — (Buteo), 858.
 — (Nesopelia), 758.
 — (Porzana), 968.
galatea (Tanysiptera), 106.
galatheæ (Homorus), 195.
galbanus (Garrulax), 327.
galbina (Mionectes), 1075.
galbraithi (Thryophilus), 421.
galbula (Galbula), 45.
galbula (Hyphantornis), 563.
 — (Oriolus), 525.
galeata (Basileornis), 538.
 — (Gallinula), 974.
 — (Metopia), 220.
 — (Myiagra), 283.
 — (Pauxis), 790.
 — (Xanthoura), 514.
galeatum (Callocephalon), 2.
galeatus (Calopteryx), 234.
galeatus (Casuarius), 1050.
galeatus (Ceophloeus), 82.
galeatus (Lophotriccus), 233.
galeatus (Serresius), 743.
galericulata (Ex), 982.
galericulata (Sterna), 1016.
galericulatus (Platylophus), 509.
galerita (Cacatua), 2.
 — (Corythornis), 113.
galeritus (Anorrhinus), 102.
 — (Eustephanus), 157.
galgulus (Loriculus), 23.
galilegensis (Cypselus), 1064.
galinieri (Lioptilus), 1081.
galliciensis (Gecinus), 63.
gallicus (Circaetus), 833.
 — (Cursorius), 930.
gallinaceus (Hydralector), 958.
gallinago (Gallinago), 953.
gallinaria (Gallinago), 953.
gallinula (Limnocyptes), 955.
gallio (Zosterops), 709.
gallopavo (Meleagris), 796.
galtoni (Saxicola), 390, 1092.
gambagæ (Alseonax), 1080.
 — (Bessonornis), 410.
gambeli (Anser), 983.
 — (Lanius), 484, 1103.
 — (Lophortyx), 819, 1116.
 — (Parus), 463.
 — (Zonotrichia), 626.
gambensis (Dryoscopus), 492.
 — (Plectropterus), 980.
gambiensis (Serpentarius), 827.
gambierana (Eopsaltria), 482.
gamblei (Pachycephala), 479, 1102.
ganeesa (Hypsipetes), 316.
gardeni (Nycticorax), 917.
gariensis (Francolinus), 809.
gariépina (Motacilla), 443.
garleppi (Compsospiza), 628.
 — (Crypturus), 783.
 — (Merganetta), 1002.
garleppi (Phaethornis), 132.

- garnoti* (Halodroma), 1037.
garnoti (Priocella), 1033.
garoensis (Drymocataphus), 334.
garretti (Muscisaxicola), 1075.
garrula (Coracias), 92, 1060.
 — (Manorhina), 724.
 — (Ortalia), 793.
garrulus (Ampelis), 260.
 — (Lorius), 29.
garzetta (Herodias), 912.
gaudichaudi (Dacelo), 104.
gaumeri (Attila), 214.
 — (Chætura), 128.
 — (Leptoptila), 770.
gavia (Puffinus), 1031.
gayi (Attagis), 780.
 — (Chasiempis), 270.
 — (Phrygilus), 640.
gedgei (Francolinus), 810.
geelvinkiana (Carpophaga), 744.
geelvinkianum (Dicæum), 678.
geelvinkianus (Megapodius), 787, 1115.
 — (Monarcha), 290, 1083.
geelvinkianus (Ptilopus), 741.
geelvinkiana (Nasilerna), 24.
geisleri (Drepanornis), 520.
geislerorum (Elurædus), 523.
 — (Eupetes), 319.
gelastes (Larus), 1023.
gemina (Ptilopus), 738.
genei (Formicivora), 178.
genestieri (Alcippe), 345, 1038.
genibarbis (Myiadectes), 407.
 — (Thryothorus), 423.
 — (Xenops), 192.
gentiana (Ceyx), 112.
geoffroyi (Charadrius), 937.
 — (Claravis), 765.
 — (Ithagene), 797.
 — (Neomorphus), 61.
 — (Schistes), 159.
georgiana (Eopsaltria), 481.
 — (Melospiza), 632.
georgica (Querquedula), 993.
geospizopsis (Passerculus), 631.
germaini (Dryonastes), 328.
 — (Molpastes), 305.
 — (Polyplectron), 796.
germana (Pelasophora), 145.
 — (Ptilotis), 722.
germani (Collocalia), 129.
 — (Gallinula), 974.
gerontodes (Pionus), 7.
gestroi (Ptilopus), 739.
ghiesbreghtii (Leucopternis), 860.
gibbericeps (Balearica), 923.
gibberifrons (Querquedula), 993.
gierowi (Pyromelana), 572.
gierræ (Chætura), 128.
giffardi (Cossypha), 409.
 — (Galerida), 458.
gigantea (Chætura), 127.
 — (Coracocichla), 1073.
 — (Fulica), 977.
 — (Gallinago), 954.
 — (Grallaria), 171.
 — (Ibis), 901.
 — (Leguatia), 978.
 — (Ossifraga), 1036.
 — (Pelargopsis), 114.
giganteus (Argusianus), 795.
 — (Bucco), 47.
giganteus (Lanius), 483.
gigantodes (Merula), 395.
gigantura (Diaphorillas), 1088.
gigas (Aramides), 964.
gigas (Collocalia), 1064.
 — (Coccyz), 60.
 — (Dacelo), 104, 1062.
 — (Merula), 395, 1092.
 — (Palagona), 135.
gigliolii (Emberiza), 623.
gigliolii (Montifringilla), 595.
gilberti (Pachycephala), 479.
gilletti (Mirafr), 455.
gilolensis (Melitograis), 726.
gilva (Nyctidromus), 1063.
gilvicollis (Micrastur), 838.
gilvigaster (Thamnophilus), 183.
gilviventris (Xenicus), 206.
gilvus (Mimus), 416, 1095.
 — (Vireo), 472.
gindiana (Afrotis), 924.
gingalensis (Alopius), 103.
gingica (Arboricola), 814.
ginginiana (Neophron), 831.
ginginianus (Acridotheres), 538.
giraudi (Otocorys), 452.
 — (Pendulinus), 558.
girrenera (Haliastur), 862.
githaginea (Erythrospiza), 596.
giu (Scops), 882, 1117.
giulianetti (Gerygone), 1080.
glaber (Sublegatus), 241, 1076.
glabricollis (Cephalopterus), 218.
glabripes (Scops), 884.
glabrirostris (Melanoptila), 414.
glacialis (Colymbus), 1039.
 — (Fratricula), 1046.
 — (Fulmarus), 1036.

- glacialis* (Harelda), 999.
glacialoides (Priocella), 1033.
gladiator (Malacotus), 490.
glandarius (Coccystes), 49.
 — (Garrulus), 510.
glareola (Totanus), 948.
glauca (Chenorhamphus), 275.
glauca (Diglossa), 686.
glauca (Erythrura), 583.
glaucescens (Larus), 1025.
 — (Xanthoura), 515.
glaucion (Clangula), 998.
glaucocærulea (Guiraca), 612.
glaucocolpa (Tanagra), 662.
glaucodes (Larus), 1022.
glaucogaster (Branta), 985.
glaucogularis (Acredula), 467.
 — (Capito), 42.
 — (Daenis), 687.
glaucoides (Larus), 1026.
glaucopis (Thaluranian), 143.
glaucopoides (Eriocnemis), 154.
glaucops (Strix), 899.
glaucovirens (Lamprocolius), 547.
glaucura (Pachycephala), 477.
glaucurus (Eurystomus), 93.
glaucus (Anodorhynchus), 10.
 — (Larus), 1026.
glaucus (Phalacrocorax), 1008.
glaucus (Thamnomanes), 180, 1070.
glaux (Athene), 894.
glitschi (Aquila), 852.
globicera (Carpophaga), 743.
globicera (Crax), 789.
globulosa (Crax), 790.
glocitans (Querquedula), 992.
gloriosa (Diglossa), 685.
glottis (Totanus), 947.
glupischa (Fulmarus), 1036.
glyceria (Zodalia), 158.
gnatho (Euphonia), 673.
gnathophila (Mino), 540.
gnoma (Glaucidium), 896.
godeffroyi (Halcyon), 108.
 — (Monarcha), 289.
godini (Eriocnemis), 154.
godlewskii (Anthus), 447.
godlewskii (Emberiza), 623.
godmani (Basileuterus), 439.
 — (Chloronerypes), 65.
 — (Cæreba), 691.
 — (Colinus), 821.
 — (Euphonia), 673.
 — (Leptopogon), 237.
goensis (Lobivanellus), 934.
gøringi (Brachygalba), 46.
gøringi (Campylopterus), 134.
gøringi (Chlorospingus), 652.
goertan (Mesopicus), 76.
goffini (Cacatua), 3.
 — (Trachyphonus), 41.
goiavier (Lædorus), 306.
goisagi (Gorsachius), 918.
goldiei (Cinclosoma), 319.
goldiei (Glossopsitta), 31.
 — (Macropygia), 755, 1114.
goldiei (Ninox), 890.
goldmani (Antrostomus), 1063.
 — (Cryplurus), 784.
 — (Dendroeca), 435, 1097.
 — (Momolus), 1061.
 — (Trogon), 1060.
goliath (Ardea), 909.
 — (Centropus), 55.
 — (Phænorhina), 747.
golzi (Chlorodyta), 353.
golzii (Aedon), 382.
gongonensis (Passer), 1109.
goodenoviensis (Ninox), 889.
goodenovii (Petroeca), 267.
goodfellowi (Thryothorus), 1095.
 — (Turdus), 1093.
goodsoni (Columba), 1114.
goramensis (Myiagra), 283.
gordoni (Hirundo), 255.
gorii (Gecinus), 64.
gossi (Sula), 1012.
goudoti (Chamæpetes), 794.
 — (Cyanophaia), 137.
gouldi (Acrocephalus), 369.
 — (Anthus), 446.
 — (Ardeiralla), 915.
 — (Calliste), 665.
gouldi (Circus), 836.
gouldi (Euphonia), 673.
gouldi (Eupsychortyx), 819.
gouldi (Lophornis), 165.
gouldi (Malurus), 367.
 — (Melospiza), 633.
gouldi (Merula), 397.
 — (Monarcha), 289.
 — (Pelargopsis), 114.
 — (Phalacrocorax), 1010.
 — (Phonygammus), 517.
 — (Psalidoprymna), 158.
 — (Zosterops), 706.
gouldie (Ethopyga), 696.
 — (Poephila), 585.
gouldii (Selenidera), 44.
gounellei (Phaethornis), 132.

- govinda* (Milvus), 863.
goyderi (Amytes), 349.
grace-annæ (Pendulinus), 557.
graciæ (Dendroeca), 434, 1097.
gracilipes (Tyranniscus), 239.
gracilirostris (Catharus), 394.
 — (Chlorocichla), 313.
gracilirostris (Dymornis), 187.
gracilirostris (Vireo), 473.
gracilis (Aphelocoma), 512.
 — (Ægialitis), 941.
gracilis (Burnesia), 360.
 — (Chlorocichla), 314.
 — (Empidagra), 241.
 — (Empidonax), 248, 1078.
 — (Euphonia), 672.
 — (Eutoxeres), 1065.
 — (Geranospizias), 838.
 — (Hypotriorchis), 872.
 — (Leptosoma), 91.
 — (Malacias), 325.
 — (Mimus), 1095.
 — (Oceanites), 1030.
 — (Picolaptes), 188, 1071.
 — (Pcinia), 359.
 — (Psalidoprymna), 158.
 — (Ptilotis), 720.
 — (Pyctorhis), 340, 1087.
gracilis (Rhinoptilus), 931.
gracilis (Rupornis), 858.
 — (Sterna), 1015.
 — (Tachornis), 126.
 — (Tinnunculus), 871.
graculina (Sigmodus), 498.
 — (Strepera), 501.
graculus (Fregilus), 516.
 — (Phalacrocorax), 1008.
græca (Caccabis), 807.
græca (Parus), 1100.
græffei (Pachycephala), 478.
grallaria (Fregetta), 1030.
grallaria (Speotyto), 895.
 — (Stiltia), 929.
grallarius (Burhinus), 928.
graminea (Calliste), 666.
 — (Melospiza), 633.
gramineus (Lampornis), 145.
 — (Megalurus), 351.
 — (Poocætes), 630.
 — (Tanygnathus), 18.
grammica (Chondestes), 625.
grammiceps (Cryptolopha), 286.
 — (Strachyrhis), 339.
grammicus (Celeus), 79.
 — (Pseudoscops), 879.
grammithorax (Miglyptes), 77.
graminicola (Cistothorus), 425.
 — (Siptornis), 200.
granadensis (Calliste), 668.
 — (Capito), 41.
 — (Dendroeca), 433.
 — (Euscarthmus), 232.
 — (Myiozetetes), 242.
 — (Picumnus), 84.
 — (Pyroderus), 218.
grandensis (Xiphorhynchus), 186.
granatina (Columbigallina), 763.
 — (Pitta), 208, 1073.
granatinus (Uraginthus), 582.
grandidieri (Chactura), 128.
grandidieri (Orthotomus), 362.
grandior (Anthus), 447.
 — (Monasa), 49.
 — (Phonipara), 618.
 — (Vireo), 472.
grandis (Acridotheres), 538.
 — (Ageleus), 553.
 — (Alcedo), 113.
 — (Carpodacus), 603.
 — (Cygnopsis), 984.
 — (Hyphantornis), 563.
 — (Jacamerops), 46, 1056.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Loxigilla), 614.
 — (Melocichla), 363.
 — (Motacilla), 443.
 — (Munia), 587.
grandis (Myiozetetes), 241.
grandis (Niltava), 295.
 — (Nyctibius), 118.
 — (Oreopsittacus), 33.
 — (Ruticilla), 385.
 — (Saltator), 645.
 — (Thryothorus), 1095.
 — (Yungipicus), 75.
granti (Accipiter), 845.
 — (Camaroptera), 1089.
 — (Francolinus), 808.
 — (Guttera), 805.
 — (Lophoceros), 103.
 — (Ninox), 889.
 — (Phlogœnas), 773.
 — (Sula), 1118.
 — (Turdinulus), 1086.
grantia (Gecinulus), 67.
granulifrons (Ptilopus), 741.
grata (Elaïnea), 240.
grata (Malia), 342.
 — (Sialia), 386.
gratiosa (Ochthoeca), 226.

- gravis* (Puffinus), 1031.
gravivox (Pomatorhinus), 326.
grawfurdi (Thriponax), 82.
grayi (Ammomanes), 459.
 — (Ardeola), 913.
 — (Argusianus), 795.
 — (Chenorhamphus), 275.
 — (Crax), 789.
 — (Edoliisoma), 298.
 — (Eucephala), 139.
grayi (Halcyon), 108, 109.
grayi (Leptocoma), 700.
 — (Turdus), 401, 1093.
 — (Zosterops), 708.
graysoni (Amazilia), 138.
 — (Colinus), 820.
 — (Harporhynchus), 417.
 — (Icterus), 558.
 — (Micropallas), 898.
 — (Parula), 432.
 — (Picus), 71.
 — (Quiscalus), 560.
 — (Turdus), 400.
 — (Zenaidura), 757.
grebnitskii (Carpodacus), 602.
gregaria (Chaetusia), 936.
gregorjewi (Turtur), 1114.
grenadensis (Loxigilla), 613.
 — (Thryothorus), 422.
greyi (Ardea), 911.
 — (Ocydromus), 964.
greyi (Pœoptera), 546.
 — (Ptilopus), 736.
 — (Stringops), 1.
grimmi (Lanius), 484.
grindæ (Psaltriparus), 466.
grinnelli (Regulus), 379.
grisea (Amphispiza), 627.
 — (Aphelocoma), 512.
 — (Cistothorus), 424.
 — (Columba), 748.
 — (Diuca), 641.
 — (Formicivora), 177.
 — (Muscisaxicola), 230.
 — (Perisoreus), 1105.
 — (Pyrrhulauda), 459.
 — (Serphophaga), 236, 1075.
 — (Spermophila), 615.
griseatus (Caprimulgus), 124.
griseatus (Lophostrix), 886.
griseicapilla (Carpophaga), 746.
griseicapillus (Dendrocopus), 185.
griseicauda (Osmotreron), 733.
griseicauda (Rhipidura), 277.
griseicauda (Rupornis), 858.
griseiceps (Apalis), 353.
 — (Astur), 840.
 — (Criniger), 311, 1085.
 — (Basileuterus), 440.
 — (Catharus), 393.
griseiceps (Furnarius), 204.
griseiceps (Glauclidium), 896.
 — (Hylophilus), 475.
 — (Microeca), 264.
 — (Neositta), 682.
 — (Pachycephala), 479.
 — (Phyllomyias), 1076.
 — (Piprites), 219.
 — (Platyrhynchus), 231.
 — (Saxicola), 389.
 — (Tityra), 211.
 — (Tyranniscus), 239, 1076.
griseicollis (Scytalopus), 166.
griseifrons (Canirallus), 965.
griseifrons (Nephœceles), 1064.
griseigena (Podicipes), 1042.
griseigula (Camaroptera), 356.
 — (Timeliopsis), 727.
griseigularis (Anthreptes), 704.
 — (Attila), 214.
 — (Columba), 752.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Pericrocotus), 302.
 — (Phaethornis), 133.
griseigularis (Pycnorhis), 340.
griseigularis (Urospizias), 843, 1116.
griseimentalis (Sigmodon), 498.
griseinucha (Macropygia), 755.
 — (Montifringilla), 595.
griseipectus (Carpophaga), 745.
griseipectus (Dendrotyx), 818.
griseipectus (Empidonax), 248.
 — (Myrmeciza), 1069.
 — (Pyrrhura), 1053.
 — (Thryothorus), 423.
griseistriata (Erythropygia), 1094.
griseitincta (Reinwardtœnas), 756.
griseiventris (Crypturus), 782.
 — (Hylophilus), 1102.
 — (Parus), 461.
 — (Pithys), 173.
 — (Polyonomus), 157.
 — (Pyrrhula), 607.
 — (Synallaxis), 198.
 — (Tetrastes), 823.
 — (Zosterops), 707.
griseldis (Acrocephalus), 369.
griseobarbata (Vireo), 472.
griseocapilla (Phyllomyias), 238.
griseocephalus (Mesopicus), 77.

- griseocristatus* (Coryphospingus), 642.
griseoflava (Eremomela), 355.
griseogularis (Ammoperdix), 807.
griseogularis (Elafina), 240.
griseogularis (Eopsaltria), 481.
griseogularis (Sublegatus), 241.
griseolateralis (Cyphorhinus), 429.
griseo-murina (Schizæaca), 201.
griseonota (Pachycephala), 480.
griseonucha (Grallaria), 170.
griseopyga (Hirundo), 254.
griseosticta (Butalis), 262, 1079.
 — (Hemichelidon), 1079.
griseostriatus (Francolinus), 809.
griseotincta (Zosterops), 709.
griseovirescens (Zosterops), 711.
griseoviridis (Camaroptera), 356.
griscens (Belonopterus), 935.
griscens (Clytorhynchus), 499.
griseus (Alopius), 103.
 — (Bradyornis), 287.
 — (Campylorhynchus), 419.
 — (Crateropus), 330.
 — (Empidonax), 1078.
 — (Nycticorax), 917.
 — (Puffinus), 1032.
 — (Sittasomus), 191.
griseus (Tyrannus), 252.
grisola (Butalis), 262, 1079.
 — (Pachycephala), 480.
grombcewskii (Tetraogallus), 806.
grossus (Ptilus), 643.
gruberi (Onychotes), 856.
grylle (Uria), 1043.
gryphus (Sarcorhamphus), 827.
guadeloupensis (Quiscalus), 560.
 — (Speotyto), 895.
 — (Thryothorus), 422.
guadelupensis (Salpinctes), 427.
 — (Saltator), 616.
guaiana (Eucichla), 209.
gualanensis (Pendulinus), 558.
gualaquiza (Pogonotriccus), 235.
guarauna (Aramus), 920.
guarauna (Plegadis), 903.
guarouba (Conurus), 11.
guarayanus (Thryophilus), 421.
guatemalæ (Chrysotis), 4.
 — (Scops), 885.
 — (Setophaga), 441.
 — (Sialia), 386.
guatemalensis (Campophilus), 81, 1059.
 — (Chlorophanes), 689.
 — (Cyanomyia), 139.
 — (Grallaria), 170.
guatemalensis (Porzana), 968.
guatemalensis (Sclerurus), 192, 1071.
 — (Xanthoura), 515.
guatemozinus (Gymnostinops), 549.
guayabambæ (Myrmotherula), 1070.
guayaquilensis (Campophilus), 81.
gubernator (Agelæus), 553.
 — (Enneoctonus), 487.
guenbiensis (Eos), 29.
guentheri (Alcedo), 113.
guentheri (Myzomela), 714.
guerilla (Micrastur), 837.
guerini (Gecinus), 64.
 — (Oxygogon), 159.
guerrerensis (Automolus), 194.
 — (Cyanomyia), 139.
guglielmi (Lorius), 29.
guglielmi III (Cyclopsitta), 33.
guianensis (Chætura), 128.
 — (Cyclorhis), 476.
 — (Hylocharis), 1066.
 — (Leistes), 554.
 — (Morphnus), 847.
 — (Odontophorus), 822.
 — (Phaethornis), 132.
 — (Psittacula), 15.
 — (Synallaxis), 198.
guldinigi (Chrysotis), 4.
guilianettii (Gerygone), 268.
guilielmi (Paradisea), 518.
guillemardi (Dicrurus), 531.
 — (Graucalus), 297.
 — (Loxia), 1109.
guimarasensis (Iole), 312, 1085.
guimarensis (Leptocoma), 700.
guimeti (Klais), 164.
guinea (Columba), 749, 1114.
guineensis (Bucorvus), 99.
 — (Dendropicus), 1058.
 — (Irrisor), 1061.
guinetta (Actitis), 948.
guira (Guira), 62.
guira (Nemosia), 653.
guirahuro (Pseudoleistes), 554.
guisei (Ptilotis), 722.
gularis (Accipiter), 847.
 — (Agapeta), 149.
 — (Ardea), 911.
 — (Argya), 324.
 — (Aspatha), 95.
 — (Campylorhynchus), 420.
 — (Chloronerpes), 65.
 — (Cichlopsis), 407.
 — (Criniger), 311.
 — (Cuculus), 51.

- gularis* (*Eopsaltria*), 482.
 — (*Eurystomus*), 93.
 — (*Euscarthmus*), 232.
 — (*Francolinus*), 809.
 — (*Garrulax*), 327.
 — (*Halcyon*), 107.
 — (*Heteromorpha*), 470.
 — (*Icterus*), 558, 1107.
 — (*Illadopsis*), 336.
 — (*Lamprocorax*), 542.
 — (*Melittophagus*), 96.
 — (*Melithreptus*), 714.
 — (*Micropternus*), 78.
 — (*Mixornis*), 340.
 — (*Monticola*), 393.
 — (*Myrmotherula*), 179.
 — (*Nicator*), 493.
 — (*Estrelata*), 1035.
 — (*Paroaria*), 643.
 — (*Poliospiza*), 599.
 — (*Ptilopus*), 736.
 — (*Rhinomyias*), 282.
 — (*Rhipidura*), 279.
gularis (*Rougelius*), 965.
gularis (*Rubigula*), 308.
 — (*Sericornis*), 367.
 — (*Suthora*), 471, 1101.
 — (*Sylvia*), 1090.
 — (*Synallaxis*), 198.
 — (*Tephrodornis*), 494.
 — (*Yuhina*), 346, 1088.
gulgula (*Alauda*), 454.
gulielmi tertii (*Diphyllodes*), 519.
gulielmi (*Poicephalus*), 9.
gulliveri (*Zosterops*), 712.
gundlachi (*Chordeiles*), 118.
gundlachi (*Colaptes*), 63.
gundlachi (*Conurus*), 12.
gundlachi (*Cooperastur*), 844.
 — (*Dendroeca*), 433.
gundlachi (*Mimus*), 415.
gundlachi (*Quiscalus*), 560.
 — (*Vireo*), 473.
gurial (*Pelargopsis*), 114.
gurneyi (*Anaplectes*), 568.
 — (*Baza*), 867.
 — (*Eucichla*), 209.
 — (*Geocichla*), 404, 1094.
 — (*Promerops*), 727.
 — (*Pseudopteryx*), 832.
 — (*Spizaetus*), 849.
gustavi (*Anthus*), 448.
 — (*Brotogetrys*), 16.
 — (*Malacothraupis*), 1111.
guttacristatus (*Chrysocolaptes*), 80.
guttata (*Ethomyias*), 274.
 — (*Calliste*), 666.
guttata (*Ceryle*), 114.
guttata (*Cichladusa*), 411, 1094.
 — (*Chlamydera*), 523.
 — (*Chrysoptilus*), 67.
guttata (*Dendrocygna*), 988.
guttata (*Dendroornis*), 189.
 — (*Geocichla*), 404, 1094.
 — (*Henicurus*), 450.
 — (*Laniarius*), 491.
 — (*Margarornis*), 191.
 — (*Myrmotherula*), 179.
 — (*Ortalia*), 793.
 — (*Salpinctes*), 427.
 — (*Spermospiza*), 571.
 — (*Staganopleura*), 579.
 — (*Strachyrhis*), 339.
guttaticollis (*Fulvetta*), 346.
 — (*Paradoxornis*), 470.
 — (*Turdinulus*), 332.
guttatoides (*Dendroornis*), 189.
guttatum (*Todirostrum*), 231.
guttatus (*Campylorhynchus*), 421.
 — (*Cooperastur*), 844.
 — (*Ixonotus*), 309.
guttatus (*Myrmeciza*), 175.
guttatus (*Odontophorus*), 822.
 — (*Psilorhynchus*), 177.
 — (*Thamnophilus*), 184.
 — (*Tinamus*), 782.
guttifer (*Picumnus*), 84.
 — (*Tarsiger*), 384, 1091.
 — (*Totanus*), 947.
guttula (*Monarcha*), 289.
guttulata (*Ceryle*), 1062.
 — (*Dendrocygna*), 988.
guttulatus (*Anabazenops*), 193.
 — (*Dysithamnus*), 180.
 — (*Monarcha*), 289.
guttuligera (*Thripophaga*), 195.
gutturalis (*Anthus*), 447.
 — (*Aramides*), 963.
 — (*Buarremon*), 648.
 — (*Chalcomitra*), 701.
 — (*Cinclocerthia*), 414.
 — (*Criniger*), 311.
 — (*Francolinus*), 808.
 — (*Helminthophaga*), 1096.
 — (*Hirundo*), 253.
 — (*Homorus*), 195.
 — (*Irania*), 383.
 — (*Myrmotherula*), 179.
 — (*Neocichla*), 412.
 — (*Pachycephala*), 477.

- gutturalis* (Parula), 432.
 — (Pelicius), 491.
gutturalis (Phalacrocorax), 1007.
gutturalis (Phœnicotheraps), 657.
 — (Pipra), 221.
 — (Pterocles), 777.
 — (Sericornis), 367.
 — (Spermophila), 616.
gutturosa (Chiromachæris), 222.
guyi (Phaethornis), 132.
gymnocephala (Pityriasis), 501.
gymnocephalus (Picathartes), 516.
gymnocycla (Columba), 749.
gymnogenys (Æthiocicila), 330.
gymnophthalma (Columba), 750.
gymnophthalmus (Turdus), 401.
gymnophthalmus (Verreauxia), 84.
gymnophthalmus (Yungipicus), 75.
gymnopis (Cacatua), 3.
gymnopodus (Scops), 883.
gymnops (Gymnopithys), 173.
 — (Melipotes), 728.
gymnostoma (Parra), 958.
gyrfalco (Hierofalco), 876.
gyrola (Calliste), 667.
gyroloides (Calliste), 667.
haasti (Apteryx), 1049.
haasti (Scelognathus), 887.
 — (Xenicus), 206.
habeli (Geospiza), 609.
haberlini (Chlorostilbon), 141, 1066.
habroptilus (Stringops), 1.
hadramanticus (Amydrus), 1106.
hæmalea (Pyrausta), 658.
hæmastica (Limosa), 916.
hæmatina (Spermospiza), 571.
hæmatocephala (Xantholæma), 40.
hæmatodes (Trichoglossus), 30.
hæmatogaster (Campophilus), 81.
hæmatonota (Myrmotherula), 179.
hæmatonotus (Psephotus), 25.
hæmatopus (Himantornis), 965.
hæmatopygius (Aulacorhamphus), 44.
hæmatorrhynchus (Rhamphastus), 1056.
hæmatorrhous (Psephotus), 25.
hæmatostictum (Dicæum), 678.
hæmatostigma (Eleopicus), 76.
hæmatothorax (Malaconotus), 489, 1103.
hæmatotis (Pionopsitta), 7.
 — (Pyrrhura), 14.
hæmatribon (Chrysocolaptes), 80.
hæmaturopygia (Cacatua), 3.
hæmorrhous (Cassicus), 551.
 — (Conurus), 11.
 — (Molpastes), 304.
hæsitanda (Astur), 841.
hæsitata (Cisticola), 364.
 — (Estrelata), 1033.
hæsitata (Priofinus), 1032.
hagedash (Hagedashia), 902.
hagenbecki (Phasianus), 1116.
hahni (Ara), 10.
hainana (Gracula), 539.
 — (Siphia), 1083.
hainanus (Blythipicus), 1059.
 — (Gecinus), 1057.
 — (Pachycephalixus), 306.
 — (Pyrotrogon), 1060.
haliætus (Pandion), 877.
halmaheræ (Semioplera), 519.
haloptila (Passerculus), 631.
halsueti (Speleornis), 426.
hamadryas (Rhipidura), 278.
hamata (Dryoscopus), 493.
hamatus (Rosthramus), 865.
hambroeki (Scops), 883.
hamiltoni (Helianthea), 1067.
hamondi (Empidonax), 248.
hanapepe (Hemignathus), 693.
hancii (Oreocinclæ), 403.
hannahæ (Calliste), 668.
hantu (Ninox), 890.
haplochrous (Urospizias), 842.
haplonota (Anorthura), 428.
 — (Grallaria), 170.
 — (Machlophus), 464.
haplopteryx (Cænotriccus), 233.
hardwickii (Chloropsis), 317.
 — (Yungipicus), 75.
hargitti (Melanerpes), 68.
hargitti (Pharomacrus), 86.
hargitti (Thriponax), 82.
harlani (Buteo), 856.
harmandi (Picus), 72.
harmani (Crossoptilon), 799.
harmonica (Colluricincla), 495.
harpyia (Thrasætus), 848.
harringtoni (Rhamphococcyx), 59.
harrisi (Gisella), 893.
 — (Nannopterum), 1010.
 — (Parabuteo), 858.
 — (Picus), 71.
harrisoni (Pyrrhulauda), 459, 1100.
harterti (Batrachostomus), 116.
 — (Certhia), 683.
 — (Entomyza), 725.
 — (Galerida), 457.
 — (Geospiza), 1110.
 — (Phlogophilus), 1067.
 — (Polyxemus), 1068.

- harterti* (Schizœaca), 1072.
 — (*Turturœna*), 753.
 — (*Upucerthia*), 203.
 — (*Xenocichla*), 310.
hartingi (*Rhinoptilus*), 931.
hartlaubi (*Accipiter*), 816.
 — (*Alopius*), 103.
 — (*Campophaga*), 300.
hartlaubi (*Capito*), 42.
 — (*Cisticola*), 364.
hartlaubi (*Crateropus*), 330.
 — (*Cyanomitra*), 702.
 — (*Dendropicus*), 1058.
 — (*Erythropygia*), 412.
 — (*Falcipennis*), 825.
 — (*Francolinus*), 810.
 — (*Larus*), 1024.
 — (*Onycognathus*), 515.
 — (*Otis*), 926.
 — (*Penthetria*), 573.
 — (*Pseudodacnis*), 665.
 — (*Pteronetta*), 981.
 — (*Turacus*), 89.
harwoodi (*Francolinus*), 810.
hasselti (*Leptocoma*), 699.
hastata (*Aquila*), 852.
 — (*Scops*), 886.
hatcheri (*Muscisaxicola*), 1075.
hattamensis (*Pachycephalopsis*), 481.
hausburgi (*Campothera*), 1057.
hauxwelli (*Myrmotherula*), 179.
 — (*Pendulinus*), 557.
 — (*Porzana*), 968.
 — (*Turdus*), 401.
hawaii (*Urospizias*), 843.
hawaiiensis (*Anous*), 1019.
 — (*Corvus*), 502.
hawkeri (*Uræginthus*), 583.
hayi (*Calorhamphus*), 38.
haynaldi (*Iole*), 312.
haynesii (*Crateropus*), 330.
hecki (*Casuarus*), 1051.
hecki (*Chrysotis*), 5.
hecki (*Crax*), 790.
 — (*Poephila*), 584.
heckeli (*Cyanocorax*), 514.
hectori (*Turnagra*), 329.
hedwigæ (*Chlorochrysa*), 670.
hedwigæ (*Metallura*), 156.
heermanni (*Larus*), 1023.
 — (*Melospiza*), 633.
heilprini (*Cyanocorax*), 514.
heinei (*Colluricincla*), 496.
 — (*Oreocincla*), 403.
heineni (*Sylvia*), 375.
hejenæ (*Calypte*), 163.
 — (*Hypothymis*), 274.
 — (*Lophornis*), 165.
 — (*Parotia*), 522.
helenoræ (*Eremomela*), 355.
heliaca (*Aquila*), 851.
helianthea (*Culicicapa*), 282.
helias (*Eurypyga*), 921.
heliobates (*Geospiza*), 1110.
heliodori (*Acestrura*), 163.
helioeides (*Pendulinus*), 1107.
heliosylus (*Zonerodius*), 920.
helleri (*Anorthura*), 1096.
hellmayeri (*Catharus*), 1092.
heloisæ (*Atthis*), 163.
helveola (*Syrnium*), 890.
helvetica (*Squatarola*), 937.
helviverter (*Hapalocercus*), 234.
helvivertris (*Phlogœnas*), 772.
 — (*Psaltriparus*), 466, 1101.
helvolus (*Turdus*), 401.
hemichrysa (*Myiodynastes*), 244.
hemidactylus (*Geranospizias*), 838.
hemileuca (*Cœligena*), 148.
 — (*Hypocnemis*), 174.
hemileucura (*Lanius*), 1102.
hemileucurus (*Campylopterus*), 134.
hemileucurus (*Lagopus*), 827.
hemileucurus (*Phlogophilus*), 154.
hemileucus (*Passer*), 598.
hemimelœna (*Myrmeciza*), 175.
hemiplilopus (*Archibuteo*), 854.
hemispila (*Nucifraga*), 506.
hemixantha (*Eremomela*), 356.
hemixantha (*Microeca*), 264.
hemprichii (*Dendropicus*), 73.
 — (*Larus*), 1023.
 — (*Pratincola*), 387.
hendersoni (*Locustella*), 370-71.
hendersoni (*Podoces*), 506.
 — (*Scops*), 883.
henicogrammus (*Urospizias*), 843.
henicura (*Doricha*), 162.
henkei (*Arses*), 288.
 — (*Leptocoma*), 699.
hennickei (*Trochalopteron*), 321.
henrici (*Arboricola*), 813.
 — (*Cœligena*), 148.
 — (*Criniger*), 311.
 — (*Dammeria*), 1082.
 — (*Heliangelus*), 155.
 — (*Leptopœcile*), 379.
 — (*Tetraogallus*), 806.
henricii (*Megalœma*), 39.
 — (*Trochalopteron*), 321.

- henryi* (Chordeiles), 118.
 — (*Heliodoxa*), 1067.
henshavi (Chamaea), 469.
henshawi (Selasphorus), 162.
henslowi (Ammodromus), 632.
hensoni (Hypsipetes), 316, 1086.
hensti (Astur), 839.
hepatica (Pyrranga), 659.
heraldica (Estrelata), 1035.
herberti (Cryptolopha), 1082.
 — (*Thryothorus*), 423.
herbicola (Tardivola), 639.
herculis (Pygocelis), 1047.
herioti (Siphia), 292.
hermani (Pœcilogryas), 271.
herminieri (Cichlherminia), 403.
 — (*Melanerpes*), 68.
hermonensis (Calandrella), 453.
hernsheimi (Ptilopus), 736.
herodias (Ardea), 910.
herrani (Chalcostigma), 156.
hesperia (Progne), 259.
hesperis (Corvus), 503.
hesperus (Helianthea), 154.
heterocerca (Cirrhipipra), 220.
 — (*Siptornis*), 199.
heteroclitus (Geoffroyus), 17.
heteropogon (Chalcostigma), 156.
heterura (Ammomanes), 1100.
 — (*Eutoxeres*), 133.
 — (*Pyrocephalus*), 246.
 — (*Siptornis*), 1072.
heterurus (Monarcha), 290.
 — (*Xenops*), 1071.
heudei (Paradoxornis), 470.
heuglini (Cossypha), 409.
heuglini (Cucullus), 51.
heuglini (Hyphantornis), 562.
 — (*Otis*), 925.
heyi (Ammoperdix), 807.
hiaticula (Egialitis), 939.
hiemalis (Anorthura), 427.
 — (*Junco*), 629.
hilarea (Rhynchæa), 956.
hilaris (Henicorhina), 428.
hildebrandti (Francolinus), 810.
 — (*Hemixus*), 315.
 — (*Notauges*), 548.
 — (*Urobrachya*), 573.
hildegardæ (Apalis), 353.
hillii (Mimus), 415.
himalayana (Certhia), 683.
 — (*Loxia*), 605.
himalayanus (Cucullus), 51.
himalayensis (Dendrocitta), 508.
himalayensis (Gyps), 830.
 — (*Picus*), 70.
 — (*Regulus*), 379.
 — (*Sitta*), 680.
 — (*Tetraogallus*), 806.
hindei (Crateropus), 1086.
hindii (Cisticola), 364.
hiogaster (Urospizias), 842.
hippocrepis (Sturnella), 555.
hirsuta (Glaucis), 131.
hirsuta (Ninox), 887.
hirsuta (Tridactylia), 73, 1058.
hirsutum (Tricholæmia), 36, 1055.
hirtensis (Anorthura), 427.
hirundinacea (Euphonia), 673.
hirundinacea (Hemipus), 497.
hirundinacea (Sterna), 1015.
hirundinaceum (Dicæum), 677.
hirundinea (Pholia), 1080.
hirundineus (Dicrocercus), 95.
hirundo (Eupetomena), 134.
hirundo (Sterna), 1015.
hispana (Corvus), 1104.
hispanica (Caccabis), 807.
hispaniensis (Perdix), 812.
hispaniolensis (Blacicus), 249.
hispaniolensis (Gyps), 830.
hispaniolensis (Passer), 597, 1109.
hispidus (Phaethornis), 132.
histrion (Eos), 28.
 — (*Pionopsitta*), 7.
histrionica (Phaps), 767.
histrionis (Histrionicus), 999.
hoamy (Trochalopteron), 322.
hoazin (Opisthocomus), 794.
hochstetteri (Cyanorhamphus), 26.
hochstetteri (Notornis), 976.
hodgei (Thriponax), 82.
hodgsoni (Batrachostomus), 117.
 — (*Certhia*), 684.
 — (*Columba*), 750.
 — (*Cryptolopha*), 286.
 — (*Motacilla*), 443.
hodgsoni (Oreocincla), 404.
 — (*Palæornis*), 19.
hodgsoni (Ruticilla), 385.
 — (*Siphia*), 292.
 — (*Tarsiger*), 384.
 — (*Thriponax*), 82.
hodgsoniæ (Perdix), 812.
hoedti (Alopecenas), 773.
 — (*Rhipidura*), 279, 1081.
hoffmanni (Centurus), 69.
 — (*Formicarius*), 172.
 — (*Pyrrhura*), 14.

- holboelli* (Cannabina), 590.
 — (Hierofalco), 876.
 — (Podicipes), 1042.
holdereri (Archibuteo), 854.
 — (Phasianus), 802.
holerythra (Rhectes), 495.
 — (Scops), 1117.
holerythrus (Lipaugus), 213.
hollandi (Hapalocercus), 234.
hollandi (Thamnophilus), 184.
holochlora (Chloropipo), 219.
holochlorus (Conurus), 12.
 — (Erythrocerus), 1081.
holomelæna (Psalidoprocne), 260.
holopolius (Edoliisoma), 1084.
 — (Graucalus), 295, 1084.
holosericea (Drepanoptila), 741.
holosericeus (Amblycercus), 551.
 — (Amblyrhampus), 554.
 — (Eulampis), 146.
holospilus (Spilornis), 834.
holospodia (Tænioptera), 225.
holostictus (Automolus), 194.
holoxanthus (Hyphantornis), 564.
holroydi (Micropternus), 78.
holsti (Machlolophus), 464.
holti (Iole), 312.
hombroni (Halcyon), 110.
homeyeri (Lanius), 483.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Phylloscopus), 378.
homochlamys (Hæmophila), 634.
homochroa (Catamenia), 617.
 — (Dendrocincla), 186.
 — (Oceanodroma), 1029.
homochrous (Hadrostomus), 211.
hondoensis (Locustella), 370.
honorata (Eudynamus), 54.
hoopesi (Sturnella), 555.
hooveri (Dendroeca), 435, 1097.
hopkei (Carpodectes), 217.
hornbyi (Oceanodroma), 1029.
hornemanni (Cannabina), 590.
hornensis (Trogodytes), 425.
horreorum (Hirundo), 253.
horsfieldi (Æthopyga), 696.
 — (Gennæus), 800.
 — (Miraфра), 456.
 — (Myiophoneus), 408.
horsfieldi (Oreocincla), 403.
horsfieldi (Pomatorhinus), 325.
hortensis (Sylvia), 374.
hortulana (Emberiza), 622.
hortulanus (Serinus), 601.
hortulorum (Merula), 397.
horus (Cypselus), 126.
hosei (Calypptomena), 205.
 — (Diceum), 676.
 — (Oriolus), 527.
 — (Siphia), 1083.
hoskinsi (Glaucidium), 896.
hottentotta (Querquedula), 993.
hottentotta (Turnix), 778.
hottentottus (Dicrurus), 530.
houbara (Houbara), 927.
hova (Miraфра), 455.
hovarum (Zosterops), 713.
hoyti (Otocorys), 452.
hubbardi (Francolinus), 808.
hudsoni (Cnipolegus), 229.
 — (Siptornis), 200.
hudsonica (Limosa), 946.
hudsonicus (Numenius), 945.
 — (Parus), 463.
hudsonius (Circus), 836.
huegeli (Gallinago), 955.
hueti (Alcippe), 345.
 — (Urochroma), 8.
huhula (Ciccaba), 893.
huillensis (Serinus), 600.
hulli (Nesomimus), 446.
humberti (Paroaria), 1111.
humbloti (Ardea), 910.
 — (Circus), 837.
 — (Cyanomitra), 702.
humboldtii (Eucephala), 139.
 — (Pternistes), 811.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Spheniscus), 1049.
humei (Chrysophlegma), 67.
 — (Coccothraustes), 611.
 — (Halcyon), 109.
 — (Molpastes), 305.
 — (Phyllobasileus), 378.
 — (Pyrrhospiza), 604.
 — (Sphenocichla), 428.
 — (Turdinulus), 1086.
humeralis (Agelaius), 553.
 — (Bessonornis), 410.
 — (Diglossa), 686.
 — (Geopelia), 762.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Lanius), 485.
 — (Ninox), 889.
 — (Penthetria), 1108.
 — (Pitylus), 643.
 — (Plegadis), 904.
 — (Ptilopus), 739.
 — (Terenura), 177.
humia (Phasianus), 803.

- humicola (Siptornis), 200.
humii (Sturnus), 535.
 — (Suthora), 471.
humilis (Campylorhynchus), 420.
 — (Heterotetrax), 925.
 — (Ixulus), 344.
 — (Podoces), 506.
 — (Polioaetus), 877.
 — (Rallus), 1118.
 — (Sericornis), 367.
 — (Siptornis), 200.
 — (Turtur), 761.
humivagans (Cistothorus), 425.
humivagans (Corythopsis), 168, 1068.
hunsteini (Diphyllodes), 519.
hunsteini (Munia), 587.
 — (Phonygamus), 517.
hunteri (Chalcomitra), 701.
 — (Cisticola), 365.
huonensis (Goura), 775.
 — (Ptilopus), 738.
hutchinsi (Branta), 984.
huttoni (Argya), 323.
huttoni (Phalacrocorax), 1010.
huttoni (Ptilopus), 738.
 — (Vireo), 473.
hyacinthina (Halcyon), 1062.
 — (Siphia), 292.
hyacinthinus (Anodorhynchus), 9.
hyacinthus (Porphyrio), 975.
hyalinus (Phaethon), 1064.
hybrida (Chloephaga), 985.
 — (Hydrochelidon), 1013.
 — (Laniarius), 491.
 — (Turacus), 1060.
hybridus (Colaptes), 63.
 — (Tetrao), 825.
hydrocharis (Tanysiptera), 106.
hydrocorax (Hydrocorax), 100.
hylophila (Ciccaba), 1117.
hyloscopa (Picus), 1058.
hyogastra (Ptilopus), 741.
hyperboreus (Chen), 982.
 — (Lagopus), 827.
 — (Phalaropus), 957.
 — (Plectrophanes), 624.
hypermelæna (Parus), 643.
hypermetrus (Spilocorydon), 457.
hyperrhynchus (Bucco), 47.
hyperythra (Arboricola), 814.
 — (Argya), 323.
 — (Brachypteryx), 342.
 — (Chlorura), 584.
 — (Dumetia), 340.
 — (Hirundo), 255.
hyperythra (Muscicapa), 263.
 — (Muscicapula), 294.
 — (Pachycephala), 479.
 — (Rhipidura), 277.
hyperythrus (Campylopterus), 134.
 — (Hypopieus), 70.
 — (Odontophorus), 822.
 — (Tarsiger), 384.
 — (Thryothorus), 423.
hypocherina (Vidua), 574.
hypochlora (Thaluriana), 143, 1066.
hypochondriaca (Poospiza), 628.
 — (Siptornis), 200.
hypochondriacus (Macrosphenus), 314.
 — (Todus), 95.
hypochrysea (Dendroeca), 435.
hypochryseus (Vireo), 473.
hypocyaneus (Chlorestes), 140.
hypodila (Anthreptes), 704.
hypenochroa (Columba), 752.
hypenochrous (Lorius), 29.
hypogæa (Speotyto), 895.
hypoglaucus (Andigena), 43.
 — (Oxyrhamphus), 224.
hypogramma (Ninox), 889.
hypogrammica (Anthreptes), 703.
 — (Pytelia), 578.
hypolais (Zosterops), 708.
hypoleuca (Actitis), 948.
 — (Alethe), 410.
 — (Aphelocoma), 512.
 — (Circaetus), 833.
 — (Cissa), 509.
 — (Crateropus), 330.
 — (Grallaria), 170.
 — (Gymnorhina), 500.
 — (Haliaeetus), 853.
 — (Haplopetia), 1115.
 — (Heterocnemis), 175, 1069.
 — (Estrelata), 1034.
 — (Pœcilodryas), 271.
 — (Serphophaga), 236.
 — (Spermophila), 615.
 — (Thryophilus), 1095.
hypoleucum (Dicæum), 679.
hypoleucus (Artamus), 534.
 — (Basileuterus), 439.
 — (Capito), 41.
 — (Elanus), 864.
 — (Endomychura), 1044.
 — (Eupsychortyx), 820.
 — (Falco), 875.
 — (Graucalus), 296.
hypoleucus (Malurus), 368.
hypoleucus (Melanotis), 417.

hypoleucus (Myrmochanes), 176.
 — (Phalacrocorax), 1010.
 — (Pomathorinus), 326.
 — (Sphecotheres), 528.
 hypomelæna (Cercomacra), 176.
 hypomelæna (Parra), 958.
 hypomelas (Pendulinus), 557.
 hypophæa (Hadrostomus), 211.
 hypophæus (Chlorospingus), 651.
 hypophonius (Aprosmictus), 21.
 hypopinaria (Coccytes), 49.
 hypopolius (Centurus), 69.
 hypopyrrha (Aulia), 213.
 hypopyrrhus (Malacotus), 489.
 hypospodia (Elainea), 240.
 — (Pinarochroa), 388.
 — (Synallaxis), 197.
 hypospodius (Buteo), 857.
 — (Dendrortyx), 818.
 — (Thryothorus), 423.
 hyposticta (Siptornis), 199.
 hypostictus (Campylorhynchus), 420.
 — (Crateropus), 329.
 — (Talaphorus), 135.
 hypoxantha (Burnesia), 359.
 hypoxantha (Chelidorhynch), 274.
 hypoxantha (Cisticola), 363.
 hypoxantha (Eremomela), 356.
 — (Euphonia), 673.
 — (Gerygone), 268.
 — (Hypocnemis), 173.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Prinia), 358.
 — (Pyrrhura), 1053.
 — (Spermophila), 615.
 — (Zosterops), 711.
 hypoxanthus (Andropadus), 313.
 hypoxanthus (Attila), 214.
 hypoxanthus (Pœcilodryas), 272.
 hyrcana (Erithacus), 382.
 hyrcanus (Garrulus), 510.
 hysginus (Pyrrhulopsis), 21.
 ianthinogaster (Uræginthus), 583.
 ibidis (Chasiempis), 270, 1080.
 ibis (Pseudotantalus), 905.
 ichthyaëtus (Larus), 1021.
 — (Polioaëtus), 877.
 icterica (Chrysomitris), 592.
 ictericus (Criniger), 311.
 icterina (Chloropeta), 274.
 — (Hypolais), 373.
 icterocephala (Calliste), 666.
 — (Chloropsis), 318.
 icterocephalus (Calypte), 163.
 icterocephalus (Xanthosomus), 553.

icteroides (Pachycephala), 478.
 — (Pycnorhamphus), 611.
 icteromelas (Chrysoptilus), 66.
 icteronotus (Rhamphocælus), 660.
 icterophrys (Myiozetetes), 241.
 icterophrys (Sisopygis), 228.
 icteropygialis (Chlorodyta), 354.
 icteropygus (Saltator), 645.
 icterorhyncha (Scops), 885.
 icterorhynchus (Francolinus), 810.
 icterotis (Conurus), 11.
 — (Geothlypis), 437, 1089.
 — (Platycercus), 24.
 ictinus (Milvus), 862.
 idæ (Ardeola), 913.
 idahoensis (Scops), 885.
 idaliæ (Phaethornis), 132.
 idia (Anthreptes), 704.
 igata (Gerygone), 268.
 ignatii (Campophaga), 300.
 ignavus (Bubo), 880.
 ignea (Cardinalis), 619.
 — (Pendulinus), 557.
 — (Terpsiphone), 1081.
 igneus (Pericrocotus), 301.
 igneus (Plegadis), 903.
 igneiventris (Cinnyris), 698.
 ignicapilla (Prionochilus), 675.
 ignicapillus (Regulus), 379.
 ignicauda (Æthopyga), 696.
 igniceps (Heteropelma), 223.
 ignicolle (Dicæum), 677.
 ignicrissa (Pœcilothraupis), 664.
 ignifera (Pipra), 1074.
 igniferum (Dicæum), 677.
 ignipalliat (Phænicopterus), 908.
 ignipectus (Dicæum), 679.
 ignita (Lophura), 798.
 ignitus (Lamprocolius), 546.
 — (Platycercus), 24.
 igniventris (Pœcilothraupis), 664.
 ignobilis (Automolus), 194.
 — (Chlorospingus), 651.
 — (Momotus), 94.
 — (Turdus), 401.
 ignota (Geothlypis), 437.
 — (Xiphocolaptes), 188.
 ignotincta (Minla), 343.
 ignotus (Drymocaplius), 334.
 — (Seleucides), 520.
 iheringi (Picumnus), 84.
 ijiima (Emberiza), 623.
 ijmæ (Acanthopneuste), 377.
 illex (Terpsiphone), 1081.
 iliaca (Passerella), 635.

- iliacus* (*Turdus*), 399.
iliceti (*Garrulus*), 510.
iliolophus (*Melilestes*), 718.
imberbe (*Ornithion*), 238, 1076.
imberbis (*Pomatorhinus*), 326.
 — (*Serinus*), 600.
imbricata (*Oreocincla*), 403.
imbricatum (*Trochalopteron*), 322.
imerina (*Neocossyphus*), 410.
immaculata (*Celeus*), 79.
immaculata (*Herodias*), 912.
 — (*Porzana*), 968.
immaculatus (*Accentor*), 381.
 — (*Anabazenops*), 192.
immaculatus (*Brachypodius*), 308.
immaculatus (*Henicurus*), 449.
 — (*Myrmelastes*), 181.
 — (*Saltator*), 646.
immanis (*Aphelocoma*), 1105.
immodestus (*Pericrocotus*), 302, 1084.
immundus (*Lipaugus*), 213.
immutabilis (*Diomedea*), 1038.
impennis (*Alca*), 1043.
imperator (*Grallaria*), 170.
imperatrix (*Eugenia*), 150.
imperialis (*Amazona*), 1053.
imperialis (*Aquila*), 851.
imperialis (*Campophilus*), 80.
 — (*Gallinago*), 955.
imperialis (*Phalacrocorax*), 1009.
impetuani (*Fringillaria*), 624.
impeyanus (*Lophophorus*), 798.
impiger (*Euscarthmus*), 233.
importunus (*Andropadus*), 313.
improbis (*Tyranniscus*), 239.
imthurini (*Agelæus*), 553.
inauris (*Anthochaera*), 724.
inca (*Bourcieria*), 151.
inca (*Empidonomus*), 252.
inca (*Nænia*), 1018.
 — (*Rhamphastos*), 42.
 — (*Scardafella*), 762.
incana (*Cisticola*), 363.
 — (*Eminia*), 353.
 — (*Estrela*), 582.
 — (*Glycyphila*), 717.
incanescens (*Phyllomyias*), 1076.
incanus (*Totanus*), 947.
incarnata (*Erythrospiza*), 596.
incasta (*Leptopogon*), 1076.
incei (*Terpsiphona*), 280.
incerta (*Geospiza*), 609.
incerta (*Luscinola*), 371.
incerta (*Estrelata*), 1034.
 — (*Turturcena*), 753.
incerta (*Zosterops*), 711.
incertum (*Edoliisoma*), 299.
incertus (*Eupetes*), 319.
 — (*Psittinus*), 21.
 — (*Thamnophilus*), 184.
incognita (*Megalaema*), 39.
incognitus (*Spodiopsar*), 535.
incommoda (*Crax*), 789.
incompta (*Eaïnea*), 240, 1076.
incompta (*Geothlypis*), 1097.
 — (*Merula*), 395.
 — (*Phaenomyias*), 1076.
incon dita (*Eos*), 29.
inconspicua (*Gerygone*), 1080.
inda (*Ceryle*), 115.
indica (*Athene*), 895.
indica (*Chætura*), 127.
 — (*Chalcophaps*), 766.
 — (*Coracias*), 92.
 — (*Hypotriorchis*), 873.
 — (*Luscinola*), 371.
 — (*Passer*), 597.
 — (*Rallus*), 960.
 — (*Sypheotis*), 926.
 — (*Upupa*), 99.
indicator (*Xenocichla*), 309.
indicus (*Ægialitis*), 939.
 — (*Anastomus*), 906.
indicus (*Anser*), 983.
 — (*Butastur*), 859.
 — (*Caprimulgus*), 124.
indicus (*Cuculus*), 51.
indicus (*Gyps*), 830.
 — (*Limoni dromus*), 445.
 — (*Lobivanellus*), 934.
 — (*Loriculus*), 23.
 — (*Metopidius*), 957.
 — (*Oriolus*), 525.
 — (*Phaeton*), 1005.
indicus (*Porphyrio*), 975.
indicus (*Sturnus*), 535.
 — (*Tarsiger*), 384.
indigo (*Stoparola*), 291.
indigotica (*Diglossa*), 686.
 — (*Guiraca*), 612.
indigoticus (*Scytalopus*), 166.
indoburmanica (*Palæornis*), 19.
indraneæ (*Syrnium*), 892.
indrani (*Syrnium*), 892.
indus (*Haliastur*), 862.
inepta (*Megacrex*), 964.
inerna (*Ornithion*), 238.
inexpectata (*Collocalia*), 129.
 — (*Cyanocorax*), 514.
 — (*Strix*), 900.

inexpectata (Sturnella), 556.
inexpectatus (Acrocephalus), 1090.
 — (Chlorostilbon), 141.
 — (Copsychus), 411.
 — (Podargus), 1063.
 — (Prionochilus), 675.
 — (Rhamphocœlus), 661.
infaustus (Perisoreus), 511.
infelix (Monarcha), 290.
inflexirostris (Quiscalus), 560.
infortunata (Ploceus), 1107.
infrenata (Cyrstostomus), 1113.
infulata (Alseonax), 264.
 — (Butalis), 1079.
infumata (Tachornis), 127.
infuscata (Acropternis), 168.
 — (Agricola), 288.
infuscata (Glaucidium), 897.
infuscata (Henicopernis), 866.
 — (Merula), 395.
infuscata (Muscicapa), 1081.
infuscata (Myzomela), 715.
infuscatus (Anthus), 446, 1098.
 — (Cacomantis), 52.
 — (Lanius), 483.
 — (Miglyptes), 78.
 — (Phimosus), 902.
infuscatus (Podiceps), 1041.
infuscatus (Pternistes), 811.
ingens (Dendropicus), 1059.
 — (Scops), 886.
inglisi (Pomatorhinus), 326.
ingoufi (Tinamotis), 786.
innexa (Muscicapula), 294.
innominata (Campophaga), 301, 1084.
innominata (Ceyx), 111.
 — (Collocalia), 129.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Sterna), 1017.
 — (Zosterops), 710.
innominatus (Caprimulgus), 124.
innominatus (Chrysococcyx), 1056.
 — (Picumnus), 84.
innotata (Ethya), 997.
 — (Geocichla), 405.
 — (Polioptila), 1091.
inocellatus (Chalcurus), 795.
inopinatus (Chalcurus), 1115.
inornata (Acanthiza), 366.
 — (Adelomyia), 155.
inornata (Aplonis), 542.
 — (Arachnothera), 705.
inornata (Calliste), 667.
 — (Calopteryx), 234.
 — (Catamenia), 617.

inornata (Charadrius), 938.
inornata (Chloëphaga), 985.
 — (Chrysotis), 4.
 — (Columba), 750.
 — (Conopias), 242.
 — (Crypturus), 784.
 — (Gerygone), 268.
 — (Haplopelia), 768.
 — (Lamprocorax), 542.
 — (Malacoptila), 48.
inornata (Megalema), 39.
 — (Myrmotherula), 179.
inornata (Parula), 432.
 — (Phacelodomus), 196.
 — (Pinaroloxias), 594.
 — (Prinia), 359.
 — (Serphophaga), 235.
 — (Thlypopsis), 653.
 — (Zosterops), 712.
inornatum (Dicæum), 679.
inornatus (Acomus), 798.
 — (Amblyornis), 525.
 — (Buarremon), 648.
 — (Caprimulgus), 124.
inornatus (Cuculus), 51.
inornatus (Euscarthmus), 233.
 — (Lophophanes), 465.
 — (Monarcha), 289.
inornatus (Edicnemus), 928.
inornatus (Philemon), 726.
 — (Rhabdornis), 685.
 — (Stephanihyx), 936.
 — (Thamnophilus), 183.
inquieta (Scotocerca), 360.
 — (Sisura), 288.
inquietus (Myiarchus), 250.
inquietus (Trogodytes), 425.
inquisitor (Tityra), 211.
inscriptus (Pteroglossus), 43.
insectivora (Bourcieria), 151.
inseparabilis (Cyclopsitta), 33.
insignibarbis (Lophornis), 165.
insignis (Aegothales), 116.
 — (Ardea), 909.
 — (Artamus), 533.
 — (Carpophaga), 746.
 — (Chalcopsitta), 28.
 — (Chalcostetha), 695.
 — (Clytomyias), 275.
 — (Colinus), 821.
 — (Euphonia), 672.
 — (Heterhyphantes), 565.
 — (Hypotaenidia), 962.
 — (Melanoparus), 460.
 — (Nemosia), 654.

- insignis* (Panterpe), 142.
insignis (Phasianus), 802.
insignis (Picolaptes), 188.
 — (Poliohierax), 869.
 — (Pratincola), 387.
 — (Prodotiscus), 35.
 — (Rhinomyias), 282.
 — (Thamnophilus), 183.
insignita (Helianthea), 151.
insolens (Agriornis), 224.
 — (Corvus), 503.
 — (Myiodynastes), 1077.
insolitus (Ptilopus), 739.
inspeculata (Pitta), 209.
insperata (Gerygone), 268.
 — (Lalage), 303.
insperatus (Cacomantis), 52.
insperatus (Parus), 461.
insularis (Amaurornis), 973.
insularis (Andropadus), 313.
insularis (Aphelocoma), 512.
 — (Arses), 288.
 — (Carpophaga), 744.
 — (Centropus), 56.
 — (Corvus), 1105.
 — (Cyclorhis), 475.
 — (Dicrurus), 530.
 — (Eos), 29.
 — (Fringillaria), 624.
 — (Gerygone), 1080.
 — (Gymnoscops), 887.
insularis (Hadrostomus), 211.
insularis (Junco), 629.
 — (Leptoptila), 769.
 — (Myiadectes), 1094.
 — (Myiophoneus), 408.
 — (Nyctidromus), 1063.
 — (Oriolus), 526.
 — (Ostinops), 550.
 — (Otidiophaps), 774.
 — (Otocorys), 1099.
 — (Parula), 432.
 — (Passer), 598.
 — (Passerella), 635.
 — (Phœnicotheraupis), 657.
 — (Picus), 72.
 — (Platypsaris), 1073.
 — (Platyrhynchus), 1075.
insularis (Prinia), 359.
insularis (Psittacula), 1053.
 — (Quiscalus), 560.
 — (Sarothrura), 969.
 — (Strix), 899.
 — (Tæniopygia), 580.
 — (Terpsiphone), 280.
insularis (Thalassiornis), 1001.
 — (Thryomanes), 424.
insularis (Traversia), 206.
insularis (Vireo), 473, 1101.
 — (Zonotrichia), 626.
insulicola (Empidonax), 248, 1078.
intacta (Pachycephala), 477.
intactus (Gymnocrex), 963.
intensus (Casuarius), 1050.
intensus (Tarsiger), 1091.
intercedens (Cossypha), 409.
intercedens (Grallaria), 170.
 — (Mirafr), 456.
 — (Nothocercus), 782.
 — (Ptilorhis), 521.
 — (Pyromelana), 1108.
 — (Rhynchops), 1020.
 — (Tachyphonus), 656.
interfringillacea (Vini), 30.
intermedia (Arboricola), 813.
 — (Bolbopsittacus), 22.
 — (Buthraupis), 663.
 — (Campophaga), 300.
 — (Capito), 1056.
 — (Carpophaga), 744.
 — (Chalybura), 144.
 — (Chamæa), 1101.
 — (Chlorura), 584.
 — (Chrysura), 1066.
 — (Cœreba), 690.
 — (Columba), 749.
 — (Conirostrum), 686.
 — (Cryptolopha), 285.
 — (Cyanocorax), 514.
 — (Cyanorhamphus), 26.
 — (Dacelo), 104.
 — (Formicivora), 177.
 — (Geospiza), 609.
 — (Gracula), 539.
 — (Grallaria), 170.
 — (Haliastur), 862.
 — (Herodias), 912.
intermedia (Luscinola), 371.
intermedia (Meleagris), 796.
 — (Merula), 395.
intermedia (Microglossus), 1.
intermedia (Minla), 1088.
 — (Molpastes), 304.
 — (Monachalcyon), 105.
 — (Myiagra), 283.
 — (Numida), 804.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Palæornis), 19.
 — (Paradisæa), 518.
intermedia (Parra), 958.

- intermedia* (Parus), 461.
 — (Pelargopsis), 114.
 — (Petronia), 1109.
 — (Picus), 1058.
 — (Pipilo), 637.
intermedia (Pipreola), 216.
 — (Platalea), 904.
intermedia (Podargus), 117.
 — (Quelea), 571.
 — (Sigmodus), 498.
 — (Sphenæacus), 337.
 — (Strepera), 501.
 — (Sturnus), 535.
 — (Textor), 569.
 — (Tiga), 1059.
 — (Trichoglossus), 1054.
 — (Upupa), 1061.
 — (Urosticte), 154.
 — (Xantholæma), 40.
 — (Zonotrichia), 626.
 — (Zosterops), 709.
intermedium (Dicæum), 678.
intermedium (Pellorneum), 336.
intermedius (Dendrocolaptes), 185.
intermedius (Elanus), 864.
 — (Ceuthmochares), 60.
 — (Cuculus), 51.
intermedius (Hemipus), 497.
 — (Hyphantornis), 562.
 — (Myrmelastes), 181.
intermedius (Onycognathus), 545.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Polyplectron), 796.
 — (Porzana), 967.
intermedius (Prionops), 1104.
 — (Pterythrion), 487.
intermedius (Tetrao), 825.
 — (Tiga), 78.
 — (*Trachypelmus*), 781.
intermedius (Troglodytes), 425.
interpres (Arenaria), 949.
 — (Geocichla), 405.
interseapularis (Megalurus), 351, 1088.
 — (Melanopteryx), 567.
involucris (Ardetta), 914.
iolaema (Cossypha), 409.
 — (Ptochoptera), 142.
iolata (Petasophora), 145.
ionogaster (Ptilopus), 741.
iora (*Phœnicomanes*), 341.
iozonus (Ptilopus), 739.
iracunda (Ceralopipra), 220.
iranica (Otocorys), 1098.
irbii (Acredula), 467.
irena (Pitta), 207.
iridescens (Lampornis), 145.
 — (Smaragdochrysis), 142.
iridina (Tanagrella), 670.
iriditorques (Turturæna), 753.
iris (Coccycolius), 547.
 — (Helianthea), 151, 1067.
 — (Neopsittacus), 33.
 — (Pitta), 208.
irrorata (Diomedea), 1038.
 — (Pogonorhynchus), 36.
irroratus (Dromæus), 1050.
 — (Halcyon), 107.
irupero (Tenioptera), 225.
isaacsoni (Eugenia), 150.
isabella (Stiltia), 929.
isabellæ (Callene), 408.
 — (Iodopleura), 217.
 — (Oriolus), 527.
isabellina (Amaurornis), 973.
 — (Galerida), 458.
 — (Geositta), 204.
 — (Saxicola), 390.
 — (Sylvia), 355.
isabellinus (Calamanthus), 360.
 — (Enneoctonus), 486.
 — (Tinnunculus), 871.
 — (Turtur), 759.
isauræ (Chalybura), 144.
isidorei (Lophotriorchis), 849.
isidori (Jacamerops), 46.
 — (Pipra), 221.
isidorii (Pomatorhinus), 326.
islandica (Clangula), 998.
islandicus (Larus), 1026.
islandus (Hieroalco), 876.
ispida (Alcedo), 112.
ispidoides (Alcedo), 112.
isthmica (Rhamphocelus), 1111.
isura (Rhipidura), 279.
isurus (Milvus), 863.
itala (Calandrella), 453.
italiæ (Passer), 597.
italicus (Parus), 1100.
itzensis (Pachyrhamphus), 1073.
iula (Psaltiriparus), 466.
ixoides (Ptilotis), 722.
jaburu (Euxenura), 906.
jacana (Parra), 958.
jacapa (Rhamphocelus), 660.
jacarini (Volatinia), 619.
jacksoni (Allopius), 103.
 — (Apalis), 353.
 — (Barbatula), 37.
 — (Bathmocercus), 1086.
 — (Calamocichla), 1089.

- jacksoni* (Cryptospiza), 1108.
 — (Cuculus), 1056.
 — (Dryoscopus), 1104.
 — (Francolinus), 810.
 — (Hyphantornis), 562.
 — (Illadopsis), 1087.
 — (Irrisor), 98.
jacksoni (Nectarinia), 694.
jacksoni (Parisoma), 1081.
 — (Penthetria), 574.
 — (Platystira), 266.
 — (Sylvia), 355.
 — (Zosterops), 710.
jacobinus (Coccyzus), 49.
jacquinoti (Ninox), 890.
 — (Pachycephala), 478.
jacucaca (Penelope), 792.
jacula (Heliodoxa), 150, 1067.
jacunda (Amazilia), 1065.
 — (Pipreola), 216.
jacupeba (Penelope), 791.
jacutinga (Cumana), 794.
jagoensis (Estrela), 581.
 — (Passer), 598.
jagori (Munia), 588.
jakal (Buteo), 856.
jala (Philepitta), 210.
jaliscensis (Elainea), 1076.
 — (Sittasomus), 1071.
jalla (Sturnopastor), 536.
jamacai (Icterus), 558.
jamaica (Pyrrhuloxia), 671.
jamaicae (Sycalis), 601.
jamaicensis (Corvus), 504.
 — (Circus), 971.
 — (Erismatura), 1001.
 — (Leptopitula), 769.
jamaicensis (Nyctanassa), 918.
jamaicensis (Nyctibius), 118.
 — (Estrela), 1034.
 — (Pitangus), 243.
 — (Turdus), 402.
jambu (Ptilopus), 736.
jamesi (Phoenicoparrus), 908.
 — (Telephonus), 488.
jamesii (Phonygamus), 517.
jamesoni (Diaphorophya), 265.
 — (Gallinago), 954.
 — (Heliodoxa), 150, 1067.
 — (Hyphantornis), 564.
 — (Lagonosticta), 577.
jamesoni (Larus), 1023.
jamesoni (Rhodornis), 357.
jani (Thamnophilus), 184, 1070.
jankowskii (Emberiza), 623.
janthina (Columba), 752.
japonensis (Corvus), 504.
 — (Grus), 922.
japonica (Anthus), 447.
 — (Certhia), 683.
 — (Coccothraustes), 611.
 — (Colurnix), 815.
japonica (Fulica), 977.
japonica (Gallinago), 954.
 — (Hirundo), 255.
 — (Loxia), 605.
japonica (Motacilla), 443.
japonica (Ninox), 887.
 — (Nucifraga), 506.
 — (Parus), 462.
 — (Pericrocotus), 302.
 — (Picus), 70.
japonica (Platalea), 904.
japonica (Regulus), 379.
 — (Tinnunculus), 870.
japonica (Yunx), 85.
japonica (Zosterops), 706.
japonicus (Ampelis), 260.
 — (Garrulus), 510.
japonicus (Scops), 883.
jardinei (Cinnyris), 697.
jardinei (Crateropus), 329.
 — (Glaucidium), 897.
 — (Panoplitus), 152.
 — (Picus), 71.
 — (Spodiornis), 641.
 — (Urospizias), 842.
jardinii (Circus), 837.
 — (Sarothrura), 969.
javanensis (Batrachostomus), 117.
 — (Gracula), 539.
 — (Ketupa), 879.
 — (Ploceola), 567.
 — (Tiga), 78, 1059.
javanica (Acanthopneuste), 376.
javanica (Arboricola), 814.
 — (Butorides), 916.
 — (Dendrocygna), 988.
 — (Hirundo), 253.
javanica (Hydrochelidon), 1013.
 — (Loriculus), 22.
javanica (Merula), 398.
 — (Mirafrax), 456.
 — (Mixornis), 340.
 — (Rhipidura), 279.
 — (Strix), 899.
 — (Zosterops), 711.
javanicus (Acridotheres), 538.
 — (Centropus), 56.
 — (Eurylæmus), 205.

- javanicus* (*Leptoptilus*), 907.
javanicus (*Palaëornis*), 19.
 — (*Pelecanus*), 1005.
javanicus (*Phalacrocorax*), 1010.
 — (*Zanclostomus*), 58.
javensis (*Chloropsis*), 318.
javensis (*Graucalus*), 296.
 — (*Megalæma*), 38.
 — (*Thriponax*), 82.
jaxartica (*Ægithalus*), 467.
jefferyi (*Æthopyga*), 696.
 — (*Chlamydochæra*), 299.
 — (*Cissa*), 508.
 — (*Pithecophaga*), 834.
jelskii (*Iridornis*), 665.
 — (*Melallura*), 155.
 — (*Ochthoeca*), 226.
 — (*Picumnus*), 83.
 — (*Spodiornis*), 641.
 — (*Thalurania*), 143.
 — (*Upucerthia*), 203.
jendaya (*Conurus*), 11.
jentinki (*Dicrurus*), 531.
 — (*Hypolaenidia*), 962.
jerdoni (*Accentor*), 351.
 — (*Ægialitis*), 940.
 — (*Anthus*), 446.
 — (*Baza*), 867.
 — (*Chloropsis*), 318.
 — (*Cryptolopha*), 286, 1082.
 — (*Minla*), 343.
 — (*Oreicola*), 273.
jerdoni (*Scops*), 884.
 — (*Siphia*), 293.
jerdoni (*Sylvia*), 374.
 — (*Timalia*), 340, 1087.
 — (*Trochaloxyron*), 322.
jessieæ (*Zenaida*), 758.
jessoensis (*Gecinys*), 64.
jesupi (*Octoeca*), 1075.
jheringi (*Gisella*), 893.
jobiensis (*Dicaeum*), 678.
 — (*Diphyllodes*), 519.
jobiensis (*Geoffroyus*), 17.
 — (*Lorius*), 29.
 — (*Manucodia*), 518.
 — (*Melidora*), 105.
 — (*Pachycephala*), 479.
 — (*Paradisæa*), 518.
 — (*Phlogœnas*), 773.
 — (*Ptilopus*), 739.
 — (*Rhœtes*), 495.
 — (*Talegallus*), 788.
 — (*Tropidorhynchus*), 725.
jocosus (*Campylorhynchus*), 420.
jocosus (*Olocompso*), 304.
johannæ (*Calospiza*), 1112.
 — (*Cinnyris*), 697.
 — (*Hemistephania*), 130.
 — (*Phlogœnas*), 773.
 — (*Prionochilus*), 675.
johannis (*Ptilopus*), 740.
johni (*Dissemurus*), 1105.
 — (*Pachycephala*), 1102.
johnsoni (*Alethe*), 411.
johnstoni (*Dioptrornis*), 287.
johnstoni (*Francolinus*), 810.
 — (*Gallirex*), 1060.
 — (*Haplopelia*), 768.
 — (*Mesopicus*), 77.
 — (*Nectarinia*), 694.
 — (*Tarsiger*), 334.
jolyæa (*Cyanolyca*), 513.
jonesi (*Caprimulgus*), 1063.
 — (*Gennæus*), 1115.
jonquillaceus (*Ptilis*), 20.
josephæ (*Vireo*), 472.
josephinæ (*Charmosyna*), 32.
 — (*Chrysuronis*), 1066.
jotaka (*Caprimulgus*), 124.
joudera (*Turnix*), 779.
jourdani (*Chætocercus*), 163.
jouschistos (*Acredula*), 466.
jouyi (*Basileuterus*), 439.
 — (*Chrysomitris*), 592.
 — (*Columba*), 752.
jouyi (*Hypolaenidia*), 961.
jouyi (*Merula*), 398.
jubaensis (*Zosterops*), 708.
jubata (*Alopochen*), 988.
 — (*Chenonetta*), 986.
jubatus (*Rhinocetus*), 921.
juddi (*Melospiza*), 633.
juggur (*Falco*), 875.
jugularis (*Ardea*), 911.
jugularis (*Brotogerys*), 15.
 — (*Cyrtostomus*), 703.
 — (*Eulampis*), 146.
 — (*Francolinus*), 809.
 — (*Micrastur*), 833.
 — (*Miglyptes*), 78.
 — (*Myzomela*), 715.
juliæ (*Arachnothera*), 705.
 — (*Damophila*), 140.
 — (*Halcyon*), 108-109.
 — (*Leptocoma*), 700.
 — (*Psilidoprymna*), 158.
julius (*Nothocercus*), 782.
jumana (*Celeus*), 79.
juninensis (*Geositta*), 204.

- juninensis* (*Muscisaxicola*), 230.
 — (*Podicipes*), 1041.
kadiaka (*Montifringilla*), 1109.
kædingi (*Oceanodroma*), 1029.
kaffensis (*Campothera*), 1057.
 — (*Zosterops*), 710.
kakamegæ (*Xenocichla*), 1085.
kalaoensis (*Siphia*), 293.
kalckreuthi (*Chalcomitra*), 701.
kaleensis (*Yungipicus*), 74.
kaleniczenskii (*Motacilla*), 445.
kalidupæ (*Scops*), 1117.
kalinowskii (*Dives*), 559.
 — (*Macropsalis*), 120.
 — (*Nothoprocta*), 1115.
kalinowskii (*Thiriponax*), 82.
kalulongæ (*Malacopteron*), 337.
kamtschatica (*Corvus*), 502.
kamtschatica (*Motacilla*), 443.
kamtschatica (*Pyrrhula*), 607.
kamtschatica (*Simorhynchus*), 1045.
kamtschatica (*Tetrao*), 825.
kamtschaticus (*Picus*), 70.
kamtschatkensis (*Nucifraga*), 506.
 — (*Parus*), 463.
kamtschatkensis (*Picus*), 71.
kamtschatkensis (*Pinicola*), 606.
kandavensis (*Pachycephala*), 477.
kandti (*Barbatula*), 1056.
 — (*Estrela*), 1108.
kangeanensis (*Centropus*), 56.
 — (*Rhopodytes*), 59.
 — (*Uroloncha*), 585.
kannegielri (*Graucalus*), 297.
karelini (*Enneoctonus*), 486, 1103.
karu (*Lalage*), 303.
kasumba (*Harpactes*), 88.
kaupi (*Arses*), 288.
kaupi (*Casuarus*), 1051.
kaupi (*Leucopernis*), 860.
kaurensis (*Dryonastes*), 1086.
kavirondensis (*Empidonax*), 1082.
kawarahiba (*Ligurinus*), 610.
keartlandi (*Ptilotis*), 721.
keayi (*Phlogoenas*), 772.
keaysi (*Ochthoeca*), 1075.
kebirensis (*Stigmatops*), 719.
keiense (*Dicaeum*), 677.
keiensis (*Nasiterna*), 24.
kelaarti (*Spizaetus*), 849.
 — (*Uroloncha*), 585.
kelleni (*Neocichla*), 412.
kelungensis (*Cuculus*), 51.
kemoensis (*Dybowskia*), 359.
kenaiensis (*Melospiza*), 633.
kennicotti (*Scops*), 886.
kenricki (*Pœoptera*), 546.
kenya (*Chloropeta*), 1081.
keraudreni (*Phonygammus*), 517.
kerheri (*Crypturus*), 783.
kerri (*Celeus*), 79.
kersteni (*Sycobrotus*), 566.
kerstingi (*Macropygia*), 755.
kessleri (*Merula*), 397.
kethullei (*Pholidophalus*), 1061.
kettlewelli (*Macronus*), 341.
keyensis (*Geoffroyus*), 16.
 — (*Gerygone*), 269.
 — (*Macropygia*), 755.
khasiana (*Suya*), 358.
kiangsinensis (*Anthus*), 446.
kidderi (*Estrelata*), 1034.
kieneri (*Lophotriorchis*), 849.
 — (*Pyrgisoma*), 636.
kienerii (*Dendronis*), 190.
kikuyuensis (*Francolinus*), 809.
 — (*Xenocichla*), 310.
 — (*Zosterops*), 710.
kilimense (*Glaucidium*), 897.
kilimensis (*Alcippe*), 345, 1080.
 — (*Coccygia*), 580.
 — (*Geocichla*), 1094.
 — (*Haplopetia*), 768.
 — (*Nectarinia*), 695.
 — (*Pyrrhospiza*), 1109.
 — (*Smilorhis*), 37.
kinabaluensis (*Chloropsis*), 318.
 — (*Cryptolopha*), 1082.
kingi (*Cyanolestes*), 157.
kinnisi (*Merula*), 396.
kintampoensis (*Poicephalus*), 1053.
kioloides (*Canirallus*), 965.
kirchoffi (*Strix*), 899.
kirki (*Crateropus*), 329.
 — (*Francolinus*), 308.
 — (*Zosterops*), 709.
kirikii (*Chalcomitra*), 701.
 — (*Eleopicus*), 76.
kirtlandi (*Dendroeca*), 435.
 — (*Eleopicus*), 76.
kismayensis (*Laniarius*), 1104.
kisserensis (*Gerygone*), 268.
 — (*Monarcha*), 289, 1083.
 — (*Philemon*), 726.
kisuki (*Yungipicus*), 74.
kittlitzii (*Brachyrhamphus*), 1044.
kittlitzii (*Gygis*), 1020.
 — (*Lamprocorax*), 542.
kittlitzii (*Larus*), 1022.
kittlitzii (*Ligurinus*), 610.

- kittlitzii* (Tænioptera), 225.
klaasi (Chrysococcyx), 52.
klæsii (Chætura), 127.
klagesi (Lophornis), 1068.
klarki (Ixulus), 344.
klecho (Macropteryx), 130.
kleei (Tinamus), 781.
kleinschmidti (Erythrura), 584.
 — (Galerida), 457.
kleinschmidti (Parus), 1100.
 — (Petroeca), 267.
klossowskii (Phasianus), 802.
knudseni (Himantopus), 943.
knudseni (Puffinus), 1031.
kochi (Graucalus), 297.
 — (Pitta), 209.
kœnigi (Caccabis), 807.
 — (Cypselus), 126.
 — (Fringilla), 589.
 — (Gecinus), 64.
kolbi (Gyps), 830.
kollari (Synallaxis), 198.
komadori (Erithacus), 382.
komarowi (Phasianus), 802.
kona (Chloridops), 606.
kordensis (Monarcha), 290.
 — (Rhipidura), 279.
kordoana (Hypocharmosyna), 32.
korejevi (Podicipes), 1041.
korejewi (Parus), 1100.
korejewi (Passer), 1109.
kori (Eupodotis), 927.
koroensis (Pyrrhulopsis), 21.
korschun (Milvus), 863.
korthalsi (Sphenocercus), 731.
koslowi (Accentor), 381.
 — (Tetraogallus), 806.
kowaldi (Todopsis), 275.
krefftii (Mino), 540.
krefftii (Pitta), 208.
kretschmeri (Nigrita), 575.
kretschmeri (Phyllostrophus), 314.
krideri (Buteo), 856.
krueperi (Sitta), 681.
krugi (Gymnasio), 896.
krynickyi (Garrulus), 510.
kuanzæ (Cinnyris), 698.
kubaryi (Corvus), 504.
kubaryi (Dacelo), 105.
kubaryi (Phlogœnas), 773.
 — (Rhipidura), 277.
kuelni (Hypotaenidia), 1118.
 — (Myzomela), 1113.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Pitta), 1073.
kuhli (Puffinus), 1031.
 — (Vini), 30.
kühni (Dicæum), 1112.
 — (Dicrurus), 1105.
kühni (Eos), 28.
kühni (Gerygone), 1080.
kulambangræ (Monarcha), 1083.
 — (Zosterops), 1113.
kumlieni (Larus), 1026.
kundoo (Oriolus), 525.
kurilensis (Anorthura), 427, 1096.
 — (Pyrrhula), 607.
kutteri (Gorsachius), 918.
labradora (Hierofalco), 876.
labradora (Falcipectus), 825.
labradora (Lunda), 1046.
labradora (Tridactylia), 1058.
labradorides (Calliste), 668.
labradorius (Camptolæmus), 1000.
lacera (Pionus), 7, 1053.
lacernulata (Carpophaga), 746.
 — (Leucopternis), 860.
lacrymiger (Picolaptes), 187.
lacrymosa (Dendroornis), 189.
 — (Pœcilotbraupis), 664.
lacrymosum (Tricholæma), 36.
lacrymosus (Euthlypis), 442.
lactea (Agyrtia), 136.
 — (Glareola), 930.
 — (Poliopitila), 380.
lacteifrons (Colius), 91.
lacteus (Bubo), 881.
lacteus (Pseudotantalus), 905.
lacuum (Dendropicus), 74, 1059.
ladoensis (Cisticola), 364.
 — (Pyromelana), 572.
læmosticta (Myrmeciza), 174.
 — (Synallaxis), 198.
læmostictus (Dicrurus), 531.
læta (Agyrtia), 1065.
 — (Alcyon), 113.
 — (Ceyx), 1062.
 — (Cryptolopha), 1082.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Microeca), 1080.
 — (Zosterops), 709.
lætiscapa (Rhipidura), 280.
lætissimus (Andropadus), 313.
lætitiator (Eurystomus), 93.
lætior (Melithreptus), 714.
 — (Oriolus), 528.
lætus (Thryothorus), 423.
lævigata (Gerygone), 269.
 — (Sericornis), 367.
lafargei (Myzomela), 715.

- lafayettei* (Gallus), 803.
lafresnayana (Myrmotherula), 179.
lafresnayanus (Eulabeornis), 963.
 — (Xiphorhynchus), 187.
lafresnayeii (Dendrocincia), 186.
 — (Picumnus), 84.
lafresnayi (Aëthorhynchus), 341.
 — (Dendropicus), 73.
 — (Diglossa), 686.
 — (Melittophagus), 96.
 — (Xenopirostris), 499.
lagdeni (Malaconotus), 489.
laglaizei (Casuarius), 1051.
 — (*Chloromyias*), 674.
lagopoda (Chelidon), 256.
lagopoides (Lyrurus), 826.
lagopus (Archibuteo), 854.
lagrandieri (Megalaema), 39.
lagunæ (Sitta), 681.
lahitora (Lanius), 484, 1103.
lamberti (Malurus), 368.
lamelligerus (Anastomus), 907.
lamellipennis (Xipholena), 217.
laminirostris (Andigena), 43.
lamperti (Chalcomitra), 701.
lamprocephala (Auriparus), 468.
lanaiensis (Hemignathus), 693.
 — (Phæornis), 284.
lanarius (Falco), 875.
lanceolata (Chiroxiphia), 222.
 — (Locustella), 371.
 — (Micromonacha), 48.
 — (Rhinocephala), 167.
lanceolatus (Babax), 320.
 — (Garrulus), 511.
 — (Plectrohynchus), 714.
 — (Spizaetus), 849.
landanæ (Cisticola), 364.
 — (Ixonotus), 309.
 — (Lagonosticta), 577.
langsdorffi (Prymnacantha), 165.
 — (Selenidera), 44.
languida (Hypolais), 373.
laniirostris (Euphonia), 673.
lanioides (Pachycephala), 481.
lansbergi (Coccyzus), 53.
 — (Geoffroyus), 1054.
lansbergi (Pericrocotus), 302.
lantzi (Ellisia), 351.
laperousii (Megapodius), 787.
lapponica (Limosa), 945.
 — (Scotiaptex), 892.
lapponicus (Calcarius), 625.
largipennis (Campylopterus), 133.
larutensis (Graucalus), 297.
larvata (Calliste), 667.
 — (Haplopelia), 768.
 — (Lagonosticta), 578.
larvata (Paroaria), 642.
larvata (Strachyrhis), 339.
larvatus (Crateropus), 330.
 — (Graucalus), 297.
 — (Oriolus), 527.
latebricola (Scytalopus), 1068.
lateralis (Cisticola), 363.
 — (Lobivanellus), 934.
 — (Poospiza), 628.
 — (Psophodes), 320.
 — (Zosterops), 712.
lathamii (Æthopyga), 695.
lathamii (Catheturus), 788.
 — (Francolinus), 808.
lathamii (Gisella), 893.
laticauda (Penthetria), 573.
latiularius (Heliangelus), 155.
 — (Saltator), 645.
latifasciata (Pyrranga), 659, 1111.
latifrons (Microhierax), 868.
 — (Sarcophorus), 933.
 — (Tinamus), 781.
latimeri (Vireo), 473.
latinucha (Pipilopsis), 648.
latirostris (Alseonax), 264.
 — (Andropadus), 313.
 — (Blacicus), 249.
 — (Corvus), 504.
 — (Euscarthmus), 232.
 — (Myiagra), 283, 1082.
 — (Ocyalus), 549.
 — (Phæoptila), 139.
latirostris (Sayornis), 227.
latissimus (Buteo), 857.
latistriatus (Anthus), 416.
latouchei (Æthopyga), 696.
 — (Scops), 885.
latrans (Carpophaga), 745.
laudabilis (Pendulinus), 557.
laurina (Liothrix), 348.
laurivora (Columba), 751.
lauterbachii (Arses), 288.
 — (Chlamydera), 523.
lautus (Aulacorhamphus), 1056.
lavendula (Cisticola), 1089.
lavinia (Calliste), 667.
lawesi (Parotia), 522.
lawrencei (Chætura), 128.
 — (Empidonax), 1077.
 — (Geotrygon), 771.
 — (Gymnasio), 896.
 — (Hæmophila), 633.

- lawrencei* (Icterus), 559.
 — (Lanio), 657.
 — (Myiarchus), 251, 1078.
 — (Myrmelastes), 1070.
 — (Phæoptila), 139.
 — (Saucerottea), 137.
 — (Sclerurus), 1071.
lawrencii (Chrysomitris), 593.
 — (Cichlherminia), 403.
 — (Corvus), 502, 1104.
 — (Cyphorhinus), 429.
 — (Helminthophaga), 431.
 — (Mimus), 416.
lawrencii (Myrmelastes), 181, 1070.
 — (Picumnus), 84.
lawrencii (Pseudocolaptes), 196.
 — (Thryothorus), 423.
lawryi (Apteryx), 1049.
layardi (Diomedea), 1038.
 — (Graucalus), 296.
 — (Megapodius), 787.
 — (Merula), 398.
 — (Parisoma), 273.
 — (Picolaptes), 188.
 — (Pycnonotus), 305.
 — (Rhipidura), 277.
 — (Saxicola), 390.
layardorum (Dicæum), 678.
laysanensis (Anas), 990.
lazula (Guiraca), 612.
lazuli (Halcyon), 108.
lazulina (Chloropsis), 317.
lazulus (Campylopterus), 134.
leachii (Dacelo), 104.
leachii (Oceanodroma), 1029.
leachii (Thamnophilus), 184.
leadbeateri (Cacatua), 2.
 — (Heliodoxa), 150.
leari (Anodorhynchus), 10.
lebruni (Pseudochloris), 640.
lecauchen (Turdus), 401.
leclancheri (Cyanospiza), 626.
 — (Ptilopus), 736.
ledouci (Parus), 462.
leei (Centurus), 69.
leggii (Petroeca), 266.
leilavalensis (Ptilotis), 720.
leiopa (Alauda), 454.
lembeyi (Empidias), 252.
lembeyi (Polioptila), 380.
lempiji (Scops), 885.
lemprieri (Anthracoceros), 101.
lemprieri (Platylophus), 510.
 — (Siphia), 293.
lentiginosus (Bolaurus), 919.
lenzi (Rhipidura), 279.
 — (Todiostrostrum), 232.
leocadiæ (Anthoscenus), 1068.
leopoldi (Columba), 752.
 — (Gymnoschizorhis), 90.
leotandi (Chlorospingus), 651.
lepida (Burnesia), 360.
 — (Ceyx), 112.
 — (Eminia), 353.
 — (Excalfactoria), 816.
 — (Gallinula), 974.
 — (Phonipara), 618.
 — (Pnoepyga), 430.
 — (Pyrrhura), 14.
 — (Rhipidura), 278.
 — (Tachycineta), 1079.
lepidoccephala (Malacopteron), 337.
lepidonota (Hypocnemis), 173.
lepidopleurus (Turdinus), 331.
lepidotus (Picumnus), 84.
lepidus (Dendropicus), 73, 1058.
 — (Uragus), 603.
leptodetus (Cuculus), 51.
leptogrammica (Macropygia), 754.
leptogrammicum (Syrnium), 891.
leptonyx (Corvus), 502, 1104.
leptorhynchus (Calamocichla), 352.
 — (Henicognathus), 13.
leptorhynchus (Nucifraga), 506.
 — (Picus), 70.
leptosomus (Brachypteracias), 92.
lepturus (Phaeton), 1004.
lepurana (Turnix), 778.
leschenaulti (Henicurus), 449.
 — (Melittophagus), 96.
lessoni (Alcyon), 113.
 — (Chlorostilbon), 1066.
 — (Lamprocolius), 546.
 — (Momolus), 94.
 — (Muscylva), 270.
 — (Ochthoeca), 226.
 — (Estrelata), 1033.
 — (Philemon), 726.
 — (Sphenoproctus), 153.
letitiæ (Prymnacantha), 165.
lettia (Scops), 884.
lettiensis (Graucalus), 296, 1084.
 — (Ptilopus), 735.
letti (Bubo), 880.
leucansiptila (Otocorys), 1099.
leucaspis (Gymnopiliys), 173.
 — (Oreopyra), 148.
leucauchen (Grus), 922.
leucero dia (Platalea), 904.
leucoblepharus (Basileuterus), 440.

- leucobronchialis* (Helminthophaga), 431.
leucocapilla (Pipra), 221.
leucocapillus (Anous), 1019.
leucocephala (Artamia), 498.
 — (Arundinicola), 228.
 — (Chimarrhornis), 386.
 — (Chrysotis), 6.
 — (Columba), 750.
leucocephala (Dissoura), 906.
leucocephala (Emberiza), 623.
 — (Erismatura), 1001.
 — (Neositta), 682.
 — (Pandion), 877.
 — (Pelargopsis), 114.
leucocephalus (Buteo), 855.
 — (Cinclus), 419.
 — (Cladorhynchus), 943.
 — (Colius), 91.
 — (Cranorrhinus), 100.
 — (Crateropus), 330.
leucocephalus (Hagedashia), 902.
leucocephalus (Haliaëtus), 853.
 — (Himantopus), 942.
 — (Hypsipetes), 316.
 — (Pogonorrhynchus), 35.
 — (Pseudotantalus), 905.
leucocephalus (Spodiopsar), 535.
leucocephalus (Stephanophorus), 664.
 — (Synallaxis), 199.
leucocilla (Pipra), 221.
leucogaster (Agyrtria), 136.
leucogaster (Ardea), 911.
leucogaster (Centropus), 56.
 — (Chlorospingus), 651.
 — (Cinnyris), 698.
leucogaster (Fregetta), 1030.
 — (Garrulax), 327.
leucogaster (Haliaëtus), 854.
 — (Lophophaps), 768.
leucogaster (Phalacrocorax), 1010.
leucogaster (Pholidauges), 541.
 — (Picolaptes), 187.
 — (Picumnus), 83.
 — (Pogonorrhynchus), 36.
leucogaster (Pomatorhinus), 325.
leucogaster (Schizorhis), 90.
 — (Turnix), 779.
leucogastra (Caica), 8.
 — (Cinclus), 418.
leucogastra (Creciscus), 972.
leucogastra (Dendrocitta), 508.
leucogastra (Eopsaltria), 482.
leucogastra (Galbula), 45.
 — (Ispidina), 111.
 — (Melizophilus), 1090.
leucogastra (Ortalida), 793.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Poliopila), 380.
 — (Sula), 1012.
leucogastra (Trichostoma), 333.
leucogastra (Uroloncha), 586.
 — (Uropsila), 428.
leucogastroides (Uroloncha), 586.
leucogenys (Acredula), 466.
 — (Bostrycholophus), 304.
 — (Cichlopsis), 407.
 — (Dacnis), 688.
 — (Dicrurus), 530.
 — (Lybius), 1055.
 — (Merganetta), 1002.
 — (Pyrrhula), 607.
leucogeranus (Grus), 922.
leucognaphalus (Corvus), 505.
leucogonys (Tyranniscus), 239.
leucogrammica (Ptilopyga), 332.
leucogrammicus (Alcyrus), 307.
 — (Laniellus), 483.
leucolæma (Barbatula), 38.
 — (Geocichla), 405.
 — (Otocorys), 452.
leucolæma (Thamnolæa), 392.
leucolæma (Xenocichla), 1085.
leucolæmus (Chloronerpes), 65.
 — (Odontophorus), 822.
leucolopha (Anorrhinus), 102.
leucolophum (Tigrisoma), 919.
leucolophus (Calliechthrus), 50.
 — (Garrulax), 327.
 — (Turacus), 89.
leucomela (Columba), 753.
 — (Lalage), 303.
 — (Saxicola), 389.
leucomelæna (Saxicola), 389.
leucomelan (Tricholæma), 36.
leucomelanura (Siphia), 292.
leucomelanus (Gennæus), 800.
leucomelas (Alopius), 104.
 — (Certhionix), 719.
 — (Melanoparus), 460.
 — (Puffinus), 1030.
leucomelas (Tricholæma), 36.
leucomelas (Turdus), 401.
leucometopa (Ochthœca), 226.
leucomystax (Stactolæma), 38, 1055.
leuconota (Columba), 749.
 — (Gymnorhina), 500.
 — (Thalassiornis), 1001.
leuconotus (Cinclus), 419.
 — (Copurus), 229.
 — (Maurus), 368.

- leuconotus* (*Melanoparus*), 460.
 — (*Myrmelastes*), 181.
 — (*Nycticorax*), 917.
 — (*Picus*), 72.
lecontei (*Ammodromus*), 632.
 — (*Harporhynchus*), 417.
 — (*Myioceyx*), 111.
leuconucha (*Sitta*), 681.
leuconyx (*Cypselus*), 125.
leucopais (*Baza*), 867.
leucoparæa (*Pteruistes*), 811.
 — (*Pyrhulauda*), 459.
leucopareia (*Eutrygon*), 774.
leucopareia (*Hydrochelidon*), 1013.
leucopareius (*Branta*), 984.
leucophæa (*Amazilia*), 138.
 — (*Calaudrella*), 454.
 — (*Climacteris*), 684, 1112.
 — (*Collocalia*), 129.
 — (*Mimus*), 416.
 — (*Zosterops*), 712.
leucophæus (*Dicrurus*), 530.
leucophæus (*Larus*), 1025.
leucophrys (*Basileuterus*), 440.
 — (*Brachypteryx*), 342.
 — (*Dendrotyx*), 818.
 — (*Erythropygia*), 412.
 — (*Henicorhina*), 429.
 — (*Hypocnemis*), 173.
 — (*Mecocerculus*), 227.
 — (*Oelthæca*), 226.
leucophrys (*Estrelata*), 1035.
 — (*Porzana*), 968.
leucophrys (*Sylviella*), 355.
 — (*Thryomanes*), 424.
 — (*Zonotrichia*), 626.
leucophilhalma (*Formicivora*), 178.
 — (*Pomarea*), 291.
leucophthalmus (*Æthya*), 997.
leucophthalmus (*Automolus*), 195.
 — (*Conurus*), 12.
leucophthalmus (*Larus*), 1022.
leucopis (*Buarremon*), 618.
leucopleura (*Xenocichla*), 309.
leucopleurus (*Oreotrochilus*), 147.
leucopogon (*Burnesia*), 360.
 — (*Campophilus*), 80.
 — (*Eupsychortyx*), 819.
 — (*Thryophilus*), 422.
leucoproctum (*Trichostoma*), 292.
leucoprosopon (*Lophortyx*), 819.
leucops (*Anthipes*), 1083.
 — (*Dicrurus*), 531.
 — (*Lædorusa*), 306.
 — (*Merula*), 395.
leucops (*Oreoctistes*), 306.
leucops (*Pœcilodryas*), 272.
 — (*Siphia*), 293.
leucopsis (*Branta*), 984.
 — (*Motacilla*), 443.
 — (*Scops*), 883.
 — (*Sitta*), 681.
 — (*Spermophila*), 616.
 — (*Sylviella*), 355.
 — (*Xerophila*), 468.
leucoptera (*Afrotis*), 925.
 — (*Ardeola*), 913.
leucoptera (*Asarcornis*), 981.
 — (*Chætura*), 936.
 — (*Erythropygia*), 412.
 — (*Fulica*), 978.
 — (*Hydrochelidon*), 1012.
 — (*Lalage*), 303.
 — (*Lanius*), 483.
 — (*Loxia*), 605.
leucoptera (*Melanocorypha*), 452.
leucoptera (*Melopelia*), 758.
 — (*Neositta*), 682.
 — (*Estrelata*), 1035.
 — (*Phegornis*), 956.
 — (*Pica*), 507.
 — (*Picus*), 70.
leucoptera (*Pitta*), 208.
leucoptera (*Psophia*), 924.
 — (*Pyriglena*), 175.
 — (*Tanagra*), 661.
leucopterus (*Cracticus*), 500.
 — (*Larus*), 1026.
 — (*Malurus*), 367.
leucopterus (*Melanoparus*), 460.
leucopterus (*Nyctibius*), 118.
 — (*Pipilopsis*), 649.
 — (*Platysmurus*), 509.
 — (*Serinus*), 600.
leucopteryx (*Icterus*), 559.
leucopus (*Furnarius*), 203.
 — (*Hæmatopus*), 932.
leucopyga (*Fulica*), 977.
leucopyga (*Tachycineta*), 256.
leucopygia (*Collocalia*), 130.
 — (*Iodopleura*), 217.
 — (*Nyctiprogne*), 118.
 — (*Saxicola*), 389.
leucopygialis (*Chætura*), 129.
 — (*Diaphorophya*), 265.
 — (*Dicrurus*), 530.
 — (*Lalage*), 303.
leucopygius (*Basileuterus*), 440.
 — (*Bycanistes*), 101.
 — (*Crateropus*), 330.

- eucopygius* (Graucalus), 296.
 — (Halcyon), 108.
 — (Serinus), 600.
 — (Symmorphus), 303.
leucopygus (Rosthramus), 865.
 — (Lanius), 484.
leucopyrrhus (Creciscus), 972.
leucorhamphus (Cassicus), 551.
leucorhynchus (Arlamus), 533.
 — (Laniarius), 492.
 — (Rhectes), 495.
leucorrhoea (Cryptolopha), 286.
leucorrhoea (Oceanodroma), 1028.
 — (Pipra), 221.
 — (Rupornis), 859.
 — (Saxicola), 1092.
 — (Tachycineta), 255.
leucorrhous (Polytmus), 147.
leucoryphus (Haliaetus), 854.
leucoscepus (Pternistes), 811.
leucoschista (Muscicapula), 294.
leucosoma (Hirundo), 254.
leucosomus (Leucospizias), 841.
leucospila (Ralliecula), 970.
 — (Scops), 884.
leucospodia (Elainea), 240.
leucostephes (Melirrhophetes), 728.
leucosterna (Cheramœca), 258.
leucosternus (Haliastur), 862.
leucosticta (Erythropgyia), 412.
 — (Henicorhina), 428.
 — (Huhua), 882.
 — (Uroloncha), 586.
leucostictus (Dysithamnus), 180.
 — (Eupetes), 319.
 — (Turdinulus), 332.
leucostigma (Aceros), 102.
 — (Anas), 991.
leucostigma (Heterocnemis), 175.
 — (Pachycephala), 481.
leucote (Pyrgisoma), 636.
leucothorax (Lanio), 656.
 — (Rhipidura), 278.
leucothrix (Penelope), 791.
leucotis (Basilinna), 139.
 — (Colius), 91.
 — (Gabalecorhynchus), 46.
 — (Garrulus), 510.
 — (Molpastes), 305.
 — (Monarcha), 290.
 — (Myiadectes), 407.
 — (Phabotreron), 734.
leucotis (Podicipes), 1041.
leucotis (Poephila), 584.
 — (Ptilotis), 721.
leucotis (Pyrrhulauda), 459, 1100.
 — (Pyrrhura), 13.
 — (Scops), 885.
 — (Smilorhis), 37.
 — (Strachyrhis), 339.
 — (Thryophilus), 421.
 — (Turacus), 88.
 — (Vireolanius), 475.
leucura (Agriornis), 1074.
 — (Chætusia), 936.
leucura (Niltava), 292.
leucura (Notodela), 384.
 — (Pratincola), 387.
 — (Saxicola), 389.
 — (Tityra), 211.
 — (Urochroa), 148.
leucuropyga (Centropus), 56.
leucurum (Crossoptilon), 799.
leucurus (Elanus), 864.
 — (Lagopus), 827.
 — (Monarcha), 290.
 — (Threnetes), 131.
levaillanti (Corvus), 504.
 — (Chrysotis), 5, 1053.
 — (Francolinus), 809.
 — (Pogonorhynchus), 35.
levaillantii (Cisticola), 365.
 — (Plotus), 1011.
 — (Pycnonotus), 305.
 — (Thamnotaea), 392.
leveriana (Cissopis), 644.
levipes (Rallus), 959.
levraudi (Creciscus), 972.
lewini (Hypotaenidia), 961.
lewini (Ptilotis), 720.
lewisii (Ptilopus), 741.
leyboldi (Eustephanus), 157.
leylandi (Eupsychortyx), 820.
leytensis (Pericrocotus), 304.
 — (Yungipicus), 75.
lhuyssii (Lophophorus), 798.
liberiae (Glareola), 930.
liberianus (Cosmophoneus), 490.
liberensis (Chlorocichla), 313.
libonyanus (Turdus), 399.
lichtensteini (Hemignathus), 693.
 — (Pterocles), 777.
liCTOR (Pitangus), 243.
lidthi (Garrulus), 511.
lidthii (Gracula), 539.
lifuenensis (Graucalus), 297.
 — (Myzomela), 715.
lignatus (Picus), 72.
lilacea (Dendrophila), 682.
lilacina (Chrysotis), 5.

- lilfordi* (Grus), 921.
 — (Picus), 72.
liliana (Agapornis), 22.
limata (Rhamphocelus), 1111.
limbata (Ptilotis), 718.
limbatus (Euscarthmus), 232.
limnaëlus (Spizaetus), 849.
limnophilax (Gorsachius), 918.
linaria (Cannabina), 590.
linchi (Collocalia), 130.
lincolni (Melospiza), 632.
lindenii (Oxygogon), 158.
lindsayi (Halcyon), 110.
linearis (Chiroxiphia), 222.
 — (Geotrygon), 771.
lineata (Acanthiza), 366.
 — (Conopophaga), 169.
 — (Excalfactoria), 816.
 — (Megalæma), 39.
 — (Numenius), 944.
 — (Pelagodroma), 1030.
 — (Pytelia), 578.
 — (Sarothrura), 969.
 — (Spermophila), 616.
lineata (Tigrisoma), 919.
lineaticeps (Ancistrops), 193.
lineaticeps (Picolaptes), 1071.
lineatocapilla (Dendroornis), 190.
lineatocephala (Xiphocolaptes), 188.
lineatum (Ciccaba), 893.
lineatum (Trochaloxyron), 322.
lineatus (Buteo), 856.
 — (Ceophlœus), 82.
lineatus (Cuculus), 51.
lineatus (Cymbilanius), 185.
 — (Gennæus), 800.
 — (Graucalus), 296.
lineiventris (Anthus), 445.
lineola (Bolborhynchus), 14.
lineola (Spermophila), 617.
lineolata (Pachycephala), 480.
lineolatus (Bolborhynchus), 14.
linota (Cannabina), 590.
linteatus (Heterocercus), 224.
litæ (Chloronerpes), 1057.
 — (Myiobius), 1077.
litsitsirupa (Psophodichla), 406.
littayei (Pachycephala), 478.
littoralis (Conirostrum), 687.
 — (Colyle), 257.
 — (Montifringilla), 595.
 — (Ochthornis), 227.
 — (Phœnicothraupis), 657.
liventer (Butastur), 859.
livia (Columba), 749.
livida (Agriornis), 224.
lividus (Mimus), 415.
livingstoni (Turacus), 89.
livingstonii (Erythrocerus), 275.
 — (Saxicola), 390, 1092.
lizanoi (Grallaria), 170.
lloydi (Psaltiparus), 466, 1101.
lobata (Biziura), 1002.
lobata (Phalaropus), 957.
lobatus (Lobivanellus), 931.
lobatus (Lobotus), 300.
locustelloides (Chætornis), 352.
loculator (Tantalus), 905.
loddigesi (Cephalolepis), 164.
lodoisia (Coturnix), 815.
lomitensis (Thryothorus), 422.
lomvia (Uria), 1043.
longa (Dierurus), 529.
longicauda (Bartramia), 949.
 — (Dendrocincla), 186.
 — (Discura), 166.
 — (Elminia), 281.
 — (Graucalus), 296.
 — (Henicoperis), 866.
 — (Icteria), 438.
 — (Motacilla), 443.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Palaornis), 20.
longicauda (Stereocorarius), 1028.
 — (Suthora), 471.
longicauda (Sutoria), 361.
 — (Talegallus), 788.
 — (Urocharis), 675.
longicaudata (Ellisia), 351.
 — (Lanius), 1103.
 — (Urocichla), 426.
longicaudatus (Dierurus), 530.
 — (Mimus), 415.
 — (Nyctibius), 118.
longicaudus (Malurus), 367.
longicornis (Scops), 885.
longimembris (Pseudotantalus), 905.
longipennis (Chlorophonia), 671.
 — (Cinclodes), 1073.
 — (Columba), 1114.
 — (Furnarius), 204.
 — (Macrodipteryx), 120.
 — (Macropteryx), 130.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Pitta), 1073.
 — (Sterna), 1015.
longipes (Miro), 270.
longipes (Myrmeciza), 174, 1069.
 — (Xanthocephalus), 554.
 — (Xenicus), 206.

- longirostris* (*Acrocephalus*), 369.
 — (*Arachnothera*), 705.
 — (*Arbelorhina*), 690.
 — (*Chalcophaps*), 766.
 — (*Chrysomitris*), 592.
 — (*Chrysuronia*), 140, 1066.
 — (*Dendroplex*), 189.
 — (*Dicrurus*), 531.
 — (*Floricola*), 160, 1068.
longirostris (*Furnarius*), 204.
 — (*Grus*), 922.
longirostris (*Hæmatopus*), 932.
 — (*Harporhynchus*), 417.
 — (*Herpsilochmus*), 178.
 — (*Iole*), 312.
 — (*Melanotis*), 417.
 — (*Meliornis*), 723.
 — (*Nasica*), 187.
 — (*Numenius*), 944.
 — (*Estrelata*), 1035.
 — (*Otocorys*), 451.
longirostris (*Parus*), 462.
longirostris (*Phaethornis*), 132.
 — (*Pyrrhospiza*), 604.
 — (*Rallus*), 959.
 — (*Rhizothera*), 811.
 — (*Sphenura*), 349.
 — (*Stenopsis*), 121.
longirostris (*Tatara*), 369.
longirostris (*Thryophilus*), 421.
 — (*Timelia*), 310.
 — (*Zosterops*), 709.
longuemareus (*Phaethornis*), 132.
longuemarii (*Anthreptes*), 704.
lopezi (*Apalis*), 1089.
 — (*Astur*), 1116.
 — (*Cryptillas*), 1088.
 — (*Halcyon*), 1062.
lophorhinus (*Dissemuropsis*), 532.
lophotes (*Baza*), 866.
 — (*Homorus*), 195.
 — (*Ocyphaps*), 768.
loquax (*Coracias*), 1060.
loralis (*Pœcilodryas*), 271.
lorata (*Sterna*), 1018.
lorealis (*Arses*), 288.
lorenzi (*Hierofalco*), 876.
 — (*Phylloscopus*), 378.
loreto-yacuensis (*Thamnophilus*), 183.
lorie (*Aegothales*), 116.
loriæ (*Casuarus*), 1051.
 — (*Eupetes*), 319.
 — (*Loria*), 524.
 — (*Pitta*), 209.
loricata (*Grallaricula*), 169.
loricata (*Myrmeciza*), 174.
loricatus (*Celeus*), 79.
 — (*Lamprotes*), 652.
 — (*Monarcha*), 290.
 — (*Turdinus*), 331.
lori (*Coracias*), 92.
 — (*Francolinus*), 809.
lory (*Lorius*), 29.
lotenius (*Cinnyris*), 699.
louisadeusis (*Cracticus*), 501.
 — (*Graucalus*), 296.
 — (*Myzomela*), 716.
 — (*Rhipidura*), 278.
louisæ (*Rhynchostruthus*), 596.
lovati (*Cisticola*), 365.
 — (*Indicator*), 1055.
 — (*Otis*), 926.
lowi (*Collocalia*), 129.
lowii (*Sarcops*), 539.
lüberli (*Hyphantornis*), 1107.
 — (*Lanius*), 1103.
 — (*Saxicola*), 1092.
lubomirskii (*Pipreola*), 216.
lucani (*Lophotriorchis*), 850.
lucasana (*Buteo*), 856, 1116.
 — (*Picus*), 71.
 — (*Vireo*), 472.
lucaysiensis (*Myiarchus*), 251.
luchsi (*Myiopsitta*), 14.
luciæ (*Agyrtia*), 136.
 — (*Helminthophaga*), 432.
 — (*Heteroscops*), 887.
luciani (*Eriocnemis*), 154.
 — (*Picus*), 1058.
 — (*Pyrrhura*), 13.
 — (*Rhamphocelus*), 660.
lucida (*Amazilia*), 138.
 — (*Arbelorhina*), 690.
 — (*Hirundo*), 254.
 — (*Psittacula*), 15.
lucidus (*Bubulcus*), 913.
 — (*Chrysocolaptes*), 80.
 — (*Chrysococcyx*), 53.
 — (*Hemignathus*), 693.
 — (*Phalacrocorax*), 1007.
lucieni (*Nigrita*), 575.
lucifer (*Calothorax*), 160.
lucionensis (*Enneoclonus*), 486.
luconensis (*Prioniturus*), 17.
 — (*Tanygnathus*), 18.
luciosa (*Myristicivora*), 747.
 — (*Spermophila*), 617.
luctuosus (*Tachyphonus*), 655.
 — (*Thamnophilus*), 183.
ludovicensis (*Cinnyris*), 699.

- ludoviciae* (Hemistephania), 131.
 — (Merula), 396.
ludoviciana (Ardea), 911.
ludoviciana (Pyrranga), 659.
ludovicianus (Hedymeles), 612.
 — (Lanius), 484, 1103.
ludovicianus (Sturnella), 555.
ludovicianus (Thryothorus), 422.
ludwigi (Otis), 925.
ludwigii (Dicrurus), 529.
luehderi (Cinnyris), 699.
 — (Laniarius), 491.
lugens (Butalis), 262.
 — (Conirostrum), 1112.
 — (Dryonastes), 328.
 — (Eriocnemis), 154.
 — (Motacilla), 443.
 — (Parisoma), 1081.
 — (Sarothrura), 970.
 — (Saxicola), 388.
 — (Turtur), 759.
lugentoides (Saxicola), 388.
luggeri (Myiozetetes), 242.
lugubris (Acanthopneuste), 377.
 — (Brachygalba), 45.
 — (Campophaga), 300.
 — (Celeus), 79.
 — (Ceryle), 114, 1062.
 — (Cisticola), 365.
 — (Contopus), 248.
 — (Coracocichla), 210.
 — (Dendropicus), 74.
 — (Hypocnemis), 174.
 — (Melanocichla), 327.
 — (Motacilla), 442.
 — (Ninox), 887.
 — (Ochthodroma), 225.
 — (Parus), 463.
 — (Pœoptera), 546.
 — (Quiscalus), 560.
 — (Saxicola), 388.
 — (Surniculus), 501.
 — (Zosterops), 711.
luguieri (Myiagra), 283.
lulu (Strix), 899.
lumachellus (Augastes), 159.
luminosa (Cyanophaea), 137.
 — (Iolœnia), 150.
 — (Quiscalus), 560.
lunala (Sterna), 1016.
lunatus (Serilophus), 205.
lunifrons (Petrochelidon), 258.
lunigera (Calliste), 668.
lunulata (Anellobia), 724.
 — (Gallopodix), 817.
lunulata (Ianthocincla), 323.
 — (Oreocincla), 403.
 — (Pithys), 173.
 — (Pœcilothraupis), 664.
lunulatus (Bolbopsittacus), 22.
 — (Hypotriorchis), 873.
 — (Melithreptus), 714.
lurida (Turdus), 1093.
luscini (Acrocephalus), 369.
 — (Aedon), 382.
 — (Microcerculus), 430.
luscini (Upucerthia), 203.
luscinioides (Locustella), 370.
lusitanica (Certhilauda), 450.
lutea (Colaptes), 1057.
 — (Liothrix), 347.
 — (Manorhina), 724.
 — (Pseudochloris), 639.
 — (Zosterops), 709.
luteicapilla (Euphonia), 672.
luteifrons (Hylophilus), 474.
 — (Nigrita), 575.
luteiventris (Lophotriccus), 233.
luteiventris (Lusciniola), 371.
 — (Myiodynastes), 244.
 — (Myiozetetes), 242.
 — (Sycalis), 602.
luteocephala (Pseudochloris), 639.
luteocristatus (Cacatua), 2.
luteola (Certhidea), 689.
 — (Cœreba), 691.
 — (Emberiza), 622.
 — (Lædorus), 306.
 — (Muscicapa), 263.
 — (Sitagra), 564.
luteovirens (Chrysœnas), 741.
luteoviridis (Basileuterus), 438.
lutescens (Eremomela), 355.
 — (Helminthophaga), 431.
lutetiæ (Helianthea), 150.
luteus (Colaptes), 62.
luteus (Passer), 599.
lutosus (Polyborus), 832.
luxuosa (Xanthoura), 514.
luzonica (Anas), 990.
 — (Phlogœnas), 772.
 — (Zosterops), 710.
luzoniense (Dicæum), 679.
luzoniensis (Cittocincla), 413.
 — (Loxia), 605.
luzoniensis (Motacilla), 443.
 — (Muscicapa), 263.
luzoniensis (Muscicapula), 294.
lyalli (Traversia), 206.
lyogyrus (Cicinnurus), 1105.

- lyra (*Macropsalis*), 120.
 lyrura (*Philodice*), 161.
maackii (*Acrocephalus*), 370.
 macao (*Ara*), 10.
macartneyi (*Lophura*), 799.
macassariensis (*Macropygia*), 754, 1114.
 macavuanna (*Ara*), 10.
maccalli (*Erythrocercus*), 275.
 — (*Ortalia*), 793.
macclellandi (*Iole*), 312.
 — (*Pomathorinus*), 326.
macclounii (*Pogonorrhynchus*), 35.
maccoa (*Erismatura*), 1001.
macconnelli (*Picumnus*), 1059.
 — (*Zonotrichia*), 1110.
maccormicki (*Megalestris*), 1027.
maccowni (*Plectrophanes*), 624.
maccoyi (*Cyclopsitta*), 33.
macedonica (*Acredula*), 467.
macei (*Graucalus*), 296.
 — (*Picus*), 72.
macfarlanei (*Scops*), 886.
macgregorii (*Cnemophilus*), 524.
machiki (*Geocichla*), 404.
macilvainii (*Elafina*), 240, 1076.
macilwraithi (*Cyclopsitta*), 34.
macleannani (*Phlogopsis*), 172.
macleayæ (*Falcinellus*), 520.
macleayana (*Cyclopsitta*), 33.
macleayana (*Ptilotis*), 720.
macleayi (*Halcyon*), 108.
macleodi (*Otophanes*), 121.
maclouviani (*Muscisaxicola*), 230.
macdonaldi (*Nesomimus*), 416.
macgillivrayi (*Bulweria*), 1036.
 — (*Geothlypis*), 438.
 — (*Megapodius*), 787, 1115.
 — (*Oporornis*), 1097.
 — (*Platycercus*), 1054.
macgillivrayi (*Rhipidura*), 276.
macgillivrayi (*Zosterops*), 710.
macgrigoriæ (*Niltava*), 295.
mackenziana (*Cryptolopha*), 286.
mackinderi (*Bubo*), 880.
mackinlayi (*Macropygia*), 756.
mackinnoni (*Lanius*), 484.
mackloti (*Dicaeum*), 677.
 — (*Hapalarpactes*), 88.
 — (*Pitta*), 209.
macquariensis (*Hypotaenidia*), 962.
macquonii (*Houbara*), 926.
macrocephala (*Petroeca*), 267.
macrocerca (*Hylonympha*), 150.
 — (*Penthetria*), 574.
macrocerus (*Eupetes*), 319.
macroactyla (*Gallinago*), 953.
 — (*Oceanodroma*), 1029.
macroactylus (*Bucco*), 47.
 — (*Turdinus*), 331.
macrolopha (*Puerasia*), 801.
macromystax (*Antrostomus*), 122.
macronychus (*Buteo*), 857.
macronyx (*Acrocephalus*), 369.
macronyx (*Ægithalus*), 468.
 — (*Pipilo*), 637.
macroptera (*Microeca*), 363.
 — (*Ninox*), 888.
macroptera (*Estrelata*), 1033.
macroptera (*Trichostoma*), 333.
macropterus (*Lyncornis*), 119.
macropteryx (*Thlypopsis*), 653.
macropus (*Scytalopus*), 167, 1068.
macrorhina (*Melidora*), 105.
macrorhyncha (*Bubo*), 881.
 — (*Butorides*), 916.
macrorhyncha (*Calyptorhynchus*), 2.
 — (*Cinclocerthia*), 414.
 — (*Colluricincla*), 496.
 — (*Dendrocincla*), 186.
 — (*Nucifraga*), 506.
 — (*Oreocincla*), 403.
 — (*Pachycephala*), 476.
 — (*Rhea*), 1052.
macrorhyncha (*Stenopsis*), 121.
macrorhynchus (*Bucco*), 46.
 — (*Corvus*), 503.
 — (*Cymborhynchus*), 206, 1073.
 — (*Turacus*), 89.
macroscelus (*Circus*), 836.
macroscelides (*Astur*), 841.
macrootis (*Lyncornis*), 119.
macroura (*Muscicapa*), 263.
macroura (*Troglodytes*), 1096.
macroura (*Zenaidura*), 757.
macrourus (*Amytis*), 349.
 — (*Caprimulgus*), 123, 1063.
 — (*Colius*), 91.
 — (*Dendrortyx*), 818.
 — (*Oriolus*), 526.
macrura (*Eupetomena*), 134.
 — (*Penthetria*), 573.
macrura (*Sterna*), 1015.
macrura (*Tardivola*), 639.
 — (*Thalassoaëtus*), 853.
macrurus (*Asio*), 879.
 — (*Circus*), 836.
 — (*Cittocincla*), 413, 1094.
 — (*Megalurus*), 351.
 — (*Quiscalus*), 560.
 — (*Trogon*), 87.

- macrurus* (Urolithorichis), 838.
macularia (Acanthiza), 366.
 — (Actitis), 948.
 — (Grallaria), 170.
maculata (Adelomyia), 1067.
 — (Anthus), 445.
 — (Aquila), 852.
 — (Caloenas), 775.
 — (Casuarius), 1052.
 — (Chlamydera), 523.
maculata (Colinus), 820.
maculata (Harporhynchus), 1095.
 — (Melipotes), 728.
 — (Ninox), 888.
 — (Oreomyza), 692.
 — (Oriolus), 526.
 — (Ptilotis), 720.
 — (Sericornis), 367.
 — (Strachyrhis), 339.
 — (Strix), 899.
 — (Tachycineta), 256.
 — (Terenura), 177.
 — (Thamnophilus), 183.
 — (Tringa), 952.
 — (Zenaida), 757.
maculatum (Todiostrom), 231.
maculatus (Bucco), 47.
 — (Chrysococcyx), 53.
 — (Dendrocopus), 185.
 — (Henicurus), 450.
 — (Indicator), 34.
 — (Pipilo), 636.
 — (Prionochilus), 675.
 — (Rallus), 961.
maculatus (Tetrao), 825.
maculatus (Yungipicus), 75.
maculi-alatus (Pendulinus), 557.
maculicauda (Agyrtria), 1065.
 — (Hypocnemis), 174.
 — (Siptornis), 1072.
maculicaudis (Cercomacra), 176.
maculicaudus (Antrostomus), 122.
maculiceps (Chrysocolaptes), 80.
maculiceps (Sarganura), 722.
maculicollis (Indicator), 34.
maculicollis (Rhynchotus), 784.
 — (Serinus), 601.
 — (Sutoria), 361.
maculicoronatus (Capito), 41.
maculifrons (Eleopicus), 76.
maculipectus (Phabotreron), 734.
maculipectus (Phacelodomus), 196.
maculipectus (Rhipidura), 278.
 — (Thryothorus), 423.
maculipennis (Larus), 1022.
maculipennis (Otis), 926.
 — (Phyllobasileus), 378.
 — (Pygoptila), 181.
maculirostris (Muscisaxicola), 230.
maculirostris (Querquedula), 992.
maculirostris (Selenidera), 44.
 — (Turdus), 401.
maculosa (Anas), 990.
 — (Campothera), 66.
maculosa (Cercomacra), 176.
maculosa (Columba), 750.
 — (Dendroeca), 434.
 — (Nothura), 785.
 — (Prinia), 358.
 — (Turnix), 779.
maculosus (Eluroedus), 523.
 — (Bubo), 880.
 — (Circus), 836.
maculosus (Edicnemus), 928.
mada (Columba), 750.
 — (Prioniturus), 1054.
madagascariensis (Accipiter), 845.
 — (Agapornis), 22.
 — (Alectrenas), 742.
 — (Anastomus), 907.
 — (Asio), 878.
 — (Baza), 867.
 — (Bernieria), 314.
 — (Calicalicus), 487.
 — (Caprimulgus), 123.
 — (Centropus), 56.
 — (Fondia), 566.
 — (Hartlaubius), 540.
 — (Ispidina), 111.
 — (Ixocincla), 316.
 — (Margaroperdix), 812.
madagascariensis (Mascarinus), 18.
 — (Muscicapa), 263.
 — (Nettopus), 981.
madagascariensis (Oxylabes), 338.
 — (Phedina), 259.
 — (Porphyrio), 975.
madagascariensis (Querquedula), 994.
madagascariensis (Rallus), 960.
 — (Tylas), 317.
madagascariensis (Zosterops), 707.
madaraszi (Colluricincla), 1104.
 — (Psittacella), 21.
 — (Pyrrhulauda), 1100.
 — (Serinus), 1109.
madeirensis (Petronia), 596.
maderaspata (Zosterops), 707.
maderaspata (Motacilla), 443.
maderensis (Fringilla), 589.
 — (Regulus), 379.

- madrensis* (Columba), 751.
maësi (Ampelis), 260.
mæsi (Dryonastes), 328.
mafoorana (Pitta), 208.
maforensis (Dicæum), 678.
 — (Gerygone), 269.
 — (Graucalus), 296.
 — (Hermotimia), 700.
 — (Macropygia), 755.
 — (Nasiterna), 24.
magdalenæ (Thryothorus), 423.
magellanica (Chloëphaga), 985.
 — (Gallinago), 954.
 — (Turdus), 400.
magellanicus (Bubo), 881.
 — (Campophilus), 81.
 — (Phalacrocorax), 1009.
magellanicus (Sarcorhamphus), 828.
magellanicus (Scytalopus), 166.
 — (Spheniscus), 1019.
magentæ (Estrelata), 1034.
magica (Scops), 884.
magister (Myiarchus), 250.
 — (Vireo), 472.
magna (Acanthornis), 367.
 — (Arachnothera), 705.
 — (Caccabis), 807.
 — (Galerida), 458.
 — (Macropygia), 754, 1114.
 — (Sitta), 681.
 — (Sturnella), 555.
magnifica (Ethopyga), 696.
magnifica (Ketupa), 879.
magnifica (Megaloprepia), 742.
 — (Ptilorhis), 521.
magnificus (Diphyllodes), 519.
 — (Lophornis), 165.
 — (Nycticorax), 917.
magnirostre (Malacopteron), 337.
magnirostris (Acanthopneuste), 376.
magnirostris (Acrocephalus), 368.
 — (Alcippe), 345.
magnirostris (Baza), 867.
 — (Casiempis), 237.
magnirostris (Charadrius), 937.
magnirostris (Cyanorhamphus), 26.
 — (Cæreba), 690.
magnirostris (Enneoctonus), 487.
magnirostris (Eophona), 610.
 — (Eopsaltria), 481.
 — (Esacus), 929.
 — (Geospiza), 608.
 — (Gerygone), 269.
 — (Graucalus), 297.
 — (Mimus), 416.
magnirostris (Myiarchus), 251.
 — (Palæornis), 19.
 — (Phaëthus), 1013.
 — (Pheucticus), 611.
 — (Pipilo), 637.
 — (Rhamphocælus), 660.
 — (Rupornis), 859.
 — (Sasia), 1059.
 — (Sericornis), 367.
 — (Siphia), 293.
 — (Tyrannus), 252.
 — (Urocissa), 507.
magnoides (Saltator), 645.
magnum (Malacopteron), 337.
magnus (Macruropsar), 543.
 — (Saltator), 645.
magnus (Tringa), 951.
maguari (Euxenura), 906.
mahali (Ploceipasser), 569.
mahrattensis (Acridotheres), 538.
 — (Caprimulgus), 124.
 — (Picus), 72.
maillard (Circus), 836.
maingayi (Syrnium), 892.
maja (Munia), 588.
major (Acredula), 467.
 — (Echmophorus), 1042.
 — (Aedon), 382.
 — (Asio), 878.
 — (Callene), 408.
 — (Carduelis), 591.
 — (Cettia), 372.
 — (Cissopis), 644.
 — (Cisticola), 363.
 — (Crotophaga), 62.
major (Dendrocoryna), 987.
major (Diglossa), 686.
 — (Emberiza), 621.
 — (Eurypyga), 921.
major (Gallinago), 953.
 — (Graucalus), 296.
major (Indicator), 34, 1055.
 — (Laniarius), 491.
 — (Lanius), 483.
 — (Leptopœcile), 379.
 — (Lorius), 1054.
 — (Luscinola), 371.
 — (Macropteryx), 130.
 — (Oryzoborus), 613.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Palæornis), 1054.
 — (Parus), 461.
 — (Picus), 70.
major (Ptatalea), 904.

- major* (Podicipes), 1042.
major (Polioaetus), 877.
 — (Polioptila), 1091.
major (Puffinus), 1031.
major (Quiscalus), 560.
 — (Schiffornis), 223.
 — (Tanagra), 661.
 — (Thamnophilus), 184.
 — (Tinamus), 781.
 — (Veniliornis), 1059.
 — (Xiphocolaptes), 188.
majoroides (Picus), 70.
malabarica (Aidemosyne), 585.
 — (Chloropsis), 317.
 — (Crateropus), 330.
 — (Galerida), 458.
 — (Osmotreron), 733.
 — (Pericrocotus), 301.
 — (Tænioglaux), 897.
 — (Xantholæma), 40.
malabaricus (Anthraccoceros), 100.
 — (Sarcophorus), 934.
malabaricus (Scops), 884.
malabaricus (Spodiopsar), 536.
malabaroides (Dissemurus), 533.
malacca (Munia), 588.
malaccensis (Anuropsis), 333.
 — (Anthreptes), 704, 1113.
 — (Chrysophlegma), 67.
 — (Cymborhynchus), 206, 1073.
 — (Hemixus), 315, 1086.
 — (Passer), 597.
 — (Pelargopsis), 114.
malachurus (Stipiturus), 348.
malacoptilus (Rimator), 332.
malacorhynchus (Hymenolæmus), 1002.
malagæ (Metallura), 156.
malamau (Ceyx), 112.
malaris (Phaethornis), 1064.
malayana (Anthipes), 294.
 — (Chrysococyx), 53.
 — (Oreocinclæ), 403.
 — (Scops), 883.
 — (Siva), 1088.
malayanus (Anthraccoceros), 101.
malayanus (Indicator), 34.
malayensis (Chaptia), 532.
 — (Ictinaëtus), 850.
malcolmi (Argya), 324.
maleo (Megacephalon), 789.
malherbei (Campophilus), 81.
 — (Campothera), 1057.
 — (Cyanorhamphus), 26.
 — (Turturæna), 753.
malimbicus (Halcyon), 107.
malimbicus (Merops), 97.
malouinus (Attagis), 780.
maltae (Passer), 1109.
malura (Formicivora), 178.
maluroides (Siptornis), 200.
malzacii (Dryoscopus), 492.
manacus (Chiromachæris), 222.
manadensis (Monarchia), 290.
mandarina (Rallina), 966.
mandarinus (Merula), 395.
mandellii (Arboricola), 814.
 — (Lusciniola), 371.
 — (Minla), 344.
 — (Montifringilla), 594.
mandellii (Siphia), 264.
mandibularis (Nycticorax), 918.
mandli (Uria), 1044.
manecoensis (Rhipidura), 280.
mangle (Aramides), 963.
mango (Lampornis), 145.
mangoliensis (Ptilopus), 736.
manillæ (Penelopides), 102.
manillensis (Accipiter), 847.
 — (Ardea), 910.
 — (Caprimulgus), 123.
manillensis (Muscicapa), 263.
manillensis (Nycticorax), 918.
manillensis (Pelecanus), 1005.
manimbe (Ammodromus), 632.
manningi (Cosmophoneus), 490.
manipurensis (Micropodix), 813.
mansuetus (Cygnus), 987.
mantananensis (Scops), 885.
mantchuricum (Crossoptilon), 799.
mantelli (Apteryx), 1049.
 — (Notornis), 976.
mantis (Scops), 885.
mantoui (Lophophorus), 797.
 — (Ptilorhis), 521.
manyar (Ploceus), 567.
marabou (Leptoptilus), 907.
maracana (Ara), 10.
marail (Penelope), 791.
maraisi (Chlorophoneus), 491.
maranonica (Synallaxis), 198.
maranonicus (Turdus), 400.
marayniocensis (Siptornis), 200.
marchei (Chlorocichla), 1085.
 — (Cleptornis), 722.
 — (Glareola), 930.
marchei (Hypotaenidia), 961.
marchei (Numida), 804.
 — (Ptilopus), 735.
marchei (Xenocichla), 310.
marchesæ (Pericrocotus), 301.

- marchii* (Anthracoceros), 101.
 — (Phonipara), 618.
mareensis (Merula), 396.
margaretæ (Ceyx), 112.
margarethæ (Coeligena), 148.
 — (Cyanolesbia), 157.
 — (Tanyptera), 106.
margarilaceiventer (Euscarthmus), 232.
margaritæ (Calliste), 667.
 — (Certhilauda), 450.
 — (Charmosyna), 32.
margaritæ (Phlogoenas), 773.
margaritæ (Sporæginthus), 581, 1108.
margaritata (Pygoptila), 181.
margaritatus (Hypargus), 579.
 — (Trachyphonus), 40.
margaritifera (Hypocnemis), 1069.
margelanica (Sylvia), 375.
marginalis (Amadina), 579.
 — (Cisticola), 364.
 — (Hylia), 272, 1080.
 — (Pendulinus), 558.
 — (Rallina), 966.
marginata (Ægialitis), 940.
marginata (Aplonis), 541.
marginata (Cinclosoma), 319.
 — (Collocalia), 130.
marginata (Edoliisoma), 298.
marginata (Mirafr), 455, 1099.
marginata (Myrmeciza), 1069.
marginata (Rhynchoecyclus), 1077.
 — (Upupa), 99.
 — (Zoolthera), 404.
marginatus (Microcerculus), 430.
marginatus (Myiozetetes), 241.
 — (Pachyrhamphus), 212.
maria (Paradisea), 518.
 — (Pitta), 208.
mariae (Cardinalis), 620.
 — (Chrysophilus), 67.
 — (Megalurulus), 324.
 — (Puffinus), 1031.
 — (Urolais), 1089.
marianæ (Cistothorus), 424.
 — (Troglodytes), 425, 1096.
marianæ (Acrocephalus), 369.
marila (Cinclus), 419.
 — (Fuligula), 997.
marina (Pelagodroma), 1030.
marinus (Larus), 1024.
mariquensis (Bradyornis), 287.
 — (Cinnyris), 698.
maritima (Agriornis), 224.
 — (Geositta), 204.
 — (Tringa), 951.
maritimus (Ammodromus), 631.
markhami (Oceanoedroma), 1029.
marmorata (Marmaronetta), 995.
marmorata (Nothura), 785.
 — (Odontophorus), 822.
 — (Podargus), 117.
 — (Ptilotis), 722.
marmoratum (Tigrisoma), 919.
marmoratus (Brachyrhamphus), 1044.
marmoratus (Scops), 885.
 — (Turdinus), 331.
marshallorum (Megalæma), 38.
marstersi (Acanthiza), 1090.
martensi (Prionops), 1104.
martii (Urospatha), 93.
martinica (Elainea), 239.
 — (Geotrygon), 770.
 — (Porphyriola), 975.
marlinicana (Cereba), 691.
 — (Zenaida), 757.
martinicensis (Blacicus), 249.
 — (Quiscalus), 1107.
 — (Thryothorus), 422.
martius (Dryocopus), 83.
marueta (Porzana), 967.
marungensis (Numida), 804.
marwitzii (Andropadus), 313.
 — (Estrela), 582.
 — (Lanius), 1103.
masafueræ (Oxyurus), 202.
masoni (Pyroderus), 218.
massaica (Dendropicus), 1058.
 — (Chloropeta), 274.
 — (Poicephalus), 9.
 — (Struthio), 1052.
massaicum (Tricholema), 36.
massaicus (Lamprocolius), 1106.
massena (Trichoglossus), 30.
massenæ (Trogon), 87.
mastersi (Gerygone), 269.
mastersianus (Platycercus), 24.
masukuensis (Andropadus), 313.
 — (Parus), 461.
matschiei (Poicephalus), 9.
matthewsi (Panoplitus), 153.
matthiæ (Halcyon), 1062.
 — (Rhipidura), 1081.
matui (Alseonax), 264.
mauduyti (Spizaetus), 848.
maugæi (Sporadinus), 142.
maugei (Conurus), 12.
 — (Geopelia), 762.
maugei (Ninox), 888.
maura (Pratincola), 387.
mauri (Ereunetes), 949.

- mauritana* (Picus), 70.
mauritanica (Clivicola), 1079.
 — (Merula), 1092.
 — (Pica), 507.
mauritiana (Zosterops), 713.
maurus (Circus), 836.
mavors (Heliangelus), 155.
maicensis (Cossypha), 1094.
maxillaris (Molothrus), 552.
 — (Sphecotheres), 528.
maxillosus (Saltator), 645.
maxima (Apteryx), 1049.
maxima (Ceryle), 114.
 — (Colluricincla), 496.
 — (Lanthocincla), 322.
 — (Melanocorypha), 452.
 — (Merula), 395.
 — (Numida), 804.
 — (Pitta), 207.
 — (Sterna), 1016.
maximiliani (Oryzoborus), 613.
 — (Pionus), 7.
 — (Pitangus), 243.
 — (Pulsatrix), 892.
 — (Synallaxis), 199.
maximus (Artamus), 533.
maximus (Bubo), 880.
maximus (Macrurapsar), 543.
maxwelli (Aplonis), 1105.
 — (Hylocharis), 140.
 — (Melanopteryx), 1107.
 — (Philentoma), 281.
maxwelliæ (Scops), 886.
mayensis (Bubo), 881.
mayeri (Nesoenas), 753.
maynana (Cotinga), 216.
 — (Myrmeciza), 174.
maynardi (Coccyzus), 54.
 — (Geothlypis), 1097.
 — (Picus), 71.
 — (Vireo), 473.
mayottensis (Zosterops), 709.
mcgregori (Carpodacus), 604.
mcleodi (Hæmophila), 634.
meadewaldoi (Cannabina), 1109.
mearnsi (Cyrtonyx), 821.
mearnsi (Harporhynchus), 417.
 — (Junco), 629.
mechowi (Ægialitis), 940.
 — (Cercococcyx), 51.
 — (Melierax), 839.
media (Calospiza), 1112.
 — (Chloropsis), 318.
 — (Gallinago), 953.
 — (Nothura), 785.
media (Sterna), 1016.
 — (Urobrachya), 1108.
mediana (Alopius), 104.
 — (Picus), 1058.
 — (Saltator), 1111.
mediocris (Cinnyris), 699.
 — (Halcyon), 108.
medioximus (Sphenocercus), 1114.
medius (Monarcha), 289.
 — (Picus), 72.
medius (Tetrao), 825.
meeki (Anthreptes), 704.
 — (Cacomantis), 1056.
 — (Ceyx), 1062.
 — (Dicrurus), 1105.
 — (Hypocharmosyna), 1055.
 — (Loriculus), 23.
 — (Pachycephala), 481.
 — (Pitta), 209.
 — (Podargus), 117.
 — (Syma), 1062.
 — (Zosterops), 711.
meiffreni (Ortyxelus), 930.
megacephalum (Calopteryx), 234.
megacephalus (Rhynchocyclus), 242.
megala (Gallinago), 953.
megalonyx (Pipilo), 637.
megalopterus (Campylorhynchus), 420.
 — (Ibycter), 832.
megalorhynchus (Squatarola), 937.
 — (Melilestes), 718.
megalorhynchus (Tanygnathus), 18.
megalornis (Dicrurus), 531.
megalotis (Scops), 883.
megalura (Leptoptila), 769.
megapodius (Hylactes), 168.
megarhyncha (Colluricincla), 496.
 — (Dendroornis), 1071.
 — (Hæmophila), 635.
 — (Passerella), 635.
 — (Ploceus), 1107.
 — (Pitta), 207.
 — (Psittacus), 3.
 — (Syma), 110.
megarhynchus (Dicranostreptus), 532.
 — (Leptodon), 866.
 — (Melilestes), 718.
 — (Rhamphomantis), 55.
megistus (Aphobus), 561.
mekena (Ardeiralla), 915.
 — (Munia), 587.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Pentholæa), 392.
melaleucus (Tachyphonus), 655.
melamprosopus (Cosmophoneus), 490.

- melananthera* (*Spathura*), 153.
melanaria (*Cercomacra*), 176.
 — (*Merula*), 396.
melanauchen (*Pyrrhuloxia*), 459.
 — (*Sterna*), 1018.
melancholicus (*Baryphthengus*), 95.
melancholicus (*Tyrannus*), 252.
melania (*Oceanodroma*), 1029.
melanictera (*Ixidia*), 308.
melanicterus (*Cassiculus*), 551.
 — (*Gymnomystax*), 556.
 — (*Melophus*), 624.
melanisticus (*Oriolus*), 526.
melanocephala (*Elanoides*), 523.
 — (*Anthornis*), 723.
 — (*Ardea*), 910.
 — (*Arenaria*), 949.
 — (*Burnesia*), 360.
 — (*Caccabis*), 807.
 — (*Caica*), 8.
 — (*Emberiza*), 622.
 — (*Heteronetta*), 996.
 — (*Ibis*), 901.
 — (*Motacilla*), 444.
 — (*Setophaga*), 441.
 — (*Spermophila*), 616.
 — (*Zosterops*), 712.
melanocephalum (*Malacopteron*), 337.
 — (*Tricholæma*), 36.
melanocephalus (*Ampelion*), 215.
 — (*Brachypodius*), 308.
 — (*Buarremon*), 648.
 — (*Conurus*), 11.
 — (*Cyrlostomus*), 703.
melanocephalus (*Garrulus*), 510.
melanocephalus (*Graucalus*), 296.
 — (*Hedymeles*), 612.
 — (*Hyphantornis*), 562.
 — (*Larus*), 1021.
 — (*Malurus*), 368.
 — (*Melithreptus*), 714.
 — (*Melizophilus*), 375.
melanocephalus (*Monarcha*), 289.
melanocephalus (*Oriolus*), 527.
 — (*Pardalotus*), 674.
 — (*Pendulinus*), 557.
melanocephalus (*Pluvianus*), 930.
melanocephalus (*Ptilopus*), 740.
 — (*Sarciophorus*), 934.
 — (*Tragopan*), 797.
 — (*Trogon*), 87.
melanoceps (*Dendrocolaptes*), 185.
melanocervix (*Motacilla*), 445.
melanochlamys (*Irena*), 317.
 — (*Urospizias*), 843.
melanochlorus (*Chrysophilus*), 66.
melanochroa (*Carpophaga*), 747.
melanochrous (*Serinus*), 600.
 — (*Thamnophilus*), 183.
melanocoryphus (*Coccyzus*), 54.
 — (*Cygnus*), 987.
melanocrissa (*Hirundo*), 255.
melanocrissus (*Thamnophilus*), 184.
melanocyanea (*Cyanolyca*), 513.
melanoderus (*Phrygilus*), 640.
melanogaster (*Fregetta*), 1030.
 — (*Heterhyphantes*), 565.
 — (*Lamprocolius*), 547.
melanogaster (*Oreotrochilus*), 147.
 — (*Olis*), 926.
 — (*Plotus*), 1011.
 — (*Spermophila*), 616.
 — (*Sterna*), 1014.
 — (*Thryothorus*), 423.
 — (*Turdus*), 779.
melanogastra (*Cinclus*), 418.
 — (*Conopophaga*), 169.
 — (*Formicivora*), 177.
 — (*Myrmotherula*), 179.
 — (*Nectarinia*), 694.
 — (*Piaya*), 58.
 — (*Pternistes*), 811.
melanogenia (*Gallula*), 45.
melanogenys (*Adelomyia*), 154.
melanogenys (*Anous*), 1019.
melanogenys (*Basileuterus*), 440.
 — (*Cyclopsitta*), 34.
 — (*Falco*), 874.
 — (*Pœcilodryas*), 271.
 — (*Pœcilothraupis*), 664.
melanolæma (*Chrysophilus*), 66.
 — (*Pipreola*), 216.
 — (*Rhipidura*), 277.
melanolæmus (*Pipilopsis*), 648.
melanoleuca (*Anseranas*), 979.
melanoleuca (*Atticora*), 258.
 — (*Lalage*), 302.
 — (*Lamprospiza*), 644.
 — (*Malacias*), 324.
 — (*Muscicapula*), 294.
 — (*Oreicola*), 273.
 — (*Poospiza*), 628.
 — (*Rhipidura*), 279.
 — (*Saxicola*), 389.
 — (*Terenura*), 177.
melanoleucens (*Accipiter*), 847.
 — (*Aëronantes*), 126.
 — (*Artamus*), 533.
 — (*Campophilus*), 81.
 — (*Circus*), 836.

melanoleucus (*Geranoaëlus*), 860.
 — (*Lophoceros*), 103.
 — (*Micrastur*), 837.
 — (*Microhierax*), 868.
 — (*Microtarsus*), 309.
 — (*Phalacrocorax*), 1010.
 — (*Spiziastur*), 850.
 — (*Totanus*), 947.
 — (*Urolestes*), 482.
melanolophus (*Gorsachius*), 918.
 — (*Lophophanes*), 465.
melanolorus (*Graucalus*), 296.
melanonola (*Amblyospiza*), 570.
 — (*Calliste*), 667.
 — (*Climacteris*), 684.
 — (*Gossypha*), 409.
 — (*Pipridea*), 669.
 — (*Pulsatrix*), 892.
 — (*Sarcidiornis*), 980.
 — (*Urochroma*), 8.
melanonotus (*Gennæus*), 800.
 — (*Monarcha*), 290.
 — (*Odontophorus*), 822.
 — (*Porphyrio*), 976.
 — (*Thamnophilus*), 183.
melanope (*Motacilla*), 444.
melanopezus (*Automolus*), 195.
melanophæus (*Creciscus*), 971.
melanophrys (*Diomedea*), 1038.
 — (*Manorhina*), 723.
melanopis (*Theristicus*), 902.
melanopleura (*Merula*), 396.
melanopogon (*Caprimulgus*), 124.
melanopogon (*Hypocnemis*), 174.
 — (*Luscinola*), 371.
 — (*Melanerpes*), 68.
melanops (*Egialitis*), 941.
melanops (*Anous*), 1019.
melanops (*Artamus*), 534.
 — (*Burnesia*), 360.
 — (*Carcineutes*), 110.
 — (*Centropus*), 57.
 — (*Chrysomitris*), 593.
 — (*Conopophaga*), 169.
 — (*Crateropus*), 329.
 — (*Geothlypis*), 437, 1097.
 — (*Graucalus*), 296.
 — (*Leucopternis*), 860.
 — (*Myiadectes*), 407.
 — (*Phleocryptes*), 201.
 — (*Pipilopsis*), 648.
 — (*Pœcilothraupis*), 664.
 — (*Porphyriops*), 974.
 — (*Spermophila*), 616.
 — (*Stoparola*), 291.

melanops (*Zosterops*), 711.
melanopsis (*Monarcha*), 289.
melanopsis (*Theristicus*), 902.
melanoptera (*Campophaga*), 300.
 — (*Cercotrichas*), 413.
 — (*Chloëphiaga*), 985.
 — (*Dendroeca*), 433.
 — (*Glareola*), 929.
 — (*Graculipica*), 537.
 — (*Metriopelia*), 765.
 — (*Mimus*), 1095.
melanoptera (*Platystira*), 266.
melanoptera (*Strepera*), 501.
 — (*Tanagra*), 662.
melanopterus (*Monarcha*), 289.
 — (*Pogonorrhynchus*), 35.
 — (*Prionops*), 1104.
 — (*Stephanibyx*), 936.
melanopygia (*Lanio*), 656.
 — (*Parra*), 958.
melanorhamphus (*Corcorax*), 517.
melanorhyncha (*Colluricincla*), 496.
 — (*Eudynamis*), 54.
 — (*Luscinola*), 371.
 — (*Pelargopsis*), 114.
melanorhyncha (*Sterna*), 1016.
melanorhynchus (*Chlorostilbon*), 141.
 — (*Irrisor*), 1061.
 — (*Ploceipasser*), 569.
melanorrhœa (*Chalybura*), 144.
melanoschista (*Accipiter*), 845.
melanospila (*Ptilopus*), 740.
melanosterna (*Acridothores*), 538.
 — (*Brachygalba*), 46.
melanosternon (*Gypoclinia*), 863.
 — (*Prymnacantha*), 165.
melanostethus (*Buteo*), 857.
melanosticta (*Gymnophithys*), 173.
melanosticta (*Hypocnemis*), 174.
melanostigma (*Trochalopteron*), 321.
melanostoma (*Harporhynchus*), 417.
melanothorax (*Cyanoderma*), 343.
melanothorax (*Gerygone*), 270.
melanothorax (*Sylvia*), 375.
 — (*Thamnophilus*), 184.
melanotis (*Ælurædus*), 523.
 — (*Anaplectes*), 568.
 — (*Basileuterus*), 439.
 — (*Calliste*), 668.
 — (*Chlorospingus*), 652.
 — (*Coryphospiza*), 639.
 — (*Milvus*), 862.
 — (*Nesomimus*), 416.
 — (*Odontophorus*), 822.
 — (*Pionopsitta*), 7.

- melanotis* (Psaltiriparus), 466, 1101.
 — (Pterythrurus), 487.
melanotis (Spilornis), 831.
melanotus (Malurus), 367.
melanotus (Monticola), 393.
melanoxantha (Phainoptila), 261.
melanoxanthus (Heterhyphantes), 565.
 — (Mycerobas), 611.
 — (Prionochilus), 675.
melanura (Anthornis), 723.
 — (Cercomela), 391.
 — (Ceyx), 111.
 — (Cittocincla), 413.
 — (Climacteris), 684.
 — (Dryodromas), 354.
 — (Eophona), 610.
 — (Euphonia), 673.
 — (Henicornis), 202.
 — (Hypocnemis), 174.
melanura (Limosa), 945.
melanura (Myiagra), 283.
 — (Myristicivora), 747.
 — (Pachycephala), 476.
 — (Polytelis), 20.
 — (Pyrrhura), 13.
melanura (Rhipidura), 277.
melanura (Rhynchops), 1020.
melanura (Sula), 1011.
melanura (Terpsiphone), 1081.
melanuroides (Limosa), 945.
melanurus (Himantopus), 942.
 — (Larus), 1023.
melanurus (Myiophonus), 408.
 — (Pomatorhinus), 325.
 — (Rhamphocœnus), 176.
 — (Thamnophilus), 184.
 — (Trogon), 87.
melas (Ardeiralla), 915.
melas (Edolisoma), 298.
 — (Himantopus), 943.
melba (Cypselus), 125.
 — (Pytelia), 578.
meleagrides (Agelastes), 804.
meleagris (Numida), 804.
meligera (Anorthura), 427, 1096.
melindæ (Anthus), 446.
melinus (Sericultus), 525.
melitophrys (Vireolanius), 475.
melleri (Anas), 990.
mellivora (Anellobia), 724.
 — (Florisuga), 134.
meloda (Ægialitis), 941.
 — (Melopelia), 758.
melodia (Melospiza), 633.
melophila (Erithacus), 1091.
meloryphus (Hapalocœrus), 234.
melpoda (Sporæginthus), 581.
melpomene (Catharus), 394.
membranaceus (Malacorhynchus), 995.
menadensis (Scops), 884.
 — (Turacœna), 754.
menagei (Batrachostomus), 117.
 — (Dicrurus), 531.
 — (Phlogœnas), 772.
 — (Yungipicus), 75.
menckei (Monarcha), 1083.
mendanæ (Acrocephalus), 369.
mendiculus (Spheniscus), 1049.
mendoza (Pomarea), 291.
mendoza (Pseudochloris), 639.
menebiki (Centropus), 55.
meneliki (Oriolus), 527, 1105.
menetriesi (Buteo), 855.
 — (Myrmotherula), 179.
meninling (Alcedo), 113.
meninting (Ceyx), 112.
mensstruus (Pionus), 6.
mentale (Chrysophlegma), 67.
mentalis (Anabazenops), 193.
mentalis (Anser), 983.
 — (Argya), 323.
 — (Arlamus), 533.
 — (Catharus), 393, 1092.
 — (Certhidea), 689.
 — (Cracticus), 501.
 — (Dysithamnus), 180.
 — (Eremomela), 356.
 — (Graucalus), 296.
mentalis (Icterus), 558.
mentalis (Melocichla), 362.
mentalis (Monarcha), 289.
mentalis (Pachycephala), 477.
 — (Pipra), 221.
 — (Platystira), 266.
 — (Rhodospingus), 642.
 — (Sigmodus), 498.
 — (Sitagra), 564.
menzbieri (Sturnus), 535.
mercenaria (Chrysotis), 5.
mercieri (Ptilopus), 738.
merganser (Merganser), 1003.
meriani (Turacus), 89.
meridæ (Pipilopsis), 649.
meridana (Cyanolyca), 513.
meridanus (Basileuterus), 439.
meridionale (Trochalopecton), 322.
meridionalis (Acrocephalus), 368.
meridionalis (Asturina), 839.
meridionalis (Athene), 894.
meridionalis (Caprimulgus), 123.

- meridionalis* (Conurus), 11.
meridionalis (Eurypyga), 1117.
 — (Heterospizias¹), 861.
 — (Lanius), 483.
 — (Melilestes), 718.
 — (Melittophagus), 96, 1061.
 — (Microhierax), 868.
 — (Myiodiotes), 442.
 — (Nestor), 27.
 — (Oriolus), 526.
 — (Pachycephala), 480.
meridionalis (Parus), 463.
meridionalis (Picus), 71, 1058.
 — (Ptilopus), 735.
 — (Rhamphococcyx), 1057.
 — (Rhectes), 494.
 — (Stoparola), 292.
meridionalis (Struthio), 1052.
meridionalis (Sturnella), 556.
 — (Trogon), 87.
 — (Zenaida), 757.
merionis (Merops), 1061.
merlini (Saurothera), 57.
merriami (Cyrtonyx), 821.
merriami (Meleagris), 796.
merrilli (Melospiza), 633.
 — (Nyctidromus), 121.
 — (Otocorys), 452, 1099.
merula (Dendrocincla), 186.
merula (Turdus), 394.
merulinus (Cacomantis), 52.
 — (Garrulax), 328.
meruloides (Dendrocincla), 186.
 — (Geocichla), 1094.
meserythrus (Crypturus), 783.
mesochrysa (Basileuterus), 440.
 — (Euphonia), 673.
mesoleuca (Dendrophila), 682.
 — (Elaeina), 240.
 — (Pipilo), 637.
 — (Ruticilla), 385, 1091.
mesolencus (Basileuterus), 440.
 — (Thryothorus), 422.
mesomelas (Pendulinus), 557.
mesoxantha (Zosterops), 707.
metabates (Melierax), 839.
metallica (Columba), 752.
 — (Hedydipna), 694.
metallicus (Lamprocorax), 542.
metallicus (Myiophoneus), 407.
metcalfei (Zosterops), 708.
mevesi (Lamprotornis), 544.
mexicana (Ajaja), 905.
mexicana (Asio), 878.
 — (Calliste), 667.
mexicana (Cassidix), 1106.
 — (Chrysomitris), 592.
 — (Cœreba), 690.
 — (Cooperastur), 844.
 — (Grallaria), 171.
 — (Grus), 921.
 — (Henicorhina), 429.
 — (Hesperiphona), 610.
 — (Loxia), 605.
mexicana (Meleagris), 796.
mexicana (Muscivora), 244.
mexicana (Myiarchus), 250.
mexicana (Nyctibius), 1063.
 — (Piaya), 58.
 — (Polioptila), 1091.
 — (Pyrocephalus), 246.
 — (Sialia), 386.
 — (Sitta), 681.
 — (Spizella), 630.
 — (Sturnella), 555.
 — (Zarhynchus), 1106.
mexicanoides (Colaptes), 63.
mexicanus (Attila), 1074.
 — (Carpodacus), 604.
 — (Catharus), 393.
 — (Catherpes), 428.
 — (Cinclus), 419.
 — (Colaptes), 63, 1057.
 — (Corvus), 503.
 — (Crypturus), 784.
 — (Geococcyx), 61.
 — (Hierofalco), 876.
 — (Himantopus), 943.
 — (Momotus), 94.
 — (Myiarchus), 1078.
mexicanus (Pendulinus), 1106.
mexicanus (Phaethornis), 132.
 — (Phalacrocorax), 1008.
mexicanus (Plegadis), 903.
mexicanus (Psilorhinus), 515.
 — (Quiscalus), 560.
 — (Sclerurus), 191.
 — (Trogon), 86.
meyeni (Zosterops), 708.
meyeri (Chrysococcyx), 53.
 — (Edolisoma), 299.
 — (Falcinellus), 520.
 — (Halcyon), 110.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Philemon), 726.
 — (Poicephalus), 9.
 — (Ptilotis), 721.
 — (Pucrasia), 801.
 — (Rhectes), 1104.
 — (Rhipidura), 278, 1081.

- meyeri* (Tanyptera), 106.
 — (Timeliopsis), 727.
 — (Trichoglossus), 31.
meyerianus (Urospizias), 842.
miamensis (Thryothorus), 422.
micans (Chlorostilbon), 142.
michalowskii (Parus), 462.
michleri (Pittasoma), 171.
micra (Vireo), 473.
micrastur (Heliangelus), 155.
microcephalus (Myiodiodes), 1098.
microcyaneus (Halcyon), 108.
micromegas (Picumnus), 84.
microptera (Agriornis), 224.
microptera (Miralra), 457.
micropterus (Cuculus), 51.
 — (Podiceps), 1041.
microrhinus (Rhamphococcyx), 59.
microrhyncha (Agyrtia), 136.
 — (Arbelorhina), 690, 1112.
 — (Bradyornis), 287.
 — (Cassicus), 551.
 — (Cinnyris), 697.
 — (Geothlypis), 1098.
 — (Gygis), 1020.
 — (Hedimeles), 1110.
microrhyncha (Tanyptera), 106.
microrhynchum (Rhamphomicon), 158.
microrhynchus (Ægialitis), 939.
microrhynchus (Batrachostomus), 116.
microsoma (Halocyptena), 1028.
microstephanus (Momotus), 94.
micrura (Myrmia), 161.
 — (Sylviella), 355.
midas (Asio), 878.
middendorffi (Anser), 983.
migrans (Lanius), 484, 1103.
 — (Milvus), 863.
migratorius (Ectopistes), 756.
 — (Turdus), 400.
mikani (Crax), 790.
mikettæ (Vireolanius), 475.
milanensis (Criniger), 311.
 — (Turdus), 399.
miles (Lobivanellus), 934.
milesi (Bubo), 880.
militaris (Ara), 10.
 — (Chiroxiphia), 222.
militaris (Crocopus), 732.
militaris (Hæmatoderus), 218.
 — (Trupialis), 555.
milleri (Agyrtia), 136.
millsi (Pennula), 969.
milni (Trochalopecton), 322.
milo (Centropus), 55.
milvipes (Hierofalco), 876.
minahasa (Rallina), 966.
minahassæ (Nycticorax), 918.
mindanaensis (Macronus), 341.
mindanense (Dicæum), 679.
 — (Edoliisoma), 299.
mindanensis (Bolbopsittacus), 22.
 — (Ceyx), 112.
 — (Copsychus), 411.
 — (Eudynamis), 54.
mindanensis (Graucalus), 297.
mindanensis (Hydrocorax), 100.
 — (Lyncornis), 119.
 — (Muscicapula), 294.
 — (Ptilocichla), 331.
mindanensis (Folvocivora), 299.
mindorensis (Carpophaga), 746.
 — (Centropus), 55.
 — (Graucalus), 297.
 — (Iole), 312.
 — (Loriculus), 23.
 — (Merula), 398.
 — (Ninox), 888.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Penelopides), 102.
 — (Prioniturus), 17.
 — (Scops), 885.
 — (Thriponax), 82.
miniata (Setophaga), 441.
 — (Cettia), 372.
miniatus (Chrysophlegma), 67.
miniatus (Dendrocolaptes), 185.
 — (Picrocolus), 301.
minima (Alseonax), 261.
 — (Batis), 265.
 — (Branta), 984.
 — (Elainea), 1076.
 — (Lagonosticta), 577.
 — (Leptocoma), 700.
 — (Mellisuga), 164.
 — (Molothrus), 552.
 — (Sylviella), 355.
minimum (Dicæum), 679.
minus (Chthonicola), 366.
minus (Empidonax), 248.
 — (Psaltiparus), 466.
 — (Spilornis), 834.
minusi (Thryophilus), 422.
 — (Xenerpestes), 200.
minor (Alectroenas), 742.
 — (Andropadus), 313.
 — (Artamus), 534.
 — (Batis), 1080.
minor (Botaurus), 919.
minor (Bradyornis), 287.

- minor* (Calandrella), 453.
minor (Campophaga), 303.
minor (Campylorhynchus), 419.
 — (Carpodacus), 604.
 — (Chionarchus), 780.
 — (Chordeiles), 118.
 — (Cinclodes), 202.
 — (Cissa), 508.
 — (Cittocincla), 1095.
 — (Cnipodectes), 245, 1077.
 — (Coccyzus), 53.
 — (Colinus), 820.
 — (Cotyle), 257.
minor (Cygnus), 986.
 — (Dacelo), 1062.
minor (Dendrocincla), 186.
 — (Dicrurus), 529.
 — (Diuca), 641.
 — (Estrela), 581.
 — (Eudypula), 1048.
 — (Euphonia), 673.
 — (Falco), 875.
minor (Fregata), 1012.
minor (Furnarius), 203.
 — (Garrulus), 510.
 — (Geospiza), 608.
 — (Hadrostronus), 211.
 — (Halcyon), 108.
 — (Huhua), 882.
 — (Hylophilus), 474.
 — (Indicator), 34.
 — (Ketupa), 879.
 — (Lalage), 302.
 — (Lamprocorax), 542.
 — (Lamprolia), 392.
minor (Lamprosar), 559.
minor (Lanius), 483.
 — (Leptopogon), 237.
minor (Locustella), 370.
minor (Lophorhina), 522.
 — (Lophotriccus), 233.
 — (Macropygia), 754.
 — (Malacocincla), 333.
minor (Myiodynastes), 244.
minor (Nilaus), 488.
minor (Numenius), 945.
minor (Odontorhynchus), 1095.
 — (Paradisea), 518.
 — (Parus), 461.
minor (Pelecanus), 1005.
minor (Pellorneum), 336.
 — (Peltops), 1083.
 — (Pentholæa), 392.
 — (Pernostola), 175.
 — (Philohela), 955.
minor (Phœnicopterus), 908.
 — (Picus), 71.
 — (Pipra), 221.
 — (Platalea), 904.
minor (Podicipes), 1040.
minor (Pœcilodryas), 272.
 — (Pycnonotus), 1084.
 — (Pyrenestes), 576.
 — (Pyromelana), 572.
 — (Reinwardtœnas), 75.
 — (Rhabdornis), 685.
 — (Rhinopomastus), 98.
 — (Spermestes), 1108.
 — (Sturnus), 535.
 — (Sycalis), 602.
 — (Tanyptera), 106.
 — (Telephonus), 488.
 — (Thryophilus), 421.
 — (Turdus), 402.
 — (Zosterops), 708.
minulla (Batis), 265.
minullum (Dicæum), 679.
minullus (Accipiter), 845.
 — (Cinnyris), 699.
minus (Drymocataphus), 334.
minusecula (Sylvia), 374.
 — (Turdus), 402.
minuta (Æthopyga), 696.
minuta (Ardetta), 914.
minuta (Atticora), 258.
minuta (Barbatula), 37.
 — (Cettia), 372.
 — (Columbigallina), 764.
 — (Euphonia), 673.
 — (Munia), 588.
 — (Piaya), 58.
minuta (Porzana), 967.
minuta (Ptilocichla), 331.
 — (Scops), 883.
minuta (Siphia), 292.
minuta (Spermophila), 615.
 — (Sterna), 1017.
 — (Tringa), 951.
 — (Zosterops), 710.
minutilla (Glaucidium), 897.
minutilla (Tringa), 952.
minutissimus (Picumnus), 83.
minutus (Antichromus), 489.
 — (Colæus), 505.
 — (Dendropicus), 73.
 — (Histrionicus), 999.
 — (Larus), 1021.
 — (Numenius), 945.
 — (Picumnus), 84.
miosnomensis (Pachycephala), 479

- miqueli* (Ptilopus), 740.
mirabilis (Dicrurus), 529.
mirabilis (Loddigesia), 166.
mirabilis (Palmeria), 692.
mirabilis (Paradisea), 1105.
 — (Poephila), 585.
miramaræ (Galerida), 457.
miranda (Daphænositta), 682.
mirandollei (Micrastur), 837.
misoriensis (Chrysococcyx), 53.
 — (Nasiterna), 24.
 — (Urospizias), 842.
mississippiensis (Ictinia), 864.
missouriensis (Lophophanes), 465.
mitchelli (Phegornis), 956.
 — (Philodice), 161.
 — (Trichoglossus), 31.
mitrata (Numida), 804.
 — (Rhinocichla), 327.
mitratus (Conurus), 11.
 — (Myiodiotes), 442.
mitratus (Pelecanus), 1005.
 — (Pionopsitta), 7.
mitu (Mitua), 790.
mixta (Batis), 265.
mixtus (Batrachostomus), 117.
 — (Picus), 72.
mlokosiewiczzi (Lyrurus), 826.
moabiticus (Passer), 598.
mocinno (Pharomacrus), 85.
mocoa (Cyanolestes), 157.
mocquersyi (Eupsychortyx), 820.
modesta (Aidemosyne), 585.
modesta (Ara), 10.
modesta (Arachnothera), 705.
 — (Bessonornis), 410.
 — (Butalis), 262.
 — (Cisticola), 365.
 — (Cosmophoneus), 490.
 — (Erythrura), 584.
 — (Galerida), 458.
 — (Geothlypis), 1097.
 — (Gerygone), 268.
 — (Glycyphila), 717.
 — (Grallaria), 170.
modesta (Herodias), 912.
modesta (Myiagra), 283.
 — (Palæornis), 19.
 — (Pæcilodryas), 271.
 — (Psittacella), 21.
 — (Pyrrhuloxia), 460.
 — (Siptornis), 200.
 — (Turæna), 754.
 — (Zosterops), 713.
modestus (Bradyornis), 287.
modestus (Cabalus), 962.
modestus (Corvus), 504.
modestus (Dicrurus), 529.
 — (Eudromia), 938.
 — (Larus), 1023.
modestus (Merops), 97.
modestus (Prionochilus), 675.
 — (Sylviparus), 465.
 — (Thryophilus), 421.
modestus (Tragopan), 797.
modestus (Vireo), 473.
modiglianii (Gerygone), 268.
 — (Macropygia), 755.
 — (Pericrocotus), 301.
modularis (Accentor), 381.
modulator (Cyphorhinus), 429.
 — (Mimus), 416.
moebiusi (Nothoprocta), 785.
moesta (Lalage), 302.
 — (Saxicola), 389.
 — (Synallaxis), 197.
moetissima (Fregetta), 1030.
mogilnik (Aquila), 851.
molessoni (Emberiza), 622.
molinae (Pelecanus), 1006.
 — (Pyrrhura), 14.
molitor (Batis), 265.
 — (Cinclodes), 1073.
molleri (Prinia), 359.
mollessoni (Hypolais), 373.
mollis (Lanius), 483.
 — (Estrelata), 1034.
mollissima (Chamaea), 171.
 — (Oreocincla), 404.
mollissima (Phleaxis), 349.
mollissima (Somateria), 1000.
moloneyanus (Illadopsis), 336.
moltchanovi (Parus), 1100.
molucca (Ibis), 901.
 — (Uroloncha), 585.
moluccana (Amaurornis), 972.
moluccensis (Cacatua), 3.
 — (Philemon), 726.
 — (Tinnunculus), 870.
molybdophanes (Ptilogonys), 261.
 — (Struthio), 1052.
moma (Sylvia), 375.
mombasæ (Chlorocichla), 313.
mombassica (Campothera), 66.
momota (Momotus), 94.
momotula (Hylomanes), 95.
monacha (Crateroscelis), 333.
 — (Lalage), 303.
 — (Myiopsitta), 14.
 — (Pachycephala), 480.

- monacha* (Saxicola), 388.
 — (Sitagra), 564.
monachus (Ægialitis), 941.
monachus (Artamus), 533.
 — (Centropus), 57.
 — (Dryonastes), 328.
 — (Grus), 922.
 — (Illadopsis), 336.
 — (Monachalcyon), 105.
 — (Neophron), 831.
 — (Oriolus), 527.
 — (Ptilopus), 738.
monachus (Tropidorhynchus), 725.
monachus (Vultur), 829.
monasa (Pennula), 969.
mondoura (Claravis), 765.
monedula (Colæus), 505.
moneduloides (Corvus), 505.
mongolica (Erythropsiza), 596.
 — (Melanocorypha), 453.
mongolicus (Charadrius), 938.
 — (Phasianus), 802, 1115.
moniliger (Anthipes), 294.
 — (Batrachostomus), 117.
 — (Formicarius), 172.
 — (Garrulax), 327.
monocerata (Ceratorhyncha), 1046.
monogrammica (Asturipula), 839.
monorhis (Oceanodroma), 1029.
monosyllabicus (Cuculus), 51.
monotonus (Graucalus), 295.
montagnii (Penelope), 791.
montana (Agriornis), 224.
 — (Brachypteryx), 342.
 — (Buthraupis), 663.
 — (Certhia), 683.
 — (Cettia), 372.
 — (Crateroscelis), 333.
 — (Dendroeca), 434.
 — (Geolrygon), 770.
 — (Hesperiphona), 610.
 — (Junco), 629.
 — (Margarops), 414.
 — (Melospiza), 633.
 — (Mixornis), 341.
 — (Nestor), 27.
 — (Oreomyza), 692.
 — (Parus), 462.
 — (Perdix), 812.
 — (Pinicola), 606.
montana (Ptilotis), 720.
montana (Saxicola), 389.
 — (Zosterops), 706.
montanellus (Accentor), 381.
montani (Anthracoceros), 101.
montanum (Edoliisoma), 298.
montanus (Anabazenops), 193.
 — (Andropadus), 313.
montanus (Anthus), 446.
montanus (Charadrius), 938.
 — (Myiadectes), 466.
 — (Oreoscoptes), 415.
 — (Passer), 597.
 — (Perierocotus), 301, 1084.
 — (Pomatorhinus), 325.
 — (Prioniturus), 17.
monteiri (Alopius), 104.
 — (Clytospiza), 570.
 — (Hirundo), 255.
 — (Malaconotus), 489, 1103.
montensis (Phæomyias), 1076.
montezumæ (Cyrtonyx), 821.
 — (Gymnostinops), 549.
monticola (Grallaria), 170.
 — (Iole), 312.
 — (Megalæma), 39.
 — (Picus), 71.
 — (Saxicola), 389.
 — (Spizella), 630.
 — (Troglodytes), 426.
 — (Zoothera), 404.
monticulum (Dicæum), 677.
monticolus (Caprimulgus), 424.
 — (Parus), 461.
montifringilla (Fringilla), 589.
montis (Cryptolopha), 286.
 — (Mesolophus), 308.
 — (Stasiasticus), 335.
montium (Notodela), 384.
 — (Paramythia), 261.
 — (Sitta), 680.
montivagus (Cypselus), 126.
moori (Alethe), 1094.
moquini (Hæmatopus), 933.
morecomi (Atthis), 163.
 — (Dendroeca), 433.
moreleti (Fringilla), 589.
morelleti (Spermophila), 616.
morenoi (Gymnopelia), 1114.
moretoni (Malurus), 367.
morinellus (Endromias), 938.
morio (Amydrus), 545.
 — (Edoliisoma), 299.
 — (Psilorhinus), 515.
morio (Saxicola), 388.
morokæ (Pachycephala), 1102.
morotensis (Lycocorax), 517.
 — (Monarcha), 289, 1083.
morotensis (Tanygnathus), 18.
morotensis (Scops), 884.

- morpheus* (Monasa), 49.
morphnoides (Eutolmaëtus), 851.
morrisonia (Alcippe), 345.
mortieri (Tribonyx), 973.
mortoni (Chalcophaps), 766.
 — (Dissovra), 1117.
mosambica (Coracias), 93.
mosambica (Podica), 978.
moschata (Cairina), 980.
maseleyi (Halcyon), 110.
mosquera (Eriocnemis), 154.
mosquitus (Chrysolampis), 146.
mossambicus (Laniarius), 491.
motacilla (Henicocichla), 436.
motacilloides (Herpsilochmus), 178.
motacilloides (Rhipidura), 279.
motitensis (Passer), 598.
motmot (Ortalia), 792.
mouhoti (Garrulax), 327.
mouroniensis (Zosterops), 709.
moussieri (Pinarochroa), 388.
muelleri (Cisticola), 365.
 — (Erythromyias), 267.
 — (Hedydipna), 694, 1112.
 — (Hypotaenidia), 961.
 — (Merops), 96.
 — (Pitta), 208.
muelleri (Rhipidura), 277.
 — (Urospizias), 843.
muelleriana (Monachella), 271.
mugimaki (Muscicapa), 263.
mulleri (Carpophaga), 746.
 — (Edolisoma), 298.
 — (Pseudozosterops), 713.
 — (Tanygnathus), 18.
mulsanti (Acestorura), 163.
multicolor (Cosmophoneus), 490.
 — (Petroeca), 266.
 — (Psephotus), 25.
 — (Pyrrhurus), 1085.
 — (Saltatricula), 636.
multicolor (Setophaga), 441.
multicolor (Spindalis), 661.
 — (Todus), 95.
multicolor (Trichoglossus), 31.
mullicolor (Xenocichla), 310.
multiguttata (Dendroornis), 190.
multipunctata (Nucifraga), 506.
multistriata (Accentor), 381.
multistriatus (Thamnophilus), 182.
multistriatus (Dendrocolaptes), 185.
multostriata (Siptornis), 200.
munda (Erythropygia), 412.
 — (Puffinus), 1032.
 — (Serphophaga), 235.
mundus (Heteranax), 1083.
 — (Monarcha), 289.
munipurensis (Cisticola), 364.
 — (Sulthora), 470.
munroii (Branta), 984.
muraria (Tichodroma), 684.
murina (Alseonax), 264.
 — (Aquila), 852.
 — (Atticora), 257.
 — (Crateroscelis), 333.
 — (Cypselus), 125, 1064.
 — (Gerygone), 269.
murina (Ochthornis), 227.
murina (Pyrrhula), 607.
 — (Tanioptera), 225.
 — (Thryomanes), 424.
murina (Turdinulus), 332.
murina (Turdus), 401.
murinus (Bathmocercus), 331.
 — (Bradyornis), 287.
 — (Eleopicus), 76.
 — (Laniarius), 1104.
murinus (Myiopsitta), 14.
 — (Sublegatus), 241.
murinus (Thamnophilus), 183.
musæ (Tatare), 369.
muscatensis (Merops), 97.
muschenbroeki (Arlamus), 533.
muschenbroeki (Neopsittacus), 33.
 — (Ptilopus), 741.
 — (Surniculus), 50.
musicapinus (Bradyornis), 287.
 — (Hylophilus), 474.
musculus (Ægithalus), 468.
 — (Troglodytes), 426.
musgravianus (Amblyornis), 525.
musica (Copsychus), 411.
 — (Euphonia), 671.
musicus (Bias), 265.
musicus (Cygnus), 986.
musicus (Cyphorhinus), 429.
musicus (Melierax), 838.
musicus (Nuttallornis), 1078.
 — (Pomatorhinus), 326.
 — (Thryothorus), 422.
 — (Turdus), 399.
mussoli (Zosterops), 707.
mustelina (Synallaxis), 198.
mustelinus (Turdus), 402.
mutata (Terpsiphone), 280.
mutura (Gennæus), 800.
muticus (Pavo), 795.
mulus (Lagopus), 826.
myadestina (Phæornis), 284.
myiotherina (Hypocnemis), 173.

- myochrous* (Tachornis), 126.
myoptilus (Cypselus), 126.
myristicivora (Carpophaga), 743.
myrtha (Syrnium), 891.
mysorensis (Geoffroyus), 17.
mysorensis (Hermotimia), 700.
 — (Lorius), 29.
mysorensis (Zosterops), 708.
mysoriensis (Dicaeum), 678.
 — (Todopsis), 275.
mystacale (Chrysophlegma), 67.
mystacalis (Æthopyga), 696.
 — (Apalis), 353.
 — (Cyanocorax), 514.
 — (Diglossa), 685.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Iole), 318.
 — (Malacoptila), 48.
 — (Meliornis), 723.
mystacalis (Pyrgisoma), 636.
mystacalis (Rhabdornis), 685.
 — (Thryothorus), 423.
mystacea (Geotrygon), 771.
 — (Macropteryx), 130.
 — (Prinia), 359.
 — (Sylvia), 375.
mystaceus (Platyrhynchus), 231.
mystacophanes (Megalæma), 39.
nacunda (Podager), 118.
nævia (Aquila), 852.
nævia (Coracias), 93.
 — (Geocichla), 405.
 — (Henicocichla), 436, 1097.
 — (Heterocnemis), 175.
 — (Hypocnemis), 174.
 — (Locustella), 370.
 — (Mirafr), 456.
nævioides (Aquila), 852.
nævioides (Hypocnemis), 174.
nævius (Diplopterus), 61.
 — (Myiobius), 246.
 — (Rhamphodon), 131.
 — (Symmorphus), 304.
 — (Thamnophilus), 183, 1070.
nævosa (Stictonetta), 989.
nagaensis (Drymocataphus), 334.
nagaensis (Sitta), 680.
nais (Tanysiptera), 106.
namaqua (Pteroclorus), 776.
namaquus (Dendropicus), 74.
namiyei (Erithacus), 382.
 — (Hirundo), 254.
 — (Picus), 72.
nana (Acanthiza), 366.
 — (Aphelocoma), 512.
nana (Cannabina), 1109.
 — (Chlorostilbon), 1066.
 — (Cisticola), 365.
 — (Dendroornis), 189.
 — (Grallinula), 169.
 — (Lawrencia), 248.
 — (Oreomyza), 692.
 — (Pœcilodryas), 272.
 — (Sisura), 288.
 — (Spermestes), 577.
 — (Sylvia), 375.
 — (Turnix), 778.
nandensis (Dendropicus), 1058.
 — (Dryoscopus), 492.
 — (Sycobrotus), 565.
nandu (Rhea), 1052.
nanina (Nasiterna), 24.
nanum (Glaucidium), 896.
nanus (Conurus), 12.
nanus (Cyclopsitta), 34.
nanus (Hierococyx), 50.
 — (Ptilopus), 741.
 — (Pyrocephalus), 246, 1077.
 — (Taoniscus), 785.
 — (Vireo), 473.
 — (Yungipicus), 75.
napæa (Dacnis), 688.
 — (Ornithion), 238.
napensis (Cercomacra), 176.
 — (Psophia), 923.
 — (Tachyphonus), 656.
napoleonis (Polyplectron), 796.
narcissina (Xanthopygia), 272.
narcondami (Rhytidoceros), 102.
narina (Hapaloderma), 87.
nasalis (Pycnorhis), 340.
nasesus (Neorhynchus), 614.
nasica (Liemetis), 3.
 — (Treron), 733.
nasicus (Corvus), 505.
naso (Calyptorhynchus), 2.
nasuta (Lanius), 1103.
nasutus (Lophoceros), 103.
natalensis (Caprimulgus), 124.
 — (Chloropeta), 274.
 — (Cisticola), 365.
 — (Cossypha), 409.
 — (Francolinus), 810.
 — (Ispidina), 111.
 — (Sphenæacus), 337.
natalis (Chalcophaps), 766.
 — (Collocalia), 130.
 — (Ninox), 890.
 — (Urospizias), 843.
 — (Zosterops), 708.

- nationi* (.Ethya), 997.
nationi (Myiobius), 245.
nationi (Pyrgisoma), 636.
nativitatis (Puffinus), 1032.
nattereri (Anthus), 448.
 — (Chrysotis), 5.
 — (Cotinga), 216.
 — (Lurocalis), 118.
 — (Momotus), 94.
 — (Phaethornis), 132.
nattereri (Phylloscopus), 377.
nattereri (Pipra), 221.
 — (Rupornis), 859.
 — (Selenidera), 44.
 — (Tachyphonus), 656.
natunensis (Strachyrhis), 339.
naumanni (Merula), 397.
 — (Tinnunculus), 871.
nearctica (Fuligula), 997.
nebouxi (Sula), 1012.
nebulosa (Rhipidura), 276.
nebulosum (Syrnium), 890.
nebulosus (Picumnus), 83.
nectarinoides (Cinnyris), 697.
neera (Chrysura), 140, 1066.
neglecta (Anorthura), 428, 1096.
 — (Campophaga), 301.
 — (Carpophaga), 745.
 — (Centurus), 1058.
 — (Chlorodyta), 353.
 — (Collocalia), 130.
 — (Columba), 749.
 — (Cyanomitra), 702.
 — (Gerygone), 269.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Lusciniola), 371.
 — (Estrelata), 1035.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Parus), 462, 1101.
 — (Polyerata), 136.
 — (Salpinctes), 427.
 — (Sitta), 680.
 — (Sturnella), 555.
 — (Tinnunculus), 870.
 — (Zosterops), 707.
neglectum (Dicæum), 677.
 — (Edoliisoma), 299.
neglectus (Anser), 983.
 — (Colæus), 505.
 — (Pericrocotus), 301.
 — (Phalacrocorax), 1008.
 — (Pyrotrigon), 1060.
 — (Trichoglossus), 31.
 — (Tropidorhynchus), 725.
 — (Veniliornis), 1059.
nelirkorni (Dicæum), 677.
 — (Edoliisoma), 299.
 — (Hylia), 272.
 — (Neolesbia), 143.
 — (Zosterops), 710.
nelicourvi (Nelicurvis), 567.
nelsoni (Ammodromus), 632.
 — (Geothlypis), 1098.
 — (Lagopus), 827.
 — (Larus), 1025.
 — (Pendulinus), 557.
 — (Phœnicothera), 1111.
 — (Picus), 71.
 — (Quiscalus), 1107.
 — (Sitta), 1112.
nematura (Lochmias), 202.
nemorica (Gallinago), 954.
 — (Montifringilla), 595.
 — (Spodiopsar), 536.
nenday (Conurus), 11.
nengela (Tæniptera), 225.
neobritannica (Porphyrio), 976.
neohanoveranus (Eurystomus), 1061.
neoxena (Ardeita), 914.
 — (Hirundo), 254.
 — (Leptoptila), 770.
neoxenus (Euphonia), 86.
nepalensis (Aceros), 102.
 — (Palæornis), 18.
neris (Oceanites), 1030.
 — (Sterna), 1017.
nesiotis (Sula), 1012.
nesiotis (Edoliisoma), 299.
 — (Porphyriornis), 973.
 — (Synallaxis), 1072.
nesiotis (Yungipicus), 74.
nesophila (Ardeiralla), 915.
 — (Cinnyris), 697.
 — (Thryomanes), 424.
nestor (Merula), 397.
neumanni (Campothera), 65.
 — (Cisticola), 1090.
 — (Hirundo), 1079.
 — (Lophoceros), 103.
neumayeri (Sitta), 680.
neutalis (Agelæus), 1106.
nevadensis (Amphispiza), 627.
newarensis (Syrnium), 891.
newelli (Puffinus), 1031.
newtoni (Calamocichla), 352.
 — (Cœreba), 690.
 — (Cyanomitra), 702.
newtoni (Gymnasio), 896.
newtoni (Lalage), 303.
 — (Lanius), 485.

newtoni (*Oreomyza*), 692.
— (*Terpsiphone*), 281.
— (*Tinnunculus*), 871.
— (*Zosterops*), 713.
newtoniana (*Prionodura*), 524.
niansæ (*Cypselus*), 125.
niasense (*Syrnium*), 891.
niasensis (*Ethopyga*), 696.
— (*Chrysophlegma*), 67.
niasæ (*Cinnyris*), 698.
nicaraguensis (*Quiscalus*), 560.
nicobarica (*Ethopyga*), 696.
— (*Calœnas*), 774.
— (*Palœornis*), 20.
— (*Scops*), 883.
— (*Terpsiphone*), 280.
— (*Zosterops*), 707.
nicobariensis (*Iole*), 1085.
— (*Megapodius*), 786.
nicholsoni (*Anthus*), 446.
nidifica (*Collocalia*), 129.
nidipendulus (*Euscarthmus*), 232.
nieuwenhuisi (*Chrysococcyx*), 1056.
— (*Euptilosus*), 1085.
nigellicauda (*Psaropholus*), 528.
niger (*Capito*), 41.
niger (*Copsychus*), 411.
— (*Geranospizias*), 838.
— (*Hadrostomus*), 211.
— (*Hæmatopus*), 933.
— (*Limnocolax*), 972.
— (*Melanoparus*), 460.
— (*Melierax*), 839.
niger (*Milvus*), 863.
niger (*Neoclaes*), 181.
— (*Nephœetes*), 129.
— (*Pachyrhamphus*), 212.
— (*Phasidus*), 804.
— (*Plectropterus*), 980.
— (*Quiscalus*), 560.
— (*Textor*), 569.
nigerrima (*Hypochæra*), 575, 1108.
— (*Melanopteryx*), 567.
— (*Munia*), 587.
nigerrimus (*Cnipolegus*), 228.
— (*Hypsipetes*), 316.
— (*Laniarius*), 492.
— (*Nesopsar*), 555.
nigra (*Astrapia*), 519.
— (*Campophaga*), 300.
— (*Campothera*), 1057.
— (*Ciconia*), 906.
— (*Cittocinclæ*), 413.
— (*Coracopsis*), 4.
— (*Crypsirhina*), 508.

nigra (*Hydrochelidon*), 1013.
— (*Lessonia*), 230.
— (*Melanocharis*), 676.
— (*Melanoperdix*), 815.
— (*Melopyrrha*), 618.
— (*Merula*), 394, 1092.
— (*Monasa*), 48.
nigra (*Muscicapa*), 263.
nigra (*Myzomela*), 716.
— (*Oedemia*), 999.
— (*Parra*), 958.
— (*Penelopina*), 792.
— (*Pomarea*), 291.
— (*Rhynchops*), 1020.
— (*Thamnolæa*), 391.
— (*Tijuca*), 215.
nigrescens (*Ammodromus*), 631.
— (*Antrostomus*), 122.
— (*Bubo*), 881.
— (*Chamæospiza*), 635.
— (*Dendroeca*), 431.
— (*Dicrurus*), 529.
— (*Melanorhæctes*), 495.
— (*Merula*), 395.
— (*Mirafra*), 456.
— (*Myiochanes*), 250.
— (*Platycercus*), 24.
— (*Rheinardti*), 1115.
— (*Strix*), 899.
— (*Thamnophilus*), 183, 1070.
— (*Yungipicus*), 74.
nigricans (*Branta*), 985.
— (*Centropus*), 56.
— (*Cercomacra*), 176.
— (*Mirafra*), 456.
nigricans (*Ocydromus*), 961.
nigricans (*Petrochelidon*), 258.
— (*Pycnonotus*), 305.
— (*Rallus*), 961.
— (*Sayornis*), 227, 1075.
— (*Scotornis*), 120, 1063.
— (*Serphophaga*), 236.
— (*Sigmodus*), 498.
nigricantium (*Syrnium*), 891.
nigricapilla (*Formicarius*), 172.
— (*Myiarchus*), 1078.
— (*Perisoreus*), 511.
nigricapillus (*Basileuterus*), 439.
nigricapillus (*Liopitilus*), 273.
— (*Nothocercus*), 782.
— (*Thryophilus*), 422.
— (*Tyranniscus*), 239.
nigricapitatus (*Drymocataphus*), 334.
nigricauda (*Agyrtria*), 136.
— (*Automolus*), 195.

- nigricauda* (Citlocincla), 413.
 — (Myrmeciza), 174.
nigricaudata (Campylorhynchus), 420.
nigricephala (Spindalis), 661.
nigriceps (Apalis), 353.
 — (Arremon), 647.
 — (Chrysomitris), 593.
 — (Eleopicus), 76.
 — (Hyphantornis), 563.
 — (Lanius), 485, 1103.
 — (Mecocerculus), 1075.
 — (Merula), 396.
 — (Myiarchus), 251.
 — (Munia), 587.
 — (Orthotomus), 361.
 — (Polioptila), 380, 1091.
 — (Pyrrhuloxia), 460.
 — (Spermestes), 576.
 — (Strachyrhis), 339.
 — (Tanyptera), 105.
 — (Terpsiphone), 281.
 — (Thamnophilus), 183.
 — (Tityra), 211.
 — (Todiostrostrum), 231.
 — (Xenocichla), 310.
nigricincta (Phaethornis), 133.
 — (Xerophila), 468.
nigricinereus (Melanoparus), 460.
nigricollis (Busarellus), 862.
nigricollis (Chauna), 979.
nigricollis (Chloropsis), 318.
 — (Colius), 91.
nigricollis (Cygnus), 987.
nigricollis (Euphonia), 672.
 — (Graculipica), 537.
 — (Grus), 922.
 — (Heterhyphantes), 564.
nigricollis (Himantopus), 942.
nigricollis (Lagonosticta), 578.
 — (Lampornis), 145.
 — (Phoenicocercus), 215.
 — (Podiceps), 1041.
 — (Strachyrhis), 339.
 — (Turnix), 779.
nigricotis (Motacilla), 443.
nigricrissus (Eupetes), 319.
nigricristatus (Basileuterus), 439.
 — (Thamnophilus), 182.
nigrifrons (Ægialitis), 941.
nigrifrons (Alcippe), 345.
 — (Chlorospingus), 651.
 — (Cosmophoneus), 490.
 — (Cyclopsitta), 34.
 — (Dendroeca), 435, 1097.
 — (Formicarius), 172, 1069.
nigrifrons (Graucalus), 295.
 — (Leptopogon), 237.
 — (Monasa), 49.
 — (Muscisaxicola), 230.
 — (Pyromelana), 572.
 — (Rhipidura), 277.
 — (Tricholæma), 1055.
nigrifumosa (Synallaxis), 198.
nigrigenis (Gecinus), 64.
nigrigenys (Conopophaga), 169.
nigrilora (Parula), 432.
nigriloris (Cisticola), 363.
 — (Mimus), 415.
 — (Parus), 1100.
nigrilorum (Turdus), 400.
nigritentalis (Stoparola), 292.
nigritentum (Dicæum), 676.
 — (Estrela), 582.
 — (Monarcha), 289.
nigritentum (Pachycephala), 477.
nigritentum (Yuhina), 346.
nigripectus (Colinus), 820.
 — (Machærihynchus), 285.
 — (Symmorphus), 304.
nigripennis (Eurostopus), 119.
 — (Gallinago), 953.
 — (Estrela), 1034.
 — (Oriolus), 528.
 — (Pavo), 795.
nigripes (Dacnis), 688.
 — (Diomedea), 1038.
 — (Herodias), 912.
nigripileus (Molpastes), 305.
nigriplumbea (Accipiter), 846.
nigrirostris (Andigena), 43.
 — (Arremon), 647.
 — (Ceryx), 112.
 — (Columba), 753.
 — (Cyclorhis), 476.
 — (Macropygia), 756.
 — (Turdus), 401.
nigriscapalis (Colius), 91.
nigriscapularis (Caprimulgus), 124.
 — (Hermotimia), 700.
nigrita (Hirundo), 254.
 — (Myzomela), 716.
 — (Ochthoeca), 226.
nigritemporalis (Nilaus), 488.
nigrithorax (Cosmophoneus), 490.
nigritorquis (Munia), 587.
 — (Rhipidura), 279.
nigriventris (Eupherusa), 144.
 — (Myzomela), 715.
 — (Pyromelana), 571.
nigrivertex (Basileuterus), 439.

- nigrivestis* (*Eriocnemis*), 153.
nigroaurantia (*Sperinophila*), 615.
nigrocapitatus (*Zosterornis*), 339.
nigrocincta (*Calliste*), 668.
 — (*Corythopsis*), 168.
nigro-cinereus (*Thamnophilus*), 183.
nigrocristatus (*Anæretes*), 236.
nigrocyanea (*Halcyon*), 108.
nigrogularis (*Colinus*), 821.
 — (*Colluricincla*), 496.
 — (*Cracticus*), 500.
 — (*Phalacrocorax*), 1007.
 — (*Psophodes*), 320.
 — (*Rhamphocelus*), 660.
 — (*Siphia*), 293.
 — (*Trichoglossus*), 31.
nigrofasciata (*Thalurania*), 143.
nigrofumosus (*Cinclodes*), 202.
nigrogenys (*Paroaria*), 642.
nigroguttata (*Nothura*), 785.
nigrolineata (*Ciccaba*), 893.
 — (*Grallaria*), 170.
nigrolutea (*Egithina*), 341.
nigromaculata (*Phlogopsis*), 172.
nigromentalis (*Rhipidura*), 279.
nigromitrata (*Trochocercus*), 276.
nigronotata (*Urobrachya*), 573.
nigropectus (*Biatas*), 181.
nigropileus (*Merula*), 396.
nigrorufa (*Hirundo*), 254.
 — (*Sericornis*), 367.
 — (*Siphia*), 293.
 — (*Spermophila*), 615.
nigrorufus (*Centropus*), 56.
nigrorum (*Carpophaga*), 715.
 — (*Cittocincla*), 413.
 — (*Cryptolopha*), 285.
 — (*Merula*), 396.
 — (*Muscicapula*), 294.
 — (*Phabotreron*), 734.
 — (*Zosterops*), 710.
nigrosquamatus (*Francolinus*), 810.
nigrostellatus (*Pomatorhinus*), 326.
nigrostriatus (*Oriolus*), 527.
nigrotecta (*Poephila*), 584.
nigroviridis (*Calliste*), 667.
nigrum (*Edoliisoma*), 298.
nilghiriensis (*Anthus*), 446.
nilgiriensis (*Oreocincla*), 403.
ningpoense (*Trochalopteron*), 321.
nipalense (*Pellorneum*), 336.
nipalensis (*Acanthoptila*), 322.
 — (*Actinodura*), 331.
 — (*Accentor*), 382.
 — (*Ethopyga*), 696.
nipalensis (*Alcippe*), 345.
 — (*Anorthura*), 427, 1096.
 — (*Brachypteryx*), 342.
 — (*Caprimulgus*), 123.
 — (*Certhia*), 684.
 — (*Chelidon*), 256.
 — (*Cutia*), 348.
 — (*Hirundo*), 255.
 — (*Huhua*), 882.
 — (*Hydroornis*), 207.
nipalensis (*Phodilus*), 898.
nipalensis (*Procarduelis*), 590.
 — (*Pucrasia*), 801.
 — (*Pyrrhula*), 607.
 — (*Spizaetus*), 848.
 — (*Suthora*), 471.
 — (*Treron*), 733.
nippon (*Ibis*), 901.
nisbetti (*Gennæus*), 1115.
nisicolor (*Hierococyx*), 1056.
nisoria (*Glycyphila*), 717.
 — (*Munia*), 587.
 — (*Sylvia*), 374.
nisorius (*Thryophilus*), 422.
nisus (*Accipiter*), 844.
nitens (*Columba*), 752.
 — (*Hypochæra*), 574.
nitens (*Lamprocolius*), 547.
nitens (*Malimbus*), 568.
 — (*Phainopepla*), 261.
 — (*Psolidoprocne*), 260.
 — (*Trochocercus*), 276.
nitida (*Acanthopneuste*), 376.
 — (*Arbelorhina*), 690.
 — (*Asturina*), 859.
 — (*Myiagra*), 283.
nitida (*Phæoptila*), 139.
nitida (*Phalænoptilus*), 121.
 — (*Pœcilodryas*), 272.
nitidicauda (*Agyrtria*), 136.
nitidifrons (*Agyrtria*), 136.
nitidissima (*Alectœnas*), 742.
 — (*Chlorochrysa*), 670.
nitidissima (*Chlorostilbon*), 141.
nitidissimus (*Tachyphonus*), 656.
nitidula (*Lagonosticta*), 578.
nitidulus (*Hypargus*), 579.
nitidum (*Dicæum*), 677.
nitidus (*Carpodectes*), 217.
 — (*Monarcha*), 290.
nivalis (*Chen*), 982.
 — (*Montifringilla*), 594.
 — (*Plectrophanes*), 624.
nivaria (*Haplospiza*), 627.
nivea (*Herodias*), 912.

- nivea* (Pagodroma), 1035.
nivea (Rissa), 1027.
niveifrons (Ægialitis), 940.
niveigularis (Tyrannus), 252.
niveiguttatis (Hypargus), 579.
niveipectus (Agyrtria), 136.
niveiventris (Dendroeca), 434.
niveiventris (Saucerottea), 137.
niveogularis (Acredula), 466.
niveus (Chasmodorhynchus), 219.
nivicola (Lerwa), 805.
— (Syrnium), 890.
nivosa (Ægialitis), 940.
— (Alæmon), 451.
— (Campothera), 66.
nobilis (Ara), 10.
nobilis (Ardea), 909.
nobilis (Corvus), 502.
— (Chamæza), 171.
nobilis (Eurostopus), 119.
nobilis (Gallinago), 954.
— (Lophura), 798.
— (Moho), 727.
— (Myiodynastes), 244, 1077.
— (Oreonympha), 159.
— (Otidiphaps), 774.
nocticolor (Diglossa), 686.
noctis (Loxigilla), 613.
noctivagus (Crypturus), 784.
noctua (Athene), 894.
noctula (Scops), 885.
noguchii (Blythipicus), 77.
nonnula (Estrela), 582.
norfolkensis (Nestor), 27.
norfolkensis (Halcyon), 109.
normani (Graucalus), 296.
notabilis (Compsocoma), 663.
notabilis (Erythrura), 583.
notabilis (Glycyphila), 717.
— (Henicocichla), 1097.
— (Nestor), 27.
— (Stigmatops), 719.
northcotti (Merops), 1061.
northropi (Pendulinus), 557.
notata (Campothera), 65.
— (Chrysomitris), 593.
— (Gerygone), 269.
— (Phlogopsis), 172, 1069.
— (Ptilotis), 720.
— (Xenocichla), 309.
— (Coturnicops), 970.
— (Scopelus), 98.
notatum (Malacopteron), 1087
notatus (Brotogeris), 16.
notatus (Cinnyris), 697.
notatus (Conurus), 12.
notatus (Oriolus), 525.
notius (Pachyrhamphus), 1073.
notosticta (Hæmophila), 634.
novæ britannix (Ninox), 889.
novæ-caledoniæ (Turnix), 779.
novæ-guinæ (Chætura), 128.
— (Harpyopsis), 848.
— (Hieracidea), 870.
— (Hydralector), 958.
— (Melilestes), 718.
— (Orthonyx), 729.
— (Paradisea), 518.
— (Pitta), 208.
— (Tropidorhynchus), 725.
— (Zosterops), 707.
novæ-hiberniæ (Pitta), 209.
novæ-hollandiæ (Aegothales), 116.
— (Ardea), 911.
— (Calopsitta), 3.
— (Cereopsis), 980.
— (Dromæus), 1050.
novæ-hollandiæ (Hydralector), 958.
novæ-hollandiæ (Larus), 1023.
— (Leucospizias), 841.
— (Meliornis), 723.
— (Phalacrocorax), 1007.
— (Podiceps), 1040.
— (Plotus), 1011.
— (Recurvirostra), 943.
— (Scythrops), 55.
— (Strix), 900.
— (Trichoglossus), 31.
novæ-pomerianæ (Myiagra), 283, 1082.
novæ-zealandiæ (Anthus), 448.
— (Certhiparus), 469.
— (Coturnix), 816.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Fulica), 977.
— (Fuligula), 998.
novæ-zealandiæ (Himantopus), 943.
novæ-zealandiæ (Nesihierax), 869.
— (Ninox), 888.
— (Thinornis), 944.
novæ-zealandiæ (Prothemadara), 723.
— (Scops), 883.
novæ-zealandiæ (Hemiphaga), 748.
novæboracensis (Coturnicops), 970.
— (Vireo), 472.
novus (Pericrocotus), 301.
nuba (Otis), 925.
nubica (Campothera), 65.
nubicoide (Merops), 97.
nubicus (Caprimulgus), 124.
— (Enneactonotus), 486.

- nubicus (Merops), 97.
nuchale (Syrnium), 891.
nuchalis (Campylorhynchus), 421.
— (Carpophaga), 744.
— (Chlamydera), 523.
— (Cisticola), 365.
— (Dolospingus), 617.
— (Dryonastes), 328.
— (Dulus), 261.
— (Glareola), 930.
— (Grallaria), 170.
— (Megalæma), 39.
— (Melanoparus), 460.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Sphyrapicus), 69.
nudiceps (Gymnocichla), 175.
nadicollis (Chasmorhynchus), 219.
— (Pternistes), 810.
nudigula (Pachycephala), 481.
nudipes (Chætura), 127.
— (Gymnasio), 895.
— (Psiloscops), 887.
nudirostris (Vinago), 732.
numidicus (Picus), 70.
nuna (Psalidoprymna), 158.
nunezi (Saucerottea), 137.
nupta (Myiagra), 283, 1082.
nusæ (Haleyon), 1062.
nutalli (Phalænoptilus), 121.
— (Pica), 507.
— (Picus), 71.
nuttingi (Myiarchus), 250.
— (Oryzoborus), 613.
nyansæ (Astur), 1116.
— (Campothera), 1057.
— (Dryoscopus), 492.
nyasæ (Amydrus), 545.
— (Hyphantornis), 562.
nyassæ (Bradypterus), 350.
nycthemerus (Gennæus), 800.
nycticorax (Nycticorax), 917.
nyeanus (Centurus), 69.
nyikensis (Butalis), 262.
nympha (Pitta), 207.
— (Tanyptera), 105.
nyroca (Æthya), 997.
oatesi (Bradyornis), 288, 1082.
— (Garrulus), 510.
— (Gennæus), 800.
— (Hydrornis), 207.
— (Niltava), 294.
oaxacæ (Antrostomus), 1063.
— (Dendrortyx), 818.
— (Otocorys), 452.
oberi (Myiarchus), 250.
oberi (Pendulinus), 557.
obiense (Edoliisoma), 299.
obiensis (Carpophaga), 746.
— (Eos), 1054.
— (Geoffroyus), 17.
— (Lycocorax), 517.
— (Pachycephala), 477.
— (Reinwardtœnas), 756.
— (Rhipidura), 279.
— (Tanyptera), 106.
— (Urospizias), 1116.
obscura (Alseouax), 264.
— (Ammodromus), 632.
— (Anas), 990.
— (Anthus), 448.
— (Aphelocoma), 512.
— (Campylopterus), 133.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Chrysolophus), 803.
— (Colluricincla), 496.
— (Cyanomitra), 702.
— (Elaïnea), 240.
— (Grallaria), 170.
— (Hadrostromus), 211.
— (Helminthophaga), 431, 1096.
obscura (Hypolais), 373.
obscura (Lampropygia), 1067.
— (Larvifera), 383.
— (Leptopœcile), 379.
— (Lophophorus), 797.
obscura (Lusciniola), 371.
obscura (Manorhina), 724.
— (Merula), 398.
— (Molothrus), 552.
— (Myzomela), 716.
— (Ninox), 889.
— (Penelope), 791.
— (Phæornis), 284.
— (Polioptila), 1091.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Porzana), 967.
— (Psalidoprocne), 260.
— (Psophia), 924.
— (Ptilotis), 722.
— (Quiscalus), 1107.
— (Siphia), 293.
— (Spermophila), 615.
obscura (Sylvia), 1090.
obscura (Vireo), 473.
obscurata (Lochmias), 202.
obscurior (Cyrlostomus), 703.
— (Hypotaenidia), 961.
— (Pachycephala), 477.
— (Sclerurus), 1071.
obscurum (Dicæum), 679.

- obscurus* (Charadrius), 937.
 — (Dendragapus), 824.
 — (Empidonax), 248.
 — (Hemignathus), 693.
 — (Hemipus), 497.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Myiadectes), 407.
obscurus (Nycticorax), 917.
obscurus (Perisoreus), 511.
 — (Puffinus), 1031.
obscurus (Pycnonotus), 305.
obscurus (Pyrocephalus), 246.
 — (Regulus), 1091.
 — (Scytalopus), 166.
 — (Tetraophasis), 806.
observanda (Gecinns), 64.
obsoleta (Cotyle), 257.
 — (Dendrocolaptes), 1070.
 — (Dendroornis), 1071.
 — (Erythrospiza), 596.
 — (Hierofalco), 876.
 — (Hypolais), 373.
 — (Rallus), 960.
obsoletum (Ornithion), 238.
obsoletus (Buteo), 857.
 — (Buteola), 858.
obsoletus (Crypturus), 782.
 — (Dendrocolaptes), 185.
 — (Dendropicus), 74.
 — (Picumnus), 84.
 — (Prionochilus), 675.
 — (Salpinctes), 426.
obsoletus (Scops), 883.
obsoletus (Turdus), 401.
obstinata (Zosterops), 709.
obtecta (Parus), 463.
obtectus (Picolaptes), 1070.
ocai (Saucerottea), 138.
occidentale (Syrnium), 891.
occidentalis (Æchmophorus), 1042.
 — (Ægialitis), 940.
 — (Ammodromus), 632.
 — (Apteryx), 1019.
 — (Ardea), 910.
 — (Barnardius), 1054.
 — (Branta), 984.
 — (Cacalua), 2.
 — (Catharus), 394.
 — (Celeus), 79.
 — (Certhia), 683.
occidentalis (Chætura), 128.
occidentalis (Chlorocichla), 313.
 — (Coccyzus), 54.
 — (Crypturus), 784.
occidentalis (Cuculus), 51.
occidentalis (Cyclopsitta), 33.
 — (Dendroeca), 434.
 — (Dryoscopus), 492.
 — (Empidonax), 248, 1078.
occidentalis (Ereunetes), 949.
occidentalis (Geopsittacus), 27.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Larus), 1024.
 — (Leucopternis), 860.
occidentalis (Meleagris), 796.
occidentalis (Molothrus), 552.
 — (Muscivora), 244.
 — (Myiadectes), 1094.
 — (Myrmelastes), 181.
 — (Nestor), 27.
 — (Ninox), 888.
 — (Oryzoborus), 613.
 — (Otocorys), 1099.
 — (Pachycephala), 477.
 — (Parus), 463.
 — (Philemon), 726.
 — (Platycercus), 25.
 — (Procnias), 670.
 — (Sialia), 386.
 — (Tinnunculus), 870.
occipitale (Pyrgisoma), 636.
occipitalis (Acanthopneuste), 377.
 — (Casuarius), 1051.
 — (Chlorophonia), 671.
 — (Dendrocitta), 508.
 — (Eremomela), 356.
 — (Gecinns), 64.
occipitalis (Glaucidium), 897.
occipitalis (Halcyon), 109.
 — (Hypothymis), 274.
 — (Ixulus), 344.
 — (Lophoaëtus), 850.
 — (Lophogyps), 829.
 — (Loriculus), 23.
 — (Muscisaxicola), 1075.
 — (Phabotreron), 734.
 — (Ptilopus), 735.
 — (Urocissa), 507.
 — (Yuhina), 346.
oceanica (Carpophaga), 743.
 — (Myiagra), 283.
oceanicus (Oceanites), 1029.
ocellata (Dendroornis), 190.
 — (Ianthocinclia), 322.
 — (Lipoa), 788.
 — (Meleagris), 796.
 — (Ninox), 888.
 — (Spermophila), 617.
 — (Turnix), 779.
ocellatum (Syrnium), 891.

- ocellatus (Antrostomus), 122.
 — (Cyrtonyx), 82f.
 — (Harporhynchus), 417.
 — (Podargus), 117.
 — (Rheinardius), 795.
 ochotensis (Locustella), 370.
 ochra (Thamnophilus), 1070.
 ochracea (Loxops), 594.
 — (Ninox), 888.
 — (Sasia), 85.
 — (Spizella), 630.
 — (Syma), 1062.
 ochraceiceps (Hylophilus), 474.
 — (Pomatorhinus), 325.
 ochraceiventris (Grallaria), 170.
 — (Mitrephanes), 247.
 ochraceus (Celeus), 79.
 — (Chlorospingus), 652.
 — (Contopus), 219.
 — (Troglodytes), 426.
 — (Vireo), 473.
 ochreata (Fraseria), 497.
 ochrocephala (Chrysotis), 5.
 — (Clitonyx), 469.
 — (Cyclorhis), 476.
 ochrocephalus (Trachycomus), 315.
 ochrogaster (Estrela), 582.
 — (Penelope), 792.
 ochrolæmus (Automolus), 195.
 ochroleuca (Grallaria), 170.
 ochromelas (Eurylæmus), 205.
 — (Melirrhophetes), 728.
 ochropus (Totanus), 947.
 ochroptera (Chrysotis), 5.
 — (Leptoptila), 769.
 — (Psophia), 924.
 ochropterus (Euscarthmus), 1075.
 ochrura (Ruticilla), 385.
 oclularia (Sitagra), 564.
 — (Spiloptila), 362.
 oclularis (Conurus), 12.
 — (Cryptospiza), 1108.
 oclularis (Euscarthmus), 233.
 oclularis (Glareola), 930.
 oclularis (Melittophagus), 1061.
 oclularis (Motacilla), 443.
 — (Phrygilus), 641.
 — (Rhinomyias), 282.
 — (Stigmatops), 718.
 oculatus (Zonæginthus), 580.
 oculea (Caloperdix), 814.
 oculeus (Canirallus), 965.
 odiosa (Ninox), 889.
 œdica (Turdus), 1094.
 œnanthe (Saxicola), 390.
 œnanthoides (Ochthoeca), 226.
 œnas (Columba), 749.
 œnochlamys (Dendrophila), 682.
 œnone (Chrysuronia), 140.
 œnops (Columba), 751.
 — (Garrulus), 510.
 œnothorax (Carpophaga), 744.
 oglei (Actinodura), 331.
 olax (Osmotreron), 734.
 oleaginea (Anabazenops), 192.
 — (Encometis), 655.
 — (Zosterops), 708.
 oleagineus (Andropadus), 313.
 — (Mionectes), 237.
 — (Ostinops), 550.
 — (Eleopicus), 75.
 olivacea (Alcippe), 345.
 — (Amaurornis), 972.
 — (Apalis), 853.
 — (Camaroptera), 356.
 — (Certhidea), 688.
 — (Chalcostigma), 156.
 — (Chamaea), 171.
 — (Chlorothraupis), 658.
 — (Chrysomitris), 592.
 — (Cryptolopha), 285.
 — (Cyanomitra), 702.
 — (Dendrocicla), 186.
 — (Dysithamnus), 180.
 — (Iole), 312.
 — (Ixcicla), 316.
 — (Lophotilbis), 903.
 — (Mionectes), 236.
 olivacea (Newtonia), 266.
 olivacea (Ochthoeca), 1075.
 — (Ornithion), 238.
 — (Pachycephala), 479.
 olivacca (Phonipara), 618.
 olivacea (Pomatorhinus), 325.
 — (Pyrrhospiza), 604.
 — (Regulus), 1091.
 — (Sericornis), 367.
 — (Siphia), 293.
 — (Xenocichla), 310.
 — (Zosterops), 711.
 olivaceiceps (Chlorospingus), 650.
 olivaceiceps (Coracias), 93.
 olivaceiceps (Coccyz), 60.
 — (Griniger), 311, 1085.
 — (Sitagra), 564.
 olivaceocauda (Aglaeactis), 152.
 olivaceofuscus (Turdus), 400.
 olivaceum (Oncostoma), 232.
 — (Stactolema), 38.
 olivaceus (Chlorophoneus), 490.

- olivaceus (Chlorospingus), 650.
 - (Geocolaptes), 62.
 - (Hemignathus), 693.
 - (Hylophilus), 475.
 - (Malaconotus), 489.
 - (Mitrephanes), 247.
 - (Peucedramus), 436.
 - (Picumnus), 84.
 - (Prionochilus), 675.
 - (Rhynchocyclus), 242.
 - (Tarsiger), 384.
 - (Turdus), 399.
 - (Vireo), 472.
- olivascens (Basileuterus), 439.
 - (Catharus), 394.
 - (Cinnicerthia), 419.
 - (Embernagra), 638.
 - (Gymnopithys), 173.
 - (Lioptilus), 273.
 - (Myiarchus), 1078.
 - (Regulus), 379.
 - (Saltator), 645.
 - (Sclerurus), 1071.
- olivatra (Merula), 398.
- olivei (Turnix), 779.
- olivetorum (Hypolais), 373.
- olivicyanea (Tanagra), 662.
- olivina (Elainea), 240.
- olivinus (Eleopicus), 76.
- olivus (Empidonax), 247.
- olor (Cygnus), 987.
- olympica (Cinclus), 1095.
- ombriosa (Parus), 464.
- omissa (Cittocinclæ), 1095.
 - (Phonipara), 618.
 - (Siphia), 293.
 - (Synallaxis), 1072.
- omoensis (Cossypha), 1094.
- onerosa (Gerygone), 269.
- onocrotalus (Pelecanus), 1005.
- onslowi (Phalacrocorax), 1009.
- oorti (Megalæma), 39.
- opaca (Hypolais), 373.
- opalizans (Pipra), 221.
- ophryophanes (Hypotriorchis), 873.
- ophthalmica (Cacatua), 3.
 - (Spermophila), 616.
- ophthalmicus (Chlorospingus), 650.
 - (Pogonotricus), 235.
- opistholeuca (Saxicola), 389.
- opistherythra (Rhipidura), 277.
- opisthomelas (Puffinus), 1031.
- optatus (Cuculus), 51.
- oratrix (Amazona), 1053.
- oratrix (Chrysotis), 5.
- orbignesia (Bolborhynchus), 14.
- orbignii (Arremon), 646.
- orbignyana (Dendroornis), 190.
- orbignyanus (Picumnus), 83.
 - (Thinocorus), 780.
- orbignyi (Siptornis), 200.
- orbitalis (Capsiempis), 237.
- orbitatus (Euscarthmus), 232.
- ordi (Bucco), 47.
- ordi (Plegadis), 903.
- oreas (Lessonia), 230.
 - (Picathartes), 516.
- oreas (Pitta), 207.
- oreas (Rhipidura), 278.
- oregona (Pipilo), 637.
- oregonus (Junco), 629.
- orenocensis (Pyroderus), 218.
 - (Saltator), 645.
 - (Serphophaga), 1075.
 - (Veniliornis), 1059.
 - (Xiphocolaptes), 1071.
- orenocensus (Cnipolegus), 229.
- oreobates (Cinclodes), 1073.
 - (Melittophagns), 96.
- oreoeca (Picus), 1058.
- oreodrama (Otocorys), 1098.
- oreophila (Cettia), 372.
- oreophila (Saxicola), 1092.
- oreskios (Harpactes), 88.
- orientale (Parisoma), 273.
- orientalis (Accentor), 381.
 - (Acrocephalus), 368.
- orientalis (Aidemosyne), 1108.
- orientalis (Anthreptes), 704.
 - (Aquila), 852.
 - (Arhricola), 814.
 - (Arses), 288.
 - (Batis), 265.
- orientalis (Carduelis), 591.
- orientalis (Carpophaga), 745.
 - (Chelidonaria), 1079.
 - (Chlamydera), 523.
 - (Dryoscopus), 493.
 - (Emberiza), 621.
 - (Eudynamis), 54.
 - (Eurystomus), 93.
 - (Gallinula), 974.
 - (Geoffroyus), 17.
 - (Glareola), 929.
 - (Glaucidium), 896.
 - (Haleyon), 107.
 - (Hieracidea), 870.
 - (Huhua), 881.
 - (Hypochaera), 574.
 - (Macropygia), 756.

- orientalis* (*Melanopyrrhus*), 540.
- (*Melocichla*), 362.
- orientalis* (*Merganser*), 1003.
- orientalis* (*Merula*), 396.
- (*Nasiterna*), 1054.
- (*Pernis*), 865.
- (*Psallidoprocne*), 260.
- (*Pteroclorus*), 777.
- (*Ptilopus*), 740.
- orientalis* (*Pyrrhula*), 607.
- orientalis* (*Pyrrhurus*), 1085.
- (*Tarsiger*), 384.
- (*Tinnunculus*), 870.
- (*Turtur*), 759.
- (*Xenocichla*), 310.
- oritis* (*Cyanomitra*), 702.
- orix* (*Pyromelana*), 572.
- orizabæ* (*Pipilo*), 637.
- ornata* (*Cissa*), 509.
- (*Cyanolyca*), 513.
- (*Myrmotherula*), 179.
- (*Nothoprocta*), 785.
- (*Poospiza*), 628.
- (*Ptilotis*), 722.
- (*Setophaga*), 441.
- (*Tanagra*), 662.
- (*Thlypopsis*), 653.
- (*Tiaris*), 642.
- ornatum* (*Auriparus*), 468.
- ornatus* (*Antrostomus*), 122.
- ornatus* (*Calcaris*), 625.
- (*Cephalopterus*), 218.
- (*Lophornis*), 165.
- (*Merops*), 97.
- (*Myiobius*), 245.
- (*Orthorhynchus*), 164.
- (*Pachyrhamphus*), 212.
- (*Pardalotus*), 674.
- (*Ptilopus*), 739.
- (*Spizaetus*), 848.
- (*Trichoglossus*), 31.
- orphea* (*Microcerculus*), 429.
- (*Sylvia*), 374.
- orpheus* (*Mimus*), 445.
- (*Pachycephala*), 479.
- orphnocephalus* (*Hyphantornis*), 1107.
- orphogastra* (*Cinnyris*), 699.
- orrhophæus* (*Harpactes*), 88.
- orru* (*Corvus*), 504.
- orthonyx* (*Acropternis*), 168.
- orthura* (*Catharna*), 161.
- ortoni* (*Penelope*), 791.
- (*Zodalia*), 158.
- oryzivora* (*Cassidix*), 551, 1106.
- (*Padda*), 588.
- oryzivorus* (*Dolichonyx*), 552.
- osberti* (*Chlorostilbon*), 141.
- osburni* (*Laletes*), 475.
- osceola* (*Meleagris*), 796.
- oscillans* (*Microeca*), 264.
- (*Oriolus*), 1105.
- oscitans* (*Anastomus*), 906.
- osculans* (*Hæmatopus*), 932.
- (*Helianthea*), 151.
- (*Rhamphastos*), 42.
- (*Sericornis*), 367.
- osea* (*Cinnyris*), 698.
- oseryi* (*Clypeicterus*), 549.
- osiris* (*Cinnyris*), 698.
- ossifraga* (*Gypætus*), 831.
- ossifragus* (*Colæus*), 505.
- ostralegus* (*Hæmatopus*), 932.
- ostrinus* (*Pyrenestes*), 576.
- otoleuca* (*Pyrrhulanda*), 1100.
- ottonis* (*Pogonotriccus*), 1075.
- (*Siptornis*), 1072.
- otus* (*Asio*), 877.
- ouratensis* (*Acridula*), 467.
- oustaleti* (*Anas*), 990.
- (*Cinclodes*), 1073.
- (*Cinnyris*), 698.
- (*Leptopogon*), 237.
- (*Nothoprocta*), 1115.
- (*Scotopelia*), 879.
- oustaleti* (*Strix*), 900.
- oustaleti* (*Temnurus*), 509.
- ovampensis* (*Accipiter*), 845.
- oweni* (*Apteryx*), 1049.
- owstoni* (*Hypotaenidia*), 961.
- (*Parus*), 461.
- (*Xanthopygia*), 1080.
- (*Zosterops*), 710.
- oxycerca* (*Cercibis*), 903.
- oxyptera* (*Querquedula*), 993.
- oxyura* (*Chætura*), 128.
- oxyurus* (*Sphenocercus*), 731.
- pachycephaloides* (*Clytorhynchus*), 499.
- pachydemas* (*Pœcilodryas*), 1080.
- pachyrhyncha* (*Cassicus*), 551.
- (*Geospiza*), 608, 1110.
- (*Halcyon*), 109, 1062.
- (*Rhynchopsitta*), 11.
- pachyrhynchus* (*Catarrhactes*), 1048.
- pachyrhynchus* (*Nucifraga*), 506.
- pachyrhynchus* (*Pachyphantes*), 567.
- pachyrhynchus* (*Poicephalus*), 9.
- pacifica* (*Amphispiza*), 1110.
- (*Anorthura*), 427.
- (*Ardea*), 911.
- (*Bubo*), 881.

- pacifica* (Carpophaga), 743.
 — (Colymbus), 1039.
 — (Drepanis), 691.
 — (Eurystomus), 93.
 — (Hypotaenidia), 961.
 — (Lalage), 303.
 — (Parula), 432.
 — (Tringa), 951.
pacificus (Cyanorhamphus), 26.
pacificus (Cypselus), 125.
 — (Gabianus), 1026.
 — (Pareudiasles), 973.
pæna (Erythropygia), 412.
pagana (Elaïnea), 239.
pagodarum (Syrnium), 891.
pagodarum (Temenuchus), 537.
palawanense (Malacopteron), 337.
palawanensis (Buchanga), 530.
palawanensis (Carpophaga), 744.
 — (Chloropsis), 318.
 — (Criniger), 311.
 — (Dicrurus), 529.
 — (Gracula), 539.
 — (Oriolus), 526.
pallasi (Cinclus), 419.
 — (Turdus), 402.
pallatangæ (Elaïnea), 210.
pallens (Accipiter), 844.
 — (Butalis), 262, 1079.
 — (Galbula), 1056.
 — (Hemichelidon), 1079.
pallens (Merula), 398.
pallens (Vireo), 473.
pallescens (Anorthura), 427, 1096.
 — (Bubo), 881.
 — (Campylorhynchus), 420.
 — (Columbigallina), 763.
 — (Dendrocolaptes), 185.
 — (Gyps), 830.
 — (Monasa), 49.
pallescens (Parus), 1101.
pallescens (Psephotus), 25.
palliata (Dendroornis), 189.
 — (Falculia), 728.
 — (Junco), 629.
 — (Leucopternis), 860.
 — (Porphyrio), 976.
palliatu (Cinclodes), 202.
 — (Garrulax), 328.
 — (Hæmatopus), 932.
 — (Thamnophilus), 182.
pallice (Pitta), 209.
pallida (Ægialitis), 940.
 — (Anorthura), 427.
 — (Caica), 8.
pallida (Chrysomitris), 591.
 — (Colius), 91.
 — (Columba), 749.
 — (Diglossopsis), 686.
 — (Drymoedus), 319.
 — (Eucometis), 655.
 — (Eupsychorlyx), 820.
 — (Formicarius), 172.
 — (Galerida), 1100.
 — (Geospiza), 609.
 — (Gerygone), 268.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Hypolais), 373.
 — (Hypotriorchis), 873.
 — (Leptoptila), 770.
 — (Leucippus), 135.
 — (Malacias), 324.
 — (Merula), 398.
 — (Munia), 587.
 — (Myiagra), 283, 1082.
 — (Otocorys), 451-52.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Perdix), 812.
 — (Petrochelidon), 1079.
 — (Polyborus), 832.
 — (Psittacula), 21.
 — (Psittacula), 1053.
 — (Pterythrion), 487.
 — (Siptornis), 199.
pallida (Spizella), 630.
pallida (Sylviella), 355.
 — (Thryothorus), 423.
 — (Upucerthia), 203.
 — (Upupa), 1061.
 — (Yuhina), 346.
 — (Zosterops), 706.
pallidiceps (Buarremon), 1111.
 — (Columba), 752.
 — (Floricola), 160.
 — (Platycercus), 24.
 — (Schizorhis), 1060.
 — (Urospizias), 842.
pallidicincta (Tympanuchus), 824.
pallidifrons (Chætura), 127.
 — (Hylophilus), 475.
pallidigula (Pratincola), 387.
 — (Xenocichla), 310.
pallidigularis (Automolus), 195.
pallidinucha (Pipilopsis), 649.
pallidior (Dicæum), 678.
 — (Myzomela), 716.
 — (Osmotreron), 733.
 — (Poliospiza), 599.
 — (Synæcus), 816.
pallidipes (Phylloscopus), 378.

- pallidipes* (Zosterops), 709.
pallidirostris (Colluricincla), 496.
 — (Lanius), 1103.
 — (Lophoceros), 103.
pallidirostris (Schizorhis), 90.
pallidiventris (Anthus), 446.
 — (Contopus), 248.
 — (Merula), 1092.
 — (Ortalia), 793.
 — (Parus), 461.
 — (Psalidoprymna), 1067.
 — (Selophaga), 441.
pallidus (Accentor), 382.
 — (Blacicus), 249.
 — (Bradyornis), 287.
pallidus (Caprimulgus), 122.
pallidus (Criniger), 311.
 — (Cuculus), 51, 1056.
pallidus (Cypselus), 125.
pallidus (Horornis), 373.
 — (Spilornis), 834.
palliolatus (Misocallus), 52.
pallipes (Siphia), 292.
palliseri (Elaphornis), 335.
palmæ (Fringilla), 589.
palmarum (Dendroeca), 435.
 — (Glaucidium), 896.
 — (Hypocharnosyna), 32.
 — (Phœnicophilus), 652.
 — (Tanagra), 662.
palmensis (Parus), 464.
palmeri (Harporhynchus), 417.
 — (Phæornis), 284.
 — (Porzana), 971.
 — (Rhodacanthis), 606.
palpebralis (Geothlypis), 437, 1098.
 — (Schizæaca), 201.
palpebrosa (Gerygone), 270.
 — (Pœcilothraupis), 664.
 — (Zosterops), 707.
paludicola (Cistothorus), 424.
 — (Cotyle), 257.
 — (Estrela), 582.
palumbarius (Astur), 839.
palumboides (Columba), 752.
palumhus (Columba), 751.
palustre (Pellorneum), 336.
palustris (Acrocephalus), 369.
 — (Cistothorus), 424.
palustris (Cotyle), 257.
palustris (Emberiza), 620.
 — (Ligea), 436.
 — (Megalarus), 351.
 — (Parus), 462.
 — (Porzana), 967.
palustris (Spermophila), 615.
pamela (Aglæactis), 152.
pamirensis (Charadrius), 938.
 — (Montifringilla), 595.
pammelæna (Mælæornis), 287.
 — (Myzomela), 716.
pamprepta (Aithurus), 1066.
panamensis (Chrysotis), 5.
 — (Crax), 789.
 — (Damophila), 140.
 — (Malacoptila), 47.
 — (Myiarchus), 250, 1078.
panaya (Sterna), 1017.
panayensis (Culicicapa), 282, 1082.
 — (Edoliisoma), 299.
 — (Graucalus), 298.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Ortothomus), 361.
 — (Spilornis), 834.
panayensis (Sterna), 1017.
panayensis (Stoparola), 292.
panderi (Podoces), 506.
panerythrus (Philydor), 194.
panini (Penelopides), 102.
panychlorus (Bolborhynchus), 14.
papa (Cathartes), 828.
papa (Chaunoproctus), 610.
papillosa (Ibis), 901.
 — (Numida), 804.
papua (Pygoscelis), 1047.
papuana (Erythrura), 584.
 — (Hypotriorchis), 873.
 — (Microeca), 1080.
 — (Pœcilodryas), 272, 1080.
papuanus (Casuarus), 1051.
papuensis (Acanthiza), 366.
 — (Chætorhynchus), 531.
 — (Charnosyna), 32.
 — (Graucalus), 296.
 — (Lyncornis), 119.
 — (Merula), 397.
 — (Neositta), 682.
 — (Oreocincla), 403.
 — (Podargus), 117.
paradisea (Ptilorhis), 521.
 — (Sterna), 1015.
 — (Tetrapteryx), 923.
 — (Urogalba), 45.
 — (Vidua), 574.
paradiseus (Dissemurus), 532.
 — (Platycercus), 1054.
paradisi (Terpsiphone), 280.
paradoxa (Cholornis), 470.
 — (Enneoctonus), 486.
 — (Motacilla), 445.

- paradoxus* (Syrnhaptes), 776.
 — (Triptorhinus), 168.
paraensis (Automolus), 1072.
 — (Dendrexetastes), 189.
paraguayæ (Gallinago), 953.
paralios (Sturnella), 1106.
parambæ (Attila), 1074.
 — (Grallaria), 1069.
 — (Odontophorus), 822.
parasiticus (Stercorarius), 1028.
parca (Mionectes), 1075.
pardalotum (Glaucidium), 897.
pardalotus (Dendroornis), 189.
pardus (Campylorhynchus), 421.
parellina (Guiraca), 612.
parensis (Momotus), 94.
pareola (Chiroxiphia), 222.
parina (Xenodacnis), 687.
parisorum (Pendulinus), 557.
parkeri (Notornis), 976.
parkinsoni (Majaqueus), 1033.
parkmanni (Troglydytes), 425.
paroticalis (Ixia), 308, 1085.
parulus (Anæretes), 236.
parumstriata (Suya), 358.
parva (Cannahina), 1109.
 — (Chlorodrepanis), 692.
 — (Microdynamis), 55.
 — (Mirafræ), 456.
 — (Muscicapa), 263.
 — (Phyllostrophus), 314.
 — (Porphyriola), 975.
 — (Porzana), 968.
 — (Spermophila), 616.
 — (Tachornis), 126.
 — (Thriponax), 1059.
 — (Tyranniscus), 239.
parvieristatus (Eupsychortyx), 820.
parvirostris (Artamus), 533.
parvirostris (Attila), 1074.
 — (Chloropsis), 318.
 — (Chlorospingus), 651.
 — (Crypturus), 783.
 — (Elafuea), 240, 1076.
 — (Graucalus), 296.
 — (Ixocinclæ), 316.
 — (Microchera), 164.
 — (Estrelata), 1034.
parvirostris (Phegornis), 956.
parvirostris (Picolaptes), 187.
 — (Poliophtila), 380, 1091.
 — (Serphophaga), 236.
 — (Tetrao), 825.
parvissima (Scops), 883.
parvula (Aglæactis), 152.
parvula (Cacatua), 2.
 — (Colluricincla), 496.
parvula (Geospiza), 608.
parvula (Heliodoxa), 1067.
 — (Nesomimus), 416.
 — (Zosterops), 709.
parvulus (Ægithalus), 468.
parvulus (Anorthura), 427.
parvulus (Antrostomus), 122.
 — (Graucalus), 297.
parvus (Pitangus), 243.
parzudakii (Calliste), 668.
pasadenensis (Harporhynchus), 417.
passerina (Athene), 894.
passerina (Columbigallina), 763.
 — (Emberiza), 621.
passerina (Nyctala), 894.
passerina (Psittacula), 15.
passerinii (Rhamp hoccelus), 660.
passerinum (Glaucidium), 896.
passerinus (Cacomantis), 52.
 — (Eleopicus), 76.
pastazæ (Galbula), 45.
pastinator (Licmetis), 3.
 — (Trypanocorax), 505.
patagonica (Aptenodytes), 1047.
 — (Siptornis), 200.
patagonicus (Cinclodes), 202.
 — (Mimus), 416.
patagonus (Conurus), 11.
paucalensis (Synallaxis), 199.
paucimaculatus (Thryothorus), 423.
paulina (Carpophaga), 744.
paulus (Hapalocercus), 1075.
pauper (Nyctanassa), 918.
 — (Phyllostrophus), 314.
 — (Spermophila), 615.
paupera (Geospiza), 609.
pauci (Pauxis), 790.
pavonina (Balearica), 923.
pavoninus (Dromococcyx), 62.
 — (Lophornis), 165.
 — (Pharomacrus), 86.
payesi (Ardetta), 914.
paykulli (Rallina), 966.
pealei (Falco), 874.
 — (Halcyon), 109.
pealii (Erythrura), 583.
peasei (Prodotiscus), 1055.
pecilei (Mesopicus), 77.
pecilei (Neocossyphus), 410.
pecoris (Molothrus), 552.
pectinicaudus (Sittasomus), 191.
pectorale (Dicæum), 678.
pectoralis (Automolus), 194.

- pectoralis* (Bucco), 47.
 — (Calliope), 383.
 — (Caprimulgus), 123.
pectoralis (Cladorhynchus), 943.
pectoralis (Colinus), 820.
 — (Cooperastur), 844.
 — (Coturnix), 816.
pectoralis (Crateroscelis), 1087.
 — (Cyrtostomus), 703.
 — (Dicrurus), 531.
 — (Diglossa), 685.
 — (Eclectus), 16.
 — (Euphonia), 673.
 — (Garrulax), 327.
pectoralis (Gerygone), 268.
pectoralis (Graucalus), 296.
 — (Gymnogenys), 1116.
 — (Habruca), 234.
 — (Herpsilochmus), 178.
 — (Hylophilus), 474, 1102.
pectoralis (Hypotaenidia), 962.
pectoralis (Icterus), 558.
 — (Microcerculus), 1096.
 — (Munia), 586.
 — (Myzomela), 716.
 — (Oreopyra), 149.
pectoralis (Pachycephala), 479.
 — (Pellorneum), 336.
pectoralis (Phlogoenas), 773.
 — (Ploceipasser), 569.
 — (Ptilopus), 741.
 — (Rhinomyias), 282, 1081.
 — (Rhipidura), 279.
pectoralis (Ruticilla), 385.
 — (Sarciphorus), 933.
pectoralis (Serinus), 601.
 — (Thlypopsis), 653.
 — (Thriponax), 82.
 — (Uroloncha), 585.
 — (Xerophila), 468.
 — (Yunx), 85.
pecuaria (Ægialitis), 941.
pekinensis (Cypselus), 125, 1064.
 — (Parus), 462.
 — (Tinnunculus), 871.
 — (Rhopophilus), 350.
pelagica (Chætura), 128.
 — (Procellaria), 1028.
pelagicus (Phalacrocorax), 1007.
 — (Thalassoaëtus), 853.
pelecanoides (Sterna), 1016.
pelewensis (Anas), 990.
 — (Artamus), 533.
 — (Caloenas), 775.
 — (Halcyon), 108.
pelewensis (Porphyrio), 976.
 — (Ptilopus), 736.
pele (Gymnobucco), 37, 1055.
 — (Scotopelia), 879.
pelingsensis (Ptilopus), 740.
pelios (Turdus), 400.
pella (Topaza), 147.
pelvicus (Tephrodornis), 494.
pelzelni (Agyrtria), 136.
pelzelni (Aplonis), 542.
 — (Euscarthmus), 232.
 — (Granatellus), 438.
pelzelni (Micrastur), 838.
pelzelni (Myiarchus), 251, 1078.
 — (Myrmeciza), 175.
 — (Podicipes), 1040.
 — (Pseudotriccus), 233.
 — (Rhipidura), 276.
 — (Silagra), 564.
 — (Sycalis), 601.
 — (Tityra), 211.
peltata (Platystira), 266.
pemberton (Clivicola), 1079.
penduliger (Cephalopterus), 218.
pendulinus (Ægithalus), 467.
penelope (Mareca), 991.
penicillata (Eucometis), 654.
 — (Kelaartia), 307.
 — (Otocorys), 451.
 — (Ptilotis), 722.
penicillatus (Phalacrocorax), 1008.
peninsula (Cuculus), 51.
peninsula (Pyrrhuloxia), 619.
peninsulæ (Ammodromus), 631.
 — (Contopus), 249.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Trochalopteron), 321.
peninsularis (Lagopus), 1116.
 — (Melanocichla), 1086.
 — (Ninox), 888.
 — (Phœnicotheraupis), 1111.
 — (Tinnunculus), 871.
 — (Troglodytes), 1096.
 — (Yungipicus), 75.
pennata (Rhea), 1052.
pennata (Scops), 883.
pennalus (Eulolmaëtus), 851.
pennsylvanica (Anthus), 447.
 — (Dendroeca), 434.
pennsylvanicus (Buteo), 857.
pensilis (Nelicurvius), 567.
pentlandi (Nothoprocta), 785.
 — (Tinamotis), 786.
peposaca (Metopiana), 996.
peracensis (Alcippe), 345.

- peracensis* (Iole), 312.
perciali (Psalidoproene), 260.
 — (Rhynchostruthus), 1109.
 — (Telephonus), 488.
percna (Thryomanes), 421.
percnopterus (Neophron), 830.
percussus (Prionochilus), 674.
 — (Xiphidiopicus), 77.
perdicaria (Nothoprocta), 784.
perdix (Brachyrhamphus), 1044.
peregrina (Helminthophaga), 431.
 — (Otocorys), 452.
peregrinator (Falco), 874.
peregrinoides (Falco), 875.
peregrinus (Falco), 874.
 — (Pericrocotus), 301.
periculosa (Cossypha), 409.
periophthalmica (Callæops), 288.
 — (Grallaria), 1068.
periophthalmicus (Dicrurus), 530.
 — (Monarcha), 290.
perissa (Otocorys), 1099.
perkinsi (Oreomyza), 692.
perlata (Margarornis), 191.
 — (Rhipidura), 278.
 — (Strix), 899.
perlatum (Glaucidium), 897.
perlatus (Ptilopus), 739.
permagnus (Sphenocercus), 731.
permista (Campothera), 66.
perniger (Hypsipetes), 316.
pernigra (Rhinogryplius), 828.
pernix (Ochthodiæta), 1074.
pernyi (Picus), 70.
peroni (Ægialitis), 940.
peronii (Geocichla), 404, 1094.
perousei (Ptilopus), 736.
perpallida (Ammodromus), 632.
 — (Columbigallina), 764.
perpallidus (Gecinus), 64.
perplexa (Empidonax), 1078.
perquisitor (Vireo), 1102.
perreini (Estrela), 582.
perroti (Dendrexetastes), 189.
persa (Turacus), 89.
persica (Calandrella), 453.
 — (Motacilla), 443.
 — (Parus), 464.
 — (Saxicola), 388.
persicus (Cassicus), 550.
 — (Merops), 97.
 — (Phasianus), 802.
 — (Puffinus), 1032.
personata (Aëthocorys), 1099.
 — (Agapornis), 22.
personata (Arboricola), 814.
personata (Chlorodyta), 1089.
 — (Diglossa), 686.
 — (Emberiza), 622.
 — (Eophona), 610.
 — (Gerygone), 269.
 — (Gymnoschizorhis), 90.
personata (Heliopais), 978.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Motacilla), 443.
 — (Nesomimus), 416.
 — (Poephila), 584.
 — (Poospiza), 628.
 — (Pyrrhulopsis), 21.
 — (Rhipidura), 277.
 — (Spizocorys), 454.
personata (Strix), 900.
 — (Sula), 1011.
personatus (Artamus), 534.
 — (Geoffroyus), 16.
 — (Graucalus), 297.
personatus (Lobivanellus), 934.
personatus (Pipilopsis), 649.
 — (Pterocles), 777.
personatus (Sitagra), 564.
personatus (Trogon), 86.
perspicillata (Carpophaga), 745.
 — (Grallaria), 169.
 — (Lichenops), 229, 1075.
 — (Malacocincla), 333.
 — (Myiagra), 1082.
 — (Oedemia), 999.
 — (Pulsatrix), 892.
 — (Sericornis), 367.
 — (Terpsiphone), 281.
perspicillatus (Artamus), 534.
 — (Chloronerpes), 65.
 — (Dryonastes), 328.
perspicillatus (Malaconotus), 489.
perspicillatus (Phalacrocorax), 1007.
 — (Turtur), 760.
perstriata (Ptilotis), 720.
pertinax (Contopus), 248.
 — (Conurus), 12.
peruana (Chrysomitris), 592.
 — (Cinnicerthia), 419.
 — (Empidochanes), 247.
 — (Monasa), 49.
 — (Nemosia), 654.
 — (Spathura), 153.
peruanus (Ammodromus), 632.
 — (Chlorostilbon), 142.
peruviana (Conopophaga), 169.
 — (Eleopicus), 75, 1059.
 — (Geositta), 204.

- peruviana* (*Hypocnemis*), 173.
 — (*Leptopogon*), 237.
 — (*Nothoprocta*), 785.
 — (*Pithys*), 173.
 — (*Quiscalus*), 560.
 — (*Rhynchochylus*), 242.
 — (*Rupicola*), 215.
 — (*Zonotrichia*), 626.
peruvianus (*Anthus*), 448.
peruvianus (*Picolaptes*), 187.
peruvianus (*Rallus*), 960.
 — (*Rhynchochylus*), 1077.
peruvianus (*Steatornis*), 115.
peruvianus (*Tinamus*), 781.
pesqueti (*Dasyptilus*), 4.
petechia (*Dendroeca*), 433.
petenicus (*Ammodromus*), 632.
petenicus (*Thryothorus*), 422.
petersi (*Podica*), 978.
petiti (*Campophaga*), 300.
petiti (*Psammocrex*), 965.
petiti (*Psalidoprocne*), 260.
petronella (*Petronia*), 597.
petrophila (*Euphema*), 26.
petrosa (*Caccabis*), 807.
petzii (*Conurus*), 12.
phæa (*Chamaea*), 469.
phæocephala (*Alcippe*), 345.
phæocephalus (*Chlorospingus*), 650.
 — (*Criniger*), 310.
 — (*Cyphorhinus*), 429.
 — (*Myiarchus*), 251.
 — (*Rhæctes*), 495.
phæocephus (*Micropternus*), 78.
phæocercus (*Mitrephanes*), 247.
phæochroa (*Dendrocincla*), 1070.
phæochromus (*Oriolus*), 527.
phæonola (*Columba*), 750.
 — (*Parus*), 462.
phæonolus (*Myiarchus*), 251.
 — (*Pachycephala*), 479.
phæopleurus (*Buarremon*), 647.
 — (*Catharus*), 394.
phæopus (*Numenius*), 944.
phæopyga (*Rallina*), 966.
phæopygia (*Esrelata*), 1034.
phæopygoides (*Turdus*), 402, 1093.
phæopygus (*Turdus*), 401.
 — (*Xiphocolaptes*), 188.
phæostriata (*Megalæma*), 39.
phaethon (*Zonotrichia*), 920.
phaethon (*Neochmia*), 583.
phainopeplus (*Campylopterus*), 134.
phalæna (*Caprimulgus*), 124.
phalænoides (*Glaucidium*), 897.
phalænoides (*Podargus*), 117.
phalerata (*Helianthea*), 1067.
phaon (*Lesbia*), 158.
pharetra (*Dendroeca*), 435.
phasianella (*Macropygia*), 755.
 — (*Pteropodocys*), 300.
phasianellus (*Oromococcyx*), 62.
 — (*Pediæceles*), 823.
phasianus (*Centropus*), 56.
phayrei (*Osmotreron*), 733.
phayrii (*Alcippe*), 345.
 — (*Anthocincla*), 206.
 — (*Pomatorhinus*), 325.
phelpsi (*Sittasomus*), 191.
philadelphia (*Geothlypis*), 438.
 — (*Larus*), 1021.
 — (*Oporornis*), 1097.
philadelphicus (*Vireo*), 472.
philipi (*Egithina*), 341.
 — (*Casuarus*), 1051.
philippina (*Columba*), 752.
philippii (*Phaethornis*), 132.
phillipsi (*Saxicola*), 389.
philippensis (*Centropus*), 56.
philippensis (*Hypotaenidia*), 961.
 — (*Iole*), 312.
 — (*Loriculus*), 23.
philippensis (*Muscicapa*), 263.
philippensis (*Ninox*), 888.
 — (*Oriolus*), 527.
 — (*Pelecanus*), 1005.
philippensis (*Pitta*), 208.
philippensis (*Podiceps*), 1040.
 — (*Pseudopteryx*), 882.
 — (*Spizaetus*), 849.
 — (*Thriponax*), 82.
philippina (*Phyllergates*), 362.
philippinarum (*Cacatua*), 3.
philippinensis (*Ceyx*), 112.
 — (*Circus*), 836.
 — (*Mirafra*), 456.
 — (*Pachycephala*), 480.
 — (*Philemon*), 726.
 — (*Siphia*), 293, 1083.
philippinus (*Ægialitis*), 939.
philippinus (*Corvus*), 504.
 — (*Merops*), 97.
philomela (*Aedon*), 382.
philomela (*Microcerculus*), 429.
phœbe (*Metallura*), 155.
phœnicea (*Campophaga*), 300.
 — (*Petroeca*), 266.
 — (*Urobrachya*), 573.
phœniceum (*Trochaloxyron*), 321.
phœniceus (*Agelæus*), 553.

- phoeniceus* (Cardinalis), 620.
 — (Tachyphonus), 655.
phoenicobia (Tachornis), 127.
phœnicomera (Pyromelana), 572.
phœnicomitra (Myiobius), 245.
phœnicoptera (Ampelis), 260.
phœnicoptera (Pytelia), 578.
phœnicopterus (Crocopus), 732.
 — (Lamprocolius), 547.
phœnicotis (Anthreptes), 704.
phœnicotis (Chlorochrysa), 670.
 — (Uræginthus), 582.
phœnicura (Amaurornis), 973.
 — (Ammomanes), 458.
 — (Henicornis), 202.
 — (Rhipidura), 277.
 — (Ruticilla), 385.
phœnicuroides (Ammomanes), 459.
 — (Enneoctonus), 486.
 — (Hodgsonius), 384.
phœnicurus (Attila), 214, 1074.
phœnicurus (Enneoctonus), 485.
phœnicurus (Myiobius), 245.
phœnicurus (Phaeton), 1004.
phragmitis (Acrocephalus), 370.
phryganophila (Synallaxis), 199.
phrygia (Meliphaga), 719.
piaggæ (Geocichla), 404.
pica (Copsychus), 441.
 — (Fluvicola), 227.
picaoides (Sibia), 324.
picata (Ardea), 911.
 — (Certhionix), 719.
picata (Cracticus), 500.
 — (Grallina), 500.
 — (Himantopus), 942.
 — (Laniarius), 491.
 — (Leucosarcia), 774.
 — (Petroeca), 267.
 — (Saxicola), 388.
picatum (Todiostrostrum), 232.
picatus (Bucco), 47.
 — (Hemipus), 497.
 — (Yungipicus), 74.
picazuro (Columba), 750.
picea (Pyriglena), 176.
pichincha (Oreotrochilus), 147.
picina (Chaetura), 128.
picrostris (Dendroplex), 189.
pickeringi (Carpophaga), 745.
picta (Ispidina), 111.
 — (Emblema), 580.
 — (Entomophila), 719.
 — (Psittacella), 21.
 — (Pyrrhura), 13.
picta (Setophaga), 441.
picticollis (Casuarius), 1051.
 — (Garrulax), 327.
pictifrons (Suthora), 471.
pictum (Todiostrostrum), 231.
picturatus (Turtur), 759.
pictus (Aramus), 920.
 — (Buteo), 858.
 — (Calcarius), 625.
 — (Chrysolophus), 803.
 — (Francolinus), 808.
 — (Oreortyx), 818.
picui (Columbula), 763.
picumnus (Climacteris), 1112.
 — (Dendrocolaptes), 185.
picus (Dendroplex), 189.
pierrei (Chrysophlegma), 67.
pilaris (Calopteryx), 234.
 — (Turdus), 399.
pileomayensis (Picumnus), 83.
pileata (Anous), 1018.
 — (Atticora), 258.
 — (Camaroptera), 356.
 — (Leptasthenura), 201.
 — (Leptopogon), 237.
 — (Nemosia), 653.
 — (Neophron), 831.
 — (Neositta), 682.
 — (Penelope), 791.
 — (Pionopsitta), 7.
 — (Saxicola), 390.
 — (Spermophila), 616.
 — (Timelia), 339, 1087.
 — (Zonotrichia), 626.
pileatus (Atlapetes), 636.
 — (Chlorospingus), 650.
 — (Contopus), 249.
 — (Cooperastur), 844.
pileatus (Crypturus), 782.
pileatus (Dryocopus), 83.
 — (Furnarius), 204.
 — (Halcyon), 107.
 — (Herpsilochmus), 178.
 — (Monarcha), 290.
 — (Piprites), 219.
pileatus (Sarciophorus), 933.
pileolata (Myiodiotes), 442.
pinaronota (Nigrita), 575.
pinetorum (Spizella), 630.
pinicola (Geocichla), 405.
pinima (Crax), 789.
pinnatus (Botaurus), 919.
pinon (Carpophaga), 747.
pinosa (Junco), 629.
 — (Scops), 886.

- pinus* (*Chrysomitris*), 593.
 — (*Dendroeca*), 435.
 — (*Helminthophaga*), 431.
pinwilli (*Pomatorhinus*), 325.
piperata (*Ptilotis*), 720.
piperivora (*Selenidera*), 44.
pipile (*Cumana*), 793.
pipra (*Iodopleura*), 217.
 — (*Picus*), 71.
piririgua (*Guira*), 62.
piscator (*Sula*), 1011.
piscatrix (*Sula*), 1011.
pispoletta (*Calandrella*), 453.
pistacina (*Chrysomitris*), 591.
pistor (*Acrocephalus*), 369.
pistrinaria (*Carpophaga*), 745.
pitangua (*Megarhynchus*), 244.
pithecops (*Strix*), 900.
pitiayumi (*Parula*), 432.
pitiús (*Colaptes*), 63.
pittieri (*Henicorhina*), 428.
pittoides (*Atelornis*), 92.
pityophila (*Dendroeca*), 435.
placens (*Climacteris*), 684.
placens (*Elaínea*), 240.
placens (*Hypocharmosyna*), 32.
 — (*Precilodryas*), 271.
placens (*Sterna*), 1017.
placida (*Egialitis*), 939.
 — (*Geopelia*), 762.
 — (*Gerygone*), 268, 1080.
 — (*Phyllostrophus*), 1086.
 — (*Xenocichla*), 309.
plagiata (*Asturina*), 859.
plagosa (*Chrysococcyx*), 53.
 — (*Dendrocolaptes*), 185.
planicornis (*Hydrocorax*), 100.
platalea (*Spatula*), 995.
platei (*Diomedea*), 1038.
platenæ (*Ceyx*), 112.
platenæ (*Iole*), 312.
 — (*Phlogoenas*), 772.
 — (*Prioniturus*), 17.
platenæ (*Siphia*), 293.
plateni (*Aramidopsis*), 963.
 — (*Cyrtostomus*), 703.
 — (*Ninox*), 889.
 — (*Pachycephala*), 480.
plateni (*Prionochilus*), 675.
plateni (*Zosterornis*), 339.
platensis (*Cistothorus*), 425.
 — (*Embernagra*), 638.
 — (*Leptasthenura*), 201.
platura (*Dissemurus*), 533.
platura (*Stenopsis*), 121.
platurus (*Prioniturus*), 17.
platycercus (*Crateropus*), 329.
 — (*Selasphorus*), 162.
platyrhyncha (*Geospiza*), 1110.
 — (*Limicola*), 952.
 — (*Myiarchus*), 1078.
platyrhynchus (*Prionirhynchus*), 94.
 — (*Sublegatus*), 241.
platyura (*Hedydipna*), 694.
 — (*Schoenicola*), 349.
platyura (*Scotocerca*), 360.
plebeia (*Mirafra*), 456.
plebeius (*Contopus*), 249.
 — (*Crateropus*), 329.
 — (*Phrygilus*), 641.
 — (*Turdus*), 401.
plebeja (*Calamocichla*), 352.
pleschanka (*Saxicola*), 389.
plesia (*Cistothorus*), 424.
pleskei (*Locustella*), 370.
 — (*Podoces*), 506.
 — (*Ruticilla*), 1091.
pleskii (*Parus*), 464.
pleurostictus (*Thryophilus*), 422.
plicatus (*Rhytidoceros*), 101.
plinii (*Himantopus*), 942.
plumatus (*Prionops*), 497.
plumbea (*Butorides*), 916.
plumbea (*Columba*), 753.
plumbea (*Dacnis*), 688.
 — (*Dendroeca*), 435.
 — (*Diglossa*), 686.
plumbea (*Edoliisoma*), 298.
plumbea (*Euphonia*), 674.
plumbea (*Harpiprion*), 902.
 — (*Hydrochelidon*), 1013.
plumbea (*Ictinia*), 864.
 — (*Lathria*), 213.
 — (*Leucopternis*), 860.
 — (*Mimocichla*), 394.
 — (*Myiagra*), 282.
 — (*Polioptila*), 380.
 — (*Porzana*), 968.
 — (*Psaltriparus*), 466, 1101.
 — (*Ptilotis*), 722.
 — (*Rosthramus*), 865.
 — (*Spermophila*), 615.
 — (*Strepera*), 501.
 — (*Vireo*), 472.
plumbeiceps (*Leptoptila*), 769.
 — (*Pogonotriccus*), 235.
 — (*Saltator*), 645.
 — (*Spermophila*), 615.
 — (*Terpsiphone*), 281.
plumbeicollis (*Aramides*), 964.

- plumbeicollis* (Ptilopus), 739.
plumbeigularis (Anous), 1018.
plumbeitarsa (Acanthopneuste), 376.
plumbeiventris (Gymnocrex), 963.
plumbeum (Parisoma), 273.
plumbeum (Todiostrostrum), 231.
plumbeus (Dysithamnus), 180.
 — (Myrmelastes), 181.
plumbeus (Polioaetus), 877.
plumbeus (Synœcus), 816.
plumbiceps (Larus), 1021.
plumbiceps (Polioptila), 1091.
plumifera (Ægotheles), 116.
 — (Guttera), 805.
 — (Lophophaps), 767.
 — (Oreortyx), 818.
plumiferus (Herodias), 912.
plumigenis (Philemon), 726.
plumipes (Athene), 894.
plumipes (Buteo), 855.
 — (Caprimulgus), 123.
 — (Scops), 884.
plumosa (Lædorusa), 306.
 — (Penelope), 1115.
plumosus (Pinarornis), 324.
plumula (Ptilotis), 722.
pluricinctus (Pteroglossus), 43.
pluto (Myiagra), 283.
pluvialis (Charadrius), 937.
 — (Hyetornis), 57.
podargina (Scops), 883.
podiceps (Ardetta), 914.
 — (Podilymbus), 1042.
podobe (Cercotrichas), 413.
pœcilocercus (Empidochanes), 247.
 — (Mecocerculus), 227.
pœcilochrous (Buteo), 857.
pœcilogaster (Buteo), 857.
pœcilolæmus (Dendropicus), 73.
pœcilonota (Hypocnemis), 173.
pœcilonota (Pithys), 173.
 — (Copurus), 229.
pœcilopsis (Lophophanes), 1101.
pœciloptyx (Eulabeornis), 962.
 — (Geobates), 204.
pœciloptylus (Botaurus), 919.
pœcilorhyncha (Anas), 990.
pœcilorhynchus (Dryonastes), 328.
pœcilorrhoa (Carpophaga), 746.
pœcilostrina (Mirafr), 456.
pœcilostrinus (Ptilotis), 721.
pœcilotis (Hylophilus), 474.
 — (Leptopogon), 237.
 — (Moupinia), 346.
pœcilura (Chrysococcyx), 53.
pœciluroides (Chrysococcyx), 53.
pœcilurus (Empidochanes), 247.
poelzami (Picus), 70.
poensis (Batis), 1080.
 — (Calamocichla), 1089.
 — (Callene), 1094.
 — (Campothera), 1057.
 — (Chlorocichla), 1085.
 — (Cyanomitra), 1112.
 — (Cypselus), 1064.
 — (Haplopelia), 1115.
 — (Huhua), 882.
 — (Hylia), 1089.
 — (Indicator), 1055.
 — (Laniarius), 1104.
 — (Neocossyphus), 410.
 — (Phyllostrophus), 1086.
 — (Psalidoprogne), 1079.
 — (Spermestes), 576.
 — (Strix), 899.
 — (Sycobrotus), 1107.
 — (Turdus), 1093.
poiocephala (Alcippe), 345.
poiocephalus (Brachypodius), 309.
poliocephala (Alethe), 411.
 — (Carpophaga), 745.
 — (Chloëphaga), 986.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Gerygone), 269.
 — (Glycyhæra), 717.
 — (Merula), 396.
 — (Mesopicus), 77, 1059.
 — (Ortalida), 793.
 — (Prinia), 359.
 — (Rhynchoecelus), 242.
 — (Stachyrhis), 339.
 — (Xenocichla), 309.
poliocephalum (Todiostrostrum), 231.
 — (Caprimulgus), 124.
 — (Cuculus), 51.
poliocephalus (Garrulax), 328.
 — (Larus), 1022.
poliocephalus (Leucospizias), 841.
 — (Malaconotus), 489.
 — (Phœnicophilus), 652.
 — (Podiceps), 1041.
poliocephalus (Porphyrion), 975.
poliocephalus (Prionops), 497.
poliocerca (Sterna), 1016.
poliochlamys (Malaconotus), 489.
poliogaster (Cooperastur), 844.
 — (Cyanoderma), 343.
 — (Pitylus), 643.
poliogastra (Estrelida), 582.
 — (Ochthæca), 226.

- poliogastra* (Zosterops), 706.
poliogenys (Cryptolopha), 286.
 — (Siphia), 293.
poliogyna (Brachypteryx), 342.
 — (Loxia), 605.
poliophilus (Batrachostomus), 117.
 — (Prionops), 497.
polionota (Lagonosticta), 577.
 — (Merula), 396, 1092.
 — (Ochthæca), 226.
 — (Spermophila), 616.
polionotus (Arremon), 647.
polionotus (Leucopternis), 860.
polionotus (Thamnophilus), 184.
 — (Uroszipias), 843.
poliopareia (Estrela), 1108.
poliophrys (Alethe), 1094.
 — (Buarremon), 647.
 — (Synallaxis), 197.
poliopleura (Emberiza), 621.
 — (Thryophilus), 421.
poliopse (Edolisoma), 299.
poliopsis (Astur), 840.
 — (Hypopicus), 70.
polioptera (Campophaga), 301.
polioptera (Cichladusa), 412.
poliopterus (Melierax), 838.
 — (Melilestes), 718.
polioptila (Catherpes), 1096.
poliosoma (Agriornis), 1074.
 — (Pachycephalopsis), 481.
poliosomus (Buteo), 858.
poliothorax (Alethe), 411.
poliothrix (Basileuterus), 440.
poliotis (Glycyphila), 717.
 — (Suthora), 470.
polioxantha (Eremomela), 355.
poliura (Chætura), 128.
 — (Megaloprepia), 742.
 — (Chrysococcyx), 53.
polleni (Columba), 753.
 — (Xenopirostris), 499.
pollens (Agriornis), 224.
 — (Campophilus), 81.
 — (Graucalus), 297.
pollux (Emarginata), 391.
polloratzkii (Sturnus), 535.
polychroa (Prinia), 359.
polychlorus (Eclectus), 16.
polychropterus (Pachyrhamphus), 212.
polyglotta (Hypolais), 373.
polyglottus (Cistothorus), 425.
 — (Mimus), 415.
polygramma (Ptilotis), 721.
polyocerca (Eupherusa), 144.
polysticta (Dendroornis), 190.
polytmus (Aithurus), 147.
polyzona (Ortygospiza), 577.
polyzonoides (Astur), 810.
polyzonus (Melierax), 838.
pomare (Larus), 1023.
pomarina (Aquila), 852.
pomarinus (Stereorarius), 1027.
pomatorhinus (Stereorarius), 1027.
pompadora (Osmotreron), 733.
 — (Xipholena), 217.
ponapensis (Ptilopus), 736.
 — (Zosterops), 713.
pondicerianus (Francolinus), 808.
pondicerianus (Haliastur), 862.
pondicerianus (Teplirodornis), 493.
poortmani (Chlorostilbon), 142.
popelairei (Prymnacantha), 165.
porphyraceus (Ptilopus), 737.
porphyrea (Ptilopus), 735.
porphyreolophus (Gallirex), 89.
porphyrocephala (Glossopsitta), 31.
 — (Iridornis), 665.
porphyrolæma (Apalis), 353.
 — (Cotinga), 217.
 — (Hermotimia), 700.
porphyromelas (Blythipicus), 77.
porphyronota (Sturnus), 535.
portoricensis (Asio), 878.
 — (Cereba), 691.
 — (Loxigilla), 614.
 — (Melanerpes), 68.
 — (Mimus), 415.
 — (Pendulinus), 557.
 — (Spindalis), 661.
postocularis (Chlorospingus), 650.
potosina (Aphelocoma), 512.
potosina (Pipilo), 637.
potteri (Antichromus), 1103.
powelli (Colluricincla), 496.
 — (Turnix), 778.
præcipua (Ptilotis), 722.
præcognitus (Cyanoderma), 343.
prælatus (Diardigallus), 799.
prætermissa (Alauda), 455.
 — (Ardeiralla), 915.
prasina (Erythrura), 583.
 — (Eupetomena), 134.
 — (Hylia), 357.
 — (Neneba), 719.
prasinorrhous (Ptilopus), 740.
prasinoscelis (Ardeola), 913.
prasinus (Aulacorhamphus), 44.
 — (Chlorostilbon), 141.
pratensis (Anthus), 447.

- pratensis* (Crex), 966.
 — (Pseudochloris), 640.
praticola (Otocorys), 452.
pratincola (Glareola), 929.
 — (Strix), 899.
preissi (Rhipidura), 276.
presbytis (Acanthopneuste), 377.
pretiosa (Calliste), 667.
pretiosa (Clavavis), 764.
pretrei (Chlorophonia), 671.
 — (Chrysotis), 6.
 — (Phaethornis), 132.
 — (Spindalis), 661.
preussi (Campophaga), 300.
 — (Cinnyris), 699.
 — (Cosmophoneus), 490.
 — (Graucalus), 295.
 — (Heterhyphantes), 565.
 — (Lecythoplastes), 258.
 — (Onycognathus), 545.
prevosti (Euryceros), 498.
 — (Lampornis), 145.
prillwitzii (Arachnothera), 1113.
 — (Læduros), 1084.
 — (Mixornis), 1087.
primolina (Metallara), 156.
princei (Geocichla), 404.
princeps (Grallaria), 171.
 — (Hyphantornis), 564.
 — (Leucopternis), 860.
 — (Passerculus), 631.
 — (Terpsiphone), 281.
princetonianus (Phrygilus), 640.
principalis (Campophilus), 80.
 — (Corvus), 502.
 — (Haplopelia), 768.
 — (Phasianus), 802.
 — (Vidua), 574.
pringlei (Cœligena), 148.
pringlii (Dryoscopus), 492.
prinioides (Cisticola), 1090.
pririt (Batis), 265.
pristina (Amazilia), 138.
pristoptera (Psolidoprocne), 260.
pritchardi (Megapodius), 788.
pritzbueri (Merula), 396.
prjevalskii (Trochalopteron), 321.
problematicus (Copsychus), 411.
procerior (Ptilotis), 720.
procerns (Hemignathus), 693.
procne (Diatropura), 573.
procurvipes (Xiphorhynchus), 186.
procurvus (Xiphorhynchus), 186.
productus (Nestor), 27.
promaucanus (Phalacrocorax), 1010.
promeropirhynchus (Xiphocolaptes), 188.
propinqua (Dicrurus), 531.
 — (Geospiza), 608.
propinqua (Ibis), 901.
propinqua (Loxigilla), 614.
 — (Pitta), 208.
 — (Sclerurus), 1071.
 — (Synallaxis), 198.
 — (Turdus), 401.
 — (Upucerthia), 203.
 — (Uroloncha), 585.
propinqua (Ploceipasser), 569.
proregulus (Phyllobasileus), 378.
proserpinæ (Hermotimia), 700.
prospora (Fraseria), 497.
prostheleuca (Henicorhina), 428.
prosthelas (Geospiza), 609.
 — (Pendulinus), 557.
protomomelena (Merula), 397.
protomomelas (Merula), 397.
provincialis (Melizophilus), 375.
provocator (Ptilotis), 720.
proxima (Ptilotis), 722.
pruinosa (Chordeiles), 119.
prunelli (Lampropygia), 152.
pryeri (Dicaeum), 677.
 — (Hypsipetes), 316, 1086.
 — (Megalurus), 351.
 — (Scops), 884.
przewalskii (Grallaria), 170.
 — (Sitta), 681.
 — (Suthora), 471.
psaltria (Chrysomitris), 591.
psalurus (Hydropsalis), 120.
psammacromia (Penthetria), 573.
psammochroa (Agrobates), 374.
psaroides (Hypsipetes), 315.
pseudo-borealis (Acanthopneuste), 376.
pseudourogallus (Tetrao), 825.
psittacea (Erythrura), 583.
 — (Osmotreron), 734.
 — (Psittirostra), 605.
psittacina (Parisomus), 205.
psittacula (Geospiza), 609.
 — (Phaleris), 1046.
ptilocnemis (Tringa), 951.
ptilogenys (Gracula), 539.
ptilonorhynchus (Pernis), 865.
ptilorhyncha (Numida), 805.
ptilosus (Macronus), 341.
pubescens (Picus), 71, 1058.
pucherani (Centurus), 69.
 — (Chlorostilbon), 141, 1066.
 — (Geoffroyus), 117.
 — (Guttera), 805.

- pucherani* (Neomorphus), 61.
 — (Rupornis), 858.
 — (Xiphorhynchus), 187.
puercasia (Puerasia), 801.
pudivunda (Siptornis), 200.
pudiva (Elaeina), 240.
pudiva (Synallaxis), 197.
puella (Batis), 265.
 — (Chalcopelia), 766.
 — (Hirundo), 254.
 — (Hypothymis), 274.
 — (Irena), 317.
 — (Megaloprepia), 742.
 — (Trogon), 86.
pugnax (Pavoncella), 948.
 — (Turnix), 778.
pulchella (Acredula), 1101.
 — (Carpophaga), 744.
 — (Charmosyna), 32.
 — (Euphema), 26.
 — (Malacias), 325.
 — (Nectarinia), 694.
 — (Ochthoeca), 226.
 — (Phyllolais), 354.
pulchellum (Todiostrostrum), 231.
pulchellus (Caprimulgus), 124.
 — (Carcineutes), 110.
 — (Nettopus), 981.
 — (Ptilopus), 738.
 — (Thamnophilus), 182.
 — (Urospizias), 842.
 — (Vireolanius), 475.
pulcher (Aegothies), 116.
 — (Melanerpes), 68.
 — (Myiobius), 246.
 — (Notanges), 548.
 — (Phyllobasileus), 378.
pulcherrima (Ethopyga), 696.
 — (Electroenas), 742.
 — (Dacnis), 688.
 — (Megalæma), 39.
 — (Myzomela), 715.
pulcherrimus (Carpodacus), 604.
 — (Malurus), 368.
pulcherrimus (Pericrocotus), 301.
pulcherrimus (Psephotus), 25.
 — (Todus), 95.
pulchra (Alcyon), 113.
 — (Apalis), 353.
pulchra (Ardeita), 914.
pulchra (Athene), 895.
 — (Calliste), 666.
 — (Calothlorax), 161.
 — (Colius), 1060.
 — (Cyanolyca), 513.
pulchra (Cyanospiza), 627.
 — (Eremomela), 356.
 — (Eupetes), 1086.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Macgregoria), 524.
 — (Parula), 432.
 — (Pionopsitta), 7.
 — (Porphyrospiza), 627.
 — (Sarothrura), 969.
pulchria (Dicæum), 677.
pulchricollis (Columba), 752.
 — (Yunx), 85.
pulchrirostris (Alopius), 104.
pullaria (Agapornis), 22.
pullicanda (Neopsittacus), 33.
pullus (Anous), 1019.
pulmentum (Bucco), 47.
pulsatrix (Pulsatrix), 892.
pulveria (Empidonax), 248.
 — (Salpinctes), 427.
pulverulenta (Eopsaltria), 482.
 — (Pœcilodryas), 271.
pulverulentus (Hemilophus), 81.
 — (Porphyrio), 976.
pulverulentus (Totanus), 947.
pumila (Alseonax), 264.
 — (Bradyornis), 287.
pumilo (Cyanolyca), 513.
pumilum (Glaucidium), 896.
pumilus (Chlorostilbon), 141.
 — (Coccyzus), 54.
pumilus (Loriculus), 23.
pumilus (Yungipicus), 74.
 — (Zebrilus), 915.
puna (Colaptes), 63.
 — (Querquedula), 992.
 — (Trogodytes), 426.
punctata (Bowdleria), 337.
 — (Calliste), 666.
 — (Campothera), 65.
punctata (Dendrocygna), 988.
punctata (Microeca), 264.
 — (Querquedula), 993.
 — (Spermestes), 576.
punctatissima (Strix), 899.
punctatum (Cinclosoma), 318.
punctatus (Anorthura), 428.
punctatus (Batrachostomus), 117.
 — (Capito), 41.
punctatus (Eudynamis), 54.
punctatus (Megalurus), 351, 1089.
 — (Pardalotus), 674.
 — (Phalacrocorax), 1007.
 — (Thamnophilus), 183.
 — (Tinnunculus), 871.

- puncticeps* (*Dysithamnus*), 180.
puncticeps (*Herpsilochmus*), 178.
puncticeps (*Picolaptes*), 187.
puncticollis (*Brachypternus*), 78.
 — (*Dendrocolaptes*), 185.
punctifrons (*Egithalus*), 468.
 — (*Picumnus*), 84.
punctigula (*Chrysoptilus*), 67.
 — (*Dendroornis*), 189, 1071.
 — (*Serinus*), 600.
punctiliger (*Thamnophilus*), 184.
punctulata (*Calliste*), 666.
 — (*Catherpes*), 1096.
 — (*Munia*), 586.
 — (*Ninox*), 889.
punctulatus (*Chlorospingus*), 650.
punensis (*Nuttallornis*), 1078.
 — (*Phrygilus*), 640.
 — (*Siptornis*), 1072.
punica (*Accipiter*), 845.
 — (*Falco*), 875.
punicea (*Columba*), 752.
 — (*Pyrrhospiza*), 604.
puniceus (*Gecinus*), 64.
pura (*Manacus*), 1074.
purpurascens (*Chlorophanes*), 689.
 — (*Euphonia*), 1112.
 — (*Hypochaera*), 574.
 — (*Molothrus*), 552.
 — (*Penelope*), 791.
purpurascens (*Phalacrocorax*), 1009.
purpurascens (*Sturnus*), 535.
purpurata (*Urochroma*), 8.
purpuratus (*Ptilopus*), 737.
 — (*Trachyphonus*), 41.
purpurea (*Ardea*), 910.
 — (*Cochoa*), 284.
 — (*Columbigallina*), 763.
 — (*Lampropygia*), 152.
 — (*Osculatia*), 770.
 — (*Progne*), 259.
purpureicauda (*Chalcostigma*), 156.
purpureiceps (*Lamprocolius*), 547.
 — (*Lamprocorax*), 542.
purpureicollis (*Catheturus*), 788.
purpureiventris (*Cinnyris*), 697, 1112.
purpureotincta (*Columba*), 1114.
purpureus (*Carpodacus*), 603.
 — (*Centropus*), 56.
 — (*Lamprocolius*), 547.
 — (*Lamprotornis*), 544.
purpuropterus (*Lamprotornis*), 544.
purus (*Graucalus*), 295, 1083.
purus (*Picus*), 70.
pusilla (*Acanthiza*), 366.
pusilla (*Alcyone*), 113.
 — (*Ardetta*), 914.
 — (*Astur*), 840.
 — (*Barbatula*), 37.
 — (*Emberiza*), 621.
 — (*Eremomela*), 355.
 — (*Gallinago*), 955.
pusilla (*Glaucidium*), 896.
pusilla (*Glossopsitta*), 32.
 — (*Lædorusa*), 306.
 — (*Petroeca*), 267.
 — (*Pnoepyga*), 430.
 — (*Phonipara*), 618.
 — (*Porzana*), 967.
 — (*Pyromelana*), 1108.
 — (*Sitta*), 681.
 — (*Spizella*), 630.
pusilla (*Tyranniscus*), 239.
pusillum (*Ornithion*), 238.
pusillus (*Cnipolegus*), 229.
 — (*Corvus*), 504.
 — (*Coryphospingus*), 642.
 — (*Empidonax*), 248.
 — (*Ereunetes*), 949.
 — (*Graucalus*), 295, 1084.
 — (*Loriculus*), 22.
 — (*Melittophagus*), 96.
 — (*Myiodiodes*), 442.
 — (*Nannochordeiles*), 119.
 — (*Serinus*), 601.
 — (*Simorhynchus*), 1045.
 — (*Vireo*), 473.
 — (*Xiphorhynchus*), 186.
pusio (*Nasiterna*), 24.
 — (*Spizella*), 630.
pustulatus (*Icterus*), 558.
puteicola (*Petronia*), 596.
puxeli (*Iladopsis*), 1087.
pyca (*Malacocincla*), 333.
pycnopygius (*Chætops*), 320.
pygæus (*Molpastes*), 304.
pygargus (*Circus*), 836.
pygmæa (*Empidonax*), 1077.
 — (*Cannabina*), 1108.
 — (*Hypochaemosyna*), 32.
 — (*Myrmotherula*), 178.
 — (*Nasiterna*), 23.
pygmæa (*Porzana*), 967.
pygmæa (*Sitta*), 681.
pygmæum (*Dicaeum*), 679.
 — (*Edistoma*), 718.
pygmæus (*Centurus*), 69.
pygmæus (*Eurhynorhynchus*), 950.
 — (*Indicator*), 34.
 — (*Phaethornis*), 133, 1065.

pygmæus (Phalacrocorax), 1010.
 — (Picumnus), 84.
 — (Simorhynchus), 1045.
 — (Yungipicus), 74.
 — (Zosterornis), 339.
 pylzowi (Urocynchramus), 620.
 pyra (Topaza), 147.
 pyrenaica (Pteroclorus), 776.
 pyrgita (Petronia), 597.
 pyrrilia (Pionopsitta), 8.
 pyrocephalus (Machæropterus), 222.
 pyrrhopygaster (Hypopyrrhus), 561.
 pyrolophus (Psilopogon), 40.
 pyronotus (Acomus), 798.
 pyrope (Tænioptera), 225.
 pyropyga (Coccyz), 60.
 pyropygia (Chlorestes), 140.
 pyrrhocephalus (Phænicophaeus), 59.
 pyrrhocorax (Fregilus), 516.
 pyrrhodes (Philydor), 194.
 pyrrhogaster (Mesopicus), 77.
 pyrrhogenys (Trichostoma), 334.
 pyrrhonota (Alaemon), 451.
 pyrrhonota (Climacteris), 685.
 — (Erythromyias), 267.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Petrochelidon), 258.
 pyrrhonotus (Anthus), 446.
 — (Passer), 597.
 pyrrhophius (Dendrocopus), 185.
 pyrrhops (Bucorvus), 99.
 pyrrhops (Cyanoderma), 313.
 — (Dicurus), 530.
 — (Euscarthmus), 233.
 — (Pionopsitta), 7.
 pyrrhoptera (Alcippe), 345.
 — (Brotogeris), 15.
 — (Callene), 408.
 pyrrhoptera (Cyanoderma), 343.
 pyrrhopterum (Philentoma), 282.
 pyrrhopterus (Lycocorax), 517.
 — (Pendulinus), 556.
 pyrrhopygia (Acanthiza), 366.
 pyrrhopygia (Cittocincla), 413.
 pyrrhopygia (Hylacola), 320.
 pyrrhopygius (Halcyon), 108.
 pyrrhopygus (Trichixus), 409.
 pyrrhorhoa (Gallinula), 974.
 pyrrhorthorax (Charadrius), 938.
 — (Picus), 70.
 — (Turnix), 779.
 pyrrhotis (Blythipicus), 77.
 pyrrhulina (Emberiza), 620.
 pyrrhuloides (Emberiza), 620.
 pyrrhura (Myzornis), 347.

pyrypogaster (Hypopyrrhus), 561.
 pytiopsittacus (Loxia), 604.
 quadribrachys (Alcedo), 113.
 quadricinctus (Pterocles), 777.
 quadricolor (Cosmophoneus), 490.
 — (Halcyon), 108.
 — (Loriculus), 23.
 — (Prionochilus), 675.
 — (Trichothraupis), 654.
 quadrifasciata (Picus), 72.
 quadrigemina (Ptilopus), 738.
 quadrigintus (Pardalotus), 674.
 quadrivirgata (Erythropgia), 412.
 quanxæ (Urobrachya), 1108.
 quartinia (Coccopygia), 580.
 querula (Zonotrichia), 625.
 quindiana (Cyanolyca), 513.
 quinquelineata (Emberiza), 623.
 quinquetriata (Amphispiza), 627.
 quinticolor (Capito), 41.
 — (Munia), 587.
 quisqualina (Campophaga), 300.
 quitensis (Metallura), 156.
 quixensis (Formicivora), 178.
 quoyi (Cracticus), 500.
 raalteni (Synæcus), 816.
 rabieri (Gecinus), 1057.
 rachelæ (Malimbus), 568.
 radama (Hypotriorchis), 872.
 radcliffi (Indicator), 34.
 raddei (Enneoctonus), 487, 1103.
 radiata (Carpophaga), 746.
 — (Tænioglaux), 897.
 radiatus (Bucco), 47.
 — (Carpococcyx), 61.
 — (Erythrotriorchis), 847.
 — (Gymnogenys), 835.
 — (Thamnophilus), 182.
 radiatus (Urospizias), 844.
 radiolatus (Centurus), 69.
 — (Dendrocolaptes), 185.
 radiolosus (Neomorphus), 61.
 radjah (Tadorna), 989.
 rafflesi (Mesospilus), 67.
 rafflesii (Querquedula), 992.
 raggiana (Paradisæa), 518.
 ragazzii (Cyanomitra), 702.
 raimondi (Gnathospiza), 602.
 raimondi (Sycalis), 602.
 raimondii (Phytotoma), 210.
 raja (Spilornis), 834.
 raloides (Ardeola), 913.
 — (Myiadectes), 407.
 rama (Hypolais), 373.
 ramalina (Parula), 1096.

- ramonianus (Trogon), 87.
ramsayi (Actinodura), 331.
— (Megalaema), 39.
— (Myzomela), 716.
— (Petroeca), 267.
ramsayi (Siphia), 293.
ramsayi (Yungipicus), 75.
— (Zosterops), 712.
ramuensis (Gerygone), 268, 1080.
randonii (Galerida), 457.
ranivorus (Circus), 837.
rapax (Aquila), 852.
rara (Lagonosticta), 577.
— (Lamprolaima), 903.
— (Phylotoma), 210.
rarotongensis (Ptilopus), 737.
ravid (Mimocichla), 394.
rayi (Motacilla), 444.
raytal (Calandrella), 453.
raza (Spizocorys), 454.
recondita (Malia), 342.
rectirostris (Anthreptes), 704.
— (Colluricincla), 495.
— (Furnarius), 204.
— (Hemistephania), 131.
— (Lafresnaya), 1067.
— (Limnornis), 196.
reclunguis (Centropus), 56.
recurvirostris (Avocettula), 145.
— (Esacus), 928.
— (Todorhamphus), 110.
redivivus (Harporhynchus), 417.
reevesi (Phasianus), 803.
reevii (Merula), 396.
refulgens (Lophophorus), 797.
— (Thalassidroma), 144.
regalis (Milvus), 862.
— (Otodiplops), 774.
regia (Diomedea), 1038.
— (Erythrura), 583.
— (Muscivora), 244.
— (Platalea), 904.
— (Vidua), 574.
regina (Chiroxiphia), 222.
regius (Cicinnurus), 519.
— (Cinnyris), 699.
— (Cosmopsarus), 544.
reguloides (Acanthiza), 366.
— (Acanthopneuste), 377.
— (Tyrannulus), 238.
regulorum (Balearica), 923.
regulus (Ammomanes), 459.
— (Grallaria), 171.
regulus (Hypotriorchis), 873.
regulus (Lophornis), 165.
regulus (Loriculus), 23.
— (Machæropterus), 221.
— (Prodotiscus), 35.
rehsei (Acrocephalus), 369.
reichardi (Hyphantornis), 562.
— (Poliospiza), 599.
reichenbachii (Celeus), 79.
— (Cyanomitra), 702.
— (Eleopicus), 75.
— (Halcyon), 108.
— (Leptoptila), 769.
reichenowi (Antichromus), 489.
— (Bradyornis), 1082.
— (Burnesia), 360.
— (Cinnyris), 699.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Cryptospiza), 576.
— (Dendropicus), 74.
— (Enneoctonus), 486, 1103.
— (Galerida), 458.
— (Heterhyphantes), 565.
— (Hyphantornis), 563.
— (Monarcha), 290.
— (Nectarinia), 695.
— (Numida), 804.
— (Pionus), 6.
— (Pitta), 1073.
— (Poicephalus), 9.
— (Pycnonotus), 1084.
— (Rhipidura), 1081.
— (Sarothrura), 969.
— (Serinus), 601.
— (Tinnunculus), 871.
— (Turacus), 89.
— (Turtur), 760.
reinhardtii (Iridornis), 665.
— (Lagopus), 827.
reini (Polyerata), 137.
reinwardtii (Baza), 867.
— (Crateropus), 330.
— (Hapalarpactes), 88.
— (Reinwardtina), 756.
— (Selenidera), 44.
reischeki (Hematopus), 932.
reiseri (Accentor), 1091.
relicta (Nucifraga), 506.
religiosa (Gracula), 539.
religiosa (Ibis), 901.
religiosus (Hypotriorchis), 873.
remifer (Bhringa), 532.
remigialis (Telephonus), 488.
remotum (Edoliisoma), 299.
renauldi (Carpococcyx), 61.
rendalli (Anomalospiza), 1107.
— (Serinus), 600, 1109.

- rendallii* (Lagonosticta), 578.
rendovæ (Zosterops), 709.
resplendens (Phalacrocorax), 1007.
resplendens (Pharomacrus), 85.
resplendens (Ptiloscelis), 935.
respublica (Schlegelia), 519.
restricta (Campylorhynchus), 1095.
— (Poliopitila), 380.
reticulata (Eos), 28.
— (Ptilotis), 721.
retrocinctum (Dicæum), 678.
retzii (Sigmodus), 498.
revoili (Machærhamphus), 865.
rex (Clytoceyx), 104.
rex (Grallaria), 170.
rex (Machilophus), 465.
— (Trogodytes), 425.
rex-pineti (Graucalus), 296.
reyi (Chlorospingus), 651.
— (Ninox), 881.
reynaudii (Coccyz), 60.
rhaad (Otis), 926.
rhani (Lamprolæma), 149.
rhaphastinus (Tetragonops), 42.
rhenana (Certhia), 1112.
rhinoceros (Buceros), 100.
rhinolophus (Merulaxis), 167.
rhizophoræ (Cyrstostomus), 703.
rhodeogaster (Mesopicus), 1059.
rhodinogaster (Petroeca), 267.
rhodinolæma (Carpophaga), 745.
— (Phœnicotræpis), 657.
rhodocephala (Pyrrhura), 14.
rhodocephalus (Carpodacus), 603.
rhodochrous (Carpodacus), 603.
rhodocolpa (Carpodacus), 604.
rhodocorytha (Chrysotis), 5.
rhodogaster (Accipiter), 846.
rhodogaster (Pyrrhura), 14.
rhodolæma (Anthreptes), 704, 1113.
rhodomætopus (Carpodacus), 603.
rhodoparia (Lagonosticta), 577.
rhodopeplus (Carpodacus), 603.
rhodoptera (Cisticola), 363.
rhodops (Geoffroyus), 16.
rhodopyga (Estrela), 581.
rhodorhynchus (Anser), 983.
rhynchotis (Spatula), 995.
ribbei (Pomarea), 291.
richardi (Anthus), 446.
richardi (Alcyon), 113.
— (Monarcha), 289.
— (Ptilopus), 736.
— (Thriponax), 82.
richardsoni (Capito), 41.
richardsoni (Contopus), 249.
— (Cyphorhinus), 429.
— (Dendragapus), 824.
— (Hypotiorchis), 874.
— (Nyctala), 893.
— (Spermophila), 615.
richmondi (Agelæus), 553.
— (Embernagra), 638.
riciniata (Eos), 29, 1054.
ricketti (Arboricola), 814.
— (Chrysophlegma), 67.
— (Cryptolopha), 285.
ricordi (Sporadicus), 142.
ridgwayi (Anous), 1019.
— (Antrostomus), 122.
— (Certhiidea), 689.
— (Chasiempis), 270, 1080.
— (Colinus), 821.
— (Cotinga), 216.
— (Empidonax), 248.
— (Glaucidium), 897.
— (Icterus), 1107.
— (Lagopus), 827.
— (Lophophanes), 1101.
— (Loxigilla), 614.
— (Myiobius), 245.
— (Nesotrichus), 251.
— (Ornithion), 238, 1076.
— (Plegadis), 904.
— (Rupornis), 859.
— (Scardafella), 762.
— (Scops), 886.
— (Stelgidopteryx), 1079.
— (Thalassidroma), 1066.
— (Thryothorus), 423.
— (Urubitinga), 861.
ridibundus (Larus), 1022.
ridleyana (Elainea), 239.
riedeli (Eclectus), 16.
— (Erythromyias), 1080.
riedeli (Lalage), 302.
riedeli (Phyllergates), 362.
— (Tanysiptera), 106.
riefferi (Amazilia), 138, 1065.
— (Pipreola), 216.
— (Psittospiza), 646.
riisii (Butalis), 262.
— (Elainea), 239.
rikeri (Berlepschia), 196.
ringeri (Ardea), 911.
ringia (Uria), 1043.
riocouri (Nauclerus), 863.
rioje (Phaethornis), 133.
riparia (Cotyle), 256.
ripponi (Carpodacus), 1109.

- ripponi (Cryptolopha), 1082.
 — (Trochalopteron), 1086.
 risorius (Alectrurus), 228.
 — (Turtur), 759.
 rivoilii (Melittophagus), 96.
 rivolii (Hypoxanthus), 63.
 — (Ptilopus), 740.
 rivularia (Melospiza), 633.
 rivularis (Cinclus), 419.
 rixosa (Machetornis), 229.
 roberti (Aphantochroa), 134.
 — (Callene), 1094.
 roberti (Sphenocichla), 428.
 roberti (Turdinulus), 332.
 robinsoni (Butorides), 916.
 — (Cardinalis), 620.
 roborowskii (Montifringilla), 595.
 robusta (Arachnothera), 705.
 — (Cisticola), 365.
 — (Gerygone), 270.
 — (Gracula), 539.
 — (Lanius), 484.
 — (Molothrus), 1106.
 — (Perdix), 812.
 — (Phalacrocorax), 1007.
 — (Pratincola), 387.
 robustirostris (Megalæma), 39.
 — (Xantholæma), 1056.
 robustus (Campophilus), 81.
 — (Poicephalus), 8.
 — (Tinamus), 781.
 rochii (Cuculus), 51.
 rochusseni (Scelopax), 955.
 rodericanus (Bebrornis), 349.
 rodergi (Gecinus), 64.
 rodersi (Fulmarus), 1036.
 roidei (Thamnophilus), 184.
 rollandi (Podicipes), 1041.
 rolleti (Pogonorrhynchus), 35.
 romanovi (Enneoctonus), 486, 1103.
 roraimæ (Basileuterus), 439.
 — (Chlorophonia), 671.
 — (Merula), 398.
 — (Myiobius), 246.
 — (Scops), 886.
 roratus (Eclectus), 16.
 rosa-alba (Cracticus), 501.
 rosacea (Carpophaga), 745.
 — (Pyrrhula), 607.
 rosaceus (Anthus), 447.
 rosæ (Chætocercus), 163.
 roscoe (Geothlypis), 437.
 rosea (Acredula), 467.
 — (Loxops), 594.
 — (Pelecanus), 1005.
 rosea (Petroeca), 267.
 — (Phœnicothraupis), 657.
 — (Rhodinocichla), 418.
 — (Rhodostethia), 1021.
 — (Xantholæma), 40.
 roseicapilla (Cacatua), 3.
 roseicapillus (Ptilopus), 737.
 roseicollis (Agapornis), 22.
 roseicollis (Hadrostomus), 211.
 roseicollis (Ptilopus), 735.
 roseicrissa (Estrela), 582.
 roseigaster (Temnotrogon), 86.
 roseigularis (Pyrauga), 659.
 roseilia (Sitta), 680.
 roseipectus (Carpodacus), 604.
 rosenbergi (Antrostomus), 122.
 — (Gercomacra), 176.
 — (Gymnocrex), 963.
 — (Heteropelma), 223.
 — (Myzomela), 715.
 — (Nemosia), 654.
 — (Pitta), 208.
 — (Polyerata), 136.
 — (Rhipidura), 278.
 rosenbergi (Scelopax), 955.
 rosenbergi (Strix), 899.
 rosenbergi (Tanyptera), 106.
 — (Trichoglossus), 31.
 roseogriseus (Turtur), 760.
 roseus (Carpodacus), 603.
 — (Pastor), 537.
 — (Pericrocotus), 301.
 — (Phœnicopterus), 908.
 rositæ (Cyanospiza), 626.
 rossæ (Musophaga), 90.
 rosseliana (Gerygone), 269.
 — (Ninox), 888.
 — (Pachycephala), 477.
 — (Tanyptera), 106.
 rossi (Ghen), 982.
 — (Thinornis), 942.
 rostrata (Calliste), 666.
 — (Cannabina), 590.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Hylocharis), 1066.
 — (Ixocincla), 316.
 — (Mimus), 416.
 — (Estrelata), 1034.
 — (Siptornis), 1072.
 — (Speotyto), 895.
 — (Tyrannus), 252.
 rostratum (Edolisoma), 299.
 — (Trichostoma), 333.
 rostratus (Passerculus), 631.
 — (Platyrhynchus), 231.

- rostratus (Turtur), 759.
 rostripallens (Dendroornis), 189.
 rothschildi (Butlraupis), 663.
 — (Casuaris), 1051.
 — (Chrysotis), 5.
 — (Geospiza), 1110.
 — (Guiraca), 612.
 — (Heliangelus), 155.
 — (Melizophilus), 1090.
 rothschildi (Phalacrocorax), 1009.
 rothschildi (Serilophus), 205.
 — (Serinus), 1109.
 rougeti (Rougetius), 965.
 roulroul (Rollulus), 815.
 rourei (Nemosia), 653.
 rousseauti (Anous), 1018.
 rouxi (Ixulus), 344.
 rovimæ (Parus), 462.
 rowleyi (Cyanorhamphus), 26.
 rowleyi (Hypothymis), 274.
 rubea (Otocorys), 452.
 rubeca (Erithacus), 382.
 — (Geocichla), 405.
 rubecula (Monarcha), 289.
 — (Myiagra), 282.
 rubecula (Nonnula), 48.
 — (Poospiza), 628.
 — (Pteroptochus), 167.
 rubeculoides (Accentor), 381.
 — (Siphia), 292.
 rubeculus (Cuculus), 51.
 rubeculus (Pomatorhinus), 325.
 ruber (Cardinalis), 619.
 — (Greciscus), 972.
 — (Eudocimus), 904.
 — (Ergaticus), 440.
 — (Phacelodomus), 196.
 — (Phœnicopterus), 908.
 — (Sphyrapicus), 70.
 ruberrima (Lagonosticta), 1108.
 rubescens (Megalæma), 39.
 — (Phlogœnas), 773.
 rubetra (Pratincola), 387.
 — (Tænioptera), 225.
 rubetraoides (Pratincola), 387.
 rubica (Phœnicothraupis), 657.
 rubicilla (Carpodacus), 602.
 — (Pyrrhula), 607.
 rubicilloides (Carpodacus), 603.
 rubicoides (Phœnicothraupis), 657.
 rubicola (Pratincola), 387.
 rubicunda (Cassinia), 295.
 rubicunda (Empidonax), 1077.
 rubicunda (Neopipo), 221.
 rubicundus (Empidonax), 247.
 rubidiceps (Chloëphaga), 985.
 rubidiventris (Lophophanes), 465.
 rubidus (Accentor), 381.
 — (Automolus), 195.
 rubiensis (Carpophaga), 747.
 — (Lorius), 29.
 — (Manucodia), 518.
 — (Monarcha), 289.
 — (Ptilotis), 721.
 — (Rhectes), 495.
 — (Tanyptera), 106.
 rubiginosa (Argy), 323.
 — (Cinnamopteryx), 561.
 — (Dendroeca), 433.
 — (Eos), 29.
 — (Margarornis), 191.
 — (Ortygocichla), 335.
 rubiginosus (Automolus), 194.
 — (Calamanthus), 1089.
 — (Chloronerpes), 65.
 — (Chlorophoneus), 490.
 — (Drymocolaphus), 334.
 rubiginosus (Rallina), 966.
 — (Timelia), 340.
 rubinea (Clytolæma), 149.
 rubineus (Pyrocephalus), 246.
 rubinoides (Phælæma), 149.
 rubra (Casiornis), 214.
 — (Eos), 28.
 — (Foudia), 566.
 — (Gerygone), 269.
 rubra (Hæmatoderus), 218.
 rubra (Loriculus), 23.
 — (Paradisea), 518.
 rubra (Pauxis), 790.
 rubra (Phœnicothraupis), 657.
 — (Pyrranga), 659.
 — (Rallacula), 970.
 rubratra (Myzomela), 714.
 rubricapilla (Mixornis), 310.
 — (Muscisaxicola), 230.
 — (Pipra), 221.
 — (Spermospiza), 571.
 — (Xantholæma), 40.
 rubricapillus (Poicephalus), 9.
 rubricata (Lagonosticta), 577.
 — (Origma), 352.
 rubricatum (Pyrgisoma), 635.
 rubricatus (Pardalotus), 674.
 rubricauda (Phaeton), 1004.
 rubricaudatus (Dendrocopus), 185.
 rubriceps (Anaplectes), 568.
 — (Pyrranga), 659.
 rubricera (Carpophaga), 743.
 rubricollis (Accipiter), 845.

- rubricollis* (*Campophilus*), 80.
 — (*Malimbus*), 568.
rubricollis (*Podiceps*), 1042.
 — (*Pternistes*), 811.
 — (*Querula*), 218.
 — (*Recurvirostra*), 943.
rubrifacies (*Pogonorhynchus*), 36.
rubrifrons (*Cardellina*), 440.
 — (*Hylophilus*), 474.
rubrifrons (*Megapodius*), 787.
rubrifrons (*Melanerpes*), 68.
 — (*Rhodornis*), 357.
rubrigastra (*Cyanotis*), 236.
rubrigena (*Ara*), 10.
rubrigulare (*Dicaeum*), 677.
rubrigularis (*Hypocharmosyna*), 32.
rubrigularis (*Pelasophora*), 145.
rubrigularis (*Pionus*), 6.
rubrinucha (*Pitta*), 209.
rubripersonata (*Neophron*), 1116.
rubripes (*Anas*), 990.
 — (*Crypturus*), 783.
 — (*Mimocichla*), 394.
rubripileum (*Neopsittacus*), 33.
rubripileus (*Chloronerpes*), 1057.
rubrirostris (*Anser*), 982.
 — (*Arboricola*), 814.
 — (*Bolborhynchus*), 14.
 — (*Chlorospingus*), 651.
rubritorques (*Trichoglossus*), 31.
rubritorquis (*Conurus*), 12.
rubriventre (*Dicaeum*), 678.
rubriventris (*Centurus*), 69.
 — (*Estrela*), 581.
rubrobrunnea (*Myzomela*), 716.
rubrocoronatum (*Dicaeum*), 677.
rubrocrista (*Heliochera*), 217.
rubrocucullata (*Myzomela*), 715.
rubrofrontata (*Rhipidura*), 277.
rubrogenis (*Ara*), 10.
rubro-limbatus (*Pericrocotus*), 302.
rubromitratus (*Selasphorus*), 162.
rubronigra (*Munia*), 588.
rubronotata (*Hypocharmosyna*), 32.
rubropygius (*Serilophus*), 205.
rubrotincta (*Myzomela*), 716.
ruckeri (*Tbrenetes*), 131.
ruecki (*Siphia*), 1083.
rudis (*Ceryle*), 114.
rudolfi (*Ninox*), 889.
rudolphi (*Paradisaea*), 518.
rueppelli (*Amydrus*), 515.
 — (*Eurocephalus*), 494.
rufa (*Ardea*), 911.
 — (*Egotheles*), 1063.
rufa (*Baza*), 868.
 — (*Caccabis*), 807.
 — (*Campylorhynchus*), 420.
 — (*Cisticola*), 363.
 — (*Climacteris*), 684.
 — (*Dendrocitta*), 508.
 — (*Formicivora*), 1070.
 — (*Halcyon*), 106.
rufa (*Limosa*), 945.
 — (*Lophura*), 799.
rufa (*Loxops*), 594.
 — (*Macropygia*), 756.
 — (*Malacoptila*), 47.
rufa (*Ninox*), 889.
rufa (*Pnoepyga*), 430.
 — (*Sarothrura*), 970.
 — (*Saxicola*), 390.
 — (*Schiffornis*), 223.
 — (*Trichocichla*), 335.
 — (*Vanga*), 499.
rufalbus (*Thryophilus*), 421.
rufatra (*Formicivora*), 177, 1070.
rufaxilla (*Heliochera*), 217.
 — (*Leptoptila*), 769.
rufescens (*Egotheles*), 116.
 — (*Argya*), 323.
 — (*Atrichia*), 729.
 — (*Aulia*), 213.
 — (*Bowdleria*), 338.
 — (*Calandrella*), 1099.
 — (*Cannabina*), 590.
 — (*Centropus*), 57.
 — (*Cinclorhamphus*), 361.
 — (*Cracticus*), 501.
 — (*Cryptillas*), 1088.
rufescens (*Euryptila*), 350.
rufescens (*Garrulus*), 510.
 — (*Gerygone*), 269.
 — (*Haemophila*), 634.
 — (*Illadopsis*), 336.
 — (*Muscisaxicola*), 230.
 — (*Myiobius*), 245.
 — (*Parus*), 464.
 — (*Pelecanus*), 1005.
 — (*Phyllostrophus*), 314.
 — (*Procarduelis*), 591.
 — (*Rhynchotus*), 784.
 — (*Scops*), 885.
 — (*Sylviella*), 355.
rufescens (*Syrnium*), 890.
rufescens (*Thamnistes*), 181.
 — (*Thryothorus*), 422.
rufescens (*Tryngites*), 950.
rufescens (*Turnix*), 779.
rufibarba (*Estrela*), 581.

- ruficapilla* (Cisticola), 363.
 — (Cryptolopha), 286.
 — (Dendroeca), 433, 1096.
 — (Fulvetta), 346.
 — (Grallaria), 170.
 — (Helminthophaga), 431.
 — (Nemosia), 653.
 — (Nonnula), 48.
 — (Sylviella), 355.
 — (Synallaxis), 197.
ruficapilla (Vitia), 334.
ruficapillum (Trochalopteron), 321.
ruficapillus (Baryphthengus), 95.
 — (Henicurus), 450.
 — (Thamnophilus), 182.
 — (Xanthosomus), 554.
ruficauda (Bathilda), 585.
 — (Cichladusa), 411.
 — (Cinclocerthia), 414.
 — (Erythropygia), 412.
 — (Formicivora), 178.
 — (Galbula), 45.
 — (Hæmophila), 633.
 — (Histurgops), 569.
 — (Myrmeciza), 174, 1069.
 — (Ortalida), 792.
 — (Rhinomyias), 282.
 — (Rhynchoecyclus), 242.
 — (Rupornis), 858.
 — (Siphia), 293.
 — (Upucerthia), 203.
 — (Zenaida), 757.
ruficaudatus (Philydor), 194.
 — (Thryothorus), 423.
ruficeps (Aramides), 963.
ruficeps (Cænotriccus), 233.
 — (Chalcostigma), 156.
 — (Cisticola), 365.
 — (Coua), 60.
 — (Cyanoderma), 343.
 — (Dendrocincla), 186.
 — (Elaïnea), 240.
 — (Eleopicus), 76.
 — (Euphonia), 672.
 — (Formicarius), 1069.
 — (Garrulax), 327.
 — (Grallaria), 170.
 — (Gymnopithys), 173.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Heteromorpha), 470, 1101.
 — (Laniarius), 491.
 — (Macropygia), 756.
 — (Megalurus), 351.
 — (Myioceyx), 111.
 — (Ortalida), 792.
ruficeps (Orthotomus), 361.
 — (Pellorneum), 336.
 — (Pomatorhinus), 325.
 — (Pyrrhocoma), 654.
 — (Stipiturus), 348.
 — (Suthora), 471.
 — (Tephrocorys), 454.
ruficeps (Thamnophilus), 184.
ruficeps (Thlypopsis), 653.
ruficeps (Tinamus), 781.
ruficeps (Todiostrostrum), 232.
ruficervix (Calliste), 668.
 — (Stenopsis), 121.
ruficollaris (Petrochelidon), 258.
ruficollis (Anabazenops), 193.
ruficollis (Aramides), 963.
ruficollis (Ardea), 911.
 — (Branta), 985.
 — (Bucco), 47.
 — (Caprimulgus), 123.
 — (Corvus), 502, 1104.
 — (Chrysococcyx), 53.
 — (Cypsnagra), 654.
 — (Dryonastes), 328.
 — (Gerygone), 269.
 — (Glossiptila), 689.
 — (Hylocharis), 139.
 — (Hypotriorchis), 873.
 — (Merula), 397.
 — (Micrastur), 838.
 — (Montifringilla), 595.
 — (Myiagra), 283, 1082.
 — (Oreophilus), 933.
 — (Pomatorhinus), 326.
 — (Spermophila), 615.
 — (Stelgidopteryx), 260.
ruficollis (Thamnophilus), 183.
ruficollis (Tringa), 951.
ruficolor (Galerida), 457.
ruficoronata (Setophaga), 441.
ruficrissa (Amaurornis), 972.
ruficrissa (Rhinomyias), 282.
 — (Stoparola), 291.
 — (Urosticte), 154.
ruficrissus (Criniger), 311.
ruficrista (Afrotis), 924.
rufidorsa (Ceyx), 111.
 — (Rhipidura), 278.
rufidorsalis (Dryodromas), 354.
 — (Henicurus), 450.
 — (Passer), 1109.
rufifrons (Basileuterus), 439.
 — (Cyanoderma), 343.
 — (Dryodromas), 354.
 — (Fulica), 977.

- rufifrons* (Garrulax), 328.
 — (Malacopteron), 337.
 — (Phacelodomus), 196.
 — (Rhipidura), 278.
 — (Siphia), 293, 1083.
rufigaster (Phaethornis), 133, 1065.
rufigastra (Alcedo), 113.
rufigastra (Carpophaga), 746.
 — (Siphia), 1083.
rufigena (Anaplectes), 1107.
 — (Caprimulgus), 123.
rufigene (Todiostroum), 232.
rufigenis (Calliste), 668.
 — (Eremomela), 356.
 — (Pipilopsis), 649.
 — (Siptornis), 199.
 — (Staphidia), 344.
rufigula (Carpophaga), 743.
 — (Cotyle), 257.
 — (Dendroeca), 433.
 — (Gymnopathys), 173.
 — (Myiagra), 283.
 — (Petrochelidon), 258.
 — (Phlogœnas), 772.
 — (Siphia), 293.
rufigulare (Trochalopetron), 321.
rufigularis (Acanthogenys), 724.
 — (Apalis), 353.
 — (Attila), 214.
 — (Calliste), 666.
rufigularis (Dromococcyx), 62.
rufigularis (Entomophila), 719.
 — (Euscarthmus), 232.
rufigularis (Gymnocichla), 175.
rufigularis (Halcyon), 108.
 — (Hypotriorchis), 873.
 — (Iole), 312.
 — (Minla), 344.
rufigularis (Sclerurus), 191.
rufigularis (Siphia), 293.
rufilata (Accentor), 381.
 — (Accipiter), 845.
 — (Cisticola), 365.
 — (Turnix), 778.
 — (Zosterops), 713.
rufilatus (Tarsiger), 384.
rufilateralis (Rhipidura), 277.
rufiloris (Rhamphococcyx), 1057.
rufimarginata (Ochthœca), 226.
rufimarginatus (Herpsilochmus), 178.
rufina (Columba), 751.
 — (Melospiza), 633.
 — (Netta), 996.
rufinucha (Campylorhynchus), 420.
 — (Leptoptila), 770.
rufinucha (Pachycephala), 479.
 — (Pipilopsis), 648.
rufinuchalis (Laniarius), 491, 1104.
rufinuchus (Charadrius), 937.
rufipectoralis (Ochthœca), 226.
rufipectus (Attila), 1074.
 — (Automolus), 194.
 — (Formicarius), 172.
 — (Leptopogon), 237.
 — (Parus), 462.
 — (Podicipes), 1041.
 — (Spilornis), 834.
 — (Turdinus), 331.
rufipennis (Aplonis), 512.
 — (Butastur), 859.
 — (Cichladusa), 1094.
 — (Columbigallina), 764.
 — (Geositta), 204.
rufipennis (Hladopsis), 336.
rufipennis (Macropygia), 754.
 — (Muscisaxicola), 230.
rufipennis (Myiozetetes), 241.
rufipennis (Neomorphus), 61.
 — (Pachycephala), 480.
 — (Petrophassa), 767.
 — (Phacelodomus), 196.
 — (Pitangus), 243.
 — (Scops), 883.
 — (Siptornis), 200.
rufipes (Euscarthmus), 232.
 — (Gennæus), 800.
 — (Syrnium), 891.
rufipilea (Mirafr), 455.
rufipileata (Philydor), 1072.
rufipileus (Colaptes), 1057.
rufistrigata (Ninox), 889.
rufitincta (Aslur), 840.
rufitorques (Fuligula), 998.
rufitorques (Merula), 396.
 — (Urospizias), 843.
rufiventer (Eudynamis), 54.
rufiventer (Formicivora), 178.
rufiventer (Lalage), 303.
 — (Pterythrion), 487.
 — (Tachyphonus), 656.
 — (Turdus), 400.
rufiventre (Hapaloderma), 87.
rufiventris (Accipiter), 846.
 — (Ardeola), 913.
rufiventris (Carpophaga), 746.
rufiventris (Colluricincla), 496.
rufiventris (Erythronyx), 933.
rufiventris (Euphonia), 673.
rufiventris (Geotrygon), 771.
rufiventris (Halcyon), 1062.

- rufiventris* (Illadopsis), 336.
rufiventris (Laniarius), 491.
rufiventris (Lurocalis), 118.
 — (Malacocincla), 333.
 — (Mionectes), 237.
rufiventris (Myiagra), 283.
rufiventris (Myiotheretes), 225.
 — (Pachycephala), 479.
 — (Parus), 461.
rufiventris (Phaethornis), 1065.
rufiventris (Picumnus), 83.
 — (Pitta), 209.
 — (Poicephalus), 9.
 — (Rhamphocœnus), 176.
 — (Rhipidura), 279.
 — (Ruticilla), 385.
 — (Saltator), 645.
 — (Sigmodus), 498.
 — (Synallaxis), 199.
 — (Terpsiphone), 281.
 — (Thryophilus), 421.
rufivertex (Dendroeca), 1097.
 — (Muscisaxicola), 230.
rufivirgata (Embernagra), 638.
rufo-axillaris (Molothrus), 552.
rufobrunnea (Crateroscelis), 1087.
 — (Poliospiza), 599.
rufo-brunneus (Automolus), 194.
rufobuccalis (Eurystomus), 93.
rufocaligatus (Spathura), 153.
rufocapilla (Ægialitis), 940.
rufocastanea (Macropygia), 756.
 — (Pomarea), 1083.
rufociliata (Troglodytes), 426.
rufocincta (Ægialitis), 940.
 — (Passer), 598.
rufo-cinerea (Grallaria), 170.
rufocinerea (Monticola), 393.
rufocinnamomea (Mirafra), 455.
rufo-dorsalis (Xiphorhynchus), 187.
rufollavidus (Bradypterus), 350.
rufogastra (Colluricincla), 496, 1104.
rufogularis (Arboricola), 814.
 — (Pachycephala), 479.
rufolateralis (Monarcha), 290.
rufolateralis (Smithornis), 285.
rufomaculatus (Antrostomus), 122.
rufomarginatus (Hapalocercus), 234.
rufomerus (Chrysococcyx), 1056.
rufoniger (Melanopteryx), 567.
rufonuchalis (Lophophanes), 465.
rufo-olivacea (Dendrocincla), 1070.
rufopicta (Lagonosicta), 578.
rufopictus (Pternistes), 811.
rufopileata (Cisticola), 363.
rufopileata (Dendroeca), 433, 1097.
rufopileatum (Pittasoma), 1069.
rufopunctatus (Chrysocolaptes), 80.
rufoscapulatus (Ploceipasser), 569.
rufoschistaceus (Urospizias), 1116.
rufo-superciliatus (Anabazenops), 192.
rufolibialis (Accipiter), 847.
rufotincta (Casuarius), 1051.
rufoviridis (Galbula), 45.
rufula (Argya), 323.
 — (Grallaria), 170.
 — (Hirundo), 254.
rufula (Prinia), 359.
rufulus (Anthus), 447.
 — (Thryothorus), 422.
rufulus (Troglodytes), 425.
rufulus (Gampsorhynchus), 323.
rufum (Bathmisyrra), 291.
 — (Conirostrum), 687.
rufus (Anthus), 448.
 — (Antrostomus), 122.
rufus (Batara), 184.
rufus (Bathmocercus), 331.
 — (Campylopterus), 134.
 — (Celeus), 79.
 — (Cursorius), 931.
 — (Dendrocopus), 185.
 — (Enneoctonus), 486.
 — (Furnarius), 203.
 — (Harporhynchus), 417.
rufus (Margarops), 414.
rufus (Neocossyphus), 410.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Philydor), 193.
 — (Phylloscopus), 377.
 — (Plotus), 1010.
 — (Selasphorus), 162.
 — (Zeocephus), 280.
rugensis (Metabolus), 271.
rugillatus (Dryonastes), 328.
ruki (Zosterops), 713.
rumicivorus (Thinocorus), 780.
rupestris (Chordeiles), 119.
 — (Columba), 749.
 — (Cotyle), 257.
rupestris (Hirundinea), 245.
rupestris (Lagopus), 826.
 — (Monticola), 393.
rupicola (Colaptes), 63.
 — (Pyrrhura), 13.
rupicola (Sitta), 681.
 — (Turtur), 759.
rupicoloides (Tinnunculus), 870.
rupicolus (Tinnunculus), 870.
ruppelli (Francolinus), 810.

- ruppelli* (Galerida), 457.
 — (Gyps), 830.
 — (Heterotetrax), 925.
 — (Leptoptilus), 907.
 — (Plectropterus), 980.
 — (Poicephalus), 9.
 — (Sylvia), 374.
rupurumi (Phaethornis), 132.
rusbyi (Conopophaga), 1068.
rushiæ (Pholidornis), 357.
rushi (Conopophaga), 169, 1068.
ruspolii (Dinemellia), 570.
 — (Turacus), 89.
russata (Bubulcus), 913.
russata (Eriocnemis), 1067.
 — (Rhipidura), 278.
russatus (Chlorostilbon), 142.
 — (Euscarthmus), 232.
russei (Quelea), 571.
russula (Luscinola), 371.
rustica (Elainea), 240.
rustica (Emberiza), 621.
 — (Hirundo), 253.
rusticola (Scolopax), 955.
rusticolus (Hierofalco), 876.
rutenbergi (Butorides), 916.
rutherfordi (Spilornis), 834.
ruticilla (Setophaga), 441.
 — (Siptornis), 199.
rutila (Casarca), 989.
 — (Emberiza), 622.
 — (Phytotoma), 210.
 — (Scops), 884.
rutilans (Enneactonotus), 486, 1103.
 — (Passer), 598.
 — (Synallaxis), 199.
rutilus (Nephæcetes), 129.
rutilus (Piaya), 58.
rutilus (Pipilo), 637.
 — (Thryothorus), 423.
 — (Xenops), 192.
rutledgii (Ploceus), 567, 1107.
ruwensorii (Mesopicus), 1059.
rytirhynchus (Rallus), 961.
sabinei (Bonasa), 823.
 — (Chætura), 128.
 — (Chaunonotus), 493.
 — (Xema), 1020.
sabota (Mirafr), 456.
sabrina (Tanyptera), 106.
saccharina (Cœreba), 690.
sacer (Halcyon), 108.
 — (Hierofalco), 875.
sacerdotis (Ceyx), 112, 1062.
sacra (Ardea), 911.
sacra (Tudirhamphus), 110.
sagittata (Chthonicola), 366.
 — (Scops), 885.
sagittatus (Picumnus), 83.
sagittirostris (Viridonia), 693.
sagræ (Myiarchus), 251.
saharæ (Caprimulgus), 1063.
 — (Fringillaria), 624.
 — (Edicnemus), 927.
 — (Passer), 598.
 — (Scotocerca), 360.
saipanensis (Rhipidura), 277.
saira (Pyrrang), 658.
saisseti (Cyanorhamphus), 26.
sajamæ (Siptornis), 1072.
sakalava (Ploceus), 567.
saker (Hierofalco), 876.
sala (Alauda), 455.
salaccensis (Brachypteryx), 342.
salangæ (Criniger), 1085.
salangensis (Dicrurus), 530.
salax (Pratincola), 387.
saleyerensis (Cyrtostomus), 703.
salicamans (Chrysomitris), 591.
salicaria (Sylvia), 374.
salicicola (Turdus), 402.
salimæ (Dryoscopus), 493.
salinazi (Creciscus), 971.
salinazi (Porzana), 968.
sallæi (Chrysotis), 6.
sallæi (Cyrtonyx), 821.
 — (Granatellus), 438.
sallei (Florisuga), 134, 1065.
salmoni (Brachygalba), 46.
 — (Dacnis), 688.
 — (Ostinops), 550.
 — (Tigrisoma), 919.
salomonensis (Nasiterna), 24.
salomonensis (Ptilopus), 740.
 — (Zosterops), 712.
salomonis (Halcyon), 109.
 — (Edoliisoma), 299.
 — (Phlogœnas), 773.
saltuensis (Amazona), 1053.
salvadoriana (Tanyptera), 105.
salvadorii (Echmophorus), 1042.
salvadorii (Egotheles), 116.
salvadorii (Argya), 323.
salvadorii (Bradypterus), 1088.
salvadorii (Caprimulgus), 123.
salvadorii (Carpophaga), 747.
 — (Casuarius), 1050.
 — (Cryptospiza), 576.
 — (Cyclopsitta), 33.
 — (Dicaeum), 677.

- salvadorii* (Edoliisoma), 299.
 — (Eremomela), 355.
 — (Eudynamis), 1057.
 — (Gerygone), 268.
 — (Galeopsar), 546.
 — (Hermotimia), 700.
 — (Lorius), 29.
 — (Merops), 97.
 — (Microglossus), 1, 1053.
 — (Nasiterna), 1054.
 — (Pachycephala), 479, 1102.
 — (Palæornis), 19.
 — (Phyllomyias), 238.
 — (Pœcilodryas), 272.
 — (Ptilopus), 741.
 — (Ptilotis), 720.
 — (Querquedula), 993.
 — (Salpornis), 684.
salvadorii (Sericornis), 1087.
salvadorii (Sericornis), 1090.
 — (Sphecotheres), 528.
 — (Spilornis), 834.
 — (Stigmatops), 719.
 — (Tanygnathus), 18.
salvadorii (Vinago), 732.
salvadorii (Zosterops), 707.
salvini (Accipiter), 846.
 — (Agyrtria), 136.
 — (Amazilia), 1065.
 — (Antrostomus), 122.
 — (Basileuterus), 440.
 — (Capito), 42.
salvini (Certhidea), 689.
salvini (Chlorostilbon), 141.
 — (Chrysotis), 5.
 — (Colinus), 821.
 — (Crypturus), 783.
 — (Cyphorhinus), 429.
 — (Diomedea), 1038.
 — (Empidochanes), 247.
 — (Empidonax), 248.
 — (Eutoxeres), 133, 1065.
 — (Geospiza), 609.
salvini (Heliodoxa), 149.
salvini (Mitua), 790.
 — (Neomorphus), 61.
 — (Ochthoeca), 226.
 — (Pachyrhamphus), 212, 1073.
 — (Pendulinus), 1106.
 — (Phœnicothraupis), 657, 1111.
 — (Picumnus), 84.
 — (Pithys), 1069.
 — (Sclerurus), 192.
 — (Spindalis), 661.
 — (Tinamus), 781.
samarensis (Ceyx), 111, 1062.
 — (Chrysocolaptes), 80.
 — (Corvus), 504.
 — (Hypothymis), 274.
 — (Muscicapula), 294.
 — (Oriolus), 527.
 — (Orthotomus), 361.
 — (Penelopides), 102.
 — (Prionochilus), 675.
 — (Rhinomyias), 282.
 — (Sarcophanops), 205.
samoensis (Leptornis), 724.
 — (Merula), 395.
 — (Phlogœnas), 773.
 — (Porphyrio), 976.
samuels (Melospiza), 633.
sanaka (Melospiza), 1111.
sanblasiana (Cyanolyca), 513.
sancta (Rhipidura), 276.
sanctæ-catharinæ (Scops), 886.
sanctæ-crucis (Zosterops), 712.
sanctæ-helenæ (Ægialitis), 941.
sanctæ-luciæ (Cichlherminia), 403.
 — (Myiadectes), 407.
 — (Rhamphocinclus), 414.
sanctæ-martæ (Centurus), 1058.
 — (Guiraca), 612.
 — (Myrmotherula), 1070.
sanctæ-marthæ (Rhamphocœnus), 176, 1069.
sanctihieronymi (Panyptila), 126.
sancti-johannis (Archibuteo), 854.
 — (Picus), 72.
sancti-thomæ (Anaplectes), 569.
 — (Cœreba), 691.
 — (Dendrocolaptes), 185.
sanctorum (Picus), 71.
sanctus (Halcyon), 109.
sandvicensis (Branta), 985.
sandwichensis (Chasiempis), 270.
 — (Gallinula), 974.
sandwichensis (Estrelata), 1034.
sandwichensis (Passerculus), 631.
 — (Pennula), 969.
sanghirana (Pitta), 208.
sanghirense (Dicæum), 677.
sanghirensis (Ceycopsis), 1062.
 — (Chalcophaps), 766.
 — (Cittura), 105.
 — (Hermotimia), 700.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Macropygia), 755.
 — (Megapodius), 786.
 — (Oriolus), 526.
 — (Osmotreron), 733.
 — (Prionochilus), 675.

- sanghirensis* (Tanygnathus), 18.
sanguinea (Cacatua), 3.
sanguinea (Cannabina), 590.
sanguinea (Himatione), 692.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Rhodopechys), 596.
sanguineus (Eleopicus), 76.
sanguinceps (Hæmalortyx), 814.
sanguineus (Æthopyga), 696.
sanguinirostris (Quelea), 571.
sanguinolenta (Myzomela), 715.
 — (Phlogothraupis), 659.
 — (Pyrrangia), 659.
 — (Rallus), 961.
 — (Rupicola), 215.
 — (Uragus), 608.
sanguinolentum (Dicæum), 677.
sanguinolentus (Analcipus), 528.
 — (Eleopicus), 75.
sannio (Dryonastes), 328.
santacruzii (Centurus), 69.
santaecrucis (Melospiza), 1110.
santaritæ (Psaltiriparus), 466, 1101.
sapphira (Muscicapula), 294.
sapphirina (Hylocharis), 140.
 — (Osculatia), 770.
sapphiropygia (Eriocnemis), 154.
sappho (Lesbia), 158.
saracura (Aramides), 964.
sarasinorum (Acanthopneuste), 377.
 — (Myza), 724.
 — (Zosterops), 707.
saravacensis (Philentoma), 281.
sarawacensis (Parus), 461.
sardus (Melizophilus), 375.
sartorii (Hæmophila), 634.
 — (Syrnium), 891.
sasak (Pelargopsis), 1062.
sasakensis (Carpophaga), 746.
satelles (Glycyphila), 717.
satrapa (Regulus), 379.
satscheunensis (Phasianus), 802.
saturata (Æthopyga), 695.
 — (Amazilia), 1066.
 — (Ammodramus), 459.
 — (Argyria), 323.
 — (Arremon), 647.
 — (Brachypteryx), 342.
 — (Bubo), 881.
 — (Butorides), 916.
 — (Campophaga), 300.
 — (Euphonia), 673.
 — (Formicarius), 172.
 — (Heterocnemis), 175.
 — (Hypotaenidia), 962.
saturata (Leptoptila), 769.
 — (Lioptila), 413.
 — (Momotus), 94.
 — (Nuttallornis), 1078.
 — (Passer), 597.
 — (Phlogopsis), 172.
 — (Phrygilus), 640.
 — (Pyrocephalus), 1077.
 — (Rallus), 960.
 — (Rupornis), 859.
 — (Scolopax), 955.
 — (Tinnunculus), 870.
 — (Turdus), 400.
 — (Turnix), 779.
 — (Turtur), 759.
 — (Xiphocolaptes), 188.
saturatia (Edolisoma), 1084.
saturator (Aphantochroa), 1065.
 — (Chalcomitra), 701.
 — (Colaptes), 1057.
 — (Gampsonychus), 1086.
 — (Halcyon), 107.
 — (Nigrita), 1108.
 — (Picolaptes), 188.
 — (Pterocles), 777.
 — (Upocerthia), 1073.
saturatus (Antrostomus), 122.
 — (Cuculus), 51.
 — (Platyrrhynchus), 231.
 — (Poicephalus), 1053.
saturatus (Scops), 886.
saturninus (Mimus), 416.
 — (Thamnophilus), 184.
satyra (Tragopan), 797.
saucerottii (Saucerottea), 137.
saulæ (Lafresnaya), 151.
saularis (Copsychus), 411.
sauli (Rhipidura), 280.
saundersi (Larus), 1021.
 — (Sterna), 1017.
saurophaga (Halcyon), 108.
savanna (Passerculus), 631.
savannarum (Ammodromus), 632.
savatieri (Coccyphygia), 580.
savesi (Aegothales), 116.
savignii (Hirundo), 253.
savignii (Merops), 97.
savorgnani (Centropus), 56.
saxatilis (Caccabis), 806.
 — (Monticola), 392.
saxicolina (Geositta), 204.
saxicolina (Monachella), 271.
saya (Sayornis), 227.
sayaca (Tanagra), 662.
saypani (Zosterops), 711.

- scalaris* (Etelrelata), 1035.
 — (Picus), 71.
scandens (Climacteris), 684.
 — (Geospiza), 609.
 — (Xenocichla), 309, 1085.
scandiaca (Nyctea), 894.
scandulaca (Certhia), 683.
scapularis (Ægithina), 341.
scapularis (Butorides), 916.
scapularis (Ceophlæus), 82.
 — (Pitylus), 643.
scapulata (Hermotimia), 700.
 — (Scops), 883.
 — (Thalurania), 143.
scapulatus (Chalcomitra), 701.
scapulatus (Corvus), 593.
schach (Lanius), 485.
schalowi (Lanius), 484, 1103.
 — (Rhinopomastus), 1061.
 — (Saxicola), 388.
 — (Turacus), 89.
 — (Vinago), 732.
scheepmakeri (Goura), 775, 1115.
schillingsi (Hyphantornis), 1107.
 — (Pseudogyps), 1116.
schimperi (Columba), 749.
schistacea (Apalis), 353.
schistacea (Ardea), 911.
schistacea (Geocichla), 405.
 — (Hypocnemis), 173.
 — (Leucopternis), 860.
 — (Melæornis), 287.
 — (Melanorhæctes), 495.
 — (Meliornis), 723.
 — (Mimocichla), 394.
 — (Nigrita), 575.
 — (Passerella), 635.
 — (Rhodinocichla), 418.
schistaceiceps (Dicæum), 678.
 — (Todiostrotrum), 232.
schistaceigula (Poliopitila), 380.
schistaceigularis (Cacomantis), 1056.
schistaceus (Dysithamnus), 180.
 — (Graucalus), 297.
 — (Henicurus), 449.
 — (Pipilopsis), 649.
 — (Spermophilopsis), 614.
schisticeps (Cryptolopha), 286.
 — (Edoliisoma), 299.
 — (Palæornis), 19.
 — (Pomatorhinus), 325.
 — (Ruticilla), 386.
schistisaga (Larus), 1024.
schlegeli (Arremon), 647.
 — (Caprimulgus), 123, 1063.
schlegeli (Catarrhactes), 1048.
 — (Francolinus), 808.
 — (Hypargus), 579.
 — (Merula), 398.
 — (Pachycephala), 477.
 — (Philepitta), 210.
 — (Platysmurus), 509.
schleiermacheri (Polyplectron), 796.
schliephacki (Docimastes), 152.
schmackeri (Garrulax), 327.
schmackeri (Iole), 312.
schmidti (Amazona), 1053.
schmitzi (Motacilla), 1098.
 — (Strix), 899.
schoana (Malaconotus), 1104.
schœniclus (Emberiza), 621.
schœnicola (Cisticola), 364.
schœnobæus (Acrocephalus), 369.
 — (Phleocyptes), 201.
schoensis (Dendropicus), 74.
schomburgki (Hydropsalis), 120.
 — (Thyrorhina), 970.
schranksi (Calliste), 665.
schreibersi (Iolæma), 150.
schrenkii (Butorides), 916.
schuetti (Francolinus), 810.
 — (Turacus), 89.
schulzi (Cinclus), 419.
 — (Dryocopus), 83.
schwaneri (Cryptolopha), 286.
 — (Eucichla), 209.
schwarzi (Lusciniola), 371.
schwebischi (Elminia), 281.
scintillans (Phasianus), 802.
scintilla (Selasphorus), 162.
scintillatus (Chalcopsitta), 28.
scintilliceps (Yungipicus), 74.
scioana (Plectropterus), 980.
 — (Pyromelana), 572.
 — (Textor), 569.
scirpicola (Geothlypis), 1097.
scita (Stenostira), 273.
scitilus (Aithurus), 1066.
scitula (Basileuterus), 1098.
sclateri (Agelæus), 553.
 — (Anæretes), 236.
 — (Apalis), 1089.
 — (Attila), 214.
 — (Automolus), 195.
 — (Calliste), 666.
 — (Casuarius), 1050.
 — (Catarrhactes), 1048.
 — (Chætura), 128.
 — (Chasiempis), 270.
 — (Chrysomitris), 591.

- sclateri* (Crax), 789.
sclateri (Cyanocorax), 514.
 — (Doliornis), 217.
 — (Euphonia), 672.
 — (Goura), 775, 1115.
 — (Graucalus), 296.
 — (Guttera), 805.
 — (Hirundinea), 244.
 — (Hirundo), 255.
 — (Hylophilus), 474.
 — (Icterus), 558.
 — (I. ophophorus), 798.
 — (Loriculus), 23.
 — (Loxigilla), 613.
 — (Myiarchus), 251.
 — (Myzomela), 716.
 — (Ornithion), 238, 1076.
 — (Parus), 463.
 — (Penelope), 791.
 — (Philemon), 726.
 — (Phyllomyias), 1076.
 — (Picumnus), 83.
 — (Pipreola), 216.
sclateri (Plectropterus), 980.
sclateri (Poliophtila), 380, 1091.
 — (Psittacula), 15.
 — (Tanagra), 661.
 — (Thryothorus), 423.
 — (Thripophaga), 195.
 — (Todiostrosum), 231.
 — (Xiphocolaptes), 188, 1071.
sclateriana (Amatocichla), 406.
scolopacea (Barbatula), 38.
scolopacea (Heterotetrax), 925.
scolopaceus (Aramus), 920.
scolopax (Crypturus), 783.
 — (Edicnemus), 927.
scopifrons (Sigmodon), 498.
scopulinus (Larus), 1023.
scoresbyi (Leucophæus), 1026.
scotæa (Nyctala), 1117.
scoticus (Lagopus), 826.
scotops (Eremomela), 356.
 — (Serinus), 600.
scotti (Hæmophila), 635.
 — (Rallus), 960.
 — (Zosterops), 710.
scouleri (Hemicurus), 450.
scratchleyana (Munia), 587.
scripta (Geophaps), 767.
scriptoricauda (Campothera), 66.
scriptus (Elanus), 864.
scrutator (Thripadectes), 193.
scullii (Hirundo), 254.
scutata (Rhinoplax), 99.
scutata (Spermestes), 576.
 — (Synallaxis), 198.
scutatus (Malimbus), 568.
 — (Pyroderus), 218.
scutopartita (Malimbus), 568.
scutulata (Asarcornis), 981.
 — (Ninox), 887.
secretarius (Serpentarius), 827.
secunda (Mirafr), 456.
seducta (Centurus), 1058.
seebohmii (Calandrella), 453.
 — (Cettia), 372.
 — (Dromæocercus), 348.
 — (Lanius), 483.
 — (Luscinola), 371.
 — (Merula), 397.
 — (Pipilopsis), 649.
 — (Rhinoptilus), 931.
 — (Saxicola), 389.
 — (Yungipicus), 74.
seena (Seena), 1014.
sefilata (Parotia), 522.
segetum (Anser), 983.
segmentata (Macropsalis), 120.
selheriæ (Æthopyga), 695.
sejuueta (Culicicapa), 282.
seloputo (Syrnium), 891.
selysii (Eleopicus), 76.
semenowi (Saxicola), 1092.
 — (Scops), 1117.
semiatra (Pomareopsis), 291, 1083.
 — (Sayornis), 1075.
semibadius (Thryophilus), 422.
semibrunneus (Hylophilus), 474.
semicæruleus (Halcyon), 107, 1062.
semicervinus (Basileuterus), 440.
semicinerea (Dysithamnus), 180.
 — (Synallaxis), 198.
semicinereus (Hylophilus), 474.
semicinnamomeus (Celeus), 80.
semicollaris (Chætura), 127.
 — (Rhipidura), 278.
 — (Rhynchæa), 956.
semicoronatus (Yungipicus), 74.
semifasciata (Lophoceros), 103.
 — (Tityra), 211.
semiflava (Casiempis), 237.
semiflava (Elainea), 240.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Zosterops), 709.
semillavus (Tyrannulus), 239.
semifusca (Myiopatis), 238, 1076.
semifusca (Sublegatus), 241.
semifuscus (Chlorospingus), 651.
semigaleatus (Hydrocorax), 100.

- semilarvata* (Eos), 28.
semilarvatus (Melanoparus), 460.
semipagana (Elaïnea), 239.
semipalmata (Anseranas), 979.
semipalmatus (Ægialeus), 939.
semipartitus (Bradyornis), 287.
 — (Empidonis), 1082.
semiplumbea (Leucopternis), 860.
semiplumbeus (Rallus), 960.
semirubra (Rhipidura), 277.
semirufa (Ardeola), 913.
semirufa (Cossypha), 409.
 — (Hirundo), 255.
 — (Ruticilla), 385.
 — (Thamnotæa), 392.
semirufus (Myiarchus), 251.
 — (Pipilopsis), 649.
semischistaceus (Mionectes), 237.
semistriata (Uroloncha), 586.
semitorquata (Alcedo), 112.
 — (Alæmon), 451.
 — (Garrulax), 327.
 — (Phasianus), 802.
 — (Rhamphocænus), 176.
semitorquatus (Arremon), 647.
 — (Barnardius), 25.
 — (Lurocalis), 118.
 — (Poliohierax), 868.
 — (Turtur), 760.
semitorques (Scops), 884.
 — (Spizixus), 304.
semperi (Cichlherminia), 403.
semperi (Leucopæza), 430.
 — (Zosterops), 710.
senegala (Lagonosticta), 577.
senegalensis (Batis), 265.
 — (Bradyornis), 287.
 — (Centropus), 57.
 — (Chalcomitra), 701.
 — (Coracias), 1060.
 — (Ephippiorhynchus), 907.
 — (Galerida), 458.
 — (Halcyon), 107.
 — (Hirundo), 255.
 — (Edicnemus), 928.
 — (Otis), 926.
 — (Podica), 978.
senegalensis (Scops), 882.
 — (Sterna), 1015.
senegalensis (Terpsiphone), 280.
 — (Textor), 569.
 — (Turtur), 761.
 — (Zosterops), 708.
senegalus (Lobivanellus), 934.
 — (Phyllostrophus), 314.
senegalus (Poicephalus), 9.
 — (Pteroclorus), 777.
 — (Telephonus), 488.
senex (Acridula), 467.
 — (Euscarthmus), 233.
 — (Gymnocorax), 505.
 — (Megapodius), 787.
 — (Nephœetes), 129.
 — (Platyrhynchus), 231.
 — (Pogonorhynchus), 36.
 — (Sturnornis), 536.
senicula (Pipilo), 637.
senilis (Pionus), 7.
 — (Scytalopus), 166.
seniloides (Pionus), 7.
sennaarensis (Saxicola), 390.
sennetti (Ammodromus), 631.
 — (Buteo), 857.
 — (Harporhynchus), 417.
 — (Pendulinus), 1106.
separata (Carpophaga), 744.
sephæna (Francolinus), 808.
sepiaria (Malacocincla), 333.
 — (Rallina), 966.
sepium (Orthotomus), 362.
septemstriata (Fringillaria), 624.
septentrionalis (Ceryle), 115.
 — (Colymbus), 1039.
 — (Edoliisoma), 299.
 — (Geospiza), 609.
 — (Megaloprepia), 742.
 — (Metallura), 156.
 — (Nestor), 1054.
 — (Parus), 463.
 — (Phasianus), 801.
 — (Stoparola), 291.
 — (Tetrastes), 823.
 — (Trichoglossus), 1055.
septimus (Batrachostomus), 116.
serena (Erythrura), 583.
 — (Pipra), 221.
sericea (Loboparadisea), 524.
 — (Meliornis), 723.
sericeocaudatus (Antrostomus), 122.
sericeus (Monarcha), 290.
 — (Spodiopsar), 535.
serina (Xenocichla), 310, 1085.
serrana (Merula), 395.
serrana (Upucerthia), 203.
serranus (Larus), 1022.
serrator (Merganser), 1003.
 — (Sula), 1011.
serratus (Coccystes), 50.
serresiana (Catarrhactes), 1018.
serriana (Coua), 60.

- serripennis* (Stelgidopteryx), 260.
serrirostris (Anser), 983.
 — (Euphonia), 672.
 — (Petasophora), 144.
serva (Pyriglena), 176.
setaria (Leptasthenura), 201.
setarius (Pteroclorus), 776.
 — (Prioniturus), 17.
setosa (Rhipidura), 279.
severa (Ara), 10.
severus (Hypotriorchis), 873.
 — (Thamnophilus), 184.
severtzovi (Carpodacus), 603.
severtzowi (Tetrastes), 823.
sexpennis (Parotia), 522.
seychellarum (Copsychus), 411.
 — (Foudia), 566.
seychellensis (Bebrornis), 349.
sgausini (Alectronas), 742.
sharpei (Accipiter), 1116.
 — (Apalis), 353.
 — (Argya), 1086.
 — (Bradyornis), 288.
 — (Caprimulgus), 1063.
 — (Ceryle), 115.
 — (Cœreba), 1112.
 — (Coracias), 1061.
 — (Corvus), 502, 1105.
 — (Creciscus), 971.
 — (Crateropus), 329.
 — (Dendropicus), 73.
 — (Dicrurus), 530.
 — (Francolinus), 810.
 — (Gecinus), 63.
 — (Gennæus), 800.
 — (Grus), 922.
 — (Lalage), 303.
 — (Melittophagus), 1061.
 — (Munia), 587.
 — (Myopornis), 1083.
 — (Myzomela), 716.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Pelecanus), 1005.
 — (Pholidauges), 541.
 — (Pholidophalus), 101.
 — (Phonipara), 618.
 — (Pseudochloris), 639.
 — (Pseudocossyphus), 410.
 — (Pulsatrix), 1117.
sharpai (Rhipidura), 276.
sharpai (Serinus), 1109.
 — (Sitagra), 564.
 — (Smithornis), 1082.
 — (Stictolimnas), 967.
 — (Terenura), 1069.
sharpei (Trochalopteron), 1086.
 — (Turacus), 89.
 — (Turturæna), 753.
 — (Urospizias), 843.
 — (Zosterops), 710.
sharpii (Ceyx), 111.
 — (Phyllostrophus), 314.
shawii (Phasianus), 802.
sheba (Urospizias), 842.
shellei (Ethopyga), 696.
 — (Capito), 1056.
shellei (Caprimulgus), 123.
shellei (Cinnerys), 698.
shellei (Cotyle), 257.
shellei (Cryptospiza), 1108.
 — (Cypselus), 1064.
 — (Francolinus), 809.
 — (Huhua), 882.
 — (Hyphantornis), 562.
 — (Nesocharis), 1108.
 — (Notauges), 548.
 — (Passer), 598.
shellei (Thamnolæa), 392.
shellei (Trachyphonus), 40.
 — (Turtur), 760.
 — (Xenocichla), 1085.
shorii (Tiga), 78.
sialis (Sialia), 386.
siamensis (Zosterops), 708.
siaoensis (Scops), 884.
sibbensis (Alopius), 103, 1062.
sibila (Colluricincla), 496.
sibilans (Aedon), 382.
 — (Coracopsis), 4.
 — (Myiadectes), 407.
sibilator (Sirystes), 243.
sibilatrix (Mareca), 992.
 — (Phacelodomus), 196.
 — (Phylloscopus), 377.
 — (Syrigma), 917.
sibirica (Bubo), 880.
 — (Butalis), 1079.
 — (Geocichla), 405.
 — (Hemichelidon), 262, 1079.
 — (Lanius), 483.
 — (Melanocorypha), 452.
 — (Otocorys), 451.
sibiricus (Lanius), 1102.
sibiricus (Uragus), 608.
sibisibina (Ptilotis), 721.
sibutuense (Dicæum), 679.
sibutuensis (Scops), 884.
sibuyanum (Dicæum), 678.
sicula (Acredula), 1101.
sieboldi (Sphenocercus), 731.

- siemiradzii* (*Chrysomitris*), 592.
sifanica (*Perdix*), 812.
sigillata (*Pœcilodryas*), 272.
sigillifer (*Lobospingus*), 584.
signata (*Aëdonopsis*), 412.
 — (*Pyrrhulauda*), 460.
signatum (*Todirostrum*), 231.
signatus (*Chlorospingus*), 650.
 — (*Ochthodietæ*), 225.
siju (*Glaucidium*), 896.
silens (*Arremon*), 646.
 — (*Bradyornis*), 287.
silvestris (*Buceros*), 100.
simalurensis (*Macropygia*), 1114.
sinensis (*Psophocichla*), 406.
similis (*Chloropeta*), 274.
 — (*Cosmophoneus*), 490.
 — (*Myiozetetes*), 241.
 — (*Pachyrhamphus*), 212.
 — (*Petroeca*), 267.
similis (*Ptilotis*), 720.
similis (*Saltafor*), 645.
 — (*Trochalopteron*), 321.
simillima (*Merula*), 396.
 — (*Pitta*), 208.
 — (*Sibia*), 324.
simoni (*Dendropicus*), 1058.
 — (*Helianthus*), 155.
simonsi (*Buarremon*), 1111.
simplex (*Adelomyia*), 154.
simplex (*Anthreptes*), 704.
 — (*Cænotriccus*), 1075.
 — (*Calamonastes*), 352.
 — (*Cisticola*), 365.
 — (*Chloronerypes*), 65.
 — (*Crypturus*), 783.
 — (*Geoffroyus*), 17.
 — (*Gerygone*), 268.
 — (*Grallaria*), 170.
 — (*Haplopelia*), 768.
simplex (*Heterocnemis*), 175.
simplex (*Lædorusa*), 306.
 — (*Lipaugus*), 213.
 — (*Myzomela*), 716.
 — (*Pachycephala*), 480.
 — (*Passer*), 598.
 — (*Pipilopsis*), 649.
simplex (*Poicæphalus*), 9.
simplex (*Serinus*), 1109.
 — (*Spermophila*), 615.
 — (*Stactolæna*), 38.
 — (*Thamnophilus*), 183.
 — (*Xenocichla*), 310.
 — (*Zosterops*), 707.
simpliciceps (*Xiphocolaptes*), 188.
simus (*Cacomantis*), 52.
sinaiticus (*Carpodacus*), 603.
sinaloa (*Hæmophila*), 634.
 — (*Thryophilus*), 422.
sinaloæ (*Embernagra*), 638.
 — (*Progne*), 259.
sincipitalis (*Ostinops*), 550.
sindianus (*Phylloscopus*), 378.
sinensis (*Ardetta*), 914.
 — (*Blythipicus*), 77.
 — (*Brachypteryx*), 342.
sinensis (*Bubo*), 881.
sinensis (*Centropus*), 56.
 — (*Cissa*), 508.
 — (*Cotyle*), 257.
 — (*Cryptolopha*), 286.
 — (*Dendrociitta*), 508.
 — (*Garrulus*), 510.
 — (*Gracula*), 539.
 — (*Henicurus*), 449.
 — (*Horornis*), 372.
 — (*Ibis*), 901.
 — (*Ithagenes*), 797.
 — (*Merula*), 395.
sinensis (*Munia*), 588.
sinensis (*Pachycephalixus*), 306.
sinensis (*Phalacrocorax*), 1003.
sinensis (*Pycnorhis*), 340.
 — (*Sterna*), 1017.
 — (*Sturnia*), 537.
sinensis (*Syrnium*), 891.
sineusis (*Sitta*), 680.
singalensis (*Anthreptes*), 704.
singularis (*Siptornis*), 200, 1072.
 — (*Xenerpestes*), 1072.
sinicus (*Ligurinus*), 610.
sinuata (*Emarginata*), 391.
 — (*Pyrrhuloxia*), 619.
sinuosa (*Geothlypis*), 1097.
sipahi (*Carpodacus*), 602.
siparaja (*Ethopyga*), 696.
siquijorensis (*Iole*), 312.
 — (*Loriculus*), 23.
 — (*Zosterops*), 707.
sirkee (*Taccocua*), 58.
sitticolor (*Conirostrum*), 686.
sittoides (*Diglossa*), 685.
sivalensis (*Palæornis*), 18.
sjæstedti (*Columba*), 750.
 — (*Glaucidium*), 897.
skorniakovi (*Anser*), 983.
skua (*Megalestris*), 1027.
sladeni (*Phasianus*), 802.
slevini (*Turdus*), 1094.
sloetii (*Campochæra*), 299.

- smaragdina* (Cyanolesbia), 157.
smaragdinea (Timolia), 143.
smaragdineus (Chrysococcyx), 52.
smaragdinicauda (Cyanolesbia), 157.
smaragdinicollis (Metallura), 156.
smaragdinipectus (Eriocnemis), 153.
smaragdinus (Coriphilus), 30.
 — (Microsittace), 13.
smaragdinus (Porphyrio), 976.
smaragnotus (Porphyrio), 975.
smithi (Dryodromas), 354.
 — (Geophaps), 767.
 — (Pyrrhulanda), 460.
 — (Zosterops), 1113.
smithii (Campothera), 66.
 — (Crateropus), 330.
 — (Hirundo), 254.
 — (Lanius), 485.
smithii (Spatula), 995.
smithii (Terpsiphone), 1081.
smithsonianana (Larus), 1025.
smithsonianus (Ptilopus), 737.
smyrnensis (Halcyon), 107.
snowi (Uria), 1044.
sociabilis (Pluvianellus), 941.
 — (Rosthramus), 864.
socialis (Burnesia), 360.
 — (Spizella), 630.
socius (Philæterus), 575.
socorroensis (Buteo), 856.
 — (Columbigallina), 764.
socorroensis (Micropallas), 898.
socorroensis (Oceanodroma), 1029.
socotrana (Fringillaria), 624.
 — (Scops), 882.
socotranus (Rhynchostruthus), 596.
soderstromi (Heliangelus), 1067.
soemmeringi (Phasianus), 802.
sogdianensis (Hypolais), 373.
solanderi (Estrelata), 1034.
solandri (Calyptorhynchus), 2.
solaris (Cyrtostomus), 703.
 — (Pericocotus), 301.
solitaria (Agriornis), 225.
 — (Anthipes), 294.
 — (Ceyx), 112.
 — (Gallinago), 954.
 — (Harpyhaliaëtus), 861.
 — (Myiodynastes), 243.
 — (Monticola), 393.
solitarius (Amblycercus), 551.
 — (Buteo), 856.
 — (Corvus), 504.
 — (Cuculus), 51.
 — (Myiadectes), 406.
solitarius (Phigys), 30.
 — (Tinamus), 781.
 — (Totanus), 947.
 — (Vireo), 472.
sollicitans (Dicæum), 1112.
soloensis (Astur), 841.
solokensis (Scops), 885.
solomonensis (Eclectus), 1054.
 — (Eurystomus), 93.
solomonensis (Lamprocorax), 542.
solomonensis (Pseudopteryx), 1116.
solomonis (Ninox), 889.
solstitialis (Conurus), 11.
 — (Spathura), 153.
 — (Troglodytes), 426.
somalensis (Cursorius), 931.
 — (Upupa), 99.
somalica (Burnesia), 360.
 — (Calandrella), 453.
 — (Cisticola), 364.
 — (Pteroclorus), 777.
 — (Saxicola), 389, 1092.
somaliensis (Alopius), 104.
 — (Irrisor), 1061.
 — (Lagonosticta), 578.
 — (Numida), 805.
somersii (Cardinalis), 1110.
somervillei (Crateropus), 330.
songarus (Parus), 463.
sonitans (Burnesia), 359.
sonnerati (Cuculus), 51.
 — (Gallus), 803.
sonnerati (Ninox), 889.
sonnini (Eupsychortyx), 820.
sonora (Ptilotis), 721.
sonorana (Dendroeca), 433.
sonoriensis (Agelaus), 553.
sonorivox (Bambusicola), 817.
sophiæ (Calospiza), 1112.
 — (Leptopœcile), 379.
 — (Saucerottea), 137, 1065.
sordida (Erythrosterna), 292.
sordida (Helminthophaga), 431.
 — (Phæoptila), 139.
 — (Philemon), 726.
 — (Pinarochroa), 388.
 — (Siptornis), 200.
 — (Siva), 347.
 — (Stoparola), 292.
 — (Thlypopsis), 653.
 — (Vireo), 473.
sordidior (Siva), 1088.
sordidus (Anthus), 446.
 — (Artamus), 534.
 — (Cinclus), 419.

- sordidus* (Criniger), 1035.
 — (Halcyon), 109.
 — (Hemicercus), 81.
sordidus (Pericrocotus), 302.
sordidus (Pionus), 6.
sorgophilus (Acrocephalus), 370.
soror (Hydrornis), 207.
 — (Minla), 344.
 — (Pachycephala), 477.
 — (Penthetria), 574.
sororcula (Pachycephala), 478.
 — (Strix), 900.
sororia (Dendroornis), 1071.
 — (Elainea), 241.
 — (Grallaria), 1069.
 — (Hæmophila), 635.
sororia (Lochmias), 202.
sororia (Myrmotherula), 179.
sororius (Sphenocercus), 731.
souancei (Pyrrhura), 13.
soudanensis (Pytelia), 578.
soui (Crypturus), 782.
souimanga (Cinnyris), 698.
souleyeti (Picolaptes), 187.
souliei (Actinodura), 331.
 — (Spelæornis), 426.
soulliei (Cinclus), 419.
soumagnei (Heliodilus), 898.
souzæ (Lanius), 484.
sowerbyi (Stactolæma), 38.
spadicea (Galloperdix), 817.
 — (Hemiphaga), 748.
 — (Zenaida), 757.
spadiceus (Attila), 214.
spaldingi (Orthonyx), 729.
sparganura (Lesbia), 158.
sparmanni (Indicator), 34.
sparsa (Anas), 991.
sparsimfasciata (Astur), 841.
sparsim guttata (Nigrita), 575.
sparverioides (Hierococcyx), 50.
 — (Tinnunculus), 872.
sparverius (Tinnunculus), 871.
spatiator (Grallaria), 170.
spatulata (Coracias), 92.
spatzi (Alcedo), 1062.
spatzi (Caccabis), 807.
 — (Pratincola), 1092.
speciosa (Ardeola), 913.
 — (Columba), 750.
 — (Dacnis), 688.
 — (Dasyrotapha), 338.
 — (Formicivora), 177, 1070.
 — (Geothlypis), 437.
 — (Parula), 1096.
speciosa (Xanthoura), 1105.
speciosus (Falcinellus), 520.
 — (Heliangelus), 155.
 — (Hoplopterus), 935.
 — (Odontophorus), 822.
 — (Pericrocotus), 301.
 — (Ptilopus), 740.
spectabilis (Arremon), 647.
 — (Celeus), 79.
 — (Dryotriorchis), 835.
 — (Elainea), 239.
 — (Eugenes), 148.
 — (Munia), 587.
 — (Selenidera), 44.
 — (Somateria), 1000.
specularis (Anas), 991.
speculifera (Diuca), 642.
speculiferus (Nesospingus), 647.
speculigera (Conothraupis), 646.
 — (Enneocotus), 486, 1103.
 — (Muscicapa), 1079.
spekii (Hyphantornis), 562.
speluncæ (Scytalopus), 166.
spencei (Heliangelus), 155.
spengeli (Psittacula), 15.
sperata (Leptocoma), 700.
sperlingi (Macrodipteryx), 120.
sphenocercus (Lanius), 483.
sphenura (Astur), 840.
sphenura (Tardivola), 639.
sphenura (Vidua), 574.
sphenurus (Haliastur), 862.
sphenurus (Puffinus), 1031.
sphenurus (Sphenocercus), 731.
sphinx (Spizaetus), 849.
spicifer (Lophotriccus), 233.
spiciferus (Pavo), 795.
spilocephala (Ninox), 888.
 — (Scops), 883.
spilocephalus (Scops), 885.
spilodera (Ethomyias), 274.
 — (Petrochelidon), 258.
 — (Rhipidura), 276.
spilogaster (Eleopicus), 76.
 — (Eulomaetus), 850.
spilogastra (Athene), 895.
 — (Francolinus), 808.
 — (Ptilotis), 721.
spilolænius (Francolinus), 808.
pilonota (Ciccaba), 893.
 — (Macholophus), 464.
 — (Ninox), 888.
 — (Salpornis), 684.
pilonotus (Circus), 837.
 — (Creciscus), 971.

- spilonotus* (*Hyphantornis*), 562.
spiloptera (*Geocichla*), 404.
 — (*Porzana*), 968.
 — (*Saroglossa*), 540.
spilopterus (*Centropus*), 55.
spilorhyncha (*Andigena*), 43.
spilorrhoa (*Myristicivora*), 747.
spilothorax (*Circus*), 837.
spilura (*Thryomanes*), 424.
spinescens (*Chrysomitris*), 591.
spinicauda (*Chaetura*), 128.
 — (*Dafila*), 994.
 — (*Orthonyx*), 729.
 — (*Oxyurus*), 201.
 — (*Pachycephala*), 481.
spiniacollis (*Ibis*), 901.
spinoletta (*Anthus*), 447.
spinoides (*Chrysomitris*), 591.
spinosus (*Hoplopterus*), 935.
spinus (*Chrysomitris*), 592.
spixi (*Anodorhynchus*), 10.
 — (*Dendroornis*), 190.
 — (*Synallaxis*), 197.
spiza (*Chlorophanes*), 689.
splendens (*Campophilus*), 81.
 — (*Corvus*), 503.
 — (*Heliodoxa*), 150.
 — (*Malurus*), 367.
 — (*Pyrrhuloxia*), 21.
splendens (*Vidua*), 574.
splendens (*Volatinia*), 619.
splendida (*Euphema*), 26.
 — (*Myzomela*), 715.
splendidissima (*Astrapia*), 519.
splendidum (*Dicaeum*), 677.
splendidus (*Chlorostilbon*), 141.
splendidus (*Cinnyris*), 697.
 — (*Lamprocolius*), 546.
 — (*Platycercus*), 24.
spleniata (*Tephrocorys*), 454.
spodocephalus (*Mesopicus*), 77.
spodiogastra (*Butorides*), 916.
 — (*Myrmeciza*), 175.
spodiogenys (*Fringilla*), 589.
spodiokama (*Turdus*), 402.
spodionota (*Myrmotherula*), 179.
 — (*Ochthoeca*), 226.
spodionotus (*Dysithamnus*), 180.
 — (*Pipilopsis*), 649.
spodiops (*Euscarthmus*), 1075.
spodiptila (*Terenura*), 177.
spodiopygia (*Collocalia*), 129.
spodiostetha (*Atila*), 214.
spodiostethus (*Odontophorus*), 822.
spodiurus (*Pachyrhamphus*), 212.
spodocephala (*Eucometis*), 655.
 — (*Emberiza*), 622.
spodocephalus (*Mesopicus*), 77, 1059.
sponsa (*Ex*), 982.
spraguei (*Neocorys*), 418.
spurius (*Pendulinus*), 556.
 — (*Porphyrocephalus*), 25.
squalida (*Pachycephala*), 479.
squalidus (*Phaethornis*), 132.
 — (*Prionochilus*), 675.
squamata (*Acanthiza*), 366.
 — (*Callipepla*), 818.
 — (*Claudia*), 127.
 — (*Formicivora*), 178.
 — (*Ixidia*), 308.
 — (*Ortalia*), 792.
 — (*Ptilochloris*), 223.
 — (*Rhipidura*), 277.
 — (*Stigmatops*), 719.
squamatum (*Trochalopteron*), 321.
squamatus (*Capito*), 41.
 — (*Francolinus*), 810.
 — (*Gecinus*), 64.
 — (*Merganser*), 1003.
 — (*Picolaptes*), 187.
 — (*Turdinulus*), 1087.
squamiceps (*Argya*), 323.
 — (*Horornis*), 373.
 — (*Hypsipetes*), 316.
 — (*Pseudozosterops*), 713.
squamicollis (*Uroloncha*), 586.
squamicristatus (*Lophotriccus*), 233.
squamifrons (*Sporopipes*), 570.
 — (*Zosterops*), 712.
squamigera (*Geobiasetes*), 92.
 — (*Grallaria*), 171.
 — (*Margarornis*), 191.
squamipila (*Ninox*), 889.
squamosa (*Columba*), 750.
 — (*Myrmeciza*), 174.
 — (*Scardafella*), 762.
squamosus (*Helimaster*), 160.
squamulata (*Ciccaba*), 893.
squamulatus (*Crateropus*), 330.
 — (*Microcerulus*), 430.
 — (*Monarcha*), 290.
 — (*Picumnus*), 81.
stagnatilis (*Butorides*), 916.
 — (*Totanus*), 947.
stairi (*Phlogoenas*), 773.
stampflii (*Sylviella*), 355.
stanleyi (*Chalcostigma*), 156.
stapazina (*Saxicola*), 390.
starki (*Malacotus*), 489.
stavorini (*Chalcopsitta*), 28.

- steerei* (Ceyx), 112.
 — (Oriolus), 527.
 — (Pitta), 208.
steerii (Capito), 41.
 — (Centropus), 55.
 — (Liocichla), 347.
 — (Sarcophanops), 205.
steindachneri (Anthus), 448.
 — (Picumnus), 83.
stejnegeri (Anthus), 447.
 — (Chlorodrepanis), 692.
 — (Chrysomitris), 592.
stejnegeri (Hemignathus), 693.
stejnegeri (Oedemia), 999.
 — (Parus), 1100.
 — (Spindalis), 661, 1111.
 — (Zosterops), 707.
stellæ (Charmosyna), 32.
 — (Picumnus), 1059.
stellaris (Botaurus), 918.
 — (Cistothorus), 425.
 — (Thamnophilus), 183.
stellata (Brachypteryx), 342.
 — (Calyptorhynchus), 2.
 — (Ceryle), 115.
 — (Hypocnemis), 174.
 — (Margarornis), 191.
stellatus (Batrachostomus), 117.
 — (Caprimulgus), 1063.
 — (Myiobius), 245.
 — (Odontophorus), 822.
 — (Tarsiger), 384.
stelleri (Cyanocitta), 511.
 — (Somateria), 1000.
stenocricota (Zosterops), 710.
stenopterus (Chordeiles), 119.
stenorhynchum (Heteropelina), 223.
stenorhynchus (Pomatorhinus), 326.
stenozone (Baza), 867.
stentoreus (Acrocephalus), 368.
stenura (Culicivora), 235.
 — (Gallinago), 952.
 — (Zenaida), 758.
stenurus (Chlorostilbon), 142.
stephani (Chalcophaps), 766.
 — (Graucalus), 295.
stephaniæ (Astrapia), 520.
stephanophorus (Heterhyphantes), 565.
stephensi (Passerella), 635.
stephensi (Vireo), 473.
sterea (Guiraca), 1110.
stevensoni (Accipiter), 847.
stewartæ (Anthoscenus), 1068.
stewarti (Emberiza), 623.
 — (Phalacrocorax), 1009.
stictifrons (Sycobrotus), 565.
stictilæma (Chætura), 128.
 — (Crateropus), 1086.
 — (Tricholæma), 36, 1055.
stictipennis (Ceryle), 115.
stictithorax (Indicator), 34.
stictocephala (Dubusia), 663.
stictocephalus (Pycnopygius), 728.
 — (Thamnophilus), 1070.
stictocorypha (Formicivora), 178.
stictolæmus (Halcyon), 108.
 — (Sittasomus), 191.
stictolophus (Lophornis), 165.
stictonota (Margarornis), 1071.
 — (Scops), 883.
stictoptera (Ceryle), 115.
 — (Myrmeciza), 174.
 — (Rhopoterpe), 172.
 — (Urochroma), 8.
stictopterus (Mecocerculus), 227.
stictoptilus (Automolus), 194.
stictothorax (Eucometis), 655.
 — (Synallaxis), 198.
stictura (Herpsilochmus), 178.
 — (Laniarius), 491.
sticturus (Thamnophilus), 183.
stierlingi (Calamonastes), 1089.
 — (Cinnyris), 698.
 — (Dendropicus), 1058.
 — (Hladopsis), 336.
 — (Psophocichla), 406.
 — (Zosterops), 710.
stigmatophorus (Spermaestes), 576.
stigmatops (Dicrurus), 530.
stigmatothorax (Tricholæma), 36.
stigmatura (Dacnis), 688.
stigmatus (Loriculus), 23.
stoliczkæ (Ægithalus), 467.
 — (Carpodacus), 603.
 — (Certhia), 684.
stoliczkæ (Passer), 598.
stoliczkæ (Turtur), 761.
stolidus (Anous), 1018.
 — (Myiarchus), 251.
stolzmanni (Chlorothraupis), 658.
stolzmanni (Colaptes), 63.
stolzmanni (Hæmophila), 634.
stolzmanni (Oreotrochilus), 147.
stolzmanni (Urothraupis), 650.
stonei (Eluroedus), 523.
stoneyi (Parus), 464.
stormi (Dissoura), 906.
stormsi (Cuculus), 51.
 — (Turdus), 400.
stracheyi (Emberiza), 623.

- stragulatus* (Basileuterus), 440.
straminea (Locustella), 370.
straminea (Serphophaga), 235.
stramineicollis (Gallus), 803.
strangei (Cisticola), 365.
strauchi (Phasianus), 802.
strenua (Geospiza), 608.
 — (Ninox), 889.
 — (Pachycephala), 478.
strenua (Pitta), 209.
strenua (Vireo), 1102.
 — (Zosterops), 712.
strenuus (Attila), 214.
 — (Graucalus), 295.
 — (Hierococcyx), 50.
strepera (Elaenia), 240.
streperus (Acrocephalus), 369.
 — (Chalelasmus), 991.
streptans (Dryonastes), 328.
 — (Phyllostrophus), 314.
 — (Pitta), 208.
streptophora (Lathria), 213.
streptophorus (Francolinus), 808.
streubeli (Cypselus), 126.
striata (Agriornis), 224.
 — (Aplonis), 541.
 — (Butorides), 916.
 — (Dendroeca), 435.
 — (Formicivora), 177.
 — (Geopelia), 762.
 — (Graminicola), 362.
 — (Henicornis), 202.
 — (Hypotaenidia), 961.
 — (Kenopia), 338.
 — (Melospiza), 632.
 — (Neositta), 682.
 — (Siptornis), 200.
 — (Staphidia), 344.
 — (Tanagra), 662.
 — (Uroloncha), 586.
striateps (Automolus), 194.
 — (Dysithamnus), 180.
 — (Embernagra), 638.
 — (Hapalocercus), 234.
 — (Iole), 312.
 — (Macronus), 341.
 — (Muscisaxicola), 230.
 — (Phacelodomus), 196.
 — (Siptornis), 199.
striaticollis (Alethe), 411.
 — (Anabazenops), 193.
striaticollis (Campylorhynchus), 420.
striaticollis (Euscarthmus), 233.
 — (Fulvetta), 346.
 — (Mionectes), 236.
striaticollis (Myiotheretes), 225.
 — (Phacelodomus), 196.
 — (Siptornis), 199.
striatigula (Eroessa), 354.
striatigularis (Dendroornis), 1071.
striatipectus (Bucco), 47.
striatipectus (Melanerpes), 68.
striatipectus (Poliospiza), 599.
 — (Synallaxis), 198.
striativentris (Melanocharis), 676.
striatula (Astur), 839.
striatulus (Trogodytes), 425.
striatus (Alcurus), 307.
 — (Amytis), 349.
 — (Centurus), 69.
 — (Colius), 90.
 — (Crateropus), 330.
striatus (Cuculus), 51.
 — (Dendrotyx), 818.
striatus (Dicurus), 529.
 — (Grammatopila), 329.
 — (Graucalus), 297.
 — (Oriolus), 526.
 — (Turdinulus), 332.
 — (Zosterornis), 339.
striatlandi (Chrysocolaptes), 80.
 — (Cittocinclia), 413.
 — (Gallinago), 954.
 — (Lophostrix), 886.
 — (Picus), 71.
strictipennis (Ibis), 901.
strictothorax (Dysithamnus), 180.
strictus (Chrysocolaptes), 80.
stridula (Syrnium), 890.
stridulus (Campylorhynchus), 420.
 — (Pomatorhinus), 326.
strigata (Otocorys), 452.
strigiceps (Zonotrichia), 626.
strigilata (Formicivora), 177.
strigilatus (Ancistrops), 193.
strigirostris (Didunculus), 775.
strigoides (Podargus), 117.
strigula (Siva), 347.
strigulosus (Crypturus), 783.
striifacies (Xenocichla), 309.
striigularis (Phaethornis), 133.
striolata (Fringillaria), 624.
 — (Hirundo), 255.
 — (Leptasthenura), 201.
 — (Ptilotis), 721.
 — (Strachyrhis), 339.
 — (Thripophaga), 195.
striolatus (Anthus), 446.
 — (Bucco), 47.
 — (Gecinus), 64.

- striolatus* (Hemixus), 1086.
 — (Machæropterus), 222.
 — (Serinus), 600.
strophianus (Heliangelus), 155.
strophiate (Siphia), 293.
 — (Tylas), 317.
*strophiatu*s (Accentor), 381.
*strophiatu*s (Archibuteo), 854.
strophium (Odontophorus), 822.
 — (Ptilopus), 739.
struthersi (Ibidorhynchus), 944.
struthopus (Ortallida), 793.
stuartæ (Floricola), 160.
stuarti (Phaethornis), 133.
stubeli (Chlorostilbon), 142.
 — (Oxygogon), 159.
stuhlmani (Cinnyris), 699.
stuhlmanni (Francolinus), 808.
stuhlmanni (Pedilorhynchus), 266.
 — (Sitagra), 564.
 — (Stilbopsar), 546.
 — (Zosterops), 710.
stulta (Petronia), 596.
sturmi (Ardeiralla), 915.
 — (Pteroglossus), 43.
sturnina (Sturnia), 537.
styani (Chrysophlegma), 1057.
 — (Pomatorhinus), 326.
 — (Siphia), 293.
 — (Suthora), 1101.
 — (Trochaloxyton), 321.
stygius (Asio), 878.
suahelensis (Rallina), 966.
suahelica (Cosmophoneus), 490.
 — (Poicephalus), 9.
 — (Syrnium), 891.
 — (Terpsiphone), 281.
suahelicus (Dryoscopus), 493.
suahelicus (Trachyphonus), 40.
suavis (Cittocincla), 413, 1095.
suavissima (Cyclopsitta), 34.
 — (Pipra), 221.
subadusta (Alseonax), 264.
subaffinis (Phylloscopus), 378.
 — (Tanygnathus), 18.
subalaris (Amblyornis), 525.
 — (Anabazenops), 193.
subalaris (Bradyornis), 287.
subalaris (Cinnyris), 699.
 — (Graucalus), 295.
 — (Lathria), 213.
 — (Macragelæus), 561.
 — (Merula), 396.
 — (Puffinus), 1032.
 — (Xenopipo), 1074.
subalbifrons (Anser), 982.
subalpina (Sylvia), 375.
subandinus (Thamnophilus), 183.
subarcticus (Bubo), 881.
subarquata (Tringa), 950.
subaureus (Hyphantornis), 561.
subbrunneus (Cnipodectes), 245.
subbuteo (Hypobrychis), 872.
subcærulata (Dryonastes), 329.
subcærulea (Chlorestes), 140, 1066.
subcæruleum (Parisoma), 273.
subcastanea (Munia), 587.
subcaudalis (Elurædus), 523.
subcinerea (Tanagra), 662.
subcinnamomea (Euryptila), 350.
subcirris (Picus), 72.
subcorniculatus (Philemon), 726.
subcoronatus (Lanius), 485.
subcristata (Baza), 867.
 — (Lophotriccus), 233.
 — (Lophozosterops), 713.
 — (Serphophaga), 235.
 — (Siptornis), 199.
subcristatus (Tinamus), 781.
subcyanæa (Pæcilodryas), 271.
subcylindricus (Bycanistes), 101.
subelegans (Centurus), 1058.
subfasciata (Glycyphila), 717.
subfasciatus (Thamnophilus), 182.
subflava (Hypocnemis), 173.
 — (Ornithion), 238.
 — (Serphophaga), 236.
subflavescens (Cyanorhamphus), 26.
 — (Cyclorhis), 475.
 — (Myristicivora), 747.
 — (Philydor), 194.
subflavus (Sporæginthus), 581.
subfrenata (Ptilotis), 720.
subfulvus (Philydor), 194.
subfurcata (Chlorostilbon), 141.
subfurcatus (Cypselus), 126.
subgularis (Ptilopus), 736.
subhimalayensis (Propyrrhula), 607.
sublacteus (Laniarius), 492.
sublineata (Graucalus), 296.
submaculata (Pipilo), 637.
subminuta (Tringa), 951.
submoniliger (Anthipes), 294.
subniger (Falco), 875.
subniger (Hypsipetes), 316.
subobscura (Merula), 398.
subochraceum (Pellorneum), 336.
subochraceus (Myiobius), 246.
subocularis (Stigmatops), 718.
subpagana (Elaenia), 239.

- subpersonata* (Motacilla), 1098.
 — (Sitagra), 564.
subplacens (Elaïnea), 240.
 — (Hypocharmosyna), 32.
subplumbeus (Dysithamnus), 180.
subpudica (Synallaxis), 197.
subquadratus (Bycanistes), 101.
subradiata (Thamnophilus), 182.
subrosea (Zosterops), 707.
subrufa (Argya), 323.
subrufescens (Cossypha), 409.
 — (Creciscus), 1118.
 — (Momotus), 94.
subruficapilla (Cisticola), 365.
subruficollis (Rhytidoceros), 102.
 — (Tryngites), 950.
subrufipennis (Thamnomæa), 392.
subspeciosa (Formicivora), 177, 1070.
substriata (Burnesia), 360.
 — (Malacoptila), 48.
subsulphurea (Barbatula), 38.
subtectus (Bucco), 47.
subtuberosa (Tropidorhynchus), 725.
subulata (Orthinocichla), 430.
subulatus (Automolus), 194.
 — (Todus), 95.
subundulata (Munia), 586.
subunicolor (Trochalopteron), 321.
subvinacea (Columba), 753.
subvirgata (Ammodromus), 632.
subviridis (Phyllobasileus), 378.
subviridis (Phyllomyias), 238.
suckleyi (Hypotriorchis), 874.
sudestiensis (Geoffroyus), 117.
suecica (Cyanecula), 383.
suffusa (Suthora), 471.
suinda (Ciccaba), 893.
suiriri (Empidagra), 241.
sukatschewi (Trochalopteron), 322.
sula (Sula), 1012.
sulaense (Dicæum), 677.
sulaensis (Accipiter), 846.
 — (Aprosmictus), 21.
 — (Lamprocorax), 543.
 — (Scops), 884.
 — (Spilornis), 834.
 — (Turacæna), 754.
sulcatus (Aulacorhamphus), 44.
sulcirostris (Crax), 789, 1115.
 — (Crotophaga), 62.
 — (Hypotænidia), 962.
 — (Phalacrocorax), 1008.
sulphurascens (Automolus), 195.
sulphurata (Emberiza), 622.
sulphuratus (Pitangus), 243.
sulphuratus (Serinus), 600.
sulphurea (Cacatua), 2.
 — (Cyanoderma), 1088.
 — (Gerygone), 263.
sulphureipygia (Myiobius), 245, 1077.
sulphureopectus (Cosmophoneus), 490.
sulphurescens (Rhynchocyclus), 242.
sulphureus (Graucalus), 296.
 — (Myiozetetes), 242.
sulphurifera (Siptornis), 200.
sulphuriventer (Pachycephala), 480.
sultanea (Melanichlora), 460.
suluensis (Ceyx), 112.
 — (Dicrurus), 1105.
 — (Oriolus), 526.
 — (Prioniturus), 17.
 — (Thriponax), 82.
sumatrana (Arboricola), 814.
 — (Ardea), 909.
 — (Caloperdix), 814.
 — (Lophura), 798.
 — (Merops), 96.
 — (Niltava), 294.
sumatranum (Dicæum), 677.
sumatranus (Corydon), 205.
 — (Criniger), 311.
 — (Dicrurus), 531.
 — (Hemixus), 315.
 — (Phyllergates), 362.
 — (Rhopodytes), 59.
sumatrensis (Baza), 867.
sumatrensis (Graucalus), 297.
 — (Siphia), 293.
sumbaensis (Merops), 1061.
 — (Strix), 899.
 — (Terpsiphone), 280.
 — (Urospizias), 843.
sumbavensis (Geoffroyus), 16.
sumbawensis (Rhipidura), 278.
 — (Zosterops), 709.
sumbensis (Graucalus), 296.
 — (Rhipidura), 278.
 — (Tanygnathus), 18.
sumichrasti (Aphelocoma), 512.
 — (Catherpes), 428.
 — (Chlorospingus), 1111.
 — (Dives), 559.
 — (Hadrostomus), 211.
 — (Hæmophila), 634.
 — (Saucerotlea), 138.
sumptuosa (Compsocoma), 663.
sundara (Niltava), 294.
sundevalli (Butorides), 916.
 — (Camaroptera), 356.
 — (Cereba), 691.

- sundevalli* (Pyromelana), 572.
sunia (Scops), 883.
superba (Cardinalis), 619.
 — (Erithacus), 382.
 — (Lophorhina), 522.
 — (Menura), 729.
 — (Nestor), 27.
superbus (Anthoscenus), 1068.
 — (Augastes), 159.
 — (Cinnyris), 697.
 — (Notauges), 548.
 — (Ptilopus), 738.
superciliaris (Burnesia), 359.
 — (Camaroptera), 357.
 — (Centurus), 69.
 — (Chlorospingus), 651.
 — (Ciccaba), 893.
 — (Cittocincla), 413.
 — (Cryptolopha), 286.
 — (Drymoedus), 319.
 — (Eumomota), 94.
 — (Hypothymis), 274.
superciliaris (Ixulus), 345.
superciliaris (Leistes), 554.
 — (Leptopogon), 237.
 — (Leptotriccus), 235.
 — (Muscicapula), 294.
superciliaris (Myiodynastes), 244.
superciliaris (Ninox), 889.
 — (Edicnemus), 928.
 — (Oligura), 343.
 — (Ortalia), 793.
 — (Penelope), 791.
superciliaris (Philydor), 193.
superciliaris (Platyrhynchus), 231.
 — (Pseudoxenicus), 1088.
 — (Rallina), 966.
 — (Saltator), 645.
 — (Scytalopus), 167.
 — (Spermophilopsis), 614.
 — (Sterna), 1018.
 — (Sturnopastor), 536.
 — (Suya), 358.
 — (Thryophilus), 421.
superciliaris (Todiostrostrum), 232.
superciliaris (Vireo), 473.
 — (Xiphorhamphus), 326.
 — (Zosterops), 710.
superciliosa (Acanthopneuste), 377.
superciliosa (Anas), 990.
 — (Ceryle), 115.
 — (Climacteris), 685.
 — (Embernagra), 638.
 — (Hæmophila), 633.
 — (Myiobius), 246.
superciliosa (Ochthæca), 226.
 — (Ophrysia), 818.
 — (Parula), 432.
 — (Pæcilodryas), 271.
 — (Synallaxis), 197.
superciliosa (Vidua), 574.
superciliosa (Zosterops), 709.
supercilosus (Acanthorhynchus), 717.
 — (Artamus), 534.
 — (Centropus), 57.
 — (Dasylophus), 60.
 — (Dendrocolaptes), 185.
 — (Enneoctonus), 486.
 — (Heliobletus), 193.
 — (Merops), 97.
 — (Pachyphantes), 567.
 — (Parus), 463.
 — (Phaethornis), 132, 1064.
 — (Phyllobasileus), 378.
 — (Ploceipasser), 569.
 — (Pomatorhinus), 325.
 — (Sarciphorus), 934.
superflua (Galerida), 457.
 — (Rhipidura), 278.
suratensis (Turtur), 761.
surda (Urochroma), 8.
surinamensis (Heliornis), 978.
surinamensis (Hydrochelidon), 1013.
 — (Myrmotherula), 178.
surinamus (Pachyrhamphus), 212.
 — (Tachyphonus), 656.
surucura (Trogon), 87.
susurra (Phaethornis), 1064.
susurrans (Dendroornis), 189.
sutoria (Sutoria), 361.
suvensis (Halcyon), 109.
swainsoni (Bucco), 47.
 — (Buteo), 857.
swainsoni (Circus), 836.
swainsoni (Gampsonyx), 864.
swainsoni (Graucalus), 296.
swainsoni (Halcyon), 107.
 — (Helmitherus), 431.
 — (Momotus), 94.
 — (Muscivora), 244.
 — (Myiarchus), 250, 1078.
 — (Myrmeciza), 174, 1069.
 — (Passer), 598, 1109.
 — (Petrochelidon), 258.
 — (Pternistes), 811.
 — (Ptilopus), 736.
 — (Turdus), 402.
 — (Vireo), 472.
swanzii (Cisticola), 363.
swindereniana (Agapornis), 22.

- swinhoi (Alcippe), 345.
 — (Gennæus), 800.
swinhoi (Macropygia), 754.
swinhoi (Melittophagus), 96.
 — (Pomatorhinus), 326.
sybilla (Pratincola), 387.
sybillæ (Coeligena), 148.
sycorius (Lamprocolius), 547.
sykesi (Lalage), 302.
sykesi (Megalæma), 39.
sylvanus (Oreocorys), 449.
sylvatica (Carpophaga), 744.
 — (Chætura), 128.
 — (Prinia), 359.
 — (Turnix), 778.
sylvaticum (Glaucidium), 897.
sylvaticus (Bradypterus), 350.
sylvestris (Anser), 983.
 — (Cabalus), 962.
 — (Scytalopus), 166.
 — (Urospizias), 843.
sylvia (Pœcilodryas), 271.
sylvia (Sericornis), 367.
 — (Tanyptera), 105.
sylvicola (Phylloscopus), 377.
sylvicola (Scops), 884.
 — (Tephrodornis), 494.
sylvioides (Sittasomus), 191.
sylviola (Leptotriccus), 235.
syndactyla (Xenocichla), 309.
syriaca (Serinus), 601.
 — (Merula), 1092.
 — (Sitta), 680.
syriacus (Picus), 70.
syrinx (Acrocephalus), 369.
syrmatorphorus (Herodias), 912.
syrmatorphorus (Phaethornis), 132.
szalayi (Oriolus), 1105.
szechenyii (Tetraophasis), 806.
tabuensis (Aplonis), 541.
 — (Porzana), 968.
 — (Pyrrhulopsis), 21.
tacazze (Nectarinia), 694.
tachiro (Astur), 841.
taczanowskii (Cinclodes), 202.
 — (Columba), 749.
 — (Elaïnea), 240.
 — (Euphonia), 672.
taczanowskii (Gnathospiza), 602.
 — (Montifringilla), 594.
taczanowskii (Nothoprocta), 784.
 — (Pendulinus), 1106.
 — (Pipilopsis), 649.
 — (Podiceps), 1044.
 — (Siptornis), 200.
taczanowskii (Talaphorus), 135.
tadornoides (Casarca), 989.
tæniata (Dubusia), 663.
tæniata (Ninox), 890.
tæniatus (Microcerculus), 430.
 — (Morphnus), 847.
tæniolæma (Campothera), 66.
tæniolata (Burnesia), 360.
tænionotus (Eleopicus), 76.
tænioptera (Thryophilus), 1095.
tæniopterus (Hyphantornis), 562.
tæniura (Certhia), 683.
 — (Rosthramus), 865.
tagulana (Edoliisoma), 298.
taha (Pyromelana), 572.
tahanensis (Pterythrius), 1103.
tabapisi (Fringillaria), 623.
tahitica (Hirundo), 253.
tahitiensis (Numenius), 945.
 — (Porzana), 968.
taigoor (Turnix), 778.
taitianus (Coriphilus), 30.
taitiensis (Urodynamis), 54.
taivana (Motacilla), 444.
taivanum (Trochalopecton), 322.
taivanus (Garrulus), 510.
 — (Pachycephalixus), 306.
talacoma (Prionops), 497.
talatala (Cinnyris), 698.
talautense (Dicæum), 677.
talautensis (Edoliisoma), 298.
 — (Eos), 28.
 — (Ermotimia), 701.
 — (Prioniturus), 17.
 — (Ptilopus), 1114.
 — (Tanygnathus), 18.
 — (Zeocephus), 280.
talifuensis (Anorthura), 1096.
talischensis (Phasianus), 801.
talpacoti (Columbigallina), 764.
tambillana (Dysithamnus), 180.
tamariceti (Hypolais), 373.
tamatia (Bucco), 47.
tamaulipensis (Icterus), 1107.
 — (Turdus), 401, 1093.
tanagra (Turnagra), 329.
tanagrinus (Lamprosar), 559.
tanganjicæ (Crateropus), 329.
tanki (Turnix), 779.
tannaensis (Cyanorhamphus), 26.
tannaensis (Myiagra), 283.
tannensis (Halcyon), 109.
 — (Ptilopus), 739.
tanneri (Geothlypis), 437.
 — (Troglodytes), 425.

- lanyptra* (Falco), 875.
tao (Tinamus), 781.
tapera (Progne), 259.
tappenbecki (Colluricincla), 496, 1104.
 — (Musciparus), 267.
taprobana (Alcedo), 112.
taranta (Agapornis), 22.
tarda (Otis), 925.
tarimensis (Phasianus), 802.
tarnii (Hylactes), 168.
tarnowskii (Phasianus), 802.
tasmanica (Fulica), 977.
tatao (Calliste), 665.
tatarica (Melanocorypha), 453.
tataupa (Crypturus), 783.
taurica (Acredula), 1101.
tauricus (Tetraogallus), 806.
taviunensis (Ptilotis), 720.
 — (Pyrrhulopsis), 21.
tayazugaira (Nycticorax), 917.
taylori (Aithya), 147.
taylori (Calliste), 668.
 — (Melopyrrha), 618.
 — (Pitangus), 243.
tchagra (Telephonus), 488.
lectus (Bucco), 47.
 — (Sarciophorus), 933.
teesa (Butastur), 859.
teginæ (Pericrocotus), 302.
teitensis (Indicator), 1055.
telasco (Spermophila), 615.
telescopthalmus (Arses), 288.
temmincki (Æthopyga), 695.
temmincki (Anser), 983.
temmincki (Coracias), 93.
 — (Cursorius), 931.
 — (Dendrexetastes), 188.
temmincki (Gallus), 803.
temmincki (Graucalus), 297.
temmincki (Lobatus), 300.
temmincki (Lyncornis), 119.
 — (Myiophoneus), 408.
 — (Picumnus), 83.
 — (Pterophanes), 152.
 — (Ptilopus), 738.
temmincki (Synthliboramphus), 1045.
temmincki (Tragopan), 797.
 — (Tringa), 951.
 — (Yungipicus), 75.
temnurus (Prionotelus), 86.
tempesti (Merula), 397.
temporalis (Ægitha), 583.
 — (Anabazenops), 192.
 — (Heterhyphantes), 565.
 — (Pomatorhinus), 325.
tenebricosa (Strix), 900.
tenebrosa (Agyrtria), 1065.
 — (Chelidoptera), 49.
 — (Colluricincla), 496.
 — (Gallinula), 973.
 — (Gerygone), 1080.
 — (Rhipidura), 278.
tenebrosus (Crateropus), 329.
tenebrosus (Puffinus), 1032.
tenella (Eroessa), 354.
 — (Trogon), 87.
tenellipes (Acanthopneuste), 376.
tenellus (Ægialitis), 940.
tenellus (Tmetothylacus), 448.
tener (Loriculus), 23.
teneriffæ (Parus), 464.
 — (Regulus), 379.
tenerrima (Estrela), 582.
tengmatmi (Nyctala), 893.
tenimberensis (Megapodius), 786.
tenkatei (Acanthiza), 366.
 — (Gerygone), 1080.
 — (Rhipidura), 279.
tentelare (Syma), 110.
tenuifasciatus (Thamnophilus), 182.
tenuipunctatus (Thamnophilus), 182.
tenuirostre (Edoliisoma), 298.
tenuirostris (Acanthiza), 1090.
 — (Acanthorhynchus), 716.
tenuirostris (Ægialitis), 940.
tenuirostris (Anous), 1019.
 — (Cinnamopterus), 545.
tenuirostris (Cuculus), 51.
tenuirostris (Geositta), 201.
tenuirostris (Larus), 1023.
tenuirostris (Macropygia), 754, 1114.
 — (Mitrephanes), 247.
 — (Neositta), 682.
 — (Numenius), 944.
 — (Oriolus), 526.
tenuirostris (Phalacrocorax), 1007.
tenuirostris (Picolaptes), 187.
 — (Platalea), 904.
 — (Puffinus), 1032.
 — (Quiscalus), 560.
 — (Rallus), 959.
 — (Tridactylia), 1058.
 — (Xenocichla), 309.
 — (Xenops), 1072.
 — (Zosterops), 712.
tenuis (Leptotodus), 269.
tephrocephala (Agyrtria), 135.
 — (Cryptolopha), 285.
tephrocotis (Montifringilla), 595.
tephrogenys (Criniger), 310, 1085.

- tephrolæma (Anthreptes), 704.
— (Xenocichla), 310.
tephronota (Acredula), 467.
— (Sitta), 681.
tephronotum (Glancidium), 897.
tephronotus (Lanius), 485.
— (Sycobrotus), 565.
— (Turdus), 399.
tephropleura (Zosterops), 712.
tephrops (Malacocincla), 333.
terat (Lalage), 302.
teresita (Elminia), 281.
teretirostris (Anous), 1019.
terpna (Agyrtia), 136, 1065.
terræ-reginæ (Arses), 288, 1083.
terrestris (Cisticola), 364.
— (Eutrygon), 774.
terrestris (Phyllostrophus), 1085.
terrestris (Synallaxis), 198.
terricolor (Centurus), 69.
— (Ninox), 890.
tersa (Procnias), 670.
tertia (Aulia), 1074.
— (Graculipica), 537.
tessellatus (Troglodytes), 426.
testacea (Pyranga), 658.
tethys (Procellaria), 1028.
tetraoninus (Francolinus), 810.
tetrax (Otis), 925.
tetrix (Lyrurus), 826.
texana (Aphelocoma), 1105.
— (Colinus), 820.
— (Pyrrhuloxia), 619.
texensis (Chordeiles), 119.
— (Lophophanes), 465.
— (Myiozetetes), 241.
textilis (Amytis), 349.
textrix (Cisticola), 364.
teydea (Fringilla), 589.
teysmanni (Cyrtosomus), 703.
— (Osmotreron), 734.
— (Pachycephala), 479.
— (Rhipidura), 278.
thagus (Pelecanus), 1006.
thalassina (Butorides), 115.
thalassina (Cissa), 509.
— (Petasophora), 145.
thalassina (Plegadis), 903.
— (Stoparola), 291.
thalassina (Tachycineta), 256.
thalassinoides (Stoparola), 292.
thalloni (Thamnotæa), 392.
thamnophiloides (Attila), 214.
thamnophilus (Dryoscopus), 493.
tharus (Polyborus), 832.
thaumantias (Polytmus), 146.
thaumasta (Zodalia), 1068.
thayeri (Parus), 1100.
thecklæ (Galerida), 457.
thenca (Mimus), 415.
theoides (Criniger), 311.
theomacha (Ninox), 889.
theresæ (Hermotimia), 701.
— (Hypocnemis), 174.
theresiæ (Metallura), 1067.
— (Polytmus), 1066.
thibetana (Calandrella), 453.
— (Chrysomitris), 593.
— (Corvus), 502.
thierryi (Centropus), 1057.
— (Passer), 598.
thilius (Agelæus), 553.
thiogaster (Lybius), 1055.
thomassoni (Mernula), 397.
thomensis (Chætura), 1064.
— (Columba), 750.
— (Corythornis), 1062.
— (Elæocerthia), 702.
— (Estrela), 582.
— (Nectarinia), 694.
— (Strix), 900.
thompsoni (Cerasophila), 1086.
thomsoni (Erythrocerus), 275.
thomsoni (Manucodia), 517.
thoracica (Apalis), 352.
— (Ægialitis), 941.
— (Bambusicola), 817.
— (Calliste), 665.
— (Lusciniola), 371.
— (Ochthoeca), 226.
— (Poospiza), 628.
— (Strachyrlhis), 339.
thoracicus (Cyphorhinus), 429.
— (Dactylortyx), 821.
— (Formicarius), 172.
— (Hylophilus), 474, 1102.
— (Liosceles), 167.
— (Prionochilus), 675.
— (Thryophilus), 422.
— (Xiphorhynchus), 187.
thornei (Francolinus), 1116.
thorpii (Gerygone), 268.
threothorax (Rhipidura), 278.
thruppi (Parus), 461.
thura (Carpodacus), 604.
thyroideus (Sphyrapicus), 70.
tianduana (Pachycephala), 1102.
tibetana (Sterna), 1015.
tibetanum (Crossoptilon), 799.
tibetanus (Myiophonus), 408.

- tibetanus (Syrrhaptes), 776.
 — (Tetraogallus), 806.
 tibialis (Astur), 840.
 — (Atticora), 258.
 — (Buarremon), 648.
 — (Lorius), 29.
 — (Pendulinus), 556.
 — (Pheucticus), 611.
 tibialis (Rhectes), 494.
 tibicen (Gymnorhina), 500.
 tickelli (Anorrhinus), 102.
 — (Drymocataphus), 334.
 — (Iole), 312.
 tickelliae (Siphia), 293.
 tickellii (Pomatorhinus), 326.
 tige (Tiga), 78.
 tigrina (Mirafra), 456.
 — (Perissoglossa), 435.
 tigrina (Tigrisoma), 919.
 tigrinus (Enneoctonus), 457.
 — (Turtur), 761.
 timida (Empidonax), 1077.
 — (Passer), 598.
 timneh (Psittacus), 3.
 timoriensis (Edolisoma), 299.
 — (Herodias), 912.
 — (Lalage), 302.
 — (Megalurus), 351.
 — (Petrochelidon), 258.
 timoriensis (Sphecotheres), 528.
 timoriensis (Tropidorhynchus), 725.
 timorlaoensis (Baza), 867.
 — (Geoffroyus), 17.
 — (Graucalus), 296, 1034.
 — (Macropygia), 754, 1114.
 — (Philemon), 726.
 tincta (Camaroptera), 356, 1089.
 tingitanus (Corvus), 502.
 tinniens (Cisticola), 364.
 tinnunculus (Celeus), 79.
 tinnunculus (Tinnunculus), 870.
 tinoclora (Panoplitus), 1067.
 tinus (Accipiter), 845.
 tiphia (Ægithina), 341.
 tirica (Brotogeris), 15.
 titihs (Synallaxis), 199.
 titys (Ruticilla), 385.
 tjindanae (Geoffroyus), 117.
 tobaci (Agyrtria), 135, 1065.
 tobaci (Saucerotlea), 137.
 tobagensis (Formicivora), 1070.
 — (Mimus), 1095.
 — (Trogodytes), 425.
 tocard (Rhamphastos), 42.
 toco (Rhamphastos), 42.
 togata (Bonasa), 823.
 togoensis (Hirundo), 254, 1079.
 togoensis (Trachyphonus), 41.
 toitoi (Petroeca), 267.
 tolimæ (Speotyto), 895.
 tombacea (Galbula), 45.
 tomentosa (Mitua), 790.
 topela (Munia), 587.
 torda (Alca), 1043.
 torotoro (Syma), 110.
 torquata (Bourcieria), 151.
 — (Ceryle), 115.
 — (Chamæospiza), 635.
 torquata (Columba), 751.
 torquata (Gampsorhynchus), 323.
 torquata (Glareola), 929.
 torquata (Halcyon), 107.
 — (Hydropsalis), 120.
 — (Hypotaenidia), 962.
 — (Malacoptila), 47.
 — (Merula), 395.
 — (Pachycephala), 478.
 — (Palæornis), 19.
 — (Poospiza), 628.
 — (Pratincola), 387.
 torquata (Pulsatrix), 892.
 torquata (Querquedula), 994.
 — (Rhopoterpe), 172.
 — (Setophaga), 441.
 — (Streptocitta), 544.
 — (Synallaxis), 199.
 torquatus (Acridotheres), 538.
 torquatus (Ægialitis), 939.
 torquatus (Asyndesmus), 68.
 — (Buarremon), 647.
 — (Celeus), 79.
 — (Corvus), 503.
 — (Cracticus), 501.
 — (Lanioturdus), 270.
 — (Melidectes), 727.
 — (Neolestes), 488.
 — (Pedionomus), 779.
 — (Phasianus), 802, 1115.
 — (Pogonorhynchus), 36.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Thamnophilus), 182.
 — (Urospizias), 843.
 torqueola (Arboricola), 813.
 — (Spermophila), 616.
 — (Staphidia), 344.
 torquilla (Yunx), 85.
 torrejoni (Chlorophonia), 671.
 torrida (Mirafra), 455.
 torrida (Rhipidura), 1081.
 torridus (Attila), 214.

- torridus* (Caprimulgus), 124.
 — (Furnarius), 203.
 — (Oryzohorus), 613.
 — (Selasphorus), 162.
torringtonia (Columba), 751.
toruensis (Butalis), 1079.
totta (Chrysomitris), 593.
toulsoni (Cypselus), 126.
toussenelii (Astur), 841.
tovi (Brotogerys), 15.
townsendi (Brachyrhamphus), 1044.
townsendi (Dendroeca), 434.
 — (Geospiza), 609.
 — (Junco), 629.
 — (Lagopus), 827.
 — (Myiadectes), 407.
 — (Plectrophanes), 624.
 — (Spindalis), 661.
 — (Spiza), 639.
 — (Thaluranina), 143.
trachelopyrus (Campophilus), 81.
trachyrhynchus (Pelecanus), 1006.
trailli (Empidonax), 248, 1077.
 — (Psaropholus), 528.
tranquebarica (Turtur), 761.
tranquilla (Geopelia), 762.
transandeanus (Thamnophilus), 184.
transandina (Leptopogon), 237.
transcaspica (Otocorys), 1098.
transcaspica (Passer), 1109.
transcaspicus (Parus), 461.
transfasciatus (Crypturus), 784.
transfluvialis (Scaerhynchus), 1101.
transvaalensis (Mirafr), 456.
 — (Numida), 804.
 — (Poicephalus), 9.
traversi (Bradyornis), 1082.
 — (Miro), 270.
 — (Phalacrocorax), 1009.
traversii (Urobrachya), 573.
traviesi (Helianthea), 151.
treacheri (Rhinocichla), 327.
trepidus (Empidonax), 1078.
triangularis (Dendroornis), 189.
tricarunculatus (Chasmorhynchus), 219.
trichas (Geothlypis), 437, 1097.
tricholopha (Popelairea), 1068.
tricholopha (Prymnacantha), 165.
trichopsis (Scops), 886.
trichroa (Erythrura), 583.
tricollaris (Oxyechus), 939.
tricolor (Agelæus), 553.
 — (Alectrurus), 228.
 — (Ara), 10.
 — (Ardea), 911.
tricolor (Calliste), 665.
 — (Centurus), 69, 1058.
 — (Cinnamopteryx), 561.
 — (Cittocincl), 1094.
 — (Cœreba), 690.
 — (Criniger), 311.
 — (Dryoscopus), 493.
 — (Ephthianura), 376.
 — (Erythrura), 584.
 — (Furnarius), 203.
 — (Lalage), 302.
tricolor (Lobivanellus), 934.
tricolor (Myiarchus), 251.
 — (Phalaropus), 957.
 — (Pipilopsis), 649.
 — (Podiceps), 1040.
 — (Pycnonotus), 305.
 — (Pyrrhurus), 1085.
 — (Rallina), 966.
tricolor (Sarcidiornis), 980.
tricolor (Sarciophorus), 933.
 — (Sigmoidus), 498.
 — (Terpsiphone), 281.
 — (Xanthopygia), 272.
tridactyla (Ceyx), 111.
 — (Jacamaralcyon), 46.
 — (Rissa), 1027.
 — (Tridactylia), 72, 1058.
trifasciatus (Basileuterus), 439.
 — (Carpodacus), 603.
 — (Microspingus), 650.
 — (Nesomimus), 416.
trigemina (Ptilopus), 738.
trigonostigma (Dicæum), 679.
trimaculatus (Caprimulgus), 1063.
trinitatis (Euphonia), 672.
 — (Estrelata), 1035.
 — (Rhamphocænus), 177.
 — (Spermophila), 617.
 — (Thamnophilus), 182.
trinotatus (Astur), 841.
tristigma (Caprimulgus), 123, 1063.
tristigmata (Phlogœnas), 772.
tristis (Acridotheres), 537.
 — (Chrysomitris), 591.
 — (Leptopogon), 237.
 — (Miglyptes), 77.
 — (Phylloscopus), 378.
 — (Regulus), 379.
 — (Rhodydytes), 58.
 — (Thamnophilus), 183.
 — (Turdus), 401.
tristissima (Uroloncha), 586.
tristrami (Amydrus), 545.
 — (Dicæum), 678.

- tristrami (Edoliisoma), 1084.
 — (Emberiza), 623.
tristrami (Gallinago), 954.
 tristrami (Halcyon), 109.
 — (Myzomela), 716.
 — (Nasiterna), 1054.
 — (Oceanodroma), 1029.
 — (Ptilopus), 738.
 tristriata (Poliospiza), 599.
 tristriatus (Basileuterus), 439.
 triton (Cacatua), 2.
 triurus (Minus), 415.
 trivialis (Anthus), 445.
 trivirgata (Acredula), 466.
 — (Conopias), 242.
 — (Cryptolopha), 285.
 trivirgatus (Astur), 840.
 — (Monarcha), 289.
 trivittata (Phlogopsis), 172.
 trobriandi (Cacatua), 2.
 — (Pachycephalopsis), 481.
 trocaz (Columba), 751.
 trochilrostris (Xiphorhynchus), 186.
trochiloides (Acanthopneuste), 377.
 trochiloides (Gerygone), 269.
 trochilus (Phylloscopus), 377.
 troglodytes (Anorthura), 427.
 — (Collocalia), 130.
troglodytes (Cisticola), 363.
 troglodytoides (Spelaornis), 426.
 — (Synallaxis), 199.
 troile (Uria), 1043.
 tropica (Turtur), 1114.
 tropicalis (Accipiter), 845.
 — (Melenornis), 287.
 — (Mirafrax), 456.
 — (Turdus), 399.
 trothæ (Dioptornis), 1082.
 trudeau (Sterna), 1018.
 truncatus (Temnurus), 509.
 tschebaiewi (Calliope), 383.
tschudii (Capito), 42.
 tschudii (Piprites), 219.
 — (Pyrausta), 658.
 — (Thalassidroma), 143.
 — (Thamnophilus), 183.
 tschusii (Lyrurus), 826.
tschusii (Parus), 1100.
 tuberosa (Mitua), 790.
 tucanus (Rhamphastos), 42.
 tucumana (Chrysotis), 6.
 — (Columba), 751.
 — (Cyanocorax), 514.
 tucuyensis (Dysithamnus), 180.
 tui (Brologerys), 16.
 tuipara (Brologerys), 16.
 tukki (Miglyptes), 77.
 tullbergi (Campothera), 66.
 tumbezana (Myiopatis), 238.
 tumulus (Megapodius), 787.
 tumultuosus (Pionus), 7.
 turalii (Laniarius), 492.
 turcestanica (Phasianus), 802.
 turcomana (Bubo), 880.
 — (Perdix), 812.
 turcosa (Irena), 317.
 — (Cyanolyca), 513.
 — (Siphia), 293, 1083.
 turdina (Automolus), 195.
 — (Dendrocincla), 186.
 turdinum (Heteropelma), 223.
 turdinus (Harporhynchus), 417.
 turdinus (Ptyrticus), 408.
 — (Pyrrhurus), 1085.
 turdoides (Acrocephalus), 368.
 turdoides (Cataponera), 328.
 turneri (Gennæus), 1115.
 turneri (Merganetta), 1002.
 — (Parus), 463.
 turricula (Columba), 749.
 turtur (Macropygia), 755.
 — (Prion), 1037.
 tusalia (Macropygia), 754.
 tutuila (Halcyon), 109.
 tutus (Todarhamphus), 110.
 tweeddalei (Pernis), 866.
 tweeddali (Irena), 317.
 tygus (Bonapartia), 307.
typhon (Ardea), 909.
 typica (Abeillia), 164.
 — (Deconychura), 190.
 — (Ellisia), 351.
 — (Saucerottea), 137.
 typicus (Corvus), 501.
 — (Gymnogenys), 835.
 typus (Trichophoropsis), 315.
 tyrannina (Cercomaera), 176.
 — (Dendrocincla), 186.
 tyrannula (Herpornis), 347.
 tyrannulus (Myiarchus), 250.
 tyrannus (Milvulus), 252.
 — (Spizaetus), 848.
tyrannus (Tyrannus), 252.
 tyrianthina (Metallura), 156.
 tyro (Dacelo), 105.
 tytleri (Hirundo), 253.
 — (Hypothymis), 274.
 — (Lamprocorax), 543.
tytleri (Muscicapa), 263.
 tytleri (Palaornis), 20.

- tytleri (Phylloscopus), 378.
 ugandæ (Barbatula), 37.
 — (Burnesia), 360.
 — (Passer), 598.
 — (Scops), 883.
 ugiensis (Pomarea), 291.
 uhehensis (Columba), 749.
 — (Numida), 804.
 ukambensis (Erythropygia), 1094.
 ulietanus (Cyanorhamphus), 26.
 ulietensis (Aplonis), 542.
 — (Merula), 398.
 ultramarina (Aphelocoma), 512.
 — (Daenis), 687.
 — (Hypochaera), 574.
 — (Parus), 464, 1101.
 ultramarinus (Coriphilus), 30.
 uluensis (Francolinus), 809.
 — (Hyphantornis), 1107.
 ulula (Surnia), 894.
 umbelloides (Bonasa), 823.
 umbellus (Bonasa), 823.
 umbratilis (Scops), 885.
 umbretta (Sclerurus), 191.
 — (Scopus), 909.
 umbrina (Automolus), 194.
 — (Buteo), 1116.
 — (Syrnium), 891.
 — (Thryothorus), 423.
 umbriniceps (Chloropeta), 1081.
 umbrinus (Corvus), 502, 1104.
 umbrosa (Formicarius), 172.
 umbrovirens (Cryptolopha), 286.
 unalaschensis (Passerella), 635.
 unalaschkensis (Hirundo), 1078.
 unappendiculatus (Casuarius), 1051.
 uncinata (Lanius), 484.
 uncinatus (Leptodon), 866.
 undatus (Celeus), 79.
 — (Melizophilus), 375.
 — (Pogonorhynchus), 36.
 underwoodi (Selasphorus), 162.
 — (Spathura), 153.
 undina (Eudiptula), 1048.
 undosus (Calamonastes), 352.
 undulata (Alseonax), 264.
 — (Anas), 990.
 undulata (Coturnicops), 970.
 undulata (Gallinago), 954.
 — (Glycyphila), 717.
 — (Houbara), 927.
 undulata (Muscicapa), 263.
 undulata (Picumnus), 84.
 undulata (Zebrius), 915.
 undulatus (Crypturus), 783.
 undulatus (Melopsittacus), 27.
 — (Rhytidoceros), 102.
 unduliger (Thamnophilus), 184.
 unduliventer (Astur), 841.
 ungava (Parus), 463.
 unibrunnea (Cinnicerthia), 419.
 uncineta (Columba), 749.
 uncinetus (Parabuteo), 858.
 unicolor (Amblyospiza), 570.
 — (Aphelocoma), 512.
 — (Buteo), 857.
 — (Campylorhynchus), 420.
 — (Chamaepetes), 794.
 unicolor (Chloropipo), 219.
 unicolor (Circus), 837.
 — (Cnipolegus), 229.
 — (Corvus), 1105.
 — (Cosmopsarus), 544.
 — (Cyanorhamphus), 26.
 — (Cypselus), 125.
 — (Dysithamnus), 180.
 — (Hæmatopus), 932.
 — (Haplospiza), 627.
 — (Heteromorpha), 470.
 — (Melanocharis), 676.
 — (Merula), 398.
 — (Myiadectes), 407.
 — (Myrmotherula), 179.
 — (Phrygilus), 641.
 — (Ptilotis), 722.
 — (Scytalopus), 166.
 — (Siphia), 292.
 — (Sturnus), 535.
 unimodus (Graucalus), 297.
 uniformis (Chloropipo), 219.
 — (Haplospiza), 627.
 — (Porzana), 969.
 unirufa (Cinnicerthia), 419.
 — (Lathria), 213.
 — (Synallaxis), 198.
 unirufus (Centropus), 57.
 unirufus (Homorus), 195.
 unitorques (Malacoptila), 47.
 unwini (Caprimulgus), 122.
 upcheri (Hypolais), 373.
 uralense (Syrnium), 890.
 uralensis (Sitta), 680.
 uralensis (Tetrao), 825.
 uraniæ (Rhipidura), 277.
 urbica (Chelidon), 256.
 urichi (Mecocerculus), 1075.
 urinatrix (Halodroma), 1037.
 urochrysea (Chalybura), 144.
 urogallides (Tetrao), 825.
 urogalloides (Tetrao), 825.

- urogallus* (Tetrao), 825.
urophasianus (Centrocercus), 824.
urophasianus (Dafila), 994.
uropygialis (Acanthiza), 366.
 — (Arachnothera), 1113.
 — (Attila), 214.
 — (Barbatula), 37.
 — (Basileuterus), 440.
 — (Cassicus), 551.
 — (Centurus), 69.
 — (Chirocylla), 213.
 — (Chrysomitris), 592.
 — (Cœreba), 691.
 — (Collocalia), 130.
uropygialis (Garrulax), 327.
 — (Limosa), 945.
uropygialis (Mecocerculus), 227.
 — (Nigrita), 575.
uropygialis (Numenius), 944.
uropygialis (Pachyrhamphus), 212.
 — (Pardalotus), 674.
 — (Pheucticus), 611.
 — (Pseudochloris), 639.
 — (Rhamphocelus), 660.
 — (Rhectes), 494.
 — (Stelgidopteryx), 260.
 — (Trachyphonus), 41.
 — (Zosterops), 711.
urosticta (Myrmotherula), 179.
urostictus (Poliolophus), 307.
ursulæ (Cyanomitra), 1112.
urubitinga (Rhinogryphus), 828.
 — (Urubitinga), 861.
urumutum (Nothocrax), 790.
usneæ (Parula), 432.
ussleri (Artomyias), 265.
 — (Butalis), 262, 1079.
 — (Chætura), 128.
 — (Indicator), 1055.
 — (Pitta), 208.
 — (Scotopelia), 879.
 — (Telephonus), 489.
ussurianus (Horornis), 373.
usla (Scops), 885.
usticollis (Eremomela), 355.
ustulata (Turdus), 402.
ustulatus (Microcerculus), 430.
uvæensis (Nymphicus), 27.
vaalensis (Anthus), 446.
vagans (Creciscus), 971.
 — (Halcyon), 109.
 — (Hierococcyx), 1056.
vaillanti (Gecinus), 64.
valdizani (Eleopicus), 76.
validirostris (Lanius), 485.
 — (Melithreptus), 714.
 — (Upucerthia), 203.
 — (Yungipicus), 75.
validissimus (Corvus), 504.
validus (Attila), 214.
 — (Chrysocolaptes), 80.
 — (Corvus), 504.
 — (Dendrocolaptes), 185.
validus (Hadrostromus), 211.
validus (Myiarchus), 250.
 — (Pachycoccyx), 50.
vallicola (Lophortyx), 819.
vallisneria (Ethya), 997.
vandepolli (Carpophaga), 744.
 — (Pachycephala), 480.
vanikorensis (Merula), 395-96.
vanikorensis (Myiagra), 283.
vanwycki (Carpophaga), 745.
varia (Ceryle), 114.
 — (Enneoctonus), 486.
 — (Grallaria), 170.
 — (Mniotilta), 432.
 — (Oreocincla), 403.
 — (Turnix), 779.
variabilis (Fringillaria), 624.
variabilis (Parra), 958.
 — (Tringa), 951.
varians (Crypsirhina), 508.
variegata (Casarca), 989.
 — (Dendrocolaptes), 185.
 — (Eos), 1054.
variegata (Formicivora), 177.
variegata (Legatus), 241.
 — (Mesœnas), 959.
 — (Ninox), 889.
 — (Numenius), 944.
variegata (Spatula), 995.
variegata (Sula), 1012.
variegaticeps (Anabazenops), 192.
 — (Thamnophilus), 182.
variegatum (Trochalopteron), 321.
variegatus (Alcippe), 345, 1088.
 — (Campylorhynchus), 420.
 — (Chasmorhynchus), 219.
 — (Crypturus), 783.
 — (Cuculus), 1056.
variegatus (Geospiza), 609.
variegatus (Indicator), 34.
 — (Melittophagus), 96.
 — (Pterocles), 777.
 — (Trogon), 87.
variolosus (Cacomantis), 52.
varius (Empidonomus), 252.

- varius* (Euneoctonus), 1103.
 — (Fregilupus), 548.
 — (Gallus), 803.
 — (Hierococcyx), 50.
varius (Oporornis), 436.
varius (Parus), 461.
 — (Phalacrocorax), 1010.
 — (Sphyrapicus), 69.
vasa (Coracopsis), 4.
vassori (Procnopis), 669.
valensis (Clytorhynchus), 499.
vaughani (Acrocephalus), 1090.
vaughani (Tutare), 1090.
vauxi (Chætura), 128.
vegæ (Larus), 1025.
vegeta (Zosterops), 712.
vegelus (Corvus), 504.
velata (Geothlypis), 437.
 — (Tænioptera), 225.
velatum (Philentoma), 281.
velatus (Henicurus), 450.
 — (Hyphantornis), 562.
velia (Tanagrella), 670.
velox (Psalidoprocne), 259.
velox (Sterna), 1016.
velox (Turnix), 779.
velutina (Pipra), 221.
velutinus (Surniculus), 50.
velvetina (Oedemia), 999.
venatica (Ninox), 888.
venatoria (Cissa), 508.
venerata (Gracula), 539.
veneratus (Tudirhamphus), 110.
venezuelæ (Momotus), 94.
venezuelana (Chlorospingus), 650.
venezuelensis (Embernagra), 638.
 — (Geotrygon), 771.
 — (Merula), 396.
 — (Molothrus), 552.
venezuelensis (Myiadectes), 407.
venezuelensis (Phyllomyias), 1076.
 — (Pipidea), 669.
 — (Xiphorhynchus), 1070.
ventralis (Accipiter), 846.
 — (Buteo), 856.
 — (Chrysotis), 6.
 — (Eriocnemis), 153.
 — (Hoplopterus), 935.
 — (Phylloscartes), 234.
 — (Tribonyx), 973.
venusta (Ægialitis), 940.
 — (Calliste), 668.
 — (Chloropsis), 318.
 — (Dacnis), 688.
venusta (Euphema), 25.
 — (Pitta), 208.
 — (Thalurania), 143.
venustulus (Parus), 461.
venustus (Artamus), 534.
 — (Cinnyris), 698.
 — (Granatellus), 438.
veræcrucis (Centurus), 1057.
veræpacis (Automolus), 194.
veræ-pacis (Heteropelma), 223.
veræ-pacis (Malacoptila), 48.
veraguensis (Basileuterus), 440.
 — (Geotrygon), 771.
 — (Hemistephania), 131.
 — (Lampornis), 145.
 — (Odonotophorus), 822.
veredus (Charadrius), 938.
verecunda (Turdus), 1094.
vermiculatus (Edicnemus), 928.
vermiculatus (Scops), 885.
vermivorus (Basileuterus), 439.
 — (Helmitherus), 431.
vernalis (Loriculus), 22.
vernans (Osmotreron), 734.
verreauxi (Aquila), 851.
 — (Baza), 867.
 — (Bubo), 881.
 — (Carpodacus), 603.
 — (Coua), 60.
 — (Criniger), 310.
 — (Dryoscopus), 493.
 — (Elæocerthia), 702.
 — (Leptoptila), 769.
 — (Lophornis), 165.
 — (Pholidauges), 541.
 — (Rhipidura), 276.
verreauxi (Suthora), 471.
verreauxi (Turdus), 399.
verreauxius (Trichoglossus), 31.
verrucosa (Phalacrocorax), 1009.
versicolor (Calliste), 666.
 — (Capito), 41.
 — (Columba), 752.
 — (Chrysotis), 4.
 — (Cyanospiza), 627.
 — (Ergaticus), 440.
 — (Lanio), 656.
 — (Megalaema), 38.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Phasianus), 802.
 — (Ptilotis), 721.
 — (Querquedula), 992.
 — (Quiscalus), 559.
 — (Rhipidura), 277.

- versicolor* (*Trachyphonus*), 40.
— (*Trichoglossus*), 31.
— (*Urospizias*), 842.
versteri (*Poicephalus*), 9.
— (*Pristorhamphus*), 676.
verticalis (*Chlorospingus*), 651.
— (*Cossypha*), 409.
— (*Creurgops*), 655.
— (*Cyanomitra*), 702.
— (*Cyanomyia*), 139.
— (*Embernagra*), 638.
— (*Monarcha*), 290.
— (*Prioniturus*), 17.
— (*Pyrrhuloxia*), 459.
— (*Setophaga*), 441.
— (*Tyrannus*), 252.
— (*Vireolanius*), 475.
verticata (*Serphophaga*), 235.
verticeps (*Thalurania*), 143, 1066.
vesper (*Rhodops*), 160.
vespertina (*Hesperiphona*), 610.
vespertinus (*Erythropus*), 872.
vestita (*Eriocnemis*), 153.
veterum (*Porphyrio*), 975.
vetula (*Muscipipra*), 229.
— (*Ortalida*), 793.
— (*Saurothera*), 57.
vexator (*Tyrannus*), 252.
vexillarius (*Macrodipteryx*), 120.
vicaria (*Pœcilodryas*), 272.
vicina (*Ptilopus*), 741.
vicinia (*Contopus*), 219.
vicinior (*Vireo*), 472.
victa (*Rallina*), 966.
victor (*Chrysœnas*), 741.
victoria (*Goura*), 775, 1115.
victoriæ (*Lamprolia*), 392.
— (*Menura*), 729.
— (*Psalidoprymna*), 158, 1067.
— (*Ptilorhis*), 521.
victorini (*Compsocoma*), 663.
— (*Phlexis*), 349.
vidali (*Halcyon*), 109.
vidua (*Campophaga*), 301.
— (*Harpactes*), 88.
— (*Monarcha*), 289.
— (*Motacilla*), 443.
— (*Rhipidura*), 279.
viduata (*Dendrocygna*), 987.
— (*Myrmotherula*), 179.
vieilloti (*Calliste*), 667.
— (*Dendroeca*), 433, 1097.
— (*Lophura*), 799.
— (*Pogonorhynchus*), 36.
vieilloti (*Saurothera*), 57.
vieillotides (*Myiobius*), 245.
vigil (*Rhinoplax*), 99.
vigilantis (*Rallus*), 961.
vigorsi (*Æthopyga*), 695.
— (*Heterotetrax*), 925.
— (*Pitta*), 207.
vigua (*Phalacrocorax*), 1008.
viguieri (*Dacnis*), 688.
vilissimus (*Tyranniscus*), 239.
villavicensio (*Campylopterus*), 134.
villosa (*Myiobius*), 245.
— (*Sitta*), 681.
villosus (*Picus*), 71.
vina (*Columba*), 751.
vinacea (*Acredula*), 467.
— (*Chrysotis*), 4.
— (*Columba*), 753.
— (*Lagonosticta*), 578.
— (*Phœnicotheraupis*), 657.
— (*Scops*), 886.
vinaceigula (*Ardea*), 910.
vinaceigularis (*Prionops*), 497.
vinaceiventris (*Leptoptila*), 770.
vinaceo-rufa (*Zenaida*), 758.
vinaceus (*Carpodacus*), 603.
— (*Turtur*), 760.
vincens (*Prionochilus*), 675.
vindhiana (*Aquila*), 852.
vinipectus (*Alcippe*), 345.
vinitincta (*Merula*), 398.
viola (*Heliangelus*), 155.
violacea (*Euphonia*), 673.
— (*Geotrygon*), 770.
— (*Loxigilla*), 613.
— (*Musophaga*), 90.
— (*Nyctanassa*), 918.
— (*Sturnia*), 537.
violaceicollis (*Euphonia*), 672.
violaceus (*Anthobaphes*), 695.
— (*Centropus*), 55.
— (*Corvus*), 504.
— (*Cyanocorax*), 514.
violaceus (*Gallus*), 803.
— (*Phalacrocorax*), 1007.
violaceus (*Ptilonorhynchus*), 522.
violajugulum (*Trochilus*), 162.
violea (*Cassidix*), 1106.
violiceps (*Cyanomyia*), 139.
violicollis (*Casuaris*), 1051.
— (*Heliangelus*), 155.
violifera (*Helianthea*), 151.
violilavata (*Tanagra*), 662.
vioscæ (*Columba*), 751.

- virago* (*Cyclopsitta*), 33.
viens (*Andropadus*), 313.
 — (*Chlorodrepanis*), 692.
 — (*Contopus*), 249.
 — (*Dendroeca*), 434.
 — (*Icteria*), 438.
 — (*Megalæma*), 38.
 — (*Sylviella*), 354.
 — (*Zosterops*), 710.
virenticeps (*Buarremon*), 648.
 — (*Chrysotis*), 4.
 — (*Cyclorhis*), 476.
vireo (*Nicator*), 493.
vireoninus (*Empidochanes*), 1077.
viresens (*Brotogerys*), 15.
 — (*Butorides*), 916.
 — (*Cacomantis*), 52.
 — (*Dicaeum*), 679.
 — (*Empidonax*), 1078.
 — (*Gerygone*), 269.
 — (*Hemixus*), 315.
 — (*Heteropelma*), 223.
 — (*Hypsipetes*), 316.
 — (*Myiozetetes*), 1077.
 — (*Pendulinus*), 557.
virescens (*Phyllomyias*), 237.
virescens (*Pipilo*), 637.
 — (*Pipra*), 221.
 — (*Pseudoleistes*), 554.
 — (*Ptilotis*), 722.
virgata (*Aphriza*), 949.
 — (*Ciccaba*), 893.
 — (*Formicivora*), 178.
 — (*Siptornis*), 200.
 — (*Sterna*), 1014.
 — (*Xiphocolaptes*), 188.
virgaticeps (*Thripadectes*), 193.
virgatum (*Trochalopteron*), 322.
virgatus (*Accipiter*), 846.
 — (*Philydor*), 194.
 — (*Tephrodornis*), 494.
 — (*Thamnophilus*), 1070.
virginalis (*Lampornis*), 146.
 — (*Pitta*), 208.
 — (*Trogon*), 1060.
virginiae (*Helminthophaga*), 431.
virginianus (*Bubo*), 881.
virginianus (*Cardinalis*), 619.
virginianus (*Chordeiles*), 118.
 — (*Colinus*), 820.
 — (*Rallus*), 960.
virginicus (*Charadrius*), 937.
virgo (*Phlogœnas*), 773.
virgo (*Tetrapteryx*), 923.
virgo (*Tympanistria*), 765.
viridana (*Acanthopneuste*), 376.
 — (*Gecinulus*), 67.
 — (*Lyrurus*), 826.
viridanus (*Gecinulus*), 64.
viridescens (*Attila*), 214.
 — (*Iole*), 312.
viridicata (*Elaïnea*), 240.
viridicauda (*Talaphorus*), 135.
viridicaudatus (*Phaethornis*), 1064.
viridiceps (*Agyrtria*), 136.
 — (*Chlorodyta*), 353.
 — (*Euscarthmus*), 232.
viridiceps (*Neopsittacus*), 33.
viridiceps (*Rhynchocyclus*), 242.
viridicollis (*Calliste*), 669.
viridicyanea (*Cyanolyca*), 513.
viridiflava (*Eremomela*), 355.
 — (*Hylophilus*), 474.
viridiflava (*Microeca*), 1080.
viridiflavus (*Tyranniscus*), 239.
viridifrons (*Crocopus*), 732.
 — (*Cyanomyia*), 139.
 — (*Nasiterna*), 1054.
viridifuscus (*Oriolus*), 526.
viridigaster (*Oreopsittacus*), 33.
viridigaster (*Saucerottea*), 137.
viridigena (*Chrysotis*), 5.
viridigenalis (*Chrysotis*), 5.
viridinitens (*Dicrurus*), 531.
 — (*Myiagra*), 1082.
viridinucha (*Chloropsis*), 318.
viridipallens (*Coeligena*), 148.
viridipectus (*Lamprotonis*), 544.
viridipennis (*Acanthopneuste*), 377.
viridipennis (*Tanygnathus*), 1054.
viridirostris (*Grus*), 922.
viridirostris (*Rhopodytes*), 58.
viridis (*Ægithina*), 341.
 — (*Ælurædus*), 522.
 — (*Calyptomena*), 204.
 — (*Calyptorhynchus*), 2.
 — (*Carpococcyx*), 61.
 — (*Centropus*), 56.
 — (*Chlorophonia*), 670.
 — (*Chloropsis*), 318.
 — (*Chrysœnas*), 741.
 — (*Cochoa*), 284.
 — (*Cosmophoneus*), 490.
 — (*Creciscus*), 1118.
 — (*Cyclorhis*), 476.
viridis (*Embernagra*), 638.
viridis (*Eroessa*), 354.
 — (*Estrela*), 582.

- viridis* (Galbula), 45.
 — (Gecinulus), 67.
 — (Gecinus), 63.
 — (Irrisor), 98.
 — (Lampornis), 146.
 — (Leptornis), 725.
 — (Megalæma), 39.
 — (Merops), 97.
 — (Monachella), 271.
viridis (Motacilla), 444.
viridis (Oriolus), 527.
 — (Orthogonys), 658.
 — (Ostinops), 550.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Pipeola), 216.
 — (Pitylus), 643.
 — (Psophia), 924.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Ptilopus), 741.
 — (Sphecotheres), 528.
viridis (Terpsiphone), 281.
viridis (Todus), 95.
 — (Trogon), 87.
viridissplendens (Cyanomitra), 702.
viridissima (Ægithina), 341.
 — (Agyrtria), 1065.
 — (Oriolus), 526.
viridissimus (Brotogeris), 15.
viridissimus (Merops), 97.
viridissimus (Pachynus), 6.
viridissimus (Polytmus), 147, 1066.
viridissimus (Tyranniscus), 239.
viriditecta (Chloropsis), 1086.
viridiventris (Hylochais), 140, 1066.
virussu (Lathria), 213.
viscivorus (Turdus), 399.
visi (Ptilotis), 721.
vitellina (Chironomachæris), 222.
 — (Dendroeca), 431.
vitellinus (Hyphantornis), 561.
 — (Rhamphastos), 42.
vitiensis (Aplonis), 541.
 — (Colluricincla), 496.
 — (Columba), 752.
 — (Merula), 398.
 — (Pachycephala), 477.
vitiensis (Phlogœnas), 773.
 — (Porphyrio), 976.
vittata (Catarrhactes), 1018.
 — (Chrysotis), 6.
 — (Erismatura), 1001.
 — (Euphonia), 673.
 — (Petroeca), 267.
 — (Pyrrhura), 13.
vittata (Saxicola), 390.
 — (Sterna), 1014.
vittatum (Hapaloderma), 87.
vittatus (Enneoctonus), 486.
 — (Gecinus), 64.
 — (Prion), 1037.
vittatus (Rhinocichla), 327.
vitriolina (Calliste), 666.
vivida (Niltava), 291.
vivida (Psittacula), 15.
vivida (Siphia), 1083.
 — (Xanthoura), 515.
vlangali (Phasianus), 802.
v-nigra (Somateria), 1000.
vocifer (Haliaëtus), 851.
vociferans (Tyrannus), 252.
vociferoides (Haliaëtus), 854.
vociferus (Antrostomus), 122.
 — (Oxyechus), 939.
volitans (Cisticola), 364.
volkmanni (Chalcopelia), 1114.
vordermani (Cryptolopha), 286.
 — (Graucalus), 1084.
 — (Osmotreron), 733.
 — (Siphia), 293, 1083.
vrayi (Pericrocotus), 301.
vulcani (Chalcostigma), 156.
 — (Zonotrichia), 626.
vulgaris (Buteo), 855.
 — (Coccothraustes), 610.
 — (Francolinus), 807.
 — (Icterus), 558.
 — (Sturnus), 534.
vulgaris (Turtur), 758.
 — (Vanellus), 936.
vulnerata (Analcipus), 528.
 — (Myzomela), 715.
vulneratum (Dicæum), 678.
vulpecula (Synallaxis), 198.
vulpina (Erythropygia), 412.
 — (Synallaxis), 198.
 — (Terpsiphone), 280.
vulpinus (Batimocercus), 331.
vulturina (Gypopsitta), 8.
vulturinum (Acryllium), 805.
vulturinus (Philemon), 726.
waalia (Vinago), 731.
waddelli (Garrulax), 327.
wagæ (Myiapatis), 238.
wagleri (Aulacorhamphus), 44.
 — (Centurus), 1058.
 — (Conurus), 12.
 — (Ortalida), 792.
 — (Pendulinus), 557.

- wagleri* (Pygoscelis), 1047.
wagleri (Zarhynchus), 549.
wahlbergi (Aquila), 852.
wahnesi (Gerygone), 270.
waigiouensis (Eurystomus), 93.
waigiouensis (Salvadorina), 1002.
wakefieldi (Vinago), 732.
wakoloensis (Myzomela), 716.
wallacei (Aegothales), 116.
 — (Geyx), 112.
 — (Eos), 28.
 — (Habroptila), 964.
 — (Hemilophus), 82.
 — (Heteropelma), 223.
 — (Macropteryx), 130.
 — (Megapodius), 788.
 — (Munia), 587.
 — (Osmotreron), 733.
 — (Picumnus), 81.
 — (Ptilopus), 739.
 — (Semioplera), 519.
 — (Todopsis), 275.
 — (Urospizias), 843.
 — (Zosterops), 708.
waldeni (Actinodura), 331.
 — (Cranorrhinus), 100.
 — (Dicrurus), 530.
waldeni (Tanyptera), 106.
walleri (Amydrus), 545.
wallichii (Catreus), 801.
wallisii (Henicornis), 1072.
warcewiczii (Dives), 559.
 — (Picolaptes), 187.
wardi (Ardea), 910.
 — (Geocichla), 405.
 — (Palæornis), 19.
 — (Pseudobias), 281.
warszewiczii (Saucerottea), 1065.
watersi (Sarothrura), 969.
waterstradti (Acanthopneuste), 1091.
 — (Pyrrhula), 1109.
 — (Snya), 1089.
watertoni (Thalurania), 143.
wattersi (Alauda), 455.
 — (Yungipicus), 74.
waynei (Rallus), 959.
webberi (Iridia), 308.
weberi (Trichoglossus), 31.
webbiana (Suthora), 471.
websteri (Alcyon), 113.
 — (Cacomantis), 1056.
 — (Sula), 1012.
weddelli (Conurus), 11.
weigalli (Coracias), 92.
weiskei (Cacomantis), 1056.
 — (Climacteris), 685.
 — (Entolmaëtus), 851.
weiskei (Syma), 1062.
welchi (Lagopus), 827.
welchmani (Graucalus), 297.
wellsii (Cœreba), 691.
 — (Leptoptila), 770.
 — (Saucerottea), 1065.
welwitschii (Caprimulgus), 124.
wertheri (Pyromelana), 572.
westermanni (Carpophaga), 747.
westermanni (Casuarius), 1051.
westermanni (Eclectus), 16.
westermanni (Muscicapula), 294.
westernensis (Zosterops), 712.
wetterensis (Gerygone), 268.
 — (Ptistes), 20.
weynsi (Melanopteryx), 567.
whartoni (Carpophaga), 744.
whiteheadi (Calyptomena), 205.
 — (Collocalia), 129.
 — (Dicrurus), 530.
 — (Gennæus), 800.
 — (Harpactes), 88.
whiteheadi (Leptocoma), 699.
whiteheadi (Merula), 398.
 — (Orthocichla), 430.
whiteheadi (Pachycephala), 480.
whiteheadi (Scops), 885.
 — (Sitta), 681.
 — (Syrnium), 891.
 — (Turnix), 778.
 — (Urocissa), 507.
 — (Zosterornis), 339.
whitei (Glycyhæra), 717.
whitei (Zonotrichia), 626.
whiteleyana (Spermophila), 615.
whitelyana (Iolæma), 150.
whitelyanus (Aulacorhamphus), 44.
whitelyi (Agyrtria), 136.
 — (Antrostomus), 122.
 — (Calliste), 669.
 — (Pipreola), 216.
 — (Tænioglaux), 898.
whithei (Poospiza), 628.
whitii (Synallaxis), 198.
whitmei (Lalage), 303.
whitneyi (Micropallas), 898.
whytei (Smilorhis), 37.
 — (Sylvia), 355.
whytii (Serinus), 600.
wickenburgii (Crateropus), 548.
wickhami (Gennæus), 800.

- wiedi* (Cyclorhis), 476.
 — (Pteroglossus), 43.
 — (Troglodytes), 425.
wiedi (Urochroma), 8.
wiepkeni (Syrnium), 891.
wiglesworthi (Anthreptes), 1113.
wilhelminæ (Dicæum), 677.
 — (Hypocharmosyna), 32.
 — (Lamprothorax), 521.
wilkesi (Carpophaga), 744.
wilcocksii (Indicator), 1055.
williami (Carpophaga), 746.
 — (Metallura), 156.
williamsi (Gennæus), 800.
williamsoni (Turdinulus), 332.
wilkouskii (Syrnium), 890.
willsi (Cypselus), 125.
 — (Saucerottea), 137.
wilsoni (Charadrius), 937.
 — (Glaucopis), 516.
 — (Hemignathus), 693.
 — (Hypocharæa), 1108.
 — (Lampropygia), 152.
 — (Leptodon), 866.
wilsoni (Oceanites), 1029.
wilsoni (Estrelata), 1035.
 — (Oreomyza), 692.
wilsoni (Pennula), 969.
 — (Phalaropus), 957.
wilsoni (Schlegelia), 519.
wilsoniana (Asio), 878.
winchelli (Haleyon), 108.
 — (Pachycephala), 480.
wingatei (Siva), 347.
wintoni (Macronyx), 449.
wolfi (Aramides), 963.
 — (Circus), 836.
 — (Cyanecula), 383.
wollweberi (Lophophanes), 465.
wolstenholmei (Loxops), 594.
wolterstorffi (Accipiter), 845.
woodi (Mixornis), 340.
woodfordi (Ardeiralla), 915.
 — (Corvus), 504.
 — (Erythrura), 584.
 — (Eulabeornis), 963.
 — (Syrnium), 891.
 — (Urospizias), 842, 1116.
woodfordiana (Macropteryx), 130.
woodhousei (Aphelocoma), 512.
woodhousii (Parmoptila), 357.
woodwardi (Bradyornis), 287, 1082.
 — (Mirafla), 1099.
 — (Stactolæma), 38.
worcesteri (Loriculus), 23.
wortheni (Estrelata), 1034.
 — (Spizella), 630.
wrangellii (Brachyrhamphus), 1044.
wrayi (Æthopyga), 696.
 — (Chrysophlegma), 67.
 — (Pericrocotus), 1084.
 — (Pomatorhinus), 326.
wuchereri (Arremon), 647.
wuchereri (Euscarthmus), 232.
wumizusume (Synthliborhamphus), 1045.
wurdemanni (Ardea), 910.
wyatti (Siptornis), 200.
wywilliana (Anas), 990.
xalapensis (Trogon), 86.
xantherythraea (Pachycephala), 478.
xanthocephala (Calliste), 668.
xanthocephalus (Chrysocolaptes), 80.
xanthocheilus (Charadrius), 937.
xanthochlamys (Pyromelana), 1108.
xanthochlora (Herpornis), 347.
xanthochloris (Pterythrius), 487.
xanthochlorus (Chloronerpes), 65.
xanthochroa (Zosterops), 706.
xanthodryas (Acanthopneuste), 376.
xanthogaster (Pericrocotus), 301.
 — (Ptilopus), 736.
xanthogaster (Xanthomelus), 524.
xanthogastra (Calliste), 666.
 — (Chrysomitris), 592.
 — (Euphonia), 672.
 — (Pharomacrus), 86.
xanthogenys (Machæirhynchus), 285.
 — (Machlolophus), 464.
 — (Pachyrhamphus), 212.
 — (Platycercus), 25.
xanthogonys (Heliodoxa), 149.
xanthogrammus (Phrygilus), 610.
xantholæma (Lædorusa), 306.
xantholarynx (Melanerpes), 68.
xantholeuca (Herpornis), 347.
xantholophus (Mesopicus), 77.
xantholora (Chrysotis), 6.
xanthomelas (Pyromelana), 572.
xanthomera (Caica), 8.
xanthomus (Agelæus), 553.
xanthonota (Calyptorhynchus), 2.
 — (Terenura), 1069.
xanthonotus (Indicator), 34.
 — (Oriolus), 527.
xanthonura (Phlogœnas), 773.
xanthophrys (Crossleyia), 338.
 — (Motacilla), 445.
 — (Passerculus), 1110.

- xanthophrys* (*Pseudonestor*), 606.
xanthophthalmus (*Chlorospingus*), 651.
xanthoprocta (*Pachycephala*), 479.
xanthoprymna (*Saxicola*), 389.
xanthops (*Chrysotis*), 5.
 — (*Hyphantornis*), 564.
 — (*Psittacula*), 15.
xanthoptera (*Brotogerys*), 15.
xanthoptera (*Diphyllodes*), 519.
xanthopterus (*Dysilhamnus*), 180.
 — (*Hyphantornis*), 563.
xanthopterus (*Poicephalus*), 9.
xanthopteryx (*Chrysotis*), 5.
xanthopus (*Merula*), 398.
xanthopygia (*Cryptolopha*), 286.
 — (*Myiobius*), 245.
xanthopygium (*Dicaeum*), 679.
xanthopygius (*Pardalotus*), 674.
 — (*Prionochilus*), 675.
xanthopygius (*Serinus*), 601.
 — (*Tachyphonus*), 655.
xanthopygus (*Pycnonotus*), 305.
xanthorhyncha (*Anas*), 991.
xanthorhyncha (*Turdus*), 1093.
xanthorhynchus (*Chrysococcyx*), 53.
xanthornoides (*Campophaga*), 300.
xanthornus (*Pendulinus*), 558.
xanthorrhoea (*Ptilopus*), 740.
xanthorrhous (*Pachycephalixus*), 306.
 — (*Psephotus*), 25.
xanthosceles (*Merula*), 395.
xanthoschista (*Cryptolopha*), 285.
xanthospila (*Pucrasia*), 801.
xanthostieta (*Barbatula*), 1055.
xanthostomus (*Melanoparus*), 460.
xanthotis (*Aethorhynchus*), 341.
xanthusi (*Basilinna*), 139.
xavieri (*Xenocichla*), 309.
yamakanensis (*Pyrotrogon*), 1060.
yamdenæ (*Alcyon*), 1062.
yangpiensis (*Yuhina*), 1088.
yapensis (*Phlogœnas*), 772.
yarrelli (*Chrysomitris*), 591.
yarrelli (*Motacilla*), 442.
yarrelli (*Myrtis*), 161.
yarrellii (*Myrmeciza*), 174.
yaruqui (*Phaethornis*), 132.
yatei (*Passer*), 598.
yelkouana (*Puffinus*), 1031.
yeltoniensis (*Melanocorypha*), 453.
yeni (*Calliste*), 665.
yerburyi (*Cercomela*), 391.
yessoensis (*Emberiza*), 621.
yetapa (*Cybernetes*), 228.
yncas (*Xanthoura*), 514.
youngi (*Todirhamphus*), 110.
ypacaha (*Aramides*), 964.
ypanemæ (*Macropsalis*), 120.
yucatanensis (*Amazilia*), 138.
 — (*Chloronerpes*), 65.
 — (*Cyclorhis*), 475.
yucatanensis (*Eumomota*), 94.
yucatanensis (*Icterus*), 558.
 — (*Myiarchus*), 251.
 — (*Nyctidromus*), 1063.
 — (*Zenaida*), 757.
 — (*Zenaidura*), 757.
yucatanica (*Cardinalis*), 620.
 — (*Cyanolyca*), 513.
yucatanicus (*Anrostomus*), 122.
yucatenensis (*Elainea*), 1076.
yukonensis (*Sayornis*), 1075.
yunnanensis (*Certhia*), 1112.
 — (*Emberiza*), 1110.
yunnanensis (*Hypsipetes*), 316.
yunnauensis (*Sitta*), 680.
yuracarium (*Gymnostinops*), 550.
zambesiæ (*Chlorocichla*), 313.
 — (*Prodotiscus*), 35.
zambesiana (*Erythropygia*), 412.
zambesiana (*Anthreptes*), 704.
zanzibari (*Dendropicus*), 73.
zanzibarica (*Syrnium*), 891.
zanzibarica (*Urobrachya*), 573.
zaphiroi (*Heterhyphantes*), 1107.
zarudnoi (*Gecinus*), 64.
zarudnyi (*Amimomanes*), 1100.
 — (*Passer*), 599.
zebra (*Centurus*), 69.
zechi (*Pseudogyps*), 1116.
zeledoni (*Cochlearius*), 920.
 — (*Cyanocorax*), 514.
 — (*Lophotriccus*), 1075.
 — (*Pittasoma*), 171.
 — (*Pogonotriccus*), 235.
 — (*Thryophilus*), 421.
zelotes (*Certhia*), 1112.
zena (*Phonipara*), 618.
zena (*Spindalis*), 661.
zenkeri (*Accipiter*), 845.
zenkeri (*Agapornis*), 22.
 — (*Cassinia*), 295.
 — (*Macrosphenus*), 1086.
 — (*Melignomon*), 35.
zenkeri (*Rectirostrum*), 314.
zenkeri (*Smithornis*), 1082.
 — (*Turacus*), 89.
zenobia (*Cyrtostomus*), 703.

- zerafshanica (Phasianus), 802.
zeylonica (Leptocoma), 700.
— (Megalæma), 39.
zimmermannæ (Buteo), 855.
zoeæ (Carpophaga), 745.
zombæ (Pogonorhynchus), 36.
zombensis (Andropadus), 313.
zonaris (Chætura), 127.
zonarius (Barnardius), 25.
zonatus (Campylorhynchus), 420.
zoniventris (Dissodectes), 869.
zonocercum (Ciccaba), 893.
zononota (Myrmotherula), 179.
zonorhyncha (Anas), 990.
zonorhynchus (Larus), 1025.
zonothorax (Micrastur), 835.
zonura (Ptilopus), 739.
— (Schizorhis), 90.
— (Urubitinga), 861.
zorca (Scops), 882.
zosterops (Bernieria), 314.
— (Chloropsis), 318, 1086.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Euscarthmus), 232.

PUBLICATIONS DE M. LE D^r ALPH. DUBOIS

CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,
OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD.

-
- Synopsis avium. — Nouveau Manuel d'Ornithologie.** — 2 vol. in-4^o, avec 16 planches coloriées. — Bruxelles, 1899-1904.
- Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux.** — 4 vol. in-4^o avec 427 planches coloriées à la main et cartes (1876-1893).
- Les Lépidoptères de la Belgique**, leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. — 3 vol. in-4^o avec 451 planches coloriées à la main (1861-1884).
- Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés).** — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. — Bruxelles, 1895.
- Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux.** — Broch. in-8^o. — Paris, 1891.
- Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique.** Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée. — 1 vol. in-12. — Bruxelles, 1889.
- Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps.** — Nouveau tirage en chromo.
- Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés.** — Broch. in-8^o, avec 2 planches coloriées. — Bruxelles, 1884.
- Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science.** — 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. — Bruxelles, 1882.
- Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie,** 1 vol. in-12, avec 166 gravures. Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen. — Bruxelles, 1882.
- Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum.** — Broch. in-8^o. — Bruxelles, 1871.
- Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles.** 1 vol. in-8^o, avec 15 planches. — Bruxelles, 1867.
- Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière.** — 1 vol. in-8^o avec 4 planches coloriées. (Ouvrage couronné.) — Gand, 1863.
-

Pour paraître prochainement dans les *Annales du Musée du Congo* :

MATÉRIAUX POUR LA FAUNE DU CONGO

1^{re} PARTIE : MAMMIFÈRES

PAR

ALPH. DUBOIS

Conservateur au Musée royal d'Histoire naturelle
de Belgique.

ET LE

PROF. P. MATSCHIE

Conservateur au Musée royal de Zoologie
de Berlin.

2^e PARTIE : OISEAUX

PAR

ALPH. DUBOIS

Bruxelles. — POLLEUNIS & CEUTERICK, imprimeurs, rue des Ursulines, 37.

1. PTILOPUS PONAPENSIS 2 P PELEWENSIS. 3. GLOBICERA RUFIGULA

1 CARPOPHAGA WESTERMANI 2 COLUMBA UNICINCTA

LOPHURA SUMATRANA

PULSATRIX MAXIMILIANI

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,
CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,
CHEVALIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD,

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,
DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,
MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

Fascicule XI

COLUMBÆ, HETEROCLITÆ, CRYPTURI,
GALLINÆ, ACCIPITRES (1^{re} partie).

Pl. XIII

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1902

172381

AVIS

Nous donnons dans ce fascicule XI les 24 pages qui manquaient au précédent, pour la raison indiquée.

Nous rappellerons que les tables alphabétiques des genres, des espèces et des variétés paraîtront dans le dernier fascicule.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, **M. H. Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.

AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & C^{ie}**.

BERLIN, chez **M. R. Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.

LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.

MADRID, chez **M. Romo y Fussel**.

MILAN, chez **M. Ulrico Hoepli**, 57, Corso Vittorio Emanuele.

OXFORD, chez **M. James Parker & C^{ie}**, 27, Broad street.

PARIS, chez **M. P. Klincksieck**, 5, rue Corneille.

NEW-YORK, chez **M. G.-E. Stechert**, 9 East 16th street.

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de **Henri LAMERTIN**,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — <i>Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur</i>	fr. 400
Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4°	75
Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 5 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884)	275
Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891	1 25
Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889	1 75
Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. Bruxelles 1895	2
Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo	2 50
Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés , broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884	2
Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science , 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882	6
Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882	3
Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum , broch. in-8°, Bruxelles 1871	2
Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles. 1 vol. in-8°, avec 15 pl. — Bruxelles 1867	8
Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (Ouvrage couronné.) — Gand, 1865 (Épuisé.)	

AUG. LAMEERE, Manuel de la Faune de Belgique (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895.	5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise	7 00

nds

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

...

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,
CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,
OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD.

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,

DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,

MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

Fascicule XII

ACCIPITRES, STRIGES, HERODIONES (1^{re} partie).

Pl. XIV

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1902

185851

AVIS

Nous rappellerons que les tables alphabétiques des genres, des espèces et des variétés paraîtront dans le dernier fascicule.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, **M. H. Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.

AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & C^{ie}**.

BERLIN, chez **M. R. Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.

LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.

MADRID, chez **M. Romo y Fussel**.

MILAN, chez **M. Ulrico Hoepli**, 57, Corso Vittorio Emanuele.

OXFORD, chez **M. James Parker & C^{ie}**, 27, Broad street.

PARIS, chez **M. P. Klincksieck**, 5, rue Corneille.

NEW-YORK, chez **M. G.-E. Stechert**, 9 East 16th street.

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — <i>Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur</i>	fr. 400
Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4°	75
Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysa- lides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourri- cières. 5 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884)	275
Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891	1 25
Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889	1 75
Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. Bruxelles 1895	2
Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo	2 50
Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés , broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884	2
Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science , 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882	6
Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882	5
Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum , broch. in-8°, Bruxelles 1871	2
Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles. 1 vol. in-8°, avec 15 pl. — Bruxelles 1867	8
Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (Ouvrage couronné.) — Gand, 1865 (Épuisé.)	

AUG. LAMEERE, Manuel de la Faune de Belgique (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895.	5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise	7 00

5 Runko

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

...

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,
CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,
OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD,
MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,
DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,
MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

Fascicule XIII

HERODIONES (fin), GRALLATOIRES, PALAMEDEÆ,
ANSERES (1^{re} partie).

Pl. XV

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1903

AVIS

Nous rappellerons que les tables alphabétiques paraîtront à la fin de la publication, en même temps que le supplément; ce dernier comprendra les nouvelles espèces décrites depuis la mise sous presse du *Synopsis avium*, ainsi que les corrections.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, M. H. Lamertin, 20, rue du Marché-au-Bois.

AMSTERDAM, chez MM. Feikema, Caarelsen & C^{ie}.

BERLIN, chez M. R. Friedländer & Sohn, Carlstr. 11, N. W.

LONDRES, chez MM. William & Norgate, 14, Henrietta street.

MADRID, chez M. Romo y Fussel.

MILAN, chez M. Ulrico Hoepli, 57, Corso Vittorio Emanuele.

OXFORD, chez M. James Parker & C^{ie}, 27, Broad street.

PARIS, chez M. P. Klincksieck, 5, rue Corneille.

NEW-YORK, chez M. G.-E. Stechert, 9 East 16th street.

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — <i>Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur</i>	fr. 400
Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4°	75
Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysa- lides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourri- cières. 3 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884)	275
Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891	1 25
Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889	1 75
Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. Bruxelles 1895	2
Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo	2 50
Revue critique des oiseaux de la famille des Bucerotidés , broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884	2
Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science , 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882	6
Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie , 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882	5
Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum , broch. in-8°, Bruxelles 1871	2
Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles. 1 vol. in-8°, avec 15 pl. — Bruxelles 1867	8
Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (<i>Ouvrage couronné.</i>) — Gand, 1865 (<i>Épuisé.</i>)	

AUG. LAMERE, Manuel de la Faune de Belgique (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895.	5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise	7 00

7 B-15
SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU
MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

...

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,

CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,

OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD,

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,

DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,

MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

Fascicule XIV

ANSERES, STEGANOPODES, GAVIÆ, TUBINARES,
PYGOPODES, IMPENNES, APTERYGES, CASUARII, RHEÆ,
STRUTHIONES. — SUPPLÉMENT (1^{re} partie, p. 1053).

Pl. XVI

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

—
1903

AVIS

Nous commençons dans le présent fascicule la publication du *Supplément* (p. 1053), qui comprend les nouveautés décrites depuis la mise sous presse de notre *Synopsis* jusqu'en juin 1903, ainsi que les corrections. Dans le prochain fascicule paraîtront la fin du supplément et les tables alphabétiques des genres, des espèces et des variétés.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, M. H. Lamertin, 20, rue du Marché-au-Bois.

AMSTERDAM, chez MM. Feikema, Caarelsen & C^{ie}.

BERLIN, chez M. R. Friedländer & Sohn, Carlstr. 11, N. W.

LONDRES, chez MM. William & Norgate, 14, Henrietta street.

MADRID, chez M. Romo y Fussel.

MILAN, chez M. Ulrico Hoepli, 57, Corso Vittorio Emanuele.

OXFORD, chez M. James Parker & C^{ie}, 27, Broad street.

PARIS, chez M. P. Klincksieck, 5, rue Corneille.

NEW-YORK, chez M. G.-E. Stechert, 9 East 16th street.

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4 ^o avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — <i>Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur</i>	fr. 400
Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4 ^o	75
Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysa- lides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourri- cières. 5 vol. in-4 ^o avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884)	275
Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8 ^o , Paris, 1891	1 25
Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889	1 75
Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. <i>Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique.</i> Bruxelles 1895	2
Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo	2 50
Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés , broch. in-8 ^o , avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884	2
Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science , 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882	6
Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882	5
Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum , broch. in-8 ^o , Bruxelles 1871	2
Archives cosmologiques. <i>Revue des sciences naturelles.</i> 1 vol. in-8 ^o , avec 15 pl. — Bruxelles 1867	8
Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in-8 ^o , avec 4 pl. col. (<i>Ouvrage couronné.</i>) — Gand, 1865 (<i>Épuisé.</i>)	

AUG. LAMEERE, Manuel de la Faune de Belgique (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895.	5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise	7 00

Binds

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,

CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,

OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD,

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,

DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

Fascicule XV

**SUPPLÉMENT (fin), TABLE ALPHABÉTIQUE
DES GENRES**

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1903

AVIS

Le présent fascicule contient la fin du supplément et la table alphabétique des genres. Le prochain et dernier fascicule contiendra la table alphabétique des espèces et des variétés, la table systématique du tome II et les titres. Le collationnement de cette table étant très long, nous prévenons nos honorables souscripteurs que le dernier fascicule ne pourra paraître que vers le mois d'avril 1904.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, **M. H. Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.

AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & C^{ie}**.

BERLIN, chez M. **R. Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.

LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.

MADRID, chez M. **Romo y Fussel**.

MILAN, chez M. **Ulrico Hoepli**, 57, Corso Vittorio Emanuele.

OXFORD, chez M. **James Parker & C^{ie}**, 27, Broad street.

PARIS, chez M. **P. Klincksieck**, 5, rue Corneille.

NEW-YORK, chez M. **G.-E. Stechert**, 9 East 16th street.

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — <i>Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur</i>	fr. 400
Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4°	75
Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 5 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884)	275
Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891	1 25
Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889	1 75
Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. Bruxelles 1895	2
Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo	2 50
Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés , broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884	2
Manuel de zoologie , conforme aux progrès de la science, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882	6
Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882	5
Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum , broch. in-8°, Bruxelles 1871	2
Archives cosmologiques. <i>Revue des sciences naturelles.</i> 1 vol. in-8°, avec 15 pl. — Bruxelles 1867	8
Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (<i>Ouvrage couronné.</i>) — Gand, 1865 (<i>Épuisé.</i>)	

AUG. LANEERE, Manuel de la Faune de Belgique (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895.	5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise	7 00

Birds

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,
CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,
OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD.

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,
DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,
MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

Fascicules XVI et XVII

**TABLES ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES ET SYSTÉMATIQUE
DES ORDRES ET DES FAMILLES**

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1904

c 189965-

ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, M. H. Lamertin, 20, rue du Marché-au-Bois.

AMSTERDAM, chez MM. Feikema, Caarelsen & C^{ie}.

BERLIN, chez M. R. Friedländer & Sohn, Carlstr. 11, N. W.

LONDRES, chez MM. William & Norgate, 14, Henrietta street.

MADRID, chez M. Romo y Fussel.

MILAN, chez M. Ulrico Hoepli, 57, Corso Vittorio Emanuele.

OXFORD, chez M. James Parker & C^{ie}, 27, Broad street.

PARIS, chez M. P. Klincksieck, 5, rue Corneille.

NEW-YORK, chez M. G.-E. Stechert, 9 East 16th street.

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — <i>Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur</i>	fr. 400
Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4°	75
Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysa- lides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourri- cières. 3 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884)	275
Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891	1 25
Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889	1 75
Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. Bruxelles 1895	2
Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo	2 50
Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés , broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884	2
Manuel de zoologie , conforme aux progrès de la science, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882	6
Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882	5
Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum , broch. in-8°, Bruxelles 1871	2
Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles. 1 vol. in-8°, avec 15 pl. — Bruxelles 1867	8
Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (Ouvrage couronné.) — Gand, 1865 (Épuisé.)	

AUG. LAMERE, Manuel de la Faune de Belgique (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895.	5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise	7 00

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,
CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,
OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD.

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,
DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,
MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

DEUXIÈME PARTIE

(1902-1904)

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

—
1904

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — <i>Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur</i>	fr. 400
Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4°	75
Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysa- lides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourri- cières. 5 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884)	275
Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891	1 25
Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889	1 75
Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. Bruxelles 1895	2
Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo	2 50
Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés. broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884	2
Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science , 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882	6
Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie , 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882	5
Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum , broch. in-8°, Bruxelles 1871	2
Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles. 1 vol. in-8°, avec 15 pl. — Bruxelles 1867	8
Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (Ouvrage couronné.) — Gand, 1865 (Épuisé.)	

AUG. LAMEERE, Manuel de la Faune de Belgique (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895.	5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 838 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise	7 00

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00688 6873