64C
Oswald Weigel
Antiquariat & Auktions-Institut
Leipzig, Hauptstadt

†SB108

.G4

G3

Bd.2

Kenneth K. Mackenzie
Collection

T. Schmitz
n. 8.

W. Belius.

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

Released from Library
Horticultural Society of New York, Inc.,

5160

OEKONOMISCH-TECHNISCHE

FLORA DER WETTERAU

H e r a u s g e g e b e n

v o n

G. Gärtner, Dr. B. Meyer und Dr. J. Scherbius.

Sämtlich Mitglieder mehrerer gelehrten Gesellschaften.

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE

← 080 →
Zweiter Band

Frankfurt am Main.

verlegt von Philipp Heinrich Guilhauman.

1 8 0 0.

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

+SE108

G4

G3

Ed. 2

V o r b e r i c h t.

Wir fanden es für unsern Zwekk zu weitläufig, die Abarten der Obstsorten zu beschreiben, und führten daher nur die Namen von allen denen auf, die bei uns gezogen werden, und nach der neuesten Ausgabe in *Christs Handbuch von der Obstbaumzucht* bei demselben in Kronenberg, als auch in der Goldnerschen Baumschule zu Offenbach, (nach einem nächstens darüber auszugebenden Katalog) und bei dem Bauverwalter und Hofgärtner Frank in Rumpenheim am Main, käuflich zu haben sind.

Man wird in diesem und dem folgenden Bande einige Pflanzen finden, z. B. *Spiraea opulifolia*, *Prunus serotina* Ehrh. *Fumaria lutea* etc. die bis jetzt noch nicht als teutsche Pflanzen aufgestellt worden sind. Aber wir trugen durchaus kein Bedenken ihnen das Bürgerrecht in unserer Flora zu geben, da wir sie in einem völlig verwilderten Zustand gefunden haben. Ueberdem bekümmert es uns gar

nicht, ob sie vor 30 oder 40 Jahren durch Kunst hingepflanzt worden sind oder nicht; da ohnehin eine Flora ursprünglich deutscher Pflanzen sehr mager ausfallen würde. Was bei uns in Wäldern, und überhaupt an unkultivirten Orten wächst, und seit mehreren Jahren sich so, durch sich selbst fortgepflanzt hat, daß es nicht leicht wieder ausgehen kann, das wird von uns als heimisch aufgenommen, mag es nun übrigens aus einem Lande herkommen, woher es will.

Seit dem Abdruck des ersten Bandes haben wir noch viele in die ersten 7 Klassen gehörige Pflanzen gefunden, z. B. *Utricularia minor*, *Oenanthe peucedanifolia*, *Trientalis europaea* etc. Alle diese werden wir als Nachträge am Ende des dritten Bandes liefern.

Kupferstiche führten wir deshalb nirgends an, weil wir alle Pflanzen der Wetterau getrocknet auf Subskription liefern, und wir gute getrocknete, vollkommene Pflanzenexemplare für weit besser halten als Kupferstiche; überdem sind auch solche, in so kostbaren Werken zerstreuet anzutreffen, daß die wenigsten Liebhaber der Kräuterkunde diese Werke sich anschaffen können.

A C H T E K L A S S E.

OCTANDRIA. Mit acht Staubfäden.

I. ORDNUNG.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

*) Mit vollständigen Blumen.

CXCII.
ERICA.
Heide.

Der Kelch vierblättrig, unterhalb dem Fruchtknoten, bleibend. Die Blumenkrone einblättrig, vierspaltig, glocken- oder eyförmig. Die Staubfäden in den Fruchtböden eingesenkt. Die Staubbeutel zweiborstig. Die Narbe vierspaltig. Die Saamenkapsel fast rund, kleiner als der Kelch, gerade, vierfächerig, vier-

klappig, vielsaamig; die Scheidewände laufen mit den Näthen in einander.

CXCI.

VACCINIUM.
Heidelbeere.

Der Kelch sehr klein, vier, selten fünfzählig, oberhalb dem Fruchtknoten, bleibend. Die Blumenkrone einblättrig, vier - selten fünfspaltig, eyrund-glockenförmig. Die acht oder zehn Staubfäden sind dem Fruchtknoten einverleibt. Die Staubbeutel zweiborstig. Die Beere kugelförmig, mit einem Nabel versehen, unreif vier - bis fünffächerig, reif ohne Fächer und vielsaamig.

CXC.

EPILOBIUM.
Weiderich.

Der Kelch lang, walzenförmig, vier-spaltig, oberhalb dem Fruchtboden gefärbt und abfallend. Die Blumenkrone vierblättrig, den Kelcheinschnitten eingefügt. Die Staubfäden wechselsweise kürzer. Die Narbe dikk, öfters vier-spaltig, zurückgerollt. Die Saamenkapsel sehr lang, vierseitig-walzenförmig, gestreift, vierfächerig, vielklappig, enthält viele mit einer Haarkrone versehene Saamen; die Scheidewände den Klappen entgegengesetzt. Der Fruchtboden sehr lang, viereckig, frei, hin und her gewunden, und gefärbt.

CLXXXIX.
OENOTHE-
RA.*Nachtkerze.*

Der Kelch vierspaltig, oberhalb dem Fruchtknoten, abfallend. Die Blumenkrone vierblättrig, den Kelcheinschnitten eingefügt. Die Blättchen verkehrt-herzförmig, flach. Die Staubbeutel gleichbreit, beweglich. Die Narbe stumpf, vierspaltig zurückgeschlagen. Die Saamenkapsel fast vierseitig-walzenförmig, vierfächerig, vierklappig, enthält viele eckige, schwammige, nackte Saamen. Der Fruchtboden säulenförmig, frei, viereckig, und von der Spindel der Frucht nicht verschieden.

CLXXXVIII.
TROPAEO-
LUM.*Indianische
Kresse.*

Der Kelch fünfspaltig, bespornt, gefärbt, unterhalb dem Fruchtknoten. Die Blumenkrone fünfblättrig, ungleich, zwei Blättchen sitzen fest auf, die übrigen sind mit gefranzten Nägeln versehen. Die Staubfäden niedergebogen, ungleich. Der Fruchtknoten dreilappig, gestreift. Die Narbe dreispaltig. Die Frucht, drei etwas gefurchte, eckige und einsamige trockne Beeren.

**) Mit unvollständigen Blumen.

CXIII.
DAPHNE.
Kellerhals.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone einblättrig, vierspaltig, trichterförmig, unterhalb dem Fruchtknoten, leicht ver-

welkend, die Staubfäden einschliessend. Der Griffel sehr kurz. Die Narbe kopfförmig. Die Frucht eine eyrunde, einsaamige Apfelhöhle. (Antrum pomum Med.)

CXCIV.
THYME-
LAEA.
Thymelæe.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone einblättrig, vierspaltig, trichterförmig, unterhalb dem Fruchtknoten. Der Griffel kurz. Die Narbe kopfförmig. Die Frucht eine eyrunde, einsaamige, rindige Höhle. (Antrum corticosum Med.)

CXCV.
STELLERA.
Stellere.

Der Kelch fehlt. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, einblättrig, vierspaltig, trichterförmig, am Grunde bauchig. Die Staubfäden sehr kurz, stehen mit ihren Staubbeuteln in der Mitte der Röhre. Die Fruchthülle eyrund, mit halbzweispaltigem Schnabel, einfächerig, von der bleibenden Blumenkrone umgeben.

II. ORDNUNG.

DIGYNIA. Mit zwei Staubwegen.

CXCVI.
ACER.
Ahorn.

Der Kelch fünfspaltig, gefärbt, bleibend. Die Blumenkrone fünfblättrig, unterhalb dem Fruchtknoten. Die zwei

Flügel Früchte eyförmig, zusammenge-
wachsen, mit häutigen Flügeln sich en-
digend. Die Blumen theils in vermeng-
ten Geschlechtern, Zwitterblumen und
männliche auf einem Stamme, theils ge-
trennt und männliche oder weibliche auf
besondern Stämmen.

CXCVII.
CHRYSO-
SPLENIUM.
Milzkrout.

Die Geschlechts-Hülle inwendig ge-
färbt, bleibend, vier- bis fünfspaltig,
oberhalb dem Fruchtknoten, unten an
die Fruchthülle angewachsen, enthält
acht, selten zehn sehr kurze Staubfäden.
Die Saamenkapsel zweihörnig, einfäche-
rig, halbzweiklappig, zur Hälfte unter
der Geschlechts-Hülle, enthält viele klei-
ne Saamen.

III. ORDNUNG.

TRIGYNIA. Mit drei Staubwegen.

CXCVIII.
POLYGO-
NUM.
Knöterich.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkro-
ne einblättrig, inwendig gefärbt, un-
terhalb dem Fruchtknoten; der Saum
vier- fünf- sechstheilig. Mehrentheils 8
Staubfäden, zuweilen aber nur 5, 6-7
vorhanden. Der dreiekkige Fruchtknoten
hat gewöhnlich 3, zuweilen auch 2 oder
gar 1 Staubweg. Ein einziger, entweder

linsenförmiger, oder lanzettförmiger, oder dreiekkiger Saamen steckt in dem stehengebliebenen Kelch.

IV. ORDNUNG.

TETRAGYNIA. Mit vier Staubwegen.

CC.
ADOXA.
Bisamkraut.

Der Kelch 2-3-4 zählig, am Grunde mit der Frucht auf das genaueste zusammenhängend und bleibend. Die Blumenkrone oberhalb dem Fruchtknoten, die Endblume vierspaltig, mit 8 Staubfäden, die Seitenblumen fünfspaltig, mit 5 Staubfäden. Der Fruchtknoten hat 4 bis 5 bleibende Griffel von der Länge der Staubfäden, und diese haben einfache Narben. Die unächte Beere fast kugelförmig, mit dem Kelch halb umkleidet, mit einem Nabel versehen, fleischig, einfächerig, und enthält vier zusammengedrückte Saamen.

CCI.
ELATINE.
Tünnel.

Der Kelch drei oder vierblättrig, bleibend. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, drei oder vierblättrig. Staubfäden 8 oder 3. Staubwege 4 oder 3. Die Saamenkapsel kugelig zusammengedrückt, groß, drei oder vierklappig, drei oder vierfächerig, enthält viele mond-

förmige, aufrechtstehende und radförmig den Fruchtboden umgebende Saamen.

CXCIX.
PARIS.
Einbeere.

Der Kelch vierblättrig, bleibend. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, vierblättrig; die dem Kelch ähnliche Blättchen sind schmal. Die Staubbeutel in der Mitte der Staubfäden angewachsen. Die Narbe einfach. Die unächte Beere fleischig, kugelförmig, fast vierfurchig, vierfächerig, enthält in jedem Fache 6 bis 8 Saamen.

ACHTE KLASSE.

OCTANDRIA. Mit acht Staubfäden.

I: ORDNUNG.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

CLXXXVIII. TROPAEOLUM. Indianische Kresse.

†, 489. T. MA-
JUS.*Grosse india-
nische Kresse.*Die Blätter schildförmig, fast fünf-
lappig. Die Blumenkronen feuerroth;
die Blumenkronblätter stumpf.

Wohnort. Sie stammt aus Peru, von woher sie
durch Bewernnig 1684. nach Europa
kam, und wird jetzt häufig in unsern
Gärten gezogen.

Blüthezeit. Juli bis Herbst. Im Freyen ☉, im
Treibhaus 4.

Fruchtreife. September, Oktober.

Bemerkung. Das Fräulein v. Linné will einmal
in der Abenddämmerung an den Blu-
men einen blizzenden Schimmer bemerkt
haben, allein Ingenhoufs und an-
dere neuere Naturforscher, so wie auch
wir, haben bei der angestrengtesten Auf-
merksamkeit nie etwas dergleichen ent-
decken können.

Nuzzen.

Theils zur Zierde, theils auch des Nuzzens wegen ziehen wir sie in unsern Gärten. Die Blätter und Blumen essen wir als Salat, und die noch nicht entfalteten Blumen, so wie die unreifen Früchten werden wie die Kapern mit Salz und Essig eingemacht und zu Brühen an Fleisch und Fische gebraucht.

CLXXXIX. OENOTHERA.

Nachtkerze.

490. O. BIENNIS.

Zweijährige

Nachtkerze;

*Rapontikwurz-
zel.*

Der Stengel aufrecht, ästig, rauh, feinhaarig, unten rund und oben ekkig. Die Blätter ey-lanzettartig, feinhaarig, flach, und am Rande mit schwielenartigen Zähnen besetzt. Die grossen einzelnen schwefelgelben Blumen stehen ährenartig.

Wohnort,

Virginien ist ihr Vaterland, von woher sie 1614. nach Europa kam. Sonst wurde sie bei uns gebaut; jetzt findet man sie häufig an gebauten und ungebauten Orten wild, z. B. am Ende der Hanauer Fasanerie; disseits Groß-Steinheim; häufig um Offenbach; bei dem Riedhof und dem Sandhof ohnweit Frank-

furt; hinter dem Frankf. Forsthaus im Wald: auf dem Lerchenberg; häufig an der Wetter zwischen Trayfs und dem Arnspurger Kloster; um Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juni — August. ♂

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Aus den Blumen holen die Bienen viel Wachs. Die sehr nahrhafte Wurzel wird gekocht, in Scheiben geschnitten und mit Oehl und Essig im Winter als Salat zubereitet, auch als Gemüß und in Suppen gebraucht; in dünne Scheiben geschnitten stellt sie aufs täuschendste gekochten Schinken vor, und ist daher auch in manchen Orten unter dem Namen Schinkensalat bekannt. An Geschmack und Nahrhaftigkeit übertrifft diese Wurzel beinahe den Zellerie und verdiente, überall angebaut zu werden.

CXCX. EPILOBIUM. Weiderich.

*) Mit niedergebogenen Staubfäden und Staubwege.

491. E. ANGUSTIFOLIUM.

Schmalblättriger Weiderich.

Der Stengel aufrecht, rund, glatt, ästig. Die Blätter zerstreut, gleichbreit-lanzettförmig, auf der untern Fläche fahlgrün, mit hervorragenden

den, querliegenden Nerven bezeichnet. Die schönen purpurrothen Blumenkrönen ungleich; die Blumenblätter ausgerandet. Der Kelch feinhaarig und roth. Die Saamenkapsel feinhaarig.

Wohnort. Auf Wiesen und in Wäldern auf feuchtem Boden. In der Hanauer Fasanerie, am Wilhelmsbad, im Gebüsch beim Hanauer Galgen; im Niederröder und Frankfurter Wald; im Wald beim Falkensteiner Schloß; ausserordentlich häufig bei Wisbaden; im Hangestein und an mehreren Orten um Giesen etc.

Blüthezeit. Juni bis August. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Er wird von dem Rindvieh, den Ziegen und Schaafen, aber nicht von den Pferden und Schweinen, gefressen. Die jungen zarten Wurzelsprossen kann man im Frühjahr wie Spargel essen; in Kamtschatka wird das Mark der Stengel für einen Lekkerbissen gehalten, und man kocht auch daselbst die Blätter als Gemüse, und nach Krascheninikow bereiten die dortigen Einwohner aus die-

ser Pflanze und dem Fliegenblätterschwamm (*A. muscarius.*) ein berauschendes Getränk, auch bedienen sie sich der Blätter, Stiele und Wurzel zum Thee, welche bei ihnen unter dem Namen kurilischer Thee bekannt ist.

Die Saamen liegen in einer feinen gelblichen Seide, die bei dieser, so wie bei allen Arten dieses Geschlechts, nach Holmberger, Springfield etc. mit verschiedenen Zusätzen ein feines Gespinnst giebt, und auch zu Papier, Kastenröcken etc. gebraucht werden kann. Die Isländer bereiten Dachte aus dieser Seide. Vielleicht könnte man aus der Wurzel Puder bereiten. Die Blätter geben eine röthlich braune Farbe. Fast alle unsere Weiderich - Arten verdienen, zur Zierde in unsern Gärten gezogen zu werden.

**) Mit aufrechten Staubfäden und zweispaltigen Blumenkronblättern.

492. E. GRANDIFLORUM

Roth.

Großblumiger
Weiderich.

Der Stengel aufrecht, vom Grunde an ästig, rund, haarig; die Aeste einander entgegenstehend. Die Blätter entgegenstehend, eyrund-lanzettförmig, umfassend, stiellos, rauh-

haarig, sägezahnig. Die grossen purpurrothen Blumen kommen einzeln aus den Blattwinkeln hervor. Die Narbe vierspaltig und dick.

Opilobium hirsutum *a* Linn.

Wohnort. In Sümpfen und an Wassergräben. In Gräben hinter dem Fischerhof bei Hannau und noch an mehreren Orten; unterhalb Bergen; um Frankfurt, Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Bemerkung. Besonders merkwürdig ist diese Pflanze, durch die von Priestley an ihr entdeckte Eigenschaft, eine Menge von entzündlicher Luft einzusaugen.

Nutzen. Das Vieh frisst ihn, ausgenommen die Schweine. Er giebt eine Seide welche wie die vorhergehende benutzt werden kann. In Italien wird er als Salat gegessen.

493 E. PARVIFLORUM.

Schrebr.

Kleinblumiger Weiderich.

Der Stengel aufrecht, sehr einfach, zottig, Die Blätter lanzettförmig, etwas sägezahnig, feinhaarig, unten

2. Th.

B

kurzgestielt, oben stiellos. Die kleinen blafsrothen, wechselweise stehenden Blumen bilden am Ende des Stengels eine Rispe, wo zwischen den Blumen kleinere einzeln sitzende Nebenblätter befindlich sind.

Epilobium hirsutum β Linn.

Wohnort. In Sümpfen und an Wassergräben. In den Chausseegräben nach Niederrothenbach zu; hinter Großsauheim; zwischen Rumpenheim und Bieber; um Frankfurt, Darmstadt, Friedberg, Giesen etc.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Wie bei der vorhergehenden Art.

494. E. RO-
SEUM Schrebr.
Rosenfarbiger
Weiderich.

Der Stengel aufrecht, rund, glatt, oben weiszottig, Die Blätter entgegenstehend und abwechselnd, gestielt, eyrund- lanzettförmig, sägezählig und glatt. Die Blumen blassroth. Die Narbe keulenförmig und unzertheilt. Der Fruchtknoten mit dichten weissen Zotten überzogen.

Wohnort. An Wassergräben und an sumpfigen Orten. Am Kohlbrunnen bei Hanau, an dem Mezgerbruch bei Frankfurt etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Kommt wohl mit den vorhergehenden Arten überein.

495. E. MONTA-
NUM.

*Berg-Wei-
derich.*

Der Stengel aufrecht, einfach, nur oben getheilt, rund, kaum feinhaarig, meistens glatt. Die Blätter entgegenstehend, kurz gestielt, eyförmig, gezahnt, glatt, die obersten abwechselnd und lanzettförmig. Die kleinen röthlichen Blumen stehen wechselweise und einzeln. Die Narbe tief vierspaltig, die Theile zurückgebogen.

Wohnort. In Wäldern und auf Bergen. Um Hanau in der Bulau; hinter Bischofsheim in der Lohe; im Wald hinter Oberrod; auf den Mauern beim Allerheilgenthor zu Frankfurt; beim Falkensteiner Schloß; im Hangestein bei Giesen; an vielen Orten im Vogelsberg etc.

Blüthezeit.	Juni bis August. 4
Fruchtreife.	September, Oktober.
Nutzen.	Er wird von dem Vieh gern gefressen.

496 E TETRA-
GONUM.

*Viereckiger
Weiderich.*

Der Stengel aufrecht, unten vier-
eckig, oben rundlich eckig. Die Blät-
ter lanzettförmig, klein sägezahnig,
die untersten entgegenstehend, die
oberen abwechselnd. Die rothen Blu-
menkronblätter ausgerandet. Die Nar-
be dick, anfangs ganz glatt gerandet
und zuletzt beinahe vier-paltig.

Wohnort.

An Gräben und überhaupt auf feuch-
tem Boden. Vor Bornheim an Gräben;
um Offenbach, Darmstadt, im Hange-
stein bei Giesen etc.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Das Vieh frisst ihn. Solang er noch
jung ist, essen ihn die Isländer als Ge-
müse. Meyer erhielt aus dem Saamen
Brennöl.

497. E. PALU-
STRE.

*Sumpf-Wei-
derich.*

Der Stengel aufrecht, rund, mei-
stens glatt, und nur zuweilen etwas
feinhaarig. Die Blätter entgegenste-
hend, lanzettförmig, ganz glattge-

rändet. Die Blumen blassroth, einzeln, klein, mit ausgerändeten Blumenblättchen. Die Blumenstiele meistens länger als die Saamenkapseln. Die Narbe etwas dick, anfangs glattgerändert und zuletzt fast viertheilig.

Wohnort. Häufig auf sumpfigem Boden, z. B. bei dem Steinheimergalgen; auf dem Sombornerberg; bei der Frankfurter grossen Sau- stiege; auf der Wiese im Niederröder- wäldchen etc.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Das Vieh frisst alle Arten des Weide- richs, aber doch diesen am liebsten. Zum Verfüttern sind sie vor dem Oeff- nen der Saamenkapseln am besten.

CXCI. VACCINIUM. *Heidelbeere.*

498. V. MYR-
TILLUS.

*Gemeine-Hei-
delbeere.*

Der Stengel zweitheilig, ekkig, hellgrün, glatt. Die Blätter eyför- mig, sägezählig, abfallend. Die Blu- menstiele einblumig, tragen röthli- che, nikkende Blumen. Der Kelch ohne Zähne. Die Beeren blaulich schwarz, selten weiss,

Wohnort. Häufig in unsern schattigen Wäldern z. B. beim Wolfsgang ohnfern Hanau; im Bruchköbler - und Neuhoferwald; bei Heusenstamm; hinter dem Frankfurter Forsthaus; hinter Homburg; auf dem Feldberg und in der ganzen Gegend; um Giesen, Darmstadt, Aschaffenburg, Wasserlos etc. mit weissen Beeren im Frontel bei Biber in der Obergrafschaft Hanau.

Blüthezeit. Mai, Juni. †

Fruchtreife. Juli.

Nutzen. Die Blätter werden von den Ziegen, den Pferden, Schweinen, Schaafen und dem Wild gefressen. Aus den Blüthen erhalten die Bienen reichliche Beute. Die Beeren sind für verschiedenes Wild eine Mast, und werden von dem zahmen und wilden Geflügel gerne gefressen. Man isst sie roh und gekocht, hebt sie auch gedörst auf und verwendet sie zu Bakkwerk und anderen Speisen, benutzt sie zum Branntweinbrennen, zur Färbung der Weine und zur Nachkünstlung des Pontakks; die Mabler und Färber bereiten eine dunkelblaue und violette, auch eine rothe Farbe daraus; in

Schottland bedient man sich des Saftes derselben statt der Zitronen zum Punsch, und mit Alaun giebt der frische Saft eine violette Farbe, deren sich die Schweden zur Färbung der Strümpfe bedienen; in Lappland mengt man die Beeren unter die aus Rennthiermilch gemachten Käse, und verspeist sie als einen Lekkerbissen. Der ganze Strauch ist zum Gerben tauglich, und wird auch in Schlesien hierzu angewendet. Die Blätter kann man statt des Thees gebrauchen, in Island färbt man mit denselben grün.

499. V. VITIS
IDAEA.
Preusselbeere.

Der Stengel am Grunde niederliegend, nachher aufrecht, rund. Die Blätter verkehrt-eiförmig, lederartig, am Rande etwas zurückgerollt, vollkommen ganz, unten punktirt, immergrün. Die weissen Blumen bilden am Ende eine überhängende, kurze, einfache Traube. Der Kelch fünfförmig. Die Beeren karminroth.

Wohnort.

In bergigen Wäldern auf trockenem Boden z. B. häufig auf dem Gipfel des Feldbergs, und im Lindenerwald.

Blüthezeit. Mai, Juni. †

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Die Blüthen geben den Bienen Honig. Die Beeren werden von dem Geflügel, auch von den Ziegen und Schweinen gefressen, und sind vorzüglich eine Lektorspeise der Bären. Reif ist man sie mit Essig und Zucker eingemacht; auch kann man sie roh in Torten bakken, und auch eine Gallerte daraus bereiten. Am angenehmsten schmekken sie, wenn man sie in einen siedenden Zuckersyrup wirft, wozu man zerschnittene Zitronenschale und einige Stücke Zimmt setzt, und hiermit so lange kochen läßt bis sie durchsichtig werden. Aus Gerste oder Roggen und diesen Beeren, läßt sich eine Art Bier, und bringt man sie mit Honig und Weingeist in Gährung, ein Wein bereiten. Die Blätter werden von einigen als Thee gebraucht. Nach B a u t s c h ist diese Pflanze zum Gerben brauchbar. Obgleich du R o i versichert man könnte diese Strauch - Arten gut fortpflanzen. so hat uns doch die Erfahrung gelehrt, daß sie sich, gleich allen zweihörnigen Pflanzen, weil die

Rinde ihrer Wurzeln sehr zart sind und leicht trocken werden, sehr schwer verpflanzen lassen, und auch dafs sie trotz Wendlands trefflicher Methode, doch immer noch aus Saamen schwer zu erziehen sind.

500. V. Oxy-
coccus.

Moosbeere.

Der Stengel fadenförmig, kriechend, nakkt. Die Blätter meistens in die Höhe gerichtet, eyrund, lederartig, spizzig, vollkommen ganz, am Rande zurückgerollt, immergrün. Die Blumenstiele fadenförmig, purpurroth, an der Spitze eingekrümmt. Die sehr schönen rothen Blumen überhängend. Die Beeren roth.

Wohnort.

Auf sumpfigem und torfartigem, meistens mit Sphagno bedeckten Boden. Häufig hinter der Tempelseemühle im Wald bei Offenbach; bei dem kalten Klingborn und auf mehreren Wiesen bei Offenbach; im Sumpf bei dem Frankfurter Forsthaus; auf der Wiese bei der Stinkhütte ohnweit Frankfurt; auf der grossen Förster Wiese bei Neuyenburg im Wald etc.

Blüthezeit.

Mai, Juni. †

Fruchtreife. Oktober, November.

Nutzen.

Die Beeren werden von den Schweinen und Kranichen, Schnee- und Haus-Hühnern gerne gefressen. In Rußland und Sibirien werden sie sowohl roh als auch mit Zucker und Honig eingemacht gegessen, und in England roh in Torten gebakken, oder mit Rahm und Zucker gegessen; der ausgepresste Saft giebt mit Wasser vermischt ein angenehmes Getränk und wird ohne Vermischung mit Wasser in Petersburg häufig zum Punsch benutzt. Auch läßt sich aus demselben ein Wein bereiten. Oft haben wir uns an diesen Beeren auf unsern botanischen Wanderungen gelabt. Die Silberarbeiter bedienen sich der Beeren um das Silber weiss zu sieden. Die Blätter sollen einen schmackhaften Thee geben. Obgleich diese kleine Strauchart häufig bei uns wächst, so macht man doch noch keinen Gebrauch davon. Die dünnen Ranken sind wohl zu klein um sie wie Leonhardi glaubt zu Flechtarbeit benutzen zu können. So lange wir ihn sammt dem umgebenden Moos verpflanzten, gieng er uns zu Grunde,

seitdem wir aber vor dem Pflanzen alles Moos sorgfältig von seinen feinen Wurzelfasern abmachen, blühet und bringt er alljährlich Beeren in unsern Gärten, auch ohne dafs wir ihn sehr feucht zu halten brauchen; überhaupt haben wir die Erfahrung gemacht, dafs die meisten Sumpfpflanzen sich leicht an trockneren Boden gewöhnen lassen, wann sie nur stets im Schatten stehen.

CXCII. ERICA, Heide.

501. E. VULGARIS.

*Gemeine
Heide.*

Die Blätter entgegenstehend und pfeilförmig. Die rothen, selten weissen, glockenförmigen, fast gleichen, einzelnen, überhängenden Blumen bilden am Ende eine Traube. Die Kelche gedoppelt. Die Staubbeutel begrannt. Der Griffel aus den Blumenkronen hervorragend.

Wohnort.

Mit rothen Blüthen allenthalben in grosser Menge, auf unfruchtharen Triften und in sandigen trocknen Wäldern. Mit weissen Blüthen auf dem Hausberg bei Butzbach; auf dem Münsterberg zwischen Orb und Salmünster; häufig

im Homburger Gebirge ohnweit der Goldgrube; im Lindener Wald bei Giesen; hinter dem Frankf. Forsthaus.

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Siehe bei der folgenden Art.

502. E. TETRALIX.

Sumpfbeide. Die Blätter zu vier quirlförmig beisammenstehend, gefranzt, länglich, unten filzig; die Blattstiele am Grunde aussen mit einer rothen Drüse bezeichnet. Die Kelche gefranzt, filzig. Die purporrothen, eyrunden, bauchigen, überhängenden Blumen, stehen kopfförmig beisammen. Die Staubbeutel zweigrannig, innerhalb der Blume. Der Griffel eingeschlossen.

Wohnort. Auf sumpfigem Boden. Selten auf dem Bruch hinter dem Frankfurter Forsthaus; bei Darmstadt an dem Herrgottsbrunnen, an mehreren Orten, in der Mark und bei Arheilgen nach der Koberstadt hin.

Blüthezeit. Juli, August. ✚

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen.

Diese und die vorhergehende Art tragen vieles zur Erzeugung des Torfs bei, werden von den Schaafen vorzüglich gerne und auch von den Ziegen und Pferden gefressen, geben den Bienen reichlichen Honig und Wachs, werden zu kleinen Besen gebraucht, in den Seidenspinnereien den Würmern zum Einspinnen vorgelegt, sind, vorzüglich die gemeine Heide wichtige Farbengewächse, und auch zum Gerben zu benutzen. Die Blätter und Zweige der gemeinen Heide wurden ehemals in England und Irland anstatt des Hopfens zum Bierbrauen gebraucht. Auf der Hebridischen Insel Jura kochen die Einwohner aus dem Saft des obern Theils der gem. Heide eine gelbe Farbe. Nach du Hamel werden um Bourdeaux die meisten Kohlen von grossen Heidewurzeln und ihren Stöcken bereitet, und Dillon behauptet, daß nichts im Pflanzenreiche zu Kohlen geschikter seye, als sie. In Schottland dekkt man mit *E. vulg.* die Dächer. Die weissblühende Abart wird in Thüringen zu allerhand abergläubischen Arzneymitteln bei dem Vieh ge-

braucht. Durch den Geruch der gem. Heide sollen die Mäuse vertrieben werden. An einigen Orten mengen die Mauerer die Blätter mit Stroh unter den Leinen. Da wo sie häufig wachsen, bedecken sie den Boden so, daß in ihrer Nachbarschaft keine andere Pflanze fortkommen kann. Durch fleissige Kultur lassen sie sich ausrotten. Sie empfehlen sich beide sehr zu Zierblumen, lassen sich aber äusserst schwer fortpflanzen. Sie aus Saamen zu ziehen ist zwar noch am sichersten, aber mühsam.

CXCIII. DAPHNE. Kellerhals.

503. D. MEZE-
REUM.

Gemeiner Kellerhals; Seidelbast.

Aus jeder Knospe kommen im ersten Frühling meistens drei purpurrothe, selten weisse, wohlriechende Blumen hervor; gleich nach der Blüthezeit kommen aus der Spitze der Knospe die Blätter büschelweise, endlich abwechselnd hervor, und sind lanzettförmig, glatt, glattgerändert und abfallend. Die Beeren nachdem die Farbe der Blumen war: von den weissen, gelb; von den rothen, roth.

Wohnort. Häufig in Wäldern. Im Gebüsch beim Hanauer Galgen; in der Hartig, der Lobe, Biesel, im Vilbeler-Wald; im Hägwald hinter Rentel; im Wald zwischen Falkenstein und Niederreifenberg; im Homburger Tannenwald und überhaupt sehr häufig im Homburger Gebirge; um Birstein, Darmstadt, Gießen etc. mit weissen Blumen hinter Wasserlos.

Blüthezeit. März, April. †

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Ziegen und Schaafe fressen ohne Nachtheil die Blätter, so wie viele Vögel und auch die Schweine die Beeren. Der Geruch der Blumen erregt Kopfweh, und dieser ganze Strauch hat für Menschen und sehr viele Thiere giftige Eigenschaften; vorzüglich hüte man sich etwas von ihm in den Mund zu nehmen weil er gleich Blasen zieht. Seine Rinde ist offizinell und unter dem Namen Seidelbast bekannt. Aus der Rinde der Wurzeln läßt sich ein grobes graues Papier bereiten. Die Mahler machen aus den Beeren eine rothe Farbe; mit denselben reiben sich die gemeinen Wei-

ber in Sibirien, welche ein rothes Gesicht für schön halten in dem Bade die Wangen, die davon anschwellen und fast entzündlich roth werden; zu eben der Absicht weichen die tatarischen Weiber die Beeren in Wasser ein und waschen sich mit denselben das Gesicht. Beckmann versichert, daß der Kelterhals dem schwachen Bier von Betrügern beigemischt würde, um solches dadurch stärker und berauschend zu machen. Zweige mit Blättern geben auf vorbereitetem Tuche gelbe und braune Farben. Wegen seinen purpurfarbigen wie Hyazinthe riechenden Blumen, deren Erscheinung ein Vorbote des Frühlings ist, wird dieser Strauch hin und wieder in unsern Gärten gezogen. Er läßt sich durch Saamen, Ableger, Stöcklinge und zerschneiden der Wurzel vermehren.

CXCIV. THYMELAEA. Thymelæe.

504. T. CNEORUM *Nobis.*

Niederliegende Thymelæe.

Der Stengel am Grunde niederliegend, nachher aufrecht. Die Blätter lanzettförmig, nakkt, glatträndig, weichstachelig, immergrün. Die hell-

rothen, sehr wohlriechenden Blumen sitzen stiellos, büschelweise, von den Stengelblättern ganz umgeben, am Ende der Zweige. Die Früchte anfänglich grün, endlich braun.

Daphne Cneorum Linn.

Wohnort. An trocknen sandigen waldigen Orten. Hinter dem Frankfurter Forsthaus bei dem Schwengelsbrunnen rechts und links im Wald unter den Fichten.

Blüthezeit. Mai, Juni. †

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Sie ist sehr scharf und verursacht im Mund heftiges Brennen und Blasen. Die Sardinier bedienen sich ihrer zum Schwarzfärben. Ihre schönen wohlriechenden rothen Blumen empfehlen sie sehr in Gärten als Zierblume, nur schade, daß sie so schwer zu verpflanzen ist. Man muß beim Ausgraben, ihre langen, unter dem Boden fortlaufenden Stengel bis zu ihrer kleinen gelben rübenförmigen Wurzel verfolgen, und sie dann in einen thonigen Boden pflanzen, wo sie am besten gedeihet. Sie läßt sich auch durch Ab-

leger, die aber erst nach einem Jahr Wurzel schlagen vermehren. Nur höchst selten bringt sie bei uns Früchte.

CXCV. STELLERA. Stellere.

505. S. PASSE-
RINA.

*Sperlings-
kopfartige
Stellere.*

Der Stengel aufrecht, ästig, ruthenartig. Die Blätter gleichbreit, abwechselnd, glattgerandet, zugespitzt. Die kleinen grünen, an der Spitze gelben Blumen, sitzen ungestielt in den Blattwinkeln. Der Saame glänzendschwarz, einem Sperlingskopf sehr ähnlich.

Wohnort.

Auf trockenen Feldern und auf Aekern unter der Saat. Auf Aekern bei der Hartig, beim Wartbäumchen vor Windekken, hinter Langenselbold, zwischen Hüttengesäfs und Ravoltshausen, bei der Lehmkaute hinter Steinfurt nach Butzbach; zwischen der Friedberger Warte und dem Brennigsheimer Steeg etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

II. ORDNUNG.

DIGYNIA. Mit zwei Staubwegen.

CXCVI. ACER. Ahorn.

506. A. PSEUDO-PLATANUS. Die Blätter herzförmig, fünf-
 Gemeiner, pig, ungleich und etwas stumpf sä-
 oder weisser gezahnt, oben glatt und dunkelgrün,
 Ahorn. unten weissgrau und hauptsächlich
 gegen die Rippen zu filzig. Die klei-
 nen Blumen haben gleichbreite, gelb-
 lichgrüne Kronblätter, und hängen
 in eyrundlichen Trauben herab. Die
 Saamen gross, mit einwärts wie ein
 Horn gekrümmten Flügeln.

Wohnort. In Wäldern. Um Hanau im Bruch-
 kübeler Wald, hinter dem Kohlrunnen,
 im Lambowald, im Forst; bei dem Rei-
 chebach hinter Falkenstein; an dem Kal-
 tenbach hinter Oberursel; bei Arheilgen
 an dem sogenannten Ruzenbache; im
 Lindener Wald bei Giesen; gepflanzt an
 der Chaussee beim Hanauer Galgen.

Blüthezeit. April und Mai, wenn sich die Blät-
 ter schon entwickelt haben. †

Fruchtreife. Oktober.

Nuzzen.

Er wird ansehnlich hoch und wohl 400 Jahr alt. Den Blüthen gehen die Bienen sehr nach und erhalten Wachs und Honig aus ihnen. Die Blätter sind ein gutes Viehfutter. Die Hamster sind sehr lüstern nach den Saamen der Ahorn-Arten. Die stärksten Stämme geben gute Bohlen zu Tischlerarbeiten; das maserige Holz wird zum Einlegen, auch zu Gewehrschäften und verschiedener Drechslerarbeit gebraucht; die feinen Bretter dienen zu musikalischen Instrumenten, und die mässigen Stämme zu Rollen, Walzen, Oelstempeln Tellern, Löffeln etc. Das Holz wirft sich nicht und wird nicht leicht vom Wurme angegriffen; man kann ihm auch eine sehr schöne Mahagonifarbe geben. Das Schlagholz ist gut zum Verbrennen und verkohlen. Weder Rinde noch Holz taugt für Färbereien. Wenn die stärkern Bäume, nach dem ersten harten Frost im November, wenn die Wurzeln mit Schnee bedeckt sind, an der Mittagsseite einen Fuß über der Erde angebohrt werden, so geben sie bis zu Ende des Dezembers alle 24 Stunden 6 bis 10

Maas Saft, der einen guten Essig Brantwein und auch vor der Gährung verdickt einen Zucker giebt, der in der Güte dem vom Zuckerahorn in Amerika gleichkommt; 16 Maas geben ohngefähr 1 Pfund Zucker. Aus diesem Saft bereitet man in Schottland und Irland einen lieblichen Wein. Ausser seiner Benutzung zu Alleen schickt er sich auch zur Abwechslung in Lustwaldungen. Den Schnitt verträgt er nicht wohl, indem er nachher zu viele Schößlinge aus der Wurzel treibt. Die Alten schätzten den Ahornbaum so äusserst hoch, daß sie ihn oft statt des Wassers mit Wein begossen. Durch Saamen und junge Triebe läßt er sich vermehren.

507. A. PLATANOIDES.

Spizziger

Ahorn; oder

Lenne.

Die Blätter fünflappig, auf beiden Seiten glatt; die Lappen scharfzugespitzt und scharfspizzig gezahnt. Bei dem Abreissen der Blätter quillt ein Milchsaft hervor. Die grossen Blumen haben eyförmige, gelblichgrüne Blumenkronblätter und stehen aufrecht in Doldentrauben. Die Saamen mit auswärts gekrümmten Flügeln.

Wohnort. In gebirgigen Waldungen. Im Rüd-
lingshayner Wäldchen im Oberwald; im
Hangestein bei Giesen; bei Arheilgen die
Hahnwiese genannt, und ohnfern dem
Forsthaus die Koberstadt bei Darmstadt;
gepflanzt, wiewohl selten, auf der Chaus-
see beim Hanauer Galgen.

Blüthezeit. April, Mai: wenn eben die Blätter
sich entfalten. †

Fruchtreife. September, Oktober.

Beobacht. Die Knospen haben im Winter eine
röthliche Farbe, und ihre geraden auf-
geschossenen, glatten Zweige, machen
sie sehr kenntlich.

Nutzen. Die scharfe Milch in den Blättern
schützt diesen Baum vor Insekten. Die
Bienen lieben die Blumen sehr und er-
halten viel Wachs und Honig aus ihnen.
Die Blätter sind den Schaafen ein ange-
nehmes Futter, und können jung auch
als Salat gegessen werden. Er enthält
ebenfalls einen süssen Saft, welcher wie
der von dem gemeinen Ahorne benutzt
werden kann. Das Holz ist weisser
und zäher als von jenem und wird von
den Drechslern und Schreibern vorzüg-
lich geschätzt. Zweige mit Blättern ge-

ben nach Suckov dem mit Alaun vorbereiteten Tuche eine schöne zitrongelbe, dem mit Eisenvitriol vorbereiteten aber eine gesättigte schwarzbraune Farbe. Alles übrige wie bei der vorhergehenden Art.

508. A. CAM-
PESTRE.

Feldahorn;
Massholder.

Die Rinde gelbbraun, rauh und mit Rissen versehen. Die Blätter herzförmig, fünflappig, glatt; die Lappen ohne Zähne, stumpf, die drei grösseren mit wenigen stumpfen Einschnitten. Die kleinen gelblichgrünen Blumen stehen in einer dreitheiligen aufrechten Doldentraube. Die Saamen mit wagrechten Flügeln.

Wohnort. Häufig in Hekken, Zäunen und Waldern.

Blüthezeit. April und Mai mit den Blättern zugleich. ♀, selten ♂

Nutzen. Die angebohrten Stämme geben einen süssen Saft, so wie die Blätter auch eine Milch enthalten. Wegen seines schönen Masers, dient das Holz sehr gut zu Drechsler und Wagnerarbeit; so wie zum Auslegen, zu Gewehrschäften und Pfeifenköpfen. Das gerade wird zu La-

destökken, und das junge Holz, so lange es sich gut spalten läßt, zu Peitschenstökken gebraucht. Als Brennholz ist es in Laubforsten eins von der besten Güte. Sowohl die Rinde als das Holz geben schöne braune und rothbraune Farben auf Tuch. Dieser Ahorn giebt vortreffliche Hekken, die nicht allein dicht wachsen, sondern auch den Schnitt sehr gut vertragen. Durch Saamen läßt er sich leicht vermehren.

CXCVII. CHRYSOSPLENIUM.

Milzkrant.

509. C. ALTERNIFOLIUM.

*Abwechselndblättriges
Milzkrant.*

Der Stengel aufrecht, einfach, dreiekkig. Die Blätter abwechselnd, herz-nierenförmig, gekerbt. Die Blumen goldgelb. Die Saamen glänzend.

Wohnort.

In Wäldern auf sumpfigem Boden. Auf sumpfigen Stellen in der Schneusse bei dem Wolfsgang ohnweit Hanau; hinter dem Sandhof am Graben der längst dem Niederröder Wäldchen hinzieht; auf der grossen Wiese bei der Frankfurter Saustiege; im Gieserwald bei dem Grundelbach und um den Waldbrun; bei Kranichstein an dem Ruze-

bache; dicht bei dem Offenbacher alten Hägewalds- Weiher im Wald, und an dem Lutherischen - Born.

Blüthezeit. April, Mai. 4

Fruchtreife. Juni, Juli.

Nutzen. Nach unserer Beobachtung frisst das Vieh diese und die folgende Art nicht. In Blumentöpfen und auf schattigen Rabatten gezogen, können sie als Zierblumen prangen. Sie lassen sich im August durch Zertheilung ihrer Wurzeln, so wie auch durch Saamen vermehren. Beide Arten erregen wenn sie roh oder gekocht gegessen werden heftiges Erbrechen.

510. C. OPPOSITIFOLIUM.

Entgegenstehendblättriges - Milzkraut.

Der Stengel niederliegend, vier-
ekkgig, wurzelnd. Die Blätter entgegenstehend, fast rund, etwas gekerbt. Die Blumen goldgelb. Die Saamen glänzend.

Wohnort. An Bächen und auf sumpfigem Boden in Wäldern. Bei Oberrothenbach links dem Schäferberg herab an einer Quelle; zwischen dem Feldberg und Altkühn auf Torfboden; nicht weit von Falkenstein an dem Reichebach; an den Drei-

born und an dem Kaltenbach; in der Mark ohnweit Rosdorf hinter Darmstadt; im Rüdlingshayner Wäldchen am Oberwald.

III. ORDNUNG.

TRIGYNIA. Mit drei Staubwegen.

CXCVIII. POLYGONUM. Knöterich.

*) Mit einer einzigen Blumenähre.

511. P. BISTOR-

TA.

Natterwurz.

Der Stengel aufrecht, rund, glatt, ganz einfach. Die Wurzelblätter eyrund, etwas wellenförmig, in den Blattstiel laufend; die Stengelblätter stiellos, eyrund-lanzettförmig, und mit Scheiden, die den Stengel umfassen versehen. Die Aehre, dicht, walzenförmig. Die schönen rothen, immer zu zweien beisammenstehenden Blumen, wovon die eine gestielt, die andere ungestielt ist, haben 3 Staubfäden und 3 Staubwege. Der Saame dreiekkig.

Wohnort.

Auf feuchten Wiesen, meistens in bergigen Gegenden. Sehr häufig bei Offenbach auf Wiesen bei dem kalten Kling-

born und um den Hinterwaldsweiher; an dem Wäldchen hinter Bockenheim auf den Wiesen; bei dem Reichebach hinter Falkenstein; hinter Oberursel; im Gebüsch bei dem Kloster Thron eine Stunde von Usingen; um Darmstadt, Arheilgen und Wixhausen auf feuchten Wiesen; in der dürrn Hekke bei Geddern; im Oberwald häufig.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli.

Nutzen. Die wohlriechenden Blumen geben den Bienen Wachs und Honig. Stengel und Blätter werden von dem Rindvieh, den Schaafen und Ziegen, aber nicht von den Pferden gefressen; die jungen zarten Blätter können auch als ein Zugemüs gegessen werden. Die Wurzel kann zur Gerberei, zur Färberei und auch zur Tiinte benutzt werden. Das Mehl derselben giebt dem Brod einen angenehmen Geschmakk; die Isländer machen mit diesem und saurer Molken Kuchen, welche sie auf heissen Platten bakken. In Sibirien fand Steller und Gmelin eine Abart mit nicht gekrümmten, zusammenziehenden, aber süssen fast wie

Haselnüsse schmeckenden Wurzeln, welche von den Russen und Kamtschadkalen sowohl roh als auch gekocht als Lekerbissen gegessen werden, ja sie lieben solche so sehr, daß sie dieselben sogar den Feldmäusen, welche diese Wurzeln als Wintervorrath in ihre Löcher zusammenschleppen, stehlen. Als Zierpflanze empfiehlt sie sich z. B. in Lustwaldungen wo ihre stark auslaufenden Wurzeln nichts schaden können. Sie ist officinell.

**) Mit zweispaltigem Stengsl, und weniger als acht Staubfäden.

512. P. AMPHIBIUM.

Amphibienknöterich.

Die Aehre eyförmig. Die rothen Blumen fünfmännig, halbzweiweibig. Der Saame rundlich - herzförmig, flach.

A barten.

a. Wasserknöterich. Der Stengel glatt, nach oben zu schwimmend. Die Blätter gestielt, stumpf, glatt. Die Aehre beinahe rund. Die Staubfäden kürzer als die Blumenkrone.

b. Landknöterich. Der Stengel aufrecht, haarig. Die Blätter sehr kurzgestielt, lanzettförmig, unten rauhhaarig. Die Aehre länglich. Die Staubfäden länger als die Blumenkrone.

Wohnort. In stehenden Wassern, Fischteichen, am Ufer der Wassergräben, auf feuchten Wiesen, und auch auf angebautem Lande, welches einen feuchten Boden hat. Um Hanau, Frankfurt, Arheilgen, Kranichstein, Darmstadt, Hungen, Lich, Friedberg, Butzbach etc.

Blüthezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Er wird von den Ziegen, den Schaafe, Schweinen und Pferden gefressen. Die ganze Pflanze hat einen sauern Geschmack, und soll dem Wein, wenn man sie damit gähren läßt, einen Himbeergeruch mittheilen, Gleditsch hat sie zum Gerben empfohlen.

513. P. HYDRO- Der Stengel, rund, glatt, zweitheilig und mit Gelenken versehen.
PIPER.
Wasserpfefer-Knöterich. Die Blätter lanzettförmig, in den

Blattstiel laufend, die Blattansätze abgestutzt, am Rande etwas gefranzt. Die Aehre schlaff, etwas überhängend. Die Blumen klein und purpurröthlich, haben sechs Staubfäden die kürzer als die Kronen sind. Der Griffel halbweispaltig. Der Saame stumpf-dreieckig, oben zugespitzt.

Wohnort. Auf feuchtem Boden. An Gräben bei Niederrothenbach; an Gräben im Niederröder Wäldchen; häufig um Darmstadt an Teichen, Gräben etc. im Gieserwald etc.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Der Wasserpfeffer gehört zu den sehr scharfen Pflanzen. Die gemeinen Leute brauchen ihn äusserlich zur Heilung böserartiger Geschwüre bei dem Vieh, und die Husaren pflegen die zerquetschten Blätter auf die vom Sattel wundgedrückten Stellen ihrer Pferde zur Heilung aufzulegen. Die Schweine fressen vor und nach dem Ferkeln diese Pflanze gerne. Gehörig zubereitet färbt sie die Wolle gelb. In China und Cochinchina

gebraucht man sie nach Laureiro, zu Verzäunungen für Wasserpflanzen. Die Blätter und Blumenähren werden nach Bryant in einigen Gegenden in England, von dem Landvolk zu den Speisen hinzugesetzt, um solchen den Geschmack von Pfeffer zu geben.

514. P. PERSICARIA.

*Pfersichkraut-
Knöterich;
Flöhkraut.*

Der Stengel aufrecht, oft am Grunde niederliegend, rund, sehr glatt. Die Blätter eyrund-lanzettförmig, in der Mitte mit einem braunen Flecken bezeichnet; die Blattansätze abgestutzt, am Rande gefranzt. Die Aehre eyrund-länglich, dicht, stumpf. Die Blumen weissröthlich, mit sechs Staubfäden so lang als die Krone. Der Griffel zweispaltig. Der Saame zusammengedrückt, etwas flach.

Wohnort.

Häufig an Aekkerrainen, auf etwas feuchten Aekkern, Schutthaufen, an Zäunen, Gräben etc.

Blüthezeit.

Juli, August. ☉

Fruchtreife.

September, Oktober.

Beobacht.

Es raviirt diese Pflanze, 1) mit rother und weisser Blüthe; 2) mit gefleck-

ten und ungeflekkten Blättern; 3) mit breiteren und schmälern Blättern; 4) mit unten grauen und rauhen Blättern.

Nutzen.

Er ist nicht so scharf als die vorhergehende Art, aber fast eben so zu benutzen. Von den Schaafen, Ziegen und Pferden wird er gefressen.

515. P. ANGUSTIFOLIUM
Roth.

Schmalblättriger Knöterich.

Der Stengel rund, fadenförmig, meistens niederliegend, sehr ästig, roth. Die Blätter lanzettförmig-gleichbreit, glatt; die Blattansätze abgestutzt, gefranzt. Die Aehren in den Blattwinkeln und auf der Spitze des Stengels, fadenförmig und schlaff. Die kleinen röthlichen, zuweilen weissen Blumen sechsmännig. Der Griffel etwas zweispaltig. Der Saame linsenförmig.

Polygonum Persicaria β Linn.

Wohnort.

Auf feuchtem sandigem Boden. Um Hanau zwischen dem Philippsruherschloss und der Fasanerie und noch an andern Orten; an feuchten Plätzen um Giesen; bei Wixhausen in Wiesengräben etc.

Blüthezeit.

Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.
 Nuzzen. Wie bei der vorhergehenden Art.

***) Mit Blumen welche acht Staubfäden haben.

516. P. AVICU-
 LARE.

*Wegetritt-
 Knöterich;
 Vogelknöte-
 rich.*

Der Stengel krautartig, niederliegend. Die Blätter lanzettförmig. Die Blumen weiss oder röthlich, stiellos, in den Blattwinkeln der Blätter, achtmännig, dreiweibig. Der Saamen dreiekkig.

Wohnort. Allenthalben an Strassen, Fußswegen, auf Aeckern, auf Mauern an Häusern etc.

Blüthezeit. Den ganzen Sommer durch. ☉

Fruchtreife. Vom Juli bis November.

Nuzzen. Die Schweine fressen ihn gerne, aber die Schaafte sollen davon verstopft und faul werden. Die Saamen glaubt Bryant könnte man in theuern Zeiten als ein Getreide benuzzen. Sie dienen im Herbst, Winter und Frühling einer unzähligen Menge von Vögeln zum Unterhalt. Nach Thunberg wird dieser Knöterich in Japan nebst dem chinesischen Knöterich gebaut, zerquetscht, in Kuchen geformt und wie der Waid zu einer Indigfarbe gebraucht. Nach Suckov giebt er eine

2. Th.

D

gute Vigognefarbe. Auf den Aekern ist er ein beschwerliches Unkraut. War officinell.

****) Mit fast herzförmigen Blättern.

†. 517. P. FAGOPYRUM.

Buchweizen;
Heidekorn.

Der Stengel aufrecht, röhrig, purpurroth, glatt, glänzend, ästig. Die Blätter herzförmig pfeilförmig. Die Blumen weiss oder röthlich. Die Ekken der Saamen zahnlos.

Wohnort.

Ursprünglich aus dem nördlichen Asien stammend, von woher er im Anfange des 15. Jahrhunderts nach Europa gekommen ist; schon längst bei uns häufig im Anbau und auch schon freiwillig hin und wieder auf Aekern und in Wäldern.

Blüthezeit.

Juni bis August. ☉

Fruchtreife.

September, Oktober.

Nutzen.

Die Blumen geben den Bienen reichlichen Stoff zu Honig und Wachs. Die grünen Stengel und Blätter sind ein gutes Viehfutter und in Italien wird er deswegen gebaut. Der Saamen dient zur Mästung der Schweine, welche davon ein sehr schmackhaftes Fleisch bekommen, und ist auch ein gutes Futter

für das Geflügel; auch giebt er Oehl, in Verbindung mit Möhren Bier, und mit etwas Malz vermischt einen vortreflichen Brantwein, Die Buchweizen-Grütze ist äusserst gesund und nahrhaft, und dient sowohl zu Brod, als auch zu Suppen etc. Gleditsch hat aus ihr Stärke bereitet. Nach Manetti giebt das mit Butter und Lodiser Käse zubereitete Buchweizenmehl in der Lombardey ein wohlschmeckendes Gerichte ab, welches *Polenta nera* genennet wird. Die Grütze giebt eine röthliche Nankinfarbe. Das frische und getrocknete Kraut, ist von vorzüglichem Werth für Färbereien, und giebt sowohl für sich, als in der Verbindung der Rinde von italienischen Pappeln und Krapp, sehr schöne hochbraune dauerhafte Farben.

†. 518. P. TATARICUM.

*Tatarischer
Knöterich.
Gezählter
Buchweizen.*

Der Stengel aufrecht, gegliedert. Die Blätter herzförmlich pfeilförmig. Die Blumen weiss, oft ein wenig roth oder purpurroth. Die Ekken der Saamen stumpf gezähnt.

Wohnort. Stammt aus der Tartarey, wird aber nun bei uns eben so, wie die vorhergehende Art gebaut.

Blüthezeit. Juli, August, ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Er verdient in aller Hinsicht dem gemeinen Buchweizen vorgezogen zu werden, da er die Kälte gut verträgt, weit mehr Saamen liefert, und grössere saftigere Stengel treibt, welche frisch und getrocknet eine gute Viehfütterung geben. Die Blätter können wie Spinat zubereitet und gegessen werden. Die ganze Benutzung ist völlig der vorhergehenden Art gleich.

519. P. CON-
VOLVULUS.

*Winden- Knö-
terich; Buch-
winde.*

Der Stengel windend, ekkig, ästig, glatt. Die Blätter herzförmig; die Blattansätze abgestutzt und ganz. Die weisslichgrünen Blumen sind nachenförmig. Der Griffel ist einfach, und die drei Narben kugelförmig. Der Saame dreiekkig, glatt und schwarz.

Wohnort. Fast allenthalben auf Aeckern z. B. hinter dem Lehrhof bei Hanau, um Frankfurt, Giesen, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Da er zu gleicher Zeit mit den vorhergehenden reif wird, sich auch sehr gut einsammeln läßt, und die Kälte gut verträgt, so könnte er wie der gemeine Buchweizen angebaut und auch eben so benutzt werden. Die Schaafse lassen ihn stehen, dem andern Vieh aber schmeckt er angenehm. Den Saamen fressen die Vögel gern, und man könnte ihn, so wie es nach Lepechin in Sibirien geschieht zum Füttern des Federviehs benutzen. Das Kraut giebt braune, und hochzitrongelbe Farben.

520. P. DUMETORVM.

Hekken - Knöterich; Hekkenbuchwinde.

Der Stengel windend, glatt, gestreift. Die Blätter herzförmlich pfeilförmig. Die weisslichgrünen Blumen, mit einer häutigen, geflügelten, durchsichtigen Rückenschärfe. Der Griffel sehr kurz, und die drei Narben kugelförmig. Der Saame dreieckig.

Wohnort. Häufig an Zäunen und in Gebüsch um Hanau, Offenbach, Steinheim, Frankfurt, Darmstadt, Gießen etc.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Wie bei der vorhergehenden Art. Da er hoch wächst, so kann er auch zur Bekleidung der Hütten gebraucht werden. Stengel und Blätter geben moschusartige Farben.

IV. ORDNUNG.

TETRAGYNIA. Mit vier Staubwegen.

CXCIX. PARIS. Einbeere.

521. P. QUADRI-
FOLIA.

Vierblättrige
Einbeere.

Der Stengel aufrecht, ganz einfach, fast fushoch, rund, nakkt; an der Spitze des Stengels sitzen vier eyförmige, ungestielte, glattgerändete, glatte, unten glänzende Blätter. Eine einzige gelblichgrüne, gestielte Blume, stehet oben auf dem Ende des Stengels, und auf sie folgt eine schwarzbraune Beere.

Wohnort. In Wäldern. In der Hanauer Fasanerie, im Forst, im Mittelbacher- und Bruchköbler Wald; im Lehen bei Offenbach; in dem Wäldchen hinter Bockenheim; im Lindener Wald und Hangenstein; bei Arheilgen in der Täubchen-

höhle und an mehreren Orten um Darmstadt; bei Gedern in dem Steinwald etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juni, Juli.

Beobacht. Es giebt Abänderungen mit drei, fünf und sechs Blättern.

Nutzen. Diese Pflanze empfiehlt sich durch ihre ganz eigene Gestalt als Zierblume in die Gärten. Die vor dem Blühen gesammelten Blätter getrocknet und mit Garn oder Linnen, welches vorher in Alaunwasser gebeizt worden ist gekocht, färben dasselbe gelb. Die Beeren haben betäubende Eigenschaften, und verursachen, so wie die Wurzeln, den Menschen Magenkrampf und Erbrechen; mehreren Thieren z. B. den Hühnern sind sie tödlich. Die noch unreifen Beeren liefern für Mignaturmaler eine schöne grüne Farbe.

CC. ADOXA. Bisamkraut.

522. A. MOSCHATELLINA.

Gemeines

Bisamkraut.

Die Wurzel büschelförmig, schuppig, fleischig und weiss. Der Stengel aufrecht, einfach, viereckig, unten nakkt, über der Mitte mit zwei entgegenstehenden, dreilappigen, ein-

geschnittenen Blättern versehen. Die grünlichgelben Blumen ungestielt, bilden am Ende des Stengels einen einzelnen, gestielten, meistens fünfblumigen würfelförmigen Blumenkopf. Die runde Beere, von Geruch und Geschmakk wie Bisam.

Wohnort. In Wäldern, Zäunen und Gebüsch in einem lockeren, schwammigen, fetten Boden. Im Gebüsch beim Kinzigheimerhof; vor Rückingen in Zäunen; in dem Escherig auf der Bieberermark bei Offenbach; in den Zäunen bei dem Offenbacher Judenkirchhof; nahe bei dem Hellerhof; in Dorngebüsch und Zäunen um Rödgen bei Giesen etc.

Blüthezeit. März, April. 4

Fruchtreife. Mai.

Nutzen. Die Blätter und Blumen dieser Pflanze haben einen feinen bisamartigen Geruch. Sie verdient in Gärten, vorzüglich unter Bäumen und im Schatten gepflanzt zu werden. Sie läßt sich sehr leicht um die Zeit im Sommer da ihre Blätter absterben, durch ihre Nebenknollen ver-

mehren. Schon zu Ende Juni ist diese Pflanze nicht mehr sichtbar.

CCI. ELATINE. Tännel.

523. E. HYDRO-
PIPER.

*Wasserpfe-
fer - Tännel.*

Die Stengel unter dem Wasser krie-
chend, sehr ästig, zweitheilig, rund,
wurzelschlagend. Die Blätter entge-
genstehend. Die Blumen blassroth,
abwechsell, 4-8 männig, vierwei-
big. Kelch und Blumenkrone vier-
blättrig. Die Frucht seitwärts nie-
dergebogen.

Wohnort.

In Gräben und auf überschwemmten
Orten. Um Nauheim (Mönch); bei
Arheilgen und Kranichstein in reinen
Bächen unter dem Wasser, oder auch
an überschwemmt gewesenen Stellen
(Borckh.)

Blüthezeit.

Juni, Juli. ☉

Fruchtreife.

August.

Nutzen.

Die Ziegen fressen ihn nach Linné
gerne.

524. E. TRIAN-
DRA Schkuhr.

*Dreimänni-
ger - Tännel.*

Die Stengel unter dem Wasser krie-
chend, sehr ästig, zweitheilig, etwas
geflügelt, wurzelschlagend. Die Blät-

ter entgegenstehend. Die rothen dreiblätterigen Blumen, 3 - 6 männig, dreiweibig. Der Kelch 2 - 3 blätterig, Die Saamen wenig gekrümmt und roth,

Wohnort. An überschwemmt gewesenen Orten, z. B. nach Borckh. nicht selten bei Arheilgen und Kranichstein.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen, Diese Art wird wohl auch von den Ziegen gefressen.

NEUNTE KLASSE.

ENNEANDRIA. Mit neun Staubfäden.

HEXAGYNIA. Mit sechs Staubwegen.

CCII.

BUTOMUS.

Wasserviole.

Der Kelch eine dreiblättrige, kurze, einfache, abfallende Hülle. Die Blumenkrone sechsblättrig; die Blättchen rundlich, ausgehöhlt, und wechselsweise kürzer und spizziger. Die Staubbeutel zweilappig. Die Narben dikklich. Die sechs länglichen, zusammengewachsenen, aufrechtstehenden, einklappigen, eyförmig-geschnäbelten, nach innen zu aufgehenden, einfächerigen Saamenkapseln, enthalten viele, länglich walzenförmige, auf beiden Seiten stumpfe und den Wänden der Kapseln angewachsene Saamen.

N E U N T E K L A S S E.

ENNEANDRIA. Mit neun Staubfäden.

HEXAGYNIA. Mit sechs Staubwegen.

CCII. BUTOMUS. Wasserviole.

525. B. UMBELLATUS. Die Blätter schwertförmig, dreieckig, aufrecht, sehr lang, glatt. *Doldenförmige Wasserviole.* Der Schaft aufrecht, rund, nakkt, endigt sich mit einer schönen, einfachen Dolde. Die Blumen rosenroth, gross und langgestielt.

Wohnort. Am Ufer der Flüsse, Teiche, Gräben und in stillstehenden Wässern. Am Mayn- ufer hinter Philippsruh, und vor Fechenheim; im Sumpf bei dem Hanauer Galgen im Wald; bei Frankfurt am Mayn- ufer; in den Gräben hinter dem Kettenhof und dem Mezgerbruch; in der Wetter zwischen Steinfurt und Oppershofen; bei Lich; am Lahn- ufer und an der Wissek bei Giesen; um Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juni bis August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Diese ausserordentlich schöne Pflanze, die man in Gärten in Gräben und Teiche an das Ufer säen und auch in Blumenköpfen ziehen sollte, lassen Schaaf und alles Vieh unberührt stehen. Die zaserige bitterschmeckende Wurzel wird von den Jakuten und andern russischen Nationen gegessen. Aus den Blättern kann man allerhand Körbe zum Einpakken verfertigen, und die Holländer machen Matten daraus.

Sumpfpflanzen in Töpfen zu ziehen gelingt nach unserer Erfahrung auf folgende Art am besten: man füllt einen Blumentopf mit einer Vermischung von Schlamm, etwas Erde und Moos an, säet entweder den Saamen im Spätherbst, oder im Frühling, oder pflanzt auch das Gewächs selbst in denselben, stellt diesen Topf in einen grössern, durch welchen kein Wasser durchdringen kann, gräbt diesen an einen schattigen Ort so tief in die Erde ein, daß er nur noch ohngefähr einen Zoll hoch über derselben herausragt und trägt dann Sorge, daß er stets mit Wasser angefüllt ist.

Durch das Herausragen des Topfs über der Erde, wird verhindert, daß keine Würmer sich in denselben einnisten, welche oft bei zarten Pflanzen die Wurzeln losbohren. Den Winter über müssen diese Töpfe und die Erde um dieselben mit Laub oder Moos wohl zugedeckt werden, sonst erfrieren die Pflanzen meistens.

ZEHNTE KLASSE.

DECANDRIA. Mit zehn Staubfäden.

I. ORDNUNG.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

*) Die Blumenkronen vierblättrig, unregelmässig.

CCIII.
DICTAMNUS
Diptam.

Kelch und Blumenkrone sind fünfblättrig, von den Blättern der letztern sind zwei aufwärts, zwei seitwärts, und eins niederwärts gebogen. Die Staubfäden sind niedergebogen und mit punktförmigen Drüsen besetzt. Die gedoppelte Kapsel zusammengedrückt, zugespitzt, fünffächerig: die äussere rauh und krautartig, die innere knorpelartig, von innen aus elastisch aufspringend, enthält viele kugelrunde, glänzende Saamen.

**) Die Blumenkronen vierblättrig, regelmässig.

CCIV.
MONOTRO-
PA.
Monotropa.

Die oberste Blumenkrone hat 10 Blätter und 10 Staubfäden, die zur Seite stehenden Blumenkronen nur 8 Blätter und 8 Staubfäden; alle Blätter an der Spitze sägeartig gezähnt und innwen-

dig haarig; die äussern kelchartig, länger, und am Grunde der innern honiggebenden Vertiefung wegen, erhaben. Der Staubfäden sind 10 und 8. Die Narbe kopfförmig. Die eyrunde Kapsel ist 4-5 furchig, 4-5 klappig, 4-5 fächerig und enthält viele spreuartige Saamen.

CCV.
PYROLA.
Pyrola.

Der Kelch fünftheilig. Die Blumenkrone fünfblättrig. Die Staubfäden haben grosse überhängende, oben zweihörnige Staubbeutel. Die Beerenkapsel fast rund, benabelt, fünfeckig, fünffächerig, fünfklappig, springt an den Ekken auf mit entgegenstehenden Scheidewänden, und enthält viele mit einer spreuartigen Haut umgebene Saamen.

***) Die Blumenkronen einblättrig, gleichförmig.

CCVI.
ANDROMEDA.
Andromeda.

Der Kelch sehr klein, fünftheilig, gefärbt, bleibend. Die Blumenkrone eyrund mit fünfspaltigem zurückgeschlagenem Rande. Die Staubfäden haben begrante Staubbeutel. Die Kapsel eyrund, fünfeckig, fünffächerig, fünfklappig, springt an den Ekken mit entgegenstehen-

den Scheidewänden auf und enthält viele rundliche, glänzende Saamen.

II. ORDNUNG.

DIGYNIA. Mit zwei Staubwegen.

CCVII.
ASCLEPIAS.
Asklepie.

In die Familie der Conorten gehörig. Der Kelch fünfspaltig, gleich, spizzig, klein, bleibend. Die Blumenkrone fünfspaltig, gleich, flach, zurückgebogen, unterhalb dem Fruchtknoten; die Theile eyrund, zugespitzt, und etwas nach der Sonne gedreht. Im Innern dieser Blumenkrone befinden sich noch fünf eyförmige, hohle, fleischige Afterblumenblättchen, aus deren Grunde ein spizziges eingebogenes Hörnchen in die Höhe steigt. Die Staubfäden paarweise mit einander verbunden, unter den Spalten der Narbe verborgen. Die zwei Staubwege der beiden länglichen Fruchtknoten haben eine gemeinschaftliche große dicke, fünfeckige, oben mit den Staubbeutelspitzen bedeckte, in der Mitte mit einer Vertiefung versehene, in zwei Theile theilbare Narbe. Die zwei grossen zugespizzen, bauchigen Fruchtbälge,

sind einfächerig und einklappig, und enthalten viele schuppig übereinander liegende, mit Haarkronen versehene Saamen, an einem freien häutigen Fruchtboden.

CCIX.
SCLERANTHUS.
Knaul.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten röhrig, zur Hälfte fünfspaltig, spizzig, mit verengtem Hals, und bleibend. Die Blumenkrone fehlt. Die fünf, oder zehn Staubfäden sind dem Kelche einverleibt. Die Fruchthülle eyrund, sehr zart, im lederartigen Kelch eingeschlossen, enthält einen einzelnen, an der einen Seite flachen und auf der andern erhabenen Saamen.

CCVIII.
SAXIFRAGA
Steinbrech.

Der Kelch fünftheilig, bleibend, bald an die Kapsel angewachsen, bald frei. Die Blumenkrone fünfblättrig. Die Kapsel unter dem Kelch, oder nur damit bekleidet, zweischnäbelig, zweifächerig, unter den Griffeln mit einer Oeffnung aufspringend und vielsaamig.

CCX.
GYPSOPHILA
Gypskraut.

Der Kelch fünftheilig, glockenförmig eckig, an den Ekken gefärbt, bleibend. Die Blumenkrone fünfblättrig, eyförmig, stumpf, abstehend, mit nägelför-

migen Fortsätzen versehen. Die Narben einfach. Die Kapsel kugelrund, einfächerig, vier- bis fünflappig, springt vier- bis fünffach auf, und enthält viele fast runde Saamen.

CCXI
SAPONARIA.
Seifenkraut

Der Kelch röhrig, fünfzahnig. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, fünfblättrig, mit Nägeln versehen. Afterblumenblätter zwei, sehr schmal, an der Kronplatte angewachsen. Die Kapsel etwas spindelförmig, klappenlos, an der Spitze fünffach aufspringend, unten zwei- oben - einfächerig, vielsaamig.

CCXII
VACCARIA.
Kuhkraut.

Der Kelch pyramidenförmig, fünfkantig. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, fünfblättrig, mit nägelförmigen Fortsätzen versehen. Die Kapsel fast kegelförmig, gedoppelt: die äussere knorpelartig, an der Spitze mit 4 Zähnen aufspringend: die innere sehr dünne hautartig, oben unregelmässig sich öffnend, unten drei- bis vierfächerig, oben einfächerig, vielsaamig.

CCXIII.
DIANTHUS
Nelke.

Der Kelch röhrig, fünfzahnig, am Grunde mit angedrückten Schuppen um-

geben. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, fünfblätterig, die Blättchen mit nagelförmigen Fortsätzen, und gezähnt. Die Narben spizzig und zurückgekrümmt. Die Kapsel walzenförmig, einfächerig, an der Spitze vierfach aufspringend, vielsaamig.

III. ORDNUNG.

TRIGYNIA. Mit drei Staubwegen.

CCXVII.

ARENARIA.

Sandkraut.

Der Kelch fünfblätterig, abstehend, bleibend. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, fünfblätterig; die Blättchen eyrund, glatträndig, abstehend. Die Kapsel eyförmig, einfächerig, an der Spitze drei bis sechsfach aufspringend, enthält viele nierenförmige Saamen.

CCXVII.

STELLARIA.

Sternblume.

Der Kelch fünfblätterig; die Blättchen eyrund- lanzettförmig, ausgehöhlt, spizzig, abstehend, bleibend. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, fünfblätterig; die Blättchen flach, länglig, zweitheilig. Die Kapsel eyrund, einfächerig; sechsklappig, enthält viele, fast runde, zusammengedrückte Saamen.

CCXIV. Der Kelch aufgeblasen, fünfzählig.
CUCUBALUS. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, fünfblätterig; die Blättchen manchmal zweispaltig, mit nägelförmigen Fortsätzen, am Schlunde nakkt. Die Kapsel dreifächerig, an der Spitze aufspringend, vielsaamig.
Kukubal.

CCXV. Der Kelch glockenförmig, aufgeblasen, fünfzählig. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, fünfblätterig; die Blättchen von einander stehend, zweispaltig, mit nägelförmigen Fortsätzen, am Schlunde mit Zähnchen besetzt. Die dem überhangenden Kelch einverleibte, schwarze Beerenkapsel kugelrund, einfächerig, enthält viele nierenförmige Saamen. Der Fruchtboden frei.
SCRIBAEA.
Scribäe.

CCXVI. Der Kelch länglich, fünfzählig. Die Blumenkrone unterhalb dem Fruchtknoten, fünfblätterig; die Blättchen zweispaltig-gekerbt, mit schmalen nägelförmigen Fortsätzen, am Schlunde mit Zähnchen besetzt. Die Kapsel drei- bis vierfächerig, an der Spitze aufspringend, enthält viele nierenförmige Saamen.
SILENE.
Silene.

IV. ORDNUNG.

PENTAGYNIA. Mit fünf Staubwegen.

CCXIX.
SEDUM.
Sedum.

Der Kelch fünf- bis sechsspaltig. Die Blumenkrone fünf- bis sechsblättrig, enthält am Grunde der fünf Fruchtknoten fünf an der Spitze eingeschnittene Schüppchen. Staubfäden sieben bis zwölf. Staubwege fünf bis sechs. Kapseln fünf bis sechs, deutlich von einander abgesondert, zugespitzt, zusammengedrückt, nach dem Grunde zu ausgeschweift, von der innern Seite aufspringend und vielsamig.

CCXXIV.
SPERGULA.
Spark.

Der Kelch fünfblättrig; die Blättchen eyrund, stumpf, ausgehöhlt, abste-
hend. Die Blumenkrone fünfblättrig; die Blättchen eyrund, ausgehöhlt, abste-
hend, ganz, grösser als der Kelch. Der Staubfäden zehn oder fünf. Die Kapsel eyförmig, halbfünflappig, einfächerig, enthält viele zusammengedrückt- kugelige, mit einem ausgeschnittenen Rande umgürtete Saamen.

CCXXIII.
CERASTIUM.
Hornkraut.

Der Kelch fünfblättrig; die Blättchen eyrund- lanzettförmig, spizzig, abste-
hend. Die Blumenkrone fünfblättrig;

die Blättchen zweispaltig, stumpf, aufrechtstehend, beinahe so lang als der Kelch. Die Kapsel länglich oder kugelförmig, einfächerig, an der Spitze zehnzählig und zehnfach aufspringend, enthält viele fast runde Saamen.

CCXXI.
AGROSTEM-
MA.
Raden.

Der Kelch röhrig, lederartig, fünfzählig, bleibend. Die Blumenkrone fünfblätterig; die Blättchen mit langen nägelförmigen Fortsätzen, am Schlunde nackt, mit flachem, abstehendem, stumpfem Saum. Die Kapsel länglich-eyrund, einfächerig, fünfklappig, an der Spitze fünffach aufspringend, enthält viele nierenförmige punktirte Saamen, welche auf stufenweise längern Stielen, an dem in der Kapsel freistehenden Fruchtboden befindlich sind.

CCXXII.
LYCHNIS.
Lychnis.

Der Kelch röhrig, häutig, glatt, fünfzählig, bleibend. Die Blumenkrone fünfblätterig, mit nägelförmigen Fortsätzen, am Schlunde mit Zähnen gekrönt, und flachem, zweispaltigem Saume. Die Kapsel beinahe eyrund, ein- bis fünffächerig, fünfklappig, enthält viele fast runde Saamen.

CCXX.
OXALIS.
Sauerklee.

Der Kelch fünftheilig, spizzig, sehr kurz, bleibend. Die Blumenkrone fünfblättrig; die Blättchen hängen mit den nägelförmigen Fortsätzen zusammen, sind stumpf und ausgeschweift, und stehen aufrecht. Die Staubfäden ungleich, die fünf äusseren kürzern am Grunde zusammengewachsen. Die Kapsel fünfeckig, fünfklappig, fünffächerig, springt an den Ekken der Länge nach auf, und enthält in jedem Fächerchen zwei bis drei mit einer korkartigen elastischen Haut bedekkte Saamen.

ZEHNTE KLASSE.

DECANDRIA. Mit zehn Staubfäden.

I. O R D N U N G.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

CCIII. DICTAMNUS. Diptam.

526. D. ALBUS. Der einfache Stengel, die Blumenstiele und die Blumenblätter sind mit harzigen haarförmigen Drüsen besetzt. Die Blätter gefiedert; die Fiederblättchen eyförmig und gering gekerbt. Die Blattstiele geflügelt. Die weißlichrothen, wohlriechenden Blumen bilden am Ende des Stengels eine eyrunde, zusammengesetzte Traube.

Wohnort. In Wäldern. In sehr großer Menge in den Tannen, im Offenbacher neuen Hägwald an der Babenhäusser Landstrasse; im Frankfurter Wald vor und hinter dem Schwengelsbrunnen.

- Blüthezeit. Juni, Juli. 4
- Fruchtreife. August, September.
- Beobachtung. Die ganze Pflanze hat einen starken harzigen Geruch, der von ihrem wesentlichen Oehle herrührt, das seinen Sizz auf der Oberfläche der äussersten Stengel und in den inwendigen Theilen der Blumen in ganz kleinen Bläschen hat. Dies Oehl ist so entzündbar, dafs die Ausdünstungen, wenn man nach einem heissen trocknen Tage des Abends die Pflanze mit einem Lichte berührt und sie dabei schüttelt, brennen; nur mufs der Wind die brennbaren Ausdünstungen noch nicht zerstreuet haben.
- Nutzen. Ihrer schönen wohlriechenden Blumen wegen, aus welchen die Bienen Honig holen, verdient sie mit Recht eine der ersten Stellen in unsern Gärten. Die Wurzel ist schon von alten Zeiten her officinell. Durch Saamen und Wurzelzertheilung läfst sich der Diptam vermehren.

CCIV. MONOTROPA. Monotropa.

527. M. HYPO- Der Stengel ganz einfach, aufrecht,
PITHYS. weifslich, glänzend, und mit eyrun-
Fichten Monotropa.

den, stumpfen, weisslichen Schuppen anstatt der Blätter besetzt. Die gelblichweissen kurzgestielten Blumen bilden am Ende des Stengels eine überhängende Traube.

Wohnort. Wächst als eine Schmarozerpflanze auf den Wurzeln der Bäume, besonders der Nadelhölzer in etwas hochliegenden Wäldern z. B. um Hanau, Offenbach, Frankfurt, Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. September.

Nutzen: Sie soll in Schweden dem Rindvieh und den Schaafen wider den Husten gegeben werden.

CCV. PYROLA. Pyrole.

528. P. ROTUNDIFOLIA.

Rundblättrige Pyrole.

Der Schaft aufrecht, nakkt, trägt am Ende die weissen gestielten, einzeln und wechselsweise stehenden ziemlich grossen Blumen in einer einfachen Traube. Die Blätter liegen kreisförmig, sind rund, gestielt, schwach gekerbt, etwas hart und glatt. Die Staubfäden aufsteigend;

der Stempel niedergebogen; die Narbe verdickt, fünfzählig: die Zähne aufrecht und spizzig.

Wohnort. In schattigen hochliegenden Wäldern z. B. hinter Homburg, bei Frankfurt, Darmstadt, Arheilgen, Wetzlar, Giesen, Badenburg, Linden, Glauberg etc.

Blütezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Nach Pallas werden die Blätter bei den Mongolen und Buräten als Thee gebraucht. Es liessen sich wohl auch die übrigen Arten hierzu benutzen; vielleicht auch zum Ledergerben anwenden. Dieses ganze Geschlecht empfiehlt sich sehr zu Zierblumen, ist aber, wie uns eigene Erfahrung gelehrt hat, äusserst schwer fortzupflanzen. Die Blätter waren sonst officinell.

529. P. MINOR.
Kleine Pyrole,

Der Schaft aufrecht, nakkt, trägt am Ende die weissen gestielten, einzeln und wechselsweise stehenden kleinen Blumen in einer dichten Traube. Die Blätter sind wie bei der vorhergehenden Art. Die Staubfäden

und der Stempel aufrecht. Die Narbe schildförmig, gewölbt und fünf-lappig.

Wohnort. In schattigen hochliegenden Wäldern z. B. hinter Homburg, Falkenstein, Frankfurt, Bischofsheim, Darmstadt, Giesen, Badenburg, Linden, Pfaffen-wisbach etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Diese Art ist in allen ihren Theilen kleiner als die vorhergehende.

Nutzen. Wie bei *P. rotundifolia*.

550. *P. SECUN-* Der Stengel aufrecht, einfach,
DA. zweiekkig. Die Blätter eyförmig,
Einseitige Py- langzugespitzt, schwach gekerbt. Die
role, weissen Blumen einzeln, abhängig, bilden eine lange, einfache, einsei-tige Traube. Die Narbe schildförmig, gewölbt, fünf-lappig, mit fünf Oeffnungen durchbohrt.

Wohnort. In schattigen gebirgigen Waldungen z. B. auf dem Glauberg bei Ortenberg; in dem Homburger grossen Tannenwald; zwischen Grünberg und Merlau; in Fich-

tenwäldern zwischen Burkhardts und Escherod; im Arheilger Wald; auf der Hartig.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. ✓ August, September.

Nutzen. Gewiss wie die vorhergehenden Arten zu benutzen.

531. P. UMBELLATA.

Doldenförmige Pyrole.

Der Stengel aufrecht, oder am Grunde niederliegend, strauchartig, ästig und zweitheilig. Die Blätter keilförmig- lanzettartig, stumpf sägeartig gezähnt, glatt, hart, immergrün, bald entgegenstehend, bald quirlförmig. Die weisslichrothen, gestielten, aufrechtstehenden, Blumen bilden am Ende eine ganz einfache, wenigblumige Dolde. Die Narbe fast aufsitzend, zirkelrund, in der Mitte ausgehöhlt.

Wohnort. In schattigen Wäldern z. B. zwischen Oberrotenbach und Somborn unter *Pinus Picea du Roi*; in dem Offenbacher neuen Hägewald bei *Dictamnus albus*; hinter dem Lerchenberg im Wald; bei Darmstadt in der Tanne.

Blüthezeit. Juni, Juli. ⚔

Blüthezeit. August, September.

Fruchtreife. Wie die vorhergehenden Arten zu benutzen.

552. P. UNI-
FLORA.
Einblüthige
Pyrole.

Der Schaft rund, ganz einfach, endigt sich mit einer einzigen, weissen, wohlriechenden, niederhängenden, und im Verhältniß der übrigen Arten dieser Gattung, sehr grossen Blume. Die Blätter zirkelrund, in den Blattstiel laufend, gekerbt und glatt. Die Narbe schildförmig, fast wie eine Krone gestaltet und fünfzählig; die Zähne aufrecht und spizzig.

Wohnort. In schattigen Wäldern. Zwischen Oberrotenbach und Somborn unter *Pinus picea*; bei Arheilgen in der Täubchenshöhle und in der Tanne bei Darmstadt; bei Usingen im Wald.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. und Nuzzen. Wie bei *P. umbellata*.

CCVII. ANDROMEDA. Andromede.

533. A. POLI-
FOLIA.

Poleyblätteri-
ge Andromede.

Der Stengel strauchartig, aufrecht, am Grunde kriechend, zweitheilig. Die immergrünendenden Blätter kurzgestielt, hart, abwechselnd, lanzettförmig, am Rande zurückgeschlagen, oben erhaben, glänzend, nezzförmig, unten ausgehöhlt, weisslich, glatt. Die büschelförmigstehenden abhängenden Blumen schön purpurfarbig.

Wohnort.

Auf sumpfigem torfhaltigem Boden bei Griesheim ohnweit Darmstadt ziemlich häufig.

Blüthezeit.

Mai, Juni. †

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

In Torfländern ist dieser kleine Strauch von Nutzen, indem er die lockere Lagen zusammenhält und Stoff zu vielen entzündbaren Theilen giebt. Als Zierblume ist er zu empfehlen, nur läßt er sich sowohl durch Zertheilung und Ableger, als auch durch den Saamen schwer fortpflanzen.

II. ORDNUNG.

DIGYNIA. Mit zwei Staubwegen.

CCVII. ASCLEPIAS. Asklepie.

†. 554. A. SYRI-
ACA.*Syrische As-
klepie.*

Die Wurzel sehr kriechend. Der Stengel sehr einfach und rund. Die Blätter entgegenstehend, oval, flach. unten filzig. Die Dolden überhängend. Die wohlriechenden Blumen purpurröthlich.

Wohnort.

Wild wächst sie in Virginien und um Astrakan; angebaut wird sie auf der Stahlschmiede vor Alzenau, auf den Emmrichshöfen, und um Frankfurt in einigen Gärten.

Blüthezeit.

Juli, August. 4

Fruchtreife.

September, Oktober.

Nuzzen.

Die an den Saamen hängende, lange glänzende Seide giebt, theils allein, theils mit Zusaz von Baumwolle und Floretseide, oder feiner Lammwolle, einen zarten Faden. Mönch hat sie unter Hutfilz wie auch baumwollen Garn mischen lassen; mit letzterem vermischt kann man Strümpfe, Handschuhe etc. daraus bereiten. Schniebes in

Bauzen läßt sie im grossen bauen und aus der mit Baumwolle vermischten Seide den Zeug fabriziren der unter dem Namen englisch Leder bekannt ist. Die Kanader essen im Frühjahr die zarten Stengel als Spargel, und aus den Blumen kochen sie einen braunen Zucker. Die Seide wird von den Amerikanern grösstentheils zum Ausstopfen der Betten gebraucht, und die Stengel wie Hanf bereitet. Das Kraut läßt sich zu gelben Farben benutzen. Die Blumen werden von den Bienen häufig besucht. Als Zierblume empfiehlt sich diese Pflanze sehr. In sandigem Boden gedeiht sie am besten.

535. A. VINCE-
TOXICUM.

Schwalben-
wurzel Askle-
pie.

Der Stengel aufrecht, einfach, rund und etwas zottig. Die Blätter einander gegenüberstehend, gestielt, ey-herzförmig, am Grunde gefranzt. Die Blumenstiele kommen aus den Blattwinkeln, stehen wechselsweise, sind meistens kürzer als die Blumen und bilden eine sprossende Dolde mit weissen Blumen.

Wohnort. In gebirgigen Gegenden in Gebüsch.
Vor der Hartig; auf den Anhöhen zwischen Biber und der Mühlheimer Ziegelei; in dem Offenbacher neuen Hagenwald; auf dem Lerchenberg; im Frankfurterwald; bei Nauheim auf dem Johannisberg; bei Buzbach auf dem Hausberg; im Hangenstein bei Giesen etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. 2

Fruchtreife. September.

Nutzen. Diese so wie die vorhergehende Art enthält einen scharfen, milchichten Saft und beide Arten gehören zu den giftigen Pflanzen. Nur die Ziegen fressen sie und zwar nur die äussersten Stengelchen. Die Pferde fressen sie nur wenn sie gefroren ist. Ihre Seide ist zwar von weit geringerer Güte als die der syrischen Asklepie, sie kann aber doch benutzt werden. Die Stengel geben einen guten Flachs. Die Wurzel ist officinell.

CCVIII. SAXIFRAGA. Steinbrech.

536. S. GRANULATA.
Körniger / Steinbrech. Die Wurzel körnig. Der Stengel aufrecht, zottig, ästig. Die Blätter zottig, rauh, hellgrün; die Wurzel-

blätter nierenförmig, in den Blattstiel laufend, mit stumpfen, gekerbten Lappen versehen; die Stengelblätter handförmig, spizzig. Die Blumen weiss.

Wohnort. Gemein auf grasigen und sonnigen Hügeln.

Blüthezeit. April bis Juni. 24

Fruchtreife. Juni, Juli.

Beobacht. Fünf Staubfäden sind kürzer als die übrigen.

Nutzen. Sonst war diese Pflanze officinell. Das Vieh verabscheut sie. Einfach und gefüllt findet sie sich in unsern Gärten als eine Zierblume.

537. S. TRIDAG-
TYLITES.

*Dreifingerar-
tiger Stein-
brech.*

Der Stengel aufrecht, ästig, haarig, unten röthlich. Alle Blätter keilförmig und dreispaltig, die an der Wurzel gestielt, am Stengel aufsitzend. Die Blumen weiss mit kleinen rothen Pünktchen.

Wohnort. Gemein an Felsen, auf Mauern und Aekern.

Blüthezeit. April, Mai. ☉

Fruchtreife. Juni, Juli.

Nutzen. Er kann als Salat benutzt werden.
Zur Bekleidung künstlicher Felsen empfiehlt sich diese Pflanze.

CCIX. SCLERANTHUS. Knauel.

538. S. ANNUUS. Die Kelchzähne spizzig, kaum mit
Einjähriger einem schwachen weißlichen Rande
Knauel. eingefasst, bei der Fruchtreife von-
einander stehend.

Wohnort. Als ein häufiges Unkraut auf sandi-
gen Aekkern.

Blütezeit. Mai bis August ☉.

Fruchtreife. Juni bis Oktober.

Beobacht. Meistens sind fünf Staubfäden kürzer
als die übrigen.

Nutzen. An den Wurzeln dieser und der fol-
genden Art, findet man die europäische
Kocheneille (*Coccus polonicus*) wel-
che sonst in der Färberei sehr stark ge-
braucht, und in Pohlen gesammelt
wurde.

539. S. PEREN- Die Kelchzähne stumpf, eyförmig
NIS. mit einem breiten, häutigen weißen
Ausdauernder Rande umgeben, bei der Fruchtreife
Knauel. sich zusammenziehend.

Wohnort. Auf den Feldern und dürren Hügeln.
Auf der Heide hinter dem Lehrhof bei Hanau, auf dem Lerchenberg, bei dem Sandhof; um Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Mai bis August. 4

Fruchtreife. Juli bis Oktober.

Nutzen. Siehe bei der vorhergehenden Art.

CCX. CYPSOPHILA, Gypskraut.

540. G. MUR-
LIS.
Mauer Gyps-
kraut.

Der Stengel aufrecht, etwas rauh, zweitheilig, sehr ästig. Die Blätter gleichbreit, flach. Die Blumenstiele einblüthig. Die Kelche am Grunde nakkt. Die Blumenkronblätter ungleich gekerbt. Die Blumen fleischfarbig.

Wohnort. Auf Aeckern und an Wegen. Um Hauau bei der Kesselstädter Ziegelhütte; in dem Graben am Wald nach Niederrotenbach; zwischen Offenbach und Heusenstamm im Wald; zwischen Frankfurt und Hedernheim auf Aeckern; bei Somborn, Giesen, Darmstadt, Arheiligen etc.

Blüthezeit. Juni bis in den späten Herbst ☉

Fruchtreife. August bis Oktober.

CCXI. SAPONARIA. Seifenkraut.

541. S. OFFICINALIS. *Offizinelles Seifenkraut.* Der Stengel aufrecht, rund, knieig, (geniculatus) glatt, ästig. Die Blätter eyrund- lanzettförmig, dreiripig und glatt. Der Fruchtknoten kurzgestielt. Die Blumen weißröthlich.

Wohnort. An Zäunen, altem Gemäuer, in Gebüsch und auf Wiesen. Am Mayn- ufer in den Weidengebüschen bei Philippsruh und Dörnigheim; im Gebüsch bei dem Hanauer Galgen; bei Niederrotenbach; disseits Großsteinheim am Mayn; häufig um Frankfurt; in den Berger Weinbergen; am Lahnufer zu Giesen; bei Arheilgen, Wixhausen, Darmstadt, Offenbach etc.

Blüthezeit. Juni bis August. 4

Fruchtreife. August bis Oktober.

Nutzen. Blätter und Wurzel enthalten ein seifenartiges Wesen, welches mit Wasser ausgezogen, zum Waschen gebraucht werden kann. Mit dem Saft der zerquetschten frischen Blätter und mit einer Abkochung der Wurzel, lassen sich Fettflecken und andere Unreinigkeiten aus der Leinwand und den Kleidern bringen.

An den Blumen können die Entomologen die schönsten Dämmerungsvögel fangen. In unsern Gärten prangt sie gefüllt als eine Zierblume. Der Blumenstaub färbt roth. Das Vieh frisst diese Pflanze. Wurzel und Blätter sind officinell.

CCXII. VACCARIA. Kuhkraut.

542. V. PYRAMI-
DATA Nobis
Pyramidenför-
miges Kuh-
kraut.

Der Stengel aufrecht, vom Grunde an ästig und sehr blaßgrün. Die Blätter eyrund - lanzettförmig, zusammengewachsen-stiellos, fahlgrün. Die Blumenkronblätter kaum länger als der Kelch. Der Fruchtknoten aufsitzend. Die Blumen purpur - oder rosenfarbig.

Saponaria Vaccaria Linn.

Wohnort.

In Obstgärten, auf Aeckern und vorzüglich unter der Saat, besonders des Sommergetreides. In Obstgärten vor der Kinzigbrücke zu Hanau; auf Aeckern bei der Hartig, bei Fechenheim, um Grüningen, Frankfurt, Seckbach, bei Watzeborn, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Das Rindvieh frisst es gerne. Nach Borckhausen wird im Odenwalde aus dem Saamen ein wohlschmeckendes Oehl geschlagen. Wegen seiner rothen Blumen verdient es eine Stelle in unsern Gärten.

CCXIII. DIANTHUS. Nelke.

*) Mit haufenweise beisammenstehenden Blumen.

543. D. CAR- Der Stengel aufrecht, rund, kno-
THUSIANORUM. tig. Die Blätter gleichbreit, drei-
Carthäuser rippig und spröde. Die rothen,
Nelke. selten weissen Blumen etwas ge-
häuft; die längliche, begrante Hül-
le kürzer als das Blumenköpfchen.
Kelchschuppen 4 bis 7, eyförmig,
begrant, kürzer als die Röhre. Die
Blumenblätter gezahnt. Die Narben
an der Spitze zurückgekrümmt.

Wohnort. Auf trocknen von der Sonne beschie-
nenen Hügeln und Wiesen sehr häufig.

Blüthezeit. Mai bis August. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Einfach und gefüllt als eine Zierblume in unsern Gärten.

544. D. ARMERIA. Der Stengel am Grunde eingebogen, aufrecht, rund. Die Blätter gleichbreit, haarig. Die büschelförmig beisammenstehenden Blumen sind purpurroth mit weissen Punkten bezeichnet. Die Kelchschuppen lanzettförmig, zottig, der Röhre gleich. Die Blumenblätter zweispaltig, gekerbt. Die Narben aufrecht, voneinander stehend.

Wohnort. In Wäldern auf unfruchtbarem Boden gemein, z. B. um Hanau, Offenbach, Frankfurt, Arheilgen, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. - Sie empfiehlt sich als Zierblume für unsere Gärten.

545. D. PROLIFERA. Der Stengel aufrecht, sehr glatt, mit Gelenken versehen. Die kleinen rothen Blumen stehen kopfförmig beisammen. Die Kelchschuppen eyrund, stumpf, dünne, häutig; die untere weichstachelig, und dreimal

kleiner als der Kelch, die beiden übrigen von der Länge des Kelchs. Die Blumenblätter verkehrt herzförmig und ausgerandet.

Abart.

- b. Der Stengel niedrig, dünne, ästig. Die kleinen rothen Blumen einzeln, mit acht Kelchschuppen, wovon die vier innern grösser sind und über den Kelch hervorgehen.

Dianthus, diminutus Linn.

Wohnort. Auf grasigen Hügeln und sandigen Weiden. Um Hanau; hinter Steinheim; vor Rödelheim; auf dem Lerchenberg; bei Arheilgen, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni bis August. ☉

Fruchtreife. August, September.

**) Mit einzelnen Blumen, deren aber mehrere auf einem Stengel sitzen.

546.D.DELTOIDES.

Deltaförmige Nelke.

Der Stengel niederliegend, ein wenig feinhaarig. Die Blumen einzeln, langestielt, purpurroth, mit weissen Punkten oder gewöhnlich mit der Figur des griechischen Delta (Δ) bezeichnet. Die Kelchschuppen

eyrund - lanzettförmig und doppelt kürzer als der Kelch. Die Blumenblätter gekerbt. Die Narben hin und her gebogen.

Wohnort. Gemein auf Feldern, Weiden, trocknen Wiesen, an Rainen und grasigen Waldplätzen um Hanau, Offenbach, Frankfurt, Homburg, Darmstadt, Gießen etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Sie verdient ihrer Blumen wegen eine Stelle in unsern Gärten.

547: D. SUPER-
BUS.

Prachtnelke.

Der Stengel am Grunde etwas eingekrümmt, dann aufrecht, glatt. Die grossen weisslichvioletten, sehr wohlriechenden Blumen stehen einzeln in einer Rispe. Die violetten Kelchschuppen etwas eyförmig, lang zugespitzt, und nur halb so gross als der Kelch. Die Blumenblätter vielfach geschlitzt und am Grunde mit gelben weichen Haaren versehen.

Wohnort. Auf etwas feuchten Wiesen, in Gebüsch und Wäldern. Auf den Wiesen

jenseits des Fichtenwaldes von Hanau aus nach Hochstadt; in Menge im Wald hinter Biber, nach Heusenstamm; auf Wiesen an der Dicke bei Offenhach; hinter dem Sandhof im Gebüsch; auf der Kasse bei Gelnhausen; auf Wiesen hinter dem Kettenhof ohnweit Frankfurt; um Arheilgen, Darmstadt, Griedel, Homburg etc.

Blüthezeit. Juli, August. ♂

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Des Wohlgeruchs der Blumen wegen verdient diese Nelke einen vorzüglichen Platz in unsern Gärten.

***) Mit einblüthigem Stengel.

548. D. ARENARIUS

Sandnelke.

Der kleine Stengel meistens einblüthig. Die Blätter gleichbreit, spröde, weichstachelig. Die Kelchschuppen eiförmig, stumpf; die unteren sehr klein. Die Blumenblätter bis unter die Mitte zertheilt und zerrissen. Die Blumen röthlich.

Wohnort. In gebirgigen Gegenden auf rauhem Boden z. B. um Giesen. (Dillen)

Blüthezeit. Juni. 4?

III. ORDNUNG.

TRIGYNIA. Mit drei Staubwegen.

CCXIV. CUCUBALUS. Kukubal.

549. C. BEHEN
*Behen - Kuku-
bal.*

Die Blätter eyrund- lanzettförmig, glattrandig, am Rande etwas gefranzt, und zusammengewachsen aufsitzend. Die weissen etwas abhängenden Blumen bilden eine lockere Rispe. Die Kelche beinahe kugelrund, glatt, nezzförmig aderig. Die Blumenblätter zweitheilig und am Rande fein gekerbt. Die Saamenkapsel fast rund,

Wohnort.

Auf trocknen Wiesen und an Rainen. Zu Hanau in der Hayngasse; disseite Grossteinheim auf Wiesen; zu Frankfurt bei der Oed; im Niederröther Wäldchen; bei Arheilgen, Darmstadt, Biber etc.

Blüthezeit.

Mai bis August. 4

Fruchtreife.

Juli bis September.

Nutzen.

Diese Pflanze wird an mehreren Orten in unserer Gegend unter dem Namen Kernkraut und Körnerig im Frühjahr als Gemüs gegessen. Die Bienen

besuchen fleißig die Blumen und es finden sich an denselben auch schöne Dämmerungsschmetterlinge. Die Blätter liefern etwas braune Farbe. Als Zierblume ist diese Pflanze zu empfehlen.

550. C. OTITES Die Stengel hier und da etwas
Ohrlöffel-Ku- klebrig. Die Blätter spatelförmig
kubal. und rauh. Die kleinen grünlichgelben Blumen bilden quirlförmig stehend am Ende der Stengel Trauben, und sind ganz getrennten Geschlechts, und selten, auch Zwitter. Die Blumenblätter gleichbreit, unzertheilt und wellenförmig.

Wohnort. Auf trocknen sandigen Hügeln und waldigen bergigen Gegenden. Auf Sandhügeln hinter dem Lehrhof bei Hanau; bei Niederrothenbach im Wald; bei Mühlheim, Rumpenheim, Biber, Offenbach, Frankfurt, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Das Vieh frisst diese Pflanze.

CCXV. SCRIBAEA, Scribäe.

551. S. DIVARI-
GATA *Nobis.*
Ausgesperrte
Scribäe.

Der Stengel rund, rauh, mit Gelenken versehen, hoch, klimmend; die Aeste wagrecht einander gegenüberstehend und auseinander gesperrt. Die Blätter eyförmig, entgegenstehend, glattrandig und rauh. Die Blumen weiss.

Cucubalus bacciferus Linn.

Wohnort.

In Zäunen und Gebüsch. Bei Hanau in einem Hägewäldchen im Nürnbergerfeld; im Gebüsch beim Hanauer Galgen; in Zäunen hinter klein Steinheim und zwischen Hochstadt und Bischoffsheim; an mehreren Orten um Frankfurt z. B. bei dem hohen Steeg; am Hellerhof bei der Oed etc.

Blüthezeit.

Juni bis August. 4

Fruchtreife.

September, Oktober.

Bemerkung.

L. G. Scriba, Pfarrer in Arheilgen bei Darmstadt, hat sich nicht allein durch Aufsuchen der Pflanzen in der Darmstädter Gegend um unsere Flora sehr verdient gemacht, sondern ist auch als geschickter Entomolog schon rühmlichst gekannt.

CCXVI. SILENE. *Silene*.552. S. GALLI-
CA.*Französische
Silene.*

Der Stengel weichhaarig, oben klebrig. Die Blätter elliptisch. Die fleischfarbenen Blumen in unvollkommenen Aehren, wechselsweise, aufrecht, einseitig. Die Blumenblätter oftmals ausgerandet. Die Kapseln aufrecht. Der Kelch zehnstreifig.

Wohnort.

Häufig in Getreidefeldern bei Arheilgen.

Blüthezeit.

Juli. ☉

Fruchtreife.

August.

553. S. NUTANS.

*Ueberhängen-
de Silene.*

Der Stengel etwas rauh, knieig, oben etwas klebrig. Die Stengelblätter lanzettförmig, stielloos, rauh. Die Rispe überhängend. Die weissen Blumen an den Seiten, einseitig, niedergebogen. Die Blumenblätter zweispaltig.

Wohnort.

Häufig auf trocknen Wiesen und Hügeln und in Wäldern z. B. um Hanau, Bruckköbel, Steinheim, Frankfurt, Offenbach, Giesen, Arheilgen, Darmstadt etc.

2. Th.

G

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Aus den Blumen holen die Bienen Honig.

554. S. CONOR-
DEA.

*Kugelförmige
Silene.*

Der Stengel feinhaarig, rauh, oben klebrig. Die Wurzelblätter eyförmig, die Stengelblätter lanzettförmig, alle glatt. Die Blumenkelche länglich zugespitzt, kaum in der Mitte etwas bauchig, klebrig, haarig, die Fruchtkelche fast kugelrund, mit 30 Streifen bezeichnet. Die Blumenblätter unzertheilt und röthlich.

Wohnort. Unter der Saat bei Nieder-Weisel fand sie Fabricius häufig.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

555. S. CONICA.

*Kegelförmige
Silene.*

Der Stengel weichhaarig, durchaus nicht klebrig. Die Blätter lanzettförmig, etwas filzig. Die Fruchtkelche kegelförmig mit 30 Streifen bezeichnet. Die Blumenblätter etwas wenig ausgerandet, rosenroth und meistens in der Mitte mit einem Zahn versehen.

Wohnort. Auf Aeckern und gepflügtem Feld. Auf dem Lerchenberg; beim Frankfurter Galgen; in zahlloser Menge bei Darmstadt und Arheilgen.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

556. S. NOCTIFLORA.
Nachtblüthige Silene. Der Stengel aufrecht, rund feinhaarig, zweitheilig, oben etwas klebrig. Die Blätter eyrund-lanzettförmig. Die zehnekkigen Kelche, deren Zähne so lang als die Blumenröhre, sind zottig und klebrig. Die weissen Blumen, deren Blättchen zweispaltig, sind am Tage eingewikkelt und geschlossen, des Nachts aber und des Morgens stehen sie offen.

Wohnort. Auf Aeckern vor dem St. Gallenthor zu Frankfurt gleich hinter den Gärten in grosser Menge, und auf Aeckern zwischen dem Schwarzgüldenloch; bei Arheilgen auf Aeckern.

Blüthezeit. Juni bis Oktober. ☉

Fruchtreife. August bis Oktober.

557. S. NEMO- CCXVII. STELLARIA. Sternblume.
RUM.

Wald - Stern- blume. Der Stengel aufrecht oder niederliegend, ekkig, etwas rauhhaarig, hat am Grunde Ausläufer. Die Blätter gestielt, herzförmig, spizzig. Die Blumenstiele ästig, eine zweitheilige Rispe bildend. Die weissen Blumen deren Blumenblätter tief zweispaltig, sind etwas glockenförmig. Die Saamenkapsel länglich und einge-krümmt.

Wohnort. In feuchten Wäldern um Arheilgen und Darmstadt, gemein; hinter dem Altkönig auf feuchten Stellen; häufig bei Hirchenhayn im Oberwald.

Blüthezeit. Mai bis Juli. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Die Blumen werden häufig von den Bienen besucht.

558. S. HOLO-
STEA.

*Großblüthige
Sternblume.*

Der Stengel am Grunde kriechend, dann aufrecht, vierekkig, etwas rauh und ästig. Die Blätter gegenüberstehend, lanzettförmig, am Rande fein gezähzelt. Die grossen weissen Blu-

men haben zweispaltige Blumenblätter. Die Saamenkapsel fast kugelförmig.

- Wohnort. An schattigen Orten sehr gemein.
 Blüthezeit. April bis Juni. 4
 Fruchtreife. Juni, Juli.
 Nuzzen. Die Blumen geben den Bienen viel Wachs.

559. S. GRAMINEA.
Grasartige Sternblume. Der Stengel am Grunde niederliegend, dann aufrecht, zweitheilig, viereckig, glatt, mit Gelenken versehen. Die Blätter gleichbreit, entgegenstehend, glatträndig. Die Blumen weiss; die Blumenblättchen bis unter die Mitte in zwei Theile getheilt.

Wohnort. Sehr gemein auf Wiesen, Triften, an Rainen, Zäunen, auf Aekern und in Wäldern.

- Blüthezeit. Mai bis Juli. 4
 Fruchtreife. Juli, August.
 Nuzzen. Diese und die nachfolgenden Arten werden von dem Vieh gefressen.

560. S. DILLENIANA Mönch.
Dillenische Sternblume. Der Stengel schlaff. Die meergrünen Blätter gleichbreit - lanzettförmig. Die Blumenstiele stehen auf der Spitze des Stengels, sind zweiblühend.

mig, und haben in der Mitte zwei häutige, lanzettförmige, entgegengesetzte Afterblättchen. Die weissen Blumenblätter zweitheilig.

Stellaria graminea β Linn.

Wohnort. Auf sumpfigem Boden nördlich der Lambobrücke bei Hanau und südlich des Niederrotenbacher Chausseehauses; bei Arheilgen und Darmstadt, in feuchten Waldungen und nassen Gebüsch.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. Juli, August.

561. S. ALSINE
Sumpf-Stern-
blume. Der Stengel niedergestreckt, ausgebreitet, sehr ästig, schwach, glänzend glatt, viereckig. Die Blätter stiellos, lanzettförmig, am Grunde gefranzt, fahlgrün; die untern breiter, die obern schmaler. Die Blumenstiele zu dreien, meistens an den Seiten stehend, der mittlere einblumig, die an den Seiten zweitheilig, wenigblüthig, alle zur Blüthezeit aufrecht, aber zur Fruchtreife weit auseinanderstehend und abhängend. Die

weissen Blumenblätter kürzer als der Kelch und sehr schmal zweitheilig.

Stellaria graminea γ Linn.

Wohnort. In Wassergräben, an Quellen und in Sümpfen z. B. bei dem Brunnen nahe bei den Lavabrüchen hinter Kleinsteineheim; auf Sumpfwiesen hinter Falkenstein; an dem Goldbach bei der Frankfurter Saustiege; häufig an dem Bach ohnfern der grossen Försterwiese bei Ysenburg; um den Waldbrunnen bei Giesen; in einem kleinen Sumpf bei Arheilgen hinter des Dianenburg.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. Juni, Juli.

CCXVIII. ARENARIA. Sandkraut.

562. S. TRINERVIA. Die Stengel niederliegend oder aufrecht, etwas feinhaarig, knieig. Die Blätter gegenüberstehend, eyförmig, spizzig, gestielt, dreirippig, glatt. Die Blumenstiele einblüthig. Die weissen Blumenblätter kürzer als der Kelch.

*Dreinerviges
Sandkraut.*

Wohnort. Fast allenthalben in schattigen Laubwäldern, in feuchten Gebüsch, an faulen Baumstämmen etc.

Blüthezeit. April bis Juni. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die Pflanzen dieses Geschlechts sind zwar klein, aber doch dem Vieh, besonders den Schaafen angenehme Futterkräuter.

563. *A. SERPILLIFOLIA*,
Quendelblät-
teriges Sand-
kraut. Die Stengel niederliegend oder aufrecht, sehr ästig und schwach. Die Blätter gegenüberstehend, eyförmig, spizzig, stiellos, feinhaarig. Die Blumenstiele einblüthig. Die weissen Blumenblätter kürzer als der Kelch.

Wohnort. Sehr gemein auf Aekern, Triften, Gartenland und Mauern.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. August, September.

564. *A. RUBRA*.
Rothblühendes
Sandkraut. Die Stengel niederliegend und rauh. Die Blätter entgegenstehend, fadenförmig, doppelt kürzer als die Räume zwischen den Gelenken, etwas rauh, werden am Grunde mit zwei eyrunden, häutigen Afterblättchen unter-

stützt. Die Kelche von gleicher Länge der Saamenkapseln. Die Blumen roth.

Wohnort. Auf sandigem Boden z. B. auf sandigen Plätzen vor dem alten Wald bei Hanau; bei den Rückinger Schlägen; bei dem Niederröterwäldchen, hinter Homburg; um Giesen; Darmstadt etc.

Blüthezeit. Mai his Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

565. A. MARINA Roth.
Meer - Sandkraut.

Die Stengel niedergestreckt, fleischig und glatt. Die Blätter entgegenstehend, fleischig, halbwalzenförmig, von der Länge eines Stengelknotens zum andern, feinhaarig klebrig, werden am Grunde mit zweyeyrunden, häutigen Afterblättchen unterstützt. Die Kelche feinhaarig klebrig, halb so lang als die Saamenkapseln. Die Blumen purpurröthlich,

Arenaria rubra β Linn.

Wohnort. Bei den Salzquellen zu Soden, Nauheim, Wisselsheim, Nidda, Büdingen und Orb; am Weg und auf Wiesen links vor Soden hinter Salmünster.

Blüthezeit. Mai bis August. ☉

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Staubfäden sind bald, fünf, acht oder zehen. Die Blumen öffnen sich Morgens um 9 Uhr und schliessen sich Abends um 7 Uhr.

566. A. TENUIFOLIA.

Dünnblätteri- Die Stengel aufrecht, fadenförmig, *gesandkraut.* glatt, sehr ästig, knieig, zweitheilig, endlich rispenförmig. Die Blätter pfriemenförmig, am Grunde zusammengewachsen, glatt, kürzer als die Räume zwischen den Knoten. Die Kelchblättchen häutig, spizzig, dreirippig, an der Spitze röthlich. Die weissen Blumenblätter kürzer als der Kelch und lanzettförmig. Die Saamenkapseln aufrecht.

Wohnort. Häufig auf sandigen Aekken des Lerchenbergs, bei Mühlheim, Wasserlos, Darmstadt, und zwischen Fetzberg und Weilmünster.

Blüthezeit. Mai bis Juli. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

Beobacht. Staubfäden zehn; Griffel drei; die Narben federartig; die Saamenkapsel län-

ger als der Kelch und an der Spitze sechsfach aufspringend.

IV. ORDNUNG.

PENTAGYNIA. Mit fünf Staubwegen.

CCXIX. SEDUM. Sedum.

*) Flachblättrige.

567. S. TELE-
PHIUM.

*Knolliges Se-
dum; Fett-
heune.*

Die Wurzel knollig, fleischig und weiss. Der Stengel am Grunde eingebogen, dann aufrecht, einfach, rund, sehr glatt. Die Blätter flach, fleischig, dikk, eyrund, sägezahnartig, glatt. Die blättrige Doldentraube auf der Spitze des Stengels. Die Blumen weisslichgelb, selten purpurroth oder weiss.

Wohnort. Gemein auf trocknen Wiesen, in Zäunen, Gebüsch und Wäldern und an Mauern.

Blüthezeit. August, September. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Beobacht. Es variirt diese Pflanze sehr in Farbe und Grösse des Stengels und der Blumen. *Sedum maximum* das wir mehrmals fanden ist gewiss nur eine Abart von *S. Teleph.*

Nutzen.

Die Blätter kann man als Salat essen. Aus den Blumen holen die Bienen Honig. Die ganze Pflanze enthält ein mineralisches Laugensalz. Blätter und Wurzel waren sonst offizinell. Mit rother Blüthe pflanzt man es als Zierblume.

568. S. ANA-
CAMPSEOS.

*Kriechendes
Sedum.*

Die Stengel kriechend. Die untersten Blätter keilförmig, die obersten eyförmig, alle glatträndig. Die weissen oder rothen Blumen bilden eine eyförmige Afterdolde und sind mit Nebenblättchen versehen.

Wohnort.

Auf den Felsen des Steinheimer Schlosses, der Goldgrube hinter Homburg und an der Heidetränke ohnweit der Goldgrube.

Blüthezeit.

Juni, Juli. ✚

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Man kann die Blätter dem Salat beimischen.

*) Rundblätterige.

569. S. REFLE-
XUM.

*Zurückgebo-
genes Sedum.*

Die Stengel oben vielspaltig, die Aestchen zurückgebogen. Die Blätter halbrund, spizzig, begrannt, zerstreut, am Grunde nicht zusammen-

gewachsen, die unteren zurückgebogen. Die Blumen gelb.

Wohnort. Gemein auf sandigen Weiden, trockenen Hügeln, an steinigen Akkerrainen, auf Mauern u. d. gl.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Der Kelch sechsspaltig, Blumenblätter sechs; Staubfäden zwölf; Stengel sechs.

Nutzen. Die Blätter kann man als Salat essen und man bauet es deshalb in Holland in Gärten. Die meisten Arten dieses Geschlechts empfehlen sich in die künstlichen Felsen der Lustgärten gepflanzt, ungemein.

570. S. ALBUM. Die Stengel aufrecht, nach oben
Weisses Sedum; Tripmadam. zu zweitheilig. Die Blätter länglich, stumpf, rundlich, stiellos, abstehend. Die weissen Blumen gestielt, abwechselnd, aufrecht, bilden am Ende eine ästige Dolde.

Wohnort. Auf Mauern, Felsen und Strohdächern. Zu Hanau auf der Mauer am Kanalthor; auf den Felsen beim Steinheimer Schloß;

auf Mauern zu Hechtsheim; auf den Felsen des zerfallenen Reifenberger Schlosses etc.

Blüthezeit. Juni bis August. 4

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Blumenblätter fünf; Staubfäden zehn.

Nutzen. Wird als Zierblume in den Gärten gezogen.

571. S. ACRE.
*Scharfes Sedum; Mauer-
pfeffer.*

Die Stengel am Grunde niederliegend, ästig, rund. Die Blätter fast eyrund, stiellos, am Grunde zusammengewachsen, höckerig, zerstreut, etwas aufrecht, abwechselnd. Die gelben Blumen aufrecht und wechselsweise stehend, ungestielt, bilden eine dreispaltige Afterdolde am Ende der Stengel. Die Kelche gelb.

Wohnort.

Auf Feldern, Mauern und Wiesen z. B. bei Hanau auf den Sandhügeln hinter dem Lehrhof; beim Neuen-Wirthshaus; zwischen Hanau und Kleinsteinheim am Weg; am Brunnen ohnweit dem Apothekerhof bei Frankfurt; auf dem Lerchenberg; um Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit.	Juni, Juli. 24
Fruchtreife.	August, September.
Nutzen.	Ist officinell.

572. S. SEXANGULARE.

Sechseckiges Sedum.

Die Stengel am Grunde niederliegend, dann aufrecht, nicht sehr ästig. Die Blätter eyrund, ungestielt, am Grunde zusammengewachsen, zerstreut, höckerig, vor dem Blühen und in den unfruchtbaren Aesten in sechs Reihen dachziegelförmig übereinanderliegend. Die Afterdolde dreispaltig. Die Blumen gelb.

Wohnort. Fast allenthalben auf sandigen Aekern; an Wegen und überhaupt an trockenen sonnigen Orten.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Der Kelch vier bis fünfspaltig; Blumenblätter vier oder fünf; Staubfäden acht oder zehn.

573. S. VILLOSUM.

Zottiges Sedum.

Der Stengel aufrecht, etwas klebrig zottig, mit rothen Punkten bestreut. Die Blätter etwas zottig und klebrig, rundlich flach, die untern

eyrund, die obern gleichbreit und stumpf. Kelch und Blumenstiele zottig-klebrig. Die röthlichen Blumen einzeln, aufrecht, bilden eine Afterdolde.

Wohnort. Auf sumpfigem Boden. Häufig in Sümpfen auf dem Sombornerberg; im Sumpf beim Steinheimer Galgen; hinter Oberursel; zwischen dem Kloster Thron und Wehrheim auf Wiesen; vor Wenings und zwischen Wenings und Gedern auf Wiesen; im Rulhausen beim Teich oberhalb Gedern; auf Wiesen um den Forellenteich im Oberwald; beim Hangestein auf Wiesen; bei Arheilgen an der Strasse nach Frankfurt auf sumpfigen Plätzen esc.

Blüthezeit. Juni bis August. ☉

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Staubfäden sieben bis acht.

CCXX. OXALIS. Sauerklee.

374. O. ACETO-
SELLA.

Gemeiner

Sauerklee.

Die Wurzel schuppig gegliedert. Die Blätter dreifach, verkehrt herzförmig, haarig. Der Schaft einblumig, länger als die Blätter. Die Griffel

von der Länge der innern Staubfäden.

Die Blumen weiss, mit rothen Adern bezeichnet, manchmal purpurroth, etwas nikkend.

Wohnort. Fast überall auf schattigem Boden in Wäldern.

Blüthezeit. April bis Juni. 24

Fruchtreife. Juni, Juli.

Beobacht. Angesät in Gärten bringt sie oft röthliche und bläuliche Blüten hervor.

Nutzen. Sie hat eine angenehme Säure und kann wie Sauerampfer in der Küche gebraucht werden. Aus einem Theil Blätter und zwei Theilen Zucker, läßt sich eine treffliche Konserve bereiten. Das wesentliche Salz, welches officinell ist, kann zur Reinigung der Wolle und Tücher gebraucht werden; daß man durch dieses Salz Tintenflecken aus der Leinwand wegbringen kann ist allgemein bekannt. Die Blätter mit Milch gekocht geben eine angenehme Molke. Die Blumen werden häufig von den Bienen besucht. Die Blätter unter Salat gemischt geben demselben einen gu-

ten Geschmakk. Die ganze Pflanze ist officinell.

575. O. STRICTA Die Wurzel faserig. Der Stengel
Jacq. aufrecht, ästig und ausgebreitet. Die
Steifaufstei- Blätter dreifach, verkehrt herzförmig,
genter Sauer- zurückgebrochen und auf beiden Sei-
klée. ten glatt. Die doldenartigen Blumen-
stiele sind kürzer als der Blattstiel
und tragen drei bis vier gelbe mit
schwarzen Streifen bezeichnete Blu-
men.

Oxalis corniculata der Floristen.

Wohnort. In Gemüsegärten und auf Aekkern
um Giesen.

Blüthezeit. Juni bis August. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die Blätter sind ebenfalls sauer und
lassen sich wie die der vorhergehenden
Art benutzen.

CCXXI. AGROSTEMMA. Raden.

576. A. GIHHA- Die ganze Pflanze rauhhaarig. Die
go. Blätter zusammengewachsen, unge-
Korn-Raden. stielt, gleichbreit. Die schönen ro-

then Blumen stehen einzeln auf der Spitze des Stengels und sind langgestielt. Der Kelch mit der Blumenkrone von gleicher Länge, selten länger.

Wohnort. Fast überall unter der Saat.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August.

Nutzen. Bechstein räth, das mit dem Raddensaamen sehr verunreinigte Getreide zum Branntwein brennen anzuwenden; aber doch wohl nur deswegen, weil es demselben mehr Feuer giebt. Die schwarzen runden Saamen theilen zwar, dem Mehl keine schwarze Farbe mit, machen aber dasselbe ungesund; Blumhof sahe Schweine von dem Genuß solches Brodes erkranken und das Federvieh sterben.

CCXXII. LYCHNIS. Lychnis.

*) Mit einfächerigen Kapseln.

577. L. FLOS Der Stengel aufrecht, gefurcht,
CUCULI. rauh, oberwärts getheilt. Die Blät-
Kukuks-Lych-ter lanzettförmig, langzugespitzt und
nis.

glatt. Die schönen purpurrothen Blumen, deren Blumenblätter vier-spaltig sind, stehen einzeln am Ende und in den Astwinkeln. Der Kelch röthlich und rauh. Die Saamenkapsel rundlich und fünfzahnig.

Wohnort. Allenthalben auf feuchten Wiesen und an den Rändern der Gräben und Bächen.

Blüthezeit. Mai, Juni. 24

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Die untern Abschnitte der Blumenblätter sind kürzer und auseinander gesperret; die Zähnen am Schlunde zweispaltig. Sie wird gerne vom Vieh gefressen.

578. L. SYLVES-
TRIS *Nobis*
Wald-Lychnis

Der Stengel aufrecht, gestreift, rauhhaarig, die Blätter haarig; die Stengelblätter eyförmig, zugespitzt, die obern eylanzettförmig. Die Griffel mit kopfförmigen Zotten besetzt. Die Blumen roth, bisweilen mit Zwitterblumen. Der Fruchtknoten aufrecht eyrund. Die Saamenkapsel springt zehnfach auf und ihre Zähne sind zurückgekrümmt.

Lychnis dioica a Linn.

Wohnort. In Wäldern auf schattigem feuchtem Boden. Um Hanau bei dem Waldesel, der Lambobrücke und in der Bulau; um Frankfurt im Niederröter-Wäldchen; hinter Niedererlenbach; bei Arheilgen und Kranichstein in schattigen Waldungen; im Hangestein bei Giesen.

Blüthezeit. Mai bis Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Sie wird, so wie die vorhergehende und nachfolgenden Arten, als Zierblume einfach und gefüllt in unsern Gärten gezogen.

579. L. ARVEN-
SIS *Nobis*

Akker - Lych-
nis.

Der Stengel weichhaarig, weisslichgrün, beim Anfühlen weich. Die Blätter weichhaarig, weisslichgrün, sammetartig. Die weissen, grossen Blumen getrennten Geschlechts. Die Griffel nur wenig haarig und fast glatt. Der Fruchtknoten umgekehrteyrund. Die Saamenkapsel springt zehnfach auf und ihre Zähne sind nicht zurückgekrümmt.

Lychnis dioica β Linn.

Wohnort. Auf Aekkern, an steinigen Orten, Feldern und altem Gemäuer. Zu Hanau auf dem Vorstädter - Wall; in den Hekken vor Niederrodenbach; auf den Frankfurter Stadtwällen und in der Gärtnerei; bei dem Ginheimer Steeg; um Arheilgen und Kranichstein auf Aekkern und Wiesen etc.

Blüthezeit. Mai bis Juli. 2

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Eine Zierblume unserer Gärten.

580. L. CORONA-

RIA.

Kranz - Lych-
nis.

Die ganze Pflanze ist filzig. Die Blätter eylanzettförmig, stiellos. Der lederartige Kelch mit Winkeln die abwechselnd viel kleiner sind. Die Blumenblätter kaum ausgerandet; die Nägel gleichbreit; die Schuppen am Schlunde glattrandig, steif, stechend, keilförmig. Die Griffeln aufsteigend. Die Blumen an der wilden Pflanze weiß, an der in Gärten gezogenen, purpurroth.

Arostemma Coronaria Linn.

Wohnort. Sehr häufig auf steinigem Boden in den Weinbergen auf der Kazze bei Gelnhausen.

Blüthezeit. Juni, Juli. ♂—24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Sie wird unter dem Namen Gartenraden einfach und gefüllt, mit weisser, etc. Blume als Zierblume gezogen.

**) Mit fünffächerigen Kapseln.

581. L. VISCA-
RIA.
Pech-Lychnis; *rig.* Die Blätter lanzettförmig, zusammengewachsen, am Grunde gefranzt, sind in der Nähe der Blumen roth gefärbt. Die (rothen, selten weissen Blumen bilden am Ende eine Traube; die Blumenblätter stumpf, fast ohne allen Einschnitt, am Rande etwas wellenförmig. Die Blumenstiele meistens dreiblumig. Der Kelch zehnstreifig.

Wohnort. In grassigen trocknen Wäldern und Wiesen. Um die Teiche des Hanauer Fischerhofs; hinter dem Frankfurter Forsthaus und hinter dem Schwengelsbrunnen im Wald; am Weg von Geddern nach Volkhardshayn; auf erhab-

nen Wiesen über dem Forellenteich im Oberwald; um die Klippen im Hange-stein bei Giesen; in der Leonhardstanne bei Arheilgen; auf den Wiesen hinter dem sogenannten Blech ohnweit Arheilgen.

Blütezeit. Mai bis Juli 2.

Fruchtreife. Juli bis September.

Nutzen. Einfach und gefüllt ist sie eine Zierblume unserer Gärten.

CCXXIII. CERASTIUM.

Hornkraut.

*) Mit länglichen Saamenkapseln.

582. C. VULGATUM. Der Stengel am Grunde liegend, dann aufrecht, ausgebreitet, auf allen Seiten haarig. Die Wurzelblätter liegen kreisförmig, sind eyrund und laufen in den Blattstiel; die untern Stengelblätter entgegenstehend, zusammengewachsen aufsitzend, verkehrt eyförmig, stumpf, am Grunde schmaler; die obern sind zungenförmig; alle sind glatträndig und auf allen Seiten zottig. Die Kelchblättchen lanzettförmig, spiz-

*Gemeines
Hornkraut.*

zig. Die Blumen weiß, haben Blumenblätter von gleicher Länge des Kelchs. Die reifen Saamenkapseln durch den Kelch halbbedekt, aufrecht, an der Spitze etwas zurückgekrümmt.

Wohnort. Sehr gemein auf Wiesen, an Aekkern Wegen und in Obstgärten.

Blüthezeit. Den ganzen Frühling und Sommer durch. ☉

Fruchtreife. Juni bis Oktober.

Nutzen. Wird von dem Vieh gerne gefressen.

583. *C. viscosum.* Der Stengel aufrecht, mit kopfförmigen, klebrigen, feinen Haaren besetzt. Die Blätter eyförmig, gegenüberstehend, die unteren gestielt, die obern stiellos, alle mit kopfförmigen klebrigen Haaren besetzt. Die Kelchblättchen weißrandig. Die weissen Blumenblätter kürzer als der Kelch.

Klebriges Hornkraut.

Wohnort. Auf Wiesen, Triften, und gebauten Feldern. Hinter dem Lehrhof bei Hannau, an dem Sumpf beim Apothekenhof vor Frankfurt; zwischen dem Forst-

haus und Niederroth; um Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Vom April bis in den Herbst. ☉

Fruchtreife. Juni bis Oktober.

Nutzen. Es wird von dem Vieh gefressen.

584. C. SEMIDE-
CANDRUM.

*Halbzehn-
männiges
Hornkraut.*

Der Stengel erst etwas liegend, dann aufrecht, ziemlich einfach, feinhaarig. Die Blätter zusammen- gewachsen, eyförmig, zottig, etwas rauh, hellgrün. Die weissen Blumen blätter ausgerandet, kürzer als der Kelch. Von den zehn Staubfäden haben wechselsweise fünf Staubbeutel, und die andern fünf sind unfruchtbar.

Wohnort. Gemein auf magern Triften, trocknen Wiesen, an Akkerrainen, Rändern der Wege zu Hanau, Offenbach, Frankfurt, Darmstadt, Giesen, Wiesbaden etc.

Blüthezeit. April bis August. ☉

Fruchtreife. Juni bis September.

Nutzen. Wird von dem Vieh gefressen.

585. C. ARVEN-
SE.

*Akker - Horn-
kraut.*

Die Stengel niederliegend, etwas haarig, am Grunde röthlich, erheben sich zur Blüthezeit und stehen

aufrecht. Die Blätter gleichbreit-lanzettförmig, stumpf, weichhaarig. Die weissen Blumenblätter doppelt grösser als der Kelch.

Wohnort.	Allenthalben auf Aeckern und Feldern.
Blüthezeit.	April, Mai. 2
Fruchtreife.	Juni, Juli.
Nutzen.	Wird von dem Vieh gefressen.

**) Mit fast runden Saamenkapseln.

586. C. AQUATICUM. Die Stengel aufrecht, ästig, ausgesperret, nach oben zu zottig und etwas klebrig. Die Blätter herzförmig, stiellos. Die weissen Blumen einzeln, in den Blattwinkeln und auf der Spitze des Stengels. Die Blumenblätter bis auf den Grund zweispaltig, doppelt so lang als der Kelch. Die Saamenkapseln hängend.

Wohnort.	Gemein an Wassergräben und überhaupt auf feuchtem Boden.
Blüthezeit.	Juni bis August. 2
Fruchtreife.	August bis Oktober.
Beobacht.	Die Saamenkapseln springen fünffach auf und die Klappen sind zweispaltig.
Nutzen.	Das Vieh frisst es.

CCXXIV. SPERGULA. Spark.

†587.S.ARVEN-
SIS.*Akker-Spark.*

Der Stengel ästig. Die Blätter in Quirlen, gleichbreit-pfriemenförmig. Die weissen Blumen zehnmännig, in einer gabeligen Rispe; die Blumenblätter von der Länge des Kelchs. Die Saamen ohne Rand.

Wohnort. Auf sandigem Boden überall in Menge.

Blüthezeit. Mai bis August. ☉

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Sie variirt mit 5—bis 10 Staubfäden und mit 5—5 Stempeln.

Nutzen. Die Pflanze ist eins der vorzüglichsten Futterkräuter, nimmt mit dem schlechtesten Sandboden vorlieb und verdiente allgemeinen Anbau; aber leider ist sie bei uns noch völlig dem Landmann unbekannt. Von allem Vieh wird sie begierig gefressen und Milch und Butter durch ihren Genuß sehr verbessert; besonders werden die Schaafe sehr fett davon. Mit dem Saamen kann man auch das Federvieh füttern; auch läßt sich nach Eckberg ein gutes Oehl daraus pressen, ja sogar nach Linné

als Mehl unter anderes Mehl gethan zu Brod bakken.

588. S. PENTANDRA.

*Fünfmänniger
Spark.*

Die Stengel einfach. Die Blätter in Quirlen, borstenformig. Die kleinen weissen Blumen fünfmännig, in einer wenig blüthigen Rispe. Die Saamen zusammengedrückt, mit einem weissen häutigen Rande umgeben.

Wohnort.

Auf sandigem trocknem Boden z. B. bei Arheilgen und auch bei Frankfurt zwischen dem Riedschlag und dem Wald auf Aekkern.

Blüthezeit.

April his Juni. ☉

Fruchtreife.

Juli, August.

Nutzen.

Gleich der vorhergehenden Art.

589. S. NODOSA.

*Knotiger
Spark.*

Der Stengel einfach, knotig. Die Blätter gegenüberstehend, in Büscheln, pfriemenförmig, glatt, am Stengel aufwärts, allmählig kürzer. Die weissen Blumen einzeln, am Ende des Stengels; die Blumenblätter länger als der Kelch.

Wohnort.

Auf Wiesen und Triften. Bei den Sandhügeln nach dem alten Wald ohn-

weit Hanau; in der Schneusse vom Wilhelmsbad nach dem Kinzigheimer Hof; auf der Wiese bei der Frankfurter Saustiege; unterhalb Bornheim im Bruch, bei Rödchen und Annerod, bei Arheiligen besonders gegen die Täubchenshöhle hin etc.

Blüthezeit.	Juni bis August. ☉
Fruchtreife.	August, September.
Nutzen.	Wie der Akkerspark.

EILFTE KLASSE.

DODECANDRIA. Mit zwölf Staubfäden.

I. ORDNUNG.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

CCXXV
ASARUM
Haselwurz.

Die Blumenkrone glockenförmig, drei oder vierspaltig, lederartig, gefärbt, bleibend, auf dem Fruchtknoten; die Theilen aufrechtstehend, an der Spitze mit eingekrümmten Zähnen. Die Staubfäden pfriemenförmig, um die Hälfte kürzer als die Blumenkrone, ragen über die zweilappigen Staubbeutel wie ein Hörnchen hervor. Die Narbe sechsstrahlig. Die Saamenkapsel fast rund, lederartig, mit der Blumenkrone umkleidet, sechsfächerig, ohnklappig; die Fächerchen viersaamig.

CCXXVI
PORTULACA
Portulak

Der Kelch zweiblättrig, an der Spitze zusammengedrückt. Die Blumenkrone fünfblättrig. Die 10—15 Staubfäden sind um die Hälfte kürzer als die Krone. Der Fruchtknoten um die Hälfte

te unter dem Kelch und der Krone. Die 4—5 Narben sind länglich. Die Saamenkapsel eyrund, einfächerig, in die Quere mit einem Dekkel aufspringend; die obere Klappe halbkugelförmig, gedoppelt, vielsaamig. Die fünf Fruchtböden frei von einander getrennt und ästig.

CCXXVII.
LYTHRUM.
Blutkraut.

Der Kelch unter dem Fruchtknoten walzenförmig, gestreift, hat sechs oder zwölf wechselsweise kleinere Zähne, und wird nach vollendeter Befruchtung durch die Zähnchen geschlossen. Die Blumenkrone hat 4 oder 6 längliche, stumpfe, abstehende, in die Kelcheinschnitte gewachsene Blätter. Von den 6 oder 12 Staubfäden sind die obern kürzer als die untern. Der Griffel niedergebogen. Die Narbe stumpf. Die Saamenkapsel länglich, zugespitzt, zweiklappig, zweifächerig, vielsaamig.

II. ORDNUNG.

DIGYNIA. Mit zwei Staubwegen

CCXXVIII.
AGRIMONIA
Odermennig.

Der Kelch länglich, fünfzählig, bestachelt, die Fruchthüllen einschliesend. Die Blumenkrone fünfblättrig, die fla-

chen ausgerandeten Blättchen abstehend, am Rande zurückgerollt und mit den schmalen Nägeln am Kelche angewachsen. Meistens 12 Staubfäden welche auf dem Kelch sitzen. Die 2 bis 4 Fruchthüllen werden von dem verhärteten Kelch umkleidet.

III. ORDNUNG.

TRIGYNIA. Mit drei Staubwegen.

CCXXIX.
RESEDA,
Wau.

Der Kelch vier- bis sechstheilig. Die Blumenkrone unregelmässig, drei- bis sechsblättrig; die Blättchen an der Spitze geschlitzt, das obere aber höckerig und am Grunde mit einer Drüse versehen. Staubfäden acht, zwölf, oder mehrere. Griffel drei bis vier. Die Saamenkapsel an der Spitze eingedrückt, höckerig, geschnabelt, offenstehend, einfächerig, enthält viele nierenförmige Saamen.

CCXXX.
EUPHORBIA.
Euphorbie.

Der Kelch glockenförmig, bauchig, vier- bis fünfzählig. Die Blumenkrone regelmässig, vier oder fünfblättrig; die Blumenblättchen mit ihren nagelförmigen

gen Fortsätzen den Kelchabschnitten einverleibt, höckerig, dick, eiförmig, ganz, oder mondförmig-zweihörnig. Die zwölf oder mehreren gegliederten Staubfäden, brechen zu verschiedener Zeit hervor. Der stumpfdreieckige, gestielte Fruchtknoten hat drei zweispaltige Griffel. Die dreiköpfige, gestielte, dreifächerige Saamenkapsel springt elastisch auf, und enthält einzelne fast runde Saamen.

IV. ORDNUNG.

DODECAGYNIA. Mit zwölf Staubwegen.

CCXXXI.
SEMPERVIVUM.

Hauswurz.

Der bleibende Kelch zwölfspalzig; die Abschnitte gleichbreit, ausgehöhlt, gleich, spizzig. Die Blumenkrone zwölf oder vielblättrig; die Blättchen lanzettförmig, spizzig, ausgehöhlt. Drüsen, so viel als Fruchtknoten vorhanden sind, an dem Grunde derselben nach aussen befindlich. Staubfäden zwölf oder mehrere. Saamenkapseln zwölf oder mehrere, am Grunde zusammengewachsen, einfächerig, einklappig, von aussen zugespitzt, von innen aufspringend, vielsaamig.

EILFTE KLASSE.

DODECANDRIA. Mit zwölf Staubfäden.

I. O R D N U N G.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

CCXXV. ASARUM. Haselwurz.

590. A. EURO-
PAEUM.

*Europäische
Haselwurz.*

Die Wurzel kriechend. Der Stengel kurz und zottig. Die zwei Blätter sind nierenförmig und stumpf, lederartig, glänzend, blassgrün. Die von aussen zottige grünlichrothe, inwendig aber schwarz purpurrothe Blume, steht auf einem aus der Wurzel kommenden langen Blumenstiel.

Wohnort.

In schattigen hochliegenden Wäldern, Zäunen und Gebüsch. Sehr häufig hinter Erbstadt in einem kleinen Wäldchen; um Hitzkirchen und Rinderbuchen in Zäunen; in Zäunen bei Sulzbach und dem Rüstersee; im Hangestein und im

Buchwald bei Giesen; in Zäunen zwischen Pferdsbach und Binsachsen; zwischen Wenings und Gedern; im Gebüsch bei der untersten Mühle am Berg bei Gedern; um den kleinen Bildstein oberhalb Bräungeshayn; im Gebüsch um Langenhayn im Vogelsberg; in Hecken und Zäunen um Crainfeld und Hintersteinau; im Bohnenstrauch bei Schlüchtern; um Biber im Gebüsch; in Gebüsch bei Heusenstamm etc.

Blüthezeit. April, Mai. 4

Fruchtreife. Juli.

Bemerkung. Die ganze Pflanze, vorzüglich aber die Wurzel, hat einen starken betäubenden, dem Baldrian ähnlichen Geruch, und wird von den Katzen sehr geliebt.

Nutzen. Blätter und Wurzel sind officinell; letztere wird von den Viehärzten beim Rindvieh und den Schaafen gegen die Fäulniß, und bei den Pferden gegen die Würmer benutzt. Die Wurzel unter das Bier zu mischen, oder sich mit derselben und den Blättern zu purgiren, ist höchst schädlich. Der Absud des Krauts giebt vorbereiteter Wolle apfelgrüne und braungrünliche Farben.

CCXXVI, PORTULACA. Portulak.

†. 591. P. OLERACEA.

Gemüse-Portulak.

Der Stengel niederliegend, röthlich, glatt, ästig. Die Blätter keilförmig, dikk, fleischig, ungestielt. Die gelben Blumen sizzen haufenweise in den Blattwinkeln.

Wohnort.

Auf Aekern, in Gärten, Weinbergen und an Mauern sehr häufig, wild und angebaut.

Blüthezeit.

Juni bis August. ☉

Fruchtreife.

September, Oktober.

Beobacht.

Die Blume öffnet sich bei Sonnenschein gegen 12 Uhr.

Die Saamenböden unterscheiden den Portulak von allen übrigen Geschlechtern und sind bis jezt einig und allein dieser Pflanze eigen.

Bemerkung.

Sollte nicht das eigentliche Vaterland des Portulaks Amerika seyn? Er ist eine von den 4 einzigen Pflanzen welche auf der Ascensions-Insel wachsen.

Nutzen.

Wird häufig sowohl roh als Salat, als auch gekocht als Gemüse und besonders in Suppen benutzt.

CCXXVII, LYTHRUM. Blutkraut.

592. L. SALICARIA. Der Stengel aufrecht, hoch, ekkig, etwas rauh. Die Blätter gegenüberstehend, manchmal auch zu drei, stiellos, herzlanczettförmig, langzugespitzt. Die zwölfmännigen purpurrothen Blumen stehen quirlförmig und bilden eine schöne Aehre.

*Weiderich-
Blutkraut.*

Wohnort. Fast allenthalben an Ufern, Wassergräben und Sümpfen.

Blüthezeit. Juli bis in den Herbst. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Ihre schönen purpurrothen Blumenähren empfehlen sie zur Zierblume. Gleditsch rechnet sie unter die Gerberpflanzen, und nach Dambourney und Suckov kann sie in Färbereien benutzt werden. Jung frisst sie das Vieh gerne. Sie ist officinell.

593. L. HYSSOPIFOLIA. Der kleine aufrechte Stengel, gegen den Grund zu ästig. Die Blätter abwechselnd, gleichbreit. Die kleinen rothen, zuletzt violett werdenden

*Ysopblätteri-
ges Blutkraut.*

Blumen stehen einzeln und sind sechsmännig.

Wohnort. Auf sandigem feuchtem überschwemmtem Boden hinter den Rückinger Schlägen häufig. An der Allee bei dem Frankfurter Forsthaus welche nach Niederroth hin führt; vor Rödelheim häufig.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Häufig findet man, als die Folge eines Insektenstichs, den Stengel in Knoten ausgewachsen.

II. ORDNUNG.

DIGYNIA. Mit zwei Staubwegen.

CCXXVIII. AGRIMONIA.

Odermennig.

594. A. EUPATORIA.

Gemeiner

Odermennig.

Der Stengel aufrecht, ganz einfach, zottig. Die Stengelblätter abwechselnd, gefiedert; die Blättchen mit abwechselnd kleineren untermischt, wovon das ungepaarte gestielt ist. Die gelben, kurzgestielten Blumen bilden am Ende des Stengels eine lockere Aehre.

- Wohnort. Häufig an Zäunen, Wegen, in Wäldern und Gebüsch.
- Blütezeit. Juni bis September. 4
- Fruchtreife. August bis Oktober.
- Beobacht. Ein kleiner, aus zwei dreispaltigen Blättchen bestehender Kelch mit grösserem mittlerem Abschnitt, umgiebt den Grund des eigentlichen Kelches; die Borsten des oberen Kelches sind aufwärts hakenförmig.
- Nutzen. Blätter und Stengel mit noch ungeöffneten Blumen geben eine dunkelgelbe Brühe und die mit Wismuth vorbereitete Wolle erhält davon eine schöne goldgelbe dauerhafte Farbe. Die blühende Pflanze ist zur Gerberei brauchbar. Die Blätter sind officinell.

III. ORDNUNG.

TRIGYNIA. Mit drei Staubwegen.

CCXXIX. RESEDA. Wau.

595. R. LUTEO- Der Stengel aufrecht, ekkig, glatt.
LA.
Gelblicher Die Blätter lanzettförmig, ganz; die
Wau. an der Wurzel zu beiden Seiten mit einem Zahn versehen. Die Kelche vierspaltig. Die Saamenkapseln fast

rund, spizzig - geschnäbelt, in die Quere wellenförmig. Die Blumen gelblich.

Wohnort. An Wegen, Dörfern, altem Gemäuer etc. Von Hanau aus nach Steinhelm am Weg; vor dem Langenselbolder Schloß; an den Weinbergen zwischen Bergen und Seckbach; am Weg zwischen Bonames und Harum; bei Frankfurt am Maynufer; bei Bockenheim; hinter Rödelheim; bei Schiffenberg, Arheilgen etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Blumenblätter drei, wovon das oberste halbsechsspaltig und die zur Seite stehenden dreispaltig. Bisweilen kommen noch unten zwei sehr kleine ungetheilte Blättchen hinzu. Staubfäden gewöhnlich 30.

Nutzen. Der Wau ist die beste Pflanze zum Gelbfärben und sollte billig auch bei uns angebaut werden; besonders da er mit jedem leichten Sandboden vorlieb nimmt. Im Jülicher Land säet man ihn zwischen Klee und rauft im Herbst die Pflanzen mit den Wurzeln aus, wobei

der Klee nicht leidet; man kann ihn auch wie Getreide umhauen. Durch die Zusätze von Salzen, Blauholz etc. giebt er viele Abänderungen von Farben.

596. R. LUTEA.
Gelber Wau.

Der Stengel am Grunde liegend, ausgebreitet, ekkig und rauh. Die Blätter wellenförmig, alle dreispaltig, die unterstengefiedert. Der Kelch sechstheilig. Die gelben Blumenkronen sechsblättrig und ungleich. Die Saamenkapseln länglich, stumpf, geschnäbelt.

Wohnort.

An Wegen, Akkerrändern, steinigen Orten, in Gebüsch z. B. am Maynufer Großsteinheim gegenüber; bei der Dörnigheimer Heide; Rumpenheim gegenüber am Maynufer; vor den Thoren um Frankfurt; bei Schierstein, Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit.

Mai bis Juli. ☉

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Man könnte wohl diese Pflanze statt Kohl essen. Höchst wahrscheinlich besitzt sie Farbestoff. Die Schaaf

fressen sie nur wenn sie Saamenkapseln hat.

CCXXX. EUPHORBIA. Euphorbie.

*) Mit ganzen Blumenblättern.

597. E. HELIOS-COPIA. Die Blätter abwechselnd, keilförmig, sägeartig gezahnt. Die Dolde erst fünfstrahlig, dann dreistrahlig, endlich zweitheilig. Die Hüllblättchen eyförmig, sägeartig gezahnt. Die Blumen grün. Die Saamenkapseln glatt.

Wohnort. In Gemüsegärten, an Wegen, auf gebautem Boden. Bei Hanau auf Aeckern in dem Nürnbergerfeld und nach dem Bruchköblerwald hin; am Feldweg bei Hochstadt; gemein um Frankfurt in den Gemüsefeldern; um Giesen, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Mai bis August. ☉

Fruchtréife. Juli bis September.

Beobacht. Die Blumenblätter etwas rund. Fruchtbare Staubfäden sechs oder acht. Der Saamen eyförmig, etwas rauhhaarig.

Nutzen. Das Vieh frisst sie, aber nicht gänzlich ohne Schaden. Ueberhaupt gehört das ganze Euphorbiengeschlecht, so wie

alle dreiköpfige, dreifächerige Saamenkapseln, zu den verdächtigen Pflanzen, welche meistens giftige Eigenschaften besitzen. Fast alle Arten enthalten einen milchichten, mehr oder weniger scharfen reizenden Saft, welcher mit Milch vermischt, dieser eine rosenrothe Farbe mittheilt; auch nehmen beim Austrocknen mehrere Arten eine bläulichgrüne Farbe an und verdienen in Absicht der Färberei eine genaue Untersuchung. Diese so wie mehrere Arten geben eine grüne, und nach langem Kochen eine Aurorafarbe auf Wolle.

598. E. PLATYPHYLLOS.

Breitblätteri-
ge Euphorbie.

Die Blätter abwechselnd, lanzettförmig, sägeartig gezahnt, gegen die Spitze zu breiter, oben glatt, unten zottig. Die Dolde erst fünfstrahlig, dann dreistrahlig, endlich zweitheilig. Die Hüllen lanzettförmig, mit herzförmigen, sehr fein sägeartig gezahnten an der Rückenschärfe haarigen Hüllblättchen. Die Blumen gelb. Die Saamenkapseln warzig.

Wohnort. Auf Aekern und angebauten Orten z. B. bei Dorfelden, Seckbach, Kilianstetten, Bornheim, Frankfurt etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die aus den Blattwinkeln kommende Dolden sind dreispaltig. Die Staubfäden rauhhaarig, 12 — 14 fruchtbar, und eben so viele unfruchtbar.

599. E. CAJOGALA Ehrh.
Brennende Euphorbie.

Der Stengel einfach. Die Blätter stiellos, zerstreut, gleichbreit-lanzettförmig, spizzig, endigen sich in eine weiche Stachel, und sind dreinervig. Die Dolden vielstrahlig, mit zweitheiligen Doldchen. Die allgemeine Hüllblättchen breit-lanzettförmig; die besondern breit-herzförmig. Die Blumen gelb. Die Saamenkapseln glatt.

Wohnort. Auf Viehtriften hinter Kleinsteinheim um den Feldbrunnen; häufig in der Gegend der Sachsenhäuser Warte, des Lerchenbergs, des Forsthauses und des Sandhofs; häufig um Darmstadt auf den Sandfeldern und Sandhügeln.

- Blüthezeit. Mai bis Juli. 2
 Fruchtreife. August, September. \
- Beobacht. Die Blätter graugrün. Blumenblätter
 4. Staubfäden 5 oder 8. Sie ist die
Euphorbia Esula in Reichards
Flora Moeno-francofurtana.

600. E. PALU-
 STRIS.

*Sumpf-Eu-
 phorbie.*

Der Stengel 3, 4 bis 5 Fuss hoch,
 ästig; die Aeste meistens unfrucht-
 bar. Die Blätter stiellos, lanzettför-
 mig, meist glattrandig. Die Dolde
 vielstrahlig; die Strahlen drei bis
 viertheilig; die Doldchen zweitheil-
 lig. Die Hüllen eyrund, fahl. Die
 Blumen gelb. Die Saamenkapseln
 warzig.

Wohnort. In einer sumpfigen Waldgegend zwi-
 schen Arheilgen und Messel, das Blech
 genannt.

- Blüthezeit. Mai bis Juli. 2
 Fruchtreife. August bis September.

*) Mit zweihörnigen Blumenblättern.

601. E. PEPLUS.
*Rundblätteri-
 ge Euphorbie.*

Die Blätter glattrandig, verkehrt
 eyförmig, in den Blattstiel laufend.
 Die Dolde dreistrahlig; die Doldchen
 zweitheilig. Die Hüllblättchen ey-

rund. Die Saamenkapseln glatt, mit drei nachenförmigen Furchen, wellenförmig gekerbt. Die Blumen grünlich.

Wohnort. An Gemüsegärten und auf Aekkern häufig.

Blüthezeit. August, September. ☉

Fruchtreife. September Oktober.

Beobacht. Die Saamen sind auf der einen Seite eckig und zweimal gefurcht, auf der andern gewölbt und nezzförmig gezeichnet.

602. E. ESULA Der Stengel aufrecht und ästig, mit unfruchtbaren und blüthetragenden Aesten. Die kurzgestielten Blätter gedrängt, lanzettförmig, stumpf, nur einrippig und endigen sich in eine kleine Spitze. Die Dolde vielstrahlig, die Doldchen zweitheilig. Die allgemeinen Hüllblättchen den Stengelblättern gleichförmig, die besonders herzförmig zugerundet. Die Blumen gelb. Die Saamenkapseln etwas warzig.

Gemeine Euphorbie.

Wohnort. An Wegen und sandigen Triften z. B. bei Hanau am Maynufer disseits Großsteinheim; bei Offenbach diss- und jenseits dem Maynufer.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. September.

Beobacht. Wir haben die Saamenkapseln niemals glatt, sondern stets etwas warzig gefunden.

603.E. DULCIS. Die Blätter abwechselnd, stiellos, *Süsse Euphor-* lanzettförmig, stumpf, fast ganz *bie.* glattrandig, oben glatt, unten blasser, sehr weich und weisslich zottig. Die Dolde fünfstrahlig, die Strahlen zweitheilig. Die Hüllenblättchen fast herzförmig, fein sägezählig, endigen sich in eine Spitze. Die Blumen gelb. Die Saamenkapseln unter der Mitte mit zwei gedoppelten Reihen rother Warzen, die dachziegelförmig übereinander liegen, gekrönt.

Wohnort. Bei Kranichstein in dem feuchten schattigen Walde an dem Ruzenbache, hinter Kranichstein in dem Saupark. (Borckh.)

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Der Saft dieser Euphorbie ist süß und ohne alle Schärfe; getrocknet wird sie ganz schwarz.

604. EXIGUA
Kleine Euphor-
bie.

Die Blätter gleichbreit, stiellos, abwechselnd, spizzig. Die Dolde dreistrahlig, manchmal auch vier oder fünfstrahlig. Die Strahlen zweitheilig. Die Hülleneylanzettförmig. Die Blumen gelb. Die Saamenkapseln glatt.

Wohnort. Unter der Saat z. B. bei Hanau auf den Aeckern bei der Kesselstädter Ziegelhütte, bei dem Kinzigheimer Hof, der Hartig etc. auf Aeckern um Offenbach, Homburg, Frankfurt, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni bis in den Herbst. ☉

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Die Blumen sind sehr klein; der Kelch spizzig-vierzahlig. Die vier Blumenblätter zweihörnig und schildförmig. Die Saamen etwas nezzförmig gezeichnet.

605. E. CYPA-
RISSIAS.

Zypressen-Eu-
phorbie.

Der Stengel ästig, manche Aeste unfruchtbar. Die Blätter zerstreut,

2. Th.

K

am Stengel gleichbreit, an den Aesten gleichbreit - borstenförmig. Die Dolde vielstrahlig, die Strahlen zweitheilig. Die Hüllen gleichbreit, mit etwas herzförmig-runden Hüllblättchen. Die Blumen gelblich. Die Samenkapseln warzig.

Wohnort. Sehr häufig auf sandigen Grasplätzen und Akkerrainen, auf Triften, an Wegen etc.

Wohnort. April, Mai. 2

Blüthezeit. Juli, August.

Fruchtreife. Blumenblätter 4, fruchtbare Staubfäden 5—6, unfruchtbare 8—9.

Beobacht. Diese Pflanze wird äusserst häufig mit dem Euphorbienstaubpilze befallen, wodurch sie sich ganz unähnlich wird; ihre Blätter werden dann eyförmig, die untere Seite mit safranfarbigen Punkten bezeichnet, der Stengel wird ganz einfach und blühet nur sehr selten. Dies ist die *E. degener* Riv. und mehrerer Botaniker.

Nutzen. Diese Art nährt in Menge die schöne Raupe des Euphorbienschwärmers.

Die Ziegen fressen sie, so wie den Samen die Tauben.

IV. ORDNUNG.

POYGYNIA. Mit vielen Staubwegen.

CCXXXI. SEMPERVIVUM.

Hauswurz.

606. S. TECTORUM.

Gemeine Hauswurz.

Die Blätter gefranzt. Die Wurzelsprossen abstehend. Der Kelch zwölfspalzig. Die purpurrothen Blumenkronen zwölflblätterig. Fruchtknoten 24, in einer doppelten Reihe; die 12 in der äussern sind unfruchtbar.

Wohnort. Auf Mauern und Dächern fast in allen Dörfern.

Blüthezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Die jungen zarten Blätter kann man so wie Portulak zu den Suppen hinzusetzen; der aus denselben ausgepresste Saft, mit höchstgereinigtem Weingeist vermischt, giebt eine schöne weisse Pomade, welche von manchen als Schminke gebraucht wird, und man kann auch damit die Sommersprossen im Gesichte

vertreiben. Diese und die folgenden Arten, empfehlen sich zu Zierblumen, und nehmen sich in künstliche Felsen gepflanzt, sehr schön aus.

607. S. GLOBI-
PERUM.

*Kugeltragende
Hauswurz.*

Die Blätter gefranzt. Die Wurzel-
sprossen kugelrund. Der Kelch 12 bis
14 spaltig. Die blaßgelben Blumen-
kronen 12 bis 14 blätterig. Frucht-
knoten 10 bis 12.

Wohnort.

Auf Mauern z. B. in Frankfurt hinter der Judengasse und zwar in der Strasse so von dem Wallgraben in die Allerheilgengasse führt; auf Mauern in Bockenheim, Kassel vor Mainz, Lindheim, Homburg, Niederweichsel, des Butzbacher Schlosses, Giesen etc.

Blüthezeit.

Juli, August. 24

Fruchtreife.

September, Oktober.

ZWOELFTE KLASSE.

ICOSANDRIA. Mit zwanzig und mehr Staubfäden die auf dem Kelche sitzen.

I. ORDNUNG.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

CCXXXII, PH. LADEL-
PHUS. *Pfeifenstrauch* Der Kelch oberhalb dem Fruchtknoten, vier bis fünfstheilig, bleibend. Die Blumenkrone vier bis fünfblättrig. Die Kronblättchen an der Spitze ausgerandet. Staubfäden 20 bis 24. Der Griffel bis in die Mitte 4 bis 5 spaltig. Die Narben einfach. Die Saamenkapsel gedoppelt, unten mit dem Kelch und der Krone bekleidet, oben nackt, 4 bis 5 klappig, 4 bis fünffächerig. Der häutige Umschlag des Saamens keulenförmig, zugespitzt, und am Grunde gezähnt.

CCXXXIII. AMYGDALUS
Mandelbaum. Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, glockenförmig, fünfstheilig, abfallend. Die Blumenkrone fünfblättrig. Staubfäden 20 oder sehr viele, dem

Grunde des Kelchs und dessen ganzen inneren Wand, in gleichlaufenden Reihen angeheftet. Die Steinfrucht trocken, lederartig, auf der einen Seite einfurchig bei ihrer Reife von einanderstehend, enthält eine einsamige, zusammenge-drückte, eyförmige, langzugsspitze, glatte, auf beiden Seiten mit etwas hervorragenden Näthen, nezzförmigen Vertiefungen und zuzeilen kleinen Löchern versehenen Nufs.

CCXXXIV
PERSICA.

Pfirsichbaum.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, glockenförmig, fünftheilig, abfallend. Die Blumenkrone fünfblättrig. Staubfäden 20 oder sehr viele, dem Grunde des Kelches und seiner ganzen inneren Wand, in gleichlaufenden Reihen einverleibt. Die Steinfrucht fleischig, saftig, eyrund oder rundlich, auf einer Seite einfurchig. steht bei ihrer Reife nicht von einander, und enthält eine einsamige, eyförmige, oben lang zugespitze, auf beiden Seiten mit etwas hervorragenden Näthen und vielen Grübchen und Furchen nezzförmig gezeichneten Nufs.

CCXXXV
ARMENIACA.
Aprikosen-
baum.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, glockenförmig, fünftheilig, abfallend. Die Blumenkrone fünfblätterig. Staubfäden 20 oder sehr viele, dem Grunde des Kelches und seiner ganzen inneren Wand, in gleichlaufenden Reihen einverleibt. Die Steinfrucht fleischig, rundlich, etwas filzig, auf der einen Seite einfurchig, enthält eine einsamige, rundliche, etwas zusammengedrückte an dem einem Rande spitzige, an dem andern stumpfe, auf beiden Seiten gefurchte Nufs.

CCXXXVI
PRUNUS.
Pflaumenbaum.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, eyförmig, fünftheilig, abfallend; die Abschnitte zugerundet, abstehend. Die Blumenkrone fünfblätterig. Staubfäden 20 oder mehrere, dem obern Rande der Kelchröhre einverleibt. Die Steinfrucht fleischig, glatt, länglich oder rundlich, auf einer Seite gering einfurchig, enthält ein einziges, etwas zusammengedrücktes Steinchen, dessen Näthe nur schwach hervorragen.

CCXXXVII
PADUS.
Ahlkirschbaum

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, eyförmig, fünftheilig, abfallend; die Abschnitte zugerundet, abstehend.

Die Blumenkrone fünfblätterig; die Blättchen gezähnt. Staubfäden 20 oder mehrere, dem oberen Rande der Kelchröhre einverleibt. Die Steinfrucht fleischig, glatt, kugelig, auf einer Seite gering einfurchig, enthält ein einziges kugelformiges, rauhes, auf einer Seite etwas eckiges Steinchen.

CCXXXVIII
CERASUS.
Kirschbaum.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, eiförmig, fünftheilig, abfallend; die Abschnitte lanzettförmig, zurückgebogen. Die Blumenkrone fünfblätterig die Blättchen fast ganz. Staubfäden 20 oder mehrere, aus der Mitte der inneren Kelchwand entstanden und an dessen obern Hälfte in gleichlaufender Reihe einverleibt. Die Steinfrucht fleischig, glatt, kugelformig, auf einer Seite schwach einfurchig, enthält ein einziges, kugelförmiges, glattes, auf einer Seite etwas eckiges Steinchen.

II. ORDNUNG.

DI—PENTAGYNIA. Mit zwei- bis fünf Staubwegen.

CCXXXIX
MESPIUS.
Mispelbaum.

Der Kelch auf dem Fruchtknoten, fünfspaltig, bleibend. Die Blumenkrone fünfblätterig. Staubfäden 20 und meh-

rere. Griffel einer, zwei oder fünf. Die Steinfrucht eyförmig, fleischig, bei der Reife zuweilen oben geöffnet, enthält 1 — 5 einfächerige, zweisaamige Steinchen, wovon ein Saame meistens unbefruchtet ist.

CCXL
PYRUS.
Birnbaum.

Der Kelch auf dem Fruchtknoten, fünftheilig, bleibend; die Abschnitte lanzettförmig, auseinanderstehend. Die Blumenkrone fünfblätterig. Staubfäden 20 und mehrere. Griffel einer und zwei, drei vier, fünf, oder eben so vielspaltig, am Grunde wollig. Die Fruchthöhle eine kreiselförmige, oder kugelförmige, zwei bis fünfächerige Apfelfrucht, deren Fächerchen durch eine eigene Haut bekleidet sind, und zwei glatte, auf der einen Seite erhabene, auf der andern flache Saamen enthalten, von welchen meistens der eine unbefruchtet ist.

CCXLI
SPIRAEA.
Spierstaude.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, fünf - sechsspaltig. Die Blumenkrone fünf - sechsblätterig. Der Fruchtknoten sind fünf, sechs oder mehrere. Mehrere gehäufte, langzugespitzte, zweiklappige, einfächerige,

einsaamige Saamenkapseln, enthalten wenige, zugespizzte, kleine, an der innern Nath angeheftete Saamen.

III. ORDNUNG.

POLYGYNIA. Mit vielen Staubwegen.

CCXLII.
ROSA.
Rose.

Der Kelch fünftheilig, röhrig, bleibend, wird durch die Reife in eine farbige Fruchthöle verändert. Die Blumenkrone fünfblättrig. Die aus der Röhre des Kelchs entstandene Fruchthöle ist fleischig, kreiselförmig, gefärbt, einfächerig, mit den vertrockneten Kelchstücken gekrönt, am Halse enge zusammengezogen, oben geöffnet, und enthält viele, an der innern Seite angeheftete, längliche, rauhzottige Fruchthüllen.

CCXLIII.
RUBUS.
Himbeere.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, fünfspaltig. Die Blumenkrone fünfblättrig. Die haarförmigen Griffel kommen aus der Spitze der Fruchtknoten. Die rundlichen einsaamigen ächten Beeren sitzen auf einem kugelförmigen Fruchthoden, in eine zusammengesetzte Beere vereinigt.

CCXLVI.
TORMEN-
TILLA.
Tormentille.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, achtspaltig; die Abschnitte wechselsweise kleiner. Die Blumenkrone vierblättrig; die Blättchen verkehrt herzförmig. Der in ein Köpfchen vereinigte Fruchtboden klein, erhaben und saftlos. Der Fruchthüllen sind achte, etwas rund, ohnbewaffnet und glatt.

CCXLIV.
FRAGARIA.
Erdbeere.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, zehnspaltig; die äussern Abschnitte schmaler. Die Blumenkrone fünfblättrig. Die Griffel sitzen an den Seiten der Fruchtknoten. Auf dem gemeinschaftlichen Fruchtboden sitzt der fleischige, eyförmig - kugelige, gefärbte, am Grunde abgestuzte, abfällige Fruchtknoten, welcher sehr viele, kleine, zugespizte, auf der Oberfläche zerstreute, nakte, glatte Saamen enthält.

CCXLV.
POTENTIL-
LA.
Potentille.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, zehnspaltig, mit abwechselnd kleineren, zurückgebogenen Kelchstücken. Die Blumenkrone fünfblättrig. Der in ein Köpfchen vereinigte Fruchtknoten klein, saftlos, und schwämmig. Die sehr vielen Fruchthüllen sind nackt und runzlich.

CCXLVII.
GEUM.
Geum.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, zehnpaltig; die äussern Abschnitte sehr klein und spizzig. Die Blumenkrone fünfblättrig. Die Griffel haarig, bleibend, mit Gelenken, stehen an den Spitzen der Fruchtknoten. Auf dem gemeinschaftlichen säulenförmigem Fruchtboden sitzen sehr viele, längliche, steifhaarige, mit dem knieförmigen Griffel begrante Fruchthüllen.

CCXLVIII.
COMARUM.
Comarum.

Der Kelch unterhalb dem Fruchtknoten, zehnpaltig, mit abwechselnd kleinern gefärbten Kelchabschnitten. Die Blumenkrone fünfblättrig. Die kurzen Griffel stehen an den Seiten der Fruchtknoten. Der in ein Köpfchen vereinigte Fruchtknoten ist sehr gross, kugelig, zottig und saftlos; die Fruchthüllen nackt und glatt.

Z W O E L F T E K L A S S E.

ICOSANDRIA. Mit zwanzig und mehr Staubfäden,
die auf dem Kelche sitzen.

I. O R D N U N G.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

CCXXXII. PHILADELPHUS. Pfeifenstrauch.

608. P. CORO-
NARIUS.
*Wohlriechen-
der Pfeifen-
strauch.*

Die Blätter eyförmig, gezähnt, ent-
gegenstehend, zugespitzt, glatt, kurz-
gestielt. Die weissen, selten gefüll-
ten, sehr wohlriechenden Blumen
bilden am Ende der Aeste eine Blu-
mentraube.

Wohnort. Das mittägige Europa; bei uns gleich-
sam wild an Zäunen und in Hekken
z, B. in den Zäunen hei der Hanauer
Meisterei; bei Frankfurt im Affenstein,
vor dem Eschenheimerthor und a. m. O;
in Zäunen um Friedberg.

Blüthezeit. Mai, Juli. ‡

Fruchtreife. September, Oktober.

Nuzzen.

Dem schönen, pomeranzen ähnlichen Geruch seiner Blüthen wegen, pflanzt man ihn in Gärten an. Von seinen Zweigen ohne Blätter, läßt sich auf vorbereitetem Tuche eine braunrothe Farbe erhalten. Nach Nocca, nimmt man in Italien die Blätter mit denen von *Schinus mollis* zu den Salaten, um solchen einen Pfeffer- und Kukummern-Geschmack zu geben, Aus den älteren Zweigen lassen sich gute Tobaksröhren machen. Die Vermehrung geschieht durch Wurzelbrut, Absenker, abgeschnittene Zweige und Saamen.

CCXXXIII. AMYGDALUS.**Mandelbaum.**

†. 609. A. COMMUNIS.

Gemeiner

Mandelbaum.

Die Blätter eylanzettförmig, lang-zugespitzt, glatt, sägeartig gezähnt, die unteren Säugungen und die Blattstiele mit Drüsen besetzt. Die röthlichen Blumen ungestielt, paarweise sizzend. Die Blumenkronblätter grösser als der Kelch. Die Schale der Frucht beinartig und sehr hart.

Wohnort. Er stammt aus Asien und Afrika, und wird in unsern Gärten, hin und wieder auch in Weinbergen, gszogen.

Süsse Abarten.

1) Die kleine süsse Steinmandel. 2) Die grosse süsse Steinmandel. 3) Die Pfirsichmandel.

Bittere Abarten.

1) Die kleine bittere Steinmandel.
2) Die grosse bittere Steinmandel.

Blüthezeit. Ende des Aprils oder Anfangs Mai, vor dem Ausbruch der Blätter. ‡

Fruchtreife. September, Oktober.

Bemerkung. Den Mandelbaum erhielten die Römer zuerst aus Griechenland, daher Cato die Mandeln auch griechische Nüsse nannte; von Italien kam er nach Frankreich, von da in die Schweiz, nach England, Holland und zuletzt nach Teutschland.

Nutzen. Die unreifen Mandeln werden in Frankreich wie die Wallnüsse in Zucker eingemacht; die süssen von ihrer bittern Schale gereinigt, ißt man roh, oder in Bakkwerk, an Speisen und auch mit Zucker überzogen. Man preßt aus ihnen und den bittern Mandeln das beste

und süsseste unter allen Oehlen; mit Wasser abgerieben geben sie die Mandelmilch. Die Mandelkleye wird statt der Seife zur Reinigung der Haut gebraucht; auch kommt sie unter die Seifenkugeln. Die bittern Mandeln sind dem mehrsten Geflügel, so wie auch den vierfüssigen Thieren ein Gift; ja häufig genossen erregen sie auch bei Menschen Erbrechen, doch in geringer Menge sind sie unschädlich, dann man gebraucht sie die Speisen zu würzen und zum Konfekt. Sollte nicht in dem Häutchen derselben das Gift stecken? Einige bittere Mandeln vor dem Genuß geistiger Getränke gegessen, sollen die Betrunketheit verhüten; schon Dioscorides bemerkt dieses, und Plutarch führt einen Arzt des Sohns des Kaisers Tiberius an, der durch dieses Hülfsmittel bei den täglichen Schmausereyen die übrigen alle in Trinken übertroffen hat.

Aus gleichen Theilen gerösteten, abgeschälten und gemahlenen süssen und bittern Mandeln kann man eine Art Kaffe bereiten, und setzt man ihnen auf diese Weise bereitet, Gewürze und Milch

hinzu, so giebt es ein Getränk wie Chokolade. Roux hat ein gutes Klebwerk welches aus einem Teige von dem Rückbleibsel der Mandeln aus denen man das Oehl geprefst hat und gewöhnlichen Leime besteht, bekannt gemacht. Nach Strabo bereiteten einige Völker in Medien Brod von gedörrten Mandeln. Die Mandeln sind offizinell. Das Holz kann zu guten Dreher- und Tischlerarbeiten gebraucht werden. Ausser seinem Nuzzen empfiehlt sich auch dieser Baum noch durch seine schöne Blüthen in Gärten. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, die besondern Abarten werden aber durch Fropfen und Okuliren fortgepflanzt.

†. 610. A. FRAGILIS *Borckh.*
Krachmandel-
baum.

Die Blätter eylanzettförmig, lang-zugespizt, mehr gehäuft und kürzer als bei der vorhergehenden Art, glatt, sägeartig gezähnt, die untersten Säugungen und die Blattstiele mit Drüsen besetzt. Die blassrothen Blumen ungestielt, paarweise stehend. Die Blumenblätter kaum etwas über den

Kelch hervorragend. Die Schale der Frucht weich und zerbrechlich. Der Kern süß.

Amygdalus communis γ Linn.

Wohnort. Stammt ursprünglich aus Asien und Afrika, und wird hin und wieder in Gärten bei uns gezogen.

Blüthezeit. Anfang des Mai oder noch etwas später, vor dem Ausbruch der Blätter. †

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Wie bei der vorhergehenden Art.

CCXXXIV. PERSICA. Pfirsichbaum.

†. 611. P. VUL-
GARIS Mill.

Gemeiner Pfir-
sichbaum.

Die Blätter lanzettförmig, langzugespitzt, mit zweifachen sägeartigen Zähnungen. Die rothen Blumen auf-sizzend, einzeln. Die Steinfrucht zottig.

Amygdalus Persica α Linn.

Abarten.

A. Deren Stein sich vom Fleisch ablöset.

a. Gefärbte mit schmelzendem Fleisch.

1) Genueser Pfirsche, 2) grosse Prinzessinpfirsche, 3) rothe Magdalene,

4) doppelte Montagne, 5) Edelpfirsche, 6) Burdiner, 7) Kanzlerpfirsche, 8) Maltheserpfirsche, 9) frühe Purpurpfirsche, 10) Venuspfirsche, 11) König Georgpfirsche, 12) Sanftfärbige, 13) Fromentinerpfirsche, 14) rothe Frühpfirsche, 15) Safranpfirsche, 16) frühe Peruvianerin, 17) grosse Blutpfirsche.

b. Gefärbte mit festem Fleisch.

1) Wunderschöne, 2) kleine Lieblingspfirsche, 3) Persische Pfirsche, 4) Portugisische Pfirsche, 5) schöne von Vitry, 6) wollige Nivette.

c. Ungefärbte mit schmelzendem Fleisch.

Weisse Frühpfirsche.

d. Ungefärbte mit hartem Fleisch.

Pfirsche mit gefüllter Blüthe.

B. Deren Stein am Fleisch angewachsen.

a. Gefärbte.

Monströser Härtling.

b. Ungefärbte.

1) Grosse Charlestowne Ananaspfirsche, 2) kleine Charlestowne Ananaspfirsche.

Wohnort. Persien ist sein Vaterland. In unsern Gärten wird er sammt obigen Abarten gezogen.

Blüthezeit. Ende Aprils und Anfangs Mais, vor dem Ausbruch der Blätter. †

Fruchtreife. Von der Mitte des Juli bis Ende Septembers, nachdem die Verschiedenheit der Abarten ist.

Beobacht. Die Blumen kommen aus den Augen der jüngsten Sommerlatten, die zugleich neue Schosse zur nächsten Jahresfrucht hergeben, und die Blätter kommen aus der auf der Spitze befindlichen Knospe und nicht unterhalb den Blumen hervor.

Bemerkung. Plinius glaubt, daß die Pfirschen zuerst aus Persien nach dem südlichen Europa verpflanzt worden sind, und Theophrast, daß sie aus Persien zuerst nach Rhodus und Egypten, und von da nach Griechenland gekommen seyen.

Nutzen. Der Pfirsichbaum liefert eine der al-
leredelsten Früchte unter dem Steinobst. Die saftigen Arten ist man bloß roh, die festen braucht man auch zum Kompot, Bakkwerk, zum Einmachen in Zucker, Essig, Brantwein und zum Trock-

nen. Nach Feuillée verwahrt man sie in Buenos Ayres auf den Winter, daß man die Haut abzieht, das Fleisch in dünne Scheiben schneidet, es bis zu einem gewissen Grade trocknet, die Scheiben übereinander legt, stark zusammenbindet und in Körbe pakt; will man nun die Pfirsichen essen, so löset man das Band, hakt die Scheiben klein, kocht sie mit etwas Wasser, Wein und Zucker zu einer Kompotte, die ein pikanten, dabei sehr angenehmen Geschmack hat. In Neu-England in Amerika wo sie in grosser Menge wachsen, bereiten aus ihnen die Einwohner einen trefflichen geistigen Most. Bei uns preßt man frisch den Saft aus, vermischt ihn mit Zucker und rothem Wein, welchen trefflichen Trank wir Leppell nennen. Der über die Pfirsichkerne abgezogene Brantwein, ist der beliebte Persiko; die Kerne geben auch ein gutes Oehl. Statt des Chinesischen Thees trinken manche den schwachen Aufguss von den Blättern; auch in Milch werden sie gekocht, wodurch diese einen Mandelgeschmack erhält. Das Holz von

alten Stämmen wird zu Tischler und Drechslerarbeiten benutzt. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, die besonders Abarten werden aber durch Propfen und Okuliren gepflanzt. Er ist officinell.

†. 612. P. Nu-
CIPERSICA
Bauh.
Nusspflirsich-
baum.

Die Blätter lanzettförmig, langzugespitzt, spizzig, mit einfachen sägeartigen Zähnungen. Die rothen Blumen einzeln und aufsitzend. Die Steinfrucht glatt.

Amygdalus Persica β Linn.

A b a r t e n .

A. Deren Stein sich vom Fleisch ablöset.

a. Gefärbte mit schmelzendem Fleisch.

1) kleine frühe Violette, 2) grosse rothe nakkende Frühpflirsche.

b. Gefärbte mit hartem Fleisch.

Newingtons Nektarine.

B. Deren Stein am Fleisch angewachsen.

a. Gefärbte mit hartem Fleisch.

Violette Brügnon.

b. Gefärbte mit weichem Fleisch.

1) Goldnektarine, 2) weisse Nektarine.

Wohnort. Persien ist sein Vaterland. In unsern Gärten, sammt obigen Abarten.

Blüthezeit. April — Mai, vor dem Ausbruch der Blätter. $\frac{1}{2}$

Fruchtreife. August — Oktober, nach der Verschiedenheit der Abarten.

Nutzen. Alles wie bei der vorigen Art.

CCXXXV. ARMENIACA. *Aprikosenbaum.*

†613. A. EPIRO-
TICA. *Nobis*
Gemeiner
Aprikosen-
baum

Die Blätter eyförmig, etwas herzförmig, spizzig, sehr fein sägeartig gezähnt, einwärts gerollt. Die blassrothen Blumen aufsitzend, an den Seiten der Zweige, gewöhnlich einzeln, zuweilen zu zwei beisammen. Die Steinfrucht mit einer rauhen Haut ohne Wolle.

Prunus Armeniaca Linn.

Abarten.

A. Mit süsser Mandel.

1) Ananasaprikose, 2) Violette Aprikose, 3) Provenser Aprikose, 4) Rothe Aprikose.

B. Mit bitterer Mandel.

1) Kernaprikose, 2) Portugiesische Aprikose, 3) Fröhaprikose, 4) Pfirsichaprikose, 5) Gemeine Aprikose, 6) Grosse Zukkeraprikose, 7) Aprikose mit geschnittenem Blatt, 8) Albergeaprikose, 9) Ungarische Aprikose.

Wohnort. Asien ist sein Vaterland. In unsern Gärten, sammt obigen Abarten.

Blüthezeit. März, April, vor dem Ausbruch der Blätter. ♀

Fruchtreife. Juli, August, nach der Verschiedenheit der Abarten.

Bemerkung. Die Aprikose kam zuerst aus Armenien zu den Zeiten der Siege Alexanders nach Griechenland und Epirus, von welchem letztern Lande die Römer die Früchte bekamen; daher sie Mala armeniaca und epirotica genannt wurden.

Nutzen. Die Früchte ißt man sowohl roh als auch gedörst und eingemacht; auch zu Backwerk und mancherlei Bereitungen benutzt man sie. Wenn sie frisch nur einige Stunden über ihre völlige Reife gehalten werden, so verlieren sie ihren guten Geschmakk. Die bittern Kerne

braucht man mit zur Bereitung des Rastavia, die süßen wie Mandeln. Die Steine geben zu Pulver gebrannt sowohl eine schwarze Farbe zum Oehlmalen, als auch nach Lewis eine Tusche. Die Zweige können zu Färbereien dienen. Die Vermehrung kann zwar durch den Saamen geschehen, aber man pflegt, doch die besondern Abarten durch Okuliren, Propfen und Ablaktiren fortzupflanzen.

†614. A. DASY-
CARPA Borckh
Schwarzer
Aprikosen-
baum

Die Blätter eyförmig, langzuge-
spitzt, doppelt sägeartig gezähnt. Die
Blattstiele mit Drüsen besetzt. Die
kleinen weisslichen Blumen stehen
einzeln oder zu zwei beisammen,
auf sehr kurzen Stielchen. Die Stein-
frucht klein, rund, auf der Sonnen-
seite schwarzblau, auf der andern
dunkelroth, mit feinen weichen Här-
chen bedekt.

Prunus dasycarpa Ehrh.

Wohnort.

Das Vaerland ist unbekannt. Viel-
leicht ist es das südliche Europa, oder
der Orient? In unsern Gärten ist sie
selten.

Blüthezeit.	April, Mai. †
Fruchtreife.	August.
Nutzen.	Wie bei der vorigen Art.

CCXXXVI. PRUNUS.

Pflaumenbaum.

615. P. SPINOSA Die Aeste dornig, weichhaarig.
Schlehendorn; Die Blätter elliptisch, zusammenge-
Schwarzdorn. rollt, auf der Oberfläche glatt, auf
der Unterfläche etwas haarig, am
Rande einfach stumpf sägeartig ge-
zähnt. Die Blumenstiele einzeln, et-
was haarig. Die Blumen weiß. Die
Seinfrüchte oval und schwarzblau.
- Wohnort. Allenthalben in Zäunen, Gebüsch
und Wäldern.
- Blüthezeit. April, Mai, vor dem Ausbruch der
Blätter. ‡
- Fruchtreife. Im Spätherbst.
- Beobacht. Der Kelch vierspaltig, aber selten.
Der Staubfäden sind allezeit weniger als
zwanzig.
- Nutzen. Dieser Strach schikt sich besser auf
freien Plätzen wegen seinen weit wu-
chernden Wurzeln zu Umzäunungen
als zu Gartenzäunen. Sein Holz ist hart.

und dient in den Gradierhäusern als Wellenholz, zum Durchlaufen der Soole; auch benutzen es die Bildschnitzer, Dreher, Tischler und Instrumentenmacher. Die schwärzliche Rinde verwahrt die Käse vor der Fäulnis; auch giebt sie mit Lauge vermisch eine rothe Farbe, und ist auch in der Gerberei zu benutzen. Die Früchte werden selten roh gegessen, mehrentheils macht man sie mit Zukker, oder auch mit Senf, oder in Essig ein, oder kocht sie mit mit den gedörrten Pflaumen. Dem Apfelwein (auf die Frankfurter Ohm 1 Simmer) ganz oder zerstampft, frisch oder oder gedörrt, vor oder nach der Gährung zugesetzt, geben sie ihm eine liebliche rothe Farbe, mehr Geist und einen angenehmen Geschmakk; diese Benutzung der Schlehen können wir nicht genug unsern Landsleuten empfehlen. Sie geben auch einen Essig und einen guten Magenwein; letztern bereitet man besonders in Westphalen und Niedersachsen aus ihnen. Die Engländer machen ihren Aporto- oder Rumpunk daraus, ein angenehmes Getränke, dafs sie.

aus den Schlehen mit Apfelmost und Branntewein bereiten. Mit dem Saft der Schlehen färbt man weisse Weine roth; auch färbt derselbe leinenes Zeuch sehr dauerhaft blafsbraun; mit den gedörrten Früchten läfst sich roth färben. Ehedem klärte man durch die Schlehen trübe Weine, wie dies Joh. Bauhin bemerkt. Die Blätter können, wenn man sie gelinde röstet anstatt des Thees benutzt werden; auch die Blüthen kann man als Thee gebrauchen. Sie sind officinell.

† 616. P. INSTITUTE.
Haferpflaumenbaum.

An den Spitze einiger Zweige findet sich einzeln ein Dorn. Die Blätter eyförmig, zusammengerollt, auf der Oberfläche dunkelgrün und glatt, auf der Unterfläche zottig. Die weissen Blumen, stehen auf paarweise beisammenstehenden Blumenstielen. Die Steinfrüchte rund, schwarzblau und noch einmal so groß als bei *P. spinosa*.

Wohnort.

In Zäunen und Obstgärten. Bei Sulzbach in Hekken; im Mühlloch bei Ha-

nau; angebaut in ausserordentlicher Menge zu Schwalbach bei Höchst; zu Kroneberg und Oberursel, aber nicht häufig.

Blüthezeit. April, Mai. †

Fruchtreife. September

Nutzen. Die Früchte haben einen herben bittern Geschmakk; doch ist man sie, wenn sie eine Zeitlang gelegen haben, auch werden sie in Essig und Gewürzen eingemacht. Sie geben einen guten Brantwein. Das Holz ist schön geschäkt und wird von den Drehern sehr geschätzt. Die Vermehrung geschieht durch Saamen und Wurzelbrut.

†617. P. DOMESTICA. Die Aeste ohnbewaffnet, im wilden Zustand mit einzelnen Dornen. *Zwetschen- oder Pflaumenbaum.* Die Blätter lanzettförmig, zusammengerollt, weichhaarig. Die weissen Blumen an den Seiten der Zweige einzeln oder auch zu zwei beisammen. Die Steinfrüchte (gewöhnlich schwarzblau) an Gestalt, Gröfse, Farbe und Geschmakk nach den verschiedenen Abarten verschieden.

Abarten.

A. Zwetschen.

1) Dattelpflaume, 2) Frühzwetsche, 3) Grüne Zwetsche, 4) Damaszener-Zwetsche, 5) blaue Eyerpflaume, 6) blaue Kaiserpflaume, 7) Gelbe Eyerpflaume, 8) rothe Cyprische Eyerpflaume, 9) gespreinkelte Pflaume.

B. Damaszenerpflaumen.

1) Violette Damaszenerpflaume von Tours, 2) Königspflaume, 3) Indianische Pflaume, 4) Damenpflaume, 5) Italienische Pflaume, 6) muskirte Damaszenerpflaume, 7) rothe Damaszenerpflaume, 8) geflammte Kaiserpflaume, 9) Hyazinthenpflaume, 10) Herrnpflaume.

C. Mirabellen.

1) Gelbe Mirabelle, 2) Goldpflaume, 3) schwarze Mirabelle, 3) rothe Mirabelle, 4) Katharinenpflaume, 5) Pflaume ohne Kern, 6) Iohannis-pflaume, 7) Mirabollane.

D. Herzförmige spanische Pflaume.

1) Taubenherz, 2) blaue Diapre, 3) rothe Diapre, 4) weisse Diapre, 6) gelbe Frühpflaume.

E. Italienische Pflaumen, Perdrigon und Renekloden.

1) Weisse Perdrigon, 2) blaue Perdrigon, 3) rothe Perdrigon, 4) schwarze Perdrigon, 5) Marunke, 6) Marokkopflaume, 7) grosse Reneklode, 8) kleine Reneklode, 9) schwarze Reneklode, 10) Ilvert, grosse grüne Pflaume, 11) rothe Aprikosenpflaume.

Wohnort. Wächst in den gemässigten Ländern von Europa; gleichsam wild bei uns hin und wieder in Zäunen und Gebüsch, und angebaut sammt obigen Abarten überall in unsern Gärten, auf Feldern etc.

Blüthezeit. April, Mai, ½

Fruchtreife. Nach der Verschiedenheit der Abarten vom Ende Juli – Oktober.

Bemerkung. Die edlern Sorten stammen aus dem wärmeren Asien; auch der lateinische Name *Prunus* giebt das schon zu erkennen, der ohne Zweifel von dem asiatischen Wort *Prounaon* her stammt. Besonders scheint ihre Abkunft aus *Algota* oder *Gura* zu seyn, dem berühmten Thal *Cölesyriens*; denn *Theophrastus* thut Meldung von vielen Pflaumenbäumen, die in der

fruchtbaren Ebene Syriens und Damasko wuchsen, und Europa erhielt vor Alters von daher getrocknete Pflaumen. Von Syrien kamen sie nach Griechenland, von da nach Italien und endlich erst zu uns Teutschen.

Nutzen.

Man ißt die Zwetschen roh und gedörst (zieht man ihnen vor dem Dörren die Haut ab und befreiet sie von den Steinen, so nennt man sie Prunellen) kocht sie frisch mit Gewürzen als Gemüse und auch als Suppe; benutzt sie zu Torten und anderm Bakkwerk, macht sie mit Essig, Zucker, Zimmt und Gewürznelken ein, bereitet ein vortreffliches Muß und brennt auch einen Brantwein aus ihnen, welcher in Sklavonien Racky genennt wird; mit Aepfeln vermischt geben sie durch die Gährung einen guten Wein; die Brühe von gedörsten Zwetschen zu verdorbenen Tabak gegossen, verbessert denselben; aus den Kernen kann man Oehl pressen und Brantwein über dieselben abgezogen giebt einen trefflichen Persiko. Das schöne braune Holz empfiehlt sich zu feinen Tischler- und Dreherarbeiten,

und es verspricht auch brauchbare Farben; aus der Rinde hat Rüger einen kaffeebraunen Lakk bereitet. Die Vermehrung geschieht durch Saamen und Wurzelausläufer; die Abarten aber werden durch Pfropfen und Okuliren fortgepflanzt.

618. P. CERASIFERA.

Kirschpflaumenbaum.

Die Aeste sehr glatt, haben zuweilen kurze Dornen. Die Blätter elliptisch, hellgrün, glatt, am Rande fein und tief sägeartig gezähnt, zusammengerollt. Die Blumenstiele einzeln, sehr dünne und sehr glatt. Der Kelch zurückgebogen. Die Blumen weiss, in grosser Menge. Die Steinfrüchte rundlich, wie eine Kirsche gestaltet, nur etwas zugespitzt, dunkelroth, süßlich, hängend.

Prunus domestica var. c. Du Roi.

Wohnort.

Nordamerika ist sein Vaterland. In unsern Gärten wird er hier und da gezogen.

Blüthezeit.

April, Mai, 7

Fruchtreife.

Ende Augusts.

2. Th.

M

Nuzzen.

Wegen seiner frühen und ausserordentlich vollen Blüthe, davon er ganz wie mit einem weissen Tuch, überdeckt zu seyn scheint, dient er gar trefflich zu Bekleidung von Lauben etc. Die übrige Benutzung ist der vorhergehenden Art gleich. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, Propfen und Okulieren.

CCXXXVII. PADUS. Ahlkirschbaum.

619. P. AVIUM
Mill.

Vogel - Ahl-
kirschbaum.

Die Blätter abfallend, eylanzettförmig, abwechselnd, doppelt sägeartig gezähnt, etwas runzlich, am Grunde auf der Oberfläche mit zwei grosse Drüsen. Die wohlriechenden weissen Blumen, in einfachen hängenden Trauben. Die Steinfrüchte anfangs grün, dann roth, endlich schwarz, von der Grösse einer Erbse.

Prunus Padus Linn.

Wohnort.

An Zäunen, in Gebüsch und Wäldern. Sehr häufig bei Hanau im Forst; in Zäunen beim ehemaligen Sieghaus vor Hanau und in der Hanauerfasanerie

häufig bei Frankfurt in der Landwehr vor der Ziegelhütte; hinter Oberursel an dem Kaltenbach etc.

Blüthezeit. Mai ☿—♄

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Dieser Baum empfiehlt sich seiner äusserst schönen wohlriechenden Blumentrauben wegen in Lustgärten sehr. Das Holz kann zu verschiedenen Dreherarbeiten, vorzüglich zu den Büchschäften, Pfeifenstielen, Tabaksröhren etc. verbraucht werden; in Frankreich wird es unter dem Namen Luzienholz verarbeitet und verkauft. Die Rinde der alten Stämme giebt mit Zusätzen eine dauerhafte braunrothe, und auch noch andere Farben. Die frischen Zweige mit den Blumen, sollen Mäuse, Maulwürfe und Wanzen vertreiben. Die Blätter werden von dem Vieh nicht gefressen. Die reifen Früchte fressen die Vögel ausserordentlich gerne; daher auch in England dieser Baum Vogelkirsche heisst. In Schweden, Kamtschatka und im Salzburgischen ist man sie mit Salz bestreut; die Lappländer tauchen sie vor dem Genuß in Wein oder Brantewein ein;

in Rußland wird mit dem ausgepressten Saft derselben der Wein oder Brantwein roth gefärbt; die gemeinen Russen essen die Früchte zum Nachtsch; vermittelst der Gährung geben sie einen Geist und zwar in so grosser Menge, daß man aus 96 Pfund reifer Früchte 9 Pfund erhält, auch in Schottland bereitet man einen angenehmen Wein aus ihnen. Die zerstoßenen Kerne theilen den spirituösen Getränken einen Mandelgeschmack mit; getrocknet und geschält lassen sich dieselben zur Mandelmilch gebrauchen. Die Vermehrung geschieht durch Saamen Ableger und Wurzelbrut.

620. P. SEROTINA Borckh.
*Spätblühende
 Pflaume.*

Die Zweige rundlich, mit vielen erhabenen Warzen besetzt. Die Blätter länglich eyförmig, einfach sägeartig gezähnt, die unteren Zähne bisweilen drüsig, auf der Oberfläche dunkel glänzendgrün, auf der untern blassgrün, die Mittelrippe nach der Basis zu mit dichtstehenden, gleichlangen Haaren besetzt. Die weissen Blumen an der Spitze der Zweige in einfachen Trauben. Die Früchte von

der Grosse einer Erbse anfangs grün, nachher roth, und endlich schwarz.

Wohnort. Dieser nordamerikanische Baum, findet sich gleichsam wild an dem Rutzebach (im Walde) bei Kranichstein, wo auch schon viele aus Saamen aufgegangene junge Bäume stehen.

Blüthezeit. Mai, Juni. ‡

Fruchtreife. September.

Nutzen. Die Früchte werden von den Vögeln gefressen, sollen aber auch einen guten Kirschgeist, und ein abgezogenes Wasser geben. In Nordamerika wird das Holz zu Tischen, Stühlen und andern Schreinerarbeiten verbraucht.

CCXXXVIII. CERASUS.

Kirschenbaum.

†. 621. C. DULCIS *Nobis.* Die Aeste gerade. Die Blätter ey-lanzettförmig, sägeartig gezähnt, zusammenliegend, unten weichhaarig. Der Blattstiel zweidrüsig. Die weissen Blumen in stiellosen Dolden. Die Frucht süß und schwarzpurpurroth; in den Gärten in Gestalt, Farbe

und Geschmakk nach der Verschiedenheit der Abarten verschieden.

Prunus Avium Linn und *P. Cerasus dulcis Linn.*

Abarten.

A. Knorbelkirschen, mit färbendem Saft und hartem Fleisch.

1) Späte Maikirsche, 2) späte braune spanische Herzkirsche, 3) schwarze Lothkirsche, 4) braune Herzkirsche, 5) Ungarische Herzkirsche, 6) braune Knorbelkirsche, 7) schwarze bitterliche Herzkirsche, 8) rothe Herzkirsche.

B. Blutkirschen, mit färbendem Saft und weichem Fleisch.

1) Süsse Maiherzkirsche, 2) grosse süsse Maikirsche, 3) schwarze spanische Frühherzkirsche, 4) Kronkirsche, 5) veredelte schwarze Waldkirsche, 6) Ochsenherzkirsche, 7) schwarze süsse Herzkirsche, 8) späte schwarze spanische Herzkirsche.

C. Marmorkirschen, mit
weissem Saft und har-
tem Fleisch.

1) Lauermannskirsche, 2) schöne von
Rocmont, 3) bunte Lodi-kirsche, 4) Spek-
kirsche, 5) Thränen Muskateller.

a. Mit einfärbiger Haut.

1) Gelbe Herzkirsche, 2) goldgelbe
Herzkirsche, 5) Agatkirsche.

b. Mit bunder Haut.

1) Dankelmanns weisse Herzkirsche,
2) Blutherzkirsche, 3) Flamentiner,
4) rothe Molkenkirsche, 5) lange weisse
Herzkirsche, 6) Perlkirsche, 7) Tür-
kine, 8) späte bunte Herzkirsche.

E. Mit gefüllter Blüthe.

Herzhirsche mit grossgefüllter
Blüthe.

Wohnort.

Der süsse wilde Kirschbaum in Wäl-
dern und auch bisweilen in Zäunen.
Ohnweit Hanau in der Bulau, dem Bruch-
köblerwald und auch in Zäunen bei dem
ehemaligen Sieghaus; bei Frankfurt in
der Landwehr und auf dem Lerchenberg;
hinter Hombürg unter den Tannen in

dem grossen Tannenwald etc. Die Abarten finden sich in unsern Gärten.

Blüthezeit. April, Mai †

Fruchtreife. Juni, Juli.

Beobacht. Die Blumen kommen an den Aesten des vorletzten Jahrs hervor. Der Griffel sind manchmal 3, manchmal aber auch 6.

Bemerkung. Die Zeit wann der Kirschbaum zuerst nach Europa gekommen ist, läßt sich nicht mit Gewißheit bestimmen. Nach dem Plinius hat Lucullus, nach dem er den Mithridat überwunden, zuerst ihn aus Cerasunte (daher auch sein lateinischer Name Cerasus) einer Stadt in Pontus in Kleinasien, im Jahre nach Erbauung der Stadt Rom 680, (74 Jahre vor Christi Geburt) mit nach Italien gebracht; von da aus sey er 120 Jahr nachher nach England gekommen. In Griechenland war er lange schon vorher bekannt. Die veredelten Sorten mögen wohl aus Pontus stammen, aber unsere sogenannte Waldkirsche halten wir vor ursprünglich heimisch.

Nutzen. Die Kirschen isst man roh, kocht sie auch frisch und gedörrt, macht sie mit

Zukker, gebraucht, sie zu mancherlei Bakkwerk, preßt mit Zukker und Gewürz vermischt einen Saft aus ihnen der unter dem Namen Kirschsafft den sogenannten Kirschwein giebt. Mehre abgezogene Wasser bereitet man aus den Kernen; auch der Kirschratafia hat vorzüglich von ihnen seinen Ursprung; es läßt sich ein Oehl aus ihnen pressen, und eben so wie die bittern Mandeln, kann man sie zum Kochen brauchen. Das Holz wird zu mancherlei Tischler und Dreherarbeiten gebraucht; nach Nocca verfertigt man in Italien Fässer daraus, für Essig, welcher sich darinnen sehr lange erhält. Die Rinde ist für Färbereien brauchbar, auch läßt sich ein brauner Lakk aus ihr bereiten. Der Blätter bedient man sich beim Einmachen der Gurken und auch zum Füttern der Schweine. Die Blumen geben den Bienen Wachs und Honig. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, und die Spielarten werden durch Propfen und Okuliren fortgepflanzt.

†. 622. C. ACI-
DA Nobis.

*Saurer Kirsch-
baum.*

Die Aeste meistens hängend. Die Blätter eylanzettförmig, sägeartig

gezähnt, zusammenliegend, glatt. Die Blättstiele ohne Drüsen. Die weissen Blumen in etwas gestielten Dolden. Die sauern Früchte nach der Verschiedenheit der Abarten in Farbe, Gestalt, Grösse und Geschmakk verschieden.

Prunus Cerasus austera et aproniana
Linn.

Abarten.

A. Weichsel mit färbendem Saft und schwarzer oder dunkelrother Haut.

a. Fast ganz süss.

1) Rothe Maikirsche, 2) Scharlackirsche, 3) Herzogkirsche, 4) Holländische grosse Kirsche, 5) Valserkirsche, 6) alte Königskirsche, 7) schwarze Muskatellerkirsche, 8) Prager Muskatellerkirsche.

b. Süss mit säuerlich gemischt.

1) Frühe Natt aus Saamen, 2) Wanfrieder rothe Frühkirsche, 3) Wanfrieder Weichsel, 4) rothe Muskatellerkirsche, 5) braune Muskatellerkirsche,

6) doppelte Weichsel, 7) Herzkirschweichsel, 8) Holländisch Folgerkirsche, 9) Portugiesische Griotte, 10) Leopoldskirsche, 11) Doktorkirsche, 12) Spanische Weichsel, 13) Jerusalemkirsche, 14) teutsche Griotte, 15) Henneberger Grafenkirsche, 16) Kirsche van der Natt, 17) Brüsseler Braune, 18) Ostheimer Kirsche, 19) Erfurter Augustkirsche.

c. Fast ganz sauer.

1) Nordamarelle, 2) Holländische späte Weichsel, 3) Morelle.

B. Glaskirschen, mit weissem Saft und heller durchsichtiger Haut.

a. Fast ganz süß.

1) Altendorferkirsche, 2) Gelbe oder rothe Orangenkirsche.

b. Sauer mit süß gemischt.

1) Kleine Montmorency, 2) grosse Glaskirsche, 3) grosse Montmorency.

c. Fast ganz sauer.

1) Späte Morelle.

C. Mit gefüllter Blüthe.

- 1) Glaskirsche mit dickgefüllter Blüthe,
- 2) Glaskirsche mit halbgefüllter Blüthe,
- 3) Bouquetkirsche.

Wohnort. Gleichsam wild in Gebüschten oberhalb Hochstadt vor der Hartig nach den Weinbergen und auf dem Lerchenberg bei Frankfurt. Ueberall angebaut in unsern Gärten.

Blüthezeit. April, Mai, $\frac{1}{2}$

Fruchtreife. Juni, Juli, August; nach der Verschiedenheit der Abarten.

Beobacht. Die obersten Knospen bringen Blätter, die an den Seiten Blumen und zwar kommen solche an den Aesten des vorletzten Jahrs zum Vorschein. Der Griffel sind manchmal 2, 3, und auch 4.

Bemerkung. }
Nutzen. } Wie bei der vorhergehenden Art.

†. 623. C. SEMPERFLORENS.
Borckh.
Immerblühender Kirschbaum.

Die Aeste lang, hängend. Die Blätter eylanzettförmig, sägeartig gezähnt, zusammenliegend, glatt. Die Blattstiele ohne Drüsen. Die Blumen weiss, an der Spitze der jungen Triebe, in einer Traube, zu 6 - 8. Die Früchte

klein, rund, von weissem Fleisch
und säuerlichem Geschmakk.

Prunus semperflorens Ehrh.

Wohnort. Das Vaterland ist unbekannt. In unsern Gärten findet man ihn, jedoch selten.

Blüthezeit. Mai bis in den späten Herbst. 7

Fruchtreife. Juli bis in den Herbst.

Beobacht. Dieser Kirschbaum treibt seine Blüthen aus denen erst im Frühjahr erwachsenen Sommertrieben, und seine Blüthenknospen werden nicht wie bei andern Kirschen nach Johannis für das künftige Jahr gebildet.

Nutzen. Wie bei *C. dulcis*.

II. ORDNUNG.

DI - PENTAGYNIA. Mit 2 - 5 Staubwegen.

CCXXXIX. MESPILUS. Mispelbaum.

624. M. OXYACANTHA Ehrh.

Gemeiner

Weissdorn;
oder Hagedorn.

Die Aestedornig, glatt. Die Blätter etwas rautenförmig, drei- oder beinahe fünfspaltig, sägeartig gezähnt, glatt. Die sehr wohlriechenden Blumen an den Spitzen der Zweige, in ausgebreiteten Doldentrauben, weiss, in Gärten auch roth und gefüllt, gewöhn-

lich mit zwei Griffeln, bisweilen auch mit einem, oder gar 3, 4. und 5. Die dunkelrothen Steinfrüchte eyförmig.

Crataegus Oxyacantha Linn.

Wohnort. Ueberall an Zäunen, Gebüsch und Wäldern.

Blüthezeit. Mai, Juni. ‡

Fruchtreife. September.

Nutzen. Zu dauerhaften undurchdringlichen

Hekken ist es der vorzüglichste Strauch.

Das Holz dient seiner Festigkeit wegen

zu Stielen in Hämmer, Beile, zu man-

cherlei Wagner- und Mühlenarbeit, zu

Dreschflegeln und zu Dreherarbeiten.

Die schlanken Triebe geben gebakkene

Spazierstöcke. Die Rinde kann zur

Färberei benutzt werden. Die Beeren

werden im Winter von Vögeln, Mäu-

sen etc. genossen, auch kann man sie

zur Schweinsmast gebrauchen, und in

der Schweiz wird ein dem Bier ähnli-

ches Getränk daraus bereitet. Die ge-

trockneten Blätter und Blumen können

statt des gewöhnlichen Thees benutzt

werden. Dressius soll, wie Manatti

berichtet, aus den getrockneten und ge-

mahlenen Beeren Brod bereitet haben. Der Zierde wegen pflanzt man in unsern Gärten die Abart mit rothen und mit gefüllten Blumen. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, und die Abarten werden durch Propfen und Okuliren auf gemeine Weissdornstämme fortgepflanzt.

†. 625. M. GERMANICA.
Teutscher Mispelbaum.

Die jüngern Aeste (in wildem Zustand des Baums) haben unter den Anwachswinkeln einzelne, starke, sehr glänzende, gerade Dorne. Die Blätter länglich lanzettförmig, sägeartig gezähnt, kurz gestielt, weich und unten weissfilzig. Die weissen Blumen einzeln, fast aufsitzend, mit fünf Staubwegen. Die Kelchabschnitte sehr lang und abstehend. Die Steinfrucht verkehrt eyrund, unreif grün, reif braun, abgestutzt, zottig.

A b a r t e n.

- a. Grosser Gartenmispelbaum, mit unbewaffneten Aesten und grossen Früchten.
- b. Mispelbaum ohne Kern.

c. Saurer Mispelbaum.

Wohnort. Im Wald bei der Frankf. Saustiege und in dem Niederrötherwäldchen; in Hekken und Weinbergen bei Bergen; in Hekken auf dem Riederberg und bei der Sachsenhäuser Warte; auf dem Sachsenhäuser Berg; im Homburger Schlossgarten; in der Hanauer Fasanerie; zu Braunheim in Gärten etc.

Blüthezeit. Maí. ‡

Fruchtreife. Oktober, November.

Nutzen. Die Früchte werden bei uns gegessen; in Frankreich macht man sie in Zukker ein, und dämpft sie auch mit Butter, Wein und Zukker; durch die Gährung läßt sich aus ihnen ein Brantewein bereiten; unter Aepfeln gekeltert geben sie einen vortrefsslichen Wein. Unreife Früchte, Rinde, Blätter und Zweige dienen zur Gerberei und das Holz zum Brennen. Die Vermehrung geschieht durch Okupfen und Propfen auf Weisdorn, Birnwildlinge, oder andern damit verwandten Baumarten. Die Fortpflanzung durch Saamen ist zu weitläufig.

CCXL. PYRUS. Birnbaum.

†. 626. P. COM-
MUNIS SYLVE-
STRIS.

Holzbirn-
baum.

Hat meistens Dornen, und ist mit einer grauen, im Alter rissigen Rinde überzogen. Die Blätter länglich eyförmig, glatt, (die jüngern feinhaarig) etwas gezähnt. Die Blumen weiss und bilden Doldentrauben. Die Frucht etwas kreiselförmig, kurzgestielt; die Winkeln der Fächerchen stumpf.

A b a r t e n.

A. Winterbirnen.

a. Mit schmelzendem butterhaftem Fleisch.

1) Königsbirne von Neapel, 2) Sarasin, 3) St. Germain, 4) verguldete St. Germain, 5) Paradiesbirne, 6) Winterkönigin, 7) rothe Winterbutterbirne, 8) Silvansbirne, 9) englische Winterbutterbirne, 10) Dauphine oder Lausac. 11) Marquis. 12) Manna-
birne, 13) Jagdbirne, 14) Amberbirne, 15) Muskatellerbirne von Mez, 16) deutsche Muskatellerbirne, 17) grüne Zuk-

kerbirne, 18) lange grüne Winterbirne, 19) gute Luisenbirne, 20) Winterdorn, 21) Winterfürstenbirne, 22) schwarze zuckersüsse Birne.

b. Mit halbschmelzendem Fleisch.

1) Winterbutterbirne, 2) Winterkönigsbirne, 3) Birne von Neapel, 4) Schäferbirne, 5) Besi de Caissoy, 6) Winterrobine, 7) Kaiserbirne mit Eichenlaub.

c. Mit zartem Fleisch.

1) St. Lazinbirne, 2) Augustinerbirne, 3) Pfingstbirne, 4) Verbrannte Kazze, 5) Winterzuckerbirne, 6) Amadotte, 7) Kronbirne, 8) englische von Bourdeaux.

d. Mit brüchigem Fleisch.

1) Winterchristbirne, 2) spanische Christbirne, 3) Winterpomeranze, 4) Rouville, 5) Martinsbirne, 6) Wintermuskatellerbirne, 7) Rosmarinbirne, 8) schöne Winterbirne, 9) Orleanische Christbirne.

B. Herbstbirnen.

a. Mit schmelzendem Fleisch.

1) Weisse Butterbirne, 2) verguldete weisse Butterbirne, 3) graue Butterbirne, 4) graue Doyenne, 5) rothe Butterbirne, 6) Savoureuse, 7) Forellenbirne, 8) lange grüne Herbstbirne, 9) Schweizerbirne, 10) De la Motte.

b. Mit halbschmelzendem Fleisch.

1) Englische Butterbirne, 2) Weinbergsbirne, 3) Franchipanne, 4) schönste Herbstbirne.

c. Mit zartem Fleisch.

1) Langgestielte Herbstmuskateller, 2) Schelmbirne, 3) Herbstzuckerbirne, 4) doppeltragender Birnbaum, 5) Aze-rolbirne.

d. Mit brüchigem Fleisch.

1) Junker Hansenbirn, 2) Haberbirne, 3) Rietbirne, 4) Schmuzzige, 5) Kümmelbirne, 6) persische Birne, 7) grosse Septemberbirne.

C. Sommerbirnen.

a. Mit butterhaftem Fleisch.

1) Lange grüne Sommerbirne, 2) schöne lange Sommerbirne, 3) fürstliche Tafelbirne, 4) Franz-Madam, 5) Rit-

terbirne, 6) Rettigbirne, 7) Saftbirne, 8) Jalousie, 9) Sommerdorn, 10) Voltmarse, 11) langstielige Zuckerbirne, 12) grüne Sommerzuckerbirne von Hoyerswerda, 13) türkische Königsbirne, 14) gute graue Sommerbirne.

b. Mit halbschmelzendem Fleisch.

1) Eyerbirne oder Bestebirne, 2) Ananasbirne, 3) geblünte Muskateller, 4) schönste Sommerbirne, 5) Spatbirne, 6) Solitaire, 7) Wespenbirne.

c. Mit zartem Fleisch.

1) Salviati, 2) du Bouchet, 3) Balsambirne, oder Muscat Royal, 4) Cassolette, 5) Magdalenenbirne, 6) doppelte Kaiserbirne, 7) Sirenenzitronebirne, 8) Karminbirne, 9) edle Münchsbirne, 10) kurzstielige Blanquet, 11) rothe Pfalzgrafenbirne.

d. Mit brüchigem Fleisch.

1) Gute Christbirne, 2) Muskirte frühzeitige Christbirne, 3) Rosenbirne, 4) Brester Schmalzbirne, 5) grosse Zwiebelbirne, 6) grüne Pomeranzen, 7) Muskatellerpomeranze, 8) rothe Pomeranzenbirne, 9) Margarethenbirne, 10) kleine Muskatellarbirne, 11) kleine

Gewürzmuskatellerbirne, 12) Goldbirne,
13) kleine Blanquet.

D. Russelletten.

1) Kleine Russelet, 2) grosse Russelet, 3) Russelet von Rheims, 4) Winterrusselet, 5) rothe Konfesselsbirne, 6) frühe Russelet, 7) Fürstenbirne, 8) Frauenschenkel, 9) Robertsmuskateller.

E. Bergamotten.

1) Herbstbergamotte, 2) verguldete Herbstbergamotte, 3) Herbstbergamotte des Quintinye, 4) englische Bergamotte, 5) unvergleichliche Bergamotte, 6) Osterbergamotte, 7) Berg Crasanne, 8) holländische Bergamotte, 9) Berg. Cadette, 10) Bergamotte von Nizza, 11) Besi de Montigny, 12) Bergamotte von Solothurn, 13) Schweizerbergamotte, 14) Sizilischebergamotte.

F. Blos wirthschaftliche Birnen.

1) Champegner Weinbirne, 2) Gräulingbirne, 3) Winterzimmetbirne. 4) Belle et Nonne, 5) Londnerbirne, 6) Erzherzogsbirne, 7) Lorenzbirne,

8) römische Butterbirne, 9) Catillac,
 10) rothe Kappesbirne, 11) Pfundbirne,
 12) kleine Pfundbirne, 13) Zapfenbirne,
 14) Weissbartsbirne, 15) kupferzeller
 Mostbirne, 16) weisse Kappesbirne.

Wohnort. In Wäldern, an Wegen und an Dörfern. Im Mittelpunkt in der Hanauer Fasanerie im Gebüsche; im Wald hinter dem Frankfurter Forsthaus; auf dem Glauberg; im Wald zwischen Ortenberg und dem Finkenloch; zwischen Selters und Ortenberg am Weg; bei den Riederhöfen bei Frankfurt; bei Eckenheim, Bornheim etc. Die Abarten werden in unsern Obstgärten und auf Aekern gebaut.

Blüthezeit. April, Mai. 7

Fruchtreife. Gegen den Herbst hin; die Abarten bald früher bald später.

Bemerkung. Der Holzbirnbaum ist der Stammvater aller Abarten, deren man jetzt schon über 1500 zählt. Alle gehn durch das Säen in die Hauptart über, und sind nur durch Klima, Boden und Kultur entstanden.

Nutzen. Die wilden Birnen haben einen herben, sauern zusammenziehenden Geschmakk, werden sie aber teig, so schmekken sie weinsäuerlich und ange-

nehm. Sie geben den bekannten guten Birnessig, in Vermischung mit besseren Sorten Birnmost, und können auch zum Branteweinbrennen benutzt werden; sie geben auch eine gute Mast, und sind für das Wild, Vieh und Schweine wahre Lekkerbissen. Aus den Kernen der wilden Birnen und Aepfeln, die beim Essigbrauen übrigblieben, wird in Thüringen ein vortreffliches Oel gemacht, (aus einer Mezze bekommt man drei Pfund). Schade daß diese Benutzung bei uns noch nicht eingeführt ist! Das Holz ist nuzzbarer als von allen übrigen Birnarten; gebeizt ist es dem Mahagonieholz ähnlich; Tischler und Dreher schätzen es sehr. Die Rlätter der Birnarten geben eine gelbe Farbe. Aus der Rinde machte Rüger einen braunrothen Lakk, und nach Dambourney geben das Holz und die Rinde von Zweigen der mit Wissmuth vorbereiteten Wolle eine Zimmtfarbe. Die zahmen Birnen werden theils roh verspeist, theils dienen sie zum Kochen, Bakken, Einmachen, einige geben guten Birnwein, andere ein treffliches Mus und

einen Zukkersüssen Saft. Die Fortpflanzung der Abarten geschiehet durch Okuliren, Kopuliren und Propfen, und die Erziehung neuer Sorten durch Säen der Saamenkerne von edlen Abarten.

†. 627. P. MALUS SYLVESTRIS.

*Holzapfel-
birnbaum,
oder wilder
Apfelbaum.*

Hat Dornen und eine schwärzliche, ziemlich glatte Rinde. Die Blätter eyrund, langzugespitzt, sägeartig gezähnt, unten rauhhaarig. Die weissen purpurröthlichen Blumen stehen in Dolden fast stiellos auf den Blumenstielen. Die Frucht rund, sehr kurzstielig; die Ekken der Fächerchen spizzig.

A b a r t e n .

A. Kalvillen.

a. Vollständige, mit weitem Kernhaus und Rippen oder Ekken.

a.) Gelbe.

1) Osterapfel, 2) weisser Winterkalvil, 3) Gräfensteiner, 4) Winter-Quit-
tenapfel, 5) Cyrusapfel, 6) Herrnapfel,
7) Kaiserapfel, 8) langer Kartheuser,
9) weisser Herbstkalvil, 10) rother
Herbstkalvil, 11) weisser Sommerkalvil,

- 12) weisser Kalvil, 13) Loskrieger,
14) rother Sommerkalvil, 15) Him-
beerenapfel.

β. Rothe und rothgestreifte.

- 1) Rother Winterkalvil, 2) Ananas-
apfel, 3) Sternapfel, 4) Farosapfel,
5) englischer Karolin.

**b. Unvollständige mit weitem Kern-
haus und ohne Rippen.**

- 1) Italienischer weisser Rosmarinapfel,
2) Melonenapfel, 3) rother Flaschen-
apfel, 4) Vaterapfel, 5) rother Winter-
kalvilsüssapfel, 6) weisser Winterkalvil-
süssapfel.

**B. Rosenäpfel (allermeist Som-
merobst.)**

- 1) Rother Taubenapfel, 2) weisser
Taubenapfel, 3) Jerusalemsapfel, 4) Vio-
lenapfel, 5) Rosenapfel, 6) gestreifter
Rosenapfel, 7) kleiner Rosenhäger, 8) ro-
ther Passpomm, 9) weisser Passpomm,
10) Frühapfel, 11) revalscher Birnapfel,
12) Moskoviterapfel,

C. Renetten.

- 1) Muskatrenette, 2) siegende Re-
nette, 3) Renette von Windsor, 4) Nord-

renette, 5) Nelguin, 6) unvergleichliche Renette, 7) pikotirte Renette, 8) Tulipanrenette, 9) grüner sans pareil, 10) Goldrenette, 11) teutsche Goldrenette, 12) holländische Goldrenette, 13) rother Kurzstiel, 14) courtpendu mit Roth gestreift, 15) unvergleichlicher Kurzstiel, 16) weisser Kurzstiel, 17) Kasselrenette, 18) grauer Kurzstiel, 19) feuerrothliche Renette, 20) rothe Renette, 21) einseitig rothe Renette, 22) gelbe späte Renette, 23) gestrikte Renette, 24) glänzende Renette, 25) übereinstimmende Renette, 26) gestochene Renette, 27) grüne Renette, 28) weisse Renette, 29) Renette von Clareval, 30) französische Renette, 31) holländische Renette, 32) grosse englische Renette, 33) kleine englische Renette, 34) Renette von Orleans, 35) Renette von Rochella, 36) graue Renette, 37) kleine graue Renette, 38) graue Goldrenette, 39) Birnapfel des du Hamel, 40) Champagner Renette, 41) sizilische Renette, 42) Renette von Aujou, 43) Italienische Renette, 44) Renette von Luneville, 45) Renette von Bretagne, 46) Renette

von Montbron, 47) Renette von Aizer-
na, 48) Renette von Sorgvliet, 49) teut-
sche Renette, 50) normännischer Apfel,
51) Zwiebelapfel, 52) ragout Renette,
53) rother Borsdörfer, 54) grosser Bors-
dörfer, 55) schwarzer Borsdörfer, 56) grü-
ner Borsdörfer.

D. Peppings.

1) Edler Borsdörfer, 2) neuyorker Re-
nette, 3) newingstons Pepping, 4) eng-
lischer Pepping, 5) englischer Goldpep-
ping, 6) Goldrenette des du Hamel,
7) geflekter Pepping, 8) teutscher Pep-
ping, 9) Gewürzpepping, 10) Wunder
von Portland, 11) Wyker Pepping,
12) kentischer Pepping, 13) weisser
Pepping, 14) grauer Pepping, 15) ro-
ther Pepping, 16) Kastanienapfel,
17) Anisapfel, 18) Winteranisrenette,
19) weisser Fenchelapfel, 20) rothge-
streifter Fenchelapfel, 21) rother Fen-
chelapfel, 22) rother Agatapfel, 23) weis-
ser Agatapfel.

E. Parmänen.

1) Winterparmäne, 2) Königspar-
mäne, 3) Drüparmäne, 4) Loans Som-

merparmäne, 5) Birnrenette, 6) Erdbeerapfel, 7) goldgestikter Apfel, 8) Charakterapfel, 9) Birnapfel.

F. Kanten - oder Rippenäpfel.

1) Fürstenapfel, 2) Winterpostof, 3) Apfel von hoher Güte, 4) Pariser Apfel, 5) gelber Gülderling, 6) rother Gülderling, 7) weisser Gülderling, 8) spanischer Gülderling, 9) rother Kronapfel, 10) braunrother Winterapfel, 11) Winterrambur, 12) kleiner Apiapfel, 13) grosser Api, 14) weisser Tafetapfel, 15) Atlasapfel, 16) Orangeapfel, 17) grosser Richard, 18) Pfundapfel.

G. Plattäpfel.

1) Papagayapfel, 2) violetter Apfel, 3) Silberling, 4) Tellerapfel.

H. Spizzäpfel und Längliche.

1) Winterblumensüsser, 2) Blumensaurer, 3) Prinzessenapfel, 4) edler Prinzessenapfel, 5) rother Kardinalapfel, 6) weisser Kardinal, 7) rother Paradiesapfel, 8) winter Fleiner, 9) Fei-

genapfel ohne Blüthe, 10) Bohnapfel,
11) Leichter Mätpfel, 12) Sieben-
schläfer.

I. Kugeläpfel.

1) Vaterapfel ohne Kern, 2) Frauen-
apfel, 3) Seidenhemdchen, 4) Zimmet-
apfel, 5) rother Zimmetapfel, 6) Hecht-
apfel, 7) kleiner violetter Apfel,
8) schwarzbrauner Mätpfel, 9) Spat-
blühender Mätpfel, 10) rother Stetti-
ner, 11) weisser Stettiner, 12) gelber
Stettiner, 13) grüner Stettiner, 14) Som-
merrambur, 15) weisser Paradiesapfel,
16) Streifling, 17) champagner Wein-
apfel, 18) Kirschapfel.

Wohnort. In Wäldern und an Dörfern um Gie-
sen; im Bruchköblerwald nahe bei dem
Kohlbrunnen; selten um Frankfurt. Die
Abarten werden in Gärten, Obstgärten,
auf Aekkern, an Wegen etc. gezogen.

Blüthezeit. April, Mai. 7

Fruchtreife. Im Herbst; die Abarten bald früher
bald später.

Bemerkung. Der Holzapfelbaum ist der Stammva-
ter aller Abarten; denn alle gehen durch
das Säen wieder in die Hauptart über,
und folglich sind sie nur durch Klima,

Boden und Kultur entstanden. Die Kunst, durch die Kultur die Aepfel essbarer zu machen, war schon den Griechen zu Homers Zeiten bekannt.

Nutzen.

Die wilden und zahmen Aepfel sind völlig so zu benutzen, wie die wilden und zahmen Birnen; aus den wilden bereiten die Engländer ihren berühmten Cyder und aus den zahmen wir den unserigen. In unserer Gegend, vorzüglich um Frankfurt, Offenbach, Hanau etc. wird seit einigen Jahren eine ungeheure Menge Apfelwein gemacht, z. B. in Vilbel allein diesen Herbst (1799) 6000 Ohm. Die Benutzung der Schlehen zu dem Apfelwein, siehe bei den Schlehen nach. Der wilde Apfelbaum giebt gute lebendige Hekken. Sein Holz ist zwar etwas weich wird aber doch von Tischlern, Drehern, Wagnern und Müllern gebraucht; zur Feuerung ist es dienlich. Das Holz der zahmen Bäume wird wegen seines weichen saftigen Gewebes nur beim Ableben der Bäume zum Verbrennen benutzt. Die Rinde kann man zum Gelbfärben benutzen. Trocknes, zerhacktes Holz gab der mit

Wissmuth gebeizten Wolle eine reine, dauerhafte kastanienbraune Farbe. Die Vermehrung und Fortpflanzung ist wie bei den Birnen.

†. 628. P. Cy-
DONIA.
Quittenbaum.

Ohnbewaffnet. Die Blätter glattrandig, sitzen auf filzigen Stielen, sind oben glatt und unten weissfilzig. Die weissen Blumen stehen einzeln. Die Frucht filzig und gelb, von durchdringendem angenehmem Geruch.

A b a r t e n.

1) Apfelquitte, mit eyförmigen Blättern und mehr runden Fruchthölen.

2) Birnquitte, mit länglich-eyförmigen Blättern und kreiselförmigen Früchten.

3) Portugisische Quitte, mit verkehrt eyförmigen, fast herzförmigen Blättern, welche auf der untern Fläche eine rothe Mittelader haben, und kreiselförmig kugeligen Früchten.

Wohnort.

Ursprünglich stammt er aus Cydon, einer Stadt auf der Insel Creta, von woher er zuerst nach Italien und von da in das übrige Europa gebracht worden ist; wild wächst er jetzt noch in Un-

garn an den steinigen Ufern der Donau, und gleichsam wild bei uns in Gebüsch vor der Hartig; an Zäunen vor Hanau nach dem Fischerhof hin, auf dem Lerchenberg, dem Riederberg, in dem Affenstein; bei Niederroth etc. und gezogen sammt den Abarten wird er in unsern Gärten.

Blüthezeit. Mai, Juni. ‡

Fruchtreife. Oktober.

Nutzen. Das feste harte Holz kann von Drehern und Tischlern verarbeitet werden. Die Rinde färbt braun. Die Früchte, worunter die portugiesischen die besten sind, ißt man bei uns nicht roh, sondern kocht sie, bakkt sie, braucht sie zu Torten, Konfekt, Mus, zu Quittenbrod, Quittenwein, Quittenliqueur, Quittensyrup u. s. f. Die Schale im gebakkenen Obst mitgekocht, giebt demselben einen angenehmen Geschmakk. In Madeira und am Kap der guten Hoffnung verfertigt man von den Quitten schöne Marmeladen. Ihre Vermehrung und Fortpflanzung geschieht entweder durch den Saamen, oder durch die Wurzelausläufer, oder durch das Pfropfen,

Kopuliren, Okuliren, und auch durch abgeschnittene Zweige.

629. P. AME-
LANCHIER Ehrh.
Amelanchier-
baum.

Ohnbewaffnet. Alle Theile im jüngern Zustand filzig-zottig. Die Blätter oval, stumpf, sägeartig gezähnt, obenglatt, unten, besonders die jüngern, filzig. Die Blattansätze pfriemenförmig, an den Seiten stehend und abfallend. Die weissen Blumen mit 5 Staubwegen, bilden einfache, wenigblüthige Doldentrauben und haben fast gleichbreite Blumenblätter. Die Früchte kugelförmig, erst grün, in der Reife blau oder schwärzlich, ganz glatt und fünffächerig.

Mespilus Amelanchier Linn.

Wohnort. Auf den Felsen des zerstörten Falkensteiners Schlosses und auch im Gebüsch unten am Fus des Berges; häufig auf dem Kreuzberg bei Schierstein.

Blüthezeit. Mai. ☿

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Die Früchte schmecken süß und können gegessen werden. Dieser Strauch

giebt gute Hekken und empfiehlt sich auch in Lustgebüsche.

650. P. ARIA
Ehrh.
Mehlbeer-
baum.

Ohnbewaffnet. Die Blätter oval, doppelt sägeartig gezähnt, oben glatt, unten weissfilzig. Die weissen Blumen mit 2 — 3 Staubwegen, bilden flache vielblüthige Doldentrauben. Die Früchte fast rund, roth, mehlig, zwei- bis dreifächerig.

Crataegus Aria var. *a* Linn.

Wohnort. In hochliegenden Wäldern z. B. häufig hinter Oberursel an dem Kaltenbach, an der Goldgrube, um Falkenstein, dem Altkühn, auf dem Feldberg, am zerstörten Herzsteinerschloss; im Thiergarten bei Idstein etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. †

Fruchtreife. Oktober.

Nutzen. Die Früchte werden in Schweden gegessen; auch kann man sie einmachen und auch zum Brantewein benutzen. Dieser Baum schikt sich gut zu Alleen. Das Holz ist eins der härtesten, wirft sich nicht, und kann daher zu den besten Maschinen verarbeitet werden; vor-

zöglich glatt läßt sich der Kern verarbeiten; als Unterholz dient es auch zu Kohlen. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, Ableger, Pfropfen und Okuliren.

631. P. TORMI-
NALIS Ehrh.
Elzbeerbaum.

Ohnbewaffnet. Die Blätter fast herzförmig, siebenlappig, sägeartig gezähnt, oben glatt, unten feinhaarig; die untersten Lappen von einanderstehend. Die weissen Blumen mit 2, sehr selten mit 3 Staubwegen bilden ästige und weitläufige Doldentrauben. Die Früchte eyförmig, braunroth mit weissen Punkten bezeichnet, säuerlich schmeckend, 2, sehr selten 3 fächerig.

Crataegus torminalis Linn.

Wohnort. In Wäldern, z. B. auf der Hartig; im Vilbelerwald; im Scheerwald bei Frankfurt; im Wald zwischen Grünigen und Lich; im Lindenerwald; im Hangestein etc.

Blüthezeit. Mai, Juni, †

Fruchtreife. Oktober.

Nutzen.

Das Holz ist sehr hart, wirft sich nicht und wird von Tischlern und Drehern sehr geschätzt; von den jungen Zweigen werden Flöten und Zwergpfeifen verfertigt; auch zum Brennen ist das Holz sehr gut und verdiente deshalb mehreren Anbau. Die reifen Früchte isst man roh, macht sie aber auch in Zucker ein; sie geben eine vortreffliche Mast, und werden auch zu Brantwein und Essig benutzt; in einigen Gegenden kocht man aus denselben ein Mus, das wenn es zuvor mit Wein, Zucker und Zitronensaft versetzt wird, zu Braten gegessen wird; die Vögel fressen die Früchte sehr gerne. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, Pfropfen und Okuliren.

632. P. AUCU-
PARIA Ehrh.
Ebereschen-
baum, oder
Vogelbeer-
baum.

Ohnbewaffnet. Die Rinde grau. Die Aeste glatt. Die Blätter gefiedert, zu beiden Seiten glatt, geben gerieben einen widrigen Geruch von sich. Die weissen wohlriechenden Blumen, meistens mit 3 Staubwegen, bilden eine erhabene, ästige, grosse Doldentraube. Die Früchte kugelförmig, kaum

von der Grösse der Blumen, glatt, roth, meistens dreifächerig.

Sorbus aucuparia Linn.

Wohnort. In Wäldern, an Dörfern und an Wegen. Im Schiffenberger und Lindenerwald; im Forst und beim Wolfsgang bei Hanau; im Wald zwischen Nieder- und Oberrodenbach; im Niederröther Wäldchen bei Frankfurt; in Steden bei Homburg; in der Hanauer Fasanerie; vor Offenbach in der Allee etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. †

Fruchtreife. Oktober.

Nutzen. Wegen seinem schnellen Wuchs, dicht-belaubten Krone, wohlriechenden Blüthen und rothen Früchten, ist er für Anpflanzungen und Alleen eine wahre Zierde, und nicht genug zu empfehlen. Das Holz läßt sich gut poliren und wird von Büchschäftern, Böttchern, Drehern, Wagnern und Tischlern benutzt; als Schlagholz ist es auch zu gebrauchen. Die Rinde ist zur Gerberei brauchbar. Die Früchte sind eine Lieblingskost für Schneuss- und andere Vögel, und werden bei uns zum Vogelfang be-

nutzt und deshalb z. B. in Steden ordentlich anepflanzt; auch für das Wild, die Mäuse etc. sind sie eine gute Winternahrung; sie dienen auch zu einem guten Futter für Rind - Schaaf- und Feder- vieh, und auch zum Branteweinbrennen. Die Kamtschatkalen essen die Früchte roh; der ausgepresste Saft derselben ist fast wie Zitronensäure zu benutzen; aus den getrockneten und gepulverten Früchten wird in einigen Ländern Brod gebakken. Die Vermehrung geschieht sehr leicht durch den Saamen.

†. 653. P. SOR-
BUS *Nobis*
Speierling-
baum.

Ohnbewaffnet. Die Rinde bräunlich. Die jüngern Aeste zottig. Die Blätter gefiedert, oben glatt, unten filzig, gerieben ohne Geruch. Die weissen, wohlriechenden Blumen mit 5, sehr selten mit 6, niemals mit 3 Staubwegen, bilden aufrechtstehende und zusammengesetzte Doldentrauben. Die Früchte etwas kreiselförmig, viel grösser als die Blumen, grünlich gelb oder röthlich, fünffächerig.

Sorbus domestica Linn.

Abarten.

1) Birnspeierling, mit Früchten von der Gestalt und Grösse der Kirschen, grünlichgelb und an der Sonnen- seite roth, unten am Stiel spizz, oben rund.

2) Aepfelspeierling, mit viel grössern und dikkern Früchten.

Wohnort.

Wild in den südlichen Gegenden von Europa, doch auch in den teutschen Waldungen, besonders in den westlichen und östlichen Gegenden. Bei uns wird er angebaut, z. B. zu Hochstadt, Bischofsheim, Steinheim, Mittelbuchen, Eschborn, Frankfurt etc.

Blüthezeit.

Mai. 7

Fruchtreife.

September, Oktober.

Nutzen.

Die zeitigen Früchte schmekken frisch herbe, können aber wenn sie erst einige Tage gelegen haben, eben so wie die Mispeln gegessen werden; man kann sie auch mit Zukker einmachen und durch die Gährung wird ein guter Cyder und Brantwein aus ihnen bereitet, aber zu ersterm müssen Aepfel mit untergekel- tert werden, z. B. 1 Malter Speierling und 2 Malter Aepfel geben eine Ohm

sehr vorzüglichen Cyder. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, Pfropfen, und Okuliren auf andere Kernobstarten.

CCXLI. SPIRAEA. Spierstaude.

654. S. SALICIFOLIA.

Weidenblättrige Spierstaude.

Die Blätter eylanzettförmig, der Längennach sägeartig gezähnt, stumpf, glatt, auf der untern Seite bräunlichgrün. Die fleischfarbenen gestielten Blumen bilden am Ende des Stengels eine zweifach zusammengesetzte Traube.

Wohnort. Hinter Niederreifenberg an der Schmiede längst dem Bach abwärts sehr häufig, wo dieser Strauch schon seit 50 Jahren von den Landleuten in diesem wilden Thale beobachtet worden ist.

Blüthezeit. Juni bis September. ‡

Fruchtreife. Oktober, November.

Nutzen. Die jungen zähen Zweige braucht man zu Reitgerten und zu Spizzen an die Angelruthen. Sie empfiehlt sich ihrer schönen Blüthen wegen in Lustwaldungen, zu kleinen Hekken und Bekleidungen, und findet sich häufig in unsern Gärten. Ihre Vermehrung geschieht durch

Ableger, Stekklinge, Wurzelbrut und durch Saamen.

635. S. OPULI-
FOLIA.

*Schneeball-
blättrige
Spierstaude.*

Die Zweige hellbraun, an den ältern schält sich jährlich die äussere Rinde, die jungen Triebe sind ekkig. Die Blätter rundlich eyförmig, kurz dreilappig, ungleich sägeartig gezähnt, auf beiden Seiten glatt und grün. Die weissen, mit röthlichen Staubbeuteln, und nur drei Staubwegen versehenen Blumen an den Spizzen der Zweige, auf gestielten, vielblumigen Doldentrauben.

Wohnort.

Dieser nordamerikanische Strauch, findet sich gleichsam wild an dem Rutzebach (im Walde) bei Kranichstein, wo er sich seit vielen Jahren schon durch sich selbst fortgepflanzt hat.

Blüthezeit.

Juni, Juli. ‡

Fruchtreife.

Oktober.

Nutzen.

Findet sich überall in unsern sogenannten englischen Gartenanlagen. Die Saamen sind eine Lekkerspeise der Blutfinken und man kann im Winter sie leicht an diesem Strauch mit Leimru-

then und Sprenkeln fangen. Die Zweige sind vielleicht für Färbereien nicht ganz unbrauchbar. Ihre Vermehrung geschieht durch Saamen und Wurzelbrut.

636. S. FILIPENDULA.

*Knollige
Spierstaude.*

Die Blätter unterbrochen gefiedert; die Fiederblättchen gleichbreit-lanzettförmig, unterbrochen sägeartig gezähnt, zu beiden Seiten nakkt. Die weissen sechsblättrigen Blumen bilden eine Afterdolde.

Wohnort,

Auf Wiesen bei Hochstadt, an der Hartig, zwischen Bockenheim und Rödelheim, vor Rödelheim, bei dem Ginheimerstege, der Harumer Brücke, um Offenbach, Darmstadt, Treys-Münzenberg etc.

Blüthezeit.

Juni, Juli, zuweilen nochmal im August und September. 24

Fruchtreife.

September.

Nutzen.

Die knollige Wurzel kann man zu Brod anwenden; es läßt sich ein starker Geist aus ihr, eben so wie auch Stärkmehl bereiten; die Schweine suchen sie auf und fressen sie gerne. Die ganze Pflanze läßt sich zum Gerben gebrauchen. Ihre Blumen geben den Bienen

weisses Wachs. Gefüllt und einfach prangt sie in unsern Gärten. Die Wurzel war sonst offizinell.

637. S. ULMA-
RIA.
*Ulm - Spier-
staude.*

Die Blätter unterbrochen gefiedert, die Fiederblättchen eyförmig, doppelt sägeartig gezähnt, unten grau filzig, das ungepaarte grösser und dreilappig. Die weissen, fünfblättrigen, sehr wohlriechenden Blumen bilden eine dichte Afterdolde.

Wohnort. Gemein auf feuchten Wiesen und in Gebüsch.

Blüthezeit. Juni, Juli. 2

Fruchtreife. September.

Nutzen. Die Bauern in Schweden streuen die Blumen ihres Wohlgeruchs wegen bei Festtagen und Gastmahlen in die Stuben umher. Ihr Geruch soll die Kornwürmer auf den Fruchtböden vertreiben. Den Ziegen ist diese Pflanze ein angenehmes Futter. Die Russen und Kamtschatkalen essen im Frühjahr die jungen Blätter und Stengel, und bereiten aus der Wurzel eine Art Grütze. Die getrockneten Blätter geben einen wohl-

schmeckenden Thee. Die Weinhändler bedienen sich der Blumen um die Weine, sonderlich dem Malvasier einen lieblichen Geruch und Geschmakk mitzutheilen. Die Isländer gebrauchen die Blätter zum Schwarzfärben und zum Gerben. Dambourney erhielt aus dieser Spierstaude theils eine zitrontheils eine dunkelgelbe Farbe. Die Bienen besuchen häufig die Blumen. Einfach und gefüllt ist sie eine Zierblume unserer Gärten. Blätter und Blumen sind offizinell.

III. ORDNUNG.

POLYGYNIA. Mit vielen Staubwegen.

CCXLII. ROSA. Rose.

*) Mit fast kugelrunden Früchten.

638. R. LUTEA
Mill.

Gelbe Rose.

Der Stengel mit geraden Stacheln besetzt. Die Blätter gefiedert, die Fiederblättchen verkehrt eiförmig, doppelt sägeartig gezähnt, mit Drüsen besetzt, klebrig, glänzendgrün. Die Blattstiele mit sehr feinen Härchen und Drüsen besetzt und haben nur

selten 1 — 2 feine Stacheln. Die sägeartigen Zähne der Blattansätze mit Drüsen besetzt. Die Blumenstiele glatt. Die Kelchblättchen halbgefiert und zottig drüsig. Die wanzenartig riechenden Blumen gelb. Die Frucht rund, glatt und roth.

Rosa Eglantheria Linn. *R. chlorophylla* Ehrh.

b. Zweifarbige Rose. Mit Blumen welche ausserhalb gelb, und innerhalb schön sammetartig dunkelroth sind.

Rosa bicolor Jacq. *R. punicea* Mill.

Wohnort.

In Zäunen um Butzbach nach Nieder-Weisel, jedoch selten; b. In Zäunen bei Schierstein.

Blüthezeit.

Juni, Juli. ‡

Fruchtreife.

September.

Nutzen.

Die Bienen besuchen die Blumen und die Blätter können zum Gerben gebraucht werden. Einfach und gefüllt ist sie eine Zierde unserer Gärten.

659. **R. CINNAMOMEA.**

Zimmt-Rose.

Der Stengel mit zurückgekrümmten, zerstreuten Stacheln besetzt. Die Blätter gefiedert; die Fiederblättchen eylanzettförmig, sägeartig gezähnt, stumpf, weichhaarig, ohne Drüsen, auf der untern Seite aschfarbig. Die Blattstiele mit feinen Härchen und einzelnen zerstreutstehenden, kurzen, geraden Stacheln besetzt. Die feinsägeartig-gezähnten Blattansätze mit Drüsen besetzt. Die Blumenstiele glatt. Die Kelchblättchen pfriemenförmig, an der Spitze oft blattähnlich, weichhaarig, aufrecht. Die kleinen purpurfarbigen Blumen haben einen feinen zimmetartigen Geruch. Die Frucht roth, glatt und rund.

Wohnort.

In Zäunen vor Gross-Steinheim nach dem Feldbrunnen hin; hinter Klein-Steinheim; um Offenbach; in Zäunen an der Allee von Babenhausen nach Harreshausen; aber überall stets mit gefüllten Blumen.

Blüthezeit.

Mai, Juni. ‡

Fruchtreife.

September, Oktober.

Nutzen. Sie wird zu Hekken und Zäunen sehr geschätzt, weil sie sich gut beschneiden läßt, und schon im Mai blüht.

640. R. PIMPINELLIFOLIA.
*Pimpinellen-
rose.*

Der Stengel mit geraden, zerstreutstehenden Stacheln besetzt. Die Blätter gefiedert; die Fiederblättchen oval, stumpf, gleichförmig-sägeartig gezähnt, sehr glatt. Die Blattstiele glatt, mit sehr feinen Stacheln besetzt. Die Blattansätze an der Spitze drüsig und sägeartig gezähnt. Die Blumenstiele und die Kelchröhre glatt. Die Kelchblättchen ganz, am Rande so wie innerhalb weisshaarig. Die Blumenblätter ausgerandet. Die kleinen Blumen blassroth. Die Frucht schwarzroth, glatt und rund, wird bei völliger Reife ganz schwarz.

Wohnort. Auf einem grossen Felsen, im dichten Gebüsch einige Schritte von dem zerfallenen Falkensteiner Schloss.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☞

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen.

Sie wird als Zierblume in unsern Gärten gezogen. Ihre Blumen geben den Bienen Honig.

641. R. SPINO-
SISSIMA.

*Stachelichste
Rose.*

Der Stengel mit sehr vielen grossen und kleinen, dicht zusammenge-
drängten Stacheln besetzt. Die Blät-
ter gefiedert; die Fiederblättchen
länglich, doppelt sägeartig gezähnt
und unten nezzförmig. Die Blatt-
stiele stachlig. Die Blumenstiele so
wie die Kelchröhre glatt. Die Kelch-
blättchen ganz. Die Blumen weiss.
Die Frucht dunkelpurpurroth, rund,
bei völliger Reife schwarz.

Wohnort.

Im Hägewald hinter Rentel nach Kar-
ben; im Hangestein und Wiseker Walde.

Blüthezeit.

Juni, Juli ☞

Fruchtreife.

September, Oktober.

Beobacht.

Der Wuchs der vorigen Art bleibt im-
mer niedrig und wird nur 2 3 Fuss
hoch, dahingegen diese eine Höhe von
5 — 6 Fuss erreicht.

Nutzen.

Als Zierblume findet sie sich in un-
sern Gärten. Billig sollte man sie zu
Zäunen benutzen. Ihre Blumen geben
den Bienen viel Honig.

642. R. VILLO-
SA.

Zottige-Rose.

Der Stengel mit zerstreutstehenden, starken, meistens gekrümmten Stacheln besetzt. Die Blätter gefiedert; die Fiederblättchen eyförmig, doppelt sägeartig gezähnt, zu beiden Seiten zottig. Die Blattstiele nebst den Rippen filzig und mit kleinen zerstreuten Stacheln besetzt. Die Blumenstiele und die Kelchröhre mit Borsten welche an der Spitze eine Drüse haben. Die Kelchblättchen halbgefiedert. Die Blumenblätter ausgerandet. Die Blumen blassroth. Die Frucht (sogenannte grosse Hagebutte) gross, reif schwärzlichroth, elliptisch, rund, rauhborstig.

Wohnort.

In Wäldern und Gebüsch um Offenbach, Frankfurt, ums Wilhelmsbad, Giesen etc.

Blüthezeit.

Juni, Juli. ‡

Fruchtreife.

September, Oktober.

Nutzen.

Die Früchte werden wegen ihrer vorzüglichen Grösse und ihres Wohlgeschmakks für die Küche getrocknet, und auch mit Zucker eingemacht.

643. R. FUSCA
Moench.
Braune Rose.

Der Stengel braun, mit zurückgekrümmten, zerstreutstehenden Stacheln besetzt. Die Blätter meistens nicht abfallend und wohlriechend; die Fiederblättchen eyförmig, oben glatt unten zottig, doppelt sägeartig gezähnt, die Sägezähne haben grüne Drüsen. Die Blattstiele glatt, stachelig und klebrig drüsig. Die Blumenstiele stehen fast doldenformig und sind steifborstig. Die Kelchröhre fast steifhaarig. Die Kelchblättchen halbgefiedert, inwendig zottig, auswendig rauh und klebrig drüsig. Die Blumen auf den Enden aller Zweige zahlreich, in fast doldenförmigen Trauben, weiss oder röthlich, von Bisamgeruche. Die Frucht fast kugelförmig, schwärzlich, steifborstig.

Rosa sempervirens Linn. *R. umbellata* Leers.

Wohnort.

Am Weg zwischen Bonames und Calbach; bei Langen, Sprendlingen und Kelsterbach.

Blüthezeit. Juni bis August. ‡

Fruchtreife. Oktober.

Nutzen. Diese Rose empfiehlt sich sehr als Zierblume in englische Lustgärten.

**) Mit eyrunden Früchten.

644. R. RUBIGINOSA.

*Rostfarbige
Rose; Wein-
rose.*

Der Stengel mit etwas zurückgekrümmten, zerstreuten Stacheln besetzt. Die Blätter gefiedert, von angenehmem Wein- oder Obstgeruch; die Fiederblättchen eyförmig, doppelt sägeartig gezähnt, unten zottig rothfarben, klebrig, an den Sägeeinschnitten mit Drüsen versehen. Die Blatt- und Blumenstiele mit drüsigen klebrigen steifen Haaren bestreut. Die Kelchröhre etwas steifhaarig. Die Hälfte der Kelchblättchen gefiedert, alle inwendig filzig, auswendig wegen klebriger und mit Köpfen versehener Haare rauhzottig. Die kleinen blassrothen Blumen haben einen angenehmen Wein- oder Obstgeruch. Die Frucht eyförmig, am Grun-

de etwas steifhaarig, in der Reife schwärzlich.

Wohnort. Häufig an Wegen, in Zäunen, Gebüsch und Wäldern um Hanau, Offenbach, Frankfurt, Rüsselsheim, zwischen Ockstadt und Nauheim, vor Usingen, auf dem Hausberg etc.

Blüthezeit. Mai bis August. ‡

Fruchtreife. Oktober.

Nutzen. Einfach und gefüllt wird sie zur Zierde in unsern Gärten gezogen.

†. 645. R. CENTIFOLIA.
Centifolien-rose.

Der Stengel steifhaarig und stachelig. Die Blätter gefiedert, die Fiederblättchen sägeartig gezähnt, auf der Oberfläche glatt, auf der untern mattgrün, mit einzelnen, zerstreuten, kurzen Haaren bedekt. Die Blattstiele unbewaffnet und mit sizzenden Drüsen versehen. Die Blumenstiele und die Kelchröhre steifhaarig. Die Kelchblättchen gefiedert, an der Spitze mit Drüsen, am Rande weisshaarig, innerhalb dicht weisshaarig. Die rosenrothen, sehr wohlriechenden Blu-

men stets gefüllt, daher die Frucht nicht zu bestimmen.

Wohnort. Ihr eigentliches Vaterland ist unbekannt; nach Theophrast soll sie bei Philippos wild wachsen. Fast in allen unsern Gärten und auch an den Häusern wird sie angepflanzt.

Blüthezeit. Juni. ‡

Nutzen. Die Blumenblätter werden zu Rauchwerken, Potpouri und vorzüglich zu dem Rosenwasser benutzt. Man pulvert auch die getrockneten Blätter und kocht sie mit in die Milchsuppen. Diese Rose ist eine Lieblingsblume der Städter und Landleute und wird überall ihrer schönen wohlriechenden Blumen wegen angepflanzt.

†. 646. R. GAL-
LICA.

Essig-Rose.

Der Stengel steifhaarig und stachelig; die Aeste grün. Die Blätter gefiedert; die Fiederblättchen eyförmig, unten zottig. Die Blattstiele fein behaart, mit Drüsen und kleinen Stacheln bedeckt. Die Blumenstiele und die Kelchröhre mit feinen, spizzigen

Stacheln und Drüsen dicht besetzt. Die Kelchblättchen halb gefiedert, mit vielen Drüsen, inwendig weisshaarig. Die Blumen hell- und dunkelroth, auch bunt, bald einfach bald gefüllt; die gefüllten immer flach. Die Frucht eyförmig mit feinen Stacheln und gestielten Drüsen.

Wohnort. Das südliche Europa ist ihr Vaterland; gezogen wird sie in unsern Gärten und gleichsam wild findet sie sich auf dem Sachsenhäuser Berg beim Hainerweg.

Blüthezeit. Mai, Juni. ‡

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Mehr der Zierde als Wirksamkeit wegen setzt man ihre Blätter zu Räucherpulvern; auch benutzt man sie zu Rosenwasser. In Gärten und häufig auf Kirchhöfen wird sie zur Zierde gepflanzt.

647. R. CANINA.

Hundsrose.

Der Stengel mit zurückgekrümmten, zerstreutstehenden Stacheln besetzt. Die Blätter gefiedert; die Fiederblättchen eyförmig, scharf sägeartig gezähnt, glatt. Die Blattstiele

stachelig. Die Blumenstiele und die Kelchröhre glatt. Die Kelchblättchen halbgefiedert, etwas zottig. Die fleischfarbigen Blumen einzeln oder in armblüthigen Doldentrauben. Die Frucht eyförmig, glatt und roth.

- Wohnort. Häufig in Zäunen und Gebüsch.
- Blüthezeit. Juni, Juli. ‡
- Fruchtreife. September, Oktober.
- Nutzen. Die Früchte sind unter dem Namen Hagebutten oder Hahnebutten allgemein bekannt, werden nachdem sie von den Saamen gereinigt sind, getrocknet oder eingemacht, und dann auf mancherlei Art als Speise benutzt. Aus den gestossenen Saamen läßt sich mit Wasser ein guter Brei kochen; auch haben einige vorgeschlagen aus den gemahlenen Saamen Brod zu bakken. Die Kamtschatkalen kochen die kleingeschnittene Wurzel und Stengel mit Wasser und trinken sie statt des grünen Thees. Die frischen Früchte bringen mit Milch gekocht solche zum Gerinnen und geben angenehme schmeckende Molken; durch die Gährung läßt sich aus ihnen ein Bran-

tewein bereiten. Nach Mitsching sind die getrockneten Früchte ein treffliches Surrogat des Kaffees. Man brennt sie nach dessen Erfahrung, gleich diesem, und trinkt sie entweder allein, oder mit der Hälfte Kaffee vermischt, oder nimmt auch nur $\frac{1}{3}$ Hahnebitten und 2 Theile Kaffee. Die Blätter sind zum Gerben tauglich, so wie die Blumen zum Rosenwasser. Die Rinde färbt wol- lenes Zeug dunkelbraun und Wurzel und Holz geben eine unreine fahlgelbe Farbe. Die Schlafäpfel oder Rosenschwämme haben ihren Ursprung einem Insekt *Tenthredo Rosae* genannt zu ver- danken; der Aberglauben schreibt ihnen mancherlei Wirkungen zu. Alle Rosen lassen sich durch Wurzelbrut und durch den Saamen vermehren. Ist officinell.

648. R. ALBA.

Weisse - Rose.

Der Stengel mit zurückgekrümm- ten, zerstreutstehenden Stacheln be- setzt. Die Blätter gefiedert, eyför- mig, scharf sägeartig gezähnt, oben glatt, unten zottig, an den Sägezäh- nen drüsig. Die Blattstiele fein weiss- lich haarig, mit kleinen, zerstreu-

ten Stacheln, und nach der Basis zu, mit kleinen, gestielten Drüsen besetzt. Die Blumenstiele mit lang gestielten Drüsen. Die Kelchröhre glatt. Die Kelchblättchen halbgefiedert, feinhaarig, mit gestielten Drüsen. Die Blumen weiss, wild einfach, in den Gärten gefüllt. Die Frucht eyförmig, glatt und manchmal etwas stachelig.

Wohnort. Im Lambowald und in der Bulau ohnweit Hanau an lichten Plätzen, jedoch sparsam; im Hangestein.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☞

Fruchtreife. Oktober.

Nutzen. Die Blumen sind offizinell. Als Zierblume prangt sie in unsern Gärten. Das Holz aller Rosenarten ist hart, zähe und gelblich und kann zu feinen Verarbeitungen gebraucht werden.

CCXLIII. RUBUS. Himbeere.

*) Strauchartige.

649. R. IDAEUS. Der Stengel stachelig. Die untern Blätter meistens zu fünf, die obern zu drei gefiedert, alle unten weisslich

Himbeere.

lich filzig. Die Blattstiele rinnenförmig. Die Blumen weiss. Die Frucht roth, selten weiss.

Wohnort. In Wäldern z. B. bei Hanau in der Bulau und am Wilhelmsbader Schiesplazz; in der Lohe; in den Wäldern hinter Offenbach; hinter Oberrod; bei der Frankfurter Saustiege; hinter Falkenstein nach Reifenberg etc. Mit weissen Blüthen wird sie in Gärten gezogen.

Blüthezeit. Mai, Juni. ‡

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. In Gärten braucht man die Himbeere zur Bekleidung der Wände, und durch die Kultur wird sie sehr veredelt. Die Früchte isst man roh mit Zukker und Wein zum Nachtsch, oder in kalten Schaalen, man macht sie in Zukker ein und bereitet Geleen, Bakkwerk, Essig, Syrup, ein abgezogenes Wasser, (die drei letzteren sind offizinell) Brantewein, Wein und in Russland Meth daraus. Den Gänsen sind die Früchte ein Gift.

650. R. CAESIUS.

Bokksbeere.

Der Stengel rundlich, striegelig, borstig, stachelig. Die Blätter zu drei beisammenstehend, fast nakkt, unten

weichhaarig; die beiden Seitenblättchen meistens zweilappig. Die weissen oder rosenfarbenen Blumen bilden eine Doldentraube. Die Beeren schwarzblau, gleichsam wie mit einem Nebel überzogen.

Wohnort. Auf Aekkern zwischen Umstadt und Friedberg; zwischen Vilbel und Karben; häufig um Frankfurt etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ✚

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die Schaafte fressen die Blätter sammt den Beeren gerne, und säen alsdenn durch ihren Dünger die Saamen aus, so daß dieser schwer zu vertilgende Strauch, oft ganze Aecker, vorzüglich sandige, bedekt. Die Beeren haben einen angenehmen Geschmakk und theilen dem Wein einen vortrefflichen Geruch und Geschmakk mit; wie Heidelbeeren behandelt geben sie eine schöne blaue Farbe. Gleditsch empfahl diese Pflanze zur Gerberei. In nordischen Gegenden werden die Beeren gegessen.

651. R. FRUTICOSUS.

Brombeere.

Der Stengel und die Blattstiele stachelig. Die untern Blätter zu fünf,

die obern zu drei fingerförmig zusammengesetzt, zu beiden Seiten grün und weichhaarig. Die weissen, zuweilen fleischfarbigen, manchmal gefüllten Blumen, bilden eine Doldentraube. Die Beeren glänzend schwarz, zuweilen weiss.

b. Mit auf der untern Seite weisslich filzigen Blättern.

Wohnort.

Sehr gemein in Wäldern und Gebüschen. b. am Vilbeler Wald von Bergen her; auf dem Johannisberg bei Nauheim; um Darmstadt, Offenbach etc. Abarten mit gefüllten Blumen und weissen Beeren finden sich nur in Gärten.

Blüthezeit.

Mai, Juni. ‡

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Die Blätter werden von dem Rothwild äusserst gerne gefressen. Sie liefern eine dunkle Brühe, welche mit mancherlei Zusätzen brauchbare Farben giebt. Die Kohlen des schwarzen Holzes dienen zum Pulvermachen, so wie der ganze Strauch zur Gerberei. Durch die Gährung erhält man aus den frischen Beeren Essig, Wein und Brantewein;

in Frankreich färbt man verschiedene Weine damit; man ißt sie roh und gebraucht sie auch zum Kuchenbakken. Ueber unreife, getrocknete und zu Pulver gestossene Beeren Wein gegossen, giebt einen trefflichen Essig. Die Abart mit gefüllten Blumen ist eine stolze Gartenpflanze.

652. R. TOMENTOSUS *Borckh.*
Filzige Brombeere.

Der Stengel stachelig und feinhaarig. Die Blattstiele rund. Die Blätter zu drei beisammenstehend; die Fiederblättchen keilförmig-eyrund oder eylanzettförmig, grob und ungleich sägeartig gezähnt, oben weichhaarig, unten weissfilzig, ganz sammetartig anzufühlen. Die weissen Blumen bilden eine Afterdolde. Die kleinen sauern Beeren glänzend schwarz, mit röthlichem Schimmer.

Wohnort. In Wäldern auf steinigem Boden z. B. bei Langen die Koberstadt genannt, im Wald hinter Arheilgen etc.

Blüthezeit. Juni bis August. ‡

Fruchtreife. September, Oktober.

Bemerkung. Die Beeren des *Rub. tomentosus* sind kleiner, saurer, ohne blauen Reif und bestehen aus wenigern *Acinis* als die des *R. fruticosus*. Der Stengel ist nicht glatt, wie Willdenow sagt, sondern stachelig und feinhaarig, welche Haare bei heissem Wetter verschrumpfen, und dann hat der Stengel das Aussehen, als seye er mit einem blauen Reif überzogen. Diese Pflanze welche Willdenow in der neuen Ausgabe von Linné *spec. plant.* unter obigem Namen aufführt, beschrieb Borckhausen schon unter demselben Namen von *Rubus tomentosus* vor mehreren Jahren, in Roemmers neuem botan. Magazin im 1ten St. — *Suum cuique!*

Nutzen. Hat gleiche Eigenschaften wie die vorhergehende Art.

**) Krautartige.

655. *R. SAXATILIS.* Der Stengel krautartig, aufrecht, klein, glatt, oben haarig. Die Wurzelsprossen 1 — 3 Fuss lang, kriechend, haarig, etwas stachelig. Die Blätter dreifach; die Blättchen ey-

Felsen-Himbeere.

rund, schief, auf der einen Seite breiter, etwas haarig, sägeartig eingeschnitten, unten blässer. Die weissen Blumen bilden eine drei bis sechsblumige gestielte Doldentraube. Die Beeren hochroth, aus drei bis fünf deutlich unterschiedenen kleinen Beerchen zusammengesetzt.

Wohnort. In Gebirgswäldern z. B. am Fusse des Altkönigs nach Steinbach auf einer Wiese; im Lindenerwald bei Giesen; häufig in gutem Boden im Schuldsteinwald bei Gedern; häufig in der Orbig zwischen Bellings und Marios auf steinigem Boden.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Beobacht. Im Schuldsteinwald fanden wir häufig diese Pflanze mit Beeren, aber nur äusserst sparsam mit Flagellen, in der Orbig fanden wir gerade das Gegentheil. Sollte etwa die Natur, welche zur Erhaltung ihrer Geschöpfe alles beiträgt, auf dem sterilen Boden der Orbig diese Pflanze mit häufigern Flagellen versehen haben; weil durch die selten sich befruchtenden Blumen die Früchte nicht ge-

hörig reifen können und durch Flagellen fortgepflanzt werden müssen.

Nutzen.

Die Beeren werden in einigen Gegenden eingemacht und mit Fleisch verpeist; die Russen vermengen sie mit Honig und machen daraus durch die Gährung ein sehr angenehmes Getränk.

CCXLIV. FRAGARIA. Erdbeere.

†. 654. F. ves-
CA.

*Gemeine Erd-
beere.*

Die Blätter dreifach. Die Wurzelsprossen kriechend. Die Blumen weiss. Die Frucht in Farbe, Gestalt, Grösse, Geruch und Geschmakk, nachdem die Abarten sind, verschieden.

A b a r t e n.

a. Die gemeine Walderdbeere.

Die Blätter zu beiden Seiten weichhaarig, die auf der Spitze stehende Sägung etwas kleiner als die nebenstehenden; die weichen Haaren an den Blattstielen sehr abstehend, an den Blumenstielen hingegen ange-drückt. Die Frucht roth, selten weiss.

Wohnort.

Fast überall in Wäldern und an Hecken. Mit weisser Frucht, auf den Wäldern nach Osten hin zu Giesen.

Blüthezeit. April, Mai, 4

Fruchtreife. Juli, August.

Gezogen werden in unsern Gärten:

b. Die gemeine Gartenerdbeere. Die Blätter zu beiden Seiten weichhaarig; die oberste Säugung derselben etwas länger als die vorigen; die weichen Haaren der Blatt- und Blumenstiele sehr abstehend. Der Fruchtkelch zurückgebogen. Die Frucht meistens auf einer Seite grünlich, auf der andern dunkelroth. Ihr Vaterland ist vielleicht Amerika.

c. Die Virginische Erdbeere. Die Blätter oben beinahe glatt, die Säugungen lang zugespitzt, die an der Spitze befindliche, fast mit den übrigen gleichlang; die weichen Haare der Blattstiele aufrecht, die an den Blumenstielen angedrückt. Der Fruchtkelch abstehend. Die Frucht hellroth, eyförmig, zugespitzt, schmeckt weinsäuerlich. Sie reift sehr frühe. Virginien ist ihr Vaterland.

d. Die Ananas Erdbeere. Die Blätter stumpf sägeartig gezahnt, oben beinahe glatt; die Säugungen der Blät-

ter eyförmig; die an der Spitze etwas kürzer als die übrigen; die weichen Haare der Blatt- und - Blumenstiele aufrecht. Der Fruchtkelch aufrecht. Die Frucht gross, weissgrünlich, auf der Sommerseite röthlich, von überaus kräftigem Geruch und Geschmakk.

Sie stammt aus Surinam.

e. Die Riesen Erdbeere. Die Blätter gekerbt - sägezahnig, zu beiden Seiten weichhaarig; die Breite der Sägungen übertrifft ihre Länge; die weichen Haare der Blatt- und - Blumenstiele sehr abstehend; der Fruchtkelch aufrecht. Die Frucht sehr gross, von festem Fleische, rund und blassroth.

Sie soll aus Chili stammen.

f. Monats - Erdbeere. Die Blätter scharf sägezahnig, zu beiden Seiten weichhaarig; die Sägungen lanzett-eyförmig, die äusserste kürzer als die nachstehenden. Die Frucht mässig gross, pyramidenförmig, scharlachroth, reift von dem Juni an bis in den November.

Soll in der Schweiz und auch in Teutschland wachsen.

Nutzen.

Die Natur scheint die Erdbeere wegen ihrer überaus gesunden Frucht allen Zonen mitgetheilt zu haben. Sie wächst in Europa bis an das Nordkap, in Asien bis in Kamtschatka, im nördlichen Amerika, und auf Island, in Afrika, nur nicht unter dem Aequator, sonst aber überall. Man genießt sie frisch entweder ohne alle Zuthat, oder sie werden mit Zukker bestreut, oder man ißt sie mit Milch oder Wein, oder wie in Island mit saurerer Milch; auch geben sie einen guten Saft, Geleen, Wein und Essig. Durch die Kultur wird nur die Grösse der Erdbeeren sehr vermehrt, nicht aber der gewürzhafte Geschmakk derselben verbessert, sondern vermindert. Vor 200 Jahren wurde diese Pflanze nur noch selten in den Gärten gezogen, und nur auf den Tafeln der Vornehmen sahe man ihre Früchte. Ob die Alten sie gezogen haben, läßt sich nicht mit Gewisheit bestimmen. Die Blätter sind zum Gerben dienlich; noch jung und im Schatten getrocknet geben sie einen guten Thee. Durch Ranken und

Wurzeln lassen sich alle Erdbeersorten äusserst leicht und geschwind vermehren. Ist offizinell.

CCXLV. POTENTILLA. Potentille.

*) Mit gefiederten Blättern.

655. P. ANSERINA.

Gänse-Potentille; Gänse-rich.

Der Stengel kriechend. Die Blätter abgebrochen gefiedert, sägeartig gezähnt, unten mit weissen seidenartigen Haaren bestreut. Die Blumenstiele einblumig. Die Blumen gelb.

Wohnort.

Allenthalben an Wegen und auf trocknen Weiden.

Blüthezeit.

Mai, Juni. 4

Fruchtreife.

Juli, August.

Nutzen.

Sie dient zur Befestigung des Flugsandes, wird von den Gänsen und Schweinen gefressen und soll zur Gerbung des Leders dienlich seyn. Die Wurzel wird nach Sloane in brodlosen Zeiten in Schottland und Nordirland gegessen. Die Blätter waren offizinell.

656. P. RUPESTRIS,

Felsen-Potentille.

Der Stengel aufrecht und purpurröthlich. Die untern Blätter gefiedert und abwechselnd, die obern ste-

hen zu drei beisammen, die Blättchen eyförmig, gekerbt, feinhaarig. Die Blumenstiele fadenförmig. Die Blumen weiss.

Wohnort. Auf steinigem Boden bei Ziegenberg (Fabricius.)

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. August.

Nutzen. Als Zierblume ist sie zu empfehlen.

657. P. SUPINA. Der Stengel niederliegend und zweitheilig. Die Blätter gefiedert, etwas feinhaarig. Die Blumenstiele einblumig, zur Blüthezeit aufrecht, wenn sie Saamen tragen abwärts gebogen. Die Blumen klein und gelb.

Wohnort. Auf feuchtem sandigem Boden z. B. am Grindbrunnen, ohnfern Frankfurt; vor Frankfurt zwischen dem Bockenheimer und Eschenheimerthor.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

**) Mit fingerförmig getheilten Blättern.

658. P. RECTA. Der Stengel aufrecht, zottig, oben getheilt und Doldentraubig. Die Blätter lanzettförmig, tief gezahnt, zu

Gerade Potentille.

beiden Seiten haarig; die untern sieben - die mittlern fünf- und die obern dreifach. Die schwefelgelben Blumen, deren Blättchen ausgerandet, sind grösser als der sehr rauhzottige Kelch und bilden Doldentrauben.

Wohnort. Im Frankfurter Wald am Weg links des Schwengelsbrunnens nach dem hölzernen Kreuz hin.

Blüthezeit. Juni, Juli. 2

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Sie verdient in unsern Blumengärten eine Stelle.

659. P. ARGENTEA. Der Stengel aufrecht, traubendoldig. Die Blätter fünffach, keilförmig, eingeschnitten, unten weissfilzig. Die Blumen gelb.

*Silberfarbige
Potentille.*

Wohnort. Gemein an Wegen, altem Gemäuer, auf sandigen Hügeln etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. 2

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Sie ist zum Schwarzfärben und auch zum Gerben brauchbar. Die Wurzel wird nach Olaffen von den Isländern gegessen. Das Vieh frisst diese Pflanze nicht.

660. P. VERNA. Der Stengel niedergebogen. Die *Frühlings-* Wurzelblätter fünffach, scharf sägezäh-
Potentille. nigt, eingedrückt; die Stengelblätter dreifach. Die Blumen gelb.

Wohnort. Fast überall an Wegen und auf trocknen Triften.

Blüthezeit. Von April an bis in den September. 24

Fruchtreife. Juni bis Oktober.

Nutzen. Jung ist sie besonders für das Schaafvieh ein angenehmes Futter. Vielleicht wäre sie auch zur Gerberei zu benutzen?

661. P. OPACA. Die Stengel niederliegend, rasenförmig. Die Blätter auf beiden Seiten haarig, sägezäh-
Schattenliebende-Potentille. nigt, an der Wurzel meistens siebenfach, am Stengel fünffach, die obern Astblätter dreifach. Die Blumen gelb; die Kronblättchen ausgerandet, meistens gegen den Nagel zu mit einem braunen Fleck bezeichnet.

Wohnort. An Wegen um Giesen; im Walde hinter dem Frankfurter Forsthaus.

Blüthezeit. Mai bis Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Wie bei der vorhergehenden Art.

662. *P. INCANA* Die Stengel niederliegend, rasen-
Nobis. förmig, weit ausgebreitet. Die Blät-
Graue Potentille. ter weichfilzig, ganz graugrün und
 sammetartig anzufühlen, am Rande
 gefranzt, an der Wurzel fünffach,
 am Stengel dreifach; alle verkehrt-
 eyförmig, stumpf gekerbt. Die Blu-
 men gelb mit ganzen Kronblättchen.
Potentilla opaca Pollichii. P. are-
naria Borckh.

Wohnort. Auf dürrem sandigem Boden bei Darm-
 stadt in der Tanne.

Blüthezeit. Juli bis September. 4

Fruchtreife. August, September.

Bemerkung. Die ganze Pflanze ist sehr schlaff und
 weichsammetartig anzufühlen und sieht
 graugrün aus, hingegen die wahre *P.*
opaca Linn ist in allen Theilen etwas
 steifer und nicht so stark wie diese mit
 feinen Haaren bekleidet.

Nutzen. Wie bei *P. verna.*

663. *P. ALBA.* Die Stengel fadenförmig, nieder-
Weisse Po- liegend, dann aufrecht, oben ge-
tentille. theilt, weissfilzig. Die Blätter fünf-

fach, an der Spitze mit seidenartigen, sich zusammenneigenden sägeartigen Zähnen versehen, sind oben grün, feinhaarig, unten mit weissen seidenartigen Haaren besetzt. Die Blumenstiele weissfilzig, einblumig, zur Blüthezeit aufrecht, wenn sie Frucht tragen zurückgebogen. Die Blumen weiss. Der Fruchtboden zottig.

Wohnort. Im Wald über dem Wilhelmsbader Weinberg nach dem Galgen hin; hinter der Frankfurter grossen Saustiege nach Ysenburg zu; im Wald hinter dem Frankf. Forsthaus.

Blüthezeit. April, Mai und oft im Herbst zum zweitenmal. 2

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Sie ist eine schöne Zierblume für unsere Gärten.

664. P. REP-
TANS.

*Kriechende
Potentille.*

Die Stengel kriechend, knieig und ästig. Die Blätter fünffach; die Fiederblättchen verkehrt lanzettförmig, stumpf, sägeartig gezähnt, runzlich, feinhaarig, auf beiden Sei-

ten hellgrün. Die Blumenstiele einzeln. Die Blumen gelb.

Wohnort. Fast allenthalben an Wegen, Zäunen etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Sie möchte wohl zum Gerben brauchbar seyn. Wurzel und Blätter waren sonst offizinell.

***) Mit dreifachen Blättern.

665. P. PRO-
STRATA Moench,
*Niederge-
streckte Po-
sentille.*

Der Stengel niedergestreckt, rauhaarig. Die Blätter dreifach, verkehrt eyförmig, unten rauhaarig, sägeartig gezähnt, der mittlere sägeartige Einschnitt kleiner als die an den Seiten; die Blattansätze lanzettförmig, ganz. Die blumentragenden Aeste schlaff. Die Blumen weiss.

Fragaria sterilis Linn.

Wohnort. In gebirgigen Gegenden z. B. an Hecken vor Königstein; auf dem Altkühn; auf sehr unfruchtbaren Wiesen um Giesen.

Blüthezeit. März — Mai. 4

Fruchtreife. Juni, Juli.

CCXLVI. TORMENTILLA.

Tormentille.

666. T. ERECTA. Der Stengel fast aufrecht. Die Blätter
Aufrechte stiellos. Die Blumen gelb.
Tormentille.

Wohnort. Gemein auf Triften und in Wäldern.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die Wurzel wird zum Färben des Branteweins gebraucht; die Lappländer färben mit ihr das Leder schön roth; mit Alaun gebeiztes Tuch in Verbindung mit ihr und den Beeren von *Opulus glandulosa* wird auch davon schön roth gefärbt; auf den Inseln Ferro, St. Kilda und den Orkadischen Inseln gerbt man mit ihr das Leder, ja es soll sogar durch sie fester als durch die Eichenrinde werden; auch bei uns wird sie zum Gerben und Färben benutzt; in Holland heilen durch sie die Bauern das Blutharnen des Viehs; die Buräten und verschiedene andere sibirische Nationen gebrauchen sie statt des Thees, oder kochen vielmehr vermittelst des Zusazzes von Mehl, Butter und Salz eine Suppe daraus; sie ist officinell.

667. T. REP- Der Stengel kriechend, wurzel-
TANS. schlagend. Die Blätter gestielt. Die
Kriechende Blumen gelb.
Tormentille.

Wohnort. In Wäldern z. B. hinter dem Frank-
furter Forsthaus.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

Nuzzen. Völlig wie bei der vorhergehenden
Art.

CCXLVII. GEUM. Geum.

668. G. URBA- Die untern Blätter fünffach, die
NUM. obern dreifach, die ganz obersten ein-
Gemeines fach; die Blattansätze rundlich, deut-
Geum; Nel- lich von einander unterschieden, drei-
kenwurz. lappig. Die gelben Blumen aufrecht.
Die Grannen der Griffel hakkenför-
mig und nakkt.

Wohnort. Sehr gemein an Zäunen, in Gebü-
schen, Hekken und Wäldern.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Beobacht. Kelch und Blumenkrone stehen offen;
der eyrunde Fruchtboden ist etwas ge-
stielt.

Nutzen. Im Frühjahr hat die Wurzel einen Gewürznelken - Geruch; dem Bier theilt sie diesen Geruch mit und verwahrt es vor dem Sauerwerden; in Schweden würzt man auch mit ihr die Weine. Die jungen Blätter werden nach Matuschka in Schlesien als Salat gegessen; jung fressen sie die Schaafte gerne. Die ganze Pflanze giebt der mit Wissmuth vorbereiteten Wolle eine dauerhafte Nussfarbe und ist auch zum Ledergerben dienlich. Die Wurzel ist officinell.

669. G. RIVALE. Die untern Blätter gefiedert, die
Wasser Geum. oberen einfach dreilappig; die Fiederblättchen mit kleinern untermischt, wovon das Endblättchen dreilappig; die Blattansätze eylanzettförmig und gezähnt. Die Blumen überhängend, rothbraun mit purpurrothen Streifen versehen. Der Griffel gedreht und nakkt.

Wohnort. Auf feuchten Wiesen z. B. bei Gross-Auheim; hinter dem Kettenhof bei Frankfurt; im Stelzenmorgen bei Giesen etc.

Blüthezeit. Mai bis Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Kelch und Blumenkronblättchen sind etwas aufrechtstehend und letztere verkehrt herzförmig; der Fruchtboden länglich und gestielt.

Nutzen. Die Wurzel ist an manchen Orten officinell; zum Gerben soll sie brauchbar seyn.

CCXLVIII. COMARUM. Komarum.

670. C. PALU-
STRE.

*Sumpf Coma-
rum.*

Der Stengel am Grunde kriechend, schlägt Wurzel, wird hernach aufrecht, ist purpurröthlich, oben feinhaarig und ästig. Die untersten Blätter gefiedert; die Fiederblättchen fünffach, elliptisch-lanzettförmig, sägeartig gezähnt, unten grau, die obersten Nebenblättchen dreifach oder auch einfach. Die langen feinhaarigen Blumenstiele stehen am Ende und jeder trägt eine grosse purpurrothe aufrechtstehende Blume.

Wohnort. Auf sumpfigem, meistens torfhaltigem Boden. Bei Hanau in Sümpfen ohnweit dem Lehrhof; beim neuen Wirthshaus

im Wald; im Neuhoferwald; im Ried Rumpenheim gegenüber, rechts am Weg nach Bischofsheim; beim Steinheimer Galgen; um Offenbach häufig; auf der Wiese im Niederröderwäldchen bei dem Brunnen; im Sumpf beim Frankfurter Forsthaus; bei dem Forellenteich im Oberwald; an dem Philosophenwäldchen bei Giesen etc.

- Blüthezeit. Mai bis August. 24
- Fruchtreife. August, September.
- Beobacht. Die Zahl der Kelchabschnitte und der Blumenkronblätter ist sich nicht immer gleich.
- Nutzen. Diese Pflanze verdientę ihrer schönen purpurrothen Blumen wegen in den Gärten als Zierblume gezogen zu werden, und nach unserer Erfahrung gelingt dieses ohne viele Kunst sehr gut. Sie ist zum Gerben dienlich, und die Finnländer gebrauchen die Wurzel zum Rothfärben. Die Rennthiere fressen diese Pflanze gerne, anderes Vieh aber läßt sie unberührt stehen.
-

DREIZEHENTE KLASSE.

POLYANDRIA. Mit vielen Staubfäden, die auf dem Fruchtboden sitzen.

I. ORDNUNG.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

CCLI.
PAPAVER.
Mohn.

Der Kelch zweiblättrig, nach kaum geöffneter Blume abfallend. Die Blumenkrone vierblättrig, abfallend. Die Narbe aufsitzend, schildförmig, gestrahlt, gekerbt. Die Saamenkapsel mit der Narbe gekrönt, kugelig oder länglich, klappenlos, einfächerig, bis zur Hälfte vielfächerig, unter der Narbe mit vielen Oeffnungen von einander springend, viel-saamig.

CCL.
CHELIDO-
NIUM.
Schellkraut.

Der Kelch zweiblättrig, abfallend. Die Blumenkrone vierblättrig, abfallend. Die Narbe aufsitzend, kopfförmig, zweispaltig. Die unächte Schote gleichbreit, rund, enthält viele eyrunde, glänzende Saamen.

CCXLIX.
ACTAEA.
Christophs-
kraut.

Der Kelch und die Blumenkrone sind vierblättrig, beide abfallend. Die Narbe aufsitzend, gestrahlt. Die unächte Beere ey-kugelförmig, glatt, fleischig, einfurchig und einfächerig, enthält viele halbzirkelförmige in doppelter Reihe aufeinander liegende Saamen.

CCLIV:
CISTUS.
Cistrose.

Der Kelch fünfblättrig, bleibend; zwei Blättchen kleiner als die übrigen. Die Blumenkrone fünfblättrig und abfallend. Die Narbe etwas dicklich. Die Saamenkapsel durch den Kelch bedeckt, dreiseitig, dreiklappig; die Klappen gedoppelt, die Wand derselben einfach; die vielen Saamen an die Klappen angeheftet.

CCLIII.
TILIA.
Linde.

Der Kelch fünftheilig, abfallend. Die Blumenkrone fünfblättrig, abfallend. Die Narbe fünfseitig, stumpf. Die Frucht eine rindige Höhle (*Antrum corticosum* Med.) kugelförmig-kreiselförmig, vier- bis fünffächerig, am Grunde aufspringend; die Fächerchen einsaamig.

CCLII.
NYMPHAEA.
Nymphäe.

Der Kelch vier oder fünfblättrig, oben gefärbt, bleibend. Die Blumen-
2. Th. R

krone vielblättrig. Die Narbe zirkelrund, flach, handförmig aufsitzend, mit Strahlen bezeichnet, am Rande gekerbt, bleibend. Die unächte Beere abgestutzt, eyrund, am Halse enger, an der Spitze gekrönt, markvoll, vielfächerig, enthält viele rundliche Saamen.

CCLV.
DELPHI-
NIUM.

Rittersporn.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone besteht aus fünf ungleichförmigen, in einem Kreise stehenden Blättchen, von denen das obere sich hinten in einen langen Sporn endigt; die übrigen sind eylanzettförmig, abstehend und fast gleich. Das Afterblumenblatt bespornt, und in die Röhre des obersten Kronblättchens eingewikkelt. Die Saamenkapsel aufrechtstehend, einklappig, einfächerig, innwendig der Länge nach von einanderspringend, vielsaamig.

II. ORDNUNG.

TRIGYNIA. Mit drei Staubwegen.

CCLVI.
ACONITUM.
Sturmhut.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone besteht aus fünf ungleichförmigen Blättern, wovon das oberste helmförmig und röhrig ist, und enthält noch zwei After-

blumenblättchen mit sehr langem, unten zurückgekrümmtem Sporn, der unter dem obersten helmförmigen Kronblatt verborgen ist. Die 3 bis 5 aufrechtstehenden Saamenkapseln, sind einfächerig, springen von innen auf und enthalten viele ekkige runzlige Saamen.

III. ORDNUNG.

PENTAGYNIA. Mit fünf Staubwegen.

CCLVII.
AQUILEGIA.
Aquilegie.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone besteht aus fünf gleichen, lanzettförmigen Blättern, zwischen welchen fünf andere kappenförmige kleinere Afterblumenblättern sitzen, welche sich in einen Sporn endigen. Die fünf Fruchtknoten sind mit zehn runzlichen Spreublättchen versehen. Die fünf walzenförmigen, abgesonderten, geschnabelten, von innen aufspringenden Saamenkapseln sind einfächerig und enthalten viele glänzende Saamen.

CCLVII.
NIGELLA.
Nigelle.

Der Kelch fehlend, oder in einigen Arten eine blätterige Hülle. Die Blumenkrone besteht aus fünf gleichen, abstehenden, deltaförmigen Blättern und

aus acht kleinen, in einem Kreis stehenden Afterblumenblättchen, von denen die äussere grössere Lippe zweispaltig, und mit 2 Punkten bezeichnet, die innern aber kürzer, und in eine Linie geëndigt ist. Die vielen Staubfäden am Grunde frei, in 8 oder 10 Partien getheilt, sind kürzer als die Blumenkrone. Die Fruchtknoten haben sehr lange ekkige, zurückgerollte, bleibende Griffel, mit der Länge nach heräblauenden Narben. Die Saamenkapseln eyförmig, rund fünfseitig, geschnabelt, springen nach innen zu an der Spitze auf, sind mit durchsichtigen Drüsen besetzt und enthalten viele eyförmige, ekkige, rauhe Saamen.

IV. ORDNUNG.

POLYGYNIA. Mit vielen Staubwegen.

CCLIX.
THALIC-
TRUM.

Wiesenraute.

Die vier bis fünfblättrige Blumenkrone hat keinen Kelch. Die Staubfäden länger als die Blumenkrone und oben breiter. Die Fruchtknoten sitzen auf sehr kurzen Stielchen, haben keine, oder äusserst kurze Griffel, und dikk-

liche Narben. Die Fruchthüllen ey- oder keulenförmig, gefurcht, mit einem kleinen Sehnäbelchen versehen, ohngeschwänzt, einsaamig.

**CCLXVIII.
HELLEBO-
RUS.**

Niesswurz.

Die fünfblätterige Blumenkrone, welche bleibend und bisweilen gefärbt ist, hat keinen Kelch, enthält aber noch mehrere röhrige, aufrechtstehende, zweilippige in einem Kreis stehende Afterblumenblättchen, deren Lippen stumpf und ganz sind. Die Saamenkapseln zusammengewachsen, geschnäbelt, einklappig, von innen aufspringend, einfächerig, vielsaamig.

**CCLXVII.
TROLLIUS.
*Trollblume.***

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone vielblätterig; die Blättchen gleich und einwärts gekrümmt. Die Afterblumenblätter gleichbreit, röhrig, an der Rückenspitze ausgehöhlt, am Grunde durchlöchert. Die vielen Saamenkapseln sind mit einer zurückgekrümmten Spitze versehen, in ein Köpfchen vereinigt, zusammengewachsen, einfächerig, zusammengedrückt, zweiklappig, springen an der innern Seite auf und enthalten viele eyförmige Saamen.

CCLXIX. Der Kelch fehlend. Die Blumenkro-
 CALTHA. ne fünfblätterig, ohne Afterblumenblätt-
Dotterblume. chen. Die Griffel fehlen. Die Saamen-
 kapseln zusammengewachsen, zusammen-
 gedrückt, sternförmig, abstehend, an
 der innern Seite der obern Nath auf-
 springend, einklappig, einfächerig, viel-
 saamig.

CCLX. Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone
 CLEMATIS. vier- oder fünfblätterig. Die Staubbeu-
Waldrebe. tel an der Seite der Staubfäden ange-
 wachsen. Der Fruchtknoten rundlich,
 zusammengedrückt, endigen sich in pfrie-
 menförmige Griffel, die länger als die
 Staubfäden sind. Die Fruchthüllen durch
 den bleibenden, federartigen, verlängerten
 Griffel geschwänzt.

CCLXII. Kelch keiner, statt dessen ein schwü-
 ANEMONE. liger fein behaarter Ring, in welchem
Anemone. die Rinde aufhört, unterhalb der Blu-
 me. Die Blumenkrone fünf bis sechs-
 blätterig; die Blättchen in 2 oder 3 Rei-
 hen. Die vielen Fruchthüllen rundlich,
 glatt oder wollig, niedergedrückt, weich-
 stachelig, einsaamig.

CCLXI.
PULSATIL-
LA.

Küchenschelle.

Kelch keiner, statt dessen eine blätterige vielspaltige Hülle. Die Blumenkrone sechsblättrig; die drei äussern Blätter ein Fortsazz der Rinde. Die vielen Fruchthüllen zottig, geschwänzt, einsaamig.

CCLXIII.
HEPATICA.
Leberkraut.

Der Kelch dreiblättrig, etwas von der Blumenkrone entfernt und bleibend. Die Blumenkrone sechsblättrig; die Blätter in zwei oder drei Reihen. Die Narben stumpf. Die vielen Fruchthüllen zottig, länglich, ohnbewaffnet, von dem Kelch umgeben, einfächerig, einsaamig.

CCLXV.
FICARIA.
Fikarie.

Der Kelch dreiblättrig, abfallend. Die Blumenkrone 8 — 12 blättrig; die Blättchen haben honigtragende Grübchen welche mit einem Schüppchen bedeckt sind. Die Narben aufsitzend. Die vielen Fruchthüllen zusammengedrückt, stumpf, nakkt, einfächerig, einsaamig.

CCLXVI.
RANUNCU-
LUS.
Ranunkel.

Der Kelch fünfblättrig, abfallend. Die Blumenkrone fünfblättrig, über den Nägeln der Blätter befinden sind honigtragende Grübchen welche mit Schüppchen bedeckt sind. Die Narben fast stiellos, zurückgeschlagen, Die vielen Frucht-

hüllen eiförmig, zusammengedrückt,
glatt oder weichstachelig, einfächerig,
einsaamig.

CCLXIV.
ADONIS.
Adonis.

Der Kelch fünfblätterig, etwas gefärbt,
abfallend. Die Blumenkrone fünf- bis-
vielblätterig. Afterblumenblättchen keine.
Die Narben aufsitzend, zurückgeschla-
gen. Der Fruchtboden verlängert. Die
vielen Fruchthüllen, eckig, geschnäbelt,
einfächerig, einsaamig.

DREIZEHENTE KLASSE.

POLYANDRIA. Mit vielen Staubfäden, die auf dem Fruchtboden sitzen.

I. O R D N U N G.

MONOGYNIA. Mit einem Staubwege.

CCXLIX. ACTAEA. Christophskraut.

671. A. NIGRA
Nobis.

Schwarzes
Christophs-
kraut.

Die Blätter doppelt gefiedert, säge-
artig gezähnt, das äusserste Fieder-
blättchen dreilappig. Die Traube ey-
rund. Die Blumen weiss. Die Bee-
ren glänzend schwarz.

Actaea spicata nigra Linn.

Wohnort.

In schattigen Wäldern und Gebüsch.
Häufig auf dem Berg bei dem Falken-
steiner Schloss; um den kleinen Bild-
stein oberhalb Bräungeshayn; bei dem
Forellenteich im Oberwald; in Gebü-
schen um Herchenhayn und zwischen
Herchenhayn und Crainfeld; im Gebü-
sche um Ilbeshausen und Hintersteinau;

im Hangestein auf der Abendseite; häufig an dem Wendelstege in der Landwehre im Wald zwischen Oberrad und Frankfurt.

Blütezeit. Mai bis August. 24

Fruchtreife. August — Oktober.

Nutzen. Diese Pflanze hat giftige Eigenschaften wird aber doch von Ziegen, Schaafe und Schweinen ohne Nachtheil gegessen. Der Saft der Beeren mit Alaun gekocht, giebt eine schwarze Farbe. Die Wurzel dient zu Haarseilen für das Vieh. War ehemals officinell.

CCL. CHELIDONIUM. Schellkraut.

672. C. MAJUS. Die Blätter halbgefiedert; die Fiederblättchen stumpflappig, die äussern zusammenfliessend. Die Blumenstiele doldenförmig. Die Blumen gelb.

Wohnort. Fast überall an Zäunen, Mauern und steinigen Orten.

Blütezeit. April — Juni. 24

Fruchtreife. Juli — September.

Nutzen. Die Blüten werden stark von den Bienen besucht. Sowohl die Wurzel, als auch der aus den Stengeln und Aesten

fließende scharfe Saft, giebt eine dauerhafte gelbe Farbe. Mit einem Dekokt der Wurzel waschen in Krain die Einwohner die faulen Geschwüre der Pferde und töden damit die in denselben befindlichen Würmer. Die ganze Pflanze hat schädliche Eigenschaften und wird nicht ohne Gefahr von dem Vieh gefressen. Sie ist officinell.

CCLI. PAPAVER. Mohn.

*) Mit steifhaarigen Saamenkapseln.

675. P. ARGEMONE.

Keulenförmiger Mohn.

Der Stengel blätterig, vielblumig, mit langen, steifen, dichtstehenden, angedrückten Haaren bedekt. Die Blätter dreitheilig, zwei oder dreimal gefiedert, steifhaarig, die Blättchen eingeschnitten. Die Blumen roth, mit länglichen, fast keulenförmigen, an der Spitze sehr fein sägeartig gezahnten Blumenblättern. Die Saamenkapsel keulenförmig, gefurcht, mit wenigen, weisslichen, gebogenen, angedrückten Borsten besetzt. Die Staubfäden unter den Staub-

beuteln breiter. Die Narbe etwas spizzig, fünfstrahlig.

Wohnort. Auf sandigen Aekkern unter der Saat z. B. um dem Lehrhof bei Hanau; bei dem Hanauer Galgen; bei der Hartig; um Frankfurt in den Gärten vor dem Gallenthor; bei der Frankf. Ziegelhütte; auf dem Lerchenberg; am Wezlarer-Weg bei Giesen; um Darmstadt, Arheilgen etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Nur Schaafe und Ziegen fressen diesen Mohn.

674. P. HYBRIDUM.

Bastard Mohn.

Der Stengel blätterig, vielblüthig, mit angedrückten, dichten, steifen, eingekrümmten Borsten besetzt. Die Blätter dreifach, fiederförmig getheilt. Die Blumen roth. Die Saamenkapsel eyrund, gedreht rinnenförmig, mit rauhen eingekrümmten Borsten dicht besetzt.

Wohnort. Auf Aekkern unter der Saat um Darmstadt und Arheilgen.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Nur Schaaf und Ziegen fressen ihn.

**) Mit glatten Saamenkapseln.

675. P. RHOEAS Der Stengel vielblumig, mit ab-
Klatschrosen- stehenden Haaren besetzt. Die Blät-
Mohn. ter fiederförmig getheilt und einge-
schnitten. Der Kelch geschlossen,
eyrund, stumpf. Die Blumen pur-
purroth. Die Narbe zehn- bis fünf-
zehnstrählig. Die Saamenkapsel ku-
gelrund und glatt.

Wohnort. Fast überall auf Aeckern unter der
Saat.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Das Rindvieh, die Ziegen und Schaaf
fressen diese Pflanze, aber die Schweine
und Pferde nicht. Der aus den ausge-
pressten Blumenblättern erhaltene Saft
färbt vorbereitetes Tuch, Seide, Baum-
wolle und Leinwand schön roth; nach
Seetzen werden in Holland mit die-
sem Saft die Käse gefärbt. In Irland
werden die jungen zarten Blätter als
Gemüse gekocht, und mit Butter und
Käse vermischt, gegessen. Saamenkap-

seln und Blumen sind offizinell. In unsern Gärten werden mehrere Abarten mit einfachen und gefüllten Blumen von verschiedener Farbe der Zierde wegen gezogen.

376. P. DUBIUM.

Zweifelhafter Mohn.

Der Stengel vielblumig, mit wagerecht abstehenden Haaren besetzt. Die Blätter fiederförmig eingeschnitten. Die Haare an den Blumenstielen angedrückt. Der Kelch geschlossen, eiförmig, länglich. Die Blumen roth. Die Narbe zehnstreihig. Die Saamenkapseln länglich, glatt, bis zur Hälfte zehnfächerig.

Wohnort.

Auf Aeckern unter der Saat, z. B. jenseits des Hanauer Galgens; in der Bulau nahe an der Kinzig; rechts der Sachsenhäuser Warte; häufig auf dem Lerchenberg; bei Niedererlenbach, Darmstadt, Arheilgen etc.

Blüthezeit.

Juni, Juli. ☉

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Ist nicht offizinell, leistet aber sonst denselben Nutzen wie die vorhergehende Art.

†. 677. P. som-
NIFERUM.

*Schlafmachen-
der Mohn.*

Der Stengel sehr hoch, vielblumig, blätterig, und sammt den umfassenden, eingeschnitten-gezahnten Blättern, Blumenstielen, Kelchen, und grossen, fast kugelrunden Saamenkapseln, glatt. Die Blumen einfach und gefüllt, von den mannigfaltigsten Farben - Abänderungen. Die Saamen weiss- oder blauschwärzlich, nach dem die Abart ist.

Wohnort.

Stammt höchstwahrscheinlich, ursprünglich aus dem Orient; wird vorzüglich häufig um Darmstadt und an mehreren Orten bei uns gebaut, und findet sich auch hin und wieder gleichsam wild.

Blüthezeit.

Juni, Juli. ☉

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Aus denen in die äussere Haut geritzten, noch unreifen Saamenkapseln, erhält man im Orient, wo diese Pflanze oft eine Höhe von 30 — 40 Fuss erlangt, den berühmten Milchsaft, der sich an der Sonne verdickt und unter dem Namen Opium, als ein wichtiges Arzneimittel bekannt ist. Ein schlechteres

Opium wird ausgekocht. Die Nachfolger Muhamets bedienen sich dieses Saftes statt des Weins, sowohl um sich zu vergnügen, als sich rasend zu machen, worauf aber Mismuth und zuletzt tödende Erschlaffung folgt; überhaupt ist das Opium nur in der Hand des erfahrenen Arztes nützlich, sonst aber ein fürchterliches Gift. Wir benutzen nur den Saamen, um ein Oehl daraus zu schlagen, das an Güte dem Baumöhl sehr nahe kommt; auch wird derselbe von uns, und sehr vielen andern Völkern in Kuchen gebakken, und schon Dioscorides sagt, man habe ihn zu Brod gebraucht, so wie Galen, daß man ihn statt Gewürzes auf Brod streue; viele Stubenvögel, als Zeisige, Stieglitze, Girlitze, Flachsfincken etc. werden damit gefüttert. Die jungen Blätter können als Gemüse gegessen werden. Die Oehlkuchen sind für das Vieh ein gesundes Futter. Die trocknen Stengel sind zur Feuerung zu benutzen. Saamen und Saamenkapseln sind officinell. Diese Pflanze ist als Zierblume bei uns sehr geschätzt, aber ihr Anbau leider

nochnicht so allgemein; als er es verdiente.

CCLII. NYMPHAEA. Nymphäe.

678. N. LUTEA. Die Blätter herzförmig, zugerundet, glatträndig. Der Kelch fünfblätterig, grösser als die Blumenblätter. Die Blumen gelb. Die Beeren kegelförmig.

Wohnort. In stehenden und langsam fliessenden Wassern z. B. um Hanau beim Waldesel in der krummen Kinzig; im Lambowald und in der Bulau in der ausgetrokkneten Kinzig; bei Frankfurt in dem Mezgerbruch in Gräben; in stillstehendem Wasser hinter Bockenheim; in der Nied bei Rödelheim, Bonames, Ginnheim etc. im Bach Wiseck, und im Stadtgraben zu Giesen etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 2

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. In einigen Ländern werden die getrokkneten Blätter von dem Vieh gefressen, aber nur nicht von den Schaafen. Blätter, Blüten und Wurzel sind zum

Gerben brauchbar; letztere tödtet, wenn man sie in Milch zerrieben hat, die Schaben und Grillen. Die Wurzel wurde in Schweden in theuern Zeiten als Nahrungsmittel ohne Schaden genossen, und auf der Insel Seeskär bei Narva mit der Fichtenrinde Brod daraus gebakken. Neuern Beobachtungen nach, haben nicht aus dieser Art, sondern aus *Nymphaea Lotus* die Aegypter Brod gemacht. In Lustgärten, die Wassergräben, Teiche und Kanäle mit dieser und der nachfolgenden Art bepflanzt, ist ein herrlicher prachtvoller Anblick; um dieses leicht zu bewerkstelligen, sammle man nur um die Zeit der Reife ihres Saamens solche Beeren, die im Begriff sind sich öffnen zu wollen, und werfe solche auf das Wasser.

679. N. ALBA.
Weisse Nymphae.

Die Blätter herzförmig, lang zugespitzt, glatträndig. Der Kelch vierblättrig, kleiner als die lanzettförmigen Blumenblätter. Die Blumen weiss, sehr wohlriechend. Die Beeren kugelrund.

b. Mit viel kleinerer Blume.

Wohnort. In stehenden und langsam fliessenden Wassern z. B. in den Teichen bei Kranichstein; in der Bulau in der ausgetretenen Kinzig, ohnweit Hanau; in Sümpfen welche von Hanau aus links an dem Wilhelmsbaderweg und in dem Wald liegen; bei der Steinheimer Fasanerie; in Waldsümpfen zwischen Seeligenstadt und Babenhausen, und auch zwischen Frankfurt und Darmstadt; in dem Lutherischen Bornweiher bei Offenbach; im Mezgerbruch bei Frankfurt; in einem Graben vor Rödelheim etc. b. in dem Stadtgraben zu Lich.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die türkischen Frauenzimmer bereiten aus den frischen Blumen durch die Destillation ein sehr angenehmes Getränk; aller übrige Gebrauch ist wie bei der vorhergehenden Art.

CCLIII. TILIA. Linde.

†. 680. T. GRAN- Die Blätter fast herzförmig, lang-
DIFOLIA Ehrh. zugespitzt, sägeartig gezähnt, etwas
Grossblätteri- rauhhaarig, unten in den Achseln
ge Linde;
Sommerlinde.

der Aderäste braunwollig. Die Blumen bleich schwefelgelb und wohlriechend. Die Saamenkapsel vierfächerig, etwas haarig.

Tilia europaea a. β. γ. Linn.

Wohnort. In Wäldern z. B. in der Tanne bei Darmstadt; im Hangestein bei Giesen; gepflanzt in Frankfurt in der Stadtallee, und noch an vielen andern Orten.

Blüthezeit. Juni. ♀

Fruchtreife. September.

Nutzen. Dieser Baum taugt vorzüglich gut zu Gränzbäumen, dann er erreicht ein Alter von 5 bis 800 Jahren und einen Umfang von 20 und mehr Fuss. Unter der Scheere gehalten giebt er schöne Lusthekken und Sommerlauben. Die Blüthen geben den Bienen reichlichen Stoff zu Wachs und Honig; doch den mehrsten Honig holen sie von den Blättern die mit Honigthau befallen sind; getrocknet sind die letzteren den Ziegen, Schaafen und Kühen ein gutes Winterfutter. Aus dem angebohrten Stamm läßt sich ein ähnlicher Saft, wie aus den Birken ziehen. Das weisse, leichte

zähe Holz wird von den Drehern, Schreibern und Bildhauern sehr geschätzt; zu Schuster-Tischen ist es vorzüglich brauchbar, weil die Schuster darauf ihr Leder schneiden können, ohne ihre Instrumente allzusehr dadurch stumpf zu machen; gebeizt sieht es wie Ebenholz aus. Die Kohlen sind zum Zeichnen und zum Schiesspulver gut, aber als Brennholz hat es wenig Werth. Die innwendige Rinde ist ein schönes Bast, woraus in Russland, Schweden und Frankreich Dekken und Matten zur Einpakkung der Kaufmannswaaren, auch Körbe, Hüte, Stricke, Schuhe, Fischreusen etc. verfertigt werden; Quelmalz empfahl dieselbe bei Mangel an Getreide mit unter das Brod zu bakken; Rüger hat einen Rosenlakk aus der Rinde bereitet, und Marquis de Vilette ein röthlich braunes zimmlich dickes Papier, welches zum Drukken und Schreiben, besonders aber zum Zeichnen brauchbar war; auch aus den Blättern bereitete Schäfer ein haltbares graues Papier. Munting versichert, daß er ein auf Lindenbast geschriebenes Buch gesehen

habe, welches über 1000. Jahr alt war. Missa, ein französischer Arzt, hat zuerst bemerkt, daß man aus den Früchten ein Oehl, oder eine Art Butter pressen könne; die nach dem Pressen übrig gebliebene Kuchen dienen nicht nur statt der Mandelkleyen zum Händewaschen, sondern sollen sogar eine wohlschmeckende Mehlspeise geben. Durch die Destillation läßt sich aus den Lindenblüthen ein Weingeist abziehen. Sie ist officinell. Die Vermehrung geschieht durch Saamen, Ableger, Stekklinge und Wurzelbrut.

†. 681. T. PAR-
VIFOLIA Ehrh.

*Kleinblätteri-
ge Linde;
Winterlinde.*

Die Blätter herzförmig, langzugespitzt, ungleich sägeartig gezähnt, auf beiden Seiten glatt. Die Blumen bleich schwefelgelb und wohlriechend. Die Saamenkapsel zugerundet, fünffächerig, filzig und viel kleiner als die der vorhergehenden Art.

Tilia europaea γ. δ. Linn.

Wohnort.

In Wäldern z. B. im Lambowald und in der Bulau bei Hanau; hinter Hom-

burg; hinter Bockenheim; im Lindenerwald und im Hangestein bei Giesen; um Darmstadt. Gepflanzt z. B. auf den Hanauer Stadtwällen und an der Chaussee nach Kesselstadt; zu Frankfurt auf den Stadtwällen und in der Allee in der Stadt etc.

Blüthezeit. Juli. ½

Fruchtreife. Oktober.

Beobacht. Diese Art wird nicht so hoch und stark als die vorige, die Rinde ist brauner und das Holz röthlicher, gröber, zäher, härter und knotiger; auch die Blüthen sind kleiner.

Nutzen. Die Benutzung ist dieselbe, wie bei der Sommerlinde, nur ist das Holz zum Schnitzen nicht so weich; aber zu Pflanzungen ist sie ihres länger dauernden Laubes wegen vorzüglicher.

CCLIV. CISTUS. Cistrose.

682. C. HELIANTHEMUM.
Gemeine Cistrose.

Die Stengel halbstrauchartig, niederliegend, ästig; die Aeste von einander stehend. Die Blätter eyförmig, am Rande zurückgeschlagen, mit wenigen Haaren besetzt; die Blattan-

sätze lanzettförmig. Die gelben Blumen in schlaffen, vor dem Aufblühen überhängenden Trauben.

Wohnort.

Auf sonnigen Hügeln und trocknen waldigen Triften z. B. hinter dem Wilhelmsbad am Weg nach Hochstadt; in der Gegend des Steinheimer Galgens; um Rumpenheim und auf den kalkigen Anhöhen bei Offenbach, so wie auch im Lehen in grosser Menge; um Frankfurt gemein; an den Weinbergen um Oppershofen; um Giesen, Darmstadt etc.

Blüthezeit.

Mai — August. †

Fruchtreife.

August — Oktober.

Nutzen.

Das Rindvieh, die Schaaf, Ziegen und Pferde fressen sie, aber die Schweine nicht. Den Bienen geben die Blumen viele Beute. Diese Pflanze verdient unter die Zierblumen unserer Gärten aufgenommen zu werden.

CCLV. DELPHINIUM. Rittersporn.

683. D. CONSO-
LIDA.

Feldritter-
sporn.

Der etwas zertheilte Stengel steht von einander. Die Blätter gefiedertvielspaltig, leicht feinhaarig; die Abschnitte gleichbreit. Das Afterblu-

menblatt sehr lang bespornt; die Lippe zweispaltig. Die Blumen violettblau.

Wohnort. Sehr gemein auf Aeckern unter der Saat.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. September.

Nutzen. Schaaf, Ziegen und Pferde fressen sie, aber Rindvieh und Schweine nicht. In Thüringen sammelt man die Blumen und schneidet sie unter den Rauchtak; die Bienen sammeln Honig aus denselben; der aus denselben ausgepresste Saft giebt für die Zuckerbäcker eine gute grüne Farbe, und mit Alaun gekocht liefern sie eine blaue, welche als Tinte gebrauchen kann. Sonst waren die Blumen officinell.

II. ORDNUNG.

TRIGYNIA. Mit drei Staubwegen.

CCLVI. ACONITUM. Sturmhut.

684. A. LYCOTONUM.
*Wolfs-
Sturmhut.*

Der Stengel aufrecht, besonders oben feinhaarig. Die Blätter handförmig, vielmal getheilt, feinhaarig, gefranzt; die Theile fast keilförmig,

dreitheilig, zerrissen gezähnt. Die blassgelben zottigen Blumen bilden eine lange Traube; der Helm verlängert sich in ein walzenförmiges, stumpfes Horn. Der Kapseln sind drei.

Wohnort. Auf dem Lollarer-Kopf, wo ihn auch schon Dillen fand.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Die Wurzeln sind für Wölfe, Hunde und Katzen ein Gift, und der Absud mit Wasser kann bei Rindvieh und Pferden zur Vertreibung des Ungeziefers, so wie auch wider die Wanzen gebraucht werden. Dem Menschen ist die ganze Pflanze ein scharfes und betäubendes Gift. Als Zierblume ist dieser Sturmhut in mehreren Gärten anzutreffen.

III. ORDNUNG.

PENTAGYNIA. Mit fünf Staubwegen.

CCLVII. AQUILEGIA. Aquilegie.

685. A. vul-

GARIS.

Gemeine

Aquilegie.

Die Blätter dreifach, die Blättchen dreitheilig, rundlich, stumpf gezähnt. Die Spornen der Afterblumenblätter

eingebogen und sammt den Stempeln weichhaarig. Die Blumen blau.

Wohnort. In Wäldern, auf Wiesen, Hügeln und auch an Zäunen z. B. am Högwald hinter dem Wilhelmsbad; in Hekken und auf Wiesen hinter der Windecker Stadtmauer, im Högwald hinter Rentel und Klein-Karben; zwischen Enckheim und Bergen; auf Wiesen bei der Güntersburg vor Frankfurt; bei dem Reichebach hinter Falkenstein; auf dem Stadtwallen um Friedberg; im Schuldsteinwald bei Gedern; um das Schifftenbergerschloss und im Lindenerwald; bei Arheilgen in der Fasanerie etc.

Blüthezeit. Mai bis Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Bemerkung. In unsern Gärten trifft man sie theils mit, theils ohne bespornte Afterblumenblätter, von den mannigfaltigsten Farbenabänderungen, einfach und gefüllt an.

Nutzen. Ehemals war sie officinell, jezt prangt sie als Zierblume in unsern Gärten. Aus den Blumen sammeln die Bienen Wachs und Honig. Durch Infussion geben die Blumen eine blaue Tinktur, welche durch Säure roth und durch Alkali grün wird,

und von den Chemikern zu Untersuchungen benutzt werden kann. Eckberg hat aus dem Saamen Oehl geprefst.

CCLVIII. NIGELLA. Nigelle.

686. N. DAMASCENA. Der Stengel gestreift und glatt. Die Blätter dreifach zusammengesetzt, die Abschnitte gleichbreit. Die blassblauen Blumen mit Blättern, die den übrigen ähnlich sind, umhüllet. Die Saamenkapsel fast kugelförmig, fünfschnäbelich.

Wohnort. Auf Aeckern um Rödgen bei Giesen und auf Schutthaufen um Darmstadt. Gezogen häufig in unsern Gärten.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Der Saame kann als Gewürz dienen. Als Zierblume findet sich diese Pflanze einfach und gefüllt in mancherlei Farbenabänderungen in unsern Gärten.

687. N. SATIVA. Der Stengel feinhaarig. Die Blätter dreifach zusammengesetzt; die Abschnitte gleichbreit lanzettförmig, feinhaarig, gefranzt, etwas stumpf.

Garten-Nigelle; Schwarzer Kümmel.

Die kleinen weissen oder gelblichen Blumen ohne Hüllen. Die Saamenskapsel rundlich und stachelig.

Wohnort. Stammt aus dem Orient; wird bei uns in den Gärten der Städter und Landleute gebaut.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Der Saame wird von den Morgenländern, so wie auch hin und wieder bei uns statt des Kümmels mit unter das Brod gebakken, und wird auch als Gewürz an die Speisen bei uns gebraucht; im Hannöyrischen baut man ihn unter dem Namen tout-epice; auch Oehl läßt sich aus demselben pressen; bei uns wird er häufig bei Krankheiten des Viehs gebraucht; er ist offizinell. Die Bienen besuchen die Blumen fleissig und holen Honig aus ihnen.

688. N. ARVEN- Der Stengel kurz, ausgesperrt, gestreift und haarig. Die Blätter viel-
sis.
Akker Nigelle. spaltig, die Abschnitte gleichbreit, lanzettförmig. Die blassblauen Blumen ohne Hüllen. Die Saamen-

kapsel kreuselförmig und lang geschnabelt.

Wohnort. Unter der Saat, z. B. bei Hochstadt, Bischofsheim, Mühlheim bis Steinheim, Fechenheim und Offenbach, um Frankfurt, Darmstadt, Buseck etc.

Blüthezeit. Juli, ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Kann völlig wie die vorhergehende Art benutzt werden.

IV. ORDNUNG.

POLYGYNIA. Mit vielen Staubwegen.

CCLIX. THALICTRUM.

Wiesenraute.

689. T. MINUS. Der Stengel gestreift und glatt.
Kleine Wiesenraute. Die Blätter dreifach gefiedert, von einanderstehend; die Blättchen herzförmig, rundlich, tief dreilappig, und an den obern Stammblättern hinten eyrund, und vornen spizzig dreilappig oder dreispaltig, am Rande gefärbt. Die kleinen, abwärtshängenden, gelblichgrünen Blumen mit rothen oder grünen Streifen, deren

Blumenkronen vierblättrig und abfallend sind, haben nackte und haarförmige Blumenstiele, und bilden eine ausgebreitete und ästige Rispe. Der Fruchtknoten sind 4 - 6.

Wohnort. Auf Wiesen und Triften, z. B. bei Hanau im Neuhoferwald; vor Klein-Steinheim und bei der Rumpenheimer Ueberfahrt; bei Ginheim, Offenbach, Oberrad etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Das Vieh frisst sie. Die Blumen liefern den Bienen etwas Honig. Die ganze Pflanze ist zum Gelbfärben dienlich.

690. T. ANGUSTIFOLIUM.
Schmalblättrige Wiesenraute.

Der Stengel ekkig, gestreift und glatt. Die Blätter doppelt gefiedert; die Blättchen glattrandig, dreitheilig und einfach, lanzettförmig, gleichbreit, am Rande zurückgerollt, oben hellglänzend, unten blasser. Die kleinen gelblichen Blumen, deren Blumenkronen vierblättrig sind, bilden eine aufrechtstehende, ästige, nackte Rispe. Der Fruchtknoten sind 7 - 9.

Wohnort. Hinter dem Frankfurter Forsthaus links dem Schwengelsbrunnen, nach dem hölzernen Kreuz hin; in den trocknen Waldwiesen bei Arheilgen.

Blüthezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Gewiß wie die vorige Art zu benützen.

691. T. FLA-
VUM.

*Gelbe Wiesen-
raute.*

Der Stengel blätterig, ekkig, gefurcht und glatt. Die Blätter doppelt gefiedert; die Blättchen keilförmig, meistens spizzig dreilappig, stumpf, aderig, runzlich, unten mit hervorragenden Nerven und nezzförmigen Adern versehen. Die gelben, aufrechtstehenden Blumen, deren Blumenkronen vierblättrig sind, bilden eine dichte aufrechtstehende Rispe. Der Fruchtknoten sind viele.

Wohnort. Auf Wiesen vor dem alten Wald bei Hanau; auf Wiesen nicht weit von Wiseck.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

Nutzen.

Das Vieh frisst diese Pflanze sehr gerne und aus ihren Blumen holen die Bienen viel Honig. Wurzel, Blätter und Stengel sind zum Gelbfärben sehr gut; mit Salmiak wird die Farbe blass, mit Weinsteinöhl orangefarbig; Alaun vermehrt den Glanz der Farbe und Alaun mit Weinstein ihre Dauerhaftigkeit.

CCLX. CLEMATIS, Waldrebe.

*) Mit kletterndem Stengel.

692. C. VITICELLA.
Blaue Waldrebe

Die Blätter theils einfach, theils doppelt zusammengesetzt, die Blättchen theils eyrund, theils in Lappen zertheilt, alle glattrandig, das Endblättchen mit einem kleinen Stachel versehen. Die Blumen blau; die Blumenblätter keilförmig. Die Saamen endigen sich in eine kurze, krumme, nakkende Spitze.

Wohnort.

Im Hage bei Giesen an der Bleiche am Launsbacher Weg; im Gebüsche am Buchrainweiher bei Offenbach unter C. Vitalba.

Blüthezeit.

September. ‡

2. Th. T

Fruchtreife. November.

Nutzen.

Kein Gewächs schikt sich wegen seiner prächtigen Blumen besser zu Lauben als dieses, zudem da es die heftigste Kälte ertragen kann. In unsern Gärten wo es zur Bekleidung von Lauben, Gartensitzen und Mauern gezogen wird, findet es sich auch einfach und gefüllt mit purpurrothen Blumen. Seine Vermehrung geschieht durch Saamen, Ableger, zertheilen der Wurzel und ablösen der Wurzelsprossen.

693. C. VITAL-

BA.

Gemeine

Waldrebe.

Die Blätter gefiedert; die Blättern herzförmig eyrund, entweder gekerbt, oder eingeschnitten, oder glattrandig. Die Blattstiele und Blüthenrispen kletternd. Die Rispenäste an der Basis von einfachen herzförmigen Blättern unterstützt. Die Blumen graulichweiss; die Blumenblätter lederartig, auf beiden Seiten filzig. Die Staubfäden gegen die Spitze zu breiter. Der Fruchtboden kugelförmig. Die Schwänze der Saamen federartig, seidenartig und lang.

Wohnort. An Zäunen und in Gebüsch, z. B. bei Hanau im Steinheimergrund; bei Hochstadt, bei Bischofsheim, vor der Lohe, bei Nauheim, Vilbel, Offenbach, Bergen, Seckbach, Berkersheim, um Frankfurt, Schiffenberg, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni bis August. ‡

Fruchtreife. Oktober, November.

Nutzen. Das ganze Gewächs hat einen scharfbrennenden Geschmakk. Nach Vicat und Sauvages werden die jungen Wurzelsprossen in Frankreich als Salat gegessen. Das harte, feste, gelbliche, wohlriechende Holz, kann zu eingelegerter Arbeit, und Blätter und Zweige zur Färberei gebraucht werden; letztere können auch statt der Weiden zum Binden, so wie auch zu kleinen Fassreifen dienen. Aus den Saamenschwänzen kann man Papier machen. In unsern Gärten dient dieser Strauch zu Bekleidungen; seine Vermehrung ist wie bei der vorigen Art.

694. C. FLAM-
MULA.

*Brennende
Waldrebe.*

Die Blätter gefiedert; die Blättchen eyförmig, zugespitzt, entweder eingeschnitten, oder gekerbt, oder

glattrandig, oft dreilappig. Die Blattstiele und Blütherispen kletternd: letztere weitläufig und ihre Aeste von schmallanzettformigen Dekkblättchen unterstützt. Die Blumen weiss, mit Linien bezeichnet; die Blumenblätter lanzettförmig, dreinerig, auf beiden Seiten glatt. Die Saamen federartig und lang.

Wohnort. Im Licherwald; auf Staufenberg; bei Kranichstein in der Fasanerie nahe bei Darmstadt; im Bessungerwald in der Nähe des Herrgottsbrunnen.

Blüthezeit. Juli, August. 2

Fruchtreife. Oktober, November.

Nutzen. Diese Waldrebe besitzt einen äusserst brennenden Saft; ihre zähen Reben sind gut zu Bindweiden zu gebrauchen, und aus den dicken Stengeln kann man Stöcke machen, welche denen von spanischem Rohr nahe kommen.

**) Mit aufrechtem Stengel.

695. C. ERECTA. Die Blätter gefiedert; die Blättchen eylanzettförmig und ganz glattrandig. Die weissen Blumen vier und
Aufrechte
Waldrebe.

fünfblättrig. Die Saamen herzförmig rundlich, mit einem langen, zurückgebogenen, federartigen Schwanze.

Wohnort. Auf trocknen Wiesen disseits Gross-Steinheim.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Als Zierblume ist sie zu empfehlen sie besitzt einen äusserst scharfen Saft. Ihre Vermehrung geschieht durch Zertheilung und Saamen.

CCLXI. PULSATILLA.

Küchenschelle.

696. P. VERNALIS *Borckh.*
Frühlings Kü-
chenschelle.

Die Blätter gefiedert, glänzend und glatt; die Fiederblättchen am Grunde schmaler, eingeschnitten lappig; die obersten hüllenförmig. Die etwas abhängende Blume stehet einzeln und hat weisse, eylanzettförmige, stumpfe, aussen purpurröthliche, zottige Blumenblätter.

Anemone vernalis Linn.

Wohnort. Auf einem trocknen Hügel im Besungerwald ohnweit der Papiermühle;

in einem sehr trocknen Gebirgswalde bei
Umstadt. (Borckh.)

Blüthezeit. März — Mai. 2

Fruchtreife. Mai, Juni.

Nutzen. Sie verdient als Zierblume gezogen zu
werden.

697. P. VULGA-
RIS Borckh.
Gemeine Kü-
chenschelle.

Die Blätter doppelt gefiedert und
zottig; die Fiederblättchen gleich-
breit; die obersten hüllenförmig.
Die zuerst purpurviolettfarbene, her-
nach hellblaue, meistens aufrechte
Blume, neigt sich gegen das Ende
der Blüthezeit etwas auf die Seite;
die Blumenblätter elliptisch lanzett-
förmig, zottig, an der Spitze gerade,
nach der Blüthezeit nicht selten zu-
rückgekrümmt.

Anemone Pulsatilla Linn.

Wohnort. Auf trocknen und sonnigen Hügeln,
z. B. bei dem Rückinger Geleitshaus;
im Wald am Weg bei dem Kohlbrunnen;
am Wilhelmsbad bei dem Caroussel;
auf den kalkigen Anhöhen der Biberer
Mark bei Offenbach; auf dem Lerchen-
berg; zwischen Offenbach und Ysenburg

im Wald; bei Niederklee; zwischen Arheilgen und Langen im Walde etc.

Blüthezeit. März, April. 24

Fruchtreife. Mai, Juni.

Nutzen. Von den Schaafen und Ziegen wird diese Pflanze gefressen und aus ihren Blumen sammeln die Bienen Wachs und Honig. Sie hat giftige Eigenschaften und zieht Blasen. In alten Geschwüren bei dem Vieh sollen die Blumen gute Dienste leisten. Mit den Blättern und Blumen kann man grün färben und aus dem Saft der letzteren eine grüne Tinte machen; in Schwaben färbt man mit den Blumen die Ostereyer grün. Als Zierblume ist sie zu empfehlen. War officinell.

698. P. PRA-
TENSIS Borckh.
Wiesen Kü-
chenschelle.

Die Blätter doppelt gefiedert und zottig: die letzten Stücke an der Spitze gezähnt; die obersten hüllenförmig. Die Blume doppelt kleiner als bei der vorigen Art, nikkend, schwarzbraun, aussen sehr zottig; die Blumenblätter an der Spitze zurückgeschlagen, vor dem Aufblühen sich zusammenneigend.

Anemone pratensis Linn.

Wohnort. Auf sehr trocknen Anhöhen in der Mark ohnweit Gundershausen, (Borckh.)

Blüthezeit. März — Mai. 24

Fruchtreife. Mai, Juni.

Nutzen. Von Hirten wird sie wider den Biss giftiger Thiere beim Vieh gebraucht. Sie hat eine besondere heftige Schärfe und ist überhaupt giftartiger als die vorhergehende Art. Kochet man die Blumen mit etwas Farbendistel und Alaun, so erhält man nach Pallas, ein treffliches Grün zur Saftmalerey. Alles Uebri- ge wie bei *P. vulgaris* Sie ist of- fizinell.

CCLXII. ANEMONE. *Anemone*.

699. A. SYLVE-
STRIS.

*Wald Ane-
mone.*

Die Blätter fünftheilig, rauhhaa- rig; die Blättchen eingeschnitten und sägeartig gezähnt. Die weisse, grosse, nakkte, von aussen zottige, nikken- de Blume, stehet einzeln, und hat fünf eyförmige, ganz stumpfe Blu- menblätter. Die Fruchthüllen rund- lich, rauhhaarig.

Wohnort. In Wäldern und auf etwas hoch liegenden trocknen Triften und Angern. Sehr häufig in den Weinbergen zwischen Bischofsheim und Bergen; um Windecken; im Wald hinter Offenbach und Oberrod; im Wald hinter der Sachsenhäuser Landwehr; auf dem Lerchenberg sehr häufig; bei Darmstadt in der Tanne; nicht weit vom Gehaborner Hofe und an der Paleswiese auf sehr trocknen Flächen.

Blüthezeit. Mai, Juni und oft im Herbst zum zweitenmale. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Bemerkung. Oft findet sich eine Spielart dieser Pflanze die in allen ihren Theilen um die Hälfte kleiner ist; welches gewiß eine nur aus Saamen aufgegangene Pflanze, in sehr magerm Boden ist, die nicht als eine besondere Abart verdienet aufgeführt zu werden.

Nutzen. Diese Pflanze verdient ihrer schönen Blumen wegen als Zierblume in unsern Gärten überall aufgenommen zu werden, so wie überhaupt alle Anemonen.

700. A. NEMO-
ROSA.

Busch-Anemone.

Der Stengel hat in der Mitte dreidreifach getheilte, zerrissen zahnige, glatte, gestielte Blätter. Die weisse, von aussen röthliche, nackte, etwas nikkende Blume, stehet einzeln, und hat sechs verkehrt lanzettförmige, stumpfe Blumenblätter. Die Fruchthüllen glatt und spizzig.

Wohnort.

Allenthalben in schattigen etwas feuchten Wäldern und Gebüsch.

Blüthezeit.

März, April. 4

Fruchtreife.

Mai, Juni.

Nutzen.

Diese Pflanze ist sehr scharf, und Menschen und Vieh sehr schädlich, ja fast tödtlich. In Schweden waschen sich zuweilen die Mädchen mit einem über sie abgezogenen Wasser das Gesicht um schön zu werden. Als Zierblume ist sie zu empfehlen, besonders da sie zu den Erstlingen der wieder auflebenden Natur gehört. Sonst war sie offizinell.

701. A. RANUNCULOIDES.

Ranunkelartige Anemone.

Der Stengel hat in der Mitte dreidreitheilige, stumpf gezahnte, kurz gestielte Blätter und ist meistens zwei - oft auch nur ein - oder

dreiblüthig. Die Blumen aufrechtstehend und schöngelb, haben fünf oder sechs eyrunde, stumpfe Blumenblätter. Die Fruchthüllen glatt und spizzig.

Wohnort. In Wäldern und auf denen an sie angrenzenden Wiesen. Im Lambowald bei Hanau und auch hinter dem Kohlbrunnen; äusserst häufig im Lehen und in der Dikke bei Offenbach; auf der Wiese bei der grossen Frankfurter Saustiege; in dem bei Bockenheim gelegenen Wäldchen; im Hangestein bei Giesen; bei Kranichstein in dem Wäldchen zu beiden Seiten des Ruzebachs.

Blüthezeit. April, Mai, 24

Fruchtreife. Juni.

Beobacht. Erscheint der Stengel einblumig, so findet man doch meistens in dem Winkel der Stengelblätter den Anfang einer zweiten Blume, die sich aber nicht immer entwickelt.

Nutzen. Dieser Erstling des Frühlings, verdient seiner schönen Blume wegen ein vorzügliches Plätzchen in unsern Gärten. Er hat einen brennend scharfen

Geschmakk. Nach Kraschenninikow schmieren die Kamtschatkalen mit dem ausgepressten Saft die Spitzen ihrer Pfeile; die Wunden davon, saugt man sie nicht gleich aus, werden baldigst blau, schwellen auf, und sind in zweien Tagen tödtlich; mit dergleichen vergifteten Pfeilen erlegen sie auch die größten Wäldfische.

CCLXIII. HEPATICA. Leberkraut.

702. H. NOBILIS
Moench.

Edles Leber-
kraut.

Die Blätter langgestielt, herzförmig, dreilappig, glatträndig, und unten nebst den Blattsielen zottig. Die Blumen sind langgestielt, blau, bisweilen purpurfarbig oder weiss, in den Gärten gefüllt, und kommen einzeln in Menge aus der Wurzel hervor, noch ehe die Blätter sich gehörig entwickeln.

Anemone Hepatica Linn.

Wohnort.

In Wäldern z. B. am Rande des Waldes ohnweit dem Buchrainweiher bei Ofenbach.

Blüthezeit.

März, April. 24

Fruchtreife.

Juni.

Nutzen.

Die Blumen, welche fast ein ganzes Jahr vorher völlig ausgebildet in der Knospe stecken, öffnen sich sobald das Erdreich aufgethaut ist, und verschaffen dadurch den Bienen sehr frühzeitig Nahrung. Einfach und gefüllt in mancherlei Farbenabänderungen wird sie häufig der Zierde wegen in unsern Gärten gezogen. War officinell.

CCLXIV. ADONIS. *Adonis.*

703. A. AESTIVALIS.
Sommer Adonis.

Die Blätter doppelt gefiedert, vietheilig; die Theile gleichbreit, rundlich, an der Spitze röthlich. Die Blumen mennigfarbig oder weissgelblich, mit schwarz purpurrothen Nägeln, fünf-achtblättrig; die Blumenblätter lanzettförmig. Die Fruchthüllen eyförmig.

Wohnort.

Auf Aekern unter der Saat z. B. bei der Hartig; zwischen Hochstadt und Wachenbuchen; bei Prunigsheim; ohnweit Frankfurt bei der Friedberger Warte; zwischen Windecken und Heldebergen; zwischen Hohenweisel und dem Hausberg; bei Griedel etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. August, September.

Bemerkung. Die *A. autumnalis*, welche Reichard bei der Friedberger Warte will gefunden haben, ist durchaus nichts anders als *A. aestivalis*; erstere haben wir noch nicht bei uns auffinden können.

Nutzen. Sie wird in den Gärten ihrer Schönheit wegen gezogen, wo sie sich durch ihre ausfallende Saamen sehr leicht von selbst wieder fortpflanzt.

CCLXV. FICARIA. Fikarie.

704. F. RANUNCULOIDES Roth.
Ranunkelartige Fikarie.

Die Wurzel aus kleinen, länglichen, zusammengesetzten Knollen zusammengesetzt. Der Stengel niederliegend, glatt. Die Blätter gestielt, herzförmig, ekkig, glänzend, glatt, in der Mitte meistens mit einem schwärzlichen Flekken bezeichnet. Der Blumenstiel einblüthig. Die Blumen gelb.

Wohnort. Allenthalben gemein, an schattigen feuchten Orten.

Blüthezeit. März, April. 4

Fruchtreife. Mai, Juni.

Beobacht. Die Blumen öffnen sich Morgens um 9 Uhr und schliessen sich Abends gegen 5 Uhr.

Nutzen. Die Blätter werden bei uns im Frühjahr, so wie an vielen andern Orten, als Gemüse und Salat gegessen; jung werden sie in England mit Wein, Zucker und Essig eingemacht. Die Blumenknospen mit Essig gekocht, und mit diesem und Gewürzen eingemacht, schmecken den Kapern fast völlig gleich. Die Wurzel ist scharf, vorzüglich am meisten vor dem Ausbruch der Blumen, und erregt auf der Haut Blasen, womit sich bosshafte Bettler, eben so wie mit *Clematis Flammula* bisweilen um Mitleiden zu erregen Geschwüre machen. Durch gewisse Handgriffe sollen die Wurzeln ein Stärkmehl geben. Das Vieh frisst diese Pflanze. Ehedem war sie officinell. Die Blumen geben den Bienen Wachs und Honig, und sind wegen ihrer frühen Erscheinung der Bienenzucht sehr nützlich.

CCLXVI. RANUNCULUS.

Ranunkel.

*) Mit einfachen Blättern.

705. R. FLAM-
MULA.

*Kleiner Ra-
nunkel.*

Der Stengel am Grunde niederliegend, ästig und glatt. Die Blätter elliptisch - lanzettförmig, gestielt, etwas sägeartig gezähnt. Die Blumen gelb.

Wohnort.

Ueberall an nassen Orten, an Bächen, Sümpfen, Teichen, auf nassen Wiesen und Triften.

Blüthezeit.

Mai bis August. 4

Fruchtreife.

August, September.

Bemerkung.

Er raviirt mit ganzen Blättern und auch mit gefüllten Blumen.

Nutzen.

Er gehört zu den schärfern Ranunkelarten, erregt auf der Haut Blasen und hat für das Vieh schädliche Eigenschaften. In Schweden ist er offizinell.

706. R. REP-
TANS.

*Wurzelnder
Ranunkel.*

Der Stengel fadenförmig, kriechend, gegliedert, bei jedem Gliede wurzelnd. Die Blätter gleichbreitlanzettförmig, ganz glattrandig und glatt. Die sehr kleinen Blumen gelb.

Wohnort. Auf feuchtem sandigem Boden bei Hannau vor dem alten Wald; auf feuchten Wiesen bei Offenbach; an der Entenlak beim Frankfurter Forsthaus; bei Arheilgen auf dem Pechbusche, auf der Blechwiese.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

707. R. LINGUA. Der Stengel aufrecht, feinhaarig, ästig, röhrig. Die Blätter lanzettförmig, meistens fusslang, stiellos, nervig, an der mittlern Rippe rinnenförmig, unten feinhaarig, am Grunde scheidenartig, etwas häutig, umfassend, gezähnelt. Die Blumen gross und gelb.

*Grosser Sumpf-
franklin-
kel.*

Wohnort. In Gräben und Sümpfen. In dem kleinen Bach vor dem alten Wald bei Hannau; im Sumpf der beim Hanauer Galgen im Wald liegt; im Ried hinter Dörnigheim nach Bischofsheim; in einem Sumpf wenn man von dem Feldbrunnen hinter Klein - Steinheim nach Gross-Steinheim geht; bei Frankfurt im Mez-

gerbruch und auf der Wiese bei der grossen Saustiege in einem Graben; in stehendem Wasser hinter Bockenheim; auf sumpfigen Wiesen um Rockenburg nach dem Kloster hin; um Darmstadt.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Variirt mit 6, 7, 8 Blumenblättern.

Nutzen. Die Blumen geben den Bienen viel Wachs. Dieser Ranunkel ist äusserst scharf und tötet sogar die Thiere welche ihn fressen; daher es immer rathsam ist, das Vieh nicht in Morästen weiden zu lassen.

**) Mit zerschnittenen und zertheilten Blättern.

708. R. AURICOMUS.

Goldgelber
Ranunkel.

Die Wurzelblätter gestielt, nierenförmig, gekerbt, eingeschnitten; die Stengelblätter stielloos, fingerförmig, gleichbreit, gekerbt. Der Stengel vielblumig. Die Blumen gelb; die Blumenblätter kaum etwas länger als der Kelch. Die Fruchthüllen etwas weichhaarig.

Wohnort.

Allenthalben auf Wiesen, in Gärten, feuchten Weiden, Gebüsch, an Zäunen etc.

Blüthezeit. April, Mai. 24

Fruchtreife. Juni.

Beobacht. Die ersten Blumen im Frühling haben meistens gar keine Blumenblätter, wenigstens fallen sie gleich ab, späterhin haben sie deren 2-3-4. Das honigbehältnissartige Schüppchen ist unten schmaler und oben abgestutzt.

Nutzen. Dieser Ranunkel besitzt so wenig Schärfe, daß er als Gemüse gegessen werden kann. Die Bienen fliegen den Blumen sehr nach. Er ist ein gutes Viehfutter, welches die Milch fett macht, und der Butter eine schöne gelbe Farbe giebt.

709. R. SCELE-
RATUS.

Giftranunkel.

Die Wurzelblätter gestielt, handförmig; die Abschnitte eingeschnitten und stumpf, die obern stiellos, fingerförmig, gleichbreit. Die blassgelben Blumenblätter kürzer als der Blumenboden. Der Fruchtboden länglich.

Wohnort. In Sümpfen und Wassergräben. Zwischen der Hanauer Fasanerie und dem Wilhelmsbad an dem Bach; im Sumpf der bei dem Hanauer Galgen im Wald

liegt; in Gräben bei der Oed ohnweit Frankfurt; im Sumpf auf der Bornheimer Heide; in Gräben vor Bornheim; an feuchten Orten hinter Ilbenstadt; auf der Vilbeler Viehtrift bei Massenheim; in Gräben um Giesen; bei Arheilgen; auf dem Ziegelbusche bei Darmstadt etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. Juni, Juli.

Nutzen. Diese Pflanze enthält ein ungemein scharfes Gift, besonders der Fruchtknoten. Sie erregt Entzündungen, Brand, Verzuckungen der Muskeln, Irreden, ein unwillkührliches, sardonisches Lachen und zuletzt den Tod. Einige haben sie für die *Sardoa* des Sallustius gehalten. Oehl und warmes Wasser sind die besten Gegenmittel. Getrocknet soll sie das Vieh ohne Schaden genießen, aber frisch genossen, verursacht sie demselben das sogenannte kalte Feuer, und fast immer den Tod. Boshafte Bettler bedienen sich ihrer oft zur Erzeugung scheusslicher Geschwüre, um Mitleiden zu erregen. Die Wurzel ist milde und soll nach Kraft als Salat, oder in Suppen, oder als Gemüse ge-

noßsen werden können. Durch das Kochen sollen sogar Blätter und Blumen ihre Schärfe verlieren, so daß sie nach Murray von den Hirten in Morlachien, mit gehörigem Gewürze bereitet, als Gemüse gegessen werden. Wir wollen sie zur Speise nicht empfehlen, und rathen auch, sie auf Weiden sorgfältig auszurotten.

710. R. ACONITIFOLIUS.
Sturmhutblätteriger Ranunkel.

Der Stengel aufrecht, ohngefähr 2 Fuss hoch, ästig. Die Blätter fünf-fingerförmig, bis an den Blattstiel getheilt, glatt und dikklich; die Blättchen lanzettförmig, zerschnitten, sägeartig gezähnt; die Blätter am Grunde der Blüthenstielchen lanzettförmig. Die Blumen weiss, nur halb so gross als bei der folgenden Art.

Wohnort.

In Gebirgs-Waldungen hinter Oberursel. (Reich.)

Blüthezeit.

Mai — Juli. 2

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

In unsern Gärten prangt die gefüllte Spielart auf dem Rabatten als eine Zierblume.

711. R. PLATANIFOLIUS.

*Platanusblät-
teriger Ra-
nunkel.*

Der Stengel aufrecht, höher als bei der vorhergehenden Art, ästig. Die Blätter handförmig, fünfspaltig, nicht dicke und rauhhhaarig; die Blättchen zerschnitten, tief und scharf sägear-
tig gezahnt; die Blätter am Grunde der Blütenstielchen gleichbreit. Die Blütenstiele länger und schwächer als bei *R. aconitifol.* Die Blumen weiss und gross.

Wohnort.

In schattigen Gebirgswäldern, z. B. um den Falkensteiner Schlossberg; im Gebüsche bei der Heidetränke hinter Homburg im Gebirge; am Fahrweg im Wald zwischen Herchenhayn und Ullrichstein; bei Adolphsekk im Wald ohnweit Langenschwalbach.

Blütezeit.

Mai — Juli. 24

Fruchtreife.

August, September.

Bemerkung.

Was Reichard hinter Oberursel fand, ist sicher, wie wir aus seinem herbario
ersehen, der wahre *R. aconitifolius*,
alles aber was wir ohngefähr in derselben
Gegend fanden, ist *R. platanifolius*.

Nutzen.

Er verdient als Zierblume eine Stelle
in unsern Gärten,

712. R. BULBOSUS.

Knolliger Rannunkel.

Die Wurzel knollig. Der Stengel aufrecht, ekkig, zottig, zweitheilig, vielblumig. Die Blätter aus drei Blättchen zusammengesetzt, die wieder dreitheilig, eingeschnitten gezähnt und haarig sind. Die Blumenstiele einblumig, ekkig, gefurcht. Die Kelche aussen haarig, inwendig gelb, über der Mitte zurückgeschlagen. Die Blumen gelb. Das honigtragende Schüppchen verkehrt herzförmig und flach.

Wohnort. Sehr gemein auf Wiesen und Triften,

Blüthezeit. Mai bis Juli. 4

Fruchtreife. August.

Nutzen. Jung ist diese Pflanze in allen ihren Theilen sehr scharf, aber in der Blüthezeit wird sie milder, ausgenommen der Wurzelknolle, welcher in jedem Alter scharf bleibt und in der Blüthezeit noch schärfer wird, hingegen die Wurzelfasern, sind bloß vor dem Blühen scharf. Durch das Trocknen und Kochen soll die Wurzel ihre Schärfe verlieren und dann wie Pennant sagt, in Schottland

gegessen werden. Die Schweine fressen diese Pflanze nicht. Zum Färben verspricht sie einigen Gebrauch. Diese und *R. repens* erscheinen in unsern Gärten öfters mit gefüllten Blumen.

713. *R. PHILO-*
NOTIS Ehrh.

Rauhhaariger
Ranunkel.

Die Wurzel büschelförmig. Die ganze Pflanze zottig. Die Blätter dreifach, haben dreilappige Blättchen, deren Lappen gekerbt eingeschnitten sind, und sich an den Spizzen mit einem weissen Punkte endigen. Die Blumenstiele gefurcht. Die Kelche zurückgeschlagen und nebst den Blumen gelb. Die Fruchthüllen zusammengedrückt und langzugespitzt.

Ranunculus Sardous Roth. R. hirsutus Curtis.

Wohnort.

An Aekken zwischen der Lambo-
brücke und dem Waldesel bei Hanau;
an Akkerrainen bei dem Goldbach ohn-
weit dem Sandhof bei Frankfurt; an
feuchten Orten bei Darmstadt.

Blüthezeit.

Juni, Juli. ☉ — ♂

Fruchtreife.

August.

Bemerkung.

Er besitzt eine ausserordentliche Schärfe.

714. R. REPENS. Die Wurzelsprossen kriechend. Der
Kriechender Stengel meistens liegend. Die Blät-
Ranunkel. ter dreispaltig, wovon das mittlere
länger als die zur Seiten. Die Kelche
auseinanderstehend, haarig, grünlich,
am Rande gelb. Die Blumen gelb. Das
honigtragende Schüppchen schmal,
auf der einen Seite erhaben, und auf
der andern ausgehöhlt. Die Blumen-
stiele gefurcht.

Wohnort. Gemein auf Aekern, an Wegen, in
Obstgärten etc. In Chaussee Gräben vor
dem Neuenthor zu Frankfurt mit ge-
füllten Blumen.

Blüthezeit. Mai, Juni. 24

Fruchtreife. Juli, August.

Beobacht. Beim Regen sind die Blumen geschlos-
sen, jedoch ohne überzuhängen.

Nutzen. Er hat keine nachtheilige Schärfe und
kann nach Schrank als ein Gemüse
gegessen werden. Dem Vieh ist er ein
gufes milchvermehrendes Futter.

715. R. POLYAN- Der Stengel aufrecht, haarig, ge-
THEMOS. furcht, schwach, am Grunde einge-
Vielblumiger bogen. Die Blätter alle fingerförmig,
Ranunkel.

haarig und geflekt; die Abschnitte halbsiebenspaltig, gleichbreit, spitzig, gezähnt. Die Blumenstiele lang, gefurcht, eckig, einblumig. Die Kelche etwas abstehend, grünlichgelb und aussen haarig. Die Blumen gelb.

Wohnort. Auf Bergen in Wäldern und Wiesen, z. B. hinter Oberursel in Wäldern.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Beobacht. Diese Pflanze hat keine sonderliche Schärfe. Bei dem Regen hängen ihre Blumen über, aber ohne geschlossen zu seyn.

716. R. ACRIS.
Scharfer Rannkel.

Der Stengel aufrecht, nach oben zu weniger rauh, vielblumig. Die Blätter alle fingerförmig, an der Wurzel dreitheilig, mit verkehrt herzförmigen, eingeschnittenen Abschnitten, an dem Stengel dreitheilig, mit gleichbreiten, gezähnten Abschnitten. Die Blumenstiele rund und feinhaarig. Die gelben Blumen einfach

und gefüllt. Das honigtragende Schüppchen länglich und abgestutzt.

Wohnort. Gemein auf Wiesen, Triften und in Obstgärten. Mit gefüllten Blumen im Bruchköbler Hügwald bei Hanau.

Blüthezeit. Mai, Juni. 2

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Er ist äusserst scharf und seine vorzügliche Schärfe sitzt im Fruchtknoten; kultivirt wird er milde und soll dann sogar als Gemüse gegessen werden können. Auf den Wiesen rottet man ihn aus, weil man das oft unerklärte Viehsterben ihm zuschreibt. Frisch frisst ihn das Vieh nicht, trocknen genießt es aber denselben ohne Widerwillen und Nachtheil. Die Bienen besuchen fleissig die Blumen. Für die Färberey verspricht er einigen Nutzen. Ausser Oehl und warme Wasser, mildern auch noch die Schärfen der Ranunkelarten, die zerquetschten Blätter und der ausgepresste Saft des Sauerampfers, so wie auch die unreifen Johannisbeeren.

717. R. LANUGINOSUS.

Wolliger Ranunkel.

Der Stengel aufrecht, vielblumig und sammt den Blattstielen rauhzottig. Die Blätter dreispaltig, lappig, gekerbt und sammetartig, am Winkel einen blassen, sich dikker anführenden Flekken. Die Blumenstiele rund und zerstreut. Die Kelche ausgebreitet und rauhzottig. Die Blumen gelb.

Wohnort.

In feuchten schattigen Wäldern. Bei Hanau im Forst, der Fasanerie und dem Mittelbacher Wald; im Wald bei Offenbach das Lehen genannt; im Butzbacherwald; um Darmstadt in Wäldern etc.

Blüthezeit.

Juni bis August. 4

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Er hat keine Schärfe und kann jung als Gemüse genossen werden; das Vieh frisst ihn.

718. R. ARVENSIS.

Akker Ranunkel.

Die Blätter dreitheilig, die Lappen langgessielt, zwei-dreitheilig, scharf eingeschnitten. Die Blumen klein und blassgelb. Das honigtragende Schüppchen verkehrt herzförmig und ausgerandet. Die Fruchthüllen stehen

kreisförmig, sind halbmondförmig, zusammengedrückt, auf beiden Seiten stachelig, und endigen sich mit einem gekrümmten weichen Stachel.

Wohnort. Allenthalben auf Aekkern und unter der Saat.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Uns keiner bekannt. Blätter und Blumen sind sehr scharf, und erregen gleich den mehrsten Ranunkelarten Blasen, die heftigsten Darmschmerzen, und wohl auch blutende Milch bei den Kühen.

719. R. HEDE-
RACEUS.

*Epheublät-
tiger Ranun-
kel.*

Der kriechende Stengel wurzelnd.

Die Blätter gestielt, herzförmig, rundlich, drei - fünfflappig, sehr glatt und glatträndig. Die Blumen weiss oder blassgelb, mit doppelt längern Blumenblättern als der Kelch, haben statt dem Schüppchen nur eine honigtragende Höhle. Der Staubfäden fünf - zehn.

Wohnort. Reine Quellen und Bäche. Bei der Heidetränke hinter Homburg; an seichten Bächen hinter Oberursel; in der En-

tenlak hinter Niederrod; an mehreren Orten um Darmstadt; in den Quellleitungen nahe bei der Taubentränk und hinter dem Hangestein bei Giesen.

Blüthezeit. Juni. Juli. 24

Fruchtreife. August, September.

720. R. HETERO-
ROPHYLLUS
Leys.

Verschieden-
blättriger
Ranunkel.

Die Blätter unter dem Wasser haarförmig, die über dem Wasser nierenförmig, handförmig - fünflappig. Die Blumen weiss.

Ranunculus aquatilis L. Linn.

R. diversifolius Schrank.

Wohnort.

In Sümpfen, seichten Bächen, Wassergräben und Teichen. Bei Hanau in einem Bach vor dem alten Wald; im Bruchköblerwald in einem Bächlein; hinter dem Kinzigheimerhof bei Bruchköbel; bei Offenbach, Seckbach, in der Entenlak bei Niederrod, um Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. 24

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen.

Nach Linne ist dieser und die folgenden Arten den Aalen sehr angenehm, und wird daher in Schweden Ahlnato genannt.

721. R. DIVARIGATUS Schrank. Die Blätter alle haarförmig, mit auseinander- einandergesperrten Stükken, welche gesperrter Ra- einen runden Kreis bilden. Die kleinen Blumen weiss.

Ranunculus aquatilis γ . Linn.

Wohnort. In Sümpfen, Gräben und Teichen. Bei Hanau im Bruchköbler Wald in einem Bächlein; vor Rödelheim in einem stehenden Wasser; im Rüstersee vor dem Bockenheimerthor zu Frankfurt; in stillstehenden Wassern um Giesen, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Er ist ein sehr gutes Viehfutter.

722. R. PEUCEDANIFOLIUS Reich. Die Blätter alle haarförmig, mit sehr langen, einander gleichlaufenden Stükken. Das honigbehältnissartige Grübchen mit einem Ring umgeben. Die Blumen weiss.

Ranunculus aquatilis δ . Linn.

Wohnort. In mehr fliessenden als stillstehenden Wassern. Bei Hanau in der Kinzig in dem Lambowald und bei der Kinzigbrücke häufig; in der Gernsprenz bei

Babenhausen; im Mayn an mehreren Orten; häufig in der Lahn bei Giesen; um Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Ein treffliches Viehfutter.

CCLXVII. TROLLIUS. Trollblume.

723. T. EURO-
PAEUS.

*Europaeische
Trollblume.*

Der Stengel aufrecht, selten ästig, rund, glatt. Die Wurzelblätter stehen kreisförmig, sind langgestielt, fünftheilig, dreifach eingeschnitten gezähnt, glänzend, glatt; die Stengelblätter abwechselnd und fast ungestielt. Die Blumen schön gelb, kugelförmig, nackt, haben mehrere in zwei Reihen geordnete, verkehrt eyrunde, stumpfe, eingebogene, mit den Spitzen sich zusammenneigende Blumenblätter, und Afterkronblätter von gleicher Länge der Staubfäden.

Wohnort. Häufig auf allen Wiesen des Oberwaldes von Ullrichstein bis Herchenhayn.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Das Vieh frisst diese Pflanze gerne. Sie, verdiente in allen unsern Gärten als Zierblume zu prangen! Aus den Blumen erhalten die Bienen Wachs und Honig.

CCLXVIII. HELLEBORUS.

Niesswurz.

724. H. VIRIDIS.

Grüne Niesswurz.

Der Stengel zweitheilig, die Aeste blätterig und zweiblüthig. Die Wurzelblätter langgestielt, fingerförmig, glatt, hart, die Blättchen lanzettförmig und sägeartig gezahnt, an der Seite handförmig 3 - 4 theilig, am Grunde schmaler, die Stengelblätter fast ungestielt, 3 - 4 theilig, den Ast am Grunde scheidenartig umfassend. Die grünen, nikkenden Blumen haben meistens 3, selten 4 und höchst selten 5 Staubwege.

Wohnort. Im Walde bei Kranichstein, in der sogenannten Plantage.

Blüthezeit. Mai, Juni. 24

Fruchtreife. Juli, August.

2. Th.

X

Nutzen.

Man trifft sie häufig bei uns als Zierblume in den Gärten. Von den Hirten wird die Wurzel statt eines Haarseils bei dem Vieh, und auch in manchen Krankheiten derselben innerlich gebraucht. Die Wurzel ist officinell. Die ganze Pflanze ist sehr giftig.

725. H. FOETIDUS.

Stinkende

Niesswurz.

Der Stengel vielblüthig und blätterig. Die Wurzelblätter fehlen fast ganz. Die Stengelblätter fussförmig, die Blättchen, deren meistens 9-10, schmal lanzettförmig, sägeartig gezähnt; die Astblätter eylanzettförmig, ungestielt, umfassend, gefärbt, ganz glatträndig. Die Blumen grün.

Wohnort.

In Gebirgswaldungen zwischen Langenschwalbach und Adolphsekk sehr häufig.

Blüthezeit.

April, Mai ♂ — 4

Fruchtreife.

Juli, August.

Nutzen.

Sie ist officinell, wird als Arznei bei dem Vieh gebraucht und in unsern Gärten als Zierblume gezogen. Die ganze Pflanze ist sehr giftig. Die Einwohner im Delphinat gebrauchen sie als ein Ge-

gengift, wider die weisse Niesswurz bei ihren Schaafen. Den Blumen gehen die Bienen sehr nach.

CCLXIX. CALTHA. Dotterblume.

726. C. PALU-
STRIS.

*Sumpfdotter-
blume.*

Der Stengel am Grunde meistens niederliegend, dann aufrecht, ästig, glatt. Die Blätter gestielt, nierenförmig, gekerbt, glänzend und glatt. Die Blumenstiele einblumig, tragen grosse gelbe Blumen.

Wohnort. Fast allenthalben auf feuchten und sumpfigen Wiesen.

Blüthezeit. April, Mai. 2

Fruchtreife. Juni, Juli.

Nutzen. Obgleich diese Pflanze bitter und scharf ist, so wird sie doch von dem Vieh ohne Machtheil gefressen. Die Bienen holen viel Honig aus ihr. Nach Kalm wird sie in den nördlichen Theil Europens im Nothfall zum Brodbakken gebraucht. Aus dem Saft der Blumen, wenn man sie mit Alaun abkocht, erhält man eine gelbe Farbe,

die zum Färben eben so brauchbar ist, als die daraus bereitete gelbe Tinte. Die Blumenknospen können wie Kapern eingemacht und eben so gegessen werden. In den Gärten findet sie sich mit gefüllten Blumen.

VIERZEHNTE KLASSE.

DIDYNAMIA. Mit 2 langen und 2 kurzen Staubfäden.

I. ORDNUNG.

PERICARPIFERAE. Mit Fruchthüllen (*Gymnospermia* L.)

*) Die Kelche fünfzählig.

CCLXXXIII. Der Kelch fünfseitig, fünfzählig. Die
LEONURUS. Blumenkrone rachenförmig, die Ober-
Löwen- lippe ganz gewölbt, die untere sehr
schwanz. klein, dreitheilig, am Rande zurückge-
 bogen. Die Staubbeutel mit kleinen,
 erhabenen, kugeligen, glänzenden Drü-
 sen besetzt. Die Fruchthüllen länglich,
 dreiseitig, gerandet, an der Spitze mit
 kurzen steifen Haaren besetzt.

CCLXXV. Der Kelch walzenförmig, fünfzählig,
GLECOMA. 15 streifig. Die Blumenkrone rachen-
Gundelrebe. förmig, die Oberlippe zweispaltig, ge-
 wölbt, die untere dreispaltig. Die Staub-
 beutel (vor Ausstreuerung des Blumen-
 staubs,) liegen paarweise in Form eines
 Kreuzes zusammen. Die Fruchthüllen
 rundlich und eben.

CCLXXIV. Der Kelch röhrig, fünfzählig. Die
MENTHA. Blumenkrone röhrig, fast gleichförmig
Münze. vierspaltig, nur der obere Abschnitt
meistens breiter und an der Spitze aus-
gerandet. Die Staubfäden, wovon 2 nur
etwas kürzer, sind aufrecht und stehen
von einander ab. Die Fruchthüllen
rundlich.

CCLXXI. Der Kelch röhrig, fünfzählig. Die
TEUCRUM. Blumenkrone rachenförmig, die Ober-
Gamander. lippe bis über den Grund in zwei Theile
getheilt und auseinandergesperrt, die
Unterlippe dreitheilig, wovon der mitt-
lere Abschnitt grösser, zugerundet und
ausgehöhlt ist. Die Fruchthüllen eben
und eckig.

CCLXX. Der Kelch fünfzählig. Die Blumen-
AJUGA. krone rachenförmig, von aussen und
Günsel. innen haarig, die Oberlippe sehr klein,
zweizählig, kürzer als die Staubfäden,
die Unterlippe dreitheilig, der grosse
mittlere Abschnitt verkehrt herzförmig.
Die Staubfäden behaart. Die Frucht-
hüllen länglich und rundlich.

CCLXXIX. Die fünf Zähne des Kelchs endigen
BETONICA. sich in Grannen. Die Blumenkrone ra-
Betonie. chenförmig, die Röhre walzenförmig und

gekrümmt, die Oberlippe ungetheilt, etwas flach, aufsteigend, die Unterlippe dreitheilig, abstehend, die Seitenabschnitte zurückgeschlagen. Die Staubfäden von der Länge des Schlunds. Die Fruchthüllen ekkig und eben.

CCLXXVI.
LAMIUM.
Taubnessel.

Der glockenförmige Kelch hat fünf ziemlich gleiche Zähne, welche sich in Grannen endigen. Die rachenförmige Blumenkrone, hat einen aufgeblasenen Schlund, welcher auf beiden Seiten mit einem zurückgebogenen borstenförmigen Zähnchen versehen ist, die Oberlippe ist gewölbt und ungetheilt, die kleinere Unterlippe zweilappig und zurückgebogen. Die Staubbeutel länglich und rauhhaarig. Die Fruchthüllen dreiseitig, an beiden Enden abgestutzt.

CCLXXVII.
GALEOPSIS.
Hohlzahn.

Die fünf Zähne des Kelchs endigen sich in lange Grannen. Der Schlund der rachenförmigen Blumenkrone am Grunde der Unterlippe mit zwei erhabenen, unten hohlen, stumpfen Hörnchen versehen; die Oberlippe gewölbt, gering gekerbt, die Unterlippe dreispaltig, ihre Seitenabschnitte rundlich, etwas nieder-

gebogen, der mittlere gekerbt, und an der Spitze eingeschnitten. Die Fruchthüllen dreiseitig und eben.

CCLXXVII. Der Kelch glockenförmig, fünfzählig.
GALEOBDO- Die Blumenkrone rachenförmig, mit
LON. zahnlosem Schlund, die Oberlippe ge-
Waldnessel. wölbt, glatträndig, die Unterlippe 3 thei-
 lig. mit ganzen Abschnitten, wovon der
 mittlere der längste ist. Die Fruchthül-
 len dreiseitig.

CCLXXX. Der Kelch röhrig, hat fünf spizzige,
STACHYS. pfriemenförmige Zähnnchen. Die Röhre
Stachys, der rachenförmigen Blumenkrone sehr
 kurz, der längliche Rachen am Grunde
 höckerig, die Oberlippe gewölbt, die
 Unterlippe dreitheilig, an den Seiten zu-
 rückgeschlagen, der grössere mittlere
 Abschnitt ausgerändet und zurückge-
 schlagen. Die verwelkten Staubfäden
 biegen sich nach den Seiten des Schlun-
 des. Die Fruchthüllen rundlich, ekkig.

CCLXXIII. Der Kelch walzenförmig, spizz-fünf-
NEPETA. zählig. Die Blumenkrone rachenför-
Katzenminze. mig, die Oberlippe aufrecht, ausgerän-
 det, etwas kürzer als die dreispaltige
 Unterlippe, deren Seitenabschnitte sehr

kurz und zurückgeschlagen und der grössere mittlere, niedergebogen, ausgehöhlt und gering gekerbt ist. Die Staubbeutel stehen dicht beisammen, nach dem Abblühen aber zurückgeschlagen. Die Fruchthüllen länglich, eben, mit einem weissen nabelförmigen Flecken bezeichnet.

CCLXXII.
SATUREJA.
Saturey.

Der Kelch glockenförmig, fünfzählig. Die Blumenkrone rachenförmig, mit walzenförmiger am Schlunde erweiterter Röhre, die Oberlippe aufrecht, an der Spitze scharf eingeschnitten, die Unterlippe dreitheilig, die Abschnitte fast einander gleich, der mittlere ausgerandet. Die Staubfäden stehen von einander entfernt, die Staubbeutel sind aber zusammen geneigt. Der Staubweg hat 2 borstenförmige Narben. Die Fruchthüllen eben.

CCLXXXI.
BALLOTA.
Ballote.

Der Kelch glockenförmig, fünfzählig, fünfeckig, zehnstreifig, und an der Mündung gefaltet. Die Blumenkrone rachenförmig, die Oberlippe gewölbt, eiförmig und gekerbt, der mittlere Abschnitt der dreitheiligen Unterlippe flach und

ausgerändert. Die Fruchthüllen eyförmig, dreiseitig, eben.

CCLXXXII.
MARRU-
BIUM.
Andorn.

Der Kelch walzenförmig, zehnzählig, zehnstreifig, spröde. Die Blumenkrone rachenförmig, die Oberlippe aufrecht, gleichbreit und zweispaltig, der mittlere Abschnitt der dreispaltigen Unterlippe gekerbt. Die Staubfäden in der Röhre verborgen. Die Fruchthüllen länglich und eben.

**) Die Kelche zweilippig.

CCXCI.
SCUTELLA-
RIA.
Schildkraut.

Der Kelch sehr kurz, an der Mündung fast ungetheilt, und nach der Blüthe mit einem helmförmigen Dekkel geschlossen. Die sehr kurze Röhre der rachenförmigen Blumenkrone am Grunde zurückgebogen, die Oberlippe zusammengedrückt, die Unterlippe abstehend und ausgerändert. Die Fruchthüllen etwas runzlich und rundlich.

CCLXXXVII.
THYMUS.
Thymian.

Der Kelch zehnstreifig, die Oberlippe drei - die Unterlippe zweizählig, der Schlund durch zottige Haare geschlossen. Die Blumenkrone rachenförmig, die Oberlippe aufrecht und ausgerändert, der mittlere Abschnitt der dreitheiligen Un-

lippe ganz oder ausgerändet. Die Staubfäden gekrümmt und von einander stehend. Die Fruchthüllen länglich und eben.

CCXCII.
PRUNELLA.
Prunelle.

Der Kelch fast glockenförmig, die Oberlippe abgestutzt und seicht dreizählig, die Unterlippe tief dreispaltig. Die Blumenkrone rachenförmig, die Oberlippe gewölbt und ganz, der mittlere Abschnitt der dreitheiligen Unterlippe ausgerändet und gezähnt. Die Staubfäden zweigablig, tragen an der untern Spitze den Staubbeutel. Die Fruchthüllen länglich-eyrund, gestreift und glatt.

CCLXXXV.
ORIGANUM.
Dosten.

Der Kelch walzenförmig, fünfzählig, die Zähne gleich, mit Dekkblättern besetzt, nach der Blüthe durch zottige Haare geschlossen. Die Blumenkrone rachenförmig, mit offnem Schlund, die Oberlippe aufrecht und ausgerändet, die Unterlippe dreispaltig, die Abschnitte eyförmig, ganz, ziemlich flach. Die Fruchthüllen rundlich und eben.

CCLXXXVI.
MAJORANA.
Majoran.

Der Kelch zusammengedrückt - aufgeblasen, mit Dekkblättern besetzt und dreitheilig, der obere Abschnitt sehr

gross und oval, die untern lanzettförmig. Die Blumenkrone rachenförmig, mit zusammengedrücktem Schlund, die Oberlippe seicht zweispaltig, die Unterlippe ausgerändet. Die Fruchthüllen rundlich und eben.

**CCLXXXIV.
CLINOPO-
DIUM**

Weichborste.

Die Blumenquirle sind mit einer vielborstigen Hülle umgeben. Der Kelch walzenförmig, oben zusammengezogen, die Oberlippe dreispaltig und zurückgebogen, die Unterlippe zweitheilig und einwärts gebogen. Die Blumenkrone rachenförmig, wird nach und nach weiter, ist kurzröhrig und hat eine aufrechte, eyförmige, vertiefte, ausgerändete Oberlippe, und eine dreitheilige Unterlippe, deren grosser mittlerer Abschnitt ausgerändet ist. Die Staubfäden in einen Bogen gekrümmt, mit den Staubbeuteln quer zweitheilig. Die Fruchthüllen rundlich und eben.

**CCXC.
MELITTIS.**
Melitis.

Der glockenförmige Kelch weiter als die Röhre der Blumenkrone, die Oberlippe ausgerändet, die kurze Unterlippe dreispaltig, mit von einander weichen Abschnitten. Die Blumenkrone ra-

chenförmig, die Oberlippe aufrecht, flach, rundlich und ganz, der grössere mittlere Abschnitte der dreispaltigen Unterlippe gekerbt. Die Staubbeutel stehen kreuzweiss an einander. Die Fruchthüllen rundlich, dreikantig, von aussen zottig.

CCLXXXVIII.
MELISSA.
Melisse.

Der Kelch fast glockenförmig, gleichsam vertrocknet, eckig, gestreift, die Oberlippe dreizählig, flach und zurückgeschlagen, die untere kürzere absteigende Lippe zweitheilig. Die Blumenkrone rachenförmig, die kürzere Oberlippe aufrecht, halbweispaltig, die Ränder zurückgeschlagen, der mittlere grössere Abschnitt der absteigenden, flachen, dreitheiligen Unterlippe, eyförmig. Die Fruchthüllen eyförmig und eben.

CCLXXXIX.
CALAMIN-
THA.
Bergmünze.

Der Kelch röhrig, zehnstreifig, die Oberlippe dreizählig, die Unterlippe zweitheilig, nach dem Blühen durch zottige Haare geschlossen. Die Blumenkrone rachenförmig, mit aufgeblasenem Schlund, die Oberlippe ausgerandet, die Unterlippe dreitheilig, der mittlere Abschnitt breiter, eyförmig, etwas ausgerandet, oder gering gekerbt. Die Fruchthüllen rundlich und eben.

II. ORDNUNG.

CAPSULIFERAE. Mit Saamenkapseln.
(*Angiospermia* L.)

*) Die Kelche zweispaltig.

CCCIV.
OROBAN-
CHE.*Erlenwürger.*

Der gefärbte Kelch tief halb - zweier- oder fünfspaltig. Die fast gleiche Blumenkrone rachenförmig, die Oberlippe gewölbt, stumpf, ausgerandet und vielspaltig gekerbt, die Unterlippe dreispaltig, mit gleichen, gezähnelten, gelappten Abschnitten. Am Grunde des Fruchtknotens befindet sich eine Drüse. Die Narbe halbweispaltig, dicklich, überhangend, und jeder Lappen an der Spitze eingeschnitten. Die Saamenkapsel einfächerig, zweiklappig und viel-saamig.

**) Die Kelche vierspaltig.

CCXCVI.
LATHRAEA.
*Schuppen-
wurz.*

Der Kelch glockenförmig. Die Blumenkrone maskenförmig. Eine eingedrückte Drüse ist auf dem Blumenboden an dem andern Winkel des Fruchtknotens eingewachsen. Die Staubbeutel stehen zusammengeneigt. Die Narbe stumpf und überhängend. Die stumpfe, mit Spitzen versehene Saamenkapsel ist

einfächerig, zweischalig, und enthält wenige, an den Schalen befestigte Saamen.

CCXCIV.
EUPHRASIA.
Euphrasie.

Der Kelch walzenförmig. Die Blumenkrone maskenförmig, die Oberlippe aufrecht, ausgerändet oder ganz, alle Abschnitte der dreitheiligen Unterlippe ausgerändet oder ganz. Die Staubbeutel zweilappig, an den zwei untern Staubfäden endigt sich der untere Staubbeutel-Lappen in eine kleine Spitze, oder alle Staubbeutel endigen sich in eine kurze Spitze und sind bei ihrer Anfügung mit einem Bart versehen. Die Saamenkapsel eyrund-länglich, zweiklappig, zweifächerig, und vielsamig.

CCXCIH.
RHINANTHUS.
Hahnenkamm.

Der Kelch rundlich, bauchig, zusammengedrückt. Die Blumenkrone maskenförmig, die Oberlippe helmförmig, zusammengedrückt, am Grunde ohrförmig, die Unterlippe flach, halb dreispaltig, mit einem breiten Mittelabschnitt. Die Saamenkapsel zusammengedrückt, stumpf, zweiklappig, zweifächerig, enthält einzelne Saamen.

CCXCV.
MELAMPYRUM.
Kuhweizen.

Der Kelch röhrig. Die Blumenkrone maskenförmig, die Röhre zurückgekrümmt, der Saum zusammengedrückt,

die Oberlippe ausgehöhlt, am Rande zurückgebogen, die Unterlippe halb dreispaltig, mit gleichen Abschnitten, in der Mitte mit zwei Hervorragungen besetzt. Die Staubfäden unter der Oberlippe verborgen. Die Saamenkapsel eyförmig zusammengedrückt, zweiklappig, zweifächerig, die Fächerchen einsamig; die Saamen höckerig.

***) Die Kelche fünfspaltig.

CCCI.

LIMOSELLA.

Sumpfkraut.

Der Kelch mit ungleichen Abschnitten. Die Blumenkrone glockenförmig, regelmässig, fünfspaltig. Die Staubfäden paarweise nahe beisammen stehend. Die Saamenkapsel eyförmig, zweiklappig, oben einfächerig, unten durch eine häutige, geringe Scheidewand getheilt und vielsamig.

CCCI.

SCROPHULARIA.

Braunwurz.

Der Kelch mit rundlichen gleichen Abschnitten. Die Blumenkrone kugelig, gleichsam umgewandt, mit zusammengezogenem zweilippigen Saum, die Oberlippe innwendig durch ein hinzukommendes Schüppchen vergrössert, die Unterlippe dreilappig, der mittlere Lappen sehr klein und gegen die Röhre zu-

rückgeschlagen. Von den Staubfäden entwickeln sich zwei später. Die Saamenkapsel fast kugelrund, zweifächerig, zweiklappig, mit gedoppelter Scheidewand, geht in der Reife mit einer Oeffnung von einander; die Fächerchen viel-
saamig.

CCCH.
DIGITALIS.
Fingerhut.

Der Kelch fünftheilig, mit ungleichen Abschnitten. Die Blumenkrone glockenförmig, ihre grosse, offene Röhre unterwärts bauchig, der Saum ungleich vierlappig, die oberen Lappen meistens ausgerandet, der untere grösser. Die Staubfäden niedergebogen. Die Narbe aus zwei Blättchen bestehend. Die Saamenkapsel eyförmig, spizzig, zweiklappig, zweifächerig, viel-
saamig; die Scheidewand durch die eingebogenen Ränder der Klappen gedoppelt.

CCXCVIII.
ANTIRRHI-
NUM.
Löwenmaul.

Der Kelch fünfblätterig. Die Blumenkrone maskenförmig, am Grunde höckerig und stumpf, die Oberlippe zweispaltig und zurückgeschlagen, die Unterlippe dreispaltig, der höckerige Schlund durch einen Gaumen geschlossen. Ausser den vier Staubfäden, ist noch ein sehr

kleiner, unfruchtbarer vorhanden. Die Saamenkapsel länglich, klappenlos, springt an der Spitze mit drei Löchern auf und enthält in den Fächerchen viele Saamen.

CCXCIX.
LINARIA.
Leinkraut.

Der Kelch fünfblätterig. Die Blumenkrone maskenförmig, bespornt; übrigens wie bei dem Löwenmaul gebaut. Die Saamenkapsel eyförmig, klappenlos, an der Spitze in zurückgebogenen Fächerchen von einander gehend; die Fächerchen vielsaamig; die Saamen fast zirkelrund, zusammengedrückt und mit einem Rande versehen.

CCC.
CYMBALARIA.
Zymbelkraut.

Der Kelch fünfblätterig, mit lanzettförmigen, gleichen, spizzigen Blättchen. Die Blumenkrone maskenförmig, bespornt. Die Staubfäden, wie bei dem Löwenmaul. Die unächte Schote sehr kurz, kugelig, legt von der Spitze an zu beiden Seiten das Blättchen ab, läßt das mittlere am Grunde zurück, und enthält viele verkehrt eyförmige, rauhe Saamen.

CCXCVII.
PEDICULARIS.
Läusekraut.

Der Kelch rundlich, bauchig, entweder zweilippig oder fünfspaltig, mit gekerbten oder ganzen Abschnitten. Die

Blumenkrone maskenförmig, die Oberlippe zusammengedrückt und helmförmig, die Unterlippe flach, dreilappig, der Mittellappen schmaler. Die Saamenkapsel rundlich, schief, scharf zugespitzt, zusammengedrückt, zweifächerig, zweiklappig, mit entgegengesetzter Scheidewand, enthält wenige, mit dem Nabel an den Fruchtboden befestigte Saamen.

VIERZEHNTE KLASSE.

DIDYNAMIA. Mit 2. langen u. 2. kurzen Staubfäden.

I. O R D N U N G.

PERICARPIFERAE. Mit Fruchthüllen. (*Gymnospermia* L.)

CCLXX. AJUGA. Günsel.

727. A. PYRAMIDALIS.
*Pyramiden-
förmige Günsel.*

Der Stengel einfach, aufrecht, ganz dicht zottig, viereckig - pyramidenförmig. Die Wurzelblätter sehr gross, eyförmig, die zunächst an der Blume eyförmig, sägeartig gezähnt. Die Blumen blau, manchmal weiss oder blassroth.

Wohnort.

Trockne Wälder z. B. zwischen Offenbach und Oberrad im Lehen dicht vor dem Scheerwald, gleich unter der Stelle, wo in grosser Menge *Orob. vernus* steht; hinter der Sachsenhäuser Warte im Wald mit *Veronica prostrata*; unter jungen Fichtenbäumen bei Gross-Auheim.

Zwei lange u. 2. kurze Staubf. Fruchthüllen. 341

Blütezeit. Mai — Juli. ♂

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Diese und die folgenden Günselarten werden, obgleich ungerne, doch vom Vieh unter dem übrigen Futter gefressen. Ihre Blumen geben den Bienen Stoff zu Honig. Sie war officinell.

728. A. GENE-
VENSIS.

*Genfer - Gün-
sel.*

Der Stengel einfach, aufrecht, zottig. Die Blätter filzig, die untern gestrichelt, die zunächst an den Blumen meist dreilappig, der mittlere Lappen etwas länger, die zur Seiten stehenden von einander entfernt. Die Kelche sehr zottig. Die Blumen blau, zuweilen purpur- oder fleischfarben, oder weiss.

Wohnort. Auf dürren Sandhügeln und Feldern. An den kleinen Hügeln hei dem Wilhelmsbad; bei Diedesheim; hinter der Sachsenhäuser Warte am Weg nach Ysenburg; an der Landwehr bei der Sachsenhäuser Ziegelhütte; bei dem Frankfurter grossen Saustiege; im Wald hinter Oberrad; am Fuss der Berge um Grossen - Buseek bei Giesen.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

729. A. REP-
TANS.

*Kriechender
Günsel.*

Der Stengel einfach, aufrecht, glatt und nur die gegeneinander überstehenden Seiten abwechselnd haarig. Die Wurzelsprossen kriechend. Die Blätter eyförmig, gekerbt, glatt. Die Blumen blau, auch manchmal weiss oder röthlich.

Blüthezeit. Vom April an bis zu Ende des Sommers. 4

Fruchtreife. Juli — September.

Nutzen. Mit Alaun behandelt giebt sie eine schöne Zimmetfarbe. Alles übrige ist wie bei *A. pyramidalis*.

730. A. CHA-
MAEPITHYS
Schr. b.

Schlagkraut.

Der Stengel weitschweifig. Die Blätter dreispaltig, gleichbreit, glatträndig. Die gelben stiellosen Blumen in den Blattwinkeln, einzeln, kürzer als das Blatt, haben dreispaltige Oberlippen die in der Mitte mit einem Zahn versehen sind.

Teucrium Chamaepithys Linn.

Wohnort. Auf sandigen, steinigen Stellen jenseits Frankfurt auf dem Lerchenberg; auf sandigen Aekkern um Darmstadt, Eberstadt etc.

Blüthezeit. Mai — Juli. ☉

Fruchtreife. August.

Beobacht. Die Oberlippe der Blumenkrone ist dreispaltig und in der Mitte mit einem Zahn versehen.

Bemerkung. Frisch ist diese Pflanze klebrich anzufühlen, riecht harzig wie die Fichte, und schmeckt bitter.

Nutzen. Mit Alaun versetzt, färbt sie die Wolle kaffeebraun, und sind die Pflanzen frisch, so wird die Farbe dauerhaft. Den kranken Schaafen ist ihr Genuss heilsam. Sie ist officinell.

CCLXXI. TEUCRIUM. Gamander.

751. T. BOTRYS. Der Stengel niederliegend. Die Blätter halbgefiedert, die Abschnitte 2 - 3 spaltig und einfach. Die röthlich und weiss gedüpfelten gestielten Blumen, stehen zu 3 in den Blattwinkeln. Der Kelch am Grunde sehr höckerig.

Wohnort. Auf magern sonnigen kalksteinigen Aekkern des Lerchenbergs.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Bemerkung. Die ganze Pflanze ist klebrig, und hat einen ziemlich starken, angenehmen Balsamischen etwas weinigten Geruch.

732. T. SCORODONIA.
Skorodonie.

Der Stengel aufrecht, gegliedert. Die Blätter gestielt, herzförmig, sägeartig gezähnt. Der oberste Kelchabschnitt sehr breit, verlängert sich von dem zugerundeten Grunde in die Spitze. Die gelblichweissen Blumen bilden einseitige Trauben.

Wohnort. Häufig in waldigen Gegenden, z. B. im Altenwald bei Hanau; bei den Rückinger-Schlägen; im Forst und in der Hanauer Fasanerie; im Wald zwischen der Tempelseemühle und Heusenstamm; im Niederröther Wäldchen etc.

Blüthezeit. Juli, August. 2

Fruchtreife. September.

Nutzen. Sie giebt eine schöne gelbgrüne Farbe.

733. T. SCOR-
DIUM.

*Lachenknob-
lauch.*

Der Stengel weitschweifig, weich-
haarig, Die Blätter stiellos, länglich,
unten schmaler, sägeartig gezähnt,
blassgrün, fast nakkt. Der Kelch zot-
tig. Die röthlichweissen Blumen siz-
zen zu zwei, auf eigenen Stielen in
den Blattwinkeln.

Wohnort.

In Sümpfen und feuchten Gründen.
Zu Hanau vor dem Steinheimerthor in
der Kieselkaute; an dem Heubach hin-
ter Gross-Auheim; vor dem Bruchköb-
lerwald in den Wiesengräben; im Mez-
ger- und Bornheimerbruch bei Frank-
furt und an Gräben bei dem Kettenhof;
in Wiesengräben beim Stelzemorgen in
der Gegend der Wieseckermühle bei Gie-
sen etc.

Blüthezeit.

Juli, August. 4

Fruchtreife.

September, Oktober.

Nutzen.

Schaafe und Kühe fressen diese Pflanze
gerne, aber sie theilt der Milch einen
starken Knoblauch Geruch mit. Nach
Pörner und Dambourney soll sie
für Färbereien brauchbar seyn. Sie ist
offizinell.

CCLXXII. SATUREJA. Saturey.

†. 754. S. HORTENSIS.

Gartensaturey; Bohnenkraut.

Der Stengel aufrecht, dünn und ästig. Die Blätter lanzettförmig, gleichbreit, steif und wohlriechend. Die blassblauen Blumen, an den Seiten der Zweige, auf zweiblüthigen Stielen.

Wohnort.

Ihr Vaterland ist Italien und das nördliche Frankreich; in unsern Gärten wird sie überall kultivirt, wo sie sich gewöhnlich wieder von selbst aussäet.

Blüthezeit.

Juli, August. ☉

Fruchtreife.

September.

Nutzen.

Sie wird als Gewürz zu mancherlei Speisen, vorzüglich an Bohnen gebraucht. Zum Gerben und Färben soll sie anwendbar seyn. Sie ist officinell.

CCLXXIII. NEPETA. Kazzenmünze.

755. N. CATARRIA.

Gemeine Kazzenmünze.

Die Blätter gestielt, herzförmig, grob sägeartig gezähnt. Die röthlich-weißen gestielten Blumen stehen quirlartig und bilden eine Aehre. Die Deckblätter borstenförmig und kürzer als der Kelch.

Wohnort. An Zäunen, Mauern, auf Schutt und an steinigen Orten, z. B. bei Gross-Steinheim am Mayn; hinter dem Philippsruher Schlossgarten; am Kinzigheimerhof bei Bruckköbel; um Giesen etc.

Blüthezeit. Juni bis August. 4

Fruchtreife. August bis Oktober.

Nutzen. Die Kазzen gehen dieser Pflanze sehr nach; daher es auch nützlich ist, um die Mäuse aus dem Bienenhause zu entfernen, Büschel von ihr an die Balken in demselben zu hängen. Zur Färberei ist sie nicht ganz unbrauchbar. Die Bienen besuchen ihre Blumen fleissig. Sie war officinell.

CCLXXIV. MENTHA. Münze.

*) Mit ährenförmigen Blumen.

756. M. SYLVE-
STRIS

Wilde Münze.

Die Blätter stiellos, länglich, lang zugespitzt, sägeartig gezähnt, runz-lich, unten filzig. Die Blumenähren eyförmig-länglich, aus dichten Quir-len zusammengesetzt. Die Kelche kurzhaarig. Die Staubfäden länger als die purpurfarbigen Blumen.

A b a r t.

Die Blätter eylanzettförmig, auf beiden Seiten weichfilzig.

Mentha mollissima B o r c k h.

Wohnort. Gemein an Gräben und an dem Ufer der Flüsse.

Blüthezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Sie kann statt der Krausemünze in der Apotheke gebraucht werden. Von dem Vieh wird sie nur im Nothfall gefressen; in Menge von demselben genossen, hindert sie die Milch am Gerinnen.

757. M. VIR-
DIS.

Grüne Münze.

Die Blätter stiellos, lanzettförmig, sägeartig gezähnt, nakkt. Die Blumenähren länglich, aus Quirlen zusammengesetzt. Die Staubfäden länger als die röthlichen Blumen.

Wohnort. An einem kleinen Bach unmittelbar vor Nieder-Rodenbach dicht am Weg bei den Gärten; an einem Graben dicht vor Arheilgen an der Landstrasse, ehe man von Frankfurt aus in Arheilgen kömmt.

Blüthezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Sie hat einen angenehmen und gewürzhaften Geruch und wird sowohl in der Apotheke als auch in der Küche gebraucht.

738. M. ROTUN- Die Blätter stiellos, rund - herzför-
DIFOLIA. mig, gekerbt, runzlich, haarig, endi-
Rundblätte- gen sich in eine kurze Spitze. Die
rige Münze. Blumenähren länglich, aus Quirlen
zusammengesetzt, durch kleine herz-
förmige, in kleine Dornen überge-
hende Blättchen unterbrochen. Der
Kelch sehr haarig. Der Griffel dop-
pelt länger als die Blumenkrone. Die
Staubfäden etwas kürzer als die
weissen oder blassfleischfarbenen
Blumen.

Wohnort. An Rhein bei Schierstein; an einem
Bächlein, von Bergen aus links des Fuss-
pfads, dicht vor dem Vilbeler Wald; bei
Gräfenhausen und Arheilgen an Gräben
welchs die Aekker durchschneiden.

Blütezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nuzzen.

Diese sehr stark und angenehm zitronenartig riechende Münze, ist wie die vorhergehenden Arten zu benutzen.

**) Mit kopfförmigen Blumen.

739. M. HIR-
SUTA.

*Rauhhaarige
Münze.*

Die Blätter fast stiellos, eyförmig, sägeartig gezähnt, weichhaarig, unten grau bestäubt. Die Staubfäden länger als die veilchenblauen Blumen.

Wohnort.

Auf den überschwemmt gewesenen Stellen der Heide hinter der Tempelseemühle nach Riber zu, ohnweit Offenbach.

Blüthezeit.

August, September. 4

Fruchtreife.

Oktober.

Nuzzen.

Ihren Blumen gehen die Bienen sehr nach.

740. M. AQUA-
TICA.

Wassermünze.

Die Blätter gestielt, eyförmig, sägeartig gezähnt, fast nakkt, zu beiden Seiten grün. Die Staubfäden meistens länger als die weisspurpurfarbigen Blumen.

Wohnort.

An Gräben und Bächen, z. B. bei Hanau in dem Bach vor dem Nieder-Rodenbacher Chausseehaus; in Gräben bei Gross - Auheim; in Gräben bei Rum-

penheim, Bergen, Frankfurt, Steinfurt, Giesen, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Sie ist von starkem, aber unangenehmem Geruch, und wird nur ganz jung von den Schaafen gefressen. Ihre Blumen geben den Bienen Stoff zu Honig. Sie war officinell.

***) Mit quirlförmigen Blumen.

741. M. GENTILIS. Der Stengel roth, etwas haarig. Die Blätter eyförmig, spizzig, sägeartig gezähnt. Der Kelch mit harzigen Punkten besetzt. Die Staubfäden kürzer als die blassvioletten Blumen.

Wohnort. In Gräben und an sumpfigen Orten. Im Mezgerbruch bei Frankfurt; in Gräben vor Nieder-Weisel; hin und wieder in schattigen und feuchten Wäldern um Giesen.

Blüthezeit. August, September. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Ihre Blätter werden zu verschiedenen Arten von Bakkwerk, oder als Gewürze zu Gemüsen (gewiss sind die meisten Münzenarten hierzu zu gebrauchen)

hinzugesetzt, und ihre Blumen geben den Bienen Stoff zu Honig.

742. M. AR-
VENSIS.

Akkermünze.

Der Stengel ausgebreitet, zottig. Die Blätter eyförmig, spizzig, sägeartig gezähnt, haarig. Die Kelche grauhaarig. Die Staubfäden von gleicher Länge der bläulichen Blumen.

Wohnort.

Auf Aeckern vor Nieder - Rodenbach; auf feuchten Aeckern zwischen Rumpenheim und Heusenstamm; häufig um Frankfurt; auf Aeckern und an Gräben bei Giesen etc.

Blüthezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen.

Sie hat einen süßlichen widrigen Geruch, aber mit den übrigen gleiche Arzneykräfte. Ihre Blumen geben den Bienen Honig. Sie macht, gleich allen Münzenarten, die Milch bei dem Vieh gerinnen.

743. M. VERTI-
CILLATA Dillen.
Quirlblätterige Münze.

Der Stengel aufrecht, ästig, zottig. Die Blätter eylanzettförmig, sägeartig gezähnt, rauhhaarig. Die Quirle kürzer als der Blattstiel. Die Kelche haarig. Die Staubfäden länger, manch-

mal aber auch kürzer, als die purpurfarbig - violetten Blumen.

Wohnort. An Gräben und in feuchten Gebüschen. Im alten Wald bei Hanau häufig; an feuchten Gräben hinter dem Poppenwäldchen bei Hanau, und auch an feuchten Plätzen im alten Haag, ohnweit des Kohlbrunnens; zwischen Niederroth und dem Frankfurter Forsthaus ohnweit der Entenlak; zwischen Rumpenheim und Bieber; vor Rothebergen auf feuchten Aekkern; um Giesen etc.

Blüthezeit. Juli, August, 2

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Wie bei den vorhergehenden Arten.

744. M. AUSTRI-
ACA Jacq.
Oestreichische
Münze.

Der Stengel aufrecht, fast einfach. Die Blätter kurz gestielt, die untersten eyförmig, die andern lanzettartig, spizzig, sägeartig gezahnt, der mittlere Nerve ganz mit Haaren besetzt. Die Kelchzähne einander gleich. Die Staubfäden viel kürzer als die bleichvioletten Blumen.

Wohnort. In Gräben und auf Aekkern unter der Akkermünze fand sie Reichard, aber wir noch nicht.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Bemerkung. Reichard bestimmt sie in seiner Flora für *M. gentilis*, aber im Hanauschen Magazin sagt er, es seyn *M. austriaca* Jacq.

Nutzen. Wie bei den vorhergehenden Arten.

745. *M. PULEGIUM.*

Poley - Münze.

Die Stengel fast rund und kriechend. Die Blätter eyförmig, stumpf, etwas gekerbt. Die Staubfäden länger als die blassblauen Blumen.

Wohnort. An feuchten und überschwemmt gewesenen Orten. Bei Hanau an der Kinzig gegen der Papiermühle über; zwischen Niederroth und dem Sumpf beim Frankf. Forsthaus; an überschwemmt gewesenen Orten dicht vor Rödelheim, wo sie auch schon Dillen fand etc.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Die Schaafe lieben sie, und die Bienen holen viel Honig von ihren Blumen. Sie in die Betten gelegt, soll die

Flöhe aus denselben vertreiben, und daher soll auch ihr Name *Pulegium* (von *pulex*) kommen. Sie ist officinell. Alles übrige wie bei *M. gentilis*.

CCLXXV. GLECOMA. Gundelrebe.

746. G. HEDE-
RACEA.
*Gemeine Gun-
delrebe.*

Die Stengel darniederliegend, wurzelnd. Die Blätter gestielt, nierenförmig, gekerbt, haarig. Die Blumen blau, zuweilen auch purpurfarbig oder weiss.

Wohnort. Allenthalben auf Wiesen, an Gärten, Zäunen, Mauern, in Wäldern und Gebüsch.

Blüthezeit. April bis September. 24

Fruchtreife. Juli bis Oktober.

Nutzen. Das Kraut macht das Bier, in die Bierfässer geworfen hell, und hindert seine allzuschnelle Gährung. In einigen Gegenden Deutschlands wird es seines angenehmen Geschmakks wegen in Suppen gegessen, und man kann es auch statt der Maulbeerblätter zur Fütterung der Seidenwürmer gebrauchen. Der ausgepresste Saft mit Wein ver-

mischt, vertreibt den Pferden die dunkeln Flekken der Hornhaut in den Augen, wenn derselbe Morgens und Abends in dieselben eingestrichen wird. Bienen und Ameisen besuchen diese Pflanze fleissig, und das Vieh frisst sie gerne. Sie ist officinell.

CCLXXVI. LAMIUM. Taubnessel.

747. L. LAEVIGATUM.

*Geglättete
Taubnessel.*

Der Stengel glatt und purpurröthlich. Die Blätter herzförmig, runzlig, sägeartig gezähnt, langzugespitzt. Die Blumenquirle fünfblüthig. Die Kelche glatt, so lang als die Röhre der rothen Blumenkrone.

Wohnort. An Zäunen und in Wäldern um Giesen etc.

Blüthezeit. April bis Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

748. L. MACULATUM.

Gefleckte Taubnessel.

Der Stengel, hauptsächlich bei der jungen Pflanze, kriechend, wurzelnd. Die Blätter gestielt, herzförmig, langzugespitzt, sägeartig gezähnt, am Rande lichtgrün, in der Mitte weiss.

Die Quirle zehnbülthig. Die Blumen purpurroth.

Wohnort. An Zäunen, in Obstgärten und Gebüschcn. Bei Hanau am Forst und in demselben; um Frankfurt gemein an den Wegen und auf dem Sachsenhäuser Berg; an Zäunen bei Echzel, Oberklee und bei der Schmelz hinter Weiperfeld.

Blüthezeit. April bis Juni. 24

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Sie ist ein sehr gutes Bienenkraut.

749. L. ALBUM. Der Stengel unten ästig, nicht ausgebreitet. Die Blätter gestielt, herzförmig, lang zugespitzt, sägeartig gezähnt. Die Quirle zwanzigblüthig. Die Blumen weiss, mit gelben Flecken, haben einen starken unangenehmen Geruch.

Wohnort. Gemein an Zäunen, in Hekken und überhaupt an gebauten und ungebauten Orten.

Blüthezeit. April bis September. 24

Fruchtreife. August bis Oktober.

Nutzen. Diese und die folgende Art werden in Schweden, Irrland und in einigen

Gegenden Teutschlands im Frühjahr als Gemüse gegessen. Die Bienen holen aus ihren Blumen viel Honig. Schaafe und Ziegen fressen diese Pflanzen, aber die Schweine nicht leicht. Die Blumen sind officinell.

750. L. PURPUREUM.

Rothe Taubnessel.

Der Stengel nakkt, glatt, oben Blätter- und blüthetragend. Die Blätter gestielt, herzförmig, stumpf, gekerbt. Die Quirle vielblüthig. Die Blumen purpurfarben, haben so wie die ganze Pflanze, einen ekelhaften stinkenden Geruch.

Wohnort.

An gebauten und ungebauten Orten sehr gemein.

Blüthezeit.

April bis August. ☉

Fruchtreife.

Juli bis September.

Nutzen.

Wie bei der vorhergehenden Art. Mit dem Kraut soll man Motten und Wanzen vertreiben können.

751. L. AMPLEXICAULE.

Stiellose Taubnessel.

Die Wurzelblätter gestielt, herzförmig, lappig, die Stengelblätter umfassend, zugerundet, eingeschnitten. Die kleinen Blumen roth.

A b a r t e n.

- a. Die Blumen mit sehr langer Röhre, und aufgeblasenem Schlunde.
- b. Die Blumen klein, kaum grösser als der Kelch.

Wohnort.	Allenthalben an gebauten Orten etc.
Blüthezeit.	Vom März bis zu Ende des Sommers. ☉
Fruchtreife.	Mai bis Oktober.

CCLXXVII. GALEOPSIS. Hohlzahn.

752. G. LADA-
NUM.
*Schmalblät-
tiger Hohl-
zahn.*

Die Stengelgelenke knotenlos. Die Blätter gleichbreit - lanzettförmig, entfernt sägezählig, glatt. Die Quirle vielblüthig, alle entfernt. Die Kelche glockenförmig, weichhaarig, mit gleichbreit - borstenförmigen, aus einander gebreiteten Zähnen. Die Blumen roth.

Wohnort.	Auf Aeckern bei der Hartig, der Hochstädter Ziegelhütte, um Frankfurt, bei Bornheim, um Giesen etc.
Blüthezeit.	Juli, August. ☉
Fruchtreife.	September.
Nutzen.	Der Saamen kann zur Oehlgewinnung dienen. Die Blumen geben den Bienen

Nahrung. Des Kraut scheint zur Färberei nicht ganz unbrauchbar zu seyn.

753. G. GRANDIFLORA Roth.
Grossblüthiger Hohlzahn.

Die Stengelgelenke knotenlos. Die Blätter eylanzettformig, sägeartig gezähnt, weichhaarig. Die Quirle vielblüthig, alle von einander entfernt. Die Kelche röhrig, sehr rauhhhaarig, mit lanzettförmigen, lang zugespitzten, geraden, borstenförmigen Zähnen. Die Blumenkronen mit sehr langen Röhren, blasspurpurfarbig, bisweilen weisslich, gelb und purpurfarbig gezeichnet.

Galeopsis Ladanum β Linn. *G. segetum* Reich.

Wohnort. Auf Aekkern und unter der Saat, z. B. um Hanau bei dem Lebrhof, Neuenhof, Gross-Auheim, hinter dem Frankf. Forsthaus am Wald, bei der Sachsenhäuser Warte, dem Sandhof, Nieder-Roth, bei Idstein, um Burgjoss etc.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September.

Nutzen. Wie bei der vorhergehenden Art.

754. G. TETRA- Die Stengelknoten werden nach
HIT. oben zu dicker und aufgeschwollen.
Breitblätteri-
ger Hohlzahn. Die Blätter eyförmig, sägeartig ge-
zähnt. Die Quirle vielblüthig, die
obern berühren fast einander. Die
Kelche bauchig, mit borstenförmigen,
gleichen, sehr langen Zähnen. Die
purpurfarbigen, selten weissen Blu-
menkronen, doppelt so lang als der
Kelch.

Wohnort. Auf Feldern, Aekkern, an Zäunen
und in Wäldern, z. B. bei Nieder-Ro-
denbach, dem Diebacherhof, an der Lohe
und in derselben, um Frankfurt, Offen-
bach, Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September.

Nutzen. Der Saamen, welcher sehr leicht aus-
fällt, wird in Thüringen und im Schwä-
bischen zum Oehlschlagen gebraucht,
auch daselbst als Vogelfutter verkauft.
Ein Pfund Saamen giebt ohngefähr
 $\frac{1}{2}$ Schoppen Oehl. Diese Pflanze ver-
diente häufig angebaut zu werden.

755 G. CANNA-
BINA Roth.

Hanfartiger

Hohlzahn.

Die Stengelknoten werden nach oben zu dikker und aufgeschwollen. Die Blätter eylanzettförmig, sägear-
tig gezähnt. Die Quirle vielblüthig, die obern berühren fast einander. Die Kelche röhrig, mit etwas kürzern, gleichbreiten, ungleichen Zähnen, wovon drei grösser als die übrigen sind. Die Blumenkronen gelblich weiss, zuweilen weiss mit purpurfarbig untermischt, viermal so gross als der Kelch.

Galeopsis Tetrahit β Linn.

Wohnort.

Auf Aekkern und Saathfeldern um Hannau, Offenbach, Darmstadt, Frankfurt, Giesen etc.

Blüthezeit.

Juli — September. ☉

Fruchtreife.

August — Oktober.

Nutzen.

Völlig wie bei der vorhergehenden Art.

CCLXXVIII. GALEOBDOLON.

Waldnessel.

756. G. LU-
TEUM Nob.

Goldgelbe

Waldnessel.

Die Blätter gestielt, herzförmig, gezähnt, geflekt. Die Quirle sechs-

blüthig. Die Kelche dornig. Die Blumen goldgelb.

Galeopsis Galeobdolon Linn.

Wohnort. Unter Hekken und in waldigen Gegenden im Schatten. Bei Hanau in der Bulau, dem Lambowald, dem Forst; in Hekken bei der Kesselstädter Ziegelhütte und bei Hochstadt; in der Lohe; im Wald bei Offenbach; in der Sachsenhäuser Landwehr; im Niederröther Wäldchen; im Hangestein etc.

Blüthezeit. April, Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Die Bienen holen Honig aus den Blumen.

CCLXXIX. BETONICA. Betonie.

757. B. OFFICINALIS.
Offizinelle Betonie. Die Blätter etwas stumpf gekerbt, die untern gestielt und herzförmig, die obern stiellos und länglich. Die purpurfarbigen, selten weissen Blumen, in unterbrochenen Aehren.

Wohnort. In Wäldern und Hainen; vorzüglich aber auf Waldwiesen, die leetigen und lehmigen Boden haben. In der Hanauer Fasanerie; im Poppenmäldchen und al-

ten Wald bei Hanau; im Niederröther Wäldchen; im Wald beim Goldstein; auf Wiesen zwischen Ginheim und Hausen; auf Bergwiesen bei Homburg; in Wäldern um Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni bis August. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die jungen Blätter werden bisweilen in England mit an das Gemüse gekocht. Die ganze Pflanze in Milch gekocht, soll ein bewehrtes Mittel für das Rindvieh seyn, welches von dem Genusse der Binsen, und andern in Sümpfen wachsenden Grases erkranket. Sie ist officinell. Aus ihren Blumen holen die Bienen Honig. Blätter und Blüthen färben die mit Wissmuth gebeizte Wolle dauerhaft olivenbraun.

CCLXXX. STACHYS. *Stachys*.

758. S. SYLVATICA.

Waldstachys.

Der Stengel aufrecht, haarig. Die Blätter lang gestielt, herzförmig, sägezählig. Die sechsblüthigen Quirle in Aehren. Die Oberlippe der Blumenkrone dunkelpurpurroth mit drei noch dunkleren Strichen, die Unterlippe dunkelroth und weiss geflekt.

Wohnort. In schattigen Wäldern und Hekken, z. B. bei Hanau in der Bulau, der Fasanerie, im Gebüsch beim Galgen etc. im Niederröther Wäldchen; ohnfern der grossen Saustiege im Wald; im Schiftenberger Wald und im Stelzenmorgen bei Giesen; in den Wäldern um Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juni — August. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Diese sehr stinkende Pflanze frisst das Rindvieh gerne. Die Stengel wie Hanf geröstet, geben eine Wolle, die zu Garn gesponnen und gebleicht, sehr weiss wird. Mit den Blättern kann man gelb färben.

759. S. PALU-
STRIS.

Sumpfstachys.

Der Stengel aufrecht, rauhhaarig. Die Blätter fast stiellos, lanzettförmig, stumpf gekerbt. Die in Aehren stehenden Quirle, 6-12 blüthig. Die Blumen roth mit weisslichen oder gelben Flecken bezeichnet.

Wohnort. An Ufern und auf feuchten Aekern. Vor Nieder Rodenbach; im Bruckköbelerwald; an Bächen in der Hanauer Fa-

sanerie; auf feuchten Aekkern um Vilbel, Bonames, Frankfurt, Offenbach etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. September.

Nutzen. Die fleischige mehligte Wurzel, kann nach Bryant, Pennant und Linné im Nothfall zum Brodbakken gebraucht werden; für die Schweine ist sie ein Lekkerbissen.

760. S. GERMANICA.

Teutsche Stachys.

Der Stengel aufrecht, weissfilzig. Die Blätter gestielt, herzförmig-länglich, stumpf gekerbt, mit weissem dichten Filz bedekt. Die Blumen in vielblüthigen Quirlen, die Oberlippe inwendig roth, die Unterlippe roth geadert.

Wohnort.

Auf Hügeln, Feldern, an Wegen und Zäunen; vorzüglich auf steinigem Boden. An Zäunen hinter dem Philippsruher Schloss nach der Dörnigheimer Heide; bei dem Hanauer Galgen; bei und hinter Dörnigheim wo der Braubach in den Mayn fließt; an der Hartig; zwischen Seckbach und Bornheim an der Chaussee; vor dem Vilbeler Wald nach Bergen hin etc.

Blüthezeit. Juni — August. ♂ — 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Ihre Blumen geben den Bienen Honig.

761. S. RECTA. Der Stengel niederliegend, ästig.
Gerade Sta- Die Blätter eylanzettförmig, gekerbt,
chys; Beruf-
kraut.
rauh, zu beiden Seiten zottig. Die
zehnbülthigen Quirle fast ährenför-
mig. Die Kelche etwas dornig. Die
Blumen gelblich, oben roth gestri-
chelt, unten roth gedüpfelt.

Wohnort. An steinigen Orten und überhaupt an
Zäunen und Wegen gemein. Hinter
dem Philippsruher Schloss; am Mayn-
ufer disseits Gross- Steinheim; am Weg
zwischen Klein- Steinheim und Diedes-
heim; auf dem Lerchenberg; am Mayn-
ufer bei Niederroth etc.

Blüthezeit. Mai — August. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Diese angenehm gewürzhalt riechende
Pflanze, wird von den gemeinen Leuten
sehr häufig bei uns unter dem Namen
Berufkraut, bei vermeinten behexten
Kindern und bei dem Vieh gebraucht.

762. S. ANNUA.
Jährige Sta-
chys.

Der Stengel aufrecht, ästig. Die Blätter gestielt, eylanzettförmig, scharf gekerbt, glatt, dreirippig. Die Kelche begrannt. Die Blumen in sechsblüthigen Quirlen, die Oberlippe weisslich, die Unterlippe blassgelb.

Wohnort. Auf Aekkern und Feldern bei Ginheim fand sie Reichard, aber nicht wir.

Blüthezeit. Juli — September. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die Bienen holen aus dieser wohlriechenden Pflanze Honig.

763. S. ARVEN-
 SIS.
Akkersta-
chis.

Der Stengel schwach, die beiden Aesten abstehend. Die Blätter herzförmig, stumpf, gekerbt, ziemlich nakkt. Die untern Blumen gepaart, die obern in sechsblüthigen Quirlen, röthlich, von der Länge des Kelchs.

Wohnort. Auf Aekkern, z. B. vor Heusenstamm; hinter Nauheim; zwischen Neuenhayn und Cronenberg, bei Ilbshausen im Vogelsberg; zwischen dem Ketten- und Hellerhof bei Frankfurt.

Blüthezeit. Juni — August. ☉

Fruchtreife. September.

CCLXXXI. BALLOTA. Ballote.

764. B. NIGRA. Die Blätter eyherzförmig, sägear-
Schwarze Bal- tig gezähnt. Die Quirle gestielt, viel-
lote; schwar- blüthig, fast einseitig. Die Kelche
zer Andorn. begrannt. Die Blumen purpurröth-
lich, sehr selten weiss.

Wohnort. Gemein an Wegen, Hekken, Dörfern,
auf altem Schutt etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. 2

Fruchtreife. September.

Nutzen. Wegen ihres unangenehmen Geruchs
wird sie von dem Vieh nicht gefressen.
In Schweden braucht man sie in Krank-
heiten des Rindviehs. Sie ist zu braunen
Farben brauchbar. Sonst war sie offizinell.

CCLXXXII. MARRUBIUM. Andorn.

765. M. vul- Die Blätter rundlich eyförmig. Die
GARE. Quirle vielblüthig. Die Kelche mit
Gemeiner An- abwechselnd kleineren, borstigen und
dorn. hakenförmigen Zähnen. Die Blu-
men weiss.

Wohnort. Auf Schutt, an Bergen, Wegen, Zäu-
nen und Dörfern. Zu Hanau auf dem
2. Th. A a

Wallen beim Kanalthor; auf dem Philippsruher Weg in den Weiden; beim Steinheimer Galgen; an dem Buchhübel ohnweit Offenbach; am Schwengelsbrunnen hinter dem Frankf. Forsthaus; bei Rödelheim; zu Griedel in Bauernhöfen.

Blüthezeit. Juni — August. 2

Fruchtreife. September.

Nutzen. Zur Gerberei und Färberei wurde diese Pflanze empfohlen; aus ihren Blüthen holen die Bienen Honig. Sie ist officinell.

CCLXXXIII. LEONURUS.

Löwenschwanz.

766. L. CARDIACA.

Herzgespann.

Die untern Blätter herzförmig, fünflappig, eingeschnitten, die Stengelblätter lanzettförmig, dreitheilig, mit kleinen Zahnchen besetzt. Die Blumen purpurfarbig, aussen sehr zottig.

Wohnort.

An ungebauten Orten z. B. im Bruchköblerwald an der Saustiege; zu Grossauheim in Höfen; am Frankf. Forsthaus; bei der Frankf. grossen Saustiege; zu Kloppenheim im Hofe des Wirthshauses; an Zäunen um Giesen etc.

- Blüthezeit. Juli, August. 2
Fruchtreife. September.
Nutzen. Sie liefert eine vortreffliche dunkle Olivenfarbe. In Krankheiten des Rindviehs wird sie gebraucht. Aus ihren Blüthen holen die Bienen Honig. Sie war sonst officinell.

CCLXXXIV. CLINOPODIUM.

Weichborste.

767. C. VUL-
GARE.
Gemeine
Weichborste. Der Stengel haarig, viereckig. Die Blätter eyförmig, etwas gekerbt, haarig. Die Quirle rundlich, vielblüthig. Die Blumendekblätter borstenförmig, gefranzt. Die Kelche gefranzt, die Abschnitte borstenförmig. Die Blumen purpurfarbig, gering weichhaarig, bisweilen weiss.

- Wohnort. Allenthalben in Wäldern, an Zäunen, Wegen etc.
Blüthezeit. Juli, August. 2
Fruchtreife. September, Oktober.
Nutzen. Für Färbereien und Gerbereien scheint sie brauchbar zu seyn. Die Blätter geben einen schmackhaften gesunden Thee,

und können auch in der Küche gebraucht werden. Die Blumen werden häufig von den Bienen besucht.

CCLXXXV. ORIGANUM. Dosten.

768. O. vul-
GARE.
Gemeine Do-
sten.

Der Stengel und die eyförmigen Blätter haarig. Die rundlichen Blumenähren rispen- und knaulförmig. Die farbigen Blumendekblätter eyförmig, spizzig, länger als der Kelch. Die Staubfäden länger als die blassrothen zuweilen weissen Blumenkronen.

Wohnort. Allenthalben in Wäldern, an Bergen, Zäunen etc.

Blüthezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Diese Pflanze verdiente als Gewürzpflanze von uns benutzt zu werden; sie hat einen angenehmen Geruch und einen scharfen, beisenden, gewürzhaften Geschmack. Hängt man diese Pflanze in die Bierfässer, so verhindert es das Sauerwerden des Biers, läßt man sie aber damit gähren, so wird es berauschend. Die Blätter geben einen lieblich schmek-

kenden Thee. Aus den Blumen holen die Bienen Honig. Man kann mit der ganzen Pflanze hochbraun und roth färben; ersteres sahe Linné im Oeländ, letzteres Pallas in Rußland. Sie ist officinell.

CCLXXXVI. MAJORANA. Majoran.

†. 769. M. HORTENSIS.

Garten Majoran.

Die Blätter eyförmig, stumpf. Die Aehren fast rund, dicht beisammen stehend, weichhaarig. Die kleinen Blumen weiss.

Wohnort.

Sein eigentliches Vaterland ist unbekannt; in unsern Gärten wird er überall gezogen.

Blüthezeit.

Juli, August. ☉

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Als Gewürzpflanze gebrauchen wir ihn an viele Speisen. Aus den Blumen erhalten die Bienen Honig. Er ist officinell.

CCLXXXVII. THYMUS. Thymian.

770. T. SERPYLLUM.

Feldthymian.

Die Stengel kriechend. Die Blätter flach, stumpf, am Grunde gefranzt. Die kopfförmigen Blumen purpurfarbig, selten weiss.

Abarten.

a.) Gemeiner Feldthymian. Der Stengel niederliegend, weichhaarig. Die Blätter eyförmig, glatt, sehr kurz gestielt. Die Staubfäden innerhalb der Blumenröhre verborgen.

Wohnort. In dünnen, stark der Sonne ausgesetzten Wäldern und auf Hügeln, z. B. um Hanau auf den Hügeln bei den Rückinger Schlägen, auf der Heide hinter dem Lehrhof und hinter dem Wilhelmsbad; um Frankfurt, Neuenhayn, Giesen, Darmstadt etc.

b.) Grösserer Feldthymian. Der Stengel ziemlich aufrecht, unten niederliegend. Die Blätter länglich-eyförmig, glatt, länger gestielt. Die Staubfäden über die Blumenröhre hervorragend.

Wohnort. Auf der Mauer des Heusenstammer Schlossgartens.

c.) Zitronthymian. Die mit den Fingern zerriebene Blätter stark nach Zitronen riechend.

Wohnort. Um Frankfurt, Hanau, Giesen etc.

d.) Aufrechter Thymian. Der Stengel ganz aufrecht stehend

Wohnort. Am Fusse des Berges bei Grossen - Buseck.

e) Rauhhaariger Thymian. Der Stengel und vorzüglich die Blätter auf beiden Seiten haarig.

Wohnort. Um Schiffenberg bei Giesen; auf dem Lerchenberg und bei dem Frankf. Forsthaus; um Hanau etc.

Beobachtung. Die obersten Blätter der rauhhaarigen Abart fanden wir mehrmalen von einem seine Eyer in dieselben legen Cynips, in ein graues, wolliges, ungestaltetes Köpfchen zusammengewachsen und zusammengerollt.

Blüthezeit. Juni bis September. †

Fruchtreife. August — Oktober.

Nutzen. Diese Pflanze verdiente allgemein als Gewürz von uns benutzt zu werden, sie hat einen angenehmen, starken gewürzhafteu Geruch und Geschmakk. Einige Abarten werden auch schon zum Küchengebrauch in unsern Gärten gezogen. Die Isländer thun ihn Winters in die Molken, wodurch dieselbe einen angenehmen Geschmakk erhält, Zerquetscht in

Bier eingeben, soll er wider das Drehendwerden der Schaaf dienlich seyn. Bechstein behauptet die Schaaf fressen ihn nicht so gerne als manche Oekonomen sagten. Auf dem Lande ist er das beste und gebräuchlichste Parfüm. Den Bienen dienen die Blumen als ein Stärkungsmittel. Die Blätter geben einen angenehmen Thee. Er ist officinell.

†. 771. T. VUL-
GARIS.
Gartenthymian.

Der Stengel strauchartig, aufrecht, sehr ästig. Die Blätter eyförmig, zurückgerollt, immergrün. Die matt purpurrothen Blumen in quirlartigen Aehren.

Wohnort. Das südliche Europa ist sein Vaterland; in unsern Gärten wird er überall gezogen.

Blüthezeit. Juli, August. ✚

Fruchtreife. September.

Nutzen. Bei uns wird er als Gewürzpflanze vorzüglich in Einfassungen der Beete gezogen. In einigen Ländern spület man mit dem Absud dieser Pflanze die Weinfässer aus, um dem Wein einen angenehmen Geschmakk zu verschaffen. Er ist officinell.

772. T. ACINOS. Der Stengel aufrecht, haarig, am
Bergthymian. Grunde etwas ästig. Die Blätter ey-
förmig, spizzig, gegen die Spitze
sägezähnig. Der Kelch oben bauchig,
unten zusammengezogen. Die Blu-
men blass veilchenblau, mit gelblich-
geflecktem Schlunde, in sechsblüthi-
gen Quirlen.

Wohnort. Auf trockenem Sand und Kalkboden.
Bei Hanau auf dem Steinheimerweg;
zwischen Philippsruh und Dörnigheim;
bei Bischoffsheim, Bergen, Seckbach;
auf den Anhöhen von Offenbach nach
Rumpenheim und Biber; bei Mühlheim;
auf dem Hausberg, dem Lerchenberg,
bei Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September.

Nutzen. Er kommt in seinen Eigenschaften
den vorigen Arten bei. Er riecht an-
genehm gewürzhalt, und die Bienen
holen Honig aus den Blumen.

CCLXXXVIII. MELISSA. Melisse.

773. M. OFFI-
CINALIS.

Offizinelle
Melisse.

Der Stengel aufrecht, ästig. Die
Blätter eyförmig, sägeartig gezähnt.

Die weissen Blumen in den Blattwinkeln, quirlförmig, auf einfachen Stielchen.

Wohnort. Bei Frankfurt vor dem Eschenheimerthor, südlich vom Kirschwäldchen nahe am Weg; im Hayngraben zu Sulzbach.

Blüthezeit. Juli, August. 2

Fruchtreife. September.

Nutzen. Wegen ihrem angenehmen zitronartigen Geruch ist sie in unsern Gärten als Gewürzpflanze nicht selten. Die getrockneten Blätter geben einen guten Thee; frisch setzt man solche dem Salat bei. Von den Teuschen und Engländern wird die Melisse zuweilen dem Bier beige-mischt, um solches berauschender zu machen. Boucherey will aus ihr einen süssen und guten Zukker verfertigt haben. Die Bienen besuchen häufig ihre Blumen. Bei dem Karmeliterwasser sind die Blätter ein Hauptbestandtheil. Sie ist offizinell.

CCLXXXIX. CALAMINTHA.

Bergmünze.

774. C. OFFICINALIS.

*Offizinelle
Bergmünze.*

Der Stengel aufrecht, ästig. Die Blätter eyförmig, sägeartig gezähnt,

spizzig, gerippt, etwas weichhaarig. Die Blumenstiele in den Blattwinkeln, einseitig, in mehrere kleine Stielchen getheilt. Drei Zähne der obern Kelchlippe rückwärts hakenförmig gebogen. Die bläulichen oder röthlichen Blumen doppelt so lange als der Kelch.

Melissa Calamintha Linn.

Wohnort. Im Wald zwischen der Sachsenhäuser Warte und Ysenburg, wenn man vom Ehrmannischen Garten her den Fusspfad geht. Schon Camerer fand sie in dieser Gegend; siehe Bauhin hist. plantar. T. 5. p. 228.

Blütezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September.

Nutzen. Völlig wie bei der Melisse.

CCXC. MELITTIS. *Melittis*.

775.M. MELIS- Die Blätter schwärzlichgrün oval,
SOPHYLLUM. sägeartig gezähnt, haarig, stark rie-
Melissenblät- chend und gross. Die Blumen in den
terige Melittis. Blattwinkeln, einander gegenüber,

fast einseitig, weisspurpurfarbig, mit rothen Adern durchmalt.

Wohnort. In Gebirgswäldern bei Königstein und Oberursel, woselbst sie auch schon Clusius fand.

Blüthezeit. Juni, Juli. 24

Fruchtreife. August.

Nutzen. Schon den Griechen und Römern war es bekannt, daß die Bienen die honigreichen Blumen dieser Pflanze sehr fleissig besuchen. Der Zierde wegen verdient sie in den Gärten eine Stelle. Sonst war sie bei uns offizinell.

CCXCI. SCUTELLARIA. Schildkraut.

776. S. GALERICULATA.

Gemeines

Schildkraut.

Die Blätter herzlancettförmig, gekerbt. Die Blumen in den Blattwinkeln, gepaart, einseitig, an der Oberlippe blau, an der Unterlippe weiss und am Schlunde geflekt.

Wohnort. An Gräben, Bächen, Teichufern, an feuchten Orten, besonders in waldigen Gegenden, z. B. im Ried bei Gross-Auheim; in sumpfigen Orten bei dem Lehrhof ohnweit Hanau; am Bruchköb-

lerwald; im Mezgerbruch bei Frankfurt;
auf sumpfigen Wiesen bei Ursel etc.

Blüthezeit. Juni — September. 4

Fruchtreife. August — Oktober.

Nutzen. Sie liefert eine schwarze Farbe. Sonst
war sie officinell.

777. S. HASTI-
FOLIA.

*Spiesförmiges Schild-
kraut.*

Die Blätter glatträndig, die un-
tern spiesförmig-eyrund, die obern
pfeil-lanzettförmig, etwas stumpf.
Die Blumen in den Blattwinkeln,
zu 2-3, blau.

Wohnort. In einem sumpfigen Buchwald bei
Giesen fand sie Dillen.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

778. S. MINOR.
*Kleines Schild-
kraut.*

Die Blätter ey-herzförmig, fast glatt-
rändig. Die Blumen in den Blattwin-
keln, meistens einzeln, einseitig,
roth, inwendig weiss geflekt, aussen
rauhhaarig.

Wohnort. In sumpfigen Gegenden, z. B. im
Bruch hinter dem Frankfurter Forst-
haus; an dem Reichebach welcher bei
Falkenstein aus dem Gebirge kommt;
bei Wixhausen in einer Waldwiese an

faulen Stämmen ziemlich häufig; nördlich bei Gross-Auheim.

Blüthezeit. Juli, August. 2

Fruchtreife. September, Oktober. 1

CCXCII. PRUNELLA. Prunelle.

779. *P. VULGARIS.*
Gemeine Prunelle. Alle Blätter gestielt, eyförmig-länglich, sägeartig gezähnt. Die obere Kelchlippe abgestutzt, fast dreizählig. Die Blumenkrone doppelt so lang als der Kelch, blauviolett, bisweilen fleischfarbig, oder weiss.

Wohnort. Sehr gemein auf Wiesen, Triften, in Obstgärten, Wäldern und überhaupt auf magern Plätzen.

Blüthezeit. Juni — August. 2

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die jungen Blätter können als Gemüse und Salat genossen werden. Das Vieh frisst diese Pflanze gerne und aus den Blumen holen die Bienen Honig. Sie enthält einen brauchbaren Farbestoff. Sonst war sie officinell.

780. *P. GRANDIFLORA.*
Grossblumige Prunelle. Alle Blätter gestielt, eyförmig-länglich, etwas sägeartig gezähnt. Die obere Kelchlippe tief dreispaltig.

Die Blumenkrone viermal so lang als der Kelch, blauviolett, bisweilen weiss.

Wohnort. Auf Hügeln und auf bergigen Wiesen und Weiden. Bei Dörnigheim am Ried; an der Lohe zwischen dem Wald und den Feldern; zwischen Bergen und Enkheim; bei Vilbel, Homburg, Wisbaden; auf den Anhöhen zwischen Rumpenheim und Biber; bei Hüttengesäss um die Lavabrüche; häufig im Vogelsberg; um Schiffenberg und Annerod etc.

Blüthezeit. Juni — August. 2

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Wie bei der gemeinen Prunelle.

II. ORDNUNG.

CAPSULIFERAE. Mit Saamenkapseln.
(*Angiospermia* Linn.)

CCXCIII. RHINANTHUS.

Hahnenkamm.

781. R. CRISTAGALLI.
Glatte Hahnenkamm.

Die Blätter lanzettförmig, sägear-
tig gezähnt. Die Blumendekblätter
rundlich, sägeartig gezahnt, hohl.
Die Kelche glatt. Die Blumenkronen

eyergelb, der ohrförmige Anhang des Helms blau.

Wohnort. Gemein auf niedrigen, etwas feuchten Wiesen.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Grün frisst ihn das Vieh nicht ungern, allein dürr ist er ein hartes und zähes Futter. Gute Oekonomen rotten ihn daher auf ihren Wiesen durch öfteres Abmähen der Blumen vor der Saamenreife aus. Den zu Mehl zerriebenen Saamen hat man an mehreren Orten mit unter das Brod gemischt. Für Färbereien ist der Hahnenkamm nicht ohne allen Nutzen.

782. R. ALEC-
TOROLOPHUS
Poll.

*Zottiger Hah-
nenkamm.*

Die Blätter lanzettförmig, sägear-
tig gezahnt. Die Blumendekblätter
hohl, eyförmig, sägeartig gezahnt.
Die Kelche zottig. Die Blumenkro-
nen blassgelb, der ohrförmige An-
hang des Helms blau.

Rhinanthus crista galli γ. Linn.

Wohnort. Auf Wiesen um Giesen gemeiner als die vorige Art; unter Roggen am Stei-
nauer Berg bei Marjoss.

Blüthezeit.	Mai, August. ☉
Fruchtreife.	August, September.
Nutzen.	Wie bei der vorigen Art.

CCXCIV. EUPHRASIA. Euphrasie.

783. E. OFFICINALIS.
Offizinelle
Euphrasie;
Augentrost. Die Blätter stiellos, eyförmig, gestrichelt, scharf gezähnt. Die Blumen sehr bleichröthlich, mit weiss und gelb untermischt.

Wohnort. Allenthalben auf trocknen Wiesen, Triften und in Wäldern.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Das Vieh frisst ihn, und seine Blumen geben den Bienen etwas Honig. War offizinell.

784. E. ODONTITES.
Zahneuphrasie. Die Blätter stiellos, gleichbreit-lanzettförmig, alle sägeartig gezähnt. Die Blumen einseitig, purpurfarbig, selten weiss.

Wohnort. Unter der Saat, auf Wiesen, Triften, und an Wegen überall.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Wie bei der vorbergehenden Art.

785. E. LUTEA. Die Blätter gleichbreit, sägeartig
Gelbe Euphrasie. gezähnt, am Rande etwas zurückge-
 rollt, die obersten glatträndig. Die
 Blumen gelb.

Wohnort. Häufig an den Kalksteinbrüchen und
 in den verlassenen Weinbergen zu Ber-
 gen, dicht vor den Häusern, und auch
 um Seckbach; bei dem Darmstädter Ju-
 denkirchhof.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

CCXCV. MELAMPYRUM.

Kuhweizen.

786. M. CRISTATUM. Die Blätter gleichbreit, glatträn-
Kammartiger dig. Die purpurröthlichen Blumen
Kuhweizen. in vierekkigen Aehren. Die zusam-
 mengelegten Dekkblätter herzförmig,
 fein gezähnt, dachziegelförmig auf
 einanderliegend, zurückgekrümmt.

Wohnort. Auf trocknen Wiesen und am Rande
 der Wälder und der Gebüsche, z. B. am
 Rande des Wäldchens zwischen Rödel-
 heim und Bockenheim; im Hägewald
 zwischen Renteln und Carbez; auf Wie-

sen hinter Homburg; im Wald zwischen Cronenberg und Falkenstein; auf Wiesen zwischen Urborach und Messel und Darmstadt; bei Hergershausen; im Stelzenmorgen bei Giesen und an dem Rande der Gebüsche bei Lollar etc.

- Blüthezeit. Juni — August. ☉
Fruchtreife. August, September.
Nutzen. Wird jung von dem Rindvieh gerne gefressen.

787. M. ARVEN-
SE.

Akker - Kuh-
weizen.

Die Blätter lanzettförmig, die untern glatträndig, die obern am Grunde gezähnt. Die purpurröthlichen, mit gelben Streifen versehenen Blumen, in lockern, kegelförmigen Aehren. Die Dekkblätter purpurfarben, lanzettförmig, mit borstenförmigen Zähnen.

- Wohnort. Unter der Saat, z. B. zwischen dem Kinzigheimerhof und dem Mittelbacherwald; zwischen Dörnigheim und Rumpenheim; bei Bischofsheim, Offenbach, Frankfurt, Darmstadt, Enckheim, Homburg, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August.

Nutzen. Die Saamen machen das Mehl, wenn sie in Menge sich unter dem Getreide befinden, bläulich und bitter, aber ohne Nachtheil der Gesundheit. Dem Vieh ist diese Pflanze ein sehr angenehmes Futter, vorzüglich gut ist sie zum Ochsen- und Kuhmästen; und in dieser Absicht verdient sie gleich dem Buchweizen angebaut zu werden. Sie liebt einen sandigen leichten Boden. Aus den Blumenähren kann man nach Cronstedt eine ziemlich dauerhafte blaue, und mit feuerfesten Laugensalzen eine purpurrothe Farbe erhalten. Die Bienen erhalten aus den Blüthen Honig. Als Zierblume ist sie zu empfehlen.

788. M. NEMO-
ROSUM.

Haynkuhlweizen.

Die Blätter eylanzettförmig, glatträndig. Die gelben Blumen einseitig, an den Seiten der Zweige, in einer Art von Aehre. Die untern Deckblätter violett, herzlancettförmig, gezähnt, die obern blüthenlos und zweifarbig. Die Kelche mit einem purpurrothlichen Filz überdeckt.

Zwei lange u. 2. kurze Staubf. Saamenkapseln. 589

Wohnort. Häufig im Börl, einem Walde zwischen Hinter- Steinau und Schlüchtern.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Sie dient zum Viehfutter und zur Bienennahrung, und verdiente als Zierblume ihrer ungemein schönen Färbung wegen, eine der ersten Stellen in unsern Gärten.

789. M. PRATENSE.
Wiesen - Kuhweizen. Die Blätter lanzettförmig, die untern glatträndig, die zunächst an den Blumen, gering gezähnt; sämmtlich paarweise von einander entferntstehend. Die geschlossenen, gelben, mit weisslicher Röhre versehenen Blumen, einseitig, kommen aus den Seiten des Stengels ein- und paarweise hervor. Die Kelchzähne lanzettförmig-gleichbreit, langzugespitzt, meistens länger als die Kelchröhre.

Wohnort. Häufig auf trocknen Wiesen und in Wäldern.

Blüthezeit. Mai — September. ☉

Fruchtreife. August — Oktober.

Nutzen.

Von dem Genuss dieser Pflanze bekommt die Butter der Kühe eine gelbe Farbe und einen vortrefflichen Geschmack. Die Schweine fressen sie nicht, Die Bienen holen aus den Blumen Honig. Dambourney erhielt von ihr eine schmutzige Olivenfarbe.

790. M. SYLVATICUM.

Waldkuhweizen.

Die Blätter eylanzettförmig, die untern glatträndig, die obern am Grunde mit einigen kleinen Zähnen, paarweise von einander entfernt stehend. Die offenstehenden gelben Blumen einseitig, aus den Seiten des Stengels paarweise hervorkommend. Die Kelchzähne lanzettförmig, etwas stumpf, kürzer.

Wohnort.

Am Rande der Wälder und in den Wäldern selbst, hinter Homburg im Gebirge.

Wohnort.

Juni — August. ☉

Blüthezeit.

August, September.

Fruchtreife.

Wie bei der vorhergehenden Art.

CCXCVI. LATHRAEA.

Schuppenwurz,

791. L. SQUA-
MARIA.

Gemeine

*Schuppen-
wurz.*

An dem sehr einfachen blasspur-
purblauen Stengel, sitzen an der Stelle
der Blätter, welke Schuppen. Die pur-
purröthlichen Blumen hängen unter
sich und die Unterlippe derselben ist
dreispaltig.

Wohnort.

Im Wald bei Falkenstein.

Blüthezeit.

Mai — Juli. 4

Fruchtreife.

Juli, August.

Nutzen.

Diese Schmarozzerpflanze gebrauchen
die Schäfer, in Vermischung mit andern
Pflanzen, als Vieharzney.

CCXCVII. PEDICULARIS.

Läusekraut.

792. P. PALU-
STRIS.

*Sumpfläuse-
kraut.*

Der Stengel aufrecht, ästig. Die
Blätter gefiedert, die Fiederblättchen
halbgefiedert, lanzettförmig. Der
zweilippige Kelch kammförmig,
schwülig-punktirt. Die purpurfarbi-
gen, bisweilen weissen Blumen, ha-
ben eine schiefe, durch kleine Zähn-
chen geschnäbelte Oberlippe.

Wohnort. Auf sumpfigen Wiesen z. B. bei Bishopsheim; häufig um Frankfurt; bei Bockenheim, Offenbach, Darmstadt, Homburg, Wehrheim, im Vogelsberg, um Giesen etc.

Blüthezeit. Mai bis Juli. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Uns keiner bekannt. Man zählt diese und die folgende Art unter die scharfen und äzzenden Pflanzen; denn sie verursachen dem Rindvieh und den Schaafen mancherlei Beschwerden, und nur den Ziegen sind sie unschädlich. Dafs sie dem Vieh Läuse verursachen sollen ist höchst unwahrscheinlich.

793. P. SYLVATICA.

Waldläusekraut.

Der Stengel rasenförmig und niederliegend. Die Blätter gefiedert, die Fiederblättchen rundlich, gering gezähnt. Der fünfspaltige Kelch länglich, ekkig, glatt, die Abschnitte gering gekerbt, der obere sehr klein. Die purpurfarbigen, selten weissen Blumen, haben eine herzförmige schiefe Unterlippe.

Wohnort. Auf sumpfigen Wiesen und waldigen sumpfigen Weiden, z. B. um Hanau auf

Wiesen bei dem alten Wald, an den Sümpfen bei dem Wolfsgang, im Bruchköblerwald, auf einer Heide zwischen dem Wilhelmsbad und dem Kinzigheimerhof; um Offenbach, Frankfurt, Darmstadt, Homburg, im Vogelsberg, um Giesen etc.

Blüthezeit. April — Juni. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

CCXCVIII. ANTIRRHINUM.

Löwenmaul.

794. A. ORONTIUM.

Fingerförmiges Löwenmaul.

Die Blätter gestielt, lanzettförmig. Die Kelchblättchen gleichbreit, spitzig, ungleich, länger als die Blumenkrone. Die fast in Aehren von einander entferntstehenden Blumen purpurfarbig (selten weiss) mit einem gelben Filze überzogen.

Wohnort.

Auf Feldern und Aekern. Um Hahnau auf Aekern bei dem Kinzigheimerhof; bei dem Diebacherhof; bei Nieder- und Ober-Rodenbach; an der Gallenwarte bei Frankfurt; bei Heddernheim und Bornheim; in den Weinbergen zwischen Soden und Neuenhayn;

im Getreide bei Rodheim; um Giesen;
bei Ilbershausen im Vogelsberg etc.

Blütezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Die aufgesprungene Saamenkapsel siehet aus, wie der Hirnschädel eines Affens.

Nutzen. Sie liefert nach Dambourney eine rothbraune Farbe. Sie ist giftig und gehörte sonst unter die Berufskräuter.

CCXCIX. LINARIA. Leinkraut.

795. L. ARVEN-
SIS Nob.

Akker-Lein-
kraut.

Der Stengel aufrecht, ästig, etwas
rauh. Die Blätter gleichbreit, die
untern quirlförmig zu vier, höher
hinauf paarweise, oder einzeln. Die
Dekkblätter zurückgeschlagen, von
der Länge der Blumenstiele. Die Blu-
men in Trauben, fast stiellos, blau
oder gelb. Die Kelche mit klebrigen
Haaren besetzt; die Kelchblättchen
länger als die Blumenkronen, der
Sporn zurückgekrümmt, spizzig.

Antirrhinum arvense Linn.

Wohnort. Auf Aekern und sandigen Feldern,
z. B. bei Hanau an dem Lehrhof und

Zwei lange u. 2. kurze Staubf. Saamenkapseln. 395

dem Neuen - Wirthshaus; beim Frankfurter Forsthaus; am Walde bei der Sachsenhäuser Warte; bei Neu - Ysenburg; um Wenings, Giesen etc.

Blüthezeit. Juni — September. ☉

Fruchtreife. August — Oktober.

796. L. MINOR
Nobis.
Kleines Lein-
kraut.

Der Stengel aufrecht, sehr ästig, zottig - klebrig. Die Blätter verkehrt lanzettförmig, stumpf, zottig, die untern einander gegenüber stehend, die obern abwechselnd. Die röthlichen Blumen in den Blattwinkeln, lang gestielt, der Sporn zurückgekrümmt. Die drei obern Kelchabschnitten aufwärts und zurückgebo-gen, die untern kürzer.

Antirrhinum minus Linn.

Wohnort. Auf Aeckern unter der Saat, z. B. im Steinheimer Grund bei Hanau; bei der Hartig; um Frankfurt, Offenbach, Ysenburg, Giesen, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juni — August. ☉

Fruchtreife. September.

797. *L. VULGARIS* Moench.
Gemeines Leinkraut.

Die Wurzel kriechend, treibt weit umher aufrechte, ästige Stengel hervor. Die Blätter lanzettförmig-gleichbreit, spizzig, gedrängt stehend. Die gelben Blumen in stiellosen Aehren, auf der Spitze des Stengels, dachziegelförmig über einander liegend, mit goldgelbem, zottigem Gaumen, und geradem, spizzigem Sporn, welcher länger als der Blumenstiel ist.

Antirrhinum Linaria Linn.

b. *Monströsses Leinkraut*, (*Peloria*.) mit zwei, drei - fünfmal bespornten, fünf männigen Blumen, und fünfspaltigem, einwärts gefaltetem, stumpfem, geschlossenem Saume.

Wohnort.

Gemein auf Schutt, an Wegen, Zäunen, Ruinen, Bergen und zwischen dem Getreide. b. Am Maynufser bei Kesselstadt; von Hanau aus am Weg nach Rückingen gegen über der Papiermühle; in Weinbergen zwischen Soden und Neuenhayn; um Darmstadt.

Blüthezeit. Juni — August. 24

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Diese Pflanze, welche verdächtige Eigenschaften besitzt, wirft man in Smaland in die Milch, um dadurch die Fliegen zu töden. Sie giebt eine olivenbraune Farbe; ihren Blumen gehen die Bienen sehr nach; als Zierblume ist sie zu empfehlen. Sie ist officinell.

CCC. CYMBALARIA. Zymbelkraut.

798. C. MUR-
LIS Nobis.

Mauer-Zym-
belkraut.

Die Stengel flach aufliegend und wurzelnd. Die Blätter abwechselnd, herzförmig, fünflappig, glatt. Die veilchenblauen Blumen einzeln in den Blattwinkeln, mit kurzem und geradem Sporn.

Antirrhinum Cymbalaria Linn.

Wohnort.

Auf Mauern in Frankfurt auf dem Fischerfeld; auf einer alten Mauer an der Kapelle an der Ecke der Schnurgasse in Frankfurt; auf den Mauern des Senckenbergischen Stiftsgartens und an der Katharinenkirche zu Frankfurt.

Blüthezeit. April — August. 24

Fruchtreife. Juli — September.

Nutzen.

War sonst officinell.

799. C. ELA-
TINE Nobis.*Spiesförmiges
Zymbelkraut.*

Die Stengel ausgebreitet. Die Blätter abwechselnd, spiesförmig, gefranzt. Die gelb - violetten Blumen einzeln, in den Blattwinkeln. Die Blumenstiele fadenförmig. Die Kelche haarig. Der Sporn zurückgekrümmt, spizzig, etwas kürzer als die Blumenkrone.

Antirrhinum Elatine Linn.

Wohnort.

Auf Brach - und Saatäckern, z. B. auf Aekern bei der Hartig; vor dem Vilbelerwald und um Vilbel; bei Massenheim; um die Oed bei Frankfurt; zwischen dem Schwarzguldenloch und dem Hellerhof bei Frankfurt und hinter der Gallenwarte nach Höchst hin; zwischen Soden und Naumhayn; um Giesen etc.

Blüthezeit.

Juli — September. ☉

Fruchtreife.

August — Oktober.

800. C. SPURIA
Nobis.*Unüchtes Zym-
belkraut.*

Die Stengel flach aufliegend. Die Blätter abwechselnd, eyförmig, rauhaarig, die untern gekerbt, die obern glatträndig. Die gelb - schwärzpurpurfarbigen Blumen, einzeln in den

Blattwinkeln, gestielt, mit etwas gekrümmtem, spizzkegelförmigem, kürzerem Sporn, als die Blumenkrone. Die Kelche haarig.

Antirrhinum spurium. Linn.

Wohnort. Auf Brach- und Saatäkkern, z. B. bei Dörnigheim; bei der Hartig; bei Dorfelden; um Frankfurt zwischen dem Schwarzguldenloch und dem Hellerhof, hinter der Oed und hinter der Friedburger- und Gallenwarte; um Giesen etc.

Blüthezeit. Juli — September. ☉

Fruchtreife. August — Oktober.

CCCI. SCROPHULARIA. Braunwurz.

801. S. NODOSA. Die Wurzel sehr knotig und faserig, weisslich. Die Stengel stumpf-
Knotige
Braunwurz. ekkig, purpurröthlich. Die Blätter gestielt, herzförmig, sägeartig gezähnt. Die Blumen an der Oberlippe purpurroth, an der untern grün.

Wohnort. Gemein an Gräben, in Gebüsch und feuchten Wäldern.

Blüthezeit. Juni, Juli. 4

Fruchtreife. August, September.

Beobacht. Diese Pflanze, welche einen starken widrigen Geruch hat, wird von mancherlei Insekten stark besucht, z. B. von Wespen und Schlupfwespen, dem *Byrrhus Scrophulariae*, *Curculio pericarpus*, *Tenthredo scrophulariae* etc. Dem Vieh scheint sie als Futter nicht zuträglich zu seyn.

Nutzen. Ihre Wurzel soll in den Würmern der Schweine brauchbar seyn und die Blättern geben eine braune Farbe. Die Bienen besuchen ihre Blumen häufig. Sie ist officinell.

802. S. AQUATICA.

Wasserbraunwurz.

Der Stengel mit häutigen Ekken. Die Blätter eylanzettförmig, spizzig, sägeartig gezahnt, herablaufend. Die Blumen an der Oberlippe dunkelroth, an der untern grün, mit purpurroth gemischt.

Wohnort.

An Gräben und Bächen, z. B. an dem Bach beim Hanauer Fischerhof und an Gräben hinter der Hanauer-Fasanerie; an dem Bach zwischen der Frankfurter Saustiege und Ysenburg; in dem Grummelbach bei Giesen und um Grossen-Buseck etc.

407
~~440~~

Zwei lange u. 2. kurze Staubf. Saamenkapseln.

Blüthezeit. Juni, Juli. 2

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die Blumen dieser stinkenden Pflanze, geben den Bienen Stoff zu Honig. Sie war officinell.

CCCH. DIGITALIS. Fingerhut.

303. D. PURPUREA. Der Stengel aufrecht, weichhaarig. Die Blätter abwechselnd, eyförmig, spizz gekerbt, in den Blattstiel laufend, runzlich, zu beiden Seiten weichhaarig. Die Kelchblättchen eyförmig, spizzig. Die Blumen einseitig, in dichten Aehren, schön purpurroth, inwendig mit Punkten bezeichnet, sind stumpf, und haben ganze Oberlippen.

Wohnort. In Gebirgswäldern z. B. hinter Königstein nach dem Feldberg; häufig auf dem Gebirg zwischen Wisbaden und Langenschwalbach; bei der Falkensteiner Mühle, und im Wald zwischen Falkenstein und Nieder-Reifenberg.

Blüthezeit. Juni, Juli. ♂

Fruchtreife. August, September.

2. Th. C c

Bemerkung. Menschen und Thieren ist der rothe Kingerhut ein scharfes Gift! Die Trutzhühner werden auf seinen Genuss betrunken, bekommen bluthigen Koth, zehren ab und sterben.

Nutzen. Eine wichtige Arzneypflanze! Aus den Blumen erhalten die Bienen etwas Honig. Als Zierblume ist sie sehr zu empfehlen.

804. D. AMBIGUA.

Braungefleckter Fingerhut.

Der Stengel aufrecht, weichhaarig. Die Blätter abwechselnd, eylanzettförmig, spizzig, oben glatt, unten weichhaarig. Die Kelchblättchen lanzettförmig. Die Blumen einseitig, in weitläuftigen Aehren, okkerfarben, mit braunen Punkten bezeichnet, sind stumpf, und haben ausgerändete Oberlippen.

Wohnort.

In Wäldern, z. B. bei den Rückingerschlägen ohnweit Hanau, im alten Wald und in der Bulau; in Gebüschern beim Steinheimer Galgen; auf den Anhöhen zwischen Offenbach und Biber; häufig hinter dem Frankfurter Forsthaus; zwischen Ysenburg und dem Saustiege; im

Wald hinter Cronenberg nach Falkenstein zu; bei Harreshausen; in den verlassenen Weinbergen bei der Katz jenseits Gelnhausen; häufig um Kleeberg; bei Kelsterbach etc.

Blüthezeit. Juli, August. 24

Fruchtreife. September.

Nutzen. Sie verdient als Zierblume in unsere Gärten aufgenommen zu werden. Die Bienen gehen den Blumen sehr nach.

CCCIH. LIMOSELLA. Sumpfkraut.

805. L. AQUATICA.

Gemeines

Sumpfkraut.

Der Stengel kriechend und wurzelnd. Die Blätter sehr langgestielt, lanzettförmig, fleischig, glatt, glatträndig. Die röthlichen Blumen in den Blattwinkeln, kurz gestielt.

Wohnort. Auf überschwemmten sandigen Stellen, z. B. häufig von Hanau aus jenseits den Rückinger-Schlägen rechts und links auf dem Weg nach Rückingen zu; an feuchten Orten beim Hanauer Galgen; vor Rödelheim; an dem Sumpf hinter der Schleifmühle zu Hausen; im Rulhausen beim Teich oberhalb Gedern; um Giesen etc.

Blüthezeit. Juli — Oktober. ☉

Fruchtreife. September — November.

CCCIV. OROBANCHE. Ervenwürger.

806. O. LAEVIS. Der Stengel sehr einfach, eben, violet-bläulich. Der Dekkblätter sind drei an einer jeden Blume. Der Kelch vier-fünfspaltig. Die Staubfäden etwas über die Blumenkrone hervorragend. Die Narbe einfach, gross. Die Blumen schön violet-blau.

Orobanche purpurascens Jacq.

Wohnort. Eine Schmarozzerpflanze welche Reichard häufig auf dem Riederberg bei Frankf. fand, wir aber, mehrmalen daselbst vergelblich suchten.

Blüthezeit. Mai, Juni. 24

Fruchtreife. Juli, August.

Bemerkung. Wir haben ganz genau die getrockneten Exemplare in Reichards herbar. mit der in Jacquin fl. austr. t. 276. unter dem Namen O. purpurea, nachher aber von ihm purpurascens genannten Pflanze, verglichen, und völlig einerlei gefunden.

807. O. ARENARIA Borckh.

Sand-Ervenwürger.

Der Stengel sehr einfach, weichhaarig, gelblich oder purpurfarbig-bläulich. Der Dekkblätter sind drei an einer jeden Blume. Der Kelch vierselten fünfspaltig. Die Staubfäden kürzer als die Blumenkrone. Die Narbe kopfförmig, zweispaltig. Die geruchlosen purpurfarbig-blauen Blumen fünfspaltig; die Oberlippe zweispaltig, die Unterlippe dreispaltig, inwendig der Länge nach mit zwei weisslichen Erhabenheiten versehen.

Wohnort.

Eine Schmarozzerpflanze welche auf dürrem Sandboden wächst, z. B. auf dürrer Sandhügeln von Frankfurt aus rechts bei Arheilgen; bei Kelsterbach.

Blüthezeit.

Juni — August. 4

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Wie bei der folgenden Art.

808. O. MAJOR.

Grosser Ervenwürger.

Der Stengel sehr einfach, weichhaarig. Nur ein Dekkblatt an jeder Blume. Der Kelch vierspaltig. Die Staubfäden nur etwas über die Blu-

men hervorragend. Die Narbe kopfförmig, zweitheilig. Die stark gewürznelkenartig riechenden Blumen weisslich, oben sehr schwach purpurröthlich, mit etwas gelben untermischt; der Helm inwendig mit purpurröthlichen Adern durchmahlt.

Wohnort.

Eine Schmarozzerpflanze welche auf trocknem Boden, auf Wegen, auf Wiesen und bergigen Triften wächst, z. B. am Fahrweg von Hochstadt nach der Hartig; an dem Hohlweg zwischen Bischofsheim und der Lohe, bei Bergen, Enckheim, Rumpenheim, Offenbach, häufig um Frankfurt, auf dem Lerchenberg, um Darmstadt; auf trocknen Hügeln bei Treys-Münzenberg; bei Steinfurt etc.

Blüthezeit. Juni — August. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. In Schonen werden die jungen Stengel sowohl roh, als gekocht als Salat gegessen.

809. O. RAMOSA.
Aestiger Er-
venwürger.

Der Stengel ästig, blassgelb, feinhaarig. Der Dekkblätter sind drei an einer jeden Blume. Der Kelch vier-

spaltig. Die Staubfäden kürzer als die fünfspaltigen Blumenkronen. Die kleinen Blumen bald blassbläulich, bald purpurröthlich, oder weiss.

Wohnort. Eine Schmarozzerpflanze welche auf Hanffeldern um Darmstadt wächst.

Blüthezeit. Juni — August. 4

Fruchtreife. August, September.

Schaden. Dieser ist sehr beträchtlich indem diese Pflanze auf den Hanffeldern dem Hanf alle Nahrung aussaugt. Hofrath Gmelin in Karlsruhe hat berechnet, daß der Schaden der durch sie jährlich im Bädischen entsteht, auf 50000. fl. sich beläuft.

FÜNFZEHNTE KLASSE.

TETRADYNAMIA. Mit 4. lang. u. 2. kurz. Staubfäden.

I. ORDNUNG.

SILICULOSAE. Mit Schötchen.

*) Mit etwas aufgeblasenen Schötchen.

CCCV. Der Kelch vierblättrig, abste-
 CAMELINA. die Blättchen lanzettförmig. Die Blumen-
Leindotter. krone vierblättrig, mit nagelförmigen
 Verlängerungen, stumpf und ganz. Die
 Staubfäden ohne Zähne. Die Narbe kopf-
 förmig. Das aufgeblasene, herzförmige
 Schötchen, besteht aus zwei freiwillig
 abfallenden Schalen, mit hervorstehen-
 dem Rand, welche obenher zwei halb-
 walzenförmige Verlängerungen haben,
 die in ihrer Verbindung ein Rohr bil-
 den, welches den, auf der herzför-
 migen Scheidewand sizzenden Griffel
 aufnimmt. An dem Umfange der Schei-
 dewand befinden sich 10 — 15 rundli-
 che, ausgerändete Saamen an eigenen
 Stielchen, wovon aber nicht alle reifen.

CCCVI.
COCHLEA-
RIA.

Löffelkraut.

Der Kelch vierblättrig, abstehend; die Blättchen länglich und hohl. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Die Staubfäden ohne Zähne. Der Griffel sehr kurz. Die Narbe stumpf. Das Schötchen herzförmig, aufgeblasen, an der Spitze eingeschnitten. Die freiwillig abspringenden Schalen haben in der Mitte einen hervorstehenden Bukkel, sind am Rande wo sie an der Scheidewand anstehen etwas beigezogen, an der Oberfläche mit hervorstehenden, in einander laufenden Linien geziert, und enthalten viele, eyförmige, ausgerändete Saamen.

CCCVII.
ADYSETON.
Steinkraut.

Der Kelch vierblättrig, abstehend; die Blättchen länglich und flach. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Die zwei kürzern Staubfäden haben in der Mitte ein kleines fadenförmiges Zähnchen. Die Narbe stumpf. Das Schötchen am Umkreis rund, an der Oberfläche schwach gewölbt und fast glatt. Die runde Scheidewand mit dem sehr kurzen, stehenbleibenden Griffel von gleicher Grösse der abspringenden Schalen. Die Fächer-

chen enthalten zwei zirkelrunde, gerändete Saamen.

CCCVIII.
ALYSSON.
Alyse.

Der Kelch vierblättrig, etwas offestehend; die Blättchen eyförmig. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen; die Blättchen halbzweispaltig. Die zwei kurzen Staubfäden am Grunde gezähnt. Die Narbe kopfförmig. Das Schötchen klein, am Umkreis oval, auf der Oberfläche glatt, oder doch sehr schwach gewölbt, hat einen runden, sehr langen, stehendbleibenden Griffel, eine gleich grosse, ovale Scheidewand, zwei abspringende Schalen und ein - zwei - oder dreisaamige Fächerchen. Die Saamen zusammengedrückt, zirkelrund, mit einem fadenförmigen Rand umgeben.

CCCIX.
ARMORACIA.
Meerrettig.

Der Kelch vierblättrig; die Blättchen eyförmig. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Die Staubfäden ohne Zähne. Der Griffel fehlt. Die Narbe dikk, kopfförmig. Zwei Drüsen unter jedem kurzen Staubfaden. Das Schötchen länglich, geglättet, etwas wellenförmig, mit dreisaami-

gen Fächerchen. Die Saamen eyförmig, ausgerändet.

CCCX. Der Kelch vierblättrig; die Blättchen
 DRABA. eyförmig-länglich, am Grunde gleich.
Hungerblume. Die Blumenkrone vierblättrig, mit sehr
 kleinen nagelförmigen Verlängerungen,
 hat entweder ungetheilte, oder an der
 Spitze eingeschnittene, oder halb zweis-
 paltige Blättchen. Die Staubfäden ohne
 Zähne. Die Narbe kopfförmig, flach.
 Das Schötchen eyförmig-länglich, etwas
 zusammengedrückt, an der Spitze nicht
 eingeschnitten, zweifächerig, vielsaamig,
 und die Scheidewand steht mit den
 Schalen gleichlaufend. Die Saamen ey-
 förmig, etwas zusammengedrückt.

**) Mit an der Spitze ausgerändeten und
 einem häutigen Rande umgebenen Schötchen.

CCCXI. Der Kelch vierblättrig; die Blättchen
 THLASPI. stumpf. Die Blumenkrone vierblättrig;
Täschelkraut. regelmässig. Der Griffel sehr kurz. Die
 Narbe kopfförmig. Das Schötchen zir-
 kelnrund, oder fast rund, die beiden
 Schalen kahnförmig ausgehöhlt, haben
 auf der Gegenseite ihrer Oeffnung, oder
 auf ihrem Rücken einen herumlaufen-
 den häutigen Rand. Die Fächerchen ent-

halten viele eyförmige, ausgerändete Saamen.

CCCXII.

IBERIS.

Zungenblume.

Der Kelch vierblättrig; die Blättchen verkehrt, eyförmig und hohl. Die Blumenkrone vierblättrig, unregelmässig; die zwei äussern Blättchen grösser. Der Griffel kurz. Die Narbe stumpf. Das Schötchen rundlich; die Scheidewand schmal länglich, hat auf beiden Seiten herumlaufende Fortsezzungen, an welchen die kahnförmiggebogenen, geflügelten Schalen ansitzen. Die Fächerchen einsamig. Die Saamen rundlich, eyförmig, zusammengedrückt, in der Spitze jeder Seite der Scheidewand mit einem eigenen Faden befestiget.

CCCXIII.

NASTUR-
TIUM.

Kresse.

Der Kelch vierblättrig, abstehend; die Blättchen hohl. Die Blumenkrone vierblättrig. Drüsen 2, in der Grundfläche der kürzern Staubfäden. Der Griffel kurz. Die Narbe stumpf. Das Schötchen auf der Oberfläche platt, am Umkreis oval, oben krum eingeschnitten; die Schalen kahnförmig ausgehöhlt, unten sanft, oben stärker geflügelt; die Flügel höher als der Griffel; die Scheidewand elliptisch, hat auf ihrer obern

Spizze auf jeder Seite an einem eigenen Faden einen herabhängenden Saamen.

***) Mit an der Spizze ausgerändeten Schötchen, ohne häutigen Rand.

CCCXIV.
SENCKEN-
BERGIA.

Senckenbergie.

Der Kelch vierblättrig, abstehend; die Blättchen hohl. Die Blumenkrone fast ohne Blätter. Staubfäden nur zwei. Griffel keiner. Die Narbe stumpf. Das Schötchen zirkelrund, am Rande spizzig, ausgerändet, mit einsaamigen Fächerchen.

CCCXV.
LEPIDIUM.
Pfefferkraut.

Der Kelch vierblättrig, abstehend; die Blättchen hohl. Die Blumenkrone vierblättrig, gleich. Drüsen, sechs kleine. Der Griffel sehr kurz. Die Narbe stumpf. Die kahnförmig ausgehöhlten Schalen laufen oben und unten spizzig aus, und bilden ein länglich-ovales Schötchen; die elliptische Scheidewand hat auf beiden Seiten einen Saamen.

CCCXVI.
RODSCHIEDIA.

Rodschiedie.

Der Kelch vierblättrig, abstehend; die Blättchen hohl. Die Blumenkrone vierblättrig, gleich. Das Schötchen keilförmig anlaufend, mit kahnförmig ausgehöhlten, an der Kante nicht geflügelten, am Ende aber in einen Flügel auslaufenden Schalen, deren Oeffnung tief

sitzt, mit welcher sie an der elliptisch gebildeten Scheidewand anstehen; die Fächerchen vielsaamig.

II. O R D N U N G.

SILIKUOSAE. Mit Schoten.

*) Mit gleichbreiten und runden Schoten.

CCCXVII.
SISYM-
BRIUM.
Sisymbrium.

Der Kelch vierblättrig; die Blättchen etwas abstehend. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Die Narbe stumpf. Vier Drüsen am Grunde des Fruchtknotens. Die Schote lang, mit geringen Vertiefungen, und geraden, nicht zurückgerollten Klappen. Die Saamen ausgerandet.

CCCXVIII.
SINAPIS.
Senf.

Der Kelch vierblättrig, sehr abstehend, gefärbt. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen; die Blättchen aufrecht. Drüsen vier, wovon sich zwei zwischen den kürzern Staubfäden und dem Fruchtknoten, und zwei zwischen den längern Staubfäden und dem Kelch befinden. Die Narbe schwach ausgerandet, zusammengedrückt. Die Scheidewand der runden mäfsig langen Schote, ist über die Schalen hinaus in einen langen

schwerdförmigen, oder vierekkigen Schnabel verlängert. Die beiden Fächer gewöhnlich 2-3 saamig, zuweilen findet sich aber noch in dem Schnabel ein kleines, entweder leeres, oder mit einem kleineren Saamen versehenes Fach.

CCCXIX.
BRASSICA.
Kohl.

Der Kelch vierblättrig, abstehend, gefärbt, die Blättchen gleichbreit, hohl, an der Spitze kappenförmig, am Grunde höckerig. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Drüsen vier, wovon zwei zwischen den längern Staubfäden nach aussen und zwei zwischen den kürzern Staubfäden nach innen liegen. Der Fruchtknoten rund, der Griffel kurz und dikk. Die Narbe kopfförmig. Die Schote länglich, rund. Die den kürzern Schalen entgegengesetzte Scheidewand geht in einen pfriemenförmigen etwas zusammengedrukten stumpfen Schnabel aus, der sich mit der Narbe endigt. Die Fächerchen vielsaamig.

**) Mit vierekkigen Schoten.

CCCXX.
ERYSIMUM.
Hederich.

Der Kelch vierblättrig, geschlossen, gefärbt; die Blättchen am Grunde gleich. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Zwischen

den beiden kürzern Staubfäden befinden sich zwei Drüsen. Die Narbe kopfförmig. Die Schote mit Vertiefungen, einer den Schalen entgegengesetzten Scheidewand, und sehr kurzem Schnabel. In jedem Fächerchen befinden sich viele rundliche Saamen.

CCCXXI.
TURRITIS.
Thurmkraut.

Der Kelch vierblättrig, nur etwas von einanderstehend, am Grunde gleich. Die Blumerkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Die sehr lange, steifstehende, rautenartig-zusammengedrückte Schote, endigt sich mit der zweihalsigen, stiellosen Narbe, und die Scheidewand ist mit den Schalen gleichlaufend. In jedem Fächerchen befinden sich viele ausgerändete, zusammengedrückte Saamen.

CCCXXII.
ERUCA.
Rauke.

Der Kelch vierblättrig, geschlossen, am Grunde gleich. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Die rautenartig-zusammengedrückte Schote, endigt sich entweder mit einem schwertförmigen oder fast viereckigen Griffel.

***) Mit zusammengedrückten Schoten.

CCCXXIII.
CHEIRAN-
THUS.

Levkoje.

Der Kelch vierblättrig, zusammenge-
neigt; zwei Blättchen am Grunde etwas
höckerig. Die Blumenkrone vierblät-
terig, mit nagelförmigen Verlängerungen.
Von den 6 Staubfäden stehen die 2 kür-
zern bei den höckerigen Kelchblättern
und sind mit Drüsen umgeben. Der
sehr kurze Griffel hat eine zweitheilige,
zurückgeschlagene, dikkliche Narbe. Die
lange zusammengegedrückte stumpfwinke-
lige Schote, hat eine dünne Scheidewand,
einen sehr kurzen zweispaltigen Schna-
bel, und enthält in jedem Fächerchen
viele zusammengedrückte, am Rande oft
häufige Saamen.

CCCXXIV.
ARABIS.

Arabis.

Der Kelch vierblättrig, zusammenge-
neigt; zwei Blättchen am Grunde etwas
höckerig, oder auch gleich. Die Blu-
menkrone vierblättrig, mit nagelförmi-
gen Verlängerungen. Drüsen, vier. Die
Schote lang, zusammengedückt, endigt
sich mit einem sehr kurzen, stumpfen,
Schnabel und enthält viele gerändete
Saamen.

CCCXXV.
CARDAMINE
Kardamine.

Der Kelch vierblättrig, am Grunde gleich. Die Blumenkrone vierblättrig; mit nagelförmigen Verlängerungen. Drüsen sechs; zwei am Grunde eines jeden kürzern Staubfadens, die übrigen zwischen den grössern Staubfäden. Die Narbe kopfförmig. Die längliche zweischneidige Schote engigt sich mit dem stumpfen Griffel; die Schalen springen elastisch auf, und rollen sich mehrentheils zurück; die häutige Scheidewand ist mit den Schalen gleichlaufend. Die Fächer enthalten wenige Saamen.

CCCXXVI.
DENTARIA.
Zahnwurz.

Der Kelch vierblättrig, sehr klein, etwas abstehend; die Blättchen am Grunde gleich. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Die Narbe stumpf ausgerandet. Die Schote lang, rund, springt elastisch vom Grunde gegen die Spitze mit zurückgerollten Schalen von einander; die Scheidewand ist etwas länger als die Schalen. Die Fächerchen enthalten viele Saamen.

CCCXXVII.
LUNARIA.
Mondviole.

Von den vier zusammengeneigten Kelchblättern sind zwei entgegengesetzte am Grunde höckerig und sakkförmig. Die

Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Der gestielte Fruchtknoten, hat einen kurzen Griffel, und eine dicke, stumpfe eingeschnittene Narbe. Die grosse Schote ist rundlich, blattartig zusammengedrückt, und die beiden Schalen sind der ihnen gleichlaufenden Scheidewand gleich. Sie enthält wenige nierenförmige, flache, am Rande geflügelte Saamen.

****) Mit niedergebogenen Schoten.

CCCXXVIII.
BAEUMER-
TA.
Bäumerte.

Der Kelch vierblättrig; die Blättchen am Grunde gleich. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Drüsen, vier. Die runde Schote vielsaamig, mit geraden, von einander gehenden Schoten.

CCCXXIX.
CAROLI-
GMELINA.
*Karls-Gme-
line.*

Der Kelch vierblättrig, abstehend, gefärbt, am Grunde gleich. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Die Schote länglich, kurz und mit Vertiefungen.

III. ORDNUNG.

PERICARPIFERAE. Mit Fruchthüllen.

CCCXXX.
VOGELIA.
Vogelie.

Der Kelch vierblättrig, etwas abstehend. Die Blumenkrone vierblättrig.

kugelige nussartige Fruchthülle ist zweifächerig, hat eine durchsichtige Scheidewand, und oben zwei klaffende Hervorragungen, zwischen welchen der Griffel steht, der aber bei völliger Zeitigung abfällt. Sie enthält gewöhnlich nur einen Saamen, aber immer ist die Spur von der Scheidewand und dem andern verkrüppelten Saamen da.

CCCXXXI.
CORONOPUS.

Krähenfuss.

Der Kelch und die Blumenkrone sind vierblättrig. Die Narbe einfach. Die Fruchthülle einzeln, nussartig, rundlich-nierenförmig und igelartig, besteht aus 2 nebeneinander liegenden, elliptischen, einsaamigen Fächerchen. Die Scheidewand beinartig.

CCCXXXII.
RAPHANISTRUM.

Akkerrettig.

Der Kelch vierblättrig; die Blättchen gegeneinandergeneigt, wovon zwei am Grunde bauchig sind. Die Blumenkrone vierblättrig. Die schotenförmige Fruchthülle, rund, zugespitzt, bei der Reife rosenkranzartig gegliedert, besteht aus einer der Länge nach herablaufenden Reihe knochenartiger Fächer, wovon jedes einen Saamen enthält.

CCCXXXIII.
RAPHANUS.
Rettig.

Der Kelch vierblättrig; die Blättchen gegeneinandergeneigt, am Grunde aufgeblasen. Die schotenförmige Fruchthülle rund, kegelartig gestaltet, mit einem langen spizzigen Schnabel versehen, inwendig schwammig, hat Vertiefungen, ist vielsaamig und hat einfache Fächer. Diese Gefache scheinen oft eine Scheidewand zu haben, im Grunde aber zertheilen sie sich durch mannigfaltig sich durchkreuzendes schwammiges Gewebe in Gefache mancherlei Grösse und ohne alle Ordnung.

CCCXXXIV.
ISATIS.
Waid.

Der Kelch vierblättrig, gefärbt; die Blättchen etwas abstehend. Die Blumenkrone vierblättrig, mit nagelförmigen Verlängerungen. Der zweischneidige, zusammengedrückte Fruchtknoten hat keinen Griffel, aber eine stumpfe, kopfförmige Narbe. Die Flügelfrucht elliptisch zusammengedrückt, einfächerig und einsaamig.

FÜNFZEHNTE KLASSE.

TETRADYNAMIA. Mit 4. lang. u. 2. kurz. Staubfäden.

I. O R D N U N G.

SILICULOSAE. Mit Schötchen.

CCCV. CAMELINA. Leindotter.

†. 810. C. SA-

TIVA Medic.

Memeiner

Leindotter.

Die Blätter lanzett-pfeilförmig ,
manchmal tief sägartig gezähnt. Die
blassgelben Blumen in Trauben.
Die Schötchen glätt.

Myagrum sativum Linn.

Wohnort.

Auf Aekkern und besonders zwischen
dem Flachs, z. B. bei Gross-Auheim;
bei den Röderhöfen ohnweit Frankfurt;
auf dem Lerchenberg; zwischen Ock-
stadt und der Nauheimer Saline, um
Darmstadt, Giesen etc. Angebant wird
er hin und wieder.

Blüthezeit. Mai — Juli. ☉

Fruchtreife. August.

Nutzen.

So schädlich diese Pflanze unter dem Flachs ist, so nützlich ist ihr Saame; weshalb man sie auch an vielen Orten anbaut. Derselbe dient nicht allein zum Futter für die Vögel und zur Mästung des Geflügels, sondern man preßt auch aus demselben ein gutes mildes Oehl, welches in der Haushaltung mit Vortheil an Speisen und zum Brennen gebraucht wird. Dieses Oehl gefriert nur bei der allerstrengsten Kälte, wird aber leicht ranzig. Die Griechen haben den Saamen, seines angenehmen Geschmakks wegen, mit unter das Brod gebakken. Getrocknet ist das Kraut nach NoCCA, für die Seidenwürmer brauchbar, welche es zu der Zeit, wenn sie sich einspinnen wollen, vorzüglich gerne fressen. Die Blüten sind den Bienen sehr angenehm.

CCCVI. COCHLEARIA. Löffelkraut.

†. 811. C. OFFICINALIS.

*Officinelles
Löffelkraut.*

Die Wurzelblätter gestielt, herzförmig-rundlich, die Stengelblätter stiellos, länglich, etwas buchtig, gezähnt. Die Blumen weiss.

Wohnort. Häufig bei der Saline zu Soden. In unsern Gärten wird sie hin und wieder als Küchengewächs gezogen.

Blüthezeit. Mai — August. ♂

Fruchtreife. Juli — September.

Nutzen. Man ißt diese Pflanze bei uns als Gemüse und gebraucht sie auch zu Kräutersuppen. In Irland zerhakt man sie nach Olaffen, und ißt sie mit Molken oder Milch als Gemüse, auch macht man sie zum Gebrauch auf den Winter mit Salz, in grosse Fässer ein. Den Schaafen ist sie ein nahrhaftes gesundes Futter. Ihre Blüthen geben den Bienen viel Stoff zu Wachs und Honig. Sie ist officinell.

CCCVII. ADYSETON. Steinkraut.

812. A. CALY- Die Blätter keillanzettförmig,
CINUM. *Nobis.* stumpf, graugrün. Die Kelche blei-
Gemeines bend. Die schwefelgelben, baldigst
Steinkraut. weisswerdenden, ganzen Blumen-
blätter, kaum etwas länger als der
Kelch.

Alyssum calycinum Linn.

Wohnort. Auf dürrem der Sonne ausgesetztem Boden. Bei Hanau am Mayn disseits Stein-

heim; auf der Dörnigheimer Heide; an den Weinbergen zu Bergen; zwischen Seckbach und Bornheim und auf dem Bornheimer Berg; am Mayn von Fechenheim bis Frankfurt etc.

Blüthezeit. Mai — Juli. ☉

Fruchtreife. Juli — September.

813. A. MONTANUM *Nobis.*
Bergstein-
kraut,

Der Stengel weitschweifig, auf den Boden ausgebreitet. Die Kelche abfallend. Die Blätter lanzettförmig, mit stachlichen Punkten bezeichnet. Die gelben Blumen in kleinen Trauben, sind viel grösser als der Kelch.

Alyssum montanum Linn.

Wohnort. Auf sonnigen trocknen (weissens sandigen) Plätzen z. B. am Mayn disseits Steinheim; hinter Gross-Auheim; auf sandigen Heiden bei Rumpenheim, auch disseits Rumpenheim am Mayn; bei der Mühlheimer Ziegelhütte auf sandigen Hügeln; zwischen Darmstadt und Arheilgen auf sandigen Hügeln; auf einer Anhöhe zwischen Schierstein und Nordenstadt.

Blüthezeit. Mai, Juni. 24

Fruchtreife. Juli, August.

CCCVIII. ALYSSON. Alysse.

814. A INCA-
NUM.

Bestäubte

Alysse.

Der Stengel aufrecht, ästig. Die Blätter lanzettförmig, glatträndig oder etwas gezähnt, weissgrau bestäubt. Die weissen Blumen in Doldentrauben, Die Schötchen etwas haarig.

Wohnort.

Auf sandigen, sonnigen Plätzen. Zu Hanau vor dem Steinheimerthor an der Kieselkaute; an Aekkern vor Nieder-Rodenbach, am Maynufer bei Philippsruh; um Frankfurt fast auf allen Anhöhen; um Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Es ist ein gutes Schaaffutter und giebt den Bienen Stoff zu Wachs.

CCCIX. ARMORACIA. Meerrettig.

†. 815. A. RUS-
TICANA *Nobis.*

Gemeiner

Meerrettig.

Die Wurzelblätter lanzettförmig, gekärbt; die Stengelblätter eingeschnitten. Die Blumen weiss oder röthlich.

Cochlearia Armoracia Linn.

Wohnort. Wird überall häufig bei uns gebaut, und findet sich auch an wässerigen Plätzen hin und wieder gleichsam wild.

Blüthezeit. Juni, Juli, 2

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die Wurzel wird zu mancherlei Speisen gebraucht; die rohe geschabte mit Essig und Zucker vermischte, giebt einen Salat, der insgemein zum Rindfleisch und zu Fischen gegessen wird; die gekochte hat gleichen Gebrauch, nur riecht man auf ihren Genuss höchst unangenehm aus dem Munde; um ihre Schärfe zu mildern, darf man sie nur mit geschälten und gestossenen Mandeln, oder Milch vermischen. Dass sie mit Weinessig digerirt die Sommersprossen vertreibt; davon hat unsere Erfahrung gerade das Gegentheil bewiesen. In Schweden wird der ausgepresste Saft mit abgeschäumter Milch vermischt, und als Schminkmittel gebraucht. Man hat auch versucht Stärke aus ihr zu machen, aber ohne Nutzen; Beckmann führt die pulverisirte Wurzel als ein Gerbmateriale an. Die Blätter sind für das Vieh ein milchvermehrendes Futter, werden aber

fast immer von der *Chrysomela Armoraciae* zerfressen. Die Wurzel ist officinell.

CCCX. DRABA. Hungerblume.

316. D. VERNALIS. Die Blätter lanzettförmig, etwas gezähnt. Die schneeweissen Blumen, auf zahlreichen einfachen Schaften. Die Blumenblätter halb zweispaltig. Der Griffel sehr kurz.

Wohnort. Ueberall in Menge, auf Aeckern und Feldern.

Blüthezeit. März — Juni. ☉

Fruchtreife. Mai, Juni.

Beobacht. Wann Regen kömmt, oder die Nacht einbricht, neigt dieses Pflänzchen seine Blüthen herab.

Nutzen. Den Schaafen ist sie ein angenehmes gesundes Futter. In Småland zeigen sie durch ihre Blüthen an, wenn Sommerkorn gesäet werden soll.

CCCXI. THLASPI. Täschelkraut.

317. T. ARVENSE. Die Blätter umfassen den Stengel züt Hälfte, sind pfeilförmig, länglich, buchtig-gezähnt und glatt.

Die Blumen weiss, mit ganzen Blättern. Die Schötchen zirkelrund und geglättet.

- Wohnort. Auf Aeckern und Feldern gemein.
Blüthezeit. April — Juli. ☉
Fruchtreife. Juli — September.
Nutzen. Es riecht völlig wie Knoblauch und wird von dem Vieh gern gefressen. Der Saame kann statt des Senfsaamens benutzt werden. Das Kraut giebt eine gute Moschusfarbe.

318. T. CAMPE- Die Blätter umfassen den Stengel
STRE. zur Hälfte, sind pfeilförmig, ge-
Feldtäschel- zahnt lanzettförmig, weissgrau be-
kraut. stäubt. Die weissen Blumenblätter
kaum etwas länger als der Kelch.
Die Schötchen rundlich, vollkom-
men glatträndig und haarig.

- Wohnort. Häufig auf Feldern und zwischen der
Saat.
Blüthezeit. April — Juli. ☉
Fruchtreife. Juni — August.
Nutzen. Diese Pflanze hat einen scharfen Ge-
schmack und wird von den Schweinen
gefressen. Da wo sie wächst, zeigt sie

wenigstens thonige Aekern an. Sonst war sie officinell.

819. T. PERFO-
LIATUM.
*Durchwachse-
nes Täschel-
kraut.*

Der Stengel am Grunde ästig. Die Stengelblätter herzförmig - umfassend, etwas gezähnt und glatt. Die weissen Blumenblätter von der Länge des Kelchs. Die Schötchen verkehrt herzförmig.

Wohnort.

Auf Aekern, Feldern, an Wegen, Zäunen und Gebüsch, z. B. im Gebüsch bei der Hartig; in Hekken um Bergen und Enckheim; unterhalb Seckbach; bei Frankfurt am Krötenweg, am Mühl- und Altenberg, auf dem Lerchenberg etc.

Blüthezeit.

April, Mai. ☉

Fruchtreife.

Juni.

CCCXII. IBERIS. Zungenblume.

820. I. NUDI-
CAULIS.
*Naktstengli-
che Zungen-
blume.*

Der Stengel fast nackt und einfach. Die Wurzelblätter in einem Kreis auf der Erde liegend, halbgefiedert; die Fiederblättchen stumpf, das äusserste das grösste. Die Blumen weiss.

Wohnort.

Fast allenthalben auf Aekern und Sandfeldern.

Blüthezeit. April — Juni. ☉

Fruchtreife. Mai — Juli.

Beobacht. Sie weicht zuweilen ab, mit ästigem, blätterigem Stengel und glatträndigen Blättern.

Nutzen. Die Schaafte fressen diese Pflanze sehr gerne. Nach N o c c a dienen in Italien die jungen Blätter im Frühjahr als Gemüse.

CCCXIII. NASTURTIIUM. Kresse.

†. 821. N. SATIVUM Moench.
Gartenkresse. Die Blätter lanzettförmig, eingeschnitten- vielspaltig, stumpf. Die Blumen weiss.

Nasturtium hortense crispum Bauh.

Lepidium sativum Linn.

b. Mit kraussen Blättern.

Wohnort. Ihr Vaterland ist unbekannt; nach S c o u t e n sollte man glauben es seyen die Inseln der Magellanischen Meerenge. In unsern Gärten wird sie häufig gezogen.

Blüthezeit. Mai — Juli. ☉

Fruchtreife. Juni — August.

Nutzen. Sie wird als Salatpflanze benutzt; auch mit Zukker auf Butterbrod gegessen. Ihr Saame giebt ein gutes Brennöhl,

auch könnte derselbe einigermassen den Senf ersetzen. Sie ist officinell.

822. N. IBERIS
Nobis.

Gichtkresse.

Die untersten Blätter lang gestielt, lanzettförmig, sägezählig oder verschieden tief eingeschnitten, die obern gleichbreit und glatträndig. Die Blumen weiss.

Lepidium Iberis Linn.

Wohnort. In den Gleiberger Ruinen bei Giesen.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

CCCXIV. SENCKENBERGIA.

Senckenbergie.

823. S. RUDE-
RALIS Nob.

Schutt-Sen-
ckenbergie,
oder Stink-
kresse.

Der Stengel sehr ästig. Die Wurzelblätter gezähnt- gefiedert, die an den Aesten gleichbreit und glatträndig. Die weissen Blumenblätter meistens fehlend.

Lepidium rudemale Linn.

Wohnort. Auf Schutt, Mauern, an Wegen und steinigen Orten, z. B. auf der Kinzigbrücke zu Hanau; auf dem Weg von Hanau nach Kesselstadt; vor dem Steinheimerthor zu Hanau; häufig um Frankfurt, Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Mai — August. ☉

Fruchtreife. August, September.

Bemerkung. Johann Christian Senckenberg war Arzt in Frankfurt, und stiftete daselbst, ganz aus seinen eigenen Mitteln, ein grosses Hospital, eine Anatomie und einen botanischen Garten. Noch ehe diese Gebäuden ganz vollendet waren, stürzte er von einem derselben todt herunter, und wurde in dem, von ihm errichteten botanischen Garten, begraben. Botanik war sein Lieblingsstudium, und ihm haben wir die Entdeckung mancher seltenen Pflanze der hiesigen Gegend zu verdanken.

Nutzen. Ihr knoblauchsartiger Geruch vertreibt Wanzen und Kornwürmer, und theilt sich dem Fleisch, der Milch, der Butter und dem Käse der Thiere mit, welche sie fressen; er verliert sich aber, wann sie nur 3 Tage hindurch wieder ander Futter genießen.

CCCXV. LEPIDIUM. Pfefferkraut.

824. L. LATIFOLIUM.

Breitblättriges Pfefferkraut.

Die Wurzel sehr kriechend. Der Stengel aufrecht, hoch, graugrün.

2. Th.

E e

Die Blätter gestielt, dikk, glatt; an der Wurzel eylanzettförmig, sägear-
tig-gezähnt, stumpf, am Stengel
lanzettförmig, glatträndig, langzu-
gespizt. Die Blumen weiss. Die
Schötchen rauhhaarig.

Wohnort. Häufig an der Saline zu Soden. In
unsern Gärten wird es hin und wieder
gezogen.

Blüthezeit. Juni, Juli. 2

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Die Blätter werden fein zerschnitten,
mit Essig und Baumöhl wie Salat ange-
macht, und zum Rindfleisch gegessen;
auch kann man sie als Gemüse genießen.

825. L. GRAMI-
NIFOLIUM.

*Grasblätteri-
ges Pfeffer-
kraut.*

Der Stengel glatt, rund, rispen-
und ruthenförmig. Die Blätter gleich-
breit, die an der Wurzel gefiedert-
leyerförmig, die untern am Stengel
sägeartig gezähnt, die obern glatträn-
dig. Die Blumen weiss. Die Kelche
purpurroth. Die Schötchen glatt.

Lepidium Iberis Reich. Fl. Moenofr.

Nro. 442.

Wohnort. An Mauern, Wegen, Zäunen und auf Schutt. Um Frankfurt vor dem Gallenthor, vor den Gärten an der Windmühle, bei Sachsenhausen am Weg nach den obern Bleichen etc. sehr häufig an der Kirchenmauer in Friedberg und an Zäunen um diese Stadt, wo diese Pfl. auch schon Dillen und Pollich fanden; bei den Salinen zu Soden und Nauheim etc.

Blüthezeit. Juli, August. 4

Fruchtreife. September, Oktober.

Nutzen. Sollte diese Pflanze nicht wie die Gartenkresse zu benutzen seyn?

CCCXVI. RODSCHIEDIA.

Rodschiedie.

326. R. BURSA
PASTORIS Nob.
Gemeine Hir-
tentasche.

Die Wurzelblätter halbgefiedert, gezähnt; die Stengelblätter lanzettförmig gezähnt, den Stengel pfeilförmig umfassend. Die Blumen weiss. Die Schalen der Schötchen an der Spitze stumpf.

b. Mit ungetheilten Blättern.

Thlaspi Bursa pastoris Linn.

Wohnort. Ueberall auf gebauten und ungebauten Aekern, Schutt, an Wegen etc.

Blüthezeit. April — September. ☉

Fruchtreife. Juni — Oktober.

Bemerkung. Ernst Karl Rodschied aus Hannau gebürtig, gieng von da 1790. als Arzt nach Rio-Essequibo in Guiana und starb daselbst im Jänner 1796. Er hat sich durch seine Bemerkungen über das Klima und die Krankheiten in Rio-Essequibo, im 28sten St. von Baldingers mediz. und phys. Journal, und durch seine, Med. und chir. Bemerk. über das Klima, die Lebensweise und Krankh. der Einwohner der Holländischen Kolonie Rio-Essequibo welche 1796. in Frankf. am Mayn in 8 erschienen; sowohl als Naturforscher, (vorzüglich als Botanist) als auch als Arzt der Welt bekannt gemacht.

Nutzen. Das Vieh frisst die Pflanze, vorzüglich die Schaafe, gerne. Sonst war sie offizinell.

II. ORDNUNG.

SILIKUOSAE. Mit Schoten.

CCCXVII. SISYMBRIUM.

Sisymbrium.

827. S. IRIO. Der Stengel eben, glatt und ästig.
Glattes Sisymbrium. Die Blätter schrotsägeförmig, gezähnt, glatt. Die blassgelben Blumenblätter länger als der etwas gefärbte Kelch. Die Schoten aufrecht.

Wohnort. An dem Mayn bei der Frankfurter Schindkaute, wo schon Dillen und Reichard diese Pflanze fanden.

Blüthezeit. Juli, August. ☉

Fruchtreife. September.

828. S. SOPHIA. Die Blätter zweimal gefiedert; die
Sophien Sisymbrium. Fiederblättchen halbgefiedert, gleichbreit. Die gelben Blumenblätter kleiner als der Kelch.

Wohnort. An Wegen, Zäunen, auf Schutt etc. gemein.

Blüthezeit. Mai — Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Liese sich der Saame nicht als Senf benutzen? Die Nericier heilen mit

ihm die Ruhr beim Rindvieh. In Brandenburg macht man Besen aus dieser Pflanze. Sie war officinell.

829. S. STRIC-
TISSIMUM.

*Senkrechtscho-
tiges Sisym-
brium.*

Der Stengel 4 - 5 Fuss hoch. Die fruchttragenden Aeste etwas einseitig. Die Blätter ganz, lanzettförmig, sägeartig gezähnt. Die Blumen gelb. Die Narbe ausgerandet. Die Schoten senkrecht stehend, glatt, mit Erhabenheiten und Vertiefungen versehen.

Wohnort.

Im Gebüsche von Hanau aus hinter dem Philippsruher Schloss nach der Dörningheimer Heide; in den Hekken bei der Gerbermühle ohnweit Oberrath, wo sie auch schon Dillen fand.

Blüthezeit.

Juni, Juli. 24

Fruchtreife.

August.

CCCXVIII. SINAPIS. Senf.

830. S. ARVEN-
SIS.

Akkersenf.

Die Blätter eyförmig - länglich, buchtig, gezähnt. Die Kelchblättchen glatt, unter der Spitze mit einem stumpfen, durchsichtigen Stachel versehen. Die Blumen gelb. Die Schoten geglättet, mit Erhabenheiten und

Vertiefungen, sind länger als der etwas viereckige, zusammengedrückte Schnabel.

Wohnort. Auf leutigem und steinigem Boden unter der Saat, z. B. in der Hanauer Fasanerie; häufig auf Aekkern bei der Hartig nach der Lohe, bei Dorfelden, Frankfurt, Darmstadt, Giesen etc.

Blütezeit. Juni — August. ☉

Fruchtreife. September.

Nutzen. Die Blätter werden vom Schaaf- und Rindvieh gerne gefressen, und jung können dieselben als Gemüse genossen werden. Den Saamen kann man mit Essig oder Most anmachen und zum Rindfleisch essen; auch läßt sich aus demselben ein gutes Brennöl schlagen; aus einem Zentner erhält man 30 Pfund Oehl. In den Blumen finden die Bienen viel Nahrung.

831. S. ALBA.
Weisser Senf.

Die Blätter gefiedert, die untersten Fiederblättchen entfernt und kleiner, das äusserste dreilappig. Die Blumenstiele abstehend. Die Kelchblättchen mit einzelnen Stacheln besetzt. Die Blumen gelb und geadert. Die Scho-

ten etwas gerade, haben Erhöhungen und Vertiefungen und sind steifhaarig. Der mit den Schoten gleich grosse Schnabel ist etwas viereckig, zusammengedrückt, und hauptsächlich am Rande steifhaarig. Der Saamen gelblich.

- Wohnort.** Auf Aekkern und unter der Saat, z. B. um Hanau, Offenbach, Frankfurt etc.
- Blüthezeit.** Mai — Juli, ☉
- Fruchtreife.** August.
- Nutzen.** Er wird an vielen Orten in Teutschland seines Saamens wegen, den man zu Oehl und Gemüse braucht, angebaut. Er hat den schärfsten Saamen, und bei uns wird er vorzüglich mit Essig oder Most zum Mästrich benutzt. Er giebt auch viel süßes mildes Oehl; von einem Zentner 36 — 38 Pfund. Die Blätter sind für Schaaf und das Rindvieh ein so gutes Futter, daß man in England ganze Aecker ansäet, und sie mit denselben abhütet; die jungen Blätter sind wie Kohl zubereitet ein äusserst schmackhaftes Gemüse. Die Bienen holen aus den Blumen Wachs und Honig, und eine

Menge anderer Insekten finden in denselben ihre Nahrung. Er ist officinell.

832. S. NIGRA.

*Schwarzer
Senf.*

Die untersten Stengelblätter gefiedert, die Fiederblättchen kleinzählig, das äussere grössere in Lappen getheilt, die obern Stengelblätter gleichbreit-lanzettförmig, gezähnelt, ganz und hängend. Die Kelchblättchen glatt, gefärbt. Die Blumen gelb. Die Schoten zusammengedrückt, erhaben-aufgetrieben, glatt, an dem Stiel der Blumentraube angedrückt; der Schnabel sehr kurz, viereckig und geglättet. Die Saamen rothbraun.

Wohnort.

Auf Schutt, unter der Saat und an den Rändern der Aekker, z. B. um Hannau, Gross-Steinheim, Frankfurt etc.

Blüthezeit.

Mai — Juli ☉

Fruchtreife.

August.

Nutzen.

Völlig wie bei der vorhergehenden Art.

CCCXIX. BRASSICA. Kohl.

†.833. B. NAPUS.

*Repskohl;
Rübsaamen;
Töpel.*

Die stengeltreibende Wurzel spindelförmig. Die glatten Wurzelblätter leyerförmig, die Stengelblätter

herzförmig-länglich, umfassend, tief-gezähnt. Die Schoten abstehend, geglättet. Die Blumen gelb.

a. Wilder Repskohl. (*Napus sylvestris. Bauh.*)

b. Zahmer Repskohl. (*Napus sativa radice nigra Bauh.*)

Wohnort. Die zahme Abart wird bei uns gebaut, und die wilde findet sich bei Hochstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Der Sommerrübsaamen: Juni bis Juli. ♂. Der Winterrübsaamen: April, Mai. ♂

Fruchtreife. Der Sommerrübsaamen im September. Der Winterrübsaamen im Junl.

Nutzen. Als Oehlpflanze wird er bei uns gebaut. Der Saatzeit nach ist er entweder Sommer oder Winterreps, ersterer wird im Mai und Juni, letzterer welcher im August oder September gesäet wird, ist grösser und öhlreicher in seinen Saamen und wird auch nicht so wie jener durch den Frass der Insekten, der Erdflöhe, Pfeiffer und der grauen Made (*Phalaena exclamatoria*) zerstört. Man kann auch im Winter die Blätter

als Gemüse brauchen, und die Schaaf, wenn sie nicht faul sind, darauf treiben. In Gothland ist man die Wurzel so lange sie noch nicht in die Stengel getrieben hat. Man könnte wohl auch, wie es sonst in England geschahe, in unsern Gärten den Winterreps als Winter- und Frühlingssalat benutzen. Seinem Saamen geht das wilde Geflügel sehr nach. Nur den Sommerrübsaamen kann man mit den saamenfressenden Stubenvögeln z. B. Hänflingen, Kanarienvögeln, Blutfirken, Grünlingen, Zitronenfirken etc. füttern; denn von dem Winterrübsaamen sterben sie in kurzer Zeit. Die Oehlkuchen benutzt man bei uns als Einschmalz für Rindvieh und Pferde, und der Bodensatz wird wie Theer gebraucht. Das Stroh steckt man im Winter den Schaafen auf; das klärere fressen sie und das gröbere kömmt in den Mist. Für die Bienen ist der Repskohl eine der allervorzüglichsten Pflanzen.

† 834. B. RAPA. Die stengeltreibende Wurzel kugelförmig, am obern Ende flach gedrückt, fleischig. Die Blätter leyer-

Rübenkohl;
weisse Rübe.

förmig, runzlich, rauh, die obern ziemlich ungetheilt. Die Blumen gelb.

Abarten.

a. Die Mairübe, Teller- oder Frührübe. Mit ganz breiter, weisser, scheiben- oder tellerförmiger, in der Mitte mit einem kleinen Schwänzchen versehenen Wurzel.

b. Die englische runde grünköpfige Rübe. Mit über der Erde grüner Wurzel.

c. Die englische runde rothköpfige Rübe, oder Schweizerrübe. Mit purpurrother nach unten zu blauer dikker Wurzel.

d. Die Gukelrübe oder lange Futterrübe. Mit langer, weisser, zum Theil aus der Erde hervorstehender, fleischiger, weicher und milder Wurzel.

e. Die Herbst- oder Kelchrübe. Mit langer, runder, weisser, fest in den Boden verwachsener Wurzel.

f. Die gelbe Weissrübe. Mit runder, inwendig und auswendig gelber Wurzel.

g. Die Stekk-oder Stikkelrübe. Mit kleiner, kurzer, derbfleischiger, angenehm nussartigschmeckender Wurzel.

h. Die Märkische-oder Teltowerrübe. Mit sehr kurzer und kleiner, ungemein angenehm nussartigschmeckender Wurzel.

Wohnort. Wild soll sie in England und Holland auf Brachäckern wachsen. Bei uns wird sie, sammt obigen Abarten, auf Aekern und in Gärten angebaut.

Blütezeit. Im Sommer. ♂

Fruchtreife. Gegen den Herbst hin.

Nutzen. Ausser dem frischen Gebrauch, den man von den weissen Rüben als Gemüse macht und sie zur Viehfütterung anwendet, werden sie auch noch an einigen Orten geschält, in lange Streifen geschnitten und an der Luft getrocknet; dies giebt für den Winter und das Frühjahr die sogenannten welken Rüben,

ein sehr gewöhnliches Gericht der Landleute. In der Schweiz und auch bei uns macht man sie auch wie Sauerkraut ein. Aus den Blumen holen die Bienen viel Nahrung.

†. 835. A. OLE-
RACEA.

*Gemeiner
Kohl.*

Die stengeltreibende Wurzel endigt sich in sehr viele haarförmige Fasern. Der Kelch ist etwas ange-drückt. Die Blumen blassgelb. Die Schoten abstehend und geglättet.

Wohnort.

Wild soll er an den englischen See-ufern wachsen. Nachstehende Abarten werden in unsern Gemüsgärten und auf Aeckern gezogen.

A b a r t e n.

A. Kopfkohlarten.

a. Weisser Kopfkohl oder Weisskraut. Mit mehrentheils festgeschlossenen und ründlichen Köpfen.

Die festern Köpfen werden als Gemüse unter dem Namen Weisskraut gekocht, und liefern, klein geschnitten und in Fässern eingemacht, das gewöhn-

liche Sauerkraut, welches nicht allein für unsere Küchen von grossem Nuzzen ist, sondern auch als Speise die Seefahrer vor dem Skorbut schützen hilft. Aus den lockern Köpfen macht man das Komstkraut. Die abgefallenen Blätter und Strünke sind für milchendes Vieh dienlich.

b. Winkelstädter Kopfkohl oder Spizzfrühkraut; (*Br. pyramidalis. Mill.*) Mit länglichen und gespizten Köpfen.

Um Johanni ist er vollkommen.

c. Rother Kopfkohl oder rothes Kappeskraut. (*Br. oleracea rubra L. γ.*) Mit blaurothen oder ganz rothen Köpfen.

d. Savoyer-Kohl-oder weisser Wirsing oder Sachsenhäuser Kohlkraut. (*Br. oleratia Sabauda L. ε.*) Mit gelblichen runzlichen Blättern und länglichen, kleinen, nicht ganz geschlossenen Köpfen.

e. Grüner Wirsing, Pörschkohl, Herzkohl. (*Br. oleratia Sabellica* L. δ .) Mit krausen grünen Blättern, und sehr schlaffen gelben Köpfen.

B. Blattkohlarten.

f. Brauner Kohl, Blaukohl, Krauskohl, Federkohl, Plümmagekohl. (*Br. oler. Selenisia* L. η .) Mit krausen, tief eingeschnittenen Blättern, die mit einem bläulichen Reif bedeckt sind.

g. Niedriger brauner Kohl, Bardowicker-Kohl. (*Br. fimbriata pumila* C. Bauh.) Bleibt sehr niedrig und hat weissgefleckte krause Blätter.

Er ist eins der vortrefflichsten Gemüse!

h. Hoher Pommerscher Kohl. (*Br. sativa rubra aperta laevis* Moriss.) Mit schlichten, dicken, grossen Blättern und 5-10 Fuss hohem Stengel.

Es wird vorzüglich zum Viehfutter angewendet, doch werden auch die Blätter frisch und getrocknet als Gemüse gegessen.

C. Blüthekohlarten.

i. Blumenkohl, Käsekohl.
(*Br. oler. Botrytis. L. 1.*) Er bringt zwischen den länglichen lichtgrünen Blättern grosse kopfähnliche gelbweisse Blumenknospen hervor, die ehe die Blüthen hervorbrechen gegessen werden.

Er stammt aus Italien und ist eine der köstlichsten Kohlarten. Am Kap macht man den Blumenkohl mit Essig und spanischen Pfeffer ein, und isst ihn als Salat zu Braten.

k. Broccoli oder Spargelkohl. (*Br. asparagoides. C. Bauh.*) Er ist eine Abart des Blumenkohls, treibt mehrere Köpfe, und hat essbare wie Spargel schmeckende Strün-

ke. Es giebt purpurrothe und weisse Sorten.

Er stammt aus Italien.

D. Kohlraben oder Kohlrüben.

1. Kohlraben über der Erde. (*Br. oler. gongylodes. L. λ.*) Mit runden oder länglichen Knollen, von bläulicher oder grüner Farbe, welche der Strunk über der Erde ansetzt. Sie sind ein treffliches Gemüse.

m. Kohlraben unter der Erde. (*Br. oler. Napobrassica. L. η.*) Mit runden dicken Knollen (Stekkrüben - Wurzeln) unter der Erde.

Sie sind ein gutes Gemüse für Menschen und ein vortreffliches Mastfutter für das Vieh.

n. Schnittkohl. (*Spielmann, 56.*) Lueder hält ihn für eine Abart der Unterkohlraben. Man schneidet ihn als Gemüse so oft er zum Abschneiden gross genug geworden ist, an der Erde ab.

Blüthezeit. Im Sommer. ♂

Fruchtreife. Sommer — Herbst.

Nutzen. Alle diese Kohlarten, werden theils zur Viehfütterung bei uns gebraucht, wie wir auch schon mehrentheils bei den Abarten angegeben haben. Alle geben auch Saamen, welcher eine grosse Menge Oehl enthält. Aus den Blumen holen die Bienen viel Honig und Wachs. Die Raupen von *Papilio Brassicae*, *Rapae*, *Napi* und *Sinapis* thun an den Kohlarten einen äusserst grossen Schaden und fressen sie oft gänzlich ab, so dass nur die Blattrippen stehen bleiben.

CCCXX. ERYSIMUM. Hederich.

836. E. STRIC-
TUM. *Nobis.*

*Steifaufrecht-
stehender He-
derich.*

Der Stengel steifautrechtstehend, 1 - 1 $\frac{1}{2}$ Schuh hoch, ganz einfach und nur höchst selten etwas ästig, ekkig, etwas rauh, und mit kleinen ange-
drückten Haaren bedekt. Die Wur-
zelblätter liegen in einem Kreis flach
auf der Erde auf, sind lanzettförmig,
in den Blattstiel ablaufend, etwas
rauh und kaum haarig, haben ein-
zelne, von einander entfernt stehen-

de spizzige Zähne, und sind von einem Zahne bis zum andern etwas buchtig; die Stengelblätter stehen zerstreut, sind von gleicher Gestalt wie die Wurzelblätter, und nur die ganz obersten sind gleichbreit. Der Kelch blassgelb und haarig. Die gelben Blumen stehen in Trauben und sind viel grösser als bei der folgenden Art. Die Schoten stehen steif-aufrecht, beinahe an den Stengel ange-drückt, sind 2 mal so lang als bei der folgenden Art, weich-haarig und endigen sich mit einer kopfförmigen, schwach ausgerändeten Narbe.

Erysimum hieracifolium Reich. Fl.
Moen. Francofr.

Wohnort. Auf den Mauern des Teutschenhauses und um dasselbe in Sachsenhausen.

Blüthezeit. Juni — September. ♂ — 4

Fruchtreife. August — November.

Bemerkung. Wir haben diese Pflanze ganz genau mit Jacquins Abbildung von *Erysimum*.

hieracifol. in seiner Fl. austr. t. 73. verglichen und völlig von ihr verschieden gefunden. Unsere Pflanze hat durchaus keine sägartig gezähnte Blätter, sondern nur einzelne Zähne; auch ist sie von *Crysim. cheiranth.* und *Cheiranthus Erysimoides* verschieden; überhaupt herrscht bei Beschreibung dieser Pflanze unter den Autoren eine sehr grosse Verwirrung.

Nutzen. Ausser, daß man sie als Zierblume in unsere Gärten aufnehmen könnte, ist uns keiner bekannt geworden.

837. E. CHER
RANTHOIDES.
Lavkojenarti-
ger Hederich. Der Stengel aufrecht, sehr astig. Die Blätter lanzettförmig, glatt, schief, sparsam gezähnt. Der Kelch durchaus gelb. Die Blumen zitronfarbig. Die Schoten etwas abste-
hend, endigen sich mit der kleinen bleibenden Narbe.

Wohnort. Auf Aeckern und an Zäunen z. B. auf sandigen Aeckern bei Nieder-Rodenbach; im Getreide bei Gross-Auheim; auf Aeckern um Offenbach, Oberrad,

Frankfurt, Ysenburg, Niederrad, Bocken-
heim, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ♂

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Viele Vögel fressen den Saamen sehr
gerne.

838. E. AU- Der graugrüne Stengel ästig und
STRIACUM.
Roth. glatt. Die herzförmigen Blätter umfas-
Oestreichi- sen den Stengel, sind alle glatträn-
scher Hederich. dig, glatt und graugrün. Die Blumen
weisslich. Die langen, geraden,
aufrechten Schoten, endigen sich
mit der zweispaltigen, kopfförmigen
Narbe.

Brassica austriaca Linn.

Wohnort. Auf den Aekern und den sandigen
ungebauten Stellen bei dem Riedschlag
ohnweit und auch auf dem Lerchenberg.

Blüthezeit. Mai — Juli. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

839. E. ALLIA- Der Stengel aufrecht, etwas glatt,
RIA.
Knoblauchs- leicht gestreift. Die Blätter gestielt,
Hederich. herzförmig, buchtig-gezähnt, die
untern stumpf, die obern spizzig.

Die Blumen weiss. Der Saamen schwarz. Die ganze Pflanze riecht und schmeckt wie Knoblauch.

Wohnort. In Hekken, Obstgärten, Gebüsch und allenthalben an schattigen Orten.

Blüthezeit. Mai — Juli. ♂ — 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Das Landvolk in England ist die Blätter auf dem Brode, auch vermischt man sie mit Salat, dämpft das Rindfleisch damit und ist dieselben auch mit Salzfishen. Sonst gebrauchte man die frischen Blätter als Gewürz an viele Speisen. Die Kühe fressen diese Pflanze gerne, aber die Schaaf gar nicht. Sonst war sie officinell.

840. E. BARBARA. Der Stengel aufrecht, ästig, glatt, gefurcht. Die Blätter leyerförmig, *Barbara - He-* die untersten Abschnitte gleichbreit-
derich; Bar- lanzettförmig, der äusserste ist am
benkraut. grössten, rundlich und gezähnt. Die Blumen gelb. Der Saamen röthlich.

Wohnort. Fast überall an feuchten Orten z. B. beim Hanauer Galgen im Gebüsch; am Graben welcher bei dem Bruchköbler

Wald herzieht und im Hägewald selbst;
um Offenbach, Darmstadt, Frankfurt,
Giesen etc.

Blüthezeit. April — Juli. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Die jungen zarten Blättern können
als Gemüs und Salat gegessen werden,
und aus den Blumen erhalten die Bie-
nen Wachs und Honig. Sonst war sie
offizinell. In unsern Gärten findet sich
eine schöne Abart mit gefüllten Blumen.

841. E. OFFICI-
NALE.

*Offizineller
Hederich.*

Der Stengel ästig, ausgesperrt,
etwas rauh. Die Blätter schrotsäge-
förmig, etwas rauh, haarig, der äus-
serste Abschnitt spiessförmig und ge-
zähnelte. Die kleinen Blumen gelb.
Die Schoten etwas rauhhaarig, an
den Traubenstiel angedrückt.

Wohnort. Allenthalben auf Schutt, an Wegen,
in Hekken, in Dörfern etc.

Blüthezeit. Mai — August. 4

Fruchtreife. August — Oktober.

Nutzen. Die jungen zarten Blätter können als
Gemüs und Salat gegessen werden, und
die Saamen die Stelle des Senfs vertret-
ten. Aus den Blumen holen die Bienen

Stoff zu Wachs und Honig. Das Vieh, vorzüglich die Schaafte fressen diese Pflanze gerne; sie ist officinell.

CCCXXI. TURRITIS. Thurmkraut.

842. T. GLA-
BRA.
Glattes
Thurmkraut.

Der Stengel einfach und aufrecht. Die Wurzelblätter schrotsägeartig-leyerförmig, rauh; die Stengelblätter umfassend, glatträndig, gerade, glatt. Die kleinen weissen Blumen in Trauben. Die Schoten gerade, an den Traubenstiel angedrückt.

Wohnort.

Auf trocknen Triften in der Hanauer-Fasanerie; im Bruchköbler Wald; auf sandigen Wiesen bei Diedesheim; bei Frankfurt auf denen nach dem Sachsenhäuser Berg führenden Wegen; häufig im Niederröder Wäldchen etc.

Blüthezeit.

Mai, Juni. ♂

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Sie schmeckt wie Kresse, wird von dem Vieh gerne gefressen, und die Blumen geben den Bienen Wachs und Honig.

CCCXXII. ERUCA. Rauke.

845. E. ERUCASTRUM *Nob.**Gemeine**Rauke.*

Die Wurzel spindelförmig. Der Stengel aufrecht, kurzhaarig. Die graugrünen Blätter halbgefiedert; die Fiederblättchen abwechselnd und gegenüberstehend, laufen in einander über, sind gleichbreit-lanzettförmig, stumpf gezähnt. Die bleichgelben, mit dunklern und grünen Adern durchmalten Blumen, bilden lange lокkere Trauben. Die Schoten geglättet, aufrechtstehend. Der Griffel schwertförmig.

*Brassica Erucastrum Linn. — non**Reich. in fl. Moenofr.***Wohnort.**

Auf sandigen Aekern bei dem Philippsruher Schloss ohnweit Hanau; unter den Weidengebüschcn bei dem Gutleutenhof ohnweit Erankfurt; am Maynufer bei Gross-Steinheim; um Darmstadt etc.

Blüthezeit.

Juni — August. ☉

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Jung kann man diese Pflanze als Salat genießen. Die Blumen geben den Bienen Honig.

844. E. MURALE. Der Stengel ästig, glatt, am Grunde mit wenigen wagerechten Haaren besetzt. Die gestielten Blätter meergrün, halbgefiedert, die Fiederblättchen gleichbreit, gezähnt, am Rande etwas haarig. Die Blumen zitrongelb und äusserst wohlriechend.

Nobis.
Mauer Rauke.

Sisymbrium tenuifolium Linn. et Poll.
Brassica muralis Huds et Curtis.
Brassica Erucastrum Reich. f.

Moenofr. Nr. 459.

Wohnort. Ueberall um Frankfurt eine der allerge-
meinsten Pflanzen, sonst aber auch
nirgends in unserer Flora.

Blüthezeit. Juni bis zu den ersten Herbstfrö-
sten. ☉ — ♂

Fruchtreife. Juli — November.

Beobacht. Bei Regenwetter bleiben die Blumen
geschlossen.

Nutzen. Die Bienen holen Honig und Wachs
aus den Blumen.

CCCXXIII. CHEIRANTHUS.

Levkoje.

845. C. CHEIRI. Der Stengel strauchartig, ästig, die
Gelbe Levkoje, oder Godlakk. Aeste ekkig. Die Blätter lanzettförmig.

mig, glatt, glatträndig. Die gelben Blumen sehr wohlriechend.

Wohnort.

Auf Mauern und Dächern, z. B. zu Hanau auf der Stadtmauer beim Frankfurterthor und auf der Stadtmauer, wenn man von der reformirten Kirche in die Judengasse geht; auf Mauern in Hochstadt; in Frankfurt auf der Mauer am Armenhaus und über dem Gallenthor etc.

Blüthezeit.

Mai, Juni. ♂ — ♀

Fruchtreife.

August, September.

Nutzen.

Einfach und gefüllt in mancherlei Farben - Abänderungen hat man diese Pflanze ihrer schönen und wohlriechenden Blumen wegen in unsern Gärten. Die Blumen sind officinell; die Bienen gehen denselben sehr nach.

CCCXXIV. ARABIS. Arabis.

846. A. THALIANA.

Gemeine Arabis, Schaafkraut.

Der Stengel fast nackt, ästig, haarig. Die Wurzelblätter gestielt, eyförmig, etwas gekerbt; die Stengelblätter stiello, lanzettförmig, gekerbt. Die kleinen Blumen weiss. Die Schoten abstehend.

Wohnort. Allenthalben auf Aeckern und Feldern, vorzüglich in sandigen Gegenden.

Blüthezeit. April — September. ☉

Fruchtreife. Juni — Oktober.

Nutzen. Die Schaafte fressen diese Pflanze ausserordentlich gerne!

847. A. HIRSU-
TA Roth.

Rauhhaarige
Arabis.

Der Stengel einfach, aufrecht, hoch, kurzhaarig. Alle Blätter steifhaarig, sägeartig gezähnt, die an der Wurzel eyförmig, stumpf, in den Blattstiel ablaufend, die an den Stengel, pfeilförmig, eyförmig länglich, denselben umfassend. Die keinen Blumen weiss. Die Schoten lang, die jüngeren dem Stengel angedrückt.

Turritis hirsuta Linn.

Wohnort. Auf dünnen Wiesen in der Hanauer Fasanerie, im Gebüsche bei dem Kettenhof ohnweit Frankfurt und auf den Wiesen bei der Oed; im Hangestein und um Schiffenberg etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. ♂

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Das Vieh frisst diese Pflanze gerne.

CCCXXV. CARDAMINE. Kardamine.

848. C. IMPATIENS.

Spring-Kardamine.

Der Stengel aufrecht, meist einfach, glatt, scharfekkig; die Aeste gerade. Die Blätter glatt, gefiedert, mit Blattansätzen versehen; die untersten Fiederblättchen eyförmig, stumpflappig; die obersten Stengelblätter lanzettförmig, mit spizzigen Zähnen. Die Blumen entweder kronblätterlos, oder wenn sie vorhanden sind, doch sehr schnell abfallend und weiss.

Wohnort.

In feuchten Waldgegenden z. B. ohnweit Hanau am Ende des Lambowaldes beim Langendiebacher Unterwald und im Forst; im Niederröder Wäldchen und bei der grossen Frankf. Saustiege; im Hangestein und im Buchwald bei Giesen; im Wald bei Adolphseck ohnweit Langenschwalbach.

Blüthezeit.

Mai, Juni. ♂

Fruchtreife.

August.

Beobacht.

Die reife Schote springt bei der geringsten Berührung elastisch auf und streut den Saamen rings umher.

Nutzen. Die jungen Blätter können als Salat gegessen werden.

949 C. HIRSU-
TA.

*Rauhhaarige
Kardamine.*

Der Stengel aufrecht, ästig, ekkig, haarig, nach oben zu glatt. Die Blätter weichhaarig, gefiedert, die untersten Fiederblättchen eyförmig, rundlich, stumpf, das ungepaarte ist am grössten und etwas gelappt; die Stengelblätter länglich, fast glatträndig. Die weissen kleinen Blumen haben nur 4 Staubfäden.

Wohnort. An Gräben und Sümpfen im Walde bei dem Wolfsgang ohnweit Hanau.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. Juni, Juli.

Nutzen. Die jungen Blätter können als Salat gegessen werden.

450. C. PRA-
TENSIS.

*Wiesen Kar-
damine.*

Der Stengel aufrecht, einfach, glatt, am Grunde röthlich. Die Blätter gefiedert, glatt; die äussersten Fiederblättchen rundlich, ekkig; die Stengelblätter lanzettförmig und glatträndig. Die grossen Blumen purpurfarbig und zuweilen weiss.

Wohnort. Ueberall auf Wiesen, feuchten Triften und in Obstgärten.

Blüthezeit. April — Juni. 4

Fruchtreife. Juni, Juli.

Nutzen. Ihre jungen Blätter werden häufig im Frühjahr zum Salat, als wie die Brunnenkresse gegessen. Alles Vieh frisst sie gerne. Ihre Blumen sind den Bienen nützlich; sie sind auch officinell.

850. C. AMARA.
*Bittere Kar-
damine.*

Der Stengel einfach, aufrecht, etwas weichhaarig, treibt (besonders nach der Blüthezeit) aus der Wurzel und den Blattwinkeln, einwärts gekrümmte Sprossen. Die Blätter gefiedert; die Fiederblättchen rundlich, durch kleine Zähnen eckig. Die Blumen gross und weiss.

Wohnort.

In feuchten waldigen Gegenden, z. B. bei Hanau an sumpfigen Orten im Mittelbacher Wald bei der ehemaligen Burg; am Kuhbrunnen der im Wald hinter der Tempelseemühle ohnweit Offenbach liegt; um Frankfurt in Gräben der Gärtnerei; am Rande des Waldes zwischen dem Sandhof und Niederrod; ohnweit dem Frankf. Forsthaus; bei dem Schell-

bach hinter Homburg; an feuchten Orten um den Waldbrunnen bei Giesen.

Blüthezeit. April — Juni. 24

Fruchtreife. Juni, Juli.

Nutzen. Wie bei der vorhergehenden Art.

CCCXXVI. DENTARIA. Zahnwurz.

852. D. BULBIFERA.

Knollenträgende Zahnwurz.

Die Wurzel kriechend, weiss, schuppig. Die untersten Blätter gefiedert, die obersten meist einfach; die Fiederblättchen lanzettförmig, stumpf, sägezählig und spizzig. Die stiellosen in den Blattwinkeln sitzende Knöllchen werden zuletzt schwarzpurpurfarbig. Die purpurfarbigen Blumenkronen sind viermal so lang als der Kelch.

Wohnort. In schattigen waldigen Gegenden, z. B. häufig im Forst bei Hanau; im Offenbacher alten Hägewald dicht bei dem Weiher unter Bäumen; im Frankfurter Wald ohnweit der Grastränke; in schattigen Wäldern zwischen Falkenstein und Nieder-Reifenberg; im Hangestein bei

Giesen; an einem Bächlein im Rüdlingshayner - Wäldchen am Oberwald.

Blüthezeit. April, Mai. 4

Fruchtreife. Juli.

Beobacht. Wenn die Blumen verwelkt sind, so verdorren meistens die Schoten und fallen ab, aber die in den Blattwinkeln sizzende Knöllchen wachsen fort, und dienen dann zur Vermehrung der Pflanze.

CCCXXVII. LUNARIA. Mondviole.

853. L. REDI-VIVA.

*Ausdauernde
Mondviole.*

Die Wurzel ausdauernd. Die Blätter abwechselnd, gestielt, herzförmig, langzugespitzt, eingeschnitten-gezähnt, zu beiden Seiten haarig und rauh. Die Blumen einzeln, gestielt, violet und wohlriechend.

Wohnort. An jähen Felsen gegen Morgen im Hangestein bei Giesen.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Die Blumen geben den Bienen Stoff zu Wachs und Honig.

CCCXXVIII. BAEUMERTA.

Bäumerte.

854. B. NASTURTIUM' Nob. Der ästige glatte Stengel ist am Grunde kriechend und wurzelnd. Die Blätter gefiedert, glatt; die Fiederblättchen etwas herzförmig-eyrund und stumpf, das ungepaarte grössere ist eckig. Die weissen Blumen, bilden schlaffe, kurze Trauben.

Sisymbrium Nasturtium. Linn.

Wohnort. An Quellen in reinen Gräben und Bächen, z. B. bei Hanau an Bächen im Wald hinter dem Kinzigheimerhof und jenseits desselben bei der Chausséebrücke bei einem Brunnen; bei Ocarben; in den kleinen Gräben um die Krautfelder bei der Mülheimer Ziegelhütte; zwischen Bergen und Seckbach; bei Oberrad in Gräben; um Frankfurt; auf der Schiffenberger Wiese und an den in der Nähe liegenden Quellen; hinter dem Hangestein bei Giesen etc.

Blüthezeit. Mai — September. 2

Fruchtreife. August — Oktober.

Bemerkung. J. H. Bäumert, aus Hanau gebürtig, ist seit Errichtung des Senckenbergischen Stiftsgarten in Frankfurt botanischer Gärtner in demselben, und ihm hat dieser Garten manche treffliche Einrichtung und viele seltenen Pflanzen zu verdanken. Er ist nicht bloß Gärtner, sondern ein wahrer Botanist! Senckenberg und Reichard waren seine Freunde, und er der stete Begleiter auf ihren botanischen Wanderungen.

Nutzen. Sie wird bei uns als ein nuzzbares Küchengewächs zu Gemüse und Salat benutzt; auch auf Butterbrod ißt man sie. Der Saame kann statt des schwarzen Senfs gebraucht werden. Sie ist officinell.

CCCXXIX. CAROLI-GMELINA.

Karls-Gmeline.

855. C. G. LAN-
CIFOLIA Nob.
Lanzettför-
mige Karls-
Gmeline.

Die Blätter eylanzettförmig, gezähnt. Die Blumenblätter gelb, länger als der Kelch. Die Fruchstiele abwärts gebogen.

Sisymbrium amphibium Linn.

A b a r t e n.

Die Blätter alle tief gezähnt, oder sägezählig eingeschnitten.

Sisymbrium amphibium aquaticum

L i n n.

Die obersten Blätter zerrissen oder halbgefiedert.

Sisymbrium amphibium terrestre L i n n.

Wohnort. An Gräben und auf feuchten Wiesen.

Blüthezeit. Mai — Juli. 2

Fruchtreife. Juli — September.

Bemerkung. Karl Christian Gmelin von Badenweiler gebürtig, ist Hofrath, Doktor der Medizin und Professor der Naturgeschichte auf dem Gymnasio zu Karlsruhe. Er schrieb eine Diss. unter dem Tittel: *Consideratio generalis filicum*. Erlange 1784., machte eine gelehrte Reise durch Frankreich und Spanien, sammelte auf derselben viele lebende Pflanzen und Saamen (wohl tausend Arten) für den Karlsruher Garten, entdeckte in den Pyrenäen viele neue Pflanzen, welche derselbe nächstens in einen zu erwartenden *Spicilegio florae Hispaniae* beschrei-

ben und abbilden wird; giebt eine flora Badensis, die völlig ausgearbeitet im Manuskript daliegt heraus, und schrieb den hortus Carolsruhans zum Umtausch der Saamen.

Nutzen.

Die Blumen geben den Bienen Stoff zu Wachs und Honig. Die Wurzel kann statt der Radieschen gegessen, und der Saame statt des Senfs gebraucht werden.

856. C. G. PALUSTRIS Nob.
Sumpf Kals-
Gmeline.

Die Blätter halbgefiedert, sägear-
tig gezähnt. Die Blumenblätter gelb,
kleiner als der Kelch. Die Frucht-
stiele niedergebogen.

Sisymbrium amphibium palustre Linn.

Wohnort.

In einem Graben bei Hanau welcher
den Lambowald von dem Langendieba-
cher Unterwald trennt; um Frankfurt in
Gräben; um Darmstadt etc.

Blüthezeit. Mai, Juli. 2

Fruchtreife. Juli — September,

Nutzen. Wie bei der vorhergehenden Art.

857. C. G. SYL-
VESTRIIS Nob.
Wald Karls-
Gmeline.

Die Blätter gefiedert, die Fieder-
blättchen gezähnt, eyrund oder lan-
zettförmig. Die Blumenblätter gelb,

mit dem Kelch gleichlang. Die Fruchtstiele abstehend.

Sisymbrium sylvestre Linn.

Wohnort. An Gräben und feuchten sandigen Stellen, z. B. beim Forsthaus in der Hanauer Fasanerie; im Wald bei Nieder-Rodenbach; um Frankfurt sehr häufig; um Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Mai — Juli. 4

Fruchtreife. Juli — September.

Nutzen. Wie bei den vorhergehenden Arten.

III. ORDNUNG.

PERICARPIFERAE. Mit Fruchthüllen.

CCCXXX. VOGELIA. Vogellie.

858. V. SAGIT-
TATA Med.
Pfeilförmige
Vogellie.

Der Stengel aufrecht, eckig, kurzhaarig. Die Blätter abwechselnd, pfeil-lanzettförmig, lang zugespitzt, gezäh-
nelt. Die Blumen gelb. Die Fruchthüllen punktirt-runzlich.

Myagrum paniculatum Linn.

Wohnort. Unter der Saat, z. B. häufig auf dem Lerchenberg, selten um Giesen.

Blüthezeit. Mai — Juli. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

CCCXXXI. CORONOPUS.

Krähenfuss.

859.C DEPRES- Der Stengel niedergedrückt. Die
sus Moench, Blätter halbgefiedert, glatt, etwas
Niederge- fleischig. Die Trauben in den Blatt-
drükter Krä- winkeln, kürzer als das Blatt. Die
henfuss. kleinen Blumen weiss.

Cochlearia Coronopus Linn.

Wohnort. An Wegen, sonnigen Orten und auf
Salzboden, z. B. vor Bergen am Weg;
bei Bürgel dicht an der Mauer; auf dem
Weg bei dem Ilbenstädter Kloster; bei
den Salinen zu Soden, Nauheim und
Wisselsheim; auf Aekkern bei Weisel;
an Aekkern um Harum; an der Wind-
mühle bei Frankfurt; am Weg vor
Nied; am sandigen Lahnufer bei Gie-
sen etc.

Blüthezeit. Juni — August. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Sie hat einen der Brunnenkresse ähn-
lichen Geschmakk, und wird, besonders
in England, stark als Salat gegessen. Die
Schaafe fressen sie sehr gerne.

CCCXXXII. RAPHANISTRUM.

Akkerrettig.

860. R. INNO-
CUUM Moench.
Unschädlicher
Akkerrettig.

Der Stengel aufrecht, ästig, kurzhaarig. Die halbgefiederten Blätter leyerförmig, zu beiden Seiten etwas steifhaarig. Die Blumen weiss, bisweilen gelb, mit purpurfarbigen Adern. Die Fruchthüllen aufrecht.

Raphanus Raphanistrum Linn.

Wohnort. Auf Aekkern bei der Dörnigheimer Heide; auf Aekkern um Frankfurt; auf Aekkern zwischen Enkheim und Seckbach; auf Aekkern bei Giesen; unter dem Getreide bei Rödgen.

Blüthezeit. Mai — August. ☉

Fruchtreife. Juli — September.

Nutzen. Gewiss ist diese Pflanze an der Entstehung der Kriebelkrankheit unschuldig! Ihre Wurzel schmeckt wie Rettig, und ihre Blätter können als Gemüse gegessen werden; für die Schaafe und Rinder sind sie ein gesundes Futter. Der Saamen, der statt Senf dienen kann, giebt ein gutes Oehl, und zwar beinahe so reichhaltig als der Rübsaamen; auch

können damit die Schweine gefüttert werden. Aus den Blumen holen die Bienen Stoff zu Wachs und Honig.

CCCXXXIII. RAPHANUS. Rettig.

†. 861. R. SATIVUS.

*Gemeiner
Rettig.*

Die fleischige Wurzel ist rund oder spindelförmig. Die Blätter leyerförmig. Die Blumen sind bald weiss bald purpurroth. Die dicken Fruchthüllen enthalten 2 - 3 rundliche Samen.

Abarten.

a. Schwarze Winterrettige. Sie werden gegen Johanni gesäet, erreichen eine ansehnliche Grösse, und haben eine scharfschmeckende, schwarze, rissige Rinde.

b. Schwarze Früh- oder Sommerrettige. Sie werden im Mai gesäet und früher reif als jene; sie sind saftiger und nicht so scharf als jene, und schiessen auch nicht leicht in Saamen.

c. Sandrettige. Sie werden 2 - 3 Wochen nach Johanni gesäet und ha-

ben eine runde Wurzel. Schon um Weihnachten werden sie pelzig.

d. Korinthische Rettige. Sie setzen eben so wie die Kohlraben einen Knollen über der Erde an, haben von aussen purpurfarbene Ränder, unter der Erde aber theilt sich die Wurzel in Aeste mit faserigen Abtheilungen. Die Blumen sind dunkelblau ins Purpurrothe fallend mit schwärzlichen Adern und Rändern.

e. Runde Radieschen, Monatrettige, Raphanellen. Die Wurzel ist klein, rund, und hat einen dünnen Schwanz. Sie können von April bis Jakobi gesäet werden.

f. Lange Radieschen oder lange Monatradieschen. So weit sie aus der Erde stehen, sehen die länglichen Wurzeln purpurroth, unter der Erde aber weiss aus.

g. Forellenradieschen. Mit kleiner, länglicher, rothgeflekter Wurzel.

Wohnort. Sein ursprüngliches Vaterland soll China seyn; jetzt zieht man ihn sammt den Abarten überall bei uns in Gärten und auf Krautfeldern.

Blüthezeit. Im Sommer. ☉ — ♂

Fruchtreife. Im Herbst.

Nutzen. Bei uns ist man die meisten Rettige roh, mit Salz zum Butterbrod, oder bei dem Rindfleisch. Die jungen Rettige gekocht und wie Spargel zubereitet, sollen sehr gut schmecken. Man kann auch aus den Rettigen mit Honig einen Wein bereiten. Setzt man die schwarzen Sommerrettige in den Keller in Sand, so treiben sie weisse Keime, welche als Salat zugerichtet werden können; überhaupt könnte man von allen Rettigabarten die jungen zarten Blätter als Gemüse benützen. Aus den Saamen kann man Oehl pressen, und es ist zu bedauern, daß der chinesische Oehlrettig noch nicht bei uns gebaut wird, dessen Saamen über die Hälfte an Oehl hat. Die Bienen besuchen die Blumen fleissig. Die Wurzeln sind officinell.

CCCXXXIV. ISATIS. Waid.

862. I. TINCTO- Die gestielten eyförmigen Wurzel-
RIA. blätter gezähnelte; die Stengelblätter
Färber Waid. pfeilförmig, umfassend und glatt.
Die Blumenstiele glatt. Die Blumen
gelb. Die reife Frucht braun.

Wohnort. Im Gebüsche vor Offenbach am Mayn-
ufer; bei Hanau links dem Galgen; zwi-
schen Hochstadt und Bischofsheim; bei
der Lohe.

Blüthezeit. Mai — Juli. ♂

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. In mehreren Gegenden Teutschlands
wird er seiner Blätter halber mit Vor-
theil als ein Farbeprodukt angebaut und
von den Färbern zu ihren Blau-Küppen
gebraucht. Aus den Saamen läßt sich
Oehl gewinnen. Er erfordert einen ge-
mischten, guten Boden. Man säet ihn
entweder im Herbst, oder doch in den
ersten Tagen des Mais, und wohl auch
noch früher. Aus den Blumen holen
die Bienen Stoff zu Wachs und Honig.

SECHZEHNTE KLASSE.

MONADELPHIA. Die Staubfäden zusammen in eine
Partie verwachsen.

I. O R D N U N G.

OCTANDRIA. Mit 8. Staubfäden.

CCCXXXV.
POLYGALA.
Polygala.

Der Kelch fünfblättrig; die zwei Seitenblättchen sind grösser und vor der Saamenreife farbig, nachher grün. Die Blumenkrone zweiblättrig; das obere Blumenkronblatt röhrig und zweispaltig, das untere hohl, zusammengedrückt und an seiner Spitze ist noch ein kleines fächerförmiges Afterblumenblättchen eingefügt. Der Griffel hat eine etwas dickliche Narbe. Die Saamenkapsel verkehrt herzförmig, zusammengedrückt, zweiklappig, zweifächerig; die Fächerchen einsamig.

II. O R D N U N G.

DECANDRIA. Mit 10. Staubfäden.

*) Mit regelmässigen Blumenkronen.

CCCXXXVI.
GERANIUM.
*Storchschna-
bel.*

Der Kelch fünfblättrig. Die Blumenkrone fünfblättrig und regelmässig. Die fünf honigtragenden Schüppchen wechseln mit den Nägeln der Blumenblätter ab. Die fünf, oder zehn Staubfäden, tragen entweder sämmtlich, oder nur abwechselnd Staubbeutel. Der Griffel pyramidenförmig und bleibend. Der fünfeckige geschnabelte Fruchtknoten hat einen bleibenden Griffel, und fünf zurückgeschlagene Narben. Die fünf zusammengewachsenen, einfächerigen, einsamigen, der Länge nach von innen aufspringenden Saamenkapseln, sitzen um einen geschnabelten Fruchtboden, mit dem sie durch eine sehr lange spiralförmig sich zurücklegende, entweder bärtige oder bartlose Granne verbunden sind.

**) Mit unregelmässigen, schmetterlingsartigen Blumenkronen.

CCCXXXVII.
GENISTA.
Ginster.

Der Kelch röhrig, zweilippig; die Oberlippe zweispaltig, die Unterlippe dreizählig. Die Schmetterlingsblume hat

eine eyförmige, aufrechte Fahne, die Flügel und das Schiffchen sind zurückgebogen, und letzteres ist etwas länger als die Flügel, und von gleicher Länge mit der Fahne. Die Staubfäden entweder von der Fahne eingeschlossen oder wagerecht stehend. Der Griffel glatt, etwas gekrümmt. Die Narbe stumpf. Die knotenlose nicht aufgeblasene Hülse gleichbreit, etwas zusammengedrückt und vielsaamig.

CCCXXXVIII.
SALTZWE-
DELIA.

Saltzwedelie.

Der Kelch röhrig, zweilippig; die Oberlippe zweitheilig, die untere dreizählig. Die Schmetterlingsblume hat eine auf den Flügeln und dem Schiffchen aufliegende Fahne, das Schiffchen ist zweiblättrig und die Blättchen sind gleichlang. Die knotenlose nicht aufgeblasene Hülse gleichbreit, rundlich 4 - 6 saamig.

CCCXXXIX.
VOGLERA.

Voglere.

Der Kelch glockenförmig, zweilippig; die Oberlippe zweizählig, die untere dreizählig. Die Schmetterlingsblume hat eine eyförmige, aufrechte, an den Seiten zurückgeschlagene Fahne, die Flügel sind sehr kurz und das zweiblättrige Schiffchen welches länger als Fahne

und Flügel ist, schliesset die Staubfäden und den Griffel ein. Die knotenlose nicht aufgeblasene, gleiche Hülse, enthält 2-4 Saamen.

CCCXL.
SPARTIUM.
Pfrieme.

Der Kelch glockenförmig, unten dreizählig, mit einem häutigen dünnen Rande. Die Schmetterlingsblume hat eine runde, sehr grosse, abstehende Fahne, eyförmige, stumpfe, abstehende Flügel und ein zweispaltiges Schiffchen welches länger als die Flügel ist. Die Staubfäden niedergebogen. Der Griffel einwärts gebogen, länger als die Staubfäden. Die Narbe zusammengedrückt. Die angeschwollene (torulosus) Hülse gleichbreit-lanzettförmig und viel-saamig.

CCCXLI.
ANTHYLLIS.
Anthyllis.

Der Kelch bauchig, fünfzählig, zottig. Die Schmetterlingsblume hat eine Fahne die länger als die Flügel und das Schiffchen ist. Der einfache Griffel aufsteigend. Die Narbe stumpf. Die Hülse angeschwollen, durch den aufgetriebenen Kelch bedekt, 1-2 saamig.

CCCXLII.
ULEX.
Stechginster.

Der Kelch zweiblättrig; die Blättchen eyförmig-länglich, das obere zwei- das 2. Th. H h

untere dreizählig. Die Schmetterlingsblume schlaff, hat ein an der Spitze eingeschnittenes Fähnchen, und ein zweiblättriges Schiffchen. Der Fruchtknoten rauh; der Griffel hat eine stumpfe Narbe. Die Hülse aufgeblasen, eyförmig länglich, zottig, sich mit dem langen zurückgebogenen Griffel endigend, kaum länger als der Kelch, enthält wenige Saamen.

CCCXLIII.
ONONIS.
Heuhechel.

Der Kelch glockenförmig, fünfspaltig; die Abschnitte spizzig, gleichbreit, wovon 4 unter der Fahne. Die Schmetterlingsblume hat eine gestreifte Fahne, welche grösser als die übrigen Theile, und an den Seiten abstehend ist; die Flügel sind von der Länge des spizigen Schiffchens. Die stiellose, schief eyförmige, aufgeschwollene Hülse, ist kaum etwas länger als der Kelch, mit dem bleibenden etwas hakenförmigen Griffel bekrönt, und enthält 2-5 Saamen.

III. ORDNUNG.

POLYANDRIA. Mit vielen Staubfäden.

CCCXLIV.
MALVA.
Malve.

Der bleibende Kelch gedoppelt, der äussere 2-5 blättrig, der innere halb

fünfspaltig. Die Blumenkrone fünfspaltig. Der kurze vielsaltige Griffel hat viele borstige Narben. Die vielen Fruchthüllen sitzen in einem Kreise um den säulenförmigen Fruchtboden, sind einfächerig, einsaamig, fast nierenförmig, und etwas zusammengedrückt.

CCCXLV.
ALTHAEA.
Althæe.

Der bleibende Kelch gedoppelt, der äussere 6-8 spaltig, der innere fünfspaltig. Die Blumenkrone fünfspaltig. Der vielspaltige Griffel hat an 20 Narben. Die vielen einsaamigen, einfächerigen, zusammengedrückt-nierenförmigen Fruchthüllen, sitzen in einem Kreise um den säulenförmigen Fruchtboden.

SECHZEHNTE KLASSE.

MONADELPHIA. Die Staubfäden zusammen in eine
Partie verwachsen.

I. ORDNUNG.

OCTANDRIA. Mit 8. Staubfäden.

CCCXXXV. POLYGALA. Polygala.

362. P. AMARA. Der Stengel ziemlich aufrecht, gerade, etwas ästig. Die in den Blattstiel ablaufenden Wurzelblätter liegen in einem Kreise, sind eyförmig und grösser als die zerstreuten lanzettförmigen Stengelblätter. Die weissvioletten Blumen in kammförmigen Trauben, stehen auf der Spitze des Stengels.

Wohnort. Auf Waldwiesen und an Bergen, z. B. im Gebirge an dem Reichebach.

Blüthezeit. Mai, Juni. 2

Fruchtreife. August.

Nutzen. Sie ist ein gutes milchreiches Futter für das Vieh. Die Bienen besuchen die Blumen fleissig. Blätter und Wurzel sind officinell.

863. **P. VULGARIS.** Der Stengel meist gestrekt, gestreift. Die stiellosen Blätter zerstreut, an der Wurzel eylanzettförmig, am Stengel lanzettförmig. Die Blumen gewöhnlich blau, selten purpur- oder fleischfarbig, oder weiss, bilden kammförmige Trauben, auf der Spitze des Stengels.

Gemeine Polygala, oder Kreuzblume.

Wohnort. Gemein auf trocknen Wiesen, Triften, Anhöhen, Bergen und in Wäldern.

Blüthezeit. Mai, Juni. 24

Fruchtreife. August.

Nutzen. Die Blätter kann man statt des chinesischen Thees trinken. Alles übrige wie bei *P. amara*.

II. ORDNUNG.

DECANDRIA. Mit 10. Staubfäden.

CCCXXXVI. GERANIUM.

Storchschnabel.

*) Die Blumenstiele meistens einblütig.

364. G. SANGUI-
NEUM.*Blutrother**Storchschna-
bel.*

Der Stengel fast aufrecht, gegliedert, roth, steifhaarig. Die Blätter entgegengesetzt, zirkelrund, tief 5-7 theilig, mit gleichbreiten, 2-3 spaltigen Abschnitten. Die Blumenstiele einzeln, sehr lang und gegliedert. Die blutrothen Blumenblätter am Grunde haarig, doppelt so gross als der Kelch. Die Saamenkapseln glatt.

Wohnort.

Auf trocknen schattigen Wiesen und in Wäldern, z. B. im Wald hinter dem Frankfurter Forsthaus, bei dem Schwengelsbrunnen; am Johannisberg bei Nauheim; an den zusammengehäuften Steinen auf der Kazz bei Gelnhausen; am Cleeberger Wald.

Blüthezeit.

Juni, Juli. 24

Fruchtreife.

August, September.

Nuzzen.

Die dicken fleischigen braunen Wurzeln sind zur Gerberei dienlich; auch

zum Färben kann diese Pflanze brauchbar seyn. Als Zierblume ist sie, so wie die meisten Arten dieses Geschlechts zu empfehlen. Die Bienen besuchen fleissig die Blumen.

**) Die Blumenstiele zweiblüthig.

a. Die Blumenblätter zweispaltig, eingeschnitten oder ausgerandet.

865. G. DISSECTUM.
Zerschnittener Storchschnabel. Der Stengel zottig, etwas aufrecht. Die entgegengesetzten Blätter handförmig; die Abschnitte tief 5 theilig. Die Blumenstiele kürzer als das Blatt. Die Kelche begrannt. Die ausgerandeten rothen Blumenblätter von gleicher Länge des Kelchs. Die Saamenskapseln zottig.

Wohnort. An Wegen, Zäunen und auf Aekern z. B. um Hanau, Frankfurt, Giesen etc.

Blüthezeit. Mai — Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

866. G. COLUMNUM.
Tauben-Storchschnabel. Der gestreckte Stengel etwas rauh. Die entgegengesetzten Blätter in handförmige Lappen getheilt; die Lappen halbgefiedert, lanzettförmig-gleichbreit und spizzig. Die Blumenstiele

länger als das Blatt. Die Kelche begrannt. Die purpurfarbigen Blumenblätter mit einigen kleinen Zähnchen besetzt, und nicht so lang als die Kelche sammt den Grannen. Die Saamenkapseln glatt.

Wohnort. An Zinnen, schattigen Hekken und auf Aeckern, z. B. auf Aeckern bei der Hartig; zwischen Kaichen und Ilbenstadt; auf dem Sachsenhäuser Berg bei dem Haynerweg; auf dem Lercherberg.

Blüthezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

867. G. PUSILLUM.

Sehr kleiner Storchschnabel.

Der ästige Stengel niedergedrückt. Die rundlichen Blätter lappig, die Lappen dreispaltig, gleichbreit, spitzig, an den Blumen stehen sie zu zwei einander gegenüber. Die Kelchblättchen stumpfspitzig. Die purpurfarbigen ausgerändeten Blumenblätter am Grunde bartlos, mit dem Kelche von gleicher Länge. Die Saamenkapseln haarig.

Wohnort. Auf Aekkern, Feldern und unfruchtbaren Stellen z. B. vor Hanau zwischen dem Steinheimer- und Nürnbergerthor; beim Jägerhaus in der Hanauer Fasane-rie; häufig um Offenbach, Frankfurt etc.

Blüthezeit. Juni — August. ☉

Fruchtreife. September.

868. G. MAL-
VAEFOLIUM
Scepl.
*Nalvenblät-
teriger Storch-
schnabel.*

Der etwas aufrechte Stengel weich anzufühlen. Die Blätter zirkelrund, halb siebenspaltig, eingeschnitten, und so wie die Blattstiele weich anzufühlen. Die langzugespizten Kelche ohnbegrannt. Die bläulichen ausge-
rändeten Blumenblätter, schlechter-
dings nicht länger als der Kelch.

Geranium rotundifolium Pollich.

Wohnort. An Wegen und Zäunen um Giesen, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Mai — September. ☉

Fruchtreife. August — Oktober.

Nutzen. Den Schweinen soll er wider das ro-
the Wasser dienlich seyn.

869. G. MOLLE.
*Weichblätte-
riger Storch-
schnabel.*

Der Stengel etwas aufrecht, haarig. Die zirkelrunden Blätter mit sehr
langen weichen Haaren besetzt, sie-

benlappig, dreispaltig, stumpf, stehen am Stengel einander entgegen, wechseln an den Blüthen ab und stehen dem Blüthenstiel entgegen. Die Kelche stumpf. Die purpurfarbigen Blumenblätter halb zweispaltig, am Grunde bärtig, kaum etwas länger als der Kelch. Die Saamenskapseln in die Quere runzlich.

Wohnort. Auf Schutt, an Wegen, Zäunen z. B. um Frankfurt, Giesen etc.

Blütezeit. Juni, Juli. ☉

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Mit Buttermilch gekocht wird er den Schaafen wider das rothe Wasser gegeben.

870. G. LUCIDUM.

*Glänzender
Storchschnabel.*

Der Stengel aufrecht, purpurfarbig glänzend. Die Blätter entgegengesetzt, zugerundet - handförmig, hellglänzend, fünflappig, am Rande haarig; die Lappen stumpf, eingeschnitten - gezähnt. Die Kelche pyramidenförmig, ekkig, querrunzlich. Die purpurfarbigen ausgerändeten

Blumenblätter, länger als der Kelch.
Die Saamenkapseln glatt.

Wohnort. An den Felsen des zerstörten Falkensteiner Schlosses.

Blüthezeit. Mai, Juni. ☉

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Das Vieh frisst ihn.

871. G. SYLVATICUM.

Waldstorchschnabel.

Der Stengel aufrecht. Die Blätter fast schildförmig, runzlich, fünflappig, eingeschnitten - sägezähmig, die untern gestielt, die obern stiellos. Die ausgerändeten purpurfarbig-violetten Blumenblätter, doppelt so lang als der Kelch.

Wohnort. Im Wald am Falkensteiner Schloss.

Blüthezeit. Mai, Juni. 4

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Die Isländer färben mit diesem Storchschnabel. Das Vieh frisst ihn.

b. Mit ganzen Blumenblättern.

872. G. PRATENSE.

Wiesenstorchschnabel.

Der Stengel aufrecht, ausgebreitet. Die Blätter entgegengesetzt, fast schildförmig, runzlich, 5 - 7 theilig; die Lappen lanzettförmig, halb-

gefiedert, tief eingeschnitten gezähnt. Die glattrandigen, bläulichen, mit violetten Adern durchmahlten Blumenblätter zugerundet, mit einer Spitze versehen, und 3 mal so lang als der Kelch.

Wohnort. Auf Wiesen, z. B. bei Hochstadt, Bischofsheim, Steinheim, Offenbach, Frankfurt, Darmstadt, Butzbach etc.

Blüthezeit. Mai, Juni. 2

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Die Bienen erhalten aus ihren Blumen Honig und Wachs. Als Zierblume empfiehlt sie sich sehr. Das Vieh frisst sie. Ehedem war sie officinell.

873. G. PALU-
STRE.

*Sumpfstorch-
schnabel.*

Der Stengel aufrecht, ausgebreitet, zottig. Die Blätter entgegengesetzt, handförmig, zottig, tief 5 lap-
pig; die Lappen dreispaltig, eingeschnitten-kleinzähmig. Der Blumenstiel sehr lang. Die Fruchtsielchen niedergebogen. Die roth purpurfarbigen, mit dunklern Adern durchmahlten Blumenblätter, zugerundet,

glatträndig und doppelt so lang als der Kelch.

Wohnort. An Gräben, in Sümpfen, auf feuchten Wiesen und in feuchtem Gebüsch, z. B. an einem Bach hinter der Hannauer Fasanerie; beim Kohlbrunnen; in einem Graben bei Bischofsheim; bei dem Kettenhof ohnweit Frankfurt; zwischen Hausen und Ginheim; bei Nieder-Erlenbach; um Darmstadt, Giesen etc.

Blüthezeit. Mai — Juli. 24

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Wie bei der vorhergehenden Art.

874. G. MACRORHIZUM.

Grosswurzlicher Storchschnabel.

Die Wurzel dikk, fleischig und kriechend. Der Stengel aufrecht, ästig. Die Blätter entgegengesetzt, glatt, dikk, handförmig, in 5 - 7 eingeschnittene spizzige Lappen getheilt. Die Kelche aufgeblasen, kugelrund und roth. Die glänzend purpurrothen Blumenblätter glatträndig. Der Griffel sehr lang und niedergebogen. Die Saamenkapseln glatt. Die ganze Pflanze sehr wohlriechend.

Wohnort. Auf den Mauern des Gleiberger und Fetzberger zerstörten Schlosses, wo wir 1788. zuerst diese Pflanze fanden.

Blüthezeit. Mai, Juni. 24

Fruchtreife. Juli, August.

Nutzen. Sie verdient in allen unsern Gärten als Zierblume zu prangen.

875. G. ROBERTIANUM.

Rupprechtskraut, oder stinkender Storchschnabel.

Der Stengel aufrecht, haarig, mit verdickten, purpurfarbigen Gelenken. Die widrigriechenden Blätter dreifach gefiedert eingeschnitten und meistens sammt den Blattstielen röthlich. Die rothen Kelche zehnstreifig und haarig. Die glatträndigen purpurfarbigen Blumenblätter länger als der Kelch. Die Saamenkapseln endigen sich in 2 lange Grannen.

Wohnort. An Zäunen, in Wäldern, auf Mauern und Felsen, z. B. im Wald beim Hanauer Galgen; im Bruchköbler Wald; beim Kohlbrunnen; um Offenbach, Darmstadt, Frankfurt; auf den felsigen Hügeln um Grossbuseck; in den Steinwiesen bei Gedern etc.

Blüthezeit. Mai — September. ♂

Fruchtreife. Juli — Oktober.

Nutzen. Die Hirten gebrauchen in Schweden den Aufguss von dieser stinkenden Pflanze wider das Blutharnen des Viehs. Das frisch zerquetschte Kraut soll die Wanzen vertreiben.

***) Mit vielblüthigen Blumenstielen.

876. G. CICUTARIUM. Der Stengel ästig, gestrekt. Die Saamenlappen herzförmig. Die Blätter gefiedert; die Fiederblättchen länglich, eingeschnitten und stumpf. Die glattrandigen, lichtpurpurfarbigen Blumenblätter, kaum etwas länger als der Kelch. Nur 5 Staubfäden tragen Staubbeutel. Die Grannen der Saamenkapseln glatt.

Geranium cicutarium β Reich.

Wohnort. Auf Aeckern und unfruchtbaren Orten um Hanau, Frankfurt, Giesen etc.

Blüthezeit. März — Oktober. ♂

Fruchtreife. April — Oktober.

Nutzen. Wird von dem Rindvieh und den Pferden gefressen. Die Bienen besuchen fleissig die Blumen. Die Grannen können als Hygrometer dienen.

877. G. CHAEROPHYLLUM

Cavan.

Kälberkropf-
blättriger
Storchschna-
bel.

Der Stengel aufrecht, dann niederliegend. Die Saamenlappen dreilappig. Die Blätter entgegengesetzt, gefiedert, die Fiederblattchen eyförmig, tief und spizzig eingeschnitten. Die glatträndigen hellblauen Blumenblätter grösser als der Kelch. Nur 5 Staubfäden tragen Staubbeutel. Die Grannen der Saamenkapseln haarig.

Geranium cicutarium *α* Reich. *G. pimpinellaefolium* Dillen et Moench.

Wohnort.

Auf Aekern und unfruchtbaren Orten um Hanau, Offenbach, Vilbel, Frankfurt, Giesen etc.

Blüthezeit.

März — Oktober. ☉

Fruchtreife.

April — Oktober.

Nutzen.

Wie bei der vorhergehenden Art.

CCCXXXVII. GENISTA. Ginster.

878. G. TINC-TORIA.

Färberginster.

Der strauchartige Stengel liegt so lang er jung ist nieder, erwachsen steht er aufrecht. Die Aeste rund, gestreift, aufrecht. Die Blätter lanzettförmig und glatt. Die gelben Blumen in Aehren. Die Hülsen glatt.

- Wohnort.** In Wäldern und auf Waldwiesen, z. B. bei Hanau am Wald bei dem neuen Wirthshaus und nach dem Schäferberg zu; bei den Rückinger Schlägen; im Bruchköbler Hägewald; auf der Wiese bei der Frankf. grossen Saustiege; im Frankfurter Wald; im Gieser Wald etc.
- Blüthezeit.** Juni — Juli. ✚
- Fruchtreife.** September, Oktober.
- Nutzen.** Kraut und Blumen färben gelb, welches auch schon Plinius gewußt hat; aus dieser gelben Farbe wird mit Kalkwasser, Kreide und Alaun das Schüttgelb bereitet. Die Stengel werden in Italien zu Tauben- und Vogelnester gebraucht. Das Vieh frisst den Färbeginster gerne und aus seinen Blumen holen die Bienen viel Wachs und Honig. Zu niedrigen Zäunen in Gärten und in englische Anlagen schikt sich dieser Halbstrauch sehr. Seine Vermehrung geschieht durch Saamen und Zertheilung. Die Rinde des jüngern Holzes giebt in Wasser gerötet, eine Art Flachs zu grober Leinwand und Strikken, und die ganze Pflanze kann zu Besen gebraucht werden.

879. G. PILOSA. Der strauchartige Stengel gestreckt, überall mit Knötchen besetzt. Die Blätter stehen büschelweise, sind lanzettförmig, stumpf und auf beiden Seiten mit seidenartigen Haaren bekleidet. Die gelben Blumen in Aehren. Die Zeugungstheile wagerecht. Die Hülsen etwas rauh und mit Haaren bedekt.

Wohnort. Auf dürrem Sandboden in Wäldern und auf Hügeln, z. B. um Hanau im Wilhelmsbader- und Mittelbacher-Wald; bei dem Kohlbrunnen; im Forst; häufig hinter dem Frankfurter Forsthaus; um Darmstadt etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. ✚

Fruchtreife. September.

Nutzen. Für Ziegen und Schaafe ist diese Pflanze ein treffliches und nahrhaftes Futter.

CCCXXXVIII. SALTZWEDELIA.

Saltzwedellie.

880. S. SAGITTALIS *Nobis.* Die strauchartigen Stengel flach an der Erde aufliegend. Die Zweige Pfeilförmige zweischneidig, häutig, gegliedert.
Saltzwedellie.

Die Blätter eyförmig, auf beiden Seiten haarig. Die gelben, aufrechten, fast stiellosen Blumen stehen an der Spitze der Zweige, in einfachen Trauben und haben Dekkblätter. Die Hülsen zottig.

Genista sagittalis Linn.

Wohnort. In Wäldern auf sandigem unfruchtba-
ren Boden, z. B. ohnweit Hanau im
Wald bei dem neuen Wirthshaus; in
zahlloser Menge im Lehen bei Offen-
bach; zwischen Messel und Eppertshau-
sen; in grosser Menge im Wald bei dem
Frankfurter Forsthaus und bei der gros-
sen Saustiege; zwischen Königstein und
Falkenstein; bei Oberursel; zwischen
Usingen und Pfaffenwisbach etc.

Blüthezeit. Juni, Juli. †

Fruchtreife. September, Oktober.

Bemerkung. Peter Saltzwedel, Apotheker in
Frankfurt, seiner Vaterstadt, unterhält
schon seit vielen Jahren einen eigenen
botanischen Garten, der besonders an
sibirischen Pflanzen und an ausländischen
prachtvollen grossen Bäumen in Teutsch-

land allgemein bekannt ist. Ihm haben wir die Entdeckung mancher seltnen Pflanze in hiesiger Gegend zu verdanken, und durch seine treffliche botanische Bibliothek wurden wir in den Stand gesetzt, oft bei zweifelhaften Pflanzen uns zurecht zu finden.

Nutzen.

Wird von dem Vieh gefressen, und die Bienen besuchen fleissig die Blumen.

CCCXXXIX. VOGLERA. Voglere.

881. V. SPINOSA

Nobis.

Dornige Voglere.

Der strauchartige Stengel aufrecht, ästig, rauhhaarig; die älteren Aeste mit zusammengesetzten Dornen, die jüngern ohnbewaffnet. Die Blätter lanzettförmig, spizz, mit einzelnen, langen, abstehenden, weissen Haaren besetzt. Die kleinen gelben Blumen in Aehren. Die Hülsen zottig.

Genista germanica Linn.

Wohnort.

In] Wäldern, z. B. im Bruchköbler Hägewald; im Neuhofer und Langendiebacher Wald; auf der Kazz bei Gelnhausen; bei Dietzenbach und Offenbach im Wald; bei dem Frankf. Forsthaus und der grossen Saustiege; bei der Gold-

grube hinter Homburg; zwischen Usingen und Pfaffenwisbach; in der Gröninger Gemarkung; in dem Gaulkopfs-Schlag bei Gedern etc.

Blüthezeit. Mai — Juli. ✚

Fruchtreife. September, Oktober.

Bemerkung. Johann Philipp Vogler, aus Darmstadt gebürtig, Doktor der Medizin und Physikus in Weilburg. Er ist der eigentliche Entdecker von *Polyp. montanum* (*Oreopteris* Ehrh.) wie dies selbst sein Bruder Johann Andreas Vogler sagt, in seiner Diss. botan. de *Polypodii specie, Polypodium montanum vocata*. Gissae. 1781. Schon vor 23. Jahren wurde J. Ph. Vogler als Botanist bekannt, durch sein 1776. bei Krieger in Gießen herausgegebenes *Schediasma botanic. de duabus graminum speciebus nondum satis extricatis*. In diesem kleinen Büchelchen beschrieb er 2 Grasarten, die damals noch bei keinem neuern Schriftsteller, weder bei Linné noch andern, sondern nur bei den Alten vorkamen. Die eine Art welches der *Bromus asper*

ist, nannte er *B. sylvaticus*, die andere, welches die *Avena dubia* Leers ist, nannte er *Avena strigosa*.

Nutzen.

In hochliegenden trocknen Gärten verdient sie als Zierblume eine Stelle; auch zu Umzäunungen ist sie dienlich. Aus ihren Blumen holen die Bienen Honig. Die Vermehrung geschieht durch Saamen und Zertheilen der Pflanze.

CCCXL. SPARTIUM. Pfrieme.

882. S. SCOPARIUM.

Besenpfrieme.

Der Stengel strauchartig. Die Zweige grün, vieleckig, glatt, wechselseitig stehend. Die Blätter stehen zu drei und auch einzeln, sind länglich stumpf, kurz gestielt, mit anliegenden Haaren dicht bedekt. Der Griffel bis über die Mitterauhhaarig. Die schwefelgelben Blumen kommen einzeln und auch manchmal zu zwei aus den an den Aesten befindlichen Knospen. Die Hülsen glatt, an beiden Näthen rauhhaarig, mit einem kurzen Stachel versehen.

Wohnort. Sehr gemein in unsern Wäldern, an Wegen, und auf Hügeln, vorzüglich auf sandigem und lettigem Boden.

Blüthezeit. Juni, Juli. ‡

Fruchtreife. September.

Nutzen. Das Wildbret und das zahme Vieh liebt ihn sehr und frisst ihn oft bis auf die Wurzel ab. In Holzarmen Gegenden liefert dieser Strauch Reis- und Wellholz, welches zum Bakken, Brauen und Ziegelbrennen mit Nuzzen verwendet wird. Die Zweige geben Besen und dienen auch zur Streu; gerötet geben sie eine Art von Bast zu Strikken und groben Säkken; getrocknet färben sie die Wolle braungelb und auch schwarzbraun, und sind auch zum Gerben zu benutzen; nach Kalm und Ruttty bediente man sich ehemals in England der Zweige statt des Hopfens unter das Bier, welches aber davon stark und berauschend wird; nach Böhmern kann man aus der innern Rinde ohne Zusatz von Lumpen Schreibpapier verfertigen. Die Blütheknospen können mit Essig und Oehl oder Salz wie Kapern eingemacht und so auch gegessen werden. In Au-

vergne und in Aquitanien ist das gemeine Volk, nach Lobel, die Blumen als Salat; sie geben den Bienen Stoff zu Honig und Wachs und liefern auch eine gelbe Farbe. Die Saamen geröstet, können als Kaffee benutzt werden. In Lustgärten empfiehlt sich dieser Strauch seiner sehr schönen Blüthen wegen sehr, aber in Forsten, wo er ungemein viel schadet, sucht man ihn durch Umhauen vor der Blüthezeit auszurotten. Er ist officinell.

CCCXLI. ANTHYLLIS. Anthyllis.

883. A. vul-
NERARIA.
Wundklee.

Der niedergestreckte Stengel weichhaarig. Die Wurzelblätter einfach, länglich, die Stengelblätter gefiedert, das ungepaarte am grössten. Zwei Blumenköpfchen stehen bei einander, haben fingerförmige Blumendekblätter, weissgelbe Blumen und ein-saamige Hülsen.

Wohnort.

Auf Wiesen, Triften, Hügeln und Anhöhen. Am Wilhelmsbad bei Hanau; auf Wiesen bei Wachenbuchen; an der Lohe hinter Bischofsheim; auf Wiesen

bei Gross - und Klein - Steinheim; bei Diedesheim; Fechenheim; Offenbach gegen über auf den Wiesen; in und um die Wälder bei Frankfurt; um Schiffenberg, Rödgen, Giesen, Darmstadt etc.

Blüthezeit. Mai — August. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Er ist ein vortreffliches Futter für das Vieh. Mit dem Kraut kann man gelb und mit den Blumen blau färben. Ehedem gehörte er zu den Wundmitteln und zu den Berufkräutern der abergläubischen Mütterchen.

CCCXLII. ULEX. Stechginster.

884. U. EURO-
PAEUS.

*Europäischer
Stechginster.*

Die alten Zweige glatt, gefurcht und grün, die jüngern grün, tief gefurcht, mit langen Haaren bedekt, alle mit zottigen, zusammengesetzten, blüthetragenden Dornen dicht bekleidet, deren jede ein pfriemenförmiges, flaches, spizziges Blatt unter sich hat. Kelch und Blumenstiel mit kleinen gelblichen Haaren dicht besetzt. Die gelben Blumen zottig. Die Hülsen schwarz, mit dichten weis-

sen Haaren bedekt. Die Saamen dunkelbraun, glänzend, oval, etwas zusammengedrückt.

Wohnort. Hin und wieder im Gieserwald. Er liebt vorzüglich Sandboden.

Blüthezeit. Mai, Juni. ‡

Fruchtreife. September.

Nutzen. In Holzarmen Gegenden wird er zur Heizung der Ziegelöfen und Dörrung des Malzes gebraucht. Die Zweige auf Mühlen zerquetscht, geben ein ganz vorzügliches Pferdefutter; so daß es sich wohl der Mühe lohnte ihn in schlechtem Sandboden anzubauen; besonders auch, da er sich so vielfältig und leicht durch Saamen selbst fortpflanzt. Ihn zu Hekken zu gebrauchen ist nicht rathsam; denn erstlich erfriert er leicht bei strenger Kälte so, daß er auch nicht wieder aus der Wurzel treibt, zweitens verdrängt seine allzugrosse Vermehrung alles übrige um ihn her, und drittens wird er nach dem Grunde zu bald nakt, und macht dadurch grosse Lücken.

CCCXLIII. ONONIS. Heuhhechel.

885. O. SPINOSA.

Dornige Heuhhechel.

Der Stengel niederliegend und zottig. Die jungen Aeste ohnbewaffnet, die älteren endigen sich allein in einen spizzigen einfachen Dorn. Die Blätter dreifach und einzeln stehend. Die Blumen purpurfarbig, selten weiss, kommen aus den Blattwinkeln, einzeln, oder zu zwei beisammen, und bilden Trauben.

Wohnort. Sehr gemein auf wüsten Feldern, an Wegen, auf trocknen Hügeln und Aekern.

Blüthezeit. Juni — August. †

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Jung frisst sie alles Vieh gerne; obgleich alle Theile dieser Pflanze sehr stinken. Ehemals wurden die jungen Blättersprossen wie Plinius berichtet, als Gemüse gegessen, und noch jetzt werden sie in der Schweiz in Salzbrühe eingemacht und so verspeist. Zweige und Blätter enthalten Farbestoff. Die ganze Pflanze enthält viel Laugensalz und verdiente bei Glashütten angebaut

zu werden. Auf Aekkern und Wiesen ist sie sehr schädlich, indem sie das Pflügen hindert und das Heu stachelig macht. Die Blumen geben den Bienen Honig. Wurzel und Kraut waren sonst officinell.

III. ORDNUNG.

POLYANDRIA. Mit vielen Staubfäden.

CCCXLIV. MALVA. Malve.

886. M. ROTUN-
DIFOLIA.

*Rundblät-
rige Malve.*

Der Stengel niedergestreckt und weichhaarig. Die Blätter herzförmig rund, gering fünflappig; die Lappen gezähnelt. Die Fruchtsiele niedergebogen. Die Blumen weiss, mit purpurfarbigen Adern durchmahlt. Die Fruchthüllen auf der äussern Krümmung mit einem dichten Filz bedekt.

Wohnort. Allenthalben an Strassen, Wegen, altem Gemäuer, auf Schutthaufen etc.

Blüthezeit. Juni — September. 4

Fruchtreife. August — Oktober.

Nutzen. Sie war bei den Römern und Egyptern, so wie mehrere Malvenarten, ein beliebtes Gemüse. Das Vieh frisst sie

gerne, vorzüglich angenehm schmeckt sie Haasen und Kaninchen. Holmberger hat die getrockneten Stengel und Zweige im Wasser so lange gerötet bis sie sich in feine Fäden theilten, dann trocknete er sie, worauf sie weiss wurden und sich spinnen liessen. Die Wurzeln getrocknet, geschält und an dem einen Ende fein büstenartig ausgefasert, giebt vortreffliche Zahnbürsten. Aus den Blumen erhalten die Bienen Wachs und Honig. Sie ist officinell.

887. M. SYLVESTRIS.

Wilde Malve.

Der Stengel meistens aufrecht und rauh. Die Blätter 5 - 7 lappig; die Lappen sägeartig gezähnt und spizzig. Die Blumen- und Blattstiele haarig. Die Fruchstiele aufrecht. Die Blumen blaupurpurfarbig, mit dunklern Adern durchmahlt. Die Fruchthüllen auf der äussern Krümmung mit glatten nezzartigen Runzeln bedekt.

Wohnort. Allenthalben an Wegen, Hekken, Zäunen, Dörfern, auf Schutt etc.

Blüthezeit. Juni — August. 24

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. Völlig wie bei der vorhergehenden Art.

388. M. ALCEA. Der Stengel aufrecht, rauh, mit
Siegmars sternförmig stehenden Haaren bedekt.
Malve. Die rauhen, fast schildförmigen Blätter
vielmal getheilt. Die grossen Blumen bald
purpurfarbig, bald fleischroth, bald weiss, sind an den Gipfeln
der Zweige doldenartig. Die Fruchthüllen durch Schilder halbbedekt.

Wohnort. Häufig an Zäunen, auf Hügel'n, auf
aufgeworfener Erde, an Steinhaufen etc.

Blüthezeit. Juni — August. 4

Fruchtreife. August, September.

Nutzen. In unsern Gärten dient sie als Zier-
blume. Das Vieh frisst sie gerne und
aus ihren Blumen holen die Bienen
Wachs und Honig.

389. M. MOSCHATA. Der Stengel aufrecht und rauh. Die
Bisammalve. Wurzelblätter nierenförmig einge-
schnitten, die Stengelblätter fünf-
theilig gefiedert und vielspaltig. Die
rosenfarbigen Blumen riechen stark
nach Bisam. Die Fruchthüllen durch
Schilder halbbedekt.

Wohnort. In gebirgiger unfruchtbarer Gegen-
den z. B. im Falkensteiner Schlosshof;

hinter Königstein ; um Ober - Ems ; um
Ilbeshausen im Vogelsberg ; auf dem
Burgberger Kirchhof hinter Biber bei
Gelnhausen ; bei Adolphsekk ohnweit
Langenschwalbach sehr häufig etc.

Blüthezeit. Juni , August. 4

Fruchtreife. August , September.

Nutzen. In unsern Gärten könnte sie als Zierblu-
me dienen. Das Vieh frisst sie gerne, und
ihre Blumen werden häufig von den
Bienen besucht.

CCCXLV. ALTHAEA. Althäe.

890. A. OFFICI-
NALIS.

Offizinelle

Althäe, oder
Eibisch.

Der Stengel aufrecht und filzig.
Die Blätter herzförmig- eyrund, un-
deutlich gelappt, gekerbt, filzig. Die
Blumenstiele kürzer als das Blatt. Die
Blumen blasspurpurröthlich , oder
fleischfarbig.

Wohnort. Zu Soden hinter dem Mineralbrun-
nen ; an der Saline zu Wisselsheim. *Neu / 1892*
neu

Blüthezeit. Juli , August. 4

Fruchtreife. September , Oktober.

Nutzen. Nach Cavanilles geben ihre Sten-
gel in Wasser geweicht, sehr feine,

weisse, weiche und starke Fäden, welche gefärbt zu schönen Zeugen brauchbar sind. Gewiss giebt diese Pflanze auch einen guten Kleister. Marquis de Vilette hat aus ihr ein gelblichgrünes, ziemlich feines Papier verfertiget. Aus ihren Blumen holen die Bienen Stoff zu Honig. Die gestossene Wurzel könnte man zum Poudre benutzen. Wurzel, Blätter und Blumen sind officinell.

Ende des 2ten Bandes.

New York Botanical Garden Library

SB108.G4 .G3 Bd 2 ~~Abt. 2~~ ^{gen}
Gartner, Gottfried/Oekonomisch-technisch

3 5185 00110 2266