Livres provenant de la bibliothèque De Candolle,
acquise par la Ville de Genève en 1921, insérés la
même année dans la bibliothèque du Conservatoire
botanique de Genève.

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

TAB LEAU

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DE

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR M. DESFONTAINES,

MEMBRE DE L'INSTITUT, ET PROFESSEUR DE BOTANIQUE.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

A PARIS;

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 6.

M. DCCC. IV.

1804

+QK'13

,P3

D45

Je préviens les CONTREFACTEURS et les DÉBITANS de Contre-
façons, que j'userai de tous mes droits.

AVERTISSEMENT.

NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

LE Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le jardin et dans les serres du Muséum d'Histoire naturelle. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Étrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Muséum par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'École de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude, et d'avoir un plan fixe pour un second ouvrage dont celui-ci est le type, et qui ne tardera pas à paroître. Chaque espèce y sera accompagnée d'une description abrégée, pour l'instruction de ceux qui suivent le Cours public que je fais tous les ans.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail, et d'y faire les changemens qu'il a

AUG 7 - 1923

jugés convenables. M. Cels m'a donné des renseignemens utiles sur plusieurs plantes étrangères qu'il cultive dans son jardin ; et M. de la Marck m'a communiqué ses herbiers ; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique , et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau , et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte ; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité , et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans , et pour corriger , sans beaucoup de peine , les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'École de Botanique , soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre , soit par la transposition des étiquettes , ou autres accidens.

La collection de plantes vivantes cultivées au Muséum , et dont le nombre est de plus de six mille , sans y comprendre les variétés , est sans contredit une des plus riches de l'Europe ; elle offre un champ vaste à l'étude , et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Le jardin du Muséum est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe , et d'où elles se répandent dans nos départemens , chez les autres nations de l'Europe , et souvent même au-delà des mers. La France lui doit , depuis l'époque de sa création , un grand nombre d'arbres étrangers , de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol ; en un mot , cet Établissement , par son but d'utilité publique et par sa magnificence , est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

EXPLICATION des signes et des abréviations.

⊙.... Annuelle.	am. m. Amérique méridionale (par-
♂.... Bisannuelle.	tie comprise entre les tro-
℥.... Vivace.	piques).
♂.... Ligneuse.	n. esp. Nouvelle-Espagne.
or.... Orangerie.	n. holl. Nouvelle-Hollande.
s. ch. . Serre-chaude.	(alim.) Alimentaire.
f. France.	(écon.) Economique.
eur... Europe.	(méd.) Médicinale.
as. ... Asie.	(orn.) Ornement.
af. ... Afrique.	(ven.) Vénéneuse.
am. s. Amérique septentrionale.	

Noms d'Auteurs par abréviation.

<i>All.</i> ... Allioni.	<i>L'Her.</i> L'Héritier.
<i>Andr.</i> Andrews.	<i>L.</i> Linnæus.
<i>Bill.</i> ... Billardièrè.	<i>L. f.</i> .. Linnæus filius.
<i>Bull.</i> . Bulliard.	<i>Mass.</i> Masson.
<i>Cav.</i> ... Cavanilles.	<i>Mich.</i> Michaux.
<i>Curt.</i> . Curtis.	<i>Mill.</i> .. Miller.
<i>Dec.</i> ... Decandolle.	<i>Murr.</i> Murray.
<i>Desf.</i> .. Desfontaines.	<i>Pers.</i> .. Persoon.
<i>Forsk.</i> Forskal.	<i>Retz.</i> .. Retzius.
<i>Haw.</i> Haworth.	<i>Salisb.</i> Salisbury.
<i>Hoff.</i> .. Hoffmann.	<i>Thunb.</i> Thunberg.
<i>H. K.</i> . Hortus Kewensis.	<i>Vent.</i> .. Ventenat.
<i>Jacq.</i> Jacquin.	<i>Vill.</i> ... Villars.
<i>Juss.</i> .. Jussieu.	<i>Wald.</i> Waldstein.
<i>Lmk.</i> . Lamarck.	<i>Wild.</i> Wildenow.
<i>Lapeyr.</i> Lapeyrouse.	

ERRATA.

<i>Pagina</i>	14,	<i>linea</i>	30,	ÆGYLOPS,	<i>lege</i> ÆGILOPS.
	19,		5,	lacrima,	lacryma.
	28,		10,	POLYANTHES,	POLIANTHES.
	31,		36,	ATHOLIZA,	ANTHOLYZA.
	33,		6,	HEDICHUM,	HEDYCHUM <i>retz.</i>
	43,		32,	circinnatus,	circinatus.
	53,		8,	MONGORIUM,	MOGORIUM.
	71,		23,	MESSERCHMIDIA,	MESSERSCHMIDIA.
	77,		9,	APOCINEÆ,	APOCYNEÆ.
	100,		23,	ægyptica,	ægyptiaca.
	102,		28,	pyrenæus <i>lmk</i> ,	pyrenæus.
	113,		29,	POEDERIA,	PÆDERIA.
	121,		14,	<i>Herbaceæ</i> ,	<i>Herbacea.</i>
	133,		40,	KAKILE,	CAKILE.
	136,		16,	HYPPOCRATEA,	HIPPOCRATEA.
	159,		41,	AGROSTEMA,	AGROSTEMMA.
	170,		2,	FUSCHIA,	FUCHSIA.
	174,		5,	MESPYLUS,	MESPILUS.
	186,		32,	RAPHNIA,	RAFNIA.
	197,		22,	verpertilionis,	vespertilionis.
	198,		10,	latilisiqua,	latisiliqua.
	200,		29,	SPAPHYLEA,	STAPHYLEA.
	203,	16 et	17,	<i>Thumb</i> ,	<i>Thunb.</i>
	211,		11,	cynocrambre,	cynocrambe.
	222,		17,	gangeticum <i>deleatur.</i>	

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DE PARIS.

CLASSIS I.

ACOTYLEDONES:

ORDO I.

FUNGI.

I. Fungi pileo destituti.

MUCOR
mucedo L.

TRICHIA
cinnabaris Bull.

RETICULARIA
hortensis Bull.

SPHÆRIA
disciformis Hoff.

ÆCIDIUM
berberidis Pers.

LYCOPERDON
bovista L.
stellatum L.

TUBER
cibarium Bull.

CLATHRUS
cancellatus L.

CLASSE I.

LES ACOTYLÉDONS:

ORDRE I.

LES CHAMPIGNONS.

I. Champignons sans chapeau:

MOISSISSURE
commune. F.

CAPILLINE
rouge. F.

RÉTICULAIRE
des jardins. F.

SPHÆRIA
en disque. F.

ÆCIDIUM
du Berberis. F.

LYCOPERDON
vesse de loup. F.
étoilé. F.

TRUFFE
comestible. F. (alim.)

CLATHRE
à réseau. F.

NIDULARIA
striata Bull.

PEZIZA
cochleata L.

CLAVARIA
ophioglossoides L.
coralloïdes L.

II. Fungi pileati:

PHALLUS
esculentus L.
impudicus L.

HELVELLA
mitra L.

AURICULARIA
reflexa Bull.

HYDNUM
repandum L.

BOLETUS
igniarius L.
versicolor L.

AGARICUS
campestris L.
aurantiacus Bull.

ORDO II.

ALGÆ.

BYSSUS
aurea L.
botryoïdes L.

TREMELLA
atrovirens Bull.

CONFERVA
rivularis L.

ULVA
intestinalis L.

FUCUS
nodosus L.

LICHEN
rugosus L.
parietinus L.
ciliaris L.

NIDULAIRE
striée. F.

PÉZIZE
limaçon. F.

CLAVAIRE
ophioglosse. F.
corail. F.

II. Champignons à chapeau.

MORILLE
comestible. F. (alim.)
fétide. F.

HELVELLE
mitrée. F.

AURICULAIRE
réfêchie. F.

HYDNUM
festonné. F.

BOLET
amadouvier. F. ♀ (écon. méd.)
bigarré. F. ♀

AGARIC
des champs. F.
orange. F. (alim.)

ORDRE II.

LES ALGUES.

BYSSUS
doré. F.
vert. F.

TREMELLE
verte F.

CONFERVE
des ruisseaux. F.

ULVE
intestinale. F. ☉

VAREC
vésiculeux. F.

LICHEN
ridé. F.
des murs. F.
cilié. F.

caninus L.
 deustus L.
 pyxidatus L.
 rangiferinus L.

des chiens. F.
charbonné. F.
en coupe. F.
des rennes. F.

ORDO III.

H E P A T I C Æ.

RICCIA
 glauca L.
 BLASIA
 pusilla L.
 ANTHOCEROS
 lævis L.
 JUNGERMANNIA
 tamarisci L.
 MARCHANTIA
 polymorpha L.

ORDO IV.

M U S C I.

SPLACHNUM
 ampullaceum L.
 POLYTRICHUM
 commune L.
 HYPNUM
 sericeum L.
 FONTINALIS
 antipyretica L.
 BRYUM
 scoparium L.
 PHASCUM
 acaulon L.
 BUXBAUMIA
 aphylla L.
 SPHAGNUM
 palustre L.
 LYCOPODIUM
 clavatum L.

O R D R E I I I.

LES HÉPATIQUES.

RICCIE
 glauque. F.
 BLASIE
 naine. F.
 ANTHOCÉROS
 lisse. F.
 JUNGERMANNIE
 tamarix. F.
 HÉPATIQUE
 de fontaine. F. ♀

O R D R E I V.

LES MOUSSES.

SPLACHNUM
 vésiculeux. F. ♀
 POLYTRIC
 commun. F. ♀
 HYPNUM
 soyeux. F. ♀
 FONTINALE
 des ruisseaux. F. ♀
 BRYUM
 à balais. F. ♀
 PHASCUM
 sans tige. F.
 BUXBAUMIA
 sans feuell. F.
 SPHAGNUM
 des marais. F. ♀
 LYCOPODE
 à massue. F. ♀ (arts.)

ORDO V.

FILICES.

I. *Fructificatio in spicas distinctas dispositas.*

OPHIOGLOSSUM
vulgatum L.

ONOCLEA
sensibilis L.

OSMUNDA
lunaria L.
regalis L.
spicant L.
crispa L.

II. *Fructificatio in altera foliorum superficie.*

ACROSTICHUM
septentrionale L.
aureum L.
marantæ L.
ilvense Vill.

POLYPODIUM.

1. *Fronde indivisa.*

crassifolium L.

2. *Fronde pinnatifida.*

vulgare L.
cambricum L.
aureum L.

3. *Fronde trifoliata.*
trifoliatum L.

4. *Fronde pinnata.*

lonchitis L.
reticulatum L.

5. *Fronde sub-bipinnata.*

phægopteris L.
fragrans L.
dilatatum Hoff.
fontanum L.
cristatum L.
filix mas L.
filix femina L.

ORDRE V.

LES FOUGÈRES.

I. *Fructification en épis distincts.*

OPHIOGLOSSE
commune. F. ψ

ONOCLEA
sensible. Am. s. ψ

OSMONDE
lunaire. F. ψ
officinale. F. ψ (méd.)
spicant. F. ψ
crépue. F. Alpes. ψ

II. *Fructification sur le dos des feuilles.*

ACROSTIC
du Nord. F. ψ
doré. Am. m., s. ch. ψ
de Maranta. F. Alpes. ψ
velu. F. Alpes. ψ

POLYPODE.

1. *Feuilles entières.*

à feuell. épaisses. Am. m., s. ch. ψ

2. *Feuilles presque pennées.*

commun. F. ψ (méd.)
lacinié. F. ψ
doré. Am. m., s. ch. ψ

3. *Feuilles ternées.*

à trois feuell. Am. m., s. ch. ψ

4. *Feuilles pennées.*

lonchitis. F. ψ
à réseau. Am. m., s. ch. ψ

5. *Feuilles presque deux fois pennées.*

phægopteris. F. ψ
odorant. F. Alpes. ψ
dilaté. F. ψ
de fontaine. F. ψ
à crêtes. F. ψ
fougère mâle. F. (méd.)
fougère femelle. F. ψ

thelypteris L.
aculeatum L.
bulbiferum L.
rhæticum L.

6. *Aculeata.*

arborescens L.

7. *Fronde supra-decomposita.*

dryopteris L.
myrrhidifolium Will.

ASPLENIUM.

1. *Fronde simpliciter.*

serratum L.
scolopendrium L.
 — *crispum*.
hemionitis L.

2. *Fronde pinnatifida.*

ceterach L.

3. *Fronde pinnata.*

denticulatum.
trichomanes L.
adanthum nigrum L.
ruta muraria L.
marinum L.

BLECHNUM

occidentale L.

PTERIS

aquilina L.
cretica L.
longifolia L.

ADIANTHUM.

1. *Fronde simpliciter.*

reniforme L.

2. *Fronde supra-decomposita.*

pedatum L.
capillus veneris L.

DAVALLIA

canariensis Smith.

TRICHOMANES

membranaceum L.

thelypteris. F. ψ
à aiguillons. F. ψ
bulbifère. F. ψ
de Rhétie. F. Alpes. ψ

6. Pétioles garnis d'épines.

en arbre. Am. m., s. ch. ψ

7. Feuillage décomposé.

dryopteris. F. ψ
à feuil. de myrrhis. F. Alp. ψ

SCOLOPENDRE.

1. Feuilles simples.

en scie. Am. m., s. ch. ψ
officinale. F. ψ (méd.)
 — *crépue*.
hemionitis. F. m., or. ψ

2. Feuilles presque pennées.

ceterac. F. ψ (méd.)

3. Feuilles pennées.

dentelée. Am. s. ψ
trichomanes. F. ψ
capillaire noir. F. ψ (méd.)
des murailles. F. ψ (méd.)
maritime. F. ψ

BLECHNUM

d'Occident. Am. m., s. ch. ψ

PTERIS

commun. F. ψ
de Crète. or. ψ
à feuil. longues. Am. m., s. ch. ψ

ADIANTHUM.

1. Feuilles simples.

reniforme. canaries., or. ψ

2. Feuilles décomposées.

de Canada. Am. s. ψ (méd.)
Capillaire de Montpellier. F.,
 or. ψ (méd.)

DAVALLIA

des Canaries. canaries., or. ψ

TRICHOMANES

membraneux. Am. m., s. ch. ψ

III. *Antheræ strobilo impositæ, pistilla a staminibus segregata.*

ZAMIA

cycadis L.
furfuracea H. K.
debilis H. K.
integrifolia H. K.

CYCAS

circinalis L.
revoluta L.
Riedlei.

IV. *Antheræ pistillis mixtæ in eodem involucri.*

PILULARIA

globulifera L.

MARSILEA

quadrifolia L.

V. *Plantæ filicibus affines, foliis non convolutis.*

SALVINIA

natans.

ISOETES

lacustris L.

EQUISETUM

arvense L.
sylvaticum L.
palustre L.
fluviale L.
hyemale L.

ORDO VI.

NAIADES.

HIPPURIS

vulgaris L.

CHARA

vulgaris L.
hispida L.
flexilis L.

CERATOPHYLLUM

submersum L.
demersum L.

III. Fleurs en chatons, pistils séparés des étamines.

ZAMIA

des Hottent. cap., s. ch. ♀
furfuracé. inde., s. ch. ♀
foible. inde., s. ch. ♀
à feuell. entières. Am. s., or. ♀

CYCAS

arrondi. inde., s. ch. ♀ (alim.)
roulé. chine, s. ch. ♀
de Riedlé. N. Holl., s. ch. ♀

IV. Anthères mêlées avec les pistils dans une enveloppe commune.

PILULAIRE

à globules. F. ♀

MARSILEA

à quatre feuell. F. ♀

V. Plantes qui ont de l'affinité avec les fougères, et dont les feuilles ne sont pas roulées.

SALVINIA

flottant. F.

ISOËTES

des marais. F. m. ♀

PRÉLE

des champs. F. ♀ (arts.)
des bois. F. ♀
des marais. F. ♀
des rivières. F. ♀
d'hiver. F. ♀

ORDRE VI.

LES NAÏADES.

HIPPURIS

aquatique. F. ♀

CHARA

commun. F. ☉
hérissé. F. ☉
flexible. F. ☉

CERATOPHYLLUM

à fruit lisse. F. ♀
à fruit épineux. F. ♀

NAIAS

- marina L.
— angustifolia.

SAURURUS

- cernuus L.

POTAMOGETON

- natans L.
perfoliatum L.
densum L.
lucens L.
crispum L.
compressum L.
pectinatum L.
gramineum L.
pusillum L.

RUPPIA

- maritima L.

ZANICHELLIA

- palustris L.

CALLITRICHE

- verna L.
— autumnalis.

LEMNA

- polyrhiza L.
minor L.
— gibba.
trisulca L.

NAIADÆ

- aquatique. F. Ψ
— à feuell. étroites.

SAURURUS

- incliné. Am. S. Ψ

POTAMOGETON

- flottant. F. Ψ
perfolié. F. Ψ
bifurqué. F. Ψ
luisant. F. Ψ
crépu. F. Ψ
comprimé. F. Ψ
pectiné. F. Ψ
à feuell. de gramen. F. Ψ
grêle. F. Ψ

RUPPIA

- maritime. F. Ψ

ZANICHELLE

- des marais. F. ⊙

CALLITRIC

- printanier. F. ⊙
— d'automne. ⊙

LEMNA

- à larges feuell. F. ⊙
à petites feuell. F. Ψ
— gibbeuse.
à trois sillons. F. Ψ

CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina hypogyna.)

ORDO I.

AROIDEÆ.

- I. Spadix spatha involutus.

ZOSTERA

- marina L.

CLASSE II.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines sous le pistil.)

ORDRE I.

LES AROÏDES.

- I. Spadix entouré d'un spathe.

ZOSTERA

- maritime. F. Ψ

ARUM.

1. *Acaulia, foliis compositis.*

dracunculus L.
dracontium L.
triphyllum L.

2. *Acaulia, foliis simplicibus:*

maculatum L.
italicum Lmk.
arisarum L.
colocasia L.
pictum. L. f.
tenuifolium L.
muscivorum L. f.
divaricatum L.
trilobatum L.

CALADIUM vent.

1. *Acaulia.*

sagittæfolium.
violaceum.
bicolor.
helleborifolium.

2. *Caulescentia:*

arborescens.
variegatum.

CALLA

æthiopica L.
palustris L.

DRACONTIUM

pertusum L.

POTHOS

crassinervia Jacq.
scolopendrioides.

II. *Spadix spatha destitutus:*

ACORUS

calamus L.
gramineus H. K.

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées:

serpentine. F. ψ (méd.)
dracontium. Am. m., s. ch. ψ
à trois feuell. Am. s. ψ

2. Point de tige, feuilles simples.

maculé. F. ψ (méd.)
d'Italie. ψ
capuchon. F. m., or. ψ
colocase. inde, s. ch. ψ (alim.)
veiné. minorque, or. ψ
à feuell. étroites. F. m., or. ψ
gobbe-mouche. minorque., or. ψ
divergent. inde, s. ch. ψ
trilobé. inde, s. ch. ψ

CALADIUM.

1. Point de tige.

hasté. Am. m., s. ch. ψ
violet. Am. m., s. ch. ψ
bicolor. BUÉROS-AYRES., s. ch. ψ
à feuell. d'helléb. Am. m., s. ch. ψ

2. Une tige.

en arbre. Am. m., s. ch. ψ
moucheté. Am. m., s. ch. ψ

CALLA

d'Ethiopie. Afr., or. ψ (orn.)
des marais. F. ψ

DRACONTIUM

perforé. Am. m., s. ch. ψ

POTHOS

à grosse nervure. Am. m., s. ch. ψ
à feuell. de scolopendre. Am. m.,
s. ch. ψ

II. Spadix sans spathe:

ACORUS

aromatique. F. ψ (méd.)
à feuell. étroites. chine, s. ch. ψ

ORDO II.

TYPHÆ.

TYPHA

- latifolia L.
angustifolia L.
minima Roth.

SPARGANIUM

- erectum L.
simplex Curt.
natans L.

ORDO III.

CYPEROIDEÆ.

I. Flores monoici.

CAREX.

1. *Spica unica simplici.*

- dioica L.
pulcaris L.

2. *Spicis androgynis.*

- arenaria L.
tenella Thuit.
ovalis Good.
vulpina L.
muricata L.
stellulata Good.
divulsa Good.
curta Good.
elongata L.
brizoides L.
paniculata L.
teretiuscula Good.
remota L.

3. *Spicis sexu distinctis femineis sessilibus.*

- digitata L.
flava L.
œderi Roth.
montana L.
tomentosa L.
præcox Jacq.
filiformis L.
distans L.

ORDRE II.

LES MASSÈTES.

MASSÈTE

- à larges feuell. F. ψ
à feuell. étroites. F. ψ
petite. F. ψ

RUBAN-D'EAU

- à tige droite. F. ψ
à tige simple. F. ψ
flottant. F. ψ

ORDRE III.

LES SOUCHETS.

I. Fleurs monoïques.

CAREX.

1. Un seul épi simple.

- dioïque. F. ψ
pulcaire. F. ψ

2. Epis androgynes.

- des sables. F. ψ
délicat. F. ψ
ovale. F. ψ
compacte. F. ψ
hérissé. F. ψ
étoilé. F. ψ
séparé. F. ψ
tronqué. F. ψ
allongé. F. ψ
brizoïde. F. ψ
paniculé. F. ψ
cylindrique. F. ψ
écarté. F. ψ

3. Epis femelles sessiles et séparés des mâles.

- digité. F. ψ
jaune. F. ψ
d'Oeder. F. ψ
de montagne. F. ψ
cotonneux. F. ψ
précoce. F. ψ
filiforme. F. ψ
distant. F. ψ

4. *Spicis sexu distinctis , femineis pedunculatis.*

argentea Vill.
panicea L.
sylvatica Huds.
pallascens L.
plantaginea Lmk.
pseudocyperus L.
depauperata Good.

5. *Spicis sexu distinctis masculis pluribus.*

cespitosa L.
glauca Scop.
stricta Good.
riparia Good.
paludosa Good.
acuta Good.
vesicaria L.
ampullacea Good.
hirta L.
hordeistichos Vill.

II. Flores hermaphroditi.

SCHOENUS.

1. *Culmo tereti.*

mariscus L.
mucronatus L.
nigricans L.
fuscus L.

2. *Culmo triquetro.*

compressus L.
albus L.

ERIOPHORUM

polystachion L.
angustifolium Roth.
vaginatum L.

SCIRPUS.

1. *Spica unica.*

articulatus L.
palustris L.
cespitosus L.
acicularis L.
fluitans L.
ovatus Roth.
campestris Willd.

4. Epis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.

argente. F. ♀
faux panis. F. ♀
des bois. F. ♀
pâle. F. ♀
à feuell. de plantain. Am. S. ♀
faux souchet. F. ♀
à fruits rares. F. ♀

5. Plusieurs épis mâles séparés des femelles.

gazonnant. F. ♀
glauque. F. ♀
serre. F. ♀
des rivages. F. ♀
des marais. F. ♀
aigu. F. ♀
vésiculeux. F. ♀
renflé. F. ♀
velu. F. ♀
épi d'orge. F. ♀

II. Fleurs hermaphrodites.

SCHÆNUS.

1. Chaume cylindrique.

des étangs. F. ♀
acéré. F. ♀
noir. F. ♀
brun. F. ♂

2. Chaume triangulaire.

comprimé. F. ♀
blanc. F. ♀

LINAIGRETTE.

à épis. F. ♀
à feuell. étroites. F. ♀
engainé. F. ♀

SCIRPE.

1. Un seul épi.

articulé. inde, s. ch. ♀
des marais. F. ♀
gazonnant. F. ♀
aiguille. F. ♀
flottant. F. ♀
ovale. F. ♀
des champs. F. ♀

2. *Culmo tereti*, *polystachio*.

setaceus L.

supinus L.

lacustris L.

holoschoenus L.

romanus L.

australis Lmk.

3. *Culmo triquetro*, *polystachio*.

mucronatus L.

maritimus L.

sylvaticus L.

annuus All.

CYPERUS.

1. *Culmo tereti*.

articulatus L.

2. *Culmo triquetro*.

viscosus Swartz.

longus L.

tenuiflorus Jacq.

esculentus L.

eragrostis Lmk.

flavescens L.

fuscus L.

pannonicus Jacq.

papyrus L.

flabelliformis Rottb.

KILLINGIA

triceps L.

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

I. *Styli* 2, *stamina* 1-2.

ANTHOXANTHUM

odoratum L.

CRYPsis

aculeata H. K.

schoenoides H. K.

II. *Styli* 2, *stamina* 3, *gluma* uniflora.

ALOPECURUS

utriculatus.

bulbosus L.

2. Chaume cylindrique, à plusieurs épis.

sétiforme. F. ψ

couché, F. ψ

des étangs. F. ψ

à globules. F. m., or. ψ

romain. F. m., or. ψ

austral. F. m., or. ψ

3. Chaume triangulaire, à plusieurs épis.

piquant. F. m., or. ψ

maritime. F. ψ

des bois. F. ψ

annuel. F. ⊙

SOUCHET.

1. Chaume cylindrique.

articulé. inde, s. ch. ψ

2. Chaume triangulaire.

visqueux. Am. m., s. ch. ψ

odorant. F. ψ (écon. méd.)

à petites fleurs. inde, s. ch. ψ

comestible. orient., or. ψ

amourette. Am. m., s. ch. ψ

jaunâtre. F. ψ

brun. F. ψ

de Hongrie. ψ

papyrus. égypte, s. ch. ψ

éventail. inde, s. ch. ψ

KILLINGIA.

à trois têtes. Am. m., s. ch. ⊙

ORDRE IV.

LES GRAMINÉES.

I. 2 styles, 1 ou 2 étamines.

FLOUVE

odorante. F. ⊙

CRYPsis

piquant. F. m. ψ

faux schoenus. F. m. ψ

II. 2 styles, 3 étamines, calice à une fleur.

ALOPÉCURE

à utricules. F. ⊙

bulbeux. F. ψ

pratensis L.
 geniculatus L.
 gerardi Vill.

des prés. F. ♀
 geniculé. F. ♀
 de Gérard. F. ♀

PHLEUM

pratense L.
 nodosum L.
 alpinum L.
 arenarium L.

FLÉAU

des prés. F. ♀
 bulbeux. F. ♀
 des Alpes. F. ♀
 des sables. F. ♂

LEERSIA

oryzoides Willd.

LEERSIA

des marais. F. ♀

PHALARIS

aspera Retz.
 phleoides L.
 minor Retz.
 canariensis L.
 paradoxa L.
 erucæformis L.
 arundinacea L.
 — picta.

ALPISTE

rude. F. ♂
 fléau. F. ♀
 mineure. orient. ♂
 des Canaries. Afr. ♂
 rongée. orient. ♂
 chenillette. Sibérie. ♂
 roseau. F. ♀
 — panachée. ♀

PASPALUM

membranaceum Lmk.
 stoloniferum Bosc.
 sanguinale.
 dactylon.

PASPALUM

membraneux. Pérou, s. ch. ♀
 rampant. Pérou. ♂
 pourpre. F. ♂
 chiendent. F. ♀

PANICUM

1. Flores spicati.

verticillatum L.
 viride L.
 glaucum L.
 maritimum Lmk.
 italicum L.
 crus-galli L.
 colonum L.

2. Flores paniculati.

plicatum Lmk.
 proliferum Lmk.
 virgatum L.
 coloratum L.
 capillare L.
 latifolium L.
 arborescens L.

PANIS

1. Fleurs en épis.

verticillé. F. ♂
 vert. F. ♂
 glauque. F. ♂
 maritime. ♂
 d'Italie. inde. ♂ (alim.)
 pied de poule. F. ♂
 tacheté. inde. ♂

2. Fleurs en panicule.

plissé. Am. m., s. ch. ♀
 prolifère. Am. s. ♀
 effilé. Am. s. ♀
 coloré. Égypte. ♂
 capillaire. Am. s. ♂
 à larges feuil. Am. m., s. ch. ♀
 calumet. inde, s. ch. ♀

MILIUM

paradoxum L.
 effusum L.
 lendigerum L.

MIL

noir. F. ♀
 étalé. F. ♀
 tuberculeux. F. ♂

AGROSTIS.

1. *Aristatæ.*

spica venti *L.*
interrupta *L.*
miliacea *L.*
canina *L.*

2. *Mutica.*

dispar *Mich.*
cornucopiæ *Lmk.*
trichodium laxiflorum. *Mich.* }
stolonifera *L.*
alba *L.*
vulgaris *smith.* }
capillaris *Leers.* }
dulcis.
pumila *L.*
pungens *L.*
mexicana *L.*
tenacissima *Jacq.*
minima *L.*

POLYPOGON *Desf.*
monspeliense.

STIPA

pennata *L.*
ukranensis *Lmk.*
aristella *L.*
juncea *L.*
tenacissima *L.*
tortilis *Desf.*

SACCHARUM

officinarum *L.*
— violaceum.
cylindricum *L.*
ravennæ *L.*

LAGURUS

ovatus *L.*

III. *Stili 2, stamina 3, gluma uni aut multiflora, flores polygami.*

HOLCUS

spicatus *L.*
sorghum *L.*
saccharatus *L.*
halepensis *L.*
lanatus *L.*
mollis *L.*

AGROSTIS

1. Fleurs garnies d'arêtes.

des moissons. *F.* ☉
interrompu. *F.* ☉
faux millet. *F.* ☿
des chiens. *F.* ☿

2. Fleurs sans arêtes.

disparate. *Am. s.* ☿
corne d'abondance. *Am. s.* ♂
traçant. *F.* ☿
blanc. *F.* ☿
commun. *F.* ☿
doux. orient. ☉
nain. *F.* ☿
piquant. *F. m.* ☿
du Mexique. *Am. m.* ☿
à feuell. dures. inde, *s. ch.* ☿
filiforme. *F.* ☉

POLYPOGON

de Montpellier. *F. m.* ☉

STIPA

penniforme. *F. m.* ☿
d'Ukraine. ☿
à petites barbes. *F. m.* ☿
jonciforme. *F.* ☿
spart. esp., or. ☿ (arts.)
tordu. barbarie. ☉

SUCRE

officinal. inde, *s. ch.* ☿ (écon.)
— violet.
cylindrique. *F. m.*, or. ☿
de Ravenne. *italie*, or. ☿

LAGURUS

ovale. *F. m.* ☉

III. 2 styles, 3 étamines, calice à une ou plusieurs fleurs, fleurs polygames.

HOLCUS

à épis. inde. ☉
sorgo. inde. ☉
sucré. inde ☉
d'Alep. syrie. ☿
laineux. *F.* ☿
velouté. *F.* ☿

ANDROPOGON

contortum L.
 provinciale Lmk.
 ischoemum L.
 annulatum Vahl.
 bicorné L.
 hirtum L.
 distachion L.
 barbatum L.
 gryllus L.
 schoenanthus L.

ANTHISTIRIA

ciliata L. f.

CHLORIS swartz.

petræa swartz.
 ciliata swartz.
 scoparia.
 cynos. scoparius Lmk. }
 curtipendula Mich.

TRIPSACUM

hermaphroditum L.
 dactyloides L.

TRAGUS Haller.

racemosus.

CENCHRUS

echinatus L.
 ciliaris L.

ECHINARIA Desf.

capitata.

ÆGYLOPS

ovata L.
 triuncialis L.
 squarrosa L.

ROTTBOLLIA

incurva L.

IV. Styli 2, stamina 3, gluma bi aut triflora, flores hermaphroditi.

AIRA

cespitosa L.
 flexuosa L.
 caryophyllea L.
 præcox L.
 minuta L.
 canescens L.
 pubescens Vahl.
 aquatica L.

ANDROPOGON

contourné. inde. ♀
 de Provence. F. m. ♀
 digité. F. ♀
 annulaire. égypte.
 bicorné. Am. m., s. ch. ♀
 hérissé. F. m. ♀
 à deux épis. F. m. ♀
 barbu. inde. ☉
 paniculé. F. m. ♀
 jonc-odorant. inde, s. ch. ♀ (m.)

ANTHISTIRE

ciliée. inde. ♂

CHLORIS

des rochers. Am. m., s. ch. ♀
 ciliée. Am. m., s. ch. ♀
 à balais. inde ☉
 à fleurs pendantes. Am. s. ♀

TRIPSACUM

hermaphrodite. Am. m. ☉
 monoïque. Am. s. ♀

TRAGUS

à grappes. F. ☉

CENCHRUS

hérissé. Am. m. ☉
 cilié. Af. ☉

ECHINARIA

à fleurs en tête. F. m. ☉

ÆGYLOPS

ovale. F. ☉
 à longs épis. F. ☉
 rude. Barb. ☉

ROTTBOLLIA

arque. F. ☉

IV. 2 styles, 3 étamines, calice à deux ou trois fleurs, fleurs hermaphrodites.

AIRA

touffu. F. ♀
 tortueux. F. ♀
 étalé. F. ☉
 printanier. F. ☉
 filiforme. F. ☉
 blanchâtre. F. ♀
 pubescent. F. m. ☉
 aquatique. F. ☉

MELICA

ciliata L.
lanuginosa.
pyramidalis Lmk
uniflora Retz.
nutans L.
altissima L.
cœrulea L.

V. *Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ, flores glomerati.*

DACTYLIS

cynosuroïdes L.
glomerata L.

VI. *Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ supra rachim densè spicatæ.*

SESLERIA

cœrulea.

CYNOSURUS

cristatus L.
echinatus L.
durus L.
aureus L.

ELEUSINE Gært.

ægyptiaca.
indica
coracana.

LOLIUM

tenue L.
temulentum L.
multiflorum Lmk.
perenne L.

ELYMUS

arenarius L.
giganteus Vahl.
virginicus L.
sibiricus L.
ramosus.
histris L.
hordeiformis.

HORDEUM

vulgare L.
 — *celeste*.
hexastichon L.
zeocriton L.

MELICA

cilié. F. ψ
lanugineux. F. m. ψ
pyramidal. F. m. ψ
uniflore. F. ψ
à fleurs penchées. F. ψ
élevé. sibérie. ψ
bleuâtre. F. ψ

V. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, fleurs agglomérées.

DACTYLIS

cynosure. Am. s. ψ
aggloméré. F. ψ

VI. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs disposées le long de l'axe en épis serrés.

SESLERIA

bleuâtre. F. ψ

CYNOSURUS

des prés. F. ψ
hérissé. F. m. ⊙
roide. F. ⊙
jaune. F. m. ⊙

ELEUSINÉ

d'Egypte. ⊙
des Indes. ⊙
coracan. barbarie. ⊙ (écon.)

LOLIUM

grêle. F. ψ
ivroye. F. ⊙
à fleurs nombreuses. F. ψ
raigrass. F. ψ

ELYME

des sables. F. ψ
gigantesque. ψ
de Virginie. Am. s. ψ
de Sibérie. ψ
rameux. ψ
divergent. orient. ψ
épi d'orge. ψ

ORGE

commune. russie. ⊙ (alim.)
 — *nue*.
hexagone. ⊙ (alim.)
éventail. ⊙ (alim.)

distichon *L.*
 — nudum.
 maritimum *L.*
 secalinum *L.*
 murinum *L.*
 jubatum *L.*

TRITICUM

æstivum *L.*
 hybernium *L.*
 turgidum *L.*
 compositum *L.*
 durum *L. Desf.*
 spelta *L.*
 monococcum *L.*
 polonicum *L.*
 cristatum.
 junceum *L.*
 repens *L.*
 — aristatum.
 caninum *L.*
 glaucum.
 prostratum *L.*
 planum.
 tenellum. *L.*
 filiforme.
 unilaterale *L.*

SECALE

cereale *L.*
 creticum *L.*

VII. *Stylis 2, stamina 3, glumæ multiflora*
vagæ.

BROMUS

mollis *L.*
 secalinus *L.*
 grossus.
 squarrosus *L.*
 dumetorum *Lmk.*
 arvensis *L.*
 pratensis *Lmk.*
 sterilis *L.*
 maximus *Desf.*
 tectorum *L.*
 giganteus *L.*
 rubens *L.*
 inermis *L.*
 pinnatus *L.*
 sylvaticus *Lmk.*

à deux rangs. Russie. (alim.)
 — nue.
 maritime. F. ()
 des prés. F. ()
 des murailles. F. ()
 chevelue. syrie. ()

FROMENT

d'été. (alim.)
 d'hiver. (alim.)
 renflé. (alim.)
 rameux. (alim.)
 corné. (alim.)
 épautre. (alim.)
 monospermè. (alim.)
 de Pologne. (alim.)
 à crêtes. ()
 jonciforme. F. ()
 chiendent. F. () (méd.)
 — barbu.
 des chiens. F. ()
 glauque. ()
 couché. sibérie. ()
 aplati. Égypte. ()
 grêle. F. ()
 filiforme. F. ()
 unilatéral. F. ()

SEIGLE

cultivé. (alim.)
 de Crète. ()

VII. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs
 fleurs, épillets étalés.

BROME

velu. F. ()
 des seigles. F. ()
 à gros épillets. F. ()
 rude. F. ()
 des buissons. F. ()
 des champs. F. ()
 des prés. F. ()
 stérile. F. ()
 à grands épis. F. ()
 des toits. F. ()
 gigantesque. F. ()
 pourpre. F. m. ()
 sans arêtes. F., Alpes. ()
 penné. F. ()
 des bois. F. ()

distachyos L.
stipoides L.

FESTUCA

1. *Panicula secundâ.*

bromoides L.
ovina L.
capillata Lmk.
heterophylla Jacq.
rubra Leers.
duriuscula L.
amethystina L.
glaucâ Lmk.
dumetorum Willd.
elatior L.
myurus L.
spadicea Smith.

2. *Panicula æquali.*

diandra Mich.
fascicularis Lmk.
virgata Lmk.
decumbens L.
calycina L.
fluitans L.
divaricata Desf.
phleoides Willd.

POA

aquatica L.
alpina L.
bulbosa L.
trivialis L.
angustifolia L.
pratensis L.
trinervata Schrad. }
sylvatica Pollick. }
pilosa L.
annua L.
compressa L.
nemoralis L.
rigida L.
maritima L.
cristata L.
divaricata Gouan.
peruviana Jacq.
gracilis.
abyssinica L.

à deux épis. F. m. ☉
stipoide. F. m. ☉

FÉTUQUE

1. *Panicule unilatérale.*

bromoïde. F. ☞
des moutons. F. ☞
capillaire. F. ☞
à feuil. variables. F. ☞
rouge. F. ☞
à feuil. dures. F. ☞
améthyste. F. ☞
glaucue. F. ☞
des buissons. F. ☞
élevée. F. ☞
myurus. F. ☞
jaune. F. ☞

2. *Panicule égale.*

à deux étamines. Am. s. ☞
fasciculée. Am. s. ☞
effilée. Am. m. ☉
tombante. F. ☉ (écon.)
à grand calice. F. m. ☞
flottante. F. ☞
étalée. Barbarie. ☉
fléau. F. ☞

POA

aquatique. F. ☞
des Alpes. F. ☞
bulbeux. F. ☞
commun. F. ☞
à feuil. étroites. F. ☞
des prés. F. ☞
à trois nervures. F. ☞
velu. F. ☞
annuel. F. ☉
comprimé. F. ☞
des bois. F. ☞
roide. F. ☉
maritime. F. ☞
à crêtes. F. ☞
étalé. F. m. ☉
du Pérou. Am. m. ☉
grêle. ☉
d'Abyssinie. Afr. ☉

tenella *L.*
ciliaris *L.*

BRIZA

minor *L.*
media *L.*
maxima *L.*
eragrostis *L.*

UNIOLA

latifolia *Mich.*

AVENA

elatior *L.*
— nodosa.
striata *Lmk.*
sativa *L.*
— nuda.
orientalis *Schreb.*
brevis *Roth.*
fatua *L.*
sterilis *L.*
pubescens *L.*
versicolor *L.*
pratensis *L.*
bromoides *L.*
distichophylla *Vill.*
flavescens *L.*
panicea *Lmk.*
fragilis *L.*

ARUNDO

donax *L.*
— variegata.
phragmites *L.*
epigeios *L.*
calamagrostis *L.*
arenaria *L.*

VIII. *Styli* 2, *stamina* 6 aut *plura*.

ORYZA

sativa *L.*

ZIZANIA

aquatica *L.*

IX. *Stylus* 1, *stigma* 1.

NARDUS

stricta *L.*

LYGEUM

spartum *L.*

délicat. inde. ☉

cilié. Am. m. ☉

BRIZA

triangulaire. F. m. ☉
moyen. F. ♀
à grandes fleurs. F. m. ☉
eragrostis. F. ☉

UNIOLA

à larges feuell. Am. s. ♀

AVOINE

fromental. F. ♀ (écon.)
— *noueuse.*
striée. F. Alpes. ♀
cultivée. ☉ (écon.)
— *nue.*
d'orient. ☉
courte. Allem. ☉
avron. F. ☉
stérile. F. ☉
pubescente. F. ♀
bigarrée. F. ♀
des prés. F. ♀
bromoïde. F. ♀
distique. F. Alpes. ♀
jaunâtre. F. ♀
panis. F. m. ☉
fragile. F. ☉

ROSEAU

à quenouilles. F. m. ♀
— *panaché.*
à balais. F. ♀
épigeios F. ♀
plumeux. F. ♀
des sables. F. ♀

VIII. 2 styles, 6 étamines ou plus.

RIZ

cultivé. inde. ☉ (alim.)

ZIZANIA

aquatique. Am. s. ☉ (alim.)

IX. 1 style, 1 stigmaté.

NARD

serré. F. ♀

LYGEUM

sparte. F. m. ♀ (arts.)

ZEA

maïs L.

X. *Stylus* 1, *stigma* divisum.

COIX

lacrima L.

arundinacea Lmk.

CORNUCOPIÆ

cucullatum L.

MAIS

cultivé. rérou. ☉ (alim.)

X. 1 style, stigmaté divisé.

COIX

larme de Job. inde. ☉

vivace. am. m., s. ch. ♀

CORNUCOPIÆ

en capuchon. orient. ☉

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina perygina.)

ORDO I.

PALMÆ.

I. *Fronde* pinnata.

PHOENIX

dactylifera L.

ARECA

oleracea L.

COCOS

nucifera L.

ELAÏS

guineensis L.

CARYOTA

urens L.

II. *Folia* palmata.

CORYPHA

hystrix.

CHAMÆROPS

humilis L.

SABAL

Adansonii guers.

chamærops acaulis Michx. }

LATANIA

chinensis Jacq.

CLASSE III.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

LES PALMIERS.

I. Feuilles pennées.

DATTIER

cultivé. Af., s. ch. ♂ (écon.)

AREC

chou-palmiste. am. m., s. ch. ♂
(écon.)

COCOTIER

cultivé. inde, s. ch. ♂ (écon.)

ELAÏS

de Guinée. am. m., s. ch. ♂

CARYOTA

piquant. inde, s. ch. ♂

II. Feuilles palmées.

CORYPHA

hérissé. am. s., or. ♂

CHAMÆROPS

commun. Af. s., or. ♂

SABAL

d'Adanson. am. s., or. ♂

LATANIER

de Chine. s. ch. ♂

RHAPIS

flabelliformis Jacq.
arundinacea H. K.

CUCIFERA (*Hyphaene Gaert.*)
thebaica Delile.

ORDO II.**ASPARAGI.**

I. Flores hermaphroditi.

DRACENA

draco L.

terminalis L.
marginata Lmk.

reflexa Lmk. }
cernua Jacq. }
umbraculifera Jacq.

DIANELLA

nemorosa L.
cœrulea.

FLAGELLARIA

indica L.

ASPARAGUS

tenuifolius Lmk.
officinalis L.
 — *maritima.*
decumbens Jacq. }
crispus Lmk. }
mauritanus Lmk.
retrofractus L.
asiaticus L.
albus L.
acutifolius L.
aphyllus L.
horridus L. f.
capensis L.
sarmentosus L.

MEDEOLA

asparagoides L.

TRILLIUM

sessile L.

RHAPIS

évantai. inde, s. ch. 5
de Caroline. Am. s., or. 5

CUCI.

de la Thébaidé. Af., s. ch. 5

ORDRE II.**LES ASPERGES.**

I. Fleurs hermaphrodites.

DRACENA

sang-dragon. canar., s. ch. 5
 (méd.)

pourpre. chine, s. ch. 5
à bords rouges. madagascar,
s. ch. 5

abaissé. isle de F., s. ch. 5
en parasol. inde, s. ch. 5

DIANELLE

des bois. inde, s. ch. 7
bleue. 7

FLAGELLARIA

des Indes. inde, s. ch. 5

ASPERGE

à feuil. menues. F. 7
officinale. F. 7 (alim.)
 — *maritime.*

crépue. cap, s. ch. 7
de l'Ile de France. s. ch. 5
coudeé. Afr., s. ch. 5
d'Asie. inde, s. ch. 5
blanche. orient, or. 5
à feuil. aiguës. F. m. 5
sans feuil. orient, or. 5
hérissée. orient, or. 5
du Cap. s. ch. 5
sarmenteuse. ceylan., s. ch. 5

MEDEOLA

sarmenteux. cap., s. ch. 7

TRILLIUM

sessile. Am. s. 7

PARIS

quadrifolia L.

CONVALLARIA

maialis L.

japonica *Thunb.*

POLYGONATUM (*Convallaria* L.)

uniflorum.

multiflorum.

verticillatum.

SMILACINA (*Convallaria* L.)

racemosa.

stellata.

bifolia.

II. Flores dioici, germen superum.

RUSCUS

aculeatus L.

hypophyllum L.

hypoglossum L.

androgynus L.

racemosus L.

SMILAX

1. *Caule aculeato, fruticoso.*

aspera L.

— *auriculata.*

mauritanica Desf.

excelsa L.

horrida.

laurifolia L.

caduca L.

pubera Mich.

2. *Caule herbaceo.*

herbacea L.

lanceolata L.

DIOSCOREA

villosa L.

III. Flores dioici, germen semi-inferum.

UBIUM (*Dioscorea* L.)

alatum.

aculeatum.

altissimum.

TAMNUS

communis L.

PARISETTE

à quatre feuell. F. ψ

MUGUET

de mai. F. ψ (orn.)

du Japon. s. ch. ψ

SCEAU-DE-SALOMON

à une fleur. F. ψ

à plusieurs fleurs. F. ψ

verticillé. F., Alpes. ψ

SMILACINE

à grappes. A. S. ψ

étoilée. Am. s. ψ

à deux feuell. F. ψ

II. Fleurs dioïques, ovaire supère.

FRAGON

épineux. F. h (méd.)

sans foliole. Italie. h

à foliole. Italie. h

androgyn. canaries, or. h

à grappes. Italie. h

SMILAX

Tiges épineuses, ligneuses.

rude. F. m., or. h (méd.)

— *auriculé.*

de Mauritanie. Afr. s., or. h

élevé. orient, or. h

hérissé. Am. s. h

à feuell. de laurier. Am. s. h

caduc. Am. s. h

velu. Am. s. h

2. Tiges herbacées.

herbacé. Am. s. ψ

lancéolé. Am. s. ψ

IGNAME

velue. Am. s. ψ

III. Fleurs dioïques, ovaire presque infère,

UBIUM

ailé. Am. m., s. ch. ψ (alim.)

épineux. inde, s. ch. ψ

élevé. Am. m., s. ch. ψ

TAMNE

commun. F. ψ (méd.)

ORDO III.

J U N C I.

- I. *Germen unicum, capsula trilocularis, calix glumaceus.*

APHYLLANTHES

monspeliensis L.

JUNCUS

1. *Culmo nudo.*

acutus L.
maritimus Zmk.
conglomeratus L.
effusus L.
glaucus wild.
inflexus L.
squarrosus L.

2. *Culmo folioso.*

articulatus L.
sylvaticus wild.
bulbosus L.
tenageia L. f.
bufonius L.
niveus L.
campestris L.
pilosus L.
compactus.
maximus wild.

- II. *Germen unicum, capsula trilocularis, calix semi-petaloides.*

COMMELINA

1. *Petala inæqualia.*

communis L.
africana L.
erecta L.

2. *Petala æqualia aut subæqualia.*

virginica L.
tuberosa L.
cristata L.
zanonia L.

TRADESCANTIA

virginica L.

ORDRE III.

LES JONCS.

- I. Un seul ovaire, capsule à trois loges, calice glumacé.

APHYLLANTE

de Montpellier. F. m. ψ

JONC

1. Chaume nud.

aigu. F. ψ
maritime. F. ψ
aggloméré. F. ψ
épars. F. ψ
glauque. F. ψ
courbé. F. ψ
rude. F. ψ

2. Chaume feuill.

articulé. F. ψ
des bois. F. ψ
bulbeux. F. ψ
à fleurs sessiles. F. ⊙
dichotome. F. ⊙
blanc. F. ψ
des champs. F. ψ
velu. F. ψ
compacte. F. ψ
à larges feuil. F. ψ

- II. Un seul ovaire, capsule à trois loges, les trois divisions internes du calice en forme de pétales.

COMMELINE

1. Pétales inégaux.

commune. Am. m. ⊙
d'Afrique. s. ch. ψ
droite. Am. s. ψ

2. Pétales égaux ou presque égaux.

de Virginie. Am. s. ψ
tubéreuse. Am. m., s. ch. ψ
à crêtes. ceylan. ⊙
à fruit mou. Am. m., s. ch. ψ

ÉPHÉMÈRE

de Virginie. Am. s. ψ

erecta Jacq.
rosea Mich.
discolor Smith.

III. *Germina plura, capsulae totidem uniloculares, flores in scapo umbellati aut verticillati.*

BUTOMUS

umbellatus L.

ALISMA

plantago L.
ranunculoides L.
natans L.
damasonium L.

SAGITTARIA

sagittifolia L.

IV. *Germina plura, saepius 3, capsulae totidem uniloculares interdum basi coactae, flores paniculati aut spicati.*

SCHEUCHZERIA

palustris L.

TRIGLOCHIN

palustre L.
maritimum L.

NARTHECIUM

caliculatum L.
helonias borealis Wild. }

HELONIAS

bullata L.
angustifolia Mich.

VERATRUM

album L.
nigrum L.
luteum L.

COLCHICUM

autumnale L.
variegatum L.
montanum L.

MERENDERA ramond.

bulbocodioides.

droite. Am. m. ☉

rose. Am. s. ♀

de deux couleurs. Am. m., s. ch. ♀

III. Plusieurs ovaires, autant de capsulés à une loge, fleurs en ombelle ou verticillées sur une hampe.

BUTOME

ombellifère. F. ♀

ALISMA

plantain d'eau. F. ♀
renoncule. F. ♀
flottant. F. ♀
étoilé. F. ♀

FLÈCHIERE

aquatique. F. ♀

IV. Plusieurs ovaires, ordinairement trois, autant de capsules à une loge, quelquefois réunies par la base, fleurs en panicule ou en épis.

SCHEUCHZERIA

des marais. F., Alpes. ♀

TRIGLOCHIN

des marais. F. ♂
maritime. F. ♀

NARTEC

caliculé. F., Alpes. ♀

HÉLONIAS

rose. Am. s. ♀
à feuil. étroites. Am. s. ♀

VERATRUM

blanc. F. ♀ (ven.)
noir. sibérie. ♀ (ven.)
jaune. Am. s. ♀

COLCHIQUE

d'automne. F. ♀ (ven.)
panaché. orient. ♀ (orn.)
de montagne. F., Alpes. ♀

MERENDERA

bulbocodium. F.m., or. ♀

ORDO IV.

LILIA.

TULIPA

sylvestris L.
suaveolens Roth.
gesneriana L.

ERYTHRONIUM

dens canis L.

METHONICA (*Gloriosa* L.)

superba

UVULARIA

amplexifolia L.
perfoliata L.

FRITILLARIA

imperialis L.

persica L.
meleagris L.
latifolia Dec.

LILIUM

candidum L.
bulbiferum L.
croceum.
pomponium L.
pyrenaicum Gouan.
martagon L.
chalcedonicum L.
superbum L.

YUCCA

gloriosa L.
aloifolia L.
—pendula.
dracônis L.
filamentosa L.

SANSEVIERA

Zeylanica Wild.
guineensis Wild.

ALETRIS

capensis L.
fragrans L.

ORDRE IV.

LES LIS.

TULIPE

sauvage. F. ♀
odorante. AS. ♀ (orn.)
des jardins. orient. ♀ (orn.)

ERYTHRONIUM

dent de chien. F.; Alp. ♀ (orn.)

METHONICA

superbe de Malabar. inde,
s. ch. ♀ (orn.)

UVULAIRE

des Alpes. F. ♀
perfoliée. AM. S. ♀

FRITILLAIRE

couronne impériale. ASIE. ♀
(orn.)
de Perse. ASIE. ♀
damier. F. ♀ (orn.)
à larges feuil. ♀

Lis

blanc. AS. ♀ (orn., méd.)
bulbifère. F., Alpes. ♀ (orn.)
orangé. ♀ (orn.)
pomponien. F. m. ♀ (orn.)
des Pyrénées. F. ♀ (orn.)
martagon. F., Alpes. ♀ (orn.)
hémérocale. AS. ♀ (orn.)
superbe. AM. S. ♀ (orn.)

YUCCA

à feuil. entières. AM. S. ♂ (orn.)
à feuil. d'aloès. AM. S., or. ♂
(orn.)
—à feuil. pendantes
à larges feuil. AM. m., s. ch. ♂
filamenteux. AM. S., or. ♂

SANSEVIERA

de Ceylan. s. ch. ♀
de Guinée. s. ch. ♀

ALETRIS

du Cap. s. ch. ♀ (orn.)
odorant. cap., s. ch. ♂

farinosa L.
 uaria L.
 glauca H. K.
 sarmentosa Andr.

farineux. Am. s. ψ
 à grappes. cap., or. ψ (orn.)
 glauque. cap, or. ψ (orn.)
 sarmenteux. cap, or. ψ

PITCAIRNIA

bromeliæfolia L'Her.

angustifolia H. K.
 latifolia H. K.

PITCAIRNIA

à feuell. d'ananas. Am. m.,
 s. ch. ψ
 à feuell. étroites. Am. m., s. ch. ψ
 à larges feuell. inde, s. ch. ψ

ALOE

purpurea Lmk.

vulgaris C. B.
 abyssinica Lmk.
 rubescens Dec.
 succotrina L.
 fruticosa Lmk.
 ferox H. K.
 mitræformis Lmk.
 — angustior.
 rhodocantha Dec.
 perfoliata L.
 brevifolia Dec.
 humilis L.
 umbellata Dec
 maculata. }
 picta Dec. }
 — major.
 variegata L.
 disticha L.
 — triangularis:
 — latifolia.
 carinata Dec.
 obliqua H. K.
 plicatilis L.
 spiralis L.
 viscosa L.
 retusa L.
 rigida.
 margaritifera L.
 — minor.
 arachnoïdea L.
 atrovirens Dec.

ALOËS

à bords rouges. île Bourbon.
 s. ch. ψ
 commun. Afr., s. ch. ψ (méd.)
 d'Abyssinie. s. ch. ψ
 rougeâtre. inde, s. ch. ψ
 soccotrin. cap, s. ch. ψ (méd.)
 corne de bœlier. cap, s. ch. ψ
 hérissé. cap, s. ch. ψ
 mitré. cap, s. ch. ψ
 — à feuell. étroites.
 à épines rouges. cap, s. ch. ψ
 perfolié. cap, s. ch. ψ
 à feuell. courtes. cap, s. ch. ψ
 nain. cap, s. ch. ψ
 ombellifère. cap, s. ch. ψ
 moucheté. cap, s. ch. ψ
 — à larges feuell.
 perroquet. cap, s. ch. ψ
 bec de canne. cap, s. ch. ψ
 — triangulaire. cap, s. ch. ψ
 — à larges feuell. cap, s. ch. ψ
 tuberculeux. cap, s. ch. ψ
 oblique. cap, s. ch. ψ
 éventail. cap, s. ch. ψ
 en spirale. cap, s. ch. ψ
 visqueux. Afr., s. ch. ψ
 écrasé. cap, s. ch. ψ
 piquant. cap, s. ch. ψ
 perlé. cap., s. ch. ψ
 — petit.
 patte d'araignée. cap, s. ch. ψ
 vert livide. cap, s. ch. ψ

ANTHERICUM

frutescens L.
 alooides L.

ANTHÉRIC

arbrisseau. cap, s. ch. ψ
 à feuell. d'aloës. cap, s. ch. ψ

asphodeloides L.

annuum L.

PHALANGIUM (*Anthericum* L.)

revolutum.

ramosum.

liliago.

liliastrum.

bicolor Desf.

elatum H. K.

milleflorum Dec.

albucoïdes H. K.

ASPHODELUS

luteus L.

ramosus L.

spicatus.

fistulosus L.

EUCOMIS

regia.

punctata l'Her.

HYACINTHUS

non scriptus L.

patulus.

amethystinus Lmk. }

amethystinus L. }

hispanicus Lmk. }

romanus L.

serotinus L.

orientalis L.

viridis L.

MUSCARI

suaveolens.

comosus.

monstrosus.

racemosus.

PHORMIUM

tenax Forst.

LACHENALIA

pendula H. K.

lanceæfolia Jacq.

pallida Thunb.

tricolor Jacq.

à feuell. d'asphodèle. cap, s.
ch. ψ

annuel. cap. ⊙

PHALANGIUM

recourbé. cap, or. ψ

rameux. F. ψ

à grappes. F. ψ (orn.)

lis Saint-Bruno. F., Alp. ψ
(orn.)

bicolor. F. ψ

élevé. cap., s. ch. ψ

à fleurs nombreuses. N. Holl. ψ

faux albuca. cap, s. ch. ψ

ASPHODELE

jaune. F. m. ψ

rameux. F. m. ψ

à grappe. F. m. ψ

fistuleux. F. m. ⊙

EUCOMIS

couronné. cap, s. ch. ψ

tacheté. cap, s. ch. ψ

JACINTHE

des bois. F. ψ

étalée. Eur. ψ

améthyste. Pyrén. ψ

romaine. Barb., or. ψ

rouillée. Esp. ψ

d'orient. Asie. ψ (orn.)

verte. Esp. ψ

MUSCARI

odorant. orient. ψ (orn.)

chevelu. F. ψ

monstrueux. F. ψ (orn.)

à grappes. F. ψ

PHORMIUM

lin de la N. Zélande. or. ψ
(écon.)

LACHENALIA

à fleurs pendantes. cap, or. ψ

lancéolé. cap, or. ψ

à fleurs pâles. cap, or. ψ

tricolor. cap, or. ψ

ALBUCA

- major L.
alba Lmk.
minor L.

SCILLA

- maritima L.
peruviana L.
italica L.
amoena L.
liliohyacinthus L.
hyacinthoides L.
bifolia L.
undulata Desf.
autumnalis L.

ERIOSPERMUM

- lanceæfolium Jacq.

ORNITHOGALUM

- luteum L.
pyrenæicum L.
pyramidale L.
narbonense L.
umbellatum L.
longibracteatum Jacq.
arabicum L.

ALLIUM1. *Folia teretia.*

- cepa L.
schœnoprassum L.
ascalonicum L.
flavum L.
vineale L.
sphærocephalum L.
pallens L.
paniculatum L.
lusitanicum L.
capillare Cav.
carinatum L.

2. *Folia plana.*

- angulosum L.
roseum L.
striatum Jacq. }
gracile H. K. }
subhirsutum L.
nutans L.
sativum L.
scorodoprassum L.
arenarium E.

ALBUCA

- jaune. cap., or. ψ
blanc. cap., or. ψ
petit. cap., or. ψ

SCILLE

- maritime. F. m., or. ψ (méd.)
du Pérou. F. m. ψ (orn.)
d'Italie. ψ
agréable. orient. ψ
lis-jacinte. F., Alpes. ψ
jacinte. canar. ψ
à deux feuell. F. ψ
ondée. barb., or. ψ
d'automne. F. ψ

ERIOSPERME

- en lance. cap., or. ψ

ORNITHOGALE

- jaune. F. ψ
des Pyrénées. F. ψ
pyramidal. F. m. ψ
de Narbonne. F. m. ψ
ombellifère. F. ψ
à longues bractées. cap., or. ψ
d'Arabie. Alger, or. ψ (orn.)

AIL1. *Feuilles cylindriques.*

- oignon. ♂ (écon. méd.)
civette. sibér. ψ (écon.)
échalotte. palest. ψ (écon.)
jaune. F. ψ
des vignes. F. ψ
à tête ronde. F. ψ
pâle. F. ψ.
paniculé. suisse. ψ
de Portugal. ψ
capillaire. sicile. ψ
en carène. suisse. ψ

2. *Feuilles planes.*

- anguleux. F., Alpes. ψ
rose. F. m. ψ
strié. cap., or. ψ
velu. orient. ψ
penché. sibér. ψ
cultivé. sicile. ψ (écon. méd.)
rocambolle. F. ψ (écon.)
des sables. F. ψ

obliquum L.
 ampeloprasmus L.
 porrum L.
 monspessulanum *Gouan.*
 victorialis L.
 ursinum L.
 scorzoneraefolium.
 moly L.
 fragrans *Vent.*

POLYANTHES
 tuberosa L.

HEMEROCALLIS
 fulva L.
 flava L.
 cœrulea *And.*
 japonica *Thunb.*

AGAPANTHUS
 umbellatus *l'Her.*
 — minor.

ORDO V.

NARCISSE.

AGAVE
 americana L.
 — variegata.
 mexicana L.
 — angustifolia.
 vivipara L.
 foetida L.

ALSTROEMERIA
 pelegrina L.
 ligtu L.

HÆMANTHUS
 coccineus L.
 ciliaris L.
 puniceus L.
 pubescens L. *f.*

CRINUM
 asiaticum L.
 americanum L.
 erubescens L. *f.*
 bracteatum *Wild.*

oblique. sibér. Ψ
 ampeloprasmus. or. Ψ
 poireau. suisse. ♂ (écon.)
 de Montpellier. F. m. Ψ
 à feuell. de plantain. F. Alp. Ψ
 pétiole. F. Ψ
 à feuell. de scorzonère. Ψ
 moly. F. m. Ψ
 odorant. Afr., or. Ψ

TUBÉREUSE
 cultivée. inde, s. ch. Ψ (orn.)

HÉMÉROCALE
 rouge. chine. Ψ (orn.)
 jaune. suisse. Ψ (orn.)
 bleue. chine, s. ch. Ψ (orn.)
 du Japon. s. ch. Ψ (orn.)

AGAPANTHUS
 ombellifère. cap, or. Ψ (orn.)
 — petit.

ORDRE V.

LES NARCISSES.

AGAVÉ
 d'Amérique. Am. m., or. Ψ
 (écon.)
 — panaché.
 du Mexique. s. ch. Ψ
 — à feuell. étroites.
 vivipare. Am. m., s. ch. Ψ
 aloëspitt. Am. m. s. ch. Ψ (écon.)

PÉLEGRINE
 tachetée. Pérou, or. Ψ (orn.)
 veinée. Pérou, s. ch. Ψ (orn.)

HÉMANTE
 écarlate. cap, or. Ψ (orn.)
 ciliée. cap, or. Ψ (orn.)
 ponceau. cap, or. Ψ (orn.)
 pubescente. cap, or. Ψ (orn.)

CRINUM
 d'Asie. inde, s. ch. Ψ (orn.)
 d'Amérique. Am. m., s. ch. Ψ
 (orn.)
 rougeâtre. Am. m., s. ch. Ψ (orn.)
 à longues bractées. Am. m.,
 s. ch. Ψ (orn.)

AMARYLLIS

lutea L.
atamasco L.
formosissima L.

broussonetii Dec.

belladonna l'Her.
equestris Jacq.
vittata l'Her.
falcata l'Her.
sarniensis L.

undulata L.
aurea l'Her.

PANCRACTIUM

caribæum L.

amboinense L.
declinatum Jacq.
illyricum L.
maritimum L.

NARCISSUS

poeticus L.
pseudonarcissus L.
bicolor L.
tazetta L.
 — *alba*.
jonquilla L.
bulbocodium L.

LEUCOIUM

vernum L.
æstivum L.
autumnale L.

GALANTHUS

nivalis L.

HYPOXIS

erecta L.
villosa L. f.

BROMELIA

ananas L.
karatas L.
chrysantha Jacq.

TILLANDSIA

serrata L.

AMARYLLIS

jaune. F. m. Ψ (orn.)
atamasco. Am. s. Ψ (orn.)
de Saint-Jacques. Am. m.,
 or. Ψ (orn.)
de Broussonet. Afr., s. ch. Ψ
 (orn.)
belladone. Am. m., or. Ψ (orn.)
rose. Am. m., s. ch. Ψ (orn.)
veinée. cap, or. Ψ (orn.)
falciforme. cap, or. Ψ (orn.)
grenésienne. Pérou, grenesey,
 or. Ψ (orn.)
ondulée. cap, or. Ψ (orn.)
jaune. chine, s. ch. Ψ (orn.)

PANCRACTIUM

des Antilles. Am. m., s. ch. Ψ
 (orn.)
d'Amboine. inde, s. ch. Ψ (orn.)
incliné. Am. m., s. ch. Ψ (orn.)
d'Illyrie. F. m. Ψ (orn.)
maritime. F. Ψ (orn.)

NARCISSE

des poètes. F. Ψ (orn.)
porion. F. Ψ (orn.)
bicolor. F. Ψ (orn.)
à bouquets. F. m. Ψ (orn.)
 — *blanc*.
jonquille. orient. Ψ (orn.)
trompette. F. Ψ (orn.)

LEUCOIUM

printanier. F. Ψ (orn.)
d'été. F. Ψ (orn.)
d'automne. Afr. s., or. Ψ

GALANTINE

perce-neige. F. Ψ (orn.)

HYPOXIS

à tige droite. Am. s., or. Ψ
velu. cap, or. Ψ

ANANAS

cultivé. Am. m., s. ch. Ψ (alien.)
karatas. Am. m., s. ch. Ψ
jaune. Am. m., s. ch. Ψ

TILLANDSIA

à feuell. en scie. Am. m., s. ch. Ψ

ORDO VI.

IRIDES.

SISYRINCHIUM

- bermudiana L.
 — major.
 convolutum.
 striatum *smith.*

TIGRIDIA

- pavonia.

FERRARIA

- undulata L.

IRIS

1. *Barbatæ.*

- susiana L.
 florentina L.
 germanica L.
 — cœrulea.
 — violacea.
 pallida *Link.*
 plicata *Link.*
 swertii *Link.*
 squalens L.
 variegata L.
 aphylla L.
 pumila L.
 lutescens *Link.*

2. *Imberbes.*

- pseudo-acorus L.
 foetidissima L.
 sibirica L.
 ochroleuca L.
 spuria L.
 fimbriata *Vent.*
 graminea L.
 xiphium L.
 tuberosa L.
 persica L.
 sisyrinchium.
 tricuspis *Thunb.*

MOREA

- irioides L.
 nortiana *Andr.*

ORDRE VI.

LES IRIDÉES.

BERMUDIENNE

- à petites fleurs. Am. s. ψ
 — à grandes fleurs.
 roulée. cap, or. ψ
 à réseau. Mexique, or. ψ

TIGRIDIA

- à fleurs pourpres. cap, or. ψ
 (orn.)

FERRARIA

- ondulé. cap, or. ψ

IRIS

1. Fleurs barbues.

- de Suze. orient, or. ψ (orn.)
 de Florence. Italie. ψ (méd.)
 flambé. F. ψ (orn. méd.)
 — bleu. (orn.)
 — violet. (orn.)
 pâle. orient. ψ (orn.)
 plissé. ψ (orn.)
 de Swert. ψ (orn.)
 sale. F. m. ψ
 panaché. Hongrie ψ
 sans feuell. ψ
 nain. F. ψ (orn.)
 jaunâtre. F. ψ

2. Fleurs non barbues.

- des marais. F. ψ (méd.)
 fétide. F. ψ
 de Sibérie. ψ
 jaune. orient. ψ
 bâtard. F. ψ
 frangé. Chine, or. ψ
 graminé. Autriche. ψ
 xiphium. F. m. ψ (orn.)
 hermodate. orient, or. ψ (m.)
 de Perse. orient. ψ (orn.)
 à feuell. de safran. Barbar. ψ
 à trois pointes. cap, or. ψ

MOREA.

- faux iris. orient, or. ψ
 à gaine. cap, or. ψ

chinensis.
sordescens Jacq.

IXIA

bulbocodium L.
crocata L.
hyalina.
miniata Jacq.

— *maculata.*
polystachya.

anemonæflora Jacq.

fuscocitrina.
leucantha Jacq.
bulbifera L.
dubia Vent.
filiformis Vent.
longiflora Jacq.

erecta Jacq.
maculata Jacq.
viridis Jacq.
cruciata Jacq.
liliago.

GALAXIA

ixiæflora Dec.

GLADIOLUS

communis L.
plicatus L.
tristis L.
angustus L.

carneus Willd.

merianus.
lineatus Curt.
cuspidatus Jacq.
tubiflorus Jacq.
securiger Curt.
gramineus Andr.

ANTHOLIZA

æthiopica L.
cunonia L.

de Chine. or. ψ (orn.)
sale. cap, or. ψ

IXIA

bulbocodium. F. m. ψ (orn.)
safrané. cap, or. ψ (orn.)
membraneux. cap, or. ψ
couleur de minium. cap, or. ψ
(orn.)
— *tacheté. cap, or. ψ*
à plusieurs épis. cap, or. ψ
(orn.)
à fleurs d'anémone. cap, or. ψ
(orn.)
brun citron. cap, or. ψ (orn.)
blanc. cap, or. ψ (orn.)
bulbifère. cap, or. ψ (orn.)
douteux. cap, or. ψ (orn.)
filiforme. cap, or. ψ (orn.)
à longues fleurs. cap, or. ψ
(orn.)
droit. cap, or. ψ (orn.)
maculé. cap, or. ψ (orn.)
vert. cap, or. ψ (orn.)
crucifère. cap, or. ψ (orn.)
fleur de lis. cap, or. ψ (orn.)

GALAXIA

à fleurs d'ixia. cap, or. ψ
(orn.)

GLAYEUL

commun. F. m. ψ (orn.)
plissé. cap, or. ψ (orn.)
triste. cap, or. ψ (orn.)
à feuell. étroites. cap, or. ψ
(orn.)
couleur de chair. cap, or. ψ
(orn.)
de Mérian. cap, or. ψ (orn.)
veiné. cap, or. ψ (orn.)
en pointe. cap, or. ψ (orn.)
tubulé. cap, or. ψ (orn.)
en doloire. cap, or. ψ (orn.)
à feuell. de gramen. cap, or. ψ
(orn.)

ANTHOLISE

d'Éthiopie. cap, or. ψ (orn.)
cunonia. cap, or. ψ (orn.)

CROCUS

vernus L.
 sativus L.
 multifidus. *Ramond.*

SAFRAN

printanier. F. ψ (orn.)
cultivé. orient. ψ (écon. méd.)
découpé. F., pyrén. ψ (orn.)

WACHENDORFLIA

paniculata L.
thyrsiflora. L.

WACHENDORFE

paniculée. cap, or. ψ
à fleurs en thyrses. cap, or. ψ

PONTEDERIA

cordata L.

PONTÉDÉRIA

à feuill. en cœur. Am. s. ψ (orn.)

CLASSIS IV.**CLASSE IV.****MONOCOTYLEDONES.****MONOCOTYLÉDONS.**

(*stamina epigyna.*)

(*étamines sur le pistil.*)

ORDO I.**ORDRE I.****MUSÆ.****LES BANANIER.****MUSA**

sapientum L.
paradisiaca L.
coccinea *Andr.*

BANANIER

à petit fruit. inde, s. ch. ψ (alim.)
à grand fruit. inde, s. ch. ψ (al.)
écarlate. chine, s. ch. ψ (orn.)

HELICONIA

bihai.
psittacorum L. f.

HÉLICONIA

bihai. inde, s. ch. ψ
des perroquets. surin., s. ch. ψ

RAVENALA

madagascariensis.

RAVENAL

de Madagascar. s. ch. ψ

STRELITZIA

reginæ H. K.

STRÉLITZIA

de la reine. cap, s. ch. ψ (orn.)

ORDO II.**ORDRE II.****CANNÆ.****LES BALISIERS.****CANNA**

indica L.
 — *punctata.*
 — *coccinea.*
glaucia L.
gigantea.

BALISIER

des Indes. or. ψ (orn.)
 — *punctue.*
 — *écarlate.* Am. m., s. ch. ψ
glaucue. Am. s., or. ψ
gigantesque. s. ch. ψ

GLOBBA

nutans L.

GLOBBA

inclinée. inde, s. ch. ψ (orn.)

AMOMUM

zingiber L.

zerumbet L.

sylvestre swartz:

cardamomum L.

AMOMEgingembre. inde, s. ch. ψ
(écon. méd.)zerumbet. inde, s. ch. ψ
(écon. méd.)

sauvage. am. m., s. ch. ψ

cardamome. inde, s. ch. ψ
(écon. méd.)**HEDICHIUM**

coronarium L.

HÉDICHIMUM

en couronne. inde, s. ch. ψ

COSTUS

arabicus L.

COSTUSd'Arabie. am. m., s. ch. ψ
(méd.)**ALPINIA**

racemosa L.

ALPINIA

à grappes. am. m., s. ch. ψ

MARANTA

arundinacea:

MARANTAà feuell. de balisier. am. m.,
s. ch. ψ**THALIA**

dealbata.

THALIA

blanc. s. ch. ψ

CURCUMA

longa L.

CURCUMAsafran des Indes. s. ch. ψ
(écon., arts., méd.)**KÆMPFERIA**

galanga L.

longa jacq.

KÆMPFERIA

galanga. inde, s. ch. ψ

allongé. inde, s. ch. ψ

ORDO III.**ORCHIDEÆ.****ORCHIS****1. Bulbis indivisis:**

bifolia L.

pyramidalis L.

coriophora L.

morio L.

mascula L.

laxiflora Lmk.

ustulata L.

militaris L.

variegata jacq.

simia Lmk.

2. Bulbis palmatis.

latifolia L.

ORDRE III.**LES ORCHIDÉES.****ORCHIS****1. Bulbes non divisées.**

à deux feuell. F. ψ

pyramidal. F. ψ

fétide. F. ψ

morio. F. ψ

mâle. F. ψ

à fleurs lâches. F. ψ

charbonné. F. ψ

militaire. F. ψ

tacheté. F. ψ

singe. F. ψ

2. Bulbes palmées.

à larges feuell. F. ψ

maculata L.
 conopsea L.
 abortiva L.

SATYRIUM

hircinum L.
 viride L.
 nigrum L.

OPHRYS

ovata L.
 antropophora L.
 nidus avis L.
 paludosa L.
 insectifera L.
 — musciflora.
 — arachnites.
 — rubiginosa.
 spiralis L.
 æstivalis.

SERAPIAS

latifolia L.
 longifolia L.
 grandiflora L.
 rubra L.

LIMODORUM

tankervillæ H. K.
 purpureum Lmk.
 altum L.

CYPRIPEDIUM

calceolus L.
 flavescens Lec.

EPIDENDRUM

cochleatum L.
 ciliare L.
 bifidum Swartz.

maculé. F. ψ
 à long éperon. F. ψ.
 avorté. F. ψ

SATYRIUM

fétide. F. ψ
 vert. F. ψ
 noir. F., Alpes. ψ

OPHRYS

doublé feuell. F. ψ
 homme. F. ψ
 nid d'oiseau. F. ψ
 des marais. F. ψ
 insecte. F. ψ
 — mouche.
 — araignée.
 — rouillé.
 en spirale. F. ψ
 d'été. F. ψ

HELLEBORINE

à larges feuell. F. ψ
 à feuell. longues. F. ψ
 à grandes fleurs. F. ψ
 rouge. F. ψ

LIMODORE

de Chine. s. ch. ψ (orn.)
 pourpre. Am. m., s. ch. ψ
 élevé. Am. m., s. ch. ψ

CYPRIPEDIUM

des Alpes. F. ψ
 jaune. Am. s. ψ

EPIDENDRUM

limaçon. Am. m., s. ch. ψ
 cilié. Am. m., s. ch. ψ
 bifide. Am. m., s. ch. ψ

ORDO IV.

HYDROCHARIDES.

VALLISNERIA

spiralis L.

STRATIOTES

alooides.

HYDROCHARIS

morsus ranæ L.

ORDRE IV.

LES MORÈNES.

VALLISNERIA

en spirale. F. ψ

STRATIOTES

à feuell. d'aloès. F. ψ

MORÈNE

aquatique. F. ψ

NYMPHÆA

alba L.

lutea L.

cœrulea sav.

NYMPHÆA

blanc. F. ♀

jaune. F. ♀

bleu. égypte, s. ch. ♀

CLASSIS V.

CLASSE V.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

APETALÆ.

SANS COROLLE.

(stamina epigyna.)

(étamines sur le pistil.)

ARISTOLOCHIA

altissima Desf.

sempervirens L.

pistilochia L.

bilobata L.

caudata L.

trilobata L.

peltata L.

bœtica Lmk.

sypho l'Her.

rotunda L.

clematitis L.

serpentaria L.

ARISTOLOCHE

élevée. Alger, or. ♂

toujours verte. orient. or. ♂

crênelée. F. m., or. ♀ (méd.)

bilobée. Am. m., s. ch. ♀

filifère. Am. m., s. ch. ♂

trilobée. Am. m., s. ch. ♂

bouclier. Am. m., s. ch. ♀

de Portugal. ♀

syphon. Am. s. ♂ (orn.)

ronde. F. m. ♀ (méd.)

clématite. F. ♀ (méd.)

serpenteaire. Am. s. ♀ (méd.)

ASARUM

europæum L.

canadense L.

virginicum L.

ASARUM

d'Europe. F. ♀ (méd.)

de Canada. Am. s. ♀

de Virginie. Am. s. ♀

CLASSIS VI.

CLASSE VI.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

APETALÆ.

SANS COROLLE.

(stamina perigyna.)

(étamines attachées au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

E L Æ A G N I.

LES CHALEFS.

I. Stamina 5, aut pauciora.

I. Cinq étamines, ou moins.

THESIUM

linophyllum L.

THESIUM

à feuill. de lin. F. ♀

OSYRIS

blanc. F. 5

HYPOPHAE

ramnoïdes L.
canadensis L.

ELÆAGNUS

angustifolia L.

NYSSA

<i>aquatica</i> L.	}
<i>denticulata</i> H. K.	
<i>angulisans</i> Mich.	
<i>villosa</i> Mich.	}
<i>integrifolia</i> H. K.	
<i>candicans</i> Mich.	

CONOCARPUS

erecta L.II. *Stamina sapius* 10.

BUCIDA

buceras L.

TERMINALIA

catappa L.
angustifolia Jacq.

ORDO II.

T H Y M E L E Æ.

DIRCA

palustris L.

DAPHNE

1. *Floribus lateralibus.**mezereum* L.
— *album*.
thymelæa.
tartou-raïra L.
alpina L.
pontica L.
laureola L.2. *Floribus terminalibus.**odora* Thunb.
oleæfolia Link.
collina Jacq.
cneorum L.
gnidium L.

OSYRIS

alba L.

ARGOUSIER

ramnoïde. F. 5
de Canada. 5

CHALEF

à feuell. étroites, ou olivier de
Bohême. orient. 5 (orn.)

TUPÉLO

aquatique. Am. s. 5*velu.* Am. s. 5*blanchâtre.* Am. s. 5

CONOCARPE

droit. Am. m., s. ch. 5

II. Ordinairement 10 étamines.

BUCIDA

cornu. Am. m., s. ch. 5

BADAMIER

catappa. inde, s. ch. 5
à feuell. étroites. inde, s. ch. 5

ORDRE II.

LES THYMELEËS.

DIRCA

bois-cuir. Am. s. 5

DAPHNÉ

1. Fleurs latérales.

boisgentil. F. 5 (orn. vén.)
— *à fleur blanche.*
thymelée. F. 5 (orn.)
tartou-raïre. F. m., or. 5
des Alpes. F. 5
de Pont. As., or. 5 (orn.)
lauréole. F. 5 (vén.)

2. Fleurs terminales.

odorant. or. 5
à feuell. d'olivier. orient, or, 5
d'Italie. or. 5
cneorum. F. 5 (orn. vén.)
garou. F. m., or. 5 (méd. vén.)

PASSERINA

- hirsuta* L.
dioica conan.
calycina Lapeyr.
filiformis L.
capitata L.
grandiflora L. f.
laxa L. f.

STELLERA

- passerina* L.

STRUTHIOLE

- virgata* L.
erecta L.
imbricata Andr.

DAIS

- cotinifolia* L.

GNIDIA

- oppositifolia* Thunb.
simplex L. f.
pinifolia L. f.

ORDO III.

PROTEÆ.

PROTEA

- argentea* L.
pallens L.
conifera L.
obliqua Thunb.
levisanus Thunb.
hirta L.
glauc.
saligna Thunb.
sericea L. f.

BANKSIA

- serrata* L. f.
spinulosa Smith.

HAKEA

- gibbosa* Cav.
dactyloides Cav.

EMBOTRIUM

- salicifolium* Vent.
sericeum Smith.

PASSERINE

- cotonneuse* F. m., or. 5
dioïque F. m. 5
calyculée F. m. 5
filiforme cap, or. 5
à fleurs en tête cap, or. 5
à grandes fleurs cap, or. 5
lâche cap, or. 5

STELLERA

- passerine* F. ☉

STRUTHIOLE

- effilé* cap, or. 5
à tige droite cap, or. 5
imbriqué cap, or. 5

DAIS

- à feuell. de fustet* cap, or. 5

GNIDIA

- à feuell. opposées* cap, or. 5
à tiges simples cap, or. 5
à feuell. de pin cap, or. 5

ORDRE III.

LES PROTÉES.

PROTEA

- arbre d'argent* cap, or. 5
pâle cap, or. 5
conifère cap, or. 5
oblique cap, or. 5
lévisanus cap, or. 5
velu cap, or. 5
glauque cap, or. 5
à feuell. de saule cap, or. 5
soyeux cap, or. 5

BANKSIA

- à feuell. en scie* N. Holl., or. 5
épineux N. Holl., or. 5

HAKEA

- gibbeux* N. Holl., or. 5
dactyloïde N. Holl., or. 5

EMBOTRIUM

- à feuell. de saule* N. Holl., or. 5
soyeux N. Holl., or. 5

ORDO IV.

LAURI.

LAURUS

1. *Folia perennantia.*

cinnamomum L.

camphora L.

persea L.

nobilis L.

indica L.

borbonia L.

foetens H. K.

2. *Foliis deciduis.*

geniculata Michx.

benzoïn L.

sassafras L.

MYRISTICA

aromatica L.

HERNANDIA

sonora L.

ORDO V.

POLYONEÆ.

COCOLOBA

excoriata L.

uvifera L.

macrophylla.

pubescens L.

diversifolia Jacq.

BRUNNICHIA Gaert.

cirrhosa.

ATRAPHRAXIS

undulata L.

spinosa L.

ORDRE IV.

LES LAURIERS.

LAURIER

1. Feuilles persistantes.

cannellier. AS., or. 5 (écon. méd.)

camphrier. japon, s. ch. 5 (écon. méd.)

avocat. AM. M., s. ch. 5 (alim.)

d'Apollon. orient. 5 (écon. méd.)

des Indes. canaries, or. 5

rouge. AM. S., or. 5

fétide. canaries, or. 5

2. Feuilles tombantes.

geniculé. AM. S., or. 5

faux benjoin. AM. S. 5

sassafras. AM. S. 5 (méd.)

MUSCADIER

aromatique. moluques, s. ch. 5 (écon. méd.)

HERNANDIA

sonore. AM. M., s. ch. 5

ORDRE V.

LES POLYGNÉES.

RAISINIER

écorcé. AM. M., s. ch. 5

à grappes. AM. M., s. ch. 5

à grandes feull. AM. M. s. ch. 5

pubescent. AM. M., s. ch. 5

à feull. changeantes. AM. M. s. ch. 5

BRUNNICHIA

à vrilles. AM. S. 5

ATRAPHRAXIS

ondulé. cap, or. 5

épineux. orient. 5

POLYGONUM.

POLYgone

1. *Foliis indivisis, floribus octandris, trigynis.*

1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.

aviculare L.
maritimum L.
polygamum Vent.
frutescens L.
divaricatum L.
alpinum All.
angustifolium.

renoué, centinode. F. ♀ (méd.)
maritime. F. ♀
polygame. Am. s.; or. ♂
arbrisseau. sibérie. ♂
étalé. sibérie. ♀
des Alpes. F. ♀
à feuell. étroites. sibérie. ♀

2. *Persicariæ, pistilo bifido, stamina minus 8.*

2. Les persicaires, 2 styles, moins de 8 étamines.

orientale L.
persicaria L.
— maculata.
minus H. K.
hydropiper L.
amphibium L.
virginianum L.

d'orient. ☉ (orn.)
persicairé. F. ☉
— maculée.
nain. F. ☉
poivre d'eau. F. ☉
amphibie. F. ♀
de Virginie. Am. s. ♀

3. *Bistortæ, spica unica.*

3. Les bistortes, un seul épi.

viviparum L.
bistorta L.
— major.

vivipare. F., Alpes. ♀
bistorte. F. ♀ (méd.)
— à larges feuell.

4. *Foliis subcordatis.*

4. Feuilles en cœur ou hastées.

tataricum L.
fagopyrum L.
emarginatum Willd.
convolvulus L.
dumetorum L.
scandens L.
acetosæfolium Vent.

de Tartarie. ☉ (alim.)
sarrazin. Asie. ☉ (alim.)
échancré. chine. ☉
liseron. F. ☉
des buissons. F. ☉
grim pant. Am. s. ♀
à feuell. d'oseille. Brésil. ♀

RUMEX.

RUMEX.

1. *Hermaphroditæ, valvulis glandulâ destitutis.*

1. Fleurs hermaphrodites; calice sans glandes.

lunaria L.
vesicarius L.
roseus L.
tingitanus L.
scutatus L.
— glaucus.
digynus L.
bucephalophorus L.

arbrisseau. canaries, or. ♀
vésiculeux. Afr. s. ☉
rose. Égypte. ☉
de Tanger. Alger. ♀
en bouclier. F. ♀ (alim. méd.)
— glauque.
à deux styles. F., Alpes. ♀
tête de bœuf. F. m. ☉

2. *Floribus diclinis.*

2. Fleurs polygames.

arifolius L. f.
alpinus L.

à feuell. d'arum. Afr., s. ch. ♂
des Alpes. F. ♀ (méd.)

tuberosus *L.*
 montanus. }
 arifolius *All.* }
 cordatus.
 acetosa *L.*
 acetosella *L.*
 spinosus *L.*

3. *Floribus hermaphroditis , valvulis
 granulato notatis.*

maritimus *L.*
 crispatus *Mich.* }
 persicarioides *Poiret.* }
 ægyptiacus *L.*
 dentatus *L.*
 pulcher *L.*
 nemolapathum *L.*
 sanguineus *L.*
 purpureus *Poiret.*
 obtusifolius *L.*
 crispus *L.*
 hydrolapathum *H. K.*
 patientia *L.*
 undulatus.

RHEUM

rhaponticum *L.*
 compactum *L.*
 undulatum *L.*
 ribes *L.*
 palmatum *L.*

CALLIGONUM

comosum *Desf.*

PALLASIA

casica *L.*

ORDO VI.

ATRIPLICES.

I. *Fructus baccatus.*

PHYTOLACCA

octandra *L.*
 decandra *L.*
 dodecandra *L'Her.*
 icosandra *L.*
 dioica *L.*

tubéreux. *italie., or. ♀*
 de montagne. *F. ♀*
 en cœur. *cap., or. ♀*
 oseille. *F. ♀ (alim. méd.)*
 auriculé. *F. ♀*
 épineux. *orient. ☉*

3. Fleurs hermaphrodites ; valves glanduleuses.

maritime. *F. ☉*
 crispé. *Am. s. ☉*
 d'Égypte. *☉*
 denté. Égypte. *☉*
 violon. *F. ♂*
 des bois. *F. ♀*
 sanguin. *Am. s. ♀*
 purpurin. *♀*
 à feuell. obtuses. *F. ♀*
 crépu. *F. ♀*
 des marais. *F. ♀*
 patience. *F. ♀ (méd.)*
 onde. *sibérie. ♀*

RHUBARBE

rhapontic. *Asie ♀ (méd.)*
 compacte. *chine. ♀ (méd.)*
 ondée. *chine. ♀ (méd.)*
 ribes. *Asie. ♀ (écon. méd.)*
 palmée. *chine. ♀ (méd.)*

CALLIGONUM

hérissé. *Afr., or. ♀*

PALLASIA

de la mer caspienne. *or. ♀*

ORDRE VI.

LES ARROCHES.

I. Une baie.

PHYTOLACCA

à 8 étamines. *Am. m., s. ch. ♀*
 à 10 étamines. *Am. s. ♀*
 à 12 étamines. *Abyss., s. ch. ♀*
 à 20 étamines. *inde., s. ch. ♀*
 dioïque. *Am. m., s. ch. ♀*

RIVINA

- humilis* L.
octandra L.
levis L.

BOSEA

- yerva-mora* L.

II. *Fructus capsularis*:

PETIVERIA

- alliacea* L.

POLYCNEMUM

- arvense* L.

CAMPHOROSMA

- monspeliaca* L.

PTERANTHUS

- echinatus* Desf.

GALENIA

- africana* L.

III. *Semen tectum calice, stamina 5*:

BASELLA

- rubra* L.
alba L.
cordifolia Lmk.
vesicaria Lmk.

SALSOLA

1. *Fruticosæ*:

- brevifolia* Desf.
fruticosa L.
prostrata L.
canescens.
oppositifolia Desf.

2. *Herbacæ*:

- hirsuta* L.
muricata L.
laniflora Pallas.
altissima L.
soda L.
radiata Desf. }
platiphylla Michx. }
salsa L.
kali L.
tragus L.
rosacea L.

RIVINA

- velu.* Am. m., s. ch. 5
à 8 étamines. Am. m., s. ch. 5
lisse. inde, s. ch. ♂

BOSEA

- yerva-mora.* canaries, or. 5

II. Une capsule.

PETIVERIA

- alliace.* Am. m., s. ch. 5

POLYCNEMUM

- des champs.* F. ☉

CAMPHRÉE

- de Montpellier.* F., or. 5 (méd.)

PTERANTHUS

- hérissé.* Afr. s. ☉

GALENIA

- d'Afrique.* cap, or. 5

III. Graines recouvertes par le calice,
5 étamines.

BASELLE

- rouge.* inde. ♂ (écon.)
blanche. chine. ♂ (écon.)
à feuil. en cœur. inde. ♂ (écon.)
vésiculeuse. pérou.

SOUDE.

1. Tiges ligneuses.

- à feuil. courtes.* Barb., or. 5
arbrisseau. F. 5
couchée. sibérie. 5
satinée. or. 5
à feuil. opposées. Barb., or. 5

2. Tiges herbacées.

- velue.* F. m. ☉
hérissée. égypte, or. 7
laineuse. sibérie. 7
élevée. Italie. ☉
commune. F. m. ☉ (arts.)
rayonnée. Am. s. ☉
salée. sibérie. ☉
kali. F. ☉ (arts.)
épineuse. F. ☉ (arts.)
rosacée. Asie. ☉

SPINACIA

- oleracea L.
— levis.

BETA

- vulgaris L.
— rubra.
cycla L.

maritima L.

CHENOPODIUM.

1. *Foliis angulatis.*

- botus henricus L.
urbicum L.
serotinum L.
atriplicis L.
murale L.
hybridum L.
ficifolium. *smith.*
album L.
rubrum L.
ambrosioides L.
anthelminticum L.

- botrys L.
multifidum L.
glaucum L.

2. *Foliis integris.*

- vulvaria L.
polyspermum L.
scoparia L.
villosum *zmh.*
aristatum L.
maritimum L.

ATRIPLEX

- halimus L.
portulacoides L.
rosea L.
sibirica L.
hortensis L.
— rubra.
— ruberrima.
bengalensis.
virgata.
laciniata L.
multifida.

ÉPINARS

- cultivé. AS. S. ⊙ (alim.)
— lisse. (alim.)

BETTE

- commune. Eur. aust. ♂ (alim.)
— rouge.
racine de disette. portug. ♂
(alim.)
maritime. F. ⊙

ANSERINE.

1. Feuilles anguleuses.

- bon Henri. F. ♀ (méd.)
triangulaire. F. ⊙
tardive. F. ⊙
à feuell. d'arroche. chine. ⊙
des murailles. F. ⊙
hybride. F. ⊙
à feuell. de figuier. F. ⊙
blanche. F. ⊙
rouge. F. ⊙
odorante. Am. m. ⊙ (méd.)
anthelmintique. Am. m., or. ♀
(méd.)
botrys. F. ⊙ (méd.)
découpée. Am. m., or. ♀
glauque. F. ⊙

2. Feuilles entières.

- fétide. F. ⊙
polysperme. F. ⊙
belvédère. chine. ⊙
velue. sibérie. ⊙
barbue. sibérie. ⊙
maritime. F. ⊙

ARROCHE

- halime. F. ♀
à feuell. de pourpier. F. ♀
rose. F. ⊙
de Sibérie. ⊙
des jardins. Asie. ⊙ (écon.)
— rouge.
— pourpre.
du Bengale. ⊙
effilée. sibérie. ⊙
laciniée. F. ⊙
découpée. ⊙

hastata L.
patula L.
littoralis L.

hastée. F. ☉
touffue. F. ☉
maritime. F. ☉

IV. *Semen tectum calice, stamina pauciora quam 5.*

IV. Graine renfermée dans le calice ; moins de cinq étamines.

AXYRIS

amaranthoides L.
hybrida L.

AXYRIS

fausse amarante. sibérie. ☉
hybride. sibérie. ☉

BLITUM

capitatum L.
virgatum L.
chenopodioides L.

BLETTE

à fleurs en tête. F. ☉
effilée. F. ☉
anserine. tartarie. ☉

SALICORNIA

herbacea L.
fruticosa L.

SALICORNE

herbacée. F. ☉ (écon.)
arbrisseau. F. m., or. ☉

V. *Semen denudatum.*

V. Graines non-recouvertes.

CORISPERMUM

spicatum.
hyssopifolium L.

CORISPERME

à épis. sibérie. ☉
à feuell. d'hyssope. tartar. ☉

CLASSIS VII.

CLASSE VII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

A P E T A L A E.

SANS COROLLE.

(*stamina hypogyna.*)

(étamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

AMARANTHI.

LES AMARANTES.

I. *Folia alterna nuda.*

I. Feuilles alternes nues.

AMARANTHUS

AMARANTE

I. *Triandri.*

I. Trois étamines.

albus L.
græcisans L.
persicarioides.
circinnatus.
tricolor L.
lividus L.
melancholicus L.
gracilis.
chenopodium caudatum. Jacq. }

blanche. Am. s. ☉
à feuell. étroites. Am. s. ☉
persicaire. ☉
à feuell. rondes. ☉
tricolor. inde. ☉ (orn.)
livide. Am. s. ☉
mélancolique. inde. ☉
grêle. ☉

blitum L.
 sylvestris.
 polygonoides L.

2. Pentandri.

chlorostachys *wild.*
 paniculatus L.
 hybridus L. }
 retroflexus *Lmk.* }
 caudatus L.
 spinosus L.

CELOSIA

argentea L.
 margaritacea L.
 trigyna L.
 cristata L.
 coccinea L.

II. *Folia opposita nuda.*

IRESINE

celosioides L.

ACHYRANTHES

argentea *Lmk.*
 fruticosa *Lmk.*
 crispa.
 virgata.
 lappacea L.
 styracifolia *Lmk.*
 muricata L.
 porrigens *Jacq.*

GOMPHRENA

globosa L.
 interrupta L.

ILLECEBRUM

lanatum L.
 javanicum L.

III. *Folia opposita, stipulacea.*

PARONICHIA (*illecebrum* L.)

verticillata.
 echinata *Desf.*
 vulgaris.
 capitata.
 ficoidea
 sessilis.
 achyrantha.
 frutescens *L'Her.*

blatte. F. ☉
 sauvage. F. ☉
 membraneuse. Am. m. ☉

2. Cinq étamines.

pâle. ☉
 paniculée. Am. m. ☉ (orn.)
 hybride. F. ☉
 à longs épis. Pérou. ☉ (orn.)
 épineuse. inde. ☉

CÉLOSIA

argenté. inde. ☉
 perlé. inde. ☉
 à trois styles. Afr. ☉
 à crêtes. Asie. ☉ (orn.)
 pourpre. inde. ☉ (orn.)

II. Feuilles opposées nues.

IRESINE

faux celosia. Am. m., s. ch. ♀

CADELARI

argenté. barbarie. ☉
 arbrisseau. inde. ♀
 crépu. inde. ♀
 à longs épis. inde. ♀
 hérissé. inde. ♀
 à feuell. de styrax. inde ☉
 épineux. Égypte. ☉
 étalé. Pérou. ♀ (orn.)

AMARANTINE

globuleuse. inde. ☉ (orn.)
 interrompue. Am. m. ♀

ILLECÈBRE

laineuse. inde. ☉
 de Java. inde. ♂

III. Feuilles opposées, accompagnées de stipules.

PARONIC

verticillé. F. ☉
 hérissé. barbarie. ♀
 commun. F. m. ♀
 à fleurs en tête. ♂
 ficoïde. Am. m., s. ch. ♀
 sessile. inde, s. ch. ♀
 achyrantha. orient. ☉
 arbrisseau. Pérou, s. ch. ♀

HERNIARIA

HERNIOLE

suffruticosa.
 illecebrum suffruticosum L. }
 fruticosa L.
 glabra L.
 hirsuta L.
 incana.

sous-arbrisseau. barb., or. ☿
 ligneuse. F., or. ☿
 lisse. F. ☉
 velue. F. ☉
 blanche. Esp. ♀

ORDO II.

ORDRE II.

PLANTAGINES,

LES PLANTAINS.

PLANTAGO

PLANTAIN

1. Caule folioso.

1. Tige feuillue.

psyllium. }
 arenaria wild. }
 indica. L.
 cynops L.
 squarrosa L.
 stricta schousb.

psyllium. F. ☉
 des Indes. égypte. ☉
 cynops. F. ♀
 rude. égypte. ☉
 serré. maroc. ☉

2. Scapo nudo.

2. Tige nue.

maxima Jacq.
 asiatica Lmk.
 cordata Lmk.
 major L.
 media L.
 crassa wild.
 lanceolata L.
 lagopus L.
 amplexicaulis Cav.
 serraria L.
 vaginata Vent.
 virginica L.
 albicans L.
 interrupta Poiret.
 alpina L.
 sphærocephala Poiret. }
 alpina Jacq. }
 microcephala Poiret. }
 villosa Roth. }
 cretica L.
 maritima L.
 subulata L.
 Lœflingii L.
 coronopus L.

capuchon. sibérie. ♀
 d'Asie. ♀
 en cœur. Am. s. ♀
 commun. F. ♀ (méd.)
 moyen. F. ♀ (méd.)
 charnu. ♀
 lancéolé. F. ♀
 lagopus. F. ☉
 amplexicaule. Esp. ♀
 en scie. barbarie. ♀
 à gaines. canaries, or. ☿
 de Virginie. Am. s. ☉
 blanchâtre. F. m. ♀
 interrompu. Am. s. ♀
 des Alpes. F. ♀
 à tête ronde. Alpes. ♀
 à petites têtes. orient. ☉
 de Crète. orient. ♂
 maritime. F. ♀
 en alène. F. m. ♀
 de Lœfling. Esp. ☉
 corne de cerf. F. ☉

LITTORELLA

LITTORELLE

lacustris L.

des marais. F. ♀

ORDO III.

NYCTAGINES.

MIRABILIS

jalapa L.

— lutea.

longiflora L.

viscosa Cav.

aggregata Cav.

ABRONIA

umbellata Lmk.

BOERHAAVIA

erecta L.

diffusa L.

hirsuta L.

obtusifolia Lmk.

scandens L.

tuberosa Lmk.

PISONIA

aculeata L.

fragrans.

nitida.

ORDO IV.

PLUMBAGINES.

PLUMBAGO

europæa L.

scandens L.

rosea L.

STATICE.

I. Caule ramoso.

monopetala L.

— angustifolia.

suffrutescens L.

limonium L.

latifolia Smith.

cordata L.

minuta L.

mucronata L.f.

tatarica L.

oleaeifolia Scop.

ORDRE III.

LES NYCTAGES.

MIRABILIS

belle de nuit. Am. m. ♀ (orn.)

— jaune.

à longues fleurs. Mexique,

or. ♀ (orn.)

visqueuse. Pérou, s. ch. ♀

agglomérée. N. Esp., s. ch. ♀

ABRONIA

ombellifère. Californie. ☉

BOERHAAVIA

droit. Am. m., s. ch. ♀

étalé. Am. m., s. ch. ♀

velu. Am. m., s. ch. ♀

à feuil. obtuses. Am. m., s. ch. ♀

grimpant. Am. m., s. ch. ♂

tubéreux. Pérou, s. ch. ♂

PISONIA

épineux. Am. m., s. ch. ♂

odorant. Am. m., s. ch. ♂

luisant. Am. m., s. ch. ♂

ORDRE IV.

LES DENTELAIRES.

DENTELAIRE

d'Europe. F. m. ♀ (méd.)

grimpante. Am. m., s. ch. ♂

rose. Inde, s. ch. ♂ (orn.)

STATICE.

I. Tige rameuse.

monopétale. F. m., or. ♂

— à feuil. étroites.

sous-arbrisseau. Sibérie. ♂

limonium. F. ♀ (orn.)

à larges feuil. sibér. ♀ (orn.)

à feuil. en cœur. F. m., or. ♀

petite. F. m., or. ♀

crépue. Barbar., or. ♀ (orn.)

de Tartarie. ♀

à feuil. d'olivier. Ital., or. ♀

sinuata L.
spicata Willd.

2. *Caule simplici , floribus capitatis.*

armeria L.
 — *minor*.
fasciculata Vent.

sinuée. Alger , or. ♂
à épis. perse, or. ♀

2. Tige simple, fleurs en tête.

gazon d'olympé. F. ♀ (orn.)
 — *petit gazon d'olympé*.
fasciculée. Sardaigne, or. ♀

CLASSIS VIII.

CLASSE VIII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(*corolla hypogyna.*)

(corolle attachée sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

LYSIMACHIÆ.

LES LYSIMACHIES.

I. *Flores cauli insidentes.*

1. Fleurs sur la tige.

CENTUNCULUS
minimus L.

CENTENILLE
naine. F. ☉

ANAGALLIS
arvensis L.
 — *cœrulea*.
monelli L.
collina Schousb.
latifolia L.
tenella L.

MOURON
des champs. F. ☉
 — *bleu*.
de Monelli. Esp. ♂
de Maroc. or. ♀
à larges feuil. Esp. ☉
rampant. F. ♀

LYSIMACHIA
vulgaris L.
ephemerum L.
orientalis Lmk.
thyrsiflora L.
punctata L.
ciliata L.
nemorum L.
nummularia L.
linum stellatum L.

LYSIMACHIE
commune. F. ♀ (méd.)
éphémère. Esp. ♀ (orn.)
d'orient. ♀
en thyrsé. F. ♀
punctuée. F. ♀
ciliée. Am. s. ♀
des bois. F. ♀
nummulaire. F. ♀
lin étoilé. F. ☉

HOTTONIA
palustris L.

HOTTONIA
des marais, F. ♀

CORIS
monspeliensis L.

CORIS
de Montpellier. F. m. ♀

LIMOSELLA

aquatica L.

TRIENTALIS

europæa L.

ARETIA

vitaliana L.

II. Flores scapo insidentes umbellati,
involucro polyphylo, rarius solitarii.

ANDROSACE

maxima L.

septentrionalis L.

elongata L.

lactea L.

carnea L.

villosa L.

PRIMULA

veris L.

elatior *wild.*

— acaulis.

auricula L.

marginata *wild.*

farinosa L.

viscosa *All.*

integrifolia L.

villosa *Jacq.*auriculata *Lmk.*

CORTUSA

matthioli L.

SOLDANELLA

alpina L.

DODECATHÉON

meadia L.

CYCLAMEN

europæum L.

hederæfolium *H. K.*

[III. Genera *lysimachiis* affinia.

GLOBULARIA

alypum L.

longifolia *H. K.* }salicina *Lmk.* }

vulgaris L.

linifolia *Lmk.*

LIMOSELLE

aquatique. F. ☉

TRIENTALIS

d'Europe. F., Alpes. ☿

ARÉTIA

des Alpes. F. ☿

II. Fleurs sur une hampe disposées en
ombelle, accompagnées d'un involucre,
ou plus rarement solitaires.

ANDROSACÉ

à grand calice. F. ☉

du nord. russie. ☉

à longs pédoncules. F. ☉

blanche. F., Alpes. ☿

couleur de chair. F., Alpès. ☿

velue. F., Alpes. ☿

PRIMEVERE

commune. F. ☿ (orn.)

élevée. F. ☿ (orn.)

— sans tige.

oreille d'ours. F., Alp. ☿ (orn.)

bordée. suisse. ☿

farineuse. F., Alpes. ☿

visqueuse. F., Alpes. ☿

à feuell. entières. F., Alpes. ☿

velue. F., Alpes. ☿

auriculée. orient, or. ☿

CORTUSA

de Matthioli. F., Alpes. ☿

SOLDANELLE

des Alpes. F. ☿

DODÉCATHÉON

méadia. Am. s., or. ☿ (orn.)

CYCLAMEN

d'Europe. F. m. ☿ (orn.)

à feuell. de lierre. Italie, or. ☿

(orn.)

III. Genres qui ont de l'affinité avec les
lysismachies.

GLOBULAIRE

alypum. F. m., or. ☿ (vén.)

à feuell. longues. madère, or. ☿

commune. F. ☿

glaucue. Espagne. ☿

nudicaulis L.
cordifolia L.

SAMOLUS

valerandi L.

UTRICULARIA

vulgaris L.
minor L.

PINGUICULA

vulgaris L.

MENYANTHES

trifoliata L.
nymphaeoides L.
ovata. L.

à tiges nues. F., alpes. ♀
à feuell. en cœur. F., alpes. ♀

SAMOLUS

mouron d'eau. F. ☉

UTRICULAIRE

commune. F. ♀
grêle. F. ♀

GRASSETTE

commune. F. ♀

MÉNYANTE

tresle d'eau. F. ♀ (méd.)
à feuell. de nymphaea. F. ♀
à feuell. ovales. cap, or. ♀

ORDO II.

PEDICULARES.

I. *Stamina 2, aut plura, non didynama.*

POLYGALA.

1. *Cristatæ.*

vulgaris L.
amara L.
monspeliaca L.
austriaca crantz.
myrthifolia L.
oppositifolia L.

2. *Imberbes.*

chamæbuxus L.
heisteria L.

VERONICA.

1. *Spicata.*

virginiana L.
spuria L.
maritima L.
longifolia L.
incana L.
spicata L.
hybrida L.
pinnata H. K.
incisa H. K.

2. *Corymboso-racemosæ.*

officinalis L.
bellidioides L.
fruticulosa L.

ORDRE II.

LES PÉDICULAIRES.

I. 2 étamines, ou plus, non-didynames.

POLYGALA.

1. Fleurs barbues.

commun. F. ♀
amer. F. ♀
de Montpellier. F. ☉
d'Autriche. F. ☉
à feuell. de myrthe. cap, or. ♂
à feuell. opposées. cap, or. ♂

2. Fleurs non-barbues.

à feuell. de buis. F. ♂
d'Heister. cap, or. ♂

VÉRONIQUE.

1. Fleurs en épis.

de Virginie. Am. s. ♀
à feuell. ternées. sibiérie. ♀
maritime. eur. ♀
à longues feuell. suisse. ♀
blanche. russie. ♀
à épis. F. ♀
hybride. suède. ♀
pennée. sibiérie. ♀
incisée. sibiérie. ♀

2. Grappes de fleurs en corymbe.

officinale. F. ♀ (méd.)
à feuell. de paquerette. F. ♀
fruticuleuse. F., alpes. ♂

alpina L.
 decussata *Wild.*
 serpyllifolia L.
 beccabunga L.
 anagallis L.
 scutellata L.
 teucrium L.
 prostrata L.
 chamædrys L.
 latifolia L.
 urticæfolia H. K.
 montana L.
 multifida L.
 austriaca *Wild.*
 orientalis H. K.

3. *Pedunculis unifloris.*

persica.
 agrestis L.
 arvensis L.
 hederæfolia L.
 triphyllos L.
 verna L.
 romana L.
 præcox *All.*
 acinifolia *Wild.*
 digitata *Vahl.*
 chamæpithyoides *Link.* }

SIBTHORPIA

europæa L.
 africana.

DISANDRA

prostrata L.

II. *Stamina 4 didynama.*

ERINUS

alpinus L.

MANULEA

oppositiflora *Vent.*
 alterniflora.

EUPHRASIA

officinalis L.
 odontites L.
 lutea L.
 viscosa L.

PEDICULARIS

palustris L.
 sylvatica L.

des Alpes. F. ☞
en croix. Détroit de Magell. ☞
à feuell. de serpolet. F. ☞
beccabunga. F. ☞ (méd.)
anagallis. F. ☉ (méd.)
à feuell. linéaires. F. ☞
germandrée. F. ☞
couchée. F. ☞
chamædrys. F. ☞
à larges feuell. F. ☞
à feuell. d'ortie. F. ☞
de montagne. F. ☞
découpée. Sibérie. ☞
d'Autriche. ☞
d'orient. ☞

3. *Pedoncles à une fleur.*

de Perse. ☉
agreste. F. ☉
des champs. F. ☉
à feuell. de lierre. F. ☉
à trois lobes. F. ☉
printanière. F. ☉
romaine. F. ☉
précoce. F. ☉
à feuell. d'acinos. F. ☉
digitée. F. m. ☉

SIBTHORPIA

d'Europe. F. ☞
d'Afrique. or. ☞

DISANDRA

couchée. orient, or. ☞

II. *4 étamines didynames.*

ÉRINUS

des Alpes. F. ☞

MANULEA

à feuell. opposées. cap, or. ☞
à fleurs alternes. n. holl. ☉

EUPHRAISE

officinale. F. ☉ (méd.)
rouge. F. ☉
jaune. F. ☉
visqueuse. F. ☉

PÉDICULAIRE

des marais. F. ☉
des bois. F. ☉

RHINANTHUS
 crista galli L.
 — hirsuta.

MELAMPYRUM
 arvense L.
 cristatum L.
 pratense L.
 sylvaticum L.

OROBANCHE
 major. *smith.*
 caryophyllacea *smith.*
 minor *smith.*
 ramosa L.

LIATHRÆA
 clandestina L.

ORDO III.

ACANTHI.

I. Stamina 4 didynama.

ACANTHUS
 mollis L.

 spinosus L.
 spinosissimus.

RUELLIA
 blechnum L.
 strepens L.
 varians *vent.*
 cranthemum pulchellum *andr.* }
 ovata *cav.*
 lactea *cav.*
 patula *jacq.*
 tuberosa L.

II. Stamina 2.

JUSTICIÆ.

I. Fruticosæ.

adhatoda L.
 hyssopifolia L.
 ecbolium L.
 gandarussa L.
 quadrifida *vahl.* }
 coccinea *cav.* }
 furcata *jacq.* }
 peruviana *cav.* }

COCRÈTE
 crête de coq. F. ☉
 — velue. F. ☉

MÉLAMPYRUM
 des champs. F. ☉
 à crête. F. ☉
 des prés. F. ☉
 des bois. F. ☉

OROBANCHE
 élevée. F. ☿
 odorante. F. ☿
 petite. F. ☿
 rameuse. F. ☿

CLANDESTINE
 commune. F. ☿

ORDRE III.

LES ACANTHES.

I. 4 étamines didynames.

ACANTHE
 branche-ursine. ital. ☿ (orn.,
 méd.)
 épineuse. ital. ☿
 très-épineuse. ☿

RUELLIA
 blechnum. am. m., cr. ☿
 élastique. am. s., or. ☿
 bleu. inde, s. ch. ☿
 ovale. mexique, s. ch. ♂
 blanc. mexique, s. ch. ☿
 étalé. inde. ☿
 tubéreux. am. m., s. ch. ☿

II. 2 étamines.

CARMANTINE.

I. Tiges ligneuses.

adhatoda. ceylan, or. ☿ (orn.)
 à feuil. d'hysope. canar., or. ☿
 ecbolium. inde, s. ch. ☿
 gandarussa. inde, s. ch. ☿
 rouge. n. esp., s. ch. ☿
 fourchue. pérou. ☿

2. *Herbaceæ.*

ciliaris *L. f.*
 lithospermifolia *Jacq.* }
 ladanoides *Lmk.* }
 bicaliculata *Vahl.* }
 ligulata *Cav.* }

ELYTRARIA *Mich.*
 virgata *Mich.*

ORDO IV.

J A S M I N E Æ.

I. *Fructus capsularis.*

SYRINGA

vulgaris *L.*
 persica *L.*
 — laciniata.

FRAXINUS

excelsior *L.*
 — argentea.
 — verrucosa.
 — jaspidea.
 — horizontalis.
 — pendula.
 rotundifolia *Lmk.*
 lentiscifolia. }
 parvifolia *Lmk.* }
 monophylla.
 ornus *L.*
 pubescens *Lmk.*
 americana *L.*
 caroliniana *Lmk.*
 juglandifolia *Lmk.*
 sambucifolia *Lmk.*
 platicarpa *Mich.*

FONTANESIA

phillyreoides *Bill.*

II. *Fructus baccatus.*

CHIONANTHUS

virginica *L.*
 incrassata *Swartz.*

OLEA

europæa *L.*
 — buxifolia.
 capensis *L.*
 americana *L.*

2. *Tiges herbacées.*

ciliée. ceylan. ☉
 à feuell. de grémil. pérrou,
 s. ch. ☉
 caliculée. inde, s. ch. ☿

ELYTRARIA

effilé. Am. s., or. ♀

ORDRE IV.

LES J A S M I N S.

I. Une capsule.

LILAS

commun. Asie. ☿ (orn.)
 de Perse. Asie. ☿ (orn.)
 — lacinié. (orn.)

FRÊNE

élevé. F. ☿
 — argenté.
 — graveleux.
 — jaspé.
 — horizontal.
 — pendant.
 à feuell. rondes. Italie. ☿
 à feuell. de lentisque. Orient. ☿
 à une feuell. Am. s. ☿
 à fleurs. Italie. ☿ (orn., méd.)
 pubescent. Am. s. ☿
 d'Amérique. Am. s. ☿
 de Caroline. Am. s. ☿
 à feuell. de noyer. Am. s. ☿
 à feuell. de sureau. Am. s. ☿
 à fruit large. Am. s. ☿

FONTANESIA

à feuell. de filaria. As. ☿ (orn.)

II. Fruit charnu.

CHIONANTE

de Virginie. Am. s. ☿ (orn.)
 renflé. Am. m., s. ch., or. ☿

OLIVIER

cultivé. F. m., or. ☿ (écon., méd.)
 — à feuell. de buis.
 du Cap. s. ch. ☿
 d'Amérique. Am. s., or. ☿

fragrans Thunb.
emarginata Lmk.

PHILLYREA

angustifolia L.
media L.
latifolia. L.
— *levis.*

MONGORIUM

sambac.

JASMINUM

glaucum H. K.
fruticans L.
humile L.
odoratissimum L.
azoricum L.
volubile Jacq.
mauritanum.
officinale L.
grandiflorum L.

LIGUSTRUM

vulgare L.

ORDO V.

VITICES.

I. Flores oppositè corymbosè.

CLERODENDRUM

infortunatum L.

VOLKAMERIA

aculeata L.
inermis L.
angustifolia.
japonica Jacq.

ÆGIPHILA

martinicensis L.
macrophylla.

VITEX

agnus castus L.
— *albidus.*
incisa Lmk.
— *alba.*
trifolia Lmk.

odorant. chine, or. 5 (écon.)
échancré. inde, s. ch. 5

FILARIA

à feuell. étroites. F. 5 (orn.)
moyen. F. m. 5 (orn.)
à larges feuell. F. m. 5 (orn.)
— *lisse.*

MONGORI

jasmin d'Arabie. inde, s. ch. 5
(orn.)

JASMIN

glauque. cap, s. ch. 5 (orn.)
cytise. F. m. 5 (orn.)
d'Italie. or. 5 (orn.)
jonquille. or. 5 (orn.)
des Açores. or. 5 (orn.)
sarmenteux. inde, s. ch. 5 (orn.)
de l'Isle de France. s. ch. 5
officinal. inde. 5 (orn.)
à grandes fleurs. inde, or. 5
(orn.)

TROËNE

commun. F. 5 (orn.)

ORDRE V.

LES GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbes et opposées.

CLÉRODENDRUM

visqueux. inde, s. ch. 5

VOLKAMERIA

épineux. Am. m., s. ch. 5
sans épines. inde, s. ch. 5
à feuilles étroites. s. ch. 5
du Japon. s. ch. 5 (orn.)

ÆGIPHILA

de la Martinique. s. ch. 5
à grandes feuell. Am. m., s. ch. 5

VITEX

agnus castus. F. m. 5 (méd.)
— *à fleurs blanches.*
incisé. chine. 5 (orn.)
— *à fleurs blanches.*
à feuilles ternées. inde, s. ch. 5

CALEICARPA
americana L.

CALLICARPA
d'Amérique. am. s., or. 5

CORNUTIA
pyramidata L.

CORNUTIA
pyramidal. am. m., s. ch. 5

TECTONA
grandis L. f.

THEK
élevé. inde, s. ch. 5

II. Flores racemosi in racemis alterni.

II. Fleurs alternes et en grappes.

CITHAREXYLUM
cinereum L.
quadrangulare L.
caudatum L.
pentandrum Vent.

BOIS-GUITTARE
cendré. am. m., s. ch. 5
quadrangulaire. am. m., s.
ch. 5
à longues grappes. am. m.,
s. ch. 5
à 5 étamines. am. m., s. ch. 5

DURANTA
plumieri L.
ellisia L.
microphylla.

DURANTA
deplumier. am. m., s. ch. 5
lancéolè. am. m., s. ch. 5
à petites feuell. am. m., s. ch. 5

LANTANA
trifoliata L.
annua H. K.
involucrata L.
recta H. K.
salvifolia Jacq.
cinerea Lmk.
nivea Vent.
suaveolens.
camara L.
aculeata L.
— flava.

LANTANA
à feuell. ternées. am. m., s. ch. 5
annuel. am. s. ☉
à involucre. am. m., s. ch. 5
à tiges droites. am. m., s. ch. 5
à feuell. de sauge. cap, s. ch. 5
cendré. am. m., s. ch. 5
à fleurs blanches. inde, s. ch. 5
odorant. s. ch. 5
camara. am. m., s. ch. 5 (orn.)
épineux. am. m., s. ch. 5 (orn.)
— jaune.

SPIELMANNIA
africana Wild.

SPIELMANNE
d'Afrique. cap, s. ch. 5

VERBENA
globifera l'her.
triphylla l'her.
mexicana L.
mutabilis Jacq.
jamaicensis L.
indica L.
nodiflora L.
multifida Fl. Per.
aubletia L.
urticifolia L.
caroliniana L.

VERVEINE
à globules. am. m., s. ch. 5
citronelle. chili, or. 5 (orn.)
du Mexique. or. 5
changeante. am. m., s. ch. 5
de la Jamaïque. am. m. ☉
des Indes. ceylan ☉
nodiflore. orient, or. 5
laciniée. pérou. ☉
à bouquets. am. s. ♂
à feuell. d'ortie. am. s. 5
de Caroline. am. s. 5

stricta vent.
paniculata Lmk.
diffusa.
hastata L.
bonariensis L.
bracteosa Mich.
officinalis L.
supina L.

Genera viticibus affinia.

SELAGO

corymbosa L.

HEBENSTREITIA

dentata L.

ORDO VI.

LABIATÆ.

I. Stamina 2 fertilia.

LYCOPUS

europæus L.
exaltatus L.

AMETHYSTEA

cœrulea L.

ZIZIPHORA

capitata L.
tenuior L.
cunila.
pulegioides.
mariana.

MONARDA

fistulosa L.
didyma L.
punctata L.

WESTERINGIA

rosmarinacea Andr. }
cunila fruticosa Wild. }

ROSMARINUS

officinalis L.

SALVIA.

I. Fruticosa.

pomifera L.
officinalis L.

fusciculée. Am. s. ♀
paniculée. Am. s. ♀
étalée. ♀
hastée. Am. s. ♀
de Buénos-Ayres. ♂
à longues bractées. Am. s. ☉
officinale. F. ♀ (méd.)
couchée. F. m. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les gattiliers.

SÉLAGO

corymbifère. cap, or. ♀

HÉBENSTREIT

denté. cap. ♂

ORDRE VI.

LES LABIÉES.

I. 2 étamines fertiles.

LYCOPUS

d'Europe. F. ♀
pinnatifide. Italie. ♀

AMÉTHYSTÉA

bleu. Sibérie. ☉

ZIZIPHORA

à fleurs en tête. orient. ☉
lancéolé. F. m. ☉
cunila. Sibérie. ☉
à feuil. de pouliot. Am. s. ☉
de Virginie. Am. s. ♀

MONARDA

fistuleux. Am. s. ♀ (orn.)
écarlate. Am. s. ♀ (orn.)
punctué. Am. s. ♂

WESTERINGIA

à feuil. de romarin. N. Holl.,
or. ♀

ROMARIN

officinal. F. m. ♀ (orn., méd.)

SAUGE.

I. Tiges ligneuses.

à pommes. crête, or. ♀ (écon.)
officinale. F. m. ♀ (méd.)

— tricolor.
 — variegata.
 tenuior.
 grandiflora *wild.*
 crassifolia.
 cretica *L.*
 sypilea *Lmk.*
 africana *L.*
 paniculata *L.*
 chamædryoides *Cav.*
 aurea *L.*
 canariensis *L.*
 mexicana *L.*
 formosa *L'Her.*
 acetabulosa *L.*
 polystachia *Cav.*
 foetida *Desf.*
 tingitana *wild.* }
 coccinea *L. f.*

2. Caule herbaceo.

pinnata *L.*
 angustifolia *Mich.*
 reptans *Jacq.* }
 angustifolia *Cav.* }
 scabiosæfolia. }
 habliziana *wild.* }
 glutinosa *L.*
 amara *Jacq.* }
 circinata *Cav.* }
 pratensis *L.*
 sclarea *L.*
 patula *Desf.*
 præcox. }
 spinosa *Jacq.* }
 æthyopis *L.*
 austriaca *Jacq.*
 argentea *L.*
 indica *L.*
 bicolor *Desf.*
 ceratophylla *L.*
 ceratophylloides *L.*
 lanigera.
 runcinata *L. f.*
 erosa.
 sylvestris *L.*
 nemorosa *L.*
 virgata *Jacq.*

— de trois couleurs. (orn.)
 — panachée. (orn.)
 de Catalogne. *F. m.* ♪ (méd.)
 à grandes fleurs. ♪
 à feuell. épaisses. ♪
 de Crète. orient, or. ♪
 du mont Sypile. or. ♪
 d'Afrique. cap, or. ♪
 paniculée. cap, or. ♪
 chamædryis. Mexique, or. ♪
 dorée. cap, or. ♪
 des Canaries. or. ♪
 du Mexique. or. ♪
 écarlate. pérrou, s. ch. ♪ (orn.)
 à grand calice. orient, or. ♪
 à plusieurs épis. Mexique, or. ♪
 fétide. Tunis, or. ♪
 rouge. Am. s., s. ch. ♪

2. Tige herbacée.

pennée. orient, or. ♂
 à feuell. étroites. Am. s. ♪
 rampante. N. esp., s. ch. ♪
 à feuell. de scabieuse. Tauri-
 de. ♪
 gluante. F., Alpes. ♪
 amère. Mexique. ♪
 des prés. F. ♪ (méd.)
 sclurée. F. ♂ (méd.)
 étalée. Barbar., or. ♪
 précoce. orient. ☉
 cotonneuse. orient. ♂
 d'Autriche. ♪
 argentée. orient. ♂
 des Indes. ♪
 bicolor. Alger. ♪ (orn.)
 corne de cerf. syrie, or. ♂
 laciniée. sicile, or. ♂
 laineuse. perse, or. ♂
 pinnatifide. cap. ♂
 rongée. ☉
 sauvage. Allemagne. ♪
 des bois. Autriche. ♪
 effilée. orient. ♪

nubica H. K.
 nilotica L.
 disermas L.
 viscosa Jacq.
 verticillata L.
 napifolia L.
 ægyptiaca L.
 horminum L.
 — rubens.
 viridis L.
 nepetifolia.
 verbenaca L.
 lyrata L.
 micrantha.
 serotina Jacq.
 dominica L.
 hispanica L.
 tiliæfolia Vahl.
 nutans L.
 pendula.
 nutans wald. }

COLLINSONIA

canadensis L.

II. Stamina 4, corollæ labium superius nullum aut brevissimum.

AJUGA

orientalis L.
 genevensis L.
 pyramidalis L.
 reptans L.

TEUCRIUM

canariense Link.
 fruticans L.
 rosmarinifolium Link.

betonicum l'Her.

abutyloïdes l'Her.

campanulatum L.
 orientale L.
 chamæpitys L.
 pseudochamæpitys L.

iva L.
 laxmanni L.
 botrys L.

de Nubie. ☉

du Nil. ☉

disermas. syrie. ♀

visqueuse. Italie. ♀

verticillée. F. m. ♀

à feuell. de navét. F. ♀

d'Egypte. orient. ☉

ormin. F. m. ☉

— rouge.

verte. Italie. ☉

à feuell. de cataire. ☉

verveine. F. m. ♂

en lyre. Am. s. ♂

à petites fleurs. ♂

tardive. orient. ♂

des Antilles. s. ch. ♀

d'Espagne. ☉

à feuell. de tilleul. Pérou. ☉

penchee. Russie. ♀

pendante. Russie. ♀

COLLINSONIA

de Canada. ♀

II. 4 étamines, lèvre supérieure de la corolle nulle ou très-courte.

BUGLE

d'orient. or. ♀

de Genève. F. ♀

pyramidale. F. ♀

rampante. F. ♀

GERMANDRÉE

des Canaries. or. ♀

arbrisseau. F. m., or. ♀

à feuell. de romarin. orient,
 or. ♀

à feuell. de bétouine. canaries,
 or. ♀

à feuell. d'abutylon. canaries,
 or. ♀

campanulée. orient. ♀

d'orient. ♀

chamæpitys. F. ☉ (méd.)

faux chamæpitys. barbarie,
 or. ♀

ivette. F. m., or. ♀ (méd.)

de Laxmann. sibérie. ♂

botrys. F. ☉ (méd.)

flavum L.
 lucidum L.
 chamædrys L.
 — major.
 myrthifolium.

marum L.
 multiflorum L.

canadense L.
 massiliense L.
 asiaticum L.
 scorodonia L.
 scordium L.
 montanum L.
 pyrenaicum L.
 aureum schreb. }
 flavicans Lmk. }
 polium L.
 capitatum L.
 spinosum L.

III. Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata.

SATUREIA

globulifera.
 græca L.
 juliana L.
 capitata L.
 thymbra L.
 montana L.
 hortensis L.

HYSSOPUS

officinalis L.
 — myrthifolius.
 lophanthus L.
 nepetoides L.
 ocymifolius Lmk.

NEPETA

cataria L.
 pannonica L.
 nepetella L.
 amethystina.
 longiflora Vent.
 nuda L.
 — alba.
 violacea L.
 crispa Wild.

jaune. Esp. ♀
 luisante. F. m. ♀
 chamædrys. F. ♀ (méd.)
 — élevée.
 à feuell. de myrthe. orient,
 or. ♀
 marum. Esp., or. ♀ (méd.)
 à fleurs nombreuses. Espagne,
 or. ♀
 de Canada. ♀
 de Marseille. F. m., or. ♀
 d'Asie. or. ♀
 des bois. F. ♀ (méd.)
 scordium. F. ♀ (méd.)
 de montagne. F. m., or. ♀
 des Pyrénées. F. ♀
 jaunâtre. F. m., or. ♀
 polium. F. m., or. ♀
 à fleurs en tête. orient, or. ♀
 épineuse. Esp. ♂

III. 4 étamines fertiles, corolle à deux lèvres.

SARIETTE

à globules. Am. s. ♀
 de Grèce. orient, or. ♀
 à feuell. linéaires. orient, or. ♀
 à fleurs en tête. orient, or. ♀
 thymbra. orient, or. ♀
 de montagne. F. ♀
 des jardins. F. ☉ (écon., méd.)

HYSOPE

officinale. F. ♀ (méd.)
 — à feuell. de myrthe.
 renversée. chine. ♀
 à feuell. de cataire. Am. s. ♂
 à grandes bractées. sibérie. ☉

CATAIRE

herbe aux chats. F. ♀ (méd.)
 paniculée. Autriche. ♀
 à feuell. étroites. F. ♀
 améthyste. ♀
 à longues fleurs. orient, or. ♀
 nue. suisse. ♀
 blanche.
 violette. Espagne. ♀
 crépue. orient. ♀

italica L.
reticulata Desf.
tuberosa L.
bipinnata Cav.
multifida L. f. non L. spec. }

d'Italie. ♀
réticulée. barbarie. ♀
tubéreuse. espagne. ♀
bipennée. sibérie. ⊙

PERILLA

ocymoides L.

LAVANDULA

spica L.
— latifolia.
stoechas L.
dentata L.
multifida L.
pinnata L.
elegans.
abrotanoïdes Wild. }

PÉRILLA

à feuell. de basilic. inde. ⊙

LAVANDE

spic. F. m. ♀ (orn., méd.)
— à larges feuell.
stœchas. F. m., or. ♀ (méd.)
dentée. esp., or. ♀
découpée. barbarie, or. ⊙
pennée. madère, or. ♀
élégante. canaries, or. ♀ (orn.)

SIDERITIS.

1. Ebracteata.

cretica L.
canariensis L.
montana L.
romana L.
nigricans Link. }
elegans Wild. }

2. Bracteata.

syriaca L.
perfoliata L.

3. Bracteata bracteis dentatis.

hirsuta L.
fœtida.
scordioides L.
hyssopifolia L.
incana L.
glauca Cav.

SIDÉRITIS.

1. Fleurs sans bractées.

de Crète. or. ♀
des Canaries. or. ♀
de montagne. F. ⊙
de Rome. F. m. ⊙
noirâtre. ⊙

2. Fleurs accompagnées de bractées.

de Syrie. orient. ♀
perfolié. orient. ♀

3. Bractées dentées.

velu. F. ♀
fétide. espagne. ♀
à feuell. de scordium. F. ♀
à feuell. d'hysope. F. ♀
blanc. espagne, or. ♀
glauque. espagne. ♀

BISTROPOGON

canariense l'Her.
punctatum l'Her.

BISTROPOGON

des Canaries. or. ♀
ponctué. canaries, or. ♀

MENTHA.

1. Spicata.

sylvestris L.
viridis L.
rotundifolia L.
crispa L.
piperita L.

MENTHE.

1. Fleurs en épis.

sauvage. F. ♀ (méd.)
verte. F. ♀ (méd.)
ronde. F. ♀ (méd.)
crépue. F. ♀ (méd.)
poivrée. Anglet. ♀ (écon., méd.)

2. *Capitata*.

aquatica L.
citratæ *Wild.*

3. *Verticillatæ*.

sativa L.
gentilis L.
arvensis L.
pulegium L.
cervina L.

HYPTIS

capitata *Jacq.*

GLECOMA

hederacea L.

LAMIUM

orvala L.
hirsutum *Link.*
garganicum L.
purpureum L.
amplexicaule L.
album L.
molle *H. K.*

GALEOPSIS

tetrahit L.
ladanum L.
grandiflora *Wild.*
galeobdolon L.

BETONICA

officinalis L.
hirsuta L.
orientalis L.
alopecuroides L.

STACHYS

sylvatica L.
palustris L.
lanata *Jacq.*
germanica L.
intermedia *H. K.*
palæstina L.
alpina L.
circinata *L'Her.*
nepetifolia.
hirta L.
decumbens.

2. Fleurs en tête.

aquatique. F. Ψ
citronnelle. Eur. Ψ

3. Fleurs verticillées.

cultivée. Eur. Ψ (écon., méd.)
purpurine. Eur. Ψ
des champs. F. Ψ (méd.)
pouliot. F. Ψ (méd.)
fétide. F. m. Ψ

HYPTIS

à fleurs en tête. Am. m., s. ch. Ψ

GLECOMA

lierre-terrestre. F. Ψ (méd.)

LAMIUM

orvale. ital. Ψ
velu. F. Ψ
à feuell. de cataire, ital. Ψ
pourpre. F. $\odot$
amplexicaule. F. $\odot$
blanc. F. Ψ (méd.)
à feuell. entières. Ψ

GALEOPSIS

tétrahit. F. $\odot$
ladanum. F. $\odot$
à grandes fleurs. F. $\odot$
jaune. F. Ψ

BÉTOINE

officinale. F. Ψ (méd.)
velue. F. Ψ
d'orient. Ψ
jaune. F., Alpes. Ψ

STACHYS

des bois. F. Ψ
des marais. F. Ψ
laineux. sibérie. Ψ
cotonneux. F. Ψ
intermédiaire. Am. s. Ψ
de Palestine. or. Ψ
des Alpes. F. Ψ
à feuell. rondes. Barb., or. Ψ
à feuell. de cataire. Ψ
velu. F. Ψ
tombeant. Ψ

arvensis L.
recta L.
annua L.
maritima L.

des champs. F. ☉
crapaudine. F. ♀
annuel. F. ☉
maritime. F. ♂

BALLŌTA

lanata L.
nigra L.

BALLŌTE

laineuse. sibérie. ♀
noire. F. ♀

MARRUBIUM.

1. *Calicibus quinque dentatis.*

alyssum L.
peregrinum L.
candidissimum L.
supinum L.

2. *Calicibus decem dentatis.*

vulgare L.
crispum L.
pseudodictamnus L.
hispanicum Lmk.

MARRUBE.

1. Calice à cinq dents.

alysson. esp., or. ♂
étranger. orient. ♀
très-blanc. orient. ♀
couché. F. m. ♀

2. Calice à dix dents.

commun. F. ♀ (méd.)
crépu. Italie., or. ♀
faux-dictame. orient., or. ♀
d'Espagne. ♀

LEONURUS

marrubiastrum L.
sibiricus L.
cardiaca L.
crispus L.
tataricus L.

CARDIAQUE

à petites fleurs. Allem. ☉
de Sibérie. ♂
officinale. F. ♀ (méd.)
crépu. sibérie. ♀
de Tartarie. ☉

PHLOMIS

fruticosa L.
— angustifolia.
— latifolia.
italica Smith.
purpurea Smith.
lychnitis L.
laciniata L.
herba-venti L.
tuberosa L.
leonurus L.
nepetifolia L.
zeylanica L.
caribæa Jacq.
martinicensis Willd. }

PHLOMIS

arbrisseau. orient. ♀ (orn.)
— à feuell. étroites.
— à larges feuell.
d'Italie. or. ♀
pourpre. esp., or. ♀
à feuell. de sauge. F. m., or. ♀
lacinie. syrie. ♀
violet. F. m. ♀
tubéreux. sibérie. ♀ (orn.)
leonurus. cap, or. ♀ (orn.)
à feuell. de cataire. inde. ☉
de Ceylan. inde. ☉
des Antilles. ☉

MOLUCELLA

levis L.
spinosa L.

MOLUCELLE

lisse. syrie. ☉
épineuse. syrie. ☉

IV. *Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata, calix bilabiatus.* IV. 4 étamines fertiles, corolle et calice à deux lèvres.

CLINOPODIUM

vulgare L.
incanum L.

ORIGANUM

dictamnus L.

vulgare L.
humile.
pallidum.
sipyleum L.
smyrneum L.
ægyptiacum L.
majoranoïdes *Wild.*

THYMUS

serpyllum L.
— villosum.
— citratum.
piperella L.
vulgaris L.
— latifolius.
filifolius *H. K.*
zygis L.
hispanicus.
mastichina L.
alpinus L.
patavinus *Jacq.*
acinos L.
virginicus L.

THYMBRA

spicata L.

MELISSA

officinalis L.
— hirsuta.
arborescens.
grandiflora L.

nepeta L.
calamintha L.
cretica L.

DRACOCEPHALUM

virginianum L.

canariense L.
peregrinum L.

CLINOPODE

commun. F. Ψ
blanc. Am. s. Ψ

ORIGAN

dictame. erète, or. $\mathfrak{h}$ (orn., méd.)
commun. F. Ψ (méd.)
nain. Ψ
pâle. orient. Ψ
du mont Sipyle. orient, or. $\mathfrak{h}$
de Smyrne. orient, or. Ψ
à coquilles. orient, or. $\mathfrak{h}$ (orn.)
marjolaine des jard. orient. $\mathfrak{h}$

THYM

serpolet. F. Ψ
— velu.
— citronelle.
piperelle. esp., or. $\mathfrak{h}$
commun. esp. $\mathfrak{h}$ (orn., méd.)
— à larges feuil.
filiforme. mahon, or. $\mathfrak{h}$
zygis. esp., or. $\mathfrak{h}$
d'Espagne. or. $\mathfrak{h}$
mastichine. esp., or. $\mathfrak{h}$
des Alpes. F. Ψ
de Padoue. σ
acinos. F. $\odot$
de Virginie. Ψ

THYMBRA

à épis. orient, or. $\mathfrak{h}$

MÉLISSE

officinale. F. Ψ (écon., méd.)
— velue.
arborescente. esp. $\mathfrak{h}$
à grandes fleurs. F., Alpes. Ψ
(orn.)
népéta. F. Ψ
calament. F. Ψ (méd.)
de Crète. F. m. Ψ

DRACOCÉPHALUM

de Virginie, ou cataleptique.
Am. s. Ψ (orn.)
des Canaries. or. $\mathfrak{h}$
découpé. sibérie. Ψ

austriacum L.
 ruyschiana L.
 sibiricum L.
 moldavica L.
 canescens L.
 peltatum L.
 nutans L.
 thymiflorum L.

d'Autriche. ♀
à feuell. linéaires. sibérie. ♀
de Sibérie. ♀
moldavique. sibérie. ⊙
blanc. orient. ⊙
en bouclier. orient. ⊙
à fleurs penchées. sibérie. ⊙
à fleurs de thym. sibérie. ⊙

MELLITIS

melissophyllum L.

MELLITIS

à feuell. de mélisse. F. ♀

HORMINUM

pyrenaicum L.

ORMIN

des Pyrénées. F. ♀

PLECTRANTHUS

fruticosus *l'Her.*
 punctatus *l'Her.*

PLECTRANTHUS

arbrisseau. cap, or. ♂
tacheté. Afr. ♂

OCYUM

gratissimum L.
 zeylanicum *medic.*
 grandiflorum *l'Her.*

BASILIC

suave. inde, s. ch. ♂
de Ceylan. s. ch. ♂
à grandes fleurs. Arabie,
s. ch. ♂
à petites fleurs. inde. ⊙
cultivé. inde. ⊙ (orn.)
— lacinie.
— bulleux.
nain. ceylan ⊙ (orn.).

SCUTELLARIA

orientalis L.
 fruticosa.
 lupulina L.
 alpina L.
 lateriflora L.
 galericulata L.
 minor L.
 integrifolia L.
 peregrina L.
 altissima L.
 albida L.

SCUTÉLLAIRE

d'orient. or. ♂
arbrisseau. perse. ♂
jaune pâle. sibérie. ♀
dés Alpes. F. ♀
à grappes. Am. s. ♀
toque. F. ♀
petite. F. ♀
à feuell. entières. Am. s. ♀
étrangère. Italie. ♀
élevée. orient. ♀
blanche. orient. ♀

PRUNELLA

vulgaris L.
 grandiflora L.
 laciniata L.
 hyssopifolia L.
 ovata.

BRUNELLE

commune. F. ♀
à grandes fleurs. F. ♀
laciniee. F. ♀
à feuell. d'hysope. F. m. ♀
à feuell. ovales. Am. s. ♀

CLEONIA

lusitanica L.

CLEONIA

de Portugal. ⊙

PRASIUM

majus L.
minus L.

PRASIUM

arbrisseau. F. m., or. ♀
herbacé. Italie, or. ♀

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA

globosa Lmk.
salvifolia H. K.

SCOPARIA

dulcis L.

CAPRARIA

biflora L.

HALLERIA

lucida L.

SCROPHULARIA

nodosa L.
aqualica L.
betonicifolia L.

auriculata L.
altaica Murr.
scorodonia L.
sambucifolia L.
mellifera Vahl.

trifoliata L.
levigata Vahl.
appendiculata Jacq. }

orientalis L.
vernalis L.
peregrina L.
glabrata Jacq.
lucida L.
canina L.
frutescens L.

DODARTIA

orientalis L.

LINARIA (*Antirrhinum* L.).

I. Foliis angulatis.

cymbalaria.
pilosa.

ORDRE VII.

LES SCROPHULAIRES.

I. 4 étamines didynames.

BUDLÉIA

à globules. Chili. ♀ (orn.)
à feuell. de sauge. cap., or. ♀

SCOPARIA

doux. Am. m., s. ch. ♀

CAPRARIA

à deux fleurs. Am. m., s. ch. ♀

HALLERIA

luisant. cap., or. ♀

SCROPHULAIRE

des bois. F. ♀ (méd.)
aquatique. F. ♂ (méd.)
à feuell. de bétoune. Portugal,
or. ♀

auriculée. Alger. ♀

de Sibérie. ♀

scorodonia. Italie, or. ♀

à feuell. de sureau. orient. ♀

mellifère. Barbarie. ♀

à trois feuell. Barbarie. ♀

d'orient. ♀

printanière. F. ♂

étrangère. Italie. ☉

glabre. Canaries. ♂

luisante. orient., or. ♀

laciniée. F. ♀

arbrisseau. Tunis. ♀

DODARTIA

d'orient. ♀

LINAIRE.

I. Feuilles anguleuses.

cymbalaire. F. ♀ (méd.)

velue. Alpes. ♀

elatine.
 spuria.
 cirrhosa.
 ægyptiaca.

2. *Foliis inferioribus oppositis.*

triphylla,
 triornithophora.

reticulata *Desf.* }
 pinifolia *Poiret.* }
 purpurea.
 bipartita *Vent.*
 versicolor.
 repens.
 marginata *Desf.*
 supina.
 arvensis.
 simplex *Wild.*
 pelisseriana.
 multicaulis.
 juncea *Link.* }
 spartea *Cav.* }
 alpina.
 elegans.
 organifolia.
 minor.
 pubescens.

3. *Foliis alternis.*

hirta.
 genistifolia.
 vulgaris.
 chalepensis.
 canadensis.

ANTIRRHINUM

majus *L.*
 orontium *L.*
 molle *L.*
 sempervirens *Lapeyr.*
 asarina *L.*

ANARRHINUM (*Antirrhinum L.*)
 bellidifolium.

NEMESIA *Vent.*

foetens *Vent.*
 chamædrifolia *Vent.* }
 antirrhinum macrocarpum *H. & A.* }

elatine. *F.* ☉
 velvete. *F.* ☉
 à vrilles. Égypte. ☉
 d'Égypte. ☉

2. Feuilles inférieures opposées.

à feuell. ternées. Tunis. ☉
 à grandes fleurs. Portugal. ☉
 (orn.)

à réseau. Barbarie. ☿
 pourpre. *F.* ☿ (orn.)
 à fleurs d'orchis. Maroc. ☉
 bigarrée. *F.* ☉
 rampante. *F.* ☿
 membraneuse. Barbarie, or. ☿
 couchée. *F.* ☉
 des champs. *F.* ☉
 à tiges simples. *F.* ☉
 de pelisser. *F.* ☉
 paniculée. orient. ☉
 jonciforme. Esp. ☉
 des Alpes. *F.* ♂
 élégante. Esp. ☉
 à feuell. d'organ. *F. m.* ☉
 petite. *F.* ☉
 pubescente. ☉

3. Feuilles toutes alternes.

velue. Esp. ☉
 à feuell. de genet. Suisse. ☿
 commune. *F.* ☿
 à long éperon. *F.* ☉
 de Canada. ☉

MUFLIER

des jardins. *F.* ♂ (orn.)
 tête de mort. *F.* ☉
 à feuell. molles. Esp., or. ♀
 toujours vert. *F. m.*, or. ♀
 asarine. *F.* ☿

ANARRHINUM

à feuell. de paquerette. *F.* ♂

NEMESIA.

fétide. cap, or. ♀
 à feuell. de chamædrys. cap,
 or. ☿

DIGITALIS

canariensis L.
 purpurea L.
 ambigua L.
 lutea L.
 ferruginea L.
 parviflora Jacq. }
 ferruginea Lmk. }
 orientalis Lmk. }
 lanata Wild. }
 obscura Z.

II. Stamina 2.**CALCEOLARIA**

pinnata Z.

III. Genera scrophulariis affinia.
*Oppositifolia.***COLUMNÆA**

humilis Lmk.

GRATIOLA

officinalis Z.

MIMULUS

ringens Z.
 glutinosus Wild. }
 aurantiacus Curt. }

LINDERNIA

pyxidaria Z.

IV. Folia alterna.**BROWALLIA**

elata Z.
 demissa Z.

ORDO VIII.**SOLANÆÆ.****I. Fructus capsularis.****CELSIA**

orientalis Z.
 arcturus Z.
 cretica Z.
 heterophylla.

HEMITOMUS

fruticosus L'Her.

DIGITALE

des Canaries. or. ♂ (orn.)
 pourpre. F. ♂ (orn., méd.)
 ambiguë. F., Alpes. ♀
 jaune. F. ♀
 rouillée. Italie. ♀ (orn.)

à petites fleurs. ♂

d'orient. ♀

à feuell. étroites. Esp., or. ♂

II. 2 étamines.**CALCÉOLAIRE**

pennée. Pérou. ☉

III. Genres qui ont de l'affinité avec les
scrophulaires. Feuilles opposées.**COLUMNÆA**

écarlate. Am. m. ♀

GRATIOLE

officinale. F. ♀ (méd.)

MIMULUS

à deux lèvres. Am. s. ♀

glutineux. or. ♂

LINDERNIA

pyxidaire. F. ☉

IV. Feuilles alternes.**BROWALLE**

droite. Pérou. ☉

tombante. Am. m. ☉

ORDRE VIII.**LES SOLANÉES.****I. Une capsule.****CELSIA**

d'orient. ☉
 arcturus. orient, or. ♂
 de Crète. or. ♂
 à feuell. variables. or. ♂

HÉMITOMUS

arbrisseau. Pérou, s. ch. ♂
 (orn.)

VERBASCUM

thapsus z.
 thapsoïdes z.
 phlomoïdes z.
 lychnitis z.
 — album.
 mucronatum *zmk.*
 nigrum z.
 sinuatum z.
 undulatum *zmk.*
 phoeniceum z.
 blattaria z.
 — alba.
 blattarioïdes *zmk.*
 spinosum z.
 myconi z.

HYOSCIAMUS

niger z.
 reticulatus z.
 albus z.
 datora *Forsk.*
 betonicaefolius *zmk.* }
 aureus z.
 pusillus z.
 physalodes z.
 scopolia z.

NICOTIANA

tabacum z.
 fruticosa z.
 glutinosa z.
 rustica z.
 paniculata z.
 crispa.
 undulata *vent.*

DATURA

stramonium z.
 ferox z.
 tatula z.
 fastuosa z.
 metel z.
 humilis.
 ceratocaula *jacq.*
 levis z.
 arborea z.

MOLÈNE

commune. F. ♂ (méd.)
 thapsoïde. eur. ♂
 phlomoïde. F. ♂
 cunéiforme. F. ♀
 — blanche.
 pointue. orient. ♂
 noire. F. ♀
 sinuée. F. m. ♂
 ondée. orient, or. ♀
 bleue. carniol. ♂
 blattaire. F. ⊙
 — blanche.
 fausse blattaire. F. ⊙
 épineuse. orient, or. ♀
 sans tige. F., pyrénées. ♀

JUSQUIAME

noire. F. ♂ (vén.)
 réticulée. orient. ♂
 blanche. F. m. ⊙
 datora. Égypte, or. ♂
 jaune. orient, or. ♀
 grêle. orient. ⊙
 faux coqueret. sibérie. ♀
 de Scopol. ital. ♀

NICOTIANE

tabac. am. m. ⊙ (écon., méd.)
 arbrisseau. chine, or. ♀
 gluante. pérou. ⊙
 rustique. am. m. ⊙ (écon. méd.)
 paniculée. pérou. ⊙ (écon.)
 crépue. pérou. ⊙
 ondée. n. holl., or. ♂

DATURA

épineux. F. ⊙ (vén.)
 à grosses épines. chin. ⊙ (vén.)
 tatula. as. ⊙
 violet. Égypte. ⊙ (orn.)
 metel. asie. ⊙
 nain. ⊙
 cornu. cuba. ⊙
 à fruit lisse. abyssin. ⊙ (vén.)
 en arbre. chili, or. ♀ (orn.)

II. *Fructus baccatus.*

SOLANDRA

grandiflora swartz. }
datura sarmentosa zmk. }

ATROPA

mandragora z.
belladonna z.
solanacea z.
aristata H. K.
arborescens z.
cestrum campanulatum zmk. }
frutescens z.
procumbens cav.

NICANDRA

physalodes.

PHYSALIS.

1. *Perennes.*

somnifera z.
arborescens z.
barbadensis Jacq.
incana.
curassavica L.
pensylvanica z.
alkekengi z.

2. *Annua.*

prostrata l'Her.
angulata z.
pubescens z.
philadelphica zmk.

SOLANUM.

1. *Inermia.*

lycopersicum z.
pseudolycopersicum Jacq.
peruvianum z.
dulcamara z.
triquetrum cav.
crassifolium zmk.
quercifolium z.
radicans z.
corymbosum Jacq.
nigrum z.
 — *villosum.*
 — *guineense.*
 — *virginicum.*
nodiflorum Jacq.
tuberosum z.

II. *Une baie.*

SOLANDRA

à grandes fleurs. Am. m.,
s. ch. h

ATROPA

mandragore. F. m. ψ (vén.)
belladone. F. ψ (vén.)
à feuil. de solanum. cap, or. h
barbu. canaries, or. h
en arbre. Am. m., s. ch. h
arbrisseau. Esp., or. ψ
couché. Mexique. ⊙

NICANDRA

du Pérou. ⊙

COQUERET.

1. *Vivaces.*

somnifère. Esp., or. h
en arbre. Am. m., s. ch. h
des Barbades. Am. m., s. ch. ψ
blanc. s. ch. ψ
de Curaçao. Am. m., or. h
de Pensylvanie. ψ
alkekengi. F. ψ (méd.)

2. *Annuels.*

couché. Pérou. ⊙
anguleux. inde. ⊙
pubescent. inde. ⊙
à gros fruit. Am. s. ⊙

SOLANUM.

1. *Point d'aiguillons.*

tomate. Am. m. ⊙ (alim.)
fausse tomate. Am. m. ⊙
du Pérou. s. ch. h
douce-amère. F. h (méd.)
triangulaire. N. Esp., s. ch. h
à feuil. épaisses. cap, or. h
à feuil. de chêne. Pérou, or. ψ
rampant. Pérou, or. ψ
corymbifère. Pérou, or. ψ
noir. F. ⊙ (méd.)
 — *velu.*
 — *de Guinée.*
 — *de Virginie.*
nodiflore. île de F., s. ch. h
pomme de terre. Pér. ψ (alim.)

reclinatum *l'Her.* }
 pinnatifidum *Lmk.* }
 macrocarpon *L.*
 æthiopicum *L.*
 diphyllum *L.*
 pseudocapsicum.

aggregatum *Jacq.*
 laurifolium *L. f.*

verbascifolium *L.*

auriculatum *Lmk.*
 bonariense *L.*
 grandiflorum.
 betaceum *Cav.*

2. *Aculeata.*

melongena *L.*
 — ovifera.
 fuscum *Lmk.*
 æthiopicum *L.*
 mammosum *L.*
 capsicoides. }
 ciliatum *Lmk.* }
 aculeatissimum *Jacq.*
 sodomæum *L.*
 virginianum *Jacq.*
 sarmentosum *Lmk.* }
 lanceæfolium *Jacq.* }
 giganteum *Jacq.*
 marginatum *L.*
 tomentosum *L.*
 coccineum *Jacq.*
 polygamum *Vahl.*
 elæagnifolium *Cav.*

leprosum *ortega.*
 bahamense *L.*
 igneum *L.*
 pyracantha *Lmk.*
 polyacanthos *Lmk.*
 caroliniense *Jacq.*
 milleri *Jacq.*
 stramonifolium *Jacq.*

cuneifolium *Jacq.*
 lycioides *L.*

récliné. pérou, s. ch. ♂

à gros fruit. pérou, s. ch. ♀
d'Ethiopie. ☉

à deux feuell. am. m., s. ch. ♀
faux piment. madère, or. ♀
 (orn.)

aggrégé. guinée, s. ch. ♀
à feuell. de laurier. inde,
 s. ch. ♀

à feuell. de molène. am. m.,
 s. ch. ♀

auriculé. île de f., s. ch. ♀

à bouquets. or. ♀ (orn.)

à grandes fleurs. ♀

à feuell. de bette. pérou, s. ch. ♀

2. Tiges garnies d'aiguillons.

melongène. am. m. ☉ (alim)

— ovifère.

brun. am. m. ☉

d'Ethiopie. ☉

pomme de teton. am. m. ☉

faux piment. ☉

très-épineux. am. m. ♀

hérissé. cap, or. ♀

de Virginie. ☉

sarmenteux. am. m., s. ch. ♀

gigantesque. cap., s. ch. ♀

blanc. abyssinie, s. ch. ♀

cotonneux. éthiopie, s. ch. ♀

écarlate. as., s. ch. ♀

polygame. am. m., s. ch. ♀

à feuell. de chalef. am. m.,
 s. ch. ♀

lépreux. chili, s. ch. ♀

de Bahama. am. m., s. ch. ♀

couleur de feu. am. m., s. ch. ♀

de Madagascar. s. ch. ♀

polyacanthos. am. m., s. ch. ♀

de Caroline. ♀

de Miller. cap., s. ch. ♀

à feuell. de stramoine. inde,
 s. ch. ♀

cunéiforme. am. m., s. ch. ♀

faux lycium. pérou, or. ♀ (orn.)

CAPSICUM

grossum L.
— deflexum.
annuum L.
conicum.
frutescens L.
violaceum.
cerasiforme L.
baccatum L.

LYCIUM

afrum L.
europæum L.
carnosum.
barbarum L.
chinense *Link.*
boerhaaviaefolium L. *f.*

CESTRUM

nocturnum L.
diurnum L.
laurifolium *l'Her.*

macrophyllum.

auriculatum *l'Her.*
vespertinum L.
alaternoïdes.
parqui *l'Her.*

III. *Genera solaneis affinia.*

BONTIA

daphnoïdes L.

BRUNSFELSIA

americana L.

CRESCENTIA

cujete L.

ORDO IX.

BORRAGINÆÆ.

I. *Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.*

CORDIA

sebestena L.

PIMENT

irrégulier. inde, s. ch. ♂ (écon.)
— abaissé.
annuel. Am. m. ☉ (écon.)
conique. s. ch. ♂
arbrisseau. inde, s. ch. ♀ (éc.)
violet. chine, s. ch. ♂
cerise. s. ch. ♀
baccifère. inde, s. ch. ♀ (écon.)

LYCIUM

d'afrique. esp., or. ♀
d'Europe. f. m., or. ♀
charnu. or. ♀
lancéolé. chine. ♀ (orn.)
de Chine. ♀
glaucue. pérou, or. ♀

CESTRUM

de nuit. Am. m., s. ch. ♀
de jour. chili, s. ch. ♀
à feuell. de laurier. Am. m.,
s. ch. ♀
à grandes feuell. Am. m.,
s. ch. ♀
auriculé. pérou, s. ch. ♀
à fruit noir. Am. m., s. ch. ♀
à feuell. d'alaterne. Am. m. ♀
parqui, chili. ♀

III. Genres qui ont de l'affinité avec les solanées.

BONTIA

à feuell. de daphné. Am. m.,
s. ch. ♀

BRUNSFELSIA

d'Amérique. Am. m., s. ch. ♀

CALEBASSIER

des Antilles. s. ch. ♀ (écon.)

ORDRE IX.

LES BORRAGINÉES.

I. Graines dans une baie, tiges ligneuses.

CORDIA

sébestier. égypte, s. ch. ♀
(méd., alim.)

mixa L.
dentata *vahl.*
gerascanthus L.

macrophylla L.

nitida *vahl.*

parviflora *ortega.*
scabra.
sebestena *andr.* }

à feuell. lisses. ég., s. ch. h
denté. am. m., s. ch. h
à feuell. de verveine. am. m.,
s. ch. h
à grandes feuell. am. m.,
s. ch. h
à feuell. luisantes. am. m.,
s. ch. h
à petites fleurs. n. esp., s. ch. h
à feuell. rudes. am. m., s. ch. h

EHRETIA

tinifolia L.

beurreria L.

EHRÉZIA

à feuell. de laurier-tin. am. m.,
s. ch. h
de Beurrer. am. m., s. ch. h

VARRONIA

martinicensis L.

mirabilioïdes *jacq.*

corymbosa L.

VARRONIA

de la Martinique. am. m.,
s. ch. h
à grandes fleurs. am. m.,
s. ch. h
corymbifère. am. m., s. ch. h

TOURNEFORTIA

volubilis L.

humilis L.

scabra *lmk.*

arborescens *lmk.*

laurifolia *vent.*

mutabilis *vent.*

TOURNEFORTIA

sarmenteux. am. m., s. ch. h

nain. am. m., s. ch. h

rude. am. m., s. ch. h

arbre. inde, s. ch. h

à feuell. de laurier. am. m.,
s. ch. h

à fleurs changeantes. inde,
s. ch. h

MESSERCHMIDIA

argusia L.

fruticosa L.

angustifolia *lmk.*

II. *Fructus uni aut bicapsularis.*

MESSERCHMIDIA

arguse. sibérie. v

arbrisseau. canaries, or. h

à feuell. étroites. canar., or. h

II. Une ou deux capsules.

ELLISIA

nyctelea.

ELLISIA

de Virginie. o

HYDROPHYLLUM

virginicum L.

canadense L.

HYDROPHYLLUM

de Virginie. am. s. v

de Canada. am. s. v

DICHONDRA

caroliniensis *mich.*

DICHONDRA

de Caroline. am. s., or. v

CERINTHE

major L.

aspera *roth.*

minor L.

MELINET

à grandes fleurs. f. m. o

à feuell. rudes. f. o

à fleurs aiguës. f. m. o

III. *Fructus gymnotetraspermus*, faux
corolla nuda.

III. 4 graines nues au fond du calice,
entrée de la corolle nue.

HELIOTROPIUM

peruvianum L.
indicum L.
europæum L.
villosum Willd.
parviflorum L.
supinum L.
curassavicum L.

HÉLIOTROPE

du Pérou. s.ch. ♀ (orn.)
des Indes. ☉
d'Europe. F. ☉ (méd.)
soyeuse. orient. ☉
à petites fleurs. inde. ☉
couchée. F. ☉
de Curaçao. Am. m., or. ♂

ECHIMUM.

1. Herbacea.

vulgare L.
pyrenaicum L.
australe Lmk.
plantagineum. }
creticum Lmk. }
prostratum }
creticum Forsk. }

2. Fruticosa.

candicans Jacq.
strictum H. K.

1. Tiges herbacées.

commune. F. ♂ (méd.)
des Pyrénées. F. ♂
rouge. orient. ☉
à feuell. de plantain. italie. ☉
couchée. égypte. ♀

2. Tige ligneuse.

blanchâtre. canaries, or. ♀
serrée. canaries, or. ♀

LITHOSPERMUM

arvense L.
officinale L.
purpureocœruleum L.
orientale L.
decumbens Vent.
fruticosum L.
callosum Vahl.

GRÉMIL

des champs. F. ☉
officinal. F. ♀ (méd.)
bleu pourpre. F. ♀
d'orient. ♀
tombeant. perse. ☉
arbrisseau. F. m., or. ♀
calleux. égypte, or. ♀

PULMONARIA

officinalis L.
angustifolia L.
virginica L.
sibirica L.
maritima L.

PULMONAIRE

officinal. F. ♀ (méd.)
à feuell. étroites. F. ♀
de Virginie. Am. s. ♀
de Sibérie. ♀
maritime. F. ☉

ONOSMA

echioides L.
simplicissima L.

ONOSMA

à feuell. de vipérine. F. ♂
à tige simple. sibérie. ♂

IV. *Fructus gymnotetraspermus*, faux
corolla instructa squamis ♀.

IV. 4 graines au fond du calice. tube de
la corolle couronné de 5 écailles.

SYMPHYTUM

officinale L.
tuberosum L.

CONSOUDE

officinale. F. ♀ (méd.)
tubéreuse. F. ♀

LYCOPSIS

- arvensis L.
— undulata.
orientalis L.

ECHIOIDES (Lycopsis L.)

- nigricans.
rubra.

MYOSOTIS

- nana *Willd.*
scorpioides L.
palustris L.
lappula L.
apula L.

ANCHUSA

- italica *Retz.*
angustifolia L.
barrelieri *All.*
tinctoria L.
sempervirens L.
verrucosa *Lmk.*

BORAGO

- officinalis L.
orientalis L.
indica L.
africana L.

ASPERUGO

- procumbens L.

CYNOGLOSSUM

- officinale L.
apenninum L.
montanum *Lmk.*
cheirifolium L.
linifolium L.
omphalodes L.

NOLANA

- prostrata L.

ORDO X.**CONVOLVULI.****CONVOLVULUS.**

1. *Caule volubili.*
arvensis L.
sepium L.

LYCOPSIS

- des champs. F. ☉
— ondulé.
d'orient. ☉

ECHIOIDES

- noir. ital. ☉
rouge. ital. ☉

MYOSOTIS

- nain. F. ☉
des champs. F. ☉
des marais. F. ♀
hérissé. F. ☉
jaune. ital. ☉

BUGLOSE

- officinale. ♀ (méd.)
à feuell. étroites. orient. ♀
de barrelier. Alpes. ♀
orcanette. F. m., or. ♀ (arts.)
toujours verte. Espagne. ♀
tuberculeuse. Égypte. ☉

BOURRACHE

- officinale. F. ☉ (méd.)
d'orient. ♀
des Indes. ☉
d'Afrique. ☉

RAPETTE

- couchée. F. ☉

CYNOGLOSSUM

- officinale. F. ♂ (méd.)
des Apennins. ♂
de montagne. F., Alpes. ♀
à feuell. de cheiri. orient. ♂
à feuell. de lin. esp. ☉
omphalodès. F. ♀ (orn.)

NOLANA

- couchée. Pérou, or. ♂

ORDRE X.**LES LISERONS.****LISERON.**

1. Tige grimpante.
des champs. F. ♀
des haies. F. ♀ (méd.)

inflatus.

panduratus L.

farinosus L.

batatas L.

nervosus Lmk.

canariensis L.

jalapa L.

ipomœa macrorrhiza Mich. }

althæoides L.

pentaphyllus L.

cairicus L.

dissectus L.

hermanniæ l'Her. }

crenatus Jacq. }

fruticulosus Lmk.

sibiricus L.

ebracteatus Lmk.

siculus L.

2. Caule non volubili.

pentapetaloides L.

evolvuloïdes Desf.

lineatus L.

cneorum L.

oleæfolius Lmk.

cantabrica L.

pilosellæfolius Lmk.

dorycnium L.

tricolor L.

pes-capræ L.

soldanella L.

IPOMŒA

quamoclit L.

coccinea L.

luteola Jacq.

leucantha Jacq.

bona-nox L.

tuberculosa.

stipulacea Jacq.

convolvulus tuberculosus Lmk. }

triloba L.

hederacea.

nil.

quinqueloba.

purpurea.

renflé. Am. s. ♀ (orn.)

sinué. Am. s. ♀

farineux. madère, or. ♂

patate. Am. m., s. ch. ♀ (alim.)

à nervures. inde, s. ch. ♂

des Canaries. or. ♂

jalap. Mexique, or. ♀ (méd.)

à feuell. de guimauve. F. m.,

or. ♀

à 5 feuell. Am. m. ⊙

du Caire. ⊙

découpé. Am. m. ⊙

à feuell. d'hermannia. pér. ♀

fruticuleux. canaries, or. ♂

de Sibérie. ⊙

sans bractées.

de Sicile. ⊙

2. Tige non grimpante.

à 5 divisions. Italie. ⊙

évolvulus. Barbarie. ⊙

rayé. F. m., or. ♀

satiné. orient, or. ♂ (orn.)

à feuell. d'olivier. orient, or. ♂

(orn.)

linéaire. F. ♀

à feuell. de piloselle. orient. ♂

dorycnium. orient. ♂

tricolor. esp. ⊙ (orn.)

ped de chèvre. inde. ♀

soldanelle. F. ♀ (méd.)

IPOMŒA

quamoclit. inde. ⊙ (orn.)

écarlate. Am. m. ⊙

jaune. Am. m. ⊙

à fleurs blanches. Am. m. ⊙

épineux. Am. m. ⊙

tuberculeux. île de F., s. ch. ♀

à 3 lobes. Am. m. ⊙

à feuell. de lierre. Am. m. ⊙

nil. Am. m. ⊙

à 5 lobes. ♀

pourpre. Am. m. ⊙ (orn.)

EVOLVULUS
 Alsinoïdes L.
 linifolius L.

CRESSA
 cretica L.

Genera convolvulis affinia.

CUSCUTA
 europæa L.
 — epithymum.

ORDO XI.

POLEMONIA.

PHLOX
 suaveolens H. K.
 glaberrima L.
 paniculata L.
 divaricata Wild.
 maculata L.
 setacea L.
 reptans Mich.

POLEMONIUM
 cœruleum L.
 reptans L.

COBÆA
 scandens Cav.

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

CHELONE
 glabra L.
 pentstemon L.
 barbata Cav.
 campanulata Cav.

SESAMUM
 orientale L.

BIGNONIA.

1. *Foliis simplicibus.*

catalpa L.
 quercus Lmk.

sempervirens L.

EVOLVULUS
 à feuell. d'alsiné. inde. ☉
 à feuell. de lin. Antilles. ☉

CRESSA
 de Crète. orient, or. ☿

Genres qui ont de l'affinité avec les
 liserons.

CUSCUTE
 d'Europe. F. ☉
 — épithym. F. ☉

ORDRE XI.

LES POLÉMOINES.

PHLOX
 odorant. Am. s. ☿
 glabre. Am. s. ☿
 paniculé. Am. s. ☿ (orn.)
 étalé. Am. s. ☿
 tacheté. Am. s. ☿ (orn.)
 à feuell. étroites. Am. s. ☿
 rampant. Am. s. ☿

POLÉMOINE
 bleue. Eur. ☿ (orn.)
 rampante. Am. s. ☿ (orn.)

COBÆA
 sarmenteux. chili, or. ♀

ORDRE XII.

LES BIGNONES.

CHELONE
 glabre. Am. s. ☿ (orn.)
 à 5 étamines. Am. s., or. ☿
 barbue. Mexique. ☿
 campanulée. Mexique. ☿

SÉSAME
 d'orient. ☉ (écon.)

BIGNONE.

1. Feuilles simples.

catalpa. Am. s. ♀ (orn.)
 à feuell. de chêne. Am. m.,
 s. ch. ♀
 toujours verte. Am. s. ♀

2. *Foliis conjugatis.*

unguis L.
capreolata L.
crucigera L.

3. *Foliis digitatis.*

pentaphylla L.
leucoxylon L.

4. *Foliis pinnatis.*

radicans L.
stans L.
pandorana Andr.

MARTYNIA

proboscidea H. K.
angulosa Lmk.
perennis L.

ORDO XIII.

GENTIANÆ.

I. *Capsula simplex, unilocularis.*

GENTIANA.

1. *Corollis quinquefidis, subcampaniformibus.*

lutea L.
asclepiadea L.
pneumonanthe L.
acaulis L.
amarella L.

2. *Corollis quadrifidis.*

campestris L.
cruciata L.

SWERTIA

perennis L.

CHLORA

perfoliata L.

II. *Capsula simplex bilocularis.*

CHIRONIA

decussata Vent.

frutescens L.
linoïdes L.
baccifera L.

2. Feuilles conjuguées.

à griffes. Am. m., s. ch. ♀
à vrilles. Am. m., s. ch. ♀
crucifère. Am. s., or. ♀

3. Feuilles digitées.

à 5 feuell. Am. m., s. ch. ♀
à bois blanc. Am. m., s. ch. ♀

4. Feuilles pennées.

grimpante. Am. s. ♀ (orn.)
droite. Am. m., s. ch. ♀ (orn.)
pandorana. île norfolk, or. ♀

MARTYNIA

à fruit cornu. Am. m. ☉
anguleux. Mexique. ☉
vivace. Am. m., s. ch. ♀

ORDRE XIII.

LES GENTIANES.

I. Capsule simple, à une loge.

GENTIANE.

1. Corolles presque en cloche, à cinq divisions.

jaune. F., Alpes. ♀ (méd.)
à feuell. d'asclépias. F., Alp. ♀
pneumonanthe. F. ♀
sans tige. F., Alpes. ♀ (orn.)
amarella. F. ☉

2. Corolle à quatre divisions.

des champs. F. ☉
croisette. F. ♀

SWERTIA

vivace. F., Alpes. ♀

CHLORA

perfolié. F. ☉

II. Capsule simple biloculaire.

CHIRONIA

à feuell. en croix. cap, or. ♀
(orn.)
arbrisseau. cap, or. ♀ (orn.)
à feuell. de lin. cap, or. ♀
baccifère. cap, or. ♀

centaurium.

— minus.

filiformis.

petite centaurée. F. ☉ (méd.)— *naine.**filiforme.* F. ☉III. *Capsula didyma bilocularis.*

III. Capsule didyme, à deux loges.

SPIGELIA

anthelmia L.

marylandica L.

SPIGÉLIA

anthelmia. Am. m. ☉*de Maryland.* Am. s. ☿

ORDO XIV.

ORDRE XIV.

A P O C I N E Æ.

L E S A P O C I N É E S.

I. *Germen duplex, fructus bifollicularis, semina non papposa.*

I. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines sans aigrettes.

VINCA

major L.

minor L.

rosea L.

PERVENCHE

grande. F. ♀ (méd., orn.)*petite.* F. ♀ (orn.)*rose.* inde, s. ch. ♀ (orn.)

TABERNÆMONTANA

amsonia L.

citrifolia L.

nervosa.

TABERNÆMONTANA

amsonia. Am. s. ☿*à feuell. de citronier.* Am. m.,

s. ch. ♀

à grosses nervures. Am. m.,

s. ch. ♀

CAMERARIA

latifolia L.

CAMÉRARIA

à larges feuell. Am. m., s. ch. ♀

PLUMERIA

rubra L.

alba L.

PLUMÉRIA

rouge. Am. m., s. ch. ♀*blanc.* Am. m., s. ch. ♀II. *Germen duplex, fructus bifollicularis, semina papposa.*

II. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines aigrettées.

NERIUM

oleander L.

— album.

— odoratum.

NÉRIUM

laurier rose. orient, or. ♀ (orn.)— *blanc.* (orn.)— *odorant.* (orn.)

ECHITES

corymbosa L.

suberecia L.

ECHITÈS

corymbifère. Am. m., s. ch. ♀*droit.* Am. m., s. ch. ♀

STAPELIA

hirsuta L.

grandiflora Mass.

asterias Mass.

cæspitosa Mass.

papillosa Dec.

STAPÉLIA

velu. cap, s. ch. ♀*à grandes fleurs.* cap, s. ch. ♀*astérias.* cap, s. ch. ♀*touffu.* cap, s. ch. ♀*mamelonné.* cap, s. ch. ♀

variegata L.
reticulata Mass.

PERIPLOCA

græca L.
angustifolia Bill.

APOCYNUM

androsæmifolium L.
cannabinum L.
hypericifolium H. K.
venetum L.

CYNANCHUM

prostratum Cav.
acutum L.
monspeliacum L.
melanthos Vahl.
caroliniense Jacq.
erectum L.
mauritianum.

ASCLEPIAS

vincetoxicum L.
nigra L.
nivea L.
curassavica L.
incarnata L.
tuberosa L.
amoena L.
linaria Cav.
mexicana Cav.
fruticosa L.
syriaca L.
gigantea L.
arborescens L.

III. *Germen simplex, fructus baccatus, aut rarius capsularis.*

RAUWOLFIA

nitida L.
canescens L.

CERBERA

thevetia L.

CARISSA

bispinosa.

STRYCHNOS

nux vomica L.

panaché. cap, s. ch. 5
à réseau. cap, s. ch. 5

PÉRIPOCA

de Grèce. orient. 5
à feuell. étroites. tunis, or. 5

APOCIN

gobe-mouche. Am. s. 7
à fleurs vertes. Am. s. 7
à feuell. d'hypericum. Am. s. 7
denté. Italie. 7

CYNANCUM

couché. Mexique, s. ch. 7
aigu. F. m. 7
de Montpellier. F. m. 7
à fleurs noires.
de Caroline. Am. s., or. 7
droit. Syrie, 5
de l'Isle de France. s. ch. 5

ASCLÉPIAS

dompte-venin. F. 7 (méd.)
noir. F. m. 7
blanc. Am. s., or. 7
de Curacao. s. ch. 5
incarnat. Am. s. 7
tubéreux. Am. s., or. 7
rose. Am. s. 7
à feuell. de linair. or. 7
du Mexique. or. 7
arbrisseau. Tunis, or. 5
à la ouate. Am. s. 7 (arts.)
à grandes fleurs. Ég., s. ch. 5
arbre. cap, s. ch. 5

III. Un seul ovaire, une baie, ou plus rarement une capsule.

RAUWOLFIA

à feuell. luisantes. Am. m.,
s. ch. 5
blanchâtre. Am. m., s. ch. 5

CERBÉRA

thévétia. Am. m., s. ch. 5

CARISSA

bifurqué. cap, s. ch. 5

STRYCHNOS

noix vomique. inde, s. ch. 5

THEOPHRASTA
americana L.

THÉOPHRASTA
d'Amérique. am. m., s. ch. 5

ORDO XV.

SAPOTÆ.

SIDEROXYLON

melanophleum L. }
laurifolium Lmk. }
atrovirens Lmk.
lycioides L.
tenax Lmk.
spinosum L.

CHRYSOPHYLLUM

glabrum L.
cainito L.
argenteum Jacq.

ACHRAS

sapota L.

MYRSINÆ

africana L.
retusa H. K.

ORDRE XV.

LES SAPOTILLIERS.

BOIS-FER

à feuell. de laurier. inde, s. ch. 5
vert sombre. am. m., s. ch. 5
à feuell. de saule. am. s. 5
satiné. am. s., or. 5
argent. af. s., or. 5 (écon.)

CAIMITIER

glabré. am. m., s. ch. 5
drapé. am. m., s. ch. 5
argenté. am. m., s. ch. 5

SAPOTILLIER

cultivé. am. m., s. ch. 5 (alim.)

MYRSINÆ

d'Afrique. cap, or. 5
à feuell. obtuses. Açores, or. 5

CLASSIS IX.

CLASSE IX.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(Corolla perigyna.)

(Corolle attachée au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

GUAYACANÆ.

LES PLAQUEMINIERS.

DIOSPYROS

ebenus L.
virginiana L.
lotus L.

PLAQUEMINIER

ébénier. île def., s. ch. 5 (écon.)
de Virginie. am. s. 5
lotos. orient. 5 (alim.)

ROYENA

lucida L.
hirsuta L.
lycioides.

ROYENA

luisant. cap, or. 5
velu. cap, or. 5
à feuell. de lycium. 5

STYRAX

officinale L.
levigatum H. K.

HALESIA

tetraptera L.
diptera L.

HOPEA

tinctoria L.

STYRAX

officinal. F. m. 5 (méd.)
glabre. Am. s. 5

HALESIA

à 4 ailes. Am. s. 5
à 2 ailes. Am. s. 5

HOPEA

de teinturiers. Am. s. 5 (arts.)

ORDO II.

RHODODENDRA.

I. *Corolla monopetala.*

KALMIA

latifolia L.
angustifolia L.
glauca H. K.

RHODODENDRON

ferrugineum L.
hirsutum L.
maximum L.
minus Mich.
ponticum L.

AZALEA

viscosa L.
glauca L.
nudiflora L.
pontica L.
procumbens L.

II. *Corolla subpolyptala.*

RHODORA

canadensis L'Her.

LEDUM

palustre L.
latifolium Lmk.
thymifolium Lmk.

BEPARIA

paniculata Mich.

MENZIEZIA

polyfolia Juss.
andromeda dabœcia L. }

ITEA

virginiana L.
racemiflora L'Her.

ORDRE II.

LES ROSAGES.

I. *Corolle monopétale.*

KALMIA

à larges feuell. Am. s. 5 (orn.)
à feuell. étroites. Am. s. 5 (orn.)
glauque. Am. s. 5 (orn.)

RHODODENDRON

ferrugineux. F., Alpes. 5
hérissé. F., Alpes. 5
d'Amérique. Am. s. 5 (orn.)
ponctué. Am. s. 5 (orn.)
de Pont. As. 5 (orn.)

AZALÉA

visqueux. Am. s. 5 (orn.)
glauque. Am. s. 5 (orn.)
à fleurs nues. Am. s. 5 (orn.)
de Pont. As. 5 (orn.)
couché. F., Alpes. 5

II. *Corolle presque polyptale.*

RHODORA

de Canada. Am. s. 5 (orn.)

LÉDUM

des marais. Alpes. 5 (écon.)
à larges feuell. Am. s. 5
à feuell. de thym. Am. s. 5

BÉFARIA

paniculé. Am. s. 5

MENZIEZIA

à feuell. de polium. F. m. 5

ITÉA

de Virginie. Am. s. 5 (orn.)
à grappes. Am. s. 5

ORDO III.

ERICAÆ.

I. Germen superum.

ERICA.

I. *Antheræ aristatæ.*a. *Foliis oppositis.**glutinosa Thunb.**lutea L.*b. *Foliis ternis.**paniculata L.**halicacaba L.**monsoniana L. f.**discolor Andr.**cruenta H. K.**nigrita L.**regerminans L.**urceolaris Thunb.**marifolia H. K.**planifolia L.**hirta Thunb.**articularis L.**viridi-purpurea L.**pubescens L.*c. *Foliis quaternis.**persoluta L.**gracilis wendl.**castra L.**arborea L.**plumosa Thunb.**blæria ciliaris L.**glabella Thunb.**blæria purpurea L.**blæria Thunb.**blæria ericoides L.**mucosa L.**tetralix L.**abietina L.**verticillata Andr.**pattersonia Andr.*d. *Foliis senis.**mammosa L.**empetrifolia L.**spicata Thunb.*

ORDRE III.

LES BRUYÈRES.

I. Ovaire supère.

BRUYÈRE.

I. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles opposées.

*glutineuse. cap, or. h**jaune. cap, or. h*

b. Feuilles ternées.

*paniculée. cap, or. h**vésiculeuse. cap, or. h**à grandes fleurs. cap, or. h**de deux couleurs. cap, or. h**couleur de sang. cap, or. h**à tige brune. cap, or. h**prolifère. cap, or. h**urcéolée. cap, or. h**à feuell. de marum. cap, or. h**à feuell. planes. cap, or. h**hérissée. cap, or. h**articulée. cap, or. h**vert-pourpre. portugal. h**pubescente. cap, or. h*

c. Feuilles quatre à quatre.

*polymorphe. cap, or. h**grêle. cap, or. h**des Caffres. cap, or. h**en arbre. f. m., or. h**plumeuse. cap, or. h**glabre. cap, or. h**blæria. cap, or. h**muqueuse. cap, or. h**tetralix. f. h**à feuell. de sapin. cap, or. h**verticillée. cap, or. h**de patterson. cap, or. h*

d. Feuilles six à six.

*mamelonnee. cap, or. h**à feuell. d'empetrum. cap, or. h**à épis. cap, or. h*

2. *Cristata.*a. *Foliis oppositis.**vulgaris* L.b. *Foliis ternis.**corifolia* L.*calicina* L.*triflora* L.*scoparia* L.*bergiana* L.*formosa* Thunb.*rubens* Thunb.*incarnata* Thunb.*cinerea* L.*australis* L.c. *Foliis quaternis.**ramentacea* Thunb.*margaritacea* Thunb.*baccans* L.*pendula* Wendl.*retorta* L. f.3. *Mutica.*a. *Foliis ternis.**serrata* Thunb.*umbellata* L.*imbricata* L.*axillaris* Thunb.*sexfaria* H. K.*taxifolia* H. K.*capitata* L.*bruniades* L.*ciliaris* L.*virgata* Thunb.*hispidula* L. f.*petiverii* L.*banksii* Andr.*sebana* H. K.*monadelphica* Andr.*plukenetii* L.*versicolor* Andr.*perspicua* Wendl.*aitonia* Andr.b. *Foliis quaternis aut pluribus.**pulchella* Thunb.*vestita* Thunb.*pinica* Thunb.2. *Anthères en crête.*a. *Feuilles opposées.**commune.* F. hb. *Feuilles ternées.**à feuell. de coris.* cap, or. h*à grand calice.* cap, or. h*à fleurs ternées.* cap, or. h*à balais.* F. h*de Bergius.* cap, or. h*cannelée.* cap, or. h*rouge.* cap, or. h*incarnate.* cap, or. h*cendrée.* F. h*australe.* Esp., or. hc. *Feuilles quatre à quatre.**à longs rameaux.* cap, or. h*perlée.* cap, or. h*globuleuse.* cap, or. h*pendante.* cap, or. h*conique.* cap, or. h3. *Anthères sans appendices.*a. *Feuilles ternées.**à feuell. en scie.* cap, or. h*ombellifère.* cap, or. h*imbriquée.* cap, or. h*axillaire.* cap, or. h*hexagone.* cap, or. h*à feuell. d'if.* cap, or. h*à fleurs en tête.* cap, or. h*laineuse.* cap, or. h*ciliée.* F. h*effilée.* cap, or. h*soyeuse.* cap, or. h*de Petiver.* cap, or. h*de Banks.* cap, or. h*de Séba.* cap, or. h*monadelphie.* cap, or. h*de Plukenet.* cap, or. h*de diverses couleurs.* cap, or. h*diaphane.* cap, or. h*d'Aiton.* cap, or. hb. *Feuilles quatre à quatre ou plus.**élégante.* cap, or. h*recouverte.* cap, or. h*en massue.* cap, or. h

coccinea L.
 purpurea Andr.
 grandiflora H. K.
 curviflora L.
 tubiflora L.
 conspicua H. K.
 cerinthoides L.
 ventricosa Rhumb.
 fastigiata L.
 comosa L.
 mediterranea L.

multiflora L.

vagans L.
 hirsuta Rhumb.
 cubica L.
 herbacea L.

ANDROMEDA

mariana L.
 nitida Bartram. }
 lucida Lmk. }
 coriacea H. K. }
 axillaris Lmk.
 paniculata L.
 racemosa L.
 arborea L.
 caliculata L.
 ferruginea L.
 polifolia L.
 — angustifolia.
 — latifolia.

ARBUTUS

unedo L.
 andrachne L.
 uva-ursi L.
 alpina L.

CLETHRA

alnifolia L.
 tomentosa Lmk.
 arborea H. K.

PYROLA

rotundifolia L.
 minor L.
 secunda L.
 uniflora L.
 maculata L.

écarlate. cap, or. 5
 pourpre. cap, or. 5
 à grandes fleurs. cap, or. 5
 à fleurs courbes. cap, or. 5
 tubulée. cap, or. 5
 remarquable. cap, or. 5
 à fleurs de cerinthé. cap, or. 5
 ventrue. cap, or. 5
 fasciculée. cap, or. 5
 à fleurs serrées. cap, or. 5
 de la Méditerranée. F. m.,
 or. 5
 à fleurs nombreuses. F. m.,
 or. 5
 étalée. F. m., or. 5
 velue. cap, or. 5
 cubique. cap, or. 5
 précoce. suisse. 5

ANDROMEDA

de Maryland. Am. s. 5

luisant. Am. m. 5

axillaire. Am. s. 5
 paniculé. Am. s. 5
 à grappes. Am. s. 5
 en arbre. Am. s. 5
 caliculé. Am. s. 5
 ferrugineux. Am. s. 5
 à feuell. de polium. Am. s. 5
 — à feuell. étroites.
 — à larges feuell.

ARBOUSIER

des Pyrénées. F. m., or. 5 (orn.)
 andrachné. orient, or. 5
 busserole. F., Alpes. 5 (méd.)
 des Alpes. F. 5

CLETHRA

à feuell. d'aune. Am. s. 5 (orn.)
 velu. Am. s. 5 (orn.)
 en arbre. canar., or. 5 (orn.)

PYROLE

ronde. F. 5
 petite. F. 5
 unilatérale. F. 5
 à une fleur. F., Alpes. 5
 maculée. Am. s. 5

EPIGÆA

repens L.

GAULTHERIA

procumbens L.

erecta Vent.

II. *Germen inferum aut semi inferum.*

VACCINIUM

myrtillus L.

pensylvanicum Lmk.

uliginosum L.

vitis idea L.

stamineum L.

corymbosum L.

amœnum H. K.

disomorphum Mich. }

macrocarpon H. K.

oxycoccos L.

EMPETRUM

nigrum L.

ORDO IV.

CAMPANULÆ.

I. *Antheræ distinctæ.*MICHAXIA (*Mindium* Juss.)

campanuloïdes L'Her.

levigata Vent.

CANARINA

campanulata L.

CAMPANULA.

1. *Folia levia, calicis sinibus non reflexis.*

cenisia L.

uniflora L.

hederæfolia L.

rotundifolia L.

rapunculus L.

persicifolia L.

obliqua Jacq.

pyramidalis L.

stylosa Lmk.

lilifolia L.

grandiflora L. f.

rhomboïdea L.

verticillata L.

EPIGÆA

rampant. Am. s. ♀

GAULTHERIA

de Canada. Am. s. ♀ (écon.)

à tige droite. Pérou, or. ♀

II. Ovaire infère ou moitié infère.

MYRTIL

luet. F. ♀ (alim.)

de Pensylvanie. Am. s. ♀

des marais. F. ♀

ponctué. F., Alpes. ♀ (méd.)

à longues étamines. Am. s. ♀

corymbifère. Am. s. ♀

à gros fruit. Am. s. ♀

canneberge. F. ♀ (alim.)

EMPETRUM

à fruit noir. F., Alpes. ♀

ORDRE IV.

LES CAMPANULES.

I. Anthères distinctes.

MICHAXIA

rude. syrie, or. ♂

lisse. perse. ♂

CANARINE

campaniforme. madère, or. ♀

CAMPANULE.

1. Feuilles lisses, sinus des calices non réfléchis.

du mont Cénis. Alpes. ♀

à une fleur. F., Alpes. ♀

à feuell. de lierre. F. ♀

à feuell. rondes. F. ♀

raiponce. F. ♂ (alim.)

à feuell. de pêcher. F. ♀

oblique. ♂

pyramidale. F. ♂ (orn.)

à long style. sibérie. ♀

à feuell. de lis. sibérie. ♀

à grandes fleurs. tartarie. ♀

rhomboïdale. F., Alpes. ♀

verticillée. russie. ♀

2. *Foliis asperis, sinibus calicis non reflexis.*

latifolia L.
trachelium L.
rapunculoïdes L.
bononiensis L.
glomerata L.
thyrsoïdea L.
tomentosa Lmk.
peregrina L. }
lanuginosa Lmk. }
erinus L.

3. *Sinibus calicis reflexis.*

medium L.
barbata L.
spicata L.
longifolia Lapeyr.
sibirica Jacq.

4. *Capsula columnifera aut prismatica.*

speculum L.
hybrida L.
perfoliata L.
aurea L.

TRACHELIUM

cœruleum L.

GESNERIA

tomentosa L.

PHYTEUMA

spicata L.
orbicularis L.
hemispherica L.
pinnata L.

II. *Antheræ connatæ.*

LOBELIA

longiflora L.
cardinalis L.
siphilitica L.
inflata L.
cliffortiana L.
urens L.
triquetra L.
laurentia L.
erinus L.
pubescens Jacq.

2. Feuilles rudes, sinibus du calice non-réfléchis.

à larges feuell. F., Alpes. ♀
gantelée. F. ♀
fausse raiponce. F. ♀
de Bologne. Italie. ♀
agglomérée. F. ♀
en thyrses. F., Alpes. ♂
cotonneuse. Orient. ♀
hérissée. Orient. ♂
érine. F. ☉

3. Sinus des calices réfléchis.

des jardins. F. m. ♂ (orn.)
barbue. F., Alpes. ♀
en épi. F., Alpes. ♂
à longues feuell. Pyrénées. ♀
de Sibérie. ♂

4. Capsule en colonne ou prismatique.

miroir de Vénus. F. ☉
hybride. F. ☉
perfoliée. F. ☉
jaune. Canaries, Or. ♀

TRACHELIUM

à fleurs bleues. Afr. s., Or. ♀

GESNERIA

cotonneux. Am. m., s. ch. ♀
(orn.)

PHYTEUMA

en épis. F. ♀
orbiculaire. F. ♀
hémisphérique. F. ♀
à feuell. pennées. Orient, Or. ♀

II. Anthères réunies.

LOBELIA

à longues fleurs. Am. m., s. ch. ♀
cardinale. Am. s. ♀ (orn.)
siphilitique. Am. s. ♀ (méd.)
renflé. Am. s. ☉
de Cliffort. Am. m. ☉
brûlant. F. ☉
triangulaire. Cap, Or. ♂
à longs pédoncules. Italie. ☉
à feuell. d'érine. Afr. ☉
pubescent. Cap, Or. ♀

minuta Z.
dortmanna Z.

GOODENIA
ovata Smith.

JASIONE
montana Z.
perennis Lmk.

nain. corse, or. ♀
aquatique, F. ♀

GOODENIA
ovale, N. HOLL. ♂

JASIONÉ
de montagne, F. ♂
vivace, ♀

CLASSIS X.

CLASSE X.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(*Corolla pistillo imposita*,
antheræ connatæ.)

(*Corolle sur le pistil*, *anthères réunies*.)

ORDO I.

ORDRE I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

LES SEMIFLOSCULEUSES.

I. *Receptaculum nudum*, *semen absque pappo*.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

LAMPSANA
communis Z.
— *crispa*.

LAMPSANE
commune, F. ☉
— *crépue*.

RHAGADIOLUS (*Lapsana* L.)
stellatus.
lampsanoides.
kolpinia Zmk.

RHAGADIOLE
étoilée, orient. ☉
fausse lampsane, orient. ☉
hérissée, tartarie. ☉

II. *Receptaculum nudum*, *semen papposum*.

II. Réceptacle nud, graines couronnées d'une aigrette.

PRENANTHES
muralis Z.
viminea Z.
purpurea Z.
alba Z.
pinnata Z.

PRÉNANTHÈS
des murailles, F. ♂
effilé, F. ♀
pourpre, F., Alpes. ♀
blanc, F., Alpes. ♀
penné, canaries, or. ♂

CHONDRILLA
junccea Z.

CONDRIILLE
jonciforme, F. ♀

LACTUGA
perennis Z.
tenerrima Pourret.

LAITUE
vivace, F. ♀
glauque, F. ♀

saligna L.
 virosa L.
 — laciniata.
 scariola L.
 — sanguinea.
 sativa L.
 — romana.
 — capitata.
 — crispa.
 intybacea Jacq.
 spinosa L.

SONCHUS

fruticosus L.
 sibiricus L.
 tataricus L.
 cordifolius.
 plumieri L.
 alpinus L.
 floridanus L.
 multiflorus.
 oleraceus L.
 — asper.
 divaricatus Desf.
 chondrilioides Desf.
 tenerrimus L.
 palustris L.
 arvensis L.
 maritimus L.

HIERACIUM.

1. Caule folioso.

fruticosum.
 umbellatum L.
 sabaudum L.
 — maculatum.
 — latifolium.
 blattarioides L.
 pyrenaicum L.
 amplexicaule L.
 villosum L.
 grandiflorum Wald. }
 pappoleucum Vill. }
 alpinum L.
 intybaceum Jacq. }
 albidum Vill. }
 tubulosum Lmk. }
 cerinthoides L.
 paludosum L.

lancéolée. F. ☉
 vireuse. F. ☉
 — olaciniée.
 escariote. F. ☉ (alim.)
 — pourpre.
 cultivée. ☉ (alim.)
 — romaine.
 — pommée.
 — crépue.
 à tige nue. Am. m. ☉
 épineuse. Alger, or. ☿

LAITRON

arbrisseau. canaries, or. ☿
 de Sibérie. ♀
 de Tartarie. ♀
 à feuell. en cœur. ♀
 de plumier. F., Alpes. ♀
 des Alpes. F. ♂
 de Floride. Am. s. ♂
 à fleurs nombreuses.
 commun. F. ☉
 — rude.
 étalé. Égypte, or. ♀
 à tige de condrille. Barb. ☉
 lacinié. F. ☉
 des marais. F. ♀
 des champs. F. ☉
 maritime. F. ♀

EPERVIERE.

1. Tige feuillue.

arbrisseau. ☿
 ombellifère. F. ♀
 de Savoie. F. ♀
 — tacheté.
 — à larges feuell.
 à feuell. de blattaire. F., Alp. ♀
 des Pyrénées. F. ♀
 amplexicaule. F., Alpes. ♀
 velue. Alpes. ♀
 à grandes fleurs. F., Alpes. ♀
 des Alpes. F. ♀
 tubulée. F., Alpes. ♀
 à feuell. de melinet. F., Alp. ♀
 des marais. F., Alpes. ♀

lampsanoïdes *Gouan.*
prenanthoïdes *L.*

jacquini *Vill.*
murorum *L.*
sylvaticum *L.*
prunellæfolium *All.* }
pumilum *L.* }
porrifolium *L.*
echioides *Wald.*

2. *Caule nudo multifloro.*

aurantiacum *L.*
piloselloïdes *Vill.* }
cynosum *Leers.* }
auricula *L.* }
dubium *L.* }

3. *Caule nudo unifloro.*

pilosella *L.*

CREPIS

sibirica *L.*
parviflora.
coronopifolia *Desf.*

albida *Vill.*
alpina *L.*
rubra *L.*
pauciflora.
nemausensis *Gouan.* }
andryala nemausensis *Vill.* }
foetida *L.*
pulchra *L.*
hispida *Wald.*
virgata *Desf.*
dioscoridis *L.*
patula.
tectorum *L.* }
virens *Vill.* }
biennis *L.*
cinerea. }
tectorum *Vill.* }
pungens.

DREPANIA (*Crepis* *L.*)

barbata.
 — *pallida.*

à feuill. de lampsane. *F., Pyr. ♀*
à feuill. de prenanthès. *F.,*
Alpes. ♀
de Jacq. *F., Alpes. ♀*
des murs. *F. ♀*
des bois. *F. ♀*

à feuill. de brunelle. *F., Alp. ♀*

à feuill. de poireau. *F., Alp. ♀*
rude. *Allem. ♀*

2. *Tige nue à plusieurs fleurs.*

couleur de feu. *F., Alpes ♀*

à feuill. de piloselle. *F., Alp. ♀*

auriculée. *F. ♀*

3. *Tige nue à une fleur.*

piloselle. *F. ♀ (méd.)*

CRÉPIS

à larges feuill. *sibérie. ♀*
à petites fleurs. *orient. ☉*
à feuill. de corne de cerf.
Barb. ☉

blanc. *F., Alpes. ♀*

des Alpes. *F. ☉*

rouge. *F. ☉*

à fleurs rares. *Égypte. ☉*

à tige nue. *F. ☉*

fétide. *F. ☉*

à fleurs de lampsane. *F. ☉*

hérissé. *Hongrie. ☉*

effilé. *Barbarie. ♀*

de dioscoride. *F. ☉*

étalé. *☉*

des toits. *F. ☉*

bisannuel. *F. ♂*

cendré. *F. ♂*

piquant. *☉*

DREPANIA

barbu. *F. m. ☉*

— *à fleurs pâles.*

HYOSERIS.

1. *Caule ramoso.*

hedypnoïs L.
rhagadioloïdes L.
cretica Cav.

2. *Caule nudo simplici.*

radiata L.
lucida L.
aspera L.
foetida L.
minima L.
taraxacoïdes Vill.

ZACINTHA

verrucaria.

TARAXACUM

dens-leonis.

LEONTODON

pyrenaïcum Couan.
aureum L.
bulbosum L.
autumnale L.
hastile L.
hispidum L.

PICRIS

hieracioïdes L.
sprengeriana.
hieracium sprengerianum L. }
integrifolia.
rhagadioloïdes.
crepis rhagadioloïdes L. }
globulifera.
asplenioïdes L.

HELMINTIA (*Picris* L.)

echioides.

SCORZONERA

hispanica L.
angustifolia L.
humilis L.
laciniata L.
resedifolia L.
eriosperma Couan.
aspera Desf.

PICRIDIMUM (*Scorzonera* L.)

vulgare
tingitanum,

HYOSERIS.

1. *Tige rameuse.*

dormeuse. F. ☉
rhagadiole. F. ☉
de Crète. ☉

2. *Tige nue simple.*

rayonnee. F. m. ☉
luisante. orient. ♂
rude. Italie. ☉
fétide. F. ☉
petite. F. ☉
commune. F. ♀

ZACINTHA

tuberculeux. orient. ☉

TARAXACUM

pissenlit. F. ♀ (méd.)

LÉONTODON

des Pyrénées. F. ♀
orangé. F., Alpes. ♀
bulbeux. F. ♀
d'automne. F. ♀
lancéolé. F. ♀
hérissé. F. ♀

PICRIS

épervière. F. ♂
de Sprenger. F. m. ☉
à feuell. entières. Eur. ☉
rhagadiole. ☉
globuleux. ☉
à feuell. d'asplénium. Barb. ☉

HELMINTIA

hérissé. F. ☉

SCORZONÈRE

d'Espagne. ♂ (alim., méd.)
à feuell. étroites. F. ♀
petite. F. ♀
laciniée. F. ♂
à feuell. de réséda. F. ☉
laineuse. F. m. ♀
rude. orient. ♀

PICRIDIMUM

commun. F. ☉
de Tanger. ☉

TRAGOPOGON

pratense L.
majus Jacq.
undulatum Jacq.
orientale L.
porrifolium L.
crocifolium L.

CERCIFIX

des prés. F. ♂ (alim.)
élevé. Autriche. ♂
ondulé, orient. ♂
d'orient. ♂
à feuell. de poireau. F. ♂
à feuell. de safran. F. m. ♂

UROSPERMUM (*Tragopogon* L.)

dalechampii.
picroides.

UROSPERMUM

de Dalechamp. F. ♂
hérissé. F. ☉

III. *Receptaculum villosum aut paleaceum.*

III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.

GÉROPOGON

glabrum L.

GÉROPOGON

glabre. Italie. ☉

HYPOCHÆRIS

maculata L.
glabra L.
arachnoïdea Desf.
radicata L.

HYPOCHÆRIS

tacheté. F. ♀
glabre. F. ☉
arachnoïde. Alger. ☉
à longues racines. F. ♀

SÉRIOLA

levigata L.
ætnensis L.
cretensis L.

SÉRIOLA

lisse. Barbarie. ♀
de l'Etna. Italie. ☉
de Crète. ☉

ANDRYALA

integrifolia L.
sinuata L.
lanata L.
ragusina L.
cheiranthifolia L'Her.

ANDRYALA

à feuell. entières. F. ♂
sinué. F. ♂
laineux. F. ♀
de Raguse. F., or. ♀
à feuell. de giroflée. mère,
or. ♀
pinnatifide. canaries, or. ♀

pinnatifida H. K.

CATANANCHE

cœrulea L.
lutea L.

CATANANCHE

bleue. F. ♂
jaune. F. m. ☉

CICHORIUM

intybus L.
endivia L.
— crispa.
spinosum L.

CHICORÉE

sauvage. F. ♀ (méd., alim.)
endive. ☉ (alim.)
— crépue.
épineuse. F. m. ♂

SCOLYMUS

maculatus L.
grandiflorus Desf.
hispanicus L.

SCOLYMUS

panaché. Italie. ☉
à grandes fleurs. Barbarie. ♂
d'Espagne. ♂

ORDO II.

ORDRE II.

FLOSCULOSÆ.

LES FLOSCULEUSES.

I. *Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flores flosculosi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis L.)*

CNICUS

oleraceus L.
erisithales L.
acarna L.
spinosissimus L.
centauroides L.
cernuus L.

CARDUUS.

1. *Foliis decurrentibus.*

lanceolatus L.
leucographus L.
nutans L.
arvensis.
serratula arvensis L. }
crispus L.
palustris L.
acanthoides L.
pycnocephalus Jacq.
argentatus L.
arabicus. Jacq.
dissectus L.
monspessulanus L.
canus L.
carlinoides Gouan. }
carlina pyrenaica L. }

2. *Foliis sessilibus vel amplexicaulis.*

semipectinatus Link.
helenioides L.
anglicus Link.
tuberosus L.
stellatus L.
syriacus L.
marianus L.
— viridis.
casabonæ L.
diacantha Will. }
afer Jacq. }
fruticosus.
eryophorus L.
giganteus Desf.

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graines aigrettées, tous les fleurs hermaphrodites. (Polygamie égale).

CNICUS

des prés. F. ♂
érisithales. F. ♀
acarna. Esp. ☉
hérissé. F., Alpes. ☉
à feuell. de centauree. F., Pyr. ♀
penché. Sibérie. ♀

CHARDON.

1. Feuilles décurrentes.

lancéolé. F. ♂
panaché. F. m. ☉
penché. F. ♂
hémorrhoidal. F. ♀
crépu. F. ☉
des marais. F. ♀
à feuell. d'acanthé. F. ☉
à fleurs tombantes. F. ☉
argenté. Égypte. ☉
d'Arabie. ☉
découpé. F. ♀
de Montpellier. F. ♀
blanchâtre. Autriche. ♀
à fleurs de carline. Pyrén. ♀

2. Feuilles sessiles ou amplexicaules.

demi-pectiné. Tartarie. ♀
à feuell. d'aunée. Sibérie. ♀
des prés. F. ♀
tubéreux. F. ♀
étoilé. Orient. ☉
de Syrie. ☉
marie. F. ♂ (méd.)
— vert.
casabon. Eur. austr., or. ♂
à 2 épines. Syrie. ♂
arbrisseau. or. ♀
à tête laineuse. F. ♂
gigantesque. Barbarie.

ciliatus Murr.
serratuloides L.
acaulis L.

ONOPORDON

acanthium L.
 — *viride*.
illyricum L.
arabicum L.
acaule L.

CINARA

scolymus L.
cardunculus L.
humilis L.
acaulis L.

CARLINA

acaulis L.
acanthifolia All.
lanata L.
corymbosa L.
vulgaris L.

ATRACTYLIS

gummifera L.
cancellata L.
humilis L.

CARTHAMUS

tinctorius L.
albus.
lanatus L.
creticus L.
cœruleus L.
mitissimus L.
corymbosus L.
salicifolius L.

ARCTIUM

lappa L.
 — *tomentosa*.
grandiflora.

STÆHELINA

dubia L.
chamæpeuce L.

SERRATULA

centauroïdes L.
spicata L.
squarrosa L.
tinctoria L.

cilié. sibérie. ♀
sarette. F. ♀
sans tige. F. ♀

ONOPORDON

à feuil. d'acanthé. F. ♂
 — *vert*.
d'Illyrie. Eur. austr. ♂
d'Arabie. F. m. ♂
sans tige. F., pyrénées. ♂

ARTICHAUX

cultivé. F. m. ♀ (écon.)
cardon. barbarie. ♂ (écon.)
nain. Alger. ♀
sans tige. Alger. ♀

CARLINE

sans tige. F., alpes. ♀
à feuil. d'acanthé. F., alpes. ♀
laineuse. F. m. ☉
corymbifère. Italie, or. ♀
commune. F. ♂

ATRACTYLIS

gommeifère. barbarie. ♀ (écon.)
chardon prisonnier. F. m. ☉
nain. esp. ♂

CARTHAME

des teinturiers. ég. ☉ (arts.)
à tige blanche. orient. ☉
laineux. F. ☉
de Crète. ☉
bleu. esp. ♀
sans épines. F. ♀
corymbifère. tunis, or. ♀
à feuil. de saule. canar., or. ♂

BARDANE

officinale. F. ♂ (méd.)
 — *cotonneuse*.
à grandes fleurs. F. ♂

STÆHELINA

à feuil. de romarin. F., or. ♂
chamæpeucé. orient, or. ♂

SARETTE

laciniée. sibérie. ♀
à épis. Am. s. ♀
rude. Am. s. ♀
des teinturiers. F. ♀ (arts.)

coronata L.
heterophylla Desf.
pinnatifida.
carduus radiatus wald. }

couronnée. sibérie. ♀
à feuell. variables. F., Alp. ♀
pinnatifide. hongrie. ♀

II. *Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flosculi steriles in ambitu.* (Polygamia frustranea L.)

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graine couronnée d'une aigrette, fleurons de la circonférence stériles, (Polygamie frustranée.)

ZOEGEA

leptaurea L.

ZOEGEA

d'orient. ☉ (orn.)

CENTAUREA.

CENTAURÉE.

1. *Squamæ calicinae laeves, nec ciliatae nec spinosae.*

1. Ecailles du calice lisses, dépourvues de cils et d'épines.

crupina L.
lippii L.
amberboï Lmk.
moschata L.
rhutenica Lmk.
centaurium L.
alpina L.
africana Lmk.

à feuell. de chondrille. F.m. ☉
de Lippi. égypte. ☉
odorante. orient. ☉ (orn.)
musquée. orient. ☉ (orn.)
glaucue. russie. ♀
grande. Italie. ♀
des Alpes. Italie. ♀
d'Afrique. barbarie. ♀

2. *Squamæ calicinae serrato ciliatae.*

2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

phrygia L.
jacea L.
nigra L.
uniflora L.
pullata L.
montana L.
cyanus L.
paniculata L.
spinosa L.
ragusina L.
candidissima Lmk.
cinerea Lmk.
sempervirens L.
scabiosa L.
— italica.
atropurpurea.
diluta H. K.
orientalis L.
balsamita Lmk.

plumeuse. F., Alpes. ♀
jaccée. F. ♀
noire. F. ♀
à une fleur. F.m. ♀
à colerette. F.m. ☉
de montagne. F., Alpes. ♀
bluet. F. ☉ (orn.)
paniculée. F. ☉
épineuse. orient, or. ♀
de Raguse. orient, or. ♀
très-blanche. Italie, or. ♀
cendrée. Italie, or. ♀
toujours verte. portug., or. ♀
scabieuse. F. ♀
— d'Italie.
noir-pourpre. orient. ♂
rose-pâle. Eur. mér. ☉
d'orient. or. ♀
à feuell. de balsamite. orient. ☉

3. *Squamæ calicis scariosae.*

3. Ecailles du calice scarieuses.

glastifolia L.
alata Lmk.
alba L.
behen L.

à feuell. de pastel. orient. ♀
ailée. tartarie. ♀
blanche. Espagne. ♀
béhen. syrie, or. ♀ (méd.)

conifera L.
rhapontica L.

4. *Spina calicina palmata*.

sonchifolia L.
ferox Desf.
seridis L.
aspera L.
napifolia L.
prolifera Vent.

5. *Spina calicis compositæ*.

benedicta L.
criophora L.
calcitrapa L.
— major.
apula L.
melitensis L.
collina L.
solstitialis L.
verutum L.
multifida.

6. *Spina calicis simplicis*.

salmantica L.
pumila L.
crocodylum L.
galactites L.

III. *Flosculi calice proprio cincti.* (Polygamia segregata L.)

ELEPHANTOPUS

scaber L.

GUNDELIA

tournefortii L.

SPHERANTHUS

indicus L.

ECHINOPS

sphærocephalus L.
ritro L.
spinosus L.
horridus.
strigosus L.

IV. *Receptaculum nudum, semina absque pappo, flosculi omnes hermaphroditi.*

BALSAMITA Desf.

grandiflora Desf.
ageratifolia.
chrysanthemum flosculosum L. }

conifère. F. m., or. ♂
rhapontic. F., Alpes. ♀

4. Epines du calice palmées.

à feuell. de laitron. F. m. ☉
hérissée. Alger. ♀
à feuell. de chicorée. Esp. ♀
rude. F. m. ♀
à feuell. de navet. orient. ☉
prolifère. Égypte. ☉

5. Epines du calice rameuses.

chardon bénit. F. m. ☉ (méd.)
laineuse. Alger. ☉
chausse-trape. F. ♂ (méd.)
— grande. Égypte. ♂
de la Pouille. ☉
de Malte. F. m. ☉
des collines. F. m. ♀
du solstice. F. ☉
à longues épines. orient. ☉
découpée. ♀

6. Epines du calice simples.

de Salamanque. F. m. ♂
petite. Égypte. ♂
à feuell. de vulnéraire. syrie. ☉
panachée. F. m. ♂

III. Fleurons entourés d'un calice partiel, (Polygamie séparée.)

ELEPHANTOPUS

rude. inde, s. ch. ♀

GUNDELIA

de Tournefort. syrie. ♀

BOULETTE

des Indes. s. ch. ♀

ECHINOPS

à grosses têtes. F. ♀
azuré. F. m. ♀
épineux. tunis. ♀
de Perse. ♀
à feuell. rudes. Esp. ☉

IV. Réceptacle nud, graines sans aigrettes, tous les fleurons hermaphrodites.

BALSAMITE

à grandes fleurs. Alg. ♀ (orn.)
à feuell. d'agératum. crète. ♀

suaveolens. }
 tanacetum balsamita L. }
 annua. }
 tanacetum annuum L. }

odorante. F. m. ♀

annuelle. Esp. ☉

V. *Receptaculum nudum, villosum aut paleaceum, semina nuda, flosculi feminei in ambitu.* (Polygamia superflua L.)

V. Réceptacle nud, velu, ou garni de paillettes; fleurs femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)

HIPPIA

frutescens L.

HIPPIA

arbrisseau. cap, or. ♀

GYMNOSTYLES JUSS.
 anthemifolia.

GYMNOSTYLE

à feuell. d'anthémis. N. holl. ☉

TANACETUM

suffruticosum L.
 vulgare L.
 — crispum.
 sibiricum L.

TAN AISIE

arbrisseau. cap, or. ♀
 commune. F. ♀ (méd.)
 — crépue.
 de Sibérie. ♀

CARPESIMUM

cernuum L.

CARPESIMUM

penché. F. ♂

GRANGEA (Artemisia L.)

latifolia.
 maderaspatana.
 decumbens.
 minima.

GRANGEA

à feuell. larges. ☉
 à feuell. sinuées. inde. ☉
 tombant. N. holl. ☉
 nain. chine. ☉

ARTEMISIA.

1. *Herbaceæ, calices oblongi.*

capillifolia Lmk.
 vulgaris L.
 palmata Lmk.
 maritima L.
 suaveolens Lmk.

1. Tiges herbacées, calices allongés.

capillaire. chine, or. ♀
 commune. F. ♀ (méd.)
 palmée. Espagne. ♀
 maritime. F. ♀
 odorante. F. ♀

2. *Herbaceæ, calice hemisphærico.*

austriaca Jacq.
 campestris L.
 dracunculus L.
 tanacetifolia L.
 glacialis L.
 rupestris L.
 insipida Vill.
 absinthium L.
 absinthioides.
 pontica L.

2. Tiges herbacées, calice hémisphérique.

d'Autriche. ♀
 champêtre. F. ♀ (méd.)
 estragon. tartarie. ♀ (écon.)
 à feuell. de tanaïsie. F., Alp. ♀
 des glaciers. F., Alp. ♀
 des rochers. F., Alpes. ♀
 insipide. F., Alpes. ♀
 absinthe. F. ♀ (méd.)
 fausse absinthe. ♀
 de Pont. Italie. ♀ (méd.)

3. *Fruticoseæ.*

cœrulescens L.
 corymbosa Lmk.

3. Tiges ligneuses.

bleuâtre. Italie. ♀
 corymbifère. Italie. ♀

valentina. }
 hispanica Lmk. }
 abrotanum L.
 sinensis L.
 argentea L'Her.
 arborescens L.

MICROPUS

erectus L.
 supinus L.
 pygmæus. }
 filago pygmæa L. }

VI. *Receptaculum nudum rarius paleaceum, semina papposa, flosculi feminei in ambitu.*

FILAGO

montana L.
 germanica L.
 gallica L.
 pyramidata L.
 leontopodion L.

XERANTHEMUM

annuum L.
 inapertum L.
 fulgidum L.
 bracteatum Vent.

GNAPHALIUM.1. *Chrysocomæ.*

stœchas L.
 — minor.
 crassifolium Lmk.
 ovatum. }
 crassifolium L. }
 cymosum L.
 orientale L.
 arenarium L.
 luteo-album L.
 scetidum L.
 patulum L.

2. *Argyrocoma.*

teretifolium L.
 undulatum L.
 spathulatum Lmk.
 serpyllifolium Lmk.
 margaritaceum L.
 dioicum L.

de Valence. Esp., or. 5

citronnelle. F. m. 5 (méd.)
 moxa. chine, or. 5 (méd.)
 argentée. canaries, or. 5
 en arbre. F. m., or. 5

MICROPUS

droit. F. m. ⊙
 couché. F. ⊙
 nain. F. m. ⊙

VI. Réceptacle nud ou rarement garni de paillettes, graines aigrettées, fleurons femelles à la circonférence.

FILAGO

de montagne. F. ⊙
 dicothome. F. ⊙
 de France. F. ⊙
 pyramidal. F. ⊙
 pied de lion. F., Alpes. 4

XÉRANTHÈME

annuel. F. ⊙ (orn.)
 fermé. F. ⊙
 éclatant. cap, or. ♂ (orn.)
 à grandes bractées. N. Holl.,
 or. ♂ (orn.)

IMMORTELE.1. *Fleurs jaunes.*

stœchas. F. m., or. 5 (méd.)
 — naine.
 à feuell. épaisses. or. 5
 à feuell. ovales. cap, or. 5
 corymbifère. cap, or. 5
 d'orient. or. 5 (orn.)
 des sables. Allemagne ⊙
 jaune-blanche. F. ⊙
 fétide. cap. ⊙
 étalée. cap, or. 5

2. *Fleurs blanches.*

à feuell. cylindriq. cap, or. 5
 ondulée. Am. m. ⊙
 en spatule. ⊙
 à feuell. de serpolet. cap, or. 5
 des jardins. Am. s. 4 (orn.)
 pied de chat. F. 4 (méd.)

supinum L.
 alpinum L.
 sylvaticum L.
 uliginosum L.

CONYZA et BACCHARIS L.

neriifolia L.
 ivæfolia L.
 halimifolia L.
 dioscoridis L.
 odorata L.
 candida L.
 chinensis L.
 gouani.
 erigeron gouani L. }
 ægyptiaca L.
 squarrosa L.
 rupestris L.
 sordida L.
 saxatilis L.

TUSSILAGO

alpina L.
 farfara L.
 alba L.
 petasites L.
 suaveolens.

VII. *Receptaculum nudum, semen papposum, flosculi omnes hermaphroditi.*

CACALIA.

1. Fruticosæ.

laciniata L.
 papillaris L.
 anteuophorbium L.
 kleinia L.
 ficoïdes L.
 cylindrica Lmk.
 repens L.

2. Herbacææ.

linaria Cav.
 porophyllum L.
 suaveolens L.
 petasites Lmk.
 tomentosa Lmk.
 alliaræfolia Lmk.
 atriplicifolia L.
 sonchifolia L.

petite. F., Alpes.
 des Alpes. F. ♀
 des bois. F. ♂
 des marais. F. ☉

CONISE

à feuell. de nérium. cap, or. ♀
 à feuell. d'iva. Am. m., or. ♀
 à feuell. d'halime. Am. s. ♀
 de dioscoride. syrie, or. ♀
 odorante. Am. m., s. ch. ♀
 blanche. candie, or. ♀
 de Chine. ☉
 de Gouan. canaries, or. ♂
 d'Egypte. ♀
 rude. F. ♂
 des rochers. barbarie, or. ♀
 à trois fleurs. F. m., or. ♀
 à une fleur. F. m., or. ♀

TUSSILAGE

des Alpes. F., Alpes. ♀
 pas-d'âne. F. ♀ (méd.)
 blanc. F. ♀
 petasite. F. ♀
 odorant. ♀ (orn.)

VII. Réceptacle nud, graines aigrettées, tous les fleurons hermaphrodites.

CACALIA.

1. Tiges ligneuses.

lacinié. cap, s. ch. ♀
 mamelonné. cap, s. ch. ♀
 à feuell. ovales. cap, s. ch. ♀
 Kleinia. canaries, s. ch. ♀
 ficoïde. cap, s. ch. ♀
 cylindrique. cap, s. ch. ♀
 rampant. cap, s. ch. ♀

2. Tiges herbacées.

à feuell. de linairé. N. Esp.,
 s. ch. ♀
 à feuell. poreuses. Am. m. ☉
 odorant. Am. s. ♀
 à feuell. de tussilage. F., Alp. ♀
 cotonneux. F., Alpes. ♀
 à feuell. d'alliaire. F., Alp. ♀
 à feuell. d'arroche. Am. s. ♀
 à feuell. de laitron. inde. ☉

CHRYSOCOMA

dichotoma L. f.
coma aurea L.
cernua L.
linosyris L.
dracunculoides Lmk.
graminifolia L.
anthelmintica.
noveboracensis.
præalta.

EUPATORIUM.

1. *Calix imbricatus*, 3 ad 9 florus.

houstonis L.
dalea L.
scandens L.
altissimum L.
cannabinum L.
syriacum Jacq.
sessilifolium L.
purpureum.
maculatum L.

2. *Calix imbricatus decemflorus et ultra.*

atriplicifolium Lmk.

perfoliatum L.
aromaticum L.
coelestinum L.
ageratoïdes L. f.
sessilifolium Lmk.
fruticosum.

STEVIA

serrata Cav. }
ageratum punctatum Ortega. }
pedata Cav. }
ageratum pedatum Ortega. }

KUHNIA

fruticosa Vent. }
eupatorium canescens Ortega. }

AGERATUM

conyzoides L.
cœruleum.

CHRYSOCOME

dicothome. canaries, or. ♀
dorée. cap, or. ♀
penchée. cap, or. ♀
linosiris. F. ♀
à feuell. d'estragon. sibér. ♀
à feuell. de gramen. Am. s. ♀
antelmintique. inde, s. ch. ♂
de Novéboraco. Am. s. ♀
gigantesque. Am. s. ♀

EUPATOIRE.

1. Calice imbriqué renfermant 3 à 9 fleurs.

de Houston. Am. m., s. ch. ♀
de la Jamaïque. Am. m., s. ch. ♀
grimpeante. Am. s., or. ♀
élevée. Am. s., or. ♀
à feuell. de chanvre. F. ♀ (méd.)
pubescente. ♀
à feuell. sessiles. Am. s. ♀
pourpre. Am. s. ♀
maculée. Am. s. ♀

2. Calice imbriqué renfermant 10. ou un plus grand nombre de fleurons.

à feuell. d'arroche. Am. m.,
s. ch. ♀
perfoliée Am. s., or. ♀
aromatique. Am. s., or. ♀
bleue. Am. s., or. ♀
agératum. Am. s. ♀
à feuell. sessiles. Am. s. ♀
ligneuse. ♀

STÉVIA

à feuell. en scie. Mexique, or. ♀
à feuell. en pédale. Cuba. ☉

KUNIA

arbrisseau. île de Cuba, or. ♀

AGÉRATUM

fausse conise. Am. m. ☉
bleu. Am. m. ☉

VIII. *Receptaculum villosum aut paleaceum, semen nudum aut subnudum.*

CALEA

aspera Jacq.

TARCHONANTHUS

camphoratus L.

ATHANASIA

annua L.

trifurcata L.

crithmifolia L.

parviflora L.

tricuspis.

DIOÏS (*Athanasia L.*)

maritima.

SANTOLINA

chamæcyparissus L.

rosmarinifolia L.

tomentosa.

eriosperma. }

an erecta L. }

ANACYCLUS

aureus L.

creticus L.

valentinus L.

ORDO III.

RADIATÆ.

I. *Receptaculum nudum, pappus nullus.*

COTULA

aurea L.

anthemoides L.

coronopifolia L.

turbinata L.

BELLIS

annua L.

perennis L.

MATRICARIA

parthenium L.

chamomilla L.

suaveolens L.

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes, graines sans aigrettes.

CALEA

à feuell. rudes. am. m. ☉

TARCONANTE

camphrè. cap, or. ☿

ATHANASIA

annuel. f. m. ☉

trifurqué. cap, or. ☿

à feuell. de bacelle. cap, or. ☿

à petites fleurs. cap, or. ☿

à trois pointes. cap, or. ☿

DIOÏS

maritime. f. m., or. ♀

SANTOLINE

commune. f. m. ☿ (orn.)

à feuell. de rosmarin. esp., or. ☿

cotonneuse. esp., or. ☿

laineuse. ital. ♀

ANACYCLUS

jaune. f. m. ☉

de Crète. orient. ☉

de Valence. f. m. ☉

ORDRE III.

LES RADIÉES.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

COTULA

jaune. esp. ☉

à feuell. d'anthémis. esp. ☉

corne de cerf. cap. ☉

conique. cap. ☉

PAQUERETTE

annuelle. f. ☉

vivace. f. ♀

MATRICAIRE

officinale. f. ♀ (méd.)

chamomille. f. ☉

odorante. f. ☉ (méd.)

CHRYSANTHEMUM.

1. *Leucanthema*.

præaltum Vent.
corymbiferum L.
frutescens L.
pinnatifidum L. S.
serotinum L.
leucanthemum L.
grandiflorum.
montanum L.
balsamita L.
 — *multifida*.
monspeliense L.
alpinum L.
carinatum Schousb.

2. *Chrysanthema*.

myconis L.
segetum L.
coronarium L.
 — *pallidum*.

CALENDULA

arvensis L.
ægyptica.
officinalis L.
stellata Cav.
tomentosa Desf.
hybrida L.
pluvialis L.
fruticosa L.

MADIA

viscosa Cav.

OSTEOSPERMUM

moniliferum L.
spinosum L.
pinnatifidum L'Her.

MILLERIA

quinqueflora L.
contrayerva Lmk.

ERIOCEPHALUS

africanus L.

II. *Receptaculum nudum, semina papposa.*

BELLIIUM

minutum L.
bellidioides L.

CHRISANTHÈME.

1. Fleurs blanches.

élevé. perse, or. ♀
corymbifère. F. m. ♀
arbrisseau. canaries, or. ♀
pinnatifide. canaries, or. ♀
tardif. Am. s. ♀
grande marguerite. F. ♀
à grandes fleurs. F., pyrén. ♀
de montagne. F., Alpes. ♀
balsamita. orient. ♀
 — *découpé*.
de Montpellier. F. m. ♀
des Alpes. F. ♀
en carène. maroc. ☉

2. Fleurs jaunes.

à feuil. entières. F. m. ☉
des moissons. F. ☉
des jardins. orient. ☉ (orn.)
 — *à fleurs pâles*.

SOUCI

des champs. F. ☉
d'Egypte. ☉
cultivé. F. ☉ (écon.)
étoilé. Espagne. ☉
cotonneux. barbarie.
hybride. cap. ☉
des pluies. cap. ☉
arbrisseau. cap, s. ch. ♀

MADIA

visqueux. chili. ☉

OSTEOSPERME

à colliers. cap, or. ♀
épineuse. cap, or. ♀
pinnatifide. cap, or. ♀

MILLERIA

à 5 fleurs. Am. m. ☉
contrayerva. chili. ☉

ERIOCEPHALE

d'Afrique. cap, or. ♀

II. Réceptacle nud, graines aigrettées.

BELLIIUM

nain. orient. ☉
fausse paquerette. Italie. ☉

HELENIUM

- autumnale L.
quadridentatum Bill.

PECTIS

- prostrata. Cav.
multifida Ortega.

TAGETES

- erecta L.
patula L.
lucida Cav.
tenuifolia Cav.
minuta.
papposa Mich.

DORONICUM et ARNICA L.

- pardalianches L.
plantagineum L.
arnica L.
scorpioides L.
bellidiastrum L.

GORTERIA

- rigens L.
pinnata L.

INULA

- helenium L.
bifrons L.
oculus christi Lmk.
britannica L.
dysenterica L.
crispa.
gnaphalodes Vent. }
aster crispus Forsk. }
squarrosa L. }
spiræifolia Lmk. }
salicina L.
ensifolia L.
chrithmoides L.
hirta L.
montana L.
cinerea Lmk. }
vaillantii All. }
viscosa. }
erigeron viscosum L. }
graveolens. }
erigeron graveolens L. }
tuberosa. }
erigeron tuberosum L. }

HELENIUM

- d'automne. Am. s. ♀
à quatre dents. Am. s. ♀

PECTIS

- couché. N. Esp., s. ch. ♀
découpé. Pérou. ☉

TAGÈTE

- droite. Mexique. ☉
touffue. Mexique. ☉
luisante. N. Esp., or. ♀
à feuil. étroites. Pérou. ☉
à petites fleurs. Chili. ☉
aigrettee. Am. s. ☉

DORONIC

- à feuil. en cœur. F., Alpes. ♀
à feuil. de plantain. F. ♀
arnica. F., Alpes. ♀ (méd.)
scorpion. F. ♀
à fleurs de paquerette. F., Alp. ♀

GORTERIA

- à grandes fleurs. Cap, or. ♀
penné. Cap, or. ♀

AUNÉE

- officinale. F. ♀ (méd.)
décurrente. F. ♀
œil de Christ. F. ♀
britannique. F. ♀
dysenterique. F. ♀

crépue. Égypte. ☉

rude. F. ♀
à feuil. de saule. F. ♀
ensiforme. F. ♀
criste marine. F. ♂ (écon.)
velue. F. ♀
de montagne. F. ♀

cendrée. F. ♀

visqueuse. F. m., or. ♂

fétide. F. ☉

tubéreuse. F. m., or. ♀

glutinosa. }
 aster glutinosus *cav.* }

ERIGERON

canadense *L.*
 siculum *L.*
 longifolium.
 annuum. }
 aster annuus *L.* }
 philadelphicum *L.*
 alpinum *L.*
 uniflorum *L.*
 acré *L.*
 foetidum *L.*
 contortum.
 viscosum. }
 psidia glutinosa *Jacq.* }

BOLTONIA (*Matricaria L.*)

asteroides *L'Her.*
 glastifolia *L'Her.*

ASTER

dentatus *Andr.*
 fruticosus *L.*
 argenteus *Mich.* }
 sericeus *Vent.* }
 tenellus *L.*
 tripolium *L.*
 alpinus *L.*
 pyrenæus *Lmk.*
 amellus *L.*
 amygdalinus *Lmk.*
 leucanthemus.
 acris *L.*
 trinervis.
 dracunculoïdes *Lmk.*
 diversifolius *Mich.*
 amplexicaulis *Lmk.*
 novæ angliæ *L.*

cordifolius *L.*

patulus *Lmk.*
 rubricaulis *Lmk.*

lævigatus *Lmk.*
 longifolius *Lmk.*
 amœnus *Lmk.*
 novi belgii *L.* }
 paniculatus *Lmk.* }

glutineuse. mexique, or. 5

ERIGERON

de Canada. *F.* ☉
 de Sicile. *F. m.* ☉
 à feuell. longues. *Am. s.*
 à fleurs blanches. *Am. s.* ☉
 de Philadelphie. *Am. s.* ʒ
 des Alpes. *F.* ʒ
 à une fleur. *F., Alpes.* ʒ
 acré. *F.* ☉
 fétide. cap, or. ♂
 à feuell. contournées. ☉
 visqueuse. Antilles, s. ch. 5

BOLTONIA

à fleurs d'aster. *Am. s.* ʒ
 à feuell. de pastel. *Am. s.* ʒ

ASTER

denté. *N. Holl., or.* 5
 arbrisseau. cap, or. 5
 satiné. *Am. s.* 5
 fragile. cap. ☉
 maritime. *F.* ♂
 des Alpes. *F.* ʒ
 des Pyrénées. *F.* ʒ
 amelle. *F. m.* ʒ (orn.)
 à feuell. d'amandier. *Am. s.* ʒ
 à fleurs blanches. *Am. s.* ʒ
 acré. *F. m.* ʒ
 à trois nervures. ʒ
 à feuell. d'estragon. ʒ
 à feuell. variables. *Am. s.* ʒ
 amplexicaule. *Am. s.* ʒ (orn.)
 de la Nouvelle-Angleterre.
Am. s. ʒ (orn.)
 à feuell. en cœur. *Am. s.* ʒ
 (orn.)
 étalé. *Am. s.* ʒ (orn.)
 à tiges pourpres. *Am. s.* ʒ
 (orn.)
 glabre. *Am. s.* ʒ
 à feuell. longues. *Am. s.* ʒ
 luisant. *Am. s.* ʒ (orn.)
 paniculé. *Am. s.* ʒ (orn.)

strictus.
 salicifolius *Link.*
 tradescanti *L.*
 coridifolius *Mich.*
 ericoides *L.*
 grandiflorus *L.*
 chinensis *L.*

miser *L.*

SOLIDAGO.

1. *Racemis secundis patulis.*

sempervirens *L.*
 elliptica *H. K.*
 canadensis *L.*
 glabra.
 nutans.
 procera *H. K.*
 aspera *H. K.*

2. *Racemis erectis.*

integrifolia.
 multiflora.
 mexicana *L.*
 latifolia *L.*
 bicolor *L.*
 flexicaulis *L.*
 virga-aurea *L.*
 minuta *L.*
 rigida *L.*
 gracilis.

CINERARIA

geifolia *L.*
 lobata *L'Her.*
 alpina *L.*
 amelloïdes *L.*
 maritima *L.*
 populifolia *L'Her.*
 aurita *L'Her.*
 lanata *L'Her.*
 cruenta *L'Her.*

SENECIO.

1. *Floribus flosculosis.*

cernuus *L. f.* }
 rubens *Jacq.* }
 hieracifolius *L.*
 vulgaris *L.*

ramassé. *Am. s. ♀*
 à feuell. de saule. *Am. s. ♀*
 de Tradescanti. *Am. s. ♀*
 à feuell. de coris. *Am. s. ♀*
 à feuell. de bruyère. *Am. s. ♀*
 à grandes fleurs. *Am. s. ♀*
 reine-marguerite. chine. ☉
 (orn.)
 grêle. *Am. s. ♀*

VERGE-D'OR.

1. Grappes unilatérales et étalées.

toujours verte. *Am. s. ♀*
 elliptique. *Am. s. ♀*
 de Canada. *Am. s. ♀* (orn.)
 glabre. *Am. s. ♀* (orn.)
 penchée. *Am. s. ♀* (orn.)
 élevée. *Am. s. ♀* (orn.)
 rude. *Am. s. ♀* (orn.)

2. Grappes redressées.

à feuell. entières. *Am. s. ♀*
 à fleurs nombreuses. ♀
 du Mexique. *Am. s. ♀*
 à larges feuell. *Am. s. ♀*
 de deux couleurs. *Am. s. ♀*
 tortueuse. *Am. s. ♀*
 des bois. *F. ♀*
 petite. *F. ♀*
 à feuell. dures. *Am. s. ♀*
 grêle. ♀

CINÉRAIRE

à feuell. de géum. cap, or. ☿
 lobée. cap, or. ☿
 des Alpes. *F. ♀*
 à fleurs d'amelle. cap, or. ☿
 maritime. *F. ☿*
 à feuell. de peupl. canar., or. ♀
 auriculée. canaries, or. ☿
 laineuse. canaries, or. ☿
 pourpre. canaries, or. ☿

SÉNEÇON.

1. Fleurs flosculeuses.

à fleurs penchées. inde. ☉
 à feuell. d'épervière. *Am. s. ☉*
 commun. *F. ☉*

reclinatus *Her.*
discolor.

recliné. cap, or. $\mathfrak{h}$
de deux couleurs. $\mathfrak{h}$

2. *Floribus radiatis, ligulis revolutis.*

ægyptius L.
triflorus L.
sylvaticus L.
viscosus L.
coronopifolius *Desf.*

2. Fleurs radiées, demi-fleurons roulés

d'Egypte. $\odot$
à fleurs ternées. égypte. $\odot$
des bois. F. $\odot$
visqueux. F. $\odot$
corne-de-cerf. barbarie. $\odot$

3. *Floribus radiatis, radio patente, foliis pinnatifidis.*

dentatus *Jacq.*
elegans L.
jacobæa L.
erucifolius L.
abrotanifolius L.
incanus L.
nebrodensis L.

3. Fleurs radiées, demi-fleurons horizontaux, feuilles découpées.

denté. cap. $\odot$
violet. cap. $\odot$ (orn.)
jacobée. F. $\mathfrak{W}$
à feuell. de roquette. F. $\mathfrak{J}$
à feuell. de citronelle. F. $\mathfrak{J}$
blanc. Alpes. $\mathfrak{W}$
à feuell. de paquerette. esp. $\odot$

4. *Floribus radiatis, radio patente, foliis indivisis.*

paludosus L.
sarracenicus L.
nemorensis L.
doria L.
coriaceus *H. K.*
doronicum L.
longifolius L.
halimifolius L.
rigidus L.

4. Fleurs radiées, rayons horizontaux, feuilles entières.

des marais. F. $\mathfrak{W}$
traçant. F. $\mathfrak{W}$
des forêts. F. $\mathfrak{W}$
doria. F. m. $\mathfrak{W}$
à feuell. de limonium. orient. $\mathfrak{W}$
doronic. F., Alpes. $\mathfrak{W}$
à feuell. longues. cap, or. $\mathfrak{h}$
à feuell. d'halimé. cap, or. $\mathfrak{h}$
rude. cap, or. $\mathfrak{h}$

OTHONNA

cheirifolia L.
coronopifolia L.
pectinata L.

OTHONNA

spatule. tunis. $\mathfrak{h}$
corne-de-cerf. cap, or. $\mathfrak{h}$
pectiné. cap, or. $\mathfrak{h}$

III. *Semina non papposa, receptaculum paleaceum.*

III. Graines sans aigrette, réceptacle garni de paillettes.

ANTHEMIS.

I. *Floribus radio albis.*

cota L.
altissima L.
maritima L.
mixta L.
arvensis L.
cotula L.
nobilis L.
pyrethrum L.

ANTHEMIS.

I. Demi-fleurons blancs.

piquante. italie. $\odot$
élevée. F. m. $\odot$
maritime. F. $\mathfrak{W}$
corne-de-cerf. F. $\odot$
des champs. F. $\odot$
fétide. F. $\odot$
camomille. F. $\mathfrak{W}$ (méd.)
pyréthre. F. m., or. $\mathfrak{W}$ (méd.)

2. *Floribus radio luteis aut violaceis.*

tinctoria L.
valentina L.
 — *bicolor*.
arabica L.
grandiflora.

ovatifolia Ortega.
globosa Ortega.
triloba Ortega.

ACHILLEA.

1. *Corollis radio luteis.*

santolina L.
falcata Zmk.
tenuifolia Zmk.
ageratum L.
ægyptiaca L.
bipinnata L.
pubescens L.
pauciflora Zmk.
decumbens Zmk.
abrotanifolia L.
filipendulina Zmk.

tomentosa L.

2. *Corollis radio albis aut purpureis.*

macrophylla L.
clavennæ L.
herbarota All. }
cuneifolia Zmk. }
serrata Retz.
ptarmica L.
alpina L.
sibirica L.
impatiens L.
flosculosa.
magna All. }
compacta Zmk. }
nana L. }
lanata Zmk. }
nobilis L.
ligustica All.
millefolium L.
 — *purpureum*.
rosea.
asplenifolia Vent. }

2. *Demi-fleurons blancs ou violets.*

des teinturiers. F., Alpes. ψ
de Valence. F. m. ☉
 — *de deux couleurs*.
d'Arabie. Alger. ☉ (orn.)
à grandes fleurs. chine. ☿
 (orn.)
à feuilles ovales. Pérou, s. ch. ψ
globuleuse. Mexique, or. ψ
à 3 lobes. N. Esp., or. ψ

MILLEFEUILLE.

1. *Demi-fleurons jaunes.*

santoline. orient. ψ
falciforme. orient, or. ☿
à feuilles menues. orient, or. ☿
eupatoire. F. m. ψ (méd.)
d'Égypte. orient. ψ
bipennée. orient. ψ
pubescente. orient. ψ
à fleurs rares. orient. ψ
tombante. Kamtzh. ψ
à feuil. de citronnelle. orient. ψ
à feuil. de filipendule. orient,
 ψ
cotonneuse. F., Alpes. ψ

2. *Demi-fleurons blancs ou roses.*

à larges feuil. F., Alpes. ψ
corne de cerf. F., Alpes. ψ
cunéiforme. F., Alpes. ψ
à feuil. en scié. Alpes. ψ
sternutatoire. F. ψ
des Alpes. F. ψ
de Sibérie. ψ
pectinée. Sibérie. ψ
flosculeuse. ψ
compacte. F., Alpes. ψ
petite. F., Alpes. ψ
odorante. F., Alpes. ψ
fasciculée. Alpes. ψ
commune. F. ψ
 — *pourpre*. (orn.)
rose. Am. s. ψ (orn.)

PARTHENIUM

hysterophorus L.
integrifolium L.

BUPHTALMUM

frutescens L.
arborescens L.
peruvianum Lmk.
aquaticum L.
maritimum L.
spinosum L.
grandiflorum L.
procumbens.

SIGESBECKIA

orientalis L.
flosculosa L'Her.

ECLYPTA

erecta L.
prostrata L.

BALTIMORA

erecta L.

DAHLIA

pinnata Cav.

rosea Cav.
purpurea Cav.

POLYMNIA

uvudalia L.
canadensis L.

ENCELIA

halimifolia Cav.

canescens Cav.

XIMENESIA

encelioides Cav.

SCLEROCARPUS Jacq.

africanus Jacq.

SILPHIUM

laciniatum L.
terebinthinaceum Jacq.

perfoliatum L.
connatum L.

PARTHENIUM

lacinié. Am. m. ☉
à feuell. entières. Am. s., or. ♀

BUPHTALMUM

arbrisseau. Am. s., or. ♀
en arbre. Am. m., s. ch. ♀
du Pérou. s. ch. ♀
aquatique. F. ☉
maritime. F. ♀
épineux. F. m. ☉
à grandes fleurs. F. ♀
couché. ♀

SIGESBECKIA

d'orient. inde. ☉
flosculeux. pérou. ☉

ECLYPTA

droit. inde. ☉
couché. inde. ☉

BALTIMORA

droit. Am. s. ☉

DAHLIA

à feuell. pennées. Mexique ,
s. ch. ♀ (orn.)
rose. Mexique, s. ch. ♀ (orn.)
pourpre. Mexique, s. ch. ♀ (orn.)

POLYMNIA

à larges feuell. Am. s. ♀
de Canada. ♀

ENCELIA

à feuell. d'halime. N. Esp.,
s. ch. ♀
à feuell. blanches. Mexique ,
s. ch. ♀

XIMENESIA

à feuell. d'encelia. Mexique. ☉

SCLÉROCARPE

d'Afrique. ☉

SILPHIUM

lacinié. Am. s. ♀ (orn.)
à feuell. en cœur. Am. s. ♀
(orn.)
perfolié. Am. s. ♀ (orn.)
à feuell. réunies. Am. s. ♀ (orn.)

trifoliatum L.
 scabrum *walth.*
 trilobatum L.

COREOPSIS

auriculata L.
 tripteris L.
 verticillata L.
 delphinifolia *Link.*

alternifolia L.
 alata *cav.*

COSMOS *cav.*

bipinnata *cav.*

RUDBECKIA

laciniata L.
 — angustifolia.
 pinnata *vent.*
 aspera.
 triloba L.
 hirta L.
 purpurea L.
 amplexicaulis *Bosc.* }
 perfoliata *cav.*

SANVITALIA *cav.*

villosa *cav.*
 lorantea atropurpurea *ortéga.* }

IV. *Semina papposa, receptaculum paleaceum.*

HELIANTHUS

annuus L.
 multiflorus L.
 tuberosus L.
 mollis *Link.* }
 pubescens *vahl.* }
 canescens *Mich.* }
 tubæformis *Jacq.*
 atrorubens *Link.*
 altissimus L.
 gigantens L.
 angustifolius L.
 strumosus L.
 divaricatus L.
 levis L. }
 buphtalmum helianthoides L. }
 prostratus.
 dentatus *cav.*

à *feuill. ternées.* Am. s. ♀ (orn.)
 à *feuill. rudes.* Am. s. ♀
 trilobé. Am. m., s. ch. ♀

CORÉOPSIS

auriculé. Am. s. ♀
 à trois ailes. Am. s. ♀ (orn.)
 verticillé. Am. s. ♀
 à *feuill. de delphinium.* Am. s.
 ♀ (orn.)
 à *feuill. alternes.* Am. s. ♀
 ailé. Mexique, or. ♀

COSMOS

bipenné. Mexique. ☉

RUDBECKIA

lacinié. Am. s. ♀ (orn.)
 — à *feuill. étroites.*
 à *feuill. pennées.* Am. s. ♀
 à *feuill. rudes.* Am. s. ♀
 trilobé. Am. s. ♂
 velu. Am. s. ♂
 pourpre. Am. s., or. ♀ (orn.)
 amplexicaule. Mexique. ☉

SANVITALIA

velu. N. Esp. ☉

IV. Graines aigrettées, réceptacle garni de paillettes.

SOLEIL

cultivé. Pérou. ☉ (orn.)
 à fleurs *nombr.* Am. s. ♀ (orn.)
 topinambour. Brésil. ♀ (alim.)
 cotonneux. Am. s. ♀
 renflé. Mexique. ☉
 noir-pourpre. Am. s. ♀ (orn.)
 élevé. Am. s. ♀
 gigantesque. Am. s. ♀
 à *feuill. étroites.* Am. s. ♀
 fusiforme. Am. s. ♀
 étalé. Am. s. ♀
 lisse. Am. s. ♀
 couché. Pérou, or. ♀
 à *feuill. dentées.* Mex., or. ♀

GAILLARDA *fougeroux.*

pulchella. }
virgilia helioides l'her. }

GALINSOGA *cav.*

parviflora cav.
triloba cav.

PASCHALIA *ortéga.*

glauca ortéga.

AMELLUS

lychnitis L.
pedunculatus ortéga.

ZINNIA

pauciflora L.
multiflora L.

violacea cav. }
elegans jacq. }
revoluta cav. }
tenuiflora jacq. }

VERBESINA

gigantea jacq.
atriplicifolia.
fruticosa L.
serrata cav.
alata L.
nodiflora L.

HETEROSPERMA *cav.*

pinnata cav.

BIDENS

tripartita L.
cernua L.
frondosa L.
pilosa L.
bullata L.
nivea L.
bipinnata L.
heterophylla ortéga.
dichotoma.

SPILANTHUS

oleracea L.

fusca.
alcmella L.

GAILLARDA

élégant. véra-cruz. ☉ (orn.)

GALINSOGA

à petites fleurs. pérou. ☉
trilobé. N. esp. ☉

PASCHALIA

à feuell. glauques. chili, s. ch. ♀

AMELLUS

bleu. cap, or. ♂
pedonculé. ☉

ZINNIA

à fleurs rares. pérou. ☉ (orn.)
à fleurs nombreuses. Louisiane. ☉ (orn.)

violet. mexique. ☉ (orn.)

roulé. mexique. ☉ (orn.)

VERBESINE

gigantesque. Am. m., s. ch. ♂
à feuell. d'arroche. s. ch. ♂
arbrisseau. Am. m., s. ch. ♂
à feuell. en scie. N. esp., s. ch. ♂
ailée. Am. m., s. ch. ♀
nodiflore. Am. m. ☉

HÉTÉROSPERME

à feuell. pennées. N. esp. ☉

BIDENS

à trois feuell. F. ☉
penché. F. ☉
feuillu. Am. s. ☉
velu. Am. m. ☉
bulleux. Italie. ☉
à fleurs blanches. Am. s. ♀
bipenné. Am. s. ☉
à feuell. de saule. N. esp., or. ♀
dichotome. ♀

SPILANTHUS

cresson de Para. Am. m. ☉
(méd.)
brun. Am. m. ☉ (méd.)
alcmella. inde. ☉

AGRIPHYLLUM (*Gorteria* L.)

asteroides.

echinatum.

gorteria echinata H. K. }

AGRIPHYLLUM

à feuell. d'yeuse. cap, or. ♀

hérissé. cap. ☉

ARCTOTIS

tristis L.

plantaginea L.

aspera L.

repens. Jacq.

ARCTOTIS

triste. cap. ☉

à feuell. de plantain. cap, or. ♀

rude. cap, or. ♀

rampant. cap, or. ♀

CLASSIS XI.

CLASSE XI.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(*Corolla epigyna, antheræ distinctæ.*)

(Corolle sur le pistil, anthères distinctes.)

ORDO I.

ORDRE I.

DIPSACEÆ.

LES DIPSACÉES.

I. Flores aggregati.

I. Fleurs rapprochées.

MORINA

persica L.

MORINE

de Perse. ♀ (orn.)

DIPSACUS

sylvestris Jacq.

fullonum Wild.

laciniatus L.

pilosus L.

DIPSACUS

sauvage. F. ♂

chardon bonnetier. F. ♂ (arts.)

lacinié. F. ♂

velu. F. ☉

SCABIOSA.

SCABIEUSE.

I. Corollis quadrifidis.

I. Corolles à quatre divisions.

alpina L.

rigida L.

syriaca L.

dichotoma Lmk. }

transylvanica L.

centauroïdes Lmk.

leucantha L.

succisa L.

arvensis L.

sylvatica L.

integrifolia L.

des Alpes. F. ♀

à feuell. dures. cap, or. ♀

de Syrie ☉

de Transylvanie. ☉

fausse centauree. F. m. ♀

à fleurs blanches. F. m. ♀

tronquée. F. ♀ (méd.)

des champs. F. ♀ (méd.)

des bois. F. ♀ (méd.)

à feuell. entières. F. ☉

2. *Corollis quinquefidis.*

columbaria L.
 — lutea.
 suaveolens.
 lucida Vill.
 setifera Lmk.
 ochroleuca Jacq.
 urceolata Desf. }
 rutæfolia Vahl. }
 divaricata Lmk. }
 argentea L.
 sícula L. }
 divaricata Jacq. }
 stellata L.
 parviflora Desf. }
 dichotoma Cyrillo. }
 prolifera L.
 atropurpurea L.
 africana L.
 cretica L.
 graminifolia L.
 palæstina L.

KNAUTIA

orientalis L.
 plumosa L.

ALLIONIA

incarnata L.

II. Flores distincti.

VALERIANA.

1. *Semen unicum papposum.*

rubra L.
 angustifolia All.
 calcitrapa L.
 dioica L.
 officinalis L.
 plu L.
 tripteris L.
 montana L.
 tuberosa L.
 celtica L.
 saxatilis L.
 pyrenaica L.

2. *Fructus trilocularis coronatus.*

cornucopiæ L.
 olitoria Wild.

2. Corolle à cinq divisions

colombaire. F. ♀
 — jaune.
 odorante. F. ♀
 luisante. F., Alpes. ♀
 sétifère. ☉
 jaunâtre. All. ♂

urcéolée. Tunis. ♀

argentée. orient., or. ♀

de Sicile. ☉

étoilée. F. m. ☉

à petites fleurs. orient. ☉

prolifère. orient. ☉

des jardins. inde. ☉ (orn.)

d'Afrique. or. ♂

de Crète. or. ♂

à feull. de gramen. F., Alp. ♀

de Palestine. or. ♀

KNAUTIA

d'orient. ☉
 plumeux. orient. ☉

ALLIONIA

incarnat. Pérou. ☉

II. Fleurs distinctes.

VALÉRIANE.

1. Une seule graine aigrettée.

rouge. F. ♀ (orn.)
 à feull. étroites. F. ♀
 chaussetrape. orient. ☉
 dioïque. F. ♀
 officinale. F. ♀
 plu. F. ♀
 à feull. ternées. F., Alpes. ♀
 de montagne. F., Alpes. ♀
 tubéreuse. F., Alpes. ♀
 nard-celtique. F., Alp. ♀ (méd.)
 des rochers. F., Alpes. ♀
 des Pyrénées. F. ♀

2. Fruit couronné et à trois loges.

corne d'abondance. Barb. ☉
 mâche. F. ☉ (alim.)

vesicaria wild.
coronata wild.
echinata wild.
sibirica L.

vésiculeuse. orient. ☉
couronnée. F. ☉
hérissée. F. ☉
de Sibérie. ♂

ORDO II.

ORDRE II.

RUBIACEÆ.

LES RUBIACÉES.

I. *Fructus dicoccus dispermus, stamina
 sapius 4.*

I. 2 graines accolées, ordinairement
 4 étamines.

SHERARDIA

arvensis L.

SHÉRARDIA

des champs. F. ☉

ASPERULA

arvensis L.
odorata L.
taurina L.
cynanchica L.
brevifolia Vent.
tinctoria L.
calabrica L.

ASPÉRULE

des champs. F. ☉
odorante. F. ♀
de Turin. F., Alpes. ♀
à l'esquinancie. F. ♀
à feuell. courtes. orient, or. ♂
des teinturiers. F. ♀
de Calabre. or. ♂

GALIUM.

1. *Fructu glabro.*

palustre L.
uliginosum L.
verum L.
mollugo L.
saxatile L.
provinciale Lmk.
lucidum.
glaucum L.
rubioïdes L.
sylvaticum L.
linifolium Lmk.
pumilum Lmk.
jussieui Vill.
trichophyllum All.
parisiense Lmk.
divaricatum Lmk.

2. *Fructu hispido aut aspero.*

rotundifolium L.
aparine L.
— minor.
villosum Lmk.
spurium L.

CAILLELAIT.

1. Fruit glabre.

des marais. F. ♀
aquatique. F. ♀
jaune. F. ♀ (méd.)
blanc. F. ♀
des rochers. F. ♀
de Provence. ♀
luisant. F. ♀
glaucue. F. ♀
à feuell. de garance. F. ♀
des bois. F. ♀
à feuell. de lin. F. ♀

nain. F., Alpes. ♀

de Paris. ☉
étalé. F. ☉

2. Fruit hérissé ou rude.

à feuell. rondes. F. ♀
apariné. F. ☉
— petit.
velu. Esp. ♀
à fruit rude. F. ☉

CRUCIANELLA

- angustifolia L.
 latifolia L.
 ciliata Lmk.
 maritima L.

VALANTIA

- muralis L.
 hispida L.
 articulata L.
 aparine L.
 cruciata L.

RUBIA

- tinctorum L.
 lucida L.
 angustifolia L.
 cordifolia L.

ANTHOSPERMUM

- æthiopicum L.

II. *Fructus dicoccus dispermus*, stamina 4,
 rarius 5 aut 6.

HOUSTONIA

- coccinea Andr.

SPERMACOCE

- verticillata L.
 tenuior L.

DIODIA

- virginiana L.

PHYLLIS

- nobla L.

III. *Fructus monocarpus bilocularis polyspermus*, stamina 4.

OLDENLANDIA

- madagascariensis.

CATESBÆA

- spinosa L.

IV. *Fructus monocarpus bilocularis polyspermus*, stamina 5.

RANDIA

- aculeata L.

PINCKNEYA Mich.

- pubens Mich.

CRUCIANELLE

- à feuell. étroites. F. ☉
 à feuell. larges. F. ☉
 ciliée. orient. ☉
 maritime. F., or. ☿

VALANTIA

- des murailles. F. ☉
 velu. F. ☉
 articulé. orient. ☉
 à gros fruit. F. ☉
 croisette. F. ♀

GARANÇE

- des teinturiers. F. ♀ (arts.)
 luisante. barbarie, or. ☿
 à feuell. étroites. minorq., or. ☿
 à feuell. en cœur. russie. ♀

ANTHOSPERMUM

- d'Éthiopie. s. ch. ☿

II. 2 graines accolées, 4 étamines,
 rarement 5 ou 6.

HOUSTONIA

- écarlate. mexique, s. ch. ☿
 (orn.)

SPERMACOCE

- verticillé. am. m., s. ch. ☿
 grêle. am. ☉

DIODIA

- de Virginie. or. ♀

PHYLLIS

- à feuell. ternées. canar., or. ☿

III. 1 fruit à 2 loges polyspermes,
 4 étamines.

OLDENLANDIA

- de Madagascar. ☉

CATESBÆA

- épineux. am. m., s. ch. ☿

IV. 1 fruit à 2 loges polyspermes,
 5 étamines.

RANDIA

- épineux. antilles, s. ch. ☿

PINCKNEYA

- pubescent. am. s., or. ☿

- RONDELETIA**
triflora *vahl.*
- GENIPA**
americana *L.*
- GARDENIA**
florida *L.*
verticillata.
- V. Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 4.**
- IXORA**
coccinea *L.*
alba *L.*
- ERNODEA swartz.**
littoralis *swartz.*
- VI. Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 5.**
- SERISSA Juss.**
foetida.
lycium foetidum *L. f.*
lycium indicum *Retz.*
lycium japonicum *Thunb.*
bucchozia coprosmodies *L'Her.*
- CHIOCOCOA**
racemosa *L.*
- PSYCHOTRIA**
undata *Jacq.*
- COFFEA**
arabica *L.*
- POEDERIA**
foetida *L.*
- VII. Fructus monocarpus multilocularis loculis monospermis, stamina 4, 5 aut plura.**
- GUETTARDA**
scabra *Vent.*
matthiola scabra *L.*
- VIII. Fructus monocarpus multilocularis loculis polyspermis, stamina 5 aut plura.**
- HAMELLIA**
patens *L.*
- RONDÉLÉTIA**
à trois fleurs. Antilles, s. ch. 5
- GÉNIPA**
d'Amérique. Am. m., s. ch. 5
- GARDÉNIA**
à grandes fleurs. cap, or. 5
(orn.)
verticillé. s. ch. 5
- V. 1 fruit à 2 loges monospermes, 4 étamines.**
- IXORA**
écarlate. Am. m., s. ch. 5 (orn.)
blanc. indé, s. ch. 5
- ERNODÉA**
des rivages. Antilles, s. ch. 5
- VI. 1 fruit à 2 loges monospermes, 5 étamines.**
- SÉRISSE**
fétide. Japon, s. ch. 5
- CHIOCOCOA**
à grappes. Am. m., s. ch. 5
- PSYCHOTRIA**
ondulé. Am. m., s. ch. 5
- CAPÉ**
d'Arabie. As., s. ch. 5 (écon., méd.)
- PÉDÉRIA**
fétide. Indé, s. ch. 5
- VII. 1 fruit à plusieurs loges monospermes, 4, 5 ou un plus grand nombre d'étamines.**
- GUETTARDA**
rude. Antilles, s. ch. 5
- VIII. 1 fruit à plusieurs loges polyspermes, 5 étamines ou plus.**
- HAMELLIA**
ouvert. Am. m., s. ch. 5

IX. Flores aggregati supra receptaculum commune, aut rarius coadunati.

MITCHELLA
repens L.

OPERCULARIA Gærtner.
paleata Young.
sessiliflora Juss.
aspera Gærtner.

CEPHALANTHUS
occidentalis L.

ORDO III.

CAPRIFOLIA.

I. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla monopetala.

LINNÆA
borealis L.

TRIOSTEUM
perfoliatum L.

SYMPHORICARPOS (*Lonicera* L.)
parviflora.

DIERVILLA (*Lonicera* L.)
lutea.

LONICERA.

I. Caule volubili.

parviflora Lmk. }
dioica H. K. }
caprifolium L.
periclymenum L.
sempervirens L.

2. Caule recto, pedunculis bifloris.

tatarica L.
pyrenaica L.
nigra L.
coerulea L.
xylosteon L.
alpigena L.

II. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla sub-polypetala.

VISCUM
album L.

IX. Fleurs rapprochées sur un réceptacle commun, ou plus rarement réunies.

MITCHELLA
rampant. Am. s. h

OPERCULAIRE
à paillettes. N. Holl., or. ψ
à fleurs sessiles. N. Holl., or. ψ
à fruit rude. N. Holl., or. ψ

CÉPHALANTE
d'occident. Am. s. h (orn.)

ORDRE III.

LES CHÈVREFEUILLES.

I. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle monopétale.

LINNÉE
boréale. Alpes. h

TRIOSTÉUM
perfolié. Am. s. ψ

SYMPHORINE
à petites fleurs. Am. s. h

DIERVILLA
jaune. Am. s. h (orn.)

CHÈVREFEUILLE.

I. Tige grimpante.

à petites fleurs. Am. s. h (orn.)
des jardins. F. m. h (orn.)
des bois. F. h (orn.)
toujours vert. Am. s. h (orn.)

2. Tige droite, pédoncules à 2 fleurs.

de Tartarie. h (orn.)
des Pyrénées. F. h (orn.)
à fruit noir. F., Alpes. h (orn.)
à fruit bleu. F., Alpes. h (orn.)
velu. F., Alpes. h (orn.)
des Alpes. F. h (orn.)

II. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle presque polypétale.

GUI
blanc. F. h (méd.)

III. *Calix bracteatus, stylus nullus, stigmata 3, corolla monopetala.*

VIBURNUM

tinus L.

— latifolius.

nudum L.

lentago L.

prunifolium L.

pyrifolium.

cassinoides L.

punicifolium.

lantana L.

— canadensis.

dentatum L.

— longifolium.

acerifolium L.

opulus L.

— sterilis.

HORTENSIA

rosea

hydrangea hortensia smith. }

SAMBUCUS

ebulus L.

canadensis L.

nigra L.

— virescens.

— laciniata L.

racemosa L.

IV. *Calix simplex, stylus 1, corolla subpolypetala.*

CORNUS

sanguinea L.

alba L.

stricta l'Her.

paniculata l'Her. }

racemosa Lmk. }

sericea l'Her. }

anomum Mill. }

cerulea Lmk. }

circinata l'Her. }

rugosa Lmk. }

III. Calice accompagné de bractées, style nul, 3 stigmates, corolle monopétale.

VIOIRNE

laurier-tin. Esp. ♀ (orn.)

— à larges feuell.

nue. Am. s. ♀ (orn.)

luisante. Am. s. ♀ (orn.)

à feuell. de prunier. Am. s. ♀ (orn.)

à feuell. de poirier. Am. s. ♀ (orn.)

à feuell. de cassiné. Am. s., or. ♀

à feuell. de grenadier. Am. s., or. ♀

cotonneuse. F. ♀

— de Canada.

dentée. Am. s. ♀ (orn.)

— à longues feuell.

à feuell. d'érable. Am. s. ♀ (orn.)

obier. F. ♀ (orn.)

— boule de neige. (orn.)

HORTENSIA

rose. jap., or. ♀ (orn.)

SUREAU

hiéble. F. ♀ (méd.)

de Canada. ♀

noir. F. ♀ (écon., méd.)

— vert.

— lacinié.

à grappes. F. ♀ (orn.)

IV. Calice simple, 1 style, corolle presque polypétale.

CORNOUILLER

sanguin. F. ♀ (écon.)

blanc. Am. s. ♀ (orn.)

élancé. Am. s. ♀ (orn.)

paniculé. Am. s. ♀ (orn.)

à fruit bleu. Am. s. ♀ (orn.)

à feuell. rondes. Am. s. ♀ (orn.)

florida L.
 mascula L.
 — flava.
 alternifolia L.

succica L.
 canadensis L.

HEDERA
 helix L.

à grande fleur. Am. s. ♀ (orn.)
 mâle. F. ♀ (écon.)
 — à fruit jaune.
 à feuell. alternes. Am. s. ♀
 (orn.)
 de Suède. ♀
 de Canada. ♀

LIERRE
 commun. F. ♀ (orn., écon.)

CLASSIS XII.

CLASSE XII.

DICOTYLEDONES DICOTYLÉDONS

POLIPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(Stamina epigyna.)

(Étamines sur le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

ARALIÆ.

LES ARALIES.

ARALIA

spinosa L.
 racemosa L.
 hispida Michx.
 nudicaulis L.

ARALIA

épineux. Am. s. ♀ (orn.)
 à grappes. Am. s. ♀
 velu. Am. s. ♀
 à tiges nues. Am. s. ♀

PANAX

quinquefolium L.
 aculeatum H. K.
 zanthoxylum trifoliatum L. }

PANAX

ginseng. chine, Am. s. ♀ (méd.)
 épineux. chine, or. ♀

ORDO II.

ORDRE II.

UMBELLIFERÆ.

LES OMBELLIFÈRES.

ÆGOPODIUM

podagraria L.

ÆGOPODIUM

podagraire. F. ♀

PIMPINELLA

saxifraga L.
 magna L.
 — rubens.
 dissecta Retz.
 peregrina L.
 dioica L.
 anisum L.

BOUCAGE

saxifrage. F. ♀
 élevé. F. ♀
 — rouge.
 lacinié. suisse. ♀
 étranger. ital. ♀
 dioïque. F. ♀
 anis. orient. ☉ (écon., méd.)

CARUM

caryi L.

APIUM

petroselinum L.
 — crispum.
 — tuberosum.
 graveolens L.
 — celeri.

ANETHUM

segetum L.
 graveolens L.
 fœniculum L.

SMYRNIUM

olusatrum L.
 perfoliatum L.

PASTINACA

sativa L.
 opopanax L.
 lucida L.
 dissecta Vent.

THAPSIA

villosa L.
 garganica L.

SESELI

montanum L.
 annuum L.
 ammoides L.
 elatum L.
 tortuosum L.

IMPERATORIA

ostruthium L.
 sylvestris. }
 angelica sylvestris L. }
 verticillaris. }
 angelica verticillaris L. }

CHÆROPHYLLUM

sylvestre L.
 bulbosum L.
 temulum L.
 aromaticum L.
 aureum L.
 hirsutum L.
 coloratum L.

SCANDIX

odorata L.

CARYI

cultivé. F. ♂ (écon., méd.)

APIUM

persil. sardaigne. ♂ (alim.)
 — crépu.
 — tubéreux.
 des marais. F. ♂
 — céleri. (alim., méd.)

ANET

des moissons. Portugal. ☉
 fétide. Esp. ☉
 fenouil. F. m. ♀ (écon., méd.)

MACERON

à feuill. ternées. F. ♂
 perfolié. orient. ♂

PANAIS

cultivé. F. ♂ (alim., méd.)
 opopanax. sicile. ♀ (méd.)
 luisant. mahon. ♂
 découpé. syrie, or. ♂

THAPSIA

velu. F. m. ♀
 lisse. F. m. ♀

SÈSÉLI

de montagne. F. ♀
 annuel. F. ♂
 à feuill. d'ammi. Portugal. ☉
 tuberculéux. F. ♀
 tortueux. F. m. ♂

IMPÉRATEIRE

des Alpes. F. ♀ (méd.)
 des prés. F. ♀
 verticillée. F. ♀

MYRRHIS

sauvage. F. ♀
 bulbeux. F. ♂
 tacheté. F. ♂
 aromatique. Autriche. ♀
 jaune. F. ♀
 velu. F. ♀
 coloré. illyrie. ♂

CERFEUIL

musqué. F., Alpes. ♀ (écon.)

pecten L.
 australis L.
 pinnatifida *vent.* /
 cerefolium L.
 antriscus L.
 trichosperma L.

CORIANDRUM
 sativum L.
 testiculatum L.

ÆTHUSA
 cynapium L.
 meum L.
 buniis L.

CICUTA
 virosa L.
 maculata L.

PHELLANDRIUM
 aquaticum L.
 mutellina L.

OENANTHE
 fistulosa L.
 crocata L.
 prolifera L.
 globulosa L.
 pimpinelloïdes L.

CUMINUM
 cyminum L.

BUBON
 macedonicum L.
 rigidius L.
 galbanum L.
 levigatum H. K.
 gummiferum L.

SISON
 segetum L.
 amomum L.
 canadense L.
 ammi L.
 inundatum L.
 verticillatum L.

SIMUM
 angustifolium L.
 latifolium L.
 nodiflorum L.
 repens L.

peigne de Vénus. F. ☉
austral. F. m. ☉
pinnatifide. perse. ☉
cultivé. F. ☉ (écon.)
hérissé. F. ☉
à longues soies. orient. ☉

CORIANDRE
cultivée. orient. ☉ (écon., méd.)
bilobée. Eur. austr. ☉

ÆTHUSA
fétide ou petite ciguë. F. ☉ (vén.)
méum. F., Alpes. ♀ (méd.)
à feuell. de coriandre. F. ♂

CIGUE
aquatique. F. ♀ (vén.)
tachetée. Am. s. ♀ (vén.)

PHELLANDRIUM
aquatique. F. ♂ (vén.)
des Alpes. F. ♀

OENANTHÉ
fistuleuse. F. ♀
à feuell. de persil. F. ♀
prolifère. sicile. ♀
globuleuse. F. ♂
à feuell. de boucage. F. ♀

CUMIN
officinal. orient. ☉ (méd.)

BUBON
de Macédoine. ♂
à feuell. roides. or. ♀
galbanum. cap, or. ♀ (méd.)
lisse. cap, or. ♀
gommifère. cap, or. ♀

SISON
des moissons. F. ♂
amomum. F. ♂
de Canada. ♀
ammi. orient. ☉
aquatique. F. ☉
verticillé. F. ♀

BERLE
à feuell. étroites. F. ♀
à feuell. larges. F. ♀
nodiflore. F. ♀
rampante. F. ♀

sisarum L.
falcaria L.
siculum L.

ANGELICA

archangelica L.

lucida L.
atropurpurea L.
razoulii Gouan.
triloba.
laserpitium trilobum Jacq. }

LIGUSTICUM

levisticum L.

peloponense L.
pyrenæum Gouan.
austriacum Jacq.
peregrinum Jacq.

HERACLEUM

sphondylium L.
angustifolium L.
alpinum L.
laciniatum.
amplifolium Lapeyr.

LASERPITIUM

latifolium L.
gallicum L.
— crispum.
siler L.
halleri L.
simplex L.
thapsioides Desf.
triquetrum Vent.

FERULA

communis L.
ferulago L.
tingitana L.
orientalis L.
nodiflora L.

PEUCEDANUM

officinale L.
altissimum.
alsaticum Poiret. }
album. }
an minus L. }

chervi. F. ♀ (alim.)
falciforme. F. ♀
de Sicile. ♂

ANGÉLIQUE

de Bohême. F., Alpes. ♂ (écon.,
méd.)
luisante. Am. s. ♂
noir-pourpre. Canada. ♀
de Razoul. F., Pyrénées. ♀
trilobée. Italie. ♀

LIVÊCHE

officinale. F., Alpes. ♀ (écon.,
méd.)
cicutaire. Carniole. ♀ (orn.)
des Pyrénées. F. ♀
d'Autriche. F. ♀
à feuell. de cèleri. Portugal. ♂

BERCE

des prés. F. ♀ (écon., méd.)
à feuell. étroites. F. ♀
des Alpes. F. ♀
laciniée. Sibérie. ♀
à grandes feuell. Pyrénées. ♀

LASER

à larges feuell. F. ♀
cunéiforme. F. ♀
— crépu.
lancéolé. F. ♀
de Haller. F., Alpes. ♀
à tiges simples. F., Alpes. ♀
jaune. Barbarie, Or. ♀
triangulaire. Asie, Or. ♀

FÉRULE

commune. Eur. aust. ♀
luisante. Barbarie. ♀
de Tanger. Barbarie. ♀
d'orient. ♀ (orn.)
nodiflore. Orient. ♀

PEUCÉDANUM

officinal. F. ♀ (méd.)
gigantesque. ♀
blanc. ♀

tenuifolium *Poiret.*
silais *L.*

à feuell. menues. Ψ
des prés. *F.* Ψ

CACHRYS

tomentosa *Desf.* }
panacisfolia *Vahl.* }
libanotis *L.*
sicula *L.*

CACHRYS

cotonneux. barbare. Ψ
libanotis. sicile, or. Ψ
de Sicile. or. Ψ

CRITHMUM

maritimum *L.*

CRITHMUM

maritime. *F.* Ψ (écon.)

ATHAMANTA

libanotis *L.*
condensata *L.*
sibirica *L.*
cervaria *L.*
oreoselinum *L.*
sicula *L.*
cretensis *L.*
annua *L.*

ATHAMANTA

libanotis. suède. Ψ
à fleurs denses. sibérie. Ψ
de Sibérie. Ψ
glaucue. *F.* Ψ
oreosolinum. *F.* Ψ
de Sicile. *F. m.*, or. Ψ
de Crète. *F.*, Alpes. Ψ
annuelle. orient. $\odot$

SELINUM

chabrai *Murr.*
palustre *L.*
pyrenæum *Gouan.*
seguieri *L. f.*
peucedanoides.
austriacum *L.*
carvisfolia *L.*
monnieri *L.*

SÉLINUM

de Chabréus. *F.* Ψ
des marais. *F.* Ψ
des Pyrénées. *F.* Ψ
de Séguier. Italie. Ψ
à feuell. de peucedanum. Ψ
d'Autriche. *F.* Ψ
à feuell. de carvi. *F.*, Alp. Ψ
de Lemonnier. *F. m.* $\odot$

CONIUM

maculatum *L.*

CONIUM

ciguë des jardins. *F.* σ

BUNIUM

bulbocastanum *L.*
minus. *Gouan.*

BUNIUM

terre-noir. *F.* Ψ
petit. *F. m.* Ψ

AMMI

majus *L.*
visnaga. }
daucus visnaga *L.* }

AMMI

officinal. *F.* $\odot$ (méd.)
bisnagre. *F.* $\odot$

DAUCUS

meoides.
carota *L.*

CAROTTE

à feuell. de méum. Ψ
cultivée. *F.* σ (alim., méd.)

CAUCALIS

grandiflora *L.*
daucoides *L.*
latifolia *L.*
platicarpus *L.*

CAUCALIS

à grandes fleurs. *F.* $\odot$
à feuell. de carotte. *F.* $\odot$
à larges feuell. *F.* $\odot$
à gros fruit. *F.* $\odot$

leptophylla L.
anthriscus.
nodosa.

à feüll. menues. F. ☉
anthriscus. F. ☉
nodiflore. F. ☉

TORDYLIUM

syriacum L.
officinale L.
apulum L.
maximum L.

TORDYLIUM

de Syrie. orient. ☉
officinal. F. m. ☉
d'Italie. ☉
lancéolé. F. m. ☉

HASSELQUISTIA

ægyptiaca L.

HASSELQUISTIA

d'Egypte. ☉

ARTEDIA

squamata L.

ARTEDIA

écailleux. orient. ☉

BUPLEVRUM.

1. Herbacéu.

rotundifolium L.
longifolium L.
stellatum L.
petræum L.
ranunculoides L.
falcatum L.
semicompositum L.
odontites L.
junceum L.
tenuissimum L.
rigidum L.

1. Tiges herbacées.

à feüll. rondes. F. ☉
à feüll. longues. F., Alpes. ♀
étoilé. F., Alpes. ♀
des rochers. F., Alpes. ♀
renoncule. F., Alpes. ♀
falciforme. F. ♀
demi-composé. F. m. ☉
odontites. F. m. ☉
jonciforme. F. ☉
filiforme. F. ☉
à feüll. dures. F. m. ♀

2. Fruticosa.

spinosum L. f.
fruticescens L.
fruticosum L.
coriaceum l'Her.
gibraltaricum Lmk.
obliquum vahl.
arborescens Jacq. }

2. Tiges ligneuses.

épineux. F. m. ♀
à feüll. étroites. Barb., or. ♀
arbrisseau. F. m. ♀ (orn.)

coriace. barbarie, or. ♀

ECHINOPHORA

spinosa L.
tenuifolia L.

ECHINOPHORA

épineux. F. m. ♀
à petites feüll. orient. ♀

ASTRANTIA

major L.
minor L.

ASTRANTIA

à grandes fleurs. F., Alpes. ♀
(orn.)
à petites fleurs. F., Alpes. ♀

SANICULA

europæa L.
marylandica L.

SANICLE

d'Europe. F. ♀ (méd.)
de Maryland. ♀

ERYNGIUM

planum L.
 aquaticum Z.
 dichotomum Desf.
 pusillum Z.
 alpinum Z.
 spina-alba Vill.
 campestre Z.

dilatatum Zmk.
 bourgati Gouan.
 maritimum Z.
 tenue Desf.
 suaveolens Brouss.

HYDROCOTYLE

vulgaris Z.
 sibthorpioides Zmk.
 americana Z.
 spananthe Willd.
 spananthe paniculata Jacq. }

LAGOECIA

cuminoides Z.

ERYNGIUM

à feuell. planes. F. ♂
 aquatique. Am. s. ♀
 dichotome. Barbarie. ☉
 petit. Barbarie, or. ♀
 des Alpes. F. ♀
 à épines blanches. F., Alp. ♀
 des champs, ou chardon Ro-
 land. F. ♀ (méd.)
 dilaté. Maroc. ♀
 bourgati. F. m. ♀
 maritime. F. ♀
 filiforme. Barbarie. ☉
 odorant. canaries. ☉

HYDROCOTYLÉ

écuelle d'eau. F. ♀
 à feuell. de sibthorpia.
 d'Amérique. Am. s. ♀
 barbu. Am. m. ☉

LAGECIA

à feuell. de cumin. F. m. ☉

CLASSIS XIII.

CLASSE XIII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(Stamina hypogyna.)

(Étamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

RANUNCULACEÆ.

LES RENONCULES.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

I. Capsules monospermes ne s'ouvrant pas.

CLEMATIS.

CLÉMATITE.

I. Scandentes.

I. Tiges grimpantes.

viorna Z.
 viticella Z.
 crispa Z.
 florida Thunb.

orientalis Z.
 vitalba Z.

viorne. Am. s. ♀
 bleue. Esp. ♀ (orn.)
 crépue. caroline. ♀
 à grandes fleurs. Japon, or. ♀
 (orn.)
 d'orient. ♀
 brillante. F. ♀

virginiana L.
 flammula Z.
 cirrhosa Z.
 calycina H. K. }
 balearica Lmk. }

2. *Erectæ.*

erecta Z.
 integrifolia Z.

ATRAGÈNE

alpina Z.
 — flava.
 indica.

THALICTRUM

alpinum Z.
 foetidum Z.
 tuberosum Z.
 minus Z.
 majus Jacq.
 angustifolium Z.
 flavum Z.
 angulosum.
 glaucum.
 rugosum.
 nigricans Jacq.
 medium Jacq.
 atropurpureum Jacq. }
 aquilegifolium L. }

ANEMONE

hepatica Z.
 vernalis Z.
 pulsatilla Z.
 alpina Z.
 apiifolia Wild.
 coronaria Z.
 stellata Lmk. }
 hortensis L. }
 baldensis Z.
 sylvestris Z.
 virginiana Z.
 dichotoma Z.
 trifolia Z.
 nemorosa Z.
 ranunculoïdes Z.
 narcissiflora Z.
 thalictroïdes Z.

de Virginie. ♀
 odorante. F. m. ♀ (orn.)
 à vrilles. barbar. ♀ (orn.)
 à grand calice. Mahon. ♀

2. Tige droite.

droite. F. m. ♀
 à feuell. entières. Autriche. ♀

ATRAGÈNE

des Alpes. F. ♀
 — jaune.
 des Indes. s. ch. ♀

PIGAMON

des Alpes. F. ♀
 fétide. F. ♀
 tubéreux. F., Pyrén. ♀
 des bois. F. ♀
 élevé. Autriche. ♀
 à feuell. étroites. F. ♀
 des prés. F. ♀
 anguleux. ♀
 glauque. ♀
 ridé. F. m. ♀
 noir. Autriche. ♀
 moyen. Hongrie. ♀
 à feuell. d'ancolie. F., Alp. ♀
 (orn.)

ANÉMONE

hépatique. Eur. ♀ (orn.)
 printanière. F. ♀
 pulsatille. F. ♀
 des Alpes. F. ♀
 à feuell. de persil. F., Alpes. ♀
 des jardins. orient. ♀ (orn.)
 étoilée. F. m. ♀
 du mont Baldus. F., Alpes. ♀
 sauvage. suisse. ♀
 de Virginie. ♀
 dichotome. Canada. ♀
 à trois feuell. F. ♀
 des bois. F. ♀
 reconcule. F. ♀
 à fleurs de narcisse. F., Alp. ♀
 à feuell. de pigamon. Am. s. ♀

ADONIS

æstivalis *z.*
 autumnalis *z.*
 vernalis *z.*

ANAMENIA *vent.*

coriacea *vent.* }
 adonis capensis *z.* }

RANUNCULUS.

1. *Foliis simplicibus.*

flammula *z.*
 lingua *z.*
 gramineus *z.*
 nodiflorus *z.*
 pyrenæus *z.*
 amplexicaulis *z.*
 parnassifolius *z.*
 bullatus *z.*
 ficaria *z.*
 thora *z.*

2. *Foliis dissectis et divisis.*

creticus *z.*
 spicatus *Desf.*
 auricomus *z.*
 sceleratus *z.*
 pennsylvanicus *z. f.* }
 canadensis *Jacq.* }
 aconitifolius *z.*
 platanifolius *z.*
 asiaticus *z.*
 glacialis *z.*
 rutæfolius *z.*
 nivalis *z.*
 alpestris *z.*
 hirsutus *curtis.* }
 pallidior *Vill.* }
 philonotis *Retz.* }
 bulbosus *z.*
 repens *z.*
 acris *z.*
 lanuginosus *z.*
 chærophyllus *z.*
 arvensis *z.*
 muricatus *z.*
 paryiflorus *z.*
 falcatus *z.*
 hederaceus *z.*

ADONIS

d'été. *F.* ☉
 d'automne. *F.* ☉
 printanier. *F.*, Alpes. *ψ*

ANAMÉNIA

à feuell. coriaces. cap, or. *ψ*

RENONCULE.

1. Feuilles entières.

petite douve, *F.* *ψ*
 lancéolée. *F.* *ψ*
 à feuell. de gramen. *F.* *ψ*
 à fleurs sessiles. *F.* *ψ*
 des Pyrénées. *F.* *ψ*
 amplexicaule. *F.*, Alpes. *ψ*
 à feuell. de parnassia. *F.*, Alp. *ψ*
 bulleuse. barbarie. *ψ*
 petite chélidoine. *F.* *ψ* (méd.)
 thora. *F.*, Alpes. *ψ*

2. Feuilles découpées.

de Crète. *ψ*
 à épis. barbarie. *ψ*
 printanière. *F.* *ψ*
 scélérate. *F.* ☉ (vén.)
 de Pensylvanie. ♂
 à feuell. d'aconit. *F.*, Alpes. *ψ*
 à feuell. de platane. *F.*, Alp. *ψ*
 d'Asie. *ψ*
 des glaciers. *F.*, Alpes. *ψ*
 à feuell. de rue. *F.*, Alpes. *ψ*
 des neiges. *F.*, Alpes. *ψ*
 des Alpes. *F.* *ψ*

velue. *F.* ☉

bulbeuse. *F.* *ψ* (vén.)
 rampante. *F.* *ψ* (vén.)
 âcre. *F.* *ψ* (vén.)
 lanugineuse. *F.* *ψ*
 à feuell. de cerfeuil. *F.* *ψ*
 des champs. *F.* ☉
 hérissée. *F.* ☉
 à petites fleurs. *F.* ☉
 falciforme. *F.* m. ☉
 à feuell. de lierre. *F.* *ψ*

aquatilis L.
 — circinatus.
 peucedanoïdes.

MYOSURUS

minimus L.

II. Capsulæ polyspermæ.

TROLLIUS

europæus L.

HELLEBORUS

hyemalis L.

niger L.

viridis L.

fœtidus L.

lividus H. K.

ISOPYRUM

thalictroïdes L.

fumarioides L.

NIGELLA

damascena L.

sativa L.

arvensis L.

hispanica L.

orientalis L.

GARIDELLA

nigellastrum L.

AQUILEGIA

vulgaris L.

alpina L.

viridiflora H. K.

canadensis L.

DELPHINIUM.

1. Unicapsularia.

consolida L.

ajacis L.

2. Capsulæ 3 aut 5.

ambiguum L.

peregrinum L.

grandiflorum L.

elatum L.

— hirsutum.

— hybridum Wild. }

staphysagria L.

aquatique. F. ψ (vén.)

— arrondie.

à feuell. de peucedanum. F. ψ

MYOSURUS

petit. F. ⊙

II. Capsules polyspermes.

TROLLIUS

d'Europe. F., Alpes. ψ

HELLEBORE

d'hiver. F., Alpes. ψ

noir. F., Alpes. ψ (orn.)

vert. F., Alpes. ψ

pié de griffon. F. ψ

livide. corse. ψ

ISOPYRUM

à feuell. de pigamon. F. ⊙

à feuell. de fumeterre. F. ψ

NIGELLE

à involucre. F. m. ⊙ (orn.)

cultivée. orient. ⊙

des champs. F. ⊙

d'Espagne. F. m. ⊙

d'orient. ⊙

GARIDELLE

de Provence. ⊙

ANCOLIE

des jardins. F. ψ (orn.)

des Alpes. F. ψ

à fleurs vertes. sibérie. ψ

de Canada. ψ (orn.)

DELPHINIUM.

1. Une seule capsule.

des blés. F. ⊙

d'Ajax. suisse. ⊙ (orn.)

2. 3 ou 5 capsules.

de deux couleurs. maroc. ⊙

étranger. barbarie. ⊙

à grandes fleurs. sibérie. ψ

élevé. sibérie. ψ (orn.)

velu. sibérie. ψ

staphysaigre. F. m. ♂ (vén.,
 méd.)

ACONITUM.

1. *Corolla flavæ.*

lycoctonum L.
pyrenaicum L.
anthora L.

2. *Corolla caruleæ.*

napellus L.
cammarum L.

CALTHA

palustris L.

PÆONIA

mascula L. }
corallina Retz. }
femina L. }
officinalis Retz. }
villosa. }
humilis Retz. }
lobata.
albiflora Pallas.
anomala L.
tenuifolia L.

ZANTHORHIZA l'Her.

apiifolia l'Her.

III. *Germe unicum, bacca unilocularis polysperma.*

ACTÆA

spicata L.
— alba.
— rubra.
racemosa L.

PODOPHYLLUM

peltatum L.

ORDO II.

PAPAVÉRACEÆ.

I. *Stamina indefinita, antheræ filamentis adnatæ.*

SANGUINARIA

canadensis L.

ARGÉMONE

mexicana L.

ACONIT.

1. *Corolles jaunes.*

tue-loup. F., Alpes. ψ (vén.)
des Pyrénées. ψ (vén.)
anthora. F., Alpes. ψ (vén.)

2. *Corolles bleues.*

napel. F., Alpes. ψ (vén.)
à grandes fleurs. F., Alpes. ψ
(vén.)

CALTHA

des marais. F. ψ (orn.)

PIVOINE

mâle. suisse. ψ (orn., méd.)

femelle. F., Alp. ψ (orn., méd.)

velue. esp. ψ (orn.)

lobée. ψ (orn.)

blanche. sibérie. ψ (orn.)

laciniée. sibérie. ψ (orn.)

à feuil. menues. sibér. ψ (orn.)

ZANTHORHIZA

à feuil. de persil. Am. s. ψ

III. *1 seul ovaire, baie polysperme à une loge.*

ACTÆA

des Alpes. F. ψ (méd.)

— à fruit blanc. Am. s. ψ

— à fruit rouge.

à grappes. Am. s. ψ

PODOPHYLLUM

en bouclier. Am. s. ψ

ORDRE II.

LES PAVOTS.

I. *Étamines indéfinies, anthères attachées le long du bord des filets.*

SANGUINAIRE

de Canada. ψ

ARGÉMONE

du Mexique. ☉

PAPAVER.

PAVOT.

1. *Capsulis hispids.*

hybridum L.
argemone L.
alpinum L.
nudicaule L.

2. *Capsulis glabris.*

rhoeas L.
dubium L.
cambricum L.
orientale L.
somniaferum L.

— nigrum L.

CHELIDONIUM

glaucium L.
corniculatum L.
hybridum L.
majus L.
— quercifolium.

II. *Stamina definita.*

BOCCONIA

frutescens L.

HYPECOUM

procumbens L.

FUMARIA

cucullaria L.
bulbosa L.
solida *smith.*
nobilis L.
fungosa *H. K.*
sempervirens L.
lutea L.
vesicaria L.
parviflora *Lmk.*
officinalis L.
capreolata L.
claviculata L.
spicata L.

1. Capsules hérissées.

hybride. F. ☉
argémone. F. ☉
des Alpes. F. ☿
à tiges nues. F., Alpes. ☿

2. Capsules glabres.

coquelicot. F. ☉ (méd.)
à long fruit. F. ☉
jaune. F., Alpes. ☿
d'orient. ☿ (orn.)
des jardins. F. ☉ (orn., méd.,
écon.)
— à graines noires.

CHÉLIDOINE

glaucue. F. ♂
cornue. F. m. ☉
hybride. F. m. ☉
officinale. F. ☿ (méd.)
— à feuil. de chêne.

II. Etamines définies.

BOCCONIA

arbrisseau. Am. m., s. ch. ♀

HYPÉCOUM

tombant. F. ☉

FUMETERRE

capuchon. Am. s. ☿
bulbeuse. F. ☿ (orn.)
solide. F. ☿
odorante. Sibérie. ☿
fongueuse. Am. s. ☿
toujours verte. Am. s. ☉
jaune. Barbarie. ☿
vésiculeuse. cap. ☉
à petites fleurs. F. m. ☉
officinale. F. ☉ (méd.)
à vrilles. F. m. ☉
claviculée. F. m. ☉
à épis. F. m. ☉

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. *Siliquosæ.*

RAPHANUS

- sativus L.
- oleifer.
- niger.
- raphanistrum L.

SINAPIS

- arvensis L.
- alba L.
- nigra L.
- incana L.
- pubescens L.
- pyrenaica L.
- hispida *schousb.*
- cernua *Thunb.*
- junceæ L.
- brassicata L.
- erucoides L.

BRASSICA

- cheiranthos *Vill.*
- eruca L.
- erucastrum L.
- richeri *Vill.*
- alpina L.
- vesicaria L.
- oleracea L.
- sylvestris.
- sabellica.
- gongliodes.
- botrytis.
- viridis.
- capitata.
- rubra.
- rapa L.
- napus L.
- arvensis L.
- campestris L.
- orientalis L.

TURRITIS et ARABIS L.

- glabra L.
- hirsuta L.
- arabis hispida *Lmk.* }

ORDRE III.

LES CRUCIFÈRES.

I. *Siliquenses.*

RAIFORT

- cultivé. chine. ☉ (écon.)
- radis.
- noir. ♂
- des moissons. F. ☉

MOUTARDE

- des champs. F. ☉
- blanche. F. ☉
- sénévé. F. ☉ (écon.)
- incane. F. ♂
- pubescente. sicile, or. ♀
- des Pyrénées. F. ♂
- hérissée. maroc. ☉
- penchée. chine. ☉
- jonciforme. chine. ☉
- à feüill. de chou. chine. ☉
- fausse roquette. F. m. ☉

CHOU

- à fleur de cheiri. F., Alpes. ♂
- roquette. F. ☉
- fausse roquette. F. m. ☉
- de Richer. F., Alpes. ♀
- des Alpes. F. ♀
- vésiculeux. Espagne. ☉
- commun. F. ♂ (alim.)
- sauvage. (alim.)
- frisé. (alim.)
- rave. (alim.)
- fleur. (alim.)
- vert. (alim.)
- pommé. (alim.)
- rouge. (alim.)
- turneps. F. ♂ (alim.)
- navet. F. ♂ (alim.)
- violet. F. ♀
- des champs. F. ☉
- d'orient. F. ☉

TOURETTE

- glabre. F. ♂
- velue. F. ♂

hispida L.
bellidifolia L.
verna L.
italiana L.
pendula L.
turrita L.

HESPERIS

matronalis L.
tristis L.
lyrata Lmk.
africana L.
laxa Lmk.
verna L.
maritima.
cheiranthus maritimus L. }
chia L. }
cheiranthus chius L. }
linifolia Pourret.

CHEIRANTHUS

cheiri L.
mutabilis l'Her.
fenestralis L.
sinuatus L.
incanus L.
annuus L.
græcus.
hesperis æstiva Lmk. variet B. }
littoreus L.
tristis L.
tricuspidatus L.
farsetia L.

ERYSIMUM

officinale L.
barbarea L.
præcox Smith.
alliaria L.
repandum L.
cheiranthus paniculatus Lmk. }
cheiranthoides L.
hieracifolium L.
murale.
cheiranthus erysimoides L. }
alpinum.
cheiranthus alpinus L. }
quadrangulum.
cheiranthus quadrangulus l'Her. }
cheiranthus cornutus Lmk.

hérissée. F., Alpes. ♀
à feuell. de paquerette. F., Alp. ♀
printanière. F., Alpes. ♀
paniculée. F. ☉
pendante. F., Alpes. ♂
inclinée. F., Alpes. ♂

JULIENNE

cultivée. F., Alpes. ♂ (orn.)
à fleurs brunes. Autriche. ♂
en lyre. Sibérie. ☉
d' Afrique. F. m. ☉
à fleurs lâches. Tartarie. ☉
printanière. F. m. ☉
de Mahon. F. m. ☉ (orn.)
de Chio. orient. ☉
à feuell. de lin. Esp. ♀

GIRÔFLÉE

jaune. F. ♂ (orn.)
changeante. canaries, or. ♀
fenestrelle. ♂ (orn.)
sinuée. F. ☉
incane. Esp. ♀
quarantain. Eur. austr. ☉ (orn.)
grecque. orient. ☉ (orn.)
des rivages. F. m. ♂
brune. F. m., or. ♀
à trois pointes. F. m. ☉
de farset. barbarie, or. ♀

ERYSIMUM

officinal. F. ☉ (méd.)
à feuell. en lyre. F. ♀
printanier. F. ♂
alliaire. F. ♂ (méd.)
festonné. F. ☉
à petites fleurs. F. ☉
à feuell. d'epervière. F. ♂
des murailles. F. ♂
des Alpes. F. ♀
à long style. Sibérie. ♀

SISYMBRIUM.

1. *Siliquis declinatis levibus.*
nasturtium L.
palustre pollich. }
terrestre curtis. }
sylvestre L.
amphibium L.
pyrenaicum L.
tanacetifolium L.
tenuifolium L.
hispanicum Jacq.
2. *Siliquis sessilibus axillaribus.*
polyceratium L.
supinum L.
bursifolium L.

3. *Caule nudo.*

- murale* L. }
erucastrum Gouan. }
vimineum L.
barrelieri L.
repandum Wild. }
monense All. }
arenosum L.

4. *Foliis pinnatis.*

- sophia* L.
altissimum L.
irio L.
columnæ Jacq.
loeselii L.
obtusangulum Wild. }
jacobæfolium Bergeret. }

5. *Foliis integris.*

- strictissimum* L.
apetalum.

CARDAMINE.

1. *Foliis simplicibus.*

- alpina Wild.* }
bellidifolia All. }
asarifolia L.

2. *Foliis ternatis.*

- resedifolia* L.
trifolia L.

CRESSON.

1. *Siliques lisses et abaissées.*
de fontaine. F. ♀ (alim., méd.)
des marais. F. ☉
sauvage. F. ☉
amphibie. F. ♀
des Pyrénées. F. ♀
à feuell. de tanaïs. F., Alp. ♀
fausse roquette. F. ♀
d'Espagne. F. ☉

2. *Siliques sessiles axillaires.*
à siliques nombreuses. F. ☉
couché. F. ☉
à feuell. de tabouret. F. ☉

3. *Tige nue.*

- des murailles.* F. ☉
grêle. F. ☉
de barrelier. F. m. ☉
sinué. F., Alpes. ♀
des sables. F., Alpes. ☉

4. *Feuilles pennées.*

- sophia.* F. ☉
élevé. F. ☉
irio. F. ☉
de Columna. F. ☉
de Loesel. F. ☉
à angles obtus. F., Alpes ☉

5. *Feuilles entières.*

- ramassé.* F., Alpes. ♀
sans pétales. ☉

CARDAMINÉ.

1. *Feuilles simples.*

- des Alpes.* F. ♀
à feuell. d'asarum. F., Alp. ♀

2. *Feuilles ternées.*

- à feuell. de réséda.* F., Alp. ♀
à feuell. ternées. F. ♀

3. *Foliis pinnatis.*

chelidonia L.
amara L.
impatiens L.
hirsuta L.
parviflora L.
pratensis L.

DENTARIA

enneaphylla L.
pinnata Lmk. }
heptaphyllos Vill. }
pentaphyllos L.

II. *Siliculosæ.*

RICOTIA

ægyptiaca L.

LUNARIA

rediviva L.
annua L.

BISCUTELLA

auriculata L.
levigata L.
apula L.

CLYPEOLA

jonthlaspi L.
maritima L.
alliacea. }
peltaria alliacea L. }

ALYSSUM.

1. *Fruticulosa.*

spinosum L.
saxatile L.
alpestre L.

2. *Herbacea.*

incanum L.
montanum L.
calicinum L.
campestre L.
clypeatum L.

3. *Siliculis inflatis.*

deltoidæum L.
sinuatum L.
utriculatum L.

3. Feuilles pennées.

à feuell. de chélidoine. F. ♀
amer. F. ♀
élastique. F. ♂
velu. F. ☉
à petites fleurs. F. ☉
des prés. F. ♀

DENTAIRE

à 9 feuell. F., Alpes. ☉
pennée. F., Alpes. ♀
à 5 feuell. F., Alpes. ♀

II. Les siliculeuses.

RICOTIA

d'Égypte. ☉

LUNAIRE

vivace. F. ♀ (orn.)
annuelle. F. ☉ (orn.)

BISCUTELLA

auriculé. F. m. ☉
à fruit lisse. F. ☉
à fruit rude. F. ☉

CLYPÉOLA

jonthlaspi. F. m. ☉
maritime. F. m. ♂
à odeur d'ail. Autriche. ♀

ALYSSON.

1. Tiges ligneuses.

épineux. F. m. ♀
des rochers. orient. ♀
des Alpes. F. ♀

2. Tiges herbacées.

blanc. F. ♂
de montagne. F., Alpes. ♀
à petites fleurs. F. ☉
des champs. F. ☉
en bouclier. Liban. ♂

3. Silicules renflées.

deltoidæ. syrie, or. ♀
sinué. Espagne. ♂
à utricules. orient. ♀

DRABA.

1. *Caule nudo.*

aizoïdes L.
alpina L.
verna L.
pyrenaïca L.

2. *Caule folioso.*

muralis L.
hirta L.
incana L.

COCHLEARIA

officinalis L.
danica L.
armoracia L.

draba L.
glastifolia L.

CORONOPUS

vulgaris.

SENEBIERA *dec.*

pinnatifida *dec.*
lepidium didymum L. }

IBERIS

semperflorens L.

sempervirens L.
saxatilis L.
cinerea.
gibraltarica L.
rotundifolia *wild.*
carnosa *wild.*
amara L.
umbellata L.
pinnata L.
linifolia L.
nudicaulis L.

THLASPI

arvense L.
campestre L.
alliaceum L.
saxatile L.
montanum L.
perfoliatum L.
alpestre L.
hirtum L.

DRABA.

1. *Tige nue.*

aizoïde. F., Alpes. ♀
des Alpes. F. ♀
printanier. F. ☉
des Pyrénées. F. ♀

2. *Tige feuillue.*

des murailles. F. ☉
hérissé. F. ♀
blanc. F., Alpes. ♂

COCHLEARIA

officinal. F. ♂ (méd.)
de Danemarck. ♂
cran de Bretagne. F. ♀ (écon.,
méd.)
draba. F. ♀
à feuell. de pastel. F. ♂

CORNE DE CERF

commune. F. ☉

SÉNÉBIÉRA

pinnatifide. AS. ♂

IBÉRIS

de tous les mois. sicile, or. ♀
(orn.)
toujours verte. F., Alpes. ♀
des rochers. F., Alpes. ♀
cendrée. esp., or. ♀
de Gibraltar. esp., or. ♀
à feuell. rondes. F., Alpes. ♀
à feuell. charnues. F., pyr. ♀
amère. F. ☉ (orn.)
ombellifère. esp. ☉ (orn.)
pennée. F. m. ☉
à feuell. de lin. F. m. ♂
à tige nue. F. ☉

THLASPI

à grandes siliques. F. ☉
pubescent. F. ♂
alliace. F. ☉
des rochers. F. ♂
de montagne. F., Alpes. ♀
perfoliè. F., Alpes. ♂
alpestre. F. ☉
velu. F. m. ♂

ceratocarpon L. f.

bursa pastoris L.

sativum.

lepidium sativum L. }

— latifolium.

— crispum.

nudicaule.

lepidium nudicaule L. }

rudérale.

lepidium rudérale L. }

LÉPIDIUM

perfoliatum L.

subulatum L.

procumbens L.

alpinum L.

petraeum L.

latifolium L.

iberis L.

cardamines L.

vesicarium L.

ANASTATICA

hierochuntica L.

VELLA

pseudocitysus L.

annua L.

MYAGRUM

perenne L.

orientale L.

rugosum L.

perfoliatum L.

sativum L.

paniculatum L.

saxatile L.

BUNIAS

spinosa L.

erucago L.

aegyptiaca L.

balearica L.

orientalis L.

KAKILE

maritima.

CRAMBE

maritima L.

tatarica L.

à fruit cornu. sibérie. ☉

bourse à berger. F. ☉

cresson alénois. ☉ (écon.,
méd.)

— à larges feuell.

— crépu.

à tige nue. F. ☉

sans pétales. F. ☉

LÉPIDIUM

perfolié. orient. ☉

en aléne. Esp. ☿

couché. F. ☉

des Alpes. F. ♀

des rochers. F. ☉

passe-rage. F. ♀ (écon.)

ibéris. F. ♀

à feuell. lyrées. Esp. ♂

vésiculeux. orient. ☉

ANASTATICA

rose de Jériko. Af. s. ☉

VELLA

faux cityse. orient, or. ☿

annuel. barbarie. ☉

CAMELINE

vivace. Allem. ♀

d'orient. ☉

ridée. F. m. ☉

amplexicaule. F. ☉

cultivée. F. ☉ (écon.)

paniculée. F. ☉

des rochers. F., Alpes. ♀

BUNIAS

épineux. égypte. ♂

tétragone. F. m. ☉

d'Égypte. ☉

de Mahon. ☉

d'orient. ♀

KAKILÉ

maritime. F. ☉

CRAMBÉ

maritime. F. ♀ (écon.)

de Tartarie. ♀

orientalis L.
hispanica L.
filiformis Jacq.
strigosa L'Her.

d'orient. ♀
d'Espagne. ☉
filiforme. ♀
des Canaries. or. ♀

ISATIS

tinctoria L.
lusitanica L.

PASTEL

des teinturiers. F. ♂ (arts.)
de Portugal. ☉

ORDO IV.**CAPPARIDES.****CLEOME**

gigantea L.
pentaphylla L.
spinosa L.
dodecandra L.
icosandra L.
arabica L.
viscosa L.
ornithopodioides L.

CLÉOMÉ

gigantesque. guinée, s. ch. ♀
à 5 feuell. inde. ☉
épineux. Am. m. ☉
à 12 étamines. inde. ☉
à 20 étamines. ceylan. ☉
d'Arabie. Égypte. ☉
visqueux. ceylan. ☉
pié-d'oiseau. orient. ☉

CAPPARIS

spinosa L.
longifolia Swartz.
saligna Vahl.

flexuosa L.
frondosa L.

CAPRIER

cultivé. F. m. ♀ (écon.)
à longues feuell. Am. m., s. ch. ♀
à feuell. de saule. Am. m.,
 s. ch. ♀
tortueux. Antilles, s. ch. ♀
feuellu. Antilles, s. ch. ♀

RESEDA

luteola L.
glauca L.
sesamoides L.
alba L.
undata L.
lutea L.
phyteuma L.
odorata L.
canescens L.

RÉSÉDA

gaude. F. ♂
glauque. F., Pyrénées. ♂
sésamoïde. F. ☉
blanc. Espagne. ☉
à 5 styles. Espagne. ♀
jaune. F. ♀
à grand calice. F. ☉
odorant. Barbarie. ☉ (orn.)
velu. orient. ♀

DROSERA

rotundifolia L.
longifolia L.

ROSSOLIS

à feuell. rondes. F. ☉
à feuell. longues. F. ☉

PARNASSIA

palustris L.

PARNASSIA

des marais. F. ♀

ORDO V.

SAPINDI.

CARDIOSPERMUM
halicacabum L.

PAULLINIA
pinnata L.

SERJANIA
tritermata.
paullinia polyphylla L. }

KOELREUTERIA
paullinioides V^{her.} }
paniculata Lmk. }

SAPINDUS
saponaria L.
rigidus H. K.
indica.

ALLOPHYLLUS Swartz.
racemosus Swartz.

EUPHORIA
lit-chi.
sapindus edulis H. K. }

MELICOCCA
bijuga.

CUPANIA
glabra Swartz.

ORDO VI.

ACERA.

ÆSCULUS
hypocastanum L.
flava H. K.
pavia L.
macrostachia Michx.

ACER
negundo L.
pensylvanicum L. }
striatum Lmk. }

ORDRE V.

LES SAVONNIERS.

CARDIOSPERME
pois de merveille. Am. m. ☉

PAULLINIA
à feuell. pennées. Am. m.,
s. ch. ☿

SERJANIA
triterné. Am. m., s. ch. ☿

KOELREUTERIA
paniculé. pérrou. ☿ (orn.)

SAVONNIER
commun. inde., s. ch. ☿
à feuell. roides. Am. m., s. ch. ☿
des Indes. s. ch. ☿

ALLOPHYLLUS
à grappes. Am. m., s. ch. ☿

EUPHORIA
lit-chi. chine, s. ch. ☿ (alim.)

MELICOCCA
à 4 feuell. Am. m., s. ch. ☿

CUPANIA
glabre. Am. m., s. ch. ☿

ORDRE VI.

LES ÉRABLES.

ÆSCULUS
maronnier d'Inde. Asie. ☿
(orn.)
jaune. Am. s. ☿ (orn.)
pavia rouge. Am. s. ☿ (orn.)
nain. Am. s. ☿ (orn.)

ÉRABLE
à feuell. de frêne. Am. s. ☿ (orn.)
jaspé. Am. s. ☿ (orn.)

montanum H. K. }
spicatum Lmk. }
tataricum L.
rubrum L.
coccineum H. K. }
tomentosum. }
saccharinum L.
platanoïdes L.
 — *lacinosum*.
pseudo-platanus L.
campestre L.
opalus L.
opulifolium Vill.
monspesulanum L.
creticum L.

HYPOCRATEA
volubilis L.

ORDO VII.

MALPIGHIÆ.

BANISTERIA
laurifolia L.

tomentosa.
periplocæfolia.

TRIOPTERIS
jamaïcensis L.

MALPIGHIA
glabra L.
punicifolia L.

myrtifolia.

urens L.
nitida L.
macrophylla.
coccigera L.

TRIGONIA
villosa Aublet.

ERYTHROXYLUM
hypericifolium Mmk.

de montagne. Am. s. ♀
de Tartarie. ♀ (orn.)
rouge. Am. s. ♀ (orn.)

écarlate. Am. s. ♀ (orn.)

à sucre. Am. s. ♀ (écon.)

plane. F. ♀

— *lacinié*.

sicomore. F. ♀

champêtre. F. ♀

opale. F., Alpes. ♀

à feuill. d'obier. F., Alpes. ♀

de Montpellier. ♀ (orn.)

de Crète. ♀

HYPOCRATEA
sarmenteux. Am. m., s. ch. ♀

ORDRE VII.

LES MALPIGHIES.

BANISTERIA
à feuill. de laurier. Am. m.,
 s. ch. ♀
cotonneux. Am. m., s. ch. ♀
à feuill. de périploca. Am. m.,
 s. ch. ♀

TRIOPTERIS
de la Jamaïque. s. ch. ♀

MALPIGHIA
glabre. Am. m., s. ch. ♀
à feuill. de grenadier. Am. m.,
 s. ch. ♀
à feuill. de myrte. Am. m.,
 s. ch. ♀
brûlant. Am. m., s. ch. ♀
luisant. Am. m., s. ch. ♀
à larges feuill. Am. m., s. ch. ♀
à feuill. de kermès. Am. m.,
 s. ch. ♀
à feuill. de houx. Am. m., s. ch. ♀

TRIGONIA
velu. cayenne, s. ch. ♀

ERYTHROXYLUM
à feuill. de millepertuis. île
 de F., s. ch. ♀

ORDO VIII.

HYPERICA.

HYPERICUM.

1. Trigyna.

ægyptiacum L.
 scabrum L.
 coris L.
 nummularium L.

pulchrum L.
 tomentosum L.
 elodes L.
 crispum L.
 humifusum L.
 montanum L.
 hirsutum L.
 perforatum L.
 quadrangulare L.
 delphinense vill. }
 dubium smith. }
 canariense L.
 androsæmum L.
 hircinum L.
 elatum Desrouss.
 triplinerve Vent.
 prolificum L.
 dolabriforme Vent.
 heterophyllum Vent.

2. Styli 5.

richeri vill. }
 fimbriatum Desrouss. }
 amplexicaule Desrouss.
 calycinum L.
 chinense L.
 balearicum L.

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA

rosea L.

MAMMEA

americana L.

ORDRE VIII.

LES MILLEPERTUIS.

MILLEPERTUIS.

1. 3 styles.

d'Egypte. or. 5
 rude. orient, or. 5
 verticillé. F., Alpes. 5
 à feuell. de nummulaire. F.,
 Alpes. 7

élégant. F. 7
 cotonneux. F. m., or. 7
 des marais. F. 7
 crépu. barbarie. 7
 couché. F. 0
 de montagne. F. 7
 velu. F. 7
 officinal. F. 7 (méd.)
 tétragone. F. 7

du Dauphiné. F., Alpes. 7
 des Canaries. or. 5 (orn.)
 androsème. F. 5 (méd.)
 fétide. orient. 5
 élevé. 5

à 5 nervures. Am. s. 7
 prolifique. Am. s. 5 (orn.)
 en doloire. Am. s. 7
 à feuell. variables. perse, or. 5

2. 5 styles.

de Richer. F., Alpes. 7
 amplexicaule. 7
 agrandcalice. orient. 5 (orn.)
 de Chine. or. 5 (orn.)
 de Mahon. 5

ORDRE IX.

LES GUTTIERS.

CLUSIA

rose. Am. m., s. ch. 5

MAMMEA

abricot de St. - Domingue.
 s. ch. 5 (alim.)

ORDO X.

AURANTIA.

I. *Fructus monospermus.*BALANITES *Delisle.*

ægyptiaca.
xymenia ægyptiaca L. }

FISSILIA

psittacorum.

II. *Fructus polyspermus baccatus.*

MURRAYA

sinica L.

CITRUS

medica L.

— acida.

— cedra.

— tuberosa.

— balotina.

— limon.

— florentina.

aurantium L.

— olyssiponense.

— violaceum.

— multiflorum.

— lunatum.

— maximum.

— bergamium.

decumana L.

sinense.

trifolia L.

LIMONIA

trifoliata L.

III. *Fructus polyspermus capsularis.*

TERNSTROMIA

elliptica *swartz.*

THEA

bohea L.

— viridis.

CAMELLIA

japonica L.

ORDRE X.

LES ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE

d'Egypte. s. ch. 5

FISSILIA

bois de perroquet. île de F.,
s. ch. 5

II. Une baie polysperme.

MURRAYA

buis de Chine. s. ch. 5 (orn.)

CITRONNIER

commun. inde, or. 5 (écon.,
méd.)

— aigre.

— cédra.

— poncire.

— balotin.

— lime-douce.

— de Florence.

oranger. asie, or. 5 (écon.,
méd.)

— de Portugal.

— violet.

— riche-dépouille.

— ture.

— chadec.

— bergamotte.

pampelmousse. inde, or. 5

de Chine. or. 5

à feuell. ternées. japon, or. 5

LIMONIA

à feuell. ternées. inde, s. ch. 5

III. Une capsule polysperme.

TERNSTROMIA

elliptique. am. m., s. ch. 5

THÉ

bou. chine, or. 5 (écon., méd.)

— vert.

CAMELLIA

du Japon. or. 5 (orn.)

ORDO XI.

MELIÆ.

I. *Folia simplicia.*

WINTERANIA
canella L. f.

AYTONIA
capensis L. f.

II. *Folia composita.*

PORTESIA *cav.*
ovata *cav.*

TRICHILIA
spondioides Jacq.

GUAREA
trichilioides L.

MELIA
azedarach L.

SWIETENIA
mahogoni L.

CEDRELA
odorata L.

ORDO XII.

VITES.

CISSUS
orientalis.
acida L.
quadrangularis L.
sicyoides L.
antarcticus Vent.
quinquefolia.
hederacea Wild.
hedera quinquefolia L. }

VITIS
vinifera L.
laciniosa L.

ORDRE XI.

LES AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA
canelle blanche. Am. m., s. ch.
‡ (méd.)

AYTONIA
du Cap. or. ‡

II. Feuilles composées.

PORTÉSIA
à feuell. ovales. Am. m., s. ch. ‡

TRICHILIA
à feuell. de monbin. Am. m.,
s. ch. ‡

GUAREA
faux trichilia. Am. m., s. ch. ‡

MÉLIA
azédarac. inde, or. ‡ (orn.)

SWIÉTÉNIA
mahogoni, acajou à meubles.
Am. m., s. ch. ‡ (arts.)

CÉDRELA
odorant, acajou à planches.
Am. m., s. ch. ‡ (arts.)

ORDRE XII.

LES VIGNES.

CISSUS
d'orient. perse, or. ‡
acide. Am. m., s. ch. ‡
quadrangulaire. inde, s. ch. ‡
à feuell. dentées. Am. m., s. ch. ‡
antarctique. N. holl., or. ‡

vigne vierge. Am. s. ‡

VIGNE
cultivée. Asie. ‡ (écon.)
laciniée. ‡ (écon.)

vulpiņa z.
 labrusca L.
 cordifolia Mich.
 virginiana.
 rubra Mich. Herb. }
 arborea L.

de renard. Am. s. 5
 cotonneuse. Am. s. 5
 à feuell. en cœur. Am. s. 5
 de Virginie. Am. s. 5
 à feuell. de persil. Am. m.,
 s. ch. 5

ORDO XIII.

GERANIA.

GERANIUM.

1. *Staminibus 7 antheriferis.* (Pelargonia.)

fulgidum L.
 inquinans L.
 — roseum.
 hybridum L.
 flabeliatum.
 zonale L.
 — variegatum.
 acetosum L.
 glaucum L. f. }
 lanceolatum Cav. }
 canum. }
 tomentosum Andr. }
 peltatum L.
 grandiflorum Andr.
 cortusæfolium Jacq. non l'Her.
 hamatum Jacq. }
 echinatum Curtis. }
 tetragonum L.
 reniforme Andr.
 papilionaceum L.
 inodorum.
 cotyledonis L.
 vitifolium L.
 angulosum H. K. }
 acerifolium Cav. }
 beaufortianum.
 cucullatum L.
 ribifolium Jacq.
 tomentosum Jacq.
 rigidum Wild.

ORDRE XIII.

LES GÉRANIUM.

GÉRANIUM.

1. 7 étamines fertiles. (Les Pélargonium.)

couleur de feu. cap, or. 5 (orn.)
 écarlate. cap, or. 5 (orn.)
 — rose.
 hybride. cap, or. 5 (orn.)
 en éventail. cap, or. 5
 à zones. cap, or. 5 (orn.)
 — panaché.
 acide. cap, or. 5
 lancéolé. cap, or. 5
 à feuell. blanches. cap, or. 5
 en bouclier. cap, or. 5
 à grandes fleurs. cap, or. 5
 (orn.)
 à feuell. de cortusa. cap, or. 5
 (orn.)
 à crochets. cap, or. 5 (orn.)
 tétragone. cap, or. 5 (orn.)
 réniforme. cap, or. 5
 papilionacé. cap, or. 5 (orn.)
 inodore. N. Holl., or. 5
 à feuell. de cotylédon. cap, or.
 5
 à feuell. de vigne. cap, or. 5
 anguleux. cap, or. 5 (orn.)
 de Beaufort. cap, or. 5 (orn.)
 capuchon. cap, or. 5 (orn.)
 à feuell. de groseiller. cap, or. 5
 drapé. cap, or. 5
 à feuell. dures. cap, or. 5

cordifolium *cav.* }
cordatum *H. K.* }
violarium *Jacq.*

ovale *l'Her.*
betulinum *Z.*
 — *incisum.*
formosissimum.
capitatum *Z.*

viscosum *cav.* }
glutinosum *l'Her.* }
 — *laciniatum.*
quercifolium *Z.*

terebinthinaceum *cav.* }
graveolens *l'Her.* }
radula *cav.*
scabrum *Z.*
tricuspidatum *l'Her.*
bicolor *Jacq.*

quinquevulnerum *Andr.*
carnosum *Z.*
gibbosum *Z.*
ceratophyllum *l'Her.*
extipulatum *cav.*
crispum *Z.* }
hermanniæfolium *Z. f.* }
ternatum *Z. f.*
trifidum *Jacq.*
adulterinum *l'Her.*
incisum *Andr.*
suaveolens.
tabulare *Z.* }
elongatum *cav.* }
alchimilloïdes *Z.*

odoratissimum *Z.*
astragalifolium *Jacq.* }
pinnatum *H. K.* }
multicaule *Jacq.*
betonicum *cav.*
coriandrifolium *Z.*

myrrhisfolium *Z.*
lacerum *Jacq.*
grossularioides *Z.*

à feuell. en cœur. cap, or. 5
 (orn.)
à fleurs de pensée. cap, or. 5
 (orn.)
ovale. cap, or. 5
à feuell. de bouleau. cap, or. 5
 — *incisé.*
élégant. cap, or. 5 (orn.)
à fleurs en tête. cap, or. 5
 (orn.)

visqueux. cap, or. 5
 — *lacinié.*
à feuell. de chêne. cap, or. 5
 (orn.)

terebinthinacé. cap, or. 5
radula. cap, or. 5 (orn.)
rude. cap, or. 5
à 5 pointes. cap, or. 5
de deux couleurs. cap, or. 5
 (orn.)

à 5 taches. cap, or. 5 (orn.)
charnu. cap, or. 5
gibbeux. cap, or. 5
à feuell. cormes. cap, or. 5
sans stipules. cap, or. 5

crépu. cap, or. 5
trilobé. cap, or. 5
trifide. cap, or. 5
adulterin. cap, or. 5
incisé. cap, or. 5
suave. cap, or. 5
à longspédoncules. cap, or. 5
à feuell. d'alchimille. cap, or.

5
odorant. cap, or. 5
à feuell. d'astragale. cap, or.
 5
à tiges nombreuses. cap, or. 5
à feuell. de bétouine. cap, or. 5
à feuell. de coriandre. cap, or.

5
à feuell. de myrrhis. cap, or. 5
lacéré. cap, or. 5
filiforme. cap, or. 5

carneum Jacq.

lobatum L.

triste L.

daucifolium Cav. }

flavum Burm. }

à petites fleurs. cap, or. ♀

lobé. cap, or. ♀

à fleurs brunes. cap, or. ♀ (orn.)

à feuell. de carotte. cap, or. ♀
(orn.)

2. *Staminibus 5 antheriferis.* (Erodia.)

alpinum Burm.

petraeum Gouan.

cicutarium L.

romanum L.

moschatum L.

hirtum Forsk.

laciniatum Cav.

maritimum L.

malacoïdes L.

glaucophyllum L.

ciconium L.

gruinum L.

geifolium Desf. }

hymenodes l'Her. }

trifolium Cav. }

pusillum L.

chamaedrioides Cav. }

reichardi Murr. }

2. 5 étamines fertiles. (Les Erodium.)

des Alpes. Italie. ♀

des rochers. F., Pyrénées. ♀

à feuell. de cigüe. F. ☉

romain. F. ☉

musqué. F. ☉

pubescent. Égypte, or. ♀

lacinié. Barbarie. ☉

maritime. F. ☉

malacoïde. F. m. ☉

glaucue. Égypte. ☉

bec de cigogne. F. ☉

bec de grue. F. ☉

à feuell. de bénoîte. Barbarie,
or. ♂ (orn.)

petit. F. ☉

à feuell. de chamaedris. Corse,
or. ♀

3. *Staminibus 10 antheriferis.* (Gerania.)

pyrenaïcum L.

tuberosum L.

macrorrhizum L.

anemonefolium l'Her. }

palmatum Cav. }

phæum L.

roseum l'Her. mss.

reflexum L.

lividum l'Her.

nodosum L.

striatum L.

aconitifolium l'Her.

sylvaticum L.

maculatum L.

pratense L.

varium l'Her. }

cineraceum Lapeyr. }

incanum L.

argenteum L.

robertianum L.

lucidum L.

3. 10 étamines fertiles. (Les Géranium.)

des Pyrénées. F. ☉

tubéreux. Italie. ♀

à grosse racine. Italie. ♀

à feuell. d'anémone. Madère,
or. ♀

brun. F., Alpes. ♀

rose. F., Alpes. ♀

réfléchi. F., Alpes. ♀

livide. F., Alpes. ♀

nouveaux. F., Alpes. ♀

réticulé. Italie. ♀ (orn.)

à feuell. d'aconit. F., Alpes. ♀

des bois. F., Alpes. ♀

tacheté. Am. s. ♀

des prés. F. ♀

cendré. F., Pyrénées. ♀

incane. cap, or. ♀

argenté. F. m. ♀

herbe à Robert. F. ♂

luisant. F. ☉

bohemicum *z.*
 divaricatum *wild.*
 carolinianum *z.*
 lanuginosum *Jacq.* }
 molle *z.*
 columbinum *z.*
 dissectum *z.*
 rotundifolium *z.*
 sibiricum *z.*
 sanguineum *z.*

MONSONIA

speciosa z. f.

Genera geraniis affinia.

TROPÆOLUM

majus z.
 — *multiplex.*
minus z.

IMPATIENS

balsamina z.
noli me tangere z.

OXALIS.

1. *Foliis ternatis, scapo unifloro.*
acetosella z.
purpurea Jacq.
2. *Foliis ternatis, scapo multifloro.*
violacea z.
cernua Jacq.
3. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris,*
caule inferne nudo.
versicolor z.
4. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris,*
caule folioso.
incarnata z.
5. *Foliis ternatis, pedunculis multifloris,*
caule folioso.
corniculata z.
stricta Jacq.

de Bohême. ☉

étalé. Hongrie. ☉

de Caroline. ☉

à feuell. molles. F. ☉

colombin. F. ☉

découpé. F. ☉

à feuell. rondes. F. ☉

de Sibérie. ☉

sanguin. F. ♀

MONSONIA

élégant. cap, or. ♀

Genres qui ont de l'affinité avec les
 Géranium.

CAPUCINE

cultivée. Pérou. ☉ (orn., écon.)

— *à fleurs doubles. s. ch. ♀*

à petites fleurs. Pérou. ☉

BALSAMINE

des jardins. inde. ☉ (orn.)

des bois. F. ☉

OXALIS.

1. Feuilles ternées, hampe à une fleur.
des bois. F. ♀ (écon., méd.)
pourpre. cap, or. ♀
2. Feuilles ternées, hampe à plusieurs
 fleurs.
violet. Am. s. ♀
incliné. cap, or. ♀
3. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur,
 tige nue inférieurement.
bigarré. cap, or. ♀
4. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur,
 tige toute feuillue.
incarnat. cap, or. ♀
5. Feuilles ternées, pédoncules à plusieurs
 fleurs, tige feuillue.
cornu. F. ♀
serré. Am. s. ♀

ORDO XIV.

ORDRE XIV.

MALVACEÆ.

LES MALVACÉES.

I. *Stamina in tubum corolliferum connata indefinita. fructus multicapsularis, capsulæ capitata.*

I. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules réunies en tête.

PALAVA *cav.*

malvifolia *cav.*

malope parviflora l'Her. }

PALAVA

à feuell. de mauve. Pérou. ☉

MALOPE

malacoides *z.* •

trifida *cav.*

MALOPE

à feuell. ovales. Barbarie. ♂

à 5 lobes. Afr. s. ☉

KITAIBELIA *wild.*

vitifolia *wild.*

KITAIBELIA

à feuell. de vigne. Hongrie. ♀

II. *Stamina in tubum corolliferum connata indefinita. fructus multicapsularis, capsulæ in orbem dispositæ aut in unam coalitæ.*

II. Étamines indéfinies réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules disposées circulairement ou réunies en une seule.

MALVA.

1. *Foliis indivisis.*

spicata *z.*

polystachia *cav.*

scoparia *cav.* et l'Her. non Jacq.

scabra *cav.*

americana *z.*

angustifolia *cav.*

1. Feuilles non-lobées.

à épis. Am. m., s. ch. ♀

à plusieurs épis. Pérou, s. ch. ♀

à balais. Pérou, s. ch. ♀

rude. Pérou, s. ch. ♀

d'Amérique. Am. m. ☉

à feuell. étroites. Mex., s. ch. ♀

2. Feuilles anguleuses.

asperima Jacq.

miniata *cav.*

fragrans *cav.*

capensis *cav.*

virgata *cav.*

abutiloides *z.*

rapeuse. cap, or. ♀

rouge. s. ch. ♀ (orn.)

odorante. cap, or. ♀

du Cap. or. ♀

effilée. cap, or. ♀ (orn.)

à feuell. d'abutilon. Am. m., s. ch. ♀

du Pérou. ☉

de Lima. ☉

de Caroline. ☉

de Sherard. Italie, or. ♂

à petites fleurs. Barbarie. ☉

verticillée. Chine. ☉

à petit fruit. Égypte. ☉

à feuell. rondes. F. ♀ (méd.)

sauvage. F. ♂ (méd.)

crépue. Orient. ☉

alcée. F. ♀

peruviana *z.*

limensis *z.*

caroliniana *z.*

sherardiana *z.*

parviflora *z.*

verticillata *z.*

microcarpa.

rotundifolia *z.*

sylvestris *z.*

crispa *z.*

alcea *z.*

moschata L.

ægyptia L.

LAVATERA.

1. *Caule fruticoso.*

arborea L.

micans L.

olbia L.

pseudo-olbia.

unguiculata.

triloba L.

lusitanica L.

maritima Gouan.

2. *Caule herbaceo.*

punctata All.

cretica L.

thuringiaca L.

trimestris L.

ALTHEA et ALCEA L.

rosea L.

— sinensis.

ficifolia L.

pallida Wald.

officinalis L.

narbonensis Cav.

cannabina L.

ludwigii L.

hirsuta L.

MALACHRA

capitata L.

alceaefolia Jacq.

triloba.

PAVONIA Cav.

urens Cav.

typhalea Cav.

cuneifolia Cav.

hibiscus præmorsus L. f. }

spinifex Cav. }

hibiscus spinifex L. }

— aristata.

zeylanica.

hibiscus zeylanicus L. }

URENA

lobata L.

sinuata L.

musquée. F. ♀

d'Egypte. ☉

LAVATERA.

1. *Tige ligneuse.*

en arbre. Italie, or. ♪

brillant. Esp., or. ♪

olbia. F. m., or. ♪

faux olbia. or. ♪

onguiculé. or. ♪

à 5 lobes. F. m., or. ♪

de Portugal. or. ♪

maritime. F. m., or. ♪

2. *Tige herbacée.*

ponctué. Nice. ☉

de Crète. ☉

du Tyrol. ☉

à opercule. F. m. ☉

ALTHEA

rose trémière. Chine. ♂ (orn.)

— de Chine.

à feuell. de figuier. Sibérie. ♂
(orn.)

à fleurs pâles. Hongrie. ♂

officinal. F. ♀ (méd.)

de Narbonne. F. m. ♀

à feuell. de chanvre. F. m. ♀

de Ludwig. Sicile. ☉

velu. F. ☉

MALACHRA

à fleurs en tête. Am. m. ☉

à feuell. d'alcea. Am. m. ☉

à 3 lobes. ☉

PAVONIA

piquant. Île de F., s. ch. ♪

à 5 pointes. Am. m., s. ch. ♪

cunéiforme. Cap, or. ♪

épineux. Am. m., s. ch. ♪

— à longues arêtes.

de Ceylan. ☉

URÉNA

à feuell. lobées. Am. m., s. ch. ♪

à feuell. sinuées. Am. m., s. ch. ♪

NAPÆA

scabra L. }
 sida dioica Cav. }
 levis L. }
 sida napæa Cav. }

SIDA

spinosa L.
 frutescens Cav.
 carpinifolia L.

rhombifolia L.
 alnifolia L.
 unilocularis l'Her.
 retusa L.
 viscosa L.
 angustifolia Cav.

umbellata L.
 triquetra L.
 virgata Cav.
 periplocifolia L.

nutans l'Her.
 fragrans l'Her.
 ricinoides l'Her. }
 palmata Cav. }
 nudiflora l'Her. }
 stellata Cav. }
 crassifolia l'Her.

mollissima Cav.
 arborea L. f. }
 peruviana Cav. }
 reflexa Cav. }
 retrorsa l'Her. }
 tiliaefolia.

gigantea Jacq.
 palmata Cav. }
 jatrophoides l'Her. }
 abutilon L.
 indica L.
 occidentalis L.
 asiatica L.
 crispa L.
 hirta Cav. }
 pilosa l'Her. }
 mollis ortega.

NAPÆA

rude. Am. s. ☞

lisse. Am. s. ☞

SIDA

épineux. Am. m. ☉
 arbrisseau. Am. m., s. ch. ☞
 à feuell. de charme. canaries,
 or. ☞

rhomboïdal. inde, s. ch. ☞
 à feuell. d'aune. inde. ☉
 à une loge. île de F. ☉
 émoussé. inde. ☉
 visqueux. Am. m., s. ch. ☞
 à feuell. étroites. île de Bourbon,
 s. ch. ☞

ombellifère. Am. m. ☉
 triangulaire. Am. m., s. ch. ☞
 effilé. Pérou, s. ch. ☞
 à feuell. de périploca. Am. m.,
 s. ch. ☞

à fleurs penchées. Pér., s. ch. ☞
 odorant. Am. m., s. ch. ☞
 à feuell. de ricin. Pérou. ☉

à fleurs nues. Am. m., s. ch. ☞
 à feuell. épaisses. Am. m.,
 s. ch. ☞
 velouté. Pérou, s. ch. ☞
 en arbre. Pérou, s. ch. ☞

réfléchi. Pérou, s. ch. ☞
 à feuell. de tilleul. Am. m.,
 s. ch. ☞

gigantesque. Am. m., s. ch. ☞
 à feuell. palmées. Pérou. ☉

abutilon. suisse. ☉
 des Indes. s. ch. ☞
 d'occident. Am. m. ☉
 d'Asie. inde. ☉
 crépu. caroline. ☉

hérissé. inde. ☉
 à feuell. molles. Pérou, s. ch. ☞

*mauritiana l'Her.**triloba Jacq.**hastata L.**anoda hastata Cav. }**parviflora. }**anoda parviflora Cav. }**de l'Ile-de-France. s. ch. 5**à 5 lobes. cap, or. 5**à feuell. hastées. mexique. ☉**à petites fleurs. mexique. ☉*

III. *Stamina in tubum corolliferum connata
indefinita, fructus simplex multilocu-
laris.*

HIBISCUS*solandra l'Her.**solandra lobata Murray. }**palustris L.**moscheutos L.**speciosus H. K.**pentacarpus L.**populneus L.**tiliaceus L.**mutabilis L.**rosa-sinensis L.**phoeniceus L. f.**syriacus L.**ficulneus L.**manihot L.**flabellatus.**cannabinus L.**digitatus.**abelmoschus L.**esculentus L.**sabdariffa L.**tubulosus Cav.**vitifolius L.**trionum L.*

III. Etamines indéfinies réunies en un tube
adhérent à la corolle, une capsule à plu-
sieurs loges.

HIBISCUS*à 5 lobes. île de Bourbon. ☉**des marais. Am. s. 5 (orn.)**moscheutos. Am. s. 5 (orn.)**lacinié. Am. s. 5 (orn.)**à 5 fruits. Italie. 5**à feuell. de peuplier. inde ,
s. ch. 5**à feuell. de tilleul. inde, s. ch. 5**à fleurs changeantes. inde ,
s. ch. 5**rosé de Chine. s. ch. 5 (orn.)**rose. inde, s. ch. 5**mauve en arbre. orient. 5'
(orn.)**à feuell. de figuier. ceylan ,
s. ch. 5**à grandes fleurs. inde, s. ch. 5**en éventail. N. Holl., s. ch. 5**à feuell. de chanvre. inde. ☉**digité. s. ch. 5**abelmosc. inde, s. ch. 5**comestible. inde. ☉ (écon.)**oseille de Guinée. inde. ☉**tubulé. inde. ☉**à feuell. de vigne. inde, s. ch. 5**vésiculeux. Italie. ☉***MALVAVISCUS** *Cav.**arboreus Cav.**achania malvaviscus H. K. }***MALVAVISCUS***en arbre. Am. m., s. ch. 5***LAGUNEA***squamea Vent.**hibiscus patersonius Andr. }***LAGUNEA***écailleux. N. Holl., or. 5***REDUTEA** *Vent.**heterophylla Vent.***REDUTEA***à feuell. variables. Am. m.,
s. ch. 5*

GOSSYPIMUM

herbaceum L.
 micranthum Cav.
 arboreum L.
 hirsutum L.
 vitifolium Lmk.
 purpurascens.

IV. *Stamina basi in urceolum sessilem connata, omnia fertilia, definita aut indefinita.*

MELOCHIA

pyramidata L.
 corchorifolia L.
 mollissima.
 tomentosa L.

STUARTIA

malachodendron L.
 pentagyna L.

GORDONIA

lasianthus L.
 pubescens Lmk.

BOMBAX

ceiba L.

ADANSONIA

digitata L.

V. *Stamina basi in urceolum sessilem connata, sterilia fertilibus intermixta, definita aut indefinita.*

PENTAPETES

phoenicea L.

THEOBROMA

cacao L. }
 cacao sativa Lmk. }

ABROMA Jacq. (*Theobroma* L.)

fastuosa Jacq. }
 ambroma augusta L.f. }

GUAZUMA JUSS. (*Theobroma* L.)

ulmifolia. }
 theobroma guazuma L. }
 bubroma guazuma wild. }

DOMBEYA Cav.

ferruginea Cav.

COTONNIER

de Malthé. syrie, or. ☿ (écon.)
 à petites fleurs. perse, s. ch. ☿
 en arbre. inde, s. ch. ☿
 velu. Am. m., s. ch. ☿
 à feuell. de vigne. inde, s. ch. ☿
 pourpre. Am. m., s. ch. ♀

IV. Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies, filets réunis à la base en un corps cylindrique sessile et évasé.

MÉLOCHIA

pyramidal. Brésil, s. ch. ♀
 à feuell. de corète. inde. ☉
 velouté. Am. m., s. ch. ☿
 cotonneux. Am. m., s. ch. ☿

STUARTIA

à 1 style. caroline, or. ☿
 à 5 styles. virginie. ☿

GORDONIA

à feuell. glabres. carol., or. ☿
 pubescent. caroline, or. ☿

FROMAGER

Ceiba. Am. m., s. ch. ☿

BAOBAB

digité, pain de singe. Afr. m.,
 s. ch. ☿

V. Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles; filets réunis à la base en un cylindre sessile et évasé.

PENTAPÉTÈS

écarlate. inde. ☉

CACAO

cultivé. Am. m., s. ch. ☿ (écon.)

ABROMA

à larges feuell. inde, s. ch. ☿

GUAZUMA

à feuell. d'orme. Am. m., s. ch. ☿

DOMBEYA

ferrugineux. île de F., s. ch. ☿

BYTTNERIA

ovata *Lmk.*

VI. *Stamina basi in urceolum germini arcte circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumque definita et fertilia.*

AYENIA

pusilla *L.*

HELICTERES

isora *L.*jamaicensis *Lmk.* }

STERCULIA

balanghas *L.*platanifolia *L.*foetida *L.*

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILICIMUM

floridanum *L.*parviflorum *Vent.*

MAGNOLIA

grandiflora *L.*glaucæ *L.*acuminata *L.*tripetala *L.*umbrella *Lmk.* }macrophylla *Mich.*auriculata *Mich.*purpurea *Curtis.* }obovata *Thunb.* }discolor *Vent.* }pumila *Andr.*

LIRIODENDRON

tulipifera *L.**Genera magnoliis affinia.*

DILLENIA

scandens *Willd.*

OCHNA

nitida *L.*

BYTTNERIA

à feuell. ovales. Pérou, s. ch. ♀

VI. *Étamines ordinairement définies et fertiles, filets réunis à la base autour de l'ovaire en un cylindre porté sur un pédicelle.*

AYENIA

petit. Am. m., s. ch. ♂

HÉLICTÈRES

isora. Am. m., s. ch. ♀

STERCULIA

balanghas. inde, s. ch. ♀

à feuell. de platane. chine, or. ♀

fétide. inde, s. ch. ♀

ORDRE XV.

LES MAGNOLIERS.

BADIANE

de la Floride. or. ♀ (écon.)

à petites fleurs. floride, or. ♀

MAGNOLIA

à grandes fleurs. floride, or. ♀ (orn.)

glaucue. virginie. ♀ (orn.)

à feuell. aiguës. Am. s. ♀ (orn.)

ombrelle. Am. s. ♀ (orn.)

à grandes feuell. Am. s. ♀ (orn.)

auriculé. caroline. ♀ (orn.)

pourpre. chine, s. ch. ♀ (orn.)

petit. chine, s. ch. ♀ (orn.)

TULIPIER

de Virginie. ♀ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Magnoliers.

DILLENIA

sarmenteux. N. Holl., or. ♀

OCHNA

à feuell. luisantes. Am. m., s. ch. ♀

ORDO XVI.

ANONÆ.

ANONA

squamosa L.

muricata L.

cherimolia *Miller.* }tripetala *H. K.* }

glabra L.

reticulata L.

triloba L.

ORDRE XVI.

LES ANONES.

ANONE

écailleuse , pomme canelle.

inde, s. ch. ♪ (alim.)

hérissée , cachiman. Am. m.,

s. ch. ♪ (alim.)

cherimolia. Pérou , s. ch. ♪

(alim.)

glabre. Am. m., s. ch. ♪

cœur de bœuf. Am. m., s. ch. ♪

à 5 lobes , assiminier. Am. s. ♪

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS

pareira L.

MENISPERMUM

canadense L.

virginicum L.

carolinianum L.

LES MÉNISPERMES.

CISSAMPELOS

pareira-brava. Am. m., s. ch. ♪

(méd.)

MÉNISPERME

de Canada. ♪

de Virginie. ♪

de Caroline. ♪

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS

vulgaris L.

— rubra.

— violacea.

— canadensis.

cretica L.

sibirica *Pallas.*

sinensis.

ORDRE XVIII.

LES VINETTIERS.

BERBÉRIS

épine-vinette. F. ♪ (écon., méd.)

— à fruit rouge.

— à fruit violet.

— de Canada.

de Crète. ♪

de Sibérie. ♪

de Chine. ♪

EPIMEDIUM

alpinum L.

ÉPIMÉDIUM

des Alpes. F. ♪

HAMAMELIS

virginiana L.

HAMAMELIS

de Virginie. Am. s. ♪

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. Stamina basi monadelpha definita.

WALTHERIA

- americana L.
arborescens *cav.* }
indica *Jacq.* }

HERMANNIA

- denudata L. *f.*
hyssopifolia L.
lavandulifolia L.
althæifolia L.
cuneifolia L.
alnifolia L.
micans *Schrad.* }
latifolia *Jacq.* }
scabra *cav.*
multiflora *Jacq.*

MAHERNIA

- pinnata L.
glabrata L. *f.*

II. Stamina distincta, plerumque indefinita, fructus multilocularis.

CORCHORUS

- hirsutus L.
siliquosus L.
trilocularis L.
olitorius L.
hirtus *Jacq.* an *Lin.*
æstuans L.
tridens L.

HELIOCARPUS

- americanus L.

TRIUMFETTA

- lappula L.

FLACURTIA *L'Her.*

- ramontchi *L'Her.*

GREWIA

- nitida *Juss.*
orientalis L.
occidentalis L.

ORDRE XIX.

LES TILLEULS.

I. Étamines définies, filets réunis à la base.

WALTHERIA

- d'Amérique. s. ch. 5

HERMANNIA

- lisse. cap, or. 5
à feuell. d'hysope. cap, or. 5
à feuell. de lavande. cap, or. 5
à feuell. d'althéa. cap, or. 5
cunéiforme. cap, or. 5
à feuell. d'aune. cap, or. 5
à feuell. brillantes. cap, or. 5
rude. cap, or. 5
à fleurs nombr. cap, or. 5

MAHERNIA

- à feuell. pennées. cap, or. 5
lisse. cap, or. 5

II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies, fruit à plusieurs loges.

CORCHORUS

- velu. am. m., s. ch. 5
siliquoux. am. m., s. ch. 5
à 5 loges. inde. ☉
cultivé. Afr. ☉ (alim.)
hérissé. am. m. ☉
à 6 pointes. am. m. ☉
à 5 pointes. inde. ☉

HELIOCARPUS

- d'Amérique. am. m., s. ch. 5

TRIUMFETTA

- hérissé. am. m., s. ch. 5

FLACURTIA

- ramontchi. inde, s. ch. 5

GREWIA

- luisant. chine, s. ch. 5
d'orient. inde, s. ch. 5
d'occident. cap, or. 5

TILIA

sylvestris.
europæa L.
pubescens H. K.
americana L.
alba H. K.

III. *Stamina distincta indefinita, fructus unilocularis.*

BIXA

orellana L.

ORDO XX.

CISTI.

CISTUS.

1. *Corollæ albæ aut flavescentes.*

populifolius L.
laurifolius L.
ladaniferus L.
 — *maculatus.*
monspeliensis L.
salvifolius L.

2. *Corollæ roseæ.*

symphitifolius Lmk. }
vaginatus H. K. }
purpureus Lmk.
villosus L.
complicatus Lmk.
incanus L.
heterophyllus Desf.
albidus L.
crispus L.
creticus L.

HELIANTHEMUM (*Cistus* L.).

1. *Exstipulata fruticosa.*

umbellatum L.
halimifolium L.
ocymoides Lmk.
alyssoïdes Lmk.
calycinum L.
levipes L.
humana L.
celandicum L.
marifolium L.

TILLEUL

sauvage. F. h (orn., méd.)
commun. F. h (orn., méd.)
pubescent. Am. s. h (orn.)
d'Amérique. Am. s. h (orn.)
argenté. Am. s. h (orn.)

III. *Étamines distinctes indéfinies, fruit à une loge.*

ROCOU

cultivé. Am. m., s. ch. h (arts.)

ORDRE XX.

LES CISTES.

CISTE.

1. *Corolles blanches ou jaunâtres.*

à feuell. de peuplier. Esp., or. h
à feuell. de laurier. F. m., or. h
ladanifère. Esp., or. h
 — *tacheté.*
de Montpellier. F. m., or. h
à feuell. de sauge. F. m., or. h

2. *Corolles roses.*

à feuell. de consoude. canaries,
 or. h
pourpre. orient, or. h
velu. Esp., or. h
plissé. orient, or. h
incâne. orient, or. h
à feuell. diverses. barb., or. h
cotonneux. F. m., or. h
crépu. F. m., or. h
de Crète. or. h (méd.)

HÉLIANTHÈME.

1. *Tiges ligneuses, point de stipules.*

ombellifère. F. h
à feuell. d'halime. F. m., or. h
à feuell. de basilic. Esp., or. h
à feuell. d'alysson. F. h
à grand calice. barbar., or. h
glauque. F. m., or. h
humana. F. h
d'eland. F. h
à feuell. de marum. F. h

2. *Stipulata fruticosa.*

squamatum *L.*
 lippii *L.*
 canariense *L.*
 lavandulæfolium *Link.* }
 syriacum *Jacq.* }
 serpyllifolium *L.*
 thymifolium *L.*
 pilosum *L.*
 racemosum *L.*
 vulgare *L.*
 — latifolium.
 mutabile *Jacq.*

3. *Exstipulata herbacea.*

guttatum *L.*
 canadense *L.*

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium *L.*
 salicifolium *L.*
 niloticum *L.*
 ægyptiacum *L.*

Genera *cistis* affinia, fructu trivalvi, valvis
 seminiferis, sed definite staminifera.

VIOLA.

1. *Acaules.*

hirta *L.*
 palustris *L.*
 odorata *L.*

2. *Caulescentes, stipulis indivisis.*

cenisia *L.*
 canina *L.*
 mirabilis *L.*
 canadensis *L.*
 montana *L.*
 biflora *L.*
 verticillata *Ortega.*

3. *Stipulis pinnatifidis.*

tricolor *L.*
 — hortensis.
 rothomagensis.
 grandiflora *L.*
 calcarata *L.*
 cornuta *L.*

2. Tiges ligneuses, feuilles accompagnées
de stipules.

écailleux. *Esp.*, or. *h*
 de Lippi. Égypte. *⊙*
 des Canaries. or. *h*
 à feuell. de lavande. *F. m.*, or. *h*
 à feuell. de serpolet. *F.*, Alp. *h*
 à feuell. de thym. *F. m.*, or. *h*
 velu. *F.* *h*
 à grappes. *Esp.*, or. *h*
 commun. *F.* *h*
 — à larges feuell.
 à fleurs changeantes. *F. m.* *h*

3. Tiges herbacées, point de stipules.

maculé. *F.* *⊙*
 de Canada. *⊙*

4. Tiges herbacées, feuilles accompagnées
de stipules.

à feuell. de ledum. *F. m.* *⊙*
 à feuell. de saule. *F. m.* *⊙*
 du Nil. *⊙*
 d'Égypte. *⊙*

Genres qui ont de l'affinité avec les Cistes,
 fruit à 3 valves, graines attachées aux
 valves, étamines définies.

VIOLETTE.

1. Tige nulle.

velue. *F.* *ψ*
 des marais. *F.* *ψ*
 odorante. *F.* *ψ* (orn., méd.)

2. Une tige, stipules entières.

du mont Cénis. *F.*, Alpes. *ψ*
 de chien. *F.* *ψ*
 sans corolle. *F.* *ψ*
 de Canada. *ψ*
 de montagne. *F.*, Alpes. *ψ*
 à 2 fleurs. *F.*, Alpes. *ψ*
 verticillée. Mexique. *⊙*

3. Stipules pinnatifides.

tricolor. *F.* *⊙*
 — pensée. (orn.)
 de Rouen. *F.* *ψ*
 à grandes fleurs. *F.*, Pyrén. *ψ*
 à long éperon. *F.*, Alpes. *ψ*
 cornue. *F.*, Pyrénées. *ψ*

ORDO XXI.

RUTÆ.

I. *Folia stipulacea sapius opposita.*

TRIBULUS

terrestris *L.*
cistoides *L.*

FAGONIA

cretica *L.*

ZYGOPHYLLUM

fabago *L.*
morgsana *L.*
album *L.*

GUAIAIACUM

sanctum *L.*

II. *Folia sapius alterna nuda.*BORONIA *Smith.*

pinnata *Smith.*

CORREA *Andr.* (*Mazentoxeron* *Bill.*)

alba *Andr.*

CROVEA *Andr.*

saligna *Andr.*

RUTA

sylvestris *Mill.*
legitima *Jacq.*
montana *H. K.*
graveolens *L.*
chalepensis *L.*
linifolia *L.*

PEGANUM

harmala *L.*

DICTAMNUS

albus *L.*

Genera rutis affinia.

MELIANTHUS

major *L.*
minor *L.*
comosus *Vahl.*

ORDRE XXI.

LES RUES.

I. Feuilles ordinairement opposées,
accompagnées de stipules.

TRIBULUS

hérissé. *F.* ☉
à fleurs de ciste. *Am. m.* ☉

FAGONIA

de Crète. orient, *s. ch.* ♂

FABAGELLE

commune. orient. ♀
membraneuse. cap, or. ♀
à fleurs blanches. barb., or. ☉

GAIAIAC

commun. *Am. m.*, *s. ch.* ♀
(méd., arts.)

II. Feuilles ordinairement alternes et sans
stipules.

BORONIA

à feuilles pennées. *N. Holl.*,
or. ♀

CORRÉA

à fleurs blanches. *N. Holl.*, or. ♀

CROVÉA

à feuell. de saule. *N. Holl.*, or. ♀

RUE

sauvage. barbarie, or. ♀

puante. *F. m.* ♀ (méd.)

ciliée. Arabie, or. ♀

à feuell. de lin. *Esp.*, or. ♀

PÉGANUM

harmala. barbarie. ♀

FRAXINELLE

cultivée. *F. m.* ♀ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Rues.

MÉLIANTE

à larges feuell. cap., or. ♀
à feuell. étroites. cap, or. ♀
vehu. cap, or. ♀

DIOSMA

rubra L.
ericoides L.

ciliata L.
hirsuta L.

ORDO XXII.**CARYOPHYLLÆ.**

*I. Calix partitus, stamina 3, stylus 1 aut
sæpius 3.*

ORTEGIA

hispanica L.

HOLOSTEUM

umbellatum L.

POLYCARPON

tetraphyllum L.

MOLLUGO

verticillata L.

MINUARTIA

campestris L.
dichotoma L.

POLYCARPEA Lmk.

teneriffæ Lmk.

QUERIA

canadensis L.

*II. Calix partitus, stamina 4, styli 2
aut 4.*

BUFONIA

tenuifolia L.

SAGINA

procumbens L.
erecta L.
cerastioides Smith.

*III. Calix partitus, stamina 5 ad 8,
styli 2, 3 aut 4.*

ALSINE

media L.
segetalis L.
mucronata L.

PHARNACEUM

cerviana L.

DIOSMA

*rouge. cap, or. 5 (orn.)
à feuell. de bruyère. cap, or. 5
(orn.)
cilié. cap, or. 5 (orn.)
velu. cap, or. 5 (orn.)*

ORDRE XXII.**LES CARYOPHYLLÉES.**

I. Calice partagé, 3 étamines, 1 à 3 styles.

ORTÉGIA

d'Espagne. ☉

HOLOSTÉUM

ombellifère. F. ☉

POLYCARPON

à 4 feuell. F. ☉

MOLLUGO

verticillé. Am. S. ☉

MINUARTIA

des champs. Esp. ☉
dichotome. Esp. ☉

POLYCARPEA

de Ténériffe. ☉

QUÉRIA

de Canada. ☉

II. Calice partagé, 4 étamines, 2 ou 4 styles.

BUFONIA

à feuell. menues. F. ☉

SAGINA

couché. F. ☉
droit. F. ☉
à feuell. de cérastium. F. ☉

*III. Calice partagé, 5 à 8 étamines,
2, 3 ou 4 styles.*

MORGELINE

des oiseaux. F. ☉
des moissons. F. ☉
pointue. F. ☉

PHARNACEUM

filiforme. Esp. ☉

MOERHINGIA
 muscosa L.

ELATINE
 hydropiper L.
 alsinastrum L.

IV. Calix partitus, stamina 10, styli 3
 aut 5.

SPERGULA
 nodosa L.
 arvensis L.
 pentandra L.
 saginoides L.

CERASTIUM.

1. Capsulis oblongis.

perfoliatum L.
 vulgatum L. }
 viscosum *curtis.* }
 semidecandrum L.
 viscosum L. }
 vulgatum *curtis.* }
 dichotomum L.
 arvense L.
 alpinum L.

2. Capsulis subrotundis.

latifolium L.
 tomentosum L.
 aquaticum L.

CHERLERIA
 sedoides L.

ARENARIA
 peploïdes L.
 tetraquetra L.
 biflora L.
 trinervis L.
 spathulata *Desf.*
 ciliata L.
 serpyllifolia L.
 balearica *L'Her.*
 montana L.
 rubra L.
 media L.
 dianthoides *Smith.*
 cucubaloïdes *Smith.*
 saxatilis L.
 striata L.

MOERHINGIA
 touffu. F., Alpes. ♀

ÉLATINÉ
 à feuell. de serpolet. F. ☉
 verticillé. F. ☉

IV. Calice partagé, 10 étamines,
 3 à 5 styles.

ESPARGOUTTE
 noueuse. F. ♀
 des champs. F. ☉
 à 5 étamines. F. ☉
 à feuell. de sagina. F. ♀

CÉRASTIUM.

1. Capsules oblongues.

perfolié. orient. ☉
 commun. F. ☉
 à 5 étamines. F. ☉
 visqueux. F. ♀
 dichotome. Esp. ☉
 des champs. F. ♀
 des Alpes. F. ♀

2. Capsules presque rondes.

à larges feuell. F., Alpes. ♀
 cotonneux. F. ♀
 aquatique. F. ♀

CHERLERIA
 sédoïde. F., Alpes. ♀

ARÉNARIA
 à feuell. de peplis. F. ♀
 tétragone. F. m. ♀
 à 2 fleurs. F., Alpes. ♀
 à 5 nervures. F. ☉
 en spatule. barbarie ☉
 cilié. F., Alpes. ♀
 à feuell. de serpolet. F. ☉
 de Mahon. ♀
 de Montagne. F. ♀
 à fleurs rouges. F. ☉
 membraneux. F. ☉
 à feuell. d'œillet. orient. ♀
 à fleurs de behen. orient. ♀
 des rochers. F. ♀
 strié. F. ♀

verna L.
 tenuifolia L.
 fasciculata L.
 triflora L.

STELLARIA

nemorum L.
 holostea L.
 graminea L.
 uliginosa *curtis.* }
 alsine *wild.* }

V. Calix tubulosus, stamina 10, styli 2, 3
 aut 5.

GYPSOPHILA

repens L.
 viscosa *Murray.*
 paniculata L.
 — grandiflora.
 altissima L.
 strutium L.
 fastigiata *Link. an Lin?*
 perfoliata L.
 muralis L.
 saxifraga L.

SAPONARIA

officinalis L.
 vaccaria L.
 ocymoides L.
 lutea L.
 orientalis L.
 porrigens L.

DIANTHUS.

1. Flores aggregati.

barbatus L.
 carthusianorum L.
 armeria L.
 prolifer L.
 atrorubens *All.*
 ferrugineus L.
 collinus *Wald.*

2. Flores solitarii plures in eodem caule.

corymbosus.
 caryophyllus L.
 — ruber.
 moschatum *Mayer.*

printanier. F. ♀
 à feuell. menues. F. ☉
 fasciculé. F. ☉
 à 5 fleurs. F. ♀

STELLULAIRE

des bois. F. ♀
 des haies. F. ♀
 à feuell. de gramen. F. ♀
 des marais. F. ☉

V. Calice en tube, 10 étamines, 2, 3 ou
 5 styles.

GYPSOPHILA

rampant. F., Alpes. ♀
 visqueux. orient. ☉
 paniculé. sibérie. ♀
 — à grandes fleurs.
 élevé. sibérie. ♀
 strutium. esp., or. ♂
 corymbifère. suisse. ♀
 perfolié. esp. ♀
 des murailles. F. ♂
 caliculé. F. ♀

SAPONAIRE

officinale. F. ♀ (méd., écon.)
 anguleuse. F. ☉
 à feuell. de basilic. F. ♀
 jaune. F., Alpes. ♀
 d'orient. ☉
 à longs pédoncules. orient. ☉

OEILLET.

1. Fleurs rapprochées.

de poète. F. ♂ (orn.)
 à 5 nervures. F. ♀
 velu. F. ☉
 prolifère. F. ☉
 brun-pourpre. F., Alpes. ♂
 rouillé. Italie. ♂
 des collines. Hongrie. ♀

2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.

corymbifère. ♀ (orn.)
 des jardins. F. ♀ (orn.)
 — ratafiat.
 nignardise. ♀ (orn.)

plumarius L.
 superbus L.
 chinensis L.
 deltoïdes L.
 attenuatus *smilh.*
 leptopetalus *Marschal.*

3. *Caule subunifloro herbaceo.*

alpinus L.

4. *Caule fruticoso.*

arboreus L.
 fruticosus L.

SILÈNE.

1. *Floribus solitariis lateralibus.*

lusitanica L.
 quinquevulnera L.
 cerastioides L.
 gallica L.
 tridentata *Desf.*
 nocturna L.
 sericea *All.*

2. *Floribus lateralibus confertis.*

arenaria *Desf.*
 nutans L.
 amoena L.
 paradoxa L.
 fruticosa L.
 buplevroides L.
 gigantea L.
 viridiflora L.

3. *Floribus ex dichotomia caulis.*

sedoïdes *Desf.*
 conoïdea L.
 conica L.
 behen L.
 noctiflora L.
 maritima *Wild.*
 antirrhina L.
 inaperta L.
 polyphylla L.
 portensis L.
 apetala *Wild.*
 cretica L.
 muscipula L.
 rubella L.

plume. F., Alpes. ♀ (orn.)
 superbe. F., Alpes. ♀ (orn.)
 de Chine. ☉ (orn.)
 deltoïde. F. ♀
 aminci. F. m. ♀
 à pétales linéaires. Russie. ♀

3. Tige herbacée ordinairement à une fleur.

des Alpes. F. ♀

4. Tige ligneuse.

à feuell. épaisses. orient, or. ♂
 à feuell. aiguës. orient, or. ♂

SILÉNÉ.

1. Fleurs solitaires latérales.

de Portugal. ☉
 à 5 taches. F. ☉
 échancre. F. ☉
 non-denté. F. ☉
 à 3 dents. F. m. ☉
 nocturne. F. m. ☉
 soyeux. F. m. ☉

2. Fleurs latérales ramassées.

des sables. barbarie. ☉
 à fleurs penchées. F. ♀
 à fleurs ternées. tartarie. ♀
 odorant. Italie. ♀
 arbrisseau. sicile, or. ♂
 à feuell. de buplèvre. orient. ♀
 gigantesque. Afr., or. ♂
 à fleurs vertes. F., Alpes. ♂

3. Fleurs dans les bifurcations des tiges.

à feuell. de sédum. Barbar. ☉
 à gros fruit. F. ☉
 conique. F. ☉
 faux béhen. orient. ☉
 noctiflore. suisse. ☉
 maritime. F. ♀
 à feuell. de linair. Am. s. ☉
 fermé. Eur. Austr. ☉
 fasciculé. Allemagne. ☉
 paniculé. Portugal. ☉
 apétale. ☉
 de Crète. ☉
 gobbe-mouche. F. m. ☉
 incarnat. orient. ☉

bipartita Desf.
stricta L.

4. *Floribus terminalibus.*

chloræfolia Smith.
picta.
armeria L.
atocion L. }
orchidea L. f. }
rupestris L.
alpestris Jacq.
saxifraga L.
vallesia L.
acaulis L.

CUCUBALUS

stellatus L.
bacciferus L.
béhen L.
— *alpinus*.
— *angustifolius*.
roseus.
fabarius Wild.
tataricus L.
sibiricus L.
multiflorus Wild.
cæspitosus.
viscosus L.
catholicus L.
otites L.

LYCHNIS

grandiflora Jacq. }
coronata Thunb. }
chalcedonica L.

flos-cuculi L.
viscaria L.
alpina L.
dioïca L.
— *rubra*.

GITHAGO

segetum.
agrostema githago L. }

AGROSTEMA

coronaria L.
flos-jovis L.
cœli-rosa L.

à fleurs roses. Barb. ☉ (orn.)
à fleurs serrées. F. m. ☉

4. Fleurs terminales.

à feuell. de chlora. orient, or. ♀
à réseau.
à bouquets. F. ☉ (orn.)
atocion. orient. ☉
des rochers. F., Alpes. ♂
à 4 dents. F. ♀
saxifrage. F., Alpes. ♀
du Valais. F., Alpes ♀
sans tige. F., Alpes. ♀

BÉHEN

étoilé. Am. s. ♀
baccifère. F. ♀
commun. F. ♀
— *des Alpes*.
— *à feuell. étroites*.
à fleurs roses.
dichotome. sicile. ♀
de Tartarie. ♀
de Sibérie. ♀
à fleurs nombreuses. Hongr. ♀
touffu. ♀
visqueux. Italie. ♂
de Rome. ♀
dioïque. F. ♀

LYCHNIS

à grandes fleurs. Japon, or. ♀
(orn.)
croix de Jérusalem. Russie. ♀
(orn.)
des prés. F. ♀
visqueux. F. ♀
des Alpes. F. ♂
dioïque. F. ♀
— *rouge*.

GITHAGO

nielle des blés. F. ☉

AGROSTÈMA

coquelourde. F. ♂ (orn.)
rose. F., Alpes. ♀ (orn.)
maritime. F. m. ☉ (orn.)

VI. *Calix tubulosus, stamina pauciora quam 10, styli 2 aut 3.*

VELEZIA

rigida L.

SAROTHTA

gentianoïdes L.

Genera caryophylleis affinia.

FRANKENIA

levis L.

pulverulenta L.

hirsuta L.

LINUM.

1. *Floribus caeruleis, albis aut rubentibus.*

usitatissimum L.

perenne L.

narbonense L.

tenuifolium L.

alpinum L.

catharticum L.

radiola L.

2. *Floribus luteis.*

gallicum L.

strictum L.

suffruticosum L.

maritimum L.

campanulatum L.

VI. Calice en tube, moins de 10 étamines, 2 ou 3 styles.

VÉLÉZIA

à feuell. roïdes. Esp. ☉

SAROTHTA

filiforme. Am. S. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les Caryophyllées.

FRANKENIA

lisse. F. m. ♀

pulvérulent. F. m. ☉

velu. orient.

LIN.

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

cultivé. Eur. Austr. ☉ (écon., méd.)

vivace. Sibérie. ♀ (écon.)

de Narbonne. ♀

à feuell. menues. F. ♀

des Alpes. F. ☉

cathartique. F. ☉ (méd.)

radiola. F. ☉

2. Fleurs jaunes.

à petites fleurs. F. ☉

rude. F. m. ♂

sous-arbrisseau. Esp., or. ♀

maritime. F. ♀

campanulé. F. m., or. ♀

CLASSIS XIV.

CLASSE XIV.

DICOTYLEDONES

DICOTYLEDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(*Stamina perigyna.*)

(*Étamines attachées au calice.*)

ORDO I.

ORDRE I.

SEMPERVIVÆ.

LES JOUBARBES.

TILLÆA

muscosa L.

TILLÆA

nain. F. ☉

BULLIARDA *Dec.**vaillantii Dec.**tillæa aquatica Lmk.**tillæa vaillantii Willd.***CRASSULA.**1. *Herbaceæ.**glomerata L.**ciliata L.**acutifolia Lmk.**rubens L. f.**sedum rubens L.**orbicularis L.**lycopodioides Lmk.**muscosa Thunb.*2. *Fruticosæ.**coccinea L.**scabra L.**perfoliata L.**perfossa Lmk.**tetragona L.**obvallata L.**cultrata L.**falcata Dec.**portulacea Lmk.**obliqua H. K.**lucida Lmk.**spathulata Thunb.**cordata L. f.**lactea H. K.**cotyledon Jacq.***COTYLEDON***orbiculata L.**hemisphærica L.**ungulata Lmk.**tuberculosa Lmk.**hispida Lmk.**viscosa Vahl.**hispanica L.**umbilicæ L.**lutea H. K.**lusitanica Lmk.**cymosa Dec.***KALANKOE** *Adans.**laciniata Dec.**cotyledon laciniata L.**spathulata Dec.***BULLIARDA***de Vaillant. f. ☉***CRASSULE.**1. *Tiges herbacées.**agglomérée. cap. ☉**ciliée. cap, or. ♀**à feuell. aiguës. cap, or. ♀**rouge. f. ☉**orbiculaire. cap, or. ♀**lycopode. cap, or. ♀*2. *Tiges ligneuses.**écarlate. cap, or. ♂ (orn.)**rude. cap, or. ♂**perfoliée. cap, or. ♂**enfilée. cap, or. ♂**tétragone. cap, or. ♂**à feuell. serrées. cap, or. ♂**tranchante. cap, or. ♂**falciforme. cap, or. ♂**à feuell. de pourpier. cap, or. ♂**luisante. cap, or. ♂**en cœur. cap, or. ♂**blanche. cap, or. ♂**cotylédon. cap, or. ♂***COTYLÉDON***orbiculaire. cap, or. ♂**hémisphérique. cap, or. ♂**ongulé. cap, or. ♂**tuberculeux. cap, or. ♂**hispide. barbarie. ☉**d'Espagne. ☉**nombril de Vénus. f. ♀**jaune. portugal, or. ♀**corymbifère. ♀***KALANKOE***lacinié. inde, s. ch. ♂**en spatule. chine, or. ♂*

ægyptiaca *Dec.*
 cotyledon ægyptiaca *Lmk.* }
 crenata *Dec.*
 vereia crenata *Andr.* }
 cotyledon crenata *Vent.* }

d'Égypte. s. ch. ♀

crênelé. cap, or. ♀

SEDUM.

1. Planifolia.

rhodiola. }
 rhodiola rosea *L.* }
 telephium *L.*
 — purpureum.
 — maximum.
 anacampseros *L.*
 — longifolium.
 aizoon *L.*
 stellatum *L.*
 hybridum *L.*
 populifolium *L.*
 cœpœa *L.*

2. Teretifolia.

dasyphyllum *L.*
 reflexum *L.*
 virens *H. K.*
 rupestre *L.*
 altissimum *Poiret.*
 sempervivum sediforme *Jacq.* }
 hispanicum *L.* }
 rupestre *Vill.* }
 album *L.*
 acre *L.*
 sexangulare *L.*
 anglicum *L. f.*
 villosum *L.*
 nudum *H. K.*
 cruciatum.

SEMPERVIVUM

arboreum *L.*
 canariense *L.*
 glutinosum. *H. K.*
 tortuosum *H. K.*
 villosum *H. K.*
 aizoides *Lmk.*
 tectorum *L.*
 globiferum *L.*
 hirtum *L.*
 montanum *L.*

SÉDUM.

1. Feuilles planes.

odorant. *F.*, Alpes, or. ♀
 téléphium. *F.* ♀ (méd.)
 — pourpre.
 — à larges feuil.
 anacampseros. *F.* ♀
 — à feuil. longues.
 aizoon. sibérie. ♀
 étoilé. *F.* ☉
 hybride. tartarie. ♀
 à feuil. de peuplier. sibér. ♀
 cœpœa. *F.* ☉

2. Feuilles cylindriques.

à feuil. épaisses. *F.*, Alpes. ♀
 penché. *F.* ♀
 verdoyant. Portugal. ♀
 des rochers. *F.* ♀
 élevé. Eur. ♀
 d'Espagne. or. ♀
 blanc. *F.* ☉
 vermiculaire. *F.* ♀
 hexagone. *F.* ♀
 d'Angleterre. ♀
 velu. *F.* ☉
 à tige nue. canaries, or. ♀
 à feuil. en croix. ♀

JOUBARBE

en arbre. barbarie, or. ♀
 des Canaries. or. ♀
 glutineuse. canaries, or. ♀
 tortueuse. canaries, or. ♀
 velue. canaries, or. ♀
 aizoïde. canaries, or. ♀
 des toits. *F.* ♀ (méd.)
 à globules. *F.* ♀
 hérissée. suisse. ♀
 de montagne. *F.*, Alpes. ♀

arachnoïdeum L.
monanthos H. K.

PENTHORUM
sedoides L.

ORDO II.

SAXIFRAGÆ.

1. *Fructus superus, capsularis birostris.*

HEUCHERA
americana L.

SAXIFRAGA.

1. *Foliis integris, caule subnudo.*

longifolia Lapeyr.

cotyledon L.
pennsylvanica L.
burseriana L.
androsacea L.
stellaris L.
umbrosa L.
hirsuta L.
geum L.
cuneifolia L.
crassifolia L.

punctata L.
sarmentosa L. f.

2. *Foliis indivisis, caule folioso.*

rotundifolia L.
oppositifolia L.
aizoïdes *wild.* }
autumnalis *æder.* }
aspera L.

3. *Foliis lobatis.*

granulata L.
geranioides L.

tridactylites L.
cespitosa L.
hypnoides L.
furcata Lapeyr.

toile d'araignée. F., Alp. ☞
à une fleur. canaries, or. ☞

PENTHORUM
à grappes. Am. s. ☞

ORDRE II.

LES SAXIFRAGES.

1. Ovaire supère, une capsule à deux pointes.

HEUCHERA
d'Amérique. Am. s. ☞

SAXIFRAGE.

1. Feuilles entières, tiges presque nues.

à longues feuell. F., pyrén. ☞
(orn.)
cotylédon. F., Alpes. ☞
de Pensylvanie. ☞
à une fleur. F., Alpes. ☞
androsacée. F., Alp. ☞
étoilée. F., Alpes. ☞
ombreuse. F., Alpes. ☞
velue. F., Alpes. ☞
géum. F., Alpes. ☞
cunéiforme. F., Alpes. ☞
à feuell. épaisses. sibérie. ☞
(orn.)
ponctuée. sibérie. ☞
sarmenteuse. japon. ☞

2. Feuilles entières, tige feuillue.

à feuell. rondes. F., Alpes. ☞
à feuell. opposées. F., Alpes. ☞
aizoïde. F., Alpes. ☞
rude. F., Alpes. ☞

3. Feuilles lobées.

grenue. F. ☞
à feuell. de géranium. F., py-
rénées. ☞
à 5 pointes. F. ☉
touffue. F., Alpes. ☞
hypnoïde. F., Alp. ☞
fourchue. F., pyrénées. ☞

decipiens Ehr. }
palmata Smith. }

palmée. F., pyrénées. ψ

TIARELLA

cordifolia L.
bitermata Vent.

TIARELLE

à feuell. en cœur. Am. s. ψ
biternée, Am. s. ψ

MITELLA

diphylla L.
nuda L.

MITELLA

à 2 feuell. Am. s. ψ
à tige nue. Asie. ψ

II. *Fructus inferus, capsularis aut baccatus.*

II. Ovaire infère, une capsule ou une baie.

CHRYSOSPLENIUM

oppositifolium L.
alternifolium L.

CHRYSO SPLÉNIUM

à feuell. opposées. F. ψ
à feuell. alternes. F. ψ

ADOXA

moschatellina L.

ADOXA

moschatelle. F. ψ

HYDRANGÆA

arborescens L.
nivea Mich. }
radiata Wild. }

HYDRANGÆA

en arbre. Am. s. ψ
cotonneux. Am. s. ψ

ORDO III.

ORDRE III.

CACTI.

LES CIERGES.

I. *Petalâ et stamina definita.*

I. Pétales et étamines définies.

RIBES.

GROSEILLIER.

1. *Inermia.*

1. Tiges sans épines.

rubrum L.
 — *album.*
petræum Jacq.
nigrum L.
prostratum L'Her. }
glandulosum H. K. }
pensylvanicum Lmk. }
floridum L'Her. }
alpinum L.

rouge. F. ψ (écon., méd.)
 — *blanc.*
des rochers. F., Alpes. ψ
cassis. F. ψ (écon., méd.)
couché. Am. s. ψ
de Pensylvanie. ψ
des Alpes. F. ψ

2. *Aculeata.*

2. Tiges garnies d'aiguillons.

cynosbati L.
diacantha Pallas.
orientale.
grossularia L.
uvacrispa L.
 — *rubra.*

cynosbati. Am. s. ψ
à 2 aiguillons. Russie. ψ
du Liban. ψ
épineux. F. ψ
à maquereau. F. ψ (écon.)
 — *rouge.*

II. *Petala et stamina indefinita.*

CACTUS.

1. *Opuntia*, caule plano.

Opuntia L.
 — *ficus-indica*.
 — *tuna*.
 — *polyanthos*.
 — *nana*.
 — *inermis*.
coccinellifer L.
curassavicus L.
spinosissimus H. K.
phyllanthus L.
pereskia L.

2. *Echino-melocacti subrotundi.*

mammillaris L.
melocactus L.

3. *Erecti cylindrici.*

cylindricus Lmk.
heptagonus L.
tetragonus L.
peruvianus L.
royeni L.

4. *Repentes.*

grandiflorus L.

flagelliformis L.
parasiticus L.
triangularis L.
prismaticus.

ORDO IV.

PORTULACÆÆ.

I. *Fructus unilocularis.*

PORTULACA

pilosa L.
oleracea L.

TALINUM

anacampseros Willd. }
portulaca anacampseros L. }
patens Willd.
reflexum Cav.

II. *Pétales et étamines indéfinies.*

CIERGE.

1. Les *Opuntia*, tiges applaties.

Opuntia Afr., s. ch. ♀ (écon.)
 — *figue d'Inde*. Am. m., s. ch.
 — *tuna*.
 — à fleurs nombreuses.
 — petit.
 — sans épines.
 à cochenille. Am. m., s. ch. ♀
 de Curaçao. s. ch. ♀
 très-épineux. Am. m., s. ch. ♀
 scolopendre. Am. m., s. ch. ♀
Pereskia. Am. m., s. ch. ♀

2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamelonné. Am. m., s. ch. ♀
mélocacte. Am. m., s. ch. ♀

3. Tige droite cylindrique.

cylindrique. Pérou, s. ch. ♀
heptagone. Am. m., s. ch. ♀
tétragone. Am. m., s. ch. ♀
 du Pérou. or. ♀
lanugineux. Am. m., s. ch. ♀

4. Tige rampante.

à grandes fleurs. Am. m.,
 s. ch. ♀
serpentin. Am. m., or. ♀
parasite. Am. m., s. ch. ♀
triangulaire. Am. m., s. ch. ♀
prismatique. Am. m., s. ch. ♀

ORDRE IV.

LES PORTULACÉES.

I. Fruit à une loge.

POURPIER

velu. Am. m. ☉
cultivé. F. ☉ (alim., méd.)

TALINUM

anacampséros. cap, or. ♀
paniculé. Am. m., s. ch. ♀
jaune. Am. m., s. ch. ♀

trichotomum *dec.*
fruticosum *wild.*

TURNERA
cistoïdes *L.*

MONTIA
fontana *L.*

TAMARIX
gallica *L.*
germanica *L.*

TELEPHIUM
imperati *L.*

CORRIGIOLA
littoralis *L.*

SCLERANTHUS
annuus *L.*
perennis *L.*

II. Fructus multilocularis.

TRIANTHEMA
monogyna *L.*

CLAYTONIA
virginica *L.*

PORTULACARIA
afra *Jacq.*
claytonia portulacaria *L.* }

ORDO V.

F I C O I D E Æ.

REAUMURIA
vermiculata *L.*

NITRARIA
scoberi *L.*
tridentata *Desf.*

SESUVIUM
portulacastrum *L.*
revolutifolium *ortega.*

AIZOON
canariense *L.*
hispanicum *L.*

GLINUS
lotoïdes *L.*

trichotome. *s. ch.* ♀
ligneux. *am. m., s. ch.* ♀

TURNERA
à fleurs de ciste. *am. m.* ☉

MONTIA
aquatique. *F.* ☉

TAMARIX
de France. ♀ (orn.)
d'Allemagne. ♀ (orn.)

TELEPHIUM
d'impérati. *F.* ♀

CORRIGIOLA
des sables. *F.* ☉

SCLÉRANTHUS
annuel. *F.* ☉
vivace. *F.* ♀

II. Fruit à plusieurs loges.

TRIANTHÉMA
monogyne. *am. m.* ☉

CLAYTONIA
de Virginie. ♀

PORTULACARIA
d'Afrique. *cap, or.* ♀

ORDRE V.

LES FICOIDES.

REAUMURIA
à feuell. de sédum. *barb., or.* ♀

NITRARIA
à feuell. entières. *russe, or.* ♀
à 3 dents. *barbarie, or.* ♀

SÉSUVIUM
à feuell. de pourpier. *inde.* ♂
roulé. *cuba.* ♂

AIZOON
des Canaries. ☉
d'Espagne. ☉

GLINUS
lotoïde. *esp.* ☉

MESEMBRYANTHEMUM.

FICOIDE.

1. *Foliis planis.*

cristallinum L.
linguiforme L.
tortuosum L.
expansum L.
pinnatifidum L. f.
cordifolium L. f.
cuneifolium Jacq. }
limpidum H. K. }
helianthoides H. K.

2. *Foliis subtus convexis.*

ciliatum H. K.
geniculiflorum L.
noctiflorum L.
pallens H. K.
bicolorum L. }
coccineum Haw. }
tuberosum L.
tenuifolium L.
violaceum Dec.
stipulaceum L.
corniculatum L.
loreum L.
verruculatum L.
echinatum H. K.
viridiflorum H. K.
splendens L.
villosum L.
micans L.
rostratum L.
caninum Haw.
felinum Haw.
tigrinum Haw.
testiculatum Jacq.

3. *Foliis teretibus.*

nodiflorum L.
brachiatum H. K.
hispidum L.
tuberculatum Dec.
striatum Haw.
barbatum L.
stellatum Mill.
calamiforme L.

1. Feuilles planes.

cristalline. madère. ☉
linguiforme. cap, or. ♀
tortueux. cap, or. ♀
ouvert. cap, or. ♀
pinnatifide. cap. ☉
en cœur. cap, or. ♀
cuneiforme. cap. ☉
à fleur de soleil. cap. ☉

2. Feuilles convexes en dessous.

cilié. cap, or. ♀
geniculiflore. cap, or. ♀
de nuit. cap, or. ♀
pâle. cap, or. ♀
écarlate. cap, or. ♀
tubéreux. cap, or. ♀
à feuell. menues. cap, or. ♀
violet. cap, or. ♀
à stipules. cap, or. ♀
cornu. cap, or. ♀
courroie. cap, or. ♀
à feuell. lisses. cap, or. ♀
hérissé. cap, or. ♀
à fleurs vertes. cap, or. ♀
luisant. cap, or. ♀
velu. cap, or. ♀
argenté. cap, or. ♀
bec-de-grue. cap, or. ♀
gueule de chien. cap, or. ♀
gueule de chat. cap, or. ♀
gueule de tigre. cap, or. ♀
bilobé. cap, or. ♀

3. Feuilles cylindriques.

nodiflore. barbarie. ☉
étalé. cap, or. ♀
hispidé. cap, or. ♀
tuberculeux. cap, or. ♀
strié. cap, or. ♀
barbu. cap, or. ♀
étoilé. cap, or. ♀
doigt d'enfant. cap, or. ♀

4. *Foliis triquetris.*

falcatum L.
 reptans H. K.
 spinosum L.
 glomeratum L.
 glaucum L.
 spectabile Haw.
 aureum L.
 serratum L.
 scabrum L.
 uncinatum L.
 — minus.
 pugioniforme L.
 filamentosum L.
 acinaciforme L.
 lacerum Haw.
 deltoïdes L.
 albidum L.
 bellidiflorum L.
 dolabriforme L.

TETRAGONIA

decumbens Mill.
 echinata H. K.
 expansa Murr.
 cristallina l'Her.

ORDO VI.

ONAGRÆ.

I. *Stylus multiplex.*

MYRIOPHYLLUM

spicatum L.
 verticillatum L.

PROSERPINACA

palustris L.

CERCODEA

erecta Murr.
 halogaris cercodia H. K.
 halogaris alata Jacq.
 tetragonia ivæfolia L.f. }

II. *Stylus 1, fructus capsularis, stamina
 petalis numero æqualia aut pauciora.*

TRAPÆ

natans L.

4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap, or. ♀
 rampant. cap, or. ♀
 épineux. cap, or. ♀
 aggloméré. cap, or. ♀
 glauque. cap, or. ♀
 à grandes fleurs. cap, or. ♀
 doré. cap, or. ♀
 denté. cap, or. ♀
 rude. cap, or. ♀
 à crochets. cap, or. ♀
 — petit.
 en poignard. cap, or. ♀
 filamenteux. cap, or. ♀
 en sabre. cap, or. ♀
 lacéré. cap, or. ♀
 deltoïde. cap, or. ♀
 blanc. cap, or. ♀
 à fl. de paquerette. cap, or. ♀
 en doloire. cap, or. ♀

TÉTAGONIA

tombant. cap, or. ♀
 hérissé. cap, or. ☉
 étalé. N. zélande ☉
 cristallin. Pérou. ☉

ORDRE VI.

LES ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU

à épis. F. ♀
 verticillé. F. ♀

PROSERPINACA

des marais. Am. S. ♀

CERCODEA

à tige droite. N. zélande, or. ♀

II. Un style, une capsule, étamines en
 nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE

flottante. F. ♀ (alim.)

LOPEZIA

racemosa cav.

CIRCÆA

*lutetiana L.**alpina L.*III. *Stylus 1, fructus capsularis, stamina petalorum dupla.*

JUSSIÆA

erecta L.

OENOTHERA.

1. *Capsulis teretibus.**biennis L.**suaveolens.**parviflora L.**muricata L.**longiflora L.**mollissima L.**nocturna Jacq. }**albicans Zmk. }**sinuata L.*2. *Capsulis angulatis.**tetraptera cav.**purpurea Curt.**rosea L.**pumila L.*

GAURA

*biennis L.**fruticosa Jacq.**mutabilis cav.*

EPILOBIUM

*angustifolium Zmk. }**angustissimum H. K. }**spicatum Zmk. }**angustifolium H. K. }**hirsutum Willd.**pubescens Roth.**montanum L.**palustre L.**tetragonum L.**dodonei Willd.**latifolium Fl. Dan.**alpinum L.*

LOPEZIA

à grappes. Mexique. ☉ (orn.)

CIRCÉE

*des bois. F. ♀**des Alpes. F. ♀*

III. Un style, une capsule, étamines en nombre double des pétales.

JUSSIÆA

à tige droite. Am. m. ☉

ONAGRE.

1. Capsules cylindriques.

*commune. F. ♂**odorante. Am. s. ♂**à petites fleurs. Am. s. ♂**tuberculeuse. Am. s. ♂**à longues fleurs. Buenos-Ayres,**or. ♂**veloutée. Buenos-Ayres. ☉**noctiflore. cap. ☉**sinuée. Am. s., or ♂*

2. Capsules anguleuses.

*à 4 ailes. Mexique, s. ch. ♀**pourpre. Am. s. ☉**rose. Pérou, or. ♀**naine. Am. s. ♀*

GAURA

*bisannuelle. Am. s. ♂**arbrisseau. Am. m., s. ch. ♀**à fleurs changeantes. Mexiq.,**s. ch. ♀*

EPILOBIUM

*à feuil. étroites. F. ♀ (orn.)**à grappes. F. ♀ (orn.)**velu. F. ♀**pubescent. F. ♀**à feuil. ovales. F. ♂**des marais. F. ♀**tétragone. F. ♀**de Dodoens. F., Alpes. ♀**à larges feuil. F., Alpes. ♀**des Alpes. F. ♀*

IV. *Stylus 1, fructus baccatus.*

FUSCHIA

magellanica Zmh. }
coccinea H. K. }
lycioides Andr.

IV. Un style, une baie.

FUSCHIA

de Magellan. or. 5 (orn.)
à feuilles de lycium. Am.,
 s. ch. 5

ORDO VII.

MYRTI.

I. *Flores in foliorum axillis aut in pedunculis multifloris oppositi, folia plerumque opposita et punctata.*

MELALEUCA

thymifolia Smith. }
coronata Andr. }
gnidiæfolia Vent. }
hypericifolia Smith.

myrtifolia Vent.*ericifolia* Andr.*styphelioides* Smith.*diosmæfolia.*

LEPTOSPERMUM

squarrosum.
myrtifolium.

thea Wild.*pubescens* Wild.*arachnoideum* Smith.*juniperinum* Smith.

FABRICIA

levigata Smith.

METROSYDEROS

saligna Smith. }
lanœcolata Smith. }
citrina Curtis. }
linearis Smith.
lophanta Vent.
 — *latifolia.*

ORDRE VII.

LES MYRTES.

I. Fleurs opposées dans les aisselles des feuilles ou sur des pédoncules communs, feuilles souvent opposées et parsemées de petites glandes transparentes.

MELALEUCA

à feuell. de thym. N. Holl., or. 5*à feuell. d'hypericum.* N. Holl.,
or. 5*à feuell. de myrte.* N. Holl.,
or. 5*à feuell. de bruyère.* N. Holl.,
or. 5*à feuell. de styphelia.* N. Holl.,
or. 5*à feuell. de diosma.* N. Holl.,
or. 5

LEPTOSPERMUM

rude. N. Holl., or. 5*à feuell. de myrte.* N. Holl.,
or. 5*théa.* N. Holl., or. 5*pubescent.* N. Holl., or. 5*arachnoïde.* N. Holl., or. 5*à feuell. de genévrier.* N. Holl.,
or. 5

FABRICIA

lisse. N. Holl., or. 5

MÉTROSYDÉROS

à feuell. de saule. N. Holl., or. 5*lanœolé.* N. Holl., or. 5*à feuell. linéaires.* N. Holl., or. 5*en panache.* N. Holl., or. 5— *à feuell. larges.*

marginata.
pliniaefolia.

corifolia vent.
anomala vent. }
hirsuta andr. }
connata.
angustifolia smith.
laurifolia.

EUCALYPTUS

robusta smith.
resinifera smith.
piperita smith.
obliqua l'Her.

PSIDIUM

pyriferum z.
montanum swartz.

MYRTUS

communis z.

— *boetica.*
— *romana.*
— *tarentina.*
— *belgica.*
— *mucronata.*
pimenta z.

tomentosa H. K.
horizontalis vent.

EUGENIA

uniflora z.
jambos z.

CALYPTRANTHES swartz.

zuzygium swartz. }
myrtus zuzygium z. }

CARYOPHYLLUS

aromaticus z.

DECUMARIA

barbara z.

PUNICA

granatum z.
— *nanum.*
— *flavum.*

bordé. N. holl., or. 5
à feuell. de plinia. N. holl.,
or. 5
à feuell. de coris. N. holl., or. 5
anomale. N. holl., or. 5
à feuell. réunies. N. holl., or. 5
à feuell. étroites. N. holl., or. 5
à feuell. de taurier. N. holl.,
or. 5

EUCALYPTUS

gigantesque. N. holl., or. 5
résineux. N. holl., or. 5
poivré. N. holl., or. 5
oblique. N. holl., or. 5

GOYAVIER

poire. inde, or. 5 (alim.)
de montagne. Am. m., s. ch. 5

MYRTE

commun. F. m., or. 5 (orn.,
méd.).
— *d'Andalousie.*
— *romain.*
— *de Tarente.*
— *moyen.*
— *pointu.*
pimento, toute-épice. Am. m.,
s. ch. 5 (écon.)
cotonneux. chine, s. ch. 5
horizontal. Am. m., s. ch. 5

EUGÉNIA

à une fleur. Brésil, s. ch. 5
jamrose. inde, s. ch. 5 (alim.)

CALYPTRANTHES

zuzygium. Am. m., s. ch. 5

GIROFLIER

aromatique. moluques, s. ch. 5
(écon., méd.)

DÉCUMARIA

sarmenteux. caroline. 5

GRENADIER

cultivé. Afr. s., or. 5 (écon.,
orn.)
— *nain.*
— *jaune.*

PHILADELPHUS
 coronarius z.
 — nanus.
 inodorus z.

SERINGAT
 odorant. eur. aust. ♀ (orn.)
 — nain.
 inodore. caroline. ♀ (orn.)

ORDO VIII.

ORDRE VIII.

MELASTOMÆ.

LES MÉLASTOMES.

MELASTOMA
 elcagnoïdes *vahl.*

MÉLASTOME
 à feuell. de chalef. am. m.,
 s. ch. ♀

ORDO IX.

ORDRE IX.

SALICARIÆ.

LES SALICAIRES.

I. Flores polypetali.

I. Fleurs polypétales.

LAGERSTROMIA
 indica z.

LAGERSTROMIA
 des Indes. s. ch. ♀ (orn.)

LAUSONIA
 inermis z. }
 spinosa z. }

HENNÉ
 d'orient. s. ch. ♀ (arts.)

LYTHRUM
 salicaria z.
 virgatum z.
 hyssopifolia z.

SALICAIRE
 commune. f. ♀ (orn.)
 effilée. autriche. ♀ (orn.)
 à feuell. d'hysope. f. ☉

CUPHEA *Jacq.*
 viscosissima *Jacq.* }
 lythrum cuphea z. f. }

CUPHÉA
 visqueux. Brésil. ☉

II. Flores saepe apetalæ.

II. Fleurs souvent sans pétales.

ISNARDIA
 palustris z.

ISNARDIA
 des marais. f. ♀

GLAUX
 maritima z.

GLAUX
 maritime. f. ♀

PEPLIS
 portula z.

PEPLIS
 aquatique. f. ☉

ORDO X.

ORDRE X.

ROSACEÆ.

LES ROSACÉES.

I. *Cermen simplex inferum polystylium, pomum calicino limbo umbilicatum multiloculare.*

I. Un seul ovaire infère, plusieurs styles, une pomme à plusieurs loges terminée par un ombilic couronné par le calice.

MALUS (*Pyrus* L.)

POMMIER

communis.

commun. F. ♀ (écon.)

— *sylvestris.*

— *sauvageon.*

— *prasmila.*

— *de reinette.*

— *paradisiaca.*

— *de paradis.*

— *castanea.*

— *de châtaignier.*

— *cavillea.*

— *de Calville.*

— *apiosa.*

— *d'apis.*

coronaria H. K.

odorant. Am. S. ♀

sempervirens.

toujours vert. Am. S. ♀

angustifolia H. K. }

hybrida.

hybride. ♀

baccata L.

baccifère. sibérie. ♀

spectabilis H. K.

à bouquets. chine. ♀ (orn.)

PYRUS

POIRIER

communis L.

commun. (écon.)

— *pyraster.*

— *sauvageon.*

— *pompeiana.*

— *bon chrétien.*

— *rufescens.*

— *de roussellet.*

— *liquescens.*

— *de beurré.*

pollveria L.

cotonneux. F. ♀

salicifolia L. f.

à feuell. de saule. sibérie. ♀

cydonia L.

coignassier. F. ♀ (écon.)

— *lusitanica.*

— *de Portugal.*

GRATÆGUS

ALISIER

torminalis L.

des bois. F. (écon.)

latifolia Zmk.

de Fontainebleau. F. ♀

aria L.

allouchier. F. ♀

— *longifolia.*

— *à feuell. longues.*

chamæmespylus. }

nain. F., Alpes. ♀

humilis Zmk. }

arbutifolia Zmk.

à feuell. d'arbousier. Am. S. ♀

pyrifolia Zmk.

(orn.)

à feuell. de poirier. Am. S. ♀

spicata Zmk.

(orn.)

à épis. Am. S. ♀ (orn.)

racemosa Zmk.

à grappes. Am. S. ♀ (orn.)

amelanchier. }

amélanchier. F. ♀ (orn.)

rotundifolia Zmk. }

SORBUS

aucuparia L.
domestica L.
hybrida L.

MESPYLUS (*Crataegus* L.)

oxyacantha L.
— plena.
— rubra.
monogyna Jacq.
azarolus L.
— aronia.
tanacetifolia Poiret.

tomentosa L.

corallina. }
acerifolia Poiret. }
coccinea L.
latifolia Poiret.
pyrifolia. }
cornifolia Poiret. }
linearis.
prunifolia Poiret.

crus-galli L.
pyracantha L.
cotoneaster L.
germanica L.
japonica Thunb.

II. *Germina plura indefinita calice urceolari
supra coarctato tecta, singula monostyla.*

ROSA.

1. *Fructibus subglobosis.*

berberifolia Pallas.
eglanteria L. }
lutea H. K. }
— punicea.
sulphurea H. K.
spinosissima L.
scotica.
cinnamomea L.
arvensis L.
carolina L.
parviflora Willd.

SORBIER

des oiseleurs. F. H. (orn.)
cormier. F. H. (écon.)
de Laponie. H. (orn.)

NÉFLIER

aube-épine. F. H. (orn., écon.)
— double. (orn.)
— de Mahon. (orn.)
monogyne. F. H.
azerolle. F. m. H. (écon.)
— d'orient. H. (écon.)
à feuell. de tanaïsie. orient. H.
(orn.)
cotonneux ou Pinchaw. Am. s.
H.

petit corail. Am. s. H. (orn.)
écarlate. Am. s. H. (orn.)
à larges feuell. Am. s. H. (orn.)
à feuell. de poirier. Am. s. H.
(orn.)
à feuell. étroites. Am. s. H. (orn.)
à feuell. de prunier. Am. s. H.
(orn.)
pié-de-coq. Am. s. H. (orn.)
buisson ardent. F. m. H. (orn.)
cotonéaster. F., Alpes. H. (orn.)
cultivé. F. H. (écon.)
du Japon ou bibacier. H.
(écon.)

II. Plusieurs ovaires indéfinis renfermés
dans un calice étranglé à son sommet,
chaque ovaire surmonté d'un style.

ROSIER.

1. Fruits presque ronds.

à une feuille. persé, or. H.
églantier. Allemagne. H. (orn.)
— ponceau. (orn.)
jaune. orient. H. (orn.)
hérissé. F. H.
d'Ecosse. H.
canelle. F., Alpes. H.
des champs. F. H.
de Caroline. H.
à petites fleurs. Am. s. H.

villosa L.
sinica L.

2. *Fructibus ovatis.*

remensis.
burgundiaca.

damascena H. K.
centifolia L.

— *unguiculata.*

muscosa.

maxima.

semperflorens.

turbinata H. K. }

francofurtensis. }

gallica L.

— *versicolor.*

bracteata *wend.*

kamtchatica *vent.*

alba L.

collina *murr.*

rubiginosa L.

canina L.

glauca.

rubrifolia *vill.* }

alpina L.

pendulina L.

moschata L.

diversifolia *vent.*

semperflorens *jacq.* }

chinensis *jacq.* }

sempervirens L.

balearica.

velu. F. h
de Chine. h

2. Fruits ovales.

de Champagne. h (orn.)

de Bourgogne ou pompon. h
(orn.)

de Damas. h (orn.)

à cent feuell. h (orn.)

— *onguiculé.* (orn.)

mousseux. h (orn.)

de Hollande. h (orn.)

de tous les mois. h (orn.)

à gros cul. h (orn.)

de Provins. EUR. h (orn., méd.)

— *panaché.* (orn.)

de Macartney. chine. h (orn.)

du Kamtchatka. h

blanc. EUR. h (orn.)

des collines. F. h

odorant. F. h

de chien. F. h

glauque. F., Alpes. h

des Alpes. F. h

à fruit pendant. F. h

musqué. BARB. h (orn., écon.)

à feuell. variables. chine, or.

h (orn.)

toujours vert. Allemagne. h

de Mahon. or. h

III. *Germina plura definita (rarius unum), calice urceolari supra coarctato tecta, quasi infera, singula monostyla, semina totidem.*

III. Ovaires en nombre défini, rarement un seul, surmontés chacun d'un style et renfermés dans un calice étranglé au sommet; autant de graines.

POTERIUM

sanguisorba L.

hybridum L.

caudatum H. K.

spinosum L.

PIMPRENELLE

des jardins. F. ♀ (écon., méd.)

hybride. F. m. ♂

à grappes. madère, or. h

épineuse. orient, or. h

SANGUISORBA

officinalis L.

media L.

canadensis L.

SANGUISORBE

officinale. F. ♀ (écon.)

moyenne. AM. S. ♀

de Canada. ♀

ANCISTRUM
sanguisorbæ *L. f.*

repens *vent.*

AGRIMONIA
eupatoria *L.*
— alba.
— odorata.
repens *L.*
agrimonioïdes *L.*

CLIFFORTIA
ilicifolia *L.*

ALCHIMILLA
vulgaris *L.*

hybrida *L.*
alpina *L.*
pentaphyllea *L.*
aphanes.
aphanes arvensis *L.* }

SIBBALDIA
procumbens *L.*

IV. *Germina plura indefinita vere supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla, semina totidem nuda aut rarius baccata.*

TORMENTILLA
erecta *L.*
reptans *L.*

POTENTILLA.

1. *Foliis pinnatis.*

fruticosa *L.*
anserina *L.*
multifida *L.*
supina *L.*
bifurca *L.*
rupestris *L.*
pennsylvanica *L.*

2. *Foliis digitatis.*

recta *L.*
intermedia *L.*
hirta *L.*
argentea *L.*
verna *L.*

ANCISTRUM
à feuell. de pimprenelle. nouv.
zél. Ψ
rampant. pérou, or. Ψ

AIGREMOINE
officinale. *F.* Ψ (méd.)
— blanche.
— odorante.
rampante. orient. Ψ
à feuell. ternées. Italie. Ψ

CLIFFORTIA
à feuell. de houx. cap, or. Ψ

ALCHIMILLE
commune, *pié-de-lion.* *F.* Ψ
(méd.)
hybride. *F.*, Alpes. Ψ
satinée. *F.*, Alpes. Ψ
à 5 feuell. *F.*, Alpes. Ψ
perchepierre. *F.* $\odot$

SIBBALDIA
couché. *F.*, Alpes. Ψ

IV. Plusieurs ovaires supères et indéfinis attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style, autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLE
droite. *F.* Ψ
rampante. *F.* Ψ

POTENTILLE.

1. Feuilles pennées.

arbrisseau. sibérie. Ψ (orn.)
argentine. *F.* Ψ (méd.)
laciniée. *F.* Ψ
couchée. *F.* $\odot$
bifurquée. sibérie. Ψ
des rochers. *F.*, Alpes. Ψ
de Pensylvanie. Ψ

2. Feuilles digitées.

droite. *F. m.* Ψ
moyenne. *F.*, Alpes. Ψ
hérissée. *F. m.* Ψ
argentée. *F.* Ψ
printanière. *F.* Ψ

alchimilloïdes *Lapeyr.*

aurea *L.*

grandiflora *L.*

alba *L.*

incisa.

reptans *L.*

lupinoïdes *Wild.* }

valderia *Will.* }

caulescens *L.*

3. *Foliis ternatis.*

monspeliaca *L.*

norvegica *L.*

parviflora. }

fragaria sterilis *Will.* }

emarginata. }

fragaria sterilis *L.* }

FRAGARIA

vesca *L.*

— monophylla.

— efflagellis.

— semperflorens.

— moschata.

— nigra.

— viridis.

— virginiana.

— chiloensis.

— ananassa.

COMARUM

palustre *L.*

GEUM

urbanum *L.*

virginianum *Murr.*

canadense *Murr.* }

strictum *Wild.* }

alepicum *Jacq.* }

rivale *L.*

nutans *Link.*

pyrenaïcum *Wild.*

montanum *L.*

reptans *L.*

DRYAS

octopetala *L.*

à feuell. d'alchimille. *F.*, *Py-*
rénées. *ψ*

dorée. *F.*, *Alpes.* *ψ*

à grandes fleurs. *F.*, *Alpes.* *ψ*

blanche. *F.*, *Alpes.* *ψ*

incisée. *ψ*

quintefeuille. *F.* *ψ* (méd.)

à feuell. de lupin. *F.*, *Alpes.* *ψ*

tombante. *F.* *ψ*

3. Feuilles ternées.

de Montpellier. *F.* *ψ*

de Norvège. *ψ*

à petites fleurs. *F.* *ψ*

échancrée. *F.* *ψ*

FRAISIER

des bois. *F.* *ψ* (écon., méd.)

— à une feuille.

— sans coulans.

— de tous les mois.

— capiton.

— noir.

— vert.

— écarlate.

— du Chili.

— ananas.

COMARUM

des marais. *F.* *ψ*

BENOITE

officinale. *F.* *ψ* (méd.)

de Virginie. *ψ*

de Canada. *ψ*

des ruisseaux. *F.*, *Alpes.* *ψ*

penchée. *F.* *ψ*

des Pyrénées. *F.* *ψ*

de montagne. *F.*, *Alpes.* *ψ*

rampante. *F.*, *Alpes.* *ψ*

DRYAS

à 8 pétales. *F.*, *Alpes.* *ψ*

RUBUS.

RONCE.

1. *Fruticosi.*

idæus L.
occidentalis L.
villosus H. K. }
vulpinus. }
fruticosus L.
 — *inermis*.
 — *laciniatus*.
tomentosus L.
glandulosus.
pinnatus.
cæsius L.
 — *crispus*.
odoratus L.

2. *Herbacei.*

saxatilis L.
arcticus L.
chamæmorus L.

V. *Germina plura definita supera monostyla, capsula totidem mono aut polysperma.*

SPIRÆA.

1. *Herbaceæ.*

filipendula L.
aruncus L.
ulmaria L.
lobata L.
trifoliata L.

2. *Fruticosa.*

sorbifolia L.
salicifolia L.
levigata L.
tomentosa L.
hypericifolia L.
crenata L.
opulifolia L.

VI. *Germin unicum monostylum, nux monostyla aut disperma nuda aut drupacea.*

PRUNUS.

1. *Cerasi. Nucleo subrotundo.*
caroliniana Wild.
laurocerasus L.
lusitanica L.

1. *Tige ligneuse.*

framboisier. F. ♀ (écon.)
d'occident. AM. S. ♀ (écon.)
velue. AM. S. ♀
des haies. F. ♀ (écon., méd.)
 — *sans épines*.
 — *laciniée*.
cotonneuse. F. ♀
glanduleuse. F., pyrén. ♀
pennée. île de F., S. ch. ♀
à fruit bleu. F. ♀ (écon.)
 — *crêpue*.
odorante. AM. S. ♀

2. *Tige herbacée.*

des rochers. F. ♀
du nord. suède. ♀ (écon.)
des marais. suède. ♀ (écon.)

V. Oaires supères en nombre défini, autant de capsules renfermant une ou plusieurs graines.

SPIRÆA.

1. *Tige herbacée.*

filipendule. F. ♀ (orn.)
à grappes. F. ♀ (orn.)
ulmaire. F. ♀ (orn.)
à feuell. lobées. AM. S. ♀ (orn.)
à 3 feuell. AM. S. ♀ (orn.)

2. *Tige ligneuse.*

à feuell. de sorbier. sib. ♀ (orn.)
à feuell. de saule. sib. ♀ (orn.)
à feuell. lisses. sib. ♀ (orn.)
cotonneux. AM. S. ♀ (orn.)
à feuell. d'hypericum. F. ♀ (orn.)
à feuell. crénelées. sib. ♀ (orn.)
à feuell. d'obier. AM. S. ♀ (orn.)

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style, une noix nue ou recouverte d'une pulpe renfermant une ou deux graines.

PRUNIER.

1. Les Cerisiers. Noyau presque rond.
de Caroline. or. ♀
laurier-cerise. F. ♀ (orn.)
azarero. portug., ♀ (orn.)

padus L.
 — rubra.
 virginiana L.
 serotina *wild.*
 pumila L.
 chamæcerasus Jacq.
 mahaleb L.

semperflorens *wild.* }
 serotina Roth. }
 cerasus L.
 — nana.
 — ruberrima.
 — suavissima.
 — juliana.
 avium L.
 — sylvestris.
 — nigra.
 — bigarella.
 persicifolia.

2. Pruni. Nucleo ovato sub compresso.

spinosa L.
 sinensis.
 amygdalus pumila L. }
 prostrata Bill.
 insititia L.
 brigantina Vill.
 domestica L.
 — cerea.
 — cereolea.
 — damascena.
 — hungarica.
 — claudiana.
 myrobolana. }
 cerasifera *wild.* }
 acinaria.

3. Armeniaca. Nucleo orbiculari compresso.

armeniaca L.
 — dulcis.
 — nigra.
 — macrocarpa.

AMYGDALUS

persica L.
 communis L.
 — amara.

merisier à grappes. F. 5 (orn.)
 — à fruit rouge.
 de Virginie. 5 (orn.)
 tardif. Virginie. 5
 ragoumier. Am. s. 5 (orn.)
 chamæcerasus. Autriche. 5
 mahaleb, ou de Sainte-Lucie.
 F. 5 (orn.)

de la Toussaint. 5

cerisier. F. 5 (écon.)
 — nain.
 — de Montmorency.
 — royal, ou chérédue.
 — guignier à fruit noir.
 merisier. F. 5 (écon.)
 — des bois, à fruit rouge.
 — des bois, à fruit noir.
 — bigarotier.
 à feuill. de pêcher. 5

2. Les Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.

épineux, ou prunellier. F. 5
 de Chine. 5 (orn.)
 couché, orient. 5
 sauvage. F. 5
 de Briançon. 5
 cultivé. F. 5 (écon.)
 — de Sainte-Catherine.
 — de mirabelle.
 — de Damas.
 — de Damas noir.
 — de reine Claude.
 demyrobolan. Am. s. 5 (écon.)
 de cerisette. Am. s. 5 (écon.)

3. Abricotiers. Noyau orbiculaire et comprimé.

abricotier. orient. 5 (écon.)
 — alberge.
 — à fruit noir.
 — pêche.

AMANDIER

pêcher. perse. 5 (écon.)
 cultivé. Asie. 5 (écon.)
 — amer.

nana L.
 orientalis H. K. }
 argentea Lmk. }

Genera rosaceis affinia.

CALYCANTHUS
 floridus L.
 præcox L.

HOMALIUM
 racemosum L.

ORDO XI.

LEGUMINOSÆ.

I. *Corolla regularis, legumen multiloculare, sæpius bivalve, dissepimentis transversis, loculis monospermis, stamina distincta.*

MIMOSA.

1. *Foliis simplicibus.*

verticillata L'Her.
 juniperina L'Her.

linifolia Vent.
 floribunda Vent.

obliqua Smith.
 longifolia Andr.
 falcata.
 suaveolens Smith.
 stricta Andr.
 heterophylla Lmk.

2. *Foliis simpliciter pinnatis.*

inga L.
 fagifolia L.

3. *Foliis bi aut trigeminis.*

unguis-cati L.
 foetida Jacq.

4. *Foliis conjugatis simulque pinnatis.*

sensitiva L.
 strumbulifera Lmk.
 coronillæfolia.
 furcata.

nain, sibérie. H (orn.)

satiné, perse. H (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les
 Rosacées.

CALYCANTHUS
 de Virginie. H (orn.)
 du Japon. H (orn.)

HOMALIUM
 à grappes. Am. m., s. ch. H

ORDRE XI.

LES LÉGUMINEUSES.

I. *Corolle régulière, gousse à plusieurs loges monospermes, communément bivalve, séparée par des cloisons transversales, étamines distinctes.*

SENSITIVE.

1. *Feuilles simples.*

verticillée. N. Holl., or. H
 à feuell. de genévrier. N. Holl.,
 or. H
 à feuell. de lin. N. Holl., or. H
 à fleurs nombreuses. N. Holl.,
 or. H
 oblique. N. Holl., or. H
 à feuell. longues. N. Holl., or. H
 falciforme. N. Holl., or. H
 triangulaire. N. Holl., or. H
 serrée. N. Holl., or. H
 à feuell. variables. île de F.,
 s. ch. H

2. *Feuilles une fois pennées.*

ailée. Am. m., s. ch. H
 à feuell. de hêtre. Am. m.,
 s. ch. H

3. *Feuilles deux ou trois fois géminées.*

griffe de chat. Am. m., s. ch. H
 puante. Mexique, s. ch. H

4. *Feuilles conjuguées et pennées.*

sensible. Brésil, s. ch. H
 tire-bouchon. Pérou, s. ch. H
 à feuell. de coronille. s. ch. H
 bifurquée. Afr., s. ch. H

5. *Foliis duplicato pinnatis.*a. *Aculeata aculeis sparsis.*

pudica L.
asperata L.
sarmentosa.
uncinella.
horridula Mich.
trinervis.
ceratonia L.

rhodacantha.

b. *Spinosa spinis axillaribus.*

juliflora Swartz.
guayaquilensis.
mauroceana.
senegal L.
nilotica L.
indica.
farnesiana L.
eburnea L. f. }
leucacantha Jacq. }
cornigera L.

c. *Inermes.*

muricata L.
portoricensis Jacq.
leucocephala Lmk.

lophantha Vent. }
distachia Vent. }
arborca L. }
filicifolia Lmk. }
julibrissin Scop.
decurrens Vent.
angustifolia Lmk. }
peregrina L. }
lebbek L.
trichodes Jacq.
scandens L.
botrycephala Vent.
lentiscifolia.

angustisiliqua Lmk. }
virgata Jacq. }
pubigera.
glandulosa Mich.
punctata L.

5. Feuilles deux fois pennées.

a. Tige garnie d'aiguillons épars.

commune. Am. m., s. ch. ☉
rude. Am. m., s. ch. ♀
sarmenteuse. s. ch. ♀
à crochets. s. ch. ♀
hérissée. Am. s., or. ♀
à trois nervures. s. ch. ♀
à feuil. de caroubier. Am. m.,
 s. ch. ♀
à épines de rosier. s. ch. ♀

b. Epines axillaires.

à chatons. Mexique, s. ch. ♀
de guayaquil. s. ch. ♀
de Maroc. s. ch. ♀
à tige blanche. Ég., s. ch. ♀
du Nil. Égypte, s. ch. ♀
des Indes. s. ch. ♀
de Farnèse. Inde, or. ♀
à épines blanches. Inde, s. ch. ♀
à grosses épines. Mexique,
 s. ch. ♀

c. Tige sans épines.

tuberculeuse. Am. m., s. ch. ♀
de Porto-Rico. s. ch. ♀
à têtes blanches. Am. m.,
 s. ch. ♀

en panache. N. Holl., or. ♀

en arbre. Am. m., s. ch. ♀ (orn.)

arbre de soie. Asie. ♀
décurrente. N. Holl., or. ♀
à feuil. étroites, ou tendre à
caillou. Am. m., s. ch. ♀
lebbek. Inde, s. ch. ♀
barbue. Pérou, s. ch. ♀
grimpante. Inde, s. ch. ♀
à grappes. N. Holl., or. ♀
à feuil. de lentisque. Mexique,
 s. ch. ♀
à gousses étroites. Am. m.,
 s. ch. ♀
velue. s. ch. ♀
glanduleuse. Am. s., or. ♀
punctuée. Am. m., s. ch. ♀

lycopodioides.
aqualica *Humboldt.*

GLEDITSIA

triacanthos *L.*

— levis.

monosperma *H. K.* }

caroliniensis *Lmk.* }

sinensis *Lmk.*

macrocanthos.

GYMNOCLADUS *Lmk.*

canadensis *Lmk.* }

guilandina dioica *L.* }

CERATONIA

siliqua *L.*

TAMARINDUS

indica *L.*

PARKINSONIA

aculeata *L.*

SCOTIA *Jacq.*

speciosa *Jacq.* }

guayacum afrum *L.* }

CASSIA

absus *L.*

tora *L.*

bicapsularis *L.*

viminea *L.*

alata *L.*

corymbosa *Lmk.*

falcata *L.*

occidentalis *L.*

planisiliqua *L.*

auriculata *L.*

stipulacea *H. K.*

fistula *L.*

latifolia. }

an atomaria *L.?* }

senna *L.*

acutifolia *Lmk.*

grandiflora. }

corymbosa *ortega.* }

biflora *L.*

tomentosa *Lmk.* }

multiglandulosa *Jacq.* }

à feuell. de lycopode. s. ch. ☿
aquatique. mexique, s. ch. ♀

FÉVIER

à trois pointes. Am. s. ☿ (arts,
orn.)

— sans épines.

monosperme. Am. s. ☿ (orn.)

de Chine. ☿ (arts, orn.)

à gross. épines. chine. ☿ (orn.)

GYMNOCLADUS

de Canada, chicot, bonduc. ☿

CAROUBIER

commun. F. m., or. ☿ (écon.)

TAMARIN

des Indes. s. ch. ☿ (méd.)

PARKINSONIA

épineux. Am. m., s. ch. ☿

SCOTIA

écarlate. cap, or. ☿

CASSE

hérissée. égypte. ☉

à fruit grêle. Am. m. ☉

à deux loges. Am. m., s. ch. ☿

sarmenteuse. Am. m., s. ch. ☿

ailée. Am. m., s. ch. ♀

corymbifère. Brésil, s. ch. ☿

falciforme. Am. m. ☉

puante. Am. m., s. ch. ☿ (méd.)

à gousse plate. Am. m., s. ch. ☿

auriculée. inde, s. ch. ☿

à gr. stipules. chili, s. ch. ☿

des boutiques. inde, s. ch. ☿
(méd.)

à larges feuell. Am. m., s. ch. ☿

séné d'Italie. ☉ (méd.)

lancéolée, ou séné de la palte.

égypte, s. ch. ☿ (méd.)

à grandes fleurs. mexique,
s. ch. ☿

à deux fleurs. Am. m., s. ch. ☿

cotonneuse. chili, s. ch. ☿

hirsuta L. f.
glandulosa L.
chamæcrista L.
marylandica L.

velue. Am. m., s. ch. 5
glanduleuse. Am. m. ①
chamæcrista. Am. m. ①
de Maryland. Am. s. 7

II. *Corolla regularis, legumen uniloculare bivalve, stamina 10 distincta.*

II. Corolle régulière, gousse bivalve à une loge, 10 étamines distinctes.

SPAENDONCEA Desf.
tamarindifolia Desf. }
cadia purpurea Forsk. }

SPAENDONCEA
à feuill. de tamarin. Afr.,
s. ch. 5

HOFFMENSEGGIA Cav.
falcaria Cav. }
larrêa glauca Ortéga. }

HOFFMENSEGGIA
falciforme. Pérou. 7

MORINGA
nux-ben. }
guilandina moringa L. }
hyperanthera moringa Vahl. }

MORINGA
noix de Ben. inde, s. ch. 5
(écon., méd.)

HÆMATOXYLUM
campechianum L.

CAMPÊCHE
commun. Am. m., s. ch. 5
(arts.)

ADENANTHERA
pavonina L.

CONDORI
glabre. inde, s. ch. 5

POINCIANA
pulcherrima L. }
cæsalpinia pulcherrima Swartz }

POINCILLADE
élégante. inde, s. ch. 5 (orn.)

CÆSALPINIA
sappan L.
bahamensis Lmk.
vesicaria Lmk.

BRÉSILLET
sapan. inde, s. ch. 5 (arts.)
de Bahama. s. ch. 5
vésiculeux. Am. m., s. ch. 5

GUILANDINA
bonducella L.

QUENIQUIER
sarmenteux. inde, s. ch. 5

III. *Corolla subirregularis, stamina defnita distincta aut basi tantum coalita, legumen uniloculare bivalve.*

III. Corolle un peu irrégulière, étamines distinctes ou seulement réunies à la base, gousse bivalve à une loge.

HYMENÆA
courbaril L.

HYMÉNÆA
courbaril. Am. m., s. ch. 5

BAUHINIA
porrecta H. K.
tomentosa L.

BAUHINIA
allongé. Am. m., s. ch. 5
cotonneux. inde, s. ch. 5

IV. *Corolla papilionacea, stamina distincta, legumen uniloculare bivalve.*

IV. Corolle papilionacée, étamines distinctes, gousse bivalve à une loge.

CERCIS
siliquastrum L.
canadensis L.

GAINIER
de Judée. orient 5 (orn.)
de Canada. 5 (orn.)

ANAGYRIS

foetida L.

SOPHORA

alopécuroïdes L.

flavescens L.

tomentosa L.

japonica L.

microphylla H. K.

tetraptera H. K.

PODALYRIA Lmk.

capensis wild. }

sophora capensis L. }

aurea wild. }

sophora aurea H. K. }

virgilia Lmk. }

robinia subdecandra l'Her. }

australis wild. }

sophora australis L. }

tinctoria wild. }

sophora tinctoria L. }

alba wild. }

sophora alba L. }

lupinoïdes wild. }

sophora lupinoïdes L. }

cuneifolia vent.

PULTENEA

ericoides vent.

V. Corolla papilionacea, stamina 10 mono
aut diadelph, legumen uniloculare bi-
valve.

PLATILOBIUM Smith.

formosum Smith.

scolopendrium Andr.

ULEX

europæus L.

minor Roth.

GENISTA.

1. Spinosa.

anglica L.

germanica L.

hispanica L.

lusitanica L.

ANAGYRIS

fétide. F. m., or. ♀

SOPHORA

queue de renard. orient. ♀

jaune. sibérie. ♀

cotonneux. ceylan, s. ch. ♀

du Japon. ♀ (orn.)

à petites feuell. N. zél., or. ♀
(orn.)

à quatre ailes. N. zél., or. ♀

PODALYRIA

du Cap. or. ♀

à fleurs jaunes. Abyss., s. ch. ♀

de Caroline. ♀

des teinturiers. Am. s. ♀ (arts.)

à fleurs blanches. caroline. ♀

à feuell. de lupin. kamtchatka.

♀
cunéiforme. cap, or. ♀

PULTENEA

à feuell. de bruyère. N. holl.,
or. ♀

V. Corolle papilionacée, 10 étamines
monadelphes ou diadelphes, gousse
bivalve à une loge.

PLATILOBIUM

élégant. N. holl., or. ♀

à feuilles de scolopendre.
N. holl., or. ♀

AJONC

marin. F. ♀ (écon.)

petit. F. ♀

GENET.

1. Tige épineuse.

d'Angleterre. F. ♀

d'Allemagne. F. ♀

d'Espagne. F. ♀

de Portugal. F. ♀

2. *Inermes.*

pilosa L.
sagittalis L.
tinctoria L.
sibirica L.
canariensis L.
candicans L.
junceae.
spartium junceum L. }

SPARTIUM.

1. *Inermia.*

sphaerocarpon L.
monospermum L.
cinereum *Wild.* }
genista scoparia *Vill.* }
album *Desf.* }
multiflorum *L'Her.* }
genista alba *Lmk.* }
multicaule.
genista multicaulis *Lmk.* }
purgans L.
scoparium L.
triquetrum *Lmk.*
nubigenum *H. K.* }
fragrans *Lmk.* }
patens Z.
cytissus pendulinus *L.f.* }
virgatum *H. K.*
parviflorum *Vent.*
radiatum Z.
umbellatum *Desf.*
linifolium *Desf.* }
genista linifolia Z. }

2. *Spinosa.*

aspalathoides *Desf.*
ferox *Desf.*
scorpius Z.
spinosum Z.
lanigerum *Desf.*
creticum.
an aspalathus cretica Z. ? }

CYTISUS

sessilifolius Z.
nigricans Z.

2. Tige sans épines.

tuberculeux. F. h
ailé. F. h
des teinturiers. F. h (arts.)
de Sibérie. h
des Canaries. or. h
blanchâtre. F. m., or. h
jonciforme, ou *d'Espagne*.
 F. m. h (orn.)

SPARTIUM.

1. Tige sans épines.

à fruit rond. barbarie, or. h
monosperme. F. m., or. h
cendré. F. m. h
à fleurs blanches. barb., or. h
 (orn.)
très-rameux. mahon, or. h
purgatif. F. h
à balais. F. h (écon.)
triangulaire. esp., or. h
odorant. canaries, or. h
étalé. F. m., or. h
effilé. madère, or. h
à petites fleurs. orient, or. h
à rayons. italie, or. h
ombellifère. barb., or. h
à feuell. de lin. barb., or. h

2. Tige épineuse.

aspalat. barbarie, or. h
à grosses épines. barb., or. h
scorpius. F. m., or. h
épineux. F. m., or. h
laineux. barb., or. h
de Crète. or. h

CYTISE

à feuell. sessiles. esp. h (orn.)
à épis. Allemagne. h (orn.)

laburnum *L.*

— latifolium.

cajan *L.*

hirsutus *L.*

anagyrius *L'Her.*

austriacus *L.*

divaricatus *L'Her.*

spartium complicatum *L.* }

proliferus *L.*

foliolosus *L'Her.*

triflorus *L'Her.*

biflorus *L'Her.*

supinus *L.*

argenteus *L.*

volgaricus *L. f.* }

pinnatus *Pallas.* }

des Alpes, ou faux ébénier.

F. h (orn.)

— à larges feuil. (orn.)

cajan, ou pois d'Angole.

Am. m., s. ch. h

hérissé. F. m. h

anagyris. canaries, or. h

d'Autriche. h

étalé. F. h

prolifère. canaries, or. h

feuill. canaries, or. h

à trois fleurs. F. m., or. h

à deux fleurs. hongrie. h

couché. F. h

argenté. F., Alpes. h

du Volga. h

CROTALARIA.

1. Foliis ternatis.

arborescens Lmk. }

incanescens H. K. }

incana L.

purpurascens Lmk.

2. Foliis simplicibus.

sagittalis L.

junceae L.

semperflorens Vent.

retusa L.

bengalensis Lmk.

verrucosa L. }

angulosa Lmk. }

cœrulea Jacq. }

CROTALAIRE.

1. Feuilles ternées.

en arbre. île de F., s. ch. h

(orn.)

blanche. Am. m. ☉

pourpre. île de F. ☉

2. Feuilles simples.

sagittée. Brésil. ☉

jonciforme. inde. ☉

toujours fleurie. inde, s. ch. h

émoussée. inde, s. ch. ☉

du Bengale. ☉

tuberculeuse. inde. ☉

RAPHNIA

triflora Thunb. }

crotalaria triflora L. }

retusa Vent.

RAPHNIA

à trois fleurs. cap, or. h

émoussé. N. holl., or. h

LUPINUS

perennis L.

varius L.

angustifolius L.

luteus L.

LUPIN

vivace. Am. s. u

bigarré. F. m. ☉ (orn.)

à feuil. étroites. F. ☉

jaune. barbarie. ☉ (orn.)

ONONIS.

1. Flores purpurei aut albi.

arborescens *Desf.*
 antiquorum *L.*
 arvensis *L.*
 altissima *Lmk.*
 mitissima *L.*
 cenisia *L.*
 alopecuroïdes *L.*
 cherleri *L.*
 rotundifolia *L.*
 fruticosa *L.*
 tridentata *L.*
 hirta.

2. Flores lutei.

viscosa *L.*
 natrix *L.*
 parviflora *Lmk.*
 minutissima *Jacq.* non *Lin.*
 columnæ *All.*
 subocculta *Vill.*
 minutissima *L.*
 saxatilis *Lmk.*
 ornithopodioides *L.*
 vaginalis *Vahl.*

ARACHIS

hypogea *L.*

EBENUS

cretica *L.*
 pinnata *Desf.*

ANTHYLLIS.

1. Fruticosa.

barba-jovis *L.*
 cytisoides *L.*
 hermanniæ *L.*
 erinacea *L.*

2. Herbacea.

cornicina *L.*
 montana *L.*
 tetraphylla *L.*
 vulneraria *L.*
 — purpurascens.

ONONIS.

1. Fleurs rouges ou blanches.

en arbre. barbarie, or. $\mathfrak{h}$
 arrête-bœuf. *F.* Ψ (méd.)
 des champs. *F.* Ψ (méd.)
 élevé. Allemagne. Ψ
 à fleurs serrées. *F. m.* Ψ
 du mont Cénis. Ψ
 queue-de-renard. *Esp.* $\odot$
 de Cherler. *F. m.* Ψ
 à feuil. rondes. *F.*, Alpes. Ψ
 arbrisseau. *F.*, Alpes. $\mathfrak{h}$ (orn.)
 à trois dents. *Esp.*, or. $\mathfrak{h}$
 hérissé. orient, or. Ψ

2. Fleurs jaunes.

visqueux. *F. m.* $\odot$
 natrix. *F.* $\mathfrak{h}$

à petites fleurs. *F.* $\mathfrak{z}$

nain. *F.* Ψ

pié-d'oiseau. barbarie. $\odot$
 à gaines. orient, or. $\mathfrak{h}$

ARACHIS

pistache de terre. *Am. m.* $\odot$
 (écon.)

EBENUS

de Crète. or. $\mathfrak{h}$
 penné. or. Ψ

ANTHYLLIS.

1. Tige ligneuse.

satiné. orient, or. $\mathfrak{h}$
 à fleurs de cytise. *F. m.*, or. $\mathfrak{h}$
 d'orient. or. $\mathfrak{h}$
 épineux. *Esp.*, or. $\mathfrak{h}$

2. Tige herbacée.

cornu. *Esp.* $\odot$
 de montagne. *F.* Ψ
 à quatre feuil. *F. m.* $\odot$
 vulnérable. *F.* $\odot$
 — pourpre.

DALEA

purpurea vent.
petalostemum violaceum mich. }
candida.
petalostemum candidum mich. }
linnæi mich.

DALEA

violet. Am. s., or. ♀
blanc. Am. s., or. ♀
de Linné. Am. s. ♀

PSORALEA

pinnata L.
odoratissima Jacq.
verrucosa wild. }
angustifolia Jacq. }
aphylla L.
bituminosa L.
palæstina Gouan.
glandulosa L.
americana L.
bracteata L.
corylifolia L.

PSORALEA

à feuell. pennées. cap, or. ♀
odorant. cap, or. ♀
tuberculeux. cap, or. ♀
sans feuell. cap, or. ♀
bitumineux. F. m., or. ♀
de Palestine. or. ♀
glanduleux. rérou, or. ♀
d'Amérique. s. ch. ♀
à grandes bractées. cap, or. ♀
à feuell. de noisetier. inde. ☉

MELILOTUS (*Trifolium* L.)

cœrulea L.
indica L.
— minor.
officinalis L.
alba.
dentata wild.
polonica L.
italica L.
cretica L.
messanensis L.

MELILOT

bleu. bohème. ☉ (écon.)
des Indes. ☉
— petit.
officinal. F. ♂ (méd., écon.)
blanc. sibérie. ♂ (écon.)
denté. Hongrie. ☉
de Pologne. ☉
d'Italie. ☉
de Crète. ☉
de Messine. ☉

TRIFOLIUM.

1. *Lotoïdea. Leguminibus tectis polyspermis.*

lupinaster L.
strictum L.
hybridum L.
repens L.
alpinum L.
involucratum wild.

2. *Lagopoïdea. Calicibus villosis.*

subterraneum L.
cherleri L.
lappaceum L.
rubens L.
pratense L.
diffusum wild.
alpestre L.

TRÈFLE.

1. Les Lotoïdes. Gousses polyspermes recouvertes par le calice.

à feuell. de lupin. sibérie. ♀
serré. F. ☉
hybride. F. ♀
rampant. F. ♀
des Alpes. F. ♀
à involucre. ♀

2. Les Lagopodes. Calices velus.

souterrain. F. ☉
de Cherler. F. ni. ☉
bardane. F. ☉
rouge. F. ♀ (écon.)
des prés. F. ♀ (écon.)
étalé. Hongrie. ♂
à deux têtes. F., Alpes. ♀

flexuosum *racq.* }
 medium *Afz.* }
 pannonicum *L.*
 ochroleucum *L.*
 squarrosum *L.*
 incarnatum *L.*
 — pallidum.
 angustifolium *L.*
 arvense *L.*
 saxatile *All.* }
 thymiflorum *Vill.* }
 stellatum *L.*
 clypeatum *L.*
 alexandrinum *L.*
 scabrum *L.*
 glomeratum *L.*
 parviflorum *Wild.*
 striatum *L.*
 suffocatum *L.*

3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.*

spumosum *L.*
 tomentosum *L.*
 fragiferum *L.*

4. *Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.*

montanum *L.*
 agrarium *Wild.* }
 aureum *Pollich.* }
 spadiceum *L.*
 procumbens *Smith.*
 filiforme *Smith.*

tortueux. F., Alpes. ♀

de Hongrie. ♀

jaunâtre. F. ♀

hérissé. F. ⊙

incarnat. F. ⊙

— pâle.

à feuell. étroites. F. m. ⊙

des moissons. F. ⊙

des rochers. F., Alpes. ♂

étoilé. F. m. ⊙

bouclier. orient. ⊙

d'Alexandrie. ⊙ (écon.)

rude. F. ⊙

aggloméré. F. ⊙

à petites fleurs. Hongrie. ⊙

strié. F. ⊙

nain. F. m. ⊙

3. Les vésiculeux. Calices renflés.

écumeux. F. ⊙

cotonneux. F. ⊙

fraise. F. ♀

4. Les Lupulins. Etendard de la corolle abaissé.

de montagne. F. ♀

des champs. F. ⊙

brun. F. ⊙

tombant. F. ⊙

filiforme. F. ⊙

MEDICAGO.

1. *Leguminibus lœnatis.*

arborea *L.*
 radiata *L.*
 circinnata *L.*
 sativa *L.*
 falcata *L.*
 lupulina *L.*

2. *Leguminibus cochleatis.*

prostrata *L. f.*
 marina *L.*
 orbicularis *L.*
 tornata *L.*
 — minor.

LUSERNE.

1. Gousse falciforme.

en arbre. orient, or. ♂

radiée. Italie. ⊙

pennée. Italie. ⊙

cultivée. F. ♀ (écon.)

falciforme. F. ♀

des prés. F. ♂

2. Gousse en limaçon.

couchée. Hongrie. ♀

maritime. F. m., or. ♀

orbiculaire. F. ⊙

barillet. F. ⊙

— petit barillet.

elegans *Wild.*
tuberculata *Wild.*
aculeata *Wild.*
rigidula *L.*
intertexta *L.*
globulifera.
tribuloides *Link.*
ciliaris *L.*
maculata *Wild.* }
arabica *L.* }
coronata *L.*
denticulata *Wild.*
apiculata *Wild.*
minima *L.*
laciniata *L.*

TRIGONELLA.

1. Flores in pedicello communi.

platicarpus *L.*
corniculata *L.*
cancellata.
prostrata.
laciniata *L.*

2. Flores sessiles.

monspeliaca *L.*
spinosa *L.*
polycerata *L.*
fœnum-grecum *L.*

LOTUS

edulis *L.*
siliquosus *L.*
tetragonolobus *L.*
conjugatus *L.*
peregrinus *L.* }
oligoceros *Link.* }
hispidus.
arabicus *L.*
creticus *L.*
jacobæus *L.*
ornithopodioides *L.*
prostratus *Desf.*
corniculatus *L.*
 — *major.*
 — *tenuifolius.*
hirsutus *L.*

élégante. *sicile.* ☉
tuberculeuse. *F. m.* ☉
à aiguillons. ☉
rude. ☉
entrelacée. *F. m.* ☉
à globules. ☉
à grosses pointes. *Barbarie.* ☉
ciliée. *F. m.* ☉
tachée. *F.* ☉
couronnée. *F. m.* ☉
denticulée. *F. m.* ☉
à petites pointes. *Eur.* ☉
velue. *F.* ☉
laciniée. *F.* ☉

TRIGONELLE.

1. Fleurs portées sur un pédoncule commun.

à gousses larges. *sibérie.* ☉
cornue. *F.* ☉
pie-d'oiseau. ☉
couchée. *orient.* ☉
laciniée. *Égypte.* ☉

2. Fleurs sessiles.

de Montpellier. ☉
épineuse. *crête.* ☉
à gousses longues. *F. m.* ☉
fœnu-grec. *F. m.* ☉ (méd.)

LOTIER

comestible. *orient.* ☉
à grosses gousses. *F.* ☿
à quatre ailes. *orient.* ☉
conjugué. *F.* ☉
étranger. *Barbarie.* ☉
hérissé. *F. m.* ☉
d'Arabie. *or.* ☿
argenté. *orient,* *or.* ☿
à fleurs brunes. *Afr., or.* ♂
comprimé. *Esp.* ☉
couché. *orient,* *or.* ☿
pie-d'oiseau. *F.* ☿
 — *élevé.*
 — *à feuell. étroites.*
velu. *F. m., or.* ☿

rectus L.
dorycnium L.

DOLICHOS

lablab L.
— albus.
sinensis L.
sesquipedalis L.
unguiculatus L.
luteolus Jacq.
articulatus Lmk.
minimus L.

lignosus L.
urens L.
ensiformis.
acinaciformis Jacq. }
gladiatus Jacq.

soja L.
biflorus L.

PHASEOLUS

vulgaris L.
coccineus Lmk. }
multiflorus Wild. }
lunatus L.
vexillatus L.
caracalla L.
paniculatus Mich.
radiatus Lmk. an Lin. ?
semi-erectus L.
nanus L.
stipularis Lmk. }
an dolichos trilobus L. ? }
sphærospermus L.

ERYTHRINA

herbacea L.
corallodendrum L.
abyssinica Lmk.
✓ aculeatissima.
✓ portoricensis.

CLITORIA

ternatea L.
— alba.
heterophylla Lmk.

brasiliانا L.
virginiana L.

à tige droite. F. m. ♀
dorycnium. F. m., or. ♀

DOLIC

lablab. Égypte. ☉ (orn.)
— à fleurs blanches.
de Chine. ☉
à longues gousses. Am. m. ☉
onguiculé. Am. m. ☉
jaunâtre. Am. m. ☉
articulé. Am. m., s. ch. ♀
à petites gousses. Am. m.,
s. ch. ♀
ligneux. inde, or. ♀ (orn.)
brillant. Am. m., s. ch. ♀
pois-sabre. Am. m., s. ch. ♀
à grandes gousses. Am. m.,
s. ch. ♀
soja. japon. ☉
à deux fleurs. inde. ☉

HARICOT

commun. inde. ☉ (écon.)
écarlate. Am. m. ☉ (écon.,
orn.)
arqué. inde. ☉ (écon.)
à grand étendart. Am. m. ☉
caracolles. inde, or. ♀ (orn.)
en panicule. Am. s. ♀
à rayons. ceylan. ☉
pourpre. Am. m. ☉
nain. inde. ☉ (écon.)
à grandes stipules. inde. ☉
à graines rondes. inde. ☉

ERYTHRINA

herbacé. caroline, or. ♀
arbre de corail. Am. m., s. ch. ♀
d'Abyssinie. s. ch. ♀
très-épineux. s. ch. ♀
de Porto-Rico. s. ch. ♀

CLITORIA

ternatée s. ch. ♂
— à fleurs blanches.
à feuilles variables. inde,
s. ch. ♀
du Brésil. ☉
de Virginie. ☉

glabella. }
galacia glabella *Mich.* }

GLYCINE

monoïca L.
caribæa L.
tomentosa L.
bituminosa L.
apios L.
frutescens L.
bimaculata *curt.*
rubicunda *curt.*
coccinea *curt.*

ABRUS

precatorius L.

AMORPHA

fruticosa L.
pumila *Mich.*
glabra.

PISCIDIA

erythrina L.

ROBINIA

pseudo-acacia L.

inermis.
viscosa *Mich.*
hispida L.
altagana *l'Her.*
caragana L.
pygmæa L.
frutescens L.
chamlagu *l'Her.*
spinosa L.
halodendron *L.f.*
squamata *Vahl.*
tomentosa *Wild.* }
panacoco *Aublet.* }

COLUTEA

arborescens L.
alepica *Lmk.* }
pocokii *Wild.* }
orientalis *Lmk.* }
cruenta *H. K.* }
frutescens L.

LESSERTIA *Dec.*

perennans *Dec.* }
colutea perennans L. }

glabre. Am. s.

GLYCINE

monoïque. Am. s. ♀
des Antilles. s. ch. ♂
cotonneux. Am. s. ♀
bitumineux. cap, or. ♀
apios. Am. s. ♀
arbrisseau. Am. s. ♂ (orn.)
à deux taches. N. Holl., or. ♂
rouge. N. Holl., or. ♂
écurlate. N. Holl., or. ♂

ABRUS

à chapelets. Am. m., s. ch. ♂

AMORPHA

faux indigo. Am. s. ♂ (orn.)
nain. Am. s. ♂
glabre. Am. s. ♂

PISCIDIA

érythrina. Am. m., s. ch. ♂

ROBINIA

faux acacia. Am. s. ♂ (orn.,
écon.)
sans épines. Am. s. ♂ (orn.)
visqueux. Am. s. ♂ (orn.)
acacia rose. Am. s. ♂ (orn.)
altagana. daurie. ♂
caragana. sibérie. ♂ (orn.)
grêle. sibérie. ♂
arbrisseau. sibérie. ♂
chamlagu. chine. ♂ (orn.)
épineux. sibérie. ♂ (orn.)
satiné. sibérie. ♂
écailleux. Am. m., s. ch. ♂
cotonneux. cayenne, s. ch. ♂

BAGUENAUDIER

arbre. F. m. ♂ (orn.)
d'Alep. orient. ♂ (orn.)
d'orient. ♂ (orn.)
d'Ethiopie. cap, or. ♂ (orn.)

LESSERTIA

vivace. sibérie. ♀

annua *Dec.*
colutea herbacea *L.* }

annuel. cap. ☉

PHACA

boetica *L.*
astragalina *Dec.*
astragalus alpinus *L.* }
alpina *L.*

PHACA

de Portugal. or. ☿
faux astragale. *F.* ☿
des Alpes. *F.* ☿

OXYTROPIS *Dec.*

campestris *Dec.* }
astragalus campestris *L.* }
pilosa *Dec.* }
astragalus pilosus *L.* }
deflexa *Dec.* }
astragalus deflexus *Pallas.* }
astragalus hians *Jacq.* }
astragalus parviflorus *Lmk.* }

OXYTROPIS

des champs. *F.* ☿
velu. *F.*, Alpes. ☿
à fruit pendant. sibérie. ☿

ASTRAGALUS.

ASTRAGALE.

1. *Stipulis caulinis, floribus rubris.*

austriacus *L.*
annularis *Forsk.* }
maculatus *Lmk.* }
subulatus *Desf.* }
stella *L.*
sesameus *L.*
vesicarius *L.*
pentaglottis *L.*
purpureus *Lmk.*
hypoglottis *L.*
glaux *L.*
onobrychis *L.*
— alpinus.
— major.
hispidulus *Dec.*
sulcatus *L.*

1. Stipules adhérentes à la tige, fleurs rouges.

d'Autriche. *F. m.* ☿
annulaire. *Afr. s.* ☉
étoilé. *F. m.* ☉
à fleurs sessiles. *F. m.* ☉
vésiculeux. *F.* Alpes. ☿
pentaglotte. Barbarie. ☿
pourpre. *F. m.* ☿
hypoglotte. *F.* ☉
glaux. *Esp.* ☉
onobrychis. *F.* ☿
— des Alpes.
— de Sibérie.
hérissé. Égypte. ☉
silloné. sibérie. ☿

2. *Stipulis caulinis, floribus ochroleucis.*

depressus *L.*
contortuplicatus *L.*
trimestris *L.*
hamosus *L.*
glycyphyllos *L.*
cicer *L.*
galegiformis *L.*
asper *Jacq.* }
chloranthus *Pallas.* }

2. Stipules adhérentes à la tige, corolle d'un blanc jaune.

déprimé. *F.* ☿
récroquevillé. sibérie. ☉
hâtif. Égypte. ☉
en hameçon. *F. m.* ☉
à feuil. de réglisse. *F.* ☿
pois-chiche. *F.* ☿
galéga. sibérie. ☿
rude. sibérie. ☿

canadensis L.
 uliginosus L.
 odoratus Lmk.
 falcatus Lmk.
 christianus L.
 tomentosus Lmk.
 alopecuroides L.
 narbonensis Gouan.

de Canada. ♀
 des marais. sibérie. ♀
 odorant. orient. ♀
 falciforme. Russie. ♀
 de Judée. or. ♀
 cotonneux. égypte. ♀
 queue de renard. sibérie. ♀
 de Narbonne. F. m. ♀

3. *Stipulis petiolo adhaerentibus, inermes.*

caprinus L.
 exscapus L.
 incanus L.
 monspessulanus L.

4. *Spinescentes.*

longifolius Lmk.
 massiliensis Lmk. }
 tragacantha L. }
 sempervirens Lmk. }
 aristatus L'Her. }
 tragacantha Vill. }

3. *Stipules adhérentes au pétiole, feuilles sans épines.*

dés chèvres. barbarie, or. ♀
 sans tige. suisse. ♀
 blanc. F. m. ♀
 de Montpellier. F. ♀

4. *Feuilles terminées par une épine.*

à longues feuell. orient. ♪
 de Marseille. F. m. ♪
 toujours vert. F., Alpes. ♪

BISERRULA

pelecinus L.

BISERRULA

rateau. barbarie. ☉

GLYCYRRHIZA

echinata L.
 glabra L.
 foetida Desf.

RÉGLISSE

hérissée. tartarie. ♀
 officinale. F. ♀ (méd.)
 puante. barbarie. ♀

GALEGA

officinalis L.
 rosea Lmk.
 pulchella Scop. }
 stricta H. K. }
 cinerea L.
 coronillæfolia.
 caribæa L.
 pubescens Lmk.
 longifolia Jacq. }
 clitoria micrantha Scop. }

GALÉGA

officinal. F. ♀ (écon.)
 rose. cap, or. ♪
 élégant. cap, or. ♪
 cendré. Am. m. ☉
 à feuell. de coronille. s. ch. ♪
 des Antilles. s. ch. ♪
 pubescent. Am. m. ♪
 à longues feuell. Am. m. ♪

INDIGOFERA

viscosa Lmk.
 tinctoria L.

INDIGOTIER

visqueux. Am. m., s. ch. ♀
 des teinturiers. inde, s. ch. ♂
 (arts.)
 anil. inde, s. ch. ♂ (arts.)
 argenté. orient, or. ♪ (arts.)

anil L.
 argentea L. }
 glauca Lmk. }

macrostachya vent.
australis wild.
enneaphylla L.

LATHYRUS.

1. *Pedunculis unifloris.*

aphaca L.
nissolia L.
axillaris Lmk. }
sphæricus Retz. }
cicera L.
sativus L.
setifolius L.
turgidus Lmk.

2. *Pedunculis bifloris.*

clymenum L.
articulatus L.
odoratus L.
tingitanus L.
annuus L.

3. *Pedunculis multifloris.*

hirsutus L.
tuberosus L.
pratensis L.
sylvestris L.
latifolius L.
palustris L.

PISUM

sativum L.
 — *excorticatum.*
 — *umbellatum.*
arvense L.
maritimum L.
ochrus L.

OROBUS

lathyroides L.
vernus L.
luteus L.
tuberosus L.
albus L. f.
sylvaticus L.
niger L.
tomentosus.
lathyrus tomentosus Cav. }
vicia tomentosa wild. }

à gros épis. chine, or. h
austral. N. Holl., or. h
à neuf folioles. inde. o

GESSE.

1. Pédoncules à une fleur.

aphaca. F. o
sans vrilles. F. o
axillaire. F. m. o
sillonnée. Esp. o
cultivée. F. o (écon.)
à feuil. étroites. F. m. o
renflée. v

2. Pédoncules à deux fleurs.

d'Espagne. o
articulée. F. m. o
odorante. ceylan. o (orn.)
de Tanger. o
jaune. F. m. o

3. Pédoncules à plusieurs fleurs.

velue. F. o
tubéreuse. F. v (écon.)
dés prés. F. v
sauvage. F. v
à larges feuil. F. m. v
des marais. F. v

POIS

cultivé. F. o (écon.)
 — *sans parchemin.*
 — *à bouquets.*
des champs. F. o
maritime. F. v
ailé. F. m. o

OROBE

à feuil. de gesse. sibérie. v
printanier. F. v
jaune. F., Alpes. v
tubéreux. F. v
blanc. Autriche. v
des bois. F., Alpes. v
noir. F. v

cotonneux. pérrou, s. ch. h

VICIA.

VESCE

1. *Pedunculis elongatis.*

- pisiformis* L.
dumetorum L.
sylvatica L.
cracca L.
onobrichioides All.
atropurpurea Desf.
bengalensis L.
biennis L.
monanthos.
ervum monanthos L. }
ervilia Wild. }
ervum ervilia L. }

2. *Floribus axillaribus subsessilibus.*

- sepium* L.
sativa L.
 — *angustifolia*.
peregrina L.
torulosa.
lathyroides L.
ervum soloniense L. ex Wild. }
lutea L.
hybrida L.
narbonensis L.

FABA (*Vicia* Lin.)

- major* L.
 — *minor*.
 — *viridis*.

ERVUM

- hirsutum* L.
tetraspermum L.
lens L.
 — *minor*.

CICER

- arietinum* L.

VI. *Legumen articulatum, articulatis monospermis.*

SCORPIURUS

- vermiculata* L.
muricata L.
sulcata L.

ORNITHOPUS

- perpusillus* L.
compressus L.
scorpioides L.

1. *Pédoncules allongés.*

- pisiforme*. F. ♀
des buissons. F. ♀
des bois. F. ♀
à fleurs nombreuses. F. ♀
à feuell. de sainfoin. F., Alp. ☉
brun-pourpre. Barbarie. ☉
du Bengale. ☉
bisannuelle. Sibérie. ♂
à une fleur. F. ☉
ers. F. ☉

2. *Fleurs axillaires presque sessiles.*

- des haies*. F. ♀
cultivée. F. ☉ (écon.)
 — *à feuell. étroites*.
échancrée. F. ☉
bosselée. ☉
printanière. F. ☉
jaune. F. ☉
hybride. F. ☉
de Narbonne. ☉

FÈVE

- de marais*. perse. ☉ (écon.)
 — *petite*, ou *fèverolle*.
 — *verte*.

LENTILLE

- velue*. F. ☉
à quatre graines. F. ☉
cultivée. F. m. ☉ (écon.)
 — *petite*.

CICER

- pois-chiche*. orient. ☉ (écon.)

VI. *Gousse articulée, articulations monospermes.*

CHENILLETTE

- écailleuse*. F. m. ☉
hérissée. F. m. ☉
sillonnée. F. m. ☉

PIÉ-D'OISEAU

- petit*. F. ☉
comprimé. F. m. ☉
queue de scorpion. F. m. ☉

HIPPOCRÉPIS

- unisiliquosa L.
 multisiliquosa L.
 comosa L.
 balearica H. K.

HIPPOCRÉPIS

- à gousses solitaires. F. m. ☉
 à plusieurs gousses. F. m. ☉
 des champs. F. ♀
 de Mahon. or. ♂

CORONILLA

- emerus L.
 valentina L. }
 stipularis Lmk. }
 glauca L.
 juncea L.
 minima L.
 varia L.
 globosa Lmk.
 cretica L.
 securidaca L.

CORONILLE

- emèrus. F., Alpes. ♂ (orn.)
 à grandes stipules. F. m., or. ♂
 glauque. F. m., or. ♂
 jonciforme. F. m., or. ♂
 petite. F. ♀
 bigarrée. F. ☉ (orn.)
 globuleuse. orient. ♀
 de Crète. ☉
 à gousses plates. F. ☉

HEDYSARUM.

1. Foliis simplicibus.

- alhagi L.
 maculatum L.
 vaginale L.
 verpertilionis L. f.

gangeticum L.

2. Foliis ternatis.

- junceum L.
 coriaceum.
 canadense L.
 canescens L. ?
 marylandicum L.
 diffusum.
 gyrans L. f.

3. Foliis pinnatis.

- alpinum L.
 obscurum L.
 coronarium L.
 flexuosum L.
 fruticosum L.
 muricatum Jacq.
 lanuginosum.
 onobrychis L.
 saxatile L.
 caput-galli L.
 crista-galli L.

SAINFON.

1. Feuilles simples.

- à la manne. syrie. ♀
 panaché. inde. ☉
 à gaines. inde. ☉
 aile d'oiseau. cochinchine,
 s. ch. ♂
 du Gange. s. ch. ♂

2. Feuilles ternées.

- effilé. sibiérie. ♀
 à feüll. coriaces. or. ♂
 de Canada. ♀
 blanchâtre. Am. s., or. ♀
 de Maryland. ♀
 étalé. s. ch. ♂
 oscillant. Bengale, s. ch. ♂

3. Feuilles pennées.

- des Alpes. F. ♀
 à fruit lisse. Alpes. ♀
 d'Espagne. ♂ (écon., orn.)
 tortueux. orient. ☉
 arbrisseau. sibiérie. ♂
 hérissé. Afr. ♀
 laineux. orient. ♀
 cultivé. F. ♀ (écon.)
 des rochers. F., Alpes. ♀
 tête-de-coq. F. m. ☉
 crête-de-coq. orient. ☉

ÆSCHYNOMENE

grandiflora L.
sesban L.
picta Cav.
fusca.

VII. *Corolla papilionacea, legumen capsulare uniloculare submonospermum saepe non dehiscens.*

DALBERGIA

latilisiaqua.

GEOFFRÆA

inermis Swartz.

PTEROCARPUS

ecastaphyllum L.

SECURIDACA

volubilis L.

ORDO XII.**TEREBINTHACEÆ.**

I. *Germen simplex, fructus unilocularis monospermus.*

ANACARDIUM

occidentale L.

MANGIFERA

sativa L.

RHUS.

1. *Foliis pinnatis.*

coriaria L.
typhinum L.
glabrum H. K.
vernix L.
copallinum L.
semialatum Murr.
javanicum L.

2. *Foliis ternis.*

toxicodendron L.
radicans L.
aromaticum H. K.
tomentosum L.
dentatum Thunb.

ÆSCHYNOMENÉ

à grandes fleurs. inde, s. ch. 5
sesban. Égypte, s. ch. ♂
tacheté. N. Esp., s. ch. ♂
à fleurs brunes. s. ch. 5

VII. *Corolle papilionacée, gousse capsulaire à une loge ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.*

DALBERGIA

à gousse large. Am. m., s. ch. 5

GEOFFRÆA

sans épines. Am. m., s. ch. 5

PTÉROCARPUS

à feuilles simples. Am. m., s. ch. 5

SÉCURIDACA

sarmenteux. Am. m., s. ch. 5

ORDRE XII.**LES TÉRÉBINTHES.**

I. *Un seul ovaire, fruit à une seule loge monosperme.*

ANACARDE

d'occident, ou noix d'acajou.
 Am. m., s. ch. 5 (écon.)

MANGUIER

cultivé. inde, s. ch. 5 (alim.)

SUMAC.

1. *Feuilles pennées.*

des corroyeurs. F. m. 5 (écon.)
de Virginie. 5 (orn.)
glabre. Am. s. 5 (orn.)
vernis. Am. s. 5
ailé. Am. s. 5
semi-ailé. inde, s. ch. 5
à feuil. de sorbier. inde, s. ch. 5

2. *Feuilles ternées.*

vénéneux. Am. s. 5
traçant. Am. s. 5 (méd.)
aromatique. Am. s. 5
cotonneux. cap, or, 5
denté. cap, or, 5

cuneifolium *Thunb.*

glaucum.

thezera *Desf.*

rhamnus pentaphyllus *L.* }

oxyacanthoides.

angustifolium *L.*

viminale *H. K.*

levigatum *L.*

lucidum *L.*

villosum *L. f.*

undulatum *Jacq.*

nervosum.

3. *Foliis simplicibus.*

cotinus *L.*

II. *Germen simplex, fructus multilocularis, loculis quibusdam interdum abortivis.*

CNEORUM

triccoccum *L.*

pulverulentum *Vent.*

COMOCLADIA

ilicifolia *L.*

dentata *L.*

AMYRIS

polygama *Cav.*

SCHINUS

molle *L.*

PISTACIA

terebinthus *L.*

trifoliata *L.* }

vera *L.* }

chia.

atlantica *Desf.*

lentiscus *L.*

BURSERA

gummifera *L.*

SPONDIAS

monbin *L.*

III. *Germen multiplex, fructus multicapsularis.*

AYLANTUS *Desf.*

glandulosa.

cunéiforme. cap, or. 5

glaucue. cap, or. 5

thézera. barbarie, or. 5

à feuell. d'aube-épine. orient, or. 5

à feuell. étroites. cap, or. 5

flexible. cap, or. 5

lisse. cap, or. 5

luisant. cap, or. 5

velu. cap, or. 5

ondulé. cap, or. 5

veiné. cap, or. 5

3. Feuilles simples.

fustet. F. m. 5 (arts)

II. Un seul ovaire, fruit à plusieurs loges dont quelques-unes avortent quelquefois.

CAMELÉE

à trois coques. F. m. 5

pulvérulente. canaries, or. 5

COMOCLADIA

à feuell. de houx. Am. m.,

s. ch. 5

à feuell. dentées. Am. m.,

s. ch. 5

AMYRIS

polygame. chili, s. ch. 5

SCHINUS

mollé. pérou, s. ch. 5

PISTACHIER

térébinthe. F. m. 5

cultivé. orient, or. 5 (écon.)

de Chio. or. 5

de l'atlas. or. 5 (écon.)

lentisque. F. m., or. 5 (écon.)

BURSERA

gommifère. Am. m., s. ch. 5

SPONDIAS

monbin. Am. m., s. ch. 5

III. Plusieurs ovaires, autant de capsules.

AYLANTE

glanduleux. japon. 5 (orn.)

BRUCEA *l'her.*
ferruginea l'her.

FAGARA
pterota L.
microphylla.

ZANTHOXYLUM
fraxinifolium Marschal. }
cauliflorum Mich. }
clava-herculis L.

PTELEA
trifoliata L.

DODONÆA
viscosa L.
angustifolia L. f.
triquetra Willd.

JUGLANS
regia L.
— serotina.
fraxinifolia Lmk.
alba L.
pacan H. K. }
cylindrica Lmk. }
cinerea L.
nigra L.

BRUCEA
ferrugineux. Afr., s. ch. h

FAGARA
à feuell. de jasmin. Am. m.,
s. ch. h
à petites feuell. Am. m., s. ch. h

ZANTHOXYLUM
à feuell. de frêne. Am. s. h
à gros aiguillons. Am. m.,
s. ch. h

PTÉLÉA
à trois feuell. Am. s. h (orn.)

DODONÆA
visqueux. inde, s. ch. h
à feuell. étroites. inde, s. ch. h
triangulaire. N. Holl., or. h

NOYER
cultivé. Asie. h (écon.)
— tardif.
à feuell. de frêne. Asie. h
ikori. Am. s. h
pacanier. Am. s. h (écon.)
cendré. Am. s. h
noir. Am. s. h

ORDO XIII.

RHAMNI.

I. Stamina petalis alterna, fructus capsularis.

SPAPHYLEA
pinnata L.
trifoliata L.

EVONYMUS
europæus L.
latifolius L.
americanus L.
atropurpureus Jacq.
verrucosus L.

CELASTRUS
scandens L.
cassinoides l'her.

ORDRE XIII.

LES NERPRUNS.

I. Étamines alternes avec les pétales, une capsule.

STAPHYLÉA
à feuell. pennées. F. h (orn.)
à feuell. ternées. Am. s. h (orn.)

FUSAIN
d'Europe. F. h (écon.)
à larges feuell. F. h (orn.)
d'Amérique. Am. s. h
noir-pourpre. Am. s. h
galeux. Autriche. h (orn.)

CÉLASTRUS
grimpant. Am. s. h
à feuell. de cassiné. canaries,
or. h

octogonus *l'Her.*
 lucidus *L.*
 cassine concava *Lmk.* }
 buxifolius *L.*
 pyracanthus *L.*
 senegalensis *Lmk.* }
 phyllacanthus *l'Her.* }
 multiflorus *Lmk.* }
 hispanicus *H. P.* }

II. *Stamina petalis alterna*, drupa aut
bacca.

RUBENTIA

mauritiana.
 longifolia.
 elæodendrum orientale *Jacq.* }

CASSINE

capensis *L.*
 maurocenia *L.*
 xylocarpa *Vent.*

ILEX

aquifolium *L.*
 — crassifolium
 — ferox.
 — serratum.
 — variegatum.
 balearica.
 maderiensis *Lmk.* }
 perado *H. K.* }
 cassine *L.*
 — angustifolia.
 æstivalis *Lmk.* }
 prinoïdes *H. K.* }
 vomitoria *H. K.* }
 cassine peragua *L.* }
 canadensis *Mich.*

PRINOS

verticillatus *L.*
 glaber *L.*

III. *Stamina petalis opposita*, fructus
drupaceus.

RHAMNUS.

1. *Spinosi.*
 catharticus *L.*
 infectorius *L.*

octogone. pérœu, s. ch. $\mathfrak{h}$
 à feuell. luisantes. cap, or. $\mathfrak{h}$
 à feuell. de buis. cap, or. $\mathfrak{h}$
 à épines rouges. cap, or. $\mathfrak{h}$
 du Sénégal. s. ch. $\mathfrak{h}$
 à fleurs nombr. cap, or. $\mathfrak{h}$

II. Étamines alternes avec les pétales,
 un drupe ou une baie.

RUBENTIA

bois d'olive. île de F., s. ch. $\mathfrak{h}$
 à longues feuell. s. ch. $\mathfrak{h}$

CASSINÉ

du Cap. or. $\mathfrak{h}$
 à feuell. convexes. cap, or. $\mathfrak{h}$
 à fruit osseux. Antilles, s. ch. $\mathfrak{h}$

HOUX

commun. F. $\mathfrak{h}$ (écon., orn.)
 — à feuell. épaisses.
 — hérisson.
 — en scie.
 — panaché.
 de Mahon. $\mathfrak{h}$ (orn.)
 de Madère. or. $\mathfrak{h}$
 à feuell. de laurier. caroline,
 or. $\mathfrak{h}$
 — à feuell. étroites.
 à feuell. deprinos. carol., or. $\mathfrak{h}$
 purgatif, apalachine. flo-
 ride, or. $\mathfrak{h}$
 de Canada. $\mathfrak{h}$

PRINOS

verticillé. Am. s. $\mathfrak{h}$
 lisse. Am. s. $\mathfrak{h}$

III. Étamines opposées aux pétales, un
 drupe.

NERPRUN.

1. Tige épineuse.
 purgatif. F. $\mathfrak{h}$ (arts, méd.)
 graine d'Avignon. F. m. $\mathfrak{h}$
 (arts.)

theezans L.
 lycioides L.
 buxifolius L.
 oleoides L.
 saxatilis L.
 erythroxylum Pallas.

2. Inermes.

frangula L.
 colubrinus L.
 hybridus L'her. }
 burgundiacus H. P. }
 alpinus L.
 alnifolius L'Her.
 pumilus L.
 glandulosus H. K.
 ellipticus H. K. }
 ceanothus reclinatus L'Her. }
 alaternus L.
 — angustifolius.
 — hispanicus.
 — rotundifolius.
 — variegatus.

ZIZYPHUS (Rhamnus L.)

sinensis Lmk.
 inguanea Lmk.
 lotus L.

sativa.
 spina-christi L.
 volubilis L. f.

PALIURUS (Rhamnus L.)

aculeatus.

IV. Stamina petalis opposita , fructus
 tricoccus.

COLLETIA

obcordata Vent.

CEANOTHUS

africanus L.
 microphyllus Mich.
 americanus L.
 discolor Vent.

PHYLICA

ericoïdes L.
 axillaris Lmk.
 plumosa L.

de Chine. or. 5
 à feuell. linéaires. F. m., or. 5
 à feuell. de buis. Esp., or. 5
 à feuell. d'olivier. Esp., or. 5
 des rochers. F., Alpes. 5
 à longues feuell. sibérie. 5

2. Tige sans épines.

bourgene. F. 5 (arts.)
 ferrugineux. Am. m., s. ch. 5
 hybride. 5
 des Alpes. F. 5
 à feuell. d'aune. Am. s. 5
 nain. F., Alpes. 5
 glanduleux. canaries, or. 5
 elliptique. Am. m., s. ch. 5
 alaterne. F. m. 5 (orn.)
 — à feuell. étroites.
 — d'Espagne.
 — de Mahon.
 panaché. (orn.)

JUJUBIER

de Chine. or. 5
 croc-de-chien. Am. m., s. ch. 5
 des lotophages. tunis, or. 5
 (écon.)
 cultivé. orient. 5 (écon., méd.)
 napéca. égypte, s. ch. 5 (écon.)
 sarmenteux. Am. s. 5

PALIURUS

épineux. F. m. 5

IV. Étamines opposées aux pétales , fruit
 à trois coques.

COLLÉTIA

à feuell. en cœur. pérou, or. 5

CÉANOTHUS

d'Afrique. cap, or. 5
 à petites feuell. Am. s. 5
 d'Amérique. Am. s. 5
 de deux couleurs. N. holl., or. 5

PHYLICA

bruyère du Cap. or. 5 (orn.)
 axillaire. cap, or. 5
 plumeux. cap, or. 5

pubescens H. K.
 buxifolia L.
 cordifolia Lmk.
 myrtifolia Lmk.
 ledifolia.
 thymifolia Vent.

Genera *Rhamnis affinia.*

BRUNIA

lanuginosa L.

LASIOPETALUM Smith.

ferrugineum Smith.

GOUANIA

domingensis L.
 mauritiana Lmk.
 integrifolia Lmk.

AUCUBA Thumb.

japonica Thumb.

pubescent. cap, or. ♀
 à feuell. de buis. cap, or. ♀
 à feuell. en cœur. cap, or. ♀
 à feuell. de myrte. cap, or. ♀
 à feuell. de ledum. cap, or. ♀
 à feuell. de thym. N. Holl., or. ♀

Genres qui ont de l'affinité avec les Nerpruns.

BRUNIA

lanugineux. cap, or. ♀

LASIOPÉTALUM

ferrugineux. Botany-Bay, or. ♀

GOUANIA

de Saint-Domingue. s. ch. ♀
 de l'Ile-de-France. s. ch. ♀
 à feuell. entières. s. ch. ♀

AUCUBA

du Japon. or. ♀

CLASSIS XV.

DICOTYLEDONES

APETALÆ.

(*Stamina idiogyna.*)

ORDO I.

EUPHORBIAE.

I. *Styli plures definiti, sæpius tres.*

MERCURIALIS

perennis L.
 annua L.
 tomentosa L.
 elliptica Lmk.

EUPHORBIA.

1. *Herbaceæ, umbella bifida aut nulla,*
hypericifolia L.
maculata Jacq.
picta Jacq.

CLASSE XV.

DICOTYLEDONS

SANS PÉTALES.

(*Fleurs unisexuelles.*)

ORDRE I.

LES EUPHORBES.

I. *Styles en nombre défini, ordinairement trois.*

MERCURIALE

vivace. F. ♀
 annuelle. F. ♂ (méd.)
 cotonneuse. F. m. ♀
 elliptique. Portugal. or. ♀

EUPHORBE.

1. *Tige herbacée, ombelle bifide ou nulle,*
à feuell. d'hypericum. inde. ♂
taché. Am. s. ♂
panaché. s. ch. ♀

pilulifera L. }
capitata Zmk. }
thymifolia L.
canescens L.
chamæsyce L.
peplis L.
prunifolia Jacq.

2. *Herbaceæ, umbella trifida.*

peplus L.
falcata L.
exigua L.

3. *Herbaceæ, umbella quadrifida.*

lathyrus L.

4. *Herbaceæ, umbella quinquefida.*

purpurata Thuill.
alepica L.
segetalis L.
helioscopia L.
serrata L.
verrucosa L.
platiphyllus L.
bupleuroïdes Desf.

orientalis L.
hyberna L.
sylvatica L.

5. *Herbaceæ, umbella multifida.*

illirica Zmk. }
an pilosa L. ? }
linariæfolia Zmk.
pinifolia Zmk.
cyparissias L.
palustris L.
myrsinites L.

6. *Caulibus suffruticosis aut fruticosis,*

characias L.
paralias L.
pithyusa L.
spinosa L. }
mauritanica L.
virgata. }
mauritanica Zmk. }
dendroïdes L.

à globules. inde. ☉

à feuell. de thym. inde. ☉

blanchâtre. esp. ☉

chamæsyce. F. m. ☉

péplis. F. m. ☉

à feuell. de prunier. ☉

2. Tige herbacée, ombelle à trois rayons.

péplus. F. ☉

fulcifforme. F. ☉

menu. F. ☉

3. Tige herbacée, ombelle à quatre rayons.

épurge. F. ♂ (méd.)

4. Tige herbacée, ombelle à cinq rayons.

purpurin. F. ☉

d'Alep. syrie, or. ♀

des blés. F. ☉

réveille-matin. F. ☉

en scie. F. ♀

tuberculeux. F. ♀

à feuell. larges. F. ☉

à feuell. de buplèvre. barbarie,
or. ♀

d'Orient. ♀

à feuell. de laurèole. F. ♀

des bois. F. ♀

5. Tige herbacée, ombelle à plus de cinq rayons.

de Dalmatie. ♀

à feuell. de linair. F. ♀

à feuell. de pin. F. ♀

petit cyprès. F. ♀

des marais. F. ♀

myrsinites. F. m. ♀

6. Tige ligneuse ou presque ligneuse.

à fleurs brunes. F. m. ♂

maritime. F. ♂

à feuell. de genévrier. F. ♂

piquant. F. m., or. ♂

de Mauritanie. or. ♂

effilé. Afr., or. ♂

en arbre. barbarie, or. ♂

longifolia *zmk.* }
 mellifera *H. K.* }
 linearis *Retz.*
 cotinifolia *L.*

verticillata.
 heterophylla *L.*

7. *Carnosæ inermes.*

tithymaloïdes *L.* }
 myrtifolia *zmk.* }
 lophogona *zmk.*
 caput-medusæ *L.*
 tridentata *zmk.* }
 anacantha *H. K.* }
 meloformis *H. K.*

8. *Carnosæ aculeata.*

uncinata *Dec.*
 canariensis *L.*
 hystrix *Jacq.* }
 loricata *zmk.* }
 neriifolia *L.*

officinarum *L.*

mellifère. canaries, or. 5
 linéaire. Antilles, s. ch. 5
 à feuell. de fustet. *Am. m.*,
 s. ch. 5
 verticillé. *Am. m.*, s. ch. 5
 à feuell. variables. *Am. m.*,
 s. ch. 5

7. Tige charnue sans épines.

à feuell. ovales. *Am. m.*, s. ch. 5
 à crêtes. Madagascar, s. ch. 5
 tête-de-Méduse. cap, s. ch. 5
 à trois dents. cap, s. ch. 5
 melon. cap, s. ch. 5

8. Tige charnue garnie d'épines.

à crochets. s. ch. 5
 des Canaries. s. ch. 5
 hérissé. cap, s. ch. 5
 à feuell. de nérîum. inde,
 s. ch. 5
 des boutiques. cap, s. ch. 5

PHYLLANTHUS.

1. *Fruticosæ.*

grandifolia *L.*
 brasiliensis *Poiret.*
 reticulata *Poiret.*

2. *Herbaceæ.*

ninuri *L.*
 caroliniensis *Mich.*

PHYLLANTHUS.

1. Tige ligneuse.

à grandes feuell. *Am. m.*,
 s. ch. 5
 du Brésil, ou bois à enivrer.
 s. ch. 5
 à réseau. île de F., s. ch. 5

2. Tige herbacée.

ninuri. inde. ☉
 de Caroline.

KIRGANELIA *Juss.*
 phyllanthoides.

KIRGANELIA
 à feuell. de phyllanthus. île
 de F., s. ch. 5

XYLOPHYLLA

falcata *Swartz.*
 angustifolia *Swartz.*
 latifolia *Swartz.*
 ramiflora *H. K.*

XYLOPHYLLA

falciforme. *Am. m.*, s. ch. 5
 à feuell. étroites. *Am. m.*, s. ch. 5
 à feuell. larges. *Am. m.*, s. ch. 5
 à fleurs axillaires. Sibérie. 5

KIGGELLARIA
 africana *L.*

KIGGELLARIA
 d'Afrique. cap, or. 5

CLUTIA

pulchella L.
alaternoides L.

ANDRACHNE

telephioïdes L.

AGYNEJA

impubes L.

BUXUS

sempervirens L.
 — *suffruticosa*.
 — *angustifolia*.
balearica Zmk.

ADELIA

acitodon L.?

RICINUS

communis L.
 — *rutilans*.
inermis Jacq.

JATROPHA

curcas L.
multifida L.
napæifolia Desrouss.

manihot L.
gossypifolia L.

acuminata Zmk. }
panduræfolia Andr. }

ALEURITES Forst.

moluccana.
croton moluccanum L. }

CROTON.**1. Fruticosa.**

sebiferum L.
penicillatum Vent.
ciliato-glanduliferum Ortega. }
punctatum Jacq.
balsamiferum L.
lacerum.

2. Herbacea.

dioicum Cav.
argenteum L.

CLUTIA

élégant. cap, or. ♀
à feuell. d'alaterne. cap, or. ♀

ANDRACHNÉ

couché. orient. ♂

AGINÉJA

glabre. chine. ☉

BUIS

toujours vert. F. ♀ (arts, orn.)
 — *nain*.
 — *à feuell. étroites.*
de Mahon. ♀

ADÉLIA

acitodon. Am. m., or. ♀

RICIN

commun. barbarie. ♀ (méd.,
 écon., orn.)
 — *pourpre*.
à fruit lisse. inde, s. ch. ♀

JATROPHA

pignon d'Inde. s. ch. ♀ (méd.)
lacinié. Am. m., s. ch. ♀
à feuell. de napæa. Am. m.,
 s. ch. ♀
manioc. Am. m., s. ch. ♀ (alim.)
à feuell. de cotonnier. Am. m.,
 s. ch. ♀
à feuell. pointues. Am. m.,
 s. ch. ♀

ALEURITÈS

noix de Bancoul. inde, s. ch. ♀

CROTON.**1. Tige ligneuse.**

arbre à suif. inde, s. ch. ♀
 (écon.)
penicillé. île de cuba, s. ch. ♀
ponctué. Am. m., s. ch. ♀
balsamique. Am. m., s. ch. ♀
lacéré. s. ch. ♀

2. Tige herbacée.

dioïque.
argenté. Am. m. ☉

tinctorium L.

lobatum L.

ACALYPHA

virginica L.

alopecuroïdea Jacq.

II. *Stylus unicus*.

TRAGIA

volubilis L.

involucrata L.

plumosa.

SAPIUM

laurocerasum.

HIPPOMANE

mancinella L.

HURA

crepitans L.

DALECHAMPIA

villosa Lmk. }

scandens L. }

des teinturiers, ou tournesol,

F. m. ☉

lobé. Am. m., s. ch. ♂

ACALYPHA

de Virginie. ☉

queue-de-renard. ☉

II. Un seul style.

TRAGIA

sarmenteux. inde, s. ch. ♀

à involucre. inde, s. ch. ♀

plumeux. Am. m., s. ch. ♀

SAPIUM

à feuell. de laurier - cerise.

Am. m., s. ch. ♀

MANCENILLIER

vénéneux. Am. m., s. ch. ♀

SABLIER

élastique. Am. m., s. ch. ♀

DALECHAMPIA

sarmenteux. Am. m. ☉

ORDO II.

ORDRE II.

CUCURBITACEÆ.

LES CUCURBITACÉES.

SICYOS

angulata L.

SICYOS

anguleux. Am. s. ☉

BRYONIA

dioïca Jacq.

africana L.

laciniosa L.

abyssinica Lmk.

pubescens.

BRYONE

dioïque. F. ♀ (méd.)

d'Afrique. cap, or. ♀

laciniée. ceylan, s. ch. ♀

d'Abyssinie. s. ch. ♀

pubescente. s. ch. ♀

MELOTHRIA

pendula L.

MÉLOTRIA

à fruit pendant. Am. s. ☉

MOMORDICA

pedata L.

luffa L.

balsamina L.

elaterium L.

MOMORDICA

en pédale. pérou. ☉

luffa. ceylan. ☉

balsamine. inde. ☉

concombre sauvage. F. m. ☉

CUCUMIS

colocynthis L.

CONCOMBRE

coloquinte. barb. ☉ (méd.)

prophetarum L.
anguria L.
acutangulus L.
lineatus BOSC.
melo L.
 — *saccharinus*.
 — *cantalou*.
 — *viridis*.
chate L.
dudaïm L.
sativus L.
 — *minor*.
flexuosus L.

CUCURBITA

leucantha Duchêne.
 — *lagenaria*.
 — *laticor*.
 — *pyrotecha*.
 — *longa*.
pepo L.
 — *luteus*.
 — *viridis*.
melo pepo L.
 — *verrucosus*.
 — *aurantiiformis*.
 — *pyriformis*.
 — *clypeatus*.
 — *radiatus*.
citrullus L.

TRICHOSANTHES

anguina L.

Genera cucurbitaceis affinia.

PASSIFLORA.

1. *Foliis simplicibus.*

maliformis L.
laurifolia L.
quadrangularis L.
serratifolia L.

2. *Foliis bilobis.*

rubra L.
biflora Lmk.

des prophètes. Arabie. ☉
d'Amérique. ☉
à angles aigus. inde. ☉
strié. cayenne. ☉
melon. Asie. ☉ (alim., méd.)
 — *brodé*.
 — *cantalou*.
 — *vert*.
abdelaoui. Égypte. ☉
orange. Afr. s. ☉
commun. orient. ☉ (alim.)
 — *cornichon*.
serpentin. inde. ☉

COURGE

à fleurs blanches. Am. m. ☉
 — *cougourde*.
 — *gourde*.
 — *poire à poudre*.
 — *calebasse*.
pepon. ☉ (alim.)
 — *potiron*.
 — *vert*.
mélopepon ☉ (alim.)
 — *tuberculeux*.
 — *orange*.
 — *pyriforme*.
 — *bonnet d'électeur*.
 — *artichaut*.
pasteque. orient. ☉ (alim.)

TRICHOSANTHES

anguina. chine. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les Cucurbitacées.

GRENADILLE.

1. Feuilles simples.

à gros fruit. Am. m., s. ch. ☿
à feuell. de laurier. Am. m.,
 s. ch. ☿
quadrangulaire. Am. m., s. ch.
 ☿
à feuell. en scie. Am. m., s. ch. ☿

2. Feuilles bilobées.

rouge. Am. m., s. ch. ☿
à deux fleurs. Am. m., s. ch. ☿

3. *Foliis trilobis.*

punctata L.
 lutea L.
 suberosa L.
 minima L.
 heterophylla H. K.

longifolia Zmk.

holosericea L.
 peltata Cav.
 foetida L.
 incarnata L.

4. *Foliis multilobis.*

coerulea L.

CARICA

papaya L.

monoïca Desf.

ORDO III.

U R T I C Æ.

I. Flores in communi involucre monophyllo
 reconditi.

FIGUS

carica L.
 — violacea.
 mauritiana Lmk.
 scabra Jacq.
 macrophylla.
 laurifolia Lmk.

citrifolia Lmk.

crassinervia.

benghalensis L.

rubiginosa.

populifolia.

religiosa L.

racemosa L.

glaucohylla.

arbutifolia Lmk. }

pertusa L. f. }

3. Feuilles trilobées.

punctuée. Pérou, s. ch. 5
 jaune. Virginie, or. 5
 fongueuse. Am. m., s. ch. 5
 à petites fleurs. Am. m., s. ch. 5
 à feuell. variables. Am. m.,
 s. ch. 5
 à longues feuilles. Am. m.,
 s. ch. 5

veloutée. Mexique, s. ch. 5
 en bouclier. Am. m., s. ch. 5
 fétide. Am. m. ☉
 incarnate. Am. m., s. ch. 5

4. Feuilles à plus de trois lobes.

bleue. Brésil, or. 5 (orn.)

PAPAYER

commun. Am. m., s. ch. 5
 (écon., méd.)
 monoïque. s. ch. 5

ORDRE III.

LES ORTIES.

I. Fleurs renfermées dans un involucre
 monophylle.

FIGUIER

cultivé. F. m. 5 (écon.)

— violet.

de l'Ile-de-France. s. ch. 5

à feuell. rudes. inde, s. ch. 5

à grandes feuell. N. Holl., or. 5

à feuell. de laurier. Am. m.,
 s. ch. 5

à feuell. de citronnier. Am. m.,
 s. ch. 5

à grosses nervures. Am. m.,
 s. ch. 5

du Bengale. s. ch. 5

rouillé. N. Holl., or. 5

à feuell. de peuplier. Am. m.,
 s. ch. 5

des pagodes. inde, s. ch. 5

à grappes. inde, s. ch. 5

glauque. s. ch. 5

à feuell. d'arbusier. Am. m.,
 s. ch. 5

pumila L.
benjamina L.
scandens Lmk.

DORSTENIA

contrayerva L.

II. Flores receptaculo communi multifloro
impositi, aut squamis involucrantibus
capitati, aut distincti sparsi.

CECROPIA

peltata L.

ARTOCARPUS

incisa L.

integrifolia L.

MORUS

alba L.

italica Lmk.

constantinopolitana.

nigra L.

rubra L.

BROUSSONETIA

papyrifera L'Her. }

morus papyrifera L. }

URTICA

1. Foliis alternis.

baccifera L.

nivea L.

canadensis L.

pumila L.

2. Foliis oppositis.

cylindrica L.

cannabina L.

dioica L.

urens L.

pilulifera L.

dodartii L.

FORSKALEA

tenacissima L.

angustifolia Retz.

PARIETARIA

officinalis L.

réticulé. chine, s. ch. ☯

à feuell. striées. inde, s. ch. ☯

sarmenteux. Am. m., s. ch. ☯

DORSTENIA

contrayerva. Am. m., s. ch. ☯

(méd.)

II. Fleurs sur un réceptacle commun,
ou réunies en une tête accompagnée
d'écaillés, ou bien distinctes et éparées.

CÉCROPIA

en bouclier. Am. m., s. ch. ☯

JAQUIER

arbre à pain. taïti, s. ch. ☯
(alim.)

à feuell. entières. Am. m., s. ch.
☯

MURIER

blanc. Asiemin. ☯ (écon.)

d'Italie. ☯ (écon.)

de Constantinople. ☯ (écon.)

noir. Asiemin. ☯ (écon.)

rouge. Am. s. ☯ (écon.)

BROUSSONÉTIA

mûrier à papier. chine. ☯
(orn., econ.)

ORTIE.

1. Feuilles alternes.

baccifère. Am. m., s. ch. ☯

cotonneuse. inde, or. ☯

de Canada. ☯

naine. Am. s. ☯

2. Feuilles opposées.

cylindrique. Am. s. ☯

de Sibérie. ☯ (écon.)

dioïque. F. ☯

grièche. F. ☉

à globules. F. m. ☉

de Dodart. ☉

FORSKALÉA

à larges feuell. barbarie. ☉

à feuell. étroites. Afr. ☉

PARIÉTAIRE

officinale. F. ☯ (méd.)

judaïca L.
lusitanica L.
cretica L.
arborea l'Her.
urtica arborea L. f. }

de Judée. F. ☿
de Portugal. ☉
de Crète. ☿
en arbre. canaries, or. ☿

HUMULUS
lupulus L.

HOUBLON
cultivé. F. ☿ (écon.)

CANNABIS
sativa L.

CHANVRE
cultivé. inde. ☉ (écon.)

THELIGONUM
cynocrambre L.

THÉLIGONUM
cynocrambé. F. ☉

DATISCA
cannabina L.

DATISCA
chanvre de Crète. orient. ☿

Genera Urticis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les Orties.

PIPER
medium Jacq.
cuneifolium Jacq.
magnoliæfolium Jacq.

obtusifolium L.

POIVRE
moyen. Am. m., s. ch. ☿
cunéiforme. Am. m., s. ch. ☿
à feuell. de magnolia. Am. m.,
s. ch. ☿
à feuilles obtuses. Am. m.,
s. ch. ☿
à longs épis. Am. m., s. ch. ☿
pointu. Am. m., s. ch. ☿
luisant. Am. m., s. ch. ☉
rhomboidal. s. ch. ☿
vernissé. s. ch. ☿
élégant. Am. m., s. ch. ☿

IVA
frutescens L.

IVA
arbrisseau. virginie, or. ☿

AMBROSIA
bidentata Mich.
artemisiasfolia Lmk.
maritima L.
trifida L.
arborescens Lmk.
xanthium fruticosum L. f.
franseria ambrosioïdes Cav. }

AMBROISIE
à deux dents. Am. s. ☿
à feuell. d'armoise. Am. s. ☿
maritime. F. ☿
à trois lobes. Am. s. ☉

en arbre. pérou, or. ☿

XANTHIUM
strumarium L.
orientale L.
spinosum L.

LAMPOURDE
commune. F. ☉
d'orient. ☉
épineuse. F. m. ☉

ORDO IV.

A M E N T A C É E .

I. Flores hermaphrodites.

FOTHERGILLA

- alnifolia L. f.
— lanceolata.

ULMUS

- campestris L.
— latifolia.
— suberosa.
pedunculata Foug. }
effusa Wild. }
americana L.
tomentosa.
pumila L.
chinensis.
crenata H. P.
polygama Poiret.
rhamniscarpinifolius Pallas. }

II. Flores dielines.

CELTIS

- australis L.
occidentalis L.
cordata H. P. }
crassifolia Lmk. }
tournefortii Lmk.

SALIX

- helix L.
purpurea L.
vitellina L.
alba L.
pentandra L.
triandra L.
babylonica L.
viminalis L.
amygdalina L.
hastata L.
aurita L.
caprea L.
— ulmifolia.
glaucæ L.
incubacea L.
arenaria L.

ORDRE IV.

LES AMENTACÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLA

- à feuell. d'aune. Am. s. h
— lancéolé.

ORME

- champêtre. F. h (arts.)
— à larges feuelles.
— fongueux.
à longs pédoncules. F. h
d'Amérique. Am. s. h
cotonneux. Am. s. h
nain. sibérie. h
de Chine. or. h

crénelé. sibérie. h

II. Fleurs unisexuelles.

MICOUCOULIER

- de Provence. h (arts, orn.)
de Virginie. h (arts, orn.)
à feuell. en cœur. Am. s. h
(arts, orn.)
de Tournefort, orient. h

SAULE

- hélix. F. h
osier rouge. F. h (écon.)
osier jaune. F. h (écon.)
blanc. F. h (écon.)
à cinq étamines. F. h
à trois étamines. F. h
de Babylone, orient. h (orn.)
à longues feuell. F. h (écon.)
à feuell. d'amandier. F. h
hasté. F. h
auriculé. F. h
marceau. F. h
— à feuell. d'orme.
glaucæ. F. h
des dunes. F. h
des sables. F. h

lappinum L.
lanata L.
myrsinites L.
retusa L.
reticulata L.
herbacea L.

de Laponie. F., Alpes. 5
laineux. F., Alpes. 5
myrsinites. F. 5
émoussé, F., Alpes. 5
réticulé. F., Alpes. 5
herbacé. F., Alpes. 5

POPULUS

alba L.
— grisea.
tremula L.
tremuloïdes Mich.
græca H. K.
fastigiata. }
dilatata H. K. }
nigra L.
monilifera H. K.
virginiana L.
angulata L.
heterophylla L.
balsamifera L.

PEUPLIER

blanc. F. 5 (orn.)
— grisaille.
tremble. F. 5
faux tremble. Am. s. 5
d'Athènes. orient. 5 (orn.)
d'Italie. 5 (orn.)
noir. F. 5
de Canada. 5 (orn.)
suisse. Am. s. 5 (orn.)
de Caroline. 5 (orn.)
argenté. Am. s. 5 (orn.)
baumier, Am. s. 5 (méd.)

MYRICA

gale L.
cerifera L.

pennsylvanica Lmk.

cordifolia L.
quercifolia L.
trifoliata. }
rhys suaveolens L. }

MYRICA

galé. F. 5
cirier de la Louisiane. 5
(écon.)
cirier de Pennsylvanie. 5
(écon.)
à feuell. en cœur. cap, or. 5
à feuell. de chêne. cap, or. 5
à feuell. ternées. Am. s. 5

BETULA

alba L.
nigra L.

lenta L.
nana L.
pumila L.

BOULEAU

blanc. F. 5 (écon.)
noir, ou à canots. Am. s. 5
(écon.)
merisier. Am. s. 5
nain. sibérie. 5
à feuell de marceau. Am. s. 5

ALNUS

communis L.
— laciniata.
incana H. K.
oblongata H. K.
serrulata H. K.

AUNE

commun. F. 5 (écon.)
— lacinié.
blanc. F., Alpes. 5
à feuell. oblongues. Eur. 5
à feuell. en scie. Am. s. 5

CARPINUS

betulus L.
— quercifolius.

CHARME

commun. F. 5 (orn., écon.)
— à feuell. de chêne.

virginiana *mill.*
ostrea *L.*
orientalis *Link.*

FAGUS

castanea *L.*
pumila *L.*
sylvatica *L.*
purpurea.

QUERCUS.

1. *Foliis perennantibus.*

phellos *L.*
virens *H. K.*
ilex *L.*
— integrifolia.
— longifolia.
suber *L.*
ballota *Desf.*

coccifera *L.*

2. *Foliis deciduis.*

pseudo suber *Desf.*
rubra *L.*
tinctoria *Mich.*
robur *L.*
— pedunculata.
— glomerata.
— villosa.
fastigiata *Link.*

cerris *L.*
— haliphæos.
— tomentosa.

ægylops *L.*
alba *L.*
prinus *Mich.*
infectoria *olivier.*

CORYLUS

rostrata *H. K.*
avellana *L.*
— alba.
— rubra.
columna *L.*

de Virginie. *h* (écon.)
houblon. *italie.* *h* (orn.)
d'orient. *h* (orn.)

FAGUS

châtaignier. *F.* *h* (arts., alim.)
chincapin. *Am. s.* *h* (alim.)
hêtre. *F.* *h* (écon.)
pourpre. *Am. s.* *h* (orn.)

CHÊNE.

1. Feuilles persistantes.

à feuell. de saule. *Am. s.* *h*
vert de Caroline. *or.* *h*
yeuse. *F. m.* *h* (écon.)
— à feuell. entières.
— à feuell. longues.
liège. *F. m.* *h* (écon.)
ballote, ou à glands doux.
barbarie. *h* (écon.)
au kermès. *F. m.* *h* (arts.)

2. Feuilles tombantes.

faux liège. barbarie, *or.* *h*
rouge. *Am. s.* *h* (écon.)
quercitron. *Am. s.* *h* (arts.)
rouvre. *F.* *h* (écon.)
— à longs pedoncules.
— à trochets.
— velu.
pyramidal, ou cyprès. *F.*, *py-*
renées. *h*
cerris. *F.* *h*
— de Bourgogne.
— de l'Angoumois, ou taus-
sin.
vélani. *orient.* *h* (arts.)
blanc. *Am. s.* *h*
à feuell. de châtaigner. *Am. s.* *h*
à la noix de galle. *orient.* *h*
(écon.)

NOISETTIER

cornu. *Am. s.* *h*
commun. *F.* *h* (écon.)
— avelinier blanc.
— avelinier rouge.
de Byzance. *h* (écon.)

LIQUIDAMBAR

styraciflua L.
imberbe H. K.

COMPTONIA *l'Her.*

aspleniifolia *l'Her.*

PLATANUS

orientalis L.
— acerifolia.
occidentalis L.

COPALME

d'Amérique. AM. S. ♀ (méd.)
d'orient. ♀

COMPTONIA

à feuell. d'asplénium. AM. S. ♀

PLATANE

d'orient. ♀ (orn.)
— à feuell. d'érable.
d'occident. AM. S. ♀ (orn.)

ORDO V.

CONIFERÆ.

I. *Calix staminifer.*

EPHEDRA

monostachia L.
distachia L.
altissima Desf.

CASUARINA

equisetifolia L. f.
torulosa H. K.
stricta H. K.

TAXUS

baccata L.

II. *Calix nullus, squamæ staminiferæ.*

PODOCARPUS

elongata *l'Her.*
taxus elongata H. K. }

JUNIPERUS

communis L.
— suecica.
oxycedrus L.
drupacea Bill.
bermudiana L.
virginiana L.
phoenicea L.
sabina mas C. B.
sabina foemina C. B.
thurifera H. K.
prostrata Mich.

ORDRE V.

LES CONIFÈRES.

I. Calice renfermant les étamines.

EPHÉDRA

à un épi. sibérie. ♀
à deux épis. F. ♀
élevé. barbarie, or. ♀

CASUARINA

à feuell. de préle. inde, s.ch. ♀
tuberculeux. N. holl., or. ♀
ramassé. N. holl., or. ♀

IF

commun. F., Alpes. ♀

II. Calice nul, écailles staminifères.

PODOCARPUS

allongé. cap, or. ♀

GENÉVRIER

commun. F. ♀ (écon.)
— de Suède.
cade. F. ♀ (écon.)
à gros fruit. syrie, or. ♀
des Bermudes. ♀
de Virginie. ♀ (orn.)
de Phénicie. F. m. ♀ (orn.)
sabine mâle. F. ♀ (méd.)
sabine femelle. F. ♀ (méd.)
à l'encens. EUR. ♀
couché. AM. S. ♀

CUPRESSUS

sempervirens L.
 — horizontalis.
 pendula L'Her. }
 lusitanica Mill. }
 disticha L.
 thuyoides L.
 juniperoides L.

THUYA

occidentalis L.
 orientalis L.
 articulata *Wahl.*

PINUS

sylvestris L.
 — rubra.
 laricio.
 pinaster H. K. ? }
 montana H. K.
 maritima Lmk.
 pinea L.
 halepensis Mill.

tæda L.
 echinata Mill.
 inops H. K.
 palustris Mill.
 strobus L.
 cembro L.

ABIES (*Pinus* L.)

taxifolia. }
 pinus picea L. }
 balsamea L.
 canadensis L.

nigra H. K.
 alba H. K.
 picea. }
 pinus abies L. }

LARIX (*Pinus* L.)

europæa L.
 americanâ. Mich.
 cedrus L.

CYPRÈS

pyramidal. crête. h (orn.)
 — étalé.
 pendant. Goa, or. h
 chauve. Am. s. h (écon.)
 faux thuya. Am. s. h
 faux genévrier. cap, or. h

THUYA

d'occident. Am. s. h (orn.)
 de la Chine. h (orn.)
 articulé. Barbarie, or. h

PIN

de Genève. F. h (écon.)
 — rouge d'Ecosse.
 laricio. corse. h (écon.)
 mugo. F., Alpes. h
 maritime. F. h (écon.)
 à pignons. F. m. h (écon.)
 d'Alep, ou de Jérusalem.
 F. m., or. h
 tæda. Am. s. h
 épineux. Am. s. h
 de Virginie. h
 de marais. caroline, or. h
 de Weinouth. Am. s. h (orn.)
 cembro. F., Alpes. h

SAPIN

argenté. F. h (écon.)
 baumier de Gilead. Am. s. h
 hemlock - spruce. Am. s. h
 (écon.)
 épinette noire. Am. s. h
 épinette blanche. Am. s. h
 épicia. F., Alpes. h (écon.)

MÊLÈZE

d'Europe. F., Alpes. h (écon.)
 d'Amérique. h
 cèdre du Liban. Asie min. h
 (orn., écon.)

GENERA INCERTÆ SEDIS.

GENRES NON CLASSÉS.

ARDISIA *swartz* (*Badula* JUSS.)
crenulata *vent.*

CHLORANTHUS *l'her.*
inconspicuus *l'her.*

AZIMA *lmk.*
tetracantha *lmk.*
monetia barlerioides *l'her.* }

MONOTROPA
hypopithys *L.*

DIONÆA
muscipula *L.*

EUCLEA
racemosa *L.*

ARISTOTELIA *l'her.*
maqui *l'her.*

SARRACENIA
purpurea *L.*
flava *L.*

BEGONIA
nitida *H. K.*
obliqua *l'her.*
minor *jacq.*
purpurea *swartz.*
hirsuta *aublet.* }

SAMYDA
serrulata *swartz.*

CORIARIA
myrtifolia *L.*

PANDANUS
odoratissimus *L. f.*

BILLARDIERA.
scandens *smith.*

VISNEA
mocanera *L. f.*

ARDISIA
crênelé. *am. m., s. ch. 5*

CHLORANTHUS
à petites fleurs. *chine, s. ch. 5*

AZIMA
à quatre épines. *inde, s. ch. 5*

MONOTROPA
hypopitys. *f. 7*

DIONÉE
gobe-mouche. *caroline, or. 7*

EUCLEA
à grappes. *cap, or. 5*

ARISTOTÉLIA
maqui. *chili, or. 5*

SARRACÉNIA
pourpre. *am. s. 7*
jaune. *am. s. 7*

BÉGONIA
luisant. *antilles, s. ch. 7*

hérissé. *cayenne, s. ch. 7*

SAMYDA
à feuill. en scie. *am. m., s. ch. 5*

REDOUL
à feuill. de myrte. *f. m. 5*

VACOUA
odorant. *s. ch. 5*

BILLARDIÉRA.
sarmenteux. *n. holl., s. ch. 5*

VISNÉA
mocanéra. *canaries, or. 5*

APPENDIX.

POLYPODIUM
decompositum.

ARUM
seguinum L.

POTHOS
cordata L.
lanceolata L.

CINNA
arundinacea L.

PANICUM
miliaceum L.
— nigrum.

AGROSTIS
serotina L. Mant.
festuca serotina L. sp. }

FESTUCA
alopeurus Vahl.
phleoides Desf.
macrostachya.

POA
glomerata.

ERHARTA
panicea Smith.
erecta Lmk.
stipoides Willd. }

SMILAX
oblongata Swartz.

dulcis.

RAJANIA
cordata L.

COMMELINA
benghalensis L.

TRADESCANTIA
cristata Jacq.
commelina cristata L. }

YUCCA
boscii.

APPENDIX.

POLYPODE
décomposé. N. Holl., or. ♀

ARUM
venéneux. Am. m., s. ch. ♂

POTHOS
en cœur. Am. m., s. ch. ♀
lancéolé. Am. m., s. ch. ♀

CINNA
roseau. Am. s. ♀

PANIS
millet. inde ☉ (écon.)
— noir.

AGROSTIS
d'automne. F. m. ♀

FESTUCA
plumeux. Barbarie, or. ♀
à épis. F. ☉
à grands épis. ♀

POA
aggloméré. inde. ♀

ERHARTA
à fleurs de panis. cap, or. ♀
à fleurs de stipa. N. Holl., or. ♀

SMILAX
à feuell. oblongues. Am. m.,
s. ch. ♂
sucré. N. Holl., or. ♂

RAJANIA
en cœur. Am. m., s. ch. ♂

COMMELINE
du Bengale. s. ch. ♀

ÉPHÉMÈRE
à crêtes. Ceylan, s. ch. ♀

YUCCA
de Bosc. s. ch. ♂

BULBOCODIUM
vernum *L.*

PANCRATIUM
amœnum *salisb.*

HELICONIA
humilis *Jacq.*

ARISTOLOCHIA
indica *L.*

PASSERINA
grandiflora *L.*
spicata *L. f.*

BANKSIA
grandis *Willd.*

ATRIPLEX
albicans *H. K.*

CHENOPODIUM
incisum.

ERIOGONUM
tomentosum *Mich.*

CELOSIA
paniculata *L.*

GOMPHRENA
prostrata.

JUSTICIA
spinosa *L.*
nasuta *L.*
coccinea *L.*
paniculata *Vahl.*

NOTELÆA
rigida.
longifolia *Vent.*

MONARDA
purpurea.

LAVANDULA
heterophylla.

MENTHA
lavandulæfolia.

STACHYS
scordioides.

BULBOCODE
printanier. *F. V.*

PANCRATIUM
élégant. Guyane, s. ch. *V.*

HÉLICONIA
à feuell. de balisier. *Am. m.,*
s. ch. *V.*

ARISTOLOCHE
des Indes. s. ch. *h*

PASSÉRINE
à grandes fleurs. cap, or. *h*
à épis. cap, or. *h*

BANKSIA
sinué. *N. Holl., or. h*

ARROCHE
blanchâtre. cap, or. *h*

ANSERINE
incisée.

ÉRIOGONUM
cotonneux. caroline, or. *V.*

CÉLOSIA
paniculé. *Am. m., s. ch. V*

GOMPHRENA
couché.

JUSTICIA
épineux. *Am. m., s. ch. h*
tubuleux. inde, s. ch. *h*
écarlate. cayenne, s. ch. *h*
paniculé. inde. *⊙*

NOTÉLÆA
à feuell. coriaces. *N. Holl., or. h*
à longues feuell. mers du sud,
or. *h*

MONARDA
pourpre. *V.*

LAVANDE
à feuell. variables. or. *h*

MENTHE
à feuell. de lavande. or. *V.*

STACHYS
à feuell. de scordium. maroc,
or. *h*

OCYUMUM
cochleatum.

HORMINUM
caulescens *ortéga*.

COLUMNÆA
hirsuta *swartz*.

SOLANUM
subrepandum.
vespertilio *H. K.*
coagulans *Forsk.*
argenteum.

POGONIA
debilis *Andr.*

CORDIA
patagonula *H. K.*

VARRONIA
mollis.

TOURNEFORTIA
lucida.

ECHIUM
giganteum *L. f.*

ANCHUSA
hispida *Forsk.*

CYNOGLOSSUM
micranthum.

CONVOLVULUS
scoparius *L. f.*

TABERNÆMONTANA
angustifolia *H. K.*

STAPELIA
verrucosa *Masson.*

DIOSPYROS
obovata *Jacq.*

SONCHUS
pinnatus *H. K.*

LAGASCA
mollis *Cav.*

CENTAUREA
diffusa *Lmk.*

CONYZA
chrysocomoides *Desf.*

BASILIC
en cuiller. ☉

HORMIN
jaune. mexique, or. ♀

COLUMNÆA
hérissé. am. m., s. ch. ♀

SOLANUM
festonné. am. m., s. ch. ♀
vespertilio. canaries, or. ♀
coagulant. arabie, s. ch. ♀
argenté. s. ch. ♀

POGONIA
grêle. n. holl., or. ♀

CORDIA
des Patagons. or. ♀

VARRONIA
velouté. am. m., s. ch. ♀

TOURNEFORTIA
luisant. am. m., s. ch. ♀

VIPÉRINE
gigantesque. canaries, or. ♀

BUGLOSE
hérissée. égypte. ☉

CYNOGLOSSÉ
à petites fleurs.

LISERON
effilé. canaries, or. ♀

TABERNÆMONTANA
à feuell. étroites. am. s. ♀

STAPÉLIA
tuberculeux. cap, or. ♀

PLAQUEMINIER
ovale-renversé. s. ch. ♀

LAITRON
penné. madère, or. ♀

LAGASCA
velouté. la havane. ☉

CENTAURÉE
étalée. orient, or. ♀

CONYSE
chrysocome. barbarie, or. ♀

CALENDULA
chrysanthemifolia *vent.*
flaccida *vent.*

ASTER
cymbalariae *H. K.*
reflexus *L.*

OEDERA
prolifera *L.*

SPERMACOCE
rubra *Jacq.*

PLOCAMA
pendula *H. K.*

VAUGUERIA
commersonii.

APIUM
prostratum *Bill.*

BUPLEVRUM
difforme *L.*

DELPHINIUM
puniceum *L. f.*

COSSIGNIA
pinnata *Lmk.*

ELÆOCARPUS
serratus *Vahl.*

OXALIS
rubella *Jacq.*

PÄVONIA
parviflora.

HIBISCUS
radiatus *Wild.*
macrophyllus.

PELARGONIUM
abrotanifolium.
hirtum *Jacq.*
tenuifolium *L'Her.*
rapaceum *H. K.*

LARREA
nitida *Cav.*

RUTA
pinnata *L. f.*

SOUCI
à feuell. de chrysantème. cap, or. ♀
rougeâtre. cap, or. ♀

ASTER
cymbalaire. cap, or. ♀
réfléchi. cap, or. ♀

OEDERA
prolifère. cap, or. ♀

SPERMACOCE
rouge. ☉

PLOCAMA
fétide. canaries, or. ♀

VAUGUERIA
de Commerson. île de F., s. ch. ♀

APIUM
couché. N. holl., or. ♀

BUPLEVRUM
difforme. cap, or. ♀

DELPHINIUM
ponceau. sibérie. ♀

COSSIGNIA
à feuell. pennées. île de F., s. ch. ♀

ELÆOCARPUS
à feuell. en scie. inde, or. ♀

OXALIS
rouge. cap, or. ♀

PÄVONIA
à petites fleurs.

HIBISCUS
rayonné. ☉
à grandes feuilles. s. ch. ♀

PELARGONE
à feuell. d'aurone. cap, or. ♀
velu. cap, or. ♀
à feuell. menues. cap, or. ♀
à grosses racines. cap, or. ♀

LARREA
luisant. Buénos-Ayres, s. ch. ♀

RUE
à feuell. pennées. canar., or. ♀

CRASSULA
calycina.

SEDUM
sexfidum *Marsch.*

LEPTOSPERMUM
lanigerum.

EUCALYPTUS
oppositifolia.
angustifolia.

DAVIESIA
denudata *Vent.*
pultenæa juncea *Wild.* }

MELASTOMA
cymosa *Vent.*

HEDYSARUM
triquetrum *L.*
gangeticum *L.*

POMADERRIS
apetala *Bill.*

PITTOSPORUM
undulatum *Vent.*
coriaceum *Andr.*

BURSERIA
paniculata *Lmk.*

LOUREIRIA
cuneifolia *Cav.*
mozinna spathulata *Ortega.* }

MYRICA
serrata *Lmk.*

PLANERA
ulmifolia *Mich.*

CASUARINA
quadridentata.

PACHISANDRA
prostrata *Mich.*

BALANOPTERIS
tothila *Cærtner.*

CRASSULE
à grand calice. *N. Holl.*, or. ½

SÉDUM
à six divisions.

LEPTOSPERMUM
laineux. *N. Holl.*, or. ½

EUCALYPTUS
à feuell. opposées. *N. Holl.*, or. ½
à feuell. étroites. *N. Holl.*, or. ½

DAVIÉSIA
à tiges nues. *N. Holl.*, or. ½

MÉLASTOMA
corymbifère. *Am. m.*, s. ch. ½

SAINFOIN
triangulaire. inde, s. ch. ½
du Gange. s. ch. ½

POMADERRIS
apétale. *N. Holl.*, or. ½

PITTOSPORUM
ondulé. canaries, or. ½
coriace. canaries, or. ½

BURSÉRA
bois de colophane. île de F.,
s. ch. ½

LOUREIRIA
cunéiforme. Mexique, s. ch. ½

MYRICA
à feuell. en scie. cap, or. ½

PLANÉRA
à feuell. d'orme. *Am. s.* ½

CASUARINA
à quatre dents. *N. Holl.*, or. ½

PACHISANDRA
couché. *Am. s.* ½

BALANOPTÉRIS
tothila. inde, s. ch. ½

INDEX GENERUM.

A

Abies.	Page 216	Albuca.	Page 27
Abroma.	148	Alcea.	145
Abronia.	46	Alchimilla.	176
Abrus.	192	Aletris.	24
Acalypha.	207	Aleurites.	206
AGANTHI.	51	ALGÆ.	2
Acanthus.	<i>Ibid.</i>	Alisma.	23
Acer.	155	Allionia.	110
ACERA.	<i>Ibid.</i>	Allium.	27
Achillea.	105	Allophyllus.	135
Achras.	79	Alnus.	213
Achyranthes.	44	Aloe.	25
Aconitum.	126	Alopecurus.	11
Acorus.	8	Alpinia.	33
Acrosticum.	4	Alsine.	155
Actæa.	126	Alstroemeria.	28
Adansonia.	148	Althæa.	145
Adelia.	206	Alyssum.	131
Adenanthera.	185	AMARANTHI.	43
Adiantum	5	Amaranthus.	<i>Ibid.</i>
Adonis.	124	Amaryllis.	29
Adoxa.	164	Ambrosia.	211
Æcidium.	1	Amellus.	108
Ægilops.	14	AMENTACEÆ.	212
Ægiphila.	55	Amethystea.	55
Ægopodium	116	Ammi.	120
Æschynomene.	198	Amomum.	33
Æsculus.	135	Amorpha.	192
Æthusa.	118	Amygdalus.	179
Agaricus.	2	Amyris.	199
Agapanthus.	28	Anacardium.	198
Agave.	<i>Ibid.</i>	Anacyclus.	99
Ageratum.	98	Anagallis.	47
Agrimonia.	176	Anagyris.	184
Agriphyllum.	109	Anamenia.	124
Agrostemma.	159	Anarrhinum.	65
Agrostis.	15 et 218	Anastatica.	135
Agyneia.	206	Anchusa.	75 et 220
Aira.	14	Ancistrum.	176
Ajuga.	57	Andrachne.	206
Aizoon.	166	Andromeda.	85

Andropogon.	Page 14	Arnica.	Page 101
Androsace.	48	AROÏDEÆ.	7
Andryala.	90	Artedia,	121
Anemone.	123	Artemisia.	95
Anethum.	117	Artocarpus.	210
Angelica.	119	Arum.	8 et 218
Anona.	150	Arundo.	18
ANONÆ.	<i>Ibid.</i>	Asarum.	35
Anthemis.	104	Asclepias.	78
Anthericum.	25	ASPARAGI.	20
Anthistiria.	14	Asparagus.	<i>Ibid.</i>
Anthoceros.	3	Asperugo.	75
Antholyza.	31	Asperula.	111
Anthospermum.	112	Asphodelus.	26
Antoxanthum.	11	Asplenium.	5
Anthyllis.	187	Aster.	102 et 221
Antirrhinum.	65	Astragalus.	193
Aphyllantes.	22	Astrantia..	121
Apium.	117 et 221	Athamanta.	120
APOCYNEÆ.	77	Athanasia.	99
Apocynum.	78	Atractylis.	92
Aquilegia.	125	Atragene.	123
Arabis.	128	Atraphaxis.	58
Arachis.	187	ATRIPLICES.	40
Aralia.	116	Atriplex.	42 et 219
ARALLE.	<i>Ibid.</i>	Atropa.	68
Arbutus.	85	Aucuba.	205
Arctium.	92	Avena.	18
Arctotis.	109	AURANTIA.	158
Ardisia.	217	Auricularia.	2
Areca.	19	Axyris.	43
Arenaria.	156	Ayenia.	149
Aretia.	48	Aylantus.	199
Argemone.	126	Aytonia.	159
Aristolochia.	35 et 219	Azalea.	80
Aristotelia.	217	Azima.	217

B

Baccharis.	97	Bauhinia.	183
Balanites.	158	Befaria.	80
Balanopteris.	222	Begonia.	217
Ballota.	61	Bellis.	99
Balsamita.	94	Bellium.	100
Baltimora.	106	BERBERIDES.	150
Banisteria.	156	Berberis.	<i>Ibid.</i>
Banksia.	57 et 219	Beta.	42
Basella.	41	Betonica.	60

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
Betula.	213	Bromus.	16
Bidens.	108	Broussonetia.	210
Bignonia.	75	Browallia.	66
BIGNONIÆ.	<i>Ibid.</i>	Brucea.	200
Billardiera.	217	Brunia.	203
Biscutella.	131	Brunnichia.	38
Biserrula.	194	Brunsfelsia.	70
Bistropogon.	59	Bryonia.	207
Bixa.	152	Bryum.	3
Blasia.	3	Bubon.	118
Blechnum.	5	Bucida.	36
Blitum.	43	Budleia.	64
Bocconia.	127	Bufonia.	155
Boerhaavia.	46	Bulbocodium.	219
Boletus.	2	Bulliarda.	161
Boltonia.	102	Bunias.	133
Bombax.	148	Bunium.	120
Bontia.	70	Buphtalmum.	106
BORRAGINÆ.	<i>Ibid.</i>	Buplevrum.	121 et 221
Borago.	73	Bursera.	199 et 222
Boronia.	154	Butomus.	23
Bosea.	41	Buxbaumia.	3
Brassica.	128	Buxus.	206
Briza.	18	Byssus.	2
Bromelia.	29	Bytneria.	149

C

Cacalia.	97	CAMPANULÆ.	84
Cachrys.	120	Camphorosma.	41
CACTI.	164	Canarina.	84
Cactus.	165	Canna.	32
Cæsalpinia.	183	CANNÆ.	<i>Ibid.</i>
Cakile.	133	Cannabis.	211
Caladium.	8	CAPPARIDÆ.	134
Calceolaria.	66	Capparis.	<i>Ibid.</i>
Calea.	98	Capraria.	64
Calendula.	100 et 221	CAPRIFOLIA.	114
Calla.	8	Capsicum.	70
Callicarpa.	54	Cardamine.	130
Calligonum.	40	Cardiospermum.	135
Callitriche.	7	Carduus.	91
Caltha.	126	Carex.	9
Calycanthus.	180	Carica.	209
Calyptranthes.	171	Carissa.	78
Camellia.	138	Carlina.	92
Camieraria.	78	Carpesium.	95
Campanula.	84	Carpinus.	213

<i>Carthamus.</i>	<i>Page</i> 92	<i>Chrysosplenium.</i>	<i>Page</i> 164
<i>Carum.</i>	117	<i>Cicer.</i>	196
<i>CARYOPHYLLÆ.</i>	155	<i>Cichorium.</i>	90
<i>Caryophyllus.</i>	171	<i>Cicuta.</i>	118
<i>Caryota.</i>	19	<i>Cinara.</i>	92
<i>Cassia.</i>	182	<i>Cineraria.</i>	105
<i>Cassine.</i>	201	<i>Cinna.</i>	218
<i>Casuarina.</i>	215 et 222	<i>Circæa.</i>	169
<i>Catananche.</i>	90	<i>Cissampelos.</i>	150
<i>Catesbæa.</i>	112	<i>Cissus.</i>	159
<i>Caucalis.</i>	120	<i>CIST.</i>	152
<i>Ceanothus.</i>	202	<i>Cistus.</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Cecropia.</i>	210	<i>Citharexylum.</i>	54
<i>Cedrela.</i>	139	<i>Citrus.</i>	158
<i>Celastrus.</i>	200	<i>Clathrus.</i>	1
<i>Celosia.</i>	44 et 219	<i>Clavaria.</i>	2
<i>Celsia.</i>	66	<i>Claytonia.</i>	166
<i>Celtis.</i>	212	<i>Clematis.</i>	122
<i>Cenchrus.</i>	14	<i>Cleome.</i>	154
<i>Centaurea.</i>	95 et 220	<i>Cleonia.</i>	65
<i>Centunculus.</i>	47	<i>Clerodendrum.</i>	55
<i>Cephalanthus.</i>	114	<i>Clethra.</i>	85
<i>Cerastium.</i>	156	<i>Cliffortia.</i>	176
<i>Ceratonia.</i>	182	<i>Clinopodium.</i>	62
<i>Ceratophyllum.</i>	6	<i>Clitoria.</i>	191
<i>Cerbera.</i>	78	<i>Clusia.</i>	157
<i>Cercis.</i>	185	<i>Clutia.</i>	206
<i>Cercodea.</i>	168	<i>Clypæola.</i>	151
<i>Cerithe.</i>	71	<i>Cneorum.</i>	199
<i>Cestrum.</i>	70	<i>Cnicus.</i>	91
<i>Chærophyllum.</i>	117	<i>Cobæa.</i>	75
<i>Chamærops.</i>	19	<i>Coccoloba.</i>	58
<i>Chara.</i>	6	<i>Cochlearia.</i>	152
<i>Cheiranthus.</i>	129	<i>Cocos.</i>	19
<i>Chelidonium.</i>	127	<i>Coffea.</i>	115
<i>Chelone.</i>	75	<i>Coix.</i>	19
<i>Chenopodium.</i>	42 et 219	<i>Colchicum.</i>	25
<i>Cherleria.</i>	156	<i>Colletia.</i>	202
<i>Chiococca.</i>	115	<i>Collinsonia.</i>	57
<i>Chionanthus.</i>	52	<i>Columnnea.</i>	66 et 220
<i>Chironia.</i>	76	<i>Colutea.</i>	192
<i>Chlora.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Comarum.</i>	177
<i>Chloranthus.</i>	217	<i>Commelina.</i>	22 et 218
<i>Chloris.</i>	14	<i>Comocladia.</i>	199
<i>Chondrilla.</i>	86	<i>Comptonia.</i>	215
<i>Chrysanthemum.</i>	100	<i>Conserva.</i>	2
<i>Chrysocoma.</i>	98	<i>CONIFERÆ.</i>	215
<i>Chrysophyllum.</i>	79	<i>Conium.</i>	120

Conocarpus.	Page 36	Crescentia.	Page 70
Convallaria.	21	Cressa.	75
CONVOLVULI.	73	Crinum.	28
Convolvulus.	73 et 220	Crithmum.	120
Conyza.	97 et 221	Crocus.	52
Corchorus.	151	Crotalaria.	186
Cordia.	70 et 220	Croton.	206
Coreopsis.	107	Crovea.	154
Coriandrum.	118	Crucianella.	112
Coriaria.	217	CRUCIFERÆ.	128
Coris.	47	Crypsis.	11
Corispermum.	45	Cucifera.	19
Cornucopiæ.	19	Cucubalus.	159
Cornus.	115	Cucumis.	207
Cornutia.	54	Cucurbita.	208
Coronilla.	197	CUCURBITACEÆ.	207
Corônopus.	132	Cuminum.	118
Correa.	154	Cupania.	155
Corrigiola.	166	Cuphea.	172
Cortusa.	48	Cupressus.	216
Corylus.	214	Curcuma.	33
Corypha.	19	Cuscuta.	75
Cosmos.	107	Cycas.	6
Cossignia.	221	Cyclamen.	48
Costus.	33	Cynanchum.	78
Cotula.	99	Cynoglossum.	75 et 220
Cotyledon.	161	Cynosurus.	15
Crambe.	153	CYPEROÏDEÆ.	9
Crassula.	161 et 222	Cyperus.	11
Cratægus.	173	Cypripedium.	54
Crepis.	88	Cytisus.	185

D

Dactylis.	15	Dentaria.	151
Dahlia.	106	Dianella.	20
Dais.	37	Dianthus.	157
Dalbergia.	198	Dichondra.	71
Dalea.	188	Dictamnus.	154
Dalochampia.	207	Diervilla.	114
Daphne.	36	Digitalis.	66
Datisca.	211	Dillenia.	149
Datura.	67	Diodia.	112
Davallia.	5	Dionæa.	217
Daucus.	120	Dioscoræa.	21
Daviesia.	222	Diosma.	155
Decumaria.	171	Diospyros.	79 et 220
Delphinium.	125 et 221	Diotis.	99

DIPSACEÆ.	Page 109	Dorstenia.	Page 210
Dipsacus.	<i>Ibid.</i>	Draba.	152
Dirca.	36	Dracæna.	20
Disandra.	50	Dracocephalum.	62
Dodartia.	64	Dracontium.	8
Dodecatheon.	48	Drepania.	88
Dodonæa.	200	Drosera.	154
Dolichos.	191	Dryas.	177
Dombeya.	148	Duranta.	54
Doronicum.	101		

E

Ebenus.	187	Erharta.	218
Echinaria.	14	Erica.	81
Echinophora.	121	ERICÆ.	<i>Ibid.</i>
Echinops.	94	Erigeron.	102
Echioïdes.	75	Erinus.	50
Echites.	77	Ernodea.	115
Echium.	72 et 220	Eriocephalus.	100
Eclypta.	106	Eriogonum.	219
Ehretia.	71	Eriophorum.	10
ELÆAGNI.	35	Eriospermum.	27
Elæagnus.	36	Ervum.	196
Elæocarpus.	221	Eryngium.	122
Elais.	19	Erysimum.	129
Elatine.	156	Erythrina.	191
Elephantopus.	94	Erythronium.	24
Eleusine.	15	Erythroxyllum.	136
Ellisia.	71	Eucalyptus.	171 et 222
Elymus.	15	Euclea.	217
Elytraria.	52	Eucomis.	26
Embothrium.	57	Eugenia.	171
Empetrum.	84	Evolvulus.	75
Encelia.	106	Evonymus.	200
Ephedra.	215	Eupatorium.	98
Epidendrum.	54	Euphorbia.	203
Epigæa.	84	EUPHORBIE.	<i>Ibid.</i>
Epilobium.	169	Euphoria.	155
Epimedium.	150	Euphrasia.	50
Equisetum.	6		

F

Faba.	196	Fagus.	214
Fabricia.	170	Ferraria.	30
Fagara.	200	Ferula.	119
Fagonia.	154	Festuca.	17 et 218

FICOÏDEÆ.	Page 166	Forskalea.	Page 210
Ficus.	209	Fothergilla.	212
Filago.	96	Fragaria.	177
FILICES.	4	Frankenia.	160
Fissilia.	138	Fraxinus.	52
Flacurtia.	151	Fritillaria.	24
Flagellaria.	20	Fuchsia.	170
FLOSCULOSÆ.	91	Fucus.	2
Fontanesia.	52	Fumaria.	127
Fontinalis.	5	FUNGI.	1

G

Gaillarda.	108	Globba.	52
Galanthus.	29	Globularia.	48
Galaxia.	31	Glycine.	192
Galega.	194	Glycyrrhiza.	194
Galenia.	41	Gnaphalium.	96
Galeopsis.	60	Gnidia.	37
Galinsoga.	108	Gomphrena.	44 et 219
Galium.	111	Goodenia.	86
Gardenia.	113	Gordonia.	148
Garidella.	125	Gorteria.	101
Gaultheria.	84	Gossypium.	148
Gaura.	169	Gouania.	205
Genipa.	115	GRAMINEÆ.	11
Genista.	184	Grangea.	95
Gentiana.	76	Gratiola.	66
GENTIANÆ.	<i>Ibid.</i>	Grewia.	151
Geoffræa.	198	GUAIACANÆ.	79
GERANIA.	140	Guaiacum.	154
Geranium.	140 et 221	Guarea.	159
Geropogon.	90	Guazuma.	148
Gesneria.	85	Guettarda.	115
Geum.	177	Guilandina.	183
Githago.	159	Gundelia.	94
Gladiolus.	51	GUTTIFERÆ.	157
Glaux.	172	Gymnocladus.	182
Glecoma.	60	Gymnostyles.	95
Gleditsia.	182	Gypsophila.	157
Glinus.	166		

H

Hæmanthus.	28	Halleria.	64
Hæmatoxylum.	183	Hamamelis.	150
Hakea.	57	Hamellia.	115
Halesia.	80	Hasselsquistia.	121

Hebenstreitia.	Page 55	Hippuris.	Page 6
Hedera.	116	Hoffmenseggia.	183
Hedychium.	53	Holcus.	13
Hedysarum.	197 et 222	Holosteum.	155
Helenium.	101	Homalium.	180
Helianthemum.	152	Hopea.	80
Helianthus.	107	Hordeum.	13
Heliconia.	52 et 219	Horminum.	63 et 220
Helicteres.	149	Hortensia.	115
Heliocarpus.	151	Hottonia.	47
Heliotropium.	72	Houstonia.	112
Helleborus.	125	Humulus.	211
Helminthia.	89	Hura.	207
Helonias.	25	Hyacinthus.	26
Helvella.	2	Hydnum.	2
Hemerocallis.	28	Hydrangea.	164
Hemitomus.	66	HYDROCHARIDES.	34
HEPATICÆ.	3	Hydrocharis.	<i>Ibid.</i>
Heracleum.	119	Hydrocotyle.	122
Hermannia.	151	Hydrophyllum.	71
Hernandia.	58	Hymenæa.	185
Herniaria.	45	Hyosciamus.	67
Hesperis.	129	Hyoseris.	89
Heterosperma.	108	Hypocoum.	127
Heuchera.	163	HYPERICA.	137
Hibiscus.	147 et 221	Hypericum.	<i>Ibid.</i>
Hieracium.	87	Hypnum.	3
Hippia.	95	Hypochæris.	90
Hippocratea.	156	Hypoxis.	29
Hippocrepis.	197	Hyptis.	60
Hippomane.	207	Hyssopus.	58
Hippophae.	56		

I

Jasione.	86	Iresine.	44
JASMINEÆ.	52	IRIDES.	30
Jasminum.	55	Iris.	<i>Ibid.</i>
Jatropha.	206	Isatis.	134
Iberis.	152	Isnardia.	172
Ilex.	201	Isoëtes.	6
Illecebrum.	44	Isopyrum.	125
Illicium.	149	Itea.	80
Impatiens.	145	Iva.	211
Imperatoria.	117	Juglans.	200
Indigofera.	194	JUNCI.	22
Inula.	101	Juncus.	<i>Ibid.</i>
Ipomæa.	74	Jungermannia.	5

Juniperus.	Page 215	Ixia.	Page 31
Jussiaea.	169	Ixora.	115
Justicia.	51, et 219		

K

Kæmpferia.	55	Kirganelia.	205
Kalankoe.	161	Kitaibelia.	144
Kalmia.	80	Knautia.	110
Kiggellaria.	205	Koelreuteria.	155
Killingia.	11	Kuhnia.	98

L

LABIATÆ.	55	Ligusticum.	119
Lachenalia.	26	Ligustrum.	55
Lactuca.	86	LILIA.	24
Lagasca.	220	Lilium.	<i>Ibid.</i>
Lagerstromia.	172	Limodorum.	54
Lagoëcia.	122	Limonia.	158
Lagunea.	147	Limosella.	48
Lagurus.	15	Linaria.	64
Lamium.	60	Lindernia.	66
Lampsana.	86	Linnæa.	114
Lantana.	54	Linum.	160
Larix.	216	Liquidambar.	215
Larrea.	221	Liriodendrum.	149
Laserpitium.	119	Lithospermum.	72
Lasiopetalum.	205	Littorella.	45
Latania.	19	Lobelia.	85
Lathræa.	51	Lolium.	15
Lathyrus.	195	Lonicera.	114
Lavandula.	59 et 219	Lopezia.	169
Lavatera.	145	Lotus.	190
LAURI.	58	Loureiria.	222
Laurus.	<i>Ibid.</i>	Lunaria.	151
Lausonia.	172	Lupinus.	186
Ledum.	80	Lychnis.	159
Leersia.	12	Lycium.	70
LEGUMINOSÆ.	180	Lycoperdon.	1
Lemna.	7	Lycopodium.	5
Leontodon.	89	Lycopsis.	75
Leonurus.	61	Lycopus.	55
Lepidium.	155	Lygeum.	18
Leptospermum.	170	Lysimachia.	47
Lessertia.	192	LYSIMACHIÆ.	<i>Ibid.</i>
Leucoium.	29	Lythrum.	172
Lichen.	2		

M

Nadia.	<i>Page</i> 100	Mesembryanthemum.	<i>Page</i> 167
Magnolia.	149	Mespylus.	174
MAGNOLIE.	<i>Ibid.</i>	Messerschmidia.	71
Mahernia.	151	Methonica.	24
Malachra.	145	Metrosideros.	170
Malope.	144	Miehauxia.	84
Malpighia.	156	Micropus.	96
MALPIGHIE.	<i>Ibid.</i>	Milium.	12
Malva.	144	Milleria.	100
MALVACEÆ.	<i>Ibid.</i>	Mimosa.	180
Malvaviscus.	147	Mimulus.	66
Malus.	173	Minuartia.	155
Mammea.	157	Mirabilis.	46
Mangifera.	198	Mitchella.	114
Manulea.	50	Mitella.	164
Maranta.	35	Moerhingia.	156
Marchantia.	5	Mogorium.	55
Marrubium.	61	Molucella.	61
Marsilea.	6	Mollugo.	155
Martynia.	76	Momordica.	207
Matricaria.	99	Monarda.	55 et 219
Medeola.	20	Monotropa.	217
Medicago.	189	Monsonia.	145
Melaleuca.	170	Montia.	166
Melampyrum.	51	Moræa.	30
Melastoma.	172 et 222	Morina.	109
MELASTOMÆ.	172	Moringa.	185
Melia.	159	Morus.	210
MELIE.	<i>Ibid.</i>	Mucor.	1
Melianthus.	154	Murraya.	158
Melica.	15	Musa.	52
Melicocca.	155	MUSÆ.	<i>Ibid.</i>
Melilotus.	188	Muscari.	26
Melissa.	62	Musci.	3
Mellitis.	65	Myagrum.	155
Melochia.	148	Myosotis.	75
Melothria.	207	Myosurus.	125
MENISPERMA.	150	Myrica.	215 et 222
Menispermum.	<i>Ibid.</i>	Myriophyllum.	168
Mentha.	59 et 219	Myristica.	58
Menziezia.	80	Myrsine.	79
Menyanthes.	49	MYRTI.	170
Mercurialis.	205	Myrtus.	171
Merendera.	25		

N

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
NAIADES.	6	Nicandra.	68
Naïas.	7	Nicotiana.	67
Napæa.	146	Nidularia.	2
NARCISSI.	28	Nigella.	125
Narcissus.	29	Nitraria.	166
Nardus.	18	Nolana.	73
Narthecium.	23	Notelæa.	219
Nemesia.	65	NYCTAGINES.	46
Nepeta.	58	Nymphæa.	55
Nerium.	77	Nyssa.	56

O

Ochna.	149	ORCHIDEÆ.	53
Ocymum.	65 et 220	Orchis.	<i>Ibid.</i>
OEdera.	221	Origanum.	62
OEnanthe.	118	Ornithogalum.	27
OEnothera.	169	Ornithopus.	196
Oldenlandia.	112	Orobanche.	51
Olea.	52	Orobus.	195
ONAGRÆ.	168	Ortegia.	155
Onoclea.	4	Oryza.	18
Ononis.	187	Osmunda.	4
Onopordon.	92	Osteospermum.	100
Onosma.	72	Osyris.	36
Opercularia.	114	Othonna.	104
Ophioglossum.	4	Oxalis.	145
Ophrys.	54	Oxytropis.	193

P

Pachisandra.	222	Paris.	21
Pæderia.	113	Parkinsonia.	182
Pæonia.	126	Parnassia.	154
Palava.	144	Paronychia.	44
Paliurus.	202	Parthenium.	106
Pallasia.	40	Paschalia.	108
PALMÆ.	19	Paspalum.	12
Panax.	116	Passerina.	37 et 219
Pancratium.	29 et 219	Passiflora.	208
Pandanus.	217	Pastinaca.	117
Panicum.	12 et 218	Paullinia.	155
Papaver.	127	Pavonia.	145 et 221
PAPAVERANCEÆ.	126	Pectis.	101
Parietaria.	210	PEDICULARES.	49

Pedicularis.	Page 50	Platanus.	Page 215
Peganum.	154	Platilobium.	184
Pentapetes.	148	Plectrantus.	65
Penthorum.	165	Plocama.	221
Peplis.	172	PLUMBAGINES.	46
Perilla.	59	Plumbago.	<i>Ibid.</i>
Periploca.	78	Plumeria.	77
Petiveria.	41	Poa.	17 et 218
Peucedanum.	119	Podalyria.	184
Peziza.	2	Podocarpus.	215
Phaca.	195	Podophyllum.	126
Phalangium.	26	Pogonia.	220
Phalaris.	12	Poinciana.	185
Phallus.	2	POLEMONIA.	75
Pharnaceum.	155	Polemonium.	<i>Ibid.</i>
Plasum.	5	Polianthes.	28
Phaseolus.	191	Polycarpon.	155
Phellandrium.	118	Polycarpea.	<i>Ibid.</i>
Philadelphus.	172	Polycnemum.	41
Phillyrea.	55	Polygala.	49
Phleum.	12	Polygonatum.	21
Phlomis.	61	POLYGONEÆ.	58
Phlox.	75	Polygonum.	59
Phoenix.	19	Polymnia.	106
Phormium.	26	Polypodium.	4 et 218
Phylica.	202	Polypogon.	15
Phyllanthus.	205	Polytrichum.	3
Phyllis.	112	Pomaderris.	222
Physalis.	68	Pontederia.	52
Phyteuma.	85	Populus.	215
Phytolacca.	40	Portesia.	159
Picridium.	89	Portulacá.	165
Picris.	<i>Ibid.</i>	PORTULACEÆ.	<i>Ibid.</i>
Pittosporum.	222	Portulacaria.	166
Pilularia.	6	Potamogeton.	7
Pimpinella.	116	Potentilla.	176
Pinguicula.	49	Poterium.	175
Pinkneia.	112	Pothos.	8 et 218
Pinus.	216	Prasium.	64
Piper.	211	Prenanthes.	86
Piscidia.	192	Primula.	48
Pisonia.	46	Prinos.	201
Pistacia.	199	Proserpinaca.	168
Pisum.	195	Protea.	57
Pitcairnia.	25	PROTEÆ.	<i>Ibid.</i>
Planera.	222	Prunella.	65
PLANTAGINES.	45	Prunus.	178
Plantago.	<i>Ibid.</i>	Psidium.	171

Psoralea.	Page 188	Pulmonaria.	Page 72
Psychotria.	113	Pultenæa.	184
Ptelea.	200	Punica.	171
Pteranthus.	41	Pyrola.	83
Pteris.	5	Pyrus.	173
Pterocarpus.	198		

Q

Quercus.	214	Queria.	155
----------	-----	---------	-----

R

RADIATÆ.	99	Ribes.	164
Rafnia.	186	Riccia.	3
Rajania.	218	Ricinus.	206
Randia.	112	Ricotia.	131
RANUNCULACEÆ.	122	Rivina.	41
Ranunculus.	124	Robinia.	192
Raphanus.	128	Rondeletia.	113
Ravenala.	32	Rosa.	174
Rauvolfia.	78	ROSACEÆ.	173
Reaumuria.	166	Rosmarinus.	53
Redutea.	147	Rottbollia.	14
Reseda.	134	Royena.	79
Reticularia.	1	Rubentia.	201
Rhagadiolus.	86	Rubia.	112
RHAMNI.	200	RUBIACEÆ.	111
Rhamnus.	201	Rubus.	178
Rhapis.	20	Rudbeckia.	107
Rheum.	40	Ruellia.	51
Rhinantus.	51	Rumex.	39
RHODODENDRA.	80	Ruppia.	7
Rhododendrum.	<i>Ibid.</i>	Ruscus.	21
Rhodora.	<i>Ibid.</i>	Ruta.	154 et 221
Rhus.	198	RUTÆ.	154

S

Sabal.	19	Salvinia.	6
Saccharum.	13	Sambucus.	115
Sagina.	155	Samolus.	49
Sagittaria.	23	Samyda.	217
SALICARÆ.	172	Sanguinaria.	126
Salicornia.	43	Sanguisorba.	173
Salix.	212	Sanicula.	121
Salsola.	41	Sansevieria.	24
Salvia.	55	Santolina.	99

Sanvitalia.	Page 107	Sesuvium.	Page 166
SAPINDI.	135	Sherardia.	11
Sapindus.	<i>Ibid.</i>	Sibbaldia.	176
Sapium.	207	Sibthorpia.	50
Saponaria.	157	Sicyos.	207
SAPOTÆ.	79	Sida.	146
Sarothra.	160	Sideritis.	59
Sarracenia.	217	Sideroxylum.	79
Satureia.	58	Sigesbeckia.	106
Satyrrium.	54	Silene.	158
Saururus.	7	Silphium.	106
Saxifraga.	163	Sinapis.	128
SAXIFRAGÆ.	<i>Ibid.</i>	Sison.	118
Scabiosa.	109	Sisymbrium.	130
Scandix.	117	Sisyrinchium.	50
Scheuchzeria.	25	Sium.	118
Schinus.	199	Smilacina.	21
Schoenus.	10	Smilax.	21 et 218
Scilla.	27	Smyrnum.	117
Scirpus.	10	Solandra.	68
Scleranthus.	166	SOLANÆÆ.	66
Sclerocarpus.	106	Solanum.	68 et 220
Scolymus.	90	Soldanella.	48
Scoparia.	64	Solidago.	103
Scorpiurus.	196	Sonchus.	87 et 220
Scorszonera.	89	Sophora.	184
Scotia.	182	Sorbus.	174
Scrophularia.	64	Spaendoncea.	185
SCROPULARIÆ.	<i>Ibid.</i>	Sparganium.	9
Scutellaria.	65	Spartium.	185
Secale.	16	Spergula.	156
Securidaca.	198	Spermacoce.	112 et 221
Sedum.	162 et 222	Sphæranthus.	94
Selago.	55	Sphæria.	1
Selinum.	120	Sphagnum.	5
SEMIFLOSCULOSÆ.	86	Spielmannia.	54
SEMPERVIVÆ.	160	Spigelia.	77
Sempervivum.	162	Spilanthus.	108
Senebiera.	152	Spinacia.	42
Senecio.	105	Spiræa.	178
Serapias.	54	Splachnum.	5
Serjania.	155	Spondias.	199
Seriola.	90	Stachys.	60 et 219
Serissa.	113	Stæhelina.	92
Serratula.	92	Stapelia.	77 et 220
Sesamum.	75	Staphylea.	200
Seseli.	117	Statice.	46
Sesleria.	15	Stellaria.	157

Stellera.	Page 37	Stuartia.	Page 148
Sterculia.	149	Styrax.	80
Stevia.	98	Swertia.	76
Stipa.	15	Swietenia.	159
Stratiotes.	54	Symphoricarpos.	114
Strelitzia.	52	Symphytum.	72
Struthiola.	57	Syringa.	52
Strychnos.	78		

T

Tabernæmontana.	77 et 220	Tordylium.	121
Tagetes.	101	Tormentilla.	176
Talinum.	165	Tournefortia.	71 et 220
Tamarindus.	180	Trachelium.	85
Tamarix.	166	Tradescantia.	22 et 218
Tamnus.	21	Tragia.	207
Tanacetum.	95	Tragopogon.	90
Taraxacum.	89	Tragus.	14
Tarchonanthus.	99	Trapa.	168
Taxus.	215	Tremella.	2
Tectona.	54	Trianthema.	166
Telephium.	166	Tribulus.	154
TEREBINTHACÆ.	198	Trichia.	1
Terminalia.	56	Trichilia.	159
Ternstroemia.	158	Trichomanes.	5
Tetragonia.	168	Trichosanthes.	208
Teucrium.	57	Trientalis.	48
Thalia.	33	Trifolium.	188
Thalictrum.	123	Triglochin.	23
Thapsia.	117	Trigonella.	190
Thea.	138	Trigonia.	156
Theligonum.	211	Trillium.	20
Theobroma.	148	Triopteris.	156
Theophrasta.	79	Triosteum.	114
Thesium.	55	Tripsacum.	14
Thlaspi.	152	Triticum.	16
Thuya.	216	Triumfetta.	151
Tymbra.	62	Trollius.	125
THIMELEÆ.	36	Tropæolum.	145
Thymus.	62	Tuber.	1
Tiarella.	164	Tulipa.	24
Tigridia.	50	Turnera.	166
Tilia.	152	Turritis.	128
TILIACEÆ.	151	Tussilago.	97
Tillæa.	160	Typha.	9
Tillandsia.	29	TYPHÆ.	Ibid.

U

Ubiùm.	Page 21	Urena.	Page 145
Ulex.	184	Urospermum.	90
Ulmus.	212	Urtica.	210
Ulva.	2	URTICÆ.	209
UMBELLIFERÆ.	116	Utricularia.	49
Uniola.	18	Uvularia.	24

V

Vaccinium.	84	Veronica.	49
Valantia.	112	Viburnum.	115
Valeriana.	110	Vicia.	196
Vallisneria.	54	Vinca.	77
Vangueria.	221	Viola.	155
Varronia.	71 et 220	Viscum.	114
Velezia.	160	Visnea.	217
Vella.	155	VITES.	159
Veratrum.	25	Vitex.	55
Verbascum.	67	VITICES.	<i>Ibid.</i>
Verbena.	54	Vitis.	159
Verbesina.	108	Volkameria.	55

W

Wachendorfia.	52	Westeringia.	55
Waltheria.	151	Winterania.	159

X

Xanthium.	211	Ximenesia.	106
Xeranthemum.	96	Xylophylla.	205

Y

Yucca.	24
--------	----

Z

Zacintha.	89	Zizania.	18
Zamia.	6	Ziziphora.	55
Zanichellia.	7	Ziziphus.	202
Zanthorhiza.	126	Zoëgea.	95
Zanthoxylum.	200	Zostera.	7
Zea.	19	Zygophyllum.	154
Zinnia.	108

New York Botanical Garden Library

QK73.P3 D45

Desfontaines, Rene/ Tableau de l'Ecole de

gen

3 5185 00018 6948