THE D. H. HILL LIBRARY
NORTH CAROLINA STATE COLLEGE

SPECIAL COLLECTIONS

SB761

B42

v.1-2

THE FRIEDRICH E. TIPPMANN

ENTOMOLOGICAL COLLECTION

**This book must not be
taken from the Library
building.**

--	--	--

Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
NCSU Libraries

<http://www.archive.org/details/vollstndigenat01bech>

Vollständige
Naturgeschichte
der
schädlichen Forstinsekten.

Ein Handbuch
für
Forstmänner, Cameralisten und Oekonomen.

Herausgegeben

von

Johann Matthäus Bechstein,

Herzoglich Sachsen-Weiningschen Cammer- und Forstath, der Weiningschen öffentlichen Lehranstalt und
der Gotha'schen und Weiningschen Societät der Forst- und Jagdkunde Director und mehrerer
Academien und gelehrten Gesellschaften Mit- oder Ehrenmitglieder,

und

Georg Ludwig Scharfenberg,

Pfarrer zu Ritschenhausen und Wölfershausen und Mitglied der Gotha'schen und Weiningschen
Societät der Forst- und Jagdkunde.

Erster Theil.

Mit drey illuminirten Kupfertafeln.

Leipzig,
bey Carl Friedrich Cnoch Richter
1804.

Vollständige
N a t u r g e s c h i c h t e
der
schädlichen Forstinsekten.

Erste Abtheilung.

V o r b e r i c h t.

Unter allen Theilen der Forstwissenschaft, hat der der Forstinsektenkunde den Forstmann und Naturforscher noch am wenigsten beschäftigt. Wenn man über Bewirthschaftung, Cultur, Eintheilung, Schätzung und Abtrieb der Wälder, über Forstsäugerthiere und Vögel, und über Forstgewächse die Schriften zu Dugenden aufzuweisen hat, so findet man über die Forstinsektengeschichte keine einzige, die diesen Gegenstand planmäßig und vollständig behandelte. Zwar giebt es mancherley Vorarbeiten, und der Vater der Forstwissenschaft, Gleditsch, hat auch hierin in seiner systematischen Einleitung in die Forstwissenschaft noch bis jetzt das vollständigste und vorzüglichste geliefert. Allein er fand, wie in den meisten Zweigen der Forstkunde, also auch hier, das Feld noch zu unbearbeitet, zu groß und zu weittäufig, daß er uns also bey allem Fleiße und aller Mühe, die er anwandte, theils keine genaue, theils keine hinlängliche Anleitung mittheilen konnte, daß er oft blos zufrieden seyn mußte, das Insekt anzugeben, wenn es nur von ihm oder andern im Walde gefunden worden war, unbekümmert, ob es demselben Schaden oder Nutzen brachte. Und diesem sind dann nun die meisten Forstschriftsteller in Aufzählung der Waldinsekten gefolgt. Bey Gelegenheit der neuern Vermessungen, die diese Insekten im Brandenburgischen, am Harze, im Voigtlande u. s. w. angerichtet haben, ist zwar auch diese Untersuchung erneuert worden, und es sind in diesen Zeiträumen mehrere, diesen Gegenstand betref-

fende

fende Schriften von Hennert, Fördens, Lynker, Zink, und auch von mir und andern erschienen, allein sie beschränken sich mehrentheils blos auf die damals gerade wüthenden Forstinsekten, den Borkenkäfer, die Kanne, Kiefernspinner, Kiefernspanner und einige andere, die zu gleicher Zeit oder vorher sich im Großen fürchtbar gemacht hatten, umfaßten also nicht das Ganze, oder gaben wenigstens nur von den bekannten schädlichen Waldinsekten eine kurze Uebersicht, und da wo die Noth vorüber ist, scheinen sie auch wieder vergessen zu seyn. Die Sache ist aber, meiner Einsicht nach, zu wichtig, als daß sie sogleich der Vergessenheit überlassen werden dürfte, wenn uns die Noth nicht mehr auf sie hinweist — sie hat mit der Cultur der Wälder gleichen Werth; denn was helfen mir alle Vorschriften zur Verbesserung der Waldungen, wenn ich den Feind nicht kenne, der mir über lang oder kurz alle meine Bemühungen vereiteln kann, ihn nicht von meinen Holzungen abzuhalten, oder gar zu vernichten verstehe. Seitdem ich daher Vorsteher meiner eignen Privat-Forstlehranstalt zu Waltershausen, und der hiesigen öffentlichen bin, habe ich mir angelegen seyn lassen, meinen Zuhörern diesen Gegenstand wichtig zu machen, habe sie alle Insekten, die dem Walde in höherem oder geringerem Grade, also mehr oder weniger schädlich werden, in einem eigenen jährigen Cursus kennen gelehrt, und habe ihnen die Naturgeschichte derselben nach allen ihren Theilen, und die anwendbaren Verhütungs- und Vertilgungsmittel (die erstern sind immer die besten), vorgelesen.

Und diese Vorlesung ist denn die Grundlage des gegenwärtigen Werks. Ich hätte zwar meinen Lesern die Sache grade so geben können, wie ich sie in meinen Hefen aufgezeichnet habe, und wie ich die Hauptdata davon meinen Schülern jedesmal in die Feder diktiere — und sie würden vielleicht damit zufrieden gewesen seyn; allein glücklicherweise habe ich in hiesiger Gegend einen Freund, der, wie das Publikum schon aus mehreren Entomologischen Schriften weiß, ein Insektenkenner ist, den Herrn Pfarr Scharfenberg in Ritschenhausen. Diesen bat ich daher, da es mir an Zeit gebrach, um nicht blos dem Forstmann, sondern auch zugleich dem Entomologen einen Dienst zu erzeigen, aus dem Vorrathe seiner Kenntnisse und seiner großen und schönen Insektensammlung, so viel als möglich lauter neue Beschreibungen zu diesem Werke zu liefern. Er fand sich denn auch gleich bereit dazu, und so bin ich denn durch unsere vereinten Bemühungen im Stande, dem Publikum eine Schrift zu liefern, die zwar nicht allen denen Forderungen entsprechen wird, (sie genügt mir selbst noch nicht ganz!) die man an ein Werk der Art macht, die uns aber der Vollkommenheit in diesem Zweige des menschlichen Wissens gewiß um vieles wieder näher gebracht hat,

und

und in welchem auch für den eigentlichen Entomologen hier und da eine Bemerkung vor-
kömmt, die neu und der öffentlichen Bekanntmachung werth seyn wird.

Ueber die Behandlung der Materie selbst, brauche ich fast nichts zu sagen. Da Deutlichkeit die erste Forderung an dergleichen Schriften ist, und diese hier gewiß nicht zu verkennen seyn wird, so ergibt sich schon hieraus, daß Plan, Grundsätze und Regeln, nach welchen die Bearbeitung geschehen ist, sich dem Leser von selbst bey dem flüchtigsten Ueberblick darstellen werden. Es gehört zu einem Handbuche der Art, das nicht bloß zu Vortlesungen für den Kenner, sondern auch zur Selbstbelehrung für den Nichtkenner bestimmt ist, eine allgemeine Einleitung in die Insektenkunde, eine besondere für die Forstinsektenologie, die Beschreibung jedes mehr oder minder schädlichen Forstinsekts nach seiner vollkommenen und unvollkommenen Gestalt, seiner Nahrungsmittel, seiner Verhütungs- und Vertilgungsart u. s. w., und dies in einer Sprache, die allgemein, d. h. für jeden, der die gewöhnliche Büchersprache kennt, verständlich ist. Ob diese Eigenschaften dem Werke im vorzüglichsten Grade zukommen, darüber wird freylich der Leser selbst noch gewisser entscheiden können.

So deutlich aber nun immer das Insekt selbst beschrieben ist, so wird es doch nur dem vorzüglichsten Liebhaber der Insektenkunde leicht werden, da selbst in der Natur selbst zu finden; für den gewöhnlichen Forstmann werden also Abbildungen oder eine Forstinsektensammlung nothwendig. Ich habe für nöthig gefunden, um das Werk nicht zu vertheuren, nur die am meisten schädlichen Forstinsekten abbilden zu lassen. Es soll aber auf die Stimme des Publikums ankommen, ob nach und nach alle, wie sie hier beschrieben sind, in einer Reihe von Hefen in treuen Abbildungen geliefert werden sollen. Ich glaube aber auch, daß sich Insektensammler finden werden, die dem Forstmann in dieser Ordnung aufgestellte Insektenkabinetten um billige Preise überlassen werden, und diese sind dann freylich besser noch, als die besten Abbildungen.

Zuletzt

*) Es ist gerade die nämliche, wie in meinem Handbuche der Jagdwissenschaft die Naturgeschichte der jagdbaren und jagenden Thiere vorgetragen ist, als dessen Fortsetz-

zung dies Werk auch angesehen werden kann; da auch jenes einen Theil der Vortlesungen enthält, welche den hiesigen Fortst. eleven gehalten werden.

Zuletzt muß ich noch bemerken, daß in einem Anhange, oder in der vierten Abtheilung dieses Werks, auch die nützlichen oder zu schonenden Forstinsekten, die von der Natur bestimmt sind, die schädlichen Waldinsekten vertilgen zu helfen, beschrieben werden sollen, weil ich es zur Vollständigkeit dieser Schrift für nothwendig halte, auch den Forstmann auf diejenigen Insekten aufmerksam zu machen, die ihm beym Geschäfte der Verhütung und Vertilgung der Waldzerstörer mit an die Hand gehen.

Dresßigacker bey Weiningen,
den 10. Julius 1803.

Joh. Matth. Bechstein.

Die
Forstinspektengeschichte
ein Zweig
der
Forstnaturgeschichte.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.

1917

—

Erster Abschnitt.

Allgemeine Einleitung.

Erstes Kapitel.

Begriff der Insekten.

Die Naturgeschichte der Insekten war im 17ten Jahrhundert noch ein rechtes Chaos. Erst im 18ten fing man an, darin aufzuräumen. Besonders wurde sie in den beiden letzten Jahrzehnten sehr bearbeitet und vervollkommenet. Zu solcher Vervollkommenung hatte doch der Schwedische Ritter von Linné den eigentlichen Grund gelegt, worauf andere Naturforscher, Fabricius, die Verfasser des Wiener Verzeichnisses, Olivier, Panzer und andere, weiter bauen konnten.

In dem Linnéischen Natursystem machen die Insekten die fünfte Classe der Thiere aus a). Diese sehr kleinen Geschöpfe, wovon der Moluckische Riesenfuß das größte, und die Milbe das kleinste ist, sind mit einem, durch mehr oder weniger tiefe Einschnitte oder Ringe, abgetheilten Körper versehen, holen nicht durch den Mund, sondern durch verschiedene Zufüßler an beiden Seiten des Körpers Athem; erreichen (meist) erst nach verschiedenen Verwandlungen ihre vollkommene Gestalt, und besitzen zwey bewegliche Fühlhörner, auch sechs oder mehr Füße.

Da

a) Man findet es dem Zweck dieser Arbeit nicht angemessen, die lateinische Nomenclatur überall beizufügen. Nur da, wo es die Genauigkeit erfordert, und dann bey den systematischen

Namen der Gattungen und Arten ist sie nöthig. Dem Kenner sind die deutschen Ausdrücke mit ihren Erklärungen schon hinreichend.

Da ihr Kopf, Brust und Hinterleib wie durch Einschnitte von einander gesondert sind, so haben sie ihren Namen vom lateinischen *insecare*, einschneiden, kerben, griechisch, *Entoma*. Sie haben, wenigstens innerlich, keine Knochen, obgleich einige äußerlich zu ihrer Bedeckung etwas ähnliches haben. Ihr Herz besteht nur aus Einer Herzkammer ohne Herzohren, und die Stelle des rothen Bluts vertritt eine zähe, schleimichte weiße Feuchtigkeit, die kaum zwey bis drey Grad mehr Wärme hat, als die Luft, in der sie leben.

Durch die Verwandlung und durch die Fühlhörner und Füße unterscheiden sie sich hinreichend genug von den Würmern, die zwar weißblütig, aber statt der Fühlhörner nur mit Fühlfäden am Kopf versehen sind. Findet man bey den Insecten rothes Blut, so ist es nur eingesaugtes, z. B. bey den Fliegen, Mücken u. a. m. Ein sehr großer Theil von ihnen ist geflügelt. Doch hat die Natur mehreren Gattungen die Flügel versagt.

Man pflegt, nach *Linnei Systema Naturae*, und nach *Fabricii philosophia entomologica* 1778, den Körper der Insecten in vier Theile, in den Kopf, den Rumpf oder Vorderleib, den Hinterleib und die Gliedmaßen einzutheilen. Einige, z. B. *Schneider* in *Stralsund*, rechnen den Hinterleib auch mit zum Rumpf.

Zweytes Kapitel.

I. Der Kopf und die Benennung seiner Theile.

Der Kopf ist nicht allemal verhältnismäßig, sondern scheint bald zu groß, bald zu klein gegen den übrigen Körper. Bey verschiedenen Gattungen ist Kopf und Rumpf völlig zusammengewachsen; bey den meisten aber ist er ordentlich darein eingelenkt, und hat bald eine lange und spitzige, bald eine runde, platte oder eckige und sonst noch sehr verschiedene Gestalt. Er wird vom Kopfschild bedeckt, welches eine ziemlich harte Schale ist, von deren Form der Kopfsinnriß meist abhängt. Man unterscheidet am Kopf die Oberfläche und die Unterfläche, den Vorder- und den Hintertheil. Zwischen den Augen und dem Mund oder der Zunge, liegt die Stirn: der obere Theil des Kopfes heißt der Wirbel, der untere aber, zwischen der Lippe und Brust, die Kehle.

Manche tragen den Kopf gerade aus, andere lassen ihn niederhängen, andere verbergen ihn, indem sie solchen ganz niederbiegen. Inwendig im Kopf der eigentlichen, d. i. der vollendeten, vollkommenen, nicht mehr im Larvenstand befindlichen Insecten, liegt ein knorpelartiger Körper oder Faden, welcher das Gehirn ist, das, weil es sich eher mit dem

Rück-

Rückenmarke, als mit dem eigentlichen Gehirn anderer Thiere vergleichen läßt, von Linne nicht anerkannt wurde.

Außerdem enthält der Kopf fast alle Sinneswerkzeuge, besonders die des Gesichtes und des Geschmacks, und der Wahrscheinlichkeit nach, auch des Gehörs und Geruchs.

Am dem Kopf befinden sich zwei Augen (und beim Tauch- oder Wirbelsäfer, Pyrinus, vier), die man, um sie von gewissen kleinen Augen oder Augenpunkten zu unterscheiden; die eigentlichen, auch wohl die zusammengesetzten nennt. Sie ragen mehr oder weniger hervor, und sind bald größer, bald kleiner, alle aber ohne Augenlider oder äußerliche Bedeckung, und unbeweglich. Die harte Hornhaut derselben, die sie hinlänglich vor Verletzung schützt, ist so wie die darunter liegende crystallische Feuchtigkeit in eine große Menge ebener sechseckiger Facetten oder Augenflächen geschnitten, wovon eine jede ein besonderes Auge ausmacht, und mit seinen besondern Seh-Nerven versehen ist. Vermittelt dieser besonderen Beschaffenheit der Augen, können sie auch die seitwärts liegenden Gegenstände sehen, ohne daß das Object vervielfältiget wird. Man hat bey dem Winden-Schwärmer (*Sphinx Convoluti*) auf jeder Seite 13000, beim Seiden-Spinner (*Phalaena Bombyx Mori*) 6236, bey andern Schmetterlingen auf jeder Seite 17325, oder genauer, an beyden Augen 34650 solcher geschliffener Seiten wahrgenommen, dergleichen bey den Fliegen auf jeder Seite 8000 derselben, und bey den Libellen ein Drittel mehr. Also besitzen die Insecten den Sinn des Gesichtes in einem höhern Grad, als alle andre Thiere.

Bei einigen Gattungen der Insecten trifft man außer den eben beschriebenen zusammengesetzten noch 2 andere kleinere, halbrunde erhabene Punkte an, die auf der Stirne zwischen den vorigen sitzen und ebenfalls für Augen gehalten werden. Man nennt sie auch Nebenaugen, Augenpunkte, Wirbelpunkte, Scheitelpunkte, Perleypunkte (*Stemmata*). Sie sind glänzend, mit einer Einfassung umgeben, fast durchsichtig, und in der Mitte etwas helle. Bei einigen finden sich ihrer drey, nämlich nach Linne's Beobachtung, bey der Stinkfliege, Scorpionfliege und Kameelfliege (*phryganea*, *panorpa* et *raphidia* L.), und nach spätern Beobachtungen bey dem Blattläufer, der Wassernymphe, Cicade, Biene und Hummel, Wespe, Holzweisse, Ameise und Fliege (*chermes*, *libellula*, *cicada*, *apis*, *vespa*, *sirex*, *formica* et *musca*), ohne Zweifel auch bey den übrigen wespenähnlichen (*piezata* F. *hymenoptera* L.) Insecten; bey einigen andern nur zwey, als bey den Phalanen und Schwärmern (*Sphingis* L.) und Taghieren. Die Käfer aber haben keine. Sie sollen zum Sehen in die Ferne dienen, wie man vermuthet. Degeer und Kleemann entdeckten sie, jener an dem Hummel-Schwärmer, dieser an dem Rüssel-Zünsler (*phalaena pyr. proboscidalis* L.). Diejenigen, denen die zusammengesetzten Augen fehlen, sind mit einfachen Augen versehen, deren die Spinnen und Scorpionen acht, die Krebsspinnen vier haben.

Die beweglichen Antennen, welche den Namen Fühlhörner deswegen erhalten haben, weil man sie immer für Werkzeuge des Gefühls gehalten, und weil sie einigermaßen, wenigstens bey manchen Arten, den Hörnern gleichen, nach andern aber auch Fühlöhren heißen, sind längliche, weiche Fortsätze am Vorderkopf über den Augen, und beste-

bestehen aus mehreren, bey den Käfern aus 9, 10 oder 11 Gelenken. Der Kopf eines jeden Insekts ist mit zwey solchen, inwendig hohlen, Gelenken versehen, bey denen man sowohl in Ansehung der Gestalt, als auch in Ansehung der Länge eine große Verschiedenheit antrifft. Denn bey einigen Gattungen sind sie fadenförmig, bey andern borstenartig, bandelförmig (was sie allmählig verdünnt), keulenförmig oder kolbich, sägelförmig, mit ringelartigen Knöpfchen versehen, wie beyhm Fugenkäfer (Byrrhus L.) drehschnedig, wie bey gewissen Schwärmern; gespaltene, wie bey den Lebkäfern (Scarab. Melolontha L.), federig oder kammförmig, und bey vielen noch anders gestaltet. Oft haben sie am Ende einen zugerundeten, eysförmigen, länglichen, durchblättrten Knopf. Bey einigen sind sie eben so lang, oder auch viel länger, als der ganze Körper, bey andern hingegen sind sie von der Länge des Körpers, bey einigen länger als die Brust, bey andern kürzer, als sonst. Man unterscheidet an ihnen die Wurzel, den Stiel oder die Glieder, und die Spitze.

Die Wurzel oder Basis besteht aus einem mehr oder weniger erhabenen Knopf, in welchen die Fühlhörner so eingelenkt sind, daß sie nach allen Seiten bewegt werden können. Der Stiel oder die Glieder (Gelenke), sind sehr verschieden gebaut, und man hat sie nach ihren vielfachen Verschiedenheiten zu Bestimmung generischer Charaktere geordnet. Linne theilte in seinem System nach der Gestalt derselben die erste Ordnung der Insekten, die Käfer, in drey Abtheilungen, und die dritte Ordnung, die Schmetterlinge, in drey Gattungen. Fabricius hat bey den Käfern die Abtheilungen vermehrt, und deren anfänglich sechs, im neuesten Werke aber, Syst. Eleutheratorum 1800, neun festgesetzt. Die Zahl der Gelenke ist bey manchen, z. B. der Vassartwespe (Sphex) zehn, der Goldwespe (Chrysids) zwölf, der Holzwespe (Sirex), über 24, der Ichneumon über 30.

In Rücksicht der Farben sind diese Stiele der Antennen entweder einfarbig, oder buntgeringelt. Oft ist der Stiel von der nämlichen Farbe wie die Blättchen oder die Kämme, oft heller oder dunkler.

Die Spitze der Antennen ist nach ihrem Bau und ihrer Farbe eben so verschieden, bald dicker, bald dünner als der Stiel, zuweilen walzenförmig, breitgedrückt, in die Höhe gebogen, unter sich gekrümmt, auf die Seite gebogen, zurückgekrümmt u. s. w. Eben so werden die Antennen verschieden getragen, bald in die Höhe gerichtet oder perpendikular, bald gerade aufstehend, bald in Winkel vorwärts, bald wie ein liegendes S. Ihre Bestimmung ist ungewiß. Folgende wichtige Naturforscher, Reaumur, Linné, Clerck, haben sie für Werkzeuge des Geruchs gehalten; Sulzer, Scarpa, Schneider b) und

b) Schneider schreibt in den zur Vorhaus-
fenschen Naturgeschichte der Schmetterlinge
2. Heft, Seite 59 untergesetzten Noten,
Anmerkung 69: Man kann öfters an den
Schlafwespen (Ichneumon) bemerken, daß
wenn sie an Bäumen laufen, Raupen und
Holzwürmer zu suchen, in welche sie ihre Eyer
legen, sie die Antennen in die Löcher stecken
und gleichsam lauschen und horchen, ob sich

etwas darinnen regt oder nicht. Im ersten
Fall legen sie geschwind ihre Ey hinein, im
letzten gehn sie weiter. Die Vorkäfer erzeu-
gen um die Vegetationszeit durchs Reiben des
Bruststücks, einen kispfernden Laut. Ich ha-
be mehrmals bemerkt, daß wenn ich mehrere
einer Art beisammen hatte, und der eine er-
regte diesen Laut, die andern mit aufgereck-
ten Fühlhörnern, gleichsam horchend, stan-
den.

und Vortheil ausen für die des Gehörs; andere für beides zugleich. — Mössel will beobachtet haben, daß sie ein Tagfalterling bey der Begattung gebraucht habe. Ob nun gleich die Meinung, es wären Gehörwerkzeuge, von einem Sachkennner, Pexold in seinen Lepidopterologischen Anfangsgründen, Coburg bey Ahl 1796, bezweifelt wurde; so scheint sie doch die richtige und fast allgemein angenommene zu seyn. Der dieser Meinung deshalb entgegen ist, weil viele im Ruhestand ihre Antennen beulegen und in eine Lage setzen, die zum Riechen und Hören nicht bequem sey; wer da glaubt, sie seyen ihnen das, was den Fliegen und Mücken und allen Zweyflüglern die Balancierstäbchen sind, sie im Flug im Gleichgewicht zu halten und denselben zu dirigiren: der denkt nicht daran, daß die ungeflügelten der siebenten Linnischen Ordnung, nicht ohne Antennen sind. Neben- zweck mag das wol seyn, als wie die Vögel Kopf, Füße und Schwanz, auch zur Direction ihres Flugs zu gebrauchen wissen; allein nimmer Hauptzweck. Man kann die Be- legung der Fühlhörner im Ruhestand nicht als eine Widerlegung der Meinung für das Ge- hör ansehen. Der Ruhestand ist gleichsam der Schlaf, in welchem auch die Sinnen ruhen. Werden sie darinnen gestört, so treten die Fühlhörner sogleich hervor und lauren. Wenn der Tagfalterling flog: so streckt er seine Fühlhörner in die Höhe, macht damit allerley Bewegungen, ohne zu fliegen. Warum der so verschiedene Bau dieser Glieder nöthig war, oder warum manche, wie z. B. der Wasserschorpion (*Nepa* L.) so kurze, und die Weibkäfer, z. B. der Zimmerweibkäfer (*Ceram. aedilis* Lin. *Lamia aedilis* Fab.), dergleichen die Motte *Degeerella* Linn., so gar lange Antennen erhielten, kann nicht so leicht befriedigend beantwortet werden.

Der Mund, der bey den meisten unter dem Kopf, bey einigen an der Brust ist, besteht bey den Käfern (*Coleoptera* Lin. *Eleutherata* Fab.) aus einer Lezse oder Ober- lippe, zwey Kinnbacken (dergleichen die Schmetterthener sind), zwey Kinnladen, einer Un- terlippe, und bald aus vier, bald aus sechs Gespitzigen, die auch Fühlspitzen, Bartspitzen, Fühlerchen, Palpen, genannt werden. Bey den Fabricischen *Monatis* besteht der Mund aus 4 Palpen, einer bedeckten Kinnlade mit stumpfem Helm; bey seinen *Synista- tis* aus 4 Palpen, die Kinnlade nebst der Lippe bekrängt; bey den *Piezatis* aus 4 Palpen; die Kinnlade hornicht, breitgedruckt, zuweilen verlängert; bey den *Odonatis* aus 2 kni- gen Palpen, die Kinnlade hornicht und gezähnt; bey den *Mitosatis* aus 2 Palpen, die Kinnlade fadenförmig und häutig; bey den *Unogatis* aus 2 hervorstehenden Palpen, die Kinnlade hornicht und beklaut; bey den *Polygonatis* aus mehreren Kinnladen innerhalb der Lippe; bey seinen *Cleistagnathis* aus mehreren Kinnladen, die außerhalb der Lippe den Mund schließen; bey den *Exochmatis* aus mehreren Kinnladen außerhalb der Lippe,

den. Vielleicht sind auch deswegen bey den Käfern, die sehr kurze Fühlhörner haben, die Spitzen durchblättert, damit ihnen das, was an der Länge abgeht, durch die mehreren Spiz- zen ersetzt werde, und sie doch gut von fern hören könnten. Die Fühlhörner sehen auch

gewöhnlich da, wo bey andern Thieren die Ohren sind.

Eine völlig ähnliche Bemerkung hat der Engländer *Marsham*, von dem Ichneumon manifestator, in den *Transactions* 1791 angeführt.

von den Fressspitzen bedeckt; bey seinen Glossatis (Schmetterlingen) aus einer Spiralzunge zwischen 2 bis 4 zurückgebogenen Palpen; bey den Ryngotis aus einem Rüssel mit gegliederter Scheide; bey seinen Antliatis befindet sich statt des Mundes ein gebrochener zurückziehbarer Rüssel, wo jedoch die Bremse (Oestrus) eine Ausnahme macht, die 3 Punkte oder Kndchen ohne Rüssel hat.

Von den Käfern ist die Lezze breiter als lang, beweglich, mehr oder weniger breit, und am Vordertheil des Kopfschildes befestigt. Der Kopfschild ist zuweilen ein Fortsatz der Stirne, zuweilen von derselben durch eine Quernath getrennt. Die Kinnbacken (Mandibulae,) bewegen sich seitwärts, sind gewöhnlich hart, hornartig, ziemlich verb. Zuweilen sind sie löffelförmig ausgehöhlt mit scharfen Rändern, oder endigen sich auch in 2 oder 3 Zähnen. Bey einigen Arten der Käfer sind sie lang und mit spizen Zähnen bewaffnet. Bey einigen ist die linke Kinnbacke auffallend. Veym linken Stuckkäfer (Hister laevus Rossi) ist solche größer, und zuweilen auch anders und stärker gezahnt als die rechte. Da wo sie gar zu fehlen scheinen, sind sie dennoch da, aber sehr klein, und unfähig, dem Insekt Nutzen zu schaffen, z. B. bey solchen Arten, die keine Nahrung zu sich nehmen, oder bey Metallkäfern, die nur von Blumenfäst leben. Die Kinnladen oder Maxillen, die unter den Kinnbacken liegen, werden auch seitwärts bewegt. Sie sind hornartig oder häutig, einfach oder getheilt, nackt oder mit Haaren, Franzen und Zähnen besetzt. Sie sind kleiner als die Kinnbacken, und jede trägt an ihrer Außenseite oder Rückenseite eine oder zwey Fressspitzen. Doch sind bey Gattungen, wo die Kinnbacken häutig sind, die Kinnladen auch wol groß, z. B. bey Pillenkäfern, Metallkäfern. Herr Illiger in der Uebersetzung von Oliviers Entomologie I. Th. 1800 in der Anmerkung a, unterscheidet an der Kinnlade 3 Theile. Der größere Wurzeltheil (Basis), hat am obern innern Ende einen Fortsatz, der unbeweglich sitzt, und neben diesem an der Außenseite noch einen andern Fortsatz, der durch ein Gelenk verbunden ist, und sich seitwärts bewegen läßt. Jenen nennt er den innern Fortsatz, diesen den beweglichen oder äußern. Mit diesem letztern, dem beweglichen Fortsatz, sind die innern oder mittlern Fressspitzen bey manchen Gattungen, z. B. bey den Laufkäfern (Carabus) und Sandkäfern (Cicindela) einerley, womit auch Herrn Knoch's Erfahrungen übereinstimmen. Dies hat auf die Gattungsbestimmungen einen Einfluß, indem wir nun eine Menge von Käfern mit sechs Fressspitzen bekommen, oder indem nun keine Gattung mehr sechs Fressspitzen hat, aus welchem Gesichtspunkte man es nehmen will. Die Lippe, worunter man allemal die Unterlippe versteht, welche den Mund von unten bedeckt, trägt die beyden andern Fressspitzen. Was zwischen der Lippe und der Kehle (dem untern Theil des Kopfs liegt, und dem Kopfschild der Oberseite völlig entspricht, nennt Herr Illiger a. a. O. das Kinn (mentum).

Die Fressspitzen oder Palpen selbst, werden bey den Käfern in zwey vordere und zwey hintere getheilt. Jene vordern oder äußern sitzen an der Kinnlade, und sind viergliedrig; diese sitzen an der Lippe oder zuweilen auch am Kinn. Und die zwey zweifelhaften sind die innern oder mittlern bey denen, wo man an den Kinnladen doppelte (also in allem sechs Palpen) annimmt. Fabricius giebt aber unrichtig den zweifelhaften den

Namen der vordern, und den viersgliedrigen, vordern oder äußern den Namen der mittlern: und wegen der Benennung der hintern an der Kinnlade ist keine Irrung. Auch bey den Fabricischen Ordnungen, Ulonata, (wozu die Grille und Heuschrecken gehören), Synistata, (wozu die Ameisenlöwen, Florsiegen und Kameelfliegen u. a. gehören), Piezata, (Wespen, Blattwespen, Raupenbödler und ähnliche) und den zu der Ordnung der Schmetterlinge (Glossata F.) gehörigen Aluciten (gewisse Linneische Motten) sind, wie oben bey Anzeiger der Mundtheile bemerkt worden, vier Palpen vorhanden. Hingegen die Insekten der Fabricischen Ordnungen, Odonata, (Libellen), Mitosata, (Asseln, Tausendbeine u.), Unogata, (Spinnen, Asterspinnen, Milbe) und Glossata, haben derselben nur zwey c). Und die von den übrigen Ordnungen haben gar keine.

Herr Vorkhausen hält die Palpen für Werkzeuge des Geruchs, eben so der Necensent von Smellins Philosophie der Naturgeschichte, welcher dem Autor, der sie für Zungen hielt, widerspricht. S. Allg. Literatur-Zeitung vom 12. Novemb. 1791; desgleichen Varsch in seinen Grundzügen der Naturgeschichte des Thierreichs 1801. Uebrigens hat Fabricius in seinem geschätzten System die Beschaffenheit der Palpen mit zu der generischen Bestimmung seiner Glossaten gewählt. Diese Glossaten oder Schmetterlinge haben eine ihnen allein eigene, und den übrigen Insekten fehlende Spiralzunge, (mißbräuchlich Saugrüssel genannt,) welche die Stelle des Mundes vertritt. Sie ist vorne unter dem Kopf, bey den meisten schneckenförmig, oder in eine Spirallinie zusammengerollt, und wird auf beyden Seiten von Haarbüscheln und den Palpen bedeckt. Sie besteht zuweilen wie bey den Schwärmern (Sphinx L.) aus einer halbdurchsichtigen, hornartigen und glänzenden Materie; bey andern, z. B. den Spinnerphalänen (phal. bomb. L.) ist sie pergamentartig, geschmeidig, hellfarbig und sehr dünne. Ein einziger Schwärmer (Sph. convoluti L.) hat eine drey Zoll lange Spiralzunge. Ueberhaupt besteht sie aus zwey besondern, an einander liegenden Röhren. Die mit langen Spiralzungen versehenen, heißen spiralzüngige, die mit kurzen, heißen unzüngige (clingues). Sie dient dem Schmetterlinge, um die Blumenäfte aus den Honigbehältnissen oder Nektarien zu fangen; statt deren auch andere, als der Weißdornfalter (Pap. Crataegi L.) mit den Feuchtigkeiten der Pflügen, und der schöne Bachweidenfalter (Schillervogel, Pap. Iris L.) mit dem verlocken Viehmist vorlieb nehmen, auch wohl nach dem abfließenden Saft von verwundeten Bäumen sehr lüstern sind, den auch diejenigen Linneischen Kolbenkäfer, welche als eigne Urtheilung, Metalkäfer benannt werden, ferner diejenigen Linneischen Vockkäfer, welche nach Fabricius in Fockkäfer, in eigentliche Vockkäfer, in Fauerkäfer und in Fangerböcke (Prionus, Ceramb. Lania et Klugium Fab.) zerfallen, endlich die Schwärter, gar sehr auffuchen. Der Saft von grünen und von halbwelken Birnschnigen, von Carexten und Munkelkräben, könnte bey nahe zu einer Bitterung oder einem Vockhaerde dienen.

c) Man will auch der Scorpionfliege (Panor-

pa) nicht mehr als zwey zugesehen. Sie gehört zu den Synistatin.

dienen. Ein Beyspiel davon steht in *Scriba Journal für Liebhaber der Entomologie*, 1. B. 3. Stück S. 239 angeführt. Die meisten Käfer und viele Schmetterlinge, z. B. die Seidenraupen-Phalänen, nehmen niemals Nahrung zu sich, und die es thun, saugen nur etwas Blumenast, und sind nur mit der Sorge beschäftigt, sich fortzupflanzen und ihre Art zu erhalten. Daher können viele fast vier Wochen lang ohne Nahrung leben, wenn sie den Zeugungstrieb noch nicht befriedigt haben. Setzt man einem Schmetterlinge nachher etwas hartes, als Zucker vor, so läßt er eine Feuchtigkeit darauf fallen, und erweicht ihn damit, um ihn genießen zu können. Doch giebt es Raubinsekten, die von kleinern leben, als unter den Coleopteris der Fingerkäfer (*Scarites*), Laufkäfer (*Carabus*) und Cicindele (*Cicindela*), der Todtengräber (*Nicrophorus F. Silpha L.*), die braune Astersfliege *d*) (*Cantharis fusca*), und Marienkäfer (*Coccinella*). Unter den Nicht-Käfern gehören hierher: die Bootwanze (*notonecta*), der Wasserscorpion (*nepa*), die Wasserjungfer (*libellula*), die Florsfliege (*hemerobius*), der Raupentödder (*ichneumon*), die Bastardwespe (*sphex*), die Goldwespe (*chryseis*), die Ameise und die Raubfliege (*asilus*).

Drittes Kapitel.

II. Der Rumpf oder Vorderleib (*truncus*).

Dieser ist dasjenige bepanzerte Stück, welches zwischen dem Kopf und Hinterleib liegt. Die obere Seite heißt der Ober Rücken (Rumpfrücken, Bruststück), und ist der thorax im weitläufigen Verstand, so daß er den eigentlichen thorax oder das Halschild, nebst dem Rumpfrücken zugleich andeutet. Die untere, diesem gerade entgegengesetzte Seite, ist die Brust; und da, wo die Flügel eingelenkt sind, die Seiten. Der Rumpf ist seiner Figur nach eiförmig oder mehr cylindrisch, an beyden Seiten etwas zusammengedrückt, oder von oben nach unten und am Vordertheil mehr oder weniger ausgeschnitten, auch bisweilen fast ganz kugelförmig, zuweilen viereckigt oder noch anders gestaltet. Bey manchen Arten hat er einen Rand mit einer Einsassung, und oft ist er mit dem Hinterleibe nur durch einen dünnen, wie ein Stiel gestalteter Theil verbunden, z. B. bey den Wespen und Asterswespen

d) Diese wächst vorzüglich auf schädlichen Rau-

pen, so wie die Marienkäfer-Larven und die Florsfliege eigentlich auf Blattläusen.

wespen und ihren Gattungsverwandten. Dieser Kumpf oder Vorderleib ist immer kürzer, als der Hinterleib, und bey allen Insekten, wenn der Hals nicht mitgerechnet wird, zweythellig, wenn man ihn aber dazu rechnet, d. i. er besteht aus drey Theilen, welche sehr genau zusammen schließen, die aber vermittelst häutiger Hälse sich auseinander ziehen lassen. Eine Abbildung davon ist in *Pezold's lepidopterologischen Anfangsgründen* 1796, Seite 36 Tab. 1. Fig. 1 — 4. Das erste ist der ordentliche Hals, der vom Halschild (thorax), den einige das Brustschild nennen, bedeckt ist. Dieser ist bey den Käfern in Gestalt und Größe verschieden. Er ist gewölbt oder flach, eben oder uneben, erund oder viereckicht, hat zugrundete oder zurückgeschlagene Seiten, ist unbewehrt, oder mit Dornen oder Beulen bewaffnet, ist größer oder kleiner als der Kropf und die Deckschilde. Er sitzt zwischen dem Kopf und der Wurzel der Deckschilde, und aus seiner Unterseite entspringen die beyden Vorderbeine. Das zweyte ist das größte Kumpfstück und das dritte das kleinste. Beide heißen zusammen der eigentliche Ober Rücken oder Kumpf. Illiger schlägt den Namen, Schulterblätter vor, weil ihn eine Furche in zwey Längsheile theilt. Er liegt zwischen dem Halschild und der obern Wurzel des Hinterleibes, und wird von den Deckschilden (Flügeldecken), und bey einigen von den Vorderflügeln bedeckt. Auf dem zweyten Kumpfstück ruht bey den Käfern das Rückenschild (Schildchen, scutellum), nämlich gleich hinter dem Halschild, und sitzt zwischen der innern Wurzel der beyden Flügeldecken, an dem vordern Ende der Naht. Es ist größer oder kleiner, länger oder kürzer. Zuweilen ist es sehr klein und kaum sichtbar; zuweilen fehlt es gänzlich. Gewöhnlich ist es dreyeckicht, nicht selten gleicht es der Hälfte eines Eyrundes. An die Unterseite des zweyten Kumpfstückes sind die beyden mittlern Beine angegliedert, wie auch die zwey Flügeldecken, oder bey den Schmetterlingen die zwey Vorderflügel mit einer an der Wurzel darüber liegenden Lamelle. An das dritte, kleinste Kumpfstück (welches *Pezold* den Zwischenring nennt,) auf der Unterseite sind bey den Käfern die zwey verborgenen Flügel, und bey den Schmetterlingen die zwey Hinterflügel, und zugleich das dritte Paar Beine angeschlossen.

Die eben genannte Unterseite (Unterfläche) des zweyten und des dritten Kumpfstückes, oder, wie gesagt, des eigentlichen Kumpfs, heißt die Brust. Sie ist also der ganze untere Raum vom Halschild an bis zur Wurzel des Bauchs. Sie liegt dem Kumpfrücken gegenüber, und wird von einigen Schriftstellern entweder mit dem Bauch, oder auch mit der Unterseite des Halschildes verwechselt.

Der Längsraum, der sich zwischen den vier Hinterbeinen auf der Brust befindet, heißt das Brustbein (sternum). Es tritt bey den Käfern zuweilen sehr lang nach vornen, in Gestalt eines zugespitzten oder zugerundeten Horns heraus, wie man bey einigen Marktäfern, einigen Pracht- und Metalkäfern bemerkt; nach hinten endigt es sich zuweilen in eine lange, gerade, starke, scharfe Spitze, wie man bey mehreren Schwimmtäfern wahrnimmt.

Bei den Käfern und andern Insekten ist der Hals deutlicher und abgesonderter, als bey den Schmetterlingen. An manchen ist er zwar abgesondert, aber doch vest an den folgenden Theil angeschlossen, an verschiedenen nur durch eine Naht oder als ein Wulst sichtbar.

Im Vorbengehen gesagt, so ist dieser dreentheilige Rumpf nichts anders als die drey ersten Ringe der Larven und Raupen, an welchen die drey Paar Brustfüße stehen.

Viertes Kapitel.

III. Der Hinterleib (Unterleib, abdomen).

Dieser ist unmittelbar an den Zwischenring angegliedert, läuft bey vielen Gattungen mit dem Rumpf in eins fort, und ist ebenfalls verschiedener Gestalt. Bey einigen Arten ist er cylindrisch, bey andern eiförmig oder sichelförmig, bey manchen flach und zusammengedrückt, bey den Schmetterlingen aber ziemlich gefondert, meist kegelförmig, oft an den Seiten, oder auch von oben nach unten zusammengedrückt, und bey allen, auch den Käfern, aus verschiedenen Ringen zusammengesetzt, die sich etwas in einander schieben lassen, und die gegen den After meist an Größe etwas abnehmen. An den Käfern findet man ihrer fünf bis sechs, an den Tagfaltern sechs, an den Schwärmern sechs bis sieben.

Eigentlich sind es nur halbe Ringe oder Abschnitte, die auf der Oberseite einen etwas größern Bogen beschreiben, und die mit denen auf der Unterseite an beyden Seiten, wo die Luftlöcher stehen, zusammengefügt sind.

Der Hinterleib ist immer länger als die Brust: sein oberer Theil heißt der Rücken (tergum, Bauchrücken, dorsum ventris), der untere der Bauch selbst. Dieser ist unten unbedeckt, oben von den Flügeln und Flügeldecken geschützt, weil solche den Rumpf und den Hinterleib gewöhnlich zugleich bedecken. Bey den Schmetterlingen ist der Hinterleib mit Haaren stark besetzt, und von vielerley Farben, am meisten von allen Schattirungen des Grauen. Bey den Käfern ist er unten am Bauch hart, hornartig und gewölbt, oben auf dem Hinterrücken weich, platt, oder ausgehöhlt. Das Ende oder der letzte Ring des Hinterleibes heißt die Spitze (apex), die bald zugrundet, bald zugespitzt, bald zusammengedrückt, bey den Schmetterlingen bald haarig, bald glatt, bald geschwänzt u. s. w. Weil dieselbe am Ende offen ist, um dem Auswurfe und den Zeugungstheilen einen Ausgang zu lassen, so heißt sie auch der After, und besteht in einer cylindrischen fleischigen Röhre, in der Nähe der Zeugungstheile.

Auf jeder Seite eines jeden Bauchrings steht eine runde unmerkliche Oeffnung, die man Luftloch (stigma, schicklicher spiraculum) nennt. Durch solche Oeffnungen der Luft- und Lungenröhren nach außen, holt das Thier Athem, indem überhaupt kein Insekt durch

durch den Mund athmet. Sie haben Klappen und liegen mit der Naht, welche das Bruststück mit dem Bauch verbindet, in gleicher Linie. Es finden sich am Hinterleib zum Aus- und Einathmen gerade doppelt so viel Lustlöcher als Ringe, d. i. zehn bis vierzehn. Wenn man dieselben mit Oel oder andern, dem äußern Eindringen der Luft hinderlichem Fette, bestreicht, so stirbt das Insekt.

Die Zeugungsorglieder finden sich nicht durchaus gleich bey allen Insekten. Außerlich findet man am Bauchende des männlichen Schmetterlings zwey löffelförmige Stücke, darin das Zeugungsglied steckt. Das weibliche ist eine mit einer besondern Decke bedeckte Spalte von mondformiger Gestalt. Malpighi, Reaumur, Swammerdam, Degeer, wie auch Müller in der ausführlichen Erklärung des Linneischen Natursystems 5. Band S. 555, und Schmiedlein in der Einleitung zur Kenntniß der Insektenlehre S. 126 Tab. 1. Fig. 5. 6. haben gute Veyrträge geliefert, wie auch Pexold am angeführten Orte S. 74 vom Sphinx stellatarum. Von verschiedenen andern Insekten, vorzüglich vom Floh hat Rösel im 2. Band, von den Rücken und Schnaken, Tab. 2—4. das Nöthige mit Vergrößerung abgebildet und beschrieben. — Von den männlichen Spinnen geben die hakenförmigen Anhänge der Füße den Unterschied des Geschlechts an.

Fünftes Kapitel.

IV. Die übrigen Glieder, die an den Rumpf angefügt sind.

Dies sind die Flügel, die Flügeldecken, die Beine und der Schwanz.

Der Flügel sind bey der ersten und zweyten Ordnung der Insekten, nämlich den Käfern und den Halbflüglern, zwey. Sie sind häutig, mit Adern durchflochten, in einander geschlagen, oder auch zuweilen nur ganz einfach kreuzweis über einander gelegt. An ihrer Stelle ist zuweilen nur ein Flügelstumpf oder Flügelansatz vorhanden; zuweilen fehlt auch dieser. Sie werden von zwey Scheiden bedeckt, die man Flügeldecken (Decken, Deckflügel) nennt. Sie sind in einander geschlagen, wenn sie länger sind, als die Decken, oder nur kreuzweise über einander gelegt, wenn sie diese nicht an Länge übertreffen. Manche Käfer, z. B. ein Theil der Laufkäfer, sind ohne eigentliche Flügel.

Die Flügeldecken der ersten Ordnung stoßen in einer geraden Linie aneinander, welches man die Naht nennt. Sie haben die Härte des Horns; ja oft sind sie noch viel härter,

härter, oft aber auch weicher und pergamentartig. Auf der obern Seite sind sie gewölbt, auf der untern ausgehöhlt. Bey den Arten, welche unter ihren Decken keine Flügel haben, sind sie in der That mit einander verbunden, und bilden ein einziges Stück. Sie bedecken nicht nur den Brustücken, sondern auch den Bauchücken, und zwar entweder nur auf der Oberseite, oder sie umfassen ihn von allen Seiten. Zuweilen aber sind sie so kurz, daß sie nur einen Theil desselben bedecken. Man findet bewegliche, abgestumpfte, dornichte, sägeförmige, rauhe, gestreifte, gefurchte und punktirte Decken.

Die halben Flügeldecken bey der zweyten Ordnung, sind das Mittel zwischen Flügel und Flügeldecken.

Die meisten Insekten haben vier Flügel, nämlich die 3te, 4te und 5te Liniense Ordnung. Die häutigen Flügel der Schmetterlinge sind mit Schuppen oder Federstaub versehen, zwischen welchen die Flügelnerven liegen. Sie sind von allerlei Gestalt und Umriss. Nach ihren übrigen Eigenschaften sind sie ebene, gefaltete, in die Höhe gerichtete, zusammengeschlagene, abhängende, zurückgeschlagene, aufliegende, gezahnte, geschwänzte, neßförmige, mit Flecken, Binden, Streifen, Linien, Punkten, bemahlte, mit Narben (Merenmakeln, stigmata) bezeichnete und mit Ocellen gezierte.

Die 6te Ordnung hat zwey Flügel, aber dabey noch zwey Flügelcolben, die auch Schwingcolben, Balancierstäbchen, Halteres, heißen, und die zur Erhaltung des Gleichgewichts im Flug dienen.

Die 7te Ordnung hat gar keine Flügel.

Die Beine, welche dem Insekt nicht blos zum Laufen und Springen, sondern auch zum Graben, zum Schwimmen, und zur Lenkung seines Körpers im Flug dienen, sind wenigstens sechs, zwey Vorder- zwey Mittel- und zwey Hinterbeine. Jedes bestehet aus mehreren durch Gelenke an einander gefügten Stücken. Das erste kurze und ziemlich dicke Stück, hat den Namen Hüfte (coxa) erhalten; das zweyte heißt Schenkel, das folgende Schienbein (tibia), und die dann zuletzt folgenden Glieder, werden zusammen Fuß oder Fußglieder genannt. Einige Naturforscher vereinigen die Hüfte und Schenkel, und betrachten sie als ein Stück. Die Schenkel sind bald lang, bald kurz, verdickt, glatt, gedornet, gezahnt, bennabe walzenförmig, an der Wurzel sehr dünn. Das Schienbein ist gewöhnlich lang und ziemlich walzenförmig; zuweilen ist es etwas flach gedrückt, gezähnel, stark gezahnt oder gedornet. Die Fußglieder (Fußblätter, Fußsohlen, tarsi, oder eigentliche Füße) der sechs Beine sind aus drey, vier oder fünf Gliedern zusammengefest; zuweilen haben die vier Vorderbeine fünf, die beyden Hinterbeine vier Glieder. Sie endigen sich bey den Käfern in zwey hakenförmig gekrümmte, ziemlich starke und harte Klauen, unter welchen nicht selten zwey Aftersklauen stehen. Statt der Klauen führen andere Insekten Fäsern oder schwammichte Kissen, womit sie sich an den glattesten Dingen anhalten und darauf gehen können. Das, was an der Hüfte mancher Käfer, als der Laufkäfer, Sandkäfer u. s. w. hängt, heißt der Anhang, trochanter. Man muß übrigens die Klauen zu der Zahl der Fußglieder nicht mitzählen. Viele Ohnflügler (Aptera L.) haben mehr als sechs Beine, nämlich die Milben, Spinnen, Afterspinnen und Scorpionen acht, die

die Krebse, Krebsähnlichen Affeln und Affelwürmer, zehn, zwölf, sechszehn, achtzehn, ja hundert und drüber.

Die Stelle oder der Sitz der Füße ist oben schon berührt.

Von den Schmetterlingen, deren Beine behaart sind, giebt es Tagfalter, deren beyden ersten Füße (die Püppförschen) zum Gehen nicht geschikt sind, weil ihnen oft die Fußglieder und die Krallen fehlen.

Der Schwanz, welcher aber nicht bey allen Ordnungen gefunden wird, ist bald einfach, bald zusammengesetzt, auch bey vielen Gattungen mit Vorsteln, oder mit einer Gabel, Zange, Scheere oder Stachel versehen.

Des Stachels, der den Käfern und Schmetterlingen mangelt, und der fünften Ordnung eigen ist, bedienen sich die damit versehenen Thierchen nicht nur zu ihrer Vertheidigung, sondern auch, um Löcher in die Bäume, Pflanzen, Häute der Thiere und in andere Körper zu bohren, damit sie ihre Eyer hinein legen können, wozu die Weibchen einen Legestachel erhalten haben.

Sechstes Kapitel.

Etwas von den innern Theilen.

Was die innern Theile betrifft, welche man im Kopfe, in dem Vorder- und Hinterleibe findet, so ist oben schon bemerkt worden, daß den Insekten das Gehirn nicht abgesprochen werden kann, nach Linnæus, dem großen Zergliederer. Das Herz, von Malpighi die große Pulsader genannt, ist meistens eine lange Röhre, welche mit den übrigen Gefäßen des Körpers zusammenhängt, und durch eine wellenförmige Bewegung den weißlichen Saft, welcher das Blut der Insekten ausmacht, in alle Theile des Körpers verbreitet. Der Magen und die Gedärme bilden im Hinterleibe ebenfalls nur eine einzige lange Röhre, die aber nicht überall gleiche Weite hat.

Siebentes Kapitel.

Von der Verwandlung und Fortpflanzung der Insekten.

Man findet, daß die Weibchen wegen des Eyerstocks einen dickern Hinterleib, aber nicht so große Fühlhörner haben, als die Männchen. Man findet auch Insekten, die beyde Geschlechter (sexus) zugleich haben, und endlich solche, die geschlechtslos sind, z. B. unter den Bienen, Ameisen und Termiten. Die Verwandlung ist mit Einschluß des vollkommenen Standes, vierfach, als Ey, Larve, Puppe und vollständig Insekt e). Sie ist bey den Käfern, Schmetterlingen und Fliegen, in die Augen fallender, als bey denen, deren Larven und Puppen gleichsam uneigentliche Larven und Puppen sind, z. B. Spinnen; Heuschrecken u. s. w.

Das Ey, deren manche Schmetterlinge f) vier hundert, die Bienenkönigin in acht bis zehn Wochen, dreßsig bis vierzig tausend, die Ameisenkönigin in sieben bis acht Monaten, sieben bis acht tausend legen, wird nicht von diesen Thierchen, sondern blos von der Luftwärme ausgebrütet. Fast alle Insekten legen ihre an Farbe, Gestalt und Härte verschiedene Eyer, wenig Tage nach ihrer Begattung, nur an solche Stellen, wo die entweder in acht Tagen, oder spätestens in sechs bis acht Monaten auskriechenden Jungen (Larven) gleich eine schickliche Nahrung finden. Einige Käfer legen die Eyer auf Bäume und Pflanzen, als die Chrysomelen, Erdstichkäfer und Marienkäfer; die Speckkäfer und die Knollkäfer (byrrhus L. seu anthrenus Fab.) auf thierische Körper, Mehl und Holzwerk; die Todtengräber (necrophorus F.) und andere Naskäfer (silpha F.) und Raubkäfer, legen sie in faulem Nas nieder: die Pilzkäfer oder Herzkäfer (diaperis F.), Strandschlüpfer (paederus F.), Dreyknospenkäfer (tritoma F.) vertrauen sie den Pilzen an. Die Saamenkäfer (bruchus L. et F.), die Rüsselkäfer (curculio L. F.), Laubkäfer (melolontha F.), Metallkäfer (cetonia F.), Reizkäfer (mylabris F.), und Pflasterkäfer (lytta F. meloë L.) wählen die Erde. Die Mist- und Puppenkäfer (scarab. et copris F.), die meisten Raubkäfer und die Halbfugelskäfer (sphaeridium F.) legen sie in den Mist und in faulende Gewächse. Die Bockkäfer (cerambyx L. F.), Schmalbockkäfer (leptura L. F.), Schröter (lucanus), Prachtkäfer (buprestis) und Springkäfer (elater), legen sie ins Holz selbst, wovon sich auch die Larve nährt. Die Schwimmkäfer (hydrophilus F.) und Wasserkäfer (dytiscus L. F.), lassen ihre Eyer in ein stehendes oder sanft

e) Doch da das vollendete Insekt keiner weitem Verwandlung unterworfen ist: so sind zwar vier Stände oder Stufen, aber nur drey Verwandlungen.

f) Clerf in araneis Sueciae pag. 5 eignet manchen Spinnen an die tausend Eyer, der Phalaena Cossus über tausend, und der Ph. Caia auf 1600 zu, welches übertrieben ist.

sauft fließendes Wasser fallen. Die Mehlkäfer (*tenebrio molitor* L.) legen sie in Weizen- oder Kornmehl, die Wienerkäfer (*attelebus apiarius* L. *trichodes apiarius* Fab.) g), in die Rester der Mauerbiene; die Schmetterlinge an die Zweige der Bäume, Gewächse, Gräser, oder an Pelz re.; die Syrphenfliegen an Kohlgewächse. Die Bremsen (*oestrus*), die man nicht mit der Brems (*tabanus*) confundiren muß, lassen sie auf die Haut der Thiere, als des Wildpreys, des Hindviehes, der Schafe re. bald ans Ende des Mastdarms, bald in die Nasenlöcher fallen, da sich dann das steinharte und mit eignen Haken versehene Ei von selbst anklammert, und wenn es durch Wärme und Feuchtigkeit ausgebrütet worden, die Larve sich endlich in die Haut einfrisst, so daß die äußere Haut Beulen bekommt, worin auch die Verpuppung geschieht. Die Schafsbremsenlarve kriecht von den Nasenlöchern der Schafe in die Höhle des Stirnbeins. Die Menschenbremsenlarve (*oestrus hominis* Modeeri) kommt in die Haut des Unterleibs der nackend gehenden Südamerikaner. Die Bremsenlarven haben den gemeinschaftlichen Namen der Engerlinge, den auch die Larven der gemeinen Maykäfer mißbräuchlich führen.

Die Schmeißfliegen (*musca carnaria*) suchen zur Eyerlage nicht sowohl das ganz frische, sondern das faulende Fleisch auf, weil es zarter ist. Die Brechfliegen (*musca vomitoria* L.) legen ihre Eier nicht nur, wie mehrere Fliegenarten, auf Cadavers, sondern sogar an die Körper lebendiger Blindschleichen h).

Die Spinnen schließen ihre Eier in seidene Säcke oder Futterale ein, oder umspinnen sie locker. Findet man zuweilen eine einzelne Spinne über den Eiern, so ist das kein Ausbrüten, sondern eine Vorsorge für ihre Nachkommen.

Einige Insekten machen eine Ausnahme, und gebären lebendige Junge, z. B. ein Theil der Blattläuse, welche überhaupt deshalb merkwürdig sind, weil durch eine einzige Begattung mehrere Generationen befruchtet werden.

Die Larven (Raupen bey Schmetterlingen) gleichen Würmern, sind saftreicher und weicher als das vollkommene Insekt, ungeflügelt, unfruchtbar, zwölffringig (weil man bey den Schmetterlingen die Schwanzklappe für den zwölften Ring ansieht), langsam, theils unfräßig, theils vielfräßig, mit achtzehn Spiegelpunkten oder Lufelöchern, desgleichen mit Rinnbacken oder Zangengebiss versehen, dessen sie sich bey ihrem Fraß bedienen. Denn nur in dem Larvenstand wächst jedes Insekt i). Ihre Nahrung finden sie an und in Thie-

g) *Trichodes apiarius* F. hieß in Fab. Entomol. system. *clerus apiarius*, ist aber in dessen syst. eleutheratorum 1800, von den *cleris* gesondert und zu der neuerrichteten Gattung *trichodes* gezogen worden. Dergleichen neue Gattungen (*genera*) hat Fabric. mehrere im angeführten neuesten Werke errichtet.

h) Welches ich 1802 im Jul. dadurch innen ward, daß aus der Haut einer solchen, mit

nach Hause genommenen Blindschleiche den dritten Tag über hundert dergleichen Larven heraustreten, nachdem sie das Thierchen ausgehöhlt hatten. Worauf sie dann in die Erde krochen, und vierzehn Tage darauf sich enthielten.

C.

i) Die sogenannten uneigentlichen Puppen laufen und wachsen auch. Davon unten.

Thieren, in Fleisch, Honig, Käse; in Mist; in Körnern, Hülsen, Mehl, Pelzwerk, in Laub, Holz und Wurzeln. Wovon auch noch unten, bey Anzeige des Schadens, der von Insekten kommt, manches vorkommen wird. Dies gilt aber nur von ihren Larven. Denn die meisten Käser und Schmetterlinge im vollkommenen Stande leben nicht von Körnern, Hülsen, Pelzwerk, Mehl oder Laub, sondern bleiben fast nahrunglos, oder saugen nur Blumenast. Hingegen leben, wie schon oben bey Erklärung der Mundtheile angeführt worden, folgende Käseergattungen: Die Fingerkäse (Scarites F.), die Lauskäse (Carabus L. F.), die Sandkäse (Cicindela L. F.), und sehr viele aus andern Ordnungen sowohl im Larven- als vollendeten Stand, vom Raube, und würgen andere Insekten. So leben auch die Spinnen in den dreyn Ständen von Fliegen, kleine Schmetterlingen und sogar kleinen Spinnen. Einige Minier-Kaupen unter den Mottenphalänen, und einige Minierer unter den Nüsselkäsechen leben zwischen den zwey Blatthäuten.

Man spricht ihnen die Augen ab, obgleich Lyonnet, Kleemann, Degeer, Nöf sel und Schäfer die sechs schwarzen durchsichtigen Körner, die an jeder Seite des Kaupenkopfs stehen, für Augen gehalten. Schade, daß sich diese vermeinten Augen nach überstandener Häutung verlieren, oder doch bedeckt sind. Die Spinnwarze der Raupe liegt unter dem Kopfe. Den Raupen der Linneischen Pap. equitum, und der Gabelschwanzraupe (phal. Pomb. Vinula L.) sitzt ein zweyarmig Fühlwerkzeug (duo tentacula) am Kopf, das sich aus- und einschiebt, und nicht sowohl zur Vertheidigung, als vielmehr zur Absonderung bestimmt scheint, z. B. bey dem Fenchelsalter, Pap. Machaon L. F.

Die Schmetterlingsraupen haben nie mehr als sechzehn, und nie weniger als acht Füße, worunter immer sechs Brustfüße sind. Einige derselben leben gesellig und in Menge beisammen, z. B. die Processionsraupe, die vom Weißdornsalter ic. Einige sind Sackträger, als eine gewisse Mottenfamilie Phalaenae tineae bombycifomes Viennensium, die in einem Futteral oder Säckchen wohnen, das sie immer mit sich fortschleppen. Der langhändigen Chrysomele (Chrysom. longimana L.) eignet Johann Gottfried Hübner zu Halle, in Friesly Archiv, ebenfalls eine Sackträgerlarve zu. Sehr artig sind die aus allerley Materialien, Sand, Muscheln, Holz und Stroh verfertigten, röhrenförmigen Gehäuse, die sich die Larven der Stinkfliegen (Wassereulen, Wasserschmetterlinge (Phryganeae L.) bauen und bewohnen.

Der innere Bau des Raupenkörpers enthält eine weiche, unförmliche und gelbe Materie, die außer dem Eingeweidesack, den Seitenbehältnissen, den Luftröhren, dem Gehirn und Rückenmark, den ganzen Körper ausfüllt, nämlich den Fettkörper. Lyonnet in seinem Traité anatomique etc., einer Schrift, die ihn verewigt hat, zählt in der Raupe der Cossus-Phaläne, außer den Nerven, Luftröhren und andern Gefäßen, zusammen viertausend und ein und sechzig Muskeln.

Die meisten Insekten und auch die Käse, haben theils unfüßige, theils sechsfüßige Larven mit zwölf bis dreizehn Ringen, manche mit sehr kurzen Antennen. Die Blattwespenlarven sind unter den sogenannten eigentlichen Larven die einzigen, die mehr Füße, als

als die Schmetterlingsraupen haben, nämlich zwanzig bis zwei und zwanzig. Bösel nennt sie Afterraupen. Unter den Käferlarven scheinen die Rüffel- und die Beckkäfer die einzigen unfüßigen zu seyn.

Alle Insekten wachsen nur in ihrem Larvenstande, und haben darin eine weit längere Dauer, als in ihrem vierten Stande. Und die Larve ist weit länger, als das ausgebildete Insekt. Ihre Häutung geschieht also: Die Haut spaltet sich nach der Länge auf dem Rücken; die Larve geht nach und nach aus der Hülle hervor, indem sie einen Theil des Körpers nach dem andern losmacht. Sie bereitet sich zu diesem Geschäfte durch ein länger oder kürzer währendes Enthalten der Nahrung vor, und sie nimmt nur erst einige Zeit nach der Beendigung desselben Speise zu sich. Nach drey- oder vier- (oft mehr) zuweilen gar achtmaliger Häutung, woben sie sogar die Kopfhaut mit abstreifen, sind sie ausgewachsen, und treten, nachdem ihr Larvenstand entweder wenig Wochen, als bey den Tagfaltern und bey den auf Pflanzenblättern lebenden Käfern, den Chrysomelen und Furchkäfern, oder ein bis drey Jahre, nämlich bey den Käfern, die sich von Wurzeln oder Holz nähren, dem Maykäfer, dem Hirschschräder ^{k)} gedauert hat, in den Puppenstand, darin sie sich bald gar nicht, bald mehr bewegen. —

Die Erziehung der Käferlarven ist müßlicher als die der Schmetterlingsraupen, weil die in Cadavers, im Dünger und in der Erde lebenden, gar nicht fortzubringen sind. Und von den Holzfreßenden, denen man Korn- oder Weizenmehl dafür reicht, mißlinge die Verpuppung zwar nicht, desto gewisser aber die Enthüllung oder der Uebergang in den vollendeten Stand, welches leider auch der Fall bey vielen Phalänen, zumal der Spannerphalänen (*Phal. geometra* L. *Phalaena* F.) ist.

Die Puppen (Chrysaliden) sind zusammengezogen, theils mit einer Schale bedeckt, theils nackt, mit oder ohne Füße. Linné hat von den Puppen fünf Abtheilungen gemacht. Die schon im Larven- und Puppenstand mit Füßen versehenen, sind:

- 1) entweder Spinnen, Milben und Asseln, die sich in den drey letzten Ständen oder Stufen fast ganz gleichen, nur in der Größe nicht. Diese häuten sich mehrmals als Larven.
- 2) oder Heuschrecken, Cicaden, Wanzen, Libellen, Haspe, deren drey Stände sich ebenfalls ziemlich ähneln, nur daß sie statt der Flügel blos Flügelansätze haben und sich häuten, so daß deren letzte Häutung den Puppenstand vorstellt und ausmacht. Diese beyden Abtheilungen, deren Puppen umhergehen und Nahrung suchen, könnte man die uneigentlichen Larven und Puppen, und die folgende dritte, vierte und fünfte, die eigentlichen Larven und Puppen, nennen.

3) oder

^{k)} Man findet in *Scriba Journal* I. 3. S. 222, Erfahrungen angeführt, wo *Phal.* Puppen sich sogar im dritten und vierten

Jahr erst ausbildeten. Welche Ausnahmen und Abweichungen von der Regel!

- 3) oder Käfer, Vienen, Ameisen, Bachmücken (*tipula*) und Floh, durch deren Puppenhaut man alle die äußern Theile des vollkommenen Insekts erkennt. Ihre Puppen bleiben unbeweglich liegen.
- 4) Hingegen die fußlosen und schallichten Puppen sind theils solche, an denen man das Bruststück und den Hinterleib unterscheiden kann, bald mit, bald ohne Cocon, als diejenigen der Schmetterlinge.
- 5) theils eyrunde, zusammengezegene, ohne äußeres Merkmal der Körpertheile, als diejenigen der Fliegen und Bremsen.

Die Vielfüße (*Julus*) schliefen nur mit sechs Füßen aus dem Ey.

Viele nackte Puppen bleiben am Afters befestigt auf einer Pflanze, oder in einem andern Körper, z. B. die Marienkäfer. — Viele aber spinnen sich ein, das ist, sie verfertigen sich, vermittelst einer klebrichten Materie, die in ihrem Körper erzeugt wird, sehr künstliche, weiche oder auch harte Gehäuse, worin sie sich ohne Speise und Trank, wie alle Puppen von der Urtheilung drey bis fünf, so lange aufhalten, bis ihr Körper die gehörige Vollkommenheit hat, oder, welches einerley ist, bis ihre Enthüllungszeit gekommen ist, als die Mantkäfer, die Spinnenphalänen (*Bombyx* F.). Alsdann zerreißen sie ihre Verwandlungshülse und kommen als geflügelte Thiere oder als vollendete Insekten zum Vorschein, in welchem Zustande sie erst ordentlich zur Fortpflanzung geschickt sind 1).

In allen kalten und gemäßigten Erdstrichen, überwintern die Insekten entweder als Ey, oder als Larve, oder als Puppe, und ihr Leben dauert kurze Zeit, nämlich bey den Männchen bis nach der Begattung, und bey den Weibchen bis nach dem Eyerlegen, die Vienenkönigin und einige andere ausgenommen. Da nun aber ein Theil im spätern Herbst sich erst ausgebildet hat, ohne sich begatten zu können; so überleben solche den Winter, um sich sodann im Frühjahr zu paaren.

Die Hafte, (*Ephemeren*, Tagfliegen, Eintagthierchen, Stundenthierchen, *Ufercaas*), deren Leben halbe Tage, ein bis zwey Tage, bey gewissen Arten davon aber nur wenig Stunden dauert, haben im Larvenstande schon Jahr und Tag gelebt.

Die Vermehrung der Insekten ist nicht in allen Gattungen gleich. Sie ist unermesslich in den Gattungen der Mantkäfer, Lauffkäfer, Speckkäfer, Pflasterkäfer (*Lytta* F. *Meloë* L.), Reizkäfer, (*Mylabris* F. *Meloë* L.) Chrysomelen, Erdflohkäfer, Marienkäfer, Schmetterlinge, Hafte, Fliegen, Mücken. Sie ist weit geringer in andern Gattungen, nämlich die Prachtkäfer, Springkäfer, Bochkäfer, Halbedekäfer, Immenkäfer.

1) Die entlarvten Schmetterlinge, und zwar die Tagvögel geben einen meist röthlichen, die Phalänen aber einen weißlichen Saft von sich, der in einer besondern Blase des Leibes, die mit dem Afters Gemeinschaft hat, enthal-

ten ist, welcher der Reinigungssaft heißt. Es ist außer der Regel, daß sie sich vor Absonderung dieses Safts begatten. Da wo er in Menge gesehen worden, erzeugte sich die Fabel der Alten vom Blutrigen.

Achtes Kapitel.

Noch einige merkwürdige Eigenschaften der Insekten.

Die Insekten sind stumm, außer die Arten, die durch eigene Werkzeuge einen Laut von sich geben. Daß sie aber taub seyn, scheint noch Zweifeln ausgesetzt zu seyn. Daß viele ein zähes Leben haben, davon ist der Umstand ein Beweis, daß ein angespießter Bockkäfer wohl über sechs Wochen lebendig bleibt. Doch ist jedem angehenden Sammler und Liebhaber dieser Geschöpfe die Insektenquälerei sehr abzurathen. Ein Druck unter der Brust des Schmetterlings tödtet denselben geschwind, und in kleinen blechernen Gefäßen aufbewahrte Käfer, werden entweder in eine Ofenröhre, oder auf Kohlen einige Minuten lang gesetzt, oder in Medicingläserchen, worin Aquavit gegossen, gethan, wo sie denn schnell sterben, und hierauf, wenn sie zum Cabinet bestimmt sind, an Nadeln aufgesteckt werden.

Unter den Europäischen Insekten sind, die Scorpione und die Giftkanker ausgenommen, keine giftigen vorhanden. Dren Arten von Giftkanker (*Solpugia Lichtensteinii*), die zu den *Unogatis Fabric.* gehören, sind nebst dem Europäischen Scorpione im südlichen Europa zu Hause. Doktor Meyer zu Göttingen hat zwar sogenannte Gifteinsekten beschrieben. Dieser Ausdruck muß aber in einem ziemlich weitläufigen Sinne genommen werden. Denn er zeigt weiter nichts an, als daß Insekt etwas schädliches bey sich führe, wofür man sich hüten müsse. D. Meyer trieb die Sache zu weit. Selbst die Spinne hat, wenn man ja ihren ägenden Saft mit einem Gift vergleichen will, kein Magengift, sondern nur ein Wundgift. Und die Raupen der *Phal. bombyx Pityocampa* und der *processionea L.*, die die Alten für giftig hielten, verursachen äußerlich bloß leichten Geschwulst, der bald wieder vergeht.

Neuntes Kapitel.

Von der Anzahl und der systematischen Einteilung der Insekten.

Um nicht von den Individuen zu reden, so ist schon die Anzahl der Arten äußerst beträchtlich. Linne zählte freylich nicht mehr als 2904 Arten: Das war aber wohl kaum der fünfte

fünfte Theil. In der *Entomologia systematica* Fab. 1792—94, befinden sich 3458 Eleutherata, 1759 von der 2ten bis 8ten Ordnung, 2319 Glossata, und 1619 von der 10ten und 11ten Ordnung, Summa 9727 Arten. Wozu aber in den Supplementen eine große Menge neu entdeckter gekommen ist. Von allen diesen möchten wohl auf Deutschland mit Einschluß von 1200 Glossaten in allem 4000 Arten kommen. Man kann ihre allgemeine Zahl sicherlich auf funfzehntausend setzen.

Unter den vier großen Europäischen Insekten-Sammlungen sind die Linneische, die Hr. Schmit in London besaß, und die des Hrn. Banks daselbst, durch Staub und Mottenfraß ganz ruiniert. Hingegen sind die des 1802 verstorbenen Hrn. Gerning zu Frankfurt, und die vereinigte Graf Hofmannsegg- und Hellwigsche zu Braunschweig im besten Zustande.

In des Hofrath und Professors Fabricius *Entomologia systemat.* sind eilf, späterhin in den Supplementen dreizehn Ordnungen aufgestellt, die wir hier mit den Linneischen und den in der Einleitung zu Oliviers deutschen Uebersetzung vorkommenden Olivierschen Ordnungen vergleichen wollen. Die Charaktere der Fabricischen Ordnungen sind schon oben bei Beschreibung der Mundtheile angeführt, daher ich auf solche verweise.

- I. Die Eleutherata mit 117 Gattungen. Linnei und Olivier's Coleoptera.
- II. Die Ulonata mit 8 Gattungen. Linnei Hemiptera und alle Olivierschen Geradflügler (Orthoptera) mit Kinnladen und Kinnbacken.
- III. Die Synistata mit 11 Gattungen. Linnei und Olivier's Neuroptera.
- IV. Die Piezata mit 24 Gattungen. Linnei und Oliviers Hymenoptera theils mit, theils ohne einen Rüssel.
- V. Die Odonata mit 3 Gattungen. Die zu den Linneischen und Olivierschen Neuropteris gehörigen Wassernymphen.
- VI. Die Mitosata mit 3 Gattungen. Die zu den Linneischen und Olivierschen Apteris gehörigen Asfchwürmer, Bielsfüße und Asfeln.
- VII. Die Unogata mit 5 Gattungen. Die zu den Apteris des Linné und Olivier's gehörigen Spinnen und Spinnenähnliche.
- VIII. Die Agonata mit 11 Gattungen. Die zu den Linné's und Olivier's Apteris gehörigen Krebse, Krebsähnliche und Riesenfüße *m*).
- IX. Die Glossata mit 15 Gattungen. Linné's und Olivier's Lepidoptera.
- X. Rhyngota mit 22 Gattungen. Die zu den Linneischen Hemipteris gehörigen Cicaden, Wanzen und Conforten; alle Olivierschen Hemiptera.
- XI. Antliata mit 27 Gattungen. Linné's und Olivier's Diptera mit zwey Apteris.

Aber

m) Es ist bereits der Vorschlag geschehen, die Krebse von den Insekten ganz zu trennen,

und aus ihnen eine eigene Thier-Klasse zu formiren.

Über in den Supplement. sind statt der achten Classe Agonata folgende drey neue Ordnungen:

- a) Polygonata mit 5 Gattungen. Die Linneischen Affeln und ähnliche, auch Kiefernfüße.
- b) Cleistagnata mit 14 Gattungen. Die Linneischen Krebse und Krebsähnliche.
- c) Exochmata mit 13 Gattungen. Die Linneischen Krabben und Krabbenähnliche.

Die Ordnungsfolge hat Fabricius mehrentheils von der Uebereinstimmung ihrer Lebensart hergenommen.

Ob nun gleich diese Fabricische Einteilung ohnstreitig viel Vorzüge hat, besonders wenn das ganze System vorgetragen werden soll; so erschwert sie doch, wegen der von den Greifwerkzeugen (den Palpen, Kinnladen und Kinnbacken) hergenommenen Kennzeichen der Gattungen, nicht nur dem Anfänger, sondern auch dem geübten Insektensforscher dieses Studium gar sehr. Und ohnerachtet auch das neue System, das Herr von Clairville in seiner Entomologie Helvetique, Zürich 1798 gr. 8., mit 16 Kupfern aufgestellt hat, der die Insekten in Pterophora, geflügelte, nach sieben Ordnungen, und in Aptera, ungeflügelte, nach zwey Ordnungen eingetheilt hat, wo wie beyhm Linné bey den Gattungen die Kennzeichen von den Antennen hergenommen sind, so daß man zugleich mit auf die Einfügungsart, Gestalt und Gelenkzahl solcher Antennen Rücksicht nimmt, obgleich, sage ich, dies neue Clairvillische System wirklich recht faßlich ist, wenn es nämlich ganz vollendet seyn wird: so wählen wir doch zur Kenntniß der Forstinsekten das beliebte Linneische, um seiner mehreren Faßlichkeit willen.

Der Ritter von Linné hat sieben Ordnungen festgesetzt.

Die 1. Ordnung, mit zwey harten Flügeldecken mit einer ordentlichen Naht, und mit zwey darunter liegenden Flügeln: Panzerflügler (Schaaflügler, coleoptera.)

Die Kennzeichen dieser Ordnung sind von den Antennen, und bey den Gattungen derselben von mehr Theilen hergenommen. Dahin gehören dreyßig Gattungen, in drey Abtheilungen.

Erste Abtheilung. Die keulförmigen Antennen sind auswärts verdickt: Der Kolbenkäfer, Schröter, Speckkäfer, Stuschkäfer, Juckenkäfer, Tauchkäfer, Ackerhalskäfer, Rüsselkäfer, Naskäfer und Marienkäfer (scarabaeus, lucanus, dermestes, histio, byrrhus, gyrinus, attelabus, curculio, silpha et coccinella).

Zweite Abtheilung. Die mit fadenförmigen Fühlhörnern: Muffelkäfer, Schildkäfer, Wehrkäfer, Goldhähnchen, Stachelkäfer, Maywurmkäfer, Wehlkäfer, Leuchtkäfer, Stachelhockkäfer, Raubkäfer (bruchus, cassida, ptilinus, chrysomela, hispa, meloe, tenebrio, lampyrus, mordella, staphylinus).

Dritte Abtheilung. Die mit borstenförmigen Antennen: Vorkäfer, Schmalbock, Ackerfliege, Springkäfer, Sandkäfer, Prachtkäfer, Wasserkäfer, Laufkäfer

Käfer, Fliegenkäfer, Jangenkäfer oder Ohrwurm (*cerambyx*, *leptura*, *cantharis*, *elater*, *cicindela*, *buprestis*, *dytiscus*, *carabus*, *necydalis* und *forficula*).

Die 2. Ordnung, mit halben, d. i. solchen undurchsichtigen Oberflügeln, die theils aus einem harten, theils aus einem weichen Theil bestehen; mit länglichem, gegen die Brust zu umgebogenem Rüssel. Die Larven sehen nicht erst einem Wurm ähnlich, sondern nähern sich dem ausgebildeten Stande. Halbflügler (*hemiptera*). Die Schabe, Fangheuschrecke, Grylle, Laternenträger, Cicade, Vootwanze, Wasserfrosch, Wanze, Blattlaus, Blattsauger, Schildlaus, Blasenfuß (*blatta*, *mantis*, *gryllus*, *fulgora*, *cicada*, *notonecta*, *nepa*, *cimex*, *aphis*, *chermes*, *coccus*, *thrips*).

Die 3. Ordnung, deren vier Flügel mit über einander gelegten Schuppen (griechisch *lepidia*) besetzt sind, und die eine Rollzunge und haarigen Leib haben: Die Staubflügler (Schuppenflügler, *lepidoptera*), nämlich die Falter, Schwärmer, Pfläner (*papilio*, *sphinx*, *phalaena*).

Die 4. Ordnung, mit vier pergamentartigen Flügeln, die aus einem zarten, meist durchsichtigen Häutchen bestehen, mit dicken Adern durchwebt. Der Körper ist lang und dünn, der Schwanz unbewaffnet. Alle räuberischer Art. Die Larve ist dem vollkommenen Insekt bis auf die Flügel so ziemlich ähnlich. Aderflügler (*neuroptera*). Die Wassernymphe, Hant, Phrygane, Glorfliege, Ameisenlöwe, Scorpionfliege, Camelfliege (*libellula*, *ephemera*, *phryganea*, *hemerobius*, *myrmeleon*, *panorpa*, *raphidia*).

Die 5. Ordnung, mit vier häutigen Flügeln, deren Adern nicht so dick sind. Die meisten Weibchen haben einen Stachel am Schwanz zur Eyerlage: Netzflügler (*hymenoptera*). Die Gallwespe, Blattwespe, Holzwespe, Raupentödter, Bastardwespe, Goldwespe, Wespe, Biene, Ameise, Akerbiene (*cynips*, *tenthredo*, *sirex*, *ichneumon*, *sphex*, *chrysis*, *vespa*, *apis*, *formica*, *mutilla*).

Die 6. Ordnung, mit zwei unbedeckten Flügeln und zwei Wagestäbchen, mit einem fleischichten dehnbaren Saugrüssel. Die Augen sind netzförmig. Ihre Larven sind fußlos. Zweiflügler (*diptera*). Die Bremse, Bachmücke, Fliege, Dremse, Schnake, Schnepfenfliege, Stachfliege, Raubfliege, Schwebler, Lausfliege, (*oestrus*, *tipula*, *musca*, *tabanus*, *culex*, *empis*, *conops*, *asilus*, *bombylius*, *hippobosca*).

Die 7. Ordnung, die ungeflügelte. Diese kommen in ihrer eigentlichen Gestalt aus dem Ei, doch häuten sie sich auch; (Ohnflügler (*aptera*)).

Darunter sind a) sechsfüßige: das Schuppenthierchen, der Springschwanz, Termit, Laus, Floh (*lepisina*, *podura*, *termes*, *pediculus*, *pulex*). b) Die von acht bis vierzehn Füßen: die Milbe, Asterspinne, Spinne, Scorpion, Krebs, Kiefenfuß, Affel oder Kellerefel (*acarus*, *phalangium*, *aranea*, *scorpio*, *cancer*, *monoculus*, *oniscus*). c) Die mit vielen Füßen: der Affelwurm und der Vielfuß (*scolopendra*, *iulus*).

Zehntes Kapitel.

Von den Insekten: Schriften.

Von solchen sind, außer den ältern Merianischen und Frischischen, und den neuern eines Reaumur, Geoffroy, Devillers, Ernst, Latreille in Frankreich, des Wilkes, Albin, Drury, Kirby und Jones in England, des Seba, Voet und Sepp in Holland, des Clerk, Degeer, Thunberg und Paykull in Schweden, des Scopoli, Rossi und Cyrilli in Italien, des Sulzers, Schäffers, Bergsträfers, Schneiders, Goeze, Scriba, Hellwigs, Brahms, Illigers, Jakob Sturms und Creutzers in Deutschland, außer jenen sind folgende die Hauptwerke:

A) Abbildungs-Schriftsteller.

Köfel von Rosenhof Insektenbelustigung 1746—1761, kostet seit 1796 bey Raspe zu Nürnberg 36 Rthlr., und auf Holländisch Papier 10 Rthlr. 8 gr. mehr. Die dazu gekommenen Venträge Kleemanns 1762, auf ordinär Papier 10 Rthlr. und auf Holländisch Papier 1 Rthlr. und 16 gr. mehr. Die Schwarzischen Venträge zum Köfel, bey Raspe 4 Rthlr. 8 gr. und auf Holländ. Papier 1 Rthlr. 4 gr. mehr.

Tablonsky, nachher Herbsts Natursystem der bekannten inn- und ausländischen Insekten. Berlin bey Pauli, gr. 8. 1783. Davon die ersten neun Bände mit 183 illuminirten Quart-Kupfertafeln statt 57 Rthlr. um den Prämumerationspreis für 38 Rthlr. 12 gr. angeboten worden. Die Insekten gehen bis auf die Springkäfer. In seinem System sind die Gattungsmerkmale zum Theil schwankend.

Doct. M. Oliviers Entomologie oder Naturgeschichte der Insekten, übersetzt von Carl Illiger. Die Käfer. Braunschweig 1800. 1. Theil, 4. Seine Einteilung nähert sich der Linneischen mehr, als der Fabricischen. Das französische Original kostet in Paris 140 Rthlr. wegen der Kupfer, die der Uebersetzung, deren Fortsetzung gewünscht wird, fehlen n).

Doct. G. W. F. Panzers Initia Faunae Insectorum Germaniae. Nürnberg 1793 — 1799. Das 72ste Heft kam 1799 heraus. Jeder Heft hat 24 Quer-Oktavblätter Text, und eben so viel Kupfertafeln, und kostet 54 Kr. oder im 20 Fl. Fuß 12 gr. Würde 43 Rthlr. 18 Kr. oder in schwerem Gelde 36 Thlr. ausmachen, wenn nicht die Hefte des letzten Jahrgangs, jedes Heft um 18 Kr. erhöht worden wäre. Dem obgeachtet sind sie nicht zu theuer, und doch sehr gut gemalt.

B) Systematiker.

Caroli a Linné, Systema naturae. Editio XII. Holmiae 1766. Drey Tomi gr. 8. 12 Rthlr. im 20 Fl. Fuß. In dem ersten Theil kommen die Insekten vor. Die 13te Edition ist von Gmelin, und hat sich keinen Verfall verschafft.

Von des berühmten Entomologen, Johann Christian Fabricius zu Kiel, von Zeit zu Zeit herausgegebenen entomologischen Werken, sind eigentlich die beyden neuesten am vollständigsten, nämlich dessen Entomologia systematica. IV. Tom. gr. 8. 1792 — 1794. Preis 8 Rthlr. — Die Supplemente 1798 sind noch besonders. Dann Systema Eleutheratorum 1801. gr. 8. S. 506 wird fortgesetzt.

C) Lepidopterologen.

Hierher gehört theils der oben angeführte Rösel, theils vier andere Hauptwerke, wovon das Herbstische und das Hübnersche die besten sind.

- 1) P. Cramers und des Predigers Caspar Stoll Papillons exotiques 1775, in Niederländischer und franz. Sprache. Preis über 100 Thaler.
- 2) Eugenius Johann Christoph Espers Schmetterlinge. 1777 — 1800. gr. 4. Erlangen, fünf Theile. I. Theil, die Europäischen Tagsschmetterlinge nebst den Supplementen, 112 Tafeln. II. Th. die Europ. Schwärmer, mit den Supplementen 46 Taf. III. Th. die Europ. Spinner- und Eulenphalänen 192 Tafeln, doch so, daß weil die letzten 13 Platten der Spinnerphalänen Zahlen führen, die schon da

n) Jakob Sturm in Nürnberg liefert jetzt in eignen Heften auch die Abbildungen dazu.

da gewesen, solcher Tafeln 205 sind. IV. die Europ. Spannerphalänen, wovon nur erst 40 Tafeln heraus sind. V. die exotischen. Rechnet man nun das Heft mit fünf Platten nach dem jetzigen Preise zu 24 Bogen, so kosten die vier ersten Theile 80 Rthlr. in Frankf. Cours. Mehrere Eulenphalänen sind verzeichnet, und die Aufnahme so vieler Abweichungen und Varietäten hat das Werk erweitert.

- 3) Zablonsky, nachher Joh. Fr. Wilhelm Herbsts Natursystem der Schmetterlinge von 1782 an bis 1801. Berlin bey Pauli. Zehn Theile, gr. 8. mit Quartkupfern. Wird um 57 Rthlr. 20 gr. als den Pränumerationspreis gegeben.
- 4) Joh. Jak. Hübners zu Augsburg, Naturgeschichte und Sammlung Europ. Schmetterlinge nach der Natur. 4. 1791—1800. Es sind zwey Werke. Die Naturgeschichte enthält die abgebildeten Raupen. Die Sammlung aber enthält die entlarvten Schmetterlinge von allen Gattungen, und besond 1801 aus 262 ganz vortreflich ausgemalten Kupfertafeln, um den erhöhten Preis von 51 Rthlr. 14 Bg. 4 Kr. Auf den Hübnerschen Platten stehen aber auch mehr Zeichnungen als auf den Espfischen.

Liebhavern, welche kostbare Werke nicht kaufen können, und welchen das Schiffermüllersche Verzeichniß der Schmetterlinge der Wiener Gegend keine Gnüge leistet, von 1776 gr. 4. für 4 Rthlr. 15 Bogen, ist des Hrn. Kammerraths Vorkhausen Naturgeschichte der Europ. Schmetterlinge, 5 Theile, gr. 8. Frankfurt 1788—1794 empfehlungswerth. Darin kann man für 7 Rthlr. 15 Bogen o) alles beschrieben finden, was in den theuersten Werken abgezeichnet vorkommt. Schade, daß Hr. Vorkhausen bey den Spannern stehen geblieben ist, und die kleinern Phalänen noch nicht bearbeitet hat.

Fünftes Kapitel.

Von dem Aufenthalte und der Lebensart der Insekten.

I. Von den Schalflüglern oder Käfern (Coleoptera) halten sich die Schröter auf Bäumen, zumal Eichen, und innerhalb der faulen Stämme oder am Fuß derselben in
der

o) Den Bogen zu 5 Kr. gerechnet.

der Erde, unter Baumstöcken, in Gärten auf Traubenspalieren auf, und schwärmen an heitern Abenden umher p).

Die Kolbenkäfer, Grabkäfer, Dungkäfer, Rothkäfer, Scharrkäfer, Pillenkäfer, Mistkäfer, (*Aethrus*, *geotrupes*, *scarabaeus*, *onitis*, *copris*, *atteleuchus*, *aphodius* in Fab. Eleutherat.), die sonst auch den allgemeinen Namen Kolben- oder Mistkäfer (*scarabaeus* Linnei) führen, leben im thierischen Auswurf, auch in Misthaufen, im Gartendünger und verfaulten Pflanzen. Sie suchen sich bey Beunruhigungen tiefer zu graben, um sich zu retten. Die kleinern Arten fliegen bey heiterm Wetter, zuweilen im Winter selbst, in der Luft herum, am häufigsten aber im Herbst und Frühling bey Garten-Dunghäufen.

Die Arten von Erdstaubkäfer (*trox* Fab.) kriechen gewöhnlich des Abends an Gartenmauern und Zäunen, zuweilen aber auch an der Weidenblüthe herum.

Die Arten der Laubkäfer (*melolontha* F. ein Theil der Linneischen *Scarabaei*) wohnen auf Bäumen und Gesträuchen, von denen sie Blätter und Blüten abnagen; auch einige davon an den Kornähren, andere an Waldgräsern. Verschiedene haben die Gewohnheit, sobald man nach ihnen greift, die Füße an sich zu ziehen und herab zu fallen. Daher greife man mit der einen Hand zu, indem die andere zugleich unter das Insekt gehalten wird. Man kann aber auch eine offene Schachtel darunter halten.

Die Gattung, Schirmblumenkäfer (*trichius* Fab. ein anderer Theil der *Scarabeorum* Lin.) hält sich an den Blüten der Bäume, der Gesträucher, und auf Schirmblumen auf, und kommt zuweilen in die Häuser.

Die Arten der Gattung, Metallkäfer (*cetonia* Fab. wieder eine Parthie der *Scarab.* Lin.) werden auf Blüten der Obstbäume und verschiedener Gesträuche, auch an den Stämmen der Eichen, Weiden und Pappelbäume, an der aufgeborstnen Rinde, an der Weidenblüthe, auf Schirmblumen zc. gefunden. Sie lassen sich auch gerne fallen; oder fliegen bey warmem heiterm Wetter wohl gar davon.

Die Stuschkäfer (*hister* Lin. et Fab.) wohnen nicht nur in Roth und Dunghäufen, sondern auch an todtten Mäusen und Maulwürfen.

Die Splinkäfer (*apate* Fab. ein Theil der Linneischen *dermest.*) sind unter Baumrinden.

Die Speckkäfer oder Kleinkäfer (*dermestes* Lin. et Fab.) wohnen als Larven und vollkommene Insekten, in Häusern, in gedörrtem Fleisch, Wolle, Tuchwaaren, in Sammlungen getrockneter Thiere und Pflanzen; sogar nisten sie sich in den Speisekammern zuweilen in Backwerk von Mehl und Zucker ein. Andere trift man beym Kase, auf Blumen

p) Aus Nicol. Joseph Brahms Insektenkalender gezogen.

men und Baumbllüthen an. Einige unter ihnen affectiren den Tod, wenn man nach ihnen greift. Findet man daher die kleinern Arten in den Zimmern an Wänden kriechen, so verfährt man am sichersten, wenn man einen Finger mit Speichel benetzt, und den Käfer damit berührt, der dann daran, gleich als an einer Leimruche, hängen bleibt.

Die Gattung der Vorkenkäfer (Kopukäfer, *bostrichus* Fab. ein Theil der Linneischen Dermestiden) halten sich zwischen den Rinden der Bäume, vorzüglich des Nadelholzes auf. Wo man frisch gebohrte runde Löcherchen in einem Stamm bemerkt, darf man nur mit einem Messer die Rinde behutsam abschälen, und die unter derselben ausgehöhlten labyrinthischen Gänge verfolgen, an deren Ende man die Käfer unfehlbar antreffen wird. Am häufigsten bemerkt man sie an frisch gefällten jungen Stämmen. Man kann sie hier zuweilen mit der Hand im Fluge haschen.

Die Arten der beyden Gattungen, der Fugenkäfer (*Byrrhus* F.) und Knosfkäfer (*Anthrenus* F.), die unter den Linneischen *Byrrhis* begriffen sind, trifft man auf Blumen, vorzüglich auf Doldengewächsen und den Obstblüthen an. Bey dem herannahenden Frühling, kommen sie oft in unsern Wohnungen vor. Sie haben auch die Gewohnheit, sich bey Nachstellungen von ihrem Aufenthalt herabfallen zu lassen, oder gar davon zu fliegen.

Die Bohrkäfer (*Ptinus* F.) und die Hauskäfer (*Anobium* P.), beyde unter den Linneischen *Ptinis* begriffen, halten sich im Holze, in Sämereyen, in ausgetrockneten Insekten, Pflanzen u. s. w. auf. Wir treffen sie besonders im Frühjahr und Herbst in unsern Wohnungen, an Holzwerk und an Wänden kriechend an. Die Weibchen, die unter ihren Flügeldecken keine Flügel haben, findet man oft, mit den kleinen ungeflügelten Speckkäfer-Arten in Gläsern und glasirten Gefäßen, in die sie gefallen sind, und woraus sie sich nicht helfen können.

Die Muffelkäfer (*Bruchi* L. et F.), findet man theils im Sommer auf Doldengewächsen, theils im Herbst entwickelt in Hülsefrüchten. Sie fliegen gern davon bey Annäherung eines Menschen.

Die Arten von der Gattung, Kunzelskäfer (*Klophorus* F. *Silpha* L.) halten sich im Wasser auf. Kleine Pflügen auf Wiesen, die jedoch helles Wasser haben, oder dergleichen Eisternen, sind ihr Lieblingsaufenthalt. Bey heiterem Wetter, wenn dergleichen Stellen von der Sonne beschienen werden, sieht man sie innerhalb des Wassers an Pflänzchen oder abgedörzten Grasstengeln herumkriechen. Sie lassen sich sehr leicht, und mit der bloßen Hand fangen. Bey ähnlichen Wasserinsekten ist es anzurathen, daß man jederzeit ein Gläschen mit Wasser bey sich führe, und sie in demselben aufbewahre. Denn außerhalb ihres Elements sterben sie sehr geschwinde ab, und vertrocknen eben so bald. Es geschieht daher oft, daß sie nicht mehr auszubreiten sind, sondern in Stücke springen, wenn man sie nach Hause bringt.

Die Halbkugelfäfer (*sphaeridium* F. *dermestes* L.) halten sich im Roth auf, sind sehr lebhaft, und sind daher aus ihrem schmutzigen Aufenthalte gar mühsam herauszubringen.

Die Gattung *ips* Fabr. Rindennager (*silpha* L.), findet man theils in faulem Holze, theils in Baumschwämmen. Auch haßt man sie zuweilen im Fluge und auf Blumen.

Die Stachelkäfer (*hispa* L. et F.) halten sich nicht nur an den Grasswurzeln, sondern auch unter der Rinde, und der kammförmige Stachelkäfer, hält sich im Holz selbst auf.

Die Arten der Todtengräber und der Naskäfer (*microphorus* F. et *silpha* F.), die unter die linneischen Silphen gehören, finden sich bey Nase, Koth, auch an Mauern, auf Fahrwegen, fast überall wo eine Beute aufzuspueren ist. Die raubbegierigsten unter ihnen, sind die eigentlichen Todtengräber, z. B. der gemeine und der deutsche. Aber der *microph. vespilloides* wohnt in versauten Erdschwämmen.

Die Sandgräber (*opatum* F. *silpha* L.) kriechen in sandigen Gegenden an dem Boden herum, bey Annäherung eines Menschen suchen sie sich in die Erde einzuwühlen. Sie sind gesellschaftlich.

Die Gattung der Glanzkäfer (*nitidula* F. *silpha* L.) trifft man theils bey Koth, theils auf Blumen, theils auf ausgetretenen Baumsäften an.

Die Marien- oder Sonnenkäfer (*coccinella* F. et L.) wohnen auf den Blüten der Bäume, besonders der Weide, auch auf andern Pflanzenarten, welche nebst den Blattläusen gewöhnlich ihren Larven zur Nahrung dienen. Im Frühjahr und im Herbst kommen sie oft in unsere Zimmer. Die meisten lassen sich bey Vermerkung einiger Nachstellung von ihrem Aufenthalte auf den Boden fallen. Es ist daher bey ihrem Fange die nämliche Vorsicht, wie bey den Blattkäfern, anzurathen.

Die Schildkäfer (*cassida* L. et F.) wohnen gewöhnlich auf Distelarten, einige im Grase, auf Brennesseln. Sie lassen sich sehr bequem fangen, indem sie gegen unsre Nachstellungen gar kein Rettungsmittel einschlagen.

Die Blattkäfer (*chrysomela* L. et F.) wohnen auf Bäumen, Gesträuchen und Pflanzen. Diejenigen unter ihnen, die man Springchrysomelen (*altica* Geoffr.) oder Pflanzenstöhe, auch Erdschäfer nennt, retten sich durch Hüpfen.

Die Forchtkäfer (*galeruca* F. *chrysomela* L.) wohnen eben daselbst. Unter ihnen sind ebenfalls Spring-Forchtkäfer.

Die Fallkäfer (*cryptocephalus* F. *chrysomela* L.) besitzen die Eigenschaft des Fallens in einem hohen Grade, und verrathen dadurch ihre Gegenwart am meisten.

Die Sägekäfer (*clytra* F. *chrysom.* L.) besitzen jene Eigenschaft nicht so stark.

Die Fadenkäfer (*cistela* F. *chrysom.* L.) wohnen größtentheils auf Doldengewächsen und auf den Arten des *galii*. Zum Entrinnen bedienen sie sich theils des Fallens, theils des Flugs, theils des Laufens, z. B. die Herbstische *cistela reppensis*.

Die Arten der Gattung, Schnurkäfer (*crioceris* F. *chrysom.* L.) haben mit den vielen vorübergehenden Blattkäferähnlichen einerley Aufenthalt und zum Theil einerley Sitten.

Eben so verhält es sich mit den Schmalkäfern (*lagria* F. *chrysom.* L.)

Die Rüsselkäfer (*curculio* F. et L.) sind überall zu Hause, auf Bäumen, Gesträuchen, Pflanzen, auf Wegen, unter Steinen etc. Die meisten von ihnen haben die Eigenschaft des Fallens in gleichem Grade mit den Fallkäfern gemein.

Die Dickkäfer (*rhinomacer* F. *curculio* L.) wohnen auf Doldengewächsen, und werden, ohnerachtet ihres Laufens, bequem ergriffen.

Die Cleren (*clerus* F. *attelab.* L.) werden an Baumstämmen, als *clerus formicarius*, gefunden.

Die Bienenkäfer (*trichodes*, *attelab.* L.), besonders der eigentliche Bienenkäfer, bewohnt Blüthen allerley Art.

Die Asterrüsselkäfer (*attelabus* F. *curcul.* L.), leben auf Gesträuchen und Bäumen.

Die Schildkrötenkäfer (*notoxus* F. *meloë* L.) lieben Pflanzen und Bäume.

Von der Gattung, *anthicus* F. (*meloë* L.) wohnt die einzige inländische Art, der Blumen-*Anthicus*, allenthalben, entgeht aber oft durch seine Fertigkeit im Laufen und Fliegen unsern Nachstellungen.

Die Gattung der Waldkäfer (*spondylis* F. *attelabus* L.) hält sich an Baumrinden, am häufigsten in den Stöcken der Fichten auf, wo sie im Puppenstand sich befindet, als der prachtkäferartige Waldkäfer, *spondylis buprestoides*.

Die Vockkäfer (*ceramb.* Lin.), nämlich der Forstkäfer, Vockkäfer, Zauberkäfer, Zahnbock, Holzbock, Zangenbock, Schneckenkäfer und Iiskäfer (*prionus*, *cerambyx*, *lamia*, *stenocorus*, *calopus*, *rhagium*, *saperda* et *callidium* Fab.) kommen auf Bäumen, in hohlen Stämmen, unter gefällten Klößern, verschiedene aus den beyden letzten Fabricischen Gattungen, auch auf Blumen vor.

Die Linneische Gattung, Schmalbock (*leptura* L.) ist von Fabricius in die Gattungen der Iiskäfer *q*), eigentlichen Schmalböcke, Fliegenkäfer, Halbkäfer und Flußpflanzenkäfer (*callidium*, *leptura*, *necydalis*, *molorchus* et *donacia* F.) abgesondert worden.

q) Die meisten Fabricischen Callidien stecken unter den Linneischen Vockkäfern, und nur

sehr wenige unter den Linneischen Schmalböcken.

worden. Die letzteren sind auf feuchten Wiesen, und innerhalb des Wassers an Pflanzensiegeln in Gesellschaft der Kinnelkäfer, zu finden. Alle übrigen besuchen die Blüthen der Pentandristen und Syngenesiten. Die kleineren Arten der Fabric. Schmalbäcke entweichen unsern Händen leicht, wenn man sich keiner Fangklappe bedient.

Die Leuchtkäfer (*lampyris* L. et F.) wohnen im Grase der Gärten und besonders der Wälder. Ihr Glanz verräth sowohl die fliegenden Männchen als die kriechenden Weibchen.

Die himmelsche Gattung, Asterscheinkäfer (*cantharis* Lin.) zerfällt beim Fabricius in die Gattungen der Feuerkäfer, Astersfliegen und Warzenkäfer (*pyrochroa*, *cantharis* et *malachius* F.). Sie bewohnen die Blüthen der Pentandristen und Syngenesiten; wiewohl die schonungswerthe braune Astersfliege (*cantharis* L. F.) die Drueten schädlicher Raupen besonders verfolgt.

Die Springkäfer (*elater* L. et F.) wohnen im Grase, auf Blüthen, an Stämmen, einige auf Viehweiden unter dürrem Rothe, und an den Aehren der Feldfrüchte. Bei heiterm Wetter fliegen sie in der Luft umher.

Die Prachtkäfer (*buprestis* L. et F.) trifft man auf Bäumen und auf Blumen an. Die kleinern Arten entfliegen gewöhnlich unsern Annäherungen.

Die Sandkäfer (*cicindela* F. et Lin.) halten sich in sandigen Gegenden, auf Heiden, Hecken u. auf. Bei Annäherungen fliegen sie auf, lassen sich aber bald wieder nieder.

Die Strandkäfer (*elaphrus* F. *cicindela* L.) wohnen theils unter dem feuchten Moos, theils an den Rändern der Bäche, Wasserlachen u. dgl. Diese fliegen nicht, laufen aber sehr geschwind, und ent schlüpfen gar leicht den Händen des Sammlers.

Die himmelschen Wasserkäfer (*dytiscus* L.) zerfallen beim Fabricius in Schwimmkäfer (*hydrophilus* F.) und Wasserkäfer (*dytiscus* F.). Sie leben im Wasser, in großen Lachen, Bassins, Gräben und Eisternen, und werden am häufigsten zu Anfang des Frühjahrs gefunden. Mit einem Filerneß muß man langsam und ohne von ihnen gesehen zu werden, den Fang anstellen. Doch lassen sich die Schwimmkäfer, sonderlich der käserartige (*hydroph.* *scarabaeoides*) auch mit den Händen greifen. Desgleichen sind sie auch bey einem Fraß, z. B. an Wasseregeln, Kröten- oder Froschlärven zahlreich wahrzunehmen. Die großen Arten können empfindlich beißen.

Die Dreh- oder Tauchkäfer (*gyrinus* L. et F.) haben mit den vorigen einerley Aufenthalt gemein. Sie schwimmen in Kreisen herum, und können nur mit einem Netze gefangen werden.

Die Lauffkäfer des Linne (*carabus* L.) zerfallen beim Fabricius in Schusskäfer, Lauffkäfer, Calosomen, Galeriten, Bombardierkäfer und Anthien (*scarites*, *carabus*, *calosoma*, *galerita*, *brachinus* et *anthia*). Sie leben unter Steinen, abgefallnen Blättern der Bäume, im Grase, in Gärten auf Gemüßbeeten, unter dichtgepflanzten

Küchenkräutern, an den grasigen Rändern der Bäche, Cisternen, Wasserlachen, Gräben, überhaupt wo ein Raub aufzufühlen ist. Man findet sie daher selbst auf Bäumen, wiewohl selten. Raupen, Würmer, Schnecken, Käfer, auch Schmetterlinge werden von ihnen gejagt und verzehret, ja unter sich selbst sind die kleinern eine Speise der größern Arten. Vorzüglich thun dies der ausspähende und verrätherische Raufkäfer (*carab. inquisitor et sycophanta* L. *calosoma inquisitor et calos. sycoph.* Fab.). Ihr Gang erfordert keine vorzüglichen Vortheile, weil sie sich nur durch Laufen, und durch den aus dem Mund hervortretenden sinkenden Saft, gegen unsere Nachstellungen zu schützen wissen.

Die Linneischen Schattenkäfer (*tenebrio* L.) wozu die Fabric. Gattungen, Höferkäfer, Tottenkäfer, Mehlkäfer und Schattenkäfer, (*pimelia, blaps, tenebrio et helops*) gehören, wohnen in Häusern unter dem Kehrige, unter Steinen und altem Holzwerke. Die letztere Gattung (*helops* F.) besucht auch die Nase.

Die Maywurmkäfer (*meloe* Lin.), wozu die Fabricischen Gattungen, der Anthicus, der Kronenkäfer, der Pfasterkäfer, der Reizkäfer und der Maywurmkäfer (*anthicus, cerocoma, lytta, mylabris et meloe* F.) gehören, wohnen, die Fabricische *meloe* ausgenommen, auf Blumen und Gesträuchen. Sie sind meistens sehr träge, nur die *meloe monoceros* L. und die *mel. Schafferi* (*cerocoma* Schaff. F.) ausgenommen, welche letztere davon fliehet, sobald sie bemerkt, daß man sie ergreifen will.

Die Linneischen Mordellen (*mordella* L.) werden beim Fabricius theils Kammkäfer (*rhizophorus* F.), theils Stachelstoschkäfer (*mordella* F.) genannt. Sie leben auf Blumen, und entwischen gerne.

Die Linneischen Raubkäfer (*staphilin* L.) zerfallen in mehrere Fabric. Gattungen, als der Raubkäfer, Stumpfkäfer, Hüpfkäfer und Traubenkäfer (*staphylinus, oxyporus, hallomenus, paederus* Fab.). Sie wohnen unter Steinen und breitblättrigen Gewächsen, vorzüglich im Frühjahr; in der Folge im Koth, wo sie sich von den kleinen Dungkäferarten nähren. Die kleineren fliegen häufig in der Luft herum.

II. Die Halb- oder Federflügler (*Hemiptera* L. *Ulonata et Ryngota* Fabr.).

Die Schaben (*Blatta* F. et L.). Die größern wohnen in Häusern in dumpfigen, dunkeln Winkeln, unter altem Gehölze, Kehrige etc. und benagen und verderben viele Victualien und Geräthschaften, Kleider, Leinen, Leder. Die kleinern Arten halten sich in den Wäldern, unter Baumrinden, besonders des Nadelholzes auf.

Die Fangheuschrecken (wandelnde Blätter, *mantis* L. et F.) wohnen im Grase.

Die Linneische Gattung der Grillen (*gryllus* L.) zerfällt in mehrere Fabricische Gattungen, als die Grashüpfer, die Trupalis, die Höhlengrille, die Heuschrecke und

die Grille (*acrydium*, *truxalis*, *acheta*, *locusta*, *gryllus* F.). Von diesen hält sich die Gattung der Höhlengrille in Höhlen unter der Erde auf, die übrigen sämmtlich im Grase, auf Gesträuchen, Bäumen u. s. w. Bei diesen allen muß das Abspringen der Springsfüße verhütet werden. Brah m giebt den Rath, sie nicht zu tödten, sondern absterben zu lassen.

Die Laternenträger (*fulgora* L. et F.) wohnen unter den breitblättrigen Pflanzen, wenigstens die Europäische Art.

Die Linneischen Cicaden (*cicada* L. seu *membracis*, *tettigonia*, *cicada* et *cercopis* F.), haben mit der Grille einen Aufenthalt gemein.

Die Linneischen Bootwanzen (*notonecta* L. *notanecta* et *sigara* F.) wohnen in Eisernen, Bassins, überhaupt in stehenden Gewässern, zuweilen auch in kleinen Bächen, jedoch an Stellen, wo das Wasser ruhig ist. Man fängt sie gleich den Wasserkäfern, mit Netzen. Bei der grauen Bootwanze (*notonecta glauca* L. F.) hat man sich wohl vorzusehen, daß man mit den Fingern ihrem Rüssel nicht zu nahe komme, mit dem sie äußerst peinlich stechen kann. Doch läßt der Schmerz augenblicklich nach, sobald das Insekt den Stachel aus der Wunde zurückziehet. Sie leben vom Raube anderer Insekten.

Die Linneischen Wanzen (*cimex* L.) zerfallen in mehrere Fabricische Gattungen, in Gluchwanzen, Steifwanzen, Eckwanzen, Strichwanzen, Blattwanzen, Schmalwanzen und Vochwanzen (*acanthia*, *cimex*, *coreus*, *lygaeus*, *miris*, *gerris* et *reduvius*). Sie wohnen auf Bäumen, Blumen, einige Arten unter Steinen und Kehrlicht in Gärten. Bloß die Bettwanze wohnt in Häusern.

Die Wasserseorpionen (*nepa* Lin. *nepa* et *naucoris* F.) haben mit den Bootwanzen gleichmäßige Lebensart, nur daß sie träger sind und immer im Schlamm stecken, mit Ausnahme des wanzenähnlichen Wasserseorpions.

Die Blattläuse (*aphis* L. et F.) leben auf Pflanzen. Der Oeconom kennt einige Arten derselben unter dem Namen des Mehlthaues. Auch sie sind es, die eine Art des sogenannten Honigthaus verursachen.

Die Blattsauger (*chermes* L. et F.) halten sich ebenfalls auf Pflanzen und Bäumen auf.

Die Schildläuse (*coccus* L. et F.) leben wie die beiden vorhergehenden Gattungen an niedern Pflanzen und auf Bäumen, bald auf den Blättern, bald an der Rinde, auch in Gewächshäusern, wo sie die Gärtner nicht gerne sehen.

Die Blasenfüße (*thrips* L. et F.) wohnen auf Pflanzen.

III. Die Staubflügler (*Lepidoptera* L. *glossata* Fab.).

Die Tagsschmetterlinge (*papilio* L.) zerfallen beim Fabricius in Falter und Hesperiiden (*papilio et hesperia* F.). Sie sind am meisten von früh 9 Uhr bis nach Mittag um 3 Uhr, überall wo Pflanzen blühen, am meisten, wo solche auf erhabenen, mageren und trockenen Plätzen stehen. Der weniger wässerichte, concentrirte und kräftigere Nectar, solcher mageren und an voller Sonne gewachsenen Blüthen, scheint ihnen ganz vorzüglich zu behagen, und wird häufig besucht. Lichte Plätze in Waldungen, blumenreiche Wiesen mit Wassergräben, zumal wo sie an niedriges Gebüsch, und dieses an hohes haubares Holz angränzen, feuchte Fußwege, hohe Berglagen, wo es nicht an Sonne fehlt, und der Wind übergeht, werden besonders gerührt. Unterdeß muß deshalb keine Lage, selbst die dunkeln Stellen oder das Dickicht der Wälder, unbefucht bleiben, weil sich manche Arten, selbst der Tagvögel, als *papil. aegeria* L. selten anderswo finden lassen.

Eine gleiche Beschaffenheit hat es mit den nächsten Linneischen Schwärmern (*sph. adscita* Lin. *zygaena* Fab.) und einigen ächten Linneischen Schwärmern (*sph. legitima* L. *Glasflügler sesia* Fab.).

Alle übrige Linn. Schwärmer (*sph. legit. L. sphinx* Fab.) darf man, wenige ausgenommen, nie anders als in der Morgen- und Abenddämmerung erwarten. Sie sind wegen ihres schnellen Flugs, da sie sich auch sogar beim Zitternehmen nicht niedersetzen, und selbst wegen des trüglischen Lichts, bei dem sie fliegen, besonders unartig beim Fang. Der Jasmin, Weisblatt, die Salappe, das Seifenkraut, der Nittersporn, lockt sie besonders an. Hat man das Glück, am Tage einen an verborgenen Orten, an Baumstämmen u. s. w. sitzend zu finden; so verhalten sie sich desto ruhiger, und machen oft das Netz unnütz.

Die Phalänen muß man, weil sie nur bei Nacht fliegen, an den Stämmen der Bäume, da, wo sie das Sonnenlicht nicht treffen kann, unter hervorragenden Balken der Garenhäuser und Planken aufsuchen. Von den größern dieser Horde besonders, ist selten ein Netz notwendig. Sie lassen sich so, wenn man nur Fertigkeit genug hat, und sie nicht durch unnötiges Berühren mit der Nadel reizt, ruhig an die Nadel speißen. Die meisten, besonders kleinere Arten, verbergen sich im Laub der Bäume und Sträucher, wo man sie durch nicht allzuhastiges Anschlägen mit einem Stöckchen erschreckt, daß sie herunter fallen, oder herausfliegen, sich aber selten weit entfernen, und gut fangen lassen. Von solchen, die herunter gefallen sind, und wie todt liegen, darf man nicht zu langsam seyn sie aufzunehmen. Denn sie ergreifen oft im Hury die Flucht, und sind verloren.

Es giebt aber auch Ausnahmen, indem mehrere Arten der Phalänen unter den Spinnen und Eulen, z. B. *russula*, *gamma*, *mi*, *glyphica* L. auch unter den Spinnern und den kleinern, auch bei Tage fliegen.

Uebrigens ist die einzige Gattung der Phalänen oder Nachtvögel des Linne (phalaena L.) von Fabricius in der Entomol. systemat. und den supplementis, in fünfzehn Gattungen vertheilt worden, welche Spinner, Holzbohrer, Hepialen, Eulen, Lithosien, Hybläen, Spanner, Wickler, Galerien, Phycis, Cramben, Yposolophen, Motten, Aluciten und Geistschen (bombyx, cossus, hepialus, noctua, lithosia, hyblaea, phalaena, pyralis, galeria, phycis, crambus, yposolophus, tinea, alucita et pterophorus) genannt werden.

IV. Die Aderflügler (Neuroptera Lin. Odonata et Synistata Fabr.)

Die Linneischen Wassernymphen (libellula L.) machen die Fabricische Ordnung, Odonata, in drey Gattungen (libellula, aeshna et agrion) aus. Sie wohnen an Bächen, auf feuchten Wiesen, in Gärten, Wäldern, überhaupt, wo Wasser in der Nähe ist. Sie leben von dem Raube anderer Insekten, fangen Schmetterlinge, Fliegen u. dgl. welche sie verzehren. Sie könnten also für nützlich gelten, wenn nur ihre Larven in Fischteichen den jungen Bruten nicht gefährlich wären.

Die Haste, Ephemeren, halten sich gleichfalls in der Nähe des Wassers auf. Man findet sie dort auf Gesträuchen, an Mauern, Baumstämmen etc.

Die Stinkfliegen (phrygan. L.) oder Fabricische Stinkfliegen und Phryganeen (semblis et phryganea F.) haben mit den vorhergehenden Gattungen einerley Aufenthalt.

Die Florfliegen (hemerobius L. F.) wohnen auf Bäumen, in Gärten, Wäldern, besonders zwischen den Nadeln der Föhren, Fichten. Oft kommen sie in unsre Häuser, und zwar meistens im Früh- oder Spätjahre, und kriechen dann beim Sonnenschein an den Fenstern herum. Sie überwintern größtentheils als vollkommene Insekten. Man kann sie alsdann in Gartenhäusern an der Decke häufig finden. Ihre Larven machen auf die Blattläuse Jagd.

Die Ackerwassernymphen (myrmeleon L. myrmeleon et ascalaphus F.) findet man an Baumstämmen, oder in Gesträuchen und strauchartigen Pflanzen versteckt. Besonders fliegt ascalaphus an Bächen.

Die klopfende Pappierlaus (Staublaus, termes pulsatorium L. psocus pulsat. Fab.) ist im Staub, in Fächern, Schränken, Pappieren u. s. w.

Die Scorpionfliegen (panorpa F. et L.) wohnen auf Gesträuchen und Gartenhägen.

Die Kamelfliegen (raphidia F. et L.) leben auf Blumen, vorzüglich auf den Distelarten.

V. Die Kieflügler (Hymenoptera Linn. — piezata F.).

Die Gallwespen (*cynips* L. et F.) wohnen auf Bäumen, vorzüglich auf Eichen und Weiden. Einige Arten legen ihre Eier in Raupen und Blattläuse. Und in dieser Rücksicht wären sie für uns nützliche Insekten.

Die Blattwespen (*tenthredo* L. et F.) halten sich auf Bäumen, Gesträuchen, Blumen zc. auf. Einige Arten findet man auch auf Wiesen im Grase, oder sonst an rasichten Stellen an der Erde sitzen, wo sie aufstiegen, wenn man zu nahe zu ihnen kommt.

Die Holzwespen (*sirex* L. et F.) wohnen auf Bäumen und Blumen. Erstere besuchen sie zur Absetzung ihrer Brut, und letztere zu ihrer Nahrung. Sie haben keinen Stachel. Man kann sie daher ohne Furcht ergreifen.

Die Raupentödter (*ichneumon* L. F.) leben auf Blumen, Bäumen, Gesträuchen, niedern Pflanzen, mit einem Worte, man trifft sie überall an, wo sich Larven oder Raupen vermuthen lassen, welche sie aufsuchen, um in dieselben ihre Eier abzulegen, welches jedoch nur von dem weiblichen Geschlecht zu verstehen ist. — Man nehme sich vor den Legestacheln der größern Arten in acht.

Die Banchen, Ophions und Fönen (*banchus*, *ophion* et *foenus* F.) des Fabricius, sind auch Linneische *Ichneumons*.

Die Linneischen Bastardwespen (*sphex* Linn.) machen acht Fabricische Gattungen aus, als *evania*, *chalcis*, *sphex*, *larva*, *tiphia* oder Raubwespe, *scolia* oder Drehwespe, *oryssus*, *pompilus*. Sie haben zum Theil mit vorhergehenden Gattungen einerley Aufenthalt gemein. Einige Arten laufen auf den Wegen gleich Spürhunden hin und her, und suchen Raupen oder Spinnen auf, welche sie tödten, in Löcher unter die Erde schleppen, und zur Ablegung ihrer Brut gebrauchen. Mehrere Arten der Fabr. Gattung *chalcis* zieht man aus Schmetterlingsraupen.

Die Goldwespen (*chrysis* L. F.) findet man auf Blumen, an hölzernen Garteneinfassungen, Mauern. Ueberhaupt streifen sie fast allenthalben herum, und suchen aus gleicher Absicht, wie die vorhergehenden Arten, Raupen und Larven auf.

Die Linneischen Wespen (*vespa* L.) nämlich acht Fabricische Gattungen, *thynnus*, *leucopsis*, *bembex*, *vespa*, *masaris*, *mellinus* oder Wippenwespe, *philanthus*, *crabro* oder Siebbiene, wohnen in hohlen Bäumen, in Höhlen innerhalb der Erde, in Mauerritzen, alten Gebäuden zc. Man kann sie, und zwar am sichersten, einzeln auf Blumen und bey reifem Obste, vorzüglich aber bey Trauben fangen.

Die Linneischen Bienen (*apis* Lin.), nämlich fünf Fabricische Gattungen, Blumenbienen, Waldbienen, Bienen, Euceren und Trauerbienen *hylaeus*, *andrena*, *apis*, *eucera* et *nomada* F.) findet man auf Blumen. In den ersten Tagen des Frühjahrs,

wo diese noch selten sind, bemerkt man sie auch auf sonnigen und wenig gangbaren Fußsteigen an der Erde sitzen.

Die Ameisen (*formica* L. et F.) wohnen auf Rasenplätzen und in Wäldern.

Die Akerbienen (*mutilla* L. *dorylus* et *mutilla* F.) findet man auf Blumen, vorzüglich in Wäldern.

VI. Die Zweyflügler (*diptera* L. *anthliata* F.).

Die Bremsen (*oestrus* L. et F.) wohnen auf Viehweiden, besonders in gebirgigen Gegenden. Auch findet man sie öfters an Baumstämmen, doch meistens wo Heerden von Rindvieh in der Nähe sind.

Die Bachmücken (*tipula* L. *tipula* et *hirtea* F.) halten sich an Bächen, auf feuchten Wiesen, in Gärten u. s. w. auf. Auch findet man sie auf den Blüthen der Dolbengewächse.

Die Inneischen Fliegen (*musca* L.) machen zwölf Fabricische Gattungen aus, nämlich die Niesfliege, Kreuzfliege, Mohnfliege, Wassenfliege, Stiletfliege, Schnabelfliege, die Cerien, Syrphen, Thereven und Mulsionen, die eigentliche Fliege und der Sarge — (*mydas*, *bibio*, *anthrax*, *stratiomis*, *nemotelus*, *rhagio*, *ceria*, *syrphus*, *thereva*, *mulio*, *musca* et *sargus*) haben sehr verschiedene Wohnorte. Einige leben in Häusern von den Speisen der Menschen, andere in heimlichen Gemächern, in Gräben, auf Nase, Roth, Blumen 2c. Die Larven einiger Arten der Gattung *syrphus* wohnen auf Kopfpflanzen, die sie beschädigen.

Die Bremsen (*tabanus* L. *tabanus* et *sicus* F.) wohnen vorzüglich in Wäldern, und gehen auf Weiden und Wegen an das Vieh.

Die Raubfliegen (*asilus* L. et F.) leben von dem Raube, fangen andere Insekten, Fliegen, Käfer, Schmetterlinge, die sie tödten und verzehren. Ihre Raubbegierde überwiegt bey ihnen auf eine gewisse Art selbst die Triebe der Fortpflanzung. Wenn schon das Männchen mit dem Weibchen über dem Begattungsgeschäfte begriffen ist, so scheint letzteres doch dafür keine Aufmerksamkeit zu haben. Es jagt mit dem auf seinen Rücken angeklammerten Männchen, wie zu andern Zeiten, den Fliegen nach, und wenn es eine gefasst hat, verzehret es dieselbe ganz ruhig unter den nämlichen Umständen. Ähnliche Erscheinungen bemerkt man auch bey verschiedenen andern Insektenarten, selbst bey Schmetterlingen.

Die Inneischen Stechfliegen (*conops* L.) haben die Fabriciusschen Gattungen der Stachelfliege, Stechfliege, Angelfliege und Blasenfliege (*rhingia*, *conops*, *stomoxys* et *myopa*) aus, die auf Blumen leben. Die einzige Art der Pferdestechfliege, c. cal.

e. calcitrans wohnt auf Viehweiden, in Ställen, und kommt auch oft genug in unsere Wohnungen, wo sie uns durch ihre Stiche belästigt.

Die Gattung der Schnaken (*culex* L. et F.) fliegt auf feuchten Wiesen, gemeinlich erst nach Sonnenuntergang.

Die Schnepfenfliegen (*empis* L. et F.) halten sich auf Blumen, Blüthen und Gesträuchen auf.

Die Schwebefliegen (*bombylius* L. et F.) werden auf Blumen gefangen. Ihr Flug ist schwebend und rasch.

Die Hausfliegen (*hypobosca* L. et F.) wohnen auf Thieren, vorzüglich an dem Geflügel, mit dem sie zuweilen in unsre Wohnungen kommen, und uns beschwerlich fallen.

VII. Die Ohnflügler (*aptera* L.)

wozu von den Fabricischen Ordnungen, *Synistata* und *Anliata*, sehr wenige, dann aber die fünf ganzen Fabricischen Ordnungen, *Mitosata*, *Unogata*, *Polygonata*, *Cleistagnatha* und *Exochinata* gehören.

Die Schuppenthierchen (*lepidisma* L. et F.) halten sich in feuchten Winkeln in den Wohnungen, unter allerlei Geräthe, auch unter Blumentöpfen vor den Fenstern auf.

Die Fußschwänzer oder Springfüße (*podura* L. et F.) wohnen unter Steinen, breitblättrigen Gewächsen, unter den Moosen, in Blumentöpfen, einige Arten im Mist, im Wasser, auf Bäumen, an den Graswurzeln u. s. w.

Die Staubläuse, Termiten (*termes* L.) sind, seitdem die Europäische Art, die klopfernde Pappierlaus, von Fabricius von denselben gesondert, und als *psocus pulsatorius* unter die *Synistata* (*neuropt.* L.) geordnet, alle Außereuropäisch.

Obige drei Gattungen gehören zu der Fabric. Ordnung der *Synistaten*, und die beiden folgenden, die Läuse (*pediculus* L. et F.) und Milben zu derjenigen der *Anliaten*.

Der Aufenthalt der Läuse (*pediculus* L. et F.) auf Menschen und Thieren, braucht als zu bekannt, keine Erwähnung.

Die Milben (*acarus* L.) haben sehr verschiedenen Aufenthalt. Einige, wie die Kräg- und Ruhrmilbe (*acarus scabiei*, *dysenteriae*) wohnen im menschlichen Körper. Und bekanntlich wüthen die von beiden herrührenden Krankheiten im Früh- und Spätsjahr am ärgsten und häufigsten. Andere, z. B. die Käsermilbe, die vegetirende Milbe (*acarus coleopratorum*, *vegetans*) wohnen auf thierischen Körpern: wieder andere, z. B. die Mehl- und die Milchmilbe (*acarus siro*, *lactis*) in unsern Nahrungsmitteln, noch andere in Büchern, in Insektensammlungen, besonders an Coleoptern, auch an Pflanzen.

Mit den zu den Fabricischen *Rhngoten* gehörigen Flöhen (*pulex* L. et F.) hat es die nämliche Verwandniß wie mit den Läusen.

Die

Die Linneischen Asterspinnen, Spinnen und Scorpionen, machen die ganze Ordnung der Fabric. Unogaten in sechs Gattungen aus, als die Atermilben, Spinnen, Asterspinnen, Taranteln, Scorpionen und Gifskanker (*trombidium*, *aranea*, *phalangium*, *tarantula*, *scorpio*, *solpugia*).

Die Asterspinnen (*phalangium* L. *phalangium*, *tarantula* et *solpugia* F.) wohnen in Häusern und auf dem Felde, in Risen und an Mauern; so auch die Atermilben (*acarus* L. *trombidium* F.)

Die Spinnen (*aranea* L. et F.) sind zu bekannte Insekten, als daß es nöthig wäre, über ihren Gang und Aufenthalt etwas zu sagen.

Die Scorpionen (*scorpio* L. et F.) findet man in südlicheren Gegenden an abgelegenen Orten, in altem Gemäuer, unter Steinen. Die krebssähnliche Asterspinne des Linné (*phalang. cancr.*) zählt Fabricius den Scorpionen bey (*scorp. cancroides*).

Die Linneischen Krebse machten ehemals eine, nach der Zeit aber zwei ganze Fabricische Ordnungen aus, die Eleistagnathen und Erochnaten, in 27 Gattungen, davon der Flußkreb (cancer *astacus* L. *astacus fluviatil.* F.) und der Heuschreckenkreb (cancer *locusta* L. *gammarus loc.* F.) wohlbekannt sind.

Die Linneischen Kiefenfüße und Affeln (*monoculus* et *oniscus* L. *monoc. onisc.* et *cymothoa* F.) machen die ganze Fabr. Ordnung der Polygonaten aus.

Solche Kiefenfüße wohnen in Eisternen, in stehenden Wasserlachen auf Wiesen u. dgl. Sie dienen den Polypen, auch den kleinen Wasserkäsern und andern Insekten zur Nahrung.

Die Affeln (*onisc.* L. F.) leben unter Steinen, Blumentöpfen, in feuchten Gewölben und Zimmern, unter breitblättrichten Gewächsen, und die Wasseraffeln (*onisc. aquaticus* L. *cymothoa* F.) halten sich in kleinen, sanft fließenden Bächen, in Gesellschaft des Heuschreckenkrebess auf.

Die Linneischen und Fabric. Affelwürmer und Biessfüße (*scolopendra* et *julus* L. F.) machen die ganze Ordnung der Fabr. Mitosaten aus.

Sie haben mit den Landasseln einerley Aufenthalt gemein, nur werden sie häufiger in der Erde angetroffen.

Zwölftes Kapitel.

Von dem Nutzen und Schaden der Insekten.

Ueberhaupt sind sie dem Naturfreund, dem eigentlichen Naturforscher, dem Arzt und dem Oekonomen wichtig genug. Viele unter ihnen gewähren uns wegen ihrer Schönheit, wegen ihres Farbenschmucks, womit sie unser Auge ergötzen, Vergnügen. Viele setzen uns wegen ihrer Zeichnung, ihres Körperbaues, und sogar die unscheinlichsten Arten wegen ihrer Kunsttriebe ^{r)} in Bewunderung, ob sie gleich den unverdienten Namen, Ungeziefer erhalten. So sind z. B. die Termiten (*termites L. et F.*) in Afrika bewundernswürdig, deren ein Theil ungeflügelt und zugleich geschlechtslos, ein Theil geflügelt und zur Fortpflanzung, und der dritte zur Vertheidigung bestimmt ist. Die Geschlechtslosen machen das arbeitende Volk aus, die gemeinschaftliche Wohnungen und Vorrathshäuser errichten, die sich zuweilen zehn bis zwölf Schuh über die Oberfläche des Bodens erheben. Man sehe Heinrich Schmeatshmanns Sendschreiben über die Termiten 1783, desgleichen Füßly neues Magazin der Entomologie, 2. Band, 1784 Zürich.

Es sind nicht nur mehrere Insekten, die dem Menschen wichtige Vortheile verschaffen, z. B. die Bienen wegen Honig und Wachs, die Cochenille als ein köstlich farbe-Materiale, die Spanische Fliege wegen Pflanzentzügen, der siebenpunktirte und andere Marienkäfer (denen sonst auch des Gerli zahnschmerzstillender Nüsselkäfer zugesellt wurde), gegen Zahnschmerzen, die Ameise wegen eines Spiritus, die Maywürmer als Mittel gegen den tollen Hundsbiß, die Kellerwürmer ebenfalls in der Medicin, die Gallinsekten wegen

r) Auch die Spinne hat sich in neuern Zeiten, besonders seit 1796 merkwürdig gemacht. Die Alten wußten schon, daß die gegenwärtige oder zukünftige Witterung die Arbeit der Spinnen bestimme. Schon Aristoteles sagt, daß die Spinne bey heiterm Himmel arbeite, und die Kälte scheue, sich im Winter verberge; und Plinius: daß sich aus den Spinnen vorherzusagen lasse. Denn, heißt es hist. nat. lib. XI. cap. 28, ehe die Flüsse anschwellen, machen die Spinnen ihr Gewebe höher. Bey heiterm Himmel weben sie, bey trübem nicht. — In den neuern

Zeiten machte ein Franzos, Quatremère Disjonval, die Entdeckung des beständigen Verhältnisses zwischen dem Erscheinen und Verschwinden, der Arbeit oder Ruhe, dem mehreren oder mindern Umfang der Gewebe und Auhängesäden der Spinnen von verschiedenen Arten, und die atmosphärischen Veränderungen, von dem schönen Wetter zum Regen, von der Hitze zur Kälte u. s. w. Welche Wissenschaft Araneologie genannt wird. Dieser Kenntniß schreibt man Hollands Eroberung durch die Franzosen in dem obgedachten Jahr zu.

gen der Galläpfel, und die Kermesbeere zur Färberey s), die Krebse zur Speise, sondern es befindet sich auch noch unter den Schmetterlingen selbst wenigstens eine Art, die, da sie Millionen Menschen Kleider, und Millionen Menschenhände zur Erwerbung ihres Unterhalts nützlich beschäftigt, fast den mannichfaltigen Schaden im Ganzen ersetzt, den die Gefräßigkeit der übrigen Schmetterlingsraupen anzurichten im Stande ist. Und das ist die bekannte Seidenraupe auf Maulbeerbäumen. Aber bey dem allen ist für den Oekonom und Forstmann die Ausrottung, oder wenigstens die Verminderung der nachtheiligen Arten eine Sache von Wichtigkeit. Gut ist es daher, daß das Thier- und Insektenreich selbst viele Geschöpfe enthält, die uns zur Verringerung der schädlichen Raupenarten behülfflich seyn, und die daher geschont werden müssen: Ganze Gattungen der Vögel aegen mit ihnen sowohl sich, als ihre Jungen, z. B. die Schwalben, Weissen, Lerchen, Grasmücken, Finken, Ammern u. a. m. Die Sperlinge thun es nur in einem geringen Grad. Selbst manches Fleischfressende Säugethier, als Rase, Marder, Biesel, Fledermäuse fressen hien, wenigstens den größern Arten, nach. Viele Gattungen der Insekten, namentlich die Erd- oder Lauskäfer (*carabus*), die braune Aftersfliege (*cantharis fusca* L.), die Garten- und Feldwanzen (*cimex* L.), die ausgebildeten Wasserjungfern (*libellula* L.), die Larven der Florfliegen, die Raubfliegen (*asilus* L.), die Ameisen (*formica*), alle diese jagen und mordend unaufhörlich, was sie aufstreifen können. Auch sind einige Arten Gallwespen, dann aber besonders die Raupentödtter (*ichneumon*), von einigen Schlupfwespen genannt, die ihre Eyer nicht allein in lebendige Raupen und Puppen, sondern zum Theil in Schmetterlingseyer selbst legen, und sie dadurch vermindern. Auch einige Waskardwespen (*sphex* L.) und Goldwespen (*chrysis* L.), treiben dies Geschäfte. Auch die Sammetmilbe (*trombidium holoserice* F.) frist Schmetterlingseyer.

Man kann füglich annehmen, daß die Vögel allein zwey Drittel aller vorhandenen Raupen, Puppen und Schmetterlinge verzehren, daß von den letztern ein Drittel die Raupentödtter wieder die Hälfte umbringen, und im Ganzen von den Ungemächlichkeiten der Witterung ein Zwölftheil aufgerieben wird, mithin kaum die zwölfte Raupe zum Schmetterling gedeiht. Und gerade diejenigen Arten, so sich am stärksten vermehren, pflegen meistens den Gefahren am meisten ausgesetzt zu seyn. Zweitens kann ein plötzliches und anhaltendes Ungewitter große Verheerungen unter diesen Creaturen anrichten. Und daher kommt es auch, daß man zuweilen eine Schmetterlings- oder andere Insektenart in einem Jahr in großer Menge erblickt, und im nächsten Jahr, wenn man sie in doppelter Anzahl wieder erwartet, oft Mühe hat, eine einzige zu finden, und es mehrere Jahre dauert, ehe dieser Schmetterling wieder in Menge erscheint. Damit auch dem Ueberhandnehmen dieser Creaturen gesieuet werde, bekamen sie vom Schöpfer einen zarten Körper, der

*) Pfeiffer in seinen Böhmischen Insekten 1790 schlägt auch den gelbbraunen Cast unter dem Rückenschild von dem gemeinen Maykäfer zu

einer schönen gelbbraunen Farbe in der Waskmalerey vor.

der durch anhaltendes Ungemach des Wetters leicht aufgerieben werden kann. Daher es geschieht, daß, wenn allensfalls in einem Jahre eine besondere Art Raupen überhand nehmen sollte, dagegen wieder die andern schädlichen Arten ausbleiben.

Der Oekonom von allen Fächern und also auch vom Forstfache, muß daher die der Natur gemäßesten Mittel zur Verminderung der Raupen anwenden, indem er alle die Raupen auffuchenden kleinen Vögel und auch Insekten, als Laufkäfer, Ameisen und Sämenmonswespen, so viel er kann, schützt, damit wenigstens durch seine Schuld nicht das so nöthige Gleichgewicht in der Natur gestört werde. Pezold's Mittel, die uns schädlich werdenden Raupen zu vermindern, berücksichtigt vorzüglich die Gartenraupen.

Daß außer den Raupen auch andere Insektenlarven durch ihr Ueberhandnehmen schädlich werden können, ist bekannt. Gleditsch hat in seiner Forstwissenschaft deren eine allzugroße Zahl angegeben, worunter aber doch einige fehlen, die zu seiner Zeit noch nicht für schädlich bekannt waren.

Unter den Käferlarven thun die Arten der Muffel- oder Saamenkäfer (*bruchus*), des schwarzen und rothen Kornrüstkäfers (*curc. granarius et frumentarius* L.) beim Getraide, die des grauen Naskäfers (*silpha grisea* des Hrn. Curtis) an Waden, und mehrere andere Muffel- und Asienrüstkäfer ¹⁾ an Knospen und Aernern, die Knecht- und Speckkäfer (*anthrenus* F. et *dermestes*) den Kuchensack und Holzwerk, Schaden. Ferner schaden alle Arten der Laufkäfer (*scarab. L. melolontha* F.), worunter der Julius- der Julius- und besonders der verrufene Markkäfer gehört, dessen Larve Erdengerling genannt wird, dann die Metallkäfer (*cetonia* F.), den Wurzeln, die Schnurr- oder Zirkkäfer (*crioceris* F.), die Erdstolzkäfer (*altica* Geoffr. et Panzeri), und Herdchkäfer (*galeruca* F.) ²⁾ den Gemüsen, deren Blätter sie benagen. Manche führen hier auch den Mehlkäfer (*tenebrio molitor* L.) mit an.

Die größern Schwimm- und Wasserkäfer (*hydrophilus et dytiscus* F. L.) sind der jungen Fischbrut schädlich. Die Larven der Springkäfer, der Heft- Beck- Zauber- und Schmalbeckkäfer (*elater, prionus, cerambyx, lamium calliothum, leptura* F.), und unter ihnen besonders des Zimmer- Zauberkäfers (*lam. aedil. F.*), des Hurothien und des violetten Istkäfers (*callid. sanguineum et violac. F. cerambyx* L.) schaden dem Gehölz in Waldungen, vorzüglich aber ruiniert die Larve des gemeinen Borkenkäfers (*dermest.*

¹⁾ Derselben *attolens bacchus* F. (*curc. Bacch. L.*) am Weinstrauch, *curc. Pyri* L. am Apfel, und der *curc. lapathi* des Hrn. Curtis in Wadenstammen, zuweilen vorkommen.

²⁾ Fabricius hat im neuen Werke, *syn. entomol.* die Geseffische und Panzer'sche *Galeruca, altica*, theils mit *zelenae*, theils mit *chrysomela* und *crioceris* wieder vereinigt.

mest. typographus L. bostrich. typogr. F.) und des größern Fichtenborkenkäfers (bostrichus pinastri, der im Fabric. fehlt) das Föhren- oder Kiefernholz.

Unter denen die keine Käfer sind, gehören hieher: Die Schaben (blatta L. F.), welche in Häusern beynah nichts von Viktualien, Kleider und Leder verschonen, und durch Steinkohlendampf vertrieben werden. Die Wanderheuschrecke (gryll. migratorius L.) ist zuweilen im östlichen Europa, und die Maulwurfsgrille (Erdfrebs, gryllus gryllotalpa L.) in mehreren Gegenden den Wiesen und Gärten furchtbar geworden. Die Bettwanze und die Mosquitostiege, jene bey uns, diese in Südamerika sind als Menschenquälereien bekannt genug. Gewisse Larven von Blattwespen (tenthredo Lin.), machen unsere Stachelbeerhecken eben so kahl, als die Stachelbeerraupe (ph. geom. grossulariata L.). Die Larven von der Siebbiene (sphex arenaria L. crabro arenaria F.) leben, sobald sie das Ey verlassen, in den Halmen des Winterweizens, zuweilen auch des Roggens und des Hafers, indem sie von unten in das Innere des Stengels bis hinauf kriechen, dessen Aehren davon weiß oder verschienen genannt werden, und verderben. Solche Larven entstehen aus Eiern, die die weibliche Siebbiene in eine Raupe gelegt, die sie zuvor in die Erde geschleppt und mit Erde bedeckt hatte. Von der viehquälenden Bremse oder Wehr (oestrus L.) ist oben bey dem Eyerlegen geredet worden.

Die Blattläuse und Schildläuse (aphis et coccus L. et F.) mit Ausnahme der nützlichen Cochenille und der Kermesbeere, die auch zu dieser Gattung gehören, werden an den Blättern und Rinden der Bäume und der niedern Pflanzen in Gewächshäusern nicht gerne gesehen: so wie auch der bekannte Blasenfuß (thrips physapus), dessen Puppe in den Kornähren zu finden, im Verdacht ist; im Jahr 1795 dem Korn in England nachtheilig gewesen zu seyn, laut Marschalls Nachrichten in den Transactions III. u. IV. Band, 1797. 1798. Von der neuen Weizenbachmücke (tipula tritici) und ihrer Schädlichkeit, wird in eben dem Werke IV. u. V. Band geredet, und zugleich die Naturgeschichte ihres tödtlichen Feindes, eines Raupentödtlers, geliefert.

Die Afrikanischen Termiten plündern in den heißen Ländern manche Baarenlager und Niederlagen von Werth.

Von den giftigen ist schon oben geredet worden.

Es sind nur noch die den Naturalien- und Pflanzensammlungen recht besonders schädlichen zu nennen. Diefes sind die Milbe (acarus L.), der gemeine Speckkäfer (derm. lardarius L.), die gemeine Pappier- oder Bücherlaus (termes pulsat. L.), die Krebsasterpinne (phalang. cancriformis L. scorp. cancr. F.), dann der diebische Bohrkäfer (ptinus fur L. F.), der Brodspeckkäfer (dermest. paniceus L. anobium F.), und der Kabinetts-Knollkäfer (byrrhus museorum L. anthrenus F.), wovon die drey letzten zugleich auch den Akten und Büchern und deren Einband nachtheilig sind.

Doch werden auch viele Arten uns dadurch nützlich, daß die im Mist und in den Cadavern wohnenden, eine Ansteckung der Luft verhüten; Futter für Vögel, Fische und andere Thiere abgeben, die wir zur Speise und Kleidung nöthig haben; ferner, daß sie durch einen scheinbaren Untergang als Dünger, der Pflanzen Wachstum befördern, und so durch einen immerwährenden Zirkellauß die ewige Jugend der Natur bewirken helfen.

Zweiter Abschnitt.

Nähere Einleitung in die Naturgeschichte der Forstinsekten.

Die Kenntniß der Insekten ist einem Forstkundigen nicht mehr so entbehrlich, als man sonst glaubte. Man ist dieses inne worden, seitdem in den beiden verfloßenen Jahrzehnten viele Waldungen durch ihren Fraß mehr oder weniger gelitten haben. Man hätte eher daran denken können. Denn schon hundert Jahr vorher wurden ähnliche Holzverlustungen erwähnt, denen man aber bei zu geringer Natur- und Insektenkenntniß nicht vorbeugen konnte, und woben man gendthigt war, um das anbrüchige Holz noch anzubringen, große Strecken niederzuhauen und solche den Besitzern der damals vorhandenen oder erst entstehenden Eisengewerken und Glasfabriken käuflich zu überlassen.

Der in den neuern Zeiten entstandene Holzmangel, zwang die Inhaber der Forste auf eine forstwissenschaftliche Holzpflege im Ernst bedacht zu seyn, und zu den Hülfsmitteln derselben aus dem Gebiet der Naturkunde nebst der Botanik, auch die Insektenkunde hinzuzuziehen. Es scheint zwar, daß eine Bekanntschaft mit den allerschädlichsten Forstinsekten der bloßen Nadelhölzer: als: dem Vorkenkäfer, dem Kiefernswärmer, dem Hpfel- oder Nornenspinner, dem Kiefernspinner und der Forl- oder Kiefernraute für den Revierförster schon hinreiche. Allein, wer kann uns dafür strehen, daß nicht von den bisher für minder schädlich gehaltenen Arten künftig nicht die eine oder die andere sich vermehre und für unsere Forsten verderblich werde x)? Daher müssen in einem Jagd- und Forst-Handbuch, so bald es mehrere Vollständigkeit, als andere dieser Art haben soll, auch alle im Holz und vom Laub der Bäume und Gesträuche lebenden Insekten mit ihren Larven durch Beschreibungen kenntbar gemacht werden, um wenigstens bei Gelegenheit nachschlagen zu können. Wenn z. B. ein Förster auf der Eiche bei 200 Arten dieser Geshwürfe (und das ist nicht zu viel) gewahr wird: wie vermag er da ohne Anleitung oder Handbuch,

die

x) Man denke nur an die Monus (Ph. Bomb. monacha Lin.) &

die darunter befindlichen nützlichen, z. B. Raupentödtter (Scheunmonswespen), oder den verrätherischen Lauskäfer (*carabus sycophanta* L.), oder mehrere Raubinsekten von den schädlichen, und bey diesen wieder die mehr schädlichen von den minder schädlichen Arten abzusondern? Denn die anscheinende Aehnlichkeit so vieler Arten mit und unter einander, die bey genauern Untersuchungen so wesentliche Unterschiede zeigen, machen einem Nichtkenner viel Verlegenheit. So war auch die sehr geringe Größe einiger derselben bisher Schuld, daß man sie übersah. Man glaubte kaum, daß Käferchen von ein Paar Linien Länge (Borkenkäfer) oder solche Raupen, wie die der Forsteule (*noctua piniperda*) ganze Waldungen räumten könnten. Man hätte wohl eher die großen Schrötter-Larven oder die großen rothen Raupen des Weidenholzspinners, *P. B. cossus*, die freylich auch mit unter die schädlichen gehören, für die schlimmsten Waldverheerer angesehen. Allein die Natur legte zum Glück den größern Arten größere Hindernisse ihrer Vermehrung in den Weg, als den kleinern. Sonst würde wohl die Larve des Birnspinners (*P. B. Pavonia maior* L. *Pyri* Vienn.) bey einer zahlreichen Nachkommenschaft große Strecken von Forsten verderben. Sie sorgte, daß dem Laubholz seine vielen Insektenarten nicht so großen Schaden zufügten, als dem Nadelholz seine wenigen Arten. Sonst würden die 200 Arten der auf Eichen lebenden uns kein festes Bauholz übrig lassen.

Ist, da die Forstwissenschaft größere Fortschritte macht, muß auch mit derselben die Insektenkunde, nicht in ihrer ganzen Vollständigkeit, sondern nur in Rücksicht theils der schädlichen, theils der nützlichen Forstinsekten verbunden werden. Den ersten ist in gegenwärtiger Schrift der größere Theil, den letzten ein kleinerer, oder vielleicht der Anhang gewidmet. Wobey man aber doch die Leser um gütige Rücksicht bitten muß, wenn einige derselben, eben weil sie weniger in Cabinetten vorkommen, kürzer, als man wünscht, beschrieben sind. Und wer kann alle vorhandenen, oft sehr kostbaren Insektenwerke ohne Unterschied theils selbst besitzen, theils zur Durchsicht erhalten!

Wir glauben, daß sich zwey Zerstöhrungsweisen der schädlichen Arten annehmen lassen: Die erste, da das Insekt die Rinde, den Splint, das innere Holz und die Wurzel angreift; die zweyte, da durch die äußere Beschädigung und Entblätterung der Bäume, diesen die Nahrung entzogen und das Wachsthum gehemmt wird.

A. Die von innen aus, den Ruin der Bäume verursachenden Insekten Deutschlands, wären denn:

I. Aus der ersten Ordnung (Coleoptera) in folgenden fünfzehn Gattungen zu suchen und aufzuzählen:

15 Kolbenkäfer des Linne; beyrn Fabricius 1 Baumnager, 6 Laub- 4 Schirmblumen- und 3 Metallkäfer.

4 Schrötter des Linne und Fabric.

- 27 Kleinfäfer, bey Fabr. 16 Borkenfäfer, 3 Splint- und 8 Kleinfäfer.
 3 Bohrfäfer des Linne, oder beyhm Fabr. 1 Federfamm- und 2 Hausfäfer.
 3 Todtengräber des Linne, beyhm Fabr. 1 Staub- 1 Kugelfäfer und 1 Rindennager.

Von 34 Rüsselfäsern des L., die beyhm Fabr. 4 Asterrüsselfäfer, 26 Rüssel- und 4 Vorkenfäfer ausmachen, gehört nur ein Theil hieher.

- 1 Asterrüsselfäfer, beyhm Fabr. 1 Waldfäfer.
 31 Vockfäfer des Linne, beyhm Fabr. 2 Forstkäfer, 7 Vock- 4 Zauberbock- 1 Schmalbock- 2 Zangenbock- 7 Schneckenfäfer und 8 Listfäfer.
 9 Schmalbockfäfer des Linne, beyhm Fabr. 1 List- 1 Schnecken- und 7 Schmalbockfäfer.
 1 Pastardbockfäfer des L., beyhm Fabr. Halbfäfer (Molorchus).
 2 Warzenfäfer des L., beyhm Fabr. Wersefäfer.
 5 Springfäfer des L. und Fabric.
 6 Prachtfäfer des L. und Fabric.
 1 Schattenfäfer des L. beyhm Fabr. 1 Kneipfäfer.
 4 Pochfäfer des Fabricius.

II. Aus der zweyten Ordnung, Lederflügler (Hemiptera).

- 3 Cicaden des L., beyhm Fabr. 2 Schildcicaden und 1 Singcicade.

III. Aus der dritten Ordnung, Staubflügler (Lepidoptera).

- 1 Schwärmer,
 2 Phalänen des L. beyhm Fabr. Vohrer (Cossus).
 1 Wickler.

IV. Aus der fünften Ordnung, Aderflügler (Hymenoptera).

- 6 Holzwespen.

B. Die, welche nicht durch unmittelbaren Holzfraß, sondern von außen durch Abnagen und Entblättern auf das innere Verderben der Bäume wirken.

I. Aus der ersten Ordnung, Schaafstügler, Käfer.

- 1 Laubfäfer des Fabr. aus den Linn. Kolbenkäfern.
 1 Schildfäfer des L. und Fabr.
 25 Blattfäfer des L., aus mehreren Fabr. Gattungen.

Ein Theil aus der Zahl der obigen Rüsselfäfer.

- 2 Asterrüsselfäfer des L. und Fabr.
 1 Blasenfäfer des L., beyhm Fabr. Pflasterfäfer.
 1 Zangenfäfer des L. u. Fabr.

II. Aus der zweyten Ordnung, lederflügler.

5 Cicaden, nämlich 2 Schaum- und 3 Baumd Cicaden.

5 Wanzen.

21 Blattläuse.

14 Blattfänger.

15 Schildläuse.

2 Blasenfüße.

III. Aus der dritten Ordnung, Staubflügler.

23 Falter des L., beym Fabr. 16 Falter und 7 Kleinflügler.

11 Schwärmer des L., beym Fabr. 6 Schwärmer, 3 Sesien und 2 Ingnen.

351 Phalänen, als 86 Spinner, 91 Eulen, 90 Spanner, 3 Fünfler, 34 Wickler, 45 Motten und 3 Geißchen, die beym Fabr. aber anders abgetheilt sind.

IV. Aus der fünften Ordnung, Akerflügler.

14 Gallwespen des L. und Fabr.

42 Blattwespen des L. und Fabr.

V. Aus der sechsten Ordnung, Balancierflügler.

2 Bachmücken des L. und Fabr.

VI. Aus der siebenten Ordnung, Ohnflügler.

3 Fußschwänzer des L. und Fabr.

2 Milben des L. und Fabr.

Däzel bestimmt ihre ganze Zahl mit Gleditsch auf 367, wir zählen weit mehrere, nämlich bey 700.

Man wird hieraus zugleich gewahr werden, daß die schlimmsten Holzerstörer von innen, aus den Gattungen der Borken- und Bockkäfer, und die durch ihren äußern Blätterfraß die innere Vegetation des Baums in Unordnung bringenden und dessen Absterben befördernden schlimmen, aus der Gattung der Schmetterlinge sind. Diesen letztern find einige einzelne Arten von Blüthenzerstörern, Früchlebenagern und Saamenkeim-Verzehrern beizuzählen.

Forstänner, deren Beruf sie beständig in ihre Reviere führt, werden einige derselben nur auf Laub- andere nur auf Nadelbäumen, und wieder andere auf beyden antreffen. Sie werden in manchen Jahren das nämliche Insekt früher antreffen, das sie in andern später fanden, und umgekehrt; welches nichts anders als Folge vom Clima, desgleichen von mehr oder weniger günstiger Witterung ist: daher in dieser Schrift mehrentheils die mitlere Erscheinungszeit angegeben werden mußte. Sie werden sehen, daß einige

nige nur Bäume von einerley, andere von mehreren Arten bewohnen, daß einige an Stämmen oder Ästen, in und unter der Rinde, oder im Holze, andere theils auf den Blättern, theils auf den Blüthen, theils auf und in den Früchten leben, daß einige sich am Fuß des Stammes in Rinde und Holz, andere an dem Gipfel in die frische Knospe einbohren; daß alle nur durch ihre Menge schädlich werden, auf welche Clima und Jahreswitterung Einfluß haben. Sie werden ein aufgefundenes Insekt, dessen Kenntniß sie wünschen, zuerst mit den Kennzeichen der Ordnung vergleichen, sie werden darauf selbst die Arten mit ihren Kennzeichen durchgehen, bis sie gefunden, welche Kennzeichen der Art auf solches passen. Nicht jedes verletzte Blatt hat seine Beschädigung von einem Insekt, sondern oft nur von Schnecken, welches sich dann durch die Art der Verletzung und durch die Spur von Schleim verräth. Die gerollten Blätter verrathen Raupen der Wicklerphalänen und der Rüsselkäfer.

Die Blätter mit gesonderter Ober- und Unterhaut dienen, oder haben entweder Blattminirmotten oder Rüsselkäfern zur Nahrung gedient. Die Anwesenheit der Ameisen ist zuweilen Anzeige naher Raupen, zuweilen auch der Blattläuse. Jene werden von ihnen verletzt, diese aber belect und niemals getödtet. Nur die Marienkäfer und die Florfliegen sind Blattlaustöddter, nie aber die Ameisen, die vielmehr die Ausleerungen der Blattläuse weglecten.

Zuweilen findet der Forstmann Gelegenheit, fehlende Lücken der Naturgeschichte eines einzelnen Insektes durch einen günstigen Zufall zu ergänzen, wenn es Raupen oder andere Larven zur Verwandlung bringt, deren Wohnort und Nahrung bisher ungewiß und unbekannt war, dieß aber nur unter der Voraussetzung, daß die Zeit dazu den Dienstgeschäften nicht entzogen werde. So ist es auch mit der Untersuchung und Vergleichung der Insekten, welche zum Beschlusse dieser Schrift als nützliche Geschöpfe angeführt werden sollen. Gegenden im Holze, z. B. wo in den Monaten May und Junius viele Wassernymphen, Libellulae L. schwärmen, und mit ihren blauschillernden Flügeln die Zweige der Bäume an Waldwegen umflattern, werden durch solche von Raupen und verschiedenen Schmetterlingen rein gehalten, und solche Wassernymphen — sind schonenswerth.

Aber wozu, möchte man fragen, sind die Feld- und Waldbäume, deren Saamen und Früchte ohnehin von Menschen, Thieren und Vögeln aufgesucht werden, noch ebendrein so vielen Insekten Nahrung? Gewiß, auch hier liegen Ursachen verborgen, die sehr zweckmäßig sind, und auf wesentlichen Nutzen hinielen. Denn man hat ausgemacht, daß eine zwölfjährige Ulme über 164500, schreibe, hundert vier und sechzig tausend und fünfshundert Saamen, nicht blos Blüthen, sondern wirklichen Saamen, in einem einzigen Jahr trage, die dann binnen andern zwölf Jahren, wenn nichts hindert, eben so große Bäume als der Mutterbaum werden, und unter eben dieser Bedingung eine dreieinzigste Zahl von weit über 26960 Millionen Bäumen hinter sich lassen werden. Damit nun nicht die halbe Erde eine Waldung, der Raum für die darauf wohnenden Menschen nicht verengt, ihre Gesundheit nicht gefährdet werden, viele Naturschönheiten für sie nicht verloren gehen;

gehen; damit nicht eine große Menge von Thieren allerley Art, und vor 29 bis zetaufsend Pflanzenarten der Raum gänzlich mangeln möge; so hat der weise Urheber der Natur die Einrichtung gemacht, daß holzverzehrende Insekten mitunter seyn müssen, denen allzustarke Vermehrung wieder theils fleischfressende Vögel, theils Raubinsekten und Raupenwider entgegen gesetzt sind. Hierdurch wird ein verhältnißmäßiges Gleichgewicht erhalten, und auf der einen Seite die Vermilderung der Erdgegenden, auf der andern dem Holzangel Grenzen gesetzt. Die Menschen sind es also, die diesen Natureinrichtungen nicht entgegen arbeiten, die die schonenswerthen Geschöpfe unter Vögeln und Insekten nicht vertilgen sollen; sie sind es, die überhaupt der Kenntniß der Natur einen Theil ihrer Zeit widmen, die Erfahrungen anderer benützen, und neuen Vorbauungsmitteln nachdenken sollen, um größern und kleinern Waldverheerungen zuvorzukommen.

Es sind noch verschiedene von Fabricius und in der Panzer'schen Faune vorkommende, an Bäumen sich vorfindende Käfer, nämlich aus den Gattungen: *Cetonia*, *Chrysomela*, *Curculio*, *Elater*, *Ips*, *Lamia*, *Lymexylon*, *Prionus* u. *Trichius*, in Deutschland einheimisch, von denen aber nicht mit Gewißheit gesagt werden kann, daß sie wirkliche Forstverheerende Insekten seyen, so wenig wie von den Fabric. Gattungen der Rindenkäfer, *Cucujus*, und der Kiefläfer, *Lyctis*, dergleichen zu behaupten ist. Denn nicht alles, was an Bäumen und deren Stöcken, oder zwischen der Rinde krieucht und steckt, hat sich daselbst als Larve genährt; öfters sind dergleichen Stellen nur Verbergungsörter für sie; so wie jedermann weiß, daß nicht alles, was von Schmetterlingen durch die Wälder fliegt, den Forstinsekten bezzuzählen sey. Und manche sind von jenen Schriftstellern auch nicht hinreichend genug beschrieben.

Was daher die in Gleditsch Einleitung in die Forstwissenschaft 1775. Berlin, vorkommenden Insekten betrifft, die auch ohne alle Sonderung in Wagners u. Hebig's botanischem Forsthandbuch von 1800, zu Lauterbach gedruckt, welches manche Vorzüge hat, ob es gleich zu viele Forstpflanzen aufnimmt, und die Forstunkräuter nicht absondert, im Anhang verzeichnet stehen; so sind zwar die wirkliche hieher gehörigen aus Gleditsch Werke angeführt, allein, wie sich von selbst versteht, die, von denen man gewiß weiß, daß sie weder im unvollkommenen Stand auf Bäumen und Gesträuchen leben, noch im vollkommenen Stand denselben schädlich werden, ja die nicht einmal auf Forstunkräutern leben, weggelassen worden. Die ausgelassenen Insekten sind in alphabetischer Ordnung folgende:

1. Acari: *Acarus salicinus*. Gehören zu den schonenswerthen.
2. Aphis *Rhamni*. Nicht im Linné, nach andern Autoren.
3. Carabi: *Carabus inquisitor*. Ist schonenswerth.
4. *Chrysomela elongata* (*Lagria* F.) ist ausländisch.
5. *Coccinellae*, dreierley, alle schonenswerth.
6. *Cimices*, Wanzen, 14 Arten, alle schonenswerth.
7. *Dermestes pulicarius*, kleinster Blumenfloh, ein unschädlicher Kleinkäfer.

8. *Ichneumon Bedeguaris* L., ebenfalls schonenswerth.
9. *Lampyris noctiluca*, bey *Gleditsch cantharis noctiluca*.
10. *Musca ribesii* L., schonenswerth.
11. *Papiliones*: *Arion*, *Comma*, *Euphrosyne*, *Hyperanthus*, *Janira* (*Pamphilus Hufnagelii*), *Jo*, *Latonia*, *Ligea*, *Maturna*, *Nephele* (*Pamphilus* L.) *Semele*.
12. *Phalaenae alucitae*, nämlich *Ph. aluc. didactyla* L.
13. *Phalaena Bomb. Castrensis* L.; *Putris*, (nicht die *sinneische*).
14. *Phalaenae Geometrae*: *Amata*, das ist *Amataria* L.; *Bicolorata et Contaminata* (Ein *Geschöpf*); *bisetata*; *chenopodiata* L.; *clathrata* L.; *corculata*, das ist, *Linaria* Borkhaus.; *Dilatata*; *Emarginata et Erosata* (Ein *Geschöpf*); *Fluctuata* L.; *Lactearia* Hufnag.; *Muricata* Hufn.; *Nigropunctata* Hufn.; *Obliterata*; *Purpuraria*; *Pustulata* Hufnag.; — *Rectangulata* Hufn. das ist, *Viridaria* Fab.; *Tiliaria* Hufn.; *Tridentata* Hufn.; *Tristata* L.
15. *Phalaenae Noctuae*: *Bicolor* Hufn.; *Comma*, *Fuliginosa*; *Lunula*, das ist, *Linariae* Esp.; *Matura*, das ist *Texta* Esper.; *Munda*, das ist *Mundana* L.; *Muscerda* Hufn.; *Pronuba* L.; *Putris* Hufn.; *Ruficornis* Hufn.; *Tridens* Hufn. das ist *Virens* L.
16. *Phalaenae Pyralides*: *Rostralis* L.
17. *Phal. Tineae*: *Arbutella* L.; *Corticella* L.; *Nemorella* L.; *Tessella* L.; *Trigonella* L.
18. *Phal. Tortrices*: *Fusca* L.; *Hamana* L.; *Lediana* L.; *Literana* L.
19. *Sphinges*: *Atropos*; *Convolvuli*; *Culiciformis*; *Elpenor*; *Porcellus*.

Was unter solchen Schonung verdient, wird unter die schonungswerthen gesetzt werden, deren Zahl ohngefähr anderthalb hundert seyn wird.

Auch werden einige *Gleditsche* theils wegen ihrer Nahrung von Forstunkräutern, theils weil man sie auf ihnen sonst ungewöhnlichen Nahrungspflanzen angetroffen, mit in den Anmerkungen vorkommen.

Beschreibung

der

schädlichen Forstinsekten.

Dritter Abschnitt.

Beschreibung der schädlichen Forstinsekten.

Erste Ordnung.

Forstinsekten mit ganzen Flügeldecken. Die Käfer. Coleoptera Lin.
Eleutherata Fab. Schaafkügler.

Kennzeichen der Ordnung.

Sie haben zwei häutige geaderte Flügel, die von einer Art von Scheide bedeckt werden, welche man Flügeldecken nennt. Diese sind auf der einen Seite gewölbt, auf der andern ausgehöhlt; lederartig, ziemlich hart, und stoßen in einer geraden Linie, der Naht, an einander.

Ein großer Theil der Käfer macht sehr wenigen, oder gar keinen Gebrauch von seinen Flügeln. Letztere bewegen sich durch Gehen oder durch Springen von einem Ort zum andern. Ja einige haben gar nicht einmal Flügel.

Was von der Erzeugung der Insekten überhaupt, von ihrer Verwandlung und Häutung, von ihrer Nahrung und Lebensart, von den Theilen des Körpers, von ihrer systematischen Eintheilung, bereits in der Einleitung ausführlich gesagt worden, gilt größtentheils auch von dieser ersten Ordnung. Daher nur die Theile ihres Körpers und ihre vier Stände hier anzugeben sind.

Der Kopf (des vollkommenen Käfers) besteht aus zwei Fühlhörnern, zwei Augen und dem Munde. Nur der Tauchkäfer (Cyrinus) hat vier Augen. Der Mund be-
steht

steht aus einer Lefze, zwey Kinnbacken, zwey Kinnladen, einer Lippe, und aus vier oder sechs Fühlern.

Der Leib begreift den Halschild, der auch Brustschild genannt wird, den Ober Rücken, den Rückenschild oder das Schildchen, die Brust, das Brustbein und den fünf- oder sechsringigen Unterleib, dessen Oberseite der Bauchrücken, und dessen Unterseite der Bauch genannt wird. Jeder Bauchring hat auf jeder Seite ein Lustloch, deren also zusammen zwölf sind.

Die Gliedmaßen sind: die zwey Flügel, die zwey Flügelbecken und die sechs Beine. Jedes Bein besteht aus mehr Stücken, aus der Hüfte, Schenkel, Schienbein und dem Fuß oder den Tarsen, welche entweder drey, vier oder fünf Glieder haben, die sich in zwey oder vier Klauen endigen.

In ihrem ersten Stand sind sie Eyer, im zweyten Larven, welche zwölf bis dreyzehn Ringe, und entweder gar keine, oder sechs ziemlich harte Beine, und achtzehn Lustlöcher haben, die am ersten, vierten, fünften, sechsten, siebenten, achten, neunten, zehnten und eilften Gelenke oder Absätze stehen. Am zweyten, dritten und zwölften aber, fehlen sie. Einige haben sehr kurze Fühlhörner, aber keine hat Augen. Die sich von Pflanzen nähren, als die Chrysomelen (*chrysomelae et galerucae* Fab.) bleiben gewöhnlich nur einen Monat in dieser Gestalt. Diejenigen aber, die von Holz oder von Wurzeln leben, und von denen man noch viel zu wenige kennt, bleiben ein bis drey Jahre, ja wohl noch länger, Larven. Sie häuten sich drey- oder viermal vor ihrer Verpuppung, zum Beispiel, der Maykäfer alle Jahr einmal. Ihr Mund ist mit Fresswerkzeugen versehen, welche ihrer Lebensart angemessen sind. Die auf Pflanzen haben weichere Kinnbacken, als die vom Holz sich nähren. Im dritten oder Puppenstande bleiben sie nahrunglos, und bewegen sich nicht. Durch die Haut, welche die Puppe bedeckt, erkennt man alle die äußern Theile des vollkommenen Insekts. Die Laubkäferpuppen liegen in der Erde in einem Gehäuse verborgen. Ihr vierter Stand ist der vollkommene oder Enthüllungsstand.

Der Ritter von Linné hat drey Abschnitte der Käfer gemacht. Erstlich die, welche mit derben, d. i. solchen Fühlhörnern versehen sind, die am Ende einen Kopf haben, wozu folgende Gattungen von Forstinsekten gehören: *Scarabacus*, *Lucanus*, *Dermestes*, *Attelabus*, *Curculio*, *Silpha*. Zweitens die mit fadenförmigen, oder durchaus gleich dicken Antennen, nämlich: *Cassida*, *Plinus*, *Chrysomela*, *Meloe*, *Tenebrio*. Drittens die mit borstenförmigen oder solchen Fühlhörnern, welche von der Wurzel bis zur Spitze in der Dicke unmerklich abnehmen, als: *Cerambyx*, *Leptura*, *Cantharis*, *Elater*, *Buprestis*, *Necydalis* und *Forficula*.

Wir werden bey jeder Gattung auf die mehr und die minder schädlichen Arten sehen, und bey jeder Art zuerst die Benennung, Synonymen und Nachweisung der Ab-

bil-

bildung, hierauf die Diagnose beifügen, so dann die Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts liefern, weiterhin dessen Aufenthalt, Fortpflanzung und Feinde anführen. Sind Mittel gegen ihr nachtheiliges Ueberhandnehmen vorhanden, so werden solche nicht übergangen werden. Noch ist folgendes anzuführen nöthig:

- 1) daß bey der Literatur und Synonymie, von den vielen entomologischen Schriften des Fabricius nur dessen *Entomologia systematica*, und die besten Abbildungen allegirt worden sind.
- 2) daß da, wo das Insekt seinen Trivialnamen von einer Pflanze oder Baum erhalten hat, z. B. *Chrysomela Alni*, *Betulae*, *Cerasi* etc. sich solche Gewächse auf die Nahrung, nicht des Käfers oder Insekts, sondern seiner Larve gewöhnlich beziehen. Wir sagen, gewöhnlich; denn die Larve lebt nebenbey auch noch von andern Gewächsen, die alsdenn mit angegeben werden. Oder es ist der Fall gewesen, daß Linne sich mit der Futterpflanze geirrt hat, z. B. bey *Papilio Rubi* u. *Phal. Rubi*. Der Aufenthalt der Larve ist selten der Aufenthalt des vollendeten Insekts.
- 3) daß die deutschen *Species*-Namen mit Vorbedacht nicht aus Müllers Uebersetzung des Linneischen *N. S.* genommen sind, weil sie mehrentheils unpassend, oft abentheuerlich und fast nie systematisch sind, und den Beyfall der Naturforscher gar nicht haben, — auch nicht aus Gleditschens Forstwissenschaft; sondern daß, so weit sichs thun läßt, die deutschen Trivialnamen der Käfer und anderer Insekten den lateinischen nachgebildet sind, nach dem Vorgang der Herren Brahm, Illiger, Schrank, Scriba, Schneider ic. Bey den Schmetterlingen aber behalten wir die von der Nahrungspflanze hergenommenen deutschen Namen des Wiener Werks bey, und die später entdeckten Larven, werden ebenfalls mit ihren Schmetterlingen von den Futterpflanzen benannt.

Erste Gattung.

Die Kolbenkäfer. *Scarabaei* L.

Sie heißen: Käfer, Scharrkäfer und ein großer Theil derselben Dungkäfer.

Aus dieser zahlreichen Gattung, daraus Hr. Fabricius in dem *Systema Eleutheratorum* zehn bis eils Gattungen gemacht hat, gehören nach Verhältniß nicht viele Arten hieher. Denn da die Kolbenkäfer, die einen bewaffneten Kopf oder Halschild, oder beydes zugleich haben, im Larvenstand in Viehdung und Kotz leben, so machen sie dem Forstmanne keine Besorgnisse.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Die Fühlhörner sind keulförmig und am Ende mit einem gespaltenen Knöpfchen versehen. Die Schenkel sind mehrentheils vornen gezähnt. Die Larve hat sechs nicht unbeträchtliche Füße, kann aber damit nicht gehen, sondern liegt gekrümmt an der Seite, und lebt, was die Laubkäfer betrifft, von Wurzeln; was aber die Baumnager, Sinodendron, Schirmlumenkäfer und Metalkäfer betrifft, in und von morschem Holz. Die übrigen Larven leben im Viehdung, und gehören, wie gesagt, nicht hieher.

Die Gattungskennzeichen der hier vorkommenden Fabricius'schen Gattungen sind folgende: Fabr. Entomol. systemat. Der Schirmlumenkäfer No. 75. Trichius: Die vier Fressspitzen sind fadenförmig; die Kinnlade ist gespalten; die Fühlhörner haben ein blätterichtes Kölbchen am Ende. Der Metalkäfer No. 76. Cetonia: Die Kinnlade ist an der Spitze borstig; die lederartige Lippe ist ausgerandet und bedeckt die Fressspitzen; die Fühlhörner haben blätterichte Kölbchen. Der Laubkäfer No. 77. Melolontha. Die kurze Kinnlade ist hornig, an der Spitze vielgezähnt. Die Fühlhörner haben ein Kölbchen am Ende. Der Baumnager No. 94. Sinodendron. Die Fressspitzen sind fadenförmig und ungleich; die untere Kinnlade (maxilla) ist einzahnig; die Lippe ist fadenförmig, hornartig und enthält an ihrem Ende die Fressspitzen; die Fühlhörner sind an den Kolben geblättert.

Seine sogenannten äußern Gattungskennzeichen (characteres secundarii), die er von dem äußern Habitus *y*) hernimmt, und um der Anfänger willen in der Entomol. systematica beybringt, sind folgende: 75. Trichius: Der Körper ist rund, etwas niedergedrückt, rauh, ungerandet, träge; der Kopf ist rund, eingezogen, mit hervorragender Lippe, runden, seitwärts stehenden Augen, die nicht viel hervorragen, und kurzen nicht zu nahe beisammen stehenden Fühlhörnern, die unter den Augen eingefügt sind; der Halschild ist vornen schmal und rauh; das Schildchen klein und dreheficht; die Flügeldecken steif und kürzer als der Hinterleib; die Füße sind kurz und stark; die vordern Schienbeine gezähnt, mit fünfgliedrigen Fußblättern; die Farbe des Insekts ist bunt. 76. Cetonia: Der Körper ist oblong, unbehaart, ungerandet, glattanliegend und träge; der Kopf rund und eingefügt; mit hervorstehender Lippe, am Rand verstärkt; mit kugelfichten seitwärts stehenden Augen, und kurzen, abstehenden Fühlhörnern, die unter den Augen angewachsen sind; der erhabene Halschild ist vornen schmal; das Schildchen länglich und dreheficht; die Flügeldecken steif, gewölbt, nicht viel länger als der Hinterleib; die Füße sind kurz, stark, an den Schienbeinen gezähnt, mit fünfgliedrigen Fußblättern. Die Farbe des Insekts ist öfters glänzend.

77. Melolontha. Der Körper ist oblong, höhericht, filzhaarig, glatt anliegend, ohne Rand, träge; der Kopf rund, mit runder Lippe, kugelfichten und seitwärts

y) Ich behalte dies Wort mit Bedacht bey. Es bedeutet das äußerliche Ansehen des ganzen Insekts, oder die Uebereinstimmung der

Theile bey denen zu einer Gattung gehörigen Arten; manche übersetzen es: Bau, Körperbau.

siehenden Augen; mit kurzen, unter denselben eingefügten Fühlhörnern; der Halschild ist seitwärts ausgehend, und vorwärts fast gerade abgeschnitten; das Schild den rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, von der Länge des Hinterleibes; die Füße kurz, stark, an den Schienbeinen gezähnt; die Fußblätter füngliedrig. Die Farbe ist bey den meisten zweyfarbig; (schlecht)...

94. Sinodendron. Der Körper ist walzenförmig, unbehaart, ungerandet, vornen und hinten abgestumpft, träge; mit kleinem, runden, platten Kopf, an dessen Rande die kleinen, runden Augen stehen; die Fühlhörner sind zurückgebogen und unter den Augen eingefügt; der Halschild ist höher, vornen abgestumpft, gewölbt oder ungleich; das Schild ist klein, dreieckicht; die Flügeldecken sind steif, gewölbt und umschließen den Hinterleib, auch sind sie zuweilen zurückgebogen und sägezähnt; die Füße sind kurz, stark, die vordern Schenkel mit Zähnen und die Fußblätter mit fünf Gliedern versehen. Die Farbe der meisten Arten ist dunkel.

Es sind zwey Abtheilungen zu machen: 1) Kolbenkäfer mit gehörntem Kopf und gezähntem Halschild. 2) Mit unbewaffneten Kopf und Halschild.

Erste Abtheilung. Mit bewaffnetem Kopf und Halschild.

Weniger schädliche.

1. Der Walzenkäfer. *Scarabaeus cylindricus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Baumnager, Sägekäfer, Rundbauch, cylindrischer Kolbenkäfer, walzenförmiger Scharfkäfer, Schrotkäfer.

Scarab. cylindricus. Linnæi Systema Naturae editio XII. Seite 544. No. 11.

— — — — Müllers Einseich. Natursystem, übersezt, fünfter Theil. Seite 56. No. 11.

Sinodendron cylindricum. Fabricii Entomologia systematica. 1. 2. Seite 358. No. 1.

— — — — — Walther's Forstphysiographie 1800. Herborn 10. S. 352.

— — — — — Panzeri Fauna insectorum German. Heft 1. tab. 1. — Heft 2. tab. 9.

Schäfferi Iconum Insectorum Ratisbonnensium. II. tab. 201. Fig. 1. 2.

Gulzer's abgetürzte Geschichte der Insekten. Winterthur 1776. tab. 1. fig. 2.

Kennzeichen der Art.

Er ist überall schwarz und beynah walzenförmig; der gestufte Halschild hat beym Männchen fünf, beym Weibchen drey Zähndchen. Das Kopshorn ist zurückgekrümmt, und beym Weibchen kleiner.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Dieser Käfer, den Fabricius mit Recht von den Kolbenkäfern gesondert hat, ist sechs bis siebenthalb Linien lang 2), schwarz, etwas glänzend, beynahе walzenförmig, so lang wie der Frühlings-Mistkäfer, aber schmal. Die Fühlhörner sind braun, und haben an der Spitze drey blätterichte Glieder. Der Kopf ist mit einem in die Höhe gerichteten, zurückgekrümmten, hinten etwas gelb behaarten Horn bewaffnet. Der Halschild ist glänzend, sparsam punktiert und vornen gestuft. Das Schildchen ist klein. Die Flügeldecken sind stark punktiert, nach hinten zu muschelbraun. Das Männchen hat ein starkes, das Weibchen ein kurzes Horn oder Höckerchen. Letzteres hat auf dem vornen abgestuften Halschilde, statt fünf, nur drey, und zwar hervorragende Zähne, und eine etwas erhöhte glatte Längslinie.

Aufenhalt.

Im May und Juni in modernden Bäumen und Stämmen, z. B. der Eichen und Kirschen, in dem nördlichen Europa, auch bey uns hier nicht so selten. Walthers am ang. Orte hält ihn für so unschädlich als den Hirsch-Schröter.

Zweite Abtheilung. Mit unbewaffnetem Kopf- und Halschilde. Drey Familien.

Erste Familie.

Die Fühlhörner haben ein blätterichtes Kölbchen am Ende; die Fressspitzen ein länglich rundes Knöpfchen am Ende; der Halschild ist breiter, als lang; die Schienbeine der Vorderfüße sind gezähnt. Es sind die Fabriciussischen Laufkäfer.

A. Die mehr schädlichen.

2. Der Maykäfer. *Scarabaeus melolontha* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gemeine Maykäfer, Maykolbenkäfer, May-Laubkäfer, Baumkäfer, Kreuzkäfer, Laubkäfer, Müller.

Scarabaeus melolontha Lin. 554. 60. Müllers Uebersetz. 80. 60.

Melolontha vulgaris Fab. Entom. 1. 2. 154 nr. 3.

Scarab. melolontha. Gleditsch Einleitung in die Forstwissenschaft. 2 Bände. Berlin, die Edition in gr. 8. 1775. I. 476.

— — — — — Beschreibens kurze doch gründliche Musterung aller bisher für schädlich geachteten Thiere u. Gotha 1792. S. 151.

Kösel von Rosenhof Insekten: Belustigung. Nürnberg 4. II. Band. 1. Klasse. Käfer t. 1.

Kennt

2) Die vorkommenden Ausmessungen sind nach dem Pariser Maßstabe gemacht.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer.

Er ist unbewehrt und kupferbraun, mit schwarzem, zuweilen kupferbraunem, behaarten Halschild, eingebogener Schwanzspitze und weißen Einschnitten am Bauch.

Die Larve

ist gelblichweiß mit pomeranzenfarbenem Kopfe, dunkelbraunem Zangengebiss und violengrauem After.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Es ist ein und ein Viertel Zoll lang. Kopf und Halschild sind schwarz, und die Flügeldecken ziegelfarben oder kupferbraun. Die Ringe am Unterleibe sind weiß, und auf den Einschnitten befinden sich dreieckichte, spizig zulaufende weiße Flecken. Der Hinterleib ist spizig abwärts gebogen. Das Männchen hat an den Fühlhörnern einen größern sieben-, das dickere Weibchen aber, einen kleinern sechsblättrigen Büschel. Als Käfer überlebt er keinen Sommer. Es giebt auch Varietäten mit gleichfarbigem Kopf- und Halschild; und große und kleine, je nachdem ihre Nahrung als Larve überflüssig oder kümmerlich war. In unfruchtbaren Sandgegenden sind sie daher immer kleiner und das Halschild ziegelfarben.

Die Larve, gewöhnlich Engerling genannt, die den Alten unter dem Namen: Spondylis, bekannt war, hat ausgewachsen anderthalb Zoll Länge, und ohne den Kopf zwölf Absätze von gelblichweißer Farbe. Der pomeranzenfarbige Kopf ist mit einem dunkelbraunen Zangengebiss oder zwey Kinnbacken bewaffnet, und der After ist violengrau. Ihre Fühlspitzen sind gelbbraun und fünfgliederig. Sie gleicht mehrentheils der Schräterlarve, und nährt sich von den Wurzeln des Getraides, der Gräser und der Feldgartengemüse, die sie benagt, und ihren Untergang befördert.

Die Puppe, von unrein röthlichgelber Farbe, ist oft ein Klasten tief in der Erde verborgen, wo sie in einem Gehäuse eingeschlossen ist, und überwintert. Die aber, welche sich im Junius oder Julius verpuppen, brauchen nur vier bis fünf Wochen bis zur Entpuppung.

Aufenthalt, Nahrung und Fortpflanzung.

Die Käfer befinden sich im April und May auf Bäumen, wo sie bey Tage, am meisten aber des Nachts umherschwärmen, und die Larven leben an den Wurzeln der Gewächse. Die Begattung geschieht im May, und zwar am liebsten in den Morgen- und Abendstunden, bey lieblicher, windstiller Witterung, weil Sonnenhitze, Regen und Stürme das Insekt nöthigen, sich zu verbergen. Bald nachher begiebt sich das Weibchen über oder unter einer Spanne tief in die Erde, die sie mit ihrer Schwanzspitze auflockert, um darein seine Eyer, zwanzig bis dreysig an der Zahl, nicht auf einmal, sondern

dern in verschiedenen Zeitfristen einzeln und zerstreut fallen zu lassen; worauf es entweder bey seinen Eiern bleibt und stirbt, oder wieder hervorkömmt und das Laub noch einige Wochen benagt. Im August und September kommen erst die jungen Larven aus der Eierschale und thun in der Herbsternde nicht viel Schaden, liegen beim kommenden Winterfrost sechs Schuh tief in der Erde. Ihr Wachsthum dauert bis zur Entwicklung eigentlich in der Regel drey Jahre. Gemeinlich thun sie im zweyten Jahr an Heu und Grummet, desgleichen am Getraide, Kartoffeln und Gartensachen den größten Schaden, und im dritten schaden sie noch dem Heu. Die ausgewachsene Larve verpuppt sich gemeinlich zu Ende des Sommers im dritten Jahr, in einem glatten und ebenen Gehäuse, sehr tief im Erdboden, um schon im nächstfolgenden Januar oder Februar in den vollkommenen Stand als Käfer zu treten, und noch so lange als solcher in der Erde zu bleiben, bis die völlige Wärme kommt. Späteres Auskriechen aus dem Ey, magere Nahrung in den ersten Wochen und Monaten ihres Lebens, nasse kalte Jahrgänge, künstliche Auffütterung, nebst andern Ursachen, machen viele Larven zu Spärlingen. Dies erfordert denn, was auch andern Insekten, selbst von einerley Brut, nicht selten begegnet — ein oder auch zwey Jahre längere Zeit, um sich entweder zu verpuppen, oder aus der Puppe sich entwickeln zu können. Nach vollendeter Paarung, bald darauf, wenn die Baumblüthen abfallen, das ist, nach einem Schwärmen von sechs bis acht Wochen, ermatten sie und gehen alle sammt und sonders zu Grunde, ohne jemals wieder zu erscheinen.

Feinde.

Den Käfern stellen die Dornkreher, Saatkrahen, Sperlinge, Finken, Enten, welsche Hühner, Haushühner, Eulen, Frösche, Fledermäuse, den Larven aber die Eisker, Rabenkrähen, Nebelkrähen, Grünspechte, dann die Maulwürfe und Schweine nach.

Schaden.

Es ist desselben zum Theil schon gedacht worden. —

Sie werden zuweilen eine Landplage, und fressen als Käfer Blüthen und Laub von Buchen, Eichen, Weiden, Ahornarten u. in Wäldern, und von Obstbäumen in Gärten gänzlich ab. Vorzüglich werden sie an Eichen und Buchen den Gränzen der Waldungen sehr nachtheilig, deren ganzer Jahrausschlag verloren geht, und deren Säfte stoffend werden. Oder sie verursachen im Larvenstand durch ihre Menge Mißwachs des Getraides, wie z. B. im Jahr 1735, wo man im Elsaß, nach Reaumur *histoir. des insect.* 2. S. 327 zur Abwendung ihres Fraßes, um die Erlaubniß ansuchte, eine solenne Procession halten zu dürfen. Sogar im Jahr 1479 wurden die Engerlinge in einem weitläufigsten Monitorio vors geistliche Gericht zu Lausanne citirt, das ihnen zwar einen Advokaten aus Freyburg zugesand, sie selbst aber nach reiflicher Ueberlegung in den Damm that. S. Mich. Stettler Schweizer Chronik S. 278.

Mittel dagegen.

In wirksamen Mitteln, ihre Larven überhaupt, und also auch in Wäldern, zu vermindern, sind wir noch zu arm: allein, wenn wir mit vereinten Kräften an ihre Vertilgung dächten, so wäre ihrer schädlichen Vermehrung leicht dadurch zu steuern, daß man z. B. durch die Schulkinder in jedem Orte, bei einem Käserjahre, zu Ende des Aprils oder im May die Wald- und Gartenbäume etlichemal schütteln und die Käfer todt treten ließ. Sie sollen auch für die Hühner eine nahrhafte Speise seyn, wenn man sie ihnen mäßig zum Futter giebt.

Man lese auch Christian Jakob Genslers Traktätchen: Der Maykäfer und seine Larve, ökonomisch betrachtet, nebst den Mitteln, ihre schädlichen Wirkungen zu vermindern. Gotha, 1796 bey Ettinger. Auch ist eine Preisaufgabe von der ökonomischen Gesellschaft zu Bern im Reichsanzeiger des Jahres 1803. No. 128. S. 1697 bekannt gemacht worden: Die Verminderung der Maykäfer und ihrer Larven, der Engerlinge betreffend. —

B. Die weniger schädlichen.

3. Der Juliuskäfer. *Scarabaeus Fullo*. Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Der gefleckte oder große Juliuskäfer, Walzer, Müllerkäfer, Tiger und Müllerlaubkäfer.

Scarabaeus Fullo. Lin. 553. num. 57. Mätker 77. num. 57.

Melolontha — Fab. Ent. I. 2. 154 num. 1.

Scarabaeus — Sultzer's abgef. Geschichte I. Vignette 1.

Schäffers Icon. t. 23 f. 2.

Boets Käfer 7. 6. fig. 48. 49.

Nöfel IV. t. 30.

Fullo albis guttis bey Plinius in dessen histor. natur. lib. 30. cap. 11.

Kennzeichen der Art.

Kopf und Halschild sind unbewehrt, die Fühldörner siebenblättrig, die Flügeldecken bunt mit zwey weißen Flecken am Schildchen; der schwarze Leib ist gelbroth behaart.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der bloße Körper dieses Laubkäfers, wovon das Männchen einen Zoll und fünf Linien, das Weibchen eine Linie weniger mißt, ist schwarz mit gelbrothen Haaren. Die kastanienfarbigen Flügeldecken sind mit weißen Makeln, Fügen und Punkten, wie mit Blumenwerk verziert. Der sehr stumpfe Kopf und der Halschild sind auch weißlich gefleckt. Letzterer hat auch einen weißen Längsstrich, und das Rückenschild hat zwey dergleichen

gleichen eyrunde Flecken. Die Einschnitte des Unterleibs sind weißgefleckt. Der Körper läuft hinten spitzig zu, und ist umgebogen. Die Fühlhörner des Männchen sind noch blätterichter und länger, als bey den übrigen. Des Weibchens seine sind kleiner. — Er ist noch einmal so groß als der Maykäfer.

Von den ersten Ständen dieses in unsern Thüringischen und Hennebergischen Gegenden nicht vorhandenen, und auch an andern Orten etwas seltenen Laubkäfers, der von seiner Flugzeit im Julius, seinen deutschen Namen erhalten hat, kann nichts zuverlässiges gesagt werden. Nach der Analogie zu schließen, wird Ey, Larve und die ganze Lebensart vieles mit dem Maykäfer gemein haben.

Aufenthalt.

Sein Aufenthalt ist nach Linné und andern, auf Eichblättern, Linden, Pappeln, Schilfgras (*arundo arenaria*), Sandgras (*elymum arenarium*), und Heidekorn, in den Dünen oder Sandhausen.

Schaden und Mittel dagegen.

Seine Schädlichkeit ist oft von Bedeutung. Schon hatte er sich, nach Frischens Erzählung l. c. 1731 im Julius bey Straußberg im Brandenburgischen als schädlich bekannt gemacht, da er nicht nur Waldbäume, besonders Eichen, entblätterte, sondern auch das Sand- und Schilfgras verheerte. Auch in den neuern Zeiten war er theils im Zerbstischen, theils in dem Brandenburgischen in Kiefer-Waldungen einsamahlen sehr häufig. Es läßt sich das Mittel, das bey dem Maykäfer angegeben ist, auch auf ihn anwenden, doch ist ihm nicht so leicht beizukommen, da er gewöhnlich auf großen hohen Bäumen sitzt.

4. Der Feld-Laubkäfer. *Scarabaeus agricola*. L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ackermann, Feldkäfer, Feldkolbenkäfer, Feldscharrkäfer, Acker-Laubkäfer.

Scarabaeus agricola Linn. 553. 58. — Müller 79. 58.

Melolontha agricola Fab. Ent. l. 2. 173. n. 74.

— — et crucifera Schrank Fauna l. 409.

Scarabaeus cyathiger, Scopoli Entomologia Carniolica. 6.

— — *agricola*. Brahm's Insekten-Calender für Sammler und Oekonomen. 1790. Maynz l. 124. 431.

Melolontha agricola. Panzeri Fn. Heft 47. Taf. 10.

Schäfferi *Icones* t. 63. f. 1, Von Fabricius allegirt.

Kennzeichen der Art.

Der Kopf und Halschild sind schwarzblau, und die Flügeldecken rostgelb; der Kopfschild ist am Ende zurückgebogen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist vier Linien lang, mit feinbehaarten, bald schwarzkupferlichten, bald schwarz-blauen Kopf und Halschilder, und gelben, schwarzgesäumten Flügeldecken, die eine schwarze, an der Naht gebogene, gemeinschaftliche Mackel haben, die Scopoli mit einem Becher vergleicht. Der Kopfschild ist am Ende zurückgebogen. Die Füße sind schwarz, die Klauen aber scheinen ins Röhliche zu fallen. Die Flügeldecken bedecken den Hinterleib nicht völlig. Auf der Unterseite ist der ganze Käfer weißlich behaart. Er ist um ein geringes stärker, als der nachfolgende Garten-Laubkäfer. Meine (Scharfenbergs) Exemplare treffen mit Panzers Abbildung und Scopoli Beschreibung überein. Fabricius sagt ausdrücklich, es gebe auch ungesteckte Varietäten. Ob aber Hrn. Schrank's Melol. crucifera und agricola als Varietäten zusammen gehören, kann ich nicht entscheiden. In seiner Fauna Boica. Nürnberg 1799. Tom. I. S. 409 beschreibt er beyde: a) Aehren-Laubkäfer, Melolontha crucifera Herbst. Schaefferi Icon. 23. fig. 8. mit blauem Halschild und einem schwarzen, zuweilen unterbrochenen Kreuz auf den rostgelben Flügeldecken; der Kopfschild am Ende zurückgebogen; die Gegend des Schildchens mattschwarz. b) Feld-Laubkäfer, Melolontha agricola, Schäfferi Icon. 63. fig. 1. Melolontha agricola Herbst. tab. 24. fig. 10. 11. mit gräulichschwarzem Halschilder; die Flügeldecken rostgelb; die darauf befindliche Binde und der Hinterrand schwarz; der Kopfschild ist am Ende zurückgebogen. Dieser findet sich auf Kornähren.

Aufenthalt.

Er wird im Junius nicht nur auf Kornähren, sondern auch auf Blumen, auf Hecken und im lichten Gehölz angetroffen; desgleichen auf Grassengeln.

Schaden.

Man führet ihn hier an, weil Lapech in in seinem Tagbuche, wo er t. 16 f. 14. abgebildet ist, Seite 240 schreibt, daß er die Blätter der Eichen skeletirt, und durch seine große Menge einen Eichenwald kahl gefressen habe. Unser Feld-Laubkäfer ist zwar in Deutschland, wo ihn die südlichen Gegenden besitzen, von dieser schlimmen Seite bisher noch nicht bekannt gewesen; er mußte aber doch kenntlich gemacht werden.

5. Der Garten-Laubkäfer. Scarabaeus horticola L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Johanniskäfer, Gartenkäfer.

Scarabaeus horticola. Lin. 554. 59. Müller 80. 56. tab. 2. f. 5.

Melolontha horticola. Fab. Ent. Syst. pars II. 171. 63.

— — — — Gleditsch II. 87. Der Frischsche Obst- und Apfelsb. Käfer.
(Frisch ist ein Versehen).

Schäff. Icon. t. 23. 4.

Kennzeichen der Art.

Er ist geschildet, unbewehrt, mit einem blauen etwas behaarten Kopf und Halschild, zimmetfarbigen Deckflügeln und schwarzen Füßen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Dieser gemeine Käfer hat vier Linien Länge. Der Kopf und Halschild sind glänzend violett, zuweilen grünschwartz und etwas haaricht; die Flügeldecken ziegelroth oder auch zimmetfarbig; Leib und Flügel schwarz; der Körper stumpfer. Linne hat aus Versehen des Frischens IV. t. 14. allegirt, wo aber die *Melolontha Frischii* Fabric., die bald graubraune, bald grüne, blaue und schwarze Decken hat, gezeichnet ist. Man hat weiter keine Varietät bemerkt, als solche, deren Flügeldecken fast ganz schwarz sind.

Von der noch ungemalten Larve weiß man, daß solche sechs gelbe Füße und zwey Kinnbacken hat.

Aufenthalt, Fortpflanzung, Feinde, Schaden und Mittel dagegen.

Der Aufenthalt dieses sehr gemeinen Käfers sind Hecken, Gehölz und Gärten im Junius, wo er auf den Blüthen der Obstbäume, Rosen, des Weinstocks, des Hollunders und Weißdorns, und auf den Blättern der Laubbäume wohnt. Das Weibchen verfertigt Pillen zu seiner Eyerlage.

Es wären ihm viel Feinde zu seiner Verminderung zu wünschen. Aber den Gänsen bekömmet er nicht. Er ist nebst dem Juniuskäfer ihnen tödlich, wenn sie ihn verschlucken. Man hätte ihn, wenn man ihn blos als Verderber des Obsts und der Gartengewächse betrachtet, zu den mehr schädlichen zählen können; aber weil er in den Forsten nicht außerordentlich schadet, so zählen wir ihn den minder schädlichen bey. Bemerkenswerth ist es, daß er nach Linne das Birnobst nicht berührt.

Wirksame Verminderungsmittel sind, außer dem Abschütteln, nicht bekannt.

6. Der Junius-Käfer. *Scarabaeus solstitialis* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Junius-Laubkäfer, kleiner Laubkäfer, Brachkäfer, Sonnenwend-Kolbenkäfer.

Scar. solstitialis Lin. 554. 61. Müllers Uebers. 83. 61.

Melolontha solstitialis F. Entom. I. 2. 157. num. 11.

Scar.

Scar. solstitialis, der andere große Frühlingskäfer, Gebiſch I. 462. n. II. 87.
Vöſt. Scar. tab. 6. fig. 51 und 52.

Kennzeichen der Art.

Käfer: Er iſt geſchildet, unbewehrt und ziegelroth; ſein Halſchild etwas haarig, und ſeine gleichfalls ziegelrothe Flügeldecken, führen drey bleiche, bennähe unmerkliche Parallellinien.

Die Larve: iſt weißlich, mit gelbem Kopf und gelben Ringſtellen.

Befchreibung des vollkommenen und unvollkommenen Inſekts.

Man nennt ihn deshalb den kleinen Laub- oder Maykäfer, weil er die halbe Größe des gemeinen Markkäfers hat. Kopf und Halſchild ſind braunröthlich, letzteres etwas haarig. Die Flügeldecken ſind von der Farbe der Markkäfer, mit drey nicht ſowol weißen, als vielmehr unmerklich bleichen Parallellinien gezeichnet. Die Bauchſchnittre ſind weiß. Die Füße ſind gelb. Degeers Exemplare hatten einen ſchwarzen Kopf.

Er darf mit dem rothhörnichten Laubkäfer, *Melolontha ruficornis* Fab. der kleiner iſt, und den Kornährten ſchadet, auch durch den weißlich nackten Leib kennbar iſt, nicht verwechſelt werden. Lentin hat ihn in den Beobachtungen einiger Krankheiten, Göttingen 1774 verwechſelt, da er dem Juniuskäfer ſchuld giebt, daß er das Mutterkorn verurſache, indem er ſich ans Korn hänge, wenn es noch in der Milch ſieht, und die Ähren ausſaugt.

Die Larve hat einen Zoll Länge und ein Viertelzoll Dicke, iſt weißlich mit gelben Flecken an den Ringen beſetzt. Der gelbe Kopf hat ſcharfe Kinnbacken. Ihre Nahrung iſt nicht ſowohl Holzerde, als Graswurzeln, da man ſie meiſt auf Wieſen antrifft.

Aufenthalt und Schaden.

Der Käfer fliegt bey Abend. Brahm ſah ihn bey Mainz in zahlloſer Menge herumſchwärmen. Man findet ihn im Junius bis in den Auguſt auf Laubbäumen, Feldgebüſchen und Saaten, aber lange nicht ſo häufig, als den vorhergehenden. Auf großen Wieſen ſchnürt er zuweilen häufig des Abends herum und verwirrt ſich in den Grashaſmen, wo man ihn leicht fangen und tödten kann a). Zuweilen hat er die Weißbuchen, *Carpinus Betulus*, vom Laub entblößt.

7. Der

a) Bey den mindere ſchädlichen Käſerarten, wo keine beſondere Vertilgungsmittel angegeben ſind, iſt dies das allgemeine, daß man ſie da ablieſt und tödtet, wo man ſie an ihrem

Aufenthaltsorte, der auch gewöhnlich der Nahrungsort iſt, wo ſie ſchaden, findet.
B.

7. Der Silberkäfer. *Scarabaeus argenteus* Scopuli.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt: Blumenkolbenkäfer, silbersandiger Laubkäfer, am Unterleib versilberter Manikäfer.

Scarabaeus argenteus Scopuli no. 9. in Entomolog. Carniolica.

Melolontha argentea Fab. Entom. 1. 2. 174. no. 30.

— — Panzeri Fauna Insectorum Germaniae. Heft 28. tab. 18.

Melolontha farinosa, Variet. *Scriba* Beyträge zur Insektengeschichte 1790. tab. 4. fig. 9.

Voët *Scarabaei* tab. 10. fig. 36.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz mit gerandetem Halschild und hirschbraunen Flügeldecken. Unten ist er silberglänzend. Die Hinterfüße sind sehr lang, und mit Einer Klaue.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist nicht so groß, als die kleinste Abart des Garten-Laubkäfers. Der Kopfschild ist vornen aufgeworfen, aber nicht ausgeschnitten, und nebst dem Halschild, After, Brust, Leib und Füßen, schwarz: die Flügeldecken aber braunschwärzlich. Obenher trifft man nichts von Schuppen an, sondern nur wenige abgenutzte gelbgraue Haare. Der After aber und der ganze Untertheil ist wie mit weißblauen Pünktchen bestäubt. Die Hinterfüße sind lang und stark.

Aufenthalt.

Ich (Scharfenberg) fand ihn in zwölf Jahren nur einmal, aber zugleich in mehrerer Zahl auf Weidengesträuchen im Junius. Er ist auch auf Pappeln anzutreffen.

Zweyte Familie.

Die Fühlhörner haben ein blätterichtes Kölbchen am Ende; der Halschild ist ungerandet, fast tellerförmig, schmaler als der Hinterleib; die Flügeldecken sind zugerrandert, verkürzt und steif. Die Schienbeine der Vorderfüße sind gezähnt, Fabricii Schirmblumenkäfer.

8. Der halbbedeckte Schirmblumenkäfer. *Scarabaeus hemipterus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Halbdecker, halbflügelichter Kolbenkäfer, bohrender Kolbenkäfer.

Scarabaeus hemipterus Lin. 555. 65. Müllers Ueberf. 63.*Trichius hemipterus* Fab. I. 2. 121. no. 9. Voët Käfer tab. 10. f. 88—90.

Knoch Beyträge zur Insektengeschichte 2. t. 7. f. 11.

Kennzeichen der Art.

Er ist geschildet und unbewehrt; der raue Halschild ist mit zwey Runzeln eingefaßt, und die Flügeldecken sind abgekürzt.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist vier Linien lang. Der Kopfschild ist kaum ausgeschnitten. Die Fühlhörner und Füße sind pechschwarz; der Leib schwarz, der Halschild ist schmaler als die Flügeldecken, etwas länglicht. Er ist gerandet und hat zwey längliche Runzeln. Die ganz platten Flügeldecken sind schwarz, weißgestreift und halb so groß, als der aschgraue Hinterleib. Der sägezahnige und hervorgestreckte Stachel des Weibchens scheint ein Werkzeug zu seyn, für die Eier in einem festen Theil als Erde, vielleicht in Holz oder Rinden einen Eingang zu machen. Unter den Weibchen giebt es Abänderungen mit und ohne weiße Flecken des Halschildes und der Decken.

Aufenthalt.

Sein Aufenthalt ist zuweilen auf Baum- und Obstblüthen, im May, am meisten aber an modernden Bäumen, in Deutschland und Frankreich. Er frisst die Blüthen aus. Scriba hat im Journal für die Liebhaber der Entomologie, Frankfurt 1790 Seite 67 um dieses Käfers willen mit Recht eine neue Gattung; Sperrbeinkäfer, *Valgus*, errichtet.

9. Der bandirte Schirmblumenkäfer. *Scarabaeus fasciatus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heist auch: bandirter Doldenkäfer und Livrenkäfer.

Scarabaeus fasciatus Lin. 556. 70. Müller 86. 70. tab. 2. fig. 8.*Trichius fasciat.* Fabr. Ent. I. 2. 119 n. 4.

— — — Schrank Fauna 1. 414.

Melolontha fasciata. Herbst 3. 179. t. 27. fig. 10.

Schäff. Icon. I. fig. 4.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz; der Körper grau wollig; die Flügeldecken sind gelb, mit drey schwarzen Binden.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist fünf Linien lang, unbewehrt und schwarz. Der Körper scheint gelbwollig, ist aber graugelbwollig. Nimmt man an den Flügeldecken die schwarze Farbe als Grundfarbe an, so führen sie zwey gelbe zusammenfließende Querverbinden. Betrachtet man aber die Flügeldecken als gelb, so sind sie mit drey unterbrochenen Binden bezeichnet, die außen breit, einwärts spizig sind. Die erste ist an der Wurzel, die letzte am Ende der Flügeldecken, die zweyte in der Mitte, und reicht nicht bis an die Naht.

Aufenthalt.

Der Käfer ist im May auf Liguster, Glieder (Syringa) und Obstbäumen, dergleichen auf allerley Schirmpflanzen in Wäldern, und frisst die Blüthen aus.

10. Der Einsiedler-Schirmblumenkäfer, *Scarabaeus Eremita* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Zuchtenkäfer, Einsiedler, Eremit, Schusterkäfer und Eremiten-Dolddenkäfer.

Scarab. Eremita Lin. 556. 74. Müller 87. 74.

Trichius Eremita Fabr. Ent. I. 2. 118. 1. In seinen frühen Schriften eine Cetonia.

— — — — Panzeri Faunae German. Initia 41. tab. 12. Ejusdem Entomolog. (1795.) fig. 6.

Voëts Käfer 6. f. 51. 52.

Nöfels Insektenbelust. II. Erbkäf. I. tab. 3. f. 6.

Kennzeichen der Art.

Er ist geschildet, unbewaffnet, braunschwarz und glänzend. Der Halschild hat eine Längsfurche, so wie auch das Schildchen, das an der Wurzel zwey Vertiefungen hat.

Beschreibung.

Der Käfer ist dicker als der Maykäfer, über elf Linien lang, braunschwarz und glänzend. Der Kopfschild ist viereckig mit einem erhabenen Rand. Der Halschild hat eine Furche, zwischen zwey erhabenen Kugeln. Das Schildchen, scutellum, liegt etwas tief. Die Flügeldecken sind rau und sämtliche Füße stachelig. Die Fühlhörner führen kleine Kolben. — Er hat einen Zuchtengeruch.

Seine Larve soll, nach dem Herrn von Schreber, eben so gebaut seyn, wie die des gemeinen Maykäfers.

Aufenthalt.

Der etwas seltene Käfer findet sich im August in modernden Birn- und Weidenholz, in Deutschland und im südlichen Europa. Dessen Larve soll ebenfalls in der Weiden- und Birnbaum-Erde leben.

11. Der achtpunktirte Schirmblumenkäfer. *Scarabaeus octopunctatus*. *Trich. octopunct.*

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Zehnpunktiger Dolsenkäfer.

Trichius octopunctatus Fabr. Ent. I. 2. 119. 3. In seinen frühen Schriften eine *Cetonia*.

— — *decempunctatus* Schrank's Fauna 1. 414.

— — *octopunct.* Panzeri Fauna 41. t. 14.

Cursor maculosus Voët Käfer I. 27. 24. t. 5. f. 42.

Vielleicht hat Gleditsch darunter auch seine *Sc. variat.* I. 522. dunkel, glatte, punktirte Käfer verstanden.

Kennzeichen der Art.

Er ist ganz schwarz, mit zwey weißen Punkten auf dem Halschild, und bald zwey, bald drey, bald vier, auch wohl fünf dergleichen auf jeder Flügeldecke, welche in zwey Querreihen stehen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist neun Linien lang und fünf breit, und hat die Gestalt, nicht aber die Größe des edlen Schirmblumenkäfers, und ist in seinem Bau gewölbt. Er ist übrigens unbewehrt und schwarz mit einem weißen oder auch weißgelben Punkt an jeder Seite des Halschildes. Jede Flügeldecke ist gegen die Mitte mit zwey, zuweilen vier solchen Punkten, nebst einem dabey stehenden außerordentlich kleinem Punkte, jede Seite des unbedeckten Endes des letzten Leibrieges aber mit einem länglichen weißen Punkte bezeichnet, der aber auch fehlen kann b). — Er soll nach Hrn. Panzer zugleich *Scarab. variab.* Linnei 558. 79. seyn; vielleicht bestätigt sich dieses künftig noch mehr.

Auf:

b) Es giebt Varietäten, die kastanienbraun sind, und andere, denen die zwey weißen

Punkte des Halschildes fehlen. — Die weiße Farbe der Punkte vermischt sich oft mit

Aufenthalt.

In modernem Holz und in Ameisenhausen, sehr selten.

12. Der edle Schirmblumenkäfer. *Scarabaeus nobilis* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Edler Kollenkäfer, goldgrüner Doldenkäfer.

Scarabaens nobilis. Lin. 558. 87. Müller 90. 87.

Trichius nobilis. Fab. Entom. I. 2. 119. 2.

Trichius auratus. Schrank Fauna I. 413.

Scarab. nobilis. Der glatte, grünlüche mit rauhen Decken. Gleditsch II. 222.

Trich. nobilis. Panz. Faun. 41. t. 13.

Rösel II. Erbkäfer 2. tab. 3. fig. 3—5.

Schäfferi Icones t. 55. f. 5.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer. Er ist geschildet, unbewehrt und glatt; überdem goldgrün mit einem Kupferglanze und am Ende des Hinterleibes stumpf ausgerändert.

Die Larve ist weiß, mit braunem Kopf und Füßen, und erhöhten gelben Luftlöchern. Sie ist nicht so lang, als die des goldnen Metallkäfers, hat aber einen größern Kopf.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Der Käfer ist bald sechs, bald sieben Linien lang, und von einem viel schönern Goldglanz, als der goldne Metallkäfer, obgleich in Müllers Uebersetzung steht: „ohne Glanz.“ Der Kopf ist grün, die Augen schwarz; Fühlhörner und Füße sind braun. Der Halschild ist nicht so groß und so breit als jener. Die Flügeldecken bedecken den Hinterleib nicht ganz. Sie sind voll eingedrückter Punkte oder Runzeln, und haben einen grünen Goldglanz. Die kleinen goldgelben Flecken der Flügeldecken und des Hinterleibes gehen durch die Zeit verloren.

Die Larve fand Rösel in einem Garten, an einem faulen Stamm eines abstehenden Zwitschenbaums. Sie unterscheidet sich von der Larve des goldnen Metallkäfers also: 1) Der Körper ist zwar gleichgefärbt, aber schlanker. 2) Der Kopf ist größer als bei jener, und auch etwas dunkelbrauner. Die übrigen Glieder sind jenen völlig gleich. 3) Sie wird nur einen Zoll lang. Sie zerbeißt übrigens faules Holz, und schließt sich in Erdballen ein. Ihr Puppenstand währet drey Wochen.

Auf,

mit dem Alter des Käfers, so daß man nur den bloßen Eindruck der Punkte gewahr wird,

wie es sich auch zuweisen mit dem goldnen Metallkäfer ereignet.

Aufenthalt.

Wie bey dem goldenen und marmorirten Metallkäfer, nämlich der Käfer ist auf Schirmpflanzen, und besonders dem schwarzen Hollunder, auch Kreuzdorn. Auch wird er in Gesellschaft des sehr gemeinen goldenen Metallkäfers am rinnenden Eichenfaß angetroffen. Die Larve findet sich in anbrüchigen Bäumen, deren gänzlichcs Verderben sie, wie alle Käferlarven, die im anbrüchigen und faulen Holz wohnen, beschleunigen.

Feinde.

Die Maulwürfe sind Feinde dieser und anderer Larven ihrer Gattungsgenossen; so auch die Grünspechte, die Larven und Puppen auffuchen.

Dritte Familie.

Die Fühlhörner haben ein blätteriges Kölbchen am Ende; der Halschild ist etwas gerändert, fast gleich breit, rückwärts abgestuht. Die Flügeldecken haben über der Schulter am Außenrand einen Einbug. Die Schienbeine der Vorderfüße sind gezähnt. Die Fabriciusischen Metallkäfer.

13. Der goldene Metallkäfer. *Scarabaeus auratus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Goldkäfer, kleiner Goldkäfer, gemeiner Goldkäfer, Goldkolbenkäfer.

Scarabaeus auratus. Lin. 557. 78. Müller 83. no. 78.

Cetonia aurata. Fab. E. S. I. II. 127. 8.

Cetonia aurata maculata. Scriba Journal I. 63.

Scarab. auratus, der Goldkäfer, Gleditsch II. 238.

Cetonia aurata. Panz. Faun. 41. f. 15.

Mösel Ins. II. Erdkäfer 1. t. 2. f. 9. Und f. 1—5. Larve und Puppe. Die andern Figuren gehören nicht hierher.

Sie heißen bey den alten Griechen *Melolontha* und *Chrysalis*.

Kennzeichen der Art.

Der geschildete (mit einem Rückenschildchen versehene) goldene Metallkäfer, an welchem der erste Abschnitt an den Seiten des Hinterleibes einzählig, und das Schildchen eben ist.

Die Larve ist weiß, am Kopf, Füßen und Lufschchern rothgelb; in der Länge des Maykäfers, aber der Kopf ist äußerst klein.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Ueber Mels tab. 2. loc. cit. wo drey Arten Metallkäfer abgebildet sind, ist viel Streit und Ungewißheit gewesen. Göze 3. B. in seinen Entomol. Beiträgen hielt a) die fig. 6. 7. für den *Scar. auratus* L. Allein dieser ist die *Cetonia festiva* Fab. — b) Die fig. 8. u. 9. wurde für *Scarab. variabilis* L. ausgegeben. Allein fig. 8. ist *Cetonia marmorata* F., und fig. 9. die *Cetonia aurata* F. oder der ächte Linneische *Scar. auratus*. Wobei zu merken, daß die olivenfarbige *Cetonia marm.* fig. 8. etwas natürlicher und genauer seyn sollte.

Unser Käfer ist neunzehnhalb Linien lang und hat über und über eine grünliche, mit einem röthlichen und gelben Kupferglanz durchgossene Farbe. Doch haben die Decken drey oder vier gelbweiße Stricheln. Er ist an dem Unterleib und an den Schenkeln etwas haarig, und glänzt unten wie polirtes Kupfer, oder wie Messing mit spielendem Grün. Die Seiten der Brust gehen hinten in einen Zahn aus. Das Brustbein ist vorgestreckt. Er ist nicht so lang als der Maykäfer, aber breiter und hinten nicht so spitzig.

Er hat nebst seinen Familiengossen die Eigenheit, daß er seine Flügeldecken nicht auseinander breitet, sondern damit den Leib bedeckt, wie in der Ruhe, und nur die Flügel unter denselben hervorstreckt.

Die anderthalb Zoll lange Larve ist weiß, Kopf und Füße rothgelb, und die erhöhten Lufschcher an den Einschnitten sind gleichfalls gelb. Die Kinnbacken und Fühlhörner sind dunkelbraun. Folgende Merkmale unterscheiden sie von der Larve des Maykäfers: Die Larven der goldnen Metallkäfer haben eine merklich hellere und weißere Farbe, eine kürzere und breitleibigere Gestalt, einen mehr runden als zugespitzten After, einen viel kleineren und dunkelbraunröthlichen Kopf, viel kürzere, zärtere und nicht so folbige Füße, auch auf der Ober- und Unterfläche des Leibes mehrere Härchen, an beiden Seiten des vordersten Abfages hinter dem Kopf aber einen merklichen gelbrothen Flecken. Sie leben theils in hohlen Eichen, und dürrern, faulem Holze und Gerberlohe, theils in Ameisenhaufen; indem die Ameisen keinen Naturtrieb haben, sie zu verfolgen c).

Zu ihren Nahrungsmitteln rechnete *Leemann* auch (in seiner mit Noten versehenen Ausgabe des Rößlichen Werks) Salatwurzeln und zuweilen Regenwürmer. Sie verschließen sich bey ihrer Verpuppung vom May bis Julius in große ovale Erdballen, die von

c) Hr. Obersorger *Christ* schreibt in seiner Classification der Wespen, Bienen und Ameisen: „Wenn ich den Wurm (die Larve der *Cetonia aurata*) aus seiner Hülle nahm und auf die Ameisenhaufen legte, so trugen ihn

die Ameisen mit aller Vorsicht unter die Erde, und schienen sehr besorgt um ihn zu seyn. Vielleicht dient etwa der Aemwurf dieser Larven den Ameisen zu einer besonders angenehmen Speise.“

von Erde, Spänen, Meßern und Nadelholz und ihrem eignen Unrath verfertigt, und inwendig glatt sind. Ihre Puppenruhe dauert im Sommer nur vier bis fünf Wochen. Die später verpuppten liegen den Winter durch.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Feinde.

Das erwachsene (vollkommene) Insekt verfrachtet sich in diesem Falle, noch bis zur warmen Witterung, in die Erde. Worauf es sehr häufig auf Eichstämmen und Weiden, woraus der Saft rinnt, auf Blüthen, Blumen, besonders Schirnbrumen aller Art seiner Nahrung und Begattung nachgeht. Die Flugzeit ist vom Frühling bis in den August.

Das Weibchen legt seine Eier, die denjenigen der Maikäfer gleichen. tief unter die Ameisenhaufen. Es währt drei Wochen, ehe daraus die Larven herauskommen. Die Zeit vom Ei an, bis zum vollkommenen Stand, beträgt drei Jahre. — Die Grünspechte sind ihre Feinde.

Gegen Nachstellungen vertheidigen sie sich mit einem braunen ägenden Saft, den sie aussprüzen, wie es mehrere Käfer, sonderlich die Raubkäfer, thun.

Schaden.

Vom Schaden dieses und des nachfolgenden Metallkäfers ist folgendes zu bemerken: 1) Im Larvenstande sollen sie nach Olivier (in seiner Entomologie, übersetzt von Illiger, S. 20) den Wurzeln sehr nachtheilig seyn. Dieser Meinung widerspricht Herr Illiger in der Note dazu, und Olivier selbst in der weitern Fortsetzung bey Beschreibung der Cetonien, erklärt ihren Nachtheil für unbedeutend. 2) Im Käferstande hatten sie sich einem gewissen Hrn. Melm in Bremen 1745, zufolge der Kleemann'schen Noten zu Nöfels Werk, für seine Pomeranzenblüthen und Tulpen im Garten gefährlich gemacht, die alle (der Blüthe nach) ruinirt worden wären, wenn Melm nicht durch schnelles Aufsammlen derselben zuvorgekommen wäre. Wirklich hatte er in zwei Morgen über 500 Stücke aufgebracht. Die in die Gänge des Gartens gestreute Gerberlohe, war an ihrer Vermehrung in den ersten Ständen schuld gewesen.

In Forsten würde ein solches Ueberhandnehmen der Käfer wohl keine Verheerung verursachen, weil sich da die Menge auf die unzähligen Blumen vertheilen und verlieren können.

14. Der marmorirte Metallkäfer. *Scarabaeus marmoratus*.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eichenmetallkäfer, metallfarbiger Kolbenkäfer.

Cetonia marmorata. Fab. I. c. I. H. 127. 10. — *Cetonia quercus* Schrank.
417.

Scar. metall. Brahm Insektenkalender I. 231. 788.

Voët Käfer 1. fig. 3. Rösel loc. cit. fig. 8. und die Larve fig. 2.
Panzer. Fn. 41. 17. Cetonia aenea Scriba Journal.

Kennzeichen der Art.

Der geschildete, unbewehrte, olivenfarbene Metallkäfer, an welchem der erste Einschnitt an jeder Seite des Bauchs in einen Zahn ausgeht, und dessen Halschild gefleckt ist.

Die Larve ist ganz wie diejenige des goldnen Metallkäfers; doch aber einen halben Zoll länger.

Beschreibung des vollkommen und unvollkommen Insekts.

Mit Linné hat man anfänglich diesen eilftheilb Linien langen Käfer für das Weibchen des vorhergehenden erklärt. Allein er ist doch zu sehr unterschieden. Denn 1) ist sein Brustbein anders gestaltet, und am Kopf breiter. 2) Hat er mehr Zeichnungen als der auratus. Er ist auf dem Halschild und auf den Flügeldecken mit gelbweißen Punkten, Strichen und Linien gleichsam übersät, wo der auratus auf dem Halschild gar keine, und auf den Decken gewöhnlich nur drey bis vier Strichelchen hat. 3) Ist sein Glanz feiner und lebhafter, weil er weniger Narben hat, als jener. 4) Ist sein Körper kürzer und verhältnißmäßig kleiner. 5) Ist er fast immer größer, als der größte auratus. 6) Fehlen die Flecken auf den Bauchringen bey aurato immer, bey unserm marmorato aber vermisst man sie nie.

Er variirt gerne, und ist, so wie der vorhergehende, an der Wurzel der Flügeldecken mit einem Schlußwinkel versehen.

Die Larve ist ganz derjenigen vom goldenen Metallkäfer gleich, aber größer, zwey Zoll lang. Sie nährt sich eben so, und geht auf eben die Art, wie jene zur Verpuppung über.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Schaden.

Der Aufenthalt des nicht so häufigen Käfers ist im Junius in Gesellschaft des vorhergehenden an dem rinnenden Eichenfaß, aber selten bey solchem auf Blumen. Brahm in Maynz fand ihn noch im September an dem austretenden Pappeln- und Weidenfaß.

Mit seiner Fortpflanzung, Eyerlage und allensalzigem Schaden verhält es sich eben so, wie bey dem vorhergehenden. Die Grünspechte stellen ihnen und allen Metallkäfern nach.

15. Der goldgrüne Metallkäfer. Scarabaeus fastuosus.

Cetonia fastuosa Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Großer Goldkäfer, Smaragd-Goldkäfer, blankvergoldeter Metallkäfer.

Ce-

Cetonia fastuosa. Fabr. Entom. I. 2. 127. g.
 — — — Panzeri Fau. 41. t. 16.
 — — Frischii. Schrank Fauna I. I. 416.
 — — speciosissima Rossi. — Herbst. 2. t. 29. fig. 1.
 Røffel II. t. 2. fig. 6. 7. Sehr schön.

Kennzeichen der Art.

Er ist schimmernd, goldglänzend grün, einfarbig und ganz glatt.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Seine Länge beträgt einen Zoll und zwei Linien, und seine Breite an der Wurzel der Flügeldecken sieben Linien. Er schimmert sehr stark ohne einen Punkt oder eine fremde Farbe goldgrün. Nur die Augen und die Fühlerhörner sind schwarz. Die Flügeldecken haben weder eingegrabene Punkte noch Streifen. Hr. Panzer hält diesen für den *Scarab. auratus* Lin.

Aufenthalt.

Dieser höchst seltene und prächtige Käfer findet sich im Juni auf Blüten, und seine noch nicht genug bekannte Larve soll in der Holzerde der Eichen und Weiden wohnen.

Zweite Gattung.

Die Schröter. *Lucani* L.

Sie heißen auch: Feuerschröter, Feuerkäfer, Feuerwürmer, Kneipschröter, Schröterkäfer, Schrotkäfer, Kaminkäfer und Waldkäfer.

Gattungskennzeichen nach Linné.

Die Fühlerhörner sind keulförmig und zehngliedrig, davon die vier letztern Glieder nach einer Seite hin geblättert sind. Die äußern Kinnladen (Kinnbacken) sind vorgestreckt und gezähnt. Das zungenförmige Werkzeug, nämlich die beiden Lamellen, dienen ihnen zur Beleckung der Bäume und Straucharten.

Ihre Larven leben in faulem Holze, und ähneln denjenigen der vorhergehenden Gattung.

Nach Fabricius sind die eigentlichen Gattungskennzeichen: Schröter n. 30. Lucanus: Unter der Lippe sind zwei Pinsel oder Lamellen, an welchen die Greifspitzen liegen. Die Fühlhörner sind fahmarrig gebrochen. Die sogenannten äußern Gattungskennzeichen sind nach Fabricius: Der Körper ist groß, länglicht rund, breitgedrückt, glatt, ungerandet und trägt; der Kopf ist groß, flach, herausgerecht und fast viereckicht; die Kinnbacken (mandibulae) sind öfters herausstehend und gleichen Hörnern; die runden Augen stehen am Rande; die Fühlhörner stehen von einander ab, und sind unter der hervorragenden Kopfspitze angewachsen, von der Länge des Halschildes; dieser hat auf jeder Seite einen zurückgeschlagenen Rand; das Schildchen ist rund; die Flügeldecken steif und gewölbt; die Füße stark, zum Laufen eingerichtet, mit fünfgliedrigen Fußblättern. Die Farbe ist schwarz.

Sie gehören zu den weniger schädlichen.

1. Der Hirsch-Schröter. Lucanus Cervus L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Baumshróter, Hornshróter, fliegender Hirsch, Hirschkäfer, gehörnter Käfer, Pferdeklemmen, Klammerhirsch, Holzshróter und Börner.

Lucanus Cervus. Lin. 559. 1. Müller 94. 1.

— — Fabr. Entom. I. 2. 236. 2. Walthers Forstphysiographie. S. 352.

Röfels Insektenbelustigung II. Theil. 1. Classe der Erbkäfer. Taf. 5. fig. 7. 9.

Schäffer Icon. 133. fig. 1. — Sulz. ins. 1. fig. 4.

Lucanus Cervus foemina. Franz. la Biche.

Rüssel ins. I. c. fig. 8. Degeer 4. t. 12. f. 4.

Voets Käf. 29. f. 2. Schäff. Icon. 33. 2.

Lucanus Dorcas, Müllers Prodrum. 444.

Kennzeichen der Art.

Der schwarze, rückenschildige Hirschshróter mit hervorstehenden Kinnbacken, die einzähmig, und an der Spitze zweizinkig sind.

Die sechsfüßige Larve ist glänzend, dunkelstrohfarbig, groß, mit zwey braun-rothen hornichten Kinnladen bewaffnet.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Das Männchen ist viel größer als das Weibchen, fast zwey Zoll lang ohne die Kinnladen, und mit denselben oft über drey Zoll. Die Kinnbacken sind dick, halb so lang wie der Körper, an der Innenseite nach der Mitte zu mit einem starken, beynahewagerech-

gerechten Zähne bewaffnet, und an der Spitze in ein Zwenzack geendiget. Man sieht einige Kiebzähnen zwischen dem Zwenzacke und dem Zahn, und einige unterhalb des Zahns. Der Kopfschild ist niedergebogen, spitzig, mit einer hervorspringenden Quer-Erhöhung nach hinten zu, und eine andere unterbrochene stärker hervortretende nach vornen. Der Halschild ist eben, schwach gerandet, an der Seite beynahe winklicht, mit einer wenig eingedrückten Längslinie auf der Oberseite. Das Schildchen ist eben zugerundet. Die Flügeldecken sind glatt, gerandet. Die Vordersehenbeine haben einige Seitenzähne, und die andern haben erliche Dornen. Der Leib ist unten schwarz. Die Kinnbacken sind braunschwarz und die Flügeldecken kastanienbraun. Die rostgelben federartigen Werkzeuge an der Lippe sind die zwei wie Pinsel gestalteten Stücke, Lamellen oder Aufsenfortsätze der beiden Kinnliden, woran dann noch zwei ganz kleine Pinselchen liegen, die aber zu der gespaltenen Lippe gehören.

Das Weibchen ist kleiner als das Männchen. Die Kinnbacken sind kürzer als der Kopf; jede hat zwei Zähne gegen die Mitte zu. Der ganze Körper ist schwarz, die Flügeldecken oben sind schwarzbraun.

Kösel und Degeer hielten mit Recht ebenfalls diesen für den weiblichen Schröter, obgleich Geoffroy und der Dänische Staatsrath Müller, beyde Schröter für verschiedene Arten betrachtete.

In Rücksicht der Größe giebt es Varietäten, welches wahrscheinlich in der überflüssigen und spärlichen Nahrung der Larven seinen Grund hat.

Die Larve desselben sieht einem weichen Wurm ähnlich, ist groß; ihr Leib ist bogiggekrümmt, und aus dreizehn abgesonderten Ringen zusammengesetzt. Ihr Mund ist mit zwei hornigen sehr harten und sehr starken Kinnbacken bewaffnet, womit sie das Holz zernagt, und es in eine Art von Loche verwandelt. Ihr Kopf ist hart, schwielig. Sie hat sechs schwielige Füße, welche den sechs Füßen des vollkommenen Käfers entsprechen. Hat sie ihr gehöriges Wachsthum erreicht, so verfertigt sie sich in der Masse des Holzes selbst eine Zelle oder ein Gehäule mit der Art von Loche, wovon so eben gesprochen worden. Dann verwandelt sie sich in die Puppe, und geht erst als Käfer aus ihrem Gehäule hervor. Alle Theile des Käfers sieht man schon in der Puppe deutlich entworfen. Der Kopf ist gekrümmt und an die Brust gedrückt. Flügel und Flügeldecken sind kurz und noch nicht entwickelt. Die Füße sind an den Leib geleimt. Dieser ist kürzer als bey der Larve, und man kann deutlich die Anzahl der Bauchringe zählen.

Aufenthalt, Fortpflanzung, Feinde, Schaden.

Der Aufenthalt der Larve ist in der Erde, und ihre Nahrung halbvermodertes Holz, besonders von Eichen. — Vom Ey an bis zur völligen Ausbildung des Insekts giebt Kösel, der ihre Naturgeschichte genau beschrieben, sechs Jahre an. Aber die Lebensdauer im letzten Stand ist kurz.

Die Eier, welche der weibliche Schröter tief in die Erde legt, sind ziemlich groß und blaß. Ihre Zahl ist nach Det. Murali gewöhnlich zwanzig.

Ob sie gleich im Larvenstande wegen ihrer Verborgenheit vor Feinden sicher sind; so habe ich doch beobachtet, daß wenn zufälligerweise gewisse Acari sich herbenziehen können, sie durch ihre große Zahl der Larve tödlich werden. Was die Schädlichkeit dieser und der übrigen Schröterlarven betrift, so sind hierüber die Meinungen getheilt. Einige behaupten, daß die Larve nicht blos das kranke Holz zernage, sondern selbst das gesunde angreife, indem sie sich häufiger in den Wurzeln als im den Stamm und den Zweigen aufhalte; und wenn sie auch nicht den schnellen Tod der Eiche verursache, so beschleunige sie doch ihr Verderben dadurch, daß sie den Stamm oder einen Theil der Wurzel in Fäulniß bringe. Andere, z. B. Hr. Walther a. a. O. giebt an, daß die Larve die Bäume reinige, und die gesunden Theile derselben von dem leicht um sich fressenden Uebel befreie.

Was den Käfer betrifft, so ruinirt er keinen Baum, sondern begnügt sich blos an der honigartigen Feuchtigkeite der Eichenblätter, Eichenrinden, Lindenrinden u. zu leben.

Die Schonung der Insektenfressenden Vögel, besonders des gemeinen Würgers, (*Lanius excubitor*), des Holz- und Tannenhebers, der Krähenarten, auch der großen Fledermäuse, baut, wo nicht völlig, doch größtentheils dem Ueberhandnehmen dieses Käfers vor.

Der *Cossus* der alten Römer, diese gepriesene Leckerspeise der Reichen, soll die Schröterlarve gewesen seyn; nach andern aber entweder die Larve von dem Heros-Vockkäfer, oder die des Palm-Rüsselkäfers, welcher aber nur in Indien zu Hause ist; oder nach Linne die Raupe vom Kopfwidenspinner (*Ph. Bomb. Cossus*). Da solche aber einen unangenehmen Geruch hat; so fragt Illiger, ob es nicht gar ein Wurm oder Schnecke gewesen?

2. Der Ziegenschrüter. *Lucanus Dorcas*, *Panzeri*.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Der Vockschrüter.

Luc. Dorcas. Panz. Fauna 58. 11. Rossi l. c. 1. 2. 2.

Lucanus capreolus. Fab. Ent. Syst. l. 2. 237. 4.

Sulzer Geschichte t. 2. f. 1. — Voët Coleopt. 29. f. 3.

Luc. Hircus. Herbst. 3. 299. 4. tab. 33. f. 4. 5.

Kennzeichen der Art.

Der schwarze Schröter, mit braunen, von der Mitte bis zur Spitze vielzähligen Kinnbacken und beynahe glattem Kopfe.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist vierzehn Linien lang, und ist nicht der Linneische *capreolus*, sondern wo nicht eigene Art, wenigstens eine Abänderung des vorhergehenden, dessen halbe Größe

er nur hat. Die Kimbacken sind schwärzlich braun, ein wenig länger als der Kopf, und an der Innenseite von der Mitte an bis nahe an die Spitze, mit mehreren Zähnen bewaffnet. Der Kopfschild geht schräg hinunter, ist kürzer als das der vorhergehenden Art, am Ende zugerundet, mit einer unterbrochenen Quer-Erhöhung zwischen den Kimbacken. Der Kopf ist beinahe so breit als das Halschild; nach hinten zu hat er eine wenig bemerkbare, sehr wenig hervorstehende Quer-Erhöhung. Der Halschild ist glatt, wenig gerändert, mit einer wenig merklichen eingedrückten Längslinie. Das Schildchen ist hinten beinahe zugerundet. Die Flügeldecken sind glatt. Die Vordersehenbeine haben einige Seitenzähne und die übrigen etliche Dornen. Der ganze Körper ist schwarz, nur die Flügeldecken sind schwärzlich-braun. Herr Panzer's Meinung, daß der Ziegen Schröter eine krankhafte Abweichung des Hirsch Schröters sey, ist noch nicht genug bestätigt. Nach Rossi und Illiger ist das Weibchen folgendermaßen gebildet.

Der Kopf ist schmaler als der Halschild, mit einer schwachen Spur einer erhabenen schrägen Linie, die sich auf jeder Seite seiner Oberfläche findet. Diese ist, den Hinterkopf ausgenommen, mit ziemlich großen eingestochenen Punkten bedeckt. Der Halschild ist glatter und gewölbter: der Seitenrand von dem Vorderwinkel bis zur hervorstehenden Ecke zugerundet, und nicht, wie beim Männchen, geschwungen. Die Vordersehenbeine sind kürzer und breiter; das Klauenglied kürzer. Daß dies das Weibchen sey, kann man jetzt als unbezweifelte Wahrheit annehmen. Rossi sah beide in Begattung.

Die Larve wird, die Größe ausgenommen, derjenigen des Hirsch Schröters ähnlich seyn.

Aufenthalt.

Der Aufenthalt dieser Käfer ist in Deutschland und im südlichen Frankreich auf modernden Eichenstämmen. Des Abends sieht man sie von einem Baum zum andern fliegen. Beobachtende Forstmänner werden sie mit den Hirsch Schröttern im Junius und Julius des Abends herum schwärmen sehen, und auch zusammen an Safisstellen der Eichen finden, wo sie wie jene den Eichsaft lecken,

3. Der Balken-Schröter. *Lucanus parallelipedus* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Parallelepipedalischer Käfer, Kammkäfer, viereckichter Schröter.

Linné 561. 6. Müller 1. c. 98. 6.

Fabr. 1. c. 1. 2. 239. 11.

Der besorgte Forstmann S. 40. 1.

Panz. Ent. Germ. 1. 244. 2. Ejusd. Fn. Germ. 2. t. 19.

Lucanus Capra. Panz. Fn. 58. t. 12. Das Weibchen.

Herbst Käf. 3. 303. 9. tab. 54. f. 5. Das Männchen.

Schäff. Elem. t. 161. f. 1. Ejusd. Icon. 65. f. 7.

Kennzeichen der Art.

Der plattgedrückte dunkelschwarze Schröter, mit einzahnigen Kinnbacken, dessen Kopf zwey kleine dicht neben einander stehende Höckerchen hat.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Seine Länge beträgt neun bis zehn Linien. Der ganze Körper ist tief und mattschwarz. Die Fühlhörner sind gebrochen. Das erste Glied ist fast so lang, wie alle die übrigen zusammen genommen. Die einzahnigen Kinnbacken sind bey dem Männchen ein wenig kürzer, als der Kopf, bey dem Weibchen beträchtlich kürzer. Der Kopf ist schmaler, als der Halschild, fein lebernartig, und nur bey dem Weibchen mit zwey nahe neben einander stehenden Punkten besetzt. Der Halschild hat nur eine schwach eingedruckte mittlere Längslinie, ist glatt, punktiert und leicht gerandet. Das Schildchen ist dreynckig. Die Flügeldecken sind fein lebernartig oder vielmehr mit eingegrabenem länglichten Punkten dicht besetzt.

Linne sagt: Er ist in allen Stücken dem weiblichen Hirschschröter ähnlich; nur achtmal kleiner.

Aufenthalt und Schaden.

Der Käfer erscheint im Junius und September auf verfaulten Baumstämmen, vorzüglich in alten Eichen, Weiden und Linden. Da die Larve eben daselbst lebt; so könnte sie auch wohl einmal dem gesunden Holz schädlich werden. Im besorgten Forstmanne wird dieser Balkenschröter sowohl als der folgende lauffkäferartige, von Hrn. Det. G. G. Zinke (Naturgeschichte der schädlichen Nadelholz-Insekten 1797. no. 1. und 2.) auch den Nadelholz-Verderbern zugesellt.

Das übrige seiner Naturgeschichte ist künftigen Entdeckungen vorbehalten.

Den Beweis, daß Hr. Panzers Luc. Capra blos das Weibchen unsers Balkenschröters sey, hat Hr. Illiger in der Uebersetzung von Oliviers Entomol. S. 68 gut ausgeführt.

4. Der lauffkäferartige Schröter. *Lucanus caraboides* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt: Käfer-Schröter, blauer Schröter.

Linn. l. c. 591. 7. Müllers Uebers. 98. 7.

Fab. l. c. l. 2. 239. 14. Rossi l. c. 1. 3. 4. — Der besorgte Forstmann S. 40. 2.

Panzer Ent. Germ. 245. 4. Ejusd. Fauna 58, 13.

Herbst 3. 310. 12. t. 34.

Der Luc. rufipes, Herbst's und Panzers ist eine Varietät.

Kennzeichen der Art.

Der glänzend grünlich blaue Schröter, mit hervorstehenden, mondförmigen Kinnbacken. Der Halsschild ist vorn beynahe ausgerundet.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist fünf Linien lang. Auf den ersten Anblick sieht er einem Laufkäfer ähnlich. Die Fühlhörner sind gebrochen. Das erste Glied ist fast so lang, als alle andere zusammen genommen, und die vier letztern sind blätterig. Die Kinnbacken sind kürzer als der Kopf. Der Halsschild, der den Kopf an Breite übertrifft, hat an beiden Seiten einen zurückgeschlagenen Rand. Das kleine Schildchen ist zugerundet. Die Flügeldecken sind fein ledernarbig, d. i. punktiert. Die Unterseite des Körpers, Fühlhörner und Beine, sind schwarz. Oben ist der ganze Körper blaugrünlich, zuweilen goldgrün, oder auch stahlblau.

Aufenthalt.

In Europa, theils auf modernem Holz, theils an den jungen, eben ausschlagenden Eichen, im Junius,

Dritte Gattung.

Die Kleinkäfer und die mit denselben verwandte Arten.

Dermestides, Lin.

Sie heißen auch Speckkäfer, Fettkäfer, Hautfresser und Hautkäfer. Sie zerfallen beim Fabricius in mehrere Gattungen.

Gattungskennzeichen.

Die Fühlhörner sind durchblättert; die letzten Glieder bilden einen Keulenknopf. Der Halsschild ist erhaben rund, und der Kopf unterwärts gebogen.

Die Fabricius'schen Gattungen mit ihren Gattungskennzeichen sind: Der Speckkäfer, 32. Dermestes. Er hat ungleiche und fadenförmige Fressspitzen, eine gespaltene Kinnlade, eine hornartige, stumpfe und ganze (das ist unverkürzte) Lippe. Die Fühlhörner haben eine durchblätterte Kolbe.

Der Splintkäfer, 95. *Apatе* hat fadenförmige, gleiche Fressspitzen, eine häutige, verkürzte Lippe, einzähnichte Kinnladen und durchblätterte Fühlhörner.

Der Vorkenkäfer, 96. *Bostrichus* hat eine hornartige Kinnlade. An der Spitze der unverkürzten und der cylindrischen Lippe stehen die Fressspitzen. Die Fühlhörner sind mit einer unzertheilten Kolbe versehen.

Der Glanzkäfer, 40. *Nitidula*, hat vier fadenförmige Fressspitzen, eine cylindrische und häutige Kinnlade, eine cylindrische und unverkürzte Lippe. Die Fühlhörner haben eine unzertheilte Kolbe.

Der Drahtkäfer, 104. *Colydium*, hat vier keulenförmige Fressspitzen, davon das äußerste Glied größer ist; die Lippe ist häutig und ausgerandet; die Fühlhörner sind durchblättert.

Die äußern, das ist, nicht von den Fressspitzen und übrigen Fresswerkzeugen, sondern vom Habitus hergenommenen Gattungsskennzeichen des Fabricius sind: Der Kleinkäfer (Speckkäfer) 23. *Dermestes*, hat einen kleinen, trägen, länglicht-runden unausgerandeten Körper; einen kleinen, eyrunden, unter den Halschild untergebogenen Kopf; runde Augen, die an den Seiten stehen; kurze, unter den Augen eingefügte, verborgene Fühlhörner; einen seitwärts ausgehenden Halschild mit unmerklichen Rändern, die abwärts gehen; ein kleines rundes Schildchen; steife, fest anschließende Flügeldecken, in der Länge des Hinterleibes; kurze, starke Füße mit fünfgliederigen Fußblättern. Die Farbe ist mehrentheils dunkel.

Der Splintkäfer, 95. *Apatе*: Der Körper ist walzenförmig, etwas filzhaarig, ungerandet, träge; der Kopf ist klein, rund und untergebogen; die Augen sind kugelförmig, klein und stehen an den Rändern; die Fühlhörner stehen nicht nahe beisammen, sind kurz und unter den Augen angeleimt; der Halschild ist rund, hohlericht, vornen oftmals schneckenförmig gedreht; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken steif, gewölbt, und von der Länge des Hinterleibes; die Füße kurz und stark, mit viergliederigen Fußblättern. Die Farbe ist gewöhnlich dunkel.

Der Vorkenkäfer, 96. *Bostrichus*: Der Körper ist klein, cylindrisch, filzhaarig, ungerandet, auf jeder Seite stumpf, und träge; der Kopf ist klein, rund und verdeckt; die Augen sind rund und stehen an den Rändern; die Fühlhörner sind kurz, nicht nahe beisammen, unter den Augen eingefügt; der Halschild ist rund und cylindrisch; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und blaß, mit vierblättrigen Fußblättern. Die Farbe ist dunkel, mehrentheils schwarz.

Der Glanzkäfer, 40. *Nitidula*: Der Körper ist klein, eyrund, etwas niedergedrückt, glatt, behende und thätig; der Kopf eyrund und eingefügt; die Augen sind rund und stehen an den Rändern; die kurzen Fühlhörner sind vor den Augen eingefügt; der

der Halschild ist niedergedrückt, mit Rändern versehen, vornen aber breit ausgerandet; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind etwas gerändert und steif, von der Länge des Hinterleibs; die Füße sind kurz, stark, mit zusammengedrückten Schenkeln und runden Schienbeinen; die Fußblätter sind funfgliederig. Die Farbe des Insekts ist dunkel.

Der Drahtkäfer, 104. *Colydium*: Der Körper ist klein, cylindrisch, schmal, glatt, ungerändert und trägt; der Kopf ist eysförmig, platt, von der Länge des Halschildes und sehr eingefügt; die kuglichten Augen stehen an den Seiten und ragen wenig hervor; die kurzen Fühlhörner stehen von einander ab und sind hinter den Augen angeleimt; der Halschild ist schmal, platt, mit einer Rückenfurche; das Schildchen ist dreieckicht; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, platt, von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz, stark, zusammengedrückt, mit viergliederigen Fußblättern. Die Farbe ist bunt.

Linne legt mehreren davon etwas sonderbare Benennungen bey, die mit der Lebensweise dieser Käserchen im Bezuge stehen. Die nicht immer ganz unregelmäßigen Züge, Furchen, Gänge und Mienen, die sie in die Rorken der Nadelhölzer graben, veranlassen die Idee des Buchdruckens, Kupferstechens u. s. w.

Die sechsfüßigen Larven zerstreifen die Haut der Thiere, Pelzwerk und Saamen; diejenigen der eigentlichen Rorkenkäfer aber nur Rinde und Holz.

Erste Familie.

Diejenigen Kleinkäfer, die Rorkenkäfer sind, oder auch Splintkäfer.

Erste Linie. Die eigentlichen Rorkenkäfer, Fabricischen Bostrichen.

A. Die mehr schädlichen.

1. Der gemeine Rorkenkäfer. *Dermestes typographus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt auch: Buchdrucker, Buchdrucker = Kapuzinerkäfer, fliegender schwarzer Wurm, sichenzersiehrender Rindenkäfer, sichenzersiehrender Kapuzkäfer, buchstabenmachender Hautresser.

Dermestes typographus Lin. 562. 7. Müller's Uebers. 100. 7.

Bostrichus — — Fabr. Entom. Poin. I. part. 2. Seite 365. Nr. 3.

Dermestes piniperda, der fliegende schwarze Wurm. Gleditsch Forstwissenschaft. I. Seite 403.

— — — Brahm's Insectencalender I. 82.

Dermeestes typographus, besorgter Forstmann. 41. 4.

Boltrichus typographus. Panzeri Fauna Insectorum German. 15. tab. 2.

— — — Beschreibung d. Musterung aller bisher für schädlich gehaltenen Thiere. Geitha 1792. S. 153. 2.

— — — G. A. Dägel's Anleit. zur Forstwissenschaft. München. 1802. tab. 1. fig. 1. 2.

Sulzers Geschichte der Insekten tab. 2. fig. 4.

Hennert vom Kaupenfraß. tab. 6. fig. 1. 2.

Kennzeichen der Art.

Käfer: Er ist bald schwärzlich oder dunkelbraun (d. h. wenn er im Freien und nicht mehr unter der Borke ist) und behaart, mit langem allzeit dunklern Halschild als die Flügeldecken, und mit gezähnten Flügeldecken, die hinten angefressen scheinen; die Fußenden sind roth.

larve: Weiß mit gelbem Kopf, scharfen Kinnladen, kleinen Fühlhörnern, runzlichtem Körper mit einem röthlichen Rückenstreif ^d) und sechs Füßen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist dem Bau nach dem nächstfolgenden ähnlich, aber nur zwey bis zwey und ein Viertel, höchst selten drittehalb Linien lang, und eine breit; daher alle Beschreibungen und Abbildungen in den Degeer- Prensler- Panzer- und Dägel'schen Schriften, auch in Hennerts Schrift, sogar in Leonhard's Forst-Calender 1794. t. 6. fig. a. b. c. diesem Käfer ein zu großes Ausmaaß, nämlich drey Pariser Linien Länge geben, da doch der nächstfolgende, *B. Pinastri* nicht mehr als drey oder drey und eine Viertellinie lang ist. Wodurch denn viele Anfänger irre geleitet werden können. Auch ist durch ein Versehen im Forstcalender die Breite zu zwey, statt einer Linie angegeben. Vermittelt der Lupe entdeckt man an jeder Flügeldecke sechs Höhlpunktstreifen, und sieben schräg eingeschnittene Zähne, wovon die drey mittlern stärker sind, als die übrigen.

Seine Farbe ist oben glänzend, bald mehr, bald weniger schwärzlich dunkelbraun, Kastanienbraun, und zieht sich oftmals ins Rothe; unten mattschwarz. An verschiedenen Stellen des Körpers und gegen das Ende der Flügeldecken stehen viele Fuchshaare. Der Halschild ist gewöhnlich ganz schwarz, wenigstens allzeit dunkler, als die Flügeldecken. Je länger das Insekt lebt, desto dunkler wird es. Der Kopf ist niederhängend, und steckt zum Theil im Halschild, der nur um ein Drittel kürzer ist, als die Flügeldecken. Die Fühlhörner sind klein, und die Füße kurz und braun. Unter der Rinde ist er anfangs blaß rothgelb, wird dann fuchseroth, und wenn er auskriechen will, braunroth.

Die Larve ist, den röthlichen Rückenstreif ausgenommen, weiß, gelbköpfig, sechsfüßig, mit scharfer, bräunlicher Kinnlade und kleinen Fühlhörnern versehen, Ihr Körper

^d) Dieser röthliche Rückenstreif, den man auch oft unten am Bauch sieht, kommt von dem

mit röthlichem Linwarthe angefüllten Darmkanal her.

per besteht aus vielen kleinen, abgebrochenen, neben und unter einander befindlichen, aufgetriebenen Rinzeln, und läuft spitzig zu. Sie kriecht und nährt sich von der Zäfernde, und hinterläßt ein röthliches Wurmloch als Unrath. Ihre Gänge schlängeln sich bald auf- bald abwärts, ohne die Gänge ihrer Cameraden zu durchkreuzen, und durchscheiden den Splint oder das weiche unter der Rinde sitzende Holz flach. In ihrem Larvenstande, der nicht länger als zwey bis drey Wochen dauert, ist sie größer als im Puppen- und vollkommenen Stand. Als Puppe, die alle Theile des vollkommenen Insekts, nur die Flügel kürzer hat, ist sie anfänglich weiß und brennweich, gegen Hitze und große Kälte sehr empfindlich, wird nach und nach rostgelb, und tritt nach ein und zwanzig Tagen in den vollkommenen Stand, darin das Insekt seine Lebensart fortsetzt, und den Baß zerstößt, und sich dann durch ein rundes Loch herausbohrt.

Den Namen: typographus, erhielt das Insekt daher, weil es unter und in der Rinde der Rothtannen und Föhren, Buchen und Nienen gräbt, welche Buchstaben gleichen.

Aufenthalt.

Der Käfer befindet sich im Frühling, besonders im May ^e) zwischen der Rinde und dem Holz der Rothtannen oder Fichten (*Pinus pieea* Clusii), auch der Weißtannen, (*Pinus abies* Clusii) und Kiefer (*Pinus sylvestris*), wo man auch seine Larve in allen Jahreszeiten antrifft, wiewohl nicht sowohl an gesunden, stehenden Bäumen, als wenn er gefälltes Holz finden kann.

Uebrigens ist der Käfer der ersten Generation zwar schon im Winter unter der Borke der Nadelbäume, fliegt aber erst im May, und der von der zweyten im September oder October, zuweilen in großen Schwärmen, gewöhnlich nicht allzuweit, bey starken Winden aber wohl eine Stunde weit, um sogar das stehende Holz anzufallen.

Fortpflanzung.

Und wenn er in noch so großer Anzahl herumschwärmt, so fliegt er doch mehrentheils Paarweise nach seinem Hecker, um sich vermittelst eines schiefen Lochs von drey Viertel oder ein Zoll Länge unter die festen Borkeuschuppen und von da weiter bis zum Splint einzubohren. Dabey höhet er sich einen zwey bis vier Zoll langen Gang aus, wo dann der weiblische Käfer seine weißen, runden Eyer, sechzig bis siebzig an der Zahl, an den Seiten hin legt, und mit Wurmehl verklebt, woraus nach vierzehn Tagen die jungen Larven sich enwickeln ^f). Ein zweymaliges Eyerlegen des nämlichen Käfers kann eben

^e) Da wo er häufig ist, z. B. in Holzmagazinen, aufgetastert in Wäldern, und an andern Orten, findet man ihn den ganzen Sommer hindurch, und er fliegt auch zu allen Zeiten aus, nur im May bis zu Anfang des Julius am stärksten. D.

^f) Wenn ich recht beobachtet habe (und ich habe es viele hundertmal gesehen), so fliegt das Männchen nach der Begattung mit dem Weibchen an den Platz, wo die Eyer abgelegt werden sollen. Erstes sucht lange, ehe es eine passende Stelle zum Anbohren findet, und

eben so wenig, als eine dreymalige Generation mit Sicherheit behauptet werden, auch selbst wenn die Umstände und Witterung günstig wären.

Die saftige Ninde ist die Nahrung der Larve, deren Gänge immer breiter werden, je größer sie wird. Da wo die Verpuppung vor sich gehen soll, ist sie am allerbreitesten und am Ende zugerundet.

Hier findet man auch nicht blos rundliches Wurmmehl, wie in den übrigen Canälen, welche durch dasselbe als den braunen Koth des Thieres voll gefüllt sind, sondern nebst diesen auch weißliche Splitterchen, die blos abgefressen und zum Puppenlager zusammengelegt sind. Von hieraus geht dann der schiefe Gang zum Ausfliegen des eigentlichen Insekts.

Feinde,

Die Arten der Spechte, der Wendehals und mehrere Insektenfressende Waldvögel, als der gemeine Fink, die Fliegenfänger und mehrere Grasmücken- und Sangerarten. Bey dieser Gelegenheit wird es nicht unnöthig seyn, alle Insektenfressende Vögel namentlich anzuführen, und sie in solche einzutheilen, die in Rücksicht des Aufspürens und Fraßes der Käfer, Schmetterlinge und ihrer Larven mehr oder weniger vorzüglich sind.

a) Die vorzüglicheren sind.

Die mittlere Ohreule, *Strix otus*; die kleinste Ohreule, *Strix scops*; die Nacht-eule, *Strix aluco*; die Brandeule, *Strix stridula*; die Schleyereule, *Strix flammula*; der große Kauz, *Strix ulula*; der kleine Kauz, *Strix passerina*; der gemeine Würger, *Lanius excubitor*; der graue Würger, *Lanius minor*; der rothköpfige Würger, *Lanius collurio*; der rothrückige Würger oder Dorndreher, *Lanius spinitorquus*; der gemeine Kufuf, *Cuculus canorus*; der Schwarzspecht, *Picus martius*; der Grünspecht, *Picus viridis*; welcher keine gesunde Bäume angeht, sondern nur die unter der Rinde anbrüchigen; der Buntspecht, *Picus major*; der Weißspecht, *Picus medius* und der Grasspecht *Picus minor*; der drengelige Specht, *Picus tridactylus*; der gemeine Kleiber, *Sitta europaea*; die blaue Rabe, *Coracias garrula*; der Pirol, *Oriolus galbula*; der Wendehals, *Lynx torquilla*; der gemeine Baumläufer, *Certhia vulgaris*; der Mauerpecht, *Certhia muraria*; der Wiedehopf, *Upupa epops*; der gemeine Fink, *Fringilla caelebs*; der Tannenfink, *Fringilla montifringilla*; alle Ammerarten (*Emberiza*), vorzüglich der Goldammer, *Emberiza citrinella*; alle Drosselarten (*Turdus*), z. B. die Misteldrossel, *Turdus musicus*: die Schwarz-

drossel,

und wird immer vom Weibchen begleitet. Hat es eine gute Stelle gefunden, so frist es gleich ein Loch an, und das Weibchen folgt ihm nach. Kommt dann ein anderes Männchen in das Loch, so wird es mit grim-migen Wiffen herausgejagt. Ich habe den

Kampf oft selbst veranlaßt, indem ich ein Männchen in das Loch eines andern steckte, wo der Streit gleich losgieng. Man erkennt das Männchen daran, daß es schmäler als das Weibchen ist.

B.

drossel, *Turdus merula*; die Singdrossel, *Turdus musicus*; der schwarzrückige und gesleckte Fliegenfänger, *Muscicapa atricapilla et grisola*; alle Vachstelzen und Sängervogeln, als Nachtigall, Grassmücken, Steinschmäger, Rothkehlchen, Gartenrotschwänzchen, Hausrotschwänzchen, Braunnellen, Zaunkönig, Goldhähnchen, Weidenzeischen u. s. w.; ferner alle Arten Schwalben; dann die Nachtschwalbe oder Ziegenmelker, *Caprimulgus europaeus*; die Heubienenmeise, *Parus cristatus* (in Nadelwäldern); die Kohlmeise, *Parus maior*; die Blaumeise, *Parus caeruleus*; die Sumpfschneise, *Parus palustris*; die Tannenmeise, *Parus ater*; die Schwanzmeise, *Parus caudatus*.

b) Die weniger vorzüglichen.

Der Holzheher (*Corvus glandarius*), der Tannenheher, (*Corvus caryocatactes*); die Waldhühner (*Tetrao*), als das Auerhuhn *Tetrao Urogallus*, das Wirkhuhn, *Tetrao Tetrix*, das Haselhuhn, *Tetrao Bonasia*, die Feldlerche, (*Alauda arvensis*, welche sich auch in Holzungen und zwar in tiefsten Gebirgen aufhält, die Brachlerche, *Alauda campestris* und die Piepelerche, *Alauda trivialis*,

c) Die unter gewissen Umständen hierher gehörigen.

Solche Einschränkungen sind: daß, weil einige davon der niedern Jagd, andere der Fischen, andere der Saat, dem Getraide, den Sommerungsfeldern, den Obstgärten u. s. w. nicht zuträglich sind, solche entweder geschlecht, oder zu gewissen Jahreszeiten verfolgt, aber nicht ganz vertilgt werden müssen.

Der Wespenbussard, *Falco apivorus*; die Rabenkrähe, *Corvus corone*; die Nebelkrähe, *Corvus cornix*; die Saatkrähe, *Corvus frugilegus*; die Dohle, *Corvus monedula*; die Steindohle, *Corvus graculus*; die Elster, *Corvus pica*; der Feldsperling, *Fringilla montana*; der Hausperling, *Fringilla domestica*.

Doch verdient der letzte nicht die uneingeschränkte Hegung der meisten andern, wenn man bedenkt, daß er in der Regel von Getraidekörnern lebt. Und wenn er denn auch in den Paar Frühlingsmonaten seine Jungen mit Raupen füttert, so geht er doch dabei die zarten aufgewachsenen Erbsen, Kohlpflanzen, und späterhin die Kirschen, Gartenerbsen, Johannisbeere an, und zehrt überhaupt das ganze Jahr von unsern Körnern. Daher die Sperlinge allerdings in Schranken gehalten werden müssen, damit der Nutzen, den sie leisten, nicht durch ihre Schädlichkeit überwogen werde. Freylich hat man Verscheuchmittel, wodurch man ihn unschädlich machen kann, allein wendet man sie denn immer, oder wie es sollte, allgemein gehörig an?

Unter obigen Vögeln sind folgende den Vögeln zur Raupen- und Insecten- Verminderung dienlich: der gemeine Kuckuck, der Grasspecht, der Grünspecht, der Weißspecht, der Baumkäufer, der Fink, alle Motacillen oder Säger (*Sylvia*), die Blaumeise, die Kohlmeise, der Goldammer, *Emberiza citrinella*, und der Feldsperling.

Nicht allein aber unter den Vögeln hat der Vorkenkäfer seine Feinde, sondern auch jedes nasse und kalte Wetter zu der Zeit, wenn er gerade ausfliegt, ist seiner Vermehrung nachtheilig und hinderlich, ob er gleich nicht so sehr von der Bitterung leidet, als seine andern schädlichen Verwandten, die schädlichen Forstschmetterlinge.

Schaden.

Die Verheerungen, die der Vorkenkäfer, als vollkommen und unvollkommenes Insect in den Nadelforsten anrichtet, ist zu bekannt, indem er die innere Substanz der Rinde, die Saftgänge und den Anfang des Splintes verzehrt. Denn er haukt sowohl in regelmäßig abgetriebenen Schlägen, als geschlossenen Waldungen, und zieht die saftigen den dürrern, aber auch den vollsaftigen; die mittelmäßigen den ganz alten und ganz jungen Bäumen vor, deren Nadeln dadurch anfänglich bläugrün, hernach gelblich, und endlich braunröthlich werden, dann gar abfallen und den Tod des Baums verkündigen. Die Löcher in der Rinde und das Wurmmehl verrathen dem Förster seine Gegenwart. Manche wollen ihn aus dem Grunde von der Wurmtrockniß freisprechen, weil sie ihn in ihren Gegenden nur an solchen Fichten angetroffen, welche umgehauen, ein und mehrere Jahre gelegen haben.

Herr Schrank behauptet in seiner Fauna I. 434. daß ihre Vermehrung nicht übermäßig seyn werde, wo die Waldungen gesund sind und naturgemäß bewirthschaftet werden; aber nicht gerade deswegen, weil dem Käfer frische und gesunde Bäume nachtheilig sind, sondern nur, weil er von ihrem Geruch weniger gelockt wird: denn wo keine allgemeine Baumtrockniß vorkommt, findet man den Käfer nichts desto weniger häufig, aber nur in todttem, oder aus andern, sichtbaren Ursachen krankem Holze, z. B. in berindeten Baumpfählen, Windwürfen, vom Blitze getroffenen Bäumen, in Kastenholz u. s. w. aber nie in jungem Holze. Auch wird die Erfahrung immer mehr und mehr beweisen, daß kein Käfer ins Holz geht, welches im Winter gefällt, und also ohne Saft ist; da sie hingegen am liebsten und in den stärksten Schwärmen auf das in der Saftzeit gefällte Bauholz, auf die geschnittenen Brunnenröhren fallen; daß sie die Schneebrüche fast gar nicht, hingegen die Windbrüche im Sommer sogleich angreifen. Also ist es nicht der Mangel des Safts oder die geschwächte Gesundheit der Fichte, sondern der faulichte oder der Geruch der in Gährung übergegangenen Säfte, der die Vorkenkäfer herbey lockt.

Herrn Schrank's Gedanke in Ansehung der Wurmtrockniß, die man diesem Käfer und dem Bostr. piniperda zuschreibt, sind in s. Fauna Boica I. S. 435. 1) Der Käfer ist nicht die Ursache, sondern die Folge der Baumtrockniß, davon die Ursache in älteren Gebrechen liegt, welche sehr mannichfaltig seyn kann; und zum Theil auch wohl in unserm Eigensinne beruht, daß wir auf demselben Flecke immer einenley Holz nachziehen wollen (?). 2) Aber er befördert sie, indem er die Nahrungslosigkeit des Baumes durch seine Arbeiten vermehrt. 3) Da in Gegenden, wo die Baumtrockniß, so zu sagen, einheimisch ist, das ist, wo sie eine allgemeine Ursach voraussetzt, eben so wenig alle Bäume davon befallen werden müssen, als bey endemisch herrschenden Krankheiten nicht alle Einwohner

wohner der Gegend davon angegriffen werden: so ist es begreiflich, wie es zugehe, daß sogar bey einer allgemeinen Baumtrockniß das Uebel nur stellenweise vorkömmt. 4) Jugend und Gesundheit sind auch bey Bäumen nicht einerley Dinge, obgleich hohes Alter schon für sich eine Krankheit ist. 5) Da der Käfer von außen in die Bäume hineinkömmt, so ist es allerdings möglich, daß er bey einer durch die Baumtrockniß beförderten Vermehrung seiner Art gezwungen werde, auch junge und gesunde Bäume anzufallen 5), und sie, zwar etwa mit anfänglichen Nachtheile der es wagenden einzelnen Käfer, krank mache. Es ist also wohlgethan, wenn alles todte, sterbende, oder krepstrockne Holz frühzeitig herausgeschlagen und vom Forste weggeschafft wird. 6) Aber man vergesse darüber ja nicht, auch auf die vorbereitenden Ursachen der Krankheit genaue Rücksicht zu nehmen, und diejenigen, welche in unsrer Hand sind, zu zerstören. —

Mittel dagegen.

Die besten auf Theorie und Erfahrung sich gründenden Mittel sind diese:

a) daß man der Insectenfressenden Vögel, denen dieser Käfer und seine Larve zur Nahrung dient, schone, z. B. der Finken, Fledermäuse, Nachtschwalben, Spechte u. s. w.

b) Daß man die Bäume ausroden oder tiefer an der Erde wegschneiden, die zurückbleibenden hohen Strünke aber, in deren Borke er sich in kalten Waldungen am meisten einnistet, und haufenweise überwintert, sogleich ausroden und aufarbeiten lasse 1).

c) Daß man die Gehäue bis Johanni räume, das im Sommer gefällte Holz so gleich, das Herbstholz aber noch vor dem Januar fortchaffe. Nähere Untersuchungen bezeugen, daß immer in tiefen Waldungen, wo oft das im Frühjahr geschlagene Holz im folgenden

g) Meine Erfahrungen und Beobachtungen, die auch von andern bestätigt worden, sind diese: Wenn die ausgeflogenen Käfer in Easht gefälltes oder auf irgend eine Art beschädigtes saftiges Holz finden, so gehen sie zu allererst dieses an. Sind sie aber in einem Forste, der gut bewirtschaftet, also von allem anbrüchigen Holz gereinigt ist; und wo das gemachte Holz zu gehöriger Zeit aus dem Walde geschafft wird, so greifen sie in Menge gewöhnlich schaarweise bey warmen sonnenreichen Tagen nach Verhältniß ihrer Anzahl 30 — 100 Stämme in einem einzigen Bezirke, zuweilen auch 1 — 2 Morgen, auf einmal über der Mitte des Baumes an, gehen am liebsten an Nadelholz von 50 bis 70 Jahren, und fallen gewöhnlich in dem Forstort gegen Morgen oder Mittag ein.

Einzelnen findet sie aber der aufmerksame Beobachter auch an den Stämmen der Waldungen an den gesündesten Fichten von 70 — 100 Jahren, denen sie auch keinen großen Schaden thun, denn ich kenne solche Bäume, in welchen drey und vier Löcher waren, die schon vor zehn Jahren von ihnen bewohnt waren, und die noch immer gesund sind und fortwachsen. Nur dann, wenn sie so häufig sind, daß sie in der ganzen Rindung des Baums den Saftzug abschneiden, dann verdorrt der Baum.

V.

h) Ich habe zuweilen auf dem Thüringer Walde in den hohen Stöcken zwischen der Schale bis zur Wurzel herab, ganze Hände voll gefunden.

V.

genden Winter erst weggeschafft wird, sich die Wurmtröckniß zuerst angefangen, und ohne allen Zweifel die Brutten, die sich in dem gefällten Holze erzeugt hatten, die Ursache waren.

d) Die durch Wind- und Schneebüche, Frost, Sturm u. s. w. beschädigten oder umgerissenen Bäume müssen sogleich aufgearbeitet und aus dem Walde geschafft werden, damit sie keine Wurmnester werden.

e) Fichten, deren Gipfel verdorrt, oder in deren Spinnweben und Schuppen Wurmmehl liegt, müssen sofort umgehauen werden. Besonders muß der Forstmann auf das Dürwerden und Entnadeln der Bäume in denjenigen Districten merken, wo Schwärme eingefallen sind, damit solche Strecken sogleich mit noch einigen daneben stehenden Bäumen weggehauen und aus dem Walde geschafft werden.

f) Man gestatte den Zimmerleuten nicht, ihre Werkstätte im Walde aufzuschlagen, da sie fast immer nur anbrüchiges Holz, in welchen der Käfer schon hauset, kaufen, oder das gute so lange in der Schaafe liegen lassen, daß er leicht darein kommt.

Endlich g) und dieß ist die Hauptsache, man setze die Schläge nicht dem Windbruch und der Sonnenhitze aus und lege sie also nicht von Abend oder Mittag gegen Morgen oder Mitternacht an, sondern wo nicht andere wichtige Hindernisse eintreten, umgekehrt, und zwar in schmalen Streifen.

Dieß sind die Verhütungsmittel, die denn ganz natürlich die vorzüglichsten sind; Als Vertilgungsmittel ist h) eigentlich nur ein einziges wirklich anwendbar. Wenn nämlich der Käfer, wo er in Menge wüthet, einen District angegriffen hat, so schlägt man diesen in Winter, wo das Insect als Larve, Puppe oder Käfer zwischen der Rinde ist, nieder, und läßt das Holz entweder aus dem Walde schaffen und von der Rinde entblößen, oder wo dieß nicht möglich ist, im Walde durch Zimmerleute und Holzmacher die Rinde mit dem Beile abhauen. Diese bringt man alsdann nach Hause und verbrennt sie, oder wenn sie nicht alle zu verbrauchen wäre, so vergräbt man sie eine zeitlang in die Erde oder wirft sie ins Wasser. Würde man die Insecten erst im Sommer beim Ausfluge gewahr, so fällt man eine ganze Strecke Bäume, in welche sie sich sogleich eingraben werden. Man fängt sie oder vielmehr ihre Brut gleichsam; schält alsdann solche Bäume, und läßt die Schaafe frey dem Wetter und der Sonne ausgesetzt liegen, wo denn die Eier oder auch die Maden und Puppen verderben. Sollte man im Sommer den Zeitpunkt des Schwärmens der Käfer verfehlt und kein Holz zum Einlegen ihrer Brut gefallt haben, so ist es auch noch Zeit das stehende Holz, in welchen man sie eingenistet findet, zu fällen, und es von der Schaafe zu befreien. Wird dieß Mittel einige Jahre wiederholt, so kann man sich von diesem schädlichen Waldverderber befreien, sonst ist er fast nicht auszurotten, wenn er erst in Menge da ist, da die Natur fast selbst kein Mittel hat, wodurch sie außer den Vögeln seiner Vermehrung zu steuern im Stande wäre; denn Masse, Kälte und Hitze schaden ihnen gewöhnlich nichts.

Man

Man sehe Bechsteins kurze aber gründliche Musterung aller 12. Gotha 1792. S. 162.

Herr Däzel a. a. O. empfiehlt, außer der Schonung der Vögel auch noch theils die Abschaffung der Schneidr, theils das Niederhauen einer ganzen von Insecten angegriffenen Strecke Holz zu einer Zeit, wo das Insect im unvollkommenen Zustande sich in den Bäumen befindet; theils die Nachfeuer, welche aber nicht zu groß, und nicht bey der Dürre gemacht werden dürfen. Allein letzteres scheint uns bey diesem Insect nicht so anwendbar als bey den Nachfaltern.

2. Der Kiefern-Forkenkäfer. *Bostrichus pinastri*. Bechst.

Kenntzeichen der Art.

Käfer: Er ist bald rostbraun bald kastanienbraun, die Flügeldecken heller als der Halschild; die längstreifigen Flügeldecken sind zurückgeschlagen, stark gezähnt, als ob sie ausgefressen wären, und haben oben an der Seite einen glatten dunkeln Höcker.

Larve: Weiß mit einem kleinen rostbraunen Kopfe, und einer kaum merklichen Rückenlinie.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist drey bis drey und eine halbe Linie lang, also noch einmal so groß und schwer und oft noch größer und schwerer, als der vorhergehende, mehrentheils rostbraun aber auch kastanienbraun, selten noch dunkler, niemals in Frenheit hellgelb, ob er gleich unter der Rinde, wie fast alle Käfer, die noch nicht an der Luft gewesen, gelb ist, und zwar heller und gelber als der vorhergehende. Kinnbacken und die schrägliegenden bohnenförmigen, haagrinirten Augen und die Unterflügel sind schwarz. Der vorne haarige, hinten zu glatte hohlpunctirte Halschild ist, wie die mit sehr deutlichen hohlpunctistreifen versehenen Flügeldecken, wie gesagt, rostbraun oder kastanienbraun, ersteres allezeit heller als letzteres und der Kopf noch heller, also am allerhellsten. Die Flügeldecken haben oben an der Quernath fast in der Mitte des Flügels einen glatten schwärzlichen oder dunkelkastanienbraunen unpunctirten Höcker, von welchem aus mehrere hohlpunctistreifen, wie aus einem Punkte, nach den Seiten der Flügeldecken ausgehen und am Hinterrande stehen sieben dreieckige Zähne oder Zacken, wovon der mittelfte oder vierte der größte ist, und oben einen schwärzlichen starken, glänzenden Kopf hat, die andern oben aber nur abgerundet sind, aber auch schwärzlich glänzen, und der hinterste sich als eine Kante ausbreitet und die Flügel schließt. Diese Zacken bilden wie beym vorhergehenden im Kreis herum gleichsam eine Krone, deren Höhlung hohlpunctirt ist. Er ist fast überall mit blonden Haaren besetzt, vorzüglich stark an den Seiten hin.

Er ist zuweilen mit dem vorhergehenden verwechselt worden, kann aber, da er kolonienweise vorhanden, keine Varietät von jenem seyn, der sich von diesem durch seine mindere Größe, dunklere Farbe und rothe Füßenden schon hinlänglich unterscheidet.

Aufenthalt, Schaden und Mittel dagegen.

Er hält sich in keinem andern Nadelholze auf, als in Kiefern, wo er vorzüglich unter der Rinde geschlagener und abgestorbener Kiefern weite und irreguläre Gänge macht, aber auch an stehenden, äußerlich gesunden Bäumen angetroffen wird ¹⁾. Daher er denn eben so verüchtigt, und ein schädlicher Käfer vom ersten Range ist, wie der vorhergehende.

Es sind auch bey der Kiefer eben die Verhütungsmittel gegen diesen Vorkenkäfer anzuwenden, wie bey der Korythanne oder Fichte. Man muß vor ihm auf seiner Hut seyn.

3. Der Fichten-Vorkenkäfer. *Dermestes piniperda* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt: Fichtenverderbender Vorkenkäfer, Fichten-Kapuzkäfer, Waldbgärtner, Rienbohrer, Trauerkäfer, Fichtenzerstörer, Fichtenverderber, zweyter fliegender schwarzer Wurm, Fichten-Schabkäfer.

Dermestes piniperda Lin. 563. 11. Mäßer 104. 11.

Bostrichus piniperda Fab. Ent. 1. 2. 367. 17.

Hylesinus piniperda Fab. Syst. Eleutheratorum.

— — — — — Bechsteins Musterung S. 165.

— — — — — Dägel Forstwiss. 293. S. 336.

Dermest. piniperda Degeer 5. t. 6. fig. 8. 9.

— — — — — Zinke im besorgten Forstmann S. 56. n. 7.

Bostrichus piniperda Panzer Fauna 15. t. 9.

— — — — — Hennert vom Raupenfraß t. 6. f. 8—10.

Kenntzeichen der Art.

Er ist glänzend schwarz, etwas behaart, mit hohlpunktierten, unangefressenen, pechfarbigen Flügeldecken, und rothen Fühlhörnern und Füßen.

¹⁾ Ich habe diesen Vorkenkäfer noch nie anders, als in Kiefern gefunden, da der gemeine nicht bloß in der Fichte, sondern auch in der Weißtanne und Kiefer wohnt. Man trifft ihn in geschlagenen Klastern und Bauholz manches Jahr (wie z. B. 1802 u. 1803) in Menge an. Er macht größere,

weitere und unregelmäßigere Canäle, als die Larve des vorhergehenden; hat aber gleiche Flug-Larven- und Puppenzeit. In Holzmagazinen ist er wie jener gleichsam herumirrend, und man trifft daher zu allen Jahreszeiten, Käfer, Larven und Puppen an. V.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist kaum zwey Linien lang. Der Körper ist länglich oval und cylindrisch, schwächer als bey dem gemeinen Vorkenkäfer, bald schwarz bald dunkelkastanienbraun, und mit kleinen Fuchshaaren überall besetzt. Kopf, Halsschild und Fühlerhörner sind schwarz, letztere sind neungliedrig, birnenförmig und an ihrem dretheiligen Knopfe rostbraun. Die glattschemenden, in der That aber höckerpunktirten Flügeldecken sind nicht abgestuft, und die schwarzen Füße sind an den Fußblättern rothfarben.

Die Larve ist schneeweiß mit einem kleinen rostbraunen Kopfe.

Aufenthalt, Schaden und Mittel dagegen.

Der Käfer findet sich nicht nur an schon anbrüchigen Rinden, gefällten Baumstämmen und Stammenden, sondern er bohrt auch die jungen Föhrenzweige, welche aus dem Stamm hervortreten, an, daß sie verdorren. Nicht weniger zeigt er sich in unsern Häusern an dem hölzernen Geräthe. Wenn er nicht in großer Zahl, sondern einzeln vorhanden, so wird er, nach Linne's Wohnung und Ausdruck im Natursystem, ein natürlicher Waldgärtner, indem er nur die entbehrlichen Zweige abnagt, wodurch die Stämme desto schöner wachsen. Allein mehrere Erfahrungen haben bewiesen, daß seine Gärtnerey nichts taue, und viel Nadelholz zu Grunde richte.

Man bedient sich gegen ihn der nämlichen Mittel, als bey dem gemeinen Vorkenkäfer. Besonders leisten hier die Spechte und Kleiber den größten Nutzen.

Wenn er die jungen Föhren angreift, welches gewöhnlich 12 bis 30 jährige Dicken sind, so läßt man die gelbwerdenden Zweige abschneiden, zusammenharken und verbrennen, und dadurch kann man die angegriffene Waldung erhalten. Thut man dieß nicht bald, so greift er um sich, und verdirbt in etlichen Jahren ganze Distrikte. Wenn man die Zweige an jungen Föhrendickigen, besonders an den Säumen hin, sieht an den Spitzen gelb werden, so ist er gewöhnlich da. Er bohrt sich oben neben der Mayknospe ein, und die Larve durchfrist bis zur Verwandlung herabwärts nach dem Stamm zu, den Zweig h).

B. Die weniger schädlichen.

4. Der Kapuz-Vorkenkäfer. *Dermestes capucinus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt: Kapuz-Schabkäfer, rother Kapuzkäfer, Zopfkäfer, Kapuziner, rother Splinkkäfer.

Der-

h) Durch dies Mittel ist im Sommer 1802 auf einem Weiningischen Forste ein Distrikt erhalten worden. Ich kenne aber auch

Gegenden; wo bey keinem angewandten Mittel die schönsten Kiefern Dickungen sind verwüster worden. B.

Dermestes capucinus L. n. 562. 5. Müller 102. 5.

Apate capucinus, Fabr. Entom. 1. 2. 362. 7. Früher ein *Bostrichus*, und mit mehreren Rechte.

Dermest. capucinus, besorgter Forstmann 40. no. 3.

Bostr. capucinus Panzer 43. t. 18.

Eulzer's Geschichte 2. fig. 5. Schäffer Icon. 189. fig. 1.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz mit rothen Flügeldecken und einem schwarzen, ausgerandeten, zurückgebogenen, gewölbtem Halschild.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist fünf Linien lang, und also unter allen Vorkenkäfern der größte. Die Fühlhörner sind braun. Der körnige Halschild ist gleich einer Kapuze zurückgezogen und fuglig; daher die Benennung. Die feinpunktirten oder chagrinirten Flügeldecken sind bei frischen Exemplaren, wenn sich durch das Licht die Farbe noch nicht ausgezogen hat, nebst den letzten Bauchringen roth. Daher er gut ins Auge fällt — Bisweilen hat er ganz schwarze Fühlhörner. Auch seine Größe und Farben wechseln.

Aufenthalt und Schaden.

In alten Stöcken der Eichen; zuweilen an neuen eichenen Planken und breternen Wänden.

Dr. Zinke im besorgten Forstmann zählt ihn unter die den Nadelhölzern schädliche Insekten.

5. Der walzenförmige Vorkenkäfer. *Bostrichus cylindricus* Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Cylindrischer Vorkenkäfer.

Bostrichus cylindrus, Fabr. Entom. 1. 2. 364. 2.

— — — — — Panzer 15. tab. 1.

Platypus cylindrus, Herbst Naturgeschichte der Käfer 5. tab. 49. f. 3. e.

Kennzeichen der Art.

Er ist cylindrisch und schwarz; mit gestreiften und am Hinterrande behaarten und sägezahnigen Flügeldecken; die Füße sind platt und rostgelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist zwey und eine halbe Linie lang, und, die Fühlhörner und Füße ausgenommen, überall mattschwarz, doch sind die Flügeldecken gestreift, und haben an der Endspitze, wie der typographus, gezähnte schiefe Quers-Einschnitte. Jede Flügeldecke hat acht Streifen. Die Fühlhörner haben vier Gelenke, wovon das äußerste aus einer dicken Kolbe besteht. Ihre Farbe ist so rostgelb, als die der Füße.

Aufenthalt.

In alten Eichstämmen, bey Braunschweig.

6. Der Lerchen-Vorkenkäfer. *Bostrichus laricis* Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bostrichus Laricis, Fabr. Ent. 1. 2. 365. 4.

— — — — — Panz. 15. tab. 3.

Herbst Käfer 5. t. 48. f. 13.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz, mit zurückgebogenen und angestressen scheinenden Flügeldecken; die Füße sind pechfarben.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er hat viel ähnliches mit dem typographus und dem cylindrus, ist aber kleiner als beyde, indem er nur ein und drey Viertel Linien Länge hat. Seine kurzen, gekolbten Fühlhörner und Füße sind pech- oder gelbschwarz. Sonst ist er überall braunschwarz und behaart, nur an den Füßen und Fühlhörnern nicht. — In der Panzerischen Abbildung die Sturm geliefert hat, ist die Farbe zu braunroth genommen, und die Füße sind, statt pechbraun zu seyn, gelb gefärbt.

Aufenthalt.

Er lebt unter der Rinde des Lerchenbaums.

7. Der zweyzählige Vorkenkäfer. *Bostrichus bidens* Fab

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bostrich. bidens, Fabr. Entom. 1. 2. 368. 24.

— — — — — Panz. Entom. I. 290. 29.

— — — — — Panz. Fauna 39. tab. 21.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarzbraun mit an dem Hinterrande rückwärts abgestuften, zwenzähligen Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist sehr klein, kaum eine Linie lang, und von schwarzem Halschilde, der fast den Kopf bedeckt. Die Flügeldecken scheinen durchs Mikroskop zehn Punktereihen zu haben. Sie sind nebst den Fühlhörnern und Füßen gelbmattschwarz, jedoch tiefschwarz eingefast. Jede Flügeldecke ist so ausgerandet am Hinterrande, daß zusammen zwei Spitzen oder Zähne erscheinen.

Aufenthalt.

In den durchfressenen Rinden der Föhren, wo ihn Hr. Amtmann Schwarz zu Nürnberg, der fleißige und genaue Fortsetzer der Kleemannischen Insectenbeiträge wahrgenommen hat, nachdem solcher schon zu Kiel, ebenfalls in Stöcken entdeckt worden.

8. Der Kupferstecher-Vorkenkäfer. *Dermestes chalcographus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kupferstecher, Kupferstecher-Speckkäfer, Kupferstecher-Schabkäfer.

Dermestes chalcographus Lin. 562. 8. Müller 103. 8.

Bostrichus chalcographus Fabr. Entom. 1. 2. 365. 5.

Dermest. — — — Zink im besorgten Forst: 54. 5.

Bostrichus — — — Panz. Fauna 39. t. 20.

Herbst Käfer 5. t. 48. fig. 26.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz, mit augenagtscheinenden, fuchsrothen Decken, die an der Seite und an der Wurzel schwarz sind.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist nur eine Linie lang, also gerade zweimal kürzer, als der gemeine Vorkenkäfer, *typographus* und behaart. Der Halschild ist länger, als breit, vorne nicht sehr heruntergezogen, und von Farbe schwarz mit einem rothen Schein im Mittelraum, und einem Längsstrich vom Kopfe bis zu den Flügeldecken. Beides, Kopf und Decken sind fuchsroth; letztere am Ende nagezählig oder angefressen. und an den Rändern und der Wurzel schärzlich. Fühlhörner und Füße sind gelb.

Nach Fabricius variiert er auch mit schwarzen Decken.

Auf

Aufenthalt.

Er lebt unter der Rinde verschiedener Nadelhölzer, und zwar am liebsten derjenigen Fichten und Tannen, die frisch gefällt oder die windbrüchig sind.

Fortpflanzung und Schaden.

Der weibliche Käfer legt wirklich der Zahl nach mehr Eier als der gemeine; ich finde aber keine Anzeige, ob seine Erscheinung jährlich mehr als einmal vorhanden. Dieser Käfer fällt, bei einer stärkern Vermehrung auch junges, gesundes Holz an, vornehmlich am Gipfel und in den Aesten. Seine in der Safthaut gegrabenen Gänge sind feiner, als des gemeinen Vorkenkäfers, mit dem er doch zuweilen zu gleicher Zeit in den nämlichen halbge- wachsenen Nadelbäumen lebt, wo dann jeder dem andern mit vieler Gefälligkeit ausweicht, daß keines an seiner Brut Schaden leide ¹⁾.

9. Der Tannen-Vorkenkäfer. *Dermestes micrographus* L.

Namen und Schriften.

Stutzköpfiger Kapuzkäfer, Kleinschreiber, Hautfresser mit haarigen Flügeldecken.

Dermestes micrographus Lin. 562. 9. Müller 104. 9.

Bostrichus — — — Fab. Ent. 1. 2. 366. 8?

— — — — Schrank Fauna Boica I. S. 437?

Kennzeichen der Art.

Er ist rothfärbig, glatt, mit schwarzem Halschild. Die Flügeldecken sind schief abgestumpft und gezähnt.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Nur etwas über eine Linie lang. Der Körper ist nebst dem Halschild schwarz. Die etwas behaarten Flügeldecken haben am Außenrande eine schwarze Längslinie. Die

Füh-

¹⁾ Der in der Fauna Panzeri, Heft 15. t. 4. als *Bostrichus chalcographus* früher abgebildete, zwey Linien lange Käfer mit schwarzem, sehr kugligen oder gewölbten Halschild, rothbraunen, schwarzgerandeten, hinten nagezahnigen Flügeldecken und schwarzen Füßen; gelben, eilfgliedrigen Fühldern, mit Einschluß der drei Kolbenglieder;

und schwarzer Unterfläche — wurde nach der Zeit vom Verfasser, Hrn. D. Panzer in seiner Entomol. Germanica 282 den *Sinodendris* zugezählt, weil Hr. Det. u. Prof. Hellwig versichert halte, daß nicht der im 15. Hefte t. 4., sondern der im 39. Hefte t. 20. abgebildete Käfer der achte *Bostrichus chalcographus* Fabr. sey.

Fühlhörner haben ein ungetheiltes Kölbchen, und sind nebst den Flügeldecken und Füßen rothfarbig.

Fabricius und Schrank sind nur fragweise allegirt, weil solche unserm Käser unabgestufte Flügeldecken zueignen: das Uebrige trifft sonst zu. Auch giebt Fabricius seinem Insekt eine Stirne von weißen Filzhäarchen.

Aufenthalt und Schaden.

Im Splint verschiedener Hölzer, wo er besonders in den abgestandenen oder abgehauenen Weistammen, vorzüglich wenn es noch Stangen sind, die eine weiche und schwache Rinde haben, Locherchen, so fein wie mit einer Nadel gestochen, einbohrt. Er kann einmal, da er in manchen Jahren außerordentlich häufig ist, den Tannenwäldungen nachtheilig werden.

10. Der Zeichner-Vorkenkäfer. *Dermestes polygraphus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt auch: Vielschreiber-Vorkenkäfer, Vielschreiber, Stadtschreiber-Vorkenkäfer, Zeichner, Geschwindschreiber, zeichnender Kleinkäfer, Vielschreiber-Speckkäfer, nebelgrauer Vorkenkäfer.

Dermestes polygraphus Lin. 561. 10. Müller 104. 10.

Bostrichus — — — Fabr. Entom. 1. 2. 365. 6.

— — — — — Walthers Forstphysiographie 355.

Dermestes — — — Forstmann 55. 6.

— — — — — Gleditsch: der haarichte, schimmelgraue Rindenkäfer I. S. 463 und 477.

Bostrichus — — — Panzeri Fn. 15. t. 5.

Wenn *polygraphus* kein Schreib- oder Druckfehler des Linne scheint, statt *polygraphus*, der wird gegen die Panzer'sche Uebersetzung: Stadtschreiberkäfer, nichts einzuwenden haben. Man möchte aber doch wohl *polygraphus* vorziehen.

Bostrichus polygraphus Herbst Archiv der Naturgesch. 4. t. 20. f. 9.

Kennzeichen der Art.

Er ist äußerst klein, braunröthlich rauch, mit punktförmigen, abgerundeten, meergrünen Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

In der Größe eines Flohes, ein und eine Viertellinie lang. Seine glatten, weißbesprengten Flügeldecken scheinen fast schimmelgrau oder meergrün, und sind hinten etwas zuge-

zugerundet. Einige haben einen schwarzbraunen Kopf und Halschild; die gewöhnlichen aber sind braunröthlich. Die Füße sind gelb, wie die Fühlhörner, welche fünf Ringe mit Einschluss der dicken Kolben, haben.

Aufenthalt und Schaden.

Er wohnt im May in Nadelhölzern unter den Baumrinden der jungen Stämme, die er ganz zu zerstören im Stande ist, weit lieber und häufiger, als an schon erwachsenen, dick- und hochstämmigen. Seine labyrinthischen Gänge laufen auf beyde Seiten aus.

11. Der Kolben-Vorkenkäfer. *Bostrichus scolytus* Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kolbenkäferchen.

Bostrichus scolytus Fab. Entom. I. 2. 366. n. 9.

Dermestes — — besorgter Forstmann 58. n. 8.

Bostrichus — — Panz. Faun. 15. t. 6.

Ekkoptogaster scolytus Herbst Naturgeschichte t. 49. f. 1. a. Sulzer's Gesch. t. 2. fig. 13.

Gmelin über die Wurmtrocknis t. 2. f. 13.

Kennzeichen der Art.

Er ist glatt, mit abgestuften, braunrothen ins Pechschwarze fallenden Flügeldecken und zurückgebogenem Hinterleibe.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwey Linien lang, hat die Gestalt des gemeinen Vorkenkäfers, und ist ganz glatt. Die gelben viergliedrigen Fühlhörner haben eine dichte Keule zum letzten Glied. Die Stirne ist haaricht und aschgrau. Kopf und Halschild sind sehr glatt, schwarz, glänzend, letzterer von der Länge der Flügeldecken. Diese sind mit vier erhabenen Linien und dazwischenlaufender Punktenreihe gestreift, pechschwarz, an der Endspitze aber abgestuft, ein wenig länger, als der Hinterleib, welcher schwarz und sehr zurückgebogen ist.

Aufenthalt und Schaden.

In England ist er den Ulmen schädlich gewesen, die er sehr mitgenommen hat. Auch lebt er an schon angegriffenen, von der Wurmtrocknis beynahe schon überwältigten Fichtenstämmen zuweilen in sehr großer Menge.

12. Der gekerbte Borkenkäfer. *Bostrichus crenatus* F.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bostrichus crenatus Fabr. Ent. I. 2. 366. 10.

— — — — — Panz. Fn. 15. tab. 7.

Herbst Naturgeschichte d. Käfer t. 48. f. 10.

Kennzeichen der Art.

Er ist unbehaart und schwarz; die Flügeldecken sind pechbraun und vieltreifig. Die Streifen sind gekerbt; daher der Name.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwey und eine halbe Linie lang, unbehaart und schwarz von Kopf und Halschild, welcher fein punktiert ist. Die Fühlhörner, welche mit Einschluß der Kolbe neun Glieder, oder wenn man die dreytheilige Kolbe nicht für Ein, sondern für drey Glieder annimmt, elf hat, sind so wie die unabgekürzten Flügeldecken, pechbraun. Letztere haben, ohnerachtet sie dem bloßen Auge glatt oder eben scheinen, doch unter der Vergrößerung viele Streifen, nämlich jede Decke sechs kerben- oder kappenförmige Streifen. Die Füße sind etwas blässer.

Er darf nicht mit *Dermestes crenatus* Fabr. Supplem. S. 72. verwechselt werden.

Aufenthalt.

In unsern deutschen Nadelforsten, und zwar nicht gemein. Herr Senator Schneider hat ihn zuerst entdeckt,

13. Der zottige Borkenkäfer. *Bostrichus villosus* F.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bostrichus villosus Fabr. Ent. I. 2. 367. 16.

— — — — — Panz. Fn. 15. tab. 8.

— — — — — Herbst 5. 121.

Kennzeichen der Art.

Er ist behaart und pechbraun, mit ziegelfarbenen Füßen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist ein und drey Viertel Linie lang; der ganze Körper, so wie Kopf und Halschild nach Fabricius pechbraun, nach der Sturmischen Abbildung in der Saune, ziegelbraun mit zottigen Härchen. Der Kopf ist niedergesenkt. Die braunen Fühlhörner sind, wenn man die dreitheilige Kolbe nur für Ein Glied rechnet, neungliedrig. Der Halschild hat die halbe Länge des Hinterleibes, und ist an den Rändern und an der Wurzel schwärzlich. Man nimmt sechs undeutliche Streifen auf den Flügeldecken, deren Ränder ebenfalls etwas mattschwarz sind, wahr, welche an einander liegenden Punkten gleichen. Die Füße, welche nach Fabricius ziegelfarbig seyn sollten, haben in der Sturmischen Zeichnung eine gelbe Farbe. — Er hätte viel Aehnlichkeit mit dem Kupferstecher-Vorkenkäfer, *chalcographus* L., wenn dieser nicht kleiner, und an den Decken nagezählig wäre.

Aufenthalt.

Er lebt, so wie seine Familiengenossen, den *Bostrichus minutus* F. allein ausgenommen, unter der Borke der Nadelhölzer.

14. Der zarthäarige Vorkenkäfer. *Bostrichus pubescens* F.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bostrichus pubescens Fabr. Ent. I. 2. 368. 19.

Herbst 5. 121 ohne Abbildung.

Panzer 15. t. 10.

Kennzeichen der Art.

Er ist fein behaart, schwarz, mit gelben Fühlhörnern und Füßen; die Stirn ist aschgrau behaart.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Nicht mehr, als fünf Viertel Linien beträgt seine Länge, und seine Farbe ist ein durchgängig ins bräunliche fallende mattes Schwarz, ausgenommen die Fühlhörner und Füße, welche bleichgelb sind. Auch ist die Kolbe der Fühlhörner dreitheilig. Der Halschild ist unter der Vergrößerung mit schwarzen Punkten bestreut, und ist weniger, als halb so lang wie die Flügeldecken, die sich durch ihre weiße Pünktchen auszeichnen. Vendes, Halschild und Decken sind fein behaart.

Aufenthalt.

Auch dieser noch wenig bekannte deutsche Vorkenkäfer führt gleiche Oekonomie mit dem vorigen.

15. Der Borkenkäfer mit dem gewölbten Bruststück. *Bostrichus thoracicus*, Hellwigii.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bostrichus thoracicus Panz. Ent. I. 288.

— — — — Panz. Fn. 34. t. 18.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist tiefschwarz und gewölbt; die Flügeldecken sind mattschwarz, punktförmig und nicht abgekürzt; die Fühlerhörner und Füße schwarzgelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwey Linien lang, cylindrisch und unbehaart, mit einem sehr gewölbten tiefschwarzen Kopfe und Halschilde, der vorne rauh ist. Die mattschwarzen Flügeldecken haben jeder sechs schwarze Punktreihen. Die Fühlerhörner und Füße sind pechfarben (in der oben allegirten Fauna gelb). Die Unterseite ist schwärzlich.

Aufenthalt.

Herr Prof. Hellwig fand ihn unter der Rinde der Föhren.

16. Der sägebrüstige Borkenkäfer. *Bostrichus serratus* Panz.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Der Borkenkäfer mit dem sägerauen Bruststück.

Bostrichus serratus, Panzeri Entom. germ. I. 283. no. 20.

— — — — Panz. Fn. 34. t. 19.

Kennzeichen der Art.

Er ist pechfarbig, mit rothem Halschilde, der vorne her rauh ist; die Flügeldecken sind glatt und ziegelgelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist halb so klein, als der vorhergehende, nämlich nur eine Linie lang. Der Kopf und die glänzenden Flügeldecken sind ziegelfarben, nebst den Füßen. Der gewölbte Halschild ist vorwärts sägerauh, hinterwärts aber glatt. Die hornigen Flügeldecken haben zusammen vierzehn Reihen Punktreihen. Der Körper ist auf der Unterseite gelbperlfarbig und haarig.

Auf-

Aufenthalt,

Unter der Buchenrinde.

17. Der kurzleibige Borkenkäfer. *Bostrichus brevis* Panz.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bostrichus brevis Panz. Entom. germ. I. 288. 21.

— — — Panz. Fn. 34. t. 20.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz mit röthlichbraunem, rauhen Halschild und dunkelroßbraunen Flügeldecken, die kaum merklich gestreift sind; Fühlhörner und Füße sind gelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der ganze Käfer hat nur ein und ein Viertel Linie Länge, ist durchaus behaart und von dickem Ansehen. Der Kopf ist mit den kurzen Flügeln roßbraun. Der Halschild ist ebenfalls rauh und bestäubt,

Aufenthalt,

Unter der Föhrenrinde,

18. Der veränderliche Borkenkäfer. *Bostrichus testaceus* Fabr. m).

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bostrichus testaceus Fabr. Ent. I. 2. 367. 18.— — — Herbst und dessen *Bostrichus dispar*.

— — — Hennerts Naupenfraß und Windbruch in den Königl. Preussischen Forsten. Zweyte Auflage 1798. S. 66. tab. 66. f. 3. 4. und die schwärzliche Varietät fig. 5. 6. mit Vergrößerung.

Kennzeichen der Art.

Er ist glatt, ockergelb, mit unbehaarten und unausgefärbten Flügeldecken, die die Länge des Körpers haben. Er variiert mit dunkelbraun oder schwarz.

Ver-

m) Vielleicht ist er mit dem Schrankischen *Bostrichus flavescens* einestey.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwey Linien lang mit zwey, unter der Vergrößerung in Reihen stehenden, silberglänzenden Punkten auf den cylindrischen Flügeldecken. Die Fühlhörner sind an der Wurzel stärker als in der Mitte; an der Spitze aber haben sie ein ockergelbes, fast durchsichtig scheinendes Knöpfchen. Die Fressspitzen sind gegen die Mitte zu breit und beugen sich horizontal gegen einander. Der ockergelbe Halschild ist vorne schmal, und mit feinen Punkten überall bezeichnet. Die Füße sind auch ockergelb. Ob das Insekt gleich ganz unbehaart scheint, so hat es doch seitwärts betrachtet, einige Härchen. Die dunkle, fast schwarze Varietät hat rostfarbige Füße.

Aufenthalt.

In den alten Kienstöcken, auch in Sandgräben um und an den Kienhölzern.

Schaden.

Er fällt nur umgeworfenes Holz an, und, so viel man bis jetzt noch weiß, kein stehendes.

19. Der Holzverderbende Borkenkäfer. *Bostrichus ligniperda* Fabr.

Namen und Schriften.

Bostrichus ligniperda Fabr. I. 2. 367. 14.

Kennzeichen der Art.

Er ist behaart, schwarz, und die Schienbeine der vier Hinterfüße sind sägezahnig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist um eine Viertel Linie grösser, als der vorhergehende, mit dessen schwärzlicher Varietät er leicht verwechselt wird. Sein Kopf ist schwarz, die Fühlhörner ziegelfarbig; Halschild, Hinterleib und Flügeldecken haarig und ins Schwarze fallend; letztere sind auch gestreift und am Hinterrande etwas zurück gebogen. Die kurzen Füße sind stark, von ziegelbrauner Farbe, und zwar haben die vier hintern sägezahnige Schienbeine.

Aufenthalt.

In Holzstämmen, in deutschen Wäldern, nach den Nachrichten, die Herr Profes. Fabricius vom hallischen Naturforscher Herrn Hübner erhalten.

20. Der Eschen-Borkenkäfer. *Bostrichus Fraxini* Bechst.

Kennzeichen der Art.

Er ist gelblich, haarig, braungefleckt und hat ganze oder unausgeschnittene Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Dieser Borkenkäfer ist ein und eine halbe Linie lang und cylindrisch gestaltet. Die Kinnbacken und Augen sind schwarz, die Farbe bald blaßgelb, bald roßgelb, bald gelblich-weiß, auf den Flügeldecken dunkelbraun gefleckt oder gepunktelt; überall ist er mit blonden Härchen besetzt, besonders an den Seiten und Schenkeln.

Die Larve ist weiß, hat einen gestreckten, schmalen Kopf, und die Puppe, welche den Käfer immer ähnlicher wird, wohnt in einer weißlichen Zelle.

Aufenthalt.

Dieses Borkeninsekt wohnt zu manchen Zeiten in ungeheurer Menge in dem gefällten Eschenholze, besonders unter der Rinde nicht zu gar starker Bäume. Ein solcher Stamm sieht oft aus, als wenn er dicht mit klarem Vogeldunst durchschossen wäre. Die Larven graben gerädere Gänge, als die andern Borkenkäfer. In gesunden Stämmen habe ich ihn noch nicht gesehen.

Zweite Linie. Die den Borkenkäfern verwandte Splintkäfer.
Apate Fabr. n).

Weniger schädliche.

21. Der gesäumte Splintkäfer. *Apate limbatus* Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Apate limbatus Fabr. Ent. I. 2, 363. n. 13.

— — — Panz. Fn. 43. t. 19.

Herbst Archiv 4. tab. 20. f. 11,

Kenn:

n) Der oben bereits aufgeführte Kapuz-Borkenkäfer *Bostrichus capucinus*, den Fabricius in seinen Schriften für einen

Splintkäfer erklärte, bleibt besser unter den eigentlichen Borkenkäfern.

G.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz mit bleichen unangefressenen Flügeldecken, welche auf allen Seiten herum einen schwarzen Saum haben.

Beschreibung des vollkommen und unvollkommenen Insekts.

Dieser Käfer ist ein und ein Viertel Linie lang, und hat einen schwarzen, gelbhaari- gen, erhabenen Halschild und schwarze Füße. Die unabgestuften Flügeldecken haben eine bleichgelbe Grundfarbe. Sie sind auf jeder Seite herum und auch an der Nath schwarz gesäumt. Außerdem laufen an jeder Flügeldecke vier Reihen sehr feiner schwarzer Pünkt- chen die Länge hinab.

Bei Varietäten fehlt der schwarze Saum ganz, oder er ist nur an der Nath vorhanden. c).

Aufenthalt.

In altem wurmförmigen Holze, auch unter der Buchenrinde, wo ihn z. B. Herr Dalldorf zu Kiel bemerkt hat.

22. Der Linden-Splintkäfer. *Apatæ Tiliae* Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Apatæ tilia Fabr. Supplement. Entomologiae 1798. Seite 157. n. 17.

— — Panzer Fn. 8. tab. 14.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarzbraun, fein behaart, mit unabgefärbten, punktförmigen Flügeldecken, einem höckerigen Halschild, auf dessen Mitte ein röthlicher, rauher Fleck wahrzunehmen ist.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist sehr klein, von drey Viertel Linie Länge, von walzenförmig gebautem, etwas behaartem und schwarzem Körper. Der schwarze Kopf ist punktiert, der Mund gefranzt, und die Fühlhörner mit elf Gliedern versehen, so daß die vordersten drey davon eine durch- blätterte

c) Der Herr Professor Hellwig zu Braun- schweig, von dessen Güte ich einige derglei- chen, nebst vielen andern dankenswerthen Seltenheiten erhalten, erklärt ihn für einen wahren Splintkäfer. Und dafür ist er wohl

mit mehrerem Rechte, als für einen Splint- käfer zu halten. — Man darf ihn nur nicht mit dem *Dermestes domesticus* L. vermin- gen, welches Hr. Fabricius, aber ohne Grund, gethan hat. E.

blättere Keule bilden. Der aufgetriebene Halschild führt Punkte, und dessen Mittelfeld einen erhabenen gedrehten rostbraunen Fleck. Die unabgekürzten Flügeldecken haben vier Punktreifen, und auf denselben rauhe weiße Härchen. Die Füße sind braunschwarz und ziehen ins Pechbraune.

Es giebt Varietäten, wo der ganze Käfer pechbraun ist. Irrig wird in Fabricius Supplementen a. a. O. die Farbe der Fühlhörner und Füße grau genannt.

Aufenthalt und Schaden.

Bei Braunschweig, wo ihn Herr Prof. Hellwig erhalten, und wahrgenommen, daß er den jungen Lindenstämmen sehr schädlich sey.

Anmerkung.

Da die Borkenkäfer so schädliche Thiere für die Holzungen sind, so sind jedem Forstkundigen auch die bisher noch übersehenen nicht gleichgültig. Herr v. Schrank zählte noch fünf zu dieser Gattung, in seiner Fauna Boica oder Geschichte der in Bayern einheimischen und zahmen Thiere 1. Theil. Nürnberg 1798. Seite 431, wovon die beyden ersten Arten mehrentheils unter andern Benennungen bekannt sind.

Der erste ist sein mutillenartiger Kapuz- oder Borkenkäfer, *Bostrichus mutillarius* (*clerus mutillarius* Fab. Entom. 1. 1. 157 1.) Schäffl. 136. fig. 8.) Er ist schwarz mit einer zwey- oft dreysachen weißen Binde auf den Flügeldecken. An Gestalt und Zeichnung ist er dem nächstfolgenden ameisenähnlichen ziemlich verwandt, aber ein wenig größer. Der Leib ist schwarz, die Stirne weiß und dicht behaart. Der Halschild ist schwarz mit feinen Haaren. Die schwarzen Flügeldecken, die an der Wurzel röthlich sind, haben drey weiße Binden, wenn man die Binde vor der Spitze der Decken mitzählt, welche in der Abbildung: Panzer Vn. 51. tab. 12. fehlt. Der Hinterleib ist roth. Die erste weiße Binde vermischt sich fast mit der rothen Wurzel der Decken. Die Unterseite des Insects ist schwarz. — Er wohnt im Junius in alten Stöcken, wo er altes Holz be- nagt, auch auf den Blüthen verschiedener Gewächse.

Der zweyte ist dessen ameisenähnlicher Kapuz- oder Borkenkäfer, *Bostrichus formicarius*, (*Attelabus formicarius* Lin. *Clerus formicarius* Fab. Entom. 1. 1. 207. n. 5. *Clerus form.* Panzer 4. t. 3. Schäffler Icon. 136. f. 3.) oder ameisenähnlicher Bienenkäfer, der vier Linien lang und schwarz ist, dessen Flügeldecken zwey weiße Binden haben und an der Wurzel roth sind. Der Halschild und die Unterseite des Hinterleibes sind auch roth. Die bleichen Fühlhörner haben elf Ringe, davon die drey äußersten dick sind.

Da man von diesem Käfer die Larve kennt, welche schwarz ist, und einen mit einem starken Kinnbacken versehenen Kopf und rothen, glatten, nur mit ganz einzelnen Härchen besetzten Körper hat, und man von ihr weiß, daß sie jungen Mauerbienen nachstrebt: so

so bleibt es etwas zweifelhaft, in wie fern diese Art unter die Holzverderber zu zählen sey. — Man findet ihn aber doch in Föhrenwäldern auf abgetauenen Stöcken, alten Zäunen und in Holzschlägen, wo er Holz benagt, desgleichen in Häusern, zu allen Jahreszeiten. Mit mehreren Rechte scheinen die drey folgenden Schrankkäfer hier ihre Stelle zu behaupten.

Der dritte, sein gelblicher Kapuz- oder Vorkenkäfer, *Boltrichus flavescens* (*Boltrichus testaceus*, Herbst 5. tab. 48. fig. 3.) ist so groß, als der Fichtenborkenkäfer, länglich walzenförmig und rothgelb: unten aber rothgelb. Der Kopf ist dunkler, die Augen sind allein schwarz. Die Flügeldecken sind vollkommen ganz. Der Halschild ist vorwärts etwas verengt. Er lebt in Fichten. Es ist ungewiß, ob dieses der *Boltrichus testaceus* Fab. Entom. 1. 2. 367. 18. ist, welcher zuweilen mit einem schwarzen Körper variiert, übrigens von Fabricius zu kurz beschrieben ist.

Der vierte ist sein rothhörniger Kapuz- oder Vorkenkäfer, *Boltrichus ruficornis*, der drey Linien lang, schwarz und unbehaart ist. Die Fühlhörner und Fußblätter sind rothbraun, und die Schienbeine alle auswärts drenggezahnt. Die Flügeldecken haben Punktsirisen.

Der fünfte ist sein abweichender Kapuzkäfer, *Boltrich. anomalus*, welcher schwarz ist, und Kopflange Keulen an den Fressspitzen hat. Der Halschild ist vorwärts verengert. Die Flügeldecken sind verkürzt und abgestugt. Er hält sich in Nasentorff auf.

Zweyte Familie.

Kleinkäfer, die keine Vorkenkäfer noch Splinkkäfer sind.

23. Der gewellte Kleinkäfer. *Dermestes undatus* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gewässerter Speckkäfer, gewellter Fettkäfer, Wellenkäferchen, gewässerter Hautfresser.

Dermestes undatus Lin. 562. 3. Müller 101. 3.

— — — — — Fabr. Ent. 1. 1. 228. n. 6.

— — — — — Herbsts Käfer 4. t. 40. f. 9.

Schäffer Icon. 157. f. 7. a. b. Aber in der Entom. Fabr. wird durch einen Druckfehler fig. 17. allegirt.

Kennzeichen der Art.

Er ist länglich und schwarz, mit einer doppelten weißen Wellenbinde über die Flügeldecken.

De.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist bald über, bald unter zwey Linien lang, tiefschwarz und weißgespritzt. Er hat die Gestalt des Kürschner-Käfers, *Dermestes pellio*; aber anstatt des weißen Punktes hat jede Flügeldecke zwey weiße gewellte Querlinien. Die Fühlhörner sind sehr kurz, die Kolbe macht die halbe Länge derselben aus. Der Halschild hat an jeder Seite einen weißen Punkt, der aus weißen Härchen besteht, so wie auch die Querlinien der Flügeldecken, durch die Lupe betrachtet, aus solchen Härchen bestehen, die überdem hier und da auf der Oberfläche angetroffen werden. Die sechs Füße haben fuchsrothe Fußblätter. Er scheint nicht der *Brahmische undulatus* zu seyn, *Brahms Insectenkalender* 1. 114. als welcher am Körper weiß ist, und weißgeringelte Schenkel hat.

Aufenthalt.

Im April und May, auf Wiesen und in Häusern, wo er bey uns im alten Holze und im Kechricht zu finden ist. Selten.

24. Der beschriebene Kleinkäfer. *Dermestes graphicus* Schrank.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schriftzügiger Zettkäfer.

Dermestes graphicus. Schrank *Fauna Boica* 423.

Nitidula strigata, Fabr. *Mantissa* I. 51.

— — — — Fabr. *Entomol.* I. 1. 257. n. 9.

Strongylus strigatus, Herbst *Käfer* 4. t. 43. f. 7.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz. Der Halschild und die Flügeldecken sind ziegelbraun gerandet. Auf jeder sieht man zwey gelbe buchstabenförmige Zeichnungen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Kopf ist mattschwarz, mit an der Kolbenspitze rothfarbigen Fühlhörnern. Sowohl der Halschild als die Flügeldecken sind glatt, mattschwarz, mit ziegelbraunem Rande. Letzre sind glänzend und haben eine gelbe Mondlinie an ihrer Wurzel, und einen dergleichen krummen Streifen an der Endspitze. Diese Zeichnungen gleichen buchstabenförmigen Zügen. Der Körper ist schwarz, und die Füße ziegelbraun.

Aufenthalt.

Im Junius an Eichen, in Bayern, desgleichen bey Halle in Sachsen.

25. Der Buchen-Kleinfäfer. *Dermestes faginus* Schrank.

Namen und Schriften.

Buchen-Fettkäfer.

Dermestes fagineus. Schrank Fn. 424.

Kennzeichen der Art.

Er ist pechschwarz und glänzend. Der viereckige Halschild ist feinpunktirt. Die Flügeldecken sind punktfleisig, die Füße pechbraun, und das Kölbchen der Fühlhörner rothgelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist eine Linie lang. Der Halschild ist so breit, als die beyden Flügeldecken, dicht und fein punktirt. Das ganze Insekt ist sehr glänzend und überall pechschwarz. Die mit einem eysförmigen, rostgelben und etwas zottigen Kölbchen versehenen Fühlhörner sind so lang als der Körper.

Er muß nicht mit *Apati Fagi* Fab. Suppl. 157. n. 16. verwechselt werden, nämlich dem Buchen-Splintkäfer, dessen Kennzeichen diese sind; der Halschild ist runzlich und schwarz, und die Decken pechfarbig; und von welchem *Fabricius* weiter nichts hinzu fügt, als daß seine Fühlhörner durchblättert scheinen, daß die Runzeln des Halschildes zahlreich, in die Quere ziehend und aufgeworfen, hingegen die Decken glatt und pechfarben, und die Füße dunkel sind, und daß er auf Buchen in Sachsen angetroffen werde, als ein sehr kleines Insekt,

Aufenthalt.

Der Buchen-Kleinfäfer ist im September unter der Rinde abgestorbener Buchenstämme in Bayern anzutreffen.

26. Der Weiden-Kleinfäfer. *Dermestes salicinus* Mülleri.

Namen und Schriften.

Weiden-Fettkäfer.

Dermestes salicinus Mülleri prodrom. n. 501.

— — — — Schrank Fn. 424.

Kennzeichen der Art.

Er ist halb cylindrisch, pechschwarz, ohne Glanz. Der Wurzelrand des Halschildes ragt hervor. Der Kopf hat einen zurückgebogenen Rand. Das Költchen der Fühlerhörner ist abgestutzt und zweigliedrig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist ein und eine halbe Linie lang, und nicht gar eine Linie breit. Die folgenden Fressspitzen und die dünnen Fühlerhörner sind sattrosigelt. Die letzten haben am abgestutzten Költchen nur zwei, deutlich von einander abgesonderte Glieder. Die Füsse sind sattrosbraun. Alles übrige ist schwarz mit einem etwas röthlichen Blicke. Der Kopfschild ist an den Rändern zurückgebogen. Der Halschild ist an der Wurzel etwas über den Kopf hervorgezogen. Die Flügeldecken sind zwar punktförmig, welches aber wenig zu erkennen ist, weil gleichsam eine Art grober Firniß drüber herliegt.

Aufenthalt.

Im September unter der Rinde verwesender Buchenstöcke.

27. Der flachgedrückte Kleinkäfer. *Dermestes complanatus* Schrank.

Namen und Schriften.

Flachgedrückter Ferkkäfer.

Dermestes complanatus Schr. Fna. 425.

Kennzeichen der Art.

Er ist flachgedrückt, durchaus ziegelbraun, die Augen sind allein schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist dem beschriebenen oder schriftzügen Kleinkäfer, *Dermestes graphicus*, ähnlich, aber etwas kleiner, und noch mehr niedergedrückt, fast wie eine ausgehungerte Bettwanze, davon er auch die Farbe hat, die aber bald heller, bald tiefer ist. Jedoch geben ihm die etwas gewölbten Flügeldecken ein etwas weniger flaches Ansehen.

Aufenthalt.

Im October, in Bayern, in alten Birkenstöcken.

28. Der gewürfelte Kleinkäfer. *Dermestes tessellatus* F.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Größerer Nagelkäfer, gewürfelter Fettkäfer.

Dermestes tessellatus Fabr. Syst. Ent. 56. 8. et Entomol. I. 1. 230. 15.

— — Goeze Entomol. Beiträge I. 42.

Anobium minus, Schrank Fn. 539.— — *tessellatum*, Herbst *Sablon'sky Käfer* 5. t. 47. 2.

Kennzeichen der Art.

Er ist länglich rund und filzhaarig, mit grauem und rostgelb getrübtm Halschild und Flügeldecken, und mattschwarzem Hinterleibe.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist drey Linien lang und anderthalb breit, und hat die Gestalt und Größe des mäusefarbenen Kleinkäfers, *Dermestes murinus* L. wiewohl er nicht so, wie der mäusefarbene, ins Schwarze fällt. Er ist eigentlich ziegelbraun. Der gewölbte und geränderte Halschild und die Flügeldecken sind mit rostgelben niederliegenden Haaren bedeckt, mit dazwischen befindlichen leeren Stellen, woher er das wolfige Ansehen hat. Die Fühlhörner sind fadenförmig, die Augen schwarz, das Schildchen weißgrau und der Leib hinten schwarz. Fabricius warnt, denselben nicht mit dem *Anobium tessellatum* zu vermischen.

Aufenthalt.

Man hat ihn sowohl, nach Fabricius, auf Cadavern gefunden, als auch nach Schrank, in alten hölzernen Brettern.

29. Der zweckfleckige Kleinkäfer. *Dermestes bipunctatus* Güzii.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Fettkäfer mit zwey Brandflecken, Buchen-Nagelkäfer, Büchenholz-Kleinkäfer.

Dermestes bipunctatus, Goeze Entomol. Beiträge I. 147.*Anobium Fagi* Schrank Fn. I. 539. In seinen frühern Schriften ein *Dermestes*.— — Herbst *Sablon'sky* 10. 5. t. 47. f. 4.

Kennzeichen der Art.

Er ist länglich und schwarz, am Halschilde sind die Endspitzen rostgelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er hat die Gestalt des violettten Kleinkäfers, *Dermestes violaceus* L. *Corynetes violaceus* Fabr. Syst. Eleutheratorum, und ist sattschwarzbraun, mit gestreiften Flügeldecken. Die Fühlhörner sind fadenförmig. Der gewölbte und geränderte Halschild hat an den Ecken des Hinterrandes einen rosigelben Flecken. — Er ist vom Büchen-Splintkäfer verschieden.

Aufenthalt.

In altem Holze, besonders in buchenem.

30. Der verlängerte Drahtkäfer. *Colydium elongatum* F.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Colydium elongatum, Fabr. Entom. I. 2. 495. 2.

Bostrichus elongatus. Fabr. Mantissa I. 36—3.

Ips linearis, Rossi Faun. Etrur. t. 2. f. 45.

Colydium elongatum, Panz. Faun. 3. t. 17.

Er kann wohl nicht anders, als bey unsrer Gattung der Kleinkäfer mitgenommen werden.

Kennzeichen der Art.

Er ist schmal, gleichbreit, mit schwärzlichem, viereckigen Halschild, rothfarbenen Fühlhörnern und Füßen. Die Flügeldecken haben schwarze und rothfarbene wechselseitige Streifen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er hat eine Länge von zwey und einer halben Linie, und sein viereckiger Halschild ist glänzend schwarz und dreymal gefurcht. Die Füße und Fühlhörner sind rothfarben, letztere zehngliedrig, wovon sieben Glieder äußerst dünn und die drey Kolbenglieder ungleich dick sind. Von den schwarzen Flügeldecken hat jede drey rothbraune kappenförmige Streifen, auf welchen schwarze Pünktchen stehen. Die Nath ist auch schwarz.

Aufenthalt und Schaden.

Er wird in eichenen Stämmen angetroffen, die noch nicht faul sind, worin er tiefe Gänge macht. Er führt, wie auch schon Panzer vermuthete, eben die Oekonomie, welche den Vorkenkäfern eigen ist.

Vier te Gattung.

Die Bohrkäfer und die denselben ähnlichen. *Prini* L.

Gattungskennzeichen nach Linné.

Der Halschild ist rund, ungerändert, und ragt über den Kopf hervor. Die Fühlhörner sitzen am Kopfe dicht beisammen, und sind sehr lang und zum Theil fadenförmig. Die letzten Glieder aber sind länger, als die übrigen. Die Fußblätter haben fünf Glieder.

Die Larven haben keine Füße, und bohren runde Löcher in trockne Baumstämme, auch ins Hausgeräthe, welches auch die Käfer thun.

Die Gattungskennzeichen der Fabriciusschen Hauskäfer oder Buchfalkäfer, No. 35. *Anobium*, wozu zwey unserer vorkommenden Bohrkäfer gehören, sind diese: Sie haben keulige Greifspizen, eine stumpfgezahnte Kinnlade, eine ganze Lippe und fadenförmige Fühlhörner, davon die drey letzten länger und dicker sind. Der Federkammkäfer 35. *Ptilinus* hat vier ungleiche Greifspizen; eine kurze gespaltene Kinnlade; eine häutige, etwas gerandete Lippe und wedelförmige Fühlhörner.

Die äußern Gattungskennzeichen nach Fabricius sind:

Der Hauskäfer, *Anobium*: der Körper ist klein, länglich rund, wenig behaart, ungerandet und träge; der unter das Halschild untergebogene Kopf ist enrund; die an den Seiten stehenden Augen sind rund; die kurzen Fühlhörner sind hinter den Augen eingefügt und versteckt. Der Halschild ist vorne ein wenig keulförmig, und an den Seiten drüber und abwärts gehend; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind steif, abwärts gebogen, von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und stark mit fünfgliedrigen Fußblättern. Das Insekt hat eine dunkle Farbe.

Der Federkammkäfer, *Ptilinus*. Der Körper ist klein, oblong, filzhaarig, ungerandet, träge; der Kopf ist enrund und hervorragend; die Augen sind rund und stehen an den Rändern; die Fühlhörner sind kurz und stehen sehr hervor, sie sind vor den Augen eingefügt; der Halschild ist kurz, geht seitwärts aus mit abwärts stehenden Rändern; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz, die Fußblätter fünfgliedrig. Das Insekt führt eine dunkle, durchaus glanzlose Farbe.

Erste Familie.

Bohrkäfer, welches Fabricius Federkammkäfer sind.

Weniger schädlich.

1. Der Federbusch-Bohrkäfer. *Plinus pectinicornis* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Federkamm, strahlenförmiger Zettkäfer, sägesformiger Nagelkäfer, brauner Federkammkäfer, Kammhöbner Bockelkäfer.

Plinus pectinicornis, Lin. 565. 1. Müller III. 1. tab. 3. fig. 3.

Ptilinus pectinicornis, Fabr. Ent. I. 1. 245. 2.

Hispa pectinicornis, Fabr. in seinen frühern Schriften.

Anobium ilabellicorne, Schrank.

Hispa pectinicornis, Sultzer's Gesch. t. 2. f. 6.

Ptilinus pectinicornis, Panz. Fn. 3. t. 7.

Kennzeichen der Art.

Er ist walzenförmig und schwarz, an den Fühlhörnern und Füßen mattrothgelb. Die Flügeldecken und der Hinterleib sind mattschwarz. Nur das Männchen hat Kammfühlhörner.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Seine Grundfarbe ist schwarzbraun. Der schwarze Halschild ist stark gewölbt und gerändert. Die Flügeldecken sind etwas blasser. Die Fühlhörner sind auswärts sägeförmig, und nebst den Füßen bleich rothgelb. Das Männchen ist ein und ein halbe, das Weibchen aber zwey Linien lang, und hat die sieben gewöhnlichen längern Glieder, die das Männchen an der Spitze der eilfgliedrigen Fühlhörner hat, nicht. — Er variiert in der Größe.

Ein Beispiel, wie Fabricius solche Käfer nach den Freßwerkzeugen, unter dem Mikroskop beschreibt, ist folgendes: Dieser Käfer hat vier ungleiche fadenförmige Freßspitzen, wovon die vordern viergliedrig sind: die Glieder sind gleich; das letzte ist eckrund, an welchem die Kinnladen liegen; die letztern oder hintern sind dreigliedrig; das letzte Glied ist eckrund, woran die längere Lippe befestigt ist. Die Kinnbacken, das ist, die äußern Kinnladen, sind dick, hornig, spizig, gespalten. Die innern Kinnladen sind häutig und zweispaltig; ihre linienförmigen Falten sind sich gleich. Die Lippe ist kurz, häutig und etwas ausgerandet. Die Fühlhörner sind bey'm Männchen wedelförmig.

Aufenthalt.

Er wohnt an und in alten Weidenstöcken, in welche er eine Menge tiefer, runder, Löcher bohrt. Fabricius giebt Haselsträuche zum Aufenthalt desselben an.

Zweite Familie.

Bohrkäfer, welche Fabricius'sche Hauskäfer (Anobium) sind.

Sie sind weniger schädlich.

2. Der Holzbohrer. *Ptinus pertinax* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hartnäckiger Bohrkäfer, trogköpfiger Bohrkäfer, Trogkopf, eigensinniger Dufkelfäfer.

Ptinus pertinax, Lin. 565. 2. und Müller 112. 2.
Anobium pertinax, Fabr. Ent. I. 1. 237. 5.
 Herbst's Käfer 5. t. 47. f. 3.

Kennzeichen der Art.

Er ist einfarbig braun und ungefleckt. Der kapuzenförmige Halschild hat eine Längsfurche.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist eine bis anderthalb Linien lang und eine Linie breit, und durchaus schwärzlich rothbraun, von der Farbe des Rauchs, aber sehr tief und fast schwarz. Die Fühlhörner sind fadenförmig, aber die beiden vorletzten Glieder zugleich breitgedrückt. Der Leib mit den Flügeldecken ist halb cylindrisch. Letztere sind mit viel Punktreifen versehen. Der Halschild ist hinten kapuzförmig und eingebogen, daß man in der Mitte ein Dreieck wahrnimmt. Eine eingegrabene Längslinie läuft seinen ganzen Körper herab.

Die Larve ist klein und weiß, ohne Füße.

Aufenthalt, Feinde und Schaden.

Im März und im Julius in Häusern an altem Holzwerk, wo die Larve runde Löcher bohrt und das Holz verwüftet. Er lebt auch im Freyen im Holze, und ist in Bibliotheken den hölzernen Bänden nachtheilig. Wenn man ihn in Meubles bemerkt, so füllt man, wie bey allen Holzwürmern die Löcher mit Salzgeist aus, welche die vollkommenen und unvollkommenen Insekten tödten. Hierbei verfährt man so: man legt das Holz so, daß die Flüssigkeit bis auf den Boden des Wurmlochs eindringen kann, dann gießt man einen Tropfen Salzgeist dicht neben das Wurmloch, nimmt eine Schweinsborste und sucht mit derselben das Loch mit der Flüssigkeit durch Aus- und Einziehen zu füllen. Reichs-anzeiger. 1803. Nr. 164. S. 2148.

Sein Feind ist der *Clerus formicarius* F. der oben als ameisenähnlicher Vorkenkäfer des Schrankes in der Anmerkung beschrieben worden ist. Wenn man ihn greift, so

so zieht er sich wie todt zusammen, und ist auf keine Weise zur Bewegung zu bringen, bis es ihm selbst beliebt p).

3. Der weichschildige Bohrkäfer. *Ptinus mollis* Lin.

Namen und Schriften.

Weichschild, weicher Hautfresser, weicher Bohrkäfer.

Ptinus mollis, Lin. 565. 3. Mäler 112. 3.

Anobium molle Fabr. Entom. I. 1. 237. 7.

Ptinus mollis, besorgter Forstmann 58. 9.

Aufenthalt und Schaden.

Er ist röthlich, mit schwarzen Augen und glatten Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist eine Linie lang, von Farbe röthlich; Kopf und Halschild sind dunkler und glatt, die Augen schwarz, und die Fühlhörner nach Verhältniß länger, als an seinen Cameraden. Vorzüglich sind die drei letzten Glieder sehr lang, aber nicht viel dicker, als die andern. Seine braunen Flügeldecken sind weich und haben weder Streifen noch Punkte. Er hat viel ähnliches mit dem Holzbohrer (*Pt. pertinax*) q).

Aufenthalt.

Im Kehrlichte, auch an den Fichten und altem Holze, desgleichen auf Baumblüthen.

Anmerkung.

Diese beiden Bohrkäfer haben einen Erzbösewicht, den Zerstörer aller Naturalien-Insekten- und Kräuter-Sammlungen, den Kräuterdieb, *Ptinus* für Lin. zum Vatersungsverwandten, der übrigens kein Forstinsekt ist, allein den Forstmann um desswillen interessiren muß, weil er ihm seine Sammlungen zerstört. Er ist eine und eine halbe Linie lang, eiförmig, bläulichroth, hat auf den Flügeldecken zwei weiße Binden und ein Brustschild

p) In dünnem Geräthe, als Kesselschlägen, Weichreibern u. dgl. läßt er kein Herausbohren aus dem Holze, oft einen, wie eine Taschenuhr tickenden Ton hören, woher ihn der Aberglaube die Todtenuhr nennt, und

glaubt, daß jemand im Hause bald sterbe, wenn er sich hören läßt. B.

q) Degeer sagt: Die Flügeldecken haben eine roth: Spitze. Diese finde ich an meinen Exemplaren nicht. C.

schild mit vier Zähnen. Das Weibchen hat wohl Flügeldecken aber keine Unterflügel. — Die Larven fressen noch gieriger als die Käfer, und verschonen auch die Wücher und das Pelzwerk nicht. Sie sind weißgrau, fast walzenförmig mit nach dem Schwanze zu gebogenerm Kopfe, welches verhindert, daß sie sich nicht grade ausstrecken können. Nur durch Arsenik und Alaun können sie getödtet werden, welches Mittel aber mit Vorsicht angewendet werden muß.

F ü n f t e G a t t u n g.

Die Todtengräber und die ihnen ähnlich sind. Silphae Lin.

Sie heißen auch: Aaskäfer, Geiskäfer, Wisamkäfer, Maulwurfskäfer, Erbkäfer; wiewohl diese Namen eigentlich den größern Arten der linneischen Silphen zukommen.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Die Fühlhörner sind vorwärts dicker; die Flügeldecken ausgerandet, der Kopf hervorragend; der Halschild eben und gerandet. — Die Larven sind sechsfüßig mit kleinem Kopf.

Die hier vorkommenden drey Arten gehören nicht zu den Fabric. Silphen, sondern zu zwey andern Gattungen, nämlich erstlich zu seinen Rindennagern, 111. Ips, deren Hauptkennzeichen sind: Die vier Fressspitzen sind einander gleich und sehr kurz; das erste Glied derselben ist eyrund; die Rinnlade ist zweyspaltig; die Lippe häutig, kegelförmig und ausgerandet; die Fühlhörner durchblättert. Die Kennzeichen der andern Gattung, nämlich seiner Kugelskäfer, 5. Sphaeridium, sind: Die vier Fressspitzen sind fadenförmig; die Lippe ist viereckig und ausgerandet; die Fühlhörner sind durchblättert.

Die Fabriciusischen sogenannten äußern oder Nebenkennzeichen, characteres secundarii, vom Rindennager sind: Der Körper ist länglich, höckerig, unbehaart, ungerandet und behende; der Kopf ist eyrund, etwas flach und sehr eingesüßt; die hervorragenden kugligen Augen stehen an den Seiten; die Fühlhörner sind kurz, stehen von einander entfernt, und sind unter den Augen eingeleimt; der Halschild läuft seitwärts aus, und ist ein wenig viereckig; das Schildchen ist rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und stark; die Schienbeine zusammengestreift, und die Fußblätter füngliedrig. Die Farbe des Insekts ist meistens schwarz und glänzend.

Der Kugelfäfer hat einen runden, oben convexen, unten flachen und glatten Körper; der Kopf ist klein und ungerbogen; das erste Glied der kurzen Fühlhörner ist sehr lang; und die drei letzten derselben sind ziemlich dick und durchblättert; der Halschild ist convex, ungerader, glatt; die Füße sind kurz und stark, die Schenkel etwas zusammengedrückt, die Schienbeine gebogen, und die Fußblätter fünfgliedrig.

Erste Familie.

Todtengräber, die einen länglichen ensörmigen Halschild und einen länglichen Körper haben, folglich Fabriciussche Blindmager.

Sie sind weniger schädlich.

1. Der vierblättrige Todtengräber. *Silpha quadripustulata* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Vierfleck, viergefleckter Faulholzfäfer, vierfleckichter Halbeyfäfer, vierblättrichter Staubbäfer, vierpunktirter Nagetäfer.

Silpha quadripustulata, Lin. 570. 5. Müller 125. 5.

Ips quadripustulata, Fab. Ent. 1. 2. 512. n. 6. in seinen frühern Schriften *Tritonia quadripustulata*.

Nitidula quadripustulata, Schrank Fa. B. 1. 444.

Ips quadripustulata, Naturforscher 24. t. 1. f. 18. von Panzer.

Ips quadripustulata, Herbst 4. tab. 42. f. 5.

Silpha, Degeer 4. tab. 6. fig. 21.

Des Geoffroy Dermeste à quatre points rouges, den manche hieher ziehen, gehört nicht hieher, weil derselbe gestreift, bey unserm aber, selbst unter der stärksten Vergrößerung, keine Streifen erscheinen.

Kenzeichen der Art.

Der Käfer ist länglich und schwarz, mit zwey rostfarbigen Punkten auf jeder Flügeldecke.

Die Larve ist von Farbe grau, länglich und behaart.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist eine und eine halbe Linie lang und eine breit, sehr schön glatt und schwarzbraun. Die Fühlhörner sind an den drei letzten Gliedern durchblättert; die beyden Rücken

backen zangenförmig gestreckt. Der große Kopf und der fast viereckige Halschild ist tiefer gefärbt, vornen breiter als hinten, und spielt mit seinen anliegenden Haaren ins Goldfarbene. Die Flügeldecken sind nicht gestreift, aber jede derselben hat in der Mitte ein Kossfleck und zwey an der Wurzel. Er hat übrigens eher das Ansehen eines Schröters, als eines Kolbenkäfers. Und die drey vertieften Punkte auf dem Kopf, welche Herr Panzer bemerkt, machen ihn bald kenntlich.

Die Varietäten haben einen aus zwey zusammengesetzten Fleck, in der Mitte der Flügeldecken, und einen andern an ihrer Wurzel, welcher fast hammerförmig ist.

Die Larve, welche bey Frisch, Insekten IX. 36. tab. 19. vorkömmt, ist länglich-rund, behaart und von Farbe grau. Sie wird von ihm der wollschwigende Wurm genannt.

Aufenthalt.

In modrigem, feuchten Holze, und an den Baumstämmen.

2. Der viertropfige Rindennager. *Ips quadriguttata* Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Viertropfiger Schmalkäfer.

Ips quadriguttata, Fab. Ent. 1. 2. 513. 8.

— *quadriguttatus*, Schrank Fn. Boica 514.

— — — Herbst: Tablonsky 4. t. 42. f. 3.

— — — Panz. Fn. 3. t. 18.

Nitidula quadriguttata, Olivier ins. 2. 12. 10. 11. t. 3. f. 25.

Kennzeichen der Art.

Er ist glänzend, tieffschwarz; auf jeder Flügeldecke stehen zwey weißliche Mackeln: die vordern mit einem einwärts gerichteten Hacken, die hintern aus zweyen zusammengesetzt.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er hat die Größe und Gestalt des Kürschnerkäfers oder gemeinen Mottenkäfers r). Der Kopf ragt stark hervor; die Kinnladen sind ansehnlich, an der Spitze zwenzählig. Die blutrothen Fühlhörner haben ein durchblättertes schwarzes drengliedriges Kölbchen. Der ganze Käfer ist tieffschwarz mit einer glänzenden Glätte. Der Halschild ist mit eingegrabenen Punkten besät; die Flügeldecken zwar auch, aber man muß sie mit einer starken Lupe suchen. Die Flecken der Decken sind weißlich, so daß sie etwas ins Rothe ziehen, verlieren sich aber, wenn das Thierchen todt ist, zum Theil.

Wir

r) Mein Exemplar hat nur zwey Linien Länge. S.

Wir haben ihn, weil wir die Linneische Methode beibehalten, zu den Todtengräbern, *Silpha L.*, zählen müssen; man könnte ihn auch den Kleinkäfern bezzählen. Am besten aber hat ihn *Fabricius* unter seine Gattung der Rindemager geordnet. Er variiert in Ansehung der Größe und erreicht zuweilen drey Linien.

Aufenthalt.

Er lebt unter der Rinde der Eichen und anderer Bäume.

Zweyte Familie.

Todtengräber mit einem gerandeten Halschild, einem fast halb kugelförmigen Körper, und allzu geräumigen Flügeldecken; *Fabricius'sche* Kugeltäfer.

Weniger schädlich.

3. Der kuglige Todtengräber. *Silpha seminulum L.*

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt auch: Möller, rollender Naßkäfer, Samenkorn, samenähnlicher Kugeltäfer.

Silpha seminulum; *Lin.* 570. 8. *Müller* 126. 8.

Sphaeridium seminulum, *Fabr. Ent.* 1. 1. 83. 28.

Silpha seminulum. *Forstmann* 58. 10.

Sphaeridium semin. *Panzeri En.* 23. t. 2.

Kennzeichen der Art.

Er ist rund, glänzend, ungefleckt, schwarz, mit rothem Hinterleibe und Füßen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist, nach der *Panzerschen* *Fauna* eine, sonst auch anderthalb Linien lang, von der Größe eines Saamenkorns. Kopf und Halschild sind schwarz, aber der Rand des letzten ist auf jeder Seite rothgesäumt, welches an der Abbildung in der *Fauna* nicht ausgedruckt ist. Die Flügeldecken sind ebenfalls schwarz, nur von der Spitze an bis nicht gar zur Mitte des Außenrandes rothgesäumt. Fühlhörner und Füße sind bleichgelb, ob sie gleich *Fabricius* für roth erklärt. Er rollt sich wie das Gürtelhier, wenn er in Furcht geräth, zusammen. Indem er Kopf, Brust und Hinterleib zusammen beugt, stellt er ein glattes, helles Saamenkorn vor, wodurch man getäuscht wird.

Aufenthalt.

In feuchtem Tannen- und Fichtenholz, auch unter dem Moos solcher Gehölze; an alten Zäunen, in Baumpilzen, auf blühenden Gewächsen, auch im Kuhdünger.

Sechste Gattung.

Die Schildkäfer. *Cassidae* Lin.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Der Kopf ist unter dem Halschild verborgen. Die Fühlhörner sind fadenförmig, außen etwas dicker. Die Flügeldecken haben einen Rand. Die Fußblätter haben nur vier Gelenke. Der Halschild bedeckt ganz den Kopf, wie die Flügeldecken den ganzen Leib.

Die Larven sind sehr flach, kurz und eyrund, mit zahlreichen, ästigen Dornen. Sie kriechen auf der Oberfläche der Pflanzenblätter äußerst träge herum, und benagen blos die Oberhaut und das Zellgewebe, desgleichen die zartesten von den Adern. Ihr eigener Unrath, den sie auf dem Rücken mit sich tragen, schützt sie vor den Sonnenstrahlen und vor ihren Feinden.

Die Fabriciusischen Hauptgattungs-Kennzeichen dieser Käfer sind: Die Fressspitzen sind ungleich, die vordersten mit einem Köpfchen versehen. Die Kinnlade ist einfach. Die Lippe ist verlängert und ganz. Die Fühlhörner sind perlschnurförmig. Seine Nebenkennzeichen sind: Der Körper ist rund, oben höher, unten flach, gerändert, unbehaart, zuweilen glatt und glänzend; der Kopf ist unter dem weiten Halschild versteckt; die Augen sind eyrund und nahe beisammen; die Fühlhörner sind zwischen den Augen eingefügt; der Halschild geht seitwärts aus, mit einem breiten und flachen Rand; das Schildchen ist dreieckig und klein; die Füße sind kurz und stark, die Schenkel zusammengedrückt; die Schienbeine rund, die Fußblätter viergliedrig. Das Insekt ist vielfarbig bunt und glänzend.

Wir nehmen nur einen von dieser Gattung hier auf, weil die übrigen Schildkäfer in ihrem Larvenstand nicht auf Bäumen leben.

Weniger schädliche.

1. Der graue Schildkäfer. *Cassida nobilis* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blaustrich, blaugestreifter Schildkäfer, edler Schildkäfer.

Cassida nobilis, Lin. 575. 4. Müller 157. 4. tab. 5. fig. 12. c.

— — — Fab. Ent. I. 1. 297. n. 24.

— — — Grauer Schildkäfer mit dem blauen Strich. Gleditsch II. 89.

— — — *speciosa*, Brahm's Insektenkalender 1. 241.

Schäffer Icon. 96. f. 6. schlecht.

Kennzeichen der Art.

Er ist blaßgelb, mit einer oder drey goldgrünen oder blauen Linien auf den Flügeldecken, welche verschwinden, wenn das Insekt todt ist.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwey Linien lang, und der Körper, nämlich Kopf, Brust und Hinterleib schwarz. Letzterer hat braune Ringe oder Gelenke. Die Fühlförner sind braun mit schwarzen Kölbchen. Halschild und Flügeldecken sind nicht sowohl grau, als blaßgelb. Längs den gestreiften Flügeldecken ist nahe an der Naht eine goldgrüne Linie, zuweilen noch zwey andere, die dünner sind und entfernter stehen. Es ist schade, daß der Goldglanz der Naht im Tode verschwindet, wie dies der Fall auch bey den übrigen glänzenden Schildkäfern ist.

Aufenthalt.

Im May, gewöhnlich im Grase, selten aber, doch zuweilen auf den Blättern des Kern- und Steinobstes, dessen untere Seite er meist zerstört; desgleichen auf Petersilien.

S i e b e n t e G a t t u n g.

Die Blattkäfer und ihre Verwandten. *Chrysomelae* Lin.

Sie heißen auch: Goldhähnchen und Chrysomeien, und zerfallen bey Fabricius in seiner Entomol. System. 1792, in sieben, und in seinem neuesten, noch lange nicht vollendetem Systema Eleutheratorum 1801 in neun, theils inn- theils ausländische Gattungen.

Gat:

Gattungskennzeichen nach Linné.

Die eifsgliedrigen Fühlhörner sind bandelförmig, und werden nach außen zu dicker. Der ganze Körper ist rund, der Halschild gerandet, oder gesäumt, aber nicht die Flügeldecken. Die meisten haben vier, wenige aber sechs Freßspitzen.

Die Larven haben sechs hornartige Füße, leben von Blättern, deren mehrestes Wesen sie verzehren, und die Ribben übrig lassen.

Die Eyer sitzen unter den Blättern vest.

Die eigentlichen Gattungskennzeichen der hier vorkommenden Fabric. Gattungen sind folgende:

No. 45. Der Blattkäfer, *chrysomela* F. (in der Entomol. systematica, nicht aber in dem Systema Entomologiae 1775). Die sechs Freßspitzen sind auswärts dicker. Die Lippe ist hornig und ganz. Die Fühlhörner sind perlenschnurförmig. —

No. 47. Der Forchtkäfer, *galleruca*, hat nicht vier, wie in den ältern Fabric. Schriften, sondern nach der Entom. syst. sechs fadenförmige Freßspitzen, wovon das erste Glied spizig ist, eine gespaltene Rinnlade, bald perlenschnurförmige, bald fadenförmige Fühlhörner, bald beydes zugleich.

No. 56. Der Fallkäfer, *Cryptocephalus*, hat vier fadenförmige Freßspitzen, eine einzahnichte Rinnlade, eine hornige, ganze Lippe und fadenförmige Fühlhörner.

Ferner Fab. Supplement. Entomolog. S. 109. Der Sägekäfer, *Clythra*, hat vier ungleiche fadenförmige Freßspitzen, eine an der Spitze erweiterte und ausgerandete Lippe und kurze sägeförmige Fühlhörner.

Die uneigentlichen oder äußeren Gattungskennzeichen derselben sind nach Fabricius:

Der Blattkäfer, *chrysomela*: Der Körper ist eiförmig, höckerig, ungerändert, unbehaart, zuweilen auch glatt und glänzend; der Kopf ist eiförmig und sehr eingefügt; die nierenförmigen Augen stehen am Rande; die kurzen Fühlhörner sind vor den Augen angewachsen. Der Halschild geht seitwärts aus, und hat oft einen dicken Rand; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, und von der Länge des Hinterleibes, mit herabgebogenem Rande; die Füße sind stark und mittelmäßig, mit viergliedrigen Fußblättern. Die Farben sind bey diesen Käfern bunt, öfters mit schönem Glanz. —

Der Forchtkäfer, *galleruca*: Der Körper ist länglich, unbehaart, etwas niedergedrückt, ungerandet und träge; der Kopf klein, rund und sehr eingefügt; die Augen sind rund, stehen an den Rändern und ragen hervor; die vor den Augen eingefügten Fühlhörner stehen nahe beisammen; der Halschild ist rund und kurz; das Schildchen klein und rund; die Flügeldecken sind steif, flach und von der Länge des Hinterleibes; die Füße mittelmäßig und stark; die Hintersehenkel zuweilen dick und zum Hüpfen gemacht; die Fußblätter sind viergliedrig. Die Farbe des Insekts ist bunt.

Der Fallkäfer, *cryptocephalus*: Der Körper ist cylindrisch, vorne und hinten zu abgestumpft, glatt, ungerändert; der Kopf flach und sehr eingefügt; die Augen stehen an den Seiten, und sind rund; unterhalb der Augen sind die Fühlhörner eingefügt,

und kürzer als der Körper. Der Halschild ist kurz, rund, und geht seitwärts aus; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt und fast länger als der Hinterleib; die Füße sind stark, etwas lang; die Fußblätter sind viergliedrig. Die Farbe des Insekts ist bunt, öfters glänzend.

Der Sägekäfer, clythra: Der Körper ist klein, ungerandet, cylindrisch, öfters glatt und träge; der Kopf ist zurückgezogen; die Augen sind länglich, wenig hervorragend, an der Seite stehend; die sägezahnigen, von einander stehenden, vor den Augen eingefügten Fühlhörner haben die Länge des Halschildes, welcher seitwärts ausläuft und rund ist; der Rand läuft abwärts; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind länger als der Hinterleib und gewölbt; die Füße sind stark; die vordern lang, die Fußblätter viergliedrig. Die Farbe des Insekts ist bunt.

Es giebt kinnische Blattkäfer mit eyrundem Körper; hüpfende; mit cylindrisch-rundem und mit länglichem Körper. Daher entstehen vier Familien.

Erste Familie.

Die Blattkäfer mit eyrundem Körper.

Sie gehören zu den minder schädlichen.

1. Der Rothaster, Blattkäfer. *Chrysomela haemorrhoidalis* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rothaster, Rothsteiß, rothasteriger Faltkäfer, rothsteißiger Blattkäfer, schwarzer Erlen-Blattkäfer, zweytropfiger Faltkäfer.

Chrysomela haemorrhoidalis, Lin. 587. 7. Müller 166. 7.

Cryptocephalus haemorrhoidalis, Fab. Ent. I. 1. 329. 107. Über in seinen feineren Schriften eine *Chrysomela*.

— — — Podae, Schrank Fna. 1. S. 548.

Coccinella haemorrhoidalis Scopoli.

Chrysom. haemorrhoidalis, der schwarze, glatte Blattkäfer der Erle. Gleditsch I. 445. 17.

Schäfferi Icones t. 30. f. 4. 5.

Kenntzeichen der Art.

Er ist eyrund, glänzend schwarz; an der Wurzel der Fühlhörner gelb, am After roth.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist drey Linien lang, schwarz und glatt. Die Fühlerhörner sind da, wo sie am Kopf anschließen, gelb. Der schwarze oder dunkelmetallgrüne Halschild hat zwey schwarze, wiewohl kaum sichtbare Punkte. Die mit Punktstreifen versehenen, schwarze oder dunkelmetallgrüne Flügeldecken sind am Aßer rothgelb (bei alten Exemplaren gelb). Degeer kannte auch rothe Varietäten, und Fabricius erwähnt blauer,

Aufenthalt und Schaden.

Er zerstört das Mark des Birken- und Erlenlaubs, wo ihn auch Degeer mit dem Goldweidenkäfer, vitellinae, in der Paarung angetroffen hat.

2. Der kupfergrüne Blattkäfer. *Chrysomela aenea* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt auch: Kupferhähnchen, Kupferblattkäfer, schillernder Blattkäfer, metallischer Blattkäfer, metallfärbiger Blattkäfer, metallfärbiges Goldhähnchen, grüner Erlenblattkäfer.

Chrysomela aenea, Lin. 587. 8. Müller 167. 8. und tab. 4. fig. 6.

— — — Fab. Ent. I. 1. 309. 109.

— — — fuscicornis Fabr. Mantissa.

— — — aenea, der grüne, glänzende, eysförmige Blattkäfer der Erle. Gleditsch I. 415.

— — — Panzeri Fna. 25. t. 9.

Schäfferi Icones 21. fig. 3. 4.

Kennzeichen der Art.

Er ist eyrund, grün, glänzend, mit rothem Hinterleib, schwarzen Fühlerhörnern und Schienbeinen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist etwas länglich rund, mit einem kupfrigen Goldglanz. Der Grund der Fühlerhörner ist rothbraun, die Fühlerhörner selbst schwarz. Der Halschild ist vorne her ausgehöhlt. Die Flügeldecken haben blaue Längstreifen, die Punkten ähnlich sind. Die letzten Vandränge sind an den Seiten rothfarbig. Fabricius hatte Exemplare, wo die Wurzel und Spitze der Fühlerhörner schwarz, und ihre Mitte rothbraun war.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Schaden.

Er skeletirt wie der vorhergehende die Blätter der Erlen und Birken. Otto Friedrich Müller, der von dem Uebersetzer des Linné, Statius Müller, verschieden

schieden ist, hat ihn in der Paarung mit *Chrysomela graminis* gesehen, hingegen Linné mit dem nachfolgenden.

3. Der Erlen-Blattkäfer. *Chrysomela Alni* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt auch: Erlenhähnchen, violette Erlen-Chrysomela, Erlenfresser, Erlenforschkäfer.

Chrysomela Alni, Lin. 587. 9. Müller 162. 9.

Galleruca Alni, Fabr. Ent. 1. 2. 16. n. 15. War früher bei ihm eine *Chrysomela*.

Chrysomela Alni, der violettblaue, eyrunde und tiefpunktirte Blattkäfer. Gleditsch I. S. 445.

Sulzer's Geschichte L. 3. fig. 15.

Kennzeichen der Art.

Er ist eyrund und violett. Die Flügeldecken sind mit zerstreuten Hohlpuncten versehen und die Fühlerhörner und Füße sind schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er hat nicht gar $\frac{1}{2}$ Zoll Länge, und glänzt schön. Er ist violettblau wie angelauener Stahl, und auf der Unterseite schwarz. Seine schwarzen Fühlerhörner sind lang. Der Halschild ist klein. Die tiefen Grübchen auf den Flügeldecken sind unordentlich zerstreut.

Aufenthalt.

Auf Erlen, im May, deren Blätter er stark zerfrisst.

4. Der Birken-Blattkäfer. *Chrysomela Betulae* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Birkenchrysomela, Birkenmeyer, Goldhähnchen der Weißbirke.

Chrysomela Betulae, Lin. 587. 10. Müller 168. 10.

Galleruca Betulae, Fabr. Ent. 1. 2. 17. n. 19. In seinen frühern Schriften eine *Chrysomela*.

Chrysomela Betulae, der violette, eyrunde, mit tiefen gestrichelten Punkten bezeichnete Blattkäfer der Birke. Gleditsch I. 439.

Chrysom. caerulea Betulae, Degeer 5. t. 9. fig. a. b.

Anmerkung.

Linne, Fabricius und D. F. Müller in Prodromo Zoologiae Danicae, allegiren hier Käfer II. Band. 3 Cl. t. 1. und lassen Degeers Käfer weg. Linne und Fabricius allegiren aber auch die nämliche Käfersche Figur bey dem Goldweiden-Blattkäfer, welches auch Degeer, Füssly, Schrank und Brahm thun.

Kennzeichen der Art.

Er ist eyrund, violet, mit streifartigen Höhlpuncten.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist kleiner, aber von gleicher Farbe, wie der vorhergehende, violettblau, länglich und auf der Unterseite schwarz. Die Höhlpuncte stehen in Reihen, und sind wegen ihrer Feinheit kaum mit bloßen Augen zu bemerken. Er soll als Abart zur *Chrysomela cochleariae*, Fabr. gehören.

Die Larve ist sechsfüßig.

Aufenthalt.

Auf den Birken, wo die Larve die untere Seite der Blätter, so wie das ganz zarte Laub und die jungen Triebe verzehret.

5. Der Bruchweiden-Blattkäfer. *Chrysomela vigintipunctata* Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

20 punctirtes Goldhähnchen, 22 punctirter Blattkäfer, länglich punctirtes Goldhähnchen, Scopoli'shähnchen.

Chrysom. vigintipunctata, Fabr. im Systema Eleutheratorum, desgleichen in den frühern Schriften.

Galleruca vigintipunct. Fabr. Ent. 1. 2. 21. 36.

Chrysom. vigintipunct. Brahm 1. 152. 493.

— — — — — Panz. Fn. 6. 1. 10.

Schäfferi Icon. 3. f. 4, und t. 51. f. 7.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist metallschwarzgrün, mit weißem Rand; die Flügeldecken weiß, jede mit 10 schwarzen Punkten oder Flecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist vier Linien lang, länglich eyrund; der Körper aber schwarz mit Metallglanz. Der Halschild hat eben diese Farbe, jedoch mit weißer Rand-Einfassung. Die weißen Flügeldecken führen zusammen 20 längliche schwarze oder vielmehr metallschwarzgrüne Punkte. Eben diese Farbe hat die Nath. Die weiße Farbe der Flügeldecke verwandelt sich nach dem Tode des Insekts in limoniengelb. Die Ursache liegt in dem vielen Saft, womit die weichen Flügeldecken angefüllt seyn müssen. Man thut wohl, sie erst dann mit der Nadel durchzustechen, wenn sie einige Zeit todt sind.

Aufenthalt.

Der Käfer befindet sich nicht nur in England und Italien, sondern auch in Deutschland, im May und Junius bey uns auf Weiden sammt der Larve und Puppe, deren Beschreibung aber von uns aufzuzeichnen vergessen worden ist.

6. Der Kirschen-Blattkäfer. *Chrysomela Cerasi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heist auch: Kirschhähnchen, Vogelskirschhähnchen.

Chrysomela Cerasi, Lin. 588. 13. Müller 169. 13.

— — — der längliche, graue oder bleifarbene und schwarzäugige Blattkäfer. Gleditsch II. 113.

— — — Padi, der Patscherbensauger. Gleditsch II. 113?

— — — Degeer 5. t. 9. f. 2.

Kennzeichen der Art.

Er ist länglich eyrund, grau oder bleifarben, mit schwarzen Spitzen der Fühlhörner und schwarzen Augen.

Die Larve ist platt gedrückt und grün, mit einzelnen Borsten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist länglich eyrund und gelblich grau, blaß und glänzend, mit länglichem Halschild. Seine Fühlhörner sind nicht lang und an den Enden braunschwarz. Der Körper hat die Größe einer Bettwanze. Der Vorderrand des Halschildes fällt ins Schwarze, welche Farbe auch die Augen haben. Die oben beschriebene Larve hängt auf der Unterseite der Traubenkirsche.

Er ist von der in Schweden auf Kirschen befindlichen *Galleruca Cerasi*, Fabr. Entom. 1. 2. 22. k. 13. ganz verschieden, welche einen schwarzen Körper, tiefschwarzen Kopf mit einem roßfarbigen, verblichenen Stirnpuncte, aschgraue Fühlhörner, einen fuchsrothen, glatten Halschild, blasse und schwarz gerandete Flügeldecken und roßfarbene Füße hat.

Aufenthalt und Schaden.

Auf dem Faulbaum und besonders auf den Traubenkirschen (*Prunus Padus* L.) in guten und fruchtbaren Waldungen. Er saugt den Saft der jungen Triebe und Blätter aus, und hinterläßt deren Skelette.

Schrank fand ihn auf Weiden, aber nur halb so groß.

7. Der Traubenkirschen-Blattkäfer. *Chrysomela Padi*, Lin.

Namen und Schriften.

Flohhähnchen, Flohblattkäfer, schwarzes Vogelfirschhähnchen.

Chrysomela Padi, Lin. 588. 14. Müller 169. 14. Fehlt in Fabricius Schriften, und soll von Gleditsch und Degeers *Chr. Padi* verschieden seyn; dagegen sich doch erinnern läßt, daß Degeers Beschreibung mit *Ch. Cerasi* und Gleditschens seine mit *Ch. Padi* stimmt.

Kennzeichen und Beschreibung.

Er ist eiförmig, schwarz, an der Spitze der Fühlförner bleifarben; äußerst klein, nämlich wie ein Floh, oder doch nicht viel größer. Die Flügeldecken sind schwarz und nach hinten zu blaß.

Aufenthalt.

Auf Sauerkirschen und Schlehdorn, besonders nach Linné auf der Traubenkirsche, wie der vorhergehende s).

8. Der

s) Hier bemerken wir, daß der Saat-Blattkäfer, oder das Kornähren-Goldhähnchen, *Chrysom. cerealis*, Lin. 588. n. 17. Fab. Ent. I. 1. 323. n. 76. Schäff. 1. f. 3. Panzer 44. t. 11. von Forstium träutern lebt. Ich zähle ihn also nicht unter die eigentlichen Forstinsekten, beschreibe ihn aber doch kurz: Er ist auf der Oberseite schön rothgolden, mit drey blauen Strei-

fen über den Halschild, und fünf dergleichen über die Flügeldecken. Auf der Unterfläche ist er dunkelviolett. Er legt seine Eier nach Professor Hermanns Bemerkung auf das *Spartium scoparium*, und vermuthlich auch auf die Ginster-Arten (*Genistae*) und ist drey und eine halbe Linie lang. Als Käfer findet er sich im May und Junius auf den Saatfeldern.

8. Der Goldweiden-Blattkäfer. *Chrysomela Vitellinae* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Dotterweiden-Blattkäfer, kupferfarbener Blattkäfer, Sahlweiden-Chrysomela, Weiden-Blattkäfer, Eyerdotter, Blausflügel, runder blauer Weiden-Blattkäfer, metallener Weiden-Blattkäfer.

Chrysomela vitellinae Lin. 589. 23? Müller 171. n. 23.

Galleruca vitellinae, Fab. Ent. 1. 2. 13. n. 22.

Chrysom. vitellinae, der gelbe, eyrunde Blattkäfer. Gleditsch I. 542. — II. 61.

Galleruca vitellinae, Panzeri 44. t. 16.

Rösel II. Erbk. 3. Klasse tab. I.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist länglich errund, grünblau, zuweilen kupfergold-grün, überaus glänzend, an der Wurzel der Fühlförner rothfarben.

Die Larve ist gelb und schwarz punctirt, mit schwarzem Kopf und Schwanz; ihr Geruch ist stinkend.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Der Käfer ist 2 Linien lang, 1 breit, zuweilen kupfergrün, zuweilen blau. Die Flügeldecken sind gestreift-punctirt. Die schwarzen Fühlförner sind nur an der Wurzel gelbroth oder rothfarben. Die Fußblätter sind röthlich, hingegen sind die Schienbeine schwarz. Die Unterseite des ganzen Körpers ist auch schwarz.

Die Larve ist gelb mit schwarzen Punkten, einem schwarzen Kopf und Schwanz, und riecht übel.

Die Puppe ist blaßgelb und klein, und ruht gewöhnlich nur 14 Tage: einige Puppen aber überwintern.

Diese ganze Beschreibung geht eigentlich auf den Rösel'schen Käfer und dessen Verwandlungen. Bey diesen und andern glänzenden Insekten ist in der Panzer'schen Fauna der Glanz zu wenig ausgedrückt. Linné und Fabricius führen zwar a. a. O. bey ihrer *vitellinae* unsere Rösel'sche Abbildung an, finden aber von andern Naturforschern viel Widerspruch, wie oben in der Anmerkung bey *Chr. Betulae* gesagt worden 1).

Auf-

1) Ich bin geneigt, die Rösel'sche Figur nicht sowohl für die eyrunde *Chrysomela Armo-raciae* Panzeri 44. t. 16. als vielmehr nach Scriba Vorgang für die *Chrysomela caerulea salicis*, Degeer 5. S. 317. zu halten, aber so, daß ich Schrank beyprete, und unsern Linne'schen und Rösel'schen Käfer

zugleich mit der *Chrysom. caerulea salicis*, Scriba Journal I. 295. und dessen *Chrysomela metallica salicis* S. 296. gänzlich verbinde. In meinem Exemplar des Rösel'schen Werks haben die blauen Flügeldecken von allen Seiten einen bleichen Rand. Dies halte ich für ein Versehen des Illuministen, zumal

Aufenthalt und Schaden.

Man findet Käfer und Larve in allen Jahreszeiten auf den glatten Weiden, auch auf der Sahlweide und Zitterpappel, deren Blätter sie skeletiren, indem sie streifenweise, zuweilen zwanzig auf einem Blatt fressen. Die blauen und grünen vermischen sich in der Begattung unter einander.

9. Der blasse Blattkäfer. *Chrysomela pallida* Lin.

Namen und Schriften.

Weidenhähnchen, blaßgelbes Weidenhähnchen, blaßgrauer Maywuchs-Weidenkäfer.

Chrysomela pallida, Lin. 689. 25. Müller 172. 25.

— — — Fabr. Ent. 1. 2. 321. n. 64.

— — — der eysförmige gelbe Weidenblattkäfer. Gleditsch II. 62.

Kennzeichen der Art.

Er ist eyrund, blaßgelblich, mit schwarzen Augen und Unterleibe.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist drey Linien lang, und seine Farbe wechselt ins Hell- oder Rothgraue. Auf jeder Flügeldecke sind neun Punctengrübchen. Die Unterseite des Körpers ist glänzend schwarz. Die Füße sind wie der Körper gefärbt.

Fabricius gedenkt einer Varietät mit undeutlichen schwarzen Flecken der Flügeldecken und schwarzem Körper.

Aufenthalt.

Auf verschiedenen Weiden-Arten und dem Vogelbeerbaum, wo er die Blätter zerfrißt.

10. Der

zumal doch alles übrige am Käfer und den Larven mit der Natur übereinstimmt. Es giebt größere und kleinere unter diesen Goldweidenkäfern. Die kleinern sind von der

Größe wie die im Mößel und die größeren sind vielleicht die, welche Linne vulgarissima nennt, nicht aber die Schrankische vulgarissima. E.

10. Der polirte Blattkäfer. *Chrysomela polita*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Geglätteter Blattkäfer, Spiegelrücken, grüner kupferglänzender Mayenkäfer, Spiegelrücken Blattkäfer, glatter Korbweiden-Blattkäfer.

Chrysomela polita, Lin. 590. 27. Müller 172. 27.

— — — Fabr. Ent. I. 1. 317. 49.

— — — Schrank's Fauna Boica 524.

Coccinella polita Scopoli.

Chrysom. polita, der eyrunde Blattkäfer, mit röthlichen Flügeldecken, und einem grünlichen, ins Goldfarbne spielenden Bruststück. Gleditsch I. 542. u. II. 62.

— — — Degeer Insect. 5. t. 8. fig. 23.

Kennzeichen der Art.

Er ist eyrund mit vergoldetem Halschild und röthlichen Flügeldecken, worauf zerstreute Höhlpunkte stehen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist drey und dreyviertel Linien lang und hat einen blendend kupfergrünen Kopf und Halschild. Die Fühlerdrner und Flügeldecken haben die Farbe wie der Pappeln-Blattkäfer, das ist: sie sind einfarbig röthlich, und werden, wenn sie lange getrocknet aufbewahrt sind, braungelbe. Ob er nun gleich der polirte oder geglättete heißt: so haben seine Decken doch Höhlpunkte. Diese fallen aber nicht ins Auge, sondern müssen durchs Suchglas entdeckt werden.

Er darf weder mit dem Pappeln- noch Zitterpappeln-Blattkäfer, noch mit Schäferi Icon. t. 65. fig. 9, wo *chrysomela metallica* Schrank und Leicharting gezeichnet steht, confundirt werden. Diesen setzen hat Gög (Entomologische Beyträge I. 263) aus Versehen hierher gezogen, und ersieh Herr Hofrath Fabricius.

Aufenthalt.

Im April, Juli und September auf Aspen und Weiden, in manchen Gegenden gemein. Der Käfer ist auch auf der *Inula britannica* und *Mentha sylvestris* wahrzunehmen.

11. Der Pappel-Blattkäfer. *Chrysomela Populi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pappelhähnchen und Pappelfresser.

Chry-

Chrysomela Populi. Lin. 590. 50. Müller 173. 30.
 — — — — Fab. Ent. I. 1. 316. n. 44.

Cocanella populi Scopoli.

Chrysom. populi, der eyrunde Blattkäfer mit dem blaulichten Bruststück und rothen schwarzspitzichten Flügeldecken. Gleditsch I. 542.

Schäfferi Icones t. 47. f. 45. Aber Fabric. allegirt Icon. t. 21. fig. 9.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist eyrund mit blaulichem Halschild und rothen Flügeldecken, die eine schwarze Endspitze haben.

Die Larve ist sechsfüßig und bunt aus Schwarz und Weiß, mit zwey Reihen von Höckern.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Es ist fünf Linien lang, und also unter den einheimischen Blattkäfern der größte. Die Größe ausgenommen hat er die meiste Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden. Sein Halschild ist metallgrün, und seine Flügeldecken, wenn er frisch ist, sind roth.

Im Späthjar kommt er kleiner mit hellgelbbraunen Flügeldecken, ohne schwarzes Hinterende vor. Diese Erscheinung wird vom Professor Schrank (Fauna Boica S. 524) für eine Folge der schlechten, minder erziehbigen Nahrung aus absterbenden Blättern angegeben, und der so beschaffene Käfer selbst für die *Chrysomela Tremulae* Fabr. gehalten, welche eine Varietät unsers Käfers sey. Auch selbst die Stammart führt statt des schönen Roth der Flügeldecken oft eine schwarzbraune Farbe.

Die sechsfüßige Larve ist nach Lister's Beobachtung, schwarz und weißbunt, mit einer doppelten Reihe von Erhabenheiten, woraus sie eine unerträgliche stinkende, gelbe Feuchtigkeit von sich läßt. Sie skeletirt das Laub der Zitterpappeln, daß bloß die Fasern und Ribben übrig bleiben.

Aufenthalt und Schaden.

Käfer und Larve bewohnen die Weiden und Aspen oder Zitterpappeln, die von der Larve, wie oben bemerkt ist, beschädigt werden. Man findet sie vorzüglich auf niedrigen jungen Pappelbüschen, im April, August und September, die sie oft ganz kahl abfressen. Dem jungen fetten Ausschlag gehen sie vorzüglich nach.

12. Der Zitterpappel-Blattkäfer. *Chrysomela tremulae* F.

Namen und Schriften.

Chrysomela tremulae, Fabr. Entom. I. 1. 517. n. 45.

— — — — — Walther's Lehrbuch S. 541.

— — — — — *populi* Varietas, Schrank Fauna,

Kenn:

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ganz wie der vorhergehende Pappelblattkäfer, aber halb so groß, und ohne schwarze Endspitzen der Flügeldecken.

Die Larve ist der vorhergehenden ähnlich, aber kleiner.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Die Flügeldecken haben keine schwarzen Endspitzen. Sonst gleicht der ganze Käfer, die Größe ausgenommen, den vorhergehenden. Auch die Larve gleicht jener des Pappel-Blattkäfers. Wenn man sie berührt, läßt sie aus den zwey Reihen Knöpfchen, womit der Rücken besetzt ist, weiße Bläschen hervortreten, die aber augenblicklich wieder verschwinden, und einen widrigen Geruch zurücklassen. Brahm's Insektenkalender I. 105.

Aufenthalt und Schaden.

Der Käfer und die Larve im May und Junius auf Pappelbäumen, zum Nachtheil derselben. Vielleicht bestätigt sich Herrn Schrank's Meinung, daß dies Insekt nur Varietät von dem vorhergehenden ist.

13. Der Bandweiden-Blattkäfer. *Chrysomela viminalis*, Lin.

Namen und Schriften.

Er heißt auch: rother Korbweiden-Blattkäfer, Weidenbinder.

Chrysomela viminalis, Lin. 590. 31. Müller 174. 31.

— — — — Fab. Ent. I. 1. 319. 59.

— — — — Degeer 5. 297. 6.

— — — — der schwarze rothgeflügelte, eysförmige Weiden-Blattkäfer. Gleditsch II. 62.

Coccinella signata, Scopoll.

Kennzeichen der Art.

Er ist eckrund, schwarz; der Halschild ist roth mit zwey Makeln, und die Flügeldecken sind ziegelroth.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er mißt drey Linien in die Länge. Die zwey Makeln des rothen Halschildes sind schwarz, und die rothen Flügeldecken haben eine schwarze Nath, und neun Reihen schwarzer Punktgrübchen.

Vey Varietäten fehlen am Halschild die zwey Punkte oder Makeln.

Mit dem Nachfolgenden hat er etwas Aehnlichkeit. Und Herr Scriba (Journal S. 288.) vermuthet, daß beyde zu einer Art gehören. Seine Gründe sind diese: beyde, der Wandweiden- und der zehnpunctirte Blattkäfer haben einerley Gestalt und Größe; die Fühlhörner färben sich gegen die Wurzel rothgelb. Die Unterseite des Körpers ist schwarz, der After und die Seite des Leibes rothgelb, das Schildchen schwarz, und die Flügeldecken mit neun bis zehn punktirten Linien oder Streifen versehen. Hingegen der Baron Degeer will unsern Käfer mit dem rothhastrigen Chrysl. haemorrhoidalis Lin. in der Begattung angetroffen haben.

Aufenthalt.

Der Käfer liebt die Korb- Vand- und Mandel- Weide.

14. Der zehnpunctirte Blattkäfer. *Chrysomela decempunctata*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Zehnpunkt, Puncthähnchen, Bachweiden- Blattkäfer.

Chrysomela decempunctata, Lin. 590. 32. Müller 174. 32.

— — — — — Fabr. Entom. I. 1. 320, 62.

— — — — — Schrank Enumeratio Ins.

— — — — — Linneana, Schrank Faun. 525.

— — — — — *decempunctata*, der eyrunde, schwarzgetüpfelte Blattkäfer mit rothen Flügeldecken und einem oberwärts rothen, unterwärts schwarzem Bruststücke. Gleditsch I. 543.

Schäffer Icon. 84. f. 7. Männchen.

Schäffer Icon. 194. f. 4. Weibchen. Anstatt dieser beyden Figuren führt Fabricius Schäff. Icon. 21. f. 10. an.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz. Der Halschild hat auf jeder Seite einen rothen Punkt. Die Flügeldecken sind roth, beyh Männchen schwarz punktirt, beyh Weibchen einfarbig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Es ist drey Linien lang. Die Fühlhörner sind von der Wurzel an bis zur Hälfte roßbraun. Der oberwärts rothe, hinterwärts schwarze Halschild ist an den Seiten punktirt, in der Mitte vollkommen glatt. Die Punktreihen auf den rothen Flügeldecken laufen spizwärts paarweise zusammen in einen Winkel. Die Fußblätter sind unten roßgelb. Gewöhnlicherweise hat zwar jede Flügeldecke fünf schwarze Makeln. Allein der Käfer wechselt auch mit weniger Punkten, nämlich 4, 3, 2 und 1, oder ist wohl ganz schwarz. Ferner wechselt er mit einem schwarzen Halschild, dessen Seite roth, wo dann die Flügeldecken roth und schwarz punktirt, alle Füße schwarz und zuweilen die Schienbeine roth sind.

Dies

Dies ist alsdenn *Chrysomela nigripes* des Degeers. Ist unser Käfer mit rothem Halschild, mit 2 schwarzen Flecken hinten an dem Rand bey den Flügeldecken, mit rothen Flügeldecken, die schwarz punctirt sind, und mit rothgelben Füßen versehen, so ist dies die Varietät, welche Degeer (Ins. 5. t. 8. fig. 25) *Chrysomela rufipes* nennt. Findet man ihn aber ungefleckt, so ist es keine Varietät, sondern, nach Schrank's Beobachtung, das Weibchen.

Aufenthalt.

Im Juni auf Weiden und Aspen.

15. Der Blattkäfer mit dem Halsbände. *Chrysomela collaris* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Halsbandiger Blattkäfer, Kragenträger, schildgesäumter Sägekäfer.

Chrysomela collaris, Lin. 591. 37. Müller 176. 37.

— — — Fab. Ent. 1. 1. 319. n. 56.

— — — der eyrunde violette Blattkäfer mit einem am Rande gelbpunctirten Bruststück (sollte heißen: am gelben Rande punctirten). Gleditsch II. 62.

Clytra collaris, Schrank Fn. 544.

Schäfferi Icones t. 52. f. 11. 12.

Kennzeichen der Art.

Er ist rund, violet, mit carminfarbenem Rand am Halschild: beyderseits mit einem schwarzen Punkte.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist eiförmig und glänzend schwarz violet. Die Ränder des Halschildes sind gelbroth, jeder mit einem schwarzen Punkte versehen, so daß der Punkte zusammen zwey sind. Er wechselt mit Kupfergrün. Schäffer's Abbildung stellt Umriß und Zeichnung genau vor, aber die Farbe müßte nicht schwarz seyn.

Aufenthalt.

Auf den glatten Weiden der Wiesen und der Vorhölder in Europa und Amerika.

Zweyte Familie.

Die hüpfenden Blattkäfer, Springhähnchen. *Altica* Panzeri et Schrankii. Sie sind den Gärtnern unter dem Namen der Erdschöhe bekannt.

Weniger schädlich

wiewol einige den nächstfolgenden unter die mehr schädlichen zählen.

16. Der Apfelblattkäfer. *Chrysomela nitidula* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Glänzender Blattkäfer, Glanzhähnchen, glänzender Hüpfkäfer, glänzendes Springhähnchen, Glanzrücken, goldfarbige Springchrysomele.

Chrysomela nitidula, Lin. 594. 60. Müller 183. 60.

Galleruca nitidula, Fab. Ent. 1. 2. 30. n. 81.

Chrysomela nitidula, Fab. Eleutherata et Mantissa.

Altica nitidula, Fab. Systema Entom.

— — — Schrankii Fna 561.

Chrysom. nitidula, der goldfarbene Springkäfer mit blauen Flügeldecken und rothen Füßen. Gleditsch II. 90.

Schäfferi Icon. t. 87. fig. 5.

Kennzeichen der Art.

Er ist grün, glänzend, springend, mit blauen Flügeldecken, vergoldetem Kopf und Halschild und rothfarbenen Füßen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Körper dieses sehr niedlichen Insekts, das nur eine Linie Länge hat, ist schwarz. Der Kopf und Halschild ist grün mit Gold. Die Fühlhörner und Füße sind roth und der Hinterscheitel schwarz. Er wechselt mit Blau und Grün, was die Flügeldecken, und mit Kupferglanz, was den Halschild betrifft. Die Hinterschenkel sind, wie bei allen Springhähnchen, keulenförmig und sehr stark. Sie sind zwar glänzend schwarz, aber die Füße selbst roßbraun.

Aufenthalt und Schaden.

Vom April bis in den October, besonders im Monat Junius auf Weiden und Eschweiden, ferner auf dem wilden Apfelbaume, auf vielen zahmen und wilden Holzarten, auch auf den Hecken, und vorzüglich in den neuen zwey- und dreijährigen Gehauen. Das Insekt wird der ganzen Holzfaat gleich anfanglich nach dem Aufkeimen schädlich. Er liebt unter den Weiden besonders die, welche an den Ufern der Flüsse stehen.

13. Der

17. Der Birn-Blattkäfer. *Chrysomela holsatica* Lin.

Namen und Schriften.

Holsteiner, Holsteinischer Springkäfer, Rothpunkt.

Chrysomela Holsatica, Lin. 595. 67. Müller 184. 67.*Galleruca Holsatica* Fabr. Ent. 1. 2. 33. n. 101.*Chrysom. Holsat.* Fabr. Eleutherat. wie in d. Mantissa.— — — der schwarze, glänzende Springkäfer mit rothen Flügeldeckenspitzen.
Gleditsch II. 90.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz, glänzend, die Flügeldecken haben an der Spitze einen rothen Punkt.
Er hat Springfüße.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er gehört zu den springenden oder hüpfenden Blattkäfern, die man aber nicht mit den Mordellen confundiren muß. Die rothen Spitzen der Flügeldecken machen ihn kenntlich. Die Hinterschenkel sind wie beim vorigen keulenförmig und stark.

Aufenthalt, Schaden und Mittel dagegen.

Käfer und Larve sind dem wilden Kernobst schädlich, dessen zarte Sprossen und weiche Blätter letztere frisst. In so fern diese und andere Springhähnchen in Gärten den jungen Pflänzchen schaden, wendet man dagegen das Bestreuen mit Asche und Ofenruß an, welches der Pflanzen Wachsthum und des Insekts Untergang befördert. Das Besprengen mit Wasser ist besonders den Larven zuwider, die davon einen Durchfall bekommen. In Wäldern ist dieß Mittel impracticabel.

Dritte Familie.

Die Blattkäfer mit cylindrischrundem Körper.

Erste Linie. Mit cylindrischrundem Körper und kurzen sägezahnichten Fühlhörnern. Fabriciusische Sägekäfer, *Clythrae*. (Sollte *Clytrae* heißen).

Weniger Schädliche.

18. Der dreyzahnige Blattkäfer. *Chrysomela tridentata* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blaupunktfirter Blattkäfer, dreyzahnichter Sägekäfer, Dreyzahn.

Chrysomela tridentata, Lin. 596. 73. Müller 186. 73.*Clytra tridentata*, Olivier.*Chrysomela tridentata*, der walzenförmige blaue Blattfäuger. Gleditsch II. 199.*Clytra longimana* Schneideri, Panz. Fn. 48. t. 14.*Schäfferi* Icon, 62. f. 7.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist walzenförmig, mit blauem Halschild und blaßgelben Flügeldecken.

Die Larve wohnt in einem birnförmigen Gehäuse oder Sack, den sie mit sich herumträgt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Der Käfer ist glänzend, blau, mit winkligem, erhobenen, blauen Halschild und ins Bläßgelbe fallenden Flügeldecken. Der Ausdruck im Linne: *elytris testaceis*, muß hier durch: blaßgelbe Flügeldecken übersezt werden, ohnerachtet sonst *testaceus* bey ihm ziegelroth, auch sandfarben und muschelbraun bedeutet. Die Füße sind wenigstens größtentheils blau, so wie der Kopf und das Schildchen.

Die Larve ist eine unbehaarte Sackträgerin, die sich von den Blättern der Haselstaude nährt. Ihr Sack ist braun, behaart und birnförmig.

Aufenthalt und Schaden.

Der Käfer findet sich auf den Heckenkirschen und dem Weißblatt; die Larve aber, wie gesagt auf Haseln, die sie beschädigt.)

19. Der

a) Für die Besitzer der Fauna des Herrn Panzer's sey es mir erlaubt, die hier zu weilen verwechelte Arten aus einander zu setzen.

a) Unser dreyzahniger ist die Linneische und Degeersche (Degeers s. t. 10 f. 10.) *Chrysom. tridentata* und zugleich die in Panz. Fauna, Heft 48 Taf. 14 abgebildete, langarmige *Clytra* des Herrn Schnei-

der's, und befindet sich nicht in Fabricius's Werken.

b) Der *Cryptocephalus trident.* Fab. Ent. 1. 2. Seite 55 n. 14 oder *Clytra trident.* Fab. Supplement. 112. n. 15. ist fast von der Größe der unsrigen. Aber er hat einen grünen Kopf, Halschild und Füße, und seine schmuziggelbe Flügeldecken haben an der Wurzel einen schwarzen Punct.

Er

19. Der gelbböhrige Blattkäfer. *Chrysomela aurita* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbböhr, gelbböhriges Stugkäferchen.

Chrysomela aurita, Lin. 596. 75. Müller 187. 75.*Cryptocephalus auritus* Fabr. Ent. 1. 2. 57. n. 20.*Clytra aurita*, Fabr. Supplem. S. 119. n. 15.

— — Panz. Entomol. I. 190. n. 7.

Chrysomela aurita, Walthers Lehrbuch der Forstwiss. S. 541.*Clytra aurita*, Panzer Fn. 25. t. 20.

Kennzeichen der Art.

Er ist etwas cylindrisch und schwarz. Der Halschild hat auf beyden Seiten eine gelbe Makel; auch die Schienbeine sind gelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwey und drey viertel Linien lang, von cylindrischer Gestalt. Kopf und Flügeldecken sind ganz schwarz. Das schwarze Halschild ist auf beyden Seiten gelbgemakelt. Die sägezahnigen, eiskliedrigen Fühldörner sind nebst den Schienbeinen der Füße gelb, die Schenkel aber schwarz.

Aufenthalt.

Im Julius auf Weiden und Haseln in Deutschland.

20. Der

Er ist in Panzers Taschenbuch als *Clytra tridentata* aufgeführt, und in seiner Fauna 48. t. 15. als *Clytra humeralis* Schneideri, Schneiderischer Sägetäfer, abgebildet. Seine zangenförmigen, hervorgestreckten Kinnbacken, die Farbe des Halschildes und seine Größe unterscheiden ihn von dem nachfolgenden. Er wird im Oesterreichischen angetroffen und fehlt in Linnés System.

c) Der *Cryptocephalus longimanus*, Fabr. Entom. 1. 2. 58. n. 25. et Olivier, oder *Clytra longimana*, Fabr. Supplement. 115. n. 22. dessen Halschild, Kopf und Füße grün, die Fühldörner an der Wurzel roth sind, dessen gelbe Flügeldecken an der Wurzel einen gelben Punkt führen,

wie der vorhergehende, ist da in Fauna Panz. 48. t. 12. als *Clytra tridentata* Schneideri und auch in Schaff. Icon. 77. f. 5. abgebildet; obgleich Fabricius diese Abbildung bey seiner trident. nachweist. — Er ist halb so groß, als der vorige (*Crypt. trid.* Fabr.), und die Vorderfüße sind beyr Weibchen länger. Seine Wohnung sind der Verglee und die Heckenmilch. Fabricius eignet ihm auch eine Saftträgerlarve zu.

d) Eine vierte Art, *Chrysomela longimana* Linn. ist davon abermals verschieden. Es ist die aus dem Archiv unter dem Namen: *Clytra longimana* Hübneri, bekannte Art. S.

20. Der Seiden-Blattkäfer. *Chrysomela sericea* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Seidenhähnchen, seidenglänzender Blattkäfer, goldgrüner Fallkäfer, dunkelblauer Fallkäfer, Habichtshähnchen, Lungenblumenkäfer, seidengrünes Stuzhähnchen.

Chrysomela sericea, Lin. 598. 86. Müller 190. 86.

— — *hypochaeridis*, Lin. 598. 21. Müller 171. 21.

Cryptoceph. sericeus, Fab. Ent. 1. 2. 63. n. 56.

Chrysomela sericea, der walzenförmige, ins Seidenhafte spielende Weiden-Blattkäfer. Gleditsch II. 61.

Cryptoceph. hypochaeridis, Schrank Fn. 549. und zugleich Schaff. Icon. 65. fig. 2—4.

— — — *sericeus*, Schrank Fn. und zugleich Schaff. Icon. 65. fig. 5. tab. 87. fig. 5.

Sulzer's Geschichte t. 3. f. 13.

Kennzeichen der Art.

Er ist cylindrisch, blaugrün von Halschild, Flügeldecken und Füßen. Die Fühlhörner sind schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Dieser schöne Käfer ist drey, auch wohl viertelhalb Linien lang. Die zehngliedrigen Fühlhörner haben, unter der Lupe betrachtet, einzelne Härchen. Der Kopf ist wie bey seinen übrigen Familien-Genossen, zurückziehbar. Der Halschild, Flügeldecke und Füße sind nebst der etwas bestäubt scheinenden Unterseite, grün mit Gold- und Kupferglanz. Das dreyeckige Rückenschildchen ist wie ein zugespitzter Höcker. Der Halschild ist rund, gewölbt und die Flügeldecken fein chagriniert, und stehen hinten von einander ab. Auch bedecken sie, wie bey seinen übrigen Familien-Genossen den Hinterleib nicht ganz. Die größere goldgrüne Art ist wohl die Stammart und zugleich Schrank's goldgrüner Fallkäfer, *Cryptoceph. hypochaeridis*. Die blaue Varietät ist dessen dunkelblaue, *Cryptoceph. sericeus*, die ins Violet zieht, von blauem Halschild, Decken und Füßen, die auch in Franken einzeln vorkommt. Auch ist mir (Scharfenberg), aber nur einmal, bey Römhild eine ganz purpurrothe Varietät zu Theil worden, die ein befremdendes Ansehen hatte.

Aufenthalt.

Er findet sich auf verschiedenen Strauch- und andern Weidenarten, auch auf den Syngenesisten, als dem Habichtskraut, der Moosdistel und den Scabiosen im Julius nicht selten.

21. Der gelblippige Blattkäfer. *Chrysomela labiata* Lin.

Namen und Schriften.

Maßmündiger Faltkäfer, Lippenhähnchen, Blattkäfer mit der gelben Lippe, gelblippiges Staghähnchen.

Chrysomela labiata, Lin. 598. 37. Müller 191. 87.

Cryptocephalus labiatus, Fabr. I. 2. 65. n. 62.

Chrysomela labiata, Walther's Forstwissensch. 541.

Kennzeichen der Art.

Er ist etwas cylindrisch und schwarz; an Kopf, Füßen und Wurzel der Fühlhörner gelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist nicht viel größer als ein großer Fleh. Kopf und Flügeldecken sind schwarz und glänzend, der Mund aber, die Wurzel der Fühlhörner und die Füße lichtbraun. Zuweisen sitzen zwei gelbe Punkte an der Stirn; nicht selten sind die Punktstriche der Flügeldecken gegen die Spitze hin verwischt.

Aufenthalt.

Auf Pappelbäumen und Weiden, desgleichen auf Rosen, vom Junius bis September.

22. Der Weißbirken-Faltkäfer. *Cryptocephalus flavilabris* Fab.

Er ist nach der Linneischen Methode ein Blattkäfer, von dieser Familie.

Namen und Schriften.

Cryptocephalus flavilabris, Fabr. Ent. 1. 2. 65. n. 63.

— — — parvulus, Mülleri prodrom. 519.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist violett und glänzend, mit feinbehaartem Munde, schwarzen Fühlhörnern und Füßen.

Die Larve ist eine Sackträgerin, deren Sack vorne schief abgestutzt ist.

Veschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Zu Obigem gehört noch, daß die violetten Flügeldecken gestreift punktiert sind. Und obgleich die Fühlhörner eigentlich schwarz sind: so färben sie sich doch an ihrer Wurzel gelb. Die Larve bewohnt ein sackähnliches Gehäuse, welches vorne eine schiefe Abstützung hat.

Aufenthalt.

In Sachsen auf der Birke, nach Angabe des Herrn Schallers zu Halle.

23. Der verbräunte Blattkäfer. *Chrysomela parenthesis* Schrank.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gerändeltes Goldhähnchen, und lichtbraunfüßiger Gallkäfer.

Chrysom: parenthesis. Neues Entomol. Magazin I. 153. wo durch einen Druckfehler bipunctata steht.

— — — — Schrank Fn. 553.

Walters Forstwissenschaft 541.

Cryptocephalus flavipes, Fab. Ent. 1. 2. 65. n. 64. wo durch einen Schreib- oder Druckfehler Schrank's paracthesis vorkommt.

Shäfferi Icon. t. 102. fig. 5.

Kennzeichen und Veschreibung des Insekts.

Er ist sattfschwarz. Die Stirn, der Mund und die Wurzel der Fühlhörner sind lichtbraun. Der Kopf und die Füße sind braungelb. Der Außenrand der Flügeldecken ist an der Wurzel gelb.

Aufenthalt.

Im Junius auf Weiden und Pappelbäumen in Deutschland und Italien.

24. Der Fichten-Blattkäfer. *Chrysomela Pini* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Fichtenfänger, Fichten-Gallkäfer.

Chrysomela Pini, Lin. 598. 89. Müller 191. 89.

Cryptocephalus Pini, Fab. Ent. 1. 2. 69. 84.

— — — — Panzer Fn. 39. t. 17. Shäff. Icon. 109. fig. 7.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Er ist hellziegelroth; die Flügeldecken sind blasser und verloren punktiert; die Fühlhörner schwarzbraun.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist ein und eine halbe Linie lang, mit ziegelrothem gelbgerändertem Halschild, und vergleichen, doch etwas blässern, Flügeldecken mit verlorenen Punkten. Die Fühlhörner haben an der Wurzel vier gelbe, und von da bis zur Spitze sieben schwarze Glieder. Die Füße sind auch gelb.

Aufenthalt.

In deutschen und schwedischen Fichtenwäldern.

Vierte Familie.

Blattkäfer mit länglichem Körper und schmalem Halschild.

Weniger schädlich.

25. Der Weiden-Blattkäfer. *Chrysomela capreae* Lin.

Namen und Schriften.

Weiden-Forchtkäfer, Weist-Blattkäfer, Weiden-Blattkäfer (von der Weide, Weidenweide, *salix caprea* L.), Weidenhuhn, schwarzer Lilien-Nagetäfer.

Chrysomela capreae, Lin. 600. 100. Müller 196. 100.

Galleruca capreae, Fabr. Ent. 1. 2. 20. n 40. Und in seinen frühern Schriften eine *Crioceris*.

Adimonia capreae, Schrank's Fauna 557.

Chrysom. capreae, der schmale graue Weist-Blattkäfer. Gleditsch II. 61.

Im Linné steht *caprea*, durch einen Druckfehler.

Kennzeichen der Art.

Er ist eckrund, mit schwarz bemakeltem Halschild, grauen Flügeldecken und langen schwarzen Fühlhörnern.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwey und eine Drittellinie lang und schmalleibig; oben gelblichbraun oder gelblichgrau, unten schwarz: der Rückenschild (scutellum) mit schwärzlichen Eindrücken ist eckig; die Flügeldecken sind nicht gestrichet. Der Halschild ist schwarz bemakelt oder punkirt, und der Hinterleib schwarz.

Aufenthalt.

Er zeigt sich im Frühling, Sommer und Herbst auf der Weide- und den übrigen Weiden-Arten, und auf Erlen. Wenn man ihn ergreifen will, so zieht er die Füße an sich, und läßt sich fallen.

Achte Gattung.

Die Rüsselkäfer und die mit denselben verwandt sind. Curculiones Lin.

Sie heißen auch: Elephantenkäfer und Schnauzenkäfer, und zerfallen beyh Fabricius, in dessen Entomologia syst. in fünf, und in seinem neuesten Systema Eleutheratorum von 1801 in weit mehrere Gattungen. Schrank in seiner Fauna Boica, macht fünf Gattungen aus dieser einzigen. Diese sind: a) der Bürstenkäfer, Anthribus, b) der Pießenkäfer, Involvulus, c) der Rüsselkäfer, Curculio, d) der Schnabellkäfer, Rhynehopterus, wozu der schwarze und rothe Kornwurm gehören, und e) der Minierkäfer, Salix.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Der Rüssel besteht aus einem hornartigen Fortsatz, auf welchem die kolben- oder Knopfförmigen Fühlhörner stehen. Diese Fühlhörner sind entweder neun- oder zehn- oder elfgliedrig, mit Einschluß der Kolbengliederchen. Denn die Kolbe oder Knopf hat bald eins, bald zwey, drey oder vier Glieder. Die Fußblätter sind, bis auf wenig fünf- gliedrige, alle viergliedrig, und haben einen Vallen.

Ihre Larven haben einen hornartigen Kopf mit Kinnbacken und keine Füße, und die Larven der kleinsten Arten miniren die Blätter.

Da bey unsern Linneischen Rüsselkäfern drey Fabriciusische Gattungen vorkommen, so bemerken wir hier sogleich ihre Kennzeichen, und zwar zuerst die eigentlichen: Der Bürstenkäfer no. 98. Anthribus; Die vier Freßspitzen sind sich gleich und fadenförmig; die Kinnlade ist sehr kurz und zweyspaltrig; die Lippe ist zweyspaltrig, die

die Fühlhörner haben ungleiche Glieder; die letztern drey Glieder sind eyrund, länger und dicker, und sitzen auf dem kurzen, flachen Rüssel.

Der Afterrüsselkäfer no. 100. *Attelabus*, hat vier fadenförmige Fressspitzen. Die Kinnlade ist gespalten. Die Lippe ist hornartig und bedeckt die Fressspitze. Die Fühlhörner sind bandelstorförmig und sind dem Rüssel einverleibt.

Der Rüsselkäfer no. 102. *Corculio*, hat vier kaum bemerkbare, fadenförmige Fressspitzen; eine cylindrische einzahnigte Kinnlade. Die Lippe ist vollständig, und die Fühlhörner sitzen auf einem hornartigen Rüssel.

Was die äußerlichen Kennzeichen nach Fabricius betrifft, so sind diese nachfolgende: Der Kürstikäfer: Der Körper ist eyrund, hederig, etwas glatt, ungerandet und träge; der Kopf ist eyrund, vornen hervorgestreckt, flach, stumpf und sehr eingefügt; die kugelichten, hervorstehenden Augen stehen an den Rändern; die etwas länglichten Fühlhörner sind am Seitengrübchen hinter den Augen eingefügt; der Halschild ist rund; das Schildchen klein und rund; die steifen und gewölbten Flügeldecken beugen sich am Hinterende abwärts und sind von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und stark, mit viergliederigen Fußblättern. Die Farbe des Insektes ist bunt, öfters auch dunkelfarbig.

Der Afterrüsselkäfer: Der Körper ist eyrund, klein, unbehaart, ungerandet und träge; der Kopf steht ausgereckt, ist eyrund, hinten schmal, vornen breit; die kugelichten Augen stehen am Rand und sind vor dem Rüssel eingefügt; die Fühlhörner sind kurz, stehen nahe beisammen, und sind an der Wurzel des Rüssels eingefügt; der Halschild ist eyrund; das Schildchen rund; die Flügeldecken steif, gewölbt und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und stark, mit viergliederigen Fußblättern. Die Farbe des Insektes ist bunt, fällt aber mehrentheils ins Dunkle.

Der Rüsselkäfer ist länglich und dabei eyrund, ungerandet und träge; der Kopf ist rund, sehr eingefügt, und endigt sich vornen in einen gerandeten Rüssel; die Augen sind kuglicht und hervorstehend, am Rande befindlich; die Fühlhörner sind von der Länge des Halschildes und stehen von einander, sie sind mitten in den Rüssel beyderseits eingefügt; der Halschild ist zuweilen rund; das Schildchen ist kurz und rund; die Flügel sind steif, gewölbt, an der Seite abwärts gebogen, von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und zum Gehen eingerichtet, oftmals mit gezahnten Schenkeln; die Fußblätter sind viergliedrig. Das Insekt ist vielfarbig.

Von den Linneischen Familien kommen hier folgende vor: erstlich Langrüssel mit dünnen, zweitens springende mit dicken Schenkeln, drittens Vorrüssel mit gezahnten, viertens Kurzrüssel mit ebenfalls gezahnten Schenkeln, fünftens Kurzrüssel mit glatten Schenkeln, und sechstens breitrüsselige.

Erste Familie.

Langrüsslige mit dünnen glatten Schenkeln. Es sind meistens Fabriciusische Asterrüsselkäfer und Schrankische Pfeiffenkäfer.

Minder schädliche.

1. Der himmelblaue Rüsselkäfer. *Curculio cyaneus* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blauer Rüsselkäfer und Weidenbohrer.

Curculio cyaneus, Lin. 506. 5. Müller 215. 5.

Attelabus cyaneus, Fabr. Entom. 1. 2. 397. n. 30.

Curculio cyaneus, der langschnäbelige schwarze Rüsselkäfer mit blauen Flügeldecken und dem weißen Schildchen. Gleditsch II. 63.

Attelabus cyaneus, Panzer Fn. 20. tab. 12.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig, schwarzleibig, mit glänzenden kornblumenblauen Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwey Linien lang und langrüsselig. Die dünnen Fühlhörner stehen gerade aus. Der längliche Körper ist sehr klein und unten schwarz. Kopf, Halschild und Flügeldecken sind kornblumenblau. Der Halschild hat zwey Seitenerhabenheiten. Jede Flügeldecke ist sechsstreifig. Das Schildchen ist nicht, wie Linné glaubte, weiß, sondern von der Farbe des Käfers selbst. Dies trifft mit Panzers Fauna und mit Herbsts Archiv 4. Heft, tab. 24. fig. 5. zu.

Aufenthalt und Schaden.

Er durchbohrt die jungen Triebe, vornehmlich der Weiden, auch anderer Holzarten. Man trifft diese und andere Zersplitterer junger Triebe vorzüglich bey jungem, geschlagenem Holz an. Man findet auch den Käfer auf den Pappeltrosen, *Alcea rosea*, Disteln und schwarzem Hollunder.

2. Der Kirschen-Rüsselkäfer. *Curculio cerasi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt auch: Zwetschen-Rüsselkäfer, Rüster-Rüsselkäfer, Pflaumen-Rüsselkäfer, Zwetschenmännchen.

Cur-

- Curculio Cerasi, Lin. 607. 11. Männchen, nämlich Herbsts Käfer VI. t. 64. f. 1.
 — — Pruni, Lin. 607. 12. Weibchen, nämlich Herbsts Käfer VI. t. 64. f. 2.
 — — — Fab. Entom. 1. 2. 495. n. 50.
 — — Cerasi, Fab. Entom. 1. 2. 440. n. 190. nämlich Panzeri Fn. 42. t. 9.
 — — — der schwarze, längelnäbelichte Rüsselkäfer, mit länglichen, dunkeln
 Flügeldecken. Gleditsch II. 87. und 113.
 — — — Müllers Uebersetzung 217. n. 11. u. 12.
 — — Ulmi, Schrank Fauna 487.

Kennzeichen der Art.

Der männliche Käfer ist langrüsselig, schwarz, mit rothfarbigen Fühlhörnern, und länglichen dunklern Flügeldecken, ohne Erhabenheiten des Halschildes.

Der weibliche Käfer ist eben so; nur der Halschild ist am Rand schwach und an der Wurzel stark gezähnt, nämlich mit zwei Erhöhungen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist, ohne den Rüssel ein und zwei Drittel Linien lang, und ganz schwarz, ohne Glanz. Die Fühlhörner, die mit den Kolbengelenken elf Gliederchen haben, sind etwas rothfarbig, und ihre dreigliedrigen Kölbchen länglich. Der Rüssel ist mittelmäßig. Der Halschild ist beim Männchen einfach, beim Weibchen aber theils am Rande schwach gezähnt, theils an der Wurzel stark gezähnt. Die Flügeldecken sind gestreift und die Schenkel unbewaffnet.

Es sind hier nach Schrank's Vorgang zwei Linneische Rüsselkäfer mit einander vereinigt, nämlich zu einer Art. Vielleicht ist er von dem Kirschbaum-Rüsselkäfer des Fabric. Entom. a. a. O. Cerasi, der ebenfalls langrüsselig und schwarz ist, mit gelben Fühlhörnern, einem schwarzen, an der Spitze zwengezähnten Halschild und länglich gestreiften, schwattenfarbigen Flügeldecken nicht verschieden, der gleichfalls an Kirschen und in deren Blättern wohnt. Panz. 42. t. 19. Nur weiß man nicht woher es komme, daß Fabricius seinem Käfer bewaffnete Schenkel zuerthet.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Schaden.

Der Käfer findet sich im Junius auf der Ulme, und nebst der Larve auf den Bäumen der Kirsche und der Kernobst-Arten, deren Blätter er zerstört und böse Flecken zurückläßt. In Schweden war er besonders 1750 sehr häufig.

3. Der Fichten-Rüsselkäfer. Curculio Pini, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt auch: Fichtenkäfer, Harzrüsselkäfer, zweyter Tannenrüsselkäfer.

- Curculio Pini, Linn. 608. 19. Müller 220. 19.
 — — — Fabr. Entom. 1. 2. 599. n. 21.
 — — — der Käufelkäfer des Nadelholzes. Gleditsch I. S. 402.
 — — — Zinke im besorgten Forstmann. S. 59.
 — — — Abietis Schrank. Faun. 430.
 — — — Pini, Pänzeri Fna 42. tab. 1.
 Rhynchacnus Pini, in Fabric. Systema Eleutheratorum.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig, mit nußbraunen Flügeldecken, die nebelige Binden haben.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er mißt ohne den Rüssel gewöhnlich drey Linien; doch findet man auch kleinere von zwey Linien Länge. Er unterscheidet sich durch mehrere Merkmale vom Tannen-Rüsselkäfer, z. B. daß dieser gezahnte und unserer glatte Schenkel hat. — Er ist pechfarbenröthlich oder nußbraun, von länglichtem Körper und gebrochenen Fühlhörnern. Der mit zwey Punkten bezeichnete Halschild ist nebst den Flügeldecken nußbraun. Letztere sind höckerig und jede Decke hat sechs subtile Punctirstreifen in die Länge, und anderthalbe, nicht schwefelgelbe, sondern röthlichgelbe Binden oder Makeln in die Quere, mit noch verschiedenen eben so gefärbten Puncten. Das Schildchen ist weiß. Die Schenkel sind glatt und einfach. —

Es sind oben mit Bedacht die Icones Schäfferi nicht nachgewiesen, weil man darüber nicht eins ist, ob unser Käfer das auf tab. 25. f. 7. oder fig. 1. abgebildete Insekt sey. Fabricius und Schrank sind für die erste Meinung, und Pänzer für die zweite, doch so, daß er bemerkt: er sey nicht genau getroffen.

Die Larve ist weiß mit einem braunen oder schwärzlichen Kopfe. Sie verwandelt sich im Holze, unter der Rinde, oder da, wo sie gelebt hat, in eine weiße Puppe (Nymphe), an welche alle Theile des vollkommenen Insekts zu erkennen sind.

Aufenthalt.

Den Käfer findet man im April, May, Junius und Julius, in Föhrenwäldern, an jungen Stämmen und in der Rinde, desgleichen an der Weißtanne. Er ist oft in solcher Menge da, daß der Forstmann auf ihn aufmerksam seyn muß, weil er an den Fichtenknospen und jungen Trieben großen Schaden anrichtet. Linné will ihn mit dem etwas größern Curculio abietis in Begattung angetroffen haben, welches aber Brahm im Insectencalender I. S. 30 für einen Verstoß hält.

Die Larve findet sich in alten Holzstöcken, unter der Rinde kranker Fichten, und innerhalb der Zweige alter Tannen, wo sie das Mark ausfrisst.

5. Der Eichen-Rüsselkäfer. *Curculio Quercus*, Fabr.

Namen und Schriften.

Rüsselkäfer des Eichbaums; Fabricischer Eichen-Rüsselkäfer. Dem der Linneische Eichen-Rüsselkäfer folgt hinten unter dem Namen des Koroweiden-Rüsselkäfers.

Curculio Quercus, Fabr. Ent. 1. 2. 412. n. 79. und in seiner Mantissa als *Curculio rana*.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig und aschgrau; der Halschild ist braunschwarz, die Decken bleichgelb mit schwarzgrauen Wellenbinden.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er hat die Größe eines Flohes. Sein Körper ist aschgrau, die Augen und der Rüssel schwarz; der Rücken des Halschildes ist schwarzbraun mit einer blassen Mittellinie. Die gestreiften Flügeldecken sind blasziegelfarbig, mit 4 — 5 aschgrauen Wellenbinden. Die Fühlhörner und Füße sind ziegelroth.

Aufenthalt.

Auf Eichbäumen.

5. Der Weinreben-Rüsselkäfer. *Curculio Bacchus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Carmoisinrother Weinlaubkäfer, *Bacchus-Rüsselkäfer*, Weingott, Rebensstecher, Pfeifer, Rebensächler, *Bacchus-Misterrüsselkäfer*.

Curculio Bacchus, Lin. 611. 58. Müller 226. 38.

Attelabus Bacchus, Fabr. Ent. 1. 2. 587. n. 15.

Involvulus Bacchus, Schrank's Fauna 474.

Sulzer t. 4. f. 4. — *Attelabus Bacch.* Panz. 20. t. 5.

Schäfferi Icon. t. 59. f. 18. nach Fabricius.

Schäfferi Icon. t. 57. f. 15. nach Schrank und andern Naturforschern.

Kennzeichen der Art.

Er ist langsnäbelig, rothgolden, mit schwarzem Rüssel und Fußblättern. Das Weibchen hat einen stacheligen Halschild.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist drey und eine Viertellinie lang und schwarz, feinhaarig, mit blendendrothen Flügeldecken und rothgoldenem Kopf und Halschild. Die drey äußersten Glieder der Fühlförner sind stärker als die andern, so wie das der Fall bey einigen der nächstfolgenden ist. Der schwarze Rüssel hat die Länge des Hinterleibes. Da der Halschild dieses Käfers in der Panzerschen Fauna, als mit zwey Dornen bewaffnet dargestellt wird, welches das Kennzeichen des weiblichen Geschlechtes ist: so darf man das Merkmal nicht bey dem Männchen suchen, welches überdem auch etwas kleiner ist. Bey dem Pappelrüsselkäfer ist das auch der Fall.

Das unvollkommne Insect soll unter der Vergrößerung einen straubichten Haarbüschel und zwey große schwarze Augen haben. Das Ey ist in der Größe eines Hirsekorns, und hat eine helle, vom Hellen ins Grünliche oder Gelbliche spielende Farbe. Das Weibchen rollt, um solche Eyer unterzubringen, die Weinblätter zusammen, nämlich so, daß sie aus einem Blatt drey Rollendüten oder Pfeiffen macht, und in eine jede Rolle ein einziges Ey bringt. Dieses dreyfache Rollengewinde gleicht einem Zapfen, und wird vom Landmanne in der Rheinpfalz bald ein Zapfen, bald eine Pfeiffe, und das Insect sowohl wegen dieser Pfeiffenrolle, als wegen seines in eine Pfeiffe verlängerten Rüssels, Pfeiffer genannt.

Aufenthalt.

Der Käfer hat zwey Generationen, nämlich eine im Frühjahr, die andere im Herbst und bewohnt nebst seiner Larve in manchen deutschen, zumal südlichen Gegenden die Weiden und Haseln, und leider auch den Weinstock. Man hat auch die Larve im *Carduus hae-morrhoidalis* und in den Artischocken gefunden, wo sonst noch der *Curculio Jacene* wohnt. Bey uns ist er selten.

Fortpflanzung.

Wie viel dieses Käferchen Eyer lege, weiß man zwar nicht, aber seine Vermehrung war z. B. 1756 in dem Baden-Durlachischen so groß, daß die vom Weinbau lebenden Einwohner zu Edenkoben und Rhod bloß in einer ihrer Markungen vierzehn Simmern oder sieben Malter ablasen und zusammenbrachten.

Schaden.

Als Forstinsekt, das ist, als Bewohner der Weiden und Haseln ist er weniger schädlich und fürchterlich, als in den Weinbergen. Im Frühjahr kriecht er aus der Erde, aus seinem Puppenstand, und sticht am Weinstock das keimende Auge, das alsdann verdorrt. Ist aber der Keim fingerslang gewachsen, so vermag der Käfer demselben nicht mehr zu schaden, weil ihm solcher zu hart ist. Da man bemerkt hat, daß ein Käfer an einem Tage einen ganzen Weinstock verheeren, oder für ein Jahr untragbar machen kann: so war es kein Wunder, daß vom Weinbau in oben genannten Gegenden sieben Achtel oder gar neun Zehntel

Zehntel im Jahr 1756 verloren ging. Hingegen das darauf folgende Jahr war ihre Anzahl gering.

Mittel dagegen.

Von Seiten der Regierung zu Durlach mußten, zufolge eines eignen bereits schon 1752 am 27 November aus Amt Rhod ergangenen Rescripts (weil schon zuvor das Unheil bekannt war, das dieser Käfer anrichtet) die Unterthanen mit Geldstrafe gezwungen werden, diese und zugleich die Birkenrüsselkäfer in den Weinbergen nach einer vorgeschriebenen täglichen Quantität zu sammeln, um sie hernach bey dem Rathhause zu Rhod in einem Kessel mit siedenden Wasser zu tödten.

6. Der Birken-Rüsselkäfer. *Curculio Betulae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Birkenfelder, Birkenfreund, Rüsselkäfer des Birkenbaums, Erlen Pfeiserkäfer, zweyter Nebenstecher, stahlblauer Nebenstecher.

Curculio Betulae, Lin. 611. 39. Müll. 226. 39.

Attelabus Betulati, Fab. Ent. 1. 2. 387. 16.

Involvulus Alni, Schrank Fn. 474.

Curculio Betulae, der grün und goldfarbiae langschnäbelige Rüsselkäfer der Birken und Erlen. Gleditsch 1. Theil 439. 445. II. Th. 634.

Schäfferi Icon. t. 6. f. 4. Sulzers abgekürzte Geschichte 4. f. 3.

Panzer 20. t. 6.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig, überall bläulichgoldgrün, auch auf der Unterseite. Das Weibchen hat allemal zwey Stacheln am Halschilde; zuweilen auch das Männchen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist drey, selten drey und eine halbe Linie lang. Die Ober- und Unterseite ist bläulichgoldgrün. Die Flügeldecken haben Punktreifen. Nicht bloß das Weibchen hat auf jeder Seite an dem Halschild einen vorwärts gerichteten Dorn, sondern auch oft das Männchen. Die Unterfläche ist bey Varietäten stahlblau, und dann läßt sich der Käfer nur durch die Größe von dem folgenden Pappel-Rüsselkäfer unterscheiden.

Es giebt Varietäten mit ganz blauer Farbe, in welchem Colorit sie dem zart-häarrigen Asterrüsselkäfer, *Attelabus pubescens*, ähnlich sind.

Aufenthalt und Schaden.

Im Julius als Käfer und Larve auf Birken, Erlen und Haseln, wo die Larve im und unter der Rinde zwischen Bast und Splint wohnt, und das Mark und alles zerstört. Am häufigsten wird sie dem Weinstock schädlich und tödtlich, dessen Blätter sie zusammenrollt, wie der vorhergehende.

7. Der Pappel-Rüsselkäfer. *Curculio Populi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pappelnager, Espen-Pfeisenkäfer, Zitterpappel-Asterrüsselkäfer.

Curculio Populi, Lin. 511. 40. Müller 226. 40.

Attelabus Populi, Fabr. Ent. 1. 2. 388. 17.

Involvulus Populi, Schrank Fn. 475.

Curculio Populi, der grüne langsnäbelige Rüsselkäfer mit einem meist stacheligen Bruststück. Gleditsch I. 454 und 543.

Attelabus Populi, Panz. Fn. 20. t. 7. Weibchen.

Rhinomacer populi, Entomologie Helvetique tab. 13.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig, glänzend feuerfarben grün: unten schwarzblau. Das Weibchen hat einen stacheligen Halschild.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist etwa zwey Linien lang und der Rüssel schwarz. Die Fühlhörner sind eiförmig, woran die Durchblätterkeule dreigliedrig ist. Die Flügeldecken haben Punctstreife. Das Weibchen hat vorwärts einen stacheligen Halschild. Bey der Zeichnung in der Panzerschen Fauna sind die Punctstreifen nicht stark genug ausgedrückt.

Uebrigens muß dieser Linné'sche von dem Fabricischen Pappel- oder Aspen-Rüsselkäfer, *curculio populi* Fab. Entomol. 1. 2. 448. 228. Panzeri Fn. 13. t. 17. verschieden bleiben, welcher nur eine Linie Länge hat, durchaus schwarz ist, mit Springfüßen, einem weißen Schildchen, mit zügelartigen Fühlhörnern und Füßen, auf Aspen oder Zitterpappeln wohnend.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Schaden.

Um die Mitte des May, auf der Weißbirke, Haseln, Weiden und Zitterpappeln. Das Weibchen rollt die Blätter zusammen und legt Eyer hinein.

8. Der purpurfarbne Rüsselkäfer. *Curculio aeneus*, Fabr.

Namen und Schriften.

Englischer Kupferfarbiger.

Curculio aeneus, Fabr. Ent. 1. 2. 405. 46.*Attelabus aeneus*, Fabr. Ent. 1. 2. 389. 25.*Curculio aeneus*, Göthe Entomologische Beyträge. I. 377.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist langrüsselig schwarz, mit schwarzzerfarbenen Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist klein, von ein und ein Drittel Linien Länge, ohne den Rüssel, und sein Körper schwarz. Nicht nur die Flügeldecken, wie Fabricius glaubte, sondern der ganze Käfer ist auf der Oberseite schwarz-kupferfarben. Die Schenkel sind glatt.

Fabricius hat ihn aus Versehen zweymal aufgeführt, einmal als einen Rüsselkäfer, und das anderemal als einen Asterrüsselkäfer.

Aufenthalt.

Im May und Junius auf mehreren Bäumen und Straucharten, in Deutschland und England; desgleichen auf Gartensyp.

9. Der Weißbüchen-Rüsselkäfer. *Curculio carpini*, Schrank.

Namen und Schriften.

Curculio carpini, Physikalische Aufsätze 117.

— — — Schrank Fauna Boica 487.

Er befindet sich nicht in Linnés und Fabric. Schriften.

Kennzeichen der Art und Beschreibung.

Er ist durchaus schwarz, glanzlos. Die Schenkel sind unbewehrt, und die Flügeldecken gefreht. Der Rüssel mit dem Kopf ist fast so lang, als der Körper.

Er ist von Herrn Curtis *Curcul. Carpini* in Herbsts Käserwerk verschieden, und von *Curc. Carpini* in Fab. Entomol. 1. 2. 409. n. 69., welcher langrüsselig feinbehaart und etwas grünlich ist, mit schwarzem Rüssel. Die Fühlhörner sind wie die Füße ziegelartig, und die Flügeldecken ohne Furchen und Flecken. Letzterer ist in den *Sinchi*-schen Beyträgen beschrieben und wehnt auf der Hainbuche, die man auch Hornbaum nennt.

Auf

Im September, auf den Blättern der Hainbuchen oder des Hornbaums (*Carpinus betulus*).

10. Der Erlen-Rüsselkäfer. *Curculio Alni*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Erlenhüpfer, Schwarzpunkt, Erlenblattminierkäfer.

Curculio Alni, Lin. 611. 42. Müller 227. 42.

— — — Fabr. Ent. 1. 2. 445. n. 216.

— — — der langrüsselige springende grünlichblaue Rüsselkäfer der Erle. Gleitsch 1. 445.

Salus Alni, Schrank 509.

Curculio Alni, Herbst = Jablonsky VI. t. 93. f. 3.

Kenntzeichen der Art.

Er ist langrüsselig mit Springsfüßen versehen und mit rothbraunem Halschild und Flügeldecken, welche zwey, oder zusammen vier dunkle Makeln haben.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insektes.

Er ist sehr klein. Der runde Körper ist nebst dem Halschild, Fühlhörnern, Füßen und Flügeldecken rothbraun, und nicht wie Linné schreibt, graublau, lividus, noch grünlichblau. Die vier Flecken auf den letztern sind matschwarz. Der Kopf ist ebenfalls schwarz, und bey Varietäten die ganze Unterseite des Käfers. Auch Fabricii *Curculio Alni* hat Abweichungen. Denn dessen Halschild soll eine abgekürzte schwarze Binde führen. Indessen bezieht er sich auf Linné und giebt England als das Vaterland des Käfers an.

Von der Larve kann nicht viel mehr gesagt werden, als daß sie eine Minier-Larve ist. Sie nährt sich aber auch von dem Marke der Rinde und jungen Sprossen.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Schaden.

Der Käfer findet sich in England und Deutschland auf dem Erlenbaum, und die Larve auf den Blättern derselben. Gegen das Ende des May bemerkt man an den Rändern der Erlenblätter beträchtliche Flecken, die die Herpfarbe dieser Blätter haben. Betrachtet man diese Flecke etwas genauer, so nimmt man wahr, daß sie aufgeschwollen sind, und findet bey ihrer Oefnung, daß die beyden Blattseiten getrennt sind, und die Höhlung von einer einsiedlerischen Larve bewohnt werden. Zu Ende des Junius bohrt sich, nach Herbst und Schrank's Bemerkung, der vollkommene Käfer in der Größe einer Laus durch,

durch, nachdem er alle seine Verwandlungen in der eben beschriebenen Blase durchgegangen hat. Dieser überwintert unter den trocknen Blättern der Ulmen und Erlen, und paart sich im Frühjahr.

11. Der Weiden-Rüsselkäfer. *Curculio Salicis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weidentänzer, Springkäfer auf den Sahlweiden, Bachweiden = Minierkäfer.

Curc. Salicis, Lin. 611. 43. Müller 227. 34.

— — Fabr. Ent. 1. 2. 447. 222.

— — der schwarze langschnäbelige und springende Rüsselkäfer, mit zwey weißen Binden. Gleditsch II. 63.

Salix Salicis, Schrank 510.

Curc. — Herbst VI. t. 93. fig. 2.

— — Panzer Fna. 18. t. 15.

Er muß mit *Curculio Salicis* Pilleri nicht verwechselt werden, der in Pillers und Mitterbachs Reisen vorkommt.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist langrüsselig und hat Springsüße. Die Flügeldecken sind schwarz mit zwey weißen Binden.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist eine Linie lang, etwas kugelig und tieffschwarz. Die Fühlerhörner sind gebrochen. Das Schildchen und die zwey Binden über die Flügeldecken sind weiß, die Fußblätter rothbraun. Der Halschild ist auch weiß gefleckt. Die Flügeldecken sind gegen das Ende mattschwarz, wegen kurzer, daselbst befindlicher Haare, die erdbraun sind.

Den Varietäten fehlen die zwey Binden der Flügeldecken. —

Die Larve ist ein Minierer. Herr Sturm hat in der Fauna die Fußblätter nicht rothbraun gemahlt.

Aufenthalt und Schaden.

Käfer und Larve leben auf Weidenblüthen, und die Flugzeit des erstern ist im May.

12. Der Korbweiden-Rüsselkäfer. *Curculio viminalis*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Curculio viminalis, Fabr. Ent. 1. 2. 447. n. 223.

— — *quercus*, Lin. 609. 25. Müller 222. 25.

Cur-

- Curculio quercus*, der kleine blaßgelbe und langsnäbelige Rüsselkäfer mit schwarzen Augen. Gleditsch I. 522.
 — — *viminalis*, Herbst VI. t. 93. fig. 1.
 — — *ulmi*, Degeer 5. t. 8. fig. 5.
Reaumur 3. t. 3. fig. 17, 18.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsslig und hat Springsüße; der Körper ist blaßbraunroth.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist von der Größe des vorübergehenden, oder auch wohl anderthalb Linien lang. Die Augen und der Hinterleib sind schwarz. Die sehr dicken Hinterschenkel haben feine Zähne. Die Flügeldecken sind gestreift, aber nicht gefleckt. — Fabricius meint, er könne vielleicht eine Varietät vom Erlen-Rüsselkäfer seyn.

Aufenthalt und Schaden.

Er kommt im April, und wieder im Jun. und Julius auf den Blättern verschiedener Bäume vor, und besonders der Weiden und Erlen, denen seine Minierlarve schadet. Auch in den Eichenblättern hält diese sich zwischen den Haupttrippen auf, und macht die Blätter fleckig.

13. Der Buchen-Rüsselkäfer. *Curculio Fagi*, Lin.

Namen und Schriften.

Springrüssel auf den Buchen, Buchenweider, Buchblattminierkäfer.

Curculio Fagi, Lin. 611. 44. Müller 227. 44.

— — — Fabr. Ent. 1. 2. 448. n. 226.

— — — der langsnäbelige schwarze und springende Rüsselkäfer mit braunen Oberfüßen. Gleditsch I. 476.

Salix Fagi, Schrank's Fauna Boica 508.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig und hat Springsüße, einen schwarzen Körper und bleiche Schenkel.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist von der Größe eines Flohes, und schwarz. Die Flügeldecken sind blässer, die Fühlhörner und Fußblätter röthlich. —

Die Larve gehört zu den Minierern.

Aufenthalt und Schaden.

Der Käfer lebt auf Buchen und Rothbuchen; die Larve im Zellgewebe solcher Blätter. Sie verursacht die Verdorrung der meisten Buchenblätter. Auch im August 1775 wurde man gewahr, daß in einem nahen Buchenwalde bey Eisenach alte Buchenblätter braun waren. Die braunen Flecken waren eines Kreuzers groß. Zwischen denselben war ein weißes Bälglein verborgen, das theils ein schwarzer Rüsselkäfer, mit gefurchten Decken, in der Größe eines Flohes, bewohnte, theils die Puppe desselben. Zu Ende des Augusts war alles voll von solchen Käserchen, welche anfänglich der Herr Oct. Kühn für den *Curculio carbonarius* gehalten, nachher aber für unsern Buchenrüsselkäfer, *Curculio Fagi*, mit Recht erkannte.

Dritte Familie.

Langrüsselige mit gezähnten Schenkeln.

A. Die mehr schädlichen.

14. Der Apfelmilch-Rüsselkäfer. *Curculio Pomorum*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Apfelschäler, Apfelbohrer, Apfelschinder, Obstrüsselkäfer, Kernobst-Rüsselkäfer, Krummbeinichter Rüsselkäfer.

Curculio Pomorum, Lin. 612. 46. Müller 228. 46.

— — — — Fabr. Entom. 1. 2. 444. n. 209.

— — — — langschnäbeliger, nebelgrauer Rüsselkäfer mit gezackten Schenkeln.
Gleditsch II. 88.

— — incurvus, Panz. Ent. germ. I. 312. 74.

— — humeralis, Panz. Ent. germ. I. 312. 72. Varietas.

— — incurvus, Panz. Fn. 36. t. 17.

Herbsts Käfer G. tab. 70. fig. 11.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist langrüsselig schwarz, mit gezähnten Schenkeln; aschgraubandirten Flügeldecken; die vordern Schenkel sind krumm.

Die Larve ist weißlich fleischfarben.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist eine und dreiviertel Linien lang, mit einem tiefschwarzen haarigten Kopf und gleichfarbigem, dünnen und bogenförmigem Rüssel. Die Fühlföhner sind rostgelb und ihre Keule mattschwarz. Der Halschild ist tiefschwarz mit drey silzigen dunklen Linien. Das Schildchen ist weiß. Die auf den ersten Anblick nebelgrau erscheinenden, in der That aber aus dem Mattschwarzen ins Graue fallenden Flügeldecken sind gestreift punktiert, gegen das Hinterende zu mit einer Binde von aschgrauem Filz geziert. Alle sechs Schenkel sind braun und gezähnt; doch die Vordersehenkel stärker als die übrigen. Daher auch Linné nur die Vordersehenkel für gezähnt erklärt. Die Schienbeine der Vorderfüße sind krumm. Der Körper ist auf der Unterseite tiefschwarz.

Die Varietäten haben a) bald einen rothen Punkt an der Wurzel jeder Flügeldecke, bald nicht. b) Bald ist der Raum hinter der Binde bis zum Ende der Decken grau, bald schwarz. c) Bald ist der Körper unten rothbraun, bald schwarz.

Die Larve ist weißlich fleischfarben.

Aufenthalt und Schaden.

Auf den Apfelblüthen und überhaupt auf den Kernobstbäumen, deren Blüthe und junge Früchte die Larve verwüftet, und oft die ganze Obsterndre schwächt oder gar vernichtet.

B. Weniger schädliche.

15. Der Tannen-Rüsselkäfer. *Curculio Abietis*, L. n.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Er heißt: Tannenkäfer, zweyter Fichtenrüsselkäfer.

Curculio Abietis, L. n. 615. 57. Müller 231. 57.

— — — Fabr. Ent. 1. 2. 428. 144. et *Rhynchaenus Abietis* F. in Syst. Eleutheratorum.

— — — besorgter Forstmann S. 60.

— — — Schrank Fauna 480. sonst in seinen frühern Schriften Pini.

— — — Panzeri Fauna 42. t. 14.

Schäfferi Icon. 25. f. 7. Er muß, weil er gezähnte Schenkel hat, von dem, ihm ähnlichen *Curculio fuscomaculatus* unterschieden werden; wiewohl Schrank auch zahnlöse unter den letztern gefunden hat.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig mit gezähnten Schenkeln und mattschwarzen Flügeldecken, die zwey weiße Linienförmige, unterbrochene Binden haben.

Beschreibung des vollkommenen Insektes.

Er gehört zu den größern, und ist vom Kopf bis zum Hinterende ohne den Rüssel einen halben Zoll lang. Seine Rühlhörner sind gebrochen, der Körper länglich und etwas schwarz. Die Flügeldecken sind punktschraffirt und mischbraun mit wellenförmigen, gelblichen Binden, die man auch bindenartige Flecken nennen kann. Auf dem Halschild sowohl als den Flügeldecken stehen gelbgraue Härchen, die das Insekt von weißen Punkten haben. Die Füße haben sämmtlich gezähnte Schenkel.

Aufenthalt und Schaden.

Im April in den Rinden und Harzknospen des Kieferhelles, auch der Rothtannen (Fichten) und Edeltannen. Auch kriecht er gerne an den Hauswänden.

16. Der braungefleckte Rüsselkäfer. *Curculio fuscomaculatus* Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Deutscher Rüsselkäfer, größerer und linneischer Deutscher Rüsselkäfer, Gelbpunkt, gelbpunktirter Rüsselkäfer.

Curculio fuscomaculatus, Fabr. Ent. 1. 2. 484. n. 576. et Schrank.

— — germanus, Lin. 615. 58. Müller 231. 58.

Schäffer Icon. 101. fig. 6. Herbst's Käf. 6. t. 87. fig. 2. Besonders Zuzers Insek. Gesch. tab. 4. fig. 8.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig, mit gezähnten Schenkeln und schwarz. Der Halschild ist auf beiden Seiten mit zwei goldfarbenen Punkten bezeichnet, und die Decken sind glatt und braungefleckt.

Beschreibung des vollkommenen Insektes.

Er ist ohne den Rüssel einen halben Zoll lang, und also nebst dem vorhergehenden der größte hiesländische; flügellos und satt schwarz, mit goldfarbenen Flecken und Punkten bezeichnet, deren Anzahl unbeständig ist. Denn sie bestehen aus feinen Schüppchen, oder vielmehr goldgelben, parthienweisliegenden Härchen, die sich abreiben. Der Halschild hat auch einzelne dergleichen Härchen, die aber nicht so truppweise stehen, daß sie zwei Punkte formiren. Vielmehr sieht man, wenn man ihn genau betrachtet, daß eine sehr schmale gelbe Mittel-Längelinie über den Halschild sich zieht. Außerdem haben die Flügeldecken sehr viele Punktreihen die Länge hinab, deren Punkte alle hohl und viereckig sind. Die Füße sind schwarz.

Es geschieht zuweilen, daß man ihn mit dem sogenannten deutschen Rüsselkäfer des Fabricius verwechselt, und ihn für eine Varietät desselben hält.

Aufenthalt.

Im Junius auf Haselstauden und Erlen, in hiesigen und andern deutschen Gegenden.

Von diesem großen deutschen oder braungefleckten Rüsselkäfer schreibt Doktor Schiller in Reichs-Anzeiger 1802. S. 3465. n. 275, daß er ein um so schädlicherer Obstverwüster sey, weil er bloß in der Blüthe seine Nahrung suche, und allegirt Sulzers Kennzeichen tab. 5. fig. 23. 24. wo doch zwey andere, nämlich der Birn- und der grüne Rüsselkäfer vorgestellt sind. Auch setzt er zum *Curculio Bacchus* als synonym oder gleichbedeutend: *Curculio viridis*, und hält weiterhin die *Geometra brumata* für einerley mit der *Phalena Tinea Padella* Lin. welches lauter Unrichtigkeiten sind.

17. Der deutsche Rüsselkäfer. *Curculio germanus*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleiner deutscher Rüsselkäfer, Kleiner Gelbpunkt, Fabricischer deutscher Rüsselkäfer.

Curculio germanus, Fabr. Ent. 1. 2. 433. n. 166.

— — — — Herbsts Käfer VI. tab. 63. fig. 1.

— — — — Panzeri Fna, 42. tab. tab. 16.

Schäfferi Icones t. 25. f. 2. 5. Statt der Abbildung führt Herr Fabricius Schäff. Icon. 62. fig. 9. und t. 101. fig. 6. an.

Kennzeichen der Art und Beschreibung.

Alles, was von dem vorhergehenden braungefleckten gesagt worden, paßt auch aufs genaueste auf diesen. Allein in der Größe unterscheiden sich beyde. Der Gegenwärtige ist um anderthalb bis zwey Linien kleiner, und zugleich der *Curc. germ. Fab.*, der vorhergehende größere aber ist, nach Herrn Professors Hellwig zu Braunschweig Versicherung, der wahre *Curc. germanus* Linnei.

Aufenthalt.

Er findet sich in Gärten, altem Mauerwerk, an sonnlichten Orten in Oesterreich, in den Gegenden von Mainz und Darmstadt und mehreren Gegenden; da hingegen der größere dorten sich selten er macht.

18. Der Haselnuß-Rüsselkäfer *Curculio nucum*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Nuß-Rüsselkäfer, Nußbohrer, Haselnußkäfer.

Curculio nucum, Lin. 673. 59. Müller 232. 59.

— — — — Fab. Ent. 1. 2. 440. n. 192. et Fab. Rhynchaenus nucum in Syst. Eleutheratorum.

— — — — der Haselnußkäfer, der graue langschnäbelige Rüsselkäfer. Gleditsch I. 451. u. 455.

Rösel III. tab. 67. f. 1 — 6. nebst Larve.

Curcul. nucum, Panz. 42. t. 21.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist langrüsselig, mit gezähnten Schenkeln und grauem Körper, von der Länge des Rüssels.

Die Larve ist dick, plump, weiß, rothköpfig und ohne Füße.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Ueber drei Linien lang, ohne den Rüssel. Der Kopf, Körper und Decken sind eigentlich schwarz, gelbgrün behaart. Der Hinterleib ist etwas dreieckig und hinten gleichsam zugespitzt. Der Halschild ist convex und ziemlich groß, der Rüssel fadenförmig und fein, zwei Linien lang. Die feingebrochenen oder bogenförmigen Fühlerhörner sind länger als der Rüssel, ja so lang als der ganze Körper. Weil dieß eyrunde Käferchen grünbehaart ist, so gibt ihm dieß das Ansehen, als wenn es schwarzgrau oder kastanienbraun wäre. Die Fühlerhörner und der Rüssel sind dunkelbraunröthlich, die Füße gelblichroth, und die Schenkel einzählicht.

Der schmutzigweißen Larve giebt Rösel in der Abbildung fünf Linien Länge im ausgewachsenen Stand. Sie hat einen kleinen glänzenden, nicht sowohl braungelben als vielmehr braunrothen Kopf mit zwei rothen Punkten am darauf folgenden Glied. Rösel irrt aber, wenn er ihr im Text unmerkliche Füße beilegt: vielmehr bewegt sich diese Larve wurmförmig fort, und ist im September ganz erwachsen. An ihrer Puppe zeigen sich alle Theile des Käfers, und sie ist hellocker gelb.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Schaden.

Der Käfer befindet sich zuweilen in unsern Wohnungen, besonders aber auf Haseln im Aug. st, wo dann das Weibchen mit seinem Rüssel in die noch unreifen Haselnüsse ein Loch bohrt, und ein Ei hineinlegt, aus dem nach vierzehn Tagen die Larve sich entwickelt. Diese nährt sich also von dem Kern, und hat sie ihre Größe erreicht, so bohrt sie ein rundes Loch in die Schale, um heraus und in die Erde zu kriechen, worin sie aber noch den Winter

ter

ter hindurch im Larvenstande bleibt, und erst im Frühling, nämlich im Junius in eine Puppe sich verwandelt. — Es giebt jährlich nur Eine Generation.

In derjenigen Edition des Rüssel'schen Werks die der selige Kleemann mit Anmerkungen bereichert hat, findet es dieser in einer Anmerkung zu Rüssel III. S. 389. unten wahrscheinlich, daß die Larve statt Rüsse auch wohl unraife Eichen wähle.

19. Der Traubenkirschen-Rüsselkäfer. *Curculio druparum*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kernbohrer, Rothschnabel, Bayrischer Rüsselkäfer.

Curculio druparum, Lin. 614. 62. Müller 233. 62.

— — — — — Fabr. Ent. 1. 2. 443. n. 205.

— — — — — bavarus, Schrank Fauna I. 483.

Schäfferi Icon. t. I. fig. 11. a. b.

Rhynchaenus duparum in Fab. Systema Eleutheratorum,

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig, mit gezähnten Schenkeln, röthlichen Flügeldecken, die gelb und fuchsroth bandirt sind, aber von matter Farbe,

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist ohne den Rüssel, zwei Linien lang, und von Farbe gelblich. Der Rüssel ist roth. Die Fühlhörner sind gebrochen. Der Halschild ist kugelförmig. Die Flügeldecken sind mit Punktsrichen, hinter der Hüfte aber mit einer braunrothen Binde bezeichnet, die gelblich und rothgewürfelt scheint. Die Schenkel sind gezähnt.

Aufenthalt.

In den Kernen von der Traubenkirsche, *Prunus Padus* Lin.

20. Der violette Rüsselkäfer. *Curculio violaceus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Violetter Fichten-Rüsselkäfer, Kienbohrer, veilblauer Rüsselkäfer.

Curculio violaceus, Lin. 614. 63. Müller 233. 63.

— — — — — Fabr. Ent. 1. 2. 449. n. 191.

— — — — — Forsmann S. 61.

— — — — — violascens, Schrank Fauna 484.

— — — — — violaceus, Panz. Fn. 42. t. 20.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig mit gezähnten Schenkeln, ganz schwarzviolet, glanzlos und gestreift.

Beschreibung des vollkommen und unvollkommen Insekts.

Die Länge beträgt ohne den Rüssel nur zwei Linien. Der Körper ist länglich und schwarzblau, auf beiden Seiten oder Flächen ohne Glanz. Die gebrochenen Fühlhörner sind schwarz, die Flügeldecken stahlblau. Denn sie fallen aus dem Blauen ins Violette, und haben Punktstriche in vielen Reihen.

Ich weiß nicht, wie es kommt, daß ihn Schrank mit ungezähnten Schenkeln beschreibt, da er doch des Herrn von Licharring *Curculio violaceus* allegirt, welches ebenfalls der unsrige ist.

Aufenthalt und Schaden.

Der Käfer lebt im May auf Weißdorn und Tichten, desgleichen auf Weinstöcken. Zinke rechnet ihn im besorgten Forstmann unter die schädlichen auf den Nadelbäumen.

Er sagt: Das Weibchen durchbohrt die Knospen der jungen Kiefern, frisst sie aus und legt seine Eier in dieselben, und so sind einige Paare schon hinreichend einen ganzen Kienbaum zu verderben. Seine Made nagt sich von der Knospe an, durch die Zweige in das Mark, und wenn sie sich vier bis sechs Zoll tief eingestossen hat, schickt sie sich zur Verwandlung an. Ihre Farbe ist milchweiß, der Kopf braun, wird fünf Linien lang, und ein und eine halbe Linie dick. Käfer und Made habe ich im October gefunden. Man erkennt seine Gegenwart, wenn der Baum im Frühjahr keine neuen Triebe macht, die Nadeln gelbgrün und endlich dürr werden. Untersucht man die Nester etwas genauer, so findet man vorzüglich um den Quirl etwas Harz und innerhalb des Astes ein völlig zerstörtes Mark nebst Käfer und Maden. — Sobald sich diese Kennzeichen an einem Baume finden, mag dieser vor angehender Frühlingwärme umgehauen, und die Nester verbrannt werden: vernachlässigt man dies, so werden in der Folge mehrere Bäume von diesem Insekto angefallen und verdorben x).

21. Der Dreh-Rüsselkäfer. *Curculio Tortrix*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Curculio tortrix, Lin. 615. 67. Müller 234. 67.

— — — Fabr. Ent. 1. 2. 444. 211.

Cur

x) Wir kommt es vor, als wenn hier die Oekonomie von dem Tichten-Borkenkäfer beschrieben würde. Entweder hat sich Herr

Zinke geirret, oder dieser Rüsselkäfer hat die nämlichen Eigenschaften.

Curculio tortrix, Schrank Fn. 506.

— — — Panzeri Fn. 18. t. 14.

— — — Entomologie Helvetique 1. t. 9.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig, mit gezähnten Schenkeln, ziegelfarbenem Leib und mattschwarzer Brust.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist zwei und eine halbe Linie lang, durchaus gelbziegelfarben, hat gebrochene Fühlhörner mit elf Gliedern, die drei Glieder der Kolbe mitgerechnet. Das Glied an der Wurzel ist außerordentlich lang. Ferner hat er schwarze Augen, punktförmige Flügeldecken und einen unordentlich-dichtpunktierten Halschild. Die Vorderschenkel allein sind gezähnt. Der Zahn ist aber sehr stark. Unten ist er etwas behaart, und hat eine schwarze Brust. Herr Schrank giebt die Farbe als braunroth an, vielleicht ist es eine Varietät. Das Weibchen ist größer als das Männchen.

Aufenthalt.

Im Junius auf Aepfen, deren Blätter die Larve zusammendreht, nach der Weise der Wicklerphalänen.

22 Der Ampfer-Rüsselkäfer. *Curculio lapathi*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weißstiriger Rüsselkäfer, Sauermaul, Grindwurz-Rüsselkäfer.

Curculio lapathi, Fabr. Ent. 1. 2. 429. n. 149. et Rhynchaenus lapathii in Systema Eleuth.

— — — Lin. 608. 20? Müller 220. 20.

— — — Herbsts Käfer 6. t. 70. f. 6.

— — — Panzer Fn. 42. t. 15.

Kennzeichen der Art.

Er ist langrüsselig mit zweifach gezähnten Schenkeln, schwarz und weißbunt gezeichnet; der Halschild und die Decken sind ziemlich flachlich.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist schwarzbraun. Der Kopf ist bunt aus schwarz und weiß, mit einem krummen schwarzen Rüssel. Die Fühlhörner sind gebrochen. Der Halschild ist oben mattschwarz

schwarz mit fünf Stacheln oder Erhabenheiten, die an der Seite weiß sind. Die Flügeldecken sind bunt aus braun und weiß und stachelig, dann gegen die Spitze hin weiß. Der Hinterleib ist schwarz. Alle Schenkel sind weiß mit zwei Zähnen. Die Degeerschen und Linneischen Exemplare waren glattschenklig. Daher Fabricius ungewiß ist, ob solche mit der seinigen eine Art ausmachen.

Aufenthalt und Schaden.

Im May und September, im Holz der Weidenstämme, besonders der jungen, wo er nach Herrn Curtis Wahrnehmung schadet. Auch auf der Grundwurz, Lappathum L. Wenn er gehascht wird, so giebt er einen schwirrenden Ton, gleich dem Bockkäfer von sich.

Vierte Familie.

Kurzrüsselige mit gezähnten Schenkeln.

Die weniger schädlichen.

23. Der Birn-Rüsselkäfer. *Curculio Pyri*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Birnkäfer, Erzbrauner Rüsselkäfer, Kupferfarbener Rüsselkäfer.

Curculio Pyri, Lin. 615. 72. Müller 235. 72.

— — — Fabr. Entom. 1. 2. 487. n. 390.

— — — dunkelgrüner Blattkäfer des Birnbaums. Gleditsch II. 87.

— — — Herbst's Käfer. VI. t. 79. f. 2.

Schäfferi Icon. 2. fig. 11.

Kenntzeichen der Art.

Er ist kurzrüsselig mit gezähnten Schenkeln, von Farbe erzbraun.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist ohne den Rüssel drey und ein Drittel Linie lang, und schwarz, hat aber bald schwarze, bald rothe Fühlhörner. Die rothbraunen Flügeldecken sind oben mit rothgelben, unten mit silbergrauen Schüppchen bedeckt, vermittelt deren er bald grünlich, bald röthlich schimmert. Diese Flügeldecken haben Punktstreife. Die Schüppchen wischen sich

leicht ab. Alsdenn vergeht der Metallglanz, und es erscheint eine tiefschwarze Farbe. Der Rüssel ist kürzer als der Halschild. Die Füße sind bald rothbraun, bald schwarz, bald gezähnt, bald ungezähnt. Er variiert also sehr.

Aufenthalt und Schaden.

Der Käfer wohnt auf den Blüthen der Pflaumen und anderer Obstbäume, auch auf Weiden im May, und die Larve in den Birnblättern. Man traut diesem Insekt nichts Gutes zu.

24. Der silbergrüne Rüsselkäfer. *Curculio argentatus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Silberkäfer, Silber-Rüsselkäfer, Fühlspizenkäfer, Versilberter Rüsselkäfer.

Curculio argentatus, Lin. 615. 73. Müller 236. 73.

— — — — — Fabr. Ent. 1. 2. 489. n. 398.

Sulzers Geschichte t. 4. f. 9.

Kennzeichen der Art.

Er ist kurzrüsselig mit gezähnten Schenkeln und grün versilbertem Körper.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist von verschiedener Größe. Ich habe ihn von zwey und einer halben und drey Linien gefunden. Der Körper ist länglich und mit grüngoldenen Schüppchen besetzt. Die gebrochenen Fühlhörner und Füße sind roth, bey Varietäten aber theils grün, theils schwarz. Die Flügeldecken sind einfarbig mit Längsfurchen.

Aufenthalt.

Im May und Junius, bey nahe auf allen Garten- und Waldbäumen, besonders auf Obstbäumen, Eichen, Erlen, Birken, Ulmen, desgleichen auf Nesseln sehr gemein. Bey Maynz traf ihn Brahm nicht so häufig an. Daher ich vermuthe, daß sein silbergrüner ein anderer sey, als der unsrige, und daß er den unsrigen, Insekten-Kalender 1. S. 180. n. 371. unter seinem berggrünen, *viride-aeris* Laicharting verstehe, von dem er sagt, daß er häufig dorten auf Eichen, Rüstern (Ulmen) und Wallnuß vorkomme. Vielleicht gehören beyde als Varietäten einander an.

25. Der Specht-Rüsselkäfer. *Curculio Picus*, Fab.

Namen und Schriften.

Curculio Picus, Fabr. Ent. 1. 2. 490. n. 404.

Kennzeichen der Art.

Der Rüssel ist kurz, die Schenkel gezähnt, der Körper schwarz, und die Flügeldecken weißgefleckt.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er gehört zu den kleinern. Die ziegelrothen Fühlhörner haben eine schwarzbraune Kolbe. Der Halschild ist abgerundet und schwarz, mit einer weißen Randlinie an den Seiten. Die Flügeldecken sind kappenförmig gestreift, mit einem oder zwei Punkten an der Wurzel, dreien in der Mitte und einigen, die an dem Hinterende in die Quere stehen. Die Füße sind schwarz.

Aufenthalt.

Auf den Birken in Deutschland, nach Fabricius und Schmidt.

Fünfte Familie.

Kurzrüßelige mit glatten Schenkeln.

Weniger schädliche.

26. Der grüne Rüsselkäfer. *Curculio viridis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Mattgrüner Rüsselkäfer, grünlicher Rüsselkäfer.

Curculio viridis, Lin. 616. 76. Müller 236. 76.

— — — Fabr. Ent. 1. 2. 454. n. 254.

Schafferi Icon. 55. fig. 6. — Sulzer's Kennzeichen t. 3. fig. 24.

Kennzeichen der Art.

Er ist kurzrüßelig, mit unbewaffneten Schenkeln, ganz grün, und an den Seiten des Halschildes und der Flügeldecken gelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist noch einmal so groß als der silbergrüne, nämlich vier und drey Viertel Linien lang mit dem Rüssel, und durchaus grün, aber ohne Glanz, und auf der Unterfläche etwas gelb. Seine Hauptfarbe ist ein schönes Grün, das ein wenig ins Graue fällt. Der breite Saum des Aussenrandes des Halschildes und der Decken ist grünlichgelb. Fühlhörner und Füße sind schwarz.

Aufenthalt.

Im May und Junius auf Weiden, Erlen, Eichen, Nesseln, Disteln.

27. Der bestäubte Rüsselkäfer. *Curculio incanus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Stumpfsdecke, Stumpfsdeckel, grauer Rüsselkäfer.

Curculio incanus, Lin. 616. 81. Müller 237. 81.

— — — Fabr. Ent. 1. 2. 461. n. 281.

— — — Forstmann 62.

— — — Panzeri Fn. 19. t. 8.

— — — Archiv der Insekt. t. 24. f. 24.

Kennzeichen der Art.

Er ist kurzrüsselig, mattschwarz und länglich, mit ebenem Halschild.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist vier Linien lang, länglich, bräunlichtgrau mit glänzenden, weißlichen oder grauen Schüppchen belegt. Die langen, gebrochenen Fühlhörner sind rötlich, der Halschild eben und die Flügeldecken schwachgestreift. Die Flügel fehlen, und die Schenkel sind unbewaffnet. Er ändert nicht selten mit schwarzen Flügeldecken ab.

Aufenthalt und Schaden.

In Fichtenwäldern im May, nach dem Linneischen System und nach Herbst, und unter den Haufen der kleinen Käsen-Ameisen, nach Wrahm. Nach Zink hält sich seine Made oder Larve unter der Rinde und an den Wurzeln kranker Tannen, Fichten und Kiefern auf; auch der Käfer ist im Frühjahr da zu finden.

28. Der Aurora-Rüsselkäfer. *Curculio aurora* Schneideri.

Namen und Schriften.

<i>Curculio aurora</i> ,	Momentator entomologicus S. 14.
— — —	Brahm's Insektenkalender I. 59. 194.
— — —	Walther's Lehrbuch II. 541.

Kennzeichen der Art.

Er ist kurzrüsselig und hellbraun, mit starkpunktirtem Halschild und punktstreifigen Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist kurzrüsselig, mit unbewaffneten Schenkeln, und hat ganz die Gestalt vom *Curculio coryli* (nicht von *Attelabus coryli*), ist aber um vieles kleiner. Die Grundfarbe ist durchgängig ein helles Braun, welches durch graue Härchen, die bey frischen Exemplaren etwas röthlich schielen, gedeckt werden. Der Halschild ist stark punktirt, und die Flügeldecken haben sechs punktirte Streifen.

Aufenthalt.

An den Knospen der Föhrenbäume, im April. Er zerstört sie.

29. Der rothsfüßige Rüsselkäfer. *Curculio rufipes*, Lin.

Namen und Schriften.

Rothfuß, pechfüßiger Rüsselkäfer.

<i>Curculio rufipes</i> ,	Lin. 617. 83. Müller 238. 83.
— — —	Forstmann S. 62.
— — —	testipes, Schrank Fauna 495.
	Er fehlt im Fabric. ganz.

Kennzeichen der Art.

Er ist kurzrüsselig, aschgrau, länglich, mit rothen Füßen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist schwarz. Der Halschild ist erhaben punktirt. Die mattschwarzen Flügeldecken haben Punktstriche. Fühlhörner und Füße sind gelbroth.

Schrank fand an diesem Käfer die Schenkel gezähnt. Sollte dies Grund haben, so gehörte er in die dritte Familie,

Aufenthalt.

Herr Doktor Zinke im besorgten Forstmann beobachtete ihn auf Fichten und Kiefern, wo er ziemlich gemein fenn, sich von Harzsafft nähren und die jungen Knospen zerstöhren soll. Larve und Puppe findet man in dem Marke halb verdorrter Zweige unter der Rinde und an den Wurzeln kranker Bäume, auch bisweilen mitten im faulen Holze.

30. Der nebelgraue Rüsselkäfer. *Curculio nebulosus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wolkendecke, nebelfarbiger Rüsselkäfer.

Curculio nebulosus, Lin. 617. 84. Müller 238. 84.

— — — — Fabr. Ent. 1. 2. 457. n. 265.

— — — — der kurzschnäbelige, nebelgraue Rüsselkäfer, mit schwarzen und schrägestreiften Flügeldecken. Gleditsch II. 229.

Schäfferi Icon. 25. fig. 3.

Kennzeichen der Art.

Er ist kurzrüsselig, weißgrau, mit schiefen schwarzen Binden auf den Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist vier und eine halbe Linie lang, länglich, schwarz- und weißbunt. Der Rüssel ist eben und schneidig, von der Länge des Halschildes. Die Fühlhörner sind gebrochen. Die Flügeldecken sind weiß mit gewölbter schwarzer Binde. Die Schenkel sind unbewaffnet.

Die Larve spinnet sich auf den glatten Blättern in ein zartes gelbes Halbkügelchen.

Aufenthalt.

Auf Hartriegel, Faulbaum und andern wilden Baumarten an Wiesen und Hecken.

31. Der Haseln-Rüsselkäfer. *Curculio coryli*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Curculio coryli, Fabr. Ent. 1. 2. 466. n. 301.

— — — — Panzer Fn. 29. t. 12.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Er ist kurzrüsselig, grau und braunschreckig. Die Flügeldecken haben bis zur Hälfte eine schwarze Nath.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Die Länge ist eine und drey Viertel Linien, und der Rüssel an der Spitze schwarz. Der Halschild und die Flügeldecken sind unbehaart, aschgrau und mit Braun gemischt. Auch sind letztere gestreift und gewölbt, und haben von der Wurzel an bis zur Mitte oder Hälfte eine schwarze Nath. Die Fühlhörner und Füße sind wie die Flügeldecken gefärbt, und die Augen schwarz. Er darf nicht mit dem Haselnußkäfer, *B. nucum*, vermischt werden.

Aufenthalt.

Fabricius giebt zwar England als das Vaterland dieses Insekts an; allein wir treffen es auch bey uns auf der Haselstaude an, und Herr von Clairville fand's auch in der Schweiz.

Sechste Familie.

Mit breitgedrücktem Rüssel. Sie sind wenigstens mit den Rüsselkäfern verwandt, und Fabricius'sche Bürstenkäfer.

Weniger schädliche.

32. Der weißstirnige Rüsselkäfer. *Curculio albinus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weißstirne, weißgestirnter Rüssel- oder Bürstenkäfer, weißköpfiger Bürstenkäfer.

Curculio albinus, Lin. 616. 79. Müller 237. 79.

Anthrribus albinus, Fabr. Ent. 1. 2. 375. n. 1. war in dessen frühern Schriften ein *Curculio*.

— — — Panzers Taschenbuch von 1795. Seite 292.

— — — Panzer Fn. 3. t. 16.

Curculio albinus, Knochs Beyträge 1. t. 6.

Kennzeichen der Art.

Er ist kurzrüßelig, schwarz, weiß aber von Stirne und After, mit gerunzeltem oder gehöckertem Halschild,

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist ohne den Rüßel vier und eine halbe bis fünf, und jede Decke besonders drey Linien lang. Das Männchen ist etwas kleiner. Die drey ersten Glieder der langen, geraden, neungliedrigen Fühlhörner sind größer als die übrigen y . Der Körper ist länglich und schwarz. Der Rüßel ist fast so breit als lang, allemal auf der Oberfläche des Körpers perpendicular. Der Halschild ist ziemlich eysförmig, aber niedergedrückt und runzelich. Diese unordentlich stehenden Runzeln werden von dem Schweden $Uddman$ n, als drey Stacheln angegeben. Die Flügeldecken haben Punktreihen in die Länge, und sind etwas faltig. Außerdem haben sie zwey hervorspringende Kiele, wovon der innere merklich ist. Dieser Kiel zählt $Uddman$ auf jeder Decke drey, und nennt sie auch Stacheln. Alle diese Theile sind von schwarzbrauner Farbe. Aber das Insekt ist mit einer Art Filz bedeckt, welcher an der Spitze der Flügeldecken, so wie an dem Rüßel, an den Füßen und an einigen andern Stellen sehr schöne weiße Zeichnungen bildet. Durch die Abnutzung des Filzes fallen die Zeichnungen etwas anders aus. Da findet man Varietäten, die oben mausegrau und unten weiß sind. Die Panzersche Zeichnung ist auch eine dergleichen.

Aufenthalt.

In den Stöcken der Nadelbäume, im nördlichen und südlichen Deutschland, wo er am leichtesten gefunden wird, wenn man frische Schläge im vollen Sonnenscheine besucht, da man den Käser auf dem weißen Schnitt der Stöcke herumkriechen sieht.

33. Der breitrüßelige Rüßel- oder Bürstenkäfer. Anthribus latirostris, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Anthribus latirostris, Fab. Ent. 1. 2. 376. t. 2. In seinen frühern Schriften ein Curculio.

— — — — — Panzeri Fn. 15. t. 12.

Silpha oblonga, Sulzeri Geschichte. 2. t. 17.

Platyrhinus costirostris, Entomologie Helvetique 1798. I. tab. 14.

Kenn-

y) Nur die Fühlhörner des Männchens, welche so lang als der Körper sind, färben sich an der Spitze des 3. 4. 5. 6. 7. Gliedes weiß. Das 8. und 9. Glied ist ganz weiß,

die letzten sind schwarz. Von dem Weibchen sind die Fühlhörner kürzer und schwarz, das 9. Glied ausgenommen, das weiß ist.

Kennzeichen der Art.

Der kurze Rüssel ist sehr breit; die Flügeldecken sind an der Spitze weiß, mit zwei schwarzen Punkten.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er hat die Gestalt des weißstirnigen Rüsselkäfers, ist aber größer, sechs und eine halbe Linie lang. Der Körper ist schwarz. Die Fühlhörner haben elf Gelenke, wenn die drei letzten eine durchwachsene Kolbe vorstellen. Sie sind weißgeringelt. Der sehr breite Rüssel ist eben, weiß, und nur an der Spitze am After, wie auch mit zwei schwarzen Punkten geziert. Die Füße sind schwarz und weiß geringelt. Der Hinterleib ist nach unten weiß und an den Seiten schwarz. Meine (Scharfenbergs) Exemplare wechseln mit weißer und mit schwarzer Stirne. Er ändert noch ab: 1) mit ganz schwarzen Flügeldecken, 2) mit an der Spitze weißen Flügeldecken und ganz schwarzem Rüssel, und 3) mit weißem Rüssel und an der Spitze weißen Flügeldecken.

Aufenthalt.

Auf den modernden Stämmen der Erle, Buche, Eiche etc. nicht häufig.

34. Der weißrüsselige Rüssel- oder Bürstenkäfer. Anthribus albirostris. Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Anthribus albirostris. Fab. 1. 2. 5-6. 7. In seinen frühern Schriften, 4. B. der Mantissa, ein Curculio.
 — — — — Panz. Fauna 15. t. 15.
 — — — — Herbsts Archiv 1. 24. f. 26.

Kennzeichen der Art.

Der Rüssel ist sehr breit, flach und kurz; Halschild und Flügeldecken sind schwarz, letzter aber am Hinterende bunt,

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist nur zwei und eine Drittel Linie lang und schön von Ansehen. Er hat das mit dem vorhergehenden und überhaupt mit allen Bürstenkäfern, Anthribus Fab., gemein, daß seine elfgliedrigen Fühlhörner perlenschnurförmig und am Ende dicker sind, und daß sein Rüssel etwas breitgedrückt ist. Auch hat er wie seine Kammeraden zwei Fußblätter vor den Krallen. Seine Stirne ist weiß, die Fühlhörner, Kopf, Halschild und bey weitem der größte Theil der Flügeldecken sind schwarz; der hintere Theil derselben ist bunt

aus Schwarz und Weiß. Die schwarzen Füße sind an den Schienbeinen und Fußblättern bunt geringelt.

Aufenthalt.

Auf Birken und jungen Weidenstämmen.

35. Der flachrüsselige Rüssel- oder Bürstenkäfer. *Anthribus planirostris* Panzeri.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Anthribus planirostris, Panzeri Fn. 15. t. 14. welcher von *Curculio planirostris*, Panz. 18. t. 18. gänzlich verschieden ist.

Kennzeichen der Art.

Er ist schmalleibig, klein; der Rüssel kurz und breit; Kopf, Halschild und Flügeldecken schmutziggelblich, die Stirn und Füße gelb.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist auch von dem flachrüsseligen Bürstenkäfer, *Anthribus planirostris*, Fab. verschieden, obgleich Panzer beide, seinen und den Fabricius'schen, der auf Kaspianien wohnt, vereinigt. Seine Länge beträgt nicht mehr als ein und eine halbe Linie. Die schmutziggelbe Farbe nimmt den Kopf, Halschild und Flügeldecken, nur nicht die Stirne und Füße ein, welche blaßgelb sind. Die Fühlhörner haben elf Glieder, wovon die drei vordersten wahre Kolben sind. Die Flügeldecken dieses schmalleibigen Insekts haben jede fünf Reihen, beide zusammen zehn, von außerordentlich feinen Punkten.

Aufenthalt.

Auf Weiden und Birken, sehr selten, desgleichen auf Erlen.

Neunte Gattung.

Die Asterrüsselkäfer. *Attelabi*, Lin.

Sie heißen auch: Vasterrüsselkäfer, Schildkrotkäfer, Heuschreckenkäfer.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Der Kopf ist hinten verdünnt und niedergebogen. Die Fühlhörner werden gegen die Spitze dicker.

Die Larven haben einen schwarzen, mit Kinnbacken versehenen Kopf, und leben theils vom Raube, theils von Blättern.

Die Kennzeichen der hierher gehörigen Fabricius'schen Gattungen sind: Der Waldkäfer 93. Spondylis: die vier Fressspitzen sind etwas fadenförmig. Die Kinnlade ist kegelförmig, dick und ganz. Die Lippe ist hornicht und gespalten. Die Fühlhörner sind bandelförmig.

Der Asterrüsselkäfer, *Attelabus*, Fabr. ist schon oben bey der Gattung der Rüsselkäfer vorgekommen. Die äußern Gattungskennzeichen vom Waldkäfer hat Fabricius nicht angegeben, weil man davon nur eine Art kennt.

Es giebt Linne'sche Asterrüsselkäfer a) mit gespaltener innerer Kinnlade, und b) mit einer solchen, die einmal gezahnt ist.

Erste Familie.

Asterrüsselkäfer mit gespaltener innerer Kinnlade.

Minder schädliche.

1. Der Hasel-Asterrüsselkäfer. *Attelabus Coryli*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kellendreher, Nollenwickler, Haselstauden-Asterrüsselkäfer.

Attelabus coryli, Lin. 619. 1. Müller 243. 1. tab. 4. fig. 13.

— — — Fabr. 1. 2. 384. n. 1.

— — — schwarzer Asterrüsselkäfer mit rothen Flügeldecken und langem Hinterkopf. Gleditsch I. 454.

— — — Entomologie Helvetique I. tab. 15.

Sulzers Geschichte t. 4. f. 12. Vach Fabric. fig. 1.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz; Halschild, Flügeldecken und Füße sind roth. Des Kopfs Verlängerung ist sonderbar.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist kurzrüßelig, klein, nur drey Linien lang und schwarz; der Halschild und Füße sind roth. Die Fühlhörner sind nicht gebrochen, sondern gerade und haben eifß Glieder, wenn man die vier Kolbenglieder mitzählt. Der runde Kopf ist hinten an der Wurzel dünne und verlängert. Die Flügeldecken sind roth und nebartig, fast wie chagrinirt. Der Körper ist braunschwarz und etwas viereckigt.

Eine Verschiedenheit oder Varietät hat kein rothes Halschild.

Fabricius vereinigt den *Attelabus coryli* und *avellanae* Lin. zu einer Art.

Aufenthalt.

Im Juli auf Erlengesträuche und Haseln, wo er die Blätter in Rollen dreht und die Oeffnungen zubaut.

2. Der Birken-Asterrüßelkäfer. *Attelabus Betulae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blattkräusler, Birkenpfeiffenkäfer.

Attelabus Betulae, Lin. 620. 7. Müller 245. 7.

— — — Fabr. Entom. 1. 2. 392. 37.

— — — der schwarze springende Asterrüßelkäfer der Birke. Gleditsch I. 439.

— — — Panzeri Fn. 20. t. 15. Weibchen.

Kennzeichen der Art.

Er ist durchaus schwarz, mit punktförmigen Flügeldecken, die kürzer, als der Hinterleib sind; nur das Männchen hat Springfüße.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer hat zwey Linien und der Hinterleib allein ein und eine halbe Linie Länge. Er ist kurzrüßelig und tiefschwarz, der Körper kurz und etwas viereckig von glänzendem Schwarz, und der runde Kopf nach hinten zu etwas verengt. Die Fühlhörner sind kurz, dünne und gerade, das ist, ungebogen. Die Flügeldecken reichen nicht bis ans Ende des Hinterleibes; auf jeder zählt man neun punktirte Längsstriche, obgleich in der Panzerischen Fauna nur sechs gesehen werden. Die Schenkel der Hinterfüße sind bey dem Weibchen etwas dick, bey dem Männchen aber von beträchtlicher Stärke, folglich wahre Springfüße, womit es behende hüpfet, ohngeachtet es Degeers Insekten-Abhandlung 5. S. 259. verneint. In der Fauna ist das Weibchen dargestellt.

Aufenthalt.

Auf den Blättern der Birke, welche er so künstlich schrotet, daß sie ganz gekräuselt davon werden.

Zweite Familie.

Asterrüsselkäfer, mit einfach gezähnter Kinnlade.

Wunder schädlich.

3. Der prachtkäferartige Asterrüsselkäfer. *Attelabus buprestoides*,
Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Dickhals, Waldkäfer, gemeiner Wanderkäfer, Stinkkäferartiger Asterrüsselkäfer, dickhalsiger schwarzer Prachtkäfer, Holzkäfer, prachtkäferartiger Waldkäfer, dickhalsiger Stinkkäfer.

Attelabus buprestoides, Lin. 621. 15. Müller 248. 13. tab. 4. fig. 20.

Spondylis buprestoides, Fabr. Ent. 1. 2. 258. n. 1.

— — — — — Panzeri Fn. 44. t. 19.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz, mit kugeligem Halschild und scharfen Kinnbacken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist neun Linien lang, sattschwarz ohne Glanz, mit scharfen Kinnbacken. Die vordern Greifspitzen sind fünf- und die hintern dreigliedrig. Die fadenförmigen und zugleich perlenkornähnlichen und flachgedrückten Fühlhörner sind so lang als der glatte und kugelige Halschild, dessen vorderer und hinterer Rand mit goldgelben Härchen gefranzt ist. Die Decken sind aderig. Die Unterseite des Insekts ist mit Fühlhärchen besetzt. Eine Varietät ist braun und aschgrau gewölkt, am Hinterleib mit einem weißen Kreuz geziert.

Degeer zählt ihn unter die Bockkäfer.

Aufenthalt.

Im May, unter gefälltten Baumstämmen in Wäldern.

Anmerkung.

Noch zwei Afterräffelfäfer sind oben in einer Anmerkung bey den Vorkenkäfern nach n. 19. beschrieben worden, nämlich der muttillenartige und ameisenähnliche.

Zehnte Gattung.

Die Bockkäfer, *Cerambyces* Lin. und die mit denselben Verwandten.

Sie heißen auch: Holzböcke, Holzkäfer, Visamkäfer, Steinbockkäfer und Geiger, wegen ihres knarrenden Lauts.

Gattungskennzeichen nach Linné.

Die Fühlhörner sind borstenartig, mit zehn bis elf knotigen Gelenken versehen und lang; sie gehen in eine feine Spitze aus. Der Halsschild ist entweder mit Dornen besetzt, oder doch höckerig und die Fühlhörner laufen an den Seiten gerade fort. Die Kinnbacken sind stark, scharf und zangenförmig.

Ihre Larven, Holzwürmer genannt, haben eine feste Haut, und liegen gerader als die andern. Sie haben sechs kurze Füße, sind oft von gelblicher Farbe, und werden mehr im Holz als in der Erde angetroffen, so wie überhaupt diese und die Larven der drey folgenden Gattungen Rinde und Holz beschädigen. Denn mit ihren scharfen Kinnbacken benagen und durchbohren sie dasselbe. Sie brauchen ein bis zwey Jahre bis zu ihrer Verwandlung, bey Ausnahmen und bey der künstlichen Erziehung auch wohl drey.

Ihre Feinde sind die Krähen und Spechte.

Die Fabricischen Gattungen mit ihren eigentlichen Kennzeichen sind:

Der Förstkäfer, n. 82. *Prionus*, hat vier fadenförmige Fressspitzen, eine cylindrische und ganze Kinnlade, eine sehr kleine Lippe und borstenförmige Fühlhörner.

Der Bockkäfer, n. 85. *Cerambyx*, hat vier fadenförmige Fressspitzen, eine stumpfe, einzahnichte Kinnlade, eine gespaltene Lippe, und borstenförmige Fühlhörner.

Der Zauberkäfer, n. 40. *Lamia*, hat vier fadenförmige Fressspitzen, eine hornichte, gespaltene Kinnlade, eine hornichte, gespaltene Lippe und borstenförmige Fühlhörner.

Der Zangenbock, n. 87. *Rhagium*, hat vier Fressspitzen, wovon die vordern gekault und die hintern fadenförmig sind, eine gespaltene Kinnlade, eine häutige, gespaltene Lippe und fadenförmige Fühlhörner.

Der Schneckenkäfer, n. 83. *Saperda*, hat vier ziemlich gleiche und fadenförmige Fressspitzen, eine gespaltene, häutige Kinnlade, eine herzförmige und abgestufte Lippe und borstenförmige Fühlhörner.

Der Iiskäfer, n. 89. *Callidium*, hat vier gekaulte Fressspitzen, eine häutige gespaltene Kinnlade, eine gespaltene Lippe und borstenförmige Fühlhörner.

Die

Die Fabricischen äußern Gattungs-Kennzeichen sind.

Der Forstkäfer: der Körper ist groß, länglich, niedergedrückt, glatt und träge. Der Kopf ist groß und seitwärts ausgehend, flach und sehr eingesügt; die seitwärts ausgehenden nierenförmigen Augen stehen am Rand; die verlängerten Fühlhörner stehen von einander und sind über den Kinnbacken eingesügt; der Halschild ist flach und gerandet, der Rand ist oftmals gezahnt; das Schildchen rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, ungerandet, von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind etwas lang, und zwar Gehfüße mit viergliedrigen Fußblättern. Das Insekt ist dunkelfarbig.

Der Bockkäfer: der Körper ist oblong, sehr mal, etwas niedergedrückt, glatt, ungerandet; träge; der Kopf ist eckig und sehr eingesügt; die Augen sind klein, rund, und stehen an den Seiten; die Fühlhörner sind lang, zwischen den Augen eingesügt; der Halschild ist rund, flach, ungleich, beiderseits gedorn, das Schildchen ist rund; die Flügeldecken steif und gewölbt von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind Gehfüße und etwas lang; die Schenkel sind zusammengedrückt; die Fußblätter viergliedrig. Das Insekt ist vielfarbig.

Der Zauberkäfer: der Körper ist cylindrisch, rund, glatt, ungerandet und träge; der Kopf ist groß und stumpf, abhängig, steht zwischen den Fühlhörnern; die großen, runden Augen ragen an den Seiten hervor; die Fühlhörner sind verlängert, nahe beisammen stehend, und zwischen den Augen eingeleimt; der Halschild ist walzenförmig, gedorn und ungleich; das Schildchen ist rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind stark, zum Gehen eingerichtet; die Fußblätter sind viergliedrig. Das Insekt ist buntfarbig.

Der Zangenbock: der Körper ist oblong, glatt, ungerandet und träge; der Kopf ist groß, eckig und hervorragend; die Augen sind rund, ragen hervor und stehen an den Rändern; die Fühlhörner sind lang, stehen nahe beisammen und sind zwischen den Augen eingesügt; der Halschild ist sehr mal, cylindrisch, beiderseits dornicht; das Schildchen ist rund; die Flügeldecken sind steif und gewölbt, länger als der Halschild, von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind Gehfüße, mit viergliedrigen Fußblättern. Das Insekt hat bunte Farben.

Der Schneckenkäfer: Der Körper ist schmal, cylindrisch, glatt, ungerandet, behende; der Kopf ist rund, seitwärts ausgehend und sehr eingesügt; die nierenförmigen Augen stehen an den Rändern; die Fühlhörner sind lang und im Vusen der Augen eingesügt; der Halschild ist kurz, rund und unbewehrt; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz, zum Gehen gemacht, mit viergliedrigen Fußblättern. Das Insekt ist buntfarbig.

Der Löffkäfer: Der Körper ist etwas flach; oftmals auch behaart, etwas niedergedrückt, ungerandet und träge; der Kopf ist eckig, stumpf und sehr eingesügt; die nierenförmigen Augen stehen am Seitenrande; die Fühlhörner sind länger als der Halschild, und sind in dem Vusen der Augen eingesügt; der Halschild ist flach mit einem runden hervorstehenden Rande; das Schildchen ist klein und dreieckig; die Flügeldecken sind steif,

steif, gewölbt und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind lange Gefäße, die Schenkel sind oft keulenförmig; die Fußblätter viergliedrig. Das Insekt hat scheckichte Farben.

Von den Bockkäfern des Linné kommen hier 1) solche vor, deren Halschild gerandet und dornig (mit Seitenzähnen bewaffnet) ist, 2) mit rundem Halschild und befestigten Dornen, 3) mit ungedornem und cylindrischem Halschild, 4) mit ungedornem und rundem Halschild.

Erste Familie.

Der Halschild ist gerandet und hat Seitenzähne. Dies sind Fabric. Prionen oder Forstkäfer.

Die minder schädlichen,

1. Der Zimmermanns-Bockkäfer. *Cerambyx faber*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Zimmermann, Zimmermannsbock, Zimmermannsforstkäfer, Zimmerbock,

Cerambyx faber, Lin. 622. 6. Müller 254. 6.

Prionus faber, Fabr. Ent. 1. 2. 244. n. 6. Fehlte in seinen frühern Schriften.

Cerambyx faber, Walthers Forstwissensch. 542.

Prionus faber, Panz. Fn. 9. f. 5. Weibchen.

Schäfferi Icones t. 140. f. 1. etwas verfehlt.

— — t. 72. f. 3. nach Fabricius.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist gerandet und runzlich; er hat auf jeder Seite zwei Zähne oder Dornen. Die Flügeldecken sind pechschwarz, und die Fühlhörner mittelmäßig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist einer der größten europäischen dieser Gattung, und was das Weibchen betrifft, zwei Zoll lang, neun Linien breit, also größer als der folgende; pechfarben und glänzend. Das Männchen ist etwas kleiner. Der Halschild ist runzlich und chagriniert, am Rande gekerbt und auf beiden Seiten einzählig. Die schwarzen Flügeldecken sind gleichfalls chagriniert und zufolge unserer Exemplare weit schwärzer als bei dem nachfolgenden.

den. Der Hinterleib ist lang. Von dem Männchen sagt noch Fabricius, daß der Halschild etwas glatter, kappenförmig gerandet und ungedornet ist.

Aufenthalt und Schaden.

Käfer und Larve sind in Nadelhölzern. Die Larve, welche schmutzig weiß ist mit braunem Kopf und Halschild und zwei Zoll lang wird, lebt ohne Zweifel in trocknen Tannenbretern, die an Orten wo das Holz nicht gespart werden darf, zur Befriedigung der Gärten gebraucht werden. Daß sie aber das in Windmühlen verbaute Holz angreife, davon finden sich nicht so starke Spuren. Sie findet sich auch in alten anbrüchigen und faulen Tannen.

2. Der Gerber-Bockkäfer. *Cerambyx coriarius*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gerber, Gerber-Forstkäfer, lederartiger Forstkäfer, lederartiger Bockkäfer, Sägen-Holz-käfer, Schuppenhorn.

Cerambyx coriarius, Lin. 622. 7. Weibchen. Müller 254. 7.

— — *imbricornis*, Lin. 622. 5. Männliche Varietät.

— — *coriarius*, schwarzer oder dunkelgrauer Borkenrindenkäfer. Gleditsch Forstwiss. I. 438.

Prionus coriarius, Fab. Ent. I. 2. 246. n. 15.

— — — Panzer Fn. 9. t. 8.

Rösel II. Erbkäfer 2. Klasse t. 1. f. 1. Männchen. 2. Weibchen.

Schäffer Icon. 67. f. 3. Männchen — t. 9. f. 1. Weibchen.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer hat einen gerandeten Halschild und auf jeder Seite desselben drei Zähne, einen länglichen Körper, zugespitzte Flügeldecken und nach Verhältniß kurze Fühlhörner. Die Farbe ist rufig.

Die Larve ist weißlich mit einer grünen Rückenlinie und kastanienbraunem Kopf.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist gleichfalls groß, fast anderthalb Zoll lang, ruf- oder pechfarbig, mit mattem Glanze. Die Fühlhörner haben beynahe die Länge des Körpers. Die vier Fehspitzen sind ocker gelb. Die Ränder des kurzen, platten und nicht chagrinierten Halschildes, der auf der Unterseite mit ocker gelben Härchen besetzt ist, sind dornzählig. Sowohl die Enden der schwarzen Flügeldecken, die chagriniert sind und glänzen, als auch die Füße sind dunkel kastanienbraun. Auf den Flügeldecken laufen einige leicht erhobene Linien nicht ganz bis

an den After. Der Hinterleib ist länglich. Das Männchen ist kleiner, hat aber nach Verhältniß größere und dabei sägenförmige Fühlhörner.

Die weibliche sechsfüßige Larve ist zwei Zoll, sieben Linien lang, hat 13 Ringe, ohne den Kopf und die Endspitze. Sie sieht wie ein unterbundener Wachtelruf aus, und hat einen kastanienbraunen und breiten Kopf, eine scharfe Kinnlade und vier Freßspitzen. Ueber die Mitte des Rückens zieht sich eine dunkelgrüne Längslinie. Sie verpuppt sich in ein ovales Gehäuse.

Die Puppe hat eine braune Farbe. Ihre Ruhe dauert drei bis vier Wochen.

Aufenthalt und Fortpflanzung.

An faulen Eichen und Birken im August, wo dann das Weibchen seine Eier einzeln hin und wieder in die Ritzen und Spalten des Holzes legt, woran solche kleben bleiben. Die länglichen Eier sind anfänglich strohgelb und färben sich hernach braun.

Zweite Familie.

Mit rundem und bewaffnetem Halschild.

Erste Linie. Solche, die Linneische und Fabricische Bockkäfer zugleich sind.

Weniger schädliche.

3. Der nebelige Bockkäfer. *Cerambyx nebulosus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Tannenbock, grauer Tannenkäfer, nebeliger Zauberbock.

Cerambyx nebulosus, Lin. 627. 29. Müller 263. 29.

— — — — Fabr. Ent. 1. 2. 261. n. 35.

— — — — Forstmann 64.

— — — — der graue Holzbock, Holzkäfer, Gleditsch I. 404.

Lamia nebulosa, Schrank's Fauna Boica 657.

Ceram. nebulosus, Panz. Fauna 14. t. 13.

Schäfferi Icon. t. 55. f. 5.

— — — t. 14. f. 9. u. t. 192. f. 16. Von Fabric. u. Panz. allegirt.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist gedreht; die Flügeldecken haben schwarze Punkte und Binden; die Fühlerhörner sind lang.

Beschreibung des vollkommen und unvollkommen Insekts.

Dieser kleine, schön gezeichnete Käfer ist vier und dreyviertel Linien lang und nebelgrau. Die zehngliedrigen Fühlerhörner sind ein und ein halbmal länger als der Körper, mit aschgrau und schwarzgesteckten Gliedern oder Ringen. Der Halschild ist schwärzlich mit vier weißlichen Pünktchen in Einer Reihe. Die aschgrauen und glatten Flügeldecken haben schwarze Punkte und Binden.

Fabricius hat hiebey aus Verschen Sultzer's tab. 4. fig. e. allegirt, wo dieser Käfer sich nicht befindet. Auch die Panzer'sche Zeichnung ist etwas im Habitus verfehlt.

Die Larve ist weiß, hat zwölf Einschnitte und einen braunen Kopf, welcher von einem hellern Schilde bedeckt ist. Ihr Wachsthum geht langsam von statten, und die Verwandlung erfolgt im Holze und unter der Rinde.

Aufenthalt.

In den Stämmen der Tannen, vom Junius bis August auf den alternden Fichten und Weinstöcken z).

Die Larve gräbt keine Gänge, sondern nagt alles um sich her weg, bleibt auch nicht allein unter der Rinde, sondern frist sich auch in das Holz hinein.

4. Der Graubock. *Cerambyx griseus*, Fabr.

Namen; Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Grauer Bockkäfer.

Cerambyx griseus, Fab. Ent. 1. 2. 261. 37.

— — — Panzer, En. 14. t. 14.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist braunschwarz und gedreht; die glatten Flügeldecken sind grau und dreyimal bandirt; die Fühlerhörner sehr lang.

Ver-

*) Noch kürzlich im Junius 1803 traf ich ihn an

Apfelbäumen an, bey dem Dorfe Vehlreith, wo er Durchbohrungen gemacht hatte. S.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist kaum vier Linien lang, von aschgrauem Körper, und die Fühlhörner haben die doppelte Länge des Körpers; sie sind an der Spitze schwarz, an der Wurzel aschgrau, Kopf und Halsschild sind braunschwarz. Letzteres hat eine Querreihe von vier gelben Pünktchen. Die hellgrauen Decken sind mit feinen Pünktchen und drey schwarzgrauen Binden geziert, wovon nur die mittellste durchaus geht. Die Füße sind schwärzlich grau; die Schenkel schwarzpunktiert, und die Schienbeine hellgrau, an der Spitze schwarz. Es ist nur ein Versehen, wenn er beim Fabricius für größer als der nebelige erklärt wird: Der Unterschied bedeutet wenig.

Aufenthalt.

An Nadelbäumen und alten Weidenstöcken, mit dem vorigen, aber seltner.

5. Der Bündel-Bockkäfer *Cerambyx fasciculatus*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bündelbockkäfer.

Cerambyx fasciculatus, Fab. Ent. 1. 2. 262. 39.

— — — — — Panzer 14. t. 15.

Naturforscher 24. t. 1. f. 34.

Kennzeichen der Art.

Der Halsschild ist gedornet; die unabgekürzten Flügeldecken haben eine weiße Binde und in dem darauf folgenden grauen Felde drey schwarze rauhe Punkte; die Fühlhörner sind etwas behaart.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Dieser Käfer ist nach meinem (Scharfenbergs) Exemplare nur drey Linien lang und aschgrau. Die Fühlhörner sind etwas länger, als der ganze Käfer und aschgrau mit rothen Ringen. Der Halsschild ist bey frischen Käfern schwärzgelblich, bey verwischten aber schwarz. Die grauen und etwas gefurchten Flügeldecken sind mit vielen kleinen Punkten besprenget. Drey Punkte aber sind größer, und stehen auf jeder Decke in Einer Reihe die Länge hinab. Es sind eigentlich schwarze Fülzstellen. Außerdem zieht sich eine verblichene weiße Querverbinde, die auf der einen Seite schwarz eingefast ist, durch dieselben, und zwar ohnweit der Wurzel. Kopf, Halsschild, Flügeldecken und Fühlhörner sind alle mit einzelnen Härchen besetzt, wie man durch die Lupe wahrnimmt. Die Flügeldecken sind nicht angestrichen wie beim folgenden, sondern hinten abgerundet. Die Füße sind grau.

Aufenthalt.

Auch wie der vorhergehende, an alten Fichtenstöcken. — Sein gedornter Halschild unterscheidet ihn hinlänglich vom *Cerambyx fasciculatus* des Herrn Piller's.

6. Der Bürsten-Bockkäfer. *Cerambyx hispidus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleiner Stachelbock, kleiner Dornbock, Dornbockkäfer.

Cerambyx hispidus, Lin. 627. 30. Müller 263. 30.

— — — — Fab. Ent. 1. 2. 262. n. 40.

— — — — Panzer 14. tab. 16.

Naturforscher 24. t. 1. f. 35. Schäffler Icon. t. 176. f. 5.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist gedornet. Die Flügeldecken sind an der Spitze zweizählig. Die mittelmäßigen Fühlhörner sind rauh oder behaart.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist zwey und drey Viertellinien lang, und die behaarten Fühlhörner haben eben diese Länge und sind nebst dem Kopf und gedornem Halschild gelbröthlichgrau. Die Flügeldecken, die an der Wurzel und nicht weit vom Hinterrand weiß sind, bilden eine mattschwarze gelogene Querbinde durch die Mitte, die auf jeder Decke zwey schwarze Punkte haben, und sich mit einem größern und einem kleinern Zacken, welche schwärzlich eingefasst sind, am Hinterende endigen. Die Schenkel sind gelbgrau. — Durch die ausgeschwungene und gedornete Endigung der Decken, läßt sich dieses Käserchen am besten von dem Bündelbockkäfer unterscheiden.

Aufenthalt.

Mit dem vorhergehenden an alten Föhrenstöcken; doch nicht eben häufig.

7. Der Bisam-Bockkäfer. *Cerambyx moschatus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bisamböcklein, Frauenbock, Bisamholzbockkäfer, Rosenbock (wegen des Geruchs).

Cerambyx moschatus, Lin. 627. 34. Müller 264. 34.

— — — — Fab. Ent. 1. 2. 251. 1.

Sulzer's Kennzeichen t. 4. fig. e. Schäffl. Icon. 11. f. 7.

Kenn:

Kennzeichen der Art.

Er hat einen gebornen Halschild und ist grün und glänzend. Die mittelmäßigen Fühlhörner sind Kornblumenblau.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist vierzehn Linien lang, sattmetallgrün und glänzend. Der Halschild hat an jeder Seite einen Zahn und unten drei Höcker. Die Flügeldecken sind schwarzgrün mit zwei erhabenen Strichen, sanft und biegsam. Am Hinterleib ist er blau. Er wechselt mit blauen und braunen Flügeldecken und Füßen.

Der Bismangeruch, der dem Weibchen eigner ist, als dem Männchen, geht durch den Tod verloren.

Von dem Todtengräber, *Silpha vespillo*, weiß man, daß er denselben mehrere Jahre noch behält.

Aufenthalt.

Im Julius auf Weiden, seltener auf Obstbäumen, in welchen auch die Larve lebt. Es ist sonderbar, daß Gleditsch desselben bey den Weiden, und überhaupt gar nicht gedacht hat; vielleicht weil er dort nicht einheimisch ist.

8. Der Glucker-Bockkäfer. *Cerambyx cerdo*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gerber, Gerber-Bockkäfer, Glucker, Glucker-Holzkäfer.

Cerambyx cerdo, Lin. 629. 39. Müller 266. 39.

— — Scopoli, Schrank Fn. 655.

— — cerdo, Fab. Ent. 1. 2. 255. n. 14.

— — — Forstmann 63.

Schäffer t. 14. f. 8.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist geborn, runzlich und schwarz. Die Fühlhörner sind lang, und ihre vier ersten Gelenke geknelt. Die Flügeldecken sind sattschwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist dreizehn Linien lang, und kleiner als der folgende. Die Fühlhörner sind länger als der Körper, und die vier äußersten Gelenke derselben sind von feinen Härchen grau. Der runzlige Halschild ist so wie die Flügeldecken glänzend, sattschwarz, chagrinirt und etwas erhoben.

Auf:

Aufenthalt.

An Eichen und ihrem rinnenden Saft, im May und Junius.

9. Der Held-Bockkäfer. *Cerambyx heros*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Größerer Berberbock, Held.

Cerambyx heros, Fab. Ent. 1. 2. 255. 15.

— — — Scopoli, 163.

— — — cerdo, Schrank 655.

— — — Walther's Forstwissensch. 542.

Schäffer Icon. t. 124. fig. 3.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist gebornt, runzlicht und schwarz. Die Fühlhörner sind lang, und ihre vier ersten Gelenke gekult. Die Flügeldecken sind braunschwarz. Das Weibchen ist größer.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist sehr ansehnlich. Denn das Männchen ist zwey Zoll lang, und das Weibchen noch länger. Linne hat ihn wegen der außerordentlichen Aehnlichkeit, die er mit dem erstbeschriebenen Zücker-Bockkäfer hat, für die Stammart, und unsern Held-Bockkäfer für eine Varietät desselben angesehen. Allein außer der Länge ist noch ein unveränderliches Merkmal vorhanden, nämlich: Die Flügeldecken sind eigentlich schwarzbraun, und gegen das Ende derselben röthlich oder abgebleicht gefärbt.

Aufenthalt.

An Eichstämmen, im Jun. und Julius, wo er aus denselben hervorkommt, nachdem sich die Puppe schon im April vorher darin enthält hat. Ohnerachtet der vorhergehende bey uns nicht selten ist, so findet man doch diesen in der hiesigen Henebergischen Gegend nicht.

Zweite Linie der zweiten Familie. Fabricische Zauberkäfer.

Weniger schädlich.

10. Der Schreiner-Bockkäfer. *Cerambyx acdilis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schreiner, Schreiner-Zauberkäfer, Hausbockkäfer, Zimmermann-Zauberkäfer, Holzmeister.

Cerambyx aedilis, Lin. 628. 37. Müller 266. 37.

Lamia aedilis, Fab. Ent. 1. 2. 270. n. 16.

Cerambyx aedilis, der Baumeister oder Ruffischer Holzbock. Glebtsch I. 404.

— — — Walther's Lehrbuch der Forstwiss. 542.

Sulzer's Kennzeichen t. 4. f. 27. In den Fabric. Schriften wird durch einen Druckfehler dessen abgekürzte Geschichte angeführt.

Schäfferi Icon. t. 14. f. 7. Weibchen.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist dornig, mit vier gelben Punkten; die Flügeldecken sind abgestumpft und nebelgrau, und die Fühlhörner außerordentlich lang. Das Weibchen ist noch einmal so groß.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der männliche Käfer ist sechs und eine halbe Linie und der weibliche noch einmal so lang. Die Fühlhörner sind viel länger als der Körper. Herr Herbst leitet ihre Länge daher, weil er tief bohren müsse. Diejenigen des Männchens sind nach Verhältnis länger, als die vom Weibchen, welches doch an sich beleibter ist. Die nebelgrauen und stumpfen Flügeldecken sind mit Härchen gewölkt, daher sie wie braungespleckelt aussehen. Der Hinterleib des Weibchens endigt sich in einem langen schmalen Fortsatz. Er wechselt mit punktförmigen, nebelgrauen, und mit glatten, kaum punktirten aschgrauen Flügeldecken?

Voet will seine gelbe Larve im Holz des Ahornbaums gefunden haben. Sie wohnt überhaupt in den Stämmen der Harz- und anderer Bäume, deren Holz sie zerstört.

Aufenthalt.

In den Föhren, Roth- und Weisstannen, gewöhnlich im May. Man findet ihn im Moos unter Föhren manchmal schon im März. Im May und Anfang des Junius ist er aber unter den frischen Zimmerhölzern, wo er seine Eier ablegen will, oft häufig anzutreffen. Herbst leitet seinen Namen her von den Niederlagen der Breter und Dieben, und Klöße von gefällten Bäumen, wo man ihn, so wie auch, wiewohl seltener, in Häusern gefunden hat.

11. Der Schuster-Bockkäfer. *Cerambyx sutor*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schuster, Schuster-Zauberkäfer.

Cerambyx sutor, Lin. 628. 33. Müller 266. 38.*Lamia sutor*, Fabr. Ent. 1. 2. 277. n. 41.*Ceramb. sutor*, Forstmann S. 65.

— — — Walthers Lehrbuch. S. 342.

— — — anglicus, Voet 3. t. 5. f. 7. Männchen.

Lamia sutor, Panzer Fn. 19. t. 2. Weibchen.

Fabricius führt auch Sutor t. 5. f. 4. aber mit Unrecht an.

Schäffer Icon. t. 65. f. 1.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist geborn; die Flügeldecken schwarz, mit Kossbraun gefleckt. Das Schildchen ist brandgelb; die Fühlhörner sehr lang, und das Weibchen beträchtlich größer.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der männliche Käfer ist sieben Linien lang, und schwarz, brandgelb gefleckt. Die Glieder der ersten sieben Linien langen Fühlhörner sind schwarz, jedes an der untern Hälfte grau. Die Stirne ist zwischen den Fühlhörnern vertieft. Kopf, Halschild und Flügeldecken sind mit erhabenen in einander fließenden Punkten besetzt. Das Schildchen und einige Punkte auf den Flügeldecken sind bald milchrahmfarbig, bald rothbraun, von einem daselbst befindlichem Fülze. Wenn diese kleine Fülzbäarchen sich abreiben, so vergehen diese gelbe Sprenkeln. — Die Größe ändert sehr ab. Denn es giebt Käfer, die ohne die Fühlhörner sechs und eine halbe bis vierzehn Linien Länge haben, und deren Fühlhörner elf bis sieben Linien erreichen. Von den Männchen sind solche oft zweymal so lang als der Körper, der pechfarbig ist, von dem der Käfer seine Benennung hat. Die Panzerische Abbildung des Käfers von dreizehn Linien Länge und sechzehn Linien Länge der Fühlhörner, stellt ein Weibchen vor.

Aufenthalt.

An Baumsstämmen und Fichten- und Tannensködern, in unsern deutschen Waldungen, in welchen auch die Larven gefunden werden.

12. Der Schneider-Bockkäfer. *Lamia sator*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schneider, Schneiderbock.

Lamia sartor, Fab. Ent. 1. 2, 278. 42.

— — — Panzer Fn. 19. t. 3.

Sulzers abgekürzte Geschichte 1. 5. f. 4.

Boets Käfer 3. t. 5. f. 6.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz mit gedornem Halsschild, gelbem Schildchen und ungefleckten Flügeldecken; die Fühlhörner haben noch mehr als die doppelte Länge des Käfers.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Wir fügen nichts dazu, als daß derselbe mit dem vorhergehenden Aehnlichkeit hat; seine Länge beträgt dreyzehn und eine halbe Linie; aber die Fühlhörner unterscheiden ihn von jenem gar sehr: sie haben zwey Zoll und zehn Linien Länge. Das herzförmige Schildchen des Rückens ist das Einzige, was an ihm nicht schwarz ist. Auch ist die Stirne zwischen den Fühlhörnern gesurcht.

Aufenthalt.

Er wird in deutschen Waldungen angetroffen, aber selten, und nie gesellschaftlich mit dem Schürer-Käfer. Diesen hat man für das Männchen von unserm Käfer halten wollen in der allgemeinen Literatur-Zeitung 1794. No. 41.; es hat aber an der Bestätigung bisher noch immer gefehlt.

13. Der Weber-Vockkäfer. *Cerambyx textor*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weber, Stricker, Weber-Zauber-Käfer.

Cerambyx textor, Lin. 629. 41. Müller 267. 41.

Lamia textor, Fab. 2. 263. 8.

— — — Panzer Fauna 19. t. 1.

Schäffer Icon. 10. fig. 1.

Kennzeichen der Art.

Der Halsschild ist gedornet, die Flügeldecken gewölbt und schwarz, die Fühlhörner mittelmäßig, und der ganze Körper dick und breit.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist ohngefähr zwölf bis dreyzehn Linien lang, mattschwarz, dick und plump. Die dicken Fühlhörner sind nicht ganz so lang, als der Körper, und das erste Gelenk an ihrer Wurzel ist keulenförmig.

Die

Die gewölbten Flügeldecken sind sammt dem Halschild unordentlich erhoben, punktirt oder Hagrinirt, und von schmutzigschwarzer Farbe.

Kusenthalt.

Im Junius auf mehreren Baumarten, z. B. Bliichen, in deren Stämmen die Larve lebt. Er ist auch an Mauern und Gartenzäunen nicht selten.

Dritte Linie der zweiten Familie. Ein Fabricius'scher Schmalbockkäfer.

Von weniger schädlicher Beschaffenheit.

14. Der Meridian-Bockkäfer. *Cerambyx meridianus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Tagdieb, Meridian-Schmalbockkäfer, Mittags-Schmalbockkäfer, Meridianer.

Cerambyx meridianus, Lin. 630. 47. Müller 269. 47.

Leptura meridianus, Fab. Ent. 1. 2. 341. n. 11. sonst bey ihm ein *Stenecorus*.

— — — Panzer 45. t. 10. das Weibchen.

Sulzer's Kennzeichen t. 5. f. 30.

Schäffer Icon. 79. f. 7. Männchen. Und t. 3. f. 13.

Fabricius allegirt Schäff. Icon. t. 82. f. 4. t. 279. f. 3.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist ein wenig gedorn. Die dachförmigen Flügeldecken sind bleichgelb, und die Brust glänzend. Von dem Weibchen sind die Flügeldecken auf der hintern Hälfte und an der ganzen Nath bleifarbig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist sechs und eine halbe Linie lang und schön glänzend. Die schwarzen Fühlhörner sind an der Wurzel und an der Spitze bleichgelb. Der Halschild ist mattschwarz und behaart mit einem stumpfen Dorn zu beyden Seiten. Die Brust ist schwarz und goldschielend. Die glatten Flügeldecken des Männchens sind einfarbig, schwach rostgelb; und die eben so gefärbten Schenkel an ihrer Spitze schwarz. — Von den Weibchen sind die Flügeldecken nur zur Hälfte schwach rostgelb, das Uebrige sammt der Nath bis zur Spitze derselben ist bleifarbig oder mattschwärzlich. — Der Hinterleib von beyden Geschlechtern hat eine rothe Spitze.

Dieser Käfer hätte unter den Schmalbockkäfern, *Leptura*, seine beste Stelle, wohin ihn auch Fabricius gezogen: allem die einmal erwähnte Ordnung des Linneischen

Systems, wo er wegen den Seitendornen den Bockkäfern einverleibt ist, hindert uns daran. Genug, daß man es nun weiß.

Aufenthalt.

Den Käfer fanden wir immer im May auf Blumen und Hecken in Wäldern, wo Espen, Birken und Föhren durch einander stehen, Brahm auf Ullmen und Gartenhefen, und auf den Blüthen des Viburnum Tinus, Schrank in Erlengebüschen, daher er seine Larve für eine Erlensbewohnerin hält. Der alte entomologische Schriftsteller Ray fand die langfüßige Larve unter der Erde.

Vierte Linie der zweiten Familie. Solche, die Fabricius'sche Zangen-Bockkäfer sind.

Weniger schädliche.

15. Der ausspähende Bockkäfer. *Cerambyx inquisitor*, L. n.

Namen, Schriften und Abbildung.

Stenkerer, Inquisitor, ausspähender Bockdornkäfer, Späher, Tannenbohrer, großer Holzbock.

Cerambyx inquisitor, L. n. 630. 49. Müller 269. 49.

Rhagium inquisitor, Fab. Ent. 1. 2. 304. n. 2.

— — *indagator*, Fab. Ent. 1. 2. 304. n. 3.

Cerambyx inquisitor, Forstmann S. 65. — Bechsteins Musterung 167. — Dä-
gels. Forstw. 294.

Frisch Insekten 13. t. 14.

Schäffer Icon. 2. f. 10.

Degeer 5. t. 4. fig. 1.

Kenntzeichen der Art.

Der Käfer. Der Halschild ist gedornet, die Flügeldecken nebelfarbig und schwarz bandirt: die Bandirung ist sehr irregulär und unvollkommen.

Die Larve ist sechsfüßig, unbehaart und weiß, am hornartigen Kopf und Hals schwarzbraun. Der Rücken ist gefurcht.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist einen Zoll lang, zuweilen kürzer, und scheint, wenn man ihn nur obenhin ansieht, gelbgrau und schwarz nebelfarbig und einigermaßen bandirt. Wenn man ihn
aber

aber genauer betrachtet, und die graue oder rostgelbe Farbe als Grundfarbe annimmt, so ist er überall mit schwarzen Flecken, Punkten und auf den Flügeldecken mit dergleichen unordentlichen Binden bezeichnet. Nimmt man aber die schwarze als Grundfarbe an, so verbreiten sich die aus rostgelben Fülzhäutchen bestehenden, unordentlich zerstreuten Flecken und Punkte über den Halschild und die Flügeldecken. Die Augen sind erhoben, und die kleinen Fühlhörner sind so wie die Füße gelblichgrau. — Die oben bereits angezeigte Larve ist von Ström in den Kopenhagener Actis beschrieben.

Eine Varietät, die gewöhnlich kleiner ist, hat drei unordentliche mattschwarze Binden, davon die obere und untere nicht begränzt, die mittlere aber auswärts zu begränzt und mehr geschwärzt ist. Fabricius hält sie für eine eigene Art und nennt sie den aufspürenden Zangenbock, *Rhagium indagator*, den Degeer 5. tab. 4. f. 7. abbilden lassen. Er ist nämlich aschgrau mit gedornem Halschilde; die Flügeldecken haben drei erhöhte Linien, schwarze Bestäubung und zwei dergleichen Binden. Die Fühlhörner sind schwarz, in der Mitte pechfarben. Der Halschild ist von aschgrauem Filz: die Füße sind schwarz.

Aufenthalt.

Gewöhnlich im May und Junius in Nadelhölzern und auf andern Bäumen, zuweilen auch schon im April. Denn da er vor dem Winter schon aus der Puppenhülle kriecht, und in diesem Zustande in den Höhlungen der Bäume, die er als Larve bewohnt, überwintert, so hängt es von der Witterung ab, ob er früher oder später hervorkommen kann. Im Herbst findet man ihm noch ganz weich in hohlen Pappeln und Birken. Füh Archiv V. S. 92.

Fortpflanzung und Schaden.

Dies Insect schadet einzeln einem Baume mehr, als der Vorkenkäfer, da es im Larvenstande rings um sich her alles wegnagt, in der Rinde ein höheres Alter erreicht, und zu seiner Verwandlung einer tiefern Aushöhlung bedarf. Der im Herbst erscheinende Käfer nährt sich, wie die Larve vom Saft der Fichte. Das Weibchen bohrt unten in dem Baume mehrere Löcher, um in jedes derselben mehrere weißliche Eier in einem Haufen beisammen zu legen. Kaum sind die Larven ausgekriecht, so bohren sie sich Gänge in der Rinde rings um den Stamm herum, mehr nach dem Wurzel- als dem Gipfelende hin, und füllen sie wieder mit den zerstreuten Theilen aus, wodurch sie Rinde, Bast und Holz, in das sie in Ermangelung besserer Nahrung, oft einen bis zwei Zoll tief eindringen, verderben. Sind sie nun zur Verwandlung reif, so höhlen sie in der Rinde eine ovale Grube um sich herum aus, füllen solche mit abgenagten Bast- und Holzfasern, um darinnen in senkrechter Stellung, den Kopf in die Höhe, ihre Verwandlung zu erwarten, welche nach beiläufig drei Monaten erfolgt. Wenn das Wetter günstig ist, legt der hervorgekommene weibliche Käfer noch im Herbst seine Brut ab. Thut er es vor dem Winter nicht: so überlebt er denselben, und begattet sich gleich im Frühjahr, um sich forzupflanzen.

16. Der bissige Bockkäfer. *Rhagium mordax*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Beißer, Zwengürteliger Bockdornkäfer, bissiger Bockdornkäfer.

Rhagium mordax, Fab. Ent. 1. 2. 303. n. 1.*Cerambyx mordax*. Walther's Lehrbuch 542,

Schäffer Icon. 8. fig. 2.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist gebornt; die schwarzen Flügeldecken haben zwei schmale, deutliche, rostfarbige Binden,

Beschreibung des vollkommenen Insekts,

Er ist schwarz und brandgelb gemischt, und dem vorigen sehr ähnlich, nur etwas größer. Man hielt ihn ehemals für eine Varietät desselben. Der Hauptunterschied besteht darin, daß bey unserm die schwarze Grundfarbe der Flügeldecken ziemlich rein, und besonders zwischen beyden Binden leer von rostgelben Punkten ist, und daß auf denselben zwei schmale rostfarbige, ziemlich reguläre Binden sich ausnehmen. Man darf ihn aber dieser zwei Binden wegen nicht mit einem gewissen *Rhagium bifasciatum*, Fab. Entom. 1. 2. 305. n. 7. confundiren, der auch zwei dergleichen auf jeder Decke hat, aber von kleinerm Umfang, und die letzteren mehr gekrümmt; und dessen Halschild-Dornen weit spiziger zulaufen.

Herr Schneider, von welchem unser Käfer dem Herrn Fabricius mitgetheilt worden, bemerkt noch, daß sein Körper nicht so schwarz, sondern graufilziger sey, als der vorige.

Aufenthalt.

Im May bis zum Julius, in Fichtenwäldern und andern Nadelforsten bey uns.

Anmerkung.

Die Bemähung, eine gewisse Vollständigkeit wo nicht ganz zu erreichen, doch wenigstens sich derselben zu nähern, erfordert es, eines beynahe übersehenen Insekts dieser vierten Linie der zweyten Familie noch zu gedenken, das den Namen des

betrüglischen Bockdornkäfers, *Rhagium sycophanta* Schrankii

führt. Die Namen und Schriften: *Rhagium Sycophanta*, Schrank's Fauna Boica I. S. 662, desselben Enumeratio Inf. Austriac. num. 260. Er ist abgebildet in Schäff. Icon. 1. 85. f. 3. und seine Kennzeichen sind nach Schrank diese: Der Käfer ist schwarzgrau und rostbraunbunt; führt auf den Flügeldecken drey dunklere Binden, und auf jeder

Decke

Decke außerdem noch zwei erhabene Striche. — Er soll das Holz der Weistanne in Bayern bewohnen, und in der ersten Frühlingszeit hervorkommen.

Dritte Familie.

Bockkäfer mit unbewehrtem, etwas eyrundem Halschild; dazu alle Fabricius'sche Schneckenkäfer, Saperdae, gehören.

Es sind weniger schädliche.

17. Der Sechundsfarbene Bockkäfer. *Cerambyx carcharias*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sechundbockkäfer, Sechund - Schneckenkäfer, hayartiger Bockkäfer, Hundsböckkäfer, gelbgänsehäutiger Walzenkäfer, sechundsfarbener Walzenkäfer.

Cerambyx carcharias, Lin. 631. Müller 271. 52.

Forstmann 67.

Saperda carcharias, Fab. 1. 2. 307. 1.

Schrank Fn. 665.

Naturforscher 27. 138.

Schäfferi Icon. 38. f. 4.

Nach Fabricius aber Schäffer Icones 152. f. 4.

Er ist von *Cerambyx carcharias* in Schrank's Enumeratione insect. Austriac. verschieden.

Kennzeichen der Art.

Er hat einen graugelben Körper mit schwarzen Punkten, und mittelmäßigen Fühlhörnern.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Dieser Käfer ist breyzehn Linien lang, mit einem cylindrisch runden, ungedornetem Halschild. Die Fühlhörner sind graugelb und schwarz geringelt. Kopf, Halschild, Flügeldecken, und der ganze Körper ist graugelb, mit erhobenen schwarzen Punkten ziemlich dicht besreut. Diesen Ansich und Bedeckung nennt Schrank gelbgänsehäutig. Da wo die niederliegenden rostgelben Haare abgegangen sind, hat das Insekt eine rüßschwarze Farbe. Seinen Namen hat es von den fein gekörnten Sechundsellen.

Ob das Weibchen kleiner ist, kann ich nicht entscheiden, weil ich nur Ein Exemplar besitze. Es wäre aber eine merkwürdige Ausnahme.

Aufenthalt.

Im Juli und August, an den Fichten und Tannen. Die Larve liegt nicht bloß in Holzstöcken und Kastenholz, sondern auch in frischen alten Tannen und Fichten, besonders unter der Rinde die Basthaut und den Splint weg.

18. Der Schwarzpappeln-Vockkäfer. *Cerambyx scalaris*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Treppenbock, Treppenbockkäfer, Stiegenbock, Stiegenbockkäfer, Treppen-Schneidekäfer, Treppenwalzenkäfer, Treppling.

Cerambyx scalaris, Lin. 632. 55. Müller 272. 35.

Saperda scalaris, Fabr. Ent. 1. 2. 307. 2.

Cerambyx scalaris, Walther's Forstwiss. 542.

Schäffer Icon. t. 38. f. 5.

Kennzeichen der Art.

Beide Decken sind an der Nath gelbgezahnt und am Außenrand gelbpunktirt, die Fühlhörner sind mittelmäßig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Dieser schön gezeichnete Vockkäfer ist sieben Linien lang und grünlich gelb. Der grüngelbe Halschild ist unbewaffnet und cylindrisch, mit einem schwarzen Mittelstreck. Der Körper ist rostfarben, und die Nath der schwarzen Flügeldecken ist grüngelb mit ausgeschweiften Nesten und daneben befindlichen einzelnen starken Punkten von solcher Farbe. Man kann diese Ausschweifungen eher staffelförmige Zeichnungen oder Nathlinien als Winden nennen.

Aufenthalt.

Auf Schwarzpappeln im Julius. Er findet sich nun auch hier bey Weiningen, nachdem man ihn bisher für ein inländisches Insekt gehalten hatte.

19. Der Pappel-Vockkäfer. *Cerambyx populeus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pappelbock, Pappelnschneckenkäfer, Allernwalzenkäfer.

Cerambyx populeus, Lin. 632. 57. Müller 273. 57. tab. 5. fig. 7. 8.

Saperda populnea, Fab. Ent. 1. 2. 315. n. 37.
Cerambyx populneus, Walther's Forstwiss. 542.
 Schaffer's Icon. t. 48. f. 5.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist dreimal liniert; die Flügeldecken haben vier starke gelbe Punkte. Die Fühlerhörner sind von mittelmäßiger Länge. Die Farbe ist schwärzlich.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er mißt über fünf Linien in die Länge und ist bleifarbig schwarz. Der cylindrische Halschild hat drei gelbe Längslinien, und die Flügeldecken vier gelbe Punkte, die von dichten zusammenstehenden Fühlerhärchen sich gebildet haben. Eigentlich sind derselben fünf. Aber der erste ist mehrentheils verwischt, ehe noch das Insekt von uns erbeutet wird. Es giebt nach Fabricius auch kleinere Varietäten, die kleinere Punkte haben.

Aufenthalt.

Im Junius auf Aspen und Birken, in Europa und Amerika. Er ist bey uns nicht sehr selten.

20. Der Parallel-Bockkäfer. *Cerambyx linearis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Parallelbock, Linienbockkäfer, Parallele, gleichbreiter Schneckenkäfer, Parallel-Walzenkäfer.

Cerambyx linearis, Lin. 652. 53. Müller 274. 58.

— — — Forstmann 69.

Saperda linearis, Fabr. Ent. 1. 2. 309. n. 12.

— — — Panzer Fn. 6. tab. 4.

Schaffer's Icon. t. 55. fig. 6.

Kennzeichen der Art.

Er ist cylindrisch und schwarz, mit mittelmäßigen Fühlerhörnern und gelben Füßen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Seine Länge beträgt sechs Linien. Er ist schwarz, überall gleichbreit und gegen hinten zu ziegelroth. Der Halschild hat keine Dornen. Alle sechs Füße sind gelb. In der Panzer'schen Fauna sind die Flügeldecken nicht schwarz, sondern aschgrau gemahlt, und der Text schweigt davon.

Aufenthalt.

Nach Panzer am häufigsten und gewöhnlichsten auf Haselstauden. Nach Zink im Sommer an saulen Fichten, Kiefern und alten Holzstöcken.

21. Der cylindrische Boekkäfer. *Cerambyx cylindricus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Walzenförmiger Holzbock, Rolle, Haseln-Walzenkäfer, rollenartiger Holzbock.

Ceramby. cylindricus, Lin. 653. 59. Mäller 274. 59.

Saperda cylindrica, Fab. Ent. 1. 2. 309. n. 14.

— — *linearis*, Schrank 668?

Rösel 2. Erdkäfer 2. Classe t. 3.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist schwarz, schmal und cylindrisch. Der Halschild hat eine weißliche Linie, und die Vorderfüße sind gelb. (Nach Rösel sind alle Füße gelb.)

Die Larve ist pommeranzengelb, mit verbogenem Kopf und sechs Füßen, die dem Auge kaum sichtbar sind.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Seine Länge beträgt sechs Linien. Er ist gleichbreit und durchgängig schwarz, zumal was die zarten Fühlerhörner, den Kopf, den cylindrischen Halschild und die erhöht gebauten Flügeldecken betrifft. Der Kopf und der Halschild haben einige Härchen, mit einer weißlichen Linie. Wenn man den Leib entblößt, so findet man, daß die unter den Decken liegenden Flügel durchsichtig und gegen die Spitze schwarz sind, und daß der Brust- und Bauchdrücken bis hinunter eine pommeranzengelbe Farbe hat. An eben diesem Hinterleibe des Weibchens ragt eine schwarze Spitze hervor.

Die drei Viertels Zoll lange und pommeranzengelbe Larve hat zwölf Absätze, wovon der am Kopfe, welcher versteckt, mit rothen Kinnbacken und subtilen Fühlerchen versehen ist, mehr Breite und Dicke hat, als die übrigen. Ihre sechs Füße sind dem bloßen Auge kaum sichtbar.

Aufenthalt und Fortpflanzung.

Auf Haseln und deren Zweigen. Das befruchtete Weibchen legt die weißen Eierchen einzeln oben an die Spitzen, oder an die Augen der jungen Triebe ab. Aus dem Ey kriecht die junge Larve aus, und beißt sich in den Kern des Zweiges ein, um sich von dem Mark desselben zu nähren: Sie verpuppt sich im Kanal des Zweiges selbst, und die Puppe hat

hat anfänglich eine gelbe, und darauf schwarz werdende Farbe. Man sieht den Käfer durch die dünne Haut schimmern. Die Puppenruhe dauert drey Wochen a).

22. Der Schildaugen-Bockkäfer. *Cerambyx oculatus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Augiger Bockkäfer, augiger Schneckenkäfer, Schildauge, schildaugiger Walzenkäfer.

Cerambyx oculatus, Lin. 633. 60. Müller 274. 60.

Saperda oculata, Fab. Entom. 1. 2. 308. n. 8.

Cerambyx oculatus, Forstmann 68.

Herbst t. 16. fig. 2.

Schäfferi Icon. 128. fig. 14.

Kennzeichen der Art.

Der gelbe Halschild hat zwey schwarze Punkte; die Decken sind dunkelgrau mit schwarzen Punkten häufig besetzt.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist sieben und eine halbe Linie lang, schmal, cylindrisch und röthlichgelb. Die Fühlhörner sind meist so lang als die Hügeldecken, nicht aber so lang, als das ganze Insekt. Der gelbe Halschild ist mit zwey schwarzen Punkten, wie mit Augen belegt. Der Kopf

a) Vielleicht ist *Cerambyx linearis* und *cylindricus* nur Eine Art. Linné und Fabricius führen bey *Cer. cylindricus* Röfels Figur an, sagen aber, daß die Vorderfüße gelb seyn müssen. Bey Röfel sind sie alle sechs gelb. Auch meine Exemplare haben sechs gelbe Füße, und die Decken sind, wie bey Schrank's Beschreibung seiner *Sap. linearis* mit sechs Reihen eingegrabener Punkte versehen. Da nun Röfel diese Punkte übersehen, und gerade dabey die Lüge nicht gebraucht hat: so muß es künftigen Untersuchungen der Naturforscher überlassen werden, ob der Vornehm- und der cylindrische Bockkäfer Ein Geschöpf ist. Röfel gedauert gleich zu Anfang seiner Beschreibung

dieses Käfers, der Birnen- und Pflaumen-Zweige, redet daselbst aber nicht von dieser, sondern von andern in jenem Jahr häufig vorgekommenen Larven. Von unserer aber sagt beydes, Text und Abbildung des Röfels, ausdrücklich, daß sie, nämlich die Larve, auf Haseln lebe. Linné hat in seinem System, vermuthlich aus Uebereilung, statt Haseln, obige Birn- und Zwetschken-Zweige für die Nahrung des Insekts angegeben, und Fabricius ihm dieses nachgeschrieben. Hinzeigen aber Panzer in seiner Fauna giebt bey seiner *linearis*, Heft 6. Taf. 14. die Haselkante als Nahrungspflanze an, und allegirt Röfel nicht.

©.

Kopf und die dachförmigen, gleichbreiten Flügeldecken sind eigentlich dunkelgrau, mit unzähligen schwarzen Höhlpunkten. Der Bauch und die Füße sind braunroth.

Aufenthalt.

Im Junius und Julius auf Obstdäumen, zuweilen auf Erlen, allemal selten. Zink sagt, sein Aufenthalt sey in den Fichtenwäldern.

23. Der Birnast-Bockkäfer. *Cerambyx Saperda rufimana*, Schrank.

Namen und Schriften.

Birnast-Schneckenkäfer, Birnast-Walzenkäfer.

Saperda rufimana, Schrank Fauna 668.

— — — — Naturforscher 24. S. 77. n. 35.

— — — — Naturforscher 27. S. 147. n. 16. von Frölich.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist schmal, cylindrisch, feinhaarig, im Leben tiefmetallgrün, nach dem Tode tiefblau. Die Füße sind schwarz, und die gelbrothen Vordersehenkel etwas dicker, als die übrigen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Das was wir von diesem Käfer wissen, verdanken wir den Herren Schrank und Frölich. Die Länge desselben beträgt vier, und die Breite eine Linie. Unten ist er tief metallgrün und dabei glanzlos; oben aber heller und mit einigem Glanze, überall feinhaarig. Nach dem Tode geht diese Farbe in ein grünliches tiefes Blau über. Kopf, Halschild und Flügeldecken sind tief punktiert. Längs der Decken ziehen sich ein Paar, wenig bemerkbare, in ihrem Lauf verlöschende, erhobene Striche hinab, und die Spitze jeder Flügeldecke ist ausgerandet und zweizählig. Die Füße sind alle schwarz, nur die Vordersehenkel durchaus, und die Schienbeine bis nahe an die Fußblätter gelbroth, oder (nach dem Tode) orangengelb. Doch bemerkt man auch an den übrigen Füßen eine Neigung zu dieser Farbe. Die Vordersehenkel sind nur wenig dicker als die übrigen.

Aufenthalt.

In den Zweigen der Birnbäume, in Bayern. Herr Schrank hatte das Insekt selbst aus einem solchen durren Zweige herausgenommen.

Vierte Familie.

Bockkäfer mit ungedornem und rundem Halschild. Beyn Fabricius Listkäfer, *Callidium*.

Weniger schädliche.

24. Der bräunliche Bockkäfer. *Cerambyx luridus*, Lin.

Namen und Schriften

Bräunling, bräunlicher Listkäfer, Hof-Bockkäfer, Hof-Listkäfer.

Cerambyx luridus, Lin. 634. 68. — Müller 277. 68.

Callidium aulicum, Fab. Suppl. S. 151. n. 56.

Cerambyx luridus, Forstmann 69.

Callidium curiale Panzeri.

Kenntzeichen der Art.

Der Halschild ist ungedornet und rund; der Körper schwarz und die Flügeldecken bräunlich schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Die Länge dieses von Hellwig für *aulicum* Fab. erklärten Käfers ist nach meinem (Scharfenbergs) Exemplare, das ich von seiner Güte erhalten, fünf und eine halbe Linie. Der Körper ist glänzend, glatt, schwarz, ins Braune fallend. Die nicht sehr langen Fühlhörner sind auch so gefärbt, aber an der Spitze hin gelbbraun. Der Halschild ist auf der Oberseite tiefschwarz, auf der untern, oder dem Brustbein ist keine rothe Linie. Die Flügeldecken scheinen ungestreift, sind aber, genau betrachtet, doch etwas unmerklich gestreift, von Farbe weniger schwarz, als der übrige Körper, und bedecken die äußerste Spitze des Hinterleibes nicht ganz. Die Schenkel sind schwarz, die Schienbeine und Fußblätter gelbbraun. Er ist um eine oder ein und eine halbe Linie kürzer als der lasttragende Bockkäfer, aber lange nicht so beleibt, sondern schmaler und unbehaart, auch ungesteckt. Hingegen ähnelt er dem *Cerambyx striatus* L., nur daß dieser letzte ebenfalls breitleibiger und stärker ist, und recht deutlich-gestreifte Decken hat.

Auch ist er von dem eben so kleinen *Callidium luridum* Fab. verschieden, dessen Halschild nackt und schwarz, mit schwachen Erhöhungen ist, dessen Flügeldecken ziegelroth sind, und woben zwar in der Entomologia Fab. unser Linneischer *luridus* angeführt steht: solcher *luridus* Lin. muß aber ausgestrichen und zu *Callidium aulicum* Fab. gesetzt werden.

Aufenthalt.

Im Gehölz, vorzüglich an Fichten in Deutschland und Dänemark, von daher von Fabricius erhalten hatte.

25. Der violette Bockkäfer. *Cerambyx violaceus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blaubock, blauer Bockkäfer, weichenblauer Bockkäfer, violenblauer Hstkäfer.

Cerambyx violaceus, Lin. 635. 70. — Müller 277. 70.

Callidium violaceum, Fab. 1. 2. 320. n. 9.

Schäfferi Icon. t. 4. f. 13.

Herbsts Archiv tab. 26. f. 10.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist etwas feinbehaart. Der ganze Körper ist glänzend violenblau, mit kurzen Fühlhörnern. Das Weibchen ist eben so, aber größer.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Man findet diesen Käfer von fünf bis sieben und einer halben Linie Länge und von satteblauer Farbe. Der Halschild ist feinbehaart, und nebst den kurzen Fühlhörnern benähe schwarz. Die Flügeldecken sind stahlblau und glänzend, fein behaart und fein chagriniert, oder welches gleichviel ist, mit Grübchen versehen. Er hat keulförmige Schenkel.

Aufenthalt.

Auf Obst- und andern Bäumen, auch zuweilen in Häusern, im Junius. Die Larve lebt im Holz.

26. Der Unbestand-Bockkäfer. *Cerambyx variabilis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Veränderlicher Bock, veränderlicher Hstkäfer.

Cerambyx variabilis, Lin. 639. 74. Müller 278. 74.

Callidium variabile, Ent. 1. 2. 321. n. 16.

— — — — Schrank's Fn. I. Seite 674.

Cerambyx variabilis, Forstmann S. 69.

Schäfferi Icon. t. 4. f. 12.

Kenn:

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist glatt, der Körper metallbraun, Fühlhörner und Füße aber braun.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist nicht über fünf und eine halbe Linie lang. Die Fühlhörner, Brust und Bauchspitze sind rostbraun. Der glatte Halschild ist oben (nicht an den Seiten), nebst den keulichten Schenkeln tiefrostbraun. Die Flügeldecken sind bald sattblau, bald blaßbraun gezeichnet, und der Bauchgrund sammt dem Bauch (die Spigen ausgenommen) bläulicht schwarz.

Schrank in seiner Fauna a. a. O. nimmt fünf Varietäten an, wovon ohngefähr die erste die Stammart ist. Ich setze solche hieher.

a) Halschild (bey Schrank Rückenschild genannt), Fühlhörner, Brust und Bauchspitze sind muschelbraun, die Flügeldecken etwas bläßer, die Spitze sattblau, der Bauchgrund schwarz, die Schenkel keulförmig und schwärzlich.

b) Halschild und alles wie a), nur daß die Flügeldecken keine blauen Spigen haben. Dies ist unser ziegelrother Bockkäfer. *Cerambyx telliceus*; Schäfferi Icon. 64. f. 6.

c) Halschild, Fühlhörner, Brust und Bauchspitze sind muschelbraun, die Flügeldecken sattblau, die Schenkel schwarz muschelbraun; Bauchgrund und Bauch schwarz. Dies ist unser Finnischer Bockkäfer, *Ceram. Fennicus*, Herbst in Finesh Archiv t. 26. f. 8.

d) Halschild, Fühlhörner, Brust und Bauchspitze, auch die Schenkel und der ganze Bauch sind muschelbraun, die Flügeldecken sattblau, der Bauchgrund schwarz.

e) Halschild und Schenkel sind tiefmuschelbraun, Fühlhörner, Brust und Bauchspitze nebst den Flügeldecken muschelbraun, Bauchgrund b) und Bauch (die Spitze ausgenommen) bläulicht schwarz. Dies ist unser Unbestand-Bockkäfer, *Ceram. variabilis*; Schäfferi Icon. 4. t. 12. Auch zieht bey meinen Exemplaren die Farbe ins Gelbrothe.

Schrank hat also drey Finncische Arten in eine einzige zusammen geschmolzen; nur ist schade, daß er bey keiner derselben die Größe angiebt. Vielleicht ändert auch diese sehr ab. Indessen ist unser Finnischer immer von einerley Länge, nämlich vier Linien.

Fabricius hatte in der Entomol. system. bey unserm *C. variabil.* noch das *Callidium hungaricum*, Herbst Archiv t. 26. f. 12. angezogen, nachher aber erklärt er letzteres für eine eigene Art in seinen Supplementen S. 149.

Aufenthalt.

Im Junius und Julius auf Weiden und Fichten.

27. Der

i) Bauchgrund ist die Wurzel des Bauchs. Bauchspitze aber das Keuferste oder Ende des Bauchs.

27. Der ziegelrothe Bockkäfer. *Cerambyx testaceus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rothbock, ziegelrother Holzbock, röthlicher Liskäfer.

Cerambyx testaceus, Lin. 639. 75. Müller 279. 75.*Callidium testaceum*, Fab. Ent. 1. 2. 326. n. 36.

Schäfferi Icon. 64. fig. 6.

Kennzeichen der Art.

Der glatte Halschild ist etwas erhaben, der Körper ziegelbraun, die mittelmäßigen Fühlhörner braun.

Beschreibung des vollkommenen Insektiv.

Er ist dunkelziegelroth. Die Augen sind schwarz, die Fühlhörner rostbraun oder beynahe mattschwarz. Der kahle, glatte Halschild ist nebst der Brust und der Bauchspitze rostbraun. Die gewölbten und grübligen Flügeldecken sind etwas blässer, und haben keine blaue Spitze. Die Schenkel sind keulenförmig. Der Bauch sammt dem Bauchgrunde ist blaulich schwarz.

Es ist die zweite Varietät von *Callid. variabilis* Schrank. Wenn die Flügeldecken aber eine sattblaue Spitze haben, so ist es die erste Varietät eben desselben.

Aufenthalt.

Im Junius und Julius auf Fichten.

28. Der lasttragende Bockkäfer. *Cerambyx bajulus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Lastträger, lasttragender Liskäfer.

Cerambyx bajulus, Lin. 636. 76. Müller 279. 76.*Callidium bajulus*, Fab. Ent. 1. 2. 318. n. 2.

Schäfferi Icon 64. f. 4. 5.

Schäfferi Icon. 68. f. 1. ist von Fabric. angeführt.

Sulzer's Kennzeichen t. 4. f. 29.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist wölbig und rauh, mit zwei Punkt-Erhöbungen, der Leib braunschwarz und die Fühlhörner kurz.

Das Weibchen hat bleichere Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Dieser Käfer mißt sechs bis sieben Linien, und ist schwarzbraun. Der runde Halsschild ist behaart, rauh und grau mit zwei kahlen glänzenden Schwielen, die von ferne wie Punkte aussehen. Die Flügeldecken haben zwei grauliche Binden. Das Weibchen ist blässer. Das Insekt variiert gerne, und eine Varietät hat auf dem aschgrauen Halsschild zwei weiße Linien, und dann rostgelbe Flügeldecken.

Aufenthalt.

Im Julius in altem Holzwerk, in Häusern.

29. Der Finnische Bockkäfer. *Cerambyx Fennicus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Finnländer, Finnländischer Istkäfer.

Cerambyx Fennicus, Lin. 636. 77. Müller 279. 77.

Callidium Fennicum, Fab. Ent. 1. 2. 319. 3.

Ceram. Fennicus Forstmann 70.

Schäff. Icon. 4. f. 12. Herbsts Archiv 1. 26. f. 8.

Kennzeichen der Art.

Der Halsschild ist rostbraun mit schwachen Erhöhungen. Die Flügeldecken sind glänzend violett oder schwarzblau, und die Fühlhörner mittelmäßig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist nur vier Linien lang, zufolge unserer Exemplare, und schwarz. Die Fühlhörner haben so wie die Brust eine rostbraune Farbe. Der etwas runde Halsschild hat rostgelbe verblichene Erhöhungen. Die Flügeldecken sind violett, die dicken Schenkel sind schwarz-rostbraun; der Bauchgrund und Bauch schwarz.

Unsere Nummer 27, der ziegelrothe Bockkäfer ist wohl nichts anders, als eine Varietät dieses unseres Finnischen, nach Hellwigs Beobachtungen. — Aber daß beyde Käfer als Varietäten vom unbeständigen Bockkäfer anzusehen sind, muß noch mehr Bestätigung erhalten.

Aufenthalt.

Im Julius an fichtenen Brettern und Holzwerk, welches er durchbohrt. Auch in Wäldern wird er im Herbst und Frühjahr an kranken Fichten und faulen Holzstücken gefunden.

30. Der blutrothe Bockkäfer. *Cerambyx sanguineus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blutrother Listkäfer, Blutbock, feuerfarbener Bockkäfer.

Cerambyx sanguineus, Lin. 636. 86. Müller 280. 30.

Callidium sanguineum, Fab. Entomol. 1. 2. 326. 35.

Schäff. Icon. 64. f. nach Schrant und nach Linne.

Schäff. tab. 64. f. 1. nach Fabric. und Goëze.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist etwas erhöht, und nebst den Flügeldecken mennigroth; die Fühlhörner sind mittelmäßig. Das Uebrige ist schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist schwarz, der Halschild ungedornt, etwas rund, platt und eckig, und nebst den Flügeldecken blutroth und dabei wollig. Fühlhörner und Körper sind schwarz.

Aufenthalt.

In Wäldern, besonders in Fichtenholz, wo die Larve tiefe Löcher in die Stämme bohrt.

31. Der melancholische Listkäfer. *Callidium melancholicum*, Fabr.

Namen und Schriften.

Callidium melancholicum, Fabr. Entomol. Supplement. C. 151. n. 43.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarzbraun: der Halschild ist flach und unbehaart, mit einer rothen Rückenlinie. Die Fühlhörner sind nicht lang, und die Füße sind pechbraun.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Körper ist klein und mattschwarzbraun, und die kurzen Fühlhörner sind pechbraun. Der flache Halschild ist unbehaart, schwarzbraun und mit einer dunkelrothen Mittelmakel bezeichnet. Die glatten Flügeldecken färben sich schwarzbraun. Die Füße sind ziegelroth und haben zusammengedruckte Schenkel, die nur ein wenig keulenförmig sind.

Aufenthalt.

Nach Fabricius und nach Hübner in Halle bewohnt dieser Käfer die Eichen in Deutschland.

Fiffte Gattung.

Der Schmalbockkäfer. Lepturae; Lin.

Sie heißen auch: Ackerbockkäfer, Ackerböcke, weiche Bockkäfer (und das mit Unrecht, denn die Flügeldecken sind nicht weich) Schmalchwänze.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Die Fühlhörner sind borstenartig und aus knotigen Gelenken zusammengesetzt. Der Halschild ist etwas rund, und die Flügeldecken sind schmal.

Man kann noch hinzu setzen, daß der Halschild randlos ist, und daß bey vielen, ja den meisten, die Enden der Flügeldecken an der Spitze abgestutzt oder ausgeschliffen sind.

Die Larven sind noch unbekannt, werden aber einerley Lebensart mit der vorhergehenden Gattung haben.

Die Fabriciusischen Gattungen mit ihren Kennzeichen sind folgende: Der Liskäfer 89. Callidium Fab. ist bey der vorigen Gattung vorgekommen.

Der Schmalbockkäfer 90. Leptura, hat vier fadenförmige Fressspitzen, eine einzahnichte Kinnlade, die an der Spitze borstig ist, eine häutige und gespaltene Lippe und borstenförmige Fühlhörner.

Die äußerlichen Gattungskennzeichen nach Fabricius sind: der Schmalbockkäfer; der Körper ist oblong, vorwärts und hinterwärts schmal, oftmals sammethaarig, ungerandet und träge; der Kopf ist herausgestreckt und eyrund; die Augen sind kugelig und hervorstehend, und stehen am Rande; die Fühlhörner sind länger als der Halschild, stehen näher beisammen und sind zwischen den Augen eingefügt; der Halschild ist rund, schmal, vorne schwach und unbewehrt; das Schildchen ist klein und dreyeckig; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, öfters ausgerandet von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind etwas länglicht und Gehfüße; die Fußblätter sind viergliedrig.

Das Insekt ist buntfarbig.

Einteilung. Es giebt 1) Schmalbockkäfer mit eyrundem Halschild und abgestutzten Flügeldecken, 2) mit erhabenem runden Halschild und stumpfen Flügeldecken, und 3) mit gleichbreiten Flügeldecken.

Erste Familie.

Mit erundem, vornen schwächtigem Halschild und abgestuften Flügeldecken.

Wunder schädliche.

I. Der schwarzasterige Schmalbockkäfer. *Leptura melanura*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schwarzaster, schwarzastriger Schmalsschwanz.

Leptura melanura, Lin. 637. 2. Müller 284. 2. tab. 6. fig. 1. 2.

— — — — Fab. Ent. 1. 2. 340. n. 5.

— — — — der große (sollte kleine heißen) schmale Holzbock mit rothschwarzer Flügelspitze. Gleditsch II. 88.

Schäffer Icon. 39. f. 4. besonders t. 112. fig. 4.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz mit röthlichen oder rothgelben (beym Weibchen dunkelrothen) Flügeldecken, die an der Nath und der scharfen Spitze schwarz sind und viel Grübchen haben. Der Halschild hat Dornen am hintern Ende.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist fünf Linien lang und schwarz. Bey dem Männchen ist der Halschild tiefschwarz und glänzend. Die schmalen Flügeldecken sind mehr oder weniger gelbroth. Ihre Grübchen sieht man nur mit bewaffneten Augen. Die Vorderfüße sind länger als der Körper. Die Nath der Flügeldecken nicht ganz von der Wurzel angefangen, ist nebst der Flügelspitze schwarz.

Bey dem Weibchen treffen auch diese Merkmale zu, außer daß die Flügeldecken dunkelroth sind, und auch eine schwarze Spitze, aber keine schwarze Nath haben.

Die kleinere Varietät hat verblichene und schmutziggelbe Decken, mit schwarzer Spitze, ohne schwarze Nath.

Aufenthalt.

Auf Kern- und Steinobstarten, und auf Doldengewächsen und andern Blumen häufig im Junius.

2. Der ziegelfarbene Schmalbockkäfer. *Leptura testacea*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schiemblüten-Schmalbockkäfer.

Das Männchen besonders: Gelschild, Ziegelbach, ziegelfarbiger Holzkäfer, scherbenfarbiger Schmalbock.

Das Weibchen: Rother Schmalbockkäfer, rother Aker-Holzbockkäfer, Rothschild, Purpurschild.

Das Männchen:

Leptura testacea, Lin. 638. 5. Müller 285. 5.

— — — Fab. Ent. 1. 2. 342. n. 14.

— — umbellatarum, Schrank Fauna I. 694. Männchen.
Schäfferi Icon. t. 39. f. 3.

Das Weibchen:

Leptura rubra, Lin. 638. 5. Müller 285. 3.

— — — Fab. Ent. 1. 2. 342. n. 13.

— — — — der große, schwarze Holzbock, mit dem rothen Bruststück, Käfen und Flügeldecken. Gleditsch II. 88.

— — umbellatarum Schrank Fauna I. 694. W.

Schäfferi Icon. t. 39. f. 2.

Sulzer's Inf. t. 5. f. 30.

Kennzeichen der Art.

Das Männchen ist schwarz mit gelbbraunen Flügeldecken und Schienbeinen. Der Halschild ist hinten abgerundet.

Das Weibchen hat einen rothen Halschild, Flügeldecken und Schienbeine, und ist noch einmal so groß.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der männliche Käfer von sechs und einer halben Linie Länge hat einen schwarzen, hinten abgerundeten Halschild, schmale gelbbraune Flügeldecken, und fuchsrothe Schienbeine. Der weibliche Käfer ist größer, nämlich von einem Zoll bis vierzehn Linien Länge, und hat einen rothen Halschild, dergleichen Flügeldecken und Schienbeine. Die Fühlhörner, Schenkel und Unterleib sind schwarz. Man hüte sich dies Weibchen mit der *Leptura sanguinolenta* des Fabr. zu verwechseln. Letzterer hat keinen rothen Halschild, sondern nur rothe Flügeldecken.

Aufenthalt und Schaden.

Auf verschiedenen Baumarten, an deren Blättern er zuweilen nagt, sonst aber mehr auf Doldengewächsen, z. B. *Pastinaca sativa* und *Heracleum*, im Jun. bis August.

3. Der

3. Der viermalbandirte Schmalbockkäfer. *Leptura quadrfasciata*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Das Männchen: Schmalbock, Schmalhans, schwächtiger Schmalbockkäfer.

Leptura attenuata, Lin. 639. n. 15. Müller 286. 13.

— — — — — Fab. Ent. 1. 2. 346. n. 40.

Schäfferi Icon. 59. f. 6.

Das Weibchen: Vierband, viergürtelicher Schmalbockkäfer, vierbindiger Schmalbock, gegürtelter Holzkäfer.

Leptura quadrfasciata, Lin. 639. 12. Müller 287. 12.

— — — — — Fab. Ent. 1. 2. 348. n. 44.

Cerambyx fasciatus Scopoli.

Schäfferi Icon. 59. fig. 6.

Kennzeichen der Art.

Das Männchen hat schmale, gelbe Flügeldecken mit vier schwarzen Binden, und ziegelrothen Füßen.

Das Weibchen ist schwarz mit ziegelrothen Decken, worauf vier gezähnte schwarze Binden stehen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der männliche Käfer hat einen kegelförmigen Halschild, mit Dornen am Hinterrande. Die schmalen Flügeldecken sind dachförmig, gegen das Ende spizig verengt. Füße und Bauch sind gelbbraun. Nimmt man die orangengelbe Farbe der Decken zur Grundfarbe an, so sind die vier Binden schwarz, und so umgekehrt, nämlich, wenn die schwarze Farbe zur Grundfarbe angenommen wird, so sind die Binden orangengelb. Zuweilen fehlt die erste Binde ganz, oder ist unterbrochen. Der Hinterleib ist roth, mit schwarzer Spitze, oder auch ganz schwarz.

Der weibliche Käfer ist schwarz, einen Zoll lang, und hat einen kegelförmigen, schwarzen Halschild mit Dornen am Hinter-Ende. Die schmalen Flügeldecken sind rostgelb mit vier schwarzen Querbinden; oder wenn man das Schwarze zur Grundfarbe annimmt, so ist es umgekehrt. Diese Querbinden haben das Ansehen wie vier Flecken. Die Füße sind bläßziegelfarbig, und die Hintersehenkel und Schienbeine an der Spitze schwarz.

Schon Linné hat darauf gerathen, daß die vier fasciata das Weibchen von der attenuata sey. Scopoli und Guésly aber haben es durch Erfahrungen bestätigt gefunden. — Es geht also abermal eine Art ein. Und künftige Untersuchungen werden es zur völligen Gewißheit bringen.

Auf

Aufenthalt.

Auf Buchen und andern Bäumen, desgleichen auf Schwammpflanzen.

4. Der ganz schwarze Schmalbockkäfer. *Leptura melanaria*, Herbst.

Namen und Schriften.

Leptura melanaria Herbst.

Kennzeichen der Art.

Er ist überall ganz schwarz, und die Bauchringe sind unten gelblich. Das Weibchen ist um ein geringes länger und breiter.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Das Männchen hat fünf und eine halbe, und das Weibchen sechs und eine halbe Linie Länge, und ist breiter, als das Männchen; ihm aber sonst an Gestalt und Farbe gleich. Beyde sind am Hinterleibe schmal, und die Spitzen der Flügeldecken sind grau bepudert. Die Fühlhörner und die Schienbeine und Fußblätter sind weniger schwarz, als die Schenkel. Er ist etwas glänzend.

Aufenthalt.

Im May, in Buschhölzern, auf Blumen und Bäumen in unserer Gegend.

5. Der zweybandirte Schmalbockkäfer. *Leptura bifasciata*, Schrank.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Leptura bifasciata, Schrank. a) in *Enumerationem insect. Austriac.* n. 298.

b) in *Fauna Boica* I. S. 693.

Schäfferi Icon. 39. fig. 4.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz, die Flügeldecken roth; eine querlanzettförmige, schwarze Binde zieht sich über die Flügeldecken und über ihr abgesetztes Ende.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Dieser Käfer hat das Längenmaaß des Schwarzstrigen, *L. melanura*, und wird von vielen für eine Varietät desselben angesehen. Wir geben aber Herrn Schrank
Bey-

Benfall, der ihn für eine eigene Art hält. Er ist eben so glänzend roth; Kopf, Halschild und Füße eben so von Bau und Farbe, wie der schwarzasterige. Aber er hat zwei schwarze irreguläre Binden: die erste fängt in der Mitte der Flügeldecken an, und hat, wenn die Decken zusammengeschlossen sind, eine rautenförmige Figur, die andere ist am schmalen Hinterende der Decken. Zwischen beyden ist die Flügelnaht schwarz.

Aufenthalt.

Im Junius, in Deutschland, auf Blüthen, in Holzungen; hier nicht selten.

6. Der Schlehen-Schmalbockkäfer. *Leptura spinosae*, Schrank.

Namen und Schriften.

Leptura spinosae, Schrank Fauna I. Seite 696.

— — — — Schrank Enumerat. N. 310.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild und die Flügeldecken sind sattblau, die Schenkel sämmtlich keulförmig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist am Kopf und auf der Unterseite blau. Die blauen Fühlhörner und Füße sind sämmtlich an ihrer Wurzel muschelbraun. Der ungedornte Halschild und die Flügeldecken färben sich, wie gesagt, sattblau. Die Schenkelkeulen sind schwarz. Die Länge des Insekts ist mir nicht bekannt.

Aufenthalt.

Der Käfer hat seine Flugzeit im May, da wo Hecken sind. Die Larve hält sich im Mark der Schlehenstaudenzweige auf.

Zweyte Familie.

Mit erhabenem runden Halschild und stumpfen Flügeldecken. Sie gehören zu den Fabriciusischen Liskäfern, und machen bey Schrank die Gattung der Widderkäfer, *Clytus*, aus.

Weniger schädliche.

7. Der Weiden-Schmalbockkäfer. *Leptura arcuata*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Vogen-Widderkäfer, Vogenstrich, bogichter Schmalkäfer, Vogen-Schmalkäfer, Vogen-Listkäfer, Weiden-Widderkäfer, Holzkäfer mit Vogenbinden.

Leptura arcuata, Lin. 640. 21. Müller 289. 21. tab. 6. fig. 5.

Callidium arcuatum, Fabr. Ent. 1. 2. 353. n. 64.

Clytus arcuatus, Laicharting.

— *salicis*, Schrank 677.

Leptura arcuata, der schwarze Baumkäfer mit gelben Quersreifen, von welchen etliche bogenweise zurückgeschlagen sind. Glebitsch II. 229.

Callid. arcuat. Panzer Fauna 4. t. 14.

Schäffer Icon. 38. f. 6. et 107. f. 2.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist gerundet. Die Flügeldecken haben außer dreß gelben Punkten, auch vier dergleichen Binden, davon die erste unterbrochen, und die übrigen bogenweise zurückgeschlagen sind.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der männliche Käfer mißt sechs, der weibliche fast acht Linien: beide sind schwarz; mit rundem Halschild, dessen Grundsaum nebst zweß kleinen Schrägslinien gelb sind. Die vier gelben Binden und dreß Punkte zeichnen ihn besonders aus: sie stehn auf den Flügeldecken, die an ihrer Wurzel so wie an der Spitze ebenfalls gelb sind. Die Fühlböden und Füße sind braungelb; doch sind die vier vordersten Schenkel größtentheils schwarz. Ferner so sind der Quersrich des Schildchens, jede Binde aller Beuchringe, dann die Oberlippe und der Hinterrand des Kopfs gelb gefärbt. An der Wurzel jeder Flügeldecke steht ein gelber Punkt, und an ihrer Nath ein gemeinschaftlicher größerer von derselben Farbe. Von den vier Binden nimmt die letzte die Spitze ein, und die erste ist abgebrochen.

Er ändert in den Zeichnungen der Flügeldecken zuweilen ab; daher erklärt Fabricius in seinen neuern Schriften das in seiner Mantissa ehemals aufgeführte *Callidium lunatum* für eine Varietät unsers Käfers.

Daß er von der *Leptura arcuata* Hellwigii, Panzer Fauna 3. t. 12. verschieden sey, braucht man kaum zu erinnern.

Aufenthalt.

In den Weidenstämmen, im Junius. Auch hat Brahm die Puppe desselben öfters bei Maynz in den Scheiten des bückenen Brennholzes gefunden, welche dann im Junius austroch. Zuweilen sieht man ihn auf alten Eichenstöcken und an Fichtenzämmen.

8. Der Widder-Schmalbockkäfer *Leptura arietis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Widder, Unruhe, gemeiner Widderkäfer, Widder-Asterbockkäfer, Widder-
 listkäfer, Schasbock-Widderkäfer, Widder-Holzkäfer.

Leptura arietis, Lin. 640. 25. Müller 290. 23. tab. 6. fig. 6.

Callidium gazella, Fab. Ent. 1. 2. 333. n. 66.

Leptura arietis, der schwarze, gelb- und quergestreifte Baumkäfer, wovon der zweyte
 Streif vorwärts in einen Bogen geht. Gleditsch II. 229.

Clytus arietis Laicharting et Schrank.

Cerambyx quadrisfasciatus Degeer.

Callidium arietis, Panzer Fauna 4. t. 15. M. u. W.

Schäffer Icon. 58. f. 7. Aber t. 107. f. 3. ist zu groß.

Er ist von *Callidium arietis* Fabr. ganz verschieden.

Kennzeichen der Art.

Der höckerige Halschild ist schwarz mit vier gelben Punkten. Die schwarzen Flügeldecken haben gelbe Binden, davon die zweite vorwärts gebogen ist. Die Füße sind rothfarben und die Schenkel schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist ebenfalls wie der vorhergehende schön von Ansehen, und von verschiedener Größe. Die größten sind sechs, die kleinsten vier und eine halbe Linie lang. Letztere halten wir für die Männchen. Die kurzen Fühlhörner sind am ersten Glied und an der Spitze schwarz. Der unbewehrte und kuglige Halschild, der mit vier gelben aus einander stehenden Punkten bezeichnet ist, hat nebst den Flügeldecken eine schwarze Farbe. Jede Flügeldecke hat eine citrongelbe Spitze und dergleichen Binden, davon die oberste eine bloße Quertlinie ist, die weder die Naht noch den Außenrand berührt. Die zweite läuft an der Naht hinauf, oder ist bogenförmig; die dritte ist gerade; die vierte läuft über die Spitze. Die Füße sind rothbraun, mit schwarzen Schenkeln.

Das Zeichen des Widders V, das der Käfer in verkehrter Lage auf den Flügeldecken führt, hat Linne Veranlassung zu dem lateinischen Namen dieser Art, und dem Herrn von Laicharting zu Innsbruck zur deutschen Benennung: Widderkäfer (*Clytus*), den seine ganze Gattung führt, gegeben.

Varietäten von ihm können einen gelben Border- und Hinterrand am Halschild aufweisen.

Aufenthalt.

Im Junius auf Weiden, dann auch auf Schirmpflanzen (umbellati).

Vierte Familie.

Schmalbockkäfer mit gleichbreiten Flügeldecken, wie die dritte Familie der Bockkäfer; Fabriciussche Schneckenkäfer.

Weniger schädlich.

9. Der gebrannte Schmalbockkäfer. *Leptura praecusta*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Angebrannter Walzenkäfer, gebrannter Schneckenkäfer, Zwergböckchen.

Leptura praenusta, Lin. 641. 24. Müller 290. 24.

Saperda praecusta, Fabr. Ent. 1. 2. 317. 48.

Lept. praenusta, der braune, gelbgeflügelte, Baunkäfer. Gleditsch II. 230.

Schäffer Icon. t. 52, f. 8. Voët. 5. t. 18. fig. 83.

Kenntzeichen der Art.

Er ist schwarz, mit gelblichen Flügeldecken, die an der Spitze schwarz sind.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist eine und eine Viertellinie lang, schmalleibig, schwarz und feinhaarig. Der cylindrische Halschild ist mattschwarz, und die Flügeldecken mattgelb mit schwarzer Spitze, und überall gleichbreit. Die Schienbeine, wenigstens der vier vordern Füße, sind gelblich.

Aufenthalt.

Der Käfer besucht im May und Junius die Baumbülthen, und ist nicht selten.

Zwölfte Gattung.

Die Bastard-Bockkäfer. *Necydales*, Lin.

Sie heißen auch Halbkäfer, Bastardböcke, Aiterhelzböcke, Fliegenkäfer, Stugbockkäfer.

Gattungskennzeichen nach Linné.

Die Fühlhörner sind borstenförmig und die Flügeldecken meistens kürzer, als die Flügel.

Die Larven leben vermuthlich im und vom Holz. Der hieher gehörige Käfer, gehört in die Fabriciussche Gattung des Halbkäfers, 92. Molorchus, dessen eigentliche Kennzeichen folgende sind: Die vier Freßspitzen sind ungleich und fadenförmig; die Kinnlade ist häutig und zweispaltig; die Lippe ist auch häutig und zweispaltig; die Fühlhörner sind borstenförmig.

Die äußern Kennzeichen nach Fabricius sind: Der Halbkäfer: Der Körper ist länglich schmal, glatt, ungerandet und von behender Art; der Kopf ist eckrund, abhängig und sehr eingefügt; die Augen sind nierenförmig, ragen hervor, und stehen am Rande; die Fühlhörner sind länger, als der Halsschild, stehen beisammen und sind innerhalb der Augen eingefügt; der Halsschild ist rund und schmal, in der Mitte rinnensförmig; die Flügeldecken sind steif, gewölbt und abgekürzt; die Flügel gefalten, auf dem Hinterleib über einander liegend, und ohngefähr in der Länge des Hinterleibes; dieser ist verlängert, auf beyden Randseiten gebogen; die Füße sind etwas länglich, die Schenkel geknickt, mit viergliederigen Fußblättern. Die Farbe des Insekts ist ziegelroth. Durch die zweispaltigen Kinnladen unterscheidet er sich am meisten von der Leptura.

Zu den weniger schädlichen.

1. Der große Bastard-Bockkäfer. *Necydalis major*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Großer Bastardbock, abgekürzter Halbkäfer, Riesenbastardbock, großer Ackerholzbock, Fliegenkäfer, abgekürzter Bastardbock, großer Stugbockkäfer, schlupfwespenartiger Halbkäfer.

Necydalis major, Lin. 641. 1. Müller 293. 1.

Molorchus abbreviata, Fabr. Ent. 1. 2. 356. 1. In dessen frühern Schriften eine Leptura.

Gymnopteron majus, Schrank Fauna S. 688.

Molorchus abbreviatus, Panzer Fauna 41. f. 20.

Schäffer Icon. t. 10. f. 10. 11.

Kennzeichen der Art.

Die sehr kurzen und eckförmigen Flügeldecken sind rothbraun und ungefleckt, und die Fühlhörner kurz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist eiff Linien lang und schwarz; der Hinterleib allein ist neun Linien lang. Die eifsgliederigen Fühlhörner, welche kürzer als der Leib sind, haben nebst den abgeklärten Flügeldecken eine rothbraune Farbe. Am Ende derselben sitzt manchmal ein schwarzer Punkt. Kopf, Halschild und Hinterleib sind schwarz. Der Halschild ist höhericht gebaut. Die Füße sind roth, aber die Kolben und Hinterfüße schwarz. Der längliche Körper hat fünf Ringe.

Aufenthalt.

Im Julius, im Holz, an Gartenhecken und an Blumen; übrigens selten.

Anmerkung.

Schrank hat auch die Feuerkäfer, *Pyrochroa* Fabr., welche Fabricius von den Linneischen Leuchtkäfern mit Recht abgerissen, und zu einer eigenen Gattung gebildet hat, als Holzwerdberber im Verdacht. Ob nun gleich dieser Vermuthung noch künftige Erfahrungen zu statten kommen müssen: so gedenken wir ihrer doch, besonders der bekanntesten Art derselben, um unsere Leser auf die etwaige Entdeckung ihrer Larve aufmerksam zu machen. Da unter den Linneischen Leuchtkäfern, *Lampyris*, seine rechte Stelle nicht ist, ob ihn gleich Linne einstweilen dorthin gezogen hatte: so sind die von Schrank angegebenen neuen Gattungs-Kennzeichen diese: Der Cardinalkäfer, *Pyrochroa*, hat psitticenförmige, sägezahnige Fühlhörner, einen herzförmigen, hervorragenden und gestreckten Kopf. Der Halschild ist randlos, flach und tellerförmig. Die Fußblätter der Vorderfüße sind fünf- und die der Hinterfüße viergliederig.

Die Gattungs-Kennzeichen nach Fabricius sind: Der Feuerkäfer, *Pyrochroa*: Die vier Freßspitzen sind fadenförmig; die Kinnladen ganz; die Lippe ist hornartig, gleichbreit, linienförmig und ganz; die eifsgliederigen Fühlhörner sind fadenförmig.

Die Neben-Merkmale oder äußere Gattungs-Kennzeichen nach Fabricius sind: Der Körper ist oblong, flach, etwas niedergedrückt, ungerandet, trägt; der Kopf ist erund, hervorgestreckt und flach; die Augen sind rund, hervorragend und an dem Rande stehend; die Fühlhörner sind länger als der Halschild, sägezahnig, unterhalb der Augen eingefügt; der Halschild ist rund und flach; das Schildchen klein und rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind etwas lang, subtil, und zum Gehen gebaut; die vordern Fußblätter haben fünf, die hintern vier Glieder. Die Farbe des Insekts ist roth und schwarz, mit etwas Glanz.

Die Namen und Schriften von dem purpurfarbigen Feuerkäfer, *Pyrochroa coccinea*, Fabr. sind. Purpurrother Leuchtkäfer, purpurfarbener Cardinalkäfer, scharlachrother, Morgenröthe. *Lampyris coccinea* Lin. 646. 13. *Pyrochroa coccinea* Fab. Entom. 1. 2. 104. 1. *Pyrochroa purpurata* Schrank Fn. I. S. 698. *Pyrochr. coccinea* Fauna Panz. 13, 11. Schaff. Icon. tab. 90. f. 4. Die Kenn-

Kenntzeichen der Art: Der Körper ist schwarz und der Halschild mit den Flügeldecken zimmerroth ohne Streifen. — Er ist acht und eine halbe Linie lang; Kopf, Füße, Unterseite des Körpers und Fühlhörner sind schwarz, letztere zugleich sägezählig, kammartig und eifsgliederig. Die zimmerrothen, ungestreiften Flügeldecken, die bei trocknen Exemplaren immer mehr verblassen, sind breiter, als der eben so gefärbte, ungerandete, tellerförmige Halschild, und dieser wieder breiter, als der ganz kleine, herzförmige Kopf. Er variiert auch mit rothem Kopf, doch ist mir selbst keine solche Varietät vorgekommen. Uebrigens ist er sammt seinen Gattungsgenossen von träger Art; auch stellt er sich, wenn er gefangen wird, wie todt, und legt die Fühlhörner an den Unterleib. Sein Flug ist leicht und schwebend, und seine Flugzeit im May, in Hecken und Gärten, auf Blüten,

Dreizehnte Gattung.

Die Warzenkäfer und mit ihnen Verwandten. *Cantharides*, Lin.

Sie heißen auch: Sanct Johannisfliegen, Afterscheinkäfer, Pflasterkäfer mißbräuchlich, Eselkäfer. Diejenigen, die aus denselben hieher gehören, heißen: Werstkäfer, auch Holzbohrer.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Die Fühlhörner sind borstenartig. Der Halschild ist gesäumt und kürzer als der Kopf. Die Flügeldecken sind weich, und die hintern Seiten mit Warzen besetzt. Die zu Linne's Zeiten noch unbekannten Larven, sind mit sechs hornartigen Füßen versehen, und leben theils in der Erde, theils (die Werstkäfer) in Holz. Die eigentlichen Warzenkäfer sind, weil sie vom Insektenraub leben, nützlich, und dem Forstkundigen schonungswerth. Gewisse Arten aber, die Linne, ehe er alles ins Reine bringen konnte, einstweilen mit jenen vereinigte, mußten nachher wegen ihres so sehr verschiedenen Körperbaues und Lebensart von solchen getrennt werden. Fabricius hatte viele Gattungen daraus errichtet. Die eine Gattung davon: Der Werstkäfer, 65. *Lymexylon*, hatte im alten Fabric. System zu Gattungs-Kennzeichen: Die Fressspitzen sind auswärts dicker; die Kinnlade ist gespalten, die Lippe ist linienförmig und an der Spitze zugerundet; die Fühlhörner sind bandelförmig. In der nachherigen *Entomolog. system. F.* sind sie so bestimmt: Der Werstkäfer: Die vordern Fressspitzen sind hervorgestreckt; ihr vorlestes Glied ist groß mit einem eiförmigen Anhang, der gespalten ist, und das letzte Glied der Fressspitzen ist eiförmig und spitzig.

Die äußern Kennzeichen der Gattung nach Fabricius sind: Der Körper ist verlängert, cylindrisch, glatt, ungerandet und lebhaft; der Kopf ist rund, oben flach, tief

tief eingefügt; die runden hervorragenden Augen stehen an der Seite: die kurzen Fühlhörner stehen nicht nahe beisammen, und sind vor den Augen eingefügt; der Halschild ist kurz, seitwärts ausgehend und nicht merklich gerandet; das Schildchen ist rund; die Flügeldecken liegen über einander, sind biegsam, von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und stark; die Schenkel zusammengedrückt; die Fußblätter fünfgliederig. Die Farbe des Insekts ist dunkel.

Minder schädliche.

1. Der schnellkäferähnliche Wanzenkäfer. *Cantharis dermestoides*,
Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Käferfliege, speckkäferartiger Asterscheinkäfer, Holzbohrer, speckkäferartiger Holzbohrer.

Cantharis dermestoides, Lin. 650, 25. Müller 314, 25.

Lymexylon dermestoides, Fab. Ent. 1. 2. 91. 1. In seiner Mantissa sonst eine Horia.

— — — — — Panzer Fauna 22. t. 2. Weibchen.

Lytta Francofurtana, Herbst's Archiv 6. t. 30. f. 4.

Kennzeichen der Art.

Er ist bräunlichgelb. Die Augen, Flügel, eigentliche Brust, auch Rand und Spigen der bräunlichgelben Flügeldecken sind schwarz. Die Fühlhörner sind nicht so lang als der Halschild.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist sieben bis acht Linien lang, und durchaus gleichbreit, fein behaart. Die kurzen Fühlhörner sind gegen die Spitze schwärzlich. Außer den beyden Gliedern an der Wurzel sind die übrigen neun Glieder sägezählig. Die Flügeldecken sind dunkler als der bräunlichgelbe Kopf und Halschild. Augen, Brust und Flügel sind besonders schwarz. In der Gaune ist der Halschild mehr roth als bräunlichgelb, welches mit meinem Exemplar nicht zutrifft.

Das *Lymexylon flabellicorne* Schneideri, Panzeri Fn. 15. t. 10. wird von einigen mit Unrecht für das Männchen zu unserm Käfer gehalten.

Aufenthalt.

Er findet sich in altem, modernden Holz, ist aber gar nicht gemein.

2. Der Eichen-Werftekäfer. *Cantharis navalis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Matrose, Schiffswerftekäfer, Eichen-Holzbohrer.

Cantharis navalis, Lin. 630. 26. Müller 314. 26.*Lymexylon navale*, Fabr. Ent. 1. 2. 92. n. 5.

— — — Panzer Fn. 22. t. 5.

— — — Oliviers Insect. 25; t. 1. fig. 4.

Aber Sch. ä. f. 59. f. 1. muß nicht angeführt werden, weil dort *Necydalis melanurae* Varietät abgebildet ist.

Kennzeichen der Art.

Der Körper ist gelb; der Kopf nebst dem Außenrand und der Endspitze der Flügeldecken schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist fünf und drey Viertellinien lang, nach Schrank sechs Linien. Der längliche schmale Körper ist nebst den Füßen gelb. Die Fühlhörner sind sehr kurz, sägezählig und fadenförmig. Der Kopf ist schwarz, und der Halschild vornen und hinten abgestutzt und gerändert, und in der Panzerschen Faune röthlichgelb. Die gelbe Farbe der Flügeldecken verliert sich gegen die Spitze zu ins Schwarze. Der Hinterleib ragt kaum unter den Flügeldecken hervor, wie beim *dermestoides* und *proboscideum*.

Aufenthalt und Schaden.

In absterbenden Eichenstöcken, bey Berlin, Regensburg, Augsburg, Braunschweig. Besonders ist er in Schweden, als ein auf den Schiffswerften bekanntes, und die zum Schiffbauholz verwendeten Eichenstämme zerstörendes Insekt einheimisch und verhaßt.

3. Der Tannen-Werftekäfer. *Lymexylon proboscideum*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Tannen-Holzbohrer, Holzbohrer mit den verlängerten Fressspitzen, bärtiger Holzbohrer, Marcuskäfer.

Lymexylon proboscideum, Fab. Ent. 1. 2. 92. n. 3.

— — — Panzer 22. f. 3.

— — — *barbatum*, Panzer 22. f. 4. Spielart.

Meloë Marci, Lin. 631. n. 15. Ebenfalls Spielart.

Pterophorus, Herbst in Guesly Archiv t. 27. f. 1.

Kenn:

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz. Die Flügeldecken sind kastanienbraun, am hintern Drittel schwarz. Die Fressspitzen haben einen federförmigblättrigen Ansaß.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist nach Schrank vier Linien lang, und eine breit, nach Panzer aber fünf und eine halbe Linie lang, und nicht ganz durchaus gleichbreit. Der Körper ist schwarz, aber die Kinnlade, die Füße, nach Linne nur die vier vordern, und der After sind rothbraun. Der tellerförmige Kopf und Halschild sind flach gerundet, etwas gestreckt, schwarz und ungesleckt. Die Fühlhörner sind sägezählig, dabey etwas perlenschnurartig und von der Länge des Halschildes. Die zwei Fressspitzen sind schwarz mit einer federbuschartigen, und also recht sonderbar gestalteten, großen, an der Wurzel durchblättrerten, und an der Spitze gekrümmelten Kolbe oder Ansaß versehen. Dieser Federbusch, womit das äußerste Glied der Fressspitze geziert ist, ähnelt dem Federbusch der Federbuschpolypen. Er giebt dem Kopf das Ansehen, als wenn er einen starken Schnurrbart hätte. Der Halschild ist kaum gerandet. Die Flügeldecken sind kastanienbraun, am hintern Theile schwarz, glanzlos, und eben so wie der schwarze, am After rothbraune Hinterleib, weich, wie ohngefähr die Wärgenkäfer sind.

Dies Insekt, an dem Linne Ähnlichkeit fand mit dem *Carabus buprestoides*, soll nach Herrn Professor Hellwig und einer Recension in der allgemeinen Literaturzeitung das Männchen von dem oben beschriebenen *Lymexylon dermestoides* seyn. Und der härte Holzbohrer, *Lym. barbatum*, Fab. Ent. Panzeri Fn. a. a. O. Schaffl. Icon. 279. fig. 7. mit mattbraunschwarzen Flügeldecken, von eben der Größe, dessen Körper schwarz ist mit flüchtigem Gold-Sammerglanz, und dessen Fühlhörner und Füße mattperlsfarbig sind, soll eine Spielart von unserm Käfer seyn, oder vielleicht das Männchen dazu. Nur muß in Fabricii Ent. und Panzeri Fauna bey *barbatum*, des Schallers *Mordella* ausgeschrieben, und dafür a) *Meloe Marci* Lin., b) *Lymexylon Marci* Oliviers, c) *Lymexylon morio*, Fabr. gesetzt werden. — Herr Hellenius in Schweden vereinigt alle drei Arten zu einer eigenen, neuen Gattung, unter dem Namen *Serropalpus*, der ihre Federbusch-Fressspitzen anzeigt.

Aufenthalt.

Im Holze absterbender Tannensöcke. Seine Entwicklung und Hervorkunft aus dem Puppenstande, erfolgt schon im März und April.

Vierzehnte Gattung.

Die Springkäfer. Elateres, Lin.

Sie heißen auch: Schnellkäfer, Springschnellkäfer, Heuschreckenkäfer.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Sie haben eine länglichteyrunde Gestalt, fadenförmige Fühlhörner, vornehmlich aber eine Schnelkraft, die sie, auf den Rücken gelegt, mittelst ihres länglichen, viereckichten Halschildes ausüben, indem sie manchmal über einen Fuß hoch in die Höhe springen oder losschrellen.

Die zu Linne's Zeiten noch unbekannten sechsfüßigen und mit einer hornartigen Haut bedeckten Larven wohnen im versaulten Holze, besonders in solcher faulen Holzerde, die man in den Gärten roten läßt.

Die Gattungs-Kennzeichen nach Fabricius sind: Der Springkäfer, 79. Elater: Die Freßspitzen sind beilförmig; die Kinnlade einzahnicht und stumpf, die Lippe gespalten, und die Fühlhörner fadenförmig. —

Die äußern Gattungs-Kennzeichen sind nach Fabricius: Der Körper ist verlängert, etwas cylindrisch, ohne Rand und ohne Lebhaftigkeit; der Kopf ist klein, gerundet, sehr eingefügt; die Augen sind kugelig, stehen an der Seite, ohne sehr hervorzuragen; die Fühlhörner haben die Länge des Halschildes, sind sägezählig und von einander abstehend; sie sind unterhalb der Augen eingefügt; der Halschild ist flach mit einem beyderseitigen, vorstehenden, scharfen Eck, und einem Brustzahn, der aus der Grube des Bauchs zurückspringt; das Schildchen ist klein und rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und stark, die Fußblätter fünfgliederig. Die Farbe des Insekts ist scheckicht, mehrentheils aber dunkel.

Eine Darstellung der mehresten Arten dieser so artenreichen Gattung, würde zu viel Raum erfordern und für den Forstmann aus der Ursache unnöthig seyn, weil sich diese Insekten sämmtlich durch ihr Aufschnellen dem Finder entdecken, und überdies unter ihnen wohl Arten seyn werden, deren Larven nicht im Holze wohnen. Wir begnügen uns daher hier folgende aufzuführen.

Minder schädliche.

1. Der zweyblättrige Springkäfer. Elater bipustulatus, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blutpunkt, Blutblatter.

Elater

Elater bipustulatus, Lin. 652. 9. Müller 320. 9.

— — — Fab. Ent. 1. 2. 235. n. 83.

— — — Forstmann S. 70.

Schäffer Icon. t. 104. fig. 6.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz, glänzend, mit einem rothen Punkt nach der Wurzel der Flügeldecken zu.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Beide Flügeldecken haben zusammen zwei, jede gestreifte Decke aber für sich nur einen rothen Blatterfleck. Auf der Unterseite ist das Insekt bräunlich schwarz.

Eine Varietät ist an der Wurzel der Flügeldecken roth; die Naht selbst aber, bleibt schwarz.

Aufenthalt.

Auf Bäumen, besonders Weiden; wie denn überhaupt die Springkäfer die Hecken und niedrigen Bäume mehr besuchen, als die großen.

Nach Zink benagt er die Rinde junger Fichtenpflanzen, welche öfters davon verdorren.

2. Der blutrothe Springkäfer. *Elater sanguineus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hoftrauer, Rothbock, blutrother Schnellkäfer, blutig eingesäusiter Springkäfer, Sattelspringkäfer.

Elater sanguineus, Lin. 654. 21. Müller 322. 21.

— — — Fab. Ent. 1. 2. 228. 55.

— — — Panzer Fn. 5. t. 13. Weißen.

— ephippium, Fab. Ent. 1. 2. 228. 56. Varietät.

— — — Panzer Fn. 5. t. 14. W.

Schäffer Icon. t. 31. f. 7. Desgleichen die Variet. t. 5. Doch muß Schäff. t. 2. f. 6. nicht angeführt werden, woselbst *Elater haematodes* Fabr. mas abgebildet ist.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwarz und glänzend, mit schwarzem Halsschild und rothen Flügeldecken, die an der Spitze schwarz sind. Das Männchen hat Kamm-Kühnhörner.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Die Länge beträgt fünf Linien. Der Körper ist tief schwarz und glänzend. Die eiförmigen Fühler sind sägeförmig und gelb, der Halschild aber schwarz, so wie auch die äußerste Spitze der tiefrothen Flügeldecken. Die Füße haben einen schmutzgelben Anflug. Die Fühler des Männchen sind kämmsförmig und schwarz.

Die Varietät hat eine, beiden Flügeldecken gemeinschaftliche Mittelmakel von schwarzer Farbe, und heißt alsdann *Elater ephippium*, Sattel-Springkäfer.

Aufenthalt.

Der Käfer findet sich im May, an Eichen, Weiden, Fichten, Obstbäumen und Doldengewächsen. Die Larve wohnt in alten modernden Eichstöcken, in deren Holz sie Canäle gräbt und sich zuletzt verpuppt. Die oben erwähnte Varietät hat sich mehrtheils in alten faulen Fichtenstöcken gefunden.

3. Der Rothdecken-Springkäfer. *Elater haemelyter*, Schrank.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Elater haemelyter, Schrank Fn. I. 591.

— *sanguineus*, Scopoli 237.

— *melanocephalus*, Voët. II. t. 44. f. 2.

Schäfferi Icon. t. 11. fig. 8. Diese Abbildung hatte Linne am Ende seines ersten Theils für *Elater livens* aus Verschen erklärt, und Fabricius ihm dieses nachgeschrieben.

Kennzeichen der Art.

Die Flügeldecken sind durchaus sattroth, die Fühler fadenförmig; alles Uebrige ist schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Die Länge desselben ist sechs Linien und die Breite zwey. Die sattrothen Flügeldecken hat dieser Käfer mit dem blutrothen, *Elater sanguineus* gemein. Aber die Fühler sind an dem Rothdecken-Springkäfer fadenförmig, und am blutrothen sägeförmig.

Aufenthalt.

Im März, April und May, im Holz der Weisstannstöcke.

4. Der mäusefarbene Springkäfer. *Elater murinus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wasserwolke, mäusefarbener Schnellkäfer, grauer Springkäfer.

Elater murinus, Lin. 655. 28. Müller 324. 28.

— — — Fab. Ent. 1. 2. 221. n. 26.

Schäffer Icon, 4. f. 6.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist dunkelashgrau; die Flügeldecken grauneblig, die Fußblätter roth.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist fünf und eine halbe Linie lang und mäusegrau. Die Flügeldecken haben wolkenartige oder mit aschgrau getrübte Zeichnungen von Filtzhäärchen. Der Rücken des Hinterleibes ist oben und unter den Decken licht braunroth, die Flügel selbst sind beruht. Die Fußblätter und Fühlhörner sind braunroth.

Aufenthalt.

Im April, gemein, nachdem er in der Erde, oder zuweilen unter Weiskrautblättern überwintert hat. Er fliegt im Sonnenschein gern auf Wiesen, und man hat ihn auch die Blüthen der Bäume benagen sehen.

5. Der Seidenglanz Springkäfer. *Elater holosericeus*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Elater holosericeus, Fab. Ent. 1. 2. 222. n. 27.

Geoffroy Ins. I. 135. n. 10.

Voët. Coleopt. t. 44. f. 27.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild und die Flügeldecken sind mattschwarz, mit aschgrauen, nebligen Mischungen, die etwas schillern.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Käfer ist vier und drei Viertellinien lang, und hat viel Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden mäusefarbigen; nur hat der gegenwärtige einen aschgrauen Schiller in seinen

nen vermischten Zeichnungen. Die Oberseite des ganzen Käfers ist bunt aus Aschgrau und Braunschwarz; der Körper aber, der sowohl vornen her, als nach hinten schmal gebaut ist, also eine spindelförmige Gestalt hat, ist mattschwarz. Die Flügeldecken sind vielstreifig, aber die Streifen sind fein.

Aufenthalt.

Im Junius und Julius bey uns an vielen Waldbäumen und Hecken, besonders wilden Rosen jährlich häufig.

F u n f z e h n t e G a t t u n g .

Die Prachtkäfer. Buprestides, Lin.

Sie heißen auch: Gleichkäfer und Stinkkäfer, welchen Namen sie aber nicht verdienen, da sie theils keinen Geruch haben, theils ihre Larven nicht, wie man ehemals glaubte, in Morästen und schlammichten Gegenden wohnen.

Unter den ausländischen Arten giebt es sehr prächtige, deren Flügeldecken dem Amerikanischen Frauenzimmer zum Kopfschmuck dienen.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Die Fühlhörner sind borstenartig, und der Kopf zur Hälfte unter dem Halschild gebogen.

Die Larven wohnen durchgängig im Holz. Denn man findet den Käfer nur da, wo es Gesiräuche und Bäume giebt, die kleinern Arten ausgenommen. Sie haben unter den Insekten keine Feinde, weil ihre Panzer zu stark sind, und weil sie nur in der heißen Tageszeit sich sehen lassen.

Die Gattungskennzeichen nach Fabricius: Der Prachtkäfer, 78. Buprestis: Die Fressspitzen sind fadenförmig; das letzte Gelenk ist abgestutzt. Die Kinnladen sind einzahnig und stumpf. Die Lippe ist cylindrisch und zugespitzt. Die Fühlhörner sind fadenförmig und gezahnt.

Die äußerlichen Gattungskennzeichen desselben sind: Der Körper ist verlängert, ein wenig niedergedrückt, seltener abgerundet; randlos, unbehaart, ohne Lebhaftigkeit; der Kopf ist rund, sehr eingefügt und abgestumpft; die Augen sind groß und länglich, stehen an den Rändern und ragen kaum hervor; die Fühlhörner sind kürzer als der Halschild, sägezahnig, nahe beysammenstehend und unter den Augen eingefügt; der Halschild geht seitwärts aus und ist zuweilen gebogen und ausgeschweift; die Flügeldecken sind

sind steif und etwas ausgehöhlt, zuweilen auch am Rande gezähnt; das Schildchen ist klein und rund; die Füße kurz und stark; die Fußblätter fünfgliederig. Das Insekt hat mehrentheils einen Glanz und bunte Farben.

Abtheilung. Es giebt 1) Prachtkäfer mit erhöhten und hinten gespizten Flügeldecken, 2) mit hinten an der Spitze gezähnelten Flügeldecken.

Erste Familie.

Die mit erhöhten und hinten gespizten Decken,

Minder schädliche.

1. Der achttropfige Prachtkäfer. *Buprestis octoguttata*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Achttropf, Fleckenschild.

Buprestis octoguttata, Lin. 659. 2. Müller 334. 2.

— — — — Fab. Ent. 1. 2. 205. n. 72.

— — — — Forstmann S. 71: n. 27.

Schäffer Icon. 31. — Berner t. 204. f. 4.

Kenntzeichen der Art.

Auf jeder Flügeldecke sind vier fast viereckige weiße oder gelbliche Flecken. Der Körper ist glänzend blauschwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist groß. Die Fühlhörner sind schwarz, von der Länge des Halschildes. Der Kopf ist bald schwarz, bald schlackenblau, mit einem weißen Striche vor den Augen. Der bald schwarze bald blaue Halschild, hat einen gelblichen oder weißen Randsaum. Die bald schwarzen bald blauen Flügeldecken sind gestreift und am Ende ausgeschnitten. Jede derselben hat vier gelbe oder weiße eingedruckte Punktflecken an der Seite; beyde Decken also zusammen acht Flecke oder Tropfen. Daher der Name des Insekts. Der blaue Hinterleib hat eine weiße Querlinie auf jeder Seite nach der Wurzel hin, und auf jedem Bauchringe stehen zwei weiße Punktflecken, daß also achtzehn vergleichen auf der Unterflache gezählt werden. Die Füße sind blau, mit einem weißen Punkt auf den vier Vorderfüßen. Die Grundfarbe ändert mit Blau oder Schwarz, oder mit Vergoldung ab, mit oder ohne Flecken.

Auf

Aufenthalt.

Im Fichtenholz. Er ist im Sommer bey warmem Sonnenschein an den Wurzeln und jungen Fichtenpflanzungen, vorzüglich in sandigen Gegenden zu finden.

Zweyte Familie.

Mit Flügeldecken, die gegen die Spitze sägezähntig sind.

Weniger schädliche.

2. Der Marylandische Prachtkäfer. *Buprestis Mariana*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Maryländer, mißbräuchlich: Marylandischer Stinkkäfer.

Buprestis Mariana, Lin. 660. 6. Müller 336. 6.

— — — Fab. Entom. 1. 2. 195. n. 41.

Herbst Archiv t. 54. f. 5.

Schäfferi Icon. t. 59. f. 1.

Kennzeichen der Art.

Er ist kupfricht; der Halschild und die Flügeldecken sind nach der Länge runzlicht. Jede Flügeldecke hat zwey Gruben.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der ganze Käfer, der nach meinem Exemplar, das ich der Güte des Hrn. Prof. Hellwigs verdanke, einen Zoll und eine Linie Länge hält, ist schwarzbräunlich-kupferfarbig. Diese Farbe verbreitet sich über die ganze Oberfläche desselben. Die Fühlhörner sind schwarz; der Kopf ist gefurcht, d. i. mit Rinnen versehen, und um die Augen mit einem goldfarbenen Kreis. Der Halschild ist runzlicht: man sieht darauf außer den Runzeln noch ein an den Rändern eingedrücktes Wöndchen. Die Flügeldecken, welche nach der Spitze hin am Außenrand sehr leicht gezähnt sind, haben auf ihrer Mitte zwey Gruben, die, wie die in der Nähe der Naht hinlaufende Längsfurche, nebst allen übrigen Vertiefungen grau bestäubt sind. Die Unterseite des Insekts ist behaart und metallglänzend. Die oben angeführte Schäfferische Abbildung hat ziemliche Aehnlichkeit: allein die in dem Linneischen Werk und den Fabriciusschen Schriften allegirte Schäfferische Abbildung Icon. t. 49. f. 1. gehört wohl nicht hieher.

Auf

Aufenthalt.

In faulen Weidenstöcken, und vermuthlich auch in Fichten.

3. Der goldnarbige Prachtkäfer. *Buprestis chrysostigma*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Goldpunktirter Prachtkäfer, Goldpunkt.

Buprestis chrysostigma, Lin. 660. 7. Müller 336. 7.

— — — — Fab. Ent. 1. 2. 199. 57.

— — — — Walther's Forstwissenschaft 542.

— — — — Herbst's Archiv t. 28. f. 6.

Beide Abbildungen, Schäfferi Elementa 31. f. 1. u. 2. und Sulzer's Kennzeichen t. 6. f. 59. die gewöhnlich, auch sogar von Fabricius hier allegirt werden, gehören nicht hieher.

Kennzeichen der Art.

Er ist schwärzlich oder metallbraun. Die Flügeldecken sind gezahnt oder gesägt, und in die Länge gefurcht, mit zwey eingedruckten Goldflecken und punktirtem Halschild.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist fünf Linien lang und zwey breit. Der Halschild ist plattgedruckt, der Körper braun. Jede der gefurchten Flügeldecken hat zwey rothgoldene eingedruckte Fleckgruben. Der Hinterleib ist oben goldgrün. Der Rand ist purpurglänzend.

Aufenthalt.

Auf Äspen, im August.

4. Der ländliche Prachtkäfer. *Buprestis rustica*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bauer, Bauren-Prachtkäfer, grüner Prachtkäfer, ländlicher Glaiskäfer.

Buprestis rustica, Lin. 660. 8. Müller 337. 8.

— — — — Fab. Ent. 1. 2. 205. n. 81.

— — — — Walther's Forstwiss. 542.

Schäfferi Icon. t. 2. f. 1.

Kennzeichen der Art.

Die Flügeldecken sind ausgerandet, und mit Dunkelfupfergrün gestreift.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist tiefschwarz mit Kupferglanze, und länglich. Der Halschild ist punktiert. Die gestreiften Flügeldecken sind an der Spitze abgestutzt.

Beim Weibchen läßt der entblößte After oder der letzte Einschnitt, zwei gelbe Flecken sehen.

Eine Varietät ist blauglänzend.

Aufenthalt.

Im Junius auf Eichen.

5. Der Eichen-Prachtkäfer. *Buprestis Quercus*, Herbst.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Buprestis Quercus, Herbst's Archiv 5. t. 28. f. 13.

— — — — — Walther's Forstwissensch. 342.

Kennzeichen der Art und Beschreibung.

Er ist grün glänzend. Der Halschild ist kreisrund, mit einem eingedrückten Punkte, die Flügeldecken abgestutzt und gerippt; die Füße blau, die Fühlhörner schwärzlich. — Er ist fast einen Zoll lang.

Aufenthalt.

Im Eichenholz am liebsten, wo er im Junius an den Stämmen der Eichen in Gesellschaft des goldenen Metallkäfers den hervorquellenden Saft einsaugt.

6. Der zweytropfige Prachtkäfer. *Buprestis biguttata*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Zweytropf.

Buprestis biguttata, Fabr. 1. 2. 213. n. 15.

— — — — — Walther's Forstwissensch. 342.

Herbst's Archiv V. t. 28. fig. 22.

Kennzeichen der Art.

Er ist grün, gleichbreit, auf jeder Flügeldecke mit einem weißen Punkt und einigen andern am Rand des Hinterleibes bezeichnet.

Es giebt auch blaue Varietäten.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist fünf und zwei Drittellinien lang, und seine Flügeldecken besonders vier und eine halbe, und ist gleichbreit und grün, nämlich auf der Oberseite glänzend, und der Unterseite seidnähulich. Das Grüne ändert bald ins Schwärzliche mit Goldglanz, bald ins Sattelfarbengrüne, bald gar ins Blaue. Auf jeder zugerundeten und gegen die Spitze hin sägezahnigen Flügeldecke sitzt nahe an der Naht ein weißer Punkt. Sechs andre weiße Punkte sind auf der Ober- und Unterfläche am Rand des Hinterleibes, nicht der Flügeldecken, nämlich drei auf der obern und drei auf der untern. Da die Decken nicht genau die ganze Breite des Hinterleibes einnehmen, so fallen sowohl die obern als die untern Punkte ins Auge. Alle diese Punkte bestehen aus feinem Haarsilze, wovon an dem übrigen Insekte weiter keine Spur ist. Nicht nur die Farbe des Insekts, sondern auch die Zahl der Randpunkte ist veränderlich.

Aufenthalt.

Im Julius auf den jungen Schößlingen der Eiche.

Sechzehnte Gattung.

Die Schattenkäfer. Tenebriones, Lin.

Sie heißen auch: Mehlkäfer, Schlupfkäfer.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Die Fühlhörner gleichen einer Perlschnur oder Reihe von Knötchen. Der Halschild ist erhaben und gesäumt; der Kopf ragt hervor; der Körper ist länglich und die Flügeldecken etwas steif. Nicht alle haben Flügel.

Die mit dreizehn Gelenken, ein Paar Fühlhörnern und einer Kinnlade versehenen Larven, leben wie die Käfer in dumpfigen Winkeln und im Auskheide, viele in Mehl und andern Küchen Sachen, in Mühlen und Backerhäusern.

Von dieser Gattung zählen wir eine Art zu den Forstinsekten, welche aber zu den Fabriciusischen Kneipkäfern gehört.

Die Gattungskennzeichen vom Kneipkäfer, *Tragosita*, Fabr. (*Tragosita* in der Entomolog. F.) sind: Die vier Fressspitzen sind sich gleich, nur das äußerste Glied ist abgestutzt; die Kinnlade ist einzahlig; die Lippe hornig, zweispaltig, mit runden gefranzten Falten; die Fühlhörner sind perlschnurförmig; die drei letzten Glieder dicker und ein wenig zusammengedrückt. Die äußern Kennzeichen nach Fabricius sind: Der Körper ist verlängert, glatt, ungerandet; der Kopf ensformig, mit Furchen versehen; die Augen sind rund und stehen in der Mitte des Randes; die Fühlhörner sind vor den Augen eingefügt; der Halschild ist ensformig und flach, hinterwärts rund; das Schildchen ist klein; die Flügeldecken sind steif, nicht niedergebogen, und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind kurz und stark, die Schenkel zusammengedrückt, die Schienbeine rund, und die Fußblätter füngliedrig. Das Insekt hat mehrentheils eine schwarze Farbe.

Weniger schädlich.

1. Der lauffäferartige Schattenkäfer. *Tenebrio caraboides*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Vastartkäfer, Zwergschroter, lauffäferartiger Kneipkäfer.

Tenebrio caraboides, Lin. 677. n. 25. Müller 374. 25.

— — — — Fab. in seinen frühern Schriften.

— — *picens* Schalleri.

— — *caraboides* Forstmann 72.

Tragosita (*Trogosita*) *caraboides*, Fab. Ent. 1. 2. 115. 2.

Lucanus fuscus, Geoffroy 1. 64.

— — — — Preßler, Verzeichniß Böhmischer Ins. I. tab. 3. fig. 1.

Carabus bucephalus et *dubius* Herbstii.

Tragosita caraboides, Panzer Entomologisches Taschenbuch von 1795. S. 41.

— — — — Panzer Fauna 3. t. 4.

Sulzers Kennzeichen t. 7. f. 53.

Kennzeichen der Art.

Er ist pechbraun, mit fast viereckigem an den Seiten gerändertem Halschild und punktförmigen Flügeldecken; der Halschild ist von dem übrigen Theil des Bruststückens (den einige, wie in der Einleitung angegeben ist, mit zum Hinterleib rechnen) mittelst eines Halses beträchtlich getrennt.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er ist drei und eine halbe bis vier Linien lang, mit kleinen, mondformigen, zweizähligen, schwarzbraunen Kinnladen; handelsorfförmigen, zehngliedrigen Fühlhörnern, davon

davon die drei äußersten, etwas größeren Glieder, die Kolbe ausmachen. Sie sind nebst den vier Freßspitzen, den Füßen und den Seiten des Hinterleibes rothbraun. Der Kopf und Halschild sind unordentlich- aber feinpunktirt, und nebst den zusammengewachsenen, etwas rauhen Flügeldecken dunkel schwarzbraun. Der fast viereckige Halschild ist vornen her mit fuchsrothen Härchen eingefaßt. Jede Flügeldecke hat acht bis neun Hochpunktstreifen, davon der erste vom zweiten weiter entfernt ist; eine doppelte Reihe sehr feiner Punkte ziehen sich zwischen jedem Paar der Streifen durch. Unter den Decken ist er flügellos. Die Fußblätter sind viergliederig. Prensler sah die zwischen den Kinnladen stehenden zwei kleinen fuchsrothen Zähne für pinselförmige Werkzeuge an, vergleichen man an den Schröttern wahrnimmt. Sie sind es aber wohl nicht.

Aufenthalt und Schaden.

In Fichtenstämmen; auch in alten Gebäuden, zuweilen auch in Häusern, in Stellen und Verhältnissen süßer Sachen. Bisher wurde er bey uns nicht wahrgenommen. Herr von Burgsdorf in seiner Schrift: Die Eiche, S. 185 schreibt: daß dies Insekt unter den Wurzeln der jungen Kiefern im Sandboden wohne, des Abends und in der Nacht hervorkomme, und den feinen Saft der jungen Sprossen verzehre,

Siebzehnte Gattung.

Die Blasenkäfer. Meloë, Lin.

Sie heißen auch: Afterkäfer, Maywürmer, Graskäfer.

Kennzeichen der Gattung nach Linne.

Die Fühlhörner gleichen einer Perlschnur, und das letzte oder zwölfte Gelenk ist cyrund. Der Halschild und die Flügeldecken sind etwas rund; letztere sind weich und biegsam. Der Kopf ist bucklich und gebogen.

Die sechsfüßigen, gelben, zwölfringigen Larven mit kurzen Fühlhörnern haben am Schwanz einige Härchen, und scheinen von Pflanzenblättern zu leben, jedoch nicht alle.

Kennzeichen der Gattung nach Fabricius.

Der Pflasterkäfer, 62. *Lytta*, hat vier Freßspitzen, die hinten geknelt sind, gespaltene Kinnladen, abgestufte Lippen und fadenförmige Fühlhörner. Die äußern oder Neben Kennzeichen derselben sind: Der Körper ist länglich, glatt und fast nicht behaart,

behaart, ungerandet und träge; der Kopf ist groß, sehr eingesügt und ensörmig; der Halschild ist etwas breit; die Augen stehen an der Seite und sind rund; die Fühlhörner sind von einander abstehend, in den innern Augenringel eingesügt und länger als der Halschild; das Schildchen ist klein; die Flügeldecken sind etwas weich, gewölbt und von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind schmale, lange Gebefüße, mit fünfgliederigen Vorder- und viergliederigen Hinterfußblättern. Die Farbe des Insekts ist bunt und sehr glänzend.

Weniger schädlich.

1. Die Spanische Fliege. *Meloë vesicatorius*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gemeiner Pflasterkäfer, Blasenzieher, Spanischer Blasenzieher, blasenziehender Maywurm, Maywurmkäfer.

Meloë vesicatorius, Lin. 679. n. 5. Müller 380. 3.

Lyta vesicatoria, Fab. 1. 2. 83. 1. wo *rufo-collis* durch einen Druckfehler steht.

Meloë vesicatorius, die große Spanische Fliege Gleditsch Forstwissensch. I. 273. Gleditsch II. 164. 197. u. 207.

Lyta vesicatoria, Panzer Fauna 41. t. 4.

Schäffer Icon. t. 47. f. 1.

Kennzeichen der Art.

Er ist glänzend grün, goldglühend und himmelblauschielend, mit langen, etwas gestreiften Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Seine Länge ist verschieden. Er hat sieben bis neun Linien, und ist durchaus goldgrün. Die Fühlhörner sind schwarz. Der Kopf ist hinterwärts höckerig. Es giebt auch blaue Varietäten.

Die Larve hat ein scharfes und dabei schwaches Gebiß, und läuft behende.

Aufenthalt, Feinde und Schaden.

Der Käfer besucht im May und Junius den Hollunder, Spanischen Flieder (*syringa vulgaris*), Eschen, Rheinweide und anderes Gesträuch, und ist, wenn er vorhanden, allemal häufig, aber nur in kleinen Bezirken, da. Es scheint, daß sie sehr schwach sind. Denn, wenn sie noch so häufig in gewissen Jahren gefunden werden, und eine einzige kalte Nacht, oder ein anhaltender Gewitterregen sie überfällt, so sind sie verschwunden, und man entdeckt keinen einzigen mehr.

Ihr

Ihr Schaden, das Beflecken der Blätter, wird von ihrem Nutzen, der sehr bekannt und medicinisch ist, überwogen.

Die Larve lebt in und an der Erde, vermuthlich wegen ihrer schwachen Kinnladen, von weichem Gewürme, und ist also ein Raubinsekt, und hat als ein solches die Behendigkeit im Laufen mit andern räuberischen Larven, z. B. der Wasserkäfer, Raubkäfer u. s. w. gemein. Ihr Gebiß ist zum Blätterfressen zu schwach. Wenn sich dieses bestätigen sollte: so muß sie zu den schonenswerthen gezählt werden.

Anmerkung.

Hier würde der Marcus-Blasenkäfer zu stehen kommen, *Meloë Marci*, Lin., wenn er nicht schon bei der dreizehnten Gattung, den Warzenkäfern und ihren Verwandten, den Werstikäfern, schicklicher geordnet, und beschrieben worden wäre.

Achtzehnte Gattung.

Die Zangenkäfer. *Forficulae*, Lin.

Sie heißen auch Ohrwürmer, Ohrenkäfer, Dohrlinge und Ohrellen.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Sie haben borstenartige Fühlhörner, halblange Flügeldecken, die nicht den ganzen Rücken, aber doch die zusammengefalteten Flügel bedecken. Der Schwanz ist mit einer Zange oder scheerenförmigem Fortsatz versehen.

Die Larven haben schon Aehnlichkeit mit dem Käfer, und erhalten erst in der dritten Häutung die Flügel. Weshalb sie sonst wohl und dadurch mit Recht zu den Insekten mit halben Decken, *Hemiptera* Lin., gerechnet werden konnten. Sie laufen schnell.

Gattungskennzeichen nach Fabricius.

Der zu der zweiten Ordnung, *Ulonata* F., gehörige Zangenkäfer 118. *Forficula*, hat fadenförmige Fressspitzen, eine dreenspaltige Lippe und borstenförmige Fühlhörner. Die äußern Gattungskennzeichen nach Fabricius sind: Der Zangenkäfer hat einen länglichen, niedergedrückten, glatten, ungerandeten Körper; einen großen, ausgestreckten, etwas runden Kopf; kuglige, an den Rändern stehende und hervorragende Augen; von einander stehende und vor den Augen eingesügte Fühlhörner; einen etwas gerandeten, niedergedrück-

gedrückten, hinterwärts gerundeten Halschild; ein klein Schildchen; bis zur Hälfte reichende Flügeldecken; gefaltene aufliegende Flügel; einen verlängerten, hinterwärts zangenförmigen Hinterleib; lange Füße mit drengliederigen Fußblättern.

Weniger schädlich.

1. Der gemeine Zangenkäfer. *Forficula auricularia*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gemeiner Ohrwurm, gemeiner Ohrkäfer.

Forficula auricularia, Lin. 686. n. 1. Mäfler 396. 1. tab. 8. fig. 9.

— — — — Fab. Ent. II. n. 1.

Schäffer Icon. 144. fig. 3. 4. Sulzers Kennzeichen tab. 7. fig. 50.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer. Die Flügeldecken sind an der Spitze weiß, die Fühlhörner vierzehngliederig.

Die Larve ist weiß, hat aber Aehnlichkeit mit dem Käfer.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Der Käfer ist über einen halben Zoll lang und braun, der Halschild schwarz und blaß gerandet. Die Flügeldecken sind weißgrau und die Flügel künstlich gefaltet. Die Füße sind gelbbraun. Seine Gefräßigkeit geht so weit, daß man einen wahrgenommen, der seinen eigenen Unterleib abgefressen hat.

Die Larve ist weiß, und kommt aus dem Ei, das das Weibchen in Erde, Mist oder Baumrinde gelegt hat.

Aufenthalt und Schaden.

Allenthalben in Gärten, vom Junius an, den Sommer hindurch. Wenn er ins Ohr kommt, welches aber ein seltener Fall ist, so thut er Schaden, und verursacht große Schmerzen. An Blüthen und Blumen aber, als Nelken, an Obst, Pflaumen und Kirschchen thut er weit mehr Schaden, die er als vollkommenes und unvollkommenes Insekt zernagt oder anfrisst. Er verbirgt sich auch unter die Rinde, Geströh und zwischen verdorrte Blätter.

Anhang zur ersten Ordnung.

Die Fabricius'sche Gattung der Pochkäfer, *Hypophlaeus* F., die unter die Einreihen nicht untergebracht werden konnte, scheint noch den Forstinsekten zugegehören. Die systematischen Kennzeichen nach Fabricius sind folgende: Die vier Fressspitzen sind einander gleich und gekulrt; die Lippe ist verlängert, häutig und ganz, oder unabgesägt. Die Fühlhörner sind auswärts dicker, beyderseits sägezählig.

Die äußerlichen oder vom Habitus entlehnten Kennzeichen sind: Der Körper ist schmal und cylindrisch, unbehaart, ungerandet und nicht träge; der Kopf ist eckrund, stark eingefügt und geht seitwärts aus; die Augen sind kuglig, hervorragend und in den Seiten stehend; die kurzen Fühlhörner stehen etwas an einander und sind unter den Augen eingefügt; der Halschild ist verlängert und ziemlich platt; das Schildchen ist rund; die Flügeldecken sind steif, gewölbt, und von der Länge des Hinterleibes. Die kurzen Füße sind stark und zusammengedrückt; die Fußblätter sind funfgliedrig. Die Farbe des Insekts ist bunt.

Weniger schädliche.

1. Der Kastanienbraune Pochkäfer. *Hypophlaeus castaneus*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hypophlaeus castaneus, Fab. Ent. 1. 2. 500. n. 1. In seinen frühern Schriften ein Stachelkäfer Hispa.

Ips taxicornis des Oliviers und des Rossi.

Hypophlaeus castaneus, Panzer Fn. 12. t. 15.

Herbst's Archiv tab. 21. fig. 6.

Kennzeichen der Art.

Der Käfer ist glatt, glänzend und kastanienbraun, mit schwarzen Fühlhörnern.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Die Größe macht zwey und drey Viertellinien aus. Der Körper ist schwächlig, sehr glatt und von schön glänzender kastanienbrauner Farbe. Seine durchblätterten und etwas spindelförmigen Fühlhörner sind kurz und schwarz. Er ist nirgends gescheckt noch gestreift.

Aufenthalt.

Unter der Rinde der Ulmen, wo ihn Professor Hellwig fand. Wir treffen ihn auch bey uns an, außerhalb der Baumrinden an Stämmen.

2. Der gleichbreite Hochkäfer. *Hypophlaeus linearis*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hypophlaeus linearis, Fabr. Ent. 1. 2. 501. n. 2.

— — — — — Panzer Fn. 6. t. 16.

Kennzeichen der Art.

Er ist glatt und schwarz, und seine Fühlhörner, Flügeldecken und Füße sind ziegelfarbig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Seine Größe ist geringer als beim vorhergehenden. Die Fühlhörner sind ziegelfarbig; der Kopf und der Halschild glatt, tiefschwarz, glänzend und ungesleckt. Die Flügeldecken sind glatt, glänzend und ziegelfarbig. Die Unterfläche des Körpers ist schwarz, und die kurzen Füße ziegelbraun.

Aufenthalt.

Er ist in Deutschland einheimisch. Denn man findet ihn unter der Föhren-Rinde auf dem sogenannten Harzwalde.

3. Der bandirte Hochkäfer. *Hypophlaeus fasciatus*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hypophlaeus fasciatus, Fabr. 12. 501. n. 3.

— — — — — Panzer Fn. 6. t. 17.

Kennzeichen der Art.

Er ist glatt und schwarz, mit ziegelfarbigem, schwarzbandirten Flügeldecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Seine Verwandtschaft mit dem vorhergehenden ist nicht zu verkennen, und man könnte ihn für eine Varietät desselben ansehen, wenn nicht die schwarze Binde, die sich über die Decken zieht, und die ein wenig breit ist, so wie auch der Ort seines Aufenthalts ihn von ihm unterscheidet.

Aufenthalt.

Unter der Eichenrinde, in der Gegend bey Volkerode, ohnweit Braunschweig.

4. Der niedergedrückte Vochkäfer. *Hypophlaeus depressus*, Fabr.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hypophlaeus depressus, Fabr. Ent. 1. 2. 501. n. 4.

Ips unicolor, Oliviers 2. t. 2. f. 8.

Mellinus unicolor, Herbst's Archiv t. 21. f. B.

Kennzeichen der Art.

Er ist glatt und ziegelfarbig: seine Flügeldecken sind etwas gestreift.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Das Insekt ist so klein wie das vorhergehende, und durchaus satt schwarzbraunroth. Die Fühlerhörner sind kurz und durchblättert, und der Halschild ganz glatt.

Aufenthalt.

Unter der Eichenrinde in deutschen Waldungen. Seine Entdeckung so wie diejenige der drey vorhergehenden hat man vorzüglich Hrn. Hellwig zu verdanken.

Zweyte Ordnung.

Insekten mit halben oder solchen undurchsichtigen Flügeldecken, die theils aus einem harten, theils aus einem weichen Theil bestehen. Halbfügler. Hemiptera, Lin. Lederflügler.

Kennzeichen der Ordnung.

Der Rüssel ist gegen die Brust untergebogen. Die Vorder- oder Oberflügel heißen nicht deswegen halbe Flügeldecken, weil sie den halben Flügel decken, sondern weil sie theils aus einem lederigen, theils aus einem häutigen Theil bestehen, und bey einigen den halben, bey den meisten den ganzen Körper bedecken, und bogenförmig neben einander hinschießen. Die Unterflügel sind häutig. Nicht nur die Decken sind nicht so hart, als diejenigen der ersten Ordnung, sondern sie haben auch keinen harten Halschild, keine deutliche Kinnladen, einige Gattungen ausgenommen, sondern lange gegen die Brust untergebogene Rüssel. Einige Gattungen unter ihnen haben gar keine, und die übrigen nur blasige Fühlspeisen. In den meisten Stücken gleichen sie den Käfern; allein sie weichen auch wieder ab, z. B. darin, daß sie keiner so merklichen Verwandlung unterworfen sind, als die Käfer, sondern meistentheils nach ihrer Hervorkunft aus dem Ey ihre eigentliche Gestalt schon haben. Als sechsfüßige Larven sind sie ungeflügelt, und häuten sich einigemal. Wenn die letzte Häutung vorüber ist, so sind sie im Puppenstand, mit kleinen Anfängen von Flügeln versehen. Sie sind aber in diesem Stand nicht in Ruhe und ohne Bewegung, sondern setzen ihre Lebensart fort, wie im Larvenstand. Endlich zersprengen sie ihre Puppenhülle, und treten geflügelt in den vollkommenen Stand. Ueberhaupt könnte man sie, wie in der Einleitung bemerkt worden, uneigentliche Larven und Puppen nennen.

Weil der große Naturforscher Linne in diese Ordnung diejenigen vierflügeligen Insekten, die ihm in die übrigen Ordnungen nicht zu passen schienen, aufnahm, so wurden einige solcher Gattungen ungleichartig. Vielleicht hätte er dieser Unvollkommenheit noch selbst abgeholfen. Seine Nachfolger nahmen daher mit dieser Ordnung Veränderungen vor.

Fabricius bildete daraus seine ganze zweite Ordnung, die *Monata*, *Helmkieser*, und einen großen Theil der Ordnung, die er *Rhngota*, *Schnabelmäuler* nennt. Die *Monaten*, z. B. die *Zangenkäfer*, *Schaben*, *Fangheuschrecken*, *Grashüpfer*, *Höhlengrillen* u. s. w. haben vier Greifspitzen und eine bedeckte oder innere Kinnlade. Die *Rhngoten*, z. B. die *Laternenträger*, *Cicaden*, *Boorwanzen*, *Wasserscorpione*, *Wanzen*, haben einen untergebogenen Rüssel mit gegliederter Scheide.

Schränk bildet aus dieser zweiten Linneischen Ordnung ebenfalls zwei Ordnungen: Erstlich *Halbfügler* mit Kinnladen und blasigen Greifspitzen; zweitens *Wanzen*, oder *Insekten* mit einem Saugrüssel ohne Kinnladen und Greifspitzen.

Die zwölf Gattungen unserer zweiten Ordnung heißen: Die *Schaben*, *Fangheuschrecken*, *Heuschrecken*, *Laternenträger*, *Cicaden*, *Boorwanzen*, *Wasserscorpione*, *Wanzen*, *Blattläuse*, *Blattsäuger*, *Schildläuse* und *Blasenfüße*; darunter nur sechs, nämlich ein Theil der *Cicaden* und *Wanzen*, dann die *Blattläuse*, *Blattsäuger*, *Schildläuse* und *Blasenfüße* zu den schädlichen Forstinsekten zu zählen sind.

Neunzehnte Gattung.

Die Cicaden. *Cicadae*, Lin.

Sie heißen auch Heuschreckengrillen und Baumgrillen.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Der Rüssel ist niederwärts gebogen, die Fühlhörner sind borstenartig und die vier Flügel pergamentartig. Die meisten haben Springfüße, und die Weibchen einen Legestock. So viel man Cicaden kennt, haben nur die Männchen, nie aber die Weibchen einen schwirrenden Gesang wie die Grillen. Sie führen am Kopf zwei Nebenaugen (*stemmata*), die zweite Familie ausgenommen, welche drei solcher Nebenaugen oder Augenpunkte hat.

Die sechsfüßigen Larven der zweiten Familie liegen ein Jahr unter der Erde, ehe sie als vollkommene Insekten erscheinen. — Die Larven der dritten Familie, die frothsartigen Springer oder Schaumcicaden, sitzen auf Zweigen und saugen sie aus. Dann leeren sie viele Blasen aus ihrem Afters aus, damit sie zugleich unter solchem Schaum verbergen bleiben mögen.

Die Namen und Kennzeichen der verschiedenen Fabriciusischen Gattungen, die hieher gehören, sind folgende:

Die Schildcicade, 202. *Membracis*, Fab.: Der Mund hat einen unterwärts gebogenen Rüssel; die Lippe ist hornartig, verlängert, an der Spitze pergamentartig und pfriemenförmig; die Fühlhörner sind pfriemenförmig und stehen an der Stirne.

Die Singcicade, 203. *Tettigonia*, Fab.: Die Lippe hat einen unterwärts gebogenen Rüssel; die Scheide ist zweigliederig; die Fühlhörner sind borstenförmig.

Die Baumeicade, 204. *Cicada*, Fab.: Der Mund hat einen unterwärts gebogenen Rüssel; die Lippe ist abgerundet, an der Spitze borstenförmig; die Fühlhörner sind unter den Augen eingefügt.

Die Schaumcicade, 205. *Cercopis*, Fab.: Der Mund hat einen untergebogenen Rüssel; die Lippe ist abgekürzt, stumpf und ausgerandet; die Fühlhörner sind unter den Augen eingefügt. —

Die sogenannten äußern Gattungskennzeichen nach Fabricius sind:

Die Schildcicade: Der Körper ist klein, vornen sehr abgestumpft, hinterwärts zusammengedrückt und ungerandet; der Kopf ist klein, eyrund und abhändig; die runden Augen stehen an der Seite hervorragend; die Fühlhörner sind kurz, pfriemenartig und unter dem Kopf eingefügt; der Halschild ist verschieden, entweder blätterig oder gehörnt, hinterwärts verlängert, oftmals von der Länge des Hinterleibes, schmalleibig und aufsteigend; das Schildchen fehlt ganz; die Flügeldecken und Flügel sind dachziegel, zusammengedrückt, häutig, länger als der Hinterleib; die Füße kurz, dünn und rund. Die Farbe des Insekts ist bunt.

Die Singcicade: Der Körper ist groß, länglich, träge und ungerandet; der Kopf geht seitwärts aus; der Halschild ist etwas breit, stumpf, ungleich und an der Stirne in die Quere gefurcht; die Augen sind groß, kugelig, an der Seite stehend und hervorragend; die Fühlhörner sind kurz und ihr erstes Glied größer und cylindrisch, die übrigen aber sehr kurz, borstenförmig, an den Seiten der Stirn eingefügt; der Halschild ist groß und rund, vornenher mit einem merkbaren Lappen geziert; das Schildchen ist klein und etwas wenig ausgerandet; die Flügeldecken und Flügel sind häutig, dachziegel und länger als der Hinterleib; dieser ist eyrund, bey dem Männchen mit einer Lamelle bedeckt; die Füße sind kurz und dick; die Vorderschenkel sind zweyzählig, und die Hinterschenke gedornet.

Die Baumeicaden: Der Körper ist klein, länglich, behende, oftmals mit der Eigenschaft des Springens begabt und ungerandet; der Kopf ist groß und seitwärts ausstehend, breiter als der Halschild, stumpf und an der Stirne in die Quere gefurcht; die Augen sind groß, eyförmig, an der Seite stehend und hervorragend; die Fühlhörner sind kurz, subtil, unter den Augen eingefügt; der Halschild geht seitwärts aus und ist vornen abgerundet; das Schildchen ist klein und dreyeckig; die Flügeldecken und Flügel sind dachziegel, länger als der Hinterleib; die Füße sind subtil und lang, die Schenke sind hinten sägezählig. Die Farbe des Insekts ist bunt.

Die Schaumcicade: Der Körper ist klein, etwas niedergedrückt, lebhaft, ungerandet; der Kopf geht seitwärts aus, ist beynähe so breit als der Halschild und vornenher abgerundet; die Augen sind groß, eyrund, an der Seite stehend und hervorragend;

die

die Stiene ist erhöht, höckerig und gefurcht; die Fühlhörner sind vor den Augen unter dem vortragenden Kopfrand eingefügt; der Halschild geht seitwärts aus, ist vornen rund und hinten zur Ausgerander; das Schildchen ist groß und dreieckig; die Flügeldecken und Flügel sind dachicht, länger als der Hinterleib; die Füße sind kurz und stark; die hintern Schienbeine sind sägezähmig.

Es giebt 1) Cicaden mit gehörnter Brust; 2) mannatragende und singende ohne Springfüße; 3) froschartige Springer, die sowohl als ihre Larven besonders Schaum machen; 4) solche, deren zarte Flügel sich um die Seite des Körpers herumschlagen.

Erste Familie.

Cicaden mit gehörntem Halschild, Schildcicaden.

Weniger schädliche.

1. Die gehörnte Cicade. *Cicada cornuta*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Horn, Hörncicade.

Cicada cornuta, Lin. 706. n. 6. — Müller 454. n. 6.

Membracis cornuta, Fab. Ent. IV. 14. n. 22.

Cicada cornuta, die gehörnte Cicade mit entblößten Flügeln. Gleditsch II. 61.

Membracis cornuta, Panzer 50. tab. 19.

Kennzeichen der Art.

Der schwarze Halschild oder Vorderrücken hat auf jeder Seite zwei Hörnchen, davon das hintere stielähnlich und so lang als der Hinterleib ist. Die Flügel sind mattschwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist drei und eine halbe Linie lang. Der Kopf ist nebst dem Vorderrücken schwarz. An jeder Seite desselben erhebt sich ein langes, schwarzes, in der Mitte rothgezeichnetes Horn, das bis hinten an das Ende des Hinterleibes gebogen ist, und die Flügel nicht berührt und bedeckt; und darüber noch ein anderes schwarzes, roth eingefasstes, spitziges, aber ganz kurzes Hornspitzchen. Am Munde ist auf beiden Seiten ein rother Fleck. Die Flügel und Füße sind mattschwarz und die Schenkel ganz schwarz.

Aufenthalt.

Im Julius in den Waldungen, auch in Feldern, an Hecken, auf Weiden, Weinreben und Disteln.

2. Die gedhrte Cicade. *Cicada aurita*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ohr, Langohr, Ohren-Cicade.

Cicada aurita, Lin. 706. 7. — Müller 454. 7.

Membracis aurita, Fab. Entom. IV. 11. n. 15.

Cicada aurita, die aschgraue deutsche Cicade. Gleditsch II. 239.

Membracis aurita, Panzer Fn. 50. t. 13.

Schäfferi Icon. 96. fig. 3.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist gleichsam zweydrüch, und das Kopfschild vornenher breit und abgerundet.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Die Länge vom Kopf an bis zu und mit dem Flügelende beträgt sieben und eine halbe Linie. Der Halschild hat auf jeder Seite zwey gedrückte ohrenähnliche Hörner. Der Kopfschild ist vornen her breit, rund, runzlich und fast gefranzt, wie auch pergamentartig. Die vier gelben, durchsichtigen Flügel, sind mit vielen braungrauen Adern versehen und niedergebogen, und die Füße haben die Farbe der Flügel. In der Abbildung in der Panzerschen Fauna sind die Flügeladern zu schwarz ausgefallen.

Aufenthalt.

Im Julius und August auf Gartenpflanzen, desgleichen in Wäldern, auch auf Eichen, Haselsträuchen und Kreuzdorn.

Zweite Familie.

Mannaträger, Singcicaden, welche nicht springen.

3. Die Manna Sing-Cicade. *Cicada Orni*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gemeine Cicade, Italiänische Cicade, Eschen-Cicade, Singfliege.

Cicada Orni, Lin. 707. n. 16. Müller 457. 16.*Tettigonia Orni*, Fab. Ent. IV. 23. n. 23.

— — — Panzer Fn. 50. t. 22.

Köfeler Inf. II. Grillen n. 1. 25.

Sulzer's Kennzeichen t. 10. fig. 65.

Kennzeichen der Art.

Die Cicade: Sie ist schwarz mit gelben Flecken und Strichen und schmutzig-weißen Flügeln, die an der Wurzel gelb sind, und die außer sechs kleinern, noch zwei größere schwarze Flecken oder Punkte haben.

Die Larve ist bräunlichgrau, ohne Glanz, mit sechs Füßen. Der Hinterleib ist mit einem Saugstachel versehen. Die Fühlhörner sind ziemlich lang.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Sie ist beträchtlich lang, und hat vom Kopf an bis zum Ende der Flügel ein und drei Viertel Zoll. Sie wird auch zu zwei Zoll und zu zwei Zoll vier Linien gefunden. Gemeinlich ist sie bräunlich mit drei gelben Flecken zwischen den großen, gelben, nebartigen Augen. Der Wirbel des Kopfs zeigt noch drei rothe Augenpunkte, stemmata. Der lange Rüssel ist unten einwärts gebogen. Die kurzen borstenartigen Fühlhörner sind fünfgliedrig. Auf dem schwarzen, zum Theil erhöhten Vorderleib zieht sich eine pomeranzengelbe schmale Binde zwischen dem Halse und dem Vorderrücken durch, vor welcher mehrere Erbsenflecken von eben dieser Farbe zu sehen sind. Das Schildchen ist von beiden Seiten zuneckgestoßen, an der Spitze ausgerandet und gelb; die mittlere Linie ist schwarz. Der aus fünf Absätzen bestehende Hinterleib ist schwarz und auf der Unterseite gelb. Die ockerigen, unbehaarten, abgerundeten und abhängigen Flügel sind an der Wurzel gelb, und haben sechs kleine und zwei große schwarze Punkte oder Flecken. Die vordern sind größer als die hintern. Die Füße sind schmutzigweiß.

Das Männchen hat unter den Hinterfüßen besondere Werkzeuge, aus zwei runden Plättchen oder Schildchen und hohlen Häutchen oder Muskeln bestehend, womit es den Gesang hervorbringt, von dem es den Namen führt, und als Sänger den ältesten Schriftstellern schon bekannt war.

Den Weibchen hat die Natur die Werkzeuge verfaßt, die den Eingeton hervorbringen, und hingegen einen Legestachel versehen, der aus einer Sägespieme zwischen zwei Scheiden besteht, die ihr statt einer Zelle dient.

Die bräunlichgraue, nicht glänzende Larve ist sechsfüßig. Die Fühlhörner sind größer als die der Cicade selbst. Ihr Hinterleib ist sieben gelenkig, dick und rund mit einem

Saugstachel, mit dem sie an Baumwurzeln ihre Nahrung sucht, und so ein ganzes Jahr auf drey Schuh tief unter der Erde ihren Larven- und Puppenstand zubringt. Wenn die Larve nach mehreren Häutungen Flügelscheiden bekömmt, so ist sie Puppe, setzt aber ihre Lebensweise fort, bis die Puppenhaut zerplatzt, und das Insekt geflügelt aus der Erde anfänglich in einem grünen Gewand zum Vorschein kömmt, alsdann aber sich braun färbt und die Bäume besiegt.

Aufenthalt.

Das vollkommene Insekt findet sich im Jun. und Julius auf den wilden Eschenbäumen und deren Saft, auf den Rothbuchen, auch auf den Maulbeerbäumen in Italien und dem südlichen Europa. Doch führt Brahm in seinem Handbuch der ökonomischen Insektengeschichte, oder Insektenkalender I. S. 192 an, daß es auch in den Gegenden am Rh. in, und Kleemann in den Anmerkungen zu Röfels II. Bande, von den Heuschrecken S. 162, daß es, nach Herrn E. C. Jungs Beobachtung, in Franken nicht unbekant sey. Besonders war die in der dritten Figur der 25. Röfelschen Tafel abgemalte 1775 im Junius in Franken, jedoch nur in einer Strecke von vier Stunden, nämlich von Segnitz bis Randersacker in den Weinbergen häufig, welche Gegenden und Weinberge alle an der Nordseite des Mainns liegen, wo es wärmer ist, als an der entgegengesetzten Mittagsseite. Ihr Name ist in Franken Lauer, und aus ihrer Menge wird auf ein gutes Weinjahr geschlossen c).

Fortpflanzung und Feinde.

Eine weibliche Cicade legt im Jul. an die fünf bis sechs hundert Eyer, und zwar an die dünnen Aeste von abgestandenen Bäumen, in welche sie einzelne Löcher bohrt, in deren jedes sie bald fünf, bald sechs weißliche längliche, an beyden Seiten zugespitzte Eyer legt. Unter diesen Eyern richtet ein gewisser Raupentöbter, Ichneumon, eine große Zerstörung an. Sonst würde sich das Insekt zu sehr vermehren, das nach der Entwicklung aus dem Ey bald sich herunter an die Wurzeln der Bäume begiebt.

Dieser Familie der Singcicaden wird der Name: Mannatragende, deshalb beygelegt, weil sich theils auf den Eschen im Königreich Neapel, woher das calabrische Manna kömmt, eine große Menge derselben befindet, theils solche ihren Stachel so tief in die Pflanze einstechen sollen, daß beym Wegjagen des Insekts der Saft oder das Manna noch nachfließt.

Dritte

c) In unsern Hennebergischen Gegenden habe ich in zwanzig Jahren nur einmal ihren Gat-

tungsgegenossen, die Blut-Singcicade, Cicada haematodes, Lin. gefangen. S.

Dritte Familie.

Die froshartigen Schaum- oder Spring-Cicaden, deren Larven einen Schaum machen.

Weniger schädliche.

4. Die gemeine Schaumcicade. *Cicada spumaria*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schaumwurm, Schaumfliege, Geiser-Speichelhierchen, Weiden-Schaumcicade.

Cicada spumaria. Lin. 703. n. 24. Müller 461. 24.

Cercopis spumaria, Fab. IV. 51. n. 18.

Cicada — — Schaumwurm. Gleditsch II. 60.

Rösel II. Heuschr. t. 23.

Sulzer's Kennzeichen t. 10. fig. 64.

Kennzeichen der Art.

Die Cicade ist braun, und hat an dem Außenrand ihrer Flügeldecken zwei ziemlich weiße Querstreifen. Der zwischen den Fühlhörnern stehenden Augenpunkte, die von den eigentlichen Augen sich unterscheiden, sind nicht drei, sondern zwei.

Die Larve hat ein breit und stumpfes, mit einem Saugstachel versehenes Köpfchen, das nebst den Augen, Fühlhörnern und Füßen von schwarzer Farbe ist. Der Hinterleib ist hellgrau, mit dunklerer Spitze.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Es ist vier Linien lang und braungrau. Die Fühlhörner sind kurz und borstenförmig. Der Kopf hat einen langen und zarten Saugstachel, der an der Unterfläche des Vorderleibes zwischen der Wurzel der sechs Füße herabgebogen und verborgen liegt. Das erste Paar Füße ist wie beim Floh, am Kopf eingelenkt. Die unbestäubten, pergamentartigen Vorderflügel laufen spitzig oder kreuzweis geschlossen zu, und bedecken den Leib und die Hinterflügel. Sie führen zwei weiße ins Ockergelbe fallende Querstreifen, die eine unterbrochene Binde bilden. — Die Springsüße sind nicht von der Art wie bei den Heuschrecken.

Die ausgewachsene Larve ist um ein Viertel kürzer als die Cicade. Der Kopf ist schon mit dem Saugstachel versehen, und nebst den Fühlhörnern, Vorderleib und Füßen schwarzbraun, der Hinterleib aber bräunlichhellgrau mit einer dunklen Spitze. Die Puppe hat Flügelansätze.

Aufenthalt, Fortpflanzung, Feinde und Schaden.

Das vollkommene und unvollkommene Insekt ist vom May bis Julius, vorzüglich im May sehr häufig auf der Wandweide und mehrern glatten Weiden, und sonst auf allerley Holzarten. Larve, Puppe und Cicade machen die sogenannten Guckuckspuke auf den Weiden, die oft herabträufeln. Es ist solches ein blasiger Schaum, den das Insekt von hinten von sich läßt, um den Nachstellungen der Vögel und der Raubinsekten zu entgehen. Nach der Paarung legt das Weibchen die Eyer an die Weidenbäume, aus welchen erst in dem darauf folgenden Frühjahr die Larven sich entwickeln. Zuweilen lebt eine, zuweilen zwey derselben in Einem Schaum. Sie haben von innen an den Zwirnwurm und von außen zuweilen an den Spinnen ihre Feinde, und sind übrigens den jungen Trieben der Weiden nachtheilig, deren Wachsthum durch Ausaugen des Safts gehindert wird.

5. Die blutrothe Schaumcicade. *Cicada sanguinolenta*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blutband.

Cicada sanguinea. Lin. 708. n. 22. — Müller 134. 22.

Cercopis sanguinea, Fab. Ent. IV. 49. n. 6.

Naturforscher VI. t. 2. fig. 1. 2.

Kennzeichen der Art.

Sie ist schwarz und führt auf den Flügeldecken zwey rothe Flecken und eine dergleichen Binde.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Körper ist schwarz, so auch die Flügeldecken. Eine rothe Binde zieht sich gegen die Wurzel und Spitze hin, dazwischen sich ein blutrother Punkt befindet. Der Hinterleib ist gleichfalls rothgefleckt und punktiert. Die Füße sind bunt aus Schwarz und Roth.

Aufenthalt.

In Frankreich, Italien und Deutschland, auf Weiden und Haseln.

Anmerkung.

Die übrigen Schaumcicaden-Arten, gehören nicht hieher.

Vierte Familie.

Die Cicaden, deren zarte Flügel sich um die Seite des Körpers herumschlagen: Baumcicaden.

Weniger schädliche.

6. Die Ulmen-Cicade. *Cicada Ulmi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ulmensteiger, Ulmen-Baumgrille, Ulmen-Heuschreckengrille.

Cicada Ulmi, Lin. 711. n. 49. — Müller 467. 49.

— — Fab. Ent. II. 45. n. 31.

— — Die kleine Mäster-Cicade. Gleditsch I. 28.

Degeers Abhandlungen III. t. 12. f. 15.

Kennzeichen der Art.

Sie hat grüngelbe Flügel, die an den Spigen aus dem Schwarzen ins Goldfarbene spielen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist wie eine Fliege gestaltet, von gelbgrüner Farbe. Der Hinterleib ist schwärzlich und die Flügeldecken haben eine schwarze Goldspitze.

Aufenthalt.

Auf den Ulmen. — Sie gehört eben so wenig, als die folgende, unter die Schaum erregenden Arten.

7. Die Rosen-Cicade. *Cicada Rosae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rosenriecher, Blattfloh, Rosen-Baumgrille, Rosen-Heuschreckengrille.

Cicada Rosae, Lin. 711. 50. Müllers Uebersetzung 467. 50.

— — Fab. Ent. 4. 45. n. 77.

— — Die gelbe Cicade der Rosensträucher mit weißen Flügeln. Gleditsch II. 270.

Reaumur Ins. V. t. 20. fig. 10 — 14.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Die Cicade ist gelb, mit weißen Flügeln, die an der Spitze gestreift sind.
Die Larve ist schwefelgelb, fünf Viertelslinien lang.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist sehr klein, in Fliegengestalt und gelbgrün. Der Hinterleib ist bald gelb, bald grün. Die weislichen Flügel sind an der Spitze durchsichtig, und braun gestreift.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Schaden.

Im April auf Rosen, unter deren zarte Blätter das Weibchen in gedachtem Monat die bis zur Unsichtbarkeit kleinen Eyerchen sorgfältig legt. Anfänglich bekommen die Blätter da, wo die Eyer gelegen haben, kleine gelbe Flecken, und wenn man sie umkehrt, sieht man die kleinen schwefelgelben Pünktchen, die man nur durch die Lupe für die Larven der Cicaden erkennt. Sie werden von Tage zu Tage etwas größer, erreichen aber vor der Verwandlung kaum die Länge von fünf Viertellinien, und saugen die Blätter immer mehr aus. — Wenn die Bäume im Herbst schon entblättert sind, so kann man in der Mitte des Novembers, zuweilen noch diese kleinen Cicaden unter den welken Rosenblättern finden.

8. Die Eichen-Cicade. *Cicada Quercus*, Fab.

Namen und Schriften.

Cicada Quercus, Fab. IV. 47. n. 88.

Kennzeichen der Art.

Sie ist gelb mit rothen Flügeldecken, die an der Spitze schwarzbraun gefleckt sind.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Kopf und Halsschild dieser sehr kleinen, nur von Fabricius beschriebenen Art ist gelblich mit schwarzen Augen. Die Flügeldecken spielen gleichfalls ins Gelbe, und sind mit vier oblongen blutrothen Flecken geziert. Die Spitze hat eine große, gezahnte Makel von schwarzbrauner Farbe. Die Flügel sind weiß.

Aufenthalt.

Bei Kiel, im Holsteinischen, auf Eichen häufig.

Zwanzigste Gattung.

Die Wanzen. Cimices, Lin.

Sie heißen auch Wandläuse, und die stinkenden Arten unter ihnen: Qualster.

Diese Gattung sollte eigentlich nicht den schädlichen, sondern da sie Raubinsekten sind, die andere, oft sich selbst aussaugen, und auch mitunter die schädlichen Forstinsekten vermindern helfen, den schonenswerthen beigezählt werden. Wir werden aber doch wenigstens diejenigen Arten hier aufzählen und beschreiben, welche in der Zeitschrift: der besorgte Forstmann, als dem Nadelholz schädliche Insekten angeführt werden, und die übrigen zu den schonenswerthen aufsparen.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Der Saugrüssel, der unter dem Leib in einer Scheide wohl verwahrt liegt, ist untergebogen, fein und scharf, ohne Kinnladen und Freßspitzen. Die Fühlhörner sind länger als der Hinterleib. Die vier Flügel, davon die vordern zur Hälfte lederartig sind, und daher Flügeldecken genannt werden können, liegen kreuzweis. Der Halsschild ist gerändelt, der Rücken flach, und die Füße dienen zum Gehen.

Sie vermehren sich sehr, und ihre Eyer sind gleichsam mit einem Deckel versehen, der, wenn die Larve auskriecht, abspringt.

Die Larven sehen dem vollkommenen Insekten ziemlich ähnlich, haben gleichfalls einen scharfen Rüssel, aber keine Flügel. Sie äßen auf Pflanzen und besonders auf weiche Insekten. Mehrere Arten haben einen übeln Geruch.

Die Fabricius'schen systematischen Gattungskennzeichen sind:

Die Gattung: Flachwanze, 211. Acanthia: hat einen untergebogenen, unter der Kopfspitze befestigten Saugrüssel, und keine Lippe. Die Fühlhörner sind vor den Augen eingefügt.

Die Gattung: Streifwanze, 212. Cimex: Der Mund hat einen untergebogenen Rüssel. Die Lippe ist verlängert, pfriemensförmig und geringelt. Die Fühlhörner sind vor den Augen eingefügt.

Die Gattung: Strichwanze, 214. Lygaeus: Der Mund hat einen untergebogenen Rüssel, der unter der Spitze des Kopfs eingefügt ist. Die Lippe ist verlängert, borstförmig und spitzig. Die Fühlhörner sind vor den Augen befestigt.

Die Gattung: Glattwanze, 215. Miris: Der Mund hat einen untergebogenen Rüssel. Die Scheide ist viergliedrig: Das erste Glied ist zusammengedrückt und häutig. Die Fühlhörner sind borstförmig und vor den Augen befestigt.

Die sogenannten äußerlichen Gattungskennzeichen sind nach Fabricius folgende: Die Acanthien- oder Flachwanze: Der Körper ist klein, oblong, ungerandet, trüg, flach, niedergedrückt; der Kopf eyrund, hervorgestreckt; die Augen sind groß, kugelig, an der Seite hervorstehend; die Fühlhörner sind vor den Augen eingefügt; der Halschild flach und vornen schmal; das Schildchen ist groß und dreneckig, chagrinirt, flach, an der Spitze häutig, von der Länge des Hinterleibes; die Füße lang, rund und dünn. Das Insekt hat eine dunkle Farbe.

Die Steifwanze: Der Körper ist eyrund, niedergedrückt, flach, ungerandet und träge. Der Kopf ist eyrund und abgestumpft; die Augen sind kugelig, und an den Seiten hervorragend; die Fühlhörner sind unter dem Rand des Kopfs vor den Augen eingefügt; der Halschild läuft seitwärts aus und ist vornen rund; die Flügeldecken sind an der Wurzel lederartig, an der Spitze häutig, von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind Gehfüße, lang, subtil und abgerundet. Das Insekt ist buntfarbig.

Die Strichwanze. Der Körper ist oblong, schwächig, glatt, ungerandet und träge; der Kopf klein, sehr hervorstehend und abgerundet; die Augen sind groß, kugelig, an den Seiten hervorragend; die Fühlhörner sind viergliederig, cylindrisch, gleich und an der Spitze des Kopfs befestigt; der Halschild ist flach, schmal; das Schildchen groß und dreneckig; die Flügeldecken sind von der Länge des Hinterleibes, an der Spitze häutig; die Füße sind verlängert und Gehfüße, oft gezahnt, oder auch häutig. Die Farbe ist schwarz oder roth.

Die Blattwanze: Der Körper ist klein, schwächig, verlängert, ungerandet, behende und znrühig; der Kopf ist eyrund und sehr eingefügt; die Augen sind kugelig, an den Seiten hervorragend; die Fühlhörner sind hervorgestreckt, borstenförmig, viergliederig, vor den Augen eingefügt; der Halschild ist rund, vornenher schmal, glatt; das Schildchen ist klein, dreneckig; die Flügeldecken liegen über einander, sind flach, niedergedrückt, an der Spitze häutig, ein wenig länger als der Hinterleib; die Füße sind Gehfüße, dünn und lang. Das Insekt hat bunte Farben.

Es kommen hier 1) schildtragende Wanzen vor, deren Schildchen (nicht Halschild) so lang ist, als der Hinterleib: 2) Wanzen, die einen langen Körper, fadenförmige Fühlhörner und unbewehrte Füße haben: 3) Wanzen, deren Fühlhörner borstenartig und so lang als der Körper sind: 4) Dornfüßige Wanzen.

Erste Familie.

Die schildtragenden Wanzen. Fabricius'sche Flachwanzen.

Sie sind weniger schädlich.

1. Die Rindenwanze. *Cimex corticalis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Cimex corticalis, Lin. 718. 17. — Müller 482. 17.

Acanthia corticalis, Fab. IV. 72. n. 21.

Cimex — — — — — Fersmann 76.

— — — — — die platte dünne Rindenwanze, Gleditsch II. 65.

Schäfferi Icon. t. 41. f. 67. In allen Editionen der Fabricius'schen Schriften ist immer der Druckfehler: Icon. t. 51.

Kennzeichen der Art.

Sie ist häutig, mit schuppenförmig eingeschnittenem Rand des Hinterleibes, und einem schwarzen Körper.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Die Größe kann nicht zuverlässig angegeben werden. Sie ist ein wenig größer als eine Bettwanze. Der platte, dünne Körper ist oben schattenfarbig, auf der Unterseite schwarz; am schildfrotzfarbigen, concaven Hinterleib, beiderseits zusammen mit zehn Zacken versehen. Der Kopf hat drei dergleichen. Von den aschgrauen Flügeldecken und Flügeln wird der Hinterleib, aber nicht die ausstehenden häutigen Zacken oder Schuppen bedeckt. —

In einer deutschen Ausgabe des Linne, unter dem Titel: Lehrbuch über das Natursystem etc. Nürnberg bey Raspe 1782 ist im 2. Band tab. 26. fig. b. diese Rindenwanze von zehn Linien Länge abgebildet, ohne Anzeige, ob dies nur Vergrößerung sei. Da wir gerade nur Ein natürlich Exemplar, und zwar von fünf Linien Länge vor uns haben: so können wir nicht sagen, ob dies die Puppe, das ist, diese Wanze vor ihrer letzten Häutung ist.

Aufenthalt.

Im April, und dann wieder im August, auf Weiden und auf Waldbäumen in Deutschland und Schweden. Sie hat einen unleidlichen Geruch, und durchbohrt mit ihrem Rüssel die Rinde vorzüglich der kranken Stämme, um den Saft zu verschlucken.

A n n e x e.

Hier wäre aus der Zeitschrift: Der besorgte Forstmann, auch die Lerchenbaum-Wanze an- und aufzuführen. Da sie aber in dem eigentlichen Linneischen und auch in den Fabriciusschen Schriften nirgends vorkommt: so beschreiben wir statt derselben eine andere: Die Birnwanze.

2. Die Birn-Wanze. *Cimex Pyri Fabricii* in Mantissa.

Namen und Schriften.

Acanthia pyri, Fabr. Entom. IV. 78. n. 44. und in seinen ältern Schriften, besonders der Mantissa ein *Cimex*.

Geoffroy I. 461. 57.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist dreynflügelig, das Schildchen blattförmig; die neßförmigen Flügeldecken sind an der Wurzel erhoben.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Kopf ist klein und weißlich. Der Halschild hat dreyn große, erhobene, weiße, weiche Flügelchen, die braune Nege zeigen. Die beyden äußern Flügelchen sind gedrückt, ausgehöhlt und scharf. Das mittelmste ist kuglig und kurz. Das Schildchen ist erhoben, blätterförmig, scharf, weiß, mit einer braunen Makel an seiner Wurzel. Die Flügeldecken sind neßförmig, weiß, braungefleckt, und an der Wurzel erhoben; die Füße sind weiß.

Aufenthalt und Schaden.

Auf dem gemeinen Birnbaum, auf der untern Blattseite, die sie zwar beschmuzzt; aber doch auch dabey den Insekten nachstrebt. Sie ist übrigens von dem sel. Professor Hermann zu Straßburg dem Hrn. Fabricius mitgetheilt worden.

Zweyte Familie.

Die einen langen Körper und fadenförmige Fühlhörner haben. Fabriciussche Strichwanzen.

Sie sind weniger schädlich.

3. Die Fichtenwanze. *Cimex Pini*, Lⁱⁿ.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Cimex Pini, Lⁱⁿ. 729. 96. — Müller 501. 96.

Lygaeus Pini, Fabr. IV. 163. 97. Sonst ein *Cimex* bey ihm.

Cimex Pini Forstmann 77.

Schäfferi Icon. 42. t. 12.

Kennzeichen der Art.

Sie ist länglich, schwarz, mit braunen Flügeldecken und einem raufenförmigen schwarzen Fleck.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist dreyn und eine Viertellinie lang und schwarz. Die Fühlhörner sind viergliederig. Der Halsschild ist hinterwärts aschgrau mit Pünktchen, so auch die schwarzpunktirten Flügeldecken, die einen schiefviereckichten schwarzen Fleck haben. Die Hinterflügel sind schwarz.

Aufenthalt.

Im April und im August, im Nadelgehölze und in Eichenwäldern. Brahm fand sie auch bey Mainz in Gärten unter dem Rehricht. Sie soll dem jungen Anflug der Weiß- und Rothtannen nachtheilig seyn.

Dritte Familie.

Längliche, deren Fühlhörner borstenartig und so lang als der Körper sind.

Weniger schädlich.

4. Die Waldwanze. *Cimex sylvestris*, Lⁱⁿ.

Namen und Schriften.

Waldsteifer.

Cimex sylvestris, Lin. 731. n. 111. Müller 504. 111.

— — — Forstmann 77.

— — — Die schwarze längliche und rothfüßige Waldwanze mit weißgezeichneten Decken und Flügeln. Gleditsch II. 66.

Acanthia sylvestris, Fab. Ent. IV. 76. n. 37.

Kennzeichen der Art.

Sie ist länglich schwarz; die Flügeldecken und Flügel sind braun und weißschecficht, die Spitze derselben schwarz.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist klein. Die Fühlhörner sind rothfarben, an den einzelnen Gliederspitzen aber schwarzbunt. Der Kopf und Halschild sind schwarz und glänzend, ohne Flecken. Die Flügeldecken sind weiß, an ihrer Spitze mit einem großen schwarzen Fleck bezeichnet. Der innere Rand derselben ist gelblich und ebenfalls schwarz gefleckt. Eben so sind auch die weißen Hinterflügel an der Spitze schwarz gefleckt. Der ganze Körper ist schwarz, und die Füße rothfarbig.

Sie gehört nach Fabricius eigentlich zu der Gattung der Blachwanzen, und also in die oben aufgeführte erste Familie, nach Linne aber hieher, und ist übrigens von *Lygaeus sylvestris* F. verschieden.

Aufenthalt.

Im Unterholz an den jungen Lohden, und in Borhdörnern an den Strauchweiden. Nach Hrn. D. Zink im besorgten Forstmann, soll sie vom Harzsafte der Tannen und Fichten leben. Man trifft sie im Junius und Julius an.

Vierte Familie.

Dornfüßige Wanzen.

Weniger schädliche.

5. Die Tannenwanze. *Cimex Abietis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Cimex Abietis, Lin. 732. 115. Müller 505. 115.

Miris — Fab. Ent. IV. 187. n. 15.

Cimex Abietis, Forsmann 77.

Cimex grossipes, Degeer III. t. 15. f. 20. 21.

Kennzeichen der Art.

Sie ist roth und gelb gefleckt, mit rothen Füßen; die Schenkel, besonders die vordern, sind dick.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist fünf Linien lang, etwas länglich, niedergedrückt, von bunter Farbe aus gelb und roth. Der Halschild ist oben her gefurcht, so auch der Hinterleib. Die vordern Schienbeine sind gedornet, und die vordern Schenkel sehr dick. Die Fußblätter sind einzahnig. Die Füße sind roth. Sie gehört unter die Fabriciusschen Blattwanzen.

Aufenthalt und Feinde.

Man findet sie in Deutschland, im März, an der Weiß- und Rothanne, in deren Zapfen und Rinden sie ihr Winterlager hat. Die Kreuzvögel sollen sich ihrer zur Winterzeit zur täglichen Nahrung bedienen. Göze Entomologische Beyträge II. Th. S. 225 unten in der Note. Allein sie rühren sie nicht an, sondern leben bloß von Fichten- und andern Nadelholzsaamen.

Anmerkung.

Göze hat daselbst diese Wanze mit der Fußzicht-Wanze *Cimex* oder *Lygaeus podagricus* F. vermuthlich deshalb vereinigt, weil Fabricius in seinen ältern Schriften bey seinem *podagricus* den *Cimex grossipes* Degeers, welcher unsre Tannenwanze ist, angeführt hat. Es muß aber diese Fußzichtwanze den schonenswerthen bengezählt werden.

Ein und zwanzigste Gattung.

Die Blattläuse. Aphides.

Sie heißen auch Pflanzenläuse, Baumläuse und Blattlausfliegen. Die bepflanzten werden von dem gemeinen Mann Mehlthau genannt.

Gattungskennzeichen nach Linné.

Sie haben einen heruntergebogenen Rüssel oder Saugschnabel und längere Fühlhörner als der Halschild ist. Sie sind theils mit vier, theils mit gar keinen Flügeln
ver-

versehen. Ihre Füße sind Gehefüße, in den Fußblättern haben sie nur Ein Gelenke — und der dicke Hinterleib ist oft mit zwey Hörnchen oder Fortsätzen versehen, die man auch Rückentrompeten nennt.

Was von den Larven und Puppen bey den Wanzen gesagt worden, daß sie nämlich dem vollkommenen Insekt bis auf die Flügel gleichen, gilt auch von diesen. Ihre vielen Arten könnten in wenigere zusammengezogen werden, wenn man lieber ihre Gestalt, als ihren Aufenthalt und ihre Farben zum Grunde legen wollte. Ihre Farbe bekommen sie höchstwahrscheinlich von dem Gehalt der Pflanzensäfte, wie man dieses besonders an der Blattlaus des Rheinfarrns bemerkt, die mit der Zeitigung der Pflanze immer röthler und zuletzt scharlachroth wird. Der Saft dieser Thierchen färbt auf Leinwand und Holz dauerhaft roth.

Ihre Oekonomie ist wunderbar und bennähe unerschöpflich. Vom Frühjahr an, bis in den spätesten Herbst, gebären sie lebendige Junge, ohne Zuthun eines Männchens *d*). Im Herbst erscheinen die Männchen, die in der letzten Generation der Lebendigen mit geboren werden, begatten sich mit den Weibchen, und dann erfolgt die letzte Generation, die aus bloßen Eiern oder Brut für die Zukunft besteht. Diese liegen im Winter in Baumrinden *e*), und kriechen im Frühjahr aus. Erstaunlich ist es, daß eine einzige Begattung zu so vielen Millionen eines Sommers hinreichend ist. In einerley Art giebt es geflügelte und ungeflügelte, auch in einerley Art haben Männchen und Weibchen Flügel, und auch keine. Ehe sie sich nicht wenigstens viermal gehäutet haben, gebären sie nicht und bekommen auch nicht Flügel. Da den Blättern der mit diesen Insekten bedeckten Bäume der Saft entzogen und solche mit ihrem Honigsaft, der wieder andere Insekten anlockt, so überfirnißt werden, daß das Einsaugen und Ausdünsten dieser wichtigen Organe gehindert wird; so sind die Blattläuse allerdings schädliche Thierchen.

Und sie würden es noch mehr seyn, wenn ihnen nicht gewisse Raupentödter, Ichneumones, nachstellten, desgleichen die Marienkäfer, Coccinellae, dann die Honigfliege, *Musca mellina* L., Münzfliege, *Musca menthastri* L., geschriebene Fliege, *Musca scripta* L., dann die Florfliegen, *Hemerobii* L. Durch Kälte und Regenwetter wird ihre Vermehrung gleichfalls sehr nachdrücklich verhindert.

Daß die Blattläuse aber an den Ameisen keine Feinde haben, wie sonst manche und auch der Uebersetzer des Linne glauben, war schon dem Linne bekannt, und beständig sich immer noch. Denn die Ameisen sind häufig unter den Blattläusen anzutreffen, und belecken sie allenthalben, thun ihnen aber nichts zu leide, sondern genießen ihren Honigsaft, den sie entweder aus dem After auf die Blätter spritzen, oder durch die beyden Rückentrompeten

d) Und in diesen Jungen befinden sich schon wieder Junge, weil eine einmalige Begattung im Spätherbste ihre befruchtende Wirkung im folgenden Frühjahr und Sommer bis ins neunte Glied äußert. Gemeinlich

soll nach Bonnet, eine einzige Mutter neunzig und drüber gebären.

e) Oder sind in die zarte Wolle der Pflanzen eingefütert, —

peten (Hörnchen) von sich geben. Dieser soll alsdann, wenn er aus dem After selbst als klebrichte Feuchtigkeit gespritzt wird, den Eichen, und derjenige, so aus den röhrenartigen Hörnchen gespritzt wird, den Obstbäumen schädlich seyn. Doch ist dieser Honigthau auch zuweilen eine Feuchtigkeit, die aus den Pflanzen ausschwißt, bey plötzlicher Veränderung der Temperatur der Luft gerinnt, und wovon sie erkranken, z. E. beym Hopfen.

Manche vertreiben sie mit Heringslake, die man mit Wasser vermischt und an die Zweige sprengt, oder mit kleinen aus Vorsten verfertigten Pinseln, mit welchen man sie trocken abbürstet. Auch die Tabackslauge können sie nicht vertragen.

Die Gattungskennzeichen nach Fabricius sind:

Die Blattlaus, 219. Aphis: Der untergebogene Rüssel hat eine fünfgliedrige Scheide, mit Einer Vorste. Die Lippe ist gewölbt, und die Fühlhörner sind borstenförmig.

Die äußern Gattungskennzeichen derselben nach Fabricius sind: Die Blattlaus: Der Körper ist eyrund, klein, ungerandet und träge, bald geflügelt, bald ungeflügelt, ohne Rücksicht des Geschlechts; der Kopf ist klein, eyrund, sehr eingesugt; die Augen ragen kaum hervor, und stehen an der Seite; die Fühlhörner stehen von einander ab, und sind an den Seiten befestigt; der Halschild ist eyrund, und hat oft einen dicken Rand; der Hinterleib ist dick und stumpf, mit zwey emporgestreckten, cylindrischen Hörnchen, und öfters mit einem kleinen und cylindrischen Stiel am After; die vier Flügel sind länger als der Hinterleib, häutig und zusammengedrückt; die Füße sind kurz und gerundet, zum Gehen bestimmt. Das Insekt hat entweder grüne oder schwarze Farben. — Sie gehören zu den Rhynготen.

Alle weniger schädliche.

1. Die Johannisbeer-Blattlaus. Aphis Ribis, Lin.

Namen, Ehrlsten und Nachweisung der Abbildung.

Aphis Ribis, Lin. 733. 1. Müller 512. 1.

— — Fab. Ent. IV. 211. n. 7.

— — die Blattlaus des Johannisbeerstrauchs, Gleditsch II. 254.

Reaumur Ins. 3. t. 22. f. 7 — 10.

Kennzeichen der Art und Beschreibung des Insekts.

Der Körper ist glatt, grün, mit schwarzen Augen. Die Fühlhörner sind von der Länge des Körpers, und nebst den Füßen mattschwarz. Der After ist stumpf, mit linienförmigen Röhrenhörnchen. Larve und Puppe sind gelblich.

Auf:

Aufenthalt, Feinde und Schaden.

Unter den aufgetriebenen Bückeln auf dem Laub der Johannisbeere, das dadurch angefalteter und blatterartig wird; wo sie theils in großer Zahl beisammen, theils einzeln darauf leben. Von ihren Feinden, den Raupenbädern, ist oben geredet worden. Dazu kommt noch die Johannisbeerfliege, *Musca ribesii*, Lin.

2. Die Ulmen-Blattlaus. *Aphis Ulmi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ulmenlaus, Rüstern-Blattlaus.

Aphis Ulmi, Lin. 733. 2. — Müller 512. 2.

— — Fab. Ent. IV. 27. n. 37.

— — Die Blattlaus der Rüstern. Gleditsch I. 287.

— — Geoffroy Insect. 494. Pl. 10. f. 3.

Reaumur Insect. 3. t. 25. f. 4—7.

Kennzeichen der Art und Beschreibung.

Der Körper ist etwas cylindrisch, rostfarben, mit weißer Wolle bedeckt. Die Hörnchen sind gleichsam abgenutzt.
Die Larve ist grün.

Aufenthalt und Schaden.

Auf der Ulme und deren eingewickelten Blättern, worauf sie große Kugeln und Auswüchse verursacht. Ihre Familien sind oft zahlreich.

3. Die Hollunder-Blattlaus. *Aphis Sambuci*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hollerlaus.

Aphis Sambuci, Lin. 734. 4. Müller 513. 4.

— — — Fab. Ent. IV. 211. n. 4.

— — — Geoffroy Insect. I. 495. 3.

— — — Die schwarze Blattlaus des Fiebers, Gleditsch II. 207.

Reaumur 3. t. fig. 5—15.

Kennzeichen der Art.

Sie ist ganz blau oder schwarzblau.

Beschreibung des Insekts.

Sie ist etwas groß, hinten stumpf und bennahe zurückgebogen. Die Hörnchen sind lang. Ihre Farbe ist schwarz, und am Rand hat sie auf beyden Seiten drey weiße Streifen. Ein kleiner Punkt steht auf beyden Seiten an der Wurzel des Hinterleibes, und ein solcher noch besonders über dem After.

Aufenthalt.

An den Zweigen des schwarzen Hollunders, auch auf andern Gewächsen.

4. Die Traubenkirschen-Blattlaus. *Aphis Padi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Vogelkirschen-Blattlaus.

Aphis Padi, Lin. 734. 8. Müller 514. 8.

— — Fab. Ent. IV. 220. n. 50.

— — die Blattlaus der Patscherbe. Gleditsch II. 113.

Reaumur 3. t. 23. f. 9. 10.

Kennzeichen der Art und Beschreibung.

Sie hat große Flügel und lange Fühlhörner, und lagert sich heerdenweis unter dem Laube, und biegt es herum.

Aufenthalt.

Auf jungem Laub und Sprossen der Traubenkirschen und des Faulbaums.

5. Die Rosen-Blattlaus. *Aphis Rosae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rosenlaus.

Aphis Rosae, Lin. 734. 9. Müller 514. 9.

— — Fab. Ent. IV. 216. n. 30.

— — die Blattlaus auf den Rosen. Gleditsch II. 270.

Reaumur 3. t. 21. fig. 1—4.

Sulzers Kennzeichen t. 12. fig. 79.

Kennzeichen und Beschreibung.

Der Körper ist grün, die Fühlhörnerspizen und die sehr langen Röhrenhörnchen sind schwarz. Der spitzige After hat keinen Stiel.

Aufenthalt.

Im Frühjahr, nämlich im May und Junius auf Rosen, gewöhnlich an den Stielen und Knospen; diese sind grün: im August aber sitzen blasfrohe Blattläuse auf den Rosen.

6. Die Linden-Blattlaus. *Aphis Tiliae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Lindenlaus.

Aphis Tiliae, Lin. 734. 11. Müller 714. 11. tab. 12. fig. 5. u. 4.

— — Fab. Ent. IV. 218. n. 39.

— — die Lindenlaus, Gleditsch I. 312.

— — Geoffroy I. 495. n. 6.

Reaumur 5. t. 25. fig. 1 — 8.

Kennzeichen der Art.

Die Flügel, Fühlhörner und Füße sind schwarz punktiert.

Beschreibung des Insekts.

Der Körper ist gelbgrünlich; die Fühlhörner und Füße sind schwarz und weißschief-fig. Der Vorderleib hat auf jeder Seite eine schwarze Linie. Der Hinterleib ist stumpf, mit vier, aus schwarzen Punkten bestehenden, Linien.

Aufenthalt und Schaden.

Auf den Linden, aus deren jungen Blättern und Sprossen sie den süßen Saft aus-saugt, den sie wieder von sich giebt.

7. Die Birken-Blattlaus. *Aphis Betulae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Birkenlaus.

Aphis Betulae, Lin. 734. 21. Müller 517. 21.

— — Fab. Ent. IV. 215. n. 25.

Aphis

Aphis Betulae, Geoffroy I. 496. 7.

— — die Birken-Blattlaus. Gleditsch I. C. 440.

Reaumur 3. t. 22. f. 2.

Kennzeichen der Art.

Die Einschnitte der Ränder am blaßgrünen Hinterleib sind schwarz punktiert. Jeder Einschnitt hat vier Punkte.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist sehr klein. Der Kopf und der Vorderleib ist schwarz und glatt; der Hinterleib ist grün und am After blaßschwarz. Die Füße sind schwarz mit bleichen Schenkelbeinen. Die Hörnchen sind kurz und grün. Die großen Flügel haben drei schwarze Bänder; die letzte davon stellt einen an der Spitze gespaltenen Zweig vor. Der Außenrand ist grüulich. — Linne hat die Geflügelten nicht beobachtet; sonst hätte er ihnen keine kurzen Flügel beigelegt.

Aufenthalt und Schaden.

Auf den Birken, deren Blätter sie von den Rippen, Stielen und äußersten Spitzen einnimmt.

8. Die Eichen-Blattlaus. Aphis Roboris, Lin

Namen und Schriften.

Eichenlaus, Winterlichen-Blattlaus.

Aphis Roboris, Lin. 773. 22. — Müller 517. n. 22.

— — Fab. Ent. IV. 213. n. 42.

— — die schwarze Blattlaus der Eiche. Gleditsch I. 522.

Kennzeichen der Art.

Sie ist schwarz, mit gleichsam abgenagten schwarzen Hörnchen auf der Mitte des Bruchs, und mit rothen Schenkeln.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist groß und ein wenig kuglich und schwarz. Die graublauen Fühlhörner sind halb so kurz als der Leib, und an der Spitze schwarz. Mitren auf dem Hinterleib sind sehr kurze, abgenagte Hörnchen. Die Schenkel sind roth. — Sie kriecht den Homothau aus dem After, nicht aus den Hörnchen, und ist von der Sommerlichen-Blattlaus, Aphis Quercus, Lin. die den längsten Rüßel hat, und in Frankreich einheimisch ist, verschieden.

Aufenthalt und Schaden.

Auf Eichen, woran solche im trockenen Sommer des Jahres 1780 klumpenweis hingen. Wenn sie damals jemanden auf den bloßen Leib oder ins Gesicht fielen, verursachten sie Entzündung. Einige Personen im Württembergischen kamen dadurch fast ums Gesicht.

9. Die Buchen-Blattlaus. *Aphis Fagi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Buchenlaus.

Aphis Fagi, Lin. 735. 23. Müller 517. 23.

— — Fab. Ent. IV. 215. n. 24.

— — Geoffroy ins. Paris. 497. 2.

Reaumur 3. t. 26. fig. 1.

Kennzeichen und Aufenthalt.

Sie ist wollig und wohnt auf der Roth- und Weißbuche. Ihre Naturgeschichte ist uns weiter nicht bekannt.

10. Die Fichten-Blattlaus *Aphis Pini*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Fichtenlaus.

Aphis Pini, Lin. 735. n. 25. Müller 518. 25.

— — Fab. Entom. IV. 219. n. 44.

— — die Kiefer- oder Fichtenlaus, Gleditsch I. 404.

— — Forstmann. S. 78.

Degeer 3. t. 6. f. 1—18.

Sie fehlt in den frühern Schriften des Fabricius.

Kennzeichen der Art.

Sie ist höckerig und braun, und die Hörnchen sind sehr kurz, die Füße aber nackt.

Aufenthalt.

In den jungen Zweigen der Kiefer, die sie aussaugt.

11. Die Weiden-Blattlaus. *Aphis Salicis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weidenlaus.

Aphis Salicis, Lin. 376. 26. Müller 518. 26.

— — Fab. Ent. IV. 219. n. 47.

— — Gleditsch II. 64.

Beaumur III, t. 22. fig. 2.

Kennzeichen der Art.

Sie ist groß und schwarz, hat vier weiße Punkte auf dem Rücken und etliche weiße Seitenstreife.

Beschreibung des vollkommen und unvollkommen Insekts.

Sie ist zwei Linien lang, und ihr Körper groß und schwarz. Die Fühlhörner sind halb so kurz als der Körper. Die vier weißen Querpunkte, die an der Seite des Rückens stehen, sind größer, als die andern linienförmigen Querpunkte. Die Hörnchen sind schön gelbroth. — Unten ist das Insekt weiß.

Als Larven sind sie grün, und todt sind sie schwarz, und die Punkte vergehen alsdann.

Aufenthalt.

Auf mehreren Weidarten f.

12. Die Pappel-Blattlaus. *Aphis Populi*, Lin.

Namen und Schriften.

Espenlaus, Aspenlaus.

Aphis Populi, Lin. 736. 27. Müller 518. 27.

— — Fab. Ent. IV. 215. n. 27.

— — die Aspenlaus, Gleditsch I. 544.

Kennzeichen der Art.

Sie ist ziemlich groß, eiförmig, blaßbraun, und am Rande fünfmal punkirt. Sie hat keine Hörnchen.

Bes.

f) Oft habe ich die nämliche in den zusammengevolkten Johannisbeerblättern, dergleichen

in den Apfel-, Pflaumen- und Kirschenblättern angetroffen. S.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Der Kopf und Vorderleib sind schwarz. Der Hinterleib fällt ins Grüne, und hat kein Hörnchen. Die weißen, spitzigen Flügel sind am Außenrand schwarz.

Sie ist als Larve grün. — Die Aspen- oder Zitterpappel-Blattlaus, *Aphis Tremulae*, Lin. die eben so lang und graublau-braun ist, scheint nur eine Abart davon zu seyn, die im Alter unkenntlich wird.

Aufenthalt.

Auf den Aspen und ihren beuligen und zusammengerollten Blättern.

13. Die Beutel-Blattlaus. *Aphis bursaria*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Aphis bursaria, Lin. 736. 29. Müller 518. 29.

— — Fab. Ent. IV. 212. n. 9.

— — die Sackblattlaus der Schwarzpappel, Gleitsch I. 543.

Seba Museum I. t. 38. f. 8.

Reaumur 3. t. 26. f. 7 — 11.

Bonnet Insectologie t. 1. fig. 3.

Der Herr von Gleichen hat eine Monographie von derselben geschrieben.

Kennzeichen und Beschreibung.

Der ganze Leib ist dunkelbraun und wollig. Die erhabnen Seiten des Vorderleibes sind durchsichtig. Die Fühlhörner sind kurz.

Aufenthalt und Schaden.

In kleinen runden Säcken, an der Schwarzpappel. Sie macht nämlich durch ihren Stich an den Stielen und auf dem Laub derselben, allerhand Beulen und Auswüchse zu ihrer Wohnung.

14. Die Ahorn-Blattlaus. *Aphis Aceris*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Haselholzerlaus, Ahornlaus.

Aphis Aceris, Lin. 736. 31. Müller 519. 31.

— — Fab. Ent. IV. 212. n. 11.

Geoffroy Insect. I. 495. n. 5.

Reaumur III, t. 22. f. 6 — 30.

Kennzeichen der Art.

Sie ist grün mit schwarzen Flecken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Leib ist mattschwarz. Die borstenförmigen Fühlhörner und Schienbeine sind blaß. Der Vorderleib ist cylindrisch und schwächer als der Hinterleib, der ebenfalls gewölbt, aber an den Seiten gefaltet ist. Der After ist stumpf, mit sehr kurzen Hörnchen.

Aufenthalt.

Auf dem Spiß-Horn (*Acer platanoides*) und Maßholder.

15. Die Pflaumen-Blattlaus. *Aphis Pruni*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Aphis Pruni, Fab. Ent. IV. 213. n. 14.

— *Pruni domesticae*, Geoffroy I. 497. 10.

Reaumur III. 23. fig. 9. 10.

Kennzeichen der Art.

Sie ist grün mit weißem Mehlstaub, und hat kleine Hörnchen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie hat einen grünen Körper, Fühlhörner und Füße. Der Rand des Hinterleibes ist gefaltet. Die Lüne auf dem Bauchrücken und der Punkt, der auf jeder Seite an dessen Wurzel steht, sind dunkler. Der After geht spizig aus, mit fadenförmigen Hörnchen.

Aufenthalt.

Auf den Blättern der Pflaumen und Zwetschken.

Anmerkung.

Von der Kiefern-Blattlaus weiß ich nicht, ob solche in Deutschland einheimisch ist. Sie heißt *Aphis Pinet*. Fab. Ent. IV. 219. n. 15. Degeer 3. 59. 2. tab. 6. f. 19. 57. Ihr Körper ist schwarz, mit weißem Mehl bestäubt; ihre Hinterfüße sind lang und mit Franzen besetzt. Ihr Aufenthalt sind die Föhren-Nadeln in Schweden. — Bestimmter hat sich Fabricius von ihr nicht ausgesprochen.

16. Die Sahlweiden-Blattlaus. *Aphis Capreae*, Fab.

Namen und Schriften.

Aphis capreae, Fab. Ent. IV. 211. n. 3.

— — — Göthe Entomologische Beyträge II. 314. 17.

Kennzeichen der Art und Beschreibung.

Sie ist klein und grün, mit blassen Seiten. Die Augen und Fühlhörner sind schwarz, so auch die Füße an der äußersten Spitze. Der Hinterleib ist spitzig.

Aufenthalt.

Auf Sahlweiden.

17. Die Kirschen-Blattlaus. *Aphis Cerasi*, Fab.

Namen und Schriften.

Aphis Pruni Cerasi, Fab. Ent. IV. 211. n. 6.

— — — Mülleri Zoologiae Danicae prodromus, 110. 1256.

— — — Göthe Entomol. Beyträge II. 314. 16.

Kennzeichen der Art.

Sie ist klein, glänzend und schwarz, an den Fühlhörnern und Füßen weiß.
Die Larve ist kastanienbraun.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Sie ist klein, schwarz und glänzend. Die Mitte der Fühlhörner und die Schienbeine sind blaß. Der After zwischen den beyden Hörnchen endigt sich mit einem spitzigen Stiel, der noch einmal so kurz ist als die Hörnchen sind. Die Fühlhörner sind kürzer als der Leib.

Aufenthalt.

Auf den Sauerkirsch-Blättern und Zweigen.

18. Die Hartriegel-Blattlaus. *Aphis Corni*, Fab.

Namen und Schriften.

Hartern-Blattlaus.

Aphis Corni, Fab. Ent. IV. 214. n. 19.
 — — Göthe Entom. Veytr. II. 315. 20.

Kenntzeichen und Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Der Körper ist schwarz. An der Wurzel des Hinterleibes und auf dessen Unterfläche ist sie grün. Die Füße sind grün, und der After hat weder Stiel noch Hörnchen. In der Jugend, das ist, als Larve, ist sie blaß und hat einen großen schwarzen Rückenpfleck.

Aufenthalt.

Auf dem Hartriegel, *Cornus sanguinea*, Lin.

19. Die Spindelbaums-Blattlaus. *Aphis Evonymi*, Fab.

Namen und Schriften.

Aphis Evonymi, Fab. Ent. IV. 214. n. 21.
 — — — Göthe Entomol. Veytr. II. 315. n. 21.

Kenntzeichen der Art.

Blattlaus: Der Körper ist schwarz, der langgestielte Hinterleib mattschwarz mit erhabenem und punktirtem Rande.

Larve: Mattschwarz mit einer weißen Wurzel an den Fühlhörnern.

— Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Wir fügen zu Obigem folgendes hinzu: Die kurzen, cylindrischen Fühlhörner sind schwarz, und der Hinterleib endigt sich mit einem Stiel, der so lang ist als die Hörnchen. Die Füße sind blaß, mit schwarzen Knien. Die Flügel sind durchsichtig, mit einem braunen Randpunkt. — Als Larve ist sie mattschwarz, mit einer weißen Wurzel an den Fühlhörnern.

Aufenthalt.

Auf dem Spindelbaum (*Evonymus europaeus*).

20. Die Eblingbaums-Blattlaus. *Aphis Viburni*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schneeballen-Blattlaus.

Aphis Viburni, Fab. Ent. IV. 216. n. 23.

— Opuli, Sulzer's Geschichte Taf. 11. f. 1. 2.

Scopoli carniolica n. 396.

Kennzeichen der Art.

Blattlaus: Eyrund, etwas kugelig; der Kopf und Vorderleib ist schwarz, alles übrige graublau.

Larve: Dunkelbraun, mit Fühlhörnern von der Länge des Hinterleibes; die Füße sind blässer.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Der schwarze düstre Körper ist eyrund und kugelig; die Fühlhörner sind an der Wurzel, nebst den Füßen blas. Der Vorderleib ist gefaltet: Der After endigt sich mit einem cylindrischen Stiel, der kürzer ist, als die beyden Hörnchen. Die ungeflügelten Männchen sind ganz schwarz, und kleiner, mit längern Fühlhörnern als die Weibchen.

Die Larve ist oben angegeben, kann aber nicht vollständiger beschrieben werden.

Aufenthalt.

Auf den Blättern, Dolden und Stengeln des Schlingbaums, Viburnum Opulus, Lin.

21. Die Apfelbaums-Blattlaus. Aphis Mali, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Aphis Mali, Fab. Entom. IV. 216. n. 29.

Degeer 5. tab. 3. f. 20.

Kennzeichen der Art.

Sie ist gelbgrün mit langen Hörnchen und schwärzlichen Füßen und Fühlhörnern.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Körper ist grün, Fühlhörner und Füße aber mattschwarz. Der Hinterleib ist weder gerandet noch gefaltet. Der After endigt sich mit einem schwarzen Stiele. Die cylindrischen Hörnchen sind schwarz.

Sie varirt mit einem ganz röthlichen Körper, mit braunen und zuweilen braun-blauen Füßen und braunem Kopf.

Aufenthalt und Feinde.

Unter den Apfelblättern. — Ihr Feind ist die Apfelbaumsfliege, Musca pyrastris, Lin.

22. Die Eschen-Blattlaus. *Aphis Fraxini*, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Aphis Fraxini; Fab. IV. 215. n. 23.

— — — Geoffroy I. 494. 2.

Kennzeichen der Art.

Sie ist schwarz und grünscheckig.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Kopf und Halschild sind schwarz. Der Hinterleib ist grün und dessen Einschnitte haben schwarze Ränder. Die Fühlhörner sind sammt den Füßen scheckig.

Aufenthalt.

Auf den Eschenbäumen.

Anmerkung.

Gleditsch gedenkt II. 232 einer Kreuzdorn-Blattlaus, *Aph. Rhamni*, die nirgends beschrieben steht, und die er selbst nicht beschreibt.

Zwey und zwanzigste Gattung.

Die Blattsauger. *Chermites*, Lin.

Sie heißen auch Ackerblattläuse, Bastard-Blattläuse, Blattsaugerfliegen, Blattflöhe.

Gattungskennzeichen nach Linné.

Der Rüssel sitzt am Halschild: Dieser ist bucklig und erhaben. Die Fühlhörner sind länger als der Halschild. Die vier Flügel sind niedergebogen, und die Füße sind Springsüße.

Ihre Larven sind sechsfüßig, und wohnen sowohl in Kollblättern, als auch in Auswüchsen der Stengel und Blätter.

Sie haben in ihrer Geburt, Struktur und Verwandlung vieles mit den vorigen gemein, außer daß sie wie Flöhe hüpfen und viele als Larven mit langen weißen Woll-

flocken überzogen sind. Sie sind nicht so zahlreich als die Blattläuse. Sulzer glaubte, drey Nebenaugen (Stemmata) am Kopf-Wirbel an ihnen zu sehen. Der Rüssel ist ein Saugfachel, der länglich ist, und zwischen dem ersten und zweyten Fußpaar zum Vorschein kommt.

Die Fabricius'schen Gattungskennzeichen sind:

Der Blattsauger, 220. Chermes, hat einen Mund mit drey niedergebogenen Borsten. Die Scheide ist häutig und zwischen den Vordersehenkeln befestigt. Die Fühlhörner sind cylindrisch.

Seine äußern Gattungskennzeichen sind:

Der Blattsauger: Der Körper ist klein, oblong, ungerandet, behende, hüpfend; der Kopf geht seitwärts aus, ist sehr stumpf und fast breiter als der Halschild; die Augen sind groß, kugelig, an der Seite stehend und hervorragend; die Fühlhörner sind fadenförmig, feinbehaart, von einander stehend, zwischen den Augen befestigt; der Halschild ist eyrund, flach, glatt; das Schildchen ist klein und dreyeckig; der Hinterleib ist eyrund, der After spitzig, mit zwey stumpfen kurzen Stielen; die vier Flügel sind dachig, länger als der Hinterleib, häutig und aderig; die Füße sind mittelmäßig, zugerundet und zum Gehen bestimmt; die Fußblätter sind zweygliedrig; die hintern aber sind Springfüße. Das Insekt ist grün gefärbt.

A. Die mehr schädlichen.

1. Der Fichten-Blattsauger. Chermes Abietis, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Tannen-Blattsauger, Tannen-Chermesinsekt.

Chermes Abietis, Lin. 738. n. 13. Müll. 525. 13.

— — — Fab. IV. 223. n. 13.

— — — der Fichtensauger. Gleditsch I. 405.

— — — Besorgter Forstmann. S. 80.

— — — Pini, Handbuch der praktischen Forst- und Jagdkunde I. 600.

— — — Walthers Forstphysiographie. 369.

— — — Däzel Forstwiss. 296. S. 340.

Psylla Geoffroy I. 487. 5.

Degeer Insekt. 3. 99. tab. 8. fig. 1 — 3.

Kennzeichen der Art.

Er ist blaßgelb mit mattschwarzen Augen und durchsichtigen bleyfarbenen Flügeln.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Er ist sehr klein. Der Körper ist bläulichgelb, die Augen mattschwarz, und zwischen denselben ist ein kleiner schwarzer Punkt. Die Fühlhörner sind borstenförmig. Eine Flügel trägt er wie der Erlen-Blattsauger. Der Mund befindet sich unter dem bucklig erhabenen Halschild. Er springt nicht wie die andern.

Die Larve ist anfänglich flockig, und kommt erst bei eintretender Frühlingswärme aus dem Eiy.

Aufenthalt, Fortpflanzung und Schaden.

Er befindet sich als Larve in grünen Körnern oder Gallen an der Spitze der Kiefer, der Weiß- und besonders der Rothtanne oder Fichten, wo er wie eine Beere aussieht. Im Herbst entwickelt er sich als vollkommenes Insekt.

Er zerstört den Maywuchs an den jungen Enden und Spitzen der eben genannten Nadelbäume dergestalt, daß sie darauf ausgedehnt, verkürzt und aufgetrieben werden, und eine schuppige, flachlige Frucht vorstellen, welche einem jungen stacheligen Zapfen gleicht, worin Zellen mit einer mehrlartigen Materie enthalten sind, in deren Mitte sich die sehr kleinen Larven aufhalten, die daher gekommen sind, weil der weibliche Blattsauger mit seinem spitzigen Rüssel die Knospen, aus welchem sich die frischen Triebe entwickeln sollten, durchbohrt, und in solche seine Eier gelegt hatte.

Die verkürzten, harten Nadeln, stehen als feine Stacheln überall hervor. Es ist in jungen Saaten, Anflug und Dickungen, oft ein großer Schaden. Denn es entstehen Mißgewächse und Krüppel davon. Oft treten die jungen Zweige dergestalt ab, daß die Bäume verdorren oder doch krüppelig werden.

B. Die weniger schädlichen.

2. Der Ulmen-Blattsauger. *Chermes Ulmi*, Lin.

Namen und Schriften.

Ulmen-sauger, Ulmen-Chermesinsekt.

Chermes Ulmi, Lin. 737. 2. Müller 522. 2.

— — — Fab. Ent. IV. 221. n. 2.

— — — Der Blattsauger der wilden Rüster. Gleditsch I. 287.

Kennzeichen der Larven.

Diese ist rund, aschgrau, mit erhabnen schwarzen Punkten, mit weißer Wolldecke reichlich bedeckt.

Aufenthalt.

Zwischen den zusammengerollten Blättern der glatten Ulme.

3. Der Birnen-Blattsäuger. *Chermes Pyri*, Lin.

Namen und Schriften.

Chermes Pyri, Lin. 737. n. 4. Müller 522. 4.

— — — Fab. Entom. IV. 221. n. 3.

— — — Der Birn-Blattsäuger. Gleitsch II. 99.

Kennzeichen der Art.

Der Körper ist klein und grau, mit weißen Seitenstreifen.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Körper ist grünbraun, von der Farbe wie rohe Kaffeebohnen. Der Hinterleib ist kurz mit weißen Seitenstreifen. Die Flügel haben am Rückenrand einen dunkeln Punkt. Die Fühlhörner sind fünfgliederig. Die Farbe des Männchen fällt ins Schwarze, und das Weibchen hat einen rothgelben Hinterleib.

Aufenthalt.

In den Büscheln auf Apfel- und besonders Birnlaub.

4. Der Birken-Blattsäuger. *Chermes Betulae*, Lin.

Namen und Schriften.

Birken-Chermesinsekt.

Chermes Betulae, Lin. 738. 9. Müller 524. 9.

— — — Fab. Ent. IV. 222. n. 11.

— — — *Betulae albae*, der Birken-säuger. Gleitsch I. 439.

Kennzeichen der Art.

Der Kopf und die Brust sind blaß, die Fühlhörner borstenförmig. Der röthliche Hinterleib hat fünf breite schwarze Querlinien auf dem Brustücken, und drei auf dem Bauchücken.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Die Fühlhörner sind borstenförmig, der Kopf und die Füße bleich. Der Hinterleib ist fleischfarben roth, mit einer breiten schwarzen Querlinie auf jedem einzelnen Einschnitt, nämlich fünf auf dem Rücken der Brust, und drey auf dem Rücken des Bauchs. Der Schwanz ist spitzig. Die vier Flügel sind durchsichtig wie Glas und glänzend. Der grüne Färbefast dieses Insekts ist innerhalb des Leibes.

Aufenthalt.

An den jungen Zweigen der Birke.

5. Der Vogelbeer-Blattsauger. *Chermes Sorbi*, Lin.

Namen und Schriften.

Sperberfänger.

Chermes Sorbi, Lin. 758. 5. Müller 523. 5.

— — — Fab. Ent. IV. 222. n. 7.

Kennzeichen der Art.

Die Oberfläche ist schwarz gestrichelt und liniert, die Unterfläche grünlich.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Der Körper ist oben schwarz und grünschekig; der Halschild aber gelblich, vornen mit zwei schwarzen Punkten, und weiterhin mit vier dergleichen Strichen. Eben dergleichen sind auch auf dem Rücken. Die Unterseite des Insekts ist grün.

Aufenthalt.

Auf Vogelbeerbäumen, die auch Quitschen heißen, *Sorbus aucuparia*.

6. Der Erlen-Blattsauger. *Chermes Alni*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Erlen-Chermes, Erlen-Chermesinsekt, Erlen-Blattsaugfliege.

Chermes Alni, Lin. 758. 10. Müller 524. 10. tab. 12. fig. 9—17.

— — — Fab. Ent. IV. 223. n. 12.

— — *Betulae Alni*, der Erlenfänger, der Saugwurm der Erle mit dem federlichten Hinterleibe. Gleditsch L. 445.

Schäff.

Schäffer Elementa t. 39. f. 1.
 Sulzers Insekten t. 12. f. 80.

Kennzeichen der Art.

Er ist spitzig und weiß, hat einen gabelförmigen Schwanz und einen dünnen Fortsatz und weiße Flügel mit braunschwarzen Adern.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts.

Das vollkommene Insekt ist grün mit borstenartigen, siebengliederigen Fühlhörnern, die weiß und schwarz geringelt sind. Der Rüssel ist weiß und an der Spitze schwarz. Der Körper ist ebenfalls weißlich, und die weißen Flügel haben schwarze Adern.

Die Larve von der Größe einer Laus, ist platt, grüngescheckt, mit langer federiger Wollstocke hinten dicht bedeckt.

Aufenthalt.

Zu Ende des Monats May auf den jungen Sprossen und Blättern der Erlengesträucher, in Deutschland und Nordamerika.

7. Der Eichen-Blattsäuger. *Chermes Quercus*, Lin.

Namen und Schriften.

Eichensäuger, Eichenlaus.

Chermes Quercus, Lin. 738. 11. — Müller 524. 11.

— — — — Lin. Faun. Suec. 263. 1099.

— — — — der weißgelbliche und braunstreifige Blattsäuger. Gled. I. 524.

Er fehlt in den Fabricius'schen Schriften.

Kennzeichen und Beschreibung.

Der Körper ist weißlichgelb; die Flügeldecken haben am Außenrand vier braune Schattenstreifen und einen solchen am Innenrand.

Aufenthalt.

Auf den Blättern der Eichen, besonders der jungen Triebe.

8. Der Büchen-Blattsauger. *Chermes Fagi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Chermes Fagi, Lin. 738. 12. — Müller 524. 12.

— — — Fab. Ent. IV. 222. n. 6.

Reaumur 3. t. 26. f. 1—6.

Kennzeichen der Art.

Er ist im Larvenstande faserig, nachher grün, und im vollkommenen Stand endlich mit Mehl bestäubt.

Aufenthalt.

In den Blättern der Buche, besonders der Rothbuche.

9. Der Weiden-Blattsauger. *Chermes Salicis*, Lin.

Namen und Schriften

Weiden-Chermesinsekt.

Chermes Salicis, Lin. 739. 14. Müller 525. 14.

— — — Fab. Ent. IV. 223. n. 14.

— — — Der eigentliche Weidenblattsauger. Gleditsch II. 63.

Kennzeichen der Art und Beschreibung.

Der Körper ist weiß. Der Rücken des Hinterleibes hat verloschene, mattschwarze Flecken. Die Fühlhörner sind an der Wurzel weiß, an der Spitze schwarz. Der Halsschild hat eine schwarze Quерlinie.

Aufenthalt.

Auf den jungen Trieben, Laub und Rinde verschiedener Weiden, wodurch ungestaltete Gewächse entstehen.

10. Der Eschen-Blattsauger. *Chermes Fraxini*, Lin.

Namen und Schriften.

Eschen-Chermesinsekt, Eschenmehlthau.

Chermes Fraxini, Lin. 730. 15. Müller 525. n. 15.

— — — Fab. Ent. IV. 223. n. 15.

N n

Cher-

Chermes Fraxini, der eigentliche Blatt- und Eschenfanger. Gleditsch I. 273.
Psylla, Geoffroy I. 486. 4.

Kennzeichen der Art.

Der Halschild ist schwarz und weißheckig, die Gegend der Fühlpitzen ist braun.
 Die Larve ist weißlockig.

Aufenthalt und Schaden.

Auf Eschen, wo die Larve an der weichen Rinde der jungen Sprossen und des Laubes saugt, wodurch Austreten des Safts, ein Nachtrocknen und Mißgewächse entstehen, wenn die Menge zu groß ist.

11. Der Ahorn-Blattfanger. *Chermes Aceris*, Lin.

Namen und Schriften.

Chermes Aceris, Lin. 739. 16. Müller 525. 16.
 — — — Fab. Ent. IV. 223. n. 16.
 — — — Der Blattfanger des Spitzahorns. Gleditsch I. 298.

Kennzeichen der Art.

Er ist sehr klein, der Körper gelblich, unten grün; der After ist psorienförmig, und fällt ins Braune.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Er gehört zu den allerkleinsten, indem er kaum eine große Laus an Größe übertrifft. Er ist auf dem Rücken gelbgrün, die Unterfläche ist mattgrün. Die Spitze des After ist psorienförmig, und schwachgrünlichbraun. Die Augen sind gelblich.

Aufenthalt.

Auf dem Stiel und den Zweigen des Ahornlaubes.

12. Der Pflaumen-Blattfanger. *Chermes Pruni*, Scopoli.

Namen, Schriften, Kennzeichen und Aufenthalt.

Chermes Pruni, Scopoli Entomolog. Carniol. 140. 414.
 Goeze Entomol. Beyträge II. 329.

Der Hinterleib ist roth und hat braune Punkte und Binden an den Seiten, —
Er hält sich auf dem Pfaffenbaum auf.

13. Der Weißdorn-Blattsauger.

Namen, Schriften, Kennzeichen und Aufenthalt.

Chermes Crataegi, Scopoli 139. 412.

— — — — Goetze Entomol. Beyträge II. 329.

Die Larve ist blengrün; sie hat eine Längsfalte mitten auf dem Rücken, und wohnt
auf dem Weißdorn, *Crataegus oxyacantha*, Lin.

14. Der Spindelbaum-Blattsauger. *Chermes Evonymi*, Scop.

Namen, Schriften, Kennzeichen und Aufenthalt.

Chermes Evonymi, Scop. 139. 412.

Goetze Entomol. Beyträge II. 329.

Er ist schwarz mit blassen Füßen, und lebt auf dem Spindelbaum.

Drey und zwanzigste Gattung.

Die Schildläuse. *Cocci*, Lin.

Sie heißen auch Muschelinfekten, Schildlausfliegen, und mißbräuchlich Gallin-
sekten, welchen Namen man eigentlich dem Cynips beylegt.

Gattungskennzeichen nach Linné.

Der Rüssel ist am Halschild. Die Männchen haben zwey lange Schwanz-
fäden am Hinterleib, und zwey aufgerichtete Flügel, die Weibchen aber keine.

Die Schildläuse, besonders die Weibchen, sehen Blattsaugern vollkommen ähn-
lich. In ihrem Larvenstand laufen sie auf den Blättern und Zweigen herum, häuten
sich einigemal, und legen sich zuletzt fest, daß es scheint, als ob sie angewachsen wären.
Aldenn kommen sie nicht mehr von der Stelle. Die Männchen sehen in ihrem Larvenstand

den andern ähnlich, verpuppen sich und erscheinen im April als kleine zweiflügelige Fliegen, mit zwey langen Schwanzborsten. Ihr Flug ist hüpfend. Sie befruchten die Weibchen durch einen Spalt, den diese hinten am Schwanzende haben. Wenn es Zeit ist, daß die Weibchen die Eyer legen: so kolkern sie ihnen unter dem Bauche hin; die Bauchhaut schließt sich um sie herum und verwahrt sie; die Mutter aber stirbt unbeweglich über den Eycen. Das träge Weibchen hat zwey schwarze Augen, einen Schild wie eine Muschel, und so kurze Fühlhörner, auch sechs so kleine Füße, daß man sie selten, auch unter dem Microscop erblickt. Es soll auf tausend Eyer bey sich haben. Wenn die Jungen ausgekrochen sind, kommen sie aus dem mütterlichen Erabe hervor.

Diese Insekten sind eine wahre Pest der Gewächshäuser. Das Weibchen ist ein Niese gegen das Männchen, welches auf seinem Körper, wie auf einer Insel herumspaziert. Man sehe Sulzers Kennzeichen t. 12. fig. 6. Aus Versehen hatte Voege in dem Anhang zu Bonnetts Insektenlogie S. 327 sie zu den lebendiggebährenden gerechnet. Er nimmt diese Meinung zurück in seinen Entomol. Beyträgen II. 331. unten in der Note.

So schädlich auch einige Arten den Gewächshäusern sind, so sind doch wieder vier andere, ausländische Arten, die Gummilaß-Schildlaus, *Coccus Ficus*, in Ostindien, die Kermesbeer-Schildlaus, *Coccus Ilicis*, die Polnische Körner-Schildlaus, *Coccus polonicus*, und die Cochenille, *Coccus Cacti*, als gute Farbmateriellen sehr nutzbar.

Ihre Gattungskennzeichen nach Fabricius sind folgende: Die Schildlaus, 221. *Coccus* hat einen Mund mit Brustborsten und mit einer Scheide an der Brust; die Fühlhörner sind fadenförmig.

Seine äußern Gattungskennzeichen sind: Der Körper des Männchens ist oblong, ungerandet, behende; der Kopf eyrund, herausstehend; die Augen sind klein, rund und hervorstehend; die Fühlhörner sind fadenförmig, von einander stehend, zwischen die Augen eingefügt; der Halschild ist eyförmig, flach, glatt; der Hinterleib eyförmig; der After hat einen Stiel und zwey lange Borsten; die zwey Flügel sind dachförmig gebogen, länger als der Hinterleib und häutig; die Füße sind kurz, zum Gehen eingerichtet, und mehrentheils grünlich. Der Körper des Weibchens ist kugelig, träge, zuletzt gar unbeweglich, unbeflügelt und glatt, an den Rinden der Gewächse festhängend.

Sie sind minder schädlich.

1. Die Eichen-Schildlaus. *Coccus Quereus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Coccus Quercus, Lin. 740. 5. Müller 530. 5.

— — — Fab. Ent. IV. 225. n. 5.

— — — Walthers Forstwissenschaft. S. 314.

Coc-

Coccus reniformis, Geoffroy I. 508. 13.

Reaumur 4. t. 6. fig. 1—4. Sulzers Gesch. t. 11. fig. 10. 11.

Kennzeichen und Aufenthalt.

Sie ist fünf Viertellinien lang, bald rund und braun, bald rund und weiß, bald länglich und wollig, mehrentheils aber niereenförmig, und darf nicht mit *Coccus Ilcis* verwechselt werden. Sie lebt auf den Blättern und jungen Zweigen der Eiche.

2. Die Birken-Schildlaus. *Coccus Betulae*. Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Birkenschild.

Coccus Betulae, Lin. 740. 7. Müller 531. 7.

— — — Fab. Ent. IV. 226. 12.

Schäff. Icon. 111. fig. 4.

Kennzeichen und Aufenthalt.

Der Körper ist klein und weiß. Man findet sie auch rund und kastanienbraun.

Sie wohnt zwischen dem gabelichten Birkenreiß.

3. Die Hornbaum-Schildlaus. *Coccus Carpini*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hagbüchenschild, Hainbüchenschild.

Coccus Carpini, Lin. 740. 8. Müller 532. 8.

— — — Fab. Ent. IV. 226. n. 13.

Reaumur Ins. 4. t. 6. f. 5. 9. 11.

Kennzeichen und Aufenthalt.

Sie ist fast rund und blaß, zuweilen röthlichbraun, oben und unten wollig. An den Seiten sind erhabne Streifen.

Auf der Hainbüche, *Carpinus betulus*, und auf dem Hornbaume.

4. Die Ulmen-Schildlaus. *Coccus Ulmi*, Lin.

Namen und Schriften,

Ulmenschild,

Coccus Ulmi, Lin. 740. 9. Müller 532. 9.

— — Fab. Ent. IV. 225. n. 11.

Chermes Ulmi, Geoffroy insect. Paris. I. 507. n. 3.

Kennzeichen der Art und Aufenthalt.

Das Insekt ist sehr klein, und sein röthlicher Schild gleicht einer Muschelschale, wegen seiner dunkelbraunen Querbänder. Es hat einen filzichten Rand von weißer Farbe.

Auf der glatten Ulme,

5. Die Hasel-Schildlaus. *Coccus Coryli*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Haselschild,

Coccus Coryli, Lin. 741. n. 10. Müller 532. 10.

— — Fab. Ent. IV. 225. n. 11.

— — die Schildlaus der Haselstaude. Gleditsch I. 544.

Chermes Coryli hemisphaeric. Geoffroy I. 507. 10.

Reaumur 4. t. 3. f. 4—10.

Kennzeichen der Art und Aufenthalt.

Sie ist citronengelb und rothgefleckt, und halbkugelig. Mit ihren Eiern gleicht sie einem Schächtelchen voll Sand, wenn man sie durch ein Vergrößerungsglas betrachtet.

Auf den jungen Zweigen und Blättern des Haselstrauchs,

6 Die Linden-Schildlaus. *Coccus Tiliae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Coccus Tiliae, Lin. 741. 11. Müller 532. 11.

— — Fab. Entom. IV. 226. n. 14.

— — Die Linden-Schildlaus. Gleditsch I. 312.

Chermes Tiliae hemisphaericus. Geoffroy I. 507. 9.

Reaumur 4. t. 3. f. 1—3.

Kenn:

Kennzeichen der Art und Aufenthalt.

Sie ist halbkugelig und der Vorhergehenden ähnlich.

Im May, an den Lindenweigen. Sie setzen sich oft so häufig an die jungen Zweige, daß es das Ansehen hat, als wenn sie glasirt wären, und saugen den Saft aus, daß dadurch die größten und schönsten Allee-bäume verkrüppeln und zu Grunde gehen können. s. Reichsanzeiger 1803. No. 176. S. 2306. Im März erschien sie schon ziemlich erwachsen an den Lindenweigen, die man ins Wasser stellte.

7. Die Sahlweiden-Schildlaus. *Coccus Capreae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Palmweidenschild.

Coccus Capreae, Lin. 741. 14. — Müller 533. 14.

— — — Fab. Ent. IV. 226. n. 17.

Degeer 6. tab. 28. n. 13.

Kennzeichen der Art und Aufenthalt.

Sie ist so groß als eine Erbse, und hat die Gestalt eines Pimpernüsschens. Außerdem ist sie rund, glatt und klebrig, bald blaßgelb, bald braun, mit einer schwarzen Rückenlinie. Vornen ist sie stumpf und gespalten.

Auf den Bäumen und Zweigen der rauen Weiden-Arten.

8. Die Weiden-Schildlaus. *Coccus Salicis*, Lin.

Namen und Schriften.

Coccus Salicis, Lin. 741. 15. Müller 533. 15.

— — — Fab. gen. insectorum 304; aber nicht in dessen Entom. systemat.

Kennzeichen und Aufenthalt.

Sie ist als Larve roth, und kaum mit bloßen Augen zu erkennen. Als vollkommenes Insekt ist sie aschgrau oder auch muschelbraun und rund.

Auf den Rinden der Weiden sitzt sie colonienweise beisammen.

9. Die Weißdorn-Schildlaus. *Coccus Oxyacanthae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hagedornschild.

Coccus Oxyacanthae, Lin. 742. 21. Müller 536. 21.— *Crataegi*, Fab. Ent. IV. 227. n. 21.— *Oxyacanthae*. Die Schildlaus des Weißdorns. Gleditsch II. 159.
Reaumur 4. t. 6. f. 11. 12.

Kennzeichen der Art und Aufenthalt.

Sie ist bald erhaben rund und in eine Wolke eingehüllt, bald länglich und kastanienbraun.

Sie lebt an den Sprossen und jungen Trieben des Weißdorns,

10. Die Tannen-Schildlaus. *Coccus Abietis*, Lin.

Namen, Schriften, Kennzeichen und Aufenthalt.

Coccus Abietis, Geoffroy I. 507. 7.

— — Goetze Entomolog. Beyträge II. S. 344.

Sie ist rund und kastanienbraun, und hält sich auf *Pinus abies* auf.11. Die braune Schildlaus. *Coccus fuscus*, Geoffroy.

Namen, Schriften, Nachweisung, Kennzeichen und Aufenthalt.

Braune Eichenschildlaus.

Coccus Quercus fuscus, Geoffr. I. 507. 11.

— — — Goetze II. 344.

Reaumur 4. t. 5. f. 2.

Sie ist rund und braun, mit weißem Filz überzogen, und lebt auf den Eichen.

12. Die bunte Schildlaus. *Coccus Quercus variegatus*, Geoff.

Namen, Schriften, Nachweisung, Kennzeichen und Aufenthalt.

Buntgescheckte Eichen-Schildlaus.

Coc-

Coccus Quercus variegatus, Geoffr. I. 508. 12.
 — — — — — Goeze Entom. II. 345.
 Reaumur 4. t. 5. fig. 3. a.

Sie ist rund, weiß, gelblich und schwarz gefleckt, und lebt auf den Eichen.

13. Die muschelförmige Schildlaus. *Coccus conchiformis*, Geoffr.

Namen, Schriften, Nachweisung, Kennzeichen und Aufenthalt.

Coccus conchiformis, Geoffr. I. 509. 17.
 — — — — — Goeze Entom. Beiträge II. 345.
 Reaumur 4. t. 5. — 7.

Sie ist schmal, gleichsam linienförmig und dunkelbraun. Ihr Aufenthalt ist die
 Ulme.

14. Die Horn-Schildlaus. *Coccus Aceris*, Geoffr.

Namen, Schriften, Kennzeichen und Aufenthalt.

Coccus Aceris, Geoffroy I. 509. n. 18.
 — — — — — Goeze Ent. Beitr. II. 345.

Sie ist eckrund, und hat an der Seite weiße oder auch aschgraue Längsstreifen.
 Man findet sie auf den Horn-Arten.

Es ist dieselbe mit der Epiahorn-Schildlaus, *Coccus Aceris* F. IV. 225. 9.
 aus Frankreich, welche einen kugelförmigen, dunkelrothen Körper hat.

15. Die wollige Schildlaus. *Coccus lanatus*, Geoffr.

Namen, Schriften, Kennzeichen und Aufenthalt.

Coccus Quercus lanatus, Geoffr. I. 508. 14.
 — — — — — Goeze II. 345.

Sie ist länglich und dunkelbraun, mit weißer Wolle überzogen, und wohnt auf
 der Eiche.

Vier und zwanzigste Gattung.

Die Blasenfüße. - Thripes Lin. et Fab.

Sie heißen auch Blasenfußfliegen.

Gattungskennzeichen nach Linne.

Der Rüssel ist klein und kaum sichtbar. Die Fühlhörner haben die Länge des Halses und des. Der Körper ist schmal und länglich, und der Hinterleib in die Höhe gebogen. Die vier gerade ausstehenden Flügel sind schmal und durchkreuzen sich. Die Fußblätter haben Blasen. Sie sind häufig auf Blumen, worauf sie mit der größten Fertigkeit herumspringen.

Die mit Fühlhörnern und Füßen versehenen Larven, sind im Laufen gleichfalls sehr fertig, und mehrentheils roth gefärbt. Es sind wahre Microscopthierchen, und der Herr von Gleichen in Franken, hat sich durch seine Schrift: Das Neueste im Reiche der Pflanzen, sehr um die Naturgeschichte dieser Insektengattung verdient gemacht.

Die Fabricius'schen Gattungskennzeichen sind:

Der Blasenfuß 222. Thrips, hat einen unscheinlichen Rüssel, der innerhalb des Mundes verborgen liegt; die Fühlhörner sind fadenförmig.

Die äußern Gattungskennzeichen desselben sind: Der Körper ist klein, verlängert, ungerandet, unruhig; der Kopf ist cylindrisch, stumpf; der Halschild ist schwächig; die Augen sind klein, kugelig, hervorragend und der Spitze des Kopfs eingefügt; die Fühlhörner sind fadenförmig, so daß das erste Glied etwas lang und krumm ist, sie sind vor den Augen eingefügt; der Halschild geht seitwärts aus, ist schmal und glatt; das Schildchen ist kurz und gerundet; der Hinterleib ist flach und länglich; der After hat einen Stiel; die vier Flügel liegen über einander, sind häutig und schmaler als der Hinterleib, etwas kurz und spizig; die Füße sind Gehfüße.

Die weniger schädlichen.

1. Der Ulmen-Blasenfuß. Thrips Ulmi, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kindeblasenfuß.

Thrips

- Thrips Ulmi, Fab. IV. 229. n. 3.
 — corticis, Degeer III. 11. 3. t. 1. fig. 8—13.
 — — Goeze Entom. Beytr. II. 1. 351. 4.
 Geoffroy I. 384. t. 7. f. 6.

Kennzeichen der Art.

Der Körper ist schwarz, mit graugelben, gefranzten Flügeln und einem spitzigen After. Das Weibchen ist flügellos.

Beschreibung des vollkommenen Insekts.

Das Insekt ist schwarz, die Flügel aber durchsichtig und mit Franzen besetzt. Degeer erklärt sie für weiß, und nennt die Franzen lange Härte. Die Fühlhörner sind achtgliedrig; der After, mit einer Schwanzborste versehen, läuft spitzig zu.

Aufenthalt.

Auf den Ulmenbäumen, in deren Rinden er in zahlreicher Menge wohnt.

2. Der Brennessel-Blasenfuß. Thrips Urticae, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelber Blasenfuß.

- Thrips Urticae, Fab. Ent. IV. 229. 4.
 — flava. Goeze Entomol. Beytr. II. 1. 350. 1.
 — — Schrank's Beyträge 51. t. 1. f. 25. 26.

Kennzeichen und Aufenthalt.

Er ist gelb mit weißlichen Flügeldecken, und befindet sich gewöhnlich auf der Brenn- und Taubnessel, zuweilen auch auf der Unterseite des Rebensocks, der Vogelkirschen und des Haselstrauchs, aber nie zahlreich, sondern einzeln.

Anmerkung.

Der Wachholder-Blasenfuß, Thrips juniperina, Lin. ist, da er auf Wachholder, einem Fersmantkraute, wohnt, mehr nützlich als schädlich. Die Schriften ic. sind: Thrips juniperina, Lin. 743. n. 4. Müllers Uebersetzung 539. 4. tab. 15. f. 5. — Fabr.

Fabr. Ent. IV. 228. 4. — Gleditsch brauner Blasenfuß mit den weißen Flügeldecken II. 273. — Forstmann S. 81. Die Flügeldecken sind schneeweiß und der Körper braun. Er ist zwey Linien lang, der Körper ist braunschwarz, mit schwarzen Augen und weißen Flügeldecken, welche nicht über den ganzen Hinterleib, der eine hervorstehende Spitze hat, hinreichen. Die Fühlhörner sind gelb, und die Bläschen an den Füßen braun. Er fliegt nicht, läuft aber schnell, und lebt auf den Wachholdern in Gallen, an warmen Hügeln, in den Haiden.

Ende des ersten Theils.

Fig. 1.

Fig. 2.

Vollständige
Nat u r g e s c h i c h t e
der
schädlichen Forstinsekten.

Ein Handbuch
für
Forstmänner, Cameralisten und Oekonomen.

Herausgegeben

von

J o h a n n M a t t h ä u s B e c h s t e i n,

Herzoglich Sachsen-Meiningischen Cammer- und Forstrathe, der Meiningischen öffentlichen Lehranstalt und
der Gothaischen und Meiningischen Societät der Forst- und Jagdkunde Director und mehrerer
Akademien und gelehrten Gesellschaften Mit- oder Ehrenmitglieder,

und

G e o r g L u d w i g S c h a r f e n b e r g,

Pfarrer zu Nitschenhausen und Wölkershausen und Mitgliede der Gothaischen und Meiningischen
Societät der Forst- und Jagdkunde.

Zweiter Theil.

Mit illuminirten Kupfertafeln.

L e i p z i g,
bey Carl Friedrich Cnoch Richter

1 8 0 5.

Vollständige

Nat u r g e s c h i c h t e

der

schädlichen Forstinsekten.

Zweite Abtheilung.

D r i t t e O r d n u n g .

Die Schmetterlinge. Lepidoptera L.

Sie heißen deutsch: Insecten mit bestäubten Flügeln, Staubflügler, Schuppenflügler, Falter, Zwensfalter, Buttervögel, Puderwägel, Commervögel, Milchdiebe, Wolkenstäuber, lateinisch papilio, griechisch psyche, englisch butter-fly, französisch papillon, holländisch überhaupt kapellen.

Kennzeichen der Ordnung nach Linne'.

Die vier Flügel sind schuppig bestäubt; die schneckenförmige, niedergebogene oder eingerollte Zunge (Spiralzunge) hat bärtige Fühlspitzen neben sich; und der Leib ist haaricht.

Kennzeichen der Ordnung nach Fabricius, in seiner Entomol. system. die neunte, in seinen Supplement. dazu die eilfte Ordnung: Füngler, Glossata: die Spiralzunge liegt zwischen niedergebognen und bärtigen Fühlspitzen.

Der Ritter von Linne' brachte sie in drey Gattungen von 780 Arten, ohne die Supplemente, wobey die Falter, papilio, 273, die Schwärmer, sphinx, 47, und die Phalänen, phalaena, 460 Arten ausmachten.

Fabricius in seiner Entomologia zählt in funfzehn Gattungen 2819 Arten, nämlich Falter, papilio, 798; Kleinflügler, hesperia, 349; Schwärmer, sphinx, 70; Glasflügler, selia, 23; Zögane oder Trägling, zygaena, 72; Spinner, bombyx, 250; Bohrer, coltus, 6; Schmalflügler, kepialus, 10; Eule, noctua, 380; Hybiär, hyblaea, 6; Spanner, phalaena, 427; Wickler, pyralis, 180; Motte, tineä, 182; Langhörnchen, alucita, 53; Geißchen, pterophorus, 13 Arten. Dazu kamen noch in den Supplementen 1798 fünf neue aus den Tineis hervorgegangene Gattungen: Flachflügler, lithosia; Bienling, galleria; Phycis, phycis; Bünsler, crambus und Hähnen (Hahnenfchwänzen) ypsolophus.

Sie haben durchgängig vier dünne, pergamentartige oder häutige Flügel, mit leicht zu verwischendem, farbigen Staub, welcher unter der Vergrößerung federig oder schuppig ist, sechs Füße und 2 Fühlhörner.

1. Da sie die Theile des Körpers, Kopf, Rumpf (Vorderleib), Hinterleib und Glieder in vielen Stücken mit andern Insecten gemein haben; so beziehen wir uns desfalls auf das in der allgemeinen Einleitung Gesagte, und brauchen auch kaum zu wiederholen, daß jedes Ihrer beyden großen Augen, die aus viel tausend Facetten bestehen, vergrößert wie ein Neß anzusehen und unbeweglich ist, und daß zwischen diesen, bey den Gattungen der Schwärmer und der Phalänen noch 2 kleine erhabne Nebenaugen (Stemmata, meist mit Schuppen überdeckt, sich zeigen. Die Fressspitzen hält Vatsch in den Grundzügen

der Naturgeschichte des Thierreichs 1801 für Geruchwerkzeuge, und Fabricius die Fühlhörner für Werkzeuge eines uns unbekannten Sinnes. Letzterer behauptet, daß die Ohren der Insecten aus einem sehr einfachen, blos liegenden Trommelfell bestehen, und an der Wurzel der Fühlhörner eingefügt seyen, um damit den laut des zweyten Geschlechts zu vernehmen.

2. Vom Bruststück. Der lateinische Systematiker nimmt den Ausdruck: Thorax, Bruststück, Brustücken, Vorderleib, Rücken des Vorderleibes, in zweyerley Bedeutung: in einer speciellen und in einer allgemeinen. a) Drückt Thorax in specieller Bedeutung bey den Käfern den Halschild (den andere bald Brustschild, bald Rückenschild nennen) aus, d. i. die hartschaalige Halsbedeckung am ersten Gelenk des Insects, wo unten die Brust nebst den 2 Vorderfüßen befindlich sind. Das wäre denn der zwischen dem Kopf und dem eigentlichen Vorderleib eingefügte Hals, den man auch mit vielen Entomologen als einen Theil vom Vorderleib ansehen kann. b) Zeigt Thorax in einer weitläufigern, aber dennoch richtigen Bedeutung, zumal bey den weichen Insecten, z. B. den Schmetterlingen, Wespen, die keinen harten Halschild haben, die ganze Oberfläche von der Wurzel des Kopfs an bis an die Wurzel des Hinterleibes an. Auf der entgegen gesetzten Unterfläche befinden sich da: erstlich der Hals, als das erste Gelenk, sammt den 2 angegliederten Vorderfüßen, hierauf das zweyte Gelenk mit den Mittelfüßen und darüber befestigten Vorderflügeln, sodann das dritte Gelenk, wo die Hinterflügel so wohl als die Hinterfüße angefügt sind. Diese ganze Unterseite wird dann die Brust genannt, da hingegen bey den hartschaaligen und hartschalschildigen Insecten gewöhnlich nur die Unterseite des Halses, an den Vorderfüßen, Brust, und die drauf folgende Unterseite des Vorderleibs, wo die Mittel- und Hinterfüße liegen, das Brustbein heißt: wiewohl einige Entomologen beydes, Brust und Brustbein zusammen, unter dem Ausdruck: Brust begreifen. Wir glauben daher, das Wort: Thorax bey den Schmetterlingen durch Vorderleib übersetzen zu müssen. Der an denselben angeschlossene Hinterleib hat 18 Luftlöcher, mit den zwey an der Brust befindlichen.

3. Von den Flügeln. Diese sind a) nach ihrer Gestalt und Verhältniß linienförmig, lanzettförmig, länglicht zugerundet, eyrund, deltaförmig (wie ein Δ), geschoben viereckicht, schmal, sichelförmig, gespalten, d. i. fingerförmig. b) Nach ihrem Umriß (figura) völlig ganz (ungerheilt), gleich (ohne Bufen), ausgeschweift, eckicht, gezähnt, gezähnel, (die auslaufenden Spizen klein und ungleich eingeschnitten) sägezähnt, ausgekapp, benagt, geschwänzt, kleingeschwänzt, ungeschwänzt. c) Nach ihren Rändern. Die drey Ränder, besonders der Vorderflügel zu bezeichnen, werde ich mich der Ausdrücke: Vorder- rand, Hinterrand und Innenrand, bedienen. Der Vorderrand, beym Augsburg-er Hübner Schwingrand, bey den Wienern Außenrand, zieht sich von der Wurzel an bis zur Flügelspize (Vorderwinkel). Der Innenrand beyh Herrn von Kottenburg im Naturforscher Unterrand, bey Schneidern Hinterrand, beyh Hübner Haarrand, läuft von der Wurzel bis zum Hinterwinkel. Der Hinterrand, von Kottenburg und Schneider Außenrand, von Hübner Saumrand genannt, geht vom Vorder- zum Hinterwinkel. Dieser ist es, auf den die vorhin beyh Umriß vorgekommenen Benennungen

meist gehen, und der mit Franzen (Saumborden, ciliae) besetzt ist. Der Innenrand hat wenige, oft keine Franzen. d) Nach ihrem Raum. Sie haben eine Mittelfläche (Mittelfeld), eine Ober- und Unterseite. Die Grundfarbe so wohl als die übrigen Zeichnungen bestehen aus eingelegten Schuppen, die dem unbewaffneten Auge wie Staub vorkommen. Die Flügel sind in dieser Rücksicht nackt (unbestäubt), mit Schuppen bedeckt, gleichfärbig (wo die Ober- und Unterseite gleiche Farbe haben), fast gleichfärbig, gefleckt (mit einzelnen schuppenlosen Flecken), durchsichtig, gegittert (netzartig), hellfärbig, vielfärbig (bunt), fleckicht, punctirt, marmorirt, geschlängelt, gewellt, gepudert, scheckicht (mit 2 entgegen gesetzten Farben), geschachtet, nebelicht. e) Andere Zeichnungen der Flügel.

Augen sind deutlich begränzte Ringe, mit oder ohne Pupillen.

Binden sind breite Streifen, die quere durch die Flügel laufen, z. B. Wellenbinden, zahnichte, abgesetzte, gemeinschaftliche, doppelte, marmorirte Binden, Augenbinden, Fleckenbinden.

Figuren sind Binden ohne Zeichnung, Verwischungen ähnlich.

Schleier, eine Längsbinde, die von der Wurzel bis zur Spitze ganz oder zum Theil sich zieht, und die in der Mitte breiter ist.

Limbus, eine breite Borde am Hinterrand.

Saum, eine schmale Einfassung.

Streifen, breitere Querstrieche, die den Binden sich nähern.

Linien, selten Quere. mehrentheils Längs-Linien.

Strahlen, Striche, die aus einem Mittelpunct ausgehn.

Flecken, vergrößerte Puncte.

Ringe, Zirkel von einer, von der Grundfarbe verschiedenen Farbe.

Möndchen, Mondflecken.

Stigmas oder Narben, Nierenmakel.

Puncte, ganz kleine, beynahe runde Flecken.

Atomen, äußerst kleine, dem Auge kaum unterscheidbare Punctchen.

Characters, Figuren, die Buchstaben oder Ziffern ähnlich sind.

f) Das Tragen der Flügel gibt zu den Benennungen Anlaß: der aufgerichteten Flügel (Papilionae), der abwärts hängenden (Noctuae), deckenden und aufliegenden (Phal. Bomb. Caia L.); offenen, wenn die Vorderflügel die hintern nicht bedecken; zurückgeschlagenen, wenn im Ruhen die Hinterflügel von den vordern hervorstehen (P. B. Quercifolia L.); zusammengefaltete, wenn die Hinterflügel wie ein Kächer zusammengelegt werden (P. T. Pascuella L.) und zusammengerosste (P. T. Pratella L.).

g) Die sogenannte Flügelfeder ist ein sehr kleines Härtchen, durch welches sich ein elastisches Haar zieht, das an der Wurzel des Hinterleibes angewachsen ist. Sie ist auf jeder Seite der Flügel, unten bey den Schwärmern und Eulenphalänen, bey einem kleinen Theil der Spinner und Spanncephalänen und bey gar keinem Falter. Sie trägt dazu bey, daß die Flügel desto genauer an einander liegen, und das Ueberschlagen derselben verhindert werde.

Die Larven oder Raupen haben einen Kopf von hornartiger Substanz, scharfe von beiden Seiten sich gegen einander bewegende gezähnelte Kinnbacken, neben welchen die Fressspitzen hervorragen, die stets in Bewegung sind, und deren Nutzen man nicht ganz genau kennt. Ihre Nahrung ist, bis auf wenige Ausnahmen, aus dem Pflanzenreich. In der darunter liegenden Lippe besitzen die Raupen eine kleine Oeffnung, wodurch sie seidene Fäden spinnen können. An jeder Seite des Kopfs finden sich sechs kleine durchsichtige Erhabenheiten, so von Kleemann und andern für Augen gehalten wurden, die aber nach überstandener Häutung wieder vergehen. Der kufelöcher sind an jeder Seite, weil der zweyte und dritte Ring, wo die Stellen der zukünftigen Flügel sind, nebst dem zwölften keine hat, neun, also zusammen achtzehn.

Die 6 hornartigen, mit drey Gliedern und einem Häkchen versehenen Brust- (Kopf- oder Klauen-) Füße an den drey ersten Gelenken fehlen ihnen niemals. Das erste Paar steht am Halse. — Die übrigen Füße sind Bauchfüße, nebst den Nachschieberfüßen am zwölften Gelenk häutig, und unten mit einem hornartigen Kranz umgeben, den die Raupe aus- und einziehen kann. Keine Schmetterlingsraupe hat weniger als 8, und keine mehr als 16 Füße, wenn wir die Motte: *Tinea Anomalella*, ausnehmen. Denn die sechzehnfüßigen haben am 4. 5. 10. und 11. keine; die vierzehnfüßigen am 4. 5. 6. 10. und 11. keine; die zwölfzüßigen Spanner und *Phal. noctua Gamma* am 4. 5. 6. 7. 10. und 11. keine, die zehnfüßigen Spanner am 4 bis 8. 10. und 11. keine; die achtfüßigen Spanner am 4 bis 8. 10 bis 12. keine Füße. Der Schwanz und die Schwanzklappe, sonst der zwölfte, auch der Afterring genannt, wird von den Wiener Entomologen nicht zu den Ringen gezählt. Bey den verschiedenen Familien der Falter-Raupen kommen noch einige Besonderheiten vor, z. B. die zweyarmigen Fühlwerkzeuge, *tentacula*, der ersten Familie; die dornenähnlichen Auswüchse bey mehreren Familien. Die Raupen der Schwärmer führen, vorzüglich was die erste und zweyte Familie betrifft, über dem Afters einen harten und spizigen Stachel. Manche Phalänenraupen zeigen fleischichte, andere knöpfichte behaarte Erhabenheiten auf dem Rücken.

Die Raupe lebt und wächst vom Ausschlupfen aus dem Ey bis zum Uebergang in den Puppenstand bald nur wenige Wochen, bald mehrere Monate. Es gibt auch Ausnahmen. Nach etwa drey- oder viermaliger Häutung verpuppt sie sich. Es gibt einige wenige, die sich 5 bis 6 mal häuten. Ueberhaupt häutet sich keine unter 3 und keine über 8 mal.

An den Puppen, die mit einer Schale überdeckt, ohne Füße und Glieder und unfähig sind, sich fort zu bewegen, oder Nahrung zu sich zu nehmen, kann man nur den Vorder- und Hinterleib unterscheiden. Undeutlich sieht man die Stellen, wo Kopf, Augen, Fühlhörner, Flügel und Füße liegen. Sechs Ringe decken die Haupttheile, und sechs den Unterleib. Letzterer hat zusammen zwölf, und die Kopfscheide nur zwey kufelöcher. Kleemann aber zählte ihrer zusammen achtzehn. Es gibt eckichte und abgerundete, glänzende und farbige Falter-Puppen. Die Phalänen- und Schwärmerpuppen sind mehrertheils schwarzbraunroth. Die Puppenruhe dauert oft kurze Zeit, oft aber Jahr und Tag. Das aus der Puppe mühsam hervorkommende Insect ist da noch feucht und unge-

staltet,

kriecht, kriecht an einen Ort, um seine Flügel durch Hin- und Herbewegen auszubreiten, wodurch der Zufluß der Säfte befördert wird, und wodurch sie an Größe zu- und die Länge des Leibes abnimmt. Nachher werden sie steif und glatt. Nun sucht es seinem Saugrüssel, oder vielmehr seiner Spiralsanze, die gehörige Gestalt zu geben. Endlich breitet es die vollkommenen Flügel aus und reinigt sich. Das Insect weiblichen Geschlechts legt nach der Begattung seine Eier und stirbt ein paar Stunden darauf.

Die Eier sind meist kegelförmig oder auch halbkuglicht; wenige sind rund. Die Eierschale ist entweder glatt oder gefurcht, oder bläsig, erhaben punctirt, netzförmig, schuppenartig, gegittert u. s. w. Von Farbe findet man sie weißlich (P. Janira), gelb (Pap. Crataegi L.), grün (Atalanta L.), blau (Pap. Urticae L.), braun (Pap. Hyperanthus L.), braungefleckt (Pap. Aethiops Esp.), mit weißen Rippen (Pap. Atalanta L.), oder dergleichen Bändern umzogen (Ph. B. Quercifolia L.), und röthlich (Ph. B. Vinula L.) u. s. w.

Ihre Zahl ist zuweilen ein- bis vier- oder fünfhundert: manche reden von tausend. Die Zeit, wie lange Eier vom legen an liegen, bis die Raupe hervorbricht, ist noch von den wenigsten Schmetterlingen, aber doch so viel bekannt, daß einige nur etwa 8 (Pap. Cardui L.), andere 12 bis 14 (Sph. tiliae L.), andre 14 bis 20 Tage (Pap. Antiopa L.), noch andre 3 bis 4 Wochen (P. B. Caia L.), ja auch 6 bis 8 Monate brauchen (Ph. B. Neustria L.). Dieß versteht sich von denen, die in warmen Tagen gelegt werden; denn die im späten Herbst abgesetzten bleiben auch so über Winter liegen.

Wir behalten die drey Gattungen derselben, der Falter, Schwärmer und Phalänen, nach Linne' bey, folgen aber, was die Familien betrifft, der Einrichtung des systematischen Verzeichnisses der Schmetterlinge der Wiener Gegend, das den Hrn. Abt Schiffermüller zum Verfasser hat *).

Fünf und zwanzigste Gattung.

Die Falter oder Tagsschmetterlinge (Tagfalter). Papiliones, Lin.

Die Kennzeichen dieser Gattung, die bey den Wienern die dritte ist, sind nach Linne': Die Fühlhörner, sind am äußersten Ende dicker, und meistens knöpfig oder kolbenförmig; sie halten im Sitzen die Flügel in die Höhe, und fliegen bey Tage.

Das Kennzeichen der Fühlhörner, welche borstenförmig, gerade, ohne Gelenke, und an der Spitze mit einem kleinen Kolben versehen, oder doch wenigstens dicker sind, ist weit beständiger, als das Fliegen bey Tage, weil dieß auch einige Arten der andern Gattungen thun. Zu den äußerlichen oder vom Habitus hergenommenen Kennzeichen gehört: daß der ganze Körper statt der Schuppen nur mit dünnen Härchen, an dem Hinterrand der Hinter-

*) Möller im Lexico Entomolog. Erst 1795, bemerkt, daß die so genannten schädlichen Raupen eben dadurch den Fruchtbaumen nützen, daß sie viele Blätter abnagen, wodurch

die Säfte mehr nach der Frucht und Blüthe geleitet werden; welches aber sehr eingeschränkt und so zu verstehen ist: wenn sie nicht überhand nehmen.

Hinterflügel besetzt ist; daß der Kopf, Vorderleib und Hinterleib merklicher von einander getrennt sind, und daß die Unterseite, zumal der Hinterflügel, mit verschiedenen, und oft noch schöneren Zeichnungen geziert ist, als die Oberseite, weil der sitzende Falter sie dem Blinde anderer Kreaturen Preis gibt.

Die Raupen, aus denen sie kommen, haben sechzehn Füße, den kuglichten Kopf merklicher vom Leibe gesondert, und sind träg und langsam. Sie führen zuweilen Fühlwerkzeuge, tentacula, desgleichen Dornen, oder auch zwey dickere behaarte Spigen am After in wagerechter Stellung. Und man wird unter ihnen keine langhaarige, blütheltragende, vierzehn- oder zwölffüßige, noch mit einer Schwanzspitze versehen finden. Manchen aber sieht man es nicht an, ob daraus ein Falter oder eine Phaläne zc. entstehen werde.

Die Verwandlung geschiehet insgemein in freyer Luft ohne Gewebe, in eine ecclichte Puppe.

Die Fabriciusschen Gattungs-Kennzeichen sind: Der Falter (*Papilio*) hat zwey zurückgebogene Fressspigen, eine ausgestreckte Spiralzunge, und Fühlhörner, die auswärts dicker sind. Der Kleinflügler (*Hesperia*) hat zwey an der Wurzel niedergedrückte und rauhe, an der Spitze aber cylindrische und unbedeckte Fressspigen. Die Fühlhörner haben eine ablange, zuweilen gekrümmte Keule oder Kolbe.

Außerliche Gattungs-Kennzeichen hat Fabricius nicht beygebracht.

Abtheilung. Sie entstehen 1) aus gemeinsförmigen Raupen: Fabriciussche Falter; 2) aus afelförmigen: Fabriciussche Kleinflügler.

Erste Horde. Die Raupen sind gemeinsförmig.

Es sind nämlich Sprengel - Rückenstreif - Seitenstreif - Hörner - Halsdorn - Echarf - Halsdorn - und Scheindorn - Raupen, woraus die Falter dieser Horde entstehen.

Erste Familie.

Sprengelraupen. Grob - schwänzige Falter. (Ritter des Linne').

Die Raupen sind roth - oder auch schwarzsprenklig, vorne sehr dick; ziehen den kleinen stumpfen Kopf gern unter den ersten Ring zurück. In diesem haben sie eine fleischichte Gabel, tentacula, zu ihrer Beschüzung verborgen. Sie verwandeln sich in freyer Luft in eine ecclichte, vornen fast einspizige Puppe, die insgemein wagerecht aufgehängt ist. Die Vorderflügel der Falter haben fast einen längern Hinter - als Innenrand, die hintern laufen in einen sehr merklichen Schwanz oder auch große Zähne aus; sind am Innenrand hohl ausgeschweift, und lassen, wenn die Falter auf ihren sechs Füßen ruhen, den buntgestreiften Leib unbedeckt.

Von minderer Schädlichkeit.

1. Der Mandelfalter. *Papilio Podalirius* L.

Anmerkung. Die Römische Zahl (I. II. etc.) bey jeder Schrift geht auf den Theil eines Buchs, die zweyte Zahl gemeinlich auf die Seite, die dritte auf die Nummer. Sind vier Zahlen: so geht die erste auf den Tom, die zweyte auf den Theil, wie z. B. der dritte Tom der *Entomologiae* Fab. zwey Theile hat; die dritte auf die Seite; die vierte auf die Nummer. Fab. *Entom.* III. 1. 24. 71. bedeutet den dritten Tom, ersten Theil, Seite 24, Nummer 71.

Namen,

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schwalbenschwanz, Engelvogel, Seelr.

Papilio Podalirius L. 731. 36. Müller. 577. 36.

Wiener B. 192. Pro. 3.

Fab. Ent. III. 1. 24. 71.

Moriz Balth. Vorkhausen Naturgesch. der europäischen Schmetter-
linge. I. 112. n. 2.Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge (vom
Senator Schneider zu Stralsund) Halle 1787. I. 55. n. 4.Esper's europäische Schmetterlinge. I. tab. 1. fig. 2. und eine
jüngere Raupe t. 50. fig. 1.

Panzers Fauna 30. tab. 24.

Röfels Insecten: Verlesigung. I. Engelvogel. 2 Klasse tab. 2. mit Raupe.

Schäfers Leones u. oder Regenspürger Insecten. t. 45. fig. 3. 4.

Kennzeichen der Art. Falter. Die geschwänzten hellschwefelgelben Flügel sind doppelt schwarz bandirt, und auf der Unterseite mit einer rothbraunen Quercinlinie an den Hinterflügeln besetzt.

Raupe. Jung grün; kurz vor ihrer Verwandlung aber strohgelb; allemal aber mit rothbraunen Puncten besprengt. Der Hals oder erste Ring des Körpers ist braun.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Er ist von einer Flügelspitze bis zur andern 3 Zoll und 4 Linien breit. Jeder Vorderflügel allein ist 1 Zoll 7 Linien lang. Zuweilen macht die Breite 3½ Zoll aus. Die Flügel sind alle hellschwefelgelb. Außer der breiten schwarzen, durch einen gelben Strich getheilten Einfassung des ungezähnten, zart gelbgesäumten Hinterrandes, führen die Vorderflügel auf der Oberseite noch fünf schwarze Querbänder, wovon aber zwei bis zur Mitte der Flügel reichen. Die gezähnten, stark gelbgesäumten Hinterflügel haben einen langen, gelbgerandeten Schwanz. Sie sind mit 2 schwachen, schwarzen Quercinbinden; ferner in dem ganzen Hinterrande mit fünf himmelblauen halbmondförmigen Flecken, und über dem letzten derselben am Innen- oder Schwanzwinkel mit einem rothbraunen Flecken geziert, welche alle sechs auch auf der Unterseite erscheinen. Dasselbst ist die schwarze Farbe sparsamer angebracht, und die Bänder meistens mit Gelb ausgefüllt: Auch zieht sich daselbst an der zweiten Binde der Hinterflügel eine rothbraune Quercinlinie hin. Oben ist der Hinterleib schwarz, unten gelb mit 4 schwarzen Längsstreifen.

Die Raupe ist in der Jugend grün, mit eingesprengten rothbraunen Puncten, und einer weißgelben Längelinie über den Rücken und dergleichen in den Seiten. Auch führt sie hellgelbe Diagonale über jeden Ring. Merkwürdig sind die zwei Stützwerkzeuge, tentacula, am Halse, welche sie nach Willkühr verlängern und verkürzen kann. Kurz vor ihrer Verwandlung wird sie strohgelb und bekümmert viele braune Flecken. Ihr Nacken oder erster Ring ist braun. Zu ihrer Verwandlung, welche gemeinlich im Junius vor sich geht, spinnt sie sich einen Faden über den Rücken, und befestigt den After an ein klumpchen Seide. Die am Vordertheil braune, hinten aber spillinggelbe, braungeringelte und punctirte Puppe hat eine stumpfe zweyzackige Kopfspitze und einen erhobenen Rücken. Ihre Ruhe dauert bey uns 9 Monate.

Aufenthalt. In hiesigen Meiningsischen Gegenden erschien der Falter bisher alle Jahr, aber nur einmal, im May, so wohl auf nahen Bergen, als in und bey den Ortschaften. Bey Maynz soll er jährlich zum zweytenmal im August nach einer 2 bis 3 wöchentlichen kurzen Puppenruhe wieder erscheinen, (Brahm Insecten-Kalender II. 521) welches merkwürdig wäre. Die Raupe frisst auf Pflaumenbäumen, Schlehen, Mandeln, und auf Eichen zuweilen. In den nördlichen Gegenden von Deutschland findet er sich nicht.

Zweyte Familie.

Rückenstreiferaupen. Weiße Falter. Linne'sche weiße Danaiden, Weißlinge.

Diese Raupen haben einen schlanken Leib, der nur ein wenig so wohl gegen den kleinen, runden Kopf, als gegen den Schwanz geschmeidiger, durchaus mit sehr kurzen feinen Haaren besetzt, und mit helleren oder dunkleren Streifen, sonderlich über die Mitte des Rückens nach der Länge bezeichnet ist. Sie verwandeln sich in eine Puppe, die am Hinterleibe und um die Mitte mit Fäden fest gemacht aufrecht steht, ein wenig eckig ist, und sich vornen in eine Spitze endigt. Die Falter stehen auf sechs Füßen, ihre ungezähnten Flügel bedecken und umfassen in der Ruhe den Hinterleib, und legen sich oben gänzlich zusammen, wie aller nachfolgenden ihre. Sie sind weiß, nur etwa ein oder anderes schwarzes Fleckchen und die Unterseite der Hinterflügel ausgenommen, die bey einigen gelblich, bey andern grünlich sind.

Mehr schädliche.

2. Der Weißdornfalter. *Papilio Crataegi*. L.

Namen, Schriften und Nachweisungen der Abbildungen.

Baumweißling, brauner Weißling, Aderweißling, Lilienvogel, deutscher Weißling.

Papil. crataegi Lin. 753. 72. Müller nro. 72.

— — — Systematisch. Verzeichniß der Schmetterlinge der Wiener Gegend. 169. Nro. 1.

— — — Fab. Ent. III. 1. 182. n. 563.

— — — Vorkhausen I. 131. Nro. 21.

— — — Systemat. Beschreibung. 71. Nro. 17.

— — — Brahm's Insectencalender. II. S. 152.

— — — Weißdornvogel, Gleditsch II. 108.

— — — Espers Schmetterlinge. I. tab. 2. fig. 3. mit Raupe.

— — — Bezolds Mittel, die uns schädlich werdenden Raupen zu vermindern. 1794. Coburg. tab. 1. fig. 4. Raupe.

— — — Schwarz, Christian, Beiträge zur Insectengeschichte. Nürnberg, 1793. tab. 6. fig. 1 — 4. Raupe, sehr natürlich.

Nöfel. I. Tagvögel. 2. Klasse. tab. 3. mit Raupe.

Schäfferi Icones. tab. 140. fig. 2. 3.

Kennzeichen der Art. Falter: Die Flügel sind rund und weiß, mit starken schwärzlichen Nerven.

Raupe: Haarig und orangegelt, mit einem schwarzen Rücken, und zwey dergleichen Seitenstreifen; der Kopf ist gleichfalls dreyimal gestreift. In ihrer Jugend lebt sie in einem gesellschaftlichen Neste.

Beschrei.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects.
 Das Ausmaß von einer Fliegelspitze bis zur andern ist 2 Zoll 7 Linien, jeder Vorderflügel ist 1 Zoll 2 Linien lang. Alle Flügel sind rund, weiß, selten ins Grüne oder ins Gelbe gemischt, und nur dünne mit Schuppenstaub belegt, daher sie leicht verstäuben. Sie haben keine Zeichnung, als starke, schwärzliche Adern, und einen schwarzen Saum am Rand. Manche haben noch in der Mitte der Vorderflügel gegen den Vorderrand einen schwärzlichen, oft kaum merklichen Flecken. Die Hinterflügel sind auf der Unterseite mit einem schwärzlichen Schatten beschmugt. Die schwarzen Fühlhörner sind an der dickern Spitze gelb.

Die 12 Zoll oder 18 Linien lange Raupe ist haarig, dreyimal über den Kopf, einmal über den Rücken, und in jeder Seite einmal schwarz gestreift. Zwischen diesen Längsstreifen ist die Grundfarbe röthlichgelb, doch an den Gelenken etwas dunkler, unten an den Seiten aber blaulichgrau. In ihrer Jugend ist sie schwarz, und an beyden Seiten, unter den Lufelöchern findet sich eine Reihe langer weißer, unter sich gekrümmter Haare; lebt da noch gesellig auf den Obstbäumen, wo sie an den Spitzen der Zweige überwintert, und sich endlich am Ende des Mais und im Junius verpuppt.

Die Puppe, die einen um den Leib gesponnenen Faden hat, ist bald weiß, bald citronengelb, immer aber mit schwarzen Puncten und Strichen geziert. Sie hat eine kleine gelbe Kopfspitze, am Vordertheil eine stark erhabene schwarze Rückenlinie, am Hintertheil aber zieht sich über den ganzen Rücken, und auch vornen an den Seiten der ersten Ringe eine erhabene gelbe, schwarz punctirte Linie. Sie ruht drey Wochen, und es soll auch Winterschläfer geben.

Aufenthalt. Der Schmetterling ist im Junius und Julius in Gärten, Wäldern, und oft Schaarenweise an Pflügen vorhanden. Und da er bey seiner Hervorkunft aus der Puppe einen rothen Saft von sich spritzt, wemil auch häufig seine Flügel besetzt sind; so möchte ihm der vermeynthliche Blutregen vor allen andern zugeschrieben werden. Die Raupe ist gefräßig, und lebt von den Blättern und Blüthen des Weisidorns, der Schlehen, Vogelkirschen, Eichen, Aepfel, Birnen, und vorzüglich der Pflaumen und Zwetschen, wie aber von Kogelgewächsen, und ist im Mai und Junius, nach Verschiedenheit der Witterung ausgewachsen. Die Puppe hängt an Baumstämmen, Zweigen, Wänden, Zäunen, Pflanzen und Mauern.

Förpflanzung. Das Weibchen legt bey 200 kegelförmige gelbe Eier, gewöhnlich auf die obere, seltener auf die untere Seite der Blätter der oben angegebenen Bäume und Sträucher, vorzüglich der Zwetschen - Pflaumen - Birn - und Apfelbäume in dicke Klümpchen, aus welchen im August die jungen Räupchen auskriechen, und sich sogleich ein gesellschaftliches Nest spinnen, um sich für Nässe, Frost und andern Uebel und Feinden zu schützen. In diesem Neste, das aus einigen zusammengespinnenen Blättern, gewöhnlich an den Spitzen der Bäume besteht, überwintern sie.

Fern de. Sie haben unter den Insectenressenden Vögeln, und unter den Raupentödttern (Zehrwespen, Ichneumon), gefährliche Feinde, zumal im Puppenstande, die sie uns oft schädlich werdende Vermehrung derselben einigermaßen verhüten.

Schaden. Im Raupenstand verheeren sie in manchen Jahren die Obstbäume ganzer Länder. Sie werden dadurch vorzüglich schädlich, daß sie, gleich bey dem Entfalten der Blüten und Blätterknospen da sind, wodurch also eine einzige Familie oft einen ganzen Baum kahl abfressen kann. Um nur Ein Beispiel anzuführen, so hatte sich diese Raupe schon im Herbst 1731 in mehreren Provinzen Frankreichs dergestalt vermehrt, daß nach Reaumurs Angabe in den *Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes* 1737. II. S. 166. u. f. w. in manchen Gegenden, auf allen Hecken neben den Straßen kein einziges Blatt zu sehen war, das nicht ganz ausgefressen worden, und daher verdorret wäre, und in Wäldern eine große Strecke nicht eine Fußbreite an einem Baum war, es mochte schlechteres Brennholz, oder hochstämmiges Bauholz seyn, die nicht von häufigen Nestern der Raupe streckte. Dadurch denn das Publikum billig bestürzt wurde, sonderlich, weil es das Ansehen hatte, daß diesen überwinternden Raupen im folgenden Jahre die Blätter der Bäume zur Nahrung nicht hinreichend seyn würden. Das Parlement ließ daher zu Anfang des Jahrs 1732 ein Arret ergehen, durch welches befohlen war, die Bäume aller Orten abzuräumen.

Sie sind nach dem Ueberwintern im Frühjahr schon in beträchtlicher Größe da, und benagen die Knospen der Bäume, ehe ihnen noch die jungen ausgeschlagenen Blätter satt-same Nahrung darreichen. Der Schaden ist also ehe schon geschehen, ehe wir es vermuthen. Sie bewohnen und vergrößern von Zeit zu Zeit ihr gemeinschaftliches Nest, liegen da des Nachts, oder selbst an Regentagen, ruhig beisammen, ziehen bey Tage aus demselben, um sich über den ganzen Baum, oder Strauch zu vertheilen. So leben sie bis in die Mitte des Mai und zu Anfang des Junius, wo sie sodann, oder noch eher, ihre ganze Größe erreicht haben, und nicht mehr in Gesellschaft leben, sondern zerstreut ihre Nahrung suchen.

Das Jahr 1803 war eins von denen, wo diese Raupe in Gärten stark überhand genommen hatte; und im Frühjahr 1804 sind da, wo man ihrer Vermehrung nicht durch Abraupen und Puppenableben gesteuert hat, in großen Strichen die Pflaumen- und Zwetschenbäume ganz entblättert worden *).

Mittel dagegen. Man hat folgende Mittel zu ihrer Verminderung:

1) Das Zerquetschen der gelben Eyer oder das Abbrechen der Blätter mit denen-selben und Zertreten, im Junius und Julius auf den Obstbäumen und an Hecken, besonders an den Pflaumenbäumen (*Prunus domestica*), Birn- und Apfelbäumen, und am Weißdorn, *Crataegus oxyacantha* L. Man kann sich hierzu einer doppelten Leiter bedienen.

2) Das Abnehmen der Gespinnste im Winter und Nachwinter bis Ende des Aprils spätestens mit der Raupenscheere, aber nur an Regentagen, oder sehr früh, damit die Räupchen nicht ausgelaufen sind.

Am

*) Man hat zwar in vielen Gegenden geraupet, allein jetzt in der Mitte des Junius fliegen doch eine ungeheure Menge Schmetterlinge der Art herum, und drohen im folgenden Jahre

eine gänzliche Zerstörung unserer Obstbäume, wenn nicht mit Eunst und zwar allgemein an ihre Verminderung gedacht wird, oder die Natur selbst auf irgend eine Art hilft.

Am besten thut der Landmann, die Raupe in ihrem Gewebe mit einer doppelten Leiter aufzusuchen, die Zweige abzuschneiden, woran sie sitzen und zu verbrennen, weil die Raupenheere oft die Zweige ruiniert. Die abgenommenen Nester werden alsdann in Töpfe gethan; dann zündet man von dürrm Reisig ein Feuer an, und verbrennt sie.

3) Das Auf- und Absuchen der Raupen und Puppen im Mai und Junius, um sie zu zertreten oder auf andere Art zu zerquetschen. Kann man sie nicht mit den Händen erreichen, so bindet man an eine Stange ein Messer, oder ein, wie ein Meißel gestaltetes, Eisen und durchschneidet sie am Zweige.

4) Im Junius und Julius können die Schulkinder an Hecken, am Klee und an andern Blumen eine große Anzahl Schmetterlinge fangen und tödten. In großer Menge sitzen sie an den Pflügen und mit einem Schlag, der durch eine belaubte Rute geschehen kann, wird oft ein ganzer Schwarm vernichtet. Wo keine Pflügen sind, muß man welche durch hingegossenes Wasser machen, um sie herbey zu locken. Sonderbar ist, daß wo Todtgeschlagene an solchen Plätzen liegen, die übrigen desto häufiger herbey kommen, an ihren getödteten Schweßtern saugen, und so wieder ihren Tod finden *).

Dritte Familie.

Seltenstreiferaupen. Gelbe Falter; gelbe Danaiden.

Diese Raupen sind ebenfalls lang, fast durchgehends gleich dick, mit so kurzen Haaren besetzt, daß sie nackt zu seyn scheinen, auf dem Rücken matt, oder dunkelgrün ohne Mittelsstreif, auf der untern Hälfte des Leibes bleich und an den Seiten mit einem gelblichen Streife bezeichnet. Sie verwandeln sich in eine vornen einspitzige, in der Mitte schneidig-gewölbte Puppe, die mit fest angesponnenem Hinterleibe in einem schlaff gespannten Faden um die Mitte, fast wagerecht hängt, oder doch nur halb aufrecht steht. Die Falter ruhen auf sechs Füßen, sind fast einfarbig gelb, haben auf dem Mittelraum der Hinterflügel oben ein orangengelbes, unten ein silberweißes, braun eingefasstes Augenfleckchen.

Erste Linie. Mit zugespitzten Flügeln.

Weniger schädlich.

3. Der Kreuzdornfalter. *Papilio Rhamni* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbes Blatt, Apfelblatt, Citronenvogel, Citronenschmetterling, Citronenpapilion, Wegedornstagfalter **).

Pap. rhamni Lin. 765. 106. Müller 194. 106.

— — Wiener Bz. 164. n. 1.

— — Fab. Entom. III. 1. 211. n. 661.

Pap.

*) Man hat nicht nöthig die Kinder sehr anzuseuern, um diese Insecten zu vernichten, am besten aber thun doch Stadträthe und Gemeinden, wenn sie den ärmern die Raupen, Puppen und Schmetterlinge bezahlen und ent-

weder für 1000 Stück 3 Pf. oder 1 Kr. oder für ein gewisses Gemäß einen bestimmten Sammlerlohn geben.

**) Fliegendes Blatt, ganz gelber Tagvogel, gelber Faulbaumvogel.

- Pap. rhamni. Gleditsch I. p. 114.
 — — Borthausen I. 117. n. 1.
 — — Systemat. Beschreibung 61. n. 8.
 — — Esper I. t. 4. f. 4.
 — — Panzeri Fauna 28. tab. 23.
 Möfels Inf. III. t. 46. f. 1. 2. und die Raupe IV. t. 26. f. 1 — 4.
 Schläfferi Icones. t. 35. fig. 1 — 3.

Kennzeichen der Art. Falter. Alle Flügel sind ungezähnt, eckig und gelb; des Männchens citronengelb, des Weibchens weißlichgelb, oder auch wohl meergrün. Alle vier haben oben einen zimmerfarbigen, unten einen rothfarbigen Punctfleck.

Raupe. Grün, sammethaarig, und an den Seiten blässer.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Männchen ist von einer Flügelspitze bis zur andern 2 Zoll und 2 Linien breit, jeder einzelne Vorderflügel aber 1 Zoll lang. Die Flügel sind ungezähnt und citronengelb. Die vordern und hintern führen eine stark hervorstehende Ecke oder Spitze, zarte, rothe Puncte am Rande, und in der Mitte einen zimmetfarbenen Punctfleck. Die Unterseite der 4 Flügel ist blässer gefärbt, und die obigen zimmetfarbenen Flecken sind hier braun. Die Farbe des Weibchens, das eine Flügelbreite von 2 Zoll 4 Linien hat, ist blässer, bisweilen ganz weiß, bisweilen meergrün. Der Umriß seiner Flügel weicht von dem Bau der andern Danaiden sehr ab.

Die Raupe ist grün mit einem helleren Bauch, und vielen, kleinen, weißen Härchen besetzt, ob sie gleich glatt zu seyn scheint, und verwandelt sich im Junius und im September in eine grüne, mit einem spizen Kopf, erhobenem Rücken und aufgeschwollener Brust versehene Puppe, die im ersten Fall 3 Wochen, im zweyten aber 7 Monate ruht.

Aufenthalt. Der Falter fliegt und zeigt sich zu Ende des März und im April, selten schon im Februar, auf Frühlingsblumen, als Küchenschelle, Schlüsselblumen, Potentille, und im August bis in den Herbst auf allerley Gewächsen, in Gärten, Wiesen und Wäldern, nicht selten. Die Raupe nährt sich auf dem Kreuzdorn (*Rhamnus catharticus* Lin.) und Faulbaum (*Rhamnus frangula* Lin.). Es sind einzelne Beispiele vorhanden, daß Falter dieser Art entweder überwintern, oder wie Brahm glaubt, bey ungewöhnlichen warmen Wintertagen sich entwickeln.

Zweyte Linie. Die Flügel sind ganz rund mit schwarzem Hinterrande.

Weniger schädliche.

4. Der Geißtaudensfalter. *Papilio Hyale* Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pomeranzgelber Heuvogel, Pomeranzenvogel, Pomeranzensflügel, rares goldnes O (bey D. Gladbach), pomeranzgelbe vermünschte Prinzessin.

- Pap. Hyale Lin. 764. 100. Müller 593. 100.
 — Edula Fab. Entom. III. 1. 206. n. 604. wo aus Irrung Esper t. 4. f. 1. allegirt ist.
 — Hyale Wiener B. 165. 3.
 — — Borthausen I. 119. 3.
 — — Systemat. Beschreib. 64. 11.
 — — Esper I. t. 4. f. 3. Männchen, und tab. 26. f. 3. Weibchen.

Pap.

Pap. Edula Panzeri Fauna 50. t. 17. Männchen.

Nöfels Inf. III. t. 46. f. 4. Weibchen.

Schäffer Icon. t. 49. f. 1. 2.

Kenzeichen der Art. Die Flügel sind zugerundet und pomeranzengelb; die hintern sind auf der Oberseite mit einem braungelben Mittelflecken, und auf der untern mit einem anderthalbäugigen Silberpunct besetzt. Das Männchen hat einen braunschwarzen, gelbaderigen, das Weibchen einen braunschwarzen, gelbgefleckten, breiten Hinterrand.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Die Breite dieses sehr schönen Falters von einer Flügelspitze bis zur andern beträgt 2 Zoll 2 Linien. Seine zugerundeten, oraniengelben Flügel führen, wie bey allen seinen Liniengenossen einen schwarzbraunen Hinterrand, der bey'm Männchen blos mit gelben Adern, bey'm Weibchen aber mit einer Querreihe gelber Flecken durchschnitten ist.

Der Mittelflecken ist an beyden Seiten der Vorderflügel ganz schwarz, an den Hinterflügeln zeigt er sich oben braungelb, und unten als einen anderthalbäugigen Silberpunct. Die Unterseite, welche bleicher und mit Grün gemischt ist, zeigt einige wenige, schwache, rothbraune Randpuncte. Die Flügel sind rosenroth gefranzt, und so färben sich auch die Fühlhörner. Er darf mit Fabricius und Brahm's Hyale im Insecten-calender nicht vermengt werden, welches P. Palaeno Lin. ist.

Aufenthalt. Fabricius gibt zwar nur Spanien als dessen Vaterland an, allein es besitzen ihn auch viele Deutsche Gegenden, z. B. so sieht man die Falter im September, im Hannövr'schen bey Eldagsen, im Fränkischen und in unserer hiesigen Gegend bey Maßfeld, hinter dem Zehnen u. s. w. aber allemal einsam und an dürrern Gegenden, die an Wiesen stoßen. Seine Raupe nährt sich unter andern von Geißflée oder der Geißflaude, *Cythus ausriacus*, nach den Berichten der Wiener Entomologen.

Anmerkung. Die in unserer Schrift mit beygebrachten, zuweilen ins Possierliche fallenden Namen des D. Gladbachs zu Frankfurt befinden sich so wohl im VII. Stück des Naturforschers, als im Everschen Schmetterlingswerk, und in D. Kühn's Anleitung Insecten zu sammeln, 1783.

Vierte Familie.

Hörnerraupen. Schielende Falter, Schillerflügler.

Der Leib dieser sonderbar gebauten Raupen hat fast eben die Gestalt, wie die der randäugigen Falter, d. i. er läuft vornen und noch mehr zurück geschmeidig zu; auch zeigt er einige blaßgelbe Querstrieche, und endigt sich in zwey kleine Spitzen; der Kopf ist vornen platt abgeschnitten, oben mit 2 langen, geraden, am Ende doch stumpfen oder zweytheiligen Hörnern versehen. Die Verwandlung geschieht in eine grüne, zusammengedrückte Puppe, die nur mit dem Hinterleibe angeheftet, mit dem in zwey Spitzen auslaufenden Kopfe senkrecht hängt. Die Falter haben nur vier Füße, auf denen sie stehen; die Flügel sind ein wenig ausgeschweift und gezähnt; ändern meistens nach verschiedener Wendung die dunkelbraune oder schwärzliche Farbe ins Blaue; die hintern haben nahe am Innenwinkel ein Aenglchen.

Weniger schädliche.

5. Der Bachweidenfalter. *Papilio Iris*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Großer Schillervogel, Chantageant; misbräulich Eichenfalterling.

Papilio Iris Lin. 775. 161. Müller 607. a. 161.

— — Wiener B. 171. 1.

— — Fab. Ent. III. 1. 119. 379.

— — Junonia, Vorthaus. I. 7. litera a.

— — Systemat. Besch. 133. 69.

— — Gleditsch I. 509.

— — vulgaris, Esper I. t. 11. f. 1. Männchen. tab. 71. f. 4. Weibchen.

Nöf. III. t. 42. f. 2. (aber nicht fig. 1.)

Nöf. IV. t. 51. f. 6. Raupe.

Kreemanns Beiträge zur Natur- und Insectengeschichte. tab. 9. f. 3. Puppe.

Kennzeichen der Art. Männlicher Falter. Die 4 Flügel sind ein wenig gezähnt, oben schwarz mit dunkelblauer Schillerung, auf beyden Seiten mit einer unterbrochenen weißen Binde versehen. Auf der Unterseite, die im Ganzen genommen rostbraun oder roth ist, und sich nur an den Rändern und an der Wurzel grau färbt, führen die Vorderflügel ohnweit des Innenwinkels einen größern, und die Hinterflügel ebenfalls am Innenwinkel einen kleinen, schwarzen, gelbeingefassten Augenfleck mit weißem Kern.

Weiblicher Falter. Größer, eben so gezeichnet, aber ohne alle Schillerung.

Raupe. Hellgrün mit einem Paar hoher grüner, gelbgerandeter Dornspitzen am Kopf und rothen Schwanzspitzen am After.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Breite dieses prachtvollen, großen Falters von einer Flügelspitze bis zur andern beträgt bey ordinären Exemplaren nicht unter 2 Zoll und 8 Linien, und die Länge eines Vorderflügels nicht unter 1 Zoll 3 Linien. Man hat aber auch Stücke von 3 Zoll und 1 Linie Flügelbreite. Die vordern sind sehr geschweift, die hintern gezähnt, alle oben schwarzbraun, welches bey dem Männchen, je nachdem das Licht drauf fällt, ins schönste Dunkelblau schillert. Eine gemeinschaftliche, unterbrochene, weiße Mittelbinde durchzieht alle Flügel auf beyden Seiten. Diese Mittelbinde besteht auf den Vorderflügeln aus mehreren unordentlich stehenden, nicht gerade gezogenen und nicht an einander hängenden Makeln. Nicht weit davon gegen den Hinterrand stehen überdem noch zwey, und endlich gegen die Spitze zu zwey weiße Makeln. Auf der Oberseite befindet sich kein Auge, sondern nur ein Schatten davon, aber auf der Unterseite eines jeden Flügels, die überhaupt da rothgefärbt sind, ist ein deutliches, schwarzes, gelb eingefasstes Auge mit weißem Kern wahrzunehmen. Zwey deutliche, schwarze Querstriehe stehen in der weißschattigen Gegend der Wurzel am Vorderrand der Vorderflügel.

Das Weibchen ist größer, und schillert überall nicht.

Die Raupe, welche mit den Endspitzen 1 Zoll und 7 Linien lang ist, lebt auf mehreren Weiden-Arten, vorzüglich der Saal- und Werstweiden (*salix caprea* et *acuminata*), und ist hellgrün mit rother Schwanzspitze. Der Kopf endigt sich oben in ein Paar hohe, grüne, gelbgerandete Dornspitzen. Ueber die vier ersten Gelenke laufen zwey gelbe

gelbe Linien oben in den Seiten; über den 6. 7 und 8. Ring läuft ein erhabener schräger Seitenstreif, und bildet auf dem Rücken des achten Rings gleichsam 2 Höcker. Nach diesem folgen noch drei solche schwache, und nicht erhabene Seitenstreifen, und der letzte Absatz ist nebst den Schwanzspitzen mit einem erhabenen, gelben Rande eingefasst. Die Puppe ist hellgrün, mit zwey Kopfspiren, und einem hohen, mit einer scharfen, erhabenen, gelben Längslinie bezeichneten Rücken. Sie hängt etwas schräge, und ihre Puppenruhe dauert 9 bis 14 Tage.

Aufenthalt. Der Falter lebt in allen wärmern Erdstrichen von Europa; er fliegt zu Ende des Julius bis zu Anfang des Augusts in Laubwäldungen, besonders da, wo Weiden an Saugspälen stehen, weil er die Feuchtigkeiten liebt. Seine Raupe lebt, wie bereits oben bemerkt ist, auf Weiden, nach Fabricius auch auf Eschen (*Fraxinus*), und nach Linné, Wedda und Köstel, welches sich aber nicht bestärigen will, auf Eichen. Der achtzehn Jahren konnte man ihn in Franken nicht selten sehen. In Süßly und Konars Magazin der Entomologie III. S. 164. schreibt Brahm, daß dieser Falter drei Malz jährlich zweymal erscheine, zuerst im Junius, hernach in der Mitte des Augusts, und daß die Raupen der letzteren überwintern.

Anmerkung. D. Georg Jacob Gladbachs neue Europäische Schmetterlinge (Frankfurt 4to 1777. 36 Tafeln für 6 Rthlr. Pränumerationspreis) tab. 33. f. 1. 2. darf hier nicht angeführt werden, so wie wir sie äußerst selten anführen wollen, weil sie oft sehr geschnitten und mysteriös sind.

6. Der Wandweidenfalter. *Papilio Ilia*, *Viennensium*.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleiner Schilervogel, schwarzer Changeant.

Papilio Ilia Wiener B. 172. 2.

— — Fab. Ent. III. t. 110. 340.

— — Systematische Beschreibung 136. 70.

— — *Iris Ilia* Dörckhaut. I. 8. lit. b.

— — minor Erwt. t. 37. f. 1. Männchen. t. 11. fig. 2. Weibchen.

Köstel III. t. 42. f. 1. Männchen; aber nicht fig. 2.

Gladbach Schmetterl. tab. 33. f. 3. 4. Weibchen.

Kennzeichen der Art. Männchen. Wie der vorhergehende, nur daß alle vier Flügel am Innenwinkel ein deutliches, gelb eingefasstes Augenfleck, aber ohne Pupille, und darüber einen gelben Punct führen, und daß die gelbbraune Unterseite keine rothe Einfassung der Binde hat.

Weibchen. Wie das Männchen, aber ohne alle Schillierung.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Er ist um einige Linien kleiner, als der vorhergehende. Die Vorderflügel sind eben so ausgeschweift; die Binden und Flecken eben so, nur daß jeder Flügel oben ein kernloses Auge hat, woben ein gelber Punct steht. Auch ist der erste weiße Fleck an der Spitze gerheilt, so daß der außer der Binde stehenden Flecken fünf sind. Die Unterfläche ist bläßer, als bey dem Bachweidenfalter, und entbehrt die rothe Einfassung der Binde. Hingegen zieht sich von dem Innern zum Hintereinkel ein gerader, brauner Streif, in welchem der Augenfleck steht. Gegen die Wurzel zeigen sich zwey braune Puncte über einander, und an dem dicken Rande der

R r

Vor.

Vorderflügel stehen, statt der beyden schwarzen Querstreiche, vier solche Puncte, die auch oben durchscheinen. Das Weibchen schillert gar nicht.

Herr Fabricius eignet diesem Falter die Raupe zu, die zu dem vorhergehenden gehört. Vermuthlich ist solche derselben sehr ähnlich.

Anmerkung. Röfel nahm zu den Abbildungen der tab. 42. lauter ausgesuchte große Exemplare. Daher kommt es, daß seine fig. 1. unsern Falter größer, als er gewöhnlich ist, darstellt (er gibt jedem Vorderflügel eine Länge von einem Zoll und 4 Linien, statt eines Zolls und 2 Linien), und daß daher alle Autoren diese Abbildung für die ordinäre Iris hielten, die sie doch wegen der Augenflecken nicht seyn kann.

Aufenthalt. Im südlichen und nördlichen Deutschland, z. B. im sogenannten Paradies bey Jena, in den Darmstädtischen Waldungen, mehrentheils auf frischer Kibdung. Die Raupe äst nach den Wienern auf der Weide.

7. Der Sahlweidenfalter. *Papilio Clytie*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Brauner Schillervogel, gelber Schillervogel; misbräuchlich Rothschiller beym Gladbach.

Pap. *Clytie* Wiener Wz. 321. im Nachtrag.

— *Clythia* Systemat. Beschreibung 137. 71.

— *Iris lutea* Vorkhausen l. 9. tit. C.

— *Iris luteus*, Esper l. t. 25. f. 4. Männchen. Und t. 43. f. 1. Weibchen.

Röf. III. t. 42. f. 3. 4. Lauter Männchen.

Gladbach t. 33. f. 1. 2. (Aber nicht f. 3. 4.)

Kennzeichen der Art. Männchen. Wie der vorhergehende in Ansehung der Augen und der Zeichnung, nur sind die Binden gelbbraun, und der Hinterrand aller 4 Flügel hat eine Reihe halbmondförmiger Flecken von oben. Die Unterseite ist grau mit weißen Binden.

Weibchen. Wie das Männchen, aber ohne Schillerung.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Er ist von einer Flügelgröße bis zur andern 3 Zoll und eine Linie breit, wie der Bachweidenfalter; doch gibt es auch Stücke von geringerem Ausmaß. Er unterscheidet sich dadurch von ähnlichen Arten, besonders von der nächst vorhergehenden genau, daß alles, was auf den Flügeln desselben weiß war, hier hellbraun erscheint, und daß die Ränder sämmtlich eine Reihe von hellbraunen Halbmonden haben. Bey dem Männchen spielt die graue Grundfarbe auf der Unterseite ins Violette, und die Binden sind weiß. Das unschillernde Weibchen ist größer und auf beyden Seiten blässer. Der braune Querstreif auf den Hinterflügeln besteht aus runden, abgesetzten, zum Theil augigen Flecken.

Fabricius hält ihn mit Unrecht für eine Varietät des vorhergehenden, und hat den Namen *Clytia* einer ausländischen unschillernden Falter-Art beygelegt.

Aufenthalt. Der Falter fliegt im Junius schon, auch bey uns, aber in einem Zwischenraum von mehrern Jahren fehlte er uns wieder. Die Raupe soll der gemeinen

Iris

Zeis.-Raupen sehr ähnlich seyn, und sich von Weidenblättern, besonders der Bachweide nähren.

Fünfte Familie.

Halbhornraupen. Fleckstreifige Falter. Wandflügler.

Der Kopf dieser bunten Raupen ist oben getheilt und zwenspitzig; der Leib über den Rücken fast nur mit zwey Reihen meistens stumpfer, aber doch ästiger Dornen besetzt. Die Puppen, in die sie sich verwandeln, hänge gestürzt, hat 2 kleine Erhöhungen am Kopfe, eine größere beulsförmige auf dem Rücken. Die Falter ruhen nur auf vier Füßen, ob sie schon nahe am Halse noch ein Paar sehr kleiner haben; ihre Flügel sind gezähnt, die oberen ein wenig ausgeschweift, oben schwarz und dunkelbraun, zuweilen ins Grüne oder Blaue schielend, unten ocker- oder zimmerbraun, und näher am Leib perlsfarben; sonst beyderseits mit einem weißen Bande, das durch die schwarzen Nerven vielfältig getheilt wird, quer durchschnitten.

Weniger schädliche.

8. Der Espenfalter. *Papilio Populi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Großer Eisvogel, bandirter Espenfalter, Pappelfalter, Pappelnymphen, Pappelvogel, großer Buchenvogel, Buchenfalter, Dreckvogel.

Papilio Populi Lin. 776. 162. Müller 608. 162.

— — Wiener Bz. 172. 1.

— — Fab. Ent. III. 1. 111. n. 343.

— — Systemat. Beschreib. 141. 74.

— — Vorkhauf. I. 3. n. 1.

— — Gleditsch Forstwissens. I. 539. großer Eisvogel.

— — Esper I. tab. 12. f. 1.

Nöf, III. t. 33. f. 1. 2. Und die Raupe IV. t. 31. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Falter. Die Flügel sind gezähnt, oben schwarzbraun, weißbandirt und gefleckt, unten aber orangegeiß, weißbandirt, mit grünlicher, himmelblauer, breiter Randeinfassung.

Raupe. Der Kopf ist zwengespitzt, in der Mitte roth, und an den Seiten schwarz; einige Glieder sind violettbraun, die übrigen grünlich. Sie führt hinter dem Kopf 2 hohe, und dahinter mehrere kleine Halbhornspitzen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser vorzüglich große und schöne Falter hat eine Flügelbreite (von einer Spitze zur andern) von 3½ Zoll, jeder Vorderflügel ist 1 Zoll und 9 Linien lang. Auf der Oberseite ist er schwarzbraun, mit abwechselnd schwarzen und weißen Franzen am gezähnten Hinterrand. Dieser ist mit 2 verloschenen grünlich himmelblauen Linien und mit einem Band von braunen Halbmondchen rings umher eingefasst. Eine weiße Querbinde, die auf den Vorderflügeln aus sechs einzelnen Flecken besteht, zieht sich auch mitten durch die hintern, wo sie durch die Adern unterbrochen wird. Auf den vordern steht auch noch ein großer, weißer Fleck gegen die Wurzel und drey kleine an der Spitze. Die Unterseite, deren Grundfarbe ocker-

Nr 2

braun

braun ist, hat die weiße Mittelbinde, die Makeln und die doppelten, grünlichblauen Randlinien, wie oben. Das Ockerbraune wechselt an den Hinterflügeln mit einem grünlichen Himmelblau ab.

Die Raupe, welche im May erwachsen ist, hat einen zwergeispigten, in der Mitte rothen und an den Seiten schwarzen Kopf, und gleich hinter demselben zwey hohe, und dahinter mehrere kleine, schwach gedornete oder eigentlich behaarte und dabey harte Spigen. Am Leibe sind das vierte, sechste, achte und neunte Glied violetbraun, die übrigen grünlich, mit braunen und schwarzen Schattierungen.

Die anfänglich weiße, nachher dunkler werdende, schwarz punctirte Puppe hat einen höckerichten Kopf und Bruststück, und einen starken beulförmigen Auswuchs hinter demselben. Die Puppenruhe dauert 3 bis 4 Wochen. Ueberhaupt sind Eier, Raupen und Puppen so sonderbar gestaltet, daß sie sich von allen andern ganz unterscheiden. Die Eier sind weder kegel- noch eysförmig rund, wie bey andern Falter-Arten, sondern platt-rund und dabey mit feinen zarten Spigen besetzt.

Aufenthalt. Der Falter fliegt im Junius und Julius in Wiesen, und an feuchten, zwischen Waldungen liegenden Stellen, wo er sich an den stehenden Pfützen und auf Fahrwegen niederläßt. Die Raupe kriecht im Herbst auf der Zitterpappel und Buche, überwintert, und tritt im May ihre Verwandlung an.

9. Der Pappelfalter. *Papilio Populeti*.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Großer Eisvogel mit kleinen Flecken; großer Buchenvogel Gladbachs.

Pap. Populi Esper I. t. 31. f. 1. wo das Männchen steht. Und t. 106. f. 1. 2. 16. die Larve dazu.

— — Panzeri Fauna 28. tab. 22.

Papillons d'Europe tab. 9. n. 10. tab. 57. n. 11. Männchen.

Gladbach tab. 20. f. 3. 4. die dort für Männchen unsers vorübergehenden gehalten werden. Etwas schlecht.

Kennzeichen der Art. Falter. Dem vorübergehenden ähnlich, aber die weißen Flecken sind nur klein und schwach, und auf den Hinterflügeln fehlt die weiße Binde überall.

Raupe. Nach Espers Angabe dunkelgrün und die mittlern Ringe sind abwechselnd etwas ins Violette gefärbt. Auf der Unterseite des 2. und 3. Ringes ist sie rothbraun, und hat über den Bauchfüßen einen blaßröthlichen Streif. Beyde Endspitzen sind roth.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Falter, der uns eines eigenen Namens werth schien, ist von einer Flügelspitze zur andern 3 Zoll 8 Linien breit, und jeder Vorderflügel hat 1 Zoll 8 Linien Länge. Er wurde von verschiedenen bisher für das Männchen zu dem vorübergehenden Espenfalter gehalten. Dieses kann er darum nicht seyn, weil man männliche und weibliche Falter gefunden, denen das starke weiße Band fehlt, und weil Hr. Professor Esper in den Supplement. zu den Tagfalterlingen S. 69. die Verschiedenheit beyder Arten durch die Raupen-Erziehung für

für entschieden ansieht. Wäre dieß nicht, so müßte er fernerhin für eine Varietät gelten. Unser Falter hat die meiste Ähnlichkeit mit dem vorhergehenden; aber die Flecken sind nur klein, und die Hinterflügel haben keine weiße Binde, auch auf der Unterseite ist nur eine schmale, blaugrüne, unterbrochene Binde.

Die dunkelgrüne Raupe, deren mittlere Ringe einigermassen abwechselnd ins Violette gefärbt sind, und deren Unterseite am zweiten und dritten Ring rochbraun ist, hat über den Bauchrißen einen blasförmlichen Streif und zwei rothe Endspitzen. Sie ist auf der Eiprachen Tafel in kriechender und in ruhender Stellung, nebst dem vergrößerten Kopf und der Puppe abgebildet, mit der Anzeige im Texte: daß man sie einem in Gelingen studierenden jungen Hrn. von Montesson und dessen Hofmeister, der Entdeckung nach, zu verdanken hat.

Aufenthalt. Dieser Falter erscheint etwas später, als der Eichenfalter, übrigens aber an ähnlichen Stellen, in Deutschland, auch bey uns. Die Raupe hält sich auf der Schwarze, d. i. der gemeinen Pappel (*Populus nigra* L.) auf, und wahrscheinlich auch auf mehreren Pappelbaum-Arten.

Zeinde. Nach Gladbach a. a. O. Seite 45. stellen ihm die großen Wassernymphen nach.

10. Der Heckenfirschenfalter. *Papilio Sibilla*, Lin. et Esper.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleiner Eisvogel, Wandfleck, Schleyer, weißer Admiral, kleiner Buchenvogel (bey Gladbach).

Papilio Sibilla Lin. 781. n. 186. Müller. 614. n. 186.

— *Camilla* Lin. 781. n. 187. Müller 614. n. 187.

— *Sibilla* Wiener Verj. 172. 2.

— — Fab. Entom. III. 1. 246. n. 766.

— — System. Beschreibung. 143. 75.

— — Vorkauf. I. 24. n. 20.

— — Esper I. t. 14. f. 2. Männchen, oder *Sibilla* Lin. fig. 3.

Weibchen oder *Camilla* Lin.

Rüssel III. t. 70. fig. 1. 3. und Raupe; Männchen.

— — tab. 33. fig. 3. 4. Weibchen.

Schäfferi Icon. tab. 153. fig. 1. 2.

Auch Bergsträfers und Fries's *Camilla*.

Kennzeichen der Art. Falter. Alle Flügel sind gezähnt, oben schwarzbraun, weißbändert, unten reißgelb, mit einer doppelten Reihe schwarzer Randpunkte.

Raupe. Grün, mit einem rothen, weißgestreiften, herzförmig gezeichnet und dornigten Kopf, weißen Füßen und Seitenstreif. Oben führt sie an jeder Seite eine Längsreihe ungleicher, farnrother, und unten auf dem weißen Streif eine Reihe schwacher, weißer Dornen, aber das erste Glied ist ungedornet.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Falter hat 2 Zoll 4 Linien Flügelbreite, und jeder Vorderflügel 1 Zoll und 1 Linie Länge. Die gezähnten, weißgestreiften, oben schwarzbraunen Flügel führen in der Mitte eine auf den Vorderflügeln unterbrochene, auf den hintern aber von Adern durchschnitene weiße

weiße Querbinde. Auf den vordern steht gegen den Hinterrand ein eigener weißer Fleck, nach der Wurzel zu noch einer, und dann zwey gegen die Spitze. Am Innenwinkel der Hinterflügel zeigt sich bey'm Weibchen ein kleiner braunrother Fleck. Die Unterseite, welche rostfarbig oder orange gelb ist, hat die nämlichen weißen Makel, aber größere, und am Hinterrand aller vier Flügel deren mehrere. Dasselbst führen die vordern an der Spitze, so wie die hintern, eine doppelte Querreihe schwarzer Punkte und schwarzer Striche an der Wurzel, die nebst dem Hinterrand der Hinterflügel weißlich blau ist.

Die Raupe derselben wird durch ihren rothen weißgestreiften, herzförmig getheilten und dornichten Kopf, weiße Füße und gleichfarbigen Seitenstreif, und auch dadurch kennbar, daß sie an jeder Seite eine Längsreihe ungleicher, karminrother, und unten auf dem weißen Streif eine Reihe schwacher, weißer Dornen führt; aber das erste Glied ist ungebort.

Die grüne, nahe vor ihrer Entwicklung braun werdende Puppe hat 2 Kopfspitzen, die nach unten zugekehrt, und fast als Haafenohren anzusehen sind, mit einem Höcker auf dem Rücken und einigen Silberflecken an Kopf und Brust. Die Puppenruhe währt 14 Tage bis 3 Wochen.

Aufenthalt. Der Falter fliegt im Junius und Julius in Wäldern, in der Nähe der Bäche, ist zwar minder selten, als der vorhergehende, doch aber eben nicht gemein. Die Raupe lebt einsam auf der Heckenkirsche (*Lonicera xylosteum* et *caerulea*), Je länger sie lieber (*Lonicera periclymenum*), und Weißblatt (*Lonicera caprifolium* L.).

11. Der Weißblattsalter *Papilio Lucilla*, Esper.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Papilio Lucilla System. Beschreibung 145 n. 76.

— — Borkhausen L. 25. n. 21.

— — Camilla Wiener Verz. 172. 1.

— — Fab. Entom. III. 1. 246. 767.

— — *Lucilla* Esper I. t. 38. f. 2. Dann tab. 106. die beyden Raupen, und fig. 7. die Puppe.

Bergsträßer nennt sie *Drusilla* und *Scopoli Rivularis*. Fabricius hätte in seinen Werken Röfels tab. 33. fig. 3. nicht allegiren sollen.

Kennzeichen der Art. Falter. Die gezähnten Flügel sind oben bläulich-schwarz, unten zimmetbraun; über die Flügel zieht sich eine weiße Binde, die auf den hintern unterbrochen oder gefleckt ist, und eine einfache Reihe schwarzer Randpunkte.

Raupe. Oben und an den Seiten gelblich grün, unten dunkelroth, mit einem herzförmigen, braunrothen, dornichten oder steifhaarigen Kopf. Auf dem 2. 3. 5. 10. und 11. Ring stehen jedesmal zwey grünlliche Kolben, die sich purpuroth endigen. Die übrigen Absätze führen rothe Kolben, die rothgedornt sind. Auf den Seiten zieht sich eine weiße Längslinie abwärts, woneben auf jedem Abschnitt noch ein Paar ästige, außerordentlich zarte Dörnchen stehen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Falter hat schwarz und weißgefranzte, schwarzblaue, gezähnte Flügel, die auf der Unter-

Unterseite zimmetbraun sind. Eine mitten durch die Flügel sich ziehende weiße Querbinde besteht aus den vordern aus acht kleinen weißen Flecken, ist aber auf den hintern zusammenhängend. Auf der eben so bandirten Unterseite läuft eine einfache Reihe schwarzbrauner Flecken mit dem Rande parallel. Dadurch unterscheidet er sich am meisten von dem vorhergehenden.

Die auf der Oberfläche und an den Seiten gelbgrüne, auf der Unterseite aber dunkelrothe Raupe mit einem herzförmigen, braunrothen, dornichten Kopf führt auf dem 2. 3. 5. 10. und 11. Ring allemal zwey grünlliche Kolben mit Purpurspizen und auf den übrigen Absätzen rothe Kolben mit rothen Dörnern. An der weißen Seiten-Längslinie sind noch auf jedem Absatz zwey ästige, sehr zarte Dörnchen. Sie unterscheidet sich bey'm ersten Anblick von derjenigen des vorhergehenden Falters durch ihre Kolbendornen und rothe Bauchfüße; überwintert in ihrer Jugend in einem Gespinnste, und erreicht im Junius des folgenden Jahrs ihre vollkommene Größe, da sie sich denn verpuppt. Und ihre eckige, braune, mit Schwarz schattirte Puppe hat eine braune Rückenerhöhung, die größer und breiter ist, als bey der vorhergehenden. Die Kopfhörner sind schaufelförmig. Ihre Ruhe dauert 14 Tage.

Außer dieser Frieslinschen, auch in Espers Werke a. a. O. abgebildeten Raupe, ist daselbst auch fig. 8. noch eine Varietät aus Nizza beygebracht, die bläßgrüner und mit dunkleren Dornen besetzt ist.

Aufenthalt. Er fliegt im Junius und Julius in Frankreich zahlreich, äußerst selten in Deutschland, an gleichen Stellen wie der vorige. Die Raupe nährt sich auf der Tatarischen Lonicere, dem Je länger je lieber und Weißblatt, niemals aber auf den Heckenkirschen (*Lonicera xylosteum*).

Sechste Familie.

Scharfbornraupen. Eckflügelige Falter, Eckflügler.

Die Raupen sind ein wenig wollig, kurzstreifig oder sprenglig, nach der Länge des Leibes mit mehreren Reihen steifer, spiziger und ästiger Dornen besetzt; der schwärzliche Kopf ist zwerspaltig. Die senkrecht hangende, öfters gold- und silberglänzende Puppe, in die sie sich verwandelt, zeigt ein Paar größerer Spizen am Kopfe und ein Paar kleinerer auf jedem Ring über dem Rücken, nebst einer nasenförmigen Erhöhung auf dem Genicke. Die Falter gehen und ruhen nur auf vier Füßen; denn das erste Paar gleicht vielmehr rauen, stumpfen Hächchen. Der Hinterrand ihrer Flügel ist einigermassen eckig ausgeschweift; die Oberseite fleckig, die untere braunschwarz oder buntgegerittet.

Weniger schädliche.

12. Der Wasserweidenfalter. *Papilio Antiopa* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Palmweidenfalter, Trauermantel, Pleurceuse, goldene Tresse, Mantillschen.

Papilio Antiopa Lin. 776. 165. Müller 609 165.

— — — Wiener Verz. 175. 4.

— — — Fab. Entom. III. 1. 115. 355.

— — — Systemat. Beschreib. 156. 83.

Papilio

Papilio Antiope. Vorkhausen I. 11. n. 3.

— — — Brahm Insecten-Calender II. Seite 17. 8.

— — — Gleditsch I. 436. u. II. 38.

— — — Esper I. t. 12. f. 2. und die große Varietät t. 29. f. 1.

Nüffel I. 1. Classe. t. 1. mit der Raupe.

Schäffler Icon. 70. fig. 1. 2. Schäff. elementa t. 94. f. 1. 2. Durch einen

Druckfehler hat Fabricius: Schäff. Icon. 94.

Kenntzeichen der Art. Falter. Die eckigen Flügel sind oben rothfarben, mit einer hellgelben Kante oder Börde.

Raupe. Gesellig lebend, schwarz, mit gelbrothen Rückenflecken auf den acht mittelsten Ringen; am zweyten Gelenk befinden sich sechs, an den folgenden sieben, an dem eilften vier, und am zwölften nur zwey schwarze, zartgedornete Spigen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügel dieses sehr großen und schönen Falters, welche in der Ausbreitung 3 Zoll und 2 Linien messen, wovon jeder Vorderflügel 1 Zoll und 5 Linien Länge hat, (doch gibts auch größere,) sind eckig, mit einer größern und einigen kleinern Spigen. Auf der Oberseite sind sie wie ein tieffloharbener Sammet anzusehen, mit einer schön hellgelben, eines Strohhalmes breiten, Einfassung des Hinterrandes umgeben, und nach innen zu mit einer Reihe kleiner, ovaler, hellblauer Flecken begränzt; der dicke Rand der Vorderflügel führt noch 2 gelbe Flecken. Unten sind die Flügel tiefschwarz; das Blaue ist kaum merklich, und der schmutzgrüne Hinterrand ist schwarz gesprengt.

Die Raupe, welche 2 Zoll 3 Linien mißt, lebt gesellig, und ist schwarz mit gelbrothen Rückenflecken auf den 8 mittelsten Ringen. Sie führt am zweyten Gelenk 6, an den folgenden 7, am eilften 4, und am zwölften nur 2 schwarze zartgedornete Spigen, und zeigt sich sowohl im Sommer, als im Herbst im erwachsenen Stande.

Die Puppe ist eckig und grau, oft braun, mit 2 Spigen am Kopf, und mehreren kleinen auf der Brust und über den Bauch. Bey warmen Wetter, oder überhaupt im Sommer dauert die Puppenruhe 2 bis 3 Wochen; bey der zweyten Generation aber 7 Monate, indem die Puppe in der Regel überwintert; wovon aber einzelne eine Ausnahme machen, sich noch im Herbst entwickeln, und wegen Mangel der Paarung überwintern, deren gelber Randsaum sich alsdann durch das Verfliegen verbleicht, abnußt und weiß wird, welches auch Brahm a. a. O. gut bewiesen hat *).

Aufenthalt, Feinde und Schaden. Der Falter ist aller Orten in Europa und Amerika zu Hause. Seine erste Erscheinung ist im März und April an den flebrichten Knospen der Steinobstblüthen und an Weidenbäumen; die zweyte zu Ende des Julius und im August, wo er den auslaufenden Saft an den aufgeborstnen Rinden der Bäume, besonders der Obstbäume saugt. Einige überwintern sogar im vollkommenen Stand.

Die Raupe lebt auf Weiden, Espen, Bellen, Pappeln und Birken, in großen Gesellschaften im Sommer und Herbst. Sie haben Fadenwürmer und auch kleine Raupentöchter (Zehrwespen) zu Feinden, deren sich in Einer Raupe wohl auf 300 auf-

*) Ich widerreufe also hier zugleich meine in Scriba Journal III. S. 209. damals ge-

äußerte Meinung, daß die weißbandigen aus überwinterten Puppen entstehen. Sch.

aufhalten. Sie sind r. d. r. Vieles fressen und können ganze Weidenpläze kahl machen. Wenn sie daher überhand nehmen, muß man Raupen und Puppen ablesen.

13. Der Kirschenfalter. *Papilio Polychloros*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rüsterfalter, großer J. aus, Weichselnachs, große Blaucante, große Aurelia, Schildkrotvogel, großer Krübler asharold, Kirschvogel.

Papilio Polychloros L. in. 777. 166. Müller 609. 166.

— — — Wiener Verz. 175. 5.

— — — Fab. Ent. III. 1. 121. 372.

— — — Systemat. Beschreibung 166. 87.

— — — Gorthausen I. 14. 7.

— — — Gleditsch II. 38. und 109.

— — — Pergold Mittel 26. t. 1. f. 5. Raupe.

— — — Esper I. t. 13 f. 1. nebst Raupe.

Rösel I. tab. 2. nebst Raupe.

Schäfferi Icon. t. 146. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Falter. Die Flügel sind eckig ausgeschnitten, gelbbraun, schwarz gefleckt; die vordern führen vier schwarze Punkte.

Raupe. Gefellig lebend, schwarz, mit gelben Rücken- und Seitenstreifen, und gelben dreieckigen Dornen, deren die mittlern Glieder sieben, das zweyte, dritte und zwölfte aber sechs führen. Das erste Gelenk ist ries. schwarz.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Falter, der von einer Flügelgröße zur andern, nach großen Exemplaren 2 Zoll 6 Linien, und jeder Vorderflügel 1 Zoll und 1 Linie in die Länge misst, hat eckig ausgeschnittene, gelbbraune Flügel, deren vordere auf der Oberseite am Vorderrand zwei größere schwarze Flecken, neben denen der Grund heller ist, und in der Mitte drei schwarze rundliche, einen herzförmigen und 2 längliche gezogene Punkte haben, welche letztere näher gegen den Körper stehen. Die Hinterflügel haben nur 2 schwarze Flecken und einen blau und schwarz ausgefachten Rand. Die Unterseite ist durchaus schwarz und braun marmorirt. Ob *Papilio Testudo*, Esper tab. 75. fig. 1. 2. eine Varietät davon sey, ist ungewiß.

Die Raupe, die von den im April gelegten Eiern herrührt, wird meistens einen Zoll und sechs bis sieben Linien lang, ist von Farbe schwärzlich, der Kopf und erste Ring ganz schwarz; auf dem Rücken und in jeder Seite findet sich ein gelber Streif, so wie gelbe, den Dornen ähnliche Spitzen über den ganzen Leib vertheilt sind, daß die mittlern Ringe 7, das zweyte, dritte und zwölfte aber 6 führen. Sie lebt gefellig, bis sie ihre Haut zum letztenmal ausgezogen hat, alsdann zerstreut sich die Gesellschaft. Sie erscheint in manchen Jahren oft nur in einem kleinen Bezirk äußerst häufig, wo man in der Nähe kaum eine einzige entdecken kann, ohne auch im folgenden Jahre mit Mühe einige finden zu können. Reemann behauptet im Maderschen Raupen-Kalender von ihr, daß sie einen Ambra-Geruch von sich gebe. Im Junius ist sie zur Verwandlung reif, wo sie sich in eine sackförmig hängende, holzbraune Puppe, die mit verschiedenen, erhöhten Metallflecken geziert ist, verwandelt. Die Puppenruhe der einen Generation dauert 14 bis 20 Tage, die der zweyten aber sieben Monate.

Aufenthalt. Der Falter erscheint schon in den ersten Tagen des Frühlings, zuweilen schon zu Ende des Februars, wenn die Witterung nur etwas erträglich ist, und so fort, meist durchs ganze Jahr. Gewöhnlich aber findet jährlich eine doppelte Generation statt, weil er im Julius wieder fliegt. Man findet ihn an bedeckten Stellen der Häuser und Büume einzeln und gepaart.

Die Raupe nährt sich von dem Laub aller Arten der Weichselbäume, der Aepfel-Birn-, Weiden-, Ulmen-, auch der nordamerikanischen Lakomahak-Bäume.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt seine zahlreichen Eyer im April, auch nach Beschaffenheit der Witterung noch später, um die kleinen Zweige, und überzieht sie mit einem Firniß, der sie für Frost und feindlichen Thieren schließt und sichert. Die Eyer sind schwer zu entdecken. In 14 Tagen werden durch einen sehr geringen Grad der Frühlingswärme die Räupchen schon aus den Eiern entwickelt, wo sich dann die ganze Brut gesellschaftlich ein sehr feines Gespinnst macht, in welchem sie bey einfallender Kälte zwar erstarren, an ihrer Gesundheit aber deswegen doch nicht Schaden leiden.

Feinde. Einige Gattungen der Meisen sind besonders geschäftig, sie zu ihrer Nahrung aufzusuchen, und uns von tausenden dieser schlimmen Fresser zu befreien, ehe sie noch beträchtlichen Schaden anrichten können. Innerlich leiden sie durch Fadenwürmer.

Schaden. Dieser ist zwar lange nicht so bedeutend, als derjenige von der Raupe des Weißdornfalters (*Papilio Crataegi*); ob aber gleich die Verwüstungen unserer Raupe seltener sind; so ist sie dagegen sehr acträftig, und wenn sie in manchen Jahren häuſig erscheint, den Besitzern der Weichselbäume verhaßt genug. Und da solche sich mit den Knospen der Bäume beſehen muß, ehe noch das Laub hervorbricht, so ist oft der Schade schon da geschehen, ehe wir ein Blatt sehen, und ist beträchtlich, ehe wir noch so schlimme Gäste vermutheten.

Mittel dagegen. Um sie zu vermindern, braucht man zwar die schwer zu entdeckenden Eyer nicht aufzusuchen, aber doch dann, wenn sie uns das Ohnmaß vor die Augen bringt, wird sie jeder gute Oeconom mit dem Zweig abnehmen und ins Feuer werfen. Und was ihre Raupengespinnte betrifft, die sich, wenn im Frühling die Bäume noch blätterlos sind, leicht entdecken lassen; so kann denselben großer Abbruch gethan werden, wenn man solche aufsucht, abnimmt und verbrennt oder zertritt. Oder wenn sie ihre letzte Häutung noch nicht überstanden, folglich sich noch nicht zerstreut haben, und oft in ganzen Trauben an den schwanken Nestern herab hängen, bietet sich die Gelegenheit von selbst dar, sie mit dem Nestchen abzunehmen und mit einem Auftritt zu vernichten.

Anmerkung. Obgleich die mehrere Größe diesen Falter von einem ihm ähnlichen, dem Messelfalter oder kleinen Fuchs, *Papilio Urticae* Lin., dessen Raupe von Nesseln lebt, und der wirklich kleiner und höher von Farbe ist, die ins Zinnoberrothe fällt, auch am äußersten Flügelrand einen weißen, halbmondförmigen Flecken hat; so wird letzterer doch zuweilen mit unserm verwechselt, und muß den Schaden, den die Raupe des Kirschenfalters angerichtet, mit dem Leben bezahlen.

Man zählt ihn übrigens zwar zu den dem Obstbau mehr schädlichen Inseeten, könnte ihn aber auch unter die beynahe mehr schädlichen Forstinseeten rechnen, weil doch die wilden Obststämme auch durch ihn leiden.

14. Der Dotterweidenfalter. *Papilio Xanthomelas*, Vienn.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Karer Schildkrotvogel.

<i>Papilio Xanthomelas</i> ,	Wiener Verz. 175. 6.
—	Systemat. Beschreib. 162. 88.
—	Vorkauf. I. 18. 14.
—	Esper I. t. 63. fig. 4.

Kennzeichen der Art. Falter. Die braunen, ins Rothgelbe ziehenden Flügel sind schwarz gefleckt, unten schwarzbraun genebelt mit einer blassen Mittelbinde.

Raupe. Schwarz mit gelben Längstreifen und mit schwarzen Dornen gezieret; der ganze Körper ist mit weißen Härchen bedeckt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Falter, den mehrere Entomologen für eine eigene Art, andere für eine Varietät des Kirchenfalters erklären, kommt demselben sehr nahe. Seine braunen, ins Rothgelbe ziehenden, eckigen Flügel sind gerade so als jener mit drey Rand- und vier Mittelstellen auf den Vorderflügeln, und einem dergleichen auf den Hinterflügeln schwarz gefleckt, weshalb er von selbigem äußerst schwer zu unterscheiden ist. Bloß in der Spitze der Vorderflügel befindet sich ein weißer Fleck, der bey dem Kirchenfalter gelblich ist. Die am Rande her liegenden blauen Flecken färben sich hier frischer. Der schwarze Hinterrand ist breiter. Die Unterseite ist heller, und kommt dem Rothbraunen näher, als beym Kirchenfalter, und sie ist braun genebelt, mit einer blässern Mittelbinde.

Die Raupe ist schwarzdornicht mit gelben Längstreifen und feinen Härchen. Allein man will aus ähnlichen Raupen auch Kirchenfalter erzogen haben.

Die Puppe ist schwarz, und allemal mit einem zarten blauen Duft überzogen.

Aufenthalt. Der Falter ist bey Wien, und in mehreren, auch nördlichen Gegenden Deutschlands einheimisch, die Raupe aber findet sich daselbst auf den Weiden.

Anmerkung. Fast könnte man auch den Rosenweidenfalter, *Papilio V*, album Vienn. et Fab., der als weißes V, L., album in Vorkaufens, Schneiders, Bergsträfers und Esper's (tab. 62. fig. 3. a. b.) Schriften vorkommt, und mit V, album Esp. nicht vermengt werden muß, den Deutschen Herkindsenten beizählen, weil er nicht bloß in Ungarn und Rußland, sondern auch in Oesterreich einheimisch ist. Das Ausmaß, die Grundfarbe, die Flecken und Flügeladern sind eben so wie beym Kirchenfalter, nur fehlen dem Hinterrand die blauen Randflecken, und die Unterseite, die mit einem lateinischen L., oder wie man die Lage verändert, mit einem V bezeichnet ist, kommt dem folgenden Hepfenfalter näher, und seine noch nicht abgezeichnete, auf Weiden wohnende Dornenraupe ist schwarz mit gelben, unterbrochenen Längslinien und einem schwarzen Kopf.

15. Der Hepfenfalter. *Papilio C*, album, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Heckenkirchenfalter mit dem C, weißer C-Vogel, C-Papillon, Gammafalter.

<i>Papilio C</i> , album	Lin. 779. n. 168. Müller 610. 168.
—	Wiener Verz. 176. 9.
—	Fab. Ent. III. 1. 124. 380.

Papilio C. album. Systemat. Beschreib. 164. 90.

— — Borkhaus. I. 15. 9. und S. 203.

— — Gleditsch II. 252.

— — Esper I. t. 13. f. 3. mit Raupe und t. 59. f. 3. die Varietät.

Nöf sel I. Tagg. 1. Classe. t. 5. mit Raupe.

Schäfferi Icon. t. 147. fig. 3. 4.

Kennzeichen der Art. Falter. Die sehr eckig und stark ausgeschnittenen Flügel sind oben braun und schwarz gefleckt, auf der Unterseite sind die hintern mit einem weißen c bezeichnet.

Raupe. An den Seiten braun mit sich durchkreuzenden Schrägestrichen; auf dem Rücken vornen her zur Hälfte dunkelgelb, von der Mitte an zur Hälfte weiß; mit kurzen Dornen von eben der Farbe als die Ringe, worauf sie stehen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts. Die Flügelbreite dieses orangebraungrundirten, olivenbraungerandeten und gestreuten Falters, dessen Flügel sehr eckig und stark ausgeschnitten sind, beträgt 2 Zoll, und die Länge jedes Vorderflügels elf Linien. Diese führen am Vorderrand zwei schwarze, und gegen die Spitze eine braune Makel; ferner in der Mitte drei schwarze und am Innenrande einen braunen Flecken. Die hintern haben drei kleine Flecken an der Wurzel, und eine unterbrochene, dunkler braune Querverbinde, die mit dem Hinterrand parallel läuft. Die Unterseite ist von Weiß, Gelb, Braun und Schwarz unter einander marmorirt und wolffisch-besgleichen in doppelten Randreihen grün gefleckt. Der Mittelstrich der Hinterflügel sieht wie ein kleines weißes c aus. Es gibt Varietäten so wohl mit viel bleicherer, als auch weit dunklerer, fast einfarbiger Unterseite, wo sich das c besonders deutlich ansimmt. Die schwärzköpfige Raupe ist an den Seiten braun mit sich durchkreuzenden Schrägestrichen; auf dem Rücken vornen her zur Hälfte dunkelgelb, von der Mitte an zur Hälfte weiß; mit kurzen Dornen von eben der Farbe als der Kopf und die Ringe, worauf sie stehen. Da zwei jährliche Erscheinungen des Falters statt finden, so kommt aus der zu Ende des May ausgewachsenen Raupe das vollkommene Insect noch zu Ausgang des Junius, und aus der im August ausgewachsenen und verpuppten Raupe das vollkommene Insect der Regel nach im kommenden April und May erst hervor. Eine Ausnahme von der Regel ist: wenn der Falter der zweyten Raupenbrut noch im Herbst erscheint; in diesem Fall gehen auch seine Eier, die er legt, zu Grunde. Herr Esper ist zwar anderer Meinung, und hält die Herbst-Erscheinung des Falters für Regel und die Frühlings-Erscheinung für Ausnahme; allein, man frage nur die Erfahrung, und sie wird uns sagen, daß das, was eben behauptet worden, richtig sey, so wie es auch schon Brahm im Insecten-Calender II. Seite 141. gut entwickelt hat. So verhält es sich auch mit mehreren Tagfaltern, z. B. dem Nesselfalter, *Papilio Urticae*.

Die Puppe ist eckig, pfirsichblüthfarben, braungefleckt, spitzhörnigt; hinter der großen, mittleren Rücken Spitze ist das mit 3 Paar Silber- oder Gold-Puncten besetzte Bruststück sehr eingebogen; der dicker werdende Hinterleib ist auf jedem Ringe zweymal gespißt. Die Puppenruhe der einen Generation beträgt 3 Wochen, nämlich vom Anfang des Junius bis gegen das Ende desselben, der andern aber 8 Monate, nämlich vom August

gust bis zum April des folgenden Jahrs; so daß nicht das Ey, sondern die Puppe überwintert. Bey Ausnahmen entwickelt sich letztere noch vor Winters in der Mitte des Octobers.

Aufenthalt. Der Falter der ersten Erscheinung fliegt im April und May, an Blüthen und Bäumen, in Gärten und Gehölzen; der von der zweiten zu Ende des Junius, wie oben bemerkt ist, daher auch die Raupe theils im May, theils im August im erwachsenen Zustand auf der Unterseite der Blätter vom Hopfen, von Nessel, Johannis- und Stachelbeersträuchern, Hedentürschen (*Lonicera xylosteum*), Ulmen und Haseln gefunden wird.

Anmerkung. Aus der Familie der Halsdornraupen und silberreichen Falter im Wiener Verzeichniß sind noch zweyer zu gedenken, die, weil sie auf Forstunkräutern leben, zu den mehr nützlichen als schädlichen gehören. Die Raupen dieser sehr artreichen Familie der Perlenmutterfalter, perlenmutterfleckigen Nessflügler, leben größtentheils auf niedern Kräutern und den Weiden: Arten, und führen dornenähnliche Spizen, und zwar auch am ersten Ring. Die Puppen haben kürzere und knieartige, veräolerte Erhabenheiten, und eine starke Vertiefung gleich hinter dem Bruststück aufzuweisen. Die Falter sind eben gelbbraun, mit schwarzen Makeln und Strichen netzförmig gefleckt; unten auf den Hinterflügeln silber- oder perlenmutterfleckig. Die Quersfäden am Vorderrand der Vorderflügel gegen die Wurzel sind mit Japrzahlen, 3. V. 1756, 1761 u. aber unpassend verändert worden. Der Flügel sind vier, außer den 2 Puffspitzen.

Der erste bisher gebildete ist der Himbeerfalter, *Papilio Paphia*, Lin. Wiener Verz. Fab. Borkhausen, Esper, Gleditsch (II. 223.), Röfel I. Tagvögel I. Cl. tab. 7. Weibchen. Schafferi Leon. Er heißt auch Silbergrün, Silberstrich, Kaiser, großer Perlenmuttervögel, Wasserfalterling. Seine Kennzeichen sind: der männliche Falter hat gezähnte Flügel, die oben rothgelb wie Virginischer Tobak, und schwarzgefleckt, unten aber auf den grünen Hinterflügeln silberstreifig sind. Der weibliche ist größer, weniger rothgelb und ohne verdickte Adern oder Längs-Nerven. Die Raupe lebt nicht gesellschaftlich, ist schwarz mit einem breiten gelben, in der Mitte schwarzen Rückenstreif und langen gelben Dornen, von ungleicher Größe, die 3 vordern Dornen sind sehr lang und schwarz.

Das Männchen misst mer Flügelbreite nach 2 Zoll und 5 bis 6 Linien, das Weibchen 2 Zoll und 6 Linien bis 3 Zoll und 2 Linien. Nicht nur die mindere Größe, sondern auch besonders die vier breiten Flügelnerven und die rothgelbe Grundfarbe, die dem Männchen eigen ist, unterscheiden es vom Weibchen. Tausend sind sie sich gleich. Am dunkeln Hinterrand befinden sich 2 Querreihen runder schwarzer Flecken. Die Vorderflügel haben in der Mitte noch fünf dergleichen, die fast wie ein 8 gezeichnet (?) gefleckt sind, und die gewöhnlichen Quersfäden an der Wurzel des Fluges. An den Hinterflügeln zeigt sich eine abgebrochene Querlinie in der Mitte, und hinter selbiger noch ein kleiner Quersfleck. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel heller, schwächer gezeichnet, und an der Spitze grün gefleckt. Die hintern sind ganz grün, am Männchen heller, mit silbernen Quersstreifen, davon einer der mittleren sich durch den ganzen Flügel zieht. Die überwinterte Raupe erreicht im May ihre vollkommene Größe, nämlich 1 Zoll und 8 Linien, und verpuppt sich zu Ende desselben oder etwas später in eine sehr eckige braungraue Puppe mit vier paar ockerener Anhängen. Die Puppenruhe dauert nicht 14 Tage, wie Röfel glaubte, sondern 4 Wochen. Wenn man einen weiblichen Falter am Hinterleibe öfnet, so wird man einen Eyerstock von beynähe 100 Stück gewahr. Aus diesen runden, geschrumpften, glänzendgelben

Eyer,

Eyerchen kriechen die Mäupchen zu Anfang des Septembers aus, und haben vor ihrer ersten Häutung nur Haare, noch keine Dornen. Der Falter durchfliegt im Junius und Julius die Wälder und hält sich auf saftreichen Blumen auf. Die Larve oder Raupe nährt sich am liebsten von der Märzviole, außerdem auch von andern Viole, Nesseln in Wäldern, und den Himbeerblättern. Es findet nur Eine Generation statt.

Der zweite unschädliche Falter dieser Familie ist der Hohlbeersfalter, *Papilio Daphne*, Vienn. Fabric. Borkhausens, und zugleich *Chloris* in der systematischen Beschreibung, im Esper, t. 44. fig. 3. und tab. 75. fig. 4. Naturforscher XIV. Die Kennzeichen der Art sind: Des Falters Flügel sind gezähnt, schwarzgefleckt, am Männchen pomeranzenroth, am Weibchen blässer; die Hinterflügel sind auf der Unterseite von der Wurzel bis zur Mitte hellgelb und zugleich durch die dunkeln Nerven in würfliche Flecken getheilt. Von der Mitte an bis zum Hinterrand sind sie röthlich violett, mit fünf äugigen Flecken, und eine Querreihe grünlicher, länglicher Randflecken. Die Raupe ist schwarzbraun mit gelben Linien, gelbem Rückenstreif und sechs Reihen gelber Dornen auf den zwölf Gelenken.

Der männliche Falter hat eine Flügelbreite von 1 Zoll 9 Linien, der weibliche von 2 Zoll und zuweilen drüber. Die schwarzen Striche sind in der Anlage wie bey den andern dieser Familie. Die Unterseite der Hinterflügel aber weicht von den verwandten Arten sehr ab. Dasselbst ist die innere Hälfte hellgelb mit dunklern Querlinien, Flecken und Aern getheilt, und die andere Hälfte ist rosenroth auf Purpur ziehend, mit hellen Schattirungen, fünf äugigen Flecken und einer Reihe grünlicher Randflecken, die sämmtlich den Flecken der Oberseite entsprechen.

Die Raupe findet man im Junius ausgewachsen; sie wird kurz vor ihrer Verwandlung ganz gelb. Die gelblichgraue Puppe hat einen etwas gebogenen, gelblichen Rücken, und hervorstehende, braungeaderte Flügeldecken. Sie führt auf dem Brustücken und Hinterleib achtzehn vergoldete, zuweilen roth und grün schillernde Spigen in zwey Längsreihen. Ihre Ruhe dauert 14 Tage.

Der Falter befindet sich im Julius im südlichen Deutschland, auch bey Leipzig, wo ihn Capiex entdeckt, und im Naturforscher bekannt gemacht hat. Die Raupe nährt sich auf dem Brombeers- und Himbeerstrauch.

Die Wiener Naturforscher geben die Ursache nicht an, warum sie diesen Falter, der keine silberglänzende Flecken hat, nicht lieber der folgenden Familie beordnen.

Siebente Familie.

Scheindornraupe. Scheidige Falter.

Die Raupen dieser Familie sehen Dornraupen ähnlich; haben aber statt der schlichten Dorne nur fleischichte, kegelförmige, mit kurzen Haaren besetzte Erhöhungen von ungleicher Zahl, sieben oder neun auf jedem der mittlern Ringe, zwey merklichere an den Seiten des Halses. Die gestürzt hängende Puppe ist vornen fast stumpf, über dem Rücken aber meistens mit erhobenen Puncten besetzt. Auch die Falter haben mit den in der Anmerkung erwähnten silberreichen sehr viel ähnliches, sind aber immer glanzlos (blinde Perlenmutterfalter). Das erste Paar Füße ist unvollkommen; die Flügel sind rundlich, oben röthlichgelb mit schwarzen, öfters zusammenstoßenden Puncten und Nerven; unten wechseln die hintern mit orangengelben und gelbweißen, schwarzpunctirten Querbändern.

Weniger schädliche.

16. Der Espenbuschfalter. *Papilio Cynthia*, Vienn.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blinde Perlenmutter *Cynthia*, Jägerm.*Papilio Cynthia*. Wiener Verz. 179. 3.

— — — Systemat. Beschreib. 190. 11.

— — — Vorkhausen I. 59. 10.

Pap. Agrotora. Vorkhausen I. 59. 11.

— — — Veransträcker, Johann Andreas Venignus, Nomenclatur und Beschreibung der Insecten 1c. 1778. tab. 75. fig. 1 — 4.

— *Cynthia*. Eyer I. t. 37. f. 2. abc nebst Naup.

Naturforscher XII. t. 2. fig. 1 — 5, mit der Naup.

Anmerkung. Die in Fabric. Entom. III. 1. 253. n. 786. aufgeführte *Cynthia* ist bloß die *Trivia* Esper. t. 37. fig. 3. obgleich der Name *Cynthia* dort steht. Solche Eiersche *Trivia* ist nach den Nachrichten des sel. Gernings zu Frankfurt derjenige Kater, den er dem Herrn Schiffermüller nach Wien zugesandt hatte, welcher solchen im Nachtrag des Wiener Verzeichnisses S. 322. mit dem Namen *Artemis* bezeichnet hat. Diesem Falter hat Fabricius die Naup zugeeignet, Naturforsch. XII. welche doch zu unserer *Cynthia* gehört.

Kennzeichen der Art. Falter. Die Flügel sind ungezähnt, rothgelb oder braunroth, mit dergleichen, dick schwarz eingesaßten Flecken und Binden; besonders zieht sich am Hinderrand aller Flügel zuerst eine schmale, mondflcetige, sodann eine breite Binde, hierauf eine schmale, hellgelb angefangene, rothgelb fortgesetzte und durch die Hinterflügel wieder hellgelb fortlaufende Binde. Hinter diesen stehen noch einige dergleichen Makeln. Auf der Unterseite sind im braunen Gelbe 5 gelbe Makeln an der Wurzel, dann in der Mitte eine gelbe Doppelbinde, die sich auf den Vorderflügeln nicht ganz, auf den Hinterflügeln aber völlig durchzieht, und dann ganz am Hinterrand eine solche einfache durch alle Flügel.

Naup. Sammettschwarz, mit einem aus großen, gelben Punkten bestehenden Rücken- und Seitenstreif, desgleichen mit kurzen, schwarzen Dornen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Falter hat ungezähnte Flügel, obgleich mehrere Autoren solche für gezähnt ausgeben, und mißt nach unsern Exemplaren von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll und 6 Linien. Die rothgelben Flecken und Binden sind dickschwarz eingesaßt auf rothgelbem Grunde: besonders zieht sich am Hinterrand aller Flügel zuerst eine schmale mondflcetige, sodann eine breite, hierauf eine hellgelb angefangene, rothgelb fortgesetzte und durch die Hinterflügel wieder hellgelb fortlaufende Binde, hinter welcher noch einige dergleichen Makeln stehen. Man kann auch das Schwarze zur Grundfarbe der Oberseite annehmen, worauf die rothgelben Binden und Flecken sich befinden. Auf der rothgelben Unterseite hat der Rand der Vorderflügel eine Querreihe weißlicher Mondflecken und die hintern an der Wurzel fünf dergleichen Makeln, die fast eine angefangene Querreihe vorstellen, und in der systematischen Beschreibung a. a. O. auch dafür gelten; hierauf in der Mitte eine hellgelbe Querreihe, die, weil sie mit einer feinen schwarzen Linie durchschnitten ist, für eine Doppelreihe oder

oder Doppelbinde passirt. Endlich umschließt eine aus 6 bis 7 dergleichen Mondflecken gebildete Querreihe den Hinterrand.

Die in dem Hallischen Naturforscher gut abgebildete Raupe, die vormalig den Viehern noch nicht bekannt war, ist sammet-schwarz mit einem aus großen, gelben Puncten entstandenen Rücken- und dergleichen Seitenstreif, desgleichen mit kurzen, schwarzen Dornen, hat statt der Dornen auf dem 7 — 9 Ring conische Erhöhungen. Sie überwintert und ist im May ausgewachsen. Hr. Esper hat a. a. O. eine andere vorgelegt, welche gesellschaftlich lebt, gelb ist mit einer schwarzen Seiten- und schmalen Rückenlinie, desgleichen mit schwarzen Dornen, die Hr. Jung in Uffenheim entdeckt hatte, und deren Nahrung der spitzige Wegerich ist. Vielleicht variiert also die Raupe.

Die Puppe ist grünlich weiß, schwefelgelb und schwarz punctirt, vornen rund, mit sieben gelben Knopfreihen. Ihre Ruhe dauert bald 2, bald 3 Wochen.

Aufenthalt. Der Falter fliegt im Junius in den südlichen Gegenden von Deutschland, hier und da in Franken, und auch bey Leipzig, in lichten, blumenreichen Waldungen. Die Raupe lebt auf Wollweiden, Buchen und Espen.

Zweyte Horde. Die Raupen sind affelförmig, und die Falter sind Kleinflügler, *Papilioes rurales* Lin. — *Hesperiae*, Fabr.

Die Raupen sind fast eyrund, und unten glatt; ihr Kopf ist sehr klein, schwarz oder bräunlich, und, wie die Füße, kaum zu sehen; quer über den Leib sind die gewöhnlichen Einschnitte. Die ganze Gestalt dieser Raupen kommt derjenigen der Aft- oder Kellerrwürmer (*Onisci*), oder auch der Schildkäser (*Cassidae* Lin.) gleich. Sie sind theils Hochschildraupen, theils Flachschildraupen.

Erste Familie.

Hochschildraupen. Vieläugige Falter.

Diese Raupen sind bey ihrer Schild- oder Aftel-Gestalt fast durchaus gleich breit; der Kopf ist schwarz, der Rücken merklich erhoben, meist sehr schön gefärbt. Die Verwandlung geschieht inegemein an einem Pflanzenstengel; zuweilen doch auch nur halb unter der Erde. Die Puppe ist mehr länglich nackt, weißlich mit einigen, düstern Flecken auf dem Rücken, oder an den Seiten. Die Fügel der Falter sind auf der Oberseite wenigstens bey dem Männchen blau, bey dem Weibchen öfters braun, auch mit einer Reihe rothgelber Flecken am Hinterrand; auf der Unterseite sind sie immer graulich mit vielen schwarzen, meist weißeingefakten Puncten oder Augen.

Sie sind minder schädlich.

17. Der Faulbaumfalter. *Papilio Argiolus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Strepuncus, Linn. 790. 234. Müller. 626. 234.

Papilio Argiolus Lin. 790. 234. Müller. 626. 234.

— Wiener Bz. 184. Stro. 8.

Hesperia Acis, Fab. Ent. III. 1. 295. 124.

Papilio Argiolus Vorkhausen. I. 173. n. 8.

— Gleditsch II. 34. n. 10.

— Cleobis Systemat. Beschreibung. 268. 167.

Papilio

Papilio Argiolus Cyrelli Insecta Neapolitana. tab. 3. fig. 1.

— Degeer I. tab. 4. fig. 9 — 15. mit der Raupe.

— Cleobis Esper I. t. 54. fig. 4.

— Sulzers Geschichte ic. t. 13. fig. 13. 14.

Anmerkung. Er muß nicht mit *Argiolus Esperii* und *Fabricii* vermischt werden.

Kenntzeichen der Art. Männchen. Die Flügel sind rund, oben weißgesäumt, etwas hellblau, ohne breiten schwarzen Hinterrand, und unten weißlichgrau: so daß die Vorderflügel hinterwärts sechs längliche Striche in einer Bogenreihe; und die Hinterflügel einige verloschene Randpunkte und acht schwarze Quersflecken führen.

Weibchen. Eben so, nur ist oben der schwarze Hinterrand der Vorderflügel breiter, ihre Mitte hat einen Punct, und die hintern haben einen schwarzen Vorderrand und Randpunct. Auf der Unterseite haben die Vorderflügel noch einige schwache Randsprenkel an der Flügelspitze.

Raupe. Rund, gelbgrün, mit einer dunkelgrünen Linie über dem Rücken, einem kleinen und glänzenden Kopf und dergleichen Füßen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Falter misst in der Ausbreitung 1 Zoll und $\frac{2}{3}$ Linien, und hat hellblaue Flügel, wovon die vordern beim Weibchen einen schwarzen Mittelpunct und einen ziemlich breiten, schwarzen Randsaum, die hintern aber bey eben demselben einen schwarzen Vorderrand und dergleichen Randpunkte haben. Er unterscheidet sich von allen übrigen Bläulingen dadurch, daß er auf der weißgrauen Unterseite anstatt der Augen bloße Punkte oder Striche hat. Derselben sitzen nämlich sechs in einem Bogen auf den vordern; und auf den Hinterflügeln sind hinten verloschene Randpunkte, worauf 8 schwarze Quersflecke in einer abgesetzten Reihe, dann noch 3 dergleichen in einer geraden Querslinie, und hinter denselben noch einer an der Wurzel folgt. Auch haben alle Flügel einen schwarzen Mittelstrich. Bey Varietäten sind die schwarzen Randpunkte der Hinterflügel mit verblichenen gelben Ringen eingefast; bey einigen haben diese Hinterflügel keine schwarze Rand-Einfassung; bey andern haben alle vier Flügel keine dergleichen; bey einigen schillert die Oberseite ins Röthliche; bey andern ist dieses Röthliche mit einem blauen Reif überzogen, mit und ohne einen schwarzen Mittelstrich.

Die erwunde, gelbgrüne Raupe hat eine dunkelgrüne Rückenlinie, einen kleinen, schwarzen, glänzenden Kopf und dergleichen Füße. Ihr ganzer Körper ist mit äußerst feinen, nur durch die Lupe sichtbaren Härchen besetzt.

Die Puppe ist glatt, ohne Ecken, vornen grün, übrigens braungemischt, mit einer schwarzen Rückenlinie: sie ruhet 14 Tage.

Aufenthalt. Der Falter fliegt zu Ende des May, durch den Junius bis Anfang des Julius in lichten Waldungen, und erwählt keine niedrige Pflanze, sondern hohe Blumen- und Baumzweige zu seinem Sitz. Die Raupe nährt sich vom Faulbaum (*Rhamnus frangula*, Lin.).

Anmerkungen. 1. Wegen seines Aufenthalts auf Ferkunträutern berühren wir hier den Wirbelfalter, Wirbelkrautfalter, *Papilio Damoetas*, Wener Beschreibung 183. n. 7. Er ist zugleich *Papilio* des Verhauf. und Eipers tab. 33. fig. 1. (Schwerlich auch fig. 2.) und *Hesperia*

Cytlarus Fab. wo aber in seiner Entomol. III. 1. 294. 122. die Nachweisung von Mößel III. t. 37. ganz anzustreichen ist. Seine Flügel sind oben dunkelblau, bald mit breiterem, bald schmalerem Hinterande; unten hell aschgrau, und zwar die vordern mit einem Mitt-lirich und acht schwarzen, weißgerandeten, in einem Bogen stehenden, etwas großen Punctstrecken. Die sieben Puncte der Hinterflügel, die von der Wurzel an bis zur Hälfte sic grüulich färben, sind weit kleiner, und stehen in einer unregelmäßigen Bogenreihe. Die Raupe (vergl. Vorkhausens II. 235.) ist blaugrün, ins Gelbe fallend, und überall mit weissen Hördchen besetzt. Der Kopf und die Brustfüße sind schwarz, die Bauch- und Schwanzfüße grünlich braun. Sie hat eine röthliche Rückenlinie, und in den Seiten dunkelgrüne schräge Querlinien. Die Puppe ist braun, und ruht drey Wochen. Der Falter fliegt im Junius in Wäldern, wo dessen Raupe, die im May ausgewachsen ist, sich auf Ake, Pflaumentraut (Spartum separium) und Wirtelstrauch nährt, nachdem sie als junge Raupe überwintert hat. Das Insect ist von Hesperia Damoetas Fab. verschieden.

2. Der Stechginsterfalter, Papilio Argus L. n. 789. 232. Wiener Veri. Fabric. Systematische Beschreibung, Vorkhausens und Espers tab. 20. fig. 3. 4. der oben blauglänzend ist, auf den Hinterflügeln der Unterseite aber in einigen Augen silberglänzende Punkte führt, und von Gleditsch in seiner Forstwissenschaft hieher gezogen worden, ist kein schädliches Forstinsect, indem die Raupe nur auf dem deutschen Ginster (Genista germanica L.) wohnt.
3. Von dem weißgefleckten Eichenbläuling, Papilio Roboris Esper. tab. 103. fig. 4. aus der Gegend von Frankfurt ist die Raupe und ihre Nahrung gar nicht bekannt, obgleich der Falter von der Eiche benannt worden.
4. Alle übrigen Bläulinge, deren keine geringe Zahl ist, leben im Raupenstand sämmtlich nicht auf Bäumen und Sträuchen.

Zweyte Familie.

Flachschildebraupen. Kleinschwänzige Falter.

Die Raupen sind den vorhergehenden ähnlich, doch nicht so viel erhoben, vornen ein wenig breit, und zurück immer schmaler, durchaus mit sehr kurzen und feinen Haaren besetzt. Sie verwandeln sich insgemein auf einem Blatte, worauf sie ihren Hinterleib mit einem Gewebe anheften, und sonst sich noch durch einen querr über den Rücken gezogenen vielfachen Faden besetzigen. Die Puppe ist unterhalb flach, über dem Rücken sehr erhoben, durchgehends ein wenig rauch. Die Falter haben an den Hinterflügeln immer ein Schwänzchen, über demselben aber in dem Innenwinkel meistens ein anderes rothgelbes Fleckchen, unten eine weiße Querlinie, oder doch eine Reihe weißer Puncte. Das Männchen hat bey einigen Arten mehr Unterscheidungs-Merkmale; das stets bleibende aber ist nach Pezolds Bemerkung (Scriba Beyträge III. Heft. 3. ein kleiner schwarzer Punct, Stigma, ohnweit des Vorderrandes, in der Mitte desselben.

Anmerkung. Den Anfang macht hier der Brombeersfalter, Pap. Rubi L., der mehr nützlich, als schädlich ist, und in den Linne'schen, Wiener, Fabriciusischen (Hesp. Rubi), Gleditschens (II. 258.), Vorkhausens und Espers'schriften (tab. 21. fig. 2.) unter obiaem Namen und als Himbeersvogel, grüner Argus, Grünkling, vorkommt. Die Flügel, die in der Ausbreitung 1 Zoll 2 Linien breit sind, sind untermittlich geschwänzt, oben schwärzlich-braun, ungefleckt mit einem schwachen, grünlichen Schimmer, der ist ganz fehlt, unten schön hell

hellgrün, mit einigen kleinen, weißen Strichen an den Hinterflügel, so hievon eine Querreine bilden. Diese Querreine ist aber nicht das Merkmal des wirklichen Geschlechts, wie Fabricius glaubt, sondern der Mangel des schwarzen, vorhin angegebenen breiten, schwarzen Puncts am Vorderrand der Vorderflügel auf der Oberseite. Die Raupe, welche man in hiesigen Wäldern öfters auf der Farbergenisse, *Genista tinctoria* L. gefunden, und von andern auch auf dem Pfeifentraut und den Geißlee-Arten, *Cytisus*, desgleichen auf Brombeere & d. n. (welches doch fast bezweifelt wird,) angetroffen worden, wor hellzellig grün mit Gelb gemischt, vor einem, blasgrünem Kopf, dunkelgrünem Rückenstreif und im Julius ausgewachsen. Die braune, behaarte Puppe, welche das knurrende Geräusch, das auch Kleemann beobachtet hat, zu machen scheint, wenn man sie aus Ohr hält, und welches nur Täuschung ist, trachte gemeinlich von uns 10 Monate, nämlich von der Mitte des Julius bis in die Mitte des kommenden Monats. Doch zeigt sich der Falter auch zuweilen schon im April und weiterhin bis zu Anfang des Junius, auf Brombeere und andern Geißeln, auf Wald- und Bergwiesen und hat einen idiosyncratischen Flug. Schaffer hat eine Monographie dieses Insects, *Nezold in Scriba's Portraite* tab. 15. fig. 8 - 10. die Raupe, und Esper eben dieselbe nebst der Puppe I. tab. 93. fig. 1 - 4. geliefert; letzterer fand auch noch im Julius und September Spatlinge von diesen Raupen.

Weniger schädliche.

18. Der Birkenfalter. *Papilio Betulae* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Nierenfleck, Schilddügel, das letzte.

Papilio Betulae Lin. 787. 220. Müller 623. 220.

— — Wiener Verz. 186. 2.

— — Systematische Beschreibung 217. 127.

— — Borkhausen I. 143. 1.

— — Gleditsch, brauner Birkenvogel. I. 436.

Hesperia — Fab. Ent. III. 1. 277. 69.

— — Panzeri Fauna. 21. tab. 20. Weibchen.

Papilio — Esper. I. tab. 19. fig. 1. Weibchen.

Nöf. I. 2. Classe tab. 6. Weibchen, mit Raupe.

Schäfferi Icones. tab. 212. fig. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Falter. Die Flügel sind oben schillernd olivenbraun, und die hintern haben eine kleine, braun gelbe Schwanzspitze mit eben so gefärbtem, verhältnißmäßigem Innenwinkel, auf der gelben Unterseite aber eine rothgelbe Binde. Das Männchen hat auf seinen Vorderflügeln ein unmerkliches Schatten und ein Stigma ohnweit des Vorderrandes; das Weibchen aber einen großen, länglichen pomeranzfarbigen Fleck.

Larve. Grasgrün, mit erhabenen gelben Rücken- und Seitenstreifen, auch schrägen weißen Querreihen; sie ist oben gewölkt, unten platt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Männchen misst nach seiner Flügelausbreitung 1 Zoll 3 Linien, und ist auf der Oberseite eisfärbig olivenbraun mit einem unmerklichen Schatten und einem Stigma ohnweit des Vorderrandes. Das Weibchen misst 1 Zoll und 5 bis 6 Linien, und hat jeder Vorderflügel 9 Linien. Sein Kennzeichen ist der große längliche pomeranzfarbene Fleck auf der

der Oberseite. Beyde sind weißgesäumt, und führen auf der gelben Unterseite nahe am Vorderrand ein klein braunes, weißgerandetes Querc. Comma in der Mitte, und näher am Hinterrande noch einen größern Quersfleck mit einem weißen Strich. Die gelben Hinterflügel haben eine rothgelbe, von schwarzen und weißen Linien begränzte Binde.

Die Raupe ist ziemlich dickleibig, obgleich nicht so erhoben, als die Hochschildraupen, doch oben etwas gewölbt und unten platt, mit erhobenen gelben Rücken- und Seitenstreifen, auch weißen schrägen Quersstrichen. Kopf und Füße sind ganz versteckt. Sie überwintert im Ey, und verpuppt sich im Julius.

Die Puppe, die sich auf der untern Blattseite aufzuhängen pflegt, ist ohne Flecken und Spigen, glatt, stumpf, rund, von Farbe braun mit schwachen helleren Streifen. Die Puppenruhe dauert nach hiesigen Beobachtungen 3 bis 4 Wochen.

Aufenthalt. Der Falter fliegt im August, und zuweilen noch im September, in Gärten und Wäldern, jährlich einmal, obgleich Brahm im Insecten. Calendar S. 233. an zwey Generationen glaubt. Die Raupe nährt sich im May und Junius auf Rirschen, Pflaumen, Zwetschen, Pfirschen, Schlehcn; äußerst selten aber auf Birken, und liebt die mageren Blätter mehr, als die saftigern.

19. Der Eichenfalter. *Papilio Quercus* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blauschwanz, kleiner Blauschiller, kleiner Eichenfalter.

Papilio Quercus, Lin. 788. 222. Müller. 623. 222.

— — Wiener Verz. 186. 3.

— — System. Beschreibung. 221. 130.

— — Vorkauf. I. 136. 3.

— — Gleditsch I. 510.

Hesperia Quercus Fab. Entom. III. 1. 278. 72.

— — Panzeri Fn. 21. t. 21. Männchen.

Papilio — Esper I. t. 19. f. 2. mit Raupe.

Rösel I. 2. Classe t. 9. fig. 4. 5. Männchen. Aber die Raupe gehört nicht dazu.

Schäfferi Icon. tab. 158. fig. 4. 5.

Naturforsch. XIV. tab. 2. fig. 5. 6. Weibchen und Raupe.

Kennzeichen der Art. Falter. Alle Flügel sind oben schwarzbraun, unten aschgrau mit einem weißen Querstreif; an der Schwanzspitze der Hinterflügel stehen zwey kleine rothgelbe augige Flecken. Der männliche Falter hat aber von der Wurzel der Vorderflügel an einen starken, hellblauen schillernden Fleck; der weibliche schillert auf der ganzen Oberfläche, aber nur schwach und dunkler.

Raupe. Sehr flach und breit, sammethaarig und braungrau mit einer Reihe erhabner dreneckiger Flecken über dem Rücken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Falter mit dem hochblauen großen Schillerfleck misst 15 und der weibliche mattblau schillernde, dessen Grundfarbe, wenn das Licht darauf fällt, schwarzbraun ist, misst 1 ½ Linie, so daß jeder Vorderflügel 7 bis 8 Linien Länge hat. Beyde sind oben schwarzbraun, und unten schön aschgrau, so daß durch alle Flügel unten ein weißer etwas dunkel gesäumter Querstreifen läuft. Noch näher am Hinterrande zieht sich eine verlorne, fast

fast schattige, stellenweis gezackte Wellenbinde durch. Die Hinterflügel sind etwas geschwänzt, und von den zwey rothgelben Makeln ohnweit der Schwanzspitze ist die obere pupillirt.

Die sehr flach und breit gebaute, braungraue und sammethaariqe Raupe hat eine Reihe erhabner dreseitiger Flecken über dem Rücken. Sie ist im Monat Junius ausgewachsen.

Die Puppe ist braun und rund, und ihre Ruhe wähete bey mir vier Wochen.

Aufenthalt. Der Falter zeigt sich im Julius, selten im August noch, in Eichenwaldungen gewöhnlich; doch nicht jährlich. Die Raupe nährt sich ebenfalls von Eichenlaub, besonders an zarten jungen Blättern.

20. Der Pflaumenfalter. *Papilio Pruni*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleiner Schlehenschmetterling, Punctband, Schwarvenschwänzchen (beym Glabach), das Erste.

Papilio Pruni, Lin. 788. 221. Müller 623. 221.

— — Wiener Verz. 186. 4.

— — Systemat. Beschreibung. 220. 129.

— — Gorthausen I. 135. 2.

— — Gleditsch Forstwissenschaft II. 43. 109.

Hesperia — Fab. Ent. III. 1. 277. n. 79.

— — Panz. Fn. 21. t. 21. Männchen.

Papilio — Esper 1. tab. 19. fig. 3. Männchen tab. 39. fig. 1. Weibchen.

Nöfel I. 2. Classe t. 7. mit der Raupe.

Schäff. Icon. tab. 14. fig. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Falter. Alle Flügel sind olivenbraun und die hintern geschwänzt, oben mit rothen Randflecken beym Männchen nur auf den hintern, beym Weibchen auf allen Flügeln geziert. Die Unterseite zeigt zwey blaulich weisse Linien, und dazwischen eine beyderseits mit Schwarz und Blau gemischten Puncten besetzte rothe Querverbinde.

Raupe. Blasarün, mit sechs Paar kurzen fleischichten ungedornten braunen Rückenspißen und zarten Schrägeßtreifen in den Seiten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser olivenbraune Falter, dessen Hinterflügel geschwänzt sind, misst 1 Zoll 2 bis 4 Linien von einer Flügelßeise bis zur andern. Auf der Oberseite sind am Männchen nur die Hinterflügel, am Weibchen aber alle Flügel mit rothen Randflecken geziert, hinter welchen sich noch eine schmale blaue Querverbinde befindet. Die Unterseite aller Flügel zeigt zwey blaulichweisse Linien, und dazwischen eine beyderseits mit Schwarz und Blau gemischten Puncten besetzte, rothe Querverbinde. Einige Entomologen haben den angegebenen Geschlechtsunterschied aus Versehen umgekehrt. Varietäten haben eine breite blaue Binde über alle Flügel.

Die Raupe ist kleiner als die vorhergehende, Kopf und Füße sind aber nicht so versteckt. Sie kömmt aus überwinterten Eiern, und ist im May und Junius erwachsen.

Die

Die Farbe ist bleich grasgrün, und über dem Rücken erheben sich sechs Paar kurze braune fleischichte Spigen; und die schrägen Seitenstreifen sind zart und heller gefärbt.

Die Puppe ist kurz und dick, das Vorder- und Hintertheil stark getrennt, und bey diesem Einschnitt, so wie am Kopf weißgefleckt, mit einem solchen Rücken- und Seitenstreif, nebst kleinen Erhabenheiten des Hintertheils. Edmeider in der systematischen Beschreibung a. a. O. glaubt eine Ueberwinterung dieser Puppe, welches wohl nicht seyn kann. Denn ihre Ruhe dauert nur 14 Tage.

Aufenthalt. Der Falter, der im Junius an Gartenhecken und in Gärten fliegt, kommt jährlich nur einmal, und hat einen milchweißen Reinigungsast. Die Raupe nähert sich von den nämlichen Futterpflanzen, wie die des Birkenfalters. Die Eyer bleiben zehn Monate unentwickelt.

21. Der Schleimfalter. *Papilio Spini*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Papilio Spini Wiener Verz. 186. 5.

— Lynceus Systemat. Beschreibung 222. 131.

— Borkhausen I. 140. 8.

Hesperia Spini Fab. Ent. III. 1. 298. 71.

— Cerasi Fab. Ent. III. 1. 299. 74. wo Esper's Abbildung ohne Benennung nachgewiesen wird.

Pap. Lynceus Esper I. tab. 39. fig. 3.

Kennzeichen der Art. Falter. Die Flügel sind schwärzlich braun, und die hintern geschwänzt, am Schwanzwinkel mit einem rothgelben Puncte bezeichnet. Auf der Unterseite durchzieht ein schmaler weißer Querstreif alle Flügel, hinter welchem die hintern eine rothe Binde von ungleicher Breite haben. Das Männchen hat das Familien-Strigma, dem Weibchen fehlt dasselbe.

Raupe. Grün mit schwarzem Kopf und gelben aus einzelnen Flecken bestehenden Rücken- und Seitenlinien; sie wird, wenn sie erwachsen ist, röthlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Falter misst, der Flügelausbreitung nach, 1 Zoll und 1 Linie. Die Flügel haben mit dem Eichenfalter einerley Umriß. Sie sind schwarzbraun und etwas bläulich angestäubt. Die geschwänzten Hinterflügel sind am so genannten Schwanzwinkel mit einem rothgelben Puncte bezeichnet. Auf der Unterseite durchzieht ein schmaler, weißer Querstreif alle Flügel, hinter welchem die hintern eine rothe Querbinde haben. Diese ungleiche Querbinde am Hinterrand der Hinterflügel der Unterseite besteht aus 2 Puncten, dann dreyn rothen und zuletzt einer großen blauen Matel, alle besonders einwärts eingesenkt. Das Strigma des männlichen Falters ist oval und blau, steht an seiner gewöhnlichen Stelle, wie bey allen Faltern dieser Familie, nämlich an der Mitte des Vorderrandes der Vorderflügel.

Die Raupe ist grün, mit schwarzem Kopf und gelben, aus einzelnen Flecken entstandenen Rücken- und Seitenlinien; sie wird, wenn sie erwachsen ist, röthlich, und wurde dem Herrn Fabricius von Wien aus bekannt gemacht.

Die Puppe ist, nach eben demselben, oben braun, unten aschgrau und behaart.

Aufent.

Aufenthalt. Der Falter erscheint jährlich einmal bey uns im Julius, an Doen- und andern Bäumen, in und außer den Waldungen, doch nicht überall. Die Raupe äser sich auf Eichen als treuen.

Anmerkung. Dieser Falter ist nicht der *Lynceus Fabricii*, sondern führt bey ihm zwey andere Namen, *Spini* und *Cerasi*, bey letztem wird *Esper* nachgewiesen.

22. Der Steinelschenfalter. *Papilio Ilcis*, *Esperi*.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Papilio Ilcis Systematische Beschreibung 218. 128.

— — — Borkh. auct. I. 138. n. 5. II. 216.

Helperia Lynceus Fab. Ent. III. 1. 279. 73.

Papilio Ilcis *Esper* I. t. 39. f. 1. b.

Nöfels Insectenabtheilung I. t. 9. f. 1 — 3. nur die Raupe und Puppe; aber der Schmetterling gehört nicht hieher.

Kennzeichen der Art. Falter. Die Flügel sind olivenbraun, die hintern etwas geschwänzt. Unten zieht sich durch alle Flügel eine weiße, und um den Rand der Hinterflügel eine aus dreyeckigen rothgelben Flecken bestehende Binde. Das Männchen hat das markt schwarze Stigma. Weibchen, wie die andern; das Weibchen aber auf den Vorderflügeln oben eine gelbrothe Nierenmakel.

Raupe. Im erwachsenen Stand kurz und dick, oben rosenroth mit erhobenen schwarzen Makeln und mit dreyeckigen grünlichen Seitenflecken bezeichnet, unten aber an den Seiten gelblich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Falter misst, der Flügelausbreitung nach, 1 Zoll und $\frac{3}{4}$ Linien. Beyde Seiten sind olivenbraun. An den geschwänzten Hinterflügeln ist die Spitze orangengelb. Auf der Unterseite zieht sich eine weiße Querbinde durchaus, und um den Hinterrand der hintern noch eine weiße Linie, vor welcher eine Reihe dreyeckiger, rothbrauner, schwarz eingefasster Flecken steht. *Esper* und *Fabricius* eignen aus Versehen dem Männchen die Nierenmakel zu, durch welche sich das Weibchen kennbar macht, so wie sich das Männchen durch das schwarze Stigma verräth. Die im erwachsenen Stande kurze und dicke, oben rosenroth mit erhobenen schwarzen Makeln und mit dreyeckigen grünlichen Seitenflecken bezeichnete, unten aber an den Seiten gelbliche Raupe war von *Nöfel* verwechselt worden. Sie ist blaßgrün und kurz vor ihrer Verwandlung rosenroth. Sie kann ihren schwarzen Kopf und kleine Füße fast ganz einziehen, und sieht dann einem Gallapfel oder einer Blattheule ähnlicher, als einer Raupe. In der Mitte des Junius wird sie eine braunrothe, etwas gefleckte, und ganz cylindrischrunde Puppe, die vierzehn Tage oder auch länger ruht. Und wenn *Brahm* die Mitte des Mays zur Verpuppungszeit angibt, so mag dieß Ausnahme seyn.

Aufenthalt. Der Falter entwickelt sich und fliegt im Julius, zuweilen im August noch, in Eichenwaldungen, an blumenreichen Grasplätzen. Die Raupe lebt auf der Eiche und Zitterpappel.

Anmerkung. Der Ulmenfalter, *Papilio W.*, album, Knoch. Brahm's Insecten: Cal. I. 372. ist nach der systematischen Beschreibung S. 219. die den Herrn Senator Schneider zu Straßburg zum Verfasser hat, eine Varietät vom Steineichenfalter. Doch will Brahm dessen Raupe beobachtet haben, die nicht grün, sondern einfärbig braun, von dem Colorit als jene des Eichenfalters, *Quercus*, doch schmaler und kleiner sey, mit einer doppelten Reihe von Rückenripfen, und auf Ulmen im Julius lebe, deren Puppenruhe 14 Tage, und die Flugzeit des Falters von dem Ausgang des Junius bis in den Julius dauere. Auch Vorkhausen II. S. 216. hält ihn für eine eigne Art. Alle Flügel sind ruffarbig, die hintern zweymal geschwänzt. Die Unterseite der Hinterrügel führt, nach Knoch in Braunschweig, ein aus vier Strichen bestehendes lateinisches W, mit einer satt orangefarbenen, fast mennichrothen Binde. Er fliegt in Niederdeutschland. Und künftige Erfahrungen werden mehr Aufklärung über seine Art, Rechte geben können.

23. Der Schwarzdornfalter. *Papilio Acaciae*, Fab.

Namen und Schriften.

Papilio Acaciae Vorkhausen II. 219. n. 10.
Hesperia — Fab. Ent. III. 1. 279. 75.

Kennzeichen der Art. Falter. Die Flügel sind schwarz- oder umbrabraun, die hintern geschwänzt. Auf der ins Aschgraue fallenden Unterseite zieht sich durch alle Flügel ein weißer Schmalstreif, und durch die hintern noch eine rothbraune Fleckenbinde von ungleicher Breite. Das Weibchen ist am After tiefschwarz gefärbt.

Raupe. Derjenigen des Steineichenfalters ähnlich, aber kleiner und grünköpfig.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügelbreite beträgt bey'm Männchen 10½ Linien, bey'm Weibchen 1 Zoll. Er ist zwar dem Steineichenfalter ziemlich ähnlich, aber allemal kleiner und mehr mattschwarzbraun. Der weiße Streif der aschgrauen Unterseite ist schmaler und durch die Vorderflügel nicht so bogicht. Bey der rothbraunen Fleckenbinde der etwas geschwänzten Hinterrügel eben dieser Seite steht einer oder zwey schwarze Puncte. Das Weibchen schillert ins Olivenfarbige, und hat auf den Hinterrügeln oben, nicht wie das Männchen 1 bis 2, sondern 3 rothe Flecken am Schwanzwinkel. Der tiefschwarz gefärbte After des Weibchens ist ein bleibendes Merkmal, um ihn von allen seinen Gattungs- und Familien-Genossen zu unterscheiden. Die grünköpfige Raupe ähnelt mit der des Steineichenfalters, und ist im Junius erwachsen. Die Verpuppungszeit ist vor Ausgang des Junius, und die Puppenruhe dauerte bey uns 3 Wochen. Das Insect ist noch nicht abgebildet.

Aufenthalt. Der Falter und dessen Raupe wohnen auf der Schlehenstaude und Kirschbäumen. Ersterer erscheint in der Mitte des Julius, hat nur Eine Generation, und ist nicht nur in Süddeutschland, sondern auch bey uns in Deutschland vorhanden, wiewohl er in vielen Jahren gar nicht gesehen wird.

Sechs und zwanzigste Gattung.

Die Schwärmer. Sphinges Lin.

Sie heißen auch: Dämmerungsfalter, Dämmerungsschmetterlinge, Abendvögel, Abendfalter, Pfeilschwänze, Sphinx, und ein Theil derselben: Unruhen, Bastard-Sphinx.

Die Kennzeichen dieser Gattung, die bey den Wienern die erste ist, sind nach Linne: Die Fühlhörner sind in der Mitte am dicksten und einigermassen dreyschneidig; die Flügel hängen im Ruhen abwärts, liegen dachicht, sind sehr schmal, die vordern in die Länge gestreckt, und die hintern sehr kurz; der Vorderleib ist flach gewölbt und sehr dicht mit Haaren bewachsen. Sie fliegen gewöhnlich in der Morgen- und Abenddämmerung mit einzigem Gesumse und haben einen etwas schweren Flug. Sie haben auch zwey Nebenaugen am Kopf, und eine Flügelfeder: Werkzeuge, die den Tag-schmetterlingen fehlen.

Die Fühlhörner, die nach unten zu geblättert sind, endigen sich in eine scharfe Spitze, und ihr Körper ist nach dem Verhältniß der Flügel groß und dick, und endigt sich spitzig. Sie sitzen fast nie auf den Blumen, sondern saugen schwebend die Säfte aus denselben. Jedoch bezieht sich dies alles eigentlich auf die 2 ersten Familien; die beyden letztern haben andere Eigenschaften. Daß durch obiges Saugen die Blüthen verderbt werden, wie Gleditsch in s. Forstwissenschaft II. 634. behauptet hatte, ist ungegründet. Die großen und unbehaarten Raupen, besonders der 2 ersten Familien führen 16 Füße, und über dem Afters einen harten und spizen Stachel, der bey den meisten Arten von beträchtlicher Größe ist, die auch Gelegenheit gegeben hat, diese Gattung Pfeilschwänze zu nennen. Sie verweilen sich in der Erde fast ohne Gespinnst, jedoch in einem mit Seide befestigten Gewölbe, in glatte, cylindrische, braune Puppen, an denen ebenfalls eine Schwanzspitze bemerkt wird. Die Eyer der Schwärmer sind mehr rund als länglich, ohne Rippen, Furchen und Kerben; nur glattschaalig.

Herr Fabricius hat die Schwärmer in drey Gattungen vertheilt. Seine Gattungskennzeichen sind: Der Schwärmer 188, Sphinx, hat zwey zurückgebogene und haarige Fressspitzen; die Spiralzunge ist hornartig, und bey den meisten herorragend; die Fühlhörner sind geschuppt. Der Winkelflügler 189, Selia, hat 2 zurückgebogene Fressspitzen, eine hervorgestreckte und abgestumpfte Zunge, und cylindrische Fühlhörner. Der Trägling 190, Zygaena, hat 2 zurückgebogene Fressspitzen, eine hervorgestreckte und borstenförmige Spiralzunge, und Fühlhörner, die in der Mitte dicker sind.

Da es in dieser Gattung, in Beziehung auf die Forstinsecten, Episkopf, Stumpfkopf, milchhaarige und Scheinpimperraupen gibt, so entstehen daraus vier Familien; die drey ersten Familien gehören zu den ächten linneischen und die vierte zu den unächtlichen linneischen Schwärmern.

Erste Familie.

Episkopfrauen. Zackenflügelige Schwärmer.

Sie heißen auch Phalänenartige Schwärmer, und die Raupen haben ein Horn auf dem Hinterleib, einen oben zugespitzten, fast dreieckigen Kopf, eine bloße, aber geriefelte Haut, und bleichgelbe Querstiche an den Seiten. Die Verwandlung geschieht unter der Erde ohne Gewebe. Die Schwärmer haben eine sehr kurze zweytheilige Zunge und ausgezackte Flügel.

Sie sind weniger schädlich.

1. Der Weidenschwärmer. *Sphinx ocellata*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Nachpfauenaug, Abendpfauenana, Glanzauge, Halbes Pfauenaug, Schnurrbock.

Sphinx ocellata Lin. 798. 1. Müller 635. 1.

— — Wiener Bz. 41. n. 1.

— — Fab. Entom. III. 1. 355. 1.

— — Borkhauf. II. 104. n. 1.

— — Gleditsch Forstwissens. II. 41. n. 12.

— — Rau Forstwissens. 283. S. 660.

— — Esper II. tab. 1. mit Raupe.

Rösel I. Nachvögel 1. Classe. tab. 1. mit Raupe.

Sulzers Kennzeichen 1. 15. f. 89. Schaff. Icon. 99. fig. 5. 6.

Kennzeichen der Art. Schwärmer. Erstflügelig, mit einem violetten Auge auf den rosenrothen Hinterflügeln. Nur die Fühlhörner des Männchens sind stark gekerbt oder sägezähnig.

Raupe. Einsam lebend, geschwänzt, chagriniert und blaulichgrün; mit weißen, schrägen Seitenstreifen und gelben Augenpunkten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser eckflügelige Schwärmer misst von einer Flügelspitze zur andern 3 1/2 Zoll, jeder Vorderflügel hat 1 Zoll 8 Linien Länge. Diese Vorderflügel sind oben röthlichgrau mit braunen, wolkigen und wellenförmigen Zeichnungen. Jeder rosenrothe Hinterflügel prangt am Schwanzwinkel mit einem großen, violetten Auge. Alle Flügel sind unten braungrau und hell bandirt, doch ist die innere Hälfte der vordern rosenroth. Die Spiratzunge ist sehr klein; der Brustkasten und Hinterleib sind wie die Flügel gefärbt; ersterer hat oben ein sammetbraunes Viereck. Das Weibchen unterscheidet sich nicht nur durch den dicken, und von Farbe schwächer braunen Hinterleib, sondern auch vorzüglich durch die Fühlhörner. Diese sind beim männlichen Schwärmer dieser Art und die folgenden: *Quercus*, *Tiliae*, *Populi*, *Pinastri*, *Ligustri* und *Fuciformis*, wie ich (Scharfenberg) bereits in *Scriba Journal* S. 235 angegeben habe, sehr deutlich gekerbt, und sägezähnig, beim weiblichen aber unmerklich, oder gar nicht gekerbt.

Diese Art sitzt bey Tage still und träge, so daß sie sich leicht ohne Netz sammeln läßt, eben so wie der Windenschwärmer, *Sphinx convoluti* Lin., der im Jahr 1775. bey Eisenach erst im May, hernach zu Ende des Augusts so häufig auf dem Markte und außer

aufser der Stadt sich einsand, daß es recht comisch aussah, wenn die Jungen solche in Zehntelstücken mit vorgestreutem Futter zum Dr. Kühn brachten. Vorher hatte sich der Pöbel für diesen geglaubten Fledermäusen, als einer neuen Landplage, gefürchtet *).

Die einsam lebende, geschwänzte, chagrinierte und bläulichgrüne Raupe mit weißen, schrägen Seitenstreifen ist zwey Zell und vier Linien lang, hat einen kleinen, dreyeckigen, dunkelgrünen Kopf und am ersten Glied ein eben so, gewöhnlich aber blau gefärbtes Schwanzhörnchen. Die drey vordersten Ringe haben keine Schrägs. sondern drey weiße oder gelbweiße Längslinien. Die Augenpunkte oder Lustlöcher in den Seiten sind ebenfalls gelb. Sie pflegt vielmals in die Höhe gerichtet zu sitzen, und variirt zuweilen ins Gelblichgrüne, mit einer doppelten Reihe rother Flecken in jeder Seite. Eine ähnliche Varietät hat Rösel III. tab. 38. f. 4. abgebildet.

Die Puppe ist braun mit Schwarz vermischt, und ihre Ruhe dauert bald 7, bald 9 Monate. Bey mir dauerte sie von der Mitte des Septembers bis in die Mitte des Junius im folgenden Jahr.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Schwärmer findet sich im May und Junius in Gärten an niedrigen Bäumen, oder auf Wiesen an Weiden, auch wohl des Abends an den Blüthen der Coniceren-Arten und des wilden Jasmins. Die Raupe, welche in ungleichen Bruten vom Julius bis September da ist, sitzt auf Aepfel-, Weiden-, Alner-, Linden- und Espenbäumen, und Schlehensträuchen, wohin das Weibchen seine Eier auf die Unterseite der Blätter im Junius bis zum August einzeln legt. Diese sind nicht kugelförmig, sondern oval und grün; auch die jungen Käupchen sind grün, und ihre eigene Eierschale ist, wie bey mehreren Raupen-Arten, ihre erste Speise.

2. Der Eichenschwärmer. Sphinx Quercus, Vienn.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

- Sphinx Quercus Wiener Bz. 41. und 244. tab. 1. a. f. 1. Raupe. t. 1. b. Weibchen.
 — — Fab. Entom. III. 1 350. n. 3.
 — — Vorkhaus. II. 108. n. 3.
 — — Esper II. t. 19. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Vorderflügel sind grau, nagezählig, mit vier schwärzlichen Linien bezeichnet, und die Hinterflügel rosenroth und ausgeschweifte. Die langen Fühlhörner sind wie am vorhergehenden stark sägezählig.

Weibchen. Die Vorderflügel sind im Grund ockergelb mit 2 oder 2½ bräunlichen Querstreifen; die Hinterflügel in der Nähe der Wurzel bis über die Mitte röthlich; hierauf folgt eine weiße Fläche, die den zimmerfarbenen Hinterrand begränzt.

U u 2

Raupe.

*) Von diesem hier im Vorhangehen berührten Windenschwärmer erzählt Gleditsch (Zammetterlinge S. 31.), daß ihm 1775 beim Fange eine Raupe bei sich gewesen sey. Und ob kann aus seiner Erfahrung behaupten, daß sich meine Raupen täglich in

der Abenddämmerung bey meiner Geißblatt-Hütte einsand, und die Kieferndwärmer und Windenschwärmer mit den Krallen weagend und sie als eine große Delikatess verzehrete. Sie versäumte keinen Abend. V.

Raupe. Sattgrün, chagriniert, mit dreieckigem Kopf, grüner Schwanzspitze und gelbweißen Schrägestreifen an den Seiten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Schwärmer misst 4 Zoll und 3 Linien nach der Flügelbreite, und die Länge eines Vorderflügels beträgt 1 Zoll, 11 Linien. Bey dem männlichen Schwärmer sind diese grau, nagezählig (am Hinterrand) mit vier schwärzlichen Linien bezeichnet, und die Hinterflügel rosenroth und ausgeschweift. Die Fühlhörner sind stärker sägezählig und weißgestielt, und der Körper hat ein sehr helles, ins Gelbe fallendes Grau. Am weiblichen Schwärmer werden die ockergelben Vorderflügel durch zwey olivenbraune, von einem Schatten begleitete Querstreifen in 3 ungleiche Felder getheilt, wovon das mittlere flacher ist. Die Hinterflügel sind in der Nähe der Wurzel bis über die Mitte röthlich; hierauf folgt eine weiße Fläche, die den zimmetfarbenen Hinterrand begränzt. Seine weißen, einwärts braungekehrten Fühlhörner sind schwächer als diejenigen des Männchens. Die Unterseite von beyden Geschlechtern hat wenig Zeichnung, nämlich nur ein blasses Ockergelb mit 2 braunen Schattenlinien.

Die Schwanzspitze der Raupe ist im Wiener Werk grün gemahlt, und im Text blaßblau beschrieben. Ueberhaupt hat dieselbe viel Aehnlichkeit mit der nächst vorhergehenden und mit derjenigen des Pappelschwärmers. Die Lustlöcher sind roth, die gelblichweißen Schrägestreifen wechselsweis breit und schmal, die sechs Klauenfüße feuerroth und die Bauchfüße grün.

Zur Verwandlung begibt sie sich in die Erde. Ihre braune Puppe misst 1 Zoll und 5 Linien und hat rothe Ränder, und die Puppenruhe dauert nach den Wienern drey bis vier Monate, nach Vorkhausen 3 Wochen.

Aufenthalt. In Ungarn und Oesterreich, aber auch da sehr selten, weswegen Sammler sie um sehr hohe Preise bezahlen. Die Raupe liebt nur die jungen Blätter des Eichbaums.

3. Der Lindenschwärmer. *Sphinx Tiliae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Lindensauger, Lindenabendfalter, Lindenvogel, Lindenmotte.

Sphinx Tiliae, Lin. 797. 3. Müller 636. 3.

— — Wiener Bz. 41. n. 3.

— — Fab. Entom. III. 1. 358. 10.

— — Vorkhausen II. 110. n. 4.

— — Gleditsch I. 309. 1. und II. 94.

— — Esper II. t. 3. und t. 23. f. 3. mit Raupe.

Rösel I. Nachtvogel 1. Classe. tab. 2. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Schwärmer. Eckflügelig, sattgrün und neblig bündert mit gelblichrothbraunen Hinterflügeln.

Das Männchen hat sein Kennzeichen an den Fühlhörnern, wie die vorigen.

Raupe. Einsam lebend, geschwänzt, chagriniert, vornen schlank und geschmeidig, und grün mit rothen und gelben Schrägestreifen an den Seiten.

We.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects.
 Der Schwärmer hat von einer Flügelspitze bis zur andern 2 Zoll und 9 Linien Breite, zumal das Weibchen; jeder Vorderflügel aber 1 Zoll 2 Linien Länge. Die Grundfarbe des Körpers ist gewöhnlich blaßgrün, ändert aber sehr ab. Nimmt man bey dessen achtflügeligen, oder nagezahnigen, sattgrünen Vorderflügeln diese Farbe als Grundfarbe an, so ziehen 2 mattfleischfarbene, beiderseits hellgerandete Klächen dieselben in ungleicher Breite, und an der Flügelspitze steht auch ein so gefärbter Fleck. Man kann aber auch das Fleischfarbene zum Grund annehmen. Die Vorderflügel sind schön rothgelb gefranzt. Die Varietäten sind unzähliger Art, indem einige einen ockergelben, andere einen röthlichgrauen, wieder andere einen weißen Grund, und statt des grünen ausgeschweiften Mittelbandes ein brandgelbes haben. Eben so viel wechselnd sind die Farben des Bruststückens. Die ausgeschnittenen Hinterflügel sind gelblich rothbraun, einige aber schwärzlich mit ockersfarbiger Randbinde. Die Unterseite variiert eben so mit Grünlich und mit Rostbraun; mit Dunkeloranien gelb, das mit 2 weißen oder blassen Binden geziert ist. Die Füßhüfner sind weiß mit braunen Zähnen.

Die zwey Zoll und fünf Linien lange Raupe ist einsam lebend, geschwänzt, chagrinirt, vornen schlank und geschmeidig, grün mit rothen und gelben Schrägestreifen, an den Seiten. Ihr Horn ist gewöhnlich blau, zuweilen doch auch grün. Ueber dem After hat sie einen körnigen Kranz. Vor ihrer Verwandlung färbt sie sich hellviolett oder auch röthlich, wo dann die Seitenstreifen verblichen. Sie wird in der Erde zu einer schwarzbraunen Puppe, deren Ruhe, wenigstens bey denen, die ich erzog, 10 Monate dauerte.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Dieser träge Schwärmer wird im May an den Stämmen der Bäume und der Grashalmen in der Nähe derselben, und Abends auf den Arten der Lonicere gesehen. Es gibt jährlich nur Eine Generation. Das Weibchen legt gemeinlich auf ein hundert Eyer, die grün und glatt sind. Die Raupe aßt vom Junius bis in den September auf Linden am meisten, aber auch auf Apfel-, Birnen-, jungen Birken- und Kistern-Bäumen, aber allemal auf dem höchsten Gipfel derselber.

Feinde. Sie werden eine vielmalige Beute der Raupentödter (Zehrwespen), wodurch viele als Puppen noch zu Grunde gehen.

4. Der Alberschwärmer. *Sphinx Populi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pappelschwärmer, Zahnflügel, Kreuzmotte, Grauer Schnurrebock, Lannengluck, Pappel-, Abendfalter.

Sphinx Populi, Lin. 797. 2. Müller 636. 2.

— — Wiener B. 41. 4.

— — Fab. Ent. III. t. 351. 9.

— — Vorthaus. II. 106. 2.

— — Nau Fortwissens. S. 283. S. 661.

— — Gleditsch I. 540. 2. II. 42.

— — Esper II. t. 2. mit Raupe. t. 36. f. 10. das Ep.

Möfel III. tab. 30. mit Raupe.

Sepp Inf. III. 3. t. 1. mit Raupe. Schäfferi tab. 100.

Kennt-

Kenzeichen der Art. Schwärmer. Die Flügel sind stark gezähnt, zurückgebogen und grau, oben dunkelschattirt und gewellt; die vordern mit einem weißen Punct, und die hintern an der Wurzel rothfarben.

Das Männchen ist wie die vorhergehenden an den Fühlhörnern kennbar.

Raupe. Einsam lebend, geschwänzt, chagriniert, grün, beyderseits mit einem Seitenstreif und sieben gelblichweißen Schrägestreifen bezeichnet.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügelbreite beträgt $3\frac{1}{2}$ Zoll bey großen Exemplaren, und die Länge eines Vorderflügels $1\frac{1}{2}$ Zoll. Die Grundfarbe der stark gezähnten Flügel ist grau mit dunkeln Schattirungen und Wellenlinien, wovon einige durch alle Flügel laufen. In der Mitte der vordern steht ein weißer Halbmond; die hintern sind an der Wurzel rothbraun. Die gelblichweißen Fühlhörner sind inwendig braun gezähnt, und zwar beyhm Männchen stärker. Der ganze Körper ist wie die Flügel gefärbt. Das Männchen trägt den Hinterleib gerne über sich gekrümmt. — Die Varietäten haben bald eine dunkle, bald eine helle Mischung, bald eine fleischfarbene Grundfarbe. Es gibt auch ganz aschgrau ohne alle Zeichnung. Desgleichen findet man auch Schwärmer von der halben Größe; einen solchen hat Esper tab. 22. f. 2. abbilden lassen; man weiß nicht gewiß, ob es eigene Art ist. Vorkhausen II. S. 181.

Die $2\frac{1}{2}$ Zoll lange, einsam lebende, chagrinierte, grüne, beyderseits mit einem Seitenstreif und sieben gelblich weißen Schrägestreifen bezeichnete Raupe kann wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Weidenschwärmerraupe gar leicht selbst von Sammlern mit solcher verwechselt werden; so ähnlich sehen sich beyde. Sie unterscheidet sich vorzüglich von jener, daß unsere von Kopf an bis zur Mitte schlanker gebaut ist. Einige häuten sich in allem 3, andere 4 bis 5 mal. Man findet auch Varietäten mit vielen rothen Flecken.

Sie wird in der Erde zu einer dunkelgrauen, hinten rothbraunen Puppe, deren Ruhe im Sommer nur 3 bis 4 Wochen, wenn sie aber überwintert, 7 Monate dauert.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Schwärmer erscheint jährlich zweymal, so wohl im May, als im August; an Weiden, Pappeln und allerley Sträuchen, und zu Abends an Blumen, welche er nicht im Flug, sondern sitzend besaugt. Das Weibchen legt nach der Begattung glänzendgrüne, runde Eyer, die sich in 2 oder 3 Wochen entwickeln, und deren erste Nahrung die Everschalen selbst sind, so wie sie auch bey Häutungen ihre abgelegte Haut sogleich verzehren und alsdenn die frischen Blätter angehen.

Die Raupe aßt auf Espen, Schwarz- Weiß- und Italienischen Pappeln, und nach einigen auf jungen Birken. Die eine Generation ist im Julius zur Verwandlung reif, die zweyte wird es zwischen dem September und October.

Zweyte Familie.

Stumpfkopfraupen. Ringleibige Schwärmer.

Die Raupen haben platt abgeschnittene eyrunde Köpfe, eine bloße, glatte Haut, ein langes krummes Horn auf dem Hinterleibe. Die Verwandlung geschieht unter der Erde

Erde ohne Gewebe. Die Schwärmer haben lanzenförmige unausgezackte Flügel, starke Nützling u., die sich meistens durch eine nadeln förmige Erhöhung auch an der Puppe zeigen. Auf dem ganzen Leibe wechseln zu beiden Seiten schwarze und helle Querstreifen ab.

A. Die mehr schädlichen.

5. Der Riefenschwärmer. *Sphinx Pinastri*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Tannen-Abendfalter, Söprenschwärmer, Fichtenschwärmer, Fichtenvogel, Spitzflügelige Fichtenmotte, Tannenkäferschwanz.

Sphinx Pinastri, L. in. 802. 22. Müller 642. 22.

—	—	Wiener Berg. 41. 3.
—	—	Fab. Ent. III. 1. 367. 35.
—	—	Borkhausen II. 101. 4.
—	—	Gleditsch I. 399. II. 629.
—	—	von Ueslar forstwissenschaftliche Bemerkungen. 209.
—	—	Mau Forstwissenschaft. 284.
—	—	Balthers Forstphysiographie. 378. n. 2.
—	—	Däzel Forstwissenschaft I. S. 297.
—	—	von Lyncker besorgter Forstmann. 138.
—	—	Becksteins Naturgeschichte der schädlichen Waldinsecten. I. Seite 9. mit Abbildung.
—	—	Becksteins Musterung 10. 169. mit Abbildung.
—	—	Eiper II. t. 12. mit Raupe, und t. 36. das Ey.
—	—	Hommel vom Raupefraß t. 2. f. 10. — 12. mit Raupe.

Nöfel I. Nachtvogel 1. Classe t. 6. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Schwärmer. Die schwarz- und weißgefranzten Flügel sind unausgezackt und greisgrau, die vordern mit drey dicken, schwarzen Strichen, der braunschwarze Hinterleib hat weiße Gürtel. Das Männchen ist, wie die obigen, an seinen Fühlhörnern kenntlich.

Raupe. Geschwänzt, mit einem rostbraunen Längsstreif über dem Rücken, woran herdersseits grüne und weiße Längsstreife sich hinziehen; die Lustlöcher sind rostbraun und augenähnlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Schwärmer mißt drey Zoll und fünf Linien, und ein Vorderflügel allein der Länge nach einen Zoll sechs Linien. Vom Kopf bis zum Hinterrande mißt er anderthalb Zoll. Alle Flügel sind unausgezackt und lanzenförmig, bald greisgrau, bald bräunlich aschgrau mit eingestreuten schwarzen Atomen. Die drey länglichen Striche auf den vordern sind bald schwarz, bald schwarzbraun. Zuweilen sieht man eine gekrümmte schwarzbraune Querbinde oder doch einen Schatten davon. Die Franzen sind weiß und schwarzwechselnd. Die weißen Fühlhörner haben braune Zähnen, sind aber beim Männchen stärker als beim Weibchen. Ueber den mit weißen Gürteln versehenen, schwarzbraunen Hinterleib zieht sich ein breiter aschrauer, durch eine schwarzbraune Längslinie geteilter Rückenstreifen. Auf der Unterseite ist der Körper weiß und die Flügel einsärbig aschgrau. Sein Flug ist schnell.

Die 2 Zoll 9 Linien messende Raupe ist geschwänzt, hat einen rostbraunen Längsstreif über den Rücken, woran beyderseits grüne und weiße Längsstreifen sich hinziehen; die Luftlöcher sind rostbraun und Augenähnlich, und ihr Raupenstand währt nur 30 Tage. Kössel, der sie 1744 zuerst kennen lernte, nennt ihren rothen, mit Gelb umzogenen Kopf einen Heuschreckenkopf. Sie verpuppt sich nach einer 4 maligen Häutung im September am Fuß der Föhrenbäume in der Erde, und die mit einer Saugrüsselscheide versehene, große, $\frac{1}{2}$ Zoll dicke und $\frac{1}{2}$ Zoll lange, braune Puppe überwintert, und ihre Puppenruhe dauert mandymal 10 Monate.

Aufenthalt. Der in ungleichen Zeiträumen vom Junius, bisweilen schon vom May an bis in den August, jährlich nur einmal erscheinende Schwärmer sucht in seinem Trauerpuge die Blüthen der verschiedenen Conicereen-Arten, und die Blumen des Reiffenfrauts, Federnelken und Levkojen auf, um sie schwebend zu besaugen. Die Larve oder Raupe nährt sich fast bloß allein von der Kiefer, besonders den jungen Nadeln nicht ganz junger, sondern älterer Bäume. Doch schreibt D. Zinke im besorgten Forstmann, daß sie sich auch von der Weiß- und Rothanne nähre.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt seine Eyer im Junius oder Julius in ziemlicher Anzahl, aber einzeln an die Nadeln der Kiefer, worauf aus diesen gelblichen ins Grüne fallenden, glänzenden, ovalrunden Eiern, die die Größe eines Hirsekorns haben, in zehn bis vierzehn Tagen sich die 2 Linien lange, mit einem zweygebelligen Horn gezierte Räupchen sich entwickeln. Nach der vierten und letzten Häutung wird die Hornspitze einfach *).

Feinde. Die Zehrwespen stellen ihr nach; sodann die Fledermäuse, Nachtschwalben, Spechte, kleine Eulen. Die Eyer werden von den Zehrwespen, Meisen und Motacillen, die Raupen von den Meisen und Spechten fleißig aufgesucht. Auch die Kägen stellen den Schwärmern an Lauben vom Weißblatt nach.

Schaden und Mittel. Die sehr gefräßige Raupe erscheint, ohnerachtet sie nicht gesellig lebt, zuweilen in so großer Menge, daß sie ganze Kieferwälder kahl freist, so daß die Bäume verdorren. In ihrer frühen Jugend benagt sie nur die Spizen der Nadeln, weiterhin aber die ganzen. Doch sind ihre Verwüstungen nicht so beträchtlich, als diejenigen der Nonne, des Kieferspinners und der Forleure.

Zuweilen sind diese Schwärmer und ihre Raupen in solcher Menge vorhanden, daß der Forstmann allerdings alle Aufmerksamkeit anzuwenden hat, daß sie nicht überhand nehmen. Es sollte daher jeder Förster eine Laube von Je länger je lieber oder Weißblatt haben, zu welcher zur Blüthezeit gewiß diese Schwärmer aus der ganzen Gegend geflogen kommen. Man kann also hier nicht bloß bemerken, ob sie häufig sind, sondern sie auch leicht fangen und vertilgen. Im Walde bemerkt man unter den Bäumen durch den starken Unrath, wo sich die Raupen befinden, und kann die Bäume besteigen lassen und sie herab-

*) Ich habe auch Raupen gefunden, die kaum Rückenstreife hatten, sondern auf dem Rücken lauter röthliche Ringeln mit grau-röthlichen Zwischenräumen, wodurch der Rücken schön rost-

roth oder graulich in die Quere gestreift erschien, und die Schwanzspitze war eine kaum merkbliche schwarze Erhöhung. D.

herabschütteln. Auch bey Sturmwind und Nachregen werden sie herabgeworfen und können gerödet werden. Da die Raupen sehr gefräßig sind, so sieht man es auch schon von weitem an den entnadelten Reben, wo sie sich aufhalten, und kann sie abschütteln oder ablesen lassen. Die Puppen wählen die Schweine aus, und die Schmetterlinge schwärmen in die Nachseuer. Durch diese Mittel ist also ihrer Vermehrung dann zu steuern, wenn sie schädlich werden sollten.

B. Die weniger schädlichen.

Der hieher geordnete, nach unsern Exemplaren 4½ Zoll, nach Kiesel über 5 Zoll in der Flügelausbreitung messende, Etechapfelschwärmer, *Sphinx Atropos* L. Todtentopf, der in den Linn. Müller's Fabric. Vorkauf. Gleditsch's Esper. (II. tab. 7. mit Raupe) Panzer's und Kiesel'schen Schriften (III. tab. 1. 2. mit Raupe) vorkommt, hat schwarze, mit Ockergelb gemischte, Vorderflügel, mit einigen kleinern und größern, bräunlichen Flecken und Streifen, und einem kleinen weißen Tropfen auf dem bräunlichschillernden Mittelraum; ferner ockergelbe Hinterflügel mit 2 schwarzen Binden, und endlich einen sehr starken Hinterleib, dessen Rückenlängstreif schieferegeau, und jeder Ring mit einem schwarzbraunen Gürtel umgeben ist. Die auf dem schwarzen Brustücken sich erhebende Figur eines Todten schädels, und der durchs Reiben mit seinem Saugrüssel an der harten Brust entstehende laut, knarrende laut, sodann seine glühenden Augen u. s. w. machten ihn ehemals fürchterlich und bey'm Pöbel zu einem Unglückspropheten. Er entsteht aus einer vier Zoll, 3 bis 4 Linien messenden, citrongelben, in den Seiten mit blauen Schrägsstreifen gezeichneten Raupe, mit orangengelber Schwanzspitze, die sich auf den Blättern der Karoffel lieber als auf Etechapfel, Jasmin, den Solanumarten, Hanf, Erdbeeren, gelben Rüben, Fäberröthe und Waid nährt. Und da sie nur durch eine Ausnahme von der Regel, nach Hüesly und Scopoli auf dem Spindelbaum (*Eryonymus europaeus*) gefunden, nach andern auch mit Blättern vom Liguster, von Birn- und Maulbeerbäumen genährt worden: so kann dieß hier und da in Deutschland und andern Ländern erscheinende Insekt, das bald vier Wochen, bald über den Winter im Puppenstand bleibt, für kein eigentliches Forstinsekt gelten.

6. Der Rheinweidenschwärmer. *Sphinx Ligustri*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.
Ligusterschwärmer, Ligustervogel, Hartriegel.

<i>Sphinx Ligustri</i> Lin. 799. n. 8. Müller 637. 8.
— — Wiener Verz. 41. n. 2.
— — Fab. Ent. III. 1. 374. n. 55.
— — Vorkaufen II. 94. n. 2.
— — Gleditsch I. 272.
— — Esper II. t. 6. mit Raupe.
— — Panzeri Fn. 8. tab. 17.

Kiesel III. t. 5. mit Raupe.

Schäfferi Elementa t. 116. fig. 2.

Kennzeichen der Art. Schwärmer. Die Flügel sind unausgezackt, die hintern rosenroth und dreymal schwarz bandirt; der schwarzgeringelte Hinterleib ist auch roth. Die Fühlhörner machen das Männchen bald kenntlich.

Er

Raupe.

Raupe. Geschwänzt und grün, mit beyderseits schiefstehenden, sieben lilasfarbigen Seitenstreifen, die weiß eingefasst sind.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts. Das Ausmaß beträgt von einer Flügelspitze bis zur andern bey großen Exemplaren 4 Zoll und 5 Linien, und die Länge eines Vorderflügels beynähe 2 Zoll. Die Vorderflügel sind nicht sowohl röthlich braun als vielmehr zimmetbraun mit 4 oder mehr schwarzen, nicht ganz auslaufenden Längslinien und einem schwarzen Rundstrich stüt eines Mittelbündchens. Am Hinterrand läuft eine schwarze, geschlängelte, weißbegrenzte, und weiter in eine ganz weiße Querlinie durch die vordern; und durch die hintern, die von der Wurzel an, aber nicht durchaus reifenroth sind, drei breite schwarze Binden. Die weißen Fühlhörner sind bey'm Männchen kammförmig, der Vorderleib schwarzbraun; der Hinterleib schwarzgeringelt und roth; auch hat derselbe noch einen breiten, gelblichen Längstreifen und gelbrothe Luftlöcher. Die Unterseite des Insekts ist einsärbig grau, und die Flügel röthlich grau, mit einer schwärzlichen und einer weißen Binde.

Am Tage sitzt er still; des Abends wird er munter. Die Begattungszeit dauert, wie z. B. bey dem Weidenschwärmer, ziemlich lang, und nach dem Eyerlegen stirbt das Weibchen aus Entkräftung.

Dieser Schwärmer war der erste, der den mythologischen Namen: *Sphinx*, von seiner Stellung im Raupenstand, und zwar von *Reaumur* erhielt.

Die Raupe, die im August oder September ihre gehörige Größe, meist von 3½ Zoll Länge erreicht, ist geschwänzt und grün, mit 7 beyderseits schiefstehenden, lilasfarbigen Seitenstreifen, die weiß eingefasst sind. Man bemerkt, daß sie anfänglich keine merklichen Seitenstreifen hat, und glatt und sanft, nach der letzten Häutung aber sich chagrinirt anfaßt; ihre gekrümmte Schwanzspitze ist braunschwarz. Vor ihrer Verwandlung wird sie schmutzfarbig. Die braunrothe Puppe mit ihrer Rüsselscheide und vierzahnigem Schwanz ruht einen oder zwey Winter, ehe die Entwicklung erfolgt.

Ausenthalt. Der Schwärmer besucht und umflattert die Blüthen der *Loniceren*-Arten, worunter der Botaniker a) das Fe länger je lieber, b) das Weifblatt, und c) die gemeine Heckenrösche (*Lonicera periclymenum*, *Lonic. caprifol.* und *Lonic. xylosteum*) versteht, nebst dem Seifenkraut gerne. Die Raupe aßt auf der Rheinweide Glieder (*Syringa vulgaris*), *Lonicere*, nach *Fabricius* und *Linne'* auch auf dem schwarzen Hollunder (*Sambucus nigra*) und Eichen, und nach *Kleemann* zuweilen auf Weiden und Birken. In hiesigen Gegenden ist sie nicht.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt im Julius über vierhundert Eyer auf die Blätter. Solche sind nicht, wie anfänglich *Rösel* glaubte, kugelförmig, sondern länglich und von hellgrüner Farbe und glatt. Die Entwicklung aus den Eiern geschieht in 14 bis 16 Tagen, worauf sie, wie mehrere Arten, die Eierschale verzehren. Sie sind anfänglich hellgrün, nachher dunkler. Ihre Häutung geschieht von 6 zu 6 Tagen, zusammen viermal. Sie können nur in ihrer Jugend Fäden spinnen, und im Alter nicht. Im Jahr 1776 hatten sie sich vom Julius bis zu Ende des Octobers auf spanischem Hollunder bey Nürnberg zahlreich eingefunden, ohne jedoch zahlreich zu werden.

Dritte Familie.

Mischhaarraupen. Glasflügelige Schwärmer.

Fabricius'sche Glasflügler, Sesiæ.

Diese Raupen, so viel davon bekannt ist, haben einen halbkugelförmigen Kopf, einige auch ein Horn (Schwanzspitze) auf dem Hinterleib. Die Haut ist mit sehr feinen weißlichen Haaren besetzt. Die Verwandlung geschieht in einem Gewebe. Die Schwärmer haben keine Kollagen, am Ende des Leibes insgemein ein breites Haarbüschelchen, glasartige, durchsichtige Flügel; sie fliegen auch in der Sonne.

A. Ein mehr schädlicher.

7. Der Pappelholzwärmer. *Sphinx apiformis* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bienenförmiger Auenfalter, Bienenchmetterling, Bienen-Sphinx, kleiner Pappelbaum-Schwärmer.

Sphinx apiformis, Lin. 804. 29. Müller 644. 29.— *crabroniformis* Wiener Verz. 44. 2. und 305. n. 10 in der Ann. 1800.*Sesia apiformis* Fab. Ent. III. n. 382. n. 13.*Sphinx* — Borkh. II. 47. 17.

— — Nau Forstwissensch. 284.

— — Brahm's Inf. Calend. II. S. 13 — 16.

— — Walther's Lehrbuch der Forstsynographie. Hadamar 1800. S. 377.

— — Esper II. t. 14. 1. 2. Dann t. 29. und 36. mit Raupe.

— — Naturforscher 18. t. 5. fig. 7. 8. von Den. Capitex.

— — Sulzer's abgetragte Ges. tab. 20. fig. 6. Er ist ganz von *Sesia crabroniformis* Fabr. verschieden.

Kenntzeichen der Art. Schwärmer. Glasflügelig, mit einem schwarzen, gelbgeringelten Hinterleib und schwarzem Brustücken, der zwei gelbe Makeln hat an der Seite des Halses. Das Männchen ist an dem Federbüschelchen am After kennbar.

Raupe. Sie hat einen großen rothbraunen Kopf, einen schmutzigen platten Körper mit einer etwas dunklern Rückenlinie, und sieht einer Käferlarve ähnlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Schwärmer misst 1 Zoll und 8 Linien, und gleicht so ziemlich einer Hornisse. Die schwarzen Fühlhörner sind inwendig braun. Der Kopf hat ein gelbes Büschelchen, und der Brustücken ist schwarz. An beiden Seiten des Halses steht ein gelbes Dreieck. Die durchsichtigen Flügel sind sehr schmal und lang, und alle ihre Ränder rothbraun einschärfen. Die verdorrten haben einen Mittelfüß in die Quere. Fünf Ringe des Hinterleibes sind gelb mit schwarzen Einschnitten; zwischen denselben steht ein schwarzer. Das Männchen ist kleiner, aber sein Büschelchen am After stärker, gelb und beiderseits schwarzblau; das Weibchen hat statt desselben 2 sehr kleine Seitenbüschelchen.

Die Raupe, die einen großen, rothbraunen Kopf, und einen schmutzigen platten Körper mit einer etwas dunklern Rückenlinie hat, sieht einer Käferlarve ähnlich und rollt sich beim Berühren zusammen. Sie brinat nicht sowohl nach Esper einige

Jahre, als vielmehr nach Brahm nur neun Monate im Raupenstande zu: und wenn sie überwintert hat, ist sie in wärmern Gegenden schon im März, in kältern erst im May und Junius zur Verwandlung reis. Dann verfertigt sie sich am Fuß des Stammes, in dessen Holz sie gelebt, von Holzspänchen ein cylindrisches Gewebe, welches inwendig grau und glänzend wie Seide ist; einige Raupen aber bleiben auch in ihrem Schlupfwinkel im Baume stecken, um sich da zu verpuppen. Sie liegen aber $1\frac{1}{2}$ Monate in der Erde, ehe sie Puppen werden, wo sie dann dunkelrothbraun und länglich sind und viel Fruchtigkeit erfordern. Die Ruhe dauert 2 Monate.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Schwärmer erscheint in wärmern Gegenden in der Regel zu Anfang des Junius an den Pappelstämmen. Die Raupe, die inwendig im Holz der Espen, der Italiänischen und Canadischen Pappel, selten aber in Weidenbäumen lebt, sieht bald wie eine Käferlarve oder auch wie die Raupe vom Weidenholzspinner (P. B. Cossus) aus, und ist schwer aus ihren verborgenen Schlupfwinkeln heraus zu bringen. Am bequemsten verschafft man sich den Schmetterling durch Ausgraben der Puppe, die eine Querschnitt tief unter der Erde an den wüchsigen Pappelbäumen und deren Wurzeln steckt. Sie ist im Hennebergischen eine Seltenheit, und in manchen Gegenden, z. B. bey Mainz, in manchen Jahren gemein, in manchen aber nicht zu finden.

Zeinde. Ohngeachtet ihrer verborgenen und für äußern Verfolgungen scheinbar gesicherten Lebensart findet man die Raupe doch nicht selten mit Zehnwespen-Larven besetzt. Entweder paßt die Mutter hiezu den Zeitpunkt ab, wo die Raupe sich zur Verwandlung aus ihrer Verborgenheit heraus begiebt, oder sie folgt ihr auch in diese nach, und legt ihr den Samen zur Zerstörung in den Körper. Die Maulwürfe und Spitzmäuse finden sie auch auf ihren Gängen.

Schaden. Diese Schwärmer-Art ist den Forsten wohl nachtheilig. Denn nicht allein das Durchbohren richtet an und für sich schon die Bäume allmählig zu Grunde, sondern das durch die minirten Canäle eindringende Regenwasser bringt überdies den Stoff einer Fäulung in den Baum, an welcher er endlich absterben muß. Und Bäume, die sich in ihrem besten Wachsthum befinden, sind ihr eigentlicher Lieblingsaufenthalt. Man erkennt ihre Gegenwart an den theils unter dem Baume liegenden, theils vor den Canälen am Stamme hängenden Klumpen zermalmer Holzspäne, theils auch aus dem Wasser, welches bey anhaltendem Regenwetter durch die gebohrten Löcher dringt und den Stamm herunter rinnt.

Mittel dagegen. Specifische Verwahrungsmittel gegen ihre Beschädigungen sind noch nicht bekannt. Doch muß man den Schmetterling, wenn man ihn gewahr wird, tödten.

B. Die weniger schädlichen.

8. Der Streufelschwärmer. *Sphinx fuciformis* L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hummelschmetterling, Drönschwärmer, Hummelmotte, durchsichtiger Schwärmer, Scabiosenschwärmer.

Sphinx fuciformis Lin. 803. 28. Müller 643. 28.

Scsia

Fab. Ent. III. 1. Seite 381. n. 11.

Sphinx

Sphinx luciformis Wiener Verz. 44. n. 1.

— — — Vorkhausen II. 52.

— — — Esper II. t. 24.

Nöfel III. t. 38. f. 2. Schwärmer allein. Damm IV. t. 34. fig. 1. 2. Raupe.

Schäffl. Icon. t. 16. f. 1.

Kenzeichen der Art. Schwärmer. Der purpurrothe, schwarzbärtige Hinterleib hat eine gelbe Binde; die Flügel sind glasartig mit einem purpurrothen Saum und dergleichen winkelförmigem Strich in der Gegend des Mittelfeldes.

Raupe. Hellgrün, mit drei weißgelblichen Längslinien, wovon nur Eine über den Rücken läuft, und einer violetten Schwanzspitze.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Schwärmer misst einen Zoll und neun Linien, und die Länge eines Vorderflügels beträgt $\frac{1}{2}$ Linien. Die Fühlhörner sind stahlblau und glänzend; Kopf und Rücken gelbgrün beschuppt, der Hinterleib rothbraunbeschuppt; die letzten beiden Ringe desselben gelblichweiß. Man könnte auch den Hinterleib gelb nennen mit einem Purpurgürtel. Der After hat einen schwarzen Bart. Die vier durchsichtigen, purpurroth gesäumten Flügel, der winklige Mittelfrich und der gelbbraungefärbte Vorderrand unterscheiden diesen von einem ähnlichen, nämlich dem Schwebefliegen-Schwärmer, *Sphinx bombyliformis* Esper, dessen Ränder schwarz und schmaler gesäumt sind, und der kein Forstinsect ist. Ferner ziehen sich bey unserm durch die Flügel rothbraune Adern. Die Unterseite der Brust ist weiß, und die der Flügel mit der Oberseite gleichfärbig. Er fliegt schnell und bey Tage.

Die Raupe ist langleibig und hellgrün mit drei weißgelblichen Längslinien, wovon nur Eine über den Rücken läuft, und mit einer violetten Schwanzspitze. Sie ist in der Mitte des Julius zur Verwandlung reif, die sie mit oder ohne grobe, purpurfarbene Fäden, an oder in lockerer Erde antritt.

Die Puppe ist schwarzbraun mit gelben Einschnitten des Hinterleibes. Sie ruhet bey 10 und 11 Monaten, vielleicht auch länger oder kürzer.

Aufenthalt. Der Schwärmer erscheint jährlich zu verschiedenen Zeiten, im May, Julius und August und später. Ich (Scharfenberg) halte aber nicht dafür, daß es zwey Generationen sind, sondern wohl nur Ausnahmen von der Regel, weil die, so ich erzog, niemals in demselben Jahr sich entwickelten. Er besucht, sonderlich bey Aufgang der Sonne, die Blüthen des Weißblatts, der Syringa und des Seifenkrauts, dergleichen der Fledernelken und Latviolten schwebend, wo ihn mancher Nichtkenner für eine Hummel hält. Die Raupe lebt im Junius, Julius und August auf dem Labkraut (*Galium* L.) und der *Lychnis dioica* L., nach Friesly und meinen Erfahrungen auf der gemeinen Heckenfirsche, *Lonicera xylosteanum* L., die auch zuweilen Streufeln, und hier zu Lande vom gemeinen Volke Pfeifenböhrlchenholz und Weißböhrlchen genannt wird, und deshalb gehört sie zu den Forstinsecten. Scopoli und die Wiener fanden sie auf der Seabiose, davon sie solche im Deutschen benannten.

Anmerkung. Da Hr. Schneider in Straßburg bewiesen, daß der Esper'sche Schwebefliegen-Schwärmer, *Sph. bombyliformis* zugleich der Linné'sche wahre *luciformis* sey, so scheint Linné, der die ganze Neufeld'sche Tab. 39. nachweist, fig. 2. und 3. wo beide stehen, diese beiden für Varietäten einer Art gehalten zu haben. Die Raupen auf jener Tafel aber gehören nicht

nicht dazu. — Ferner ist auf Nöf. t. 34. f. 3. im IV. Band das Gehäuse einer Spinnerpuppe aus Versehen für ein Gehäuse unsers Schwärmers angegeben und abgebildet worden; es hatte sich in einer ihm zugeschlachten Schachtel befunden.

9. Der Johannisbeerschwärmer. *Sphinx tipuliformis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Echnadenschwärmer, Echnadenschwärmer, Zwerg, Salmachus, Getrippelter Zirkelsvogel (beim Gladbach).

Sphinx tipuliformis Lin. 804. 32. Müller 644. 32.

— — Wiener Verz. 44. 4. und Seite 305.

Sesia — Fab. Ent. III. 1. 385. n. 21.

Sphinx — Borkhausen II. 37. 4.

— — Esper II. t. 15. f. 3.

Schäfferi Icon. t. 224. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Schwärmer. Klein und glasflügelig, mit einem schwarzen Rand und Binde, einem dergleichen Bart am Hinterleib, dessen Einschnitte wechselsweis gelbgerandet sind.

Raupe. Dünnbehaart und weißlich, mit gelbem Kopf und Füßen, und einer dunklern Rückenlinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Schwärmer mißt seiner Flügelausbreitung nach nur sieben Linien. Kopf und Fühlhörner sind glänzend stahlblau. Eben so gefärbt ist die an den Seiten gelbgestreifte Brust und der Hinterleib, der drey gelbe Ringe hat. Durch die etwas goldschillernden, durchsichtigen, blaugerandeten Flügel ziehen sich 2 schwarzblaue Querbinden in die vordern. Der After ist buschicht oder schwarzbärtig, und das Insect variiert so wohl in der Größe gar sehr, als in Ansehung der Ringe, die zuweilen alle schwarz sind.

Die noch nicht abgebildete Raupe ist nach Fabricius dünn behaart und weißlich, mit gelbem Kopf und Füßen, und einer dunklern Rückenlinie.

Aufenthalt. Der Schwärmer fliegt im Junius und Julius in den heißen Mittagstunden zwischen 12 und 3 Uhr um die Johannisbeersträucher, wohin auch das Weibchen seine Eier legt. Ich (Scharfenberg) habe ihn im Hannoverschen vor 24 Jahren nur einmal wahrgenommen, nach der Zeit nirgends wieder.

Schaden. Die Raupe verursacht zuweilen das Abdorren großer Sprossen an denjenigen Johannisbeersträuchern, in deren Mark sie wohnt, nach den Berichten der Wiener Entomologen.

Vierte Familie.

Scheinspinnerraupe. Fleckichte Schwärmer; Fabriciusische Zogänen, Träglinge.

Die Raupe sind träge, haarig, gewölbt, meistens mit 2 oder 4 Reihen schwarzer Punkte, mit einem kleinen verdeckten Kopf und verdeckten Füßen. Die Verwandlung geschieht über der Erde in einer glänzenden, gewölbten Hülse. Die Schwärmer haben Hockzwagen (Saugrüßel), schwarze, fast geklebte Fühlhörner, und lange abhangende Flügel mit hochfarbigen Flecken. Sie fliegen nur bey Tage.

10. Der Rahneichenschwärmer. *Sphinx Phegea*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Phegea, Weißfleck, Ringelmotte, Würfelträger.*Sphinx Phegea* L. in. 808. 35. Müller 645. 35.

— — — — — Wtner Berg. 45. 9. und Nachtrag S. 307.

Zygaena Quercus Fab. Ent. III. 1. 358. 6. wo Fabricius *Eipera* t. 27. Stott 17 anführt; in seinen frühern Schriften: *Phegea*.*Sphinx Phegea* Vorkhausen II. 3. n. 1

— — — — — Brahm Insecten-Calender II. 431.

— — — — — Gleditsch II. 224.

— — — — — Eipert II. t. 27. f. 2.

— — — — — Naturforscher 18. t. 5. f. 5. 6. Raupe und Puppe.

Zygaena — — — — — Panzeri Fauna 5. t. 19.

Kennzeichen der Art. Schwärmer. Die dunkelblauen, ins Röthliche spielenden Flügel haben durchsichtige Punctmakeln, die vordern 6, die hintern 2; der Hinterleib hat einen gelben Gürtel. Das Männchen hat in seinen Flügeln mehr Glanz; das Weibchen mehr größere Punctflecken auf den Hinterflügeln.

Raupe. Braun, mit rothem Kopf und Füßen, und auf dem Rücken mit vielen Haarbüscheln und Knöpfen besetzt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß ist 1 Zoll und $\frac{1}{2}$ Linien. Der männliche Falter hat dunkles, ins Röthliche spielendes Blau (welches Linne' grünschwarz nennt) in seinen Flügeln. Sechs weiße Flecken stehen in den Vorderflügeln so: erstlich einer an der Wurzel, dann zwey in der Mitte, endlich drey nach dem Hinterrande. Von den zwey Flecken der Hinterflügel ist der eine sehr klein. Der weibliche Schwärmer ist eben so, aber weniger glänzend; und die Hinterflügel haben mehr und größere Punctfleck. Ein gelber Gürtel befindet sich an dem blauen Vorderleib und dem Hinterleibe beyder Geschlechter. Der Flug ist, wie bey allen Träglingen, träge. Die braune Raupe mit rothem Kopf und Füßen, welche Frisch zuerst entdeckt, und in ihrer Jugend mit Mehl genährt hatte, zeigte auf acht Gliedern des Rückens, auf jedem 4 Federknöpfe, und sechs bloße schwarze Knöpfe, am After nur Einen. So waren auch die Exemplare, die ich (Scharfensberg) von einem fernem Freund erhielt, und die bey uns bis in den December größtentheils noch lebten, die aber nach und nach in der Ueberwinterung drauf gingen. Gewöhnlich sollen sie im Junius ihr völliges Wachsthum erhalten.

Aufenthalt. Der Schwärmer besucht, nachdem er sich im Julius entwickelt hat, die blumenreichen-Wiesen und die Graeplätze der Wälder. Die Raupe aßt nach den Wiener Entomologen auf Ampfer, spitzigem Wegerich, und Blumen so wohl als Blättern des Kriechzahns (*Leontodon Taraxacum* L.); nach Capienx zu Leipzig auf Teufelsabbiss (*Scabiosa succisa* L.). Vorzüglich und gewöhnlich aber nährt sie sich jung im Herbst von den Blättern des Löwenzahns, womit ich sie ebenfalls fütterte; und erwachsen im May des drauf folgenden Jahres von Labkraut (*Galium verum* L.). Dies durch Zufall und als Ausnahme von der Regel hatte sich einstmahl eine Partey derselben bey den Wienern vom jungen Eichenlaub genährt; daraus machte Fabricius

die

die Schlussfolge, daß sich diese Raupe häufig auf Eichen in Deutschland finde; wovon doch niemand etwas wissen will. Man könnte das Insect also wohl ganz aus der Zahl der Forstinsecten weglassen.

11. Der Sichelklee-Schwärmer. *Sphinx Ephialtes*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Buntes Rothsfleck, und die Varietät: Kronwicken-Schwärmer, rother Zirkelvogel (beym Gladbach).

Sphinx Ephialtes Lin. 806. 36. Müller 645. 36.

— *Falcatae* Wiener W. 45. n. 6.

— *Coronillae* Wiener W. 45. n. 7.

Zygaena — Fab. Ent. III. 1. 388. n. 8; in seinen frühern Schriften: *Ephialtes*.

Sphinx Coronillae Vorkhausen II. 8. 4.

— *Ephialtes* Vorkhausen II. 10 n. 7. Und S. 155. von der Raupe.

Zygaena — Panzeri Fn. 5. f. 20. Weibchen.

Sphinx — Esper II. tab. 33. f. 2.

— *Ephialtes* Esper II. t. 2. fig. 3.

— — Naturforscher 10. tab. 2. fig. 3.

Kennzeichen der Art. Schwärmer. Schwarzblau; die Vorderflügel haben 6 rothe Punctflecken, die hintern einen; der Hinterleib hat einen rothen Gürtel.

Raupe. Fein behaart, bald gelb, bald grünlich, mit schwarzem Kopf und Füßen; mit zwey deutlichen schwarzen, und einer undeutlichen dergleichen längereihen von Flecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß dieses schwarzblauen Schwärmers ist wie beym vorhergehenden 1 Zoll und $\frac{1}{2}$ Linien. Er hat in seinen Vorderflügeln sechs rothe Punctflecken, in den hintern einen; und am Hinterleib einen rothen Gürtel. Zuweilen sind alle sechs Puncte der ins Dunkelgrüne ziehenden schwarzblauen Flügel roth; zuweilen sind die 2 Puncte an der Wurzel roth, die 2 folgenden gelb, und die letzten 2 weiß, und der Gürtel des schwarzen Leibes ist blutroth. Sind aber die vier ersten Puncte weiß und die beyden letzten gelb, so daß der Leibgürtel auch gelb ist: so sind das Kennzeichen des Kronwicken-Schwärmers, *Sphinx coronillae*, welchen Fabricius für eine Varietät von unserm erklärt. Die noch nicht abgebildete Raupe ist nach Fabricius und Vorkhausen derjenigen des Steinbrech-Schwärmers, *Sphinx filipendulae* L. ähnlich, mit feinen weißen Härchen besetzt; von Farbe bald gelb, bald aus dem Schwefelgelben ins Grünliche fallend; mit 2 Reihen deutlicher schwarzer, und einer Reihe kaum sichtbarer, dunkler Flecken, einem schwarzbräunlichen Kopf und schwarzen Füßen; und spinnet sich zu Anfang des Junius in einem pergamentartigen, strohgelben Gehäuse ein, um sich nach 3 Wochen zu entwickeln.

Aufenthalt. In Sachsen, und besonders in Oesterreich, wo die Raupe eigentlich auf Sichelklee, dergleichen auf weichen Gras-Arten, auf Ehrenpreis und Klee ast. Als Forstinsect betrachtet man ihn, weil die Raupe nach Herrn Panzer a. a. O. auch auf Eichen angetroffen worden seyn soll.

Sieben und zwanzigste Gattung.

Die Phalänen. Phalaenae Linn.

Sie heißen auch: Nachtschmetterlinge, Nachrvogel, Nachtfalter.

Die Kennzeichen dieser Gattung, die die zweyte der Wiener Entomologen ist, sind nach Linne': Die Fühlhörner sind borstenförmig und werden gegen die Spitze immer dünner; sie haben meist dachförmig hängende Flügel, und sie fliegen zu Nacht.

Sie bedecken also nicht nur in wagerechter Stellung die Hinterflügel, sondern auch den Leib in dachförmiger oder abhängiger Richtung. Sie haben auch zwey Nebenaugen, Stemmata, wie die Schwärmer am Kopfe, und mit Ausnahme gewisser Familien, auch die Flügelfeder. Die Ausnahmen sind: die Spinner mit halboffenen und zurückgebogenen Flügeln, nämlich die mondmaflichten, psauenäugigen, zahnsflügelichten, zackenflügelichten, weißmakelichten, wollichten, schmalflügelichten und spannerförmigen Spinner; dann die Spinner mit flach ausgebreiteten Flügeln. Die Fühlhörner sind bey vielen mit Nebensafern versehen. Die Raupen und das Uebrige wird bey den Horden vorkommen.

Es sind nun die Fabriciusischen Gattungskennzeichen anzugeben, indem in elf seiner Gattungen mehr oder weniger Phalänen vorkommen, die Forstinsecten sind. Der Spinner, 191, Bombyx: Die zwey Fressspitzen sind zusammengedrückt und zurückgebogen; die Zunge ist kurz und häutig; die Fühlhörner sind fadenförmig. — Der Bohrer, 192, Collus: Die 2 Fressspitzen sind sehr kurz und cylindrisch; die Spitzzunge fehlt; die Fühlhörner sind kurz und fadenförmig. — Der Schmalflügler, 193, Hepialus: Die 2 Fressspitzen sind zurückgebogen und haarig; von einer zweytheiligen Zunge sind nur Spuren da, die Fühlhörner sind schnurförmig. — Die Eule, 194, Noctua: Die 2 zusammengedrückten und haarigen Fressspitzen haben eine cylindrische und unbehaarte Spitze; die Zunge ist hervorstreckt und hornartig; die Fühlhörner sind borstenförmig. — Der Spinner, 196, Phalaena: Die Fressspitzen sind cylindrisch, die Zunge ist hervorstreckt, oder verlängert und häutig, die Fühlhörner sind fadenförmig. Der Flachflügler, Lithosia: Die zwey Fressspitzen sind gekrümmt, indem das erste Glied zusammengedrückt und das zweyte gescheidet ist, die Fühlhörner sind borstenförmig. — Der Zünsler, Crambus: Von den vier Fressspitzen sind die vordern kürzer, auswärts dicker und schief abgestutzt, die hintern aber hervorstreckt und zusammengedrückt; die Fühlhörner sind borstenförmig. — Der Wickler, 197, Pyralis: Die Fressspitzen sind fast unbehaart, an der Spitze cylindrisch, in der Mitte cystförmig, an der Spitze pfriemenförmig; die Fühlhörner sind fadenförmig. — Die Motte, 198, Tinea: Von den 4 Fressspitzen sind die vordern unmerklich, die hintern hornförmig und zurückgebogen; die Zunge ist kurz und häutig; die Fühlhörner borstenförmig. — Das Langhörnchen, 199, Alucita: Die 2 Fressspitzen sind gekrümmt und sehr rau; die Fühlhörner sind verlängert und borstenförmig. — Das Hähnchen, Ypsolophus: Die beyden Fressspitzen sind hervorstreckt, in der Mitte breit, gebogen, spitzig und zurückziehbar; die Fühlhörner sind fadenförmig. — Das Weistchen, 200, Pterophorus: Die zwey Fressspitzen sind gleichbreit, die Zunge hervorstreckend und häutig; die Fühlhörner borstenförmig. —

Außerliche Kennzeichen von den Schmetterlingen hat Fabricius nicht angegeben; er hält solche für unsicher, ausgenommen von der Gattung der Flachflügler, Lithosia, von welcher er sagt: Der Leib ist mittlerer Größe, niedergebrückt, ungerandet, lebhaft; der Kopf klein und neben ausgehend, die Augen sind groß, kugelförmig, hervorragend, an der Seite und zwar aus einander stehend; die Fühlhörner sind länger, als der Vorderleib, stehen nicht benammen und sind am Wirbel eingefügt; der Vorderleib ist flach, kurz, rauh; die 4 Fühler sind sich gleich, flach, über einander geschlagen und länger als der Hinterleib; die Füße sind Gehfüße, die Vordersehenbeine sind an der Spitze einfach geordnet, und an den hintern doppelt geordnet.

Da Linne' alle Phalänen in acht Abtheilungen, nämlich in die der Acker-, Spinner, Eulen, Spanner, Zünsler, Wickler, Motten und Geißchen geordnet, und die Wiener Entomologen die 2 ersten zusammen geschmolzen haben: so bleiben 7 Abtheilungen oder Horden.

Die erste Horde der Phalänen. Die Spinner *). Phalaenae Bombyces, Lin.

Die Raupen dieser Horde haben sechzehn oder vierzehn Füße, sind größtentheils rauh, und spinnen zu ihrer Verwandlung ein Gewebe. Der Schmetterling, wenigstens das Männchen, hat gekämmte Fühlhörner, einen wollichten Rücken und meistens sehr rauche Vorderfüße. Die Spiralzunge ist kurz, und scheint gar einigen zu mangeln. Die fadenförmigen Fühlhörner sind beim Weibchen gekerbt. Die Hinterfüße sind auch rauh, nicht zu lang, theils unbewaffnet, theils kurz bespornt. Der Hinterleib ist fast von gleicher Dicke und am Ende zugrundet. Alles dieses zusammen macht den Habitus oder das äußerliche Ansehen eines Spinners aus.

Linne' und Esper nehmen zwar zum Kennzeichen der Spinner die kammförmigen Fühlhörner der Männchen an, und rechnen die Phalänen zu den Eulen, die ungekämmte Fühlhörner haben, und nicht zu den andern Horden achteen. Allein jenes Kennzeichen ist zu unsicher, widerspricht auch bei vielen, als der Matronula, Hera, fuliginosa, leporina, dem Habitus. Daher wir nach dem Vorgehen der Wiener und Vorkaufens auf jenes Kennzeichen in gewissen Fällen keine Rücksicht nehmen.

Die Raupen der ersten 16 Familien sind sechzehn- und der darauf folgenden zwei Familien vierzehnfüßig; und die von der letzten haben keine ordentlichen sichtbaren Füße. Es sind also Schweißwürmer, Stern-, Knospen-, Knöpfe-, Hals-, Würsten-, Echepe-, Halsband-, Pelz-, Haar-, Halbhaar-, Holz-, Wurzel-, Schweulen-, Scheinspanner-, Buckel-, Gabel-, Eris- und Schneckenraupen.

Erste

*) Man gebraucht: Spinner, statt Spinners phalänen, um der Kürze willen, so auch Eule für Eucyphaläne u. s. w. Man stoße sich nicht an die mit Eulen, Buchen u. s. w. zusammengesetzten Wörter, als Hageiche, Kohn-

eiche, Steineiche, Hammbuchen, Hagbuchen; sie sollen nicht so wohl die Arten der Eichen und Buchen, als vielmehr die vielerley Arten der von denselben sich nährenden Raupen andeuten.

Erste Familie.

Scheinschwärmerraupen. Monemastelichte Spinner.

Diese Raupen sind grün; meistens mit gerieelter Haut, oder sonst, was Kopf, Schwanz und die Striche betrifft, den Schwärmerraupen ähnlich. Die Verwandlung geschieht in einer gewebten Hülse unter der Erde. Die Spinner sind jungenslos, haben abhängige Flügel, auf den vordern gewöhnlich zwischen 2 geschwungenen Querstichen ein weißes oder schwarzes Mondfleckchen, nicht selten auch am Innenrand eine zahnförmige Hervorragung.

Weniger schädliche.

1. Der Hagebuchsenspinner. *Phalaena Bombyx Versicolora*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Buntflügel, bunter Nachfalter, Echeiflügel, Eisenmotte, Erlenfalter, ziegelrother Vär, rarer Zimmervogel (beym Gladbach).

Phalaena Bombyx Versicolora, Lin. 817. 32. Müller 660. 32.

Bombyx	—	—	Wiener Ver. 49. n. 2.
Phal. Bomb.	—	—	Fab. Ent. III. 1. 427. 64.
—	—	—	Gorthaus. III. 42. n. 5.
—	—	—	Gleditsch I. 437. n. 7. und II. 44.
—	—	—	Esper III. t. 32. mit Raupe.

Bombyx — Panzer Fna. II. t. 21. Männchen t. 22. Weibchen, zu klein.

Phal. Bomb. — Naturf. 14. t. 3. f. 1 — 5. Männchen und Raupe.
 Rösel III. t. 39. f. 3. Weibchen. Sulzer abgekürzte Geschichte der Insecten t. 21. fig. 4. Männchen.

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Flügel sind rückwärts gebogen, mit weißen, schwarzbegrenzten Streifen besetzt und dunkelzimmtfarbig, das Bruststück eben so gefärbt, aber vornen her weiß, die Hinterflügel einmal gestreift, und nebst dem Hinterleib fuchsroth.

Weibchen. Die Zeichnung ist eben so; nur ist die Grundfarbe der Vorderflügel heller; der Hinterleib und Hinterflügel aber weißlich.

Raupe. Etwas geschwänzt, hagriniert, grün, gelbpunctirt, mit hellen, schiefen Seitenlinien.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner misst 2 Zoll 5 Linien; jeder Vorderflügel hat 1 Zoll 1 Linie Länge. Alle Flügel sind rückwärts gebogen, zimmetfarbig mit weißen, schwarzbegrenzten Streifen besetzt. Von den zwey Streifen der Vorderflügel ist der hintere gebogen, und der vorderste rückt durch die Hinterflügel fort. Zwischen beyden ist ein schwarzes U oder auch Halbmond. Am Vorderrand stehen drey weiße Flecken, wovon zwey dreieckig sind. Der Vorderrücken ist zimmetfarben, aber vornen her weiß. Der Hinterleib und die Hinterflügel sind nach hiesigen Exemplaren ganz fuchsroth, letztere nur mit einem kleinen weißen Fleckchen am Rande bezeichnet.

Das Weibchen, zumal nach großen Exemplaren, mißt 3 Zoll 2 Linien, und jeder Vorderflügel hat 1 Zoll 5 Linien Länge. Dasjenige in der Panzerschen Fauna ist kleiner, nämlich von $2\frac{1}{2}$ Zoll Flügelbreite. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist heller, als am Männchen, und die Hinterflügel sind nebst dem mehr wollichten Hinterleib weißlich. Bey beyden Geschlechtern ist der Kopf und Brustücken rost- oder dunkelzimmtfarben, und die schwarzen Fühlföhner gekämmt.

Die grüne, chagrinierte, gelbpunctirte Raupe mit hellen schiefen Seitenlinien ist nur mit einer weichen pyramidenförmigen Erhöhung geschwänzt, also nicht nach Art der Schwärmer-raupen. In der Jugend ist sie dünnhaarig und lebt eine Zeitlang gesellig. Wenn sie im Julius erwachsen und der Verwandlung nahe ist, so färbt sie sich braun, und spinnt sich in der Erde unter dem Moos in einem Gewebe ein. Ihre Puppe ist dunkelschwarz mit kurzem rauhen Stachel. Die Ruhe dauert 8 Monate.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Spinner erscheint vor oder zu Anfang des Mays gewöhnlich in Wäldern und ist selten. Das Weibchen legt grüne Eyer, die hierauf schwefelgelb und zuletzt rosenroth werden, reihenweis an die äußersten Aeste der Birkensträucher. Die Raupe lebt und nährt sich auf denselben, und auf Haynbüchen, Linden, Haseln und Erlen.

Feinde. Sie sind den Zehrwespen und den Fadenwürmern sehr ausgesetzt: daher sie sich nicht stark vermehren können.

Anmerkungen. 1. Hier ordneten die Wiener ihre Bicoloria, weil sie die Raupe noch nicht kannten, vermöge der sie nun zur vierten Familie gehört. 2. Noch drey andere Spinner: a) Tremula Lin. b) Tremula Vienn. oder Trepida Esp. und c) Dodonea Vienn. welche Schifferrmüller, als er das Wiener Verzeichniß verfertigte, zu diesen zählte, sind späterhin von ihm und seinen Mitarbeitern in die Familie der rückenzähnichten Spinner versetzt worden, wohin sie auch nach Herrn Vorkhausen gehören.

2. Der Hageichenspinner. Phalaena Bombyx Querna, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Phalaena Bombyx Querna	Wiener W. 49. 5.
Bombyx — —	Fab. Ent. III. 1. 449. 131.
Phal. — —	Vorkauf. III. 435. 163.
— — —	Vorkhausen in Scriba Beyträgen t. 7. f. 4. Weibchen.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel sind schwärzlich aschgrau mit drey tiefschwarzen weißgerandeten Wellenlinien; vor deren letztern ein weißlicher Mondfleck steht; die Hinterflügel sind weißlich.

Raupe. Unbehaart, grün; viermal in die Länge linirt; mit schwarzen kufel-förmern und einem Höcker am Hinterende.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll 8 Linien; jeder Vorderflügel hat $9\frac{1}{2}$ Linien Länge, und ist schwärzlich aschgrau mit drey tiefschwarzen weißgerandeten Wellenlinien, davon die erste an der Wurzel die kleinste ist, und nicht ganz durchzieht, und vor der letzten steht ein weißlicher Mondfleck. Die Hinterflügel sind weißlich und die Fühler

Fühlhörner roßbraun. In den Scribaischen Beiträgen ist er, so wie alle Schmetterlinge dafelbst recht nach der Natur gezeichnet sind, gut getroffen.

Die Raupe soll nach Fabricius unbehaart, grün und viermal in die Länge liniert seyn, auch schwarze Lufelöcher und einen Höcker am Hinterende haben.

Aufenthalt. Diese noch nicht abgebildete Raupe lebt nach Fabricius auf der Eiche in Oestreich, desgleichen im Herzogthum Berg, und zwar bey Solingen.

3. Der Spateichenspinner. *Phalaena Bombyx Oblitera.*

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Verblichener Spinner.

Phalaena Bombyx Obliterata Vorkhausen III. 437. 165.

— — — *Esper* III. t. 46. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel sind dünnschuppig, die Grundfarbe bey'm Männchen mehr, bey'm Weibchen weniger verloschen blaßbraun; die Wurzel ist weißlich. Bey'm Hinterrand ist ein weißlicher, schwarzgerandeter Wellenstreif, und vor demselben der weißliche, verloschene, Familien-Mondfleck, die Hinterflügel sind bräunlich. Das Männchen hat gefiederte Fühlhörner.

Raupe. Grün, mit einigen gelben Linien bezeichnet.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt 1 Zoll und 8 Linien, und hat dünnschuppige Vorderflügel, deren Grundfarbe bey'm Männchen mehr, bey'm Weibchen weniger verloschen blaßbraun ist, und an der Wurzel weißlich wird. Bey'm Hinterrand ist ein weißlicher, schwarzgerandeter Wellenstreif, und vor demselben der weißliche, verloschene Familien-Mondfleck; die Hinterflügel sind bräunlich. Die Unterseite aller Flügel hat einen weißlichen verloschenen Schattenstreif. Kopf, Brustücken und Fühlhörner sind roßfarbig, letztere bey'm Weibchen fadenförmig; der Hinterleib ist gelblich braun.

Die grüne, mit einigen gelben Linien bezeichnete Raupe ist noch nicht abgebildet. Ihre Verwandlung geschieht in der Erde, wo sie als dunkelbraune Puppe überwintert.

Aufenthalt. Der Spinner lebt im Frühjahr in Wäldern, und seine Raupe auf Eichen, bey Frankfurt am Mayn.

Anmerkungen. 1. Nach schriftlichen Nachrichten wollen die Wiener Entomologen unter unserer Phaläne ihre *Ph. B. Dodanaea* verstanden wissen, wenn sie sich nicht übereilt haben.

2. Unsere *Oblitera* muß von *Geometra Obliterata* in Gleditsch Forstwissens. unterschieden werden, welche kein Forstinsect ist.

4. Der Steineichenspinner. *Phalaena Bombyx Chaonia*, Vienn.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Steineichennachtsfalter, weißgestreifte Eichenphaläne.

Phalaena Bombyx Chaonia Wiener Verh. 49. 7.

Noctua Roboris

Fab. Ent. III. 2. 35. 90.

Phal.

Phal. Bomb. Chaonia Borkh. III. 433. 162.

— — — — — Rau Forstwissensch. Seite 304.

— — — — — Roboris Esper III. t. 49. f. 4 — 7. mit Raupe.

Nöf sel I. Nachvögel 2. Classe. tab. 50. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel sind schwärzlich grau, mit drey weißlichen, schwarzgesäumten, wellenförmigen Querstreifen; zwischen dem mittlern und letztern steht der schwarze Familien-Halbmond in einem weißgrauen Fleck; die Hinterflügel sind hellgrau.

Beym Männchen sind die rothfarbigen Fühlhörner stärker gefiedert als bey dem Weibchen.

Raupe. Sehr geschmeidig, unbehaart und glänzend grün; jede Seite führt eine, und der Rücken 2 gelbe Längslinien.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst 1 Zoll und 8 Linien, jeder Vorderflügel in die Länge 8½ Linien. Die Vorderflügel sind schwärzlich grau, mit drey weißlichen, schwarzgesäumten, wellenförmigen Querstreifen; zwischen dem mittlern und letztern steht der schwarze Familien-Halbmond in einem weißgrauen Fleck; die Hinterflügel sind hellgrau. Beym Männchen sind die rothfarbigen Fühlhörner stärker gefiedert als bey dem Weibchen. Der Kopf und Vorderleib ist wie die Vorderflügel gefärbt, der Hinterleib bräunlich und die Unterseite grau. Er variiert mannichfaltig; bald mit einem weißen, einer Binde gleichenden Feld, worin eine schwarze Zackenlinie sich befindet; bald mit rothbrauner Grundfarbe; bald ohne Mondmakel.

Die Raupe ist auf der Oberseite heller, auf der untern dunklergrün, sehr geschmeidig, unbehaart; jede Seite führt eine, und der Rücken 2 gelbe Längslinien. Nach Brahm verpuppt sie sich im Junius, nach andern im August, in eine schwarzbraune, glänzende Puppe in der Erde und überwintert in ihrer 9 monatlichen Ruhe.

Aufenthalt. Der Spinner im April in Eichenwäldungen in Deutschland, bey Frankfurt und in vielen andern Gegenden, auch zuweilen bey uns. Die im Junius ausgewachsene Raupe lebt auf Eichen.

5. Der Klebepappelspinner. *Phalaena Bombyx Crena.*

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rappenförmigbandirter Spinner, Klebeichenspinner.

Phalaena Bombyx Crenata Borkhausen III. 439. 167.

— — — — — Brahm II. 157. von der Raupe.

— — — — — Esper III. tab. 47. f. 3. 4.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel sind hellbräunlich-grau, mit einer bey dem Männchen gelblichen, bey dem Weibchen gelbgrauen, beyderseits rappenförmig eingeschnittener und braunbegrenzter Querbinde am Hinterrand, die sich durch einen braunen Strich in zwey theilt, die Hinterflügel sind weißgrau. Das etwas kleinere Männchen hat rothbraune gekämmte Fühlhörner und mattere Zeichnung.

Raupe.

Raupe. Lichtmeergrün und ungeriefelt; die Rückenlinie und der Längstreif in jeder Seite sind blaß.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt anderthalb Zell, ist kl. hier als *Chaonia*, aber an Gestalt ihr ähnlich. Die Vorderflügel sind hellbräunlichgrau, mit einer beim Männchen gelblichen, beim Weibchen gelbgrauer, beydeſeits kappenförmig eingeschnittener und braunbegrenzter Querbinde am Hinterrand, die sich durch einen braunen Strich in 2 theilt. An der Wurzel sind einige wolkichte, braune Zeichnungen. Die Franzen sind lichtgrau und braungefleckt, und die Hinterflügel weißgrau. Die graue Unterseite hat nichts Auszeichnendes, gewöhnlich nur einige düstere Schattenstreife. Kopf und Rücken sind bräunlich. Beim Weibchen sind die roßbraunen Fühlhörner fadenförmig. Die zweytheilige Binde ist bey Varietäten auch wohl gelbgrau.

Die unabgebildete, lichtmeergrüne, ungeriefelte Raupe, deren Rückenlinie und Längstreif in jeder Seite blaß sind, ist im August erwachsen, um sich zu Ende desselben in ein weißliches, dichtes und sehr weirschichtiges Gespinnst, worin die kleine, glanzlose, schwarze, breitgedrückte und abgestumpfte Puppe liegt, einzuspinnen, welche dann überwintert. Die Puppenruhe dauert 9 Monate.

Aufenthalt. Der Spinner zeigt sich im April an Birkenstämmen und Pappeln. Die Raupe aßt auf der Schwarzpappel nach Brahm, der sie erzogen. Man hat keine Nachricht, daß sie auch auf Eichen wohne.

Anmerkung. Die Abänderung der vormaligen Benennungen: *Obliterata* und *Crenata*, in *Crena* und *Oblitera* verdient aus dem Grund Entschuldigang oder Beyfall, weil man Spanner: Emdungen bey zwey Spinnerphalänen vermeiden wollte; doch steht es jedem Leser frey, die vormaligen Namen beizubehalten.

5. Der Rothbuchenspinner. *Phalaena Bombyx* Tau, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Tau, T. Vogel. Taumachtalter, Nagelstreck, Steindecker, Schieferdecker.

Phalaena Attacus Tau Lin. 811. 8. Müller 653. 8.

Bombyx — Fab. Ent. III. t. 418. 36.

Phal. Bombyx — Wiener Verz. 49. 8.

— — — Borkhausen III. 38. 4.

— — — Esper III. t. 5. mit Raupe.

Rösel IV. t. 7. f. 3. 4. III. t. 68. f. 1. Raupe. t. 70. junge Raupe.

Kenntzeichen der Art. Spinner. Nur halbseffen, beim Männchen rothgelben, beim Weibchen ockergelben Flügeln; alle vier mit einem violetten Auge, das statt des Augenstrahls einen weißen Nagel hat. Die rothbraunen Fühlhörner sind beim Männchen feder- oder fahmsförmig, beim Weibchen fadenförmig und gekerbt.

Raupe. In der Jugend blafgrün mit hochcarminrothen Dornen, im Alter hellgrün, ungedornet, etwas viereckig, uneben, hagrünirt, mit weißen Schrägestrichen und einer Längelinie am Bauch.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Männchen misst in die Breite 2 Zoll 5 Linien, jeder Vorderflügel in die Länge einen Zoll 2 Linien, das Weibchen in die Breite 3 Zoll 4 Linien, und jeder Vorderflügel 1 Zoll 7 Linien. Die halboffenen, mit einem violetten Auge gezeigten Flügel, sind beim Männchen alle rothgelb, beim Weibchen ockergelb. Jedes Auge hat statt der Pupille ein weißes Nagelfleck; und ist an den Hinterflügeln größer. Nicht weit vom Hinterrand durchzieht ein schwarzbrauner Streif alle Flügel, die im Vorderwinkel, das ist, an der Flügelspitze einen weißen Fleck haben. Unten sind die Vorderflügel wie oben, und die hintern weißlich gefärbt, mit theils schwarzbraunen, theils weißen Atonen und einer ungleichbreiten, das Nagelfleck einschließenden Querverbinde und einer sehr hellen Randbinde. Kopf, Füße und Hinterleib sind mit den Flügeln gleichfarbig. Die rothbraunen Führlhörner sind beim Männchen fadenförmig, beim Weibchen fadenförmig und gekerbt.

Die blaßgrüne Raupe hat in der Jugend fünf carminrothe Dornen, als ein Paar auf dem ersten, 1 Paar auf dem dritten, und einen einzelnen auf dem elften Glied. Diese Dornen sind zwey- oder dreyspitzig und gelenksam. Sie verschwinden in der dritten Häutung, wo alsdenn die Raupe fast viereckig, uneben, chagriniert, hellgrün, erscheint, mit weißen Schrägestrichen und einer weißen Bauchlinie, in welcher auf dem vierten Ring ein rothgelb eingefasster Porus sich zeigt. Die Verwandlung geschieht gewöhnlicher im August, als im September in einem lockeren Gewebe in der Erde, oder auch Moos. Die länglichrunde Puppe ist rau und hinten zugespitzt; die Stachel des Hinterleibes sind kurz, aber scharf. Sie überwintert, und ihre Ruhe dauert 3 Monate.

Aufenthalt. Der Spinner in Laubwäldungen im April und May, zur Tageszeit, wo er auch zuweilen in die Dörfer und Städte fliegt. Die Raupe frisst auf Haynbüschen (*Carpinus betulus* Lin.) am liebsten, dann auch auf Eichen, Buchen, Birken, Ahornen, und nach Esper auch auf wilden Kesseln. und Birnbäumen, in den Sommermonaten.

Zweite Familie.

Sternraupen. Pfauenaugige Spinner.

Diese Raupen haben auf jedem Ring 6 mit Haaren gleichsam gesternte Knöpfe. Die Verwandlung geschieht in einer birnförmigen sehr harten Hülle über der Erde. Die Spinner sind jungelos mit flachverbreiteten augigen Flügeln.

Sie sind weniger schädlich.

7. Der Birnspinner. *Phalaena Bombyx Pyri*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Großer Nachtpfau, großes Nachtpfauenaug.

Phalaena Attacus Pavonia maior, Lin. 810. 7. Müller 653. 7.

Bomb. Pyri Wiener Verz. 49. n. 1.

Bombyx Pavonia maior Fab. Ent. III. 1. 416. 32.

Phal. Bomb. Pyri Vorthausen III. 27. 1.

Pavonia maior Esper III. t. i u. 2. mit Raupe.

Nöfel IV. tab. 15 — 17. mit Raupe, desgleichen tab. 23.

Kennt.

Kennzeichen der Art. Spinner. Zungenlos, und auf den fast bandirten, hellaschgrauen Vorder- und röthlichgrauen Hinterflügeln mit einem etwas durchsichtigen Augenfleck geziert; gegen die Wurzel läuft eine gerade, dunkelrothbraune Linie schräg durch. Die ockergelben Fühlförner sind bey'm Männchen mit Fasern stark gekämmt, bey'm Weibchen gekerbt.

Raupe. Anfänglich dunkelgrau, hernach blaulichgrün, zuletzt glänzend gelbgrün; auf jedem Ringe mit sechs erhabenen Knöpfen besetzt, die anfänglich orangengelb, hernach roth oder violett, endlich aber blau werden, und mit steifen, eine blaue Kolbe föhrenden Haaren geziert sind.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der nömliche Spinner misst von einer Flügelspize bis zur andern 4 Zoll 11 Linien, jeder Vorderflügel ist 2 Zoll 4 Linien lang; der weibliche misst 5 Zoll 9 Linien; jeder Vorderflügel ist 2 Zoll 9 Linien lang, und die etwas bandirten, hellaschgrauen Vorder- und röthlichgrauen Hinterflügel haben ein sogenanntes Auge; gegen die Wurzel läuft eine gerade, dunkelrothbraune Linie schräg durch. — Er ist dem Umriß der Flügel nach der größte Europäische dieser Gattung. Am Hinterrand aller Flügel ist der breite Saum hirschbraun, und vertieft sich nach innen ins Weisliche, und bey dem Mittelraum ist eine ockergelbe Zackenlinie. Das nickende Auge ist schwarz pupillirt, mit einem hirschbraunfarbigen Sterne, einer weissen Wimperlinie, zimmetbrauner Augendecke, und einem gemeinschaftlichen Ringe geziert. Unten ist er wie auf der Oberseite gezeichnet. Der kleine Kopf mit seinem weissen Hals tragen ist nebst dem Vorderleibe wollicht und schwarzbraun, und der Hinterleib dunkel aschgrau.

Die drey Zoll neun Linien lange Raupe, die in der Jugend gesellschaftlich, ist anfänglich dunkelgrau, hernach blaulichgrün, zuletzt glänzend gelbgrün; auf jedem Ringe mit 6 erhabenen Knöpfen besetzt, die anfänglich orangengelb, hernach roth oder violett, endlich aber blau werden, und mit steifen, eine blaue Kolbe föhrenden Haaren geziert sind. Sie entwickelt sich in 14 bis 20 Tagen aus dem Ey, häutet sich viermal, hat rothbraune Brustfüße, und gelbgrüne Bauchfüße, und wird kurz vor ihrer Verwandlung im Aaust gelb und endlich braun. Ihr braunes Gespinnst, woraus, so wie aus denjenigen der beyden folgenden Arten, grobs Seidenwand streifenweise gemacht werden kann, ist pergamentartig, oval, und mit einer Oeffnung versehen, worin die schwarzbraune Puppe liegt, welche überwintert. Ihre Puppenruhe dauert 8 Monate.

Aufenthalt. Im südlichen Deutschland und südlichen Europa überhaupt. Die Raupe öfnet sich vorzüglich auf Birnblättern, dann auch auf Pflaumen-, Zwetschen-, Apfelfosen- und Apfelbäumen, wohin das Weibchen die Eyer legt.

8. Der Schwarzdornspinner *Phalaena Bombyx Spinii*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Mittlerer Nachpau, mittlerer Nachpauensalter.

Phalaena Bombyx Spinii Wiener B. 49. 2.
— — — Borchaus. III. 31. 2.

31

Bombyx

Bombyx Pavonia media Fab. Ent. III. 1. 416. 32. Varietas.
 — — — Esper III. t. 3. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Grundfarbe ist hellgrau; an der Spitze der Vorderflügel ist ein blutrother Fleck, in der Mitte jedes Flügels der gewöhnliche Augenfleck. Die ockergelben Fühlerhörner sind bey dem etwas kleinern Männchen stark gekämmt, bey dem Weibchen nur gekerbt. Sonst sind beyde Geschlechter sich gleich.

Raupe. Dunkelschwarz, in der Jugend mit himmelblauen; im Alter mit hochgelben Knöpfen sternförmig besetzt, und der nachfolgenden ähnlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner ist kleiner, als der vorhergehende. Die weiße, schwarzbraun gesäumte Linie an der rothbraun gefärbten Wurzel ist beyh Männchen etwas röthlich, und die nach dem Hinterrand ist kappensförmig; hinter welcher der Rand etwas rothbraun und zugleich atomirt ist. Zwischen beyden Streifen oder Linien steht im weißen Raum das Augenfleck. Das Uebrige ist wie bey dem vorhergehenden. Merkwürdig ist es, daß Männchen und Weibchen gleichfärbig, und beyde dem Weibchen des nachfolgenden ähnlich sind. Die Raupe ist ebenfalls der nachfolgenden ähnlich, und dunkelschwarz, in der Jugend mit himmelblauen, im Alter mit hochgelben Knöpfen sternförmig besetzt. Sie verfertigt sich ein großes Gewebe, mit einem gummirten, bald braunem, bald weißem Gespinnst, überwintert, und entwickelt sich im May.

Aufenthalt. Der Spinner findet sich im May, und die Raupe in den Sommermonaten im südlichen Deutschland, in Ungarn und im südlichen Rußland, auf Schlehenssträuchern und wilden Apfelbäumen.

9. Der Haynbuchenspinner. *Phalaena Bombyx Carpini*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleiner Pfau, kleiner Pfaunachsfalter.

<i>Phalaena Bombyx Carpini</i>	Wiener Bz. 50. n. 3.
— <i>Attacus Pavonia minor</i>	Lin. 810. 7. Müller 653. 7.
<i>Bombyx</i> — — —	F. Ent. III. 1. 416. n. 32.
<i>Phalaena Bomb. Carpini</i>	Workhaus. III. 34. n. 3.
— — <i>Pavon. min.</i>	Gleditsch I. 286. n. 453. Ferner II. 42 u. f. w.
— — —	Esper III. t. 4. mit Raupe.
Rösel I. 2 Cl. Nachvögel. t. 4. u. 5. mit Raupe.	

Kennzeichen der Art. Männchen. Kleiner; die Vorderflügel sind röthlich, und die hintern durchaus gelb, beynah suchsfarbig; die Fühlerhörner sind stark gekämmt.

Weibchen. Größer, dem vorhergehenden ähnlich, nur die Grundfarbe ist heller, und der Saum heller und schmaler. Beyde haben das Familienauge.

Raupe. Jung schwarz und silzhaarig, nach der vierten Häutung aber hellgrün; auf jedem Ringe mit sechs, bald goldgelben, bald rosenrothen kurzborsthaarigen Sternwarzen geschmückt.

Beschrei-

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner misst 2 Zoll und 2 Linien, und hat röthliche Vorder- und gelbe Hinterflügel. Der weibliche misst 3 Zoll, weniger eine, oft auch 3 Zoll und 2 Linien; je der Vorderflügel 1 Zoll und $3\frac{1}{2}$ Linien, und die Grundfarbe ist heller, und der Saum schmaler, als beim vorhergehenden Schwarzdornspinner, dem er sehr gleicht. Beide Geschlechter haben auf jedem Flügel ein Augenfleck. Der Mittelraum, wo dasselbe steht, und ein schmaler Strich am Flügelraum, sind weiß. Die hochgelben Hinterflügel unterscheiden das Männchen gar sehr vom hellascharau-nebelichten Weibchen. Beide sind an der Wurzel aller Flügel röthlichbraun gefärbt; hierauf folgt eine mattgraubraune Querlinie, und hinter dem Auge zwey kappenförmige neben einander, worauf zwischen dem Flügelraume der Raum mattbraun ist. Die Unterseite gleicht der obern. Im Naturforscher XII. tab. 2. f. 6. ist ein Zwitter, dessen eine Hälfte männlich, die andere weiblich ist.

Die Raupe ist jung noch schwarz und filzhaarig, nach der vierten Häutung aber hellarün, auf jedem Ringe mit 6, bald goldgelben, bald rosenrothen, kurzborstenhaarigen Sternwarzen verschönert. Man kann sie daher in der Jugend leicht für eine Dornraupe der Tagfalter ansehen. Sie ist nach einer viermaligen Häutung im Julius ausgewachsen. Eine Varietät davon hat über jedes Glied einen schwarzen Gürtel. Wenn man sie erzieht, so ist ihr das Besprühen zuweilen dienlich: Zu Ende des Julius, und in warmen Gegenden zu Ende des Junius, verwandelt sie sich in eine rundliche, hinten zugespitzte Puppe, welche in einem künstlichen, pergamentartigen, bouteilleförmigen, mit einer elastischen Dichtung versehenen Cocon liegt, von welchem man eine grobe Seide bereiten kann. Die Puppenruhe dauert 9 Monate; bey der künstlichen Erziehung aber zuweilen 1 Jahr und 9 Monate. Ja dieses Jahr 1802 entwickelte sich bey uns eine Puppe am 5. May, die seit dem 28. Junius 1800, also über 2 Jahr und 10 Monate geruhet hatte.

Aufenthalt. Gewöhnlich erscheint der Spinner im May, und ist gemein. Die Raupe frisst in den Sommermonaten auf Schlehen und Sauerkirschen, wie auch Erlen, Eichen, Birken, Weiden, Haynbuchen, wilden Rosen, Heidekraut, Erd- und Heidelbeersträuchen. Das Weibchen legt seine Eier, die nicht ganz rund, sondern länglich rund, anfangs weißlichgrün und zuletzt bräunlich sind, an dürre Pflanzenstengel, und zwar ungerstreut besammeln.

Dritte Familie.

Knospenraupen. Nacktflügelige Spinner.

Die Raupen haben einen kleinen halbversteckten Kopf; sind fast ganz mit halbkugelförmigen Erhöhungen, deren auf jedem Ringe sechs zu stehen kommen, und darüber mit einigen feinen Haaren besetzt. Die Verwandlung geschieht in einem leichten Gewebe in eine haarige Puppe. Die Spinner sind zungenlos, die Männchen haben sehr breit- gekämmte Fühlhörner; verbreitete, immer nur mit dünnen Schuppen bedeckte, und also halbdurchsichtige, die Weibchen nur ganz kleine, unbrauchbare Flügel.

Sie sind minder schädliche.

10. Der Hecken Eichenspinner. *Phalaena Bombyx Rubea*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Röthlicher Spinner, blaßröthlicher Spinner.

Phal. Bomb. rubea	Wiener Wz. 51. n. 2.
Bombyx —	Fabr. Ent. III. 1. 445. 117.
Phal. Bomb. —	Vorkauf. III. 268.
— — —	Esper Spinner t. 89. f. 3.
— — —	Scrub a Veyträge t. 17. f. 6. sehr gut.

Kennzeichen der Art. Spinner. Alle Flügel sind zurückgebogen, fast durchsichtig blaßröthlich, mit einem blassen Mittelpunct. Die Fühlhörner sind am Männchen stark gekämmt, mit einer stumpfen Spitze.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Er hat einen Zoll und 2 Linien Flügelbreite, und ist an den Flügeln, welche zurückgebogen, fast durchsichtig, blaßröthlich sind, und einen blaßschwärzlichen Mittelpunct haben, sehr von Schuppen entblößt. Der ganze Körper mit allen seinen Gliedmaßen ist von blaßmennigrother Farbe, ins Fleischfarbige abstechend, und hat zottige Haare. Die bräunlichen Fühlhörner des mit einer dichten Wolle am After bekleideten Weibchens sind schwächer, als die stark gekämmten des Männchens.

Die Raupe war den Wienern bekannt, ist aber von ihnen nicht beschrieben.

Aufenthalt. Im Oesterreichischen auf Eichenbäumen, worauf die Raupe wohnt.

Vierte Familie.

Knöpferaugen. Weißliche Spinner.

Diese Raupen haben auf jedem Ringe 8 mit längern, aber nicht dichten Haaren besetzte Knöpfe, sonst auf dem übrigen Leibe kurze, feinere Haare, auf einigen der letzten Ringe, gemeiniglich dem neunten und zehnten, öfters zwei knopfähnliche Blasen, die sie einziehen und wieder erhöhen können. Die Verwandlung geschieht in einem durchsichtigen Gewebe über der Erde. Die Spinner sind zungenlos, haben abhangende, fast weiße, zuweilen mit schwarzen Stricheln oder nur sehr wenigen Puncten gezeichnete Flügel.

Erste Linie. Die Larven sind eigentliche Knopfraupen.

A. Die mehr schädlichen.

11. Der Weidenspinner. *Phalaena Bombyx Salicis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ringelfuß, Weidenmotte, silberweißer Zwiefalter, Weidenschmetterling, gelbfleckichte Weidenraupe, Atlasvogel (nämlich vom Seidenschimmer der Flügel).

Phalaena

Phalaena Bombyx Salicis	I. in. 822. 46.	Müller n. 46.
— — —	Wiener Bz. 52. n. 2.	
Bombyx — —	Fab. Ent. III. 1. 459. 163.	
Phal. Bomb. —	Vorkb. III. 294. 110.	
— — —	Gleditsch Einleitung in die Forstwiss. I. 540. 4. II.	
— — —	45. n. 25.	
— — —	Preyßlers Böhmische Insecten I. 8. 17. n. 12.	
— — —	Espin III. t. 41. f. 1—6. mit Raupe.	
Rüssel I. 2 Cl. t. 9. mit Raupe.		

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind weiß, seidenartig und glänzend, und die Füße weiß geringelt; die Fühlhörner des Männchens stark gebiebert.

Raupe. Behaart und braungrau, auf dem Rücken der Länge nach schwarz und weiß gefleckt und roth punctirt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt 2 Zell 1½ Linien, jeder Vorderflügel 11 Linien. Die weißen Flügel sind seidenartig und glänzend. Der Körper ist auf seinem schwarzen Grunde sehr dicht mit weißer Wolle bekleidet, und die Füße geringelt. Das Weibchen ist größer, sein Hinterleib dicker, und die Fühlhörner sehr unmerklich, beim Männchen aber stark gekämmt.

Die Raupe ist den Sommer hindurch von verschiednem Alter und Größe zu finden; doch ist die eigentliche Raupenzeit der May. Die Rückenflecken stehen zwischen zwey Reihen rethbehaarter Knöpfe. Der Kopf ist schwärzlich, und der behaarte Leib braungrau. Sie kommt theils im Herbst aus dem Ey, und überwintert, theils bleibt sie den Winter durch im Ey, und macht sich nach erreichter Größe zu Ende des Mays und Anfang des Junius zwischen ein Paar Blättern einen dünnen, weißglänzenden Cocoon, worin sie als eine schwarze, weißfleckichte und behaarte Puppe sehr lebhaft ist. Ihre Ruhe dauert bald 3 bald 4 Wochen.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Spinner und Raupe leben auf Espen, Weiden, Schwarzpappeln, Italiänischen und Balsampappeln. Der Spinner ist bey Tage sehr träge, und läßt sich mit der Hand fangen; des Nachts ist er munter und lebhaft. Man kann mit Kleemann und Brahm jährlich zwey Generationen annehmen. Die Raupen der ersten sind im Junius, die der zweyten im August erwachsen; der Spinner der ersten erscheint zu Ende des Junius, der von der zweyten im September. Das Weibchen legt 8 Tage nach der Befruchtung bald auf die Ober- bald auf die Unterblattsseite ihre Eyer.

Feinde. Die Fadenwürmer (Gordius L.) halten sich gern in dem Körper der Raupe auf, so wie der ausheilende Raupentöbter oder Zehrwespe (Ichneumon praerogator L.). Auch stellt ihnen der Carabus lycoplanta und die großen Baumwanzen nach.

Schaden. Nach Preyßler hatte sie sich bey dem Dorfe Nusel bey Prag 1786 so stark vermehrt, daß man besonders auf einer alten Weide viele Tausende derselben um den Baum gleich Vienen schwärmen sah, und der Baum an manchen Stellen ganz weiß und wie beschneyt ausah; und, welches sonderbar ist, in dem nämlichen Jahre sand

sie Borkhausen bey Darmstadt in so außerordentlicher Menge, daß fast alle Weiden und Pappeln von ihr kahl gefressen waren. Im folgenden Jahre wurden sie wieder eine solche Seltenheit, daß man nicht einmal einzelne Stücke erhalten konnte. In eben diesem Jahre entblättern sie die Italiänischen Pappeln bey Maynz gar arg. Eben so standen im May 1804 alle Alleen von dieser Pyramidenpappel bey Meiningen ganz entblättert da, und von einer einzigen Pappel konnte man zu Ende des Mays die ausgewachsenen Raupen und die Puppen zu viel Tausenden finden.

Mittel. Wenn man Alleen von der Pyramidenpappel von ihnen verschont haben will (denn sie fressen sie oft so ab, daß sie wie dürr da stehen), so muß man 1) die Raupen und Puppen mit Leitern ablesen oder leichter durch eine mit Stroh und Tuch umwickelte Reule, wo sie haufenweise am Stamm sitzen, zerquerschen lassen. Erstere lassen sich in den Mittagsstunden abschütteln, und wenn man ein Tuch ausbreitet, so kann man sie dann auf demselben tödten. 2) Zur Zeit, wenn die Nachtfalter fliegen, muß man hier und da Leuchtfener machen, in welchen sie schwärmen. Auf diese Art ist die Maßfelder Allee bey Meiningen im May 1804 erhalten worden.

12. Der Weißdornspinner. *Phalaena Bombyx Chrysoorrhoea*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Goldaster, Schwan, Goldasteriger Nachtfalter, Goldasterichwan, Brandreitel, Brandeule, Rosenvögelchen.

<i>Phalaena Bombyx Chrysoorrhoea</i>	Lin. 822. 45.	Müller 665. 45.
— — —	Wiener Verz. 52.	—
<i>Bombyx</i>	Fab. Ent. III. 1. 577. 74.	—
<i>Phalaena Bombyx</i>	Borkhausen III. 295. 111.	—
— — —	Brahms Ins. II. 161. 78.	—
— — —	Gleditsch I. 513. und II. 82. 227.	—
— — —	Dezolds Mittel 2c. 64. 7. tab. 1. fig. 9. Raupe.	—
— — —	Esper's Spinner. t. 39. f. 1-5. mit Raupe.	—

Abf. Ins. I. Nachtvögel, 2te Classe. t. 22. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Alle Flügel sind nebst dem Körper hellweiß; letzteres hat an der Endspitze braungelbe, wollichte Haare. Das Weibchen ist größer und mit einem hochgelben, zuweilen rostfarbigen Haarwulst an der Endspitze versehen.

Raupe. Gefellig, schwarzgrau und behaart, mit zwey rothbraunen Längslinien; auf dem vierten und auf dem letzten Ringe steht eine schwarze Warze, und in den Seiten weiße Haarbüschel.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß ist ein Zoll und zehn Linien. Die Grundfarbe ist überall ein helles Weiß; nur der Afters hat nicht sowohl einen gelblichen, als gelbbraunen Haarbüschel. Der Vorder- und der Vorderflügel ist oft auf der Unterseite schwarz angefliegen. Auch finden sich zuweilen einige schwarze Punkte auf der Oberseite. Die Fühler des Männchens sind braun mit einem weißen Schaft. Das Weibchen hat schwache Fühler, und einen rostfarbigen Haarwulst am Afters des dicken Hinterleibes.

Die Raupe ist höchstens 1½ Zoll lang, hat eine schwarzgraue Grundfarbe, mit ungleichen kurzen Haaren, die an den Seiten silzig sind. Ueber den Rücken ziehen sich vom vierten Absatz an zwei pomeranzgelbe Linien neben einander, die auf dem besagten Absatz durch eine schwarze Warzenerhöhung unterbrochen werden, und über der Schwanzklappe steht eine ähnliche, jedoch kleinere Erhöhung. Auf dem 9. und 10. (nicht 10. und 11. wie Kösel und Pezold meynen) Absatz sind 2 rothe bewegliche, und auf dem letzten eben auch dergleichen, aber unbewegliche, Knöpfe. Außer den in den Seiten befindlichen weißen Haarbüscheln sind eigentlich, genau genommen, auf jedem Absatz vier kleine Warzen. Sie entwickelt sich aus dem Ey im September und October, und überwintert zu 10 bis 20 Stück beisammen, vor der ersten Häutung an der Spitze der Zweige in einem gemeinschaftlichen eisgrauen Gewebe, das sie im Frühjahr bis zur ersten Häutung noch bewohnen. Nur bey der Verwandlung spinnen sich mehrere wieder ein gemeinschaftliches, dünnes, häutiges und hellbraunes Gewebe, darin sie sich im Juli und August verpuppen, und bey günstiger Witterung zuweilen 14 Tage früher. Die Puppe ist schwarzbraun mit einer scharfen Endspitze, und braucht 3 bis 4 Wochen zur Entwickelung Zeit.

Aufenthalt. Der Spinner hat seine Flugzeit vom Ende des Julius an bis in den September, in Gärten und Gebüsch. Die Raupe nährt sich an Hecken und in Gärten von den Blättern aller Obstbäume, vorzüglich der Zwetschenbäume, mehrerer niedrigen Gesträuche, als Weißdorn, Schlehen, ja sogar auf Eichen in Waldungen, und ist zu Ende des Mays oder Anfang des Junius erwachsen.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt seine Eyer im Julius und August in großer Zahl an Einer Stelle beisammen, an Blätter, selten unmittelbar an Baumstämme, und verkleistert solche Eyerbrut mit dem an seinem After angehängten, braungelben, glänzenden Pelz. Sie fallen an der Oberfläche der Blätter leicht in die Augen. Es sind Klumpen eines starken Fingers lang, die mit bräunlichen Haaren vom After des Weibchens durchweht und überdeckt sind. Daraus kommen im September die Käupchen, welche alsdann im Gewebe überwintern.

Feinde und Schaden. Sie hat als eine kaum aus dem Ey gekrochene Raupe die sammetrothe Erdmilbe (*Acarus holosericeus*, Lin.) und weiterhin die gewöhnlichen Vögel zu Feinden. Sie ist darum vorzüglich schädlich, weil sie sich von allen Arten der Bäume und des Gesträuchs in unsern Gärten nährt, ja sogar die Eichen angeht, und schon ganze Waldungen verwüster haben soll. Ihr Schaden ist, wenn sie nicht im Winter, spätestens bis zu Ende des Februars von den Bäumen geschafft wird, alsdann bedeutender, wenn sie da von der Sonnenwärme im Frühjahr noch eher belebt wird, als die Baum aus-schlagen. Sie benagt da die Knospen, und die Bäume bleiben bis in die Mitte des Sommers kahl stehen. Auch im Herbst zeigen diese Raupen bey gutem Wetter schon ihre Verwüstungen auf den Obstbäumen. Sie gehen gesellschaftlich auf einem Zweige herum, kressen mit einander und bewirken dadurch, daß der Zweig im Winter fast allezeit verdorret. Sie gehören daher unter die schädlichsten Obsttraupen. *)

Mit

*) Gäldners Garten-, Feld- und Walddraupen. S. 108.

der weißen Grundfarbe der Flügel laufen vier bis fünf nicht sowohl Wellen- als vielmehr Zackenlinien. Zwischen den mittlern steht ein einzelner starker Punct oder Zug. Die hell- oder bazaran, ins Weißliche absteigenden Hinterflügel sind mit einigen dunkeln, verblichenen Querstreifen gewellt, davon die äußerste sich am stärksten ausnimmt. Der Hinterrand aller vier Flügel führt auf beiden Seiten eine Reihe schwarzer Punctflecken. Die Unterseite der Vorderflügel hat in verblichener Anlage die Zeichnung der Oberseite, und ihre Farbe ist gegen die Spitze hin aschgrau. Die Hinterflügel haben auf der Unterseite ebenfalls Zacken- und Wellenlinien, wovon sich drey deutlich auszeichnen. Die Fühlhörner und Fressspitzen sind schwarz und der Kopf weiß gefärbt. Der Vorderleib ist weiß mit schwarzen Flecken, und der Hinterleib wechselt mit schwarzen Ringen und rothen Einschnitten ab, die aber auch fehlen können. Das Männchen unterscheidet sich durch seine geringere Größe, nämlich einer Flügelbreite von 2 Zoll, indem jeder Vorderflügel 10½ Linien Ausmaß hat, und durch stark gefiederte Fühlhörner, die beym Weibchen nur kurze Fäserchen zeigen, und dessen Hinterleib einen Legestachel hat, und spitzig zuläuft. Die beyden Vorderfüße sind schwarz und die vier folgenden weiß und schwarz gestreift.

Herr Professor Esper hat eine männliche Varietät angeführt mit blendendweißen Vorderflügeln, worauf die schwarzen Zeichnungen sehr verstärkt erscheinen. Die Hinterflügel haben eine Reihe weißer Flecken am Rand, und der Hinterleib rothe und gelbe Einschnitte. Herr Gerning hatte eine Varietät mit aschgrauer Grundfarbe.

Die kurze, dicke, 1½ bis 1¾ Zoll lange, und 1½ Linien dicke Raupe ist gemeinlich braungrau und schwarzgemischt, selten ganz schwarz, und noch seltener weißlich von Farbe. Der große, oben runde, gewölbte, unten breite, hechtgraue, kurzbehaarte Kopf ist über die Stirne mit einem bräunlichen Strich bezeichnet, welcher sich über dem Maul in einen eben so gefärbten dreyeckigten Fleck endigt. Jeder der 12 Ringe des Körpers ist mit sechs borstenhaartigen Warzen von blauer und von bräunlichgrauer Farbe besetzt, welche hinter dem Kopf am längsten sind und der Raupe das Ansehen geben, als ob sie ein Paar Ohren hätte. Diejenigen davon, die auf dem Rücken paarweise stehen, sind indigblau gefärbt. Von dem großen bläulichschwarzen Fleck des zweyten Abgases an zieht sich ein dunkelbräunlichgrauer Rückenstreif bis zum siebenten, und wieder vom zehnten bis letzten Abgase hinab. Dieser Rückenstreif, der auf dem zehnten und elften Ring einen rothen Knopf aufnimmt, ist von beyden Seiten durch eine helle zickzackförmige Linie begrenzt. Die sechs Bauchfüße sind gelb oder gelbbraun, die übrigen zehn grün oder graugelb. Schon vom Ey an erscheint sie schwarz mit braunem Schimmer, glänzendem Kopf und 2 Seitenknöpfchen; nach der ersten Häutung ist sie schwarz mit einem weißen Rückenstreif; nach der zweyten bekommt sie weiße Rückenpuncte, und lange graue oder schwarze Haare; nach der dritten ist ihr Kopf rund, glänzendschwarz, und ihr ganzes Ansehen graubunt; nach der vierten fällt es mehr ins Gelbliche und Bräunliche. Wo sie hingehet, zieht sie einen Faden aus der Spinn-Öffnung unter dem Munde nach sich. Erschüttert man ihren Aufenthalt: so läßt sie sich an demselben eilends herab und krümmt sich zusammen. Bey nebelichten Tagen und kalten Nächten, zumal des Herbstes, verkriecht sie sich unter das Moos, unter die Baumrinde und Ritzen der Bäume zu Tausenden. Hier hält sie auch ihr Winterlager, bis sie die

A a a

Früh-

Frühlingswärme wieder hervorlockt, um Nahrung zu suchen; denn ihr Appetit ist nicht gering, indem sie in 24 Stunden noch einmal so viel Futter braucht, als sie schwer ist.

Ihre Verpuppung geschieht gemeinlich zu Ende des Junius und Anfang des Julius, wo sie ausgewachsen ist, in einem aus wenigen Maschen bestehenden Gespinne, welches theils zwischen den Nadeln, theils über Höhlungen der Rinde angebracht, und dann der Raupenbalg in 3 bis 4 Tagen abgestreift wird. Die 3 Zoll lange Puppe ist anfänglich grün, hernach braunroth, worauf sie etwas dunkler oder auch ziemlich schwärzlich wird, mit einig m Metallschimmer. Jeder Ring über dem Rücken ist mit büschelförmigen, bald rothbraunen, bald gelben Haaren besetzt. Die Endspitze hat hackenförmige Borsten. Die männliche ist halb so groß, als die weibliche, die stärker und bauchichter ist. Bey Berührungen bewegen sie sich sehr lebhaft. Die Puppenruhe dauert 17 bis 18 Tage, auch wohl, nach Verhältniß der Witterung, 3 bis 4 Wochen; Spätlinge aber sollen auch überwintern.

Aufenthalt. Der Spinner zeigt sich am Tage und in der Dämmerung auf Hecken und in Wäldern auf Fichten, Tannen und Föhren, desgleichen auf Weiden, Linden, Eichen und Apfelbäumen, im Julius, August und September.

Die gefräßige Raupe nährt sich, wenn sie nicht mehr klein ist, auf Eichen, Ulmen, Espen, Linden, Weiden, Obstbäumen, hauptsächlich aber auf den Nadelhölzern, woran sich auch im Winter die Puppe findet. Ehemals hielt man die Flechten, Lichenes, für ihre Nahrung, weil sie solche in der Jugend liebt. Esper nährte sie mit den Föhren- oder Kiefernadeln und die neueren Erfahrungen stimmen damit leider zum Noththeil der Wälder überein, daß sie sich vorzüglich von dem bey uns gewöhnlichen Nadelhölzern nährt. Herr D. Zinke zu Hirschberg im Voigtlande schreibt im besorgten Forstmann S. 307., daß sie sich außer den Tannen und Fichten (d. i. Weiß- und Rothtannen) flütern lasse, 1) gerne mit Lerchenbaum- und Kiefernadeln, 2) ungerne mit Weymouths-Kiefern und Wachholder, 3) gerne mit Aepfel, Ulmen, Pflaumen, Eichen und Buchen, 4) wenn sie recht hungrig ist, mit Cornelfirschen, Birn, Vogelbeer, Feldahorn und Espen. Daß zehnjährige Lerchenbäume in einem Garten nahe an einem Wald zur Zeit des Voigtländischen Raupenraufes von denselben heimgesucht worden, bezeugt ein Herr von W. im Reichsanzeiger 1803. Seite 1661. Andere bemerken, daß sie im Nothfall mit grünen und trocknen Gräsern vorlieb nehmen. Mit Einem Worte: Sie brobachret, was ihre Nahrung betrifft, keine Regeln.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt im Julius und August, auch noch zu Anfang des Septembers seine Eyer in ziemlicher Zahl, zwischen 60 — 80, ja bis 150, aber nicht auf einen einzigen Haufen, sondern in mehrere Parthien zu 5, 10, 12, 15 Stück an gesunde Bäume, in die Rissen derselben, an den obern Theil der Stämme, an die untern Aeste, unter Birkenrinden, an Stacketen, Pfähle, zwischen Nadeln, an die untere Blattseite, an die Flechten der Bäume, bald hoch bald tief über der Erde an der Abendseite, bald auf die Erde selbst. Diese Eyer sind ovalrund, glatt, glänzend, aschgrau oder röthlich weiß, (die unfruchtbaren ganz weiß) und von der Gestalt des Fischrogens. Gewöhnlich kriecht die junge Brut nach 3 Wochen, also gegen das Ende des Septembers, oder im October aus der Schale, wie auch D. Zinke a. a. O. darthut. Doch muß

es auch Ausnahmen geben, weil Brahm (Insecten-Calender II. a. a. O.) im März in ungeheizten Zimmern seine Käupchen aus der Schale kriechen sah. Mit der ersten Meinung stimmt auch diejenige Erfahrung überein, da der Herr v. Türk zu Neustrelitz, ohne sich zu nennen, im Reichsanzeiger 1802. No. 62. und No. 623 schreibt: Die jungen Käupchen der Monacha seien zu Ende des Octobers 1798 aus den Eiern gekommen zu der Zeit, da die jungen Raupen der Phal. Bomb. Pini erschienen. Auch habe er sich dabei einer starken Lupe bedient, um seiner Sache gewiß zu seyn. Von der letzten Verheerung im Voigtlande hat man bemerkt, daß der Diegel nach die Käupchen im März, April und Anfang des May auskrochen, daß dieß aber auch bey guter Witterung oft noch im Herbst geschah. Es scheint also auch hier, wie es immer, wenn sich die Insecten in ungeheurer Menge einfänden, der Fall ist, die Natur ihre Wege zu überschreiten, und nicht bloß in der Nahrung, sondern sogar im Auskriechen der Eyer zu variiren. Auch Herrn Földner krochen die Eyer zwey Jahre hinter einander erst im April aus. S. dessen Garten-, Feld- und Walddraupen. S. 89 und 96.

Der männliche Spinner endigt sein Leben mit 9 bis 10 Tagen, der weibliche mit 10 bis 12 Tagen, nach seiner Ausbildung und Hervorkunft aus der Puppe.

Seinde. Verschiedene Vögel leben von den Schmetterlingen und Eiern, als die Meisen, Krähen, Elster, Spechte, Staare, Rothkehlchen, Baumkäufer, welche wegzufangen und zu schießen deshalb in mehreren Ländern, z. B. im Preussischen, auf das schärfste verboten worden ist. Die in dieser Rücksicht erfolgte Königlich Preussische Verordnung de dato Bayreuth den 16. December 1797. ist in Folio, 3 Bogen stark in der hiesigen Hofbuchhandlung zu Bayreuth gedruckt erschienen. Noch ein zahlreiches Verzeichniß hat D. Zinke a. a. O. Seite 173. von solchen Insecten aufgeführt, die den Raupen aus Verdrüß nachstellen, worunter vorzüglich die Zehrwespen (Ichneumon L.) gehören, deren Larven oder Maden, weil sie mit einem spitzigen Kopf versehen sind, die Raupen und Puppen durchbohren, um darin bis zu ihrer Verwandlung sich groß zu füttern. Das Verzeichniß ist folgendes:

1. Der Waldjäger (Wald-Sandkäfer), *Cicindela sylvatica* L.
2. Der Lederkäfer, *Carabus coriaceus* L.
3. Der Erbkäfer (Glänzender Laufkäfer), *Carabus nitens* L.
4. Die Goldleiste (Violettgerandeter Laufkäfer), *Carabus violaceus* L.
5. Der Raupenjäger (Ausspähernder Laufkäfer), *Carabus inquisitor* L.
6. Der Grostkäfer (Bändiger Raubkäfer), *Staphylinus maxillofus* L.
7. Der Schänder (Ausfahrende Zehrwespe), *Ichneumon fugillatorius* L.
8. Der Räuber (Räuberische Zehrwespe), *Ichneumon raptorius* L.
9. Der Pflüger (Pflügerische Zehrwespe), *Ichneumon exarator* L.
10. Die Tannenwespe, *Ichneumon strobilellae* L.
11. Der Schwängerer (Schwängernde Zehrwespe), *Ichneumon gravidator* L.
12. Der Spürer (Nachforschende Zehrwespe), *Ichneumon ruspator* L.
13. Der Puppenmörder (Puppen-Zehrwespe), *Ichneumon puparum* L.
14. Der Larvenmörder (Larven-Zehrwespe), *Ichneumon larvarum* L.

15. Der Sandwölber (Eigentliche Sandwespe), *Sphex sabulosa* L.
16. Die Wanderwespe (Wegbastardwespe), *Sphex viatica* L.
17. Die Aasfliege, *Musca cadaverina* L.
18. Die Brechfliege, *Musca vomitoria* L.
19. Die Schmeißfliege (Fleischflieg.), *Musca carnaria* L.
20. Die Rabenmücke (Rabenfliege), *Musca corvina* F.

Dazu gehört besonders noch der Puppenräuber, laustäfer, (verrätherischer laustäfer) *Carabus Sycophanta* L.

Ferner sind die brennende Sonnensitze, Plagregen und Sturmwinde, und zwar letztere aus der Ursache ihr tödtlich, weil sie, wenn sie von ihrem seit dem Auskriechen aus dem Ey gewohnten Nahrungsbaum herabgeworfen worden, weder denselben, noch einen andern aus Trägheit wieder besteigt, sondern eher auf dem Boden verschmachtet. Am schädlichsten aber wirkt auf sie regenhafte, mit Kälte verbundene Witterung im May und Junius, besonders wenn sie dieselbe nach einer Häutung überfällt. Sie sterben dann an der Ruhr. Auf diese Art wurde die große Verheerung im Vogtlande geendigt. Die Raupen zogen sich damals bey solcher Witterung in Klumpen zusammen, gaben eine gelbliche Sauche von sich, ihre Eingeweide wurden schwarz, und so gingen sie nach und nach ganz in Fäulniß über.

Schaden. Ob dieser Spinner gleich in manchen Jahren selten ist, wie er denn in der Gegend bey Maynz zwischen den Jahren 1770 und 1789, also in achtzehn Jahren gar nicht zu sehen war, so liefert doch der Naturforscher XXIII. S. 90. ein Beispiel von seiner schädlichen Verheerung durch die Menge derselben. So berichtet unter andern Herr von Uslar, daß er 1783 in den Kieferwäldern des Fichtelgebirgs, districtweise nicht allein altes ausgewachsenes, sondern auch junges und im besten Wachsthum stehendes Holz angefallen habe. Der Schaden, der hierdurch entstanden sey, wäre so beträchtlich, daß er ferner nicht kommen dürfe, wenn, ohngeachtet jene Gegend voller Wald ist, bey den dortigen großen Holzbedürfnissen nicht Mangel entstehen soll. Ihr Nachfolger war der Borkenkäfer. Vorher kannte man ihn nur im Lager- und abständigen Holze, jetzt fand er sich in allen Nadellos gefressenen Stämmen ein, ohne bis hieher gesundes Holz angegriffen zu haben. Kobs wahre Ursache der Baumtrockniß. Nürnberg 1789.

Die großen Verheerungen, die diese Raupen in den Jahren 1795 — 98 im Vogtlande, im Preussischen und einigen Gegenden Frankens angerichtet haben, sind aus öffentlichen Blättern zu bekannt, als daß sie hier weitläufig angeführt zu werden brauchen. Der Schaden, den diese Gegenden dadurch erlitten haben, wird in einem Jahrhunderte nicht wieder zu ersetzen seyn.

Im Mecklenburgischen hatte man 1798 im Frühling die Raupe in unendlicher Menge gesehen, und auch ihre Schmetterlinge darauf, so wie die jungen Raupen im October 1798. Aber 1799 im Frühlinge waren sie alle verschwunden, und sind nach wie vor, wieder selten geworden.

Mittel dagegen. 1. Man schone, vermittelt eines allgemeinen Verbots des Einfangens und Wegschießens, alle die Insectenfressenden Vögel, die oben beym gemeinen Wir-

Virkentäfer, *Dermostes typographus* L., und die den Raupen und Puppen nachstellenden Insecten, die oben als 3 und 4 dieser Art genannt worden sind.

2. Der Jäger und Förster gebe genau Acht, ob er im Julius und August diese Insecten in seinem ihm anvertrauten Revier gewahr werde, damit man ihnen im Anfang, ehe sie sich noch zu stark vermehren, durch leuchtfeuer Abbruch thun kann. Die Verhütungsmittel sind immer besser als die Vertilgungsmittel.

3. Und da die Verminderungsmittel im Raupenstand, ihrer ersten Lebensperiode, wenn diese Insecten schon in ungeheurer Menge vorhanden sind, oft vergeblich, ja lächerlich sind; so suche man sie in ihrem Puppenstand aufzureißen. Man lasse daher gegen eine festgesetzte Belohnung im Julius die Puppen von den Bäumen ablesen, welches mit Handschuhen geschehen kann. In Courvaichen sind deshalb auf die Maßstanne 3 Gr.; in Erfurt für ein Maß 4 Gr. Prämie, im Bayreuthischen für ein Maß 6 Kreuzer Sammlerlohn bestimmt worden.

4. Auch die Nacht- oder Leuchtfeuer, die freylich mit der größten Vorsicht unterhalten werden müssen, thun dann, wenn dieser Schmetterling in Menge da ist, ihre Dienste. Denn obgleich mehrentheils nur männliche Schmetterlinge sich verbrennen werden, da die weiblichen nicht gern herum schwärmen, sondern träge an den Stämmen sitzen bleiben; so wird doch die Fortpflanzung in so fern vermindert, daß die Weibchen nicht gehörig befruchtet werden, und also meist unfruchtbare Eyer legen.

5. Ist die Menge der Insecten so ungeheuer, daß das Abkratzen der Eyer und jungen Raupen, das Ablesen der erwachsenen Raupen und Puppen (das ohnehin wegen der brüchigen und schädlichen Haare mit Handschuhen geschehen muß) zu weitläufig seyn würde; so isolire man durch Graben oder Schneiden einen solchen angegriffenen Distrikt, von welchem man vorzüglich weiß, daß die Eyer dahin gelegt sind, und schneidele alle Bäume mit Reißstangen bis fast zur Spitze ab, wenn man das Holz nicht alle auf einmal brauchen kann, oder schlage die ganze Strecke nieder. Im ersten Fall werden sich die auskriechenden oder ausgekrochenen Räupchen kümmerlich nähren können, und wenn sie sich auch verpuppen, früppliche Schmetterlinge geben, im zweiten Fall aber wird, wenn die abgehauene Rinde und Aeste verbrannt, und auch das Moos und Gestrüß von solchen Stellen aus dem Walde geschafft wird, die ganze Zucht untergehen. Veshsteins Naturg. der schädlichen Waldinsecten, S. 49. Dessens Diana II. S. 396. und Däzel a. a. O. S. 371. §. 441 *).

14. Der Rosenspinner. *Phalaena Bombyx Dispar*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Groskopf, Groskopfbär, Stammphaläne, Stammmotte, Schwammotte, ungleicher Nachwälder, dickköpfiger Bär.

Phalaena Bombyx Dispar, Lin. 821. 44. Müller 665. 44.

— — — Wiener Verz. 52. 6.

Bombyx — — Fab. Ent. III. 1. 437. 94.

Phal.

*) Man sehe auch die Noth- und Hülfstafel zur Vertilgung der Monacha, 1 Bogen, gr. Fol.,

Erfurt bey Beyer und Mering. 3 Gr. 1798. mit Abbildungen.

Phal.	Bombyx	Dispar	Vorkhausen III. 312. 113.
—	—	—	Gleditsch I. 310. II. 45. n. 24. u. f. w.
—	—	—	Graham Inf. II. 517.
—	—	—	Prenzlér böhm. Inf. S. 41.
—	—	—	Pezoids Mittel, die uns schäd. ic. t. 2. fig. 8. Raupe.
—	—	—	Eyer III. t. 38. f. 1—6. mit Raupe.
—	—	—	Pautzeri Ena. 23. tab. 22.
Nöfel I. 2. Classe t. 3. mit Raupe. Schäfferi Icon. 28. f. 3—6.			

Kenzeichen der Art. Männchen. Die Vorderflügel sind grau und brown nebelicht, nämlich mit schwarzen, gewellten Lituren und einem schwarzen Mittelpunkt oder Winkelfleck; die Hinterflügel sind am Hinterrand schwärzlich schattirt. Die Fühlhörner sind stark gekämmt.

Weibchen. Trübschmugigweiß, mit eben solchen Lituren und Mittelpuncte auf den Vorder- und einem verbliebenen Halbmond auf den Hinterflügeln.

Raupe. Haarig, schwärzlich, dreymal gelb- oder auch weißlinirt, mit 2 Reihen behaarter, vornen blauer, hinten rother Knöpfe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügel sind dachförmig. Der männliche Spinner hat eine Flügelbreite von 1 Zoll und 3 bis 9 Linien; jeder Vorderflügel eine Länge von 9 oder 9½ Linien. Seine Grundfarbe ist ein bläuliches Schwarzgrau, auf welchem schwarze wellenförmige Züge quere durch die Flügel laufen, unter welchen ein winklichter kleiner Fleck am meisten ins Gesicht fällt. Die Hinterflügel sind etwas stärker mit ockergelb gemischt und am Hinterrand schattirt. Die Franzen sind abwechselnd ockerfarben und schwärzlich. Die Unterseite ist bräunlich ocker-gelb, mit wenig schwarzen Flecken. Die Fühlhörner sind stark gekämmt.

Das Weibchen weicht sehr ab; und mißt 3 Zoll, jeder Vorderflügel ist 1 Zoll 3 Linien lang. Es ist von Farbe schmutzigweiß, hat aber die nämlichen, wellenförmigen Züge und den Mittelpunct wie der männliche, nur blasser, oft kaum sichtbar; und die Fühlhörner sind viel geschmeidiger; der Kopf ist sehr klein, und unten sind die Flügel mit der Oberseite gleichfärbig. Es hält sich des Tags sehr stille, an offenen Orten, und kommt nur des Abends etwas mehr in Bewegung, fliegt aber, weil es einen zu schweren Leib hat, nie weit; da hingegen das Männchen auch am Tage pfeilschnell da herumschießt, wo sich ein Weibchen befindet.

In Gernings Cabinet zu Frankfurt befindet sich ein Zwitter dieser Phaläne.

Die Raupe mißt einen Zoll und neun Linien, und ist verhältnißmäßig dick; der gelb und schwarze Kopf sehr groß, die Kinnladen sehr stark, ihre Grundfarbe aber ein schwärzliches Grau. Auf dem Kopfe steht die Zeichnung eines gelben lateinischen V. Sie hat dicht am Kopf zwei hervorstehende schwarze, mit langen, gekrümmten Haarbüscheln besetzte, auf beyden Seiten hervorragende Warzen, und eben solche Haarbüschel stehen an den Seiten auf röhrlchen Warzen. Ueber den Rücken und an den Seiten läuft eine gelbe Linie; neben ersteren stehen auf beyden Seiten, auf den ersten 5 Ringen zehn blaue und auf den folgenden zwölf röhliche Warzen. Der letzte Ring ist weißlich, mit schwarzen Streifen und lang ausgestreckten Haaren. Die Raupe, aus der ein männlicher Spinner kommen soll, ist über die Hälfte kleiner, und die Grundfarbe merklich dunkler.

eine

eine Varietät oder vielleicht eigene Race vorhanden, wo die blauen Knöpfe gänzlich mangeln. Im Julius hat die Raupe, welche beim Anfassen ein Zucken verursacht, gewöhnlich ihren vollendeten Wuchs erreicht und schickt sich zur Verwandlung an. Sie verfertigt sich zu diesem Ende ein schwaches weitschichtiges Gewebe, welches entweder zwischen den klüftigen Rinden, oder unter den Einkunkungen der Zweige oder auch zwischen Blättern angebracht wird. Sie thut dies Geschäfte gern in Gesellschaft; oder mehrere zusammen wählen sich Einen Versammlungsplatz.

Die Puppe ist dunkelbraun, oft ganz schwarz, und hie und da mit einzelnen krausen Haaren besetzt. Die männliche Puppe ist sehr viel kleiner und schlanker, als die, woraus ein Weibchen kommt. Diese Puppen zeigen das Sonderbare, daß sie sich wie eine Spindel an einen Faden ihres Gespinnstes um ihre Aze vor- und rückwärts drehen können, welches bey einem runden Körper und im Freyen einen wunderbaren Mechanismus voraussetzt. Die Puppenruhe dauert 3 bis 4 Wochen.

Aufenthalt. Des Spinners Flugzeit fällt bey uns in den August bis in den halben September, in Gärten. Die Raupe lebt im Sommer auf allen möglichen Arten von Obstbäumen, und nebst diesen auch auf den Rosensträuchen, Linden, Weiden, Eichen, auch sogar auf Nadelbäumen, und dem Lorbeer, welchen letzten Herr Pexeld einst sehr stark von ihnen verwüstet fand. Und nach dem Reichsanzeiger von 1803. Seite 2983 wird aus dem geglückten Versuch, sie mit Lerchennadeln zu füttern, mit Recht die Folge hergeleitet, daß sie allerdings ein gefährlicher Feind der Nadelwaldungen werden könne.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt im August oder September seine Eyer an den Stämmen der Bäume, an Mauern, Wände, todte Zäune, auch in hohle Bäume ab, und zwar selten in einiger Höhe, die ihre Erreichung unbequem macht. Sie sind in einen, oft ½ Hand großen Klumpen gelegt und dicht mit grauen Haaren überdeckt, die das Weibchen von ihrem Hinterleibe nahm. Oft finden sich in einem solchen Klumpen, der Aehnlichkeit mit einem Schwamme hat, nach Röseln 400, nach andern bey 500 Eyer, welche über Winter liegen; und erst im April und Anfang des Mays des folgenden Jahrs kommen daraus die Raupen hervor. Sie halten sich manche Zeit ihres Raupenstandes, wenigstens nach den ersten Häutungen aefellig, lagern sich am Tag, besonders bey regnigtem Wetter, wo sie Schutz gegen die Nässe suchen, in einem kleinen Raum dichte beisammen, an die Stämme der Bäume.

Feinde. Sein natürlicher Feind ist zuerst die sammetrothe Erdmilbe (*Acarus holosericeus*, Lin.), die den Eyer nachstrebt. Hiezu kommen in der Folge die Laufkäfer, und darunter sowohl der ausspähende (*Carabus inquisitor*), als der verrätherische (*Carabus lycophanta*), die daher sehr zu schonen sind; ferner die Baumwanzen, Spinnen, Dohrlinge und besonders die Zehrwespen oder Ichneumons. Auch ist der weibliche Spinner manchmal so unvorsichtig, seine Brut an eine Stelle hinzulegen, wo die Raupe keine Nahrung findet, als an steinerne Kugebänke, Bildsäulen, oder ehe sie ihr Futterkraut findet, unterwegs eine Beute der andern Insecten wird.

Schaden. Für den Deconomen ist es ein furchtbares Insect, das ernstlich verdient verfolgt zu werden. Denn bey ihrer starken Brut und ihrer Gefräßigkeit, läßt sich der Schaden, den die Raupe verursacht, leicht denken. Linne' und Fabricius nennen sie daher eine Pest der Obstgärten.

Preyßler schreibt a. a. O. von der Raupe, daß sie auch bey Prag einst zum großen Schaden der Obstbäume sehr gemein gewesen, solche ganz aller Blätter beraubt habe, daß sie ohne Früchte da standen. Der starke Winter im Jahr 1784 und die darauf folgende Ueberschweimung, dann der zweyte noch stärkere Winter im Jahr 1788 machten aber einen so großen Eindruck auf die Eyer dieser Phalänen, daß so zu sagen die meisten erfroren. Und der Falter, den man einst zu tausenden sammeln konnte, war 1789 und 1790 dorten wieder eine große Seltenheit.

Mittel dagegen. 1. Das vollkommene Insect, zumal das stille sitzende Weibchen, das durch das um sie geschäftige Männchen bald verrathen wird, läßt sich leicht an solchen Stellen abnehmen und todt treten.

2. Die Eyerklumpen können vom Ende des Septembers und Octobers an bis in den März, an den Baumstämmen, Wänden, Zäunen und Mauern aufgesucht, mit einem Strichholz zerquetscht, oder in einen Topf gestrichen und alsdann in einem zu diesem Ende angezündeten Feuer verbrannt werden.

3. Im Junius können die zusammen lebenden Raupen nach ihren ersten Häutungen in ihren Stüllagern entdeckt, abgelesen oder zerquetscht, nie aber vergraben werden, weil sie aus der Erde wieder hervorkriechen können.

4. Durch den Julius und zu Anfang des Augusts suche man die Puppen, die an den oben genannten Orten gemeinlich in mehrerer Zahl beisammen sind, besonders an den Bäumen, wo die Raupe gelebt, und die sich durch ihr trauriges Ansehen genug auszeichnen, mehr als einmal auf, um sie zu zerdrücken, und also ihrer künftigen allzustarken Vermehrung Einhalt zu thun.

B) Die weniger schädlichen.

15. Der Winterreichenspinner. *Phalaena Bombyx nivosa*, Vienn.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schwarz Bau, Sächsisch schwarz Bau, Schwarz B. Nachtfalter, Schwarz L. Spinner, Schwarz lateinisch V.

Phalaena Bombyx nivosa Wiener Verz. 52. 1.

Bombyx V-nigrum Fab. Ent. III. 1. 458. 159.

Phal. Bomb. nivosa Vorkhausen III. 290. 109.

— — L-nigrum Mülleri prodromus.

— — V-nigrum Esper III. tab. 40. mit Raupe.

Naturforscher II. tab. 2. und XII. t. 1. f. 8. Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Hellgrünlich weiß mit einem schwarzen Bau auf den dachförmigen Flügeln. Die gelblichbraunen Fühlförner sind beym Männchen gesiedert.

Raupe.

Raupe. Sie hat acht Rückenbüschel, davon die vordern und hintern weiß sind, der Halstragen ist sehr rauch.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst einen Zoll und eils Linien, ist also beyläufig so lang, als der schädliche Weißdornspinner. Das Weiße der vier Flügel fällt ins Grüne, welches aber gar bald vergeht. Der schwarze Winkelszug der Vorderflügel gleicht einem V oder L. Die Augen sind schwarz; das erste Paar Füße hat 2 schwarze Flecken. Die gelbbraunlichen, weißgeschatteten Fühlhörner des Weibchens sind schwächer gefiedert als beym Männchen.

Die mit einem sehr rauchen Halstragen versehene Raupe, welche unter dem Stamm-Moos der Bäume überwintert, ist im May und spätestens im Junius ausgewachsen, und oben schwarz, an den Seiten rothfarben; am Halse und über dem After sehr langhaarig. Von den 8 Rückenbüscheln sind die drey mittlsten rothgelb, die übrigen weiß. — Sie verpuppt sich im Junius mit wenig Fäden in eine schöngrüne, dicke Puppe mit einem schwarzen Rückenfleck. Ihre Ruhe währt 10 bis 14 Tage. Sie ist lebhaft und bewegsam.

Aufenthalt. Der Spinner lebt im Junius und Julius in Wäldern, die Raupe auf Eichen, Buchen und Linden. Die, so ich (Scharfenberg) zog, nährte sich auch von Schwarzpappeln und verließ in der Mitte des Junius den Puppenstand.

16. Der Gartenbirns spinner. *Phalaena Bombyx auriflua*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schwan, braungerandeter Schwan, Goldaster mit braunem Rand, goldflüssiger Nachtfalter, Brandreitel (beym Gladbach).

Phal. Bomb. Auriflua	Wiener Bz. 52. 4.
Bombyx —	Fab. Ent. III. 1. 458. 161.
Phal. Bomb. —	Vorkhausen III. 298. 112.
— — —	Nau Forstwissens. 300. §. 702.
— — —	Esler III. t. 39. fig. 6. 7. mit Raupe.

Möfel I. 2. Classe Nachtvögel t. 21. mit Raupe. Guesly nannte sie Ph. Similis.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachförmig und sämmtlich weiß, beym kammsüßhörnigen Männchen am Vorderrand der Unterseite schwarz; der Hinterleib ist am Ende goldgelb oder hellpomeranzen gelb, wo das Weibchen einen eben so gefärbten Wulst am After führt.

Raupe. Von sehr schönem Ansehen, haarig und schwarz, mit einem zinnoberrothen Längstreif, der sich durch eine schwarze Längslinie theilt; sie hat vornen und am After eine Warze.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Er misst von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll und 8 Linien, jeder Vorderflügel aber 8 1/2 Linien, ist den Flügeln nach weißer, als der ihm ähnliche Weißdornspinner, und das Weibchen auf der Unterseite da, wo das Männchen schwarz angefliegen ist, ungeschwärzt. Die Fühlhörner haben an beyden Geschlechtern einen weißen Schaft, und sind beym Weib-

chen ungefleckt. Der gelbe Wulst am After dient dem letztern zum Ueberzug der Eyerlagen. — Wenn Herr Vorkhausen vom Hinterende des Männchens und Weibchens sagt, daß es rothbraun, rothfarben oder auch goldgelb sey, so ist dies ein kleiner Verstoß. Gold- oder hellpommeranzengelb ist es zwar, aber zufolge einer unzähligen Erziehung dieser Art, niemals, auch in Varietäten nicht rothbraun oder rothfarben. Im Uebrigen ist das fast der vornehmste Unterschied zwischen der Chrysorrhoea und unserer Auriflua, daß letztere am After hellpommeranzengelb, und jene resibraun ist. Varietäten haben mehr oder weniger kleine schwarze Flecken auf den Flügeln.

Die Raupe, die nicht wie die Chrysorrhoea gesellig lebt, ist von sehr schönem Ansehen, haarig und schwarz, mit einem zinnoberrothen Längstreif, der sich durch eine schwarze Längslinie theilt. Der vierte Ring zeigt einen schwarzen, weißgesteckten, behaarten Buckel und der letzte Ring einen kleinern. Auf dem 9 und 10, nicht auf dem letzten Ring, wie Köfel und andere angegeben haben, stehen 2 mennigrothe, blasenähnliche Knöpfchen, dergleichen mehrere Knöpsraupen führen. Nach ihrer Ueberwinterung ist sie zu Anfang des Junius ausgewachsen, und tritt dann in einem einsamen, lockern und bräunlichen Gewebe zwischen Blättern und Rindentklüften ihre Verwandlung in eine braune Puppe an, die 2 bis 4 Wochen ruht.

Aufenthalt. Der Spinner befindet sich im Julius an den Stämmen und Blättern der Bäume, worauf die Raupe gelebt hat. Letztere nährt sich auf allerley Objeeten, Eichen, Ulmen, Schlehen, Weißdorn, Weiden, Mehlbeer (*Crataegus Aria*), Kreuzdorn, Elsebeer, wilden Rosen, Hainbuchen. Auch findet man sie auf Haseln, Sahlweiden, Hollunder (*Sambucus nigra*), Geißblatt, Linden, Zwetschen und Pirschen, so daß sie keine Kostverächterin ist. Auf Weiden ist sie am häufigsten.

Fortpflanzung. Die Eyer werden auf gleiche Weise wie beym Weißdornspinner gelegt; doch ist die Pelsdecke weniger braun. Sie entwickeln sich in 14 Tagen, und die Raupen häuten sich im August zum erstenmal, hernach vor Winters nicht mehr. Dann spinnen sie sich in ein Blatt oder in die Rissen der Bäume ein, oder verbergen sich unter dem abgefallenen Laub, oder unter Steine, und bleiben bis zum Frühling erstarrt liegen. Ohnerachtet sie auf so vielerley Bäumen und zwar mehrentheils einzeln leben, so sind sie doch nie durch ihre Zahl schädliche vom ersten Rang geworden.

Zweite Linie. Seidenhaarige Raupen.

Weniger schädliche.

17. Der Salzbirkenspinner. *Phalaena Bombyx bicoloria*, Vien. (*bicolora*, Fabr.).

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbfleck, weißer gelbgefleckter, weißer Birkenspinner, zweifarbiger Nachtfalter, Kanonenvogel.

Phalaena Bombyx bicoloria Wiener Verz. 52. 4.
 Bombyx bicoloria Fab. Ent. III. 1. 459. 162.
 — bicoloria Vorkhausen III. 301. 113.
 — — Esper III. t. 41. f. 7.

Naturforscher XII. t. 2. fig. 10. Gladbach tab. 27. f. 7. 8. Preis der Phalaena 5 fl. Rheinisch.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachförmig und weiß, mit einer hochgelben Fleckenbinde, die auf der innwendigen Seite nach der Wurzel hin mit einer schmalen, schwarzen Linie eingefasst ist. Die Fühlhörner des Männchens sind gesiedert.

Raupe. Einfärbig, gelblichgrün, mit langen, seidenartigen, weißen, zur Seite ausstehenden Haaren besetzt, und ohne Bürsten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst 1 Zoll und $\frac{1}{2}$ Linien und ist auf beyden Seiten weiß. Ueber einer hochgelben längs Fleckenbinde steht ein kleiner Gelbfleck, und nach dem Hinterrand läuft in gleichweiter Richtung eine Querslinie von schwarzen, die gelbe Binde durchschneidenden Flecken. Hinterflügel, Unterseite, Körper, und alles ist weiß ohne weitere Flecken. Nur die Fühlhörner sind gelbbraun, jedoch mit weißem Schaft, und bey'm Männchen gesiedert.

Die Raupe ist noch nicht abgebildet; sie ist einfärbig gelblich grün mit langen, seidenartigen, weißen, zur Seiten ausstehenden Haaren besetzt und ohne Bürsten. Sie macht sich, nach Vorkhausen, von Spänchen ein dichtes Gewebe und wird im September zu einer glänzenden, braunen, lebhaften Puppe. Ihre Ruhe dauert, nach Brahm's Insecten-Calender S. 328, $7\frac{1}{2}$ Monate.

Aufenthalt. Der in verschiedenen Gegenden, als in Sachsen, bey Frankfurt und Mainz, vorhandene Spinner sitzt in Laubwäldungen an den Birkenästen, im May und Junius *) Bey schlechtem Wetter sitzt er lieber im Grase, als auf Ästen; und die Raupe lebt im August und September auf Birken.

18. Der Erlenbuschspinner. (Phalaena) Bombyx Leporina, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Erlenspinner, Erlenecule, Aderpunct, Wollfleck, Wollraupeneule, Wollseule, Wollmotte, Wollraupeneule, Hasennachtfalter, Hasenspinner.

Bombyx Leporina Fab. Ent. III. 1. 453. n. 144.
 Ph. Noctua — Lin. 838. 109. Müller 685. 109.
 — — — Wiener Verz. 67. n. 8.
 Ph. Bomb. — Vorth. III. 303. n. 114.
 — Noct. — Gleditsch l. 442. n. 7.
 — — — Espers Eulen. tab. 91. f. 1—5. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Alle Flügel sind dachförmig und weiß, die vordern mit ästigen, schwarzen Puncten und Zeichnungen, wovon 2 Flecken mitten auf

B b b 2

den

*) Gladbach jagte ihn auch von den Espenbäumen herab durchs Anklopfen.

den Flügeln winklicht sind; der Hinterleib ist ungefleckt. Das Weibchen ist größer und hat einen stärkern Hinterleib.

Raupe. Großköpfig, dicht-, lang- und weichhaarig, und grün; vorn mit zwey braunen Strichen; in der Jugend mit mehreren, im Alter nur mit 3 schwarzen Haarbüscheln.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß ist fast wie bey dem vorhergehenden, 1 Zoll und 5 Linien. Die schwarzen Zeichnungen auf den milchweißen Flügeln sind veränderlich; zwey davon bilden zuweilen ein Griechisches Psi (Ψ). Manche haben am Hinterrande eine schwarze Punktenreihe. Die Hinterflügel und die ganze Unterseite ist weiß; die Franzen weiß und schwarzbunt. Nur durch die Lupe entdecken sich an den glattscheinenden Fühlhörnern feine Zähne. Kopf, Brust und Füsse sind weißwollicht, und der Hinterleib ist ungefleckt, und bey dem Weibchen dicker. Wir haben diese Linne'sche und Wiener Gule mit Fabricius und Vorkhausen, wegen seines Habitats, den Spinnern benagzählt; und da mußte, weil wir schon einen Erle Spinner an der Cameline haben; der Name in Erlebuschspinner abgeändert werden.

Die großköpfige Raupe verbirgt durch ihre langen, weichen und dichten Haare fast ihren ganzen Körper. Sie wechselt, und ist bald hellarun, bald citronfarbig. Die auf dem 4, 6, 7, 8 und 11 Abschnitte befindlichen borstigen Haarbüschel gehen entweder alle, oder doch bis auf drey verloren. Die Haare selbst sind zum Theil an den Spigen kolbig, und stehen nicht gerade aus, sondern liegen um die Raupe im Kreis herum. Jung ist ihr behaarter, zweymal gestreifter Kopf schwarzbraun, späterhin wird er grüngelb. Ueber den Bauch zieht sich ein dunkelbrauner Streif. Die Raupe bereitet sich im September ein dichtes Seidengepinst, worein sie zernagte Holzspähne und eigene Haare mit einwebt.

Die Puppe ist dunkelrothbraun und kegelförmig; sie überwintert, um 3 Monate, d. i. bis in den May oder Anfang des Junius im künftigen Jahre, zu ruhen.

Aufenthalt. Der Spinner an den Italiänischen Pappelbäumen im May und Junius. Die im Junius aus dem Ey gekommene und im September erwachsene Raupe findet sich auf Birken, Erle, Espen, Italiänischen Pappeln und Sahlweiden. Es sind keine zwey Generationen vorhanden.

Anmerkung. Hier hat im Wiener Verzeichniß die Familie der Bärenraupen und edlen Spinner ihren Platz, deren Raupen auf jedem Dinge acht lang- und dichtbehaarte Knöpfe und ihre kurzjüngigen Spinner abhängige, besonders aber hochfarbige Hinterflügel haben. Ihre Verwandlung geschieht in einem weichen Gewebe über der Erde. Sie sind alle sehr schön gezeichnet, und wir wollen diejenigen unter ihnen kenntlich machen, deren Raupen sowohl niedrige Gewächse als auch Forstunkräuter zur Nahrung haben, und nur durch eine Ausnahme von der Regel, oder aus Mangel ihres eigentlichen Futtertrauts, an jungen Baumblättern oder Knospen nagen. Es sind folgende sechs:

a) Der Nesselspinner, *Phalaena Bombyx Caja*, Lin., die gemeine Bärenphaläne in den Linne's, Wiener, Fabricius, Vorkhausen, Gleditsch (II. 226.), Ever- und Röschen (I. 2. Classe, tab. 1.) Schriften. Die dachigen, caffèebraunen Vorderflügel sind mit weißen, bachelähnlichen Bügen durchschnitten: die hintern sind purpurroth, mit Schwarz bemakelt. Der Fühlgelbreit

gelbreite macht 2 Zoll 7 Linien, zuweilen 2 Linien mehr, aus. Die Phaläne variirt auf manchen Art. Ihre sehr gemeine, einsam lebende, lang- und dichthaarige, auf beyden Seiten der Einschnitte mit zusammen 369 blau glänzenden Puncten gezeirte und auf jedem Gliede mit zehn Haarknospfen versehene Raupe ist auf allen möglichen Gartengewäsen, auf Pappelrosen, durch eine Ausnahme von der Regel auf Garten-, Johannis- und Stachelbeersträuchen, Hollunder, zuweilen auf Brombeeren (weswegen sie hierher gehört) im May bis Junius vorhanden. Sie läßt sich auch nach Vorkhausen mit Giftpflanzen, als den Blättern der Wolfstriebe, Wilsentraut, Stachelpfeil, des brennenden und des Giftbienenfußes füttern, und spinnt sich in einem geräumigen, lockern Gewebe ein. Nach einer Puppenruhe von 3 bis 4 Wochen erscheint der Spinner zu Ende des Julius oder auch im August. Das Weibchen legt gewöhnlich zwey- bis dreihundert Eyer, obgleich Otto Friedrich Müller in der Naturforsch. XX. S. 103. sechszehnhundert will gezählt haben. Die Entwicklung aus dem Ey geschieht bald in 8, bald in 14 Tagen. Da sie nicht schaaarenweis erscheint, so ist sie uns, ungeachtet ihrer Gefährlichkeit, niemals lästig oder schädlich geworden.

b) Der Besenkrautspinner, Ph. B. Hera, Vien., Noctua, Lin., Weinwells spinner, Spanische Fahne, in den Enne', Wiener, Fabricius, Vorkhausen, Esper, Panzer, Nöfels (IV. 28. fig. 3.) und Kleemannschen (tab. 41. mit Raupe) Schriften. Die Vorderflügel sind schwarz, mit grünem Schimmer und gelben Strichen; die hintern hochroth, mit drey schwarzen Flecken. Die Flügelbreite beträgt 2 Zoll und 9 Linien, jeder Vorderflügel mißt 1 Zoll 2 Linien. Die einen Zoll und zehn Linien lange, einsam lebende, behaarte, schwarze, gelbgefleckte Raupe, hat eine hochgelbe Rücken- und beyderseits eine weiße Seitenlinie, und ist auf Besenkraut und Himbeersträuchen (weswegen sie hier anzuführen ist), Schottenweiderich, Weinwellskraut (Symphytum officinal. L.), Klee, Wegerich, und als Ausnahme von der Regel auf jungem Eichen- und Weidenlaub, im May und Junius erwachsen vorhanden. Sie spinnt sich locker ein, und ruht im Puppenstande 2 bis 3 Wochen. Zu Ende des Junius bis in den Julius erscheint der Spinner, und die Eyer, die das Weibchen legt, überwintern alsdann.

c) Der Spinatspinner, Ph. Bomb. Villica, Lin., Raumsfleck, schwarzer Bär, weißflechtige Bärenphaläne, Dornschfalter, Rüßerspinner, Mewerin, in den Enne', Wiener, Fabricius, Vorkhausen, Graham, Gleditsch (II. 226.). Esper- und Nöfelsen (IV. tab. 28. fig. 3.) Schriften. Die Flügel sind dachig; die vordern schwarz, mit 8 weißlichen Flecken; die hintern wachsgelb, und was den Saum, die Flügelspitze und einige Flecken betrifft, schwarz. Die Flügelbreite macht 2 Zoll, oft 4 Linien drüber. Seine schwarzbraune, mit auf Knospen stehenden Haarknospfen besetzte Raupe, mit dunkelrothem Kopf und Füßen, die im Laufen sehr geschwind ist, lebt gewöhnlich an weichen Gräsern und verschiedenen niedern Kräutern, als Spinat, Nessel, Lattich, Meyer oder Hühnerdarm (Alfina media), Schafgarben und Erdbeerblättern, nach Fabricius auf mehreren Küchenkräutern, nach Kleemann, und zwar durch eine Ausnahme von der Regel, an Schlehen; nach Linne, gleichfalls durch eine Ausnahme, an Ulmen. Nachdem sie vom Ey an von Monat Junius bis in den October zusammen siebenmal, und nach der Überwinterung im darauf folgenden März das achtmal (was Eigewes!) gehäut, verläßt sie außerordentlich stark frisst; so spinnt sie sich im April, zuweilen einen Monat später, ein, und wird eine schwarze, glänzende Puppe, daraus sieht nach einer 2 bis 4 wöchentlichen Ruhe im May oder Junius die Pflanze entwickelt. Da die Raupe keine Kostverächterin ist, so hat man sie auch hier einzumalen mit Johannisbeerblättern ernährt und erzogen.

d) Der

d) Der Himbeerspinner, Ph. Bomb. Dominula, Vien., Noctua, Lin., Eschen- spinner, Hundszungenspinner, Jungfer, Specht, liebreicher Vär, in den Linne', Wiener, Fabricius', Vorkhausen, Gleditsch (I. 342.), Esper- und Nöf'schen (III. tab. 47.) Schriften. Die Vorderflügel sind grünschwarz mit Seidenglanz, mit gelben oder weißen Fleck n; die Hinterflügel zinnoberroth, mit schwarzen ins Blaue spielenden Flecken. Die Flügelbreite beträgt 2 Zoll und 1 bis 2 Linien. Seine sehr schöne, vielsträhige, schwarzhaarige, mit drey gelb und weißen Linien gestreckte, auf jedem Ringe mit zehn starkbehaarten Knöpfen bezeichnete Raupe ist vorzüglich auf der Hundszunge, den Kleearten, dann auf Taubnesseln, Kackengeficht (Galeopsis L.), Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren (weswegen ihrer hier gedacht wird), und endlich nur durch eine Ausnahme, ehe der überwinterten Raupe ihr eigentliches Futterkraut herangewachsen, auf den Knospen der Wollweide, Eichen und Vogelbeerbäume, im April vorhanden, um sich im May einzuspinnen. Die Puppe ruht 4 Wochen, und der Spinner erscheint in der ersten Hälfte des Junius.

e) Der Kienschrötenspinner, Ph. B. Purpurea, Lin., Wegerkrautspinner, Purpurbär, Fünfbär, S. Vär, Purpurphaläne, Sterntrautspinner, in den Linne', Wiener, Fabricius', Vorkhausen, Gleditsch (II. 252.), Esper- und Nöf'schen (I. 2. C. tab. 10.) Schriften. Die Vorderflügel sind gelb, mit braunen Flecken; die Hinterflügel hochroth, mit schwarzen, ins Blaue spielenden Flecken. Das Ausmaß ist 2 Zoll 1 Linie. Seine wie Marum verum riechende, rauhe, graue, mit drey Reihen weißer Flecken und borstigen Büschelhaaren gezeirte, bald fuchsrothe, bald gelbe, bald weiße Raupe ähet sich auf Sternkraut (Galium Lin.), Kienschröten, das ist, Wesenkraut, auf Wegetritt, Ochsen und Hundszunge, und vielen andern, niedrigen Gewächsen, und aus Noth und Mangel obiger Kräuter an Etachelbeersträuchen, jungen Eichen oder auch zarten Pappelbaumknospen, nach ihrer Ueberwinterung im März, worauf sie im May erwachen ist, um sich in einem weiträutigen Gewebe zu verpuppen. Die Ruhe währt 3 Wochen. Die Erscheinung des Spinners erfolgt im Junius, oder spätestens im Julius. Sein Reinigungsfaß bey seiner Hervorkunft ist eine fleischfarbene Feuchtigkeit.

f) Der Schwingelspinner, Ph. B. Grammica, Lin., Streifflügel, Eichhörnchen, in den Linne', Wiener, Fabricius', Vorkhausen, Esper- und Nöf'schen (I. tab. 21. fig. a - d.) Schriften. Die schmalen Vorderflügel sind ockergelb, mit schwarzen Streifen; die hintern orangegelb, mit einem schwarzen Saume. Die Flügelbreite macht 1 Zoll und 5 Linien. Seine geschmeidige, schwarzbraune, mit einer rothgelben Rücken- und einer beyderseits weißen Seitenlinie gezeirte, auf jedem Ringe mit vielen rothbraunen Knöpfen besetzte und reichflüssige Raupe ist nach der Ueberwinterung auf dem Heidekraut (Erica vulgaris), Deyfuß, Wegerich, Mäusdhrlein, Sternkraut und weichen Gräsern, wie auch, aber selten, durch eine Ausnahme und gegen die Regel, auf Eichen und Schlehensträuchen, nach Hrn. Esper, im May anzutreffen. Sie verwandelt sich mit oder ohne Geschwinde zu Anfang des Julius, und ruht als Puppe 12 Tage, bis 3 oder 4 Wochen. Zu Ende des Julius erscheint das vollkommene Insect. Sein Flug erfolgt oft bey Tage, aber schwer und flatternd. Im Ehen sind seine Flügel um den Leib gerollt, und er könnte für einen Fabricius'schen Glasflügel passiren.

Fünfte Familie.

Hasenraupen. Gelbfüßige Spinner.

Nach diese Raupen haben ihre dichten Haare auf zehn, doch weniger sichtbaren Knöpfen, dazwischen meistens einen nackten Rückenstreif, und laufen u. gemein schnell. Die Verwandlung geschieht in einem leichten Gewebe, halb unter der Erde. Die Spinner haben kurze Spiralkungen, abhangende, meistens mit vielen schwarzen Puncten besetzte Flügel, rauhe, ockergelbe Schenkel der Vorderfüße, öfters auch den Hinterleib von solcher Farbe.

Weniger schädliche.

19. Der Hollunderspinner. *Phalaena Bombyx Lubricipeda*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelber Jäger, Ziegemotte, zweite Heermelmotte, gelbe, schwarpunctirte Bärenphalaena, gelber Hasenspinner, Schnellfuß, Gletschfuß, gletschfüßiger Nachtfalter, Mückenbärchen (beym Gladbach).

Phalaena Bombyx Lubricipeda Lin. 829. 69. Müller 675. 69.

Bombyx — — — Wiener B. 54. 1.

Bombyx — — — Fab. Ent. III. 1. 451. 138.

Phal. Bomb. — — — Vorkauf. III. 222. 69.

— — — Gleditsch I. 513. II. 225.

— — — Esper III. t. 66. mit Raupe.

Nöfel I. 2. Classe tab. 47. mit Raupe. Schaeff. Icon. 24. fig. 8. 9.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachförmig und hell ockergelb, die vordern mit einer schwarpunctirten Schräglinie; der Hinterleib ist rothgelb, mit fünf Reihen schwarzer Puncte. Das Männchen ist kleiner, dünnleibig und hat Kammsüßhörner.

Raupe. Gefräßig, in der Jugend blasgrün, dann hellfarbig, im Alter braun, mit einem blassen Rücken- und einem hellweißen Seitenstreif; jedes Glied hat rothgelbe Knöpfe mit Büschelhaaren.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Breite von einer Flügelspitze zur andern macht $1\frac{1}{2}$ Zoll, und die Länge jedes Vorderflügels $7\frac{1}{2}$ Linien aus. Der Rand aller vier ockergelben Flügel ist nebst dem mit fünf längsreihen schwarpunctirten Hinterleibe orange gelb. Es befindet sich nicht nur eine schwarpunctirte Schräglinie auf den vordern, sondern auch noch einzelne Puncte auf allen Flügeln. Kopf und Brustücken haben mit den Vorderchenkeln die Farbe der Flügel. Die beym Weibchen ungeschiederten Süßhörner sind bis in die Mitte schwarz, und von da bis zur Spitze grau. Die Unterseite weicht von der obern fast gar nicht ab. Die Weibchen fallen etwas ins Weibliche.

Die oben bestimmte, im Junius aus den Eiern gekrochene, in der Jugend blasgrüne, im Alter braune, mit einem blassen Rücken- und einem hellweißen Seitenstreif gezeichnete Raupe hat sters einen gelbbraunen Kopf, und auf jedem Gliede rothgelbe, haarbüschelige Knöpfe. Sie ist, den vielen Varietäten nach, bald grau grün mit grauen Haaren

ren oder hellstrohgelb mit schwarzen Haaren, bald roth und dunkelbraun mit schwarzen Haaren, oder auch mehr schwarz als dunkelbraun. Sie ist gefräßig, im Herbst erwachsen, und baut nach einer drey- (nach Brahm), oder viermaligen Häutung (nach Vorkhausen), vor, in oder nach dem August sich einen häutigen, braungelben Cocon zu ihrer Verwandlung. Die rothe Puppe ruht theils 2 bis 3 Wochen, theils, nämlich wenn sie überwintert, 9 Monate. Es sollen auch Raupen davon überwintern.

Aufenthalt. Der Spinner fliegt theils im May, theils, jedoch durch eine Ausnahme, indem es jährlich in der Regel nur Eine Generation giebt, im Herbst, und zeigt sich an Mauern, Baumstämmen, Gartenthüren und an Grastengeln. Die Raupe klettert a) im Freyen auf Schotenweiderich (*epilobium*), mehreren Münz-Arten, Vergiß mein nicht, Taubnessel, Ragengesicht, Andorn-Arten (*stachys*), Brennnessel, Mausohrlein (*hieracium pilosella*) und Löwenzahn; b) in Gärten auf Kohlgewächsen, lattich, Portulac, Aurikeln, Lachviolen, Levkopen, Aftern; c) als Ausnahme und gegen die Regel auf Weinlaub, jungen Weiden, und sogar nach Fabricius, wovon man aber sonst nichts Gewisses weiß, auf Eichen. Ueberhaupt möchten sie doch im strengsten Verstande kein Forstinsect seyn.

Fortpflanzung. Der weibliche Spinner legt gegen das Ende des Junius meistens gewöhnlich 450 Eyer besamen, mit einer schwachen Befestigung, und die jungen Raupen entwickeln sich daraus in acht Tagen.

Sechste Familie.

Bürstenraupen. Streckfüßige Spinner.

Diese Raupen tragen auf dem Leibe aufstehende, bürstenförmige Haarbüschel, auch sonst noch einige Knöpfchen und kürzere Haare. Die Verwandlung geschieht über der Erde, in einem weichen, nicht dichten Gewebe. Die Spinner sind jungelos, strecken in der Ruhe die rauen Vorderfüße artig voraus; haben theils abhängige, theils flach verbreitete Flügel. Es giebt hier 2 Linien.

Erste Linie. Beyde Geschlechter sind geflügelt.

20. Der Wallnußspinner. *Phalaena Bombyx Pudibunda*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Streckfuß, weißer Streckfuß, gelbe Bürstenphaläne, Nachtschwanz, Kopfhänger, schamhafter Nachtschmetterling, weißes Buschbärchen (beym Gladbach).

<i>Phalaena Bombyx Pudibunda</i>	Lin. 824. 44.	Müller 669. 44.
<i>Bombyx</i>	—	Wiener B. 55. 1.
<i>Bombyx</i>	—	Fab. Ent. III. 1. 438. n. 97.
<i>Phal. Bomb.</i>	—	Vorkhaus. III. 320. 120.
—	—	Gleditsch I. 453. II. 82.
—	—	Esper. III. t. 54. mit Raupe.

Nöf sel I. 2. Cl. t. 38. Weibchen, mit Raupe.

Schaeffer Icon. t. 44. f. 9. 10. Und t. 90. f. 1—5.

Kenn-

Kennzeichen der Art. Männchen. Weißgrau, mit 3 schwarzen Wellenlinien und einem Mittelmöndchen auf den Vorderflügeln; die Fiedern der gekämmten Fühlhörner sind nebst Vorderleib, Füßen und After mattbraunschwarz.

Weibchen. Etwas größer und heller, eben so liniert, mit einem verblichenen Mittelmöndchen. Kopf, Brustücken, Füße und Hinterleib haben die Farbe der Flügel; die Fühlhörner sind fadenförmig.

Raupe. Mehr pailienfarben als schwefelgelb, mit einem gelben Kopf und vier weißen, oder auch gelben abgestuften Haarbüscheln auf dem Rücken, und einem rosenrothen Pinsel auf dem letzten Ring.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügel sind dachförmig, und das Männchen mißt einen Zoll und acht Linien, hat drei schwarze Wellenlinien und ein Mittelmöndchen; die Fiedern der gekämmten Fühlhörner, der Vorderleib, Füße und After sind mattbraunschwarz. Das etwas größere und hellere Weibchen mißt 2 Zoll und oft 3 Linien drüber. Es ist eben so liniert, und mit einem verblichenen Mittelmöndchen bezeichnet. Kopf, Brustücken, Hinterleib und Füße sind mit den Flügeln gleichfärbig, und die Fühlhörner fadenförmig. Beide Geschlechter haben braune und weiße Franzen und am Hinterrand aller Flügel zwei verwischte aschgraue Stellen, auf der Unterseite aller Flügel einen Punct oder auch Mittelmond, mit einigen Verwischungen, dann rauchhaarige Schenkel. Es giebt Varietäten mit vier Wellenlinien.

Die einen Zoll 4 Linien lange **Raupe** ist mehr pailienfarben als schwefelgelb, hat einen gelben Kopf und vier weiße oder auch gelbe abgestuhte Haarbüschel auf dem Rücken, und einen rosenrothen Pinsel auf dem letzten Ringe; sie ist zu Ende des Sommers vorjanden, und verpuppt sich im October. Ihre in einem eyrunden Gewebe ruhende Puppe ist vornen schwarzbraun, hinten rothbraun, mit gelblichen Rückenhaaren. Sie überwintert und ruht 7 Monate.

Aufenthalt. Der Spinner lebt im April und Anfang des Mays auf den Stämmen solcher Bäume, wo die Raupe gewohnt hat, und an Zäunen und Mauern. Die Raupe weidet am liebsten auf Birnen und Pflrschen, aber auch auf Eichen, Buchen, Birken, Linden, Walnuß, Ulmen, Weiden und Obstbäumen, desgleichen auf Hopfen.

Schaden. Diese Raupe ist diejenige, welche gegen den Herbst 1799 im Fürstlich Zuldaischen, auf dem Gieseler und Kommerter Forstrevieren so überhand genommen hatte, daß sie in kurzer Zeit ein beträchtliches Stück Buchwald ganz entblättert haben soll. Man sehe Wagners und Hebig's botanisches Forsthandbuch 1800. Seite 149.

21. Der Tannenspinner. *Phalaena Bombyx Abietis*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Grüne Büschelphaläne, Tannennachfalter.

Phalaena Bombyx Abietis, Wiener Verz. 55. n. 2.

— — — Vorkhausen III. 324. 121.

— — — Esper III. t. 91. f. 2. Männchen und t. 81. f. 1. Weibchen.

cc

Pha-

Phalaena Bombyx Abietis, Hübners Beyträge III. t. 1. f. 1 — 3.
Fehl in Fabricius Schriften.

Kenzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind trübweiß; die vordern haben drey schwarze Wellenlinien und zwischen den beyden hintern einen großen ästigen schwarzen Fleck. Das Männchen hat ockerfarbige Fiedern an den weißschäftigen Fühlhörnern. Die erste Binde oder Linie ist winkelig gebogen. Die Hinterflügel, die Unterseite aller vier Flügel sind schwärzlich braun. Das Weibchen hat fadenförmige, ockerbraune Fühlhörner und weiße Hinterflügel mit schwachem Mittelschatten; die Unterseite ist weiß und etwas beschattet. Die erste Linie auf den Vorderflügeln ist gerade gezogen.

Raupe. Seladongrün, mit vier braunen Büscheln auf den vier mittlern Ringen, dann zwey langen Kopf- und einem langen Schwanzpinsel.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß ist wie bey dem nächstvorhergehenden Wallnussspinner. Die trübweißen Vorderflügel haben drey schwarze Wellenlinien und zwischen den beyden letztern einen großen, schwarzen, ästigen Fleck, viele eingesprengte Atomen und einen zweyfach schwarz punctirten Hinterrand. Der Vorderleib ist vornen aschgrau, hinten weiß und zugleich schwarz bandirt. Der Hinterleib ist schmutzig weiß. Beym Männchen haben die weißschäftigen Fühlhörner ockergelbe Fiedern. Die erste Wellenlinie der Vorderflügel ist winkelig gebogen; die Hinterflügel und die ganze Unterseite ist schwärzlich braun mit einem schwarzen Mondfleck. Beym Weibchen sind die ockerbraunen Fühlhörner fadenförmig; die erste Wellenlinie ist gerade gezogen und etwas beschattet.

Die Raupe, von der man noch keine Abbildung hat, ist seladongrün mit vier braunen Büscheln auf den vier mittlern Ringen, dann 2 langen Kopf- und einem langen After = Pinsel, desgleichen in der Nähe der Bauchfüße einen weißen, schwarzbegrenzten Flecken. Bey Varietäten sind die Haarbüschel dunkelgrün. Sie spinnt sich wie die vorhergehende in einem doppelten Gewebe ein, und wird eine haarige braune Puppe, die 2 bis 4 Wochen ruht.

Aufenthalt. Man fand ihn bisher nur im südlichen Deutschland, im Junius nämlich die Raupe, 3. B. bey Augsburg, und zwar selten.

22. Der Kleeblumenspinner. Phalaena Bombyx Fascelina, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schwarze Bürstenphaläne, Bürstenmotte, Büschelraupenvogel, Büschelnachtsalter, gestreiftes Band, achatfarbiger Streckfuß, graues Buschbärchen (bey Gladbach).

Phalaena Bombyx Fascelina Lin. 825. 55. Müller 669. 55.

Bombyx — — Wiener Verz. 55. n. 3.

Phalaena Bombyx — — Fabr. III. Ent. 1. 439. n. 98.

Phalaena Bombyx — — Vorkh. III. 317. n. 119.

— — — — Gleditsch I. 541. II. 46. und 259.

— — — — Esper III. t. 55. f. 1 — 5. mit Raupe.

Mösel I. 2. El. Tagvogel, t. 37. Weibchen, mit Raupe.

Ken-

Kennzeichen der Art. Spinner. Die dachförmigen Flügel sind aschgrau; die vordern mit 2 fein gestrichelten schwarzen, zuweilen gelbbestäubten Querstreifen. Das Männchen hat gefiederte Fühlhörner, das Weibchen am After einen schwarzen wulstigen Wulst.

Raupe. Sie hat über den Rücken fünf viereckige weiße Haarbüschel, die oben an der Spitze weiß sind. Weit länger sind 2 schwarze Hals- und ein auf dem elften Glied stehender Haarpinsel; der 9. und 10. Ring führt jeder ein rothes Knöpfchen, das sie aus- und einziehen kann.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner misst 1½ Zoll, der weibliche aber 2 Zoll. Die aschgrauen Vorderflügel haben zwei feingestrichelte, schwarze, zuweilen gelbbestäubte Querstreifen. In der Köpfschen Abbildung sind diese Streifen zu roth. Uebrigens steht in der Mitte zwischen beiden zuweilen ein schwarzer Punct. Die Hinterflügel sind einfarbig, etwas hellaschgrau, mit oder ohne einen schwärzlichen Mittelfleck. Das Männchen hat gefiederte Fühlhörner, das Weibchen am After einen wulstigen Wulst. Das ganze Insect und die Unterseite aller vier mit einem Mittelfleck bezeichneten Flügel sind aschgrau. Von seiner sonderbaren Stellung im Sizen heißt dieser und der Ballnusspinner: Streckfuß. Er variirt auf verschiedene Art.

Die 1 Zoll und 7 Linien lange, im September aus dem Ey gekommene, nachher überwinterte Raupe ist im May erwachsen, und hat über den Rücken fünf viereckichte weiße Haarbüschel, die oben an ihrer Spitze weiß sind; weit länger sind zwei schwarze Halspinsel und der auf dem vorletzten Glied stehende Haarpinsel; der 9. und 10. Ring führt jeder ein rothes Knöpfchen, das sie aus- und einziehen kann. Jeder ihrer Ringe hat zusammen vier schwarzgraue Knöpfe. Die Lustlöcher sind gelbroth, und sie macht sich zur Verwandlung in der ersten Hälfte des Junius ein eisgraues, geräumiges und eyrundes Gewebe, darin die schwarzbraune Puppe mit braunen büschelweis besetzten Haaren drey bis vier Wochen ruht.

Aufenthalt. Der Spinner ist im Julius meistens überall zu Hause, und seine Raupe weidet auf Löwenzahn, Wegerich, Klee, allen Grasarten, falschen Nibernetz (poterium sanguisorba), Schlehen, Obst, Weiden, Eichen, und ist im May erwachsen.

23. Der Haselspinner. *Phalaena Bombyx Coryli*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Haselphaläne, Haselcule, Haselnusspinner, Haselstaumachsfalter, Haselmotte,

Bejner.

<i>Phalaena Bombyx Coryli</i> , Lin.	823. 50.	Müller 667. 50.
— — —	—	Wiener Verh. 55. 4.
<i>Bombyx</i> — —	—	Fab. Ent. III. 1. 445. 114.
<i>Phalaena Bombyx</i> —	—	Porthaus III. 326. 123.
— — —	—	Gleditsch I. 453. und II. 225.
— — —	—	Nau Korkwiss. 295.
— — —	—	Esper III. t. 50. f. 1 — 5. mit Raupe.

Hasel I. Naztrod. 2. Classe. t. 58. mit Raupe.

CCC 2

Kenn-

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig; die vordern auf der vordern oder innern Hälfte hellbraun, auf der hintern bläulich aschgrau, durch eine dunkelbraune Linie getrennt, und haben einen schwarzen, weißgeringelten Punct; die Hinterflügel sind gelbgrau, und die Füßhörner gelb.

Raupe. Fleischfarbe, mit 2 langen gelbrothen, vorwärts ausstehenden Haarbürsten am Kopf, zwey so gefärbten, abgestutzten auf dem 4. und 5. und einer auf dem letzten Gelenke.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß von einer Flügelspitze zur andern beträgt $1\frac{1}{2}$ Zoll. Auf der vordern, oder der nach der Wurzel hingerichteten hellbraunen Querehälfte der Vorderflügel, durch die sich ein Winkelfstreif zieht, ist statt eines Stigma ein schwarzer Punct mit weißem Ringel. Die bläulich-ashgraue Hinterhälfte, die sich durch einen weißlichen kappenförmigen Querstreif wieder in 2 Felder theilt, fügt ein Stigma (Narbe), das aus einem subtilen nierenförmigen Fleck besteht. Die Fäzen wechseln mit Weiß und Braun. Die Hinterflügel sind ockergelbgrau, die Füßhörner gelb, der Vorderleib braunscheficht, der Hinterleib mit der ganzen Unterseite dunkelashgrau. Bey Varietäten bilden die beyden Stigmas fast die Nummer 10, wovon der Schmetterling bey einigen Liebhabern den Namen des Zehners erhalten.

Die fleischfarbene, mit dünnstehenden gelben Härchen besetzte, einen Zoll messende Raupe hat 2 lange gelbrothe, vorwärts ausstehende Haarbürsten am Kopf, zwey vergleichen, aber abgestuzte auf dem 4. und 5. und eine auf dem letzten Gelenke, dann auch einen dunkelbraunen Rückenstreif und auf dem ersten Ring einen dunkelgrauen Fleck und dunkelfarbige Lufelöcher. Im September ist solche ausgewachsen, und macht sich zur Verpuppung ein graues Gespinnst zwischen Blättern. Die vornen schwarze, hinten braunrothe Puppe überwintert, und ihre Ruhe dauert 7 bis 8 Monate.

Aufenthalt. Der Spinner findet sich im May an Thüren, Geländern und Mauern der Gärten, oder auf Blüthen. Die Raupe lebt vom Junius an bis zum September auf Haseln, Birken, Linden, Buchen und Eichen.

Zweyte Linie. Die Männchen haben flachverbreitete Flügel; die Weibchen sind flügellos.

24. Der Apricosenspinner. *Phalaena Bombyx antiqua*, Linn.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sonderling, Paradoxum, antiker Spinner, Lastträger, Esperetrvögelschen (bey Gladbach).

Phalaena Bombyx antiqua, Linn. 825. 56. Müller 671. 56.

— — — — — Wiener Verz. 55. n. 5.

B o m b y x — — — — — Fab. Ent. III. t. 476. 216.

Phalaena Bombyx — — — — — Vorkhausen III. 331. 125.

— — — — — Gleditsch I. 310. und 442.

— — — — — Rau Landwirthschaft, S. 189.

— — — — — Brahm Ins. Cal. II. 410. n. 289.

— — — — — Esper III. t. 56. f. 1—5. nr. Raupe.

Nöfel I. 2. Classe. Nachtvög. t. 39. mit Raupe; III. t. 13. Männchen.

Kenn-

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Flügel liegen über einander; die vordern sind rostbraun, mit 2 verlorenen Querbänden, und einem weißen Halbmondchen am Hinterwinkel; die hintern sind gelblichrostbraun.

Weibchen. Gelbgrau behaart, mit schmalen Vorder- und sehr dickem Hinterleib, kleinen fadenförmigen Fühlhörnern und ohne Flügel.

Raupe. Mit 4 weißen, abgestuften Rückenbüscheln, 2 Haarplüscheln hinter dem Kopfe, 2 dergleichen seitwärts am vierten und fünften Ringe, und einem schwarzen am letzten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Schmetterling misst von einer Flügelspitze bis zur andern bald 1 Zoll 1 Linie, bald 3 Linien mehr, und hat rostbraune Vorderflügel mit 2 verlorenen Querbänden, und einem weißen Halbmondchen am Hinterwinkel; gelblich rostbraune Hinterflügel, und auf der Unterseite ein hellfarbiges Rostbraun auf allen Flügeln. Die Fühlhörner sind gelblich und gefiedert. Der weibliche ist sehr träge, unscheinlich, gelbgrau behaart, mit einem schmalen Vorderleib, und sehr dicken, mit Eiern ganz voll gepfropften Hinterleib, kleinen fadenförmigen Fühlhörnern, und statt der Flügel sind nur Flügelansätze oder Stümpfschen vorhanden.

Man glaubte ehemals, daß es von seinem Männchen bey der Begattung durch die Luft getragen, und auf hohe Bäume gehoben werde; daher der Name: Lastträger. Es ist aber ein Irrthum.

Die oben beschriebene Raupe, die in der Regel aus überwinterten Eiern im April oder May austriecht, und von da an fast den ganzen Sommer durch gefunden wird, ist jung haarig und schwarz, wie eine Varenraupe ohne Rückenbüscheln, die sie erst in der dritten Häutung bekommt. Auf dem 8 bis 10 Ringe stehen drey Paar hochrother Knöpfchen, zwischen 4 gelben Pünctchen. Aber zwischen dem 9. und 10. Gliede befindet sich ein noch viel mehr hochrother, fleischiger, blasenartiger Knopf, den die Raupe aus- und einziehen kann. Sie verwandelt sich nach vier Häutungen gewöhnlich zu Ende des Junius, zuweilen auch später, im Julius und Augusts: Anfang, in einem eysförmigen, doppelten Gespinnst von eingewebten Raupenhaaren in eine gelbe, dunkelbraun bandirte Puppe. Die kleiner bleibenden Raupen geben männliche Schmetterlinge. Die Puppenruhe währt 8, 10 bis 12 Tage.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint jährlich einmal, wiewohl in ungleichen und unbeständigen Zeiträumen, vom Ende des Junius bis August, auf Himbeer-, Pirschen- und mehreren Gesträuchen. Die Zeit der Erscheinung der auf Haseln, Ulmen, Obst- und Apricosenbäumen, und nach hiesigen Beobachtungen auch auf Eichen, Hainbuchen, Stachelbeeren, Masholder und Heckenkirschen weidenden Larve ist oben bemerkt.

Fortpflanzung. Da ich (Scharfenberg) sie sehr oft erzogen, und mir keine Fille von einer doppelten jährlichen Generation, davon Brahm a. a. O. redet, wenigstens in hiesigen Gegenden, vorgekommen; so glaube ich, daß bey frühzeitiger Frühlingswärme, besonders im südlichen Deutschland, einzelne Individuen frühzeitiger, als gewöhnlich,

lich, nämlich im Anfange des Aprils, schon das Ei verlassen, und weil sie dann schon bald im Junius Schmetterlinge werden, die Eltern von den später im Herbst erscheinenden Raupen seyn. Hiermit stimmt auch Vorkhausens Wahnehmung überein, daß es zuweilen überwinterte Puppen gebe.

Das Weibchen legt gewöhnlich 300 Eier, wiewohl Klemm auch einstmals 400 gezählt hat, in Klumpen, da sich denn die Jungen nach dem Austriecken im April und May bald zerstreuen.

25. Der Zwetschenspinner. *Phalaena Bombyx Gonostigma*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Effleckt, effleckichter Spinner, Pommeranzenvogelchen (bey Gladbach).

<i>Phalaena Bombyx Gonostigma</i>	Lin. 826. 57.	Müller 670. 57.
Bombyx	—	Wiener Bz. 55. 6.
Phal. Bomb.	—	Fab. Ent. III. t. 477. n. 217.
	—	Vorkhaus. III. 329. 124.
	—	Esper III. t. 56. f. 6—10. mit Raupe.
Rösel I. 2. El. Nachtvögel. t. 40.	mit Raupe.	

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Flügel liegen über einander; die vordern sind glänzend, schwarzbraun, ins Ockergelbe fallend, mit 2 einander gegenüber liegenden weißen Makeln von ungleicher Gestalt und Größe.

Weibchen. Der flügellose Körper ist schwärzlich aschgrau behaart; das Uebrige wie bey dem vorhergehenden.

Raupe. Schwarz, und pommeranzengelb gestreift, mit 8 gelben Rückenbürsten, zwey schwarzen Haarpinseln am Kopfe, und einem solchen am After.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner mißt in der Flügelausbreitung 15 bis 16 Linien, jeder Vorderflügel in die Länge 7 Linien. Seine glänzenden, schwarzbraunen, ins Ockergelbe fallenden Vorderflügel haben 2 gegen einander überliegende, weiße, ungleiche Flecken. Der an der Spitze oder dem Vorderwinkel in einem kastanienbraunen Grunde stehende kleine Fleck ist rund, der am Innen- oder Schwanzwinkel befindliche größere aber dreyeckig; zwischen beyden zieht sich bald eine Schartenlinie, bald eine weiße Punctenlinie, und gegen die Wurzel eine oft undeutliche, schwarz eingefasste, mit hellem Rand begränzte, rothbraune Makel. Die Hinterflügel sind glänzend und dunkelbraun auf beyden Seiten. Auf der Unterseite haben die vordern, welche da hellbraun sind, an der Spitze einen weißen Fleck und schwarze Schattirung. Alles Uebrige am ganzen Insect ist dunkelbraun, und die Füßhüner gelbbraun und gesiedert.

Das Weibchen gleicht dem Weibchen des nächstvorhergehenden, ist eben so träge, eben so ungestaltet, so schön auch die an der Seite mit einer gelben Warzenlinie bezeichnete, gar nicht, wie Fabricius unrichtig angiebt, gefellig lebende Würstenraupe ist, bey welcher man entweder das Schwarze oder das Pommeranzengelbe zur Grundfarbe annehmen kann; im letztern Falle sind die längsstreifen schwarz. Von den 8 gelblichen Rücken-

Haarbüscheln stehen allemal zwey beisammen; auf den zwey vor, und den dreyn hinter denselben befindlichen Ringen oder Absätzen stehen äußerst kleine weiße, abgestufte Haarbüscheln. Die 2 längern Haarpinsel des Kopfs und derjenige des Hinterendes führen an der Endspitze eben solche, wie die Apricespinnerraupe. Uebrigens fehlen unserer die Seitenhaarpinsel, die jene am 4. und 5. Abgange hat. Sie verpuppt sich gemeinlich zu Anfang des Junius in einem Gespinste wie jene. Die männliche Puppe ist glänzend rothbraun und schlank, die weibliche schwarzbraun und weißgescheckt; beyde mit rothgelben Haaren bewachsen und lebhaft. Ihre Ruhe dauert 2 bis 3 Wochen.

Aufenthalt. Die erste Erscheinung des Schmetterlings ist zu Ende des Junius, die zweyte in der Mitte oder zu Anfang des Septembers. Die Raupe ähet nicht nur auf jungen Eichen, Schlehen, Pflaumen, wilden Rosen und Heidelbeeren, sondern auch auf Brombeer-, Himbeer- und Hartriegelsträuchen (*Cornus sanguinea* L.), vom May bis in den Herbst, weil nämlich die von den überwinterten Eiern herkommenden Raupen zu Ende des Mays ausgewachsen sind, die von der Sommerbrut aber im August ihre völlige Größe erreicht haben, so daß man also den Sommer hindurch sie von verschiedener Größe wahrnimmt.

Fortpflanzung. Die Eier dieses in unsern Gegenden nur sehr einzeln vorkommenden Spinners werden vom Weibchen 6 Tage nach der Begattung in einen einzigen Klumper zusammengelegt, um sich in 14 Tagen darauf zu entwickeln und zu zerstreuen.

Siebente Familie.

Schopfraupen. Stirnstreifige Spinner.

Diese Raupen haben nur auf dem vierten und letzten Ringe aufstehende, aber fast spitzig zusammenlaufende Haarbüsche, sonst auch einige Knöpfchen und feine Haare auf dem Leibe. Die Verwandlung geschieht über der Erde in einem dichten, doch weichen Gewebe. Die Spinner sind jungelos, haben abschließende Flügel mit einer Makel am Hinterrande, über den Kopf bis auf den halben Rücken einen dunkelbraunen Streif, die Männchen einen zweybüschartigen Hinterleib, den sie in der Ruhe über die Flügel erheben.

Anmerkung. Diese Spinner heißen auch bey einigen Schriftstellern Hochschwänze und Hochschwanzphalänen, weil sie nämlich im Sitzen die sonderbare Stellung annehmen, daß sie den Kopf und die Fühlhörner ganz zurückziehen, die Vorderfüße weit vorsehen, und den Hinterleib in die Höhe strecken, daß das Hinterende zwischen den Flügeln hervorsticht.

Daß sie jungelos sind, ist so zu verstehen, daß ihre Spiralsunge, die beyhm Vorbeerweiden spinner eine halbe Linie lang und von den Bartspitzen bedeckt, und gelbbraun ist, äußerst klein ausfällt.

Es sind weniger schädliche.

26. Der Vorbeerweidenspinner. *Phalaena Bombyx Anastomosis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wirtband, Wirtbandnachjaler, grauer Hochschwanz, brauner, streifiger Spinner, Espenspinner, Espenmotte.

Phalaena

Phalaena Bombyx Anastomosis	—	Lin. 824. 53. Müller 668. 53.
Bombyx	—	Wiener Bz. 55. 1.
Phal. Bomb.	—	Fab. Ent. III. 1. 448. 126.
—	—	Gorth. III. 335. 126.
—	—	Gleditsch II. 46. n. 30.
—	—	Nau Forstw. 296.
—	—	Esper III. t. 52. f. 1—4. mit Raupe.
Rösel I. 2. Cl. Nachzög. t. 26. mit Raupe.		

Kenntzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig; die vordern theils braungrau, theils rothbraun, mit drey weißen, schwarzbezügten Schrägslinien, hinter denen im rothbraunen Felde eine Querreihe schwärzlicher Flecken sich durchzieht; die Fühlhörner sind gelbbraun, und bey dem Männchen gesiedert.

Raupe. Schwarzbraun, dünnbehaart; sie führt auf dem schwarzen, hellpunctirten Rücken auf dem vierten Gliede einen größern, und auf dem vorletzten einen kleinen braunen Haarzapfen, und an den Seiten eine rothpunctirte Linie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügelbreite beträgt bey diesem, in seiner Familie größten, Spinner einen Zoll und acht Linien, so daß jeder Vorderflügel 9 Linien Länge hat. Seine am Innenrande braungrauen Vorderflügel mit drey gelblich weißen, braungesäumten Schrägslinien sind gegen die übrigen Ränder hin rothbraun. Die 2. und 3. Schrägslinie, zwischen welchen eine schwärzliche Nierenmakel steht, werden noch durch eine besondere, aber in verkehrter Richtung gezogene Schrägslinie verbunden. Von diesen Charakteren führt er den Namen; Wirrband. Die schwärzliche Fleckenreihe am Hinterrande bildet eine kappenförmige Binde. Kopf und Vorderleib mit seiner dicht am Kopfe gezeichneten schwarzen Makel, sind wie die Vorderflügel, und der Hinterleib wie die*) gelbbraunlichgrauen Hinterflügel (die Rösel aber schwarzbräunlich gemahlt hat) gefärbt. Der Reinigungsast ist nicht wie bey andern Phalänen braun, sondern nach Keemanns Beobachtung blutroth.

Die einen Zoll und 8 Linien messende Raupe ist schön, und am Kopf, Hals und Bauch schwarzbraun, der Rücken schwarz, auf jedem Ringe, vom 5. bis zum 10., mit 2 weißen und 2 gelben Puncten bezeichnet. Auf dem vierten Ringe steht ein größerer, und auf dem vorletzten ein kleinerer Haarzapfen, deren jeder oben vier weiße Knöpfchen führt. Die gelbe Längslinie an jeder Seite hat 7 bis 8 rothe Haarknöpfe. Sie ist das erstemal im Julius (nur bey Ausnahmen im Junius schon), das zweytemal im September erwachsen, und verwandelt sich dann in einem bald röthlichweißen (wie bey Röseln), bald gelbbraunen, dünnen Gespinnst in eine schöne, schwärzlichblaue Puppe mit 2 hochrothen Rückenstreifen, die im ersten Falle 10 bis 14 Tage, im zweyten beynähe 8 Monate ruht und überwintert.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Schmetterling erscheint nach Brahm, Ins. II. S. 468, zuerst im May, dann wieder im Julius, oder zu Anfang des Augusts. Die Raupe frisst auf Weiden, Weißdorn, allen fremden und einheimischen Pappel-Arten, wozu die Espe gehört, und auf Pflaumen, in den vorhin angezeigten Jahreszeiten.

*) Nach meinen vom Hrn. Pfarrer Scriba zu Arheilgen erhaltenen Exemplaren. Sch.

27. Der Rosenweidenspinner. *Phalaena Bombyx Curtula*, Linn. *Anachoreta*, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kurzafter, rother kurzafteriger Nachfalter, rothgelber Erpelschwanz.

Phalaena Bombyx Curtula Linn. 823. 52. Müller 668. 52.*Bombyx* — — Wiener W. 55. 2.Fabr. Ent. III. 1. 447. 123. War in dessen Syst. entom. und in den Spec. insectorum auf Pinne⁹⁸ Veranlassung mit den beiden folgenden verwechselt worden; auch in der Ent. III. bedürfte sie einer verbesserten Diagnose.*Phal. Bomb.* — —

Borkhaus. III. 338. 127.

— — *Anachoreta*

Esper t. 51. f. 5. und t. 86. f. 6. 7. Raupe 16.

— — *Curtula*

Schwarzens Beitr. 1792. tab. 17. fig. 1—4. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die ockergelben Flügel sind dachig; die vordern haben vier weiße Querstreifen, und an der rothbraunen Flügelspitze eine schwarze Punctenreihe; die Fühlhörner des Männchens sind gefiedert, die des Weibchens aber fadenförmig.

Raupe. Grau, fein- und dünnbehaart, mit einer schwarzen Warze sowohl auf dem dritten, als vorletzten Gliede; über den Rücken geht ein röthlicher Streif, und in den Seiten sind rothe Puncte. Sie variirt sehr.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Spinner, der kleiner als der vorübergehende ist, hat eine Flügelbreite von 1 Zoll und 2 Linien. Das Ockergelbe der Flügel fällt ins Fleischfarbene, und ihre 4 weißen Querstreifen haben nicht gleiche Richtungen. Die in einem weiten Raume roth gefärbte Flügelspitze hat einen Streifen von zusammengereichten schwarzen Puncten, die zwar verblischen sind, sich aber doch über die Gränzen des Raums ganz durchziehen. Die Hinterflügel sind blasser gefärbt, und eben so die eben nichts Auszeichnendes habende Unterseite aller Flügel und das ganze Insect, doch so, daß das Bruststück über den Kopf mit einem großen rothen Flecke geziert ist. Der Schopf des Afters ist beim Männchen mehr und deutlicher getheilt, als beim Weibchen, das an sich größer und mit fadenförmigen Fühlhörnern versehen ist, statt deren das Männchen gefiederte hat.

Die Raupe ist grau, feinbehaart, mit einer schwarzen Warze sowohl auf dem dritten, als vorletzten Gliede; über den Rücken geht ein röthlicher Streifen, und in den Seiten sind rothe Puncte. Sie variirt auch mit einem ins Gelbe fallenden grünen Grunde, braunem Kopfe, und vier aus blaßgelben Flecken gebildeten Längsreihen; dergleichen zuweilen mit schwarzen Seiten-Alomen. Sie lebt zwischen zusammengespinnenen Blättern, worin auch ihre Verwandlung, wenn sie theils im Anfange des Julius, theils wieder im August und September erwachsen ist, erfolgt. Ihre glänzende, braune, hinten gestielte Puppe ruht in der einen Periode nur 14 Tage, in der andern aber 7 Monate. Es ist doch etwas Eigenes und Sonderbares, daß die Espersche Abbildung und Beschreibung der Raupe eben dieses Spinners wieder von der Fabriciusschen und Borkhausenschen abweicht.

Esper fand sie (tab. 86.) 1790 zu Ende des Junius nur auf den Sahlweiden zwischen Blättern. Sie war dünnbehaart, von einem Meergrün, das sich über den Rücken ins Weiße verlor. Zur Seite der Luftlöcher waren hellgelbe verlorene, mit schwarzen Punkten begränzte Flecken, und über dieselben noch eine Reihe gelblicher verblichener Makeln. Ueber dem vierten und vorletzten Ringe standen 2 kegelförmige, abgestumpfte, glänzende Warzen mit feinen weißen Haaren besetzt. Der sehr flache Kopf war blaß ockergelb, die sämtlichen Füße aber dunkelgrün. Sie verpuppte sich zu Ausgang des Julius in einem dünnen hochgelben Gewebe in eine braune Puppe, woraus nach einer Ruhe von 14 Tagen, am 10. August, der Schmetterling hervorging. Eine andere Varietät, die Gerning hat zeichnen lassen, hatte einen breiten, gelben Rückenstreif, der durch einen feinen schwarzen Strich getheilt war; der Kopf war größer und von dunkelbrauner Farbe.

Die Schriftsteller: Bieweg, Jung, Lang und Friesly, haben die Espersche Benennung: Anachoreta, beygehalten.

Aufenthalt. Der Schmetterling erscheint im May, und zum zweytenmal im Julius, an den Stämmen der Weiden, Schwarzpappeln und Italianischen Pappeln. Die Raupe frisst auf diesen Bäumen, und auf der Lorbeer-, Rosen-, Babylonischen und Sahlweide in den oben bemerkten Zeiträumen. Brahm hatte sie durch mehrere Generationen zu Hause aus den Eiern gezogen, und gefunden, daß die überwinterten Puppen keine Ausnahme von der Regel seyn.

28. Der Korbweidenspinner. *Phalaena Bombyx Anachoreta*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Afchgrauer Erpelschwanz, große Erpelschwanzphaläne, kurzleibiger afchgrauer Spinner, kleiner Waffenträger, Weidenglutchen (beym Gladbach).

Phalaena Bombyx Anachoreta	Wiener Bz. 56. 3.
Bombyx —	Fab. Ent. III. 447. 125.
Phal. Bomb. —	Borkhauf. III. 341. 128.
— — Curtula	Gleditsch I. 513. II. 46.
Rösel III. t. 43. mit Raupe.	Esper 51. fig. 1—4. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind bläulichafchgrau, die vordern mit einigen weißlichen, ungleichen Querlinien, an deren Flügelspitze in einem großen braungrauen Fleck sich eine weiße geschwungene Querlinie durchzieht; am Schwanzwinkel steht ein deutlicher schwarzer Punct. Die Fühlhörner des an sich kleinern Männchens haben einen weißen Schaft, und sind gefedert, diejenigen des Weibchens sind fadenförmig.

Raupe. Weich, dünnbehaart und über den Rücken gelbgrau, mit vier unterbrochenen Längslinien, auf dem 4. Glied steht eine größere, und auf dem vorletzten eine kleinere, rothgelbe Warzen-Erhöhung; in den Seiten ist sie grau gezeichnet.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Spinner mißt gewöhnlich 1 Zoll 2 Linien, und nach Rösel's Zeichnung 2 Linien mehr,

mehr, und ist dem vorhergehenden ziemlich ähnlich. Seine bläulichschgrauen Vorderflügel werden von einigen weißlichen Querlinien durchzogen. An der Flügelspitze steht ein großer braungrauer Fleck mit einer weißen durchziehenden geschwungenen Querlinie. An der Wurzel ist die Farbe dunkler, und hinter der weißen Querlinie stehen nicht nur viele gelbe Fleckchen, sondern auch eine verloschene Punctenreihe. Am Schwanzwinkel steht ein schwarzer Punct und neben demselben zuweilen noch ein sehr kleiner. Die Hinterflügel sind so wie die ganze Unterseite der Flügel, nebst dem übrigen ganzen Insekt einfarbig aschgrau; doch zeigt sich nahe am Kopf über dem Bruststückchen der schwarze Familienfleck. Das Hinterende des Leibes hat eben so getheilte Haarbüschel als unser vorhergehender, und die weißschäftigen Fühlhörner sind beym Männchen gefiedert, aber nicht beym Weibchen.

Die einen Zoll und 2 Linien lange Raupe ist weich, dünnbehaart und über den Rücken gelbgrau, mit 4 unterbrochenen Längslinien; auf dem 4. Glied steht eine größere und auf dem vorhergehenden eine kleinere, rothgelbe Warzen-Erhöhung: in den Seiten ist sie grau gezeichnet; sie muß sehr variiren. Köpfe hat sie mit fleischfarbenem Rücken und auf jeder Seite mit 2 gelben Punctenreihen vorgestellt. Kleemann in seinen Anmerkungen über Köpfe fand sie klinköpfig, mit bräunlichgelben Härchen und mit schwarzen Punkten besetzten Seitenflächen. Auf dem 9. und 10. Absatz sind 2 runde Bläschen, die die Raupe nach Gefallen einziehen oder erheben kann. Sie spinnt sich einmal im Junius, das doppelmal zu Ende des Septembers zwischen Blättern oder auch Baumrissen ein, und ihre Puppenruhe dauert in der schönen Jahreszeit 14 Tage, in der rauhern aber 7 Monate, vom October an gerechnet.

Der Name *Curtula* wird dieser Art nicht nur von Esper und Gleditsch, sondern auch von Hufnagel, Rottenburg (im Naturforscher), Lang, Mader und Kleemann beigelegt.

Aufenthalt. Der Spinner zeigt sich bey seiner ersten Erscheinung an Weidenstöcken im May (einsmalen bey uns im April), und bey seiner zweiten im Julius, oder als Spärling wie beym Köpfe im October. Die vom Junius an bis Herbst in allen Gestalten, und im erwachsenen Stand jährlich nur zweymal auf den nämlichen Bäumen, wie die vorhergehende, unter zusammen gesponnenen Blättern wohnende Raupe, zieht die Weidenblätter den andern vor, und baut, so oft sie ihr Haus verzehret hat, sich ein neues.

Körpfpflanzung. Ihre halbkegelrunde Eier werden theils im Junius, theils im August und September von den Müttern auf ihre Nahrungsblätter, bald 2, bald 3, 5, 6 und mehr Eier auf Ein Blatt gelegt, und die daraus kriechenden Raupen sind schwarzköpfig, und können sich sogleich Faden spinnen. Sie überwintern nur im Puppenstand.

29. Der Rosmarinweidenspinner. *Phalaena Bombyx reclusa*, Vien.
Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleiner Erpelschwanz, kleiner kurzasteriger Nachfalter, kleine Erpelschwanzphaläne, Leppich (beym Gladbach).

Phalaena Bombyx Reclusa	Wiener Verh. 56. n. 4.
Bombyx	— Fab. Ent. III. 1. 447. 124.
Phal. Bomb.	— Gorthausen III. 344. 122.
— —	— Nau Fortw. wissensch. 296.
— —	— Esper III. t. 51. fig. 6 — 3 mit Raupe.
Rösel IV. tab. 11. fig. 1 — 6.	mit Raupe.

Kenntzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind röthlichgrau und blass; die vordern haben vier weißliche wirrbandähnliche Querstreifen, wie der Vorbermeidenspinner, und im Schatten des dritten Streifs am Vorderrand einen deutlichen, weißen, hingegen am Hinterrand einen sehr verblichenen ziegelfarbigen Fleck. Die Fühlhörner sind wie bey dem vorhergehenden.

Raupe. Dünnebehaart und dunkelashgrau, mit einem breiten, gelben Rückenstreif, und auf jedem Gelenk in der Mitte ein schwarzes Fleckchen. Die beyden Warzen stehen auf dem 4. und vorletzten Gelenk.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Schmetterling hat nur einen Zoll Flügelbreite, und ist kleiner und bey uns seltener als die vorhergehenden, bey Darmstadt aber gemein. Die Flügel sind röthlichgrau. Vier weißliche, wirrbandähnliche Querstreifen, ferner ein weißer Fleck im Schatten des dritten Streifs, und ein ziegelrother verblichener Fleck am Hinterrand bezeichnen die Vorderflügel. Nicht allzu nahe an demselben läuft eine geschlängelte Querlinie schwarzbrauner Punkte durch. Die Hinterflügel sind, so wie die ganze Unterseite, dunkelashgrauer, als sie Rösel gemahlt hat. Kopf, Vorder- und Hinterleib haben die Farbe der Vorderflügel. Das Familienschild über dem Brustücken dicht über dem Kopf ist rothbraun und der Aftersbüschel so beschaffen, wie bey dem vorhergehenden; so auch die Fühlhörner bey beyden Geschlechtern.

Die Raupe gleicht viel der vorhergehenden, ist aber kleiner, dünnebehaart und dunkelashgrau, mit einem breiten, gelben Rückenstreif, und einem schwarzen Flecken in der Mitte eines jeden Gelenks. Die beyden Warzen stehen auf dem 4. und vorletzten Gelenke. Sie hat an den Seiten eine gelbe, gefettelte Linie um die Luftröhren, desgleichen eine rothgelbe Aftersspitze, und lebt zwischen zusammen gesponnenen Blättern, und spinnt sich auf gleiche Art ein. Die Puppenruhe der Sommer-Generation dauert 3 Wochen, diejenige der andern aber 7 Monate.

Im Hallischen Naturforscher VIII. und in Jungs Verzeichniß heißt sie *Pigra*. Aufenthalt. Der Spinner auf Pappeln und Weiden, besonders der Rosmarinweide. Die doppelte Flugzeit und Verwandlungsgeschichte hat derselbe, so wie auch seine Raupe die nämliche Nahrung mit der vorhergehenden Art gemein, nur daß Rösel und Esper sie auch auf Espenbäumen gefunden haben.

Achte Familie.

Halbandraupen. Zahnflügelichte Spinner.

Die Raupen sind halbrauch, zeigen bey Beugung des Halses am 2. und 3. Ringe einen dunkelblauen oder goldgelben Einschnitt, und tragen auf dem letzten Ring eine Warze.

Warze. Die Verwandlung geschieht über der Erde, in einer länglichen, weichen, inwendig weißlich bestäubten Hülse. Die Spinner sind jungenslos mit vorstehenden Fühlspeisen, und gezähnten, aufstehenden Flügeln. Der Hinterrand der Hinterflügel steht meistens unter den vordern hervor.

A) Die mehr schädlichen.

30. Der Kieferspinner. *Phalaena Bombyx Pini*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kienbaummotte, Föhrenspinner, großer Waldraupenvogel, Tannenglucke, Fichtenspinner, Fichtenglucke, Fichtenmotte, Fichteneule, Fichtenwanderer, Fichtennachsalter. Letztere sechs Benennungen kommen ihm in Gegenden zu, wo wir hier im Meiningschen die Kiefern Fichten heißen.

Phalaena Bombyx Pini Lin. 814. 24. Müller 657. 24.

Bombyx	—	Wiener B. 56. n. 4.
Phal. Bombyx	—	Fab. Ent. III. 1. 426. 62.
—	—	Vortheil. III. 78. 20.
—	—	Gleditsch Forstw. I. 399. n. 2.
—	—	Gleditsch vier hinterlassene Abhandlungen, das praktische Forstwesen betreffend: zweyte Abhandlung. Seite 64 — 92.
—	—	von Lynker besorgter Forstmann n. 38.
—	—	Walthers Forstphysiographie. 383.
—	—	Hennert über den Raupenfraß in den Pr. Forsten (1798. 1799.) t. 1. fig. 1 — 9. mit Raupe.
—	—	Becksteins Wäurung. 172.
—	—	Becksteins Waldinsecten I. 18. mit Raupe.
—	—	Dägel Forstwiss. I. 299. t. 1. fig. 4 — 8. mit Raupe.
—	—	Egger Spinner t. 12. f. 1 — 6. mit Raupe und tab. 13. f. 1.

Köfels Inf. I. 2. Cl. Nachwög. t. 59. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Mit zurückgeschlagenen und aufstehenden Flügeln; die vordern führen in der Mitte einen weißen dreieckigen Punctfleck, und sind entweder aschgrau mit einer rothfarbenen gezackten Binde, oder rothbraun und unbauert, so wie die Hinterflügel. Nur das Männchen hat gekämmte Fühlhörner.

Raupe. Weißgrau und braungescheckt, mit zwey blauen Einschnitten über dem 2. und 3. Ring, und darunter stehenden rothen Puncten geziert. Sie führt über dem vorletzten Ring ein Warzenbüschelchen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß beträgt 3 Zoll, zuweilen einige Linien mehr; bey dem Männchen allemal weniger. Alle Flügel sind stumpfgezähnt oder gekerbt, und die 1 Zoll, 5 Linien langen Vorderflügel haben gewöhnlich nach hiesigen Exemplaren vier Felder, davon das erste und dritte braunroth, das zweite und vierte aber aschgrau ist, mit untermischten braunen Schüppchen. Jedes Feld scheider sich durch eine schwachbraune Zackenlinie von dem andern. An dem Exemplar, wornach Köfel die Abbildung des ausgebreiteten Weibchens liefert, dergleichen sich auch bey uns vorfinden, ist das erste Feld an der Wurzel nicht deutlich begrängt. Und da erscheint also auf jedem Vorderflügel nur eine rothfarbige, schwarz begrängte

begranzte zackige Querverbinde, nämlich diejenige, die sonst das dritte Feld vorstellt. Ein dreyeckiger Punct steht an der Gränze des ersten und zweyten Feldes. Die Hinterflügel sind wie die Fühlhörner und der Leib, einfarbig blaßbraun och, und eben so die Unterseite aller Flügel, an denen man bald keine, bald 1 oder 2 verlorene Querverbinden sieht. Das Weibchen hat keine stark gekämmten Fühlhörner, wie das Männchen, sondern kurzgezähnte mit weißem Stiel. Ueberdem ist es größer, stärker am Hinterleib und heller von Farbe. Es giebt viele Varietäten, sowohl was Farbe, als Zeichnung betrifft. Manche sind ganz rostbraun, wie das im Eichen abgebildete Weibchen in Köpels Werk, manche ganz aschgrau, ebenfalls ohne Abwechselung der Farben, doch so, daß drey Zackenstreifen quer durchziehen. Herr Vorkhausen gedenkt auch einer männlichen Varietät, deren vier Flügel mit dem leibe rostbraun war, und ins Feuerfarbne spielte, so daß ein schwärzlicher Schatten das 2. und 4. Feld formirte. Von Querecllinien war nur Eine, nämlich die dritte vorhanden, und der sonst weiße Punct war hier aschgrau und kaum sichtbar. Auch erzog der Vergrath Scopoli aus dieser Phaläne einen Zwitter, der beyderley Geschlechtes war, und befruchtete Eier legte.

Die halbrauche Raupe, welche ausgewachsen 3½ bis 4 Zoll lang und sehr gefräßig ist, variiert ebenfalls, ist entweder aschgrau oder fleischfarben, mit aschgrauen oder fuchsrothen Haaren besetzt, und mit braunen Zeichnungen über den Rücken und dergleichen Seitentstreifen versehen. Nach Herrn Professor Esper sollen aus den aschgrauen mit aschgrauen Haaren ohne weiße Flecken die Weibchen, und aus den fleischfarbenen mit fuchsrothen Haaren die Männchen entstehen. Sie hat ferner einen runden, oberbraunen Kopf, und trägt wie ihre Familiengenossen eine Warze auf dem vorletzten Ring. Auch zeigt sie bey Beugungen des Halses die 2 glänzenden blauen Einschnitte des 2. und 3. Ringes, und unter denselben noch einige zimmoberrothe Puncte. Auf jedem Ring und in den Seiten stehen Büschel von stärkern Haaren. Selbst die Haut der Raupe ist wie mit Filz bestäubt.

Sie verläßt im August, auch späterhin, die Eierschale, und überwintert in gar verschiedener Größe. Den Winter über liegt sie am Fuß der Stämme unter der dicken Moosdecke verborgen, wo sie sich eine runde Vertiefung, welche gerade ihren Körper in zusammengekrümmter Stellung faßt, aushöhlt. Bey den wärmern Frühlingstagen des März und Aprils läßt sie sich im Freyen, oder an den Stämmen der Bäume zwischen der Rinde sehen, wo sie gewöhnlich unter der Verhäutung begriffen ist. An dergleichen Stellen oder auch wohl an den dazu ausgesuchten Stellen eines jungen Gehölzes erfolgt dann meistens nach 8 bis 10 Tagen die Verwandlung. Zu dieser Absicht dient ihr ein gelbbraunliches, längliches, war dichtes, aber nicht festes, an einen Zweig, oder an weiten, geräumigen Baumrissen befestigtes Gewebe, welches an dem einen Ende eine dünne übersponnene Defnung hat. Man muß sich bey ihr vor dem starken Arafen hüten, weil sie gleich den übrigen Faltzraupen die Haare, welche nebst dem Staub und den Ausdünstungen derselben schädlich sind, leicht abgeben läßt. Denn die feinen Härchen, die keine Widerhärchen haben, gehen in die Poren der Haut, verursachen Jucken und Geschwulst.

Die

Die längliche, gerundete und schwärzlichgrau Puppe von 16 Linien Länge findet man in ihrem aus der nämlichen Ursache mit vieler Vorsicht zu behandelnden Gewebe, am gewöhnlichsten zwischen den Stammeinden, bald nahe an der Erde, bald höher, hauptsächlich gegen Ost und Süden zu. Ihr Puppenstand währt 3 bis 4, zuweilen 6 Wochen. Die, welche sich bey mir in der Mitte des Mays verpuppten, enthielten sich in der Mitte des Junius, und die in der Mitte des Junius den Puppenstand antraten, wurden den 8. Julius schon Schmetterlinge.

Aufenthalt. Das vollkommene Insect findet sich an den Zacken und Stämmen der Föhren und Kieftannen. Die Periode seiner Erscheinung ist, wie eben erwähnt werden, ungleich, bald im Junius, bald im Julius. Das unvollkommene Insect ist jung im Herbst, erwachsen aber theils im May, theils zu Anfang des Junius auf den Föhren (Kiefern, *pinus sylvestris*) anzutreffen, deren Nadeln die einzige Nahrung dieser sehr gefräßigen und sich sehr vermehrenden Raupe ist.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt nach und nach im Junius oder Julius 100 bis 200 Eier an Mannshohe Stellen der Stämme und Zweige, bald in die Rigen der Borke, bald auf die Borke selbst, dicht neben einander, aus denen nach 8 bis 10 Tagen zu der Zeit, wenn die Eier wie Bläschen mit einem schwarzen Pünctchen aussehen, die Räupchen sich entwickeln, und weiterhin überwintern.

Feinde. Ihre Feinde sind die Insectenfressenden Vögel, besonders die Spechte, Wendehälse und Baumkletter, dann alle größere Arten der Laufkäfer, besonders der verrätherische Laufkäfer, *Carabus lycopanta* L. mehrere Zehrwespen, z. B. der schwarze Raupentödter (*Meteorus rufus*), *Ichneumon turionellae* L.; ferner der Steuerer (gemäligte Zehrwespe), *Ichneumon moderator*; der Eierbrüter (Eierzehrwespe), *Ichneumon ovulorum*; der Blattlauszwicker (Blattlauszehrwespe), *Ichneumon aphidum* L. Zinke im besorgten Forstmann S. 154. — Selbst der mit der Kieferraupe gemeinschaftlich die Kiefern entadelnde große Juliuskäfer, *Scarabaeus fullo* L., tödtet sie, wenn sie ihm in den Weg kommt. Und ob sie gleich, eben so wie die Nonnenspinner, von dem allerstärksten Winterfroste nichts oder wenig leidet, so wird doch das Insect, wenn außer der Winterszeit bey der Verpuppung oder der öftern Häutung eine anhaltende Nässe mit Kälte und Wärme schnell abwechselte, wo nicht zu Grunde gerichtet, wenigstens sehr geschwächt, und zu der deroirigen Fortpflanzung untauglich gemacht.

Schaden *). Die Raupe hat schon 1728 in der Mark Brandenburg nicht sowohl an der W. Kieferne (*Pinus abies Clusii*) und Kieftanne (*Pinus picea Clusii*), als vielmehr an der Kiefer (*Pinus sylvestris* Lin.) viel Schaden angerichtet. Wiedrich gibt am a. D. davon Nachricht. Von dem Schaden, den sie in den Anspachischen Forsten 1783 angerichtet hat, theilt Herr Professor Losh ge Nachricht im Hallischen Naturforscher XXI. XXII. und Herr von Ustar in seinen forstwissenschaftlichen Bemerkungen S. 210.

Fin

*) Hierüber lese man vorzüglich nach Pennert über Raupenfraß und Windbruch. S. 60 — 133.

Im Churbrandenburgischen hat sie vom Jahr 1792 an unerseßlichen Schaden gethan, und überhaupt in demselben Jahre in Deutschland auf 60000 Morgen Kieferwaldungen verborben, wie dieß Siemssen in seiner Naturg. der großen Tannenraupe S. 25 anführt. Nach Hennerts Angabe (a. a. O. S. 91) waren im Jahr 1792 650000 Morgen oder 30 Quadratmeilen an Kiefernrevieren allein in der Churmark angegriffen, wovon man $\frac{7}{8}$ Theil durch die Raupen abgefressen oder zerstört annehmen konnte.

Im Reichsanzeiger 1802. No. 62. Seite 774 standen Bemerkungen (des Herrn von Türk zu Neustrelitz) über den Raupenfraß und den zu besorgenden Holzmangel in besonderer Rücksicht auf die Forsten des Stargardischen Kreises im Mecklenburgischen. Die Raupen unsers Spinners hatten sich zu Ende des Novembers 1801 auf der Kiefer so sehr vermehrt, daß keine Rettung mehr vorhanden war.

Denn ob sie schon nicht von der Zahl derjenigen ist, die in Gesellschaft leben, so sind ihrer wenige dennoch in kurzer Zeit im Stande, ganze Zweige zu entnadeln, weil sie so gefräßig ist, daß sie die Nadeln bis an die Scheide nur gleichsam zum Maul hineinschiebt. Sie kriecht von Zweig zu Zweig, und wenn sie mit andern ihres Gleichen einen Baum kahl gefressen hat, kriecht sie herab und frist einen andern an; so gar wenn sie einen Distrikt abgefressen hat, zieht sie in Schaaren auf der Erde weiter nach einem andern; wo bey nur ein sandiges Erdreich ihre Wanderschaft etwas aufhält, und eine senkrecht abgeschnittene Vertiefung ganz unterbricht. Wo altes und junges Holz zusammen stehn, pflegt sie zuerst das ältere abzufressen, und dann auch nach dem jüngern zu ziehen. Den jungen Maytrieb und die Knospen entnadeln sie zuerst, und geht dann zu den alten Nadeln. Was dabey am übelsten ist, ist dieses, daß sie Bäume, die frische Nadeln getrieben haben und sich wieder zu erholen scheinen, zuweilen zum zweytenmal abfrisst.

Mittel dagegen. Unter die natürlichen Mittel zu ihrer Verminderung gehören die oben erwähnten Feinde aus dem Thierreich, so wohl aus der Classe der Vögel, als der Insecten, und darunter auch besonders die Ameisen.

Der Verfasser des obenerwähnten Aufsatzes im Reichsanzeiger thut den Vorschlag: man müsse bey künftiger Anpflanzung der Kiefer den dritten oder vierten Theil Birken unter solche säen, weil diese Raupen solche scheuen *); auch müsse man bey schwerer Strafe das Wegfangen der schonungswerthen Vögel und das Ameisenhohlen verbieten.

Außer jener Beyhülfe hat man auch künstliche vorgeschlagen und versucht. Diese waren: 1) Das Fällen der durch den Raupenfraß ruinirten Kiefer, und das baldige Abschneiden des Holzes, um noch einem größern Uebel vorzubeugen und dem Buchdrucker-Vorkenspäßer keine Brutmagazine zu verschaffen.

2) Das Einsammeln der Puppen, Raupen und Eyer. Es werden nämlich die Eyer mit Wesen abgerieben und abgekratz, oder ganze Zweige abgenommen, um ihre Borke der Eyer wegen zu verbrennen. Die Raupen werden bey'm Hinauf- oder Herabkriechen durch Schafsheerden zertreten, oder durch Menschenhände zerstampft, desgleichen im Herbst oder

*) Dieß Vorbeugungsmittel würde aber nur etwa 30 Jahre gut thun; denn nach dieser Zeit müßte man ja die Birken aushauen. B.

oder noch sehr bald im Frühling mit dem zusammengerechten Moos und Nadeln aus dem Wald geschafft, oder sogleich im Wald auf einem feuerfichern Fleck verbrannt. Zur Absonderung der unrettbaren Distrikte von den noch gesunden dienen 1 — 1½ Fuß breite und 1 Fuß tiefe senkrechte Gräben, in welchen hin und wieder Löcher sind, in welche die Raupen stürzen und nicht wieder herauskönnen. In den Gräben werden die Raupen zertreten, und in den Löchern mit Erde bedeckt. *) Um der Puppen willen können die mit zahlreichen Puppen angehäuften Zweige und jungen Stämme, besonders an den Säumen der Waldungen, wo sie am häufigsten eingesponnen sind, weggeschafft und jene vernichtet werden. Die weiblichen Schmetterlinge werden des Morgens an den Stämmen, wo sie festjagen, abgelesen **), und beyde Geschlechter an nächtlichen Leuchtfenern, auf welche sie aufzogen, verbrannt.

3) Wenn man einen mit hohen Bäumen besetzten und angegriffenen Distrikt mit Kiefern-Riesig belegt, so spinnen sich die Raupen häufig in demselben ein. Man schafft alsdann das Riesig aus dem Walde und verbrennt es.

4) Ein anderes Mittel, ein Arcanum, hat Dunker sehr dringend empfohlen in seiner kurzen, aber gründlichen Abhandlung über die große Kienraupe. Berlin 1793. Es ist aber als unausführbar von dem Preussischen Forstdepartement verworfen worden. Eben so unanwendbar und wenig fruchtend war

5) der Vorschlag, das Holz mit einer Lauge von Taback, Wermuth, Zwiebeln und Asche zu besprühen. S. Hennert a. a. O. S. 77.

6) Man will neuerlich behaupten, daß, wenn diese Raupen die jungen Kiefern von 3 bis 10 Jahren besetzen, solche am leichtesten abzulesen seyen und dadurch ihrer weitern Vermehrung vorzubeugen sey. Darauf bezieht sich auch dasjenige, was ein Beobachter der Natur, dem es vor einigen Jahren bey dem Raupenfraß in den Kiefern glückte, seine ganzen Gehölze zu erhalten, in dem Leipziger Intelligenzblatt vom 28. May 1803 bekannt gemacht hat. Die Raupe hatte sich damals zuerst und meistens auf jungen Stämmchen und an der äußersten Südwestseite der Gehölze gezeigt, und durch sorgsamtes Ablesen war sie vertilgt worden. Wer das erste Jahr nicht solchen Ausrottungskrieg beginnt, der wird in den folgenden sich meist vergebens bemühen, theils weil alsdann die Menge größer ist, theils weil die Phalänen die höhern Bäume ersteigen und mit Eiern besetzen. Die größte Aufmerksamkeit und Eile ist also schlechterdings nothwendig.

B) Weniger schädliche.

31. Der Frühbirnspinner. *Phalaena Bombyx Quercifolia*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eichblatt, Eichenlaub, eichenblattähnliche Nachsatter, trockner Blätterbündel, Kupferglucke, Obstmotte, Stammraupe, Wunderraupe.

Pha-

*) Die Erfahrung hat gelehrt, daß das Holzen der angegriffenen Distrikte durch Gräben das beste Mittel sey. B

**) Im Preussischen wurde für eine Meße Cocon 6 Pr. und für eine Meße Schmetterlinge 1 Gr. bezahlt. S. Hennert a. a. O. S. 83.

Phalaena Bombyx Quercifolia, Lin. 812. 18. Müller 656. 18.

B o m b y x — — Wiener Verz. 56. 1.

Phalaena Bombyx — — Fab. Ent. III. 1. 420. 42.

— — — — Borkhausen III. 63. 15.

— — — — Gleditsch II. 42.

— — — — Esper III. t. 6. und t. 7. f. 1. 2. mit Raupe.

— — — — Sulzer's Kennzeichen t. 15. f. 43.

Nöfel I. 2. Classe. Nachtvög. t. 41. mit Raupe.

Schäfferi Icon. t. 71. fig. 4. 5.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgebogen, sehr gezähnt, von rostbrauner, ins Kupferbraune fallender Farbe; die Füßspitzen und Schienbeine sind schwarz.

Das Männchen ist weit kleiner und nicht so beleibt, als das Weibchen.

Raupe. Ueber den Rücken dünn behaart und erdbraun, zuweilen aschgrau; in den Seiten büschelweis behaart und rostbraun, mit blauen Halskrägen und einem Zapfen am vorletzten Ringe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Männchen mißt nach kleinen Exemplaren 1 Zoll und 8 Linien, nach größern 2 Zoll und 9 Linien, jeder Vorderflügel allein 1 Zoll und 3 Linien; aber das Weibchen ist ansehnlicher und größer. Alle Flügel sind sehr gezähnt und bey beyden Geschlechtern rostfarbig, ins Kupferbraune fallend, am Vorderrand bläulichschimmernd, und mit 3 zackichten schwarzen Querverbinden geziert; zwischen der ersten und zweyten zeigt sich auf den vordern ein schwarzer Punct. Außerdem sind sie, wie bey sämtlichen Familiengenossen, zurückgeschlagen, auf der Unterseite heller als oben, und einfach schwarz bandirt. Der Kopf ist nebst dem Rücken des Vorder- und Hinterleibes dunkelrostbraun, der Bauch zuweilen schwarz, zuweilen schwärzlich angelaufen. Die schwärzlichen Fühls Hörner sind bey beyden Geschlechtern gleich gefiedert. Fühls spizen und Schienbeine sind schwarz.

Die Halskrägen der bey großen Stücken auf $\frac{1}{2}$ Zoll messenden, dünnbehaarten und erdbraunen, zuweilen aschgrauen Raupe sind eigentlich zwey dunkelblaue, zwischen dem 2. und 3. Gelenk sich halbmondförmig bildende Einschnitte; die sich besonders bey derjenigen Nöfelschen Varietät gut ausnehmen, die auf jedem Ring einen schwarzbraunen pfeilförmigen Rückenleck mit oberwärts gerichteter Spitze führt. — Ueberdem ist bey den gewöhnlichen Stücken jeder Absatz mit 2 braunen Knöpfen und der vorletzte mit einem stumpfen Zapfen besetzt. Von ihren, in den Seiten auf beträchtlichen Warzen büschelweis stehenden Haaren, wovon 2 Büschel am Kopf vorzüglich an Größe sich auszeichnen, mischt sie die abgegangenen bey ihrem Einspinnen im May und Junius in ihr weiches und dabey dichtes und längliches Gewebe mit ein, welches, so wie die Puppe selbst, greisgrau ist. Letztere ist mit röthlich weißem Puder überzogen, den Esper von den vertrockneten Säften derselben herleitet. Die Ruhe dauert 2 bis 4 Wochen.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint jährlich einmal, nämlich vor Ausgang des Junius oder im Julius. Die Raupe, die nie bey Tage, so d en nur des Nachts, ihre Nahrung zu sich nimmt, äßt im April bis in den Junius auf allen Pflaumen- und Mandelbaumarten, auf Kirschen, Birn- und mehrern Obstbäumen, auf den

nie-

niedrigen Gesträuchen des Schlehen- und Weißdorns, der Hundrosen; nach Esper auf Gras, welches von Kleemann bezweifelt wurde; nach Gleditsch auch auf den weichen Weidenarten.

Fortpflanzung, Feinde, Schaden und Mittel dagegen. Die weissen und gelb-fleckichten Eier werden zu Anfang des Augusts, nicht aber, wie Frisch glaubte, im May, an den Stamm und an die Zweige der Bäume gelagt, wo sie sich in 14 Tagen enthüllen, um darauf zu überwintern. Die Raupe sucht ihren Feinden, den Zehrwespen und gewissen Mähen durch ihr wackeres Herumschlagen mit dem Kopfe zu entgehen. Und für unsere Gärten ist es ein Glück, daß sie bey ihrer Gefräßigkeit, wenigstens nicht im erwachsenen Zustande, gefellig lebt; sonst würde sie beträchtliche Verwüstungen anstellen können, indem sie die Tragknospen, besonders des Spalierobstes, gern anfrisst. Indessen kann man ihre Eier im August vertilgen, wenn man sie an dem Stamm findet; oder sich der Raupe selbst im May an den Rinden und Aesten bemächtigen. Da der Schmetterling wenig fliegt, und nur an den Stämmen der Bäume sitzt, so kann er auch hier, wenn man ihn antreift, vertilgt werden. Es ist sonderbar, daß er nicht durch Fliegen, sondern durch Fallen seinen Feinden zu entgehen sucht, denn bey der geringsten Berührung zieht er Füße und Fühlhörner ein, und fällt herab.

32. Der Weiskespenspinner. *Phalaena Bombyx Populifolia*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Aeserblatt, Eibenblatt, Eibenblattnachtfalter, Pappelblatt.

<i>Phalaena Bombyx Populifolia</i> ,	Wiener Verz.	310. 5.
<i>Bombyx</i> —	Fab. Ent. III. 1.	420. 41.
<i>Phalaena Bombyx</i> —	Vorkh. III. 67.	16.
— — —	Esper III. t. 6. A. f. 3. 7.	tab. 7. f. 1. und tab. 88. f. 3. die Raupe.
— — —	Schwarz; Beyträge,	Mürnberg 1792. tab. 14. f. 1 — 4.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgebogen, gezähnt und röthlichgelb; auf den vordern sind einige undeutliche Reihen mondformiger Flecken, und in der Mitte fast allezeit ein feiner schwarzer Punct. Das Männchen ist halb so groß, als das Weibchen, und mit weniger Flecken.

Raupe. Lichtschwarz, und über den Rücken bräunlich; die schwarzen Einschnitte des 3. und 4. Rings sind gelbgesäumt. Auf dem 8. Ring stehn 2 braune Flecken. Sie hat keinen Zapfen auf dem vorletzten Ringe, sondern an dessen Statt einen weißen kreuzförmig gestalteten Flecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Spinner gibt dem nächstvorhergehenden an GröÙe nichts nach, oder ist zuweilen größer, und trägt seine gezähnten, röthlichgelben Flügel noch mehr zurückgeschlagen, als jener. Die schwarzen Mondflecken bilden auf den mit einem schwarzen A.ßenrand und einem feinen schwarzen Mittelpunkt versehenen Vorderflügeln beynabe drey Bänder. Aehnliche schwarze Flecken nehmen auf den Hinterflügeln die hintere Hälfte ein. Unten sind die vordern heller, mit wenigen undeutlichen Flecken, und die hintern mit einer sehr verblichenen schwärzlichen

Quereinnde, desgleichen am Vorderwinkel mit einem verflochtenen, breiten, schwarzen Fleck bezichnet. Vorder und Hinterleib haben die Farbe der Flügel, doch bildet ein schwarzer Längstreif, der sich vom Kopf über den Rücken zieht, und von einem Quercircle des Halsfragens durchschnitten wird, ein schwarzes Kreuz. Die hervorstehenden Fühlspitzen und gefiederten Fühlgörner sind schwarz. Das Männchen hat die halbe Größe des Weibchens und weniger Flecken.

Die Raupe ist lichtgrau und über den Rücken bräunlich; die schwarzen Einschnitte des 3. und 4. Ringes sind gelbgesäumt. Auf dem 8. Ring stehen 2 braune Flecken. Sie hat keinen Zapfen auf dem vorletzten Ring, sondern an dessen Statt einen weichen, krausförmig gestalteten Fleck, und ist mit vielen dunkeln Punkten und Zeichnungen durchwebt, variiert aber nicht so sehr, als die vorhergehende. Erst in den neuern Zeiten ist sie den Insectenforschern durch Beschreibung und Abbildung bekannt geworden. Die männliche Raupe ist halb so groß, als die weibliche. Im Junius baut sie sich ein bräunlich weißgraues Gewebe, um sich darin in eine Puppe, die schwärzer als die vorhergehende ist, zu verwandeln, welche dann nach Herrn Schwarzens Nachricht 22 Tage ruht.

Aufenthalt. Der Spinner zeigt sich da, wo er vorhanden, bey Manns, Darmstadt, Berlin u. s. w., bey uns aber nicht, im Julius, und vermuthlich jährlich nur einmal. Man läßt es dahin gestellt seyn, ob die Ueberwinterung der Puppe, von welcher Brahm, Insect. Calendar II. 36. redet, eine Ausnahme von der Regel sey, oder nicht. Sie hält sich als Raupe im May und Junius in der Höhe auf Weiden, Pappeln und Espen auf.

33. Der Sahlweidenspinner. *Phalaena Bombyx Betulifolia*, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wirkenblatt, birkenblattähnlicher Nachtfalter.

Phalaena Bombyx Betulifolia, Vorkhausen III. 69. 17.

Esper III. t. 7. f. 2—6 mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgebogen und gezähnt, die vordern röthlich grau, mit einer doppelten, kappenförmigen, schwarzen Fleckenbinde, die gegen den Leib zu weißlich gesäumt, und deren mittlerer Raum zuweilen weißlich ausgefüllt ist.

Raupe. Sie ist langleibig, dicht behaart, und hat über jedem Ring einen orangefarbenen, mit schwarzen Querlinien durchkreuzten Fleck, welcher in den Seiten mit hellem Weiß breit eingefast ist, und gegen die Füße einen grau blauen Streif.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser bräunlichschafgraue Spinner ist weit kleiner als der vorhergehende, und dessen Weibchen von der Größe des männlichen Frühgeirns spinners. Seine Flügel sind zurückgebogen und gezähnt; die röthlich grauen Vorderflügel sowohl mit einer doppelten, kappenförmigen, schwarzen Fleckenbinde bezeichnet, die gegen den Leib zu weißlich gesäumt, und deren mittlerer Raum zuweilen weißlich ausgefüllt ist, als auch in der Mitte mit einem wei-

ßen

ßen Hautenfleck geziert, der von innen und außen mit einer Mondmakel von dunklerer Farbe begrenzt ist. Die Hinterflügel, durch welche 2 schwarze vermischte Querverbinden sich durchziehen, sind bis über die Hälfte aschgrau, und nur gegen den Vorderrand mit röthlichem Ockergelb überzogen. Auf der röthlicheckergelben, schwarzbestäubten Unterseite der vordern ist die Schartenbinde im Mittelraume schwarz; und der Hinterrand aschgrau. An dem Vordereckel der dunkel aschgrauen, schwarz bestäubten Hinterflügel ist an dem büsenförmigen Einschnitt ein breiter, schwarzer Wischfleck, aus dem eine schwarze Wischbinde ausläuft. Fühlerhörner, Rücken und Hinterleib sind hellrothgelb. Erstere sind beim Männchen stärker gekämmt, als beim Weibchen, an dessen Vorderflügeln sich zwischen den Binden nichts Weißes zeigt.

Die Raupe des Spinners ist geschmeidig, dicht behaart, und hat über jeden Ring einen orangefarbenen, mit schwarzen Querlinien durchkreuzten Fleck, welcher in den Seiten mit hellem Weiß breit eingefasst ist, und gegen die Füße einen graublauen Streif. Sie ist nach ihrer Ueberwinterung im Junius erst völlig ausgewachsen. Ihre orangegelben Flecken über den Rücken sind durch Schwarz verbunden. Von ihren dichten Wollhaaren, die in den Seiten sehr starke Büschel bilden, ragen zwei Büschel über den Kopf am meisten hervor. Das Gewebe, worin sie sich verwandelt, ist weißgelblich, nicht groß, und die Puppe mit Puder besetzt. Letztere hat die Gestalt und Farbe derjenigen des Frühgeirispinners, und ruht 3 bis 4 Wochen.

Aufenthalt. In Franken und um Augsburg im Julius; wo denn die Raupen auf jungen Eschweiden sich äßen.

34. Der Traubeneichenspinner. *Phalaena Bombyx Ilcifolia*, L.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eichpalmenblatt, kleiner Blattbündel, sticheheublattähnlicher Nachtfalter.

Phalaena Bombyx Ilcifolia Lin. 813. 19. Müller 565. 19.

Bombyx — — —

Phal. Bomb. — — —

— — —

— — —

— — —

Wiener W. 56. 2.

Fab. Ent. III. 1. 421. 43.

Vorkhausen III. 72. 18.

Gleditsch II. 43. n. 16.

Brahm II. 148. und 554.

Esper III. 1. 8. f. 1—5. mit Raupe.

Naturforscher XV. tab. 3. fig. 4—14. mit

Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgebogen, gezähnt und rostfarben, mit sehr deutlich weißbunten Fäden am Rande eingefasst und gegen den Vorderrand dunkler schattirt: durch den Vorderflügel ziehen 3 aus schwarzlichen Flecken bestehende Querverbinden. Alle diese Zeichnungen sind matt. Das Weibchen ist größer.

Raupe. Oben sehr dünnhaarig, in den Seiten stark behaart; oben aschgrau ins Braune ziehend; an dem Bauch und in den Seiten bald weiß mit Zimmelflecken, bald pomeranzengelb mit schwarzen Flecken. Sie hat auf dem 3. und 4. Ring zwei orangefarbene Mondflecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Männchen misst in der Ausbreitung seiner zurückgebeugenen, gezähnten und rothfarbigen Flügel 1 Zoll 4 Linien, das Weibchen 1 Zoll 6 bis 7 Linien. Alle Flügel sind am weißbunt gefranzten Hinterrand dünner geschuppt, und überhaupt matt gezeichnet, und gegen den Vorderrand dunkler schattirt. Von den drey Querlinien, die durch die Vorderflügel laufen, steht die erste nicht ganz an der Wurzel, und hinter derselben nur zuweilen ein länglicher, verwischter, weißer Fleck mit einem schwarzen Punct. Die zweyte ist schlängelnd gebogen, und hinter der dritten ist der Flügelrand aschgrau gefärbt. Jede dieser Querlinien besteht aus schwärzlichen Flecken. Die Hinterflügel zeigen zwischen zwey breiten verwischten Querverbinden einen weißlichen Wischfleck. Die Unterseite der Vorderflügel ist wie die obere; aber die Unterseite der Hinterflügel ist bey meinen Stücken schön castanienbraun mit 2 schwarzen Querverbinden. Das größere und belebtere Weibchen ist etwas deutlicher gezeichnet.

Die oben sehr dünnhaarige, überall mit kleinen Warzen, und in den Seiten mit Büschelhaaren besetzte Raupe, die oben eine aschgraue ins Braune ziehende Farbe, an dem Bauch und in den Seiten bald eine weiße Farbe mit Zimmetflecken, bald eine pomeranzengelbe mit schwarzen Flecken hat, gleicht derjenigen des Frühgehirnspinners am meisten, doch unterscheidet sie sich von ihr durch die zwey orangefarbenen Mondflecken auf dem 3. und 4. Ring, welche sie bey allen Häutungen behält. Im Ruhestand hat sie das Sonderbare an sich, daß sie sich mit den Bauch- und Schwanzfüßen festhält, den Vorderleib rückwärts gebogen und die Vorderfüße aus einander gesperrt hält, um sich so von einer Seite zur andern zu bewegen. In einem eyrunden, lockern, gelbgepuderten Gewebe zwischen Blättern oder in Ritzen geht ihre Verwandlung in eine Puppe vor sich, die der vorhergehenden gleicht und auch dicht mit Puder überzogen ist. Die Puppe von der Sommer-Generation ruht nach Vorfhausen drey Wochen, die von der andern 7 Monate.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint im April, bey früherer Wärme im März, bey späterer im May, auf Weiden und Birken, bey Frankfurt und Leipzig zc. zc. Die Raupe weidet in allen Jahreszeiten, wenigstens da, wo sie einheimisch ist, auf (nach Esper nur hochstämmigen) Eichen, Schwarzpappeln, Vogelbeeren, Espen, Sahlweiden.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt, nach CapiEUR im Naturforscher, im May (bey ihm am 8. May) auf 106 Eyer, die sich in 20 Tagen entwickeln. Nach vier Häutungen spann sich die Raupe am 14. Julius ein, und trat im folgenden Jahre zu Ausgang des Aprils und Anfang des Mays in den vollkommenen Stand.

Man hat auch bemerkt, daß sich im October verpuppte Spätlinge dieser Art schon im kommenden April entwickelt haben. Es mag übrigens nach Brahm eine einfache, oder nach Vorkhausen eine doppelte jährliche Generation statt haben, so ist es nun unwidersprechlich gewiß, daß das Insect sowohl im Raupen-, als, und zwar am meisten, im Puppenstand überwintere.

35. Der Pflaumenspinner. *Phalaena Bombyx Pruni*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schlehenblatt, Zwetschenspinner, Pflaumennachtfalter, Pflaumenblattspinner, Feuergluck (von der Farbe), Fischschwanz (von den aus einander gelegten Füßen der Raupe).

Phalaena Bombyx Pruni Lin. 813. 22. Müller 657. 22.

Bombyx — Wiener B. 56. 3.

Phal. Bomb. — Fab. Ent. III. 1. 424. n. 56.

— *Noctua* — Vorkhausen III. 75. 19.

— *Bomb.* — Gleditsch I. 516. und II. 43.

— *Bomb.* — Esper III. t. 10. f. 1—4. mit Raupe.

Nöfel I. 2. Et. N. B. tab. 36. mit Raupe.

Kenzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgeschlagen und gezähnt; die vordern orangegelb mit 2 rothbraunen Streifen und einem hellweißen oder Silberpunct.

Das Weibchen ist beleihter und ein wenig größer.

Raupe. Bläulichaschgrau, mit gelben Streifen und weißlichen, oft ganz verloschenen Flecken. Ueber dem dritten Ringe steht ein pommeranzgelber Mondfleck und auf dem vorletzten Ring ein stumpfer, fleischichter Zapfen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner misst 1 Zoll und eilf, jeder seiner Vorderflügel allein $1\frac{1}{2}$ Linien; der weibliche in der Flügelausbreitung 2 Zoll und 4, und jeder Vorderflügel 1 Zoll und 1 Linie. Seine Flügel sind zurückgeschlagen und gezähnt. Durch die hochorangegelben vordern, deren Spitze scharf ist, zieht sich ein rothbrauner Streif an der Wurzel, und ein anderer in der Mitte durch; zwischen beyden ruht ein Silberpunct, der nur selten herzförmig ist. Die hintern sind fleischfarben. Auf der blasser gefärbten Unterseite zieht sich durch alle Flügel eine braune Binde, und außer derselben auf den hintern noch eine gezackte Wischbinde. Das ganze Insect ist nach allen übrigen Theilen mit den Flügeln gleichfarbig. Die Fühlhörner beyder Geschlechter sind kammförmig und sich gleich, obgleich Nöfel aus einem kleinen Versehen solche beym Männchen zu stark gekämmt abgebildet hat.

Die über den Rücken kurzhaarige, in den Seiten büschelweis behaarte, bläulich aschgraue Raupe hat gelbe Streifen und weißliche, oft ganz verloschene Flecken. Ueber dem dritten Ringe steht ein pommeranzgelber Mondfleck und auf dem vorletzten ein stumpfer, fleischichter Zapfen. Sie ist 2 Zoll und $7\frac{1}{2}$ Linien lang. Die zwey Büschel an den Seiten des Kopfs sind wie bey ihren Familiengenossen die größten. Hinter dem Mondfleck ist ein weißes, durch einen aschgrauen Strich durchschnittenes Feld. Nach ihrem unter Moos und Laub zugebrachten Winterschlaf erscheint sie im Frühling, um sich im Junius in einem festen, weißlichgelben Gespinnst zwischen Blättern zu verpuppen. Die kurze Puppe ist braunroth und vornenher schwarz; ihre Ruhe dauert 3 bis 4 Wochen, worauf der Schmetterling hervorkommt, sich begattet und Eyer legt, aus denen vor Winters die Raupen austreten.

Aufenthalt. Der Spinner ist im Junius hier und da, nicht häufig vorhanden, und besucht des Nachts die Blumen mit kurzen Saftbehältnissen, weil sein Sauger zu kurz ist.

ist. Die Raupe frisst vom April bis Junius auf allen Arten der Pflaumen- und Mandelgattung, auf Linden, Birken und Eichen.

Neunte Familie.

Pelzraupen. Weißmakelige Spinner.

Die Raupen haben auf den Ringen kurze, unter einander verworrene Pelzhaare. Die Verwandlung geschieht über der Erde bey der ersten Art (Ph. B. Rubi), in welchen, bey den übrigen in hartschalichten, walzenförmigen Hülsen. Die Spinner sind zungenlos, haben große, gerundete, abhangende Flügel, meistens mit einem weißlichen Mittelpunct und 1 oder 2 Querstreifen.

Anmerkung. Hier hat der Brombeerspinner, Ph. Bomb. Rubi L., in dem Wiener Werk seine Stelle, der in den Linné's, Fabricius, Müller, Vorthausen, Brahm, Gleditsch (II. 43. und 258.), Esper- und Röselschen Schriften (III. t. 49.) als Ph. Rubi, Bittkras, Humbeerbblatt, Humbeernachtsfalter, Brombeermotte vorkommt. Die zurückgeschlagenen Flügel sind nebst Kopf, Rücken und Hinterleib bey muntern Männchen röthlichbraun, bey trägen Weibchen aschgrau, die vordern mit 2 parallellaufenden Querstreifen bezeichnet. Die Fühlhörner sind weißschwaftig, mit braunen Fasern bey m Männchen stark gekämmt, bey m Weibchen nur gezähnt. Von einer Flügelspitze bis zur andern misst ersteres 1 Zoll und 9, bis 2 Zoll und 2 Linien, letzteres 2 Zoll 10 Linien. Die sehr gemeine, 2 Zoll 9 Linien messende, im Julius austretende, in der Jugend erst einfärbig schwarze, nachher gelbgeringelte, zuletzt mit Oranienfächer dunkelschwarz behaarte, dem Fraß der Krähen sehr ausgelegte Raupe lebt eigentlich auf allen niedrigen Gräsern und Kräutern der Wiesen und Aecker, durch eine Ausnahme auch von Brombeerbblättern, läßt sich übrigens mit allen möglichen Gewächsen füttern, und ist nach einer viermaligen Häutung im Herbst erwachsen, worauf sie nach ihrem Winterschlaf, nämlich die männlichen in einem lanzen, die weiblichen in einem runden, weichen Gewebe von grober oder schwärzlicher Farbe zu Anfang des Maymonats sich verpuppt. Nach einer Puppenruhe von 3 bis 4 Wochen, im Junius (nicht im Julius, wie in Füesly Magazin steht) kommt der Schmetterling hervor, der schwer zu erziehen ist.

36. Der Eichenspinner. Phalaena Bombyx Quercus, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eichensteiger, Eichennachtsfalter, Grasmotte (aber nur mißbräuchlich), Quittenvogel, Quittenspinner, Heckenkriecher.

Phalaena Bombyx Quercus	Lin. 814. 25. Müller 658. 25.
— — —	Wiener W. 57. 3.
Bombyx — — —	Fab. Ent. III. 1. 423. 53.
Phalaena Bombyx — — —	Vorthausen III. 84. n. 22.
— — —	Brahm II. 80. 34.
— — —	Gleditsch I. 510. und 437.
— — —	Nau Forstwissens. 287. 9. 669.
— — —	Esper III. t. 13. fig. 2. 6. mit Raupe.
Rösel I. 2. Classe. t. 35. a. f. 1. Raupe. t. 35. b. fig. 4 — 6. Phaläne.	

Kenn.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die beim Männchen castanienbraunen, beim Weibchen blaslockergelben Flügel sind zurückgeschlagen; glattrandig mit einer gelben Querverbinde: die vordern führen einen weißen Punct. Nur das Männchen hat kammförmige Fühlhörner.

Raupe. Gelbgrau, filzhaarig; auf den Ringen ist jeder Einschnitt schwarz und jeder Wirtel 2mal weißpunctirt. Ein weißfleckiger Längsstreif zieht sich an den Seiten des zimmetfarbenen Bauchs hinweg.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner, dessen Fühlhörner kammförmig, gelbgeschafet und braunhedrig sind, misst in der Flügelausbreitung 2 Zoll und 3, der weibliche 2 Zoll und 11 Linien, und giebt also dem Früheitspinner in der Größe so wenig nach. Die zurückgeschlagenen, ungezähnten (oder glattrandigen), beim Männchen castanienbraunen, beim Weibchen blaslockergelben Flügel haben sämmtlich eine gelbe Querverbinde, welche nach hinten zu gar nicht begränzt ist. Vor derselben liegt das weiße, braun eingefasste Stigma, das auch auf der beim Männchen bis zur Hälfte castanienbraunen, zur Hälfte ganz gelben, und beim Weibchen halbdunkel- und halbhellerlockergelben, unbandirten Unterseite durchschlägt. Bey dem Männchen sind Körper und Flügel ganz gleichfarbig, so auch bey dem Weibchen. Hr. Esper nimmt noch eine zweite Race an, wo Farbe und Zeichnung eben so, nur die Querverbinde beiderseits scharf begränzt, und das Weibchen eine röthliche, ins Castanienfarbige fallende Grundfarbe hat.

Die Raupe ist filzhaarig und lang, vor der ersten Häutung bläulichschwarz mit gelben Puncten und Filzfloken; nach der vierten zu Ende des May oder im Junius sieht sie aus, wie oben angegeben ist. Sie verwandelt sich in einem eysförmigen, dichten, starken, flebrigen, gelbbraunen oder aschgrauen Cocon in eine vornen schwarze, hinten grüne, sehr zusammengezogene Puppe, die nach 3 bis 4 Wochen sich zum Schmetterlinge ausbildet.

Aufenthalt. Die Phaläne erscheint im Julius in Gärten, zuweilen im Grase in Wäldern, jährlich nur einmal. Die Raupe äßet im Frühling auf Zwetschen und alten Pflaumen-Arten, auf Pfirschen, Apricosen, Mandeln, Aepfeln, Quitten und Mirabellen, dann auf Weiden, Birken, Weißdorn, Schlehen, Stachelbeeren, Spindelbäumen, Haseln, Johannisbeeren, sehr selten auf Eichen und Psriemenkraut, ferner nach Linné auf Heidekraut, im Nocturn auf Gras. Aus denen auf Psriemenkraut will Esper seine zweyte Race erzogen haben.

Körpfpflanzung. Noch vor dem Winter kriecht die Raupe aus dem Ey, um sich 1 bis 2 mal zu häuten, und dann ihren Winterschlaf anzutreten.

Feinde. Fauchtes Fatter unterwirft sie einer schnellen innerlichen Fäulniß, die ihr tödtlich wird.

Schaden. In erwachsenen Stande ist sie nicht so schädlich, als in der Jugend, wo sie 1-90 bey Wmz schon im 8 beuar und März die Traaknospen der oben angegebenen edlen Steinobst-Arten anging. Nach der letzten Häutung können ihre Filzhaare dem, der

sie nicht mit Vorsicht angreift, dadurch, daß sie leicht in die Schweißlöcher eindringen, ein beschwerliches Zucken an den Händen verursachen.

Mittel dagegen. Das Ablefen in ihrem unerwachsenen Stande von den blätterlosen Zweigen muß im März Nachmittags und Abends geschehen, weil sie sich des Nachts verbirgt. Hat man sie aber nach der letzten Häutung angefaßt, und sich dadurch ein Zucken der Hände zugezogen; so muß man mit den Händen nicht ins Gesicht fahren, sonst entsteht daselbst eine Geschwulst, die sich aber durch eine Comresse mit Bleyessig und Wasser, oder durch einen Aufschlag von ungeschälten, rohen, in einem Mörser zerstoßenen Kartoffeln heben läßt, welches auch bey ihrem Gespinnst, desgleichen bey Wespenstichen, empfohlen wird.

Anmerkung. Daß Nöfels Raupe t. 35. a. fig. 1. und seine Phaläne t. 35. b. fig. 4—6. zusammen gehören, weil Nöfel beyde Raupen verwechselt, wird von keinem erfahrenen Entomologen bezweifelt. Denn die Raupe t. 35. b. gehört als Bombyx Trifolii zu t. 35. a. fig. 4. 5.

37. Der Schwarzkiefernspinner. (Phalaena) Bombyx Lobulina, Fabr. (Lunigera, Esp. t. 91.)

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weißer Mond, nordischer Fichtenspinner.

Bombyx	Lobulina	Fab. Ent. Supplement. 436. n. 83—84.
Phal. Bomb.	—	Vorkhausen III. 48. n. 7. wo ich aber blos die Beschreibung des sogenannten Weibchens meyne.
—	—	Borealis Vorkhaus. III. 33. n. 21. nach Schwarzens Dafürhalten.
—	—	Lunigera Esper t. 22. f. 6. nicht fig. 5.
—	—	— t. 91. f. 3. Männchen. f. 4—7. mit Raupe u. Puppe.
—	—	Lobulina Hübners Beiträge II. 2. t. 2. L. Phaläne t. 3. L. Raupe, aber zu klein.
—	—	Schwarzens Insectenbeiträge tab. 12. wo aber im Text Espers tab. 82. auszustreichen ist.

Nöfel III. t. 48. f. 1. 2. Raupe und Puppe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel, deren Grundfarbe bald hellgrau, bald schwarz oder bläulich ist, sind stets mit weißlichen Atomen bestreut, und führen 3 schwarze Zackenbinden und ein weißes Mittelmöndchen.

Das Weibchen ist beleibter.

Raupe. Sie ist stark behaart, mit schwarzen, borstenförmigen Büscheln, rautenförmigen schwarzen Ringflecken und oranienfarbenen Seitenmakeln; besonders zeichnet sie sich durch die schwarzen dichten Haarbüschel über dem zweyten und vorletzten Ringe aus.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Größe des Spinners ist veränderlich, unter oder über 1 Zoll 7 Linien in der Flügel-ausbreitung. Die Vorderflügel sind bald hellgrau, bald schwarz oder bläulich, stets mit weißlichen Atomen bestreut, und führen drey schwarze zackichte Querbinden und ein weißes Mittelmöndchen. Das Weibchen ist beleibter als das Männchen. Beyde Geschlechter haben kurzgefiederte Fühlförner.

Von

Von der Raupe, welche Köfel schon im Jahr 1745, Hübner aber in den neuern Zeiten, und Esper 1797 erzogen, sagt letzterer in der Fortsetzung seiner Spinner, phalänen S. 69 bey dieser Raupe: sie sey stark behaart und eine der schönsten, und derjenigen des Kieferspinners ähnlich. Der Kopf ist rund; auf dem Rücken eines jeden Ringes stehen schwarze borstenförmige Büschel mit einigermaßen weißen Haaren, welche in schiefer Richtung, die sich aber nicht ausdrücken läßt, einen breiten, weißen Streif zu bilden scheinen. Auf der Fläche selbst zeigt sich über jedem Ringe ein fast taurensförmiger oder winklichter schwarzer Fleck, der durch einen schmalen Streif mit den beiden nächsten verbunden ist. Diese Flecken sind zur Seiten bis an die Lustlöcher mit winklichtern, hellgelben und an den Einschnitten mit oranienfarbenen Makeln eingefast. Unter diesen bis an die Bauchfalte ist die Grundfarbe rothgelb, und hat 2 Längsklinien von bläulichen Flecken und Punkten, mit eingemengten braunen Atomen und sonst mannigfaltiger Mischung der Farben. Die Seitenhaare sind zottig und lichtgrau. Sie überdecken die Füße, welche vorzüglich lang und ausgestreckt sind. Die Unterfläche des Körpers ist gelb. Jeder Ring hat in der Mitte einen braunen Fleck, und daneben viele längliche abgesetzte wellenförmige Striche von hellbrauner Farbe. Das Hauptmerkmal sind die zwey schwarzen dichten Haarschöpfe, wie bey der *Polatoria*, wovon der eine auf dem zweyten, der andere auf dem vorletzten Ringe steht. Sie erreicht im Junius (bey ihm am 24. Junius) ihre völlige Größe, und fertigt sich sogleich ein Gewebe, worein sie sich einpinnet. Die Puppenruhe dauerte bey Esper 10 Tage (bis zum 5. und 6. Julius), bey Schwarz 20 bis 25 Tage.

Aufenthalt. Der Spinner findet sich im Julius und August bey Gunzenhausen und in andern Fränkischen Gegenden, und zwar die Raupe nur auf der Föhre, wo sie bey großer Hitze vom Stamme herunter steigt, etliche Schuh vom Boden. Die Hübnersche Abbildung derselben ist zu klein, vermuthlich in halb erwachsener Größe, mit der richtigen Futterpflanze, der Föhre, gezeichnet, die im Text aus Versehen Tanne heißt. Die Köfelsche Raupe hatte ihre Haare verloren. Sie soll auch in Lappland (*Borealis*) wohnen. Wenn aber Fabricius nach Clairvillens Vorausz die Köfelsche Föhrenraupe III. t. 48. f. 1. 2. bey seiner *Noctua Panthea* Fab. Suppl. S. 447. n. 309. nachweist, so ist dieß entweder ein Verstoß, oder es müßte diese Schweizerische *Panthea* eine Varietät unserer *Lobulina* Hüb. seyn, und zwar eine solche, auf deren Vorderflügeln die Querbinden und Atomen in lauter schwarz, und weißfleckige Zeichnungen ausarten, deren großer weißer Mittelfleck einen deutlichen schwarzen Punct führete, und der schwarze Hinterleib weiße Einschnitte hätte; welches uns keinesweges wahrscheinlich ist, zumal da diese *Panthea*, welche man Nadelbaumeule nennen kann, der *Noctua Ludifica* ähnlich soll.

Fortpflanzung. Nach beyden Schriftstellern, Hübner und Esper, werden die Eyer im Herbst auf Föhren, und, wie Schwarz angiebt, auf die höchsten Spizen derselben gelegt, aus welchen sich die Raupen vor Winters entwickeln.

Da nach Verfertigung des Vorkhausenschen Werks Fabricius diese Phaläne in seinen Supplementis als *Lobulina* aufgenommen hat; so kann dieser Name statt *Querna* Fab. Seite 50 in Vorkhausens Werk gesetzt werden.

Anmerkung. Der hier und in andern Deutschen Geandten nicht einheimische Kienbaumspinner, *Phalaena Bombyx Lobulina* Vien. et Esperi, ist nur beyläufig anzuführen. Die Wiener Entomologen erklärten in dem an Herrn Grafen von Hofmannseggge 1797 abgegebenen, auf dessen Erlauchen nach den Esper- und Hübnerschen Abbildungen bestimmten, schriftlichen, ungedruckten Verzeichniß ihrer Spinner und Eulen (nicht aller übrigen Schmetterlinge) obige Fabriciussche und Hübnersche *Lobulina*, Schwarzkiefernspinner (*Lunigera* Esp. t. 91.) nicht für die übrige; vielmehr sey ihre *Lobulina* diejenige, die sich auf Espers tab. 22. fig. 5. als *Lunigera*, und tab. 82. als *Lobulina* befinde. Letztern Namen führt also dieser Spinner im Wiener Bz. 57. n. 6., in Vorkhaufen III. 464. und in Espers Werk t. 82. Er ist kleiner, als unser vorhergehender. Der ganze Körper und die zurückgeschlagenen Flügel sind gelbbraun, mit 2 weißen, nach innen schwarzgezeichneten, ausgeschweiften Streifen durch die Vorderflügel, zwischen welchen ein weißer Halbmond sich befindet. Hinter dem zweiten Streif, der gegen den Vorderrand in einer geraden Richtung läuft, zieht sich noch vor dem schwarz- und weißbedeckten Hinterrand eine verloschene Fleckenreihe herab. Die Hühnerer sind bey dem Männchen gekämmt und dunkelrothbraun, bey dem etwas größeren Weibchen fein gekerbt; bey dem letztern ist der Flügelstreif abgebrochen.

Desen füzhaarige Raupe des Kien- oder Föhrenbaums ist noch nicht abgebildet. Einige Naturforscher, z. B. Fabricius und Schwarz, haben diese Art für eine Varietät des Schwarzkiefernspinners halten wollen. Hr. Esper ist aber anderer Meinung, und es bleibt hier immer noch deshalb Zweifel übrig, die wegzuraumen sind. Sch.

Zehnte Familie.

Haarraupen. Wollige Spinner.

Die Raupen sind langleibig, weich, mit feinen Haaren durchaus besetzt, so daß man doch alle Farben der verschiedenen Streife oder Bänder durchsieht; die meisten leben in ihrer Jugend gesellig. Die Verwandlung geschieht über oder an der Erde in einer eysförmigen Hülse. Die Spinner sind zungenlos, haben fast aufstehende Flügel, die vordern meist mit ein Paar Quersrichen, oder auch einem hellen Puncte bezeichnet, einen sehr rauhen Rücken, die Weibchen der meisten Arten zugleich am Ende des Leibes eine dicke Wolle, die Eyer zu bedecken.

A. Die mehr schädlichen.

38. Der Weißbuchenspinner. *Phalaena Bombyx Neustria*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ringelvogel, Ringelaker, Ringelspinner, Stammringelvogel, Baumlivreyvogel, Ringelmotte, Eichenringelphaläne.

<i>Phalaena Bombyx Neustria</i>	Lin. 818. 35.	Müller 661. 35.
— — —	Wiener Bz. 57. 4.	—
<i>Bombyx</i> — —	Fab. Ent. III. 1. 432. 79.	—
<i>Phal. Bomb.</i> — —	Vorkhauf. III. 103. n. 28.	—
— — —	Brahm Ins. II. 341.	—

Phalaena

Phal.	Bombyx	Neufria	Gleditsch II. 44. p. 21.
—	—	—	Nau Fortw. 291.
—	—	—	Anweisung zur sichern Vertilgung des Blüthenwicklers, S. 49.
—	—	—	Espan III. 27. f. 1—7. mit Raupe. Die Abbildungen zu verschönert.
—	—	Neufria quercus, die hell. Race, Espers Supplemente t. 85. f. 3. Männchen.	
—	—	Neufria Panzeri Fna. 23. tab. 21.	
—	—	—	Pezolds Mittel gegen die uns 16. t. 2. fig. 7. Raupe.
Mädel 1. Nachtrögel 2. Classe. tab. 6. mit Raupe.			
Schaefferi Icon. t. 209. fig. 1, 2.			

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Flügel sind zurückgeschlagen, und alle am Hinterand scheidig gefranzt, a) bey der dunkeln Race röthlichockergelb oder gar braunroth, mit zwey gelben ausgedehnten Streifen durch die Vorderflügel; b) bey der hellen Race (*Neufria quercus* Esp.) alle blaßockergelb, mit zwey röthlichbraunen Streifen.

Weibchen beyder Racen. Größer und röthlichockergelb, so daß der Raum zwischen den zwey gelben gegebenen Streifen ein wahres braunrothes Band bildet. Die Füßhöfner sind schwächer gekämmt als beym Männchen.

Raupe. Gesellig lebend, langleibig, weich- und dünnbehaart, und blaugrundbirt; mit einer weißen Mittel-, längs- und 3 rothen schmalen Neben-längslinien; der blaue Kopf hat 2 schwarze Punkte, und das Hinterende eine erhöhte Drüse.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Männchen misst von einer Flügelspitze bis zur andern $1\frac{1}{2}$ Zoll, das Weibchen 1 Zoll 8 Linien. Des Männchens Vorderflügel ist $7\frac{1}{2}$, des Weibchens aber 9 Linien lang. Das ganze Insect mit Füßhöfnern und allem hat die Farbe der Flügel, welche zurückgeschlagen und beym Männchen von der dunkeln Race röthlichockergelb oder gar braunroth sind, mit 2 gelben ausgedehnten Streifen durch die Vorderflügel; bey der gelben Race alle blaßockergelb, mit 2 röthlichbraunen Streifen. Das Weibchen beyder Racen ist röthlichgelb, so daß der Raum zwischen den 2 gelben gegebenen Streifen ein braunrothes Band bildet. Beyde Racen haben bunte Flügelfransen. Die Unterseite aller Flügel gleicht so ziemlich der obern, ist aber nur einmal scharf gestreift. Es giebt allerley Varietäten, z. B. mit einem Streif, mit anderthalbem; desgleichen solche, da beyde Streife enger oder weiter aus einander abziehen.

Die langleibige, weich- und dünnbehaarte, blaugrundbirt Raupe hat eine weiße Längslinie auf dem Rücken in der Mitte, und drey rothe schmale Längslinien daneben, einen blauen starken Kopf mit 2 schwarzen Punkten, die der Landmann gemeinlich für Augen ansieht, und eine erhöhte Drüse am After. Diese 2 Zoll lange Raupe ist vor der ersten Häutung schwärzlichbraun, bekommt hernach schmutzgelbe Längslinien, bis sie im erwachsenen Zustande, da sie nicht mehr gesellig lebt, die eben erwähnte Färbung erhält, und dann sich zerstreut. Sie spinnt sich endlich im Junius zu ihrer Verwandlung, gewöhnlich zwischen zwey Blättern, ein eyrundes, weiß- oder gelbgepudertes leichtes Gewebe, worin

worin die längliche, dunkelbraune, ebenfalls bepuderte Puppe 3 bis 4 Wochen ruht. Die Eyer überwintern.

Aufenthalt. Der Spinner fliegt schnell und mit einigem Geräusch im Julius in Gärten und andern Orten. Seine Raupe, die überall, nur nicht in kalten Ländern, zu Hause ist, lebt im April und May nach ihrem Austrieche aus dem Ey, auf allen Bäumen, die Nadelbäume ausgenommen, z. B. auf allerlei Obstbäumen, vorzüglich Birn-, Pflaumen- und Zwetschenbäumen, Schlehen, Eichen, Hainbuchen, Buchen, Ulmen, Pappeln.

Fortpflanzung. Die Weibchen legen ihre harthaarigen und festgummirten Eyer in einer Spirallinie um einen Baumzweig, den sie gleichsam wie ein Ring umgeben. Ein solcher Ring enthält gemeinlich 200 bis 350 Eyerchen, welche sowohl ihren Feinden, als der stärksten Winterkälte durch ihre Festigkeit Trost bieten. Wegen dieser Ringe, die der abergläubische Landmann in manchen Gegenden Geisferhorn nennt, und sie den Kindern, um das Geisern zu vertreiben, anhängt, heißt diese Raupe: Ringelraupe.

Feinde. Diese hat sie an den Zehrwespen (Ichneumon).

Schaden. Dieser hat zuweilen durch sie unsere Obstbäume betroffen, obwohl nicht in der Maasse, wie durch die noch schlimmern Arten. Sie wird z. B. nicht so schädlich wie der Weißdornfalter (*Papilio Crataegi*), ob sie gleich oft in weit größerer Menge vorhanden ist, wie z. B. im Jahr 1804; denn sie kriecht erst im Frühjahr aus, und kriecht erst in der letzten Hälfte des Mays am stärksten, wo die Bäume schon ganz mit Blättern bedeckt sind, und sie sie also nicht alle bezwingen kann. In manchen Jahren wird sie wieder eine Seltenheit.

Mittel dagegen. 1) Man strebe denselben, vor ihrer dritten Häutung, wo sie noch gesellig leben, im May, an Regentagen, an den Stämmen der Bäume nach. Ob sie sich gleich zuweilen sonnen, so wählen sie doch lieber Stellen, die nicht zu arg von der Sonne beschienen werden. Man trifft sie daher in den Gabeln der Zweige in einem großen wie mit Seide dicht übersponnenen Neste an, wo sie sich auch gesellschaftlich häuten. Dasselbst können sie oft zu 50 bis 200 beyammen gefunden, und mit dem Streichholz zerquetscht, oder in Töpfe herabgestrichen werden, um sie hernach vernichten zu können. Sie lassen sich gleich, wenn sie gestört werden, an Fäden herab, wo man sie dann auffuchen und zertreten muß.

2) Von der Hälfte des Junius an und den ganzen Julius hindurch, habe man ein Augenmerk auf ihre Cocons, die sich zwischen ein Paar Blättern der Bäume und Sträucher, auch an Häusern, Mauern und Zäunen befinden, um durch eine Querschung oder einen Fußtritt ihrer künftigen Brut ein Ende zu machen.

3) Man soll sie auch mit Seifenschaum tödten können, womit man die Raupen vermittelst eines an eine Stange gebundenen Lappens oder Schwammes beneßt *).

Anmerkung. Hier folgt im Wiener Verzeichnisse der jenem so ähnliche Flockenblumenspinners, P. B. Castrensis L. der in den Einneischen, Fabricius, Müller, Degeer, Vorkhausen,

Brachn,

*) Dieses Mittel kann bey allen gesellschaftlichen Raupen angewandt werden, zu denen man nicht leicht auf andere Art kommen kann. B.

Drabur, Gleditsch (II. 44.), Eiper, und Rößelschen Werken (IV. t. 14.) als *P. B. Castrensis*, Lagervogel (von dem sehr großen Gewebe), Lagermotte, Lagernachtfalter, Wiesentingelspinner, Krautringelmotte, Wollseidenspinner, und Goldringel, vorkömmt, und mit der hellern Race des vorhergehenden in allen Ständen und in der Größe so ähnlich ist. Alle Flügel sind zurückgeschlagen und am Hinterrande gelb und braun gefranzt; die Vorderflügel des Männchens sind hellrothgelb mit drey braunen Streifen, davon der dritte zackig ist und die Hinterflügel schmutzbraun und einmal gestreift sind. Kopf, Rücken und Brust sind schwefelgelb, die kammförmigen Fühlförner gelbgestreift mit bräunlichen Blättchen. Die Vorderflügel des Weibchens sind röthlichbraun mit 2 gelben, deutlichen, schrägen, und die hintern mit einer verloschenen Binde, und alles, was zum Körper gehört, von der Farbe der Flügel. Die in den nahen Gegenden gar nicht wohnende, schwarzköpfige, spindelförmige, mit einer entweder weißen oder blauen Rückenlinie, und pomeranzgelb und schwarzgesteckten Nebenlinien bezeichnete Raupe, die unten noch hochblau gestreift und weißleibig ist mit braunen Punkten, lebt brutenweis in großen Lagerzellen auf 2 Wollseidenarten (*Euphorbia esula* und *cyparillias* L.), auf der Stockblume und einigen Storchschnabelarten (*Geranium* L.); durch eine Ausnahme von der Regel hat sie sich auch einmal im Darmstüdtischen auf dem Wurzelanschlage der Birken gefunden, und damit füttern lassen, gehört aber demohngeachtet weder unter die mehr noch minder schädlichen Forstinsecten, weil die Wollseiden immer ihre eigentliche Nahrungspflanze bleibt. Nach ihren drey Häutungen tritt sie in einem etwas größer zubereiteten, aber eben so bepuderten, weichen Gewebe, als die nächst vorhergehende, im Junius zwischen den Blüthen der Wollseiden und unter den in der Nähe befindlichen Baumrinden in den Puppenstand, worin sie 3 oder 4 Wochen beharrt. Das Weibchen legt seine Eier im August in Ringeln um Pflanzenstängel, aus welchen nach 9 vollen Monaten, im Aprilmonat des folgenden Jahres die jungen Raupen herauskommen. S. h.

39. Der Viereichenspinner. *Phalaena Bombyx Proceßionea*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Heerraupe, Rageneule, Processionspinner, Processionsvogel, Processionsnacht-falter, Umgänger, (beym Glabbach).

Phalaena Bombyx Proceßionea, Lin. 819. 32. Müller 662. 32. mit einer falschen Abbildung.

Bombyx	—	Fab. Ent. III. 1. 430. n. 73.
Phal. Bomb.	—	Gorth. III. 132. 36.
—	—	Gleditsch I. 511. n. 5.
—	—	Walters Forstwissenf. 564.
—	—	Desselben Forstphysiographie, 385.
—	—	Eipers Spinner tab. 29. f. 1 — 5. mit Raupe.
—	—	Hennert über den Raupenstraß. tab. 3. f. 15 — 18. mit Raupe.

Man trägt Bedenken, Naturforscher XIV. tab. 2. beyzufügen, weil solche nicht gut zutrifft.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgeschlagen; die vordern aschgrau mit undeutlichen, dunkelbraunen Querstreifen. Das Männchen ist um etwas kleiner, und hat stärker befiederte Fühlförner.

Raupe.

Raupe. Stets gefellig, mit mattschwarzem Rücken und gelben Warzen. Sie hält ihre Processionen in regelmäßigen Zügen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser an Größe und an Zeichnung sehr unscheinliche Spinner, dessen Flügelbreite wie die bey einer männlichen Neuktria nur 1 Zoll 1 Linie beträgt, zeichnet sich blos im Raupenstande aus. Das Daseyn von drey oder vier durch die grauen Vorderflügel sich ziehender, bisweilen ins Braune fallender undeutlicher Querstreifen ist bernähe alles, was sich vom Schmetterling und von seiner Zeichnung sagen läßt. Die Hinterflügel, durch welche bey wenig Exemplaren eine verblichene Querlinie hindurch zieht, sind blasser grau und am Innenwinkel matt bestäubt. Die Unterseite ist einfärbig aschgrau. Kopf, Brust und Rücken sind sehr behaart und nebst dem kürzer behaarten Hinterleib ebenfalls aschgrau. Das Männchen hat gefiederte Füßhöfner, am After einen Haarbüschel und ist kleiner als das Weibchen. Bey einigen meiner Exemplare findet sich nach den zwey ersten Streifen ein schwarzer Mittelpunkt. Das etwas größere Weibchen von dunklerer Farbe hat noch undeutlichere Zeichnungen, einen starken Hinterleib, fadenförmige, wenig gekerbte Füßhöfner, und einen mattschwarzen wollichten After.

Deso merkwürdiger ist seine, einen Zoll lange Raupe, die man nicht mit der nächstfolgenden, *Pityocampa*, verwechseln darf. Ihre Fülzhaare werden nach der Häutung an den äußersten Spitzen grau, und nachher etwas röthlich. Die Haut ist bräunlichgrau, über den Rücken aber schwarzbraun, und an den Seiten weißlich gefärbt. Ueber jedem Ring stehen in der Mitte 2 erhabene Wörzchen von bleichgrauer, zuweilen gelber Farbe, aus welchen Haarbüschelchen herausgehen. So lebhaft das vollkommene Insect, besonders das Männchen ist, das bey der Enthüllung durch sein stetes Umherschwärmen sich verwirrt und verlegt, so träge und langsam ist die Raupe, die von der Zeit des Auskommens an, in ihrer Jugend bereits gemeinschaftlich in Geweben, die aus seinen Fäden bestehen, sich aufhält und von einem Ort zum andern hinzieht. Aber nach der dritten Häutung bauen sie sich ein gemeinschaftliches, sehr geräumiges Gewebe von mehreren dicht übereinander liegenden, aus zusammengewebten Fäden gefertigten Häuten. Es erreicht oft 18, 20 bis 24 Zoll in der Größe, ist grauweiß und mit einer Feinung zum Ausgang der Raupen versehen. Die ganze Brut beobachtet die pünctlichste Ordnung. Wenn sie ihre Küterung nöthig haben, so ziehen sie in einer starken Procession unter einem Anführer aus ihrer Wohnung auf der Erde nach der Länge und Quere über die Wege zu einem Baum, ohne sich im geringsten von ihrer Directionslinie abwenden zu lassen. Bey diesem Zug herrscht die größte Ordnung. Außer dem Anführer, wozu jede Raupe ein gleiches Recht zu haben scheint, geht noch eine Anzahl einzelner Raupen dicht hinterdrein. Diesen folgen Wie er von zwey, dann von drey, hierauf von vier, fünf, sechs und so fort, bis der ganze Zug die Wohnung verlassen hat. Trennt man sie, so schließt sich der Zug wieder, und setzt seine Procession hartnäckig fort. Ihr Rückzug geschieht eben so. Bey warmer Witterung wird diese Reise gegen oder nach Sonnenuntergang vorgenommen. Diese Einigkeit verläßt sie auch bey ihrer Verpuppung nicht. Sie bleiben beisammen in ihrem gemeinschaftlichen

lichen Gewebe, nur baut sich jede noch ein eignes, kleines mit ihren Haaren vermishtes, röthlichbraunes Gehäuse, worin sie zur ockergelben Puppe wird *).

Aufenthalt. Der Spinner findet sich in Eichenwäldern vom Anfang bis zu Ende des Julius, nach Herrn Esper auch bis zur Mitte des Augusts, aber allemal verwickelt; und seine Raupe eben daselbst, niemals aber auf Nadelholz, wie einige Schriftsteller angeben, auch nicht auf Eichensträuchern, sondern auf alten Eichen, im May und Junius, wo sie dann erwachsen ist.

Fortpflanzung. In manchen Jahren ist der Schmetterling hier und da, im May und Junius häufig in Eichenwäldern anzutreffen. Das Weibchen verwahrt seine Eier, die es im Julius oder August absetzt, sehr sorgfältig durch einen Ueberzug von flebrichter Materie an der Fläche des Stamms. Diesen bestreut sie dann mit den abgängigen Schuppen des wollichten Hinterleibes. Auf diese Unterlage kommen hierauf die sehr zahlreichen Eier in gleicher Linie enge an einander zu liegen. Sie sind von weißer, auf der Unterseite etwas gelblichen Farbe, und führen einen schwärzlichen Punct in der Mitte. Dies wird mit den noch übrigen Schuppen regelmässig überzogen. Die Farbe ist ein etwas alänzendes Dunkelbraun, daher diese Eier nicht leicht auf den gleichgefärbten Rinden zu erkennen sind. Ihre nachher im September aus den Schaalen hervorkommenden Raupen machen das oben beschriebene Gewebe, in welchem sechs bis acht hundert Stück sich befinden.

Schaden und Mittel dagegen. Dieser ist von doppelter Art: 1) Für die Gesundheit. Obgleich diese Art bey den Alten mit unter die giftigen gerechnet wurde, so wissen wir doch, daß Haare jeder haarigen Raupe, innerlich gebraucht, schädlich seyn würden. Außerlich sind die Haare dieser Schmetterlingsart feiner, steifer und daher eindringender. Und da sie in Menge beisammen leben, können die Haare um so leichter an die bloßen Theile unsers Körpers gerathen. Man muß also die Gespinste, Raupen und ihre abgelegten Raupenbälge nicht mit bloßen Händen berühren; doch kommt es auch hier auf die geschickte Behandlung an. Durch ein geringes Bestreichen mit Del ist der Schaden geheilt. Mithin ist dies kein wahres Gift. Reaumur bemerkt, daß diese Raupen doch mit einer Atmosphäre (Dunkelkreis) von fliegenden Haaren umgeben wären und zu fürchten seyen. Doch gilt dieses eigentlich mehr von der *Pityocampa*, die weit schädlicher ist. — Zum Vertreiben des Insekts pflegt man auch den empfindenden Theil mit den Blättern der gemeinen Petersilie zu reiben.

Nach dem Bericht eines andern Naturforschers (in Vorkhausens Rheinischem Magazin I. 370.) wollte ein Unterförster in Hessen an einer Eiche ein Nest dieser Raupen zerstoßen,

* Ich 1780 bey meinem Aufenthalt bey Hannover, diesen Spinner zog, fand ich, daß die Raupe bey der Erziehung in Zimmern anfanglich gleiche Lebensart fortsetzte, nachher aber erlernte, daß die Häutungen kurz auf einander folgten, daß die leeren Hautschaalen ebenfalls wie Raupen noch aussahen, und daß sich alle in

einem oder 2 Tagen, am 3. und 4. Julius verpuppten, zwey Drittel aber von ihnen nach einem Monat, nämlich am 4. August den Raupenstand verließen, der übrige Drittel den Herbst und Winter durch Puppen blieben, um sich den 27. Junius 1781 zu entthüllen. Sch.

stöhren, und brauchte seine Hände dazu. Er verspürte sogleich ein beschwerliches Jucken. Weil er sehr erhitzt war, wollte er sich den Schweiß abwischen und fuhr mit den Händen ins Gesicht, und verspürte auch da ein Jucken. Seine Hände und sein Gesicht schwellen auf, entzündeten sich, seine Augen schwellen ihm zu, und er lag beynähe 8 Tage blind. Aufschläge von Essig tilgten ihm endlich die Hitze, und nachdem er an die 14 Tage gelitten hatte, kam er wieder allmählig zu sich. Eben diesem Gelehrten ist noch ein Beispiel bekannt, wo Haare dieser Raupen den Hirten, die unter einem Baum, auf welchen diese Raupen wohnten, Mittag hielten, unter ihr Essen kamen. Sie bekamen ein fast nicht zu stillendes Erbrechen, welches mit den entsetzlichsten Schmerzen im Magen begleitet war, und wurden nur mit Mühe gerettet.

Schon Linné erzählt in seinen *Amoenitatibus academicis*, daß, als Lister einige kleine Kästchen, worin sich einige Larven von Nachtfaltern verpuppt hatten, reinigte, und den darin befindlichen Staub wegblasen wollte, ihm solcher ins Gesicht flog, und es ganz mit Blasen bedeckte. Eben dies Schicksal begegnete dem Herrn S. J. Ljungh, laut seines Aufsatzes im 2. Quartal der Schwedischen Academie der Wissenschaften zu Stockholm, Jahrgang 1802, nämlich, als er einige Schachteln, worin verschiedene Larven und Puppen aus Frankreich einige Jahre in Baumwolle eingepackt lagen, und die Baumwolle genau durchsuchte, da ihm dann ein Staub daraus entgegen kam, der ihm im Gesicht und an Händen ein Jucken verursachte. Er wusch zwar sogleich Gesicht und Hände mit Wasser. Allein als er in der Nacht im Bette warm ward, verwandelte sich das Jucken in einen brennenden Schmerz, und ließ ihm keine Ruhe. Der Schmerz nahm so zu, daß er sich den Tag darauf im Bette halten mußte. Nachdem er das Gesicht mit l'eau d'arquebuse beseufet hatte, ward der Schmerz und das Fieber noch heftiger; es entstanden kleine mit Eiter angefüllte Blasen und das Gesicht schwoll sehr auf. Nur allmählig ward er völlig hergestellt; die Kleider, die er damals angehabt, verursachten ihm ein halb Jahr hernach, ob sie gleich gut ausgebürstet waren, aufs neue Jucken und Ausschlag. Die mehresten jener vertrockneten Larven, Puppen und Cocons waren von *Bombyx processionea*. Schon Fabricius, Bomare und Panzer haben dasselbe bemerkt, und Reaumur half sich mit Petersilien. Es rührt vermuthlich von den feinen Haaren dieses Insects her, deren Spitzen sich in den Cocons verhärten, abfallen, und wenn man sie öffnet, in einer Wolle von feinem Staub aufsteigen.

2) Für die Forst-Deconomie ist sie nachtheilig. Denn da manches Gewebe von mehreren hundert Raupen bewohnt wird; da zuweilen Ein Baum drey solche Gewebe enthält, und auch bey Vertheilungen in mehrere Parthien jede Parthie doch ein hundert Stücke und drüber enthält: so können sie einen starken Eichenbaum entblättern. Das Beste ist, daß sie nicht immer bey Einem Baume bleiben. Wenigstens hat man keine ganz von ihnen entblätterten wahrgenommen.

Man muß doch ihrentwegen in Besorgung stehen, daß sie durch Ueberhandnehmen den Eichenwäldern gefährlich werden, wenn man ihnen nicht steuert. Dies geschieht durch Auffuchung ihres Aufenthaltes und Zerstörung der Nester mittelst der Stangenbesen.

40. Der Fichtenspinner. *Phalaena Bombyx Pityocampa*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleiner Fichtenspinner, Processionärer auf Fichten.

<i>Phalaena Bombyx Pityocampa</i>	Wiener Verz.	58. 11.
<i>Bombyx</i>	—	Fab. Ent. III. 1. 431. 74.
<i>Phal. Bomb.</i>	—	Vorkhausen III. 138. 37.
—	—	Vesorgers Forstmann u. 39.
—	—	Walters Forstphynographie S. 384.
—	—	Bedsteins Müsserung 174. 3.
—	—	Bedsteins Naturg. der schädlichen Waldraupen 28.
—	—	Füesly Magazin II. 232. t. 3. f. 1 — 5
—	—	Hennerts Raupentafel und Windbruch in Preußen 10.
—	—	von 1791 bis 1794. t. 3. f. 1 — 6. Raupe.
—	—	Däzel Forstwiss. I. t. 1. f. 9 — 11. mit Raupe.
—	—	Eisner III. t. 29. f. 6. 7. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgeschlagen, die vordern grau mit 2 braunen gewellten Quertlinien; die blassen Hinterflügel führen eine schwarze Randmakel. Am Kopf steht zwischen den Fühlhörnern über der Spiralzunge ein hervorragender Körper, der sich in 2 Knoten endigt.

Das Männchen hat gefiederte Fühlhörner und einen dunkelashgrauen Hinterleib, welcher beim Weibchen gelb ist.

Raupe. Schwarzleibig, gesellig lebend, mit grauen Haaren absatzweise in jeder Seite und dergleichen gelbrothen, nebst einer Art Wulst oben auf dem Rücken auf jedem Ring.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß beträgt 1 Zoll, 6 bis 7 Linien; beim Männchen 2 Linien weniger. Die Grundfarbe des Spinners ist ein schmutziges Grau, beim Männchen ins Weiße, beim Weibchen mehr ins Braune gemischt. Die Schuppen liegen nicht dichte. Zwey bis drey Querbänder ziehen sich durch die Vorderflügel, wenn der erste nicht deutlich zu sehen ist, und zwischen dem zweyten und dritten steht ein bräunlicher Punct. Die Hinterflügel sind weißlich, oft mit einer schwarzen Randmakel. Sie sind in Hennerts Schrift beim Männchen aus Versehen zu bläulich gemahlt. Der Kopf und Rücken sind stark behaart und dunkelashgrau, die Fühlhörner aber schwärzlich aschgrau. Durch die heller gefärbte Unterseite scheinen die Zeichnungen der Oberseite verblichen durch. — Das am meisten auszeichnende Merkmal ist ein am Kopf zwischen den Fühlhörnern über der Spiralzunge hervorragender Körper, der aus fünf treppenförmig über einander liegenden Schuppen besteht, und sich in 2 Knoten endigt.

Die besiederten Fühlhörner und die schwärzlich aschgraue und haarichte Endspitze des Hinterleibes unterscheiden das Männchen vom Weibchen. Letzteres ist am Hinterleib ockergelb, hat fadenförmige Fühlhörner. Auf den Flügeln sind die Zeichnungen verloschen, und um den Äfter stehn schwarzblaue Wollhaare, die leicht abstäuben.

Die Raupe ist um vieles größer, als die vorhergehende, 1½ Zoll lang und schwarzleibig mit sechszehn rothgelben Füßen. Die Haare sind über dem Rücken mehr

fuchseroth, in den Seiten aber weißgrau. Sie stehen nicht auf einzelnen Wärgchen, sondern buschweise auf jedem Absatz, auf Büschen in die Quere. Die feinen Haare verlieren sich leicht an ihr. Sie ist in den Kunsttrieben der Viereichenspinner-Raupe ähnlich, fertig gleiches, doch größeres, zuweilen trichterförmiges Gewebe, und macht gleiche Processionen und Rückzüge, wie dieselbe. Sie durchwintern in ihrem Gewebe, das sie im Sommer geräumiger und stärker weben, und das sie auch für Kälte schützt. Das kleinste hält 8 Zoll Höhe und 4 bis 5 im Durchschnitt. Da sie ganze Bäume damit überziehen und nur des Nachts herauskommen und fressen, so verspinnen sie bey Tage die Öffnung desselben wieder. Die Raupe ist im Herbst jung, um Weihnachten aber schon ziemlich herangewachsen, und erreicht im März ihre vollkommene Größe, worauf sie zwischen Steinen und Moos, oder auch 4 Zoll tief in der Erde sich verpuppt.

Die Puppe ist orange gelb. Nach einer Puppenruhe von 4 bis 6 Wochen kommt sie im Julius als Schmetterling zum Vorschein. Einige derselben bleiben über ein Jahr liegen.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Spinner und Raupe sind niemals auf Eichen, sondern jederzeit nur auf Nadelholz, nämlich der Pignole, *Pinus pinea*, in Italien, und im Nothfall auch auf der Föhre, Fichte und Tanne. Man hat sie auch in Deutschland und zwar in der Mark Brandenburg, in Oesterreich und Tyrol bemerkt. Vorzüglich hält sie sich im südlichen Europa auf, daher man sie am meisten in der mittäglichen Schweiz, in Frankreich u. s. w. antrifft. Die jungen Raupen kommen im August aus dem Ey. Ihre Colonien sind zahlreich.

Feinde. Die kalte Witterung zur ungewöhnlichen Zeit reißt sie auf, nicht aber die Winterkälte, welche sie ausstehen kann; Sperlinge und andere Vögel verzehren sie ohne Schaden.

Schaden. Das Insect hat sich den ältesten Naturforschern als eine Verwüsterin der Fichtenbäume, besonders der Pignole mit eßbaren Früchten, bekannt gemacht. Das Eigenthümliche ihres Gewebes und ihre dem Plinius, *historia mundi*, cap. 23. nicht unbekannte Wirkung hatten sie berüchtigt gemacht, und sogar zu Wesegen Anlaß gegeben. Ihre steifen und brüchigen Haare dringen in die Schweißlöcher ein, und erregen ein Jucken und Brennen, zuweilen auch Geschwulste. Klein gemacht dienten diese Haare den Giftmischern zur Bereitung giftiger Getränke, welche Schmerzen im Munde, Entzündung der Zunge und des Eingeweidcs, Erbrechen und den Tod selbst nach sich zogen.

Ihr Forst-Schaden ist um so größer, da die Nadelbäume, die sie bewohnen, von ihnen abgefressen werden, und zumal die jungen, gänzlich verloren sind. Keine andere, als diese, war wohl die 1779 in der Gegend um Dresden hausende Raupe, die nach Waltheers Lehrbuch der Forstwissenschaft S. 566 für diejenige des Viereichenspinners, *Processionea*, unrichtig gehalten wurde. Denn man beobachtete, daß, wo sie waren, sie in Linien zogen, die durch Faden an einander gekettet waren, die Bäume von der Erde an bis an den äußersten Gipfel bedeckten, und die Fichten- und Tannenwälder kahl machten. In eben demselben Jahre war ihre Anzahl auf den Bäumen der öffentlichen Promenaden zu Nancy in dem ehemaligen Lothringen so groß, daß man fürchten mußte, daß, wenn sie plöz-

lich

sich auf einmal umkamen, die Luft angesteckt, und epidemische Krankheiten verbreitet werden würden.

Mittel dagegen. 1) Die Mittel gegen die schädlichen Haare der Raupen waren bei den Alten Honig und Del. Ihr Daseyn bemerkt der Jäger gewöhnlich erst an dem seidenartigen Gespinnst, womit die Bäume so bedeckt sind, daß sie von weitem schon in die Augen fallen. Zu ihrer Verminderung in den neuern Zeiten ließ (nach Walther a. a. O.) Professor Nicolas in Frankreich ein Gemische von $\frac{3}{4}$ Schwefel und $\frac{1}{4}$ Salpeter bereiten, Strech unter die Bäume legen, es mit dem Pulver bestreuen und anzünden, wovon die Raupen ins Feuer fielen und verbrannten. Unterdessen wurden die übrigen Raupen und ihre Nester mit Stangenbesen von den Bäumen abgekehrt. Ihre Menge war so groß, daß 16 Personen in einem Tage mehr tödten, als vier Schubkarren faum fassen konnten.

2) Wenn ein Jäger einen Baum mit dergleichen Gespinnst bemerkt, so ist das Beste, ihn bey nasser Witterung abzuhauen, von den Aesten zu reinigen, und diese sammt Gespinnst und Raupen zu verbrennen.

3) Die Absonderung des kahlgefressenen Districts von den noch ganz gesunden kann durch 1 Fuß tiefe und 1 bis 1½ Fuß breite, so steil als möglich ausgestochene Gräben geschehen, entweder im ganzen Umfange, oder nach der Seite zu, nach welcher die in ihrem noch frühern Alter sich befindenden Raupen ihren Zug nehmen. Diese fallen alsdann zu tausenden in die Gräben, werden gefangen und getödtet. Doch müssen die dies- und jenseits stehenden Baumäste sich nicht berühren, oder lieber die zu nahe stehenden ganz oder astweis gefällt werden.

B. Die weniger schädlichen.

41. Der Cerreischenspinner. *Phalaena Bombyx Rimicola*, Vien. Catax, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Grauer Wellenträger, Kollrand.

Phalaena Bombyx Catax Lin. 815. 27? Müller 658. 27.

Die Wiener halten den Holzbienspinner, und Esper mit Vorkhausen diesen Cerreischenspinner für Catax L.

—	—	<i>Rimicola</i>	Wiener Bz. 57. 1.
<i>Bombyx</i>	Catax	Fab. Ent. III. 1. 429. 71.	
<i>Phal. Bomb.</i>	—	Vorkh. III. 116. 30.	
—	—	Brahm II. 285.	
—	—	Esper III. 16. f. 1—5. mit Raupe.	
Rösel III. t. 71. f. 1—3.	Raupe.	IV. t. 34. f. a. b. Weibchen.	

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind einfarbig röthlichgrau; auf der Mitte der vordern ein weißlicher Punct; die Fühlhörner des Männchens sind gefedert, die des Weibchens sehr schwach gekerbt.

Raupe. Gesellig lebend, aschgrau und dünnbehaart, mit einem blauen Rückenstreif, welchen an der Seite ein schmaler schwarzer begränzt, an den sich ein weißer anschließt. Jeder Ring hat 2 rothe behaarte Punctflecken.

Beschrei

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects.
 Der Spinner mißt 1 Zoll $7\frac{1}{2}$ Linien nach seiner Flügelausbreitung, ist also in seiner Größe der größte. Seine einfärbig röthlichgrauen Flügel sind mit dem Kopfe und dem wollichten Rücken gleichgefärbt, nicht sehr mit Schuppen belegt, in der Mitte der Vorderflügel mit einem weißlichen Puncte geziert, und am Vorderrand der Hinterflügel etwas weiß. Am Männchen sind die Fühlhörner gekämmt oder gefedert, am Weibchen aber gefedert. Der kurzhaarige Hinterleib hat bey dem Männchen einen mittelmäßigen, bey dem Weibchen einen sehr starken, aschgrauwolllichten Haarbüschel am Hinterende.

Die blaugraue, dünnbehaarte, in der Jugend gesellig lebende, an dem zweiten und dritten Ringe rothgelb gefleckte, und vom vierten bis zehnten Ringe auf jedem Gelenke 2 rothgelbe Punctenbüschel führende, gelbfüßige, 2 Zoll und 2 Linien messende Raupe hat einen blauen Rückenstreif, welchen an der Seite ein dergleichen schmaler schwarzer begränzt, an welchen sich ein weißer anschließt. Sie geht des Morgens gerne ihrem Futter nach, und gegen Sonnenuntergang noch einmal, begiebt sich aber bey Tage wegen der Sonnenhitze in die Ritzen und Klüfte der Bäume. Wenn sie sich ihr ovales, sehr festes und graugelbes Verwandlungsgehäuse mit frengelassenem Deckel, dessen Gränze von außen nicht zu sehen, und mit einem Luftloche versehen ist, fertig hat; so bleibt sie als Raupe noch sehr lange darin, ehe sie sich im Julius in eine runde und stumpfe Puppe von hellbrauner Farbe verwandelt. Die Puppenruhe ist höchst ungleich.

Aufenthalt. Er findet sich im September und October an Bäumen, mit seinem trägen Weibchen. Die ebenfalls träge Raupe lebt im May und Junius auf hochstämmigen Eichen, nach Kleeemann auch auf Weißbuchen und Espen. Sie soll die Blätter der niedrigen Eichenbüsche verschmähen. Ihre Entwicklungszeit ist sehr ungleich, indem man von Einer Brut Raupen gehabt, deren ein Theil Puppen von 1789, im October desselben Jahres schon, ein Theil 1790 im September und im November, und drey übriggebliebene erst 1791 im Herbst Schmetterlinge wurden, nach Brahm a. a. O.: gerade der Fall, den man auch bey der nachfolgenden Art, *Lanestris* L., erlebt hat.

42. Der Heckenschlehnspinner. *Phalaena Bombyx Lanestris*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wollnaster, wollnasteriger Nachtfalter, Wollenstricker, eisenfarbiger Wollenstricker, weißgefleckter Wollenträger, Kirschenspinner, Eyervogel (beym Gladbach).

<i>Phalaena Bombyx Lanestris</i>	Lin. 815. 28. Müller 658. 28.
—	Wiener Bz. 57. 2.
<i>Bombyx</i> —	Fab. Ent. III. 1. 429. 68.
<i>Phal. Bomb.</i> —	Vorkhaus. 123. 33.
— —	Gleditsch I. 309. II. 45. n. 26. II. C. 109.
— —	Mau Forsw. 288.
— —	Brahm 3. Zus. Cal. II. 288.
— —	Egper III. t. 17. f. 2 — 8. mit Raupe.
Nöfel I. 2. Cl. Nachtvögel. t. 62.	mit Raupe.
Schaefferi Icon. tab. 88. f. 10. 11.	

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgeschlagen und rothbraun, die vordern mit einem weißen Wellenstreif und 2 weißen Punctflecken bezeichnet, davon der eine in der Mitte, der andere an der Wurzel steht. Die Fühlhörner des am Hinterrande stark mit Weiß gemischten Männchens sind gekämmt und weißfüßlig, diejenigen des mit einem aschgrauen Wellenaster versehenen Weibchens aber unmerklich gezähnt.

Raupe. Gefellig lebend und violett-schwarz, mit drey weißen Puncten zwischen 2 gelbrothen Haarknöpfen auf jedem Gelenke, und dergleichen Bauch- und Schwanzfüßen, die Seiten haben eine weiße und gelbe Längslinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der an Kopf und Rücken stark behaarte Spinner, dessen Deutschen Namen: Kirschenspinner, im Wiener Werk, ich lieber in Heuschlehnspinner umänderte, weil man ihn auf Kirschen weniger findet, misst 1 Zoll und $\frac{3}{4}$, jeder Vorderflügel 9 Linien. Seine Flügel sind zu rückgeschlagen und bräunröthlich; die vordern mit einem weißen Wellenstreif und 2 dergleichen Punctflecken, davon der eine in der Mitte, der andere an der Wurzel steht. Obiger Wellenstreif zieht auch durch den etwas blässern, auf dem Vorderrande weißlich gefärbten Hinterflügel matt hindurch. Kopf und Rücken sind mit den Vorder- und der Hinterleib ist mit den Hinterflügeln gleichfärbig. Die Fühlhörner des Männchens sind gekämmt und weißfüßig; die des Weibchens aber fadenförmig und unmerklich gekerbt. Das Männchen hat am Hinterrande der Flügel viel weiße Mischung, und das Weibchen einen aschgrauen wollichten Afer.

Die 2 Zoll weniger 1 Linie lange Raupe kommt zu Anfang des Mays aus dem Ey, wo sie bis zur ersten Häutung nichts frist. Nach Wrahm ist sie immerfort, nach Kleemann nur in der Jugend gefellig. Ich fand doch, daß immer, wo nicht große, doch kleine Parthien späterhin beyammen blieben. Vor der dritten Häutung ist sie einsärbig grauschwarz, einzeln behaart, und nach der vierten, im Julius, bekommt sie eine andere Zeichnung, und wird violett-schwarz, mit 3 weißen Puncten zwischen 2 gelbrothen Haarknöpfen auf jedem Gelenke, und dergleichen Bauch- und Schwanzfüßen versehen; die Seiten haben eine weiße und gelbe Längslinie. Wobey zu merken ist, daß die rothgelben Haarknöpfe vom 2. bis 11. Ringe zehn Paar, und daß die Vorderfüße schwarz sind.

Sie leben gleich nach ihrem Auskriechen aus dem Ey in einem Gewebe, das nach und nach überaus beträchtlich erweitert wird, und aus mehreren Häuten besteht. Wenn sie eine von ihnen abgeleerte Stelle verlassen, so legen sie sich ein neues an andern Aesten an, aus dem sie Morgens und Abends zugweise auf die Nahrung ausgehen, doch nicht in der regelmäßigen Ordnung, wie der Viereichensspinner, oder sogenannte Processionsraupen. Zuweilen vereinzelte sie sich auch, wenn sie erwachsen sind. Ihr dichtes, ziemlich kleines, festgeleimtes Gehäule, das sie sich im Julius, zuweilen erst im August verfertigen, ist cyförmig, entweder weiß oder braungelb, worin die ockergelbe, braunschattirte, mit erhabenen Knöpfchen gezierte Puppe liegt, um sich in der Regel nach ihrer Ueberwinterung im April des kommenden, außer der Regel auch im April mehrerer verflossenen Jahre zu ent.

entwickeln *). — Was die Löcherchen betrifft, welche alle ihre Cocons haben, die Fiesly für Luftlöcher, und mit Recht für Werke der Raupe hielt, so ist es räthselhaft, daß die Löcherchen derselben allemal nach innen zu gekehrt sind. Man weiß nicht, ob schon in der Grundlage des Gewebes an den Stellen, wo in der Folge die Löcherchen angebracht werden sollen, nur einige dünne Fäden über einander gezogen werden, welche die Raupe nach vollbrachtem Baue des Cocons von innen mit ihren Kinnladen zerreißt, oder auf welche Art sie sonst verfährt. Zuverlässig sind es nicht feindselige Insecten, wie Kühn im Hallischen Naturforscher XI. 37. glaubt, von denen diese Löcherchen herrühren. Die Raupe läßt auch bey Verfertigung ihres Gewebes, damit sie desto leichter durchschlüpfen kann, einen Deckel frey, dessen Gränze, die von innen mit dünnen Fäden verwebt ist, man von außen nicht bemerkt.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint in der Regel jährlich einmal, und zwar im April, bey früher Wärme auch im März schon. Seine Raupe lebt im May und Junius am gewöhnlichsten auf Schlehen und Linden, frisst aber auch Kirsch-, Zwetschen-, Weißdorn- und Weidenlaub. Esper fand sie auch auf Eichen.

Fortpflanzung. Die Eyer mit der Wolle, welche der weibliche Spinner am Hinterende führt, bedeckt, werden im April abgesetzt, worauf das Räupchen gerade dann erscheint, wenn seine Nahrung, das erste Laub, da ist. Auf die Zahl der Eyer hat man nicht gehörig Acht gegeben. Im Jahr 1803 sah man ihre Nester bey uns in nicht geringer Zahl, aber sie wurden nicht schädlich; denn die Obstblüthe war schon durch die nasse Kälte ruiniert, welche vielleicht auch diesen Raupen zum Nachtheil gereichte.

Schaden und Mittel dagegen. In den Obstgärten verdienen ihre Gewebe keine Duldung: und können, da sie dem Auge wegen ihrer Größe nicht entgehen, gar leicht herabgenommen und ihre Bewohner vernichtet werden.

43. Der

*) Herr Schneider setzt zwar in seiner systematischen Beschreibung der Europäischen Schmetterlinge S. 15. n. 20. die längste Dauer des Puppenstandes aller Schmetterlinge nicht weiter als auf $\frac{1}{2}$ Jahr; ich fand es bey dieser Art, wenigstens bey der Hauserziedung, anders. Denn eine starke Parthie dieser Raupen spann sich bey mir am 17. Julius 1782, und die übrigen die darauf folgenden Tage ein, und es entwickelte sich keiner im October, sondern erst 1783 am 3. und 4. April einige wenige aus den weißen und gelben Cocons; dann 1784 am 25. April zehn Männchen und zwey Weibchen. Ich ließ die übrigen liegen, und im Jahr 1785 erschien keiner. Ich hob die Verwahrnasschachtel noch immer auf, und erhielt 1786 am 4. April nach vier verfloßenen Wintern noch 4

Schmetterlinge von der nämlichen Brut, und sah, daß in den übrigen Puppen zum Theil noch Leben war, bis sie dann im Herbst vertrockneten. Gewiß eine lange Lebensdauer für ein Insect dieser Art! Ich vermüthe im Freyen keine solchen Verzögerungen der Entwicklung. Nach Hrn. Vorkhausen sollen auch, versteht sich, außer der Regel, einige im Herbst aus den Puppen austriechen, ob ich gleich selbst keine Erfahrung davon beybringen kann. S.

Herr Földner in seinen Gärten, Feld- und Waldraupen, S. 161, bestätigt ebenfalls, daß die Puppen bey der Zucht oft 2 Jahre liegen geblieben wären; und ein Gleiches kann ich auch durch meine eigene Erfahrung bestätigen. S.

43. Der Holzbirnspinner. *Phalaena Bombyx Catax*, Vien. Everia, Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wollenträger, gelber Wollenträger, Everiennachtsfalter.

Phalaena Bombyx Catax, Wiener Wz. 57. 3.*Bombyx Everia*, Fab. Ent. III. 1. 430. 72.*Phalaena Bombyx* — Borkhausen III. 1. 120. 32.

— — Knuths Beyträge. I. t. 2. mit Raupe.

— — Lentipes Esper III. t. 16. f. 6 — 9. und t. 17. f. 1. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Flügel sind zurückgeschlagen, die mit einem weißen Punctfleck (*Stigma*) bezeichneten vordern haben an der Wurzel ein hellgelbes Fleck, sodann ein dunkelgelbes, mit einem rauhgelben Querstreif besäumtes Feld, hinter welchem der übrige Raum des Hinterrandes, so wie die Hinterflügel sieberrindenbraun und dünnbeschuppt sind. Die Fühlhörner sind stärker als beim Weibchen gefämmt.

Weibchen. Weit größer: die mit einem eben solchen Punctfleck bezeichneten Vorderflügel sind zwischen dem gelben Fleck an der Wurzel und dem Querstreif schön castanienbraun, der übrige Raum am Hinterrand ist nebst den Hinterflügeln blaffsieberrindenbraun, und wenig beschuppt. Das dicke Hinterende des Leibes ist wollenhaarig und schwarzbraun.

Raupe. Gesellig lebend, stark behaart, oben gelbbraun mit schwarzen Ring-Einschnitten, und elf schwarzen viereckigen Sammetflecken über den Rücken, und blauen, gelbgelblich und gelbpunctirten Seitenflecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner misst nach unsern Exemplaren 1 Zoll und 5 Linien in der Ausbreitung. Seine Flügel sind zurückgeschlagen; die vordern haben ein weißes *Stigma*, scheinen zwar von der Wurzel bis zu einer gewissen Nähe des Hinterrandes durchaus gelb, haben aber genauer betrachtet an der Wurzel ein hellgelbes Fleck, sodann ein dunkelgelbes mit einem rauhgelben Querstreifen besäumtes Feld, hinter welchem der übrige Raum des Hinterrandes so wie die Hinterflügel sieberrindenbraun und dünnbeschuppt sind. Kopf, Vorder- und Hinterleib und Füße sind langhaarig und nebst den starkgefämten Fühlhörnern gelb. Die Unterseite aller Flügel sind mit der Oberseite der Hinterflügel gleichfärbig, und das am Vorderrande der Vorderflügel befindliche blendendweiße *Stigma*, das schöner und größer ist, als bei dem Cerreidenspinner, scheint auch unten durch. — Der weibliche Spinner ist träger, und größer, als der männliche; er misst ein 1 Zoll 2 bis 10 Linien und hat ein eben solches *Stigma*. Der castanienbraune Raum zwischen der gelben Wurzelmakel und dem gelben Querstreif gleicht einer sehr breiten Binde, und der übrige Raum am Hinterrand ist nebst den Hinterflügeln blaffbraun und nur wenig beschuppt. Das dicke Hinterende des Leibes ist wollenhaarig und schwarzbraun. Kopf, Rücken und Füße sind langhaarig und wie die Flügel gefärbt.

Die im May austriechende junge Raupe ist schwarz und lebt bis zur ersten Häutung nahrungsgelos, und bewohnt ein gemeinschaftlich verfertigtes Gewebe bis zur dritten Häutung; alsdann vertheilen sich die Raupen. Nach der vierten ist sie ausgewachsen, in der Größe der vorhergehenden, *Laesetris* L. und stark behaart, oben gelbbraun mit schwar-

zen Ringeinschnitten, und elf schwarzen viereckigen Sammetflecken über den Rücken und blauen, gelbgestrichten und gelbpunctirten Seitensflecken. Ihre Haare sind parthienweis vertheilt. Der wie eine gedrückte Kugel aussehende Kopf scheint an jeder Seite 6 Augen zu haben, und die Füße sind dunkelocker gelb. Von ihrem langsamen Gang benannte sie Esper: lentipes, trägfüßige. Die Verpuppung derselben in einem eysförmigen, glatten, bald weißen, bald braunem Gehäuse, welches sie mit ihren eigenen Haaren inwendig auslegt, und welches in der Seite ein Luftloch und am Ende einen Deckel hat, fängt in den ersten Tagen des Junius an, und geht langsam von statten. Die Puppe ist so weichschalig wie die von Rimmicola, von Farbe zimmetbraun, mit 2 kleinen Warzen am 5. und 6. Ring und einer stumpfen Schwanzspitze. Ihre erste Beschreibung hat man, nachdem sie bereits den Wienern schon bekannt gewesen, dem Professor Knöch zu Braunschweig zu verdanken, der zuweilen 2 Raupen in Einem Gewebe sich einspinnen sah.

Aufenthalt. Der Spinner, dessen Raupe man vor 2 Jahren das erstemal hier vorfand, kommt zu Ende des Septembers *) hervor, und seine Raupe ähnet sich auf Schlehen, Birken, bey uns auf Obst und Eichen, und bey den Wienern auch auf Holzbirn.

44. Der Hagedornspinner. *Phalaena Bombyx Crataegi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Dorneule, Weißdornspinner, Gabelschwanzspinner, Weißdornspinnmotte, Hagedornnachtsfalter, bandirter Wollträger.

Phalaena Bombyx Crataegi, Lin. 823. 48. Müller 666. 48.

B o m b y x — — Wiener Verz. 58. n. 8.

Phalaena Bombyx — — Fab. Ent. III. 1. 460. 166.

— — — — Vorkhausen III. 127. 34.

— — — — Gleditsch II. 158.

— — — — Esper III. t. 45. f. 1—6. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Flügel sind dachig; die weißlichen etwas schwarzbestäubten vordern haben eine mehr oder weniger schwarzbräunliche, gezackte, und scharf begränzte Queerbinde, hinter welcher 1 bis 2 nebelichte oder verblichene Zackenlinien folgen; die Fühlhörner sind kammförmig und weißgestielt.

Weibchen. Größer, grauer, sonst eben so gezeichnet, als das Männchen, aber nicht deutlich begränzt. Der Hinterleib ist dick und wollig.

Raupe. Bläulichschwarz und dünn behaart; jeder Ring zeigt eine weiße oder gelbe Binde zwischen 2 ziegelrothen Knöpschen, darauf steife Haare stehen; in den Seiten läuft eine weiße längs-Fleckenlinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Männchen mißt 1 Zoll und 2 Linien, und alle seine am Hinterrand mit dunkeln Puncten besetzten Flügel sind in ihrem Zuschnitt mehr geründet, als bey dem Weibchen. Seine weißlichen, etwas schwarzbestäubten Vorderflügel haben eine mehr oder weniger schwarzbräunliche scharfbegränzte Zackenbinde, hinter welcher 1 bis 2 nebelichte oder verblichene Zackenlinien folgen; die kammförmigen Fühlhörner sind weißgestielt. Die Hinterflügel sind

grau;

*) Bey mir am 28. September. Sch.

grau; eben so die Unterseite, wo dann ein geschwifter Streifen durchzieht. Kopf, Vorder- und Hinterleib sind behaart und röthlich-ashgrau. Das haarige Hinterende steigt gabelförmig aus einander. Das 1 Zoll und $\frac{1}{2}$ Linien in seine Weibchen ist weit mehr grau, und von eben der, nur schwächeren und undeutlichen Zeichnung, als das Männchen. Die Fühlerhörner sind schwach gekämmt und der dicke Hinterleib ist grauwollig.

Die Raupe ist bläulichschwarz; jeder Ring zeigt eine weiße oder gelbe Binde zwischen 2 ziegelrothen Knöpfen, darauf tiefe Haare stehen; in den Seiten läuft eine Längsline von weißen Flecken. Sie ist zu Ende des Mays und im Junius bereits erwachsen. Bey Varietäten (und eine solche hat Fabricius vor sich gehabt) haben nur 4 der mittelsten Knöpfe die rothe Farbe. Sie spinnt sich in der Mitte des Junius zwischen Blättern, bald wie der Heuschreckenspinne, in ein eiförmiges, gelbes, doch nicht so regelmäßiges Gehäuse ein, worin die schwarzbraune, stumpfe Puppe liegt, welche bey uns bis nach der Mitte des Augusts, also 2 Monate und 1 Woche, bey Vrahm aber drey Monate ruhet. Insecten-Calender II. S. 292. Herr Kammerrathe Jung zu Uffenheim, Verfasser des Verzeichnisses der Europäischen Schmetterlinge, hat von dieser Phaläne einen vollkommenen Zwitter erzogen. Man weiß nicht, ob die Eyer überwintern.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint jährlich einmal, und zwar im August. Die Raupe weidet im May auf Schlehen, Weißdorn, Zwetschen, Pflaumen, Pfirschen und Weiden.

45. Der Albernspinner. *Phalaena Bombyx Populi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pappelspinner, Pappelvogel, Pappelmotte, Aspenmotte, Pappelnachtsfalter, grauer Wollträger, Kreuzmotte (von der Raupe).

Phalaena Bombyx Populi, Lin. 818. 34. Müller 660. 34.

— — — Wiener Verz. 58. 9.

Bombyx — — Fab. Ent. III. 1. 429. 70.

Phalaena Bombyx — — Vorkauf. III. 129. 35.

— — — Gleditsch I. 453. und 541. und II. 83.

— — — Rau Forstwiss. 289.

— — — Esper III. t. 25. f. 1—6. mit Raupe.

Nöfel I. 2. Classe. t. 60. und III. t. 71. fig. c 7 — c 9. mit Raupe und ihrer Varietät.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgeschlagen, fast durchsichtig; die vordern schwärzlich aschgrau mit einer weißlichen oder gelblichen zackichten Quercellinie. Die Fühlerhörner des Männchens sind stark gekämmt und die des schwerbelibren Weibchens nur fadenförmig und schwach gezähnt.

Raupe. Klein und kurzhaarig, in den Seiten aber langhaarig, bald aschgrau, bald schwärzlich, bald hellfarbig, mit großen Rückenflecken, worauf jeder Ring mit 4 im Quadrat stehenden oranienfarbenen Knöpfchen besetzt ist.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst einen Zoll und 9 Linien; seine Flügel sind sämmtlich schwach beschuppt, und die Franzen des Hinterrandes gescheckt. Die schwärzlich aschgrauen Vorderflügel, wel-

Die Köfel bräunlichgrün nennt, haben eine weißliche oder gelbliche Rückenlinie und oft noch einen zweyten gelben Streif ohnweit der Wurzel, und die Hinterflügel sind hellgrauer. Die Fühlhörner des Männchens sind stark gekämmt und die des Weibchens nur fadenförmig und schwach gezähnt. Auf der grauen Unterseite leuchtet die Zeichnung der Oberseite durch.

Das Weibchen übertrifft das Männchen an Größe und ist am Hinterende schwärzlich wollig. *)

Die nach Köfels Nachricht überwinternde, und im May gewöhnlich schon ausgewachsene, träge und langsame Raupe, welche fein und kurzhaarig, in den Seiten langhaarig, bald aschgrau, bald schwärzlich, bald hellfarbig ist, misst 1 Zell 7 Linien, hat einen kleinen Kopf und einen flachen, weißgelblichen und mit zimmetbraunen Rückenflecken bezeichneten Bauch. Jeder Ring ist mit 4 im Quadrat stehenden, oranienfarbenen Knöpfchen besetzt. Sie zeigt in ihrem Habitus viele Aehnlichkeit mit der Raupe des Frühschneiders, *Quercifolia*, geht des Morgens und Abends auf den Fraß aus, und kriecht bey Tag in die Ritzen und Klüfte der Stämme. Eine Varietät, Köfel III. 71. ist breitflügelig, weißgrau mit schwarzen Flecken von verschiedener Form und Größe. Von den kreuzförmigen Zügen derselben ist die ganze Phaläne von Liebhabern die Kreuzmotte genannt worden. Nach ihrem langwährenden Raupenstand verfertigt sie sich ein fein gewebtes, sondern erdiges Tönnchen, gemeinlich am Fuß der Bäume, oder sonst auf einer ebenen Fläche, in einem Winkel. Die darin befindliche Puppe ist dunkelbraun, kurz und ziemlich gerundet, und ihre Ruhe dauert in der Regel 4 Monate, bey Ausnahmen aber gar zehn.

Aufenthalt. Der Spinner entwickelt sich vor dem Ende des Octobers; die Raupe frisst im April bis Junius auf Eichen, Linden, Birn, Zwetschen, Apfel, Weißdorn, Weiden, Rosen und bey uns auf Buchen und Pappeln; Esper vermuthet auch auf Baum-Lichenen (*Schroffmoosen*).

Fülste Familie.

Halbhaarraupen. Großkirnige Spinner.

Die Raupen sind weich, schwarzsprenklich, haben fast nur auf den schwarzen Punkten einzelne Haare. Die Verwandlung geschieht in einer Erdhölse, entweder ober, oder unterhalb der Erde. Die Spinner sind zungenlos oder doch kurzzungig, haben einen flachen, breiten Kopf, oder vielmehr einen runden, erhöhten Kragen um denselben, einen büschigen Rücken; auf den abhängenden Vorderflügeln nebst zwey halbgezähnten Querstreifen eine oder mehr helle Makeln; sie sind einigermaßen Eulen ähnlich.

A. Eine

*) Ich habe eine Varietät aus Köfel III. t. 71. abgebildeten Raupe erzogen mit schuppenlosen,

ganz unternirten Flügeln, deren Ränder alle dunkelbraunroth sind. Sch.

A. Eine mehr schädliche Art.

46. Der Mandelspinner. *Phalaena Bombyx caeruleocephala*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Blaukopf, blautöpfiger Raupenspinner, blautöpfiger Nachschalter, Brillenvogel (von der Gestalt des Stigmas auf den Flügeln).

<i>Phalaena Bombyx caeruleocephala</i>	Lin.	826. 59.	Müller	671. 59.
B o m b y x	—	—	Wiener Verz.	59. 3.
—	—	—	Fabr. Ent.	III. 1. 440. 102.
—	—	—	Deffen Reise durch Norwegen.	S. 96.
<i>Phalaena Bombyx</i>	—	—	Vorkhausen	III. 352. 132.
—	—	—	Brahm	II. 494.
—	—	—	Gleditsch	II. 82.
—	—	—	Nau Landwirthsch.	252.
—	—	—	Anleitung zur sichern Vertilgung des Blüthenwicklers.	53. II. 4.
—	—	—	Esper's Spinner	I. 58. f. x — 4. mit Raupe.

Nöfel I. 2. Classe. Nachzög. t. 16. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Mit gekämmten Rücken, dachigen, grauen Flügeln, davon die vordern ein zusammen verbundenes weißlichgelbes Stigma oder Narbe führen. Das Männchen hat stark gefiederte, das Weibchen nur fadenförmige Fühlhörner.

Raupe. Dick, saftvoll, meergrün, mit schwarzen Knöpfen und drey blasgelben Längsstreifen, davon die mittlere etwas breit über den Rücken läuft.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll 6 bis 9 Linien. Die bräunlichgrauen, etwas glänzenden Vorderflügel haben verlorne wolkichte Flecken. Das dreifach getheilte, zwischen 2 schwärzlichen kappensförmigen Querstreifen ruhende, weißgelbe Stigma wird bald mit einem doppelten Nierenfleck, bald mit einem Brillenfleck verglichen, und steht in der Mitte, nahe am Vorderrand. Eine nicht genug bemerkbare, in Köfels Abbildung nicht ausgedrückte, weiße Wellenlinie hinter dem zweyten Streif bildet am Schwanzwinkel (Innenwinkel) ein weißes Fleckchen. Der gezahnte Hinterrand hat aschgraue glänzende, mit einer Linie umzogene Franzen. Die aschgrauen, mit einem matten Mittelfleck und verloschener Binde versehenen Hinterflügel haben am Schwanzwinkel ein schwarzes Strichfleckchen. Die Farbe der Fühlhörner, die am kleinen Kopf beym Männchen gefiedert, beym Weibchen nur fadenförmig sind, ist rostbraun. Der Bruststreifen nebst seinem unmerklichen Rückenkamm mit den vordern, und der Hinterleib sammt dem beym Männchen buschhaarigen, beym Weibchen cylindrischen, braunwolligen After ist mit den Hinterflügeln gleichfärbig.

Die meergrüne, träge, im Junius verwachsene Raupe ist gemein, und hat einen kleinen, lange nicht so blauen Kopf, wie die *Neustria*, und auf demselben 2 schwarze Rundflecke. Jeder Rückenknopf hat ein einzelnes Haar. Sie hat ein fleischernes Horn am ersten Ring zwischen der Unterlippe und den Vorderfüßen. Es gibt auch blaugrüne Varietäten. In der Jugend ist sie heller, und fällt über den Rücken oft ganz ins Weißliche und

und im Alter geht sie ins Bläuliche über. Zu ihrem engen, festen, weißen und auf der Oberseite eckrunden und unten platten Gehäuse nimmt sie allerley sich vorfindende Rinden, und Holzmateriellen, und wird darinnen nicht so bald, wie andere, sondern erst in der dritten Woche zur Puppe. Diese ist klein, cylindrisch, rothbraun, glanzlos, etwas blau bestäubt, und ihre Ruhe oder Ausbildungszeit dauert 3 Monate in der Regel, zuweilen aber kürzer oder länger.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Spinner kömmt zu Ende des Septembers zum Vorschein. Die Raupe lebt im May und Junius auf Schlehen, Weißdorn, allen Kern- und Steinobstbäumen, Mandeln und Pflaumen, auch auf Linden. Die halbrunden, gefurchten, hellgrünen Eyer werden im October einzeln an die Bäume gelegt, wo sie überwintern.

Feinde. Diese sind außer den Vögeln, theils die Larven der Ichneumonwespen (Zehrwespen) und verschiedener Fliegen, theils die Ameisen und die stinkende graue Wanze, *Cimex griseus* L., die sie aussaugt, theils eine unerklärbare, schnelle Fäulniß, in die sie übergeht. Daher bringt man bey der Erziehung immer die wenigsten durch, zumal sie die Gefangenschaft nicht vertragen kann.

Schaden. In unsern Gärten schadet sie den Bäumen überhaupt wegen ihrer Gefräßigkeit, besonders aber in ihrer Jugend den Knospen und Blüthen, ob sie gleich einsam lebt. Herr Fabricius fand auf seiner Reise durch Norwegen, daß die Bäume von ihnen kahl gefressen waren.

Mittel dagegen. Um sie aufzufuchen und im Raupenstande zu vertilgen, wähle man regnerische Tage, an welchen sie sich unter die Aeste und an trockene Stellen des Stammes flüchtet. Ferner da sie im Puppenstande an Stellen, wo Spaliere mit Mauern sind, oder niedern Aesten, hölzernen Geländern, Pfosten der Gartenthüren, und Gesimsen der Gartenhäuser zu finden ist, so kann das öftere Säubern mit Besen von guter Wirkung seyn, wenn man etwa das Abraupen versäumt hätte.

Anmerkung. Bernoulli ging zu weit, wenn er dieser Art das Vermögen, fruchtbare Eyer zu legen, ohne sich begattet zu haben, zuerkannt hat. *Erzlehen physikalische Biblioth. II. 363. S. 4.*

B. Die weniger schädlichen.

47. Der Schlehenspinner. *Phalaena Bombyx Oleagina*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Olivenfarbiger Spinner, Schlehennachtfalter.

<i>Phalaena Bombyx Oleagina</i> ,	Wiener Verz.	59. 2.
<i>Bombyx</i> —	Fab. Ent. III. 1.	440. 104.
<i>Phalaena Bombyx</i> —	Vorkhausen III.	350. 131.
— — —	Esper's Spinner t.	60. f. 4.
— — —	Esper's Eulen t.	184. f. 5. 6. Raupe.
— — —	Panzeri Fauna inl.	II. t. 23.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig und gezähnt, die vordern glänzend grün mit violetten, ins Schwarze ziehenden Wolken und Flecken, und zwey weißen Narben (Sigma) am Vorderrand, wovon der vordere rund ist und eine rostfar-

farbige Pupille hat, der hintere aber nierenförmig und größer ist. Das Männchen hat weißgeschafete, feingefiederte Fühlhörner.

Raupe. Röthlichbraungrau mit unzähligen, kurzen Strichen und Puncten, einem großen schwarzen Kopf, und abgesetzten schwarzen Rückenstreif; das Halsband, das ist, der erste Ring, ist pomeranzfarbig und schwarzgefleckt; der 2. und 3. sind schrägs gefleckt, und jeder der übrigen Ringe hat vier schwarze und mitunter auch pomeranzfarbene Puncte in Einer Reihe. Jeder der beyden letzten führt 2 Paar stumpfe Spine.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser schöne Spinner, den die Wiener Entomologen zuerst ins System und zwar in diese Familie eingetragen haben, mißt seiner Flügelausbreitung nach 1 Zoll und 7 Linien, und jeder Vorderflügel in die Länge 8½ Linien. Die Flügel sind gezähnt und haben sämmtlich rostbraune Franzen am Hinterrand. Die vordern sind glänzendgrün mit violetten, ins Schwarze ziehenden Wolken und Flecken und zwey weißen Narben am Vorderrand, wovon der vordere rund ist und einen rostfarbigen Strahl hat, der hintere aber ohne Strahl, nierenförmig und größer ist. Die hintern sind weiß mit 1 oder 2 oft sehr verblichenen Querreihen von schwarzen Puncten. Die Unterseite ist überall weiß, wo dann die Vorderflügel einen Randschatten und eine Wischbinde, die Hinterflügel eine Mittelbinde nebst 1 oder 2 Hinterrandflecken zeigen. Kopf, Halsstragen und Rücken sind grün, letzterer dabey sehr breit, mit einigen schwarzen Zeichnungen und einer geschwungenen rostfarbigen Querebinde. Der ocker-gelbe Hinterleib hat einen rothfarbenen Büschel auf jedem Gelenk. Das Männchen kennt man an seinen rostfarbigen, weißgeschafeten, feingefiederten, das Weibchen aber an seinen ungefederten, dünnen Fühlhörnern, und daran, daß es beleibter ist.

Die Raupe, welche Esper a. a. O. aus Versehen unter den Eulen hat mit abbilden lassen, war ihm nach IV. Theil, 2. Band, 2. Abschnitt S. 20. im Jahr 1794. zu Anfang des Maymonats in Menge und zum Theil in erwachsener Größe an den niedern Eschlehenhecken, da wo sie nicht freigestanden, zu Theil geworden. In der Jugend nach den ersten Häutungen ist sie lichtgrau, mit einem weißlichen Rückenstreif und in der Mitte eines jeden Rings mit einem hochrothgelben Fleck zwischen 2 schwarzen Puncten, und noch kleinern dazwischen bezeichnet. Der Kopf ist schwarz mit einem gelben Ring; das aufgetriebene Bruststück, das ist, die vorderen Ringe, sind schwarz gesäumt. Zur Seiten stehen 2 gelbe abgesetzte Linien, unter welchen sich die schwarzen Lufelöcher und über diesen noch einige weißliche Flecken befinden. Auch die Füße sind schwarz. Das Eigene, worin sie in diesem früheren Alter von allen andern Raupen abweichen, sind jene vorderen Ringe, die wie bey der Seidenraupe, *Mori*, sehr verdickt und blasenförmig aufgetrieben, neben welchen der Kopf und auch der nächste Ring so klein ist. Dieser Umstand verliert sich nach der letzten Häutung. Wegen das Hinterende (Aster) ist die Raupe spindelförmig verdünnt. Sie kömmt im ausgewachsenen Stand eine dunkelgraue, mehr ins Röthlichbraune, oder auch bey einigen ins Blauliche gemischte Grundfarbe. Unter der Vergrößerung zeigt die ganze Fläche eine Menge von schwarzen, kurzen Strichen und Puncten. Der sehr große, ganz schwarze Kopf hat 2 kugelförmige Erhöhungen am obern Theil. Der erste Ring ist hochpomeranzfarbig und mit 6 schwarzen, eingehenden Flecken gerandet. Auf dem 3.

und

und 1. Ring steht eine schräge schwarze Makel, die unten weißgesäumt oder vielmehr ins Weißliche verloren ist. Jeder der übrigen Ringe hat über dem Rücken vier schwarze, in eine Reihe geordnete größere Punkte, und darunter pomeranzfarbige in Eine Linie gereiht. Diese schwarzen Punkte sind Wärschen, die in der Mitte ein weißes Haar enthalten. Ueber den Rücken zieht sich ein abgesetzter schwarzer Streif. Jeder der beyden letzten Ringe führt in der Mitte 2 Paar stumpfe Spitzen, davon das erste Paar allezeit kleiner ist. Die Vorderfüße sind grau, und die Bauchfüße auf der innern Seite rothgelb.

Bei Herrn Esper krochen die meisten vom 4. bis zum 7. Junius zu ihrer Verwandlung in die Erde, um sich ein starkes Gewölbe zu verfertigen. Die Puppe war dunkelockergelb und dick mit schwarzbraunem Hinterende, das sich in 2 Spitzen theilte. Die Puppenruhe dauerte 9 Monate.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint in gewissen Deutschen Gegenden, z. B. bey Erlangen, Augsburg, Mainz, Leipzig und im südlichen Frankreich, jährlich einmal, und zwar im März, wo man ihn an Gartenmauern, Thüren etc. wahrnimmt. Die Raupe wohnt vom April bis zu Anfang des Junius auf Schlehensträuchen.

48. Der Bindenspinner. *Phalaena Bombyx Bucephala*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Großkopf, Ochsenkopf, Bucephalusfalter, Waffenträger, Wappenträger, halber Mond, Gelbkopf, Wandelvogel, Gelbes Eck, Mondvogel.

Phalaena Bombyx Bucephala Lin. 816. 31. Mäller 659. 31.

— — — Wiener Berg. 59. 1.

Bombyx — — — Fab. Ent. III. 1. 439. 99.

Phal. Bomb. — — — Vorkhausen III. 346. 30.

— — — Gleditsch I. 311. 437. 514 und II. 48.

— — — Esper III. tab. 20. f. 1. — 4. mit Raupe.

Nöfel I. 2. Cl. Nachtdög. lt. 14. Schäfferi Icon. t. 51. f. 10. 11.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig, die glänzend silbergrauen vordern haben zwey rostgelbe Querstreifen und eine gelbe, große, runde Makel an der Spitze der Flügel. Die gelben Fühlfhörner sind am Männchen fein gesiedert, bey dem Weibchen, das größer ist, fadenförmig.

Raupe. In der Jugend gefellig lebend, dünn und fein behaart, mit gelben Längslinien und verglichen Einschnitten, wie auch weißen Seitenpunkten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt nach den stärksten Stücken 2 Zoll 1 Linie, und jeder Vorderflügel eilf Linien in die Länge. Seine Grundfarbe ist glänzend silbergrau, mit Achsgrau schattirt. Zwischen den beyden aus Doppellinien bestehenden pomeranzfarbigen Querstreifen, davon der letztere gebogen ist, steht eine silberfarbige, nierenförmige Narbe (Stigma), die nicht scharf begränzt ist. Die gelbe große Makel an der Fühlspitze ist dunkel schattirt und an den zweyten Querstreif angeschlossen. Die Frazzen des Hinterrandes sind pomeranzengelb gefleckt. Die weißen Hinterflügel haben nur zuweilen am Innenwinkel einen Schatten. Die gelblichweiße Unterseite hat nicht viel Zeichnung; der Vorderrand der

Vor-

Vorderflügel ist roßbraun, die Mitte verblichen schattirt; die hintern haben beym Männchen einen roßfarbigen Fleck am Vorderrande, und beym Weibchen eine abgekürzte Binde daselbst. Der kleine Kopf, der hohe Halskragen und breite, behaarte Vorderrücken mit seiner schildförmigen, fast viereckichten pomeranzfarbenen Einfassung, sind nebst dem Hinterleib und Füßen ockergelb, die Brust und Vorderfüße bräunlich. An den Seiten des Hinterleibes steht eine verloschene schwarze Fleckenreihe. Nur beym Männchen sind die 9 Horn Fühlhörner feingefiedert. Im Eichen zieht der Schmetterling den Kopf ein, schleißt die Flügel dicht an den Leib, den er in die Höhe streckt.

Die fein- und dünnbehaarte Raupe mißt ausgewachsen 1 Zoll und 9, bis 2 Zoll und 1 Linie, und kömmt schwarz und dickköpfig aus dem Ey, dessen Schale sie nicht, wie viele andere thun, verzehrt, sondern sogleich die Blätter benagt. Nur in ihrer Jugend, wo sie gesellig lebt, hat sie das Besondere an sich, daß sie den After in die Höhe streckt. Nach der ersten Häutung zeigen sich schon gelbe, aber schmale Streifen; nach der zweiten sind die gelben und schwarzen von einerley Breite; nach der dritten zerstreuen sie sich; nach der vierten ist die Grundfarbe schwarzbraun, und die gelben Streifen sind nur abgesetzte Längsstriche; ihre Einschnitte färben sich gelb. Zur Verwandlung dient ihr zu Ende des Septembers eine verfertigte Erdhöhle ohne Gewebe. Ihre Puppe ist dunkelbraun, cylindrisch geründet, dennoch aber mit einer Spitze versehen, und ruht 3 Monate. Bey der Erziehung im Hause, darf die Puppe nicht zu feucht liegen.

Aufenthalt und Feinde. Der Spinner ist zu Ende des Mays bis in den Junius überall zu Hause. Seine Raupe weidet vom Julius bis zu Ende des Septembers am liebsten auf Haseln, dann auch auf Linden, Erlen, Eichen, Ahorn und Pappelbäumen.

Ihre Feinde sind die Brehwespenn (Ichneumon).

Zwölfte Familie.

Holzraupen. Bleichringige Spinner.

Die Raupen zeigen auf der sehr glatten Haut nur wenige (noch wenigere als die vorhergehenden), feine und kurze Haare, haben ein starkes Gebiß, und einen dunkeln, glänzenden Halschild; leben im Holz meistens älterer Bäume. Die Verwandlung geschieht in den ausgeschöhlten Bäumen, in einer weichen, eiförmigen, mit Spänen durchwebten Hülse. Die Spinner sind zungenlos, haben abhangende Flügel, die hinten besonders breit, die Fühlhörner merklich von andern Arten unterschieden, einen schwulstigen Rücken auf dem langen, dunkelfarbigen Leibe jeden Abschnitt mit weißlichen Haaren gesäumt.

Die beyden, der Weidenholz- und der Pappelholzspinner, machen die Linie mit blätterigen Fühlhörnern, aber der Roskastanienspinner die andere Linie aus, da das Männchen gekämmte, scheibensförmige und das Weibchen wollichte Fühlhörner hat.

Sie machen beym Fabricius eine eigne Gattung: die Bohrer, Collus, aus.

A) Die mehr schädlichen.

49. Der Weidenholzspinner. *Phalaena Bombyx Cossus*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weidenbohrer, Kopfweidenspinner, Holzbohrer, Holzdieb, Holznachtfalter, Cossusphaläne, Brummvogel (vom Saufen ihres Flugs, das von ihren ungewöhnlich dichten und steifen Flügeln herrührt).

Phalaena Bombyx Cossus Lin. 827. 63. Müller 673. 63.

Bombyx — Wiener B. 60. 1.

Cossus ligniperda, Fab. Species insect. II. 128. 65.

Phal. Bombyx Cossus, Fab. Ent. III. 2. 3. n. 1.

— — — Borkhauf. III. 357. 134.

— — — Gleditsch II. 48.

— — — Walther's Forstphysiographie. 386.

— — — Eyer III. t. 61. mit Raupe.

— — — Lyonnet traité anatomique de la chenille, qui ronge le bois de laule, mit 16 Kupfertafeln.

Rösel I. 2. Cl. Nachtvög. t. 18. mit Raupe; aber der letzte Ring mußte nicht roth, sondern schwarz seyn.

Schäfferi Icon. tab. 61. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig, steif, dunkelgrau, mit mattschwarzen Adern; die vordern hie und da neblig; der Vorder Rücken ist vornen weiß, hinten schwarz bandirt, und die Fühlerhörner schlangtblättrig gefiedert, und zwar beim Männchen stärker als beim Weibchen.

Raupe. Groß, nur einzeln behaart und fleischfarben, mit dunkelrothem Rücken, und starken Rinmladen; am Kopf, Nackenschild und letzten Ring ist sie schwarz und glänzend. Varietäten von ihr sind bald citrongelb, bald weichselbraun.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner, besonders der weibliche, welcher den männlichen an Größe übertrifft, mißt von einer Flügelspitze bis zur andern 3 Zoll, 3 Linien und jeder Vorderflügel 1 Zoll 4 Linien. Rösel beging den kleinen Irrthum, ihm eine Spirazunge zuzueignen. Seine Flügel sind unausgejackt, steif, und auf beyden Seiten sämmtlich mit mattschwarzen Wellen-, längs- und Querlinien stärker oder schwächer netzförmig durchzogen und mit dem übrigen Körper gleichfarbig dunkelgrau, nur die Vorderflügel haben in der Mitte und gegen den Hinterrand weiße Stellen; der Vorder Rücken ist vornen weiß, hinterwärts schwarzbandirt, und die Ringe am Hinterleib mit weißlichen Haaren eingefast. Die Fühlerhörner sind schlangtblättrig gefiedert, beim Männchen mehr, als beim Weibchen.

Die 4 Zoll und einige Linien messende, nur einzeln behaarte und fleischfarbene Raupe mit dunkelrothem Rücken, die am Kopf, Nackenschild und letzten Ring schwarz und glänzend ist, ist vom Prediger Lyonnet im Haag in einer eigenen Abhandlung genau beschrieben und mit den schönsten Abbildungen der innern und äußern Theile dargestellt. Er fand im Kopf 228, im Körper 1647, im Magen und in den Gedärmen 2186, also in allem 4061 Muskeln.

Mit ihren starken Kinnladen (Fresszangen), neben welchen sie auch noch Fressspitzen hat, nagt sie sich in dem Gefängnisse gar leicht durch, wenn sie der, so sie erziehen will, nicht in wohlverwahrte gläserne oder irdene Gefäße mit nassem, modernem Holz ein sperrt. Sie hat von klein auf die Gewohnheit, sich Fäden und daraus Strickleitern zu weben. Die spinnt sie sich auch wohl Gehäuse, als ob sie sich verwandeln wollte, die sie aber wieder verläßt. Gegen Verfolgungen spritzt sie einen ädenden Saft von sich, der Schmerzen verursacht. Man hat sowohl citronengelbe als weichselbraune Varietäten von ihr. Nach einem länger als zweijährigem Raupenstand und achtmaliger Häutung, wird sie kurz vor ihrer Verwandlung hellockergelb, und versfertigt sich gewöhnlich im Frühling ein äußerst festes Gehäuse von zernagten Holzrinden und Splintern, das so angebracht wird, daß sich die langgestreckte, mit tiefen Einschnitten des gelben Hinterleibes und mit harten, spitzigen Rückenfacheln versehene, bald schwarz, bald rothbraun gefärbte Puppe, wenn sie sich ausgebildet hat, aus der Oeffnung des Baums bis zur Hälfte hervordrängen kann, worauf die Schale aufplatzt und der Schmetterling nach einer Puppenruhe von unbestimmter Zeit hervorgeht *). By denen, die bey uns erzogen wurden, fand man, daß die im August verpuppten eine 10½ monatliche, und die im April eingesponnenen eine 3 monatliche Ruhe hielten. Der Sammler thut wohl, wenn er den entwickelten Schmetterling nicht zu bald, sondern erst nach mehreren Stunden tödtet, weil seine Flügelausdehnung etwas langsam von statten geht. Gewöhnlich gehen auch die Männchen, eben weil sie sich nicht begatten, und ihres Samens nicht entledigt haben, in eine ölichte Feuchtigkeits- und Fäulniß über, desgleichen auch die Weibchen, wenn entweder ihre Flügelausdehnung durch das Tödten gehindert wird, oder wenn sie durch eine Begattung die männliche Feuchtigkeits erhalten haben. Solche ölichte Stücke müssen auf einige Tage aus der Sammlung genommen und mit pulverisirtem weißen Kalk bestreut, und wenn sich alles herausgezogen, mit einem Haarpinsel abgebürstet werden.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint jährlich nur einmal, gegen das Ende des Junius und im Julius. Die Raupe, welche einen penetranten übeln, ekel bisamartigen Geruch hat, lebt das ganze Jahr in den Stämmen der Weiden, Erlen, Pappeln, Mehl- und Elzbeerebeeren, Linden, Ulmen, und (ob es gleich Voerze nicht glauben wollte) der Eichen, desgleichen der Zwetschen, Birn-, Aepfel-, Kirsch- und Walnuszäume, im Innern des Holzes, das dadurch faul und ganz durchhöht wird. Sie verpuppt sich auch in der Erde **).

Fortpflanzung und Feinde. Das Weibchen legt mit seinem starken Legestachel seine Eier, welche von eiförmiger und gerippter Gestalt sind, in die Baumrinde, worauf die entwickelten Räupchen zuerst in und zwischen der Rinde leben, und sich hernach, wenn sie mehr Stärke erhalten haben, ins Holz einbohren. Dinerachter ihrer großen Frucht.

III 2

*) Ich habe an einem Weidenstamme mehrere Puppen nach der Reihe in Ein Loch hervortreten, und so ausfliegen sehen. B.

**) Ich rieche die Stellen im Wilde, wo sich eine Puppe in der Erde befindet, besonders wenn es geregnet hat. B.

Fruchtbarkeit, indem Kleemann 1764 am 22. Junius von einem Weibchen über ein tausend Eyer erhielt, müssen doch unbekannte Ursachen mitwirken, daß sich die Raupe nicht zu arg vermehrt. Auch ist es ausgemacht, daß, wo sie einander zu nahe kommen, sie sich tödtlich verwunden und sogar auffressen.

Schaden. Oft findet man von ihnen die Sägeblöcke durchlöchert. Der Schaden, den diese Raupe nicht nur in den Forsten, sondern auch in Baumgärten verursacht, indem sie die Stämme so durchfrisst, daß sie leicht ausgehen, oder bey mäßigem Sturmen umfallen, wird dadurch vergrößert, daß sie gegen das Vespertill vielleicht aller übrigen Raupen gegen drey Jahr alt wird, ehe sie sich verpuppt *). Dabey hat sie ein so zähes Leben, daß sie nach Linnets Versuchen ohne Schaden erliche Stunden lang in luftleerem Raum, und mitten im Sommer fast 3 Wochen lang unter dem Wasser ausdauern kann.

Mittel dagegen. Es sind uns bisher keine bekannt geworden, unsere Stämme von dieser dem Gaumen der alten Römer bey ihren Mahlzeiten so delicat gewesen Raupe, wenn sie anders der *Collus* des *Plinius* wirklich seyn sollte, zu befreien.

50. Der Roßcastanenspinner. *Phalaena Bombyx Aesculi*, Vien. *Noctua*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pferdecastanien-spinner, Lindenbohrer, Lindenholtzspinner, Blausieb, großes Blausieb, blaupunctirt-r Spinner, Licaer, Puncteule.

Phalaena Bombyx Aesculi, Wiener Verz. 60. 3. nebst Abbildung auf dem Titeltupfer.

Phal. Noct. — Lin. 833. 83. Müller 679. 83.

Hepialus — Fab. Spec. insect. II. 203. 5.

Bombyx — Fab. Mantilla II. 116. 85.

Collus — Fab. Ent. III. 2. 4. n. 4.

Phal. Bomb. — Gorthausen III. 363. 136.

— — — Brahm Ins. II. 383. 260.

— *Noct. Pyrina* — Gleditsch I. 312.

— *Bomb. Aesculi* — Nau Forstwissensch. 298.

— — — Beschäftigungen der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde III. t. 1. f. 1. 2. von D. Kühn.

— — — Esper I. t. 62. f. 2. 7. mit Raupe.

— — — Naturforscher XII. t. 2. f. 7. Weibchen.

Rösel III. t. 48. fig. 5. 6. die Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig, die vordern schmal, die hintern kurz; alle glänzendweiß, dünn beschuppt, mit unzähligen schwarzblauen Puncten besetzt; der Vorderleib hat sechs dergleichen Flecken. Die Fühlfhörner sind gebrochen, beym Männchen zur Hälfte gesiedert; das Weibchen ist größer.

Raupe. Träge, dick und hochgelb, mit erhabenen schwarzen Puncten, aus deren jedem ein einzelnes Haar hervorsticht. Der Nackenschild und der letzte Ring sind mattschwarz.

Be.

*) Vor etlichen Jahren hatten wir diese Raupen einen Thomas Birnbaum so durchlöchert, daß er von einem Sturmwinde in der Mitte entwey gebrochen wurde. Es fielen gleich 53 Raupen

heraus, und bey dem Zerfägen und Zerpalten der obern Hälfte (die untere steht noch und ist wieder ausgeschlagen) fanden sich noch 213 Raupen. B.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects.

Dieser Spinner misst in der Flügelausbreitung 2 Zoll 6 Linien, jeder Vorderflügel 1 Zoll 2 Linien. Die stahlblauen, theils runden, theils länglichen Punctflecken, die nach den verschiedenen Wendungen bald grün, bald blau erscheinen, nehmen sich auf den so dünn beschuppten glänzendweißen, schmalen Vorder- und kurzen Hinterflügeln gut aus. Die Fühlhörner des Männchens sind wegen der flach ausstehenden und nach unten etwas hohl gebogenen Fasern, die wieder ihre Nebenfasern haben, merkwürdig. Von den 24 Gliedern oder Ringen der Fühlhörner sind die zwölf äußern ganz glatt, und die innern zwölf, wie gesagt, starkfaserig. Den Bruststrücken zieren sechs stahlblaue Flecken, den schwarzgrünen, ins Blaue spielenden Hinterleib weißhaarige Einschnitte. Das Männchen ist kleiner, schwächer beschuppt und die Puncte verloschener.

Die träge und dicke Raupe misst nach Kösel zwar 1 Zoll 6 Linien; weil sie aber vor ihrem vollendeten Wachsthum abgebildet worden; so ist solche um mehrere Linien größer. Sie kömmt im August aus dem Ey, häutet sich im September das erstemal und ist im Junius des darauf folgenden Jahres ausgewachsen. Sie hat einen glänzenden gelben Leib und die Füße mit tiefen Einschnitten zwischen den Ringen, auf deren jedem zehn (nach Kösel haufen zwölf) schwarz glänzende, erhabene Puncte mit einem einzelnen Haar stehn, und mit 2 schwarzen Flecken über dem Kopf. In Ansehung des schwarzen Nackenschildes und letzten Ringes ist sie der vorhergehenden ähnlich, und macht sich auch so Canäle mit ihrem schwarzen Zangengebiss ins Holz, aus denen sie nicht hervorgeht, sondern solche gegen die freye Luft und gegen ihre Feinde überwehrt. Nach einer achtmaligen Häutung nähert sie sich im Junius ihrer Verwandlung. Diese geschieht in einem eigenen Gehäuse, das sie unter der Rinde anlegt und zuspinnnt. Die längliche Puppe ist bald dunkler, bald heller braun, und rauh mit einem Haken auf dem Kopf, der der Phaläne vielleicht beim Hervorbrechen aus dem Gehäuse Dienste leistet. Dies ist auch der Zeitpunkt, wo die Puppe, gleich der vorhergehenden, sich zur Hälfte aus der Oeffnung des Baums hervordrängt, und seine Entwicklung nach einer Ruhe von 4 bis 6 Wochen vollendet.

Dem Sammler ist Herrn Espers Rath, die Puppe zur Ueberwinterung im Keller aufzubewahren, nicht undienlich.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Spinner erscheint im August an den Stämmen der Obstbäume in Gärten. Die Raupe lebt vom September an bis in den Junius in den Stämmen verschiedener Baumarten, als in Linden, Buchen, Eichen, Birken, Rosskastanien, Pappeln, Erlen, auch in Birn- und Apfelbäumen, ja sogar in alten Brückenpfählen und hölzernen Verzäunungen.

Das Weibchen bedient sich seines festen, hartschaligen Legestachels, um damit im August seine Eyer in die Baumrinde einzubohren.

Schaden. Da sie nicht bloß in altem Holz, sondern auch in den zweijährigen Trieben der Apfelbäume und der wilden Holzarten lebt, wie sie denn D. Kühn im festen Buchenholz bey Eisenach, mitten im Kern der mittlern gesunden Aeste fand: so kann sie wohl eben so schädlich werden, als wie die vorhergehende.

B) Weniger schädlich.

51. Der Pappelholzspinner. *Phalaena Bombyx Terebra*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Aspenbohrphaläne, Pappelbohrer, Salbenbaums spinner.

<i>Phalaena Bombyx Terebra</i>	—	Wiener Bz. 60. 2.
<i>Bombyx</i>	—	Fab. Mantilla II. 116. 84.
<i>Cossus</i>	—	Fab. Ent. III. 2. 4. n. 3.
<i>Phal. Bomb.</i>	—	Vorkauf. III. 361. 135.
—	—	Esper III. t. 80. f. 1.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig und silbergrau, mit vielen braunrothen längs-, Quer- und Schrägelnien nebelartig und gitterförmig durchzogen. Durch die Mitte der Vorderflügel zieht sich eine in die Grundfarbe verfließende Querbinde; der Vorderleib hat einen weißen Streif. Das Männchen hat stärkere schwarzgefiederte Fühlhörner, und ist kleiner als das Weibchen.

Raupe. Weißlich und über den Rücken gelb, übrigens von gleichen Verhältnissen als die Weidenholzspinneraupe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner hat nicht das Ausmaß von dem Weidenholzspinner, dem er aber doch sonst an Habitus ähnlich ist. Das Männchen ist an den stärker schwarzgefiederten Fühlhörnern und daran kennbar, daß es kleiner ist, als das Weibchen. Seine dachigen Flügel sind silbergrau, mit vielen braunrothen längs-, Quer- und Schrägelnien nebelartig und gitterförmig durchzogen. Durch die Mitte der Vorderflügel zieht sich eine in die Grundfarbe verfließende Querbinde; der Vorderleib hat einen weißen Streif; an der Wurzel der Hinterflügel zeigt sich ein dunkler Schatten, und der Hinterleib hat die Farbe der Flügel.

Da die meisten Phalänen auf der Unterseite keine eigentliche Zeichnung, sondern nur Schatten, Verwischungen u. dgl. haben; so verhält es sich auch mit dieser so. Die Varietäten sind entweder höher oder tiefer gefärbt, oder ihre Binde ist bald schmaler, bald breiter. Die Raupe ist weißlich und über den Rücken gelb.

Aufenthalt. Die noch unabhildete Raupe wurde von den Wiernern auf der gemeinen oder Schwarzpappel, von dem Banquier und Hofrath Vering aber, jenem großen und reichen Naturalien- und Insectensammler, der 1802 gestorben ist, in den nächsten Wäldungen bey Frankfurt auf Espen gefunden. Ihre Abbildung hat Herr Esper versprochen.

Dreizehnte Familie.

Wurzelraupen. Schmalflügelige Spinner.

Die Raupen sind fast ganz blos, haben ebenfalls ein Zangengebiß, einen glänzenden Kopf und Halschild; wohnen unter der Erde, und ernähren sich von den Wurzeln einiger fast holzartigen Pflanzen. Die Verwandlung geschieht unter der Erde, in einem

nem langen, mit Erdförnern vermengten Gewebe. Die Spinner sind zungenlos, haben ungemein kurze, ein wenig gezähnte Fühlhörner, einen fast nackten Leib, spitzig zulau- fende schmale Flügel. Das Weibchen ist immer von Farbe trüber als das Männchen.

Sie heißen bey Herrn Fabricius: Schmalflügler, Hepialus, und bey Herrn Esper: Fliegenphalänen; bey ersterem machen sie sehr schicklich eine eigene Gattung aus.

Weniger schädlich.

52. Der Eichstrauchspinner. *Phalaena Bombyx Hamma*, Vien. *Noctua Sylvina*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Waldeule, gelbe, winklichtgestreifte Fliegenphaläne.

<i>Phalaena Bombyx Hamma</i>	Wiener Bz. 61. 2. Weibchen.
— <i>Noctua Sylvina</i>	Lin. 834. 87. Müller 680. 87.
<i>Hepialus</i>	Crux Fab. Ent. III. 2. 7. n. 7. Weibchen?
— <i>angulatus</i>	Fab. Spec. inf. II. append. 506. Männchen.
<i>Phal. Bomb. Sylvina</i>	Gortzhaus. III. 153. n. 42.
— —	Grahm Ins. II. 479. 341.
— — <i>Hamma</i>	Füesly neues Magazin II. 211.
— <i>Noct. Sylvina</i> ,	Crux und Angulum, in Devillers Entomologia
— — —	Linneana.
— — —	Esper's Eulen t. 82. fig. 2—4.

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Flügel sind so wie der ganze Körper gelb mit röthlichbrauner Mischung; die vordern führen 4 weiße, mehrentheils winklichte Linien, davon die erste und dritte sehr winklicht, die zweyte eine Längslinie am Innenrande, und die vierte eine blasse Quercelinie am Hinterrande ist; die zweyte und vierte sind schwarz begrenzt.

Weibchen. Körper und Flügel sind bräunlichschwarz, mit eben solchen Linien, nur trüber.

Raupe. Mit einem schwarzen Kopfe; einem breiten schwarzammetnen Rückenstreife; und an den Seiten mit einer sammet schwarzen Linie, zwischen zwey goldgelben, und an der Bauchseite mit einem breiten schwarzgrauen Streife bezeichnet. Der mittlere Sammetstreif führt 4 Längsreihen, und jeder schwarzgraue Streif eine Längsreihe von gelben Haarknöpfchen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner ist von unbeständiger Größe, gewöhnlich von 1 Zoll 2 Linien in der Flügelausbreitung. Die Flügel sind so wie das ganze Insect männlichen Geschlechts gelb, mit röthlichbrauner Mischung. Von den 4 Linien der Vorderflügel fehlen zuweilen die erste und die letzte. Die erste steht nicht an der Wurzel, sondern in der Mitte, und krümmt sich winklicht nach dem Vorderrande zu. Die zweyte, die am untern Theile öftig ist, läuft von der Wurzel aus am Innenrande hin. Die dritte fängt von der Flügelspitze an, und endigt sich entweder bey der zweyten Linie, wodurch ein Winkel entsteht, oder auch bey der ersten; zuweilen ist sie mit keiner verbunden. Die vierte berührt weder den Vorder- noch den Innen-

Innenrand ganz, und ist blaß mit schwarz eingefassten Querlinien. Die Hinterflügel sind wie die Unterseite einfarbig dunkel.

Das zimmetbräunliche Weibchen hat die nämliche Zeichnung, nur mit einer schatticheren Begrenzung. Die sägezahnichten Fühlhörner sind bey beyden Geschlechtern kurz und rothgelb. — Es giebt Varietäten, die am Hinterrande eine schwarze Punctenreihe und im Mittelraume zerstreute Puncte führen.

Die noch unabgebildete, vom Chorherrn Mejer entdeckte, in Füesly's neuem Magazin a. a. O. beschriebene, schwarzköpfige, sammetstreifige Raupe mit gelben Knöpfen wird noch so lange für hierher gehörig gehalten, bis sich das Nähere und Gewissere entdeckt. Sie hat außer ihrem breiten schwarzsammetfarbigen Rückenstreif, der mit 2 Reihen gelber Knöpfe besetzt ist, auch an den Seiten zwischen zwey goldgelben wieder eine sammetschwarze Linie, endlich an der Bauchseite einen breiten schwarzgrauen Streif, woran gleichfalls eine Längereihe von gelben Haarknöpfen steht. Sie weicht von ihren Familiengenossen ab, welche keine Haare, folglich auch keine Haarknöpfe haben dürfen, und könnte eine eigene Unterabtheilung oder Linie bilden. Sie spinnt sich in ein kleines, festes Gehäuse ein, worin sie erst nach zehn Tagen sich verpuppt. In ihrer Häutung bleiben Kopf und Balg zusammenhängen. Ihre Puppenruhe dauert 5 Wochen.

Aufenthalt. Im May, in der Schweiz und in Deutschen Gegenden bey Mainz, Die Raupe lebt vom Eichenlaub.

Vierzehnte Familie.

Scheineulenraupen. Haarige Spinner.

Die Raupen sind gänzlich nackt, haben einen rundlichen, halbversteckten Kopf, und nach der Länge des Leibes fünf helle Linien oder Streife. Die Verwandlung geschieht in einer Erdhöhle. Die Spinner sind jungelos, haben abhangende, nur mit undeutlichen Strichen bezeichnete Flügel, zeigen um die Augen, auf dem Leibe und selbst an den Flügeln stärkere Haare oder haarförmige Schüppchen.

Weniger schädliche.

53. Der Grasslindenspinner. *Phalaena Bombyx Cassinia*, Vien. Fab.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sphinxphaläne, Storch, haariger Nachttaler.

<i>Phalaena Bombyx Cassinia</i>	Wiener Verj. 61. n. 1.
<i>Bombyx</i> —	Fab. Ent. III. 1. 460. 164.
<i>Phal. Bomb.</i> —	Vorkhausen III. 442. 169.
— —	Brahm Inf. II. 331. 217.
— <i>Noctua Sphinx</i>	Gleditsch II. 49.
— <i>Bomb.</i> —	Mau Forstwissens. 301.
— —	Esvert. 49. fig. 1—3. mit Raupe.
— —	Naturforscher X. t. 2. fig. 2. Raupe.
Nöfel III. t. 40. f. 1—5. mit Raupe.	

Kenn.

Kenzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig, die vordern grau, mit vielen, sehr kurzen, tiefschwarzen längsstrichelchen. Der Hinterrand zeigt eine weiße gezackte Querlinie; die Hinterflügel führen eine schwarze Punctreihe am Hinterrande. Nur das Männchen hat gefiederte Fühlhörner.

Raupe. Am Kopfe gelblichgrün, am übrigen Körper weißbläulichgrün, welches bey ihrem erwachsenen Stande ins Gelbliche übergeht. Sie unterscheidet sich von andern durch die fleischerne Erhabenheit am letzten Ringe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst 1 Zoll und 10½ Linien, und seine grauen, mit vielen, sehr kurzen, tiefschwarzen längsstrichelchen bezeichneten Vorderflügel sind schmal und gleichbreit, an deren Hinterrande eine weiße, mehrentheils undeutliche Zackenlinie hinläuft. Die Hinterflügel zeigen eine schwarze Punctenreihe am Hinterrande. Die graue Unterseite zeigt außer der durchscheinenden Punctenreihe auch einen schwarzen Mittelfleck. Der mit drey mattschwarzen Längelinien bezeichnete Bruststricken ist nebst dem Hinterleibe haarig und schmutziggrau. Die langen Fühlhörner sind bey'm Männchen weiß geschafret und gelbbraun gefiedert. Unter den Varietäten giebt es auch hellere, bald wieder dunkelgraue, bald braune Stücke.

Von der 1 Zoll und 4 Linien messenden, großköpfigen Raupe und ihrer Stellung, da sie den vordern Körper in die Höhe richtet und gleichsam die Gestirne anschaut, erhielt das Insect den Namen *Cassinia*, desgleichen wegen eben dieser Stellung, und der ganzen fleischichten Erhöhung am After, worin sie einigermaßen den Schwärmerraupe'n gleicht, den Namen *Sphinx* bey'm Hufnagel und Esper, darf aber nicht mit der *Cassinia* *Esperi* und des *De Villers* vermengt werden. Sie ist am Kopfe gelblichgrün, am übrigen Körper weißbläulichgrün, welches bey ihrem erwachsenen Stande ins Gelbliche übergeht. Im May ist sie ausgewachsen, und hat nicht, wie *Rösel* sagt, einen weißen und vier gelbe, sondern drey weiße und zwey gelbe Längestreifen. Auch ist sie, ob sie gleich ganz glatt scheint, doch mit einzelnen Härchen bewachsen. Die bey dieser und fast allen Raupen vorkommenden 6 Puncte an jeder Kopfseite sieht man nicht mit bloßen Augen, und sie pflegen wieder zu vergehen. *Kleemann* hielt sie immer für wahre Augen: man kann solches aber nicht mit Beweisen dathun. Sie verpuppt sich zu Anfang oder in der Mitte des Junius (später wohl nicht) in der Erde in eine anfänglich grüne, nachher rothbraun werdende Puppe, die sich in der Regel zu Ausgang des Decembers, außer der Regel auch nach *Eipers* und *Vorkhausens* Wahrnehmung im Frühjahr entwickelt, und im ersten Fall 4 bis 4½, im zweyten 11 Monate ruht.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint jährlich nur einmal zu Ende des Octobers in Wäldern und Gärten. Die weiche Raupe lebt vom April bis Junius auf Eichen, Linden, Weiden, nach *Brahm* auch auf Ulmen und Liguster, nach *Kleemann* zuweilen auf Pflerschen; auch fand sie *Esper*, wiewohl seltener, auf Kirschen und Buchen. *Mir* (*Scharfenbera*) gelang es anfänglich so wenig, wie dem sel. *Brahm*, sie ganz zu erziehen, indem die Stücke entweder über dem Verpuppen, oder nachher im Puppenstande selbst, zu Grunde gingen, bis es mir 1795 glückte, eine auf *Vire-*

R F F und

und Kirschbäumen sich nährende zur Verwandlung zu bringen, deren Puppe vom 15. Junius bis 19. October, also 4 Monate, ruhte.

Anmerkung. Sie wird in Fäesly's neuem Magazin II. 377. unrichtig P. B. Abietis genannt.

54. Der Haarbirkenspinner. *Phalaena Bombyx Nubeculosa*, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wolkenfleckiger Spinner, Mutterbirkenspinner.

<i>Phalaena Bombyx Nubeculosa</i>	Borkhausen III. 441. 168.
— — <i>Centrolinea</i>	Borkhaus. III. 444. 170.
<i>Bombyx</i> — —	Fabr. Ent. III. 1. 460. 165.
<i>Phal. Bomb. Nubeculosa</i>	Brahm II. 50. n. 13.
— — <i>Circumscripta</i>	De Villers II. 158. 76.
— — <i>Nubeculosa</i>	Esperi III. t. 48. f. 6.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel sind düsterbraun mit 2 schwarzen kappenförmigen Querstreifen, zwischen welchen ein weißlicher, in der Mitte eiförmig schwärzlicher, und unten wie ein Halbzirkel eingefasster Fleck, am Hinterrande aber eine Reihe schwarzer Flecken zu sehen ist. Die hellrothfarbigen Fühlhörner sind nur beym Männchen kammförmig.

Raupe. Sie ist chagriniert und grün gefärbt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insekts. Dieser düsterbraune Spinner mißt wie der vorhergehende, dem er an Gestalt ähnelt, 1 Zoll 10 Linien ungefähr, und seine Vorderflügel sind über und über mit kleinen Längsstrichen und mit 2 schwarzen kappenförmigen Querstreifen bezeichnet. Der zwischen denselben stehende weiße eiförmige Fleck, der in der Mitte schwarz gewölbt ist, veranlaßte den Namen: *Nubeculosa*, die wolkenfleckige Spinnerphaläne. Der Hinterrand der weißlichen Hinterflügel hat eine braune, blasse Fleckenreihe. Die auf der Unterseite aschgrauen Vorder- und weißlichen Hinterflügel haben alle einen schwarzen Mittelpunct, der von einer verloschenen braunen Halbzirkellinie umschrieben ist, daher ihn De Villers *Circumscripta* nennt. Kopf und Brustücken haben die Farbe der Vorderflügel, und der Hinterleib die Farbe der Hinterflügel. Das beliebte Weibchen ist mit fadenförmigen Fühlhörnern versehen, das Männchen mit kammförmigen.

Die grüne, durch erhabene Puncte gerieft-schlinende Raupe, die noch nicht abgebildet ist, verpuppt sich im Junius, und die Ruhe dauert 9 Monate.

Aufenthalt. Der Spinner ist einer der ersten im März, und findet sich bey Frankfurt an den Stämmen der Birken, woran ihre Raupe, die zu Ende des Mays und zu Anfang des Junius erwachsen ist, lebt: desgleichen im Oesterreichischen.

Anmerkung. Infolge einer Recension in den Ergänzungsblättern zur allgemeinen Literat. Zeitung auf 1803, S. 450, haben wir die Fabriciusische *Centrolinea* mit unserm Spinner vereinigt: wozu auch Borkhausen, S. 444, nicht abgeneigt war.

55. Der Ahornspinner. *Phalaena Bombyx Plumigera*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Federbuschspinner, großer Schnurrbart.

Phalaena Bombyx Plumigera	Wiener Verz. 61. 2.
Bombyx	Fab. Ent. III. 1. 462. 174.
Phal. Bomb.	Vorkhausen III. 445. 171.
— —	Espyer Spinner 1. 50. f. 6. 7.
— —	Schwarzens Beytr. t. 13. mit Raupe, Puppe u.
Natursorfscher III. t. 1. f. 2.	aber abgestäubt.

Kenntzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind bachig, dünn geschuppt; die vordern schmal, gelbbraun, mit etlichen schwärzlichen Adern durchgezogen; durch die Mitte zieht sich ein sattgelber Streif, und gegen die Flügelspitze einige gelbliche Flecken. — Die Fühlhörner des Männchens sind stark gekämmt.

Raupe. Schlank, gelblichgrasgrün, mit einer dunkeln Längslinie über den Rücken und 2 weißlichen Streifen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Spinner, der von seinen außerordentlich starken Fasern an den Fühlhörnern des Männchens den Namen Federbuschspinner, *Plumigera*, erhalten hat, mißt nach seiner Flügelausbreitung 1 Zoll und $\frac{3}{4}$ Linien. Die Vorderflügel sind schmal, gelbbraun, mit etlichen schwärzlichen Adern durchgezogen; durch die Mitte zieht sich ein sattgelber Streif, und gegen die Flügelspitze einige gelbliche Flecken. Die hintern sind einfärbig gelb, wie der Kopf, der wulstichte Rücken, Schenkel und die ganze Unterseite. Der Hinterleib ist gelblich. Bey hellbräunlichgelben Varietäten ist die dunkle Binde ausgeschweift, und hinter ihr eine schmale, hellere; bey andern ist die Querbinde schwärzlich auf rostfarbigem Grunde. Fabricius hatte auch ganz rostfarbene Stücke.

Die zuerst von den Wienern entdeckte, von Bieweg, dem Verfasser des tabellarischen Verzeichnisses, beschriebene, und von Schwarz gemahlte Raupe hat auf dem grasartigen Rücken eine dunkle Linie und auf jeder Seite einen weißlichen Streif. Daß die Wiener Entomologen der hellern Streife fünf zählten, kann daher kommen, daß vielleicht bey manchen die dunkle Mittelrückenslinie durch eine helle getheilt, und daß neben dem Streife an jeder Seite auch noch unten die Streifen am Bauche mitgezählt wurden. Sie kriecht im Junius in die Erde, um sich in einem Gehäule zu verpuppen, und nach einer viermonatlichen Ruhe zu entwickeln.

Aufenthalt. Der Spinner ist zu Ende des Octobers jährlich nur einmal vorhanden. Kühn fand ihn ben Eisenach in einer Felsenkluft. Die Raupe nährt sich auf Ahorn, Mascholder (*Acer campestre* L.), Eschweiden und Birken; desgleichen hatte sie Vezold bey Römild auf niedern Gewächsen, nämlich auf dem gemeinen Hahnenkamm, *Rhinanthus crista galli* L., angetroffen und damit erzogen.

Fünfzehnte Familie.

Scheinspannerraupen. Großzähige Spinner.

Die Raupen sind ebenfalls vollkommen nackt, haben einen gewölbten, vorragenden Kopf, und einen langen feingestreiften Leib, wodurch sie in der Ruhe einigen grünen Spannerraupen ähnlich sehen. Die Verwandlung geschieht in einem leichten Gewebe zwischen Blättern oder an der Erde. Die Spinner haben merkliche Fühlspitzen; die Flügel sind am Hinter- oder auch am Innenrande stark und ungleich ausgezähnt.

Weniger schädliche.

56. Der Dotterweidenspinner. *Phalaena Bombyx Libatrix*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gefranzter Spinner, Zackflügel, Näscher, Krebsuppe (von der Farbe), Sturmhaube, fantschaariger, modester Spinner, Kapuziner (beym Gladbach).

Phalaena Bombyx Libatrix Lin. 831. 78. Müller 677. 78.

— — — — — Wiener Bz. 62. 1.

— Noct. — — — Fab. Ent. III. 2. 64. 181.

— Bombyx — — — Borkhausen III. 428. 160.

— — — — — Gleditsch II. 47.

— — — — — Esper III. t. 69. f. 4 — 7. mit Raupe.

Nöfel IV. t. 20. mit Raupe. Sulzer t. 21. f. 7. Schaeff. Icon. t. 24. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel liegen über einander, sind stark gezackt und zahnsförmig ausgeschnitten, von röthlichgrauer, ins Rothgelbe gemischter Farbe, mit weißen Puncten.

Raupe. Schlank und gelbmattgrün, nur ganz einzeln behaart, gelbgeringelt, mit einer dunkelgrünen Rückenlinie und rothgelben Bauchstreifen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst von einem äußersten Flügelzacken zum andern 2 Zoll 1 Linie, und hat auf seinen zahnsförmig ausgeschnittenen, röthlichgrauen, ins Rothgelbe gemischten Vorderflügeln zwey weiße Querstreife, wovon der letzte an seinem Randende etwas winklicht ist, und hinter demselben einen weißen, in einen weißröthlichen Schatten auslaufenden Strich. Ein weißer Punct bezeichnet die Mitte, ein anderer die Wurzel der Flügel. Die aschgrauen Hinterflügel haben einen weißen Mittelschatten. Auf der grauen, mit einer schwarzen Linie versehenen Unterseite sind die Hinterflügel in der Mitte sehr stark bestäubt. — Die Fühlhörner sind bey beyden Geschlechtern gekämmt und rostfarbig. Alles Uebrige am Insect hat die Farbe der Vorderflügel, und die Füße sind schön weiß und braungefleckt. — Wegen der dünn beschuppten cylindrischen Fressspitzen zählt ihn Fabricius zu den Eulen. Bey manchen Stücken zeigen sich vor dem letzten Querstreif zwey schwarze Puncte in schräger Richtung.

Seine 1 Zoll 5 Linien lange Raupe, die bey dem Nöfel drey dunkelgrüne Streifen und am Kopfe einen Strich zwischen 2 Puncten hat, ist schlank und gelbmattgrün, nur einzeln

einzelnen behaart, gelbberingelt, mit einer dunkelgrünen Rückenlinie und rothgelben Bauchstreifen. Sie ist sowohl im Junius und Julius, als im September ausgewachsen, wird vor ihrer Verwandlung unscheinlicher, hier und da schwarzfleckig, und verfertigt sich zwischen Blättern ein dünnes, durchsichtiges Gewebe, darin die spitzig gestaltete, anfänglich grüne, nachher düsterschwarz werdende Puppe am Schwanz befestigt liegt, und in der Regel 2 bis 3 Wochen ruht. Spätlinge entwickeln sich entweder noch im Herbst, oder in den heitern Winter- oder den ersten Frühlingstagen.

Aufenthalt. Der Spinner findet sich im Julius, August, oder auch im Herbst, seltener im Frühling, sowohl im Freyen, als in unsern Häusern, in Kellern und allerley Winkeln, und in Speisekammern, wo er aber keine Speisen nascht, wie etwa sein Name vermuthen lassen möchte. Die Raupe nährt sich von den Blättern der Weiden- und Pappelbäume; Linne' glaubte auch: der Rosen und der Gudelrebe (*Glechoma hederacea*).

Anmerkung. Der Ausbleichung wegen müssen ihn Liebhaber dem Tageslichte entziehen.

57. Der Weißweidenspinner. *Phalaena Bombyx Palpina*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sichelfühler, Rüsselphaläne, Rüsselmotte, Fühlernachtsfalter, Tod (bey Maynz, wegen der sichelförmigen Fühlsippen), Fischschwanzphaläne (vom Ater des Männchens), Schnaumotte, Schwanzmotte.

Phalaena Bombyx Palpina Lin. 828. 64. Müller 673. 64.

Bombyx — — — Wiener B. 62. 2.

Phal. Bomb. — — — Fab. Ent. III. 1. 448. 129.

— — — — — Vorkauf. III. 389. 145.

— — — — — Steditsch III. 48.

— — — — — Esper III. t. 63. f. 1 — 4. mit Raupe.

Naturforscher II. t. 1. fig. 5. 6. Männchen, aber schlecht. Und X. t. 2. f. 2. Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig und gezahnt; die vordern blaßgelblich mit feinen schwarzen Adern; die Fressspitzen sind federig und hervorgestreckt, und die Fühlhörner des mit einem getheilten Haarschopfe am Hinterrande versehenen Männchens stärker gefiedert, als die des Weibchens.

Raupe. Einsam lebend, nackt und grün, mit vier weißen Rücken- und einer hochgelben Seitenlinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst 1 Zell 5 Linien, hat einen Rückenamm, und seine blaßgelblichen, mit feinen schwarzen Adern bezeichneten Vorderflügel am Innenrande einen Zahn. Von den 2 schwärzlichen verloschenen Schrägsbinden ist die hintere in einer doppelten Reihe schwarz punctirt. Dicht an den bräunlichgelben, mit Schwarz wechselnden Franzen des Hinterrandes findet sich auch eine feine schwarze Punctenreihe. Die aschgrauen Hinterflügel sind schwarz geadert, Auf der weißlichen Unterseite haben solche einen schwärzlichen Punct, mit
oder

oder ohne Wischbinde. Jede Kressspitze hat 2 breite zusammengeschlossene Federn mit dichten und langen Fasern. Die Fühlerhörner sind weißgeschafert und braungelafert, und bey'm Männchen stärker als bey'm Weibchen. Die Oberfläche des Bruststückens und Hinterleibes ist wie die Flügel gefärbt, und die Unterfläche weißlich. — Bey Varietäten wechselt die Grundfarbe ins Aschgrau, und bey andern sind die Zeichnungen unvollständig.

Die mit schrägen, dunkeln Linien umgürtelte Raupe ist in der Jugend grau, dann meergrün und endlich weißlich, mit vier weißen Rücken- und einer hochgelben Seitenlinie. Esper fand an seinen Stücken hochrothe Punkte an den Vorderringen und dem Hinterende. Nach einer viermaligen Häutung macht sie sich im September ein Erdgewölbe, worin die cylindrische, rothbraune Puppe 7 bis 8 Monate ruht, in dem sie auch überwintert.

Aufenthalt. Der Spinner ist im April und May an den Stämmen der Bäume, worauf die Raupe, nämlich an Linden, mehreren Weiden- und Pappel-Arten, besonders der Italiänischen oder Pyramiden-Pappel, vom Julius bis September weidet. Es scheint nur Eine Generation statt zu finden,

Sechszehnte Familie.

Buckelraupen. Rückenzähnlige Spinner.

Diese Raupen sind nackt, haben einen vornen fast stumpfen Kopf, etwas höhere Bauchfüße und sonst einen unregelmäßigen Bau des Körpers. Die Verwandlung geschieht zwischen zusammenengesponnenen Blättern, oder in einem mit Erdkörnern vermengten Gewebe. Die Spinner haben sehr kleine Spiralzungen, öfters einen schopfartigen Rücken, abhängende Flügel, den Schwanzwinkel der hintern meist brandmaefelig, den Hinterrand der vordern aber kleingezähnt, und am Innenrande derselben einen merklichen Zahn oder Haarbusch, der sich, wenn die Flügel in der Ruhe sind, über den Rücken erhebt.

Es sind im Wiener Werk drey Linien, wozu aber noch eine vierte zu ziehen ist, deren Raupen buckelles sind.

Erste Linie. Die Raupen haben unrichtige Höcker, besonders auf dem eilften Ringe.

Weniger schädliche.

58. Der Schwarzpappelspinner. *Phalaena Bombyx Dictaea*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Porcellanvoael, Porcellanraupenspinner, Brandflügler, brandflügeliger Nachtfalter.

Phalaena Bombyx Dictaea Lin. 826. 60. Müller 672. 60.

Bombyx — Wiener W. 62. 1.

Phal. — Fab. Ent. III. r. 443. 111.

Phal. Bomb. — Forst. III. 404. 150.

— — — — — Rau Forstw. 294. 686.

Phil.

Phal. Bomb. Dictaea Esper III. t. 58. f. 5. und t. 84. f. 2.
 Tabellarisches Verzeichniß der Brandenburgischen
 Schmetterlinge (von Bieweg) I. t. 1. f. 1. 2.
 mit Raupen.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig und dicht zusammengestellt; die vordern schmal und braunfarbig, mit einem weißen, der Mitte nach durchreichenden Felde; die hintern sind weißlich, am Schwanzwinkel mit einem braunen Fiecke, der ein weißes Stricheldchen hat. Die beynahe rostfarbigen Fühlhörner sind bey'm Männchen gefiedert.

Raupe. Nackt, glatt und glänzend, etwas hellgrün, oder rothbraun mit einer hochgelben Seitenlinie und Pyramiden-Erhöhung auf dem eilften Ringe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der weißliche, schmalflügelte und brandfarbige Spinner mißt 2 Zoll Flügelbreite, und hat am rostfarbenen Innenrande einen haarigen Zahn, übrigens ein weißes, der Mitte nach durchreichendes Feld. Am Vorderrande sieht gegen die Flügelspitze ein schwarzbrauner, brandfarbig schattierter Fleck, und dicht im Hinterrande schließt sich eine äußerst feine braune und auch gelbe Franzenlinie an. Die weißlichen Hinterflügel haben am Schwanzwinkel einen Brandfleck. Die weiße Unterseite ist braunaderig, mit Schatten und Vermischungen. Die bey'm Männchen gefiederten Fühlhörner sind rostbraun, und dessen haarbüschelig sich endigender Hinterleib ist nicht so braun als der vordere.

Die nackte, glatte und glänzende, etwas hellgrüne oder rothbraune Raupe, die in der Mitte des Julius, desgleichen wieder im October ausgewachsen ist, hat eine hochgelbe Seitenlinie und eine pyramidenförmige Erhöhung auf dem eilften Ringe, röthliche Füße und eine dergleichen Spitze. Im Ruhestande sitzt sie wie ein Stück Holz ausgestreckt, oder wie eine Spanneraupe. Die im Monat Julius in einem cylindrischen Erdgehäuse sich verwandelnde cylindrische Puppe ruht 4 Wochen, und die im Herbst sich verwandelnde 7 Monate.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint jährlich, wie gesagt, 2 mal, zuerst im May, hernach im August. Die Raupe lebt sowohl im Junius und Julius, als vom September bis November auf der schwarzen, Italiänischen und Zitter-Pappel, Birken, Weiden, bey'm Hufnagel auch auf Eichen. Liebhaber, die im März am Fuß der Pappelbäume nachgraben, entdecken daselbst ihre Puppe.

Anmerkung. In den Ergänzungsblättern der allgem. Literatur-Zeitung von 1803 wird S. 451. behauptet, daß unser Spinner nach den neuern Untersuchungen die Linne'sche Tremula, und zugleich die Wiener Aulera sey. Damit stimmen, zumal was die Aulera betrifft, die Schiffermüller'schen, an den Graf Hofmannsegg 1797 gegebenen Nachrichten gar nicht überein, zufolge welcher die Wiener Aulera mit derjenigen in Scriba's Verträgen (also auch der Everschen Aulera) ganz Ein Geschöpf ist. Sch.

59. Der Eichenbuschspinner. Phalaena Bombyx Argentina, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eilberfleckiger Spinner.

Phalaena

Phalaena Bombyx Argentina	Wiener Bz. 62. 2. t. 1. a. f. 2. Raupe. t. 1. b. f. 2. Phaläne.
Bombyx	— Fab. Ent. III. 1. 441. 151.
Phal. Bomb.	— Gorthaus. III. 407. 151.
—	— Esper III. t. 53. 1. 1. 2. mit Raupe,
—	— Panzeri Fna. 2. t. 13. aber bleich.

Kennzeichen der Art. Spinner. Kammerartig, mit lachigen Flügeln; davon die gezähnten und olivengrünen vordern drey Silbermakeln und drey Silberpunkte haben. Beym Männchen, das einen Haarschopf am After hat, sind die rostfarbigen Fühlhörner schwach gekämmt.

Raupe. Nackt und rothbraun, mit Weiß gemischt; der 4. 10. und 11. Ring haben Erhöhungen oder Wülste.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst, der Flügelausbreitung nach, einen Zoll und 2 bis 5 Linien, in welchem Falle jeder am Innenrande mit einem Haarzahne besetzter, olivengrüner Vorderflügel $8\frac{1}{2}$ Linien Länge hat, und eine Querreihe schattiger Flecken zeigt. Am Innenrande befindet sich eine hochoranienfarbige Makel, und daneben drey Silbermakeln und drey Silberpunkte. Die Hinterflügel sind so, wie die Unterseite, der Hinterleib und die ungedorneten Füße bräunlichgrau. Die rostfarbigen Fühlhörner des Männchens sind gekämmt, und die des Weibchens sind fadenförmig, und der Rücken mit seinen drey sogenannten Kämme olivengrün, mit einem pomeranzgelben Mittelflecke.

Es giebt Varietäten, die eine bräunlichgelbe Grundfarbe haben. Die den Spannenmessen nahe kommende Raupe führt über den Rücken einen weißlichen Streif, und auf jeder Seite eine Reihe gelblicher Flecken mit orangegelben Luftlöchern. Der braungelbe, länglichrunde, oben etwas gespaltene Kopf hat 2 düstere Streifen. Auf dem 4. Ringe sind die 2 Erhöhungen lang und spitzig, auf dem 10. ist eine niedrige und wulstförmige, und auf dem 11. sind mehrere kleinere bryssamen. Ihr Verwandlungsgewebe, das sie im Julius an der Erde anlegt, enthält die glänzende schwarzbraune Puppe, die entweder nach 3 Wochen oder nach der Überwinterung sich entwickelt.

Aufenthalt. Der Spinner findet sich im August bey Wien und bey Maynz, und vielleicht noch mehreren Deutschen Gegenden, aber immer nur selten, und die Raupe weidet auf jungem Eichenlaub, zu Ende des Junius und im Julius. Vielleicht sind 2 Generationen vorhanden, obgleich die Wiener Entomologen als die ersten Entdecker und Zeichner derselben, davon schweigen.

Zweyte Linie. Die Raupen haben 2 Epigen über dem ersten Ring.

Weniger städtisch.

60. Der Erlenspinner. *Phalaena Bombyx Camelina*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kameelmotte, Kameelraupenspinner, Kameelhöckericher Nachtfalter, Kronenvogel, Flügelsche, Frisierglucke (beym Gladbach). Die drey letztern Namen sind von der sitzenden Phaläne hergenommen.

Phalaena

Phalaena Bombyx Camelina,	Lin. 832. 82. Mäller 678. 80.
Bombyx	Wiener Bz. 63. 3.
Phal. Bomb.	Fab. Ent. III. 1. 450. 133.
—	Vortb. III. 409. 132.
—	Gleditsch I. 310. II. 84 und 226.
—	Nau Forstw. 297.
—	Esper III. 1. 70. f. 1—5. mit Raupe.

Nöfel I. 2. Classe. Nachzög. t. 28.

Kenntzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel dieses kammrückigen Spinners sind gezähnt und rostbraun mit 2 undeutlichen, schwarzen, zackigen Querlinien; die Hinterflügel gelblich, am Schwanzwinkel mit einem schwarzblauen Fleck, der mit einer kleinen gelben Linie bezeichnet ist. Die rostgelben Fühlhörner des Männchens sind feingekämmt.

Raupe. Einzeln behaart, meergrün, mit einem etwas weißlichen Rücken, über den sich eine bläuliche Längslinie zieht, mit einer hochgelben, rothpunctirten Seitenlinie, einer rothgelben Gabelspitze und gleichfärbigen Brustfüßen. Varietäten haben vier gelbliche Rücken- und eine Seitenlinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt 1 Zoll und 9 Linien, oder einige Linien weniger, und hat am Innenrand der rostbraunen, wolfigemischten Vorderflügel einen starken braunen Haarzahn hervorstechen, und auf oben demselben 2 mühsam zu entdeckende zackige schwarze Schrägslinien. Die gelblichen Hinterflügel haben am Schwanzwinkel einen schwarzblauen Fleck, der mit einer kleinen gelben Linie bezeichnet ist. Die feingekämmtten rostgelben Fühlhörner machen das Männchen kennbar. Der Kopf, Rückenkamm und Hinterleib sind zimmerbraun, und letztere endigen beym Männchen mit einem Haarbüschel. Die graue Unterseite hat keine Zeichnung. Die Phaläne wechselt sehr an Größe und Höhe oder Tiefe der Farben. Linne' und Fabricius eignen aus Versehen auch den Hinterflügeln einen hervorstechenden Zahn zu.

Die theils im Julius, theils im September ausgewachsene Raupe mißt 1 Zoll 9 Linien. Sie ist in der Jugend noch grau, mit dickem, schwarzem Kopf, hernach grün mit halb grünem, halb schwarzem Kopf; sodann mit 2 schwarzen Stienflecken; nach der 4. Häutung ist sie grüntöpfig und überhaupt so gezeichnet, wie sie oben angegeben ist. Nöfel hatte sie anfänglich mit einem schwarzen Rückenstreif abgebildet; dies änderte Kleemann bey der verbesserten und mit Anmerkungen versehenen Ausgabe der Insectenbelustigung. Sie ruht gern auf den Bauchfüßen und streckt den Hinterleib in die Höhe, indem sie den Kopf über sich beugt. Varietäten sind hellgelblich grün, oder auch hellweißlich blaugrün, mit oder ohne vier gelbe Rücken- und einer gelben Seitenlinie. — Sie verpuppt sich im May und im October in einer Erdböhle, welche sie ausspinnet, und worin die schwarzbraune, am Ende gespizte Puppe ruht, die sich entweder bey der ersten Generation in 3 bis 4 Wochen, oder bey der zweyten in 6 Monaten entwickelt.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Spinner lebt im May oder Junius an den Stämmen und Aesten der Eichen, Hainbuchen, Erlen, Birken, Weiden (Populus italica), Espen, Linden und glattblättrigen Weiden-Arten, wo die Raupe der ersten Erscheinung im Junius und Julius und die der zweyten vom Sep-

tember bis zu Anfang des Octobers sich genährt hatte. Das Weibchen legt im Junius und Julius an die Unterseite der Blätter ihre glatten und runden Eyer, so groß als Pulverkörner, und zwar allemal 4 bis 5 beyammen.

61. Der Bachweidenspinner. *Phalaena Bombyx Capucina*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kapuzenspinner, Kapucinermotte.

Phalaena Bombyx Capucina, Lin. 832. 79. Müller 672. 79.

— — — Wiener B. 63. 4.

Bombyx — — Fab. Ent. III. 1. 449. 132.

Phalaena Bombyx — — Vorkhaus. III. 414. 152.

— — — Gleditsch II. 47.

— — — *Camelinae* Variet. Esper III. t. 70. f. 3.

Kennzeichen der Art. Die Flügel sind dachig, gezähnt und rostfarbig; die vordern mit einem eben so zurückgeschlagenen Haarzahn am Innenrand, wie am vorhergehenden.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Der Spinner gleicht in der Größe, Habitus und Zeichnung, auch in Ansehung des zurückgeschlagenen Haarzahns, dem vorhergehenden, nur daß alle vier Flügel gezähnt und rothbraun rostfarbig sind und die vordern eine braune Querverbinde haben. Der Hinterrand ist dunkler. Auf der Unterseite sind alle Flügel rothbräunlich. — Die Espersche Varietas *Camelinae* ist nach Wiener Nachrichten an den Herrn Grafen von Hofmannsegg die wahre *Camelina* Vienn., so wie Herr Esper anfänglich selbst (*Schmetterlinge* III. Spinner, Seite 301 und 362.) mit Recht vermuthete, und wie auch Herr Vorkhausen glaubte. Ob nun gleich ersterer späterhin tab. 81. f. 1. eine von ihm benannte neue *Capucina* aus Schweden dargestellt hat, so ist doch solche von den Landsleuten des Linne selbst nicht für die Linne'sche *Capucina* erklärt, sondern von ihnen, desgleichen von Vorkhausen als *B. Thalictri* aufgeführt worden.

Aufenthalt. Die den Wiener Entomologen bekannte Raupe ist weder beschrieben noch abgebildet worden. Sie lebt im Oesterreichischen und andern Deutschen Gegenden auf den Dotterweiden.

62. Der Harteichenspinner. *Phalaena Bombyx Cuculla*, Esperi.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ruttenträger, weißstreifiger Kameelraupenspinner.

Phalaena Bombyx Cuculla, Vorkhausen-III. 414. 153.

— — — — — Brahm II. 533. 218.

— — — — — Espers Spinner t. 71. f. 1.

Kennzeichen der Art. Spinner. Er hat einen Kammrücken und dachige, ockergelbe Flügel; die mit einem schwarzen Haarzahn bezeichneten Vorderflügel führen am Innenrand und auch in der Mitte einen rostfarbigen verlornen Fleck, am Hinterrand eine weisse

weiße Randbinde mit schwarzen Strichen und grauen Zeichnungen. Die mit braunen Aestmen bestreuten Hinterflügel sind mit einer weißen Wellenlinie durchzogen. Die Fühlhörner des Männchens sind fiedersförmig.

Raupe, feinhaarig und rosenroth, mit vier gelben Rückenlinien und zwey rothen Dornen auf dem Höcker des ersten Rings.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügel sind am schwarz und weißgefranzten Hinterrand nicht gezähnt, haben aber den schwarzen, hervorragenden, haarigen Familien-Zahn am Innenrand, wo ein rothfarbener Flecken steht. Ein anderer gleichfarbiger Flecken in der Mitte hat schwarze Striche, so wie sie auch der Vorderrand hat. Am Hinterrand zieht sich eine weiße Randbinde mit schwarzen Strichen und grauen Zeichnungen. Die braunbestäubten Hinterflügel sind mit einer weißen Wellenlinie durchzogen. Die Unterseite ist durchaus ockergelb, so daß die vordern einen bräunlichen Längsschatten und einen eben so gefärbten Bogen in der Mitte haben. Kopf und Fühlhörner sind rothfarbig, der Kammrücken und der Hinterleib ockergelb und dabey bräunlich eingefärbt. Das Männchen hat fiedersförmige Fühlhörner und am Hinterende einen Haarschopf.

Die Raupe ist vom Ey an grün und nachher rosenroth mit vier gelben Rückenlinien und 2 rothen Dornen auf dem Höcker des ersten Rings. Im Ruhestand nimmt sie die Stellung der *Camelina* an. Die Verpuppung geschieht in einem Erdgehäuse, worin die Puppe überwintert.

Aufenthalt. Im May an Baumstämmen und niedrigen Gesträuchen der Wälder. Die Raupe wird im September auf Eichen gefunden, welches nach *Brahms* Vermuthung wohl die zweyte Erscheinung seyn mag.

Dritte Linie. Die Raupen haben beulenförmige Erhöhungen auf den mittlern Ringen,

Weniger schädliche.

63. Der Flechtweidenspinner. *Phalaena Bombyx Ziczac*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ziczak, Zitzakraupenspinner, Zitzaknachalter, dreyhöckeriges Ziczak, Satel, und Drachen-Kamelraupe,

Phalaena Bombyx Ziczac, Lin. 827. 61. Müller 672. 61.

— — — — — *Werner* B. 63. n. 5.

Bombyx — — — — — *Fab. Ent.* III. 1. 442. 107.

Phalaena Bombyx — — — — — *Vorkhausen* III. 415. 154.

— — — — — *Gleditsch* II. 46.

— — — — — *Degeer* II. tab. 4. f. 13. und 17.

— — — — — *Eiser* III. t. 59. f. 1—4.

Nöfel I. 2. Classe. Nachtrvg. t. 20. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel liegen dachig; die vordern sind schmutziggelbbraun, und haben an der Spitze einen schwarzen, dunkelbraun eingefärbten augen-

augenförmigen Fleck und am Innenrand einen brandfarbigen Haarzahn; die Hinterflügel sind an dem mit gefiederten Fühlhörnern versehenen, übrigens kleinern Männchen weißlich, am Weibchen aschgrau und am Schwanzwinkel schwarz bestäubt.

Raupe. Nackt und röthlichbraun mit Violett gemischt, mit gleichfarbigen Höckern auf dem 6., 7. und letzten Ringe, welche sonderbar, fast wie ein Sattel gestaltet sind, und wovon der mittlere (das ist, der auf dem 7. Ring) ein wenig niedriger ist, als die andern.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll und 9 Linien, und jeder Vorderflügel 9 Linien in die Länge. Er hat schmutziggelbbraune Vorderflügel und an der Spitze derselben einen schwarzen, dunkelbraun eingefassten, augenförmigen Fleck, dann eine dunklere, abgekürzte Querlinie; dicht an dem braungefrazten Hinterrand einen Strich und am Innenrand einen brandfarbigen Haarzahn. Die Hinterflügel sind am Männchen weißlich, am Weibchen aschgrau und am Schwanzwinkel schwarz bestäubt. Auf der grauen Unterseite haben die vordern die fast durchscheinende Zeichnung der Oberseite und die hintern einen schwarzen Mittelmond. Die rothbraunen Fühlhörner sind bey dem hellergefärbten Männchen gefiedert und bey dem größern Weibchen fadenförmig. Der Bruststrücken hat die Farbe der Flügel und der Hinterleib eine gelbgraue.

Die 1½ Zoll messende dreyhöckerige, einsam lebende Raupe ist nackt, röthlichbraun, mit Violett gemischt. Sie hat gleichfarbige, wie ein Sattel gestaltete Buckel am 6., 7. und letzten Ring, und einen herzförmig getheilten Kopf, und ist vornen von da an bis zum ersten Sattel oder Buckel schwächig mit einem pommeranzfarbenen (bey Kösel aber braunen) Rückenstreif; aber an dem Hintertheil merklich stärker und dicker. Degeer hatte auch Varietäten mit fünf Höckern, a. a. O. Fig. 13. Andere Varietäten haben bisweilen eine schmutzigschwarzfarbene, bisweilen grüne oder weißliche Grundfarbe, in welchem Fall der Längstreif über den Rücken der 5 ersten Glieder rothbraun oder auch grünlich ist. In ihrer Ruhe trägt sie das dicke Hinterende gerne in die Höhe gerichtet. Brahm bemerkte in Füesch und Römers neuem Magazin der Entomologie III. S. 154. ein eigenes Werkzeug unten am Kopf, nämlich eine purpurfarbige Blase in Gestalt von 2 Füßchen. Diese Raupe ist theils im Julius, theils im September ausgewachsen, und spinnt sich alsdann zwischen Blättern oder andern Materialien bald in bald auf der Erde in ein starkes Gespinnst ein, worin sie zu einer schwarzbraunen oder rothbraunen Puppe wird, die bey der ersten Generation 3 bis 4 Wochen, bey der zweyten aber 7 Monate ruht und überwintert, ehe sie sich entwickelt.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint zuerst im May, hernach wieder im August, und die Raupe im Julius und September auf Weiden, als Lorbeer- und babylonischen Weiden, auf der Italiänischen Pappel, und nach Kleemann auf dem Heidelbeerstrauch.

Feinde. Dazu gehört wohl am meisten die sechsende Zehrwespe (Ichneumon pugillator).

64. Der Zitterpappelspinner. *Phalaena Bombyx Tritophus*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wellenspinner, grüne Zitzatphaläne.

Phalaena Bombyx Tritophus, Wiener Verz. 63. 6.

Bombyx — Fab. Ent. III. 1. 442. 108.

Phalaena Bombyx — Vorkhausen III. 421. 156.

Nicht die Beschreibung der Phaläne, sondern die der Raupe gehört hierher.

— — — Brahm II. 334. 220. und die Verichtigung S. 556.

— — *balsamiferae*, Brahm II. 261. 155.

— — *Tritophus*, Nau Forstwiss. 297.

— — — Esper III. t. 60. fig. 2. nicht fig. 1. noch 3.

— — — Tabellarisches Verzeichniß der Brandenburg. Schmetterl. t. 1. f. 3. Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig, die vordern schwarzbraun genebelt, mit einem rostfarbenen Mittelmond, der eine weiße Einfassung hat; der gewöhnliche Haarzahn (Nückenzahn) steht am Innenrand.

Raupe. Nackt und dunkelgrün, rothköpfig; vom 5. bis zum 9. Gelenk hat jeder Ring einen rothen, hinterwärts gekrümmten Höcker, davon nur die drey ersten groß sind, und einen dergleichen auf dem letzten Glied.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Er hat die Größe des nächstvorhergehenden und viel Aehnlichkeit mit dem nachfolgenden, und auf den braunnebelichten Vorderflügeln einige dunkle, verwischte Wellenstriche, ohne weitere weiße Zeichnung, als nur die mondförmige weiße Einfassung des rostbraunen Mittelmonds. Am Innenrand steht ein Haarzahn und am Außenrand eine Reihe länglicher schwarzer Flecken auf lichtem Grunde. Die Hinterflügel sind auf der Ober- und Unterseite weiß und haben am Schwanzwinkel einen braunschwarzen Wischfleck. Kopf und Brustücken sind behaart und braunschwarz.

Die nackte und dunkelgrüne Raupe hat auf jedem Ring vom fünften bis neunten Glied einen rothen, hinterwärts gekrümmten Buckel, davon nur die ersten drey groß sind, und einen dergleichen auf dem letzten Glied. Sie hat einen herzförmig ausgeschnittenen rothen Kopf; zwischen demselben und dem ersten Buckel ist ein rother Längsstreif und unten in den Seiten ein ununterbrochener gleichfärbiger. Ihr ist ebenfalls die Gewohnheit eigen, in der Ruhe das Hintertheil in die Höhe zu heben. Wenn sie im May und zu Anfang des Junius, desgleichen im Herbst, im October ausgewachsen und zur Verwandlung reif ist, so spinnt sie sich in der Erde nicht allzu tief ein, und ruht als dunkelrothbraune Puppe im Sommer 3 bis 4 Wochen, und im Herbst und Winter 6 bis 7 Monate, um sich zu entwickeln.

Aufenthalt. Der Spinner zeigt sich erstlich im May, hernach im August in Wäldern auf Birken-, Espen-, Haseln- und Erlen-Zweigen, wo auch die Raupen sowohl im Junius und Julius, als im September und October sich nähren.

Anmerk.

Anmerkungen. 1. Von Herrn Esper's Abbildung, Spinner tab. 60. Tritophus ist fig. 1. eine unkenntliche *Dodonaea* Borkhausii, fig. 2. unser Tritophus, fig. 3. der Pyramidenpappe-spinner, *Tremula* L. 2) Herr Borkhausen hat in den Scriba'schen Beyträgen zwar verschiedenes gut berichtet, 3. B. daß die in seiner Naturgeschichte a. a. O. beschriebene Raupe diejenige der P. B. Tritophus, die Phaläne selbst aber die *Dodonaea* wieder sey, die er schon aufgeführt habe; aber Herr Brahm, der eine neue Zeichnung von P. B. Tritophus Vienn., davon die fünfstöckrichte Raupe schon bekannt ist, liefern wollte, ist darüber verstorben. S.

65. Der Birkenspinner. *Phalaena Bombyx Dromedarius*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Dromedar, Dromedarspinner, Dromedarraupenphaläne, Kameelbuckel, Mayenspinner.

Phalaena Bombyx Dromedarius, Lin. 827. 62. Müller 672. 62.

Bombyx — — — Wiener Verz. 63. 7.

Phal. Bomb. — — — Fab. Ent III. 1. 444. n. 113.

— — — Borkhausen III. 419. 155.

— — — Gleditsch I. 440.

— — — Rau Forstwiss. 297.

— — — Esper III. tab. 59. f. 5. — 9. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig, die vordern nebellichtbraun oder gelb; an der Spitze ist ein rothbrauner Fleck; eine eben so gefärbte Querverbinde läuft mit dem Hinterrand parallel; und am Innenrand ist ein schwarzer hervorstehender Haarzahn. Das Männchen hat gefiederte Fühlhörner und eine deutliche Zeichnung als das Weibchen.

Raupe. Gelbgrün mit fünf Buckeln, die auf dem 4. 5. 6. 7. und dem letzten Ring stehen; zwischen dem Kopf und dem ersten Buckel ist ein rother Rückenstreif und in jeder Seite ein längsstreif von eben der Farbe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Er ist von der Größe des vorhergehenden. Seine nebellichtbraungrauen Vorderflügel sind an der Wurzel weißlich oder gelb; an der Spitze ist ein rothbrauner Fleck; eine eben so gefärbte Querverbinde läuft mit dem Hinterrand parallel, und am Innenrand ist ein schwarzer, hervorstehender haariger Rückenzahn. Außer der Randbinde ziehen sich auch noch 2 zackige schwarzbraune, in der Mitte aschgraue, am obern Theil weißlich, am untern ockergelb gesäumte Querlinien durch, und zwischen diesen steht am Vorderrand ein rostfarbiger länglicher Punkt in einem schmalen grauen Fleck. Die aschgrauen Hinterflügel haben einen halben Bogenstreif in der Mitte, und einen gelblichen Fleck am Schwanzwinkel. Die Unterseite ist durchaus aschgrau mit einem braunen Mittelfleck. Kopf und Rücken sind mit den Vorderflügeln und der Hinterleib mit den hintern gleichfärbig, die Fühlhörner aber rostfarbig, und am Männchen gefiedert.

Die gelbgrüne Raupe, deren Spitzen der vier ersten hinter sich gekrümmten Buckel roth sind, und deren letzter gerade und kegelförmig ist, hält das Hintertheil in die Höhe. Die Buckel selbst sehn auf dem 4. bis 7. und auf dem letzten Ring; zwischen dem Kopf und

und

und dem ersten Buckel ist ein rother Rückenstreif und in jeder Seite ein Längstreif von eben der Farbe. Sie erscheint das erstemal im Julius, das zweytemal im September und October, und begibt sich, nachdem sie ausgewachsen ist, in die Erde, um sich in eine Puppe zu verwandeln, welche 2 stumpfe Endspitzen führt, deren jede zwey Stacheln hat. Die Puppe der frühern Generation liegt 3 bis 4 Wochen, und die der zweyten 7 Monate, ehe sie sich entwickelt oder Schmetterling wird.

Aufenthalt. Der Spinner ist im May und August in Wäldern an den Stämmen der Birken, zuweilen auch der Erken und Haseln zu sehen, wo sich die Raupe genährt hat.

Vierte Linie. Die Raupen haben keine heulförmigen Erhöhungen und keine Höcker.

66. Der Stieleichenspinner. *Phalaena Bombyx Velitaris*, Esper.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Segelmotte, Segelspinner.

Phalaena Bombyx Velitaris,	Borkh. III. 393. 146.
— Noctua —	Berliner Magazin III. S. 394. n. 60.
— Bomb. —	Brahm II. 290. n. 180.
— — —	Esper III. tab. 58. f. 6. Männchen.
— — —	Knoch's Beyträge zur Insectengeschichte I. tab. 4. fig. 8.
— — —	Naturforsch. VIII. t. 5. fig. 1. 2. Raupe und Puppe, aber nicht getroffen.

Kennzeichen der Art. Spinner. Mit einem Kammrücken; die Flügel sind gezähnt, bald blaß muscatenbraun, bald licht aschgrau; die vordern haben 2 weiße, braungerandete Wellenstreifen, in der Flügelspitze einen braunen Strich und am Innenrand einen hervorstehenden dunkelbraunen Haarzahn. Das Männchen hat gefederte, das Weibchen aber fadenförmige Fühlhörner.

Raupe. Rundförmig, oben gelbgrün, unten blaugrün, glänzend und fast durchsichtig, mit 2 gelben Längelinien über den Rücken, und an jeder Seite 2 Längsreihen feiner gelber Stricheln; ihr Bau ist vorwärts schmal, hinten dicker.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner hat die Größe des Erleenspinners, *Camelina*, und gezähnte, muscatenbraune, zuweilen lichtaschgraue Flügel; die vordern haben 2 weiße braungerandete Wellenstreifen, in der Flügelspitze einen braunen Strich, und am Innenrand einen hervorstehenden Haarzahn von dunkelbrauner Farbe. Von den 2 weißlichen Querstreifen ist der vordere eynweit der Wurzel beyderseits, der hintere aber nach innen schwach und nach außen deutlich eingefaßt, mit einem dazwischen befindlichen helleren Makelchen. Die Franzen sind schüdig und mit einer braunen Linie umzogen. Die Hinterflügel haben einen blasseren Querstreif. Die graubräunliche Unterseite ist undeutlich einmal bandirt. Der weiße, multius Halsfragen hat innen braunen Hinterrand. Der flache, weiße, zweybündelige Vesperücken hat in der Mitte eine braune, halbrunde Vogen-Einfassung, und der Hinterleib

terleib ist nebst den langbehaarten Füßen mit den Flügeln gleichfärbig. Das Männchen macht sich durch die gefiederten Fühlföhner kennbar. Bey den Varietäten fällt die hellaschgraue Farbe der Flügel zuweilen ins Ockergelbe.

Die der Raupe vom Weißweidenspinner, P. B. Palpina, ähnliche, fast durchsichtige, glänzende, oben gelbgrüne, auf der Unterseite runzlichte, und blaugrün gefärbte Raupe hat zwey gelbe Längslinien über den Rücken und an jeder Seite zwey Längsreihen feiner gelber Strichelschen, außerdem auch eine rothe, weißgesäumte Bauchlinie. Auf ihrem blaugrünen, mit weißlichen Linien nehförmig überzogenen runden Kopf stehen einige kurze Härchen. Außer den braunen Brustfüßen sind alle übrigen Füße blaugrün mit braunen Fußblättern. Sie ist vorwärts schmal, hinten dicker gebaut. Kurz vor ihrer Verpuppung im October bekommt die Raupe ein anderes Ansehen, wird ganz blaugrün und die rothe Bauchlinie verschwindet. Sie wurde bey Brahm a. a. O. zwischen eingespinnenen Blättern und bey Borkhausen in einem ausgespinnenen hohlen Gehäuse in der Erde zu einer braunen Puppe, deren Endspitze vier Härchen hat, und die, weil sie gerne vertrocknet, schwer zur Entwicklung zu bringen ist, die gewöhnlich nach einer 7 bis 8 monatlichen Puppenruhe im Frühling erfolgt.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint jährlich zweymal, erslich im May, zweytens im Julius, an den Stämmen der Eichen und Pappeln, wovon sich auch die Raupe der ersten Brut im Junius, und die von der zweyten im August, und bey Spätklingen im September und October nährt.

Anmerkung. Herrn Esper's Meynung, daß die Raupe so bucklicht wie P. B. Ziezac sey, und die Meynung anderer Entomologen, daß unsere Phaläne die Querna der Wiener sey, fällt aus der Ursache weg, a) weil diese ganze vierte Linie keine Buckelraupe hat, b) weil die Wiener Entomologen in der schriftlichen Erklärung an Herrn Graf von Hofmannsegg bemerkt haben, daß unsere Velitaris Esp. diejenige sey, die Herr Schiffermüller anfänglich als Aulera zu dieser Familie bestimmt habe: gleichwohl seyen die Wiener Entomologen nachher eins worden, diejenige rötlichgraue braun gezeichnete Phaläne, die in Scriba Venträgen tab. 7. fig. 5. vorkommt, künftighin Aulera wieder zu benennen, wie sie auch schon im Wiener Verzeichniß S. 310 als zur ersten Familie gehörig bestimmt war, und welche späterhin unter Esper's Eulen tab. 197. abgebildet steht. Man thut also am besten, bey unserer Phaläne die Esper'sche Benennung vorzugsweise bezubehalten. Sch.

67. Der Rahneichenspinner. Phalaena Bombyx Dodonaea Borkhaus. leu Territa.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Phal. Bomb.	Dodonaea	Borkhausen III.	402. 149.
—	—	Tritophus	Borkhausen III. 421. 156. nur die Beschreib. der Phaläne.
—	—	Dodonaea	Brahm II. 336. 222.
—	—	—	Scriba Venträge t. 7. f. 6. 7.
—	—	Tritophus	Esper III. t. 60. fig. 1.

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Flügel sind bachig und grau, die vordern stark bestäubt, mehrentheils einfärbig ohne Streifen mit einem rothfarbigen, weiß.

weißeingesakten Mittelmöndchen und am Innenrand mit einem Haarzahn versehen, die hintern sind ganz weiß. Die rothfarbenen Fühlerhörner sind gekämmt.

Weibchen. Größer; die Vorderflügel sind eben so braun bestäubt, aber mit 2 mattbraunen weißgerandeten deutlich. n Querstreifen; dazwischen steht eben so ein Mittelmöndchen, und am Innenrand eben so ein Haarzahn wie bey dem Männchen. Die hintern sind blaßgrau mit einem weißen unbegrenzten Querstreifen, und schwärzlicher Makel am Schwanzwinkel.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Der männliche Spinner mißt von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll 4 Linien, ist mehrertheils der 2 Querstreifen beraubt, hat ganz weiße Hinterflügel und gekämmte Fühlerhörner. Das Weibchen mißt 1 Zoll und $8\frac{1}{2}$ Linien. Bey letzterem sind die rothfarbigen Fühlerhörner fadenförmig. Zween mattbraune Wellenstreifen sind weißgerandet, die Hinterflügel blaßgrau mit einem weißen, nicht scharf begrenzten Querstreif, und schwärzlichen Fleck am Schwanzwinkel. Bey beyden Geschlechtern findet sich auf der grauen, stark bestäubten Vorderseite der schwarzbehaarte Zahn des Innenrandes und das rothbraune Mittelmöndchen, welches in der sonst so genauen Abbildung der Scribaischen Beyträge nicht rothbraun gefärbt ist. Die Franzen der Vorderflügel sind grau und braun gescheckt, und alle Theile und Glieder des Insects braungrau, bis auf die Fühlerhörner und weißgeringelten Fußblätter. Alle Flügel haben auf der Unterseite gleiche Farbe mit der obern und einen schwärzlichen Mittelpunkt, hinter welchem ein gemeinschaftlicher Streif durchzieht. Bey wenigen Exemplaren ist noch am Hinterrand der Vorderflügel oben eine Reihe weißlicher Stricheln.

Die Raupe ist noch nicht gehörig beschrieben und abgebildet, ob man sie gleich bey Maynz und Frankfurt mehrmals erzogen hat. Ihre Puppenruhe soll 7 Monate dauern.

Sie könnte auch wohl die *Dodonaea* der Wiener seyn, wosern diese sich nicht auf die Eipersche Abbildung der *Obliterata* bezogen hätten. Oder vielleicht ist hier der nämliche Fall, wie bey der vorhergehenden und nachfolgenden, daß diese Herren anfänglich unserer und späterhin der *Obliterata* *Espers* den Namen der *Dodonaea* verlegt haben. Der Recensent in den Ergänzungsblättern zur allg. lit. Zeitung in den leystern Quinquennien des 18. Jahrhunderts Seite 451. schlägt den neuen Namen: *Territa* vor.

Aufenthalt. Die Raupe soll im September auf Eichen, wie auch Weiden und Pappelbäumen wohnen, und Drahm vermutete 2 Generationen.

68. Der Haselchensspinner. *Phalaena Bombyx Trepida* F. Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eipenspinner, Zitternachtsfalter, aschgrauer Spinner mit fleckichtem Vorderrand der Hinterflügel, Weidenmännchen (von der Raupe, nach Glabdach).

<i>Phalaena Bombyx Tremula</i>	Wiener Veri.	49. 4.
—	—	<i>Trepida</i> Fab. Ent. III. 1. 449. 130.
—	—	— Dorthausen III. 400. 143.

M m m

Phalaena

Phalaena Bombyx Trepida Brahm II. 349. 232.

— — Tremula Bau Hortsch. 298.

— — Trepida Esper III. t. 57. f. 1. — 4. mit Raupe.

Rösel III. t. 63. f. 3. Raupe.

Kleemanns Beiträge I. t. 13. fig. A. B. Weibchen.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig, die vordern braungrau mit 2 undeutlichen Zackenstreifen, zwischen welchen bald deutlich, bald undeutlich ein dunkler länglicher Punct oder Strich mit weißer Einfassung steht, und am Innenrand mit einem stumpfen, starken Haarzahn versehen; die weißlichen Hinterflügel haben am Vorderrand einen Anfang von aschgrauer, fleckichter Zeichnung, die nur eine Linie breit am Rand fortzieht. Die rosthfarbigen Fühlhörner des Männchens sind feingefiedert, die des Weibchens aber fadenförmig.

Raupe. Einsam lebend, nackt und schön gelblich grün, auch großköpfig und träge, mit zwey weißen Rückenlinien und an jeder Seite sieben halb gelben und halb rothen Schrägsstreifen. Der meergrüne Kopf hat einen weißen Streif und zwey blaßgelbrothe Flecken; die Füße sind röthlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner mißt 1 Zoll und 10 Linien, und der weibliche 2 Zoll 3 Linien, jeder Vorderflügel aber 1 Zoll und 2 Linien. Und obgleich dieser Spinner wegen der allzustarken Adern der Vorderflügel und dadurch entstehenden verworrenen Zeichnung nicht gut zu beschreiben ist; so macht ihn doch der aschgrau bezeichnete Vorderrand der weißlichen Hinterflügel, die aber bey dieser Art recht weit aus einander zu breiten sind, charakteristisch und kenntlich. Die braungrauen Vorderflügel haben 2 undeutliche Zackenstreifen, zwischen welchen bald deutlich, bald undeutlich ein dunkler länglicher Punct oder Strich mit weißer Einfassung steht, sodann einen stumpfen, starken Haarzahn am Innenrand. Bey meinem männlichen Exemplar, das am Aster einen Haarbüschel führt, ist der längliche, weißeingefasste Punct nicht deutlich zu sehen, und der Zackenstreifen sind drey, statt zwey. Hinter solchen ist allemal noch besonders in der Nähe des mit einer schwarzen Linie umzogenen Hinterrandes eine mit ihm parallellaufende Querreihe brauner Flecken. Alle Theile des Insects haben auf der Oberseite die Farbe der Flügel. Die Unterseite der leßtern und des ganzen Körpers ist weißlich. An den feingefiederten Fühlhörnern macht sich das Männchen und an den fadenförmigen das Weibchen kennbar. So rauh gezeichnet und düster die Phaläne aussieht, so ungemein schön ist ihre Raupe, welche von träger Art und bey dem Fortschreiten zitternd ist, woher wohl auch der Name: Trepida rühren mag. Sie lebt einsam, ist nackt und schön gelblich grün mit 2 weißen Rückenlinien und an jeder Seite 7 halbgelben und halb rothen Schrägsstreifen. An ihrem großen meergrünen Kopf hat sie einen weißen Streif und 2 blaßgelbrothe Flecken; ihre Füße sind röthlich. An jedem der zwey vordern Ringe steht in der Seite ein erhabener rothgelber Fleck. Im Ruhestand pflegt sie sich mit dem Vordertheil in die Höhe zu richten. Zu ihrer Verwandlung erwählt sie sich zu Anfang des Septembers ein Erdgewölbe, darin die dunkelschwarze Puppe mit ihren hellen Einschnitten des Hinterleibes überwintert, und in allen 8 Monate ruht.

Aufent-

Ausenthal. Der Spinner sitzt im May an den Stämmen der Eiche mit dicht an den Leib angeschlossenen Flügeln, wo man auch, nämlich an den Blättern, vom Junius bis September die Raupe findet, die vielleicht 2 Generationen hat, von deren letztern der im May erscheinende Spinner herkömmt.

Anmerkung. Hier ist wieder der Fall, wie bey den beyden vorhergehenden Phalänen, daß nämlich die Wiener Entomologen den Namen und die Familie dieses Spinners abgeändert haben. Herr Abt Schiffermüller nämlich zählte ihn im Wiener Verzeichniß der ersten Familie unter dem Namen: *Tremula* bey; strich ihn aber lange nach dem Druck solches Werks aus jener Familie aus, und ließ den Namen eingehen, weil er fand, daß diese Phaläne theils gar nicht die Linneische *Tremula* sey, theils in eine eigene Linie dieser 16ten Familie gehöre.

69. Der Pyramidenpappelspinner. *Phalaena Bombyx Tremula*, Borkhauf.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Balsampappelspinner, Wellenspinner, Phöbe, Zahnflügel.

Phalaena	Bombyx	Tremula	Lin. 826. 58.?	Müller 671. 53?
—	—	—	Borkhausen III. 396. 147.	
—	—	—	Brahm II. 259. 154.	
—	—	Phoebe,	Scriba Beyträge t. 2. mit Raupe.	
—	—	Tritophi	Varietas Esper III. tab. 60. fig. 3.	

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig und unausgejackt, mit keinem starken Rückenstamm; die vordern sind schwarzbraun und bandfarbigbraun gefleckt und bandirt; mit einem Haarzahn am Innenrand; die bey dem Männchen ganz weißen; bey dem Weibchen ziemlich weißen Hinterflügel haben am Schwanzwinkel ein schwarzes Fleckchen. Die gelblich braunen Fühlerhörner sind bey dem Männchen kammsförmig, bey dem Weibchen fadenförmig.

Raupe. Weißköpfig und träge, vornen schwächer als hinten, von sammetartig, schwarzgrüner Farbe, mit einer schwarzen Rückenlinie, in welcher auf dem 4. 5. 6. und 7. Ringe kleine schwarze Zeichnungen stehen, welche auf jedem dieser Ringe ein gleichseitiges Dreieck, dessen Grundfläche nach dem Kopf zu gerichtet ist, und einen kleinen Bogen bilden, der sich vor der Spitze dieses Dreiecks herumzieht. Das erste und letzte Glied sind grauweiß gefleckt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner mißt 1 Zoll und 11 Linien, der weibliche 2 Zoll 1 Linie, und jeder Vorderflügel 11½ Linien. Er ist nebst seiner Raupe lange bekannt, vom Candidat Siebert aber in den Scriba'schen Beyträgen bekannt gemacht und in treuer Abbildung dargelegt, und von Herrn Borkhausen, in Beziehung auf die Fauna Suecica Linnei für die wahre linneische *Tremula* erklärt worden. Das Schwarzbraune und Brandfarbige der Vorderflügel ist so vertheilt, daß an der Wurzel eine breite mattschwarze Querverbinde vorhanden, an diese wieder ein breites brandfarbiges Feld stößt, das am Vorderrand der Flügel weißlich wird. In diesem Feld steht nach vornen zu

M m m 2

eine

eine unmerkliche schwärzliche Querlinie, nach hinten zu aber, ohngefähr in der Mitte des Flügels, eine brandfarbige, weißlich umzingelte, längliche Mondmakel. An derselben nimmt ein großes schwarzbraunes Feld seinen Anfang, das aber nicht durchaus zieht, und in welchem ein weißlicher Strich zu sehen ist. Dann folgt ein lichtgrauer Randstreif, in welchem ein schmalerer, dunkelbrandfarbiger Querstreif eingeschlossen ist, und sich in seiner Biegung mit dem brandfarbigen Gelbe verbindet. Der Hinterrand selbst ist in einer Breite von $\frac{3}{4}$ Linien mattschwarz, und seine Franzen sind heller und dunkler gestreift. Der Innenrand hat einen Haarzahn. Die bey'm Männchen ganz weißen, bey'm Weibchen ziemlich weißen Hinterflügel haben am Schwanzwinkel ein schwarzes Fleckchen. Die aschgraue Unterseite zeigt auf jedem Flügel einen Mondfleck, der aber auf den hintern am deutlichsten ist. Der Bruststricken, der hinten dreylappig scheint, ist mattschwarz, und der Hinterleib fällt mehr ins Aschgraue. Die Fühlhörner sind gelblichbraun, bey'm Männchen gekämmt, bey'm Weibchen fadenförmig. Es giebt sowohl dunklere, als auch bleichere Varietäten; von letzterer Art ist die Espersche Abbildung a. a. D., die aber Brahm nicht dafür erkennen wollte.

Die das erstemal zu Ende des Junius bis zur Mitte des Julius, das zweytemal im September ausgewachsene, $1\frac{1}{2}$ Zoll lange, ungebuckelte, träge Raupe ist weißköpfig, vornen schwächlicher als hinten, von sammetartig-schwarzgrüner Farbe, mit einer schwarzen Rückenlinie, in welcher auf dem 4., 5., 6. und 7. Ringe kleine schwarze Zeichnungen stehen, welche auf jedem dieser Ringe ein gleichseitiges Dreyeck, dessen Grundfläche nach dem Kopfe zu gerichtet ist, und einen kleinen Bogen bilden, der sich vor der Spitze dieses Dreyecks herumzieht. Das erste und letzte Glied sind grauweiß gestreift. Sie wird kurz vor ihrer Verpuppung lebhafter. Und ihre in einem zubereiteten Erdgewölbe ruhende Puppe ist dunkelbraun, dick, fast cylindrisch, stumpf und mit 2 Endstacheln besetzt. Die Puppenruhe der ersten Generation dauert 3 bis 4 Wochen, die der zweyten 7 Monate.

Aufenthalt. Dieser bisher seltene Spinner findet sich im südlichen Deutschland sowohl zu Anfang des May, als zu Ende des Julius und im August, an der Italiänischen Pappel, worauf sich auch die Raupe nährt. Auch schon Linné gab die Pappel zur Nahrungspflanze an.

Anmerkung. Der Recensent in den Ergänzungsblättern zur allgemeinen Literatur-Zeitung, dessen oben bey der Dodonaea gedacht worden, erklärt unsern Spinner zugleich für den Fabriciusschen Tritophus, läßt ihn aber nicht für die Linne'sche Tremula passiren.

70. Der Weißfleckenspinner. Phalaena Bombyx Melagona, Borkhauf.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Aschgrauer, schwarzfleckiger Spinner, Schwarzes Eck.

Phalaena Bombyx Melagona Borkhauf. III. 423. 157.

Borkhausen in Scriba's Beiträgen t. 7. f. 2.

Kennzeichen der Art. Die Flügel sind dachig; die hellgrauen vordern führen zwischen 2 weißlichen Wellenstreifen einen weißen Mondfleck in der Mitte, einen stumpfen Haar-

Haarzahn am Innenrande, und ein schwarzes, zweymal durchschnittenes Dreyeck an der Flügelspitze; die Hinterflügel sind weißlich, und die rothfarbigen Fühlhörner des Männchens gekämmt.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Die Größe dieses dem Eicleichen, inner, Velitaris, ähnelnden Spinners ist veränderlich. Zuweilen beträgt das Ausmaß 1 Zoll $3\frac{1}{2}$ Linien, und die Länge eines Vorderflügels $6\frac{1}{2}$ Linien, zuweilen mehr oder weniger. Von den zwey weißlichen, auf jeder Seite schwarzgerandeten Wellenstreifen der hellgrauen Vorderflügel ist die erste abgekürzt und nach der Seite des weißen Mittelmundes zu von einem schwärzlichen Schatten begleitet. An dem obern Ende des zweyten Querstreifs, also an der Spitze, befindet sich ein dreyeckiger Fleck, den zwey weiße Linien in drey schwarze Fleckchen theilen. Die Franzen des schwärzlich beschatteten Hinterrandes sind schwarz- und weißgestreift. Die Unterseite dieser Flügel ist aschgrau mit einem Wischstreif. Die Hinterflügel sind auf beyden Seiten weißlich, so daß sich noch an den Hinterrand eine haardünne Linie anschließt. Die rothfarbenen Fühlhörner des Männchens sind gekämmt, die des Weibchens ungekämmt, unter der Lupe aber doch fein gezähnt. Bey beyden Geschlechtern stehen die Fressspitzen hervorgestreckt und zurückgebogen; Kopf, Halsfragen und Hinterleib sind gelb, der Brust Rücken schwarz bemakelt, der After bebüschelt. Er variirt nicht nur in der Größe, sondern auch in der Höhe und Tiefe der Grundfarbe, und in dem stärkern oder schwächern Ausdrücke der Zeichnung, so daß kein Stück dem andern ganz gleichet.

Aufenthalt. Nach Vernings Versicherung lebt die Raupe auf Eichen.

71. Der Galleichenspinner. *Phalaena Bombyx Tripartita*, Borkhauf.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Dreyfeld; weißgrauer, dreygetheilter Spinner; dreyfleckiger.

Phalaena Bombyx Tripartita Borkhauf. III. 424. 158.

— — — — — Brahm II. 179. 87.

— — — — — Trimacula Esper t. 46. fig. 1—3. wo aber in der Abbildung der Harzahn fehlt.

Kennzeichen der Art. Die Flügel sind dachig und weißgrau; die vordern durch 2 bräunliche Querstreifen in drey Felder getheilt; der gewöhnlich kleine Harzahn steht am Innenrande, die rothfarbenen Fühlhörner sind bey dem kleinern Männchen gesiedert, bey dem größern Weibchen nicht.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Alle Flügel sind weißgrau, die hintern einsärbig, die vordern bald dunkel, bald hellgemischt, und durch 2 bräunliche Querstreifen in drey Felder getheilt. Der erste Streif ist nach außen braun beschattet, der zweyte aber nicht, sondern auf der Außenseite auf jeder Nerve mit einem spitzwinklichten Fleckchen bezeichnet; bey Varietäten aber doch auch beschattet. Die Franzen sind weißlich und braungrau. Der Harzahn ist an gehöriger Stelle vorhanden. Kopf, Rücken und Hinterleib sind bräunlich, und der Halsfragen weißlich. An den gesiederten Fühlhörnern ist

ist das Männchen kennbar. — Aber die Wiener Trimacula ist eine andere Phaläne, die 3 weiße vereinigte Makeln hat, und die Esper Scoriacea nennt.

Aufenthalt. Im April in Eichenwäldungen bey Darmstadt. Die Raupe soll zwar auf Eichen weiden, ist aber noch nicht gehörig bekannt und abgebildet.

Siebenzehnte Familie.

Gabelraupen^{*)}. Zackenstriemiger Spinner.

Diesen Raupen mangeln die zwey Schwanzfüße; sie tragen den Hinterleib hoch, der sich in 2 Spitzen endet. Die Verwandlung geschieht in einer harten, etwas runden Hülse, die sich die Raupen von abgenagten Holzspänen zusammenleimen. Die Spinner sind zungenlos, das ist, ohne vollständige Spiralfunne, haben sehr wollige Vorderfüße, abhängende, mit einigen sehr zackigen Querlinien und an den Gelenken mit schwarzen Punkten bezeichnerte Flügel.

Weniger schädliche.

72. Der Truffelspinner. Phalaena Bombyx Terrifica, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Milthäusers Phaläne, junge Wittwe.

Phalaena Bombyx Terrifica	Wiener B. 63. n. 1.
Bombyx	Borkhaus. III. 387. 144.
Milthäuseri	Fab. Ent. III. 1. 455. 150.
Phal. Bomb.	Esper III. 21. f. 1—6. mit Raupe.
Vidua	Noch Beiträge I. t. 3. f. 3. Weibchen.
Milthäusers Abhandlung.	Dresden 1763. tab. 1.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig; die vordern weißgrau mit schwarzen Adern, einem schwarzschattirten Innenrande, und durch die Mitte mit einer Reihe lebergelber Flecken besetzt; die hintern sind weißlich, am Schwanzwinkel schwarz bestäubt. Die bräunlichen Fühlhörner sind wenig gekämmt, doch bey dem Männchen stärker, als bey dem Weibchen.

Raupe. Sonderbar gestaltet, rothköpfig, nackt, grün chagriniert, ohne Schwanzfüße; auf jedem der 6 mittlern Ringe und auf dem letzten stehen rothe spitzige Höcker, von denen der erste erhöht und gabelförmig ist. Um die Mitte des Körpers zeigt sich auf jeder Seite ein fleischfarbener länglicher Fleck.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner hat die Größe vom Lindenspinner, Bucephala, weißgraue Vorderflügel mit schwarzen Adern, und in dem schwarzschattirten Innenrande stehen zwey kurze, graue Striche neben einander. Am Vorderrande befindet sich auch ein schmaler schwärzlicher Schatten.

Die

^{*)} Die nächstfolgenden, 17. und 18. Familien, haben Raupen mit vierzehn Füßen.

Die lebergelbe Fleckenreihe in der Mitte ist bald sehr verloschen, bald in die Grundfarbe vertrieben, bald deutlich vorhanden. Die weißlichen Hinterflügel mit ihrem schwarzbestäubten Schwanzwinkel sind bald ohne, bald mit einem verloschenen schwarzen Mittelfleck. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel verloschen bräunlichgrau, aber wenig gefleckt, die hintern weißlich mit einem grauen Fleck am Schwanzwinkel. Der Brust Rücken hat drey weiße Striche im schwarzen Grunde. Die Brust und der haarige Hinterleib sind so wie die Füße mit ihren langhaarigen Schenkeln gelbgrau. Die bräunlichen Fühlhörner sind bey Männchen etwas stärker gekämmt, als bey Weibchen.

Die sonderbar gestaltete, rothköpfige, nackte, grünhagrinirte Raupe ohne Schwanzfüße hat auf jedem der sechs mittlern Ringe und auf dem letzten rothe spitzige Höcker, von denen der erste erhöht und gabelförmig ist. Um die Mitte des Körpers zeigt sich auf jeder Seite ein fleischfarbener länglicher Flecken. Wenn sie im September ausgewachsen ist, nimmt sie im Eis eine gekrümmte Stellung an, indem sie wie die nachfolgende das Hintertheil in die Höhe streckt. Ihre Brustfüße sind roth. Der letzte Ring des Leibes ist flach, abgeschnitten, dreyeckig und an den Winkeln zweyspitzig. Sie macht sich ein dünnes, eprundes und grünes Verwandlungsgewebe zwischen Blättern, darin die glänzende braune, am Vordertheile zweyspitzige Puppe 7 Monate ruht und überwintert.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint im April oder May in Sachsen, im Brandenburgischen und im Fränkischen, desgleichen bey Frankfurt am Main, an den Stämmen der Bäume, worauf die Raupe vom Julius bis in den September gewohnt hat, nämlich auf Eichen, Pappeln, Esen und Birken.

73. Der Buchenspinner. *Phalaena Bombyx Fagi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Buchennachtsfalter, Buchenphaläne, Eichhornspinner, rares Eichhorn (von der Richtung des Hintertheils der Raupe).

<i>Phalaena Bombyx Fagi</i>	—	Lin. 816. 30. Müller 659. 30.
— — —	—	Wiener Bz. 63. n. 2.
<i>Bombyx</i>	—	Fab. Ent. III. 422. 50.
<i>Phal. Bomb.</i>	—	Vorkhausen III. 382. 142.
— — —	—	Brahm II. 536. 397.
— <i>Noctua</i>	—	Gleditsch I. 437. u. 454. 457.
— <i>Bomb.</i>	—	Mau Forstw. 286.
— — —	—	Esper III. t. 20. f. 1 — 7. mit Raupe.
— — —	—	Knoch's Veträge I. t. 3. f. 5. Weibchen u. t. 7.
Rösel III. t. 12. mit Raupe. Die Phaläne ist unvollkommen.		

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind zurückgeschlagen und röthlichschwarzgrau; die vordern durch 2 schmale, gebogene, weißlichgelbe Streifen in 3 gelbe Felder getheilt; die Hinterflügel haben an der Wurzel einen kurzen, weißlichgelben Streif. Die rostfarbenen Fühlhörner sind am Männchen kammförmig mit Seitensfasern.

Raupe. Einsam lebend und sehr sonderbar, vornen langfüßig, nackt und castanienbraun, mit einer hellen, schwärzlich gesäumten Rückenlinie, und auf dem 4. bis 6. Ringe

Ringe mit spitzigen Höckern besetzt; an der Stelle der Schwanzfüße laufen hinten zwey braune, hornartige Spizen aus. Auf jeder Seite des erhöhten 11. und 12. Ringes ist ein halbrunder, gezählter, fleischrother Auswuchs.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner mißt nach unsern Exemplaren von Hrn. Vering 1 Zoll 11 Linien, der weibliche 2 Zoll 2 Linien, und die Vorderflügel sind durch 2 schmale, gebogene, weißlichgelbe Streifen in drey Felder getheilt. Das erste Feld an der Wurzel ist gelblich mit schwarzen Flecken; das zweyte ins Rothe gemischt, wo am Innenrande ein Rostfleck, der sich von einem Streife zum andern erstreckt, und beym Männchen stärker ist als beym Weibchen; das dritte führt eine aus sieben ungleichen, schwärzlichen, seitwärts weißgelb gesäumten Flecken sich bildende Querverbinde. Die nach dem Hinterrande röhlich werdenden Hinterflügel haben außer einem kurzen, weißlichgelben Streif an der Wurzel auch einige weißlichgelbe Flecken. Die Franzen sind mit einer weißlichen Vogeallinie umzogen. Die Unterseite ist gelblich; Kopf, Vartspitzen, Halskragen, Brustücken und Hinterleib sind aschgrau, letzterer aber unten weiß, mit einigen Haarbüscheln auf den ersten Ringen. Das Männchen unterscheidet sich außer den Fühlhörnern und seiner geringern Leibesgröße auch durch die deutlichere Zeichnung und tiefere Farbe.

Die mit ausgerichtetem Kopfe und Hintertheile ruhende Raupe mit ihren 2 kurzen und 4 langen Vorderfüßen, die sie herunter hängen läßt, ist wegen dieser Stellung: Eichhornraupe, genannt worden. Sie lebt einsam, ist nackt, castanienbraun mit hellern, schwärzlichen, gesäumten Rückenlinien, und hat auf allen Gliedern 2 stumpfe kleine Erhabenheiten; auf dem vierten bis sechsten Gliede sind sie aber nicht klein, sondern stärker, höherig und spitzig gebildet, allemal zwey neben einander. Auf jeder Seite des erhöhten ersten und zwölften Ringes ist ein halbrunder gezählter, fleischrother Auswuchs, der, wenn die Raupe noch nicht ganz erwachsen ist, eine unverhältnißmäßige Breite hat, und ihr das Ansehen giebt, als wenn eine Gartenwanze mittlerer Größe an der Raupe hing und sie benagte. Die zwey hornartigen Schwanzspizen sind in ihrer Jugend tiefschwarz. An den Luftbüchern des 4. und 5. Ringes sind tiefschwarze Punkte oder Striche. Sie ist im October ausgewachsen, wo sie sich dann in ein zartes Gewebe zwischen Blättern enge einspinnet, um als rothbraune Puppe mit vier trummern Häkchen am Endstiel 7 Monate zu ruhen.

Aufenthalt. Der in Deutschland, z. B. bey Wien, Maynz, Darmstadt und auch in hiesigen Gegenden sparsam einheimische Spinner erscheint im May und Junius an den Buchen- und Birkenstämmen, und seine Raupe lebt auf Buchen, Eichen, Linden, Haseln, Birken; nach Kleemann und Brahm läßt sie sich auch mit Zwetschchenlaub füttern.

Anmerkung. Nicht die drey Paar Brustfüße, wie Fabricius meynt, sondern nur das 2. und 3. Paar derselben, sind ungewöhnlich lang.

74. Der Wandweidenspinner. *Phalaena Bombyx Vinula*, Lin.

Namen, Christen und Nachweisung der Abbildung.

Gabelschwanz, gabelschwänziger Nachtfalter, Haarflügel, großer Hermelfalter, Hermelfvogel, großer Hermelfspinner.

Phalaena

Phalaena Bombyx Vinula	—	I. in. 815. 29. Müller 659. 29.
—	—	Wiener B. 64. n. 3.
Bombyx	—	Fab. Ent. III. 1. 428. 67.
Phal. Bomb.	—	Worthausf. III. 367. 137.
—	—	Gleditsch I. 511. II. 43. u. 109.
—	—	Nau Forskn. 288.
—	—	Esper III. t. 18. f. 1—7. mit Raupe, und t. 79. f. 9. das Ev. — Aber die Abbildung zeigt nur 2, folglich zu wenig Hermelinflecken.
Rüssel I. 2. Classe. t. 29. mit Raupe.		
Bonnet's Abhandlungen aus der Insectologie. S. 109 u. 320. t. 3. f. 1—3. von der Raupe und ihren Eigenschaften.		
Sepps Insecten 4. tab. 5.		

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind etwas zurückgebogen, äußerst dünn beschuppt, schwarzbraunaderig, und am Hinterrande punctirt; die vordern sind lanzettförmig, weißgrau, mit schwarzen, gebogenen, gezackten und gewellten Strichen überall, desgleichen mit schwarzen Puncten an der Wurzel bezeichnet; der weiße Vorderleib ist mit schwarzen Flecken hermelinartig besetzt. Das Männchen ist kleiner, und seine Fühlhörner etwas stärker gekämmt, als die des Weibchens.

Raupe. Sonderbar gebaut, einsam lebend, höckerig, grün, vornen und in der Mitte dick und groß, mit bald violettem, bald braunem oder schwarzem Rücken, und statt der Hinterfüße zwey langen gabeligen Schwanzspitzen, die eigentlich Futterale der darin enthaltenen beweglichen rothen Fäden sind. Sie kann aus einer Drüse unter dem Kopfe einige Tropfen einer hellen scharfen Feuchtigkeit von sich sprühen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser Spinner ist von unsichtlicher, doch unbeständiger Größe, indem man Weibchen von 3 Zoll Flügelbreite hat, wo jeder Vorderflügel 1 Zoll 4 Linien mißt. Seine vier Flügel sind zurückgebogen, dünn beschuppt, schwarzbraun geädert, und am Hinterrande punctirt. Die Vorderflügel sind lanzettförmig, weißgrau, mit schwarzen, gebogenen, gezackten und gewellten Strichen und Linien überall, desgleichen mit schwarzen Puncten an der Wurzel bezeichnet, die aschgrauen, ebenfalls dunkeladerigen Hinterflügel haben auf beyden Seiten oder Flächen einen dunkeln Mittelfleck, da hingegen die vordern auf der bald schwärzlichen, bald aschgrauen, allemal dunkeladerigen Unterseite am Vorderrande mehrere dergleichen zeigen. Der Kopf, der Schaft der schwarzfederigen Fühlhörner und der Vorderleib sind weiß, letzterer mit vielen Hermelinflecken, wovon vorzüglich vier am stärksten sind, besetzt, und der Hinterleib oben schwarz mit weißen Ringeln. Die Füße sind weißwollig und schwarzgefleckt, mit weißen, schwarzgeringelten Fußblättern. Bey dem Männchen sind die Fühlhörner stärker gekämmt, die Flügel etwas schmäler und spitziger; desgleichen die Hermelinflecken und übrigen Zeichnungen weit blasser; oft fehlen auf den Hinterflügeln die Schuppen gänzlich, und auf den vordern größtentheils.

Die merkwürdige, vornen und in der Mitte dicke und große Raupe unserer Phaläne ist 2 Zoll lang, ohne die hohlen knotigen Gabelspitzen mit zu messen, welche ihr wegen der darin verborgenen rothen Fäden, die sie losschießen kann, eben so zur Vertheidigung dienen, als der ägende Saft aus ihren Kopfdrüsen. Es fehlen ihr dafür die Schwanzfüße.

Nnn

Man

Man kann ihren großen, flachen und glänzendbraunen Kopf alsdann, wenn er in den rothen Ring oder das Gelenk eingezogen ist, mit einem Käsekopfe vergleichen, wo der wahre Kopf die Nase, die 2 erhabenen schwarzen Punkte die Augen, und eine Querdüse unter dem Kopfe im rothen Ringe, woraus der ägende Saft kommt, das Maul vorstellt. Der Nackenfleck vom Kopfe bis zum Höcker ist dreyeckig, und der Sattel hinter dem Höcker rauteformig, von bald rother, bald violetter oder auch schwarzer Farbe, allemal aber mit geraden gelben Linien begränzt.

Wenn sie im Junius oder Julius das Ey verläßt, ist sie ganz glänzendschwarz, nachher grün mit braunem Rücken. Vom Ey an bis vor Anfang der vierten Häutung hat sie auf dem ersten Ringe hinter dem Kopfe fleischerne, mit schwarzen Haaren besetzte Erhöhungen, die nach Kösel mit Ohren verglichen werden können. Kurz vor ihrem Einspinnen, das bey frühern Stücken im Julius, bey Spätlingen im September vor sich geht, wird die ganze Raupe entweder dunkelroth, oder braun, oder violettfarbig, und nagt sich mit ihrem starken Gebiß eine nicht große Höhle in den Stamm oder Ast, die mit Spähnen und ihrem Saft fest zugewölbt und verküttet wird. Die braune, an beyden Enden stumpfe Puppe ruht in der Regel den Herbst durch darin, außer der Regel auch wohl 2 Winter. Bey denen, die hier erzogen wurden, dauerte die Puppenruhe einmal vom Ausgange des Septembers bis zum letzten Junius, also 9 Monate, ein andermal vom 12. Julius bis zum 3. Junius des folgenden Jahres, also beynahe 11 Monate.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Spinner erscheint in ungleichen Zeiträumen, jährlich einmal, bald vor, bald in, bald nach dem May, an den Stämmen aller Weiden- und Pappel-Arten, an deren Blättern die Raupe vom Junius bis in den September sich nährt. Das Weibchen legt im Junius oder Julius seine Eyer, die sich in 14 Tagen entwickeln. Das Ey ist nach Esper zirkelförmig, zu beyden Seiten flach, von rothbrauner Farbe mit einem schwarzen Punkte, welchen ein lichter Ring umgiebt. Dabey ist es nach Kleemanns Untersuchung voll unordentlicher sechseckiger Grübchen. Hingegen das Ey des folgenden Werstweidenspinners, *Erminea*, ist nach Esper platt und nur in der Mitte erhöht, und hellgrün mit einem dergleichen verlornen Ringe und Flecken in der Mitte. Der Rand ist hellgelb, mit einem pomeranzfarbigen Kreise umzogen. Die ganze Fläche erscheint mit schrägen, gitterförmigen Furchen nach feinsten Anlege durchzogen.

75. Der Werstweidenspinner. *Phalaena Bombyx Erminea*, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weißer Hermelinspinner.

• <i>Phalaena Bombyx Erminea</i>	Gorkhausen III. 372. 138.
— — —	Brahm II. 274. 163.
— — —	Nau Korm. 228.
— — —	Esper III. t. 19. f. 1. 2. t. 78. f. 4. Raupe, und t. 79. f. 6. das Ey.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind eben so zurückgebogen und braunaderig, aber alle schneeweiß und dichter beschuppt; die vordern sind lanzettförmig und

und sowohl am Hinterrande als an der Wurzel, aber in einer andern Richtung punctirt, mit weit feinem und kaum erkennbaren schwarzen Zacken- und Wellenzügen und Strichen; der Hermelinflecken des Vorderleibes sind sechs, und der Hinterleib ist oben schwarz. Beym Männchen sind die Fühlhörner stärker gekämmt, als beym Weibchen.

Raupe. Eben so gebaut, wie die vorige, nur statt grün ist sie violettroth. Der Raum des hellern Nackenflecks und Rückensattels ist durch gelbröthliche Linien von der Grundfarbe abgeschnitten, und der Halschild etwas blau.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Größe und der Habitus ist beynahe wie bey dem vorhergehenden, und so auch die meiste Zeichnung, und dennoch ist er wesentlich von jenem verschieden, obgleich Fabricius in seinen mittlern und spätern Schriften, 3. B. in der Entomol. III. 1. S. 428. n. 67. denselben ohne Grund der *Winula* untergeschoben hat. Die Flügel sind eben so zurückgebogen und braunaderig, aber alle schneeweiß und dicht beschuppt; die vordern sind lanzettförmig, und sowohl am Hinterrande als an der Wurzel, aber in einer andern Richtung, punctirt, mit weit feinem und kaum erkennbaren, schwarzen Zacken- und Wellenzügen und Strichen. Es findet sich auch noch ein schwarzer Mondfleck in der Mitte der einfarbig milchweißen Hinterflügel. Der Vorderleib hat 6 Hermelinflecken; sehr charakteristisch ist aber der nur unten weiße, oben allemal schwarze ungeringelte Hinterleib mit seiner weißen Endspitze.

Die Raupe ähnelt in ihrem Baue und in ihrer Lebensart der *Winula*; worin sie abweicht, ist dieses, daß sie statt grün violett gefärbt ist, und daß der Raum des hellern Nackenflecks und Rückensattels durch gelbröthliche Linien von der Grundfarbe abgeschnitten, und der Halschild etwas blau ist. Ihre Verwandlung geschieht im August oder September, worauf die Puppe überwintert.

Aufenthalt. In mehreren Gegenden von Deutschland, 3. B. bey Mainz, Frankfurt und in Franken, gewöhnlich im Maymonat an den Stämmen der Weiden, Espen und Pappeln, aber allemal äußerst selten. Eine frühe, warme Witterung verursacht, daß der Spinner wohl schon im April erscheint und Eyer legt, ehe noch die Futterpflanze der Raupe, der Espenbaum, Blätter getrieben hat.

76. Der Wellenspinner. *Phalaena Bombyx Bifida*, Brahm.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Degeerscher Gabelschwanz, Wiener Pappelweidenspinner.

<i>Phalaena Bombyx Bifida</i>	Brahm in Güesly's neuem Magazin III. 161, und
— — —	Brahm's Inf. II. 275. n. 164.
— — —	Vorkhaus. III. 374. 139.
— — —	Forcula Wiener Bz. 61. 4. mit der dortigen Anmerkung.
Degeer Mémoires II. t. 4. f. 18 — 21.	S. 315. la Chenille (Raupe).

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind stark geschuppt, am Hinterrande durchaus schwarz punctirt; die vordern sind weißlich, in der Mitte mit einer

Ann 2

breiten,

breiten, aschgrauen Quereinnde besetzt, welche von schwarzen, gelbbestäubten Querlinien begränzt wird; die hintern sind weiß mit einem schwärzlichen Mondfleck in der Mitte. Der zottige Hinterleib ist oben aschgrau, an den Seiten schwärzpunctirt, und bey'm Männchen schwächlich. Auch sind dessen Fühlhörner stärker gekämmt als die des Weibchens.

Raupe. Sonderbar gebaut, einsam lebend, höckerig, lebhaft grün, vornen und in der Mitte dick, mit bald rothbraunem, bald rosenrothem, bald violettem Nackenfleck und Sattel, und statt der Schwanzfüße mit 2 langen gabeligen Schwanzspitzen, welche Futterale der darin befindlichen rothen Fäden sind, welche Fäden sie aber nach der vierten Häutung nicht mehr gebraucht. Sie hat keine Drüsen unter dem Kopfe, auch keine zwey schwarzen Kopfflecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser schöne Spinner hat ein Ausmaß von 1 Zoll 6 Linien Flügelbreite. Seine Flügel sind stark geschuppt, am Hinterrande durchaus schwärzpunctirt; die vordern sind weißlich, in der Mitte mit einer breiten aschgrauen Quereinnde besetzt, welche von schwarzen, gelbbestäubten Querlinien begränzt wird; und zu seinen Zeichnungen gehört auch gegen die Spitze hin ein aschgrauer Fleck, welcher von einer bogenförmigen, schwarzen, gelbbestäubten Linie einwärts begränzt wird, und durch einen zackigen Fortsatz mit der Binde zusammenhängt. Zwischen diesem Flecke und der Binde zeigen sich mehrere feine Wellenlinien und ein düsterer Mondfleck. Ein anderer Mondfleck bezeichnet auch die weißen Hinterflügel, hinter welchen noch zuweilen ein Querschattenstreif vor dem punctirten Hinterrande herzieht. Auf der Unterflache leuchtet die Zeichnung der obern durch. Kopf und Halschild sind weißgrau, und der Vorderleib ist aschgrau mit schwarzen Flecken. Der zottige Hinterleib ist oben aschgrau, an den Seiten schwärzpunctirt, und bey'm Männchen schwächlich. Des letztern Fühlhörner sind stärker gekämmt als die des Weibchens.

Was die vornen und in der Mitte dicke Raupe betrifft, so müssen wir solche von 2 andern genauer unterscheiden: 1) Von der des Bandweidenspinners, *Vinula*, nämlich dadurch: a) daß unsere 3 kleiner ist; b) keine Saftdrüse und auch keine 2 schwarzen Puncte am Kopfe hat; c) daß sie die Fähigkeit, rothe Fäden aus den hohlen Schwanzgabeln zu schießen, bey der vierten Häutung verliert, da hingegen sie jene durchaus behält; d) ihr Sattel ist nicht von länglicher, rautenförmiger Figur, und nicht mit geraden, sondern mit ausgekappten gelben Streifen begränzt; auch ist der Höcker und der Sattel durch zwey Ringe getrennt.

2) Von der Palmweidenspinerraupe, *Furcula*, unterscheidet sie sich a) dadurch, daß unsere allemal auf dem Pappelbaume, *Populus nigra*, nie auf Eschweiden leben soll; b) daß unsere größer und weicher, und nicht so gelbgrün und abgeblaßt ist; c) daß bey unserer die Schwanzgabel nicht gelb und braun geringelt und auch nicht gedornit ist; d) daß unsere keine schwarze, sondern rothe Flecken, ehe sie sich viermal häutet, losläßt; e) daß der Sattel nicht von geraden gelben Linien begränzt ist; f) daß auf dem 10. Absätze zu den Seiten kein schwarzer dreyeckiger Fleck steht. Uebrigens ist ihr gelbbrauner Kopf eben so zurückziehbar, und der schwülstige Ring, worein er sich zieht, bildet einen eben so gelben Kreis

um den Kopf, wie bey den andern dieser Familie. Sie kommt schwarz mit 2 ohrenförmigen Erhöhungen aus dem Ey, und nach der ersten Häutung wird sie grün mit schwarzem Nackenfleck und Sattel. Dieser Sattel wird nachher rothbraun, zuweilen rosenroth, zuweilen violett. Statt der Schwanzfüße hat sie wie die vorigen zwey Gabelspitzen. An den Seiten des Leibes hat sie schwarze Punkte. Der Bau und die Einrichtung ihres Verwandelungsgehäuses ist wie bey der *Vinula*, und ihre Puppe eben so hellbraun und stumpf.

Aufenthalt. In Deutschland und Schweden, im May, an den Stämmen der Italiänischen Pappel, die anderwärts am Rhein zu, Velle heißt, und dann die Balsampappel (*Populus balsamifera* oder *Tafamahak*), worauf die Raupe vom Junius bis in den September lebt. Man vermuthet 2 Generationen, wovon die Puppe der zweyten überwintert.

77. Der Palmweidenspinner. *Phalaena Bombyx Furcula*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Brustpunkt, kleiner Hermelinvogel, kleiner Gabelschwanz, Gabelnachtsfalter, Doppelschwanz.

Phalaena Bombyx Furcula, Lin. 823. 51. Müller 667. 51.

Bombyx — Fabr. Ent. III. 1. 475. 213.

Phalaena Bombyx — Borkhausen III. 378. 140.

— — *Bicuspis*, Borkhaus. III. 380. 141.?

— — *Furcula*, Brahm II. 205. n. 106.

— — — Gleditsch Forstw. II. 51.

— — — Esper III. t. 19. f. 3—7. mit Raupe; dieser gleicht die Abbildung der *Bistida* fast eher.

— — — Naturforscher XIV. tab. 2. f. 13. 14. von D. Rühn.

— — — Panzeri Faal. 4. tab. 20.

D. G. J. Gladbach's Beschreibung neuer Europäischer Schmetterlinge. 1777. Frankfurt t. 25. f. 1—6. mit Raupe.

Kenntzeichen der Art. Spinner. Ganz dem vorhergehenden ähnlich; nur sind die Flügel schwächer beschuppt: der Vorder- und Hinterleib sind beyde kurzhaariger, und beyde bekommen, wenn das Insekt nicht mehr frisch ist, statt des aschgrauen ein schwärzliches Ansehen. Die Fühlhörner sind beyh Männchen stärker gekämmt, als beyh Weibchen.

Raupe. Wie die vorhergehende gebaut, aber von bleicherem Gelbgrün, zuweilen meergrün, zuweilen mit vielen kleinen roth und dunkelgrünen, durch die Lupe bemerkbaren Knöpfchen geziert, mit bald violettblauem, bald bräunlich, bald blauschattirtem dreieckförmigem Nackenfleck und Sattel, und statt der Schwanzfüße mit 2 langen und zwar mit feinen Dörnchen besetzten Gabelspitzen versehen, woraus sie wenigstens vor ihrer letzten Häutung schwarze Fäden ausschießen kann. Iyr fehlen auch die Saftdrüsen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner misst 1 Zoll 3 Linien, der weibliche 1 Zoll 4 Linien, jeder Vorderflügel $7\frac{1}{2}$ Linien. Diese Art ist der vorhergehenden ähnlich, nur sind die Flügel schwächer beschuppt, der Vorder- und Hinterleib sowohl kürzer behaart, als auch von schwärzlichem An-

Ansehen, wenn sie sich versflogen haben. Die stärker gekämmten Fühlhörner machen das Männchen kennbar. Man ist darüber noch nicht zur Gewißheit gekommen, ob die Exemplare, welche eine sehr ungleiche, buschicht eingeschnittene, ganz schwarze Querverbinde haben, auch zu unserer Furcula gehören, oder nicht.

Die Raupe hat mit der vorhergehenden viel Aehnlichkeit, aber ein bleicheres Gelbgrün, zuweilen meergrün, zuweilen mit vielen unter der Vergrößerung sichtbaren kleinen roth- und dunkelgrünen, durch die Lupe bemerkbaren Knöpfchen geziert, mit bald violettblauem, bald bräunlich, bald blauschattirtem dreieckförmigem Nackenfleck und Sattel, und statt der Schwanzfüße mit 2 nach Verhältniß langen, und zwar mit feinen Dörnchen besetzten Gabelspitzen versehen, woraus sie vor ihrer letzten Häutung noch schwarze Fäden ausschießen kann. Sie hat auch auf ihrem Sattel auf dem letzten Absatz ein kleines braungelbes Fleckchen, an welches ein schwarzes Strichelchen stößt. An den Seiten des zehnten Ringes steht ein schwarzer dreieckiger Fleck. Die Saftdrüsen fehlen ihr. Daß sie nach der dritten Häutung, wo ihre ohrenförmigen Auswüchse am Kopf noch nicht verschwunden sind, eben so wie die *Vinula*, wenn sie ihren Kopf eingezogen hat, das seltsamste Ansehen hat, indem sie einem Ragenkopf mit Ohren ähnlich ist, bestätigt sich: nur hätte dies Herr Gladbach nicht durch so elende Malereien vorstellig machen sollen. Ihr Verwandlungsgehäuse legt sie theils im Junius, theils im September nach Art der vorhergehenden an, und ihre mit grünen Flügelcheiden versehen seyn sollende Puppe ruht im ersten Fall 4 Wochen, im zweyten 7 Monate.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Spinner erscheint jährlich zweymal, zuerst im April oder Anfang des Mays, hernach wieder im Julius, an Mauern, Geländern und Stämmen der Bäume, wo die Raupe gelebt hat; diese sind die weichblättrigen Weiden, z. B. die Sahlweiden etc., nach Gladbach auch die Balsampappel. Die Raupe ist also sowohl zu Ende des Mays und im Junius, als auch wieder im August und September vorhanden. Das Weibchen legt seine Eier, die nach Esper schwarz und groß sind, nur auf die obere Blattseite, wie es die *Vinula* macht.

Anmerkung. Der Saarbaumspinner, Ph. Bomb. Bicuspis, Vorkhausen III, 380. n. 141. Drach II. 275., der bey dem eben beschriebenen fragweise mit angeführt worden, unterscheidet sich von beyden vorhergehenden durch die mit Schuppen dicht belegten blendend weißen Vorderflügel, die eine ganz schwarze, aber nicht gleich breite, sondern am Vorderrand schmale und gegen den Innenrand doppelt breite, in der Mitte buschicht eingeschnittene, mit gelblichem Anflug bestreute Querverbinde führen, und durch den schwarzen Vorderleib und weißwolligen Hinterleib. Er soll aus einer zweygabeligen, auf Espen und Wellen lebenden Raupe herkommen, deren blauer Sattel mit röthlichen Linien begränzt sey, die in den Seiten des 6. und 7. Ringes große rothe Flecken zeigen. Entweder ist dieses Insect eine sehr abweichende Varietät der Furcula, oder, welches mir immer mehr wahrscheinlich wird, wohl die Furcula selbst; alsdann würden die Vorkhausensche, Epersche und Kühnische Furcula Varietäten von der *Bifida* seyn. Man hat hier eben dergleichen Stücke, welche wegen ihrer buschichten Vinde der *Bicuspis* gleichen; und da ich finde, daß sie gar wenig beschuppt und noch kleiner sind, als die *Bifida*: so sieht man daraus, daß die dichte Beschuppung und die Schwärze des Vorderleibes kein bleibendes Merkmal abgeben.

Ueber.

Ueberhaupt weicht die Natur oft in Varietäten stärker als in den Bestimmungsgränzen der Arten selbst ab. Sch.

Achtzehnte Familie.

Episphaen. Spannerförmige Spinner.

Der fußlose Hinterleib dieser Raupen läuft in eine einfache Spitze hinaus; der Rücken ist höckerig. Die Verwandlung geschieht in einem oder in zwey zusammen gesponnenen Blättern. Die Spinner sind jungelos, mit breiten, in der Ruhe abhängenden oder auch abschließenden, am Hinterrand meist sichelförmigen Flügeln. Sie gränzen an die Phalänen der Spannerraupen.

Herr Esper nennt sie Sichelhalter, Herr Borkhausen aber Sichelspinner; und der Stadtrath Laspeyres in Berlin hat diese Familie als eine besondere Gattung: *Platypteryx*, in den Beschäftigungen der naturforschenden Freunde abgehandelt. Ihre Hinterflügel sind zugrunde.

Die weniger schädlichen.

78. Der Mayenspinner. *Phalaena Bombyx Sicula*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bandirter Sichelhalter, bandirter Sichelspinner, gelber Rasch (beym Gladbach).

Phalaena Bombyx Sicula, Wiener Wz. 64. n. 1.

Borkhausen III. 59. 12.

Phalaena Cultraria, Fab. Ent. III. 2. 133. n. 17.

Phalaena Bombyx Sicula, Esper III. t. 74. f. 4—7. mit Raupe.

Kleemanns Beiträge tab. 21. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind bachig, die vordern sichelförmig und gelb mit einer fuchsrothen breiten Binde. Das Männchen ist kleiner und hat gefederte Fühlhörner.

Raupe. Hellbraun, mit einfacher Schwanzspitze; der Rücken hat über dem 3. Ring einen fleischigen Höcker und weiter hinunter einen rosenrothen Fleck.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der männliche Spinner mißt 1 Zoll 4 Linien, und jeder Vorderflügel 7½ Linien, und der weibliche ist um ein wenig größer. Die sichelförmigen Vorderflügel sind, wie der Kopf, Vorder- und Hinterleib, hellocker gelb mit röthlich gemischt, und haben eine bald ockerbraune, bald sattelfarbig, hellgesäumte, gegen den Vorderrand breite, gegen den Innerrand schmale Mittelbinde, die sich auch durch die gelben Hinterflügel durchzieht. Gegen den Hinterrand läuft noch eine gleichfarbige Linie durch alle Flügel. In der Kleemann- und Esper'schen Abbildung befindet sich kein schwarzer Punkt an den Binden. Das kleinere Männchen hat gefederte Fühlhörner.

Die hellbraune, zehn Linien lange, im Junius und im October ausgewachsene Raupe mit einfacher Schwanzspitze hat über den Rücken einen rosenrothen Streif, der zuweilen dunk.

dunkler ist und auf dem 3. Ring eine warzige Erhöhung. Sie richtet gerne Brust und Schwanz in die Höhe. Zur Verwandlung verfertigt sie sich ein röthlichbraunes Gespinnst auf einem zusammengerollten Blatt, worin die von der ersten Brut herkommende, blau bestäubte, mit vier Haken am Ende versehene Puppe von lichtbrauner Farbe bis zur Entwicklung im Sommer 14 Tage, die von der zweyten aber, wegen ihrer Ueberwinterung, 5 Monate ruht.

Aufenthalt. Der Spinner erscheint nach Brahm jährlich zweymal, nämlich theils im April oder May, theils im Julius an Eichen und Buchen, wo seine Raupe sich nährt, die Esper auch auf Weiden und Schlehen fand.

79. Der Birkenbuschspinner. *Phalaena Bombyx Harpagula*, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Brauner, gelbfleckiger Sichelspinner.

Phalaena Harparia,

Phalaena Bombyx Harpagula, Borkh. III. 53. n. 9.

Fab. Supplem. S. 449.

Esper III. t. 73. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig, die vordern sehr stark gefleckt und ockergelb; sie haben in der Mitte einen größern dunkelbraunen, aus drey zusammengefügten, fast runden Flecken, und gegen den Hinterrand eine mondförmig gezogene Binde von schwarzen, winklichten Flecken, die beym Männchen mit Stahlblau ausgefüllt sind. Die gelbbraunen Fühlhörner sind beym Männchen gefiedert, beym Weibchen fadenförmig.

Raupe. An Gestalt der vorhergehenden ähnlich, nur vornen her nicht sehr zugespitzt. Sie ist noch nicht abgebildet.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser ockergelbe Spinner, der 1 Zoll und 4 Linien Flügelbreite hat, und durch eine tief eindringende Krümmung sichelförmig ausgeschweift ist, zeichnet sich als ein schöner Schmetterling durch die mit stahlblauen Flecken besetzte, mondförmig gezogene Randbinde aus. Auf den drey Flecken, die zusammen einen großen runden dunkelbraunen bilden, stehen eckige hellgelbe Tüpfelchen. Zu der übrigen Zeichnung gehören die vielen geraden und kappenförmigen Streifen und Flecken von bräunlicher Farbe. Die Hinterflügel und die ganze Unterseite sind einfarbig. Kopf, Vorder- und Hinterleib sind ockerbraun. Die gefiederten Fühlhörner machen das Männchen kennbar. Bey dem etwas größern Weibchen fehlt entweder das Stahlblaue ganz oder zum Theil. Anstatt desselben sind zwey Zackenlinien sichtbar. Die Hinterflügel haben dunkle Wischlinien.

Die Raupe, welche Herr Jung auf Birken entdeckt hat, ist noch nicht beschrieben und abgebildet, soll aber der vorhergehenden ähnlich seyn. *) Zur Verwandlung webt sie

*) Fabricius beschreibt sie a. a. O. nach Clairville Angabe, als ziegelfarben, mit etwas ge-

spitztem Kopf, zwey Dornen auf dem Vorderücken und einer Schwanzspitze versehen.

sie sich zwischen Blättern ein, um eine dunkelbraune längliche Puppe zu werden, die sich schon in 14 Tagen entwickelt.

Aufenthalt. In der Schweiz und Deutschland, besonders in Franken, auf dem Birkenbaum, dessen Blätter der Raupe Nahrung sind.

80. Der Weißbirkenspinner. *Phalaena Bombyx Falcula*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eichelflügel, Eichelfalter, schwarzstreifiger Eichelspinner, Eichelmesser, Eichelnachtfalter, Kufuk, S. Vogel (bey Gladbach, wegen des wie ein lateinisches S ausgeschweiften Flügelrandes).

<i>Phalaena Bombyx Falcula</i> ,	Wiener Verz. 64. 2.
<i>Phalaena Falcataria</i> ,	Fab. Ent. III. 2. 133. 16.
<i>Phal. Geom.</i> —	Lin. 859. 202. Müller 705. 202.
— —	Gleditsch I. 443. II. 227.
— <i>Bombyx Falcula</i> ,	Wockhauf. III. 54. 10.
— —	Esper III. t. 73. f. 3 — 6. mit Raupe. Im Text steht tab. 72. unricht.

Naturforscher IX. tab. 1. f. 6. Männchen, von D. Kühn.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind hellockergelb mit vielen deutlichen Wellenlinien quer durchzogen; auf den vordern zeigt sich von der Flügelspitze bis nach der Mitte des Innenrandes ein rothfarbiger Schleyer, über welchem ein schwarzer zirkelförmiger Flecken, und darüber bald ein, bald zwey Punkte stehen. Die dunklern Flügelhörner sind bey dem etwas kleinern Männchen kammförmig, beym größern Weibchen fadenförmig.

Raupe. Spindelförmig (das ist, vornen und hinten schmaler, als in der Mitte) und hellgrün, mit einem hellbraunen, durch dunkelrothe Striche und Einschnitte verschönerten Rückenstreif, drey Paar Rücken-Dörnchen und einer scharfen Endspitze statt der Hinterfüße.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner misst 1 Zoll und 4 Linien, und seine hellockergelben Flügel sind mit vielen deutlichen Wellenlinien durchzogen. Auf den vordern zieht sich vor der Flügelspitze bis nach der Mitte des Innenrandes ein rothfarbiger Schleyer, über welchem ein schwarzer zirkelförmiger Fleck und darüber bald ein, bald zwey Punkte stehen. Obiger schwarzer Rundfleck, den Linne' einen Punct nennt, ist von feinen Linien durchkreuzt. Die Hinterflügel haben einen schwarzen Mittelpunct. Die ein wenig blässere Unterseite führt in bleicherer Anlage die nämlichen Wellenlinien und Zeichnung der Oberseite. Der Kopf, Vorder- und Hinterleib sind mit den Flügeln gleichfarbig.

Beim Weibchen, das größer ist, fällt die Grundfarbe etwas ins Weißliche, und Linne' hat unrecht, wenn er demselben den schwarzen Rundfleck abspricht.

Die auf dem 2., 3. und 5. Ring gebornete Raupe ist spindelförmig und hellgrün, mit einem hellbraunen, durch dunkelrothe Striche und Einschnitte verschönerten Rückenstreif und einer scharfen Endspitze statt der Hinterfüße. Ferner hat sie auf dem 4. Ring zwey run-

de Knöpfe, und trägt die vordersten und hintersten Glieder oberwärts gekrümmt. Sie verwandelt sich zwischen zusammen verwebten Blättern in eine geschweibige, glänzend braune, und dabey etwas höckerige Puppe, welche im Sommer eine Puppenruhe von 10 bis 14 Tagen (nach Esper und Vorkhausen) und bey spätern Deuten durch den Winter eine Ruhe von 7 Monaten hält.

Aufenthalt. Der Spinner zeigt sich im April und im September auf Birken. Auf denselben und auf Eichen, Weiden, Espen und Erlen nährt sich auch theils im May, theils im Julius und August die Raupe, so daß nach Brahm's Meinung eine doppelte Generation statt finden kann; wäre aber dieses nicht, so sind die überwinterten Puppen als Spärlinge zu betrachten.

81. Der Hangeletchensspinner. *Phalaena Bombyx Flexula*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Doppelt geschweifter Sechsspinner, Doppelt geschweiffter Sechsfalter, Spinnerphaläne mit zweyfachen Krümmungen.

<i>Phalaena Bombyx Flexula</i> ,	Wiener Bz. 64. 3.
<i>Phalaena Sinuata</i> ,	Fab. Species Inf. II. 254. 69.
— <i>Flexula</i> ,	Fab. Ent. III. 2. 166. 132. Weibchen.
<i>Phalaena Bombyx</i> —	Vorkhaus. III. 61. 13.
— — —	Esper III. t. 84. f. 4.
— — —	Hübners Beyträge I. t. 4. f. 1. Z.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die röthlichgrauen Vorderflügel sind hinten zweymal ausgeschweift und sichelförmig mit 2 gelblichweißen Linien, die in der Mitte 2 schwarzbraune Puncte schief gegen einander stehen haben. Die Fühlhörner des Männchens sind gefedert, die des hellgefärbten Weibchens fadenförmig.

Raupe. Grün, mit tiefen Einschnitten; jeder Ring ist mit 2 Spigen und der 2. und 3. mit zwey Höckerspigen versehen, mit rothem Kopf und dergleichen Füßen, aber ohne Schwanzfüße.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner mißt gewöhnlich 1 Zoll und 1 Linie, und führt am Hinterrand aller Flügel eine Reihe schwarzer Puncte. Die überall braunbestäubten, mit dem Kopf, Vorder- und Hinterleib gleichfärbigen, röthlich grauen Vorderflügel haben am Hinterrande zwey busenförmige Einschnitte, und sind durch 2 Querlinien in drey Felder getheilt, wovon das dritte durch eine geschlängelte Linie durchzogen ist; daselbst ist die vordere Ausschweifung in der Nähe der sichelförmigen Flügelspitze sehr schön roth gefärbt, und im zweyten Feld stehen 2 schwarzbraune Puncte. Die Hinterflügel, durch welche die erste Querlinie der vordern sich fortsetzt, sind mit denselben beynähe einfarbig, und mit einem schwarzen Mittelpuncte bezeichnet. Die Unterseite ist durchaus röthlich bestäubt, führt auch eine solche Reihe Puncte am Hinterrande; die vordern haben ein braunes U, und die hintern einen schwarzen Mittelpunct. Die federsförmigen Fühlhörner machen das Männchen kennbar.

Die Raupe ist grün mit tiefen Einschnitten; jeder Ring ist mit 2 Spigen, und der 2. und 3. mit 2 Höckerspigen versehen; mit rothem Kopf und dergleichen Füßen, aber ohne

ohne Schwanzfüße. Sie lebt im Junius sowohl als im September zu gleicher Zeit mit den vorhergehenden, mit welchen sie einerley Naturgeschichte hat. Zwischen zwey Blättern verwandelt sie sich in eine längliche Puppe, deren Ruhe entweder 2 bis 3 Wochen, oder (vielleicht wegen einer zweyfachen jährlichen Generation) 6 Monate dauert.

Aufenthalt. Der Spinner lebt im April oder Anfang des Mays, dann auch im Julius auf Eichen, wovon sich auch dessen Raupe nährt.

82. Der Eckerbuchenspinner. *Phalaena Bombyx Hamula*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sichelspinner mit 2 Puncten, Sichelhalter mit 2 Puncten, Englischer Sichelspanner, Sperber, Hufnagels *Smarta*, Eckerbuchenspinner.

Phalaena Bombyx Hamula, Wiener B. 64. 4.

Phalaena Falcata, Fab. Ent. III. 2. 165. 131.

Phalaena Bombyx Hamula, Vorkhausen 57. 12.

— — — Rau Fortw. 303.

— — — Esper III. t. 74. f. 1—6. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Vorderflügel sind sichelförmig und rothgelb gemischt, am Männchen mit 2, am Weibchen mit drey hellgelben winklichten Querlinien und dazwischen 2 mattschwarzen Puncten bezeichnet. Die Fühlhörner sind am Männchen kammförmig und am Weibchen fadenförmig.

Raupe. Schlank, zart und röthlichbraun, mit einem hochgelben Rückenstreif von ungleicher Breite, zwey höckerigen Spigen auf dem 3. Ring und einer einfachen Endspitze, statt der Schwanzfüße.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser artige Spinner von ockergelbem Vorder- und Hinterleib und Vorderflügeln, dessen Männchen 1 Zoll, das Weibchen aber 2 Linien mehr mißt, zeigt am Männchen 2, am Weibchen 3 hellgelbe winklichte Querlinien, in deren Mitte 2 mattschwarze Puncte stehn. Er hat noch am sichelförmigen Hinterrand eine verblichene, wenig merkliche Querlinie und ein dunkles, stahlblaues, mondförmiges Strichelchen an der Flügelspitze. Die Hinterflügel, die bisweilen eine Querlinie tragen, sind nebst dem Kopf und der ganzen Unterseite der Flügel von höherem Gelb. Die Fühlhörner sind am Männchen kammförmig, am Weibchen fadenförmig. Eine Geringfingische Varietät ist dunkelbraun mit schwarzen Linien, wenn solche nicht eigene Art ist.

Die nach Vorkhausen sowohl im Junius, als besonders im Herbst sich häufig in manchen Gegenden vorfindende Raupe ist beynahe durchscheinend, und richtet beym Gehen den Vorder- und Hintertheil des Körpers in einer Krümmung in die Höhe. Sie ist schlank, zart und röthlichbraun. Ihr gelber Rückenstreif bildet wegen seiner ungleichen Breite beynahe drey schiefe Vierecke. Zwey höckerige Spigen bezeichnen den dritten Ring und eine einfache Endspitze vertritt die Stelle der Schwanzfüße. Zum Einspinnen bedient sie sich im Junius und October der Blätter ihrer Futterpflanze, darin sie sich in einem netzförmigen Cocon in eine schlanke, hinterwärts dünner werdende, glänzendbraune Puppe ver-

wandelt, deren hohle Flügelcheiden sehr dünne sind. Die Puppenruhe dauert bey der ersten Brut 14 Tage, bey der zweyten 5 Monate.

Aufenthalt. Der jährlich zweymal erscheinende Spinner findet sich in Deutschland, England u. im März, desgleichen im Julius, an Eichen und Buchen. Die Raupe nährt sich auf Eichen, Buchen, Weiden, Espen und Birken, wo sie sowohl im Junius, als im October ihre Verwandlung antritt.

Anmerkungen. 1. Dasi Fabricius von diesem Eckernbuchenspinner sowohl, als von dem vorhergehenden nur das Weibchen kenne, ist offenbar, weil er nur der borstenförmigen Fühldörner gedenkt.

2. Aus Versehen hatten die Wiener Entomologen die P. B. Tau und die gegenwärtige gleichnamig von der Rothbuche benannt. Sch.

83. Der Hangelbirkenspinner. *Phalaena Lacertula*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sichelspinner mit gezähnten Flügeln, Sichelhalter mit gezähnten Flügeln, Zahnmotte, Eidechsmesser, Eidechschwarz, Eidechsnachtfalter.

<i>Phalaena Bombyx Lacertula</i>	Wiener Verz.	64. 5.
<i>Phal. Geometra Lacertinaria</i>	Lin.	860. 204. Müller 706. 204.
<i>Phalaena</i>	Fab. Ent.	III. 2. 135. 20.
—	Gleditsch I.	518. und II. 55.
<i>Phal. Bomb. Lacertula</i>	Vorkhausen III.	51. 8.
—	Brahm II.	181. 90.
—	Nau Forstwiss.	303.
—	Esper III.	tab. 72. f. 3. 4.
Schäfferi Icones tab. 66. fig. 2. 3.		

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind bald hellockerbraun, bald ockergelb und schwarzbestäubt, kappenförmig ausgeschnitten, mit sichelförmiger Spitze und 2 dunkelbraunen Querlinien, zwischen welchen ein Punct steht; die Hinterflügel sind weißlich, und die ockerbraunen Fühldörner bey dem Männchen gefedert, bey dem Weibchen fadenförmig.

Raupe. Von brauner Farbe, cylindrisch gebaut, höckerig und knotig mit scharfen Spitzen am 2. und 3. Ring; übrigens mit einer scharfen Schwanzspitze versehen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner, dessen Vorderflügel, Kopf, nebst Vorder- und Hinterleib hellockerbraun ist, misst 1 Zoll 7 Linien, und der kappenförmig ausgeschnittene und schwärzlich gesäumte, sichelförmig gespitzte Hinterand ist weißbordirt. Die vordere der vorhandenen braunen Querlinien ist gerade und die hintere ausgeschweift. Vor derselben steht ein Punct, und zwischen derselben und dem Hinterrand läuft noch eine weiße verwickelte Querbinde. Die weißlichen Hinterflügel sind etwas weniger ausgeschweift. Auf der weißlichen und bestäubten Unterseite haben die Vorderflügel den Anfang einer Querlinie und einen Punct, die hintern einen braunen Punct und dahinter eine geschlängelte braune Linie. Im Freyen gefangene Stücke sind immer schmutziggelb. Die ockerbraunen gefederten Fühldörner machen

chen das Männchen und die fadenförmigen das Weibchen kennbar. Es gibt auch dunklere Varietäten, wo der Raum zwischen den 2 Quercinlien schwärzlich schattirt und die Hinterflügel röthlichbraun angeflogen sind.

Das Weibchen ist kleiner, hellfarbiger, aber sehr wenig bestäubt.

Die braune, zuweilen in den Seiten oder auch überall mit Grün angelaufene Raupe mit ihrem in die Höhe gerichteten Schwanz ist cylindrisch gebaut, höckerig und knotig mit scharfen Spizen am 2. und 3. Ring, und war schon dem Degeer bekannt. Sie gleicht weder der Kaumürschen Raupe, noch einer Eidechse, von der sie den Namen hat, sondern eher einem aufgeblühten Samentäschchen (amentum) der Birke an Gestalt und Farbe, und ist zu Ende des Junius und im Julius ausgewachsen. Ihr dünnes Verwandlungsgewebe wird zwischen Blättern angelegt, darin die schlanke, weißbekleidete und weißbestäubte Puppe 10 bis 14 Tage ruht. Spätlinge überwintern im Puppenstand.

Aufenthalt. Der Spinner zeigt sich im April in Deutschland und Schweden auf Birken, worauf auch seine Raupe im Julius und August lebt, und von welcher auch Linne' Eichenlaub als Nahrungspflanze angibt. Wahrscheinlich sind 2 Generationen vorhanden, wovon die erste schon im Junius zur Verwandlung reif ist. Vielleicht sind also die für Spätlinge gehaltenen Puppen, welche durchwintern, von der zweyten Generation.

Anmerkung. In der Mantisse vermengt Fabricius unsern Spinner mit der Phal. Geom. Ero-laria Viennens., die doch eine wahre Spannerphaläne ist; ferner wird von ihm noch in seinen neuern Schriften, und von andern Naturforschern die Abbildung: Sulzer's Geschichte tab. 22. fig. 10. noch immer hieher gezogen, welche doch eigentlich die Quercinaria ist, ob sie gleich Sulzer Lacertinaria Lin. nennt. Sch.

84. Der Schlehdornspinner. Phalaena Bombyx Spinula, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hirschgeweißspinnerphaläne.

Phalaena Bombyx Spinula	Wiener Bz. 64. 6.
Bombyx Compressa	Fab. Ent. III. 1. 455. 149.
Phal. Bombyx Spinula	Borkhauf. III. 62. 14. und S. 463.
—	Esper III. t. 83. f. 5. 6. mit Raupe: im Texte Compressa.
Phal. Geometra Modesta	Naturf. XIV. t. 3. f. 4.
Bombyx Compressa	Panz. Fn. 1. tab. 6.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind bald weiß, bald graubläulich, die vordern ungescheckt, mit einem bis zum Innenrand graubraunen Fleck, in dessen Mitte sich eine einem Hirschgeweiß ähnliche weiße Figur befindet. Die Fühlhörner des Männchens sind gefiedert, am Weibchen aber fadenförmig.

Raupe. Braun, mit tiefen Einschnitten. Sie hat auf dem 2. und 3. Ring vier, und auf dem elften zwey Dornen, und anstatt der Schwanzfüße eine Endspitze.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügelbreite dieses einem Spinner so ähnlichen Spinners misst bey'm Männchen 10, bey'm Weibchen 11 Linien, und bey jedem Vorderflügel 5. Er weicht im Flügelschnitt von seinen andern Familienverwandten sehr ab, indem seine Flügelspitze keine Biegung hat. Die Farbe der Vorderflügel ist bald weiß, bald graubräunlich. Ein hirschgeweihsähnlicher Charakter steht in einem wie mit Del getränkten Felde. Am Hinterrand befindet sich eine braune Punctenreihe, und die Hinterflügel sind bisweilen schwarz beschattet, so wie auch die Unterseite.

Die Raupe ist braun, mit tiefen Einschnitten, hat auf dem 2. und 3. Ring vier, und auf dem elften zwey Dornen, und anstatt der Schwanzfüße eine Endspitze, und ist im Herbst zu finden.

Aufenthalt. Der Spinner besucht im Junius und Julius die Dornhecken, und seine Raupe lebt im Herbst auf dem Schwarzdorn.

Anmerkung. Fabricius nennt sie wegen der Lage ihrer Flügel: die breitgedrückte, Compressa, und die Wiener Entomologen wegen der Gestalt der dornichten Raupe: Spinula. Sie darf aber nicht mit einer andern Phal. B. Spinula des Espers, die eine wahre Noctua ist, vermischt werden. Sch.

Neunzehnte Familie.

Schneckenraupen. Wicklerförmige Spinner.

Diese Raupen sind länglich halbrund erhoben, wie die kleinen nackten Gartenschnecken; sie halten und bewegen sich mittelst zweyer unten an den Seiten nach der Länge des Leibes laufenden Blasen, mit deren klebrigen Feuchtigkeit sie auch den Weg, den sie machen, bezeichnen. Die Verwandlung geschieht in einer eyrunden harten Hülse. Die Spinner sind zungenlos, haben einen wolligen Rücken, abhangende, dem Umrisse nach Flügel wie Wickler.

Anmerkung. Die Brustfüße sind zu klein, und die Bauchfüße mangeln gar; daher sie fußlos scheinen. Diese Familie verdiente wohl eine eigene Gattung der Schmetterlinge zu bilden, etwa unter dem Namen Heterogenea oder Limacia (Schneckenlinge), weil sie zu den Fabriciusschen Schmalflüglern (Hepialii) nicht recht passen will. Sch.

Weniger schädliche.

85. Der Zwergschneckenspinner. *Phalaena Bombyx Testudo*, Vien.

Namen; Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schildmotte, Erdschneckenraupe, Zwergnachtsfalter, gelbes Kellerschnecken (bey'm Gladbach).

<i>Phalaena Bombyx Testudo</i>	Wiener Verh. 65. 1.
Bombyx	Fab. Mantissa II. 121. 216. Weibchen.
— Sulphurea	Fab. Species II. 189. 86. Weibchen.
— Bulfo	Fab. Mant. II. 121. 128. Männchen.

Hepia-

Hepialus	Bufo	Fab. Ent. III. 2. 7. 10. Männchen.
	Testudo	Fab. Ent. III. 2. 7. n. 8.
Phal. Bomb.	—	Vortheusen II. 447. 172.
—	Limacodes	Gleditsch Forstw. I. 475.
—	—	Nau Forstw. 302.
—	Testudo	Brahm II. 71. 30.
—	Limacodes	Egner III. 26. f. 3—9. mit Raupe.

Kleemann tab. 33. Weibchen, mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner, das Männchen: Klein, die Vorderflügel nebst dem ganzen Körper sind rothgelb, mit 2 schwärzlichen Schrägslinien im schwärzlichen Mittelfeld; zwischen welchen 2 gelbliche verloschene Flecken zu sehen; die Hinterflügel sind etwas schwärzlich. Die Fühlhörner sind nicht gekämmt, sondern borstenförmig und dicker als am Weibchen.

Weibchen. Etwas größer: der ganze Körper und die Vorderflügel sind einfarbig hellocker gelb, mit zwey weißlichen, rothgelb gesäumten Schrägsstreifen, und einem braunen Strichelchen dazwischen; die hintern sind mehrentheils gleichfarbig, selten bräunlich, oder aschgrau. Die Fühlhörner sind fadenförmig und dünn.

Raupe. In der Gestalt einer Gartenschnecke, oder einer andern Schildbraupe, länglich und gewölbt, hellgrün, unbehaart, unter der Vergrößerung mit glänzenden Knöpfchen chagrinirt; mit 2 weißlichen, rothgelb gesäumten Längslinien und einem gelben Seitenrand. Sie hat, statt der Bauch- und Schwanzfüße, unten 2 längliche Blasen, um sich fortzuhelfen und festzuhalten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser nicht so gar seltene Spinner trägt seine Flügel dachförmig. Das Männchen, welches Fabricius so wenig, als das Weibchen genug kennt, und jenes daher für eigene Art, als II. Bufo auführt, mißt gewöhnlich eils Linten in der Flügelausbreitung. Seine Vorderflügel sind nebst dem ganzen Körper rothgelb mit 2 schwärzlichen Schrägslinien im schwärzlichen Mittelfeld, zwischen welchen 2 gelbliche verloschene Flecken zu sehn; die Hinterflügel sind etwas schwärzlich und die Fühlhörner borstenförmig, und dicker als am Weibchen, wo sie fadenförmig sind. Auf der Unterseite haben die Vorderflügel einen schwarzen Schatten und die hintern eine rothbraune Farbe. Das Weibchen, von Fabricius Sulphurea und Testudo genannt, woben er aber Kleemanns genaue und vollständige Abbildung anzuführen unterlassen hat, mißt 1 Zoll und 2 Linten. Sein ganzer Körper und die Vorderflügel sind einfarbig hellocker gelb, mit zwey weißlichen, rothgelb gesäumten Schrägsstreifen und einem braunen Strichelchen dazwischen; die hintern sind mehrentheils gleichfarbig, selten bräunlich oder aschgrau. Die Unterseite der Vorderflügel ist bald mit der obern gleichfarbig, bald schwärzlicher beschattet, die der Hinterflügel aber einfarbig gelb.

Die sonderbare Schildbraupe derselben ist im September oder October ausgewachsen, hat etwas Ähnliches mit den Raupen der zweyten Horde der Tagfalter, oder auch einer Gartenschnecke, ist länglich rund und gewölbt, hellgrün, unbehaart, unter der Lupe mit glänzenden Knöpfchen chagrinirt; mit zwey weißlichen, gelbgesäumten Längslinien und einem gelben Seitenrand. Sie hat statt der Bauch- und Schwanzfüße unten zwey

Bläs.

Bläschen, um sich fortzuhelfen und festzuhalten. Ihren Kopf versteckt sie gern, und spinnt sich auf den Blättern des Baums selbst in ein eyrundes Tönnchen ein, deren inneres Gespinnst weiß, das äußere braun ist. Die innere Wand eines solchen Tönnchens ist sehr fein, seidenartig, glatt und glänzend, worin aber die Raupe mehrere Monate, oft noch durch den Winter bis in den März unverpuppt liegt. In ihrem Puppenstande selbst, wo sie wie eine Käferpuppe aussieht und eine gelbliche, weiche Schale hat, bringt sie nur 4 Wochen zu.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Der Spinner findet sich im May und Anfang des Junius auf Buchen und Eichen, wovon man ihn zuweilen abschütteln kann, und wovon sich die Raupe vom Julius bis zum September oder October nährt.

Das Weibchen legt seine ovalen Eyer an die Blätter, woraus sich zu Ende des Junius die kleinen Raupen entwickeln.

Feinde. Diese sind mehrere Ichneumonswespen und auch ganz kleine Milben.

86. Der Pappelbuschspinner. *Phalaena Bombyx Afella*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Alberbuschspinner, rothes Kreuz.

Phalaena Bombyx Afella, Wiener Verz. 65. 2.

Bombyx — Fab. Mant. II. 121.

Hepialus Afellus — Fab. Ent. III. 2. S. 7. n. 9.

Phal. Bomb. Afella — Borkhausen III. 450. 174.

Phal. Heterogenea Cruciatæ, Knöch Beyträge III. tab. 3. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Spinner. Die Flügel sind dachig und einfarbig schwarzbraun; der Saum des Hinterleibes ist burbaumfarbig; das Weibchen ist dickleibiger und größer, als das Männchen.

Raupe. Eyförmig, mit erhobenem Rücken, grünlich, chagriniert; die Oberfläche hat ein blutrothes Kreuz und eine Reihe von eingedrückten gelben Rückenflecken; die Stelle der Bauchfüße vertreten zwey klebrichte Blasen. Sie variiert auch gelb.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Der Spinner ist halb so klein, als der vorhergehende, dabei etwas glänzend und ungefleckt. Die dachigen Flügel sind einfarbig schwarzbraun; der Saum des Hinterrandes ist burbaumfarbig. Das Männchen ist kleiner und schwächer als das Weibchen. Das ganze Insect hat mit den Flügeln Eine Farbe, welche bey letzteren, zuweilen in schwächerer, zuweilen in stärkerer Mischung ist. Die Fühlhörner sind wie bey der nächstvorhergehenden Art an beyden Geschlechtern fadenförmig, die Augen schwarz und die Schienbeine gelblich. Man sieht ihn im Ruhestand den Hinterleib in die Höhe richten.

Die der vorigen ähnliche, kleinköpfige Raupe ist eyförmig, mit erhobenem Rücken, grünlich, chagriniert. Die Oberfläche hat ein blutrothes Kreuz, und an einem jeden Einschnitt der Ringe einen in das rothe Kreuz eingedrückten gelben Fleck, woraus sich eine Fleckenreihe bildet, neben welcher zu beyden Seiten eine aus kleinern Flecken bestehende Linie hinzieht,

hinzieht, deren Flecken auf den Ringen selbst stehen. Auch hat der zweite Ring noch besonders zwei große gelbe Dreiecksflecken mit Epfen. Die Stellen der Bauchfüße zweifelhafte Blasen. Wenn Fressen ist der Kopf vom ersten Ring völlig bedeckt. Auch diese zieht sich zuletzt ein Blatt zusammen, um darin in einem Tönnchen, das länglichrund und wie die Testudo mit einem Deckel versehen ist, den ganzen Winter unverpuppt zu liegen, bis sie endlich darauf im May oder Junius, und zwar 2 bis 3 Wochen vor ihrer Entwicklung zur Phaläne erst eine Puppe und zwar eine unvollständige Puppe geworden ist, in deren gelblichen, weichen, besondern Scheiden alle Theile des künftigen Schmetterlings verwahrt liegen.

Aufenthalt. Der Spinner wird in Deutschland an den Nestern der Eichen, Buchen und Schwarzpappeln im Junius und Julius wahrgenommen und von da herabgeschüttelt. Auf eben denselben lebt vom August bis zum October die Raupe und zwar gewöhnlich auf der Unterseite des Blatts, von welchem sie nicht eher weicht, als bis es ganz ausgezehrt ist. Er darf nicht mit der Ph. B. Afella, Esp. vermengt werden.

Zweite Horde der Phalänen. Die Eulen. *Phalaenae Noctuae* Lin.

Die Raupen dieser Horde haben 16 oder 12, und Eine auch 14 Füße, sind größtentheils nackt, und verwandeln sich gemeinlich unter der Erde. Der Schmetterling hat borstenförmige Fühlhörner, meistens feine, ziemlich gespornte Füße, auf den Vorderflügeln 2 Narben (Stigma), nämlich eine ring- und eine niereenförmige, dann eine längere Spiralzunge. So bestimmen die Wiener Entomologen ihre Eulen; und da sie und Herr Vorkhausen nicht mit Linne' und Esper die ungekämmten Fühlhörner des Männchens als Hauptkennzeichen dieser Horde annehmen, um die natürlichen Familien nicht zu sehr zu trennen, so rechnen sie die linnéischen Spinner: *Gothica*, *Lota* und *Oo*, und die Esperschen Spinner: *Munda*, *Rubricosa* (*Miniosa* Vien.), wozu auch die *Pulverulenta* gekommen, mit allem Recht zu den Eulen. Fabricius hat die zusammengedrückten und haarigen Fühlspitzen mit einer unbehaarten Spitze zum Charakter der Eulen gemacht, allein auch dadurch sind nicht alle Schwierigkeiten gehoben. Wenn man also zu den oben gegebenen Kennzeichen der Eulen nach dem Wiener System noch hinzusetzt: daß bei einigen die Männchen gekämmte Fühlhörner, aber doch zugleich einen borstenförmigen (nicht fadenförmigen) Stiel haben, daß die Rückenschuppen mit oder ohne Kamm glatt anliegen; daß der Hinterleib an der Wurzel am dicksten ist, und nach dem Alter zu allmählig abnimmt: so hat man ohngefähr alles beisammen, was den Habitus oder das äußere Ansehen einer Eule ausmacht.

Wir alauben, Raupen und Phalänen dieser Horde in 20 Familien abtheilen zu müssen. Die Raupen der ersten Familie sind vierzehnfüßig, die von der zweiten bis neunzehnten sechzehnfüßig, und die der letzten Familie zwölffüßig. Es sind dieselben: Astergabel-, Scheinspinner-, Spindel-, Eichen-, dünnhaarige, Rinden-, Wellenstrich-, Schmalstrich-, Kiesel-, Specken-, Seitenstrich-, Breitstrich-, Schrägestrich-, Vielstrich-, Halschild-, Bleichkopf-, Nerd-, Vogenstrich-, Franzen- und Schlangentraupen.

Erste Familie.

Die Raupe hat vierzehn Füße. Aftergabelraupe. Halbgekämmt. Eule.

Dieser Raupe mangeln die zwey Schwanzfüße. Der Leib ist geschmeidig und geht in 2 Spitzen aus, die den Schneckenhörnchen gleichen. Die Verwandlung geschieht ohne Gewebe unter der Erde. Die Eule hat abhängende Flügel, einen rauhen Rücken, die Fühlhörner zur Hälfte gekämmt.

Weniger schädliche.

87. Die Rüsterneule. *Phalaena Noctua Ulmi*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Ulmennachtsfalter, Ulmensinner.

Phalaena Noctua Ulmi Wiener Verz. 66.

Phal. Bomb. Cassinia Esp. III. t. 49. f. 5. Sie ist von der *P. B. Cassinia* Vieue. verschieden.

Kennzeichen der Art. Eule. Schmalflügelig. Die Vorderflügel sind aschgrau mit schwarzen Aern, weißen Puncten auf den Sehnen und einem bis zwey Mittelflecken. Die Fühlhörner des Männchens sind bis zur Hälfte stark gefiedert, und am größern Weibchen ungefiedert.

Raupe. Grün, geschmeidig, mit 2 schneckenhörnigen Spitzen statt der Nachschieber.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese schmalflügelige Eule, die allenfalls mit Eiper und Vorkhausen zu den Spinnern geordnet werden kann, ist von mittlerer Größe, und hat aschgraue Vorderflügel mit schwarzen Aern, weißen Puncten auf den Sehnen und einem bis zwey Mittelflecken. Der Vorder- und Hinterrand der Vorderflügel ist schwarz punctirt und die Hinterflügel weißlich mit schwärzlichen Sehnen und bräunlichschattirtem Hinterrand. Die Unterseite ist weißlich; Kopf und Vorderleib sind aschgrau, der Hinterleib nebst der Fühlhörnern bräunlich; letztere sind am Männchen bis zur Hälfte stark gefiedert.

Die grüne, geschmeidige Raupe hat einen braunen Kopf, bleiche Rückenlinien und zwey schneckenhörnige Spitzen statt der Nachschieber. Sie spinnt sich nicht ein, sondern verwandelt sich in der Erde in eine rotzbraune, hinterwärts schmale Puppe.

Aufenthalt. Bey Wien und im Oesterreichischen, auf Ulmen oder Rüstern (*Ulmus campestris* Lin.), die der Raupe zur Nahrung dienen.

Anmerkung. Des Fabricius *B. Ulmi*, Entom. III. 1. 456. 153. und dessen *B. Strigula*, Mantissa II. 125. ist blos *Noct. Linariae* desselben und des Eipers; hingegen ist die bey Ulmi F. beschriebene Raupe zu unserem Spinner wirklich gehörig, laut der Recension über Eipers Spinner, in den mehr berühmten Ergänzungsblättern zur Jenaischen A. L. Zeitung S. 451. Sch.

Zweyte Familie.

Scheinspinnerraupen. Düstre Eulen.

Diese Raupen sind haarig, dem Ansehen nach immer den Spinnern gleich. Die Verwandlung geschieht über der Erde in einem dichten Gewebe. Die Eulen haben meistens aschfarbige oder trübgraue, ein wenig abhängende Flügel mit einer kleinen Ringnarbe und sehr borstenförmige Fühlhörner.

Erste Linie. Die Raupen haben einen Auswuchs auf dem Rücken.

Minder schädliche.

88. Die Apricoseneule. *Phalaena Noctua Tridens*, Wien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eule mit dem Psi, kleiner Pfeilvogel, Pfeilnachtsfalter.

<i>Phalaena Noctua Tridens</i>	Wiener Verz. 67. n. 1.
Noctua	— Fabr. Ent. III. 2. 105. n. 314.
Phal. Noct.	— Borthausen IV. 244. 107.
—	— Esper IV. t. 115. f. 5 — 8. mit Raupe.
Röfels Ins. I. 2. Classe. Nachtvög. t. 8. mit Raupe.	

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Kammrücken; die Flügel sind dachig; die vorderen bald hell, bald düster, bald röthlichaschgrau, mit 3 Wellenstreifen, und mehreren dreyzahnigen Gabeln bezeichnet; die hintern sind bald weißlich, bald grau.

Raupe. Schwarzgrundirt, mit schwarzen langen, sehr dünnstehenden Haaren, zwey schmalen gelben Rückenlinien, einem kurzen Zapfen auf dem vierten Ring, der auf jeder Seite einen weißen Punct neben sich hat. Jeder Ring, vom vierten an gerechnet hat einen weißen Punct, dann einen weißen und zwey rothe Flecken. Der After hat eine schwarz und roth eingefasste, weiße Erhöhung nebst 2 schwarzen Rundflecken.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Größe dieser von *Tridens* des Gleditsch und Hufnagels verschiedenen Eule beträgt 1 Zell, 7 Linien, und sie führt auf den bald hell, bald düster, bald röthlichaschgrauen Vorderflügeln einen schwarzen Längstreif, der von der Wurzel kommt, und drey schwarze Wellenstreifen, nämlich einen abgekürzten, mehrentheils sehr undeutlichen an der Wurzel, einen zweyten ebenfalls undeutlichen, der, da er den Längstreich aufnimmt, mit ihm eine dreyzahnige Gabel bildet; einen dritten, der kappenförmig ausgeschweift mit einigen Zähnen in den Innenrand läuft, und der an 2 Orten ohngefähr ein Griechisch Psi (Ψ) bildet. Die beyden hellgrauen Narben, eine eysförmige und eine mondformige, zwischen den beyden Wellenstreifen berühren sich mit ihrer schwarzen Einfassung, wodurch die Züge eines Griechischen Chi (Χ) entstehen. Der Vorder- und Hinterrand sind beyde schwarz punctirt, und die Franzen grau und schwarz wechselnd. Die am Hinterrand ebenfalls punctirten und buntgefranzten Hinterflügel sind mehr oder weniger weiß, zuweilen aschgrau, mit schattigem Hinterrand, mit oder ohne gefärbte Adern. Die ganze Unterfläche

terfläche richtet sich in der Grundfarbe nach der obern, und zwar haben alle Flügel daselbst einen schwarzen Mittelpunct und hinter demselben nur zuweilen einen Querstreif. Alles Uebrige am ganzen Insect hat die Farbe der Vorderflügel, der Vorderleib aber dabey einen schwarzen Seitenstreif und die Füße geringelte Fußblätter.

Die einen Zoll und sieben Linien lange, theils im Junius, theils im August bis zum späten Herbst vorhandene Raupe ist schwarzgrundirt, mit schwarzen, langen, sehr dünn stehenden Haaren, zwey schmalen gelben Rückenlinien, einem kurzen Zapfen auf dem vierten Ringe, der auf jeder Seite einen weißen Punct neben sich hat. Jeder Ring, vom vierten an, hat einen weißen Punct, dann einen weißen und 2 rothe Flecken. Der After hat eine schwarz und roth eingefaßte, weiße Erhöhung nebst 2 schwarzen Rundflecken. Sie ist am Kopfe mit Halshaaren bedeckt, und richtet bey Gefahren den Vorderleib in die Höhe, verbirgt den glänzenden, bald schwarzen, bald braunen Kopf, und läßt den Rückenapfen, wie ein Horn gerade vorstehen, um sich zur Wehr zu setzen. Kurz vor ihrer Verwandlung blaßt der Schmuck ihrer Farben sehr ab, und nach vielem unruhigen Hin- und Herkriechen spinnt sie sich am Stamm oder Ast des Baums, worin sie zuvor eine Höhlung macht, sehr fest mit abgenagten und verkitteten Spänchen ein, um darin eine geschmeidige, braune Puppe mit borstenhaarer Spitze zu werden, deren Entwicklung entweder nach einer sieben- oder achtmonatlichen Ruhe im May oder Junius, oder nach einer drey- bis vierwöchentlichen Ruhe im August erfolgt.

Aufenthalt. Die Phaläne zeigt sich, wie gesagt, nach ihrer ersten Generation im May, nach der zweyten im August, und ihre Raupe theils im Junius und Julius, theils im September bis November auf Apricosen und allen Pflaumenarten, auf Weißdorn und Weiden.

89. Die Schleheneule. *Phalaena Noctua* Pfl., Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pfeileule, Pfeilvogel, Pfeilfleck, größere Eule mit dem Pfl., größerer Pfl. Vogel.

<i>Phalaena Noctua</i> Pfl.	Lin. 846. 135. Mäller 690. 135.
— — —	Wiener B. 67. 2.
<i>Noctua</i> —	Fab. Ent. III. 2. 105. n. 315.
<i>Phal. Noct.</i> —	Vorkhausen IV. 328. 106.
— — —	Gleditsch I. 449. II. 84. n. 253.
— — —	Esper's Eulen t. 115. f. 1—4. mit Raupe.
Abf. I. Nachtvogel 2. Cl. t. 7. mit Raupe.	

Kennzeichen der Art. Eule. Ganz wie die nächstvorhergehende, aber allemal etwas Weniges größer, mehrentheils trübgrauer. Die Vorderflügel sind um ein Geringes breiter.

Raupe. Der vorhergehenden nicht gleich; sie hat überall kurze, nicht dichtestehende, grauschwarze Haare, eine breite, schwefelgelbe Rückenlinie, auf dem vierten Gliede einen fleischernen Kegei, und am Hinterrande eine zugespitzte Erhöhung; der Seitenstreif ist

ist schwarz, mit schönen rothen Stricheln auf allen Gelenken, und unter demselben ist der Bauch weißlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule, deren Augen des Nachts wie glühende Kohlen funkeln, mißt von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll 9 Linien. Obgleich, im Vorbergehen gesagt, das Ansehn der größern Insecten, wo wir es angeben, wegen der Varietäten nicht immer so genau bis auf eine Linie sich gleich bleibt, so hat doch die gegenwärtige Art dieses zum einzigen Unterscheidungsmerkmal von der vorigen, daß sie um 1½ bis 2 Linien mehr Flügelbreite hat, mehrentheils trübgrauer ist, und dann vorzüglich, was den Raupenstand betrifft, daß die Raupe etwas anders gebildet und gezeichnet ist. Unsere hat überall kurze, nicht dichtstehende, schwarzgraue Haare, eine breite schwefelgelbe Rückenlinie, auf dem vierten Gliede einen fleischernen Kegei, und am After eine zugespitzte Erhöhung. Zwey gelbe Streife, die winkelförmig zusammenlaufen, bezeichnen den Kopf, über welchen rothbraune und graue Haare hängen. Gewisse rothe Gelenkstriche stehen in einfacher Zahl an den drey ersten Gelenken, doppelt an allen folgenden, und dreyfach am letzten. Unter dem schwarzen Seitenstreif ist der Bauch, wo die Luftröhren stehen, weiß. Alle Füße sind gelblichbraun und die Nachschieber schwarz. Ihre Lebensart und Vertheidigungsweise ist wie bey der vorhergehenden, so auch die Zeit und die Art ihrer Verpuppung. Die rostbraune Puppe ist stärker als die vorhergehende, hat eine kurze Endspitze, und bewegt sich bey Berührungen lebhaft. Die von der ersten Generation ruht 3 Wochen, die von der zweyten, welche überwintert, 7 bis 8 Monate.

Aufenthalt. Die Eule erscheint bey früher Frühlingswitterung schon im April, sonst aber erst im May und zu Anfang des Junius, dann wieder im August, an Mauern und Gartenthüren. Die Raupe lebt sowohl im Junius als im August bis zum November an allen Arten von Pflaumen, an Äpfeln, Birnen, Buchen, Weiden, Eichen, Linden, Pappeln, Erlen, Haynbuchen und Weißdorn.

Anmerkung. Fabricius hat aus Versehen bey seiner Noctua Ph. beyde Köpfsche Tafeln statt der siebenten nachgewiesen, da er doch bey Tridens die achte Tafel hätte nachweisen sollen. Sch.

Zweyte Linie. Die Haare der Raupe stehen auf Knöpfen.

Weniger schädliche.

90. Die Ampfereule. *Phalaena Noctua Rumicis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Saucerampfereule, Ampferrachsfalter, Mühlrädchen (beym Madbach).

<i>Phalaena Noctua Rumicis</i>	Lin. 852. 164.	Müller 697. 164.
—	—	Wiener B. 67. 3.
Noctua	—	Fab. Ent. III. 2. 118. 553.
Phal. Noct.	—	Vorkhausen IV. 247. n. 108.
—	—	Grahm II. 203. n. 105.

Phalaena

Zweyte Horde der Phalänen, die Eulen. Zweyte Familie.

Phalaena Noctua Rumicis Esper's Eule t. 117. nicht f. 7., sondern f. 8. 9.
 Raupe und Puppe; t. 117. A. f. 3. 4. Phaläne.
 Stöfel I. Nachtvögel. 2. Cl. t. 27. mit Raupe.

Kenzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamme und dachigen Flügeln; die vordern sind grau und schwarznebelig; im dritten Streifen steht am Innenrande ein weißer, oft doppelter Fleck, und hinter demselben eine weiße Linie; die Hinterflügel sind dunkelashgrau. Das Weibchen ist beleibter und größer als das Männchen.

Raupe. Braungelb behaart und schön; über dem Rücken hat sie eine Reihe rother Punkte, und an den Seiten eine Reihe von schiefen blendendweißen Fleckchen, und über den Füßen eine gelbe rothgefleckte Längslinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese einen Zoll und sieben Linien in der Flügelausbreitung messende, etwas glänzende Eulenphaläne hat auf dem schwarznebeligen grauen Grunde drey doppelte Querstreifen, wovon der erste an der Wurzel deutlich genug, der zweyte nach der Mitte hin nicht ganz wellenförmig, der dritte geschweift und gekappt ist. Dieser scheint aus lauter Halbmondchen zusammengesetzt, und nimmt gegen den Innenrand eins oder zwey hellweiße Fleckchen auf. Darauf folgt eine weiße Querlinie, und vor den grau- und schwarzgestrichelten Franzen noch eine schwarze Punctenteihe. Die vordere Narbe ist grau mit einem Zirkelringe und schwarzem Puncte, die hintere nieren- oder mondförmig und mit schwarz gedeckt. Der durch die auslaufenden Streifen gedeckte Vorderrand hat gegen die Flügelspitze noch vier gelbliche Punkte. Die dunkelashgrauen, kaum ins Ockergelbe fallenden, scheckig gefranzten Hinterflügel sind am Hinterande schwarz schattirt. Die ockergelbe Unterseite hat eine schwärzliche Mischung und zweyfarbige Franzen, und auf jedem Flügel, besonders auf jedem Hinterflügel, einen schwarzen Mittelpunct. Die Fühlförner sind geringelt; Kopf, Brust und Hinterleib ockergelb; Halstragen, Vorderleib und Füße sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig; letztere haben braun- und gelbgeringelte Fußblätter.

Die im Junius, so wie im August bis September überall gemelne, sich langsam bewegend, schöne, braungelb behaarte Raupe mit ihrem glänzend schwarzgrauen, ziemlich großem Kopfe, ungeslecktem Halse und braunen Füßen hat über den Rücken eine Reihe von rothen Punkten, an den Seiten eine Reihe von blendendweißen schrägen Fleckchen, und über den Füßen eine gelbe, rothgeflechte Längslinie, aber an ihrem ersten Gelenke nichts Rothes. Wenn sie sich ihrer Verpuppung nähert, spinn sie sich an Bäumen, Wänden, Steinen, oder auch Grasstengeln fest ein. Ihre vornen schwarzbraune und nach hinten rothbraune Puppe hat zwey Kopf- und eine kurze Schwanzspitze, und hat die Eigenschaft der lebhaften Bewegungen mit der vorübergehenden gemein. Die Puppenruhe dauert bey der einen Generation 10 Tage bis 4 Wochen, bey der andern gewöhnlich 5, und bey Ausnahmen von der Regel oft 8 bis 9, sogar 11 Monate.

Aufenthalte. Die Eule entwickelt sich nicht nur zu Ende des Aprils und im May, sondern auch nach hiesigen und andern Beobachtungen, obgleich Brahm daran zweifelte, zufolge einer zweyten Generation zu Ende des Julius und im August, an Baumstämmen, Mauern und Gartenthüren. Ihrer Raupe, die keine Kostverächterin ist, sind bey-

beynahe alle Laubbölzer, besonders Eichen und die Pappel-Arten, und eine Menge niedriger Pflanzen recht, z. B. Flohkraut, *Polygonum perfoliarium*, Froschpolen, Wassermünze, Majoran, Saturan, Kohl, Gänsefüßel, *Sonchus*, worauf man sie im Junius, und zum zweytenmal im August bis in den November antreffen kann.

Anmerkung. Besitzer des Euperschen Werks: Die Eulenphalänen, finden tab. 117. f. 7. eine aus Versen unter dem Namen P. N. Rumicis abgebildete Phaläne, welche eigentlich P. N. Megacephala darstellt, und die wahre N. Rumicis liefert eine später eingeschobene Tafel: 117. A. Sch.

91. Die Weideneule. *Phalaena Noctua Megacephala*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Dickkopf, größköpfige Eule.

<i>Phalaena Noctua Megacephala</i>	Wiener B.	67. 5.
Noctua	Fab. Ent.	III. 2. 108. 325.
Phal. Noct.	Vorkauf.	IV. 222. 105.
— —	Brahm II.	111. n. 51.
— —	Esper's Eulen t.	144. f. 1—4. mit Raupe, aber fehlerhaft. Kerner t. 117. f. 7.
— —	Scriba Beyträge t.	6. fig. 1—3. mit Raupe, von Brah.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamme und dachigen Flügeln; die vordern sind aschgrau, schwärzlich gewellt und mit Aromen bald außerordentlich, bald mäßig bestreut; im letztern Falle lassen sich die Ring- und die Halbmond-Narbe erkennen, die sie in der Mitte führt. Das Männchen hat einen schlanken Hinterleib.

Raupe. Behaart, lichtbraun und schwarzbestäubt; der Kopf ist breiter als der plattgedrückte Körper. Jeder Absatz vom ersten bis zehnten einschließlic hat 4 rosifarbene Rücken- und auf jeder Seite 2 lichtbraune, zusammen acht Warzen, der eilfte Absatz einen gelblichen Vierecksfleck mit vier gelblichen Rücken- und dergleichen Seiten-Warzen, der zwölfte aber acht lichtbraune Warzen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese dem Baron Degeer schon bekannte, in den Scribaischen Beyträgen aber mit ihrer Raupe am genauesten von Brah m beschriebene und gut abgebildete Eule mißt 1½ Zoll, und läßt sich mit Worten nicht gut beschreiben. Sie ist aschgrau, schwärzlich gewellt, und mit Aromen bald mehr, bald weniger bestreut, und hat mit der weiten hinten vorkommenden Koseastanieneule (*Aceris* L. n.) viel Aehnlichkeit. Das erste Paar Wellenlinien an der Wurzel ist nicht bey allen Stücken deutlich zu sehen. Das zweyte Paar steht über den beyden schwärzlich eingefassten und mit einem Striche zusammen verbundenen Narben, die man aber bey dunkeln Exemplaren so beschattet findet, daß man sie nicht gewahr wird. Hinter denselben ist in der Nähe des Hinterrandes ein dunkelgrauer, stumpfzahniger Streif, der gegen innen zu schwärzlich eingefasst ist, hinter welchem dicht am Saume eine Reihe schwärzlicher Puncte angeordnet ist. Die Hinterflügel sind weißlich glänzend mit braunen Nerven,

Nerven, zuweilen noch mit einem schattigen Hinterrande. Auf der weißlichen Unterseite sind die mit einem schwarzen Mittelfleck und Bogenstreif bezeichneten Vorderflügel am Vorder- und Hinterrande mit Atomen schwärzlich schattirt; die hintern aber mit einem starken braunen Mittelpuncte, woran eine Reihe kleiner schwarzer Puncte steht; eine zweyte Punctenreihe steht am Hinterrande, und fehlt zuweilen gänzlich. Die Stirn ist weiß; Fühls- spitzen, Kopf und Rückenschopf sind nebst dem Hinterleibe aschfarbig; letzterer hat am letzten Ringe braune Punctchen und einige weißliche Haarbüschel an den Seiten. Von den gedornen Füßen hat das erste Paar graue, und die übrigen weiße Schenkel, und die Fuß- blätter sind braunringelt.

Die oben berührte, behaarte, im September erwachsene Raupe, welche 1½ bis 1½ Zoll mißt, hat an den Seiten des Kopfs, der nach den frischen Häutungen beynah den dritten Theil vom übrigen Ganzen ausmacht, und wovon das Insect den Namen: *Megacephala* (Großkopf) erhalten, schwarze Flecken, und über der Stirn eine schwarze gabelte Linie. Dem unbewaffneten Auge scheint die Raupe gelb zu seyn mit schwarzen Puncten, aber unter der Vergrößerung ist es umgekehrt, da hat sie einen sammetschwarzen, mit dichten gelblichen Puncten besetzten Grund. Jeder Absatz, vom ersten bis zehnten einschließlic, hat vier reistfarbene Rückenwarzen, und auf jeder Seite zwey lichtbraune Warzen; der eilfte Absatz einen gelblichen Viereck mit vier gelblichen Rücken- und dergleichen Seitenwarzen, der zwölfte aber acht lichtbraune Warzen. Fabricius, der die Raupe nicht selbst gesehen, sondern nur Abbildungen davon, hielt diese Warzen für solche Flecken. Ihr Raupenstand, worin sie sich dreymal häutet, bey jeder Häutung sich in Blätter überpinnt, und nach der dritten Häutung nach der oben gegebenen Beschreibung gezeichnet ist, dauert nur 7 Wochen. In der Ruhe hat sie die krumme Lage eines Römischen Augurstabes. Sie verwandelt sich unten an Baumstämmen in der Erde, oder unter der kluftigen Rinde in einem weißgrauen, mit Holzspänchen gemischten Gewebe in eine geschmeidige, länglich glänzende, braune Puppe mit Vorstenspitzen am After, ruht gewöhnlich 8 Monate und überwintert.

Aufenthalt. Die Eule, wovon Brahm späterhin, laut seines Insecten-Calendaris, wirklich 2 Generationen beobachtet hat, findet sich zu Anfang des Mays oder im Junius, dann wider zu Ende des Julius an Weiden und Pappelbäumen, und ihre Raupe weidet das erstemal im Junius und Julius, und wenn sie im August aus dem Ey gekrochen ist, das zweytemal im September und October, am liebsten auf der Weiß- und Schwarzapfel, dergleichen auf der Italiänischen und Balsampappel, nach den Wiener Entomologen auch auf Weiden. Man kann dieser doppelten Generation nicht geradezu widersprechen. Ich selbst habe die Phaläne nur einmal erzeugt, und da sie bey mir vom 1. September 1792 bis zum 28. Julius 1793, also 11 Monate im Puppenstande zugebracht hat; so kann dies gar wohl eine Abweichung von der Regel seyn, dergleichen Abweichungen bey der künstlichen Fütterung mehrerer Insecten sogar von Einer Brut sich finden. In jenem Falle soll also die Puppenruhe der Sommergeneration nur 2 bis 3 Wochen dauern.

92. Die Augentrostseule. *Phalaena Noctua Euphrasiae*, Borkhauf.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleine Mondeule, klein Eichenbärchen (beym Gladbach), Wolfsmilchseule.

Phalaena Noctua Euphrasiae

Borkhausen 232. n. 104.

— — —

Brahm II. 143.

— — — *Lunulata minor*

Goetze entomologische Beyträge III. 3. S. 103.

— — — *Euphorbiae*

Eivers Eulen t. 117. fig. 1—3. mit Raupe.

Rösel I. Nachvögel 2. Cl. t. 45. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Kammerücken und dachigen Flügelu; die vordern sind hellgrau, braunbestäubt, mit einer größern nierenförmigen und einer Ringnarbe zwischen den zwey großen der drey Wellenstreifen; die Hinterflügel sind weißlich oder graulich mit weißlichen Franzen. Das Weibchen ist beleibter als das Männchen.

Raupe. Dunkel sammetischwarz mit weißen und schwarzen Haaren an den Seiten; der Kopf ist glänzenschwarz mit einem weißlichen Dreneck; der zweyte Ring hat einen hochzinnoberröthen, herzförmig eingeschnittenen Fleck. Vom dritten Ringe an bis zum letzten zeigt sich auf jeder Seite eine Reihe von neun fleckblätterförmigen hellweißen Flecken, indem jeder Ring auf beyden Seiten 3 weiße Warzen hat, die ein weißes Kleeblatt bilden. Unten am Bauch ist eine rothe Seitenlinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule misst 1 Zoll 3 Linien, und hat auf den hellgrauen, braunbestäubten Vorderflügeln drey wellenförmige Querstreifen, davon jeder aus zwey Linien zu bestehen scheint, und am Hinterrande eine doppelte Punctreihe. Die beyden Narben (Stigma) stehen zwischen den beyden größern Wellenstreifen. Die Hinterflügel sind bald weißlich, bald aschgrau mit weißlichen Franzen, so auch die Unterseite, wo alle Flügel einen schwarzbraunen Mittelpunct und zuweilen einen Bogenstreif führen. Kopf und Rücken sind grau, letztere mit einer gelben Mischung, wodurch sie sich von der *Noct. Euphorbiae Esper*i unterscheidet. Der Hinterleib ist aschgrau nebst der Brust.

Die dunkelsammetischwarze Raupe hat weiße und schwarze Haare an den Seiten; der Kopf hat ein weißliches Dreneck, und ist nebst den Füssen glänzenschwarz; der zweyte Ring hat einen hochzinnoberröthen, herzförmig eingeschnittenen Fleck. Vom 3. Ringe an bis zum letzten zeigt sich auf jeder Seite eine Reihe von 9 fleckblätterförmigen, hellweißen Flecken, indem jeder Ring auf beyden Seiten 3 weiße Warzen hat, die ein weißes Kleeblatt bilden. Unten am Bauch ist eine rothe Seitenlinie. Sie kann sich ziemlich geschwind bewegen, und macht sich zur Verwandlung im November ein weißgrünes Gewebe zwischen Blättern, worin die schwarzbraune, glanzlose Puppe mit 2 kleinen Kopfspitzen und einer zersplitterten Endspitze bey Rösel vom August bis in den May des folgenden Jahres, bey Borkhausen vom September bis May ruhte.

Aufenthalt. Die Eule wird zu Ende des Aprils und im May in Wäldern auf lichten Plätzen, an einzelnen Bäumen und am Stamm, und ihre etwas seltene Raupe auf Heidelbeer, Sumpfsheidelbeer (*Vaccinium uliginosum* L.), rothen Pret-

Belbeer oder Hohlbeer (*Vaccinium vitis idaea* L.), Brombeer, Bocksheer, Augentroft und gemeiner Wolfsmilch angetroffen. Und ob sie gleich zuweilen durch eine Ausnahme auch auf die Birke und den Weißdorn sich verirrt hat, so fragt sich doch: ob sie in der Regel diese Nahrung liebt, und also ein eigentliches Forstinsect, oder ob sie den mehr nützlichen als schädlichen bezuzählen sey, wegen ihres Aufenthalts auf Brombeer und dergleichen?

Anmerkung. Mit allem Recht kann die hierher gehörende Bocksheereule, *Ph. Noctua Auricomma* Vienn., Bocksheernachtsfalter, Mondeule, erstes Eichenbärchen des Gladbach, so in den Wiener, Fabricius, Vorkhausen, Brahm- und Esperschen Schriften, desgleichen in Kösels I. 2. Cl. Nachtrög. t. 44. mit Raupe vorkommt, denen mehr nützlichen als schädlichen zugeordnet werden. Ihre dachigen, feingezähnten Vorderflügel sind lichtgrau, zuweilen auch dunkler, allesmal mit weißer, marmorartiger Mischung, und 3 Querstreifen, davon die ersten zwei aus doppelten Wellenlinien bestehen, und die dritte geschweift und kappenförmig ist; zwischen den beiden letzten stehen eine runde Ring- und eine Halbmondnarbe. Von der Wurzel der Flügel an zieht ein schwarzer Längsstreif herab, um den zweyten Querstreif zu durchschneiden und gleichsam ein Griechisches Psi zu bilden. Die Hinterflügel sind bald weißlich, bald aschgrau. Die Flügelausbreitung dieser der Apricosen- und der Schleheneule, *Ph* und *Tridens*, so ähnlichen *Phaläne* beträgt $1\frac{1}{2}$ Zoll. Ihre dicke, schwarze, mit rothgelben Warzenreihen auf jedem Ringe gezierte, gelbrothhaarige und gelbrothslüßige Raupe wohnt und weldet zuerst im Junius und zu Anfang des Julius, hernach abermals im September bis zu Anfang des Octobers auf den Blättern des Heidekrauts, der schwarzen und rothen Heidelbeeren, Bockss. (*Rubus caesius* L.) und Himbeeren, und liefert nach ihrem Einspinnen und nach einer Puppenruhe von 4 Wochen, zu Anfang des Augusts den Schmetterling der ersten, und nach einer achtmonatlichen Ruhe, im May des folgenden Jahres den Schmetterling der zweyten Generation, der sich an Gartenzäunen und Mauern sehen läßt. Vlos durch eine Ausnahme von der Regel will man die Raupe auch auf der Birke (*Betula alba*) angetroffen haben, welches aber ihre eigentliche und gewöhnliche Nahrung nicht ist.

93. Die Erlenbuscheule. *Phalaena Noctua Alni*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rudereule, Ruderfalter, Kolbenhorn (alles wegen der Raupe), Doppelfels, Erleneneule, Erlenachtsfalter.

<i>Phalaena Noctua Alni</i>	Lin. 845. 134. Müller 690. 134.
<i>Noctua</i>	— Fab. Ent. III. 2. 89. 266.
<i>Phal. Noct.</i>	— Vorkhaus. IV. 250. 109.
—	— Degeer I. t. 11. f. 25 — 28. mit Raupe.
—	— Espers Eulen t. 116. fig. 4. 5. u. t. 190. mit Raupe.
—	— Naturforscher XII. t. 1. fig. 14 — 16. nicht kenntlich.
—	— Naturforscher XIV. t. 4. f. 11.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Kammrücken, dachigen und schiefgefranzten Flügeln; die vordern sind am Vorderrande in zwey großen Feldern weißgrau, am Innenrande tiefschwarz gemischt. Die gewöhnlichen Narben sind mit Schwarz aus-

ausgefüllt und zuweilen nicht sichtbar; die Hinterflügel sind bald blendendweiß, bald weißlich, bald ohne, bald mit einem bleichschwarzen Mittelpuncte. Der dicke Hinterleib des Weibchens unterscheidet dasselbe vom Männchen.

Raupe. Sehr sonderbar; mattschwarz und cylindrisch; über den Rücken mit dreyzehn sehr schön gelben Querstreifen oder Schildchen geziert, in deren jedem vier gleichfarbige Knöpfe vorkommen, davon die zwey mittlsten an einander stoßen. Jeder der 4 Knöpfe des ersten Schildes führt ein langes, schwarzes, dünnes, an der Spitze kolbiges, wie ein Bühlhorn der Tagfalter aussehendes Haar. Solche Kolbenhaare stoßen vom 4. bis 10. Schild, auf jedem Schild zwey, auf dem 12. eben so viel. Nur das 2., 3., 11. und 13. Schildchen haben keine. Und alle übrigen noch vorhandenen gelben oder auch schwarzen Knöpfe haben ein kurzes Härchen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Dieser seltenen Eule, deren Flügelbreite 17 Linien, und jeder Vorderflügel $7\frac{1}{2}$ bis 8 Linien ausmacht, wollte ich den Namen: *Erleneule*, darum nicht belegen, weil er von den Wiener Entomologen der *Leporina*, die oben unter den Spinnern vorgekommen, bereits gegeben worden. Ich veränderte also den Namen in *Eulenbuscheule*.

Das oberste von den zwey weißgrauen Feldern fängt an der Wurzel an, und ist schmaler als das zweyte, welches scheibenförmig an der Flügelspitze sich verbreitet. An der Wurzel zieht sich eine kleine, abgebrochene Querlinie, nicht weit davon eine doppelte durch. Zwischen derselben und der dritten, nach außen geschweiften Linie, welche das zweyte Feld begrenzt, befinden sich die zwey Narben, wovon die ringsförmige noch im ersten, und die halbmondsförmige nicht ganz im zweyten Feld, sondern fast noch in dem schwarzen Raum liegt, der beyde Felder von einander trennt. Von der Wurzel bis zum Innenwinkel zieht durch die schwarze Fläche ein tiefschwarzer Längstreif. Bey meinem Exemplar ist nicht nur der Hinter-, sondern auch der Vorderand durch mehrere weiße Puncte und durch auslaufende schwarze Streifen gescheckt. Der Kopf und der an der Wurzel schwarzgefärbte Vorderleib sind gelblichgrau, der Hinterleib weiß mit drey verlorenen Puncten. Die Fußblätter sind geringelt. Man hat schwarzkupfarbene, nußbraune und schmutzbraune Varietäten; besonders sollen die nordischen Varietäten tiefer schwarz seyn.

Die im Stand der vierten Häutung oben beschriebene, sehr sonderbare Raupe mit ihrem schwarzglänzenden, herzförmigen, mit 2 dunkeln Knöpfchen bezeichneten Kopf, hat eine mattschwarze Haut, die ins Stahlblaue spielt. In Degeer's Schriften und in Züesly's Magazin II. t. 1. ist sie am genauesten beschrieben und abgebildet. Vor der vierten Häutung hat sie einen dunkelgrau gemischten Rückensreif, der durch eine bläulichweiße Linie getheilt wird, und nicht mehr als vier Kolbenhaare. Nach der vierten Häutung sind von den dreyzehn gelben Rückenschildchen neun derselben, jedes mit vier gelben Knöpfchen verschönert; jedes dieser Knöpfchen ist mit einem schwarzen Kolbenhaar besetzt, so daß das 2., 3., 11. und 13. keine dergleichen, sondern auf den Warzen nur kurze Härchen ohne Kolben führen. In ihrer Ruhe liegt sie stets gekrümmt, geht langsam und überspinnt jedesmal ihren Pfad. Ihre Verwandlungszelt ist nach Brahm zu Ende des Julius, nach Andern im September oder October, wo sie sich zwischen Blättern oder an

Stämmen mit eingewebten Holzspänen einspinnt. Die Puppe ist langgestreckt, und ruht zehn Monate.

Aufenthalt. Die Eule ist in Deutschland, auch in hiesiger Gegend, wiewohl äußerst selten, im May oder Junius vorhanden, und war den Wiener Entomologen nicht vorgekommen. Sie erscheint jährlich nur einmal, und ihre Raupe weidet vom Junius bis September auf Erlen, Weiden, Birken und Pappeln. Der meldete mir (Scharfenberg) einst Doctor Kühn, daß sie bey ihm keine Erlen annehmen wollen, sondern blos auf dem Rosenstrauch sich genährt habe.

Anmerkung. Fabricius vereinigt, sogar in seinen neuern Schriften, die Ph. Noct. Degener Vien. noch immer mit unserer Erlenbuscheule mit Unrecht. Und von der Linne'schen, von Fabricius beygehaltenen, Beschreibung muß man sagen, daß sie mangelhaft sey.

Dritte Linie. Die Raupen haben sehr lange Haare ohne Knöpfe.

94. Die Eberescheneule. *Phalaena Noctua Favillacea*, Esper.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bogelbeereule, aschgraue, gewellte Eule.

<i>Phalaena Noctua Favillacea</i>	Borkhauf. IV. 217. n. 100.
— — —	Esper t. 127. f. 4. zu groß.
— — —	Naturforsch. XXIV. t. 3. f. 5. 6. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamm und dachigen Flügeln; die vordern sind hellgrau, dabey gelblich gemischt, mit 3 Querstreifen, den gewöhnlichen Narben, und einer schwarzen geraden Längslinie, die unterbrochen ist; die hintern sind schmutziggelbgrau.

Raupe. Bläsigelbgrün, einzeln behaart, mit rothbraunem Kopf und einem gezahnten, breiten, gelbbraunen Rückenstreif, der mitten durch eine blässere, schmale Längslinie getheilt ist und schwarze Punkte führt; das vorletzte Glied ist etwas spizig erhöht.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß dieser Eule ist 1 Zoll und 3 Linien von einer Flügelspitze zur andern, und ihre hellgrauen, gelblich gemischten Vorderflügel haben 3 Querstreifen. Der erste an der Wurzel ist klein und unvollständig. Zwischen dem zweyten wellenförmigen und dem dritten Querstreif, der kappenförmig und dabey bogig ausgeschweift ist, stehen die gelblichen Narben (eine Ring- und eine Halbmondnarbe), wovon die letztere auf der hohlen Seite nicht genau begrenzt ist. Die von der Wurzel anfangende, gerade, schwarze Längslinie wird bey dem zweyten Querstreif unterbrochen, kömmt aber bald wieder zum Vorschein, um den dritten Querstreif zu durchschneiden. Der Vorderrand ist theils durch die auslaufenden Streifen schwarzgefleckt, theils nach der Flügelspitze hinwärts gelblich punctirt, und der Hinterrand wechselt mit schwarzen und grauen Franzen. Die meistens ungestreiften Hinterflügel sind gelblichgrau, wie die ganze mit bräunlichen Atomen besetzte Unterseite, wo jeder Flügel einen schwarzen Mittelpunkt und zuweilen einen durchgehenden oder einen abge-

abgebrochenen Vogenstreif führt. Der Kopf und Vorderleib sind dunkler, als die Flügel; der Hinterleib heller aschgrau, und die weißlichen Fußblätter grau geringelt.

Die blasgelbgrüne, einzeln behaarte Raupe mit rothbraunem Kopf und einem gezahnten, breiten, gelbbraunen Rückenstreif, der mitten durch eine blässere, schmale Längslinie getheilt ist, und schwarze Punkte führt, ist am vorletzten Glied etwas spitzig erhöht. Sie gehört unter die selteneren und erscheint im Herbst. Wenn sie sitzt, macht sie mit dem 3., 4. und 5. Ring einen Buckel. Nähert sie sich ihrer Verwandlung, so färbt sie sich gelb und darauß röthlich. Ihr Gespinnst ist weiß und mit abgenagten Blättern und Spinnchen besetzt, worin die braune, glatte und längliche Puppe vom October bis zur Mitte des Junius, acht Monate ruht.

Aufenthalt. Die Eule findet sich, aber sehr sparsam, bey uns im Junius an den Gartenhütten und Hecken; die Raupe aber auf Vogelbeerbäumen, die man auch Ebereschen nennt.

95. Die Roscastaneneule. *Phalaena Noctua Aceris*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbzotte, Eyring, Ahorneule, Ahornnachfalter, Widder, Castanienbär (nach Glabach), Gelbe Pudelraupe (nach Kühn).

<i>Phalaena Noctua Aceris</i> , Lin.	846. 137.	Müller 691. 137.
— — —	Bienert Verz. 67. n. 7.	
<i>Noctua</i> — —	Fab. Ent. III. 2. 107. n. 322.	
<i>Phalaena Noctua</i> — —	Gorthausen IV. 219. 106.	
— — —	Gleditsch I. 298.	
— — —	Espers Eulen t. 114. f. 4—7. mit Raupe.	

Rösel IV. t. 4. f. 5. Raupe.

Kleemanns Inf. Beytr. tab. 17. f. 1—5. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Kammrücken und dachigen Flügeln; die vordern sind greisgrau und schwarzbestäubt, haben schwarze Wellenlinien und zwischen den letzten die gewöhnlichen Narben, dann einen von der Wurzel ausgehenden ästigen Längsstrich; die hintern sind weiß, bald ohne, bald mit verblichenen Adern.

Das Weibchen ist größer, beleibter und düsterer, als das Männchen.

Raupe. Zottig und gelbgrundirt; auf jedem Ring steht ein weißer, schwarz eingefasster Kautenfleck, und vom dritten Ringe an, neben demselben ein Paar hohe, theils gelbe, theils rothe Seiten-Haarbüsten in pyramidenförmiger Gestalt. Der übrige Körper ist mit gelbweißlichen Haaren sehr dicht besetzt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Eule mißt 1 Zoll und 8 Linien, jeder Vorderflügel $9\frac{1}{2}$ Linien. Ihre Zeichnung hat viel Aehnliches mit der Weiden- und Bockskneule. Die Vorderflügel sind greisgrau, schwarzbestäubt und gewellt. Der Wellenstreifen sieht man bald drey, bald mehrere, wovon der letztere, welcher bogig und am deutlichsten zu sehen ist, hinter den beyden Narben steht. Von der Wurzel geht ein ästiger schwarzer Längsstrich aus. Der Hinterrand aller Flügel ist sanft gezahnt und schwarzgefleckt. Die Hinterflügel sind weiß, bald ohne, bald mit

mit verblichenen Adern. Auf der schwarz und weiß gefranzten Unterseite hat jeder Flügel einen verblichenen Mittelfleck, die vordern einen oder zwey schwärzliche, bald deutliche, bald undeutliche Bogenstreifen, die hintern einige Querreihen von Schnenstrichen. Die übrigen Theile des Körpers sind mit den Flügeln gleichfarbig und besprenkt; nur der Hinterleib ist weißgrau und hat schwarze Seitenstricheldchen. Das Weibchen ist düsterer und beleibter, als das Männchen.

Die gelbjöttige Raupe mit ihrem glänzenschwarzen Kopf, der ein gelbes Dreieck führt, hat auf jedem Ring einen weißen, schwarzeingesakten Rautenfleck und vom dritten Ring an, neben demselben ein Paar hohe, theils gelbe, theils rothe Seitenhaarbüschel in pyramidenförmiger Gestalt. Der übrige Körper ist mit gelblichweißen langen Haaren sehr dicht besetzt. Sie ist langsam, träge, liegt gern seitwärts gekrümmt, und spinnt sich von ihren untermengten Haaren und andern Materialien zu Anfang des Augusts oder später in ein Gespinnst ein, um sich in eine rothbraune Puppe zu verwandeln, worin sie, wenigstens bey der künstlichen Erziehung, 10 Monate ruht.

Aufenthalt. Die Eule erscheint in der ersten Hälfte des Junius, und die Raupe lebt im Sommer und Herbst auf der wilden und zahmen Castanie, auf verschiedenen Ahornarten, und bey uns auch auf Apfelbäumen.

Anmerkung. Hier folgt im Wiener Werk P. N. Leporina L., die wir aber oben mit den Spinnern vereinigt haben.

Dritte Familie.

Spindelraupen. Schabenartige Eulen.

Diese Raupen sind gleichfalls haarig, haben einen kleinen Kopf, und sind wegen der Abnahme gegen den Kopf und Hinterleib einigermaßen spindelförmig. Die Verwandlung geschieht in einem nicht dichten Gewebe an der Erde. Die Eulen haben dünne Leiber, sehr zarte Flügel; die vordern schmal, ohne Ring- und Nieren-Narben, um den Leib geschlagen, die Hinterflügel breit und in der Ruhe gefaltet; sehr feine Fühlförner, und kohl-schwarze hervorragende Augen.

Da solche keine rechte Eulen und keine rechten Spinner sind, so hat Fabricius eine eigene Schmetterlingsgattung daraus gemacht: Flachflügler, Lithosia.

A. Die mehr schädlichen.

95. Die Pflaumeneule. *Phalaena Noctua Quadra*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Großer Schabenspinner, Maronenspinner, Vierpunct, Viereck, viereckfleckiger Nachfalter, Strohhut, Stahlmotte, Würfel Flügel, Hangflügel, Würfelvogel.

Phalaena Noctua Quadra, Lin. 840. 114. Müller 686. 114. Weibchen.

— — Deplana in Linnei Mantissa.

— — *Quadra*, Wiener B., 68. n. 1.

Noctua

Noctua	Quadra,	Fab. Ent. III. 2. 25. n. 54.
Lithosia	—	Fab. Supplement. 459. n. 1.
Phal. Bomb.	—	Vorkhausen III. 239. n. 76.
— Noct.	—	Gleditsch I. 400. und 514. und II. 50.
— —	—	Mau Forskv. 312. S. 738.
— —	—	Däzel Forskv. I. 320. S. 363.
— —	—	Hennert vom Raupenstraß. tab. 3. f. 7 — 11. mit Raupe.
— —	—	Esper's Eulen t. 92. f. 2 — 6. mit Raupe.
Rösel I. Nachtrüg. 2. Classe. t. 17. Weibchen, mit Raupe.		
Schäfferi Element. 98. f. 5.		

Kennzeichen der Art. Männchen. Die Vorderflügel sind glatt, nieder-gebrückt, aschgrau, rothgrundirt, mit stahlblau angeflognem Vorderrand; die Hinterflügel sind gleichfalls am Vorderrand stahlblau gesäumt.

Weibchen. Größer; die Vorderflügel sind satt citrongelb und glänzend mit 2 stahlblauen Flecken, wovon das im Mittelfeld stehende viereckig ist.

Beiden sind die Fühlhörner stahlblau und ungefedert, die Vorderflügel sehr schmal, die sehr breiten Hinterflügel hellgelb.

Raupe. Gesellig, aschgrau und behaart mit drey schwarzen Rückenmakeln, einem schwarzen Längstreif in jeder Seite, und goldgelben Warzen auf allen Ringen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule, die man auch mit Vorkhausen zu den Spinnern, aber am besten mit Fabricius zu der neu errichteten Gattung seiner Flachflügler, Lithosia, ziehen kann, deren systematische sowohl, als äußere Kennzeichen oben bereits angegeben worden, hat der Flügelausbreitung nach ein Ausmaß von 2 Zoll, und jeder Vorderflügel allein eine Länge von $1\frac{1}{2}$ Linien. Beiden Geschlechtern sind die Flügel glatt und flach, die vordern sehr schmal, die hellgelben Hinterflügel sehr breit, die Franzen am Hinterrand der Vorderflügel, und die Fühlhörner nebst den Füßen stahlblau, Kopf, Rücken, Brust und Hinterleib aber ockergelb.

Beim Männchen haben die rothgrundirten, aschgrauen Vorderflügel am Vorderrand gegen den Rückenwinkel einen stahlblauen Anflug, und die hintern am Vorderrand einen stahlblauen Saum. Von demselben unterscheidet sich das Weibchen durch seine citrongelben und glänzenden Vorderflügel, welche zwey stahlblaue Flecken führen, wovon der im Mittelfeld befindliche viereckig ist.

Die Raupe hat einen schwarzen, kleinen, oben getheilten Kopf; der Leib läuft nach beiden Enden spitzig zu, und ist in so fern spindelförmig gestaltet; die Grundfarbe ist grau. Nach der Länge des Rückens ziehen sich 2 gelbe, schwarzgesäumte, wellenförmige Linien. In diesen Linien stehen auf jedem Absatz kleine und große gelbe, zuweilen hochrothgefärbte Warzen. Ueber dem dritten Paar Vorderfüße, dem zweyten Paar Bauchfüße und vor den Hinterfüßen stehen schwärzliche Flecken. Die zur Seite auf den Warzen stehenden Haare sind lang, die auf dem Rücken viel kürzer; die sechzehn Füße haben die Farbe des Leibes. Sie hat tiefere Einschnitte der Ringe, als andere, und vermöge einer besondern Schnellkraft kann sie, nach Rösel's Bemerkung, durch das Zusammenziehen der

Rin-

Ringe, von der Höhe in die Tiefe springen, wobei sie immer wieder auf die Füße zu stehen kommt. Im September ist sie noch klein, von Farbe gelblichgrün, und bringt die Fähigkeit zu spinnen schon mit auf die Welt. Sie verkriecht sich vor der zweyten Häutung im Winter in die Rissen der Borcken oder ins Moos, legt aber im Frühjahr, und zwar eigentlich mehr bey Nacht als bey Tag, ihren Fraß auf Bäumen fort, bis sie $1\frac{1}{2}$ Zoll lang und ausgewachsen ist, um sich im Junius in einem weitläufigen und zarten Gewebe in und an der Erde in eine glänzende, dunkelfarbige, nicht lebhaftige Puppe zu verwandeln, deren Ruhe nur 4 Wochen währt.

Aufenthalt. Die Eule besucht im Julius, ohngefähr in der Mitte des Monats, die Wälder und Gärten; ihre Raupe äßet im May und im erwachsenen Stande im Junius auf Eichen, Ulmen, Linden, Rosskastanien, Büchen, Zwetschen, Pflaumen und andern Obstbäumen, desgleichen auf Föhren.

Fortpflanzung. Der weibliche Schmetterling legt im Julius oder August seine Eyer, oft zu hunderten, an die Blätter solcher Holzarten, welche den nach 12 oder 14 Tagen austriechenden Raupen gleich zur Nahrung dienen mögen. Sie ist in manchen Jahren selten, zuweilen aber in ziemlicher Zahl, nie aber häufig vorhanden.

Schaden. Die Raupe, die in einigen Gegenden Deutschlands periodisch sehr häufig, und immer noch für das Laubholz gefährlicher, als für das Nadelholz gewesen, zumal man behaupten will, daß sie nicht sowohl die Nadeln selbst, als nur die Lichenen und Ingermannien darauf verzehren soll, gehört zu den gefälligen, und wird in Menge nicht gerne gesehen.

B. Die weniger schädlichen.

97. Die Tanneneule. *Phalaena Noctua unita*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbe Motteneule, safrangelber Schabenspinner, Tannenspinner, gelber Tannennachtfalter.

<i>Phalaena Noctua Unita</i> ,	Wiener W. 68. 2.
<i>Tinea Lutarella</i> , Variet.	Fab. Ent. III. 2. 292. 23.
<i>Lithosia Luteae</i> , Var.	Fab. Supplem. 461. 12.
<i>Phalaena Bombyx unita</i> ,	Borkhausen IV. 246. 80.
— Noct. —	Drahm II. 399. 279.
—	Espers Eulen t. 93. f. 6. 7.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit zusammengerollten zeichnungslosen Flügeln; die vordern sind sehr schmal, oben safrangelb, unten schwärzlich angeflogen, die hintern breit und auf jeder Seite einfarbig gelb. Das Weibchen übertrifft das Männchen an Stärke des Hinterleibes.

Raupe. Schwarz und mit citrongelben Flecken überaus schön bezeichnet; desgleichen mit büschelweis stehenden Haaren besetzt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügel sind zusammengerollt, und haben keine Zeichnung; die vordern sind sehr schmal, oben

eben safranelf, auf der Unterseite schwärzlich angeflogen, die Hintern breit, und auf jeder Seite einfarbig gelb. Auch findet man, daß die Augen schwarz, die dunkelachsfarbigem Fühlhörner zwar umgürtet, doch aber beym Männchen stärker sind; daß der Kopf, Vorderleib und Endseife des mäufefahnen Hinterleibes safranfarbig sind, daß die Brust gelb ist, und die schwärzlichen Füße einen gelblichen Anflug haben. Alle diese Merkmale machen sie vor allen ihren Familiengenossen kenntlich.

Von der Raupe ist bisher keine Abbildung geliefert worden. Sie ist schwarz und mit citrongelben Flecken schön bezeichnet; desgleichen mit büschelweis stehenden Haaren besetzt.

Aufenthalt. Da sich diese Eule in den Nadelwäldungen hier und da, nach Herrn Brahm im May, nach Herrn Vorkhausen im Julius findet, wo sie sich im Gras zu verbergen pflegt; so kann man auf 2 Generationen schließen, davon die im May fliegenden 8 Monate in der Puppe zugebracht haben. Ihre Raupe lebt auf den Nadeln der Kothannen und Föhren.

Anmerkung. Es ist ein kleiner Fehler, daß sie Fabricius für eine Varietät seiner *Lithosia lutea* ansieht, die es doch nicht ist. Daher kommt der Verstoß, daß er der letzten, die bey den Wienern Steinscheneule, Noct. luteola heißt, Nadelbäume zur Futterpflanze anweist, da doch solche von Fichten lebt.

98. Die Pappelbaumeule. *Phalaena Noctua Complana*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Flachflügel, gelbe Schabeneule, gelber Schabenspinner, Randmotte.

Phalaena Noctua Complana Lin. 840. 115. Müller 686. 115.

— — — Wiener Verz. 68. 4.

Noctua — — Fab. Ent. III. 2. 24. 53.

Lithosia — — Fab. Supplem. 460. n. 3.

Phalaena Bombyx — Vorkhaus. III. 243. 78.

— Noct. — Gleditsch I. S. 514. n. 15.

— — — Schwarz Beiträge t. 2. fig. 10 — 14. Männchen und die Raupe.

— — — Esper's Eulen t. 92. f. 7. 8. und tab. 185. f. 9. Raupe.

— — — Hübner's Beiträge 3. tab. 1. fig. F.

Schäfferi Icon. t. 266. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Männchen. Mit glattem Rücken, niedergebogenen, bleifahlen, am Vorder- und Hinterrand bleichgelben Vorderflügeln und ganz hellgelben Hinterflügeln.

Weibchen. Mit glattem Rücken, niedergebogenen, ganz lichtgrauen Flügeln, davon die vordern ebenfalls am Vorder- und Hinterrand gelbgefärbt sind.

Raupe. Schwarz, mit büschelweis stehenden kurzen Haaren, mit zwey aus gelben, rothen und weißen Punkten zusammengesetzten Linien über die acht mittlern Ringe und einer gelbrothlichen schmalen Seitenlinie mit kleinen Härchen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule mißt 1 Zoll $2\frac{1}{2}$ Linien in der Flügelbreite, und hat den Flügelbau der Pflaumen-

Art

men-

menuele. Der Rücken des Männchens ist ungekämmt; die Vorderflügel sind bleifahl, am Vorder- und Hinterrand bleichgelb, die Hinterflügel ganz hellgelb. Das Weibchen hat lichtgraue, an beyden Rändern gelbgesäumte Flügel. Beym Männchen ist der Kopf, Brust und Hüfte gelb, die Augen schwarz, die ungekämmtm Fühlhörner, Rücken und Hinterleib stahlblau, letztere dabey an der Spitze gelb. Am Weibchen ist dies alles lichtgrau.

Die Raupe mit ihrem glänzenden Kopf, braunem Bauch und blassen Füßen, ist schwarz mit büschelweis stehenden kurzen Haaren, und hat zwey aus gelben, rothen und weißen Punkten zusammengefestete Linien über die acht mittleren Ringe, und eine gelbrothliche schmale Seitenlinie mit kleinen Härchen. Sie spinnt sich im Junius in einem leichten bräunlichen Gewebe in eine Puppe ein, deren Ruhe 25 bis 27 Tage dauert. Beym Untermangel verzehren die größern Raupen die kleinern.

Aufenthalt. Die Eule findet sich im Julius auf Eichen und Buchen, wo sie durchs Abschlagen herunter gebracht wird. Ihre Raupe weidet im Junius an Eichen, Pappelbäumen, Buchen und Geißblatt (*Lonicera caprifolium*), wozu auch, nach Espers Zeugniß, Schlehen, Föhren und Haseln gesetzt werden können.

Anmerkung. In Fabricius Schriften wird das lichtgraue Weibchen für Varietät, und die Eichen nen der Eichen für das Raupenfutter ausgegeben.

V i e r t e F a m i l i e .

Schützenraupen. Lichtmückenförmige Eulen.

Diese Raupen sind ebenfalls noch mit feinen Haaren dicht besetzt. Der kurze Leib läuft von der breiten Mitte gegen den kleinern Kopf und den schmalen Hinterleib fast spitzig zusammen. Die Verwandlung geschieht an einem Nestchen in einer von abgeschälter Rinde künstlich zusammen gezogenen Hölse. Die Eulen haben abhängende, zarte, grauschedige Flügel und mit den Zünflern viel Aehnlichkeit.

Sie sind weniger schädlich.

99. Die Birneule. *Phalaena Noctua Palliola*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sperbermotte, Sperbermottenspinner, Vogelbeerspinner, Vogelbeerbaummotte,

<i>Phalaena Noctua Palliola</i>	Wiener B. 69. r.
— <i>Tinea Cucullatella</i>	Lin. 889. 370. Müller 742. 370.
<i>Tinea</i> —	Fab. Ent. III. 2. 305. n. 80.
— —	Gleditsch I. S. 131. und 159.
<i>Phal. Bombyx Cucullata</i>	Borthausen III. 474. n. 92. 93.
— <i>Cucullatella</i>	Esper III. t. 77. f. 4—9. mit Raupe.
— <i>Pyralis Palliolalis</i>	Hübners Zünftler. t. 16.
Rössel I. Nachw. 4. Classe. t. 11. mit Raupe.	

Kennzeichen der Art. Eule. Die Vorderflügel sind hellaschgrau, an der Wurzel bis zum schwarzen Quere- oder Bogenstreif matschwarzbraun, von da an weiß.

weißgrau bis zum Hinterrand mit trüber Mischung und 2 oder 3 braunen, mit Weiß begrenzten Wellenlinien.

Die Fühlhörner des Männchens sind ordentlich gekämmt, die des Weibchens aber nicht.

Raupe. Sie ist einer Schildraupe ähnlich, spindelförmig, braun, überall fein behaart, mit einer weißen durch 6 Flecken ziehenden Rückenlinie. Es fehlt ihr das erste Paar Bauchfüße.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese fast alle Horden durchwanderte Phaläne, die doch wohl ihre rechte Stelle, des Habitats wegen, wie uns deucht, unter den Spinnern hat, mißt 9 Linien, jeder Vorderflügel 4 Linien. Und obzwarachtet solche eben so wenig, wie die nächstfolgende, in den Nachrichten an Herrn Grafen von Hofmannsegge nach Esper bestimmt und angezogen ist, vermuthlich aus Versehen, oder auch aus andern Ursachen: so wird sie doch von dem Augsburger Hübner für die Palliola Vien. angegeben. Die Vorderflügel sind hellaschgrau, an der Wurzel bis zum schwarzen Querstreif mattschwarzbraun, von da an weißgrau bis zum Hinterrand mit trüber Mischung und 2 oder 3 braunen Wellenlinien, welche weiß begrenzt sind. Der kleine Bogenstreif ohnweit der Wurzel ist stark, unter den übrigen subtilen Wellenlinien zeichnet sich zuweilen eine in der Mitte durch ihre Schwärze merklicher von den übrigen aus. Da Kösel nur Weibchen, und Borkhausen nur Männchen vor sich hatte, so gibt ersterer die grauen Fühlhörner bey beyden Geschlechtern als haarförmig, der zweyte als gefiedert an. Allein bey mehrmaliger Erziehung findet man die am Männchen deutlich gefiedert, und die weiblichen fadenförmig. Die Hinterflügel sind weißlich und haben auf der grauen Unterseite eine schwarze Mittelmafel.

Die im May und Anfang des Junius erwachsene träge Raupe führt 6 weiße Schildflecken, die auch zuweilen wie Lilien aussehen, über den Rücken, ist spindelförmig, braun und fein behaart. Ihr zapfen- oder kegelförmiges, weißgraues Gewebe, worin die stumpfe Puppe bald 14 Tage, bald länger, bey uns 4 Wochen ruhte, ähnelt einer Fischerreufe; daher sie linne' aus Versehen den Sackträgermotten bengejährt hat.

Aufenthalt. Die Phaläne findet sich bey uns, und ihre Raupe weidet auf Schlehen, Weißdorn, Vogelbeer., Apfel. und Birnblättern im May, und nach Gleditsch auch auf Hartriegel (*Cornus lanuginea*).

100. Die Eicheneule. *Phalaena Noctua Strigula*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Grau und dunkelgemischte, weißgezeichnete Eule, kleiner gesprengelter Spinner.

Phalaena Noct. Strigula Wiener M. 69. 2.

— — — Borkhaus. IV. 181. 78.

— Bomb. — Esper tab. 89. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Eule. Die Flügel sind länglich und zugerundet, weißlich; die vordern haben auf der Oberseite einige gebogene Linien, mit sehr kleinen Puncten und Zi-

turen, und sind unten schwarzbraun; die Hintern sind ungefleckt. Die Fühlhörner sind am Männchen braun und stark gefiedert, am Weibchen weiß und fadenförmig.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Die Vorderflügel dieser $9\frac{1}{2}$ Linien messenden Eule sind von unreinem Weiß, das mit vielen schwärzlichen Atomen bestreut ist, welche Atomen sich hin und wieder stärker anhäufen, und als kurze Streife und subtile Characters ausnehmen. Man kann drey Wellenlinien annehmen, eine an der Wurzel, die weiß beschattet ist, dann eine doppelte, worauf die bleichen Narben folgen, die im Esser vergessen sind; endlich eine geschweifete, auf der Innenseite schwarze, auf der Außenseite weiße Querslinie. Von den beyden Narben laufen zwei sehr bleiche Linien herab, die sich sehr schwingen, und in einem spitzigen Winkel an die hintere Wellenlinie anschließen. Die Franzen sind bräunlich und schwarz punctirt. Die Unterseite ist bräunlich mit größern Flecken, und einem dergleichen Saum besetzt. Die Hinterflügel sind von außen aschgrau, und haben einen schwärzlichen Streif am äußern Rand, auf der Unterseite aber einen Mittelpunct. Kopf und Rücken sind graubraun und der schwarz eingeschnittene Hinterleib grau. Das Weibchen hat fadenförmige Fühlhörner und eine verworrenere Zeichnung, gegen den Vorderrand einen braunen Fleck, dahinter ein weißes Querstrielchen steht. Die Hinterflügel sind dunkler als am Männchen mit einem schwarzen Mittelmond.

Eine Espersche Varietät a. a. O. fig. 2. hat eine winklichte Binde, auf den Vorderflügeln; und weiße einfarbige Hinterflügel.

Aufenthalt. Die Eule lebt in Eichenwäldern im Herbst und Frühling bey Erlangen und bey Wien häufig, woher sie auch Gerning unter dem Namen Strigula erhalten hatte. Ihre auf Eichen lebende Raupe ist unbekannt und unbeschrieben; die Wiener nur kannten sie.

Anmerkung. Sie muß mit der in den Species insectorum Fab. vorkommenden Bombyx Strigula (Umi in der Entomol. Fab.) nicht vermengt werden.

Fünfte Familie.

Dünnpaarraupen. Scheckige Eulen.

Die Raupen haben nur wenige, doch fast lange Haare. Die Verwandlung geschieht in einem dichten Gewebe an der Erde. Die Eulen haben einen höckerigen Rücken, abhangende grünliche oder silbergraue Flügel, mit verschiedenen schwarzen Linien oder Strichelchen und weißen Flecken.

Weniger schädliche.

101. Die Rheinweiden, (Liguster) Eule. *Phalaena Noctua Ligastri*,
Wien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hartriegeleule, Degeersche Aprilphaläne, falsche Aprilphaläne, kleiner Todtenkopf (nach Gladbach).

Phalaena

Phalaena Noctua Ligustri	Wiener Verz. 70. n. 1.
Noct.	Fab. Ent. III. 2. 102. n. 303.
Phal. Noct.	— Vorkhausen IV. 125. 51.
— —	— Graham II. 263. 156.
— —	— Esper IV. tab. 119. f. 1 — 4. mit Raupe.

Kleemanns Beiträge t. 22. wo die Raupe, deren Abbildung von D. Glabach mitgetheilt war. nicht gut getroffen ist: sie darf kein gelbes Halsband haben.

Degeers Abhandl. Gd 3te Uebers. I. t. 5. f. 19 — 24. Raupe.

Kenntzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und dachigen Flügeln; die vordern sind schwarzbraun, zuweilen ins Violette ziehend, allemal schwarzgefleckt und gepunktet, mit den gewöhnlichen Narben, wovon die runde einen Punct hat, und die nierenförmige verblichene, mit ihrer hohlen Seite an ein schimmelfarbiges beynahe rundes Feld gränzt.

Raupe. Hellgrün, einzeln, aber langbehaart und fast walzenförmig mit drey gelben Längslinien.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Eule hat von einer Flügelstange bis zur andern 1 Zoll und 7 Linien, jeder Vorderflügel acht. Ihre schwarzbraune Farbe zieht zuweilen ins Violette. Die Ringnarbe ist deutlich und hat einen Punct. Die an ein schimmelfarbenes fast rundes Feld gränzende Nierennarbe ist sehr verblichen, die verschiedenen Querlinien sind wellenförmig und wegen der dunkeln Grundfarbe etwas undeutlich. Der Vorderrand ist mit schwarzen und weißen Punkten bezeichnet, und der hintere gleichfalls schwarz und weiß gefleckt. Die einfarbig schwarzbräunlichen Hinterflügel wechseln am Hinterrand mit aschbräunlichen und weißlichen Franzen. Auf der Unterseite sind alle Flügel gelbgrau, die vordern schattirt, die hintern fein bestäubt, mit einem schwarzen Mittelpunct, mit Wischbinden und scheckigen Franzen versehen. Die Fühlhörner, Kopf, Halsstrahlen und Vorderleib sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig und zugleich mit Schimmelfarbe gefleckt, der Hinterleib ist mit den Hinterflügeln gleichfarbig und hat schwärzliche Büschelchen auf den ersten Ringen. Die Füße sind gefleckt. Das Weibchen ist beleibter als das Männchen. Es gibt Varietäten, die ins Braungrüne schillern, von welchen Fabricius seine Kennzeichen hergenommen; andere, die mit Roth und Violett gemischt, wieder andere, wo sich auf dem Rückenstamm das Bild eines Totenkopfs zeigt, wie bey der Kleemannschen Abbildung, die aber etwas groß ausgefallen.

Die 2 Zoll lange, kleintöpfige Raupe von hellgrüner Farbe, einzelnen, aber langen, Haaren, walzenförmiger Gestalt, und mit 3 Längslinien bezeichnet, lebt auf der Unterseite der Blätter, wo sie wegen ihrer mit den Blättern übereinstimmenden Farbe schwer zu entdecken ist, und verwandelt sich nicht in einer Erdhölse, wie Kleemann vermuthete, sondern in einem schwärzlichen Gewebe, auch nicht, wie die Wiener angaben, an der Erde, sondern zwischen den Blättern ihrer Futterpflanze, in eine rothbraune Puppe zu Ende des Junius und im October, um im ersten Fall 3 bis 4 Wochen, im zweyten aber 6 bis 7 Monate zu ruhen.

Aufenthalt. Die zweymal jährlich erscheinende Phaläne lebt theils zu Ende des Aprils und Anfang des Mays, theils im Julius, an den Stämmen des Ligusters-strauchs

Strauchs (*Ligustrum vulgare*), wo auch die Raupe zuerst im May und Junius, hernach vom August bis zur Mitte des Octobers weilet, und sodann im Puppenstand überwintert.

Anmerkung. Die Wiener Naturforscher führen hier die *Apfelseule*, P. N. Degener, welche bey *Fabrieius* *Noctua Algae* heißt, auf. Man hat aber nach der Zeit bemerkt, daß sie nur von den Flechten an den Obst- und andern Bäumen sich nährt.

102. Die Eichbaumeule. *Phalaena Noctua Aprilina*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Aprileule, Wiener *Ap. lina*, *Orion*, kleiner *Seladon*, rarer α -Vogel (beym D. Glabdach.)

<i>Phalaena Noctua Aprilina</i>	Wiener Verz. 70. n. 5.
<i>Noctua</i>	— Fab. Ent. III. 2. 103. n. 306.
<i>Phal. Noct.</i>	— Gorthausen IV. 132. 54.
— —	— minor (maior ist verdruckt). Gleditsch I. 515.
— —	— n. 29. und die daselbst angegebene Raupe gehört zu
— —	— <i>Ludifica</i> Lin.
— —	— Brahm II. 405. n. 285.
— —	— <i>Orion</i> Esper IV. t. 118. f. 4. 5. mit Raupe.
— —	— <i>Aprilina</i> minor Berliner Magazin III. f. 1—3. mit Raupe.
— —	— Panzeri Fauna Heft 4. t. 21.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und dachigen Flügeln; die vordern sind lieblich meergrün, mit drey Querreihen von tiefschwarzen, groben, irregulären Flecken und Zeichnungen, wovon die mittlere unter andern vorzüglich durch ein Griechisch α sich auszeichnet. Der Hinterrand ist mit einer Reihe schwarzer, dreyeckiger Puncte bezeichnet.

Raupe. Sie hat am Hals lange, braungelbe Haare, ist auf dem Rücken bräunlich, in den Seiten schmutziggelblich. Auf dem 4. 6. und 9. Ring steht jedesmal eine hellgelbe Scheibe; auf jedem der übrigen stehn allemal vier rothe, behaarte Warzen in einer Querreihe, wovon die auf dem 2. und 3. Ring gelb eingesaßt sind. Vor einer jeden Warzenreihe steht auch eine Reihe weißer Rumpfflecken oder Puncte.

Sie hat etwas Aehnliches mit der *Dispar*-Raupe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese meergrüne, streifenweis weißgemischte *Phaläne*, wovon das Weibchen 1 Zoll und 5 Linien Flügelbreite und jeder Vorderflügel $7\frac{1}{2}$ Linien Länge hat, und etwas größer ist, als das Männchen, gehört unter die schönsten. Die erste, ohnweit der Wurzel befindliche, gekappte, tiefschwarze Querreihe der lieblich meergrünen Vorderflügel bildet am Vorderrand noch einen größern, schwarzen Fleck; die zweite, welche unterbrochen ist, scheint aus arabischen Buchstaben zusammengesetzt; einer davon gleicht einem α oder zweyen *Commata*, die die Zahl 2 einschließen; die dritte ausgezeichnete, kappenförmige Querreihe hat einen schwarzen Fleck hinter sich. Der Hinterrand ist mit einer Reihe schwarzer dreyeckiger Puncte bezeichnet. Die Franzen sind schwarz und grünlich gescheckt, und der

Vor.

Vorderrand schwarz und weiß gefleckt. Die schwärzlich aschgrauen, am Schwanzwinkel weißlichen Hinterflügel haben einen großen länglichen Schattenfleck, welcher bisweilen zur Schattenbinde wird. Am Schwanzwinkel fängt eine weiße, schwarzgerandete Quерlinie an, die nicht durchgeht. Auf der Unterseite sind alle Flügel weißlich, die vordern stark schwarz beschattet mit einigen Quерlinien. Die hintern haben eine geschweifte Quерlinie zwischen zwei schwärzlichen Quерbinden, in deren ersterer ein schwarzer Halbmond steht. Die Franzen sind schwarz und weiß gefleckt, wie die auf der Oberseite der Hinterflügel und wie die Füße. Die Fühlhörner sind bräunlich und an der Wurzel weißgeringelt. Die Fühlspitzen wechseln mit Grün und Schwarz. Der Kopf, der Saum des schwarzen Halskragens und der Vorderleib sind grün und nach hinten schwarz gezeichnet. Der Hinterleib, auf dessen Ringen jedesmal ein schwarzes Büschelchen steht, ist gelbgrau und zugleich schwarz bestreut; in den Seiten aber schwarz gefleckt.

Ihre braunkläppige, auf dem Rücken bräunliche, in den Seiten schmutziggelbliche Raupe ist bis auf die braungelben Halshaare und Warzenhaare nackt, nämlich die seitwärts stehenden Warzen fügen einen braungelben Haarbüsch und die in der Mitte ganz feine Haare. Auf dem 4. 6. und 9. Ring steht jedesmal eine hellgelbe Scheibe, auf jedem der übrigen steht allemal vier rothe behaarte Warzen in einer Quерreihe, wovon die auf dem 2. und 3. Ring gelb eingefasst sind. Vor einer jeden Warzenreihe steht auch eine Reihe weißer Rundflecken oder Puncte. Die Endspitze und Schwanzfüße sind nebst dem Bauch gelbbraun. Das Exemplar, das ich 1781 erhielt, war auf dem 5. und 11. Glied etwas erhaben, so wie die Luftlöcher, und die Füße waren weiß. Ob es auch Raupen mit gelben Scheiben auf allen Gliedern gebe, wie sie Sepp abgebildet hat, wird bezweifelt. Sie spinnt sich in der Mitte des Augusts, oder auch im September in ein dem Gespinnst der Raupe des Weißbuchs spinners, Neuftria, ähnliches Gewebe ein, darin die schmale bräunliche Puppe durch den Winter ruht. Diese Ruhe dauerte bey mir (Scharfenberg) etwas über 10 Monate, weil ihre Entwicklung erst gegen das Ende des Junius des folgenden Jahres erfolgte. Vielleicht war dieses Folge der häuslichen Erziehung.

Aufenthalt. Die Eule findet sich nach Brahm bey Maynz schon im April an Eichstämmen, worauf auch die Raupe im Julius und August in mehreren deutschen Gegenden lebt. Man redet auch von einer zweiten Generation, wo von den Raupen im May und Junius, die Phaläne, nach einer dreywöchentlichen Puppenruhe im Julius sich entwickeln soll.

Anmerkung. Sie darf nicht mit der Rahneieneule, Aprilina Lin., welches die Runicia Wien. ist, vermengt werden, desgleichen auch nicht mehr, wie es sonst geschah, mit der nächst folgenden.

103. Die Dornpflaumeneule. *Phalaena Noctua Ludifica*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Naturspiel, naturspieliger Nachfalter, gelber Hermelin, grünweißliche und schwarzgezeichnete Eule.

Phalaena

Phalaena	Noctua	Ludifica	Lin. 848. 143. Müller 692. 143.
—	—	—	Wiener Verz. 311. 8.
Noctua	—	—	Fab. Ent. III. 2. 103. 309.
Phal. Noct.	—	—	Vorkhausen IV. 137. 55.
—	—	—	Deutsche Encyclopädie. 9. Band, Seite 82. Raupenbe-
—	—	—	schreibung von Scriba.
—	—	Hermelina	Gzje Beyträge III. 3. 207. 69.
—	—	Ludifica	Esper's Eulen t. 120. f. 1. 2.
—	—	—	Frankfurter Beyträge I. S. 147. mit Abbildung.
Naturforscher XIV. t. 3. f. A. von Doct. Kühn.			

Kenntzeichen der Art. Eule. Die Flügel sind dachig, die vordern grünlichgelb, mit dichten, schwarzen, geschlängelten und fappenförmigen Zügen und Strichen und zwey silberweißen, schwarzumzogenen Narben; die Hinterflügel sind nebst dem Hinterleib gelblich; letzterer hat drey längsreihen schwarzer Flecken, wovon man auf dem Rücken eine und die beyden übrigen an den Seiten gewahr wird. Das Weibchen ist kleiner als das Männchen.

Raupe. Gelbgeknöpft, behaart, bleifarbig und dreymal gestreift, mit weißgeflecktem Hals und Schwanz.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese schöne grünlichgelbe Phaläne mißt nach meinem Exemplar von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll und 5 Linien, und ihre mannichfaltigen schwarzen, dichten Züge, die wie chineßische Buchstaben aussehen, bilden keine regelmäßigen Streifen und Linien, haben aber die beyden silberfarbenen Narben ziemlich deutlich, wovon die kleine ringförmige ganz, und die größere halbmondförmige nicht ganz schwarzumzogen ist. Der Vorderrand ist schwarz gefleckt, und die Franzen aller Flügel sind abwechselnd schwarz und silberweiß. Die Hinterflügel sind gelblich mit einigen dunkeln Nerven, nach der Wurzel zu aber sehr tiefgelb. Auf der Unterseite sind alle Flügel am Vorderrand schwarzgefleckt, und nur die vordern sehr schwarz beschattet. Die Fühlhörner sind braun, der schwarzgestrichelte Kopf, der mit 2 Quercröndchen gezierter Halsstrahlen und der schwarzgeleckte Vorderleib sind grünlich. Von den drey Fleckenreihen des Hinterleibes zeigt sich eine auf dem Rücken, und die beyden übrigen an den Seiten. Das Weibchen hat zuweilen am Vorder- und Hinterrand der Hinterflügel einen starken Schatten, auf der Unterseite der Vorderflügel am schwärzlichen Vorderrand einen weißen Fleck und eine weiße Querbinde, und auf den Hinterflügeln einige dunkle Wellenstreifen. Bey Varietäten des Männchens findet man die Hinterflügel und die ganze Unterseite einfarbig. Bisweilen hängt auch die runde Narbe mit einem Strichelchen zusammen und bildet die Zahl 2. Die ersten Abbildungen von ihr gaben: Kühn im Naturforscher und Gerning in den Frankfurter Beyträgen, beyde im Jahr 1780.

Die von Herrn Scriba am angeführten Orte beschriebene Raupe ähnelt der Raupe des Rosenspinners, Dispar, oder des Nonnenspinners, Monacha. Sie hat einen schwärzlichen Kopf, über den sich die langen weißgelben Halshaare legen. Der Absatz nach dem Halse, also der zweyte, hat zwey haarige Rückenwarzen; von da an färbt sich der Körper, über welchen drey pomeranzfarbene Längslinien laufen, aschblau.

Jeder

Jeder Absatz hat unter diesen Linien eine braungelbe Warze. Zunächst über den Füßen ist die Seite weiß, und zwischen dieser und der Seitenlinie sieht man pomeranzengelbe aufwärtsgehende Strichelchen. Die Warzen über dem 3 Paar der Vorderfüße stehen in einem schwarzen Fleck, und auf dem Absatz hinter den Vorderfüßen befindet sich oben auf dem Rücken ein weißer Fleck. Auf dem zweiten Absatz hinter den Bauchfüßen stehen zwei hohe Warzen von schwärzlicher Farbe und hinter denselben ein weißes Quadrat, und dicht am After ein kleines weißes Herz, das seine Spitze gegen das Quadrat kehrt. In der weißen Seite stehen unterwärts ziemlich lange weißliche Haare. Der Rücken hat nur einzelne Haare und sieht fast nackt aus. Sie spinnt sich, wie die vorhergehende, in ein ähnliches Gewebe im Junius ein, worauf sie sich im Julius entwickelt.

Aufenthalt. Die Phaläne ist, wiewohl immer äußerst selten, im Julius vor-
handen, und ihre Raupe weidet im Junius auf Schlehen und Eichen, und nach
Fabricius auch auf Weiden.

Sexte Familie.

Ninderaupen. Fleckige Eulen.

Diese Raupen sind nackt, an Farbe den Baumrinden ähnlich, in deren Spalten sie gerne sitzen; die meisten haben auf dem Hinterleibe zwei Spitzen oder sonst eine Erhöhung. Die Verwandlung geschieht unter der Erde in einer eiförmigen Höhlung. Die Eulen haben einen sechseckigen Rücken, abhangende Flügel, mit unrichtigen Willenlinien neben einer oder mehr hellen Makeln auf den vordern, und einem Striche oder Punkte am Schwanzwinkel der hintern.

Erste Linie. Die Raupen haben keine Spitzen auf dem Hinterleibe.

Weniger schädliche.

104. Die Sahneneule. *Phalaena Noctua Runica*, Vien. *Aprilina*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Preisjunct, Eule mit Pfeiljuncten, Aprilnachtsalter (ohneachtet sie nicht im April flieg*), Linne the Aprilina, Seladon, Diana (beym Gladbach).

Phalaena Noctua Rurica Biener Bl. 70. 1.

Noctua — Fab. Ent. II, 2. 101, 305.

Phal. Noct. Aprilina Lin. 847. 138. Müller 691. 138.

— — — Gleditsch I. 516. 30. wo aber die

— — — April. Vien. beschrieben ist.
Bunice, Stenckhausen IV. 1826.

Runica Borkhausen IV. 141. 46.
Brahm. II. 126. 286.

— — — — — Aprilina Esners Felsen tab. 116 mit Raine

— — Aphidina Eypers Eulen tab. 116. mit Raupe.
— — Ludifica Sulzers Geschichte t. 22. fig. 8

Nöfels Insect. III. t. 39. f. 4. und t. 68. f. 5. die Larve.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und dachigen Flü-
geln; die vordern sind bläuergrün mit 2 gleichfarbigen Narven, mehreren sammet-
schwarz.

schwarzen kappenförmigen Linien und 2 Reihen schwarzer dreieckiger und pfeilsförmiger Fleckchen am Hinterrand, die auch durch die Unterseite durchschlagen. Das Männchen hat stärkere Fühlhörner und einen schlanken Leib.

Raupe. Unbehaart und weißgrau; über den schwarzbraunen Rücken, wo jeder Absatz vom dritten an bis zum letzten eine weißgraue Naute hat, wo an jeder der vier Ecken ein weißlicher Punct und noch an jeder Seite ein schwarzes Ringelchen steht; über diesen schwarzbraunen Rücken läuft eine ganz schmale weiße Längslinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese zierliche Eule von 1 Zoll und 7 bis 8 Linien Flügelbreite und von neuntheil Linien Länge eines Vorderflügels, hat längere und schmalere Flügel nach Verhältniß, als die mit ihr sonst oft verwechselte Eichbaumeule, und läßt auf ihrem meergrünen Grund weiße Nerven und weiße Schattirungen sehen. Außer mehreren sammer-schwarzen, gekappten Querlinien, einer Doppelreihe von schwarzen Pfeilsflecken am Hinterrand, und den beyden Narben, die mit unregelmäßigen schwarzen Zügen umzogen, übrigens mit der Grundfarbe gleichfarbig sind, ist auch des Vorderandes zu gedenken, welcher weißlich und schwarz gefleckt ist, und der Franzen am Hinterrand aller Flügel, welche bald blos weiß, bald weiß und schwarz gefleckt sind. Was die Hinterflügel betrifft, so sind sie schwärzlich mit zwey weißlichen Schattenstreifen, woran eine dicht an den weißen oder gefleckten Franzen befindliche Reihe von schwarzen Längsstrichen gränzt, die im Kösel etwas verziert sind. Die ganze Unterseite ist weißlich gelb mit einer Reihe dreieckiger schwarzer Puncte, so daß die Vorderflügel nicht nur einen schwarzen Mittelschatten, von einer noch dunkleren Schattenbinde überzogen, sondern auch die beyden Narben, die hier gelblich grau mit schwarzer Ausfüllung sind, vorzeigen. Die zuweilen schwach, zuweilen stark bestäubten Hinterflügel werden von einer braunen, gekappten, bald schmälern, bald breitem Querslinie durchzogen, vor welcher ein großer schwarzer Mittelfleck steht, der oben durchleuchtet. Die Fühlhörner, die bey dem Männchen stärker sind, und die Füße sind schwarz und weiß, od. r grün geringelt. Die an der Wurzel schwarzfleckigen Fühlsippen, sind nebst dem Kopf, Halskragen und Vorderleib grün. Der Halskragen hat 2 schwarze Mondchen und der Vorderleib seine schwarze Züge. Der graugelbe Hinterleib bekommt durch Atomen, mit denen er dicke bestreut ist, ein aschenfarbiges Ansehen.

Die Raupe mißt über 1½ Zoll, und ist haarlos, weißgrau, über den schwarzbraunen Rücken mit einer schmalen, weißen Längslinie bezeichnet. Jeder Absatz hat ein weißgraues schiefes Viereck, und jede Ecke einen weißlichen Punct, und an den Seiten ein schwarzes Ringelchen. An der Bauchseite ist sie mit weißen schiefen Strichen geschlängelt eingefast. Der Kopf wird bald als braun (nach Kösel), bald als gelblich angegeben; der erste Ring hinter demselben, oder der Hals ist schwarz bandirt. Es gibt Varietäten, die heller und dunkler, und ganz aschgrau sind. Sie verpuppt sich zu Ende des Monats in der Erde, und die Puppe braucht nach Brahm drey Monate zur Ausbildung.

Aufenthalt. Die Phaläne erscheint nicht, wie Gleditsch schreibt, im May, sondern zu Anfang des Septembers, wiewohl sehr selten in Waldungen an Eichen, woran
auch

auch die Raupe sich nähren soll, die noch vor Winters das Ey verläßt, und die während des Winters, und auch sonst, in den klüftigen Stammrinden sitzt, um zur Nachtzeit in der Höhe der Bäume Nahrung zu suchen. Wenigiens giebt Fabricius Eichen als ihre gewöhnliche Nahrungspflanze an, womit sie Küssel nur auf wenig Tage, vielleicht nur im Nothfall, nährt. Kleemann fand sie auch auf Eichen, Vorkhausen aber bei Darmstadt auf Buchen, Linden und Apfelbäumen, bemerkte aber, daß sie sich lieber mit den darauf wachsenden Lichenen nährt.

Zweyte Linie. Die Raupen haben Spitzen auf dem Hinterleib.

Weniger städliche.

105. Die Ulmbaumeule. *Phalaena Noctua Bimaculosa*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Doppelfleck, Schwarzfleck.

<i>Phalaena Noctua Bimaculosa</i>	Lin. 856. 184.	Müller 701. 184.
— — —	Wiener B. 70. 2.	
Noctua — —	Fab. Ent. III. 2. 70. 197.	
Phal. Noct. — —	Vorkhaus. IV. 144. 57.	
— — —	Italica Esper t. 157. f. 5.	

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamm und weißlich- und braunmarmorirten Vorderflügeln, welche zwei große, fast eiförmige Narben und eine Zapfenmakel haben; die afterarzen, in der Mitte dunkler schattirten Hinterflügel haben in der Mitte und am Schwanzwinkel eine schwärzliche Makel.

Raupe. Grau, nackt, weißpunctirt, mit 2 Hornspizchen auf dem letzten Absatz.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Eule, welche ein Ausmaß von 2 Zoll und 2 Linien Flügelbreite, und gestreckte, weißlich- und braunmarmorirte Vorderflügel hat, und deren beyde große, eiförmige Narben mit Einschluß der Zapfenmakel halb oder ganz schwarz eingefast, und bisweilen bräunlich ausgefüllt sind, führt gegen den Hinterrand einen schwärzlichen Wisch. Die Franzen sind durch eine schwarze Linie geremmt. Von den zwei schwärzlichen Flecken in der Mitte und am Schwanzwinkel der Hinterflügel hat die Phaläne den Namen: Doppelfleckige, Bimaculosa, erhalten. Auf der hellaschgrauen Unterseite haben alle Flügel 2 schwarze Flecken, und die verdern noch einen schwarzen Scharten am Hinterrand. Die übrigen Theile der Phaläne sind vom Kopf bis zum Hinterleib grau, und der Halsragen bräunlich gesäumt.

Die Raupe ist noch nicht abgebildet; nach Fabricius ist sie grau, nackt, weißpunctirt, mit 2 Hornspizchen auf dem letzten Absatz.

Aufenthalt. Bei Wien und in Schlesien, woher sie wenigstens Hr. Gerning erhalten; dergleichen in Italien. Die Raupe lebt auf Ulmen.

Anmerkuna. Sie ist von der andern und gemeinen Eipfischen Bimaculosa, Esper t. 132, welche Polyodon F. et Vi. ist, ganz verschieden. Fabricius allegirt in seiner Entomolog. a. a. O.

bei seiner Bimaculosa zwar diese Wiener Eule, weist aber Seite 82. n. 5. nach, statt Seite 70. n. 2. Sch.

106. Die Weißdorneule. *Phalaena Noctua Oxyacanthae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hochschwanzcule, Buchfink, Hagedornnachfalter, Ohrenvogel (wegen der Narbe, bey Gladbach).

<i>Phalaena Noctua Oxyacanthae</i>	Lin. 852. 165.	Müller 697. 165.
—	—	Wiener B. 70. 3.
<i>Noctua</i>	—	Fab. Ent. III. 2. 93. 277.
<i>Phal. Noct.</i>	—	Vorkb. IV. 155. n. 63.
—	—	Gleditsch II. S. 110. u. 153.
—	—	Esper IV. t. 160. f. 1—7. mit Raupe.
Rösel I. 2. El. Nachvög. t. 33.	mit Raupe.	

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenamm und dachigen Stügeln; die vordern sind braun mit Grau gemischt, mit den gewöhnlichen beyden Narben, wovon die größere ehrenförmig und ledergelb ist; beyde Narben sind von 2 braunen Queralinien eingeschlossen, davon die wellenförmige hinterste in einen weißen Hakensfleck am bläulichgrünglänzenden Innenrand sich endigt. Das Weibchen ist kleiner als das Männchen.

Raupe. Nackt, großköpfig, schmutzigweiß, schwarz- und braunschreckig, bald ohne, bald mit rautenförmigen Rückenzeichnungen, und mit 2 erhöhten doppelten Spitzen am vorletzten Glied.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese braune mit Gelb und Grau gemischte Eule mißt $1\frac{1}{2}$ Zoll, auch wohl 1 oder 2 Linien drüber, und schimmert am Innenrand sowohl als am ganzen Hinterrand am Saum hinab mit einem glänzenden Grün. Der erste braune Querstreif oder Linie unweit der Wurzel ist von einem kurzen längstreif durchschnitten. Hierauf folgen in einem ziemlich einfarbig-braunen Felde die 2 Narben, davon die erste klein und beynahe rund, die zweyte nieren- oder ohrförmig, ledergelb und schwärzlich schattirt ist. Hinter den Narben folgt die zweyte und zwar wellenförmige Queralinie, die sich mit einem weißen Haken endigt. Der Raum von da, von etwa einem Zoll Breite, wird schmutzigweiß oder ledergelb; hierauf kommt ein nicht gar so breiter, aus Stricheln bestehender, glänzendgrüner Randstreif, woran die gelbgrauen Frazzen gränzen. Drey gelbe Punkte bezeichnen den Vorderrand nach der Spitze zu, und drey schwarze Pfeilspitze bezeichnen die drey letzten Rippen oder Zähne des Hinterrandes. Die mit einem bräunlichen Querstreif versehenen Hinterflügel sind graugelb, so wie die ganze Unterseite, wo der Querstreif durchleuchtet. Die Fühlhörner, Kopf und Hals tragen sind bräunlich, letztere mit schwarzer Zeichnung. Der Hinter- und Vorderleib sind grau, letzterer braun bezeichnet.

Bei der nackten, schmutzigweißen, schwarz- und braunschreckigen Raupe ist entweder die weiße oder die braunschwarze Farbe die herrschende. Der blaßbraune große Kopf hat auf der Stirne einen Querstreif. Sie ist bald mit, bald ohne rautenförmige Rücken-

Rückenzeichnungen, und mit zwey erhöhten doppelten Spizen am vorletzten Glied versehen. Alle Gelenke haben weiße Wäzchen, und auf jedem derselben stehen, wie auf dem Kopfe, kurze kaum sichtbare Härchen, und die beyden Gelenke vor den Endspizen sind weiß. Am Bauche bilden die an einander hängenden Flecken eine breite Linie. Sie öfnet gewöhnlich des Nachts, und sitzt bey Tag gemeinlich mit abwärts gerichtetem Kopf und ausgestreckten Hinterfüßen. Wenn sie im Junius ausgewachsen ist, so geht sie entweder in die Erde, oder kriecht unter die ihr nahen Gegenstände, um sich ein cyrundes Gespinnst zu bauen, worin die gelbe Puppe in der Regel 3 Monate (bey mir (Scharfenberg) wenigstens, nämlich vom Ende des Junius bis zu Ende des Septembers) ruht. Mösel behauptet auch, und zwar vermuthlich als Ausnahme von der Regel, daß einige sich schon bey ihm in 4 Wochen, andere nach der Ueberwinterung als Phalänen entwickelt hätten. Allein bey vielfältigen hiesigen Beobachtungen sind uns niemals solche Fälle vorgekommen.

Aufenthalt. Die hier und überall nicht seltene Phaläne erscheint zu Ende des Septembers und Anfang des Octobers; vor oder nach dieser Zeit gewöhnlich nicht. Die Raupe nähert sich im May und Junius am liebsten von den Blättern des Weißdorns, dann auch der Aepfel, Pflaumen, Zwetschen, Schlehen und Pfirschen, wiewohl es auch möglich ist, daß sie, wie Vorkhausen glaubt, von den Lichenen solcher Bäume, wenigstens zuweilen lebt.

107. Die Holzbirneule. *Phalaena Noctua Culta*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Holzbirnnachtsfalter, gepuhte Eule, Dreyring, braungrüne Ohrenphaläne (von den ohrenförmigen Narben).

<i>Phalaena Noctua Culta</i>	Wiener M. 70. 4.
<i>Noctua</i> —	Fab. Ent. III. 2. 94. 279.
<i>Phal. Noct.</i> —	Vorkhausen IV. 145. 58.
— — <i>Tridactylon</i>	Vorkhaus. IV. 154. 62.
— — <i>Viridana</i>	Naturforsch. XIII. t. 3. f. 5. a. b.
— — <i>Culta</i>	Hübners Beyträge II. t. 3. f. R.
— — —	Esfers Eulen t. 120. f. 4.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamm und dachigen Flügeln; die vordern sind olivenbraun mit zwey weißen, schwarzgerandeten Kappenlinien, zwischen welchen die 2 weißen Narben mit schwärzlichen Ringen stehen. Die fast unbestäubten Hinterflügel sind bey'm Männchen weiß, bey'm Weibchen bläulich, und am Hinterrand hellgrau.

Raupe. Dunkelgefleckt, mit 2 schwarzen Wellenlinien in jeder Seite, und 4 Spizen über dem Afters.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese artige, 1 Zoll und 7 Linien messende, braune, ins Olivengrüne ziehende Eule hat auf beyden Seiten aller Flügel scheckige Franzen. Die Vorderflügel haben an der Wurzel 1 oder 2 weiße Punkte, sodann 2 weiße, schwarzgerandete Kappenlinien, zwischen welchen

die

die 2 weißen Narben mit schwärzlichen Ringen stehen. Die erste weiße Narbe scheint darum so groß, weil sie aus 2, nämlich der gewöhnlichen Ringnarbe mit einem schwarzen Punkte und einer angehängten unregelmäßigen Narbe mit einem Strich, besteht; die zweyte weiße ist nierenförmig, inwendig mit einem schwärzlichen Halbmond. In der Nähe des Hinterrandes entdeckt sich eine Reihe weißer Punkte. Nicht nur der Vorderrand und die Franzen des Hinterrandes, sondern auch die Sehnen sind schwarz, und weißpunctirt. Die bey'm Männchen weißen, bey'm Weibchen bläulichen, fast unbestäubten Hinterflügel haben einen schwarzgezeichneten unterbrochenen Saum, und nahe am Schwanzwinkel ein Ausrufungszeichen. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel gegen die Spitze und der Hinterrand schwärzlich, gegen den Vorderrand schwarzgefleckt, und gegen den Innenrand bläulichweiß, mit einer schwärzlichen Querverbinde und durchflechtenden Flecken; die hintern sind weiß und hellgrau gewässert, mit schwarzen Randstrichelchen. Kopf, Fühlspißen und Füße sind weiß und schwarzbunt; die Fühls Hörner braungrau und an der Wurzel weiß; Halskrausen und Vorderrücken weiß mit brauner Zeichnung; Brust und Hinterleib sind grau oder bläulich mit schwarzen Büschelchen auf jedem Gelenk, die sich bey'm Verfliegen verlieren. Bey Varietäten laufen am Hinterrand 2 feine schwarze, und zwischen ihnen eine weiße Linie hin, und durch die Hinterflügel zieht sich eine Vogenreihe schwarzer Flecken.

Die dunkelgefleckte Raupe mit 2 schwarzen Wellenlinien in jeder Seite und vier Spiken über dem After, gleicht in etwas derjenigen des Albernspinners (Phal. Bomb. Populi), und ist noch nicht abgebildet. Sie verbirgt sich des Tages über unter den Rinden und Rissen der Bäume. Bey mir (Scharfenberg) verpuppte sie sich in einem hellen Gewebe am 20. September 1798, ruhte 9 Monate und entwickelte sich in dem darauf folgenden Jahr zu Anfang des Julius.

Aufenthalt. Die Eule erscheint also zu Ende des Junius und Anfang des Julius in Gärten und Vorhölzern, aber allemal höchst selten. Die Raupe lebt auf Holzbirnen, zuweilen auf Äpfeln und Schwarzpappeln.

Dritte Linie. Die Raupen haben am Hinterleibe eine stumpfe Erhöhung.

Anmerkung. Die hierher gehörige, schon gepukte Brombeereule, P. N. Batis, Lin., Braunaug, Eulenphaläne mit rosenrothen Makeln, Brombeermotte, Münzvoael, Batisnachfalter, die in den Linne'schen, Wiener, Fabricius's, Vorkhausen's, Gleditsch's (II, S. 259.), Eder's und Mößelschen Schriften (IV. t. 26. f. A. B. C.) vorkommt, lebt auf Forssträutern. Sie ist kammrückig (nicht glattrückig, wie Linne' glaubte), mit dachigen Flügeln, und ihre grünlisch-braunen, mit den gewöhnlichen, kaum sichtbaren Narben versehenen Vorderflügel haben fünf schöne, rosenrothe, weißeingefasste Makeln, wovon 2 am Vorderrand, eine große und kleine am Innenrand, und eine große an der Wurzel steht; die Hinterflügel sind bey'm Männchen hellocker-gelb, bey'm Weibchen aschgrau und nach hinten zu dunkler. Das Ausmaß dieser bey uns kaum einmal in 20 Jahren gesehenen Phaläne beträgt 1½ Zoll. Ihre ebenfalls 1' Zoll lange, nackte, braune, rothfarbene gefleckte Raupe mit gekerbtem Kopf hat hinter dem Hals einen zweyspitzigen Höcker, und hinter demselben noch 5 andere, und vor dem hintern eine stumpfe Erhöhung

ober

oder Japfen. Zwischen den vordern und den Bauchfüßen sind in den Seiten 2 Höcker, und zwischen den Vando- und Hinterfüßen auch zwei. Sie lebt bey Frankfurt, Mainz, Nürnberg, im Hannoverschen, im Janius und Julius auf Brombeer, Himbeer, Vockbeer und Steinbrombeer (*Rubus saxatilis*), und liefert nach ihrem im Julius erfolgten Einspinnen und nach einer Puppenruhe von 3 Wochen, im August zum erstenmal die Phaläne, und nach der im Septem- ber erfolgten Verpuppung der zweiten Brut, nach einer siebenmonatlichen Puppenruhe, im May des darauf folgenden Jahres die Phaläne zum zweytenmal. Linne', der ein verloschenes Exemplar vor sich hatte, beschrieb die Makeln weiß.

108. Die Flohkrauteule. *Phalaena Noctua Persicariae*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sägerand, Flohkrautnachtalter, Fliedermotte, Achter (beym Olabbach, vermuthlich von der Narbe).

<i>Phalaena Noctua Persicariae</i>	Lin. 847. 142.	Müller 691. 142.
— — —	Wiener B. 71. 8.	
<i>Noctua</i> — —	Fab. Ent. III. 2. 111. 335.	
<i>Phal. Noct.</i> — —	Vorkauf. IV. 162. 66.	
— — —	Esper IV. t. 129. f. 1 — 3. mit Raupe.	

Mösel I. 2. Classe. t. 30. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und gezahnten dahigen Flügeln; die vordern sind glänzenschwarzbraun und schwarzgewellt, mit einer weißgeringelten, zuweilen ungeringelten Ringnarbe, einer schneeweißen Nierennarbe und einer rothfarbigen theilweis gezackten Querlinie unweit des Hinterrandes; die gelbgefranzten Hinterflügel sind halb gräugelb, halb schwarzbraun.

Raupe. Nackt und grün, mit einer weißgelben Rückenlinie, und zwey sehr feinen schwarzen Parallellinien an jeder Seite. Der erste Ring hat ein viereckiges, schwarzgrünes, hellingefasstes Schild, der vierte und fünfte zwey schwarzgrüne hellcingefasste Dreieckstücken, der letzte ein gleichfarbiges ovales Stück auf der stumpfen Erhöhung des letzten Abgases. Dem Bauch laufen nach vornen grünbeschattete Schrägschliche von hinten vorwärts zu bis an die eine Seitenlinie, und von der andern wieder dergleichen Schrägschliche nach hinten, so daß die Raupe ein geschupptes oder gerautetes Ansehen hat.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese dem ersten Anblick nach bis auf die Nierennarbe schwarz erscheinende Eule mißt 1 Zell und 9 Linien. Die ganz schwarzen Wellenlinien laufen vor und hinter den beyden Narben weg. Die braune Ringnarbe ist zuweilen hellgeringelt, zuweilen nicht. In der größten weißen Narbe steht ein braunes Mondstüchlein. Eine dritte sehr deutliche, rothfarbige (bey verloschenern Exemplaren weiße) Zackenlinie, die zuweilen zu einer Punctenreihe wird, ist in der Nähe des Hinterrandes. Der Vorderrand ist schwarzgefleckt, mit drey gelben Puncten nach der Spitze hin. Die Franzen sind schwarz und gelbgestrichelt, und die Hinterflügel ganz gelb. Letztere haben von der Wurzel an bis zur Mitte schwarze Nieren und einen solchen Mittelpunct. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel schwarzbraun-glän-

glänzend und gelbgemischt. Die Nierennarbe mit ihrem Rindchen scheint hier gelblich durch. Die graugelben Hinterflügel dieser Seite sind zur Hälfte, nämlich am Vorderand, dunkelbraun bestäubt; die Sehnen, der Mittelpunkt und die Saumbinde am Hinterrand sind schwarz. Alle vordern Theile der Phaläne sind dunkelschwarzbraun, wie die Vorderflügel; und der auf allen Ringen mit Haarbüschchen versehene Hinterleib ist aschgrau mit Braun angeflogen. Die Fußblätter sind braun und rostgelb geringelt.

Die nackte, bald hell-, bald dunkelgrüne, bald bräunliche Raupe hat einen grünen oder braunen Kopf und blaugrünen Bauch, ferner eine weißgelbe Rückenlinie und zwey sehr feine schwarze Parallellinien an jeder Seite. Der erste Ring hat ein viereckiges, schwarzgrünes, helleingefasstes Schild, der vierte und fünfte zwey schwarzgrüne, helleingefasste Triangelflecken, der letzte einen gleichfarbigen ovalen Fleck auf der stumpfen Erhöhung des letzten Abgases. Dem Bauch laufen weißliche, nach vornen grünbefleckte Schrägschreife von hinten vorwärts zu bis an die eine Seitenlinie, und von der andern wieder der gleichen Schrägschreife nach hinten, so daß die Raupe dadurch ein geschupptes oder gerauertes Ansehen erhält. Sie verwandelt sich nach einer fünfmaligen Häutung in der Erde, nicht blos, wie Kösel glaubte, sondern in einem gewebten Gewölbe, zu Ende des Herbsts in eine glänzendrothbraune Puppe mit einem Häkchen, um 8 bis 9 Monate zu ruhen;

Aufenthalt. Die Eule erscheint im Junius oder auch zu Anfang des Julius, und ihre Raupe, welche vom August an bis in den späten Herbst vorkommt, weidet auf vielen Pflanzen, als Flohkraut, Weiden, schwarzem Hollunder, Traubenholzlunder, Brennnesseln und Himbeer, und auf Gemüsen in Gärten.

Fortpflanzung. Das Weibchen legt im Julius oder August an vier- bis fünf- hundert Eyer zusammen, doch niemals auf Eine Pflanze, sondern schnurweise an die einzelnen Fäden der Winkelspinnen in Gärten, um bey ihrer Entwicklung sogleich überall Nahrung zu finden. Die Raupe kommt nach 16 bis 17 Tagen aus dem Ey, läßt sich sogleich an einem aus sich selbst gezogenen Faden in die Tiefe hinab, um ihren Feinden, den Spinnen, zu entgehen, und sich Nahrung zu suchen. Man vergleiche Kleemanns Notizen zu Kösel a. a. O. Seite 175.

Schaden. Dieser bedeutet bey Forsten nichts; aber in Gärten ist er schon, wenn sie überhand nehmen, in Ansehung der Gemüse wichtiger; doch erscheint diese Phaläne seltener. Linne' irrte, wenn er, so wie Fabricius, behauptet, daß die Raupe zu den den Obstgärten durch ihre Gefräßigkeit nachtheiligen gehöre.

Siebente Familie.

Wellenstrichraupen. Glänzende Eulen.

Die Raupen haben auf dem Rücken beyderseits eine wellenförmige Linie, oder darneben auch einige sehr feine Haare. Die Verwandlung geschieht an der Erde in einem mit Erdförnern vermengten Gespinste. Die Eulen haben abhangende, das ist dachige,

chige, meistens staubfarbige, immer mit verwischten Wellenlinien quere besetzte, glänzende Flügel. Sie fliegen gern zum Lichte in die Zimmer.

Erste Linie. Die Raupen haben einen gespitzten Hinterleib. Die Flügel der Eule sind kupferbraun.

Weniger schädliche.

109. Die Rußbaumeule. *Phalaena Noctua Pyramidea*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Flammenflügel, Pyramidenmotte, Pyramidennachtflatter, Pyramideneule, Eule am Rußbaum, Kupferschmidt (von der Farbe), gemeiner Carif (bey Stabach).

<i>Phalaena Noctua Pyramidea</i>	—	Lin. 856. 181. Müller 702. 181.
<i>Noctua</i>	—	Wiener B. 71. 1.
<i>Phal. Noct.</i>	—	Fab. Ent. III. 2. 98. 290.
—	—	Vorkauf. IV. 197. 90.
—	—	Brahm II. 294. 418.
—	—	Gleditsch I. 515. II. 50. u. 110.
—	—	Nau Forstw. 310.
—	—	Esper t. 171. f. 1—3. mit Raupe.
—	—	Hübners Beitr. 1. 2. t. 2. M. eine Varietät.
Nöfel I. 2. El. Nachvogel. t. 11. mit Raupe.		

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenrücken und feingezahnten, dahigen Flügeln; die vordern sind dunkelashgrau glänzend, mit 3 weißlichen Wellenstreifen, wovon die ersten zwei eine Ringnarbe einschließen, und die dritte einige schwarze Pfeilpuncte aufnimmt; die Hinterflügel sind glänzend kupferbraun, am Vorderrand schwärzlich schattirt.

Das Weibchen ist beleibter.

Raupe. Nacht und meergrün, mit einer weißen Rücken- und einer bergleichen Längelinie auf jeder Seite, zwischen welchen auf allen Ringen weiße Punctchen stehen; auf dem Afters ist eine pyramidenförmige Erhöhung mit rothen Spitzen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese dunkelashgrau glänzende Eule mißt 1 Zoll und 11 Linien in die Breite, und jeder feingezahnte Vorderflügel 11 Linien in die Länge, und der schwärzschattige Raum zwischen den zwei ersten weißlichen, scharfbegrenzten Wellenlinien, wo die kleine Ringnarbe sehr sichtbar, und die größere Nierennarbe ganz verfinstert ist, ist breiter als derjenige zwischen der 2. und 3. nicht scharf begrenzten weißlichen Wellenlinie. Am Hinterend läuft eine auswärts gelbe, einwärts schwarze Punctenreihe hin. Die glänzenden kupferbraunen Hinterflügel haben schwärzliche Adern. Auf der Unterseite sind die vordern grau und metallglänzend, die hintern blaskupferiger, als oben, mit einem schwarzen Mittelpunct und einer nicht ganz durchziehenden Vinde. Die Füßspitzen, Füßhörner, Kopf und Vorderücken sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig. In den Seiten des oben ashgrau glänzenden, unten kupferfarbigen Hinterleibes stehen schwarze und weiße Haarbüschel und graue Aftersbüschel. Die schwarzen Fußblätter sind weißgeringelt.

Let

Die

Die ihr zugehörige Raupe ist zwar nackt, hat aber unter der Vergrößerung doch einzelne Härchen, und die drey ersten Absätze sind nicht, wie die übrigen, meergrün, sondern grasgrün. Sie hat eine weiße Rücken- und eine bergleichen Längslinie auf jeder Seite, zwischen welchen auf allen Ringen weiße Pünctchen stehen. Die Richtung und Ordnung dieser weißen Tüppeln ist so: Eine gerade Punctenreihe ziert den ersten Absatz, eine Schrägsreihe den zweyten und dritten, eine kreuzweis gerichtete den vierten; vom fünften bis zehnten sind die Puncten kleiner, und stehen in schrägen Reihen. Von der pyramidenförmigen Spitze laufen drey weiße Linien nach dem After zu. Es gibt, nach Herrn Meyers Beobachtung in Zuesly's Magazin, Varietäten, wo die Tüppelchen an der Raupe alle gelb, oder nur ein kleiner Theil davon gelb sind. Nach ihrer Entwicklung aus dem Ey häutet sie sich vor dem Winter zweymal, das drittemal aber im Frühling, wo sie zu Ende des Mays schon ausgewachsen ist. Sie hat die Gewohnheit, auf den Bauchfüßen zu ruhen, wie der Erlenspinner, und das Hintertheil in die Höhe zu richten. Ihr Gespinnst legt sie zu Anfang des Junius zwischen Blättern an. Ihre dunkelbraune Puppe hat tiefe Einschnitte, und sie ruht 3 bis 5 Wochen. Brahm wird wohl irren, wenn er 2 Generationen annimmt, wo die Phaläne zuerst im April erscheine, und deren Raupe im May erwachsen sey, und hierauf im Puppenstand 4 Wochen zubringe; die zum zweytenmal in der ersten Hälfte des Julius erscheinende Phaläne liefere die im Herbst vorhandenen Raupen, die noch vor Winters sich verpuppen sollen.

Aufenthalt und Fortpflanzung. Die Eule erscheint im Julius oder August, und besucht unsere Wohnungen zuweilen; ihre Raupe ähet auf Wallnuß (*Juglans regia*), Sirenen (*Syringa vulgaris*), Eichen, Haseln, Pflaumen, Heckenfirschen, Weißblatt, Je länger je lieber (*Lonicera periclymenum*), nach Kleemann auch auf Pfirschen, Kirschen und Johannisbeer auf der obern Blattseite, im May; nach Brahm auch auf Ulmen, Weiden, Pappeln, Liguster und Obstbäumen.

Kleemann hatte in einer weiblichen Phaläne etliche hundert Eyer gefunden, welche mit 12 Rippchen und Vertiefungen umgeben waren, und einzeln an die Knospen gelegt werden, die im Herbst noch laub treiben.

110. Die Ilmeneule. *Phalaena Noctua Cinnamomea*, Göz.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Karer Flammenflügel, zimmetfarbige Eule, Belleneule.

Phalaena Noctua Cinnamomea Goetze Entomologische Beyträge III. 3. S. 205. n. 60.

— — — Borkhaus IV. 202. 93.

— — — Brahm II. 492. 352.

Ilmeneule Wiener Bz. S. 71. in der Anmerkung.

Phalaena Noctua Conica Esper IV. t. 171. f. 4. mit Raupe.

Kleemann I. t. 18. f. 1—6. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit flach aufsteigenden, sehr glänzenden Flügeln; die vordern sind dunkelzimmetfarbig mit schwärzlichen Adern; die hintern aber hellzimmetfarbig.

Raupe.

Raupe. lieblich grün, mit drey gelben Längslinien, davon die mittlere blasser ist, mit vielen weißen Tüppchen und Stricheln; der Kopf ist blaugrün, und der letzte Absatz etwas erhöht.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Eule mißt 1 Zoll und 11 Linien, jeder Vorderflügel $9\frac{1}{2}$, und die sehr glänzenden Flügel sind kürzer und stumpfer als bey der vorhergehenden. Der dunkelzimmtfarbene Grund der Vorderflügel hat weißliche Schattirungen und schwärzliche Adern. Von den Narben ist nichts, und von den 2 dunklern Zackenlinien nur bey wenig Exemplaren etwas zu erkennen. Die Hinterflügel sind hellerzimmtfarbig. Die Unterseite aller Flügel ist bey beyden Geschlechtern im Mittelraum zimmtfarbig, an allen Rändern weißgrau und zimmetfarben bestäubt; die hintern haben eine zimmetfarbige Vinde. Eine solche führt das Weibchen an ihren Vorder- und Hinterflügeln und vor denselben einen gleichfarbigen Mittelpunkt. Kopf, Fühlspißen und Vorderriicken sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig, und der Hinterleib gelbgrau, mit kurzen und buschigen Seitenhaaren und einem Aterbüschel. Die Füße sind stark gespornt und an den Fußblättern weißgeringelt.

Die im May und Junius vorhandene, 1 Zoll 5 Linien messende, mit feinen kurzen Härchen bedeckte, lieblichgrüne, etwas träge Raupe hat mehrere kleine weißgelbe Striche in die Länge und Quere, die sich alle wie geschlängelt durch den Körper ziehen. Besonders führt sie drey gelbe Längslinien, davon die mittlere blasser ist; der Kopf ist blaugrün, und der letzte Absatz etwas erhöht. Sie wohnt nicht frey auf ihrer Nahrungspflanze, sondern in einem zusammengekrümmten Blatt, das sie an der Oeffnung immer weißlich bespinnt, wo sie mehrentheils zusammengezogen sitzt. Endlich baut sie sich zu Ende des Junius ein enörmiges Gewebe theils zwischen Blättern, theils an der Erde oder am Moos, worin die rothbraune, lackirte glänzende Puppe 3 bis 5 Wochen, nach Brahm und Kleemann aber 6 Wochen ruht. Man läßt es dahin gestellt seyn, ob eine oder zwey Generationen statt finden; ersteres scheint Brahm, letzteres Vorkhausen anzunehmen. Man hat, da solche in der Nähe nicht einheimisch ist, durch eigene Erfahrung hierin nichts berichtigen können.

Aufenthalt. Die Phaläne zeigt sich in der Mitte des Augusts in verschiedenen Gegenden Deutschlands, als bey Frankfurt, Mainz und Nürnberg, auf Ulmen und Pappelstämmen an den Ästen. Ihre Raupe weidet auf denselben, desgleichen auf dem Spindelbaum (*Euonymus Europaeus*) und Schwarzpappeln. Man weiß nicht, ob sie im Ey oder im Larvenstand überwintert,

Acht. Familie.

Schmalstrichraupen. Grauscheckige Eulen.

Diese Raupen sind nackt und grünlich, einige darüber mit düstern Punkten bestreut, haben an den Seiten einen bleichen schmalen Strich, bleiben auch den Tag hindurch sichtbar auf den Pflanzen. Die Verwandlung geschieht unter der Erde in ein-

gem Gewebe. Die Eulen haben einen unebenen Rücken, abhangende, hellgraue, zuweilen mit ein wenig Gelb oder Oliv gemischte, immer aber mit vielen düstern wellenförmigen Linien oder gezahnten Strichen quer besetzte Vorderflügel.

Weniger schädliche.

III. Die Birkeneule. *Phalaena Noctua Polyodon*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kerzenkrauteule, Nebelmotte, Zweyfleckiger Nachsfalter, Vielzahn, vielzähniqe Eule.

Phalaena Noctua Polyodon, Lin. 853. 170. Müller 698. 170.

— — — Wiener B. 72. 1.

Noctua — — — Fab. Ent. III. 2. 114. 349.

Phalaena Noctua — — — Borkhausen IV. 256. 109.

— — — Thapfi — — — Borkhausen IV. 567. 234.

— — — — — Brahm II. 135. und 533.

— — — Nebulosa, Naturforscher IX. S. 143. n. 103.

— — — Bimaculola, Esper IV. t. 132. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückentamm und dachigen, gezahnten Flügeln; die vordern sind weißgrau neblig, mit 3 oder 4 undeutlichen Wellenstreifen, zwey weißgrauen, dunkelfernigen Narben und einer zum Theil bogigen Zapfenmakel.

Raupe. Hellbraun oder bräunlichgrau, walzenförmig und kurzbehaart, mit erdbräunen, rautenförmigen, zusammenhängenden Rückenflecken und gelblichen Lufelöchern. An den blässhartigen Seiten hat jeder Ring eine schwärzliche Schrägellinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 1 Zoll und 11 Linien messende, ansehnliche, weißgrauenebliche Phaläne, deren dunkelfernige Narben nebst einer etwas bogigen Zapfennarbe zwischen dem zweyten und dritten undeutlichen Wellenstreif, davon-jeder aus 2 schwarzen Linien besteht, liegen, und deren vierte Wellenlinie deutlicher und schwärzer ist und einige spizwinklige Puncte, vorzüglich aber einen größern Pfeilfleck am Schwanzwinkel aufnimmt, hat einen mit schwarzen Puncten besetzten und ausgekappten, das ist, aus acht Zähnen bestehenden Hinterrand, weswegen sie Linne: *Polyodon* (Vielzahn), benannt hat. Der erste Wellenstreif an der Wurzel ist sehr unvollkommen. Die Hinterflügel sind aschgrau mit weißen Franzen, eben so die ganze Unterseite, die nichts besonders zeigt, als auf den Hinterflügeln einen schwärzlichen Punct und zwey dergleichen Streifen. Der Vordertheil der Phaläne ist mit den Vorderflügeln, und der mit schwarzen Büscheln versehene Hintertheil mit den Hinterflügeln gleichfarbig.

Die von Brahm zu Mainz entdeckte und beschriebene, noch nicht abgebildete Raupe von $1\frac{1}{2}$ Zoll Länge ist hellbraun oder bräunlichgrau, walzenförmig und kurzbehaart, mit erdbräunen, rautenförmigen, zusammenhängenden Rückenflecken und gelblichen Lufelöchern; an den blässhartigen Seiten hat jeder Ring eine schwärzliche Schrägellinie. Sie lebt nach ihrer Ueberwinterung des Tags unter Blättern, und geht des Nachts auf Nahrung aus. Sie verwandelt sich in der Erde in einem mit Erdbörnern vermischtem Gespinnst in eine

eine schlanke, glänzende, hellbraune Puppe mit 2 steifen Hinterborsten, und ruht 3 bis 4 Wochen.

Aufenthalt. Die Eule, von welcher Brahm eine zweifache Generation vermuthet, findet sich zu Ende des Mays und Anfang des Junius an Gartengeländern, Mauern und Gartenthüren. Ihre nach den Wiener Naturforschern und Fabricius auf Birken wohnen sollende Raupe nährte Brahm mit den Blättern der gemeinen Königskegze (*Verbascum Thapsus*) und mehreren Wollkrautarten, ich aber 1798 im April mit Sauerampfer und Weißblatt (*Lonicera caprifolium*); Esper führt auch Aukeln, Nesseln und Erdbeerblätter als Nahrungspflanzen an.

Anmerkung. Ich würde diese Phaläne, die wirklich nach den mehrmahls erwähnten Nachrichten von 1797 an den Grafen von Hofmannsregge, die Wiener Vireneule ist, dennoch weder in dieser Familie gelassen, noch ihr überhaupt eine Stelle unter den Forstinsecten eingeräumt haben, weil es mir nun wahrscheinlich vorkommt, daß die Wiener ihre Raupe, die sie als grün und als eine Virenebewohnerin angeben, verwechselt haben; wenn ich solche nicht mit den Blättern einer Forstpflanze, des Weißblattstrauchs, erzogen hätte; wiewohl ich nicht behaupte, daß das ihr eigentliche Futter immer sey, so wie es auch seyn kann, daß die Blätter der Viren bey den Wienern damals für diese Raupe nur eine Nothfalls-Nahrung, und ihre grüne Farbe eine Abwechslung gewesen ist. Sch.

112. Die Kirscheneule. *Phalaena Noctua Flavicincta*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kirschnachtalter, orangegelbgesteckte Eule, erster Käsekrautvogel (beym Glabbach).

Phalaena Noctua Flavicincta, Wiener W. 72. 2.

Noctua — Fab. Ent. III. 2. 14. 344.

Phal. Noctua — Vorkauf. IV. 258. 111.

— — *Aurantiomaculata*, Goetz Entomologische Beyträge III. 3. 204. *Flavicincta* S. 211.

— — *Flavicincta major*, Esper t. 153. f. 1—3. mit Raupe.

Kösel I. 2. Cl. Nachtrö. t. 34. mit Raupe.

Kenntzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenamm und dachigen gezahnten Flügeln; die vordern sind von Weißgrau und Braungrau wolkig gemischt, worin orangefarbige Atomen, Punkte und Flecken gemengt sind, und haben die gewöhnlichen Narben. Die wenigsten Stücke haben drey weißliche Wellenstreifen. Das Männchen hat etwas behaarte Füßhörner.

Raupe. Naht und ganz bläulichgrün, mit vielen erhabenen glänzenden Punkten chagriniert, und mit einem blaßgelben Seitenstreif unter den rothfarbigen Luftlöchern versehen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese den Vorderflügeln nach weißgrau und braungrau wolkig gemischte, orangegelb markirte Eule mißt 1 Zoll und 8, und jeder gezahnte Vorderflügel 3½ Linie. Da kein Exemplar dem andern gleicht, so ist auch kein Wunder, daß die Kösel'sche Zeichnung eine Ab-

wei

weichung ist. Selten gibts Stücke, die sich durch 3 weißliche Wellenstreifen auszeichnen, in welchem Fall dann die bleichen Narben, der ring- und der nierenförmige, zwischen den 2 ersten stehen. Hinter dem dritten Streif zeigt sich aber allemal eine orangegelbe Punctenreihe, einwärts von Pfeilstreifen begrenzt. In der Nähe der Wurzel schrägs vor der Ringnarbe scheint ein noch größerer bleicher Fleck zu stehen. Die grauen, weißgescheckten Franzen sind orangegelb punctirt oder gefleckt. Die aschgrauen Hinterflügel haben in der Mitte und hinten hellere Wischstreifen, wovon der hintere an die grauen Franzen gränzt. Die ganze Unterseite ist weißlich und bald mehr, bald weniger mit Grau bestäubt, mit einem braunschwarzen Streif, vor welchem auf den Hinterflügeln noch ein Mondfleck steht. Das ganze Insect ist weißlich und grau gemischt, so daß auf dem Kopf, Vorder- und Hinterrücken pommeranzgelbe Flecken zu sehen sind. Die Fühlhörner und Füße sind braun und weißgeringelt.

Die oben erwähnte, 1 Zoll und 8 Linien messende, bey Berührungen sich zusammenkrümmende Raupe ist nackt und ganz bläulichgrün, mit vielen, erhabenen, glänzenden Pünctchen chagrinirt, und mit einem blaßgelben Seitenstreif unter den rothfarbigen Aufschildern versehen. Sie wölbt sich zu Ende des Junius eine Erdböhle, die sie nicht ausspinnt, sondern ausleimt, um darin zur rothbraunen Puppe zu werden und nach 3 Monaten, also zu Ende des Septembers und im October, sich zu entwickeln.

Aufenthalt. Diese Eule erscheint im October, an Ecken und Winkeln der Gartenthüren, Brettern u. dgl. Daß Kleemann eine vor der Mitte des Julius erhalten, möchte als Ausnahme anzusehen seyn. Die Raupe weidet auf Kirschen, wo sie ihr erster Entdecker, Kösel, fand, dann auf Weiden und Beyfuß; wie auch auf der Feuerstille (*Lilium bulbiferum* L.), wo man sie allhier zu Nirschenhausen 1786 fand und damit forsfütterte,

113. Die Stachelbeereule. *Phalaena Noctua Ribis*.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wellenlinie, zweyter Kakenkrautvogel (bey Gladbach).

Phalaena Noctua Dysodea, Gorkhausen IV. 262. 112.

— — — *Undulata*, Goeze Ent. Beytr. III. 3. S. 208.

— — — *Dysodea*, Esper IV. t. 153. f. 3—6. mit Raupe.

Kösel I. 2. Classe. Nachtwög. t. 55. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenamm und dachigen, ausgekappten Flügeln; die vordern sind weißgrau mit Braungrau bestäubt und mit Orangegelb vermischt, und haben die gewöhnlichen Narben mit orangefarbenen Ringen; die wenigsten Stücke haben ihre Querstreifen deutlich. Die streifförmige Anlage des Orangegelben und die allezeit stärkeren Zähne des Hinterrandes, nebst den ockergelblichen, aschgraubestäubten Hinterflügeln dieser Art unterscheiden sie von der vorhergehenden.

Das Männchen hat etwas gefaserte Fühlhörner, das beleibte und dunkler gefärbte Weibchen aber nicht.

Rau-

Raupe. Nackt, glatt, schlank, nach dem Kopf zu schmaler, übrigens einfarbig mattgelbgrün; auf jeder Seite über den Lufthöhern durchaus gelbgestreift. Wenn sie läuft, zeigen sich in den Einschnitten gelbe Ringe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese der vorhergehenden ähnliche Eule von fast gleichem Rückenlamm, Farbe und Umriss der Flügel, deren Narben orangefarben gerinzelt sind, und die Fabricius in der Mantissa und in der Entom. System. immer noch für eine Varietät der vorhergehenden mit Unrecht ansieht, konnte den Esper. und Vorkaufenschen Namen aus der Ursache nicht behalten, weil nach den mehrerwähnten Nachrichten vom Jahr 1797 die *Dysodea* Vienn. eine andere, und zwar die nachfolgende ist. Und der Goezische Name schickt sich nur für Spanner. Ihre Flügelbreite beträgt 1 Zoll und 9 $\frac{1}{2}$ Linien, und die Länge jedes Vorderflügels 10. Da wo einzelne Stücke drey weißliche Querstreifen in eben der Ordnung wie die vorhergehenden führen, sind die beyden ersten wellenförmig und mit einer schwarzen Linie begrenzt. Auch hier hat die in der Nähe des Hinterrandes erscheinende Reihe von Pommeranzenflecken in der Innenseite schwarze Pfeilflecken, wie obige. Die Franzen sind gesteckt und die weißlichen Zähne haben schwarze Winkelpuncte. Sowohl die streiförmige Anlage des Orangegelben und die allezeit stärkern Zähne am Rande, als auch die ocker gelblichen, aschgrau bestäubten Hinterflügel unterscheiden diese Eule von der vorhergehenden. Bey diesen Hinterflügeln wird ein aschfarbiger Schatten nach dem Hinterrand und in der Mitte ein dunkler Querstreif sichtbar. Der Hinterrand hat eine schwarze Franzenlinie. Die ganze Unterseite ist ebenfalls ockergelb, mit einem bräunlichen Querstreif, vor welchem auf den Hinterflügeln noch ein schwärzlicher Mondfleck steht. Die Fühlförner sind schwarzlich mit weißen Ringeln und bey'm Männchen etwas gefasert: alle übrigen Theile am ganzen Insect sind wie bey dem vorhergehenden. Wir haben auch Varietäten, wo die Hinterflügel über $\frac{2}{3}$ weiß sind.

Ihre Raupe hat einen kleinen, glänzenden, hellgrünen Kopf, der vor der Verpuppung braun wird, und einen einfarbig mattgelbgrünen, weißpunctirten Körper und gleichfarbige Füße; nur sind die vielen weißgelben Puncte nicht wie bey der vorhergehenden erhoben, sondern eben. Sie begibt sich im Junius in die Erde, um sich eine Erdhöhle auszuwühlen und auszuleimen, darin sie als rothbraune glänzende, mit kurzer Stielspitze versehene Puppe nach Kleemann drey Monate ruht. Bey Rösel währte ihre Puppenruhe durch eine Ausnahme drey Wochen. Ihre Räupchen kriechen im Herbst aus dem Cy.

Aufenthalt. Die Eule erscheint im August und September, und ist bey Nürnberg und im Steyermärkischen einheimisch. Ihre Raupe weidet im May und Junius nach Rösel auf Stachelbeeren, sowohl der gemeinen als der Gartenstachelbeere (*Ribes uva crispa* et *grossularia*), nach Kleemann auch auf Wegwart, Sauerampfer und Rahenfraut (*Nepeta*). Sie soll auch Borrage und Lindenblätter annehmen.

114. Die Wildstätteneule. *Phalaena Noctua Dysodea*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Petersilieneule, kleine orangegelb gefleckte Eule.

Phalaena Noctua Dysodea, Wiener Bz. 72. 5.

— — — Brahm II. 539.

— — Chrysozona, Vorkauf. IV. 264. 113.

— — Flavicincta minor, Esper IV. t. 153. f. 7. 8.

Kenzeichen der Art. Eule. Weit kleiner, als die vorhergehende, mit einem Rückenrann und gezahnten Flügeln; die vordern sind silbergrau, schwarzbestäubt mit drey deutlichen weißen Wellenstreifen von gewöhnlicher Lage; der Raum, in welchem die gewöhnlichen grauen Narben stehn, bildet eine breite graubraune, scharf begränzte Binde von ungleicher Breite. Ohnweit des Hinterrandes ist, wie bey beyden vorigen, eine orangefarbene Punctenreihe. Das Weibchen ist beleibt.

Raupe. Nackt, weißgrün, mit erhabenen glänzenden Puncten chagriniert, mit dunklem Rücken- und einem weißen Seitenstreif vom Kopf bis zum After; die Luftlöcher sind gelb.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese kleine Eule mißt von einer Flügelspitze bis zur andern nach hiesigen Exemplaren 1 Zoll und 3 Linien, und ist ebenfalls stellenweise orangefarben marmorirt, z. B. ohnweit der Wurzel, an der zweyten Narbe, besonders aber durch die Punctenreihe am Hinterrand, deren Puncte pfeilförmige schwarze Flecken zeigen. Die silbergraue, schwarzbestäubte Farbe ist ober- und unterhalb der braunen Binde die herrschende. Diese scharf begränzte Binde von einer ungleichen Breite macht den Raum aus, worin die grauen Narben stehn. Die drey weißen Wellenstreifen von gewöhnlicher Lage sind deutlich vorhanden und schwarz eingefasst. Der Bodderrand ist so wie die Franzen schwarz und weißgefleckt. Die Hinterflügel sind nach innen hell- und nach außen zu dunkelgrau. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel schwärzlichgrau, scheckig gefranzt und gegen den Innenrand gelblich. Die ockergelblichen Hinterflügel dieser Seite sind am Rande schwärzlich aschgrau mit einem gleichfarbigen Mittelpunct und Bogenstreif. Die Fühlhörner und Füße sind weißgeringelt, das Schulterblatt orangegelb. Uebrigens ist sie vom Kopf bis zum Hinterleib mit den Vorderflügeln, und am Hinterleib selbst mit den Hinterflügeln gleichfarbig. Sie variirt in Ansehung der dunkeln oder hellen Farbe der Binde und der mehr oder minder aufgetragenen Drangefarbe. Das Männchen ist nicht so beleibt, als das Weibchen.

Die Raupe ist am Kopf und an den Füßen weit dunkler, als am Leibe, übrigens nackt, weißgrün, mit erhabenen glänzenden Puncten chagriniert, mit einem dunkeln Rückenstreif und einem weißen Seitenstreif vom Kopf bis zum After; die Luftlöcher sind gelb. Wenn sie zu Ende des Maymonats zur Verwandlung reif ist, macht sie sich gleich der vorhergehenden eine Erdhöhle, worin sie als rothbraune, glänzende Puppe mit kurzer Endspitze 2 Monate ruht.

Aufenthalt. Die Eule zeigt sich in Deutschland nach Brahm schon im May und wieder im Julius und August, an Gartenschüren, Geländern und Mauern, daher derselbe 2 Generationen annimmt. Die Raupe weidet im May und Junius auf Petersilien, Benvuß, Thymian, und in hiesiger Gegend fanden sich 1782 einige auf Eichen, weshalb wir sie unter die Forstinsecten mit ordnen. Solche verpuppten sich am 21.

May,

May und entwickelten sich am 24. Julius. Nach der Zeit ist uns keine vorgekommen; daher wir über das Daseyn einer doppelten Generation nichts bestimmen können.

Anmerkungen. 1. Herr Esper hält unsere Stachelbeereule für die *Nyctodea Vienn.* und Herr Brahm die gegenwärtige dafür. Letzterer, der sie unmittelbar von Wien aus erhielt, hat in der Benennung und Benennung recht. Daher beziehen wir uns auf das, was bey der Stachelbeereule oben bereits gesagt worden.

2. Die hieher gehörige, 1½ Zoll messende Akeleyeule, *Phal. Noct. Chi L.*, Griechisches Chi, Chinachfalter, die in den Pinnrischen, Wiener, Fabricius', Vorkhausen', Esper- und Wiedelschen Schriften l. Th. Nachtr. 2. Classe. t. 13. vorkommt, lebt nur auf niedrigen Pflanzen, und hat einstimalen, vermuthlich nur durch Zufall, junges und ganz zartes Eschenlaub zur Nahrung angenommen. Sie, die Eule, ist kammrückig mit dachigen, gezahnten Flügeln, und ihre greisgrauen, aschfarbigbestäubten, mit zwey weißlichen, und dabey sehr bleichschwärzlich gerandeten Narben gezierten Vorderflügel haben unter diesen Narben die dunkelschwarze Figur eines Griechischen Chi (X). Die drey Wellenstreifen sind bleichschwarzgrau gerandet, die Hinterflügel bey dem Exemplar das ich habe, weiß, die Fühhörner aber weißlich geringelt. Ihre nackte, meergrüne und schlanke, am Bauch aschgrüne, mit zwey Längslinien auf jeder Seite bezeichnete Raupe findet sich in Deutschland jährlich zweymal, im May oder Anfang des Junius, und dann im August oder Anfang des Septembers, auf Akeley, Meesdistel, Hahnenkohl (*Sonchus arvensis*), Kletten (*Arctium Lappa*) und jungen Eschenblättern, und klettert, nachdem sie sich in einem zarten Gewebe zwischen Blättern eingesponnen hat, theils nach 4 Wochen, theils was die zweyte Generation betrifft, nach der Ueberwinterung der Puppe den Schmetterling. Ch.

115. Die Haeeicheneule. *Phalaena Noctua Xanthoceros*, Borkh.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbhörniger Nachtfalter, Rothköpfige Eule.

Phalaena Noctua Flavicornis, Wiener W. 72. 6.

Noctua — Fab. Ent. III. 2. 116. 352.

Phal. Noctua Xanthoceros, Borkhausen IV. 276. 117.

— — *Erythrocephala*, Brahm II. 67. n. 28.

— — — Esper IV. t. 121. f. 1—3. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenrücken und dachigen Flü-
geln; die vordern sind düster und mehrertheils olivengrün mit schwarzen Zügen und haben
drey fast silberfarbige, gezackte Wellenstreifen, zwey sehr kleine ovale Narben von gleicher
Größe, und an den gekleckten Franzen eine Reihe von sieben schwarzen Nöthchen. Die
Hinterflügel sind, den grauschattigen Hinterand ausgenommen, weiß, und die Fühhör-
ner gelb und beym Männchen dicker, als beym Weibchen.

Raupe. Niedlich, gelb mit rothem Kopf und schwarzer Seitenlinie. Sie hat
am ersten Gelenk eine Querreihe von 4 schwarzen Punkten, und vom zweyten bis letzten
Glied ist jedes derselben achtmal weiß und viermal schwarz punctirt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects.
Dieser Phaläne mißt bald 1 Zoll und 3, bald 1 Zoll und 4 Linien, und hat schmale düster-
graue Vorderflügel, die mehrertheils olivengrün sind und schwarze Züge bilden. Man be-

Uuu

merkt

merkt auf denselben drey fast silberfarbige und gezackte Wellenstreifen. Der erste Wellenstreif an der Wurzel ist oft kaum zu sehen; ihm steht der zweyte ziemlich nahe. Zwischen diesem und dem dritten ist der Raum oft sehr dunkel, bald ohne, bald mit rostgelber Mischung, und die sich gleichen Narben sind nicht zirkel- sondern länglichrund, äußerst klein. Aus der Flügelspitze neigt sich ein Schrägschrichelchen einwärts. Die hinter den drey Wellenstreifen stehenden schwarzen Pfeilspitzen bilden zuweilen eine doppelte Zickzacklinie, und in diesem Fall kommen vier Wellenstreifen heraus. Eine Reihe von 7 Mündchen zieht an oder durch die Franzen hin, die dadurch schäctig erscheinen. Der Vorderrand ist schwarzgefleckt, und die Hinterflügel, den Hinterrand ausgenommen, weiß, nebst den Franzen. Die Unterseite ist auch mehrertheils weiß mit braunen Franzen. Die Vordertheile des Insects sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig und der Hinterleib mit den Hinterflügeln gleichfarbig, bald ins matte Rosenroth fallend, zumal bey frischen Stücken. Die Rute sind schwarzgefleckt und die schwarzen Fußblätter weißgeringelt. Von den gelben Fühlhörnern ist ihr von Herrn Borkhausen der Name *Xanthoceros* beygelegt worden. Sie variirt sehr, und hat stellenweise bald mehr, bald geringere rothfarbene Flecken; wenigen mangelt die olivengrüne Mischung.

Die gar nicht seltene, rothköpfige Raupe ist gegen den Kopf hin und am Hinterende schmaler, als in der Mitte, und hat merklich starke Fressspitzen. Sie ist sehr niedrig, gelb, mit schwarzer Seitenlinie, und hat am ersten Gelenk eine Querreihe von 4 schwarzen Punkten, und vom zweyten bis letzten Glied ist jedes derselben achtmal weiß und viermal schwarz punctirt. So oft sie sich häutet, fängt sie ein lockeres Gespinnste zu weben an, damit sie ungestört bleibe. Und wenn sie ganz ausgewachsen ist, bemerkt man nie, daß sie die ihr gegebene Erde wählte, sondern sie spann sich in einem düstergrauen Gewebe zwischen Blättern ein, gemeinlich zu Ende des Junius, oder als Spätling gar zu Anfang des Augusts, um eine hellbraune, glänzende Puppe zu werden, die bey hiesiger oftmaliger Erziehung niemals in demselben Jahr als Phaläne erschien, sondern vom 1. Julius bis zum 1. April gerechnet, eine monatlische Puppenruhe hielt. Herr Kammerrath Borkhausen nimmt zwar zwey jährliche Erzeugungen an, davon die Puppen der ersten 4 bis 6, und die der zweyten den Winter durch ruhen sollen; allein wir möchten fast dergleichen Fälle als Ausnahmen von der Regel oder für Verwechselung halten.

Aufenthalt. Die Eule erscheint, wie gesagt, in unsern Gegenden zu Ende des März oder im April, an Eichenstämmen. Stubenwärme bey einer künstlichen Erziehung lockt sie früher heraus. Aber man beobachtete auch im Gegentheil bey einer künstlichen Erziehung ohne Stubenwärme, daß sie einstmahl, nämlich von 1801 30. Junius an bis 1804 16. April, folglich drey Winter im Puppenstande beharrte. Ihre Raupe lebt im May und Junius an den Eichen, besonders an dem jungen Laube, und hat ein langsames Wachsthum.

Anmerkung. Man darf diese *Flavicornis* Vien. durchaus nicht mit der *Flavicornis* Lin. verwechseln, welches *Fabricius* in seinen spätern Schriften immer noch thut, worüber *Graham*s Gründe a. a. O. nachzulesen sind. Um aber nicht 2 *Flavicornes* ins System zu bringen, haben wir

wir die Vorkhaufensche Benennung der Wiener und auch der Eiferschen vorgezogen. Letztere ist ohnehin schon von den Naturforschern an 1 bis 2 andere Phalänen vergeben.

Neunte Familie.

Rieselraupen. Holzfarbige Eulen.

Diese Raupen haben nach der Länge des Leibes 3 oder 4 helle Striche; die meisten sind über die grüne Haut mit weißen Punkten ganz bestreut, andere aber mit wenigern ordentlich besetzt, und leben in freyer Luft. Die Verwandlung geschieht in einem dünnen Gewebe unter der Erde. Die Eulen haben lange, schmale, an Farbe und länglichen Strichen dem faulen oder versteinerten Holze ähnliche Vorderflügel, meistens einen kleinen zweygetheilten Rückenflügel und abwachsende Haarschöpfe auf dem Leibe.

Weniger schädliche.

Anmerkung. Den Anfang macht die Schareneule, welche aber mehr nützlich als schädlich ist, indem sie als Raupe niedrige Kräuter, und unter den Stauden nur Himbeer, Steinbrombeer, auch Frie mentraut zur Nahrung wählt. Die Blüthen von Rosen, die man ihr vorlegt, die sie annahm, waren nur eine Ausnahme von der Regel. Diese Schareneule, Ph. Noct. Exoleta L., gemeine Nachteule, Moderholz, veralteter Nachfalter, Aspectenraupenphaläne, Brillenraupenphaläne, die in den Linneischen, Wiener, Fabricius, Vorkhaufens, Brahm, Eiper: und Kelschischen Schriften, I. Th. Nachtr. 2. Cl. tab. 24. mit der Raupe vorkommt, und im Ausmaß 2 Zoll 5 Linien hält, hat einen schwarzen Kammrücken und lanzetförmige, zusammengerollte Flügel. — Die Vorderflügel des Männchens haben der Länge nach zwey Felder, wovon das innere schwarzbraun schattirt, das äußere aber bräunlichgelb ist, mit einer kleinen verblichenen und einer größern Nierenmarke. In der Nähe des schattirten Hinterrandes ist eine zackige, gelbliche Querslinie, die in der Mitte ein lateinisches W bildet. Die Vorderflügel des Weibchens sind braun, gelblich und weißlich streichweise gemischt, mit zwey doppeltlängigen, ungleichen Nierenmarken, davon die zweite schwarzbeschattet ist. Beyde Geschlechter haben ohnweit des Hinterrandes eine doppelte Reihe schwarzer Punkte, etwas scheelige Franzen und fünf gelbe Vorderrandpunkte. — Die männliche Raupe mißt 2 Zoll 6 Linien, ist glatt, mattgrasgrün, mit 2 verblichenen, abgesetzten Rückenstreifen, in welchen auf jedem Glied in doppelter Zahl 2 weiße Spiegelpunkte stehn. Jede Bauchseite führt noch einen schwarzen Seitenstreif. Die weibliche 2 Zoll 8 Linien messende Raupe, die vornen schwächer als hinten ist, hat 2 gelbe Rückenlinien, an welchen eben solche doppelte Spiegelpunkte, aber schräger und zusammenhängender, in der Gestalt einer 8 oder einer 6 stehn, und dann am Bauch eine rothe Seitenlinie, über welcher sehr viele weiße Ringelrücken mit Einschluß der Luftlöcher stehn.

Die Raupen, die oft sehr heßigartig werden, weiden auf verschiedenen Waldes-Arten, Scharen (Serratula tinctoria et arvensis), Wolfsmilch, Lattich, Gänsefuß, Erbsen, Spargel, Besenstiechen, Geiß, Haubehel, Himbeer, Steinbrombeer und Gras. Sie verwandelt sich zu Anfang oder in der Mitte des Julius in einer ausgesponnenen Erdhöhle, worin sie 9 bis 12 Wochen, nämlich in den ersten 3 bis 4 Wochen, noch unverwandelt, und in den letzten 6 oder 8 Wochen im Puppenstande ruht, so daß sie in der Mitte oder spätestens zu Ende des Sep-

tembere sich entwickelt. Man braucht bey ihr keine doppelte Erzeugung anzunehmen; nur Spätlinge sind, die, statt im Herbst sich zu entwickeln, als Puppen überwintern, um im April gesügelt zu erscheinen.

116. Die Winterbirneule. *Phalaena Noctua Lithoxylea*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

<i>Phalaena Noctua Lithoxylea</i>	Wiener Verz. 75. 2.
Noct.	Fab. Ent. III. 2. 123. n. 371.
Phal. Noct.	Vorkhausen III. 324. 124.
— —	Muscalis Esper IV. t. 147. f. 5.

Kenntzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und dachigen Flügeln; die vordern sind aschgrau, am Vorderrand bey der Wurzel bräunlichgrau, am Hinterrand braunschattirt, mit 2 bräunlichen, zuweilen zusammenfließenden Narben in der Mitte, und hinter denselben eine Doppelreihe schwarzer Punkte. Das Weibchen ist größer, und beleibter als das Männchen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese aschgraue Eule, die am Vorderrand bey der Wurzel bräunlichgrau und am Hinterrand braunschattirt ist, mißt 1 Zoll 7 Linien, und ihre beyden Makeln bilden zuweilen eine bräunliche, oben gekrümmte Schattenbinde. Der Vorderrand ist schwarzpunktirt. Ihre Doppelreihe von schwarzen Punkten steht wie bey der Scharteneule, nämlich auf jeder Nerve 2 beisammen. Die Franzen sind weißgrau und schwarzbraun gescheckt. Die weißgrauen oder auch weißlichen Hinterflügel sind am Hinterrand fein braunschattirt, mit weißlichen Franzen. Auf der Unterfläche sind die Vorderflügel in der Mitte aschgrau, und um die Ränder glänzend weißgrau, und am Vorderrand aschgrau schattirt, mit oder ohne Spur eines Wischflecks. Alle übrigen Theile des Insects sind aschgrau bis auf die bräunlichen Fühlhörner. Bloß am dicken Leibe ist das Weibchen kenntlich. Die Wiener kannten die Raupe, ohne sie uns beschrieben zu haben.

Aufenthalt. Die Eule findet sich in Frankem und sonst hin und wieder in Deutschland, und ihre Raupe weidet auf Birnbäumen.

117. Die Steineicheneule. *Phalaena Noctua Sublustris*, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gestreifter Mönch (von dem Stamm am Halskragen), *Eubiusstrisnachfalter*, lichtgraue und punctirte Eule.

<i>Phalaena Noctua Petrificata</i>	Wiener Verz. 75. n. 3.
Noctua	Fab. Ent. III. 2. 123. 372.
Phal. Noct.	Vorkhausen IV. 326. 135.
— —	Brahm II. 54. 20. und E. 349.
— —	Naturforsch. IX. 142.
— —	Sublustris Esper IV. t. 133. f. 1. 2. aber etwas zu groß.

Kenntzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und schmalen, ausgezähnelten, dachigen Flügeln; die vordern sind schmutziggelb, gegen den Innen- so wohl

wohl als Hinterrand fuchsbraun mit mehreren kaum sichtbaren Zackenstreifen. Vor ihren bleichen und verloschenen Narben stehn 2 Paar und hinter denselben 7 Paar schwarzer Punkte in Querreihen auf den Nerven. Das Weibchen ist breitleibig.

Raupe. Nackt, grün, mit subtilen, weißen Nieselpuncten ganz besreut, mit einem breiten schneeweißen Längsstreif, und daneben 2 bis 4 schmalen gleichfarbigen Linien geziert; die weißen Luftlöcher sind geringelt.

Sie ist nicht abgebildet, gleichet aber in etwas der *Ph. Oleracea* Lin., welche **Kösel** I. Nachtwög. 2. Classe t. 32. abgebildet hat.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese schwer zu beschreibende Eule misst nach ihrer Flügelausbreitung 1 Zoll und 5 Linien, und ihre nebelichten schmalen Vorderflügel sind nach dem Außen- oder Vorderrande hin mit Schmutzigoockergelb gemischt, nach dem Innen- und Hinterrand aber strichweise fuchsbraun. Gleich nach dem von der Wurzel herkommenden kurzen Längsstrich steht eine Doppelreihe schwarzer Pünktchen, die nur auf den Nerven oder Adern sichtbar sind, und weiße neben sich haben. Hierauf zieht sich eine schwer zu unterscheidende einfache Zackenlinie vor den 2 ockergelben verloschenen Narben, nämlich der Ring- und der Nierenmarke, zwischen welchen der Raum zimmetbraun ausgefüllt ist. Sodann erscheint eine ebenfalls schwer zu findende Doppelzackenlinie, die an eine Querreihe schwarzer Punkte gränzt. Eine dritte bräunliche Zackenlinie folgt hierauf, von welchen acht schwarze Längsstrichelchen in die fuchsbraunen Franzen gehn. Am braungefleckten Vorderrand stehen nach vornen hin 3 oder 4 Punkte. Die ausgebogenen Hinterflügel sind aschgrau mit schwärzlichen Adern und ockergelben Franzen. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel aschgrau und die hintern greisgrau, alle nach dem Vorder- und Hinterrand etwas röthlich, mit einem dunkeln Mittelpunkt, hinter welchem die Hinterflügel noch einen Wischstreif haben. Der Kopf hat das Ansehen, als wäre er vierspitzig; dies kommt von den Haarschöpfen. Die meisten Theile dieses Insects sind fuchsbraun, außer den rostgelben, gekerbten, borstenförmigen Fühlhörnern und den schwarzbraunen Augen. Auch hat der Rücken des Hinterleibes braune Haarschöpfe, wovon der auf dem 4. Ring der stärkste ist. Im Eien hat diese Phaläne das Besondere, daß 3 Spitzen vornen über und am Halskragen hervorzuragen scheinen; auch gleichet sie, sobald sie die Flügel zusammenlegt, eben so wie ihre Familiengenossen, einem Stückerhen gefertigten Holzes. Es gibt auch fast ganz lichtgramebelichte, desgleichen mit Schwarzbraun überhäufte Varietäten.

Die ihr zugehörige, fast walzenförmige **Raupe** ist nackt, grün, mit subtilen weißen Nieselpuncten ganz besreut, mit einem breiten sehr weißen Längsstreif und daneben 2 bis 4 schmalen gleichfarbigen Linien geziert: die weißen Luftlöcher sind geringelt. Sie hat die Eigenschaft des Mordens gleich den sogenannten Mordraupen an sich, und soll sich nach *Brachm* theils zu Ende des Mays, theils zu Ende des Octobers verpuppen, und im ersten Fall 3 bis 4 Wochen, im letzten 5 Monate ruhen. Bey mir geschah das Verpuppen der Raupen in einer ausgepönnenen Erdhöhle meistens in der Mitte des Julius, so daß die Entwicklung nach 28, 37, oder auch 53 Tagen, mehrentheils zu Ende des Augusts erfolgt,

erfolgt, auch kam einst eine im August verpuppte noch im October desselben Jahres heraus.

Aufenthalt. Die Eule erscheint an den Stämmen der Eichen, nach Brahm im März und April, und hernach im Julius und August. Ich selbst habe keine Erfahrung von ihrer doppelten Generation. Vielleicht war die Erscheinung der Phaläne im März, bey Herrn Brahm eine Abweichung von der Regel. Die bey uns auf Flobkraut (*Polygonum persicaria*), auf Gras, desgleichen 1787 auf Haselsträuchen wachsende, bey den Wiener Naturforschern und Brahm auf Eichen, bey Herrn von Nottemburg und Borkhausen auf Linden sich nährenden Raupe ist im April und May vorhanden, bey Mayuz, aber nur als Ausnahme, auch in den Herbstmonaten, da dann die Puppe überwintert.

118. Die Rothweideneule. *Phalaena Noctua Putris*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Faulholz, Faulholzeule, Faulholzphaläne, weißliche und braungeränderte Eule, gelbgraue, vornen braungeränderte Eule, Rindenmotte.

Phalaena Noctua Putris Lin. 850. 152. Müller 694. 152.

— — — Wiener Verz. 75. 4.

Noctua — — Fab. Ent. III. 2. 123. 370.

Phal. Noct. — Borkhausen IV. 329. 136.

— — Subcorticalis Gleditsch II. 52. n. 49.

— — Putris Esper IV. t. 138. f. 45.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamme, schmalen, nicht sowohl dachigen, als eben aufliegenden Flügeln, die am Vorderrand braunbescharften Vorderflügel schmutzig verblichen gelb. Von ihren im Schatten liegenden Narben geht ein brauner, kurzer Längsstreif mit drey Strahlen in die Franzen, und vor diesen Narben ziehen 4 Paar, hinter den Narben 7 Paar schwarzer Pünctchen in Querreihen, und eine einfache Punctenreihe umschließt die Franzen, welche schmutziggelb sind.

Raupe. Nackt, braun, und dunkelgesteckt, nach Scriba und Gleditsch. Fabricius irrt wohl, wenn er sie als nackt, schwarzpunctirt und gelb, mit weiß. und bräunlichen Streifen und schwarzem Kopf beschreibt. Sie ist noch nicht abgebildet.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Diese kleine, gelbgraue, 13 bis 13½ Linien messende Eule hat am Vorderrand einen ins Braunrothe fallenden Schatten, worin die 2 Narben, die runde und die nierenförmige, welche verfinckert ist, und ein gelbes Mündchen zeigt, stehen. Von da aus geht ein kurzer, brauner Längsstreif mit 3 Strahlen in die Franzen. Vor den Narben ziehen 4 Paar, hinter den Narben 7 Paar schwarze Pünctchen in Querreihen, und eine einfache Punctenreihe umschließt die schmutziggelben Franzen. Hinter der ersten, kaum sichtbaren Doppelpunctreihe zeigt sich eine stark ausgeschweifte Zackenlinie, und vor der zweyten Doppelpunctreihe eine ähnliche. Die Hinterflügel sind weißlich, oder auch grauweißlich mit einer Reihe Puncte am Franzen-saume. Auf der gelbgrauen Unterseite haben alle Flügel einen schwarzen Punct und einen gemein-

gemeinschaftlichen Schattenstreif, und am Hinterrand eine Punctenreihe. Die Fühlhörner, die Einfassung des Halskragens und der Vordertheil des Rückens sind braun, die Fußblätter braun und weißgeringelt, alles Uebrige am Insect ist gelbgrau.

Da ich die Raupe nur einmal gehabt, und damals nicht genau beobachten konnte, so setzt uns das Vollständige ihrer Naturgeschichte. Scriba und Gleditsch nennen sie nackt, braun und dunkelgestreift. Die Puppe überwintert.

Aufenthalt. Die Eule wohnt zu Ende des Mays und Anfang des Junius an Baumstämmen, Bretterwänden und Gartenhütten, und ihre Raupe nährt sich im Sommer von Weidenblättern.

119. Die Weißscheneule. *Phalaena Noctua Rhizolita*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Strichmotte, Weißschennachtfalter, Pfeilträger oder Telsiera.

<i>Phalaena Noctua Rhizolita</i>	Wiener Verz.	75. 6.
Noctua	—	Fab. Ent. III. 2. 124. 373.
Phal. Noct.	—	Vorthausen IV. 343. 145.
—	—	Nau Forstw. 312. §. 737.
—	Ornithopus	Naturforsch. IX. 124.
—	Rhizolita	Eyer IV. t. 121. f. 6. und t. 25. B. f. 1. 2. Raupe und Puppe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm, feingezahnten und schmalen Flügeln; die vordern sind weißgrau mit Braun schattirt, mit kaum merklichen feinen Wellenlinien, einem schwarzen dreypästigen, kurzen Längsstrich an der Wurzel und mit den gewöhnlichen Narben in der Mitte, in deren Nähe ein schwarzer gabelichter Strich steht. Die zweite Narbe ist nach meinen Exemplaren stets mattröthlich angeflogen.

Raupe, die männliche. Apfelgrün mit einer weißlichen Punctenlinie über den Rücken, und einer gelblichen Seitenlinie. Ueber der letztern stehen auf jedem Ring 2 gelbliche Puncte, und unter der Seitenlinie 2 bis 3 gleichfarbige.

Weibliche. Wie die männliche, nur ist die Grundfarbe mehr blaulichgrün, und an den Seiten steht eine Linie mehr, nämlich über den Füßen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese nette Eule, welche von den verfeinerten Holzwurzeln den lateinischen oder vielmehr griechischen Namen hat, mißt 1 Zoll und 5 Linien. Die schmalen Vorderflügel sind weißgrau mit Braun schattirt, mit kaum bemerklichen feinen Wellenlinien, einem schwarzen, dreypästigen, kurzen Längsstrich an der Wurzel und mit den gewöhnlichen Narben in der Mitte, wovon die größere stets mattröthlich angeflogen ist und einen gabelichten Strich in der Nähe hat. Der Vorderrand ist schwarzgestreift, und den Hinterrand umgibt eine schwarze Punctenreihe. Die Hinterflügel sind aschgrau mit weißem Saum, und so auch die Unterseite aller Flügel, die dabey einen undeutlichen Mittelpunct und Quersstreifen haben. Die Fühlhörner sind bräunlich; die Füße haben an den Schenkelbeinen einen schwarzen Strich und die bräunlichen Fußblätter sind schwarz punctirt. Alles Uebrige am ganzen Insect

Insect ist grau gefärbt. Der Kopf und der Halsstragen ist so gebaut wie bey der Steineicheneule, nämlich der Kopf mit 4 Spizen, und der Halsstragen mit einem spizigen Kamm und einer Ecke auf jeder Seite.

Die Raupe ist nach Vorthausen apfelgrün mit einer weißlichen Punctenlinie über den Rücken, und einer gelblichen Seitenlinie. Ueber der letztern stehen auf jedem Ring 2 gelbliche Puncte, und unter der Seitenlinie 2 bis 3 gleichfarbige. Die weibliche Raupe ist eben so, nur ist die Grundfarbe mehr bläulichgrün, und an den Seiten steht eine Linie mehr, nämlich über den Füßen. Sie geht in der Mitte des Junius zur Verwandlung in die Erde, um sich im August, September und Anfang des Octobers zu entwickeln.

Aufenthalt. Die Eule findet sich an den Stämmen der Eichen und der Zwetschenbäume, desgleichen an Gartenmauern im September und October. Spätlinge, die im Herbst die Puppenschale nicht verlassen, erscheinen erst im April des künftigen Jahres. Die Raupe weidet auf Eichen und den verschiedenen Arten der schmal- und breitblättrigen Weiden.

120. Die Ellernbaumeule. Phalaena Noctua Conformis, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gabelmotte, schieferfarbige Phaläne mit eitzigem Brustschild, Bifurkennachtfalter, Eckbrust.

Phalaena Noctua Conformis	Wiener Verz. 76. 7.
Noctua	— Fab. Ent. III. 2. 124. 374.
Phal. Noct.	— Vorthaus. IV. 348. 145.
— —	— Grahns II. 550. und Hyperici 78.
— —	— Fuscifera Naturforsch. IX. 134.
— —	— Angulata Göze Entomolog. Beiträge III. 3. 254. (nach Degeer.)
— —	— Conformis Tabellarisches Verzeichniß der Brandenb. Schmett. II. t. 3. f. 1.
— —	— Bifurca Esper IV. t. 131. f. 1. zu dunkel. Doch ist solche verbessert und mit Verfüzung der Raupe auf einer neu eingezeichneten Tafel 125. B. f. 6—9. dargestellt.

Kenntzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamm und gezahnten schmalen Flügeln; die vordern sind braungrau mit drey bräunlichen, kaum sichtbaren, feinen Doppelwellenlinien, einem schwarzen dreijägigen längsrich an der Wurzel und den gewöhnlichen hellen Narben, in deren Nähe ein zweigabeligter schwarzer Strich liegt. Sie ist größer und anders gefärbt, übrigens aber ganz genau so gezeichnet, wie die vorhergehende.

Raupe. Glatt, zuerst grün, späterhin braun, mit vielen weißen Puncten besprengt, mit einem schwarzen Hals, einer längreihe kleiner ovaler, schwarzer und gelblich abwechselnder Flecken, und einer gelblichen Seitenlänglinie bezeichnet, die durch zwey schwarze, längliche Flecken unterbrochen wird.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese, der vorhergehenden an Zeichnung so ähnliche, schmalflügelichte Eule, misst auf 5 oder 6 Linien mehr, also ohngefähr 1 Zoll 12 Linien. Sie ist schiefergrau mit blassem Rothbraun

braun sanft gemischt; eben so sind auch die Franzen gesteckt. Ein schwarzer dreyästiger Längsstriich kömmt von der Wurzel her. Von den drey bräunlichen kaum merklichen Doppelstrichen stehn die beyden letzten hinter den hellen Narben, die einen schwarzen Gabelstriich in der Nähe haben. Die bräunlichgrauen, weißgefranzten Hinterflügel haben einen dunklern Mittelpunct und Quersstreif. Die Füßspitzen, Füßhörner und der Kopf sind braun, letzterer ist mit Grau gemischt, und nebst dem schiefergrauen und bräunlichgemischtem Hals tragen so gebaut, wie der vorhergehende, nämlich mit Spitzen und Ecken. Der Vorderleib hat die Mischung des Halsstragens, und der mit Haarbüscheln auf dem Rücken und in den Seiten und am After besetzte Hinterleib ist, so wie die Brust unten und die Füße rothbräunlich. Die Schienbeine sind schwarzgestrichet und die Fußblätter weißlich punctirt. Die Varietäten beziehen sich auf die mehr und weniger Mischung des hellen Schiefergrauen mit dem blassen Rothbraun.

Die in der Jugend grüne und nach der letzten Häutung braune, glatte, durch ihre schwarze und gelbliche Zeichnung sehr scheckig aussehende Raupe, deren Entdeckung man dem Baron Deger verdankt, ist am Kopf perlengrau und schwarzgesteckt, am ersten Ring oben schwarz und gelbgerändert, an den Seiten hellbraun, an Bauch und Füßen grünlich mit braunen Schattirungen und vielen weißen Puncten. Auch entdeckt man unter der Vergrößerung auf jedem weißen Rücken- und Seitenpuncte ein feines Härchen. Eine gelbliche Seitenlängelinie wird durch 2 schwarze, längliche Flecken unterbrochen. Sie ist im Junius zu ihrer Verpuppung reif und begibt sich nicht tief in die Erde, um sich ein außen mit Erde vermengtes, inwendig sanft ausgewölbtres Gehäuse zu verfertigen, worin die glänzende castanienbraune Puppe Zeit hat, sich entweder nach 8 bis 10 Wochen, oder bey Spätlingen nach 9 Monaten zu entwickeln.

Aufenthaltsort. Die in Deutschland und Schweden einheimische, in hiesigen Gegenden seltene Eule erscheint in der Regel in der Mitte des Augusts und im September, nach Brahm auch wieder im April. Ob dies in der Regel geschehe, oder Folge der Verspätung sey, wußte selbst Brahm nicht gewiß. Die Raupe nährt sich im May und Junius von den Blättern der Erle und der gemeinen Birke.

Anmerkung. Die Schwarzeicheneule, P. N. Pulla Vien. ist uns nicht bekannt, auch in den Wiener Nachrichten von 1797 durch keine Nachweisung auf Schriftsteller aufgeklärt worden.

121. Die Conradskrauteule. *Phalaena Noctua Perspicillaris*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Brille, Brilleneule.

Phalaena Noctua Perspicillaris Lin. 849. 148. Müller 693. 148.

— — — — — Wiener Verz. 76. 11.

Noctua — — — — — Fab. Ent. III. 2. 92. 273.

Phal. Noct. — — — — — Borchhausen IV. 337. 139.

— — — — — Brahm II. 256.

— — — — — Dallingers gesammelte Nachrichten über den Fich-
tenspinner — und die übrigen auf dem Nadelholz
lebenden Raupen. Weissenburg, 1798. mit drey
Kupfern.

Er f

Phalaena

Phalaena Noctua Perspicillaris Hübners V.träge I. 4. tab. 4. fig. N.

— — — Eipers Eulen tab. 134. f. 3.

— — — Papillons d'Europe f. 236.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Kammrücken und dachigen gezahnten Flügeln; auf den brandbraungestreiften Vorderflügeln laufen hellfarbige Strahlen sowohl aus der Wurzel, als der Mittelfläche, auf welcher sich eine hellfarbige Mondnarbe befindet.

Raupe. Bald grün mit einer weißen, breiten Rücken- und einer dergleichen Seitenlinie (nach Fabricius); bald braunroth mit einem sehr weißen Seitenstreif (nach hiesigen Stücken).

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese in der Esperschen Abbildung zu blaß, in der Hübnerschen zu groß und zu schlecht gerathene, sonst aber schöne Eule mißt nach hiesigen Exemplaren 1 Zell 3 bis 4 Linien. Den gezahnten Vorderflügeln geben die stellenweis matt und dunkelgrüne, theils gelblichweiße, theils violett-schillernde Mischungen ein eignes buntfarbiges gestreiftes Ansehen. Von der Wurzel aus läuft ein weißer, mit schwarzen Linien begränzter Längsstreif oder Strahl bis bald an die starke, mit einem weißlichen Mittelstrich versehene Mondnarbe; von da ziehen vier Strahlen bis in die gelbroth gescheckten Franzen, nämlich zwey weiße in der Nähe der Flügelspitze und zwey violett-schillernde weiter hinab. Am Vorder- und Hinterrand ist eine ähnliche Schillerung und am Hinterrand ragt ein stumpfer Zahn hervor. Die gelbgefranzten, in einer gewissen Richtung ebenfalls schillernden Hinterflügel sind an der Wurzel hellgrau, nach dem Hinterrand zu dunkelgrau. Auf der Unterseite haben die hellgrauen Vorder- und weißen Hinterflügel einen oft mennichrothen, oft rothfarbigen Limbus am Vorder- und Hinterrand; letzte auch ein kleines Mittelmöndchen. Der am Halsragen und an den Schulterblättern weiße, im übrigen brandbraune und schillernde Vorderleib hat hinten einen in die Höhe stehenden purpurbehaarten stumpfen Rückenpinsel, und der Hinterleib ist wie die Hinterflügel gefärbt. Bey Varietäten sind die Mischungen stärker oder schwächer.

Die nach Fabricius a. a. O. bemerkte, grüne, von feinen Pünctchen rauche, und mit feinen Härchen besetzte Raupe, die eine weiße Rücken- und eine schmälere Seitenlinie haben soll, muß wohl auch variiren. Denn ich (Scharfenberg) fand sie, wenigstens das einzigmal, da sie mir vorgekommen ist, braunroth mit einem sehr weißen Seitenstreif, und sie verpuppte sich in einem Gewebe am 7. August 1798, um sich nach einer $10\frac{1}{2}$ monatlichen Ruhe am 28. Junius 1799 zu entwickeln.

Aufenthalt. Die Phaläne zeigt sich nach Brahm im südlichen Deutschland schon im April an Föhrenstämmen, bey uns aber erst zu Ende des Junius, und zwar äußerst selten, daher sie, wenn keine 2 Generationen etwa statt finden, eine ungleiche Entwicklungszeit haben muß, so wie auch ihre Nahrungspflanzen verschiedener Art sind, indem ich sie, so wie die Wiener, auf dem Johannis- oder Conradskraut, nämlich dem durchlöchernten (*Hypericum perforatum*) im Julius erwachsen fand. Da sie aber Fabricius auch am Astragalus, Ahorn und Pflaumen gefunden, und Dalling-

ger,

ger, Pfarrer zu Bettbrunn in Franken, sie zu den schädlichen Mandelsorft-Insecten zählt: so verdient sie die Aufmerksamkeit des Forsmanns um desto mehr.

Zehnte Familie.

Spreckenraupen. Geradgestrichte Eulen.

Die Raupen sind nackt, bräunlich oder grün; die meisten haben 5 helle Striche nach der Länge des Leibes, auf dem Rücken weißliche wohl merkbare Punkte, inegemein nur 4 auf jedem Ri. ge. Die Verwandlung geschieht unter der Erde in einer Höhlung. Die Eulen haben auf den fast einsfarbigen röthlichgrauen Vorderflügeln die gewöhnlichen 2 Narben mit einer hellern Linie umzogen, und gegen den Hinterrand eine fast eben solche gerade Querlinie. Der Rücken ist rauh, die Fühlhörner des Männchens ein wenig gekämmt.

Erste Linie. Die Raupen sind grün.

Weniger schädliche.

122. Die Mandelseule. *Phalaena Noctua Instabilis*, Wien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Mandelnachtstalter, Chamäleon (von ihrer veränderlichen Farbe).

<i>Phalaena Noctua Instabilis</i>	Wiener Verz. 76. r.
Noctua	— Fab. Ent. III. 2. 44. 119.
Phal. Noctua	— Borkhaus. IV. 591. 245.
— —	— Brahm II. 10. 5.
— —	Incerta Naturforscher IX. 119.
— —	— Gleditsch I. 442. II. 50.
— —	Instabilis Mau Forstw. 305. §. 715.
— —	— Esper IV. t. 151. f. 3.
— —	Trigutta Esper IV. t. 147. f. 4.

Kösel I. Nachtrdg. 2. Classe t. 53. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit eher rauhem als glattem Rücken und dachigen Flügeln; die vordern sind von unbeständiger Farbe, allezeit fein bestäubt, zuweilen mattröthlichgelb, zuweilen blaugrau, mit 2 wenig sichtbaren gelbgrauen Querstreifen, zwischen welchen die zwei gelbgeringelten Narben stehn, wovon die größere halb schwärzlich gefärbt ist; noch ein gelber, fast gerader Querstreif steht am Hinterrande. Ueberdem zieht sich bey den blaugrauen und andern hellfarbigen Varietäten eine nicht ordentlich begränzte, rothe oder schwärzliche Mittelbinde zwischen den Narben durch. Die Fühlhörner des Männchens sind etwas gekämmt.

Raupe. Die männliche ist gelblichgrün, die weibliche blaulichgrün und dickfleischig; beyde sind mit vier Reihen gelber erhabener Pünctchen besprenkt, mit einem unbeständigen, grünen Rückenstreif, und einem gelben, breiten, Längstreif in den Seiten geziert.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects.

Diese nicht der Hauptzeichnung, sondern mehr der Farbenmischung nach, unbeständige, 1 Zoll 8 Linien messende Eule ist bald blaugrau (*Trigutta* Esp.), bald aschgrau, bald leberfarben, bald gelblichroth, bald roßbraun (*Instabilis* Esp.), allezeit fein bestäubt. Der gelbe, nach dem Vorderrand hin etwas abgesetzte, und nach dem Innenrand einwärts gebogene, auf Espers t. 151. f. 3. vergessene Familienstreif von fast gerader Richtung ist auf der innern Seite dunkel gerandet, oder auch an 3 Stellen mit dunkeln Flecken bezeichnet, die bey einigen ins Schwarze fallen. Zwischen 2 andern gelbgrauen Querstreifen, die selten ganz deutlich da sind, stehen die zwey geringelten Narben, wovon die größere halb schwärzlich gefärbt ist. An den gelbreichen Franzen steht eine Punctenreihe. Die Hinterflügel sind entweder aschgrau oder gelbgrau, hinten allezeit aschgrau schattirt, mit einem verblischnen Mondfleck und gelbgrauen Franzen. Die glänzende, graue, mit Braun bestäubte Unterseite hat nichts Auszeichnendes, als eine Wischpunctenreihe, und einen sehr schwarzen Mittelpunct, zuweilen in der Gestalt eines Mondflecks. Kopf, Vorder- und Hinterleib sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig; doch ist letzterer ein wenig bleicher. Die blaugraue Varietät, an der sich eine nicht deutlich begränzte rothe oder schwärzliche Mittelbinde zwischen den Narben durchzieht, hat stellenweis gröbere Atomen und Bestäubung, als die dunklere. Die Fühlhörner des Männchens sind ein wenig gekämmt.

Die Raupe von beyden Geschlechtern hat einen bläulichgrün glänzenden Kopf, mißt 1 Zoll und 9 Linien, und variirt zuweilen mit einigen Längslinien mehr. Besonders ist die männliche gelblichgrün, die weibliche bläulichgrün und dickleibig; beyde sind mit 4 Reihen gelber erhabener Pünctchen besprenzt, mit einem unbeständigen grünen Rückenstreif, und einem gelben, breiten Längstreif in den Seiten geziert.

Vor Ausgang des Junius verpuppt sie sich in der Erde. Die rothbraune Puppe ruht 9 bis 9½ Monate.

Aufenthalt. Die Eule findet sich fast überall in Deutschland, der Regel nach im März und April an Lindenstämmen; doch lockt sie die Stubenwärme, oder im Freyen freundliche Wintertage, wohl schon im Februar heraus. Die Raupe weidet auf allen Steindobstarten, Zwetschen, Pflaumen, Kirschen, Mandeln, Linden, Ulmen, Eichen, nach Kleemann auch auf Haselsträuchen.

Anmerkung. 1) Herr Fabricius hat nebst mehreren Unrichtigkeiten, die in Ansehung der Schmetterlinge seinen frühern Schriften eigen sind, auch diese mit in die Entomolog. Systemat. hinübergebracht, daß er Röfels t. 53. zur *Noctua Stabilis* zieht, welches ihm mehrere Entomologen nachgeschrieben haben.

2) Herr Vorkhausen hat auch mit Recht die *Phal. Turbida* und *Contacta* Esperi mit unserer Phaläne vereinigt.

123. Die Lindeneule. *Phalaena Noctua Stabilis*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Zweyte Kirscheneule.

Phalaena

Phalaena Noctua	Stabilis	Wiener Bl. 76. 2.
Noctua	Cerasi	Fab. Ent. III. 2. 44. 118.
Phal. Noct.	Stabilis	Vorkauf. IV. 588. 244.
— —	—	Brahm II. 347.
— —	Gracilis	Nau Forstw. 305. §. 716.

Kennzeichen der Art. Eule. Nicht ganz glattrüdig, mit dachigen Flügeln; die vordern sind mehrentheils fleischfarb. braun, und haben gelb geringelte Narben, einen gelben Familienstreif; vor und hinter demselben aber eine Reihe mattbrauner Punkte.

Raupe. Bläßgrün, gleichbreit und dick; hinter dem Kopf und auf dem vorletzten Abßatz ist ein deutlicher, gelber Halbring oder Halbmond in die Quere. Zwischen den 3 gelben Rückenstreifen sind zahllose, kaum erhabene Tüppelchen, die im Alter vergehen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Bey dieser Eule, die von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll 4 Linien misst, mochte man Espers Werk nicht nachweisen, dessen Pulmonaris t. 151. f. 5. von den Wiener Naturforschern in dem mehrgedachten Aufsatz von 1797 zwar allegirt wird, welches aber wirklich für ein Versehen zu halten ist. Unsere Eule variiert vom Aschgrauen bis zum Leberbraunen, doch nicht in der Masse, wie die vorhergehende. Außer ihren 2 gewöhnlichen, gelb geringelten Narben hat sie auch noch eine Zapfenmarbe. Bey einzelnen Stücken zeigt sich eine Schattenbinde in der Mitte und einige verbliehene Querlinien. Vor und hinter dem Familienstreif ist eine Reihe mattbrauner Punkte.

Die blaßgrüne, gleichbreite, dicke, nur dünn- und kurzhaarige Raupe, die hinter dem Kopf und auf dem vorletzten Abßatz einen deutlichen, gelben Halbring oder Halbmond in die Quere, und drey gelbe Rückenstreifen in die Länge hat, ist mit zahllosen, etwas erhabenen Tüppelchen besetzt, die im Alter vergehen; und sie unterscheidet sich von der nächstvorhergehenden dadurch hauptsächlich, daß ihr der an jeden gelben Seitenstreif gränzende schwarzgrüne Nebenstreif mangelt, den jene noch hat. Sie besitzt auch die Eigenschaft des Mordens. Ihren dunkelgrünen Kopf nennt Fabricius blau, man weiß nicht warum. Sie tritt vor und nach der Mitte des Junius ihre Verpuppung gewöhnlich in, zuweilen über der Erde, jederzeit ohne Gespinnst, an. Die glänzende braune zwerspitziige Puppe liegt 9 Monate, ehe sie zur Entwicklung reift. Sie ist nicht gut zu erziehen, weil sie nicht trocken liegen darf.

Aufenthalt. Die Eule zeigt sich in der Mitte des März an Linden, wo die Raupe vom Monat May bis Junius lebt, die außerdem auch von Buchen, Pappeln, Eichen und Ulmen sich nährt.

Anmerkung. Hier ist die mehr nützliche als schädliche Ackerbeereule, Phal. Noct. Lepida, Brahm., anzumerken, welche auf Forsünkräutern lebt, und in Vorkaufens und Brahms Schriften beschrieben, in den Scribaischen Beyträgen aber tab. 18. f. 7. in Abbildung dargelegt wird. Ihr Ausmaß enthält 1 Zoll 2 bis 4 Linien. Sie hat auf den saßlgrauen, undeutlich gezeichneten Vorderflügeln die beyden Narben undeutlich; hierauf den lichten, bräunlichskatirten Familienstreif oder Linie; vor und auch hinter der Merennarbe, welche sich im untern Theil schwarz färbt, hat sie jedesmal eine Punktenreihe. Die Hinterflügel sind weißlich mit einer mattschwarzen Punktenreihe, welche auch auf der eben so beschaffenen, und noch mit einem

nem

nem schwärzlichen Mittelpunct bezeichneten Unterseite durchschlägt. Die von Brahm entdeckte, noch nicht abgebildete, vor ihrer letzten Häutung gelblichgrüne, nachher aber röthlichbraune Raupe hat ein Paar verloschene Puncte oder Wäzchen auf jedem Ring, welche durch die zwischen ihnen hindurchlaufende Pulsader getrennt werden. Die Luftröhren sind schwarz. Sie weidet im May und Junius auf Brombeer und Ackerbeer (*Rubus caesius*), und verwandelt sich gegen die Mitte des Junius in der Erde, um sich im April oder May des folgenden Jahres zu entwickeln.

Zweyte Linie. Die Raupen sind bräunlich.

Weniger schädliche.

124. Die Wasserweideneule. *Phalaena Noctua Lota*, Vienn. (Bomb. Lota, Lin.)

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Schwarzpunct, Weidendorraphaläne, Lortaler.

Phalaena Bombyx Lota Lin. 830. 70. Müller 690. 70.

Bombyx — Fab. Ent. III. 1. 454. 145.

Phal. Noct. — Wiener Bz. 76. 6.

— — Vorkauf. IV. 601. 250.

— — Hippophaës Goetze entomologische Beyträge III. 3. 252. u. 32. Bomb. Lota.

Phal. Bomb. Lota Esper III. t. 67. f. 1.

Kenzeichen der Art. Eule. Die Flügel sind dachig; die vordern glänzend, aschgrau, bald mit Röthlichbraun, bald mit Gelb gemischt, mit den gewöhnlichen beyden, kleinen, gelben Narben, wovon die nierenförmige schwarz ausgefüllt ist; hinter derselben steht eine schwarze Punctenreihe, und hinter solcher ein gerader, gelber, einwärts vortherandeter Querstreif, der etwas gebrochen ist. — Bey dem Männchen sind die Fühlhörner gekämmt, und der Hinterleib mehr gebartet, als bey dem Weibchen.

Raupe. Schwarzgrau, mit hellbraunem Kopf und 2 Reihen weißlicher Punctchen zwischen den 3 gleichfarbigen Linien; auf jeder Seite zieht ein sammetischwarzer und ganz unter denselben ein schneeweißer Längsstreif herab. Die Unterseite ist heller.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule, die eben nicht oft gesehen wird, mißt 1 Zoll und 3 Linien, und die glänzenden aschgrauen, bald mit Röthlichbraun, bald mit Gelb gemischten Vorderflügel führen einen tiefschwarzen Mittelpunct, der weiter nichts ist, als die halbe Ausfüllung der Nierennarbe, welche so wie die ovale sehr klein und gelb ist, mit Roth gerandet. Der Familienstreif fällt durch seine Röhre sogleich in die Augen, und vor derselben läuft noch ein gezackter Querstreif, der sich zuweilen in eine Punctenreihe verwandelt. Die Hinterflügel sind aschgrau mit einem verblichenen Mittelfleck. Auf der Unterseite sind dieselben gelblich, mit Braun bestäubt; von dieser Farbe ist auch die Randbinde der aschgrauen Vorderflügel; alle haben einen verloschenden Mittelfleck und dergleichen Streifen. Alle Theile und Glieder der Phaläne sind aschgrau. Es giebt auch Varietäten, die ins Achatfarbene fallen, und andere,

andere, die eine mittlere Schatterbinde in die Quere haben, die sich durch die hintern fortsetzt. Die gekämmten Fühls Hörner und der bärtige Hinterleib ist das Merkmal des Männchens.

Die Raupe, die uns in Guesly's Magazin vom Chorherrn Meyer bekannt gemacht ist, und die nach Art der Raupen unserer siebenzehnten Familie zwischen zusammengepönnenen Blättern ihr Leben hindringt, verwandelt sich zu Ende des Julius in ein Kömchen von Seide und von Erde, um sich nach 4 bis 6 Wochen zu entwickeln.

Aufenthalt. Die Eule erscheint im September in Gärten und an Gartenhäusern. Ihre Raupe klettert auf Weiden im Junius und Julius.

Anmerkung. Herr Esper hat nicht nur nach Vorgang des Linne' diese Eule seinen Spinnern zugeordnet, sondern auch die folgende.

125. Die Gartenbirneule. *Phalaena Noctua Munda*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Doppelpunct.

<i>Phalaena Noctua Munda</i>	Wiener Verz. 76. 7.
<i>Noctua</i>	Fab. Ent. III. 2. 48. 129.
<i>Phal. Noct.</i>	— Dorkhausen 603. 252.

Kennzeichen der Art. Eule. Stattrückig, mit dachigen Flügeln; die graubraunen Vorderflügel haben undeutliche Narben und den gelblichen Familienstreif, daran auf der Innenseite bald 2, bald 3 Paar schwarze Rundflecken liegen.

Wenn Männchen sind die bräunlichen Fühls Hörner gekämmt, und der Afer ist stärker gebartet, als beym Weibchen.

Raupe. (Nach Fabricius) nackt, grau und schwarzbunt mit einer ziegelrothen Seitenlinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese graubraune Eule misst bey anderthalb Zell, und ihre Narben sind oft sehr undeutlich, zuweilen gelblich eingeseift. An dem gelblichen Familienstreif liegen auf der Innenseite bald 2, bald 3 Paar schwarze Rundflecken. Die bräunlichen und am Hinterrand dunklern Hinterflügel führen einen verbliebenen Mittelmond und röthliche Franzen. Unten zeigt sich auf allen 4 bestäubten Flügeln ein schwärzlicher Mittelmond, und auf den vordern noch eine Punctenreihe. Bey manchen Stücken ist oben auf den Vorderflügeln eine Quere-Schattenbinde zu sehen. Alle Theile des Körpers sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig, nur der Hinterleib ist heller. Die gekämmten Fühls Hörner und der bärtige Afer verrathen das Männchen.

Die nackte, grau und schwarzbunte, mit einer ziegelrothen Seitenlinie versehene Raupe ist noch nicht abgebildet. Sie hat oft auch Ähnlichkeit mit der Raupe von *Noctua Brallicae*. Bey uns kroch sie am 9. Junius 1794 in die Erde, worin sie 9½ Monate ruhte.

Aufenthalt. Die Eule, welche ich (Scharfenberg) erzog, erschien am 25. März 1795, bey Dorkhausen wird auch der Julius angegeben. Die Raupe, welche sich

sich im May und Junius bey uns auf Klee und Grasarten fand und damit genährt wurde, soll nach den Wienern auf Birn weiden.

Anmerkung. 1) Sie darf nicht mit der Munda des Gleditsch, das ist, der Bombyx Mündana, Borkhauf., welche kein Forstinsect ist, vermischt werden.

2) Die Waldeicheneule, Ph. Noct. Pulverulenta, Esp., hat sowohl Kennzeichen von dieser Familie, als von der funfzehnten; wir werden sie der letzten zuordnen.

126. Die Eichbuscheule. Phalaena Noctua Cruda, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Crudanachsfalter.

Phalaena Noctua Cruda	Wiener Bz. 77. 9.
— — —	Borkhausen IV. 613. 257.
— — —	Espan IV. t. 152. fig. 4.

Kennzeichen der Art. Die Vorderflügel sind kastanienbraun, mit den gewöhnlichen Narben, die schwarz ausgefüllt und hell eingefasst sind. Unter der Ringnarbe steht ein schwarzer Punct, und an der Wurzel 2 schwarze Flecken.

Das Männchen macht sich durch die schwarzgekämmten Fühlhörner kenntlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese kastanienbraune, von Esper in Abbildung dargestellte Eule mißt ungefähr einen Zoll 8 Linien, wie die Mandeleule, und hat einen etwas geschwungenen hellen Familienstreif, der auf der hintern Seite dunkler gerandet ist. Die gewöhnlichen Narben sind schwarz ausgefüllt, und hell eingefasst. Unter der Ringnarbe steht ein schwarzer Punct und an der Wurzel 2 schwarze Flecken. Auf der röthlichweißen, braunbestäubten Unterseite haben alle Flügel einen Mittelpunct und eine braune Punctenreihe hinter demselben, so auch einen ähnlichen am Hinterrand. Die Vordertheile der Phaläne sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig, der Hinterleib ist gelbgrau. Die Fühlhörner des Weibchens sind ungekämmt, und die des Männchens gekämmt.

Aufenthalt. In einigen Deutschen Gegenden. Die uns unbekannte und noch nicht abgebildete Raupe lebt nach dem Wiener Verzeichniß auf Eichen.

Dritte Linie. Die Raupen sind lichtgrau.

127. Die Mayeneule. Phalaena Noctua Advena, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Phalaena Noctua Advena	Wiener Bz. 77. 11.
Noctua —	Fab. Ent. III. 2. 125. 375.
Phal. Noct. —	Borkhausen IV. 615. n. 258.

Kennzeichen der Art. Mit einem zweypaltigen Rückenkamm und dachigen Flügeln, die gezahnt sind; die braun und grau gemengten vordern haben die gewöhnlichen Narben und hinten einen abgekürzten schwarzen Streif.

Beschrei-

Beschreibung des vollkommenen Insects. Diese von Fabricius zuerst beschriebene Eule gehört zu den größern Arten, und ihr Familienstreif, den sie gegen den Hinterrand der braun und grau gemischten Vorderflügel führt, ist abgekürzt. In der Mitte befinden sich die Ring- und Nierenwarbe; die Hinterflügel sind schwarzbraun. Der Vorderleib hat einen erhabenen doppelten Rückenkamm, der gleichsam rinnenförmig ist. Die Phaläne und Raupe sind beyde noch nicht abgebildet, und in unserer Nähe eben so wenig einheimisch, als die vorhergehende.

Aufenthalt. Die Raupe äßet nach dem Zeugniß der Wiener Naturforscher und des Fabricius auf den Birken.

Man weiß nicht, ob die *Noctua Advena* des Biewegischen Tabellarischen Verzeichnisses der Brandenburgischen Insecten die nämliche sey oder nicht.

Elfte Familie.

Seitenstreifraupen. Schwarzgezeichnete Eulen.

Diese Raupen sind fast walzenförmig, haben an den Seiten über den Füßen einen breiten weißen Streif, oder eine sehr merkliche Blasse, mehrere, auch auf jedem Ringe ein Paar schwarze Striche oder Fleckchen; wechseln mehrentheils in der nämlichen Art mit Braun und Grün. Die Verwandlung geht in einer Erdhölse unter der Erde vor. Die Eulen haben einen kleinen längsgetheilten Rückenschopf, auf den Vorderflügeln am Hinterrande fast wie die vorhergehenden eine helle, aber mehr gekrümmte Querlinie, bey dem Anfang am Vorderrand zusammengefloßene schwarze Punkte, oder auch im Mittelraum zwischen blassen Querstichen sammettschwarze Fleckchen.

Erste Linie. Die Eulen mit schwärzlichen Punkten am Vorderrande.

Weniger schädliche.

128. Die Korbweideneule. *Phalaena Noctua Litura*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Dreystrich, Eule an Korbweiden.

<i>Phalaena Noctua Litura</i>	Lin. 858. 192.	Müller 703. 192.
— — —	Wiener Berk. 77. 2.	
— — —	Vorkauf. IV. 525. 311.	
— — —	Esper IV. t. 177. f. 4. 5.	zu farbig.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamm und weißgrauen Flügeln; die vordern sind am Vorderrand mit vier kurzen mattschwarzen Flecken bezeichnet, die in gleichen Entfernungen von einander stehen, und die gewöhnlichen Narben sind nach Verhältnis äußerst klein.

Raupe. Grün mit bleichem Kopf, einer blassen Rückenlinie und einem weiß und gelb gefleckten Seitenstreif.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese nach den hiesigen Stücken 1 Zoll und 5 bis 6 Linien messende Eule ist der vordern ersten Hälfte nach, nämlich von der Wurzel bis zur Gegend der zweyten Narbe, weißgrau, und was die letzte Hälfte betrifft, mehr aschgrau. Von den vier kurzen mattschwarzen Randflecken steht der erste an der Wurzel, der zweyte ist doppelt und steht am vordern Ende einer schwärzlichen Wellenlinie; der dritte steht gerade bey der größern Narbe; der vierte ist eine Pariser Linie von der Flügelspitze entfernt, und wie eine Schrägspitze gestaltet. Man wird bey keiner Phaläne so unregelmäßige Narben, als bey dieser, gewahr; die, welche ringsförmig seyn sollte, ist schwarz und so klein, wie ein Punct, und die größere ist länglich, nicht gar so klein; beyde sind hell eingefast. Die hintere Hälfte der Flügel theilt sich durch 2 helle wellenförmige Streifen in drey völlig gleiche Felder, wovon das mittellste etwas schattiger ist. Die Punctenreihe an den Franzen ist sehr verblichen, und die aschgrauen Hinterflügel haben weißliche Franzen. Auf der Unterseite sind alle Flügel glänzend hellgrau, die vordern mit einem Mittelfleck, die hintern mit einem Mittelpunct. Das ganze Insect hat die Farbe der Flügel. Bey Varietäten sind die Hinterflügel weißlich, und am Hinterrand schwach schattirt, mit oder ohne einen Mittelpunct.

Die grüne, bleichköpfige Raupe mit einer blassen Rückenlinie und einem weiß und gelb gefleckten Seitenstreif, deren Bekanntmachung von Borkhausen herrührt, fand derselbe im August, in welchem Monat sie sich auch zur Verpuppung in die Erde begab, und darin überwinterte.

Aufenthalt. Die Eule erscheint im April, und ihre Raupe ernährt sich auf allerley Weiden-Arten im Julius und August.

Anmerkung. Die Fabriciussche Noct. Litura Ent. III. 2. 108. n. 326., die auch in seltenen frühern Schriften vorkommt, weicht von unserer ganz und gar ab.

129. Die Spätpflaumeneule. *Phalaena Noctua Depuncta*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Punctstreich, punctirte Eule.

<i>Phalaena Noctua Depuncta</i>	Lin. 358. 191. Mäßer 709. 191.
<i>Noctua</i> —	Fab. Ent. III. 2. 109. 327.
<i>Phal. Noct.</i> —	Borkhaus. IV. 528. 212.
— —	Esper IV. t. 177. f. 3?

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückentamm und greisaschgrauen Vorderflügeln, die mehrere tiefschwarze Randpuncte am Vorderrand, eine Punctenreihe am Hinterrand und die gewöhnlichen, hell eingefastten Narben haben, welche schwärzlich sind und von der gewöhnlichen Gestalt etwas abweichen.

Raupe. Bläßgrün, kleinköpfig, etwas dick, mit vielen weißen Puncten und drey weißen Rückenstreifen, davon der mittellste stärker ist. An jeder Seite steht noch ein starker Seitenstreif. Unter dem Bauch ist sie weiß.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 1 Zoll und 4 Linien messende Eule ist kleiner als die nächstvorhergehende, und bey-

nähe

nahe wie die Klebkrauteule. An der Wurzel stehen 2 tiefschwarze Puncte, und dann noch vier dergleichen am Vorderrand, wovon der zweyte braun, die übrigen schwarz sind, so daß der letztere einem Schrägsiriche ähnelt. Der Querlinien, die wellenförmig und fein sind, können vier gezählt werden; die erste ist da, wo (die Wurzelpuncte nicht mit gezählt) der erste Randpunct steht; die zweite ist ein Schattensstreif, welcher zwischen den beyden schwärzlichen, hell eingefassten Narben durchzieht; die dritte fängt mit ihrer Krümmung oben beym dritten Randpuncte an; und die vierte, am vierten Punct anfangende, helle, ist derjenige, in welchem die Punctenreihe steht. Der kleine Raum zwischen den beyden Narben und dem Vorderrand bildet einen Wischfleck. Noch eine an den Franzen stehende zweyte Randpunctenreihe ist äußerst verblühen. Die etwas gebogenen Hinterflügel sind aschgrau, am Hinterend braunschattirt mit weißen Franzen. Die Unterseite aller Flügel ist bleischaschgrau und glänzend, und so wie die Unterseite der vorhergehenden Eule gezeichnet. Die Fühlhörner sind bräunlichgelb; alle übrigen Theile des Leibes mit den Vorderflügeln gleichfarbig. Die Fußblätter sind dunkel und hell geringelt.

Die Raupe, welche einige Aehnlichkeit mit der Klebkrautraupe hat, ist bläulichgrün, kleinköpfig, etwas dick, mit vielen weißen Puncten und drey weißen Rückenstreifen, davon der mittellste stärker ist. An jeder Seite steht noch ein starker Seitenstreif. Unter dem Bauch ist sie weiß. Sie ist mit mehrmals zu Theil geworden. Zuweilen war die Grundfarbe bleichgelbgrün, und jeder der drey Rückenstreifen bestand aus einigen grünen Linien. Sie verpuppten sich in der Erde am 12. und 21. Junius, ein andermal erst am 20. Julius; allemal kamen die Phalänen in der ersten Septemberwoche, also bald in 12, bald in 10, bald in 7 Wochen zum Vorschein.

Aufenthal. Die Eule zeigt sich im September in Gärten und in Waldungen, in Deutschland und in Schweden. Die anderwärts noch nicht beschriebene und abgebildete Raupe näherte sich bey uns an Eichen, Rosen, Aepfeln und Pflaumen; die bleichgelbgrüne Varietät der Raupe aber auf der weißen Gartensilie (*Lilium candidum* Lin.).

Anmerkung. Man hat oben bey Nachweisung der Esperischen Abbildung ein Fragezeichen gemacht, wegen ihrer Abweichung. Auch war der Esperische Text dazu zur Zeit der Vergleichung noch nicht geliefert.

Zweyte Linie. Die Eulen haben schwarze Flecken im Mittelraum.

Weniger schädliche.

130. Die Bindlatticheule. *Phalaena Noctua Plecta*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleinere weißgeschleyerte Eulenphaläne, mißbräuchlich Dickrand, statt Weißrand, Geigenbognennachtsfalter (bey Lang in Augsburg), Hübeler (bey Gladbach zu Frankfurt).

Phalaena Noctua Plecta Lin. 852. 157. Müller 695. 157.

— — — Wiener B. 77. 6.

Yyy 2

Noctua

Noctua	Plecta	Fab. Ent. III. 2. 65. 182.
Phal. Noct.	—	Vorkh. IV. 478. 190.
—	—	Boez. Entomologische Beyträge III. 2. 158. wo, statt Glimblatticheule, Glimblatticheule zu lesen.
—	—	Esper IV. t. 143. f. 4. 5. ohne Raupe.
—	—	Knoch's Beyträge III. t. 1. f. 12. die eigentliche Raupe.

Kleemann's Taf. 23. mit Raupe, aber abweichend; und die Eule ist zu groß.

Kennzeichen der Art. Eule. Etwas kammerstückig, mit glänzenden kastanienbraunen Vorderflügeln, an welchen der Vorderrand und die beyden Narben, die eysörnige und halbmondsförmige, weißlich sind; und mit glänzend weißen Hinterflügeln.

Raupe. (Nach Knoch.) Bald hell, bald dunkelgelb; der Kopf ist röthlichbraun, die zwey ersten und das letzte Glied sind grünlichbraun; jede Seite hat an den röthlichen Lustlöchern einen mennichrothen Längstreif, über welchem noch zwey feine gleichfarbige Längslinien laufen.

Kleemann's Raupe ist von schlechtgrüner Farbe, mit durchleuchtenden Eingeweiden, einem braunen Kopf, einer dunkelgrünen Rückenlinie und einem grünlichgelben Seitenstreif versehen; und ist also Varietät.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese von einer Flügelspitze bis zur andern nur 1 Zoll und 1 Linie messende, kleine Eule mit glänzenden kastanienbraunen Vorderflügeln, welche Kleemann um 5 Linien zu breit, und nebst der Raupe zu groß gemacht hat, weswegen sie Esper für eine ganz abgesonderte Art hält, wird sehr leicht an dem weißen Randschleier kennbar, der am Vorderrand in einer ziemlichen Strecke in die Länge, in einer bis an die weißlichen Narben reichenden Breite hinzieht, und der untenher von einer schwarzen Linie begränzt ist. Von der Flügelspitze bis an den Schleier stehen drey hellfarbige Punkte. An einem der hiesigen Stücke zieht sich noch eine verblichene, weiße Querlinie in der Nähe des Hinterrandes durch. Die Hinterflügel sind glänzend weiß. Auf der Unterseite sind alle Flügel gegen den Innenrand weiß, und am Vorderrand braun schattirt; so wie auch der Hinterrand der Vorderflügel. Diese haben einen verblichenen schwärzlichen Querstreif, der als eine Punctenreihe durch die mit einem Mittelpunct versehenen Hinterflügel fortläuft. Die Vorderseite der Eule sind bis auf die helle Einfassung des Halskragens mit den Vorderflügeln gleichfarbig, und der Hinterleib ist aschgrau. An den Füßen und Fußblättern befinden sich gelbe Flecken und Ringe.

Die Raupe mit dem herzförmigen Kopf in der Knoch'schen Abbildung ist die gewöhnliche, und hat auf dem gelben Rücken eine etwas röthliche, unten aber eine grünliche Mischung. Sie ist bald hell, bald dunkelgelb; der Kopf ist röthlichbraun; die zwey ersten und das letzte Glied sind grünlichbraun; jede Seite hat an den röthlichen Lustlöchern einen mennichrothen Längstreif, über welchem noch zwey feine gleichfarbige Längslinien laufen. Die Einschnitte sind auf jeder Seite mit einem mennichrothen Querstreifchen geziert. Zuweilen sind die rothen Längslinien schlechtroth oder ganz schmutzig. Wenn sie zur Verwandlung reif ist, wölbt sie sich in der Erde eine Höhle, um sich in eine rothbraune, nachher schwarz werdende Puppe zu verwandeln; die hinten vier Häkchen von ungleicher Größe hat.

hat. Von Kleemann troch die schlechtgrüne, mit dunkelgrüner Rückenlinie und grünlichgelbem Seitenstreif variirende Raupe schon am 7. September 1762 ein, und verpuppte sich in ihrem Gehäuse nicht eher, als im April 1763, worauf sie nach 6 Wochen, nämlich am 29. May, sich entwickelte.

Aufenthalt. Die Eule zeigt sich im May oder Junius, und die Raupe weidet vom Julius bis in den Herbst auf Gartenlattich, Gartenmelde, Sellerie, Mangold, Tobak, Wallstroh (Galium), Wegwarze (Cichorium Intybus) und Endivien (Cichor. Endivia). Weil sie aber nach Kleemann auch auf Pfirschen, und nach dem Zueschyschen Magazin auf Lindenblättern zuweilen sich findet: so verdient sie eine Stelle unter unsern Forstinsecten, nämlich in dem Fall, daß diese Nahrung nicht etwa eine Ausnahme von der Regel sey.

131. Die Klebekrauteule. *Phalaena Noctua Gothica*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gothische Schrift, Spinner mit Gothischen Buchstaben, Gothischer Nachfalter, Degeerisches schwarzes C.

<i>Phalaena Noctua Gothica</i>	Lin. 851. 159. Müller 696. 159.
— — Nun atrum	Wiener B. 78. 9.
<i>Noctua</i> —	Fab. Ent. III. 2. 66. 185.
— — Gothica	Fab. Ent. III. 2. 85. 249.
<i>Phal. Noct.</i> —	Borkhaus. IV. 484. 192.
— — —	Grahm Inf. I. 49.
— — — C-nigrum	Degeer II. t. 5. f. 10.
— — — Gothica	Knob III. t. 4. f. 4—6. mit Raupe.
— Bombyx —	Esper III. t. 76. f. 1. 2.
<i>Noctua</i> —	Panzeri Fa. 43. t. 23.

Sie darf aber nicht mit Linne's C-nigrum vermengt werden.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamm und flachdachförmigen, wenig ausgekerbten Flügeln; die vordern sind röthlichbraun, mit drey falben Quercinien und 2 fast ganz verblichenen Narben. Die Ringnarbe ist mit einem tiefschwarzen Hebräischen Nun (N) umzogen; unweit davon steht ein schwarzes Strichelchen, und am Vorderrand zwey tiefschwarze Randpuncte.

Das Männchen unterscheidet sich durch die gekämmten Fühlhörner und den doppelten Bart am After.

Raupe. Sanft gezeichnet, mattgrün, dick, aber vornenher abnehmend, mit unzähligen weißen Püppelchen und drey gelblichweißen Rückenlinien, wovon die mittlere dicker ist, und mit einem schneeweißen Streif auf jeder Seite geziert. Der Kopf verliert seine Puncte nach der letzten Häutung.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 1 Zoll und bald 5, bald 6 Linien messende Eule mit röthlichbraunen Vorderflügeln wird durch drey gezackte und gebogene falbe Quercinien in vier ungleiche Felder getheilt, wovon das zweyte zuweilen eine schimmelfarbige Mischung hat. Das erste Feld fängt mit
zwey

zwey an der Wurzel stehenden tiefschwarzen Puncten an, und geht bis zur ersten Quерlinie. Von da erstreckt sich das zweyte Feld, das die beyden ganz am Vorderrand stehenden, bleichen Narben enthält, bis zur zweyten Quерlinie. Die Ringnarbe ist von einer tiefschwarzen, weiß gesäumten Figur eingeschlossen, die Linne' und Fabricius einen Bogen nennen, und die der erste mit einem Alrgothischen Buchstaben, die Wiener Entomologen aber mit einem Hebräischen Nun verglichen haben. Zwischen dem Innenrand und der Nierenarbe steht vor der zweyten Linie noch ein tiefschwarzer, ebenfalls hell gesäumter Strich. Das dritte Feld zieht sich bis zur dritten Linie, an die sich ein weißlicher Schatten anschmiegt, und das vierte Feld, als das schmalste, geht bis an die Franzen, die durch die dunkeln Puncte der Kerben ein etwas scheckiges Ansehen erhalten. Am Vorderrand sieht man zwey schwarze, starke, und näher nach der Spitze desselben Randes einige gelbliche Puncte. Die sehr glänzenden grauen Hinterflügel haben einen unmerklichen Mittelpunct, und hinter demselben zuweilen einen bleichen Bogenstreif. Die bleichgraue, röthlich schattirte, und mit einem gemeinschaftlichen röthlichen Bogenstreif bezeichnete Unterseite zeigt auf den Hinterflügeln gewöhnlich einen schwarzen Mittelpunct, bey manchen meiner Stücke aber auch einen von der Mitte bis an die Wurzel reichenden schwarzen Längsstrich; obgleich Fabricius a. a. O. vielleicht durch einen Druckfehler angiebt, daß diese Seite der Hinterflügel einen weißen Punct hätte: *posticae subtus puncto centrali albo*. Durch die gekämmten Fühlhörner und einen Doppelbart am After macht sich das Männchen kennbar. An jedem Gelenke der borstenförmigen Fühlhörner des Weibchens steht in seines Härchen. Das übrige ganze Insect ist rothbraun, nur der Hinterleib etwas heller.

Die Raupe ist sanft gezeichnet, mattgrün, dick, aber vornenher abnehmend, mit unzähligen weißen Püppelchen und drey gelblichweißen Rückenlinien, wovon die mittellste dicker ist, und mit einem schneeweißen Streif auf jeder Seite bezeichnet; und von ihren unzähligen Püppelchen nehmen sich auf jedem Ring zwey gelblichweiße am meisten aus; auch die Einschnitte sind etwas gelb. Der Kopf verliert seine Puncte nach der letzten Häutung. Sie begiebt sich nach der Mitte des Junius (bey Knoch aber durch eine Verspätung und Ausnahme zu Ende des Julius) in eine von ihrem Saft ausgeleimte Höhle zur Verwandlung in die Erde; unerachtet sie sich im Nothfall auch zwischen Blättern verpuppen kann. Ihre braunrothe Puppe führt zwey Endspitzen, und ruht gewöhnlich 9 Monate.

Aufenthalt. Die Eule sieht man vom März an bis zur Mitte des Aprils an Zäunen, Gartenthüren, an den Stämmen der Eichen- und Lindenbäume. Ihre im May und zu Anfang des Junius vorhandene Raupe nährt sich nach Knoch vom Liebekraut (*Galium aparine*), Geißblatt und Weiden, nach Brahm auch auf Eichen, Linden, Ulmen und mehreren Arten von Liebekraut (*Galium*), bey mir aber auf Eichen, Heckenkirschen, Äpfeln, Zwetschen und auf Gras, desgleichen einsmalen 1787 auf der Feuerlilie (*Lilium bulbiferum*).

Anmerkung. Sie ist von P. N. Nun atrum Vorkhaufens IV. 495. verschieden, die, wie derselbe selbst S. 809. bezeugt, bloß eine Varietät von P. N. C-nigrum Lin. ist.

132. Die Saarbaumeule. *Phalaena Noctua Ypsilon*, Vien. (*Corticea*, *Esperi*).

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rindensfarbige Eule.

<i>Phalaena Noctua Ypsilon</i>	Wiener B. 78. 13.
— —	Borkhauf. IV. 503. 200.
— — <i>Corticea</i>	Esper IV. t. 145. f. 2. 3.

Darf so wenig mit *Corticea* Vien. als mit *Ypsilon* in den Scribalschen Beiträgen, und eben so wenig mit *Hufnagels Ypsilon* vermengt werden.

Kenzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamm und ein wenig gekerbten Flügeln; die vordern haben eine veränderliche Grundfarbe, vom Braunen bis zum Gelblichen, mit drey Querstreifen; zwischen dem 2. und 3. derselben stehen die beyden gewöhnlichen Narben, welche gelbgrau und mit einer weißen sowohl als schwarzen Einfassung umzogen sind, deren Zwischenraum meistens in Form eines Ypsilon mattschwarz ausgefüllt ist. In der Nähe der Ringnarbe befindet sich eine gleichfarbige Zapfennarbe.

Raupe. Braun, mit drey hellen Rückenlinien, davon die mittelfte rautenförmige Abtheilungen hat, und jede zur Seiten stehende mit schwarzen Flecken begrenzt ist.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Flügelbreite macht gemeinlich 1 Zoll, 3 bis 3½ Linien aus. Die Grundfarbe ist bald umbrabraun, bald graubraun, bald blaßrindensfarbig. Von den drey blassen, dunkelgerandeten Querstreifen ist der erste nahe an der Wurzel abgebrochen, und so undeutlich wie der zweyte, welcher geschlängelt ist. Zwischen diesem und dem dritten, der sehr deutlich ist, stehen die ersörmige und die nierenförmige Narbe, beyde gelbgrau und mit einer weißen sowohl als schwarzen Einfassung umzogen, in deren Zwischenraum sich ein Ypsilon dem Auge darstelle. In der Nähe der Ringnarbe befindet sich eine gleichfarbige Zapfennarbe. Der Hinterrand hat eine Punctreihe und der Vorderrand ist dunkel gefleckt und gelb punctirt. Die Hinterflügel sind bald graubraun, bald gelbgrau, bald weißlich mit Grau schattirt. So veränderlich ist auch die bestäubte, mit den Hinterflügeln gleichfarbige Unterseite, wo die vordern in einem schwärzlichen Schattenraum einen schwörzlichen Schatten und Querstreif haben, der auch durch die hintern zieht, die überdem auch einen schwarzen Mittelpunct haben. Der Hinterleib hat die Farbe der Hinterflügel, und das übrige ganze Insect, wenn man die gelbliche Spitze an den Füßspitzen ausnimmt, die Farbe der Vorderflügel. Bey Varietäten fließen die beyden Narben ganz zusammen, und die Figur eines Ypsilons bildet sich dann auf eine andere Art, nämlich vermittelt der dabey stehenden Zapfennarbe. Bey dunkeln Varietäten sind die Narben nicht schwarz gemischt, sondern, die Einfassung allein ausgenommen, mit der Grundfarbe ganz gleichfarbig. Borkhausen besaß eine Varietät, wo zwischen der Nierennarbe und dem letzten Querstreif noch ein bogenförmiger Streifen sich zeigte.

Die Raupe ist braun, mit drey hellen Rückenlinien, davon die mittelfste rautenförmige Abtheilungen hat, und jede zur Seite stehende mit schwarzen Flecken begränzt ist. Ihr Bauch ist unter den Luftlöchern hellfarbig, und sie soll anfänglich zwischen zusammengepönnenen Blättern, zuletzt aber in den Rissen der Baumrinde wohnen. Ihre Verwandlung geschieht in der Erde.

Aufenthalt. Die Eule erscheint im Junius und Julius auf Weiden, und Pappelstämmen, wo auch die Raupe sich nährt, jedoch in hiesigen Gegenden wenig gesehen wird.

Bemerkungen. 1. Esper hat nach Längs in Augsburg Vorgang seine Corticea mit der Corticea Vien. vereinigt; allein die Wiener haben in den Nachrichten von 1797 ihr Ypsilon und diese Esperische Corticea für Ein Geschöpf erklärt, wie es auch schon Vorkhausen vermuthete; weswegen man in dessen Naturgeschichte a. a. O. Seite 505. bey Corticea Esp. das Fragezeichen austreichen kann.

2. Vorkhausen hatte anfänglich in Scriba's Beyträgen eine gewisse, von Esper tab. 130. f. 1. als Scolopacina getaufte Eule unter dem Namen Nun atrum auf der Platte, und: Ypsilon im Text, bekannt gemacht; widerruft aber a. a. O. seiner Naturgeschichte S. 477. beyde Bestimmungen, und gibt ihr den Namen: Hepatica; wobey ich dann im Vorbeygehen bemerke, daß in den erwähnten Wiener Nachrichten diese leberbraune Eule zwar für ihre Hepatica erklärt, dabey aber doch zu erkennen gegeben wird, daß die von ihnen weit später entdeckte wahre Linnéische Hepatica eine ganz andere sey, welche sich an die Familie der Geradgestrichen noch anschliesse, und in Espers Werke, wenigstens damals, noch nicht abgebildet gewesen.

3. Eine zur dritten Linie dieser Familie: mit schwarzen Puncten und gelben Hinterflügeln geordnete Art, die Sauerampferenule, Ph. Noct. Pronuba L., frisst nicht auf Weiden, wie Gleditsch II. 51. angibt, sondern auf ganz andern Pflanzent, die nicht zu Bäumen und Sträuchen gerechnet werden.

4. Ferner die eben zu dieser Linie gehörige Heidelbeer enule, Phal. Noct. Myrtilli L., Noctua Ericae Hufnagelii, Sumpfschneckenule, Eule an der Waldheide, Waldmotte, Stockbändchen (bey Gladbach), die in den Linnéischen, Wiener, Fabricius, Vorkhausen, Gleditsch. (I. 328.) und Mösserschen Schriften IV. tab. 11. fig. A. B. vorkommt, ist mehr nützlich, als schädlich. Diese sehr niedliche, nur einen Zoll in der Flügelausbreitung messende Phalane, ist kammerförmig und ihre bräunlichrothen, wie Sammet aussehenden Vorderflügel haben einen weissen, beynahe dreieckigen, und unter solchem noch einen weißgrauen, verloschenen Fleck, am Hinterrande eine doppeltgeschweifte, gelbe Querslinie, und rothbraune und weißgefleckte Franzen. Ihre oramentarbigten Hinterflügel haben eine breite, sammet-schwarze Randborde. Die grüne, blaupförmige Raupe hat 5 erhöhte, stumpfe, viereckige Spizzen, die nach außen zu weiß sind, auf ihren Ringen, wird im Junius und Julius auf den Forstunkräutern: der Wald- und Sumpsheide (Erica vulgaris et tetralix), schwarzen und Sumpsheidelbeere, auch bey uns, allemal aber selten, gefunden, webt sich im Julius in ein Gespinste ein, um sich im August als Phalane zu entwickeln. Cw.

Zwölfte Familie.

Breitstreifraupen. Jaspisfarbige Eulen.

Diese Raupen haben gewöhnlich auf dem Rücken und an den Seiten helle deutliche und so breite Streifen, daß dieselben mit der Grundfarbe oder den dunkeln Streifen fast in gleichem Verhältnisse stehen. Sie leben, obschon bey Tage einigermassen verborgen, doch in freyer Luft. Die Verwandlung geschieht in einer Höhle unter der Erde. Die Eulen haben einen kleinen getheilten Rückenschopf, abhangende breitere Vorderflügel, meistens von lieblichen vermengten Farben, am Hinterrand eine helle, sehr merklich geschwungene oder gezahnte Querlinie; mehrere haben noch eine Zapfennarbe, einige auch erhabene weißliche Nerven.

Erste Linie. Die Vorderflügel sind braunröthlich gemischt.

Eine mehr schädliche.

433. Die Forleule (Kieferneule). *Phalaena Noctua Piniperda*, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Förcheneule.

B o m b y x	S p r e t a ,	F a b . E n t . I I I . 1 . 455 . n . 151 .
Phalaena Noctua	Piniperda ,	V o r k h a u f . E u l e n I V . 443 .
—	—	v o n H e s t a r f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e B e m e r k u n g e n . B r a u n -
—	—	s c h w e i g 1792 . S e i t e 219 .
—	—	B e c h t e i n s N a t u r g e s c h . d e r s c h ä d l . W a l d i n s e c t e n . S . 66 .
—	—	B e c h t e i n s M u s t e r u n g 10 . 202 .
—	—	B e s o r g t e r F o r s t m a n n 179 . T a f . 5 . u n d 367 .
—	—	N a t u r f o r s c h . X I . S . 27 . t . 3 . m i t R a u p e .
—	—	P a n z e r s b e s o n d e r e B e s c h r e i b u n g d i e s e r P h a l ä n e t . 1 . f i g .
—	—	1 — 12 . m i t R a u p e .
—	—	H e n n e r t s R a u p e n t r a g . t a b . 2 . f i g . 1 — 3 . m i t R a u p e .
—	—	D a z e l s F o r t w i s s . I . 311 . f . 16 — 18 . m i t R a u p e .
—	—	E s p e r s E u l e n t . 125 . f . 1 — 6 . m i t R a u p e .

D. R o b t s w a h r e U r s a c h d e r B a u m t r o c k n i ß d e r N a d e l w ä l d e r d u r c h d i e F o r s t p h a l ä n e . F r a n k - f u r t u n d L e i p z i g 1790 . 4 .

Kennzeichen der Art. Eule. Die Flügel sind dachförmig; die vordern bräunlichroth, nach der Wurzel zu gelbgemischt. Von den zwey fappenförmigen gelblichen Querstreifen ist der vordere gerade und der hintere geschweift; zwischen ihnen steht eine runde und eine nierenförmige Narbe. Das Weibchen ist beleibter.

Raupe. Unbehaart, grasgrün, mit einem weißen Rückenstreif und in jeder Seite zwey dergleichen Seitenstreife, worauf noch ein rother oder ein orangegelber Bauchstreifen folgt, und einem grünen Bauch versehen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Sie ist von einer Flügelspitze bis zur andern 1 Zoll und 4 Linien breit, vom Kopf aber bis zum Hinterende $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Zoll lang, und von Jüvely aus Irrthum zwar *Pinaetri* genannt worden, aber von der eigentlichen *Noctua Pinaetri* L. mit der Flügelfigur, Knoch

Beiträge III. t. 3. verschieden, welche Linne' vom zufälligen Aufenthalt des vollkommenen Insects benannt und dadurch zu Irrungen Anlaß gegeben hat.

Von den obigen Abbildungen unsers Insects ist die in der Panzerschen kurzen Schrift die beste, und die in dem Däzelschen Werke zu sehr verschönert. Die Eule selbst, die vor dem Jahre 1784 noch in keinem System verzeichnet war, hat nicht sowohl ganz abgerundete, als fein gekerbte Flügel, die bräunlichroth, nach der Wurzel zu gelbgemischt sind. Außer 2 kappenförmigen, gelblichen Quersstreifen, welche am Innenrande zusammenlaufen und die weißen Narben einschließen, zeigt sich an der Wurzel eine Spur von einem dritten Streif. Die am Hinterrand auslaufenden Adern sind hellgelbgestrichelt, die Franzen bunt aus Hellgelb und Braun, und die dreyeckig abgerundeten Hinterflügel sind mehr oder weniger schwarzgrau mit einem röthlichen Schimmer und weißlichen Franzen geziert, durch welche eine rothe Linie zieht. Alle Flügel sind unten ockergelblich, ihr Mittelpunct aber nebst dem Quersstreif braun. Die spitzigzulaufenden Fühlföhner sind nebst dem kleinen Kopf, dem weißeingesakten Halsfragen und dem haarigen Brustücken braunroth, letzterer zugleich weißgestreift. Der aus 7 Ringen bestehende Hinterleib ist graubraun, und die Füße rothbraun mit Gelb gefleckt.

Varietäten haben theils eine blässere, theils eine ockergelbe Farbe mit braunrothen Schattirungen.

Das Weibchen unterscheidet sich blos durch den dicken Hinterleib, seine mehrere Größe und weniger dunkles Colorit.

Die ungesellige Raupe, welche im May oder Junius das Ey verläßt, ist anfänglich blaßgelb oder weißlich grün, und bekömmt nach der zweyten Häutung einen weißen Rückenstreif, in jeder Seite 2 gleichfarbige, worauf noch ein pomeranzgelber oder rother Bauchstreif folgt. Ihr Kopf ist nach der letzten Häutung glatt, glänzend, herzförmig getheilt, von rothgelber oder rothbrauner Farbe; der Leib unbehaart, und wenn sie sich ausstreckt, vornen und hinten etwas zugespitzt; die Grundfarbe des Leibes ist grasgrün, der Bauch grün, und ihre Länge beträgt, wenn sie im August ausgewachsen ist, 1½ bis 2 Zell, worauf sie sich zu Ende des Monats unten am Fuß ihres Nahrungsbaums, in der Erde, oder unter der Streu, oder im Moos, in eine glatte, schwarze oder rothbraune, kbfasige Puppe, und zwar in einem dünnen Gespinste verwaandelt. Diese mit 2 Schwanzspitzen und zehn Ringen versehene Puppe überwintert, und hat eine 7 bis 8 monatliche Ruhe nöthig, um sich im April oder May, je nachdem die Witterung für sie günstig ist, zu entwickeln.

Aufenthalt. Die Eule und ihre Raupe leben in Rieserwäldern, wo die erstere im Frühjahr an den Stämmen und Aesten bey Tage sitzt, und des Nachts herumschwärmt. Die Raupe nährt sich im Julius und August von keinem andern Nadelbaum, als der Rieser, die bey Nürnberg Forl, in Bayern aber Förcchen, statt Föhren, genannt wird, und zieht die alten Nadeln den jungen saftigen vor.

Fortpflanzung. Die weibliche Eule legt gewöhnlich 30 bis 50 Eyer an die Spitze der Nadeln, und die jungen Raupen entwickeln sich daraus nach zehn bis vierzehn Tagen.

Fein.

Feinde. Keine Raupe hat so viele Feinde, als diese. Von hundert kommen kaum einzelne davon. Gewisse Fliegen-Arten, dann Zehrwespen und Bastardwespen legen ihre Eier in sie, und außer den Meisen und Spechten gibts noch mehrere Vögel, die sie hinwegfressen. Folgendes Verzeichniß der ihr nachstrebenden Insecten befindet sich in der Zeitschrift des Herrn Freiherrn J. J. von Lynker: der besorgte Forstmann. Weimar, 1798. Seite 468 in der Note: 1. Die große Ameise, *Formica herculanea* L. 2. Die Rabenmücke, *Musca corvina* L. 3. Die Johannisbeermücke, *Musca ribesii* L. 4. Die Fleischmücke, *Musca carnaria* L. 5. Die Mohnmücke, *Musca morio* L. 6. Die Hectentotenmücke, *Musca hotentota* L. 7. Die schwarze Stiletfliege, *Nemotelus niger* Degeer. 8. Der durchbohrende Raupentödter, *Ichneumon compunctator* Schrank. 9. Die Gürtelmücke, *Musca scripta* L. 10. Die Brechmücke, *Musca vomitoria* L. 11. Die wilde Mücke, *Musca fera* L. 12. Die graue Raubfliege, *Ailus cinereus*. 13. Die Krähenmücke, *Tipula cornicina* L. 14. Die schwarze Raubfliege, *Ailus ater* L. 15. Die vierspunctirte Bastardwespe, *Scolia quadripunctata* L. 16. Die Sandbastardwespe, *Sphex sabulosa* L. 17. Der raubende Raupentödter, *Ichneumon raptorius* L. 18. Die bandirte Stiletfliege, *Nemotelus fasciatus* Degeer. 19. Die Safran-Tanzmücke, *Tipula crocata* L. 20. Der reutende Raupentödter, *Ichneumon equitatorius*. Die richtigen deutschen Benennungen werden wir unter den nützlichen Insecten bey Beschreibung dieser 20 Arten beybringen.

Schaden. Sie hat schon die größten Verwüstungen in deutschen Waldungen bald in Gemeinschaft der großen Raupe vom Kiefernspinner, bald für sich allein angestellt, und im Anspachischen, bey Schwobach, Roth und Schwand 1783 über dreihundert Morgen Kiefernholz zu Grunde gerichtet. In der Börliger Heide hat sie im Jahr 1783 auf dem Brandrevier allein die Summe von 18494 Klastern Holz zu Schanden gemacht. *) Auch soll sie sicher diejenige seyn, die schon 1725 in der Nähe jener Anspachischen Gegenden zusammen eintaufend Morgen Landes Holz abgefressen. Im Jahr 1801 haufete sie im Anhalt-Zerbstischen und 1802 in unserm Meiningischen Unterlande bey Altenstein.

Sie weiß zwischen dem Alter der Bäume und dem der Nadeln sehr geschickt zu unterscheiden; sie zieht, wenigstens wenn sie in Menge da ist, das reife Stammholz dem jüngern vor, und achtet das Dickicht und den Anflug gar nicht, und ruhet so wenig die jungen saftigen Nadeln, als die ganz harten, dicken und starken an. Die Nadeln selbst frißt sie an der Spitze an und bis in die Scheide hinunter, wobei sie die Nadeln mit den Füßen so fest umfaßt, daß sie nicht leicht durch Schütteln zum Fallen gebracht werden kann.

Mittel dagegen. Außer der Schonung der Vögel und der oben genannten Insecten, und außer der Anlegung vermischter Holzarten bey neuer Ansäung (welches aber natürlich von ansehnlichen Forstmännern abgerathen wird) empfiehlt man gegen die Puppen:

- 1) Das 2 Zoll tiefe Aufreißen des Moores und der Erde mit eisernen Rechen. Alles Aufgerichte wird entweder sogleich auf Haufen verbrannt, oder auf der Miststätte mit dem faulenden Mist vermengt und weggeschafft. Die im Waldboden zurückbleibenden Pup-

333 2

pen

*) S. Laufiger Monatsschrift vom Jahr 1793. und Besorgter Forstmann a. a. O.

pen sind dann entblößt und werden von den Vögeln leicht aufgefunden, oder von der Nässe und Kälte verdorben. Eben diese Dienste leistet

- 2) Das Eintreiben der Schweine im Herbst.
- 3) Im May und Junius, wo die Eyer an den Nadeln kleben, ist das Abschneiden der Zweige solcher Bäume, besonders wo sie ohnehin das folgende Jahr zum Fällen einmal bestimmt sind, nicht undienlich.
- 4) In kleinen Gehölzen kann man auch das Ablefen der Raupen anwenden.
- 5) Zur Flugzeit gehen die Schmetterlinge in Leuchtfeuer.

Aber durch Gruben-Anlegen soll bey dieser Art nicht viel auszurichten seyn.

Es ist übrigens gut, daß diese Raupe zärtlich ist, und von der Bitterung bald aufgegeben wird, so daß ihr Schaden nicht viele Jahre hinter einander dauert.

Die Hauptsache ist hier, wie bey allen schädlichen Insecten, daß der Revierjäger aufmerksam ist, und wenn er diese Schmetterlinge in ungewöhnlicher Anzahl fliegen sieht, die Vorkehrung trifft, daß sie durch Nachtfeuer vertilgt werden, damit sie ihre Eyer nicht in Menge anlegen können.

Zwente Linie. Die Vorderflügel sind schwärzlich oder schwarzbraun mit gelber Zackenlinie.

Eine weniger schädliche.

134. Die Flechtenweideneule. *Phalaena Noctua Typica*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Splitterstrich, Buchdruckernachtsfalter, Neß, Eule an Flechtweiden, kleines schwarzes Kind (eine possirliche Gladbachsche Benennung; vielleicht fand man in den Vierzügen der Flügel Aehnlichkeit mit Kinder-Einwickelungen).

Phalaena Noctua Typica, Lin. 857. 186. Müller 702. 186.

— — — Wiener Verz. 81. 4.

Noctua — — Fab. Ent. III. 2. 99. 293.

Phal. Noct. — — Vorkhausen IV. 402. 162.

— — — Brahm II. 108. und 146.

— — — Gleditsch II. 49. n. 39.

— — — Esper IV. t. 173. f. 1. 2. mit Raupe.

Nöfel I. 2. Classe. t. 56. mit etwas dunkler Raupe.

Kennezeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamme und buckigen, etwas gebogenen und gekerbten Flügeln; die vordern sind dunkelgrau mit schwärzlicher Mischung und mit den gewöhnlichen, starkgerandeten Narben; die weißlichen, schwarzbraun-gerandeten Wellenstreifen bilden mit den weißlichen Abern, die sie durchschneiden, ein Vitzter; der hinterste Streif hat einige pfeilförmige schwarze Flecken.

Raupe. Naekt, erdbraun, kleinköpfig, nach hinten zu dickleibig, mit einem über den Füßen herziehenden weißlichen Seiten-längsstreif, und zwey über solchen hinlaufenden schmalen kappenförmigen Linien.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 1 Zoll und 11 Linien messende Phaläne, davon jeder Vorderflügel $\frac{9}{10}$ Linien Länge hat und dunkelgrau mit schwärzlicher Mischung ist, wird, wenn man den an der Wurzel befindlichen sehr unvollkommenen Streif und den die Franzen umgebenden Randstreif nicht mitzählt, von drey vollkommenen Wellenstreifen durchzogen, die, weil sie verdoppelt sind, aus lauter Halbmondschen zu bestehen scheinen. Die weißlichen Adern, die sie durchschneiden, geben den Flügeln ein gitterförmiges Ansehen; und Linne' fand hier Aehnlichkeit mit den Typen der Buchdrucker. Zwischen dem 1. und 2. Wellenstreif steht die ovale und die Nierenarbe, beyde schön und stark gerandet. Der schwarzen pfeilförmigen Flecken am Innenrand des letzten Streifs sind 2 oder 3. Durch die grauen Franzen schlängelt sich eine bräunliche Linie, und der Vorderrand ist schwarzgesteckt. Die weißgefranzten Hinterflügel sind aschgrau. Auf der Unterseite haben die aschgrauen Vorderflügel einen weißlichen, verloschenen Mittelstreif, eine weißgraue Randbinde und schwarze Winkeln der Randzähne; die weißlichgrauen Hinterflügel sind mit einem braunen Mittelpunct, gleichfarbigem Querstreif und einer Schattenbinde am Hinterrand bezeichnet. Die Fühlhörner sind bräunlich, das ganze übrige Insect ist weißgrau, wenn man die schwarze Bänderung des Halskragens und die braune Mischung des Vorderrückens ausnimmt. Füße und Fußblätter sind gescheckt und geringelt. Die rufsiggraubraune Varietät ohne helle Adern, wo diese Grundfarbe die Hinterflügel und auch die ganze Unterseite einnimmt, darf man nicht für Geschlechtsverschiedenheit ansehen, denn man hat sie von beyden Geschlechtern.

Die Raupe hat Linne' aus Versehen für grün angesehen; dies kommt daher: wenn die Raupe sich gut gefüttert hat, so scheint das Futter grün durch. Sie ist nackt, erdbraun, kleinköpfig, nach hinten zu dickleibig, mit einem über den Füßen herziehenden weißlichen Seiten-längsstreif, und 2 über solchen hinlaufenden schmalen, kappentförmigen Linien, und hat weiße und braungesprengte Vorderfüße und weißliche Bauchfüße. Im Herbst ist sie noch unerwachsen und bezieht nach der ersten Häutung ihr Winterquartier, nämlich wie die meisten überwinternden Raupen, unter den Blättern des Wollkrauts und anderer breitblättrigen Gewächse. Im kommenden März und April wächst sie fort, und wenn die Verpuppungszeit im May kommt, begibt sie sich in die Erde, um sich darin ein mit Erdkörnern vermischtes Gehäuse zu bauen, worin sie als rothbraune Puppe drey oder vier Wochen ruht. Die Puppenruhe der zweyten Generation dauert eben so lange.

Aufenthalt. Die Eule erscheint jährlich zweymal; zuerst im Junius, und zum zweytenmal im Septembar, nach Brahm. Die in ihrer Nahrung nicht ekele Raupe ästet nach den Wienern auf Weiden; aber Kösel und Brahm fanden sie nicht darauf, sondern ersterer auf dem weißen Wollkraut (*Verbascum Lychnitis* L.), letzterer erzog sie mit der Hundszunge, Brennesseln und Hühnerdarm (*Alfime media*). Einmal ist sie im May, das anderemal im August erwachsen anzutreffen.

Anmerkungen. 1) Hier hat zwar die Föbrenneule, Phal. Noct. Pinastr. Lin. Vien. F. ihre Stelle: es ist aber des Miverständnisses schon oben bey der Forleule gedacht worden. Da man ihre Raupe, deren Eule Linne' auf Föhren angetroffen, und daraus einen unrichtigen Schluß auf die Nahrung der Raupe gemacht hatte, wodurch auch die Wiener Entomologen irre geleitet worden,

den, erst nach der Zeit nebst ihrem Futter ausfindig gemacht hat: so ist sie schicklicher von Vorkhausen: Schaafampfercule benannt worden.

2) Zu eben dieser zweiten Linie gehört die zuweilen auf Forstunkräutern lebende Gänsefußcule, Phal. Noct. Chenopodii Wien., Dreyblatt, Cule am Dreyblatt; die in den Wiener, Fabricius-, Vorkhausen- und Rösel'schen Schriften, I. Nachtvög. 2. Classe. tab. 48. (wo sie nur mittelmäßig getroffen ist) mit der Raupe vorkommt. Diese, einen Zoll und fünf Linien messende, Phaläne hat einen Rückenlamm und flache Flügel; die vordern sind entweder aschgrau oder braungrau, mit vier gelblichen, zackigen Quersstreifen, zwischen welchen die gewöhnlichen Narben stehen, wovon die nierenförmige stark mit Schwarz (das einzige schwarze Fleck, das die Flügel haben) angelegt ist, und in deren Nähe auch eine Zapfennarbe sich befindet. Die beyden ersten Streifen sind undeutlich; der dritte steht hinter den Narben, und der vierte hat unter seinen Zacken 2 große, die ein lateinisches W oder M bilden. Die weißgrauen Hinterflügel haben eine schwärzliche graue Randbinde, worin sich ein weißlicher Wisch befindet. Klemm hat bey dem Weibchen fünfhundert Eyer. Die kleinköpfige, bald hell- bald dunkelgrüne Raupe, die auf dem Rücken 2 weiße unterbrochene Streife führt, die abwechselnd schwarzgefärbt sind, wovon Rösel auch eine braune Varietät abgebildet hat, lebt von der Mitte des Julius an bis zur Mitte des Septembers auf Spargel, Gartenlattich, Sellerie, Moosdistel, Gänsefuß (Chenopodium) und zuweilen auf Besenpfriemen, einem Forstunkraut; verpuppt sich im September in eine halb gelblichgraue, halb grünliche Puppe, die bis in den May oder Junius des folgenden Jahres, also 8 bis 9 Monate ruht.

3) Zu einer besondern Linie, wo die Vorderflügel rothbraun sind, gehört die mehr nützliche, als schädliche, übrigens eben nicht seltene Erbseculc, Phal. Noct. Pisi L., Hülsenfresser, Hülsenmotte, Erbsenmotte, Erbsennachtsfalter, die in den Linné'schen, Wiener, Fabricius-, Vorkhausen-, Gleditsch- (I. 339. und II. 253.), Esper- und Rösel'schen Schriften (I. Nachtvög. 2. Classe. t. 52.) vorkommt, und einen Zoll, acht bis neun Linien mißt. Sie hat einen Rückenlamm und dachige Flügel; die vordern sind rothbraun, mit zwey sehr blassen gelblichen Streifen, zwischen denen die gewöhnlichen Narben, durch welche ein Schattenstreif zieht, sich befinden, und außer derselben noch ein unvollkommener Streif an der Wurzel, und eine Wellenlinie am Hinterrand, dessen Grenzen bunt sind. Die sehr schöne, schlankte, rothbraune, braunbestäubte Raupe, deren Kopf, Bauch und Füße fleischfarben sind, hat vier hellgelbe Bandsstreifen. Sie wird im Julius bis in den September an Rittersporn, Ampfer, Bohnen (Phaseolus), Wicken- und Erbsen-Arten, desgleichen an Flach, Kohl, Klee und Gras, wie auch an Färbergenist (Genista tinctoria L.) angetroffen. Man will sie auch, wiewohl, wie sich leicht denken läßt, nur im Nothfall und außer der Regel, mit jungem Stachelbeer-, Eichen- und Buchenlaub und deren niedrigsten, zärtlichsten Blättern gefüttert haben, von denen sich aber die Raupen, sobald die Blätter stark wurden, hinwegbegaben.

Dreizehnte Familie.

Schrägestrichraupen. Dreyeckmakelichte Eulen (bey Vorkhausen achtsfarbige).

Diese Raupen sind nackt, haben nebst einigen bleichen nach der Länge des Leibes gerichteten Linien auf allen Ringen schräge Striche, die aus zusammengehäuften dunklen

ren Punkten bestehen. Die Verwandlung geschieht in einer Höhlung unter der Erde. Die Eulen haben auf den Vorderflügeln eine gegen den Innenrand fast in eine Spitze zusammenlaufende, dunklere, breite Querverbinde, in welcher die sich zusammen neigenden gewöhnlichen Narben noch ein kleines Dreyeck bilden. Am Hinterrand zeigt sich noch eine weißliche Querlinie, über der Rand selbst ist gezahnt.

Anmerkung. Hier stießen wir abermals auf eine mehr nützliche als schädliche Art, auf die weniger gemeine Brombeerstrauch-eule (von der Brombeereule, Batis verschieden), Ph. N. Lucipara, L. Purpurglanz, Leberfleck, leuchtender Nachtfalter, die in den Linnéischen, Wiener, Fabricius', Vorkhausen: und Esperischen Schriften IV. t. 174. f. 1. 2. mit der Raupe vorkommt, und 1 Zoll 3 bis 4 Linien mißt. Sie hat einen Rückenstamm, und dachige, fein gezahnte, glänzende kupferfarbene, aber niemals leuchtende Vorderflügel, die in der Mitte mit 2 Wellenstreifen geziert sind, welche durch einen sehr dunkelbraunen Zwischenraum, den Linné eine Vinde nennt, sich absondern, und hinten mit einem purpurrothen Zackenstreif, ohnweit des Hinterrandes bezeichnet sind. In dem besagten Zwischenraum bilden die beyden Narben, wovon die mondformige gelb, und schwarz eingefast ist, ein Dreyeck.

Die nackte, sammetartig grüne, braunköpfige Raupe hat rostfarbene Luftlöcher, und daru unter eine weißliche Linie, in der Seite dunkle Schräggestrichen, nämlich an jedem Ring anderthalb dergleichen, und am letzten Ring eine spitzige Erhöhung. Sie kann sich mit einem grünen scharfen Saft gegen Verfolgungen schützen. Ihre Nahrung im August und September sind die Blätter von Brombeer, Steinbeer (*Rubus laxatilis*), Sauerampfer, Lattich, Camillen, Steinflie, Natterntopf, Ochsenzunge, Goldwurz (Chelidonium maius), Aurteln; ihre Verwandlung geschieht im September und ihre Entwicklung zur Phaläne nach der Ueberwinterung der Puppe, im Junius oder Julius.

Weniger schädliche.

135. Die Cerreicheneule. *Phalaena Noctua Protea*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Phalaena Noctua Protea	Wiener Bz. 84. 8.
— — —	Vorkhausen IV. 386. 158.
— — —	Brahm II. 416. 292.
— — —	Esper IV. t. 150.
— — —	Thalassina Scriba Beytr. III. t. 13. f. 3.

Kennzeichen der Art. Kammrückig, mit feingezahnten Flügeln; die vordern sind weißgrau, braun und grün marmorirt, mit vier dunkelgerandeten Querstreifen und den Narben in der Mitte, woran ein winklichtes, zuweilen mit der Zahl vier verglichenes Zeichen stößt, das aber auch zuweilen ein rhombisches Wischfleck bildet.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Diese nicht viel vorkommende, wegen der Veränderlichkeit ihrer Farbe von dem mythologischen Proteus benannte, gewöhnlich weißgrau, braun und grünmarmorirte Eule hat ein Ausmaß von 1 Zoll und 3 Linien, und ist schwer zu beschreiben und abzubilden. Zwischen den beyden mittleren Querstreifen, die sich einander am Innenrande nähern, ist die ovale, weißgraue Narbe an dem winklichten rhombischen Wischfleck oder Zapfennarbe, und die gleichfarbige

farbige mit etwas Braun getiefte Halbmondnarbe hinter jener zu sehen. Der vierte Querstreif ist sehr gezackt und fein. Die Franzen bekommen durch die schwarzen Kerbepuncte ein buntes Ansehen. Die glänzenden Hinterflügel sind entweder weißlich und am Hinterrand aschgrau, oder ockergelblich und hinten schattirt; nahe am Schwanzwinkel zeigt sich ein schwarzes Pünctchen mit einer gelben Linie. Die etwas bestäubte Unterseite der vordern ist aschgrau, der hintern aber mehr oder minder weißlich; alle haben ein Augenflecken in der Mitte. Mit den Hinterflügeln ist der Hinterleib gleichfarbig, mit den Vorderflügeln sogar der grünen Mischung nach, das ganze übrige Insect, dessen Füße und Fußblätter schwarz gestrichet und geringelt sind. Die Varieräten sind mehr oder weniger mit Grün gedeckt; die, welche sich hier bey uns vorgefunden, ist hellfarbiger, als die Abbildung in *Scriba* Beyträgen.

Die grüne Raupe war nur den Wiener Entomologen bekannt, von denen uns aber keine Beschreibung gegeben worden. Brahm fand sie ihrer Verpuppung zu nahe, als daß noch einige merkbare Zeichnungen an ihr vorhanden gewesen. Ihre Verpuppung geschieht zu Ende des Maymonats in der Erde, und die hellbraune, glanzlose Puppe, deren Vordertheil dick und deren Körperringe geschmeidig, kurz und spitz zulaufend sind, ruht 3 Monate.

Aufenthalt. Die Eule erscheint im September an Eichen, wo die Raupe, vermuthlich an den höhern Aesten, ihre Nahrung gesucht hat.

Anmerkung. Die schöne Psorienkrauteule, Ph. Noct. Spartii, Borkhaus. darf hier nicht vergessen werden, da sie mehr nützlich, als schädlich ist. Diese bey Brahm und Borkhausen S. 352 und 355 als Spartii und als Genissae, bey Göße in den Entomologischen Beyträgen als Pariesin, P. N. Histris, vorkommende, bey Kleemann, tab. 42. getroffene, in *Scriba* Beyträgen aber tab. 15. f. 14. verunglückte Eule, dessen Männchen 1 Zoll und 4, das Weibchen 1 Zoll und 6 Linien mißt, ist kammrüdig, mit schmalen, lieblichschiefergrauen, mit Rothbraun gemischten Vorderflügeln, die drey hellgraue, dunkelgesäumte Wellenlinien haben; zwischen der 1. und 2. sieht die gewöhnlichen, braun eingefassten Narben, wovon die runde sehr hell ist, desgleichen eine gleichfarbige rhombische Zapfennarbe, die an die zweite Linie gränzt. Von dieser bis zur dritten ist der Zwischenraum schiefergrau mit einer weißen Punctenreihe. Die dritte an drey schwarze Pfeilflecke anschließende Wellenlinie bildet in der Mitte ein lateinisches M oder W. Die Hinterflügel sind grau. Sie gleicht der Erbseule so ziemlich, ist aber von ihr durch den weißlichen breiten Schattensstreif, der schrägs durch die runde und durch die Zapfennarbe bis zum Innenrand nahe am Schwanzwinkel zieht, wesentlich verschieden. Die kleinförmige vor der letzten Häutung gelbgrüne, nach derselben aber gummizutartige Raupe von anderthalb Zoll Länge, mit 2 dunkelgrünen Rücken- und eben so viel Seitenlinien, hat auf dem Rücken auf jedem Absatz 2 in herzförmiger Lage zusammenschließende rothe Schrägsstriche, die jedesmal zwey Punkte einschließen, und sie äßet auf Heidelbeer, Besenpsorien und allen Arten von Ginster (*Genissa*); Hr. *Scriba* fand sie auf Jacobskraut und Blutkraut (*Rumex sanguineus*); besonders hat man sie bey uns auf dem Färbeginsler (*Genissa tinctoria*) im Julius und August gefunden. Sie verwandelt sich in der Mitte des Augusts, bey Brahm aber zu Ende des Septembers in eine glänzende braunrothe Puppe mit doppelter Endspitze, und ruhet bey Brahm sieben, bey uns acht Monate. *Pezold* verdient Entschuldigung, daß seine Zeichnung in den *Scriba*ischen

Beständen so misrathen ist: er hatte durch eine Fatalität statt eines reinen, das verwischte Exemplar vor sich, da er die Zeichnung verfertigt ge, wie er uns lange nachher, da er es zu spät inne geworden, sagte. Die Raupe aber, die er von hier aus bekommen, ist nicht verfehlt. Sch.

136. Die Stammeicheneule. *Phalaena Noctua Convergens*, Vienn.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Zweymakelige Eule, doppeltes Nierenfleck.

Phal. Noct.	Convergens	Wiener Verz.	84. 8.
Noctua	—	Fab. Mantissa II.	170. 239.
—	Leucomelas	Fab. Ent. III.	2. 100. 297.
—	Convergens	Fab. Suppl.	446. n. 297.
Phal. Noct.	—	Vorkauf. IV.	357. 148.
—	Biren	Göze Entomol. Beyträge III.	3. 206. und als Convergens 218. 173.

Kleemann t. 43. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Der Psriemenkrauteule ähnlich; mit einem Rückenfaam und dachförmigen, etwas gezahnten Flügeln; die vordern sind weißgrau mit Braun gemengt, mit einem weißen unvollkommenen und zwey vollkommenen, gleichfarbigen Querstreifen, welche 2 Narben nebst einer Zapfennarbe einschließen. Ein vierter Querstreich oder vielmehr Wellenlinie folgt hierauf, hinter welcher in der Gegend des Hinterwinkels ein rostfarbiger Fleck sich auszeichnet, der diese Eule kennbar macht, bey dem Weibchen aber verloschen ist.

Raupe. Bläulichgrün von Kopf, und gelblichgrün von Körper, mit einer schwachgelblichen Rückenlinie, neben welcher jeder Ring auf jeder Seite braunrothe Schrägsstriche in herzförmiger Richtung mit braunrothen Puncten hat. Nur dem ersten Ring ist ein dunkelgrünes Schildchen eigen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Das Ausmaß dieser von einer Fingerspize bis zur andern 1 Zell und 8 Linien messenden Eule hat $8\frac{1}{2}$ Linien Länge, nach hinten zu geschweifte, am Vorderrand gefleckte Vorderflügel, die weißgrau mit Braun gemengt sind. An der Wurzel befindet sich ein bis zum unvollkommenen Querstreich ziehender Längsstrich, wie bey der Psriemenkrauteule. Die beiden vollkommenen Querstreifen, die die Narben einschließen, nähern sich einander gegen den Innenrand, und entfernen sich von einander am Vorderrand. Die kleinere weiße Narbe mit einem bräunlichen Kern ist unordentlich rund; die größere gleichfarbige Mondnarbe schließt einen gelblichen Mondstrich ein, und die Zapfennarbe verbindet sich mit einem dunkeln Stricheldchen. Hinter dem zweyten vollkommenen Querstreich zeigt sich noch eine Wellenlinie, hinter welcher in der Gegend des Hinterwinkels ein rostfarbiger Fleck sich auszeichnet, der das Männchen kennbar macht, bey dem Weibchen aber verloschen ist. Eine sehr subtile, schwarze Linie umschließt am Hinterrand die Franzen. Die aschgrauen Hinterflügel sind hinten zu bräunlich schwattirt. Alle Flügel haben auf der gelbgrauen Unterseite einen dunkeln Mittelwärt, und bald alle, bald nur die hintern eine verloschene Querlinie. Die Flügelspizen sind bey dieser länger als bey der

Pfrienkrauteule. Die Fühlhörner, Kopf und Vorderücken sind bräunlich, der Halsfragen rostfarbig mit einer weißlichen Einfassung, die hinterwärts braun wird. Auf dem schwarzgrauen Hinterrücken bildet sich eine Reihe brauner Wüschelchen.

Die Raupe ist bläulichgrün von Kopf, und gelblichgrün von Körper, mit einer schwachgelblichen Rückenlinie, neben welcher jeder Ring auf jeder Seite braunrothe Schrägschilde in herzförmiger Richtung mit braunrothen Punkten hat. Nur dem ersten Ring ist ein dunkelgrünes Schildchen eigen. Sie hat in jeder Seite noch eine dunkelgrüne und eine rothe Linie, welche sich durch die Lufslöcher zieht. Zur Zeit ihrer Verpuppung im October bereitet sie sich ein Erdgespinnst, um als dunkelbraune Puppe von gewöhnlicher Gestalt, mit rückwärts gekrümmten Häkchen auf allen Ringen des Hinterleibes und am hinteren Ende (After) besetzt, fünf Monate zu ruhen.

Aufenthalt. Die Eule entwickelt sich zu Anfang des März in Deutschland, obschon nicht in hiesigen Gegenden, und ihre Raupe nährt sich nach dem Wiener Werke auf den Eichen, nach Klemm und Vorkhausen, im August und September auf Heidelbeeren. Aber die Raupe, die Fabricius beschreibt, gehört nicht zu dieser Phaläne, die er in dem neuern Werk wieder für Convergens erklärt.

Vierzehnte Familie.

Wiesstrichraupen. Tagliebende Eulen.

Die davon bekannten Raupen sind nackt, mit vielen abwechselnden Längslinien gestreift. Die Verwandlung geschieht in einer Höhlung unter der Erde. Die Eulen haben einen flachen oder nur sehr wenig gekrümmten Rücken, abhangende, fast einfarbige Flügel ohne die gewöhnlichen Narben; mehrere haben doch im Mittelraum ein weißes Zeichen; die meisten besaugen die Blumen am Tage nach Art einiger Schwärmer.

Erste Linie. Die Eule hat Querlinien.

Weniger schädliche.

137. Die Wandelhäreule. *Phalaena Noctua Trilinea*, Wien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wandmotte, dreystrichiger Nachtfalter, weißliche dreygestrichte Eule, Eule an Eichen.

Phalaena Noctua Trilinea Wiener Werk. 84. n. 5.

Noctua Quercus Fab. Ent. III. 2. 22. 44.

Phal. Noct. Trilinea Vorkhausen IV. 700. 307.

— — Trigrammica Göze Entomol. Beyträge I. 3. 199. in welchem Band sie auch als Trilinea und Quercus vorkommt.

— — — — Esper t. 123. f. 6. ohne Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Clattrückig, mit dachförmigen Flügeln; die vordern sind weißlichgrau und braunbestäubt, mit drey braunen, vollkommenen und ungetackten

zackten Quercellinien, davon die mittlere am Vorderrande etwas Winklichtes hat, und einer dergleichen unvollkommenen an der Wurzel.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Sie mißt nicht über 1 Zoll, 3 bis 3½ Linien, und ist, die braunrothen Fühlfüßer ausgenommen, am ganzen Körper weißgrau mit Braun bestäubt. Die Vorderflügel sind ohne alle Narben, und haben drey braune, vollkommene und ungezackte Quercellinien. Die mittlere derselben hat am Vorderrande etwas Winklichtes. Außer diesen dreyen ist auch noch eine unvollkommene Quercellinie an der Wurzel. Die Unterseite aller Flügel ist ebenfalls braunbestäubt, und ihr Quercelstreif bräunlich und verblühen.

Aufenthalt. Die Eule findet sich im May und Junius bey uns und anderwärts an Scabiosen und verschiedenen Syngenesisten; besonders schüttelt sie sich von den jungen Eichenstämmen herab, worauf nach Fabricius die Raupe leben soll, die noch nicht beschrieben und abgebildet ist.

Anmerkung. Hier ordnet das Wiener System die zur zweyten Linie, wo die Quercellinien mangeln, achtrige, mehr nützliche als schädliche Vocksbartcule, Phal. Noct. Tragopoginis L. Vocksbart, Einflödler, graue Eule mit gelbem Kopf, die in den Linné'schen, Wiener, Fabricius's, Vorkhaufen-, Degeer- und Esper'schen Schriften, IV. t. 170. f. 1. 2. vorkommt, und einen Zoll und sieben Linien mißt. Diese ganz glänzende, aber nicht schöne Phaläne hat einen Rückentamm und dachige Flügel; die vordern sind braunschwarz, grau bestäubt, mit drey, statt der Narben vorhandenen, tief-schwarzen Punkten, deren einer voran und zwey hinter jenem stehen. Die braungelblichen Hinterflügel sind nach innen zu heller, nach dem Hinterrand aber dunkler und gedockt. Der Rücken des ganzen Insects ist mit den Vorderflügeln gleichfarbig. Die nackte grüne Raupe, die bey Degeer fünf gleichbreite, weiße Linien, und mehrere weiße, mit microscopischen Härchen besetzte Pünctchen hatte, zeigte bey mir nur 4 Linien, nämlich auf dem Rücken zwey, und an jeder Seite eine. Sie nährt sich im May und Junius an Vocksbart (*Tragopogon arvensis*), Felscharte (*Serratula arvensis*), Gartenspinat, den Ampferarten und Nittersporen; desgleichen fand ich sie 1788 auf Himbeerblättern, und Herr Scriba nährte sie, vermuthlich nur durch eine Ausnahme von der Regel, mit Zwetschenlaub. Ihre bräunliche Puppe ruht in einem dichten Erdgewölbe gemeinlich vom Ausgang des Junius bis nach der Mitte des Julius, also 3 bis 4 Wochen, bis sie sich entwickelt. Sch.

Fünfzehnte Familie,

Halschilbraupen. Rötlichbraune Eulen.

Diese Raupen sind nackt, braun oder olivengrün und nebelicht. Der Halschilb und die Schwanzklappe sind fast schwarz; mit zwey bleichen Linien längs durchschnitten. Die Verwandlung geschieht unter der Erde in einer Erdhölse. Die Eulen haben flachliegende, stumpfe und fast gleichbreite kastanienbraune Vorderflügel mit einigen undeutlichen, geschwungenen Quercellinien und einer Reihe feiner Punkte am Hinterrand, dünnere Hinterflügel, einen fast flachen Rücken und einen breitgedrückten, an den Seiten büschigen Leib.

Sie sind minder schädlich.

Anmerkung. Die dieser Familie zugehörige Preußelbeereule, *Phal. Noct. Vaccinii*, Lin. die in den Linnéischen, Wiener, Fabricius, Borkhausen, Brahm und Esperischen Schriften tab. 161. f. 1 — 6. und tab. 162. f. 1 — 4. mit vielen Varietäten vorkommt, und 1 Zoll 3 bis 4 Linien mißt, ist sammrückig, und hat sehr glänzende, rostbraune Vorderflügel mit drittheil braunen, wellenförmigen Doppelstreifen. Von den beyden Marken ist die nierenförmige zur Hälfte schwarz, und sie unterbricht einen schwärzlichen, braunen Seitenstreif. Vor dem Hinterrand ist eine Reihe von sieben braunen Punkten. Die aschgrauen Hinterflügel sind röthlich gefranzt. Das ganze Insect mit seinem platgedrückten Leib und allen Theilen ist mit den Vorderflügeln gleichfarbig.

Die nackte, schmutzigbraungraue, mit einem hellen Seitenlängstreif versehene Raupe hat auf dem ersten und letzten Ring ein glänzendes, schwarzes Schild, das von zwey weißlichen Linien gesäumt und in der Mitte von einer dritten durchschnitten ist, und lebt im Junius und im Herbst, bey Tage unter den Ständen der Himbeer, Brombeer, Heidelbeer und rothen Preußelbeer verborgen, deren Blätter sie des Morgens und Abends zur Nahrung nimmt. Sie baut sich eine Erdbühse, worin die Puppe der einen Generation bey uns vom 7. Julius bis 10. September, also 2 Monate, ruhte. Die Puppe der zweyten überwintert, um sich im März zu entwickeln.

138. Die Frühbirneule. *Phalaena Noctua Satellitia*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Trabant, Trabanteeule, Quercumotte, Iedervogel (beym Gladbach).

Phalaena Noctua Satellitia Lin. 855. 176. Müller S. 700. 176.

Noctua — — — Wiener Verz. 80. 5.

Phal. Noct. — — — Fab. Ent. III. 2. 87. 256.

— — — — — Borkhausen IV. 736. 333.

— — — — — Brahm II. 451. 316.

— — — — — Naui Forstw. 306.

— — — — — Transversa Naturforsch. IX. 143.

— — — — — Satellitia Esper IV. t. 169. f. 6. 7. mit Raupe.

— — — — — Rösel III. t. 50. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenrücken und gezähnten dachigen Flügeln; die vordern sind schmal, bald graubraun, bald honig- bald rothbraun, mit drittheil geschwungenen dunkeln Querrlinien. Zwischen der zweyten und dritten liegt ein bald weißer, bald gelber, starker, dreyeckiger Punct, an den sich 2 kleine, oft gleichfarbige, anschmiegen.

Raupe. Einzeln behaart, braunköpfig und sammetschwarz, mit einem viereckigen, durch Linien getheilten Nackenschild und einer abgesetzten hellen Seitenlinie. Auf dem 1. 2. 4. und 10. Ring findet sich ein weißer Fleck an jeder Seite.

Sie variiert auch mit wechselbrauner Grundfarbe, und hat die Eigenschaft des Worbens und der Gefräßigkeit.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Eule mißt von einer Flügelspitze bis zu andern 1 Zoll 8 bis 9 Linien. Ihre schma-

Ien Vorderflügel sind graubraun, zuweilen rothbraun, auch honigbraun. Von den drittehalb Quercinien steht die halbe an der Wurzel. Ein dreyeckiger starker Punct von heller, nämlich bald weißer, bald gelber Farbe, an den sich 2 kleine helle anschmiegen, steht zwischen der 2. und 3. Quercinie. Hinter dieser dritten zieht sich eine ins Gelbe fallende Binde und alsdann ein gleichfarbiger Wellenstreif in der Nähe der gesteckten Franzen durch. Die Hinterflügel sind aschgrau und gelbgefranzt. Aus der grauen Unterseite haben alle einen dunkeln Quercstreif, und die hintern ein schwarzes Mittelröndchen. Das ganze Insect ist, den platten, hellern Hinterleib ausgenommen, mit den Vorderflügeln gleichfarbig.

Ihre Raupe ist einzeln behaart, braunköpfig und sammet schwarz, bey Varietäten wechselfarbig, mit einem viereckigen, durch Linien getheilten Nackenschild und einer abgesetzten hellen Seitenlinie. Auf dem 1. 2. 4. und 10. Ring findet sich ein weißer Fleck an jeder Seite. Sie lebt, wie die der Loheneule, der Viereichen-, Feldulmen- und Espeneule u. d. gl. mehrentheils blattwicklermäßig, weil sie von Zehrwespen (Raupenröthern) verfolgt wird. Sie ist gefräßig und mordet, wenn sie hungrig wird. Ob die Stücke, an denen, nach Rösel's Zeichnung, keine weißen Seitenflecke sich befinden, Varietäten oder Raupen sind, aus denen weibliche Phalänen kommen, worauf Brahm muthmaßt, haben wir zu der Zeit, als wir sie erzogen, nicht Acht gegeben. Sie verwandelt sich zwischen der Mitte und dem Ende des Junius in der Erde in eine gewöhnliche Puppe, mit drey Endspitzen, um nach einer Ruhe von 3 Monaten, im September sich zu entwickeln, wiewohl sie auch Brahm nach einem Zeitraum von 6 bis 3 Wochen im August sich entwickeln sah. Von einer doppelten Generation sind nicht genug Beweise da. Daher die Raupe wahrscheinlich, zumal da man sie im März sehr klein gefunden hat, vor der Ueberwinterung sich einmal häuten wird.

Aufenthalt. Man sieht die Eule im August, gewöhnlicher aber vor Ausgang des Septembers, und ihre Raupe lebt im May und Junius auf Eichen und Ulmen, nach Rösel auf Stachelbeer, nach den Wienern auf Birnbäumen, nach Bieweg auf Himbeer- und Johannisbeersträuchen, nach Brahm zuweilen auf Lärch, nach Vorkhausen außer obigen auf Buchen, nach hiesigen Beobachtungen auch noch auf Apfel, Zwetschen, Linden, Wollweiden und Weißdorn.

Feinde. Zu denselben gehört eine gewisse einzelne Larve einer Zehrwespe, die die Raupe beherbergen muß, sie mag wollen oder nicht. Denn man wird oftmals Raupen gewahr, welche sammt ihrer Hülle über dem Gespinnst einer solchen Zehrwespuppe angepresst sitzen, als ob sie über einem Ey ausbrüten wollen, und endlich darüber hinwegeln und sterben.

139. Die Holzapfelseule. *Phalaena Noctua Rubiginea*, Vienn.

Namen und Schriften.

<i>Phalaena Noctua Rubiginea</i>	Wiener Verk. 86. 8.
Noctua	— Fab. Ent. III. 2. 31. 76.
Phal. Noct.	— Vorkhaus. IV. 750. 340.

Kennt

Kennzeichen der Art. Mit glattem Rücken und glänzenden dachigen Flügeln; die vordern sind gelblich rostfarben, schwarzbestäubt, mit abgesetzten rothbraunen Quercinien, undeutlichen Narben und einer schwarzen Punctenreihe am Hinterrand. Die Nierennarbe hat einen auszeichnenden schwarzen Punct. Die Hinterflügel haben einen rostfarbenen Saum.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Sie hat die Größe der Preußelbeereule, also ein Ausmaß von 1 Zoll, 3 bis 4 Linien. Die Wellenlinien der glänzenden, gelblich rostfarbenen, schwarzbestäubten Vorderflügel sind nicht immer zusammenhängend, die Narben undeutlich, doch hat die Nierennarbe einen schwarzen Punct und eine schwarze Punctenreihe steht am Hinterrande. Die Hinterflügel sind rothbraun gesäumt. Auf der gelbgrauen Unterseite haben die Vorderflügel in einem aschgrauen Schatten des Mittelraums einen dunkeln Fleck, hinter welchem ein verblichener Streif steht, der auch durch die hintern läuft, die einen Mittelpunct haben. Kopf und Rücken sind mit den Vorderflügeln gleichfarbig, und der Hinterleib ist gelbgrau. Die noch nicht abgebildete Raupe lebt nach dem gedruckten Wiener Verzeichniß auf dem wilden Apfelbaum.

Aufenthalt. Im Oesterreichischen, wo die Raupe auf dem eben bemerkten Baum und von dessen Blättern sich nährt.

Anmerkung. Die *Phalaena Noctua Pulmonaris*, Esper tab. 151. f. 5. wird hier fragweise von Herr Vorkhausen angeführt, und eben diese Esperische Phaläne von den Wienern in ihrem Auffatz von 1797 bey ihrer *Noctua Stabilis* (ich denke aus Versehen) nachgewiesen. Sch.

140. Die Loheicheneule. *Phalaena Noctua Rufina*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Phalaena Noctua Rufina Wiener Verz. 86. n. 9.

Noctua — Fab. Ent. III. 2. 32. n. 77?

Phal. Noctua — Vorkhaus. IV. 751. 341.

— — Radica Esper IV. t. 151. f. 4. nach den Nachrichten der Wiener von 1797.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit glattem Rücken und dachigen Flügeln; die vordern sind glänzend röthlichbraun, mit den gewöhnlichen Narben und mit 3 Quercinien, von sattrothbrauner Farbe; die mittlere derselben unterbricht die größte Narbe. Die aschgrauen Hinterflügel sind gelbrothlich gefranzt.

Das Männchen unterscheidet sich durch die zartgesäimten Fühlhörner.

Raupe. Nackt, lebersfarben und weißpunctirt, mit einer weißen Seitenlinie. (Nach Fabricius).

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 1 Zoll 5 Linien messende, hier nicht einheimische Eule mit glänzenden röthlichbraunen Vorderflügeln hat, wenn man die mittlere Binde, weil sie mehr ein Schattenstreif ist, nicht mitzählt, nur 2 Binden, davon die hintere sehr deutlich und zu beyden Seiten mit einer hellen Linie eingefast ist. Die aschgrauen Hinterflügel haben gelbrothliche Franzen.

Auf

Auf der Unterseite sind die Vorderflügel aschgrau mit röthlicher Schillerung und einem verbliebenen Streif, der auch durch die gelbgrauen, braunbestäubten Hinterflügel zieht, welche noch ein Mittelstreck haben. Das ganze Insect ist nebst den Fühlhörnern und Füßen röthlichbraun. Das Männchen macht sich durch die zart gekämmten Fühlhörner kennbar. — *)

Aufenthalt. Die Raupe lebt auf der Eiche.

Anmerkungen. 1) Unsere Loheneule, Radica, darf weder mit Radicea Esperii (einem ähnlichen Namen, aber vierstlig), noch mit P. Bomb. Rufina Lin. et Clerckii Icon. verwechselt werden, die nicht sowohl das Weibchen von Rullula Lin., als vielmehr unsere Noct. Punicago zu seyn scheint. Auch Fabricius mußte hier nur fragweise nachgewiesen werden, weil seine Beschreibung der Rufina auch auf unsere Punicago gedrukt werden kann.

2) Nachfolgende beide Phalänen können, wenn man lieber will, wohl auch zu unserer zehnten Familie oben gezogen werden.

141. Die Waldeicheneule. Phalaena Noctua Pulverulenta (Bombyx Esperii).

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Bestäubte Eule, röthlichgraue und matt gezeichnete Eule, braungelbe und schwarz bestäubte Eule.

Phalaena Noctua Pulverulenta	—	—	Wockhausen IV. 611. 256.
—	Bombyx	—	Brahm II. 57.
			Esper Spinner. t. 76. fig. 5. 6.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit etwas rauhem Rücken und dachigen Flügeln; die vordern sind glänzend, bald röthlichgrau, bald fahlröthlich, allemal bräunlich bestäubt, mit den gewöhnlichen zwey, metallgelb geringelten, blassen Narben, die zwischen 2 Reihen von schwarzen Puncten sich befinden. Eine dritte Punctenreihe umschließt die röthlichbraunen Franzen. Das kleinere Männchen ist an den braungekämmten Fühlhörnern mit weißem Stiel kenntlich.

Raupe. Buntfösig, unbehaart, anfänglich grün und weiß; nach der vierten Häutung zimmetbraun mit 3 weißen Rückenlinien, davon die mitt. lste stärker ist; und mit 2 gelben Seitenlinien. Der Kopf ist schwarz punctirt; der Nackenschild und die gelbgeringelte Schwanzklappe sind röthlichschwarz, und mit 3 Längslinien durchzogen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese, 1 Zoll und 5 bis 6 Linien messende, etwas schmalflügelige Eule mit glänzenden, bald röthlichgrauen, bald fahlröthlichen Flügeln hat 2, selten merkbare, wellenartige Wellenlinien, und unzählige im Mahlen nicht ausdrückbare Atemen. Bald fehlt die Ringnarbe, bald ist sie da, und alsdann ist sie, so wie die Nerenarbe, hellgeringelt und inwendig mattschwarz gemischt. Außer den drey schwarzen Punctenreihen, wovon die erste vor der Ring-

*) Die noch nicht abgezeichnete Raupe soll, nach Fabricius, nackt, leberfarben und weißpunctirt seyn, mit einer weißen Seitenlinie.

Ringnarbe und die dritte vor den röthlichbraunen Franzen steht, und wovon die mittelfte die deutlichste ist, welche sich hinter der Nierennarbe befindet, stehen auch 2 schwarze Punkte an der Wurzel. Die aschgrauen Hinterflügel sind ein wenig eingebogen. Auf der greisgrauen und zugleich braunbestäubten Unterseite sind alle Flügel mit einem schwarzen Mittelpunct und einem verblichenen Bogenstreif versehen. Die Vordertheile des Körpers sind mit den Vorderflügeln, der Hinterleib aber mit den Hinterflügeln gleichfarbig, und der After nebst den Seitenhöpfchen bleichröthlichbraun. Die gekämmten Fühlhörner sind Merkmale des männlichen Insects.

Die in keinem Schriftsteller bisher beschriebene, unbehaarte, anfänglich grüne und weiße, nach der vierten Häutung zimmetbraun werdende Raupe hat drey weiße Rückenlinien, deren mittelfte stärker ist, und zwey gelbe Seitenlinien. Der Nackenschild und die gelb geringelte Schwanzklappe sind schwarzröthlich und mit drey kleinen Längslinien durchzogen. Sie ist mit Puncten besprengt; der greisgraue Kopf ist schwarz gerüppelt; die Schwanzklappe färbt sich in den letzten Tagen röthlich; die Brustfüße sind schwarzgrauer als die Bauchfüße. Sie lebt gern in Blatthöhlen, wie die Raupe der 17. Familie, und ist schwer zu erziehen. Zur Verpuppung begibt sie sich in die Erde, um in einer lockern Erdhöhle sich in eine hellbraune Puppe zu verwandeln, die von der Mitte des Junius bis in den März des folgenden Jahres, also 9 Monate lang, ruht.

Aufenthalt. Die Eule zeigt sich im März und zu Anfang des Aprils an Eichenstämmen, aber niemals im May. Nach Brahm's und nach hiesigen Beobachtungen kann sie wohl nicht zweymal des Jahres erscheinen, ungeachtet sie Esper im Junius und Julius will gesehen haben. Die Raupe weidet am liebsten auf Eichen, aber auch auf Weißdorn, Linden und Haseln im May und Junius.

Anmerkung. Ob diese Phaläne, über welche sich die Wiener Entomologen nicht erklärt haben, ihre Ambigua sey, läßt sich nicht entscheiden. Sie kannten die Raupe so wenig, als die Herren Vorkhausen und Brahm. Letzterer rieth auf die Nahrung, und traf es. Sie hat aber Kennzeichen von der 10. und von der 15. Familie an sich. Wegen der undeutlichen Quercinien der Phaläne und wegen des schwarzen Halschildes und der Schwanzklappe der Raupe gehört sie zu unserer gegenwärtigen fünfzehnten Familie, hingegen wegen der gekämmten Fühlhörner des Männchens, wegen eines geraden Streifs, wenn man nämlich die vor der Punctenreihe an den Franzen befindliche undeutliche Linie für einen geraden Familienstreif will gelten lassen, ferner wegen des nicht breitgedrückten Hinterleibes und der fünfmal hellgestreiften und dabey punctirten Raupe, zur zehnten Familie oben.

142. Die Hayneicheneule. *Phalaena Noctua Querceti*.

Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Kleemanns: tab. 46. fig. a—d. mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und dachigen Flügeln; die vordern sind röthlichgelbbraun mit 7 oder 8 unkenntlichen, ziemlich geraden, hellen Querstreifen g. ziert; die Ringnarbe ist unsichtbar, die Nierennarbe aber ist weißgerandet und tiefschwarz ausgefüllt.

Raupe.

Raupe. Dick, schwarz punctirt und röthlichgrau mit sechs gelben Streifen, graugrünem Kopf, schwarzem Nackenschild und gleichfarbiger Schwanzklappe; der eilfte Ring hat eine gelbe Erhöhung.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule, welche 1 Zoll und 4 Linien nach Kleemann misst, röthlichgelbbraune Vorderflügel hat, und auf denselben mit vielen hellen Streifen abwechselnd besetzt ist, zeigt keine Ringnarbe, wohl aber eine weiß gerandete, tiefschwarz ausgefüllte Nierennarbe. Sie hat weiß gefranzte, bräunlichgraue Hinterflügel, die an der Wurzel weißlicher sind; ferner schwarze Augen, bräunlichgelbe Fühlhörner, übrigens aber am Kopf und Vorderleib die Farbe der Vorder-, und am Hinterleib die Farbe der Hinterflügel.

Die Raupe misst 10 Linien, ist dick, schwarz punctirt und röthlichgrau mit 6 gelben Streifen, graugrünem Kopf, schwarzem Nackenschild und gleichfarbiger Schwanzklappe; der eilfte Ring hat eine gelbe Erhöhung. Ihre beyden untern Streifen sind sehr breit. Jedes schwarze Pünctchen des Körpers hat unter der Vergrößerung ein Härchen. Die Raupe kriecht langsam und allemal mit Hülfe des Nachschiebers. Die Zeit ihrer Verpuppung ist nicht angegeben; aber die anfänglich pomeranzgelbe, nachher braunröthlich werdende Puppe mit einer doppelten Stielspitze überwintert.

Aufenthalt. Die Phaläne erscheint im Märzmonate, bey Nürnberg und in andern Gegenden. Die Nahrung ihrer Raupe ist Eichen-, Rosen- und Zwetschyenlaub.

Anmerkung. Ein Fehler scheint es, daß der Illuminist bey der Kleemannschen Abbildung die Raupe mit weißen Augen begabt hat.

Uebrigens bitten wir erfahrene Entomologen um Belehrung, ob diese Phaläne schon einen andern systematischen Namen führt, oder etwa mit der Holzapfelsaule, Rubiginea, Ein Geschoß ausmacht.

Sechzehnte Familie.

Bleichkopfraupen, Goldgelbe Eulen.

Diese Raupen sind nackt, haben einen einsfarbigen, insgemein gelblichen oder weißlichen Kopf, sonst sanfte und zarte Farben, besonders an der untern Hälfte des Leibes. Die Verwandlung geschieht unter der Erde in einer mit Erde vermengten Hülse. Die Eulen haben einen schneidigen oder spitzigen Rückentamm, abhangende, lieblichgelbe Vorderflügel, auf denselben gemeinlich drey schräge, rothbraune oder düstere Querstrieche. Die Hinterflügel sind meistens weiß.

143. Die Weißbirkeneule. *Phalaena Noctua Fulvago*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rostpunct, Eule an Weißbirken,

B666

Phalaena

Phalaena Noctua Fulvago	Lin. 858. 190. Müller 703. 190.
— — —	Wiener Bz. 86. 1.
Noctua — —	Fab. Ent. III. 2. 73. 208.
Phal. Noct. — —	Vorkhaus. IV. 664. 284.
— — —	Hübners Beitr. II. 3. t. 1. D.
— — Ochrago	Esper IV. t. 177. f. 1.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem schwachen Rückenstamm und dachigen Flügeln; die vordern sind hellgelb mit drei rothfarbigen Zackenstreifen, wovon der mittlere gebogen ist, und zwischen den beyden Narben steht. Am Hinterrand ist eine Reihe brauner Punkte; die Hinterflügel sind mehr oder weniger weiß.

Raupe. Nacht, bläulichgrün mit einem gelbbraunen Kopf; sie lebt blattwicklermäßig, wie die Hapneicheneule und mehrere.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Eule mißt 1 Zoll, 6 bis 7 Linien, und ihre Vorderflügel sind hellgelb. Von ihren rothfarbigen, gezackten Quersstreifen ist der erste und dritte durch eine blasse, angeschlossene Linie doppelte, der mittlere aber gebogen und zwischen den beyden Narben befindlich. Die Ringnarbe ist undeutlich, oder nur wie ein Punct vorhanden; die deutliche Nierennarbe aber rothfarbig. Eine braune Punctenreihe zeigt sich am Hinterrande. Und die Hinterflügel sind mehr oder weniger weiß. Die Unterseite aller Flügel ist gelblich, so daß die Nierennarbe durchleuchtet. Fühlfhörner und die Einsaffung des Halschildes sind rothfarbig; Kopf, Halskragen und Füße gelb; Brust und Hinterleib weißlich.

Die nackte, bläulichgrüne Raupe mit gelbbraunem Kopf ist noch nicht abgebildet; sie verwandelt sich in einem Gespinnst nicht tief in der Erde, um sich nach 3 oder 4 Wochen zu entwickeln.

Aufenthalt. Dieser ist, was die Raupe betrifft, die Weißbirke und deren Laub.

Anmerkung. Sie darf nicht mit Fulvago Esperi, welches die nachfolgende ist, vermischt werden, und eben so wenig mit der Fulvago in den Scribaischen Beyträgen, die unten als Palmweideneule vorkommt.

144. Die Traubeneicheneule. Phalaena Noctua Croceago, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rostpunctiger Nachsfalter.

Phalaena Noctua Croceago	Wiener Bz. 86. 2.
Noctua — —	Fab. Ent. III. 2. 73. 209.
Phal. Noct. — —	Vorkhaus. IV. 665. 285.
— — Fulvago	Hübners Beitr. I. 1. t. 1. fig. F. wird in der
— — —	Nacherrinnerung für Croceago erklärt.
— — —	Esper's Eulen t. 176. f. 3. 4. Dazu auch noch tab.
— — —	186. f. 5. 7. die Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und dachigen, etwas gezahnten Flügeln; die vordern sind schön safrangelb, am Vorderrand mit weißen Puncten verschönert, in der Mitte mit 2 safrangelben Narben geziert, zwischen welchen eine braune

braune gabelige Linie durchzieht; hinter derselben folgt eine Punctenreihe, und dann eine sanft gebogene Querc Linie; die gezahnten Hinterflügel sind weiß mit einer blutrothen Schwunglinie und gleichfarbigem Punct.

Raupe. Etwas gelb, mit einer braunen Rückenlinie und mehreren pomeranzfarbigen Schrägsstrichen in den Seiten.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese annehmlich gefärbte, am Vorderrand von der Wurzel an mit 6 weißen Puncten bezeichnete Eule mißt 1 Zoll, 3 bis $3\frac{1}{2}$ Linien, und hat auf ihren safrangelben Vorderflügeln, welche Fabricius aus Verschen rothfarbig nennt, eigentlich zwey deutliche Quercstreifen und dann zwey Punctenreihen. Die erste Reihe besteht aus wenigen, aber starken Puncten, und zieht vor der safrangelben Ringarbe unordentlich und unregelmäßig hin. Die erste dunkle, gerade Linie theilt sich vornen, wo sie die safrangelbe Nierenmakel durchkreuzt, in eine weit ausgesperrte Gabel. Hinter ihr folgt eine zweyte dunkelfarbige Punctenreihe und zuletzt eine solche Wellenlinie, unweit des Hinterrandes. Wenn Fabricius also drey Quercstreifen zählt: so versteht er darunter die zwey Querc Linien und eine von den Punctenreihen. Die gezahnten Hinterflügel sind weiß mit einer blutrothen Linie und dergleichen Punct. Die Unterseite ist weißlich und mit einer deutlichen Querc Linie durchzogen, über welcher auf den Hinterflügeln noch ein dunkler Punct steht. Von einer Zapfennarbe findet sich bey den Stücken, die man der Güte des Herrn Hauptmann Hugo zu Braunschweig zu verdanken hat, keine Spur. Alle vordern Theile des Insects nebst den Vorderfüßen sind mit den Vorderflügeln, hingegen der Hinterleib und die Hinterfüße mit den Hinterflügeln gleichfarbig.

Die etwas gelbe Raupe mit einer braunen Rückenlinie und mehreren pomeranzfarbigen Schrägslinien in den Seiten, ist, so wie sie Fabricius in laconischer Kürz. bestimmt, demselben von den Wiener Naturforschern angegeben worden. Nach der Zeit ließ sie Eier zeichnen. Doctor Kühn fand, daß sie auf dem hintern Ring zwey deutliche, schwefelgelbe Flecken hatte.

Aufenthalt. Die Raupe lebt auf der Eiche, als ihrer Nahrungspflanze.

145. Die Steinlindeneule. *Phalaena Noctua Citrago*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Citronenvogel, gelbe, bun gestreifte Phaläne, goldgelber Nachfalter.

<i>Phalaena Noctua Citrago</i>	Lin. 857. 189.	Müller 702. 189.
— — —	Wiener B3. 86. 3.	
<i>Noctua</i> — —	Fab. Ent. III. 2. 75. 215.	
<i>Phal. Noct.</i> — —	Gorkhauf. IV. 667. 286.	
— — —	Gleditsch II. 50. n. 43.	
— — —	Kang's Verzeichniß 145. n. 1052.	
— — —	Hübners Beytr. II. t. 1. fig. D.	
— — —	Esper IV. t. 175.	
— — —	Aurago	
— — —	Ochreago	
— — —	Citrago	

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Kammrücken und niedergedrückt, ten, gezahnten Flügeln; die vordern sind aurorafarbig mit vier rothfarbigen Querc Linien,

wovon die stärkste zwischen den gewöhnlichen Narben, nämlich der cirkelrunden, die einen roßbraunen Punct hat, und der nierenförmigen steht; die Hinterflügel sind weißlichgelb.

Raupe. Blatt, mit sehr zierlichen, schwarzen und weißen Zeichnungen, die man mit Spizen- und Blonden-Arbeit vergleichen könnte; einem schwarzen Kopf und dergleichen Vorderfüßen. Sie ist unter dem Bauch schneeweiß, und lebt gern in Blatthöhlen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese, gleichfalls artig gezeichnete, kammrückige Eule mißt wie die vorige 1 Zoll, 3 Linien, hat aber mehr zugespitzte Vorderflügel, die niedergedrückt und gezahnt sind, von Aurorafarbe. Der durchziehenden roßfarbigen Querlinien sind eigentlich fünfzehalb; nämlich 1½ unweit der Wurzel vor der mit einem Rostpunct versehenen Ringnarbe, einer stärkern vor, und einer hinter der Nierennarbe, welche beyde ziemlich gerade sind, und einer wellenförmigen in der Nähe des Hinterrandes, die aber sehr unendlich ausfällt, und eben deswegen von den Schriftstellern, so wenig als die halbe an der Wurzel, mitgezählt worden ist. Die Hinterflügel haben eine weißlichgelbe Farbe. Auf der Unterseite haben alle Flügel einen Punct und Anlagen von verblichenen oder durchscheinenden Streifen. Die vordern Theile des Insects sind mit den Vorderflügeln und der Hinterleib nebst den Füßen mit den Hinterflügeln gleichfarbig.

Die von Hübner beschriebene, glatte, am Kopf und an den Vorderfüßen schwarz gefärbte Raupe, welche auch ich 1780 und 1781 im May so glücklich war, zu erhalten, hat sehr zierliche, mit Spizenarbeit ähnliche, schwarze und weiße Zeichnungen, und ist unter dem Bauch schneeweiß. Sie hat die Gestalt der Raupe von der Viereicheneule, Phal. Noctua Oo, und lebt wie die Wickler in Blatthöhlen, in welchen sie sich auch zuletzt ihr Verwandlungsgespinnst bereits zu Anfang des Junius verfertigt; verpuppt sich aber darin erst nach 2 Monaten, nämlich in der ersten Woche des Augusts, worauf sie nach einer vierwöchentlichen Ruhe, ungefähr zu Ende des Augusts oder in den ersten Tagen des Septembers, sich entwickelt.

Aufenthalt. Die Entwicklungszeit ist eben angegeben worden, und die Raupe lebt und nährt sich vom Laub des Lindenbaums, worauf sie auch Hübner und die Wiener gefunden, und ist im May ausgewachsen. Linne' und Fabricius geben auch Weiden und Bogelkirschen als Nahrungspflanzen an, wenn es kein Verstoß ist.

Anmerkung. Goetze in den Entomologischen Beyträgen hat sie aus Versehen mit Ph. N. Umbra, das ist, Rutilago, Vienn., vereneigt.

146. Die Balsambelleneule. *Phalaena Noctua Ochreago*, Borkhauf. (Flavago, Fabr.)

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Welche Eulenphaläne mit rosenfarbener gefleckter Binde.

<i>Phalaena Noctua Ochreago</i>	Borkhauf. IV. 671. 288.
<i>Noctua Flavago</i>	Fab. Ent. III. 2. 76. 218.

Phalaena

Phalaena Noctua Flavago Vorkhausen in Scriba Beyträgen t. 10. fig. 2.
 Sehr gut.
 — — Togata Esper IV. t. 124. fig. 1. mit zu rother Binde.

Kenzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und dachigen Flügeln; die vordern sind hellockergelb, mit drey braunen Makeln am Vorderrand und einer rothfarbigen, aus mehreren braunen Fleckenreihen gebildeten, röhlich ausgefüllten, am Innenrand sehr breit werdenden, schrägen Binde, hinter welcher eine Punctenlinie sich befindet; die Hinterflügel sind grau gelb.

Raupe. Glatt, unter der Vergrößerung kurzhaarig, dunkelbraun, mit schwärzlichen Flecken vermengt, und mit einem breiten, lichtgrauen Seitenstreif. Sie variirt sehr, und lebt blattwicklermäßig.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese gleichfalls schöne, kammrückige Eule mißt 1 Zoll, 5 Linien, und jeder Vorderflügel $7\frac{1}{2}$ Linien. Von ihren drey großen braunen Makeln am Vorderrand steht die innere unweit der Wurzel, die mittlere in der Mitte, und die äußerste eine Pariser Linie weit von der Flügelspitze entfernt. Diese äußerste macht den Anfang einer rothfarbigen schrägen Binde, welche aus mehreren braunen Fleckenreihen sich bildet, röhlich ausgefüllt ist, und am Innenrand der Flügel sehr breit wird; hinter ihr folgt eine braune Punctenlinie, und die Hinterflügel sind grau gelb. Auf der schmutziggelben Unterseite bemerkt man nur einige verloschene Streifen. Die Bartspitzen sind lang; der Kopf, Halsstragen und Vordertheil des Bruststückens sind nebst den Fühlhörnern, Schenkeln und Schienbeinen rothbraun, alles Uebrige am ganzen Insect ist nebst den Fußblättern ockergelb.

Die Raupe ist glatt, unter der Vergrößerung aber mit einzelnen kurzen Haaren besetzt, dunkelbraun von Farbe, mit schwärzlichen Flecken vermengt, und mit einem breiten lichtgrauen Seitenstreif bezeichnet. Weil sie in Blatthöhlen lebt, und man vermuthete, daß sie ihrer Verpuppung sich näherte, konnte Esper, der sie zu Anfang des Aprils 1790 fand, keine Zeichnung davon nehmen. Ihre eigentliche Verpuppung geschah erst späterhin in einem dichten, sehr weißen Gewebe, und die Puppenruhe wird nicht angegeben.

Aufenthalt. Die Phaläne erscheint im Julius in mehreren Deutschen Gegenden, als bey Erlangen, Darmstadt, und bey Kiel, auf der Italiänischen Pappel, worauf die Raupe, wie auch auf Eahlweiden, nach Esper, im Frühling sich nährt.

Anmerkung. Sie darf mit folgenden dreym nicht vermischt werden: 1) mit der eben so großen Königsackergeneule, P. N. Flavago Wien., Vorkh. und Esperi t. 112. f. 2. 4. und t. 176. f. 1., welche kein Fersinsect ist; 2) mit P. N. Ochreago Esperi t. 177. f. 1., welche unsere Flavago oben war; 3) mit Ochreago Hübners, die oben als Ph. N. Citrargo vorgekommen.

147. Die Eichstraucheneule. Phalaena Noctua Punicago.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rothgelbe Eulenphaläne mit kattenförmiger gefleckter Binde, gelbliche purpurfarbige braun bordirte Eule.

Phalaena

Phalaena Noctua Punica Borkhausen IV. 687. 300.

— — Catenata Esper t. 123. f. 1. 2. und t. 125. B. f. 3. 4. Raupe auf einem Eichenzweig.

Kenntzeichen der Art. Eule. Mit einem zusammengedrückten schneidigen Rückenrücken und dachigen Flügeln; die purpurfarbigen, mit Gelb gemischten vordern haben an der Wurzel eine röthlichbraune Binde, dann 2 gelbringelige Narben, wovon die größere einen braunen Schattenstreif unterbricht. Nach jener folgt eine zweyte gleichfarbige Binde mit gelblichen Rändern, und endlich eine schwache, schwarzbraune Punctenreihe.

Raupe. Nackt, leberfarben, weiß punctirt, mit einer weißen Seitenlinie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule mißt 1 Zoll und 6 Linien, und nach einem unserer weiblichen Exemplare könnte man auch die beyden Purpurbänder für die Grundfarbe annehmen, alsdann wäre der Raum, worin die gelb geringelten Narben sich befinden, eine breite bleichgelbliche, durch einen Schattenstreif durchschnittenen Binde. Nimmt man aber das Gelbe zur Grundfarbe an, so sind allerdings zwey röthlichbraune Binden vorhanden. Die erste, an der Wurzel, ist von einer gelblichen, braun eingefassten Linie begränzt. Die darauf folgende Ringnarbe ist kaum bemerkbar; durch die dahinter befindliche, zum Theil etwas schwarz gemischte Nierennarbe zieht sich ein daselbst unterbrochener und gebogener Schattenstreif. Dann kommt die zweyte oder äußerste, rostfarbige, gelb gerandete, von einer Reihe länglicher, brauner, kettenförmig an einander liegender Flecken begränzte Binde, und hinter ihr eine schwache, schwarzbraune Punctenreihe. Die Hinterflügel sind aschgrau, am Border- und Hinterrand eben so gelblich, wie die ganze Unterseite. Letztere hat auch einen röthlichen Anflug, und durch alle Flügel einen schwachen abgebrochenen Querstreif, und die vordern einen schwarzen Mittelmond. Der Vordertheil des ganzen Insects ist mit den Vorderflügeln, und der Hinterleib mit den Hinterflügeln gleichfarbig, aber aschgrau schattirt.

Von der Raupe, die nackt, leberfarben, weiß punctirt, und mit einer weißen Seitenlinie bezeichnet, und derjenigen der *Rufina* Fab. ähnlich seyn soll, hat man auf einer, mit tab. 125. B. bezeichneten, eingeschobenen Platte im *Esper'schen* Werk die Abbildung; aber das Nähere ihrer Naturgeschichte ist noch zurück. Sie verpuppt sich gewöhnlich in der letzten Woche des Maymonats in einer Erdyülse, um darin bis zu ihrer Entwicklung im September zu ruhen.

Aufenthalt. Die Eule erscheint im September bey Erlangen, im Fränkischen und in andern südlichen Gegenden von Deutschland, und das Eichenlaub ist die Nahrung und der Aufenthalt der Raupe.

Anmerkungen. 1) Die Benennung *Catenata* läßt sich, da sie eine Spanner-Endung hat, nicht wohl beibehalten.

2) Nach der Recension in den Ergänzungsblättern zur *N. L. Z.*, deren oben bey der *Dodonaea* gedacht worden, wird unsere Eule mit der *Linne'schen* und *Clark'schen* *Rufina* vereinigt, obgleich *Esper* aus Versehen die *Rufina* zu *Bomb. Russula* gezogen hatte.

148. Die Pappelweideneule. *Phalaena Noctua Rutilago*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Zinnetmette, Europäischer Braunrand, hellgelbe, hundertwärts braun bandirte Eule, Wienerische Rutilago.

<i>Phalaena Noctua Rutilago</i>	Wiener B. 86. 4.
<i>Noctua Marginata</i>	Fab. Ent. III. 2. 88. 260.
<i>Phal. Noct. Umbra</i>	Vorkauf. IV. 672. 289.
— — —	Naturforscher IX. 115. n. 41.
— — —	Esper IV. t. 185. f. 7. 8.
— — —	Schwarz Beyträge II. t. 7. fig. 6 bis 8.

Kennzeichen der Art. Mit einem Rückentamm und dachigen Flügeln; die vordern sind safrangelb mit einer breiten, rothen, schönen, einwärts scharf begränzten Randbinde und drey rothen feinen Querlinien, davon die erste an der Wurzel bogenförmig, die zweyte zweymal gebrochen, und die dritte einmal gebrochen ist, und zwischen den Narben steht, davon die Ringnarbe einen braunen Punct hat. Die Hinterflügel sind weißgelb mit einer breiten, nicht scharf begränzten, schwarzen Randbinde und gleichfarbigem Mittelrande.

Beschreibung des vollkommenen Insects. Die kammrückige Eule von 1 Zoll, 3 bis 3½ Linien Ausmaß nimmt sich wegen ihrer schönen braunrothen Querbände an dem Hinterrand der safrangelben Vorderflügel gut aus; diese bekommen durch 3 rothe feine Querlinien, die von rothen Nerven durchkreuzt werden, ein gitterförmiges Ansehen. Die erste Querlinie ist bogenförmig und steht an der Wurzel, die zweyte ist zweymal gebrochen, und steht vor, und die dritte nur einmal gebrochen hinter der Ringnarbe, die einen braunen Mittelpunct hat. Die Nierennarbe ist schwarzgrau, braun eingefaßt. Am Vorderrand stehen nach der Flügelspitze zu vier weiße Randpuncte. Die weißlichgelben Hinterflügel haben eine breite schwarze, am Saum geröthete Randbinde, einen gleichfarbigen Mittelmond und blasse Franzen. Die Unterseite ist der obern ziemlich ähnlich, nur röthlich, und die Zeichnungen schimmern durch. Die Vordertheile des Insects haben die Farbe der rothen Randbinde, und der Hinterleib die Grundfarbe der Hinterflügel.

Aufenthalt. Im Fränkischen, z. B. bey Römhild, Nürnberg, Gunzenhausen, bey Berlin und in Oesterreich, auch nach Fabricius im nördlichen Europa. Die Phaläne fliehet im Julius, und die Raupe weidet nach den Wienern auf Pappelbäumen, nach Bieweg und nach Schwarz zu Nürnberg auf Hauhechel, *Ononis spinosa*.

Anmerkungen. 1) Sie ist von der Vorkaufenschen und Fabriciusschen *Ph. N. Rutilago* verschieden, welche Esper *Practexta* nennt; daher die Besitzer der Vorkaufenschen Naturgeschichte bey *Rutilago* Vork. S. 675. die Wiener Benennung *Rutilago* ausstreichen und solche bey *Umbra* einzuschreiben haben, und die Besitzer des Esperschen Werks IV. S. 338. bey *Practexta* ebenfalls die Wiener Benennung durchstreichen können. Schon Bieweg im tabellarischen Verzeichniß der Brandenburgischen Schmetterlinge S. 41. rieth darauf, und der Wiener Aufsatz von 1797 bestätigt dieses.

2) Ferner ist sie von Hübners *Rutilago*, Beyträge I. t. 2. fig. L., verschieden, die die Aurog des Fabricius und der Wiener darstellt.

3) Auch

- 3) Auch ist es sonderbar, daß Fabricius seine Marginata so sehr von den andern gelbgelben Eulen getrennt, und ihr eine Spanner-Endung beugelegt hat.

149. Die Maybirkenenule. *Phalaena Noctua Sulphurago*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Hellgelbe, schwarzbraunkige Eule, schwarzpienglicher Nachfalter.

<i>Phalaena Noctua Sulphurago</i>	Wiener B. 86. 8.
<i>Noctua</i> —	Fab. Ent. III. 2. 74. 212.
<i>Phal. Noct.</i> —	Borkh. IV. 679. 293.
— — <i>Tigerina</i>	Espan IV. t. 123. f. 3. 4. Nämlich f. 3. ist eine Varietät.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenfamm und dachigen Flügeln; die bey'm Männchen hellschwefelgelben, bey'm Weibchen trübockergelben Vorderflügel sind mit größten und kleinern schwarzbraunen Flecken und Puncten besreut, mit undeutlichen Narben und am Hinterrande mit einer schwarzen Punctenreihe versehen.

Raupe. Nackt, weißlich und mit einem gelben Kopf geziert. (Nach Fabricius).

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule mißt 1 Zoll, 6 bis 7 Linien, und hat einen Rückenfamm, dann hellschwefelgelbe (das Weibchen trübockergelbe) Vorderflügel, mit größern und kleinern schwarzbraunen Flecken und Puncten, zwey undeutlichen Narben und am Hinterrand mit einer schwarzen Punctenreihe besetzt, an den Franzen aber gelb und schwarz gefleckt; die aschgrauen Hinterflügel sind gelb gefranzt. Die gelbe Unterseite aller Flügel zeigt einen schwärzlichen Mittelfleck und dergleichen Streif, wozu bey den vordern noch eine Punctenreihe kommt. Das ganze Insect ist ockergelb mit bräunlichen Füßhörnern. Bey Varietäten fließen in der Mitte die Puncte und Flecken in einen schwarzbraunen Streif, und hinter diesem zeigt sich ein eben so entstandener Wellenstreif. Daraus zieht Fabricius in seinen kurzen Beschreibungen, und Esper hält diese Varietät für das Männchen, auch vermuthet letzterer S. 330, daß sie die *Rubiginea* Vien. sey; sie ist es aber nicht.

Die nackte, weißliche, gelbköpfige Raupe ist noch nicht abgebildet; ihr Puppenstand soll 17 Tage dauern.

Aufenthalt. Im Oesterreichischen und in andern Deutschen Provinzen an Birken, deren Blätter der Raupe Nahrung sind.

150. Die Palmweideneule. *Phalaena Noctua Cerago*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Sommersprosse.

<i>Phalaena Noctua Cerago</i>	Wiener B. 86. 9.
<i>Noctua</i> —	Fab. Ent. III. 2. 75. 213.
<i>Phal. Noct.</i> —	Borkhaus. IV. 681. 295.
— — <i>Icteritia</i>	Naturforscher IX.
— — <i>Fulvago</i>	Errib. Verträge t. 10. f. 3. wo im Text alle Synonymen zu durchstreichen u. dafür Cerago zu setzen ist.

Kenn-

Kenntzeichen der Art. Eule. Mit einem schwachen Rückenstamm und etwas ausgeschweiften Flügeln; die vordern sind hellgelb mit einer breiten Binde, die aus drey ungleichen, rostfarbigen Fleckenreihen besteht, darin ein rostfarbenes Fleckchen mit weißer Pupille steht. Von den beyden Narben ist oft keine Spur, oft nur die Ringnarbe vorhanden. Am Hinterrand ist eine braune Punctenreihe. Die Hinterflügel sind hellweiß.

Raupe. Bleichgrün und nackt, mit braunem Kopf.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule mißt 1 Zoll 3 Linien, und hat ohnweit der Wurzel der hellgelben Vorderflügel einige rostfarbene Flecken und Streifen. In einer breiten Binde, die aus drey ungleichen rostbraunen Fleckenreihen besteht, befindet sich ein rostfarbenes Fleckchen, mit oder ohne weiße Pupille, das bey deutlichen Exemplaren eigentlich im untern Theil der Nierennarbe befindlich ist. Oft sieht man von beyden Narben nichts. Ohnweit des Hinterrands ist eine braune Punctenreihe. Die hellweißen Hinterflügel haben keine Schattirung. Auf der Unterseite sind alle Flügel gelblichweiß, und nur an den vordern sieht man rostfarbene Flecken am Vorderand. Die Füßhörner und Füßspitzen sind rostfarbig; der Kopf und Brustücken nebst Füßen mit den Vorderflügeln, die Brust und der Hinterleib mit den Hinterflügeln gleichfarbig. Sie varirt in Ansehung der Zusammenfließung oder Absonderung der Flecken, welche die Binde ausmachen.

Die im Junius vorhandene, bleichgrüne, nackte, braunköpfige Raupe lebt blattwicklermäßig, und spinnt sich nicht tief in die Erde ein. Ihre Puppenruhe dauert 3 bis 4 Wochen.

Aufenthalt. Die Eule zeigt sich im Herbst, im Darmstädtschen und bey Wien. Ihre Raupe lebt auf Weißbirken und Weiden.

Anmerkungen. 1. Sie darf nicht mit der Weißbirteneule, Ph. Noct. Fulvago V i e n. verwechselt werden.

2. In dem Exemplar der Scriba'schen Beyträge, das ich vor mir habe, ist die Illumination der Flecken vergessen worden. C h.

Stiebenzehnte Familie.

Morbraupen. Gewäsierte Eulen.

Diese Raupen haben gewöhnlich am Kopf, vorzüglich um das Maul schwarze Fleckchen, oder auch einen ganz schwarzen Kopf, einen sanft gefärbten Rücken und blasse Seiten, meistens mit einigen schwarzen Fleckchen. Sie sitzen fast immer zwischen 2 ein wenig zusammengepönnenen Blättern verborgen; fressen andere schwächere Raupen, und im Mangel frisches Fatters sich auch in der nämlichen Art unter einander auf. Die Verwandlung geschieht in einem schwachen Gewebe an oder unter der Erde. Die Eulen haben fast glatte oder zurückliegende büschige Rücken, abhängende, geglättete, mit mehreren gelinden, sich einwärts einander nähernden Wellenlinien quere besetzte Vorderflügel und dunkle Hinterflügel mit einem hellen Saum oder Hinterrande.

C c c c

Erste

Erste Linie. Mit gelblichen Vorderflügeln.

Weniger schädliche.

151. Die Vierletheneule. *Phalaena Noctua* Oo. Vien. et Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Nullnull, doppeltes D, Oo Nachsaker.

<i>Phalaena Noctua</i>	Oo Wiener Verz.	87. 1.
— <i>Bombyx</i>	Oo Lin.	832. 81. Müller 678. 81.
<i>Bombyx</i>	— Fab. Syst. entom.	573. 63.
<i>Noctua</i>	— Fab. Ent. III. 2.	84. 247.
<i>Phal. Noct.</i>	— Vorthausen IV.	661. 283.
—	— Graham II.	266.
<i>Phal. Bombyx</i>	— Gleditsch I.	Seite 513.
—	— Nau Forstw.	305. wo der Druckfehler Or vorkommt.
—	— Esper III. t. 71. f. 2—5.	mit Raupe.
Rösel I. 2. Classe.	Nachvog. t. 63.	Etwas verschönert; mit Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und hellocker gelben oder auch blässern Vorderflügeln, die mit rothbraunen Adern und Querlinien gitterförmig durchschnitten sind, und vor den drey Narben einen großen grünlichgrauen Wischfleck an der Wurzel haben. — Das Männchen zeichnet sich durch die fein gekämmten Fühlhörner aus.

Raupe. Kirschbraun, zuweilen blästroth, desgleichen auch violetroth, mit weißen Punkten, einer gleichfarbigen, unterbrochenen Rückentlinie, schwarz am Kopf, Nackenschild und Vorderfüßen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese bleiocker gelbe, kammrückige Eule mißt 1 Zoll, $5\frac{1}{2}$ Linien, jeder Vorderflügel 7 Linien. An der Wurzel zeigt sich ein großer grünlichgrauer Wischfleck, daran sich die erste gekrümmte Querlinie anschmiegt. Nach dieser folgt die Ring- und auch die sehr kleine eyrunde Zapfennarbe, welche beyde das doppelte D bilden, wovon die Phaläne benannt worden ist. Hierauf erscheint die durch eine braune Linie bezeichnete Nierennarbe, die zuweilen herzförmig ist. Durch diese zieht die zweyte, etwas gebogene oder winklichte Querlinie, welche eher ein Streif genannt werden kann, der durch die Nierennarbe unterbrochen wird. Dann folgt die dritte, ebenfalls gebogene, und endlich die vierte, fast gar nicht gebogene Querlinie, an welcher am Vorderrand ein kleiner bräunlicher Wisch steht. Eine braune feine Linie umzieht die braun- und gelbgefleckten Franzen. Die Hinterflügel sind wie die ganze Unterseite weiß; die Fühlhörner bräunlich, bey dem Männchen fein gefasert, die braungefleckten Fühlspitzen, Kopf und ganzer Hinterleib, der sich hinten zuspitzt, hellocker gelb. Bisweilen bildet der Raum zwischen der 3. und 4. Linie eine grünlich-graue Binde bey Varietäten.

Die kirschbraune, zuweilen, wie bey Röseln, blästrothe Raupe, die mit weißen Flecken oder Punkten gezieret, und am Kopf, Nackenschild (oder ersten Ring) und Brustfüßen schwarz ist, lebt in Blatthöhlen und verpuppt sich, wenn sie zu Ende des May's ausge-

ausgewachsen ist, zu Anfang des Junius in der Erde, um sich nach 3 Wochen, also zu Ende des Junius zu entwickeln. Die von ihr abstammenden Raupen verpuppen sich im September, und bleiben 6 Monate und drüber im Puppenstand.

Aufzucht. Die Eule erscheint zweymal, nämlich im April und im Junius an den Stämmen der Eichen, woran die Raupe theils im May, theils im August und September lebt.

Anmerkung. Zu den mehr nützlichen, als schädlichen Insecten dieser Linie gehört die Himbeer-eule, Ph. N. Dersala, Lin. Wischflügel, abgeschakter Nachtfalter (aber unpassend), Achatzflügel, Achatzoael, Feuerstein, welche in den Linnéischen, Wiener, Fabricius's, Vorkhausen's, Panzer's und Esper'schen Schriften, tab. 142. l. 1. vorkommt, und deren Raupe auch im Hallischen Naturforscher XVIII. tab. 5. fig. 3. 4. abgebildet ist. Diese Phaläne, ein herrliches Geschöpf, das sehr gesucht wird, misst gewöhnlich 1 Zoll 5 Linien, und hat einen Rückenstamm und dachige Flügel; die vordern sind aschgrau, und haben einen großen roßbraunen Triangel, dessen Spitze nach dem Innenrande geht. Seine drey Seiten sind mit drey weißen Streifen umgeben, wovon der am Vorderrand unvollständig, der innere oder obere etwas gewässert ist, der ohnweit des Hinterrandes aber sehr gerade läuft, und den manche nicht zum Triangel mitrechnen. In diesem Triangel befinden sich die sehr kleinen gelb- oder weißgerinneten Narben, und dahinter mehrere schöne, sich sehr aus- und einbeugende Wellenlinien. Der aschgraue Raum zwischen dem großen Triangel und der Wurzel bildet einen kleinen aschgrauen Triangel, und einen noch kleineren Fleck am Vorderrand nahe an der Wurzel. Die aschgrauen Franzen werden durch eine sehr feine weiße Zackenlinie von der Gläthe getrennt. Die Hinterflügel sind, wie die Unterseite, aschgrau, nur das letztere ins Schmutziggelbe fällt, und keine besondere Zeichnung hat. Der Vordertheil des Insects ist, den gelben Kopf ausgenommen, roßbraun, der Hinterleib aschgrau, mit einer Reihe brauner Wülstchen, wenigstens bey frischen Stücken. Die von Kopf und Körper pomeranzgelbe Raupe hat auf dem Rücken auf jedem Gelenk ein coffeebraunes Sechseck, durch welche sammtlich eine feine Mittellinie sich zieht; unter jedem Sechseck ist eine schräge Querentlinie, am 4. und 5. Gelenk an den Seiten ein bleichgelber Flecken, und auf dem 2. und 11. oben ein erhabener Wulst. Sie nährt sich im August und September auf der Himbeer- und Brombeerscaude, darauf sie eben so gekrümmt liegt wie die Brombeereule, Batis L. Sie spinnt sich zwischen Blättern in ein Gewebe von weißen Fäden ein, und ihre schwarze Puppe mit einer einzigen Endspitze gelangt nach 8 Monaten, nämlich im Junius des folgenden Jahres, zu ihrer Entwicklung, wo sie dann zuweilen auf obigen Stauden, wiewohl höchst selten, aufgefunden wird.

Zweyte Linie. Mit graulichen Vorderflügeln.

Weniger schädliche.

152. Die Pappelbuscheule. Phalaena Noctua Or, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Alberneule, weißer 80. Nachtfalter.

Phalaena Noctua Or Wiener B. 87. 5.
Noctua Rusticollis Fab. Ent. III. 2. 86. 255?

Uccc 2

Phal.

- Phal. Noct. Ruficollis Borthausen IV. 626. 263, doch so, daß die Aufzucht aus Espers und dem Wiener Wert wegkommen muß.
 — — Or Borthausen IV. 620. 260.
 — — — Brahm II. 342.
 — — — Borthausen in Scriba Entomol. Beytr. t. 6. f. 4. etwas zu klein.
 — — Octogena Esper IV. t. 128.
 — — Octogelima Hübners Beytr. I. 1. t. 1. f. G.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit schwachem Rückenstamm und dachigen Flügeln: die vordern sind aschgrau mit einigen braunen Wellenlinien, wovon die beyden mittelsten stärker und doppelt sind. Die beyden fast zusammen geflossenen weißringelichten Narben drücken durch ihre Gestalt die kleinen Buchstaben or aus.

Raupe. Walzenförmig, hellgelb, mit hellbraunem Kopf, hinter welchem auf jeder Seite 2, selten 3 schwarze Punkte stehen; 2 dergleichen sind manchmal auch auf dem letzten Ring. Sie variiert zuweilen mit Pomeranzengelb.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese aschgraue, etwas purpurglänzende Eule von unbeständiger Größe mißt zwischen 1 Zoll 4 Linien und 1 Zoll 7 Linien, weil das Männchen ohnehin etwas kleiner als das Weibchen ist; doch hat man auch kleine Weibchen dieser Art. Von vier braunen Wellenlinien sind die erste und vierte nicht so stark ausgedrückt, als die zweyte und dritte, welche doppelt sind. Diese schließen die aus 2 Narben entstandene gelbe Figur ein, die man bald mit der Zahl 80 (Octogena), bald mit den kleinen Buchstaben or verglichen hat. Diese Buchstaben stellen sich uns nämlich auf dem linken Flügel dar, wenn man die Eule mit dem Kopf gegen sich richtet. Von der Flügelspitze, da wo ein Schrägstreichelchen steht, läuft noch eine helle gewässerte Linie am Hinterrande herab. Die schädeligen Franzen sind mit einer schwarzbraunen Linie umzogen. Die gelblichen Hinterflügel haben einen breiten aschgrauen Randschatten und vor demselben eine gleichfarbige Wischbinde. Auf der Unterseite sind alle Flügel weißlich mit verloschenen aschgrauen Querstreifen und an den vordern mit einem schwärzlichen Querstreichelchen an der Spitze versehen. Das ganze Insect, die rothfarbigen fadenförmigen Fühlföhner und die purpurfarbige Schattirung am Vordertheil des Bruststücks ausgenommen, ist überall aschgrau.

Die Raupe ist walzenförmig, bald hell- bald pomeranzengelb, mit hellbraunem Kopf, schwarzem Mund und dergleichen Seitenflecken am Mund. Hinter dem Kopf stehen in jeder Seite 2, selten 3 schwarze Punkte, und auf dem letzten Ring auch zwey. Sie geht ihre Verwandlung in den Blättern an, die sie fester zusammenzieht, und wird theils im Junius, theils im August darin zur braunen, glanzlosen einspitzigen Puppe, welche sich im ersten Fall nach 3 bis 4 Wochen, im letzten aber nach 6 Monaten, nach der Ueberwinterung, im May entwickelt.

Aufenthalt. Die also zweymal jährlich erscheinende Phaläne zeigt sich sowohl im May, als zu Ende des Julius oder später, desgleichen ihre Raupe auf der schwarzen und italienischen Pappel im Junius und Julius; hierauf wieder im September und October.

Anmerkung. Es gibt Schmetterlinge, deren Bestimmung in Fabricius Schriften immer noch schwankend ist; unter solche gehört auch die gegenwärtige Pappschuschule. Bey derselben sind verschiedene Schwierigkeiten. Erstlich gibt Fabricius seine *Ruficollis* ausdrücklich a. a. O. für die *Ruficollis* Wien. an, und weist doch zugleich auf *Evers* und *Hübners Octogena* und *Octogesima*. Zweitens eignet er dieser letzten eine unrechte Eichenraupe zu, die weder recht zur *Flavicornis* L. noch zu unserer gegenwärtigen gehört, aber doch allenfalls noch eher zur ersten. Drittens denkt er mit keiner Sylbe des Narbenzugs or.

153. Die Bellenule. *Phalaena Noctua Confobrina*, Borkhauf.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Fabriciussches Or, griechisches *Ypsilon*, Silberbellenule.

Phal. Noct. *Confobrina* Borkhausen IV. 622. 261.

Noct. Or Fabr. Ent. III. 2. 86. 253.

Phal. Noct. *Confobrina* Brahm II. 344. 228.

— — *Ypsilon graecum* Gdze Entomo eq. Beiträge III. 3. 253.

— — Or foem. im Text *Confobrina* Borkhausens in Scriba Beytr. t. 6. f. 4 b.

— — *Octogena* foem. Esper IV. t. 128. f. 5.

Segeers Abhandlungen II. t. 7. f. 23.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenrücken und dahigen Flügel; die vordern sind aschgrau, mit 2 Parthien brauner Wellenlinien, in deren Zwischenraum statt der gewöhnlichen Nierenmarke eine längliche, viereckige gelbgraue Makel, und vor ihr zuweilen statt einer Ringmarke ein blaßgelber Punct steht. Von der Flügelspitze an, die ein braunes Schrägschrichelchen hat, läuft wie bey der vorhergehenden, eine weiße Zackenlinie herab. Das Männchen hat am After einen braunen Schopf.

Raupe. Der vorhergehenden ähnlich, aber blaß, oder grünlichgelb, mit hellbraunem Kopf, hinter welchem auf beyden Seiten einige schwarze Puncte stehen, die auch fehlen können, zuweilen doch auch auf dem letzten Ring stehen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese aschgraue Eule ohne Purpurglanz, welche in der Regel 1 Zoll 7 Linien, und bey Ausnahmen weniger mißt, und von Herrn Borkhausen mit Recht von der vorhergehenden gesondert wird, hat eine Parthie brauner Wellenlinien vor und eine nach der etwas viereckigen Marke, deren Kern nicht ganz in der Mitte steht. Die Ringmarke ist bald als ein gelber Punct da, bald gar nicht. Eine weiße Zackenlinie, an welcher einwärts 5 braune spitzige Längschrichelchen stehen, nimmt an dem schwarzen Schrägschrichel bey der Flügelspitze ihren Anfang, und zieht bis zum Innenrand am Hinterwinkel herab. Die gelbgrauen Hinterflügel sind am Hinterrand aschgrau, mit einem schmalen Schattensstreif in der Mitte. Die Unterseite ist grau und ihre Binde verloschen. Außer den fadenförmigen Fühlhörnern, die nach oben hellbräunlich sind, ist das ganze Insect theils greisgrau theils aschgrau.

Die Raupe gleicht der vorhergehenden, ist aber blaß, oder grünlichgelb; der hellbraune Kopf, der gefleckte Mund mit seinen Seitenflecken, die schwarzen Puncte hinter dem Kopf und am letzten Ring eben so, wie bey der vorhergehenden, mit welcher sie auch

auch Lebens- und Verwandlungsart, desgleichen eine zweymalige Hervorkunft gemein hat.

Aufenthalt. Ganz wie die vorhergehende und auf eben derselben Nahrungspflanze.

Anmerkung. Noctua Or des Fabricius ist, selbst der Raupe nach, ganz diese Welleneule, ob er gleich mit Unrecht auf Noct. Or Vien. hinweist.

154. Die Pfingstmayeneule. *Phalaena Noctua Flavicornis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbhorn, Mayeneule, Eule mit gelben Fühlhörnern, aschgraue Phaläne, Touppé (nach Glabach).

<i>Phalaena Noctua Flavicornis</i>	Lin.	856. 182.	Müller 701. 182.
Noctua	—	Fab. Ent. III. 2. 116. 352.	mit unrichtiger Raupe.
Phal. Noct.	—	Vorkhausen IV. 616. 259.	
—	—	Brahm II. 464.	
—	—	Hübners Beiträge II. 1. tab. 3. fig. Q.	
—	—	Ceriba Beiträge t. 13. f. 8.	
—	—	Esper IV. t. 184. f. 1. 2.	

Degeers Abhandlung II. t. 7. f. 19. mit unrechter Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem schwachen Rückenamm und dahigen, ungezählten Flügeln; die vordern sind aschgrau, am Vorderrand weißlich mit einer zirkelförmigen, schimmelfarbigen, größern Narbe, vor welcher eine ganz kleine von gleicher Farbe steht, oft aber auch mit der größern zusammenfließt. Von den vielen gebogenen Quercinien ist eine vor und eine hinter den Narben schwärzer und ins Auge fallender, als die andern. Eine gewässerte Quercinie zieht gerade am Hinterrande herab.

Beim Männchen sind die rostfarbenen Fühlhörner stufenweis geblättert, beim Weibchen fadenförmig.

Raupe. Nackt, weißlich oder gelblich, zuweilen am Vordertheil etwas schwärzlich schattirt, mit dickem, gelbbraunem Kopf, und zu beyden Seiten des Rückens mit einer Reihe schwarzer Flecken bezeichnet, welche oben und unten mit weißen Augenpuncten umgeben sind.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese sammrückige, aschgraue Eule, mit ihrem in ungleicher Breite weißlich gefärbten Vorderrand, mißt 1 Zoll 7 Linien, das Männchen 2 oder 3 Linien weniger. Von den vielen, bleichen, gebogenen Quercinien, die sich nach außen entfernen, nach innen sich einander nähern, zeichnet sich eine vor der großen, schimmelfarbigen, runden Narbe, die eine ganz kleine vor sich hat, aus, und eine andere hinter derselben, beyde durch ihre Deutlichkeit und Schwärze. Von der Flügelspitze an, wo ein Schrägestrich steht, zieht eine gewässerte schwärzliche Linie am Hinterrand herab. Diese und die beyden eben bemerkten, stärker sich auszeichnenden Quercinien sind diejenigen drey, deren Linne' in seiner Diagnose gedenkt, indem er die blossern nicht mitzählt. Die Branten sind aus Weißgrau und Schwarz gescheckt. Die weißgrauen Hinterflügel sind am Hinterrand aschgrau schattirt, und

und haben einen oder zwen dunkle Streifen und weißliche Franzen. Die Unterseite aller Flügel ist mit der Oberseite gleichfarbig, und ihre vordern haben 2 dunkle Streifen. Außer den gelbrothfarbigen Fühlhörnern, von welchen das Insect den Namen hat und die bey'm Männchen fadenweis geblättert, bey'm Weibchen fadenförmig sind, ist alles Uebrige am Insect aschgrau.

Varietäten haben in der größern Narbe, die auch zuweilen grüngelb erscheint, einen schwarzen Mittelpunkt, andere auf den Vorderflügeln einen matten Purpurschiller, einigen fehlt die ganz kleine Narbe.

Die nackte, weißliche oder gelbliche, zuweilen an dem Vordertheil mit schwärzlichen Farben schattirte Raupe hat einen dicken, gelbbraunen Kopf auf jeder Seite des Mundes einen schwarzen Fleck. Die schwarzen Fleckenreihen auf beyden Rückenseiten zeichnen sie aus, die oben und unten mit weißen Augenpunkten umgeben sind; eine eben solche ist auch gegen die Füße. Sie ist sowohl im Junius, als auch das zweytemal im September ausgewachsen vorhanden, und verwandelt sich in einem Gewebe entweder zwischen Blättern oder in Rindenklüften, oder im Moos unter den Bäumen. Die dunkelbraune, hinten zugespitzte Puppe der einen Generation ruht wenig Wochen, die von der andern den Winter durch bis in den März.

Aufenthalt. Die Eule zeigt sich im März, und sitzt ruhig gemeiniglich an der Sonnenseite der Birkenbäume, unter deren, mit ihren Fäden verbundenen Blättern die Raupe sowohl im May und Junius, als auch, wie man behaupten will, im August und September lebt.

Anmerkungen. 1. Herr Fabricius hat dieser Eule die Raupe unserer, in der achten Familie beschriebenen Hageicheneule, *Xanthoceros*, welche *Flavicornis* Vienn. ist, zugeeignet, und die Obstbäume als den Aufenthalt der Raupe angegeben; beydes kann aber nicht statt finden.

2. Die Winterreicheneule, *P. N. Ruscicollis*, Vienn. soll nach den mehr erwähnten Wiener Nachrichten vom Jahr 1797. *Esper* tab. 128. f. 6. seyn (*Octogenae Varietas*). Und da sich jene Nachrichten nicht im mindesten auf Fabricius Schriften beziehen; so bleibt es noch in mer ungewiß, ob ihre und des Fabricius *Ruscicollis* Ein Geschöpf sey. Da sich sogar Fabricius in der *Entomologia* syst. bey seiner *Ruscicollis* auf *Esper* tab. 128. f. 4. (Wenn das 4 kein Druckfehler statt 6 ist) bezieht: wäre sonach die *Noctua Or. Vien.* und *Ruscicollis* Fab. Eine Phaläne. Man ist daher nicht im Stande, die Naturgeschichte der Wiener Winterreicheneule genau zu liefern, weil uns die tab. 128. f. 6. F. sp. nicht genügt, die Wiener Entomologen sich nicht auf mehrere Schriftsteller berufen, und weil *Esper* recht zu haben scheint, wenn er diese Lüneusche *Flavicornis* in der *Ruscicollis* Fab. findet, welche letztere dunkelschgrau, zweymal dunkelbandirte Vorderflügel und aschgraue Hinterflügel habe, und an den Fühlhörnern und am Vordertheil des Brustrückens rothfarbig seyn soll. Möglichs wäre es allemal, daß Fabricius aus Versehen die *Flavicornis* zweymal aufgeführt hätte, aber jedesmal nur unvollständig,

155. Die Sandbelleneule. *Phalaena Noctua Bipuncta*, Borkhauf.

Namen und Schriften.

Phalaena Noctua Bipuncta Borkhausen IV. 627. 264.— *Ruficollis* Brahm II. 345. 229.*Bombyx* — *Populeti* Fab. Ent. III. 1. 476. 215?

Kenzeichen der Art. Eule. Mit schwachem Rückenstamm und dunkelashgrauen Vorderflügeln, durch welche 2 weißliche Binden hinstreßen, davon die schmale eine Strecke von der Wurzel, und die größere, breite in der Mitte der Flügel sich befindet; zwischen beyden berregt sich eine schwarze Wellenlinie.

Das Männchen soll, im Fall es *Populeti* Fabr. ist, kammförmige Fühlhörner haben.

Raupe. Der Raupe der Belleneule, *Consobrina*, ähnlich; gelbgrün, mit hellbraunem Kopf, schwarzem Mund und gleichfarbigen Flecken darneben, ohne weitere schwarze Puncte.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Vorderflügel dieser 1 Zoll 6 Linien messenden, kammrückigen Eule sind dunkelashgrau; worauf sich 2 weißliche Binden, nämlich eine schmale und eine breite, und zwischen ihnen eine schwärzliche Wellenlinie befindet. In der breiten Binde stehen 2 tief schwarze Puncte an der vordern Gränze unter einander. In der Nähe des Hinterrandes sieht man eine weiße Quерlinie, und hinter derselben an der Flügelspitze eine kleine schwarze geschwungene Schräglinie. Auch schmiegt sich noch an den durch Adern gesteckt werdenden Franzen eine feine Quерlinie hinab. Die hellashgrauen Hinterflügel haben einen verblichenen Mittelpunct und dunkeln Randschatten. Ein Mittelmöndchen und ein darauf folgender Schatten bezeichnet jeden Flügel auf der Unterseite. Außer den rothfarbigen Fühlhörnern und dem Vordertheil des Brustrückens ist am ganzen Insect alles grau.

Die noch nicht abgebildete, gelbgrüne, braunköpfige Raupe sieht der Belleneuleraupe ähnlich und hat einen schwarzen Mund und dergleichen Flecken darneben; aber keine weitere schwarze Puncte. Sie zeigt sich im August, verpuppt sich im September und October, um nach einer 7 monatlichen Ruhe im May sich zu entwickeln.

Aufenthalt. Die Phaläne läßt sich bey Darmstadt im May sehen, und ihre Raupe im August und September auf Pappeln, und man vermuthet eine zweyte Generation, wo die Raupen im Junius vorhanden und die Phalänen im August sich entwickeln.

156. Die Weidenbuscheule. *Phalaena Noctua Saliceti*, Borkhauf.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Goldweiden-eul., graugelber Sultan (nach Gladbach).

Phal. Noctua Saliceti Borkhauf. IV. 630. 266.*Noctua Viminalis* Fab. Ent. III. 2. 72. 206.

Höfel III. tab. 11. mit Raupe.

Renna

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und dachigen Flügeln; die vordern sind durch einen pomeranzfarbenen Querstreif in eine dunkelbraune und hellgraue Hälfte abgetheilt; eine Ringnarbe erscheint im dunkeln, und eine Nierennarbe zum Theil im hellen Felde. Die Varietäten zeigen eine schwächere oder stärkere pomeranzfarbige Mischung.

Raupe. Ähnlich mit der Raupe der Pappelbusch- und der Pfingstmayeneule; bleichgrün, dünnfals in die Länge weißliniert mit weißen Einschnitten und gleichfarbigen Punkten; dann einem bläugelgelblichen Kopf und schwarzem Mund.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese nicht unscheinliche kammrückige Eule von ungefähr 1 Zoll, 4 bis 5 Linien ist den Vorderflügeln nach halb dunkelbraun, halb aschgrau. Beyde Farben sondern sich durch einen pomeranzfarbigen, unterbrochenen, wirklichen Querstreif. Vor der hellgrauen Ringnarbe zieht sich zuerst ein schwacher, schwärzlich gerandeter, nicht unterbrochener pomeranzfarbiger Querstreif. Diese Ringnarbe steht ganz, und die Nierennarbe zum Theil im hellen Felde, so daß ein zweyter pomeranzfarbiger Streif daran bricht. Die braune Farbe zieht sich auch noch über die Nierennarbe am Vorderrand über das graue Feld, wo am Vorderrand einige weißliche Punkte stehen. In der Nähe des Hinterrandes erscheint eine weißliche Querlinie, und die grauen Franzen werden durch eintretende schwarze Striche scheckig. Die Hinterflügel sind glänzend aschgrau und an den Franzen weiß. Fühlfippen, Kopf und Halsstragen sind ockergelb; letzterer ist durch schwarze und braune Linien verschönert. Die Fühlfhörner sind rosifarbig, der Rücken dunkelgrau, der Hinterleib wie die Hinterflügel gefärbt, seine Seiten und der After pomeranzfarbig bebüschelt, die Fußblätter aber schwarzgeringelt. Die Varietäten wechseln mit mehr oder weniger Orangefarbe.

Die der Raupe von der Pappelbuscheule ähnliche bleichgrüne, unten am Leibe und an den Füßen grasgrüne Raupe erhält durch die weißen Einschnitte der Ringe eine gegitterte Fläche, deren Felder grün sind, wo dann in jedem Feld 2 weiße Punkte stehen. Der Kopf ist bläugelbräunlich, der Mund schwarz. Unter den 5 Längslinien ist die mittlere breiter als die andern. Sie erscheint zu gleicher Zeit als die Raupe der Pappelbusch- und Pfingstmayeneule, mit denen sie ähnliche Lebensweise und Verwandlungsart hat, und verpuppt sich theils im Junius, theils im September in Geweben, um entweder in 3 bis 4 Wochen, oder in 6 Monaten sich zu entwickeln.

Aufenthalt. Die Eule erscheint das erste Mal im April, das anderemal im Junius oder Julius, und ihre Raupe lebt auf schmal- und breitblättrigen Weiden.

Anmerkungen. 1. Die Vorkhausensche lateinische Benennung hat vor der Fabriciusischen darum den Vorzug, weil letztere ihrer Endung: alis, wegen, einen Zünsler andeutet.

2. Röfels Abbildung III. t. 11. ist zwar vom Herrn Professor Esper bey seiner Bomb. Scoriacea tab. 83. im Text angezogen worden, aber nur durch eine leicht mögliche Ähnlichkeit, oder wirkliche Verwechselung der Raupen.

Dritte Linie. Mit rothbraunen Vorderflügeln.

Weniger schädliche.

157. Die Feldulmeneule. *Phalaena Noctua Diffinis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Landsmann, Portugiesischer Landsmann.

<i>Phalaena Noctua Diffinis</i>	Lin. 848. 146. Mäller 692. 146.
— — —	Wiener Bz. 88. 10.
Noctua — —	Fabr. Ent. III. 2. 87. 257.
Phal. Noct. — —	Gorkhaus. IV. 633. 267.
— — —	Brahm II. 367.
— — —	Derfelbe in Scriba Beyträgen t. 12. f. 1. 2. mit Raupen. Vorzüglich gut.
— — —	Egner IV. t. 134. fig. 2.
— — — Affinis	Hübners Beytr. I. 1. t. 1. fig. E.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamm und rothbraunen Vorderflügeln, die rosenroth und rothfarbig gemischt sind, mit 3 weißen Flecken am Vorderrand, wovon der erste ein Strichelchen ist, und die beyden andern fast kegelförmig sind. An der Flügelspitze steht ein größerer und ein kleiner schwarzer Punct. Das Männchen hat am Afters einen stärkern Schopf als das Weibchen.

Raupe. Schmal, weich, gelbgrün mit glänzendem, schwarzbraunem Kopf und Vorderfüßen, und 4 weißen Längslinien. Auf jedem Ring stehen weiße Fleckchen mit braunen Pünctchen in der Mitte. Sie lebt blattwicklerförmig.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese niedliche Eule hat von einer Flügelspitze bis zur andern ein Ausmaß von 1 Zoll 2 Linien; jeder Vorderflügel 6 Linien. Letztere sind rothbraun mit Rosenroth und Rothfarbe gemischt. Ein sehr kleiner weißer Fleck, wie das dünnste Strichelchen, zeigt sich am Vorderrand bey der Wurzel, zwey andere gleichfarbige, kegelförmige, größere weiterhin an eben diesem Rande, so daß der mittlere nach der Wurzel, der dritte nach dem Hinterrand in einen Haken gebogen ist, und aus der Spitze der mittleren läuft eine weißlichrosenrothe Querlinie, mit dunkler einseitiger Begrenzung, fast gerade durch, aus der Spitze des dritten aber eine gleichfarbige, nach hinten stark geschwungene, bis an den Innenrand hinab. Beyde Linien bilden beynähe ein rothbraunes Trapezium. Mitten durch zieht eine Schattenlinie in der Richtung der hinter ihr stehenden Querlinie. Unweit des Hinterrandes erscheint noch eine weißliche, oder blaßrosenrothe Wellenlinie, und an der Flügelspitze 2 schwarze Puncte, wovon der oberste sehr klein ist. Der Innenrand ist rosenroth. Die Hinterflügel sind dunkelschlaggrau, nach der Wurzel hin heller, und die Franzen weißlich. Auf der Unterseite haben die nach dem Hinterrand röhlichen, in der Mitte schwarzgrauen Vorderflügel am Vorderrand 2 weiße Flecken; die grauen Hinterflügel einen braunen Bogenstreif und darüber einen Punct, zuweilen auch keinen. Die Vordertheile des ganzen Insects sind röhlichgrau, und der Hinterleib mit den Hinterflügeln gleichfarbig, mit röhlicher Unterseite und dergleichen Schopf am Afters. Die Fußblätter an den weißen Füßen sind rothbraun geringelt.

Die 1 Zoll und 2 Linien messende, träge, schmale, weiche Raupe von gelbgrünem Körper hat vier weiße Längslinien, und ihr glänzend schwarzbrauner Kopf und Vorderfüße sind das standhafteste Kennzeichen, wodurch sie sich von allen andern unterscheidet. Ueber den Kopf läuft eine lichtere, wie eine Gabel sich theilende Linie, und jeder Ring hat weiße Fleckchen mit braunen Punkten in der Mitte, welche unter der Vergrößerung eigentlich Würzchen sind, darauf jederzeit ein einzelnes Härchen steht. Der erste Ring hat mehr Glanz als die übrigen. Wenn es sich betätigen sollte, daß sie im Ei überwintere, so wäre eine Zeit von 9 Monaten nöthig, ehe sie die Eierschale verließ. Sie bespinnt sich bey ihren Häutungen ihre Blätter, worin sie blattwicklermäßig lebt, genauer, und ist zu Ende des Mays völlig ausgewachsen, um sodann, oder doch gleich im Junius, in einem weißlichen Gespinnst, gar nicht tief in der Erde, bey Ausnahmen von der Regel zuweilen zwischen Blättern, eine Puppe zu werden, die braunroth gefärbt, mit einem blauen Reif überzogen und mit 2 Schwanzborsten versehen ist. Ihre Ruhe währt 3 bis 4 Wochen. Bieweg glaubt an eine zweyte Generation, deren Raupen im August und September vorhanden, und die Phalänen davon im Frühling erscheinen sollen: wogegen aber Brahm in Scribas Insectenbeträgen S. 187. gegründete Erinnerungen macht, weil man die Raupe niemals im Herbst finde.

Aufenthalt. Die Phaläne erscheint zu Ende des Junius, oder zu Anfang des Julius an Bäumen, und ihre Raupe lebt im May auf Feldulmen, nach Bieweg auch auf Eichen, und nach Brahm zuweilen auf dem Haselstrauch.

Anmerkung. Linne' nennt zwar die Farbe der Vorderflügel roßbraun, allein das ist sie nur bey verschossenen Stücken, und das Roßfarbige ist am wenigsten in ihre Farben gemischt. — Die Raupe selbst ist so wenig, als die nachfolgende, eine Wölderin von Profession, dergleichen eher die Trapezina zu seyn pflegt. Ueberhaupt scheint das Worden kein eigentlicher Familiensfehler zu seyn; sondern Raupen, die einmal von Raupen gekostet haben, finden in der Folge keinen Geschmack an ihrem gewöhnlichen Futter, sondern sind nach Raupenfleisch, vorzüglich aber nach ganz frischen Puppen, die erst ihren Raupenbals abgelegt haben, lüstern.

158. Die Espeneule. *Phalaena Noctua Affinis*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Anverwandter, Italiänischer Aeverwandter, Küsterneule.

Phalaena Noctua Affinis	Lin.	848. 144.	Müller 692. 144.
—	—	Wiener B. 88. 11.	—
Noctua	—	Fab. Ent. III. 2. 87. 258.	—
Phal. Noct.	—	Gorthausen IV. 637. 268.	—
—	—	Nau Forstw. 307.	—
—	—	Brahm Ins. Cal. II. 365.	—
—	—	Brahm in Scriba Beiträgen t. 12. f. 6. 7. mit Raupe.	—
—	—	Sehr gut.	—
—	—	Espan IV. t. 134. f. 1. Fehlerhaft.	—
—	Diffinis	Hübners Beitrage I. 1. t. 4. fig. T. eine schwarze Varietät.	—

Dddd 2

Kenn,

Kennzeichen der Art. Eule. Der Felsbülmeneule ähnlich, mit einem schwarzen Rückenstamm, und bald rostbraunen, bald rothbraun und schwarz gezeichneten Vorderflügeln, die nicht rosenroth gemischt sind, mit 2 weißen Flecken am Vorderrand, wovon der eine sehr schmalstreifig, der andere bogenförmig ist, und 2 schwarze Punkte an der Fühlgelspize neben sich hat. Das Männchen hat einen stärkern Schopf am After, und das Weibchen einen stärkern Leib.

Raupe. Aehnlich mit der Raupe der Aorneule, bald grünspangrün, bald gelbgrün von Kopf und Leib, mit 5 weißen Längslinien, und auf dem ersten Ring ein Schild und vier, auf allen übrigen Ringen acht schwarzen Wärzchen. Ueber jedem Lustloch stehen 2 schwarze Strichelchen. — Sie lebt blattwicklermäßig.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese der vorhergehenden und der nachfolgenden ähnliche, 1 Zoll und 1 Linie messende Eule hat bald rostbraune, bald rothbraun und schwarz gemischte Vorderflügel mit 2 weißen Randflecken, wovon der erste sehr schmalstreifig, der zweyte bogenförmig, folglich wie bey dem nachfolgenden ist, oder bey manchen Stücken ganz fehlt. Aus denselben laufen auch zwey, doch schwächer weiß angelegte Querlinien. Die Ring- und die Nierennarbe, die der vorhergehenden fehlen, sind hier lichter als der Grund, und bilden, indem die Ringnarbe 1 Punkt, die Nierennarbe 2 darstellt, die Zahl 80, die sich auf dem linken Flügel am besten zeigt. Zuweilen fehlen sie. Die dunkle Schattenlinie, die die Nierennarbe durchgeht, ist auch hier vorhanden. An dem gekerbten Hinterrand zieht eine Reihe schwarzer Pünktchen durch, die der vorhergehenden fehlen. Die zwey schwarzen Punkte stehen auch hier an der Flügelspize. Die gelbgefranzten Hinterflügel sind schwarz (ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von ähnlichen), und gegen die Wurzel etwas heller. Auf der Unterseite haben die gelb und röthlichgrau geränderten schwarzen Vorderflügel, wie die vorhergehende und nachfolgende, zwey Randflecken; die gelben, schwarzgemischten Hinterflügel einen schwarzen Mittelpunkt, zuweilen Mittelmond, hinter demselben eine aschgraue Vogenlinie oder auch Binde, und gelbe Franzen. Kopf und Fühlspitzen sind grau, ersterer mit rostfarbiger Mischung; Halskragen, Borderrücken und Schopf am After wie die Vorderflügel; doch ohne schwarze Mischung. Die Fühls Hörner sind nebst dem Hinterleib aschgrau, und die ganze Unterseite des Körpers weißlich mit braungeringelten Fußblättern.

Die 1 Zoll, 3 Linien messende, in der Jugend schwärzliche, dreymal weißlinierte Raupe wird nach der zweiten Häutung fünfmal weißliniert, und nach der letzten Häutung erst gänzlich grün von Kopf und Leib. An Größe und Gestalt gleicht sie der Raupe der Aorneule, Trapezina. Das erste Glied hat einen Rückenschild und vier schwarze Punkte, die unter der Vergrößerung Wärzchen sind. Solche Wärzchen mit einem Härchen haben alle folgende Glieder, jedes acht, und jedes der schwarzen Lustlöcher hat 2 schwarze Strichelchen wie ein Dächelchen über sich. Die Varietäten haben der schwarzen Zeichnungen mehrere oder weniger. Lebens- und Verwandungsweise ist nebst der Puppenruhe der glänzendschwarzen, runzlichten Puppe wie bey der vorhergehenden.

Aufenthalt. Die Eule sieht man zwar in Deutschen Gegenden, immer aber, so wie die vorhergehende, als wahre Seltenheit, z. B. bey Maynz, im Oesterreichischen u. s. w.

u. s. w. in den nämlichen Monaten, wie die vorige; eben so auch die im May auf jungen Ulmen und Espengesträuchen lebende Raupe.

Feinde. Nach Brahm gewisse kleine cylindrische, vornen zugespitzte, gelbliche Maden oder Larven, die sich an den Seiten der Raupe festsaugen, bis sie an der Entkräftung stirbt. Man trifft solche im Herzen der Ulmenscöpslinge an, wo sie in einem geschlossenen Gespinste leben, und sich in kleine, den Ichneumonswespen ähnliche Insecten der fünften Ordnung verwandeln.

Anmerkung. In der vollständigen Beschreibung dieser Eule in den Scriba'schen Beiträgen gedenkt Brahm der in der Abbildung ausgedrückten bogenförmigen Gestalt des größern Randes; stochs nicht besonders, vermuthlich weil solcher manchmal fehlt.

159. Die Obstzweigeneule. *Phalaena Noctua Pyralina*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Pyralinanachtsfalter, Knopperneicheneule.

<i>Phalaena Noctua Pyralina</i>	Wiener B. 88. 12.
— — <i>Corusca</i>	Borkhausen 640. 269.
— — <i>Pyralina</i>	Borkhaus. IV. 641. 270.
— — <i>Corusca</i>	Esper IV. t. 135. f. 4. 5. Abänderung.
— — <i>Pyralina</i>	Schwarz Beitr. t. 7. f. 1—3. Sehr genau.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenamm und dachigen Flügeln, davon die vordern glänzend rothbraun mit Schwarz gewellt sind, einen bogenförmigen, bläulichweißen Zug am Vorderrand, und an dessen äußerer Seite einen aufliegenden, schwarzen Doppelpunct, ferner in der Flügelmitte einen weißen Punct zuweilen haben.

Das Männchen verräth sich, wie bey allen Schmetterlingen, durch einen schlanken Hinterleib.

Raupe. Grün, mit drey weißen Rückenlinien. (Nach Wieweg.) Sie lebt blattwicklermäßig und ist noch nicht abgebildet.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese kammrückige, 1 Zoll und 3 bis 4 Linien messende Eule hat schöne rothbraune Vorderflügel, die am Innenrand rosenroth sind. Sie ist der vorhergehenden ähnlich, nur daß hier die Hinterflügel nicht schwarz sind. Von den drey weißen Querlinien steht die erste an der nämlichen Stelle, wie bey der vorigen, oder fehlt auch wohl gar; die zweyte fängt an einem bogenförmigen, bläulichweißen Zug des Vorderrandes an, die dritte ist nicht weit vom Hinterrand, und vereinigt sich da, wo sie anfängt, mit der zweyten. Auch sieht man zwischen den beyden vordersten Querlinien einen Schattenstreif, und zuweilen einen kleinen weißen Punct in der Mitte, den man bey den Stücken der hiesigen Gegend nicht deutlich findet, aber dagegen eine Spur von den beyden Narben antrifft. Die aschgrauen Hinterflügel haben einen blaßröthlichen oder hellen Saum. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel in der Mitte schwärzlich, an den Rändern roth mit 2 bleichen Fleckchen am Vorderrand; die hintern gelbgrauen haben einen dunkeln Mittelpunct und Bogenstreif. Bey Varietäten ist die zweyte Querlinie der Vorderflügel schwarz. Ueberhaupt ist die Phaläne

in

in der schönen Farbe der Selbduleule ähnlich, aber auch wegen des bogenförmigen Zugs am Vorderrand der Espeneule.

Ihre mit 3 weißen Rückenlinien versehene, blattwicklermäßig lebende, von Herrn Wieweg erwähnte Raupe fand man, in mehrerer Zahl, in hiesiger Gegend bey Meinungen in Gärten 1793, nach der Zeit nicht wieder, verkannte sie aber, indem man sie für eine andere hielt. Sie verpuppten sich zwischen zusammengezogenen Blättern am 14. und 20. Junius in eine blaubestäubte Puppe, um sich am 14. und 17. Julius, also nach einer 4 wöchentlichen Ruhe, zu entwickeln.

Aufenthalt. Die Eule erscheint in mehreren südlichen und nördlichen Gegenden von Deutschland in der Mitte des Julius, und die Nahrung ihrer bey uns im May und Junius vorgefundenen Raupe waren die Blätter von Kirschen, Pflaumen und Kernobstbäumen, bey Wieweg, welcher sie im September fand, Eichenlaub. Es läßt sich daher auf eine zweyte Generation schließen.

160. Die Ahorneule. *Phalaena Noctua Trapezina*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Fischfleck, Fischlereule, Eule mit dem ungleichseitigen Viereck, verschobenes Viereck, Trapeziennachtsfalter, Eule am Ahorn.

Phalaena Noctua Trapezina	—	Lin. 836. 99. Müller 683. 99.
—	—	Wiener B. 88. 13.
Noctua	—	Fab. Ent. III. 2. 44. 117.
Phal. Noct.	—	Vorkhausen IV. 642. 271.
—	—	Graham II. 507.
—	—	Gleditsch I. 516.
—	Rhombica	Knobls Venträge II. t. 3. f. 1—4. mit Raupe.
—	Trapezina	Esper IV. t. 87. f. 1. 2. 3.
—	—	—

Kennzeichen der Art. Eule. Mit glattem Rücken und niedergedrückten Flügeln; die vordern sind gewöhnlich schmutzigocker gelb mit 2 bleichen Nucerlinien, davon die vordere eine schräge, die hintere eine gebogene Richtung hat, um ein unregelmäßiges verschobenes Viereck darzustellen. In der Mitte ist ein Schattenstreif zwischen den gewöhnlichen bleichen Narben, wovon die nierenförmige einen schwarzen Punct enthält. Bey Varietäten ist das Viereck dunkel ausgefüllt und bildet eine Binde.

Raupe. Grasgrün, mit fünf weißen Längslinien, und überall schwarz punctirt; am kleinen gelbgrünlichen Kopf ist auf jeder Seite der Stirne ein doppeltes braunes Fleckchen. In der Jugend hat sie gelbliche Einschnitte. Sie ist eine Ermörderin, und wenn sie eine Zeit lang Fleisch gefressen, wird sie bräunlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese glattrückige, 1 Zoll 3 Linien messende Eule hat auf ihren Vorderflügeln eine röthlich graue Lederfarbe, mit 2 bleichen Linien, die einwärts braungesäumt sind, und durch ihre Lage ein unregelmäßiges Trapezium bilden, indem die vordere schrägs und die hintere stark gebogen läuft. Zwischen den sehr bleichen Narben, wovon die größere, nämlich die Nierrennarbe,

rennarbe, einen schwarzen Punct hat, steht ein stark gebogener Schattenstreif. Wenn sich bey Varietäten der Raum zwischen den 2 Linien dunkel ausfüllt, so entsteht die trapezienförmige Binde, deren in Linne's Beschreibung gedacht wird. Am Hinterrand ist eine sehr blasse Schwunglinie, und hinter ihr eine schwarze Punctenreihe. Die Hinterflügel sind aschgrau mit ockergelben Rändern. Die ockergelbe Unterseite aller Flügel ist mit einem Mittelpunct und Streif bezeichnet, so daß die vordern ein schwarzes Mittelfeld haben. Die Ober- und Unterseite des ganzen Körpers ist überall ockergelb, bis auf die innere Seite der Fühlhörner. Die Eule variiert mannichfaltig mit Rothgelb und Bräunlichgelb, und mit heller oder dunklerer Farbe des Trapeziums.

Die Raupe hat durch ihr Worden im Freyen und in der Gefangenschaft diese ganze Familie in einen bösen Ruf gebracht. Sie schont der Raupen, Puppen, selbst kleiner Schmetterlinge, ja ihrer eigenen Schwestern nicht. Sie ist grasgrün, wird aber durch Fleischstreßen bräunlich. Von fünf weißen Rückenlinien sind die mittlste und die beyden äußersten wegen ihrer Breite eher Streife zu nennen, und manchmal von hellgelblicher Farbe. Die Lufthöcher sind halb weiß, halb schwarz. An jeder Seite der Stirne zeigt sich ein brauner Doppelfleck. In der Jugend hat sie gelbliche Einschnitte. Sie webt sich zur Verwandlung zu Ende des Mays oder zu Anfang des Junius, lieber in als außer der Erde, in ein leichtes Gehäule ein, und wird eine blauberste Puppe, um sich in 3 bis 5 Wochen, also im Julius, zu entwickeln.

Aufenthalt. Die Phaläne fliegt im Julius, und die Raupe nährt sich im May auf Ahorn, Eichen, Espen, Birken, Haynbüchen, Haseln; desgleichen fand man sie in hiesigen Gegenden auf Weißdorn, Schwarzdorn, Rosen, Apfel, Linden, Zwetschen, Wollweiden und Syringa. Wir kennen keinen Baum, dessen Blätter sie verschmähete.

161. Die Galleicheneule. *Phalaena Noctua Miniosa*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Lichtgrauer Spinner mit gelblichrother Binde (bey Esper).

<i>Phalaena Noctua Miniosa</i>	Wiener Verz. 88. 14.
<i>Noctua</i> —	Fab. Ent. III. 2. 43. 113.
<i>Phal. Noct.</i> —	Gorthauf. IV. 645. 272.
— <i>Bombyx Rubricola</i>	Esper III. t. 75. f. 3.

Kennzeichen der Art. Eule. Blattrüchig, mit dachigen Flügeln; die vordern sind mennichroth, oder vielmehr aus Saffsafrangelb und aus Grau gemischt; mit 2 schwärzlichgrauen Narben, die zwischen zwey hellen gewässerten Querstreifen stehen. Ein dritter gelblichrothlicher steht vor der schwarzen Punctenreihe. Die weißen Hinterflügel haben oft einen braunen Mittelpunct und eine Punctenreihe darunter. Die stärker gekämmten Fühlhörner machen das Weibchen kennbar.

Raupe. Unbehaart, grauröthlich, mit einem breiten und zwey schmalen citronfarbenen Rückenstreifen. Auf den drey vordersten Ringen stehen in einer Querreihe vier dünnere

dünnere schwarze Punkte, deren der Kopf 8 bis 9, und jedes Gelenk, vom vierten bis eilften, zwey undeutliche hat. Sie lebt in der Jugend, wo sie blaugrau oder wasserblau ist, gesellschaftlich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Die Vorderflügel dieser nach beyden Geschlechtern 1 Zoll und 2 bis 4 Linien messenden Eule sind aus Saftsafrangelb und aus Grau gemischt. Vor und hinter der schwärzlichgrauen, safrangelb eingefassten Ring- und Nierennarbe läuft ein heller Wellenstreif, von denen der hintere bogig ausgeschweift ist; beyde sind einwärts dunkler gerandet. Der dritte gelblichrothe Querstreif steht unweit des Hinterrandes, und vor den gewöhnlichen grauen Franzen befindet sich eine schwarze Punctenreihe. Der Raum an der Wurzel ist grauneblig. Die weißen Hinterflügel haben einen dunkeln Mittelpunct und einen röthlichen Streif, der bisweilen nur aus einer Punctenreihe besteht, nebst einer darauf folgenden gleichfarbigen Urur am Hinterrande, der mit einer safrangelben Linie eingefasst ist. Unten sind alle Flügel weiß, und violett angeflogen, mit einem gemeinschaftlichen rothen Streif und einem schwärzlichen Halbmond auf den vordern und einem solchen Punct auf den Hinterflügeln. Die Franzen sind wie auf der Oberfläche. Der Kopf, Halstragen und der ungekämte Rücken sind von der Farbe der Vorderflügel; die gleichfarbigen, langen, borstenförmigen Fühler sind am Männchen weiß geschafet, stark gekämmt, und ihre Fasern unter der Vergrößerung mit Nebenfäserchen geziert, am Weibchen sind sie ungekämmt, und mit kurzbehaarten Kerben versehen. Der Hinterleib ist röthlichgrau, die Füße weißlich, mit röthlichem Anfluge. Bey Varietäten bildet das Feld, wo die Narben stehen, eine saftsafranfarbige Binde. Diese Farbe nimmt auch zuweilen die ganze Oberfläche ein.

Von der Raupe ist uns keine Beschreibung bekannt; denn wenn sie Fabricius als schwarz angibt, mit einer gelben unterbrochenen Seitenlinie und einem dreystreifigen Nackenschild; so muß ich hier bescheidenlich widersprechen, weil ich (Scharfenberg) sie in sehr großer Zahl mehr als einmal erzogen habe, nie aber so gefunden, als Fabricius sagt. Sie ist unbehaart, nämlich in der Jugend und im mittlern Alter wasserblau oder blaugrau, im spätern Alter aber grauröthlich grundirt, mit einem starken, citronfarbigen mittlern Rückenstreif und zwey dergleichen dünneren darneben. Der schmutziggroße Kopf hat 8 bis 9 schwarze Punkte. Auf dem eilften Gelenk hat manches Stück, wenigstens kurz vor der Verpuppung, die Figur der Römischen Zahl oder des Buchstabens X. Auf den drey vordersten Gliedern stehen nach der Breite in einer Reihe 4 dünnere schwarze Punkte. An der Seite der Luftlöcher zieht ein gelblicher Streif mit braunen Puncten hinab. Auf der Unterfläche ist die Raupe in der Jugend blaugrau, im Alter grauröthlich. Im May ist sie noch klein und in einer gesellschaftlichen Lebensart; sie zerstreuen sich aber im Alter, und jede lebt sodann zwischen 2 Blättern. Den Puppenstand treten sie zu Ende des Junius in der Erde an. Ihre braune, gewöhnlich gebaute Puppe ruht 9 Monate, nämlich bis zu Anfang des Aprills.

Aufenthalt. Diese bey uns nicht so seltene Eule befindet sich im April auf Eichen, und ihre Raupe im May und Junius an den jungen Sprößlingen, die am Hauptstamm der Eichen aufschießen, oft in der Nachbarschaft der Raupen der Waldeicheneule

Eheneule und der Hageeheneule. Hr. Vorkhausen vermuthet sie auch auf der Pappel; aber von einer Entwicklung im Julius und August ist bey uns nichts bekannt.

Anmerkung. In dem Esperschen Werk ist sie den plebejer Spinnern zugeordnet; jedoch sind ihre Narben verlesen. Ich nannte sie ehemals Dryadina von der Eule, che ich ihre systematische Wiener Benennung wußte, und die damals veranstalteten, für die Scribarschen Beiträage bestimmten Abbildungen dieser und anderer Raupen und Insecten, die nach Frankfurt und Arheiligen abgeschickt wurden, sind, während der Kriegeunruhen in dassigen Gegenden, zu jenen Beiträagen, da solche ins Stocken geriethen, nicht weiter benutzt, noch weniger wieder zu uns zurück gesandt worden.

Wegen dreyer Kennzeichen, nämlich des ziemlich geraden Streifs am Hinterrande, der mit hellen Linien umzogenen Narben und der gekämmten Fühlhörner des Männchens schickt sie sich auch in unsere zehnte Familie, der Raupe nach aber in die gegenwärtige. Sch.

Vierte Linie. Mit olivenbraunen und wicklerförmigen Flügeln.

Weniger schädliche.

162. Die Zitterpappelneule. *Phalaena Noctua Subtusa*, Vien.

Namen und Schriften.

<i>Phalaena Noctua Subtusa</i>	Wiener B. 88. 17.
<i>Noctua</i>	Fab. Ent. III. 2. 62. 173.
<i>Phal. Noct.</i>	Vorkhaus. IV. 650. 275.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und aufstehenden Flügeln; die vordern sind olivenbraun mit vier gelblichen Streifen; zwischen dem zweyten und dritten befinden sich drei gelbliche Narben, nämlich 2 Ring- und 1 Nierennarbe.

Raupe. Nackt, weißlich, mit gelben Linien, einem schwarzen Kopf und einer weißen Stirne.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese kammlückige Eule von der Größe der nächstfolgenden, also von 1 Zoll 2 bis 3 Linien Ausmaß, führt, nach Fabricius Angabe, auf dem grauen, olivenbraunen Grunde vier gelbliche, auf der einen Seite dunkelgründete Streife; der erste, nämlich an der Wurzel, ist klein und abgekürzt. Der zweyte ist fast gerade, der dritte einwärts gebogen und der letzte wellenförmig. Die vordere der 3 Narben hängt am zweyten Streif, und die hintere ist nierenförmig; sämmtlich zwischen den 2 mittlichen Streifen. Die Hinterflügel sind braun, die Fühlhörner bleich, und der Körper aschgrau und ungefleckt.

Die nackte Raupe ist weißlich mit gelben Linien, einem schwarzen Kopf und weißer Stirne.

Aufenthalt. Die Raupe dieser bey uns nicht vorhandenen Eule soll in Deutschland auf Espen oder Zitterpappeln leben.

163. Die Randweideneule. *Phalaena Noctua Retusa*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Oblatenflügel (nach Müller), Eule an Randweiden, Stumpf-flügel.

Eeee

Phalaena

Phalaena Noctua Retufa Lin. 858. 193. Müller 793. 193.

— — — Wiener B. 88. 13.

Noctua — — Fab. Ent. III. 2. 62. 174.

Phal. Noct. — — Gorkhausen IV. 648. 274.

— — — Veturia Hübners Beiträge I. 3. tab. 2. fig. H. Sollte keinen hellen Streif haben.

— — — Retufa Esper IV. t. 178. f. 1.

Degeer, II. t. 9. f. 16 — 19.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem schwachen Rückenamm und zurückgestumpften, olivenbraunen Vorderflügeln, welche ins Röthliche schimmern, mit drey gelblichen fast gerandeten Querstreifen; zwischen dem 2. und 3. befinden sich zwey nierenförmige dunkle Narben mit gelblichem Ring. Am Hinterrand zieht eine gelbliche gewässerte Linie herab.

Raupe. Grün oder braun mit fünf weißen Längslinien, davon die zwey äußersten an den Seiten Streifen sind. Zwischen dem Seitenstreif und der ersten Rückenlinie liegen weiße Pünctchen.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 1 Zoll und 3 Linien messende kammrückte Eule hat gegen die Spitze zurückgestumpfte und am Hinterrand ausgebogene, olivenbraune Vorderflügel, die etwas ins Röthliche schimmern. Der erste der drey fast geraden, dünnen, gelblichen Querstreifen ist an der Wurzel befindlich, und etwas abgefügt; der zweyte zieht vor den beyden nierenförmigen, gelbumzogenen, dunkeln Narben, davon die größere beynabe einem lateinischen B gleicht. Zwischen diesen Narben ist ein gerader Schattenstreif, und hinter der großen Narbe ein dritter Querstreif, an dessen vordern Rand sich auch eine gewässerte Linie anfängt und in einer gebogenen Richtung fortzieht. Die Hinterflügel sind einfarbig dunkelashgrau. Auf der glänzenden Unterseite sind die Vorderflügel schwärzlich mit hellgrauen Rändern, die Hinterflügel hellgrau mit einem verblichenen Mittelpunct und einem oder zwey dergleichen Bogenstreifen. Der Kopf und der Vordertheil des Insects sind mit den Vorderflügeln, der Hinterleib aber mit den Hinterflügeln gleichfarbig.

Die grüne, zuweilen braune Raupe mit drey weißen Rückenlinien und einem weißen Längstreif an jeder Seite hat zwischen den Seitenlängstreifen und der ersten Rückenlinie viel weiße Pünctchen. Sie ist in der Größe der Raupe der A hornleule, und pflegt sich in der Mitte des Junius oder später in einem Gewebe in oder an der Erde, bey der Einsperrung auch ohne Gewebe zu verpuppen, und hält eine Ruhe von 4, 5 oder 6 Wochen.

Aufenthalt. Die Eule erscheint vor Ende des Julius bis in den August, wenigstens nach den hier gezogenen Stücken zu urtheilen. Die Raupe lebt im Junius auf Weiden sowohl als auf Eichen.

Achtzehnte Familie.

Bogenstrichraupen. Zweydeutige Eulen.

Die bekannten Raupen haben einen sprenglichen Kopf, einen schlanken Leib, an dessen Seiten um die lustlöcher schwarze Puncte oder sonst feine Sprecken, darüber aber

aber abwechselnde, bogenartige Linien nach der Länge des Leibes. Die Verwandlung geschieht unter der Erde in einer harten Hülle. Die Eulen haben abhängige, mehrtheils etwas breitere Vorderflügel, welches ihnen einiges Ansehen von Spannern gibt. Sie fliegen auch des Tages, und besaugen die Blumen nach Art der Falter, unterscheiden sich aber besonders durch die Farbe der Hinterflügel, die weiß und schwarz ist.

Die hierher gehörige Linie hat schwarze oder schwarzfleckige Vorderflügel: besonders gleicht die Raupe der nächstfolgenden Stecheicheneule den Franzenraupen der neunzehnten Familie.

Weniger schädlich.

164. Die Stecheicheneule. *Phalaena Noctua Alchymista*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Weisse und schwarze Eulenphaläne; schwarze bräunlichgerandete Eule, Elster, Alchymistennachtsfalter.

Phal. Noct.	Alchymista	Wiener Verz. 89. 5.
Noctua	—	Fab. Mantissa II. 171. 240.
—	Convergens	Fab. Ent. III. 2. 100. 298.
—	Alchymista	Fab. Suppl. 447. 298.
Phal. Noct.	—	Vorkauf. IV. 70. 27.
—	Leucomelas	Naturforsch. XIV. t. 4. fig. 10.
—	—	Esper. IV. tab. 107.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkamme, bacheligen und etwas gekerbten Flügeln; die vordern sind gezahnt und schwarz, mit tiefschwarzen Wellenlinien und zwischen denselben statt der Narben mit zwey tiefschwarzen Ringelchen. Am Hinterrand zieht eine verblichene mehr graue als rothgelbe Binde durch. Die Hinterflügel sind weiß mit einem breiten, schwarzbraunen Band und einem weißen Fleckchen am Vorder- und am Schwanzwinkel.

Das Männchen hat sehr schwach gefaserte Fühlhörner.

Raupe. Den Franzenraupen ähnlich; so daß sie nach Fabricius blaüköpfig, schwarzarau, etwas gelbpunctirt, mit zwey Rückendornen, (also einem Schwulst auf dem achten Ring) und zwey Schwanzdornen (besser: einer zweispitzigen Erhöhung auf dem eilften Ring) gesiert ist, und nach Esper, wegen Kürze der Vorderfüße einen spannerförmigen Gang, und am Hals einen rothen Saum hat.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese gut aussehende Eule von 1 Zoll, 7 bis 8 Linien Ausmaß ist erst erkannt und mit andern vermischet worden. Sie ist die größte unter den äy.lichen Arten; daher der Ausdruck in Fab. Entom.: paulo minor, eher in: paulo maior abzuändern wäre. Die schwarzen, tappensförmig getrauten Vorderflügel sind durch mehrere tiefschwarze Wellenlinien durchzogen, die durch gleichfarbige Längsstricheln sich verbinden, und zwischen denen die tiefschwarzen Ringe, wovon der eine nierenförmig ist, stehen. Am Vorderrand zählt man 4 bis 5 weiße Pünctchen. Am Hinterrand zieht ein verblichenes röthlichgelbes

oder graues Band durch, das am Weibchen sich ins Schwarze verliert. Die Hinterflügel sind weiß mit einem breiten, schwarzbraunen Band, und einem weißen Fleckchen sowohl am Vorder- als am Schwanzwinkel, selten mit einem Mittelpunct. Unten sind die Vorderflügel hell schwarzbraun, mit 1 oder 2 Schattenbinden, und einem breiten, weißlichen Saum; die Hinterflügel sind beynah wie auf der Oberseite, nur noch mit Aschgrau vermischt und mit einem deutlichen schwarzen Mittelfleck. Das ganze Insect ist mit den Vorderfüßen gleichfarbig, bald schwarz, bald schwarzbraun, und die Füße sind gelbgeringelt. Die Fühlhörner des Männchens sind sehr schwach gefasert, aber dicker als beim Weibchen. Bey Varietäten ist statt des Querbandes der Vorderflügel ein rothgelber Fleck am Innenrand, und am Vorderrand ein geschwungenes gleichfarbiges Strichelchen.

Die Raupe ist von Fabricius als schwarzgrau, etwas gelb punctirt angegeben: mit zwey Rücken- und zwey Schwanzdornen und einem blauen Kopf; von Esper als eine Raupe mit einem spannerförmigen Gang, die am Hals einen rothen Saum habe; von einem Mitarbeiter des neuen Fuchs'schen Magazins II. Band. S. 380, als weiß und schwarz spießig beschrieben, mit drey Paar gelben Vorderfüßen und einem gelben Strich auf dem ersten Gelenk oder dem Halse, ohne Auswüchse, doch so, daß sie sich den Franzenraupen der nächstfolgenden Familie nähere, und deren Puppe blau bestäubt seyn soll.

Diese dreyerley Beschreibungen lassen sich so vereinigen, daß die zwey Rückendornen auf den Schnulst des achten Rings, die beyden Schwanzdornen aber auf die doppelspitzige Erhöhung des elften Ringes sich beziehen, und daß der gelbrothe Halsaum, dessen Esper gedenkt, ein gelber Strich in Fuchs's Magazin genannt wird; nur spricht man am letzten Ort der Raupe die Auswüchse und Erhöhungen ab.

Aufenthalt. Die Eule ist in mehreren deutschen Gegenden nicht unbekannt, wo sie auch bey Tage die Blumen besaugt. Die Raupe weidet auf der gemeinen Eiche, der Strehche (*Quercus ilex*), und nach Esper auch auf Schlehen.

Anmerkung. Diese Esper'sche *Leucomelas* muß nicht mit *Leucomelas* Fabr. III. 100. 297 (die er zuletzt wieder in den Supplement. in *Convergens* umtaufte), auch nicht mit *Leucomelas* Vienn., die in Fabr. Entom. III. 2. 100. 296. *Xanthographa*, und bey Herrn Esper *Alchymista* heißt, verwechselt werden.

Neunzehnte Familie.

Franzenraupen. Geschmückte Eulen.

Diese Raupen sind an Farbe den Baumrinden ähnlich; sie werden gegen den würfelförmigen Kopf dünner; haben auf dem achten Ring einen Schnulst, und auf dem elften mehrentheils eine zweispitzige Erhöhung; der Leib ist beyderseits an den Füßen mit Franzen besetzt; die zwey vordern Paare der Bauchfüße sind merklich kleiner, daher diese Raupen halb spannerartig gehen. Die Verwandlung geschieht gewöhnlich in einem zusammengepönnenen Blatt oder Blättern über der Erde. Die Eulen haben gezahnte, breite, fast flachliegende Flügel, auf den vordern sehr zackige Quерlinien, auf den hinten,

tern, die sich der Farbe wegen besonders ausnehmen, einen schwarzen Rand und sonst schwarze Streife. Sie fliegen gern in Gebäude.

Erste Linie. Mit schwärzlichen Hinterflügeln,

Weniger schädliche.

165. Die Heckendorneule. *Phalaena Noctua Maura*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Nachtgeist, Gespenst, Here, Zahnflügel, mauritanischer Zahnflügel, Mohrin, dunkelolivendraune Eule, braune Wandphaläne, großes schwarzes Kind (nach Gladbach).

Phalaena Noctua Maura Lin. 843. 124. Müller 688. 124.

— — — Wiener Verz. 90. n. 1.

Noctua — — — Fab. Ent. III. 2. 63. 177.

Phal. Noct. — — — Gorthausen IV. S. 1. n. 1.

— — — Lemur Naturforscher VI. t. 5. f. 1.

— — — *Maura* Esper IV. t. 107. f. 1.

Papillons d'Europe tab. 319. f. 4. die Raupe.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und niebergebrückten, gezahnten, schwarzolivendraunen Flügeln; die vordern haben drey düstergelbe, schwarzgesäumte Zackenlinien, dazwischen die zwey schwarzen Nierenarben stehn. An der Flügelspitze ist ein ockergelber Fleck. Die zeichnungslosen, schwärzlichen Hinterflügel haben einen schmalen ockergelben Querstreif und am Hinterrand einen dergleichen Schatten.

Raupe. Unbehaart, fast von gleicher Dicke, nur gegen den Kopf, welcher sehr klein und gelb ist, allmählig verdünnt; von schwarzgrauer Farbe, mit einer weißlichen Rückenlinie und ähnlich gefärbten Einschnitten der Ringe; auf dem zehnten stehn 2, auf dem eilften Ein Höcker.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 2 Zoll, 5 Linien messende, große Eule hat auf allen ihren Flügeln, die spizenartig gezahnt sind, ein ins Schwarze fallendes Olivenbraun; und auf ihren vordern drey Felder, davon das erste, etwas weniger dunkle, sich vom zweyten durch eine düstergelbe, schwarzgesäumte, bogige Zackenlinie trennt; das zweyte, weit dunklere, beynah schwarze Feld hat die gewöhnliche Narbe und einen schwarzflektigen Vorderrand; das dritte, hellolivendraune und etwas gelbliche Feld scheidet sich vom zweyten durch eine zweyte zackige Bogenlinie. An der Flügelspitze befindet sich ein ockergelber Fleck, an welchem eine dritte gelbe zackige Querlinie anfängt, und nebst ihrem innern Schatten sich fortzieht. Die Hinterflügel haben einen schmalen ockergelben Querstreif und am Hinterrand einen dergleichen Schatten. Die schwarzen Franzen der Vorderflügel und die weißen der Hinterflügel sind von einer gelben Linie, die zwischen 2 schwarzen Linien läuft, getrennt. Die mit der Oberseite gleichfarbige Unterseite hat einen schwarzen Mittelfleck, eine schmale ockergelbe Querbinde und am Hinterrand eine breite gleichfarbige. Das ganze Insect vom Kopf bis zum Hinterleib ist, den gelblichen Rand des Halskragens und die Schulterlappen, wie auch

den

den Afterbüfchel ausgenommen, ganz dunkelolivendbraun, wie die Flügel. Bey Varietäten haben die Hinterflügel eine große, breite, ockergelbe Binde, bey andern find die Vorderflügel mehr ſchwarz als olivendbraun.

Die den Wienern ehemals unbekannte Raupe iſt, nach den Papillons d'Europe, unbehaart, beynahe von gleicher Dicke, nur gegen den Kopf, welcher ſehr klein und gelb iſt, allmählig verdünnt, von ſchwarzgrauer Farbe, mit einer weißlichen Rückenlinie und ähnlich gefärbten Einſchnitten der Ringe. Auf dem zehnten Ring ſtehen 2, auf dem elften nur Ein Höcker. Sie verwandelt ſich nach den Nachrichten in Jüſſly's neuem Magazin, zwiſchen zuſammengeſponnenen Blättern in eine blaubefäubte, längliche, ſehr lebhaſte, der Sponſa ähnliche Puppe, und ruht 23 Tage.

Auſtentyakt. Die Eule ſtellt ſich in Deutſchland und England, im Julius und Auguſt in den ſchattichten Gebüſchen der Erlen, an Bächen, in Kellern, unter Brücken, in alten Gemöhlen und in unſern Gebäuden ein, wo es ſich zuträgt, daß ſie, beſonders das Männchen, durch Auslöſchen der Lichter die Leute erſchreckt, und wenn ſie dabey unvermuthet verſchwindet, von dem abergläublichen Landmann für ein Geſpenſt iſt erklärt worden. Ihre Raupe weidet, nach dem Jüſſlyſchen Magazin, auf Schlehen, Weißdorn, niedrigen Kräutern und Lattich.

166. Die Eſcheneule. *Phalaena Noctua Fraximi*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweiſung der Abbildung.

Blaues Band, blaues Ordensband, blaue Bandphalane, Eſchennachſalter,

Phalaena Noctua Fraxini Lin. 843. 125. Müller 688. 125.

— — — Wiener Berg. 90. 2.

Noctua — — — Fab. Ent. III. 2. 55. 152.

Phal. Noct. — — — Vorkhaus. IV. 9. 4.

— — — Gleditsch I. 272.

— — — Naturforſch. XIV. t. 2. f. 4. Raupe von Doctor Kühn.

— — — Jüſſly Archiv. t. 15. f. 1. 2. Raupe und Puppe vom Hauſſſſchen Hübner.

— — — Eſper IV. t. 101. mit Raupe.

Höfel IV. t. 28. f. 1. Weibchen.

Sepp Niederländiſche Inſecten IV. t. 18—20. Mit Raupe. Sehr ſchön!

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Aukentamm und gezahnten Flügeln; die vordern ſind weißlich und beſtäubt nebelich, mit weißen, ſchwarzrandigen Zackenlinien, einer größern Nierennarbe, die eine kleinere einſchließt, und ein ſchiefes Vierck unter ſich hat. Die ſchwarzen Hinterflügel ſind mit einer breiten, bogenförmigen, blauen Querverbinde und der Hinterrand mit weißem Saum und Franzen geſchmückt.

Sie überrreift an Größe die übrigen Europäiſchen Eulen.

Raupe. Veränderlich gefärbt, vom hellen Grauen bis zum Braunen oder auch zum Fleiſchfarbigen; mit ſtarken, ſchwarzen Puncten ganz beſtreut, übrigens zeichnungslos. Der achte Ring zeigt einen erhobenen Wulſt von bald ſchwarzer, bald dunkelblauer Farbe. An den Selten ſind weiße, fleiſcherne Franzen. Sie iſt von lebhafter Art, wie alle von dieſer Familie.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects.

Diese schöne, überaus große Eule mißt von einer Flügelspitze zur andern $3\frac{1}{2}$ Zoll, und jeder Vorderflügel 1 Zoll 8 Linien; und Köfels weibliches Exemplar betrug 4 Zoll 3 Linien. Ihre Vorderflügel von weißlicher, mit Braun bestäubter Grundfarbe haben weiße zackige Quercinien, und in der Mitte einen weißen, schiefviereckigen Fleck, worüber eine düstere Nierenmarke steht, die eine dergleichen kleinere einschließt. Die Franzen sind wie Spitzen schön geteilt. Die schwarzen Hinterflügel sind blau bandirt, am Rand aber weißgesäumt und weißgefranz. Die Vorderflügel haben auf der Unterseite wechselsweis 3 weiße und 3 schwarze Binden, und weiße, durch eine schwarze Linie von der Fläche getrennte Franzen; die Hinterflügel sind auf eben dieser Seite weiß mit 2 schwarzen Puncten und 2 dergleichen Binden. Die Vordertheile des Insects sind mit den Vorderflügeln gleichgefärbt, der Hinterleib schwärzlichaschgrau, mit hellen Einschnitten und einigen Haarbüscheln auf den obern Ringen, und die Unterseite weiß. Der schmalere, spitzigere Hinterleib unterscheidet das Männchen. Wenn der Fuß vergrößert wird, zeigt er einen fächerförmigen Federbusch.

Bei Varietäten schillert die Farbe der Binde ins Violette. Durch die Schnelligkeit des Flugs und die Größe derselben sind schon mehrmals Personen des Nachts sehr erschreckt worden; solche Ueberraschungen eignet man nur der männlichen Eule zu.

Die von dem Niederländischen Mäbler Sepp am besten beschriebene, $3\frac{1}{2}$ bis $4\frac{1}{2}$ Zoll messende Raupe kömmt zuweilen im Herbst, der Regel nach aber nach der Ueberwinterung aus dem Ey im Maymonat, wo sie unter der Vergrößerung schon schwärzliche Flecken und kurze Borstenhaare zeigt, und sich geschwind und spannerförmig bewegen kann. Nach der zweiten Häutung wird sie grün, mit zwölf Puncten auf dem Rücken; nach der dritten mit mehreren und deutlichen Puncten und so fort. Die Raupen verzehren nach der 2. bis 4. Häutung allemal ihre abgestreifte Haut. Nach der 6. Häutung ist die Raupe erwachsen, und von veränderlicher Farbe, bald hellgrau, bald mehr oder weniger braun, oder auch fleischfarbig, mit schwarzen Puncten ganz bestreut, übrigens zeichnungslos. Der achte Ring zeigt einen erhabenen Höcker, der bey den dunkeln Stücken schwarz, bey den hellen aber dunkelblau ist. An den Seiten sind weiße fleischerne Franzen. Der große, vornen flache, gelbliche Kopf hat eine dunkelbraune Einfassung; der Bauch ist bald weiß, bald bläulich, entweder dunkelblau- oder braungefleckt. Drey erhabene, glänzende Kügelchen vornen nahe am Munde auf jeder Seite wurden von Sepp für Augen gehalten. Ihr spannerförmiger Gang kommt daher, weil das erste Paar der Bauchfüße kürzer ist. Dabey ist sie wie alle von dieser Familie von lebhaftem Wesen, und schlägt, wenn man sie anrührt, unabding und sich. Man sieht sie nie des Tags ihrer Nahrung nachgehen, sondern blos zu Nacht. Zu ihrer Verwandlung verfertigt sie sich zwischen Blättern oder in große Risse der Baumrinde, von großen, glitterförmig gezogenen Fäden ein beträchtliches Gewebe, um darin innerhalb 8 Tagen eine große, schlante, braune, blau bereifte Puppe zu werden, woraus sich in drey Wochen die Eule, zur Nachtzeit, wie bey ihren übrigen Familiengenossen, entwickelt.

Aufent.

Aufenthalt. Diese große, in ziemlichem Preise (von 2 Fl. 24 Kr. zu Gladbachs Zeiten) stehende Eule erscheint im Julius oder August, oft erst zu Ende desselben, und ihre Raupe liebt die gemeine schwarze, die Italiänische und Zitterpappel, gemeine Espe, Blumesche (*Fraxinus ornus*), Ulmen, Birken, Ahorn, nach Brahm auf der Eiche, werauf sie zu Anfang des Mays bis zu Ende des Junius lebt, desgleichen die welſche Nuß- und Kofkastanienbäume. Wenn das junge Eipenlaub in Gegenden, wo es ihr gewöhnliches Futter ist, z. E. bey Frankfurt, durch Manfröste verdirbt, leiden diese Raupen gar sehr.

Zweyte Linse. Mit rothen Hinterflügeln.

Diese heißen auch: Rothe Ordensbänder, und mit Einschluß der nächstvorhergehenden Bandphaläne: Edle Eulen.

Weniger schädliche.

167. Die Weißweideneule. *Phalaena Noctua Elocata*, Esp.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rothe Bandphaläne mit gerundeter Binde.

Phalaena Noctua Elocata Borkhausen IV. 15. 5.

Noctua Nupta Fabr. Mantissa II. 149. 110. welches aber nicht die Nupta seiner Entomologia ist.

Phal. Noct. *Elocata* Esper IV. t. 99. f. 1. 2.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und lichtgrauen, braunbestäubten Vorderflügeln, welche mehrere dunkle Zackenlinien und Wellenstreifen, deren Zacken und Wellen von einerley Größe sind, und einen großen Nierenfleck haben; die Hinterflügel von blutrother, leicht abziehender Farbe sind mit einer schwarzen, einmal gezahnten Rand- und dergleichen Mittelbinde geschmückt, welche gleichförmig gekrümmt in den Hinterrand ausläuft. Das Männchen ist kleiner, und am After stärker geschnitten.

Raupe. Der Raupe der Bachweideneule ähnlich, grau, fein behaart, mit 2 Rückenlinien, in denen auf jedem Ring hellere, stumpfe Wärzchen stehen. Auf dem achten Ring ist eine breite, bräunliche, stumpfe Erhöhung; das letzte Paar Warzen ist größer, der Bauch fleischroth, und die Seiten mit steifen Haaren gefranzt.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese nach großen Exemplaren drey Zoll messende, schöne Eule hat lichtgraue, braunbestäubte und weißgefranzte Vorderflügel, welche mehrere dunkle Zackenlinien und Wellenstreife, deren Zacken und Wellen von einerley Größe sind, und eine gelblichgraue Nierennarbe haben, vor welcher sich ein weißlicher Wisch darstellt. Die Hinterflügel von blutrother, leicht abziehender Farbe sind mit einer schwarzen, nicht wellenförmig gebogenen, sondern einmal gezahnten, beider Randbinde und gleichfarbiger Mittelbinde geschmückt, welche gleichförmig gekrümmt in den Hinterrand ausläuft. Durch die weißen Franzen zieht

zieht eine graue Linie mitten durch. Uten sind die Vorderflügel abwechselnd dreymal weiß und dreymal schwarz bandirt, mit einem weißlichen Saum am Rand. Die Hinterflügel sind auf dieser Seite bleichroth mit weißen Adern, dergleichen Vorderrand und Franzen, desgleichen einer auslaufenden gekrümmten Mittelbinde und gleichfarbiger Randbinde. Alle Theile des Insectes sind grau, nur die Unterseite ist weiß. Das Weibchen ist größer und sein Schopf geringer als der des Männchens. Die der Nachweideneule ähnliche graue, aber dunkler gemischte Raupe hat einen eingekehlten, bräunlichen und schwarz eingefaßten Kopf, zwey braune Rückenlinien, in welchen auf jedem Ring hellere, stumpfe Wärtchen stehen. Auf dem achten Ring ist eine breite, stumpfe bräunliche Erhöhung, und daneben an der Seite ein brauner Fleck, und das letzte Paar Warzen ist größer, hängt zusammen und steht schief hintwärts. Wenn sie zur Verpuppung reif geworden, so spinnt sie sich aus starken Fäden ein netzförmiges Gewebe zwischen Rissen oder zwischen Blättern, um darin eine braune, bläulich bepuderte Puppe zu werden, aus der nach 3 bis 4 Wochen die Entwicklung erfolgt. Die Raupe weidet nur des Nachts, und ruht des Tags am Stamm oder an starken Ästen.

Aufenthalt. Die Eule zeigt sich in Deutschen Gegenden, z. B. bey Frankfurt, Darmstadt, Uffenheim &c. im Julius, an Weiden, und pflegt auch unsere Wohnungen aufzusuchen: doch ist sie nicht so gemein, als die nachfolgende. Ihre Raupe nähert sich vom May bis Junius auf der weißen Weide, Sahl- und Bruchweide, auf Italianischen Pappeln und Espen.

168. Die Nachweideneule. *Phalaena Noctua Nupta*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rothe Bandphaläne mit rundausgeschweiften, abgetürzten Binde; junge Frau, verheyratheter Nachfaher (bey Lange), Weiden. Carmin (bey Gladbach).

Phalaena Noctua Nupta Lin. 341. 119. Müller 687. 119.

— — — Wiener Verz. 90. 5.

— — — Esper IV. t. 97. f. 1—5. mit Raupe.

Papillons d'Europe tab. 323. f. 4.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenstamm und gezahnten Flügeln; die vordern sind grau, schwarz bestäubt und gelbgestrichelt, auf der seiten häufen sich mehrere Wellenkreise und Querlinien an, deren Zacken ungleich aus schwellen, wovon einer bald ein großes lateinisches W, bald nur ein umgekehrtes V bildet. In der Mitte ist in einer größeren Nierennarbe eine kleine eingeschlossen, und darunter eine undeutliche Rundnarbe. Die carminrothen Hinterflügel haben eine einigemal gezahnte, schwarzbraune Randbinde, und eine abgerundete, abgetürzte, kleine Mittelbinde, die nicht in den Innenrand ausläuft.

Raupe. Bräunlichgrau mit ockerfarbigen Streifen und Flecken und vielen Wärtchen. Ueber die Ringe stehen schräge Längslinien, die bald durchaus gehen, bald nicht. Der achte Ring hat eine fleischichte Erhöhung. Am weißen Bauch sind große gerundete schwarzbraune Makeln.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese unter ihres Gleichen häufiger vorkommende, nach den größten Stücken 3 Zoll messende, kammrückige Eule hat graue, schwarzbestäubte und gelbbraungefleckte Vorderflügel, die mehrere Wellenstreifen und zackige Querlinien von ungleicher Ausschweifung führen. Die deutlichste davon bildet bald ein großes lateinisches W, bald ein umgekehrtes lateinisches V. Vor derselben steht eine gezahnte Nierennarbe, die eine dergleichen kleinere einschließt, unter welcher eine undeutliche Rundnarbe sich befindet. Eine Reihe von schwarzen Strichelschen läuft am schön geferbten und hellgrau gefranzten Hinterrand herab. Zwey schwarze Binden zieren die carminrothen, weißgefranzten Hinterflügel. Die größte davon, die Randbinde, ist nach innen einigemal gezahnt, die kleinere oder Mittelbinde ist wellenförmig gebogen, und läuft nicht ganz aus bis zum Hinterrand. Auf der Unterseite sind die vordern, wie gewöhnlich, dreyimal schwarz und dreyimal weißbandirt, so daß 2 schwarze Binden zusammen fließen; die Hinterflügel sind über die Hälfte roth, das Uebrige ist weiß, und wie auf der Oberseite bandirt. Die Oberfläche des ganzen Insects ist grau, der Rücken braunbestäubt. Die grauen Füße sind dunkelbraun gefleckt; das Uebrige der Unterfläche ist weiß. Der Haarschopf am After ist beym Männchen stärker als beym Weibchen. Ihre Lebensart ist der von der nächstvorhergehenden ähnlich.

Die vom May bis Junius sich vorfindende, weniger schlant gebaute und weniger gewölbte Raupe, als die von der Escheneule, Sahlweiden- und Baumweideneule und so ferner, ist bräunlichgrau, ockerfarbig gefleckt und gestreift. Ueber die Ringe ziehen sich braune Längslinien schrägs hin, die bey einigen Stücken dick und kurz bleiben, bey andern durchlaufen, bey noch andern haardünn werden. Jedes der überall verbreiterten kleinen Würzchen ist mit einem steifen kurzen Haare besetzt. Der achte Ring hat eine fleischichte, flache, niedrige Erhöhung, und am weißen Bauch sind große gerundete schwarzbraune Makeln. Der spannermäßige Gang wird von dem letzten Paar der Bauchfüße, welches erhöht ist, mit verursacht. Ihre Lebensart und alles Uebrige hat sie mit den andern Arten dieser Familie gemein. Ihr Gewebe ist von neßförmiggezogenen Fäden gebaut, und ihre Puppe blau bedustet, letztere ruht 3 bis 4 Wochen.

Aufenthalt. Die Eule zeigt sich im Julius, besonders hler zu Lande im August, an Weiden und in der Nähe derselben; ihre Raupe wie bey der vorhergehenden.

Anmerkung. Sie darf nicht mit der Fabriciusschen Nupta in seiner Entomologia verwechselt werden; auch ist in Linné's System die Nachweisung d's sels auszustreichen.

169. Die Bruchweideneule. *Phalaena Noctua Concubina*, Borkhaus.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Roths Waisentkind, rothe Wandphaläne mit rund ausgeschweifster, auslaufender Binde.

Phalaena Noctua Concubina Borkhausen IV. 21.

— — Varietas Nuptae Espér t. 97. f. A. B. mit Raupe.

Sepp niederländische Insecten. t. 7. mit Raupe.

Renr.

Kenzeichen der Art. Eule. Wie die vorhergehende, nur ist die Nierenarbe nebst der Rundnarbe mit einem dünnen bräunlichblauen Schiller überzogen, so auch der Hinterrand, und zuweilen der Wurzelraum. Die Hinterflügel haben ein frischeres Roth, als die vorige. Das mittlere Band läuft ganz in den Innenrand aus.

Raupe. Größer als die vorhergehende, bald aschgrau, bald bräunlich mit dunkleren, oft rothfarbigen längslinien oder abgesetzten Strichen. Jeder Ring hat zwei fleischrothe Würgchen mit kleinen Borsten, und der achte eine Erhöhung von hellbräunlicher Farbe.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese an Größe den beiden vorhergehenden, und an Zeichnung der nächstvorhergehenden Nupta gleichkommende Eule hat zum Hauptmerkmal sowohl das Bräunlichblau schillernde in den Narben und am Hinterrande, als vorzüglich die nicht auslaufende Mittelbinde, wodurch sie sich von jener zu unterscheiden scheint. Doch sind noch mehrere Erfahrungen der Entomologen nöthig, um zur Gewissheit zu gelangen, zumal da man von der Bachweideneule Stücke hat, wo dünne Fortsätze der Mittelbinde ebenfalls den Innenrand erreichen.

So ist auch mit der Raupe, welche bald aschgrau, bald bräunlich ist, und dunklere, oft rothfarbige längslinien oder abgesetzte Striche hat. Auf jedem Ring sind 2 fleischrothe Würgchen, jedes mit einem borstigen Haar, und auf dem achten Ring eine hellbräunliche Erhabenheit. Ihre Lebensart und Verpuppungsweise ist wie bei jener.

Aufenthalt. Alles wie bei der Bachweideneule.

Anmerkung. Die Benennung: Roth's Waisenkind (Weeskind) in Sepps Werk ist daher entstanden, weil die bürgerlichen Waisenkinder der Stadt Amsterdam halb roth, halb schwarz gekleidet sind.

170. Die Sahlweideneule. *Phalaena Noctua Pacta*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Verlobte, Eule an Baumweiden, rosenrothe Bandphaläne mit mondförmiger Binde, schwedische Pacta.

Phal. Noct. Pacta Lin. 841. 120. Müller 687. 120.

Noctua — Fab. Ent. III. 2. 54. 149.

Phal. Noctua — Borkhaus. IV. 23.

— — — Suecica Esper t. 99. B. f. 1. 2. und Seite 365.

— — — Fälsch Archiv t. 15. f. 3. von Hübner.

Papillons d'Europe tab. 324. n. 567.

Kenzeichen der Art. Mit einem Rückenrann und hellaschgrauen Vorderflügeln, und darauf 3 weißlichen, schwarzgerandeten Wellenstreifen. Zwischen den 2 letzten steht gegen den Vorderrand eine mondförmige Augennarbe und darunter eine andere; die Hinterflügel sind rosenroth mit 2 ungleichen schwarzen Binden, davon die kleinere bogengförmige eher einem Mondfleck als einer Binde gleicht.

Von Varietäten ist der sonst aschgraue Hinterleib zuweilen schön roth.

FFFF 2

Be

Beschreibung des vollkommenen Insects. Diese kammrückige, 2 Zoll 5 bis 6 Linien messende Eule hat helle, wellenförmige Querstreifen, davon der erste an der Wurzel steht und sehr klein ist, der dritte aber nicht gleiche, sondern ungleiche Zacken hat. Eine mondformige Augennarbe gegen den Vorderrand findet sich zwischen den beyden letzten, und unter ihm eine herzförmige Narbe mit dunklerem Rand. Am aschgraugesranzten Hinterrand steht eine weißliche Punctenreihe. Die rosenrothen, schneeweißgesranzten Hinterflügel haben eine breite, ganz durchziehende, schwarze Randbinde, und eine kleine mondformig gekrümmte Mittelbinde, die weder den Vorder- noch Innenrand berührt, an beyden Enden spizig und in der Mitte breiter ist. Auf der Unterseite der Vorderflügel wechseln drey weiße mit 3 schwarzen Binden ab, von welchen letzten zwey zusammen fließen. Die auf der innern Hälfte bleichrothen, auf der äußern aber weißen Hinterflügel dieser Seite sind wie auf der obern bandirt. Das ganze Insect ist auf der Oberseite aschgrau, auf der untern trübweiß. Bey seltenen Varietäten ist der Hinterleib roth, mit allezeit aschgrauem Haarschopf am After. Fabricius hat nach einer solchen Varietät seine Beschreibung gemacht.

Aufenthalt. In Schweden, Rußland, und in den neuern Zeiten in dem Norden von Deutschland. Die Raupe soll auf Weiden leben; nach Fabricius auf Eichen.

Anmerkungen. 1. Die Borkhausensche Berichtigung dieser Art ist genau, wobey man noch *Pacta* Fab. Entomolog. hinzu schreiben kann; und was den Esperischen Text S. 123. betrifft: so muß dort Füßly ausgehtan, und zu S. 365 nicht Füßly Magazin, sondern sein Archiv t. 15. angeführt werden.

2. Linné hat in der Schwedischen Fauna unsere Eule gut beschrieben, und nur durch Uebersetzung hat er bey *Pacta* und *Nupta* jedesmal *Nöf sel s* tab. 15. angeführt.

3. In Fabricius Entomologia a. a. O. muß die Nachweisung des Wiener Werks wegbleiben.

171. Die Baumweideneule. *Phalaena Noctua Electa*, Borkhauf.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Carminfarbige Bandphaläne, Deutsche *Pacta*, rosenrothe Bandphaläne mit ausgeschweiften, abgekürzter Binde, Schlangennotte (beym Hufnagel), Weiden-Carmin; Weißdorncarmin (nach Madbach).

Phal. Noct. Electa Borkhausen IV. 26. n. 8.

Noctua Nupta Fab. Ent. III. 2. 53. 148.

Phal. Noct. Pacta Wiener Berz. 90. 3.

— — — Gleditsch I. 514. II. 49. doch kann auch eine andere gemeint seyn.

— — — *Electa* Bieweg tabellarisches Berz. S. 35. 16.

— — — *Pacta* Esper tab. 98. f. 1. 2.

Nöf sel I. Nachtvög. zweyte Classe. t. 15.

Papillons d'Europe t. 324.

Sie ist auch die Schneidersche *Nupta* und Hufnagels *Pacta*.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenamm und hellaschgrauen Vorderflügeln, die bräunlich gemischt sind, und drey weißliche, schwarzgesäumte Wellenlinien

Linien haben, davon die zweyte in ihrer Mitte einmal ein lateinisches M, die dritte aber zweymal eben diesen Buchstaben bildet. Vor derselben ist eine mondformige Augennarbe und eine helle Nierennarbe. Von den 2 ungleichen, schwarzen Binden der rosenrothen Hinterflügel ist die kleinere stark wellenförmig gebogen, und berührt nur den Vorderrand, aber nicht den Innenrand.

Seltene Varietäten haben einen rothen oder röthlichen Hinterleib.

Raupe. Bräunlich aschgrau, mit vielen kleinen Warzen und kurzen Härchen, und einem beträchtlichen Höcker oder Zapfen auf dem achten Ring besetzt; die Seiten haben fleischarne Franzen und jeder Ring einen großen schwarzbraunen Fleck.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 2 Zoll 10 Linien messende, fahnenförmige Eule mit hellaschgrauen, bräunlich gemischten Vorderflügeln zeigt drey weißliche, schwarzgeäumte Wellenlinien, davon die erste an der Wurzel klein und abgekürzt ist, die zweyte durch ihre Schwingungen ein lateinisches M, und die dritte zwey dergleichen, noch stärker sich schwingende, M bildet. Letztere hat neben sich sowohl einen bräunlichen als weißlichen Schatten; und eine mondformige Augennarbe nebst einer hellen Nierennarbe, die schwarz gerandet ist, befinden sich vor der dritten Linie. Man sieht zuweilen einen von der Wurzel aus bis an die zweyte Linie sich ziehenden, feinen rosenrothen Strich. An dem schwarzen, weispunctirten Hinterrand sind die Franzen aschgrau. Die rosenrothen Hinterflügel haben eine schwarze, kleine, stark wellenförmig gebogene Mittelbinde, die den Innenrand nicht berührt, eine größere gleichfarbige Randbinde und weiße Franzen. Auf der Unterseite der Vorderflügel sind die gewöhnlichen sechs Wechselbinden, wovon die ersten 2 schwarzen zusammenfließen, und die Hinterflügel sind zur Hälfte roth, zur Hälfte weiß, und wie auf der Oberseite bandirt. Am ganzen Insect ist auf der Oberseite alles aschgrau, nur daß bey dieser, wie bey der vorigen, die Wurzel der Fühlhörner weiß ist, und die Unterseite des Insects ist schmutzigweiß. Seltene Varietäten haben einen rothen Hinterleib. Das Männchen ist schlanker.

Die 2 Zoll 8 Linien messende, bräunlichaschgraue Raupe ist vornen schlank und in der Mitte dicker, und wegen der vielen, mit kurzen Härchen besetzten Warzen uneben. Der Höcker des 8. Ringes, dessen äußerster Theil ockerfarbig und schwarz gerandet ist, veranlaßt die Käfer, sie die schlanke, erdfarbene Zapfenraupe zu nennen. Die Fleischfranzen in den Seiten sind weißlich. Jeder Ring hat einen großen schwarzbraunen Fleck. Sie findet sich im May bis Julius vor, doch immer selten. Ihre Lebensart, Ihr Ruhigstehen bey Tage, nächtliche Geschäfte, ihr spannerförmiger Gang wegen Kürze des ersten Paares der Bauchfüße, ihre wunderlichen Sprünge beim Fallen, ihre Verwandlung in ein lockeres Gewebe zwischen Blättern, alles hat sie mit den übrigen aus dieser Familie gemein. Die schlanke, rothbraune Puppe ist ebenfalls beduftet. Die Puppenruhe dauert nicht, wie Käfer glaubte, 2 Monate, sondern gewöhnlich 3 bis 4 Wochen, und bey günstiger Witterung nur 14 Tage.

Ausenthalt. Die Phaläne ist hier zwar nicht, aber in vielen Deutschen Gegenden vorhanden; ihre Raupe liebt die verschiedenen glatten und rauhen Weiden. Arten, desgleichen unter den Pappeln die Italiänischen, niemals aber Weißdorn (Crataeg.

(Crataeg. oxyacantha), worauf sie Kösel nur sitzend angetroffen hatte, ohne sie damit zu füttern.

Anmerkung. In den ältern Schriften erklärte Fabricius diese gegenwärtige für die Pacta, änderte sie aber in seiner Entomol. System. dahin ab, daß er sie zur Nupta machte.

172. Die Rotheicheneule. Phalaena Noctua Sponfa, Linn.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Rothe Bandphaläne mit breiter, zackiger Binde, Braut, Brautnachtsfalter, carmoisinrother Eichensteiger, Eichen-Carmin (bey Glabach).

Phalaena Noctua Sponfa	—	Lin. 841. 118. Müller 637. 118.
Noctua	—	Wiener B. 90. 5.
Phal. Noct.	—	Fab. Ent. III. 2. 53. 147.
—	—	Borth. IV. 30. 9.
—	—	Brahm II. 401. 282.
—	—	Mau fortw. 308.
—	—	Esper IV. t. 99. f. 1—5. mit Raupe.
Kösel IV. t. 19. f. 3. nur die fliegende Phaläne.		

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenamm und braunen, wolkenartig gezeichneten Vorderflügeln, auf denen stärker oder schwächer ausgeschweifte, zackige Querlinien, und in der Mitte eine Augennarbe und eine viereckige Narbe sich zeigen. Die Hinterflügel sind hochcarminroth mit den gewöhnlichen schwarzen Binden, davon die kleinere fast gleichbreit, aber nebst der Randbinde sehr winkelig und zackig ist.

Raupe. Vornen und hinten schlank, von wechselnder Grundfarbe, doch gewöhnlich aschgrau oder bräunlich, mit vielen dunkeln Schattirungen, und mit rothen, oder anders gefärbten Würzchen besetzt. Die stumpfe Erhöhung des achten Ringes ist oben gelb, und auf dem vorletzten Ring stehen 2 erhöhte Spitzen. Der weißliche Leib hat braune Flecken. Sie findet sich nur auf der Eiche.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese kammrückige, 2 Zoll, 7 Linien messende Eule ist unter den ähnlichen Arten am dunkelsten gefärbt. Die Vorderflügel von 1 Zoll und 2 Linien Ausmaß sind wolkenartig braun schattirt, und in größern oder kleinern Schwingungen von mehreren gezackten Quercinlinien durchzogen, deren Farbe vom Weißlichen bis zum Schwarzen beynahе sich abändert. Vorn und unter der mondformigen Augennarbe steht eine schiefviereckige Zapfennarbe, und am feingefämmten Hinterrand braune, weißlich gefleckte Franzen. Die hoch- und frischearminfarbigen, buntgefranzten Hinterflügel sind an der Wurzel oft schwärzlich angeflogen, und ihre durchaus gleichbreite, schwarze Mittelbinde ist zackenwinkelig; eben so auch die Randbinde nach innen zu. Die Unterseite der Vorderflügel ist schwarz, ins Braune schillernd, mit 2 trübweißen Binden, grauer Wurzel und bunten Franzen. Die nämliche Seite der Hinterflügel ist der Oberseite sehr ähnlich. Die Füßhörner sind schwärzlich, die oben braunen Füßspitzen sind nach unten weißlich. Der Halskragen und Brustücken sind braun, mit gelben und schwarzen Stäubchen gemischt. Der Hinterleib ist oben dunkel.

kelaschgrau. Das Männchen hat einen kleinen und schlanken Hinterleib und das Weibchen mehr helle Zeichnung. Bey Varietäten findet man viele schwarze Mischung.

Die nach einer zweymaligen Häutung durchwinterte Raupe mit ihrem herzförmigen Kopf ist meistens aschgrau oder bräunlich, zuweilen weißlich oder gar schwärzlich, allemal dunkel schattirt, vornen und hinten dünner als in der Mitte. Die Wärzchen, deren Farbe zuweilen roth ist, machen nebst den steifen Härchen die Fläche rauh, zumal diese die nämlichen Seitenfransen, und auf dem achten Ring die nämliche Erhöhung hat, wie ihre Verwandten, aber von gelber Farbe. Zwei kleine Erhöhungen bezeichnen den vorletzten Ring, und braune Flecken den weißlichen Bauch. Auch bey dieser Art entsteht durch die Verkürzung der ersten 2 Bauchfüße ein spannerförmiger Gang. Die einzige dieser Art, die ich (Scharfenberg) zog, und zwar 1780, hatte auf jeder Seite gerade 8 große und 8 kleine Purpurpunkte. Sie hat übrigens alles, was lebens- und Verwandlungsart betrifft, und auch dies mit den andern Bandphalänen gemein, daß sie sich in der Ruhe fest an den Zweig schmiegt, der ihr zum Aufenthalt dient. Gegen die Mitte des Junius verpuppt sie sich in einem neßförmigen Gewebe zwischen Blättern, und ihre schlanke, rothbraune, bläulich angelaufene Puppe ruht 3, längstens 4 Wochen.

Aufenthalt. Die Eule erscheint zu Anfang oder in der Mitte des Julius. Ihre Raupe kriecht im August aus dem Ey, und überwintert, so daß man sie im May und Junius von den Eichen abschlagen kann, deren Blätter ihre einzige Nahrung ist, wo sie in ihrer Jugend in der Höhe, und in ihrem erwachsenen Alter auf den niedern Ästen lebt.

173. Die Welleneicheneule. *Phalaena Noctua Promissa*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Roths Bandphaläne mit schmaler, wellenförmiger Binde, brautähnlicher Nachfalter, zweyter Eichenarmin.

<i>Phalaena Noctua Promissa</i>	Wiener B. 90. 6.
<i>Noctua</i>	Fab. Ent. III. 2. 54. 150.
<i>Phal. Noct.</i>	Vorkhaus. IV. 33. 10.
— —	Brahm II. 403. 283.
— —	Mau Fortw. 309. S. 727.
— —	Esper IV. t. 96. f. 1—5. mit Raupe.
Rösel IV. t. 19. f. 1. 2. Sitzende Phaläne mit Raupe.	

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenkam und gezahnten Flügeln; die weißgrauen Vorderflügel sind wolfig bräunlich und schwärzlich gezeichnet, und haben eine mondförmige Augennarbe mit gelbem Kern, und darunter eine nicht ganz runde Zapfennarbe. Die Hinterflügel sind carminroth mit schwarzer, am Vorderwinkel sehr breiter, und am Schwanzwinkel schmaler Randbinde, und einer schmalen, verloren wellenförmigen, gegen das Hinterende wenig gekrümmten, nicht in den Innenrand auslaufenden Mittelbinde. Der Büschel am Äfter ist beym Männchen stärker.

Raupe. Veränderlich von Farbe und von Zeichnung, meistens hellblau, mit grünlicher und gelblicher Schattirung: in den Seiten bald schwarzgefleckt, bald mondförmig

mit linirt; und mit kleinen Wörzchen, kurzen Vorsten und Höckern auf dem 8. und 11. Ring geziert. Am weißen Bauch ist auf jedem Ring ein schwarzer oder dunkelrother Fleck.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese Eule ist kleiner als die vorhergehende, und mißt 2 Zoll. Ihre weißgrauen Vorderflügel haben wolkige, bräunliche und schwärzliche Zeichnungen. Von den weißen und schwarzen gezackten Querlinien und Binden ist die hintere am stärksten ausgedrückt. Vorderseits steht die mondformige Augennarbe mit gelbem Kern, und unter ihr eine weißliche, schwarzgeringelte Zapfennarbe, die weder völlig rund, noch herzförmig ist. Am Vorder- rand sind weiße und schwarze Flecken, und am aschgrau gefranzten Hinterrand eine schwarze, weißgerandete Punctenlinie. Die Hinterflügel sind heller carminroth, als bey der nächst- vorhergehenden. Die schwarze Kanobinde ist gegen den Schwanzwinkel schmaler, als voren; die Mittelbinde ist schmal, verloren wellenförmig und am nicht auslaufenden Ende etwas gekrümmt. Die Franzen sind weißlich und bräunlich gefleckt. Die Unterseite der Vorderflügel ist schwarz mit bunten Franzen und zwey weißlichen Binden, davon die erste undeutlich und einer großen Makel ähnlich ist. Die Unterseite der Hinterflügel ist fast wie oben, nur daß die gezacktere Mittelbinde am Vorderrand nach innen einen schwarzen Haken hat. Die Vordertheile des ganzen Insects haben auf der Oberseite die weiße, braunbefräubte und braungefleckte Mischung der Vorderflügel; der Hinterleib ist oben aschgrau, und auf der Unterseite nebst der Brust und den Füßen heller grau, auch sind letztere braungeringelt.

Ihre an Farbe und Zeichnungen unbeständige, übrigens nicht so schlauke Raupe, als die vorhergehende, mißt 2 Zoll. Ihre Farbe ist oft blau, mit grünlicher und gelblicher Schattirung, oft weißlich mit wenig Blau, oft hellbraun. An den Seiten hat sie zuweilen größere oder kleinere Flecken mit mondformigen Linien, nicht selten auch eingestreute weiße Puncte. Oft fließen die Zeichnungen zusammen. Sie ist mit kleinen Warzen, kurzen Vorsten, auf dem 8. und 11. Ring aber mit Höckern wie die Rothscheneule besetzt. Ueber den weißen fleischigen Franzen der Seiten zieht sich eine gekappte Randlinie, und am weißen Bauch zeigen sich schwarze oder dunkelrothe Flecken unter jedem Ring. Zur Zeit ihrer Verwandlung im Junius zieht sie sich zusammen, und bekommt eine fatale Farbe. Dann spinnt sie sich zwischen Blättern ein, um eine eben so gebaute, und blau bereifte Puppe, wie die vorhergehende, zu werden, daraus die Entwicklung in 3 oder 4 Wochen erfolgt.

Aufenthalt. Die Eule ist bey uns im Julius, wiewohl sehr selten, doch einheimisch. Ihre Raupe kriecht im August aus dem Ei, überwintert, und ist zu Ende des Mays, spätestens zu Anfang des Junius, erwachsen auf den Eichen anzutreffen.

Dritte Linie. Mit gelben Hinterflügeln, die fast ungezähnt sind.

Weniger städliche.

174. Die Zwetscheneule. *Phalaena Noctua Paranympa*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbe

Gelbe Bandphaläne mit 2 gerundeten Binden; Backenfleckige; Brautsungfer; Brautsführerin; Brautsungfernachfalter.

Phalaena Noctua Paranympa	I. in. 842. 122. Müller 687. 122.
— — — —	Wiener B. 1. 91. 7.
Noctua — —	Fab. Ent. III. 2. 59. 164.
Phal. Noct. — —	Borthausen IV. 39. 13.
— — — —	Esper IV. t. 105. f. 1 — 3. mit Raupe.
— — — —	Naturforscher XIV. t. 4. f. 8. 9. Raupe und Puppe.
— — — —	Füßly Magazin der Entom. II. t. 3. Fig. A. B. Raupe und Puppe.

Rösel IV. t. 18. f. 1. 2.

Kenntzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenamm und flachen Flügeln; die vordern sind lichtgrau mit 2 dunkelbraunen Querlinien, davon die zweyte zitzakförmig ist, und ein lateinisches M oben bildet. Zwischen beyden steht eine mondförmige Augennarbe und darunter eine gelbliche ablange Zapfennarbe. Die Hinterflügel sind hochorange gelb mit 2 schwarzen zugerundeten Binden.

Das Männchen ist an den etwas mehr gefaserten Fühlhörnern und dem Asterschopf kennbar.

Raupe. Schlank, gewöhnlich dunkelbraun, auf dem Körper mit Wärzchen besetzt, darauf Borsten stehend. Auf dem achten Ring erhebt sich ein sehr verlängerter Fleischhöcker, desgleichen auf dem 4., 11. und 12. erhöhte Spigen. An den Seiten stehen Franzen und unter dem Bauch rotke Flecken, zuweilen noch am Körper gelbliche und weißliche Flecken,

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese kammebüchtige, an Schönheit den Eulen der vorhergehenden Linie nichts nachgebende Eule mißt 2 Zoll 4 Linien, jeder Vorderflügel 1 Zoll. Durch die lichtaschgrauen Vorderflügel, die dunkel und weiß schattirt sind, ziehen sich 2 schwarzbraune Querlinien, davon die erste wellenförmig ist, und denjenigen schwarzbraunen Schatten begränzt, der von der Wurzel aus einen Drittel vom Flügel einnimmt. Die zweyte ist zitzakförmig, nach oben weißgerandet, und bildet ein großes lateinisches M oben. Das Mittelfeld dazwischen ist oft gelbgemischt; im Schatten desselben befindet sich eine mondförmige Augennarbe und darunter eine gelbliche, längliche Zapfennarbe, um welche sich die zweyte Linie herumschlingt. In dem Raum von da aus bis zum Hinterrand läuft ein wellenförmiger Querschatten; auch läuft von der Flügelspitze bis ans M ein schwarzer Zitzakstrich in einem dunkeln Schatten. Die Hinterflügel sind hochorange gelb und zweymal schwarzbandirt; die erste oder Mittelbinde ist dergestalt herumbogen, daß sie sich an der Wurzel zusammenschließt; die zweyte, oder Randbinde, ist unterbrochen, und neben derselben steht am Vorderwinkel ein gelber Fleck. Die Vorderflügel haben graue, die hintern gelbe Franzen. Die ganze Unterseite ist gelb, die Vorderflügel dreymal, die hintern zweymal schwarzbandirt. Das ganze Insect ist nach seinen Vordertheilen mit den Vorderflügeln gleichfarbig, und dabey eben so dunkel bestäubt, am Hinterleib gelbgrau. Die zart gefaserten Fühlhör-

Gggg

ner

ner sind beym Weibchen schwächer, als beym Männchen, und der schlanke, am After beschuchte Hinterleib macht das Männchen ebenfalls kennbar.

Die 1 Zoll 8 Linien messende, schlanke, gewöhnlich dunkelbraune, sonst auch wohl aschfarbige, oder auch schwärzliche Raupe zeigt ebenfalls die franzenförmigen Auswüchse in den Seiten, die rothbraunen Flecken der Unterseite, desgleichen beym Herabfallen die Lebhaftigkeit im Springen, als die von der zweyten Linie. Sie ist auf dem ganzen Körper mit Warzen besetzt, darauf Vorsten stehen. Auf dem 8. Ring erhebt sich ein sehr verlängelter Fleischhöcker, desgleichen auf dem 4., 11. und 12. erhöhte Spigen. Die Fläche zeigt auch noch bald deutliche, bald sehr undeutliche gelbliche und weißliche Flecken. Sie spinnt sich, wenn sie zur Verpuppung reif ist, ein dünnes Gewebe zwischen Blättern, und aus ihrer schlanken, braunen, blau beduften Puppe entwickelt sich in 3 bis 4 Wochen das vollkommene Insect.

Aufenthalt. Die Eule lebt und zeigt sich im Julius an den Bretterwänden in Gärten, an den Häusern, zuweilen auch in denselben, zwischen klaffenden Gartenthüren u. s. w., und ihre Raupe im May auf Weißdorn, Schlehenhecken und allen Pflaumen-Arten, wo sie die niedern Aeste starker Bäume liebt.

175. Die Schwarzdorneule. *Phalaena Noctua Hymenaea*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Gelbe Bandphaläne mit getrennten Binden.

<i>Phalaena Noctua Hymenaea</i>	Wiener B. 91. 8.
<i>Noctua</i> —	Fab. Ent. III. 2. 58. 161.
<i>Phal. Noct.</i> —	Borkhauf. IV. 43. 14.
— — —	Esper IV. t. 104. f. 1.
— — —	Hübners Beytr. I. 3. t. 3. fig. 8.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit einem Rückenrücken und dachigen Flügeln; die vordern sind ungemischt aschgrau, fein bestäubt mit einer schwarzen Wellenlinie und einer gleichfarbigen Zackenlinie, dazwischen zwey kleine schwarze Nierennarben von ungleicher Größe stehen. Die Hinterflügel sind hochgelb mit einer breiten, schwarzen, unterbrochenen Binde und einer schmalen, etwas gewellten, abgekürzten Mittelbinde. Das Weibchen hat eine hellere Grundfarbe.

Raupe. Gelbgrün, mit 2 Reihen erhabener Warzen; auf dem achten Ring mit einem zahnrörmigen Höcker und an den Seiten mit den gewöhnlichen Fleischwarzen bezeichnet.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese ist kleiner als die vorhergehende, ihr aber sonst viel ähnlich, und hat auf den ungemischt aschgrauen, fein bestäubten Vorderflügeln unweit der Wurzel ein vom Vorderrand herabgeschwungenes schwarzes längsstrichelchen. Die erste schwarze Querlinie ist gewellt und von einer Schattenlinie einwärts begleitet; das darauf folgende Mittelfeld enthält eine kleine schwarze, auswärts von einem Schattenfleck begleitete Nierennarbe, und eine noch kleinere und blässere unter jener. Hierauf kommt eine zweyte und zwar zackige Querlinie, die

die auf beyden Seiten eine dunkelgraue neben sich hat. An dieselbe zieht sich eine kleine zackige Schrägslinie von der Flügelspitze her. Den aschgrau gefranzten Hinterrand umgibt eine schwarze Punctenreihe. Die hochgelben Hinterflügel sind an der Wurzel und am Hinterrand nicht viel braun beschattet, und führen eine schmale, etwas gewellte, gegen den Innenrand sich hinkrümmende, ihn aber nicht erreichende Binde, und eine breite schwarze, gegen den Schwanzwinkel unterbrochene Randbinde, hinter welcher am gelbgrau gefranzten Hinterrand eine feine, gelbe Linie läuft, die im Vorderwinkel einen großen gelben Fleck bildet. Alle Flügel sind unten (d. i. auf der Unterseite) ockergelb und zweymal schwärzlich bandirt. Der Kopf, Kammrücken, Brust, Hinterleib und Füße sind grau, letztere braun bestäubt, und unten schwarz geringelt; die Fühlspitzen, Fühlhörner und der Halsfragen sind braungrau, letzterer erstlichmal dunkel bandirt. Die Grundfarbe der weiblichen Eule ist heller, und sie selbst ist größer.

Die gelbgrüne, mit 2 Reihen erhabener Warzen, einem zahnförmigen Höcker auf dem 8. Ring besetzte Raupe, wie sie uns Fabricius nach Schiffermüllers Angabe charakterisirt, hat vermuthlich die gewöhnlichen Fleischwarzen, Seitenfransen, und vieles Aehnliche mit der vorhergehenden.

Aufenthalt. Die Phaläne ist zwar auf Deutschem Boden zu Hause, aber nur im Oesterreichischen, wo ihre Raupe auf Schlehen blättern lebt.

176. Die Hangelbirkeneule. *Phalaena Noctua Parthenias*, Lin.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Wolkige Eule mit gelben Flügeln, Jungfernkind, *Parthenias*, *Partheniennachtsfalter*, *Blaustrich*, *Blausfleck*.

<i>Phalaena Noctua Parthenias</i>	Lin. 835. 94. Müller 682. 94.
— — —	Wiener Bz. 91. 9.
<i>Bombyx — Vidua</i>	Fab. Ent. III. 1. 468. 190.
<i>Phalaena Noctua Parthenias</i>	Vorthausen IV. 51. 18.
— — —	Knoch's Beytr. t. 3. f. 8.
— — —	Esper IV. t. 85. f. 4—8. mit Raupe.

Kleemann tab. 40. mit Raupe.

Degeers Abhandlungen I. t. 21. f. 10. 11. Raupe.

In Goezens *Entomologischen Beytraegen* ist sie als *Parthenias*, *Glaucescens* und *Glaucoscalciata*, also dreymal aufgeführt.

Kennzeichen der Art. Eule. Mit dachigen Flügeln; die vordern sind rothbraun, hier und da weißbläulich schillernd, mit einer Nierenmaße, am Männchen mit blassen, weißen Binden, am Weibchen mit einem großen weißen Quersfleck, hinter welchem zwei Wellenlinien laufen. Die Hinterflügel sind goldgelb, mit einem großen schwarzen, dreieckigen Raumfleck am Innenrand, einem solchen Mittelpunct, und einem schmalen, gleichfarbigen Randstreif am Hinterrand. Die schwarzen Fühlhörner sind am Männchen gekämmt, am Weibchen borstig und weißgeringelt.

Raupe. Gleichbreit, spannerförmig, glatt und grün, mit einer dunkelgrauen, zu beyden Seiten gelbgerandeten Rückenlinie, und einer hellgelben an jeder Seite. In ihren Ruheplätzen zieht sie einige Fäden über sich.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese 1 Zoll und 4 bis 4½ Linien messende Phaläne ist rothbraun und grau gemischt, mit feinen schwärzlichen Stäubchen bedeckt. Bey dem Männchen verlieren sich blasse, weiße Binden ins Schwarze, bey dem Weibchen hingegen bemerkt man ein weißes, längliches, großes, fast bindenförmiges Querstück, daran eine schwarz eingefasste Mond- oder Nierennarbe von blauem Schiller stößt. Esper nennt dies zusammen eine wolrige Mischung. Hinter dieser ziehen zwey wellenförmige, schwarze, weiß gesäumte Querlinien, die an einem kleinen weißen Randstück ihren Anfang nehmen. Die Franzen sind weiß und schwarz geheckt. Die Hinterflügel sind goldgelb mit einem großen schwarzen Dreyeck, das am Innenrand von der Wurzel bis zum Schwanzwinkel aufricht, und dessen Spitze sich bis in die Mitte neben einem gleichfarbigen Mittelpunkt erhebt. Der Hinterrand ist schmal, fleckenweis ungleich, schwarzgesäumt, welche Einfassung andere mit einem Streif, wohl gar mit einer Binde verglichen haben. Auf der Unterseite sind alle gelb- und schwarzgefranzten Flügel rosfarben, mit Mattoraniengelb vermischt, so daß die vordern einen schwarzen Halbmond an der Stelle haben, wo auch oben die Mondmakel steht, und die hintern wie oben gezeichnet sind. Alles dieses findet sich bey frischen selbstgezogenen weiblichen Exemplaren, wo man bey Vergleichen gewahr wird, daß Kleemann die Vorderflügel nach hinten zu etwas zu schmal gezeichnet, und ein Weibchen vor sich gehabt hat, da denn das schwarze Dreyeck ein befremdendes Ansehen gibt; hingegen sind die Vorderflügel so ziemlich natürlich.

Die 1 Zoll und 2 Linien messende, gleichbreite, wegen der Kürze der vier ersten Bauchfüße spannerförmig gehende Raupe ist grün, unter der Lupe kurz behaart, mit hellgrünem Kopf und Hinterende, gelbgrünem Körper, auf dem eine dunkelgraue, zu beyden Seiten gelbgerandete Rückenlinie und an jeder Seite eine breite, hellgelbe Längslinie herabziehen, so daß man haardünne Linien mitunter findet. Sie überspinnet sich ihr Lager mit Fäden. Kurz vor ihrer Verwandlung zu Anfang des Julius verblassen ihre Farben, und sie bereitet und befestigt sich ein Gewebe von verschiedenen Zuthaten, worin sie als längliche, braune, mit höckerigen Absätzen auf der Unterseite besetzte Puppe 9 Monate lang ruht.

Aufenthalt. Das vollkommene Insect ist zu Ende des März vorhanden, wo es stark und hoch zu fliegen pflegt, und die im Junius ausgewachsene Raupe nährt sich auf Birken, nach Herrn Esper auch auf Eichen und der Schwarzbuche, nach Fabricius, wenn kein Druckfehler a. a. O. obwaltet, auf der Weispappel.

Anmerkung. Diese Phaläne, die gleichsam das Mittel zwischen Spannern und Eulen hält, und von Fabricius den erstern zugeordnet worden, verdient doch unter den letztern, entweder in der gegenwärtigen, oder noch besser in der von Borkhausen neu errichteten Familie der geschmückten Eulen ihre Stelle, deren Raupen keine Fleischwarzen noch Höcker haben.

Zwanzigste Familie.

Schlangenraupen. Spannersförmige Eulen.

Diese Raupen haben nur vier Bauchfüße, wovon das erste Paar kleiner ist: bey einigen bemerkt man noch an den vorhergehenden Ringen Anfänge von Füßen. Sie gehen fast ganz nach Art der Spanner, sind nackt, schlank, bräunlich, mit auch über den Kopf gehenden Längstreifen. Die Verwandlung geschieht in der Erde in einem mit Erde vermengten Gewebe. Die Eulen haben breite, fast flach verbreitete Vorderflügel, mit einigen düstern undeutlichen Querstreifen und verschiedenen Zeichen, ohne die gewöhnlichen Narben; sie fliegen bey Tage.

Sie theilen sich in 2 Linien ab: 1) die Raupen haben Spuren von allen Bauchfüßen, und die Eulen eine schwärzliche Mondnarbe auf den Vorderflügeln. 2) Die Raupen haben nur 4 Bauchfüße ohne Spuren von mehreren, und die Eulen haben braungelbe, düsternelbliche Hinterflügel.

Hierher gehört nur eine einzige und zwar von der ersten Linie.

Weniger schädliche.

177. Die Truffeleule. *Phalaena Noctua Lunar*, Vien.

Namen, Schriften und Nachweisung der Abbildung.

Eidereule (von der Raupe), graue braunstreifige Eulenphaläne.

<i>Phalaena Noctua Lunar</i>	Wiener Verz. 94. 1.
<i>Noctua</i>	— Fab. Ent. III. 2. 63. 177.
—	Meretrix Fab. III. 2. 60. 167.
<i>Phal. Noct.</i>	<i>Lunar</i> Borkhausen IV. 799. 368.
—	Augur Esper IV. t. 87. f. 4 — 6. mit Raupe, und tab. 88. fig. 1.
—	<i>Lunar</i> Hübners Beytr. I. t. 1. f. 3.
<i>Noctua</i>	— Panzer Fauna 43. tab. 22.

Kenzeichen der Art. Eule. Mit einem schwachen Kammrücken, aufliegenden und gezahnten Flügeln; die vordern sind gelbgrau und fein bestäubt, mit 2 lichten, dunkelgesäumten Querstreifen, dazwischen eine schwärzliche Mondnarbe, und vor derselben ein gleichfarbiger Punct steht; und dann mit einer gewässerten bräunlichen Quercinie ohnweit des zierlich ausgekappten gelbgrau gefranzten Hinterrandes.

Das Männchen ist kleiner.

Raupe. Vor der letzten Häutung dunkelgrün und weispunctirt, mit einer rothen Seitenlinie, zwey rothen erhabenen Puncten auf dem vierten Ring, und zwey gleichfarbigen Spitzen auf dem ersten. Nach der letzten Häutung ist sie röthlichbraun, und was ehemals roth war, wird blaß oder auch rothgelb.

Beschreibung des vollkommenen und unvollkommenen Insects. Diese kammrückige Eule hat das Ausmaß von der Heckenborneule, *Maura*, von 2 Zoll, 4 bis 5 Linien. Ihre Vorderflügel sind aber schmaler, wie bey jener, übrigens getögrau, mit feinen bräunlichen Sträubchen bestreut. Zwischen 2 lichten, dunkelgerandeten

ersten Querstreifen steht statt einer Ringnarbe ein schwarzer Punct und dahinter eine gleichfarbige Mond- oder Nierennarbe. Der Raum vom 2ten Streif bis zum zierlich ausgekappten und in den Kerbenwinkeln punctirten Hinterrand ist breiter, als der, worin die Narbe steht, und ist durch eine starkgewässerte bräunliche, einwärts licht angelegte Quereinie durchzogen. — Bey Varietäten ist der obgedachte Raum von graubrauner Farbe, und auch die übrige Fläche etwas dunkler, mit lichtern Querstreifen. Die Hinterflügel sind von der Wurzel bis zur Mitte gelbgrau, und im Uebrigen dunkelgraubraun. Alle Flügel sind gelbgrau gefranzt, auf der Unterseite alle gelblich mit braunen Stäubchen, einem schwärzlichen Mittelfleck auf den Vorderflügeln. Das ganze Insect hat die gelbgraue Farbe der Vorderflügel, und nur die Vordertheile sind etwas dunkler.

Die im Julius und August aufzufindende Raupe ist vor der letzten Häutung dunkelarim, mit weißen Puncten und einer rothen Seitenlinie, desgleichen mit 2 erhabenen rothen Puncten auf dem vierten Ring und zwey gleichfarbigen Spitzen auf dem eilften. Nach der letzten Häutung wird sie röthlichbraun, die Seitenlinie wird blasser, die 2 Puncte und 2 Spitzen werden gelbroth. Der flache, grofse Kopf ist rothgelb und hellliniert; die vier ersten Bauchfüße scheinen nur Spuren von Füßen zu seyn, deren die Raupe sich nicht bedienen kann. Zur Verwandlung macht sie sich in der Erde, zuweilen auch außer derselben ein liches Gewebe, und verpuppt sich darinnen. Ihre Entwicklung erfolgt nach 8 Monaten im May des folgenden Jahres.

Aufenthalt. Die Eule erscheint im May, wenn die Eiche blüht, um welche sie bey Tage herumfliegt, und auf welcher im Julius und August ihre Raupe lebt, die auch zuweilen auf Espen sich nährt.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 1.

1

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.