Dehmer,
Pflanzenphysiologisches
Praktikum.

Zweite Auflage.

Jena,
Verlag von Gustav Fischer.

Learning and

OAK ST. HDSR
LIBRARY

OF THE

University of Illinois.

CLASS.

BOOK.

VOLUME.

581.1

□ 482

REMOTE STORAGE

Accession No.

DAS
PFLANZENPHYSIOLOGISCHE
PRAKTIKUM.

ANLEITUNG
ZU PFLANZENPHYSIOLOGISCHEN
UNTERSUCHUNGEN

FÜR
STUDIRENDE UND LEHRER DER NATURWISSENSCHAFTEN
SOWIE DER MEDICIN, LAND- UND FORSTWIRTHSCHAFT

VON
DR. W. DETMER,
PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT JENA.

MIT 184 ABBILDUNGEN.

ZWEITE, VÖLLIG NEU BEARBEITETE AUFLAGE.

JENA,
VERLAG VON GUSTAV FISCHER.
1895.

REMOTE STORAGE

Seinen Eltern

in

Dankbarkeit und Verehrung

zugeeignet

vom Verfasser.

57906

Vorwort zur ersten Auflage.

Für denjenigen, welcher sich eingehender mit pflanzenphysiologischen Studien beschäftigen will, genügt es keineswegs, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie zu hören oder Lehrbücher dieser Disciplin durchzuarbeiten, sondern er muss vor allem bestrebt sein, die Untersuchungsmethoden aus eigener Erfahrung kennen zu lernen.

Die Pflanzenphysiologie ist heute für die Ausbildung der Studierenden der Naturwissenschaften, der Land- sowie Forstwirthschaftswissenschaft und der Medicin von einer so hervorragenden Bedeutung geworden, dass man bestrebt sein sollte, dem genannten Unterrichtsgegenstande auf den Universitäten und anderen höheren Lehranstalten eine grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden, als bisher geschieht. Vor allem erscheint es zweckmässig, pflanzenphysiologische Uebungen für die Studirenden einzurichten, und da ich an der Universität Jena selbst ein solches Praktikum mit sehr günstigem Erfolg eingeführt habe, weiss ich aus Erfahrung, dass die auf den ersten Blick bedeutend erscheinenden Schwierigkeiten des Unternehmens recht gut zu überwinden sind.

In dem vorliegenden Buche habe ich mir die Aufgabe gestellt, nach Kräften zur Förderung des pflanzenphysiologischen Studiums beizutragen. Das „pflanzenphysiologische Praktikum“ ist aber keineswegs ausschliesslich zum Gebrauch für Studirende bestimmt, sondern ich denke, dass dasselbe auch manchem Lehrer an höheren Schulen willkommen sein dürfte. Die Botanik bildet aus zahlreichen Gründen einen ganz besonders geeigneten Lehrgegenstand für die Schule, und dem botanischen Unterricht kann durch die Vorführung einer Reihe physiologischer Experimente ein ganz eigenartiger Reiz sowie eine erhöhte Bedeutung für die Geistesbildung der Jugend verliehen werden.

Was die Anordnung des Stoffes im vorliegenden Buche anbelangt, so ist dieselbe freilich nicht genau, aber doch im Wesentlichen in derselben Weise wie in meinem 1883 im Verlage von E. Trewendt in

Breslau erschienenen Lehrbuche der Pflanzenphysiologie durchgeführt worden. Theoretische Erörterungen, denen in der zuletzt genannten Schrift naturgemäss ein ziemlich breiter Raum gegeben werden musste, fehlen in der vorliegenden fast völlig.

Die Arbeit, welche ich in den letzten vier Jahren zur Herstellung des „pflanzenphysiologischen Praktikums“ aufwandte, ist eine sehr erhebliche gewesen. Vor allem kam es für mich darauf an, eine grosse Zahl der verschiedenartigsten pflanzenphysiologischen Experimente und mikroskopischen Beobachtungen selbst auszuführen, um zu einem möglichst selbständigen Urtheil über den Werth und die Brauchbarkeit der Untersuchungsmethoden zu gelangen. Ueberall ist besonderes Gewicht auf die Feststellung der Beziehungen zwischen dem anatomischen Bau sowie der physiologischen Function der Pflanzenorgane gelegt worden, und ebenso sind die biologischen Verhältnisse nicht unberücksichtigt geblieben.

Ich habe mich bemüht, denjenigen Apparaten, welche in diesem Buche zur Ausführung der physiologischen Untersuchungen in Vorschlag gebracht werden, eine möglichst einfache Form zu geben, damit dieselben von jedem ohne grosse Mühe zusammengestellt werden können; gewisse complicirtere und daher auch werthvollere Instrumente, z. B. gute Mikroskope, eine chemische Waage, ein Spectroskop, einen Inductionsapparat, einen Klinostaten etc., kann man bei pflanzenphysiologischen Untersuchungen freilich nicht entbehren.

Jena, Ende September 1887.

W. Detmer.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Indem ich hiermit die zweite Auflage des „pflanzenphysiologischen Praktikums“ der Oeffentlichkeit übergebe, bin ich mir, mehr als jemals, der Schwierigkeiten bewusst, welche mit der Bearbeitung einer Anleitung zu physiologischen Experimenten verbunden sind. Diese Schwierigkeiten haben ihren Grund theils in der Sache selbst, theils aber auch darin, dass von verschiedenen Seiten durchaus nicht die gleichen Ansprüche an ein „Praktikum“ gestellt werden.

Die Gliederung des Stoffes hat im Vergleich zur ersten Auflage keine wesentlichen Aenderungen erlitten. Im Uebrigen liegt aber

eigentlich ein neues Buch vor, denn fast jeder Abschnitt hat Erweiterung oder Umarbeitung erfahren. Ich habe zahlreiche neue Experimente, die sich für Demonstrationen in der Vorlesung oder zur allgemeinen Orientirung beim Selbststudium eignen, aufgenommen, und ebenso bin ich bemüht gewesen, das Buch für denjenigen in erhöhtem Maasse brauchbar zu gestalten, der die Absicht hat, sich eingehend mit pflanzenphysiologischen Studien zu beschäftigen, und vor allen Dingen den Wunsch hegen muss, die Untersuchungsmethoden genauer kennen zu lernen. Daher sind die Forschungsmethoden denn auch in vielen Fällen in der vorliegenden Auflage sehr detaillirt in Verbindung mit kritischen Bemerkungen und unter Hinweis auf concrete Beispiele zur Prüfung ihrer Leistungsfähigkeit behandelt worden. Uebrigens sei ausdrücklich betont, dass hauptsächlich nur solche Methoden Berücksichtigung erfahren konnten, welche eine allgemeinere Bedeutung beanspruchen, während auf die für specielle Zwecke ausgearbeiteten Methoden der Untersuchung höchstens kurz hingewiesen ist, zumal dann, wenn dieselben in leicht zugänglichen Originalarbeiten eingehend behandelt worden sind.

Zahlreiche neue Abbildungen, ein Sachregister und eine Uebersicht der Bezugsquellen für Apparate werden dem Buch ebenfalls sicher zum Vortheil gereichen.

Viele Sorgfalt habe ich auch der Auswahl der für die Experimente empfohlenen Untersuchungsobjecte gewidmet. Bei dem Gebrauch meines Buches wird man finden, dass hierbei nicht allein das im Sommer zur Verfügung stehende Material, sondern ebenso dasjenige Berücksichtigung erfahren hat, welches im Winter zweckmässig verwandt werden kann. Gerade in der minder günstigen Jahreszeit ist die richtige Auswahl des Beobachtungsmaterials doppelt wichtig.

Die Anzahl der von mir zur Prüfung der Untersuchungsmethoden in den letzten 4 Jahren angestellten Experimente ist eine sehr grosse gewesen. Ich habe auch verschiedene neue Apparate construirt, die in dieser Auflage beschrieben und abgebildet sind.

Bemerkt muss auch werden, dass die nach Mitte des Jahres 1894 erschienene Litteratur keine Berücksichtigung mehr erfahren konnte.

Zu besonderer Freude gereicht es mir, dass Herr Dr. MICHEELS in Ypern im Jahre 1890 eine französische Uebersetzung meines Buches herausgab, die in Paris erschienen ist. Eine englische Uebersetzung ist in Vorbereitung.

Dem Herrn Verleger sage ich verbindlichsten Dank dafür, dass er für vollendete Ausstattung des Buches die grösste Sorge trug.

Jena, im April 1895.

W. Detmer.

Inhalts-Uebersicht.

Erster Theil.

Physiologie der Ernährung.

Erster Abschnitt.

Die Nährstoffe der Pflanzen.

I. Der Assimilationsprocess.

	Seite
1. Constatirung der Thatsache, dass grüne Pflanzen organische Substanz aus anorganischem Material zu erzeugen vermögen	1
2. Die Production organischer Substanz in der grünen Pflanzenzelle unter dem Einfluss des Lichtes	7
3. Die Assimilationsorgane	8
4. Die Durchleuchtung der Pflanzengewebe	11
5. Die Chlorophyllkörper	13
6. Der Chlorophyllfarbstoff	17
7. Das Absorptionsspectrum und die Fluorescenz des Chlorophyllfarbstoffes	18
8. Die Zersetzung des Chlorophyllfarbstoffes	22
9. Die herbstliche Färbung der Blätter und die winterliche Färbung ausdauernder Pflanzentheile	25
10. Die Entstehung des Chlorophyllfarbstoffes	26
11. Die Sauerstoffproduction bei der Assimilation	29
12. Die Kohlensäure und der Assimilationsprocess	33
13. Volumetrische Verhältnisse des Gaswechsels bei der Assimilation	35
14. Der makro- und mikrochemische Nachweis von Stärke in den Assimilationsorganen	38
15. Die Assimilationsproducte	39
16. Die Abhängigkeit der Stärkebildung bei der Assimilation von äusseren Verhältnissen	42
17. Die Spaltöffnungen und der Assimilationsprocess	47

II. Die Entstehung der Eiweissstoffe in den Pflanzen.

18. Die Versorgung niederer Organismen mit Stickstoff	49
19. Vermag die Pflanze den freien Stickstoff der Atmosphäre zur Bildung von Eiweissstoffen zu verwerthen?	50
20. Bacterium Radicicola und die Papilionaceen als Stickstoffsammler	52
21. Der Nachweis des Ammoniaks und der Salpetersäure im Wasser und in der Pflanze und die Lebensthätigkeit von Nitromonas	57
22. Die Salpetersäure als Pflanzennahrungsmittel	60
23. Das Ammoniak als Pflanzennahrungsmittel	61
24. Der Ort der Eiweissbildung in den höheren Pflanzen	61
25. Die Zersetzung der Nitrate in den Pflanzen	64

III. Die Aschenbestandtheile der Pflanzen.

26. Die mechanische Bodenanalyse	65
27. Der Nachweis einiger Pflanzennährstoffe im Boden	66
28. Der Gehalt des Wassers an Pflanzennährstoffen	67
29. Die Aschenanalyse	68
30. Das Mineralstoffbedürfniss der höheren Pflanzen und die Entbehrlichkeit des Natriums sowie des Siliciums für dieselben	70
31. Die Unentbehrlichkeit des Phosphors, Schwefels, Kaliums, Calciums, Magnesiums und Eisens für die höheren Pflanzen	71
32. Das Mineralstoffbedürfniss der Pilze	73
33. Die Formen, in denen einige Mineralstoffe in den Pflanzen vorkommen	74

IV. Die organischen Verbindungen als Pflanzennahrungsmittel.

34. Die Humuskörper des Bodens und die Mycorrhiza	76
35. Experimente mit <i>Penicillium crustaceum</i>	78
36. Einige weitere Saprophyten	80
37. Experimente mit <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	80
38. Die Bacterien	81
39. Einige parasitisch lebende Pilze	84
40. Die Flechten	86
41. Experimente mit fleischverdauenden Pflanzen	86

Zweiter Abschnitt.

Die Molekularkräfte der Pflanzen.

I. Die wichtigsten organisirten Gebilde der Pflanzenzellen.

42. Die Membranen der Pflanzenzellen	90
43. Die Stärkekörner	93
44. Das Verhalten der Stärke zum Jod	96
45. Das Verhalten der Stärkekörner im polarisirten Licht	97
46. Die protoplasmatischen Gebilde der Pflanzenzellen	97

II. Die Zerstörung der Molekularstructur organisirter pflanzlicher Gebilde.

47. Die Einwirkung niederer Temperaturen auf Pflanzen	103
48. Die Veränderungen, welche Pflanzen in Folge des Erfrierens erfahren	104
49. Die Eibildung in gefrierenden Pflanzen	105
50. Die Tödtung der Pflanzen durch zu hohe Temperaturen	108
51. Die Veränderungen, welche Pflanzen in Folge der Tödtung durch zu hohe Temperaturen erfahren	110
52. Die Vernichtung der Molekularstructur durch mechanische Eingriffe	111
53. Die Wirkung des Austrocknens auf Pflanzentheile	112
54. Die Einwirkung der Elektrizität auf Pflanzen	113
55. Die Einwirkung von Giften auf die Pflanzen	115

III. Elementare Molekularvorgänge in den Pflanzen.

56. Der Imbibitionsprocess	117
57. Die Diffusion und die Endosmose	120
58. Die diosmotischen Eigenschaften der Zellhaut und des Protoplasmas	122
59. Der Turgor und die Plasmolyse	125
60. Die isotonischen Coëfficienten	127
61. Die Grösse der Turgorkraft	129
62. Der Temperaturzustand der Gewächse	130
63. Die elektromotorischen Wirkungen an Pflanzen	132

IV. Die Bewegung der Gase in den Pflanzen.

64. Einiges über das Verhalten der Gase im Allgemeinen	135
65. Das Intercellularsystem der Pflanzen	138

	Seite
66. Die Lenticellen	140
67. Die Spaltöffnungen und ihre Bedeutung beim Gaswechsel der Pflanzen	142
68. Positiver und negativer Gasdruck in den Pflanzen	147

V. Die Wasseraufnahme seitens der Pflanzen.

69. Die Wasseraufnahme seitens der Wurzeln aus dem Boden	156
70. Die Wasseraufnahme seitens der Blätter	157
71. Einige Bewegungserscheinungen an Pflanzentheilen, die mit der Wasseraufnahme derselben im Zusammenhang stehen	157
72. Die Wasseraufnahme der Früchte und Samen	160
73. Weitere Experimente über den Quellungsprocess der Samen	163
74. Die Wasseraufnahme der Moose	164

VI. Die Wasserbewegung in den Pflanzen.

75. Constatirung der Erscheinung des Wurzeldrucks	166
76. Der Saftausfluss aus im Freien wachsenden verletzten Bäumen	168
77. Der Einfluss äusserer Verhältnisse auf den Saftausfluss aus decapitirten Pflanzen	169
78. Die Periodicität des Wurzeldrucks	172
79. Die Ursachen des Wurzeldrucks und verwandter Erscheinungen	172
80. Weitere Experimente über den Austritt tropfbar flüssigen Wassers aus Pflanzen	173
81. Die Organisation der Pflanzentheile und die Transpiration :	176
82. Weitere Transpirationsversuche	178
83. Der Einfluss äusserer Verhältnisse auf die Transpiration der Pflanzen	181
84. Das Holz als wasserleitendes Gewebe und der Einfluss der Transpiration auf die Wasserbewegung in der Pflanze	189
85. Die Beweglichkeit des Wassers im Holz	193
86. Die Geschwindigkeit der Wasserbewegung in der Pflanze	195
87. Die Erscheinung des Welkens der Pflanzen	197

VII. Die Mineralstoffaufnahme seitens der Pflanzen.

88. Die Wurzeln der Pflanzen als Organe der Mineralstoffaufnahme	199
89. Die Mineralstoffaufnahme der Wurzeln aus Nährstofflösungen	201
90. Die Corrosionserscheinungen	202
91. Die Ursachen der Corrosionserscheinungen	203
92. Das Absorptionsvermögen des Bodens	205

Dritter Abschnitt.

Die Stoffwechselprocesse im vegetabilischen Organismus.

I. Das Verhalten der stickstoffhaltigen Verbindungen.

93. Die Eiweissstoffe, welche man aus Pflanzentheilen abscheiden kann	208
94. Die makro- und mikrochemischen Eiweissreactionen	209
95. Allgemeines über das Verhalten der Eiweissstoffe in der Pflanze	210
96. Das Pepsin und die Peptone	211
97. Das Nuclein	212
98. Der mikrochemische Nachweis des Asparagins	213
99. Die quantitative Bestimmung des Gesamtnickstoffs und des Stickstoffs der Proteinstoffe und der Säureamide in Keimpflanzen	214
100. Das Verhalten des Asparagins in den Pflanzen	215

II. Der Athmungsprocess der Pflanzen.

101. Experimente zur allgemeinen Orientirung über die Pflanzenathmung	217
102. Methode zur Bestimmung der bei intramolekularer und normaler Athmung der Pflanzen producirtcn Kohlensäure	221
103. Die Kohlensäureproduction bei normaler Athmung der Pflanzen	226
104. Die Kohlensäureproduction bei intramolekularer Athmung der Pflanzen	229
105. Elementaranalytische Untersuchungen über den Athmungsprocess	232
106. Sauerstoffaufnahme bei der Athmung und Ermittlung des Respirationsquotienten $\frac{\text{CO}_2}{\text{O}}$	233

	Seite
107. Das Verhalten der Pflanzen in Contact mit Stickstoffoxydulgas	235
108. Die Alkoholbildung in den Pflanzen und das Verhalten anaërober Organismen	236
109. Die Wärmeentwicklung und die Phosphorescenz der Pflanzen	240

III. Verhalten der stickstofffreien plastischen Stoffe der Pflanzen.

110. Das Amylum als Reservestoff	245
111. Die quantitative Amylumbestimmung	246
112. Das Vorkommen der Diastase in den Pflanzen und die Wirkungsweise des Fermentes	247
113. Der Einfluss verschiedener Substanzen sowie der Temperaturverhältnisse auf den Verlauf des Processes der Stärkeumbildung durch Diastase	250
114. Die Entstehung der Diastase in den Zellen höherer Pflanzen	250
115. Die Bestimmung und der mikrochemische Nachweis der Glycose	251
116. Das Dextrin	252
117. Die Bestimmung und der mikrochemische Nachweis des Rohrzuckers	253
118. Die Reservecellulose und das Amyloid	254
119. Das Inulin	255
120. Die Pflanzenfette und die quantitative Bestimmung derselben	256
121. Die Reactionen der fetten Oele	257
122. Das Verhalten des Fettes bei der Keimung der Samen	258
123. Die Keimung der Samen von Phaseolus multiflorus	260
124. Die Keimung von Triticum vulgare	262
125. Die Keimung der Kartoffelknollen	264
126. Der Einfluss der Temperaturverhältnisse auf den Zuckergehalt der Kartoffelknollen	265
127. Das Reifen der Früchte und Samen	266
128. Die Gewinnung des für quantitative chemische Untersuchungen über Stoffwechselprocesse erforderlichen Materials	268
129. Quantitativ-chemische Untersuchungen über das Verhalten der Fette und Kohlehydrate beim pflanzlichen Stoffwechsel	269

IV. Die Nebenproducte des pflanzlichen Stoffwechsels.

130. Die organischen Säuren der Pflanzen	271
131. Das Verhalten der freien organischen Säuren im Organismus der Crassulaceen und einiger anderer Pflanzen	273
132. Die Gummiarten und die Pflanzenschleime	278
133. Die Gerbsäuren	278
134. Die ätherischen Oele und Harze	282
135. Die Farbstoffe	284
136. Der mikrochemische Nachweis von Alkaloiden und einiger anderer Stoffe in den Pflanzen	285
137. Die Nebenproducte des pflanzlichen Stoffwechsels als Schutzmittel der Pflanzen	287

V. Die Translocation plastischer Stoffe in den Pflanzen.

138. Experimente mit keimenden Pollenkörnern	289
139. Experimente mit Blättern	289
140. Experimente mit Zweigen	291
141. Die Ringelungsversuche	293
142. Die Stärke- und Zuckerscheide und ihre Functionen bei der Stoffwanderung	296
143. Die Siebröhren und ihre Function bei der Stoffwanderung	297
144. Der Milchsaft	299
145. Die Stoffaccumulation	301

Zweiter Theil.

Physiologie des Wachsthum und der Reizbewegungen.

Vierter Abschnitt.

Die Zuwachsbewegungen der Pflanzen.

I. Die Eigenschaften wachsender Pflanzentheile und die auf inneren Ursachen beruhenden Wachsthumswegungen.

	Seite
146. Die Dehnbarkeit und Elasticität wachsender Pflanzentheile	302
147. Relationen zwischen der Grösse der Turgorausdehnung, dem Wachsthum und der Dehnbarkeit der Pflanzentheile	303
148. Die Contraction der Wurzeln	305
149. Die Längsspannung	307
150. Die Querspannung	309
151. Die Vegetationspunkte und das Längenwachsthum der Pflanzentheile	310
152. Das Dickenwachsthum	313
153. Apparate zur Messung der Zuwachsbewegungen	314
154. Die grosse Wachsthumperiode	319
155. Die Wachsthumsgeschwindigkeit und Wachsthumsenergie	323
156. Die Torsionen	324
157. Einige spontane Nutationserscheinungen	325

II. Die nothwendigen Wachsthumbedingungen und die Beeinflussung der Zuwachsbewegung durch äussere Verhältnisse.

158. Das Stoffbedürfniss wachsender Pflanzentheile	327
159. Der Wassergehalt der Pflanzen und das Wachsthum	328
160. Die Athmung und das Wachsthum	329
161. Die Beeinflussung des Wachsthum durch Druck und Dehnung	330
162. Die Beeinflussung des Wachsthum durch die Temperaturverhältnisse	332
163. Die Jahresperiode der Pflanzen	334
164. Das Wachsthum der Pflanzentheile in constanter Finsterniss	337
165. Die Ursachen der Etiolirungserscheinungen	340
166. Der Einfluss des Lichts auf das Wachsthum	343
167. Der Einfluss der Beleuchtungsverhältnisse auf die Keimung der Kartoffelknollen	345

Fünfter Abschnitt.

Die Reizbewegungen der Pflanzen.

I. Die Reizbewegungen protoplasmatischer Gebilde.

168. Die Bewegungserscheinungen des Protoplasmas	347
169. Die freien Ortsbewegungen niederer Organismen (Schwärmerbewegungen etc.)	352
170. Die Bewegungen der Chlorophyllkörper	359
171. Die Bewegung der Plasmodien von Aethalium septicum	360

II. Die geotropischen, heliotropischen und hydrotropischen Nutationen und einige andere Reizerscheinungen.

172. Das geotropische Verhalten der Wurzeln	363
173. Das geotropische Verhalten der Sprosse	367
174. Die Ursachen der geotropischen Krümmungen	371
175. Die Function der Wurzelspitze bei dem Zustandekommen geotropischer Krümmungen	376
176. Experimente mit dem Klinostaten	377
177. Experimente mit dem Centrifugalapparat	384
178. Die heliotropischen Nutationen	388

	Seite
179. Weitere Orientirung über den Heliotropismus	391
180. Der Hydrotropismus der Wurzeln	395
181. Der Hydrotropismus von <i>Mucor Mucedo</i>	396
182. Der Thermotropismus der Pflanzen	397
183. Aëotropismus und Chemotropismus der Pollen- und Pilzschläuche	398
184. Die durch den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse und durch Temperaturschwankungen inducirten Bewegungen der Laubblätter und Blüthentheile. (Nyctitropische Bewegungen)	399
185. Die DARWIN'sche Krümmung etc.	403

III. Das Winden der Ranken und Schlingpflanzen.

186. Allgemeines über das Winden der Schlingpflanzen	404
187. Die rotirende Nutation	405
188. Die freien Windungen	408
189. Die Mechanik des Windens der Schlingpflanzen	409
190. Experimente über das Ranken der Cucurbitaceen	412
191. Experimente mit Ampelideenranken	416

IV. Die Dorsiventralität, Polarität und Anisotropie der Pflanzenorgane und die Correlationserscheinungen im Pflanzenreich.

192. Die Dorsiventralität der Pflanzentheile	418
193. Die Polarität der Pflanzentheile	419
194. Die Anisotropie der Pflanzenorgane	422
195. Allgemeines über die Festigung der Pflanzenorgane	430
196. Die Anordnung des mechanischen Gewebes in biegungs-, zug- und druckfesten Pflanzentheilen	434
197. Die Correlationserscheinungen im Pflanzenreich	436

V. Die Variationsbewegungen der Pflanzen.

198. Experimente mit <i>Acacia lophanta</i>	438
199. Experimente mit <i>Phaseolus multiflorus</i>	439
200. Experimente mit dem Hebel dynamometer	442
201. Experimente mit <i>Mimosa pudica</i> und anderen Pflanzen	444
202. Die durch Erschütterung oder Berührung hervorgerufenen Variationsbewegungen von <i>Mimosa pudica</i>	445
203. Beobachtung weiterer durch Erschütterung und Berührung hervorgerufener Variationsbewegungen	447
204. Die spontanen Variationsbewegungen	448
205. Der Einfluss äusserer Verhältnisse auf einige Variationsbewegungen	449
Nachtrag	450

Bezugsquellen für Apparate, Utensilien, Pflanzenmaterial etc.

(Nur die wichtigsten Apparate und Utensilien finden hier Erwähnung.)

Samen- und Pflanzenmaterial liefern HAAGE und SCHMIDT in Erfurt. Durch einen hohen Grad der Keimfähigkeit ausgezeichnet sind auch die Samen, welche Hofgärtner MAURER in Jena liefert.

Rassenreine, stärkefreie, abgepresste Bier- und Brennereihefen, denen höchstens etwas Eiweissgerinnung beigemischt ist, bezieht man im Preise von 5 Mk. p. kg. aus der Versuchs- und Lehrbrauerei zu Berlin, See- und Torfstr.-Ecke. Nach meiner Erfahrung versetzt zumal die von dort bezogene Brennereihefe PASTEUR'sche Nährlösung bei ca. 20° C. in sehr lebhaftes Gähren. Hefereinculturen in Reagensglas werden von der genannten Versuchsbrauerei für 10 Mk. abgegeben. In vielen Fällen genügt es, die Hefe, welche man benutzen will, selbst zu reinigen. Unterhefe aus einer Brauerei wird in destillirtem und durch Kochen sterilisirtem Wasser vertheilt. Haben sich die in der Flüssigkeit schwimmenden gröberen Theile abgesetzt, so giesst man die Flüssigkeit, in der die Hefezellen suspendirt sind, ab und stellt sie an einen kühlen Ort. Hat sich die Hauptmasse der Hefe abgesetzt, so giesst man die trübe Flüssigkeit ab, vertheilt den Bodensatz abermals in Wasser und decantirt in angegebener Weise noch etwa 4mal. Die gereinigte Hefe wird nun nochmals in Wasser vertheilt, man lässt etwas absetzen und entnimmt der Hefe enthaltenden Flüssigkeit mit Hilfe einer Pipette ein bestimmtes Volumen. An Stelle des zuletzt benutzten Wassers kann man auch unter Umständen eine gewisse Menge der Nährlösung verwenden (PASTEUR'sche Nährlösung, Bierwürze etc.), die zu den Hefeculturen dienen soll. Kommt es darauf an, verschiedenen Nährlösungsportionen sehr genau die nämliche Hefemenge hinzuzufügen, so thut man gut, die dem Wasser oder der Nährlösung, welche mit der gereinigten Hefe versetzt worden ist, entnommene Flüssigkeitsmenge nochmals in Wasser oder Nährlösung einzutragen, und erst von dieser Flüssigkeit unter fortwährendem Umschütteln mittelst einer Pipette ein bestimmtes Volumen zum Gebrauch abzuheben. In vielen Fällen ist erforderlich, Wasser und Nährstofflösung, in denen man die Hefe bei der Reinigung vertheilt, vor dem Gebrauch in einem mit Watteverschluss versehenen Kölbchen durch Kochen zu sterilisiren.

Chemikalien aller Art sind zu beziehen aus der chemischen Fabrik von MERCK (Darmstadt).

Farbstoffe für Mikroskopie liefert Dr. G. GRÜBLER in Leipzig, Bayrische Strasse.

Glycerin-Gelatine von KAISER zur Herstellung von Dauerpräparaten ist ebenfalls von Dr. GRÜBLER zu beziehen.

Desgleichen chinesische Tusche (verflüssigt) nebst feinem Pinsel zum Auftragen von Marken auf Pflanzentheile.

Filtrirpapier, gewöhnliches und schwedisches, liefert Dr. H. GEISSLER Nachfolger F. MÜLLER in Bonn.

Gewöhnliche Körke, Kautschukstopfen, Kautschukschläuche etc. sind zu beziehen aus der Gummifabrik von WALLACH in Cassel. Die Kautschukwaaren bewahrt man in einem grossen, verschlossenen Glaszylinder auf, in welchem noch ein kleines, bis zur Hälfte mit Terpentinöl angefülltes Glas Platz findet. So conservirte Kautschukwaaren werden nicht spröde und brüchig. Hart gewordene Kautschukwaaren kann man wieder gebrauchsfähig machen, wenn man sie einige Zeit lang der Einwirkung von Chloroformdampf aussetzt. Zu dem Zweck gelangen sie nebst einem bis zur Hälfte mit Chloroform angefüllten Gläschen in einen verschliessbaren Glaszylinder.

Kautschukkörke und Schläuche aus Paragummi von besonders guter Qualität, die auch bei langem Liegen an der Luft kaum hart werden, liefern BENDER & HOBEIN, München, Gabelsberger-Str. 76 a.

Platintiegel etc. liefert HERÄUS in Hanau.

Horn- und Porzellengeräthschaften aller Art liefert EPHRAIM GREINER in Stützerbach (Thüringen).

Glaswaaren aller Art (Röhren, Bechergläser, Trichter etc.) liefern ALT EBERHARDT und JÄGER in Ilmenau (Thüringen) und EPHRAIM GREINER in Stützerbach (Thüringen).

Büretten, Pipetten, Waschflaschen, Gasentwickelungsapparate etc. sind zu beziehen von Dr. R. MUENCKE, Berlin NW, Luisenstrasse 58.

Excelsiormühlen zum Zermahlen von Samen, Rinden etc. sind zu beziehen von GRUBON in Magdeburg-Buckau oder von WENDEROTH in Cassel.

Saftpresen und Presatücher liefern G. WENDEROTH in Cassel und GEISSLER Nachf. F. MÜLLER in Bonn.

Heberbarometer von besonders guter Qualität liefert GEISSLER Nachf. F. MÜLLER in Bonn. Das Instrument ist zweckmässig an einem Stativ zu befestigen, welches es ermöglicht, das Barometer, wenn es nicht gebraucht wird, in geneigte Stellung zu bringen. Das Glas bleibt dann da, wo die Ablesungen erfolgen, immer sauber.

Gefässbarometer in besonders guter Qualität mit Stativ und Thermometer liefert für den Preis von 32 Mk. W. HAAK, Glasbläser in Jena.

Stative aller Art sind zu beziehen von DESAGA in Heidelberg. Stative mit Porzellanplatte, besonders geeignet zum Einsenken in Wasser, liefert BÜHLER in Tübingen.

Apparate zur Stickstoffbestimmung nach KJELDAHL liefert ALT EBERHARDT und JÄGER in Ilmenau (Thüringen).

Ein Fernrohr (Kathetometer) für Ablesung bei gasanalytischen Arbeiten ist im Preis von 80—100 M. von MUENCKE in Berlin zu beziehen.

Schlitteninductionsapparate und unpolarisierbare Elektroden etc. sind zu beziehen von R. ROTHE, Universitätsmechaniker in Prag.

Chromsäureelemente und Tauchbatterien liefert Dr. MUENCKE in Berlin (s. Preisverzeichniss von 1894)

Spiegelgalvanometer sind zu beziehen aus den mechanischen Werkstätten von Dr. Th. EDELMANN in München und H. MEYER in Zürich. Die letztere Firma liefert etwas billigere, aber doch sehr empfindliche Apparate. Besonders empfehlenswerth sind auch die Spiegelgalvanometer nach HERMANN aus der mechanischen Werkstätte von PLATH in Potsdam. Das Instrument, mit 2 Rollen von zusammen 30 000 Drahtwindungen, 2 Thermorollen von je 100 Windungen, vorzüglicher Dämpfung, Fernrohr und Scala ausgestattet, kostet 485 Mk.

Spectralapparate verschiedener Art sind zu beziehen von GEISSLER Nachf. F. MÜLLER in Bonn. Ein grosses Spectroskop nach HOFMANN mit Vergleichsprisma und Messvorrichtung kostet 240 Mk. Auch A. KRÜSS in Hamburg liefert sehr gute Instrumente. Sehr empfehlenswerthe Taschenspectroskope mit Scala sind im Preis von 60 Mk. zu beziehen von SCHMIDT & HAENSCH in Berlin, Stallschreiberstrasse 4.

Luftpumpen, Wasserstrahlpumpen, Wasserstrahlgebläse sind zu beziehen von Dr. MUENCKE in Berlin. Besonders empfehlenswerth ist die ARZBERGER'sche Wasserstrahlpumpe, mit Hülfe welcher eine sehr vollständige Evacuierung zu erzielen ist. Der Apparat wird im Preis von etwa 30 Mk. von C. GERHARDT in Bonn geliefert. Auch ist derselbe von Dr. MUENCKE in Berlin und in vorzüglichster Qualität von PAUL BÖHME in Brunn zu beziehen. Ferner empfehle ich sehr nachdrücklich die Wasserstrahlpumpe vom Glasbläser HILDEBRAND in Erlangen. Der kleine Apparat (Preis 2 Mk.) wird mit Hülfe eines sehr dickwandigen Kautschukschlauches oder eines Hanfschlauches an den Ausflusshahn der Wasserleitung befestigt. Die zu erreichende Evacuation ist eine sehr vollkommene, natürlich bis auf die Tension des Wasserdampfes.

Waagen für analytische Arbeiten mit einer Tragkraft von 100—200 g und einer Empfindlichkeit von $\frac{1}{10}$ mg sind zu beziehen von G. KERN in Ebingen (Württemberg) und P. BUNOE in Hamburg (Eilbeck). Preis: 200—300 Mk.

Oberschalige Waagen, verhältnissmässig empfindlich, mit Tragkraft von 1—10 kg liefert Dr. MUENCKE in Berlin. Preis: 18—28 Mk. Für viele Transpirationsversuche eignen sich besonders die sogen. oberhalbigen Pflanzenwaagen (Belastung bis zu 2 kg, Empfindlichkeit 0,1 g), welche G. KERN & Sohn in Ebingen (Württemberg) im Preise von 140 Mk. liefern. Die nämliche Firma liefert auch für den Preis von 28 Mk. eine WESTPHAL'sche Waage zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten.

Kleine Wassermotoren, direct an den Ausflusshahn der Wasserleitung mittelst eines Hanfschlauches anzubringen und besonders geeignet, um z. B. Centrifugalapparate in Bewegung zu setzen, sind zu beziehen von F. A. HERBERTZ in Köln.

Thermometer werden geliefert von GREINER & FRIEDRICH in Stützerbach, EPHRAIM GREINER in Stützerbach, KIRCHLER in Ilmenau, HAAK, Glasbläser in Jena, GEISSLER Nachf. F. MÜLLER in Bonn. Für genaue Untersuchungen ist es erforderlich, die Thermometer prüfen zu lassen. Diese Prüfungen werden in der physikalisch-technischen Reichsanstalt zu Charlottenburg bei Berlin ausgeführt. Die Prüfung eines Normalthermometers von HAAK in Jena, welche auf meinen Wunsch im physikalischen Institut zu Jena ausgeführt wurde, ergab z. B. folgende Werthe. Bei 0°C . $-0,10^{\circ}$, bei $10^{\circ} \pm 0,00^{\circ}$, bei $20^{\circ} + 0,05^{\circ}$, bei $30^{\circ} + 0,05^{\circ}$, bei $40^{\circ} \pm 0,00^{\circ}$, bei $50^{\circ} + 0,05^{\circ}$. Die negativen Vorzeichen einer Correctur bedeuten, dass die betreffende Grösse von der unmittelbar beobachteten abzuziehen ist. Die angegebenen Correcturen gelten unter der Voraussetzung, dass der Quecksilberfaden sich seiner ganzen Länge nach in der zu messenden Temperatur befindet. Wenn ein Theil des Fadens aus dem Raume, dessen Temperatur gemessen werden soll, herausragt, so tritt zu der abgelesenen und nach den vorstehenden Fehlerangaben berichtigten Temperatur eine Correction hinzu, die aus der folgenden Formel berechnet wird:

$$\frac{n(t-t')}{6500}$$

worin n die in Graden ausgedrückte Länge des herausragenden Theiles des Quecksilberfadens, t die zu messende Temperatur und t' die mittlere Temperatur des herausragenden Fadens bedeuten. Es genügt in den meisten Fällen, für t' die Temperatur des Arbeitsraumes einzusetzen. Ist diese Temperatur niedriger als die zu messende Temperatur, so ist der gefundene Werth der Temperatur, welche das Thermometer anzeigt, hinzuzuzaddiren.

Apparate zum Abdampfen, Destilliren von Wasser und Heizen der Trockenschränke liefert in jeder gewünschten Grösse Dr. MUENCKE in Berlin.

Dampfsterilisirungsapparate zum Sterilisiren im strömenden Wasserdampf nach KOCH, ganz aus Kupfer gefertigt von 1 m Höhe, sind für 60—80 Mk. zu beziehen von H. ROHRBECK, Berlin NW, Karlstrasse 24. Vergl. Preisverzeichniss von 1891—92, S. 21. Näheres über Construction und Benutzung des Apparates vergl. man im erwähnten Catalog.

Mikroskope vorzüglicher Qualität sind zu beziehen von C. ZEISS in Jena und von W. & II. SEIBERT in Wetzlar. Ein für die gewöhnlichen Zwecke vollkommen ausreichendes ist z. B. das von ZEISS, Stativ Nr. VIIa mit den Ocularen 2, 4 u. 5 und den Objectiven B. u. D. Preis 153 Mk. Vergrösserung 95—580-fach. Zeichenprismen 20—30 Mk., den neuen Zeichenapparat von ABBE, bei dessen Benutzung man auf horizontaler Fläche zeichnet, für 60 Mk., Objectivmikrometer 10 Mk.; Objectträger und Deckgläser kann man ebenfalls von ZEISS in Jena beziehen.

Ein für pflanzenphysiologische Untersuchungen sehr empfehlenswerther Centrifugalapparat ist nach meinen Angaben vom Mechaniker des physikalischen Instituts zu Jena G. TEGMEYER construirt worden. Der Apparat ist für den Preis von 60 Mk. von dem genannten Mechaniker zu beziehen (vergl. Fig. 155). G. TEGMEYER liefert auch meinen Apparat zur Bestimmung der Dehnbarkeit, Elasticität und Festigkeit von Pflanzentheilen, Preis 35 Mk. (vergl. Fig. 179), ebenso die von mir construirten und in Fig. 49 sowie 146 abgebildeten Apparate.

Von E. ALBRECHT, Universitätsmechaniker in Tübingen können die folgenden Apparate bezogen werden.

Grosser Klinostat nach PFEFFER, Preis 320 Mk.

Kleiner Klinostat, Preis 220 Mk.

Auxanometer nach PFEFFER, Preis 320 Mk.

Zeiger am Bogen nach SACHS, Preis 60 Mk.

Apparat zum Registriren des Saftausflusses nach BARANETZKY, Preis 100 Mk.

Horizontales Messmikroskop, Preis 125 Mk.

Hebeldynamometer, Preis 15 Mk.

Gaskammer, nach dem Princip der ENGELMANN'schen, Preis 15 Mk.

Zweispiegeliger Heliostat nach REUSCH, Preis 335 Mk.

WORTMANN's Klinostat ist mit allem Zubehör im Preis von 200 Mk. zu beziehen aus der technischen Anstalt der Gebrüder UNGERER in Strassburg.

Das Azotometer ist im Preis von ca. 30 Mk. von EHRHARDT & METZGER in Darmstadt zu beziehen.

Thermostaten, Thermoregulatoren, Gasdruckregulatoren, Gasbrenner liefert Dr. H. ROHRBECK in Berlin, Karlstrasse 24. Besonders empfehlenswerth sind die im Preisverzeichniss von 1891—92 unter 114 und 129 aufgeführten Thermostaten. Preis je nach Grösse 50—200 Mk. resp. 20—30 Mk. Als Thermoregulator empfehle ich z. B. den unter 149 aufgeführten. Preis gefüllt und geprüft 19 Mk. Recht empfehlenswerth sind auch die Thermoregulatoren (mit Quecksilber und Amylalkohol gefüllt) vom Glasbläser HAAK in Jena. Preis 8—10 Mk.

Ich mache hier auch aufmerksam auf das neue Preisverzeichniss (1895) der Firma ZEISS in Jena, besonders auf folgende in demselben angegebenen Apparate: Mikroskope verschiedener Constructionen, Mikrospectralobjectiv nach ENGELMANN, S. 67, Ocularmikrometer, S. 72, Zeichenapparat nach ABBE, S. 82, Polarisationsrichtungen für Mikroskope, S. 85, Mikrospectroskop, S. 88, Heizvorrichtung zur Erwärmung mikroskopischer Objecte während der Beobachtung nach PFEIFFER, S. 93.

Millimeterpapier (durchscheinendes Pause-Skizzirpapier) ist zu beziehen von SCHLEICHER und SCHÜLL in Düren, Rheinpreussen; Preis von 25 Bogen 12 Mk.

Polarplanimeter liefert im Preise von 45 Mk. nebst Gebrauchsanweisung J. KERN in Aarau, Schweiz.

Eine Art Klebwachs, Plastilin genannt, welches in manchen Fällen gute Dienste leistet, wenn es sich z. B. darum handelt, Pflanzentheile in Glasröhren luftdicht einzukitten, ist zu beziehen von PIENING & SODEN in Hamburg, Breitestrasse.

Sämmtliche Apparate, welche in diesem Buch Erwähnung finden, können bezogen werden aus der mechanischen Werkstätte von DESAGA in Heidelberg. Diese Firma hat es sich zur besonderen Aufgabe gestellt, die Apparate selbst herzustellen oder doch zu beschaffen.

Erster Theil.

Physiologie der Ernährung.

Erster Abschnitt.

Die Nährstoffe der Pflanzen.

I. Der Assimilationsprocess.

1. Constatirung der Thatsache, dass grüne Pflanzen organische Substanz aus anorganischem Material zu erzeugen vermögen.

Die Thatsache, dass grüne Pflanzen organische, d. h. kohlenstoffhaltige, verbrennliche Substanz aus anorganischem Material zu erzeugen vermögen, ist von so fundamentaler Bedeutung, und die zur Feststellung dieser Thatsache anzustellenden Experimente sind so lehrreich, dass denselben eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. Die Versuche können fast zu jeder Jahreszeit angestellt werden; sie liefern freilich im Sommer der dann herrschenden günstigen Vegetationsbedingungen wegen die weitaus besten Resultate, und wenn es sich um Experimente handelt, bei denen die Pflanzen zu völliger Entwicklung und Samenreife gebracht werden sollen, so ist dies natürlich im Winter nicht möglich. Als Untersuchungsobjecte verwendet man zweckmässig den Mais, den Weizen, den Hafer, den Buchweizen oder die Bohne.

Es kommt zunächst darauf an, das Trockengewicht der zum Versuch dienenden ruhenden Früchte resp. Samen zu ermitteln, um den Gehalt derselben an organischer Substanz beurtheilen zu können. Einige Früchte, resp. Samen werden auf einer kleinen Handmühle zu einem feinen Pulver zermahlen, und es dient dann eine kleine Quantität dieses Pulvers, deren Gewicht aber genau festgestellt werden muss, zur Bestimmung des Trockensubstanzgehaltes des ursprünglich lufttrockenen Materials. Etwa 3 g des Pulvers werden in ein geeignetes Gläschen (Wägegläschen) gebracht und im Trockenschrank bei 100° C. vom Wasser befreit. Als Resultat dieser Untersuchungen ergibt sich, dass die lufttrockenen Früchte oder Samen etwa 85% Trockensubstanz enthalten. Freilich besteht nun diese letztere nicht ihrer Gesamtmasse nach aus organischen Stoffen, sondern es sind neben diesen noch Mineralbestandtheile vorhanden, aber die Quantität

derselben ist verhältnissmässig so gering, dass wir sie hier unberücksichtigt lassen dürfen.

Für die Culturversuche, welche angestellt werden sollen, wählen wir einige möglichst vollkommen ausgebildete Früchte oder Samen aus. Jedes Untersuchungsobject wird einzeln gewogen und das Gewicht notirt. Es lässt sich nun unter Berücksichtigung des Resultates der ausgeführten Trockensubstanzbestimmung das Trockengewicht jeder einzelnen Frucht oder jedes einzelnen Samen berechnen. Die Untersuchungsobjecte werden jetzt einzeln in kleine Glas- oder Porzellanschälchen gelegt, mit Wasser übergossen und 12—24 Stunden lang mit diesem zum Aufquellen in Berührung belassen. Darauf bringt man die Früchte oder Samen in feuchten Sägespänen, die sich in einem geeigneten Kasten oder Blumentopf befinden, zum Keimen. Es sei hier ein für alle Mal bemerkt, dass die gut durchfeuchteten Sägespäne zwischen den Händen gerieben und zu einem möglichst lockeren Keimlager in den Gefässen angehäuft werden müssen. Die Phaseolussamen legt man horizontal in das Keimbett, so dass die ausgetretene Wurzel einen rechten Winkel mit der Längsachse der Samen bildet. Maiskörner werden so gelegt, dass die austretende Wurzel, ohne Krümmungen auszuführen, gerade nach abwärts wachsen kann. Ebenso legt man z. B. auch Samen von *Vicia Faba* mit nach abwärts gewandter Mikropyle in die Sägespäne. Wenn die Keimwurzeln die Länge von mehreren Centimetern erreicht haben, so werden die Keimpflanzen vorsichtig aus den Sägespänen herausgenommen, sorgfältig abgewaschen und mit Hülfe der Methode der Wassercultur zu weiterer Entwicklung gebracht.

Wir bedürfen dazu zunächst geeigneter Glasylinder, die, wenn wir z. B. mit Maispflanzen experimentiren, so gross sein müssen, dass sie etwa 2 Liter Flüssigkeit fassen. Für kleinere Pflanzen genügen auch kleinere Gefässe. Die Glasylinder werden, um dem Mineralstoffbedürfniss der Pflanzen, auf das wir an anderer Stelle eingehend zurückkommen werden, zu genügen, nicht mit reinem Wasser, sondern mit einer Nährstofflösung angefüllt. Dieselbe bereitet man sich zweckmässig gleich in grösserer Quantität und bewahrt sie in wohl verschlossenen Gefässen im Dunkeln auf. Eine geeignete Nährstofflösung erhält man, wenn man auf 1 Liter destillirten Wassers die folgenden Mengen der nachfolgend aufgeführten Körper benutzt ¹⁾:

- 1 g salpetersauren Kalk (Ca_2NO_3);
- 0,25 „ Chlorkalium (K Cl);
- 0,25 „ schwefelsaure Magnesia (Mg SO_4);
- 0,25 „ phosphorsaures Kali ($\text{K H}_2 \text{PO}_4$).

Der Auflösung dieser Stoffe in dem Wasser werden dann noch einige Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung hinzugesetzt.

Diese Nährstofflösung habe ich oft mit gutem Erfolg benutzt. Eine recht geeignete Nährstofflösung erhält man auch durch Eintragen der folgenden Salzmengen in 1 Liter Wasser:

- 1 g salpetersaures Kali;
- 0,5 „ Chlornatrium;
- 0,5 „ schwefelsaurer Kalk;
- 0,5 „ schwefelsaure Magnesia;
- 0,5 „ dreibasisch phosphorsaurer Kalk.

1) Es genügt durchaus, die angegebenen Salzmengen unter Benutzung einer kleinen Handwage mit Hornschalen abzuwägen.

Das Kalkphosphat wird in sehr fein pulverisirtem Zustande angewendet. Es ist in Wasser sehr schwer löslich und bildet daher in den Culturgefässen einen Bodensatz. Dieser Nährstofflösung sind endlich

noch einige Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung hinzuzusetzen.

Sind die Glaszylinder mit der Nährstofflösung gefüllt, und hat man passende, mit einer grossen Bohrung versehene Korke zum Verschluss der Culturgefässe ausgewählt, so werden die Keimpflanzen mit Hülfe von Watte in den Bohrungen der Korke befestigt. (Vgl. Fig. 1.) Jede Pflanze erhält einen besonderen Cylinder. Die Wurzeln der Untersuchungsobjecte müssen in die Nährstofflösung hineinragen; die noch vorhandenen Reservestoffbehälter (Endosperm oder Cotyledonen) dürfen freilich nicht in dieselbe eintauchen, müssen aber vor dem Austrocknen geschützt sein. Die Culturgefässe werden, nachdem sie mit den Pflanzen beschickt worden sind, an ein Fenster gestellt, wo die letzteren directes Sonnenlicht empfangen. Die Glaszylinder beklebt man übrigens mit schwarzem Glanzpapier, damit die Entwicklung von Algen in der Nährstofflösung und auf den Wurzeln der Gewächse ausgeschlossen bleibe. Die weisse Fläche des Glanzpapiers muss nach aussen gekehrt sein, damit die Flüssigkeit in den Culturgefässen keine zu hohe

Temperatur annimmt. Einfacher ist es noch, um das Licht von den Wurzeln fern zu halten, jedes Culturgefäss in einen Hohlcylinder von

Fig. 1. Maispflanze, die mit Hülfe der Methode der Wassercultur zur Entwicklung gebracht worden ist.

Pappdeckel zu stellen. Während der Vegetation der Untersuchungsobjecte ist selbstverständlich oft für einen genügenden Ersatz des aus den Nährstofflösungen aufgenommenen Wassers durch Zugabe von destillirtem Wasser zu sorgen.

Die Vorsichtsmaassregeln, welche berücksichtigt werden müssen, wenn es sich darum handelt, Pflanzen mit Hülfe der Methode der Wassercultur zu weit fortgeschrittener Entwicklung zu bringen, sollen weiter unten in diesem Abschnitt Erwähnung finden. Zunächst kommt es nur darauf an, den Nachweis zu führen, dass grüne Pflanzen überhaupt organische Substanz zu erzeugen vermögen, und es genügt daher vollkommen, wenn sie einige Wochen lang vegetiren und kräftige Stengel, Blätter, sowie Wurzeln producirt haben. Wir nehmen die Pflanzen dann aus den Nährstofflösungen heraus, führen sie durch Liegenlassen an der Luft möglichst schnell in den lufttrockenen Zustand über, zerschneiden jede Pflanze für sich mit der Scheere in möglichst kleine Stücke und benutzen entweder die ganze Masse eines Individuums oder einen abgewogenen Theil der lufttrockenen Substanz zur Trockensubstanzbestimmung.

Vergleicht man das Trockengewicht einer Pflanze mit demjenigen des Samens, so findet man, dass das erstere das Vielfache des letzteren beträgt. Da der Aschengehalt der geernteten Pflanzen, ebenso wie derjenige der Samen, relativ sehr gering ist, so folgt, dass eine grosse Menge organischer Substanz von unseren Untersuchungsobjecten erzeugt sein muss. Wir haben unseren Pflanzen aber keine organischen Stoffe, sondern nur Wasser, einige Salze und die Bestandtheile der Luft zur Verfügung gestellt, und es beweisen unsere Culturen demnach, dass die benutzten Untersuchungsobjecte im Stande sein müssen, aus rein anorganischem Material organische Körper zu produciren.

Handelt es sich darum, Wasserculturversuche in grösserer Ausdehnung anzustellen und die Untersuchungsobjecte (Hafer, Mais, Buchweizen etc.) zu völliger Entwicklung und Fruchtreife zu bringen, so erfordern die Culturen natürlich eine weit grössere Aufmerksamkeit als dann, wenn nur der Nachweis geliefert werden soll, dass grüne Pflanzen überhaupt organische Substanz zu erzeugen vermögen.

1) Die Samen oder Früchte werden 12, resp. 24 Stunden lang in destillirtem Wasser angequollen und dann in gut gewaschenen und locker in Blumentöpfe eingefüllten Sägespänen zur Keimung gebracht. (Näheres ist bereits oben gesagt worden.) Unter Umständen, zumal bei genauen Untersuchungen über das Mineralstoffbedürfniss der Gewächse, empfiehlt es sich, die Samen oder Früchte nach dem Anquellen zwischen schwedischem Fliesspapier anzukeimen. Man bringt die Samen in horizontaler oder verticaler Lage, nachdem sie gequollen sind, zwischen vielfach zusammengefaltetes Fliesspapier und stellt dasselbe dann senkrecht derartig auf, dass es mit seinem unteren Ende in destillirtes Wasser eintaucht, welches den Boden eines weithalsigen Glasgefässes bedeckt. Die Vorrichtung wird endlich unter eine Glasglocke gebracht, deren Tubulus lose mit Watte verstopft ist.

2) Haben die Wurzeln der Keimlinge die Länge von einigen Centimetern erreicht, so gelangen sie in die mit den Nährstofflösungen angefüllten Culturgefässe, die je nach Umständen 1—4 Liter Flüssigkeit fassen. Die Culturcylinder können mittelst eines mit drei Oeffnungen versehenen Deckels aus lackirtem Zinkblech oder besser aus Porzellan

verschlossen werden. Die mittlere Oeffnung dient zur Aufnahme eines halbirten und durchbohrten Korkes. In dieser Bohrung werden die Keimlinge in bereits oben angegebener Weise mit Hülfe von Watte befestigt. Man kann die Keimlinge aber auch direct ohne Kork in die ca. 3 cm weite Oeffnung des Deckels einführen. Die zweite Oeffnung des Deckels ist mit einem durchbohrten Kork verschlossen, und in die Bohrung das untere Ende eines dünnen Holzstabes fest eingeschoben, der den sich entwickelnden Pflanzen als Stütze dienen kann. Die dritte Oeffnung des Deckels wird mit einem nicht durchbohrten Kork verschlossen.

3) Die Verdunkelung der Wurzeln in den Culturegefäßen erzielt man leicht durch Einsetzen derselben in geeignete, aus Pappe gefertigte Cylinder oder durch Umwickeln der Cylinder mit mehreren Lagen Flanell. Zu achten ist darauf, dass die Nährlösung an heißen, sonnigen Sommertagen keine zu hohe Temperatur annimmt.

4) Die Culturegefäße sind am Fenster eines nach Süden gelegenen Zimmers aufzustellen. Sehr förderlich für die Entwicklung der Pflanzen ist es, wenn man die Culturegefäße so oft wie möglich ins Freie vor das Fenster stellt. Führt man jährlich ausgedehnte Untersuchungen mit Hülfe der Methode der Wassercultur durch, so ist es sehr zu empfehlen, ein besonderes aus Glas und Eisen construirtes Gewächshaus erbauen zu lassen, welches derartig construiert ist, dass die in Rollwagen stehenden Culturegefäße so oft wie möglich leicht ins Freie gebracht werden können ¹⁾ ²⁾.

5) Selbstverständlich ist oft für genügenden Ersatz des aus der Nährlösung verdunsteten Wassers zu sorgen. Haben die Pflanzen ein kräftiges Wurzelsystem gebildet, so empfiehlt es sich, die Untersuchungsobjecte etwa jede Woche für 1—2 Tage aus den Nährstofflösungen herauszunehmen und in destillirtes Wasser einzusetzen.

6) Sorgfältig ist darauf zu achten, dass die Nährlösung stets schwach sauer reagire. Alkalische Reaction der Nährlösung ist höchst gefährlich und kann, wenn sie eingetreten ist, durch Zusatz von wenig Phosphorsäure beseitigt werden.

7) Um den Wurzeln in der Nährlösung stets genügenden Sauerstoff darzubieten und um der bei Sauerstoffmangel eventuell eintretenden Bildung von Schwefeleisen vorzubeugen, empfiehlt es sich, täglich ein- oder gar zweimal einen Luftstrom durch die Nährlösung zu leiten. Es geschieht dies in einfachster Weise unter Benutzung eines Gasometers. Das bis auf den Boden des Culturegefäßes reichende, die Luft zuführende Glasrohr wird durch die dritte Oeffnung des bereits unter 2) erwähnten Deckels der Culturegefäße eingeführt ³⁾.

8) Eine sehr häufige Erneuerung der Nährstofflösung ist gar nicht erforderlich, ja nicht einmal vortheilhaft, wie die Erfahrung vielfach gezeigt hat. In der Regel genügt es, wenn man mit Culturegefäßen von

1) Ueber Vegetationshäuser geeigneter Art vergl. WOLFF, Versuchsstationen, Bd. 8, S. 485, und NOBBE, ebendasselbst Bd. 12, S. 477.

2) Es empfiehlt sich sehr, den für die Pflanzen bestimmten Raum ausserhalb des Gewächshauses mit Drahtnetz zu umgeben, damit die Untersuchungsobjecte keine Beschädigung durch Vögel erfahren.

3) Gasometer sind zu beziehen von R. MUENCKE, Berlin, Luisenstr. 58. Sehr bequem zur Durchlüftung zu benutzen sind auch die von MUENCKE zu beziehenden Wasserstrahlgebläse, ein Apparat, der in einfachster Weise an einem Wasserleitungsabflussrohr angebracht werden kann. Vergl. MUENCKE's Preisverzeichniss, 1886; Thl. 1, S. 76.

etwa 3 Liter Inhalt arbeitet, die Lösung 2- oder 3 mal im Sommer zu erneuern. Es ist bequem, von vornherein concentrirte Lösungen der Nährsalze herzustellen und diese dann für den Gebrauch entsprechend zu verdünnen. So kann man z. B. in je 50 ccm Wasser 1 g salpetersauren Kalk, 0,25 g Chlorkalium und 0,25 g saures phosphorsaures Kali lösen; in einer zweiten Lösung auf je 50 ccm Wasser 0,25 g schwefelsaure Magnesia vorrätig halten. Der fertig hergestellten Nährlösung sind nur noch einige Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung hinzuzufügen. Zu empfehlen ist es, die Pflanzen, wenn das Stadium der Fruchtreife naht, aus der Nährlösung zu entfernen und ihnen nur destillirtes Wasser darzubieten, welches man, wenn die Untersuchungen es zulassen, ganz schwach mit Salpeter- oder Phosphorsäure ansäuert.

— 9) Zur Blüthezeit der Pflanzen muss dafür gesorgt werden, dass die Befruchtung normal stattfindet. Gewöhnlich genügt es, die Untersuchungsobjecte im Freien, z. B. vor dem Fenster oder hinter dem geöffneten Fenster, stehen zu lassen. Die Uebertragung des Pollens auf die Narbe kann dann durch Insekten vermittelt werden.

Für das Gedeihen der mit Hülfe der Methode der Wassercultur zu cultivirenden Pflanzen können, wie gesagt, zumal eine zu starke Erwärmung der Nährlösung und ferner Sauerstoffmangel in derselben sehr nachtheilig werden. WORTMANN¹⁾ hat nun ein einfaches Verfahren angegeben, um die bezeichneten Gefahren für die Pflanzen, wenn nicht völlig zu beseitigen, so doch wesentlich zu beschränken, ein Verfahren, das namentlich sehr empfehlenswerth ist, wenn es sich darum handelt, schöne Pflanzen mit Hülfe der Methode der Wassercultur für Demonstrationszwecke zu ziehen. Man cultivirt die Versuchsobjecte nämlich in sehr grossen Gefässen. Geeignete Gläser sind im Preis von 5 M. von EHRHARDT und METZGER in Darmstadt zu beziehen. Sie sind 60 cm hoch, haben 25 cm

Fig. 2. Holzdeckel eines Wasserculturgefässes.

Durchmesser und fassen $26\frac{1}{2}$ Liter Wasser. Man füllt die Glascylinder, wenn es sich nur um Demonstrationsversuche handelt, mit Brunnenwasser an, setzt die angekeimten Pflanzen (z. B. Phaseolus) ein und lässt sie zunächst etwa 6 Tage ruhig vegetiren. Dann mischt man dem Wasser so viel Nährsalz zu (dasselbe ist z. B. nach der auf S. 2 in zweiter Linie angegebenen Art bereitet), dass die Lösung eine Concentration von 1‰ besitzt. Nach 3—4 Tagen wird die Concentration auf 2‰ und nach abermals 3—4 Tagen auf 3‰ erhöht. Alle 3—4 Tage rührt man die Nährlösung gut durch. Eine Erneuerung derselben ist nicht erforderlich, nur auf Ersatz des verdunsteten Wassers achte man. Zur Verdunkelung der Wurzeln genügt es, 1—2 Lagen weissen Leinen- oder Wollstoffs um die Cylinder herumzuschlingen.

Als Deckel des Culturcylinders dient eine runde Holzplatte, deren Rand etwas über denjenigen des Gefässes hinausragt. Das Verschieben des Deckels auf dem Gefässe kann leicht vermieden werden, indem man auf der Aussenseite des Deckels (von unten her) einige Nägel eintreibt. In der Mitte hat der Deckel ein Loch von 3 cm Durchmesser, in welches

1) Vergl. WORTMANN, Botan. Zeitung, 1892.

die Pflanze in bekannter Weise eingesetzt wird. Dicht neben dieser Oeffnung befindet sich eine zweite zur Aufnahme eines nicht zu dicken Stabes, der z. B. einer cultivirten Phaseoluspflanze als Stütze dient. Von der 3 cm weiten Oeffnung läuft eine ca. 2,5 cm breite offene Rinne zur Peripherie des Deckels. Durch diese Rinne kann die Versuchspflanze leicht ein- und ausgeführt werden. Die Rinne ist mittelst des Holzstückes zu verschliessen, welches zu ihrer Herstellung aus dem Deckel herausgesägt werden musste. In Fig. 2 ist der Holzdeckel, von oben gesehen, abgebildet. Ich brachte in einem in angegebener Weise hergerichteten Gefässe, welches sogar nur etwa 5 Liter Wasser fasste, eine Phaseoluspflanze zur prächtigen Entwicklung. Eine völlige Erneuerung der Nährstofflösung fand von Beginn des Versuchs an bis zur Blüthe der Pflanze, wo sie über mannshoch war, gar nicht statt. Bei Culturen der Bohnen machte ich oft die Erfahrung, dass diese Pflanze in meinem Arbeitszimmer, wo Mais sich kräftig entwickelte, nicht zur normalen Ausbildung kam. Relativ trockene Luft und die Verbrennungsproducte des Gases scheinen auf die Vegetation der Bohne weit nachtheiliger einzuwirken, als z. B. auf diejenige des Mais; die erstere Pflanze ist daher, wenn kein Vegetationshaus zur Verfügung steht, stets vor dem Fenster im Freien zu cultiviren.

Ein ausgezeichnetes Object für Wasserculturen, die zur Demonstration dienen sollen, ist auch die Weide. Ich setzte z. B. Anfang Februar 1894 ein ca. 25 cm langes und 2 cm Durchmesser besitzendes Aststück von *Salix fragilis* in den Holzdeckel des zur Cultur dienenden, 5 Liter fassenden Gefässes ein. Das Gefäss enthielt zunächst nur Brunnenwasser, in das das Aststück bis zur Hälfte seiner Länge eintauchte. Ueber den aus dem Gefässe hervorragenden Theil des Untersuchungsobjectes wurde ein Glascylinder gedeckt. Nach Verlauf von 4 Wochen begannen die Knospen zu treiben, und die Wurzeln waren schon ziemlich lang geworden. Nun wurde der Glascylinder entfernt und das Brunnenwasser im Culturegefäss durch Nährlösung (halb concentrirte) ersetzt. Nach abermals 4 Wochen gelangte Nährlösung von gewöhnlicher Concentration in das Culturegefäss. Jeden Tag fand Ersatz des verdunsteten Wassers und etwa nach je 2 Monaten Erneuerung der Lösung statt. Im Laufe des Sommers entwickelten sich ein mächtiges Wurzelsystem und sechs lange, verzweigte, stark verholzte, ganz normale Seitenäste mit zahlreichen Blättern. Die Pflanze stand im Sommer oft im Freien vor dem Fenster. Anfang September wurde die Nährlösung durch Brunnenwasser ersetzt; das Untersuchungsobject blieb im warmen Zimmer hinter einem nach Süden gelegenen Fenster stehen. Es warf seine Blätter ganz allmählich in der Zeit von Mitte October bis Ende December ab und befindet sich jetzt (10. Januar 1895) noch im Zustande der Winterruhe.

2. Die Production organischer Substanz in der grünen Pflanzenzelle unter dem Einfluss des Lichtes.

Die Production organischer Substanz in der grünen Pflanzenzelle ist an die Mitwirkung des Lichtes gebunden, ein wichtiger Lehrsatz der Pflanzenphysiologie, von dessen Richtigkeit man sich durch das Experiment überzeugen muss. Einige Maiskörner werden einzeln gewogen und ihr Trockensubstanzgehalt ermittelt. (Vergl. unter 1.) Nach dem Anquellen und Ankeimen der Körner in Sägespänen wird

jede Keimpflanze für sich in einem mit Nährstofflösung angefüllten Cylinder in der Weise, wie es unter 1 angegeben worden ist, befestigt. Einige Culturgefässe bringt man nun unter einem grossen Pappkasten ins Dunkle; die anderen werden unter übrigens gleichen Verhältnissen an einem sehr gut beleuchteten Ort dem Wechsel von Tag und Nacht ausgesetzt. Die Blätter der Dunkelpflanzen ergrünen nicht, wie diejenigen der Lichtpflanzen, sondern sie nehmen eine gelbe Farbe an, da sich das normale grüne Chlorophyllpigment nur bei Lichtzutritt in den Zellen ausbilden kann. Nach 4—5 Wochen nimmt man die Untersuchungsobjecte aus den Nährstofflösungen heraus, trocknet sie an der Luft und ermittelt das Trockensubstanzgewicht jeder Pflanze, das nun mit dem Trockengewicht des betreffenden Samenkornes zu vergleichen ist. Das Trockensubstanzgewicht der Lichtpflanzen findet man erheblich grösser als dasjenige der benutzten Maiskörner, während das Trockengewicht der Dunkelpflanzen unter Umständen, wovon ich mich überzeuete, um 50% geringer als dasjenige der Samen ausfällt. Bei Lichtabschluss kann keine organische Substanz neu gebildet werden, sondern es wird im Gegentheil ein grosser Theil der vorhandenen organischen Körper durch Stoffwechselprocesse (Athmung) zerstört. Bei Lichtzutritt erfolgt freilich ebenfalls Verathmung organischen Materials, aber die dadurch herbeigeführten Verluste werden durch den Assimilationsprocess mehr als gedeckt, so dass die im Licht vegetirenden Pflanzen fortschreitend reicher an Trockensubstanz werden können ¹⁾).

3. Die Assimilationsorgane.

Wenn wir zunächst nur diejenigen Verhältnisse berücksichtigen, die uns bei den höheren Pflanzen entgegentreten, so ist zu bemerken, dass die meisten derselben entwickelte Laubblätter tragen. Diese sind in allererster Linie als Assimilationsorgane anzusehen. Ihre Spreite bietet der kohlensäurehaltigen Luft eine grosse Fläche dar, und ihr grünes Gewebe wird durch die eigenthümliche Anordnung der Nerven in einem ausgespannten Zustande erhalten. Die Nerven führen dem Mesophyll auch die für das Leben und die Functionen der Zellen des chlorophyllreichen Parenchyms nothwendigen Wasser- sowie Mineralstoffquantitäten zu. Die Anordnung der Nerven im Blatt ist bei verschiedenen Gewächsen freilich eine ungemein mannigfaltige, und man kann sich z. B. in folgender Weise specieller über die hier in Betracht kommenden Verhältnisse orientiren. Ein Blatt von *Impatiens parviflora* wird in Alcohol gelegt, bis der Chlorophyllfarbstoff extrahirt ist. Dann bringt man das Blatt einige Zeit in eine Auflösung von 5 Thl. Chloralhydrat in 2 Thl. Wasser. Darin wird das Untersuchungsobject in hohem Grade durchsichtig, und es können Stücke desselben ohne weiteres der mikroskopischen Untersuchung unterzogen werden. Im Mesophyll fällt das Vorhandensein von gestreckten Zellen auf, die Raphidenbündel (Krystalle von Kalkoxalat) enthalten. Das Blatt wird von einem ziemlich starken Mittelnerven durchzogen, von dem aus Seitennerven erster Ordnung nach dem Blattrande zu abgehen, wo sie, im Bogen verlaufend, an die nächst höheren Seitennerven erster Ordnung ansetzen. Die Nerven erster Ordnung geben die Nerven zweiter

¹⁾ Ueber ähnliche Versuche, wie solche hier besprochen worden sind, vergl. DETMER, Versuchsstationen, Bd. 14.

Ordnung ab, diese diejenigen dritter Ordnung etc., so dass ein vielfach gegliedertes Netzwerk gebildet wird, dessen letzte, sehr feine Zweige zum Theil blind im Mesophyll endigen ¹⁾).

Zur allgemeinen Orientirung über den anatomischen Bau des Mesophylls stellen wir uns nunmehr möglichst dünne Querschnitte aus Blättern her und wählen als Untersuchungsobject z. B. die Laubblätter von *Dahlia variabilis*, *Vitis vinifera*, *Berberis vulgaris*, *Syringa vulgaris*, *Trifolium pratense*, *Ilex* oder *Fagus silvatica*. Bei mikroskopischer Untersuchung der Querschnitte fällt sofort auf, dass das grüne Mesophyll auf der Ober- und Unterseite der Blätter, der angeführten Pflanzen nicht gleichmässig gebaut ist. (Vergl. Fig. 3.) Unter der Epidermis der Blattoberseite constatiren wir das Vorhandensein schlauchförmiger, rechtwinkelig zur Blattoberfläche gestreckter Zellen, die man

Fig. 3. Querschnitt eines Theiles eines ausgewachsenen Blattes von *Trifolium pratense*. *o.s* Oberseite, *u.s* Unterseite des Blattes, *o* Epidermis, *sp* Spaltöffnung, *oca* Krystall von Kalkoxalat in der Krystallscheide des Gefässbündels, *hlx* Holztheil des Gefässbündels, *g* Gefässe, *wb* Weichbast, *bf* Bastfasern. Vergr. 300. (Nach H. DE VRIES.)

als Palissadenzellen bezeichnet, während auf der Blattunterseite das an Intercellularen reiche Schwammparenchym entwickelt ist. Freilich führen sowohl die Zellen des Palissaden-, sowie diejenigen des Schwammparenchyms Chlorophyllkörner, aber aus Gründen, die erst an anderer Stelle specieller auseinander gesetzt werden können, ist das erstere für das Zustandekommen einer recht energischen Assimilation von besonderer Bedeutung, und daher verdient das Vorhandensein desselben an der Oberseite vieler Blätter specielle Beachtung.

Zur Begründung der Anschauung, nach welcher das Palissadenparenchym als spezifisches Assimilationsgewebe angesehen werden muss, lassen sich auch Thatsachen der vergleichenden Anatomie geltend machen.

Sarothamnus vulgaris ist ein Strauch, der nur sehr kleine Blätter trägt, die für die assimilatorische Arbeit nicht ausreichend erscheinen. Die vielfach verzweigten Stammgebilde müssen hier neben den Blättern

1) Vergl. SACHS, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, 1882, S. 60.

thätig sein, um genügende Quantitäten organischer Substanz für die Pflanze zu erzeugen. Ein Stengelquerschnitt stellt sich uns als fünfstrahliger Stern dar, und wenn wir einen dünnen Querschnitt mikroskopisch untersuchen, so ergibt sich, dass unter der Epidermis der Strahlenden sklerenchymatisches Gewebe vorhanden ist, während das periphere Gewebe der Buchten zwischen den Strahlenden grün erscheint. Wir stellen fest, dass dies Gewebe in seinen äusseren Schichten aus Palissadenzellen besteht, die rechtwinkelig zur Stengeloberfläche gestreckt erscheinen, während weiter nach innen zu mehr isodiametrische chlorophyllhaltige Zellen folgen. Wir untersuchen auch noch einen dünnen Querschnitt aus dem Stengel von *Spartium junceum*. Das assimilatorisch thätige Gewebe unter der Epidermis besteht hier seiner Gesamtmasse nach aus Palissadenzellen. Es folgen etwa 6 Schichten rechtwinkelig zur Stengeloberfläche gestellter, stark gestreckter, grüner Zellen auf einander. Das grüne Gewebe bildet aber keinen geschlossenen Ring unter der Oberhaut, sondern es wechselt im Umkreise des ganzen Stengels Assimilationsgewebe mit Sklerenchym ab. Bei armlaubigen Pflanzen oder solchen Gewächsen, die gar keine grünen Blätter produciren, muss das grüne Gewebe der Stammgebilde die Arbeit der Assimilation der Hauptsache nach oder gänzlich übernehmen, und dies Gewebe besteht daher im Wesentlichen oder völlig aus Palissadenzellen.

Uebrigens ist keineswegs den Laubblättern aller Pflanzen der Besitz des Palissadenparenchyms eigenthümlich. Untersucht man z. B. Querschnitte der jungen Blätter von *Triticum vulgare*, so findet man, dass das Mesophyll, welches an der Blattober- und Unterseite von der Epidermis begrenzt und von den Gefässbündeln durchzogen wird, seiner ganzen Masse nach aus nahezu gleichgestalteten, im Querschnitt runden Zellen besteht. Blätter, bei denen es noch nicht zu einer Differenzirung von Palissaden- und Schwammparenchym gekommen ist, sind auch häufig dadurch ausgezeichnet, dass nicht das gesamte Gewebe zwischen der Epidermis der beiden Blattflächen aus chlorophyllführenden Zellen besteht. Untersuchen wir z. B. einen Blattquerschnitt von *Iris germanica*, so finden wir unter der Epidermis der Blattoberseite sowie der Blattunterseite grünes Gewebe. Ausserdem treten die Gefässbündel deutlich hervor, deren Basttheil nach aussen hin mit einem Bastfaserbeleg versehen ist, und ferner sieht man sofort, dass die Mittelschicht des Blattes aus saftreichen, nicht grünen Zellen besteht. Solche chlorophyllfreie Zellen sind auch in den Blättern von *Hyacinthus orientalis* und den succulenten Blättern der Aloë-Species reichlich vorhanden.

Es muss hier ferner auf die interessante Thatsache hingewiesen werden, dass die Blätter mit deutlich entwickeltem Schwamm- und Palissadenparenchym eben hierdurch streng dorsiventral gebaut erscheinen und zu den exquisit plagiotropen Organen gehören. Aber keineswegs sind sämmtliche Laubblätter streng dorsiventral gebaut; es giebt auch viele Dicotylen mit centrisc organisirtem Mesophyll der Blätter, die dann meist eine mehr orthotrope Entwicklung zeigen. So besitzen z. B. die Blätter von *Anchusa italica*, *Centaurea Jacea*, *Tragopogon orientalis*, *Aster Amellus*, *Genista tinctoria* etc. centrischen Bau. Bei der zuletzt genannten Pflanze besteht das Mesophyll fast nur aus senkrecht zur Blattfläche gestreckten Zellen. *Centaurea Jacea* variirt, wovon ich mich oft überzeugte, je nach ihrem Standort ungemein. Die der Sonne stark ausgesetzten Individuen erzeugen z. B. lange schmale Blätter, welche relativ dick sind. Die Blätter der Schattenpflanzen erscheinen dünner,

aber mehr in die Fläche entwickelt. Das Mesophyll der Blätter von *Centaurea Jacea*, zumal der Sonnenpflanzen, ist nicht dorsiventral, sondern centrisch gebaut. Man sieht leicht bei mikroskopischer Untersuchung zarter Querschnitte, dass auf der Ober- sowie Unterseite der Blätter Palissadenparenchym vorhanden ist ¹⁾.

Die Blattstiele sind gewöhnlich arm an chlorophyllführenden Zellen, weil sie meistens nicht als Assimilationsorgane der Gewächse functioniren, sondern für ganz andere Leistungen in Anspruch genommen werden. Die mikroskopische Untersuchung eines Querschnitts durch den Blattstiel von *Vitis vinifera* lehrt, dass nahe unter der Epidermis Gruppen von Collenchymbündeln vorhanden sind, und dass sich zwischen diesen Bündeln schwach entwickeltes grünes Parenchym sowie Zellen befinden, von denen bald viele, bald nur wenige einen rothen im Zellsaft gelösten Farbstoff führen. Die aus den erwähnten verschiedenartigen Geweben bestehende Rinde des Blattstiels umschliesst den Gefässbündelkreis und das Mark. Auch bei der Untersuchung der Blattstiele anderer Pflanzen, z. B. derjenigen von *Chenopodium bonus Henricus*, lässt sich leicht feststellen, dass sie sehr arm an grünem Gewebe sind.

Wir stellen auch noch einen Querschnitt des Blattstieles einer Begonie (ich untersuchte speciell *Begonia manicata*) her. Auf die Epidermis folgt ein Collenchymring, dann grosszelliges Grundgewebe, in welchem die Gefässbündel nicht in einem Kreise angeordnet sind. Die peripherischen Schichten des grosszelligen Grundgewebes sind freilich chlorophyllhaltig, aber die Zellen führen nur wenige, allerdings relativ grosse Chlorophyllkörner.

Die grünen Stengel der Pflanzen betheiligen sich gewöhnlich ebenso wie die Blattstiele nur in sehr beschränktem Umfange an der assimilatorischen Arbeit, und daher enthält die Hauptmasse ihres Gewebes keine Chlorophyllkörner. Stellen wir z. B. einen Querschnitt aus dem Stengel einer Mohnspecies her, so gewahren wir im Centrum das Mark. Nach aussen folgen die Gefässbündel, von denen jedes, abgesehen vom Holztheil, aus einer breiten Weichbastzone und dieser nach aussen angelagerten Bastfaserregion besteht. Die Markverbindungen zwischen den einzelnen Gefässbündeln bestehen aus grossen Zellen. Für die Rinde ist das Vorhandensein eines geschlossenen Sklerenchymcylinders besonders charakteristisch; nach aussen wird dieser von einer im Verhältniss zur Gesamtmasse des Papaverstengels schwach entwickelten Schicht grünen Gewebes umschlossen, und an dieses Chlorophyllparenchym grenzt unmittelbar die Epidermis. Wir untersuchen auch noch einen Querschnitt des Stengels von *Chenopodium bonus Henricus* und finden, dass unter der Epidermis Collenchym und grünes Parenchym mit einander abwechseln ²⁾.

4. Die Durchleuchtung der Pflanzengewebe.

Das Licht ist für den Verlauf sehr verschiedener physiologischer Processe in der Pflanze von grosser Bedeutung, und die Lichtstrahlen von ungleicher Brechbarkeit sind bezüglich des Einflusses, den sie auf

1) Vergl. HEINRICHER, in Pringsheim's Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. 15.

2) Literatur über das Assimilationsgewebe: PICK, Beiträge zur Kenntniss des assimilirenden Gewebes armlaubiger Pflanzen, Bonn 1881; G. HABERLANDT, Pringsheim's Jahrbücher f. wissensch. Botanik, Bd. 13; STAHL, Botan. Zeitung, 1880.

das Pflanzenleben ausüben, keineswegs als gleichwerthig zu betrachten. Es ist daher nicht ohne Interesse, einige Experimente über die Durchleuchtungsverhältnisse pflanzlicher Gewebe anzustellen. Die Tiefe, bis zu welcher Lichtstrahlen in pflanzliche Gewebe eindringen, hängt einerseits ab von der Intensität, sowie der Brechbarkeit der ersteren, andererseits von der chemischen Beschaffenheit der Zellenbestandtheile selbst und dem anatomischen Bau der Gewebe. Mit Rücksicht auf diesen letzteren Punkt spielt unter anderem das Vorhandensein eines mehr oder minder entwickelten Intercellularsystems eine wichtige Rolle. Sind z. B. viele Intercellularen vorhanden, so müssen die einfallenden Strahlen sehr oft aus der Zellflüssigkeit und den mit Wasser imbibirten Zellhäuten in Luft übergehen, was den Grad der Durchsichtigkeit eines Gewebes natürlich erheblich herabmindert. Die Bedeutung der Intercellularen für die hier in Rede stehenden Verhältnisse wird sofort klar, wenn man das folgende Experiment anstellt. Ein Blattstück von *Begonia manicata* wird in Wasser gelegt, das sich in einem kleinen Glase befindet. Man verschliesst die Mündung des Glases mit einem Kautschukkork, durch dessen Bohrung der eine Schenkel eines im rechten Winkel gebogenen Glasrohres gesteckt worden ist, während der andere Schenkel mit der Luftpumpe in Verbindung gesetzt wird. Evacuirt man, so entweicht die Luft aus den Intercellularen des Blattstückes; dieselben füllen sich aber mit Wasser, und das Untersuchungsobject erscheint nun weit durchscheinender als bei Beginn des Versuchs. Taucht man die Spreite eines Blattes von *Primula sinensis* in Wasser und nimmt man das Ende des Blattstieles in den Mund, um die Luft aus dem Intercellularsystem durch Saugen zu entfernen, so dringt durch die Spaltöffnungen des Blattes Wasser in die Intercellularen ein, wodurch das Gewebe ziemlich durchscheinend wird.

Einen geringen Grad von Durchsichtigkeit besitzt in Folge der specifischen Natur seiner Zellmembranen das Korkgewebe. Ebenso absorbiren chlorophyllreiche Gewebe in Folge der Gegenwart des grünen Pigments viel Licht und lassen nur relativ wenig passiren. Hier ist auch der Ort, zu erwähnen, obgleich wir unter 7 noch specieller auf das Absorptionsvermögen des Blattgrüns für Lichtstrahlen zurückkommen, dass das Chlorophyllpigment ein sehr energisches Absorptionsvermögen für die sogen. chemischen Strahlen besitzt. Man kann sich hiervon leicht überzeugen, wenn man ein beliebiges grünes Blatt auf ein Stück photographischen Papiers legt und dasselbe nunmehr zwischen zwei Glasplatten dem Einflusse des Lichtes exponirt. Der nicht von dem Blatte bedeckte Theil des Papiers bräunt sich schnell; der bedeckte verändert seine weisse Farbe nicht oder nicht wesentlich, weil der Chlorophyllfarbstoff im Blattgewebe die sogen. chemischen Strahlen sehr energisch absorbirt.

Um die Tiefe zu bestimmen, bis zu welcher Licht von einer Intensität, die für das Auge noch wahrnehmbar ist, in Gewebeschichten eindringt, benutzt man nach SACHS¹⁾ das einfache Diaphanoskop (Fig. 4). Dieser Apparat besteht aus einem aus dicker Pappe gefertigten Rohr *a* von 60 mm Länge und 35 mm Durchmesser, das an einem Ende offen, am anderen Ende bis auf eine kleine Oeffnung von

1) Vergl. SACHS, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. zu Wien, 1860, Bd. 43. Vergl. auch ENGELMANN, Bot. Zeitung, 1887, S. 393.

etwa 10 mm Durchmesser geschlossen ist. Ueber dieses Ende des Rohres *a* kann eine zweite Pappröhre *b* geschoben werden, die ganz ähnliche Beschaffenheit wie das Rohr *a* besitzt. Legt man die Untersuchungsobjecte zwischen die Röhren, hält das offene Ende des Rohres *a* dicht an das Auge und richtet den Apparat gegen die Sonne oder eine helle Wolke, so kann man die Durchleuchtungsverhältnisse pflanzlicher Gewebe studiren. Als ich ein Blattstück von *Lonicera tatarica* in das Diaphanoskop einschaltete, erschien das durchgegangene Licht hellgrün. 4 Blattstücke eingeschaltet, liessen alsbald deutlich erkennen dass grünes Licht hindurchging. Wurden 6 Blattstücke eingeschaltet, so nahm das Auge nach längerem Hineinsehen in den Apparat einen gelblichen Schein wahr.

Zur Herstellung eines analysirenden Diaphanoscops braucht man das einfache Diaphanoskop nur über den vorderen Theil der Röhre eines geeigneten Spectroskops zu schieben, und dieses, indem man beobachtet, gegen helle Wolken oder den blauen Himmel zu richten. Als ich ein Blattstück von *Syringa vulgaris* in das Diaphanoskop eingeschaltet hatte, zeigte sich, dass dasselbe Roth, Orange, Gelb, Grün und etwas Blau, freilich geschwächt, passiren liess. Die brechbareren Strahlen wurden völlig absorhirt. 2 Blattstücke von *Syringa* liessen nur noch Roth, Orange, Gelb und Grün sehr geschwächt passiren, andere Strahlen nicht. Eine 17 mm. dicke Gewebeplatte aus dem Parenchym einer Kartoffelknolle, die ich in das Diaphanoskop eingeschaltet hatte, absorbirte die brechbareren Lichtstrahlen völlig, liess aber Roth, Orange, Gelb, Grün und eine Spur Blau sehr geschwächt passiren. Nach den Resultaten dieser Beobachtungen dringen die weniger brechbaren Lichtstrahlen also tiefer als diejenigen von hoher Brechbarkeit in das Pflanzengewebe ein.

Fig. 4. Diaphanoskop, im Längsschnitt dargestellt.

5. Die Chlorophyllkörper.

Als Organe der assimilatorischen Thätigkeit der Zellen sind die Chlorophyllkörper anzusehen. Die Gestalt derselben ist gewöhnlich eine scheibenförmige; in den Zellen mancher Algen kommen auch andersartige Chlorophyllkörper vor. Wir bringen z. B. einige Fäden einer Algenart, die in stehenden Gewässern häufig vorkommt, nämlich einer *Zygnemaspecies*, mit einem Wassertropfen auf den Objectträger, bedecken mit dem Deckglase und untersuchen das Object bei etwa 500facher Vergrösserung. Es zeigt sich, dass jeder Faden aus einer ganzen Reihe von Zellen besteht, und dass in jeder Zelle zwei grün gefärbte, sternförmige Gebilde, eben die Chlorophyllkörper, vorhanden sind. Wir sehen auch den Zellkern in der Mitte jeder Zelle.

Die *Spirogyra*-Arten sind Algen, welche zumeist in stehenden Gewässern vorkommen und aus unverzweigten Zellfäden bestehen. In jeder Zelle erblickt man bei mikroskopischer Untersuchung grüne Spiralbänder, je nach den Arten in verschiedener Anzahl, welche die Chlorophyllkörper repräsentiren. Das wandständige Plasma und der

im Zellsafte mittelst dünner Plasmafäden ausgespannte Zellkern sind häufig leicht zu beobachten. Bemerkt sei noch, dass den Bändern der Spirogyra in gewissen Abständen kugelige, farblose Gebilde eingelagert sind, die Amylumherde, welche je ein aus Eiweissstoffen bestehendes Pyrenoid von eckigen Contouren umschliessen. Die Pyrenoide sind von vielen kleinen Stärkekörnern umgeben.

Wenn man einmal in den Besitz guten Spirogyramaterials gelangt ist, so sollte man dasselbe, da wir es bei der Ausführung verschiedener physiologischer Experimente gebrauchen, zu cultiviren suchen. Dies geschieht nach STRASBURGER am besten, indem man die Algen in nicht zu tiefe, mit Brunnenwasser gefüllte Gefässe bringt, deren Wände nicht durchsichtig sind oder durch Ueberkleben mit schwarzem Papier undurchsichtig gemacht werden. Man setzt die Algen hellem, diffusem Licht (nicht directem Sonnenlicht) aus und wirft von Zeit zu Zeit kleine Torfstückchen, welche nach dem Auskochen mit gewöhnlicher Nährstofflösung, wie man sie bei der Ausführung von Wasserculturversuchen braucht, getränkt sind, in das Wasser.

Sehr häufig sind in stehenden, sowie fliessenden Gewässern Arten der Gattung Cladophora, Algen, die rauh anzufühlende, verzweigte Fäden darstellen. Die Seitenzweige entspringen aus dem oberen Ende der Gliederzellen. Zur weiteren Untersuchung ist ziemlich starke Vergrösserung anzuwenden, und es ergibt sich dabei, dass der grüne Wandbeleg der Zellen aus kleinen, polygonalen Gebilden besteht, die durch zarte, farblose Linien von einander getrennt sind. Die Chlorophyllkörper von Cladophora sind denjenigen höherer Pflanzen schon ziemlich ähnlich.

Es mag hier auch gestattet sein, einen merkwürdigen Organismus, der oft in Wassertümpeln an untergetauchten Pflanzentheilen haftend angetroffen wird, zu erwähnen. Ich habe hier die Hydra viridis im Auge, ein kleines Wasserthierchen von 5—12 mm Länge und grüner Farbe. Wenn wir die Hydra in einen Wassertropfen bringen und sie, um sie nicht zu beschädigen, ohne Benutzung eines Deckglases mikroskopisch untersuchen, so erkennen wir leicht, dass der Organismus ein sackartiges Gebilde darstellt, das aus zwei Hüllen, dem Ektoderm und dem Endoderm, besteht, am vorderen Ende eine Mundöffnung besitzt (eine Afteröffnung fehlt), die von vielen Tentakeln umgeben ist, und sich contrahiren, aber auch wieder ausstrecken kann. Im Endoderm des cylindrischen Körpers der Hydra, sowie im Endoderm der Tentakeln gewahrt man zahlreiche grüne, kugelige Gebilde. Es sind dies einzellige Algen, die im symbiotischen Verhältniss mit der Hydra viridis leben. Diese gewährt ihnen Schutz, während die Algen der Hydra dadurch nützen, dass sie ihr in Folge ihrer assimilatorischen Thätigkeit organische Substanz, sowie freien Sauerstoff zur Verfügung stellen.

In Gewächshäusern, in welchen Farne cultivirt werden, findet man gewöhnlich mit Leichtigkeit an feuchten Wänden oder an den Stämmen von Baumfarnen Farnprothallien auf, kleine, grüne, meist herzförmige, dem Substrat anliegende Gebilde, die wir, nachdem wir sie mit der Pincette von ihrer Unterlage abgehoben und mit Wasser abgespült haben, im Wassertropfen mikroskopisch untersuchen. Die Prothallien sind bis auf einen medianen Theil einschichtig; sie sind gewöhnlich durch den Besitz einer an ihrem vorderen Ende befindlichen Einbuchtung ausgezeichnet und produciren auf ihrer Unter-

oder Bauchseite ziemlich lange Wurzelhaare. Für unsere Zwecke ist es besonders wichtig, dass in den grün erscheinenden Prothalliumzellen zahlreiche Chlorophyllkörper leicht zu sehen sind.

Lehrreich ist es ferner, ein Blatt des verbreiteten Moores *Funaria hygrometrica* mikroskopisch zu untersuchen. Wir wählen, aus hier nicht zu erörternden Gründen, Pflanzen aus, die einige Zeit lang diffusum Tageslicht ausgesetzt gewesen sind, und finden, dass die Zellen des bis auf die Mittelrippe einschichtigen Blattes viele grosse Chlorophyllkörner enthalten, die zum Theil in Theilung begriffen sind.

Wir stellen ferner einen Querschnitt durch den Thallus von *Marchantia polymorpha* (es ist dies ein auf feuchtem Boden recht häufig vorkommendes, gabelig verzweigtes Lebermoos) her. Ohne Rücksicht auf Details genügt es uns hier, das Vorhandensein eines chlorophyllreichen Gewebes an der Thallusoberseite zu constatiren. Es folgt eine chlorophyllarme Mittelschicht, und an der Bauchseite befinden sich wieder zwei chlorophyllreichere Zellschichten.

Wird ein Blatt aus der Knospe von *Elodea canadensis* in einem Wassertropfen auf den Objectträger gebracht, so werden wir bei mikroskopischer Betrachtung nach kurzem Suchen Zellen finden, welche die in Fig. 5 dargestellten Verhältnisse zur Anschauung bringen. Das wandständige Plasma, die kernhaltige Protoplasmamasse und die von dieser letzteren ausgehenden Protoplasmastränge sind leicht zu sehen. Das Protoplasma zeigt häufig auch ziemlich lebhaftere Bewegungserscheinungen, und im Plasma treten die Chlorophyllkörper deutlich hervor.

Werden von der Unterseite eines Escheveriablattes die äusseren Zellschichten entfernt, und untersucht man Schnitte des folgenden lockeren Blattgewebes, so erblickt man in den nicht verletzten Zellen grosse Chlorophyllkörner, die deshalb besonders interessant sind, weil sie, bei ziemlich starker Vergrösserung untersucht, eine schaumige Structur relativ deutlich hervortreten lassen. Man darf annehmen, dass alle Chlorophyllkörper ein solche Structur besitzen; dieselbe ist aber keineswegs stets leicht zu constatiren.

Wenn wir Lupinensamen bei Lichtzutritt zum Keimen bringen, so nehmen die über die Bodenoberfläche hervortretenden Cotyledonen eine grüne Farbe an. Die mikroskopische Untersuchung des Querschnittes eines Keimblattes lässt die Epidermis, das Grundgewebe, sowie die Gefässbündel leicht wahrnehmen, und in den Zellen des

Fig. 5. Einige Zellen aus dem Blatt von *Elodea canadensis*. a bis e Zellkerne, f Protoplasmaabänder, g Chlorophyllkörner, zum Theil in Theilung und mit Einschluss von Stärkekörnchen. (Nach KNY.)

Grundgewebes, zumal den peripherisch gelegenen, sind viele relativ grosse Chlorophyllkörner zu erkennen ¹⁾).

Es ist von Wichtigkeit, hier zu betonen, dass es manche Pflanzentheile giebt, die nicht chlorophyllgrün aussehen, aber dennoch reichliche oder geringe Chlorophyllmengen enthalten und demnach zu assimilatorischer Thätigkeit befähigt sind. Wir stellen Querschnitte durch Blätter rothblättriger Varietäten von *Corylus* oder *Fagus* her. In den Zellen des Palissaden- sowie des Schwammparenchyms sind, wie in denjenigen grüner Blätter, zahlreiche Chlorophyllkörner vorhanden, aber die Epidermiszellen enthalten roth oder violett gefärbten Zellsaft; die in der Epidermis vorhandenen Pigmente verdecken in den unversehrten Blättern also nur die Farbe des Blattgrüns. Die jungen Blätter mancher Pflanzen (z. B. der Eichen) erscheinen nicht grün, sondern roth, später werden die Blätter aber grün. Das Mesophyll der jungen Blätter enthält zahlreiche Chlorophyllkörper, wovon man sich beim Studium von Querschnitten überzeugen kann, indessen im Zellsaft der Zellen des Assimilationsgewebes, zumal des Palissadenparenchyms, sind rothe Farbstoffe aufgelöst. In diesem Falle dient das rothe Pigment den jugendlichen, tiefer liegenden grünen Zellen als ein Schutzmittel gegen zu intensives Licht.

Die *Neottia Nidus avis* ist eine zu der Familie der Orchideen gehörende Pflanze, welche im humusreichen Boden feuchter Wälder häufig angetroffen wird. Die ganze Pflanze besitzt eine braune Farbe; sie scheint keinen Chlorophyllfarbstoff zu enthalten. Ein Querschnitt, den wir aus einer etwa 6 cm unter dem Blüthenstande liegenden Region des Stengels führen, lässt bei mikroskopischer Untersuchung die Epidermis, das Parenchym der Rinde sowie des Markes und einen dazwischen befindlichen Sklerenchymcylinder sammt den Gefässbündeln deutlich erkennen; grüne Chlorophyllkörper finden wir aber nirgends. Wird eine *Neottia*-pflanze nach dem Zerquetschen mit Alkohol übergossen, so ist es leicht, einen chlorophyllgrünen Extract zu erhalten, der auch die gewöhnlichen Fluoreszenzerscheinungen einer Blattgrünlösung zeigt. In der That enthält die *Neottia*, wie WIESNER ²⁾ zuerst fand, Chlorophyllfarbstoff; die Pflanze kann also assimiliren und einen Theil der organischen Substanz, deren sie bedarf, aus anorganischem Material selbst produciren, während sie freilich einen anderen Theil von aussen aufnimmt. Zur weiteren Orientirung stellen wir die folgende Beobachtung an. Wir ziehen ein Stückchen Epidermis von dem Fruchtknoten einer *Neottia*blüthe ab und untersuchen dasselbe bei starker Vergrösserung. In der Umgebung des Zellkernes der Zellen sehen wir rundliche oder spindelförmige, braun gefärbte Farbstoffkörperchen, die, wenn wir das Präparat mit Alkohol behandeln, ergrünen. Solche Pigmentträger finden sich ebenfalls, freilich nicht in so grosser Menge, in den Geweben des Stengels, und in allen Fällen haben wir es mit Farbstoffträgern zu thun, die neben dem Chlorophyllpigment einen unter gewöhnlichen Umständen die grüne Farbe desselben völlig verdeckenden braunen Farbstoff führen.

In den braunen *Fucus*arten ist die Farbe des Chlorophyllpigments ebenfalls durch das Vorhandensein eines braunen Farbstoffes verdeckt, wovon ich mich in folgender Weise überzeugte. Ich sammelte in der Nähe von Cuxhaven *Fucus vesiculosus*, verpackte die Algen gut, so dass

1) Ueber verschiedene hier berührte Verhältnisse vergl. STRASBURGER's Botan. Practicum.

2) Vgl. WIESNER, Pringsheim's Jahrbücher f. wissensch. Botanik, Bd. 8, S. 575.

das Untersuchungsmaterial frisch blieb, und stellte den eigentlichen Versuch am nächsten Tage an. Die jüngeren Theile der Pflanzen wurden abgeschnitten und kurze Zeit mit Wasser ausgekocht. Nach dem Abgiessen der braunen Brühe erschien das Gewebe der Algen grün¹⁾. Ich spülte sie nun mit kaltem Wasser ab und übergoss sie mit Alkohol. Dieser nahm alsbald eine gelbgrünliche Farbe an; er wurde entfernt und durch eine neue Alkoholmenge ersetzt. Man erhält auf diese Weise eine prächtig grün gefärbte Chlorophylllösung, welche stark fluorescirt²⁾.

Wir behandeln Blätter aus der Knospe von *Elodea*, Blätter von *Funaria hygrometrica* oder Farnprothallien (die beiden zuletzt genannten Objecte sind hier besonders zu empfehlen) längere Zeit mit Alkohol. Die Pflanzentheile werden farblos, und bei mikroskopischer Untersuchung erblickt man die von ihrem Pigment befreite protoplasmatische Grundmasse der Chlorophyllkörper in den Zellen. Bringen wir die Präparate mit einem Tropfen einer verdünnten wässerigen Lösung von Methylviolett in Berührung, so werden die entfärbten Chlorophyllkörper stark tingirt.

6. Der Chlorophyllfarbstoff.

In neuerer Zeit sind zahlreiche Versuche, zumal von SACHSSE, HANSEN und TSCHIRCH, gemacht worden, den Chlorophyllfarbstoff in reinem Zustande aus grünen Pflanzentheilen zu isoliren. Diese Untersuchungen haben ebenso wie auch schon die älteren von G. KRAUS³⁾ zu dem Resultate geführt, dass das Chlorophyllpigment ein Gemisch zweier Farbstoffe, nämlich eines blaugrünen, des Cyanophylls, und eines gelben, des Xanthophylls, repräsentirt. Wir wollen hier aber auf die neueren Arbeiten nicht genauer eingehen, denn einmal besitzen ihre Resultate heute noch ein mehr phytochemisches als speciell pflanzenphysiologisches Interesse, und ferner sind die bei der Isolirung mehr oder minder reiner Chlorophyllpräparate zur Anwendung kommenden Methoden recht complicirter Natur, und ihre Handhabung eine sehr zeitraubende. Dagegen müssen wir die Untersuchungen von G. KRAUS specieller berücksichtigen.

Sogenannte Rohchlorophylllösungen können wir schliesslich aus beliebigen grünen Pflanzentheilen darstellen, aber es ist zweckmässig, um einen relativ reinen Chlorophyllextract zu gewinnen, junge Weizenpflanzen oder *Elodea*-Exemplare als Untersuchungsmaterial zu verwenden. Wir schneiden die oberirdischen Theile junger Weizenpflanzen, die sich etwa bis zur Ausbildung des sechsten Blattes entwickelt haben, ab, oder wir sammeln eine nicht zu kleine Menge frischer *Elodea*pflanzen, bringen das Material (etwa 100–150 g frischer Substanz) in eine Porzellanschale und kochen es auf dem Wasserbade einige Zeit ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde lang) mit destillirtem Wasser aus. Die Brühe wird abgossen, das Pflanzenmaterial mit Wasser mehrfach ausgewaschen und nun nach dem Abpressen in einem geräumigen

1) Den erwähnten braunen Farbstoff nennt man Phycophacin. Der rothe, in Wasser lösliche Farbstoff, den die Florideen neben Chlorophyll enthalten, heisst Phycocrythin. Die blaugrünen Spaltalgen enthalten neben Chlorophyllfarbstoff Phycocyan.

2) Vgl. HANSEN, Arbeiten d. bot. Instituts in Würzburg, Bd. 2, S. 289.

3) G. KRAUS, Zur Kenntniss der Chlorophyllfarbstoffe. Stuttgart 1872.

Kolben mit $\frac{1}{2}$ —1 Liter 95-proc. Alkohol übergossen. Die Extraction geht, zumal wenn man schwach erwärmt, ziemlich schnell vor sich. Es ist nothwendig, den Auszug im Dunkeln zu bereiten, da der Chlorophyllfarbstoff, wie wir später sehen werden, sehr leicht durch den Einfluss des Lichtes zersetzt wird. Die erhaltene Chlorophyllpigmentlösung besitzt eine prachtvoll grüne Farbe.

Das Blattgrün, wie dasselbe an eine protoplasmatische Grundmasse gebunden in den Pflanzenzellen vorkommt, ist nun auf keinen Fall als ein chemisches Individuum aufzufassen, sondern es stellt dasselbe ein Gemenge zweier Farbstoffe, des gelben Xanthophylls und des blaugrünen Cyanophylls, dar, wovon man sich leicht durch den folgenden Versuch überzeugen kann.

Wir bringen recht concentrirte alkoholische Chlorophylllösung in einen Glaszylinder, fügen ihr tropfenweise etwas Wasser hinzu, aber nur so viel, dass keine Trübung bemerklich wird, versetzen sie mit Benzol, schütteln tüchtig und überlassen die Flüssigkeit darauf der Ruhe. Die Mischung sondert sich schnell in eine unten stehende alkoholische, goldgelbe Xanthophylllösung und in eine darüber stehende blaugrüne Lösung des Cyanophylls in Benzol. Der gelbe Farbstoff ist leichter in Alkohol als in Benzol löslich, der blaugrüne umgekehrt leichter in Benzol als in Alkohol, und daher tritt die erwähnte Scheidung der beiden Pigmente bei der Ausführung des Versuchs hervor.

In den Zellen im Dunkeln erwachsener, gelber Pflanzentheile sind beträchtliche Mengen von Etiolinkörnern vorhanden (vergl. unter 10). Diese bestehen aus einer protoplasmatischen Grundmasse und einem gelben Farbstoff, den man isoliren kann, wenn man z. B. bei Lichtabschluss erwachsene etiolirte Weizen- oder Gerstenkeimpflanzen mit Alkohol extrahirt. Der Auszug besitzt eine schön gelbe Farbe. Das Pflanzenmaterial gewinnt man, indem man gequollene Weizen- oder Gerstenkörner auf feuchten Sägespänen aussäet und die sich entwickelnden jungen Keimlinge etwa 8 Tage lang im Dunkeln cultivirt.

7. Das Absorptionsspectrum und die Fluorescenz des Chlorophyllfarbstoffes.

Zur Untersuchung des Absorptionsspectrums des Chlorophyllfarbstoffes bedürfen wir geeigneter Spectroskope. Je nach Umständen werden wir den BUNSEN'schen Spectralapparat, ein geradsichtiges Spectroskop, ein Taschenspectroskop oder einen mit dem Mikroskop in Verbindung zu bringenden Mikrospectralapparat benutzen. Dieser letztere Apparat wird in vorzüglicher Qualität mit Scalenrohr und Vergleichsprisma von der Firma ZEISS in Jena oder von SEIBERT und KRAFFT in Wetzlar geliefert. Die anderen Spectralapparate, welche genannt wurden, liefern z. B. R. MUENCKE in Berlin, Luisenstr. 58 und GEISSLER Nachf. in Bonn. Eine genaue Beschreibung aller Apparate würde hier zu weit führen. Näheres findet man z. B. in MÜLLER's Lehrbuch der Physik und Meteorologie, 1879, Bd. II, erste Abtheilg., S. 206.

Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass es am bequemsten ist, mit geradsichtigen Spectroskopen zu arbeiten. Bei Untersuchungen, welche den Zweck haben, die Lage der Absorptionsbänder genau zu bestimmen, bedient man sich am besten solcher Apparate, welche mit

Scalen versehen sind, die keine beliebige Theilung, sondern solche nach Wellenlängen besitzen. Die richtige Einstellung der Scala kann dann in einfacher Weise unter Zuhülfenahme der FRAUENHOFER'schen Linien geschehen.

Gehen wir zunächst auf den Mikrospectralapparat ein, wie er in der von SEIBERT und KRAFFT in Wetzlar gelieferten Form in Fig. 6 dargestellt ist, so sei bemerkt, dass *t* die den Spalt und das Vergleichsprisma bergende Trommel darstellt. Die Schraube *d* dient zur Verengerung, *h* zur Verkürzung des Spaltes, *f* ist die Ocularröhre, *o* die Schraube zum Einstellen des Spaltes für das Auge des Beobachters; in der Röhre *rr* befinden sich die Prismen, *s* ist ein Spiegel, um dem Vergleichsprisma, wenn es eingeschaltet ist, Licht zuzuführen. *p p* ist eine durchbohrte Platte, die seitlich an der Trommel *t* angebracht und mit federnden Klammern versehen ist. Zur Erzeugung eines Vergleichsspectrums wird der betreffende Körper möglichst dicht vor die Durchbohrung von *p p* gebracht. Auf die complicirte Einrichtung des Messapparates, welcher dem oberen Ende des Spectroskops seitlich eingesetzt werden kann, gehen wir hier nicht näher ein. Man vgl. vielmehr BEHRENS, Hilfsbuch bei mikroskopischen Untersuchungen, 1883, S. 121.

Will man Chlorophylllösungen untersuchen, so sind dieselben nach der unter 6 angegebenen Weise zu bereiten. Wir wollen auch hier wieder nur mit der gewöhnlichen alkoholischen Rohchlorophylllösung experimen-

Fig. 6. Mikroskop mit vollständigem Mikrospectroskop.

tiren und anderweitige Chlorophyllpräparate, die umständlich herzustellen sind, nicht berücksichtigen. Die im Dunkeln bereitete, frische Lösung gelangt in kleine, mit planparallelen Wänden und dicht schliessenden Stopfen versehene Glasfläschchen, die von MUENCKE in Berlin bezogen werden können. Diese Gläser legt man einfach auf den Objecttisch des Mikroskops und studirt nun das Spectrum. Das Chlorophyllspectrum zeigt 7 Absorptionsstreifen, wie sie auch in Figur 8 dargestellt sind. Besonders der Streifen im Roth ist sehr charakteristisch und selbst noch bei Benutzung sehr verdünnter Lösungen wahrzunehmen. Verwendet man concentrirtere Lösungen, so treten die Bänder *I—IV* zwar noch deutlich hervor, aber die Streifen *V*, *VI* und *VII* sind zu einer Endabsorption zusammengefloßen. Um auch sie zu sehen, muss man mit verdünnteren Lösungen und unter Benutzung directen Sonnenlichtes arbeiten. Die Resultate der Beobachtungen sind in eine Scala einzuzeichnen, in welcher die Lage der FRAUNHOFER'schen Linien angegeben ist. Bei genauen Untersuchungen ist der Messapparat, der mittelst des an ihm befestigten Spiegels beleuchtet werden kann, zur Hülfe zu nehmen. Das Vergleichsprisma unseres Apparates leistet zumal dann sehr gute Dienste, wenn es sich darum handelt, das bekannte Spectrum eines Körpers mit den noch nicht studirten eines anderen zu vergleichen. Schalten wir nämlich das Vergleichsprisma ein und beleuchten dasselbe gut, so erblicken wir zwei, nur durch eine zarte schwarze Linie getrennte, über einander liegende Spectra. Wenn die Substanzen, welche man untersucht, dieselben sind und auch im gelösten Zustande in gleichen Concentrationen Verwendung finden, so fallen die Absorptionsstreifen des unteren Spectrums genau in die Verlängerung der Streifen des oberen.

Handelt es sich darum, dünne Gewebeschnitte oder auch z. B. einzelne Chlorophyllkörner mit Hülfe des Mikrospectralapparates zu untersuchen, so werden dieselben in gewöhnlicher Weise auf dem Objectträger, in einem Tropfen Wasser resp. Glycerin liegend, mit Deckglas bedeckt. Behufs Einstellung des Präparates entfernt man das die Prismen tragende Rohr und öffnet den Spalt nur so wenig wie möglich. Bei dem Studium vieler chlorophyllhaltiger Objecte (ich experimentirte z. B. mit Cladophorafäden) nimmt man nur Band *I* im Roth und eine aus der Verschmelzung der Bänder *V*, *VI* und *VII* hervorgegangene continuirliche Endabsorption wahr; die Bänder *II*, *III* und *IV* treten überhaupt nicht hervor.

Bei der Untersuchung ganzer Blätter legt man dieselben einfach auf den Objecttisch und benutzt ein schwaches Objectiv. Beleuchten wir unser Object, indem wir diffuses Tageslicht oder Gaslicht auf den Spiegel des Mikroskops fallen lassen, so sind nur die Bänder *I*, *II* u. *III* des Chlorophyllspectrum sichtbar. Verwenden wir directes Sonnenlicht, so treten auch die Bänder *IV* und *V* hervor, während die Bänder *VI* u. *VII* der starken Endabsorption wegen oft nicht deutlich erkannt werden können. Dass wirklich die Bänder *I—V*, welche wir beobachteten, den Bändern *I—V* der Chlorophylllösung entsprechen, lässt sich zeigen, wenn man das Vergleichsprisma, das durch einen besonderen Spiegel Licht empfängt, in Anwendung bringt, um mit Hilfe desselben gleichzeitig mit dem Spectrum eines Blattes dasjenige einer alkoholischen Chlorophylllösung zu beobachten. Es zeigt sich dann fast völlige Uebereinstimmung in der Lage der Absorptionsstreifen beider Objecte; nur sind die Bänder des Spectrums der Lösung im Vergleich zu denjenigen des Blattspectrum etwas gegen das Violett hin verschoben, eine Erscheinung, die durch das benutzte Lösungsmittel (Alkohol) herbeigeführt wird.

Sollen Chlorophylllösungen unter Benutzung von Taschenspektroskopen, BUNSEN'scher Apparate oder geradsichtiger Spectroskope von HOFMANN oder STEINHEIL untersucht werden, so füllt man sie in Gläser mit parallelen Wänden, wie solche z. B. von MUENCKE in Berlin zu beziehen sind, ein (vgl. Fig. 7); oder man bringt sie am besten in ein Haemoskop (von DESAGA in Heidelberg zu beziehen), um in schneller und beliebiger Folge Flüssigkeitsschichten von verschiedener Dicke prüfen zu können. Wird als Lichtquelle eine Gas- oder Petroleumflamme in Anwendung gebracht, so sind deutlich oft nur die Bänder *I* und *II*, respect. diese und *III* der Chlorophylllösung zu erkennen¹). Die genauere spectroscopische Untersuchung des Chlorophyllfarbstoffs kann im directen Sonnenlicht erfolgen. Das Spectroskop ist in einem Dunkelzimmer aufgestellt. Das Licht fällt durch eine Oeffnung im Fensterladen ein, und vor demselben befindet sich, um die Richtung der Strahlen unverändert zu erhalten, ein Heliostat, dessen Spiegel mit der Hand bewegt oder besser mittelst eines Uhrwerkes gedreht werden kann. Heliostaten liefern in guter Ausführung EHRHARDT und METZGER in Darmstadt. Im Dunkelzimmer, welches überhaupt bei vielen physiologischen Arbeiten sehr gute Dienste leistet, sind Wände, Fussboden, Decke, Fensterladen, Tische etc. mattschwarz angestrichen. Die Absorptionsstreifen im stärker brechbaren Theil des Chlorophyllspectrum sind nur dann deutlich getrennt von einander zu sehen, wenn man mit relativ verdünnten Chlorophylllösungen experimentirt. Die Resultate der Untersuchungen werden nach Maassgabe der Beobachtungen, die man unter Benutzung der Scala des Spectroskops gewonnen hat, aufgezeichnet²).

Fig. 7. Glasgefäss mit parallelen Wänden zur Aufnahme von Flüssigkeiten, die spectroscopisch untersucht werden sollen.

Es ist unter 6 angegeben worden, dass der normale grüne Chlorophyllfarbstoff ein Gemenge zweier Farbstoffe, des Xanthophylls und Cyanophylls, repräsentirt. Es ist auch schon die Methode besprochen, welche man anwenden muss, um diese beiden Farbstoffe von einander zu trennen. Die Lösung des gelben Xanthophylls (wenigstens die verdünnte Lösung) zeigt bei spectroscopischer Untersuchung nur drei Absorptionsstreifen, sämmtlich im Blau und Violett gelegen. Die blaugrüne Cyanophylllösung besitzt 7 Absorptionsstreifen: *I* im Roth,

1) Sehr lichtstarke Spectra geben auch die Taschenspektroskope nach BROWNING, die, mit Scala versehen, von SCHMIDT und HÄNSCH in Berlin zu beziehen sind. Als Lichtquelle kann zweckmässig ein Argandbrenner mit Blechkamin dienen. Die erwähnten Spectroskope werden heute oft bei Studien über das Absorptionsspectrum der Chlorophylllösungen verwandt. Mit Hülfe derselben ist es möglich, namentlich die Lage der Bänder *I*—*IV* recht genau zu bestimmen. Vgl. WEGSCHEIDER, Ber. d. Deutsch. botan. Gesellschaft, Bd. 2, u. VOGEL, Praktische Spectralanalyse, Nördlingen, 1877.

2) Vgl. KRAUS, Zur Kenntniss der Chlorophyllfarbstoffe, 1872; PRINGSHEIM, Monatsber. d. Berliner Akademie, 1874 und 1875, und Sitzungsber. der Berliner Akademie, 1886; HANSEN, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 3, H. 1; TSCHIRCH, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 1.

Fig. 8. Absorptionsspektren des Chlorophyllfarbstoffes nach KRAUS. Das obere Spectrum ist das des alkoholischen Extractes grüner Blätter, das mittlere das des in Benzol löslichen blaugrünen Bestandtheiles, das untere das des gelben Bestandtheiles. Die Absorptionsstreifen der beiden oberen Spectren sind im minder brechbaren Theile *B—E* nach einer mehr concentrirten, im stärker brechbaren Theile nach einer verdünnten Lösung angedeutet. Die Buchstaben *A—G* bedeuten die bekannten FRAUNHOFER'schen Linien des Sonnenspectrums, die Zahlen *I—VII* numeriren nach KRAUS die Absorptionsstreifen, vom rothen zum violetten Ende fortschreitend. Die Striche 0—100 theilen die Länge des Spectrums in 100 gleiche Theile.

II im Orange, *III* im Gelb, *IV* im Grün, *V*, *VI*, *VII* im Blau und Violett.

Wenn man concentrirte alkoholische Chlorophylllösungen im auffallenden Licht betrachtet, so zeigt sich, dass dieselben eine rothe Farbe besitzen. Noch deutlicher und schöner lässt sich die rothe Farbe der Chlorophylllösung im auffallenden Licht zur Wahrnehmung bringen, wenn man mit Hülfe einer biconvexen Linse ein Sonnenbild an der Oberfläche der Lösung entwirft. Der Chlorophyllfarbstoff fluorescirt mit rothem Licht, wie auf die angegebene Art leicht festzustellen ist.

8. Die Zersetzung des Chlorophyllfarbstoffes.

Man stelle in Töpfen cultivirte, kräftige Exemplare von *Tropaeolum majus* ins Finstere, z. B. in einen Schrank. Ist die Temperatur nicht zu niedrig, so haben die Blätter bereits nach 8 Tagen auffallende Farbenveränderungen erfahren. Die älteren Blätter sehen, trotzdem sie noch saftig sind, gelb aus, während die jüngeren fleckig und die jüngsten noch völlig grün erscheinen. Der Lichtmangel hat, wie die mikroskopische Untersuchung dünner Schnitte aus dem Mesophyll der gelben *Tropaeolum*blätter lehrt, einen wesentlichen Einfluss auf die Chlorophyllkörner geltend gemacht. Dieselben haben an Grösse verloren, und statt des grünen Pigments ist nur noch ein gelbes vor-

handen¹⁾. Werden Spirogyrafäden in einem etwas Wasser enthaltenden Glase längere Zeit (bei meinen Versuchen 5—8 Tage lang, Temperatur 15—20° C) constanter Finsterniss ausgesetzt, so haben sich die Chlorophyllkörper wesentlich verändert. In manchen Zellen sind freilich noch grün gefärbte Spiralbänder vorhanden, in anderen ist aber bereits ein mit Verfärbung des Pigments verbundener Zerfall der Chlorophyllkörper zu unregelmässigen Ballen eingetreten.

Der Chlorophyllfarbstoff in Pflanzenzellen erfährt ferner tiefgreifende Zersetzungen, wenn er mit Säuren in Berührung gebracht wird. Wir legen Spirogyra- oder Zygnemafäden (letztere benutzte ich mit besonderem Erfolg) in eine Mischung von 1 Theil concentrirter Salzsäure und 4 Theilen Wasser. Das Chlorophyllpigment erfährt einen Farbenwechsel, und nach Verlauf längerer Zeit (zuweilen erst nach 20 Stunden) treten in den Chlorophyllkörpern, zumal an deren Rändern, bräunlich oder rostbraun gefärbte Massen, Zersetzungsproducte, die in Folge der Wirkung der Salzsäure entstanden sind, auf (Hypochlorinreaction²⁾).

Ebenso wird eine Rohchlorophylllösung (hergestellt durch Behandlung grüner Pflanzentheile mit Alkohol) wesentlich verändert, wenn man sie mit Säuren versetzt. Versetzt man eine solche Lösung z. B. mit sehr wenig Salpeter- oder Salzsäure, so geht ihre schön grüne Farbe sofort verloren, und sie nimmt einen bräunlichen Farbenton an.

Die alkoholische Rohchlorophylllösung enthält freilich neben dem Chlorophyllpigment noch eine ganze Reihe anderweitiger Substanzen, aber trotzdem kann man dieselbe bequem benutzen, um den Nachweis zu liefern, dass der Chlorophyllfarbstoff im hohen Grade lichtempfindlich ist. Im Dunkeln erhält eine alkoholische Chlorophylllösung sich lange Zeit unverändert; sie verfärbt sich nur ganz allmählich. Diffuses Licht wirkt nicht sehr schnell, directes Sonnenlicht dagegen sehr schnell verändernd auf die Rohchlorophylllösung ein; im directen Sonnenlicht ist eine solche Lösung bereits nach Verlauf einer halben Stunde sehr deutlich verfärbt. Lehrreich ist es auch, den Einfluss des Lichtes von verschiedener Brechbarkeit auf Rohchlorophylllösungen zu studiren. Es wird uns hier zum ersten Mal die Aufgabe gestellt, pflanzenphysiologische Experimente unter dem Einfluss des Lichts von verschiedener Brechbarkeit vorzunehmen, und es muss daher die Untersuchungsmethode, deren wir uns auch später bei manchen anderen Versuchen zu bedienen haben, specieller beschrieben werden.

Die fast concentrirte wässrige Lösung des doppelt-chromsauren Kalis lässt in nicht zu dicken Schichten das Roth, Orange, Gelb und einen Theil des Grün fast ungeschwächt passiren. Die Lösung des Kupferoxydammoniaks (dieselbe stellt man durch Auflösung von schwefelsaurem Kupferoxyd in Wasser und Zusatz überschüssigen Ammoniaks her) absorbiert im Gegentheil diejenigen Strahlen, welche das doppelt-chromsaure Kali durchlässt, verhindert aber den übrigen Strahlen, also einem Theil des Grün, dem Blau, Indigo und Violett, den Durchtritt nicht. Mit Hülfe der beiden angeführten Lösungen ist man demnach im Stande, das weisse Licht nahezu genau in die

1) Vgl. SACHS, Botanische Zeitung, 1864, S. 38.

2) Vgl. PRINGSHEIM, Jahrbücher für wissenschaftl. Botanik, Bd. 12.

weniger und die stärker brechbare Hälfte zu zerlegen. Zur Aufnahme der farbigen Lösungen benutzt man sehr allgemein doppelwandige Glocken (vergl. Fig. 9)¹⁾. Der Zwischenraum zwischen den beiden Glaswänden der Glocken, also auch die Dicke der farbigen Flüssigkeitsschicht, beträgt gewöhnlich etwa 1 cm. Zur Abhaltung gemischten weissen Lichts stellt man die Glocken bequem in mit Sand gefüllte Teller. Die unter die Glocken gebrachten Untersuchungsobjecte empfangen dann nur gemischtes gelbes oder gemischtes blaues Licht. Ich benutzte auch häufig bei Experimenten über den Einfluss des Lichts von verschiedener Brechbarkeit auf physiologische Prozesse

Fig. 9.

Fig. 9. Doppelwandige Glasglocke zur Aufnahme farbiger Flüssigkeiten, im Längsschnitt dargestellt.

Fig. 10.

Fig. 10. Glasflasche mit parallelen Wänden zur Aufnahme farbiger Flüssigkeiten.

innen und aussen mit mattschwarzem Papier beklebte Pappkästen, deren hintere Wand durch eine wohl verschliessbare Klappe gebildet wird, während die vordere Wand mit einer grossen Oeffnung versehen ist. Vor diese Oeffnung werden in geeigneter Weise Glasflaschen mit parallelen Wänden, welche mit den farbigen Flüssigkeiten angefüllt sind, angebracht (vergl. Fig. 10). Die in die doppelwandigen Glocken oder in die zuletzt erwähnten Glasflaschen eingefüllten Lösungen des doppelt-chromsauren Kalis und des Kupferoxydammoniaks werden einer spektroskopischen Untersuchung unterzogen, indem man das Rohr des Spectroskops in die Glocken einführt oder die Glasflaschen mit parallelen Wänden dicht vor den Spalt bringt. Man muss die Flüssigkeiten nur in einen derartigen Concentrationsgrad versetzen, dass die eine, wie es oben angegeben wurde, nur die weniger, die andere nur die stärker brechbaren Lichtstrahlen durchgehen lässt.

Wenn man nun Rohchlorophylllösungen dem Einfluss des gemischten gelben und des gemischten blauen Lichts exponirt (directes Sonnenlicht),

1) Solche Glocken sind von DESAGA in Heidelberg zu beziehen.

so ergibt sich, dass die weniger brechbaren Strahlen die Zersetzung (Verfärbung) des Chlorophyllfarbstoffs weit schneller als die stärker brechbaren Strahlen herbeiführen. Die sogen. chemischen Strahlen, d. h. diejenigen, welche das Chlorsilber zu zersetzen vermögen, betheiligen sich an der Chlorophyllfarbstoff-Zersetzung also nur in untergeordnetem Grade, denn das gemischte blaue Licht ist reich, das gemischte gelbe Licht arm an diesen chemischen Strahlen, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man photographisches Papier dem Licht von verschiedener Brechbarkeit aussetzt¹⁾.

9. Die herbstliche Färbung der Blätter und die winterliche Färbung ausdauernder Pflanzentheile.

Viele Blätter färben sich im Herbst vor dem Abfallen roth. Diese Erscheinung lässt sich besonders schön an den Blättern von *Rhus*-arten, sowie an denjenigen von *Cornus sanguinea* und *Ampelopsis hederacea* studiren. Die genannten Blätter lassen den rothen Farbenton hauptsächlich an ihrer Oberseite erkennen, und die mikroskopische Untersuchung zarter Querschnitte lehrt uns in der That, dass ins Besondere die Zellen des Palissadenparenchyms das rothe Pigment enthalten. Dieses ist im Zellsaft aufgelöst. Die Epidermiszellen führen keinen Farbstoff. Bei der herbstlichen Gelbfärbung der Blätter nehmen die sich desorganisirenden Chlorophyllkörner einen gelblichen Farbenton an, wie wir dies z. B. feststellen können, wenn wir im Herbst Ahornblätter untersuchen. Protoplasma und Chlorophyllkörper werden bei fortschreitendem Vergilben der Blätter mehr und mehr aufgelöst; ihre Substanz geht in die ausdauernden Pflanzentheile über, und schliesslich bleibt nur Xanthophyll in Form kleiner glänzender Körnchen in den Blattzellen zurück. Einige Blätter, z. B. diejenigen der Eichen, färben sich im Herbst braun, eine Erscheinung, die auf eine Braunfärbung der Zellhäute, sowie des Zellinhalts zurückzuführen ist.

Interessant sind ferner die Veränderungen der Farbe solcher Pflanzentheile, die den Winter über ausdauern. Wenn im Herbst oder im Winter die ersten Fröste eingetreten sind, so beobachtet man, dass die dem Licht zugewendete Fläche der Zweige von *Thuja orientalis* eine braune Farbe angenommen hat²⁾. Diese Erscheinung beruht darauf, dass der Chlorophyllfarbstoff theilweise zerstört wird und rothe Pigmente in den Chlorophyllkörnern auftreten. Werden braun gefärbte Thujazweige in ein warmes Zimmer gebracht, so verschwindet der rothe Farbstoff, und die Untersuchungsobjecte ergrünen wieder. Lichtzutritt ist dazu nicht erforderlich. Gebräunte Zweige von *Thuja orientalis*, die ich bei 15—20° C. im Dunkeln hielt, waren nach acht Tagen aufs Neue grün geworden.

Die winterliche Rothfärbung ausdauernder Pflanzentheile ist auf die Bildung eines im Zellsaft löslichen rothen Pigments zurückzuführen, während die Chlorophyllkörper intact bleiben, höchstens Veränderungen ihrer Lage in den Zellen erfahren. Untersuchen wir im

1) Weitere Literatur vgl. bei DERMER, Lehrbuch d. Pflanzenphysiologie, 1883, S. 18.

2) Specielle Angaben über den anatomischen Bau der Zweige von *Thuja* (freilich *Th. occidentalis*, nicht *Th. orientalis*) findet man bei FRANK, Pringsheim's Jahrbücher, Bd. 9, S. 159.

Winter Querschnitte der Blätter von *Mahonia aquifolium*, so ergibt sich, dass besonders die Zellen des schön entwickelten Palissadenparenchyms rothes Pigment enthalten ¹⁾.

10. Die Entstehung des Chlorophyllfarbstoffes.

Einige Samen von *Lupinus* werden in Gartenerde ²⁾, die sich in Blumentöpfen befindet, im Dunkeln, z. B. in einem Schrank, zum Keimen gebracht. Es ist gar nicht so ganz leicht, einen Raum herzustellen, in welchem nahezu absolute Dunkelheit herrscht, und wenn man Pflanzen bei möglichst vollkommenem Lichtabschlusse cultiviren will, so darf man diese Thatsache nicht aus dem Auge verlieren. Für unseren Zweck genügt es übrigens, wenn man die mit den Samen beschickten Blumentöpfe in dem Schrank unter einem undurchsichtigen Papprecipienten aufstellt und das Schlüsselloch des Schrankes sorgfältig verstopft.

Das hypocotyle Glied und die Cotyledonen treten bald über die Erdoberfläche hervor, wenn die Keimungsbedingungen einigermaassen günstige sind; aber die Keimblätter erscheinen nicht grün, wie diejenigen am Licht erwachsener Lupinenkeimpflanzen, sondern sie besitzen eine gelbe Farbe. Untersuchen wir Querschnitte der Cotyledonen mikroskopisch, so erkennen wir die Epidermis, die Gefässbündel, sowie das Blattparenchym deutlich. Die Zellen des letzteren, zumal die mehr peripherisch gelegenen, enthalten, abgesehen von sonstigen Inhaltsbestandtheilen, kleine, gelb gefärbte Körnchen, die Etiolinkörner. Setzt man die im Dunkeln cultivirten Keimlinge dem Licht aus, so ergrünen sie bald, und wir finden nun in den Zellen des Blattparenchyms Chlorophyllkörner. Dieselben sind unter dem Einfluss des Lichtes aus den Etiolinkörnern hervorgegangen, unterscheiden sich von diesen aber nicht allein durch ihre grüne Farbe, sondern ebenso durch ihre beträchtlichere Grösse. Werden Keimpflanzen von *Phaseolus* oder *Pisum* im Dunkeln zur Entwicklung gebracht, so erzeugen dieselben lange, weiss gefärbte Stengeltheile und kleine, gelbe Blätter. Ich fand, dass die Blätter von Erbsenkeimpflanzen, die im Finstern mehrere Internodien gebildet hatten, und welche dann ans Licht gelangten, nicht sämmtlich, sondern nur theilweise ergrünt. Die jüngeren Blätter bildeten freilich am Licht Chlorophyll. Die älteren blieben aber gelb.

Die meisten Pflanzen bilden allein bei Lichtzutritt normales grünes Chlorophyll; einige Gewächse vermögen aber auch im Finstern zu ergrünen. Werden z. B. Samen von *Pinus silvestris* in Gartenerde ausgesät und bei Lichtabschluss zur Keimung gebracht (die Keimung geht relativ langsam vor sich), so bricht zunächst die Wurzel hervor. Dann streckt sich das hypocotyle Glied, erscheint aber zunächst knie-

1) Ueber die winterliche Färbung ausdauernder Pflanzentheile vgl. H. v. MOHL, Vermischte Schriften, S. 375, und G. HABERLANDT, Sitzungsberichte d. Akademie d. Wiss. zu Wien, Bd. 72, Abtheil. I, Aprilheft.

2) Es sei hier ein für alle Mal bemerkt, dass man zu Culturversuchen gewöhnlich am besten die schwarze, sehr humusreiche Erde benutzt, wie sie für Gewächshauspflanzen gebraucht wird. Man feuchtet die Erde so weit an, dass sie sich eben noch zwischen den Händen zu einer feinkrümeligen Masse zerdrücken lässt, wirft sie durch ein Sieb, dessen Oeffnungen 1,5 mm im Quadrat messen, und rüttelt sie in die Culturegefässe ein.

förmig gebogen, weil die Cotyledonen noch im Samen stecken. Endlich treten die Keimblätter aus dem Boden heror, das hypocotyle Glied streckt sich dann gerade, und die Keimung ist vollendet. Auffallend erscheint vor allem der Umstand, dass die Cotyledonen grün sind. Ich habe mich davon überzeugt, dass dies Ergrünen der Pinuskeimblätter in einem finsternen Raume erfolgt, in welchem Weizenkeimpflanzen nicht ergrünen, sondern nur eine gelb gefärbte Plumula entwickeln.

Die im Finstern erwachsenen Keimlinge mono- sowie dicotyler Pflanzen (*Phaseolus*, *Pisum*, *Raphanus*, *Triticum*, *Zea* etc.) ergrünen nicht nur, wenn sie relativ hellem Licht ausgesetzt werden, sondern die Chlorophyllbildung erfolgt auch schon in einem sehr gedämpften Licht, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man die Untersuchungsobjecte an der hinteren Wand eines Zimmers aufstellt und sie hier noch in geeigneter Weise beschattet. Man kann Pflanzen ferner auch in künstlichem Licht zum Ergrünen bringen. So stellte ich im Dunkeln erwachsene Weizenkeimlinge mit 2—3 cm langer Plumula 15 cm entfernt von der Flamme einer Petroleumlampe auf. Die Keimlinge befanden sich mit etwas Wasser in einer Krytallisirschale. Diese von dem Licht, welches von der Lampe ausging, beleuchteten Untersuchungsobjecte ergrüntten deutlich in wenigen Stunden; Controlpflanzen, die im Dunkeln gehalten wurden, ergrüntten nicht.

Lehrreich ist es ferner, den Einfluss des Lichtes von verschiedener Brechbarkeit auf die Chlorophyllbildung zu studiren. Zu dem Ende bringt man z. B. Weizenkeimlinge, deren Plumula etwa 2 cm lang ist, und die sich im Finstern entwickelt haben, mit etwas Wasser in kleine Glasschälchen. Diese, oder auch kleine mit Erde gefüllte Blumentöpfe, in denen die Keimlinge zur Entwicklung gelangten, werden nun unter doppelwandige Glasglocken gestellt, von denen die eine mit einer Auflösung von doppelt-chromsaurem Kali angefüllt ist, während die zweite eine Auflösung von Kupferoxydammoniak enthält (vgl. unter 8). Man kann sich leicht davon überzeugen, indem man zugleich Stücke photographischen Papiers unter die Glocken legt, dass das gemischte gelbe Licht fast völlig frei von sogen. chemischen Strahlen ist, während das Licht, welches die Kupferoxydammoniaklösung passirt hat, die Zersetzung des Chlorsilbers sehr schnell bewirkt. Als ich die Apparate am Morgen eines trüben Novembertages in einem nach Süden gelegenen Zimmer bei einer Temperatur von ca. 20° C. in einer Entfernung von 5 m vom Fenster aufgestellt hatte, fand ich die Plumula der Weizenkeimlinge nach 24 Stunden unter dem Einfluss des gemischten gelben Lichtes völlig ergrünt, während diejenigen Keimpflanzen, welche der Einwirkung des gemischten blauen Lichtes ausgesetzt gewesen waren, eine Plumula von hellgrüner Farbe besaßen. Setzt man die Apparate hingegen dem directen Sonnenlicht aus, dann erfolgt das Ergrünen im gemischten blauen Licht schneller als im gemischten gelben Licht. Dem Resultat dieses letzteren vergleichenden Experiments gegenüber lassen sich aber, wenn man nicht ganz besondere Vorsichtsmaassregeln in Anwendung bringt, Bedenken geltend machen, denn ich habe mich davon überzeugt, dass sich die Luft unter einer mit Kupferoxydammoniak beschickten doppelwandigen Glocke, wenn sie dem Einfluss directen Sonnenlichtes ausgesetzt wird, viel stärker erwärmt als die Luft unter

der mit doppelt-chromsaurem Kali angefüllten Glocke. Trotzdem ist es sicher, dass es nicht als gleichgültig für das Resultat des Experiments betrachtet werden darf, ob man die im Dunkeln cultivirten Untersuchungsobjecte dem diffusen Licht oder dem directen Sonnenlicht preisgibt. Werden Weizenkeimlinge mit gelber Plumula dem diffusen, andere gleichzeitig dem directen Sonnenlicht ausgesetzt, so ergrünen jene schnell, z. B. im Laufe von 3 Stunden, während diese weit langsamer normalen Chlorophyllfarbstoff erzeugen. Wir haben nun unter 8 gesehen, dass sich das Chlorophyllpigment in alkoholischen Extracten aus grünen Pflanzen im directen Sonnenlicht sehr schnell zersetzt (verfärbt), während diffuses Licht dieselbe Wirkung sehr langsam geltend macht, und diese Thatsache muss bei der Erklärung der im Vorstehenden zur Kenntniss gebrachten Erscheinungen Beachtung finden. Im directen Sonnenlicht, mag dasselbe direct als solches, oder nachdem es eine Lösung von doppelt-chromsaurem Kali passirt hat, auf Keimlinge einwirken, ergrünen diese langsam, weil das entstehende Chlorophyllpigment zum grossen Theil wieder zerstört wird. Im diffusen Licht, wie auch im directen Sonnenlicht, welches eine Auflösung des Kupferoxydammoniaks passirt hat, kann keine energische Chlorophyllzersetzung erfolgen, deshalb häuft sich das entstehende Blattgrün schnell in den Zellen der Keimpflanzen an. Schwaches diffuses Licht wirkt kaum mehr zersetzend auf den Chlorophyllfarbstoff ein, und wenn man Keimpflanzen weit entfernt vom Fenster unter doppeltwandigen Glocken aufstellt, so ergrünen sie im gemischten gelben Licht schneller als im gemischten blauen, weil ersteres fast lediglich seine grössere chlorophyllbildende Kraft geltend macht, während die chlorophyllzersetzende sehr in den Hintergrund tritt¹⁾.

Will man untersuchen, ob die dunkeln Wärmestrahlen ein Ergrünen im Finstern erwachsener Keimlinge hervorrufen können, so bringt man z. B. Weizenkeimlinge mit gelber Plumula, die sich in kleinen Gläschen befinden, unter doppeltwandige, mit einer Auflösung von Jod in Schwefelkohlenstoff angefüllte Glasglocken. Bei hinreichender Concentration lässt diese Lösung gar keine Lichtstrahlen, wohl aber die Wärmestrahlen passiren. Die an ihrem unteren Rande mit Sand umgebenen Glocken werden dem directen Sonnenlicht oder diffusum Tageslicht ausgesetzt; ein Ergrünen der Untersuchungsobjecte tritt aber nicht ein.

Handelt es sich um das Studium der Abhängigkeit der Chlorophyllbildung von den Temperaturverhältnissen, so ist es z. B. bequem, Gerstenkeimlinge als Untersuchungsobjecte zu benutzen. Eine ganze Anzahl kleiner Blumentöpfe füllen wir mit Gartenerde an, sähen Gerstenkörner in jeden Topf und stellen dieselben ins Finstere. Wenn die Plumula der Pflänzchen etwa 2 cm Länge erreicht hat, so bringen wir einen Blumentopf vor das Fenster eines nach Norden gelegenen Zimmers, in welchem eine Temperatur von 6° C. herrscht. Ein anderer Topf wird in einem benachbarten Zimmer, in welchem das Thermometer 20° C. anzeigt, aufgestellt. Die Pflanzen sind also gleichen Beleuchtungsverhältnissen, aber verschiedener Temperatur ausgesetzt, und es ergiebt sich, dass das Ergrünen bei 6° C. weit langsamer als bei 20° C. erfolgt. Bei 30° C. geht die Chlorophyllbildung noch etwas schneller als bei 20° C. vor sich, bei 37° C. wieder langsamer, und bei 45° C. findet kein Ergrünen

1) Vgl. WIESNER, Sitzungsberichte d. Akademie d. Wiss. in Wien, Bd. 69, I. Abtheilung.

mehr statt. Um die Pflanzen Temperaturen von 30, 37 und 45° C. auszusetzen, stellen wir sie in Thermostaten auf, die durch Heizung auf diese Temperaturen gebracht worden sind (Abbildung und Beschreibung eines geeigneten Thermostaten findet man im zweiten Abschnitt bei Gelegenheit der Untersuchungen über den Wurzeldruck). Es ist noch zu bemerken, dass die Untersuchungsobjecte, bevor sie beleuchtet werden, einige Zeit in den Räumen von genau bekannter Temperatur verweilt haben müssen, damit sich ihnen sowie den Töpfen und dem Bodenmaterial diese mitgetheilt hat. Es existiren nach dem Gesagten Temperatur-Minima, -Optima und -Maxima für den Ergrünungsprocess der Pflanzen. Die Lage derselben ist für verschiedene Pflanzen aber keineswegs genau die nämliche¹⁾.

Endlich wollen wir noch den Nachweis liefern, dass der Ergrünungsprocess am Licht nicht bei Sauerstoffausschluss erfolgen kann. Wir füllen zwei retortenartige Gefässe (*a* und *b*) mit ausgekochtem und in verschlossenen Gefässen wieder

abgekühltem destillirtem Wasser an, bringen einige im Dunkeln erwachsene Weizenkeimlinge in das Wasser und stellen die Gefässe unter Benutzung eines geeigneten Stativs derartig auf, dass ihre Mündungen unter Quecksilber tauchen (vgl. Fig. 11). Nun verdrängen wir das Wasser in dem Apparat *a* bis auf einen kleinen Rest durch reines Wasserstoffgas, das Wasser im Apparat *b* aber durch atmosphärische Luft. Werden die Gefässe jetzt dem Einflusse diffusen Lichtes ausgesetzt, so ergrünen die Keimlinge in *b* schnell, diejenigen in *a* aber nicht²⁾.

Es sei noch bemerkt, dass man das Wasserstoffgas aus Zink durch Uebergiessen desselben mit verdünnter Salzsäure herstellt, und zur Reinigung Lösungen von Kalihydrat, salpetersaurem Silberoxyd und übermangansaurem Kali passiren lässt. Zur Gasentwicklung dient zweckmässig ein KIRP'scher Apparat (vgl. den dritten Abschnitt).

Fig. 11. Apparat zur Cultur von Pflanzen in sauerstofffreiem Raum.

11. Die Sauerstoffproduction bei der Assimilation.

Unter dem Einfluss des Lichtes findet in den Chlorophyllkörpern die Zersetzung von Kohlensäure statt. Der Sauerstoff wird abge-

1) Vgl. WIESNER, Die Entstehung des Chlorophylls in den Pflanzen, Wien 1877.

2) Vgl. DETMER, Landwirthschaftliche Jahrbücher, Bd. 11.

schieden und kann, wenn man geeignete Untersuchungsobjecte benutzt, leicht als solcher nachgewiesen werden.

Wir bringen in ein Glas etwa 200 ccm Brunnenwasser, in das wir nicht zu viel reine Kohlensäure einleiten. Die Kohlensäure wird aus Marmor durch Uebergiessen desselben mit verdünnter Salzsäure entwickelt, und sie muss zur Befreiung von etwa mitgerissener Salzsäure, bevor sie in das Brunnenwasser eintritt, eine Auflösung von doppelt-kohlensaurem Natron passiren. Als Untersuchungsobject wählen wir zunächst ein ziemlich langes Sprossende von *Hippuris vulgaris*, das, wie es Fig. 12 zeigt, unter dem Wasserspiegel mit seiner Basis in ein mit Wasser angefülltes Probirglas hineinragt. Die Vorrichtung wird nunmehr einige Zeit dem directen Sonnenlicht ausgesetzt. Es zeigt sich, dass von der Schnittfläche des Untersuchungsobjectes Gasblasen in dem Wasser emporsteigen, und in dem Probirglas sammelt sich nach und nach eine erhebliche Gasmenge an. Wenn wir die Mündung des Reagensrohres schliesslich unter Wasser mit dem Finger verschliessen, dasselbe umkehren und einen glimmenden Span einführen, so brennt derselbe sofort mit lebhaft leuchtender Flamme. Unsere Pflanze hat also Sauerstoff producirt.

Dies ungemein lehrreiche Experiment zur Nachweisung der Sauerstoffabscheidung assimilirender Pflanzen kann auch in etwas modificirter Weise angestellt werden (vgl. Fig. 13). Eine ganze Anzahl Zweigstücke von *Elodea* oder *Ceratophyllum* wird unter einen Trichter in ein mit kohlensäurehaltigem Wasser angefülltes Glas gebracht. Ueber die sich noch unter dem Wasserspiegel befindende Mündung des Trichterrohres wird ein mit Wasser angefülltes Probirglas gestülpt und der Apparat dem directen Sonnenlicht ausgesetzt. Der Sauerstoff oder, besser gesagt, die sauerstoffreiche Luft sammelt sich, wie bei der Ausführung des vorigen Experimentes, in dem Reagensglase an. Das Pflanzenmaterial zu diesen Versuchen steht auch lange Zeit im Winter zur Verfügung, wenn man kräftige *Elodea*-Exemplare im Herbst in ein grosses, mit Brunnenwasser gefülltes Gefäss bringt, das Gefäss im warmen Zimmer am Fenster aufstellt und das Wasser häufig erneuert.

Ein Glaszylinder wird mit Brunnenwasser, in das wir, wenn dasselbe arm an freier Kohlensäure ist, eine kleine Menge dieses Gases eingeleitet haben, angefüllt. Wir bringen nun ein Zweigstück von *Elodea* oder *Hippuris*, das wir zweckmässig an einen Glasstab angebunden haben, in die Flüssigkeit (vgl. Fig. 14) und werden beobachten, dass aus der Schnittfläche am oberen Ende der Pflanzentheile bei Lichtzutritt Gasblasen entweichen. Die Anzahl der aus sauerstoffreicher Luft bestehenden Gasblasen lässt ohne Weiteres auf die Energie schliessen, mit der die grünen Pflanzentheile assimiliren. Im directen Sonnenlicht z. B. scheiden *Elodea*-zweige häufig einen so lebhaften Strom feiner Blasen ab, dass man die Zahl der in bestimmter Zeit entweichenden Blasen nicht oder nur mühsam bestimmen kann. Andere Zweige der nämlichen Pflanze assimiliren unter denselben Umständen weniger energisch. Die aus den Schnittflächen von *Hippuriszweigen* entweichenden Gasblasen sind ziemlich gross und treten nicht in so übermässiger Anzahl hervor.

Ohne näher auf die Beziehungen zwischen der Intensität des Lichtes einer- und der Energie der Assimilation andererseits einzugehen, ist es doch leicht, sich davon zu überzeugen, dass die Sauer-

stoffabscheidung grüner Pflanzentheile im hellen diffusen Licht lebhafter als im mehr gedämpften Licht vor sich geht. Ein an einem Glasstab festgebundenes Elodeazweigstück wird unter Wasser dem Einfluss hellen diffusen Lichtes ausgesetzt. Wir ermitteln die Zahl der Blasen, welche in bestimmter Zeit, z. B. in einer oder in fünf Minuten, aus der Schnittfläche hervortreten. Nun stellen wir eine mattgeschliffene Glasplatte vor unserem Apparat auf, und es wird sich zeigen, dass jetzt in einer oder in fünf Minuten weniger Blasen als vorher in dem Wasser emporsteigen. Beschatten wir den Elodeazweig stark, so hört die Assimilation, damit auch die Sauerstoffproduction, gänzlich auf.

Elodea- oder Hippuriszweige werden in Brunnenwasser, in welches

Fig. 13.

Fig. 12.

Fig. 14.

Fig. 12. Apparat zum Auffangen des von assimilirenden Wasserpflanzen produicirten Sauerstoffs.

Fig. 13. Apparat zu demselben Zweck.

Fig. 14. Apparat zur Beobachtung der Gasblasenabscheidung assimilirender Wasserpflanzen.

man eventuell etwas Kohlensäure eingeleitet hat, sehr hellem diffusen Licht ausgesetzt. Man ermittelt die in bestimmter Zeit entweichende Blasenzahl. Man deckt nun eine mit einer Lösung von doppelt-chromsaurem Kali gefüllte doppelwandige Glasglocke über das die Pflanzentheile enthaltende Gefäß, um abermals die Zahl der entweichenden Blasen zu bestimmen. Dann entfernen wir die Glocke, um sie, nachdem wir abermals die Blasenzahl ermittelt haben, die im hellen diffusen Licht oder im directen Sonnenlicht ausgeschieden wird, durch

eine mit Kupferoxydammoniak angefüllte doppelwandige Glasglocke zu ersetzen. Auch unter diesen Umständen stellen wir die Blasen-
zahl fest. Man thut wohl, zur Controle der Temperaturverhältnisse
während der einzelnen Stadien des Versuchs ein Thermometer in das
die Untersuchungsobjecte umgebende Wasser zu bringen. Auf die
im Vorstehenden angegebene Weise gelingt es, wovon ich mich über-
zeugte, sehr leicht, die interessante Thatsache festzustellen, dass die
weniger brechbaren Strahlen, welche die Lösung des doppelt-chrom-
sauren Kali passirt haben, eine fast ebenso energische Sauerstoffab-
scheidung aus grünen Pflanzentheilen hervorrufen, wie das gemischte
weisse Licht, während dieser Process der Sauerstoffabscheidung unter
dem Einfluss der brechbaren Strahlen, welche die Kupferoxydammoniak-
lösung passiren können, mit nur sehr geringer Energie erfolgt ¹⁾.

Elodea- oder Hippuriszweige werden nebst einem Thermometer
in kohlenensäurehaltiges Wasser in ein Becherglas gebracht. Die Tem-
peratur des Wassers möge etwa 12° C. betragen. Wir ermitteln die
Blasenzahl, welche die Untersuchungsobjecte in bestimmter Zeit, z. B.
in 1, 3 oder 5 Minuten, bei Lichtzutritt abscheiden. Jetzt erwärmen
wir das Wasser im Becherglas, ohne die Pflanzen aus demselben zu
entfernen, bis auf etwa 24° C. Es wird sich zeigen, dass die von
den Elodea- oder Hippuriszweigen producirt Blasenzahl jetzt erheb-
lich grösser ausfällt, als bei niederer Temperatur. Zu achten ist natür-
lich darauf, dass die Pflanzen bei den vergleichenden Versuchen mög-
lichst genau derselben Lichtintensität ausgesetzt sind; man stellt die
Experimente daher am besten bei völlig wolkenlosem Himmel an.
Das Temperaturoptimum für die Sauerstoffabscheidung von Elodea
und Hippuris, welches übrigens noch nicht genauer ermittelt ist,
dürfte etwa bei 32° C. anzunehmen sein. Bei Temperaturen, die
jenseits dieses Temperaturoptimums liegen, erfolgt die Sauerstoffab-
scheidung wieder langsamer ²⁾.

Einige Elodeazweige setzen wir in kohlenensäurehaltigem Brunnen-
wasser, das zuvor mit Chloroform geschüttelt worden ist, dem Einfluss
des Lichtes aus. Die Sauerstoffabscheidung dauert merkwürdig lange
(bei meinen Versuchen über $\frac{1}{4}$ Stunde) fort; endlich erlischt sie in
Folge der giftigen Wirkung des Chloroforms gänzlich ³⁾.

Will man den Nachweis liefern, dass chlorophyllfreie Pflanzen-
theile nicht zu assimiliren vermögen, so braucht man z. B. nur Wurzel-
stücke in kohlenensäurehaltigem Wasser dem Licht auszusetzen. Sauer-
stoffabscheidung erfolgt nicht.

Eine sehr interessante Méthode zum Nachweis der assimilatorischen
Thätigkeit grüner Zellen ist zuerst von ENGELMANN ⁴⁾ in Anwendung ge-
bracht worden. Wir entnehmen den Reinculturen von Bacterium Termo,
die wir in einer später anzugebenden Weise hergestellt haben, schwärmende
Individuen, bringen dieselben in einem Wassertropfen auf den Object-
träger, legen das Deckglas auf und verkitten dessen Ränder mit Vaseline.

1) Genauere Angaben über den Einfluss des Lichtes von verschiedener Brech-
barkeit auf den Assimilationsprocess finden sich in meinem Lehrbuche der Pflanzen-
physiologie. Ueber Assimilationsversuche im objectiven Spectrum vergl. PFEFFER,
Botan. Zeitung, 1872, No. 23. Ueber Herstellung des objectiven Spectrums vergl.
den Abschnitt über heliotropische Nutationen.

2) Vgl. HEINRICH, Versuchsstationen, Bd. 13, S. 136.

3) Vgl. DETMER, Landwirthschaftliche Jahrbücher, Bd. 11.

4) Vgl. ENGELMANN, Botan. Zeitung, 1881 und 1882.

Unter Benutzung starker Vergrößerung constatiren wir, dass die sehr sauerstoffbedürftigen Bacterien bald zur Ruhe kommen; nur in der Nähe von Luftblasen im Präparat dauert die Bewegung fort, um indessen auch schliesslich aufzuhören. Haben wir aber gemeinsam mit den Schwärmern einen Algenfaden in das Präparat gebracht, so dauert die Bewegung der Bacterien, wenn die Alge beleuchtet ist, ununterbrochen fort. Der von den Chlorophyllkörpern erzeugte Sauerstoff wirkt als Reizursache und bedingt die Bewegung sowie auch die Bewegungsrichtung der Spaltpilze. Die Ansammlung derselben, welche in der Nähe der sauerstoffspendenden Alge eintritt, folgt, wenn wir z. B. mit Spirogyrafäden experimentiren, dem Verlauf der grünen Bänder. Unsere aërotropen Schwärmer sind also ein ausgezeichnetes Reagens auf Sauerstoff. Bei Verdunkelung der Algenfäden im Präparat hört die Bacterienbewegung auf; sie macht sich aber bei erneuter Beleuchtung sofort wieder geltend, weil dann abermals Sauerstoff durch Assimilation in hinreichender Quantität frei wird ¹⁾).

12. Die Kohlensäure und der Assimilationsprocess.

Die Kohlensäure, welche im Assimilationsprocess verarbeitet wird, entstammt ihrer Gesamtmasse nach in letzter Instanz der atmosphärischen Luft. Diese repräsentirt ein Gasgemisch, das, abgesehen von einigen unwesentlichen Beimischungen, aus etwa 79 Volumprocent Stickstoff, 21 Volumprocent Sauerstoff und wenig Kohlensäure (in 10000 Volumthl. Luft sind nur 3 Volumth. CO_2 vorhanden) besteht. Dass die Luft Sauerstoff enthält, lässt sich leicht demonstriren. Man befestigt an dem einen Ende eines zweimal in einem rechten Winkel gebogenen dicken Drahtes ein mit Alkohol getränktes Stück Watte. Der Alkohol wird entzündet und ein umgekehrt gehaltener Glascylinder über die Flamme gestülpt. Taucht man die Mündung des Cylinders jetzt schnell unter Wasser, so erhebt sich die Flüssigkeit sogleich in demselben, während die Flamme alsbald erlischt. Der Alkohol bedarf des Sauerstoffes zu seiner Verbrennung; er entnimmt ihn der Luft im Glascylinder, und in dem Maasse, in welchem der Sauerstoff verschwindet, steigt das Wasser in die Höhe.

Dass die atmosphärische Luft Kohlensäure enthält, ist ebenfalls leicht zu beweisen. Ein Luftstrom, den man mit Hülfe einer Wasserluftpumpe oder eines Tropfspirators erzeugt, wird zu dem Zweck durch klares Barytwasser geleitet. Dieses trübt sich dabei allmählich, weil die Kohlensäure eine Abscheidung von kohlensaurem Baryt bedingt. Bei genauen quantitativen Untersuchungen über den Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft muss die Menge der den Apparat durchstreichenden Luft mit Hülfe einer Gasuhr gemessen werden. (Ausführliche Angaben über die Bestimmung des Kohlensäuregehaltes von Gasgemischen vergl. im dritten Abschnitt bei Untersuchung der Athmungsvorgänge.)

Das Wasser ist im Stande, eine nicht unerhebliche Luftmenge zu absorbiren. Wird ein etwa bis zur Hälfte mit Brunnenwasser gefülltes Glas unter den Recipienten einer Luftpumpe gestellt, und evacuirt man nun, so entweicht die im Wasser aufgelöste Luft alsbald, weil der auf

1) Die ENGELMANN'sche Methode ist auch benutzt worden, um die Stärke der Kohlensäurezersetzung und Sauerstoffproduction in den verschiedenen Theilen des Spectrums zu messen. Zu diesem Zwecke dient das von ZEISS (Catalog 1885, Nr. 93, Preis 124 M.) angefertigte Mikrospectralobjectiv.

dem Wasser lastende Luftdruck schnell sinkt. Versetzt man etwas Brunnenwasser mit klarem Kalk- oder Barytwasser, so entsteht eine mehr oder minder erhebliche Trübung der Flüssigkeit, weil sich kohlen-saurer Kalk resp. Baryt abscheidet. Freilich beweist das Auftreten dieser Trübung nicht streng, dass das Wasser freie Kohlensäure in Lösung enthält; sie kann auch durch Kohlensäure verursacht werden, die in lockerer Bindung im Kalkbicarbonat des Wassers vorhanden ist.

Ohne die Gegenwart von Kohlensäure in den die Pflanzen umgebenden Medien (Luft oder Wasser) ist keine Assimilation, keine

Bildung organischer Substanz und natürlich auch keine Sauerstoffproduction möglich. Der Nachweis, dass in der grünen Pflanzenzelle nur dann organische Körper neu erzeugt werden, wenn es nicht an Kohlensäure mangelt, soll später geliefert werden. Hier wollen wir ein Experiment ausführen, dessen Resultat deutlich zeigt, dass die chlorophyllhaltigen Pflanzenzellen nur dann Sauerstoff produciren, wenn ihnen Kohlensäure zur Disposition steht. Ein Glaskolben von etwa 400 ccm Capacität wird mit 300 ccm Brunnenwasser angefüllt¹⁾. Wir bringen nun eine erhebliche Menge Elodeapflanzen in das Wasser, verschliessen die Kolbenmündung mit einem durchbohrten Kautschukkork und führen in die Bohrung den einen Schenkel eines Glasrohres ein, das durch seinen anderen Schenkel mit einem U-förmigen Glasrohre in Verbindung steht, welches vorher mit Bimssteinstückchen, die mit Kalilauge getränkt sind, und mit Stückchen Aetzkali angefüllt worden ist (vgl. Fig. 15). Die Pflanzen leiden keinen Luftmangel, denn die Luft kann durch das U-förmige Rohr zum Wasser ge-

Fig. 15. Apparat zur Feststellung der Thatsache, dass grüne Pflanzen nur dann Sauerstoff produciren können, wenn ihnen Kohlensäure zur Verfügung steht.

langen. Der Zutritt von Kohlensäure aus der Atmosphäre zu den Pflanzen ist dagegen ausgeschlossen. Setzen wir unseren Apparat dem Einfluss des directen Sonnenlichtes aus, so sehen wir, dass die Pflanzen eine lebhaft Sauerstoffabscheidung auf Kosten der im Wasser gelösten Kohlensäure unterhalten. Wir fassen bestimmte Elodeaexemplare genauer ins Auge und bestimmen von Zeit zu Zeit, etwa alle halbe

1) Zweckmässiger ist es noch, an Stelle des Kolbens einen Glaszylinder von geringem Durchmesser zu benutzen.

Stunde, die Anzahl von Gasblasen, welche sie in einer Minute liefern. Es ergibt sich dabei, dass die Sauerstoffabscheidung allmählich schwächer und schwächer wird; endlich (bei meinen Experimenten nach 6 Stunden) hört die Sauerstoffentwicklung völlig auf, weil die Kohlensäure des Wassers verbraucht wird. Oeffnen wir den Apparat jetzt und leiten etwas Kohlensäure in das Wasser ein, so beginnt die Sauerstoffabscheidung der Pflanzen am Licht aufs Neue¹⁾.

13. Volumetrische Verhältnisse des Gaswechsels bei der Assimilation.

Wir stellen unsere Untersuchungen nach einer Methode an, die von PFEFFER²⁾ genau beschrieben worden ist, und die auch HOLLE³⁾ benutzte. Der Apparat ist in Fig. 16 abgebildet. Den wesentlichsten Theil desselben macht ein an seinem oberen Ende bauchig erweitertes Glasrohr aus, dessen Gesamthöhe etwa 360 mm beträgt, von welchen etwa 260 mm auf das calibrirte Rohr *c* (im Folgenden Steigrohr genannt) fallen. Dieses ist am oberen Ende in einer Länge von 70 bis 75 mm zu einem Bauche *b* aufgeblasen und endet mit dem kleinen offenen Rohr *a*. Der Volumengehalt des gesamten Apparates beträgt etwa 115 bis 120 cem, von denen etwa 75 dem Bauche zukommen. Der Nullpunkt für die Graduierung wird von der durch die freie Aussenöffnung des Röhrchens *a* gelegten Ebene gebildet; die Theilstriche sind aber erst auf das Steigrohr aufgetragen, dessen Durchmesser, wie noch bemerkt werden mag, 14—15 mm beträgt. Die Theilung kann, was in der Abbildung nicht zum Ausdruck gelangt, bequem bis auf $\frac{2}{10}$ cem durchgeführt werden.

Bei der Ausführung der Versuche über die Volumenverhältnisse beim Gaswechsel assimilirender Blätter wird der Blattstiel der Untersuchungsobjecte nöthigenfalls bis auf ein kurzes Stück weggesehritten, und an dieses kurze Stück ein ganz dünner Eisendraht (*d*) vermittelst Durchstechens und mehrmaligen Umwickelns befestigt. Das an dem Draht befestigte Blatt wird in dem Steigrohr emporgeschoben, eine Operation, die gut gelingt, wenn man die

Fig. 16. Apparat zur Bestimmung der Kohlensäuremenge, welche assimilirende Pflanzen zersetzen.

1) Vgl. FRANK SCHWARZ in Untersuchungen aus d. bot. Institut zu Tübingen, Bd. 1, S. 97.

2) Vgl. PFEFFER, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, H. 1.

3) Vgl. HOLLE, Flora 1877.

Blattränder sanft nach rückwärts umbiegt, das Untersuchungsobject in das Steigrohr einführt und unter Beihülfe eines Holzstabes nach aufwärts befördert.

Der Apparat wird nun derartig aufgestellt, dass das untere Ende des Steigrohres in ein Quecksilber enthaltendes Glasgefäß eintaucht¹⁾, und man bringt sofort 0,3 cem Wasser mit Hülfe einer an ihrem unteren Ende umgebogenen und zu einer feinen Spitze ausgezogenen Pipette über das Quecksilber in das Steigrohr. Ueber das bisher noch immer offene Rohr *a* ist ein Kautschukschlauch gezogen. Derselbe wird in Verbindung mit einer Wasser enthaltenden Saugflasche gesetzt, und indem man aus dieser durch Saugen etwas Luft entfernt, muss das Quecksilber im Steigrohr unseres Apparates emporsteigen. Der über das Röhrchen *a* gezogene Kautschukschlauch wird mittelst eines Quetschhahnes zur rechten Zeit abgeschlossen. Man führt dann in den Kautschukschlauch ein Stück Glasstab ein, das man nach Entfernung des Quetschhahnes bis auf die Ränder des Röhrchens *a* herunterdrückt, denen sich der Glasstab mit seiner abgeschliffenen und eingefetteten Fläche völlig anschliesst.

Wenn das Quecksilber im Steigrohr auf die angegebene Weise emporgehoben worden ist und sich nach einiger Zeit die Gastemperaturen ausgeglichen haben, so kann man zu den erforderlichen Ablesungen schreiten. Man liest das Gasvolumen am unteren Wassermeniscus ab, ferner die Höhe der Wasserschicht und den Stand des Quecksilbers über dem Niveau. Die in Millimetern angegebene Höhe der Quecksilbersäule sowie der der Wasserschicht entsprechende Quecksilberdruck repräsentiren die vom Barometerstand zu subtrahirenden Druckhöhen. Temperatur und Barometerstand sind natürlich genau zu notiren. Vom abgelesenen Gasvolumen ist noch das Volumen des Drahtes sowie des Blattes, welches man durch Eintauchen der Objecte in Wasser in bekannter Weise feststellt, abzugiehen, ebenso noch 0,3 cem für den Wassermeniscus. Das Gasvolumen wird jetzt auf 0° C., 1000 mm Quecksilberdruck und den Zustand der Trockenheit reducirt²⁾.

$$v^1 = \frac{(v - m)(b - b^1 - b^2)}{(1 + 0,00366 t^0)}$$

v^1 ist das reducirte Gasvolumen; v bezeichnet das abgelesene Gasvolumen, m die Meniscuscorrection, b den Barometerstand, b^1 die für die Quecksilbersäule im Steigrohr abzuziehende Druckhöhe, b^2 die Tension des Wasserdampfes bei der Temperatur t^0 .

Jetzt leitet man etwas (etwa 8 cem) gereinigte Kohlensäure in das Eudiometer ein, stellt abermals das Gasvolumen im Apparat fest

1) Das zu verwendende Quecksilber muss recht rein sein. Die Reinigung mehrfach gebrauchten Quecksilbers wird in folgender Weise ausgeführt. Man übergiesst das Metall in einer dickwandigen Flasche mit dem gleichen Volum Wasser, fügt wenig Salpetersäure hinzu und schüttelt die Mischung $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde lang gut durch. Nun wäscht man mit Wasser sorgfältig aus. Eventuell sind diese Operationen noch einmal zu wiederholen. Schliesslich trocknet man das Quecksilber mit Fliesspapier ab, erwärmt es in einer Schale unter einem Abzug auf 120° C., bedeckt die Schale mit einem Bogen Papier und lässt abkühlen. Endlich wird das Metall noch durch Schreibpapier filtrirt, das man mit einigen Nadelstichen versehen hat.

2) Vgl. BUNSEN, Gasometrische Methoden, 1857, und HEMPEL, Gasanalytische Methoden, 1890.

und kann durch Subtraction des früher gefundenen von dem nunmehr ermittelten und reducirten Gasvolumen leicht das Volumen der zugeführten Kohlensäure bestimmen. Beim Einleiten von Kohlensäure, überhaupt auch bei der Ausführung der vorhergehenden Operationen, ist darauf zu achten, dass man die Apparate möglichst wenig berührt, damit die Temperaturverhältnisse sich vor den Ablesungen möglichst schnell (in etwa 10—20 Minuten) ausgleichen können.

Alle analytischen Arbeiten müssen bei Ausschluss directen Sonnenlichtes vorgenommen werden. Ist die Kohlensäure in das Eudiometer eingeleitet, so kann man die Apparate aber, um recht energische Assimilation hervorzurufen, einige Stunden lang den directen Sonnenstrahlen exponiren. Gleich nach der Exposition wird das Blatt aus dem Eudiometer entfernt, wobei man dasselbe etwas dreht, wenn es das sperrende Quecksilber passirt, um anhaftende Luftblasen zu entfernen. Nach etwa 2 Stunden, wenn sich der Apparat völlig abgekühlt hat, liest man das Gasvolumen ab, führt mit Hülfe einer kleinen Pipette, die man am oberen Ende verschliesst und mit der Hand erwärmt, Kalilauge in das Steigrohr ein und ermittelt das Gasvolumen abermals, wenn die nicht durch den Assimilationsprocess zersetzte Kohlensäure absorbirt ist.

Die Experimente über den Gaswechsel bei der Assimilation stellt man zweckmässig mit Blättern von *Prunus laurocerasus* oder *Nerium* an. Vor der Einführung in das Eudiometer müssen die Blätter dem Licht ausgesetzt gewesen sein, damit sie keine absorbirte Kohlensäure in ihrem Gewebe enthalten. Die Blätter bleiben im Eudiometer 3 bis 6 Stunden dem Licht exponirt, eine Zeit, in der zumal im directen Sonnenlicht erhebliche Mengen der zugeführten Kohlensäure zersetzt werden können. Mit Bezug auf die Menge der in das Eudiometer einzuleitenden Kohlensäure sei bemerkt, dass 6—8 ccm genügen. In vielen Fällen, wenn nämlich die Intensität des Sonnenlichtes, dem die Blätter ausgesetzt werden, sehr bedeutend ist, empfiehlt es sich, über dem Eudiometer eine doppeltwandige, mit Wasser angefüllte Glocke (vgl. Fig. 9) aufzuhängen, damit die Erwärmung des Blattes und der Gasmenge im Apparat keine zu erhebliche werde. Man kann das Eudiometer übrigens ja auch bei zu intensivem Licht etwas beschatten, wobei Papierschirme gute Dienste leisten. Will man den Einfluss farbigen Lichtes auf die Energie der Kohlensäurezersetzung studiren, so hängt man doppeltwandige Glasglocken, die mit farbigen Lösungen angefüllt sind, über den Eudiometern auf und hält das von unten kommende Licht in geeigneter Weise unter Benutzung von schwarzem Wachstuch ab (vgl. PFEFFER's citirte Abhandlung).

Hier interessirt uns aber wesentlich nur das Verhalten der Blätter im gemischten weissen Licht. Unter dem Einfluss desselben werden in kurzer Zeit ansehnliche Kohlensäurequantitäten zersetzt, und man wird sich, wenn man die angegebene Methode bei der Ausführung der Untersuchungen sorgfältig handhabt, davon überzeugen, dass das zurückbleibende Gasvolumen im Eudiometer nach der Exposition der Blätter im Sonnenlicht ebenso gross ist, wie vor der Exposition. Von ganz kleinen Differenzen, welche in das Bereich der Beobachtungsfehler fallen, ist natürlich abzusehen. Bei der Assimilation wird also eine Sauerstoffmenge erzeugt, die dem Volumen nach gleich ist der Quantität der zersetzten Kohlensäure.

14. Der makro- und mikroskopische Nachweis von Stärke in den Assimilationsorganen.

In sehr zahlreichen grünen Pflanzentheilen wird als erstes leicht sichtbares Assimilationsproduct Amylum erzeugt. Es gehört daher zu den gewöhnlichsten Aufgaben des Pflanzenphysiologen, diese Stärke in den Assimilationsorganen nachweisen zu müssen, und dies kann sowohl auf makro- sowie auf mikrochemischem Wege geschehen. Wir fassen zunächst den ersteren Weg ins Auge.

Die einfachste, zuerst von SACHS ¹⁾ zu ausgedehnten Experimenten angewandte Untersuchungsmethode besteht darin, dass man die auf Stärkegehalt zu prüfenden Objecte (sehr zweckmässig ist es, mit den Blättern von Tropaeolum, Helianthus, Solanum oder Phaseolus zu arbeiten) einige Minuten in kochendes Wasser legt, um sie dann in recht starken, auf 60° C. erwärmten Alkohol zu bringen. Wenn man grössere Alkoholmengen benutzt, so nimmt derselbe den Chlorophyllfarbstoff der Blätter meist sehr schnell vollständig auf, und die extrahirten Untersuchungsobjecte sind nach wenigen Minuten farblos. Jetzt gelangen die Blätter in eine Jodlösung. Man bereitet diese, indem man eine grössere Menge Jod in starkem Alkohol auflöst und die Lösung dann in destillirtes Wasser einträgt, bis die Flüssigkeit etwa die Farbe eines dunkeln Bieres besitzt. Sehr zweckmässig verwendet man auch eine Jodjodkaliumlösung. Die Blätter bleiben eine halbe, eine oder mehrere Stunden in der Jodlösung liegen, bis sie keine weitere Farbenänderung erfahren; man hebt sie mit der Pincette aus der Lösung und legt sie in eine mit Wasser gefüllte weisse Porzellanschale. Bei völliger Abwesenheit der Stärke erscheinen die mit Jod gesättigten Blätter von hellgelber oder ledergelber Farbe. Kleine Stärkemengen verrathen sich durch schwärzliche Farbe der Blätter, grössere durch tiefer schwarze Farbe derselben. Wenn man die stärkereichen, mit Jod gesättigten Untersuchungsobjecte mehrere Stunden lang auf einem Teller in Wasser liegen lässt, so nehmen sie oft eine blaue Farbe an. Bei Experimenten, die ich mit Tropaeolumblättern anstellte, trat dieser Farbenton besonders schön hervor.

Wenn es sich darum handelt, auf mikrochemischem Wege die Frage zu entscheiden, ob in den Assimilationsorganen Stärke vorhanden ist oder fehlt, so werden die Untersuchungsobjecte (z. B. Algenfäden oder zarte Querschnitte aus Blättern etc.) zunächst zur Extraction des Chlorophyllpigmentes in starken, erwärmten Alkohol gelegt. Die gebleichten Präparate werden dann entweder kurze Zeit mit heisser, oder 20 Stunden lang mit kalter, mässig concentrirter Kalilauge in Berührung gebracht, sorgfältig mit Wasser ausgewaschen, zur völligen Neutralisation des Kalis mit verdünnter Essigsäure behandelt, abermals mit Wasser ausgewaschen und in einen Tropfen Jodjodkaliumlösung (bereitet durch Auflösen von 0,05 g Jod und 0,2 g Jodkalium in 15 g Wasser) gebracht ²⁾. Sehr bequem zu handhaben ist die folgende Methode des Nachweises von Stärke in grünen Zellen ³⁾. Die Untersuchungsobjecte (mit besonderem Erfolg benutzte

1) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 3, S. 1.

2) Vgl. BÖHM, Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. zu Wien, Bd. 22, S. 479, und SACHS, Botan. Zeitung, 1864, S. 291.

3) Vgl. A. MEYER, Das Chlorophyllkorn, 1883, S. 28.

ich die gar nicht weiter präparirten Blätter von *Elodea canadensis* und *Funaria hygrometrica*) werden ohne weiteres, oder, was oft erforderlich ist, nach der Extraction mit Alkohol auf dem Objectträger in einen Tropfen der Lösung des Chloralhydrats (5 Thl. Chloralhydrat auf 2 Thl. Wasser) gelegt, etwas Jodjodkaliumlösung hinzugesetzt und sofort beobachtet. Der Chlorophyllfarbstoff wird gelöst, die Stärkekörner quellen etwas auf, und sie nehmen in Berührung mit der Jodjodkaliumlösung eine schön blaue Färbung an, ebenso wie dies geschieht, wenn die mit Kali und verdünnter Essigsäure behandelten stärkehaltigen Untersuchungsobjecte mit dem Jodreagens in Contact gelangen.

Wollen wir uns davon überzeugen, dass das durch Assimilation gebildete Amylum nicht etwa an beliebigen Orten einer Zelle, sondern in den Chlorophyllkörpern vorhanden ist, so wählen wir zweckmässig *Spirogyra*, *Zygnema* oder Blätter von *Funaria hygrometrica* als Beobachtungsobjecte. Wir bedienen uns bei der Ausführung der Untersuchung der zuletzt angeführten Methode unter Zuhülfenahme von Chloralhydrat.

15. Die Assimilationsproducte.

Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass die Stärke in den Blättern zahlreicher Pflanzen als erstes leicht sichtbares Assimilationsproduct auftritt. Dagegen existiren andere Gewächse, welche selbst unter sehr günstigen Assimilationsbedingungen nur relativ geringe, resp. sehr kleine Stärkemengen oder endlich gar keine Stärke erzeugen. Am Nachmittag eines heissen Sommertages schneiden wir z. B. in derselben Stunde Blätter von *Tropaeolum majus*, *Phaseolus multiflorus*, *Helianthus annuus*, einer *Polygonum*art, einer *Gentiana*species, von *Tamus communis* und von *Allium Cepa* ab. Es ist am besten, wenn sich die Pflanzen, denen wir die Blätter entnehmen, unter möglichst ähnlichen Bedingungen entwickelt haben, wie solche z. B. im System der botanischen Gärten gegeben sind. Zu bemerken ist noch, dass wir stets mit völlig ausgewachsenen Blättern operiren müssen. Die Untersuchungsobjecte werden in der Art, wie es unter 14 angegeben worden ist, makroskopisch oder mikroskopisch auf ihren Stärkegehalt geprüft, und wir constatiren, dass die Blätter von *Tropaeolum*, *Phaseolus* und *Tamus* reichliche Amylummengen in ihren grünen Zellen enthalten, während die *Helianthus*blätter schon weniger Stärke führen. Noch geringer ist der Stärkegehalt der *Polygonum*blätter, sehr gering derjenige der *Gentiana*blätter, und die *Allium*blätter erweisen sich als völlig stärkefrei.

Zur weiteren Orientirung über die hier in Rede stehenden Verhältnisse stellen wir das folgende lehrreiche Experiment an. Eine erhebliche Quantität der Blätter von *Helianthus tuberosus*, die wir am Nachmittag eines heissen Sommertages gesammelt und nach Entfernung der Blattstiele in kleine Stücke zerschnitten haben, wird zwischen Leinwand mittelst einer Handpresse ausgepresst. Wir bestimmen das Volumen des gewonnenen, dunkel gefärbten Saftes, kochen ihn auf, ersetzen das verdunstete Wasser wieder, wenn die Flüssigkeit erkaltet ist, und filtriren sie. In genau der nämlichen Weise stellen wir uns Saft aus den Blättern von *Allium Cepa* dar, die zur

selben Zeit wie die Helianthusblätter eingesammelt worden sind. Wir ermitteln nun durch Filtriren diejenigen Saftmengen, welche zur Reduction von 10 cem FEHLING'scher Lösung erforderlich sind, und finden, dass eine bedeutende Quantität des Helianthussaftes, dagegen eine sehr geringe des Alliumsaftes zur Reduction der FEHLING'schen Lösung verbraucht wird ¹⁾. Blätter, die reichlichere Stärkemengen erzeugen, enthalten also wenig Glykose; Blätter, welche keine Stärke bilden, sind sehr glykosereich. Die Glykose in den Blättern von Allium und anderen Gewächsen ist, wie SACHS ²⁾ es schon vor langer Zeit aussprach, und wie es ARTHUR MEYER ³⁾ specieller feststellte, in der That als Assimilationsproduct zu betrachten.

Wir können die Untersuchungen über Stärke- und Zuckergehalt assimilirender Laubblätter auch, wie folgt, ausführen und ebenfalls einerseits Helianthus-, andererseits Alliumblätter verwenden. Das Untersuchungsmaterial wird in einem grossen Trockenschranke bei etwa 80° C. möglichst schnell getrocknet, dann sehr fein zerrieben und bei 100° C. wasserfrei gemacht. Circa 5 g Trockensubstanz übergiessen wir in einem Becherglas mit 100 cem Wasser von 30° C., digeriren einige Stunden, filtriren die Lösung ab und waschen den Rückstand auf dem Filter sorgfältig aus. Die auf 200 cem aufgefüllte Lösung theilt man in zwei Portionen. In 50 cem der einen bestimmt man mit FEHLING'scher Lösung direct die Menge des vorhandenen, reducirend wirkenden Zuckers. Die zweite Portion wird mit wenigen Tropfen Salzsäure längere Zeit erwärmt und schliesslich ihr Gehalt an Zucker bestimmt. Vergl. Näheres im dritten Abschnitt. Man gewinnt auf solche Weise schliesslich ein Urtheil über den Gehalt der Blätter an direct und erst nach der Inversion reducirend wirkendem Zucker. Um auch den Stärkegehalt der Blätter zu ermitteln, wird der Rückstand auf dem Filter mit 200 cem Wasser in einen Kolben gespült und in der im dritten Abschnitt angegebenen Weise weiter behandelt. Mit Hülfe FEHLING'scher Lösung ist es schliesslich möglich, die vorhandene Zuckermenge, die ein Maass für den Stärkegehalt der Blätter abgibt, zu constatiren ⁴⁾.

Diese Methode lässt sich auch bei Untersuchungen über spezifische Assimilationsenergie der Blätter oder bei dem Studium der Abhängigkeit der Assimilation in den Blättern von Beleuchtungsverhältnissen etc. verwenden. Wir experimentiren z. B. mit Helianthus- oder Cucurbitablättern. Wir schneiden von einigen Blättern frühmorgens 5 Uhr die eine Hälfte ohne Verletzung des Mittelnervs ab, legen die Blattstücke auf ein Zeichenbrett, bedecken sie unter Ausschluss der stärkeren Rippen mit dünnen Holzbrettchen von 50 oder 100 qcm Fläche, drücken diese an und schneiden mit einem Skalpell die Blattflächen aus. Die zweiten Blatthälften werden erst

1) Handpressen und Presstücher sind von der Firma G. WENDEROTH in Cassel zu beziehen. Vergl. Preisverzeichniss No. 2907. Sind die Säfte nach dem Filtriren sehr dunkel gefärbt, so thut man gut, sie mit etwas Bleiessig zu versetzen, zu filtriren, mit Schwefelwasserstoff zu entbleien und den Schwefelwasserstoff durch Einleiten eines Luftstromes zu entfernen. Ueber Bereitung des Bleiessigs vergl. C. WOLFF, Anleitung zur Untersuchung landwirthschaftl. wichtiger Stoffe, 1875, S. 188. Die FEHLING'sche Lösung wird in der im dritten Abschnitt angegebenen Weise dargestellt.

2) Vgl. SACHS, Handbuch d. Experimentalphysiologie d. Pflanzen, 1865, S. 326.

3) ARTH. MEYER, Botan. Zeitung, 1885, Nr. 27.

4) Vgl. auch SAPOSCHNIKOFF, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 9. Ferner vergl. BROWN und MORRIS, Journal of the chem. society, May 1893.

nach 8—12-stündiger Assimilationsthätigkeit von der Pflanze abgeschnitten und dann ebenso wie die ersten behandelt. Es ist darauf zu achten, die Schablonen nach Möglichkeit symmetrisch gleichen Blatttheilen aufzulegen. Gleich nach erfolgtem Ausschneiden der Blattflächen werden die Blattstücke schnell bei 80° C. getrocknet. Bei *Helianthus annuus* wiegen 500 qcm Blattfläche trocken etwa 4 g. 5—10 g Trockensubstanz dienen dann zur Bestimmung der vorhandenen Kohlehydrate (Zucker, Stärke), und man wird finden, dass die nachträglich abgeschnittenen Blatthälften erheblich reicher an diesen Stoffen sind als die zuerst geernteten, wenn die Assimilationsbedingungen am Tage günstige waren. Während die Blätter assimiliren, häuft sich nicht die Gesamtmenge der entstehenden Producte im Blatt an. Ein Theil der Kohlehydrate wandert aus und wird verathmet. Die Quantität dieser Stoffe ist nicht zu vernachlässigen. Man ermittelt sie annähernd genau, indem man am Abend Blättern, die jenen sehr ähnlich sind, welche zu den schon erwähnten Experimenten dienen, Stücke entnimmt, um sie auf Zucker und Stärke zu prüfen. Die zurückbleibenden Blattflächen schneidet man erst nach Verlauf von 8 Nachtstunden ab, um sie der Untersuchung zu unterwerfen. Unter Berücksichtigung der Auswanderungsgrösse der Kohlehydrate findet man z. B., dass 1 qm Blattfläche von *Helianthus pr.* Stunde etwa 2 g dieser Körper unter günstigen Assimilationsbedingungen producirt¹⁾. Die ausgewanderte Menge an Kohlehydraten ist bei der Berechnung natürlich der am Tage producirt hinzu zu addiren. Merkwürdig ist, wie neuere Beobachtungen lehrten, dass selbst bei *Helianthus* nur ein Bruchtheil (etwa $\frac{1}{6}$) der durch Assimilation gebildeten Kohlehydrate Stärke repräsentirt.

Die Gesamtmenge der durch Assimilation gebildeten Stoffe findet man auch annähernd genau, wenn man z. B. *Helianthus*pflanzen in angegebener Weise früh morgens und gegen Abend je 500 qcm Blattfläche entnimmt und dieselben, ebenso wie andere, welche theils abends, theils erst nach 8 Nachtstunden abgeschnitten worden sind, zunächst schnell bei etwa 80° C., dann nach dem Zerpulvern bei 100° C. völlig austrocknet. Die Werthe für die Gewichtszunahme von je 500 qcm Blattfläche am Tage und für die Gewichtsabnahme von 500 qcm in der Nacht sind zu addiren. Man gewinnt auf solche Weise ein ungefähres Maass für die assimilatorische Thätigkeit der Untersuchungsobjecte. Diese, sowie auch die früher erwähnten Experimente sind an recht hellen, sonnigen Tagen und in recht warmen Nächten auszuführen.

Wir dürfen nun heute von der Anschauung ausgehen, dass auch in den grünen Zellen solcher Blätter, die sich als sehr stärkereich erweisen, in Folge des Assimilationsprocesses aus der Kohlensäure und dem Wasser nicht direct Stärke, sondern zunächst Glykose erzeugt wird. (Vgl. mein Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, 1883, S. 38 und 198.) Diese Glykosemenge kann in den amyllumreich erscheinenden Blättern in Folge specifischer Eigenschaften ihrer Chlorophyllkörper sehr leicht in Amylum übergeführt werden, während die Stärkebildung aus der durch Assimilation erzeugten Glykose in den Zellen der Blätter anderer Pflanzen mit mehr oder minder grossen Schwierig-

1) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 3, und SAPOSHNIKOFF, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 8.

keiten verbunden ist. In dem hier in Rede stehenden Zusammenhange ist natürlich die Thatsache von grossem Gewicht, dass es gelungen ist, Blätter zur Stärkebildung auf Kosten der Glykose, die man ihnen von aussen zugeführt hat, zu veranlassen¹⁾. Ich habe solche Versuche nicht speciell angestellt, mich aber davon überzeugt, dass Blätter aus ihnen von aussen dargebotenem Rohrzucker ebenfalls Amylum zu bilden vermögen. Frische Blattstücke von *Iris germanica*, die etwa 10 cm Länge besaßen, wurden, ohne die Wachsschicht zu beseitigen, auf 20-procentige Rohrzuckerlösung gelegt, die sich in einem flachen Glasgefäss befand. Die Blattstücke schwammen auf der Flüssigkeit, und ihre eine Fläche kam gar nicht mit derselben in Contact. Das flache Gefäss wurde mit einer Glasplatte bedeckt, aber zwischen diese und den Rand des ersteren ein Korkstück gelegt, um den Zutritt der Luft zu den Pflanzentheilen nicht zu behindern. Die Untersuchungsobjecte blieben länger als eine Woche bei mittlerer Temperatur und im Dunkeln mit der Rohrzuckerlösung in Berührung. Bei Beginn des Versuchs prüfte ich einige Blattstücke makroskopisch auf Stärke; diese war nicht vorhanden. Die Blattstücke aber, welche 8 Tage lang auf der Zuckerlösung verweilt hatten, gaben deutliche Stärkereaction. Zu bemerken ist, dass die Irisblattstücke, bevor man sie bei Ausführung der Stärkereaction in die Jodlösung legt, ziemlich lange mit warmem Alkohol behandelt werden müssen, wenn man sie völlig vom Chlorophyllfarbstoff befreien will. Die Versuche lassen sich auch bequem mit den Blättern von *Nicotiana Tabacum* durchführen. Am frühen Morgen wird die eine Hälfte eines Blattes dieser Pflanze makroskopisch auf Stärkeabwesenheit geprüft, die andere aber auf Rohrzuckerlösung gelegt. Hat das Blattstück auf der Flüssigkeit einige Tage bei Lichtabschluss verweilt, so enthält es reichlich Stärke.

16. Die Abhängigkeit der Stärkebildung bei der Assimilation von äusseren Verhältnissen.

Man lege einige Samen von *Phaseolus* in lockere Gartenerde, die sich in Blumentöpfen befindet, aus, cultivire die Pflanzen so lange im Dunkeln, bis die Cotyledonen eines sehr beträchtlichen Theiles ihres Reservestoffvorrathes beraubt sind, und untersuche die Primordialblätter nunmehr auf makrochemischem Wege nach SACHS oder auf mikrochemischem Wege, indem man dünne Querschnitte mit Chloralhydrat- und Jodjodkaliumlösung behandelt (vgl. unter 14), auf Stärke. Amylum wird man nicht in den Mesophyllzellen antreffen. Lässt man die Pflanzen jetzt einige Tage lang bei Lichtzutritt stehen, so ergrünen sie, ihr Wachsthum beginnt aufs Neue, und in den Zellen der Blätter ist auf makro- oder mikrochemischem Wege nach der angegebenen Zeit Amylum nachzuweisen.

Werden die ausgewachsenen Blätter kräftiger, in Blumentöpfen bei Lichtzutritt cultivirter Exemplare von *Tropaeolum* oder *Phaseolus* makrochemisch oder mikrochemisch auf Stärke untersucht, so ist diese Substanz leicht in ihren Zellen nachzuweisen. Werden die Unter-

1) Vgl. BÖHM, Botan. Zeitung, 1863; A. MEYER, Botan. Zeitung, 1885, Nr. 27, und besonders Botan. Zeitung, 1886, Nr. 5.

suchungsobjecte nun bei hoher Sommertemperatur kurze Zeit lang (vielleicht 48 Stunden), bei niederer Temperatur längere Zeit ins Finstere gestellt, so ist die Stärke aus dem Mesophyll ihrer Blätter verschwunden. Werden die Pflanzen wieder einige Tage lang dem Einfluss des Lichts ausgesetzt, so kann man sich leicht davon überzeugen, dass ihre Blätter abermals stärkereich sind. Es ist zweckmässig, bei vergleichenden Untersuchungen über den Einfluss der Beleuchtungsverhältnisse auf die Entstehung und das Verschwinden des Amylums in den Zellen des Blattgewebes nach Ablauf der einzelnen Versuchsperioden nicht ganze Blätter von den Pflanzen abzuschneiden, sondern stets nur Stücke der Blätter zu entfernen. Man ist dadurch in den Stand gesetzt, während der ganzen Versuchsdauer mit ein und demselben Blatt experimentiren zu können.

Untersucht man die Blätter der Knospen kräftiger und unter normalen Verhältnissen vegetirender Pflanzen von *Elodea canadensis* auf Stärke, so findet man reichliche Mengen dieses Stoffes in den Zellen. Werden die Untersuchungsobjecte ins Dunkle gebracht, so verschwindet die Stärke völlig. (Nach meinen Erfahrungen bei hoher Sommertemperatur oft schon in 24 Stunden, freilich bei nicht so hoher Temperatur viel langsamer.) Erneute Beleuchtung bedingt bald wieder die Ansammlung grosser Amylumquantitäten im Blattgewebe. Ich habe es zweckmässig gefunden, die Elodeablätter vor der Behandlung mit Chloralhydrat und Jodjodkaliumlösung zunächst zur Entfernung des Chlorophyllfarbstoffes mit kochendem Wasser und heissem Alkohol zu extrahiren.

Spirogyrafäden sind bei höherer Sommertemperatur nach 1- bis 3-tägigem Verweilen im Finstern stärkefrei, wie die Prüfung auf Amylum mit Chloralhydrat- und Jodjodkaliumlösung lehrt. Setzt man die entstärkten Spirogyrafäden dem directen Sonnenlicht aus, so enthalten sie in Folge der hohen Temperatur sowie der bedeutenden Lichtintensität sehr bald, z. B. schon nach einer halben Stunde, reichliche Amylummengen. Im diffusen Licht geht die Stärkebildung weit langsamer vor sich.

Will man den Einfluss des Lichtes von verschiedener Brechbarkeit auf die Stärkebildung im Chlorophyll untersuchen, so benutzt man als Beobachtungsobject bequeme Spirogyrafäden oder Elodeapflanzen, die zur Entstärkung einige Tage im Dunkeln verweilt haben. Die amyllumfreien Pflanzen werden in kleinen Schälchen, welche Brunnenwasser enthalten, unter doppeltwandigen Glocken oder in geeigneten Kästen (vgl. unter 8) dem Licht ausgesetzt, das die Lösung des doppelt-chromsauren Kalis und des Kupferoxydammoniaks passirt hat. Man setzt die Apparate dem directen Sonnenlicht oder dem diffusen Licht aus. Von Zeit zu Zeit, etwa alle 10 Minuten, wenn man bei directem Sonnenlicht, etwa alle 30 Minuten, wenn man bei diffusem Tageslicht experimentirt, untersucht man Spirogyrafäden oder Blätter aus den Knospen der *Elodea* auf Stärkegehalt. Es wird sich ergeben, dass, ebenso wie die Sauerstoffabscheidung im gemischten gelben Licht weit lebhafter als im gemischten blauen Licht erfolgt, auch die Stärkebildung durch die Strahlen von geringerer Brechbarkeit in viel ausgiebigerem Maasse als durch die Strahlen von grösserer Brechbarkeit herbeigeführt wird. Im directen Sonnenlicht geht die Stärkebildung im Chlorophyll übrigens selbst unter dem Einfluss des gemischten blauen Lichtes ziemlich schnell vor sich, und ich fand z. B., dass anfangs stärkefreie Spirogyrafäden, die 35 Minuten lang bei hoher Temperatur

dem Sonnenlicht ausgesetzt gewesen waren, das die Lösung des Kupferoxydammoniaks passirt hatte, nach dieser Zeit reichliche Stärkeeinschlüsse enthielten.

Lehrreich ist es ferner, panachirte Blätter, die kräftig assimilirt haben, nach der makrochemischen Methode von SACHS auf Amylum zu untersuchen. Man benutzt z. B. zu solchen Versuchen die Blätter von *Acer negundo* oder von *Sanchezia*arten (letztere müssen ziemlich lange in der Jodlösung liegen). Es ergiebt sich, dass nur die grünen Blatttheile, nicht die chlorophyllfreien, Stärke enthalten.

Das folgende Experiment, welches ich mit in Töpfen cultivirten Exemplaren von *Tropaeolum majus* ausführte, ist deshalb besonders interessant, weil es lehrt, dass die Stärkebildung im Mesophyll der Blätter insofern eine streng localisirte ist, als allein diejenigen Blatttheile assimilatorische Thätigkeit geltend machen, welche direct von

Fig. 17. Ein der Jodprobe unterworfenes *Tropaeolum*blatt. In den weiss erscheinenden Partien ist die Stärkebildung durch Verdunkelung unterdrückt worden.

den Sonnenstrahlen getroffen werden, während z. B. in künstlich verdunkelten Theilen desselben Organs keine Stärke entsteht. *Tropaeolum*exemplare werden 2 Tage oder längere Zeit verdunkelt, bis die makroskopische Prüfung zeigt, dass das Blattmesophyll stärkefrei geworden ist. Jetzt befestigt man an der Ober- und Unterseite völlig ausgewachsener Blätter, genau einander gegenüber, kleine Scheiben von dicker Pappe oder Filz mit Hülfe von Nadeln, so dass nicht die gesamte Blattfläche der nunmehr

wieder ans Licht gelangenden Untersuchungsobjecte von Lichtstrahlen getroffen werden kann. Nach einiger Zeit (bei meinen Experimenten nach $1\frac{1}{2}$ Tagen) prüft man die stellenweis verdunkelt gewesenen Blätter makroskopisch auf Stärkegehalt. Das Mesophyll der künstlich verdunkelten Blattregionen ist amyllumfrei; nur die Nerven führen Stärke. Die Blattstellen hingegen, welche von den Lichtstrahlen getroffen worden waren, erweisen sich als sehr amyllumreich (vgl. Fig. 17).

Sehr wichtig ist es ferner, sich davon zu überzeugen, dass die Pflanzen nicht im Stande sind, Stärke bei Lichtzutritt in einer kohlenstofffreien Atmosphäre zu bilden, ja, dass die eventuell schon vorhandene Stärke unter diesen Umständen aus den Chlorophyllkörpern verschwindet. Wir legen einige Samen von *Raphanus sativus* oder von anderen Pflanzen (mit besonderem Erfolg experimentirte ich mit *Lepidium sativum*) in ausgeglühten Sand, der mit gewöhnlicher, aber

mit Wasser verdünnter Nährstofflösung, wie man sie zu Wasserculturversuchen benutzt, gesättigt ist und sich in kleinen Blumentöpfen befindet. Ist die Keimung bei Lichtzutritt so weit fortgeschritten, dass die Cotyledonen ausgewachsen sind, dann gelangen die Untersuchungsobjecte, in deren Keimblättern man reichliche Stärkemengen leicht nachweisen kann, in den in Fig. 18 dargestellten Apparat. Die Glasschale *G'* enthält Quecksilber, über das wir eine dünne Wasserschicht bringen. An Stelle des Quecksilbers kann man auch Wasser verwenden. In der Glasschale *G''* befindet sich starke Kalilauge und ein Glasklotz, auf dem der Topf mit den Pflanzen steht. Die Glasglocke *Ggl* wird über die Keimlinge gedeckt; ihr unterer Rand taucht in das Quecksilber oder das Wasser ein, während durch die Bohrung des den Tubulus der Glocke verschliessenden Korkes ein gebogenes Glasrohr geschoben wird, das mit dem U-förmigen Rohre *U*, welches mit Kalilauge getränkte Bimssteinstücke sowie Kalihydratstückchen enthält, in Verbindung steht. Setzen wir den Apparat bis 2 Tage lang dem Einfluss des Lichtes aus (es ist vorthellhaft, wenn er während dieser Zeit, wenigstens periodisch, von directen Sonnenstrahlen getroffen wird), so sind die Cotyledonen stärkerfrei geworden. Stellen wir den Topf mit den Pflanzen jetzt wieder frei ans Fenster, dann sammeln sich alsbald aufs Neue erhebliche Stärkequantitäten in den grünen Zellen der Keimblätter an ¹⁾.

Will man Pflanzen längere Zeit in kohlenstofffreier Atmosphäre cultiviren, so thut man gut, um eine den Untersuchungsobjecten nachtheilige,

gar zu erhebliche Feuchtigkeitsansammlung in der Luft unter der Glocke des in Fig. 18 abgebildeten Apparates zu verhüten, in folgender Weise zu experimentiren. Man benutzt eine recht grosse Glasglocke. Dieselbe taucht man in Quecksilber ein, über welches etwas Olivenöl geschichtet ist. Man kann auch eine Glocke mit wohl abgeschliffenem Rand verwenden und dieselbe auf eine matt geschliffene Glasplatte stellen. Den luftdichten Verschluss erzielt man unter Anwendung einer durch Zusammenschmelzen von 3—4 Thl. Schmalz und 1 Thl. Wachs hergestellten Mischung. Dieselbe ist in einem ver-

Fig. 18. Apparat zur Cultur von Pflanzen bei Ausschluss der Kohlensäure.

1) Vgl. GODLEWSKI, Flora, 1873, S. 382.

schlossenen Gefäss, vor Staub geschützt, aufzubewahren und kann oft zum Dichten Verwendung finden, z. B. auch bei Experimenten mit der Luftpumpe. Im Uebrigen ist der Apparat ebenso wie der in Fig. 18 abgebildete zusammengestellt. Eventuell sind Gefässe, die Chlorealcium enthalten, in denselben einzuführen, um den Wassergehalt der Luft noch weiter herabzumindern.

Sehr interessant ist die von MOLL¹⁾ festgestellte Thatsache, dass in manchen Fällen ein Blattstück in kohlensäurefreier Luft keine Stärke bildet, wenn es mit einem anderen Theil desselben Blattes, der in kohlensäurereicher Luft stark assimilirt, noch in organischem Zusammenhang steht. Wir experimentiren in folgender Weise. Es werden zwei Krystallisirschalen ausgewählt (vgl. Fig. 19 *a* u. *a'*), deren gut abgeschliffene Ränder genau an einander schliessen, wenn die Schälchen mit den Oeffnungen auf einander gestellt waren. Die Ränder der Schalen werden nun mit Talg bestrichen und Blätter von Cucurbita

Fig. 19. Apparat nach Moll zu Experimenten über Assimilationserscheinungen.

Pepo oder Vitis vinifera, welche von Sprossen entnommen sind, die einige Zeit zur Entstärkung im Dunkeln verweilen, derartig zwischen die Ränder gelegt, dass die Blattspitze *b* sich im abgeschlossenen Raum, Basis und Blattstiel sich aber draussen befinden. Die untere Schale enthält Kalilauge. Durch leisen Druck ist ein luftdichter Abschluss

des zwischen den Schalen vorhandenen Raumes, der etwa 600 ccm betragen mag, zu erzielen. Der Blattstiel taucht in ein kleines, Wasser enthaltendes Gefäss ein. Der ganze Apparat wird nun unter eine grosse Glasglocke gestellt, welche calibriert ist und etwa 4000 ccm Capacität besitzt. Sie ruht auf flachen Marmorstückchen und taucht in Wasser ein. Mit Hülfe des gebogenen Rohres *R* saugt man 200 ccm Wasser empor, leitet dann zur Verdrängung dieser Flüssigkeitsmenge reine Kohlensäure in den Apparat ein und setzt ihn einige Stunden lang, eventuell unter Beschattung, dem directen Sonnenlicht aus. Es ergiebt sich endlich durch die Untersuchung, dass derjenige Blatttheil, welcher in der etwa 5 Proc. Kohlensäure enthaltenden Luft verweilte, sehr stärkereich ist, während in der Blattspitze keine Stärke producirt worden ist.

Versuche, welche lehren sollen, dass die Temperaturverhältnisse von Einfluss auf die Stärkebildung im Chlorophyll sind, stellt man zweckmässig im Herbst oder Winter an. In zwei Zimmern, die nach gleicher Himmelsrichtung gelegen sind, werden Gläser, die mit Brunnenwasser und im Dunkeln entstärkten Elodeapflanzen besetzt worden sind, aufgestellt. In dem einen Zimmer herrscht eine Temperatur von etwa 6° C., in dem anderen eine solche von etwa 20° C. Die Temperatur des Wassers des einen Gefässes wird constant auf 6° C., diejenige des Wassers des anderen constant auf 20° C. (nöthigenfalls durch Einbringen von Eisstückchen oder Zugießen wärmeren Wassers) erhalten. Von Zeit zu Zeit (vielleicht alle

1) Vgl. MOLL, Landwirthschaftl. Jahrb. Bd. 6, S. 345.

30 Minuten) untersucht man Elodeablätter auf Stärkegehalt und findet, dass, trotzdem die Pflanzen den gleichen Beleuchtungsverhältnissen ausgesetzt sind, unter dem Einfluss der höheren Temperatur schneller grössere Amylummengen gebildet werden als bei niedriger Temperatur¹⁾.

17. Die Spaltöffnungen und der Assimilationsprocess.

Die Resultate neuerer Untersuchungen von STAHL lassen sicher erkennen, dass die Kohlensäure, welche im Assimilationsprocess verbraucht wird, unter normalen Verhältnissen (anders liegt die Sache, wenn der Kohlensäuregehalt der die Pflanzen umgebenden Luft erhöht wird) durch die Spaltöffnungen in das Blattinnere übertritt, und dass höchstens Spuren des erwähnten Gases ihren Weg durch die cuticularisirten Membranen in das Innere der Gewebe finden. Ich wiederholte die Versuche STAHL's mit abgeschnittenen Zweigen von *Lonicera tatarica* und in Töpfen vegetirenden Exemplaren von *Phaseolus multiflorus*. Die Untersuchungsobjecte verweilten zunächst 24 Stunden im Dunkeln; ihre Blätter waren dann entstärkt. Nun wurde die Hälfte der Unterseite einiger nicht abgeschnittener Blätter, um die Spaltöffnungen zu schliessen, mit einer erwärmten Mischung von 1 Thl. Wachs und 3 Thl. Cacaobutter mittelst eines Pinsels bestrichen, um dann sogleich dem directen Sonnenlicht ausgesetzt zu werden. Es ist zu empfehlen, den Zweigen oder eingewurzelten Pflanzen bei den Experimenten nur einige Blätter zu belassen, damit sie schwach transpiriren und nicht welken. Nach 4—6-stündiger Insolation taucht man die Blätter in kaltes Brunnenwasser, löst die Fettkruste von ihrer Unterseite ab und unterwirft sie nach der Extraction mit Alkohol der Jodprobe (vgl. S. 38). Die Blatthälfte, deren Stomata verschlossen waren, hat keine Stärke gebildet, während die Assimilation in der anderen Blatthälfte normal stattfand (vgl. Fig. 20). Wird die Oberseite der Blätter bei der Ausführung der Versuche mit Cacaowachs verkittet, so erleidet die Assimilation keine wesentliche Einschränkung, weil eben durch die Stomata der Unterseite reichliche Kohlensäuremengen in das Blattinnere eintreten. Dieses Experiment lehrt zugleich, dass das Vorhandensein des Wachsüberzuges an sich das Blatt nicht irgendwie schädigt.

Wir schneiden Zweige von *Lonicera tatarica*, *Syringa vulgaris* oder *Sambucus nigra* ab, um sie zunächst zur Entstärkung 24 Stunden lang ins Dunkle zu stellen. Einigen Blättern werden kleine Fragmente entnommen und die Abwesenheit des Amylums constatirt. Ist dies ge-

Fig. 20. Junges Blatt von *Prunus padus*. Die rechte Hälfte unterseits mit Cacaowachs überzogen gewesen. Die Zeichnung ist nach dem der Jodprobe unterworfenen Material ausgeführt worden. (Nach STAHL).

1) Literatur über Stärkebildung: SACHS, Botanische Zeitung, 1862, Nr. 44; ebendasselbst 1864, Nr. 38; Arbeiten d. botanischen Instituts in Würzburg, Bd. 3, H. 1; G. KRAUS, Pringsheim's Jahrbücher, Bd. 7, S. 511; NAGAMATZ, Beiträge zur Kenntniss d. Chlorophyllfunction, Dissertation, Würzburg, 1886.

schehen, so schneiden wir einige Blätter von den Zweigen ab und zerlegen sie durch einen neben dem Mittelnerv verlaufenden Schnitt in zwei Hälften. Die den Mittelnerv führenden Hälften werden, um sie möglichst turgescient zu erhalten, sofort in feuchte Atmosphäre unter eine Glasglocke gebracht; der Blattstiel taucht mit der Schnittfläche in Wasser ein. Die andere Hälfte bleibt an einer schlecht beleuchteten Stelle des Zimmers liegen, bis sie ziemlich welk geworden ist. Beide Blatthälften werden nun in einem den Luftzutritt gestattenden Glaskasten dem directen Sonnenlicht ausgesetzt. Um eine übermäßige Erwärmung des mit seinem Stiel in Wasser eintauchenden und des welken Blattstückes zu verhindern, bringt man zwischen Sonne und Untersuchungsobjecten ein parallelwandiges, Wasser enthaltendes Glasgefäß an. Nach ca. 3-stündiger Insolation werden die Blatthälften unter Benutzung der Jodprobe auf Stärke untersucht. Das welke Blattstück hat kein Amylum, das frisch gebliebene reichliche Mengen desselben gebildet. Beim Welken haben sich in unserem Falle — und Aehnliches beobachtet man bei Versuchen mit sehr zahlreichen Pflanzen — die Stomata des Versuchsobjectes geschlossen, und somit war die Kohlensäureaufnahme und Assimilationsthätigkeit des Blattes so gut wie ausgeschlossen. Experimentirt man mit Blatthälften von *Hydrangea hortensis*, so findet man, dass auch das noch nicht gar zu welke Blattstück im Sonnenlicht Amylum erzeugt. Bei der zuletzt genannten Pflanze schliessen sich die Stomata beim Welken des Gewebes nämlich nicht.

Wir cultiviren Keimlinge von *Zea Mays* einmal in normaler Nährstofflösung, zweitens in einer solchen, der wir 0,5 Proc. Kochsalz zugesetzt haben. Die ersteren Pflanzen gedeihen kräftig, die Kochsalzpflanzen bleiben aber völlig in ihrer Entwicklung zurück, ohne dass übrigens ihre Gewebe auffallende Veränderungen erfahren. In den Blättern der Pflanzen, deren Wurzeln in normale Nährlösung eintauchen, sind reichliche Stärke- und Glycosemengen leicht nachzuweisen. Den Kochsalzpflanzen fehlen dagegen diese Stoffe völlig. (Die Prüfungen auf Stärke und Zucker sind vorzunehmen, wenn die Maispflanzen das Alter von einigen Wochen erreicht haben.)

Die im Vorstehenden erwähnten und zuerst von SCHIMPER constatirten Thatsachen finden ihre Erklärung, wie STAHL fand, darin, dass die Maispflanzen, welche Chlornatrium aufnehmen, deshalb nicht assimiliren, weil sich ihre Stomata durch die Wirkung des Kochsalzes schliessen. Die Kohlensäureaufnahme seitens der Pflanzen ist dann keine ausreichende. Mit Hülfe der Kobaltprobe, die im Abschnitt über die Transpiration eingehender behandelt werden soll, kann das Geschlossenein der Stomata der Kochsalzpflanzen in der That leicht festgestellt werden ¹⁾.

1) Vgl. STAHL, Botan. Zeitung, 1894; NAGAMATZ, in Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 3; SCHIMPER, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1890, Sitzung v. 31. Juli.

II. Die Entstehung der Eiweissstoffe in den Pflanzen.

18. Die Versorgung niederer Organismen mit Stickstoff.

Es ist sehr wichtig, den Beweis dafür zu liefern, dass viele Pflanzenzellen die Fähigkeit besitzen, aus stickstofffreien organischen Stoffen (z. B. Zucker) und stickstoffhaltigem anorganischem Material stickstoffhaltige organische Körper, z. B. Eiweissstoffe, zu produciren. Als Untersuchungsobject benutzen wir die Hefe (*Saccharomyces cerevisiae*)¹⁾.

Wir stellen 3 Kochflaschen (*a*, *b*, *c*) von etwa 200 ccm Capacität auf. In *a* bringen wir 100 ccm destillirtes Wasser, in *b* 100 ccm PASTEUR'sche Nährlösung (dieselbe besteht in 1000 Gewthl. aus 838 Thl. Wasser, 150 Thl. Trauben- oder Candiszucker [bei meinen Versuchen benutzte ich meist den letzteren, da er leichter im reinen Zustande als der Traubenzucker zu erhalten ist], 10 Thl. weinsaurem Ammoniak, 0,2 Thl. schwefelsaurer Magnesia, 0,2 Thl. phosphorsaurem Kalk und 2 Thl. saurem phosphorsaurem Kali)²⁾; in *c* 100 ccm einer Flüssigkeit, die ebenso zusammengesetzt ist, wie die PASTEUR'sche Lösung, nur kein weinsaures Ammoniak enthält. Wir kochen die drei Flüssigkeiten einige Zeit lang in den Kochflaschen, um sie möglichst zu sterilisiren, nachdem wir die Mündungen der Gefässe mit Wattepfropfen verschlossen haben, und bringen, indem wir die Pfropfen nach dem Erkalten der Nährlösungen einen Augenblick entfernen, eine kleine Hefemenge in die Flüssigkeiten. Wir benutzen 1—2 ccm hefehaltige Flüssigkeit (vgl. „Bezugsquellen“). Die mit Watte verstopften Gefässe werden einer Temperatur von 25° C. ausgesetzt und nun im Dunkeln oder bei Lichtzutritt unter häufigerem Umschütteln sich selbst überlassen. Die Flüssigkeit im Glase *b* trübt sich alsbald bedeutend, und es entstehen sehr zahlreiche neue Hefezellen, die sich massenhaft zu Boden setzen. Die Flüssigkeiten in *a* und *c* trüben sich nicht oder sehr wenig. Da die Hefe sehr schwer von allen fremden Bestandtheilen zu befreien ist, so kann wohl in *a* und *c* sehr schwache Hefevermehrung erfolgen, aber auf jeden Fall beweist die massenhafte Hefevermehrung in *b*, die auch durch Wägen der abfiltrirten und getrockneten Hefe genauer bestimmt werden kann, dass hier allein die normalen Lebensbedingungen des Pilzes erfüllt sind. Die Neubildung der Zellen muss mit einer Erzeugung stickstoffhaltiger organischer Körper verbunden gewesen sein, denn das Protoplasma der Zellen ist ja reich an diesen, und als Material können nur stickstofffreie organische Körper und Ammoniak Verwendung gefunden haben.

Während die höheren Gewächse die Salpetersäure vortrefflich für die Zwecke der Eiweissbildung zu verwerthen vermögen, ist die Hefezelle dazu nicht im Stande. Wenn wir PASTEUR'sche Nährlösung herstellen, das weinsaure Ammoniak aber durch salpetersaures Kali

1) Vgl. A. MAYER, Untersuchungen über die alkoholische Gährung, 1868, und Lehrbuch der Gährungsschene, 1874, S. 108.

2) Nach den Untersuchungen von MOLISCH bedürfen auch die Pilze zur normalen Entwicklung des Eisens. Meist ist schon der Zucker etwas eisenhaltig. Will man aber ganz sicher gehen, so fügt man der PASTEUR'schen Lösung 0,01 % Eisenvitriol hinzu.

ersetzen und Hefezellen in die Flüssigkeit bringen, so verhält sich der Pilz in dieser Nährlösung ähnlich wie in einer solchen, der wir überhaupt keinen stickstoffhaltigen Körper zugesetzt haben. Dagegen kann man sich durch Versuche, bei deren Ausführung man das weinsaure Ammoniak der PASTEUR'schen Lösung durch Pepton ersetzt, davon überzeugen, dass dieser letztere Körper eine geeigneteren Stickstoffquelle für den Hefepilz als das Ammoniak darstellt.

Dass nicht nur die Hefe, sondern auch andere chlorophyllfreie Organismen die Fähigkeit haben, aus Zucker und Ammoniak Eiweiss zu erzeugen, lässt sich leicht feststellen. Es werden zwei kleine Gefässe (*a* und *b*) aufgestellt. In *a* bringt man 25 ccm PASTEUR'sche Lösung, in *b* 25 ccm einer Flüssigkeit, die ebenso wie diese Lösung zusammengesetzt ist, der aber das weinsaure Ammoniak fehlt. Beide Gefässe stellt man nun unter eine Glasglocke und überlässt sie etwa 8 Tage lang sich selbst. Die Flüssigkeit in *a* trübt sich alsbald in Folge massenhafter Bacterienentwicklung bedeutend. Auch andere Organismen (bei meinen Versuchen z. B. der roth gefärbte *Saccharomyces glutinis*) können auftreten. Die Flüssigkeit in *b* trübt sich nur wenig, weil die Stickstoffquelle fehlt. Eine schwache Lebensäusserung der vorhandenen Keime kann erfolgen, weil die Flüssigkeit vielleicht etwas Ammoniak aus der Luft anzieht.

19. Vermag die Keimpflanze den freien Stickstoff der Atmosphäre zur Bildung von Eiweissstoffen zu verwerthen?

Die Pflanzenzellen vermögen aus stickstofffreiem organischem Material und stickstoffhaltigen anorganischen Verbindungen (Salpetersäure und Ammoniak) Eiweissstoffe zu erzeugen. Eine andere Frage ist es, ob auch der freie atmosphärische Stickstoff zur Eiweissbildung Verwendung finden kann, und diese Frage besitzt nicht allein theoretisches, sondern zugleich ein hohes praktisches Interesse. Hier folgen zunächst Versuche, welche lehren, dass Keimpflanzen unter bestimmten Umständen bei ihrer Entwicklung weder freien Stickstoff aufnehmen, noch einen Stickstoffverlust erfahren.

Als Untersuchungsobjecte benutzen wir zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage recht zweckmässig Erbsen- oder Weizenpflanzen. Wir verschaffen uns zunächst wohl ausgebildetes und durchaus keimfähiges Samenmaterial und bestimmen den Trockensubstanzgehalt, sowie den Stickstoffgehalt desselben ¹⁾. Einige Weizenkörner (vielleicht 30 Stück) oder einige Erbsensamen (vielleicht 6 Stück), deren Gewicht man genau ermittelt hat, und deren Stickstoffgehalt man daher auf Grund der erwähnten Stickstoffbestimmungen leicht berechnen kann, werden in einem Gläschen mit wenig frisch bereitetem destillirtem Wasser übergossen. Dieses Glas bleibt etwa 24 Stunden lang unter der Glasglocke des alsbald zu beschreibenden Apparates ruhig stehen. Nach dieser Zeit giesst man die kleine Menge des noch vorhandenen Quellwassers von den Samen ab, bringt die Flüssigkeit in eine Porzellanschale auf dem Wasserbade zur Trockne und stellt die den Rückstand enthaltende Schale in einen

1) Ueber die Methode der Stickstoffbestimmung nach DUMAS oder KJELDAHL sowie Darstellung der erforderlichen Normalssäure etc. vergl. KÖNIG, Anleitung zur Untersuchung landwirthschaftl. wichtiger Stoffe, 1891, S. 150 u. 682, und FRESSENIUS, Quantitative Analyse.

Exsiccator. Die gequollenen Samen werden nun in dem in Fig. 21 dargestellten Apparat zu weiterer Entwicklung gebracht. Auf einer matt geschliffenen Glasplatte steht ein Becherglas *B*, welches mit Tüll oder durchlöcherter Pergamentpapier überbunden ist und eine unter Benutzung frisch bereiteten destillirten Wassers hergestellte Nährstofflösung enthält, in der bis auf die Salpetersäure oder das Ammoniak alle Nährstoffe vorhanden sind (vgl. unter 22). Auf den Tüll oder das Pergamentpapier, an deren Stelle man auch ein durchlöcherter Silberblech benutzen kann, werden die gequollenen Samen gelegt, so dass die sich entwickelnden Wurzeln in die Nährstofflösung hineinwachsen. Die recht grosse Glasglocke *G* wird mit ihrem abgeschliffenen Rande vollkommen luftdicht auf die erwähnte mattgeschliffene Glasplatte aufgekittet, was am besten mittelst eines Kittes gelingt, den man durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Wachs und 3—4 Thl. Schmalz hergestellt hat. Man kann die Glocke auch unten durch Quecksilber absperrn, welches sich in einer grossen Schale befindet. Ueber das Metall muss aber etwas Wasser geschichtet werden, damit die Quecksilberdämpfe die Keimpflanze nicht schädigen. Oft empfiehlt es sich auch, die angequollenen Samen nicht direct, sondern erst nach dem unter der Glasglocke auf feucht gehaltener Glaswolle erfolgten Ankeimen auf die Bedeckung des erwähnten Becherglases zu legen. Der Tubulus der Glasglocke wird mit einem zweifach durchbohrten Kautschukkork verschlossen. Die eine Bohrung dient zur Aufnahme des rechtwinklig gebogenen Glasrohres *a*, die andere zur Aufnahme des ebenfalls rechtwinklig gebogenen Glasrohres *b*. Durch *a* wird dem Untersuchungsobjecte atmosphärische Luft zugeführt, die aber vor ihrem Eintritt in die Glasglocke *G* von allen Stickstoffverbindungen befreit und wieder einigermaassen mit Wassergas gesättigt worden ist. Zu diesem Zweck muss die Luft vor ihrem Eintritt in *a* nach einander Waschflaschen passiren, von denen die erste eine Lösung von doppeltkohlensaurem Natron, die zweite Bimsstein, der mit Schwefelsäure getränkt ist, und die dritte Wasser enthält. Das Glasrohr *b* steht mit einem Aspirator in Verbindung, aber man thut gut, zwischen diesem und *b* noch ein kleines, Schwefelsäure enthaltendes Gefäss einzuschalten, damit die Luft unter der Glocke gar nicht mit der Atmosphäre direct communicire. (Ueber Benutzung des Aspirators vgl. im Abschnitt über Pflanzenathmung.) Leitet man von Beginn des Quellens der Samen an einen continuirlichen, langsamen Luftstrom durch den Apparat und setzt die Pflanzen hellem, diffusum Licht aus, so entwickeln sie sich so gut, wie dies eben bei Abwesenheit von Salpetersäure und Ammoniak möglich ist. Die Versuche werden etwa 14 Tage oder auch länger fortgeführt und während dieser Zeit Tag und Nacht Luft durch den Apparat geleitet.

Fig. 21. Apparat zur Cultur von Pflanzen bei Ausschluss aller Stickstoffverbindungen.

Es handelt sich dann darum, den Stickstoffgehalt der Weizen- oder Erbsenpflanzen festzustellen. Die Untersuchungsobjecte werden in einer Porzellanschale zu einem Brei zerrieben. Das Gewicht der Schale und ebenso dasjenige eines Glasstabes, der zum Umrühren des Breies dient, muss bestimmt sein. Die Schale stellt man dann auf ein Wasserbad und fügt ihrem Inhalt noch den bis auf ein kleines Volumen eingedunsteten Rückstand der Nährstofflösung, in der sich die Wurzeln der Pflanzen entwickelten, sowie den Rückstand des Quellwassers und denjenigen des ev. zum Auswaschen der Glaswolle benutzten Wassers hinzu. Ist die Masse in der Schale ziemlich trocken geworden, so stellt man sie noch einige Zeit in einen Trockenschrank, in welchem eine Temperatur von etwa 50° C. herrscht. Dann wird die Schale, lose bedeckt, 24 Stunden lang an die Luft gestellt, das Gewicht ihres lufttrockenen Inhaltes ermittelt und sofort der Trockensubstanzgehalt desselben festgestellt. Ferner sind Stickstoffbestimmungen auszuführen¹⁾. Vergleicht man nun schliesslich den Stickstoffgehalt der benutzten Samen mit demjenigen der geernteten Pflanzen, so wird man finden, dass zwischen beiden, wenn anders die Experimente sorgfältig durchgeführt wurden, höchstens Differenzen bestehen, die Folgen kleiner Versuchsfehler sind. Die Pflanzen sind nicht im Stande, unter den bezeichneten Umständen den freien atmosphärischen Stickstoff zur Bildung von Eiweissstoffen zu verwerthen²⁾.

Will man sich davon überzeugen, dass Keimpflanzen bei ihrer Vegetation im Dunkeln weder freien Stickstoff aus der Luft aufnehmen, noch einen Verlust an Stickstoff erfahren, so sind die Versuche in ähnlicher Weise, wie wir dies beschrieben haben, anzustellen. Man hat nur dafür zu sorgen, dass die Untersuchungsobjecte nicht von Lichtstrahlen getroffen werden³⁾.

20. *Bacterium Radicicola* und die Papilionaceen als Stickstoffsammler.

Die Frage nach der Bedeutung des freien Stickstoffes als Pflanzennahrungsmittel ist vielfach experimentell behandelt worden. In wissenschaftlichen Kreisen war man bis vor kurzer Zeit unter Berücksichtigung der Resultate der Untersuchungen BOUSSINGAULT's sowie anderer Forscher allgemein der Ansicht, dass der Pflanze nicht die Fähigkeit zukäme, den elementaren Stickstoff im Ernährungsprocess zu verwerthen. Die Bedingungen, unter denen BOUSSINGAULT's Experimente angestellt wurden, schlossen auch in der That, wie wir heute wissen, die Verarbeitung des freien Stickstoffes in den Zellen aus; unter anderen Umständen kann dieselbe aber dennoch erfolgen, und es ist vor allem das grosse Verdienst HELLRIEGEL's⁴⁾, diese Thatsache sicher festgestellt zu haben.

1) Besonders empfehlenswerth ist es, die zerquetschten Keimlinge sowie die Rückstände des Quellwassers und der Nährstofflösung in HOFFMEISTER'schen Schälchen (zu beziehen von MÜNCKE in Berlin) einzutrocknen, um den Stickstoffgehalt der Gesamtmasse des Untersuchungsmaterials zu ermitteln.

2) Diese Thatsache ist namentlich von BOUSSINGAULT (vgl. Compt. rend., T. 39, p. 601) festgestellt worden.

3) Die Resultate meiner bezüglichlichen Versuche, sowie die Ergebnisse der Arbeiten anderer Beobachter habe ich in meiner vergleichenden Physiologie des Keimungsprocesses der Samen, 1880, zusammengestellt.

4) Vgl. HELLRIEGEL, Beilageheft zu der Zeitschrift d. Vereins f. Rübenzuckerindustrie d. Deutschen Reiches, November 1888.

Zur allgemeinen Orientirung stellen wir zunächst die folgenden Versuche an, die aber nur in der wärmeren Jahreszeit durchgeführt werden können.

Der Boden verschiedener Glasylinder von 24 cm Höhe und 14 cm Durchmesser, welche etwa 4—5 kg Sand fassen können¹⁾, wird mit einer 3 cm hohen Schicht von gewaschenen und geglühten Quarzstücken bedeckt. Auf diese legt man eine dünne Schicht ungeleimter Watte und füllt die Cylinder mit Quarzsand, dessen Elemente der Hauptsache nach einen Durchmesser von 0,2—0,4 mm besitzen, an. Ein sehr geeigneter, doppelt gewaschener tertiärer Quarzsand aus der sächsischen Oberlausitz, dessen Stickstoffgehalt so gering ist, dass er hier nicht in Betracht kommt, ist von der Firma: „Vereinigte Hohen-Bockaer Glassandgruben, Dresden H. WEICHELT & Co.“ zu beziehen. Der Sand wird vor dem Einfüllen in die Cylinder in folgender Weise vorbereitet. Je 1 kg des zu benutzenden trockenen Sandes werden mit 4 g kohlensaurem Kalk, 0,150 g phosphorsaurem Kali, 0,070 g Chlorkalium, 0,070 g schwefelsaurer Magnesia (die letzteren drei Salze in 150 ccm Wasser aufgelöst) und etwas phosphorsaurem Eisenoxyd vermischt. Der Sand wird nun im feuchten Zustande in die Cylinder unter zeitweisem leichtem Andrücken eingebröckelt. Jeder Cylinder wird mit gleich grossen Mengen des Sandes angefüllt. Als Versuchspflanzen wählen wir Hafer und Erbsen. Das Saatmaterial muss sehr normal ausgebildet sein und mittleres Gewicht besitzen. Wir bringen die Samen zwischen Fliesspapier zum Keimen, und setzen je 12 Hafer- und 6 Erbsenkeimlinge in den Sand verschiedener Cylinder ein. Nach einiger Zeit entfernen wir aus den Cylindern je 6 Hafer- und 3 Erbsenpflänzchen, wobei sorgsam darauf zu achten ist, dass die Samenreste und Wurzeln nicht im Sande zurückbleiben. Die Cylinder sind dann mit 6 der am besten entwickelten Hafer- oder 3 Erbsenpflanzen beschickt. Den letzteren sind alsbald Stützen darzubieten. Die Cylinder werden an einem sonnigen Standorte im Garten aufgestellt, nur bei Regen und starkem Wind oder an zu heissen Tagen unter ein Schutzdach gebracht. Jeden Tag erfolgt Wägung der Cylinder, um das verdunstete Wasser zu ersetzen. Abgesehen von denjenigen Cylindern, deren Sand keine Stickstoffverbindungen beigemischt worden sind, stellen wir noch andere auf, die in der soeben angegebenen Weise beschickt werden, deren Sand aber noch einen Zusatz von 2,00, 1,50, 1,00, 0,50 oder 0,10 g salpetersauren Kalk erhält²⁾. Im Laufe des Sommers ergibt sich, dass die Haferpflanzen ohne Zufuhr von salpetersaurem Kalk höchst kümmerlich gedeihen, während das Productionsvermögen der Haferpflanzen mit zunehmendem Gehalt des Bodens an Nitrat bedeutend wächst und mit dieser Zunahme Schritt hält. Bei den Culturen mit Erbsen ist dagegen keine genaue Relation zwischen der vorhandenen Nitratmenge und dem Productionsvermögen wahrzunehmen, ja es kommt vor, dass die Erbsen sich selbst bei Abwesenheit von Nitrat im Boden recht kräftig entwickeln. Trockensubstanzbestimmungen der geernteten Pflanzen und ein Vergleich der gewonnenen Werthe mit den über den Trockensubstanz-

1) Ich weiss aus Erfahrung, dass man bei den hier in Rede stehenden Experimenten auch schon zu ganz guten Resultaten gelangt, wenn man Glasylinder verwendet, die $2\frac{1}{2}$ kg Sand fassen.

2) Diese Nitratmengen sind nicht 1 kg Sand, sondern der ganzen Sandmenge in jedem Cylinder beizumengen.

gehalt der Samen ermittelten Zahlen geben noch näheren Aufschluss über das Productionsvermögen der Pflanzen unter den bezeichneten Bedingungen. Wenn man in der Trockensubstanz den Stickstoff bestimmt (am besten unter Benutzung der bekannten KJELDAHL'schen Methode), so findet man unter anderem, dass die in nitratfreiem Boden erwachsenen Erbsen oft reichliche Stickstoffmengen enthalten, während die im nitratfreien Boden entwickelten Haferpflanzen höchstens um einige Milligr. Stickstoff reicher sind als die ausgelegten Samen.

Die Erbsen (und ihnen analog verhalten sich auch die übrigen Papilionaceen, z. B. Lupinen, Bohnen etc.) sind im Stande — so dürfen wir schon unter Berücksichtigung der Resultate unserer vorläufigen Untersuchungen schliessen — den elementaren Stickstoff bei Abwesenheit von Nitraten im Boden zur Eiweissbildung zu verwerthen. Die Haferpflanze und sehr zahlreiche andere Gewächse vermögen dies nicht. Unsere Experimente lassen diese letztere Thatsache freilich noch nicht mit absoluter Sicherheit feststellen; indessen wir verzichten hier auf Versuche, die durchaus entscheidend sind¹⁾, und ziehen es vor, das Verhalten der Papilionaceen dem elementaren Stickstoff gegenüber noch weiter zu verfolgen.

Eine Anzahl von Glascylindern, welche die angegebenen Dimensionen besitzen, wird mit Quarzsand und Nährstofflösung etc., aber ohne Zugabe von Calciumnitrat, beschickt. Die Glasgefässe reinigt man sorgfältig mit Sublimatlösung (1:1000), um sie dann mit Alkohol auszuspülen. Quarzkies und Watte werden vor dem Einbringen in die Cylinder im Trockenschrank auf 150° C. erwärmt. Den Sand, gemischt mit der schon oben angegebenen Quantität des kohlensauren Kalkes, füllt man noch warm ein, nachdem er zuvor 2—3 Stunden lang in einem geräumigen Sandbade auf etwa 180° C. erhitzt worden war. Dem in die Gläser eingebrachten Sand mischt man die Nährstofflösung bei, nachdem dieselbe in Kolben mit Watteverschluss zunächst 1 Stunde und dann nach Verlauf von 2 Tagen nochmals vier Stunden im Dampfsterilisirungsapparat, zu beziehen von H. ROHRBECK in Berlin (vgl. Preisverzeichniss, 1887, S. 9), gekocht worden war²⁾. Die Samen, Erbsen, gelangen zunächst 2 Minuten lang in eine Sublimatlösung (1:1000), werden dann mit gekochtem Wasser abgespült und in den Sand eingesät. Die Oberfläche desselben bedeckt man mit sterilisirter Watte. Zum Begiessen wird stets nur gekochtes destillirtes Wasser verwandt. Man bestimmt täglich das Gewicht der Cylinder und ermittelt auf diese Weise, wie viel Wasser verdunstet, resp. wie viel Wasser dem Boden zuzuführen ist.

Ein Culturegefäss oder einige derselben empfangen keinen weiteren Zusatz. Andere erhalten einen Zusatz von 25 ccm Extract eines fruchtbaren Garten- oder Feldbodens, auf welchem erfahrungsgemäss Erbsen gut gedeihen. Den Auszug gewinnt man, indem man 8 g Boden mit 100 ccm Wasser schüttelt und absetzen lässt, bis die Hauptmasse des Sandes und Thons zu Boden gefallen ist, was oft mehrere

1) Solche Versuche sind, wenn man sie anstellen will, nach BOUSSINGAULT's Methode (vgl. Agronomie, I, p. 69) durchzuführen. Vergl. übrigens unter 19.

2) Mehr zu empfehlen dürfte es sein, die Cylinder mit Kies sowie dem mit Nährstoffen und kohlensaurem Kalk gemischten feuchten Sand zu beschicken, um die so vorgerichteten, mit Glasplatten bedeckten Culturegefässe dann im strömenden Wasserdampf des Dampfapparates zu sterilisiren.

Stunden dauert. Bemerket sei, dass der Gehalt solcher Bodenextracte an gebundenem Stickstoff so gering ist, dass derselbe für unsere Versuche nicht in Betracht kommt. Endlich drittens wird dem Sand in einigen Cylindern Bodenextract (wieder 25 ccm) hinzugefügt, der vorher durch längeres Kochen sterilisirt worden ist.

Die Culturegefässe stellt man in einem nach Süden gelegenen Zimmer, dessen Fenster verschlossen gehalten werden, auf. Besser noch ist es, die Culturen in einem besonderen kleinen Gewächshause, das nicht zur Cultur noch anderer Pflanzen dient, vorzunehmen.

Die Versuche ergeben nun bei sorgfältiger Durchführung, dass sämmtliche Keimlinge zunächst normal wachsen. Nach 3—4 Wochen gerathen sie aber augenfällig in einen Hungerzustand. Die Pflanzen in den Cylindern ohne Bodenextract und mit sterilisirtem Bodenextract erholen sich auch nicht wieder, sondern fristen fortan ein kümmerliches Dasein. Ihr Trockensubstanzgewicht ist bei Abschluss der Versuche, etwa nach 3—3½ Monaten, sehr gering, und Stickstoffbestimmungen ergeben, dass sie nicht oder kaum mehr Stickstoff als die ausgelegten Samen enthalten ¹⁾. Von den unter Beihülfe nicht sterilisirten Bodenauszuages zur Ausbildung gelangenden Pflanzen wird die erwähnte Hungerperiode bald überwunden. Sie gedeihen üppig, bilden reife Früchte sowie Samen (dies geschieht auch bei der Erbse in geschlossenen Räumen bei Insectenausschluss) und erzeugen reichliche Trockensubstanz- wie Eiweissmengen.

Die Erbsen und die Papilionaceen überhaupt haben also die überaus bemerkenswerthe Fähigkeit, bei Abwesenheit von Stickstoffverbindungen im Boden reichliche Eiweissmengen zu produciren. Den Gramineen sowie zahlreichen anderen Gewächsen geht dies Vermögen völlig ab; sie gedeihen nur normal, wenn ihnen Stickstoffverbindungen als Nahrungsmittel zur Disposition stehen. Die Papilionaceen müssen im Stande sein, den freien atmosphärischen Stickstoff zur Eiweissbildung zu verwerthen, und zwar kann dies, wie wir sehen werden, nur unter Vermittelung von Bacterien geschehen ²⁾.

Wenn man eine Erbsenpflanze (die Beobachtungen können auch unter Benutzung anderer Papilionaceen angestellt werden) kurz vor der Blüthezeit oder während dieser aus dem fruchtbaren Boden, in welchem sie gewachsen ist, heraushebt, so findet man, dass ihre Wurzeln eine oft sehr erhebliche Zahl, zuweilen recht grosser, Knöllchen tragen, die zur angegebenen Zeit meist rosenroth gefärbt erscheinen. Wenn wir unsere, im Sande cultivirten Erbsenpflanzen untersuchen, dann ergiebt sich, dass allein die Wurzeln derjenigen Pflanzen mit Knöllchen versehen sind, die sich unter Mitwirkung des nicht sterilisirten Bodenauszuages entwickelten. Bei Abwesenheit des Bodenauszuages überhaupt oder bei Gegenwart sterilisirten Bodenextractes kommen die Knöllchen dagegen nicht zur Ausbildung.

Wir stellen nun Querschnitte durch den mittleren Theil wohl aus-

1) Eine eventuell eintretende unbedeutende Stickstoffzunahme hat ihren Grund darin, dass der Sand nicht völlig stickstofffrei ist, und dass die Blätter bekanntlich etwas Ammoniak aus der Luft aufzunehmen vermögen.

2) Bezüglich der Frage nach der Versorgung der Papilionaceen, Gramineen und anderer Pflanzen mit Stickstoff stimme ich durchaus den Anschauungen HELLRIEGEL's und PRAZMOWSKI's (vergl. Versuchsstationen, Bd. 37 u. 38) bei. FRANK's Auffassungen (vergl. Landwirthschaftl. Jahrbücher und Botan. Zeitung, 1893) kann ich dagegen nicht theilen; wenigstens sind die Versuche FRANK's nicht völlig beweisend.

gebildeter, rosenroth gefärbter Knöllchen der Erbsenwurzeln her und untersuchen die Schnitte bei schwächerer und dann auch bei stärkerer Vergrösserung. Der mittlere Theil der Schnitte wird von einem recht grosszelligen, mit Intercellularräumen versehenen Gewebe gebildet, dessen Zellen plasmareich sind. Ausserdem nehmen wir eigenthümliche, verzweigte, stark glänzende Fäden wahr, die das erwähnte Gewebe, das als Bacteroidengewebe bezeichnet wird, durchziehen. Nach aussen schliesst sich an das Bacteroidengewebe ein Parenchym an, welches des Stärkegehaltes seiner Elemente wegen als Stärkeschicht zu charakterisiren ist. In diesem Parenchym verlaufen Fibrovasalstränge, die, wie die neueren Untersuchungen gelehrt haben, mit den Gefässbündeln der die Knöllchen tragenden Wurzeln in Zusammenhang stehen. Besonders zu beachten ist, dass der Bastkörper der Fibrovasalstränge in den Knöllchen nach innen gewandt, also dem Bacteroidengewebe zugekehrt ist, während der Holztheil nach aussen gerichtet erscheint. An der Oberfläche der Knöllchen ist eine Rindenschicht entwickelt, die aus mehreren Lagen verkorkter Zellen besteht.

Wer die Entwicklungsgeschichte der Papilionaceenknöllchen und die bei ihrer schliesslich erfolgenden Entleerung stattfindenden Processe studiren will, der ist bezüglich näherer Orientirung auf PRASMOWSKI's Arbeit (Versuchsstationen, Bd. 37, S. 209) hinzuweisen, denn der uns hier zur Verfügung stehende Raum gestattet ein Eingehen auf die bezüglichlichen, sehr complicirten Verhältnisse nicht. Es hat sich ergeben, dass die schon erwähnten, im Bacteroidengewebe auftretenden, stark glänzenden, fädigen Gebilde Schläuche sind, die zahlreiche Bacterien (*Bacterium Radicicola*) enthalten. Diese Spaltpilzform findet sich im Boden, dringt in die Wurzelhaare der Papilionaceen ein, bildet hier die Schläuche, welche nun ihrerseits in die Rinde der Wurzeln hineinwachsen und die Knöllchenbildung veranlassen. Unter Anschwellung der Schläuche gehen die in ihnen vorhandenen Bacterien, indem sie sich fortwährend stark vermehren, weiterhin in das Bacteroidengewebe der sich ausbildenden Knöllchen über, aber nach einiger Zeit verlieren dieselben ihr Theilungsvermögen, werden metamorphosirt und bilden die sogen. Bacteroiden, gabelig verzweigte Körperchen, die oft in ungeheurer Menge in den Zellen des Bacteroidengewebes angetroffen werden.

Bacterium Radicicola, der zu den Papilionaceen in einem symbiotischen Verhältnisse steht, ist derjenige Organismus, welcher auf Kosten des elementaren Stickstoffs offenbar unter Zuhülfenahme der von den Papilionaceen gelieferten Kohlehydrate Eiweiss erzeugt. Wenn bei der Entleerung der Knöllchen die Bacteroiden aus ihren Zellen verschwinden, so geht deren Eiweiss in die Organe der Papilionaceen über und wird hier für Ernährungszwecke verwerthet. Enthält der Boden, in dem sich z. B. Erbsen entwickeln, keine Stickstoffverbindungen, dann ist die Ausbildung der Pflanzen nach allem, was wir gesehen haben, nur dann möglich, wenn die Wurzeln durch Infection mit *Bacterium Radicicola* zur Knöllchenbildung etc. gebracht werden, und aus diesem Grunde konnten auch nur diejenigen unserer Untersuchungsobjecte ein erhebliches Productionsvermögen zeigen, welche im nicht sterilisirten Boden oder in einem mit frischem Bodenauszug begossenen sterilisirten Boden standen.

Wer sich damit beschäftigen will, Reinculturen von *Bacterium Radicicola* herzustellen, vergl. PRASMOWSKI, Versuchsstationen, Bd. 37, S. 197 und 199, sowie BEYERINCK, Botan. Zeitung, 1888. PRASMOWSKI (vergl. S. 198) hat auch Versuche angestellt, welche lehren, dass aus

Reinculturen entnommene Bacterien Knöllchenbildung an den Wurzeln der Erbse hervorrufen, wenn man den Boden, in welchem sich die Untersuchungsobjecte entwickeln, mit dem Spaltpilz inficirt, während bei nicht vorgenommener Infection keine Knöllchenbildung eintritt. Endlich findet man bei PRAZMOWSKI (Versuchsstationen, Bd. 38, S. 20) noch Anleitung zu Experimenten, welche unter Benutzung einer sehr exacten, aber auch recht complicirten Methode den Nachweis gestatten, dass nur *Bacterium Radicicola*, aber keine andere Spaltpilzform, die Ernährung der Papilionaceen unter Zuhülfenahme des elementaren Stickstoffs vermittelt ¹⁾.

In dem von mir geleiteten pflanzenphysiologischen Praktikum lasse ich Versuche über Ernährung der Pflanzen mit freiem Stickstoff, wenn es sich nur um eine allgemeine Orientirung handelt, wie folgt, ausführen. Der Boden geeigneter Glascylinder, welche etwa 2,5 kg Sand fassen, wird 1--2 cm hoch mit ausgeglühtem Kies bedeckt. Je 2,5 kg des schon auf S. 53 erwähnten Sandes werden in einer grossen Schale mit 375 ccm destillirtem Wasser, 0,375 g $H_2 KPO_4$, 0,200 g KCl, 0,200 g $MgSO_4$, 10 g $CaCO_3$, sowie etwas phosphors. Eisenoxyd gemischt und in die Cylinder unter häufigem Aufstossen derselben auf eine weiche Unterlage eingekrümelt. Jeder Cylinder empfängt noch 10 ccm Bodenextract, bereitet durch Uebergiessen von 10 g Boden von einem Erbsenfelde mit 100 ccm Wasser. Der Gehalt dieser Auszüge an Stickstoffverbindungen ist so gering, dass er vernachlässigt werden kann. Einige Cylinder werden mit je 4 in Sägespänen angekeimten Erbsen, andere mit je 4 Haferpflänzchen besetzt. Die Culturegefässe stehen im Zimmer am nach Süden gelegenen Fenster. Für Ersatz des verdunsteten Wassers ist täglich zu sorgen. Den Erbsenpflanzen sind Stützen darzubieten. Die Erbsen gedeihen, wenn sie die früher erwähnte Hungerperiode überstanden haben, sehr gut, während der Hafer kränkelt. Den Hafer kann man aber in solchen Culturegefässen zu freudiger Entwicklung bringen, deren Sand, abgesehen von all den genannten Stoffen, noch 0,250 g KNO_3 beigemischt worden ist. Die Gründe für das verschiedenartige Verhalten der Erbsen, sowie des Hafers bei den Culturversuchen ergeben sich aus den früheren Ausführungen.

21. Der Nachweis des Ammoniaks und der Salpetersäure im Wasser und in der Pflanze und die Lebensthätigkeit von Nitromonas.

Um sich davon zu überzeugen, dass in der Natur anorganische stickstoffhaltige Verbindungen (Ammoniak, Salpetersäure), die von den Gewächsen bei ihrer Ernährung verwerthet werden können, vorhanden sind, ist es zu empfehlen, das Wasser (Fluss-, Teich- oder Brunnenwasser) auf einen Gehalt an den beiden genannten Substanzen zu prüfen. Die Untersuchung auf Ammoniak geschieht mit Hülfe des NESSLER'schen Reagens. 2 g Jodkalium werden in 5 ccm Wasser aufgelöst und der Flüssigkeit unter Erwärmen etwas mehr Quecksilberjodid hinzugefügt, als dieselbe zu lösen vermag. Die Lösung wird nach dem Erkalten mit

1) Bemerkf sei hier noch, dass man mit dem Namen Bact. Radic. vorläufig nicht nur eine, sondern eine grosse Gruppe von Spaltpilzformen bezeichnet, die für die Ernährung der Papilionaceen wichtig sind.

20 ccm Wasser verdünnt, filtrirt und mit Kalilauge versetzt (auf 20 ccm Filtrat 30 ccm Kalilauge, die auf 1 Thl. Aetzkali 2 Thl. Wasser enthält). Man füllt nun zwei Röhren mit dem zu untersuchenden Wasser an, versetzt die Flüssigkeiten mit Natronlauge, filtrirt, wenn erforderlich, und bringt zu dem Wasser in der einen Röhre etwa 30 Tropfen des NESSLER'schen Reagens. Ein Vergleich des Farbentons der Flüssigkeiten in den beiden Röhren lehrt, ob Ammoniak vorhanden oder ob dies nicht der Fall ist, denn bei Gegenwart desselben färbt sich die mit dem Reagens versetzte Flüssigkeit röthlich. Um die Anwesenheit von Salpetersäure im Wasser festzustellen, wird ein Tropfen desselben in ein weisses Porzellanschälchen gebracht und mit 2 Tropfen Brucinlösung (durch Schütteln von Brucin mit Wasser hergestellt) versetzt. Jetzt fügt man noch einige Tropfen concentrirter Schwefelsäure¹⁾ hinzu. Eintretende Röthung zeigt die Anwesenheit von Salpetersäure im Wasser an. Um die Gegenwart äusserst kleiner Salpetersäuremengen im Wasser noch festzustellen, verdunstet man einige ccm desselben und behandelt den Rückstand nun mit Brucinlösung und Schwefelsäure²⁾.

Sehr bequem lässt sich die Gegenwart der Salpetersäure im Wasser auch feststellen, wenn man einige ccm Wasser in einer Porzellanschale verdampft und mit Hülfe eines Glasstabes zu dem Rückstande Diphenylamin, das in Schwefelsäure gelöst ist (0,05 g Diphenylamin in 10 ccm reiner concentrirter Schwefelsäure gelöst) bringt. Bei Salpetersäuregegenwart tritt in Folge der Bildung von Anilinblau Blaufärbung ein.

Ziemlich reich an Nitraten ist der Saft der Zuckerrübe. Wenn man Schnitte der Wurzel auf dem Objectträger mit der erwähnten Diphenylaminlösung behandelt, so erfolgt intensive Bläuung derselben³⁾. Einen hübschen Vorlesungsversuch zum Nachweis von Nitraten in der Rübe kann man derartig anstellen, dass man eine Wurzel durchschneidet und die Schnittfläche einfach mit Diphenylaminlösung betupft. Die Bläuung tritt sofort hervor.

Eingehender ist das Vorkommen von Nitraten in den Pflanzen von BERTHELOT und ANDRÉ⁴⁾ sowie von SCHIMPER⁵⁾ studirt worden. Sie fanden die Nitrate sehr verbreitet in den Gewächsen, und wenn man Schnitte aus dem Stengel von *Helianthus* oder z. B. den Blättern von *Sambucus nigra* auf dem Objectträger etwas eintrocknen lässt, um ihnen dann einen Tropfen der erwähnten Diphenylaminlösung hinzuzufügen, so tritt die Blaufärbung momentan ein. Die meisten Blätter, z. B. diejenigen von *Sambucus nigra*, führen fast nur im Nervenparenchym Nitrate; in einigen Fällen (Blätter von *Tradescantia Selloi*) ist aber auch das Mesophyll sehr reich an Nitraten. Nitrite, welche ebenfalls mit Diphenylamin und Schwefelsäure Blaufärbung geben, kommen, so viel man bis jetzt weiss, nicht in der lebenden Pflanze vor. Zu betonen ist übrigens, dass dann, wenn die Reaction mit Diphenylamin ausbleibt, noch nicht mit absoluter Sicherheit auf

1) Die Schwefelsäure muss natürlich frei von Salpetersäure sein und nicht an und für sich mit Brucinlösung eine Röthung hervortreten lassen. Die Schwefelsäure kann man aber von eventuell vorhandener Salpetersäure befreien, indem man sie unter Zusatz von sehr wenig Schwefel zum Sieden erhitzt.

2) Vgl. REICHARDT, Grundlagen zur Beurtheilung des Trinkwassers, 1880, S. 154 und 143.

3) Vgl. MOLISCH, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, 1. Jahrg., S. 150.

4) Vgl. BERTHELOT et ANDRÉ, Annal. de chem. et de physique, Ser. 6, T. 8.

5) Vgl. SCHIMPER, Botan. Zeitung, 1888, S. 120.

Nitratabwesenheit in den betreffenden Geweben geschlossen werden darf, denn es giebt manche Stoffe in den Pflanzenzellen, deren Gegenwart das Zustandekommen der Reaction verhindert.

Von hohem Interesse ist es, die Thatsache zu constatiren, dass es Organismen giebt, welche die Fähigkeit besitzen, das Ammoniak, welches sich z. B. im Boden vorfindet, in Salpetersäure überzuführen¹⁾. Diese Nitrification wird durch einen Spaltpilz, den man als *Nitromonas* bezeichnet und der wohl keinem Boden völlig fehlt, zum Abschluss gebracht.

Wir füllen einen Kolben mit 100 ccm Culturflüssigkeit an. Dieselbe enthält, abgesehen von 100 ccm Wasser, 0,05 g $(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$, 0,1 g KH_2PO_4 und 1 g MgCO_3 . Zu der Lösung fügen wir wenig Ackererde, um die Infection mit *Nitromonas* herbeizuführen. Nach Verlauf etwa eines Monats wird man mit Hilfe der Diphenylaminreaction constatiren können, dass viel Salpetersäure in der Lösung gebildet worden ist. Während dieser Zeit bleibt die Lösung klar. Nur an ihrer Oberfläche bildet sich ein dünnes Häutchen, und im Bodensatz von kohlensaurer Magnesia entstehen Zoogloeaformen von Bacterien, durch deren schleimige Natur die Carbonattheilchen förmlich unter einander verklebt werden. Ich beobachtete diese Erscheinung besonders deutlich in einer Cultur, die drei Monate lang gestanden hatte.

Nun werden noch einige Kolben genau in der soeben angegebenen Weise mit Culturflüssigkeit beschickt. Man versieht die Mündungen der Gläser mit Watteverschluss und erhitzt die Lösungen zur Sterilisirung zum Sieden. Nach längerem Kochen lässt man erkalten und infectirt jede Culturflüssigkeit mit einem Tropfen der umgeschüttelten *Nitromonascultur*, die zuerst eingeleitet worden war. Ein Kolben bleibt frei stehen; einen anderen stellen wir in kohlensäurefreie Luft, indem wir den unter 16 beschriebenen und abgebildeten Apparat benutzen. Nur in der Culturflüssigkeit, zu welcher die atmosphärische Kohlensäure Zutritt hat, wird sich im Verlauf einiger Zeit, z. B. eines Monats, lebhafte Nitrification durch den zur Entwicklung gelangenden *Nitromonas* geltend machen. Die Kohlensäure der kohlensauren Magnesia kann von diesem Spaltpilz nicht verarbeitet werden. Wird ein mit Culturflüssigkeit beschickter Kolben mit Watteverschluss versehen und sterilisirt, so bildet sich in der Lösung keine Salpetersäure, wenn man dieselbe nicht mit *Nitromonaskieimen* infectirt. In allen Fällen muss man sich natürlich davon überzeugen, dass die Culturflüssigkeit bei Beginn der Versuche nitratfrei ist. Man bringt zu dem Zwecke einen Tropfen der Lösung in eine weisse Schale und fügt in Schwefelsäure aufgelöstes Diphenylamin hinzu.

Nitromonas gehört zu denjenigen merkwürdigen Organismen, welche im Dunkeln und ohne Chlorophyll die Fähigkeit haben, aus anorganischem Material organische Substanz zu erzeugen. Es ist sehr schwierig und mühsam, den strengen Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung beizubringen, weshalb wir auf den Gegenstand nicht näher eingehen. Vor allem handelt es sich bei bezüglichen

1) Literatur über Nitrification. Vgl. zumal SCHLÖSING und MÜNTZ, Compt. rend., T 84, 85 u. 86; WINOGRADZKI, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 20, S. 175; GODLEWSKI, Anzeiger der Akad. d. Wiss. in Krakau, 1892. *Nitromonas* ist eine Bacterie von ellipsoidischer, etwas gestreckter Gestalt, die keine Fäden bildet.

Experimenten darum, zunächst absolut reines destillirtes Wasser und ebenso Nährstoffe zu bereiten, die keine Spur organische Substanz enthalten.

22. Die Salpetersäure als Pflanzennahrungsmittel.

Im Boden und im Wasser finden sich salpetersaure Salze vor, die von den höheren Pflanzen als Nahrungsmittel verwerthet werden können. Dass die Nitate thatsächlich im Stande sind, den Stickstoff,

Fig. 22. Maispflanze, die mit Hülfe der Methode der Wassercultur bei Ausschluss aller Stickstoffverbindungen in der Nährstofflösung zur Entwicklung gebracht worden ist.

welcher für die Eiweissbildung und die normale Entwicklung der Gewächse erforderlich ist, zu liefern, lässt sich mit Hülfe der Methode der Wassercultur darthun. Als Untersuchungsobjecte dienen Mais, Hafer oder Buchweizen. (Ich benutzte Mais mit sehr gutem Erfolg.) Die Experimente werden in der Weise, wie es unter 1 angegeben ist,

angestellt. Eine oder einige Pflanzen entwickeln sich in Berührung mit einer Nährstofflösung, welche die auf S. 2 aufgeführte Zusammensetzung besitzt (a). Andere Pflanzen gelangen mit einer Lösung in Contact, welche ebenso wie jene zusammengesetzt ist, nur statt des salpetersauren Kalkes 1 g schwefelsauren Kalk im Liter enthält (b). Die Pflanzen von a entwickelten sich bei meinen Versuchen sehr normal; diejenigen von b zeigten dagegen nach einigen Wochen ein sehr kümmerliches Aussehen (vgl. Fig. 22). Die unteren Blätter vertrockneten, und die Pflanze wuchs äusserst langsam. Den Versuchsobjecten standen nur die stickstoffhaltigen Reservestoffe des Samens als Stickstoffquelle zur Disposition; sie konnten höchstens noch kleine Ammoniakmengen aus der Luft aufnehmen, aber diese reichten nicht entfernt hin, um eine üppige Entwicklung des Organismus herbeizuführen.

23. Das Ammoniak als Pflanzennahrungsmittel.

Will man sich davon überzeugen, dass die höheren Pflanzen im Stande sind, Ammoniaksalze, die sie mit Hülfe ihrer Wurzeln aufnehmen, für die Eiweissbildung zu verwerthen, so cultivire man Maispflanzen oder andere Gewächse in einer Nährstofflösung, die genau so wie die unter 1 erwähnte zusammengesetzt ist, nur statt des salpetersauren Kalkes 0,5 g phosphorsaures Ammoniak und 0,5 g schwefelsauren Kalk enthält. Es ist hier besonders darauf zu achten, dass die Reaction der Nährstofflösung während der Versuche keine wesentliche Veränderung erleidet, also stets eine schwach saure bleibt. Trägt man diesem Momente Rechnung, so gedeihen die Untersuchungsobjecte gut. Besonders empfehlenswerth ist auch folgende Nährstofflösung: 1000 ccm destillirtes Wasser, 0,15 g schwefels. Magnesia, 0,12 g Chlorecalcium, 0,12 g schwefels. Kali, 0,50 g saures phosphors. Ammoniak und sehr wenig Eisenchlorid. Vor dem Gebrauch setzt man der Lösung so viel Ammoniak hinzu, dass sie nur noch schwach sauer reagirt. Die Lösung ist häufiger, etwa alle 5 Tage, zu erneuern. Fraglich ist übrigens, ob das Ammoniak nicht in der Pflanze vor seiner Verwerthung zur Eiweissbildung durch Oxydation in Salpetersäure übergeführt wird. Aber immerhin lehrt unser Experiment doch, dass das Ammoniak überhaupt ein Nahrungsmittel der höheren Pflanzen repäsentirt¹⁾.

24. Der Ort der Eiweissbildung in den höheren Pflanzen.

In den Blättern werden reichliche Mengen von Kohlehydraten durch Assimilation erzeugt. Der Transpirationsstrom führt den Blättern salpetersaure Salze zu, und es ist daher anzunehmen, dass die Eiweissbildung zumal in den erwähnten Organen vor sich geht.

Wir stellen Querschnitte durch ein ausgewachsenes Blättchen von *Trifolium pratense* her (vgl. Fig. 3). Abgesehen von der Epidermis sehen wir das einschichtige Palissaden- und das mehrschichtige Schwammparenchym. Der Bast- und Holztheil der Gefässbündel sind deutlich zu erkennen. Der Weichbast wird nach aussen von Bastfasern umgeben, und ebenso wird der Holzkörper nach aussen

1) Vgl. G. KÜHN und HAMPE, Versuchsstationen, 1867.

von stark verdickten Sklerenchymfasern umsäumt. Auf der Aussen-seite des Bastfaserbeleges und ebenso auf der Aussenseite der den Holzkörper umrahmenden dickwandigen Zellen ist eine einfache Lage chlorophyllfreier Zellen, die Krystalle von oxalsaurem Kalk enthalten, vorhanden. Die Krystallscheiden bedecken nur den Rücken der Faserstränge; seitwärts erstrecken sie sich nicht weit ¹⁾).

Da nun, wie wir unter 25 sehen werden, salpetersaure (und auch schwefelsaure) Salze unter den in den Pflanzen herrschenden Bedingungen von der Oxalsäure, die so sehr allgemein in Pflanzenzellen angetroffen wird, zersetzt werden können, so liegt die Annahme nahe, dass die erwähnten Krystalle von oxalsaurem Kalk als Producte derartiger Reactionen aufzufassen sind. Die Salpetersäure und Schwefelsäure können dann mit dem in den grünen Blattzellen gebildeten stickstofffreien organischen Material unter Vermittelung des Protoplasmas zur Eiweissbildung Verwendung finden. Mit Rücksicht auf die uns hier interessirenden Fragen beanspruchen nun namentlich die folgenden Beobachtungen und Experimente Beachtung ²⁾).

Will man die Gegenwart von Kalkoxalat in Blättern nachweisen, so werden die Untersuchungsobjecte (zur Orientirung über die Methode verwendet man nach meinen Erfahrungen sehr zweckmässig nicht mehr ganz junge Blätter von *Humulus*) zunächst durch Eintauchen in heisses Wasser getödtet, dann extrahirt man sie mit Alkohol, legt sie in Chloralhydratlösung (auf 8 Thl. Chloralhydrat 5 Thl. Wasser) und beobachtet die Blattstücke mittelst des Polarisationsmikroskopes. Bei gekreuzten Nikols erscheinen die Kalkoxalatkrystalle leuchtend weiss oder farbig auf schwarzem Grunde, bei parallelen Nikols erscheinen sie fast schwarz auf weissem Grunde. Die Kalkoxalatkrystalle treten in den Zellen der Pflanzen in sehr verschiedenen Formen auf. Sie gehören theils dem tetragonalen, theils dem monoklinen System an ³⁾). Wenn man die Blattstücke in concentrirte Salzsäure legt und unter dem Polarisationsmikroskop weiter beobachtet, so kann man die allmähliche Auflösung des Oxalats gut verfolgen. Wasser und Essigsäure lösen die Krystalle nicht auf.

Bemerkungen über Art der Anwendung des Polarisationsmikroskops vgl. im 2. Abschnitt.

Untersuchen wir nach der angegebenen Methode einerseits junge, andererseits alte Blätter von *Ampelopsis*, so finden wir im Parenchym der Blätter zahlreiche Rhaphidenbündel und zwar in beiden Fällen ungefähr die gleichen Mengen. Ganz anders verhalten sich die meisten anderen dicotylen Gewächse, welche den oxalsauren Kalk in ihren Blättern nicht in Form von Rhaphiden führen. Wir prüfen z. B. junge, eben ausgewachsene und ältere Blätter von *Alnus glutinosa*, *Ulmus campestris* und *Humulus*. In allen Fällen entnehmen wir die Blätter solchen Sprossen, die sich im Schatten entwickeln, und finden, dass die Oxalatmenge im Parenchym der Blätter mit zunehmendem Alter derselben bedeutend wächst.

Wird ein kräftiges, in einem Topf cultivirtes Exemplar von *Pelargonium zonale* an einen schlecht beleuchteten Ort gestellt, so dass keine Assimilation stattfinden kann, dann findet man im Parenchym der neu

1) Vgl. H. DE VRIES, Landwirthsch. Jahrbücher, Bd. 6, S. 900, und Taf. 44, Fig. 3.

2) Vgl. SCHIMPER, Botan. Zeitung, 1888.

3) Abbildungen der Calciumoxalatkrystalle vergl. bei ZIMMERMANN, Botan. Mikrotechnik, 1892, S. 56.

entstehenden Blätter wenig Kalkoxalat. Die Bildung dieser kleinen Oxalaten hängt gar nicht mit der Lichtwirkung zusammen, und man redet daher hier von dem Vorhandensein primären Kalkoxalats. Sind die Blätter im Dunkeln ausgewachsen, so hört unter den bezeichneten Umständen jede Kalkoxalatbildung auf. Dieselbe tritt aber wieder ein, wenn die Versuchspflanze ans Licht gelangt. Es entsteht dann das secundäre Kalkoxalat, dessen Production im Gegensatz zu derjenigen des primären Oxalats vom Licht abhängig ist (SCHIMPER).

Das Material zur Bildung des primären Calciumoxalats liefert einmal die in den Pflanzen durch Stoffwechselprocesse erzeugte Oxalsäure, andererseits der seitens der Wurzeln von aussen aufgenommene Kalk. Dieser letztere tritt namentlich in Verbindung mit Salpetersäure und Schwefelsäure aus dem Boden in die Pflanze ein. Wenn nun z. B. die Nitrats mit der im Stoffwechsel erzeugten Oxalsäure in chemische Wechselwirkung gerathen, dann bildet sich einmal freie Salpetersäure, welche für die Eiweissbildung Verwendung findet, andererseits entsteht Kalkoxalat. Vorübergehend können sich die Nitrats aber auch im Pflanzengewebe anhäufen, wie dies schon Beobachtungen lehrten, die unter 21 Erwähnung fanden.

Um den directen Nachweis zu liefern, dass aber auch eine Verarbeitung der Nitrats wirklich erfolgen kann, stellen wir den folgenden Versuch an. Zwei Topfexemplare von *Pelargonium zonale* werden ins Dunkle gestellt. Der Nitratgehalt der Blätter normal vegetirender Pflanzen ist meist gering, oder es ist gar kein Nitrat vorhanden. Untersuchen wir die Blätter der verdunkelten Pflanzen nach 4—6 Tagen, so zeigt sich, dass sie recht nitratreich geworden sind. Stellen wir die Pflanzen nunmehr ans Fenster, so dass sie hell beleuchtet sind, dann ist das Nitrat nach Verlauf von 8—14 Tagen wieder aus ihren Blättern verschwunden. Werden Stöcke von *Pelargonium zonale* oder *Fuchsia globosa*, deren Blätter stark panachirt sind, in derselben Weise, wie es soeben angegeben wurde, behandelt, so sieht man die Nitrats bei Lichtzutritt in den fast chlorophyllfreien Blättern nicht verschwinden.

Somit ergiebt sich, dass der Nitratverbrauch in Beziehung steht zum Chlorophyllgehalt der Blätter und zum Licht. Die Verarbeitung der Salpetersäure und die Eiweissbildung kann nach den neueren Untersuchungen im Organismus der höheren Pflanzen nur in den grünen Zellen und unter Mitwirkung des Lichtes vor sich gehen.

SCHIMPER (vgl. auch Flora, 1890, S. 251 u. 260) ist der Ansicht, dass die Verarbeitung der Nitrats und des durch Assimilation entstandenen Zuckers zu Amiden und schliesslich zu Eiweiss, wobei als Nebenproducte vielleicht organische Säuren (Oxalsäure)¹⁾ entstehen, ganz direct vom Licht sowie der Chlorophyllthätigkeit abhängig gedacht werden muss. Eine Eiweissbildung in chlorophyllfreien Zellen, wie sie thatsächlich im Lebensprocess der Pilze stattfindet, ist nach ihm im Organismus der höheren Pflanzen ausgeschlossen. Streng bewiesen ist diese Ansicht meiner Meinung nach nicht. Freilich genügen auch die Versuche nicht, durch die manche das Stattfinden der Eiweissbildung in nicht grünen Zellen höherer Pflanzen wahrscheinlich zu machen suchen²⁾. Die ganze Frage bedarf einer weiteren sehr eingehenden Behandlung, und möglich ist es, dass Licht sowie Chloro-

1) Diese Oxalsäure kann dann zur Entstehung des secundären Calciumoxalats Veranlassung geben.

2) FRANK (Lehrbuch d. Botanik, 1892, S. 568 und 570) ist der Ansicht, dass eventuell in jeder Zelle höherer Pflanzen Eiweissbildung möglich sei.

phyllkörper nur indirecte Bedeutung für den Process der Eiweissbildung haben. Auch die Bildung des erwähnten secundären Oxalats könnte nur indirecte Beziehungen zum Licht haben.

25. Die Zersetzung der Nitate in den Pflanzen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen (vgl. unter 24), dass die zur Eiweissbildung erforderliche Salpetersäure aus salpetersauren Salzen unter Vermittelung von Pflanzensäuren, zumal der Oxalsäure, in Freiheit gesetzt wird, während andererseits oxalsaure Salze entstehen. Diese und ähnliche Reactionen sind auch noch insofern von Wichtigkeit, als durch ihr Stattfinden die Pflanzensäfte von einem Uebermaass von Kalksalzen befreit werden können, denn der oxalsaure Kalk ist ja eine sehr schwer lösliche Verbindung und scheidet sich in der That in den Pflanzen sehr allgemein in Krystallform ab.

In der Pflanze findet die Einwirkung der Oxalsäure auf Kalk oder Kalisalze auf jeden Fall in sehr verdünnter Lösung statt, und daher hat es Interesse, Versuche zur Beantwortung der Frage anzustellen, ob die Reactionen, von denen hier die Rede ist, überhaupt noch bei Gegenwart sehr grosser Wassermengen stattfinden¹⁾.

Fig. 23. Apparat zur Untersuchung der Einwirkung von Oxalsäure auf Nitate.

Man stelle eine Anzahl von Gläsern auf, die Lösungen von 0,205 g (1 Aequivl.) salpetersauren Kalks in 400 ccm Wasser enthalten. Ferner bereite man sich Auflösungen von je 0,090 g wasserfrei gedachter Oxalsäure in je 100 ccm Wasser. Vermischt man nun je 400 ccm der Kalksalpeterlösungen mit je 100 ccm der Oxalsäurelösungen bei gewöhnlicher Temperatur, so entstehen Niederschläge von oxalsaurem Kalk, während Salpetersäure frei wird. Die Zeit ist aber nicht ohne Einfluss auf den Verlauf der Reaction, wovon man sich überzeugen kann, wenn man die Menge des gefällten oxalsauren Kalkes in einem Falle sofort, im anderen erst nach Verlauf von 1, 2 oder 3 Tagen ermittelt. Je länger die Oxalsäure auf das Kalksalz eingewirkt hat, um so grösser ist die Menge des abgeschiedenen oxalsauren Kalkes. Bei der quantitativen Bestimmung des letzteren wird derselbe

selbe am zweckmässigsten in bekannter Weise in Sulphat übergeführt.

Dass in der That Salpetersäure frei wird, wenn Oxalsäure auf salpetersaures Kali einwirkt, davon kann man sich auf folgende Weise überzeugen. Es werden 5 Bechergläser (*a, b, c, d, e*), von denen jedes 500 ccm Wasser enthält, aufgestellt. *a* erhält einen Zusatz von 0,210 g Salpetersäure (HNO_3), *b* einen Zusatz von 3,000 g Oxalsäure (dieselbe wasserfrei gedacht), *c* einen Zusatz von 0,337 g salpetersaurem Kali, *d* einen Zusatz von 0,210 g Salpetersäure und 3,000 g Oxalsäure und *e* einen Zusatz von 0,337 g salpetersaurem Kali und 3,000 g Oxalsäure. In die Versuchsflüssigkeiten werden Marmorplatten (vgl. Fig. 23 *M*) von möglichst gleicher Grösse (40 mm Länge und Breite und 5 mm Dicke) hinein-

1) Specielleres über Nitratzersetzungen vgl. EMMERLING, Versuchsstationen, Bd. 17 und 30.

gehängt. Zum Aufhängen dienen Fäden, die an Stäben, welche auf dem Rande der Gläser ruhen, befestigt sind. Ueberlässt man die Flüssigkeiten sich selbst, so ergibt sich, dass sich *a* nicht trübt, ebensowenig *b*, denn die Marmorplatte bedeckt sich mit einer Kruste von oxalsaurem Kalk, die der weiteren Wirkung der Oxalsäure ein Ziel setzt. Die Flüssigkeit in *c* bleibt auch klar, in den Glashäfen *d* und *e* bilden sich aber bedeutende Niederschläge von oxalsaurem Kalk. In *d* wirkt die Salpetersäure auf den Marmor ein. Es entsteht salpetersaurer Kalk, der nun unter Bildung von oxalsaurem Kalk und Freiwerdung von Salpetersäure, die ihrerseits abermals auf den Marmor einwirkt, von der vorhandenen Oxalsäure zersetzt wird. Wenn in *e* ein bedeutender Niederschlag entsteht, wie dies thatsächlich der Fall ist, so kann diese Erscheinung nur dadurch zu Stande kommen, dass die Oxalsäure aus dem salpetersauren Kali Salpetersäure frei gemacht hat, welche sich nach ihrer Bildung dann ebenso verhält, wie die Salpetersäure in *d*. Die Reactionen, von denen hier die Rede ist, gehen, wovon ich mich überzeuge, so energisch vor sich, dass in *d* und *e* bereits nach einer halben Stunde eine erhebliche Menge von oxalsaurem Kalk zur Abscheidung gelangt ist. Man kann also auf die angegebene Weise ganz bequem in Vorlesungen die Thatsache demonstrieren, dass die Oxalsäure im Stande ist, das salpetersaure Kali zu zersetzen.

III. Die Aschenbestandtheile der Pflanzen.

26. Die mechanische Bodenanalyse.

Für die Beurtheilung der Natur eines Bodens ist es von grosser Wichtigkeit, den Gehalt desselben an gröberen und feineren Elementen genau zu ermitteln. Man unterscheidet daher bereits seit langer Zeit zwischen dem Skelett und der Feinerde des Bodens. Die letztere beansprucht unsere besondere Aufmerksamkeit, denn sie ist die Trägerin der wichtigsten Bodeneigenschaften und liefert den Pflanzen in erster Linie das Mineralstoffmaterial, dessen sie zu ihrer Ernährung bedürfen. Um die für den Zweck der chemischen Bodenanalyse erforderliche Feinerde zu gewinnen, wird der lufttrockene Boden auf ein Sieb von 0,5 mm Maschenweite gebracht und die Feinerde einfach ausgeschüttelt. Handelt es sich aber darum, den Feinerdegehalt eines Bodens zu bestimmen, so werden 50 g lufttrockner Erde in einer Schale mit Wasser übergossen, etwa 1 Stunde auf dem Wasserbade erwärmt, darauf auf ein Sieb von 0,5 mm Maschenweite gebracht, und die Feinerde mit Hülfe eines Borstenpinsels, zuletzt unter einem feinen Wasserstrahl, ausgewaschen. Den Rückstand auf dem Siebe (Skelett) trocknet man und wiegt ihn. Das Skelett zerlegt man weiter in Streusand, Feinkies, Mittelkies und Grobkies. Es geschieht dies ebenfalls mit Hülfe verschiedener Siebe. Der Grobkies bleibt, wenn man mit dem Knor'schen Siebsatze arbeitet, auf einem Siebe von 4,2 mm, der Mittelkies auf einem Siebe von 2,7 mm, der Feinkies auf einem Siebe von 0,9 mm Maschenweite zurück.

Die Feinerde zerlegt man durch Schlämmen in Feinsand und thonige

Theile. Dies geschieht mit Hülfe des KÜHN'schen Schlammeylinders (Fig. 24). Der Glascyliner hat eine Höhe von 28 und einen Durchmesser von 8,5 cm (beides im Innern desselben gemessen). 5 cm über

Fig. 24. Schlammeylinder.

dem Boden des Cylinders befindet sich ein Tubulus, der in der Weise, wie es die Abbildung zeigt, verschlossen werden kann. Man bringt 30 g Feinerde, die zuvor längere Zeit in der Wärme mit Wasser behandelt worden ist, in den Schlammeylinder, füllt diesen bis zu einer Marke am oberen Rande mit Wasser an, rührt die Erde unter Zuhülfenahme eines Stabes auf und lässt dann 10 Minuten lang ruhig stehen. Jetzt wird die trübe Flüssigkeit abgelassen, ein neues Wasserquantum in den Cylinder gebracht, aufgeführt, und die Flüssigkeit nach 5 Minuten abermals entfernt. Man wiederholt diese Operationen so lange, bis alle thonigen Theile abgeschwämmt erscheinen, trocknet den Rückstand (Feinsand), der im Cylinder zurückgeblieben ist, und bestimmt sein Gewicht¹⁾. Die Feinerde besteht, wie die Schlammeylanalyse unter anderem lehrt, aus Theilchen von sehr verschiedener Korngrösse, eine Thatsache, von welcher man sich schon überzeugen kann, wenn

man etwas Feinerde mit Wasser auf einen Objectträger bringt und der mikroskopischen Prüfung unterzieht. Die erwähnten Siebe und der Schlammeylinder sind von MÜENCKE in Berlin zu beziehen.

27. Der Nachweis einiger Pflanzennährstoffe im Boden.

Es liegt hier keineswegs in meiner Absicht, eine ausführliche Anleitung zur chemischen Untersuchung des Bodens zu geben. Wer solche Untersuchungen anstellen will und die Absicht hat, sich genau über den Werth der erhaltenen Resultate zu orientiren, muss die Schriften von E. v. WOLFF²⁾, KNOP³⁾, sowie meine Bodenkunde⁴⁾ studiren. Hier handelt es sich allein darum, den Nachweis zu führen, dass der Boden bestimmte Pflanzennährstoffe enthält, und zwar verwenden wir als Untersuchungsmaterial stets die Feinerde des Bodens, welche in der Weise, wie es unter 26 angegeben, abgeschieden worden ist.

1) Ausführliche Erörterungen über die Function der Feinerde sowie des Skelettes im Boden und über die Aufgabe sowie die Methode der mechanischen Bodenanalyse findet man in meinem Lehrbuche der Bodenkunde, 1876, sowie in meiner Abhandlung über Bodenkunde, die in Bd. 2 des von v. D. GOLTZ herausgegebenen Handbuchs der Landwirthschaft, 1888, erschienen ist.

2) Vgl. E. v. WOLFF, Anleitung zur chem. Untersuchung landwirthschl. wichtiger Stoffe, 1875.

3) KNOP, Die Bonitirung der Ackererde, 1871.

4) Vgl. DETMER, Lehrbuch der Bodenkunde, 1876.

Will man die Gegenwart des Chlors im Boden constatiren, so werden 5 g Feinerde mit 200 ccm Wasser einige Zeit in Berührung gelassen. Man filtrirt dann und bestimmt das Chlor im Filtrat in bekannter Weise mittelst salpetersauren Silberoxyds.

Zum Zweck des Nachweises der Schwefelsäure im Boden werden 2 oder 5 g Feinerde mit 20—50 g schwefelsäurefreiem kohlensaurem Natron vermischt. Die Mischung wird in eine Porzellanschale gebracht, mit Wasser übergossen und einige Zeit ausgekocht. In der erhaltenen Flüssigkeit kann die Schwefelsäure leicht qualitativ nachgewiesen oder quantitativ bestimmt werden.

Etwa 10 g Feinerde werden mit Wasser übergossen und unter fort-dauerndem Umrühren so lange mit Salzsäure versetzt, bis jede Kohlen-säureentwicklung aufgehört hat. Nach einiger Zeit filtrirt man die schwach sauer reagirende Lösung ab, neutralisirt annähernd mit Ammoniak und versetzt unter gelindem Erwärmen mit essigsaurem Natron. Es bildet sich ein Niederschlag, der wesentlich aus Eisenoxyd besteht, während man in der vom Niederschlag abfiltrirten Flüssigkeit unter Zuhülfenahme von oxalsaurem Ammoniak mit Leichtigkeit die Gegenwart des Kalkes nachweisen kann. Auf das ziemlich umständliche Verfahren, welches anzuwenden ist, um im Boden das Vorhandensein anderer Stoffe, zumal des Kalis sowie der Phosphorsäure, festzustellen, gehen wir hier nicht specieller ein; es sind in dieser Hinsicht die citirten Schriften zu ver-gleichen ¹⁾.

28. Der Gehalt des Wassers an Pflanzennährstoffen.

Es dürfte von Interesse sein, die Gegenwart einiger Körper, welche als Pflanzennährstoffe Bedeutung besitzen, im Wasser festzustellen. Wir benutzen zu derartigen Versuchen Fluss-, Teich- oder Brunnenwasser. Man säuert 20 ccm Wasser mit einigen Tropfen Salzsäure an und fügt Chlorbariumlösung hinzu. Eine Trübung oder ein Niederschlag zeigt die Gegenwart von Schwefelsäure an. Entsteht ein weisser, käsiger, in Ammoniak löslicher Niederschlag oder eine Trübung, wenn man zu 20 ccm Wasser, die mit reiner Salpetersäure angesäuert worden sind, eine Lösung von salpetersaurem Silber hinzufügt, so ist Chlor vorhanden. 50 ccm Wasser werden mit Salzsäure angesäuert, darauf mit überschüssigem Ammoniak und endlich mit oxalsaurem Ammoniak versetzt. Ein entstehender weisser Niederschlag zeigt die Gegenwart von Kalk an. Der Kalk ist in den Wässern in Verbindung mit Schwefelsäure oder Kohlensäure (Calciumbicarbonat) vorhanden. Die Gegenwart des letzteren Körpers ist durch Erwärmen des frischen Wassers festzustellen, da sich derselbe bei höherer Temperatur leicht in einfach kohlensauren Kalk, welcher abge-schieden wird und eine Trübung der Flüssigkeit bedingt, sowie Kohlen-säure zersetzt. Wird Brunnenwasser, das ziemlich reich an Calcium-bicarbonat ist, in einem kleinen Glase bei gewöhnlicher Temperatur einige Zeit lang sich selbst überlassen, so scheidet sich einfach kohlensaurer Kalk in Krystallen ab, von deren Form man sich leicht durch mikro-skopische Untersuchung überzeugen kann.

Da hier keine Anleitung zur Wasseruntersuchung gegeben, sondern nur die Ueberzeugung befestigt werden soll, dass das Wasser überhaupt

1) Vgl. auch KÖNIG, Untersuchung landwirthschl. wichtiger Stoffe, 1891.

Pflanzennährstoffe enthält, so wollen wir von dem Nachweis anderer Stoffe im Wasser absehen. Uebrigens ist an anderer Stelle bereits gezeigt worden, wie man bei der Untersuchung des Wassers auf einen Gehalt an Ammoniak und Salpetersäure zu verfahren hat¹⁾).

29. Die Aschenanalyse.

Trotzdem die Ausführung qualitativer sowie quantitativer Aschenanalysen ziemlich umständlich und zeitraubend ist, kann ich demjenigen, welcher sich mit physiologischen Studien beschäftigen will, nur dringend rathen, derartige Untersuchungen auszuführen. Das Pflanzenmaterial wird zunächst sorgfältig gereinigt, z. B. auch vom anhaftenden Staub befreit. Frische Wurzeln müssen alsdann in Scheiben zerschnitten werden, die man, ebenso wie frische Stengel und Blätter, an Fäden im Trockenraum bei etwa 50° C. zum Trocknen aufhängt. Die trocknen Wurzeln zerstösst man zu einem nicht sehr feinen Pulver, während man die getrockneten Stengel oder Blätter mit der Scheere zerschneidet. Lufttrockne Samen werden im Mörser zu einem groben Pulver zerstossen.

Es sei z. B. die Aufgabe gestellt, die oberirdischen Theile der Kleepflanze auf ihre Aschenbestandtheile zu untersuchen. Ein grösseres Quantum der Pflanzen wird im Trockenschranke getrocknet, zerschnitten, und das Ganze gut durcheinander gemischt. Zur Gewinnung der Asche dienen etwa 100 g Substanz. Die Verbrennung erfolgt am besten in einer grossen Platinschale; in Ermangelung einer solchen kann auch eine Porzellanschale benutzt werden. Bei der Verbrennung selbst, die über dem freien Feuer der Lampe vorzunehmen ist, hat man sorgfältig darauf zu achten, dass die Hitze nicht zu sehr gesteigert werde; die Asche darf niemals ins Glühen kommen. Die Aschenanalyse wird nach der Vorschrift von E. v. WOLFF²⁾ angestellt. Ich habe mich oft von der Brauchbarkeit der Methode überzeugt. 1 g der gewonnenen Rohasche dient zur Kohlensäurebestimmung, die man z. B. zweckmässig mit Hülfe des DIETRICH'schen Apparates ausführt³⁾. 1 g Rohasche wird ferner mit verdünnter Salpetersäure behandelt, um in der erhaltenen Lösung das Chlor zu bestimmen. Weitere 3—4 g Asche werden in einer Kochflasche mit concentrirter Salpetersäure befeuchtet, dann mit starker Salzsäure übergossen und hierauf einige Zeit lang bei beginnender Kochhitze digerirt. Jetzt wird das Ganze in eine Porzellanschale gespült, zur Trockne verdunstet, und die trockne Masse längere Zeit im Trockenschranke belassen, dann mit concentrirter Salzsäure angefeuchtet und mit Wasser extrahirt. Der ungelöste Rückstand (Kieselsäure, Sand, Kohle) wird auf einem getrockneten und gewogenen Filter gesammelt, gut mit heissem Wasser ausgewaschen und nach dem Trocknen gewogen. Der in eine Platinschale gebrachte Inhalt des Filters wird

1) Genaue Angaben über die Methode der Wasseruntersuchung findet man bei TIEMANN, Anleitung zur Untersuchung von Wasser, 1874, und REICHARDT, Grundlagen zur Beurtheilung des Trinkwassers, 1880.

2) Vgl. E. v. WOLFF, Anleitung zur chem. Untersuchung landwirthschl. wichtiger Stoffe, 1875, S. 159.

3) Vgl. DIETRICH, Zeitschrift f. analytische Chemie, Bd. 3 u. 4. Der DIETRICH'sche Apparat kann von der Firma J. H. BÜCHLER in Breslau bezogen werden.

unter Zusatz von Natronlauge mit einer concentrirten Lösung von kohlensaurem Natron mehrmals ausgekocht, die Flüssigkeit durch das schon benutzte Filter filtrirt, um in dem gut ausgewaschenen, aus Sand sowie Kohle bestehenden Rückstande den Gehalt an diesen Körpern durch Verbrennung festzustellen. Die alkalische Lösung dient zur Bestimmung der Kieselsäure; sie wird mit Salzsäure übersättigt, zur Trockne verdampft, der Rückstand mit angesäuertem Wasser ausgekocht, und die abgeschiedene Kieselsäure ihrem Gewicht nach bestimmt.

Die von dem erwähnten, aus Kieselsäure, Sand sowie Kohle bestehenden Rückstande abfiltrirte Flüssigkeit wird auf ein bestimmtes Volumen, z. B. 500 ccm, gebracht und in zwei abgemessene Portionen getheilt. In der einen Portion bestimmt man die Schwefelsäure mit Chlorbarium, um die vom schwefelsauren Baryt abfiltrirte Lösung bei gelinder Wärme mit Ammoniak, kohlensaurem, sowie oxalsaurem Ammoniak zu behandeln. Die vom entstandenen Niederschlag abfiltrirte Flüssigkeit wird zur Trockne verdampft, der Rückstand schwach gegläht und mit Oxalsäure erhitzt. Der Glührückstand muss mit Wasser behandelt, und die gewonnene Lösung nach dem Filtriren mit Salzsäure versetzt werden. Dann bringt man die Lösung wieder zur Trockne, glüht den Rückstand schwach und bestimmt das Gewicht der nunmehr reinen Chloralkalien. Das Kali trennt man in bekannter Weise mit Hülfe von Platinchlorid vom Natron. Die zweite Portion der oben erwähnten Lösung muss annähernd mit Ammoniak gesättigt und mit essigsaurem Ammoniak versetzt werden, um unter gelindem Erwärmen das vorhandene phosphorsaure Eisenoxyd zur Abscheidung zu bringen und die Phosphorsäure, sowie das Eisenoxyd nach der Formel $\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_2$ zu berechnen. Die vom phosphorsauren Eisenoxyd abfiltrirte Flüssigkeit erhitzt man unter Zusatz von oxalsaurem Ammoniak zur Abscheidung des Kalkes bis zum anfangenden Kochen (Kalkbestimmung) und übersättigt das Filtrat nach dem Eindampfen bis auf etwa 150 ccm stark mit Ammoniak. Nach 24-stündigem Stehen wird die abgeschiedene phosphorsaure Ammoniak-Magnesia auf einem Filter gesammelt, um aus der Menge derselben die Phosphorsäure sowie die Magnesia zu berechnen. Das Filtrat wird, wenn noch Phosphorsäure in demselben vorhanden ist, mit Magnesiamixtur (bereitet durch Vermischen von 1 Thl. krystallisirter schwefelsaurer Magnesia mit 2 Thl. Chlorammonium, 8 Thl. Wasser und 4 Thl. Ammoniak) oder, wenn noch Magnesia zugegen ist, mit phosphorsaurem Natron gefällt.

Bei der Zusammenstellung der Resultate quantitativer Aschenanalysen ist der Gehalt der vegetabilischen Trockensubstanz an Rohasche, sowie an Reinasche (= Rohasche $\div$ Kohlensäure, Sand und Kohle) anzugeben. Ebenso muss die procentische Zusammensetzung der Reinasche berechnet werden.

Einige Pflanzenaschen, z. B. diejenige des Tabaks, enthalten auch Lithium. Man kann nun leicht einen hübschen Demonstrationsversuch anstellen, indem man Cigarrenasche mit verdünnter Salpetersäure anfeuchtet, das freie Ende eines in einer Glasröhre eingeschmolzenen Platindrahtes in die Mischung bringt und dann in die nicht leuchtende Flamme eines BUNSEN-Brenners oder in eine Spiritusflamme hält. Die spectroscopische Prüfung der Flamme, z. B. unter Benutzung eines kleinen Taschenspectroskops, lässt fast immer sofort das Auftreten der so sehr charakteristischen rothen Lithiumlinie erkennen.

30. Das Mineralstoffbedürfniss der höheren Pflanzen und die Entbehrlichkeit des Natriums sowie des Siliciums für dieselben.

Die Fragen, um die es sich hier handelt, können am bequemsten und sichersten mit Hülfe der Methode der Wassercultur entschieden werden. Diese letztere ist unter 1. eingehender besprochen worden, und wir cultiviren z. B. Maispflanzen nach der dort gegebenen Vorschrift in einer complete Nährstofflösung, die also salpetersauren Kalk, Chlorkalium, schwefelsaure Magnesia, phosphorsaures Kali sowie etwas Eisenchlorid enthält. Gleichzeitig versuchen wir aber auch eine in Sägespänen angekeimte Maispflanze zur Entwicklung zu bringen, indem wir ihre Wurzeln nur mit destillirtem Wasser in Berührung lassen. Diese letztere Pflanze stellt ihr Wachsthum bald ein, während die Untersuchungsobjecte, deren Wurzeln sich mit einer complete Nährstofflösung in Contact befinden, kräftig weiter wachsen. Bei meinen Versuchen entfaltete die Maispflanze, welcher destillirtes Wasser zur Disposition stand, nur vier Blätter; dann hörte ihr Wachsthum auf. Mineralstoffe sind demnach erforderlich, wenn sich Gewächse normal entwickeln sollen. Werden die Pflanzenwurzeln nicht von einer Nährstofflösung, sondern von destillirtem Wasser umgeben, so steht das Wachsthum der Pflanzen still, wenn die Reservestoffe der Samen verbraucht sind.

Unsere Nährstofflösung ist frei von Natron und Kieselsäure. Der Culturversuch lehrt also ferner, dass weder Natrium noch Silicium als unentbehrliche Pflanzennährstoffe zu betrachten sind. Uebrigens ist es möglich, dass das Silicium für manche Organismen einen unentbehrlichen Nährstoff repräsentirt. So z. B. für die Diatomeen, braun gefärbten, mikroskopisch kleinen Algen, denen man so oft auf im Wasser liegenden Steinen oder Pflanzentheilen begegnet, und deren Membranen mit grossen Kieselsäuremengen imprägnirt sind. Für die Gräser ist die Kieselsäure wohl entbehrlich, aber doch nützlich, und ähnlich mag es sich mit den Equiseten verhalten. Auf jeden Fall ist der Kieselsäuregehalt der Membranen der Epidermiszellen dieser letzteren ein sehr bedeutender, wovon man sich auf folgende Weise überzeugen kann.

Untersucht man Flächenschnitte des Stengels von Equisetum arvense, so findet man, dass spaltöffnungsführende und spaltöffnungsfreie Streifen mit einander abwechseln. Jene erscheinen durch die Unterlage aus chlorophyllhaltigen Zellen grün, diese farblos. Die Epidermiszellen sind lang gestreckt; der Bau des Spaltöffnungsapparats ist ein complicirter. Wir legen einen Flächenschnitt auf ein Glimmerplättchen, betupfen den Schnitt mit concentrirter Schwefelsäure und glühen ihn in einer Gas- oder Spiritusflamme aus. Das Glimmerplättchen mit der Asche legt man darauf auf einen Objectträger und bedeckt das Präparat nach Zusatz eines Wassertropfens mit Deckglas. Bei mikroskopischer Untersuchung erblicken wir ein Kieselskelett, welches viele der wesentlichen Structurverhältnisse des ursprünglichen Flächenschnittes noch erkennen lässt.

31. Die Unentbehrlichkeit des Phosphors, Schwefels, Kaliums, Calciums, Magnesiums und Eisens für die höheren Pflanzen.

Wir cultiviren Pflanzen, z. B. Maispflanzen, in der Weise mit Hülfe der Methode der Wassercultur, wie es unter 1 angegeben worden ist. Der complete Nährstofflösung geben wir aber eine etwas andere Zusammensetzung wie dort. Sie enthält im Liter, abgesehen von sehr wenig Eisenchlorid, 1 g Ca 2No_3 , 0,5 g K Cl , 0,5 g Mg So_4 und 0,5 g fein pulverisirten $\text{Ca}_3 \text{ 2Po}_4$. Der letztere Körper ist schwer löslich in Wasser und bildet daher einen Bodensatz in den Culturegefässen. Ferner stellen wir eine kalifreie Lösung her, indem wir das K Cl der complete Nährstofflösung durch 0,5 g Na Cl ersetzen. Eine phosphorsäurefreie Lösung stellen wir dar, indem wir den $\text{Ca}_2 \text{ 2Po}_4$ durch 0,5 g Ca So_4 ersetzen. Eine eisenfreie Lösung erhält man leicht, indem man das Eisenchlorid fortlässt. Die Culturegefässe werden sämmtlich, nachdem sie mit Maispflanzen besetzt worden sind, denselben äusseren Einflüssen ausgesetzt. Es ergibt sich, dass der Mais in der complete Nährstofflösung vortreflich gedeiht, während die Pflanzen in der kali- sowie phosphorsäurefreien Lösung ihr Wachsthum alsbald einstellen, nämlich dann, wenn der in den Samen vorhandene kleine Kali- und Phosphorsäurevorrath erschöpft ist. Kalium sowie Phosphor sind demnach durchaus unentbehrliche Pflanzennährstoffe. Der Versuch mit der kalifreien Nährstofflösung lehrt überdies, dass das Kalium im Ernährungsprocess der höheren Pflanzen nicht durch das ihm chemisch so nahe verwandte Natrium vertreten werden kann. Auch schwefelfreie Lösungen sind leicht zu bereiten.

Die Pflanzen in eisenfreien Nährstofflösungen produciren zunächst normale grüne Blätter. Aber bald tritt eine Krankheitserscheinung hervor. Die Untersuchungsobjecte werden nämlich, wenn der Eisenvorrath der Samen erschöpft ist, icterisch und chlorotisch. Die neu entstehenden Blätter erscheinen nicht mehr grün, sondern weiss, und die mikroskopische Untersuchung derselben lehrt, dass nicht normal ausgebildete oder keine Chlorophyllkörper in ihren Zellen vorhanden sind. Wenn wir der Nährstofflösung einige Tropfen einer verdünnten Eisenchloridlösung hinzufügen, so ergrünen die vorher weissen Blätter in 2—3 Tagen, und die Pflanzen wachsen nun freudig weiter¹⁾.

Auch mit den folgenden Nährstofflösungen können wir bequem arbeiten. Wir werden finden, dass unsere Pflanzen in der Normallösung gut gedeihen, unter Benutzung derjenigen Lösungen aber, denen dieser oder jener Stoff fehlt, alsbald zu Grunde gehen.

Sämmtliche Lösungen, abgesehen von der zuletzt angegebenen, phosphorsäurefreien, sind bei Gebrauch im Verhältniss von 1 : 4,8 mit destillirtem Wasser zu verdünnen²⁾.

Normal lösung³⁾:

600 ccm destill. Wasser,
7 g Kalinitrat,

1) Die Literatur über die hier behandelten Verhältnisse habe ich in meinem Lehrbuche der Pflanzenphysiologie zusammengestellt.

2) Vgl. SCHIMPER, Flora, 1890, H. 3.

3) Sämmtlichen Lösungen ist wenig verdünnte Eisenchloridlösung hinzuzufügen.

1,5 g Schwefels. Magnesia,
 1,5 „ Chlornatrium,
 1,5 „ Neutrales phosphors. Kali,
 Gyps im Ueberschuss.

Kalkfreie Lösung:
 Vorstehende Lösung ohne Gyps.

Kalifreie Lösung:
 600 ccm destill. Wasser,
 7 g Kalknitrat,
 1,5 „ Schwefels. Magnesia,
 1,5 „ Chlornatrium,
 1,5 „ Neutrales phosphors. Natron.

Magnesiafreie Lösung:
 600 ccm destill. Wasser,
 6 g Kalknitrat,
 1,5 „ Kalinitrat,
 1,5 „ Neutrales Kaliphosphat,
 1,2 „ Kalisulfat.

Phosphorsäurefreie Lösung:
 1000 ccm destill. Wasser,
 0,5 g Kalinitrat,
 1 „ Kalknitrat,
 0,5 „ Magnesianitrat,
 0,5 „ Neutrales Kalisulfat.

Dass Pflanzen, z. B. Mais und Bohnen, mit denen wir auch unter Benutzung der vorstehenden Lösungen experimentiren können, in phosphorsäurefreier Lösung alsbald zu Grunde gehen, ist schon deshalb natürlich, weil der Phosphor als ein wesentlicher Bestandtheil des Nucleins betrachtet werden muss, und dieses letztere wieder für die Erzeugung von Kernen unentbehrlich erscheint.

Werden Pflanzen in kalkfreien Nährstofflösungen cultivirt, so wachsen sie zunächst normal. Dann aber zeigen sie Krankheitserscheinungen, indem namentlich die jüngsten, später auch die älteren Blätter braunfleckig werden. Die bei Benutzung kalkfreier Lösung erwachsenen Blätter haben etwa die nämliche Grösse und auch den gleichen Chlorophyllgehalt wie unter normalen Verhältnissen entstandene. Sie können auch assimiliren, wie diese letzteren, aber sterben schliesslich doch ab. Den normalen Blättern gegenüber zeichnen sich die bei Kalkausschluss zur Ausbildung gelangten durch grossen Stärkereichthum aus. Die braunen Flecken, welche nach gewisser Zeit an ihnen auftreten, sind, wie die Untersuchungen SCHIMPER's und LOEW's wohl sicher ergeben haben, die Folge der Einwirkung schädlicher organischer Säuren, zumal Oxalsäure, auf die Gewebe. Organische Säuren werden ja reichlich im pflanzlichen Stoffwechsel gebildet. Sie müssen neutralisirt werden, und die Function des Kalkes besteht in erster Linie darin, dies zu bewerkstelligen. Wenn die Bindung der Säuren nicht eintritt, so können manche Vorgänge in den Zellen, z. B. auch die normale Ableitung der Assimilate, nicht erfolgen, und schliesslich sterben die Zellen völlig ab. Der Kalk hat auch insofern Bedeutung

für die Ernährung der Gewächse, als anorganische Säuren (Salpeter- und Schwefelsäure) zumal in Verbindung mit Kalk in die Pflanze eingeführt werden.

Das Kali scheint bei den Vorgängen der Anlage und Entwicklung der Pflanzenorgane eine wichtige Rolle zu spielen. Wenn man Pflanzen in kalifreien Lösungen cultivirt, so zeigen sie in der That auch ein wesentlich anderes Verhalten als bei Kalkabwesenheit. Zunächst reicht noch die aus den älteren Theilen der Versuchsobjecte auswandernde Kalimenge hin, um die neu entstehenden Organe bis zu einem gewissen Grade mit Kali zu versorgen. Man wird aber beobachten, dass diese Organe, z. B. die Blätter, immer kleiner und kleiner werden, bis schliesslich der Tod der Pflanze eintritt. In den kalifrei gezogenen Gewächsen hört allmählich auch die assimilatorische Thätigkeit auf (NOBBE, SCHIMPER), indessen doch erst dann, wenn anderweitige Merkmale des krankhaften Zustandes des Organismus, namentlich das beschränkte Wachsthum der neu entstehenden Organe, bereits vorher hervorgetreten sind.

32. Das Mineralstoffbedürfniss der Pilze.

Die Entwicklung der Pilze ist ebenso wie diejenige der höheren Pflanzen an die Gegenwart aufnehmbarer Mineralstoffe gebunden, und um diesen Satz zu beweisen, stellen wir geeignete Culturversuche mit dem Hefepilz, *Saccharomyces cerevisiae*, an. Wir bereiten uns eine grössere Menge einer Flüssigkeit, die in 100 Thl. 84 Thl. Wasser, 15 Thl. reinsten Candiszucker und 1 Thl. weinsaures Ammoniak enthält. Je 100 cem dieser Flüssigkeit gelangen in Kochflaschen. *a* erhält keinen Mineralstoffzusatz. *b* erhält einen Zusatz von 0,2 Thl. KH_2Po_4 , 0,02 Thl. $\text{Ca}_3 2\text{Po}_4$ und 0,02 Thl. Mg So_4 . *c* erhält einen Zusatz von 0,02 Thl. $\text{Ca}_3 2\text{Po}_4$ und 0,02 Thl. Mg So_4 . *d* erhält endlich einen Zusatz von 0,2 Thl. $\text{Na}_2\text{H Po}_4$, 0,02 Thl. $\text{Ca}_3 2\text{Po}_4$ und 0,02 Thl. Mg So_4 . Ueber den Zusatz eines Eisensalzes vergl. S. 49. Die Oeffnungen der Kochflaschen verstopft man nun mit Watte, erhitzt die Flüssigkeiten zum Sieden und lässt sie wieder abkühlen. Man setzt jeder der 4 Nährstofflösungen, indem man die Wattepfropfen, mit denen die Kochflaschen verschlossen sind, für einen Moment lüftet, 1 cem schwach milchigen Hefewassers zu. (Vergl. „Bezugsquellen“.) Am besten ist es, die vier Fläschchen nunmehr bei einer Temperatur von 25 bis 30° C. im Thermostaten, unter häufigem Umschütteln, sich selbst zu überlassen.

Lebhafte Gährung und Hefevermehrung, die man quantitativ durch Sammeln der erzeugten Hefe auf einem getrockneten und gewogenen Filter bestimmen kann, tritt nur in der Flüssigkeit *b* ein. Wenn in den Flüssigkeiten *a*, *c* und *d* eine schwache Trübung (bedingt durch geringe Hefe- oder Bakterienentwicklung) zu Stande kommen sollte, so ist das ein Zeichen für die Gegenwart kleiner Mineralstoff- resp. Kalimengen, die vielleicht im Zucker oder in dem zugesetzten Hefewasser vorhanden waren. Auf jeden Fall kann die Hefe sich nur normal entwickeln, wenn Mineralstoffe nicht in der Nährlösung fehlen. Aber unsere Experimente lehren ferner, dass auch schon dann keine üppige Hefevegetation und keine Gährung eintritt, wenn nur das Kalium, das durch Natrium nicht vertreten werden kann, nicht zu-

gegen ist ¹⁾). Bei den Versuchen ist sorgfältigst auf Reinheit des Wassers, der Reagentien und des Hefematerials zu achten! Je günstiger die Verhältnisse nach dieser Richtung hin liegen, um so schlagender der Erfolg der Experimente.

33. Die Formen, in denen einige Mineralstoffe in den Pflanzen vorkommen.

Die Mineralstoffe kommen bei weitem nicht immer nur in anorganischen Verbindungen in den Pflanzen, sondern sehr häufig auch in organischen Verbindungen vor, z. B. Schwefel in Eiweissstoffen, Phosphor im Nuclein etc. Diese Thatsache verdient hohe Beachtung, zumal wenn man die weitere Thatsache in Betracht zieht, dass ein bestimmter Stoff im Laufe der Entwicklung einer Pflanze aus organischer Verbindung in anorganische übergehen kann und umgekehrt. Das Studium dieser Verhältnisse, welches für die Beurtheilung der Function der Mineralstoffe und in anderer Hinsicht wichtig erscheint, wurde neuerdings zumal von SCHIMPER²⁾ belebt, und wir wollen zunächst die Untersuchungsmethode kennen lernen, wobei wir uns auf den Nachweis der Phosphorsäure, des Kalis und des Kalkes beschränken. Weiteres ist bei SCHIMPER und ZIMMERMANN³⁾ nachzusehen.

Zum Nachweis der Mineralstoffe auf mikrochemischem Wege werden die nicht gar zu dünnen Schnitte zunächst direct mit Reagentien behandelt, und ferner verascht man weitere Schnitte durch Glühen auf dem Deckglas, um die erhaltene Asche ebenfalls mit Reagentien zu prüfen. Die organischen Mineralstoffverbindungen lassen sich in den unveränderten Schnitten vielfältig nicht auffinden; erst in der Asche ist dann meist die Gegenwart dieser oder jener Basen oder Säuren leicht zu constatiren. Die zu verwendenden Reagentien sind mit besonderer Sorgfalt auf ihre Reinheit zu prüfen.

Um Calcium in den Aschen der Schnitte nachzuweisen, löst man dieselben auf dem Objectträger in 2-proc. Schwefelsäure auf und lässt langsam eintrocknen. Es entstehen dann namentlich am Tropfenrande, charakteristische Gypskrystalle. Vergl. Abbildungen bei HAUSHOFER, Mikroskopische Reactionen, Braunschweig 1885, und ZIMMERMANN's citirte Schrift, S. 64.

Der Nachweis des Kaliums gelingt mit Platinchlorid. Das Reagens ist besonders auf seine Reinheit zu prüfen. Die Krystalle des entstehenden Kaliumplatinchlorids stellen reguläre Octaëder oder Würfel dar. Die Schnitte werden mit einem Tropfen des Reagens versetzt, und man lässt eintrocknen. Die Asche löst man in etwas säurehaltigem Wasser auf, erwärmt den Objectträger über einer Spiritusflamme bis zum Eintrocknen der Lösung und fügt das Reagens hinzu. Die Krystalle entstehen stets zunächst am Tropfenrande, später auch in der Mitte des Tropfens.

Die Phosphorsäure fällt man bei mikrochemischem Nachweis als phosphorsaure Ammonmagnesia aus. Die Schnitte oder die Asche derselben (letztere nach dem Auflösen in säurehaltigem Wasser und

1) Weiteres über den Mineralstoffbedarf des Hefepilzes vgl. bei A. MAYER, Lehrbuch d. Gährungschemie, 1874, S. 121.

2) Vgl. SCHIMPER, Flora, 1890, Heft 3.

3) Vgl. ZIMMERMANN, Botan. Mikrotechnik, 1892, S. 46.

Eindunsten der Lösung auf dem Objectträger) werden mit einer kleinen Menge der Mischung von 25 Vol. einer concentrirten wässrigen Magnesiumsulfatlösung, 2 Vol. concentrirter wässriger Chlorammoniumlösung und 15 Vol. Wasser versetzt. Die entstehenden Krystalle von phosphorsaurer Ammonmagnesia (bei Untersuchung der Schnitte entstehen sie in den Zellen) haben sehr charakteristische Formen.

Es bedarf noch sehr eingehender Studien, um die Vertheilung der organischen und anorganischen Mineralstoffverbindungen in den Pflanzen genauer zu erforschen. Einige Resultate haben die Untersuchungen aber doch bereits ergeben.

In den ruhenden Samen (man untersuche Schnitte aus angequollenen Samen von *Phaseolus* und *Ricinus*) sind Phosphorsäure, Kalk und Kali in organischen Verbindungen vorhanden, daher nicht direct in den Schnitten, sondern erst in der Asche derselben nachzuweisen. Bei der Keimung werden diese organischen Mineralstoffverbindungen gespalten. Phosphorsäure, Kalk und Kali wandern als anorganische Salze im Parenchym der Rinde und des Markes sowohl des Stengels als auch der Wurzel und ebenso im Blattnervenparenchym. In allen diesen Geweben sind die genannten Stoffe daher direct (nicht nur nach dem Einäschern derselben) aufzufinden. Reich an Kali und Phosphorsäure ist z. B. das Parenchym der Maiskeimlinge.

In den Vegetationspunkten und im Mesophyll der Keimpflanzen kommen reichliche Mengen organischer Phosphorverbindungen vor, während anorganische Phosphorverbindungen völlig fehlen. Die Phosphorsäure ist also nur bei der Untersuchung der Asche nachzuweisen. Die Vegetationspunkte und das Mesophyll stellen demnach Endziele der Wanderung dar, Bildungsstätten phosphorhaltiger organischer Körper. Das Parenchym der Rinde, des Markes und der Nerven repräsentiren dagegen die Bahnen, in denen die Mineralstoffe bei der Keimung wandern.

Bemerkt sei noch, dass die Vegetationspunkte, das Cambium sowie die Siebröhren (man kann z. B. den Saft der Siebröhren von *Cucurbita* und die Asche desselben prüfen) der Keimpflanzen und entwickelten Pflanzen fast oder völlig kalkfrei sind, während sie mehr oder minder reichliche Mengen von Kali und Phosphorsäure zumal in organischen Verbindungen führen.

Um die Methode des mikrochemischen Eisennachweises kennen zu lernen, quellen wir Samen von *Sinapis alba* in Wasser ein, entfernen nach erfolgter Quellung die Samenschale und legen den Embryo, der bekanntlich in einander gefaltete Cotyledonen trägt, in 2-procentige Lösung des gelben Blutlaugensalzes, die sich in einem Gläschen befindet. Nach $\frac{1}{2}$ Stunde übertragen wir den Schnitt in 20-procentige Salzsäure, waschen nach einiger Zeit mit destillirtem Wasser aus und breiten die Cotyledonen auf dem Objectträger aus ¹⁾. Nur die Anlagen der Gefässbündel der Cotyledonen (ebenso bei Untersuchung der Wurzel der Centralstrang derselben) haben sich blau gefärbt und treten als blaues Netz hervor.

Bei der Keimung der Senfsamen, mag dieselbe im Dunkeln oder bei Lichtzutritt erfolgen, verschwindet das Eisen in der Form, wie es im ruhenden Samen vorhanden war, nach längerer Zeit völlig aus den Untersuchungsobjecten. Es geht wohl in organische Verbindungen

1) Benutzung von Stahlnadeln ist natürlich zu vermeiden.

über, in denen es mittelst der erwähnten Reactionsmethode nicht mehr nachgewiesen werden kann ¹⁾).

IV. Die organischen Verbindungen als Pflanzennahrungsmittel.

34. Die Humuskörper des Bodens und die Mycorrhiza.

Im Boden kommen eine ganze Reihe verschiedener, durch Verwesungs-, Vermoderungs- und Fäulnisprocesse aus Pflanzen- oder Thierresten entstandener organischer Verbindungen vor, die man als Humuskörper bezeichnet. Es ist nicht unmöglich, dass manche grüne Pflanzen (z. B. specifische Moorbewohner) ihr Bedürfniss an organischen Substanzen wenigstens zum Theil auf Kosten humoser Stoffe bestreiten können, und sicher spielen die Humuskörper im Ernährungsprocess vieler Pilze (*Agaricus*-, *Boletus*arten etc.) eine wichtige Rolle. Wir müssen uns daher mit den humosen Substanzen des Bodens bekannt machen. Fast in jedem Boden sind Humuskörper vorhanden; freilich in sehr verschiedener Menge. Uebersaus reich an Humus ist der Torfboden, den wir daher auch als Untersuchungsmaterial wählen.

Wir zerreiben Torf unter Zusatz von Wasser in einer Porzellanschale und fügen der Mischung Kalilauge zu. Die Flüssigkeit nimmt eine braune bis schwarze Färbung an. Sie enthält huminsaures Kali in Lösung und kann vom unlöslichen Rückstande des Torfes abfiltrirt werden. Diesen Rückstand berücksichtigen wir nicht weiter; er stellt ein Gemenge von noch nicht völlig humificirten Pflanzenresten, noch nicht durch das Kali extrahirter Huminsäure und einem in Kali unlöslichen Humusstoff (dem Humin) dar. Wir versetzen die Lösung des huminsauren Kalis mit Salzsäure, bis eine deutlich saure Reaction der Flüssigkeit eingetreten ist. Die Huminsäure wird dadurch ausgefällt, während die saure Flüssigkeit noch kleine Mengen gewisser Humusstoffe (Quell- sowie Quellsalzsäure) in Lösung enthält. Wenn man die Huminsäure auf einem Filter sammelt, gut mit Wasser auswäscht und trocknet, so erhält man eine spröde, brüchige, schwarze Masse, die fast unlöslich in Wasser ist. Wird dagegen noch feuchte Huminsäure mit Wasser behandelt, so gehen etwas grössere Mengen der Substanz in das Lösungsmittel über. Diese Huminsäurelösung besitzt eine gelblich-braune Farbe. Trägt man Huminsäure in Ammoniakflüssigkeit ein, so löst sich dieselbe leicht unter Bildung von huminsaurem Ammoniak auf. Diese Lösung vermischen wir mit einer Auflösung von Chlorcalcium. Es entsteht ein Niederschlag, der ein Doppelsalz von huminsaurem Kalk und huminsaurem Ammoniak repräsentirt, eine Verbindung, die sich ohne Zweifel auch unter Umständen in der Natur bilden kann. Der Boden enthält sicher noch

¹⁾ Vgl. MOLISCH, Die Pflanze und ihre Beziehungen zum Eisen, Jena 1892. Die von MOLISCH in dieser Schrift empfohlene Methode zum Nachweis des in organischen Verbindungen vorhandenen oder maskirten Eisens ist mit Mängeln behaftet, wie MOLISCH selbst und C. MÜLLER (beide in Berichten d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 11) nachgewiesen haben.

eine ganze Reihe anderweitiger Humuskörper, über dieselben ist indessen nichts Genaueres bekannt.

Wir heben eine junge Buchenpflanze (*Fagus silvatica*) vorsichtig aus dem humusreichen Waldboden aus, welcher ihr zum Standort diente, und bringen sie, in feuchtem Moos verpackt, ins Laboratorium. Nach dem Abspülen der Wurzel mit Wasser gewahren wir noch immer feine Wurzelfasern, an denen kleine Humusstückchen haften. Diese Fasern schneiden wir ab, lassen sie, um den Humus aufzuweichen, einige Zeit im Wasser liegen und untersuchen die Fasern dann bei schwacher Vergrößerung. Wurzelhaare fehlen. Dafür ist die ganze Wurzeloberfläche von Pilzfäden umspinnen. Von den Wurzelfasern strahlen auch nach allen Richtungen hin feine Pilzfäden und recht dicke Pilzfädenstränge aus, an denen oft noch Humustheilchen haften (vgl. Fig. 25). Wir haben es hier mit der Mycorrhiza¹⁾ zu thun, speciell mit der ectotropischen Form derselben, weil die Pilzfäden

Fig. 25.

Fig. 25. Buchenwurzel, in nicht sterilisirtem Waldhumus gewachsen. *p* Pilzfädenstränge, bei *a* mit dem Humus verwachsen. Mehrmals vergrößert. (Nach FRANK.)

Fig. 26.

Fig. 26. Buchenwurzel, in einem durch Sterilisirung pilzfrei gemachten Waldhumus gewachsen, unverpilzt, mit Wurzelhaaren *h*. Bei *c* die Wurzelspitze mit der Wurzelhaube. Mehrmals vergrößert. (Nach FRANK.)

nicht in die Wurzelzellen eindringen, sondern höchstens zwischen die Epidermiszellen der Wurzel. Die Mycorrhiza besteht aus den Wurzelfasern und den mit der Wurzel in Symbiose lebenden Pilzfäden. Diese letzteren saugen (die Wurzelhaare fehlen ja) Wasser und Mineralstoffe auf, deren die Buche (oder andere Gewächse, welche mit Mycorrhiza versehen sind) bedarf. Wahrscheinlich werden auch stickstoffhaltige organische Stoffe von der Mycorrhiza dem Boden entzogen.

Wir sammeln Humusboden in einem Buchenwalde. Das Material wird gut zerkleinert, gemischt und abgesiebt. Wir füllen einige Blumentöpfe von etwa 20 cm Höhe und Durchmesser mit diesem Boden und durchfeuchten denselben mässig. Einige Töpfe werden unmittelbar zu den folgenden Experimenten (nach FRANK) verwandt, andere erst, nachdem sie sammt Inhalt zur Sterilisirung einige Stunden lang in einem Trockenschrank bei 100° C. verweilt haben. Die Töpfe sind dabei mit Glasplatten

1) Vgl. FRANK, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 3 u. 6.

zu bedecken. Nun setzt man in den Boden jedes Topfes einige Buchenkeimlinge ein. Dieselben gewinnt man, indem man Buchelkerne am besten gleich nach der Ernte im Herbst zwischen feuchtem Fliesspapier ankeimt. Nach 12—18 Tagen erfolgt die Uebertragung der jungen Pflänzchen in den Boden der Töpfe, und nun stellt man diese ins Kalthaus. Zum Begiessen des Bodens verwendet man nur destillirtes Wasser.

Die sich in sterilisirtem Boden entwickelnden Pflanzen gedeihen auch im künftigen Sommer schlecht, bilden nur Wurzelhaare (vgl. Fig. 26) und gehen theilweise bald zu Grunde. Die übrigen Buchenpflanzen wachsen kräftig weiter; im Sommer sind ihre Wurzeln bereits sämtlich verpilzt. Die Ausbildung der Mycorrhiza ist also für die normale Entwicklung der Buche (und auch anderer Pflanzen) erforderlich.

Der ungünstige Erfolg unserer Culturen in sterilisirtem Boden ist nicht Folge des Sterilisirens selbst, denn solche Gewächse (z. B. Hafer), die nicht auf das Zusammenleben mit Pilzen angewiesen sind, sind leicht im sterilisirten Boden zu kräftigem Gedeihen zu bringen.

35. Experimente mit *Penicillium crustaceum*.

Wenn man eine Scheibe Brot mit Wasser durchtränkt, in eine Glasschale legt und nach Bedeckung mit einer Glasglocke sich selbst bei gewöhnlicher Zimmertemperatur überlässt, so entwickeln sich gewöhnlich zunächst kleinere Mucorarten auf dem Substrat. Bald nimmt die Oberfläche des Brotes aber eine grünliche Färbung an, in Folge des massenhaften Erscheinens von *Penicillium crustaceum*. Unter dem Mikroskop kann man das Mycel sowie die an ihrem Ende pinselförmig verzweigten, Sporenreihen tragenden Fruchthyphen dieses Pilzes leicht erkennen (vgl. Fig. 27).

Will man Culturversuche mit dem *Penicillium* anstellen, so bereitet man sich zunächst eine Mineralstofflösung, die in 100 ccm Wasser 0,05 g phosphorsaures Ammoniak (dargestellt durch Sättigung von Phosphorsäure mit Ammoniak und Eindampfen der Lösung), 0,05 g saures-phosphorsaures Kali (KH_2PO_4), 0,03 g schwefelsaure Magnesia und 0,01 g Chlorcalcium enthält. Ueber den Zusatz eines Eisensalzes vgl. S. 49. In diese Lösung bringt man die organischen Stoffe, deren Bedeutung als Nahrungsmittel des *Penicilliums* geprüft werden soll, sowie die Pilzsporen. Ich füllte z. B. 4 kleine Gläser mit je 20 ccm der Mineralstofflösung an. 1 erhielt keinen Zusatz; 2 einen Zusatz von 0,2 g Traubenzucker; 3 einen Zusatz von 0,2 g Oxalsäure; 4 einen Zusatz von 0,2 g Citronensäure. 1 und 2 wurden noch durch Zusatz einiger Tropfen sehr verdünnter Schwefelsäure angesäuert. Die Aussaat minimaler Sporenmengen geschieht am besten derartig, dass man etwas *Penicillium*material, welches sich z. B. auf Brot entwickelt hat, in viel Wasser vertheilt und den Nährstofflösungen nun einige ccm dieses Wassers hinzufügt. Die Culturegefässe werden mit Fliesspapier bedeckt und sich bei gewöhnlicher Zimmertemperatur im Dunkeln selbst überlassen. Nach mehr als 8 Tagen war bei meinen Experimenten in 1 und 3 keine *Penicillium*entwicklung wahrzunehmen, während sich die Flüssigkeiten in 2 und 4 alsbald mit einer dicken Schimmeldecke bedeckten. Traubenzucker und Citronensäure sind demnach gute Nahrungsmittel des Pilzes; Oxalsäure vermag derselbe nicht zu verwerthen. Bei Abwesenheit organischer Körper findet keine

Pilzentwicklung statt. Man kann die verschiedensten organischen Stoffe in der angedeuteten Weise auf ihre Bedeutung für die Ernährung des *Penicillium*s prüfen und, wenn es erforderlich scheint, die Menge der producirten Pilzmasse quantitativ bestimmen, indem man sie abfiltrirt, bei 100° C. trocknet und wiegt¹⁾).

Um Reinculturen von Pilzen, z. B. von *Mucor*, *Penicillium* etc., zu gewinnen, kann man oft in folgender Weise verfahren²⁾. Ungesäuertes Brod, von der Kruste befreit, wird 1—2 Tage lang im Trockenschrank zur Sterilisirung auf 120° C. erhitzt. Man legt das Brod in eine durch Erhitzen sterilisirte Krystallisirschale und bedeckt diese mit einer sterilisirten Glasplatte mit übergreifendem Rand. Am besten ist es, das Brod mit einer Nährlösung zu durchtränken. Man zieht getrocknete Früchte (Rosinen, Pflaumen) mit kaltem Wasser aus, filtrirt die Lösung und dampft sie zur Syrupdicke ein. Von dieser sehr haltbaren Masse wird eine kleine Menge in Wasser aufgelöst, in einer Spritzflasche zum Sieden erhitzt, um schliesslich mit der kochendheissen Flüssigkeit das Brod in der Krystallisirschale zu durchtränken³⁾. Das Sporenmaterial gewinnt man, indem man z. B. einige Sporangien von *Mucor*, der sich auf Brod oder Mist entwickelt hat, mit Hülfe der Pincette in ausgekochtes Wasser überträgt. Nach kurzer Zeit vertheilt man einige Tropfen dieser Flüssigkeit, z. B. unter Benutzung einer sterilisirten flachen Nadel, auf dem Brod. Sollte die Cultur noch nicht völlig rein sein, so muss man ihr eine zweite folgen lassen, indem man das zu dieser erforderliche Sporenmaterial der ersten entnimmt. Bei der Ausführung von Reinculturen von Pilzen in Nährstofflösungen müssen diese natürlich auch sterilisirt werden. Die in mit Watteverschluss versehenen Glaskölbchen befindlichen Lösungen werden eventuell durch einfaches Erhitzen oder durch Einstellen der Kölbchen in den Dampfapparat sterilisirt.

Fig. 27. *Penicillium crustaceum*. Gonidienträger mit Zweigquirnen (*s'* und *s''*), Basidien (*b*), Sterigma (*st*) und Gonidien. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

1) Vgl. NÄGELI, Sitzungsberichte d. k. bayr. Akadem. d. Wiss., 1879, mathematisch-physikalische Klasse, und REINKE, Untersuchungen aus dem botanischen Institut der Universität Göttingen, 1883, Heft 3.

2) Vgl. besonders BREFELD, Botan. Untersuchungen über Schimmelpilze, Heft 4.

3) In manchen Fällen ist es erforderlich, die Säure im Fruchtauszug, da sie von verschiedenen Pilzen nicht ertragen wird, durch Ammoniakzusatz abzustumpfen.

36. Einige weitere Saprophyten.

Werden Stengel von *Vicia Faba*, die im Herbst längere Zeit auf dem Felde verweilt haben, mehrere Stunden lang in Brunnenwasser eingeweicht, in eine Schale auf feuchtes Filtrirpapier gelegt, und das Gefäss mit einer Glasplatte bedeckt, so entwickelt sich eine üppige Pilzvegetation auf den Bohnenstengeln. Besonders interessant ist das Auftreten der weisslichen, etwa 1 mm im Durchmesser besitzenden Fruchtkörper von *Chondrioderma difforme*, eines Myxomyceten, über dessen Cultur STRASBURGER ¹⁾ genauere Angaben macht. Bei Versuchen, die ich anstellte, traten nach längerer Zeit auf den Bohnenstengeln unter anderem auch die roth gefärbten Fruchtkörper einer *Peziza* auf.

Wird frischer Kuhmist in eine Glasschale gebracht und mit einer Glasglocke bedeckt, so überzieht sich das Substrat in wenigen Tagen mit einer üppigen Pilzvegetation. Es tritt dies ein, wenn der Mist dem Einfluss des Lichtes ausgesetzt wird und ebenso bei völligem Abschluss des Lichtes. Zunächst wachsen die bis zu einigen Centimetern langen Fruchttträger von *Mucor Mucedo* aus dem Substrat hervor. Jeder Fruchttträger trägt an seiner Spitze ein rundliches Sporangium, und es ist lehrreich, diesen bekannten Pilz einer mikroskopischen Untersuchung zu unterziehen. Später kommt eine weitere Mucorinee zum Vorschein, die kurze Fruchttträger und relativ grosse, halbkugelige, schwarze Sporangien besitzt, nämlich *Pilobolus cristalinus*. Nach einigen Wochen stellt sich ein Hutpilz mit langem Stiel und kleinem Hut, der *Coprinus*, ein, und endlich erscheinen oft die gelblichen oder bräunlichen, becherförmigen Fruchtkörper von *Ascobolus*. Alle diese Pilze entwickeln ihr Mycelium in dem Mist, während ihre sporenerzeugenden Theile aus dem Substrat hervorragen. Da die erwähnten Organismen, wie sämtliche Pilze, chlorophyllfrei sind, so gedeihen sie auf Kosten des organischen Materials des Mistes.

Wenn man eine Fliege in Wasser wirft, das aus einem Tümpel geschöpft wurde, so entwickeln sich auf dem alsbald faulenden Thierkörper gewöhnlich Repräsentanten aus der Gattung *Saprolegnia* oder *Achlya*. Bei mikroskopischer Untersuchung der weissen, den Fliegenkörper umgebenden Fäden zeigt sich, dass dieselben zunächst einzellig sind. Später gliedert sich am Ende eines jeden Fadens ein keulenförmiges Sporangium ab.

37. Experimente mit *Saccharomyces cerevisiae*.

Wenn man etwas Presshefe in einem Wassertropfen auf dem Objectträger vertheilt und das Deckglas auflegt, so zeigt sich bei mikroskopischer Untersuchung, dass neben den kleinen, fast kugeligen Hefezellen reichliche Stärkemengen, durch welche die Presshefe verunreinigt ist, vorhanden sind. Auf Jodzusatz färbt sich das Protoplasma der Hefezellen bräunlich. Verdünnte Kalilauge löst den Inhalt der Hefezellen auf; die Zellhaut derselben bleibt zurück. Wenn man sehr energisch gährenden Flüssigkeiten etwas Hefe entnimmt, so ergibt

1) Vgl. STRASBURGER, Das botanische Praktikum, 1884, S. 403.

sich bei mikroskopischer Untersuchung, dass die durch Sprossung entstehenden und sich später von ihren Mutterzellen loslösenden Tochterzellen zunächst noch mit diesen zusammenhängen.

Es werden zwei Glasgefäße, die etwa 150 ccm Flüssigkeit fassen können, aufgestellt. In *a* bringen wir 100 ccm einer Flüssigkeit, die aus 85 Thl. Wasser, 15 Thl. Traubenzucker, 0,2 Thl. KH_2PO_4 , 0,02 Thl. $\text{Ca}_3\text{P}_2\text{O}_8$, 0,02 Thl. MgSO_4 und 1 Thl. salpetersaurem Ammoniak besteht. In *b* bringen wir 100 ccm einer Flüssigkeit, die ähnlich wie die erwähnte Flüssigkeit beschaffen ist, der aber der Zucker völlig fehlt. Man versetzt *a* und *b* nun mit 2 ccm Hefewasser (vgl. „Bezugsquellen“). Dieselben werden alsdann in einem Thermostaten bei 25–30° C. unter häufigem Umschütteln sich selbst überlassen. In *a* tritt bald ziemlich erhebliche Gärung ein, und die Flüssigkeit trübt sich in Folge von Hefeentwicklung. Die Lösung *b* bleibt klar, weil ihr der Zucker, also die Kohlenstoffquelle für den Hefepilz, fehlt, und dieser sich nicht zu entwickeln vermag¹⁾. Wenn man die Flüssigkeit *a* nach Verlauf längerer Zeit filtrirt und die Hefe auf einem vorher getrockneten und gewogenen Filter sammelt, so kann man auch die Menge der gebildeten Hefe genauer feststellen. Bestimmt man den Zuckergehalt in der Flüssigkeit *a* vor dem Hefezusatz und nachdem die Gärung längere Zeit angedauert hat (vgl. die Methode im dritten Abschnitt), so zeigt sich, dass in Folge der Gärung, und zwar durch die Lebensthätigkeit des Hefepilzes, viel Zucker verschwunden ist. Der Zucker wird zumal zur Erzeugung von Kohlensäure und Alkohol und ferner für die Zwecke des Wachstums des Hefepilzes verbraucht.

Es wird eine Lösung hergestellt, die aus 85 Thl. Wasser, 15 Thl. Traubenzucker, 0,2 Thl. KH_2PO_4 , 0,02 Thl. $\text{Ca}_3\text{P}_2\text{O}_8$, 0,02 Thl. MgSO_4 und 1 Thl. Pepsin besteht (*a*). Die Lösung *b* ist ähnlich wie *a* zusammengesetzt. Der Traubenzucker wird in ihr aber durch Rohrzucker (Candiszucker) vertreten. Beide Flüssigkeiten gerathen auf Zusatz reichlicher Hefemengen alsbald in lebhafte Gärung, zumal wenn man sie warm (25–30° C.) stellt. Die Hefe invertirt den Rohrzucker, und das entstehende vergärbare Material erfährt schnell eine Zersetzung in Alkohol, Kohlensäure etc.

Wenn man Flüssigkeiten, die derartig, wie es soeben angegeben worden ist, mit wenig Hefe versetzt und die eine Lösung kühl (bei 10 oder 15° C.), die andere warm (bei 25–30° C.) hält, so ergibt sich, dass in der ersteren schwaches Hefewachsthum und schwache Hefevermehrung erfolgt, während die zweite alsbald lebhaft gährt und zugleich in ihr eine schnelle Hefevermehrung eintritt. Ebenso kann man sich durch entsprechend angeordnete Experimente leicht davon überzeugen, dass Gärung sowie Hefevermehrung in zuckerhaltigen Lösungen sowohl im Dunkeln als auch bei Lichtzutritt stattfinden. Vgl. weiteres im dritten Abschnitt.

38. Die Bacterien.

Die Bacterien besitzen eine überaus weite Verbreitung in der Natur. Mit dem durch Luftströmungen fortgetragenen Staube gelangen

1) Vgl. A. MAYER, Lehrbuch d. Gährungschemie, 1874, S. 107, und Untersuchungen über die alkoholische Gärung, 1869.

sie überall hin und entfalten unter günstigen Umständen ihre Lebensthätigkeit. Wir füllen einige ERLÉNMEYER'sche Kolben mit einer filtrirten Flüssigkeit, die in 100 Thl. Wasser 1 Thl. Traubenzucker und 0,5 Thl. Fleischextract gelöst enthält. An den Kolbenwänden und zumal im Fleischextract haften zahllose Bakterienkeime, weshalb sich die Lösungen, wenn wir sie einige Tage stehen lassen, in Folge massenhafter Bakterienentwicklung bedeutend trüben. Durch zunächst vorgenommene Sterilisirung und dadurch, dass wir die Flüssigkeiten auch nachträglich sterilisirt erhalten, können wir aber diese Bakterienentwicklung ausschliessen.

Die ERLÉNMEYER'schen Kolben werden zunächst mit concentrirter Schwefelsäure, dann mit gekochtem destillirten Wasser ausgespült. Wir versehen die Mündung mit dichtem Watteverschluss, nachdem 100—200 ccm der erwähnten Nährlösung eingefüllt worden sind. Besser ist es unter Umständen noch, die Kolben vor dem Einfüllen der Lösung 2 Stunden lang im Trockenschrank bei 150° C. stehen zu lassen. Die Sterilisirung der Flüssigkeit wird dadurch herbeigeführt, dass man die mit derselben beschickten Gefässe mindestens 2 Stunden lang im Dampfsterilisirungscylinder nach KOCH (zu beziehen von H. ROHRBECK in Berlin) strömendem Wasserdampf aussetzt.¹⁾

Bei besonders sorgfältigem Sterilisiren verfährt man oft derartig, dass man das Sterilisiren im Dampfeylinder mehrere Tage hinter einander wiederholt. Sollten zunächst noch Sporen am Leben geblieben sein, so keimen sie in der Zeit bis zum erneuten Erhitzen, und dieses tödtet dann die ausgekeimten Bakterien.

Wenn wir unsere mit Watteverschluss versehenen und mit sterilisirter Nährlösung angefüllten Kolben ruhig stehen lassen, so bleibt die Flüssigkeit klar; selbst nach Monaten zeigt sie noch dies Aussehen, weil keine Bakterienentwicklung zur Geltung kommen kann.

Reinculturen von *Bacterium Termo*, einem Organismus, der sehr allgemein beim Zustandekommen der Fäulniss theilhaftig ist, kann man relativ leicht gewinnen. Wir bereiten uns COHN'sche Normallösung. Diese enthält auf 200 Thl. Wasser 1 g saures phosphorsaures Kali, 1 g schwefelsaure Magnesia, 2 g neutrales weinsaures Ammoniak und 0,1 g Chlorcalcium. Hier genügt zur Sterilisirung einfaches Kochen der Lösung in den mit Watteverschluss versehenen ERLÉNMEYER'schen Kolben. Wir lassen nun mit Wasser übergossene Erbsen faulen, bringen mit Hülfe eines Glasstabes einen Tropfen der bakterienreichen Flüssigkeit in die Nährlösung, und übertragen aus dieser, wenn *Bacterium Termo* sich entwickelt hat, wieder einen Tropfen in eine neue Nährlösung. Dies wiederholen wir mehrfach, bis endlich eine Reincultur erzielt ist. Bei der Uebertragung der Bakterien aus einer in die andere Nährstofflösung bedienen wir uns durch Erhitzen in einer Spiritusflamme sterilisirter Glasstäbe. Zum Abkühlen legt man dieselben unter eine Glasglocke auf eine sterilisirte Glasplatte. Charakteristisch für *Bacterium Termo* ist es, dass die Flüssigkeiten, in denen er sich entwickelt, in den ersten Tagen milchig trübe werden und später ein grünliches Oberflächenhäutchen erlangen. *Bacterium Termo* stellt Stäbchen dar, die meistens zu zweien an einander gereiht sind. Die Bewegung dieser Zellen ist eine ruckweise, hin und her

1) Oft genügt es schon, die Flüssigkeit im Kolben nach erfolgtem Watteverschluss desselben einfach einige Zeit zu kochen.

gerichtete. In der Zoogloea, welche in Form der erwähnten grünlichen Häute auftritt, sind unbewegliche Individuen vorhanden.

Wird etwas Malzextract (hergestellt durch Behandlung von Malzpulver mit Wasser und Abfiltriren der Lösung) sich selbst überlassen, so trübt sich die ursprünglich klare Lösung im Laufe einiger Tage. Durch mikroskopische Untersuchung lässt sich in der weiter unten anzugebenden Weise feststellen, dass zahllose Bacterien in der Flüssigkeit vorhanden sind. Bei niedriger Temperatur (etwa 15°C.) scheint sich zumal *Bacterium aceti*, bei höherer Temperatur (etwa 50°C.), der man die Flüssigkeit leicht im Thermostaten aussetzen kann, aber *Bacterium acidi lactici* im Malzextract einzustellen. Nach DELBRÜCK ¹⁾ gewinnt man den Milchsäurepilz sicher, wenn man 200 g Trockenmalz mit 1000 g Wasser übergiesst und das Gemisch, ohne dasselbe zu filtriren, einige Zeit im Thermostaten bei 50°C. stehen lässt.

Eine weite Verbreitung in der Natur besitzt der Heupilz, *Bacillus subtilis*, und um denselben sicher zu gewinnen, übergiesen wir Heu mit

Fig. 28. *Bacillus subtilis*. A Die Kahmhaut, B schwärmende Stäbchen, C die Sporenbildung. A 500, C 800, B 1000 Mal vergrößert. (Nach STRASBURGER.)

möglichst wenig Brunnenwasser, lassen 4 Stunden lang bei 36°C. stehen, giessen die Flüssigkeit, ohne zu filtriren, ab und verdünnen sie, bis sie ein specifisches Gewicht von 1,004 zeigt. Ist der Aufguss zu sauer, so neutralisirt man ihn jetzt mit kohlensaurem Natron, bringt ihn in einen Kolben von 800 ccm Capacität, verschliesst dessen Mündung mit Watte und erhitzt die Flüssigkeit zum Sieden. Sie wird eine Stunde lang bei schwacher Dampfentwicklung gekocht und sich dann bei 36°C. im Thermostaten selbst überlassen. Im Verlauf von 1—2 Tagen bildet sich eine graue Haut, eine Kahmhaut, auf dem Heuextract, die aus der Zoogloea des *Bacillus* besteht. Die Sporen dieses Organismus haben die Siedehitze ertragen, andere Bacterien, die im Aufguss vorhanden waren, sind durch dieselbe vernichtet worden, und wir gelangen auf diese Weise zu einer Reincultur des Heupilzes. Die Kahmhaut besteht aus einer Gallerte, in der zahlreiche, aus Stäbchen zusammengesetzte, parallel zu einander orientirte Fäden vorhanden sind. Um die Stäbchen, aus denen die Fäden sich zusammensetzen, recht deutlich hervortreten zu lassen, färben wir sie, ein Verfahren, das häufig bei Bacterienuntersuchungen in Anwendung

1) Vgl. ZOPF, in Schenk's Handbuch d. Botanik, Bd. 3, S. 65.

gebracht wird. Eine kleine Menge der bacterienhaltigen Flüssigkeit wird auf ein Deckglas gebracht, ausgebreitet und einige Zeit der Luft zum Eintrocknen ausgesetzt. Jetzt zieht man das Deckglas mehrere Male schnell durch eine Spiritusflamme, wobei die mit Bacterien bedeckte Fläche nach oben gekehrt sein muss, breitet einen Tropfen wässriger Methylviolett- oder Fuchsinlösung (am besten dadurch hergestellt, dass man eine kleine Menge vorrätig gehaltener alkoholischer Lösungen dieser Farbstoffe in destillirtes Wasser einträgt) auf dem Deckglas aus, lässt dasselbe mit nach unten gewandtem Präparat 20–30 Minuten lang auf destillirtem Wasser schwimmen, trocknet an der Luft, trägt einen Tropfen Terpentinöl auf und untersucht bei starker Vergrößerung ¹⁾).

39. Einige parasitisch lebende Pilze.

Es giebt zahlreiche Pilze, welche als Ursachen von Pflanzenkrankheiten bekannt sind. Sie ernähren sich auf Kosten der Substanz lebender Gewächse und gehören daher nicht zu den Saprophyten, sondern zu den Parasiten.

Im Mai und Juni gewahrt man häufig Blätter von *Berberis vulgaris*, die mit auf der Blattunterseite hervorgewölbten, polsterförmigen, orangefarbenen Anschwellungen besetzt sind. Die mikroskopische Untersuchung zarter Querschnitte durch ein *Berberis*-blatt lehrt uns, dass das Mesophyll desselben aus Palissaden- und Schwammparenchym zusammengesetzt ist, und diese Gewebe lassen sich, freilich in etwas veränderter Form, auch an denjenigen Stellen wahrnehmen, welche die Anschwellungen erfahren haben. Hier ist der Zellinhalt (Plasma sowie Chlorophyllkörner) desorganisirt, und in den Intercellularräumen sind zahlreiche Pilzhypen vorhanden. Diese gehören der *Aecidium*-generation von *Puccinia graminis* an, eben demjenigen Pilz, welcher uns an dieser Stelle interessirt. Bei Behandlung der Schnitte mit etwas Kalilauge treten die erwähnten Verhältnisse besonders deutlich hervor.

An der Unterseite der Polster gewahrt man eigenthümliche becherförmige Gebilde, welche bei ihrer Entwicklung das Gewebe des Polsters und schliesslich auch die Blattepidermis durchbrechen. Unter den Bechern sehen wir ein dichtes, aus Hyphen gebildetes Lager. Jeder Becher besteht seinerseits aus einer Hülle (*Peridie*) und den zahlreiche Sporen erzeugenden Basidien, die im unteren Bechertheile zum Hymenium vereinigt sind. An der Oberseite des Polsters des *Berberis*-blattes sind keine *Aecidien*-früchte vorhanden, wohl aber birnförmige Gebilde, die *Spermogonien*.

Die Sporen aus der *Aecidium*-frucht von *Puccinia* gelangen nun von Mitte Juni an auf verschiedenen Gräsern (Weizen, Gerste, Hafer etc.) zur Keimung. Sie befallen zumal die Halme und Blattscheiden und rufen die bekannte Rostkrankheit des Getreides hervor. Bei der Untersuchung zarter Querschnitte aus einem Haferhalm, der in Folge der Vegetation der Uredolager von *Puccinia* mit rostbraun gefärbten Streifen bedeckt ist, findet man, dass zahlreiche Pilzhypen das grüne Gewebe des Stengels durchziehen, den Inhalt der Zellen desselben desorgani-

¹⁾ Specielleres über Bacterienuntersuchung vergl. bei FLÜGGE, Die Mikroorganismen, Leipzig 1886, und HUEPPE, Methoden d. Bacterienforschung, 1886.

sirend. Das Mycelium erzeugt ferner an bestimmten Stellen zahlreiche, nach aussen gerichtete Zweige, welche die Epidermis des Halmes durchbrechen und an ihren Enden einzellige Sporen (Uredosporen) abschnüren. Die Uredosporen geben dann schliesslich zur Entstehung der Teleutosporenlager Veranlassung, auf welche wir hier nicht weiter eingehen.

Die gewöhnliche und in so hohem Grade epidemisch auftretende Kartoffelkrankheit wird durch einen Pilz hervorgerufen, der zu den Peronosporeen gehört. Es ist *Phytophthora infestans*, den man im Sommer auf dem Laube, aber auch im Winter an den Knollen von *Solanum tuberosum* beobachten kann. Werden kranke Kartoffelknollen, die man leicht an dem Vorhandensein bräunlicher, etwas eingesunkener Flecken an der Schale als solche erkennt, zerschnitten, und lässt man die Stücke etwa zwei Tage lang im dampfgesättigten Raum unter einer Glasglocke liegen, so bedecken sich die Schnittflächen mit einem zarten, weissen „Schimmel“. In der kranken Knolle ist das Mycel der *Phytophthora* von vornherein vorhanden; es findet sich hier in reichlicher Menge zwischen den Zellen und lebt auf Kosten der Bestandtheile dieser letzteren. Unter den bezeichneten Umständen treibt das Mycel aber Gonidienträger nach aussen hervor. Diese Gonidienträger sind, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, in ihrem oberen Theile verzweigt und bilden die Sporangien, welche aber in Berührung mit Wasser leicht abfallen. Lässt man Stücke kranker Kartoffeln längere Zeit unter einer Glasglocke liegen, so entwickelt sich eine reiche Pilzvegetation auf dem Substrat, die aber mit der *Phytophthora* direct nichts zu thun hat.

Sehr lehrreich ist es auch, den Entwicklungsgang einer *Peziza*-species, nämlich *P. sclerotiorum*, näher zu verfolgen. Es ist das ein Pilz, der zu den Discomyceten gehört und z. B. die Sclerotienkrankheit des Rapses bedingt. Ich will beschreiben, in welcher Weise ich den Pilz cultivirte. Einige Sclerotien werden auf die Oberfläche feuchter Gartenerde gelegt, die sich in einem Blumentopfe befindet. Man bedeckt den Topf mit einer Glasplatte, und indem man dafür sorgt, dass die Erde nicht austrocknet, lässt man ihn im diffusen Licht unweit eines Fensters ruhig stehen. Nach 6–10 Wochen entwickeln sich die kleinen, gestielten Fruchtkörper der *Peziza* aus den Sclerotien. Nun wird eine Mohrrübe in Stücke zerschnitten, und nachdem man die Stücke durch Eintauchen in heisses Wasser oberflächlich abgebrüht hat, inficirt man sie unter Benutzung einer ausgeglühten Nadel mit den in den Fruchtkörpern der *Peziza* zur Reife gelangten Sporen. Die Keimung der Sporen erfolgt in einigen Tagen auf den in einer Krystallirschale unter einer Glasglocke liegenden Wurzelstücken. Bald entwickelt sich ein üppig vegetirendes Mycel an der Oberfläche der Mohrrübenstücke, und dieses zerstört auch das durch das Abbrühen nicht getödtete innere Wurzelgewebe. An einzelnen Stellen des Mycels bemerkt man das Auftreten weicher, weisser Ballen, die sich nach und nach mehr verdichten und sich schliesslich mit dunkelgefärbter Rinde umgeben. Es haben sich Sclerotien gebildet, aus denen wieder, freilich erst nach längerer Ruhezeit, Fruchtkörper hervorgehen können. Wir bringen auch eine kleine Menge üppig auf einem Mohrrübenstück vegetirenden *Pezizamycels* in eine kleine Oeffnung, die wir an einer in einem zugedeckten Glase liegenden Kürbisfrucht angebracht haben. Das Mycel vermag in das lebende Gewebe

einzudringen; es entwickelt sich sehr üppig, bildet Sclerotien, während der Kürbis völlig zerstört wird ¹⁾).

40. Die Flechten.

Die Flechten sind bekanntlich Organismen, welche ihr Dasein dem Zusammenleben (Symbiose) von Pilzen und Algen verdanken. Die Symbiose vollzieht sich im Allgemeinen derartig, dass die Algen vermöge ihres Chlorophyllgehaltes das für ihr eigenes Dasein und dasjenige der Pilze erforderliche organische Material aus anorganischen Stoffen durch Assimilation erzeugen, während die Pilze den Algen zumal Schutz gegen Austrocknung gewähren. Der Flechtenthallus erscheint entweder homöomer oder heteromer gebaut, und wir wollen einen Repräsentanten der letzteren Flechtengruppe, nämlich *Usnea barbata*, benutzen, um uns über den Bau der in Rede stehenden merkwürdigen Organismen zu orientiren.

Wir verwenden frisches Material oder, wie ich es gethan habe, in Wasser aufgeweichtes Herbarmaterial und stellen einen zarten Querschnitt durch einen stärkeren Thallusast her. Bei mikroskopischer Untersuchung sieht man leicht, dass der Thallus aus einer Mark- und Rindenzone besteht. Die Elemente beider Schichten sind vielfach verzweigte Pilzhypen. Die Rinde sowie ein axiler Strang des Markes sind von dichter Beschaffenheit, während die periphere Region des Markes aus locker neben einander liegenden Hypen, die lufthaltige Lücken zwischen sich lassen, zusammengesetzt ist. Die grünen Algen sind an der Grenze von Mark und Rinde leicht zu sehen. Sie bilden hier eine besondere Zone, die überall von Hypen durchsetzt wird, welche vom Mark zur Rinde laufen. Will man sich über den Bau anderer Flechten unterrichten, so gewährt es zumal Interesse, die Fruchträger von *Cladonia*arten und den dorsiventralen Thallus von *Stictaspecies* zu untersuchen ²⁾).

41. Experimente mit fleischverdauenden Pflanzen.

Droserapflanzen, welche man zu physiologischen Versuchen verwenden will, cultivirt man am besten in flachen, irdenen Gefässen auf feuchtem Sphagnum unter Glasglocken. Die Droseraarten trifft man häufig auf sumpfigem, moorigem Boden in grosser Menge an; für Culturen braucht man nur einen Rasen der Versuchspflanzen auf das Torfmoos zu legen. Es ist bekannt, dass die Blattspreite sich einkrümmt, und dass die Tentakeln sich zusammenlegen, wenn das Droserablatt gereizt wird. Wir bringen zunächst ein Stückchen rohen Rindfleisches von der Grösse eines Stecknadelkopfes auf die Mitte des Blattes eines gesunden Exemplares von *Drosera rotundifolia*. Nach längerer Zeit (bei Versuchen, die ich bei 20° C. anstellte, in 24 Stunden) ist die Einbiegung sämmtlicher oder fast aller Tentakeln erfolgt. Sie

1) Zahlreiche Angaben über parasitische Pilze findet man bei FRANK, Krankheiten der Pflanzen, Breslau, 1880.

2) Ueber Bau und Leben der Flechten vergl. die Zusammenstellungen von DE BARY in dessen vergleichender Morphologie und Biologie der Pilze etc., Leipzig, 1884, S. 425.

umhüllen das Fleischstückchen nunmehr, das Secret ihrer Drüsenköpfchen wirkt auflösend auf das Eiweiss ein¹⁾, aber schliesslich (bei meinen Versuchen nach Verlauf von 48 Stunden) breiten sich die Tentakeln wieder aus. Bringt man stickstofffreie anorganische oder organische Körper (ich experimentirte mit Glasstückchen und Papierkügelchen) auf ein Droserablatt, so erfolgt freilich auch eine Einbiegung der Tentakeln, aber es lässt sich feststellen, dass diese Substanzen langsamer zu Stande kommende Bewegungserscheinungen als Fleischstückchen hervorrufen. Besonders zu beachten ist, dass, mag ein chemischer Reiz (durch Fleischstückchen) oder ein Contactreiz (durch Glasstückchen) auf das Droserablatt einwirken, auch Tentakeln durch

Fig. 30.

Fig. 29.

Fig. 29. Blatt von *Drosera rotundifolia*, von oben gesehen. Viermal vergr. (Nach DARWIN).

Fig. 30. Tentakel mit Drüsenkopf von *Drosera rotundifolia*. Vergr. 60. (Nach STRASBURGER.)

Reizfortpflanzung in Bewegung versetzt werden, deren Drüsenköpfchen nicht direct mit der als Reizursache wirkenden Substanz in Berührung gebracht worden sind.

Untersucht man Droseratentakeln mikroskopisch (es ist zweckmässig, dieselben zur Aufhellung des Gewebes auf dem Objectträger in einen Tropfen Chloralhydratlösung zu bringen), so findet man, dass der Tentakelstiel aus lang gestreckten Zellen zusammengesetzt ist; die stärkeren Stiele werden in ihrer Mitte von Schraubengefässen

1) Ein peptonisirend wirkendes Ferment ist aus den Droserablättern von REESS und WILL isolirt worden. Vgl. Botan. Zeitung, 1876, Nr. 44.

durchzogen. Das Tentakelköpfchen besteht in seiner Mitte aus schraubig verdickten Elementen, die von radial gestreckten, fächerförmig angeordneten Elementen umgeben werden (vgl. Fig. 30).

Interessant ist es, die Erscheinungen der Aggregation oder Zusammenballung zu beobachten, welche gerade in den Zellen der Tentakeln von *Drosera* in sehr auffallender Weise unter bestimmten Umständen hervortreten¹⁾, Wir entnehmen einer *Drosera*, die, um die Entwicklung rother Farbstoffe in den Tentakelzellen recht zu begünstigen, stets intensiver Beleuchtung ausgesetzt gewesen war, einen Tentakel. Dieser wird in einem Wassertropfen mikroskopisch untersucht. Wir stellen eine Zelle der äusseren Schicht des Gewebes ein und sehen wandständiges Plasma sowie die Zellen gleichmässig erfüllenden rothen Saft. Nun bringen wir mit dem ein klebriges Secret absondernden Drüsenköpfchen einiger Tentakel unserer Pflanze ganz kleine Stücke von gekochtem Eiweiss in Contact. Nach 12—20 Stunden untersuchen wir die gereizten und von der Pflanze abgeschnittenen Tentakeln wieder. Wir erblicken das wandständige Plasma. Dasselbe umgiebt nun farblosen Zellsaft, in welchem aber die verschieden gestalteten Aggregationen in Form intensiv roth gefärbter Massen leicht zu sehen sind. Diese Aggregationen bestehen aus einer Wand, deren Natur noch nicht genau ermittelt ist; ich halte wenigstens die bezüglichlichen Angaben von DE VRIES für nicht völlig beweiskräftig. Im Innern der Zusammenballungen ist Zellsaft vorhanden. Bei der Entstehung der Aggregationen muss sich der ursprünglich in der Zelle gleichmässig vertheilte Zellsaft in zwei Theile gesondert haben, einen sehr farbstoffreichen und einen wasserklaren. Wie dies zu Stande kommt, ist noch nicht genügend festgestellt. Auch wenn kohlenaures Ammoniak mit *Drosera*-tentakeln in Berührung kommt, machen sich Aggregationsprocesse geltend, bei denen aber noch Eiweissausfällungen beobachtet worden sind (H. DE VRIES).

Fig. 31. Blatt von *Dionaea muscipula* im ausgebreiteten Zustande, von der Seite gesehen. (Nach DARWIN.)

Die für physiologische Untersuchungen zu benutzen den Exemplare von *Dionaea muscipula* cultivirt man am zweckmässigsten auf feuchten Torfstücken unter einer Glasglocke. Auf die Morphologie des *Dionaea*-blattes gehe ich hier nicht weiter ein, sondern mache nur auf einige leicht auszuführende Versuche aufmerksam. Werden die Filamente, die auf der Oberseite des *Dionaea*-blattes vorhanden sind, berührt, z. B. mit einem kleinen Holzstückchen, so schliesst sich das Blatt sofort. Als bald (bei meinen Versuchen nach Verlauf von 24

Stunden) sind die Blattlappen aber wieder ausgebreitet. Werden Stückchen rohen Fleisches auf ein *Dionaea*-blatt gebracht, so tritt, im Fall eine Berührung der Filamente stattfand, eine sofortige Schliessungs-

1) Literatur: DARWIN, Insektenfressende Pflanzen, 1876; SCHIMPER, Botan. Zeitung, 1882; H. DE VRIES, Botan. Zeitung, 1886; KLEMM, Flora, 1892.

bewegung ein. Das Blatt bleibt nun aber lange geschlossen (bei von mir angestellten Versuchen länger als 8 Tage), im Gegensatz zu solchen Blättern, welche durch auf der Blattoberfläche verbleibende stickstofffreie Körper (Glasstückchen, Papierkügelchen) oder durch einfache Berührung der Filamente zu Schliessungsbewegungen veranlasst worden sind. Oeffnet sich ein Dionaeablatt, welches Fleischstückchen erhalten hat, wieder, so ergiebt sich, dass das Fleisch mehr oder minder desorganisirt und aufgelöst ist, ein Vorgang, welcher durch ein Secret vermittelt wird, das die an der Oberseite des Dionaeablattes vorhandenen Drüsen abcheiden. Dieses Secret ist von saurer Reaction und haftet oft noch in ziemlicher Menge an der Oberseite solcher Blätter, die mit Fleisch gefüttert worden sind, und sich nach Verlauf längerer Zeit wieder geöffnet haben. Stickstofffreie Körper, die auf ein Dionaeablatt gebracht werden, rufen die Abscheidung eines Drüsensecretes nicht hervor; die obere Fläche der Blattlappen bleibt bei Abwesenheit von Eiweissstoffen trocken¹⁾.

1) Specielles über das Verhalten der hier erwähnten Pflanzen vgl. bei DARWIN in dessen 1876 erschienenem Werke über insektenfressende Pflanzen. Zur allgemeinen Orientirung vgl. DETMER, Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, 1883, S. 65 und 282.

Zweiter Abschnitt.

Die Molekularkräfte der Pflanzen.

I. Die wichtigsten organisirten Gebilde der Pflanzenzellen.

42. Die Membranen der Pflanzenzellen.

Die Membranen der Pflanzenzellen bestehen keineswegs immer der Hauptsache nach aus Cellulose, sondern sie sind häufig mehr oder minder reich an anderweitigen Substanzen, die im Allgemeinen als „Einlagerungskörper“ bezeichnet werden können. Durch eine solche Einlagerung fremder Stoffe kommt z. B. die Cuticularisirung und Verholzung der Membranen zu Stande, von denen weiter unten die Rede sein soll. In vielen anderen Fällen bildet freilich die Cellulose den wesentlichsten Bestandtheil der Zellhäute, was sich unmittelbar aus dem Verhalten der letzteren verschiedenen Reagentien gegenüber ergibt.

Wir bringen Samenhaare einer Gossypiumart oder einige Wattlefasern in den Wassertropfen auf den Objectträger. Es lässt sich leicht feststellen, dass die Haare, welche im Grossen und Ganzen kegelförmige Gestalt haben, relativ dicke Membranen besitzen und sich auf Zusatz von Jodjodkaliumlösung (bereitet durch Auflösen von 0,05 g Jod und 0,2 g Jodkalium in 15 g H_2O) nur bräunlich färben. Wir lassen nun Schwefelsäure (Gemisch von 2 Thl. concentrirter Schwefelsäure und 1 Thl. Wasser) vom Deckglasrande aus zum Object treten und beobachten alsbald, dass sich die Haare blau färben. Die Membranen anderer Zellen, welche ebenso wie diejenigen der Baumwollenhaare der Hauptsache nach aus Cellulose bestehen, geben dieselbe Reaction. Desgleichen färben sich alle im Wesentlichen aus Cellulose bestehenden Membranen der Pflanzenzellen bei Behandlung mit Chlorzinkjodlösung violett, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man einige Wattlefasern auf dem Objectträger mit dem Reagens behandelt. Die Chlorzinkjodlösung bereitet man in folgender Weise. Man löst reines Zink in Stangen in reiner Salzsäure bei gewöhnlicher Temperatur bis zur Sättigung auf, dampft unter stetigem Vorhandensein metallischen Zinks zur Schwefelsäureconsistenz ein, setzt so viel Jodkalium hinzu, als aufgenommen werden kann, und trägt endlich bis zur Sättigung Jod in die Flüssigkeit ein, das sich allmählich auflöst.

Von dem Vorhandensein der Cuticula kann man sich leicht bei dem

Studium eines Querschnitts durch einen jährigen Stengel von *Viscum album* oder durch das Blatt einer *Aloëspecies* überzeugen. Ebenso ist die Cuticula sehr mächtig an der Oberfläche der Blätter von *Ilex aquifolium* entwickelt. Ein sehr zarter Querschnitt durch den Mittelnerv eines *Ilexblattes* lehrt, dass die Epidermiszellen an der Blattunterseite ein halbmondförmiges Lumen besitzen. Die cuticularisirten Schichten der Zellmembranen greifen in die Seitenwandungen der Zellen ein und werden nach aussen von der eigentlichen Cuticula überlagert¹⁾. Die Cuticula der meisten Blätter und anderer Pflanzentheile ist dünn und von sehr zarter Beschaffenheit.

Handelt es sich darum, das Korkgewebe kennen zu lernen, so untersucht man zweckmässig zarte Querschnitte, die man aus der Schale der Kartoffelknolle, dem gewöhnlichen Flaschenkork oder älteren (etwa 1 cm dicken) Stengelstücken von *Aristolochia Siphon* hergestellt hat. Die in radialen Reihen angeordneten Korkzellen sind von mehr oder minder tafelförmiger Gestalt. Bei dem Studium des Periderms von *Aristolochia* zeigt sich, dass hier breitere Zonen weiterer und schmalere Zonen engerer Korkzellen mit einander abwechseln. Concentrirte Kalilauge färbt die cuticularisirten sowie verkorkten Membranen gelblich. Diese Färbung wird beim Erwärmen der Präparate intensiver²⁾.

Wir stellen einen Querschnitt durch einen einige mm dicken Linden-zweig her. Das mikroskopische Bild ist leicht zu deuten und vor allem interessirt uns hier der insbesondere aus Gefässen von verschiedener Weite und Holzfasern bestehende Holztheil der Gefässbündel, sowie der Basttheil derselben. Die Bastmassen sind keilförmig zugespitzt, und zwar sind ihre Spitzen der Rinde zugewandt, während die keilförmigen Enden der primären Markstrahlen, welche mit den Bastmassen abwechseln, ihre Spitzen dem Holz zukehren. In den Bastmassen wechseln hell erscheinende Streifen, die aus sehr stark verdickten Bastfasern bestehen, mit dunkel erscheinenden Weichbaststreifen ab. Wir legen unsern Querschnitt jetzt auf dem Objectträger in einen Tropfen alkoholischer Phloroglucinlösung. Nach Verlauf einiger Zeit, wenn der Alkohol verdunstet ist, betupfen wir den Schnitt mit etwas concentrirter Salzsäure und beobachten ihn mikroskopisch. Alle verholzten Elemente haben sich roth gefärbt, die unverholzten sind farblos geblieben, so dass das Phloroglucin also als ein vorzügliches Reagens auf Holzsubstanz anzusehen ist³⁾. Es interessirt uns hier besonders, dass nicht allein die Elemente des eigentlichen Holzkörpers der Fibrovasalstränge, sondern auch die Elemente der Bastfaserstreifen zwischen den Weichbaststreifen roth gefärbt erscheinen, also verholzte Membranen besitzen.

Wenn man Querschnitte aus 2 mm dicken Zweigen von *Fagus silvatica* in der angegebenen Weise mit Phloroglucin und Salzsäure behandelt, so ergiebt sich, dass in den folgenden Geweben Verholzung eingetreten ist: im gesammten Mark, in den Markstrahlen, im Holztheil der Gefässbündel und in den Bastfaserbelegen, welche sich nach aussen an

1) Specielles vgl. bei DE BARY, Vergleichende Anatomie d. Vegetationsorgane etc., S. 77.

2) Bezüglich weiterer Reactionen vgl. v. HÖHNEL, in Sitzungsberichten d. Akadem. d. Wiss. zu Wien, Bd. 76, erste Abthl., S. 507.

3) WIESNER, Sitzungsber. d. Akadem. d. Wiss. zu Wien, Bd. 77, 1. Abthl., 1878, S. 60. Näheres über verholzte und verkorkte Membranen vergl. bei ZIMMERMANN, Die botanische Mikrotechnik, 1892, S. 140. Dasselbst ist auch die Literatur genau angegeben.

den Weichbast anschliessen. Die Elemente des Cambiums, des Weichbastes, des Rinden- und Peridermgewebes sind nicht roth gefärbt, also auch nicht verholzt. Ein recht brauchbares Reagens auf Holzsubstanz ist auch das schwefelsaure Anilin. Man stellt eine concentrirte Lösung desselben in Wasser her, der man noch etwas Schwefelsäure hinzugefügt hat, und bringt einen Tropfen des Reagens zu dem auf dem Objectträger liegenden Object, das untersucht werden soll. Die verholzten Elemente färben sich schnell mehr oder minder gelb. Leuchtend goldgelb fand ich z. B. die Bastfaserbelege der Zweige von *Fagus silvatica* durch schwefelsaures Anilin tingirt. In Contact mit einer wässrigen Lösung des Methylgrüns färben sich die verholzten Membranen schön grünblau, die unverholzten aber meist blau.

Um die wichtigsten Verdickungsformen der Elemente verholzter Gewebe kennen zu lernen, sind folgende Untersuchungen anzustellen.

Fig. 32. *Pinus silvestris*. A Ein Hof-tüpfel einer Tracheide in Flächenansicht. B Ein Hof-tüpfel im tangentialen Längsschnitt, *t* der Torus. C Querschnitt einer ganzen Tracheide; *m* Mittellamelle, *m** ein Zwickel, *i* das Grenzhäutchen. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

Die behöftten Tüpfel der Tracheiden des Coniferenholzes studirt man am besten an sehr zarten Querschnitten und radialen Längsschnitten aus den peripherischen Theilen des Holzes alter in Alkohol aufbewahrter Stammstücke von *Pinus silvestris*. (Vergl. Fig. 32.) Die Tracheiden sind langgestreckt, sie greifen mit ihren verjüngten Enden in einander und lassen auf ihren radialen, also denjenigen Wänden, welche den Markstrahlen zugekehrt sind, die behöftten Tüpfel leicht erkennen. Stellt man zarte radiale Längsschnitte aus dem secundären Holz etwa 1 cm dicker Zweige

von *Aristolochia Sipho* her, so beobachtet man zumal viele Tracheiden mit behöftten Tüpfeln sowie enge und sehr weite Gefässe mit behöftten Tüpfeln und ringförmigen Diaphragmen. Untersucht man radiale Längsschnitte aus den Zweigen von *Berberis vulgaris*, so ergiebt sich, dass das ganze Holz fast nur aus Gefässen, die behöft getüpfelt erscheinen, und Holzfasern besteht. Echte Spiralgefässe des primären Holzes der Gefässbündel sind sehr schön neben anderen Elementen (getüpfelten Gefässen, Holzfasern etc.) zu sehen, wenn man radiale Längsschnitte aus dem Stengel von *Helianthus annuus* oder dem fertig gestreckten hypocotylen Glied von *Ricinus communis* untersucht. Man verwende Alkoholmaterial oder bei *Helianthus* getrocknete Stammstücke¹⁾. (Vgl. Fig. 33.)

1) Ueber die chemische Natur der die Verholzung der Membranen bedingenden Substanzen vgl. SINGER, Sitzungsber. d. Akadem. d. Wiss. zu Wien, 1882, Bd. 85, S. 345. Ein wichtiger Bestandtheil verholzter Membranen der Pflanzenzellen, dessen Vorhandensein die erwähnten Reactionen mit Phloroglucin und schwefelsaurem Anilin wohl bedingt, ist das Vanillin. Meiner Ansicht nach haben die neueren Arbeiten von LANGE, THOMSEN, HEGLER u. A. die Frage nach der chemischen Natur der Holzsubstanz aber noch nicht erledigt.

Fig. 33. Längsschnitt eines Gefässbündels des fertig gestreckten hypocotylen Gliedes von *Ricinus communis*. *r* Rindenparenchym, *gs* Gefässbündelscheide, *m* Markparenchym, *b* Bastfasern, *p* Bastparenchym, *c* Cambium. Im Holztheil des Stranges bilden sich die Elemente, von *s* anfangend, nach und nach bis *t'* aus; *s* erstes enges, sehr langes Schraubengefäss, *s'* weites Schraubengefäss, beide mit abrollbarem Schraubenband, *t* leiterförmig verdicktes Gefäss, zum Theil netzartig verdickt, *h* und *h'* Holzzellen, *t* getüpfeltes Gefäss, bei *q* die resorbierte Querwand; *h''* und *h'''* Holzzellen, *t'* getüpfeltes Gefäss, noch jung, die Tüpfel zeigen erst den äusseren Hof, später tritt die Bildung des inneren Porus auf. Man bemerkt in der Gefässwand bei *t*, *t* und *t'* die Grenzlinien der benachbarten, weggenommenen Zellen. (Nach SACHS.)

Für denjenigen, der sich mit der Untersuchung der Natur der Holzelemente beschäftigt, ist es lehrreich, dieselben mit Hilfe der Macerationsmethode von einander zu trennen. Wir bringen einige Stückchen chloresäuren Kalis in ein weites Reagensrohr, übergiessen dieselben mit so viel Salpetersäure, dass sie völlig von dieser bedeckt sind, werfen nicht zu dünne Längsschnitte aus dem Holz eines 5 mm dicken Zweigs von *Tilia* in die Mischung und erhitzen über einer Spiritusflamme, bis lebhaft Gasentwicklung eintritt. Hat das Reagens noch einige Minuten auf die Holzstückchen eingewirkt, so giessen wir alles in eine grössere Wassermenge, fangen die umherschwimmenden Schnitte mit einem Glasstabe auf, spülen sie in reinem Wasser ab und legen sie in einen Wassertropfen auf den Objectträger. Durch das Macerationsverfahren ist die Mittellamelle zwischen den einzelnen Holzelementen zerstört worden, und die Präparate lassen sich daher jetzt leicht mit Nadeln zerzupfen, so dass die Elemente des Holzes isolirt beobachtet werden können. Wir constatiren vor allem die Gegenwart vieler Holzfasern und Gefässe (diese letzteren sind zum Theil in Stücke zerfallen), aber auch dünnwandige Holzparenchymzellen und Tracheiden fehlen nicht völlig. (Vgl. Fig. 34.)

43. Die Stärkekörner.

Eine kleine Menge luftgetrockneten Kartoffelmehles wird im Wassertropfen auf den Objectträger gebracht und mit dem Deckglas bedeckt.

Fig. 34. *Tilia parvifolia*. Durch Maceration isolirte Elemente aus dem secundären Holz und Bast. *A* und *B* Holzfasern (Libriformfasern). *C* Holzparenchym. *D* und *E* Tracheiden. *F* Gefässglied. *G* Bastfaser. Vergr. 180. (Nach STRASBURGER.)

Oder man zerschneidet eine Kartoffelknolle, schabt mit einem Messer etwas von der Schnittfläche ab und beobachtet die abgeschabte Masse unter dem Mikroskop. Die Kartoffelstärkekörner sind von recht verschiedener Grösse; einige erreichen eine relativ sehr bedeutende Grösse. Sie sind excentrisch gebaut, d. h. ihr organischer Mittelpunkt, um den sich die Schichten gruppieren, stimmt nicht mit dem geometrischen Centrum überein (vergl. Fig. 35).

Wir durchschneiden ein Rhizom von *Canna indica* und schaben mit dem Messer eine kleine Menge Substanz von der Schnittfläche ab, um sie in einem Wassertropfen auf den Objectträger zu bringen und mit

Fig. 35.

Fig. 36.

Fig. 37.

Fig. 35. Stärkekörner aus der Kartoffelknolle. *A* ein einfaches, *B* ein halb zusammengesetztes, *C* und *D* ganz zusammengesetzte Stärkekörner, *c* der organische Kern. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

Fig. 36. Stärkekörner aus dem Rhizom von *Canna indica*. *A* und *B* einfache Körner, *C* ein halb zusammengesetztes, *D* und *E* ganz zusammengesetzte Körner. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

Fig. 37. Stärkekörner aus den Cotyledonen von *Phaseolus vulgaris*. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

Deckglas zu bedecken. Bei mikroskopischer Untersuchung erblicken wir zahlreiche schön geschichtete, stark excentrisch gebaute Stärkekörner in unserem Präparat, welche eine beträchtliche Grösse besitzen. (Vergl. Fig. 36.)

Die Stärkekörner aus den Cotyledonen der Samen von *Phaseolus vulgaris* sind centrisch gebaut. Untersucht man sie im Wassertropfen, so erblickt man in der Mitte eines jeden Kornes eine Höhlung, die aber erst unter dem Einflusse des Wassers entsteht, denn in Glycerin beob-

achtete Stärkekörner der Bohne lassen diese Höhlung nicht erkennen. (Vergl. Fig. 37.)

Die Amylumkörner aus dem Endosperm von *Triticum* präsentiren sich uns bei der Untersuchung als runde Gebilde von recht verschiedener Grösse. Sie sind centriscb gebaut. Schichtungserscheinungen sind schwer zu erkennen.

44. Das Verhalten der Stärke zum Jod.

Wenig Kartoffelstärke wird in einem Reagensglase mit destillirtem Wasser übergossen. Man lässt unter häufigem Umschütteln längere Zeit (einige Stunden lang) stehen und filtrirt die Flüssigkeit ab. Bringt man mit Hülfe eines Glasstabes etwas alkoholische Jodlösung zu dem Filtrat, so entsteht keine Bläunung der Flüssigkeit. Reines Wasser vermag den unversehrten Stärkekörnern keine Stärkesubstanz zu entziehen.

Wenig Kartoffelstärke wird in einem Reagensglase mit Wasser übergossen. Erwärmt man, so bildet sich ein trübes Gemisch von Amylumsbstanz und Wasser (Kleister). Fügt man dem erkalteten Kleister etwas alkoholische Jodlösung hinzu, so nimmt die Flüssigkeit eine sehr charakteristische, schön blaue Farbe an. Diese Reaction ist sehr empfindlich, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man eine kleine Kleistermenge in sehr viel Wasser giesst und nun Jodlösung zusetzt. Die Flüssigkeit nimmt auch jetzt eine blaue Farbe an. Erwärmt man durch Jodzusatz blau gefärbten Kleister, so verschwindet der charakteristische Farbenton alsbald, weil Wasser von höherer Temperatur ziemlich viel Jod aufzulösen und dasselbe unter den bezeichneten Umständen daher der Amylumsbstanz zu entziehen vermag. Kühlt der Kleister ab, so tritt die blaue Farbe wieder hervor.

Sehr wenig Kartoffelstärke oder kleine Mengen einer anderen Amylumsorte werden auf dem Objectträger im Wassertropfen vertheilt. Nach der Bedeckung mit dem Deckgläschen bringt man einen Tropfen eines Jodreagens (Jodwasser, Jodjodkaliumlösung oder verdünnten Jodalkohol) an den Deckglasrand. Das Jodwasser stellt man dar, indem man Jod mit destillirtem Wasser übergiesst und mit diesem einige Tage lang in Berührung lässt. Zur Bereitung der Jodjodkaliumlösung übergiesst man 3 Thl. Jodkalium mit 60 Thl. Wasser und fügt einen Thl. Jod hinzu. Die Lösung kann durch Wasserzusatz verdünnt werden. Das an den Deckglasrand gebrachte Jodreagens dringt nun allmählich bis zu den Stärkekörnern vor, und es lässt sich bei mikroskopischer Betrachtung feststellen, dass dieselben sich zunächst schwach bläulich, nach und nach aber immer intensiver blau färben, indem sie das Jod mehr und mehr aufspeichern.

Trockene Kartoffelstärke wird auf dem Objectträger in einen Tropfen durch Auflösen von Jod in absolutem Alkohol frisch bereiteter Jodtinctur gebracht. Bei mikroskopischer Prüfung ergiebt sich, dass die Amylumkörner keine blaue, sondern eine bräunliche Farbe annehmen. Lässt man Wasser zutreten, so erfolgt die charakteristische Bläunung. Die Stärkekörner vermögen sich also nur dann auf Jodzusatz blau zu färben, wenn sie mit reichlicheren Wassermengen imbibirt sind.

45. Das Verhalten der Stärkekörner im polarisirten Licht.

Es ist sehr lehrreich, sich über die von MOHL¹⁾ und NÄGELI²⁾ studirten Erscheinungen specieller zu unterrichten, welche Stärkekörner zeigen, wenn man sie im polarisirten Licht untersucht. Man bedarf dazu freilich eines Polarisationsapparates und eines Mikroskopstatives mit hinreichend hohem Objecttisch. Der Polarisator wird in den Schlitten der Cylinderblendung eingeschoben. Als Analysator benutzt man am besten das Analysatorocular von ABBE, welches ebenso wie der Polarisator von ZEISS in Jena zu beziehen ist.

Die Stärkekörner werden in gewöhnlicher Weise in einem Wassertropfen auf dem Objectträger vertheilt und mit Deckglas bedeckt. Wenn die Polarisationsebenen des Analysators und Polarisators parallel zu einander stehen, so erscheint das Gesichtsfeld hell, und unter diesen Umständen muss die Einstellung der Objecte vorgenommen werden. Bei gekreuzter Stellung der Nicols (dieselbe ist leicht zu erreichen, indem wir das Analysatorocular drehen) erscheint das Gesichtsfeld dunkel. Die Amylumkörner heben sich sehr hell vom dunklen Grunde ab und tragen ein schwarzes Kreuz. Sehr schöne Farbenphänomene treten hervor, wenn man Stärkekörner mit Hülfe des Polarisationsmikroskops untersucht, nachdem zwischen das Object und den Polarisator Gypsplättchen von bestimmter Beschaffenheit eingeschaltet worden sind.³⁾

Ich habe das Verhalten einer ganzen Reihe verschiedener Stärkesorten im polarisirten Lichte beobachtet; von allen ergab die Kartoffelstärke die schönsten Bilder. An der Ansicht, dass die Micellen der Stärkekörner und sonstiger organisirter pflanzlicher Gebilde die Natur optisch zweiaxiger Krystalle besitzen, kann man heute nicht mehr festhalten; vielmehr ist das eigenthümliche Verhalten der organisirten pflanzlichen Gebilde im polarisirten Licht auf andere Weise zu erklären⁴⁾. Uebrigens lasse ich die Ansicht nicht fallen, wie ich schon an anderer Stelle betonte, dass die organisirten pflanzlichen Gebilde aus Micellen aufgebaut sind⁵⁾.

46. Die protoplasmatischen Gebilde der Pflanzenzellen.

Als protoplasmatische Gebilde der pflanzlichen Zellen sind die sämmtlichen eiweissreichen und organisirten Inhaltsbestandtheile derselben (das eigentliche, lebsthätige Protoplasma, die Zellkerne, Leukoplasten, sowie die Proteinkörner etc.) anzusehen. Die Chlorophyllkörper wurden bereits unter 5 besprochen, und auf andere mit Farbstoffen imprägnirte protoplasmatische Gebilde kommen wir später zurück.

Das Bild, welches das Protoplasma (Cytoplasma) der Zellen unter dem Mikroskop gewährt, ist wesentlich abhängig von der Zahl und Grösse der in denselben vorhandenen mit Zellsaft erfüllten Vacuolen. Zahlreiche kleine Vacuolen im Plasma verleihen demselben ein schaumiges Aussehen, wäh-

1) Vgl. H. v. MOHL, Botan. Zeitung, 1858, S. 1.

2) Vgl. NÄGELI, Sitzungsberichte d. Akadem. d. Wiss. zu München, 1862, Bd. 1, S. 311.

3) Vgl. Specielleres in NÄGELI's und SCHWENDENER's Mikroskop.

4) Vgl. STRASBURGER, Bau und Wachsthum d. Zellhäute, 1882, S. 208, und ZIMMERMANN, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 2, S. XVII.

5) Vgl. DETMER, Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, 1883, S. 71.

rend sich uns das Protoplasma vieler Zellen, zumal der entwickelten mit einem einzigen zusammenhängenden Saft Raum, in der in Fig. 5, S. 15 dargestellten oder ähnlicher Weise präsentirt. (Vergl. auch Fig. 38.) Wir bringen junge Blätter aus der Endknospe von *Elodea* ohne weitere Präparation in einen Wassertropfen auf den Objectträger, legen ein Deckglas auf und untersuchen. Der die Innenseite der Zellhaut jeder Zelle auskleidende protoplasmatische Wandbeleg ist leicht zu erkennen, ebenso

Fig. 38. Eine Zelle aus einem Staubfadenhaar von *Tradescantia virginica*. Vergr. 240. (Nach STRASBURGER.)

die Protoplasmaansammlung um den Kern. Jener und diese sind durch frei durch den Saft Raum der Zellen ausgespannte Protoplasmafäden mit einander verbunden. Im Protoplasma sind zahlreiche Chlorophyllkörper leicht zu sehen. Eine ähnliche Beschaffenheit wie bei *Elodea* ist dem Protoplasma der violetten Zellsaft enthaltenden und zu einem einfachen Faden verbundenen Zellen der Staubfadenhaare von *Tradescantia* eigenthümlich (vgl. Fig. 38), wie leicht constatirt werden kann, wenn man im Oeffnen begriffenen Blüthen von *T. virginica* oder einer verwandten Art einen Haarbüschel mit der Pinzette entnimmt und zur mikroskopischen Untersuchung der Zellen schreitet.

Von allergrösster Wichtigkeit ist die nunmehr sicher constatirte Thatsache, dass die Plasmamassen benachbarter Zellen fast ganz allgemein durch zarte, die Zellwände durchsetzende Plasmafäden mit einander in Zusammenhang stehen¹⁾.

Als Untersuchungsmaterial wählen wir mindestens 1 cm dicke Stammstücke von *Rhamnus Frangula*. Dieselben werden nach STRASBURGER wie folgt behandelt: Wir entfernen das Periderm und stellen aus der grünen Rinde sehr zarte, tangentielle Längsschnitte her. Bei der Untersuchung des Baues der secundären Rinde richten wir unser Augen-

merk besonders auf das chlorophyllhaltige Bastparenchym, dessen Wände mit unbehöften Tüpfeln versehen sind. Diese Bastparenchymelemente haben rechteckige Gestalt. Zudem sehen wir noch die langgestreckten Bastfasern und die spindelförmig umschriebenen Durchschnitte der Markstrahlen. Nunmehr bringen wir neue Schnitte aus der secundären Rinde auf ein Deckglas, fügen einen Tropfen concentrirter Schwefelsäure hinzu und tauchen das Deckglas nach wenigen Sekunden in ein mit Wasser gefülltes Gefäss, um die Schnitte rasch und möglichst vollkommen auszuwaschen. Nun färben wir die Schnitte mit wässrigem Anilinblau, waschen sie mit Wasser aus und legen sie in wässriges Glycerin. An Stelle des Anilinblaus verwendet man auch mit Vortheil Pikrin-Anilinblau, hergestellt durch Auflösen von Pikrinsäure in 5-proc. Alkohol bis zur Sättigung und Hinzufügen von Anilinblau, bis die Flüssigkeit blaugrün gefärbt erscheint. Die Präparate sind gelungen, wenn die Wände der Bastparenchymzellen so stark gequollen erscheinen, dass sie etwa den nämlichen Durchmesser wie die contrahirten gefärbten Plasmakörper besitzen, und wenn auch die Mittellamellen stark gequollen sind. Nicht

1) Vgl. KIENITZ-GERLOFF, Botan. Zeitung, 1891, daselbst auch Literaturzusammenstellung. Vgl. auch STRASBURGER, Botan. Praktikum.

alle Präparate und nicht sämtliche Zellen in einem Präparat eignen sich zur Untersuchung. Die Zellen müssen völlig unlädirt, und die Fixirung durch die Schwefelsäure muss schnell genug erfolgt sein.

Die Umrisse der einzelnen Plasmakörper der Parenchymzellen erscheinen an denjenigen Flächen glatt, mit denen sie an eine mit sehr feinen Poren versehene Zellwand grenzten; sie zeigen dickere oder dünnere Fortsätze dort, wo die anstossende Zellwand weitere Tüpfel besass. Die Fortsätze der Plasmakörper entsprechen sich in den benachbarten Zellen. Wenn man die gequollene Schliesshaut betrachtet, die zwei besonders breite, gegen einander gerichtete Plasmafortsätze trennt, so findet man zwischen ihnen eine Anzahl äusserst feiner, körnig erscheinender Fäden ausgespannt. Es sind dies eben die Plasmafäden, welche auch die lebenden Plasmakörper mit einander verbinden. Wo die einander zugekehrten Flächen zweier Plasmakörper glatt erscheinen, sehen wir die Mittelschichten der Zellwand oft ihrer ganzen Ausdehnung nach von Fäden durchsetzt, die in ihrer Mitte etwas angeschwollen sind.

Der Protoplasmakörper wird stets, also auch dann, wenn er von einer Zellhaut umgeben ist, an seiner Oberfläche von einer hyalinen Schicht, der Hautschicht oder dem Hyaloplasma, begrenzt. Diese Hautschicht fehlt aber auch dort nicht, wo Theile des Plasmakörpers an den Zellsaft angrenzen. Die Hauptmasse des Protoplasmas wird von der Körnerschicht desselben gebildet, welche sich durch ihren grossen Wasserreichthum und ihr Bewegungsvermögen, sowie dadurch auszeichnet, dass sie Mikrosomen und oft auch Chlorophyllkörper etc. führt. Das Hyaloplasma der meisten Zellen ist zu zart, um durch Beobachtung direct wahrgenommen werden zu können. In einigen Fällen lässt sich sein Vorhandensein aber leicht constatiren, und namentlich ist die Hautschicht in den Internodialzellen von *Nitella*, einer Algengattung, deren Repräsentanten in kalkarmen Gewässern häufig angetroffen werden, mächtig entwickelt. Die Massen der Körnerschicht des Protoplasmas sind hier in lebhafter Rotation begriffen, während sich das Hyaloplasma nicht an dieser Bewegung theiligt.

Ich habe oft und mit Nachdruck darauf hingewiesen ¹⁾, dass keineswegs Identität zwischen todtten und lebendigen Eiweissmolekülen des Protoplasmas besteht. Damit in Einklang zu bringen sind die Resultate gewisser Beobachtungen von LOEW und BOKORNY ²⁾, welche wir etwas ausführlicher erwähnen müssen. Wir stellen Kalilösung von 1,333 spec. Gew. her und vermischen 13 ccm derselben mit 10 ccm Ammoniakflüssigkeit von 0,960 spec. Gew. Das Gemisch wird auf 100 ccm verdünnt. Ferner stellen wir eine 1-proc. Lösung von salpetersaurem Silberoxyd dar. Von der Kaliammoniakflüssigkeit und der Silberlösung werden vor dem Gebrauch je 1 ccm mit einander vereinigt und auf 1 Liter verdünnt. Man legt nun in 1 Liter der alkalischen Silberlösung einige Spirographafäden (andere Zellen zeigen die Reaction, auf die es hier ankommt, zwar ebenfalls, aber nicht so deutlich), lässt dieselben einige Zeit in der Lösung verweilen (bei höherer Temperatur, z. B. 30° C., etwa 3 Stunden, bei niedriger Temperatur länger) und untersucht sie dann. Das Protoplasma in den Zellen hat sich in Folge eingetretener Reduction des Silbersalzes der Lösung schwarz gefärbt, aber es ist besonders wichtig, dass diese

1) Vgl. z. B. DETMER, Lehrbuch d. Pflanzenphysiologie, 1883, S. 151.

2) Vgl. LOEW und BOKORNY, Die chemische Ursache des Lebens, und Botan. Zeitung, 1882, S. 824.

Reaction nur eintritt, wenn die Zellen bei Beginn des Versuchs lebendig waren. Durch Hitze oder Alkohol oder auf andere Weise getödtete Spirogyrazellen nehmen beim Verweilen in der alkalischen Silberlösung nur eine gelbe bis braune Farbe an. Etwas langsamer, aber noch besser tritt die Schwarzfärbung des Protoplasmas ursprünglich lebender Spirogyrazellen ein, wenn man einige Algenfäden in eine Lösung legt, die auf 1 Liter Wasser 10 mg salpetersaures Silberoxyd und 5 ccm Kalkwasser enthält. Der Zutritt von kohlenensäurehaltiger Luft ist hier während der Reaction sorgsam auszuschliessen.

Meiner Meinung nach kommt die Schwarzfärbung des Protoplasmas solcher Zellen, die in lebensthätigem Zustande mit den Silberlösungen in Contact gerathen, freilich nicht immer allein, aber doch häufig, wesentlich dadurch zu Stande, dass die stickstofffreien, aldehydartigen Körper, welche neben Amidosäuren und Säureamiden in Folge der Zersetzung der lebendigen Eiweissmoleküle entstehen, reducirend auf das Silbersalz einwirken. Todte Eiweissmoleküle sind ohne einen solchen Einfluss auf die Silberlösung, weil sie sich nicht in der Weise wie die lebendigen Eiweissmoleküle zersetzen.

Wir gehen zum Zellkern über. Dass derselbe eiweissartige Substanzen enthält, lehrt sein Verhalten zu Reagentien. In Contact mit Jodjodkalium (hergestellt durch Vermischen von 0,050 g Jod, 0,200 g Jodkalium und 15 ccm destillirten Wassers) nehmen die Zellkerne eine gelbliche Farbe an. Methylgrünessigsäure (hergestellt durch Eintragen von etwas Methylgrün in 1-proc. Essigsäure) tingirt die Kerne sehr schön. Bei der Behandlung der Zellen mit den erwähnten Reagentien treten die Kerne deutlicher hervor, was oft von besonderer Wichtigkeit ist. Sehr schön färben sich mit Methylgrünessigsäure, wie ich oft constatirte, die Kerne in den Epidermiszellen des Blattes von *Aspidistra*. Um die Kernreaction mit Jodjodkalium kennen zu lernen, verwenden wir Epidermiszellen des Blattes von *Escheveria globosa* oder zarte Querschnitte aus der ersten Blattscheide junger Maiskeimlinge. In den Zellen des Parenchyms der Scheide sind ziemlich grosse Zellkerne vorhanden. Schön entwickelte Zellkerne enthalten die den Spaltöffnungsapparaten der Unterseite des Blattes von *Tradescantia virginica* benachbarten Zellen, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man Epidermisstreifen der Blätter mikroskopisch untersucht.

Ein besonderes Interesse besitzen die Stärkebildner für uns, Leukoplasten, denen, wie SCHIMPER¹⁾ zuerst zeigte, die Function zukommt, aus wandernden oder schon in Reservestoffbehälter übergegangenen gelösten Kohlehydraten Amylumkörner zu regeneriren. Die schönsten und grössten Stärkebildner, welche man kennt, sind in den Scheinknollen von *Phajus grandifolius* anzutreffen. Diese zu den Orchideen gehörende Pflanze kann man z. B. zum Preise von 3 M. pro Exemplar von HAAGE und SCHMIDT in Erfurt beziehen. Zur Untersuchung wählen wir eine nicht zu alte Knolle, halbiren dieselbe und stellen aus ihrer Scheitelgegend dünne Längsschnitte her, die bis zur grün gefärbten Knollenoberfläche reichen. Ich habe mich davon überzeugt, dass es am besten ist, die Schnitte schnell in concentrirte Pikrinsäure zu übertragen, um sie in dieser zu beobachten. Die Stärkebildner der Zellen der inneren Schnitttheile sind farblos; nach aussen zu werden die Stärkebildner freilich grösser, aber ihre protoplasmatische Grundmasse ist mit Chlorophyllfarbstoff imprägnirt.

1) Vgl. SCHIMPER, Botan. Zeitung, 1880, Nr. 52.

Die im Profil gesehenen Stärkebildner (vgl. Fig. 39) erscheinen stäbchenförmig. Sie haben in Folge der Pikrinsäurebehandlung eine gelbliche Farbe angenommen, während die ihnen ansitzenden grösseren oder kleineren Stärkekörner nicht gefärbt sind.

Wir wenden uns nunmehr zur Untersuchung der protoplasmatischen Gebilde ruhender Pflanzentheile. Es interessieren uns hier vor allem die Formen, in denen die Reserveproteinstoffe in den Samen vorhanden sind, und wir nehmen zunächst einen Lupinensamen in Untersuchung, indem wir den Samen halbiren, die Schnittfläche der Cotyledonen befeuchten und zarte Schnitte in Wasser untersuchen. Es treten uns in den Zellen zahlreiche, dicht gedrängt neben einander liegende, kleine Aleuron- oder Proteinkörner entgegen, deren Gestalt sich freilich in Folge des Einflusses des Wassers etwas verändert hat. Werden Präparate in Glycerin untersucht, so erscheinen die unveränderten Proteinkörner als stark lichtbrechende Gebilde, die auf den ersten Blick wie kleine Stärkekörner aussehen. Eingebettet sind die Aleuronkörner in den Zellen in eine protoplasmatische Grundsubstanz. Sehr schön entwickelte, grosse Proteinkörner sind, eingelagert in eine fettreiche Grundmasse, in den Endospermzellen der Ricinusamen vorhanden. Das erwähnte Gewebe lässt sich vortrefflich schneiden; die Schnitte können in Wasser untersucht werden, da sich dessen störende Wirkung erst langsam geltend macht. Fügen wir dem Präparat vom Deckglasrande aus Jodalkohol hinzu, so färben sich die Aleuronkörner gelb; sie zeigen überhaupt Eiweissreactionen. Lässt man zu den in Wasser liegenden Schnitten Alkohol vom Deckglasrande aus treten, so werden die Eiweisskrystalloide in den Aleuronkörnern ziemlich deutlich. Bei Untersuchung von Schnitten in einem Tropfen wasserfreier Essigsäure (Eisessig), quellen die Proteinkörner stark auf, die Krystalloide verquellen sogar völlig, aber die Globoide treten scharf hervor.

Von besonderem Interesse ist es, Schnitte aus dem Endosperm der Samen von *Bertholletia excelsa* (Paranüsse) herzustellen. Wird zu einem in Wasser liegenden Schnitt absoluter Alkohol hinzugefügt, so treten in den Proteinkörnern eigenthümliche Einschlussgebilde deutlich hervor. (Abbildungen vgl. bei PFEFFER in Pringsheim's Jahrbüchern f. wissensch. Botanik, B. 8, Tafel 36, Fig. 16 und 17.) Es kommen hier einerseits die Eiweisskrystalloide, welche gerade bei *Bertholletia* relativ gross sind, und ferner die Globoide, Verbindungen einer gepaarten Phosphorsäure mit Kalk und Magnesia, in Betracht. Behandelt man Schnitte aus der Paranuss mit 1-proc. Ueberosmiumsäure (wässrige Lösung der Säure, die im Dunkeln aufzubewahren ist), so erblickt man die Krystalloide noch deutlicher, da sie sich nur langsam gelblich färben, während der übrige Inhalt der Zellen, zumal die fettreiche Grundsubstanz, in der die Proteinkörner liegen, schnell einen dunklen Farbenton annimmt. In den Proteinkörnern von *Ricinus* kann man das Vorhandensein von Eiweisskrystalloiden

Fig. 39. *Phajus grandifolius*, Stärkebildner aus der Knolle. A C, D und E von der Seite, B von oben gesehen. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

ebenfalls feststellen, wenn man zarte Schnitte aus dem Endosperm in Ueberosmiumsäure untersucht (vgl. Fig. 40).

Wir stellen ferner zarte Querschnitte aus den Cotyledonen einer reifen, trocknen Erbse her. Auf die Schnittfläche bringen wir etwas Glycerin und untersuchen das Object auch in Glycerin, dem wir etwa $\frac{1}{3}$ destillirtes Wasser hinzugefügt haben. Das mikroskopische Bild, welches wir beobachten, ist in Fig. 41 dargestellt. Wir sehen rundliche Zellen, welche dreieckige Interzellularräume zwischen sich lassen. In

Fig. 40.

Fig. 41.

Fig. 42.

Fig. 40. Aus dem Endosperm von *Ricinus communis*. A eine Endospermzelle mit Inhalt unter Wasser, B einzelne Aleuronkörner in Olivenöl. g das Globoid, k Kry-stalloid. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

Fig. 41. Zellen aus den Coty-ledonen der Erbse. m Zellhaut, i Interzellularraum, am Stärke-, al Aleuronkörner, p Grundsubstanz, n Zellkern, letzterer nach der Be-handlung mit Methylgrünessigsäure ergänzend eingetragen. Vergr. 240. (Nach STRASBURGER.)

Fig. 42. Querschnitt durch ein Weizenkorn (*Triticum vulgare*). p Fruchthülle, t Samenhaut. In den an letztere anstossenden Endosperm-zellen: al Aleuron-, am Stärkekörner, n Zellkern. Vergr. 240. (Nach STRASBURGER.)

den Zellen befindet sich eine sehr feinkörnige Grundsubstanz. Dieser sind die ziemlich grossen Stärkekörner und die kleinen Aleuronkörner eingelagert. Auf Jodzusatz färben sich die Amylumkörner blau, die Grundsubstanz sowie die Proteinkörner, da sie wesentlich aus Eiweissstoffen bestehen, aber gelb. Zarte Schnitte aus den Erbsencotyledonen, in Methylgrünessigsäure gebracht, lassen erkennen, dass in jeder Zelle ein Zellkern, der sich grünblau gefärbt hat, vorhanden ist.

Wenn wir aus einem reifen Weizenkorn unter Betupfen der Schnitt-

fläche mit Glycerin einen zarten Querschnitt herstellen und denselben in Glycerin legen, um ihn mikroskopisch zu untersuchen, so finden wir, dass dicht unter der Frucht- und Samenschale, die wir an anderer Stelle eingehender besprechen werden, eine Schicht rechteckiger Zellen liegt. Die Zellen enthalten keine Stärkekörner, wohl aber viele kleine Aleuronkörner. Die Zellen des tiefer liegenden Gewebes führen reichliche Amylummenge (vgl. Fig. 42).

II. Die Zerstörung der Molekularstructur organisirter pflanzlicher Gebilde.

47. Die Einwirkung niederer Temperaturen auf Pflanzen.

Dem Einfluss niederer Temperaturen gegenüber verhalten sich die Pflanzen sehr verschiedenartig. Manche Gewächse (viele Flechten, Moose und Bakterien, aber auch höhere Pflanzen, z. B. *Bellis perennis* und *Stellaria media* etc.) bleiben lebendig, wenn sie bei $-6 = -8^{\circ}\text{C}$. gefroren sind und dann schnell aufgethaut werden. Ich brachte auch Blätter von *Primula elatior* im Winter in Gläser, die nach dem Verschliessen mit einer Kältemischung, welche aus Schnee und Kochsalz in einem grossen Gefässe hergestellt worden war, umgeben wurden. Die Pflanzentheile blieben 6 Stunden lang einer Temperatur von $-5 = -8^{\circ}\text{C}$. ausgesetzt und wurden dann durch Eintauchen in Wasser von 6°C . aufgethaut. Die Blätter waren bei Abschluss der Experimente nicht getödtet.

Wenn man Kartoffelknollen im Freien oder in Gläsern, die mit einer Kältemischung umgeben werden, einer Temperatur von -8°C . aussetzt, so gefrieren sie durch und durch und sind in diesem Zustande klingend hart. Blätter, z. B. solche von Crassulaceen, Kohl-, Raps-, Bohnenpflanzen, einer Temperatur von -8° ausgesetzt, werden in Folge des Gefrierens spröde wie Glas. Thaut man die Kartoffelknollen oder die Blätter auf, indem man sie in gefrorenem Zustande in Wasser legt, so gehen sie zu Grunde. Sie sind erfroren und zeigen nunmehr die unter 48 aufgeführten Merkmale.

Die Kartoffelknollen sind, wovon ich mich durch zahlreiche Experimente sicher überzeugte, stets getödtet, wenn sie, nachdem ihr Gewebe wirklich gefroren war, nachträglich aufgethaut werden, mag dies langsam oder schnell geschehen. Man bringe einige Kartoffelknollen in ein grosses Gefäss mit Wasser und setze dieses einer Temperatur von -8°C . aus, so dass die Knollen langsam gefrieren. Das nachträgliche Aufthauen des Eises und der Knollen kann sehr langsam herbeigeführt werden, indem man das Gefäss in einen Raum stellt, in welchem eine Temperatur von $+1-2^{\circ}\text{C}$. herrscht. Die aufgethauten Knollen — und dasselbe Resultat erhielt ich mit Escheveriablättern — sind todt. Ich habe auch Exemplare von *Zannichellia palustris*, die in Wasser liegend unter dem Einfluss des Lichtes reichliche Sauerstoffmengen abgeschieden, mit dem Wasser gefrieren lassen. Sie erwiesen sich nach dem Aufthauen als todt und zeigten keine assimilatorische Thätigkeit mehr.

Sehr lehrreich ist es nach meinen Erfahrungen, Blätter von *Begonia manicata*, deren Blattstiel in Wasser eintaucht, deren Spreite aber unter einer Glasglocke von Luft umgeben ist, im Freien oder in einem Zimmer einer Temperatur von -5° C. oder -10° C. auszusetzen. Die Blätter werden schon in Folge des Gefrierens missfarbig, und dieser Farbenton verschwindet auch nicht wieder, wenn man die Untersuchungsobjecte aufthaut. Die niederen Temperaturen bedingen eine Desorganisation des Protoplasmas, so dass der säurereiche Zellsaft auf die Chlorophyllkörper einwirken kann und das Chlorophyllpigment zersetzt. Wenn man Flächenschnitte erfrorener Blätter von *Begonia manicata* mikroskopisch untersucht, so ergiebt sich in der That, dass die Chlorophyllkörper nicht, wie im normalen Zustande, grün, sondern gelblich gefärbt sind. Experimente mit den erwähnten Untersuchungsobjecten sind deshalb so lehrreich, weil die bei niederer Temperatur eintretende Farbenänderung der Blätter direct erkennen lässt, dass schon das Gefrieren an sich den Tod der Zellen hervorruft ¹⁾.

Wichtig ist ferner die von verschiedenen Physiologen festgestellte Thatsache, dass dieselben Pflanzentheile, welche im wasserreichen Zustande Schaden leiden, wenn sie gefrieren, im wasserarmen Zustande nicht durch den Einfluss der Kälte leiden ²⁾. Man kann dies unter Benutzung lufttrockener sowie gequollener Samen von *Phaseolus*, *Pisum*, *Triticum* etc. leicht constatiren. Wenn man z. B., wie ich es gethan habe, einerseits lufttrockene Weizenkörner, andererseits solche, die 7 Stunden lang mit Wasser in Berührung gewesen waren, in kleinen Gläsern 15 Stunden lang einer Temperatur von -10° C. preisgibt, so findet man, dass die ersteren, auf feuchtem Sande normalen Keimungsbedingungen ausgesetzt, noch keimfähig sind, während die letzteren nicht mehr keimen und zu Grunde gehen ³⁾.

Die gesammten Untersuchungen lassen namentlich diese Thatsache deutlich hervortreten, dass verschiedene Pflanzentheile und dieselben Beobachtungsobjecte in verschiedenen Zuständen keineswegs die gleiche Empfindlichkeit der Einwirkung niederen Temperaturen gegenüber besitzen.

48. Die Veränderungen, welche Pflanzen in Folge des Erfrierens erfahren.

Beim Gefrieren von Pflanzentheilen tritt keineswegs, wie die Erfahrung lehrt, ein Zerreißen der Zellhaut ein. Wenn man z. B. Fäden von *Spirogyra* im Wassertropfen auf dem Objectträger gefrieren lässt, so sind nach dem Aufthauen keine Risse in den Zellhäuten wahrzunehmen. Wir wissen ja auch, dass beim Gefrieren von Geweben in der Regel nur in den Interzellularräumen etc., nicht aber in den Zellen selbst Eisbildung erfolgt.

Das Erfrieren ist sicher auf eine Zerstörung der Molekularstruktur des Protoplasmas zurückzuführen, was sich unmittelbar daraus ergiebt, dass dasselbe, wenn der Tod der Zellen durch Erfrieren ein-

1) Vgl. DETMER, Botan. Zeitung, 1886, Nr. 30.

2) Vgl. DETMER, Vergleichende Physiologie d. Keimungsprocesses d. Samen, 1880, S. 392.

3) Weitere Literatur: SACHS, Versuchsstationen, 1860, Berichte d. sächs. Gesellschaft d. Wiss., 1860, Bd. 12, S. 27, und Flora, 1862; GÖPPERT, Wärmeentwicklung in der Pflanze, 1830.

getreten ist, seine normale Impermeabilität für Farbstoffe, Säuren etc. verloren hat.

Legt man gefrorene Stücke rother Rüben in Wasser von gewöhnlicher Temperatur, so nimmt dieses den rothen Farbstoff in grosser Menge auf, während der Saft aus den Zellen nicht gefrorener Stücke rother Rüben, die man nach dem Abspülen in Wasser gelegt hat, nicht austritt. Erfrorene Kartoffelknollen lassen nach dem Aufthauen bei leisem Druck grosse Flüssigkeitsmengen ausfliessen. Die Zellen haben in Folge der Desorganisation des Protoplasmas ihren Turgor verloren, ebenso wie die Zellen erfrorener Blätter, welche schlaff herabhängen und bald vertrocknen. Sehr schön lassen sich diese Phänomene an erfrorenen Begonia- oder Escheveria-Blättern beobachten.

Wird Stärkekleister zum Gefrieren gebracht und dann aufgethaut, so hat man keine homogene Flüssigkeit mehr vor sich, sondern eine schwammige Masse, in deren Poren sich Flüssigkeit befindet. Es ist hier offenbar eine Umlagerung der Moleküle eingetreten, und das Ergebniss des erwähnten Versuchs ist im Stande, uns manche Vorgänge, welche beim Erfrieren von Pflanzenzellen im Protoplasma derselben stattfinden, einigermaassen zu versinnlichen.

49. Die Eisbildung in gefrierenden Pflanzen.

Ein einige cm dicker, gut abgewaschener und dann abgetrockneter Schnitt einer rothen Rübe wird in einer Schale, die man, um die Wasserverdunstung auszuschliessen, mit einer Glasplatte bedeckt hat, einer Temperatur von etwa -6° C. ausgesetzt. Ist der Pflanzentheil vollkommen gefroren, so findet man seine Oberfläche mit einer Eiskruste bedeckt, die, wie geeignete bei Temperaturen unter 0° C. ausgeführte mikroskopische Untersuchungen lehren, aus parallel neben einander gestellten Eissäulen besteht. Besonders reichliche Eismengen findet man an der Unterseite des Rübenschnittes, da wo er den Boden der Schale berührt hat. Dieses Eis ist nicht roth gefärbt, woraus erhellt, dass nicht der Zellsaft, sondern fast reines Wasser aus den Zellen des Untersuchungsobjectes herausgefroren ist.

Unter bestimmten Umständen kann freilich in den Zellen gefrierender Pflanzentheile Eis entstehen; gewöhnlich tritt aber das Wasser beim Gefrieren in die Interzellularräume oder in sonstige Höhlungen der Gewebe über und erstarrt hier erst. Schneidet man an einer grossen Runkelrübe den oberen Theil weg, befestigt denselben aber wieder mit Hülfe eines Bindfadens an seinem ursprünglichen Platze, nachdem man im unteren Theile eine nicht zu grosse Höhlung angebracht hat, und setzt das Untersuchungsobject nunmehr längere Zeit einer Temperatur von etwa -8° C. aus, so sammeln sich beträchtliche Eismassen in der Höhlung an¹⁾.

Um den Nachweis zu liefern, dass beim Gefrieren der Pflanzen die erste Eisbildung in den Interzellularen stattfindet, werden Schnitte aus gefrorenen Kartoffelknollen oder Carotten, die mit stark abgekühlten Messern hergestellt worden sind, auf gut abgekühlte Objectträger gelegt und unter dem Mikroskop bei langsamem Aufthauen beobachtet. Man

1) Vgl. über das hier Gesagte und das Folgende MÜLLER-Thurgau, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 9, S. 133.

sieht, dass sich die Eiskrystalle nicht in, sondern zwischen den Zellen gebildet haben, und dass sich die Zellreihen, welche durch die Eisdrusen auseinandergedrängt waren, beim Schmelzen des Eises einander nähern freilich nicht mehr bis zur vollständigen Berührung. Die Zellen geben also beim Gefrieren der Pflanzentheile Wasser ab. Dieses scheidet sich zunächst in den Intercellularen als Eis ab, und indem die Eismassen anwachsen, erfahren auch die Intercellularen eine Vergrösserung.

Sehr instructiv ist es, den Gang der Temperatur in gefrierenden Pflanzentheilen festzustellen, wie dies zuerst von MÜLLER-Thurgau geschehen ist. Ich habe zu solchen Versuchen den in Fig. 43 abgebildeten Apparat benutzt. Unter der tubulirten Glasglocke *Gg* liegt der Glasring *Gr*. Auf diesen letzteren gelangt das Untersuchungsobject,

Fig. 43. Apparat zur Untersuchung des Temperaturganges in gefrierenden Kartoffelknollen.

z. B. die Kartoffelknolle *K*. Mittelst eines Korkbohrers ist in die Knolle ein bis zur Mitte derselben reichendes Loch gebohrt, und dieses dient, nachdem es mit Fliesspapier ausgetrocknet worden ist, zur Aufnahme des cylindrischen Quecksilberbehälters eines empfindlichen und in Zehntel-Grade eingetheilten Thermometers *T*. Sehr wünschenswerth ist es, dass die Glasglocke nicht einen, sondern noch einen zweiten, zur Aufnahme eines zweiten Thermometers dienenden Tubulus besitzt, um neben der Temperatur der Knolle zugleich diejenige der sie umgebenden Luft unter der Glocke bestimmen zu können. Die ganze Vorrichtung wird in eine grosse Schale gestellt, und die Untersuchung in einem kalten Raum ausgeführt. Man umgibt die Glocke in der Schale mit einer Kältemischung (Schnee und Kochsalz) und liest nun von 5 zu 5 Minuten den Stand des Quecksilbers in den Thermometern ab. Die Temperatur der Knolle

sinkt allmählich auf $-3 = -4^{\circ}\text{C}$. Plötzlich aber steigt sie wieder auf -1°C ., hält sich längere Zeit ziemlich constant, um dann wieder zu sinken, bis die Temperatur der umgebenden Luft, z. B. -8°C ., erreicht ist. Wenn Kartoffelknollen einer Temperatur unter 0° ausgesetzt werden, so tritt zunächst, ohne dass Eisbildung in dem Gewebe erfolgt, eine Ueberkältung derselben ein. Ist das Ueberkältungsmaximum erreicht, so tritt die Eisbildung plötzlich ein, und durch die dabei frei werdende Wärme steigt die Temperatur in der Knolle auf den Gefrierpunkt derselben, welcher etwa bei -1°C . liegt. Allmählich sinkt dann die Temperatur der Knolle auf diejenige des umgebenden Mediums herab. Andere Pflanzentheile verhalten sich ähnlich. Ich umwickelte z. B. den Quecksilberbehälter eines Thermometers mit einem Blattstreifen einer Begonie (*B. manicata*), befestigte den Pflanzentheil mit Hilfe eines Bindfadens am Thermometer und kühlte das Untersuchungsobject ab. Das Ueberkältungsmaximum lag bei $-4,8^{\circ}\text{C}$., der Gefrierpunkt bei $-0,8^{\circ}\text{C}$. Erst als dieser erreicht war, wurde der Blattstreifen missfarbig (vergl. unter 47).

Bei ausführlichen Untersuchungen über den Temperaturgang gefrierender Pflanzentheile verwendet man zweckmässig einen Gefrierkasten, der, wie folgt, construirt ist (MÜLLER-Thurgau). Er besteht aus einem kubischen Holzkasten von 1 m Kantenlänge, mit doppeltem Boden und doppelten Seitenwänden. Boden und Wände sind mit trockenen Holzsägespänen ausgefüllt. In diesen Holzkasten passt genau ein doppeltwandiger, oben ebenfalls offener Zinkblechkasten, dessen innere Wandung sich herausheben lässt. Bei der Verwendung des Apparates wird zunächst der äussere Zinkkasten mit etwa nussgrossen Eisstücken so weit angefüllt, wie die den inneren Zinkkasten tragenden Säulen reichen, hierauf der innere Zinkkasten an seine Stelle gebracht, und auch der Zwischenraum zwischen beiden Zinkkästen mit Eis angefüllt. Handelt es sich darum, im Gefrierkasten eine Temperatur unter 0° , z. B. von -8° C. hervorzubringen, so bringt man auf die Oberfläche des Eises zwischen den Wänden der Zinkkästen bestimmte Kochsalzmengen, die, indem sie einen Theil des Eises zum Schmelzen bringen, Kälte erzeugen. Als Deckel des Apparates dienen zwei viereckige Blechteller, welche, neben einander gelegt, den doppeltwandigen Zinkblechkasten zudecken und noch nicht völlig den oberen Rand des Holzkastens erreichen. Die Deckel, welche ebenfalls mit Eis unter Kochsalzzusatz zu füllen sind, lassen eine etwa 2 cm breite, nach oben sich erweiternde Spalte über dem ganzen Gefrierkasten offen, durch welche die Thermometer, mit Hülfe welcher die Temperaturverhältnisse der Untersuchungsobjecte sowie diejenigen der diese umgebenden Luft ermittelt werden sollen, ans Tageslicht treten. Die beiden Zinkblechdeckel sind schliesslich noch je mit einem Holzdeckel zugedeckt, die gerade mit dem oberen Rande des Holzkastens abschliessen. Zur Aufstellung des Gefrierkastens wählt man einen Raum von möglichst constanter Temperatur, z. B. ein nach Norden gelegenes Zimmer. Es gelingt dann bei einiger Aufmerksamkeit im Winter leicht, tagelang eine recht constante Temperatur unter 0° im Apparat zu erhalten. Bei Ausföhrung der Beobachtungen müssen die Untersuchungsobjecte sich möglichst in der Mitte des Gefrierkastens befinden. Das obere Ende der Thermometer, deren Quecksilberbehälter von den Pflanzentheilen umgeben ist, wird durch geeignete Halter, die auf der einen Deckelhälfte stehen, festgehalten. Natürlich müssen die in Zehntel-Grade getheilten und häufiger mit einem Normalthermometer zu vergleichenden Thermometer derartig construirt sein, dass diejenigen Theile der Scala, auf denen die Temperaturen von 0 bis etwa -8° C. verzeichnet sind, noch aus dem Gefrierkasten hervorragen. Die Ablesungen der Thermometer erfolgen bei den Untersuchungen in Zwischenräumen von einer Minute. Alle Resultate dieser Ablesungen werden in tabellarischer Form übersichtlich zusammengestellt.

Um die Thatsache zu begreifen, dass Temperaturen unter 0° ausgesetzte Pflanzentheile eine Ueberkältung erfahren, und dass ihr Gefrierpunkt nicht bei 0° , sondern tiefer liegt, müssen wir uns an das Verhalten von Salzlösungen sowie an das Verhalten durch Adhäsionskräfte seitens fester Körper festgehaltenen Wassers beim Gefrieren erinnern. In den Zellen der Pflanzen ist ja auch kein reines Wasser, sondern eine wässerige Lösung verschiedener Stoffe vorhanden, und die organisirten pflanzlichen Gebilde halten das Wasser fest. Reines Wasser gefriert meist bei 0° , eine Lösung (z. B. Kochsalzlösung) aber stets erst bei tiefer liegenden Temperaturen. Je nach den Concentrationsverhältnissen lassen sich Kochsalzlösungen mehr

oder weniger überkälten, bevor die Eisbildung beginnt. Die Temperatur der Lösungen steigt dann plötzlich, bis der eigentliche Gefrierpunkt, der stets unter 0° liegt, erreicht ist. Man kann diese Verhältnisse leicht durch geeignete Experimente feststellen. Um das Verhalten durch Adhäsionskräfte gebundenen Wassers beim Gefrieren zu untersuchen, habe ich nach MÜLLER-Thurgau's Vorgange den Quecksilberbehälter eines Thermometers mit Fliesspapier umwickelt, das zunächst mit Wasser durchtränkt und dann wieder äusserlich abgetrocknet worden war. Unter einer mit einer Kältemischung umgebenen Glasglocke niedriger Temperatur ausgesetzt, nahm das Fliesspapier allmählich eine Temperatur von -3° C. an (Ueberkältungsmaximum), und dann stieg die Temperatur plötzlich bis auf etwas unter 0° C.

Das in Lösungen vorhandene, sowie das durch Adhäsionskräfte seitens fester Körper gebundene Wasser — und das Wasser in der Pflanze befindet sich ja unter solchen Verhältnissen — gefriert also nicht bei 0° C., wie reines Wasser, sondern erst bei tiefer liegenden Temperaturen. Der Gleichgewichtszustand zwischen den Wassertheilchen und den Salztheilchen oder den Theilchen der festen Körper wird erst bei Temperaturen unter 0° C. aufgehoben, so dass die Eisbildung erfolgen kann. Freilich wird nun bei der Eisbildung eine erhebliche Wärmemenge frei; indessen die Temperatur der Salzlösungen oder der mit Wasser durchtränkten festen Körper erhebt sich doch nicht ganz auf 0° C., da eine gewisse Wärmemenge verbraucht wird, um die Wassertheilchen beim Gefrieren von den Salztheilchen oder den Theilchen der festen Körper loszureissen.

50. Die Tödtung der Pflanzen durch zu hohe Temperaturen.

Als Untersuchungsobjecte dienen zunächst in kleinen Blumentöpfen zur Entwicklung gebrachte junge Pflanzen von Zea, Nicotiana, Cucurbita, Phaseolus oder Tropaeolum. Haben die Pflanzen einige Blätter entfaltet, so sind sie für die Experimente geeignet. Man bringt nun die Luft unter der Glocke eines Thermostaten auf diejenige Temperatur, deren Wirkung auf die Pflanzen studirt werden soll. Ist diese Temperatur constant geworden, so gelangt ein Untersuchungsobject in den Thermostaten. Man wartet, bis die Temperatur, deren Einfluss man untersuchen will, im Apparat wieder hergestellt ist, und überlässt die Pflanze dann dieser Temperatur gewisse Zeit lang. Oft empfiehlt es sich, die Erde in den Töpfen, um einen schnelleren Temperatúrausgleich zu erzielen, mit warmem Wasser zu begiessen. Ein Thermometer ist in die Erde, in welcher die Pflanze wurzelt, eingesenkt, ein zweites hängt unter der Glocke und berührt die oberirdischen Theile der Untersuchungsobjecte. Man kann die Versuche nun vielfältig variiren. Wir belassen eine der genannten Pflanzen z. B. eine halbe Stunde lang bei einer Lufttemperatur von 40 oder 45° C., oder wir setzen die Pflanzen im Apparat $10-30$ Minuten lang einer Lufttemperatur von 52° C. aus. Darauf werden die Gewächse aus dem Thermostaten herausgenommen und normalen Lebensbedingungen ausgesetzt, um ihr weiteres Verhalten zu beobachten. Ein halbstündiges Verweilen in Luft von 40° C. ertragen die Pflanzen gewöhnlich ohne Nachtheil; ein $10-30$ Minuten dauernder Aufenthalt in Luft von 52° C. tödtet sie aber in der Regel. Uebrigens

ist zu beachten, dass die Pflanzen keineswegs sofort absterben, wenn sie zu hohen Temperaturen, z. B. 52°C . während 10 Minuten, ausgesetzt gewesen sind. Vielmehr tritt der Tod oft erst nach Tagen ein. Die eben fertig ausgebildeten Blätter werden allmählich missfarbig, während die älteren Blätter und Internodien, sowie auch die Knospen erst später absterben. Bei der Ausführung genauer vergleichender Untersuchungen über den Einfluss höherer Temperaturen auf Pflanzen ist es nothwendig, jedes Experiment bei bestimmter Temperatur mehrfach zu wiederholen, und ebenso ist jeder Versuch mit einer noch nicht benutzten, also vollkommen normalen Pflanze anzustellen. Man schützt sich auf diese Weise vor Irrthümern. Lehrreich würde es auch sein, Pflanzen längere Zeit (mehrere Stunden oder gar Tage) bei relativ niederen Temperaturen (z. B. $35-40^{\circ}\text{C}$.) im Thermostaten zu belassen, um das nachträgliche Verhalten der Untersuchungsobjecte zu beobachten.

Während die Pflanzen ein 10 Minuten langes oder ein etwas längeres Verweilen in Luft von 52°C . nicht ohne nachtheilige Folgen ertragen, rufen schon Temperaturen von etwa $45-48^{\circ}\text{C}$., denen die Untersuchungsobjecte 10 Minuten lang ausgesetzt waren, den Tod derselben hervor, wenn das Medium nicht Luft, sondern Wasser ist. Um diese Thatsache zu demonstrieren, taucht man die oberirdischen Theile in Töpfen cultivirter Pflanzen, nachdem man, um das Herausfallen der Erde aus den Töpfen zu verhindern, Sperrhölzer auf die Bodenoberfläche gelegt hat, in Wasser von der bezeichneten Temperatur. Diese wird während der Experimente constant erhalten, und nach Verlauf von 10 Minuten nimmt man die Pflanzen aus dem Wasser heraus, um ihr ferneres Verhalten zu beobachten.

Bei dem Studium über den Einfluss des Wassers von höherer Temperatur auf die Pflanzen kann man auch mit abgeschnittenen Pflanzentheilen, z. B. mit Blättern, experimentiren. Ich benutzte unter anderem zu solchen Versuchen Blätter von *Begonia manicata* und *Vitis vinifera*, die sehr geeignete Untersuchungsobjecte darstellen, weil sie in Folge des Todes der Zellen eine wesentliche Farbenänderung erfahren. Taucht man die Blätter von *Begonia* 15 Minuten lang in Wasser von 40°C ., so sterben ihre Zellen nicht ab. In Wasser von 75°C . eingetaucht, verfärben sich die Blätter fast momentan und sind dann getödtet. Wasser von 55°C . tödtet die Blätter binnen zwei Minuten.

Fig. 44. Apparat zur Untersuchung der Einwirkung höherer Temperatur auf Samen.

Um die wichtige Thatsache zu constatiren, dass Pflanzentheile, zumal Samen, höhere Temperaturen weit besser im trocknen als im mit Wasser durchtränkten Zustande überdauern, benutzt man den Fig. 44 abgebildeten Apparat. Das Becherglas *B* ist mit Wasser angefüllt. Der das Glas verschliessende grosse Kork hat mehrere Bohrungen, und durch die eine derselben ist das Thermometer *T* gesteckt, während die beiden anderen zur Aufnahme von Probirgläsern (*P* und *P'*) dienen. Die Mündungen dieser letzteren sind mit Korken verschlossen, in deren Bohrungen Thermometer eingeführt werden. Die ganze Vorrichtung hängt in einem Metallringe und taucht in das Wasser eines Wasserbades ein. Man erwärmt nun mit einer Gas- oder Spiritusflamme, bis die Thermometer in den Probirgläsern diejenige Temperatur anzeigen, bei der man experimentiren will (z. B. 50, 60 oder 70° C.). Jetzt werden in das eine Probirglas lufttrockne, in das andere gequollene Samen gebracht, und zwar benutzt man z. B. je 50 bis 100 Samen von *Pisum*, *Zea* oder *Triticum*, um diese Untersuchungsobjecte einige Zeit lang (z. B. eine Stunde lang) der constant gehaltenen höheren Temperatur auszusetzen. Darauf werden die Samen in Sägespäne gelegt und normalen Keimungsbedingungen ausgesetzt. Die lufttrocknen erwärmten Samen keimen noch zum Theil; die aber im gequollenen Zustande erwärmten gehen sämmtlich zu Grunde und keimen nicht.

Lufttrockne Körner von *Pisum*, *Zea* oder *Triticum* kann man eine Stunde lang Temperaturen von 65 oder 70° C. exponiren, ohne dass sämmtliche Untersuchungsobjecte ihre Keimfähigkeit einbüßen; freilich wird dieselbe aber dadurch mehr oder minder geschwächt. Als ich lufttrockne Weizenkörner eine Stunde lang einer Temperatur von 62° C. ausgesetzt hatte, erwies sich nachträglich noch ein nicht unerheblicher Procentsatz der Untersuchungsobjecte keimfähig. Die gequollenen Weizenkörner, welche eine Stunde lang einer Temperatur von 62° C. ausgesetzt gewesen waren, gingen aber bei der Keimprobe sämmtlich zu Grunde¹⁾.

51. Die Veränderungen, welche Pflanzen in Folge der Tödtung durch zu hohe Temperaturen erfahren.

Man tauche ein junges Blatt aus der Knospe von *Elodea canadensis*, in dessen Zellen das Stattfinden lebhafter Protoplasmabewegung constatirt ist, kurze Zeit (etwa 1 Minute lang) in Wasser von 60° C. Infolge des Einflusses der hohen Temperatur wird die Protoplasmabewegung sofort sistirt; sie kehrt auch nach längerer Zeit nicht wieder; das Untersuchungsobject geht in einen desorganisirten Zustand über und ist abgestorben.

Sehr zahlreiche Blätter (ich experimentirte z. B. mit Kohlblättern) erfahren, wenn man sie einige Zeit lang in Wasser von höherer Temperatur (z. B. 60° C.) bringt, keine wesentlichen Farbenveränderungen. Die Blätter sterben aber in dem warmen Wasser sehr schnell ab; die Zellen verlieren ihren Turgor, und die Pflanzentheile sind schlaff

1) Literatur: SACHS, Flora, 1864, S. 5, und Handbuch d. Experimentalphysiologie der Pflanzen, 1865, S. 64. Ferner vgl. DETMER, Vergleichende Physiologie d. Keimungsprocesses d. Samen, 1880, S. 401; HÖHNEL in den von FR. HABERLANDT herausgegebenen wissenschl.-prakt. Untersuchungen auf dem Gebiete des Pflanzenbaues, Bd. 2, S. 77, und DETMER, Botan. Zeitung, 1886, Nr. 30.

geworden. Sie können auch nicht wieder in den normalen turgescenten Zustand zurückgebracht werden. Wenn man Blätter, deren Zellen säurereich sind (ausgezeichnete Objecte sind nach meinen Erfahrungen die Blätter von *Begonia manicata* und *Vitis vinifera*) in heisses Wasser taucht, so werden dieselben schnell missfarbig, weil die Chlorophyllkörper in Folge der Vernichtung des Protoplasmas jetzt in Contact mit dem säurereichen Zellsaft gelangen, und die Säure das Chlorophyllpigment zersetzt. Legt man Begoniablätter in Wasser von 55° C., so sind sie nach Verlauf von 2 Minuten missfarbig; in Contact mit Wasser von 75° C. verlieren sie fast momentan ihre grüne Farbe. Bei mikroskopischer Untersuchung von Flächenschnitten der getödteten Blätter von *Begonia manicata* ergibt sich in der That, dass die Chlorophyllkörper nicht mehr grün, sondern bräunlich gefärbt sind.

Dass das Protoplasma bei dem durch zu hohe Temperaturen hervorgerufenen Absterben seine normale Beschaffenheit einbüsst und in Folge dessen die Säuren des Zellsaftes leicht diosmosiren lässt, kann man nach meinen Erfahrungen leicht in folgender Weise feststellen. Ein Stück vom Blattstiele eines lebendigen Blattes von *Begonia manicata* wird nach dem Abspülen in destillirtes Wasser gelegt. Ein zweites Stück desselben Blattstieles tödtet man durch Einlegen in Wasser von 60° C. Ist das Blattstielstück missfarbig geworden, so überträgt man es schnell in destillirtes Wasser. Zu diesem Wasser und ebenso zu demjenigen, in welchem das lebende Blattstück verweilt, fügt man alsbald, nachdem man die Blattstücke entfernt hat, etwas Chlorcalciumlösung hinzu. Die eine Flüssigkeit bleibt klar, die andere, in der das getödtete Blattstück lag, trübt sich in Folge der Abscheidung von oxalsaurem Kalk. Das zerstörte Protoplasma ist permeabel für die Oxalsäure des Zellsaftes geworden und hat dieselbe nach aussen in das umgebende Wasser austreten lassen.

Werden Haare von den Staubfäden einer *Tradescantia* durch Eintauchen in Wasser von 55 oder 60° C. getödtet, dann in einem Wassertropfen auf den Objectträger gebracht und ihr Verhalten beobachtet, so zeigt sich, dass der rothe oder violette Farbstoff des Zellsaftes in den Zwischenraum zwischen Protoplasma und Zellhaut übergeht und schliesslich aus den Zellen in das umgebende Wasser gelangt. Das gesunde Protoplasma ist impermeabel für den Farbstoff. Wenn man Stücke frischer rother Rüben zunächst sorgfältig abspült, um den aus den angeschnittenen Zellen hervortretenden Saft zu beseitigen, und dann in Wasser legt, so geben sie selbst bei stundenlangem Verweilen in der Flüssigkeit keinen Farbstoff an dieselbe ab. Sind die Zellen der rothen Rüben aber durch den Einfluss höherer Temperatur getödtet, so lassen sie ihren Farbstoff, in Wasser von gewöhnlicher Temperatur gelegt, schnell austreten. Legt man einerseits durch Eintauchen in Wasser von 60° C. getödtete, andererseits aus lebenden Zellen bestehende Stücke weisser Rüben in den Saft rother Rüben, so dringt der Farbstoff binnen 24 Stunden nicht in die letzteren ein, während sich die ersteren durch und durch roth färben.

52. Die Vernichtung der Molekularstruktur durch mechanische Eingriffe.

Wenn es auch allbekannt ist, dass Pflanzentheile schwachen Druck oder schwache Zerrung ohne Nachtheil ertragen, wohl aber eine Zerstörung

ihrer Molekularstruktur unter dem Einflusse energischer mechanischer Eingriffe erfahren, so mögen dennoch einige nicht ganz unwichtige Experimente angeführt werden, deren Resultate die letztere Thatsache deutlich hervortreten lassen.

Etwas Kartoffelstärke wird mit Wasser von 15—20° C. übergossen. Eine gleiche Menge der Stärke wird mit Wasser übergossen, nachdem man sie in einem Mörser mit reinem Quarzsand möglichst vollkommen verrieben hat. Nach einigen Stunden filtrirt man die Flüssigkeiten ab und kann nun in der einen mit Hülfe von Jod keine Granulose nachweisen, während das Wasser der mit Sand verriebenen Stärke Granulose entzogen hat. Der mechanische Eingriff führt zu einer Zerstörung der Molekularstruktur der Amylumkörner, und diese geben daher Granulose an die Flüssigkeit ab, während die unversehrten Stärkekörner dies nicht vermögen.

Wenn man das Gewebe der Spreite des Blattes von *Begonia manicata* heftig zwischen den Fingern zusammenpresst, so nimmt dasselbe an der gedrückten Stelle alsbald eine bräunliche Färbung an. Die mikroskopische Untersuchung von Flächenschnitten von der gedrückten Stelle lehrt, dass die Chlorophyllkörper in den Zellen missfarbig geworden sind, während sie im normalen Zustande schön grün erscheinen. Durch den Druck ist eine Zerstörung der protoplasmatischen Zellenbestandtheile herbeigeführt worden. Dieselben sind permeabel für den sauren Zellsaft geworden, und dieser hat zersetzend auf das Chlorophyllpigment eingewirkt ¹⁾.

53. Die Wirkung des Austrocknens auf Pflanzentheile.

Werden krautige Sprosse abgeschnitten, und führt man ihnen nunmehr kein Wasser zu, so gehen sie alsbald in den welken Zustand über. Wenn derselbe weit vorgeschritten ist, so kann man die Sprosse durch Wasserzufuhr nicht aufs Neue in den normalen Zustand überführen, dagegen erholen sich eben angewelte Sprosse oft wieder, wenn man ihnen reichlichere Wassermengen zur Verfügung stellt.

Um den Einfluss kennen zu lernen, den das Austrocknen auf Samen sowie Keimpflanzen ausübt, verwende man Weizen- oder Erbsensamen. Das Material wird theils nach 24-stündigem Quellen, theils nachdem die Würzelchen soeben hervorgebrochen sind oder sich mehr oder minder weit entwickelt haben, in Glasschalen gebracht und dem austrocknenden Einflusse der Luft ausgesetzt. Sind die Samen oder Keimpflanzen lufttrocken geworden, so legt man sie in feuchtes Sägemehl und beobachtet ihr Verhalten. Die angequollenen Samen werden durch das Austrocknen wenig gelitten haben; ebenso diejenigen Untersuchungsobjecte, deren Wurzeln nur einen sehr geringen Grad der Entwicklung erfahren hatten. Der Einfluss der Austrocknung auf etwas weiter ausgebildete Keimpflanzen macht sich darin geltend, dass die jungen Keimtheile freilich absterben, aber bei erneuter Wasserzufuhr wieder durch Bildung von Adventivwurzeln und Entwicklung vorhandener Achselknospen ersetzt werden, während noch weiter ausgebildete Keimpflanzen durch das Austrocknen gewöhnlich völlig zu Grunde gehen ²⁾.

1) Vgl. DETMER, Botan. Zeitung, 1886, Nr. 30.

2) Vgl. NOWOCZCK in Haberlandt's wissenschl.-prakt. Unters. auf dem Gebiete d. Pflanzenbaues, B. 1, S. 122.

Werden Rasen von *Barbula muralis* mehrere Wochen an der Luft oder im Exsiccator über Schwefelsäure ausgetrocknet und dann befeuchtet und auf feuchte Erde gebracht, so wachsen sie, ohne die alten Blätter zu verlieren, ruhig weiter. Manche andere Moose verhalten sich ähnlich; es giebt aber auch Moose, die sich dem Austrocknen gegenüber recht empfindlich erweisen¹⁾.

Ueber die Frage, wie sich mehr oder minder weit ausgetrocknete, aber freilich noch immer ziemlich wasserreiche Keimpflanzen im Vergleich zu den normalen Untersuchungsobjecten bezüglich ihrer Athmungsenergie verhalten, stellte ich eine Reihe von Beobachtungen an²⁾. Etwa 30 Erbsenkeimpflanzen werden nach der im dritten Abschnitt angegebenen Methode auf ihre Athmung untersucht. Man bestimmt die Kohlensäuremenge, welche die Keimpflanzen in 2 oder 3 Stunden bei constanter Temperatur aushauchen. Dann wird den Versuchsobjecten einige Tage lang kein Wasser dargeboten und das mehr oder minder ausgetrocknete Material wieder bei derselben Temperatur wie früher auf seine Athmungsenergie geprüft. Dieselbe ist jetzt erheblich gesunken. Lufttrockene Samen geben nach meinen Beobachtungen keine nachweisbaren Kohlensäuremengen aus.

54. Die Einwirkung der Elektrizität auf Pflanzen.

Ueber die Einwirkung der Elektrizität auf Pflanzen ist, namentlich soweit es sich dabei um das feinere Detail handelt, noch relativ wenig bekannt³⁾. Von physiologischem Interesse erscheint zumal die Thatsache, dass constante Ströme sowie Inductionsströme nicht ohne Einfluss auf die Protoplasmaabewegungen sind, indem sie den Verlauf derselben meistens verlangsamen oder die Bewegungen völlig aufheben und schliesslich den Tod der Zellen herbeiführen.

Fig. 45. Objectträger zur Untersuchung der Einwirkung elektrischer Ströme auf Pflanzentheile.

Um die in Frage kommenden Phänomene zu studiren, verwende man junge Blätter von *Elodea* oder Haare von den jüngeren Theilen einer Kürbispflanze. Die Untersuchungsobjecte werden im Wassertropfen unter Deckglas der mikroskopischen Beobachtung unterzogen, und die Objectträger haben die in Fig. 45 dargestellte Form. Auf der Glasplatte *G* sind zwei Messingplatten *M*, *M* mit Asphaltlack (Auflösung von Asphalt in Terpentinöl) festgekittet. An jeder Messingplatte ist eine Klemmschraube *K* festgelöthet. Die beiden Staniolblättchen *St*, *St* werden mit Hilfe von Asphaltlack auf den Messingplatten und der Glasplatte befestigt; sie lassen einen Zwischenraum zwischen sich, der dem Wasser-

1) Vgl. SCHRÖDER, Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen, Bd. 2, S. 18.

2) Vgl. DETMER, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 11, S. 230.

3) Literaturzusammenstellungen vgl. an verschiedenen Orten in PFEFFER'S Handbuch der Pflanzenphysiologie.

tropfen, in welchem sich das Untersuchungsobject befindet, Raum gewährt. Will man die Einwirkung von Inductionsströmen auf die Pflanzenzellen studiren, so schraubt man die Enden der vom Inductionsapparat kommenden Drähte am Objectträger fest und kann nun die mikroskopischen Beobachtungen anstellen, während die Ströme ihren Einfluss auf die Zellen geltend machen. Es ist bei physiologischen Untersuchungen wichtig, die Stärke der Ströme reguliren zu können, und daher verwende man Inductionsapparate, wie sie für medicinische Zwecke von den Mechanikern geliefert werden. Diese Apparate sind gewöhnlich sammt dem stromerregenden Elemente in einem geeigneten Kasten angebracht. Die Regulirung der Stromstärke kann auch mittelst des Schlittenapparats von Du Bois REYMOND vorgenommen werden (vgl. Fig. 46), bei dessen Benutzung man die Drahtenden der Hauptspirale *A* mit dem Elektromotor und dem Rheotom verbindet, während von der Nebenspirale *B* aus die Verbindung mit den Klemmschrauben des Objectträgers hergestellt wird. Gewöhnlich ist der Schlittenapparat mit dem Rheotom (meistens einem magnetischen Hammer), der in Fig. 46 nicht dargestellt ist, verbunden. Als stromerregendes Element verwendet man zweckmässig das in Fig. 47 abgebildete Chromsäuretauchelement. Die Flasche enthält eine Lösung, die man darstellt, indem man 92 g gepulvertes doppeltchromsaures Kali mit 93,5 ccm concentrirter Schwefelsäure, das Pulver allmählich zu-

Fig. 46. Inductionsapparat.

Fig. 47. Chromsäuretauchelement.

setzend, mischt. Unter Umrühren löst man die Masse dann in 900 ccm Wasser. Die Zinkplatte des Elementes kann zwischen den Kohlenplatten mittelst eines Stabes eingesenkt oder, wenn der Apparat ausser Thätigkeit gesetzt werden soll, über das Flüssigkeitsniveau emporgehoben werden.

Bei Versuchen mit den Blättern von *Elodea canadensis* fand ich, dass schwächere Inductionsströme die Protoplasmaabewegung in den Zellen sistirten; nach Aufhebung des Stromes stellte sich dieselbe allmählich wieder ein. Stärkere Inductionsströme sistirten die Protoplasmaabewegung in einer Zelle für immer. Da stärkere Ströme die Zellen tödten und der abgestorbene Zustand des Protoplasmas leicht daran kenntlich ist, dass dasselbe permeabel für manche Stoffe (z. B. Farbstoffe) wird, die es im lebenden Zustande nicht durchlässt, so würde es instructiv sein, auf Haare der Staubfäden von *Tradescantia* elektrische Ströme einwirken zu lassen. Das Absterben der Zellen müsste sich leicht an dem Farbstoffaustritt aus dem Zellsaft, resp. aus den Zellen feststellen lassen. Bei Untersuchungen über den Einfluss elektrischer Ströme auf Pflanzenzellen

achte man auch auf die Formänderungen, welche das Protoplasma unter der Einwirkung der Ströme erleidet¹⁾).

Lehrreich ist es ferner, das folgende Experiment auszuführen²⁾. Man legt zwei Blattstücke von *Begonia manicata*, die einige cm Länge besitzen, auf eine Glasplatte. Durch das eine Blattstück schickt man nun etwa 15 Minuten lang einen nicht zu schwachen Inductionsstrom, indem man die Elektroden (kleine Metallstücke) den beiden Enden des Blattstreifens auflegt. Das zweite Blattstück dient nur als Vergleichs-object. Nach der angegebenen Zeit gelangen beide Blattstreifen in ein verschlossenes Glas. Der nicht elektrisirte Pflanzentheil bleibt grün und frisch; der elektrisirte bräunt sich alsbald, verliert seinen Turgor und wird schlaff, weil der Inductionsstrom das Protoplasma seiner Zellen getödtet hat.

55. Die Einwirkung von Giften auf die Pflanzen.

Bei Untersuchungen über die Frage, ob diese oder jene Stoffe sich den Pflanzenzellen gegenüber giftig verhalten, benutzt man zweckmässige Samen. Freilich ist immer zu beachten, dass ein Stoff, wenn er das Leben einer Pflanzenart schädigt oder vernichtet, darum noch nicht als Gift für alle Gewächse angesehen werden darf. Handelt es sich z. B. darum, die Wirkung des Sublimats, des Kupfervitriols, der Salicylsäure, der Carbolsäure, der Citronensäure, des Atropins, des salzsauren Chinins, des Kochsalzes etc. auf Pflanzen zu prüfen, so stellt man sich 0,1-, 0,2-, 0,5-, 1,0-procentige oder verdünntere, resp. concentrirte Lösungen dieser Stoffe her, bringt dieselben in kleine Gläser und legt eine nicht zu kleine Anzahl Erbsensamen oder Weizenkörner in die Flüssigkeiten. Nach 24 Stunden werden die gequollenen Untersuchungsobjecte auf flachen Schalen mit etwas Wasser in Contact gebracht oder in feuchtes Sägemehl gelegt. Man stellt nun fest, wie viele Samen in bestimmter Zeit keimen, und welche Länge die Keimtheile im Vergleich zu denjenigen solcher Keimpflanzen erreichen, die sich von Anfang an unter durchaus normalen Verhältnissen entwickelten. So fand ich z. B., dass 0,1-proc. Salicylsäurelösungen schon äusserst giftig auf Erbsen einwirkten³⁾.

Man cultivire ferner Keimpflanzen von *Pisum* in flachen Schalen, indem man dafür sorgt, dass die Cotyledonen stets bis etwa zur Hälfte vom Wasser bedeckt sind. Nach einigen Tagen bestimmt man die Länge der Wurzel- sowie Stengeltheile der Keimlinge, ersetzt das Wasser durch Lösungen verschiedener Stoffe von bekannter Concentration und lässt die Keimpflanzen 24 Stunden lang mit der Flüssigkeit in Contact. Dann misst man die Länge der Keimtheile wieder, bringt die Untersuchungsobjecte aufs Neue mit reinem Wasser in Berührung und ermittelt, ob Wachsthum derselben eintritt oder nicht. Nach meinen Erfahrungen heben manche Gifte das Wachsen der Keimpflanzen für

1) Bei den Untersuchungen über den Einfluss der Elektricität auf Pflanzen wird man fernerhin, um zu völlig einwurfsfreien Resultaten zu gelangen, bemüht sein müssen, unpolarisierbare Elektroden zu verwenden. Vgl. über dieselben die Abschnitte über elektromotorische Wirkungen an Pflanzen.

2) Vgl. DETMER, Botan. Zeitung, 1886, Nr. 30.

3) Vgl. DETMER, Landwirthsch. Jahrbücher, Bd. 10, S. 733.

immer auf; andere sistiren dasselbe freilich auch, aber die Untersuchungsobjecte beginnen doch ihre Entwicklung wieder, wenn sie nachträglich mit destillirtem Wasser in Berührung gebracht werden.

Ich habe ferner gequollene Samen von *Pisum sativum* auf flachen Glasschalen mit etwas Wasser in Berührung gebracht und, nachdem noch ein Glas mit Chloroform neben der Schale aufgestellt worden war, das Ganze mit einer Glasglocke bedeckt. Bei nicht zu niedriger Temperatur (18° C.) keimte kein Same¹⁾. Die giftige Wirkung des Chloroforms auf Pflanzenzellen kann man auch leicht in Vorlesungen demonstiren, wenn man in eine flache Schale Chloroform giesst und diese sowie ein Blatt von *Begonia manicata*, das mit seinem Stiel in Wasser eintaucht, unter eine Glasglocke stellt. (Vgl. Fig. 48.) Die Blattzellen sterben alsbald ab.

Fig. 48. Apparat zur Untersuchung der Einwirkung des Chloroforms auf Pflanzentheile.

Das Blatt wird missfarbig, indem die zu Grunde gehenden Protoplasamassen für die Säure des Zellsaftes permeabel werden, so dass eine Zersetzung des Chlorophyllfarbstoffes erfolgen kann²⁾.

Will man untersuchen, ob bestimmte Stoffe die Entwicklung von Penicillium oder von Bacterien beeinträchtigen oder völlig aufheben, so stellt man die Culturen in derselben Weise an, wie es unter 35 und 38 angegeben ist, nur mit dem Unterschiede, dass den Nährlösungen bestimmte Mengen derjenigen Körper (z. B. Salicylsäure, Sublimat etc.) zugesetzt werden, deren Wirkung auf die Pflanzen geprüft werden soll. Controlversuche ohne Zusatz der Gifte zu den Nährlösungen sind natürlich nicht zu unterlassen.

So habe ich z. B. PASTEUR'sche Nährlösung, die Rohrzucker enthielt (vgl. über Darstellung der Lösung unter 18), einmal ohne weiteren Zusatz und in einem anderen Falle mit einem Zusatz von $0,2\%$ Salicylsäure 8 Tage lang sich selbst überlassen. Die letztere Flüssigkeit war nach Verlauf dieser Zeit noch klar; in der ersteren hatte sich eine bedeutende Bacterienvegetation entwickelt, und sie erschien daher sehr trübe. Um die Wirkung von Giften auf Spirogyra oder auf andere Algen festzustellen, bringt man die Fäden derselben einfach in die betreffenden Lösungen, z. B. in solche von Kupfersalzen, Oxalsäure etc.³⁾. Sind die Lösungen nicht gar zu concentrirt, so dass die Giftwirkung langsam eintritt, dann erfolgt meist zunächst ein Einschrumpfen des Kerns und Verquellung der Chlorophyllkörper.

1) Vgl. DETMER, Wollny's Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik, Bd. 5, S. 253.

2) Vgl. DETMER, Botan. Zeitung, 1886, Nr. 30.

3) Vgl. LOEW, Flora, 1892, Heft 3, S. 374 und 386.

III. Elementare Molekularvorgänge in den Pflanzen.

56. Der Imbibitionsprocess.

Wir stellen einen zarten Querschnitt aus dem Stengel einer jungen *Laminaria* her. Bei mikroskopischer Untersuchung des in Alkohol liegenden Objects ist wenig von den Structurverhältnissen zu sehen. Dieselben treten aber auf Wasserzusatz deutlich hervor. Wir unterscheiden die Aussenrinde, deren Zellen braune Membranen besitzen, die sog. Innenrinde, welche die Hauptmasse des Gewebes bildet, und deren Zellmembranen farblos sind. In der Mitte des Querschnitts sehen wir das aus schlauchförmigen Zellen bestehende Markgewebe. Wenn man zu den in Alkohol liegenden *Laminariastücken* Wasser treten lässt, so kann man durch mikroskopische Beobachtung feststellen, dass das Beobachtungsmaterial im Moment der Wasseraufnahme eine bedeutende Volumenzunahme erfährt. Ebenso kann man sich von dieser letzteren überzeugen, wenn man einerseits die Dimensionsverhältnisse trockner, andererseits diejenigen der nämlichen mit Wasser durchtränkten Stücke von *Laminariastielen* durch Messung mit dem Millimetermaassstab ermittelt. Die *Laminariasubstanz* ist also quellungsfähig, und der Vorgang, durch den die Quellung zu Stande kommt, wird als Imbibition bezeichnet. Die Volumenzunahme, resp. Quellung der sich mit Wasser in Contact befindenden *Laminariastücke* geht aber nicht bis ins Unendliche weiter, sondern sie ist eine begrenzte, und dieser Umstand ist von besonderer Wichtigkeit, denn derselbe lehrt, dass ein *Laminariastück*, dem sich die organisirten pflanzlichen Gebilde überhaupt ähnlich verhalten, in Contact mit Wasser von gewöhnlicher Temperatur ganz andere Erscheinungen zeigt, wie z. B. Gummi.

Wird ein Stück *Laminarialaub*, dessen Gewicht im trockenen Zustande bekannt ist, in Wasser gelegt und nach Verlauf bestimmter Zeitintervalle (z. B. alle 8 Minuten) aus der Flüssigkeit herausgenommen, mit Fliesspapier abgetrocknet und gewogen, so ergibt sich, dass die Wasseraufnahme seitens des Pflanzentheils in der Zeiteinheit zunächst eine rapide ist, allmählich eine Verlangsamung erfährt und schliesslich aufhört. Hängt man das mit Wasser imbibirte Stück *Laminarialaub* mittelst eines Platindrahts an der freien Luft auf und bestimmt ab und zu (vielleicht alle halbe Stunde) das Gewicht des Untersuchungsobjects, so findet man, dass in der Zeiteinheit zunächst viel, später immer weniger Wasser verdunstet.

Einige geschälte Erbsensamen werden in Wasser von etwa 5° C. gelegt. Ferner legt man geschälte Erbsensamen, die möglichst genau dasselbe Gewicht wie die ersteren besitzen, in Wasser von etwa 20° C. Nach Verlauf von 4 Stunden werden die abgetrockneten Samen wieder gewogen. Es ergibt sich, dass die Samen bei der höheren Temperatur mehr Wasser als bei niedriger Temperatur aufgenommen haben; höhere Temperatur beschleunigt also den Verlauf der Quellung. Wenn man gleiche Mengen geschälter Erbsen einerseits in Wasser, andererseits in eine 10- oder 20-proc. Kochsalzlösung legt, so lässt sich leicht durch nach Verlauf von einigen Stunden vorgenommene Wägungen feststellen,

dass die Quellung in Salzlösungen nicht so schnell wie in reinem Wasser vor sich geht.

Will man Untersuchungen über die Volumenzunahme anstellen, welche Samen oder Holzwürfel von verschiedenen Pflanzen bei der Quellung erfahren, so bringt man die Untersuchungsobjecte zunächst im trockenen Zustande in einen schmalen Glascylinder, dessen Volumen bis zu einer am oberen Theile befindlichen Marke genau bekannt ist. Man lässt nun verdünnten Alkohol aus einer Bürette bis zur Marke in den Cylinder einfließen und kann unter Berücksichtigung der Menge der erforderlichen Flüssigkeit dann leicht das Volumen der Pflanzentheile berechnen. Bei der Volumenbestimmung der gequollenen Samen oder Hölzer benutzt man nicht verdünnten Alkohol, sondern Wasser. Bei vergleichenden Untersuchungen über die Gewichts- und Volumenzunahme, welche Pflanzentheile bei der Quellung erfahren, wird man oft, zumal bei Experimenten mit Hölzern, constatiren können, dass die factische Volumenzunahme der Untersuchungsobjecte keineswegs dem Volumen der aufgenommenen Wassermenge entspricht. Diese Thatsache ist auch durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass die Volumenzunahme quellenden Holzes nur durch die Imbibition der festen Holzsubstanz mit Wasser zu Stande kommt, während die Füllung der Lumina der Holzelemente mit Flüssigkeit keine Volumenzunahme des Untersuchungsmaterials zur Folge haben kann. Die Experimente, bei denen man gleichzeitig die Gewichts- und Volumenzunahme ein und desselben Holzstücks bei der Quellung feststellt, sind insofern besonders lehrreich, als sie keinen Zweifel darüber bestehen lassen, dass die Imbibition keineswegs mit der Capillarität verglichen werden kann. Wenn Flüssigkeiten in Capillaren übergehen, so dringen sie immer in präformirte Hohlräume ein; die Capillarität ruft also keine Volumenzunahme der Flüssigkeit aufnehmenden Massen hervor. Beim Zustandekommen der Imbibition dringen die Flüssigkeitsmoleküle zwischen die Micellen der quellenden Körper ein; sie schaffen sich dabei selbst erst Raum zwischen den Micellen, und dadurch wird eben die Volumenzunahme quellender Substanzen herbeigeführt.

Quellendes Holz dehnt sich in der Richtung des Radius und des Umfanges weit stärker aus als in der Richtung der Axe. Wenn man die Dimensionsverhältnisse ziemlich grosser walzenförmiger Holzstücke einerseits im trockenen, andererseits im gequollenen Zustande mit Hülfe eines Millimetermaassstabes feststellt, so kann man diese Thatsache leicht constatiren. Man benutze zu diesen Versuchen etwa 100 mm lange und 80 mm Durchmesser besitzende Holzstücke.

Sehr energische Quellungserscheinungen, die schliesslich mit der Zerstörung der Molekularstructur endigen, kann man z. B. an Stärkekörnern durch höhere Temperatur, Säuren, sowie Alkalien hervorrufen. Wird Kartoffelstärke auf dem Objectträger unter Ersatz des verdunstenden Wassers vorsichtig über einer Spiritus- oder Gasflamme erhitzt, so tritt eine sehr bedeutende Volumenzunahme der Körner ein, und, bei etwa 70° C. sind sie zu glashellen Massen, deren Begrenzung schwer zu erkennen ist, verquollen.

Lässt man zu Kartoffelstärke, die auf dem Objectträger in Wasser liegt, vom Deckglasrande aus Kalilauge oder Schwefelsäure treten, und sorgt man dafür, dass die Reagentien ihren Einfluss sehr allmählich auf das Untersuchungsobject geltend machen, so sieht man die Schichtung der Körner bei beginnender Einwirkung deutlicher hervortreten, dann aber schwinden die Schichtungserscheinungen, die Körner erfahren eine

bedeutende Volumenzunahme und verquellen endlich zu glashellen Massen. Dringen Wassertheilchen in imbibitionsfähige Körper ein, so muss nothwendiger Weise in Folge der energischen Anziehungskraft, welche von Seiten der Micellen auf die Flüssigkeit ausgeübt wird, eine Verdichtung derselben eintreten. Wenn aber solche Verdichtungsprocesse zu Stande kommen, so wird dabei Wärme frei, und in der That lässt sich zeigen, dass der Vorgang der Imbibition mit Wärmebildung verbunden ist. Ich habe 100 g Kartoffelstärke oder 100 g Erbsenmehl von bekannter Temperatur in Glascylindern mit relativ wenig Wasser von genau der nämlichen Temperatur vermischt. Am besten ist es, das Wasser aus einer Bürette zu der Stärke treten zu lassen. Die Temperatur der Gemische stieg sofort um etwa $1,5^{\circ}\text{C}$. Die Temperatursteigerung betrug aber, wie ich fand, 5°C ., wenn die Kartoffelstärke, nachdem sie zuvor durch Erwärmen ausgetrocknet worden war und sich wieder abgekühlt hatte, mit wenig Wasser vermischt wurde.

Bei dem Vorgange der Imbibition wird aber auch Arbeit geleistet, und zwar innere (welche die Micellen von einander entfernt), sowie äussere (durch welche äussere Widerstände, die sich der Volumenzunahme des quellenden Körpers entgegenstellen, überwunden werden können). Um in der Vorlesung über Pflanzenphysiologie zu demonstrieren, dass bei der Quellung äussere Arbeit geleistet wird, benutze ich den in Fig. 49 dargestellten Apparat ¹⁾. Auf der einen Seite des Holzgestelles

ist mittelst einer Schraube ein mit Holzfuß versehener Glascylinder *g*, der eine Höhe von 10 cm und einen

Durchmesser von 35 mm besitzt, befestigt, welcher zur Aufnahme der quellenden Samen und des zur Quel-

lung nöthigen Wassers dient. Für wasserdichten Verschluss

am unteren Ende ist durch Verkittung des Bodens mit Siegelack gesorgt. In dem Glascylinder bewegt sich ein aus Metall gearbeiteter Stempel, dessen 16 cm lange Axe *a* vertical gerichtet ist und an ihrem unteren Ende eine kreisrunde Scheibe *S* trägt, welche sich in der Röhre bequem hin- und herschieben lässt und der Samenschicht unmittelbar aufliegt. An ihrem oberen Ende trägt die Axe eine Messingscheibe *s'*, die zum Tragen der zur Druckleistung dienenden Gewichte bestimmt ist. Zum Verschluss des Cylinders dient die Metallkapsel *k*, durch

Fig. 49. Apparat zur Messung der äusseren Arbeit, welche quellende Samen leisten können.

1) Literatur: SACHS, Handbuch d. Experimentalphysiologie d. Pflanzen, 1865, S. 431; DETMER, Vergl. Physiologie d. Keimungsprocesses d. Samen, 1880, S. 78 und 290; REINKE in den v. HANSTEIN herausgegebenen botanischen Abhandlungen, Bd. 4, Heft 1; SCHLEICHTER, Naturwissenschl. Wochenschrift, Bd. 7.

deren Mitte die verticale Axe a geführt ist, so dass sich die Kapsel frei um dieselbe drehen lässt. Zwischen der Kapsel k und der Scheibe s' ist an dem verticalen Metallstab der horizontale Zeigerhebel z befestigt, welcher mittelst einer Schraube in verschiedener Höhe an der Axe eingestellt werden kann und bei u seinen Unterstützungspunkt hat. Der kurze Arm dieses Zeigerhebels hat eine Länge von 2 cm, der lange Arm eine solche von ca. 33 cm. Der Zeiger reicht bis zu dem rechts auf dem Gestell angebrachten Kreisabschnitt sk , welchem eine Centimeterscala aufgetragen ist. Jede Aufwärtsbewegung des Stempels in Folge des Druckes quellender Samen bewirkt eine Abwärtsbewegung des Hebels an der Scala und ermöglicht in entsprechend vergrössertem Maassstabe die Feststellung der Bewegung des Stempels in Folge der Quellung. Als der beschriebene Apparat z. B. mit 10 g kleiner Erbsen beschickt worden war, vermochten diese beim Quellen noch einen Widerstand von 1000 g zu überwinden.

57. Die Diffusion und die Endosmose.

Wenn gelöste Stoffe an irgend einer Stelle im Protoplasma oder im Zellsafte einer Zelle auftreten, so können sie sich von hier aus über das gesammte Protoplasma oder über den gesammten Zellsaft verbreiten. Bei diesem Vorgange spielen die bekannten Diffusionsprocesse eine wichtige Rolle, aber es ist sicher lehrreich, sich davon zu überzeugen, dass die Geschwindigkeit der Diffusion keineswegs immer eine so erhebliche ist, wie man häufig anzunehmen pflegt. Man stellt einen hohen, mit Wasser angefüllten Glascylinder auf einem zitterfreien Tische auf, wirft ein Stück doppelt-chromsauren Kalis in das Wasser und bedeckt die Mündung des Cylinders mit einer Glasplatte. Das doppelt-chromsaure Kali löst sich auf, aber selbst nach mehreren Tagen sind die oberen Flüssigkeitsschichten nur schwach gelb gefärbt, während die unteren die charakteristische Farbe einer concentrirten Lösung des benutzten Salzes erkennen lassen. Bei der Ausführung unseres Experimentes sind keineswegs alle Bedingungen, welche Veranlassung zur Entstehung von Strömungen in der Flüssigkeit geben können, ausgeschlossen; um so deutlicher tritt die Thatsache hervor, dass die Verbreitung gelöster Stoffe durch Diffusion nicht mit besonderer Geschwindigkeit vor sich geht.

Unter Berücksichtigung dieses Verhältnisses gewinnen solche Momente an Gewicht, durch welche die Ausbreitung gelöster Stoffe im Protoplasma und im Zellsaft eine Beschleunigung erfahren kann, und es müssen in manchen Fällen die Protoplasmaströmungen sowie die Bewegungen, denen die Pflanzentheile durch den Einfluss des Windes ausgesetzt sind, als solche Umstände angesehen werden.

Abgesehen von der Diffusion spielen bei der Stoffbewegung in der Pflanze in erster Linie osmotische Vorgänge eine sehr wichtige Rolle, und wir wollen ihnen daher unsere Aufmerksamkeit zuwenden.

Ein etwa 8 cm langes und 3 cm weites Glasrohr wird an seinem einen Ende mit einem Stück Schweinsblase verschlossen. Ein durchaus dichter Verschluss kann leicht erreicht werden, wenn man die Membran im feuchten Zustande über das Ende des Glasrohres bringt und sie mittelst eines Bindfadens oder besser noch mittelst einer Gummischnur festbindet. Das Glasrohr wird nun mit fast con-

centrirter Rohrzuckerlösung völlig angefüllt und sein oberes Ende mit Hülfe eines durchbohrten Kautschukkorkes verschlossen, in dessen Bohrung ein langes Glasrohr (Steigrohr) eingeführt worden ist. Markirt man den Stand der Rohrzuckerlösung in dem Steigrohr und taucht man den unteren Theil des Apparates in destillirtes Wasser ein, so findet man, dass die Flüssigkeit im Steigrohre alsbald im Steigen begriffen ist. Das Wasser tritt auf osmotischem Wege durch die Schweinsblase in die Zuckerlösung über, und wenngleich auch eine gewisse Menge dieser letzteren umgekehrt in das Wasser übergeht, so ist doch die in den Apparat einströmende Flüssigkeitsquantität grösser als die ausströmende; dadurch muss eine Volumenzunahme der Flüssigkeit im Apparat erfolgen. Wird unsere Vorrichtung mit ihrem unteren Ende bestimmte Zeit lang (1—2 Stunden) abwechselnd in Wasser von gewöhnlicher Zimmertemperatur und in warmes Wasser (z. B. solches von 30° C.) eingetaucht, so kann man durch Feststellung der Erhebung der Flüssigkeit im Steigrohr unter den verschiedenen Bedingungen leicht constatiren, dass die osmotischen Prozesse bei höherer Temperatur schneller als bei niedriger vor sich gehen. Eine Verlangsamung der osmotischen Prozesse macht sich aber geltend, wie ohne Schwierigkeit zu ermitteln ist, wenn der untere Theil unseres Apparates sich nicht mit reinem Wasser, sondern z. B. mit einer 20-proc. Kochsalzlösung in Berührung befindet ¹⁾.

Für die richtige Beurtheilung zahlreicher physiologischer Erscheinungen, zumal solcher, welche durch den Turgor bedingt werden, ist es von grosser Bedeutung, sich davon zu überzeugen, dass durch osmotische Prozesse bedeutende Druckwirkungen erzielt werden können. Man construirt sich z. B. den in Fig. 50 abgebildeten Apparat. Das 10 cm lange und 2 cm weite Glasrohr *G* ist an seinem unteren Ende, mit welchem es in Wasser eintaucht, mit Schweinsblase verschlossen. Durch die Bohrung des das obere Ende des Glasrohres verschliessenden Kautschukkorkes wird das t-förmige Rohr *T* eingeführt, dessen

Fig. 50. Apparat zum Nachweis der durch osmotische Prozesse erzeugten Druckwirkungen.

1) Vgl. DETMER, Beiträge zur Theorie des Wurzeldrucks, in PREYER's Sammlung physiologischer Abhandlungen, Bd. 1, H. 8, S. 29, Jena 1877.

verticaler Arm bei *a* mit einem kleinen, bei *b* zu einer Spitze ausgezogenen Glasrohr in Verbindung steht. Der horizontale Arm des *t*-förmigen Rohres wird dagegen mittelst eines dickwandigen Kautschukschlauches, den man noch mit Draht umwickelt, mit dem Manometer *M* verbunden. In diesem letzteren befindet sich Quecksilber; der übrige Theil des Apparates wird völlig mit fast concentrirter Rohrzuckerlösung angefüllt und die bei *b* befindliche Spitze des kleinen Glasrohres schliesslich zugeschmolzen. Die Rohrzuckerlösung zieht bedeutende Wassermengen auf osmotischem Wege an. Dadurch entsteht ein Druck im Apparat, der das Quecksilber im Manometer zum Steigen bringt, und ich fand z. B., dass bei einem Experiment nach Verlauf von drei Tagen das Quecksilber in dem einen Schenkel des Manometers 47 cm höher als im anderen stand. Der Druck im Apparat betrug also erheblich mehr als eine halbe Atmosphäre¹⁾.

58. Die diosmotischen Eigenschaften der Zellhaut und des Protoplasmas.

Ein ausgezeichnetes Object zur Feststellung der diosmotischen Eigenschaften der Zellhaut sowie des Hyaloplasmas bietet sich uns in den Staubfadenhaaren von *Tradescantia* dar. Man kann die Haare leicht mit Hülfe einer Pincette vom Filament abtrennen und findet bei mikroskopischer Beobachtung, dass jedes Haar aus einer Zellreihe besteht. Die Zellhaut, das Protoplasma, der Zellkern und endlich der schön violett gefärbte Zellsaft sind an jeder Zelle leicht wahrzunehmen. (Vgl. Fig. 38.)

Wir lassen nun vom Deckglasrande aus Glycerin oder auch mehr oder minder concentrirte Zucker- oder Kochsalzlösungen zu den *Tradescantia*haaren treten. Diese Flüssigkeiten entziehen dem Zellsaft Wasser, und daher contrahirt sich das Protoplasma, so dass Zwischenräume zwischen der Zellhaut und der Oberfläche des Plasmakörpers entstehen. Wir haben die Zellen aus dem turgescirenden in den plasmolytischen Zustand übergeführt. Durch unser Experiment ist aber ferner die wichtige Thatsache constatirt, dass das Hyaloplasma des lebenden Protoplasmas impermeabel für den im Zellsaft der *Tradescantia*haarzellen aufgelösten Farbstoff sein muss, da dieser nach erfolgter Plasmolyse nicht aus dem Protoplasma austritt.

Eine ganz andere Erscheinung beobachten wir, wenn wir auf Staubfadenhaare von *Tradescantia* absoluten Alkohol einwirken lassen und die Zellen dadurch tödten. Der violette Zellsaft geht nun, da das Hyaloplasma permeabel für den Farbstoff geworden ist, in das Plasma über. Dieses sowie zumal der Zellkern färben sich intensiv, und es kann sogar gefärbte Flüssigkeit aus den Zellen in deren Umgebung austreten. Sehr lehrreich ist es ferner, auf Zellen mit ungefärbtem Zellsaft, z. B. auf Epidermiszellen von *Tradescantiablättern*, Plasmolyse bedingende und Farbstoffe enthaltende Flüssigkeiten einwirken zu lassen.

Ich stellte solche Versuche z. B. in folgender Weise an. Epidermistückchen von *Tradescantiablättern* wurden durch Kochsalzlösung in angegebener Weise in den plasmolytischen Zustand versetzt und dann

1) Näheres bei PFEFFER, Osmotische Untersuchungen, 1877.

in den durch Zerquetschen ziemlich dunkel gefärbter Kirschen gewonnenen Saft gelegt. Der Farbstoff kann die Zellhaut passiren, er dringt in den Zwischenraum zwischen dieser und dem Plasma ein, aber das Plasma selbst nimmt ihn nicht auf. Werden Epidermiszellen von *Tradescantia* zunächst plasmolytisch gemacht, tödtet man die Zellen dann durch Eintauchen der Epidermisstücke in heissess Wasser und legt man sie nun in Kirschsafft, so färben sich das Plasma und der Zellkern ziemlich intensiv, weil das getödtete Protoplasma leicht permeabel für viele Stoffe ist, die es im lebeusthätigen Zustande nicht aufzunehmen vermag.

Will man den Nachweis liefern, dass das Protoplasma im normalen Zustande impermeabel, nach dem Absterben aber permeabel für Zucker ist, so werden einerseits sorgfältig abgespülte Stücke rother Rüben direct, andererseits aber solche Stücke nach dem Abtödtten durch heissess Wasser in destillirtes Wasser von gewöhnlicher Zimmertemperatur übertragen. Entnimmt man den Flüssigkeiten nach einigen Stunden kleine Proben, versetzt man sie mit einigen Tropfen verdünnter Salzsäure und kocht sie kurze Zeit lang, so lässt sich in derjenigen Flüssigkeit, die sich mit den getödteten Rübenstücken in Contact befunden hatte, das Vorhandensein von Zucker leicht mit Hülfe von FEHLING'scher Lösung feststellen, während die andere Flüssigkeit keinen Zucker enthält.

Um den Nachweis zu liefern, dass das normale Hyaloplasma auch häufig impermeabel für Mineralstoffe ist, stellen wir uns 2—4-proc. Lösungen von Chlornatrium oder Kalisalpeter her. In diese Lösungen bringen wir Staubfadenhaare von *Tradescantia* oder Epidermisstreifen von dem Mittelnerv der Unterseite des Blattes von *Tradescantia discolor*. Die Zellen dieses letzteren im Gewächshause zu cultivirenden Objectes enthalten gefärbten Zellsaft, und es ist dasselbe in jeder Jahreszeit zu haben. Die Lösungen dringen durch die Zellhäute in die Zellen ein, es erfolgt im Laufe von 1—2 Stunden Plasmolyse, und diese bleibt bestehen, wenn die Untersuchungsobjecte noch mehrere Stunden lang in den Salzlösungen verweilen. Diese letztere Erscheinung ist aber gerade von besonderer Wichtigkeit für uns, denn wäre das Plasma unter den bezeichneten Umständen permeabel für Kochsalz oder Salpeter, so müsste sich mit wachsender osmotischer Leistungsfähigkeit des Zellsaftes der Protoplasmakörper in den Zellen allmählich wieder ausdehnen¹⁾.

Die diosmotischen Eigenschaften des lebenden Hyaloplasmas einer- und der Zellhaut andererseits sind nach dem, was wir wissen, sehr verschiedene. Jenes ist gewöhnlich nicht permeabel für Farbstoffe, Zucker etc., während sich die Zellhaut den genannten Stoffen gegenüber ganz ähnlich wie vegetabilisches Pergament verhält. Somit gewährt es Interesse, einige Versuche anzustellen, die uns Aufschluss über die Permeabilität dieses letzteren Materials bei der Osmose geben. Als Dialysator kann man ein weites, an seinem unteren Ende mit Pergamentpapier verschlossenes Glasrohr verwenden. Ich habe dem Apparat bei meinen Experimenten der bequemerem Handhabung wegen eine etwas andere Ein-

1) Literatur: Vgl. SACHS, Experimentalphysiologie d. Pflanzen, 1865, S. 447, wo namentlich die wichtigen Arbeiten NÄGELI's besprochen sind. Ferner vergl. DE VRIES, Archives Néerlandaises, 1871, T. 6, und PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 16, S. 588; DETMER, Journal f. Landwirthschaft, 27. Jahrgang, S. 380, sowie Botan. Zeitung, 1886, Nr. 30.

richtung gegeben. Ein dickwandiges Glasrohr von 80 mm Länge und 40 mm Weite trägt an seinem unteren Ende einen Messingring, der aussen mit einer Schraubenvindung versehen ist. Der unteren Fläche dieses Ringes liegt die eine Seite der Membran aus vegetabilischem Pergament dicht an, während die andere Seite derselben sich in Berührung mit der nach oben gewandten Fläche eines zweiten, aber ziemlich dünnen Messingringes befindet. Auf den gesammten unteren Theil des Dialysators kann endlich eine mit einer kreisrunden Oeffnung von 40 mm Durchmesser versehene Messingklappe aufgeschoben werden. Die frei liegenden Messingtheile des Dialysators sind mit einem geeigneten Lack überzogen. Man stellt den Apparat nun auf kleinen Glasklötzen in einer Krystallisirschale auf, giesst destillirtes Wasser in dieselbe und die Lösung des auf sein osmotisches Verhalten zu prüfenden Stoffes in den Dialysator. Bei Experimenten mit Extracten aus rothen Rüben, Zucker- oder Salzlösungen (z. B. Lösungen von Chlornatrium, salpetersaurem Kali etc.) lässt sich leicht feststellen, dass der Farbstoff, der Zucker sowie die Mineralstoffe im Stande sind, die benutzte Membran zu passiren und in das den Dialysator umgebende Wasser überzugehen.

Weiter ist es nun aber auch mit Rücksicht auf die Thatsache, dass viele Stoffe, welche die Zellhaut zu passiren vermögen, nicht in das Plasma eindringen, von besonderem Interesse, Membranen auf künstlichem Wege herzustellen, durch welche Stoffe, die durch Pergamentpapier diosmosiren, nicht hindurchgehen. Wir bereiten uns 1-proc. Lösungen von Calciumnitrat und Dinatriumphosphat. Diese letztere gelangt in unseren mit Pergamentpapier verschlossenen Dialysator, während jene erstere als Aussenflüssigkeit dient. Es entsteht im vegetabilischen Pergament eine Niederschlagsmembran von Calciumphosphat, und wenn wir der Dinatriumphosphatlösung im Dialysator nach Verlauf einiger Stunden wenige Tropfen einer wässerigen Methylenblaulösung hinzufügen, so ergiebt sich, dass der Farbstoff nicht in die Aussenflüssigkeit übergeht. Bei meinen Experimenten erschien dieselbe z. B. nach 24 Stunden noch durchaus ungefärbt. Entfernt man die im Dialysator vorhandene gefärbte Flüssigkeit, spannt neues Pergamentpapier in den Apparat ein, ersetzt die Aussenflüssigkeit durch reines Wasser und giesst die Methylenblau enthaltende Dinatriumphosphatlösung wieder in den Dialysator ein, so findet man, dass der Farbstoff jetzt alsbald durch das vegetabilische Pergament in das Wasser übertritt. Bei meinen Versuchen war dasselbe bereits nach 2 Stunden merklich tingirt. Für Chlornatrium sind Niederschlagsmembranen von Calciumphosphat, wovon man sich ja leicht überzeugen kann, permeabel. Die angeführten Experimente haben, was besonders zu betonen ist, nur den Zweck, den Nachweis zu liefern, dass bestimmte Stoffe, die eine Membran passiren können, eine andere Membran häufig nicht zu diosmosiren vermögen. Solche Versuche sind offenbar für die Beurtheilung des Verhaltens bestimmter Stoffe der Zellhaut einer- und dem Protoplasma andererseits gegenüber von besonderem Interesse. Ob aber ein Körper, der eine künstliche Membran nicht passirt, zugleich nicht im Stande ist, in das Protoplasma einzudringen, muss immer erst durch besondere Beobachtungen ermittelt werden, und mit Bezug auf das Methylenblau ist zu bemerken, dass dasselbe in der That durch das Plasma in das Innere der Zellen übertreten kann.

Werden Exemplare von *Elodea canadensis* 24 Stunden lang mit einer 0,0008-proc. wässerigen Methylenblaulösung in Berührung belassen (man benutze 1 Liter Flüssigkeit), so ergiebt die mikroskopische Untersuchung

der Blätter, dass ihr Zellsaft tief blau gefärbt ist. Die Zellen sind nicht abgestorben, denn es ist Protoplasmaabewegung in ihnen vorhanden, und man sieht also, dass der Farbstoff die Zellhaut sowie das Plasma passiert haben muss ¹⁾).

Nach den Resultaten unserer Untersuchungen zu urtheilen, vermögen manche Stoffe (Farbstoffe, Zuckerarten, Pflanzensäuren, Mineralstoffe) die Hautschichten des Plasmas häufig nicht als solche zu diosmosiren. Damit ist aber nicht gesagt, dass das Hyaloplasma unter allen Umständen impermeabel für die genannten Körper sei. Neuere Beobachtungen verschiedener Forscher, die aber noch keineswegs zum Abschluss gelangt sind, führen vielmehr zu einer anderen Ansicht. Es scheint, dass bestimmte Stoffe, die für gewöhnlich das Plasma nicht passiren, dasselbe zu durchwandern vermögen, wenn energische Stoffaccumulationen in den Zellen stattfinden. Das Hyaloplasma verändert auch wahrscheinlich in Folge der Lebensvorgänge selbst und den Bedürfnissen der Zellen entsprechend seine diosmotischen Eigenschaften, aber es wird erst fortgesetzte energische Forschung über diese Verhältnisse Licht verbreiten können.

59. Der Turgor und die Plasmolyse.

Die im Zellsaft gelösten Substanzen (Mineralstoffe, organische Säuren, Zuckerarten etc.) befördern auf osmotischem Wege Wasser in das Innere der Zellen. Indem das Volumen des Zellsaftes dadurch mehr und mehr wächst, übt derselbe einen Druck auf das Protoplasma und die Zellhaut aus, welche ihrerseits freilich dehnbar, aber zugleich auch elastisch sind. Die Grösse der Turgorausdehnung einer Zelle ist somit abhängig von der Grösse der in ihrem Innern zur Geltung kommenden Turgorkraft einer- und der Grösse des Widerstandes der gedehnten Zellschichten (Protoplasma sowie Zellhaut) andererseits ²⁾).

Man kann Apparate construiren, welche in der That gute Dienste leisten, wenn es sich darum handelt, eine unmittelbare Vorstellung vom Wesen des Turgors zu gewinnen. Ich benutze dazu Glasröhren von 80 mm Länge und 40 mm Weite. Man verschliesst zunächst die eine Oeffnung einer solchen Röhre mit einem Stück Schweinsblase, füllt die Röhre mit einer fast concentrirten Rohrzuckerlösung völlig an und bindet auch über das obere Röhrenende ein Stück Schweinsblase. Diese sogen. künstliche Zelle taucht man nun in destillirtes Wasser unter. Die Zuckerlösung zieht auf osmotischem Wege Wasser an, so dass der Zellinhalt, dessen Volumen mehr und mehr wächst, einen immer stärker werdenden Druck auf die Membranstücke geltend macht. Diese wölben sich convex nach aussen vor, üben aber in Folge ihrer Elasticität ihrerseits auch einen Druck auf den Zellinhalt aus, so dass also in unserem Apparat eine beträchtliche Spannung (Turgorspannung) zwischen der Zuckerlösung und den Membranstücken zu Stande kommen muss. Wenn die künstliche Zelle energisch turgescirt, wird sie aus dem Wasser herausgenommen. Man durchsticht die eine ihrer Membranen mit einer feinen Nadel und wird beobachten, dass sofort ein Flüssigkeitsstrahl aus der erzeugten

1) Vgl. PFEFFER, Untersuchungen aus d. botan. Institut in Tübingen, Bd. 2, S. 223 u. 302 und Abhandlungen der mathem.-phys. Cl. der K. Sächs. Gesellschaft d. Wiss., Bd. 16.

2) Speciellere Auseinandersetzungen über das Wesen des Turgors vgl. in meinem Lehrbuch d. Pflanzenphysiologie, 1883, S. 213.

Oeffnung hervorspritzt, während die Membranen erschlaffen. In der turgescirenden Zelle muss also ein erheblicher Druck bestanden haben.

Sehr lehrreich ist ferner das folgende Experiment, welches man auch bequem in der Vorlesung ausführen kann. Ein Gläschen wird mit verdünnter Ferrocyankaliumlösung angefüllt und ein kleines Stück Kupferchlorid in die Flüssigkeit geworfen. Das Kupferchlorid umgiebt sich sofort mit einer Niederschlagsmembran von Ferrocyankupfer, und indem es Wasser von aussen anzieht, wird diese letztere gedehnt. Es entsteht auf diese Weise eine turgescirende künstliche Zelle (TRAUBE'sche Zelle), die aber schnell an Grösse zunimmt und allmählich mehrere cm Länge erreichen kann. Indem nämlich die braune Ferrocyankupfermembran gedehnt wird, treten von innen gelöste Kupferchloridmoleküle, von aussen Ferrocyankaliummoleküle in dieselbe ein. Diese Membranogene gerathen in der Membran mit einander in chemische Wechselwirkung; es resultiren Ferrocyankupfermoleküle, welche das durch Dehnung eingeleitete Wachsthum der Membran thatsächlich herbeiführen¹⁾.

Wenn man zu den Zellen der Staubfadenhaare von *Tradescantia*, zu den Epidermiszellen der Blätter dieser Pflanze oder zu Spirogyrafäden, die im Wassertropfen auf dem Objectträger liegen, vom Deckglasrande aus Glycerin oder Zuckerlösung treten lässt, so machen sich die unter 58 erwähnten Erscheinungen geltend. Die Zellen gehen aus dem turgescirenden in den plasmolytischen Zustand über. Ihr Protoplasma löst sich von der Zellwand ab und zieht sich zusammen, indem der Zellsaft sein Wasser nach aussen an die wasseranziehenden Flüssigkeiten (Glycerin, Zuckerlösung) abgibt. Durch die Plasmolyse gehen die Zellen keineswegs sofort zu Grunde, was sich schlagend aus der Thatsache ergibt, dass das Protoplasma plasmolytisch gemachter Zellen der Staubfadenhaare von *Tradescantia* noch längere Zeit impermeabel für den im Zellsaft gelösten violetten Farbstoff bleibt.

Wir müssen aber auch Versuche anstellen, um den Nachweis dafür beizubringen, dass es leicht möglich ist, aus vielen Geweben bestehende Pflanzentheile aus dem turgescirenden in den plasmolytischen Zustand überzuführen. Wir experimentiren mit jungen Blüthenschäften von *Butomus umbellatus* und *Plantago*arten, mit Blattstielen von *Tropaeolum*, mit dem etiolirten *Epicotyl* von *Phaseolus* oder mit den Hauptwurzeln dieser Pflanze (Keimpflanzen in Sägespänen gezogen). Auf die 50–100 mm langen Stengel- respect. Wurzelstücke tragen wir in Entfernungen von 40–90 mm feine Tuschemarken auf. Die Wurzeln werden vor dem Auftragen der Marken sorgsam mit feiner Leinwand abgetrocknet. Wir benutzen beste chinesische Tusche, die wir mit Wasser anreiben. Zum Auftragen der Marken dient ein Marderpinsel, der stets sorgfältig rein zu halten ist. Haben wir die Untersuchungsobjecte nach dem Auftragen der Marken einige Minuten in feuchter Luft liegen lassen, um das Adhären der Tusche zu sichern, und die Entfernung der Marken mit Hülfe eines Millimetermaassstabes festgestellt, so gelangen die Pflanzentheile in eine 10-proc. wässerige Lösung von Kochsalz oder Kalisalpeter. Sie verlieren in diesen Lösungen ihren Turgor, gehen in den plasmolytischen Zustand über, werden schlaff, und man kann nach Verlauf kürzerer oder

1) Vgl. TRAUBE in DU BOIS-REYMOND's und REICHERT's Archiv f. Anat. und Physiol., 1867, S. 87.

längerer Zeit (4—24 Stunden) leicht feststellen, dass die Entfernung der Marken eine weit geringere als bei Beginn der Experimente ist. Die Salzlösungen entziehen den Zellen, ebenso wie dies Glycerin oder Zuckerlösungen thun, Wasser. Der dadurch bedingte Turgorverlust der Zellen führt die Contraction der Gewebe herbei¹⁾.

Verlieren Pflanzentheile durch Welken Wasser, so verkürzen sie sich auch hierbei in dem Maasse, in welchem der Turgor ihrer Zellen abnimmt. Wir legen in Sägespänen erwachsene Pisumkeimpflanzen, deren Wurzeln eine Länge von etwa 50 mm erreicht haben, $\frac{1}{2}$ Stunde lang in Wasser, damit die Wurzelzellen zunächst völlig turgescen^t werden. Wir trocknen die Wurzeln nun vorsichtig mit einem Leinentuch ab und tragen eine Tuschemarke dicht hinter der Wurzelspitze, eine zweite etwa 25 mm von dieser entfernt auf die Wurzeln auf. Lässt man die Wurzeln nun 10 Minuten lang an der Luft welken, so haben sie sich, wie leicht zu constatiren ist, nicht unerheblich verkürzt. Legt man die Keimpflanzen jetzt in Wasser, so verlängern sich ihre Wurzeln wieder, und die Entfernung der Marken wird dieselbe wie bei Beginn der Experimente²⁾.

60. Die isotonischen Coëfficienten.

Die Grösse der osmotischen Leistungsfähigkeit einer Zelle ist abhängig von der Qualität und Quantität der im Zellsaft vorhandenen wasseranziehenden Substanzen. Handelt es sich darum, die Bestandtheile des Zellsaftes kennen zu lernen, so werden saftreiche Pflanzentheile (z. B. Blattstiele von *Heracleum Spondylium*, junge Rheumstengel, Blätter von *Crassulaceen* etc.) mit Hülfe einer Handpresse, am besten nachdem sie zuvor durch Erhitzen in geschlossenen Gefässen im Wasserbade getödtet worden sind, zunächst ausgepresst. Den gewonnenen Saft erhitzt man in verschlossenen Gefässen im Wasserbade bei 100° C., um sicher alles Eiweiss zum Coaguliren zu bringen, und filtrirt ihn dann³⁾. Werden 10 ccm des klaren Saftes eingedunstet, um den Rückstand vorsichtig einzüschern, so kann man in dem wässrigen Auszuge der Asche die Gegenwart von Chloriden leicht mit salpetersaurem Silberoxyd nachweisen. Die Gegenwart von Glycose ist mit Hülfe der FEHLING'schen Lösung zu constatiren. Rohrzucker lässt sich in der im dritten Abschnitt angegebenen Weise nachweisen. Als Reagens auf Oxalsäure benutzt man Chlorcalcium, und wenn man zu der chlorcalciumhaltigen Flüssigkeit, eventuell nach dem Abfiltriren des entstandenen Niederschlages, Alkohol im Ueberschuss hinzusetzt, so scheiden sich äpfelsaure Salze ab, wenn dieselben vorhanden sind.

Die saure Reaction der meisten Pflanzensäfte beweist, dass die vorhandenen Basen nicht genügen, um die Gesamtmenge der organischen Säuren zu neutralisiren. Wer quantitative Untersuchungen über die Zusammensetzung der Pflanzensäfte ausführen will, vgl. die Angaben auf S. 570 in der unten citirten werthvollen Abhandlung von H. DE VRIES.

1) Vgl. H. DE VRIES, Untersuchungen über die mechanische Ursache der Zellstreckung, Halle 1877.

2) Vgl. SACHS, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 396.

3) Das Erhitzen der Pflanzentheile und des Saftes erfolgt in Druckflaschen, die man von DESAGA in Heidelberg beziehen kann.

Es existiren manche Pflanzensäfte (z. B. derjenige aus den Blattstielen von *Heracleum Spondylium*), die sehr reich an Glycose sind, und in solchen Fällen ist diese Substanz von besonderer Wichtigkeit für die osmotische Leistungsfähigkeit des Zellsaftes, also auch für die Turgorkraft der Zellen. In anderen Fällen, z. B. in den Blättern von *Solanum tuberosum*, tritt die Menge der Glycose sehr hinter der Menge anderer Körper zurück.

Es ist nun sehr wichtig, dass die osmotische Leistungsfähigkeit gleicher Mengen der verschiedenen in den Zellsäften der Pflanzen vorhandenen Substanzen keineswegs die nämliche ist. Vielmehr ist ein Körper im Stande, das Wasser mit grosser Energie anzuziehen, während ein anderer dies nur in beschränkterem Grade vermag. H. DE VRIES hat die Zahlen ermittelt, welche uns die relative Grösse der Anziehung eines Moleküls eines Körpers in verdünnter wässriger Lösung zum Wasser angeben. Diese Zahlen bezeichnet er als die isotonischen Coëfficienten der betreffenden Substanzen. Zum Ausgangspunkt seiner gesammten Untersuchungen wählte H. DE VRIES die wasseranziehende Kraft des Kalisalpers. Der isotonische Coëfficient eines Moleküls dieser Verbindung ist, um mit ganzen Zahlen operiren zu können, = 3 gesetzt worden.

Wir lassen hier theoretische Auseinandersetzungen bei Seite, sondern stellen sofort Experimente an, um uns an der Hand der Resultate derselben über das Wesen des Gedankenganges sowie der Methode von H. DE VRIES zu orientiren. Man bereitet sich vier Lösungen von Kalisalpeter in Wasser. Die erste enthält 0,1, die zweite 0,12, die dritte 0,13, die vierte 0,15 Moleküle des Salzes, in Grm. ausgedrückt, im Liter. (Molekulargewicht des Kalisalpers $\text{KNO}_3 = 101$). Ferner stellt man sich vier Rohrzuckerlösungen in Wasser her, von denen die erste 0,15, die zweite 0,2, die dritte 0,22 und die vierte 0,25 Moleküle Rohrzucker, in Grm. ausgedrückt, im Liter enthält. (Molekulargewicht des Rohrzuckers $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} = 342$.) Je 15 ccm dieser 8 Lösungen werden in kleine Glasgefässe gebracht, und in jede Lösung gelangt noch ein kleiner, etwa 1—2 mm langer Streifen der Epidermis des Mittelnerven von der Unterseite des Blattes von *Tradescantia discolor*. Die Epidermiszellen dieses Untersuchungsobjectes, von dessen vorzüglicher Brauchbarkeit ich mich überzeuge, enthalten rothen Farbstoff in ihrem Zellsaft. Die Pflanze steht, was von besonderer Wichtigkeit ist, zu jeder Jahreszeit zur Disposition; sie ist im Warmhause zu cultiviren. Man lässt die Epidermiszellen 2 Stunden lang mit den Flüssigkeiten in den verschlossenen Gefässen bei gewöhnlicher Zimmertemperatur in Berührung und untersucht das Gewebe dann mikroskopisch. Es handelt sich darum, festzustellen, ob die Flüssigkeiten eine mehr oder minder weitgehende Plasmolyse in den Epidermiszellen hervorgebracht haben, oder ob eine Plasmolyse noch nicht eingetreten ist. Der Beginn der Plasmolyse, auf den es uns besonders ankommt, ist unter Benutzung der gefärbten Epidermis von *Tradescantia discolor* leicht zu erkennen. Er ist durch ein eben sichtbares Zurückweichen des Protoplasmas von der Membran der Zellen charakterisirt, und wir reden im Folgenden vom „Beginn“ der Plasmolyse, wenn sich das Plasma in etwa der Hälfte aller Zellen eines Objectes etwas contrahirt hat.

Man wird finden, dass die Lösungen von 0,1 Kalisalpeter und 0,15 Rohrzucker keine Plasmolyse hervorrufen, diejenigen von 0,15

Kalisalpeter und 0,25 Rohrzucker aber schon recht erhebliche plasmolytische Wirkungen veranlassen. Der Beginn der Plasmolyse tritt bei dazwischen liegenden Concentrationen ein, z. B. bei Lösungen von 0,13 Kalisalpeter und 0,22 Rohrzucker. Diese beiden Lösungen würden danach die nämliche wasseranziehende Kraft besitzen; sie rufen beide den Beginn der Plasmolyse hervor; ihre isotonische Concentration ist die gleiche. Die Werthe 0,22 und 0,13 stehen nun zu einander in dem Verhältniss von 1 zu 0,591, und wenn wir den isotonischen Coëfficienten eines Moleküls des Kalisalpeters = 3 setzen, so berechnet sich derjenige eines Moleküls Rohrzucker zu 1,77. Man sieht also, dass einem Molekül des Kalisalpeters eine grössere wasseranziehende Kraft zukommt, als einem Molekül Rohrzucker.

H. DE VRIES hat mit Hülfe seiner vergleichenden plasmolytischen Methode die isotonischen Coëfficienten einer ganzen Reihe verschiedener Körper, die im Zellsaft angetroffen werden, ermittelt. Ich gehe aber hier nicht weiter auf seine wichtigen Untersuchungsergebnisse ein; empfehle seine Arbeit aber ganz besonders zu genauem Studium ¹⁾.

61. Die Grösse der Turgorkraft.

Handelt es sich darum, die Grösse der in Pflanzentheilen thätigen Turgorkraft festzustellen, so experimentirt man zweckmässig mit Sprossstücken von 1—2 mm mittlerer Dicke und 100 mm Länge, z. B. mit Blüthenschäften von *Plantago* oder mit Stengelstücken von *Lonicera tatarica*, welches Untersuchungsobject ich benutzte, etc. etc. Man bringt in einer Entfernung von 80 mm Tuschemarken auf den Pflanzentheilen an und versetzt sie durch 24 Stunden dauernden Aufenthalt in 10-proc. Kochsalzlösung in einen völlig plasmolytischen Zustand. Die eingetretene Verkürzung kann leicht mit Hülfe eines Millimetermaassstabes ermittelt werden. Jetzt werden die Untersuchungsobjecte unter Benutzung des in Fig. 51 abgebildeten Apparates einer Dehnung unterzogen. Sie ruhen dabei in horizontaler Lage auf einem Brett *B* oder besser noch auf einer Korkplatte; ihr dünnes Ende wird mit einer kleinen Korkplatte *K* bedeckt, welcher man mit Hülfe einer Schraube eine unverrückbare Lage ertheilt, während um ihr dickeres Ende ein Faden geschlungen wird. Der Faden läuft über eine Rolle *R* und trägt eine Schale *G*, die zur Aufnahme von Gewichten bestimmt ist. Man belastet die Schale so lange, bis die Entfernung zwischen den auf den Sprossstücken vorhandenen Marken wieder dieselbe wie vor der Plasmolyse, also 80 mm, geworden ist. Was im Experiment die Dehnung durch das Gewicht leistet, das leistet in der Natur die Turgorkraft. Wir können somit durch unser Experiment die Grösse der Turgorkraft im unversehrten Pflanzentheile wenigstens

Fig. 51. Apparat zur Bestimmung der Grösse der Turgorkraft.

1) Vgl. H. DE VRIES in PRINGSHEIM's Jahrbüchern f. wissensch. Botanik, Bd. 14.

annähernd genau ermitteln. Wenn der mittlere Durchmesser eines cylindrischen Stengeltheiles 1 mm beträgt, so ist die entsprechende Querschnittfläche = 0,785 qmm, denn der Inhalt eines Kreises (J) lässt sich leicht nach der Formel $J = \frac{1}{2} r \cdot u$ berechnen, in der r der Radius, u der Umfang ($2 r \cdot 3,141$, LUDOLPH'sche Zahl) des Kreises ist. Braucht man ferner 50 g, um den plasmolytisch gemachten Spross von 1 mm Durchmesser bis auf seine ursprüngliche Länge auszu dehnen, so berechnet sich daraus die Grösse der Turgorkraft im frischen Pflanzentheile = $6\frac{1}{2}$ Atmosphären. Derartige hohe Werthe erreicht die Turgorkraft thatsächlich häufig; in einem bestimmten Falle fand ich sie für ein Stengelstück von *Lonicera tartarica* = 1,4 Atmosphären ¹⁾.

62. Der Temperaturzustand der Gewächse.

Der Temperaturzustand eines Pflanzentheiles ist von sehr zahlreichen Momenten abhängig. Es kommen als solche in Betracht: die Organisation des Pflanzentheils, seine Lage im Organismus, sein Wassergehalt, seine Eigenwärme, seine Transpirationsgrösse, sein Wärmeabsorptions-, Wärmeleitungs- und Wärmestrahlungsvermögen etc. Somit leuchtet ein, dass es in zahlreichen Fällen schwierig sein wird, die Gründe des Näheren anzugeben, welche Momente eine bestimmte, durch Beobachtung festgestellte Temperatur eines Pflanzentheiles bedingt haben. Zudem sind viele Verhältnisse, welche hier in Betracht kommen, noch nicht oder nicht eingehend genug untersucht.

Stark transpirirende Glieder einer Pflanze sind häufig etwas kälter als die sie umgebende Luft, zumal deshalb, weil bei der Wasserdampfbildung viel Wärme gebunden wird. Andererseits nehmen Gewächse, die schwach transpiriren und eine fleischige, succulente Beschaffenheit besitzen, unter dem Einfluss der directen Sonnenstrahlen oft eine relativ sehr hohe Temperatur an. Wenn man die Blätter stark besonnter Crassulaceen (*Sempervivum*, *Escheveria*) mit der Hand berührt, so fühlen sie sich ganz warm an; ihre Temperatur ist eine weit höhere als diejenige der zarteren, dünneren Blätter anderer Pflanzen, die sich in ihrer unmittelbaren Nähe entwickeln. Es ist sehr lehrreich, den Temperaturzustand succulenter Pflanzen genauer durch thermometrische Messungen festzustellen ²⁾, und ich habe solche Beobachtungen unter Benutzung einer Cactusart (*Echinopsis multiplex*) ausgeführt. Mit Hülfe eines Korkbohrers wird ein bis zur Mitte des Cactus reichendes Loch in die Pflanze gebohrt, die Bohrung mit Fliesspapier gereinigt, um ein Thermometer mit cylindrischem Quecksilberbehälter in dieselbe einzuführen. Hat man für einen dichten Verschluss der Oeffnung Sorge getragen, der z. B. leicht unter Benutzung von etwas Fliesspapier zu erzielen ist, so wird das Untersuchungsobject an einem Ort im Freien aufgestellt, an welchem es während des Tages den directen Sonnenstrahlen ausgesetzt ist. Man stellt nun am Tage und auch in der Nacht Beobachtungen über den Temperaturzustand der Versuchspflanze an und vergleicht die gewonnenen Resultate mit denjenigen, zu welchen man bei Beobachtung

1) Vgl. H. DE VRIES, Die mechanischen Ursachen der Zellstreckung, Halle 1877, S. 118.

2) Vgl. ASKENASY, Botan. Zeitung, 1875.

eines im Schatten aufgehängten Thermometers gelangt. Sichere Bestimmungen der Lufttemperatur sind übrigens gar nicht so ganz leicht auszuführen. Am besten ist es, wenn das Thermometer in einem grossen Zinkkasten aufgestellt wird, der in gehöriger Entfernung vom Erdboden vor dem nach Norden gelegenen Fenster eines Gebäudes hängt. Der Kasten muss derartig eingerichtet sein, dass er Luftcirculation gestattet. Er darf auch nicht zu dicht vor dem Gebäude angebracht werden. Man wird bei der Ausführung der Untersuchungen über die Temperaturen erstaunen, welche der Cactus in der Sonne annimmt. An einem warmen Tage besass ein Beobachtungsobject um 10 $\frac{1}{2}$ Uhr Morgens eine Temperatur von 23,0° C.; dieselbe war bis um 2 $\frac{1}{2}$ Uhr auf 40,5° C. gestiegen. Lufttemperatur zu dieser Zeit im Schatten 24,5° C. Dieselbe Pflanze hatte am Nachmittag eines anderen Tages eine Temperatur von 45,5° C. angenommen.

Will man Aufschluss über die Temperatur erhalten, welche im Innern von Baumstämmen herrscht, so bohrt man dieselben bis zur Mitte an und führt Thermometer in die Bohrungen ein. Ein luftdichter Verschluss kann ohne Mühe durch kurze Stückchen Kautschukschlauchs erzielt werden, welche man über die Thermometer gezogen hat. Die Temperaturverhältnisse im Innern der Bäume sind natürlich dicht über der Bodenoberfläche andere als in höher gelegenen Regionen, und es ist selbstverständlich ebenso nicht einerlei, ob das Untersuchungsobject im Laufe des Tages von directen Sonnenstrahlen getroffen wird, oder ob dies nicht der Fall ist. Wenn man mit nicht zu dünnen Baumstämmen, z. B. solchen von 40 cm Durchmesser, in welche die Thermometer also 20 cm weit hineinragen, operirt, so findet man im Allgemeinen, dass die Baumtemperatur am Tage niedriger, in der Nacht aber höher als die Lufttemperatur ist, und dass das tägliche Temperaturmaximum der Baumtemperatur erheblich später als das tägliche Maximum der Lufttemperatur eintritt.

Durch einen einfachen, auch in der Vorlesung über Pflanzenphysiologie leicht ausführbaren Versuch kann man die Thatsache demonstrieren, dass trockenes Holz die Wärme schneller in der zur Stammaxe parallelen als in einer dazu rechtwinkeligen Richtung leitet. Eine glattgehobelte Platte Linden-, Birken- und Eichenholzes wird mit Hülfe eines in geschmolzenes Wachs eingetauchten Pinsels mit einer dünnen Wachsschicht überzogen. Man erwärmt nun einen Draht und stemmt sein warmes Ende rechtwinkelig gegen die Holzplatte. Es entsteht eine Schmelzungszone (S Fig. 52), die eine Ellipse darstellt, deren grössere Axe parallel zur Holzfaser gerichtet ist. Man kann die Länge der grösseren und kleineren Axe der Ellipse messen, um daraus das Verhältniss der Wärmeleitungsgeschwindigkeit in der Längs- und Querrichtung des Holzes zu berechnen. Wenn man an Stelle der Holzplatte eine mit dünner Wachsschicht überzogene Glasplatte zum Experiment benutzt, so erhält man keine elliptische, sondern in Folge der gleichen Wärmeleitungsfähigkeit des Glases nach verschiedenen Richtungen hin eine kreisförmige Schmelzungszone.

Da die thermischen Zustände des Bodens einen erheblichen Einfluss

Fig. 52. Mit Wachs überzogene Holzplatte. S Schmelzungszone.

auf die Vegetation geltend machen, so ist es gewiss nicht ohne Interesse, das folgende Experiment auszuführen. Wir stellen zwei würfelförmige Zinkkästchen von 6 oder 8 cm Durchmesser auf. In den einen Kasten bringen wir lufttrockenes Bodenmaterial, den anderen füllen wir mit der gleichen Bodenmenge an, nachdem dieselbe zuvor mehr oder minder oder gar vollständig mit Wasser durchtränkt worden ist. Beide Zinkkästen setzen wir nun einige Stunden lang den directen Sonnenstrahlen aus, es ist aber zweckmässig, die Kästen in eine Holzkiste zu stellen und mit einem schlechten Wärmeleiter (z. B. Watte) zu umgeben, damit die Sonnenstrahlen fast nur von oben her auf den Boden einwirken können. Führen wir Thermometer bis zur Tiefe von 1 cm in den trockenen, sowie den feuchten Boden ein, so werden wir leicht constatiren, dass der trockene Boden sich weit mehr als der feuchte erwärmt, und ich fand z. B. bei Beobachtungen, die allerdings in etwas anderer Weise durchgeführt wurden, wie es hier angegeben worden ist, dass eine den directen Sonnenstrahlen exponirte trockene Torferde in $1\frac{1}{2}$ Stunden eine Temperatur von $34,3^{\circ}\text{C}$. an der Oberfläche angenommen hatte, während die Temperatur des nassen Bodenmaterials nur $29,5^{\circ}\text{C}$. betrug. Die geringere Temperatur des mit Wasser durchtränkten Bodens im Vergleich zum trockenen ist Folge der hohen specifischen Wärme des Wassers sowie des Umstandes, dass bei der Wasserverdunstung Wärme gebunden wird. Sehr wasserreiche Böden bezeichnet man auch wohl als kalte, eine Ausdrucksweise, die in der That nicht unzutreffend erscheint. Es ist hier nicht der Ort, die thermischen Zustände des Bodens weiter zu untersuchen ¹⁾.

63. Die elektromotorischen Wirkungen an Pflanzen.

Um elektromotorische Wirkungen an Pflanzentheilen nachzuweisen, bedürfen wir verschiedener empfindlicher Apparate, vor allem eines Elektrometers (häufig wird das LIPPMANN'sche Capillarelektrometer verwandt) oder eines Galvanometers. Ich hatte Gelegenheit, die Brauchbarkeit des letzteren Apparates für unseren Zweck mehrfach kennen zu lernen. Spiegelgalvanometer mit Fernrohr liefern in vorzüglicher Qualität die in der Uebersicht der „Bezugsquellen“ angegebenen Firmen. Der Apparat ist natürlich zitterfrei aufzustellen. Ferner bedürfen wir besonders noch eines elektrischen Schlüssels und zweier unpolarisirbarer Thontiefelelektroden. (Diese Apparate sind zu beziehen von R. ROTHE, Universitätsmechaniker in Prag.) Die Stative für diese Elektroden sind derartig gearbeitet, dass man diese letzteren in jeder beliebigen Lage leicht visiren kann (vgl. Fig. 53). Jede Elektrode besteht aus einer einige Centimeter langen Glasröhre, in deren unteres Ende gut geschlämmter Thon eingeknetet wird. Aus dem Thon ragen die etwa $\frac{1}{2}$ cm langen Enden gut ausgewaschener, weisser Baumwollenfäden hervor. Diese Fäden, die vor dem Gebrauch der Elektroden mittelst eines kräftigen Wasserstrahles ausgewaschen werden müssen und an deren Stelle man auch sehr zweckmässig kleine Pinsel benutzen kann, werden den Untersuchungsobjecten angelegt. Das Glasrohr der Elektroden füllt man mit einer Lösung von schwefelsaurem Zink an; in diese taucht ein Zinkstab ein ²⁾. Um dem Aus-

1) Specielleres vgl. bei DETMER, Lehrbuch d. Bodenkunde, 1876, S. 256.

2) Die Zinkstäbe sind, wenn erforderlich, durch Abwaschen mit Säure zu reinigen und durch Eintauchen in Quecksilber neu zu amalgamiren.

trocknen der Pinsel vorzubeugen, taucht man sie, wenn sie nicht gebraucht werden, in Wasser ein. Eine Erneuerung des Thons ist dann nur ab und an erforderlich. Ein Ankneten des Thons mit $\frac{1}{2}$ -proc. Kochsalzlösung, wie es gebräuchlich ist, erscheint für unsere Versuche nicht nothwendig; erfahrungsgemäss genügt Brunnenwasser zum Ankneten.

Wir stellen nun die Verbindung zwischen den Elektroden und dem Galvanometer her, schalten aber in die eine Drahtleitung noch einen elektrischen Schlüssel ein, um die Leitung, indem wir durch das Fernrohr sehen, durch das der Ausschlag des Spiegelgalvanometers beobachtet wird, nach Bedürfniss schliessen oder öffnen zu können. Wir bringen nun die Fäden oder Pinsel der Elektroden mit einander in Contact. Erfolgt kein Ausschlag der Nadel des Galvanometers, wenn wir die Strombahn mittelst des Schlüssels schliessen, so ist der Apparat brauchbar.

Nunmehr gehen wir zu Experimenten mit Pflanzen über. Wir legen die Pinsel an zwei nicht weit von einander entfernte Oberflächenstellen einer Sprossaxe an. In vielen Fällen, z. B. bei Versuchen mit *Aristolochia*, ist keine elektromotorische Wirkung zu constatiren, wenn man die Leitung schliesst. Eine starke Wirkung tritt aber natürlich hervor, wie hier nur beiläufig bemerkt sei, wenn man die eine Elektrode an eine Stelle des Stengelumfanges, die andere aber an einen künstlich hergestellten Stengelquerschnitt legt.

Wir experimentiren weiter mit Sprossen von *Vitis*, *Tropaeolum*, *Quercus* etc. etc., die mit ihrer Basis in Wasser eintauchen, oder mit unversehrten Keimpflanzen von *Pisum* und *Vicia*. Bei diesen letzteren legen wir die Elektroden dem Stengel und einem der Keimblätter an. Es ist bei den Keimlingen eine besonders starke elektromotorische Wirkung vorhanden. Bei Versuchen mit Blättern (wir wählen junge, möglichst benetzbare Blätter, die aber am Spross stehen bleiben) wird die eine Elektrode dem Mittelnerv nahe seiner Basis, die andere dem Mesophyll etwa in der Mitte des Blattes angelegt. Es zeigt sich, dass sich in fast allen Fällen die Blattnerven positiv gegen das Mesophyll verhalten, d. h. die positive Elektrizität strömt im ableitenden Bogen vom Nerv zum grünen Blattgewebe.

Nach KUNKEL sollen in erster Linie Wasserbewegungen als Ursache der elektromotorischen Wirkungen an ruhenden, unversehrten Pflanzentheilen anzusehen sein. Wasserbewegungen rufen ja auch QUINCKE's Diaphragmenströme hervor. Um festzustellen, dass Wasserbewegungen in der That elektromotorisch thätig sein können, stellen wir den folgenden

Fig. 53. Unpolarisirbare Elektrode.

Versuch an. Ein frischer Thoncylinder, wie man ihn zur Herstellung eines galvanischen Elementes benutzt, wird etwa bis zur Hälfte mit Wasser angefüllt. Die eine unserer Elektroden legen wir nahe dem Boden, die andere an einer Stelle über dem Wasserspiegel der Aussenwand unserer Thonzelle an. Es fliesst dann im Leitungsdraht, wie mit Hilfe des Galvanometers nachgewiesen werden kann, ein Strom von der oberen zur unteren Elektrode.

Mögen nun auch durch Wasserbewegungen und andere Vorgänge an Pflanzentheilen elektromotorische Wirkungen zu Stande kommen, so sind dieselben doch, wie HAAKE nachwies, in allererster Linie Folge ganz anderer Vorgänge, nämlich der mit der Lebensthätigkeit des Protoplasmas verbundenen Stoffwechsel- und Athmungsprocesse.

Zur Feststellung dieser interessanten Thatsache bedürfen wir noch des in Fig. 54 im Durchschnitt gezeichneten Apparates, wie er auch von HAAKE verwandt worden ist. Er besteht aus einem 20 cm langen, $3\frac{1}{2}$ cm im Lichten messenden Glasrohre, dem an einer Seite zwei je 2 cm weite und 1 cm hohe, $2\frac{1}{2}$ cm von einander entfernte Tuben angeschmolzen sind. Ueber diese werden 5 cm lange, dünnwandige Kautschukschläuche

Fig. 54. Apparat zum Gebrauch bei Untersuchungen über die elektromotorischen Wirkungen an Pflanzentheilen. Im Durchschnitt dargestellt. (Nach HAAKE.)

gezogen und, wie aus der Figur ersichtlich, an die hineingeschobenen Elektroden luftdicht angeschlossen. Die letzteren werden mit ihrem aus dem Apparat herausragenden Ende an den Stativen befestigt. Die Beweglichkeit der Elektroden ist eine hinreichende. Die beiden Enden des 20 cm langen Glasrohres sind noch mit durchbohrten Kautschukkorken zu verschliessen, in denen Glasröhren stecken. Wird nun in die feuchte Kammer ein 10—15 cm langer Erbsenkeimling gelegt, und leitet man langsam Luft, die zur Sättigung mit Wassergas ein kleines, mit nasser

Glaswolle angefülltes U-Rohr passirt hat, durch den Apparat, so erhält man nach HAAKE einen recht starken Ausschlag am Galvanometer, wenn die eine Elektrode dem Wurzelhals, die andere dem Stengel des Keimlings angelegt wird. Der Ausschlag wird aber gering, wenn man nun etwa eine viertel Stunde lang einen langsamen Wasserstoffstrom durch den Apparat gehen lässt. Das Wasserstoffgas reinigt man, indem man es eine Lösung von Kaliumpermanganat passiren lässt; zur Sättigung mit Wassergas leitet man es über feuchte Glaswolle hin. Erneuter Luftzutritt ruft wieder einen starken Galvanometeraussschlag hervor. Bei diesen Versuchen ist, um Assimilation auszuschliessen, stets für Verdunkelung des Untersuchungsobjectes zu sorgen.

Entzieht man also den Pflanzentheilen den Sauerstoff, so ruft dies eine Aenderung ihrer elektrischen Spannungsverhältnisse hervor und diese Erfahrung berechtigt eben zu dem Schluss, dass Stoffwechsel und Athmung als Ursache der elektromotorischen Wirkungen, die man an Pflanzen beobachten kann, betrachtet werden müssen. Freilich, getödtete Pflanzen (z. B. durch heissen Wasserdampf getödtete Erbsenkeimlinge) machen ebenfalls elektromotorische Wirkungen geltend; indessen erfahren diese bei Sauerstoffentziehung keine wesentliche Aenderung, und dies beweist

eben, dass sie ganz anderen Ursachen (chemischen Umsetzungen in den abgetödteten Pflanzentheilen) ihre Entstehung verdanken, wie jene, welche an der lebensthätigen Pflanze zu constatiren sind.

Sehr wichtig für die Beurtheilung unserer Beobachtungsergebnisse ist es, zu beachten, dass wir heute nur im Stande sind, das Vorhandensein von elektromotorischen Wirkungen an Pflanzen überhaupt zu constatiren. Ueber die wahre Grösse derselben erfahren wir aber nichts. Die Zellen können mit kleinen galvanischen Elementen verglichen werden, aber das Galvanometer zeigt immer nur die Differenz zwischen der Stärke der Ströme, die von den verschiedenen mit den Elektroden in Contact gebrachten Zellencomplexen ausgehen, an. Selbst wenn das Galvanometer gar keinen Strom mehr anzeigt, könnten doch noch von den Pflanzen elektromotorische Wirkungen zur Geltung gebracht werden; es könnten ja beide Stromcomponenten gleich sein ¹⁾.

IV. Die Bewegung der Gase in den Pflanzen.

64. Einiges über das Verhalten der Gase im Allgemeinen.

Es wird ein Reagensglas mit einem Pflanzensaft angefüllt, z. B. mit Rübensaft, den man durch Zerreiben entrindeter Runkelrübenstücke auf einem Reibeisen und Auspressen des in ein Tuch gebrachten Breies gewonnen und eventuell durch Filtriren geklärt hat. Ferner füllt man eine kleine Schale mit dem Rübensaft, bringt die Mündung des Reagensglases in diese Flüssigkeit und verdrängt endlich den Saft in dem Glase durch Kohlensäure. Lässt man den Apparat dann einige Zeit ruhig stehen, so zeigt sich, dass der Saft in dem Reagensglase emporsteigt. Die Kohlensäure wird von der Flüssigkeit absorbirt, und ebenso ist auch der in der unversehrten Zelle vorhandene Zellsaft im Stande, Kohlensäure, mit der er in Berührung gelangt, zu absorbiren. Das Absorptionsvermögen wässeriger Lösungen für Sauerstoff sowie Stickstoff ist ein weit geringeres als dasjenige für Kohlensäure.

Es vermögen auch lufttrockene Pflanzentheile, z. B. Samen, nicht unerhebliche Kohlensäuremengen zu absorbiren. In eine am oberen Ende zugeschmolzene Glasröhre bringt man 15 oder 20 lufttrockene Samen von *Phaseolus multiflorus* und schiebt noch ein kleines Korkstückchen oder etwas Glaswolle nach, um die Samen im oberen Röhrentheil festzuhalten. Die Röhre wird nun derartig aufgestellt, dass ihr verschlossenes Ende nach unten gerichtet ist, ein kräftiger Strom Kohlensäure eingeleitet, die Mündung der Röhre mit dem Daumen verschlossen und diese schnell unter Quecksilber gebracht. Das Quecksilber steigt allmählich in der Röhre empor, da die Samen

1) Vgl. HAAKE, Flora, 1892, und KUNKEL, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2. Bei KUNKEL vergl. auch Beobachtungen über die elektromotorischen Wirkungen ruhender und mechanisch gereizter Mimosablätter und über die sich bei der Reizung geltend machende Stromschwankung.

im Laufe mehrerer Tage einige cem Kohlensäure absorbiren, und wenn man das Volumen des Gases in dem Apparat bei Beginn und bei Abschluss des Experimentes genau feststellt (vergl. Methode unter 13), so ist es möglich, die Quantität der von den Untersuchungsobjecten gebundenen Kohlensäure exact zu bestimmen¹⁾. Nach BORODIN absorbiren gequollene Bohnensamen nicht viel mehr Kohlensäure als lufttrockene, eine Angabe, die zu weiteren Experimenten auffordert.

Nach den Untersuchungen von GRAHAM und BUNSEN verhalten sich die Geschwindigkeiten, mit welchen die Gase poröse Scheide-

Fig. 55. Apparat für Untersuchungen über die Diffusion der Gase.

wände, die keine spezifische Anziehungskraft auf eben diese Gase geltend machen, in entgegengesetzter Richtung durchziehen, umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus den spezifischen Gewichten der Gase. In der That lässt sich leicht zeigen, dass der Wasserstoff z. B. weit schneller eine poröse Scheidewand passirt als atmosphärische Luft. Ich benutzte bei meinen bezüglichen Experimenten ein 15 mm weites und etwa 40 cm langes Glasrohr, das an einem Ende mit einer trockenen Thonplatte von 5 mm Dicke verschlossen wurde. Die Thonplatte lässt sich mit Hülfe von Siegellack leicht am Röhrenende befestigen. Wird die Glasröhre jetzt mit Wasserstoffgas angefüllt und ihr offenes Ende dann schnell unter Wasser gebracht, so steigt die Flüssigkeit alsbald bis zu bedeutender Höhe im Apparat empor, weil in der Zeiteinheit eine grössere Menge Wasserstoff durch die Thonplatte in die atmosphärische Luft übergeht, als atmosphärische Luft in den Apparat eintritt. Bequemer ist es, mit dem in Fig. 55 dargestellten, ebenfalls von mir benutzten Apparat zu experimentiren. Die Thonplatte *T* verschliesst das obere Ende des Glasrohres *G*, welches mit seinem unteren Ende in Wasser eintaucht. Durch das Rohr *S* wird, während der Glashahn *H* geöffnet ist, Wasserstoff zugeleitet. Schliesst man den Hahn *H*, so steigt das Wasser allmählich im Rohr *G*

empor. Dieser Apparat kann auch bei Ausführung mancher der folgenden Versuche Verwendung finden.

Die specifisch schwere Kohlensäure passirt nach demjenigen, was wir über die Bewegung der Gase wissen, derartige poröse Scheidewände wie Thonplatten auf jeden Fall viel langsamer als atmosphärische Luft; indessen eine durchaus abweichende, geradezu entgegengesetzte Erscheinung macht sich geltend, wenn man Kohlensäure und atmo-

1) Vgl. BORODIN, Mémoires de l'acad. imp. de St. Pétersbourg, T. 28, Nr. 4.

sphärische Luft durch eine Scheidewand von einander trennt, deren Substanz eine spezifische Anziehung auf die Kohlensäure ausübt (Gasabsorption). Als ich ein Glasrohr an einem Ende mit einer dünnen Kautschukmembran verschloss (die Kautschukmembran bindet man am besten mit Gummischnur fest), die Röhre mit Kohlensäure anfüllte und ihre offene Mündung unter Quecksilber brachte, stieg dieses allmählich mehr und mehr in der Röhre empor. Freilich erhebt sich das Quecksilber nicht schnell im Apparat, und es ist daher erforderlich, denselben längere Zeit (etwa 24 Stunden) ruhig stehen zu lassen. Handelt es sich nicht um die Ausführung genauer, messender Experimente, sondern nur um Demonstrationsversuche, so ist es zweckmässig, neben der mit einer Kautschukmembran verschlossenen Glasröhre noch eine zweite aufzustellen, welche die gleichen Dimensionen wie jene erste besitzt, aber am oberen Ende zugeschmolzen ist. Der Quecksilberstand in dieser zweiten Röhre lässt erkennen, welchen Einfluss die Temperatur- sowie die Luftdruckverhältnisse während der Versuche auf die eingeschlossenen Gase ausüben. Es stellt sich nun nach längerer Zeit heraus, dass das Quecksilber in der mit der Kautschukmembran verschlossenen Röhre erheblich höher steht als in der anderen, denn in Folge des Absorptionsvermögens des Kautschuks für Kohlensäure passiert dieses Gas trotz seines hohen spezifischen Gewichts die benutzte Membran schneller, als die atmosphärische Luft dies vermag.

Als ich eine Glasröhre an einem Ende mit einem frischen Blattstück von Nerium Oleander verschloss, die Röhre mit Kohlensäure anfüllte und die offene Mündung in Quecksilber eintauchte, stieg dies ziemlich hoch in der Röhre empor. Den luftdichten Verschluss erreicht man bei diesem Experiment am besten dadurch, dass man ein durchbohrtes, als Widerlage dienendes Korkstück so weit über die Glasröhre schiebt, bis die Mündung der letzteren genau in einer Ebene mit der oberen Schnittfläche des Korkstückes liegt. Mit Hilfe von Siegellack, das man auf die untere Schnittfläche des Korkstückes bringt, befestigt man dieses an der Glasröhre. Die obere Korkfläche wird nun mit einer Mischung von 1 Thl. gelbem Wachs, 1 Thl. Olivenöl und 1 Thl. ausgelassenem Hammeltalg bestrichen, das Neriumblattstück über die Mündung des Glasrohres gelegt, so dass die spaltöffnungsfreie Oberseite des Blattes nach unten gewendet ist, und schliesslich ein völlig dichter Verschluss durch Bestreichen der Ränder des Blattstücks mit dem erwähnten Kitt hergestellt.

Zu genaueren Resultaten gelangt man unter Anwendung folgender Untersuchungsmethode. Ueber das obere gut abgeschliffene Ende einer Glasröhre von 5—6 mm Weite und 50—100 cm Länge wird ein als Widerlage dienendes, durchloches Stück Kork oder Hollundermark gezogen. Man erwärmt so viel wie möglich und trägt feinstes geschmolzenes Siegellack auf. Man legt nun das Untersuchungsobject, z. B. ein trockenes unversehrtes Blattstück von Hedera Helix, dessen Oberseite bekanntlich spaltöffnungsfrei ist, oder eine zarte Korklamelle, die eventuell unter Benutzung des Mikrotoms hergestellt ist, auf eine Korkunterlage, kehrt die erwähnte Glasröhre um und bringt sie unter nicht zu starkem Druck, während das Siegellack noch geschmolzen ist, mit dem Gewebe in Berührung. In der Regel erzielt man auf solche Weise einen völlig luftdichten Verschluss. Nach völliger Abkühlung wird die Röhre nahezu horizontal gelegt und vorsichtig gänzlich oder nur zum Theil mit Queck-

silber angefüllt, dann senkrecht aufgestellt, so dass ihr offenes Ende in Quecksilber eintaucht. Man verdrängt nun einen Theil des Quecksilbers im Glasrohr durch trockene Kohlensäure und lässt den Apparat in einem nach Norden gelegenen Raum ruhig stehen. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Vorsichtsmaassregeln, und indem man Temperatur sowie Barometerstand notirt, wird der Stand des Quecksilbers im Rohr abgelesen, und wenn man dies häufiger, z. B. jeden Tag einmal wiederholt, so gelangt man zu folgendem Resultat. Im Apparat, der mit einer trockenen Korklamelle verschlossen ist, steigt das Quecksilber sehr langsam, z. B. nur einen mm pro Tag. Gar kein Steigen erfolgt, wenn man mit trockenen Blattstücken von *Hedera Helix* experimentirt. Ein ziemlich lebhaftes Steigen des Quecksilbers macht sich geltend, wenn man auf die Gewebestücke, nachdem sie befestigt worden sind, das eine Ende eines mit dem anderen Ende in Wasser eintauchenden Fliesspapierstreifens legt, so dass sie sich mit Wasser imbibiren. Es ergiebt sich also, dass Gasdialyse, bei der ja Gasabsorption eine grosse Rolle spielt, nur in ausgiebigerem Maasse stattfinden kann, wenn die Membranen der Pflanzengewebe mit Wasser imbibirt sind. Trockene Membranen lassen keine Gase dialysiren oder sie gestatten ihnen den Durchtritt nur sehr langsam (Periderme). Die Kohlensäure passirt die Pflanzenmembranen auf dialytischem Wege schneller als Stickstoff und Sauerstoff¹⁾.

65. Das Intercellularsystem der Pflanzen.

Die Intercellularräume der Pflanzen, welche für den Gaswechsel, die Durchlüftung und die an anderer Stelle zu behandelnde Wasserdampfbildung in den Gewächsen so wichtig sind, kommen namentlich zwischen den Zellen des Parenchyms, aber auch an anderen Orten vor. Sie sind entweder schizogenen oder lysigenen Ursprungs und im letzteren Falle oft von bedeutendem Durchmesser. Im Parenchym sind die Intercellularräume gewöhnlich zwischen den abgerundeten Kanten der Zellen als dreikantige, mit einander communicirende Kanäle vorhanden. Wir unterwerfen zunächst zarte Querschnitte aus den Cotyledonen der ruhenden Samen von *Lupinus luteus* einer mikroskopischen Untersuchung. Man benutzt am besten etwas angequollene Samen zur Herstellung der Schnitte und constatirt alsbald das Vorhandensein der ziemlich engen Intercellularräume zwischen den Zellen. Die luftführenden Räume sind natürlich für den normalen Verlauf der Keimung, der mit lebhaftem Gaswechsel verbunden ist, von besonderer Wichtigkeit. Auch zwischen den Zellen der über die Erdoberfläche emporgehobenen und ergrüntten Cotyledonen von *Lupinus* lassen sich die Intercellularräume leicht auffinden.

Wir stellen ferner Querschnitte durch ein Internodium von *Zea Mays* her (vgl. Fig. 56). Es kann für unseren Zweck gerne an der Luft getrocknetes Material benutzt werden. Die Gefässbündel sind nicht im Kreise angeordnet, sondern durch das gesammte Grundgewebe vertheilt. Die Zellen des letzteren sind sehr gross, und es fallen uns sofort die

¹⁾ Literaturangaben vgl. bei DETMER, Lehrbuch d. Pflanzenphysiologie, 1883, S. 97, und bei PFEFFER, Handbuch d. Pflanzenphysiologie, Bd. 1, S. 86. Experimentelle Untersuchungen, die hier von Interesse sind, hat N. J. C. MÜLLER (vgl. PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 7) ausgeführt. Ferner WIESNER, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. zu Wien, 1889, Bd. 98, Abth. I, S. 693.

ziemlich weiten, als dreieckige Lücken zwischen den Zellen erscheinenden Intercellularräume auf. Jedes einzelne der collateralen Gefässbündel ist von einer Scheide, die aus lückenlos zusammenschliessenden, dickwandigen Sklerenchymzellen besteht, umgeben. Im Phloëtheil der Gefässbündel sind die Siebröhren sichtbar, während im Xylem mehrere grosse Gefässe sofort in die Augen fallen. Auf der inneren Seite der Gefässbündel beobachten wir aber auch einen weiten Intercellularraum. Derselbe ist lysisigen Ursprungs, während die Intercellularräume des Grundgewebes auf schizogenem Wege entstanden sind.

Werden Querschnitte aus dem Stengel von *Juncus glaucus* mikroskopisch untersucht, so zeigt sich, dass unter der stark cuticularisirten Epidermis grünes Gewebe und Gruppen von

Sklerenchymfasern mit einander abwechseln. Unter den Sklerenchymfaserbündeln sind grosse, mit Luft erfüllte Hohlräume sichtbar, und ferner erblickt man zahlreiche, in das Grundgewebe eingebettete Gefässbündel, deren Holz- und Basttheile leicht kenntlich sind. Jedes Gefässbündel ist auf seiner Aussen- sowie Innenseite mit einem Sklerenchymfaserbelag versehen. Spaltet man einen Halm von *Juncus glaucus* der Länge nach, so zeigt sich, dass die weite Höhlung in der Mitte des Untersuchungsobjectes keine continuirliche ist, sondern dass sie gekammert erscheint. Die Höhlung des Halms wird von zahlreichen Gewebeplatten, sogen. Diaphragmen, durchsetzt, welche, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, aus vielarmigen, sternförmigen Zellen bestehen.

Wird ein Querschnitt durch das Internodium eines vegetativen Sprosses von *Equisetum arvense* hergestellt, so ist schon bei schwacher Vergrösserung die eigenthümliche Anordnung des grünen Parenchyms einer- und der hypodermalen Sklerenchymfaserstränge unter der Epidermis

Fig. 56. Querschnitt durch ein Gefässbündel aus dem inneren Theile eines Internodiums des Stengels von *Zea Mays*. *a* Glied eines Ringgefässes, *sp* Schraubengefäss, *m* und *m'* unbehört getüpfelte Gefässe, *v* Siebröhre, *s* Geleitzellen, *cp* zerquetschte Cribralprimanen (Erstlinge des Basttheiles), *l* Intercellulargang, *rg* Scheide, *f* Zelle des Grundgewebes. Vergr. 180. (Nach STRASBURGER.)

andererseits leicht festzustellen (vgl. Fig. 57). Nach innen folgt grosszelliges Rindengewebe, welches weite Luftlücken, die sog. Vallecularhöhlen, umschliesst. Den Gefässbündelkreis umgiebt eine Endodermis, und jeder Fibrovasalstrang lässt einen Holz- und einen Basttheil deutlich erkennen.

Fig. 57. Querschnitt durch das Internodium eines sterilen Sprosses von *Equisetum arvense*. *m* Mark, *cl* Carinalhöhle im Gefässbündel, *e* Endodermis, *vl* Vallecularhöhle, *hp* Sklerenchymfaserstrang, *ch* grünes Gewebe, *st* Spaltöffnungsapparat. (Nach STRASBURGER.)

Im Holztheil ist ein weiter Inter-cellulargang, die Carinalhöhle, leicht zu sehen. Es ist endlich noch auf das hohle Mark und auf die relativ engen Inter-cellulargänge zwischen den Zellen des Rinden- sowie Markgewebes des Equisetumstengels zu achten.

Bei mikroskopischer Untersuchung eines zarten Querschnittes durch den Blattstiel von *Nymphaea alba* erblicken wir eine spaltöffnungsfreie Epidermis und darunter einen Collenchymring. In der peripherischen Region des Blattstiels sind die Gefässbündel in einem Kreise angeordnet; aber es sind auch noch weitere Fibrovasalstränge im Grundgewebe vertheilt. Das Grundgewebe wird ferner von zahlreichen mehr oder minder weiten Luftkanälen durchzogen. In diese letzteren ragen die

sternförmig ausgebildeten inneren Haare hinein, von denen jedes einer einzigen an den Kanal grenzenden Grundgewebezelle entspringt¹⁾.

66. Die Lenticellen.

Wir untersuchen die Zweige von *Sambucus nigra*, um uns über das Vorhandensein der Lenticellen, die eine so sehr allgemeine Verbreitung besitzen, zu unterrichten. An Querschnitten, die aus jungen Zweigen hergestellt worden sind, constatiren wir, dass unmittelbar unter der Epidermis hypodermales Collenchym vorhanden ist, das nur an einigen Stellen von dem grünen Rindenparenchym unterbrochen wird, welches an diesen Stellen eben selbst bis zur Epidermis reicht. Das innere Rindengewebe ist seiner Gesamtmasse nach aus grünen Zellen zusammengesetzt und umschliesst den Gefässbündelkreis. Bei der Untersuchung von Querschnitten älterer *Sambucus*zweige zeigt sich, dass der Pflanzentheil wesentliche Veränderungen erfahren hat. Es ist nämlich dicht unter der Epidermis ein Korkgewebe entstanden, dessen gelblich gefärbte Zellen die lebendigen Gewebe der Rinde abschliessen. Aber dieser Abschluss ist kein vollkommener, denn die *Sambucus*zweige sind mit zahlreichen Lenticellen bedeckt. Dieselben lassen sich schon mit unbewaffnetem Auge als bräunliche Flecken erkennen, und bei mikroskopischer Untersuchung von Querschnitten stellen wir fest (vgl. Fig. 58), dass die Epidermis der *Sambucus*-

1) Literatur: DE BARY, Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane etc., 1877, S. 220, und STRASBURGER, Das botanische Praktikum, 2. Aufl., Jena 1887.

zweige an denjenigen Stellen, an welchen sich Lenticellen befinden, aufgerissen ist und dass die letzteren selbst mit einer pulverigen Masse stark gebräunter Zellen (Füllzellen) angefüllt sind. Diese Füllzellen werden bekanntlich ebenso wie die Zellen des Phelloderma von dem Cambium der Lenticellen producirt. Die erwähnten Füllzellen, welche in demselben Maasse, wie sie von aussen der Desorganisation unterliegen, vom Cambium nachgebildet werden, schliessen aber nicht lückenlos zusammen, sondern es befinden sich zwischen ihnen mit Luft erfüllte Räume, die mit den Intercellularen der inneren Gewebe der Zweige communiciren. Um diese Thatsache durch ein

Fig. 58. Querschnitt durch eine Lenticelle von *Sambucus nigra*. *e* Epidermis, *ph* Phellogen oder Korkcambium, *l* Füllzellen, *pl* Cambium der Lenticelle, *pd* Phelloderma. Vergr. 90. (Nach STRASBURGER.)

physiologisches Experiment festzustellen, befestigt man eine mit Periderm und Lenticellen bedeckte Sprossachse von *Sambucus nigra* *Salix* oder *Pavia rubra* mit Hülfe einer zum Schmelzen gebrachten Mischung von 2 Thl. Wachs und 1 Thl. Colophonium in dem kürzeren Schenkel eines gebogenen Glasrohres. Die Schnittfläche am oberen Ende des Zweiges wird ferner ebenfalls gut verkittet und die Vorrichtung in einen mit Wasser angefüllten Glaszylinder gestellt. Giesst man nun Quecksilber in den längeren Schenkel des Glasrohres, so treten alsbald Gasblasen aus den Lenticellen des Untersuchungsobjectes hervor, die sich allmählich ablösen, um durch neue ersetzt zu werden. Ich habe derartige Beobachtungen im Winter an *Sambucus*-zweigen gemacht, woraus erhellt, dass die Lenticellen auch zu dieser Jahreszeit nicht verschlossen sind. Bei manchen Pflanzen werden übrigens im Winter dichter zusammenschliessende Füllzellen in den Lenticellen als im Sommer gebildet. Wenn man daher im December und ferner Anfang Juni derartige Versuche, wie sie soeben beschrieben worden sind, mit Zweigstücken von *Ampelopsis* anstellt, so ergibt sich, dass im Juni weit leichter als im December grössere Luftmengen durch die Lenticellen gepresst werden können. Die Lenticellen spielen an den mit Periderm bedeckten Zweigen eine ähnliche Rolle wie die Spaltöffnungen an jungen Pflanzentheilen. Sie sind

ebenso wie diese für die Durchlüftung der Gewebe von Bedeutung¹⁾. Man kann diese Thatsache in einfachster Weise auch so feststellen, dass man Sprossachsen genannter Pflanzen an beiden Enden verkittet und sie dann in Wasser legt. Die erwärmte Luft tritt nun in Form kleiner Blasen aus den Lenticellen hervor.

67. Die Spaltöffnungen und ihre Bedeutung beim Gaswechsel der Pflanzen.

Ein ganz günstiges Untersuchungsobject für das Studium der Spaltöffnungen ist das Blatt von *Iris florentina*. Bei mikroskopischer Untersuchung zarter Querschnitte zeigt sich (vgl. Fig. 59), dass die Schliesszellen des Spaltöffnungsapparats Chlorophyllkörner enthalten.

Fig. 59. Epidermis der Blattunterseite von *Iris florentina*. A von oben, B im Querschnitt. f Grübchen, s Spalt, c Cuticula, a Athemböhle. Vergr. 240. (Nach STRASBURGER.)

Der Spalt der Spaltöffnungen und die Athemböhle unter dem Spalt sind ebenso leicht zu erkennen. Die grubchenartige Vertiefung über den Spaltöffnungen kommt dadurch zu Stande, dass die den Schliesszellen benachbarten chlorophyllfreien Epidermiszellen über die Schliesszellen greifen, dieselben theilweise deckend.

Eine solche vertiefte Lage ist dem Spaltöffnungsapparat der Blätter von *Tradescantia virginica*, wie die Untersuchung zarter Blattquerschnitte lehrt, nicht

eigenthümlich. Dagegen ist es für die Spaltöffnungen von *Tradescantia virginica* charakteristisch, dass sie fast immer von vier Epidermiszellen, die, wie leicht zu sehen ist, schöne Zellkerne enthalten, umgeben werden. Um dies Verhältniss festzustellen, untersucht man ein Stückchen von der Unterseite des *Tradescantiablattes* abgezogener Epidermis. Die Blattoberseite ist weit spaltöffnungsärmer als die Blattunterseite (vgl. Fig. 60). Gute Objecte für das Studium des Spaltöffnungsapparats sind auch noch die Blätter von *Hyacinthus orientalis* und *Lilium candidum*.

¹⁾ Literatur: STAHL, Botan. Zeitung, 1873, und KLEBAHN, Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft, Neue Folge Bd. 10.

Wer sich mit der Untersuchung der Spaltöffnungen beschäftigt, wird alsbald die Wahrnehmung machen, dass die Anzahl der Stomata, welche auf gleichem Flächenraum bei den Blättern verschiedener Pflanzen oder auf gleichem Flächenraum der Ober- und Unterseite desselben Blattes vorhanden ist, sehr bedeutende Differenzen erkennen lässt. So z. B. beträgt nach WEISS¹⁾ die Anzahl der Spaltöffnungen auf 1 qmm Blattfläche bei:

	Oberseite	Unterseite
<i>Acer platanoides</i>	0	550
<i>Brassica oleracea</i>	219	301
<i>Helianthus annuus</i>	175	325
<i>Ficus elastica</i>	0	145
<i>Orchis latifolia</i>	20	67
<i>Nymphaea alba</i>	460	0

Die Spaltöffnungszählungen sind freilich mühsam, aber mit Hülfe einer einfachen Methode durchzuführen. Man zieht Epidermisstreifen von der Ober- und Unterseite ausgewachsener Blätter ab, bringt dieselben in einem Wassertropfen auf den Objectträger, legt ein Deckglas auf und bestimmt die Anzahl der im Gesichtsfelde des Mikroskops zu erblickenden Stomata. Aus einer Reihe solcher Beobachtungen leitet man dann die Mittelwerthe ab. Die wirkliche Grösse des Gesichtsfeldes ist leicht festzustellen, indem man den Gesichtsfeldmesser mit Hülfe eines Objectivmikrometers ermittelt,

um unter Zugrundelegung des erhaltenen Werthes die Fläche des Gesichtsfeldes zu berechnen. Es ist schliesslich nur noch erforderlich, die für die Anzahl der Spaltöffnungen gefundenen Zahlen auf die Flächeneinheit, z. B. 1 qmm, umzurechnen.

Bei der Untersuchung des Spaltöffnungsapparates der Gewächse ist es wichtig, einer Eigenthümlichkeit derselben Erwähnung zu thun, die für die Vorgänge des Gaswechsels der Pflanzen und ebenso für den später zu besprechenden Transpirationsprocess grosse Bedeutung besitzt. Der Spalte zwischen den Schliesszellen der Stomata kommt nämlich keineswegs immer die nämliche Weite zu. Man kann leicht constatiren, dass die Spalte einer Spaltöffnung unter bestimmten Umständen mehr oder minder weit geöffnet, unter anderen Verhältnissen aber geschlossen ist. Diese merkwürdigen Erscheinungen haben ihren Grund in Aenderungen des Turgorzustandes der Schliesszellen, sowie der diesen benachbarten Epidermiszellen des Spaltöffnungsapparates,

Fig. 60. Epidermis der Blattunterseite von *Tradescantia virginica*. A von oben, B Querschnitt, l Leukoplasten an den Zellkernen. Vergr. 240. (Nach STRASBURGER.)

1) Vgl. WEISS, in PRINGSHEIM's Jahrbücher f. wissenschaftl. Botanik, Bd. 4.

und wir wollen, ohne indessen auf die complicirten Details näher einzugehen, einige Experimente zur Constatirung der Hauptthatsachen anstellen ¹⁾.

Wir untersuchen zunächst einen Flächenschnitt eines am Tage abgeschnittenen Blattes von *Amaryllis formosissima* und finden die Spaltöffnungen geöffnet. Benutzen wir hingegen ein halb abgewelktes Blatt derselben Pflanze, so bemerken wir, dass die Spaltöffnungen geschlossen erscheinen. Man thut wohl, die Schnitte bei der Ausführung dieser Beobachtungen trocken zu untersuchen und ihnen erst dann Wasser hinzuzufügen, wenn man sich davon überzeugt hat, dass die Stomata der abgewelkten Blätter geschlossen sind. Der Wasserzutritt führt nun dahin, dass sich die Spaltöffnungen in wenigen Minuten weit öffnen, weil der Turgor der Schliesszellen erheblich zunimmt. Längeres Verweilen der Untersuchungsobjecte im Wasser bedingt aber einen Verschluss der Spalte, indem allmählich auch der Turgor der Epidermiszellen bedeutend wächst, und der Widerstand der Schliesszellen dadurch mehr und mehr überwunden wird.

Werden aber *Amaryllis*blättern, die gut besonnt waren, Schnitte entnommen, so gelingt es nicht, durch Wasserzufuhr einen Spaltöffnungsverschluss zu erzielen, da die Schliesszellen so reichliche Mengen osmotisch wirksamer Stoffe in Folge von Assimilation enthalten, dass sie stark genug turgesciren, um dem Turgor der benachbarten Epidermiszellen das Gleichgewicht halten zu können.

Aehnlich wie die Spaltöffnungen von *Amaryllis* verhalten sich diejenigen anderer Gewächse. Dagegen beobachten wir abweichende Verhältnisse bei solchen Pflanzen, für deren Spaltöffnungsapparat die den Schliesszellen benachbarten Epidermiszellen keine hervorragende Bedeutung besitzen. Werden Epidermisstreifen der Blätter von *Orchis* (ich experimentirte mit *O. mascula*) abgezogen und zunächst im Wassertropfen untersucht, so ergibt sich, dass die Spaltöffnungen sich niemals schliessen, sondern geöffnet bleiben. Durch Einlegen der Schnitte in einen auf dem Objectträger befindlichen Tropfen Rohrzuckerlösung lässt sich hingegen ein ziemlich schnell eintretender Verschluss der Spaltöffnungen herbeiführen. Ebenso verhalten sich z. B. auch die Spaltöffnungen von *Lilium candidum*. Reichliche Wasserzufuhr zu der Pflanze, den abgeschnittenen Blättern oder den Schnitten öffnet die Stomata. Welken der Blätter oder Wasserentziehung an den Schnitten vermindert den Turgor der Schliesszellen und ruft einen Verschluss der Spalte hervor.

Der Spaltöffnungsapparat vieler Pflanzen reagirt auch auf den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse. In der Nacht sind z. B. die Stomata von *Amaryllis formosissima* geschlossen. Directes Sonnenlicht öffnet sie weit, und wenn man zunächst hell beleuchtet gewesene *Amaryllis*exemplare plötzlich verdunkelt, so findet man die Spaltöffnungen nach einigen Stunden geschlossen. Man kann auch, wie ich es oft that, mit abgeschnittenen und mit der Basis in Wasser gestellten *Amaryllis*blättern experimentiren. Untersucht man Schnitte solcher Blätter, die mehrere Stunden hell beleuchtet waren, so findet man die

1) Literatur über die hier zu besprechenden Erscheinungen: MOHL, Botan. Zeitung, 1856, SCHWENDENER, Monatsberichte d. Berliner Akademie d. Wiss., 1881. LEITGEB (Mittheilungen d. botan. Instituts zu Graz, Bd. 1, Jena 1886, SCHAEFER, Jahrbücher f. wissenschaftl. Botanik, Bd. 19.

Stomata stets offen, bei den Dunkelblättern erscheinen dieselben dagegen geschlossen. SCHAEFER (l. c. S. 194) zeigte direct, dass der Spaltöffnungsverschluss im Dunkeln durch herabgesetzten Turgor der Schliesszellen zu Stande kommt und nicht durch erhöhten Turgor der benachbarten Epidermiszellen. Bei Untersuchungen über den Einfluss der Beleuchtungsverhältnisse auf den Spaltöffnungsapparat von *Orchis mascula* konnte ich keinen wesentlichen Unterschied in der Spaltweite dem Licht ausgesetzt gewesener sowie verdunkelt gehaltener Blätter feststellen, und auch LEITGEB hat kürzlich mit Bezug auf *Orchis* ein ähnliches Resultat erhalten (vgl. dessen citirte Abhandlung S. 160).

Zu sehr überraschenden Resultaten gelangt man ferner bei Experimenten über den Einfluss des Inductionsstroms auf den Spaltöffnungsapparat. Man zieht einen Epidermisstreifen von der Unterseite eines Blattes ab, dessen Spaltöffnungen sich weit öffnen können. Ich experimentirte mit bestem Erfolg mit Blättern von *Orchis mascula*, die am Tage abgepflückt waren und einige Zeit in Wasser verweilt hatten. Der Epidermisstreifen gelangt auf den unter 54 beschriebenen und in Fig. 45 abgebildeten Objectträger, welcher für das Studium des Einflusses der Elektricität auf Pflanzenzellen bestimmt ist. Hat man einige Spaltöffnungen unter dem Mikroskop eingestellt und lässt man den Inductionsstrom auf das Untersuchungsobject einwirken, so schliessen sich die Stomata unter dem Auge des Beobachters im Laufe kurzer Zeit ¹⁾.

Es ist sehr lehrreich, Experimente anzustellen, welche beweisen, dass die Spaltöffnungen offen und Ausführungsgänge der Intercellularen sind.

Zunächst möge der nachfolgende Versuch unter Benutzung eines unversehrten Blattes von *Primula sinensis* ausgeführt werden. Es wird dazu der in Fig. 61 dargestellte Apparat benutzt. Das mit einem doppelt durchbohrten Kautschukkork verschlossene Glas *G* füllt man halb mit Wasser an. Der eine Schenkel des rechtwinkelig gebogenen Glasrohres *R* mündet dicht unter dem Kork; der Stiel des *Primula-*

Fig. 61. Apparat zum Nachweis der Wegsamkeit der Spaltöffnungen für Luft.

1) Dieser Verschluss der Spaltöffnungen kommt zu Stande, indem der elektrische Strom die Schliesszellen tödtet. Die Stomata öffnen sich daher auch nachträglich nicht wieder, und der Inhalt der Schliesszellen zerfällt oft rasch.

blattes *P* taucht in das Wasser ein. Verdünnt man die Luft im Apparat durch Saugen mit dem Munde, so dringt neue Luft in die Spaltöffnungen des Blattes ein, und dieselbe tritt in Form eines Blasenstromes aus dem unter Wasser befindlichen Blattstielquerschnitt hervor. Experimentirt man mit anderen Blättern, so reicht häufig die durch Saugen mit dem Munde im Apparat erzielte Luftverdünnung nicht hin, um den Austritt von Luft aus dem Blattstielquerschnitt herbeizuführen. Man muss dann, um eine bedeutendere Evacuation zu erreichen, das Ende des Rohres *R* mit der Luftpumpe in Verbindung setzen.

Man kann aber auch umgekehrt zeigen, dass Luft, die in den Blattstiel eingepresst wird, sich in den Intercellularen fortbewegt und aus den Spaltöffnungen entweicht. Ich benutze auch zu zu solchen Versuchen z. B. die Blätter von *Primula sinensis*. Nimmt man den Blattstielquerschnitt in den Mund und bläst man heftig in denselben hinein, so sieht man sich grössere und kleinere Luftblasen von der Blattspreite ablösen, wenn diese unter Wasser taucht. Es tritt nicht etwa, wie man vielleicht erwartet, aus jeder Spaltöffnung ein feiner Blasenstrom hervor, sondern die ausgepresste Luft vereinigt sich zu grösseren Blasen, die sich nun stellenweise von der Blattfläche abheben. Verweilt die Spreite des *Primula*blattes einige Zeit unter Wasser, so kann man durch einfaches Blasen keine Luft mehr durch das Untersuchungsobject treiben. Die Spaltöffnungen erfahren nämlich allmählich eine Verstopfung durch capillar festgehaltenes Wasser, und sehr schnell erzielt man eine solche bei *Primula sinensis* auch auf folgende Weise. Man setzt die Lippen an den Blattstielquerschnitt und saugt die Luft aus dem Untersuchungsobject heraus, während die Spreite unter Wasser taucht. Die Stomata und die Intercellularen werden dadurch mit Wasser injicirt, und die Blattspreite erfährt in Folge dessen eine Farbenänderung; sie wird auch durchscheinender. Durch heftiges Blasen vermag man jetzt keine Luft durch das Blatt zu treiben. Um noch specieller den für die Beurtheilung der angeführten Experimente wichtigen Nachweis zu liefern, dass capillar fest-

Fig. 62. Apparat zur Bestimmung der Wegsamkeit von Capillaren für Luft.

gehaltenes Wasser im Stande ist, einem nicht unwesentlichen Druck das Gleichgewicht zu halten, stelle man den folgenden Versuch mit Hülfe des in Fig. 62 abgebildeten Apparates an. Der kürzere Schenkel eines gebogenen und einige Millimeter weiten Glasrohres wird an seinem Ende zu einer feinen Capillare ausgezogen. Man stellt das Glasrohr nun in einen mit Wasser gefüllten Glascylinder, so dass sich die capillare Oeffnung einige Centimeter unter der Wasseroberfläche befindet, und giesst Quecksilber in den langen Schenkel des Rohres, bis eine Druckhöhe von etwa 20 cm erreicht ist. Man sieht aus der Oeffnung des Glasrohres einen feinen Luftstrom hervortreten. Das Quecksilber sinkt im langen Schenkel des Glasrohres mehr und mehr herab, aber wenn nur noch eine

Druckhöhe von einigen Centimetern vorhanden ist, so erfolgt kein weiteres Sinken des Quecksilbers, und zugleich hört der Luftstrom auf. Die feine Oeffnung ist capillar mit Wasser verstopft. Dem noch vorhandenen Quecksilberdruck wird durch die capillare Anziehung des Wassers in dem ausgezogenen Theile des Glasrohres das Gleichgewicht gehalten.

Taucht man die Spreite des Blattes von *Caltha palustris* oder *Nymphaea* oder einen Theil des Blattes von *Allium Cepa* unter Wasser und bläst in den Blattstiel resp. in das offene Ende des Alliumblattes hinein, so gelingt es auch hier, auf diese einfache Weise Luft durch die Untersuchungsobjecte zu pressen. Die Oberfläche des unter Wasser tauchenden Theiles des Alliumblattes zeigt einen schönen Silberglanz, weil dieselbe mit einer Luftschicht bedeckt ist, welche eine totale Reflexion des Lichtes herbeiführt. Entfernt man an beliebigen Stellen des Blattes die adhärende Luftschicht durch Streichen mit dem Finger, so nehmen die jetzt benetzbar werdenden Stellen eine grüne Farbe an. Luft tritt jetzt nur da aus dem Blatte hervor, wenn man in das offene Ende desselben hineinbläst, wo die Epidermis noch mit dem silberglänzenden Ueberzuge versehen ist. Von den benetzten Stellen löst sich keine Luftblase los, da die Spaltöffnungen hier durch capillar festgehaltenes Wasser verstopft sind und der relativ geringe Druck nicht hinreicht, um das Wasser aus den Stomata herauszupressen.

Oft ist es auch bei Experimenten zur Feststellung der Wegsamkeit der Spaltöffnungen für Luft zweckmässig, das folgende Verfahren in Anwendung zu bringen. Man befestigt den unteren Theil eines Blattstieles, der eine unversehrte Spreite trägt, oder eines beblätterten Stengels (ich experimentirte z. B. mit dem Ende eines Camelliasprosses, der eine Knospe und ein Blatt trug) luftdicht in der Oeffnung des kürzeren Schenkels eines gebogenen Glasrohres. Den luftdichten Verschluss erzielt man je nach Umständen auf verschiedene Weise. Häufig genügt ein einfacher Verschluss mit einem durch Zusammenschmelzen gewonnenen Gemisch aus gleichen Theilen gelbem Wachs, Olivenöl und ausgelassenem Hammeltalg; in anderen Fällen nimmt man einen Kautschukschlauch zur Hülfe, oder man verschliesst die Oeffnung des Rohres zunächst mit einem durchbohrten Kork, durch dessen Bohrung der Blattstiel oder der Stengeltheil geführt worden ist, und stellt endlich den luftdichten Verschluss durch sorgfältiges Auftragen eines Kittes her. Giesst man Quecksilber in den längeren Schenkel des gebogenen Glasrohres und stellt man die Vorrichtung in einen mit Wasser angefüllten Glascylinder, so entweicht die comprimirt Luft aus den Spaltöffnungen, und es steigen kleinere und grössere Luftblasen von der Blattspreite aus im Wasser empor¹⁾.

68. Positiver und negativer Gasdruck in den Pflanzen.

Die Luft in den Intercellularen submerser Pflanzen, denen bekanntlich Spaltöffnungen gewöhnlich fehlen, steht häufig unter positivem Druck. Dieser Ueberdruck kann auf verschiedene Weise zu Stande kommen; insbesondere verdient aber mit Rücksicht auf seine Entstehung die assimilatorische Thätigkeit der grünen Pflanzentheile unter dem Einfluss des Sonnenlichts Berücksichtigung. Wenn man Zweige von *Elodea* in

1) Mit Bezug auf das hier Gesagte vgl. zumal SACHS, Handbuch der Experimentalphysiologie d. Pflanzen, 1865, S. 252.

Brunnenwasser der Einwirkung des directen Sonnenlichts aussetzt, so quillt, wie wir unter 11 specieller nachgewiesen haben, ein Blasenstrom aus dem Stengelquerschnitt hervor. Diese Sauerstoffabscheidung hört fast sofort auf, wenn man dem Lichte keinen Zutritt mehr zu den Untersuchungsobjecten gestattet. Werden unversehrte Elodea- oder Ceratophyllumindividuen oder Zweigstücke dieser Pflanzen (ich experimentirte mit Elodeazweigen), deren Schnittfläche man mit Wachs verklebt hat, unter Wasser dem Einfluss des directen Sonnenlichts ausgesetzt, so entweichen keine Gasblasen aus den Untersuchungsobjecten. Der producirte Sauerstoff sammelt sich in den Interzellularen an; er geht nicht in dem Maasse, in welchem er gebildet wird, auf dialytischem Wege in das Wasser über, so dass das Gas in den Interzellularen alsbald unter positivem Druck steht. Wenn man den Stengel der Pflanzen mit Hülfe einer Nadel verletzt, so quillt in der That sofort ein sehr lebhafter, freilich sogleich wieder schwächer werdender Blasenstrom aus der verwundeten Stelle hervor. Wenn man diesen Versuch an Pflanzen wiederholt, die einige Zeit lang im Finstern unter Wasser verweilt haben, so ruft die Verwundung die Abscheidung reichlicherer Gasmengen nicht hervor, da die in Folge der Athmung gebildete Kohlensäure die Druckverhältnisse der Interzellulargase nicht wesentlich beeinflussen kann. Sie ist leicht löslich in Wasser und kann ohne Schwierigkeiten auf dialytischem Wege aus den Pflanzen in das dieselben umgebende Medium übergehen. Will man sich noch specieller über das Interzellularsystem von *Elodea canadensis* orientiren, so gelingt dies leicht bei mikroskopischer Untersuchung von Stengelquerschnitten. Unter der wenig scharf charakterisirten Epidermis liegt das relativ mächtig entwickelte Rindengewebe, das seinerseits das axile Gefässbündel umschliesst. Die Zellen des Rindengewebes lassen kleine Interzellularräume zwischen sich; zudem ist aber in der Rinde noch ein Kreis grösserer Luftkanäle vorhanden.

Die Luft in den Interzellularen kann aber auch unter Umständen geringen negativen Druck besitzen, also verdünnter sein als die atmosphärische Luft. Das Zustandekommen dieses negativen Druckes wird durch verschiedene Umstände herbeigeführt, aber ich will hier nur einen Fall specieller hervorheben. Wenn Baumäste von directen Sonnenstrahlen getroffen werden, so wird zumal ihr Rindengewebe häufig eine höhere Temperatur als die umgebende Luft erlangen. Die Gase in den Interzellularen dehnen sich aus, und wenn Lenticellen vorhanden sind, so entweichen sie durch diese. Die Luft in den Interzellularen ist nun verdünnter als diejenige der Atmosphäre.

Sehr wichtig und für die Beurtheilung vieler Erscheinungen im Pflanzenleben von grosser Bedeutung ist die Thatsache, dass die Gase in den Elementen des Holzes, zumal zur Zeit starker Transpiration der Gewächse, unter erheblichem negativen Druck stehen. Wir kommen auf diese merkwürdige Erscheinung weiter unten eingehend zurück; zunächst wollen wir einige Verhältnisse ins Auge fassen, welche zu dem Phänomen des negativen Druckes der Holzluft in Beziehung stehen.

Zuerst ist zu bemerken, dass das Korkgewebe an sich, wenn wir von den Lenticellen absehen, selbst bei erheblichem Druck keine Gase passiren lässt¹⁾. Ich befestigte einen dünnen Korkquerschnitt, der aus

1) Vgl. WIESNER, Sitzungsberichte d. Akademie d. Wiss. zu Wien, 1879, 1. Abth., Bd. 79, Aprilheft, und ebendasselbst Bd. 98, S. 670. Vergl. ferner LIETZ-MANN, Flora, 1887, Bd. 70, und MANGIN, Extrait des Ann. de la science agronom. franç. etc., T. 1, 1888.

einem kleinen Pfropf mit Hülfe des Rasirmessers hergestellt worden war, luftdicht mittelst Siegelacks auf der Oeffnung des kürzeren Schenkels eines gebogenen Rohres von einigen mm Weite. Als in den längeren Schenkel des Glasrohres Quecksilber gegossen wurde, entwich selbst bei erheblichem Ueberdruck keine Luft durch die Korkscheibe, und der Stand des Quecksilbers im Glasrohre war auch nach einiger Zeit noch derselbe, wie bei Beginn des Experimentes. Ebenso sind alle übrigen Gewebearten, die WIESNER prüfte, nicht im Stande, unter Druck stehende Gase durchfiltriren zu lassen, wenn diese Gewebe nach aussen völlig abgeschlossen sind. In vielen Fällen ist es bei der Ausführung der Untersuchungen zweckmässig, die Gewebeschichten bei den Druckversuchen, wie folgt, in dem gebogenen Glasrohr zu befestigen. Auf das 5–6 mm weite Glasrohr wird ein zerlegbarer Metallaufsatz eingekittet, in den das Untersuchungsobject luftdicht eingepasst werden kann. Um letzteres vor dem Zerquetschen zu bewahren, liegt es zwischen durchlochten Kautschukscheiben. Die Verschraubung der Theile des Apparates muss natürlich eine durchaus luftdichte sein. Geeignete Untersuchungsobjecte bilden die Fruchthaut des Apfels, Samenschalen der Erbse und Bohne sowie Stücke lebender oder trockener Epheublätter, deren Oberseite bekanntlich spaltöffnungsfrei ist.

Weiter wollen wir hier, bevor wir zur Besprechung des negativen Druckes der Gase in den Elementen des Holzes übergehen, einige Angaben über die Wegsamkeit des Lumens der Holzgefässe sowie der Membranen der Holzelemente für Gase machen. Werden berindete Zweigstücke verschiedener Pflanzen von etwa 6 cm Länge und 8 mm Dicke mit Hülfe eines Kautschukschlauches in der Oeffnung des kürzeren Schenkels eines gebogenen Glasrohres befestigt (vergl. Fig. 63), giesst man dann Quecksilber in den längeren Schenkel des Rohres und stellt den Apparat in einen Cylinder mit Wasser, so dass der obere Querschnitt des Zweigendes sich einige cm unter dem Wasserspiegel befindet, so sieht man zahlreiche Luftblasen aus der glatten Schnittfläche hervorquellen, wodurch eben die Wegsamkeit des Lumens der Gefässe für Luft bewiesen wird. Das Quecksilber sinkt mehr und mehr im längeren Schenkel herab, während es im kürzeren steigt, bis die Niveaudifferenz des Quecksilberstandes nur noch etwa einen oder einige cm beträgt. Ist das Quecksilber zur Ruhe gekommen, so hält das von aussen in die Gefässe (selbst in die weitesten Gefässe) eingedrungene und in diesen capillar gebundene Wasser dem noch vorhandenen Quecksilberüberdruck das Gleichgewicht. Es ist auch leicht verständlich, weshalb schliesslich ein geringerer Quecksilberüberdruck bestehen bleibt, wenn man das Experiment z. B. mit Vitiszweigstücken anstellt, als wenn man Sambucus-, Prunus- oder Crataeguszweigstücke benutzt. Die Gefässe der ersteren Pflanze sind, wovon man sich leicht durch mikroskopische Untersuchung

Fig. 63. Apparat zur Bestimmung der Wegsamkeit der Gefässe des Holzes für Luft.

überzeugen kann, viel weiter als diejenigen der letzteren Gewächse, und deshalb ist auch der Widerstand des von den Gefäßen des Vitiszweiges capillar festgehaltenen Wassers geringer als derjenige, welchen das Wasser, das in die Gefäße der Sambucus-, Prunus- oder Crataegus-zweigstücke eingedrungen ist, geltend machen kann¹⁾.

Von Interesse ist es auch, sich davon zu überzeugen, dass die Länge der Gefäße, respect. Gefäßglieder der Pflanzen weitaus nicht so bedeutend ist, wie man seither gewöhnlich annahm. Aus einem etwa 5-jährigen Zweige von *Alnus glutinosa* isolirt man ein ca. 7 cm langes Mittelstück unter Wasser. An dem oberen Ende dieses Zweigstückes, d. h. demjenigen, welches dem Sprossgipfel ursprünglich zugekehrt war, bringt man mit Hülfe eines Kautschukschlauches eine 6 cm lange Glasröhre an, um dieselbe an ihrem entgegengesetzten Ende mit der Luftpumpe in Verbindung zu setzen. Das untere Ende des Zweigstückes taucht man in eine Flüssigkeit ein, die aus 3 Thl. Wasser und 1 Thl. des officinellen Liquor ferri oxychlorati²⁾ besteht. Evacuirt man nun, so dringt die braune Flüssigkeit in die geöffneten Gefäße des Untersuchungsobjectes ein. In der Glasröhre erscheint aber eine völlig wasserklare Flüssigkeit. Man setzt die Evacuation etwa $\frac{1}{4}$ Stunde lang fort und schneidet dann mittelst einer Gartenscheere am unteren Ende des Zweiges ein Stück fort. Bleibt die Flüssigkeit bei Fortsetzung des Injectionsverfahrens auch jetzt noch wasserklar, wenn sie in die Glasröhre übertritt, so wiederholt man das Abschneiden abermals, eventuell noch vielfach, bis endlich die braune Lösung in dem Rohr erscheint. Dies wird eintreten, wenn der Alnus-zweig nur noch eine Länge von ungefähr 5,5–6 cm besitzt.

Das Eisenoxychlorid ist ein durchaus colloidalen Körper, der also nicht im Stande ist, Pflanzenmembranen zu passiren. Wenn demnach das Eisenoxychlorid bei erheblicherer Länge des Zweigstückes nicht in der Glasröhre erscheint, so muss sich seiner Fortbewegung in den Gefäßen eine Membran (Querwand) in den Weg gestellt haben, und die Existenz solcher nicht perforirter Gefäßquerwände kann in der bezeichneten Weise constatirt werden. Zugleich gewährt das Injectionsverfahren ein Mittel, um die Länge der mit schräg gestellten Zwischenwandungen versehenen Gefäße zu bestimmen. Diese Länge ist offenbar gleich derjenigen, welche das Zweigstück besitzt, wenn die Eisenlösung beim Evacuiren in der Glasröhre erscheint. Wir haben es immer mit Maassen zu thun, die sich aber auf die längsten der vorhandenen Gefäße beziehen. In 3-jährigen Sprossen von *Corylus avellana* beträgt die Gefäßlänge etwa 11 cm; sehr lang sind die Gefäße in *Aristolochiazweigen*, oft 200 cm lang (6-jähriger Spross).

Wir behandeln nun ein 10 cm langes, mehrjähriges Zweigstück von *Alnus* genau in der angegebenen Weise. Wenn dasselbe nach länger dauernder Evacuation genugsam mit der Eisenlösung injicirt ist, tauchen wir das untere Ende des Untersuchungsobjectes in eine Mischung von 1 Thl. käuflichen Salmiakgeistes und 3 Thl. Wasser ein und evacuiren weiter. Durch mikroskopische Beobachtung von Längsschnitten sowie durch Vergleichung succesiver Querschnitte stellen wir fest, bis zu welcher Höhe in den Gefäßen der unter dem Einfluss der Ammoniakflüssigkeit entstandene rothbraune Niederschlag reicht. An diesen Grenzen sind auch,

1) Vgl. SACHS, Handbuch d. Experimentalphysiologie d. Pflanzen, 1865, S. 250.

2) Diese Flüssigkeit ist eine wässrige Lösung von Eisenoxychlorid.

zumal auf Tangentialschnitten, die schräg gestellten, nicht perforirten Gefässscheidewände zu sehen¹⁾).

Sehr wichtig ist nun die Thatsache, dass die Membranen der Holzelemente in hohem Grade impermeabel für Luft sind, selbst für solche, die unter erheblichem Druck steht²⁾. Diese Thatsache ist für die Theorie des negativen Druckes der Holzluft von grosser Bedeutung, ebenso für die Theorie der Wasserbewegung in der Pflanze, und sie gewinnt auch ein ganz besonderes Interesse, wenn wir sie in Verbindung mit der später zu constatirenden Thatsache bringen, dass dieselbe Holzsubstanz, welche der Luft den Durchtritt so schwer gestattet, der Wasserbewegung fast gar kein Hinderniss entgegensetzt.

Will man sich davon überzeugen, dass die Holzsubstanz in der That sehr schwer permeabel für Luft ist, so thut man am besten, aus frisch gefällten Stämmen von *Taxus baccata* oder *Abies pectinata* einige cm lange und etwa fingerdicke Holzstücke, die man den jüngsten Jahresringen entnimmt, herauszuschneiden. Diese Holzstücke werden mit Hülfe eines Kautschukschlauches in dem kürzeren Schenkel einer gebogenen Glasröhre luftdicht befestigt. Man giesst Quecksilber in den längeren Schenkel und stellt die Vorrichtung in einen mit Wasser gefüllten Glascylinder (vgl. Fig. 63). Experimentirt man mit frischen Holzstücken, oder noch besser mit solchen frischen Holzstücken, die noch einige Zeit in Wasser gelegen haben, so genügt oft der Druck von 76 cm Quecksilber nicht, um Luft durch die Untersuchungsobjecte zu pressen. Wir werden an anderer Stelle sehen, dass die Tracheiden des Holzes nicht direct mit einander communiciren. Wir werden auch sehen, dass durch die Schliessmembranen der Hoftüpfel der Tracheiden Wasser überaus leicht filtrirt werden kann, während dieselben Luft selbst unter hohem Druck nicht passiren lassen. Wenn man findet, dass mit Hülfe des erwähnten Apparates bei erheblichem oder selbst bei relativ geringem Quecksilberdruck Luft durch Zweigstücke von Coniferen gepresst werden kann — und dies Resultat erhält man wirklich zuweilen —, so deutet dies immer darauf hin, dass im Untersuchungsobject sehr lange Tracheiden (z. B. in der Markkrone) oder Intercellularen vorhanden sind, die ja auch dem Coniferenholz nach Russow nicht völlig fehlen. Als ich z. B. mit einem entrindeten Zweigstück von *Taxus baccata* von etwa 50 mm Länge und 6 mm Durchmesser experimentirte, trat bei 20 cm Quecksilberüberdruck Luft aus der oberen Schnittfläche des Zweigstückes hervor, bei 15 cm Quecksilberüberdruck entwich aber keine Luft mehr.

Auch mit Hülfe des Poroskops von CHRISTIANI kann man zeigen, dass die Tracheiden des Holzes impermeabel für Luft sind, die unter gewissem Druck steht. Der aus Glas gefertigte Apparat ist in Fig. 64 dargestellt und besteht, wie man sieht, im Wesentlichen aus zwei Manometern. Wird zwischen *a* und *b* ein entrindetes kurzes Stück eines Zweiges von *Taxus* oder *Abies* mit Hülfe von Siegellack luftdicht eingeschaltet, und bläst man nun in das Ende des Schlauches *sch* hinein, so verändert sich natürlich der Stand des Quecksilbers im Manometer *M* bedeutend, derjenige des Quecksilbers im Manometer *M'*

1) Vgl. zumal ADLER, Inaugural-Dissertation, Jena 1892, und auch STRASBURGER, Histologische Beiträge, Jena 1891, Heft 3, S. 510.

2) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2, S. 324, und M. SCHEIT, Botan. Zeitung, 1884, S. 180.

aber nicht, da keine Luft das Holz passirt. Verwendet man gefässreiches Holz dicotyler Pflanzen zum Versuch, so ruft natürlich das Einblasen von Luft sofort eine Aenderung des Quecksilberstandes in beiden Manometern hervor, indem durch die Gefässe eine offene Communication zwischen *a* und *b* hergestellt ist.

Ferner ist die durch das folgende Experiment auch in der Vorlesung zu erweisende Thatsache von Wichtigkeit, dass keine offene Communication zwischen den Gasen der cellularen Lufträume in der Pflanze und denjenigen der Intercellularräume vorhanden ist. Wir experimentiren mit 30 cm langen und 1 cm dicken, mit vielen Lenticellen besetzten Zweigstücken von *Cornus mas*, *Philadelphus* und *Syringa*. Ein Zweigstück wird in dem kürzeren Schenkel eines gebogenen Glasrohres derartig befestigt, dass es bis etwa $\frac{2}{3}$ seiner Länge in dieses hineinragt. Vorher hat man diejenige Schnittfläche, welche in das Rohr eingeführt werden soll, luftdicht mit Siegellack

Fig. 64. Poroskop.

Fig. 65.

Fig. 65. Apparat für Untersuchungen über Gasbewegung in der Pflanze. (Nach PFEFFER.)

verklebt. Man bringt die Vorrichtung nun in einen grossen, mit Wasser angefüllten Glaszylinder und giesst Quecksilber in den längeren Schenkel des Rohres. Wendet man keinen zu hohen Quecksilberdruck, etwa 20–30 cm, an, so tritt Luft auch am oberen Querschnitt der Untersuchungsobjecte nur aus der Rinde hervor, was eben beweist, dass keine offene Communication zwischen den Intercellularen einer- und den Gefässen andererseits besteht. Steigert man den Quecksilberdruck, so entweicht, zumal nach Verlauf einiger Zeit, ebenfalls Luft aus dem Holzkörper der Untersuchungsobjecte, weil unter solchen Umständen ein Einpressen von Luft in die nach neueren Untersuchungen auch im Holz nicht völlig fehlenden, freilich sehr engen Intercellularen erfolgt¹⁾.

1) Vgl. HÖHNEL in PRINGSHEIM's Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. 12, S. 72.

Uebrigens ist ja auch möglich, dass wenigstens bei manchen Pflanzen, bei hohem Druck Luft aus den Intercellularen durch die Membranen der Gefässe in kleiner Menge in diese übertritt (Gasfiltration).

Lehrreich ist es auch, die hier in Rede stehenden Erscheinungen mit dem in Fig. 65 abgebildeten Apparat zu untersuchen und Blätter von *Heracleum*, *Aegopodium* etc. oder Sprosse von verschiedenen Pflanzen (z. B. von *Prunus Padus*) als Untersuchungsobjecte zu wählen. Der Glaszylinder *g* ist mit einem Kork verschlossen, in dem der Blattstiel oder die Sprossachse des Beobachtungsobjectes luftdicht eingekittet wurde. Der Glaszylinder *f* ist ferner dem erwähnten Kork aufgepasst und enthält Wasser. Dicht unter der Wasseroberfläche liegt der Querschnitt des Blattstieles oder der Sprossachse, so dass sie unter Benutzung eines an einem geeigneten Stativ angebrachten Mikroskops bei 20- bis 40-facher Vergrösserung beobachtet werden kann. Wird nun Quecksilber in das Rohr *J* gegossen, um die in *g* vorhandene Luft, die am besten durch eine auf dem Quecksilber befindliche Wasserschicht feucht zu halten ist, zu comprimiren, so dringt die Luft in die Spaltöffnungen ein und entweicht, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, nur aus der Rinde und dem Mark am Querschnitt. Steigert man den Druck, so können auch aus den Gefässen kleine Luftquantitäten hervortreten. Ganz instructiv ist es endlich noch, das Gefäss *g* mit Kohlensäure und den Cylinder *f* mit klarem Kalkwasser anzufüllen, um nun erst die Druckversuche anzustellen. Es ergibt sich, dass die in die Spaltöffnungen eingepresste Kohlensäure, indem sie am Querschnitt hervortritt, eine Trübung des Kalkwassers hervorbringt.

Wir gehen nunmehr dazu über, uns specieller mit den Thatsachen vertraut zu machen, die über den negativen Druck der Gefässluft bekannt sind. Es ist sicher, dass die Gefässe des Holzes zu bestimmten Zeiten, wenn die Transpiration der Gewächse gering ist, also im Frühjahr und auch im Sommer zur Nachtzeit, mehr oder minder reichliche Wassermengen enthalten. Bei stärkerer Transpiration der Gewächse wird das Wasser verbraucht, und da, wie wir gesehen haben, die Holzsubstanz in einem sehr hohen Grade impermeabel für Luft ist, so wird sich ein negativer Gasdruck in den Gefässen entwickeln, d. h. die Luft in den Gefässen wird unter geringerem Druck als die atmosphärische Luft stehen. Die Grösse dieses negativen Drucks kann eine sehr verschiedene sein; es ist sogar nicht ausgeschlossen, dass der Druck der Gase in den Gefässen ein sehr unbedeutender wird. Um uns von der Thatsächlichkeit des negativen Drucks der Gefässluft zu überzeugen, stellen wir folgende Experimente an.

Wir bohren im Sommer eine Birke an, befestigen in der bis zur Stammmitte geführten Bohrung den einen Schenkel eines in einem rechten Winkel gebogenen Glasrohres luftdicht und lassen den anderen Schenkel des Rohres in Wasser eintauchen. Wir werden alsbald sehen, dass das Wasser in diesem Schenkel des Rohres emporsteigt.

Wir stellen uns einen Apparat zusammen, wie er in Fig. 66 abgebildet ist. Ein abgeschnittener Spross (ich experimentirte mit solchen von *Lonicera* und zumal mit Weidenzweigen) wird mit seiner Basis in Wasser gestellt. Wir bringen nun das gebogene Glasrohr *G* etwa bei *a* mittelst eines Kautschukschlauches in luftdichte Verbindung mit dem Spross und sorgen dafür, dass das Glasrohr mit seinem offenen Ende in Wasser oder Quecksilber eintaucht. Infolge der durch die Transpiration des Sprosses hervorgerufenen Verdünnung der Gefässluft

wird die Sperrflüssigkeit, ebenso wie bei der Ausführung des vorigen Experiments, alsbald in dem Glasrohre emporsteigen.

Zu den fernerer Versuchen verwenden wir Sprosse von *Ampelopsis*, *Vitis*, *Clematis*, *Aristolochia*, *Phaseolus*, *Helianthus*, *Quercus*, *Robinia* oder *Juglans*, die aber vor der Hand noch nicht von ihrer Mutterpflanze abgetrennt werden. Die Bohnenpflanzen können in Blumentöpfen zur Entwicklung gelangt sein. Bei Versuchen mit *Ampelopsis*, *Quercus*, *Juglans* etc. prüfen wir das Verhalten mehrjähriger Zweige. Wir biegen dieselben herab, tauchen sie an einer Stelle, die etwa 50 oder 100 cm weit von der Zweigspitze entfernt ist, in eine wässrige Lösung von Eosin und

Fig. 66. Apparat zum Nachweis des negativen Druckes der Gefäßluft.

Ampelopsis- und *Phaseolus*sprossen und liefern zumal schöne Resultate, wenn man mit in Töpfen cultivirten Bohnenpflanzen, die ziemlich welk geworden sind, arbeitet, oder wenn man die Sprosse des wilden Weins an recht heißen, trockenen Sommertagen abschneidet.

Die beobachteten Erscheinungen beweisen das Vorhandensein negativen Druckes der Gefäßluft, denn die bedeutende Erhebung der Farbstofflösung in den Pflanzentheilen kann nur dadurch zu Stande kommen, dass der Luftdruck die Flüssigkeit in die Gefäße hineinpresst. Dass die Erhebung der Eosinlösung nicht etwa nur Folge von Capillarwirkungen ist, lässt sich leicht beweisen. Schneidet man

schneidenden Zweig an dieser Stelle unter der Lösung mit einer Scheere ab. Die Schnittflächen verweilen noch 2 Minuten in der Lösung, wir spülen sie dann sorgfältig ab und untersuchen den abgeschnittenen sowie den noch mit der Mutterpflanze in Verbindung stehenden Zweigtheil. Es ergibt sich, dass die Farbstofflösung viele Centimeter weit in die Untersuchungsobjecte eingedrungen ist, wie leicht an der Färbung zu erkennen ist, welche das Holz der krautigen oder holzigen Untersuchungsobjecte angenommen hat. Die Experimente gelingen, wovon ich mich überzeuge, besonders gut mit

Sprosse der erwähnten Pflanzen in Luft ab und taucht sie dann alsbald mit ihrer Schnittfläche in Farbstofflösung, so erhebt sich diese nur wenig in den Gefässen, weil Luft in dieselben eingedrungen ist und kein negativer Luftdruck mehr in ihnen besteht. Es ist natürlich, dass sich die Farbstofflösung bei diesen letzten Versuchen bis zu einer um so geringeren Höhe capillar in den Gefässen erheben wird, je weiter dieselben sind.

Wir stellen unsere Versuche nun in etwas modificirter Weise an, indem wir unsere Zweige an einer etwa 50 cm vom Gipfel entfernten Stelle in Quecksilber eintauchen und unter demselben durchschneiden. Nach 2 Minuten nehmen wir das Zweigende aus dem Quecksilber heraus, enttrinden es und finden, dass das Quecksilber, wie sich an dem Vorhandensein vieler grauer, parallel laufender Linien schon äusserlich zu erkennen giebt, bis zu beträchtlicher Höhe durch den äusseren Luftdruck in die Gefässe des Holzes hineingepresst worden ist. Bei Robinia kann z. B. das Quecksilber im proximalen Zweigstück, d. h. dem an der Pflanze verbleibenden, in einzelnen Gefässen 50 cm hoch emporgestiegen sein. Im distalen, d. h. dem abgeschnittenen Zweigende erhebt es sich nicht so hoch. Taucht man in Luft abgeschnittene Zweige mit ihren unteren Enden einige Centimeter tief in Quecksilber ein, so erhebt sich das Metall gewöhnlich nicht in den Gefässen, weil der Quecksilberdruck meistens einen geringeren Werth als die Capillardepression des Quecksilbers besitzt.

Während es leicht ist, das Vorhandensein des negativen Druckes der Gefässluft überhaupt zu constatiren, ist die Bestimmung der wahren Grösse dieses negativen Drucks mit Schwierigkeiten verbunden¹⁾. Weitere Untersuchungen wären hier sehr erwünscht.

Recht lehrreich ist noch das folgende Experiment, welches auch bequem in der Vorlesung über Pflanzenphysiologie ausgeführt werden kann. Wir schneiden einen langen Zweig von Ampelopsis in der Luft ab, lassen die Schnittflächen einige Minuten mit der Luft in Berührung und stellen den Spross mit seiner Basis nun in Wasser. Nach 24 Stunden biegen wir eine Stelle des Sprosses, die etwa 10 cm höher als die erste Schnittfläche liegt, in Eosinlösung und schneiden sie unter der Flüssigkeit ab. Die Lösung steigt bis zu beträchtlicher Höhe in den Gefässen empor, woraus folgt, dass der negative Druck der Gefässluft sich in Sprossen, die in Luft abgeschnitten worden sind, nach Verlauf einiger Zeit unter den bezeichneten Umständen wiederherstellt, eine Erscheinung, die verschiedene Ursachen haben kann²⁾.

1) Vgl. PFEFFER, Handbuch der Pflanzenphysiologie, Bd. 1, S. 109, und v. HÖHNEL, Jahrbücher f. wissensch. Botanik, Bd. 12, S. 99. Bei vergleichenden Untersuchungen über den negativen Gasdruck hat man weit mehr, als seither geschehen, Rücksicht zu nehmen auf die Länge und Weite der Gefässe, auf etwaige Veränderungen in der Weite eines Gefässes an verschiedenen Stellen desselben, auf die capillaren Widerstände der Gefässe und andere Verhältnisse. Es würde uns viel zu weit führen, alle diese Dinge hier näher zu erörtern. Vgl. auch besonders ADLER, Dissertation, Jena 1892, S. 42.

2) Die Verhältnisse, welche sich auf den negativen Luftdruck in den Gefässen beziehen, sind zumal von HÖHNEL, Wissensch.-praktische Untersuchungen auf dem Gebiete des Pflanzenbaues, herausgegeben von HABERLANDT, Bd. 2, S. 89 u. 120, sowie von SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2, S. 168, untersucht worden.

V. Die Wasseraufnahme seitens der Pflanzen.

69. Die Wasseraufnahme seitens der Wurzeln aus dem Boden.

Die einzelnen Partikelchen des Bodens sind in mehr oder minder feuchtem Zustande desselben mit Wasserhüllen umgeben. Man kann sich vorstellen, dass diese letzteren die Bodenelemente in concentrischen Schichten umgeben, und es leuchtet ein, dass die Bodentheilchen die ihnen direct anliegenden Wassermoleküle energischer festhalten werden als die mehr peripherisch gruppirt. In der That ist dies der Fall, wie der folgende Versuch lehrt. Wir cultiviren eine Bohne in einem Blumentopfe. Die Pflanze wurzelt in guter Gartenerde, und der Topf wird, wenn die Primordialblätter der Bohne eine beträchtliche Grösse erreicht haben, in einen Raum gestellt, in welchem sie vor directem Sonnenlicht geschützt ist und nur schwach transpiriren kann. Wir führen dem Boden von jetzt ab kein Wasser mehr zu, so dass die Pflanze langsam welken muss. Wenn das Untersuchungsobject sehr welk geworden ist, entnehmen wir dem Boden an Stellen, die von vielen Wurzeln durchzogen sind, kleine Proben von einigen g Gewicht und bestimmen den Wassergehalt durch Trocknen bei 100° C. genau. Ich fand bei Versuchen, die freilich nicht mit *Phaseolus*, sondern mit *Cucurbita* angestellt wurden, dass die benutzte humose Gartenerde nach eingetretenem Welken der Pflanze noch über 15 Proc. Wasser enthielt, und man sieht also, dass ein Theil des Bodenwassers von den Erdtheilchen sehr festgehalten wird. Die Pflanzen welken unter den bezeichneten Umständen eben deshalb, weil die Wurzeln dies fest gebundene Wasser nicht schnell genug und nicht in hinreichender Menge aufnehmen können, um die Transpirationsverluste zu decken¹⁾.

Lehrreich ist es ferner, kleine Bodenmengen von einigen g Gewicht, die man dem Blumentopfe nach eingetretenem starken Welken der Versuchspflanzen entnommen hat, in einen wassergasreichen Raum, in dem aber Thaubildung ausgeschlossen ist, zu bringen und auf ihr Verhalten unter diesen Umständen zu prüfen. Man thut am besten, die gewogenen Erdproben in kleinen Schälchen nebst einem Wasser enthaltenden Gefäss und einem Psychrometer unter einen Kasten zu stellen. Die Luft im Kasten ist offenbar sehr wassergasreich, und das Quecksilber im trockenen Thermometer des Psychrometers wird daher auch nur einen wenig höheren Stand als dasjenige des feucht gehaltenen Thermometers besitzen. Trotz dieses hohen Wassergehaltes der die Bodenproben umgebenden Luft stellt sich heraus, dass dieselben kein Wasser durch Condensation binden; im Gegentheil, sie verlieren noch Wasser durch Verdunstung. Wir wissen, dass allerdings trockener Boden Wassergas zu condensiren im Stande ist, aber dieses Wassergasverdichtungsvermögen des Bodens besitzt für die Vegetation im Allgemeinen keine Bedeutung, da die meisten Gewächse, wie unsere Experimente lehren, schon zu Grunde gehen, wenn der Boden noch so viel Wasser enthält, dass sein Condensationsvermögen für Wasser-

1) Vgl. DETMER in WOLLNY's Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik, Bd. 1, und Journal f. Landwirthschaft, 27. Jahrgang. Dasselbst ist auch die Literatur angegeben und sind weitere Verhältnisse der Wasseraufnahme seitens der Wurzeln besprochen.

gas selbst unter sehr günstigen Umständen noch gar nicht zur Geltung kommen kann.

70. Die Wasseraufnahme seitens der Blätter.

Die Frage nach der Wasseraufnahme seitens der Blätter beansprucht kein hohes physiologisches Interesse; trotzdem mag dieselbe hier kurz berührt werden. Beim Eintauchen der Lamina vieler Blätter (*Brassica*, *Zea* oder *Aristolochia Siphon* etc.) in reines Wasser erscheinen die Pflanzentheile von einer silberglänzenden Schicht überzogen, die nur dort, wo grössere Blattnerven verlaufen, unterbrochen ist. Nimmt man die Blätter aus dem Wasser heraus, so überzeugt man sich, dass lediglich die Cuticula über den Blattnerven sowie eventuell vorhandene Haare eine Benetzung erfahren haben. Die Cuticula über dem Mesophyll ist in Folge ihres mehr oder minder erheblichen Wachsreichthums nicht benetzbar und daher selbst nach der Berührung mit dem Wasser trocken. Der erwähnte Silberglanz rührt von einer Luftschicht zwischen dem Blattgewebe und dem Wasser her, wodurch das Licht eine totale Reflexion erfährt. Bei längerem Verweilen der Blätter unter Wasser wird die Oberfläche derselben benetzbar, und dann verschwindet auch der Silberglanz¹⁾. Bei solchem längeren Verweilen der Blätter unter Wasser kann die Flüssigkeit ohne Zweifel durch die Cuticula (aber auch auf anderem Wege) in das Innere der Pflanzentheile eindringen. Werden gewogene Blätter bei Abschluss des Lichts mit der Spreite in Wasser getaucht, während der Blattstielquerschnitt, den man zweckmässig mit etwas Wachs verkittet hat, unbenetzt bleibt, so ergibt sich in der That, dass die nach einiger Zeit aus der Flüssigkeit entfernten und sehr vorsichtig mit Fliesspapier abgetrockneten Blätter jetzt ein höheres Gewicht als zu Beginn des Versuchs besitzen. Natürlich kann dies nur eintreten, wenn man mit Blättern experimentirt, deren Zellen nicht von vornherein das höchste Maass von Turgescenz erkennen lassen. Ich erhielt besonders günstige Resultate, wenn ich Blätter von *Coffea arabica* oder *Syringa vulgaris* kürzere Zeit (3 Stunden) oder längere Zeit (etwa 20 Stunden) mit der Spreite in Wasser tauchte, und wenn die abgeschnittenen Blätter vor Ausführung der Versuche 2 Stunden lang an einem schattigen Ort verweilt hatten und somit nicht zu wasserreich waren²⁾.

71. Einige Bewegungserscheinungen an Pflanzentheilen, die mit der Wasseraufnahme derselben im Zusammenhang stehen.

Recht interessante Erscheinungen in Folge der Wasseraufnahme zeigen die inneren Blätter des Involucrums von *Carlina acaulis*, einer Pflanze, die auf trockenem, kalkreichem Boden wächst. Wird der gesammte Blütenstand benetzt, so legen sich die sämtlichen inneren Involucralblätter zusammen (vgl. Fig. 67); Austrocknung ruft wieder Ausbreitung der Blattgebilde hervor (vgl. Fig. 68). Die Involucralblätter besitzen silberweisse Farbe; nur der mittlere Theil ihrer Unterseite ist braun

1) Vgl. SACHS, Handbuch d. Experimentalphysiologie d. Pflanzen, S. 159.

2) Vgl. DETMER in WOLLNY's Forschungen, Bd. 1, Heft 2, und Journal für Landwirtschaft, 27. Jahrgang, S. 105.

gefärbt. Wird diese braun erscheinende Region eines einzelnen aus dem Blütenstande der *Carlina* entfernten Involucralblattes mit Wasser benetzt,

so tritt sogleich eine

Bewegungserscheinung an demselben

hervor, und die Unterseite des Blattes

ist alsbald convex gekrümmt. Wir stellen

auch feine Querschnitte durch den

mittleren Theil eines Involucralblattes her

und constatiren das Folgende. Auf der

Ober- sowie Unterseite ist eine Epidermis

vorhanden. Die Epidermiszellen der

Unterseite sind braun gefärbt. Die Haupt-

masse des Gewebes zwischen den Epi-

dermislagen wird vom Parenchym ge-

bildet, das von einigen Gefässbündeln

durchzogen ist. Das Parenchym grenzt

auf der Unterseite nicht direct an die

Epidermis, sondern zwischen beiden ist

eine Sklerenchym-schicht vorhanden,

die aus etwa 3 Lagen stark verdickter,

lückenlos zusammenschliessender Zellen

besteht. Dieses Sklerenchym vermittelt

nun die erwähnten Bewegungen, indem

die Zellen desselben sich bei Benetzung

der Blätter beträchtlicher verlängern als

diejenigen des Parenchyms, und indem

sie sich beim Austrocknen der Blätter

am bedeutendsten zusammenziehen. Die

Fig. 67. *Carlina acaulis*, Blütenstand mit geschlossenem Involucrum.

Fig. 68. *Carlina acaulis*, Blütenstand mit ausgebreitetem Involucrum.

Bewegungserscheinungen der Involucralblätter von *Carlina* hängen nicht direct mit der Lebensthätigkeit der Zellen zusammen; denn auch die trockenen abgestorbenen Blätter sind bewegungsfähig¹⁾.

Wenn man *Carlina*-pflanzen an ihrem natürlichen Standorte beobachtet, so stellt man leicht fest, dass die *Carlina*-blüthenstände bei feuchter, regnerischer Witterung geschlossen erscheinen, indem sich die Involucralblätter in Folge eingetretener Benetzung zusammengelegt haben und die Blüthen dadurch vor nachtheiligen Witterungseinflüssen schützen.

Eigenthümliche Bewegungserscheinungen, die durch Wasseraufnahme bedingt werden, aber ebensowenig wie diejenigen der *Carlina*-Involucralblätter mit dem Leben der Zellen direct zusammenhängen, lassen sich an den Schnäbeln der *Erodium*-früchte sowie an den Grannen von *Stipa* beobachten. In Fig. 69 ist eine trockene Theilfrucht von *Erodium*

Fig. 69. *Erodium*-frucht.

Fig. 70. *Stipa pennata*, Frucht mit Granne. $\frac{2}{3}$ natürl. Grösse.

mit dem Schnabel dargestellt. Der untere Theil des Schnabels *s* ist schraubig gedreht, der obere *s'* nicht. Wir legen eine solche Theilfrucht kurze Zeit lang (etwa $\frac{1}{2}$ Minute) in Wasser und stecken sie alsdann mit der Basis in lockeren, feuchten Sand, der sich in einem unter eine Glasglocke gestellten Gefässe befindet. Die eintretende Bewegung ist leicht zu constatiren; sie dauert in der feuchten Luft so lange fort, bis die Windungen des unteren Schnabeltheils verschwunden sind, und der ganze Schnabel gerade gestreckt ist. Wenn man eine angefeuchtete *Erodium*-frucht in feuchten Sand steckt und der Bewegung des im trockenen Zustande fast horizontal gerichteten Schnabeltheils ein Hinderniss in Form eines senkrecht gerichteten Holzstäbchens entgegenstellt, so wird die eintretende Bewegung auf die Frucht übertragen, und indem ein senkrechter Druck auf ihre Spitze hinzukommt, wird sie in den Boden eingeschraubt. In der Natur graben sich die *Erodium*-früchte in der That mittelst des eigenthümlichen Bewegungsvermögens ihrer Schnäbel in den Boden ein.

Fig. 70 stellt die Frucht sammt Granne von *Stipa* dar. Der untere Theil der Granne (*e*) ist im trockenen Zustande schraubenförmig gewunden. Der Grannentheil *k* ist zwischen zwei Knien eingeschlossen und trägt die mit Haaren besetzte Fahne der Granne. Diese Fahne ist horizontal gerichtet, und wenn das Untersuchungsobject unter dieselben Verhältnisse

1) Vgl. DETMER, Journal für Landwirtschaft, 27. Jahrgang, S. 110, und RÄTHAY, Sitzungsberichte der Akad. d. Wiss. zu Wien, Bd. 83.

wie eine Erodiumfrucht gebracht wird (vgl. oben), so bewirkt die Wasseraufnahme unter Zurückwinden des schraubigen Theils der Granne ein Einbohren der Frucht in den Boden. Die Ursachen der hier besprochenen Bewegungserscheinungen sind in gewissen Structurverhältnissen bestimmter Zellen der schraubenförmig gewundenen Theile der Erodium- und Stipafrüchte zu suchen.

72. Die Wasseraufnahme der Früchte und Samen.

Es kommt häufig vor, dass saftreiche Früchte (Steinfrüchte, Beeren), die sich noch in Verbindung mit ihrer Mutterpflanze befinden, bei regnerischem Wetter aufreissen. Diese Erscheinung ist insbesondere Folge der unter den bezeichneten Verhältnissen fast völlig aufhörenden Transpiration der Pflanzen. Die Zellen des Parenchyms der Früchte turgesciren sehr stark, es kommen Spannungsverhältnisse im Fruchtgewebe zur Geltung (namentlich wird die Epidermis einer energischen Dehnung ausgesetzt), und schliesslich erfolgt das Aufreissen der Früchte. Bei dem Zustandekommen dieser Erscheinung kann nebensächlich auch ein anderes Moment mitwirken, nämlich die Aufnahme von Wasser seitens der Früchte, wodurch der Turgor der Parenchymzellen noch mehr gesteigert wird. Zur Constatirung der Thatsächlichkeit dieser Wasseraufnahme werden unversehrte Kirschen oder Weinbeeren genau gewogen, derartig in Wasser gelegt, dass der Fruchtsiel aus der Flüssigkeit hervorragt, und nach 4–8-stündigem Verweilen in derselben sorgfältig abgetrocknet. Ahermalige Wägung ergibt gewöhnlich eine nicht unwesentliche Gewichtszunahme der Untersuchungsobjecte.

Wir legen einige Weizenkörner in Wasser. Nach etwa 12 Stunden ist der Quellungsprocess bereits sehr weit fortgeschritten, und die Körner sind weich geworden. Die dünne das Weizenkorn umgebende Schale lässt das Wasser leicht in das Innere desselben eindringen. Wollen wir uns über den anatomischen Bau der Frucht- sowie Samenschale des Weizens orientiren, so stellen wir die erforderlichen Querschnitte nicht aus einem Korn her, das bereits völlig aufgequollen ist, denn ein solches lässt sich sehr schlecht schneiden. Wir benutzen vielmehr Körner, die nicht zu lange mit Wasser in Contact gewesen sind, und behandeln die möglichst dünnen Schnitte vor der Beobachtung mit Kalilauge. Diese ruft eine starke Quellung der Gewebe hervor, wodurch die Structurverhältnisse der Frucht- und Samenschale ziemlich deutlich werden (vgl. Fig. 71). Die Fruchtschale besteht aus der cuticularisirten Epidermis *ep*, einer Parenchymschicht *e* und einer weiteren sich an diese anschliessenden Zellschicht, deren Elemente tangential gestreckt erscheinen, *chl*. Die Samenschale besteht aus mehreren Zellschichten, aber die zellige Structur der äusseren Lagen *ii* ist auf dem Querschnitt nicht gehörig zu erkennen, und dieselben präsentiren sich der Hauptsache nach nur als braun gefärbter Streifen. Die innerste Schicht *n* der Samenschale, welche direct unter dem erwähnten braunen Streifen liegt, besteht aus wasserhellen Zellen. Die Samenschale umschliesst das Endosperm und den Embryo. Auf diese Theile des Weizenkornes kommen wir später zurück. Es sei hier nur erwähnt, dass die unmittelbar unter der Samenschale liegende Endospermischicht (Kleberzellschicht) aus einer einfachen Lage fast

Fig. 71. Tritileum vulgare. A Querschnitt durch die Frucht- und Samenschale. An dieser *ep* die Epidermis, *e* an die Epidermis grenzende Schichten, *chl* die Chlorophyllschicht; diese alle gehören zur Fruchtwandung. *ii* die aus dem inneren Integument hervorgegangene Hülle, *n* die äusserste verdickte Schicht des Nucellus; diese zusammen bilden die Samenschale. *al* die Aleuron-schicht des Endosperms. Vergr. 240.

B medianer Längsschnitt durch den unteren Theil einer reifen Frucht. In dieser links unten der Keim mit dem Scutellum *sc*, *l'* der Ligula am Scutellum, *vs* seinem Gefässbündel, *ce* seinem Cylinderepithel, *c* dem Scheidentheil des Cotyledons, *pv* dem Stammvegetationskegel, *hp* dem hypocotylen Gliede, *l* der Ligula an denselben, *r* der Radicula, *cp* der Wurzelhaube der Radicula, *cl* der Wurzelscheide; *m* Austrittsstelle der Radicula, der Mikropyle der Samenknope entsprechend, *p* der Fruchtsiel, *vp* Gefässbündel desselben, *F* Seitenwandung der Frucht. Vergr. 14. (Nach STRASBURGER.)

quadratischer Zellen besteht, die, was freilich bei der Untersuchung mit Kalilauge behandelter Schnitte nicht zu sehen ist, Proteinkörner (keine Stärke) enthalten. Es folgen darauf die mehr oder minder stärkereichen Gewebemassen des Endosperms.

Wir stellen Querschnitte des Samens von *Lupinus luteus* her. Am besten benutzen wir Samen, die in Folge von Wasseraufnahme bereits etwas aufgequollen sind, und untersuchen die Schnitte in Wasser und Aetzkaliösung. Die Cuticula ist ziemlich mächtig entwickelt und von einem körnigen Ueberzuge (Wachsmasse) bedeckt. Unser besonderes Interesse beansprucht die Epidermis, welche aus langen, radial zur Samenoberfläche gestellten Pallisadenzellen besteht. Die Wände dieser Zellen sind sehr stark verdickt. Die Pallisadenzellen führen einen braunen Farbstoff, der aber nur in bestimmten Gruppen der Epidermiszellen vorhanden ist, was das gefleckte Aussehen der Samen bedingt. Unter der Epidermis beobachten wir eine einfache Lage säulenförmiger Zellen, die sehr weite Intercellularräume zwischen sich lassen und radial gegen die Samenoberfläche gerichtet sind. Es folgt nun eine in Aetzkali stark aufquellende Zellschicht, die aus mehreren Lagen tangential gestreckter Zellen besteht. An diese schliessen sich die stark zusammengedrückten Reste des Endosperms an, und schliesslich sehen wir noch das Gewebe der Cotyledonen.

Werden viele Lupinensamen, vielleicht 100 Stück, in Wasser geworfen, so findet man, dass nach Verlauf längerer Zeit, z. B. 24 Stunden oder gar 8 oder 14 Tagen, noch keineswegs sämtliche Individuen in den gequollenen Zustand übergegangen sind. Diese Schwerquellbarkeit, der eine erhebliche biologische Bedeutung zukommt, ist ausser den Lupinensamen vielen anderen Samenspecies eigenthümlich und

wird in unserem Falle dadurch bedingt, dass die Zellen der noch vollkommen intacten Pallisadenschicht der Samenschale in Folge besonderer Eigenthümlichkeiten ihrer Membranen sehr schwer permeabel für Wasser sind. Verletzt man die Pallisadenschicht eines Samens von *Lupinus*, so quillt er stets in Contact mit Wasser leicht auf¹⁾.

Die Samen von *Pisum sativum* gehören zu den leicht aufquellenden, wovon man sich überzeugen kann, wenn man das Untersuchungsmaterial mit Wasser in Berührung bringt. Die Testa von *Pisum* hat in ihrem Bau manche Aehnlichkeit mit derjenigen von *Lupinus*. Wir ziehen die Samenschale von den aufgequollenen Samen ab, falten sie zusammen und stellen zarte Querschnitte her, die wir in Aetzkali untersuchen. Auf die Pallisadenschicht folgt auch hier die Säulenschicht, dann ein aus vielen Zelllagen bestehendes Parenchym, dessen Elemente tangential gestreckt erscheinen, und endlich die Reste des zusammengedrückten Endosperms.

Die Quellung der meisten Samen wird durch den Imbibitionsprocess, sowie durch osmotische Vorgänge vermittelt. Bei einigen Samen, z. B. denjenigen von *Linum usitatissimum*, wird der Verlauf der Quellung noch dadurch beschleunigt, dass dieselben in Contact mit Wasser einen Schleim austreten lassen, der das Wasser sehr energisch anzieht und festhält. In der That umgiebt sich jeder Leinsame, den wir mit Wasser in Berührung bringen, sofort mit einer Schleimhülle. Wir stellen recht zarte Querschnitte aus trockenen Leinsamen her und bringen dieselben in Alkohol auf den Objectträger. Nun lassen wir, während wir beobachten, Wasser vom Deckglasrand aus zu dem Object treten. In dem Moment, in welchem das Wasser mit dem Schnitt in Berührung gelangt, quellen die Zellen der Epidermis der Samenschale sehr stark auf und lassen den als Verdickungsschichten der Aussenwände der Epidermiszellen vorhandenen Schleim, ohne dass die Zellwände zerreißen, austreten. Die Epidermiszellen sind, wie man jetzt leicht sieht, radial gegen die Samenoberfläche gerichtet. Auf die übrigen Zellschichten der complicirt gebauten Samenschale von *Linum* wollen wir hier nicht näher eingehen.

Betrachtet man einen trockenen Phaseolussamen und orientirt denselben derartig, dass der in Form eines weissen Streifens entwickelte Nabel dem Beobachter zugewandt ist, so findet man auf der einen Seite des Streifens eine kleine Vertiefung, die Mikropyle, welche dicht über der Wurzelspitze des Embryo liegt. Am entgegengesetzten Ende des Nabels sieht man zwei kleine, durch eine seichte Naht getrennte Wülste, die Doppeltuberkeln. Diese, der Nabel und die Mikropyle bilden den hilaren Apparat des Samen. Die Mikropyle spielt bei der Quellung der in Wasser liegenden Bohnensamen, wie folgender Versuch lehrt, eine besonders wichtige Rolle. Ein Phaseolussamen *a* wird völlig in Wasser eingetaucht. Einen zweiten Samen *b*, der möglichst genau das nämliche Gewicht wie *a* besitzt, befestigt man in geeigneter Weise an einer Nadel und taucht ihn derartig in Wasser ein, dass seine Oberfläche mit Ausnahme des hilaren Apparates benetzt wird. Wägungen ergeben nach Verlauf einiger Stunden, dass *a* relativ viel, *b* aber nur wenig Wasser aufgenommen hat²⁾.

1) Vgl. DETMER, Journal f. Landwirtschaft, 27. Jahrg., S. 119.

2) Ueber den Bau von Samenschalen vgl. zumal SEMPOŁOWSKI's Dissertation, Leipzig 1874. Dasselbst ist auch die wichtigste Literatur zusammengestellt. Ferner vergl. MATTIROLA u. BUSCALIONI, Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II, T. XLII.

73. Weitere Experimente über den Quellungsprocess der Samen.

Die Wassermengen, welche verschiedene in den völlig gequollenen Zustand übergegangene Samenarten aufgenommen haben, sind keineswegs die nämlichen. Die Quellungscapacität der Samen ist also eine verschiedene. Man bestimmt das Gewicht einiger lufttrockener Weizenkörner und Erbsensamen. Die Untersuchungsobjecte gelangen nunmehr in Wasser und verweilen in demselben 24 Stunden. Nach dieser Zeit trocknet man die Samen gut ab, um ihr Gewicht abermals zu ermitteln, legt sie wieder in Wasser und bestimmt nach Verlauf von 6 Stunden ihr Gewicht aufs Neue. Eventuell müssen noch mehrfache Wägungen ausgeführt werden, aber auf jeden Fall wird sich als Resultat des Versuchs herausstellen, dass, wenn das Gewicht der Untersuchungsobjecte keine wesentlichen Veränderungen mehr erfährt, die Erbsensamen viel mehr Wasser im völlig gequollenen Zustande als die Weizenkörner enthalten. Erbsensamen nehmen bei der Quellung etwa 100, Weizenkörner nur 40–60 Gewichtsprocent Wasser auf.

Bei Benutzung vieler Samen (z. B. Bohnen, Erbsen) zu Quellungsversuchen lässt sich die Thatsache sofort constatiren, dass das Volumen der gequollenen Untersuchungsobjecte weit grösser als dasjenige der lufttrockenen ist. Wir können uns aber auch die Frage vorlegen, ob das Volumen einer gegebenen Samenmenge und einer gegebenen als Quellflüssigkeit dienenden Wassermenge in seiner Gesamtheit in Folge der Quellung Veränderungen erfährt. Das folgende Experiment kann zur Beantwortung dieser Frage ausgeführt werden. Wir benutzen den in Fig. 72 abgebildeten Apparat. In einen Kolben von ca. 600 ccm Capacität bringen wir 300 g Erbsen (ich experimentirte mit weissen Riesenerbsen). Der Kolben wird dann völlig mit Wasser angefüllt und sofort mit einem durchbohrten Kautschukkork verschlossen. Durch die eine Bohrung führen wir ein Thermometer, durch die zweite ein gerades Glasrohr (Steigrohr) von 0,5 cm Durchmesser ein. Der Stand des Wassers in letzterem kann bei Beginn des Versuchs und ebenso im Verlauf desselben von 5 zu 5 Minuten leicht mit Hilfe eines Millimetermaassstabes festgestellt werden, und man wird die Beobachtung machen, dass sich das Wasser im Steigrohr zunächst höher und höher erhebt. Dies Steigen dauert $\frac{3}{4}$, zuweilen auch $1\frac{1}{2}$ Stunden, dann sinkt das Wasser im Steigrohr kurze Zeit oder unter Umständen auch einige Stunden, um schliesslich wieder zu steigen.

Fig. 72. Apparat zur Beobachtung von Quellungserscheinungen.

Bei genauen Versuchen ist auch der Einfluss der Temperaturverhältnisse auf den Wasserstand im Steigrohr zu berücksichtigen.

Wenn Samen mit Wasser in Contact gelangen und in Folge dessen Imbibitionsvorgänge zur Geltung kommen, so muss eine Verdichtung des in die Samen eindringenden Wassers eintreten. Ein solcher Process würde aber zu einer Gesamtvolumenverminderung der Samen und des Wassers führen. Davon ist aber in unserem Experimente nichts zu sehen, vielmehr erhebt sich das Wasser bei Beginn des Versuchs rapide im Steigrohr; es tritt also eine Gesamtvolumenzunahme der Samen und der Quellflüssigkeit deutlich hervor. Die Ursachen, welche diese bedingen, beeinflussen den Wasserstand im Steigrohr also auf jeden Fall in überwiegendem Maasse, und sie sind in einer bei Beginn der Quellung der Erbsensamen eintretenden Faltung der Testa zu suchen. Diese hebt sich von den Cotyledonen der Samen ab; es entstehen mit verdünnter Luft erfüllte Hohlräume zwischen den Keimblättern und der Samenschale, so dass das Gesamtvolumen der Samen und des Wassers zunehmen muss. Wenn man Erbsensamen, deren Testa man verletzt hat, in unserem Apparat mit Wasser in Berührung bringt, so kommt in der That, wie ich fand, das Steigen des Wassers im Steigrohr während der ganzen ersten Versuchsperiode nicht zu Stande.

Während der zweiten Versuchsperiode sinkt das Wasser im Steigrohr; es macht sich eine Gesamtvolumenabnahme der Samen und des Wassers geltend, die auf ein Eindringen von Wasser in Hohlräume der Samen zurückgeführt werden muss. Auf die Ursachen, welche dem erneuten Steigen des Wassers im Steigrohr während der dritten Versuchsperiode zu Grunde liegen, gehe ich hier nicht näher ein. Darüber und ebenso über das Verhalten anderer quellender Samen in der hier in Rede stehenden Beziehung ist meine citirte Schrift zu vergleichen¹⁾.

74. Die Wasseraufnahme der Moose.

Die Moose besitzen keine eigentlichen Wurzeln, sondern Rhizoide. Um diese Organe genauer kennen zu lernen, wählen wir *Bryum caespitium*, ein Moos, das häufig auf Mauern angetroffen wird. Mit Hülfe eines Wasserstrahles wird die den Pflanzen anhaftende Erde möglichst entfernt, der untere Theil eines Stämmchens abgeschnitten, auf den Objectträger gebracht und beobachtet. Es zeigt sich, dass aus dem Stämmchen lange, mehrzellige, recht breite, braun gefärbte Fäden hervorgehen, die vielfach feinere Zweige besitzen und nur an ihren Enden farblos sind. Die Scheidewände zwischen den einzelnen Zellen erscheinen schief gestellt. Den Rhizoiden, mit denen wir es hier zu thun haben, kommt vor allem die Aufgabe zu, die Moospflanze im Boden zu befestigen. Als wasseraufnehmende Organe besitzen sie, wenigstens bei vielen Moosen, eine nur untergeordnete Bedeutung.

Wird ein Rasen von *Hylocomium triquetrum* in feuchtem Zustande in eine flache, Wasser enthaltende Schale gestellt, so trocknen die oberen Theile der Pflanze alsbald aus. Dieser Versuch lehrt, dass im

1) Vgl. DETMER, Vergleichende Physiologie des Keimungsprocesses der Samen, Jena 1880, S. 71, und die unter 72 citirte Arbeit von MATTIROLA. Vgl. auch Botan. Centralblatt, 1892, Bd. 52, S. 155.

Innern der Moospflanzen keine energische und ausreichende Wasserleitung wie im Organismus der höheren Gewächse stattfindet. Beobachtet man die im Wasser liegenden *Hylocomium*rasen genauer, wenn die Enden der Pflanzen trocken sind, so findet man übrigens eine ziemlich lange, über dem Wasserspiegel liegende Partie der einzelnen Stämmchen feucht. Das Wasser wird also von den Moospflanzen bis zu einer gewissen Höhe emporgehoben, und zwar sind es Capillarkräfte, welche dies vermitteln. Das Wasser steigt in den engen Hohlräumen, welche zwischen dem Stämmchen und den diesen dicht angeschmiegt Blättern vorhanden sind, bis zu bestimmter Höhe empor, aber es müssen natürlich alle Theile der Moospflanzen austrocknen, welche durch diese äussere Wasserleitung nicht mehr mit Feuchtigkeit versorgt werden können. Wird ein kräftiger Zweig von *Hylocomium triquetrum* zwischen Fliesspapier gut abgetrocknet und dann mit seiner Basis oder Spitze in die Lösung eines Anilinfarbstoffes eingetaucht (ich benutzte eine wässrige Lösung von Methylanilinviolett), so beobachtet man leicht, dass die Flüssigkeit in der That bis zu einer gewissen Höhe capillar emporsteigt. Werden von anhaftender Erde befreite Rasen von *Hylocomium*- oder *Hypnum*species im lufttrockenen Zustande gewogen, vielleicht 10 Minuten lang unter Wasser getaucht, auf eine schräg gestellte Glasplatte gelegt, damit das überschüssige Wasser abtropft, und nun abermals gewogen, so ergibt sich, dass sie das Mehrfache ihres ursprünglichen Gewichts an Wasser zurückzuhalten vermögen. Das Resultat dieses Experimentes ist im Stande, uns eine Vorstellung davon zu geben, wie gross die Wassermengen sind, welche der Moosrasen im Walde capillar festzuhalten vermag, und in der That spielen die Moose, wie hier nicht speciell auseinandergesetzt werden kann, eine wichtige Rolle als Regulatoren der Feuchtigkeitsverhältnisse vieler Gegenden.

Untersucht man Querschnitte aus dem Stämmchen von *Hylocomium triquetrum*, so findet man das ganze Gewebe aus Zellen zusammengesetzt, deren Wände eine gelblichbraune Farbe besitzen und stark verdickt sind. Das Lumen der peripherischen und ebenso dasjenige weniger central gelegener Elemente (die letzteren bilden die Andeutung eines Centralstranges) ist viel enger als das Lumen der übrigen Zellen. Für solche Moose, welche keinen oder einen nur schwach entwickelten, bekanntlich aus sehr lang gestreckten Zellen zusammengesetzten Centralstrang besitzen, kommt wesentlich nur die äussere Wasserleitung durch Capillarität in Betracht. Dagegen scheint ein entwickelter Centralstrang die Möglichkeit zu einer ausgiebigeren inneren Wasserleitung zu bieten, und Versuche, welche man mit *Polytrichum* angestellt hat, bestätigen dies. In der That ist bei *Polytrichum* ein wohl ausgebildeter Centralstrang im Stämmchen vorhanden, wovon man sich bei mikroskopischer Untersuchung zarter Querschnitte überzeugt, und als ich einige Stämmchen von *Polytrichum formosum* dicht neben einander mit ihrem unteren Ende in Wasser stellte, blieben auch die oberen Blätter der Pflanzen frisch. In diesem Zustande stehen die *Polytrichum*blätter vom Stamme ab, während sie sich beim Austrocknen demselben nach oben anlegen.

Ein besonderes Interesse beansprucht auch noch die Art und Weise, in der die *Sphagnum*arten Wasser von aussen aufnehmen und die aufgenommene Flüssigkeit festhalten. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse mögen hier übrigens einige Andeutungen bezüglich des

Baues der Blätter der erwähnten Pflanzen genügen. Wir unterziehen Blätter von *Sphagnum acutifolium* der mikroskopischen Untersuchung. Die grünen, röthlichen oder intensiv roth gefärbten Rasen dieses Moores sind leicht aufzufinden, und jedes entwickelte Blatt besteht aus chlorophyllhaltigen Zellen, die zu einem Netzwerk mit einander verbunden sind, und aus nicht mehr lebensthätigen, Wasser oder Luft enthaltenden, farblosen Zellen, welche zwischen den grünen Zellen liegen und deren ringförmig oder spiralig verdickte Membranen mit wirklichen Löchern versehen sind. In diese Löcher dringt das Wasser leicht von aussen in die Zellen ein und wird von denselben festgehalten, so dass ein *Sphagnumrasen* schon aus diesem Grunde ähnlich wie ein Schwamm im Stande ist, bedeutende Wassermengen festzuhalten ¹⁾.

VI. Die Wasserbewegung in den Pflanzen.

75. Constatirung der Erscheinung des Wurzeldrucks.

Handelt es sich darum, den Nachweis zu liefern, dass in den Pflanzenzellen in Folge osmotischer Vorgänge und der Turgorverhältnisse Druckkräfte entstehen können, welche im Stande sind, den Zellsaft durch die Membranen der Zellen zu pressen, so dass er z. B. in die Gefässe des Holzes gelangt, so ist es bequem, die Phänomene, die durch den Wurzeldruck verursacht werden, zunächst näher ins Auge zu fassen. Kräftige, in Blumentöpfen erwachsene Individuen von *Cucurbita*, *Helianthus*, *Ricinus*, *Begonia* oder in Blumentöpfen gut angewurzelte Weidenstecklinge werden decapitirt, d. h. der Stengel der Pflanze wird in Höhe von einigen Centimetern über der Erde durchgeschnitten. Im Winter kann man z. B. mit Topfexemplaren von *Sanchezia nobilis* (zu den Acanthaceen gehörend ²⁾) experimentiren. Ueber den aus der Erde hervorragenden Stengelstumpf wird jetzt ein kurzer Kautschukschlauch (Fig. 73 k) gezogen, der mit einem Glasrohr (Steigrohr [st]) in Verbindung gebracht worden ist. Der Kautschukschlauch wird über dem Stengelstumpf sowie über der Glasröhre zur Herstellung eines luftdichten Verschlusses mit Bindfaden oder, was viel bequemer ist, mit Gummischnur festgebunden, und das Glasrohr dicht über dem Schlauche mit einer Marke (m), die man mit Hülfe einer Glasfeile leicht herstellen kann, versehen. Füllt man das Glasrohr bis zur Marke mit Wasser an, so beobachtet man, wenn die Untersuchungsobjecte vor Einleitung der Experimente nicht stark transpirirt hatten, und wenn der Boden, in welchem sie wurzeln, reichliche Wassermengen enthält, dass das Flüssigkeitsniveau im Glasrohr alsbald steigt. Zur Constatirung des Saftausflusses aus den Stengelstümpfen kann man auch die in Fig. 74 abgebildete Einrichtung treffen. Auf dem Stammstumpf s wird mittelst Kautschuk k ein t-Rohr (t) befestigt. Der Kautschuk

1) Ueber Wasseraufnahme d. Moose vgl. OLTMANNS, Strassburger Inaugural-Dissertation, 1884.

2) Dies ausgezeichnete Untersuchungsobject lässt sich leicht durch Stecklinge vermehren. Ich fand, dass ein Exemplar bei Versuchen im Januar 14 Tage lang Saft gab.

ist, um einen absolut luftdichten Verschluss herzustellen, wenn erforderlich, mit Draht zu umwickeln. In manchen Fällen wird man gezwungen sein, ein enges t-Rohr zu verwenden. Der verticale Schenkel des t-Rohres schliesst am oberen Ende mit einem Kork, durch den eine mit Glashahn versehene Glasröhre eingeführt ist, ab. Der horizontale Schenkel steht dagegen mit dem Ausflussrohr *r* in Verbindung, das durch den nicht völlig luftdicht schliessenden Kork *a* in den Messcylinder *b* hineinragt. Das t-Rohr und das Ausflussrohr müssen bei Beginn des Experimentes mit Wasser angefüllt sein.

Um die Druckgrösse zu bestimmen, welche der aus Stammstümpfen ausfliessende Saft geltend zu machen im Stande ist, wird, wie es Fig. 75 zeigt, anstatt des Abflussrohres ein mit Quecksilber

Fig. 73.

Fig. 74.

Fig. 75.

Fig. 73. Apparat zu Experimenten über den Wurzeldruck.

Fig. 74. Apparat zu Experimenten über den Wurzeldruck. (Nach PFEFFER.)

Fig. 75. Apparat für Untersuchungen über den Wurzeldruck. (Nach PFEFFER.)

gefülltes Manometer an das t-förmige Rohr angebracht. In das t-förmige Rohr wird Wasser gegossen und ein Kork mit einem zu einer Capillare ausgezogenen Glasrohr (*g*) eingesetzt. Die Spitze der Capillare muss so abgeschmolzen werden, dass im Apparat keine Luft zurückbleibt.

Wenn man Pflanzen in derjenigen Weise, wie es im Vorstehenden angegeben worden ist, behandelt, so zeigt sich, dass manche Untersuchungsobjecte nur einige Tage lang Saft ausfliessen lassen. Ich habe andererseits oft beobachtet, dass der Saftausfluss länger als eine Woche fortdauern kann. Werden Pflanzen decapitirt, und beobachtet man nun ihr Verhalten ohne Weiteres, so findet man, dass der Saft aus dem Holzkörper, zumal den Gefässen desselben, hervortritt.

76. Der Saftausfluss aus im Freien wachsenden verletzten Bäumen.

Im März oder Anfang April bringe man am Stamm einer noch nicht belaubten Birke ein Bohrloch an, welches ungefähr bis zur Mitte des Stammes reicht. Bei den von mir angestellten Versuchen wurden die 7 mm weiten Bohrlöcher in einer Höhe von etwa 40 cm über dem Erdboden, woselbst die Bäume einen Umfang von ungefähr 40 cm besaßen, hergestellt. In das Bohrloch wird das Ende des einen Schenkels eines im rechten Winkel gebogenen Glasrohres luftdicht eingekittet, während der andere Schenkel in eine auf dem Erdboden stehende Glasflasche eingeführt ist. Unter Umständen fließt sofort eine bedeutende Flüssigkeitsmenge aus dem Baume aus; auf jeden Fall ist es aber sehr lehrreich, das Verhalten der Pflanzen mehrere Wochen hindurch im Auge zu behalten. Wasserzufuhr zum Boden durch Regen begünstigt den Saftausfluss; er ist am Tage gewöhnlich geringer als in der Nacht, oder er ist bei Tage gar nicht und nur während der Nachtzeit vorhanden. Diese Erscheinung hat ihre Ursache darin, dass am Tage der durch die Wurzeln in den Stamm hineingepresste Saft zur Deckung des Transpirationsverlustes der Pflanze dient, wohingegen zur Nachtzeit mindestens ein Theil des Saftes ausfließen kann, da jetzt die Wasserverdunstung durch die herrschenden äusseren Bedingungen in der Regel sehr herabgedrückt wird. Schreitet die Jahreszeit weiter vor und entfalten sich die Blätter der Birke, so hört der Saftausfluss völlig auf; die Transpirationsgrösse des Baums hat jetzt einen hohen Werth erreicht.

Die Beobachtungen über den Saftausfluss aus der Birke sind, um die Abhängigkeit der Erscheinung des Blutens von äusseren Verhältnissen näher verfolgen zu können, mit meteorologischen Beobachtungen zu verbinden. Man notire die Bewölkungsverhältnisse, den Barometerstand, und man stelle Beobachtungen über die Regenmenge, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft sowie die Temperaturverhältnisse der Luft und des Bodens an. Die erforderlichen Apparate (Regenmesser, Thermometer, Minimumthermometer, Psychrometer, z. B. das bekannte von August mit einem trocken und einem feucht zu haltenden Thermometer) können sämmtlich von MUENCKE in Berlin, Luisenstrasse 58, bezogen werden. Um aus den Ablesungen an den Thermometern des August'schen Psychrometers den Feuchtigkeitsgehalt der Luft abzuleiten, benutzt man die Psychrometer-Tafeln von JELINEK, Wien 1876.

Verdunstet man Birkensaft, so erhält man einen Rückstand, der aus organischen Stoffen und Mineralstoffen besteht. Von der Gegenwart der letzteren überzeugt man sich leicht, wenn man Birkensaft in einer Platinschale zur Trockne bringt und den Rückstand nun zur Zerstörung der organischen Stoffe glüht. Die Mineralstoffe bleiben zurück. Die Reaction des frischen Birkensaftes ist eine schwach saure. Beim Kochen des Saftes scheidet sich ein Coagulum von Eiweissstoffen ab. Wird eine kleine Menge des Saftes mit einigen Tropfen Schwefelsäure versetzt und unter Ersatz des verdunstenden Wassers gekocht, so erhält man eine Flüssigkeit, die, in heisse FEHLING'sche Lösung eingetragen, eine Abscheidung von Kupferoxydul hervorruft. Der rohe Saft enthält nämlich Rohrzucker, der durch das Kochen mit Schwefelsäure in reducirend wirkenden Traubenzucker übergegangen ist.

77. Der Einfluss äusserer Verhältnisse auf den Saftausfluss aus decapitirten Pflanzen.

Kräftige, in Blumentöpfen zur Entwicklung gelangte Exemplare von Cucurbita, Helianthus, Ricinus oder Begonia werden decapitirt und der Stammstumpf mit einem Steigrohre in Verbindung gebracht. Die Erde in den Blumentöpfen darf nicht übermässig feucht sein, und nachdem ein Thermometer in den Boden eingesenkt, dieser mit Stanniol belegt und der aus der Erde hervorragende Stengeltheil mit Stanniol umwickelt worden ist, werden die Untersuchungsobjecte in ein Zimmer, in welchem eine recht constante Temperatur herrscht, oder in einen Thermostaten gebracht. Wenn der Boden in den Blumentöpfen die Temperatur der Umgebung angenommen hat, beginnt die Beobachtung. Es wird notirt, wie gross der Saftausfluss z. B. in der Stunde ist. Nach mehrstündigem Versuch wird die Erde, in der die Pflanzen wurzeln, stark begossen, und wenn die Temperaturverhältnisse sich ausgeglichen haben, aufs Neue der stündliche Saftausfluss ermittelt. Derselbe ist jetzt in Folge des grossen Wasserreichthums des Bodens viel erheblicher als früher. Bei diesen und den folgenden Untersuchungen ist nicht zu vergessen, dass der Saftausfluss bei vielen Pflanzen periodische Schwankungen zeigt, die sich unabhängig von äusseren Einflüssen geltend machen. (Vgl. unter 78.)

Die nämlichen Untersuchungsobjecte können auch dazu benutzt werden, um festzustellen, dass die Temperaturverhältnisse von wesentlichem Einfluss auf den Saftausfluss sind. Die Erde, in der die Pflanzen wurzeln, wird bei Beginn der Versuche stark begossen, die Temperatur im Thermostaten aber von Zeit zu Zeit variirt, um nach jedesmaligem Temperatúrausgleich (d. h. wenn der Boden die Temperatur der Umgebung angenommen hat) mit den Beobachtungen über die Grösse des Saftausflusses zu beginnen. Bei 16° C. fliesst mehr Flüssigkeit in der Zeiteinheit (z. B. in einer Stunde) als bei 12° C. aus. Bei 20° C. ist der Saftausfluss erheblicher als bei 16° C. Nach meinen Beobachtungen liegt das Temperaturoptimum für den Saftauftrieb von Cucurbita Meloepo bei etwa 26° C. Noch höhere Temperatur deprimirt die Grösse der Flüssigkeitsausscheidung, und dieselbe hört bei einer Temperatur von 43° C. gänzlich auf¹⁾.

Bei zahlreichen pflanzenphysiologischen Untersuchungen, z. B. auch bei denen, von welchen soeben die Rede war, kommt es darauf an, die Beobachtungsobjecte längere Zeit constanten Temperaturverhältnissen auszusetzen.

Wir wollen hier die Methoden und Apparate, welche dies ermöglichen, besprechen.

Was zunächst die Thermometer anbelangt, so sind dieselben in den verschiedensten Formen, sowie Grössen und mit verschiedenen Theilungen versehen von den unter „Bezugsquellen“ genannten Firmen zu beziehen. Gebraucht man mehrere Thermometer bei einem Experiment, so sind dieselben genau zu vergleichen, Prüfung der Thermometer nimmt das unter „Bezugsquellen“ genannte Institut vor. In besonderen Fällen, z. B. bei Experimenten mit dem Auxanometer, wird man vortheilhaft zur

1) Vgl. DETMER, Beiträge zur Theorie des Wurzeldrucks, Jena 1877, S. 30. Vgl. auch WIELER, in COHN's Beiträgen zur Biologie der Pflanzen, Bd. 6, Heft 1.

Registrierung des Temperaturganges ein WILD'sches Registrirthermometer verwenden können, das in der von HASLER gelieferten Form sehr gut arbeitet.

Wenn man mit Registrirapparaten arbeitet oder mit grösseren Pflanzen experimentirt, die nicht in einen Thermostaten eingeführt werden können, so muss man bemüht sein, die Temperaturverhältnisse der Zimmer des Laboratoriums auf möglichst constanter Höhe zu erhalten. Sehr gut eignen sich in dieser Beziehung für kleinere Räume die mit Anthracitkohle zu heizenden sogen. amerikanischen Oefen, während für grössere Räume (solche über 150 Cubikmeter Rauminhalt) die grösseren Formen der MEIDINGER-Oefen (Kaiserslautern) sehr zu empfehlen sind. PFEFFER¹⁾ gelang es, unter Benutzung solcher Oefen die Temperaturschwankungen in Tischhöhe und in einiger Entfernung vom Fenster während Tagen und Wochen auf $+ 0,18^{\circ}$ C. einzuengen.

Um Pflanzen längere Zeit einer Temperatur von 0° auszusetzen, verwendet man den unter 49 beschriebenen Eiskasten. Räume von sehr constanten niederen Temperaturen über 0° sind in tiefen Kellern, Eiskellern oder auch in nach Norden gelegenen Zimmern eines Gebäudes mit dicken Wänden gegeben.

Von ganz besonderer Wichtigkeit für viele physiologische Untersuchungen, z. B. auch für manche Experimente, die sich auf den Wurzeldruck beziehen, sind gute Thermostaten. Diese Apparate bezieht man z. B. von Dr. H. ROHRBECK (Berlin NW., Karlstrasse Nr. 24). Sehr empfehlenswerth ist ein Thermostat, den ROHRBECK in seinem Preisverzeichniss von 1891—92 unter Nr. 114 aufführt. Preis je nach Grösse 50—200 Mk. Einen einfacheren Apparat, aber doch sehr brauchbar, findet man in dem nämlichen Preisverzeichniss unter 129. Preis je nach Grösse 20—30 Mk. Dieser Thermostat, doppelwandig, mit Wasserstandsrohr und Wasserabflusshahn, auf einem Dreifuss stehend, mit Glasdeckel, den man auch durch eine Glasglocke ersetzen kann, und vollständiger Filzbekleidung, ist am besten mit Ventilationsvorrichtung versehen anzuschaffen. In Figur 76 ist der Apparat dargestellt. Gasdruckregulatoren, Gasbrenner, z. B. die zweckmässigen Mikrobrenner behufs Herstellung sehr kleiner Flamme und Thermoregulatoren sind ebenfalls von ROHRBECK zu beziehen. Unter 149 führt dieser einen Regulator auf, welcher gefüllt und geprüft 19 Mk. kostet. Der Kopf dieses leistungsfähigen Regulators ist aus Metall gefertigt. In diesem Metallkopf ist ein Rohr (Gaszuleitungsrohr) verschiebbar, das mit der Gasleitung in Verbindung gesetzt wird. Der Regulator findet im Wasserraum des Thermostaten seinen Platz. In manchen Fällen empfiehlt es sich aber auch, den Regulator in den Arbeitsraum des Thermostaten hineinragen zu lassen. Für Temperaturen bis 40° C. ist er mit Quecksilber und Aether, für solche von 40 — 70° C. mit Quecksilber und Alkohol zu füllen.

Beim Anheizen des Thermostaten zieht man das Gaszuleitungsrohr möglichst weit aus dem Regulator heraus. Die Aether- oder Alkohol-dämpfe treiben das Quecksilber im Regulator bei steigender Temperatur empor, und wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird die Gaszuleitungsröhre so weit in den Regulator hineingeschoben, dass der an ihrem unteren Ende vorhandene dreieckige Ausschnitt eben vom Quecksilber bedeckt ist. Dem Verlöschen der Gasflamme wird durch das Vorhandensein einer feinen Oeffnung im Gaszuleitungsrohr vorgebeugt, durch

1) Vgl. PFEFFER, Zeitschrift f. wissensch. Mikroskopie, Bd. 7, S. 449.

welche auch jetzt noch Leuchtgas zum Brenner gelangen kann. Der Apparat functionirt nun in bekannter Art weiter.

Nicht ohne Einfluss auf die Function des Regulators sind die Schwankungen des Luftdruckes, deren Grösse man leicht mit Hülfe eines Barometers ermitteln kann. Diesem Umstande muss bei Benutzung des Regulators Rechnung getragen werden, wenn man die Temperatur im Apparat lange Zeit bis auf Bruchtheile eines Grades C. constant halten will. Es geschieht dies in der Weise, wie es ROHRBECK in einem kleinen Aufsatze angiebt, den man auf Wunsch von demselben mit dem Regulator erhält.

Wenn es bei physiologischen Untersuchungen nur darauf ankommt, die Temperaturverhältnisse einige Zeit lang annähernd constant zu erhalten, so ist auch der folgende Apparat bequem zu verwenden, der ebenfalls bei Mangel eines Gewächshauses gute Dienste leistet, wenn es sich darum handelt, im Winter, zumal bei kalter Witterung, Keimpflanzen etc. schnell zur Entwicklung zu bringen. Der auf einem festen Gestell ruhende Thermostat stellt einen grossen, aus starkem Zinkblech gefertigten Kasten mit doppelten Wänden dar. Die Höhe des Kastens beträgt etwa 60 cm; ebenso seine Breite und Tiefe. Der Zwischenraum zwischen den doppelten Wänden des Apparates kann 3—4 cm weit sein. Er wird mit Wasser angefüllt, das man durch eine Oeffnung am oberen Theile des Kastens eintreten lässt, während sich am unteren Theile desselben ein Hahn zum eventuell erforderlichen Abfluss des Wassers befindet. Die doppeltwandige Decke des Kastens ist noch mit einer zur Aufnahme eines Thermometers dienenden Oeffnung versehen. Die vordere Wand des Kastens wird, wie noch bemerkt werden muss, von einer Doppelthür gebildet. Die Heizung des Apparats geschieht mittelst einer unter demselben angebrachten Gasflamme.

Die Thermostaten stellt man natürlich, wenn irgend möglich, in Räumen auf, deren Temperaturen schon an und für sich möglichst geringen Schwankungen unterliegen. Im Sommer benutzt man nach Norden gelegene Räume; im Winter solche, die mittelst guter Füllöfen geheizt werden können.

Fig. 76. Thermostat mit Thermoregulator.

78. Die Periodicität des Wurzeldrucks.

Etwa 2 Monate alte, in Blumentöpfen cultivirte Individuen von *Cucurbita Meloepo* oder aus Knollen erwachsene 2 Monate alte Individuen von *Helianthus tuberosus*¹⁾ oder geeignete Exemplare von *Prunus Laurocerasus* werden decapitirt. Die Stammstümpfe bringt man nun mit einer der unter 75 beschriebenen Vorrichtungen in Verbindung, bedeckt den Erdboden in den Blumentöpfen mit Stanniol, um denselben vor erheblichem Wasserverlust zu schützen, führt ein Thermometer in den Boden ein und stellt die Untersuchungsobjecte in einen Raum von möglichst constanter Temperatur, eventuell in einen Thermostaten. Ermittelt man nun, wie gross die Saftmengen sind, welche die Untersuchungsobjecte zu verschiedenen Tageszeiten in der Zeiteinheit (z. B. in je einer oder je zwei Stunden) ausscheiden, so findet man, dass die Pflanzen, trotz gleichbleibender äusserer Verhältnisse, nicht immer die nämlichen Flüssigkeitsmengen liefern. Der Saftausfluss ist bei *Cucurbita* und *Helianthus* kurz nach Mittag am lebhaftesten, während *Prunus Laurocerasus* nach meinen Beobachtungen erst gegen Abend das Maximum der Flüssigkeitsausscheidung erkennen lässt. In der Nacht sinkt die Grösse des Saftausflusses; sie erreicht in den frühen Morgenstunden ihr Minimum, um dann wieder zu steigen. Hat man die Stengelstümpfe mit einem einfachen Steigrohr in Verbindung gebracht, so muss man natürlich nach jeder Beobachtung die über der Marke stehende Flüssigkeit entfernen. Dies geschieht bequem mit Hülfe eines dünnen Glasrohres, welches man in das Steigrohr einführt. Die in Millimetern ausgedrückte Höhe der Wassersäule von der Marke bis zum Niveau der Flüssigkeit kann als Maassstab zur Beurtheilung der Grösse des Saftausflusses dienen. Relativ junge Pflanzen lassen, soweit die Untersuchungen reichen, das Phänomen der Periodicität des Saftausflusses noch nicht erkennen. Bei Individuen von *Cucurbita Meloepo*, die einen Monat alt sind, ist z. B. die Periodicität noch nicht entwickelt²⁾. Selbstverständlich ist bei allen Versuchen besonderes Gewicht darauf zu legen, dass die Temperaturverhältnisse möglichst constant bleiben.

Bei ausführlichen Untersuchungen über die Periodicität des Wurzeldrucks empfiehlt es sich, einen Apparat zum Registriren des Saftausflusses nach dem von BARANETZKY (Abhandl. d. Naturf. Gesellschaft zu Halle 1873) angegebenen Princip zu verwenden. Dieser Apparat mit 36 Glasröhrchen zum Auffangen des Saftes ist im Preis von 100 Mk. vom Universitäts-Mechaniker ALBRECHT in Tübingen zu beziehen.

79. Die Ursachen des Wurzeldrucks und verwandter Erscheinungen.

Ein Glasrohr von etwa 80 mm Länge und 40 mm Weite (vergl. Fig. 77) wird an einem Ende mit einer gut ausgewaschenen Schweins-

1) Die Versuche mit *Cucurbita*, *Helianthus* oder manchen anderen Gewächsen stellt man zweckmässig im Sommer an. Die Pflanzen müssen an einem sonnigen Orte im Freien oder im Kalthause cultivirt worden sein.

2) Literatur vergl. bei DETMER, Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, 1883, S. 122, und in der unter 77 citirten Abhandlung WIELER's.

blase verbunden, darauf mit concentrirter Rohruckerlösung völlig angefüllt und das obere Ende der Röhre mit vegetabilischem Pergament verschlossen. Das Glasrohr ist durch die weite Bohrung eines grossen Korkes (*K*) zu schieben, so dass dasselbe, wenn der Kork auf ein Glas (*Gl*) gesetzt wird, welches destillirtes Wasser enthält, mit dem unteren Ende in diese Flüssigkeit eintaucht. Ueber den oberen, mit Pergamentpapier verschlossenen Theil des Glasrohres wird eine in ein Kautschukrohr auslaufende Kautschukkappe (*Kk*) gebunden und ein gebogenes Glasrohr (*Gr*) in das Kautschukrohr eingeführt. Ist der Apparat zusammengestellt, so beginnt derselbe seine Thätigkeit als bald. Es dringt auf osmotischem Wege Wasser in das am oberen sowie unteren Ende mit einer

Membran verschlossene Glasrohr (künstliche Zelle) ein, in demselben kommen, da mehr Wasser ein- als

Zuckerlösung austritt, Druckverhältnisse zur Geltung, die nach einiger Zeit im Stande sind, den Filtrationswiderstand des Pergamentpapiers zu überwinden. Ist dies der Fall, so wird Flüssigkeit in das Glasrohr *Gr* gepresst, und sie kann in dem Gefäss *F* gesammelt werden. Freilich sind die Vorgänge, welche sich bei dem Zustandekommen des

Wurzeldrucks und verwandter Erscheinungen in der Pflanze geltend machen, weit complicirter als diejenigen, von denen im Vorstehenden die Rede war, und es ist namentlich zu betonen, dass in der Pflanzenzelle das Protoplasma (zumal die Hautschicht desselben) eine wichtige Rolle spielt, wenn in den Gewächsen durch osmotische Vorgänge Druckwirkungen zu Stande kommen; aber immerhin ist das erwähnte Experiment doch von erheblichem pflanzenphysiologischen Interesse. In den Zellen des Parenchyms der Wurzeln kommen in Folge der osmotischen Leistungsfähigkeit des Zellinhalts Druckkräfte zur Geltung. Die stark turgescirenden Zellen pressen schliesslich einen Theil ihres Inhaltes aus, dieser tritt in die Holzelemente ein und wird in denselben emporgetrieben.

Fig. 77. Apparat zur Veranschaulichung derjenigen Vorgänge, welche sich beim Zustandekommen des Wurzeldrucks geltend machen.

80. Weitere Experimente über den Austritt tropfbar flüssigen Wassers aus Pflanzen.

Wenn in den Pflanzenzellen energische Druckkräfte in Folge osmotischer Processe zu Stande kommen, und diese Druckkräfte schliesslich den Filtrationswiderstand des Hyaloplasmas sowie der Zellhaut der Zellen überwinden, so werden Flüssigkeitsmengen aus

den Zellen hervorgepresst. Die Untersuchungen über den Flüssigkeitsaustritt aus decapitirten Pflanzen unter Vermittelung des Wurzeldrucks haben uns bereits mit Phänomenen bekannt gemacht, deren Ursachen in osmotischen Druckkräften zu suchen sind. Aber es giebt noch eine Reihe anderweitiger Erscheinungen, die hier Berücksichtigung finden müssen.

In Blumentöpfen cultivirte junge Mais- oder Tropaeolumexemplare werden in einen Thermostaten (vgl. Fig. 76) gestellt und mit einer Glasglocke bedeckt. Den Boden, in welchem die Pflanzen wurzeln, hat man reichlich mit Wasser durchfeuchtet, und die Temperatur im Apparat muss constant auf einer Höhe von 20—25° C. erhalten werden. Die Transpiration der Untersuchungsobjecte ist unter den bezeichneten Umständen fast gleich Null. In Folge der Thätigkeit des Wurzeldrucks füllen sich alle Hohlräume im Innern der Pflanze mit Wasser an, und dieses kann sogar nach aussen hervortreten. In der That beobachtet man denn auch, dass nach Verlauf von $\frac{1}{2}$ —2 Stunden an den Blatt-

Fig. 78. Apparat zum Nachweis des Einflusses von Druckkräften auf den Wasser-
austritt aus Pflanzentheilen.

spitzen von Zea sowie am Blattrande von Tropaeolum Wassertropfen erscheinen, die, wenn sie eine gewisse Grösse erreicht haben, abfallen und durch neue ersetzt werden. Bei Zea tritt das Wasser aus Rissen in der Epidermis hervor, bei Tropaeolum aus Wasserspalten.

Dass in der That Druckkräfte, wie sie durch den Wurzeldruck z. B. gegeben sind, eine wichtige Rolle beim Hervortreten von Wassertropfen aus Blättern spielen, lässt sich leicht beweisen. Man befestigt auf dem kürzeren Schenkel eines mit Wasser angefüllten Glasrohres abgeschnittene Sprosse von Vitis, Tropaeolum oder Impatiens (vgl. Fig. 78). Der Stengelquerschnitt taucht in das Wasser ein. Wenn man die Vorrichtung nun in einen grossen Glaszylinder stellt, den man mit einer Glasplatte zudeckt, um die Transpirationsgrösse der Untersuchungsobjecte möglichst herabzusetzen, und endlich Quecksilber in den langen Schenkel des Glasrohres giesst, so treten nach kürzerer oder längerer Zeit Wassertropfen aus dem Gewebe der Blätter hervor. Sehr schön sah ich die Tropfenabscheidung, als ich in der angegebenen Weise mit Sprossen von Impatiens Balsamina experimentirte. Bei einem Ueberdruck von 35 cm Quecksilber traten in wenigen Minuten Wassertropfen aus den Zähnen des Randes der Blätter hervor¹⁾.

Nach den Angaben PITRA's soll es leicht sein, die Beobachtung zu machen, dass aus dem Stammquerschnitt abgeschnittener beblätterter Sprosse, die man fast völlig in Wasser eintaucht, Flüssigkeit in beträchtlicher Menge hervortritt. Ich habe viele Versuche PITRA's wiederholt, aber mit

1) Vgl. MOLL, Botan. Zeitung, 1880.

negativem Erfolg. Freilich reichen meine Erfahrungen für eine kritische Behandlung der Experimente des genannten Autors nicht aus, und ich gehe daher auch nicht specieller auf dieselben ein. Dagegen gelingt es ohne Mühe, den Nachweis zu liefern, dass nicht nur in den Wurzeln, sondern auch in den Zellen von Stammtheilen Druckkräfte auf osmotischem Wege erzeugt werden können, die eine Flüssigkeitsauspressung zur Folge haben, wenn man Stengelstücke von *Zea* oder *Sorghum vulgare* als Untersuchungsobjecte benutzt. Die Stengelstücke werden aus kräftigen Mais- und im Beginn der Blüthezeit stehenden *Sorghum*-exemplaren in einer Länge von ca. 10 cm derartig herausgeschnitten, dass ihre obere Schnittfläche wenige Millimeter über einem Knoten liegt. Stellt man die Stengelstücke in Wasser, so dass ihre obere Schnittfläche aus der Flüssigkeit hervorragt, und bedeckt man mit einer Glasglocke, dann tritt alsbald aus dem Stengelquerschnitt Saft hervor. Trocknet man die Schnittfläche mit Fliesspapier ab, so erscheint sie bald wieder feucht.

Aber nicht nur osmotische Druckkräfte, auch andere Ursachen sind im Stande, einen Flüssigkeitsaustritt aus Pflanzentheilen herbeizuführen. So verhält sich die Sache z. B. bei vielen Nectarien¹⁾, und wir wählen diejenigen von *Fritillaria imperialis* zur Untersuchung. Am Grunde der Perigonblätter dieser Pflanze sind die relativ grossen, napfförmigen Nectarien leicht zu sehen. In ihnen ist ein zuckerreicher Saft vorhanden, der Glycose enthält, wovon man sich leicht überzeugt, wenn man die Basis einiger Perigonblätter mit wenig Wasser abspült und die erhaltene Flüssigkeit in siedende FEHLING'sche Lösung einträgt. Wir spülen ferner die Nectarien mehrerer Perigonblätter von *Fritillaria* recht sorgfältig und wiederholt mit reinem Wasser aus, trocknen sie mit Fliesspapier ab und legen die Blumenblätter unter eine Glasglocke. In die Nectarien einiger Perigonblätter bringen wir nun ein Körnchen angefeuchteten Zuckers, in diejenigen anderer aber keinen Zucker. Jene ersteren enthalten nach einigen Stunden wieder zuckerreichen Saft, diese letzteren bleiben trocken. Der Zucker zieht auf osmotischem Wege Wasser aus den Zellen der Nectarien an sich, ohne dass dabei Druckkräfte ins Spiel kommen, und was der im Experiment zugeführte Zucker leistet, das leisten unter normalen Verhältnissen vermuthlich osmotisch wirksame Stoffe, die durch Metamorphose aus der Substanz der äusseren Epidermiszellmembranen der Nectarien hervorgehen.

Wenn wasserreiche, abgehaueene Baumstämme dem Einfluss der Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, so quillt häufig Flüssigkeit aus den Querschnitten derselben hervor, eine Erscheinung, die ihren Grund darin hat, dass die Luft im Innern der Holzelemente durch die Sonnenwärme ausgedehnt wird und dadurch das gleichzeitig vorhandene Wasser aus den Pflanzentheilen hervortreibt. Genauerer lehren die folgenden Experimente. 20—50 cm lange und 3—5 cm dicke Aststücke der Weide, Ulme, Esche, des Nussbaumes oder von *Pavia rubra*, mit welchen letzteren ich zumal experimentirte, werden im Winter bei kaltem, aber feuchtem Wetter abgeschnitten und zur Erhöhung ihres Wassergehaltes, nachdem man recht glatte Schnittflächen an ihren Enden hergestellt hat, 24 Stunden lang in Wasser von etwa 20° C. gelegt. Dann taucht man die Aststücke in Wasser von 25—30° C. ein, welches sich in einem Glaszylinder befindet, so dass nur ihr

1) Vgl. WILSON in Untersuchungen aus d. botan. Institut zu Tübingen, Bd. 1 Heft 1.

oberes Ende etwas aus der Flüssigkeit herausragt. Es sammelt sich alsbald ziemlich viel Wasser auf der glatten Schnittfläche an. Ich beobachtete einen solchen, durch die Ausdehnung der in den Holzelementen vorhandenen Luft bedingten Wasseraustritt auch, als ich im Winter abgeschnittene, 15 cm lange und 2 cm dicke Aststücke von *Abies pectinata* in Wasser von 24° C. eintauchte. Gelangten die Aststücke dann in Wasser von 5° C., so wurde das vorher an der oberen Schnittfläche ausgetretene Wasser wieder vom Untersuchungsobject eingesogen, weil die Abkühlung eine Contraction der in demselben vorhandenen Luft herbeiführte ¹⁾.

81. Die Organisation der Pflanzentheile und die Transpiration.

Es sind keineswegs die sämtlichen Gewebe des Pflanzenkörpers leicht permeabel für tropfbar flüssiges Wasser oder für Wassergas. Vielmehr giebt es Gewebearten, die das Wasser nur äusserst schwierig passiren lassen, und dahin gehört in erster Linie das Korkgewebe. Diese Thatsache beansprucht ein erhebliches biologisches Interesse. Viele wasserreiche Pflanzentheile, z. B. Kartoffelknollen, die eine längere Ruheperiode zu überdauern haben, finden wir in der That mit einer mehr oder minder mächtigen Korksicht umkleidet, und um die Bedeutung derselben für die Erhaltung des wasserreichen Zustandes des Parenchyms der Knollen festzustellen, genügt es, das folgende Experiment auszuführen ²⁾. Man verschafft sich zwei Kartoffelknollen von möglichst gleicher Grösse. Die eine Knolle wird geschält, um das Korkgewebe zu entfernen, die andere Knolle bleibt ungeschält. Man bestimmt nun das Gewicht beider Knollen und lässt sie dann neben einander liegen. Erneute Wägungen, die man nach Verlauf von 3, 6 und 24 Stunden vornimmt, lehren, dass die geschälte Knolle weit mehr Wasser als die ungeschälte verliert. Die kleinen Feuchtigkeitsmengen, welche die ungeschälte Knolle verliert, entweichen zumal aus den Lenticellen und aus feinen Rissen in der Schale.

Wenn man zwei Aepfel von möglichst gleicher Grösse aussucht, den einen abschält, den anderen ungeschält lässt, und das Gewicht der Untersuchungsobjecte von Zeit zu Zeit, z. B. alle 24 Stunden, feststellt, so ergiebt sich, dass der seiner Schale beraubte Apfel weit mehr Wasser an die Luft abgiebt, als der ungeschälte. Die cuticularisirte Epidermis ist demnach ebenso wie das Korkgewebe auf jeden Fall sehr schwer permeabel für Wasser ³⁾.

Die geringe Wasserabgabe ungeschälter Kartoffeln und Aepfel wird insbesondere durch das Vorhandensein von Lenticellen vermittelt, und um noch direct darzuthun, dass diese Organe in der That nicht ohne Bedeutung für die Transpirationsgrösse sind, stelle man folgende Experimente an. Zwei möglichst gleichartige, unbeblätterte und mit Periderm überzogene Zweigstücke von *Aesculus* oder *Ampelopsis* von etwa 3 g Gewicht werden an ihren beiden Enden luftdicht mit Wachs verschlossen und sich nach erfolgter genauer Gewichtsbestimmung 24 Stunden lang selbst überlassen. Man ermittelt dann abermals das Gewicht der Untersuchungsobjecte und stellt dadurch ihren Tran-

1) Vgl. SACHS, Botan. Zeitung, 1860.

2) Vgl. DETMER, Journal f. Landwirthschaft, 1879, S. 119.

3) Vgl. JUST in COHN's Beiträgen zur Biologie der Pflanzen, 1875, Heft 3.

spirationsverlust fest. An einem Zweige verkittet man nun die Lenticellen, an dem anderen entsprechend grosse Peridermstellen mit geschmolzenem Wachs, bestimmt das Gewicht der Pflanzentheile sofort und ebenso wieder nach 24-stündiger Transpiration. Der Zweig, dessen Lenticellen verkittet worden waren, wird absolut oder wenigstens procentisch weniger Wasser als das Vergleichsobject verloren haben.

Die Epidermis der Blätter ist, wie schon unter 70 hervorgehoben wurde, sehr allgemein mit Wachsüberzügen versehen, die bekanntlich in verschiedenen Formen auftreten. Diese Wachsüberzüge setzen die Transpirationsgrösse der Blätter nicht unwesentlich herab, wie z. B. das folgende Experiment lehrt. Man benutzt zweckmässig die beiden Blätter desselben Blattpaares von *Eucalyptus globulus* zum Versuch. Das eine Blatt wird ohne Weiteres, das andere, nachdem man den Wachsüberzug mit einem weichen Tuche abgewischt hat, genau gewogen. Die nach Verlauf von 6, 12 oder 24 Stunden wiederholten Wägungen der gewelkten Blätter lehren, dass das erstere Blatt einen geringeren Transpirationsverlust als das letztere erfahren hat¹⁾.

Die im Vorhergehenden angeführten Experimente lassen freilich keinen Zweifel darüber bestehen, dass bei der Transpiration der Gewächse höchstens ein geringer Theil des verdampfenden Wassers die cuticularisirte Epidermis passirt, zumal wenn die Cuticula mit wachsartigen Substanzen reichlicher imprägnirt ist. Indessen die Cuticula ist doch nicht völlig impermeabel für Wasser, wie die folgenden Versuche lehren.

Wir legen ein abgeschnittenes, unversehrtes Blatt einer Begonie, dessen Oberfläche spaltöffnungsfrei ist, neben einen Objectträger in eine Krystallisirschale. Nun versetzen wir eine grössere Kochsalzmenge mit wenig Wasser, so dass das Kochsalz etwas angefeuchtet ist, vertheilen sowohl auf die Blattoberseite, als auch auf den Objectträger kleine Kochsalzmengen und bedecken die Krystallisirschale mit einer Glasplatte. Das Kochsalz auf dem Blatt zerfliesst alsbald, weil es Wasser aus dem Blattgewebe, welches nur durch die Cuticula nach aussen gelangt sein kann, anzieht. Das Kochsalz auf dem Objectträger zieht höchstens wenig Wassergas aus der atmosphärischen Luft an und bleibt relativ trocken.

Wir stellen uns durch Zusammenschmelzen von Wachs mit Olivenöl oder Cacaobutter (sehr empfehlenswert ist eine Mischung von 1 Thl. Wachs mit 3 Thl. Cacaobutter) ein sehr leicht zu verflüssigendes Gemisch her. Es werden dann zwei möglichst gleichartige Blättchen von Mahonia abgeschnitten, und während wir bei dem einen Blättchen nur die Oberseite mit dem Gemisch von Wachs und Fett überziehen (es gelingt das leicht mit Hilfe eines Pinsels), so wird bei dem zweiten Blatt nur die Unterseite verklebt. Bei beiden Untersuchungsobjecten verklebt man den Blattstielquerschnitt. Nach völligem Erkalten und Erstarren der Wachsüberzüge bestimmen wir das Gewicht der Blätter, lassen sie mit ihrer nach oben gewandten freien Fläche am Licht liegen und ermitteln nach einiger Zeit abermals ihr Gewicht. Das Blättchen mit freier Unterseite wird mehr Wasser durch Verdunstung abgegeben haben als das andere, weil der Unterseite des Mahoniablattes Spaltöffnungen nicht fehlen. Die spaltöffnungsfreie Oberseite des Mahoniablattes giebt natürlich nur relativ wenig Wasser an die Luft ab, und dieses Wasser muss die Cuticula pas-

1) Vgl. G. HABERLANDT, Physiologische Pflanzenanatomic, 1884, S. 69.

siren. Es giebt noch andere Pflanzen (*Ilex*, *Nerium*, *Begonia*, *Ficus* etc.), deren Blätter, da sie nur an ihrer Unterseite Spaltöffnungen besitzen, zu ähnlichen Experimenten wie die Mahoniablätter verwendet werden können.

Bei der Untersuchung der Beziehungen zwischen der Organisation der Pflanzentheile einerseits und ihrer Transpiration andererseits darf nicht unerwähnt bleiben, dass viele Blätter, übrigens auch andere Organe, Gewebe ausgebildet haben, die zur Aufspeicherung von Wasser dienen. Es kommen hier zumal Gewächse in Betracht, die an relativ trockenen Standorten vegetiren und die oft darauf angewiesen sind, eine längere Periode grosser Trockenheit zu überdauern. Zu nennen wären namentlich viele Cacteen, die cactusartigen Euphorbien, zahlreiche Crassulaceen, Aloë- sowie *Peperomiaspecies*. Wir stellen z. B. einen Querschnitt durch das Blatt von *Aloë soccotrina* her. Unter der sehr stark cuticularisirten Epidermis liegt das grüne Assimilationsgewebe, dessen Zellen relativ grosse Chlorophyllkörner führen. Die Mitte des Blattes wird von einem Gewebe, dem sog. Wassergewebe, eingenommen, dessen grosse Zellen sehr wasserreich sind und schleimige Substanzen in bedeutender Menge enthalten. An der Grenze zwischen dem Wassergewebe und dem Assimilationsgewebe, welches das erstere rings umschliesst, liegen die Gefässbündel. Wenn die Aloëarten in trockenen Zeiten nicht in der Lage sind, grössere Wassermengen mit Hilfe ihrer Wurzeln aus dem Boden aufnehmen zu können, so wird das in dem Wassergewebe aufgespeicherte Wasser verbraucht, und die Pflanzen leiden nicht wesentlich in Folge der Dürre, die andere Gewächse vernichten würde. Das Blatt von *Peperomia trichocarpa* besitzt ebenso ein entwickeltes Wassergewebe, wie man sofort bei der Untersuchung von Blattquerschnitten erkennt. Unter der Epidermis der Blattoberseite liegt ein saftreiches, chlorophyllfreies Gewebe, dessen Zellen nach der Blattmitte zu an Grösse zunehmen. Das Assimilationsparenchym präsentirt sich auf dem Querschnitt als ein Gewebe von nur geringer Dicke. Es ist zwischen dem erwähnten Wassergewebe der Blattoberseite und einer mächtigen Parenchymschicht der Blattunterseite ausgebreitet, deren Zellen zwar etwas Chlorophyll führen, aber wegen ihres bedeutenden Saftgehaltes doch wohl als solche anzusehen sind, die der Hauptsache nach ebenfalls für die Wasserspeicherung Bedeutung besitzen.

82. Weitere Transpirationsversuche.

Es ist beachtenswerth, dass von einer bestimmten Blattfläche erheblich weniger Wasser in der Zeiteinheit verdunstet, als von einer gleich grossen freien Wasserfläche. Zur Constatirung dieser Thatsache stellte ich unter Benutzung des in Fig. 79 abgebildeten Apparats die folgenden Versuche an. Ein 11 cm hohes, 8 cm weites Glasgefäss wird mit guter Gartenerde angefüllt und in dieselbe ein Bohnensame zur Keimung ausgelegt. Hat die junge Pflanze ihre Primordialblätter völlig entfaltet, so legt man eine halbirte Glasplatte auf den abgeschliffenen und mit Fett bestrichenen Rand des Gefässes. Die Glasplatte ist mit drei Löchern versehen. Das mittlere dient zur Aufnahme des Stengels der Bohnenpflanze und wird nöthigenfalls noch mit Watte verstopft. Das eine der beiden seitlichen Löcher nimmt das Thermometer *T* auf, während man das andere mit einem Kork verschliesst. Man bestimmt nun das Gewicht des gesammten Apparats, ebenso dasjenige einer mit Wasser gefüllten Krystallisirschale. Die letztere hatte

bei meinem Versuche einen Durchmesser von 5 cm. Nach Verlauf von 24 Stunden ermittelt man das Gewicht der Apparate abermals. Die Bohnenpflanze hatte 4,6 g, die freie Wasserfläche 2,23 g Wasser an die Luft abgegeben. Die Grösse der Wasserfläche berechnet sich zu 19,6 qcm. Die Oberfläche der Bohnenblätter ermittelt man auf folgende Weise. Recht homogenes Papier wird mit einer Lösung von doppelt-chromsaurem Kali getränkt. Nach dem Trocknen des Papiers bestimmt man das Gewicht eines Stückes desselben von bekannter Oberfläche. Man schneidet ferner die beiden Primordialblätter der Bohnenpflanze ab, legt sie auf genügend grosse Stücke des mit Kaliumbichromat getränkten Papiers und setzt dieses nunmehr einige Zeit lang dem directen Sonnenlicht aus. Der Umriss der Blätter ist alsbald deutlich auf dem Papiere zu erkennen, denn die unbedeckten Theile desselben bräunen sich erheblich. Man schneidet die Blattabdrücke sorgfältig aus, ermittelt das Gewicht der betreffenden Papierstücke und kann nun unter Berücksichtigung des Gewichts eines Papierstückes von bekannter Fläche auch die Oberfläche der Blätter leicht feststellen. Ich fand die Gesamtoberfläche der beiden Primordialblätter meiner Bohnenpflanze zu 230,8 qcm. Diese Blattfläche verdunstete sicher nicht mehr als 4,6 g Wasser, denn ich habe die Oberfläche der Blattstiele, des Bohnenstengels und der Endknospe ganz ausser Acht gelassen, obgleich diese Organe ja auch kleine Wassermengen an die Luft abgeben. 19,6 qcm freier Wasserfläche gaben in 24 Stunden 2,23 g Wasser ab, also 100 qcm 11,3 g. 230,8 qcm Blattfläche verloren in 24 Stunden 4,6 g Wasser, also 100 qcm 1,99 g.

Fig. 79. Apparat zu Transpirationsversuchen.

Unter 81 ist bereits festgestellt worden, dass die cuticularisirten Regionen der Epidermis der Blätter eine gewisse Bedeutung für den Process der Transpiration besitzen, denn sie sind, wie wir gesehen haben, nicht durchaus impermeabel für Wassergas. Aber trotzdem ist es sicher, dass die wesentlichste Bedeutung bei der Transpiration den Spaltöffnungen zukommt. Man hat nämlich eine entschiedene Abhängigkeit der Transpirationsgrösse eines Pflanzentheils von der Anzahl der vorhandenen Spaltöffnungen constatiren können. Eine directe Proportionalität zwischen der Anzahl der Spaltöffnungen auf bestimmter Blattfläche und der Transpirationsgrösse ist freilich nicht vorhanden, aber dies darf uns nicht wundern, denn das durch die Spaltöffnungen entweichende Wassergas wird ja in den Intercellularen gebildet, und es kommt somit nicht nur auf die Stomata allein, sondern ebenso auf die Form, Weite und Anzahl der Intercellularen an.

GARREAU ¹⁾ hat die Transpirationsgrösse der Ober- und Unterseite zahlreicher Blätter bestimmt und zugleich die Anzahl der auf gleichen Blattflächen vorhandenen Spaltöffnungen festgestellt. Er gelangte z. B. zu folgenden Resultaten:

	Verhältnisszahl der Spaltöffnungen	In 24 Std. transpirirtes Wasser in g
<i>Atropa belladonna</i>	oben 10	0,48
	unten 55	0,60
<i>Nicotiana rustica</i>	oben 15	0,57
	unten 20	0,80
<i>Tilia europaea</i>	oben 0	0,20
	unten 60	0,49

Fig. 80. Apparat für Transpirationsversuche.

Will man die Versuche GARREAU's wiederholen, so stelle man sich den in Fig. 80 abgebildeten Apparat zusammen. Zwei gleiche Glasglocken von je nach Bedürfniss verschiedener Grösse (etwa 40, resp. 80 mm Durchmesser und 100 mm Höhe) werden auf die Ober- und Unterseite desselben Blattes aufgesetzt und mit Hülfe eines Kittes luftdicht befestigt. Als Kitt leistet, wovon ich mich überzeugte, ein durch Zusammenschmelzen von 2 Thl. Baumöl, 1 Thl. ausgelassenem Hammeltalg und 1 Thl. Wachs hergestelltes Gemisch gute

Dienste. Ist die Temperatur in demjenigen Raum, in welchem der Apparat steht, relativ hoch (z. B. über 20° C.), so verwende man nicht 2 Thl. Baumöl, sondern eine geringere Menge. Die Glasglocken müssen tubulirt sein, damit man in den Stand gesetzt wird, die beiden mit Oel gesperrten Manometer *m* und *m'* anbringen zu können. Unter jeder Glasglocke befindet sich endlich noch ein mit Chlorcalcium angefülltes Glas (*g* und *g'*). Aus der Gewichtszunahme dieser Gläser ergibt sich die Transpirationsgrösse der Blattflächen. Es ist selbstverständlich, dass man nicht mit abgeschnittenen, sondern mit den an der intacten Pflanze belassenen Blättern experimentirt. Bei einem unter meiner Leitung ausgeführten

1) Vgl. GARREAU, Ann. d. sc. nat. 1850.

Versuch mit *Begonia* und Benutzung von 42 mm weiten Glasglocken wurden folgende Resultate erhalten. In 4 Stunden verdunstet bei 20° C. von der Blattoberseite 0,0075 g, von der Blattunterseite aber 0,0520 g Wasser.

Neuerdings hat uns STAHL¹⁾ mit einer Untersuchungsmethode (Kobaltprobe) bekannt gemacht, die bei Ausführung zahlreicher Versuche über die Transpiration vortreffliche Dienste leistet und auch zweckmässig benutzt werden kann, um zu zeigen, dass die cuticuläre Transpiration der stomatären gegenüber ungemein in den Hintergrund tritt. Schwedisches Filtrirpapier wird mit einer 4–5-proc. wässerigen Lösung von Kobaltchlorür imprägnirt und am Ofen oder an der Sonne getrocknet. Wir legen ein Stück des über einer Spiritus- oder Gasflamme noch weiter getrockneten und dann intensiv blau erscheinenden Kobaltpapiers auf eine trockene Glasplatte. Auf das Papier bringen wir ein Blatt von *Phaseolus multiflorus* und bedecken dies mit einem zweiten Stück ausgetrockneten Kobaltpapiers und einer zweiten Glasplatte. War das Bohnenblatt völlig frisch und vor der Benutzung dem Sonnenlicht ausgesetzt gewesen, so sehen wir schon nach sehr kurzer Zeit (einigen Secunden oder einer Minute), dass das mit der Blattunterseite in Berührung befindliche Kobaltpapier einen rothen Farbenton annimmt, während das andere Stück des Papiers seine blaue Farbe behält. Dies Resultat wird stets erzielt, wenn man mit Blättern experimentirt (Blätter von *Phaseolus*, *Salix Caprea*, *Populus nigra*, *Liriodendron*, *Syringa vulgaris*, *Cyclamen*, Blätter der letzteren Pflanze stehen ja auch im Winter zur Verfügung), deren Oberseite spaltöffnungsarm oder spaltöffnungsfrei ist. Die Röthung des Papiers kommt zu Stande, indem der Wasserdampf aus den Spaltöffnungen hervortritt und auf das Kobaltchlorür einwirkt; durch die Cuticula treten höchstens Spuren von Wasser aus, weshalb das die Blattoberseite berührende Papier keine oder nur eine höchst unbedeutende Farbenänderung erfährt.

Zum Nachweis der Verdunstung eines Blattes an der unversehrten Pflanze empfiehlt es sich gewöhnlich, statt der schweren Glasplatten grosse, dünne Glimmerblätter zu verwenden. Die Befestigung der Glimmerblätter geschieht mittelst kleiner Haftklammern.

83. Der Einfluss äusserer Verhältnisse auf die Transpiration der Pflanzen.

Die Apparate, welche man bei den zahlreichen vorliegenden Untersuchungen über den Einfluss äusserer Verhältnisse auf die Transpiration der Pflanzen in Anwendung gebracht hat, sind sehr verschiedenartig construirt worden. Wir wollen hier nur wenige Apparate benutzen, die ich aus eigener Erfahrung empfehlen kann. Der eine ist bereits unter 82 beschrieben worden und in Fig. 79 abgebildet. Dort ist angegeben, dass die Untersuchungsobjecte in dem mit Glasdeckel verschliessbaren Glasgefäss selbst cultivirt werden können. Man kann die Pflanzen aber auch in Blumentöpfen zur Entwicklung bringen und diese in die genügend grossen und mit abgeschliffenem Rand sowie Glasdeckel versehenen Glasgefässe hineinstellen. Experimentirt man mit relativ grossen Pflanzen (z. B. *Helianthus*, *Nicotiana*), und ist

1) Vgl. STAHL, Botan. Zeitung, 1894.

man daher genöthigt, um eine recht kräftige Entwicklung der Gewächse zu erzielen, grosse Blumentöpfe zu benutzen, so stellt man diese in Zinkblechbehälter, die mit einem halbirten Deckel verschlossen werden können. In diesen Deckel müssen Löcher zur Aufnahme eines Thermometers sowie des Stammes des Untersuchungsobjectes vorhanden sein. Die Deckelfugen kann man mit einem Kitt (1 Thl. Wachs und $\frac{1}{2}$ Thl. Olivenöl, zusammengeschmolzen) luftdicht verstreichen. Transpirationsversuche mit relativ grossen Pflanzen (*Helianthus*, *Nicotiana*) sind schon deshalb lehrreich, weil sie uns zeigen, dass dieselben

in kurzer Zeit (z. B. 24 Stunden) recht bedeutende Wassermengen an die Luft abgeben.

Der zweite bei Experimenten über die Wasserverdunstung der Gewächse bequem, zumal bei Demonstrationen in der Vorlesung, zu verwendende Apparat ist in Fig. 81 dargestellt. Das U-förmig gebogene, ziemlich weite Glasrohr *G* ist mit Wasser angefüllt. Die Mündung des einen Schenkels wird mittelst eines Korkes verschlossen, in dessen Bohrung das untere Ende des Sprosses *Sp*, dessen Transpirationsgrösse ermittelt werden soll, steckt. Die Mündung des anderen Schenkels wird mittelst eines zweifach durchbohrten Korkes verschlossen. Die eine Bohrung dient zur Aufnahme des Thermometers *T*, die andere zur Aufnahme des einen Schenkels des gebogenen, dünnen und mit Wasser angefüllten Glasrohres *G*¹. Wir stellen unsere Vorrichtung in ein weites Glasgefäss und sind im Stande, indem wir den gesamten Apparat auf eine Waage bringen, den durch Transpiration des Sprosses herbeigeführten Gewichtsverlust festzustellen. Zugleich aber können

Fig. 81. Apparat zu Transpirationsversuchen.

wir auch die durch die Transpiration bedingte Volumenverminderung des Wassers im Apparat direct beobachten, denn die Verdunstung bedingt ein Sinken des Wassers im Glasrohre *G*¹.

Besonders empfehlenswerth für Transpirationsversuche ist der in Fig. 82 abgebildete Apparat. In die obere Oeffnung des mit Wasser angefüllten Gefässes *C*, das z. B. eine Höhe von 25 cm und einen Durchmesser von etwa 6 cm haben kann, ist das Untersuchungsobject wasserdicht eingesetzt. Man kann mit Sprossen oder mit bewurzelten Pflanzen experimentiren. Den dichten Verschluss erzielt man durch Benutzung eines mit einer Bohrung zur Aufnahme des Pflanzentheils versehenen Kautschukkorkes, oder dadurch, dass man die bewurzelten Pflanzen mit

Hülfe eines halbirten Korkes einsetzt und die Fugen mit einer bei relativ niedriger Temperatur schmelzbaren Mischung von Wachs, Hammelfett und Olivenöl verstreicht. In den zweiten Tubulus des Gefässes *C* ist das etwa 15 mm weite, mit Wasser angefüllte und graduirte Glasrohr *R* eingesetzt. Das Wasser in *R* bedeckt man mit dünner Oelschicht. Zweckmässig ist es, die Temperatur des Wassers im Apparat durch ein Thermometer bestimmen zu können. In vielen Fällen empfiehlt es sich, das Wasser im Gefäss *C* mit einer Oelschicht zu bedecken, um auf diese einfache Weise die transpirirenden und Wasser aufnehmenden Theile des Untersuchungsobjectes von einander zu trennen.

Durch Wägung des ganzen Apparates auf einer genügend empfindlichen Waage kann der Transpirationsverlust der Pflanze ermittelt werden. Die Wasseraufnahme ergibt sich, natürlich

unter Berücksichtigung der Wärmeausdehnung des Wassers, aus den Ablesungen am Rohr *R*¹⁾. Wenn längere Zeit constante äussere Einflüsse auf eine im Apparat befindliche bewurzelte Pflanze einwirken, so stellt sich

ein Gleichgewichtsverhältniss zwischen Transpiration und Wasseraufnahme her. Wird aber durch hohe Lufttemperatur die Transpiration sehr gesteigert, so ist der Wasserverlust der Pflanze grösser als die Wasseraufnahme; stellt man die Pflanze nun aber unter eine Glasglocke, dann überwiegt die Wasseraufnahme²⁾.

Als Untersuchungsobjecte eignen sich sehr gut mit Hülfe der Methode der Wassercultur zur Entwicklung gebrachte Bohnen- oder Maispflanzen und abgeschnittene Sprosse von Holzpflanzen, z. B. *Salix*. In vielen Fällen, z. B. bei Demonstrationsversuchen, genügt es, die bei Experimenten über Transpiration zu benutzenden abgeschnittenen Sprosse in ein Wasser enthaltendes Gefäss zu stellen und die Wasseroberfläche mit einer

Schicht Olivenöl zu bedecken. Durch Wägung des Apparates lässt sich der Transpirationsverlust ermitteln. (Vgl. Fig. 83.) Kommt

Fig. 82. Apparat zur Bestimmung der Wasseraufnahme und Wasserabgabe transpirirender Pflanzen. (Nach PFEFFER.)

1) Vgl. PFEFFER, Handbuch der Pflanzenphysiologie, Bd. 1, S. 135 u. 141.

2) Ueber das Verhältniss zwischen Wasseraufnahme und Abgabe der Pflanzen vergl. zumal VESQUE, Ann. d. sc. nat., 1876 u. 1878.

es hierbei nicht auf sehr grosse Genauigkeit an, so benutzt man eine ober-schalige Waage, die im Preis von ca. 20 Mk. von MUENCKE in Berlin zu beziehen ist. (Vergl. Fig. 83). Als Beobachtungsobjecte dienen Zweige von *Salix fragilis*, *Helianthus*, *Eucalyptus globulus* (ein junger, 20 Blätter tragender Spross dieser Pflanze verdunstete unter gar nicht sehr günstigen Umständen z. B. 7 g Wasser in der Stunde) etc. Im Winter verwendet man zu diesen und anderen Transpirationsversuchen Sprosse von *Fuchsia*, die zumal in directem Sonnenlicht recht stark transpiriren.

Wollen wir uns davon überzeugen, dass Pflanzen in einer wassergasreichen Luft weit schwächer transpiriren als in wassergasarmer, so stellen wir einen unserer Apparate zunächst eine halbe Stunde lang unter eine Glasglocke, deren innere Wandfläche mit Wasser benetzt worden ist. Dann setzen wir unser Untersuchungsobject eine halbe Stunde lang der freien Luft aus. Man stelle die Versuche übrigens nicht im Freien, sondern in einem Zimmer an und Sorge dafür, dass das Beobachtungsobject während der Experimente stets den nämlichen Temperatur- sowie Beleuchtungsverhältnissen ausgesetzt bleibe.

Bei höherer Temperatur giebt eine Pflanze viel mehr Wasserdampf als bei niedriger Temperatur ab. Die Temperaturverhältnisse an sich und die Feuchtigkeitsverhältnisse wirken hierbei gewöhnlich zusammen.

Um die Abhängigkeit der Transpirationsgrösse von dem Wassergasgehalt der Luft und der Temperatur recht klar hervortreten zu lassen, stellte ich Versuche mit dem in Fig. 84 abgebildeten Apparat an. Auf einem Dreifuss steht der 40 cm hohe und 24 cm Durchmesser haltende Zinkblechcylinder *Z*. Im Cylinder ruht auf einem kleinen Dreifuss die Porcellanschale *P*, während die Krystallisirschale *K* auf einem Drahtgestell Platz findet, das an der Unterseite des den Cylinder verschliessenden Holzdeckels oder besser Metalldeckels befestigt ist. Das Thermometer *T* dient zur Bestimmung der Temperatur der Luft im Cylinder. Man experimentirt zweckmässig mit Zweigen von *Salix fragilis*, die auch im Dunkeln noch recht lebhaft transpiriren, da ihre Stomata sich bei Lichtmangel nicht schliessen. Ein mit vielen Blättern besetzter Zweig wird abgeschnitten, in ein Wasser enthaltendes Gläschen gestellt und die Wasseroberfläche, um Verdunstung von derselben zu vermeiden, mit einer Schicht von Olivenöl bedeckt. Das Gläschen findet nun in der grossen Porzellanschale seinen Platz, nachdem in diese und auch in die Krystallisirschale *K* Chlorcalcium gebracht worden ist. Hat man bei Beginn des Versuchs das Gewicht des Gläschens und des Weidenzweiges ermittelt, und wiederholt man die Wägung nach etwa 4 Stunden, so gewinnt man Aufschluss über die Transpirationsgrösse des Zweiges

Fig. 83. Waage für Transpirationsversuche.

in sehr wassergasarmer Luft. Jetzt ersetzt man das Chlorcalcium in *P* und *K* durch Wasser und lässt den Zweig 4 Stunden lang in der wassergasreichen Luft verdunsten. Hat man den relativ geringen Transpirationsverlust unter diesen Umständen constatirt, so wird das Untersuchungsobject nochmals der wassergasarmen Luft ausgesetzt. Der Apparat findet am besten in einem nach Norden gelegenen Zimmer Platz, denn in einem solchen Raum sind die Temperaturschwankungen während eines Tages nur unbedeutend.

Bei Versuchen über den Einfluss der Temperatur werden die Zweige zunächst bei niedrigerer Temperatur und nachdem *P* und *K* mit Chlorcalcium beschickt worden sind, im Apparat gehalten. Dann erwärmt man die Luft im Apparat und setzt das Untersuchungsobject der höheren Temperatur aus. Ein Weidenzweig verdunstete z. B. (immer in wassergasarmer Luft) in je 4 Stunden bei 21° C. 5,2 g, und bei 32° C. 8,5 g Wasser.

Es ist klar, dass im letzten Experiment die Transpirationsgrösse nicht nur durch die höhere Lufttemperatur, sondern zugleich auch dadurch gesteigert werden musste, dass das Untersuchungsobject aus dem warmen Wasser eine relativ grosse Flüssigkeitsmenge aufnahm. Um dies letztere Moment auszuschliessen, kann der folgende Apparat (vgl. Fig. 85) Verwendung finden, den ich auch benutzte, um die Abhängigkeit der Transpirationsgrösse vom Wassergehalt zu demonstrieren. Auf dem Ring des Stativs *St* ruht eine in ihrer Mitte mit einer Oeffnung versehenen flache Porzellanschale *P*. Die mit dem Thermometer *T* beschickte Glasglocke *G* wird zweckmässig ziemlich gross (30 cm hoch und 15 cm Durchmesser) gewählt. In den Kork *K* des mit Wasser gefüllten U-Rohres *U* steckt das Thermometer *T'* und die Basis

Fig. 84. Apparat für Transpirationsversuche. Der Zinkcylinder *Z* ist durchsichtig gedacht.

eines Sprosses (z. B. *Syringa*), während die Blätter des Sprosses von der Glasglocke *G* bedeckt sind. In der Oeffnung der Porzellanschale wird der Spross mittelst Watte befestigt. In die Bohrung des Korkes *K'* des U-Rohres wird der eine Schenkel des Glasrohres *Gl* von ca. 2 mm Weite im Lichten eingeführt. Der andere Schenkel des Rohres ruht neben einem Millimetermaassstab auf einer vom Stativ

getragenen Holzplatte. Sind *U* und *Gl* bei Beginn des Versuchs völlig mit Wasser angefüllt und hat man den Boden von *P* mit Chlorcalcium bedeckt, so wird die Glocke *G* aufgesetzt. Nach Verlauf einiger Zeit bestimmt man die Lage des Meniscus in *Gl* und kann die Grösse des Wasserverbrauchs der Pflanze nun ermitteln, indem man z. B. von 5 zu 5 Minuten constatirt, um wie viel Millimeter der Meniscus in *Gl* zurückgewichen ist.

Fig. 85. Apparat zur Messung der Wasseraufnahme transpirirender Pflanzen.

Um die Temperatur der Luft unter *G* um einige ° C. zu erhöhen, ist es nur erforderlich, das kleine mit heissem Sand angefüllte Schälchen *S* in den Apparat einzuführen. *S* findet unter *G* auf einem kleinen Dreifuss Platz. Bei Beobachtungen über den Einfluss des Wassergasgehaltes der Luft auf den Wasserverbrauch der Pflanzen wird *P* in Parallelversuchen mit Chlorcalcium und Wasser beschickt. Bei Experimenten, die ich in diffusum Licht mit Syringasprossen anstellte, wich der Meniscus in je 10 Minuten um 10 mm zurück, wenn die die Blätter umgebende Luft wassergasarm war. In einem Parallelversuch mit wassergasreicher Luft unter *G* konnte in 10 Minuten nur ein Zurückgehen des Meniscus in *Gl* um 3 mm beobachtet werden. Für manche sehr detaillierte Arbeiten über die Transpiration eignet sich auch der Apparat von KOHL. Bei dem Gebrauch desselben und ebenso bei der Benutzung der in Fig. 85 abgebildeten Zusammenstellung ist übrigens wohl zu beachten, dass, wenn die Wasseraufnahme seitens der Pflanzen im Allgemeinen auch mit der Transpiration sinkt und steigt, die erstere doch

keineswegs unter allen Umständen in ihrer Ausgiebigkeit durch die Transpiration bestimmt wird. Die Apparate sind aber doch für vergleichende Versuche von kurzer Dauer recht zu empfehlen.

Einen dem Apparat von KOHL sehr ähnlichen erhalten wir, wenn wir die Schale *P* in Fig. 85 durch eine in ihrer Mitte mit einer Oeffnung versehene, matt geschliffene Glasplatte ersetzen, überall für luftdichten Verschluss sorgen und durch den Kork der Glocke *G* ein Gasleitungs- und ein Gasableitungsrohr schieben. Mit Hilfe eines Aspirators saugen wir Luft durch den Apparat, die z. B. bei Versuchen über den Einfluss der Temperatur auf die Transpiration vor ihrem Eintritt in die Glocke,

um sie völlig zu trocknen, Gefässe passirt hat, welche concentrirte Schwefelsäure und Chlورcalcium enthalten. Erwärmung der Luft erzielt man leicht dadurch, dass man das Gaszuleitungsrohr in der Nähe der Glocke *G* mittelst einer Spiritusflamme auf höhere Temperatur bringt.

Lehrreich ist es, die Thatsache festzustellen, dass das Licht die Transpirationsgrösse erhöht. Ich benutzte bei meinen Versuchen den in Fig. 79 abgebildeten Apparat und experimentirte zumal mit *Cucurbita*. Man stellt die Beobachtungen in einem Zimmer an, das zur Zeit der Versuche nur diffuses Licht empfängt und ohne Mühe schnell verdunkelt werden kann, wobei übrigens gar nicht auf absoluten Lichtausschluss zu sehen ist. Der Apparat steht am besten vor dem Fenster auf einer Waage. Man beleuchtet eine oder zwei Stunden lang, verdunkelt dann z. B. durch Schliessen eines Fensterladens und beleuchtet wieder nach Verlauf von 1 oder 2 Stunden etc. Während der einzelnen Versuchsperioden muss die Boden- und Lufttemperatur dieselbe bleiben; ebenso darf die Luftfeuchtigkeit nicht schwanken. Als Psychrometer verwendet man bequem ein einfaches Stativ mit zwei Thermometern, von denen das eine trocken gehalten wird, während die Kugel des anderen mit nasser Leinwand umwickelt ist. Genaueres über meine Versuchsergebnisse ist in meiner Abhandlung: Beiträge zur Theorie des Wurzeldrucks, Jena, 1877, S. 77, nachzusehen. Die Ursache der Transpirationssteigerung durch Beleuchtung ist einerseits in der Wärmewirkung der in die Pflanze eindringenden Lichtstrahlen zu suchen, andererseits wird jene Steigerung in manchen Fällen noch wesentlich dadurch erhöht werden können, dass Lichtzutritt eine Erweiterung der Spalten der Spaltöffnungsapparate herbeiführt.

Dieses letztere Moment ist auch in erster Linie zu beachten, wenn es sich darum handelt, die Resultate der folgenden einfachen Versuche zu verstehen. Wir stellen zwei mit Wasser angefüllte enghalsige Glasflaschen auf. Die eine Flasche dient zur Aufnahme eines grösseren Zweiges von *Tilia grandifolia*, die andere zur Aufnahme eines Sprosses von *Salix fragilis*. Auf das Wasser beider Gläser schichten wir noch Olivenöl und wägen die Apparate. Beide werden alsdann diffusum Tageslicht ausgesetzt und nach einiger Zeit durch Wägung der Transpirationsverlust der Untersuchungsobjecte ermittelt. Ich fand, dass ein grosser *Tiliaspross* in $1\frac{1}{2}$ Stunden z. B. nur 0,5 g Wasser verdunstete, während Weidenzweige unter den bezeichneten Umständen recht lebhaft transpirirten. Dem directen Sonnenlicht ausgesetzt, gab der *Tiliazweig* in $1\frac{1}{2}$ Stunden 45 g Wasser ab. Bei *Tilia* sind die Spaltöffnungen nur in directem Sonnenlicht weit geöffnet, sie schliessen sich schon in diffusum Licht. Bei *Salix* bleiben die Stomata auch in diffusum Licht offen, daher transpiriren die Sprosse auch unter diesen Umständen recht stark.

Dass die Spaltöffnungsapparate der Linde in der That sehr lebhaft auf Beleuchtungswechsel reagiren, lässt sich leicht mit Hülfe der Kobaltprobe constatiren. Abgeschnittene Zweige von *Tilia grandifolia* werden mit der Basis in Wasser gestellt und theils dem directen Sonnenlicht, theils schwachem diffusum Tageslicht ausgesetzt. Nach Verlauf von 2 Stunden ergiebt die Kobaltprobe (vgl. S. 181), dass die Blätter der ersteren Zweige das mit ihrer Unterseite in Berührung gebrachte Kobaltpapier sehr stark röthen, während die Blätter der Zweige, welche im diffusen Licht verweilt haben, dies nur in geringem Grade vermögen. Mit Hülfe der Kobaltprobe fand ich auch, dass Blätter

von Tiliazweigen, die dem directen Sonnenlicht, ohne sich mit Wasser in Berührung zu befinden, ausgesetzt werden, ihre Stomata schnell schliessen.

Ungemein energisch reagiren auch die Spaltöffnungsapparate von *Aspidistra elatior* und *Ficus elastica* nach STAHL's Beobachtungen auf den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse. Im directen Sonnenlicht öffnen diese Pflanzen ihre Stomata weit, während dieselben im nicht zu hellen diffusen Tageslicht selbst bei hoher Temperatur (30° C.) geschlossen bleiben. *Aspidistra* und *Ficus* verdunsten daher im diffusen Licht sehr schwach, im directen Sonnenlicht stark. Wird ein in einem Blumentopf wurzelndes Exemplar von *Ficus elastica*, welches etwa eine Stunde lang besonnt gewesen war, gewogen, und das Gewicht der Pflanze nach 2—4 Stunden abermals ermittelt, so ergibt sich ein beträchtlicher Transpirationsverlust, wenn das Untersuchungsobject directes Sonnenlicht empfing. Stellt man die Pflanze nunmehr an die Hinterwand eines nach Norden gelegenen Zimmers und beginnt einen neuen Transpirationsversuch, nachdem das Beobachtungsobject sich nach Verlauf etwa einer Stunde den veränderten Bedingungen angepasst hat, dann ergeben die Wägungen sehr geringe Wasserverluste. Bei diesen Experimenten kann die Wasserabgabe seitens des Topfes und des Bodens durch Bedecken mit Stanniol und Umwickeln des Topfes mit einem weissen Tuch ausgeschlossen werden, oder man verfährt, um dies noch sicherer zu erreichen, in der auf S. 182 angegebenen Weise.

Wir schneiden Zweige von *Salix fragilis* und *Tilia grandifolia* ab. Die Zweige, welche nahezu das nämliche Gewicht haben müssen, bringen wir in einem nach Norden gelegenen Zimmer auf einen Tisch. Wasser wird ihnen nicht dargeboten. Wiederholte im Laufe von 1—2 Tagen vorgenommene Wägungen ergeben, dass der Weidenzweig viel stärker transpirirt als der Lindenzweig. Die Blätter des ersteren sind daher auch schon trocken, wenn die Lindenblätter noch relativ viel Wasser enthalten. Untersucht man welkende Linden- und Weidenblätter (den letzteren ganz ähnlich verhalten sich z. B. auch die Blätter von *Cyperus alternifolius*) mit Hilfe der Kobaltprobe, so findet man die Stomata der Linde geschlossen, diejenigen der Weide aber offen. Die Linde und viele andere Pflanzen sind im Stande, ihre Transpirationsgrösse selbst zu reguliren. Sie schliessen, wenn die Gefahr des Welkens droht, ihre Stomata. Die Weide vermag dies nicht; ihre Blätter vertrocknen daher sehr schnell, wenn Wasserzufuhr ausgeschlossen ist.

Will man im Winter Versuche anstellen, die lehren, dass welkende Blätter ihre Stomata schliessen, so verwendet man *Tradescantien* des Gewächshauses als Untersuchungsobjecte. Frisch abgeschnittene Blätter röthen das mit ihrer Unterseite in Berührung gebrachte Kobaltpapier. Wenig angewelkte *Tradescantiablätter* vermögen dies nicht mehr. Werden die auch im Winter stets zur Verfügung stehenden Sprosse von *Cyperus alternifolius* und Blätter von *Aspidistra* abgeschnitten und sich bei diffusum Licht selbst überlassen, ohne dass man ihnen Wasser zuführt, so welken erstere schnell, weil ihre Spaltöffnungen sich nicht schliessen können, die letzteren bleiben aber, da ihre Stomata geschlossen sind, lange frisch. Die Kobaltprobe kann auch hier bequem Aufschluss über den Zustand der Spaltöffnungsapparate geben.

Wenn man Cucurbitaexemplare oder andere Pflanzen mit Hülfe der in Fig. 79 oder 82 dargestellten Apparate auf ihre Transpirationsgrösse untersucht und zunächst eine halbe Stunde lang ruhig auf einer Waage stehen lässt, dann den Transpirationsverlust ermittelt, um die Pflanzentheile nun einige Secunden heftig zu schütteln, so ergiebt sich sofort, dass in dieser letzten Zeit eine unverhältnissmässig bedeutende Wassergasmenge aus den Untersuchungsobjecten entwichen ist. Plötzliche Erschütterungen erhöhen die Transpirationsgrösse der Gewächse erheblich. Ich habe mich hiervon mehrfach überzeugt ¹⁾.

84. Das Holz als wasserleitendes Gewebe und der Einfluss der Transpiration auf die Wasserbewegung in der Pflanze.

Wir bringen an der Basis eines reich beblätterten Zweiges eines Baumes oder Strauches (ich experimentirte mit *Pavia rubra*), ohne denselben von seiner Mutterpflanze zu trennen, einen Ringelschnitt an, indem wir einen etwa 5 cm breiten Rindenring rings im Umfange des Zweiges bis auf das Holz entfernen.

Das Untersuchungsobject bleibt lange Zeit frisch, trotzdem die Blätter lebhaft transpiriren, denn die Wasserzufuhr ist nicht in Folge der Ringelung aufgehoben. Somit kann die Rinde nicht als dasjenige Gewebe betrachtet werden, dem irgend welche besondere Bedeutung bei der Wasserleitung im Stamm zukommt; vielmehr ist es der Holzkörper der Fibrovasalstränge, in welchem sich das Wasser bewegt. Das trockene oder gar bereits theilweise zerstörte Mark in der Mitte der holzigen Stammgebilde spielt natürlich keine Rolle bei der Wasserbewegung in der Pflanze.

Uebrigens ist es sicher, dass nicht der gesammte Holzkörper das Wasser leitet, sondern nur das Splintholz, während das Kernholz leitungsunfähig geworden ist. Natürlich eignen sich zu bezüglichen Experimenten nur solche Pflanzen gut, bei denen ein ausgeprägter Gegensatz zwischen Kern- und Splintholz besteht. Wenn man z. B. den etwa 12—16 cm Durchmesser besitzenden Stamm einer *Robinia* im Sommer bis auf das Kernholz kreisförmig einsägt, so welkt die Pflanze oft noch am Versuchstage. Wenn man kräftigen Zweigen von *Rhus typhina* einen Rindenring von wenigen Centimetern Breite entnimmt, so welkt dieser Zweig schnell. Bei *Rhus typhina* ist der Splint so dünn, dass er bereits in Folge der Rindenringelung leidet, und somit die Wasserleitung unterbrochen werden muss ²⁾. Bei meinen Versuchen war der über der Ringelungsstelle gelegene Theil des Zweiges von *Rhus typhina* bereits nach wenigen Stunden welk. *Rhus glabra* verhält sich nicht in der nämlichen Weise.

Wir schneiden einen Spross von *Impatiens noli tangere* oder *I. parviflora* ab und stellen ihn mit seiner Schnittfläche in wässrige

1) Literatur: UNGER, Anatomie u. Physiologie d. Pflanzen, 1855; SACHS, Handbuch der Experimentalphysiologie d. Pflanzen, 1865; BARANETZKY, Botan. Zeitung, 1872; WIESNER, Sitzungsber. d. Akadem. d. Wiss. in Wien, 1876, Octoberheft; DETMER, Beiträge zur Theorie d. Wurzeldrucks, Jena 1877, S. 47; KOHL, Transpiration d. Pflanzen, Braunschweig 1886; EBERDT, Transpiration d. Pflanzen, Marburg 1889.

2) Vgl. DUTROCHET, Mémoires pour servir à l'histoire anatomique et physiologique de végétaux, 1837, p. 193.

Lösung von Methylgrün. Die Stengel unserer Untersuchungsobjecte sind in hohem Grade durchscheinend, so dass man die Erscheinungen, um die es sich hier für uns handelt, bei ihrer Benutzung besonders schön beobachten kann. Bei einem mit *Impatiens parviflora* angestellten Versuch ergab sich, dass die Farbstofflösung in dem Stengel eines ziemlich stark transpirirenden Sprosses nach Verlauf von $\frac{1}{3}$ Stunde bereits einige Centimeter hoch hinaufgestiegen war, und bei mikroskopischer Untersuchung von Stengelquerschnitten erschien nur der Holztheil der im Kreise angeordneten Gefässbündel tingirt.

Die Resultate dieses und ähnlicher Versuche haben neuerdings durch die Arbeiten WIELER's ¹⁾ und STRASBURGER's ²⁾ wieder eine grössere Bedeutung gewonnen. Sie können in der That zur Begründung des Satzes verwerthet werden, dass die Bewegung des Wassers in der Pflanze im Holz erfolgt. Bei der Beurtheilung der Resultate dieser Versuche mit Farbstofflösungen ist aber immer, zumal wenn es sich um Detailfragen handelt, viel Kritik und Vorsicht erforderlich.

Wir stellen einen ungefähr 20 mm im Durchschnitt besitzenden beblätterten Zweig von *Robinia*, der zunächst in Wasser gestanden hat, ohne seine Schnittfläche mit der Luft in Berührung zu bringen, in wässrige Eosinlösung, die so verdünnt gewählt wird, dass sie in 10 cm dicker Schicht noch durchscheinend ist. Die nach Verlauf einiger Stunden vorzunehmende Prüfung lehrt, dass nur die äusseren Holztheile, nicht die centraler gelegenen gefärbt sind. Die letzteren leiten das Wasser nicht mehr. Wenn man das Experiment nicht allzulange ausdehnt, ist auch leicht unter Berücksichtigung der Vertheilung des Eosins zu constatiren, dass nur die trachealen Bahnen, nicht aber die Holzfasern bei der Wasserbewegung theilhaftig sind. Die letzteren bleiben ungefärbt.

Wenn man Tiliazweige in der angegebenen Weise behandelt, so lässt sich das Eosin nach Verlauf einiger Stunden nur in den Gefässen und Tracheiden nachweisen. Holzfasern und Bast bleiben ungefärbt. Bei Versuchen mit *Aristolochia* färbt sich das Holz; der Ring von Sklerenchymfasern bleibt ungefärbt.

Haben wir durch die angeführten Versuche die Bewegung des Wassers in den trachealen Bahnen des Holzes festgestellt, so wollen wir nunmehr zeigen, dass die Wasserleitung nicht, wie man früher annahm, in den verholzten Membranen der Elemente des Xylems, sondern im Lumen derselben erfolgt ³⁾.

Ich führte bezüglichliche Versuche z. B. in folgender Weise aus. Zwei Zweige von *Salix fragilis* (*a* und *b*) wurden abgeschnitten und mit der Basis in Wasser enthaltende Gläschen gestellt. Das Wasser für *a* wurde noch mit einer Schicht Olivenöl bedeckt. *a* und *b* gelangten nun in den in Fig. 84 abgebildeten Apparat, nachdem die Porzellanschale sowie die Krystallisirschale mit Chlorcalcium beschiekt und die Luft im Zinkcylinder auf 32° C. erwärmt worden war. Nach Verlauf einer Stunde wurde *b* herausgenommen, der Weidenzweig in ein

1) Vgl. WIELER, Jahrbücher f. wissensch. Botanik, Bd. 19.

2) STRASBURGER, Bau und Verrichtung der Leitungsbahnen, Jena 1891, S. 549 und 569.

3) Vgl. ELFFING, Botan. Zeitung, 1882, S. 714; VESQUE, Ann. d. sc. nat. Bot., VI. Sér., T. XIX, p. 188; SCHEIT, Botan. Zeitung 1884, S. 201; ERRERA, Compt. rend. de la société roy. de bot. de Belgique, T. XXV, II. Th., p. 28; STRASBURGER, Bau und Verrichtung der Leitungsbahnen, Jena 1891, S. 541.

Gläsern gestellt, das 3-proc. Gelatinelösung enthielt, und die Oberfläche derselben mit Olivenöl bedeckt. *a* und *b* verweilten nun wieder eine Stunde lang im Apparat. Die Untersuchungsobjecte transpirirten und *b* nahm dabei die Gelatinelösung auf. Nach Verlauf der angegebenen Zeit wurden *a* und *b* aus dem Apparat herausgenommen. *b* wurde, nachdem durch Entfernen eines einige cm langen Stückes an der Basis des Zweiges eine neue Schnittfläche hergestellt worden war, in Wasser getaucht, um die Untersuchungsobjecte nunmehr bei 20° C. sich selbst zu überlassen. Die Gelatine erstarrte in den Gefässen von *b*, was die Wasserbewegung in denselben störte. Nach Verlauf von 20 Stunden waren die Blätter von *b* denn auch welk, während diejenigen des Controlzweiges *a* noch frisch erschienen.

Das nämliche Resultat liefert auch der folgende Versuch ¹⁾. Am Mittag oder am Nachmittag eines sonnigen Sommertages werden Zweige von *Vitis* unter einer Gelatinelösung (auf 100 Thl. Wasser 20 Thl. Gelatine), die man mit chinesischer Tusche gefärbt hat, abgeschnitten. Die Flüssigkeit ist auf 33° C. erwärmt, bei welcher Temperatur sie sich völlig flüssig zeigt. Stellt man die Zweige nun schnell mit der Basis in kaltes Wasser und erneuert die Schnittfläche, so welken die Untersuchungsobjecte alsbald, weil sie in Folge Verstopfung der Lumina ihrer Holzelemente durch die erstarrte Gelatine kein Wasser leiten können. Zweige von *Vitis*, die man unter Wasser abschneidet und in dieser Flüssigkeit stehen lässt, bleiben lange frisch. (Vgl. auch STRASBURGER's citirte Schrift, S. 697.)

Was die Kräfte anbetrifft, durch welche die Wasserhebung in der Pflanze vermittelt wird, so sind diese noch nicht sicher ermittelt. Es existirt leider noch keine allseitig befriedigende Theorie der Wasserbewegung in den Gewächsen ²⁾. Vielleicht kommen die von WESTERMAYER und GODLEWSKI über die Ursachen der Wasserströmung geäusserten Ansichten der Wahrheit am nächsten; vielleicht ist aber auch STRASBURGER's Ansicht die richtige ³⁾; indessen die Zukunft kann erst tiefere Einsicht bringen, und es ist hier nicht der Ort, den Gegenstand näher zu verfolgen. Wir gehen daher lieber dazu über, verschiedene Erscheinungen zu constatiren (unter 85 auch die Leichtbeweglichkeit des Wassers im Holz), welche auf alle Fälle von grosser Wichtigkeit für das Verständniss der Frage nach den Ursachen der Wasserströmung in den Pflanzen sind.

Wir schneiden zwei möglichst gleichartig entwickelte Sprosse von *Impatiens* ab und stellen sie beide mit ihrem unteren Ende in Wasser. Beide Sprosse verweilen zunächst einige Stunden lang unter einer grossen Glasglocke, deren Wand im Innern mit Wasser benetzt worden ist. Dann bringen wir ihre Schnittfläche mit Auflösungen von Methylgrün oder Eosin in Berührung. Der eine Spross wird Bedingungen ausgesetzt, unter denen er lebhaft transpiriren kann. Den anderen schützen wir möglichst vor Wasserverlust, indem wir ihn unter der Glas-

1) Vgl. ERRERA, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 4, S. 16.

2) Literatur über Wasserbewegung: SACHS, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, 1887; HARTIG, Gasdrucktheorie, 1883; WESTERMAYER, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, 1883; GODLEWSKI, Jahrbücher f. wissensch. Botanik, Bd. 15; SCHEIT, Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, N. F. Bd. 12; STRASBURGER, Bau und Verrichtung der Leitungsbahnen in den Pflanzen, Jena 1891; SCHWENDENER, Sitzungsber. d. Akadem. d. Wiss. zu Berlin, 1892. Vergl. auch die letzten Anmerkungen.

3) STRASBURGER's merkwürdige Experimente mit getödteten Pflanzen konnte ich bis jetzt noch nicht wiederholen.

glocke belassen. In diesem letzteren Spross steigt die Farbstofflösung nur wenig empor, während sie sich in den Gefässbündeln des transpirierenden Pflanzentheiles in kurzer Zeit bis zu beträchtlicher Höhe erhebt.

Die Wirkung des Transpirationsprocesses kann auch noch durch anderweitige Experimente leicht festgestellt werden. Wir verwenden dazu den in Fig. 86 abgebildeten Apparat. Wir befestigen einen belätterten Spross mit Hülfe eines Kautschukschlauches luftdicht am oberen Ende einer geraden Glasröhre, füllen dieselbe mit Wasser an und tauchen ihr unteres Ende in Quecksilber ein. In dem Maasse, in welchem das Wasser in Folge der Transpiration verbraucht wird, tritt in das Glasrohr Quecksilber ein und ich fand, dass sich das Quecksilber bei ziemlich lebhafter Wasserverdunstung des Untersuchungsobjectes (ich benutzte z. B. Sprosse von *Lonicera tatarica*) in wenigen Stunden einige Centimeter hoch erheben kann.

Wenn man den Stamm einer Birke nicht weit entfernt vom Erdboden im zeitigen Frühjahr (Ende März, Anfang April) anbohrt und den einen Schenkel eines im rechten Winkel gebogenen Glasrohres mit Hülfe eines Kautschukschlauches oder mit Hülfe von Siegellack luftdicht in der Boh-

Fig. 86. Apparat zum Nachweis der saugenden Wirkung der Transpiration.

rung befestigt, so zeigt sich, dass, zumal zur Zeit der Nacht eine erhebliche Flüssigkeitsmenge in Folge der Thätigkeit des Wurzeldruckes aus dem Baume ausgepresst wird. Wiederholt man den nämlichen Versuch im Sommer, z. B. im Juni, so fliesst kein Tropfen Saft aus der Birke aus, sondern es kann sogar Wasser von dem Stamme eingesogen werden, wie sich leicht feststellen lässt, wenn man das offene Ende des rechtwinkelig gebogenen Glasrohres in Wasser eintaucht. Diese Erscheinung wird durch die Wirkung der Transpiration hervorgerufen.

Wenn einer transpirirenden Pflanze, deren Holzelemente zunächst reichliche Wassermengen enthalten, keine sehr grossen Flüssigkeitsmengen zur Verfügung stehen — und es wird dies zumal im Sommer der Fall sein — dann verschwindet das Wasser mehr und mehr aus dem Lumen der Holzgefässe und Tracheiden. Aus dem intercellularen Luftsystem der Pflanzen geht die Luft, wie früher gezeigt wurde, nur schwierig in das cellulare System über, und ebenso sind die Luftmengen, welche das in den Gewächsen vorhandene Wasser aufgelöst enthält und unter bestimmten Bedingungen an seine Umgebung abzugeben vermag, keine erheblichen. Bei starker Transpiration der Pflanzen im Sommer bildet also nicht Wasser den alleinigen Inhalt der Holz-

elemente, sondern ausser der Flüssigkeit ist viel wasserdampfreiche, verdünnte Luft vorhanden, eine Thatsache, auf die bereits S. 154 hingewiesen worden ist.

Wenn wir ein Stück Holz aus einem transpirirenden Baum heraus-schneiden und dasselbe in Wasser werfen, so schwimmt es auf demselben. Wären die Lumina der Holzelemente völlig mit Wasser angefüllt gewesen, so hätte das Holz untersinken müssen, denn das specifische Gewicht der Holzsubstanz an sich ist grösser als dasjenige des Wassers. Ein in Wasser geworfenes Stück frischen Holzes sinkt übrigens allmählich tiefer in die Flüssigkeit ein, indem es zugleich eine Gewichtszunahme erfährt, eine Erscheinung, die nur Folge von Wasseraufnahme sein kann.

Ebenso lehrt der folgende Versuch, dass, während das Lumen der Holzelemente der Pflanzen unter Umständen völlig mit Wasser angefüllt ist, dies keineswegs immer der Fall sein kann¹). Zwei kräftige Exemplare von Cucurbita oder einer Begoniaspecies werden in der unter 75 angegebenen Weise decapitirt und mit Steigrohren versehen, nachdem die eine Pflanze vorher einen Tag lang stark transpirirt hatte, während die andere durch Ueberdecken mit einer Glasglocke vor bedeutenderem Wasserverlust geschützt worden war. Diese letztere Pflanze liefert sofort Saft, der sich unter dem Einfluss des Wurzeldrucks in dem aufgesetzten Steigrohre erhebt. Das erstere Untersuchungsobject liefert zunächst noch keinen Saft; es saugt sogar Wasser, welches man in das Steigrohr hineinbringt, ziemlich begierig ein. Erst allmählich kommt ein Saftausfluss zu Stande.

55. Die Beweglichkeit des Wassers im Holz.

Wir verschaffen uns ein 15—30 cm langes und 2—4 cm Durchmesser besitzendes Stamm- oder Aststück von *Abies pectinata*. Das Untersuchungsobject muss recht wasserreich sein, weshalb man es am zweckmässigsten im Winter einer lebensfrischen Pflanze entnimmt und eventuell vor dem Versuch noch längere Zeit in Wasser legt. Die sorgfältig geglätteten Schnittflächen des Tannenholzes erscheinen trocken. Bringen wir aber auf die obere Schnittfläche des Untersuchungsobjectes, indem wir dasselbe in verticaler Stellung halten, mit Hülfe eines Pinsels eine dünne Wasserschicht, so beobachten wir, dass dieses Wasser schnell in das Holz einsinkt, während die Schnittfläche am unteren Ende feucht wird. Ein schnelles Umdrehen des Holzstückes lässt eine Wiederholung des Vorganges beobachten. Es genügt also ein minimaler Druck, um die im Holz vorhandenen Wasserfäden in Bewegung zu setzen. Zu gleichem Schluss führen die Resultate der folgenden Experimente. Befestigt man in den kürzeren Schenkel eines U-förmigen Glasrohres ein Stück frischen Tannenholzes und füllt das Rohr mit Wasser an, so quillt so lange Flüssigkeit aus dem oberen Holzquerschnitt hervor, bis der Druck völlig ausgeglichen ist. Ein gerades, 2—4 cm weites Glasrohr *G* (vgl. Fig. 87) wird an seinem einen Ende mit einem durchbohrten Kautschukkork verschlossen, dessen Bohrung zur Aufnahme des dünnen Glasrohres *R* bestimmt ist. In das andere Ende des weiteren Glasrohres wird ein Stück frischen Tannenholzes (ich benutzte ein solches von 15 cm Länge und 2 cm

¹) Vgl. DETMER, Beiträge zur Theorie d. Wurzeldrucks, in PREYER's physio-logischen Abhandlungen, 1877, Bd. 1, Heft 8, S. 37.

Durchmesser) T luftdicht eingekittet. Das zweimal im rechten Winkel gebogene Glasrohr R steht mit dem Kolben K und dieser mittelst des Glasrohres R' mit einer Luftpumpe in Verbindung. Taucht man die freie Schnittfläche des Holzes in Wasser ein und evacuiert, so filtrirt sofort Wasser durch das Holz in das weite Glasrohr hinein. Wir stellen uns nun den in Fig. 88 abgebildeten Apparat zusammen.

In einem eisernen Ring eines auf einen hohen Schrank gestellten schweren Stativs hängt ein recht grosser Trichter T . Das Trichterrohr ist mit Hülfe eines Kautschukschlauches mit der etwa 150 cm langen Glasröhre G in Verbindung gesetzt, deren unteres Ende in das weite Glasrohr G' einmündet. Der untere Theil dieses letzteren wird durch das ca. 6 cm lange und 2 cm im Durchmesser besitzende Aststück von *Abies pectinata* oder *Taxus baccata* A luftdicht abgeschlossen. Der ganze Apparat wird nun mit staubfreiem destillirtem Wasser angefüllt. Der Wasserdruck presst das Wasser durch die Aststücke, die man im berindeten oder entrindeten Zustande zur Anwendung bringen kann, hindurch, so dass in kurzer Zeit bedeutende Flüssigkeitsmengen abfiltriren. Die Quantität des ablaufenden Wassers wird mit der Zeit geringer, wie man leicht ermitteln kann. Es tritt dies auch dann ein, wenn man dafür Sorge trägt, dass das Wasserniveau im

Trichter stets auf gleicher Höhe erhalten bleibt, und die Ursache der erwähnten Erscheinung ist in einer nach und nach zu Stande kommenden Veränderung (Verunreinigung) der Schnittfläche des Holzes, durch welche das Wasser eintritt, zu suchen.

Wir stellen einen weiteren Versuch mit unserem Apparat an, füllen denselben aber jetzt nicht mit reinem

Fig. 87. Apparat zur Constatirung der leichten Beweglichkeit des Wassers im Holz.

Fig. 88. Apparat zur Constatirung der leichten Beweglichkeit des Wassers im Holz und der Thatsache, dass die Schliessmembranen der gehöften Tüpfel der Tracheiden geschlossen sind.

Wasser, sondern mit Wasser, in welchem wir Zinnober ganz fein vertheilt haben. Eine grössere Menge destillirten Wassers wird mit bestem Zinnober versetzt, die Flüssigkeit mehrfach filtrirt, so dass nur äusserst kleine Zinnoberkörnchen in ihr suspendirt bleiben, die sich selbst im Laufe mehrerer Tage nicht zu Boden setzen. Das im Laufe von 1—2 Tagen durch den Holzcyylinder am unteren Ende unseres Apparates abfiltrirte Wasser ist vollkommen klar. Die Untersuchung des Holzstücks selbst ergiebt, dass nur die obere Schnittfläche desselben bis zu einer Tiefe von einigen Millimetern mit Zinnober imprägnirt ist. Die mikroskopische Beobachtung zarter Holzschnitte lässt uns die Gegenwart des Zinnobers in den Tracheiden erkennen, und wir gelangen schliesslich zu der folgenden Beurtheilung der Resultate unseres Experimentes.

Es ist natürlich, dass die Tracheiden des Tannenholzes, welche an die Schnittfläche der zum Versuch benutzten Holzcyylinder grenzen, bei der Herstellung derselben geöffnet worden sind. Bei der Filtration dringen Wasser und Zinnober in die Tracheiden ein. Es unterliegt nun gar keinem Zweifel, dass das Wasser selbst bei minimalem Druck durch die Schliessmembranen der behöften Tüpfel der Tracheiden filtrirt; alle unsere Experimente lassen diese Thatsache klar hervortreten. Die Zinnobertheilchen sind aber nicht im Stande, aus einer in eine andere Tracheide überzugehen, weil sie die Schliessmembranen der Tüpfel nicht passiren können. Zugleich ist hiermit der experimentelle Beweis von dem Vorhandensein der Schliessmembranen zwischen den Elementen des Coniferenholzes beigebracht ¹⁾.

Die Leichtigkeit, mit der das Wasser durch Holz filtrirt, ist für die Wasserbewegung im Holzkörper der Pflanzen von grosser Bedeutung.

86. Die Geschwindigkeit der Wasserbewegung in der Pflanze.

Man hat oft versucht, sich eine Vorstellung von der Geschwindigkeit, mit der sich das Wasser in den Pflanzen bewegt, dadurch zu bilden, dass man die Untersuchungsobjecte mit ihrer Basis in Farbstofflösungen brachte und die Höhe feststellte, in der sich der Farbstoff nach bestimmter Zeit in den Pflanzentheilen nachweisen liess. Diese Methode kann aber nicht zu genauen Werthen führen. In der Pflanze erfolgt nämlich eine Zerlegung der aufgenommenen Farbstofflösung. Der Farbstoff wird von bestimmten Elementen des Gewebes (zumal den verholzten) zurückgehalten, während das Wasser sich weiter bewegt. Man kann sich leicht von der Zerlegbarkeit der Farbstofflösungen überzeugen, wenn man in einen hohen Glascyylinder etwas wässrige Methylgrün- oder Eosinlösung (letztere so concentrirt, dass sie in 10 cm dicker Schicht noch durchscheinend ist) bringt, den Cyylinder mit einer Glasplatte bedeckt und an dieser einen schmalen Fliesspapierstreifen so befestigt, dass sein unteres Ende eben in die Farbstofflösung eintaucht. Nach Verlauf kurzer Zeit hat sich der Farbstoff bis zu bestimmter Höhe im Papier erhoben; oberhalb der Grenze, bis zu der er vorgedrungen ist, erscheint das Papier aber

1) Vgl. TH. HARTIG, Botan. Zeitung, 1863, und zumal SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, B. 2, S. 296.

nicht trocken, sondern feucht. Das Wasser ist also weiter emporgestiegen als der Farbstoff.

Wenn man einen Streifen Fliesspapier mit seinem unteren Ende in eine etwa 2-procentige Lösung von Lithiumsalpeter eintauchen lässt, so ist hingegen leicht nachzuweisen, dass das Lithiumsalz bis zur nämlichen Höhe wie das Wasser emporsteigt. Schneidet man nämlich den obersten, noch durchfeuchteten Querstreifen des Papiere ab und hält ihn in die Flamme eines BUNSEN'schen Gasbrenners, dann lässt sich die Gegenwart von Lithium auf spectroscopischem Wege (Auftreten der bekannten rothen Lithiumlinie im Spectrum) leicht constatiren. Die Lösung des salpetersauren Lithiums ist nun vielfach von SACHS¹⁾ zur Ermittlung der Geschwindigkeit der Wasserbewegung in der Pflanze benutzt worden, und auch wir wollen unsere Untersuchungen in derselben Weise wie SACHS ausführen.

Es ist aus naheliegenden Gründen zunächst am besten, die Experimente nicht mit abgeschnittenen Pflanzentheilen, sondern mit völlig intacten, bewurzelten Pflanzen anzustellen. Wir können z. B. mit Weiden experimentiren. Es werden vorjährige Zweige im Frühjahr abgeschnitten, mit der Basis in Nährstofflösungen gestellt und erst nach Verlauf einiger Monate zum Versuch benutzt, wenn die Zweige ein reiches Wurzelsystem sowie viele Blätter entwickelt haben. Auch Maispflanzen, die man mit Hülfe der Methode der Wassercultur zur Entwicklung gebracht hat, können zweckmässig verwendet werden; ebenso in Blumentöpfen in guter Gartenerde erzogene Exemplare von *Nicotiana*, *Cucurbita*, *Helianthus* etc. Die Pflanzen müssen kräftig ausgebildet und reich beblättert sein. Man stellt sie 1 oder 2 Tage vor Beginn des eigentlichen Versuchs vor einem Südfenster auf, so dass sie dem Sonnenschein und hoher Temperatur ausgesetzt sind. Die Erde in den Töpfen wird in dieser Zeit nicht begossen. Unmittelbar vor Anfang der Experimente über die Aufnahme der Lithiumlösung seitens der Pflanzen werden diese letzteren, wenn sie sich seither mit einer Nährstofflösung in Berührung befunden hatten, aus dieser herausgenommen, um sie in eine 2-procentige Lithiumsalpeterlösung zu stellen. Arbeitet man dagegen mit in Erde eingewurzelten Pflanzen, so durchtränkt man den Boden in den Töpfen sehr stark mit 2-procentiger Lithiumlösung. Die Untersuchungsobjecte bleiben auch jetzt sehr günstigen Transpirationsbedingungen exponirt. Nach Verlauf einer Stunde schneidet man den Stamm der Pflanzen über der Erde ab, zerlegt ihn von oben nach unten in kleine Stücke und schneidet die Blätter ab. Bei diesen Operationen ist grosse Sauberkeit nöthig, um das eventuell in einem Theil der Pflanze vorhandene Lithiumsalz mit dem Messer nicht auf andere Theile zu übertragen. Zur Prüfung auf Lithium werden dünne Stengelstücke der zerschnittenen Untersuchungsobjecte oder kleine Blattstückchen mit der Pincette gefasst und in die Gasflamme gehalten, auf die man das Spectroskop gerichtet hat. Grössere Lithiummengen sind sofort zu erkennen; kleinere erst dann, wenn die Asche glüht. Um auf jeden Fall zu keinem zu hohen Werth für die Steighöhe des Lithiumsalzes (und also auch des Wassers) zu gelangen, wird stets nur die Entfernung des am höchsten gelegenen Stamm- oder Blattstückes, in welchem Lithiumsalz nachzuweisen ist, vom Wurzelhals in Berück-

1) SACHS, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, B. 2, S. 148.

sichtigung gezogen. Häufig kann es auch zweckmässig sein, den Pflanzen nach Verlauf einer bestimmten Versuchszeit, ohne sie zu decapitiren, einfach Blattstückchen zu entnehmen, um dieselben auf Lithiumgehalt zu prüfen. Beachtenswerth ist die Thatsache, von deren Richtigkeit ich mich bei der Prüfung der Methode von SACHS zur Bestimmung der Wasserleitungsgeschwindigkeit in Pflanzen überzeugte, dass man zuweilen erhebliche Mengen des aufgenommenen Lithiums in den Blättern der Untersuchungsobjecte nachweisen kann, während ein solcher Nachweis in tiefer liegenden Stammstückchen nicht gelingt. Offenbar häuft sich das Lithiumsalz in den Blattgeweben oft in grösseren Mengen als in den Stammtheilen an. SACHS macht folgende Angaben über die Steighöhe des Wassers, resp. des Lithiumsalzes in einigen Pflanzen.

Steighöhe pro Stunde	
<i>Salix fragilis</i>	85 cm
<i>Zea Mays</i>	36 „
<i>Nicotiana Tabacum</i>	118 „
<i>Cucurbita Pepo</i>	63 „
<i>Helianthus annuus</i>	63 „

Neuerdings haben übrigens auch die Versuche mit Farbstofflösungen zur Ermittlung der Geschwindigkeit der Wasserleitung an Bedeutung gewonnen, indem STRASBURGER ¹⁾ nachwies, dass sich namentlich Eosinlösungen von der schon angegebenen Concentration recht gut zu den Experimenten selbst unter Benutzung abgeschnittener Pflanzentheile eignen. Die bei Anwendung des genannten Farbstoffes gewonnenen Resultate sind freilich nicht absolut genau; indessen sie verdienen dennoch Beachtung. Wir durchschneiden einen Spross einer Humulus- oder Bryonia-pflanze, die im Freien wächst, an einem heissen Sommertage an der Basis unter Wasser. Die Schnittfläche bleibt nun $\frac{1}{2}$ —1 Stunde mit dem Wasser in Berührung und gelangt dann erst in die Eosinlösung. Diese Vorsicht ist erforderlich, damit die Farbstofflösung nicht durch den Luftdruck in das Untersuchungsobject hineingepresst werde. Das Eosin steigt sehr schnell in den transpirirenden Sprossen empor. Es kann z. B. nach Verlauf einer halben Stunde bereits 2—3 m weit vorgedrungen sein, wie die Untersuchung von Querschnitten lehrt, die man den Pflanzen an den betreffenden Stellen entnimmt.

87. Die Erscheinung des Welkens der Pflanzen.

Wenn die Transpirationsverluste einer Pflanze dauernd grösser sind, als die Wasseraufnahme, so geht dieselbe allmählich in den welken Zustand über. Ihre Blätter hängen schlaff herab, und bei ausbleibender erneuter Wasserzufuhr vertrocknet sie schliesslich. Wird dagegen der Boden, in welchem in Blumentöpfen cultivirte, eben angewelkte Gewächse (z. B. Bohnen- oder Kürbispflanzen) wurzeln, begossen, dann turgesciren die Zellen der Blätter aufs Neue, und die Untersuchungsobjecte nehmen wieder schnell ein frisches Aussehen an. Dieselbe Erscheinung tritt hervor, wenn wir den angewelkten Pflanzen kein Wasser zuführen, dafür aber ihre Transpirationsgrösse herabsetzen, indem wir sie z. B. unter eine Glasglocke stellen.

1) Vergl. STRASBURGER, Histologische Beiträge, Heft III, S. 550 und 590.

Werden reich beblätterte Zweige von Bäumen oder Sträuchern abgeschnitten und mit dem unteren Ende ihres verholzten Stammtheiles in Wasser gestellt, so bleiben die Untersuchungsobjecte gewöhnlich tagelang frisch. Um so überraschender ist es, dass die Zweige einiger Gewächse, wenn sie in der angegebenen Weise behandelt werden, trotzdem ihr Stammtheil stark verholzt ist, recht schnell welken. In der Weise verhalten sich z. B. nach meinen Beobachtungen oft die Zweige von *Salix fragilis*. Im Allgemeinen bleiben aber doch abgeschnittene und in Wasser gestellte Sprosse um so länger frisch, je weiter die Entwicklung des Holzes in ihrem Stammtheil fortgeschritten ist. Wenn man z. B. etwa 1 m lange Sprosse von *Helianthus tuberosus* abschneidet und in Wasser stellt, so bleiben sie mehrere Tage hindurch frisch; 20–30 cm lange Sprosse derselben Pflanze welken dagegen, in Wasser gestellt, sehr schnell, indem zuerst die jüngeren der entfalteten Blätter, später auch die älteren schlaff werden.

Wir stellen nun den folgenden sehr lehrreichen Versuch mit *Helianthus tuberosus* an. Wir biegen lange Sprosse von *Helianthus*, ohne sie von der Pflanze zu trennen und ohne sie zu knicken, so herab, dass eine 20 cm vom Gipfel entfernte Stelle in das Wasser eines untergestellten Gefäßes taucht, der Gipfel sowie die Blätter selbst aber nicht benetzt werden. Jetzt trennen wir das 20 cm lange Sprossende durch einen mit Hülfe eines scharfen Messers geführten Schnitt von der Pflanze und sorgen vor allem dafür, dass die Schnittfläche gar nicht mit der Luft in Berührung kommt, sondern stets unter Wasser bleibt. Unser Spross bleibt tagelang frisch, während 20 cm lange *Helianthussprosse*, die man in der Luft abgeschnitten und dann alsbald (z. B. nach 1–2 Minuten) in Wasser gestellt hat, schnell welk werden. Die welken *Helianthussprosse* kann man aber auf verschiedene Weise wieder turgescent machen. Entfernt man einige der angewelkten Blätter, so nehmen die noch vorhandenen Blätter bald ein frisches Aussehen an, weil die Transpirationsverluste des Pflanzentheils jetzt durch die Wasseraufnahme gedeckt werden können. Ein welker *Helianthusspross* wird mit Hülfe eines Kautschukschlauches oder Kautschuckkorkes auf dem kürzeren Schenkel eines Wasser enthaltenden U-förmig gebogenen Glasrohres luftdicht befestigt, so dass die Schnittfläche in das Wasser eintaucht. Jetzt wird Quecksilber in den längeren Schenkel der Glasröhre gegossen. Ein Quecksilberdruck von wenigen Centimetern genügt freilich nicht, um den welken Spross frisch zu machen; pressen wir das Wasser aber mit einem Quecksilberdruck von 30–50 cm in den welken *Helianthusspross* ein, so wird dieser wieder turgescent. Von einem mit seinem unteren Ende in Wasser stehenden angewelkten *Helianthusspross* von 20 cm Länge schneiden wir mit Hülfe eines scharfen Messers ein 5 cm langes Stengelstück unter Wasser ab und sorgen dafür, dass die neu hergestellte Schnittfläche nicht mit der Luft in Berührung kommt. Der Spross wird alsbald ein frisches, turgescirendes Aussehen annehmen.

Unsere Untersuchungen an *Helianthussprossen*, die man auch an anderweitigen Objecten wiederholen kann, lehren vor allem, dass die Sprosse welken, wenn sie in Luft abgeschnitten und dann in Wasser gestellt werden, während sie, unter Wasser abgeschnitten, frisch bleiben. Diesen merkwürdigen Phänomenen liegen verschiedene Ursachen zu Grunde. Beim Abschneiden von Pflanzentheilen in Luft werden schleimige oder klebrige Stoffe, die an der Wundfläche hervortreten, nicht entfernt, sondern sie

bleiben an der Schnittfläche haften und vermindern so die Fähigkeit des Gewebes, Wasser aufzunehmen. Beim Abschneiden in Luft wird auch der negative Druck, der in den Holzelementen unversehrter transpirirender Pflanzen herrscht (vgl. Seite 154), mehr oder minder ausgeglichen, und dadurch die Wasserleitung in den Stengeltheilen wesentlich beeinträchtigt. Diese verschiedenen nachtheiligen Folgen treten beim Durchschneiden der Sprosse unter Wasser, wie leicht einzusehen ist, nicht hervor ¹⁾).

VII. Die Mineralstoffaufnahme seitens der Pflanzen.

88. Die Wurzeln der Pflanzen als Organe der Mineralstoffaufnahme.

Den Pflanzenwurzeln kommt die Aufgabe zu, die Gewächse im Boden zu befestigen; andererseits fungiren sie aber auch als Organe der Wasser- und Mineralstoffaufnahme. Wenn wir Pflanzen mit Hülfe der Methode der Wassercultur in wässriger Nährstofflösung cultiviren, so treten diese beiden letzteren Functionen der Wurzeln in klarster Weise hervor. Aber auch im Boden, der den Gewächsen zum Standort dient, finden sich häufig Nährstofflösungen vor, denn die von den Bodenelementen festgehaltenen und zwischen denselben circulirenden Flüssigkeitsmengen repräsentiren kein reines Wasser, sondern verdünnte Nährstofflösungen. Das Wasser ist im Stande, lösend und zersetzend auf die Bodenelemente einzuwirken. Diese geben in absorbirter Form oder in noch fester gebundener Form vorhandene Mineralstoffe an das Wasser ab, und die lösende Kraft des letzteren wird häufig noch durch die Gegenwart grösserer Kohlensäuremengen, die im Boden durch Verwesungsprocesse entstehen, wesentlich erhöht.

Auf die Mineralstoffaufnahme der Wurzeln aus Nährstofflösungen will ich hier nicht specieller eingehen, da wir die bezüglichen Verhältnisse unter 89 besprechen werden; hingegen wollen wir an dieser Stelle auf einige Beobachtungen hinweisen, die mit Rücksicht auf das Verhalten der Wurzeln im Boden Interesse beanspruchen.

Wir bringen einige Weizenkörner in guter Gartenerde, mit welcher ein Blumentopf angefüllt ist, zur Keimung, um die jungen Pflänzchen, wenn sie 4 oder 5 Wurzeln gebildet haben, vorsichtig aus dem Boden zu entfernen. Schüttelt man die Keimpflanzen kräftig, so fällt ein beträchtlicher Theil der an den Wurzeln haftenden Erde ab, ein anderer Theil löst sich aber nicht von denselben los. Die Gesamtoberfläche der Wurzeln wird von einer Erdschicht eingehüllt; nur an den Wurzelspitzen haften keine Bodentheilehen. Die genauere mikroskopische Untersuchung der Wurzeln lehrt uns, dass die Wurzelspitzen frei von Wurzelhaaren sind, während die ganze übrige Oberfläche der Wurzeln mit sehr zahlreichen Wurzelhaaren bedeckt erscheint. An diesen lang-

1) Vgl. H. DE VRIES in Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 287, und F. v. HÖHNEL in HABERLANDT's wissenschaft.-praktischen Forschungen auf d. Gebiete d. Pflanzenbaues, Bd. 2, S. 120.

gestreckten, einzelligen Organen haften die feineren Bodenelemente sehr fest; die Haare verwachsen förmlich mit den Erdtheilchen, und bei starker Vergrößerung ist dies leicht festzustellen. Die Wurzelhaare sind die Organe der Wurzeln, durch welche die Wasser- und Mineralstoffaufnahme in erster Linie vermittelt wird. Sie entziehen dem Boden die vorhandenen verdünnten Nährstofflösungen, aber indem die Wurzelhaare in der unter 91 angegebenen Weise auf die ihnen dicht angeschmiegtten Bodenelemente einwirken, bereiten sie auch selbst Nährstofflösungen für die Pflanzen, welche sofort in den Organismus übertreten.

Wenn man Pflanzen von *Triticum vulgare* etwa 5 Wochen lang in guter Gartenerde cultivirt und die Untersuchungsobjecte nun vorsichtig aus dem Boden hebt, so ergibt sich nach kräftigem Schütteln, dass an den Wurzelspitzen sowie an den gesammten älteren Theilen der Wurzeln keine Erde haften bleibt, wohl aber an den jüngeren Regionen der Organe oberhalb ihrer Spitzen. Diese jüngeren Regionen erscheinen mit zahlreichen Wurzelhaaren bedeckt, während die Haare der älteren Wurzeltheile bereits abgestorben sind ¹⁾.

Verschiedene Beobachter haben festgestellt, dass das Auftreten von Wurzelhaaren an den Wurzeln der Gewächse von einer Reihe äusserer Factoren abhängig ist, von denen die Feuchtigkeitsverhältnisse als die wichtigsten angesehen werden müssen ²⁾. Wir cultiviren Keimlinge von *Zea*, *Avena*, *Triticum*, *Pisum*, *Phaseolus* in mässig feuchter Gartenerde und werden durch mikroskopische Untersuchungen zarter Längs- oder Querschnitte der einigermassen entwickelten Wurzeln feststellen können, dass dieselben unter den bezeichneten Verhältnissen viele Haare producirt haben. Wir bringen ferner einige Individuen der genannten Pflanzen bei Ausschluss des Bodens zur Entwicklung, indem wir die Samen nach dem Anquellen oder Ankeimen auf Tüll legen, der über ein mit Wasser angefülltes Becherglas gespannt ist. Dies Glas stellen wir in eine etwas Wasser enthaltende Krystallisirschale und bedecken mit einer Glasglocke, so dass deren unterer Rand in das Wasser der Schale eintaucht. Während der Keimung der Samen Sorge man durch häufigeres Entfernen der Glasglocke dafür, dass die Untersuchungsobjecte keinen Sauerstoffmangel leiden. Die in dem Wasser des Becherglases zur Ausbildung gelangenden Wurzeln mancher Pflanzen (*Avena*, *Triticum*) besitzen ebenso wie die in Contact mit mässig feuchtem Boden entwickelten Wurzeln Wurzelhaare, wovon ich mich bei Versuchen mit *Triticum vulgare* überzeugte. Nach FR. SCHWARZ erzeugen die Wurzeln von *Zea*, *Pisum* und *Phaseolus* dagegen in Contact mit Wasser keine Haare. Ich muss aber bemerken, dass ich wenigstens an den sich im Wasser ausbildenden, durchaus normal aussehenden und geradegestreckten Hauptwurzeln von *Zea Mays* zahlreiche Wurzelhaare auftreten sah. Vielleicht verhalten sich die Wurzeln verschiedener Maisvarietäten in der hier in Rede stehenden Hinsicht nicht gleichartig. Vielleicht ist es auch nicht gleichgültig, ob sich die Wurzeln in Brunnenwasser oder destillirtem Wasser entwickeln, ob sie im Finstern oder bei Lichtzutritt zur Entwicklung gelangen. In destillirtem Wasser bei Lichtabschluss erwachsene Erbsen-

1) Vgl. SACHS, Handbuch der Experimentalphysiologie der Pflanzen, 1865, S. 185.

2) Vgl. FR. SCHWARZ in Untersuchungen aus d. botan. Institut zu Tübingen, Bd. 1, H. 2.

hauptwurzeln fand ich frei von Wurzelhaaren, während in Gartenerde zur Entwicklung gelangte Erbsenwurzeln sehr haarreich sind.

89. Die Mineralstoffaufnahme der Wurzeln aus Nährstofflösungen.

In meinem Lehrbuche der Pflanzenphysiologie (S. 136) habe ich schon darauf hingewiesen, dass die Verhältnisse, welche sich auf die Mineralstoffaufnahme der Wurzeln aus Nährstofflösungen beziehen, sehr complicirter Natur und noch keineswegs in wünschenswerther Weise aufgeklärt sind. Das Resultat, welches schliesslich erzielt wird, ist nicht allein abhängig von dem Concentrationszustande der Lösung, der Natur der vorhandenen Nährstoffe, ihrem Verbrauch im Organismus der Pflanze etc., sondern ebenso von der Natur der Pflanze, den äusseren Bedingungen, unter denen sie sich entwickelt, und manchen anderen Umständen. Weitere Forschungen müssen hier unter sorgfältiger Zergliederung des Gesamtpphänomens näheren Aufschluss geben. An dieser Stelle legen wir uns die Frage vor, in welcher Weise sich die Mineralstoffaufnahme der Wurzeln gestaltet, wenn denselben die wässrige Lösung eines einzigen Salzes zur Verfügung steht, eine Frage, die sicher mit Rücksicht auf die Mineralstoffaufnahme seitens der Wurzeln aus completeen Nährstofflösungen Interesse beansprucht.

Wir quellen eine Anzahl wohl ausgebildeter Samen von *Phaseolus multiflorus* oder *Zea* in Wasser ein, keimen sie in feuchten Sägespänen an, bestimmen das Lebendgewicht jeder Keimpflanze und befestigen sie einzeln mit Hülfe von Watte in den Bohrungen passender Korke, welche kleine Glasgefässe von etwas über 100 ccm Inhalt verschliessen. Einige Gefässe sind vorher mit 100 ccm 0,250-proc., andere mit 100 ccm 0,050- oder 0,025-proc. Kalisalpeterlösung beschickt worden. Wir stellen das Gewicht der Apparate fest und lassen sie nun so lange an einem wohlbeleuchteten Orte stehen, bis sie etwa 50 g an Gewicht verloren haben, also etwa die Hälfte der ursprünglichen Flüssigkeitsmenge durch die Wurzeln der Bohnenpflanzen aufgesogen worden ist. Die Versuchspflanzen werden aus den Lösungen entfernt, mit destillirtem Wasser abgespült (dies Wasser fügt man dann den Rückständen in den Gläsern hinzu), mit Fliesspapier abgetrocknet und gewogen. Man hat also einerseits die unter Vermittelung der Pflanzen verdunstete, andererseits die in das Lebendgewicht der Pflanzen übergegangene Wassermenge ermittelt. Eine Fehlerquelle unseres Versuchsverfahrens liegt darin, dass durch die Watte kein luftdichter Verschluss unserer Apparate hergestellt wird, und somit eine kleine Wasserquantität auch ohne Beihülfe der Pflanzen in die Luft übergehen kann. Die Grösse dieser Fehlerquelle ist aber leicht zu constatiren, und der Versuchsfehler auch auszuschliessen, wenn man einige Gläser mit 100 ccm der Salzlösungen anfüllt, nicht mit Pflanzen beschickt, sondern nur mit einem Kork sowie Watte verschliesst und ihren Gewichtsverlust während der Versuchszeit ermittelt. Ebenso hat es ja gar keine Schwierigkeit, die Zunahme an Trockensubstanz, welche die Untersuchungsobjecte während ihrer Vegetationszeit erfahren, mit in Berücksichtigung zu ziehen. Wird schliesslich noch der Salzgehalt der Flüssigkeitsrückstände in den Gläsern durch Verdunsten des Wassers der Lösung und Wägung des Rückstandes festgestellt, so liegen alle Daten zur

Berechnung vor. Diese ergibt, dass Bohnenpflanzen aus 0,250-proc. Kalisalpeterlösungen relativ viel Wasser und wenig Salz aufnehmen; es bleibt also ein Flüssigkeitsrückstand in den Gläsern zurück, der concentrirter ist als die ursprünglich den Versuchspflanzen dargebotene Lösung. (DE SAUSSURE'sches Gesetz ¹⁾). In Contact mit 0,050- oder 0,025-proc. Kalisalpeterlösungen nehmen die Bohnenpflanzen aber eine relativ concentrirte Lösung auf; der Flüssigkeitsrückstand ist verdünnter als die ursprünglich dargebotene Lösung ²⁾. Auf jeden Fall beansprucht die Thatsache also Interesse, dass die Pflanzenwurzeln die ihnen zur Disposition stehenden Nährstofflösungen nicht als solche aufsaugen, sondern je nach Umständen mit einer bestimmten Wassermenge bald kleinere, bald grössere Salzmenge aufnehmen. Zu einem nahezu richtigen Resultat gelangt man übrigens auch schon, wenn man Bohnenkeimlinge in angegebener Weise in Glasgefässen, die 100 ccm der Lösungen des Kalisalpeters von verschiedenen Concentrationen enthalten, cultivirt und ohne weitere Wägungen einfach den Salpetergehalt der Flüssigkeitsrückstände bestimmt, nachdem die Hälfte der ursprünglichen Flüssigkeitsquantitäten aufgesogen worden ist.

90. Die Corrosionserscheinungen.

Die Wurzeln sind nicht allein im Stande, die Gewächse mit Nährstoffen zu versorgen, indem sie fertige Nährstofflösungen aufnehmen, sondern sie vermögen auch den compacten Bodenelementen absorbirte oder gar noch fester gebundene Substanzen zu entziehen. Die auf-

Fig. 89. Marmorplatte, deren Oberfläche durch die Wurzeln eines Phaseolusexemplares corrodirt worden ist.

nehmenden Wurzelzellen, zumal die Wurzelhaare, scheiden, wie wir unter 91 sehen werden, auf jeden Fall bestimmte Körper ab, welche lösend auf die Bodentheile einwirken müssen, wenn sie in die mit Wasser imbibirten und den Erdtheile dicht angeschmiegt Membranen der Wurzelhaare gelangt sind. Die Bodenelemente erfahren auf diese Weise Corrosionen, und die durch die Wurzelthätigkeit selbst gelösten Substanzen treten in die Pflanze über.

Zur Constatirung der Thatsache, dass die Wurzeln corrodirende Wirkungen geltend zu machen vermögen, stellen wir das folgende Experiment an.

Ein kleiner Blumentopf wird etwa bis zur Hälfte mit feuchtem Sand angefüllt. Wir legen nun eine auf der Oberfläche sorgfältig polirte Marmorplatte auf den Sand. (Die Marmorplatte, mit welcher ich experimentirte und welche bei Abschluss des Versuchs die in Fig. 89 dargestellten Corrosionen erfahren hatte, besass 45 mm Durchmesser und 7 mm Dicke.) Der Blumentopf wird jetzt völlig mit

¹⁾ Vgl. DE SAUSSURE, *Recherches sur la végétation*, 1804, S. 247.

²⁾ Vgl. W. WOLF, *Versuchsstationen*, B. 6 u. 7.

feuchtem Sand angefüllt und ein gequollener Same von *Phaseolus* in denselben gelegt. Die Keimung beginnt alsbald. Die Wurzeln der Pflanzen dringen nach unten in den Sand vor, aber treffen nach einiger Zeit auf die Marmorplatte. Auf dieser wachsen sie in horizontaler Richtung hin, um, wenn sie den Rand der Platte erreicht haben, wieder mehr oder minder vertical im Sande weiter zu wachsen. Unterbricht man den Versuch, nimmt die Marmorplatte aus dem Bodenmaterial heraus, spült sie mit Wasser ab und trocknet sie mit einem weichen Tuche ab, so erblickt man an ihrer Oberfläche ein getreues Abbild derjenigen Wurzeltheile, die ihr angeschmiegt waren. Die Politur ist an den Contactstellen zwischen Marmor und Wurzeln entfernt. Ich erhielt, wie Fig. 89 zeigt, ziemlich breite Corrosionslinien, eine Erscheinung, die offenbar auf die corrodirende Thätigkeit der seitlich von den Wurzeln ausgehenden Wurzelhaare zurückzuführen ist. Die abwärts wachsende Hauptwurzel traf bei *a* auf die Marmorplatte; sie schlug dann die durch den breiten Streifen in der Abbildung angedeutete Richtung ein, während die übrigen Corrosionslinien den Seitenwurzeln ihre Entstehung verdanken. Zu bemerken ist noch, dass es sich empfiehlt, die Bohnenpflanze, deren Wurzeln die Corrosionen bedingen, nicht zu lange Zeit (etwa nur 10–14 Tage) vegetiren zu lassen, da bei längerer Versuchsdauer sehr zahlreiche Wurzeln mit der Marmorplatte in Contact gerathen und die Corrosionslinien der einzelnen Wurzeln nicht mehr deutlich hervortreten ¹⁾.

91. Die Ursachen der Corrosionserscheinungen.

Die Corrosionserscheinungen können offenbar nur dadurch zu Stande kommen, dass die den Gesteinmassen oder den Bodentheilen dicht anliegenden Wurzeln bestimmte Stoffe ausscheiden, die befähigt sind, zersetzend auf jene einzuwirken. Es ist hier natürlich vor allem an die Kohlensäure zu denken, welche in Folge des Athmungsprocesses in den Wurzelzellen entsteht, aber auch organische Säuren, ja selbst Salzsäure, kommen als weitere Substanzen, die mit Rücksicht auf die Entstehung der Corrosionen Berücksichtigung verdienen, in Betracht. Wenn die Zellhäute der Wurzelzellen mit verdünnten Lösungen der erwähnten Körper imbibirt sind, so ist damit sofort die Möglichkeit einer Einwirkung der Wurzeln auf die Gestein- und Bodenelemente gegeben, ein Verhältniss, das unter Beachtung der Resultate des folgenden Experimentes sofort klar hervortritt ²⁾.

Wir stellen den in Fig. 90 abgebildeten Apparat zusammen. Das Glas *G* enthält verdünnte Salzsäure. Durch die Bohrung des dies Glas verschliessenden Korkes geht das ziemlich weite Glasrohr *R*, welches an seinem unteren Ende mittelst eines Stückes Schweinsblase verschlossen ist. In unserem Apparat vertritt die Flüssigkeit den Zellinhalt, die Schweinsblase aber die Membran der Wurzelzellen. Legen wir ein Stückchen Marmor auf die mit verdünnter Salzsäure imbibirte Schweinsblase, so wird dasselbe alsbald theilweise in Lösung übergehen, und die gebildete Lösung von Chlorcalcium geht auf dem Wege

1) Die Corrosionserscheinungen sind zuerst von SACHS, vgl. dessen Handbuch der Experimentalphysiologie der Pflanzen, 1865, S. 188, eingehender studirt worden.

2) Dies Experiment ist zuerst von ZÖLLER auf Anregung LIEBIG's ausgeführt worden.

der Diffusion in die Salzsäure über. Wir können die Gegenwart von Calcium leicht mit Hülfe von oxalsaurem Ammoniak in der Flüssigkeit, die im Apparat vorhanden ist, feststellen. Ebenso üben die in den Membranen der Wurzelzellen in imbibirtem Zustande vorhandenen Lösungen einen zersetzenden Einfluss auf Gesteine sowie Bodenelemente aus; es entstehen die Corrosionserscheinungen, und die gelösten Stoffe werden seitens der Pflanze aufgesogen.

Fig. 90. Apparat zur Veranschaulichung einiger Vorgänge, die sich bei dem Zustandekommen der Corrosionserscheinungen geltend machen.

Aus den folgenden Experimenten, welche ich kürzlich ausführte, die aber zur Sicherstellung der fraglichen Verhältnisse noch weiter ausgedehnt werden müssen, scheint mir hervorzugehen, dass nicht allein Kohlensäure und organische Säuren, sondern auch Salzsäure als Stoffe anzusehen sind, die Bedeutung für die Entstehung der Corrosionserscheinungen besitzen. Wir cultiviren Maispflanzen mit Hülfe der Methode der Wassercultur (vgl. unter 1) in einer Flüssigkeit, die in 1000 g Wasser 1 g schwefelsauren Kalk, $\frac{1}{4}$ g Chlorkalium, $\frac{1}{4}$ g schwefelsaure Magnesia, $\frac{1}{4}$ g saures phosphorsaures Kali und etwas Eisenchlorid enthält. Die Culturegefäße brauchen nicht gross zu sein; es genügt, wenn sie nur 250 ccm Flüssigkeit fassen. Wenn die Maispflanzen das vierte Blatt in den stickstofffreien Nährstofflösungen entwickelt haben, so befinden sie sich auf jeden Fall in hohem Grade im Zustande des Stickstoffhungers. Zwei

Maispflanzen wurden nun aus der erwähnten Nährstofflösung herausgenommen und in zwei Gefäße versetzt, von denen das eine Wasser (*a*), das zweite 0,1-proc. Chlorammoniumlösung enthielt (*b*). Ferner wurde ein drittes Gefäß (*c*) nur mit Chlorammoniumlösung ohne Pflanze beschickt. Eine Pflanze blieb in der stickstofffreien Nährstofflösung (*d*), eine fernere Pflanze verblieb ebenfalls in der ursprünglichen Nährstofflösung, nachdem derselben Chlorammonium (auf 100 ccm Wasser 0,1 g) hinzugefügt worden war (*e*). Nach etwa 8 Tagen wurden Lakmuspapierstreifen 30 Sekunden lang mit den Flüssigkeiten von *b* und *e*, andere 15 Sekunden lang mit den Flüssigkeiten von *a*, sowie *d*, und darauf 15 Sekunden lang mit der Flüssigkeit von *c* in Berührung gebracht. Jene Streifen des blauen Lakmuspapiers färbten sich erheblich intensiver roth als diese, eine Thatsache, die nicht anders als durch die Annahme erklärt werden kann, dass das Chlorammonium unter Bildung freier Salzsäure durch Vermittelung der Pflanzen zersetzt worden ist. Das in das Gewebe der Pflanzen eingedrungene Chlorammonium kommt in den Zellen mit organischen Säuren in Contact. Diese wirken zersetzend auf die Chlorverbindung ein, und da die entstehende Salzsäure keine Verarbeitung in den Gewächsen findet, so wird sie in die Nährstofflösung ausgeschieden und erhöht den sauren Charakter derselben.

Will man sich davon überzeugen, dass organische Säuren im Stande sind, Chloride auch ausserhalb der Pflanze unter Salzsäurebildung zu zersetzen, so sind die folgenden Experimente auszuführen.

Wir stellen zwei Bechergläser auf, die 500 ccm destillirtes Wasser enthalten. *a* erhält einen Zusatz von 3 g Oxalsäure, *b* einen solchen von 3 g Oxalsäure und 0,4 g NaCl. In beide Gefäße hängen wir nun in der

Weise, wie es unter 25 angegeben worden ist, Marmorplatten hinein. Die Flüssigkeit in *a* bleibt klar, weil sich die Marmorplatte schnell mit einer Kruste von oxalsaurem Kalk umgiebt, die der weiteren Einwirkung der Oxalsäure ein Hinderniss entgegenstellt. Die Flüssigkeit in *b* trübt sich dagegen schnell bedeutend, eine Thatsache, deren Ursache nur in folgender Reaction liegen kann. Die Oxalsäure zersetzt das Chlornatrium. Die freigemachte Salzsäure wirkt auf den Marmor ein. Es entsteht Chlorkalcium, und auf dieses wirkt nun die Oxalsäure ein. Der gebildete oxalsaure Kalk, welcher sich alsbald in grosser Menge zu Boden setzt, ruft die Trübung der Flüssigkeit hervor.

Auch auf andere Weise kann man sich nach meinen Erfahrungen davon überzeugen, dass organische Säuren im Stande sind, zersetzend auf Chloride einzuwirken ¹⁾. Es werden sechs Versuchsflüssigkeiten hergestellt: a) 15 ccm destillirtes Wasser; b) 15 ccm Wasser mit 0,020 g Citronensäure; c) 15 ccm Wasser mit 0,7 g Chlorkalium; d) 15 ccm Wasser mit 0,7 g Chlornatrium; e) 15 ccm Wasser mit 0,020 g Citronensäure und 0,7 Chlorkalium; f) 15 ccm Wasser mit 0,020 g Citronensäure und 0,7 g Chlornatrium. Die Flüssigkeiten bleiben nun etwa 24 Stunden lang ruhig stehen und erhalten dann einen Zusatz von einigen Tropfen wässriger, sehr verdünnter Methylanilinviolettlösung. Die Flüssigkeiten a, b, c und d zeigen nahezu den nämlichen violetten Farbenton; die Flüssigkeiten e und f sind dagegen deutlich blau gefärbt. Diese Reaction zeigt die Gegenwart freier Salzsäure an, denn während sehr verdünnte Citronensäurelösungen die Farbe des Methylanilinvioletts kaum verändern, nimmt der Farbstoff in Contact mit sehr verdünnter Salzsäurelösung einen blauen Farbenton an ²⁾.

92. Das Absorptionsvermögen des Bodens.

Es ist eine sehr wichtige Thatsache, dass der Boden im Stande ist, eine Reihe von Körpern, mit denen er in Berührung kommt, sehr energisch festzuhalten (zu absorbiren). Kali, Ammoniak und Phosphorsäure werden vom Boden am lebhaftesten absorbirt und dadurch vor dem Versinken in die Tiefe geschützt, eine Thatsache, die offenbar von hoher Bedeutung für das Pflanzenleben ist. Wenn in Wasser lösliche Salze, mögen dieselben im Boden selbst entstanden oder dem Boden direct von aussen zugeführt worden sein, die Kali, Ammoniak oder Phosphorsäure enthalten, mit den Feinerdepartikeln in Berührung gerathen, so erfolgt je nach der Natur des Bodens eine mehr oder minder lebhaftere Absorption der genannten Stoffe. Sie werden chemisch gebunden, und wir wollen uns im Folgenden von der Thatsächlichkeit der Absorption eines Körpers, nämlich des Ammoniaks, durch geeignete Experimente überzeugen ³⁾. (Methode nach KNOP.)

1) Vergl. DETMER, Botan. Zeitung, 1884, No. 50.

2) Auch die GÜNSBURG'sche Reaction auf Salzsäure bei gleichzeitiger Gegenwart von Chloriden dürfte hier sehr gute Dienste leisten. Man mischt mit 30 g Alkohol 1 g Vanillin und 2 g Phloroglucin. Einige Tropfen dieser Mischung sowie einige Tropfen der Versuchsflüssigkeit werden in eine weisse Porzellauschale gebracht. Tritt beim Erhitzen Rothfärbung ein, so ist die Gegenwart freier Salzsäure nachgewiesen.

3) Ausführliches über das Absorptionsvermögen des Bodens und dessen Ursachen vgl. bei DETMER, Lehrbuch d. Bodenkunde, Leipzig 1876.

100 g lufttrockener Feinerde eines Bodens werden mit 10 g Kreidepulver innig gemischt und in einer Flasche mit 200 ccm einer Salmiaklösung übergossen, die in 208 ccm genau 1 g Salmiak enthält. Man lässt die Erde mit der Flüssigkeit 48 Stunden lang unter häufigem Umschütteln in Berührung, filtrirt 40 ccm Flüssigkeit ab und dampft unter Zusatz eines Tropfens reiner Salzsäure bis auf etwa 10 ccm ein. In diesen 10 ccm Flüssigkeit bestimmt man den Stickstoff; ebenso in 40 ccm der ursprünglichen Salmiaklösung, die man auch durch Eindunsten auf 10 ccm concentrirt hat; 40 ccm der Chlorammoniumlösung müssen, wenn dieselbe richtig bereitet worden ist, genau 40 ccm Stickstoff (bei 0° C. und 760 mm

Barometerstand) geben. Aus den Resultaten der Stickstoffbestimmungen, die man mit Hülfe eines Azotometers (vgl. über diesen Apparat Zeitschr. f. analytische Chemie, Bd. 9, S. 226, und ebendaselbst Bd. 13, S. 101 u. S. 383) und bromirter Natronlauge ausführt, lässt sich die vom Boden absorbierte Ammoniakmenge leicht berechnen. Die bromirte Lauge (Auflösung von unterbromigsaurem Natron) stellt man durch Auflösen von 100 g Aetznatron in 1250 ccm Wasser und Zusatz von 25 ccm Brom zu der erkalteten Flüssigkeit her. Man wende für jeden Versuch auf je 10 ccm durch Eindampfen

Fig. 91. Azotometer.

concentrirter Salmiaklösung 50 ccm Lauge an. Für Feststellung der Stickstoffabsorption durch 60 ccm Entwicklungsflüssigkeit (50 ccm bromirte Lauge und 10 ccm Wasser benutze man die von DIETRICH (Zeitschrift f. analytische Chemie, Bd. 5) berechnete Tabelle. Das Azotometer ist für einen Preis von etwa 30 Mk. von EHRHARDT und METZGER in Darmstadt zu beziehen.

Dieser Apparat, der in Fig. 91 dargestellt ist, besteht zunächst aus einem Entwicklungsgefäß, welches durch eine nicht bis oben hinaufreichende Glaswand — in der Figur nicht sichtbar — in zwei Theile getheilt wird. In die eine Abtheilung bringt man 50 ccm der bromirten Lauge, in die andere 10 ccm Untersuchungsflüssigkeit. Man verschliesst das Entwicklungsgefäß mit einem Kautschukkork, taucht es in ein Kühlgefäß ein, das ebenso, wie der lange Glaszylinder, mit Wasser angefüllt worden ist. Durch den Kork des Entwicklungsgefäßes geht ein mit Glashahn versehenes Glasrohr hindurch. Dasselbe steht mittelst eines Schlauches mit dem graduirten Glasrohr im Cylind in Verbindung. Der Glashahn wird herausgezogen und die im Glaszylinder eingeschlossenen

communicirenden Röhren durch Zusammendrücken des mit einem Loch versehenen Kautschukballes unter gleichzeitigem Oeffnen des Quetschhahnes mit Wasser angefüllt. Durch Ablassen des Wassers durch den Quetschhahn stellt man den unteren Meniscus des Wasserspiegels genau auf den Nullpunkt der graduirten Röhre ein. Nach Ablauf von 5 Minuten wird der Glashahn wieder eingesetzt, jedoch so gestellt, dass das Entwicklungsgefäß mit dem graduirten Rohr in Communication bleibt. Man controlirt nun nach einiger Zeit, ob der Wasserspiegel in dem letzteren keine Veränderungen erfährt. Sollte dies der Fall sein, so muss der Glashahn nochmals gelockert und die Einstellung des Wassermeniscus auf den Nullpunkt wiederholt werden.

Das Entwicklungsgefäß wird nun aus dem Kühlgefäß herausgenommen. Durch Neigen des Glases lässt man die bromirte Lauge langsam zur Untersuchungsflüssigkeit treten, nachdem man durch den Quetschhahn 20 — 30 ccm Wasser hat abfließen lassen. Darauf schliesst man den Glashahn, schüttelt das Entwicklungsgefäß kräftig und öffnet den Hahn wieder, damit der Stickstoff in das graduirte Glasrohr übertreten kann. Diese Operationen werden mehrfach wiederholt. Darauf wird das Entwicklungsgefäß wieder in den Kühlcylinder zurückgestellt und durch den Glashahn mit der graduirten Röhre in Verbindung gebracht. Nach Verlauf von etwa 15 Minuten hat dasselbe die frühere Temperatur wieder angenommen, und man lässt nun durch den Quetschhahn so viel Wasser ab- bzw. zufließen, dass das Niveau in den beiden communicirenden Röhren gleich hoch steht; endlich liest man noch die entwickelten Cubikcentimeter Stickstoff, die Temperatur des im Cylinder befindlichen Thermometers und den Barometerstand ab. Die Reductionen der Gasvolumina sind leicht unter Benutzung der dem Apparat beigegebenen Tabellen durchzuführen.

Dritter Abschnitt.

Die Stoffwechselprocesse im vegetabilischen Organismus.

I. Das Verhalten der stickstoffhaltigen Verbindungen.

93. Die Eiweissstoffe, welche man aus Pflanzentheilen abcheiden kann.

Wir sehen hier gänzlich von den bereits unter 46 behandelten organisirten plasmatischen Gebilden der Pflanzenzellen ab, sondern wollen nur den Nachweis liefern, dass verschiedene Eiweisskörper im vegetabilischen Organismus angetroffen werden.

Wenn man Weizen- oder Gerstenfrüchte zermahlt und das Pulver (ca. 25 g) mit Wasser einige Zeit in Berührung lässt, so kann man durch Filtration eine klare Flüssigkeit gewinnen, in der das Vorhandensein von Albumin nachzuweisen ist. Erhitzt man diese Flüssigkeit, so gerinnt das Eiweiss und scheidet sich als Coagulum ab. Wenn man den aus Früchten (z. B. Weinbeeren) ausgepressten und filtrirten Saft erwärmt, so erhält man ebenfalls ein Eiweisscoagulum.

Zu der zweiten grossen Gruppe der pflanzlichen Eiweissstoffe, den Pflanzencaseinen, rechnet man das Legumin der Bohnen, Erbsen etc., das Conglutin der Lupinen und das Glutencasein der Gräser. Wir untersuchen das Conglutin etwas genauer. Samen von *Lupinus luteus* werden auf einer kleinen Handmühle zermahlen, das Pulver (ca. 25 g) wird mit destillirtem Wasser übergossen, und dem Gemisch so viel Kalilauge hinzugefügt, dass die Flüssigkeit bleibend schwach alkalisch reagirt. Die Samenrückstände werden mit Hülfe eines Haarsiebes von der conglutinhaltigen Flüssigkeit getrennt, diese darauf filtrirt und ganz schwach mit Essigsäure angesäuert. Das ausgefällte Conglutin sammelt man auf einem Filter und wäscht den Eiweisskörper mit Wasser aus. Das Conglutin ist unlöslich in Wasser. Suspendirt man aber etwas Conglutin in Wasser und fügt Phosphorsäure, Essigsäure, Citronensäure oder eine Auflösung von phosphorsaurem Natron (Na_2HPO_4) hinzu, so wird der Eiweissstoff aufgelöst ¹⁾.

1) Genaueres vgl. bei DETMER in WOLLNY's Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik, Bd. 2, Heft 4. Auf WEYL's Untersuchungen über die Pflanzencaseine (vgl. DETMER, Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, 1883, S. 157) gehe ich hier nicht näher ein.

Repräsentanten der dritten Gruppe der pflanzlichen Eiweissstoffe sind zumal in grosser Menge im Weizenmehl vorhanden. Dasselbe wird mit Wasser angerührt und der Teig zwischen den Händen unter einem continüirlichen, dünnen Wasserstrahl ausgeknetet. Es bleibt eine zähe, elastische Masse, der Kleber, zurück, welcher nur noch kleine Mengen Stärke beigemischt sind. Der Kleber, der in kalihaltigem Wasser löslich ist, besteht aus einer Reihe von Eiweissstoffen (Kleberproteinstoffen), namentlich aus Glutenfibrin, Gliadin und Mucedin, welche ihm zum Theil durch Alkohol entzogen werden können¹⁾.

94. Die makro- und mikrochemischen Eiweissreactionen.

Handelt es sich darum, eine der wichtigeren mikrochemischen Eiweissreactionen (die Biuretreaction) kennen zu lernen, so wird eine wässrige Albuminlösung oder Wasser, in welchem etwas Conglutin aus Lupinensamen suspendirt ist, zum Sieden erhitzt, wenig Natronlauge hinzugesetzt und in die heisse Flüssigkeit ein Tropfen FEHLING'scher Lösung mit Hülfe eines Glasstabes gebracht. Die Gegenwart von Eiweissstoffen giebt sich durch Violettfärbung der Versuchsflüssigkeit zu erkennen. Zur Darstellung der FEHLING'schen Lösung werden 34,65 g durch Umkrystallisiren gereinigten Kupfervitriols in 200 cem Wasser aufgelöst. Diese Lösung vermischt man mit einer Auflösung von 173 g weinsauren Natron-Kalis in 480 cem Natronlauge von 1,14 spec. Gewicht (ca. 10-proc. Natronlauge) und verdünnt die Flüssigkeit bei 15° C. auf 1000 cem.

In den Zellen des Parenchyms der Cotyledonen von Phaseolus sind bekanntlich neben den Stärkekörnern reichliche Eiweissmengen vorhanden. Schnitte aus den Bohnencotyledonen, welche aber mindestens zwei Zellschichten dick sein müssen, kann man daher bequem benutzen, um die mikrochemischen Eiweissreactionen kennen zu lernen. Einige cem concentrirter Kupfervitriollösung²⁾ oder einer Lösung von weinsaurem Kupferoxyd³⁾ werden in ein Schälchen gebracht. Das weinsaure Kupferoxyd bereitet man, indem man eine Lösung von 5 Thl. Kupfervitriol mit einer Lösung von 9 Thl. einfach weinsaurem Kali mischt und von dem entstehenden, relativ schwer löslichen schwefelsauren Kali abfiltrirt. Die Schnitte gelangen in eine der Kupfersalzlösungen, werden nach einigen Minuten mit einer Pincette gefasst, durch Eintauchen in reines Wasser oberflächlich abgespült und sofort in Kalilauge gelegt, die zum Sieden erhitzt ist. Der Inhalt der Zellen färbt sich in Folge seines Eiweissgehaltes violett⁴⁾.

Wird ein Schnitt aus den Cotyledonen einer trockenen Erbse auf dem Objectträger in ein aus 1 Thl. Wasser und 2 Thl. Glycerin bestehendes Gemisch gelegt, mit Deckglas bedeckt, und ein Tropfen Jodlösung an den Deckglasrand gebracht, so färben sich die Stärkekörner alsbald blau, die Aleuronkörner und die Grundmasse, in der letztere eingebettet sind, aber in Folge ihres Eiweissreichthums gelb.

1) Genaueres vgl. bei RITTHAUSEN, Die Eiweissstoffe der Getreidearten, 1872, S. 28.

2) Vgl. SACHS, PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 3, S. 187.

3) Vgl. PFEFFER, PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 8, S. 538.

4) Diese Eiweissreaction ist übrigens, ebenso wie andere, nicht durchaus eindeutig. Bei der Ausführung der Reaction kann man die Schnitte übrigens auch auf dem Objectträger in einen Tropfen FEHLING'scher Lösung legen, mit Deckglas bedecken und erhitzen, bis sich kleine Blasen bilden.

In Contact mit Zucker und Schwefelsäure färben sich die Protein-
stoffe roth, und um diese Reaction kennen- zu lernen, bringen wir z. B.
Schnitte aus den Cotyledonen eines trockenen Bohnensamens auf den
Objectträger in einen Tropfen concentrirter Rohrzuckerlösung und
lassen vom Deckglasrande aus concentrirte Schwefelsäure auf das
Object einwirken.

Werden Schnitte aus eiweissreichen Pflanzentheilen auf dem
Objectträger einige Minuten lang in einen Tropfen kalter rauchender
Salpetersäure gelegt und dann mit Ammoniak behandelt, so nehmen
sie eine intensiv gelbe Farbe an (Xanthoproteinsäurereaction).

Das MILLON'sche Reagens, welches man bereitet, indem man
Quecksilber in der Kälte mit dem gleichen Gewichtstheil concentrirter
rauchender Salpetersäure behandelt und die Flüssigkeit nach erfolgter
Auflösung des Metalls mit ihrem gleichen Volumen Wasser verdünnt,
färbt die Eiweissstoffe ziegelroth. Es ist zu empfehlen, das Reagens
nur im frisch bereiteten Zustande zu benutzen. Wenn man Schnitte
aus den Cotyledonen von Pisum in einen Tropfen des eventuell etwas
erwärmten MILLON'schen Reagens einlegt, so wird der Inhalt der
Zellen desorganisirt; er färbt sich aber in Folge der Anwesenheit der
Eiweissstoffe nach einiger Zeit ziegelroth.

In neuerer Zeit hat man zahlreiche Reagentien (zumal Lösungs-
mittel) auf die protoplasmatischen Gebilde der Zellen einwirken lassen
und auf Grund der erzielten Ergebnisse die Ansicht zu begründen
versucht, nach welcher eine ganze Reihe verschiedener eiweissartiger
Stoffe im Protoplasma, Zellkern etc. vorhanden sind. In der That ist
sicher, dass z. B. das Nuclein, wie wir unter 97 sehen werden,
wesentlich andere Eigenschaften als das gewöhnliche Eiweiss besitzt;
indessen, abgesehen von diesem und einigen wenigen anderen Resul-
taten, hat der bezeichnete Weg, obgleich principiell nichts gegen den-
selben einzuwenden ist, bis jetzt zu keinen wesentlichen Ergebnissen
geführt. So z. B. kann man den meisten diesbezüglichen Angaben
von FRANK SCHWARZ (vgl. COHN's Beiträge zur Biologie d. Pflanzen,
Bd. 5, H. 1) von einem streng chemischen Standpunkte aus keinen
Werth beimessen.

95. Allgemeines über das Verhalten der Eiweissstoffe in der Pflanze.

An anderer Stelle sind schon die Aleuronkörner der Samen be-
sprochen worden. Dieselben sind reich an Reserveproteinstoffen, und
ebenso wie die Stärkekörner bei der Keimung der Samen bedeutsame
Veränderungen erfahren, unterliegen auch die Aleuronkörner solchen
Veränderungen, wenn der Keimungsprocess beginnt. Die Protein-
körner werden nämlich aufgelöst, ihre Substanz wird zur Bildung
lebensthätiger, protoplasmatischer Gebilde verbraucht. Wir haben nur
nöthig, um uns von diesem Auflösungsprocess zu überzeugen, Samen
von *Ricinus communis* anzukeimen und dann möglichst zarte Schnitte
aus dem Endosperm zu untersuchen. Die Proteinkörner erscheinen
nicht mehr als glänzende Gebilde, wie im ruhenden Samen, sondern
ihre Hüllmasse ist aufgelöst und mit der Grundmasse zu einer trüben
Emulsion vermischt.

Wenn man Lupinensamen auf einer Handmühle zermahlt und das Pulver mit Wasser behandelt, so kann man sich leicht davon überzeugen, dass in der Lösung reichliche Eiweissmengen vorhanden sind. Man braucht zu der zum Sieden erhitzten Flüssigkeit nur etwas Kali und einen Tropfen FEHLING'scher Lösung hinzuzufügen. Auf jeden Fall geht bei der Behandlung des Lupinensamenpulvers mit Wasser und ebenso bei der Quellung der unversehrten Samen vor allem Conglutin in Lösung. Dieser Eiweissstoff ist aber unlöslich in reinem Wasser, daher müssen Substanzen zugegen sein, welche die Auflösung des Proteinkörpers vermitteln. Untersucht man die Reaction der Lupinenpulverextracte mit Hülfe von Lackmuspapier, so ergiebt sich, dass dieselbe eine ziemlich intensiv saure ist. Diese saure Reaction wird unter Umständen durch die in manchen Lupinensorten vorhandene Citronensäure bedingt (und die Citronensäure ist ja ein Lösungsmittel für Conglutin); sie kann aber auch auf andere Weise zu Stande kommen. Vertheilt man etwas Conglutin in Wasser, so nimmt die Flüssigkeit höchstens eine ganz schwach saure Reaction an. Fügt man eine Lösung von phosphorsaurem Kali K_2HPO_4 , die als solche schwach alkalisch reagirt, hinzu, so löst sich das Conglutin auf, und die Flüssigkeit reagirt viel stärker sauer als zuvor. Der Eiweissstoff entzieht dem K_2HPO_4 Kali, wodurch seine Auflösung zu Stande kommt, während sich andererseits saures phosphorsaures Kali KH_2PO_4 bildet. Die Samen enthalten nun bekanntlich relativ reichliche Kali- und Phosphorsäuremengen, und wenn sie mit Wasser in Berührung gelangen, so kann sich nach dem Gesagten offenbar leicht eine Lösung bilden, die stark sauer reagirt und doch erhebliche Quantitäten von Eiweissstoffen aus der Gruppe der Pflanzencaseine enthält¹⁾.

Auf Experimente, welche lehren, dass in Folge des Stoffwechsels bei der Keimung der Samen weder Ammoniak noch freier Stickstoff abgeschieden werden, ist schon an anderer Stelle (vgl. unter 19) hingewiesen worden.

96. Das Pepsin und die Peptone.

Die Eiweissstoffe als solche sind nicht im Stande, die Zellhaut oder Membranen von ähnlicher Beschaffenheit auf osmotischem Wege zu passiren. Es besitzt daher die Thatsache ein physiologisches Interesse, dass manche Pflanzen Fermente produciren, welche die Eiweisskörper in Peptone, Substanzen, die wenigstens eine geringe Diffusionsfähigkeit besitzen, umzuwandeln vermögen.

Peptonisirend wirkende Fermente (Pepsin) werden von den Drüsenköpfchen der Droseraarten secernirt und sind im Nepenthessecret sowie in manchen Milchsäften (z. B. demjenigen von *Carica Papaya*) vorhanden²⁾. Wenn kein Papayotin, das übrigens käuflich ist, oder kein pepsinhaltiger Milchsaff zur Verfügung steht, der kann den folgenden lehrreichen Versuch anstellen, um wenigstens den Process der Peptonisirung überhaupt kennen zu lernen. Eine Pepsinlösung ist nämlich leicht zu erhalten, wenn man frische Stücke der Schleimhaut

1) Vgl. DETMER in WOLLNY's Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik, Bd. 2, Heft 4.

2) Vgl. zumal HANSEN, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. 3, H. 2. Ferner vgl. über Pepsingehalt der Keimpflanzen NEUMEISTER, Zeitschr. f. Biologie, Bd. 30.

des Schweinemagens mit Glycerin extrahirt und filtrirt. Werden nun etwa 500 ccm Wasser, das 0,2 Proc. Salzsäure enthält, in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade auf 40° C. erwärmt, 40 g Fibrin einige Zeit mit der warmen Flüssigkeit digerirt, bis der Eiweisstoff möglichst aufgequollen ist, so bewirkt Zusatz einiger Tropfen des fermenthaltigen Glycerins in einigen Minuten eine fast vollständige Peptonisirung und Verflüssigung des Fibrins. Das erforderliche Fibrin (aus Ochsenblut) ist vom Fleischer zu beziehen und kann in Glycerin aufbewahrt werden. Will man den Eiweisstoff zu einem Verdauungsversuch benutzen, so wäscht man ihn sorgfältig mit Wasser aus und bringt ihn dann in die verdünnte, warme Salzsäure. Benutzt man *Nepenthessecret* oder Milchsäfte als pepsinhaltige Flüssigkeiten, so ist wenigstens in manchen Fällen dafür Sorge zu tragen, dass die verdünnte Salzsäure, in der man das Fibrin aufgequollen hat, längere Zeit auf einer Temperatur von 40° C. erhalten bleibt, denn die Peptonisirung geht in diesen Fällen oft nicht so schnell vor sich. Uebrigens ist in manchen Fällen der Pepsingehalt von Milchsäften sehr schnell zu constatiren, und ich beobachtete dies z. B. bei Ausführung des folgenden Experiments, das leicht wiederholt werden kann. In ein Probirglas wurden einige ccm sehr verdünnter Salzsäure gebracht, wenige Stückchen Fibrin hinzugefügt und das Probirglas nun in Wasser eingetaucht, das auf 40° C. erwärmt war. Nach erfolgtem Aufquellen des Fibrins wurden der Flüssigkeit einige Tropfen Milchsaft hinzugesetzt, der aus den Stielen im unreifen Zustande abgeschnittener Feigenfrüchte ausgeflossen war. Die Peptonisirung und Verflüssigung des Fibrins trat in wenigen Augenblicken ein.

Wenn Pepsin auf Eiweisstoffe einwirkt, so machen sich complicirte chemische Processe geltend. Als Endproducte sind verschiedene Peptone anzusehen, die aber durch die Biuretreaction leicht als solche erkannt werden können. Wenn man eine kleine Quantität einer peptonhaltigen Flüssigkeit erwärmt, mit Kalilauge neutralisirt und nun FEHLING'sche Lösung hinzufügt, so nimmt die Mischung keine violette Färbung, wie bei Gegenwart von Eiweisstoffen, sondern eine purpurrothe Färbung an.

97. Das Nuclein.

Während das Protoplasma besonders reich an Eiweisstoffen ist, muss das Nuclein als ein charakteristischer Bestandtheil des Zellkerns angesehen werden. Von den Proteinstoffen unterscheidet sich das stickstoffhaltige Nuclein durch seinen Phosphorgehalt sowie sein eigenthümliches Verhalten zu Reagentien. In letzterer Beziehung ist namentlich wichtig, dass das Nuclein nicht von pepsinhaltigen Flüssigkeiten angegriffen wird. Um dies zu beobachten, bringt man ein Stückchen der Epidermis von der Blattunterseite einer *Tradescantia* (ich benutzte mit vorzüglichem Erfolg *Tradescantia virginica*) auf den Objectträger und fügt eine pepsinhaltige Flüssigkeit (Mischung von 1 Volumentheil Glycerinextract aus Schweinemagen mit 3 Volumentheilen 0,2-proc. Salzsäure) hinzu. Die Untersuchung lehrt, dass das Protoplasma sich contrahirt hat, während die Kerne in den Zellen bald völlig homogen werden. Die Kerne nehmen dann an Volumen zu und stellen endlich gelbliche, stark lichtbrechende Gebilde dar,

die keine weitere Veränderung erfahren. Wenn die homogen gewordenen Kerne beginnen, sich zu vergrössern, wird das contrahirte Protoplasma an einer oder an mehreren Stellen blasig aufgetrieben. Schliesslich platzt die Blase, und es bleiben nur unbedeutende Protoplasmareste übrig, die den Kern umgeben. Verdünnte Salzsäure verändert die mit der künstlichen Verdauungsflüssigkeit behandelten Kerne nicht, während sie sich in verdünnter Sodalösung sofort auflösen¹⁾.

98. Der mikrochemische Nachweis des Asparagins.

Ich habe mit Nachdruck die Ansicht zur Geltung zu bringen gesucht²⁾, dass die lebendigen Eiweissmoleküle des Protoplasmas, die physiologischen Elemente, wie ich dieselben nenne, unter allen Umständen und in jeder in Lebensthätigkeit begriffenen Zelle durch Dissociationsprocesse in stickstoffhaltige und stickstofffreie Verbindungen zerfallen (Dissociationshypothese). Diese letzteren werden verathmet und liefern das für den Wachstumsprocess der Zellen erforderliche Material etc., während die ersteren sich bald in mehr oder minder grossen Quantitäten in den Zellen anhäufen oder unter Beihülfe

Fig. 92. Asparaginkrystalle. (Nach ZIMMERMANN.)

von stickstofffreien Körpern zu Proteinstoffen regenerirt werden. Zudem besitzen die stickstoffhaltigen Dissociationsproducte der physiologischen Elemente des Protoplasmas (Asparagin, Glutamin, Leucin, Tyrosin, Allantoin) insofern grosse Bedeutung, als sie bei der Stoffwanderung im vegetabilischen Organismus eine wichtige Rolle spielen.

Unter allen stickstoffhaltigen Zersetzungsproducten der Eiweissstoffe scheint das Asparagin (Amidobernsteinsäureamid) die hervorragende Bedeutung zu beanspruchen. Wir widmen demselben aus diesem Grunde unsere specielle Aufmerksamkeit und wollen zunächst sehen, in welcher Weise es gelingt, seine Gegenwart auf mikrochemischem Wege in den Pflanzenzellen zu constatiren.

Versetzen wir eine concentrirte wässrige Asparaginlösung mit absolutem Alkohol, so scheidet sich das Asparagin ab, da es fast unlöslich in Alkohol ist. Ebenso kann man das Asparagin, welches im Zellsaft gelöst ist, durch Alkohol niederschlagen, und da die sich bildenden, dem rhombischen System angehörenden Krystalle, zumal diejenigen, welche in Form rhombischer Tafeln mit einem stumpfen Winkel von $129^{\circ} 18'$ auftreten, eine beträchtliche Grösse sowie charakteristische Form besitzen, so ist es in der angedeuteten Weise möglich, die Gegenwart des Säureamids in den Zellen auf mikrochemischem Wege festzustellen³⁾. (Vgl. Fig. 92.)

Die Schnitte, welche dicker sein müssen als eine Zellschicht, damit nicht alle Zellen geöffnet sind, legt man in ein Uhrgläschen,

1) Vgl. ZACHARIAS, Botan. Zeitung, 1881, S. 169.

2) Vgl. DETMER, Vergleichende Physiologie d. Keimungsprocesses der Samen, 1880, PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 12, WOLLNY's Forschungen auf d. Gebiete d. Agriculturphysik, Bd. 5, und Lehrbuch d. Pflanzenphysiologie, 1883.

3) Vgl. PFEFFER, PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 8, S. 533, und BORODIN, Botan. Zeitung, 1878, S. 804.

in dem sich absoluter Alkohol befindet, schwenkt sie schnell in der Flüssigkeit hin und her und untersucht sie. Ist nur sehr wenig Asparagin in den Zellen vorhanden, so thut man am besten, die Schnitte auf dem Objectträger mit absolutem Alkohol zu betupfen, das Deckglas aufzulegen, um das Präparat nach dem Trocknen der mikroskopischen Beobachtung zu unterziehen.

Um jede Verwechslung der verschiedenen Asparaginkrystalle mit anderen Körpern, z. B. Salpeterkrystallen, zu vermeiden, behandelt man die Schnitte nachträglich mit einer völlig gesättigten Asparaginlösung. Bestehen die durch Alkohol erzeugten Krystalle wirklich aus Asparagin, so lösen sie sich nun nicht auf. Andere Krystalle werden aber von der Asparaginlösung aufgenommen.

99. Die quantitative Bestimmung des Gesamtstickstoffs und des Stickstoffs der Proteinstoffe und der Säureamide in Keimpflanzen.

Aus einem grossen Vorrath der Samen von *Lupinus luteus* werden etwa 300 Stück, die sehr normal und gleichmässig ausgebildet sind, ausgesucht. Man stellt das mittlere Gewicht eines Samenindividuums fest und ermittelt den Trockensubstanzgehalt der Untersuchungsobjecte (vgl. unter 1). Die Samen gelangen nun zum Quellen 24 Stunden lang mit Wasser in Berührung. Jetzt durchfeuchtet man Sägespäne völlig mit Wasser und füllt grosse Blumentöpfe oder Zinkblechkästen mit denselben an, indem man die Späne zwischen den Händen zerreibt und in die Töpfe oder Kästen einfallen lässt, so dass ein ganz lockeres Keimbett entsteht. Die Samen werden in dasselbe eingelegt, mit feuchten Sägespänen bedeckt und bei etwa 20° C. bei Lichtabschluss sich selbst überlassen. Man hat nur für Ersatz des verdunstenden Wassers Sorge zu tragen.

Nach 3, 5 oder 7 Tagen wählt man diejenigen Keimlinge aus, welche sich sehr gleichförmig entwickelt haben. Sie werden gesäubert, in einer Reibschale zerquetscht, zunächst unter häufigerem Umrühren des Breies auf dem Wasserbade, dann im Trockenschrank bei 50 bis 60° C. getrocknet. Das Untersuchungsmaterial bleibt alsdann, lose bedeckt, 24 Stunden lang an der Luft stehen; es wird gewogen, um darauf sogleich Proben zu Trockensubstanzbestimmungen zu entnehmen. Man kennt nun das Trockengewicht der geernteten Anzahl der Keimlinge. Das Trockengewicht der entsprechenden Anzahl von Samen ist ebenfalls bekannt, und somit ist man im Stande, die Resultate der folgenden Untersuchungen auf sich entsprechende Mengen von Samen- und Keimpflanzentrockensubstanz zu beziehen.

Zur Bestimmung des Gesamtstickstoffs werden 1–2 g Trockensubstanz der Samen und Keimlinge in gut gepulvertem Zustande nach KJELDAHL untersucht. (Vergl. Methode in KÖNIG's Untersuchung landwirthschl. wichtiger Stoffe, 1891, S. 150.)

Den Stickstoff der Eiweissstoffe bestimmt man nach STUTZER's Methode. (Vergl. KÖNIG, S. 212.)

Subtrahirt man die Menge des Stickstoffs der Eiweisskörper von der Quantität des Gesamtstickstoffs, so erhält man einen Werth, durch den die Menge des Stickstoffs der nicht eiweissartigen Verbindungen zum Ausdruck gelangt. Die Samen enthalten nur sehr kleine Quantitäten

solcher Stoffe, während die Keimpflanzen, zumal weiter entwickelte, reich an Amidosäuren und Säureamiden etc. sind.

Will man speciell den Gehalt der Untersuchungsobjecte an Säureamiden (in den Lupinenkeimlingen ist fast nur von solchen Körpern Asparagin vorhanden) feststellen, so werden etwa 8 g Trockensubstanz zweimal mit 40 ccm kaltem Wasser je 1 Stunde lang extrahirt. Nach dem Filtriren unter Benutzung einer Saugpumpe wird der Rückstand einmal mit 50 ccm Wasser ausgekocht, um alle Filtrate, sowie die zum Auswaschen des Rückstandes benutzte Flüssigkeit zu vereinigen¹⁾. Man kocht die Flüssigkeit nun zur Ausfällung gelöster Eiweissstoffe schnell auf, filtrirt und bringt das Filtrat auf 200 ccm.

100 ccm werden nach Zusatz von 10 ccm Salzsäure 1—1½ Stunde lang unter Ersatz des verdunsteten Wassers gekocht, wodurch das Asparagin sich in Asparaginsäure und Ammoniak spaltet. Den Stickstoff des Ammoniaks bestimmt man mit Hülfe bromirter Lauge (bereitet durch Auflösen von 100 g Aetznatron in 1250 ccm Wasser und Eintragen von 25 ccm Brom in die völlig erkaltete Lösung) im Azotometer (vgl. unter 92). Es kommen dabei je 10 ccm Untersuchungsflüssigkeit zur Verwendung. Das gefundene Stickstoffvolumen wird auf 0° C. und 760 mm Barometerstand reducirt, und es ist dann leicht, die Gewichtsmenge des Stickstoffs und daraus die Quantität des vorhandenen wasserfreien Asparagins ($C_4H_8O_3N_2$) zu berechnen. Manchmal enthalten Keimpflanzenextracte kleine Mengen eines Körpers, der schon ohne vorheriges Kochen mit Salzsäure Stickstoff bei der Behandlung mit bromirter Lauge ausgiebt. Es ist daher erforderlich, 10 ccm des Keimpflanzenauszugs direct im Azotometer mit der Lauge zu schütteln und die eventuell gefundene Stickstoffquantität von derjenigen abzuziehen, die man nach dem Kochen des Extractes mit HCl findet²⁾. Den Stickstoff der Säureamide kann man auf die angegebene Weise recht genau in seiner Menge feststellen. Eine Berechnung dieser Stickstoffquantitäten auf Asparagin ist nur dann einigermaassen zulässig, wenn die Untersuchungsobjecte, wie es allerdings bei den Lupinen der Fall ist, neben dem Asparagin nur noch geringe Mengen anderer Amide enthalten.

100. Das Verhalten des Asparagins in den Pflanzen.

Handelt es sich darum, Aufklärung über die physiologische Function des Asparagins zu gewinnen, so bieten sich uns in erster Linie die Keimpflanzen von *Lupinus luteus* als ausgezeichnete Untersuchungsobjecte dar. Bei der Keimung der Lupine streckt sich das hypocotyle Glied sehr bedeutend, die Cotyledonen werden über die Erde gehoben, streifen die Samenschale alsbald ab und fungiren als Assimilationsorgane. Als bald streckt sich dann auch das epicotyle Stengelglied, und die ersten Laubblätter entfalten sich. Das hypocotyle Glied hat ein mächtiges Rindenparenchym entwickelt, welches den Gefässbündelkreis sowie das Mark umschliesst. In den Stielen der Cotyledonen sind die Gefässbündel halbmondförmig angeordnet. Das Grundgewebe der Cotyledonen ist nur in der peripherischen Region

1) Sollte das Filtriren der gekochten Flüssigkeit Schwierigkeiten machen, so leitet man in dieselbe etwa ¼ Stunde lang einen kräftigen Strom gewaschener Kohlensäure ein. Das Filtriren geht dann sehr schnell vor sich.

2) Vgl. SACHSSE, Die Chemie und Physiologie d. Farbstoffe etc., 1877, S. 257, und DETMER, Physiol.-chemische Untersuchungen über die Keimung etc., 1875, S. 74.

derselben reich an Chlorophyllkörnern. Die Vertheilung des Asparagins in der sich unter normalen Verhältnissen, also bei Lichtzutritt, entwickelnden Keimpflanze von *Lupinus* gestaltet sich nun nach den mikrochemischen Untersuchungen PFEFFER's, von denen ich eine ganze Reihe wiederholt habe, wie folgt: Die Samen sind asparaginfrei. Hat die Wurzel 12 und das hypocotyle Glied 2—4 mm Länge erreicht, so ist in diesen Organen sowie im unteren Theile der Samenlappenstiele wenig Asparagin vorhanden. Keimpflanzen von 30—40 mm Wurzellänge, deren Cotyledonen noch nicht wesentlich über die Erde hervorgehoben worden sind, führen in der Wurzel Asparagin; dasselbe fehlt aber der Wurzelspitze. In den Rindenzellen des hypocotylen Gliedes sowie im unteren Theile der Stiele der Cotyledonen ist Asparagin vorhanden. Der Lamina der Cotyledonen fehlt aber das Asparagin noch. Ist die Keimung so weit fortgeschritten, dass sich die Cotyledonen ausbreiten, dann ist in diesen Asparagin vorhanden. In den Samenlappenstielen, zumal aber im hypocotylen Glied finden sich jetzt sehr reichliche Asparaginemengen. Das Säureamid kommt aber nur in den Zellen des Parenchyms dieser Organe vor; den Elementen der Gefässbündel fehlt dasselbe, wie immer, vollkommen. Wenn sich das epicotyle Stengelglied streckt, so ist auch in diesem Asparagin nachzuweisen, während die übrigen Organe der Keimpflanze, zumal das hypocotyle Glied, allmählich asparaginärmer werden. Bei weiter fortschreitender Entwicklung der Pflanzen unter normalen Vegetationsbedingungen verschwindet das Asparagin gänzlich aus allen Organen, weil jetzt in Folge lebhafter Assimilation so erhebliche Mengen stickstoffreicher organischer Körper erzeugt werden, dass die durch Dissociation gebildeten stickstoffreichen Zersetzungsproducte der physiologischen Elemente sofort ihrer Gesamtmasse nach zu Eiweisstoffen regenerirt werden können. Beachtung verdient auch noch die That-sache, dass in dem Maasse, wie die Asparaginbildung bei der Keimung Fortschritte macht, die Menge der Reserveproteinstoffe in den Reservestoffbehältern abnimmt. Untersucht man z. B. die Cotyledonen von *Lupinus*, wenn die Streckung des epicotylen Gliedes beginnt, so erscheint der Zellinhalt bereits sehr aufgeklärt, und die Behandlung der Schnitte mit Jod lehrt, dass der Eiweisgehalt der Zellen kein übermässig grosser mehr sein kann¹⁾.

Um den bestimmten Nachweis dafür zu liefern, dass die Rückbildung von Eiweisstoffen aus Asparagin nur unter Vermittelung von stickstofffreien Körpern erfolgen kann, füllen wir zwei Blumentöpfe mit Sand an, den wir mit Nährstofflösung getränkt haben, und legen einige Samen von *Lupinus luteus* in den Boden. Die Pflanzen des einen Topfes entwickeln sich unter ganz gewöhnlichen Bedingungen vor einem Fenster. Der andere Topf wird in dem unter 16 beschriebenen Apparat ebenfalls dem Licht ausgesetzt, aber die Untersuchungsobjecte bilden sich in kohlenensäurefreier Luft aus. Sie können somit nicht assimiliren, und daher hört ihr Wachsthum, wenn sich das zweite Laubblatt entfaltet hat, auf. Jetzt und auch noch später bis zu ihrem schliesslich erfolgenden Absterben sind reichliche Asparaginemengen in den Organen der Keimlinge, zumal im hypocotylen Gliede, nachzuweisen, weil keine Kohlehydrate gebildet werden, welche die Eiweisregeneration vermitteln könnten. Die sich unter normalen Verhältnissen ausbildenden *Lupinen-*

1) Vgl. PFEFFER, PRINGSHEIM's Jahrbücher f. wissenschaftl. Botanik, Bd. 8.

pflanzen, welche fort und fort kräftig weiter wachsen, enthalten hingegen zu derselben Zeit, während welcher die bei Kohlensäureausschluss entwickelten Untersuchungsobjecte sehr asparaginreich sind, kein Asparagin mehr oder höchstens kleine Quantitäten desselben ¹⁾).

Werden Keimlinge von *Lupinus* bei Lichtabschluss zur Entwicklung gebracht, so sind auch noch die nach Verlauf längerer Zeit absterbenden Untersuchungsobjecte asparaginreich, weil es unter den bezeichneten Umständen an stickstofffreiem Material, das für die Eiweissregeneration verwendet werden könnte, fehlt. Alles dies ist durch mikrochemische Untersuchung (vergl. unter 98) oder durch Analyse (vergl. unter 99) festzustellen.

II. Der Athmungsprocess der Pflanzen.

101. Experimente zur allgemeinen Orientirung über die Pflanzenathmung.

Die bei genauen quantitativen Untersuchungen über den Athmungsprocess der Pflanzen in Anwendung zu bringenden Methoden sollen erst in den folgenden Abschnitten Erwähnung finden; hier handelt es sich zunächst nur um Demonstrationsversuche, welche uns namentlich über die verschiedenen Formen der Pflanzenathmung orientiren werden.

Wir stellen zwei weithalsige Glasylinder auf. In den einen Cylinder bringen wir grössere Mengen von Blüthen oder Keimpflanzen (Weizen, Erbsen, Bohnen) und verschliessen beide Gefässe mit Glasstöpseln oder Korken. In jeden Cylinder führen wir nach Verlauf einiger Stunden ein an einem Draht befestigtes brennendes Licht ein. Dasselbe wird in dem mit Pflanzen beschiekten Cylinder erlöschen; in dem anderen brennt es ruhig weiter. Die athmenden Pflanzen haben den Sauerstoff der Luft im Apparat verbraucht und dafür Kohlensäure erzeugt, welche den Verbrennungsprocess nicht zu unterhalten im Stande ist.

Diesen einfachen Vorlesungsversuch verbinden wir mit einem ferneren, der die Kohlensäureproduction in Folge der normalen Athmung direct nachweist. Wir stellen den in Fig. 93 abgebildeten Apparat zusammen. Die mit Wasser angefüllte Flasche von etwa 10 l Inhalt dient als Aspirator. Der Kork, welcher die Mündung der Flasche verschliesst, ist doppelt durchlocht. In der einen Bohrung steckt das Rohr *G*, welches mit dem mit einem Glashahn versehenen Glasrohr *R* in Verbindung steht. Vor Beginn des Versuchs werden die Röhren *G* und *R* mit Wasser angefüllt. Das Rohr *G'* ist mit den Apparaten *a*, *b*, *c* und *d* in Verbindung gesetzt. Die Cylinder *a* und *c* enthalten klares Barytwasser. Man übergiesst Barythydrat in einer grösseren Flasche mit destillirtem Wasser, schüttelt wiederholt tüchtig um, lässt absetzen und bringt eine hinreichende Menge der Flüssigkeit mit Hülfe einer gut ausgetrockneten Pipette in die völlig trockenen Cylinder *a* und *c*. In dem U-förmigen Rohr *b* befinden

1) Vgl. PFEFFER, Botan. Zeitung, 1874, S. 249.

Fig. 93. Apparat zur Demonstration der Kohlensäureproduction bei der Athmung der Pflanzen.

passirt ein Luftstrom. Die Luft wird in *d* von Kohlensäure befreit. Das Barytwasser in *c* bleibt daher auch klar. In *a* entsteht dagegen sehr schnell eine Trübung des Barytwassers resp. ein Niederschlag von kohlensaurem Baryt, wodurch eben die Kohlensäureproduction der Untersuchungsobjecte nachgewiesen wird.

Zur Demonstration des Sauerstoffverbrauchs bei normaler Athmung dient der folgende Apparat (vgl. Fig. 94). In einem Holzgestell *H* hängen zwei röhrenartige Gefässe, die am unteren Ende in Wasser eintauchen, das sich in den Gläsern *G* und *G'* befindet. Der dünnere, etwa 45 cm lange und 15 mm weite Theil dieser Gefässe *A* und *B* ist bis auf 0,2 ccm genau calibrirt, er erweitert sich oben in den 30 cm langen und 40 mm weiten Theil *W* und *W'* der Apparate. In den sorgfältig ausgewählten, sehr gut schliessenden durchbohrten Kautschukkörken stecken die mit Glashähnen versehenen Glasröhren *h* und *h'*¹⁾. Das kleine recht weite Gläschen des einen Apparates hängt an einem Draht und enthält völlig klare concentrirte Kalilauge. Nun werden z. B. in jeden Apparat 25 Erbsenkeimlinge, die 3 Tage alt sind und sich bei 15° C. entwickelten gebracht. Sie finden auf feuchter Glaswolle ihren Platz im oberen, erweiterten Theil der Vorrichtungen. Die Apparate stellt man in einem Raume von recht constanter Temperatur auf, saugt etwas Wasser in den Röhren *A* und *B* einpor, schliesst die wohl eingefetteten Hähne und wartet etwa

1) An Stelle der Kautschukkörke können auch eingeschlifene Glasstopfen Verwendung finden.

eine halbe Stunde lang, bevor man den Stand des Wassers in den Röhren *A* und *B* abliest. Man notire ferner die am Thermometer *T* abgelesene Temperatur. Bei einem von mir mit 25 Erbsenkeimlingen bei 15° C. angestellten Experiment stieg das Wasser im mit Kalilauge beschickten Apparat im Laufe von 21 Stunden von 22,2 bis 60,4 ccm. Im Apparat ohne Kalilauge verändert sich der Wasserstand bei nahezu constant bleibender Temperatur dagegen nur wenig, weil die im Athmungsprocess erzeugte Kohlensäure der Hauptmasse nach an Stelle des verbrauchten Sauerstoffs tritt. Bei Kaligegegenwart muss aber das Wasser emporsteigen, denn die von den Pflanzen producirte Kohlensäure wird schnell absorbirt und ersetzt den consumirten Sauerstoff nicht.

Auch für den folgenden Demonstrationsversuch genügt es, Wasser und nicht Quecksilber als Sperrflüssigkeit zu verwenden. Beide Apparate werden ohne Benutzung von Kalilauge mit Pflanzenmaterial beschickt. Als solches finden 5 g Erbsensamen oder 5 g Weizenkörner und 5 g Hanfkörner Verwendung. Je 5 g des Beobachtungsmaterials werden abgewogen, und nach dem Anquellen führt man in einen unserer Apparate die stärkereichen, in den anderen die fettreichen Untersuchungsobjecte ein. Beobachtet man den Wasserstand in den Röhren *A* und *B*, während die Apparate in einem Raum stehen, in welchem bedeutendere Temperaturschwankungen nicht stattfinden, so findet man im Laufe von 1–2 Tagen, dass derselbe im Apparat, der mit stärkereichen Samen beschickt worden ist, keine erhebliche Veränderung erfährt. Im anderen Apparat erhebt sich die Flüssigkeit aber beträchtlich. Die fettreichen Körner unterhalten freilich, ebenso wie die stärkereichen, normale Athmung; zugleich bringen die ersteren bei der Keimung aber noch jene Athmungsform zur Geltung, welche ich als Vinculationsathmung bezeichnet habe. Das Wesen derselben besteht in einer Sauerstoffabsorption ohne entsprechende Kohlensäurebildung, und der gebundene Sauerstoff findet zur Ueberführung des Fettes in sauerstoffreichere Körper (Kohlehydrate) Verwendung.

Endlich füllen wir noch den oberen Theil eines unserer Apparate völlig mit Blüten (*Rosa* oder *Dahlia* etc.) oder mit Keimlingen von *Vicia Faba* an. Wir saugen das Wasser bis zu bedeutender Höhe empor, schliessen den Glashahn und lassen die Vorrichtung ruhig stehen. Die Untersuchungsobjecte unterhalten zunächst normale Athmung. Bald aber ist der Sauerstoff der Luft im Apparat verbraucht, und nun macht sich selbst bei etwas sinkender Temperatur

Fig. 94. Apparat für Experimente über Pflanzenathmung.

ein Fallen der Wassersäule geltend. Die Pflanzentheile produciren in Folge intramolekularer oder innerer Athmung im sauerstofffreien Raum Kohlensäure. Dadurch wird das Gasvolumen im Apparat vergrößert und das Wasser im Rohr hinabgedrückt.

Um die Production von Kohlensäure (Athmung) bei der Gährung zu constatiren, stellen wir den in Fig. 95 abgebildeten Apparat zusammen. Wir bringen in den Kolben *A* 200 cem PASTEUR'sche Nährlösung (vgl. unter 18) und fügen zu derselben etwa 5 g Presshefe. Als bald beginnt die Gährung. Die entweichende Kohlensäure kann durch das in dem Gefäße *B* vorhandene klare Kalk- oder Barytwasser als solche nachgewiesen werden. Gährung und reichliche

Fig. 95.

Fig. 96.

Fig. 95. Apparat zur Demonstration der Kohlensäureproduction bei der Gährung.

Fig. 96. Kühne'sches Gährungsgefäß.

Kohlensäureentwicklung findet nicht statt, wenn man die Hefe im Kolben *A* mit einer Flüssigkeit in Berührung bringt, welche ebenso wie die PASTEUR'sche Nährlösung zusammengesetzt ist, der aber der Zucker fehlt und die an Stelle des weinsauren, salpetersaures Ammoniak enthält.

Auch unter Benutzung der KÜHNE'schen Gährungsgefäße ¹⁾ (Fig. 96) kann man sich leicht von der Kohlensäurebildung bei der Gährung überzeugen. Das Rohr des Apparates wird völlig mit PASTEUR'scher Nährlösung angefüllt, während die Kugel frei davon bleibt. Wir bringen nun ein Hefekügelchen in die Flüssigkeit. In Folge der alsbald beginnenden Kohlensäureentwicklung wird die Nährlösung

1) Diese Apparate stellt jeder Glasbläser her.

aus dem Rohr in die Kugel des Apparates gedrängt. Wenn man dann ein Stückchen Aetzkali in denselben einführt, so steigt die Flüssigkeit, da eine Absorption der Kohlensäure erfolgt, wieder in das Rohr zurück.

Wird ein langer Glaseylinder bis zur Hälfte mit PASTEUR'scher Nährlösung beschickt, derselben Presshefe zugesetzt, und das Gefäss nun nicht völlig luftdicht verschlossen, so kann man die alsbald gebildete Kohlensäure einfach nachweisen, indem man in den geöffneten Cylinder ein brennendes Licht einführt. Die Flamme wird erlöschen¹⁾.

102. Methode zur Bestimmung der bei intramolekularer und normaler Athmung der Pflanzen producirten Kohlensäure.

In Fig. 97 ist ein Apparat abgebildet, der bequem bei Untersuchungen über Kohlensäureproduction in Folge intramolekularer Athmung der Pflanzen Verwendung finden kann. Wir wollen hier zunächst diesen Apparat näher kennen lernen. Die bei Experimenten über normale Athmung zu benutzende Vorrichtung ist eine weit einfachere²⁾.

Bei der Ausführung der Untersuchungen handelt es sich darum, über das Beobachtungsmaterial einen kohlensäurefreien Wasserstoffstrom hinzuleiten und die von den Pflanzen bei Sauerstoffausschluss producirte Kohlensäure ihrer Quantität nach festzustellen. Die Geschwindigkeit des Wasserstoffstromes kann leicht mit Hülfe des Aspirators *A* regulirt werden. Man kann ja die in den Cylinder *M* abfließende Wassermenge z. B. von 10 zu 10 Minuten messen und den Glashahn *H^{III}* so reguliren, dass z. B. pro Stunde 3 l Wasser abfließen. Behufs genauer Einstellung ist der Glashahn *H^{III}* mit einer lang ausgezogenen Spitze versehen, die vor dem Gradbogen *Gb* spielt. Wenn das Wasserniveau im mindestens 15—20 l Wasser fassenden Aspirator *A* erheblich sinkt und dadurch eine Verminderung der Stromgeschwindigkeit zu Stande kommt, so muss der Hahn *H^{III}* häufiger verstellt werden. Es ist daher vortheilhaft, den Aspirator stets möglichst mit Wasser angefüllt zu benutzen, zumal die Füllung durch Verbindung des Abflussrohres (an der Stelle *i*) mit der Wasserleitung mittelst eines Gummischlauches sehr bequem und schnell vor jedem Versuch bewirkt werden kann. Auch die Benutzung recht grosser Aspiratorgefässe, z. B. grosser Säureballons, ist sehr empfehlenswerth.

Das Wasserstoffgas wird im grossen KIPP'schen Apparat *W* aus chemisch reinem, arsenfreiem Zink und arsenfreier Salzsäure (1 Thl. Wasser und 1 Thl. Säure) entwickelt. Um sicher jede Spur für die Pflanzen schäd-

1) Meine Ansichten über das Wesen der normalen und intramolekularen Athmung sowie der Gährung habe ich in meinem Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, Breslau 1883, ausgesprochen. Vergl. ferner DETMER, PRINGSHEIM's Jahrbücher f. wissensch. Bot., Bd. 12, und Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 10, S. 433.

2) Ich bespreche hier die Methoden, welche von mir und meinen Schülern mit bestem Erfolg benutzt wurden. Vgl. DETMER, Physiolog. Untersuchungen über die Keimung, Jena 1875, und Sitzungsber. d. Jenaischen Gesellschaft f. Medicin u. Naturwiss., 1881; CLAUSEN, Landwirthsch. Jahrb., 1890, Bd. 19; AMM, PRINGSHEIM's Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. 25; DETMER, Botan. Zeitung, 1888, und Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 8, 10 und 11; ZIEGENBEIN, PRINGSHEIM's Jahrb., Bd. 25; AEREBOE, WOLLNY's Forschungen auf dem Gebiet der Agriculturphysik, Bd. 16.

licher Beimengungen zu beseitigen, passiert das Gas die Waschflasche *Ue*, welche eine Lösung von Kaliumpermanganat enthält, und das mit Bimsteinstückchen, die mit einer Lösung von salpetersaurem Silberoxyd getränkt sind, angefüllte U-Rohr *S*. Der Inhalt beider Vorlagen

ist häufiger zu erneuern. Indem das Wasserstoffgas das unten mit concentrirter Kalilauge, oben mit Aetzkalistücken angefüllte Absorptionsgefäß *Kⁱ* sowie die mit Kalilauge getränkten Bimsteinstückchen in den U-Röhren *Kⁱⁱ* und *Kⁱⁱⁱ* durchströmt, wird es jeder Spur von Kohlensäure beraubt. Zwischen *Kⁱⁱⁱ* und dem Schlangenrohr des die Pflanzen enthaltenden Respirationsgefäßes *R* wird zweckmässig noch eine kleine als Sperrventil dienende und wenig concentrirte Schwefelsäure enthaltende Flasche eingeschaltet. Dies Ventil, ebenso beschaffen wie das Ventil *Sch* und in der Abbildung nicht dargestellt, macht einen, übrigens ohnedies kaum stattfindenden, Rücktritt von Kohlensäure aus dem Schlangenrohr in *Kⁱⁱⁱ* absolut unmöglich.

Das zur Aufnahme der Untersuchungsobjecte bestimmte Gefäß besitzt je nach Bedürfniss einen Inhalt von 200—400 ccm und läuft unten in ein Schlangenrohr aus, welches neben dem eigentlichen Respirationsraum *R* in die Höhe steigt. Dieser letztere ist oben durch einen doppelt durchbohrten Kautschukkork verschlossen. In der einen Bohrung steckt das Thermometer *Tⁱⁱ*, in der anderen ein im stumpfen Winkel gebogenes Glasrohr. Das

Thermometer, in Zehntel-Grade getheilt, besitzt zweckmässig einen langen, cylindrischen Quecksilberbehälter, der sich inmitten der Versuchs-

pflanzen befindet. Der Nullpunkt der Thermometerscala muss über dem Kautschukkork liegen, damit sichere Ablesungen möglich sind, wenn man bei niedriger Temperatur arbeitet. Auf den Grund des Respirationsgefäßes bringt man etwas angefeuchtete Glaswolle und auf diese das Pflanzenmaterial, eventuell im benetzten Zustande.

Fig. 97. Respirationssapparat.

Das Respirationsgefäß findet in einem mit Wasser angefüllten, mit Holzdeckel versehenen und auf einem Dreifuss *D* stehenden thönernen Umhüllungsgefäß *G* Platz. Durch Zugießen von warmem oder kaltem Wasser, oder durch Erwärmen des Wassers mittelst einer Gasflamme kann die Temperatur der Flüssigkeit, welche das Thermometer *T*¹ anzeigt, und somit auch diejenige der Untersuchungsobjecte in *R* regulirt werden.

Der gereinigte und kohlensäurefreie Wasserstoff wird in dem Schlangenrohr auf die Temperatur des Wassers gebracht, durchstreicht den Pflanzenbehälter dann von unten nach oben, tritt in das mit wenig concentrirter Schwefelsäure beschickte Sperrventil *Sch* ein und giebt die von den Untersuchungsobjecten producirt Kohlensäure in dem mit 75 cm Barytwasser gefüllten PETTENKOFER'schen Barytrohr *B* ab. Das Sperrventil hat den Zweck, den Uebertritt von Luft in den Respirationsraum unmöglich zu machen; dieser letztere kann übrigens noch durch den Hahn *H*^{II} gegen das Ventil hin völlig abgesperrt werden. Die Röhre *K*^{IV}, welche Aetzkalistückchen enthält, hat den Zweck, den Uebertritt von kohlensäurehaltiger Luft aus dem Aspirator in die Barytröhre auszuschliessen.

Soll ein Experiment über intramolekulare Athmung angestellt werden, so leitet man zunächst eine Stunde lang einen kräftigen Wasserstoffstrom durch den vor der Hand bei *l* geöffneten Apparat. Dann wird die Verbindung zwischen *l* und *o* mittelst eines Glasrohres hergestellt und unter Benutzung des Aspirators weiter $\frac{1}{2}$ — 1 Stunde lang Wasserstoffgas durchgeleitet. Die Temperaturverhältnisse in *R* und die Stromgeschwindigkeit (3 l pro Stunde) sind dabei sorgsam zu reguliren. Erst jetzt, nachdem, wie die eingehende Prüfung der Untersuchungsmethode gelehrt hat, der Sauerstoff verdrängt ist, schaltet man zwischen *l* und *o* die Barytröhre ein; nach Verlauf je einer Stunde werden neue Röhren vorgelegt¹⁾.

Absolut luftdichter Schluss aller Theile des Apparates ist natürlich Hauptbedingung für das gute Gelingen der Experimente. Man benutze nur sorgsam ausgewählte Kautschukkörke und Schläuche (letztere gut eingefettet), wohl eingeschliffene Glashähne und achte darauf, dass die Glasröhren an den Verbindungsstellen mit ihren Enden zusammenstossen. Von dem guten Schluss des functionirenden Apparates kann man sich dann leicht durch Zudrehen der Hähne *H*^I oder *H*^{II} überzeugen. Im ersteren Falle muss alsbald der Wasserabfluss bei *Ab*, im letzteren die Wasserstoffentwicklung aufhören.

Zur Herstellung des Barytwassers übergiesst man Barythydrat und Chlorbarium mit destillirtem Wasser (auf je 1 l Wasser 21 g Barythydrat und 3 g Chlorbarium). Man lässt die Mischung längere Zeit unter häufigem Umschütteln stehen und giesst in die hochgestellte Flasche (Fig. 98) ab. Diese Flasche fasst etwa 10 l Flüssigkeit. Das mit Kalistückchen angefüllte Rohr *k*^{II} dient dazu, das klare Barytwasser vor Kohlensäureaufnahme zu schützen. Das Barytwasser kann in die Bürette *b*, welche am oberen Ende das Kalirohr *k*^I trägt, ab-

1) Will man constatiren, ob aller Sauerstoff durch den Wasserstoff aus dem Apparat verdrängt ist, so braucht man das Sperrventil *Sch* nur mit einem Gläschen in Verbindung zu setzen, welches etwas Phosphor enthält. Von der völligen Absorption der producirt CO₂ durch 75 cm Barytwasser überzeugt man sich, indem man an die Barytröhre noch ein weiteres Barytwasser enthaltendes Gefäß anschliesst. Dies Barytwasser bleibt klar.

gelassen werden, und von der Burette aus erfolgt endlich das Füllen der gut gereinigten und vollkommen trockenen PETTENKOFER'schen Barytröhren. Den Inhalt dieser Röhren bringt man bei Abschluss jedes Versuches schnell in lange, wohl verschliessbare Cylindergläser, und nach dem Absetzen des Niederschlages werden von der darüberstehenden wasserklaren Flüssigkeit mit Hülfe einer Pipette zweimal 25 ccm zum Titiren abgehoben. Hierbei (ebenso natürlich auch beim Titiren des ursprünglichen Barytwassers) kommt eine Oxalsäurelösung in Anwendung, die im Liter 2,8636 g krystallisirte Säure enthält und von der 1 ccm 1 mg CO_2 entspricht. Die Oxalsäurelösung wird aus einer mit

Schwimmer versehenen Burette zu dem Barytwasser gelassen. Als Indicator dienen stets einige Tropfen einer Phenolphthaleinlösung (100 ccm Alkohol und 0,5 g Phenolphthalein). Die Methode gestattet es, die Kohlensäure bis auf $\frac{1}{10}$ mg genau zu bestimmen. Ueberhaupt ist die Untersuchungsmethode von mir und meinen Schülern mehrfach nach verschiedenen Richtungen hin auf ihre Brauchbarkeit geprüft worden und es haben sich dabei sehr befriedigende Resultate ergeben ¹⁾. Zu beachten bleibt aber, dass die Resultate der Beobachtungen, wenn man dieselben in angegebener Weise anstellt, stets etwas zu hoch ausfallen. Experimentirt man nämlich mit dem Apparat ohne Pflanzenmaterial, so findet man dennoch, dass der Titer des Barytwassers sich geändert hat. Diese Aenderung, auf eine Stunde und 75 ccm Barytwasser bezogen, entspricht einer Kohlensäuremenge von 0,5—1 mg. Der Versuchsfehler, dessen Höhe bei den Respirationsversuchen häufiger in angegebener Weise festzustellen ist, kann in manchen Fällen völlig vernachlässigt werden, da thatsächlich sehr oft die aus der Individualität der untersuchten Pflanzen entspringenden Differenzen in der Kohlensäureproduction sogar noch grösser ausfallen.

Handelt es sich bei Respirationsversuchen darum, nicht die Kohlensäureproduction bei intramolekularer, sondern bei normaler Athmung festzustellen, so arbeitet man ebenfalls mit unserem Apparat.

Fig. 98. Titirapparat.

1) Vergl. auch SACHSSE, Ueber einige chemische Vorgänge bei der Keimung von *Pisum sativum*, Leipzig 1875, PFEFFER, Unters. a. d. botan. Institut zu Tübingen, Bd. 1, S. 636, u. MÖLLER, Ber. d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 2.

Es werden nur der KIPP'sche Apparat, die Waschflasche mit Kaliumpermanganat und das U-Rohr mit Höllensteinlösung ausgeschaltet. Experimentirt man mit leicht welkenden Pflanzentheilen (z. B. Kronenblättern oder zarten Blüten), dann empfiehlt es sich, die Luft, bevor sie in das Schlangenrohr eintritt, ein Gefäss passiren zu lassen, welches feuchte Glaswolle enthält. Man leitet bei Ausführung der Versuche zunächst $1\frac{1}{2}$ —2. Stunden Luft mit Hülfe des Aspirators durch den Apparat (3 l p. Std.). Dann hat die Luft im Respirationsraum bezüglich ihres Kohlensäuregehaltes sicher einen stationären Zustand angenommen. Jetzt schaltet man die erste Barytröhre ein, nach einer Stunde die zweite und so fort. Um sicher zu sein, dass beim Vorlegen der Barytröhren keine Kohlensäure aus dem Respirationsraum entweicht, thut man gut, den Glashahn H'' (das Sperrventil *Sch* kann fehlen) und einen zweiten, am oberen Ende des Schlangenrohres anzubringen- den Glashahn (oder Quetschhahn) zu schliessen, wenn eine neue Röhre eingeschaltet werden soll. Ueber die Vorsichtsmaassregeln, welche bei tagelang und ununterbrochen fortzuführenden Respirationsversuchen zu beachten sind, vergl. die citirten Abhandlungen von SACHSSE (1872) und von mir (1875).

Mit Bezug auf Untersuchungen, die den Zweck haben, das Verhältniss der Kohlensäureproduction bei innerer und normaler Athmung ($\frac{J}{N}$) für ein gegebenes Pflanzenmaterial unter übrigens gleichen Bedingungen festzustellen, ist Folgendes zu bemerken. Wir stellen den gesammten Apparat zusammen; nur der KIPP'sche Apparat bleibt fort. Haben wir $1\frac{1}{2}$ Stunde unter Benutzung des Aspirators Luft durchgeleitet, so beginnt die Feststellung der bei normaler Athmung producirt Kohlensäure. Nach 1 oder 2 Stunden schalten wir dann den KIPP'schen Apparat ein, leiten 1 Stunde lang einen starken Wasserstoffstrom, dann 1 Stunde lang mit Benutzung des Aspirators 3 l H über die Pflanzen und legen zur Ermittlung der bei intramolekularer Athmung producirt Kohlensäure eine Barytröhre vor. Schliesslich wird der Wasserstoff durch Luft verdrängt, um abermals die Höhe der normalen Athmung zu constatiren.

Bei vergleichenden Untersuchungen über die Athmung der Pflanzen in reinem Sauerstoff und in Luft, leitet man an Stelle des Wasserstoffs, dessen man bei der Prüfung intramolekularer Athmung bedarf, reinen Sauerstoff aus einem grossen Gasometer über die Untersuchungsobjecte hin. Der O passirt zur Reinigung eine Waschflasche, welche Kalilauge enthält. Den O gewinnt man in bekannter Weise durch Erhitzen einer Mischung von chlorsaurem Kali und Braunstein in einer Retorte. Sehr bequem ist es auch, den Gasometer unter Benutzung einer Sauerstoffbombe, die comprimirt Sauerstoff enthält (zu beziehen aus der chemischen Fabrik von Dr. ELKAN in Berlin), zu füllen. Es empfiehlt sich, das Wasser, welches zur Verdrängung des O aus dem Gasometer dient, vorher mit O zu sättigen. Keimpflanzen von *Pisum sativum* athmen wenigstens zunächst ebenso lebhaft in reinem O wie in atmosphärischer Luft, andere Keimpflanzen verhalten sich nicht genau in derselben Weise¹⁾

1) Vgl. JOHANSEN, Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen, Bd. 1.

103. Die Kohlensäureproduction bei normaler Athmung der Pflanzen.

Nach den im vorigen Abschnitt gegebenen Darstellungen wird es nicht gar zu schwierig sein, bei Untersuchungen über die normale Athmung der Pflanzen zu richtigen Resultaten zu gelangen. Zur Uebung in der Benutzung der Methode bringe man z. B. 25 g frischer Blumenblätter von Rosa oder einer anderen Pflanze in das Respiationsgefäß und ermittle, wie viel Kohlensäure dieselben pro Stunde bei einer Temperatur von 20° C. produciren. Die Resultate der einzelnen Experimente werden bei sorgsamer Arbeit nur ganz kleine Differenzen (etwa 1 mg) zeigen. Man kann sich auch leicht davon überzeugen, dass die Blüthentheile der Pflanzen im Allgemeinen unter übrigens gleichen Umständen lebhafter athmen als die Vegetationsorgane, z. B. die Laubblätter.

Fig. 99. Athmungscurven. (Nach AMM.)

Studien über die Abhängigkeit der Pflanzenathmung von den Temperaturverhältnissen stellt man in der Weise an, dass man die Kohlensäureproduction der Untersuchungsobjecte wiederholt bei 0, 5, 10° C. etc. ermittelt. In den Versuchen bei 0° C. steht das Respiationsgefäß sammt Schlangenrohr in einem mit Eisstückchen angefüllten Umhüllungsgefäß von erheblicher Grösse. Die Temperaturverhältnisse müssen stets während des Durchleitens der Luft vor Einschaltung der Barytröhre regulirt werden, um zu genauen Resultaten zu gelangen. Recht bequem ist es, mit Keimpflanzen, z. B. mit denjenigen von *Lupinus luteus*, zu experimentiren. Eine grössere Menge der Samen wird 24 Stunden lang eingequollen und dann in Sägespänen, mit denen geeignete Zinkkästen angefüllt sind, bei 20° C. (eventuell in einem Wärmeschrank) zur Keimung gebracht. Die 4 bis 5 Tage alten Keimlinge mit Hypocotylen von ca. 2 und Wurzeln von ca. 3 cm Länge dienen nach Säuberung von den Sägespänen in Mengen von je 50 g zu den Experimenten. Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass stets ein genügender Vorrath sehr gleichförmig aus-

gebildeter Keimlinge zur Disposition steht. Die Resultate der Beobachtungen sind in der Art, wie es die obere Kurve in Fig. 99 zeigt, graphisch darzustellen. Bei 0°C . athmen die Lupinenkeimlinge bereits deutlich nachweisbar. Bei 40°C . liegt das Temperaturoptimum und bei 45°C . das Temperaturmaximum für die normale Athmung der Lupinenkeimlinge. Bei noch höherer Temperatur treten bereits Absterbevorgänge in den Zellen ein, und die Kohlensäureproduction sinkt daher rapide.

Prüft man 50 g Lupinenkeimlinge zunächst bei 20°C . auf ihre Athmungsgrösse und setzt die Untersuchungsobjecte dann im Respirationsgefäss längere Zeit einer Temperatur von etwa 100°C . aus, um sie dann abermals auf Kohlensäureproduction zu prüfen, so findet man, dass die Kohlensäureproduction jetzt völlig erloschen ist. Getödtete Pflanzen athmen nicht. Die Athmung ist eine Function des lebensthätigen Protoplasmas. Die Pflanzen sind natürlich beim Erhitzen vor erheblichem Wasserverlust zu schützen. Empfehlenswerth ist es auch, um jede nachträgliche Bacterienentwicklung auszuschliessen, dem Untersuchungsmaterial, nachdem dasselbe im normalen Zustande auf seine Athmungsgrösse geprüft worden ist, etwas Salicylsäure beizumischen.

Bei Experimenten über den directen Einfluss des Lichtes auf die Pflanzenathmung benutzt man als Respirationsraum das in Fig. 100 dargestellte Gefäss.

Dasselbe wird von TITTEL & Co. in Geiersthal bei Wallendorf (Thüringen) gefertigt und stellt eine Glasflasche mit parallelen Wänden dar. Der Durchmesser der kreisförmigen Wände beträgt 13 cm, der Abstand der Wände von einander ca. 20 mm. In den Hals am unteren Ende des Respirationsgefässes wird das Schlangenrohr luftdicht eingeführt; die obere, weitere Oeffnung dient zur Aufnahme des Thermometers und des Gasableitungsrohres. Das Gefäss hängt in Wasser hinein, mit welchem der 30 cm hohe und 10 cm weite Zinkblechkasten, dessen Vorder- und Rückwand durch Glasplatten gebildet werden, angefüllt ist. Diesen Kasten stellt man an einem nach Süden

Fig. 100. Apparat zur Prüfung des Lichteinflusses auf die Athmung der Pflanzen.

gelegenen Fenster etwas nach rückwärts geneigt auf, so dass die aus Glas hergestellte Vorder- und Rückwand schräg gerichtet sind. Vor dem Kasten, also nach dem Fenster zu, findet noch ein zweiter, grösserer, ebenfalls etwas nach rückwärts geneigter Glaskasten Platz, der concentrirte, filtrirte Alaunlösung enthält. Als Untersuchungsobjecte benutzt man völlig chlorophyllfreie Blüthentheile, Wurzeln oder Pilze (etwa je 25—40 g Sb). Bei den Experimenten selbst sind die schon früher angegebenen Vorsichtsmaassregeln zu beachten. Näheres ist auch noch in der citirten Arbeit von AERBOE nachzulesen. Die grösste Aufmerksamkeit hat man darauf zu richten, dass die in den verschiedenen Versuchsperioden abwechselnd dem Licht und der Dunkel-

heit (Verdunkelung kann leicht dadurch erzielt werden, dass man den Wasserkasten mit einem geeigneten, unten offenen Pappkasten bedeckt) ausgesetzten Untersuchungsobjecte stets der nämlichen Temperatur exponirt bleiben. Dies ist, wie ich aus Erfahrung weiss, bei Be-

Fig. 101. Apparat für Experimente über die Athmung der Wurzeln.

nutzung der Alaunlösung in den Lichtversuchen selbst dann möglich, wenn man mit directem Sonnenlicht arbeitet. Die Experimente lehren, dass die Lichtstrahlen vielleicht nur in ganz wenigen Fällen eine photochemische Wirkung auf die Pflanzenathmung geltend machen; sehr gewöhnlich athmen die chlorophyllfreien Pflanzen im Licht die gleiche Kohlensäuremenge wie im Dunkeln aus.

Indirect übt das Licht natürlich einen bedeutsamen Einfluss auf die Pflanzenathmung aus, indem ja unter Vermittelung desselben in Folge der Assimilation diejenigen Stoffe erzeugt werden, welche bei der Athmung eine Oxydation erfahren. Um diese Thatsache festzustellen, cultiviren wir Keimlinge von *Lupinus* bei Lichtzutritt in Blumentöpfen. Sind die Pflanzen einige Wochen alt, so schneiden wir von 25 recht gleichförmig entwickelten Pflanzen die Stengel dicht über dem Boden ab und stellen die Kohlensäure fest, welche sie bei 20° C. in 2 Stunden produciren. Die Töpfe gelangen jetzt ins Dunkle. Nach 2—3 Tagen prüfen wir abermals 25 Pflanzen auf ihre Athmungsgrösse. Nun werden die

Pflanzen in den Culturegefässen wieder normal beleuchtet, um 25 Exemplare nach 4 Tagen wieder auf ihre Kohlensäureproduction zu untersuchen. Eine von AERBOE unter meiner Leitung ausgeführte Versuchsreihe lieferte folgende Resultate: Je 25 Pflanzen produciren in 2 Stunden bei 20° C. CO_2

6. August, Abends	18,35 mg	(beleuchtet gewesen),
9. „ „	7,95 „	(2½ Tage verdunkelt),
13. „ „	18,72 „	(vom 9. bis 13. Aug. beleuchtet).

Untersuchungen über die normale Athmung der Wurzeln stellt man zweckmässig mit dem in Fig. 101 abgebildeten Apparat an, wenn es sich darum handelt, die Kohlensäureproduction der normal vege-

tirenden und mit den oberirdischen Theilen der Pflanze in Zusammenhang stehenden Organe zu bestimmen. Ein grösserer Glaszylinder, der in einem Wasserkasten Platz gefunden hat, dient als Culturegefäss. Der Cylinder enthält eine Nährlösung. Der zum Verschluss der Oeffnung des Cylinders dienende halbirte Kork kann so weit eingeschoben werden, dass von seiner Oberfläche bis zum Rande des Culturegefässes noch ein Raum von ca. 3 cm Höhe bleibt. Der Kork hat fünf Bohrungen, eine für die Pflanze (z. B. Mais), eine für das Thermometer *T*, eine für das mit Glashahn versehene Trichterrohr *Tr*, durch welches der Nährlösung nach Bedürfniss ausgekochtes destillirtes Wasser zugeführt werden kann, eine für das mit Schlangenrohr versehene Gaszuleitungsrohr *Z* und eine für das Gasableitungsrohr *A*. Zur Herstellung eines völlig luftdichten Verschlusses füllt man den Raum über dem Kork mit einer bei relativ niedriger Temperatur (ca. 40° C.) schmelzenden Mischung, aus Wachs, Olivenöl und Hammeltalg bestehend, aus. Die Regulirung der Temperaturverhältnisse der Nährlösung, in welche die Pflanzenwurzeln eintauchen, macht keine besonderen Schwierigkeiten, da das Culturegefäss ja in dem grossen Wasserkasten steht. Für Verdunkelung der Wurzeln ist zu sorgen; die oberirdischen Theile des Untersuchungsobjectes können dem Licht ausgesetzt bleiben. Vor Beginn eines jeden Versuchs leitet man, ohne zunächst die Kohlensäureproduction der Wurzeln zu bestimmen, längere Zeit (etwa 4 Stunden lang) Luft durch die Nährlösung. Da der Widerstand dieser letzteren recht erheblich ist, muss der Luftstrom stets ziemlich kräftig sein (ca. 8—10 l pro Stunde). Als Aspirator verwendet man eine sehr grosse Flasche. Das Wurzelsystem der in der Fig. 101 abgebildeten grossen, normal vegetirenden Maispflanze producirt in je 2 Stunden bei 20° C. 80 mg CO₂. Wenn das Untersuchungsobject nur ab und an zur Bestimmung der Kohlensäureproduction benutzt wird, so muss in der Zwischenzeit stets Luft durch die Nährlösung geleitet werden, damit die Wurzeln keinen Sauerstoffmangel leiden.

104. Die Kohlensäureproduction bei intramolekularer Athmung der Pflanzen.

Die Kohlensäureproduction bei intramolekularer Athmung der Gewächse stellt man nach der unten angegebenen Methode fest. Gewöhnlich ist die von den Pflanzen intramolekular producirt Kohlen säuremenge unter übrigens gleichen Umständen weit kleiner als die bei normaler Athmung gebildete. In einigen Fällen (z. B. Keimlinge von *Vicia Faba*) ist das Verhältniss $\frac{J}{N}$ aber doch gleich 1. Natürlich sind bei vergleichenden Experimenten über normale und intramolekulare Athmung Untersuchungsobjecte von gleichem Entwicklungsstadium zu benutzen, wenn es sich z. B. darum handelt, den Einfluss der Temperatur auf die Athmung festzustellen. Am allerbesten ist es, mit ein und demselben Material mehrere vergleichende Experimente hinter einander durchzuführen. Bei niederen Temperaturen ertragen die Pflanzen ein längeres (vieltündiges) Verweilen in Wasserstoff ohne Schädigung; sie produciren dann nachträglich bei wiederkehrender normaler Athmung ebenso viel CO₂ wie vor Beginn der intramolekularen Athmung (vgl. die Versuche von AMM in dessen citirter Ab-

handlung). Bei höherer Temperatur (von 30 oder 35° C. an) leiden die Pflanzen leicht, wenn sie zu lange im Wasserstoff verweilen; die Experimente dürfen daher nur über wenige Stunden ausgedehnt werden. Die Resultate der Versuche kann man graphisch darstellen. Fig. 99 zeigt, dass Keimlinge (4—5 Tage alte) von *Lupinus* bei intramolekularer Athmung stets weit weniger CO₂ produciren als bei normaler. Das Temperaturoptimum liegt für beide Athmungsformen bei 40° C.¹⁾

Die Erscheinung der intramolekularen Athmung tritt auch ein, wenn Pflanzen in das Vacuum gebracht werden.

Experimente im Vacuum, die ich z. B. mit *Pisum*keimpflanzen nach WORTMANN'S²⁾ Methode ausführte, stellt man in folgender Weise an. Ein starkwandiges Glasrohr von etwa 100 cm Länge und 1,5 cm. Weite, das an einem Ende zugeschmolzen ist, wird mit gereinigtem, völlig trockenem Quecksilber gefüllt. Ueber Reinigung des Quecksilbers vergl. unter 13. Das Adhären von Luftblasen an den Wänden des erwähnten Rohres beim Füllen desselben vermeidet man dadurch am besten, dass man das Quecksilber mittelst eines mit ziemlich feiner Spitze endigenden Trichters durch ein dünnes Glasrohr, welches bis auf den Boden des zu füllenden Rohres reicht, laufen lässt. Nach dem Füllen des Rohres wird die Mündung desselben verschlossen und der Apparat umgekehrt in ein flaches, theilweise mit Quecksilber angefülltes Glasgefäß gestellt. Man hat jetzt also ein Barometer mit ziemlich grosser TORRICELLI'scher Leere vor sich. In dem Quecksilber der Barometerröhre lässt man jetzt einige von den Samenschalen befreite, mit Fliesspapier abgetrocknete Keimpflanzen, die sich in Contact mit feuchten Sägespänen entwickelt haben, und ebenso, um das Untersuchungsmaterial während der Versuchsdauer feucht zu erhalten, ein mit ausgekochtem Wasser durchtränktes Fliesspapierkügelchen aufsteigen. Bei Experimenten mit *Pisum sativum* oder *Vicia Faba* verwendet man 6—10 Keimpflanzen; experimentirt man mit Keimpflanzen von geringem Gewicht, so ist eine entsprechend grössere Zahl derselben zu benutzen. Wenn das Quecksilber in der Barometerröhre nach Einbringung der Untersuchungsobjecte zur Ruhe gekommen ist, so schreitet man dazu, die Zeit, die Temperatur, den Barometerstand, sowie den Stand der Quecksilbersäule (den oberen Stand und den unteren Stand, also die Stelle, an welcher das Barometerrohr das Quecksilber in dem flachen Glasgefäß berührt) zu bestimmen. Arbeitet man mit nicht calibrirten Barometerröhren, so fixirt man den oberen sowie unteren Stand der Quecksilbersäule durch aufgeklebte Papiermarken, wiederholt dies bei jeder vorkommenden Ablesung, misst die fixirten Quecksilberhöhen und ermittelt später die ihnen entsprechenden Volumina, indem man aus einer Burette Quecksilber bis zu den die Volumina anzeigenden Marken fliessen lässt. Alle Volumina werden auf 0° C. und 1000 mm Hg reducirt.

1) Dies letztere, zuerst von AMM festgestellte Resultat bestätigte auch CHUDIAKOW (Landwirthschl. Jahrbücher, Bd. 23). Dagegen bestreitet er die Richtigkeit einiger Schlussfolgerungen von AMM und mir. Wir hatten gefunden, dass der Werth $\frac{J}{N}$ nicht bei allen Temperaturen der nämliche sei, eine Angabe, deren Richtigkeit CHUDIAKOW auf Grund der Ergebnisse seiner Versuche in Abrede stellt. Die Ausführungen des genannten Beobachters sind aber nicht zwingend für mich, und daher haben weitere Untersuchungen Klarheit zu gewähren.

2) Vgl. WORTMANN, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2.

War bei Anfang des Versuchs:

V_0 das Volumen,

h die Höhe des Hg in der Barometerröhre,

t die Temperatur und

b der Barometerstand,

bezeichnet ferner

ts die der Temperatur entsprechende Tension des Wasserdampfes auf das Quecksilber der Röhre und

a den Ausdehnungscoefficienten der Luft,

so war das reducirte Volumen:

$$V = \frac{b - (h + ts)}{1000} \cdot \frac{V_0}{(1 + a \cdot t)}.$$

War V das Volumen bei Beginn des Versuches, V_1 das etwa nach 6 Stunden berechnete Volumen, so war mithin $V_1 - V$ das in dieser Zeit ausgeschiedene Kohlensäurequantum. Da beim Vacuum das Anfangsvolumen gleich Null war, so bezeichnet V_1 direct die ausgeschiedene Kohlensäuremenge.

Es ist vielfach erwünscht, die Grösse der intramolekularen Athmung mit der Grösse der normalen Athmung vergleichen zu können, und wenn dies geschehen soll, so wird neben dem Barometerrohr ein zweites Glasrohr von derselben Grösse wie jenes aufgestellt, nachdem man ebenfalls Keimpflanzen in dasselbe eingeführt hat, die möglichst genau das gleiche Gewicht und den nämlichen Entwicklungsgrad wie diejenigen im Vacuum haben müssen. Um das Herabfallen der Untersuchungsobjecte zu verhindern, wird ihnen ein kleiner Kork nachgeschoben. Das Glasrohr

taucht mit seinem unteren, offenen Ende in Quecksilber ein, und es werden etwa 20 ccm der in dem Rohre vorhandenen atmosphärischen Luft durch Herausaugen entfernt, wodurch natürlich das Quecksilber emporsteigt (vgl. Fig. 102). Um einen Theil der Luft aus dem Rohr zu entfernen, wird ein Glaskolben, welcher durch einen Kautschukkork verschlossen ist, in dessen Bohrung ein gebogenes, einen Kautschukschlauch tragendes Glasrohr steckt, erwärmt, der Schlauch mit einer Klemme verschlossen und sein

Ende in das die Keimpflanzen enthaltende Glasrohr eingeführt. Der erkaltende Glaskolben dient also, wenn die Klemme geöffnet wird, als Saugapparat; es ist mit Hülfe desselben leicht, das Quecksilber in

Fig. 102. Apparat zur Bestimmung der Sauerstoffmenge, welche Pflanzentheile bei der Athmung aufzunehmen vermögen.

dem Glasrohr zum Steigen zu bringen. Man bedeckt nun endlich noch das Quecksilber im Glasrohr mit einer etwa 3 mm hohen Wasserschicht, macht die zur Bestimmung des Luftvolumens im Apparat erforderlichen Ablesungen und führt ein Stückchen Kalihydrat in das Glasrohr ein. Das Aetzkali wird von dem Wasser über dem Quecksilber schnell aufgelöst, und da die gebildete Kalilauge die bei der normalen Athmung der Keimpflanzen entstehende Kohlensäure absorbiert, so kann man jeder Zeit neue Ablesungen zur Feststellung der producirten Kohlensäurequantität vornehmen. Diese Methode liefert freilich durchaus nicht so genaue Resultate wie die unter 102 angegebene.

Wenn man die Untersuchungen über die intramolekulare Athmung längere Zeit, z. B. einige Tage lang, fortsetzt, so wird man finden, dass eine gegebene Menge Keimpflanzen in der Zeiteinheit und unter sich gleich bleibenden äusseren Umständen fortschreitend weniger Kohlensäure producirt. Die Untersuchungsobjecte gerathen allmählich in einen pathologischen Zustand, und es ist wichtig, dies zu wissen, weil sich daraus ergibt, dass man bei vergleichenden Untersuchungen über intramolekulare und normale Athmung keine zu lange Versuchsdauer (etwa nur 6—8 Stunden) innehalten darf. Derartige vergleichende Experimente lehren wieder, dass nur wenige Pflanzen, z. B. Keimpflanzen von *Vicia Faba*, bei intramolekularer Athmung ebenso viel CO_2 wie bei normaler Athmung produciren. Die meisten Untersuchungsobjecte liefern in Contact mit Sauerstoff erheblich grössere Kohlensäurequantitäten als bei Ausschluss desselben.

105. Elementaranalytische Untersuchungen über den Athmungsprocess.

Für die Behandlung mancher sich auf den Athmungsprocess der Pflanzen beziehenden Fragen ist es erforderlich, den Gehalt der Untersuchungsobjecte an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff vor Beginn der Experimente und nach Abschluss derselben festzustellen. Ermittelt man z. B. den absoluten Gehalt von 100 g Samen, sowie den absoluten Gehalt der aus 100 g Samen nach bestimmter Zeit hervorgegangenen Keimpflanzen an den genannten Elementen, so gewinnt man vergleichbare Zahlen, die sofort erkennen lassen, wie gross die Menge des verathmeten Kohlenstoffs, Wasserstoffs etc. ist. Besondere Bedeutung besitzen elementaranalytische Untersuchungen, wenn es sich z. B. um die Frage handelt, ob die Gesamtmasse des Kohlenstoffs, den keimende Samen verlieren, in Form von Kohlensäure abgeschieden wird, oder ob bei der Keimung auch noch andere kohlenstoffhaltige Gase (Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffe) entstehen. Bei solchen Untersuchungen vergleicht man die Resultate directer Kohlensäurebestimmungen, die nach der unter 102 angegebenen Methode anzustellen sind, mit den Ergebnissen der elementaranalytischen Untersuchungen. Ergibt sich eine gute Uebereinstimmung zwischen denjenigen Zahlen, welche durch die Respirationsversuche über den Kohlenstoffverlust bei der Keimung ermittelt werden können, und jenen, welche die elementaranalytischen Untersuchungen bezüglich des Kohlenstoffverlustes feststellen lassen, so ist der Schluss berechtigt, dass sämtlicher Kohlenstoff die keimenden Samen in Verbindung mit Sauerstoff als Kohlensäure verlässt. Bezüglich mancher Details der Untersuchungsmethode sind die in der Anmerkung citirten Abhandlungen nachzusehen. Ich bemerke nur noch bezüglich der Elementaranalysen, deren Ausführung übrigens grosse Übung

voraussetzt, dass die Samen- und Keimpflanzensubstanz mit Rücksicht auf ihren Chlor- und Schwefelgehalt mit chromsaurem Bleioxyd gemischt verbrannt werden muss, und dass mit Rücksicht auf den Stickstoffgehalt der Untersuchungsobjecte metallisches Kupfer (Kupferdrehspäne) vorzulegen ist. Die Verbrennung selbst geschieht am besten im Sauerstoffstrom¹⁾.

106. Sauerstoffaufnahme bei der Athmung und Ermittlung des Respirationsquotienten $\frac{\text{CO}_2}{\text{O}}$.

Bei Untersuchungen, welche den Zweck haben, die Grösse der Sauerstoffaufnahme und zugleich die Grösse der Kohlensäureproduction bei normaler Athmung festzustellen, benutzt man zweckmässig den in Fig. 103 dargestellten Apparat.

Die Glasglocke *a* von ca. 800 cem Inhalt ruht mit ihrem sorgfältig abgeschliffenen breiten und eingefetteten Rande auf einer geschliffenen Glasplatte. Als Kittmaterial benutzt man eine durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Wachs und 3 Thl. Schmalz hergestellte Mischung. Oben wird die Glocke mittelst eines Kautschukkorkes luftdicht verschlossen, in welchem die Röhren *r*₁ und *r* stecken. *r*₁ ist mit Glashahn versehen und gestattet es, die Verbindung des Innenraumes mit der Atmosphäre herzustellen. Das Glasrohr *r* taucht mit seinem längeren Schenkel, der einen lichten Durchmesser von 7 mm besitzt und bis auf Zehntelcentimeter calibriert ist, in ein Quecksilberggefäss ein. *b* ist ein mit durchlöcherter Boden versehenes und auf einem Glasdreifuss ruhendes Porzellangefäss, in welches man die Untersuchungsobjecte bringt. Sie liegen hier auf feuchtem Filtrirpapier oder auf feuchter Glaswolle, *g* stellt ein flaches Schälchen dar, in welchem sich die zur Absorption der Kohlensäure dienende Kalilauge befindet. Die ganze Vorrichtung, auf einem vernickelten Stativ ruhend, wird beim Gebrauch in Wasser versenkt, mit welchem ein Glaskasten mit paralleler Vorder- und Rückwand angefüllt ist. Man ist auf solche Weise im Stande, die Temperaturverhältnisse im Apparat bequem zu reguliren und constant zu erhalten.

Bei Beginn eines Experimentes hebt man das Quecksilber in *r* durch Saugen an *r*₁ etwas empor, schliesst den gut eingefetteten Glas-

Fig. 103. Apparat nach STICH zur Bestimmung der Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureproduction bei der Athmung der Pflanzen.

1) Vgl. SACHSSE, Ueber einige chemische Vorgänge bei der Keimung von *Pisum sativum*, Leipzig 1872; DETMER, Physiologische Untersuchungen über die Keimung ölhaltiger Samen etc., Jena 1875.

2) Literatur: DETMER, Physiol.-chem. Unters. über Keimung, 1875; GODLEWSKI, PRINGSHEIM's Jahrb., Bd. 13; MOELLER, Bericht d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 2; STICH, Flora, 1891; BONNIER und MANGIN, Annal. d. sc. nat., Sér. 6, T. 17 u. 18, geben hier eine z. B. auch von STICH benutzte Methode der Gasanalyse an, die in manchen Fällen sehr gute Dienste leistet. Ferner vergl. BONNIER und MANGIN in Annal. d. sc. nat., Sér. 6, T. 19; Sér. 7, T. 2.

hahn und wartet etwa eine halbe Stunde, bis man zur Ablesung des Quecksilberstandes in r schreitet. Die Ablesungen werden stets unter Benutzung eines Fernrohres ausgeführt. Man ermittelt natürlich auch die Länge der Quecksilbersäule, bestimmt ebenfalls die Temperatur sowie den Barometerstand. Für die Berechnungen ist es erforderlich, den Volumeninhalt der Glasglocke, des Rohres r und des Rohres r_1 bis zum Glashahn zu kennen. Von diesem Volumen ist aber dasjenige sämtlicher Gegenstände im Apparat (Schälchen mit Kalilauge, Glasdreifuss, Porzellanschale, feuchtes Fliesspapier, Untersuchungsobjecte) zu subtrahiren. Das Volumen dieser Objecte ermittelt man zum Theil durch Eintauchen in Wasser, das sich in einem calibrirten Gefäss befindet. Grosses Gewicht ist auf genaue Ablesung der Temperatur sowie des Barometerstandes zu legen. Die Reduction der Gasvolumina kann leicht unter Benutzung der auf S. 231 angegebenen Formel geschehen.

Die wesentlichste Fehlerquelle der Methode liegt darin, dass man die Ablesungen bei Beginn der Versuche nicht sofort, sondern erst nach etwa einer halben Stunde, wenn die Temperaturverhältnisse sich ausgeglichen haben, vornehmen kann. Während dieser halben Stunde nehmen die Pflanzen aber schon Sauerstoff auf, und um die Quantität desselben annähernd zu bestimmen, corrigirt man das thatsächlich gefundene Volum von den Pflanzen absorbirten Sauerstoffs, indem man demselben eine Quantität hinzuaddirt, die sich durch Rechnung für die Zeit einer halben Stunde ergibt. Diese Correctur ist natürlich nur dann nahezu zutreffend, wenn die Untersuchungsobjecte während der Beobachtungszeit keine wesentliche Aenderung ihrer Athmungsenergie erfahren.

Die zur Absorption der Kohlensäure dienende Kalilauge wird genau gewogen. Sie muss nahezu concentrirt und völlig klar sein. Bei Abschluss eines jeden Experimentes bringt man die Lauge in ein Kölbchen, verdünnt mit Wasser und füllt die Kohlensäure mit BaCl_2 aus. Zum Auswaschen des Niederschlages auf dem Filter benutzt man zunächst mit BaCO_3 gesättigtes, dann reines Wasser. Das Quantum des gefüllten kohlensauren Baryts bestimmt man nach dem Trocknen und schwachem Glühen durch Wägung und rechnet die Kohlensäure auf das Volumen bei 0°C. und 1000 mm Barometerstand um. Da die benutzte Kalilauge stets schon von vornherein mehr oder minder reich an kohlensaurem Kali ist, so muss durch besondere Versuche der Kohlensäuregehalt der Lauge festgestellt und mit in Rechnung gestellt werden ¹⁾.

Unter Benutzung unseres Apparates kann man zahlreiche physiologische Fragen behandeln. Vor allem ist es lehrreich, die Athmung keimender Samen näher zu verfolgen, und die bezüglichlichen Experimente führt man aus, indem man z. B. 2 g Weizenkörner, 4 g Erbsen oder 1 g Samen von *Raphanus sativus* nach dem Anquellen auf das feuchte Fliesspapier legt. Nach je 24 Stunden wird der Apparat geöffnet, die Kalilauge durch neue ersetzt und die Beobachtung fortgeführt. Die Temperatur ist stets recht constant, z. B. auf 15 oder 20°C. zu halten.

Bei den Experimenten mit Weizen findet man z. B., dass 2—2,5 g Körner mit fortschreitender Keimung auch wachsende Mengen O aufnehmen und CO_2 produciren. Vom 5. Tage an werden in je 24 Stunden bei 20°C. etwa 20 ccm CO_2 producirt und 20 ccm O absorbirt. Der

1) Besser ist es noch, die CO_2 unter Benutzung der Titrimethode (vgl. unter 102) zu bestimmen. Es muss die CO_2 dann natürlich vor und nach dem Versuch aus der Kalilauge mit BaCl_2 ausgefällt werden, um erst die restirende Flüssigkeit zu titriren.

Respirationsquotient ist hier (und überhaupt bei stärkereichen Pflanzen-theilen) nahezu = 1. Bei der Keimung fettreicher Samen (z. B. *Raphanus*) findet man einen Quotienten von 0,6—0,8. Es wird von ihnen relativ viel O aufgenommen, da das Fett bei der Keimung eine Oxydation erleidet und Kohlehydrate aus demselben entstehen.

107. Das Verhalten der Pflanzen in Contact mit Stickstoffoxydulgas.

Es ist mehrfach die Behauptung aufgestellt worden, dass die Pflanzenzellen im Stande seien, den Sauerstoff des Stickstoffoxydulgases für die Zwecke der normalen Athmung zu verwerthen. Ich habe die bezüglichen Fragen einer speciellen Untersuchung unterzogen¹⁾, und zwar sind meine Experimente in folgender Weise angestellt worden. Ein retortenartiges Gefäss (vgl. Fig. 11) von ca. 90 ccm Capacität wurde mit ausgekochtem und dann wieder in einem verschlossenen Gefäss völlig abgekühltem, destillirtem Wasser angefüllt, und das Wasser darauf durch Stickstoffoxydulgas verdrängt (*a*). Eine Retorte (*b*) wurde mit ausgekochtem Wasser angefüllt und N₂O eingeleitet, nachdem zuvor 20 Stück 7 Tage alte, im Dunkeln erwachsene Erbsenkeimlinge eingeführt worden waren. Eine dritte Retorte (*c*) wurde ebenso mit Wasser sowie Erbsenkeimlingen beschickt, dann aber atmosphärische Luft eingelassen. Das Stickstoffoxydulgas stellt man dar, indem man käufliches salpetersaures Ammonium in einer Retorte erhitzt und das entweichende Stickstoffoxydulgas vor dem Auffangen zur Befreiung von etwa vorhandenen kleinen Mengen von Stickstoffoxyd und salpetriger Säure durch eine Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxydul sowie durch Kalilauge leitet. Beim Einleiten der Gase ist darauf zu achten, dass eine ganz kleine Wassermenge in der Retortenröhre zurückbleibt. Die Apparate blieben bei meinen Versuchen, nachdem sie in der angegebenen Weise beschickt worden waren, 20 Stunden lang bei etwa 20° C. ruhig stehen. Ihre Röhrenmündungen tauchten in Quecksilber ein, und die erwähnten geringen Wasserquantitäten hatten eben den Zweck, die Keimpflanzen vor den schädlichen Quecksilberdämpfen zu schützen. Nach Verlauf von 20 Stunden wurden sämtliche Apparate, ohne dass aber Luft in dieselben eintrat, unter Wasser gebracht, welches man zweckmässig durch Eisstücke auf niedriger Temperatur erhält. Es erfolgte nun allmählich eine fast völlige Absorption der in den Retorten *a* und *b* vorhandenen Gasmengen, während in der Retorte *c* ein grosses Gasvolumen zurückblieb. Das Stickstoffoxydul konnte demnach nicht von den Keimpflanzen zersetzt worden sein. Die geringen Gasmengen, welche nach der Absorption des N₂O in der Retorte *a* (bei Abwesenheit von Keimpflanzen), sowie in der Retorte *b* (bei Gegenwart von Keimpflanzen) zurückblieben, stammten offenbar aus dem als Absorptionsflüssigkeit dienenden Wasser²⁾.

1) Vgl. DETMER, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 11, S. 213. Vgl. auch MÖLLER, Ber. d. Deutschen botan. Gesellsch., Bd. 2.

2) Mit dem Einleiten des Stickstoffoxyduls in die retortenartigen Gefässe beginnt man natürlich erst nach längerer Entwicklungsdauer des Gases, wenn dasselbe luftfrei ist. Bei Abschluss der Experimente bringt man die Apparate zweckmässig nicht in kaltes Wasser, sondern in kalten Alkohol, der das Stickstoffoxydulgas stärker absorbirt.

Wir stellen ferner den folgenden Versuch an, um uns noch specieller davon zu überzeugen, dass Samen nicht im Stickstoffoxydulgas zu keimen vermögen. Zwei retortenartige Gefässe (*a* und *b*) werden mit ausgekochtem und in verschlossenen Gefässen völlig abgekühltem, destillirtem Wasser angefüllt. In jedes Gefäss bringen wir noch einige angequollene Weizenkörner, tauchen die Mündung der Apparate unter Quecksilber und verdrängen das Wasser in *a* durch Stickstoffoxydulgas, das Wasser in *b* aber durch atmosphärische Luft. Im Laufe von einigen Tagen keimen die Körner in *b*; diejenigen in *a* keimen nicht. Werden sie aber an die Luft gebracht und normalen Keimungsbedingungen ausgesetzt, so entwickeln sich ihre Keimtheile nachträglich, im Falle die Untersuchungsobjecte nicht zu lange Zeit, z. B. nur 2 Tage, im Stickstoffoxydulgas verweilt haben.

108. Die Alkoholbildung in Pflanzen und das Verhalten anaërober Organismen.

Wir verschaffen uns aus einer Brauerei Bierwürze, füllen etwa 200 ccm derselben in einen Kolben und fügen ihr eine kleine Menge recht reiner Hefe hinzu, die mit etwas Wasser zu einem Brei angerührt worden ist. Den Trockensubstanzgehalt der Hefemenge haben wir durch einen Controlversuch ermittelt. Nach Verlauf längerer Zeit, wenn die Gährung, die alsbald lebhaft wird, schwächer geworden ist, sammeln wir die Hefe des Kolbens auf einem gewogenen Filter und finden bei der Trockensubstanzbestimmung, dass unter den bezeichneten Umständen eine bedeutende Hefeproduction stattgefunden hat.

Saccharomyces cerevisiae wächst lebhaft bei reichlichem Sauerstoffzutritt. Unter diesen Umständen vermag der Pilz aber auch in gewissen Nährlösungen ebenso wie bei beschränktem Luftzutritt oder völligem Sauerstoffmangel recht lebhaft alkoholische Gährung zu erregen, eine Thatsache, die man leicht constatiren kann, wenn man durch Bierwürze, die einen reichlicheren Hefezusatz empfangen hat, Luft mit Hülfe eines Aspirators hindurchsaugt oder gar Sauerstoff aus einem Gasometer in dieselbe einleitet.

Hierbei und in vielen anderen Fällen kommt es darauf an, ein Maass für den Verlauf der Gährung zu gewinnen. Dies Maass gewinnt man durch Ermittlung der bei der Gährung zersetzten Zuckermenge oder der producirten Alkoholquantität.

Bei den Zuckerbestimmungen werden 10 ccm der PASTEUR'schen Lösung, mit der man z. B. experimentirte, derartig verdünnt, dass sie nur noch $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ % Zucker enthalten, und, wenn Rohrzucker zur Herstellung der PASTEUR'schen Lösung benutzt worden war, mit Schwefelsäure längere Zeit erhitzt. (Vgl. unter Zuckerbestimmung.) Die Zuckerbestimmungen sind dann mit Hülfe der FEHLING'schen Lösung leicht auszuführen. Die gegohrene Flüssigkeit ist in jedem Fall vor Ausführung der Zuckerbestimmungen im verdünnten Zustande längere Zeit zu erhitzen, um den Alkohol zu verjagen.

Quantitative Alkoholbestimmungen sind in folgender Weise auszuführen. 200 ccm der vergohrenen Flüssigkeit werden, ohne sie zu filtriren, in einem 400 ccm fassenden Kolben der Destillation unterworfen. Zur Vermeidung des Ueberschäumens der Flüssigkeit bringt man ein Stückchen Paraffin in dieselbe. Der Kolben, in welchem man

das Destillat auffängt, ist, um Alkoholverlusten vorzubeugen, fast luftdicht zu verschliessen. Den Kühler muss während der Destillation kaltes Wasser durchströmen. Hat man etwa 100 ccm Destillat gewonnen, so bestimmt man das specifische Gewicht desselben mittelst der WESTPHAL'schen Waage. Aus dem gewonnenen Resultat lässt sich dann direct unter Benutzung geeigneter Tabellen (vergl. KÖNIG, Untersuchung landwirthschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe, Tabelle 15) der Alkoholgehalt von 100 ccm Destillat in Gewichts- oder Volumenprocenten ableiten. Die gefundene Zahl ist endlich noch bei Anwendung von 200 ccm vergohrener Flüssigkeit und 100 ccm Destillat durch 2 zu dividiren, da das Destillat die Gesammtalkoholmenge der ursprünglichen Flüssigkeit enthält.

Kommt es darauf an, Gährungsversuche unter Durchleiten von Gasen (Luft, Wasserstoff) durch die Nährlösungen auszuführen, so benutzt man den in Fig. 104 dargestellten Apparat. Der trichterförmige Theil *A* des die Nährlösung aufnehmenden Gährgefässes geht in das mit einer Kugel versehene Glasrohr *B* über. In dem Kautschukkork *K* steckt das Thermometer *T* und das Gasableitungsrohr *G*. Durch *B* wird der Flüssigkeit Gas zugeführt, welches sie von unten her durchströmt. Der Theil *A* des Apparates hat einen Gehalt von ca. 250 ccm. Um den Alkohol nicht zu verlieren, den das Gas mit fortreisst, wird *G* mit einem Condensationsapparat in Verbindung gesetzt. Dieser besteht aus einem Glaskölbchen, das mittelst eines doppelt durchbohrten Korkes verschlossen werden kann. In der einen Bohrung steckt ein Gasableitungsrohr, in der anderen das Gaszuleitungsrohr, dessen in dem Kölbchen befindlicher Theil ein Schlangenrohr darstellt. Das untere Ende dieses Schlangenrohres taucht in Wasser ein, das den Boden des Kölbchens bedeckt. Die Condensationsvorrichtung findet in einem grossen Glase Platz, welches Wasser und Eisstückchen enthält. Soll ein Versuch, bei dem die Gährung noch nicht vollendet ist, unterbrochen werden, um z. B. nach bestimmter Zeit die producirte Alkoholmenge zu ermitteln, so öffnet man das Gährgefäss und fügt der Nährlösung, um momentanen Stillstand der Gährung zu erzielen, 20 ccm 5-proc. Sublimatlösung hinzu.

Der hier beschriebene Apparat leistet z. B. gute Dienste, wenn es darauf ankommt, den Nachweis zu liefern, dass Hefe in Bierwürze sowohl bei Sauerstoffabwesenheit als auch bei Luftzutritt starke Gährung hervorbringt, während die Gährung unter Benutzung PASTEUR'scher Nährlösung bei Luftzutritt nur schwach, bei Sauerstoffabwesenheit aber lebhaft ist. Ueber die zu verwendende Hefe vgl. unter „Bezugsquellen“. Der Nährlösung in *A* sind einige ccm Hefeflüssigkeit zuzusetzen¹⁾.

Fig. 104. Apparat zu Gährungsversuchen.

1) Näheres über Gährungsversuche siehe bei CHUDIAKOW in Landwirthschl. Jahrbücher, Bd. 23. Vergl. Anmerkung 1 auf S. 240.

Handelt es sich nur darum, qualitativ die Alkoholbildung in Folge der Gährung festzustellen, so verfährt man genau in derselben Weise. Das gewonnene Destillat wird aber nochmals der Destillation unterzogen. Die nun resultirende Flüssigkeit riecht stark nach Alkohol; sie ist brennbar. Löst man doppeltchromsaures Kali in wenig Wasser auf, setzt etwas concentrirte Schwefelsäure hinzu und bringt einige Tropfen dieser Mischung in das letzte Destillat, so färbt sich dasselbe grün, weil die Chromsäure, indem der vorhandene Alkohol oxydirt wird, eine Reduction erleidet.

Um die sehr wichtige Thatsache zu constatiren, dass höhere Pflanzen bei Abwesenheit des freien Sauerstoffs, indem sie intramolekulare Athmung unterhalten und schliesslich allmählich absterben, Alkohol produciren, experimentiren wir mit Weinbeeren, Kirschen oder Erbsen. Die Untersuchungsobjecte werden 1 Minute lang zur Tödtung ihnen etwa äusserlich anhaftender Hefezellen in Sublimatlösung (1 : 1000) gelegt und gut mit Wasser abgespült. Die Früchte benutzt man dann sofort zum Versuch, während die Erbsensamen durch Uebergiessen mit Wasser angequollen und auf feuchtem Fliesspapier 1—2 Tage lang angekeimt werden¹⁾. Nun füllt man einen Literkolben mit den Früchten oder Keimpflanzen gänzlich an und verschliesst mit einem durchbohrten Kautschukkork, in dessen Bohrung der kürzere Schenkel eines zweimal im rechten Winkel gebogenen Glasrohres steckt, während der längere Schenkel in Quecksilber eintaucht. Der Sauerstoff im Apparat ist bald verbraucht. Es kommt schnell intramolekulare Athmung zu Stande, und diese hat eine oft wochenlange Gasentwicklung zur Folge, die schliesslich langsam wird, um endlich völlig aufzuhören, wenn die Untersuchungsobjecte abgestorben sind. In diesem Zustande gehen sie, an die Luft gebracht, schnell in Zersetzung über. Haben die Früchte oder Keimlinge 3—4 Wochen lang im Apparat verweilt, so öffnet man denselben, zerquetscht das Pflanzenmaterial und unterwirft es (die Keimpflanzen nach Zusatz von Wasser) der Destillation. Die Früchte liefern etwa 1½ % Alkohol (auf das Gewicht des frischen Materials bezogen), die Erbsenkeimlinge 5 % Alkohol vom Gewicht der Trockensubstanz. Der Alkohol ist in oben angegebener Weise leicht als solcher nachzuweisen. Dem gebildeten Alkohol sind stets aromatische Verbindungen und Fuselöl in mehr oder minder grosser Menge beigemischt²⁾.

Die Hefe vermag, wie zumal PASTEUR's werthvolle Untersuchungen ergeben haben, nicht nur bei Zutritt der Luft, sondern auch, freilich langsamer, bei völligem Sauerstoffmangel zu wachsen. Dagegen gehört der Buttersäureorganismus (*Clostridium butyricum*, ein Spaltpilz) zu den obligaten Anaëroben. Der Spaltpilz tritt in Form kurzer und längerer Stäbchen auf. Wir bereiten 5-proc. Rohrzuckerlösung, der wir etwas Fleischextract, so dass die Flüssigkeit gelblich erscheint, hinzusetzen. Ausserdem fügen wir zu der Lösung etwas kohlensaures

1) Wasser und Fliesspapier sind vorher zu sterilisiren.

2) Die Alkoholproduction scheint wirklich, so weit wir heute orientirt sind, eine Function des lebensthätigen Protoplasmas zu sein. Der ganze Gegenstand bedarf aber einer ferneren, sehr eingehenden experimentellen Behandlung. Es sind dabei zumal auch die Schädigungen ins Auge zu fassen, welche Pflanzenzellen thatsächlich erfahren, wenn sie längere Zeit in sauerstofffreiem Raum verweilen.

Kali, so dass sie schwach alkalisch reagirt. Noch geeigneter ist folgende Nährlösung. Auf 1 l Wasser 50 g Kartoffelstärke, 0,5 g Chlorammonium, 0,2 g schwefelsaure Magnesia, 1 g saures phosphorsaures Kali und 25 g Kreide. Werden die Lösungen sich in nicht gar zu fest verkorkten, dickwandigen Gefässen im Thermostaten bei 35° C. selbst überlassen, so macht sich schon am 2. oder 3. Tage lebhaft Gährung geltend. Die Gasentwicklung (CO_2 und H) ist in Folge des spontanen Auftretens des Buttersäureorganismus, wie ich es auch beobachtete, eine so energische, dass die Korke mit Gewalt fortgeschleudert werden, und die Flüssigkeiten nehmen alsbald den charakteristischen Geruch nach Buttersäure an. Wir wollen nun den Nachweis von der anaëroben Natur des *Clostridium butyricum* führen. Dazu stellen wir den in Fig. 105 abgebildeten Apparat zusammen.

Fig. 105. Apparat zur Constatirung der Thatsache, dass es Organismen giebt, die bei völligem Sauerstoffausschluss zu wachsen vermögen.

Der Kolben *d* von ca. 500 ccm Capacität wird zu $\frac{2}{3}$ mit Nährlösung von der angegebenen Zusammensetzung angefüllt. Man versieht die Mündung des Kolbens mit einem Wattepfropf und kocht die Lösung etwa $\frac{1}{2}$ Stunde lang zur Sterilisirung. Nach dem Erkalten entfernt man die Watte, inficirt den Kolbeninhalt schnell mit einigen Tropfen einer Flüssigkeit, in der bereits Buttersäuregährung eingetreten ist, und verschliesst die Mündung des Gefässes sofort mit einem doppelt durchbohrten, sehr gut passenden Kautschukkork. Die Glasröhren *R'*, *R''* und *R'''*, welche in der aus der in Fig. 105 ersichtlichen Art gebogen sind, hat man vor Zusammenstellung des Apparates sterilisirt. Das Rohr *R'''* mündet mit seinem längeren Schenkel in das Quecksilber des Gefässes *e*. *R'* und *R''* sind in dem Gefässe *c* mittelst des kurzen Kautschukschlauches *k* mit einander verbunden. Das Gefäss *b* enthält eine Lösung von übermangansaurem Kali. Nun entwickelt man aus arsenfreiem Zink und Salzsäure (das zur Verdünnung derselben dienende Wasser ist vorher, um es möglichst von Luft zu befreien, ausgekocht worden) Wasserstoffgas, welches, bevor es in *b* eintritt, noch eine mit Kalilauge beschickte Waschflasche passirt hat. Diese Waschflasche sowie der KIPP'sche Apparat sind in unserer Figur nicht dargestellt (vgl. aber Fig. 97). Man leitet etwa 2 Stunden lang Wasserstoff durch den zusammengestellten Apparat, um allen Sauerstoff zu verdrängen, giesst dann Quecksilber in die Schale

entfernt den Schlauch *k*, so dass die Mündung des Glasrohres *R''* nun unter Quecksilber geöffnet ist. Der Apparat wird bei 35° C. im

Fig. 106. Apparat zu Gärungsversuchen bei Ausschluss des freien Sauerstoffs.

Thermostaten aufgestellt. Im Laufe einiger Tage beginnt die Gärung. Die Flüssigkeit in *d* trübt sich mehr und mehr, und man sieht also, dass der

Buttersäureorganismus im Stande ist, sich bei völligem Ausschluss des freien atmosphärischen Sauerstoffs zu entwickeln¹⁾. Will man den Versuch mit Hefe ausführen, so verwendet man Bierwürze als Nährlösung, die man mit wenig möglichst reiner Hefe inficirt.

Sehr bequem ist es auch, bei den Experimenten den in Fig. 106 abgebildeten Apparat zu verwenden. Der Kolben *K* fasst ca. 250 ccm. Man füllt ihn mit Nährlösung an und kocht diese zur Sterilisirung.

Nach dem Erkalten der Lösung führt man durch das mit dem Glasrohr *H* versehene Gaszuleitungsrohr *R* mittelst einer dünnen Glasröhre eine kleine Flüssigkeitsmenge in den Apparat ein, die Clostridium oder Hefezellen enthält, leitet 2 Stunden lang Wasserstoff durch die Lösung im Kolben, führt das Ende des Rohres *R'* unter Quecksilber und schliesst den Hahn *H* sofort. Die Kugel *Kl* am Rohr *R'* hat nur den Zweck, den Uebertritt von Quecksilber in den Kolben bei erheblicherer Temperaturabnahme im Laboratorium unmöglich zu machen.

109. Die Wärmeentwicklung und die Phosphorescenz der Pflanzen.

Mit dem Athmungsprocesse der Pflanzen ist nothwendig eine Freierwerdung von Wärme verbunden. Die Eigenwärme der Gewächse kann unter Umständen eine bedeutende Höhe erreichen, und man hat z. B. gefunden, dass lebhaft athmende Gewebmassen zuweilen um mehrere Grade wärmer als ihre Umgebung sind. Insbesondere ist die Selbst-erwärmung des Kolbens der Aroidenblüthenstände eine beträchtliche²⁾,

1) Literatur zu diesem Abschnitt: A. MAYER, Lehrbuch d. Gärungschemie, 1874, Nachtrag 1876; PASTEUR, Compt. rend., 1861, T. 52; ebenso in den Jahrgängen 1863, 1872 u. 1875, ferner in Etude s. l. bière, 1876; BREFELD, Landwirthschaftl. Jahrbücher, 1874, 1875 u. 1876. Ueber Alkoholbildung in Zellen höherer Pflanzen vergl. BREFELD, Landwirthschaftl. Jahrbücher, 1876, S. 324, und LECHAR-TIER et BELLAMY, Compt. rend., T. 69, 75 und 79. Ueber anaërobe Organismen vergl. PASTEUR's citirte Schriften und PRAZMOWSKI, Unters. über einige Bacterien-arten, Leipzig 1880; DETMER, Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, 1883, S. 173.

2) Vgl. G. KRAUS, Abhandlungen d. naturforsch. Gesellschaft zu Halle, Bd. 16. In dieser Schrift ist auch die Literatur zusammengestellt.

aber da dieses Untersuchungsobject nicht immer zur Verfügung steht, so wollen wir zur Constatirung der Thatsache, dass Pflanzen Wärme produciren, zunächst keimende Samen verwenden, mit denen die Experimente zu jeder Zeit bequem ausgeführt werden können. Wir benutzen den in Fig. 107 abgebildeten Apparat. Unter einer Glasglocke steht ein Gefäß *G*, welches starke Kalilauge enthält. Auf den Trichter *T* gelangt zunächst ein kleines durchstochenes Filter, und ferner werden die Keimpflanzen, welche man bezüglich ihrer Selbsterwärmung untersuchen will, in den Trichter gebracht. Der Tubulus der Glasglocke ist mittelst eines Korkes verschlossen, durch dessen Bohrung ein Thermometer *Tm* in den Apparat eingeführt wird, so dass die keimenden Samen den Quecksilberbehälter des Thermometers vollkommen umgeben. Das Keimpflanzenmaterial gewinnt man leicht, indem man die Samen (*Pisum*, *Triticum*) nach dem Anquellen in Glasschalen auf feucht gehaltenes Fliesspapier legt, auf welchem die Keimung alsbald beginnt. Neben den mit Keimpflanzen beschickten Apparat stellt man noch einen zweiten, genau ebenso eingerichteten auf. Der Trichter wird aber nicht mit in Entwicklung begriffenen Pflanzen, sondern mit Papierkügelchen, die mit Wasser durchtränkt worden sind, angefüllt. Ich experimentirte z. B. mit 4 Tage alten Weizenkeimlingen, die auf einem Trichter von etwa 200 ccm Capacität zusammengehäuft waren. Das Thermometer zeigte nach Verlauf einiger Zeit 19°C. , während das Thermometer des mit feuchten Papierkügelchen beschickten Apparates nur 17°C. angab. Temperaturüberschuss der Keimpflanzen also = 2°C. Bei der Benutzung des beschriebenen Apparats braucht man nicht zu befürchten, dass die Untersuchungsobjecte Sauerstoffmangel leiden, denn es ist ja kein luftdichter Verschluss hergestellt, und die producirte Kohlensäure wird von der Kalilauge absorbirt. Dagegen ist es wichtig, die Apparate einige Stunden, bevor die Temperaturablesungen (z. B. in einer Vorlesung) gemacht werden sollen, zusammenzustellen und mit Keimpflanzen, resp. Papierkügelchen zu beschicken. Ebenso ist es nothwendig, die beiden Thermometer, welche man benutzt, vor Anstellung der Experimente sorgfältig mit einander zu vergleichen. Lehrreich ist es auch, an Stelle der Keimpflanzen Blüthen, z. B. von *Anthemis* oder *Bellis*, als Untersuchungsobjecte zu verwenden. Die Wärme-production dieser Pflanzentheile ist eine ziemlich ausgiebige.

Fig. 107. Apparat zum Nachweis der Eigenwärme der Pflanzen.

Zur Constatirung der Thatsache, dass bei der durch Hefezellen erregten alkoholischen Gährung Wärme frei wird, verfährt man einfach in folgender Weise. Man stellt zwei Cylinder (*A* und *B*) auf. In *A* bringt man 300 ccm PASTEUR'scher Nährlösung (vgl. über Bereitung derselben unter 18), in *B* 300 ccm Wasser. Beide Flüssigkeiten erhalten einen erheblichen Hefezusatz und werden sich dann bei etwa 24°C. selbst überlassen. Wenn im Cylinder *A* lebhaft

Gährung eingetreten ist, bestimmt man den Temperaturzustand der Flüssigkeiten. Es ergibt sich, dass die Flüssigkeit im Cylinder A um $1-2^{\circ}\text{C.}$ wärmer ist als das Wasser im Cylinder B.

Bei eingehenderen und genaueren Untersuchungen über die Eigenwärme der Pflanzen können wir bequem das in Fig. 97 abgebildete, mit Schlangenrohr versehene Respirationsgefäß von ca. 200 ccm Inhalt verwenden. Wir bedürfen zweier solcher Apparate. Den einen füllen wir mit 4 oder 5 Tage alten Weizen- oder Gerstenkeimlingen an, die in Sägespänen erwachsen sind, den anderen mit Keimlingen, die wir in kochendem Wasser, welchem etwas Salicylsäure zugesetzt war, getötet haben. Beide Apparate werden mit einander mittelst eines Kautschukschlauches verbunden, mit den sorgfältig verglichenen Thermometern versehen und, völlig in Watte verpackt, in einen Holzkasten gestellt. Dieser findet in einem nach Norden gelegenen Raum, in welchem die Temperatur wenig schwankt, seinen Platz. Den Apparat mit den lebenden Pflanzen verbinden wir mit einem Aspirator und leiten einen langsamen dampfgesättigten Luftstrom über die Untersuchungsobjecte hin. Die Luft tritt in das Schlangenrohr des mit dem getöteten Material angefüllten Gefäßes ein. Die von Zeit zu Zeit (etwa jede halbe Stunde) anzustellenden Temperaturbeobachtungen ergeben, dass die frischen Untersuchungsobjecte alsbald eine um $2-3^{\circ}\text{C.}$ höhere Temperatur gewinnen als die getöteten. Diese letzteren entwickeln keine Eigenwärme, während die lebendigen Keimlinge eine erhebliche Temperatursteigerung erfahren.

Wir wollen nun noch durch unsere Apparate etwa 1 Stunde lang einen kräftigen Wasserstoffstrom (das Gas wird gereinigt, indem man es Waschflaschen passiren lässt, die übermangansaures Kali und Kalilauge enthalten) leiten. Ist dies geschehen, so schliessen wir den Hahn *H'* (Fig. 97) und ebenso einen Hahn, welcher sich an dem Schlangenrohr des mit den getöteten Pflanzen angefüllten Apparates befindet. Die Gefässe, immer in Watte eingepackt, bleiben sich nur einige Stunden lang selbst überlassen. Der Temperaturüberschuss der lebendigen Keimlinge ist jetzt, da dieselben intramolekulare Athmung unterhalten, ein nur sehr geringfügiger, etwa $0,2-0,3^{\circ}\text{C.}$; er steigt aber schnell wieder auf $2-3^{\circ}\text{C.}$, wenn man abermals Luft durch die Apparate leitet.

Beobachtungen über Wärmeentwicklung von Keimlingen bei normaler Athmung zeigten mir auch, dass dieselbe um so bedeutender ausfällt, je mehr sich die Temperatur, bei der man experimentirt, dem Temperaturoptimum (40°C.) nähert. Dies ist ganz natürlich, denn mit steigender Temperatur machen sich Stoffwechsel sowie Athmung in den Pflanzenzellen (also auch Wärmeentwicklung) lebhafter geltend als bei niedriger Temperatur.

Wenn man unsere Apparate statt mit Keimlingen mit hinreichenden Mengen der Keulen der Blütenstände von *Arum maculatum* beschickt, deren Spatha sich eben geöffnet hat (den einen Apparat mit getöteten, den anderen mit lebendigen Keulen), so findet man den Temperaturüberschuss des normalen Untersuchungsmaterials bei intramolekularer Athmung etwa $= 0,2^{\circ}\text{C.}$, bei normaler Athmung aber $= 10-15^{\circ}\text{C.}$

Eingehende Untersuchungen über die Eigenwärme der Blüten sind von DUTROCHET, HOPPE, G. KRAUS und vielen Anderen durchgeführt worden. Man benutzt zu denselben zweckmässig in Töpfen cultivirte Exem-

plare von *Colocasia cordifolium* oder von *Arum maculatum*, die man längere Zeit vor der Blüthe im Frühjahr mit dem Erdballen in Töpfe eingesetzt hat. Die Pflanzen werden in einem nach Norden gelegenen Zimmer, in welchem möglichst geringe Temperaturschwankungen herrschen, diffusum Licht ausgesetzt. Die Eigenwärme der Blüthen lässt sich erst dann leicht constatiren, wenn die Geschlechtsorgane des Blütenstandes zur Reife gelangt sind und die Scheiden sich öffnen. Diese Eigenwärme kann man schon durch einfaches Anlegen empfindlicher Thermometer z. B. an die Blütenkeule nachweisen.

Besser experimentirt man in folgender Weise. Die Keule eines blühenden *Arum* exemplares wird etwas aus der Scheide hervorgezogen und dem cylindrischen Quecksilberbehälter eines empfindlichen Thermometers, das an einem geeigneten Stativ befestigt ist, angelegt. Mittelst eines dünnen Kautschukringes erfolgt die Befestigung des Pflanzentheiles am Thermometer. Man kann auch zweckmässig Thermometer mit dem oberen Keuleneinde in Berührung bringen, deren Quecksilberbehälter man die Form einer doppeltwandigen Glocke gegeben hat. In jedem Falle ist natürlich auch die Lufttemperatur im Versuchsraum genau zu ermitteln. Es ergibt sich, dass die untersuchten Pflanzentheile um einige Grad C. wärmer als die umgebende Luft sind. Bei längere Zeit (mehrere Tage) fortgeführten Beobachtungen findet man die Differenz zwischen der Temperatur der Luft und der Theile des Blütenstandes nicht zu jeder Tageszeit genau gleich. Vielmehr ist diese Differenz gewöhnlich zu einer bestimmten Zeit des Nachmittags am grössten. Es besteht also, was sehr merkwürdig ist, eine tägliche Periodicität der Blütenwärme ¹⁾.

Kommt es darauf an, überhaupt nur den Nachweis zu führen, dass in den Keulen der Aroideenblüthenstände eine sehr erhebliche Wärme-production erfolgt, so werden z. B. blühende Pflanzen von *Arum maculatum* abgeschnitten, mit der Stengelbasis in Wasser gestellt und einige Keulen nach Entfernung der Blütenstandsscheiden mittelst dünner Kautschukringe an dem cylindrischen Quecksilberbehälter eines empfindlichen Thermometers befestigt.

Wir stellen zwei Kolben von ca. 500 ccm Inhalt (*a* und *b*) auf. *a* wird bis zu $\frac{2}{3}$ mit Wasser, *b* bis zu $\frac{2}{3}$ mit gährender Flüssigkeit (Bierwürze mit Hefezusatz) angefüllt. Beide Kolben werden mit dreifach durchbohrten Kautschukkörken verschlossen. Die Bohrungen eines jeden Korkes dienen zur Aufnahme eines Thermometers, eines bis auf den Boden reichenden Gaszuleitungs- und eines Gasableitungsrohres. Das Ableitungsrohr des Kolbens *b* wird, nachdem man die Kolben in Watte eingepackt hat, mit einem Aspirator in Verbindung gesetzt. Ein langsamer Luftstrom passirt dann zunächst den Kolben *a* und dann den Kolben *b*, der mit ersterem durch einen Gummischlauch verbunden ist. Nach Verlauf einiger Zeit findet man, dass die gährende Flüssigkeit ca. 2° C. wärmer als das Wasser ist, und diese Temperaturdifferenz bleibt auch bestehen, wenn man Wasserstoff durch die Flüssigkeiten leitet. Die Hefe erzeugt also, im Gegensatz zu anderen Pflanzen, bei normaler sowie intramolekularer Athmung etwa die gleichen Wärmemengen ²⁾.

1) In manchen Fällen empfiehlt es sich auch, die Pflanzen bei den Untersuchungen, um deren Transpiration recht zu beschränken, unter grossen, nicht völlig luftdicht schliessenden, aus Zink und Glastafeln construirten Käfigen zu halten.

2) Vgl. ERIKSSON, Unters. a. d. bot. Inst. zu Tübingen, Bd. 1.

In manchen Fällen ist es zweckmässig, die Eigenwärme der Pflanzen unter Anwendung thermoelektrischer Apparate nachzuweisen. Diese Methode kann unter anderem bei der Untersuchung von Sprossen benutzt werden, deren Erwärmung im Allgemeinen eine nur geringfügige ist. Ich hatte Gelegenheit, bei derartigen Versuchen zu erfahren, dass z. B. lebendige Helianthussprosse von ca. 15 cm Länge im dampfgesättigten Raum einen Temperaturüberschuss von ca. $0,3^{\circ}\text{C}$. gegenüber den getödteten Vergleichsobjecten zeigten. Wir experimentiren mit dem in Fig. 108 dargestellten Apparat nach DUTROCHET's Vorgange¹⁾.

Die durch Zusammenlöthen der Enden des Eisenbügels *e* mit den Kupferdrähten *o* und *h* gewonnenen und sorgfältig mit Firniss überzogenen Spitzen sind in den lebenden Spross *c* und in den durch Eintauchen in heisses Wasser getödteten Spross *d* eingeführt, deren Temperaturdifferenz durch den Ausschlag des zwischen den Drähten *n* und *m* eingeschalteten Galvanometers ermittelt werden soll. Durch besondere Vorversuche ist natürlich festzustellen, wie gross der Ausschlag am Galvanometer ist, der z. B. $0,1^{\circ}\text{C}$. Temperaturdifferenz entspricht.

Fig. 108. Dutrochet's Apparat zu thermoelektrischen Untersuchungen an Pflanzen.

Dass einige Pflanzen in Folge ihres Lebensprocesses Licht entwickeln, ist eine erwiesene Thatsache. So existiren z. B. eine Reihe phosphorescirender Bacterienarten, und ich hatte selbst einmal Gelegenheit, das durch Spaltpilze verursachte Leuchten faulender Fische zu beobachten.

Ebenso ist die Phosphorescenz von *Agaricus olearius*, *Agaricus melleus* und *Xylaria hypoxylon* bekannt. Die bezüglichlichen Erscheinungen sind besonders von FABRE und LUDWIG in Greiz studirt worden. *Agaricus melleus* wächst zumal an Nadelhölzern, und wenn man im Herbst Wurzeln der befallenen Bäume ausgräbt oder Theile der Holzstöcke sammelt, welche sein Mycelium enthalten, so kann man das

1) Vgl. DUTROCHET, Annal. d. sc. nat., 1840, Sér. II, T. 13, p. 5. Vgl. auch PFEFFER, Handbuch, Bd. 2.

Leuchten des Holzes im Dunkeln leicht beobachten, besonders wenn dasselbe vorher einen Tag lang im feuchten Keller verweilt hat. Merkt man sich die von der genannten *Agaricus*art befallenen Bäume oder Stöcke, dann hat man Gelegenheit, zu jeder Jahreszeit „Leuchtholz“ zu beschaffen.

Die erwähnte *Xylariasppecies* ist während des ganzen Jahres an Buchenstöcken zu finden. Das inficirte Holz leuchtet mit grünlich-gelbem Licht. Das Licht, welches vom Mycel des *Agaricus melleus* durchsetztes „Leuchtholz“ aussendet, erscheint dagegen weisslich mit einem Stich ins Grünliche.

Wird Leuchtholz kurze Zeit lang in Wasser von 80 oder 100° C. eingetaucht, so leuchtet es nachträglich im Dunkeln nicht mehr, da der Pilz durch den Einfluss der hohen Temperatur getödtet worden ist. Ebenso hört das Leuchten des Holzes bei Sauerstoffentziehung, z. B. in einem Wasserstoffstrom auf, stellt sich aber bei Luftzutritt wieder ein. Das Leuchten ist Folge eines Oxydationsprocesses, der durch das lebensthätige Protoplasma in noch nicht näher bekannter Weise vermittelt wird.

III. Das Verhalten der stickstofffreien plastischen Stoffe der Pflanzen.

110. Das *Amylum* als Reservestoff.

In sehr zahlreichen Reservestoffbehältern sind die stickstofffreien Substanzen in Form von *Amylum* abgelagert. Man kann sich von dieser Thatsache überzeugen, wenn man zarte Schnitte aus den Cotyledonen der Erbse oder Bohne, aus dem Endosperm eines Weizenkornes, aus einer Kartoffelknolle oder dem Rhizom von *Canna indica* in einen Wassertropfen auf den Objectträger bringt und die Schnitte mikroskopisch untersucht. Die Stärkekörner in den Zellen sind leicht als solche zu erkennen, und zum Ueberfluss kann man sie noch durch Jodzusatz blau färben. Auch in den Markstrahlen sowie im Holzkörper der Bäume und Sträucher wird die Stärke sehr allgemein während des Winters als Reservestoff aufgespeichert¹⁾. Ich erhielt besonders günstige Resultate, als ich Zweige von *Berberis vulgaris*, *Fraxinus excelsior* und *Fagus silvatica* im Januar und Februar mit Bezug auf das in Rede stehende Verhältniss untersuchte. Man stellt Quer- und Längsschnitte durch das Holz von *Berberis vulgaris* her, legt dieselben in einen auf dem Objectträger befindlichen Tropfen von Jodglycerin (dadurch bereitet, dass man Jod längere Zeit mit Glycerin in Berührung gelassen hat), bedeckt mit einem Deckglas und erwärmt den Objectträger über einer Spiritusflamme. Nach dem Erkalten zeigt sich bei mikroskopischer Untersuchung, dass zumal die Markstrahlen, aber auch Elemente des Holzes blau gefärbte,

1) Vgl. SANIO, Untersuchungen über die im Winter Stärke führenden Zellen des Holzes, Halle 1858.

verkleisterte Stärkemassen enthalten. Das Holz von *Fraxinus* besteht aus weiten und engen Gefässen, spärlichem Holzparenchym, das sich zumal in der Umgebung der Gefässe vorfindet, und Holzfasern. Querschnitte durch das Eschenholz, die man in der angegebenen Weise mit Jodglycerin behandelt, lehren, dass namentlich die Markstrahlzellen reich an Amylum sind. Bei *Fagus* ist im Holz ausser den Gefässen und Holzfasern ziemlich viel Holzparenchym, das in tangentialen Binden auftritt, vorhanden. Dieses letztere, sowie die Zellen der breiten Markstrahlen, ist sehr amyllumreich. Im Frühjahr verschwindet die Stärke aus den Markstrahlen und dem Holztheil der Gefässbündel. Offenbar wandert das Amylum jetzt aus den erwähnten Geweben, in denen es als Reservestoff aufgespeichert war, aus, um den wachsenden Theilen der Pflanzen zuzuströmen.

Wollen wir uns genauer über den Stärkegehalt eines Rhizoms orientiren, so wählen wir den horizontal im Boden kriechenden Wurzelstock von *Pteris aquilina* zur Untersuchung. Wir können Alkoholmaterial benutzen, wählen aber nicht zu dicke Rhizomstücke aus. Das Grundgewebe besteht der Hauptsache nach aus Parenchym, dessen Zellen sehr reichliche Amylummengen führen, und wird von sehr mächtig entwickelten Sklerenchymplatten durchsetzt, die schon bei makroskopischer Betrachtung eines Rhizomquerschnittes als breite, schwarze Linien hervortreten. Zwischen diesen Sklerenchymplatten sind die bicollateralen Gefässbündel leicht zu erkennen. Jedes Gefässbündel wird von einer einfachen Schicht stärkereicher Zellen (Vorscheide) und der eigentlichen, aber stärkefreien Endodermis umgeben.

Auf die Bedeutung der in Reservestoffbehältern aufgespeicherten Stärke kommen wir noch oft zurück. Es sei hier nur erwähnt, dass die Stärke das wichtigste stickstofffreie Reservematerial der Pflanzen darstellt und dass sie, wenn sie für die Entwicklung bestimmter Organe der Gewächse verworther werden soll, zunächst in lösliche Verbindungen übergeführt wird, welche die Reservestoffbehälter verlassen können. Unter Vermittelung diastatischer Fermente wird nämlich die Substanz der Stärke, wie wir unter 112 sehen werden, in Glycose umgewandelt, welche die Wanderung der Amylumsubstanz ermöglicht.

111. Die quantitative Amylumbestimmung. :

Es sind bereits an anderer Stelle zahlreiche Angaben über die Eigenschaften sowie das Verhalten der Stärkesubstanz gemacht worden. Hier handelt es sich zumal darum, auf die Methode hinzuweisen, welche bei quantitativen Amylumbestimmungen in Anwendung zu bringen ist. Das Amylum als solches ist bekanntlich nicht im Stande, reducirend auf FEHLING'sche Lösung einzuwirken; dagegen kann die Stärke durch Einwirkung von Säuren in Traubenzucker übergeführt werden, und die Menge desselben lässt sich leicht mit Hülfe der FEHLING'schen Flüssigkeit feststellen. 2—3 g reiner Kartoffelstärke, die bei 100—110° C. vom Wasser befreit worden sind, werden in einem Kolben mit 200 ccm Wasser erhitzt. Die Flüssigkeit erhält dann noch einen Zusatz von 20 ccm 25-proc. Salzsäure und wird unter Ersatz des verdunstenden Wassers 3 Stunden lang im lebhaft kochenden

Wasserbade erhitzt¹⁾. Die erkaltete Flüssigkeit wird mit Kali neutralisirt und auf 500 cem gebracht²⁾. Man erhitzt jetzt verdünnte FEHLING'sche Lösung in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade, fügt 20 cem der zuckerhaltigen Lösung hinzu und erhitzt noch weitere 10—15 Minuten³⁾. Das gebildete Kupferoxydul wird möglichst schnell auf einem Filter gesammelt, mit heissem Wasser ausgewaschen und getrocknet. Jetzt verbrennt man das Filter, glüht das Kupferoxydul im Platintigel unter Zusatz von etwas Salpetersäure und bestimmt schliesslich das Gewicht des erhaltenen Kupferoxyds. 220,5 Theile desselben entsprechen 100 Theilen Traubenzucker oder 90 Theilen Stärke. Die erforderliche FEHLING'sche Flüssigkeit wird in folgender Weise dargestellt. Man löst 34,65 g reinen schwefelsauren Kupferoxyds in 200 cem Wasser auf, vermischt mit einer Auflösung von 173 g weinsaurem Natron-Kali in 480 cem Aetznatronlauge von 1,14 spec. Gew. (ca. 10-proc. Natronlauge) und verdünnt die Flüssigkeit bei 15° C. auf 1000 cem.

Es ist noch zu bemerken, dass die Stärke sehr kleine Mineralstoffmengen enthält. Dieselben sind zu bestimmen und in Abzug zu bringen.

112. Das Vorkommen der Diastase in den Pflanzen und die Wirkungsweise des Fermentes.

Die Diastase ist freilich sehr verbreitet im Pflanzenreich, aber die in verschiedenen Pflanzenarten vorhandenen Diastasequantitäten sind keineswegs die nämlichen. Sehr diastasereich ist die gekeimte Gerste. Wird das aus einer Brauerei bezogene Malz auf einer kleinen Handmühle zermahlen, so gewinnt man ein Pulver, das sich in hohem Grade zur Darstellung einer diastasehaltigen Lösung eignet. 25 g Malzpulver übergiesst man mit 100 cem Wasser, lässt die Flüssigkeit einige Zeit (z. B. 1—2 Std.) unter häufigem Umrühren mit dem Pulver in Berührung und filtrirt die Lösung endlich ab. Versetzt man 25 cem 1-proc. Stärkekleister (hergestellt durch Vermischen von 100 cem destillirten Wassers mit 1 g Kartoffelstärke 'und Erhitzen bis zum Sieden) mit 5 cem der klaren Diastaselösung, so macht sich die Amylumumbildung alsbald bemerklich. Sogleich nach Herstellung des aus Kleister und Malzextract bestehenden Gemisches nimmt eine Probe desselben auf Zusatz einer Spur alkoholischer Jodlösung eine blaue Farbe an. Nach wenigen Minuten ist die Stärke und Diastase enthaltende Flüssigkeit klar geworden, aber eine Probe derselben färbt sich auf Jodzusatz noch blau. Wartet man einige Zeit, so nimmt eine Probe der Versuchsflüssigkeit auf Jodzusatz eine violette Färbung an. Noch später färbt sich eine Probe der Versuchsflüssigkeit auf Jodzusatz braun, und schliesslich (etwa nach 2—3 Stunden) bringt Jod keine erhebliche Färbung einer Probe der Versuchsflüssigkeit

1) Früher benutzte man Schwefelsäure zur Ueberführung des Amylums in Traubenzucker. Der Gebrauch der Salzsäure ist aber vorzuziehen. Vgl. R. SACHSSE, Phytochemische Untersuchungen, 1880, S. 47.

2) Ueber anderweitige, zum Theil noch genauere Methoden der Stärkebestimmung vergl. KÖNIG, Anleitung zur Untersuchung landwirthschaftl. wichtiger Stoffe, 1891, S. 231.

3) Zu bemerken ist noch, dass die zuckerhaltigen Flüssigkeiten, welche der heissen FEHLING'schen Lösung zugesetzt werden, nicht mehr als etwa $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ % Zucker enthalten dürfen.

mehr hervor. Unter dem Einflusse der Diastase wird die Amylumsubstanz bekanntlich in eine Reihe nach einander entstehender Dextrinarten sowie Zucker (Maltose) umgewandelt. Diese Dextrine färben sich auf Jodzusatz nicht sämmtlich in der nämlichen Weise, und daher gewährt die Jodreaction ein sehr bequemes Mittel, um den Fortgang des Processes der Stärkeumbildung durch Diastase genauer zu verfolgen. Aus Gründen, die WORTMANN in seiner unten citirten Arbeit näher darlegt, ist es zur ganz sicheren Constatirung der diastatischen Wirkung eines Pflanzenauszuges geboten, zumal bei Gegenwart geringer Fermentquantitäten, das Jod erst nach Aufkochen und völliger Wiederabkühlung der aus dem Pflanzenextract und Kleister bestehenden Flüssigkeit zuzusetzen. Tritt dann keine Bläuung ein, so ist sicher keine Stärke mehr vorhanden. Die Zuckerbildung lässt sich ebenfalls leicht constatiren. Man bestimmt mit Hülfe der FEHLING'schen Lösung den Zuckergehalt von 5 cem Malzextract (vergl. unter 115), versetzt 25 cem Kleister mit 5 cem Malzextract und ermittelt nach einigen Stunden den Zuckergehalt der Versuchsflüssigkeit. Es ergibt sich, dass dieselbe weit zuckerreicher ist als 5 cem Malzextract.

Wird eine nicht zu kleine Menge möglichst concentrirten Malzextractes mit einem grossen Ueberschuss von absolutem Alkohol versetzt, so entsteht ein voluminöser Niederschlag. Man sammelt denselben auf einem Filter, wäscht mit Alkohol aus und trocknet den Rückstand an der Luft. Derselbe besteht aus einer Reihe verschiedener Stoffe, enthält aber auch die durch den Alkohol gefällte Diastase. Löst man eine kleine Menge der trockenen Masse in Wasser auf, so erhält man eine sehr energisch stärkeumbildend wirkende Flüssigkeit.

Von Interesse ist es, noch einige Versuche anzustellen, welche beweisen, dass nicht nur Gerstekeimpflanzen, sondern ebenso andere Keimpflanzen, Blätter und Stengel verschiedener Gewächse Diastase enthalten. Ich habe einige Tage alte Weizenkeimlinge sowie 10 Tage alte Erbsenkeimpflanzen (die Untersuchungsobjecte hatten sich im Finstern entwickelt), ferner Laubblätter von *Sedum maximum* und Stengel von *Impatiens Balsamina* im Mörser zerquetscht, mit wenig Wasser übergossen und die Flüssigkeiten nach einiger Zeit abfiltrirt. Die gewonnenen Lösungen wirkten in Berührung mit Kleister, wie sich mit Hülfe der Jodreaction feststellen liess, stärkeumbildend. Da die Untersuchungsobjecte aber bei weitem nicht so viel Diastase wie die Gerstenkeimlinge enthalten, so ist es zweckmässig, sehr verdünnten Kleister zu benutzen und nur eine kleine Menge desselben (vielleicht 2 cem) mit grösseren Quantitäten der Pflanzenauszüge (etwa 20 cem) in Berührung zu bringen^{1) 2)}.

Zur Herstellung der diastasehaltigen Auszüge werden die Pflanzentheile zerschnitten, mit etwas Wasser im Mörser zerquetscht und dann 2—6 Stunden lang mit ihrem doppelten bis vierfachen Volumen Wasser in Berührung gelassen. Endlich erfolgt Filtration. Wenn man in dieser Art operirt, so kann man das Ferment freilich in Pflanzentheilen entdecken, die reich daran sind. Bei Gegenwart kleiner Diastasequantitäten reicht die Methode aber nicht aus, und WORTMANN kommt daher auch zu dem Schluss, dass z. B. viele

1) Vgl. DETMER, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 10.

2) Näheres vergl. bei WORTMANN, Botan. Zeitung, 1890.

Laubblätter, in denen er unter Benutzung des angegebenen Verfahrens keine Diastase auffinden konnte, kein isolirbares Ferment führen. Die Stärkeauflösung soll dann durch das Protoplasma direct vermittelt werden. Dies mag seine Richtigkeit für manche Fälle haben; indessen BROWN und MORRIS wiesen neuerdings mit Nachdruck darauf hin, dass es in vielen Fällen überhaupt nicht zu empfehlen sei, die frischen Pflanzentheile zur Extraction der Diastase mit Wasser zu behandeln. Die Zellen dieser frischen Pflanzentheile sind nicht leicht sämmtlich zu zerquetschen, so dass die Bereitung der Auszüge unvollkommen gelingt, und ein negatives Resultat bei der Prüfung auf Diastase erhalten werden kann, während das Ferment thatsächlich doch in den Pflanzentheilen vorhanden ist. Man gelangt zu viel sichereren Ergebnissen, wenn man die Untersuchungsobjecte zunächst bei etwa 40° C. trocknet, dann feinstens zerreibt und nun dies Pulver oder Extracte desselben in Stärkekleister einträgt. So findet man, dass auch viele Laubblätter recht diastasereich sind, wovon ich mich unter Benutzung der Laubblätter von *Pisum sativum* überzeugte¹⁾.

Es ist mit Rücksicht auf die Wirksamkeit der Diastase in der Pflanze von Wichtigkeit, sich davon zu überzeugen, dass das Ferment nicht nur Stärkekleister, sondern auch unversehrte Stärkekörner verändern und auflösen kann. 3 cg lufttrockener Weizenstärke werden in einem Uhrsälchen mit 3 ccm concentrirten Malzextracts oder mit 3 ccm einer wässrigen Lösung des durch Alkohol gefällten Ferments übergossen. Wendet man diese letztere Flüssigkeit an, so fügt man ihr eine sehr kleine Citronensäuremenge hinzu, da, wie unter 113 angegeben ist, Säuregegenwart die Wirksamkeit der Diastase wesentlich begünstigt. Das Uhrglas wird gut zugedeckt, und man beobachtet im Laufe von 24—28

Fig. 109. Stärkekörner aus dem Endosperm des Weizenkornes in verschiedenen Stadien der Corrosion. *a* schwach, *b* stärker, *c* noch stärker, *d* am stärksten corrodirt. (Nach BARANETZKY.)

Stunden wiederholt die Veränderungen, welche relativ grosse Stärkekörner erfahren, indem man Tropfen der Flüssigkeit auf den Objectträger bringt und mikroskopisch untersucht. Ich überzeugte mich davon, dass sich die einzelnen Körner individuell sehr verschiedenartig unter dem Einfluss der fermenthaltigen Lösung verhalten; im Allgemeinen machen sich die zu Stande kommenden Corrosionen an den Amylumkörnern in der Weise geltend, wie dies in Fig. 109 *a*, *b*, *c*, *d* dargestellt ist. Die Auflösung der Stärkesubstanz schreitet von aussen nach innen fort; es entstehen helle, radial gerichtete Streifen, diese werden mit zunehmender Corrosion der Körner breiter, und allmählich schreitet die Veränderung der Körner immer mehr in das

1) Sehr eingehend ist die Literatur über das diastatische Ferment von SCHLEICHERT behandelt worden. Vgl. Nova Acta d. Leop.-Carol. Acad., Bd. 62.

Innere derselben vor, wobei sich die unter dem Einflusse des Fermentes gebildeten Corrosionscanäle auch vielfach verzweigen, so dass schliesslich das Stärkekorn zerfällt¹⁾.

113. Der Einfluss verschiedener Substanzen sowie der Temperaturverhältnisse auf den Verlauf des Processes der Stärkeumbildung durch Diastase.

In eine Anzahl kleiner Gläser bringt man je 25 ccm 1-proc. Stärkekleisters. Das Gefäss *a* erhält zunächst keinen weiteren Zusatz. *b* erhält einen Zusatz von einigen Tropfen Salzsäure, *c* einen Zusatz von einigen Tropfen einer concentrirten Citronensäurelösung, *d* einen Zusatz von einigen Tropfen Kalilauge, *e* einen Zusatz von einigen Tropfen Alkohol, *f* einen Zusatz von einigen Tropfen Chloroform. In jedes Glas bringt man jetzt noch 5 ccm Malzextract, um den Flüssigkeiten nach Verlauf von 24 Stunden eine kleine Menge alkoholischer Jodlösung mit Hülfe eines Glasstabes hinzuzufügen. Die Flüssigkeiten *a*, *e* und *f* färben sich nicht blau; alle übrigen nehmen auf Jodzusatz eine blaue Farbe an. Alkohol sowie Chloroform haben die Wirksamkeit der Diastase nicht aufgehoben; die Säuren und das Kali haben das Ferment dagegen unwirksam gemacht.

Mit Bezug auf den Einfluss, welchen Säuren dem diastatischen Fermente gegenüber geltend machen, ist übrigens zu betonen, dass nur grössere Säuremengen die Wirksamkeit der Diastase vernichten. Versetzt man einerseits 25 ccm Kleister mit 5 ccm Malzextract, andererseits aber 25 ccm Kleister mit 5 ccm Malzextract und 2—3 mg Citronensäure, so erfolgt die Amylumumbildung in der letzteren Flüssigkeit schneller als in der ersteren. Kleine Citronensäuremengen (ähnlich verhalten sich kleine Mengen anderer Säuren) heben die Wirksamkeit der Diastase also nicht auf, sondern begünstigen dieselbe im Gegentheil.

Wenn man einerseits 25 ccm Stärkekleister von 15 oder 20° C. mit 5 ccm Malzextract von 15 oder 20° C. versetzt und das Gemisch bei 15 oder 20° C. stehen lässt, andererseits aber 25 ccm Kleister sowie 5 ccm Malzextract nach erfolgter Abkühlung auf 4° C. mit einander vermischt, so kann man sich mit Hülfe der Jodreaction leicht davon überzeugen, dass der Process der Stärkeumbildung durch Diastase bei höherer Temperatur weit schneller als bei niedriger verläuft. Das Temperaturoptimum für die Diastasewirkung liegt bei 63° C. (KJELDAHL).

Erhitzt man Malzextract zum Sieden und vermischt die wieder erkaltete Flüssigkeit mit Kleister, so ergiebt sich, dass keine Stärkeumbildung erfolgt. Das Ferment ist durch den Einfluss der hohen Temperatur zerstört worden²⁾.

114. Die Entstehung der Diastase in den Zellen höherer Pflanzen.

In zwei retortenartige Gefässe von etwa 90 ccm Capacität bringt man je 20 lufttrockene Weizenkörner, füllt die Gefässe mit ausge-

1) Vgl. BARANETZKY, Die stärkeumbildenden Fermente in den Pflanzen, 1878, S. 48. Vgl. auch KRABBE, Jahrbücher f. wissensch. Botanik, Bd. 21.

2) Vgl. DETMER, Pflanzenphysiologische Untersuchungen über Fermentbildung und fermentative Processe, Jena 1884, ferner Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 10.

kochtem und wieder abgekühltem Wasser an, verschliesst die Mündungen der Gefässe mit dem Finger und stellt jedes derselben in der Art, wie es Fig. 11 zeigt, in einem mit Quecksilber und Wasser gefüllten Glase auf. Nach Verlauf von 24 Stunden wird das Wasser des einen retortenartigen Gefässes durch atmosphärische Luft, dasjenige des anderen durch Wasserstoffgas verdrängt. Den Wasserstoff stellt man durch Uebergiessen von arsenfreiem Zink mit verdünnter Salzsäure in einem geeigneten Apparate dar und leitet das Gas zunächst durch eine Lösung von Aetzkali, dann durch eine solche von übermangansaurem Kali, um eventuell vorhandene Spuren von Schwefelwasserstoff sowie Kohlenwasserstoffen zu beseitigen. In den Röhren der retortenartigen Gefässe muss übrigens eine kleine Wassermenge über dem Quecksilber zurückbleiben, damit die Untersuchungsobjecte nicht mit Quecksilberdämpfen in Berührung kommen. Die Weizenkörner, welche sich mit atmosphärischer Luft in Contact befinden, keimen alsbald; im Wasserstoffgas erfolgt keine Keimung. Controlversuche lehren aber, dass die Körner im Wasserstoffgas keineswegs schnell zu Grunde gehen, sondern ihre Keimfähigkeit ziemlich lange (mindestens mehrere Tage) bewahren und ihren Embryo daher zur Entwicklung bringen, wenn sie nachträglich günstigen Keimungsbedingungen bei Luftzutritt ausgesetzt werden. Haben die Untersuchungsobjecte sich 2—3 Tage lang mit atmosphärischer Luft, resp. Wasserstoffgas in Berührung befunden, so werden sie aus den retortenartigen Gefässen herausgenommen, im Mörser zerquetscht und der Brei mit 20 cem Wasser übergossen. Nach einiger Zeit filtrirt man durch vorher nicht angefeuchtete Filter. Versetzt man nun 10 cem der Filtrate mit 20 cem verdünnten Stärkekleyers, so ergiebt die Jodreaction, dass der Extract aus den in dem retortenartigen Gefäss bei Luftzutritt zur Entwicklung gelangten Weizenkeimpflanzen ziemlich energisch stärkeumbildend wirkt, während der Auszug aus den Untersuchungsobjecten, die sich in Contact mit Wasserstoff befunden hatten, eine sehr schwache stärkeumbildende Kraft geltend macht. Diese letztere ist nicht grösser wie diejenige eines Extractes, den man durch Behandlung von 20 zerquetschten ruhenden Weizenkörnern mit 20 cem Wasser hergestellt hat. Der angestellte Versuch lehrt also, dass sich in den Zellen höherer Pflanzen nur bei Zutritt des freien atmosphärischen Sauerstoffs Diastase bilden kann¹⁾.

115. Die Bestimmung und der mikrochemische Nachweis der Glycose.

Dextrose, Maltose etc. besitzen die Fähigkeit, unmittelbar reducirend auf FEHLING'sche Flüssigkeit einzuwirken. Diejenigen Zuckerarten, welche sich in dieser Weise verhalten, werden unter der gemeinschaftlichen Bezeichnung „Glycose“ zusammengefasst. Handelt es sich z. B. darum, den Gehalt des Malzes an Glycose zu bestimmen, so wird zunächst in einer kleinen Quantität des auf einer Handmühle zermahlenden Untersuchungsmaterials der Trockensubstanzgehalt festgestellt. Ferner werden etwa 3 g des Malzpulvers wiederholt mit

1) Vgl. DETMER, Botan. Zeitung, 1883, No. 37, und Pflanzenphysiologische Untersuchungen über Fermentbildung und fermentative Processe, Jena 1884.

kaltem Wasser behandelt und die entstandene Lösung filtrirt. Extracte aus Samen oder Keimpflanzen, mit denen wir es hier ja auch zu thun haben, lassen sich häufig nicht ohne weiteres klar filtriren. Dies gelingt aber leicht, wenn man längere Zeit gewaschene Kohlensäure in die Flüssigkeit einleitet. Die vereinigten Filtrate fällt man mit Bleiessig, filtrirt und bringt sie auf ein bestimmtes Volumen, z. B. 200 ccm. In der erhaltenen Flüssigkeit bestimmt man den Zucker mit FEHLING'scher Lösung (vgl. unter 111).

Nicht zu vergessen ist übrigens bei der Berechnung der Versuchsergebnisse, dass 100 Theile Maltose, die in erster Linie als Zucker in Malzauszügen auftritt, erst so viel Kupferoxyd wie 61 Theile Dextrose reduciren (BROWN und HERON).

Handelt es sich darum, die Gegenwart der Glycose in Geweben auf mikrochemischem Wege zu ermitteln, so stellt man zunächst Schnitte aus den Untersuchungsobjecten, z. B. aus Birnen oder Aepfeln her, die aber nicht zu dünn sein dürfen, damit nicht alle Zellen geöffnet sind. Am besten ist es, wenn die Schnitte 3 Lagen unversehrter Zellen enthalten. Die Schnitte werden in eine concentrirte Kupfersulfatlösung von gewöhnlicher Temperatur gelegt, nach kurzer Zeit mit der Pincette erfasst und oberflächlich abgespült, indem man sie in reines Wasser eintaucht. Jetzt bringt man die Schnitte sofort in siedende Kalilauge¹⁾ oder besser²⁾ in eine siedende Lösung von 10 g weinsaurem Natronkali und 10 g Aetzkali in 10 g Wasser. Ist Glycose vorhanden, so ist nach wenigen Secunden in denjenigen Zellen, welche dieselbe enthalten, ein schön roth gefärbter Niederschlag von Kupferoxydul entstanden. Die mikroskopische Untersuchung der Schnitte gewährt Aufschluss über die Vertheilung des Zuckers im Gewebe.

Sehr bequem ist auch die folgende Methode des Glycosenachweises. Die Schnitte werden nach dem Umschwenken in Wasser auf dem Objectträger unter Deckglas in einen Tropfen FEHLING'scher Lösung (vgl. unter 111) gelegt. Man erhitzt nun, bis kleine Blasen entstehen, aber nicht länger. Kupferoxydul hat sich dann bei Zuckergegenwart in den Zellen abgeschieden.

116. Das Dextrin.

100 ccm Wasser werden mit 1 g Kartoffelstärke vermischt und zum Sieden erhitzt. Der erkaltete Kleister empfängt einen Zusatz von einigen Tropfen Schwefel- oder Salzsäure und wird dann wieder erwärmt. Die Flüssigkeit klärt sich schnell, und eine kleine Probe derselben nimmt nach dem Erkalten auf Jodzusatz noch eine blaue Farbe an. Kocht man die saure Lösung weiter, um derselben von Zeit zu Zeit (etwa alle 5 Minuten) kleine Proben zu entnehmen, die man nach dem Erkalten mit Jodlösung versetzt, so zeigt sich, dass die ersten Proben auf Jodzusatz einen violetten, weitere einen rothbraunen und noch weitere einen gelblichen Farbenton annehmen. Diese Farbenreactionen lehren, dass sich unter dem Einflusse der Säure

1) Vgl. SACHS, PRINGSHEIM's Jahrbücher f. wissenschaftl. Botanik, Bd. 3, S. 187.

2) Vgl. ARTHUR MEYER, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 3, S. 332.

aus dem Amylum successive verschiedene Dextrinarten bilden. Zunächst zerfällt die Amylumsubstanz in das sich auf Jodzusatz violett färbende Amylodextrin I und Zucker. Das erstere spaltet sich dann durch die Säurewirkung in Zucker und Amylodextrin II, das sich durch Jod rothbraun färbt. Ferner bilden sich aus dem Amylodextrin II neben Zucker neue Dextrinarten, die sich auf Jodzusatz gelblich färben, und schliesslich verschwinden die Dextrine völlig, weil sie ihrer Gesamtmasse nach in Zucker übergeführt worden sind¹⁾. Nach neueren Untersuchungen ist der Vorgang vielleicht ein anderer.

✓ Dass in den Zellen der Pflanzen Dextrinarten (und zwar auch solche, die sich auf Jodzusatz bräunlich färben) vorkommen, kann man auf folgende Weise feststellen. Erbsensamen werden auf einer Handmühle zu Pulver zermahlen. Das Pulver übergiesst man mit nicht zu viel Wasser und leitet nach Verlauf einer Stunde reine Kohlensäure in die trübe Flüssigkeit ein. Dann filtrirt man, und zwar wird diese Operation durch die Gegenwart der Kohlensäure in hohem Grade erleichtert. Eine kleine Menge des klaren Filtrates bringt man mit einem Jodkrystall in Berührung, und man wird finden, dass sich die Flüssigkeit nach und nach bräunlich färbt; sie verhält sich ebenso wie die wässrige Lösung des käuflichen Dextrins, wenn diese mit Jod in Contact gelangt. Reines Wasser nimmt in Berührung mit festem Jod nur einen gelblichen Farbenton an²⁾. Wird das Verhalten des wässrigen Erbsensamenextractes zu FEHLING'scher Lösung untersucht, so zeigt sich, dass keine Reduction erfolgt. Kocht man dagegen den wässrigen Extract nach Zusatz einiger Tropfen Schwefelsäure längere Zeit, so ist die Flüssigkeit nunmehr im Stande, energisch reducirend auf FEHLING'sche Lösung einzuwirken, weil das Dextrin unter dem Einfluss der Säure in Glycose übergeführt wurde.

117. Die Bestimmung und der mikrochemische Nachweis des Rohrzuckers.

Der Rohrzucker ist ein Bestandtheil vieler Pflanzensäfte, und besonders reich an Rohrzucker ist der Saft der Zuckerrübe. Handelt es sich darum, die Menge des in den Wurzeln vorhandenen Zuckers festzustellen, so verfährt man nach E. v. WOLFF³⁾, wie folgt. Die sorgfältig gereinigten Rüben werden in Scheiben zerschnitten. 500—1000 g dieser Scheiben hängt man an Fäden im Trockenschrank bei 60—70° C. auf. Die trockene Masse wird zu einem nicht zu feinen Pulver zerstoßen, und nach der Gewichtsbestimmung des Pulvers in einer kleinen Quantität desselben (5—6 g) der Trockensubstanzgehalt festgestellt. 2—3 g des Rübenpulvers kocht man wiederholt mit 80—85-proc. Weingeist aus, filtrirt die Lösung nach jeder Auskochung ab und wäscht den Rückstand auf dem Filter schliesslich mit heissem Alkohol aus. Die gesammte Lösung versetzt man nunmehr mit viel Wasser und erwärmt so lange auf dem Wasserbade, bis der Alkohol völlig verdampft ist. Jetzt wird die Flüssigkeit auf 300 ccm aufgefüllt. 100 ccm untersucht man sofort mit FEHLING'scher Lösung auf einen Gehalt

1) Vgl. W. NÄGELI, Beiträge zur näheren Kenntniss der Stärkegruppe, 1879, und DETMER, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 10, S. 752.

2) Vgl. DETMER, Journal f. Landwirthschaft, 27. Jahrgang, S. 379.

3) Vgl. E. v. WOLFF, Anleitung zur chem. Unters. landwirthsch. wichtiger Stoffe, 1875, S. 184.

an Traubenzucker; es muss aber bemerkt werden, dass die Menge desselben, wenn er überhaupt nicht völlig fehlt, sehr gering ist. 200 ccm Flüssigkeit erwärmt man nach Zusatz von 4 Tropfen Schwefelsäure 3 Stunden lang unter Ersatz des verdunstenden Wassers auf dem Wasserbade, füllt auf 400 ccm auf und bestimmt in 100 ccm nach erfolgter Neutralisation mit kohlensaurem Natron mit Hülfe der FEHLING'schen Lösung die vorhandene Traubenzuckermenge. Schliesslich ist es leicht, aus den gefundenen Werthen den Rohrzuckergehalt der frischen Rüben oder der Rübertrockensubstanz zu berechnen. Ueber Darstellung und Anwendung der FEHLING'schen Lösung ist schon früher (vgl. unter 111) das Erforderliche mitgetheilt worden.

Nach dem Gesagten ist es ohne weiteres klar, in welcher Weise man zu verfahren hat, wenn es sich nur darum handelt, qualitativ die Gegenwart des Rohrzuckers in Rüben nachzuweisen.

Kommt es darauf an, das Vorhandensein des Rohrzuckers in den Rüben auf mikrochemischem Wege nachzuweisen, so werden Schnitte, die nicht zu dünn ausfallen dürfen, damit nicht sämtliche Zellen geöffnet sind, in derselben Weise, wie es unter 115 angegeben ist, mit Kupfer- und Kalilösung behandelt. Bei mikroskopischer Betrachtung der Schnitte zeigt sich, dass der Inhalt ihrer Zellen eine schön blaue Färbung angenommen hat, was die Gegenwart von Rohrzucker anzeigt¹⁾. Dieselbe Reaction tritt ein, wenn man die Schnitte auf dem Objectträger unter dem Deckglas in einem Tropfen FEHLING'scher Lösung erwärmt. (Vergl. unter 115.)

118. Die Reservecellulose und das Amyloid.

Es giebt manche Samen, in denen die Cellulose als stickstofffreier Reservestoff auftritt. Ein Dattelkern wird quer durchgeschnitten, um nun mit Hülfe eines sehr scharfen Rasirmessers einen zarten Querschnitt aus dem Endosperm herzustellen. Die Wände der gestreckten Zellen sind ausserordentlich stark verdickt, aber es sind viele einfache Tüpfel vorhanden. Wir imprägniren einen Schnitt aus dem Endosperm des Dattelkerns mit Jodjodkaliumlösung und lassen darauf vom Deckglasrande aus verdünnte Schwefelsäure, die durch Vermischen von 2 Volumthl. Schwefelsäure mit 1 Volumthl. Wasser hergestellt worden ist, Zutreten. Die Verdickungsschichten der Zellwände färben sich schön blau. Werden Schnitte aus dem Endosperm in der früher (unter 42) angegebenen Weise mit Phloroglucinlösung und dann mit Salzsäure behandelt, so tritt keine Rothfärbung der Objecte ein. Die Verdickungsschichten der Endospermzellen sind also nicht verholzt; sie bestehen aus Cellulose. Bei der Keimung des Dattelsamens wird diese Cellulose verbraucht.

Dieselbe ist aber nicht durchaus identisch mit der gewöhnlichen Cellulose, wie neuere Untersuchungen, z. B. diejenigen von REISS, (Landwirthschaftliche Jahrbücher, 1889) gezeigt haben, und sie wird daher als Reservecellulose unterschieden.

In den Zellen der Cotyledonen ruhender Samen von *Tropaeolum majus* sind die Parenchymelemente, wie leicht bei der Untersuchung von Querschnitten zu sehen ist, mit stark verdickten, getüpfelten Membranen

1) Vgl. SACHS, PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 3, S. 183.

ausgestattet. Zwischen den Zellen beobachtet man dreiseitige Inter-cellularen. Die Verdickungsschichten färben sich bei Behandlung mit verdünnter Jodjodkaliumlösung direct blau; sie bestehen nicht aus Reserve-cellulose, sondern aus Amyloidsubstanz. Dieses Amyloid wird bei der Keimung der Tropaeolumsamen verbraucht. Es wird unter Bildung von Corrosionskanälen aufgelöst, und schliesslich bleibt nur noch die Mittel-lamelle zwischen den benachbarten Elementen des Parenchyms der Cotyle-donen erhalten.

119. Das Inulin.

Das Inulin ist besonders reichlich in den unterirdischen Organen vieler Compositen vorhanden. Es tritt als gelöster Körper im Zellsaft auf und hat die Functionen eines stickstofffreien Reservestoffes. Wird etwas Inulin mit kaltem Wasser übergossen, so zeigt sich, dass sich die Substanz ziemlich schwer in dem-selben auflöst. Erwärmt man, so löst sich das Inulin dagegen völlig auf. Das Inulin ist nicht im Stande, reducirend auf FEHLING'sche Lösung einzuwirken. Versetzt man aber heisse FEHLING'sche Flüssigkeit mit einer bei höherer Temperatur bereiteten Inulinlösung, so tritt die Abscheidung kleiner Mengen Kupferoxyduls ein, weil schon heisses Wasser im Stande ist, geringe Quantitäten des Inulins in Glycose umzuwandeln. Wird wässrige Inulinlösung nach Zusatz einiger Tropfen Schwefelsäure gekocht, so bildet sich viel Glycose, und die Flüssigkeit wirkt nunmehr sehr energisch reducirend auf FEHLING'sche Lösung ein.

Eine heisse Inulinlösung zeigt beim Erkalten die merkwürdige Erscheinung, dass sich das Inulin nicht sofort, sondern erst nach Verlauf längerer Zeit wieder abscheidet. Fügt man aber zu einer eben erkalteten Inulinlösung einen Ueberschuss von Alkohol hinzu, so erfolgt die Abscheidung des Inulins schnell. Die Unlöslichkeit des Inulins in Alkohol wird nun bei der mikrochemischen Nachweisung desselben in Pflanzentheilen verwerthet. Nicht zu dünne Schnitte aus dem Mark der Georginenknolle (*Dahlia variabilis*) werden auf dem Objectträger mit Alkohol bedeckt und nach einiger Zeit in Wasser eingetaucht. Bei mikroskopischer Untersuchung der in Wasser liegenden Schnitte zeigt sich, dass sich das Inulin abgeschieden hat. Unter Umständen scheidet sich das Inulin in Form schöner Sphärokrystalle in den Zellen ab. Sehr deutlich treten dieselben hervor, wenn man grössere Stücke der Georginenknollen mindestens 8—14 Tage lang in Spiritus liegen lässt, aus dem

Fig. 110. Zelle aus einem Stück einer Knolle von *Dahlia variabilis* welches mehrere Monate lang in Alkohol gelegen hatte. Sphärokrystalle an den Wänden. Vergr. 240. (Nach STRASBURGER.)

Alkoholmaterial die Schnitte herstellt und dieselben in Wasser untersucht. Die Sphärokrystalle sitzen den Zellwänden an; sie stellen kugelige Gebilde von charakteristischem Aussehen dar ¹⁾ (vgl. Fig. 110).

120. Die Pflanzenfette und die quantitative Bestimmung derselben.

Wenn man getrocknete und zerkleinerte Pflanzenmassen mit Aether extrahirt, so erhält man eine Lösung, die beim Eindunsten einen wesentlich aus Fett bestehenden Rückstand liefert. Gewöhnlich ist die Menge der dem Fett beigemengten anderweitigen Stoffe so gering, dass man bei der quantitativen Bestimmung des Fettgehaltes von Pflanzentheilen meist keine Rücksicht auf diese Verunreinigungen zu nehmen braucht. Bei Fettbestimmungen benutzt man zweckmässigen in Fig. 111 dargestellten Apparat.

Der Apparat, nach SOXHLET's Angaben zusammengestellt, ist im Preis von ca. 10 M. von MUENCKE in Berlin zu beziehen. Er besteht aus dem Kolben *K*, dem eigentlichen Extractionsraum *E* und der Kühlvorrichtung *Kv*, die mit der Wasserleitung in Verbindung gesetzt wird. Als Extractionsflüssigkeit benutzt man wasserfreien Aether.

Bei der Ausführung der Untersuchungen bringt man 3—5 g der sehr fein gepulverten und bei Anwendung sehr fettreicher Körper am besten mit reinem Quarzsand zerriebenen Substanz in eine aus Fliesspapier gefertigte Patrone. Diese stellt man her, indem man um einen Holzcyylinder, dessen Durchmesser 4 mm geringer ist als derjenige des Extractionscyinders *E*, ein Stück Fliesspapier zweimal herumrollt, über die Basis des Holzcyinders ein dem Durchmesser desselben entsprechendes Stück der gebildeten Rolle hervorstehen lässt, dieses ähnlich, wie man ein Packet schliesst, umbiegt und den gebildeten Boden der Rolle durch kräftiges Aufdrücken ebnet. Hat man die Substanz eingefüllt, so schliesst man die obere Oeffnung der Patrone ebenfalls durch Umbiegen.

Die gefüllte Hülse wird nun 2—3 Stunden lang im Trockenschrank einer Temperatur von 45° C. ausgesetzt. Dann erfolgt in bekannter Weise die Extraction mit Aether. Schliesslich wird der Aether der Fettlösung im Kolben *K* abdestillirt und der Rückstand (Rohfett) 1—2 Stunden lang bei 95° C. getrocknet, um endlich sein Gewicht festzustellen.

Die Fette bestehen aus Gemischen von freien Fettsäuren und Glyceriden. Um das Glycerin in diesen letzteren überhaupt nachzuweisen, verfuhr ich in folgender Weise. Etwa 75 ccm Olivenöl wurden längere Zeit in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade mit verdünnter Kalilauge digerirt. Nach dem Erkalten wurde der Flüssigkeit viel schwefelsaures Natron hinzugefügt, die abgeschiedene Seife abfiltrirt, und das

Fig. 111. Fett-extractionsapparat.

¹⁾ Vgl. SACHS, Botanische Zeitung, 1864, S. 25, und PRANTL, Das Inulin, München, 1870.

Filtrat mit Schwefelsäure neutralisirt. Dann wurde die Flüssigkeit eingedunstet, der Rückstand mit Alkohol behandelt, die Lösung von den schwefelsauren Salzen abfiltrirt, eingedunstet und der Rückstand zur Reinigung abermals mit Alkohol behandelt, um die Lösung nach erfolgter Filtration wieder einzudunsten. Es bleibt eine syrupartige Flüssigkeit von süßlichem Geschmack, eben das Glycerin, zurück. Wird dieser Rückstand in Wasser aufgelöst und ein Theil der Flüssigkeit mit einer verdünnten Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd vermischt, in der man durch Zusatz von Kalilauge eine Abscheidung von Kupferoxydhydrat hervorgebracht hat, so wird dieser letztere Körper aufgelöst. (Glycerin-reaction.)

121. Die Reactionen der fetten Oele.

Wir bringen eine kleine Menge irgend eines fetten Oeles mit Hülfe eines Glasstabes auf den Objectträger, fügen eine Mischung von Alkohol und Aether hinzu, damit sich das Fett auflöse, bedecken mit dem Deckglase und beobachten unter dem Mikroskop. Wenn der Alkohol und der Aether verdunstet sind, so sehen wir grosse sowie kleine Tropfen in unserem Präparat, die Fettmassen darstellen. Sie erscheinen, auf den optischen Durchschnitt eingestellt, hellgrau und sind von einem schmalen, schwarzen Ring umgrenzt. Wird der Tubus gesenkt, so erscheint jeder Oeltropfen nicht mehr von einem schwarzen, sondern von einem hellen Ringe umsäumt. Die Oeltropfen können nicht wohl mit Luftblasen verwechselt werden, denn hat man diese letzteren im Mikroskop eingestellt und senkt den Tubus, so wird ihre Randpartie nicht hell, sondern der schon bestehende dunkle Rand nimmt im Gegentheil noch an Breite zu.

In den Zellen des Endosperms von Ricinus oder in denjenigen der Cotyledonen von Brassica sind neben den Eiweissstoffen reichliche Fettmengen vorhanden, und um diese nachzuweisen, brauchen wir nur dünne Schnitte aus den erwähnten Samen auf dem Objectträger mit einer Mischung von Alkohol und Aether zu behandeln. Die sich alsbald abscheidenden Fettropfen sind leicht als solche zu erkennen.

Auch die Alkannatinctur (ein tief gefärbter Auszug aus der Alkannawurzel, der durch Behandlung derselben mit 70—80-proc. Alkohol hergestellt worden ist) kann zum Nachweis der Fette dienen. Untersucht man z. B. Schnitte aus dem Endosperm von Ricinus, dessen Zellen ein Fett enthalten, das im Gegensatz zu anderen Fetten löslich in Alkohol ist, so versetzt man die Alkannatinctur mit dem gleichen Volumen Glycerin, schwenkt die Schnitte in der Mischung einige Male hin und her, spült sie oberflächlich mit Alkohol ab und legt sie in Glycerin. Die Aleuronkörner erscheinen gar nicht oder schwach gefärbt, während die Grundmasse in Folge ihres Fettgehaltes tief roth tingirt ist.

Ein weiteres Reagens auf fette Oele ist die Ueberosmiumsäure in wässriger 1-proc. Lösung. Legt man Schnitte aus dem Endosperm von Ricinus in diese Lösung, so nehmen dieselben nach einiger Zeit eine dunkle Farbe an, weil die Ueberosmiumsäure das vorhandene Fett schwärzt. Zu beachten ist übrigens, dass durch die Alkannatinctur sowie die Ueberosmiumsäure nicht nur Fett gefärbt wird.

122. Das Verhalten des Fettes bei der Keimung der Samen.

Sehr zahlreiche Samen (*Ricinus*, *Helianthus*, *Cucurbita*, *Brassica* etc.) enthalten Fett als stickstofffreien Reservestoff. Dieses Fett ist dem *Amylum* stärkereicher Samen physiologisch gleichwerthig. Es liefert das Athmungsmaterial und ebenso das Material zur Bildung der Zellhäute. Das Fett geht aber, bevor es an die Verbrauchsorte gelangt, in vielen Fällen (z. B. *Ricinus*, *Cucurbita*) zunächst in Stärke und Zucker über. In anderen Fällen, z. B. bei *Linum*, ist dies fast gar nicht zu beobachten, und dann müssen auch die Fette der Hauptsache nach als solche in den Keimpflanzen wandern, um die Translocation des stickstofffreien plastischen Materials zu ermöglichen. In der That ist von H. SCHMIDT eine solche Wanderung der Fette von Zelle zu Zelle beobachtet worden. Wir wollen hier den Stoffwechsel bei der Keimung eines fettreichen Samens näher verfolgen, welcher mit der Bildung reichlicher Quantitäten von Kohlehydraten verbunden ist.

Wir wählen als Untersuchungsobject die Samen von *Ricinus communis*. In einer centralen Höhlung des mächtig ausgebildeten Endosperms liegt der Embryo, der aus den beiden dünnen Cotyledonen und der Keimachse besteht. Die grossen Zellen des Endosperms enthalten, wie wir schon bei anderer Gelegenheit feststellten, eine fett- und eiweissreiche Grundmasse, in der die Aleuronkörner liegen. Stärke ist in den Endospermzellen und ebenso in denjenigen des Embryo, wie man mit Hülfe von Jodreagentien leicht feststellen kann, nicht vorhanden.

Einige Samen von *Ricinus* werden in Gartenerde, die sich in einem Blumentopfe befindet, bei Lichtabschluss und bei nicht zu niedriger Temperatur (etwa 20° C.) zur Keimung gebracht. Wenn sich die Hauptwurzel und ebenso das hypocotyle Glied beträchtlich gestreckt haben, der obere Theil des letzteren Organs aber noch gekrümmt erscheint, weil die Cotyledonen noch im Endosperm stecken, so enthalten die Zellen dieses Gewebes, ebenso wie vor der Keimung, keine Stärke, sondern nur Eiweiss und Fett. Die Cotyledonen haben die Aufgabe, die Reservestoffe des Endosperms aufzusaugen, damit diese von der jungen Keimpflanze verwerthet werden können. In den Zellen des Parenchyms der Cotyledonen ist viel Fett vorhanden; *Amylum*, das dem Keimblattgewebe vor Beginn der Keimung, wie erwähnt, völlig fehlte, findet sich in denjenigen Parenchymzellen reichlich, welche den Mittelnerven nach aussen umgeben. Die Cambiumzellen des hypocotylen Gliedes enthalten nur Eiweissstoffe. Das Parenchym der Rinde und des Markes des oberen, noch nicht völlig gestreckten Theiles des hypocotylen Gliedes ist, wie sich in bekannter Weise leicht feststellen lässt, sehr stärke- sowie zuckerreich, während die Menge dieser Körper im unteren gestreckten Theile des hypocotylen Gliedes mehr und mehr abnimmt. In dem fertig gestellten Theile des hypocotylen Gliedes fehlen Zucker und Stärke im Parenchym; nur in den Zellen der den Gefässbündelring umgebenden Stärkescheide sind Amylumkörner nachzuweisen. Im Gewebe der Hauptwurzel ist jetzt weder Stärke noch Fett zu finden, dagegen führt das Parenchym der sich lebhaft streckenden Nebenwurzeln viel Zucker.

Schreitet die Keimung weiter fort, so verschwindet das Fett immer

mehr und mehr aus dem Endosperm des Ricinussamens, weil es für die Zwecke des Wachstums der Keimpflanze Verwendung findet. Das hypocotyle Glied streckt sich gerade, und die Holz- sowie Basttheile der Gefäßsbündel desselben erfahren eine weitere Ausbildung. In dem Maasse, in welchem diese Streckung des oberen Theiles des hypocotylen Gliedes zu Stande kommt, verschwinden auch die aus dem Fett entstandenen Stärke- und Zuckermengen aus den Zellen des Parenchyms; nur in den Zellen der die Fibrovasalstränge umgebenden Stärkescheide sind noch Amylumkörner nachzuweisen.

Fig. 112. Theil eines Querschnittes aus dem fertig gestreckten hypocotylen Glied von *Ricinus communis*. Der Längsschnitt ist in Fig. 33 dargestellt. *r* Parenchym der primären Rinde, *m* des Markes. Zwischen *r* und *b* die einfache Gefäßsbündelscheide mit Stärkekörnern (Stärkescheide). Der Fibrovasalstrang besteht aus dem Phloëm *b*, *y*, dem Xylem *t*, *g* und dem Cambium *c c*. Das Cambium des Stranges *c c* setzt sich auch in das zwischen den benachbarten Strängen liegende Grundgewebe fort, als Interfascicularcambium *cb*. Im Phloëm sind *b b* Bastfasern, *y y* der Weichbast, z. Th. Parenchym, z. Th. Siebröhren; im Xylem sind *t t* enge getüpfelte, *g g* weite getüpfelte Gefässe, dazwischen Holzfasern. (Nach SACHS.)

Die Function der Stärkescheide wird weiter unten genauer behandelt werden; hier genügt es, auf ihre Existenz hinzuweisen. Sie tritt als geschlossene Scheide auf, welche den Gefäßsbündelkreis umgiebt, und ist, wie Fig. 112 zeigt, im Hypocotyl von *Ricinus* schön entwickelt. Im Uebrigen vergleiche man die Figurenerklärung.

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Ausbildung der Organe des Ricinusembryo von der Wurzel durch das hypocotyle Glied zu den Cotyledonen allmählich aufwärts steigt. Bei beginnender Streckung und innerer Entwicklung der Organe tritt reichliche Stärke in den Zellen des Parenchyms auf. Wenn die Streckung schnell fortschreitet, so ist im Parenchym auch viel Zucker vorhanden. Aber die erwähnten Kohlehydrate verschwinden wieder mit vollendeter Streckung und Ausbildung der Organe aus dem Parenchym; sie sind eben zur Bildung von Zellstoff verbraucht worden¹⁾.

Es ist angeführt worden, dass im Rinden- und Markgewebe des oberen Theiles des hypocotylen Gliedes von Ricinus, wenn dasselbe noch gekrümmt ist und die Cotyledonen noch im Endosperm stecken, reichliche Stärkemengen vorhanden sind. Diese Amylummenge ist, wie ich feststellte, eine so grosse, dass es möglich ist, ihre Gegenwart in einer Vorlesung makroskopisch zu demonstrieren. Schnitte aus dem oberen Theil des hypocotylen Gliedes werden dazu auf dem Objectträger mit Chloralhydrat und Jodjodkaliumlösung behandelt. Halten die Zuhörer das mit Deckglas bedeckte Präparat gegen das Licht, so können sie sich in Folge der eingetretenen Blaufärbung des Objects von dem Vorhandensein bedeutender Stärkemengen überzeugen.

Auch bei der Keimung der Samen von *Raphanus sativus* tritt ziemlich viel Stärke auf. Ich fand im sich streckenden Hypocotyl etwa 4 Tage alter Keimlinge der genannten Art, die sich bei 20° C. entwickelt hatten, reichlichere Amylummengen. Die Wurzel der Keimpflanzen war recht stärkearm. Im Hypocotyl fand sich die Stärke zumal in der Nähe der Gefässbündel, aber auch im übrigen Parenchym. Wenn in den Keimtheilen ölreicher Samen reichlich Stärke auftritt, so enthalten meist auch die im ruhenden Samen amyulfreien Cotyledonen bei Beginn der Keimung mehr oder minder grosse Stärkemengen und die stickstofffreien Körper wandern in Form von Kohlehydraten. Wenn sich dagegen Fettwanderung geltend macht (z. B. bei *Linum*), dann sind die Cotyledonen stets stärkefrei, und Kohlehydrate treten auch in den übrigen Organen der Keimpflanze meist nur in geringerer Quantität auf.

123. Die Keimung der Samen von *Phaseolus multiflorus*.

Ein sehr günstiges Object für das Studium einer Reihe von Stoffwechselprocessen sowie mancher Erscheinungen der Stoffwanderung in der Pflanze bietet der keimende Same der Schminkebohne (*Phaseolus multiflorus*) dar²⁾. Die Samenschale der Bohne besteht, wovon man sich bei dem Studium von Querschnitten überzeugen kann, aus vier Schichten. Die innerste Schicht besteht aus zusammengedrückten Zellen. Es folgt dann eine aus mehreren Zelllagen zusammengesetzte Schicht, und zwar führen die Zellen, wenn man es mit bunten Samen zu thun hat, einen rothen Farbstoff. An diese Schicht schliesst sich

1) Vgl. SACHS, Botanische Zeitung, 1859, S. 177, vgl. ferner DETMER, Vergleichende Physiologie des Keimungsprocesses der Samen, 1880, S. 316, und H. SCHMIDT, Flora, 1891, S. 320, 342 und 344.

2) Vgl. SACHS, Sitzungsberichte der Akadem. d. Wiss. zu Wien, 1859, Bd. 37, S. 57, und DETMER, Vergleichende Physiologie des Keimungsprocesses der Samen, 1880, S. 308.

eine dritte an, die aus recht kleinen Zellen besteht, und endlich folgt die Palissadenschicht, deren Elemente radial zur Samenoberfläche gestreckt und stark verdickt sind. Gruppen von Palissadenzellen führen einen schwarzen Farbstoff, wodurch die Samen ihr geflecktes Aussehen erlangen. Um recht günstige Präparate aus der Samenschale zu gewinnen, ist es nach meinen Erfahrungen zweckmässig, die Bohnen zunächst 24 Stunden lang einzuquellen und dann 12 Stunden lang austrocknen zu lassen. Das auf diese Weise vorbereitete Material lässt sich gut zur Herstellung dünner Querschnitte der Samenschale verwenden. Die Samenschale umschliesst den Embryo, welcher aus den beiden grossen Cotyledonen und der Keimaxe (Wurzel, hypocotyles Glied, erstes Stengelglied, Terminalknospe) mit den beiden Primordialblättern zusammengesetzt ist. Man überzeugt sich leicht davon, dass die Cotyledonen, da ihre nach innen gerichteten Flächen concav sind, einen Hohlraum zwischen sich lassen, und dass die Axe des Embryo knieförmig gebogen ist. Die Cotyledonen bestehen aus der Epidermis, dem mächtig entwickelten Parenchym und den dieses durchziehenden Gefässbündeln. Die Epidermiszellen führen keine Stärke, dagegen sind die Elemente des Parenchyms sehr stärkereich. Ueberdies führen sie Eiweissstoffe, wovon man sich bei der Behandlung von Schnitten aus den Cotyledonen mit Jod und FEHLING'scher Lösung überzeugen kann. Die Zellen der Gefässbündel sind amylnfrei; sie führen aber Eiweissstoffe. Feine Querschnitte durch die Keimaxe lehren, dass diese aus der Epidermis, dem Rinden- sowie Markparenchym und der dazwischen liegenden Gefässbündelregion zusammengesetzt ist. Die Primordialblätter besitzen einen Stiel sowie eine Lamina. Wird ein Blatt auf dem Objectträger im Wassertropfen ausgebreitet, mit Deckglas bedeckt und mikroskopischer Betrachtung unterzogen, so kann man sich von dem Vorhandensein der Nerven in der Lamina überzeugen. Alle Zellen des Parenchyms dieser letzteren sind stärkefrei, führen aber Eiweissstoffe.

Werden Bohnensamen in feuchte Erde eingelegt, so beginnt die Keimung alsbald. Die junge Pflanze wächst auf Kosten der in den Cotyledonen vorhandenen Reservestoffe. Man achte besonders bei der Betrachtung der sich entwickelnden Keimpflanzen auf das zuerst erfolgende Hervorbrechen der Wurzel aus der Samenschale, auf das Hervortreten des an seiner Spitze gekrümmten Stengels, auf die Entstehung der Nebenwurzeln, die Bildung der Wurzelhaare sowie der Haare am Stengel, welche am ruhenden Keim noch fehlen, auf das Wachstum der Primordialblätter und die Differenzen, welche sich bei der Keimung im Dunkeln einer- und bei Lichtzutritt andererseits herausstellen etc.

Mit Bezug auf das Verhalten des plastischen Materials bei der Keimung ist namentlich das Folgende zu bemerken. Hat die Wurzel eine Länge von 2—3 cm erreicht, so finden sich in der Rinde und dem Mark der Wurzel sowie des hypocotylen Gliedes viele kleine Stärkekörner, während die Zellen der Axe des Embryo vor Beginn der Keimung gewöhnlich nur wenig Amylum führten. Glycose ist, wie man bei Behandlung von Schnitten mit Kupferlösung und Kali constatiren kann, in den Rinden- und Markzellen der Axe vorhanden, während sich Eiweissstoffe zumal in der Gefässbündelregion vorfinden. Indem sich bei dem Fortgang der Keimung die Wurzel verlängert und das erste Stengelglied bedeutend streckt, verschwindet das Amylum

aus den fertig gestreckten Zellen der Rinde sowie des Markes. So z. B. sind die Zellen der Rinde und des Markes an der Basis des Stengels alsbald amyllumfrei, während Rinde und Mark der höheren Theile des Stengels noch Stärke führen. Endlich verschwindet diese aber auch. Ebenso verschwindet das Amyllum in dem Maasse aus den Primordialblättern, in welchem sich diese ausbilden. Ist die Streckung des ersten Stengelgliedes vollendet, so sind Rinde und Mark desselben völlig stärkefrei. Nur die bei der Bohne sehr schön entwickelte Stärkescheide, welche aus einer Zellenlage besteht und den Gefässbündelkreis umgiebt, führt noch reichlich Amylunkörner. Die Mark- und Rindenzellen, welche ihre Stärke verloren haben, führen jetzt Zucker, der aber auch mehr und mehr verschwindet, wenn die Keimung ihrem Ende naht. Eiweissstoffe sind besonders reichlich, wie sich mit Hülfe von Kupferlösung und Kali feststellen lässt, im Siebtheil der Gefässbündel vorhanden. Wenn sich die Primordialblätter völlig entwickelt haben, so kann das Keimungsstadium der Bohnenpflanze als abgeschlossen betrachtet werden. Die Cotyledonen sind fast völlig frei von Reservestoffen. Schnitte, die man mit Kupferlösung und Kali behandelt, färben sich nicht mehr violett, da kein Eiweiss vorhanden ist, sondern hellblau. Der Amylumgehalt der Cotyledonen ist nur noch ein geringer.

Die Auflösung der Stärkekörner in den Keimblättern beginnt sofort, wenn das Leben im Keim angeregt wird, und zwar sind es die der Axe zunächst liegenden Zellen der Cotyledonen, in denen die Stärkekörner zuerst angegriffen werden. Wenn das erste Stengelglied der Bohnenkeimpflanzen in lebhafter Streckung begriffen ist, so sind bereits reichliche Mengen corrodierter Amylunkörner, freilich neben noch unversehrten, in den Zellen der Cotyledonen vorhanden, und fernerhin greift der Process der Amylumauflösung immer weiter um sich.

124. Die Keimung von *Triticum vulgare*.

Handelt es sich darum, die Natur der ruhenden Weizenfrucht genauer kennen zu lernen, so ist nicht das trockene Korn, sondern es sind bis zu einem gewissen Grade in Wasser aufgeweichte Körner zur Herstellung der erforderlichen Schnitte zu benutzen. Die Frucht besteht aus der Frucht- und Samenschale, die wir bereits an anderer Stelle besprochen, dem Endosperm und dem Embryo. Wir stellen zunächst Querschnitte durch ein Korn her und constatiren, dass die äusserste Schicht des Endosperms eine einfache Lage auf dem Querschnitt fast quadratisch erscheinender Zellen darstellt, deren Membranen stark verdickt sind, und die körnige Masse als Inhaltsstoffe führen. Stärkekörner sind in diesen Zellen nicht vorhanden; sie führen aber, wie sich leicht mit Hülfe von Jod oder schwefelsaurem Kupferoxyd und Kali ermitteln lässt, reichliche Eiweissmengen. Die Hauptmasse des Endosperms zeigt sich aus Zellen von rundlichem Querschnitt zusammengesetzt, die Stärkekörner von verschiedener Grösse sowie Eiweissstoffe enthalten. Letzteres ist bei Behandlung von Schnitten mit schwefelsaurem Kupferoxyd und Kali festzustellen. Der Embryo liegt dem Endosperm seitlich an. Für das Studium des Keims sind mediane Längsschnitte durch das Weizenkorn anzufertigen, und die Betrachtung derselben zunächst bei schwacher, dann bei stärkerer

Vergrößerung, führt uns ein complicirtes Bild vor das Auge. (Vergl. Fig. 71). Zunächst ist auf denjenigen Theil des Embryos hinzuweisen, der direct an das Endosperm angrenzt. Es ist das Schildchen (Scutellum), welches unsere besondere Aufmerksamkeit erfordert. Dasselbe besteht seiner Hauptmasse nach aus kleinen, abgerundeten Zellen; nur die an das Endosperm anschliessende Zellschicht des Schildchens ist, wie man namentlich bei Behandlung der Schnitte mit Kalilauge deutlich sieht, von anderer Beschaffenheit. Die Zellen dieses Epithels des Scutellums sind nämlich von gestreckter, cylindrischer Form. Am oberen Theil des Keims erkennen wir weiter das geschlossene Scheidenblatt, die jungen Laubblattanlagen und den Vegetationskegel. Die Wurzel des Weizenembryos ist von einer Wurzelscheide (Coleorhiza) umschlossen, und zwar ist die Grenze zwischen jener und dieser scharf durch eine helle Linie markirt. Amylum oder Glycose sind weder in den Zellen des Schildchens noch in denjenigen der übrigen Theile des Keims vorhanden. Dagegen führen die sämtlichen Zellen des Embryos reichliche Eiweissquantitäten. Zu bemerken ist noch, dass auch das Endosperm des ruhenden Weizenkornes keinen Zucker enthält.

Werden angequollene Weizenkörner auf in Wasser liegende Bimsteinplatten gebracht, so beginnt die Keimung alsbald, indem die Organe des Embryos auf Kosten der ihnen aus dem Endosperm zukommenden plastischen Stoffe wachsen. Die Wurzel tritt hervor, und die ersten Seitenwurzeln, welche sich fortan lebhafter als jene entwickeln, kommen zum Vorschein. Ebenso erfahren die Blattanlagen schnell eine bedeutende Streckung, sie bleiben aber noch zunächst von dem lebhaft wachsenden ersten scheidenförmigen Blatt umschlossen. (Vgl. Fig. 113.) Der Stengel entwickelt sich erst später. Das Keimpflanzenmaterial muss nun von Zeit zu Zeit untersucht werden, wenn es sich darum handelt, Aufschluss über die Stoffwechselprocesse bei der Keimung zu erlangen. Bald nach Beginn der Keimung treten im Endosperm bedeutende Glycosemengen auf, wie mit Hülfe von schwefelsaurem Kupferoxyd und Kali leicht festzustellen ist. Das Schildchen, welches bei der Keimung im Weizenkorn stecken bleibt, vermittelt den Uebertritt des gesammten plastischen Materials aus dem Endosperm in den Keim, aber es ist wichtig, dass die Zellen des Scutellums niemals Zucker führen.

Das Cylinderepithel dient dem Schildchen als Saugorgan, und wenngleich in den Epithelzellen niemals die Gegenwart von Amylum oder Glycose nachzuweisen ist, so enthalten die übrigen Zellen des Schildchens doch alsbald nach Beginn der Keimung transitorische Stärke. Die Gegenwart dieses Körpers ist namentlich bei Behandlung von Schnitten mit Kali, Essigsäure und verdünnter Jodlösung in den Zellen des Scutellums leicht festzustellen. Uebrigens ist hier zu bemerken, dass die gekeimten Weizenkörner, um für die Untersuchung

Fig. 113. Keimpflanze von *Triticum vulgare*.

brauchbare Schnitte herzustellen, etwas ausgetrocknet werden müssen. Eiweissstoffe werden der sich entwickelnden Keimpflanze ebenso wie stickstofffreie Körper unter Vermittelung des Schildchens aus dem Endosperm zugeführt. Haben sich die Weizenkeimlinge z. B. 5 Tage lang bei gewöhnlicher Zimmertemperatur entwickelt, so ist es namentlich leicht, die Gegenwart grösserer Eiweissmengen mit Hülfe von schwefelsaurem Kupferoxyd und Kali in den jüngeren Theilen der Wurzeln sowie in den einander diametral gegenüberstehenden Gefässbündeln des Scheidenblattes nachzuweisen. Dieses letztere wächst jetzt noch sehr lebhaft und ist dem entsprechend auch reich an plastischem, aus dem Endosperm stammendem Material. Im Parenchym des Scheidenblattes sind zahlreiche Stärkekörner leicht zu erkennen, deren Menge sich in dem Maasse vermindert, in welchem das Wachstum der Scheide mit fortschreitender Keimung allmählich erlischt. Auch die Zellen der übrigen wachsenden Blätter führen Amylumkörner. Das Vorhandensein von Glycose habe ich zu keiner Zeit in irgend einem Theil des Weizenembryos nachweisen können (die von mir untersuchten Keimpflanzen entwickelten sich im Dunkeln); es ist nur im Endosperm des keimenden Weizens Glycose zugegen. Uebrigens ist es gar nicht ausgeschlossen, dass unter bestimmten Umständen Glycose auch im Embryo der Weizenkeimpflanze auftritt. Die Zellen des Endosperms werden natürlich mit fortschreitender Entwicklung der Keimpflanze immer ärmer an Reservestoffen (Eiweissstoffen sowie Amylum), und wenn man kleine Mengen des ziemlich erschöpften Endospermgewebes im Wassertropfen auf dem Objectträger vertheilt, so lassen sich bei möglichst starker Vergrösserung neben noch unversehrten Amylumkörnern andere erkennen, die in Folge der Einwirkung des bei der Keimung des Weizens entstehenden diastatischen Fermentes corrodirt und gleichsam zerfressen erscheinen ¹⁾).

125. Die Keimung der Kartoffelknollen.

Das Gewebe der Kartoffelknollen besteht fast ausschliesslich aus dünnwandigem, stärkeführendem Parenchym. Es ist nämlich nicht allein das Mark- sowie das Rindengewebe der Hauptsache nach von solcher Beschaffenheit, sondern ebenso fast das gesammte Gewebe der im Kreise angeordneten Gefässbündel besitzt parenchymatische Natur und führt Stärkekörner von verschiedener Grösse. Im Holztheil der Gefässbündel sind nur einzelne Gruppen verholzter Elemente (Gefässe und Holzfasern) vorhanden, während im Basttheil einzelne Stränge vorkommen, deren Zellen kein Amylum, wohl aber Eiweissstoffe enthalten. Das Rindenparenchym der Kartoffelknolle wird von innen nach der Schale zu kleinzelliger und stärkeärmer. Dagegen führen die Rindenzellen dicht unter der Schale häufig im Zellsaft gelöste Farbstoffe etc. Die Schale der Knollen besteht aus Korkgewebe, dessen Zellen tafelförmige Beschaffenheit besitzen.

Ich habe mich oft davon überzeugt, dass die Keimung solcher Kartoffeln, die man im Herbst in einen mit einem nicht luftdicht schliessenden Deckel versehenen Kasten legt, lange auf sich warten lässt. Die Knollen machen unter gewöhnlichen Umständen eine Ruhe-

1) Vgl. SACHS, Botan. Zeitung, 1862.

periode vor der Keimung durch. Diese letztere beginnt erst etwa zu Neujahr, indem einzelne Knospen gewisser Augen (zumal solcher, welche in der Nähe des dem Nabelende entgegengesetzten Theiles der Knollen stehen) sich langsam durch Wachsthum vergrössern. Wir lassen die Knollen nun ruhig bei Lichtabschluss und ohne ihnen Wasser zuzuführen liegen. Anfang März sind bereits manche Triebe der Knollen einige Centimeter lang geworden und es sind schuppenartige Blättchen an denselben sichtbar. Auf Querschnitten durch den Stengeltheil der Triebe ist es leicht, die Epidermis, das Parenchym der Rinde sowie des Markes, und den Gefässbündelkreis zu erkennen. Sucht man die Stoffvertheilung in den Trieben von verschiedenen Entwicklungszuständen mit Hülfe der bekannten mikrochemischen Methoden festzustellen, so ergibt sich zumal das Folgende. Das Parenchym sehr junger Triebe enthält viel Stärke. Wenn die Zellen des Parenchyms sich mit zunehmendem Alter lebhaft strecken, so sind sie zumal glycosereich. Eiweissstoffe sind im Weichbast der Gefässbündel auf der Wanderung begriffen. Das Cambium, die Stengelvegetationspunkte und die in den Internodien entstehenden Anlagen der Nebenwurzeln, welche, wie ich oft constatirte, bei solchen Trieben, die sich in Contact mit trockener Luft entwickeln, die Epidermis nicht durchbrechen, enthalten nur Eiweissstoffe, wie es denn überhaupt eine allgemeine Erfahrung ist, dass in denjenigen Geweben, z. B. dem Cambium, deren Zellen sich in sehr lebhafter Theilung befinden, Kohlehydrate in Folge des ausserordentlich schnellen Verbrauchs derselben nicht nachgewiesen werden können. Auf Details gehe ich hier nicht näher ein; sie sind übrigens leicht festzustellen¹⁾. Vergl. auch unter 126.

126. Der Einfluss der Temperaturverhältnisse auf den Zuckergehalt der Kartoffelknollen.

Die Untersuchung der Kartoffelknollen auf ihren Zuckergehalt bietet hohes Interesse dar, da derartige Prüfungen Resultate liefern, die für die Beurtheilung einer ganzen Reihe physiologischer Fragen von Interesse sind. Die Untersuchung selbst führt man in der Weise aus, dass man die Knollen (etwa 4 Stück) auf dem Reibeisen oder mittelst einer breiten Feile (Raspel) zu einem feinen Brei zerreibt, denselben auf ausgekochte Leinwand, die in einer grossen Porzellanschale liegt, bringt und mit der Hand auspresst. Man spült das Reibeisen oder die Feile, sowie die Hände mit Wasser ab, mischt das Spülwasser mit dem Pressrückstand, presst abermals aus und wiederholt diese Operationen noch zwei Mal. Die gewonnenen Flüssigkeitsmengen werden in einen Kolben von $\frac{1}{2}$ Liter Capacität gebracht. Man füllt bis zur Marke auf, versetzt eine gewisse Flüssigkeitsmenge zur Fällung von Eiweiss etc. mit etwas Bleiessig, filtrirt und ermittelt im Filtrat mit Hülfe der FEHLING'schen Lösung den Zuckergehalt. Eben gereifte Kartoffeln enthalten Zucker. Werden ungekeimte Knollen untersucht, die längere Zeit (einige Wochen) im warmen Zimmer bei 15–20° C. verweilt haben, so zeigt sich, dass diese Knollen zuckerfrei sind. Werden derartige zuckerfreie Kartoffeln etwa 14 Tage lang in einem

1) Vgl. H. DE VRIES, Landwirthschl. Jahrbücher, Bd. 7, S. 217.

Raum (z. B. in einem Keller) aufbewahrt, in welchem die Temperatur nicht unter 0° sinkt, aber auch nicht über $2\text{--}3^{\circ}$ C. steigt, so sind sie süß geworden und enthalten viel Zucker. Besonders zweckmässig ist es, die Knollen bei Abkühlungsversuchen in einen in einem Keller aufgestellten Thermostaten zu bringen, der aus einem doppelwandigen Zinkblechgefäss hergestellt ist. Der Zwischenraum zwischen den Wänden wird mit Eis angefüllt, und zum Verschliessen des Apparates benutzt man keinen gewöhnlichen Deckel, sondern ein mit Eis angefülltes Blechgefäss. Die Knollen sind also im Thermostaten einer constanten Temperatur von 0° C. ausgesetzt. Näheres über einen solchen Thermostaten vergl. unter 49. Werden Kartoffeln, die keinen oder nur wenig Zucker enthalten, in ein Glasgefäss gebracht, dieses in eine Kältemischung (Schnee oder Eis und Kochsalz) gestellt und auf diese Weise bewirkt, dass die Knollen schnell gefrieren und klingend hart werden, so ergibt die Untersuchung der in gefrorenem Zustande zerriebenen und mit Wasser extrahirten Knollen keine Veränderung in ihrem Zuckergehalte. Die hier erwähnten Thatsachen sind zuerst von MÜLLER-Thurgau constatirt worden¹⁾. Einige bezügliche Angaben finden sich auch in einer von mir publicirten Abhandlung²⁾. MÜLLER-Thurgau hat nachgewiesen, dass das Verhältniss zwischen den Processen der Zuckerbildung und der Athmung in den Kartoffelknollen bei verschiedenen Wärmegraden ein sehr verschiedenes ist, und dass es bei der Erklärung der festgestellten Erscheinungen, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch in erster Linie darauf ankommt, diesen Gesichtspunkt nicht aus dem Auge zu verlieren. Bei höherer Temperatur (etwa $15\text{--}20^{\circ}$ C.) verläuft die Athmung relativ energisch, so dass der Zucker in dem Maasse, wie er sich bildet, verbraucht wird und sich nicht in den Knollen anhäufen kann. Bei niedriger Temperatur (z. B. $0\text{--}3^{\circ}$ C.) wird mehr Zucker aus der vorhandenen Stärke gebildet, als die unter diesen Umständen schwache Athmung zu verbrauchen im Stande ist. Daher tritt bei niederen Wärmegraden Zuckeransammlung in den Knollen ein. Das Gefrieren der Kartoffelknollen selbst ist ohne Einfluss auf den Zuckergehalt derselben. Ueber Ausführung von Beobachtungen über Athmung vergl. unter 102.

127. Das Reifen der Früchte und Samen.

Wird ein dünner Querschnitt aus dem reifen Samen von *Brassica Napus* untersucht, so zeigt sich, dass die Samenschale aus einer Reihe verschiedener Schichten besteht. Von aussen nach innen folgt zunächst auf eine aus zusammengedrückten Zellen bestehende, farblose Schicht eine andere, die aus braun gefärbten Zellen, deren Lumina ziemlich deutlich sind, zusammengesetzt ist. Daran schliesst sich eine aus zusammengedrückten, braunen Zellen bestehende Schicht. Es folgt eine vierte Schicht, deren Zellen stark verdickt sind und deutliche Lumina erkennen lassen, während die fünfte Schicht ebenso wie die erste keine zellige Structur mehr zeigt. Die zweite und dritte Schicht der Samenschale bedingen die braune Färbung des Samens. In den

1) Vgl. MÜLLER-Thurgau, Landwirthschl. Jahrbücher, Bd. 11, S. 751.

2) Vgl. DETMER, Pflanzenphysiologische Untersuchungen über Fermentbildung und fermentative Processe, 1884, S. 41.

Zellen der gefalteten Cotyledonen sind reichliche Eiweiss- und Fettmengen vorhanden. Stärke fehlt dem reifen Samen vollkommen. Die sich entwickelnden noch unreifen Samen enthalten aber viel Amylum. Dasselbe strömt ihnen aus den Assimilationsorganen der Rapspflanze zu und wird schliesslich vollkommen zur Fettbildung im Samen verbraucht. Wir stellen Querschnitte aus einer grünen Schote von *Brassica Napus* (ich untersuchte z. B. am 20. Mai 6—8 cm lange Schoten) her. Zwischen den beiden Fruchtblättern sieht man bei der Untersuchung die falsche Scheidewand. Das Fruchtgewebe selbst besteht aus einer stark cuticularisirten Epidermis, grünem und farblosem Grundgewebe, sowie einer Anzahl Gefässbündel. Die jungen Samen sitzen an den verwachsenen Rändern der Fruchtblätter. Behandelt man Querschnitte mit Chloralhydrat und Jodjodkaliumlösung, so zeigt sich, dass Frucht- und Samengewebe viel Stärke enthalten.

Das Hypanthium der reifen Birnen ist bekanntlich sehr zuckerreich. Da nun die Frucht selbst nur wenig Chlorophyll enthält, so muss ihr auf jeden Fall das meiste Material, dessen sie zu ihrer Ausbildung und zur Erzeugung des in dem Hypanthiumgewebe abgelagerten Zuckers bedarf, zugeführt werden. Der Fruchtsiel vermittelt die Zuleitung des plastischen Materials. Stellt man Querschnitte aus dem Fruchtsiel der Birne her (ich untersuchte dieselben z. B. am 8. Juni), so lässt sich der Gefässbündelkreis zwischen der Rinde und dem Mark sofort selbst bei schwacher Vergrösserung erkennen. Der Basttheil der Gefässbündel besitzt nach aussen zu einen starken Beleg von Bastfasern. An diese letzteren grenzt unmittelbar eine Zellschicht (die Stärkescheide), in deren Elementen man reichliche Amylummengen beobachtet. Im Parenchym des Hypanthiums der Birnen fand ich am 8. Juni wenig Stärke, nur einzelne Zellen enthielten dieselbe, offenbar ein Beweis dafür, dass das Amylum sehr schnell verbraucht wird. In einem noch früheren Entwicklungsstadium der Birne (am 2. Mai) konnte ich selbst durch Behandlung dünner Schnitte des Hypanthiums mit Chloralhydrat und Jodjodkaliumlösung keine Stärke in den Zellen nachweisen.

Wenn man von einer *Phaseolus*-Blüthe die Blumen- sowie Kelchblätter entfernt und den noch übrigen Theil der Blüthe zur Herstellung von Querschnitten benutzt, so erblickt man bei der Untersuchung den monomeren Fruchtknoten, umgeben von der geschlitzten Staubfadenröhre. Bei *Phaseolus* und vielen anderen Papilionaceen sind ja von den 10 Staubgefässen nur 9 mit einander verwachsen; ein Staubgefäss ist frei. Der Fruchtknoten trägt die Ovula an seiner Bauchnaht. Nach SACHS¹⁾ ist bei dem Reifen der Früchte und Samen von *Phaseolus* (*Ph. vulgaris*) namentlich das Folgende zu constatiren.

Sogleich nach dem Abblühen findet sich sowohl in den Zellen der äusseren grünen als auch in denjenigen der inneren farblosen Schicht des Fruchtknotens keine Stärke. Nur in unmittelbarer Nähe der Gefässbündel an der Bauch- und Rückennaht ist wenig Amylum vorhanden. Der Embryosack enthält keine Stärke (wohl in Folge starken Verbrauchs derselben). Amylum ist aber in der Umgebung des Embryosackes und im Parenchym des Funiculus vorhanden. Hat die Frucht eine Länge von 3 cm erreicht, so enthält die äussere grüne

1) Vgl. SACHS, PRINGSHEIM's Jahrbücher f. wissensch. Botanik, Bd. 3, S. 231.

Schicht des Fruchtknotens Stärke, die innere farblose aber keine, dagegen viel Zucker. Im Funiculus und in nächster Umgebung des Embryosackes ist Stärke vorhanden. Der noch sehr kleine Embryo ist stärkefrei. Schreitet die Frucht- und Samenentwicklung weiter fort, so ist immer noch viel Stärke (aber kein Zucker) in dem Parenchym des als Zuleitungsorgan dienenden Funiculus zu finden, und auch in den Cotyledonen des sich ausbildenden Embryos häuft sich allmählich viel Amylum an.

Es sind mir Fälle vorgekommen, in denen weder im Embryosack noch im Gewebe des Knospenkernes und Funiculus (wohl in Folge sehr lebhaften Wachstums der Zellen) Stärke oder Zucker nachzuweisen waren. Ich untersuchte am 4. Mai Blüthen von *Tulipa sylvestris* und fand in den Zellen der anatropen Samenknochen, die der dreifächerige Fruchtknoten in grosser Zahl beherbergt, nur reichliche Eiweissmengen, aber weder Stärke noch Glycose.

128. Die Gewinnung des für quantitative chemische Untersuchungen über Stoffwechselprocesse erforderlichen Materials.

Eine der wichtigsten, aber zugleich auch schwierigsten und mühevollsten Aufgaben bei quantitativ-chemischen Untersuchungen über Stoffwechselprocesse im Organismus der Pflanzen besteht in der Gewinnung des geeigneten Materials. Am zweckmässigsten ist es, Keimpflanzen bei derartigen Beobachtungen, z. B. bei dem Studium über das Verhalten der Stärke oder der Fette, zu benutzen. Zunächst sucht man sich Samenmaterial von gleichförmiger Ausbildung der einzelnen Individuen sowie hoher Keimfähigkeit zu verschaffen, bestimmt den Trockensubstanzgehalt desselben, indem man zur Erlangung eines Mittelwerthes mehrere Proben des durch Zermahlen der Samen auf einer Handmühle hergestellten Samenpulvers bei 102° C. trocknet, und berechnet alle Ergebnisse der Samenuntersuchung auf Samentrockensubstanz.

Die zur Gewinnung der Keimpflanzen zu benutzenden Samen müssen genau gewogen werden; ihr Trockensubstanzgewicht lässt sich somit leicht berechnen. Das Einquellen der Samen, die Cultur der Keimpflanzen und die Ermittlung des Trockensubstanzgewichts dieser letzteren werden in derselben Weise ausgeführt, wie dies bei der experimentellen Behandlung der Frage nach der Verwerthbarkeit des freien atmosphärischen Stickstoffs für die Pflanzen geschehen ist (vgl. unter 19). Die Keimpflanzen müssen sich aber natürlich bei völligem Lichtabschluss, z. B. in einem Schrank, entwickeln und brauchen nicht unter Glasglocken zur Ausbildung zu gelangen.

Die hauptsächlichste Schwierigkeit bei den Untersuchungen besteht darin, gleichförmig ausgebildetes Keimpflanzenmaterial zu gewinnen. Legt man eine Anzahl Samen zum Keimen aus, so kommt es sehr oft vor, dass manche Keimpflanzen sich kräftig, andere schwächlich entwickeln, oder dass einige Samen gar nicht keimen und faulen. Beim Experimentiren mit manchen Samen (z. B. Weizen oder Erbsen) erhält man übrigens bei einer Anzahl von Culturen solche, die durchaus befriedigend ausfallen, bei denen also alle benutzten Samen nahezu gleichförmig ausgebildete Keimpflanzen geliefert haben, und das ist ja der denkbar günstigste Fall. Experimentirt man mit kleinen

Samen (Raps, Mohn), die man am besten nach dem Anquellen auf im Wasser liegenden Bimssteinplatten, auf feuchtem Filtrirpapier oder feuchter Glaswolle zur Keimung bringt, so ist es zweckmässig, die Samen zu zählen, das mittlere Gewicht eines Samens zu berechnen, die nicht gekeimten Samen zu zählen und ihr ursprüngliches Gewicht von dem anfänglichen Gewicht der benutzten Samenquantität in Abzug zu bringen. Wenn nicht zu viele Samen schlecht oder gar nicht keimen, so bringt dieses Verfahren keine allzu grossen Fehler mit sich. Bei Versuchen mit grossen Samen (Bohnenarten) ist es zweckmässig, jedes einzelne Untersuchungsobject individuell zu behandeln. Jeder einzelne Same wird für sich gewogen, nach dem Quellen auf feuchter Glaswolle angekeimt und dann jede einzelne Keimpflanze in einem besonderen Glase, welches destillirtes Wasser enthält, zur weiteren Entwicklung gebracht, in ähnlicher Weise, wie dies bei der Handhabung der Methode der Wassercultur geschieht (vgl. unter 1). Auf mancherlei kleine Vorsichtsmaassregeln, die aber dennoch von Wichtigkeit sind, um brauchbares Keimpflanzenmaterial zu gewinnen, wird man bei der Ausführung der Arbeiten leicht selbst aufmerksam werden.

Handelt es sich um ein vergleichendes Studium der Abhängigkeit der Stoffwechselprocesse von den Temperaturverhältnissen, so müssen die Samen natürlich in Thermostaten (vgl. unter 77) bei verschiedenen Wärmegraden zur Keimung gebracht werden.

129. Quantitativ-chemische Untersuchungen über das Verhalten der Fette und Kohlehydrate beim pflanzlichen Stoffwechsel ¹⁾.

Das Studium derjenigen Vorgänge, die sich bei der Keimung der Samen geltend machen, ist sehr geeignet, uns Aufschluss über das Verhalten der Fette und Kohlehydrate beim Stoffwechsel zu geben. Wir suchen zunächst die procentische Zusammensetzung der Samen und diejenige der Keimungsproducte, welche in der unter 128 angegebenen Weise gewonnen worden sind, zu ermitteln und rechnen dann, um vergleichbare Zahlen zu gewinnen, die Ergebnisse dieser Untersuchungen auf 100 g Samentrockensubstanz und auf die aus 100 g Samentrockensubstanz hervorgegangene Menge Keimpflanzen-trockensubstanz um. Hatten 100 g Samensubstanz z. B. 90 g Keimpflanzen-substanz ergeben, so müssen die für die procentische Zusammensetzung der Keimpflanzen gefundenen Werthe auf 90 g umgerechnet werden. Die Analyse der Samen sowie Keimpflanzen wird in folgender Weise ausgeführt.

Etwa 3 g Samen- oder Keimpflanzen-trockensubstanz werden in sehr fein zerriebenem Zustande in der unter 120 angegebenen Weise mit Aether zur Fettbestimmung extrahirt. Den Rückstand von der Fettbestimmung digerirt man wiederholt einige Zeit mit Wasser von gewöhnlicher Zimmertemperatur, filtrirt und füllt das Filtrat auf 200 ccm auf. Je 50 ccm dienen zur Zuckerbestimmung (vgl. unter

1) Neuerdings sind viele werthvolle Methoden aufgefunden worden, um die Menge der einzelnen in den Samen und Keimpflanzen vorhandenen Körper genau festzustellen. Hier ist nicht der Ort, auf solche Details einzugehen. Man vergleiche daher die neuere agriculturchemische Literatur und KÖNIG's mehrfach citirtes Buch.

115), je 50 ccm, nachdem man die Flüssigkeit mit etwas Schwefelsäure gekocht hat, zur Dextrinbestimmung (vgl. unter 116).

Den mit Wasser erschöpften Rückstand oder besser etwa 3 g neuer Samen- resp. Keimpflanzensubstanz (nur bei sehr fettreichen Samen oder Keimpflanzen muss das Fett zunächst entfernt werden) übergiesst man in einem 500 ccm fassenden Kolben mit 200 ccm Wasser, kocht längere Zeit bis zur völligen Verkleisterung der Stärke und digerirt die Flüssigkeit noch etwa 2 Stunden lang bei 70° C., nachdem man ihr einige Tropfen Salzsäure zugefügt hat. Man füllt nach dem Erkalten bis auf 500 ccm auf, lässt ruhig stehen und filtrirt 200 ccm durch ein nicht befeuchtetes Filter klar ab. Das Filtrat vermischt man mit 15 ccm 25-proc. Salzsäure, kocht 3 Stunden lang unter Ersatz des verdunstenden Wassers und füllt nach dem Erkalten wieder bis auf 200 ccm auf. In je 50 ccm Flüssigkeit ermittelt man mit Hülfe der FEHLING'schen Lösung den Zucker, dessen Menge dann auf Stärke umgerechnet wird (vgl. unter 111)¹⁾.

Den Rückstand von der Behandlung mit Salzsäure kocht man eine halbe Stunde lang mit 200 ccm 1-proc. Kalilauge aus, filtrirt und kocht die auf dem Filter gesammelte Masse eine halbe Stunde lang mit 200 ccm Wasser. Der nun noch bleibende Rückstand wird auf einem gewogenen Filter gesammelt, mit Alkohol und Aether ausgewaschen, getrocknet und gewogen. Von der Menge der erhaltenen Rohfaser ist die in ihr vorhandene und zu bestimmende Quantität Asche sowie die Menge an Eiweissstoffen in Abzug zu bringen.

Besondere Proben der Samen- und Keimpflanzensubstanz dienen zur Ermittlung des Aschengehaltes derselben. Ebenso ist die Quantität der in den Samen sowie den Keimpflanzen vorhandenen Eiweissstoffe, eventuell auch die Menge des vorhandenen Asparagins etc. festzustellen (vgl. unter 99).

Bei der Berechnung der procentischen Zusammensetzung der Samen und Keimpflanzen auf Grund der Resultate der angeführten Untersuchungen bleibt stets ein nicht unerheblicher Rest. Die Menge der „unbestimmten Stoffe“ muss aber mit aufgeführt werden.

Ueber die Bedeutung quantitativ-chemischer Untersuchungen beim Studium des Stoffwechsels habe ich mich an anderer Stelle eingehend ausgesprochen²⁾. Hier sei nur erwähnt, dass man sich mit Hülfe der quantitativ-chemischen Methode z. B. darüber Klarheit verschaffen kann, in welchem Verhältniss die beim Stoffwechsel verschwindende Stärkemenge zu der Menge der verschwindenden Trockensubstanz steht, wie viel Zucker unter bestimmten Umständen entsteht, wie gross die Menge des Amylumquantums ist, das bei der Keimung fettreicher Samen gebildet wird, wenn eine gewisse Fettmenge verschwunden ist, etc. etc. Alle diese Fragen haben ein hohes wissenschaftliches Interesse³⁾.

1) Vgl. auch KÖNIG, Untersuchung landwirthschl. wichtiger Stoffe, 1891, S. 231.

2) Vergl. DETMER, Vergl. Physiologie d. Keimungsprocesses der Samen, 1890.

3) Vgl. am soeben angegebenen Orte auch die Literatur. Ferner vgl. DETMER, Physiol. Untersuchungen über die Keimung ölhaltiger Samen und die Vegetation von Zea Mays, 1875; DETMER in WOLLNY's Forschungen auf dem Gebiete der Agri-culturphysik, Bd. 2, und SACHSSE, Ueber einige chem. Vorgänge bei der Keimung von Pisum sativum, 1872.

IV. Die Nebenproducte des pflanzlichen Stoffwechsels.

130. Die organischen Säuren der Pflanzen.

Die organischen Säuren in den Pflanzen sind nicht als Assimilationsproducte anzusehen, sondern sie entstehen, wie unter 131 noch specieller gezeigt werden soll, meistens durch Oxydationsprocesse aus Kohlehydraten. Entweder sind die in den Pflanzen vorkommenden organischen Säuren (Oxal-, Citronen-, Apfelsäure etc.) in freier Form in den Zellsäften vorhanden, oder sie treten, wie wohl meistens, in Verbindung mit Basen in sauren resp. neutralen, leicht löslichen oder sehr schwer löslichen Salzen in den Zellen auf. Die Säfte des Parenchyms enthalten ganz allgemein mehr oder minder bedeutende Quantitäten freier organischer Säuren oder saurer Salze derselben, und man kann sich sehr leicht von dieser Thatsache überzeugen, wenn man die frische Schnittfläche irgend eines beliebigen Pflanzentheiles mit blauem Lackmuspapier in Contact bringt. Die eintretende Röthung des Papiers zeigt die Gegenwart der Säure an. In zahlreichen Fällen lässt sich der saure Charakter der Pflanzensäfte schon durch den Geschmackssinn wahrnehmen.

Den freien Säuren sowie ihren sauren Salzen kommen mannigfaltige Functionen in den Zellen zu, die wir zum Theil schon erwähnt. Die Säuren erhöhen die Turgorkraft des Zellinhaltes ganz wesentlich, sie beschleunigen den Verlauf des Processes der Stärkeumbildung durch Diastase, sie dienen manchen Pflanzen als Schutzmittel gegen den Angriff schädlicher Thiere, sie zersetzen die aus dem Boden mit Hilfe der Wurzeln aufgenommenen Nitrate, ein Vorgang, der für die Eiweissbildung von grosser Wichtigkeit ist, sie binden den seitens der Pflanzen im Uebermaass aufgenommenen Kalk und sie zersetzen die Chloride im vegetabilischen Organismus unter Freimachung von Salzsäure.

Eine sehr grosse Verbreitung besitzt die Oxalsäure im Pflanzenreich. Sie kommt im freien Zustande und in sauren Salzen, die im Zellsaft löslich sind, zudem aber ungemein häufig in Verbindung mit Kalk vor. Die Krystalle des oxalsauren Kalkes trifft man in besonderen Zellen an, und wir haben schon einmal auf ihr Vorkommen hingewiesen (vgl. unter 24). Hier mögen fernere Beispiele Erwähnung finden.

Wir stellen einen Längsschnitt rechtwinklig zur Blattfläche aus dem Blatt von *Aloë arborescens* her. Die Epidermis, das grüne Parenchym und das chlorophyllfreie Wassergewebe sind bei mikroskopischer Untersuchung leicht zu erkennen. In dem grünen Gewebe sehen wir überdies parallel zur Längsaxe des Blattes gestreckte, schlauchförmige Zellen, die mit grossen Mengen nadelförmiger Krystalle von oxalsaurem Kalk dicht angefüllt sind. Diese Rhaphidenbündel ruhen in einem schleimigen Inhalt der Zellen, und bei der Herstellung der Schnitte treten häufig, wenn ein Rhaphidenschlauch zufällig geöffnet wird, diese Schleimmassen mit den Rhaphiden aus den Zellen hervor, so dass man sie ausserhalb des Untersuchungsobjectes in der dasselbe umgebenden Flüssigkeit beobachtet. Behandelt man die Schnitte mit

Kalilauge oder Essigsäure, so lösen sich die Rhaphiden nicht auf. Wir stellen ferner Querschnitte aus dem Blatt von *Beta vulgaris* her. Bei mikroskopischer Untersuchung sieht man die Epidermis der Blattober- und -unterseite, das wenig ausgeprägte Palissadenparenchym und das an Intercellularen reiche Schwammparenchym deutlich. In dem letzteren liegen die sog. Körnchenschläuche, Zellen, welche mit kleinen Krystallen von Kalkoxalat dicht angefüllt sind. Wir stellen auch noch einen Querschnitt aus einem etwa 5 mm dicken Zweige von *Tilia parvifolia* her. Das Querschnittsbild ist bereits unter 42 beschrieben worden; hier verdient nur die Thatsache Beachtung, dass im äusseren Theil der Markstrahlen sowie im Gewebe der primären Rinde viele Zellen vorhanden sind, die Krystalldrusen von Kalkoxalat enthalten.

Einige Pflanzen, zumal die Crassulaceen (z. B. *Sempervivum*, *Echeveria*, *Bryophyllum*), sind dadurch ausgezeichnet, dass ihre Säfte sehr bedeutende Mengen Aepfelsäure enthalten, die, wie KRAUS¹⁾ specieller nachwies, zum grössten Theil an Kalk gebunden ist. Das im Zellsaft lösliche Malat macht zuweilen 50 Proc. der Trockensubstanz des Saftes der Blätter der genannten Pflanzen aus. Wir zerreiben einige *Bryophyllum*-blätter im Mörser, bringen den Brei auf ein trockenes Filter und bestimmen in einem kleinen Theil des gewonnenen Saftes den Trockensubstanzgehalt desselben, während die grössere Saftmenge mit der 4—5-fachen Menge 96-proc. Alkohols vermischt wird. Es scheidet sich das Malat in Form eines weissen, pulverigen Niederschlages ab, den man abfiltriren, auswaschen, trocknen und wägen kann.

Es kommt heute in der Pflanzenphysiologie sehr oft darauf an, die Acidität von Pflanzensäften, d. h. den Gehalt derselben an titirbarer Säure, festzustellen, Je nach Umständen werden verschiedene Methoden zur Anwendung kommen müssen, und wir wollen hier auf dieselben eingehen. In erster Linie ist es wichtig, die Säfte oder Extrakte aus den Pflanzen zu gewinnen, in denen die Säuremenge bestimmt werden soll. Handelt es sich bei vergleichenden Untersuchungen nur um die Ermittlung relativer Werthe für die Acidität, so werden die Untersuchungsobjecte, wenn sie, wie z. B. Rheumblattstiele, sehr wasserreich sind, auf dem Reibeisen zerrieben, oder man zerquetscht die in Stücke zerschnittenen wasserärmeren Pflanzentheile möglichst vollständig in einem Porzellanmörser. Die breiigen Massen presst man im Colirtuch unter Anwendung möglichst gleichartigen Druckes mit den Händen oder unter Zuhülfenahme einer Presse aus, um den erhaltenen Saft schliesslich durch Filtration zu klären. Unter Umständen ist es auch zweckmässig, die zerquetschten Pflanzenmassen mit wenig Wasser auszulaugen und die erhaltenen Flüssigkeiten zu filtriren. Handelt es sich darum, absolute Werthe für die Acidität der Pflanzentheile zu gewinnen, so werden dieselben, nachdem sie gewogen worden sind, zerquetscht, der Brei mit etwas Wasser in dickwandigen Gläsern 1 Stunde lang bei 80 bis höchstens 90° C. im Wasserbade erwärmt, um Kohlensäure auszutreiben, dann auf ein Filter gebracht und mit möglichst wenig heissem Wasser ausgewaschen (vgl. unter 60). Bei Untersuchungen über das Verhalten der freien

1) Vgl. G. KRAUS, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, Bd. 16.

organischen Säuren im Organismus der Crassulaceen (vgl. unter 131) verfährt man am besten derartig, dass man die als Untersuchungs-objecte dienenden Blätter nach dem Wägen im Mörser zerquetscht, den Brei mit der erforderlichen, aber möglichst geringen Spülwassermenge in dickwandigen Gläsern 1 Stunde lang bei 80 bis höchstens 90° C. im Wasserbade erhitzt, um ihn dann wieder mit etwas Spülwasser in den Mörser zurückzubringen und nach dem Abkühlen direct zu titiren.

Zum Titiren der Säfte, Extracte oder der breiartigen Massen verwendet man verdünnte Kali- oder Natronlauge. Man löst in 1000 ccm Wasser 1 g Aetzkali oder Aetznatron auf, fügt Barytwasser in geringem Ueberschuss hinzu und dann Natriumsulfat, um den Barytüberschuss wieder zu beseitigen. Die klare und nun kohlensäurefreie Lauge darf mit Schwefelsäure keinen Niederschlag geben. Zum Einfüllen der Lauge in die Bürette wird eine ähnliche Vorrichtung verwandt, wie eine solche in Fig. 98 dargestellt ist. Die Kali- oder Natronlauge lässt man beim Titiren aus der Bürette zu den säurehaltigen Säften, Extracten oder zu dem Brei fliessen und benutzt, wenn man es mit sehr klaren Säften zu thun hat, 3–5 Tropfen einer verdünnten, alkoholischen Lösung von Phenolphthalein als Indicator. In anderen Fällen, zumal beim Titiren von breiartigen Massen, muss man Curcumpapier verwenden. Bei vergleichenden Untersuchungen ist es gar nicht erforderlich, den Titer der Natron- oder Kalilauge festzustellen. Soll dies übrigens geschehen, so stellt man sich eine Normallösung einer Säure her, d. h. eine Lösung, die in 1000 ccm 1 Aequiv. einer einbasischen Säure in g ausgedrückt, enthält. Bei Benutzung von Oxalsäure ($C_2H_2O_4 + H_2O = 126$) müssen 63 g reiner Säure in 1000 ccm Wasser aufgelöst werden. Mit dieser Lösung ist der Titer der Kali- oder Natronlauge leicht zu ermitteln¹⁾.

131. Das Verhalten der freien organischen Säuren im Organismus der Crassulaceen und einiger anderer Pflanzen.

Zahlreiche Crassulaceen und andere Pflanzen, zumal succulente Gewächse, zeigen bezüglich des Gehalts ihrer Säfte an organischen Säuren (wir haben es in diesen Fällen namentlich mit Aepfelsäure zu thun) die höchst merkwürdige Erscheinung, dass derselbe am Tage viel geringer als in der Nacht ist. Die bezüglichen, äusserst verwickelten Verhältnisse sind noch keineswegs nach allen Richtungen hin gründlich untersucht worden. Aber einige Thatsachen stehen doch fest, und diese sollen weiter unten experimentell constatirt werden, nachdem ich zunächst in aller Kürze die Anschauungen mittheilen will, welche ich mir auf Grund der vorliegenden Untersuchungen über das Verhalten der organischen Säuren in den Crassulaceen gebildet habe²⁾. Im Gewebe (zumal dem Blattgewebe) der Crassulaceen sowie

1) Ueber Titrimethoden vergl. MOHR, Lehrbuch d. analytisch-chem. Titrir-methode.

2) Literatur: A. MAYER, Landwirthschaftliche Versuchsstationen, Bd. 18 und Bd. 21; DETMER, PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 12, und Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, 1883; H. DE VRIES, Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Akademi. van Wetenschappen, 1884; G. KRAUS, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, Bd. 16; WARBURG, Untersuchungen aus dem botan. Institut zu

einiger anderer Pflanzen laufen continuirlich und unter allen Umständen zwei Processe neben einander her, die für die Aciditätsverhältnisse ihrer Säfte von hervorragender Bedeutung erscheinen. Einerseits erfolgt stets Säureproduction, andererseits wird immer Säure zersetzt. Der momentane Säuregehalt ist also die Resultirende aus diesen beiden Processen ¹⁾.

Es ist von grosser Wichtigkeit, dass sich in den Zellen der Crassulaceen unter bestimmten Umständen sehr schnell erhebliche Mengen freier Säure anhäufen können, eine Thatsache, die ohne Zweifel biologische Bedeutung für diese Organismen besitzt. Dieselben wachsen nämlich der Regel nach an trockenen und oft sehr kalkreichen Standorten; sie bedürfen daher bestimmter Mittel, durch welche die osmotische Leistungsfähigkeit ihres Zellinhaltes für den Zweck reichlicher Wasseransammlung in ihrem Gewebe erhöht und zugleich eine Bindung des ihren Zellen im Uebermaass aus dem Boden zugeführten Kalkes ermöglicht wird. Die organischen Säuren leisten beides.

Die Säuren bilden sich aus Kohlehydraten unter dem Einfluss des Sauerstoffes. Sie entstehen durch Oxydation der Assimilationsproducte. Dass sich gerade im Gewebe succulenter Pflanzen so erhebliche Säuremengen ansammeln, hängt mit der Organisation dieser Gewächse zusammen. Die Succulenten können nämlich in Folge des Besitzes einer dicken Cuticula, relativ weniger Spaltöffnungen und fleischiger Gewebe einen nur recht beschränkten Gaswechsel mit der Aussenwelt unterhalten. Sauerstoff steht ihren Zellen nicht in überreicher Menge zur Disposition, und die Verbrennung der Kohlehydrate ist daher nur eine unvollständige. Sie geht wenigstens unter bestimmten Umständen nicht bis zur Erzeugung von Kohlensäure und Wasser, sondern es werden erhebliche Quantitäten organischer Säuren als unvollständige Verbrennungsproducte angehäuft.

Der Process der Säurezersetzung, welcher continuirlich neben dem Vorgange der Säurebildung im Gewebe der Crassulaceen verläuft, ist bezüglich der Energie, mit der er erfolgt, in hohem Grade abhängig von den Temperatur-, sowie den Beleuchtungsverhältnissen. Höhere Temperatur und Lichtzutritt beschleunigen die Säurezersetzung sehr erheblich. Danach muss eine Abnahme der Acidität des Crassulaceengewebes erfolgen, wenn die Pflanzen im Dunkeln hoher Temperatur ausgesetzt, oder wenn sie dem Lichteinfluss exponirt werden. Im Dunkeln — zumal bei niedriger Temperatur — steigt die Acidität des Crassulaceensaftes hingegen. Und in der That wissen wir, dass die Acidität des Crassulaceensaftes einem täglichen periodischen Wechsel unterworfen ist; am Tage reagirt der Saft schwach, in der Nacht stark sauer.

Das Wesen der Säurezersetzung ist auf jeden Fall in einem mit Kohlensäureproduction verbundenen Oxydationsprocesse zu suchen. Die durch Oxydation gebildete Säure wird vollkommen verbrannt, und es handelt sich hier namentlich noch um die Frage, wie es kommt, dass

Tübingen, Bd. 2. Die Ansichten, welche ich in meinen citirten Schriften über unseren Gegenstand ausgesprochen habe, sind wesentlich verschieden von den hier von mir vertretenen.

1) Abgesehen von der Zersetzung freier organischer Säuren im Gewebe der Crassulaceen findet in demselben noch continuirlich eine Bindung der Säure durch Basen statt (KRAUS). Dadurch häufen sich allmählich grosse Mengen gewisser Salze in den Zellen an, und die Entstehung dieser Verbindungen, die wir hier indessen nicht weiter berücksichtigen, ist natürlich ebenfalls nicht ohne Bedeutung für die Aciditätsverhältnisse des Crassulaceensaftes.

die Lichtstrahlen beschleunigend auf diesen Vorgang einwirken. Es wurde schon erwähnt, dass die Crassulaceen aus verschiedenen Gründen einen nur beschränkten Gaswechsel unterhalten können. Dieser Umstand ist für das Zustandekommen einer beträchtlichen Säureansammlung von maassgebender Bedeutung. Im Dunkeln herrscht offenbar Sauerstoffmangel im Crassulaceengewebe; Lichtzutritt steigert dagegen die Sauerstoffquantität im Gewebe wesentlich, denn bei dem Processe der Assimilation wird Sauerstoff frei. Die assimilirenden Chlorophyllkörper sind nicht direct an dem Säurezersetzungsprocesse theilhaft, wohl aber indirect, indem sie zur Entstehung reichlicherer Sauerstoffmengen im Gewebe der Crassulaceen Veranlassung geben, die nun ihrerseits eine vollständige Verbrennung der Säure bewirken. Die dabei entstehende Kohlensäure kann in den Chlorophyllkörpern wieder verarbeitet werden, und der in Freiheit gesetzte Sauerstoff ist aufs Neue im Stande, die Säurezerstörung zu beschleunigen.

Die angeführten Verhältnisse sind in allererster Linie für die gesteigerte Säurezerstörung von Bedeutung; durch sie allein kann die Beschleunigung der Säurezerstörung unter dem Einflusse des Lichtes zur Geltung kommen. Aber es ist mir wahrscheinlich, dass die Lichtstrahlen hierbei auch noch in directer Weise theilhaft sind. Wir werden unten Experimente kennen lernen, deren Resultate zeigen, dass Lichtzutritt die Oxydation organischer Säuren ausserhalb des Organismus begünstigt. Eine directe Beeinflussung des Säurezerstörungsprocesses in den Zellen der Pflanzen durch Lichtstrahlen erscheint daher sehr wohl möglich.

Man weiss, dass Theile succulenter Pflanzen, die einige Zeit (z. B. eine Nacht lang) in einer beschränkten Luftmenge verweilen, das Volumen derselben vermindern. Es wird eben Sauerstoff bei der Bildung organischer Säuren gebunden. Dieselben Pflanzentheile vergrössern dagegen das sie umgebende Luftvolumen am Tage, indem sie Sauerstoff expiriren. Dieser Sauerstoff wird aber nicht direct aus den Molekülen der sich zersetzenden organischen Säuren abgespalten, sondern er ist ein Product wirklicher assimilatorischer Thätigkeit der Chlorophyllkörper. Die erforderliche Kohlensäure liefern freilich in der oben erörterten Weise die sich zersetzenden organischen Säuren.

Wir kommen nunmehr dazu, Anleitung zu Experimenten zu geben, deren Resultate uns über das Verhalten organischer Säuren im Organismus der Crassulaceen orientiren können.

Als Beobachtungsobjecte verwendet man in Töpfen gezogene, unter günstigen äusseren Verhältnissen kräftig entwickelte Exemplare von *Bryophyllum calycinum*, *Echeveria metallica* oder *Rochea falcata* (die letztere Pflanze ist besonders geeignet). Bei vergleichenden Untersuchungen über die Säureansammlung, resp. Säureabnahme im Gewebe der Blätter benutzt man entweder die beiden opponirten Glieder eines Blattpaares (z. B. *Rochea*), oder man experimentirt nur mit einem Blatt (z. B. *Echeveria metallica*) und theilt dasselbe der Länge nach in zwei möglichst gleiche Theile. Die von der Pflanze abgetrennten Untersuchungsobjecte werden sofort gewogen. Wenn es sich darum handelt, ihren Gehalt an freier Säure nicht sofort, sondern erst nach Verlauf einiger Zeit zu bestimmen, so gelangen die Blätter z. B. auf durchfeuchtetes Fliesspapier unter Glasglocken. Den Säuregehalt der Blätter ermittelt man durch Titriren. Die beim Titriren verbrauchte Menge an Kalilauge giebt ein unmittelbares Maass für die Acidität des Zellsaftes der Untersuchungsobjecte (vgl. die Methode unter 130).

Wir führen zunächst die folgenden Versuche aus. Gegen Abend, etwa um 5 oder 6 Uhr, wird ein Blattpaar von *Rochea* abgeschnitten, nachdem die Pflanze den Tag über dem directen Sonnenlicht ausgesetzt gewesen war. Experimentirt man mit *Bryophyllum*, so entnimmt man der Pflanze einige Blattpaare, und bei Versuchen mit *Echeveria* verwendet man nur eins der grossen Blätter. Die Hälfte der Untersuchungsobjecte wird sofort acidimetrisch geprüft; der andere Theil am nächsten Morgen, nachdem die Blätter bis dahin bei völligem Lichtabschluss in feuchter Luft unter einer Glasglocke verweilt haben. Ich fand z. B., dass die beiden Blätter eines Blattpaares von *Rochea falcata* 12,6 (*a*) und 13,6 g (*b*) wogen. *a* wurde nach dem Abschneiden sogleich am Abend untersucht, *b* erst am nächsten Morgen. Der Brei von *a* bedurfte 2,6, derjenige von *b* 12,5 ccm verdünnter Kalilauge zur Neutralisation. Auf je 10 g Blattsubstanz bezogen, erhalten wir für *a* 2,1, für *b* 9,2 ccm Kalilauge, Differenz 7,1 ccm. Man kann auch derartig verfahren, dass man nur ein Blatt der Pflanze am Abend abschneidet, um dasselbe sogleich auf seinen Säuregehalt zu prüfen, während man das zweite erst am nächsten Morgen von der Pflanze entfernt, nachdem dieselbe bis dahin bei völligem Lichtabschluss verweilt hat. Die Experimente ergeben stets eine erheblich höhere Acidität für den Saft derjenigen Blätter, die einige Zeit im Dunkeln verweilt haben.

Will man sich noch sicherer davon überzeugen, dass die Acidität des Saftes der Crassulaceen durch Lichtzutritt vermindert, im Dunkeln aber erhöht wird, so ist es erforderlich, das folgende Experiment auszuführen. Es werden zwei opponirte Blätter eines Exemplars von *Rochea* früh am Morgen abgeschnitten. Das eine Blatt wird der Länge nach halbiert, um in der einen Blatthälfte, nachdem man dieselbe gewogen hat, sofort die Acidität des Zellsaftes durch Titriren festzustellen. Die zweite Blatthälfte hängt man im dampfgesättigten Raum unter einer Glasglocke auf und verdunkelt durch Ueberdecken mit einem Pappeylinder. Das zweite Blatt wird im dampfgesättigten Raum unter einer Glasglocke bei Zutritt recht hellen, diffusen Tageslichtes aufgehängt und dafür Sorge getragen, dass auch die Rückseite des Blattes durch einen in geeigneter Weise aufgestellten Spiegel reflectirtes Licht empfängt. Bei dieser Versuchsanordnung sind die Untersuchungsobjecte nahezu den gleichen Temperaturverhältnissen ausgesetzt, und es ist daher eine Wärmeentsäuerung möglichst ausgeschlossen. Prüft man Abends die Acidität der Blatthälfte sowie des Blattes, so findet man jene (natürlich bezogen auf gleiche Gewichtsmengen frischer Blattsubstanz) säurereicher als dieses. Von dem bedeutsamen Einflusse der Temperaturverhältnisse auf den Process der Säurezersetzung in den Crassulaceenblättern kann man sich leicht überzeugen, wenn man Exemplaren von *Bryophyllum*, *Rochea* oder *Echeveria*, die seither normalen Lebensbedingungen ausgesetzt waren, am frühen Morgen einige säurereiche Blätter entnimmt, um in einem Theil derselben sofort die Acidität des Saftes festzustellen, während die übrigen erst auf ihren Gehalt an freier Säure untersucht werden, nachdem sie bei völligem Lichtabschluss etwa 12 Stunden lang theils bei niederer Temperatur (z. B. 12—16° C.), theils in einem Thermostaten bei 30° C. verweilt haben. Es wird sich ergeben, dass der Einfluss der hohen Temperatur trotz des Lichtausschlusses eine starke Entsäuerung herbeiführt hat.

Wir entnehmen einem Exemplar von *Rochea* (man kann auch mit *Echeveria* oder *Bryophyllum* experimentiren) gegen Abend ein Blattpaar. Das eine Blatt wird sogleich auf seinen Gehalt an freier Säure untersucht, das andere Blatt halbirt man der Länge nach. Jedes der Blattstücke wird nach dem Wägen in kleine Stücke von etwa 1 cm Länge zerschnitten, um diese Stücke in retortenartige Gefässe zu bringen, die mit ausgekochtem und wieder völlig abgekühltem, destillirtem Wasser angefüllt sind. Das Wasser der einen Retorte wird durch Luft, dasjenige der anderen durch reinen Wasserstoff verdrängt (Methode vergl. unter 10). Am nächsten Morgen bestimmt man den Säuregehalt der Untersuchungsobjecte, und es wird sich zeigen, dass die Blattstücke in der Luft viel freie Säure entwickelt haben, während im Wasserstoffgas höchstens geringe Quantitäten freier Säure gebildet worden sind. Es ist demnach freier Sauerstoff für die ausgiebige Säureproduction erforderlich.

Es ist schon erwähnt worden, dass Lichtzutritt die Zersetzung organischer Säuren ausserhalb des Organismus zu beschleunigen vermag, eine Thatsache, welche, wie ich bereits bemerkte, wohl sicher mit Rücksicht auf die uns hier beschäftigenden Fragen Interesse beansprucht. Den Einfluss des Lichtes auf die Säurezersetzung kann man leicht (auch in der Vorlesung) demonstrieren, wenn man zu einer Lösung von 0,2 Aequiv. Oxalsäure, mit der ein Reagensglas völlig angefüllt ist, etwas frisch bereitetes Eisenoxydhydrat (hergestellt durch Vermischen einer Eisenchloridlösung mit Ammoniak und sorgfältiges Auswaschen des Niederschlages) bringt und die nach einiger Zeit intensiv gelb gefärbte Flüssigkeit in dem Probirrohr nunmehr über Quecksilber dem directen Sonnenlicht aussetzt. Es beginnt sogleich Gasentwicklung. Das Gas (Kohlensäure) sammelt sich im oberen Theile des Apparates an, während sich die Flüssigkeit unter Abscheidung eines Niederschlages von oxalsaurem Eisenoxydul entfärbt. Es ist nicht unmöglich, dass der Oxydationsprocess organischer Säuren in der Pflanze ebenfalls durch den directen Einfluss der Lichtstrahlen wesentlich gefördert wird.

Endlich wollen wir noch Experimente anstellen, welche lehren, dass succulente Pflanzentheile, wie schon erwähnt wurde, in der That relativ viel Sauerstoff aufnehmen, wenn in ihren Zellen Säureanhäufung erfolgt. Für Demonstrationszwecke in Vorlesungen genügt es vollkommen, wenn man das Experiment in folgender Weise ausführt. Wir entnehmen einem Exemplar von *Rochea falcata* am Abend eines heissen Sommertages ein Blatt (bei meinen Versuchen besass dasselbe ein Gewicht von 24 g), zerschneiden dasselbe in Stücke und bringen diese in den oberen, bauchig erweiterten Theil des unter 10 in Fig. 11 abgebildeten Eudiometers. Wir tauchen den unteren Theil des Steigrohres in Wasser, verschliessen den Apparat und stellen ihn im Dunkeln auf. Nach Verlauf längerer Zeit (z. B. 12 Stunden) stellen wir fest, dass das Wasser sich beträchtlich im Steigrohr erhoben hat, während dies nicht bei Parallelversuchen der Fall ist, in denen wir in ein zweites Eudiometer junge Stengeltheile nicht succulenter Pflanzen (z. B. *Helianthus*) eingeführt haben. Die Rocheablattstücke unterhalten eben nicht nur normale Athmung, sondern zugleich Vinculationsathmung. Es wird Sauerstoff ohne entsprechende Kohlensäureproduction zur Ueberführung von Kohlehydraten in organische Säuren von ihnen absorbirt.

Bei genauen quantitativen Untersuchungen über die Sauerstoffinspiration der Succulenten muss man natürlich Quecksilber als Sperrflüssigkeit des Eudiometers benutzen und die Versuche überhaupt in einer Weise ausführen, die sich nach demjenigen, was unter 13 angeführt worden ist, von selbst ergibt.

132. Die Gummiarten und die Pflanzenschleime.

Das arabische Gummi (Stammpflanzen: verschiedene Acaciaarten) besteht der Hauptsache nach aus Arabinsäure. Wenn man etwas arabisches Gummi in einem Uhrsälchen mit Jodjodkaliumlösung behandelt und dann Schwefelsäure hinzufügt, so nimmt die Masse nur eine braune Färbung an. Alle echten Gummiarten verhalten sich so, während sich die Pflanzenschleime bei der Behandlung mit Jod und Schwefelsäure violett oder blau färben. Das Traganthgummi entsteht nach den Untersuchungen von MOHL durch Desorganisation der Mark- und Markstrahlzellen verschiedener Astragalusarten. Das Traganthgummi stellt keine homogene Masse dar, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man das käufliche und gepulverte Material mit viel Wasser behandelt. Es entsteht eine Lösung, die beim Eindampfen eine farblose, glasartige Masse, das eigentliche Traganthgummi, zurücklässt, und es bildet sich ein Bodensatz, der, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, aus Amylumkörnern sowie Zellhautfragmenten besteht. Der Gehalt der einzelnen Traganthsorten an Zellmembranen, die nicht völlig in Gummi umgewandelt sind, ist ein verschiedener.

Gummibehälter der Pflanzen lassen sich leicht nachweisen, wenn man Schnitte aus etwa 5 mm dicken Zweigen von *Tilia parvifolia* untersucht. Die luftführenden Markzellen sind gross; sie sind rosettenförmig um einzelne kleinere Zellen gruppiert, welche Gerbstoff, Stärke oder Krystalldrusen enthalten. Die Gummibehälter, als Höhlungen auftretend, liegen in den äusseren Theilen des Markes. Die Peripherie des Markes, in welche die primären Holztheile hineinragen, wird von einem kleinzelligen Parenchym gebildet, dessen Elemente Gerbstoff oder Stärke führen.

Untersucht man einen Querschnitt aus einer Knolle von *Orchis macula* oder *O. Morio* mikroskopisch, so zeigt sich, dass das Parenchym, in welchem die Gefässbündel zerstreut liegen, aus kleinen, stärkeführenden Zellen und grossen Zellen besteht, die sehr schleimreich sind. Zieht man pulverisirte Orchideenknollen mit kaltem Wasser aus oder behandelt man den käuflichen Salep mit kaltem Wasser, so erhält man nach dem Filtriren eine klare Flüssigkeit, in der sich auf Alkoholzusatz weisse, flockige Massen des in Weingeist unlöslichen Orchideenschleims abscheiden. Dampft man die auf die angegebene Weise gewonnene Schleimlösung ein und behandelt den Rückstand mit Jodjodkalium und Schwefelsäure, so färbt er sich violett bis blau. Die schleimigen Massen in Orchideenknollen repräsentiren also kein Gummi, sondern echten Pflanzenschleim¹⁾.

133. Die Gerbsäuren.

Die Gerbsäuren scheinen zumal als Schutzmittel der Pflanzen gegen den Angriff von Thieren und als antiseptisch wirkende Sub-

¹⁾ Die Literatur über Gummiarten und Pflanzenschleime findet man zusammengestellt bei SACHSSE, Die Chemie und Physiologie der Farbstoffe, Kohlehydrate etc., Leipzig 1877, S. 161.

stanzen zu dienen. Damit hängt es auch wohl zusammen, dass in sehr vielen Fällen gerade die peripherisch gelegenen Pflanzengewebe besonders gerbsäurereich sind. Das beste Reagens auf Gerbsäuren ist das zweifach-chromsaure Kali¹⁾, und wir wollen mit Hülfe desselben z. B. untersuchen, welche Gewebe der Zweige von *Corylus Avellana* Gerbsäure enthalten. Zur Orientirung stellen wir uns zunächst einen Querschnitt aus einem etwa 4 mm dicken Zweige her. Auf das Periderm folgt Collenchym, dann Rindenparenchym, ferner ein Ring, der aus stark verdickten Sklerenchymzellen besteht, ferner der Bast mit eingestreuten Bastfasern und endlich das Holz. Lassen wir der Länge nach halbirte Zweigstücke von *Corylus* (ich untersuchte 4 mm dicke Zweige im November) einige Tage in einer 10-proc. Lösung von zweifach-chromsaurem Kali liegen und untersuchen dann feine Querschnitte mikroskopisch, so ist das Vorhandensein von Gerbsäure in gewissen Geweben (namentlich in der Rinde, dem Bastparenchym und den meist einschichtigen Holzmarkstrahlen) leicht zu constatiren, denn der Inhalt der gerbsäureführenden Zellen hat sich rothbraun gefärbt.

Bei der Untersuchung des Längsschnittes aus dem Mark eines diesjährigen Rosenzweiges sehen wir, dass dasselbe einerseits aus grossen Zellen besteht, sowie ferner aus der Länge nach verlaufenden und unter einander verbundenen Zellenzügen, die das grosszellige Gewebe durchsetzen. Untersuchen wir Schnitte aus dem Rosenmark, welche auf dem Objectträger in einen Tropfen einer 10-proc. wässrigen Lösung von zweifach-chromsaurem Kali gebracht worden sind, so zeigt sich, dass der Inhalt der meisten schmalen Zellen rothbraun gefärbt erscheint. Die Gegenwart von Gerbsäure in den schmalen Zellen kann man ebenso feststellen, wenn man Schnitte des Rosenmarkes in einen Tropfen wässriger Eisenchloridlösung oder in einen Tropfen der Lösung des schwefelsauren Eisenoxyds legt. Der Inhalt der gerbsäureführenden Zellen färbt sich dann dunkelblau. Auch die Blätter der Rosen sind sehr gerbsäurereich, und um diese Thatsache z. B. in der Vorlesung zu demonstrieren, presst man ein auf Fliesspapier liegendes, zusammengefaltetes Blatt stark mit den Fingern aus, so dass der aus den Zellen austretende Saft von dem Papier festgehalten werden kann. Auf Betupfen der feuchten Papierstellen mit Eisenchloridlösung tritt die Gerbsäurereaction sofort hervor.

Neuerdings hat man sich mehrfach bemüht, quantitativ chemische Untersuchungen über das Auftreten des Gerbstoffs in den Pflanzen anzustellen, um zu einem näheren Verständniss derjenigen Processe zu gelangen, welche die Entstehung der Gerbstoffe im Organismus vermitteln. Bei diesen Untersuchungen und ebenso bei den mit Hülfe mikrochemischer Methoden durchgeführten Studien über die genetischen Beziehungen der Gerbstoffe darf freilich nicht vergessen werden, dass diejenigen Körper, welche man als „Gerbstoff“ bezeichnet, recht verschiedener chemischer Natur sein können, und daher sämtliche Arbeiten nach der bezeichneten Richtung hin noch immer einen provisorischen Charakter tragen müssen. Die erwähnten Untersuchungen verdienen aber dennoch, wie ein näheres Studium derselben lehrt, hohe Beachtung, und wir dürfen sie hier nicht ausser Acht lassen.

Bei quantitativen Gerbstoffbestimmungen verwendet man bei 100° C.

1) Vgl. SANIO, Botan. Zeitung, 1863, S. 17.

getrocknetes Untersuchungsmaterial, wenn man es mit Rinden, Hölzern oder massigen Rhizomen zu thun hat. Die Substanz wird auf geeigneten Mühlen¹⁾ feinstens zermahlen. Ebenso benutzt man Trockensubstanz bei der Untersuchung, wenn man mit weichen Rhizomen oder Wurzeln, mit Blättern, Samen oder Keimlingen experimentiren will. Die Substanz wird in diesen Fällen in Wasser aufgeweicht, um sie alsdann in der Reibschale feinstens zu zerkleinern²⁾).

Zur Extraction des Gerbstoffs verwendet man sehr zweckmässig den in Fig. 114 dargestellten Extractionsapparat, welcher vom Zinngiesser C. Focke in Dresden (Grosse Kirchgasse 3) in vorzüglicher Ausführung geliefert wird. Der aus Zinn gefertigte Apparat besteht aus einem mit Ausguss versehenen Kochcylinder von 12,5 cm Höhe und 7 cm Durchmesser im Lichten, mit einer am Stempel befindlichen Siebplatte zum Abpressen. Beim Gebrauch wird eine dünne Gaze über die Siebplatte gebunden, was mit besonderer Sorgfalt geschehen muss. 2–5 g des bei 100° C. getrockneten Untersuchungsmaterials werden mit 200 ccm Wasser

Fig. 114. Extractionsapparat für Gerbstoffbestimmungen.

übergossen, um die Flüssigkeit nach 12 Stunden in einen Literkolben zu giessen. Der Rückstand gelangt jetzt in den Extractionsapparat und wird in demselben 4mal je eine halbe Stunde bei Kochhitze, indem man den Kochcylinder in ein Wasserbad setzt, mit 200 ccm Wasser digerirt. Der Extract wird schliesslich filtrirt. Den Gerbstoffgehalt der Auszüge bestimmt man genau nach der Löwenthal - v. Schröder'schen Methode, wie sie in dem in der letzten Anmerkung citirten Commissionsbericht dargelegt ist, durch Titriren mit Chamäleonlösung und indigschwefelsaurem Natron (Carminum coeruleum apt. von Gehe & Co. in Dresden). Die einzelne Dosis von der Gerbstofflösung ist derartig zu wählen, dass der Chamäleonverbrauch für sie nicht viel hinter dem für die Indigodosis (10 ccm) zurückbleibt. Die gefundenen

Cubikcentimeter verbrauchter Chamäleonlösung werden auf sog. Gerbstoffprocente berechnet, unter der Annahme, dass 1 ccm der Lösung 2 mg Tannin entsprechen.

Zu den wichtigsten Thatsachen, die Kraus in seiner citirten Schrift feststellte, gehören diese, dass die Gerbstoffe in grünen Blättern bei Lichtzutritt und bei Gegenwart von Kohlensäure, nicht aber im Dunkeln oder bei Kohlensäureabwesenheit entstehen. Trotzdem sind die Gerbstoffe nicht als Assimilationsproducte anzusehen; sie entstehen vielmehr vermuthlich in Folge von Stoffwechselprocessen als Nebenproducte bei der Synthese der Eiweissstoffe. Manche Pflanzen bilden zudem überhaupt keine Gerbstoffe, und oft werden sie auch in normalerweise gerbstoffführenden Organen, trotzdem sich Kohlehydrate durch Assimilation bilden,

1) Hat man es nicht mit gar zu harten Pflanzentheilen zu thun, so empfiehlt es sich, eine sogen. Excelsiormühle zu benutzen, die im Preise von 30–40 M. von Gruson in Magdeburg-Buckau zu beziehen ist. Zum Zermahlen von Holz etc. sind Mühlen von G. Wenderoth in Cassel zu beziehen.

2) Näheres vgl. bei Kraus, Grundlinien zu einer Physiologie des Gerbstoffs, Leipzig 1889, und Berichte über die Verhandlungen der Commission zur Feststellung einer einheitlichen Methode der Gerbstoffbestimmung, geführt am 10. Nov. 1883 zu Berlin, Verlag von Fischer in Cassel, 1885.

nicht erzeugt. Dies letztere ist z. B. bei relativ schwacher Lichtintensität der Fall.

Wir schneiden im Sommer bei warmer Witterung 6 ausgewachsene Blätter von *Saxifraga crassifolia* ab, trennen von jedem Blatt der Mittelrippe entlang (ohne diese aber zu verletzen) die eine Blatthälfte ab und isoliren aus diesen Hälften Stücke von je etwa 50 qcm Fläche unter Benutzung von Matrizen, die aus Millimeterpapier bestehen. Die Blattstücke werden getrocknet und sofort auf Gerbstoffgehalt untersucht. Die mit der Blattrippe noch versehenen Blatthälften stellt man mit ihrem Stiel in Brunnenwasser, mit dem kleine Gläser angefüllt sind. Diese gelangen in einen Glaskasten, der nach Bedürfniss oben mit einer Glasplatte geschlossen werden kann. So vorbereitet, exponirt man die Untersuchungsobjecte im leichten Schatten, wie ihn z. B. Birken geben, dem Einfluss des Lichtes. Nach Verlauf einiger Tage entnimmt man den Blatthälften ebenso wie den früher abgeschnittenen und zwar an genau entsprechenden Stellen mit Hülfe des Millimeterpapiers für die Trockensubstanz- und Gerbstoffbestimmung geeignete Stücke. Zu ähnlichen Versuchen eignen sich auch die Blätter von *Quercus* und *Viburnum*. Man wird finden, dass die Blätter in Folge des Verweilens am Licht an Trockensubstanz- und an Gerbstoffgehalt zunehmen; dies ist nicht der Fall, wenn die Blätter einige Tage im Finstern gehalten werden. Stellt man Experimente in der soeben angegebenen Weise mit Blättern von *Saxifraga*, aber mit der Modification an, dass die Untersuchungsobjecte dem Licht unter einer grossen Glasglocke in kohlenstoffreicher Atmosphäre ausgesetzt werden, so ergibt sich, dass keine Gerbstoffvermehrung erfolgt. Wir haben demnach bewiesen, dass Gerbstoff in grünen Blättern nur unter dem Einfluss des Lichtes und bei Kohlensäuregegenwart entstehen kann (indirecter Einfluss der Assimilation)¹⁾.

Von 10 Blättern der *Alnus glutinosa*, die man aber nicht von der Pflanze abtrennt, werden Blatthälften am Abend eines warmen Sommertages abgeschnitten, um 150 qcm Blattfläche auf Gerbstoff zu untersuchen. Am nächsten Morgen kommen die übrigen Blatthälften zur Prüfung. Es hat ein Gerbstoffverlust stattgefunden. Die eingehenden Versuche von KRAUS (S. 9 seiner Arbeit) lehren, dass der Gerbstoff keine Zersetzung in den Blättern erfährt, sondern aus denselben auswandert. Er bewegt sich durch die Blattnerven in die Stengel oder Zweige, wandert in der Rinde weiter und wird endlich je nach der Pflanzenart in Rhizomen, dem Holz oder an anderen Orten abgelagert. Dieser in den Blättern gebildete primäre Gerbstoff tritt nicht wieder in den Stoffwechsel ein. Er dient namentlich dazu, die Organe, in denen er abgelagert worden ist, gegen Thierfrass und Fäulniss zu schützen.

Abgesehen von den primären, giebt es nun aber noch sog. secundäre Gerbstoffe, d. h. solche, die sich im Dunkeln in Folge von Stoffwechselprocessen in manchen Pflanzen bilden. Prüft man Samen von *Vicia Faba*, so findet man diese gerbstofffrei. Wenn man dagegen die im Dunkeln erwachsenen Keimlinge von *Vicia* untersucht, so erweisen sie sich recht gerbstoffreich.

1) Dies Resultat ist für die benutzten Untersuchungsobjecte und unter den in unseren Experimenten eingehaltenen Bedingungen sicher richtig. Unter modificirten Umständen gestaltet sich das Ergebniss der Versuche aber etwas anders. Vergl. darüber BÜSGEN, Beobachtungen über das Verhalten des Gerbstoffes in den Pflanzen, Jena 1889, S. 28.

Handelt es sich darum, die Entstehung und das weitere Verhalten der Gerbstoffe mit Hülfe mikrochemischer Methoden näher zu studiren, so geht man am besten, wie folgt, vor. Man injicirt die Untersuchungsobjecte unter der Luftpumpe mit einer 10-proc. Lösung von Kaliumbichromat, lässt sie darin absterben und untersucht sie dann nach sorgsamem Auswaschen sofort oder nach Aufbewahrung in Alkohol. Mit Hülfe dieser Methode kann man z. B. leicht feststellen¹⁾, dass secundärer Gerbstoff in Keimlingen von *Vicia Faba*, die sich im Dunkeln entwickelt haben, in besonders grosser Menge auftritt, in der Epidermis sowie dem subepidermalen Gewebe und in dem die Gefässbündel umgebenden Parenchym. Die Hauptwurzel der *Vicia*-keimlinge führt in der Rinde viel Gerbstoff, ihr Centraleylinder ist fast gerbstofffrei.

Secundären Gerbstoff führen auch die Stengel im Dunkeln erwachsener Keimlinge von *Phaseolus multiflorus*. Der Gerbstoff kommt in besonderen Schläuchen des Siebtheils der Gefässbündel vor. Die Keimwurzel von *Phaseolus* ist gerbstofffrei; ebenso enthält der Embryo ruhender *Phaseolus*samen gar keinen Gerbstoff. Zum Nachweis des Gerbstoffs in den *Phaseolus*keimlingen benutzt man ebenfalls eine Lösung von doppeltchromsaurem Kali oder von Eisenchlorid.

Wir schneiden im Frühjahr Zweige von *Lonicera tatarica* ab, die wir mit ihrer Basis in Wasser stellen. Das Austreiben der Knospen dieser Zweige erfolgt theils im Dunkeln, theils bei Lichtzutritt. Nur in dem Axentheile der jungen Triebe, die sich im Licht entwickelt haben, ist auf mikrochemischem Wege (z. B. in Epidermis und Rindenparenchym) primärer Gerbstoff nachzuweisen. Die im Dunkeln entstandenen Triebe sind gerbstofffrei. Weiteres vergleiche in BÜSGEN'S Abhandlung.

134. Die ätherischen Oele und Harze.

Die ätherischen Oele dürfen in vielen Fällen sicher nicht als Excrete angesehen werden, sondern man muss sie als Secrete, d. h. als Absonderungen, denen physiologische Functionen zukommen (Anlockung für die Uebertragung des Pollens nothwendiger Thiere, Fernhaltung schädlicher Thiere etc.) betrachten. Ebenso sind viele Harze gewiss als Secrete aufzufassen²⁾.

Ätherische Oele sind häufig in Interzellularräumen vorhanden. Untersuchen wir z. B. nicht gar zu dünne Querschnitte aus dem Stengel von *Ruta graveolens*, so sehen wir, dass auf die Epidermis ein hypodermes Gewebe und unter diesem grünes Parenchym folgt. In dem letzteren sind hier und dort mit einer gelblichen, stark lichtbrechenden Flüssigkeit (eben dem ätherischen Oele) angefüllte Lücken vorhanden. Ebenso sind die intercellularen, mit ätherischem Oel angefüllten Secretbehälter leicht zu sehen, wenn man Blattquerschnitte von *Citrus* untersucht. Alkohol löst die ätherischen Oele auf.

Aber nicht nur in Interzellularräumen, sondern auch in Zellen eingeschlossen kommen ätherische Oele in den Pflanzen vor. Derartige

1) Vgl. BÜSGEN, Beobachtungen über das Verhalten des Gerbstoffes in den Pflanzen, Jena 1889.

2) Vgl. H. DE VRIES, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 10.

Secretbehälter, und zwar speciell solche, die nach DE BARY zu der Kategorie der „kurzen Schläuche“ gehören, weil die betreffenden Zellen nahezu isodiametrisch sind, finden wir z. B. bei *Aristolochia Siph.* Bei der Untersuchung des Querschnittes aus einem etwa 4 mm dicken Stengel dieser Pflanze erkennen wir leicht das Mark sowie die Gefässbündel mit ihrem entwickelten Holz- und Basttheil. Jedes Gefässbündel ist nach aussen umrahmt vom parenchymatischen Rindengewebe, und an dieses schliesst sich ein geschlossener Ring von Sklerenchymfasern an, der zwischen den Gefässbündeln etwas nach innen vorspringt. Ausserhalb des erwähnten Ringes folgt grünes Parenchym, dann Collenchym und die Epidermis. In dem Rindenparenchym, welches ausserhalb und innerhalb des Sklerenchymfaserringes liegt, beobachtet man nun bei der Untersuchung von Quer- und auch von Längsschnitten des *Aristolochia*stengels das Vorhandensein zerstreut liegender Zellen, die einen gelblichen, stark lichtbrechenden Inhalt führen. Es sind dies eben die Secretbehälter, um deren Nachweis es uns zu thun war. Gegen Alkannatinctur und Osmiumsäure verhalten sich die ätherischen Oele ebenso wie die Fette. Erhitzt man die Schnitte aber auf dem Objectträger ohne Deckglas 10 Minuten lang im Wärmeschrank bei 130° C., so verschwinden die ätherischen Oele, weil sie flüchtig sind.

Lehrreich ist es auch, die Thatsache festzustellen, dass die Früchte vieler Umbelliferen reich an ätherischem Oel sind, das hier in Inter-cellularräumen angetroffen wird und offenbar als Schutzmittel gegen schädliche Thiere fungirt. Wir stellen z. B. Querschnitte durch die von der Seite zusammengedrückte Frucht von *Carum Carvi* her. Jede der beiden Theilfrüchte ist mit Endosperm Massen ausgefüllt, in deren Mitte der Embryo ruht. Ferner sieht man die fünf Hauptrippen jeder Theilfrucht. Im Gewebe der Fruchtwand erblickt man die Oelstriemen, welche die mit ätherischem Oel erfüllten Inter-cellularräume darstellen.

Handelt es sich darum, Harzgänge kennen zu lernen, so untersucht man zweckmässig sehr zarte Querschnitte der Nadeln von *Pinus sylvestris*. Auf die Epidermis, deren Zellen sehr stark verdickt sind, folgt hypodermales Gewebe. An den beiden Kanten des Blattes ist diese Schicht stärker entwickelt. Die Harzgänge (es ist stets eine ganze Anzahl derselben vorhanden) liegen im grünen Gewebe des Untersuchungsobjectes. Jeder Harzgang ist von einer Schicht dünnwandiger Zellen, dem Epithel, umkleidet, die ohne Zweifel das Material liefern, aus welchem sich das Secret bildet, und ferner wird jeder Harzgang von einer Schicht stark verdickter Sklerenchymfasern umsäumt. Weiter erblickt man das grüne Blattgewebe und das fast chlorophyllfreie Gewebe in der Mitte des Blattes, welches von dem grünen Gewebe durch eine Endodermis abgegrenzt ist. Das fast farblose Grundgewebe der Blattmitte zeigt sich aus dickwandigen und dünnwandigen Elementen zusammengesetzt und schliesst zwei Gefässbündel ein. Aehnlich wie das Blatt von *Pinus sylvestris* ist dasjenige von *Pinus Pinaster* gebaut. Die Nadeln der letzteren Pflanze lassen sich besser als diejenigen der ersteren Pflanze schneiden, und man hat ihnen daher, wenn sie zur Disposition stehen, bei der Untersuchung den Vorzug zu geben.

Ferner ist es sehr leicht, das Vorhandensein von Harzgängen im Stengelgewebe vieler Umbelliferen festzustellen. Wir untersuchen z. B. Querschnitte des Blüthenschafes von *Foeniculum officinale* bei schwacher Vergrösserung. Die Epidermis, das Rindengewebe, der Bast- sowie Holztheil der Gefässbündel und das Mark treten deutlich hervor. Die Harz-

gänge sind den Gefässbündeln vorgelagert. Sie liegen in der Rinde, zwischen den Fibrovasalsträngen und einem Gewebe, das wir sofort als Collenchym erkennen.

135. Die Farbstoffe.

Zahlreiche Pflanzentheile führen Farbstoffe von sehr verschiedenartiger Natur. Es ist hier zunächst zu betonen, dass diese Farbstoffe schon deshalb ein nicht geringes physiologisches Interesse beanspruchen, weil manche derselben uns unmittelbar Aufschluss über die Reaction derjenigen Zellen gewähren, in denen sie angetroffen werden. Im Zellsaft der Haare von den Blattstielen mancher Begoniaspecies sind rothe Farbstoffe gelöst, was auf saure Reaction des Zellsaftes schliessen lässt. Wird ein Haar auf dem Objectträger mit sehr verdünnter Kalilauge behandelt, so geht in der That die rothe Farbe des vorhandenen Pigmentes in eine blaue über; auf Säurezusatz tritt die rothe Farbe aber wieder hervor. Im Zellsaft der Myosotisblumenblattzellen ist blauer Farbstoff gelöst. Die Reaction des Zellsaftes ist hier eine schwach alkalische, denn Säurezusatz färbt das Pigment roth.

Fig. 115. Von der Oberseite des Kelches von *Tropaeolum majus*. Untere Wandung einer Epidermiszelle mit den ihr anliegenden Farbkörpern. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

Wenn wir Staubfädenhaare einer *Tradescantia* mikroskopisch untersuchen, so können wir leicht feststellen, dass in dem Zellsafte ihrer Zellen ein violetter Farbstoff aufgelöst ist. Wir ziehen mit einer Pincette ein Stückchen Epidermis von dem Blumenblatte einer Vincaart und einer rothen Rose ab. Bei mikroskopischer Prüfung finden wir, dass beide Präparate im Zellsaft aufgelöste Pigmente enthalten. In einem Falle ist der Farbstoff aber blau, im anderen rosa. Die blauen, violetten oder rothen, im Zellsaft gelösten Farbstoffe werden als Anthocyan bezeichnet.

Manche Pigmente kommen nicht im gelösten Zustande in den Zellen vor, sondern sie werden, an eine Grundmasse gebunden, in denselben angetroffen. Die mit dem Pigment imprägnirten Farbkörperchen (Chromatophoren) besitzen meistens charakteristische Formen, und wir wählen zunächst nicht gar zu reife, aber doch bereits schön geröthete Hagebutten als Untersuchungsmaterial. Wir stellen Schnitte aus dem Hypanthiumfleisch her. Die Zellen desselben enthalten neben Protoplasma und Kern zugespitzte, orangefarbene Spindeln oder in derselben Weise tingirte dreieckige Gebilde, eben die Farbkörperchen. Die orangerothe Farbe der Wurzeln der Mohrrübe (*Daucus carota*) wird durch Farbkörper hervorgerufen, die man leicht in Form rechteckiger Tafeln oder gestreckter Prismen bei mikroskopischer Untersuchung in den Zellen auffinden kann. Weiter stellen wir Flächenschnitte von der Oberseite der Kelchblätter eben geöffneter Blüten von *Tropaeolum majus* her. In den Zellen, zumal in den Epidermiszellen, sind zahlreiche eckige, gelb gefärbte Farbkörper bei mikroskopischer Untersuchung leicht zu entdecken (vergl. Fig. 115.) Die braunen Streifen an der Oberseite der *Tropaeolum*kelchblätter rühren,

wovon man sich beim Studium geeigneter Schnitte überzeugen wird, daher, dass die betreffenden Epidermiszellen carminrothen Zellsaft enthalten. Die gelben Pigmente der Pflanzen sind fast ausnahmslos an eine protoplasmatische Grundmasse gebunden. Nur selten treffen wir sie im Zellsaft gelöst an. Dies letztere ist z. B. der Fall in den Epidermiszellen der Blumenblätter von *Verbascum nigrum* ¹⁾.

Der in den meisten gelben Blüthen enthaltene Farbstoff ist nicht ohne weiteres im Wasser löslich, wohl aber in Alkohol. Er kann mit Hülfe dieses Lösungsmittels z. B. den Kronenblättern einer gelb blühenden *Ranunculusspecies* leicht entzogen werden. Die meisten rothen Blütenfarbstoffe sind hingegen in Wasser löslich, und wenn man z. B. Blumenblätter einer rothen Rose oder von *Paeonia* in einem Mörser mit Wasser zerquetscht, um die erhaltene Lösung abzufiltriren, so erhält man ein roth gefärbtes Filtrat, das nach meinen Beobachtungen (ich experimentirte mit *Paeonia*) auf Ammoniakzusatz eine blaue Farbe annimmt. Zusatz von Salzsäure stellt die rothe Farbe der Flüssigkeit wieder her. Es kann auch Interesse besitzen, die Extracte aus gelben oder rothen Blüthen spectroscopisch zu untersuchen ²⁾. Dabei sind die unter 7 angegebenen Methoden in Anwendung zu bringen.

Lehrreich ist es auch, sich mit den Farbstoffen, welche das Kernholz mancher Bäume enthält, bekannt zu machen. Wir untersuchen z. B. einen Querschnitt des rothen Sandelholzes (Stammpflanze: *Pterocarpus santalinus*). Die weiten Gefässe lehnen sich an die den Jahresringen parallel laufenden Binden des Holzparenchyms an. Ferner sehen wir die zahlreichen Markstrahlen, deren Zellen eine harzige, tief schwarzrothe Masse enthalten, und die Holzfasern mit stark verdickten Wänden. Alle Elemente des Sandelholzes führen in ihren Membranen Farbstoff, und zwar ist es besonders die rothe Santalsäure, welche in den Membranen vorkommt. Destillirtes Wasser extrahirt aus dem Sandelholz nur Spuren von Farbstoff; mit ammoniakalischem Wasser erhält man aber leicht einen carminrothen Auszug.

Die Elemente des Fernambukholzes (Stammpflanze: *Caesalpinia echinata*) führen in ihren Membranen einen gelblichen Farbstoff, das Brasilin. Behandelt man Fernambukholz mit heissem Wasser, so geht eine ziemliche Quantität dieses Körpers in Lösung, und die Flüssigkeit nimmt auf Ammoniak- oder Kalizusatz eine blutrothe Farbe an ³⁾.

136. Der mikrochemische Nachweis von Alkaloiden und einiger anderer Stoffe in den Pflanzen.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass in den Geweben der verschiedensten Pflanzen Alkaloide, Glycoside oder andere Stoffe vorkommen, über deren physiologische Bedeutung bis jetzt wenig bekannt ist. Manche dieser Körper dienen den Gewächsen ohne Zweifel als Schutzmittel gegen schädliche Thiere, andere (z. B. Glycoside) liefern wohl auch unter bestimmten Umständen in Folge von Zersetzungen, denen sie unterliegen,

1) Bezüglich verschiedener hier erwähnter Verhältnisse vgl. STRASBURGER, Das botanische Praktikum, 1884, S. 59.

2) Vgl. HANSEN, Verhandlungen der Physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg, Neue Folge Bd. 18, No. 7.

3) Ueber den anatomischen Bau des Fernambukholzes vgl. WIESNER, Rohstoffe des Pflanzenreiches, 1873, S. 555.

plastisches Material (Zucker), aber alle diese Verhältnisse sind noch wenig studirt. Ebenso sind die mikrochemischen Reactionen, deren man sich bedient hat, um die Gegenwart wenigstens einiger Alkaloide sowie Glycoside im pflanzlichen Gewebe zu constatiren, zum Theil noch ziemlich unsichere, wovon ich häufiger Gelegenheit hatte mich zu überzeugen. Einige Reactionen mögen hier dennoch Erwähnung finden, und bei der Ausführung derselben wird man finden, dass die fraglichen Körper wenigstens häufiger zumal in den peripherisch gelagerten Geweben der Organe oder in der Umgebung der Gefässbündel angehäuft sind, Beobachtungen, die schon von vornherein auf die Function der betreffenden Substanzen als chemisch wirkende Schutzmittel der Pflanzen gegen Thierfrass hindeuten ¹⁾).

Untersuchen wir einen dünnen Schnitt aus dem hornigen Endosperm des Samens von *Strychnos nux vomica*, so lässt sich leicht feststellen, dass die Zellen ziemlich dickwandig sind. Ihr Inhalt besteht aus Eiweissstoffen, Zucker und fettem Oel. Werden dünne Schnitte aus dem trockenen Samen auf dem Objectträger in einen Tropfen concentrirter Schwefelsäure gebracht, so färbt sich der Zellinhalt in einigen Minuten röthlich. Wir fügen dem in Schwefelsäure liegenden Object nun ein Splitterchen chromsauren Kalis zu, bedecken mit dem Deckglas und beobachten. Der Zellinhalt, zumal derjenige der subtestalen Endospermzellen, färbt sich bald schön violett, während die Membranen ungefärbt bleiben (Strychninreaction) ²⁾).

Bei der Untersuchung von Querschnitten aus dem Stamm oder den Zweigen von *Berberis vulgaris* (man benutze z. B. etwa 6 mm dicke Zweigstücke) unterscheidet man das Rindengewebe ³⁾ und die Gefässbündel leicht. In der Rinde, dem Weichbast sowie den Phloëmstrahlen fallen viele Zellen mit gelbem Inhalt auf, und zwar rührt diese Farbe von der Gegenwart des Berberins her. Auch im peripherischen Theil des Holzkörpers ist Berberin (nämlich als Einlagerung in die Membranen) vorhanden. Bei Behandlung der Schnitte mit Alkohol und sehr verdünnter Salpetersäure (1 Thl. Salpetersäure auf 50 Thl. Wasser) verschwindet die gelbe Farbe der berberinführenden Elemente. Die Anwesenheit grösserer Berberinmengen bedingt nun aber die Abscheidung gelber Krystalle von salpetersaurem Berberin.

Wir stellen feine Quer- oder Längsschnitte aus einer Knolle von *Colchicum autumnale* her. In unmittelbarer Nähe der Gefässbündel gewahrt man Zellen, die eine stark lichtbrechende, gelbliche Flüssigkeit führen, während die Hauptmasse des Parenchyms sehr stärkereich ist. Jene gelblich erscheinenden Zellen führen das Colchicin. Bei Behandlung der Schnitte mit Ammoniak nimmt ihr Inhalt eine intensiv gelbe Farbe an. Die Wurzeln von *Colchicum* enthalten Colchicin in der Epidermis und der Schutzscheide.

Im Stengel von *Aconitum Napellus* findet sich Aconitin in der Gefässbündelscheide und in dem dieser benachbarten Parenchym. Das Aconitin giebt mit Jodjodkalium einen braunrothen Niederschlag und mit Schwefelsäure, die mit $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ ihres Volumens Wassers verdünnt ist, zumal

1) Vgl. ERRERA, Botan. Centralblatt, Bd. 32, S. 71.

2) ROSOLL, Sitzungsber. d. Akadem. d. Wiss. zu Wien, Abthl. I, Bd. 89.

3) Genaue Angaben über den Bau der Berberisstammtheile, zumal auch ihrer Rinde, findet man in einer von BÖXING abgefassten Königsberger Dissertation vom Jahre 1885 über die Anatomie des Stammes der Berberitze.

nach vorheriger Behandlung der Präparate mit Rohrzuckerlösung, eine carminrothe Färbung (ERRERA).

Werden Querschnitte von etwa 3 mm dicken Zweigstücken der *Syringa vulgaris* auf dem Objectträger in verdünnte Schwefelsäure (1 Volumthl. concentrirte Schwefelsäure und 2 Volumthl. Wasser) gelegt, so färben sich die Membranen der Holzelemente, der Holzmarkstrahlen sowie der Bastfasern gelbgrün und später blaugrün. Alle übrigen Zellen bleiben ungefärbt. Die erwähnte Reaction wird durch das Vorhandensein des Syringins bedingt. Dieser Körper ist in den Membranen abgelagert. Zuweilen nimmt auch der Inhalt der Zellen des Rindenparenchyms bei Behandlung der Syringaschnitte mit Schwefelsäure eine bläuliche Farbe an. Diese Erscheinung rührt aber nur daher, dass etwas Syringin bei Ausführung der Reaction durch Diffusion in diese Zellen übergetreten ist.

Wir stellen Querschnitte aus etwa 3 mm Durchmesser besitzenden Zweigstücken von *Rhamnus Frangula* her und behandeln dieselben auf dem Objectträger mit weingeistiger Kalihydratlösung. Verschiedene Elemente der Schnitte, zumal die dünnwandigen Elemente des Bastes, färben sich intensiv roth, eine Färbung, die aber wenig beständig ist (Frangulinreaction).

Beim Studium der Querschnitte aus der Wurzel von *Rumex crispus* werden wir das Korkgewebe, die Rinde, den Bast- sowie den Holztheil der Gefäßbündel leicht unterscheiden. Das Holz bildet in den etwas älteren Wurzeltheilen einen geschlossenen Cylinder, der von Markstrahlen durchsetzt wird. Werden die Schnitte mit verdünnter Kalilauge behandelt, so färbt sich namentlich der Inhalt der dickwandigen Rinden- und Phloëmelemente intensiv roth, und zwar ist diese Färbung eine sehr beständige (Chrysophansäurereaction)¹⁾.

137. Die Nebenproducte des pflanzlichen Stoffwechsels als Schutzmittel der Pflanzen.

Zahlreiche Thiere, zumal Säugethiere, Insekten und Schnecken würden das Leben der Pflanzen im höchsten Grade gefährden, wenn dieselben nicht mehr oder minder gegen Thierfrass geschützt wären. Diese Schutzmittel der Pflanzen sind theils mechanische, theils chemische, und man findet oft, freilich nicht immer, dass Pflanzen, die mechanisch geschützt sind, keine sog. chemischen Schutzmittel produciren und umgekehrt.

Viele Nebenproducte des pflanzlichen Stoffwechsels haben nun, wie schon mehrfach angedeutet wurde, unter anderem in erster Linie die Aufgabe, den Pflanzen einen chemischen Schutz gegen Thiere zu gewähren, und wir wollen hier unter Zugrundelegung der Untersuchungen von STAHL²⁾ Versuche angeben, durch welche diese Thatsache leicht festgestellt werden kann. Es wird sich für uns namentlich darum handeln, zu zeigen, dass Gerbstoffe, Pflanzensäuren, ätherische Oele etc. als Schutzmittel der Pflanzen gegen Schneckenfrass dienen.

1) Vgl. BORSKOW, Botan. Zeitung, 1874, und O. HERRMANN, Leipziger Dissertation, 1876.

2) Vgl. STAHL, Pflanzen und Schnecken, Jena 1888.

Man sammelt eine Anzahl Schnecken, z. B. *Helix pomatia* und *H. hortensis*. Den Thieren wird 2—3 Tage lang kein Futter verabreicht, damit sie, wenn die eigentlichen Versuche beginnen sollen, recht hungrig sind. Je 2 oder 3 Exemplare von *Helix pomatia* oder eine grössere Zahl von Individuen der kleineren Schnecken gelangen nun in geräumige Krystallisirschalen, die man mit Glasplatten bedeckt. Diese Platten beschwert man, um das Auskriechen der Thiere zu verhindern. Den Schnecken in den Krystallisirschalen wird verschiedenartige Nahrung dargeboten. Wir wollen mit folgenden Blättern experimentiren: *Trifolium pratense* (gerbstoffhaltig), *Rumex*, *Oxalis* (säurereich), *Ruta graveolens* (reich an ätherischem Oel), *Ranunculus acris* und *Tropaeolum majus*. In die Krystallisirschalen zu den Schnecken gelangen je ein oder einige frische Blätter dieser Pflanzen; zugleich aber bieten wir den Thieren noch Blätter dar, die zur Extraction der chemischen Schutzmittel zunächst durch Erwärmen mit Alkohol ausgezogen, dann an der Sonne oder im Trockenschrank ausgetrocknet und endlich mit destillirtem Wasser ausgewaschen worden sind. Da die Schnecken besonders Abends und Nachts fressen, so empfiehlt es sich, die Krystallisirschalen mit den Thieren und Blättern stets längere Zeit stehen zu lassen. Die frischen Blätter werden gar nicht oder nur wenig von den Schnecken berührt; die extrahirten vertilgen sie schnell. Auch die folgenden Versuche lehren bestimmt, dass z. B. Gerbstoffe und Pflanzensäuren den Pflanzen einen ausgezeichneten Schutz gegen Schneckenfrass gewähren müssen. Man bietet den in Krystallisirschalen verweilenden Schnecken einmal dünne Scheiben der Möhre (*Daucus carota*) dar, daneben aber auch solche Möhrenscheiben, die in siedendem Wasser getödtet, im Ofen getrocknet und endlich in einer 1-proc. Gerbstofflösung oder 1-proc. Lösung von saurem oxalsaurem Kali aufgeweicht worden sind. Die frischen Möhrenstücke werden von den Schnecken sehr gern gefressen; die gerbstoff- und säurehaltigen Scheiben verschmähen sie durchaus.

Wir wollen nicht versäumen, um auch die Wirkung mechanischer Schutzmittel kennen zu lernen, die folgenden Versuche anzustellen. Wir legen einigen Schnecken, die sich in Krystallisirschalen befinden, unversehrte Blätter von *Symphytum officinale* oder *Boraya officinalis* vor. Zugleich erhalten die Thiere Blätter dieser Pflanzen, die mittelst eines scharfen Messers von den die Oberfläche der Organe bedeckenden spitzen, rauhen Borsten befreit worden sind. Diese letzteren Blätter werden gern von den Versuchsthieren gefressen; sie rühren die unversehrten Blätter dagegen kaum an.

Blätter von *Arum maculatum* werden selbst von sehr hungrigen Schnecken nicht gefressen. Diese Blätter sind durch Rhaphiden mechanisch geschützt, die sich, wenn die Pflanzentheile benagt werden, sofort in die Mundwerkzeuge der Thiere einbohren und dadurch eine höchst unangenehme Empfindung hervorrufen. Wenn man kleine Stücke der Arumblätter zerkaut, so nimmt man einen intensiv brennenden Geschmack wahr, der ebenfalls durch die Rhaphiden verursacht wird. Der ausgepresste, unfiltrirte Arumsaft ruft, auf die Zunge gebracht, die nämliche Empfindung hervor, während der durch Filtriren von den Rhaphiden befreite Saft nur süsslich schmeckt.

V. Die Translocation plastischer Stoffe in den Pflanzen.

138. Experimente mit keimenden Pollenkörnern.

Die Beobachtungen und Experimente, welche wir über das Verhalten der stickstoffhaltigen und stickstofffreien Körper in den Pflanzen anstellten, haben uns bereits mit einer grossen Reihe verschiedener sich auf die Stoffwanderung im vegetabilischen Organismus beziehender Thatsachen bekannt gemacht. Hier und im Folgenden sollen einige Verhältnisse der Stofftranslocation specieller behandelt werden. Als erstes Untersuchungsobject wählen wir Pollenkörner.

Wir stellen uns zuerst eine kleine feuchte Kammer her, indem wir aus nicht zu dicker Pappe einen Rahmen schneiden, dessen inneres Lumen etwas kleiner als das zu benutzende Deckglas sein muss. Dieser Papprahmen wird, nachdem er vollständig mit Wasser durchtränkt worden ist, auf einen Objectträger gelegt. Wir bringen nun einen Tropfen derjenigen Flüssigkeit, in welcher die Pollenkörner keimen sollen, auf ein Deckglas, fügen das Pollenmaterial, welches wir reifen Antheren entnommen haben, hinzu und drehen das Deckglas jetzt mit rascher Wendung um. Es wird mit nach unten gekehrtem Tropfen auf den Papprahmen gelegt, und die Keimung der Pollenkörner kann nun in dem hängenden Tropfen vor sich gehen. Wir haben nur dafür zu sorgen, dass in der feuchten Kammer kein Wassermangel eintritt. Es empfiehlt sich daher, die Objectträger, welche die feuchte Kammer tragen, auf feuchtes, in einer Krystallisirschale befindliches Fliesspapier zu legen und das Gefäss mit einer Glasplatte zu bedecken. Die Pollenkörner von *Allium*arten, von *Tulipa Gesneriana* und von *Narcissus poëticus* keimen nach STRASBURGER besonders leicht, wenn man sie in eine etwa 3-proc. Auflösung von Rohrucker in Brunnenwasser legt, und ich habe z. B. sehr schöne Resultate erzielt, als ich mit dem Pollen von *Allium Victoriale* experimentirte. Ich übertrug die Pollenkörner einmal in einen hängenden Tropfen Brunnenwassers, ferner andere Körner in einen Tropfen 3-proc. Zuckerlösung. Bei 18—19° C. hatten sich nach Verlauf von 2 Stunden bei Lichtabschluss schon Pollenschläuche entwickelt, und nach fernerem 2 Stunden waren dieselben beträchtlich gewachsen. In der Zuckerlösung keimte eine grössere Anzahl der Pollenkörner, und es wurden in derselben Zeit längere Pollenschläuche als im Brunnenwasser gebildet. Dass die Keimung der Pollenkörner mit einer Stoffwanderung verbunden sein muss, liegt auf der Hand, denn bei der Entwicklung der Pollenschläuche geht ja das Protoplasma und gehen Reservestoffe aus den Pollenkörnern in die Schläuche über. Wenn die Pollenschlauchbildung besser in der Zuckerlösung als im Wasser stattfindet, so macht diese Thatsache es wahrscheinlich, dass der von aussen aufgenommene Zucker von den keimenden Pollenkörnern als Nahrungsmittel verwerthet werden kann.

139. Experimente mit Blättern.

Die in den Blättern durch Assimilation gebildete Stärke wird nur zum kleinsten Theil für die Ausbildung des Blattes selbst verbraucht.

Die Hauptmasse des Amylums verlässt das Blatt; sie wandert aus demselben in andere Organe der Pflanze, um deren Entwicklung zu ermöglichen. Das Lösungsproduct der Stärke ist in vielen Fällen ohne allen Zweifel Glycose, und diese entsteht, indem die in den Blättern vorhandenen diastatischen Fermente (vgl. unter 112) auf die Amylunkörner einwirken. Es werden Blätter von *Tropaeolum*, *Solanum* oder *Cucurbita* am Abend eines warmen Sommertages abgeschnitten. Man kocht sie mit Wasser aus, behandelt sie zur Entfernung des Chlorophyllfarbstoffes mit Alkohol und legt einige, um sich von der Anwesenheit reichlicher Stärkemengen in ihren Zellen zu überzeugen, in Jodlösung (vgl. unter 14). Die übrigen Blätter werden nach der Behandlung mit Alkohol mit Wasser ausgewaschen und in einem frisch bereiteten Malzextracte einige Stunden lang einer Temperatur von 45° C. ausgesetzt. Legt man die Blätter nun in Jodlösung, so geben sie keine oder höchstens noch eine schwache Stärkereaction, woraus hervorgeht, dass die Diastase im Stande ist, die durch Assimilation in den Blattzellen erzeugte Stärke aufzulösen. Dieser Auflösungsprocess geht häufig mit ganz merkwürdiger Geschwindigkeit vor sich.

Wir schneiden am Abend eines recht warmen Sommertages des Juni oder Juli einige Blätter von sehr kräftig im Freien wachsenden *Solanum*-, *Nicotiana*-, *Atropa*-, *Cucurbita*- oder *Phaseolus*pflanzen ab und untersuchen dieselben sofort nach der unter 14 angegebenen Methode makroskopisch auf Stärke. Die Blätter erweisen sich als sehr stärkereich. Wenn wir den genannten Pflanzen am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang abermals einige Blätter entnehmen, um ihren Stärkegehalt makroskopisch zu prüfen, so finden wir, falls die Nacht warm war, kein Amylum in den Zellen; dasselbe ist während der Nacht aufgelöst worden und aus den Blättern in andere Organe gewandert.

Sehr lehrreich ist der folgende Versuch, den ich mit in Töpfen cultivirten Exemplaren von *Tropaeolum majus* anstellte. Man überzeugt sich zunächst auf makroskopischem Wege, dass die Blätter der kräftig entwickelten Untersuchungsobjecte reichliche Stärkemengen enthalten. Sie werden jetzt ins Dunkle gestellt, nachdem man noch einige Blätter von ihnen abgeschnitten hat, die man unter einer Glasglocke auf eine feuchte Unterlage bringt und ebenfalls verdunkelt. Nach einiger Zeit (bei meinen Versuchen, die bei einer Temperatur von nur 12—15° C. angestellt wurden, erst nach 5 Tagen) untersucht man die abgeschnittenen Blätter und ferner solche, welche nicht abgetrennt worden waren, makroskopisch auf Amylum.

Die nicht abgetrennt gewesenen Blätter enthalten nur in den Nerven Stärke, während die abgeschnittenen noch mehr oder minder stärkereich sind. Diese letzteren konnten sich während des Verweilens im Finstern ihrer Kohlehydrate nicht entledigen, weil sie nicht mehr, wie die an der Pflanze belassenen Blätter, mit anderen Organen im Zusammenhang standen.

Wenn man Blätter von *Impatiens parviflora* (diese Pflanze wächst oft bei uns wild oder kann leicht im Garten an einem etwas schattigen Orte aus Samen gezogen werden) makroskopisch auf Stärke prüft, so findet man dieselbe in reichlicher Menge in den normalen Vegetationsverhältnissen ausgesetzt gewesenen Untersuchungsobjecten. Es fällt aber auf, wovon ich mich überzeugte, dass die Nerven im Vergleich

zum Mesophyll stärkearm sind; sie nehmen daher in Contact mit Jodlösung eine gelbe oder nur schwach bläuliche Farbe an. Werden in Töpfen cultivirte Impatiensexemplare und einige von diesen abgeschnittene Blätter ins Dunkle gebracht, so findet man die an der Pflanze belassenen und ebenso die abgetrennten Blätter nach 48 oder 72 Stunden stärkefrei. Abgeschnittene Impatiensblätter verhalten sich also in der hier in Rede stehenden Hinsicht im Finstern anders wie abgeschnittene Tropaeolumblätter. Diese vermögen die als Lösungsproduct des Amylums entstehende Glycose, welche die noch an der Pflanze befindlichen Blätter verlässt, wieder in Stärke umzuwandeln; die Impatiensblätter sind dazu höchstens in geringem Grade im Stande.

Wir stellen nun einen Querschnitt durch das Blatt von *Impatiens parviflora* her und erkennen leicht, dass das Mesophyll in Palissaden- und Schwammparenchym gegliedert ist. Der Hauptnerv besteht, wie gewöhnlich bei den Blättern, aus einer peripherischen Lage langgestreckter chlorophyllarmer Zellen und aus mehreren Gefässbündeln, deren Bastseite von einer Stärkeschicht überzogen ist. Jene Schicht langgestreckter Zellen, welche die Gefässbündel der dickeren und ebenso diejenigen der dünneren Nerven umgiebt, bezeichnet man zweckmässig als Leitscheide.

Es ist schon erwähnt worden, dass die Nerven, zumal die dickeren Nerven, der unter normalen Verhältnissen zur Entwicklung gelangten Impatiensblätter auf jeden Fall stärkearm sind. Werden in Töpfen cultivirte Impatiensexemplare 24 Stunden lang verdunkelt, um einige dann abgeschnittene Blätter makroskopisch auf Stärke zu prüfen, so tritt die Stärkearmuth der Nerven noch klarer hervor. Dieselben heben sich als gelbes Netz vom blau tingirten, noch ziemlich amyllumreichen Mesophyll ab. Wir belassen ferner in Töpfen cultivirte Impatienspflanzen und ebenso abgeschnittene Blätter derselben, die wir unter eine Glasglocke in einen wassergasreichen Raum bringen, 48 Stunden lang im Finstern. Sämmtliche Blätter sind fast oder völlig stärkefrei geworden. Die mikrochemische Prüfung auf Glycose (vergl. die Methode unter 115) ergibt, wovon ich mich überzeugte, dass in den Zellen der Leitscheide der abgeschnittenen Blätter viel Zucker vorhanden ist, während die entsprechenden Zellen der nicht abgeschnittenen Blätter zuckerarm erscheinen.

Wir gelangen zu dem Schluss, dass die Leitscheide der Nerven als dasjenige Gewebe der Blätter anzusehen ist, welches die Auswanderung der Assimilationsproducte aus den Blättern in andere Organe vermittelt. Bei vielen Pflanzen, z. B. *Tropaeolum*, kann das aus der Stärke gebildete Lösungsproduct, zumal in den Zellen der Leitscheide, mit Leichtigkeit wieder transitorisch in Stärke übergeführt werden. Bei anderen Pflanzen, z. B. *Impatiens*, ist dies nicht oder nur in beschränktem Maasse möglich¹⁾.

140. Experimente mit Zweigen.

Wenn man im Herbst gleich nach eingetretenem Laubfall die mehrjährigen Zweige oder Stämme unserer Bäume mit Hülfe der unter

1) Literatur: SACHS, Arbeiten des botanischen Instituts in Würzburg, Bd. 3. Heft 1 (sehr wichtige Arbeit). SCHIMPER, Botanische Zeitung, 1885, No. 47–49.

110 angegebenen Methode auf Stärke untersucht, so findet man reichliche Mengen derselben in den Geweben, zumal in den Markstrahlen sowie dem Holz- und Rindenparenchym. Bei *Quercus* und *Betula* etc. enthält auch das Mark viel Stärke; in anderen Fällen (z. B. bei *Corylus*) ist das Mark stärkefrei¹⁾. Den Zustand, in welchem sich die Bäume oder Sträucher nach dem Laubabfall befinden, können wir als denjenigen des herbstlichen Stärkemaximums bezeichnen. Die Gewebe ihrer Stammegebilde sind dann mit sehr reichlichen Reservestoffmengen angefüllt, welche die Blätter producirt hatten. Neben der Stärke führen aber auch bei vielen Bäumen gewisse Elemente des Holzes und der Rinde, was besonders wichtig ist, im Herbst (und auch im Sommer) Glycose. Zum Nachweis der Glycose benutzen wir die von A. FISCHER angegebene Methode. Aststücke werden median gespalten, 5 Minuten lang in eine concentrirte Lösung von Kupfervitriol gelegt, mit Wasser abgespült und dann 2—3 Minuten lang in einer siedenden Lösung von weinsaurem Natron-Kali in Natronlauge belassen. Die erforderlichen Schnitte sind jetzt leicht herzustellen. In den glyucosehaltigen Elementen hat sich ein Niederschlag von Kupferoxydul gebildet. Aufhellung der Schnitte ist meist nicht erforderlich; sie kann übrigens nöthigenfalls durch Glycerin herbeigeführt werden.

Untersucht man die mehrjährigen Zweige von *Alnus*, *Betula*, *Acer*, *Syringa* etc. im Sommer in angegebener Weise, so findet man reichliche Zuckermengen in den Gefäßen. Die Holzfasern sowie die lebendigen Holzelemente (Markstrahl- und Holzparenchymzellen) sind meist glyucosefrei. In den Gefäßen der dickeren Blattnerven ist ebenfalls keine Glycose vorhanden, wohl aber in dem die Nerven umgebenden und als Leitscheide dienenden Parenchym. Zur Zeit des herbstlichen Stärkemaximums ist die Vertheilung der Glycose ungefähr noch dieselbe, wie im Sommer.

Wenn der Laubfall eingetreten und das herbstliche Stärkemaximum erreicht ist, so beginnt alsbald eine Auflösung der Stärke in den Stämmen und Aesten unserer Bäume und Sträucher. Es führt dieser Vorgang zur Entstehung des winterlichen Stärkeminimums, das z. B. schon im December völlig eingetreten sein kann und bis etwa Anfang März dauert. In zahlreichen Fällen (*Salix*, *Quercus*, *Corylus*, *Syringa*) enthält das Holz zur Zeit des winterlichen Stärkeminimums noch viel Stärke, während das Amylum aus dem Rindengewebe verschwunden und wahrscheinlich der Hauptsache nach in Form von Glycose, die übrigens im Winter, ebenso wie im Sommer, in der Rinde nicht fehlt, in die tiefer liegenden Baumtheile ausgewandert ist (Stärkebäume). Untersuchen wir dagegen Aeste von *Tilia* oder *Betula* im Januar, so finden wir weder im Holz noch in der Rinde Stärke (Fettbäume). Dieselbe hat sich in Fett umgewandelt, und dieser Körper ist bei Behandlung der Schnitte mit Alkannatinctur leicht in den Geweben nachzuweisen (vergl. unter 121).

Bei *Tilia* z. B. sind zumal die Markstrahlen und inneren Rindengewebe im Winter fettreich, während dieselben im Herbst viel Stärke führen. Im Mark von *Tilia* ist im Winter neben Fett reichlich Glycose vorhanden, während namentlich der peripherische Theil des Markes im Herbst viel Stärke beherbergt.

1) Vgl. über das Gesagte und Folgende A. FISCHER, Jahrbücher f. wissenschaftl. Botanik, Bd. 22.

Wir setzen unsere Untersuchungen nun derartig fort, dass wir Aeste von *Corylus* und *Tilia* im April auf Stärke prüfen. In der That finden wir jetzt wieder sowohl im Holz als auch in der Rinde Amylum. Dasselbe ist offenbar aus Fett und Glycose regenerirt worden. Dieser Process beginnt Anfang März (bei Fettbäumen zuerst in der Rinde); er dauert bis gegen Ende April. Um diese Zeit ist das Frühlings-Stärkemaximum erreicht.

Bei beginnender Laubentfaltung wird die Stärke wieder aufgelöst, und auf solche Weise kommt das Stärkeminimum des späteren Frühjahrs zu Stande. Die Auflösung beginnt in den jungen Aesten, so dass diese schnell (etwa im Laufe von 14 Tagen) in der Rinde sowie im Holz entstärkt erscheinen; sie macht sich später auch in den älteren Aesten geltend. Ein gutes Untersuchungsobject ist *Betula*.

Wenn die Blätter sich nun endlich völlig entfaltet haben, so dass reichliche Mengen von Kohlehydraten entstehen, dann wandern dieselben nach und nach in fortschreitend grösseren Mengen in die Stammgebilde ein, ein Process, der natürlich in seinem Verlauf ganz wesentlich durch die herrschenden Witterungsverhältnisse beeinflusst werden muss. Schliesslich kommt auf solche Weise das herbstliche Stärkemaximum zu Stande, von welchem oben die Rede war.

Wir stellen auch noch das folgende interessante Experiment an, um zu zeigen, dass der Process der Rückbildung von Stärke aus Fett oder Glycose in den Aesten unserer Bäume ganz wesentlich abhängig ist von den herrschenden Temperaturverhältnissen. Zur Zeit des Stärkeminimums im Winter, also z. B. im December oder Januar, wird ein Lindenast abgeschnitten, ins warme Zimmer gebracht und sich hier, mit der Basis in Wasser stehend, selbst überlassen. Die Stärkeregeneration beginnt bereits nach einigen Tagen und macht fernerhin weitere Fortschritte.

141. Die Ringelungsversuche.

Zu Ringelungsversuchen eignen sich vor allem Weidenzweige. Am zweckmässigsten ist es, die Beobachtungen im Frühjahre anzustellen, und ich erhielt besonders gute Resultate bei Versuchen mit *Salix fragilis*. Die etwa 200 mm langen und 12 mm dicken Weidenzweige werden an ihrer morphologischen Basis geringelt, indem man z. B. 40 mm von ihrem unteren Ende entfernt einen ca. 20 mm breiten Rindenring fortnimmt, wodurch also der Holzkörper an dieser Stelle frei gelegt wird. Nun wird der Zweig in einem genügend hohen Glascyliner aufgehängt, indem man einen Bindfaden um das obere Zweigende schlingt und den Faden mit Hülfe von Siegellack an einer der Oeffnung des Glascyliners verschliessenden Glasplatte befestigt. Der Boden des Cylinders ist einige mm hoch mit Wasser bedeckt, in das das untere Zweigende aber nicht eintauchen darf. Feuchte Fliesspapierstreifen, welche die Innenfläche des Cylinders bedecken, tragen nicht unwesentlich zu einer möglichst gleichmässigen Feuchtigkeitsvertheilung im Apparat bei. Bei einem von mir angestellten Versuch verweilte ein Weidenzweig vom 19. März bis zum 21. April bei Lichtabschluss in einem Glascyliner. Das Resultat des

Ringelungsversuchs ist aus untenstehender Abbildung zu ersehen. Das kurze, 45 mm lange Zweigstück unterhalb der Ringelungsstelle hat kleine Wurzeln erzeugt; aus dem Zweigstück oberhalb der Ringelungsstelle sind lange Wurzeln und am oberen Ende auch Triebe hervorgegangen. Die Ursache, weshalb an dem kurzen Zweigstück unter der Ringelungsstelle nur kurze Wurzeln producirt werden, ist darin zu

Fig. 116. Geringelter Zweig von *Salix fragilis*, an dessen oberem Theil kräftige Wurzeln und Triebe zur Entwicklung gekommen sind.

suchen, dass in diesem Theil des Untersuchungsobjects nicht genügende Mengen plastischen Materials zur Verfügung stehen. Die kleine Quantität stickstoffhaltiger und stickstofffreier Baustoffe im Zweigstück unter der Ringelungsstelle ist bald verbraucht. Dann können denselben freilich eventuell noch stickstofffreie Substanzen zuströmen, denn es lässt sich, wovon ich mich z. B. im Februar unter Benutzung eines Zweiges von *Salix fragilis* von 6 mm Durchmesser überzeugte, leicht feststellen (vergl. Methode unter 110), dass zumal die peripherische Holzregion der Weidenzweige viel Stärke enthält. Aber die Eiweisszuleitung, die, wie gerade die Ringelungsversuche sowie anderweitige Beobachtungen (vgl. unter 143) lehren, zumal durch Elemente des Weichbastes vermittelt wird, ist in Folge der Ringelung unterbrochen. Natürlich wird die Wurzelbildung unterhalb der Ringelungsstelle um so ausgiebiger, je höher die Stelle am Zweige liegt, von der man den Rindenring entfernt. Andererseits sah ich gar keine Wurzelbildung unterhalb der Ringelungsstelle mehr eintreten, wenn das kurze Stück am unteren Zweigende nur 20 mm Länge besass. Wenn man keine vollständige Ringelung vornimmt, sondern zwischen dem langen oberen und dem kurzen unteren Zweigstücke einen senkrechten Rindenstreifen als Brücke bestehen lässt, so erfolgt eine relativ ausgiebige

Wurzelbildung am unteren Zweigstücke, da nicht unerhebliche Eiweissmengen die erwähnte Brücke passiren können.

Untersucht man Querschnitte aus Weidenzweigen mikroskopisch, so überzeugt man sich leicht, dass der Holzkörper der Fibrovasalstränge auf seiner Innenseite direct an das Mark grenzt. Es ist nur zwischen der eigentlichen Rinde sowie der Aussenseite des Holzes Bastgewebe vorhanden, und somit muss durch eine bis aufs Holz gehende Ringelung die Eiweissleitung unterbrochen werden.

Ganz andere Resultate wie an geringelten Weidenzweigen oder überhaupt an solchen Zweigen, welche den für die Stammgebilde dicotyler Gewächse typischen Bau besitzen, treten bei Ringelungsversuchen hervor, wenn man z. B. mit *Mirabilis Jalappa* oder *Nerium Oleander* experimentirt. Und in der That ist der anatomische Bau der Stammgebilde dieser Pflanzen ein sehr eigenthümlicher.

Stellt man Querschnitte aus etwa 4 mm dicken Stengeln von *Mirabilis* her, so erblickt man bei mikroskopischer Untersuchung die Epidermis, die primäre Rinde mit ihrem äusseren Collenchymring, ferner besonders einen aus stark verholzten Zellen (Sklerenchymfasern) und eingeschalteten Gefässbündeln bestehenden Ring und den centralen Stengeltheil. Dieser besteht aus Markgewebe, dessen Zellen ich noch Ende October, nachdem Blätter der Pflanze bereits durch einen Nachtfrost getödtet waren, reichlich mit Stärke angefüllt fand, und in dem Grundgewebe vertheilten Gefässbündeln mit deutlichem Bast- und Holztheil. Von einer Ringelung werden diese centralen Gefässbündel gar nicht berührt, so dass also durch die Fortnahme eines Rindenringes in diesem Fall weder die Leitungsbahnen für die stickstofffreien noch diejenigen für die stickstoffhaltigen plastischen Stoffe eine wesentliche Unterbrechung erleiden.

Wir wählen einen kräftigen, reich beblätterten Spross von *Nerium Oleander* aus, entfernen in einer Höhe von etwa 20 mm über der Sprossbasis einen Rindenring und befestigen das Untersuchungsobject derartig unter Beihülfe von Watte in der Bohrung eines Korkes, der ein mit Wasser angefülltes Gefäss verschliesst, dass der Spross mit seinem unteren Ende etwa 80 mm weit in das Wasser eintaucht.

Bei hinreichend hoher Temperatur und nicht zu grosser Trockenheit der Luft (es ist zweckmässig, die *Nerium*sprosse im Warmhause zu halten) brechen nach einiger Zeit zahlreiche Wurzeln aus dem oberhalb der Ringelungsstelle befindlichen, noch vom Wasser benetzten Stammtheile hervor. Weiterhin entwickeln sich ebenfalls ziemlich viele Wurzeln an der Basis des Sprosses, also unterhalb der Ringelungszone. Die *Nerium*sprosse verhalten sich also wesentlich anders wie die Weidensprosse, und die Ursache dieser Erscheinung ist im anatomischen Bau der Untersuchungsobjecte zu suchen. Bei *Salix* sind nur an der Peripherie der Gefässbündel Weichbastelemente vorhanden. *Nerium* besitzt nicht nur auf der Aussen-, sondern ebenso auf der Innenseite der Gefässbündel Weichbast, wovon man sich durch mikroskopische Untersuchung zarter Querschnitte leicht überzeugen kann. Bei *Nerium* wird also die Bahn für die Eiweissleitung durch die Ringelung keineswegs völlig unterbrochen, während dies bei *Salix* der Fall ist. Bei *Nerium* können dem unterhalb der Ringelungsstelle liegenden Stengeltheile erhebliche Mengen stickstofffreier und auch stickstoffhaltiger plastischer Stoffe zuströmen, und aus diesem Grunde ist eine ziemlich ausgiebige Wurzelbildung an demselben möglich ¹⁾ ²⁾.

Was die Wanderung der stickstofffreien Körper in den sich unter normalen Vegetationsverhältnissen befindenden Bäumen und Sträuchern anbetrifft, so ist auf Grund der Untersuchungen von TH. HARTIG, SACHS

1) Literatur: HANSTEIN in PRINGSHEIM's Jahrbüchern f. wissensch. Botanic, Bd. 2, und SACHS, Flora, 1863, S. 33.

2) Uebrigens können Eiweissstoffe auch in manchen Fällen im Holz translocirt werden. Vgl. STASBURGER, Bau und Verrichtung der Leitungsbahnen, 1891, S. 900 und 911. Die Translocation von Amiden etc. findet im Parenchym statt.

und A. FISCHER ¹⁾) nicht daran zu zweifeln, dass die in den Blättern gebildeten Kohlehydrate fast nur im Parenchym der Rinde translocirt werden, während die Aufwärtsbewegung der Kohlehydrate im Frühjahr beim Austreiben der Knospen in den glycosereichen Gefässen des Holzes stattfindet.

Ein mehrjähriger Ast von *Betula*, dessen basaler Theil zweig- und blattlos sein muss, wird, ohne von der Pflanze getrennt zu werden, Anfang Juni etwa 10 cm über seiner Ansatzstelle geringelt. Das frei gelegte Holz überzieht man mit Baumwachs. Anfang August schneidet man den Ast ab und prüft entsprechende Querschnitte auf Stärke. Es genügt oft schon eine makroskopische Untersuchung, indem man die Querscheiben mit Jodlösung betupft. Oberhalb der Ringelungsstelle erweisen sich Holz und Rinde als überaus stärkereich. Das Holz der Ringelungsstelle ist sehr stärkearm; ebenso das Holz sowie die Rinde unterhalb der Ringelungsstelle. Die Kohlehydrate konnten in unserem Ast die Ringelungsstelle, weil hier die Rinde fehlte, offenbar nicht passiren. Im unversehrten Ast bewegen sie sich dagegen im Rindenparenchym nach abwärts, um sich von hier aus über das Holz, die Markstrahlen und das Mark zu verbreiten, woselbst sie in Form von Stärke zur Ablagerung gelangen.

Die Thatsache der Aufwärtsbewegung der Kohlehydrate im Holz zur Zeit des Austreibens der Knospen wird durch folgendes Experiment festgestellt. Man schneidet Ende Januar einen Syringazweig, der zwei einjährige Gabeläste trägt, ab, stellt ihn mit der Basis in Wasser und bringt dicht unter der Gabelung einen Ringelschnitt an. Im warmen Zimmer entfalten sich die Knospen im Laufe von 14 Tagen bis 3 Wochen. Das durch die Ringelung freigelegte Holz ist mit Baumwachs zu bedecken. Bei Beginn des Versuchs enthält der Holzkörper des Zweiges viel Stärke. Haben die Knospen sich entfaltet, so ist die Stärke nicht nur aus den Gabelästen, sondern auch aus dem Holz der Ringelungsstelle und aus demjenigen Holz fast völlig verschwunden, welches dem zweijährigen Zweigtheil unterhalb der Ringelungsstelle angehört. Die Substanz der Stärke ist in Form von Glycose in den Gefässen des Xylems nach aufwärts befördert worden.

142. Die Stärke- und Zuckerscheide und ihre Functionen bei der Stoffwanderung.

Zahlreiche Pflanzen sind durch den Besitz einer entwickelten Stärkescheide ausgezeichnet, und wir können dieselbe z. B. bequem beobachten, wenn wir Querschnitte durch den Stengel von Bohnenpflanzen ausführen, die sich im Dunkeln so weit ausgebildet haben, dass das erste Stengelglied erheblich gestreckt ist. Epidermis, Rinde, Mark sowie Gefässbündelkreis sind leicht zu unterscheiden. Der letztere wird an seiner Peripherie, also auf seiner Bastseite, rings von einer Zellschicht umgeben, deren Elemente kleiner sind als diejenigen des Rindengewebes, und dies ist eben die Stärkescheide. Wir finden reichliche Mengen von Stärke in den Zellen der erwähnten Gefässbündelscheide, eine Thatsache, die zu der Vermuthung geführt hat, dass die Translocation der Kohlehydrate in allererster Linie in der Stärkescheide stattfinden möchte. Indessen verschiedene Verhältnisse

1) Vgl. A. FISCHER, Jahrbücher f. wissenschaftl. Botanik, Bd. 22, S. 137 u. 142.

sind nicht mit einer derartigen Anschauung in Einklang zu bringen. Man stelle im Juli Querschnitte aus dem unteren Stengeltheile kräftiger und im Freien zur Entwicklung gelangter Phaseolusexemplare her. Jedes Gefässbündel ist an seiner Aussenseite mit einem mächtigen Bastfaserbeleg versehen, und bei mikroskopischer Untersuchung kann man sich leicht davon überzeugen, dass in dem Rinden- sowie Markparenchym reichliche Amylumengen vorhanden sind. Die Zellen der Stärkescheide sind dagegen, wovon ich mich überzeugte, sehr stärkearm oder sie enthalten gar keine Stärkekörner. Danach findet die Translocation der Kohlehydrate sicher hauptsächlich in der Rinde sowie im Mark statt. Die Stärkescheide enthält nur dann viel Amylum, wenn die Elemente des Bastfaserbeleges der Fibrovasalstränge noch nicht völlig ausgebildet sind. Mit fortschreitender Entwicklung derselben verschwindet aber die Stärke mehr und mehr aus den Zellen der Stärkescheide, weil sie beim Aufbau der dickwandigen Bastelemente verbraucht wird ¹⁾.

Es ist eine schon von uns erwähnte Thatsache, dass viele Pflanzen die Fähigkeit besitzen, die aus dem Mesophyll der Blätter auswandernden Kohlehydrate transitorisch in den Ableitungsbahnen (den Blattnerven) in Stärke umzuwandeln. Andere Gewächse vermögen dies nur in geringem Grade, weshalb wir ihre Blattnerven nicht mit Stärke, sondern z. B. mit Glycose erfüllt finden. Wir stellen Querschnitte aus dem unteren Theil der Lamina und dem oberen Theil des Blattstieles eines ausgewachsenen Rübenblattes her. Die in der Spreite durch Assimilation gebildete Stärke wandert unter normalen Verhältnissen durch die Nerven und den Blattstiel in die Rübenwurzel, die Entwicklung der letzteren bedingend. Aber wir finden mit Hülfe mikrochemischer Methoden in dem Parenchym, das die Gefässbündel der Nerven sowie des Blattstieles umgiebt, nur sehr kleine Stärkemengen, hingegen sehr grosse Glycosequantitäten, und man kann das die Kohlehydrate leitende Gewebe daher als Leitscheide, speciell als Zuckerscheide, bezeichnen ²⁾.

143. Die Siebröhren und ihre Function bei der Stoffwanderung.

Wenn wir den Stengel eines Exemplars von *Cucurbita* durchschneiden, so quillt eine bedeutende Menge einer schleimigen Flüssigkeit aus dem Querschnitt hervor. Unter Berücksichtigung der Quantität des ausfliessenden Saftes wird es uns sofort klar, dass derselbe unter Mitwirkung von Druckkräften aus der verletzten Pflanze ausgepresst werden muss, und in der That sind, wie wir weiter unten sehen werden, die Bedingungen für das Zustandekommen solcher Druckwirkungen im Organismus gegeben. Zunächst wollen wir uns über die Natur des ausgepressten Saftes unterrichten.

Wir durchschneiden den Stengel eines Exemplars von *Cucurbita*, z. B. *C. Pepo* (ich experimentirte mit *C. minensis*). Jetzt bringen wir ein Stückchen rothen Lackmuspapiers mit dem Stengelquerschnitt in Berührung und werden zu unserer Ueberraschung wahrnehmen, dass sich dasselbe blau färbt. Auf jeden Fall besitzt demnach ein grosser

1) Vgl. H. HEINE, Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 3, Heft 5.

2) Vgl. H. DE VRIES, Landwirth. Jahrbücher, Bd. 8, S. 445.

Theil des aus dem Cucurbitastengel ausfliessenden Saftes eine relativ stark alkalische Reaction, während die meisten Pflanzen, wenn sie verwundet worden sind, einen Saft von überwiegend saurer Reaction liefern, der also blaues Lackmuspapier roth färbt. Wenn wir unseren Stengelquerschnitt von *Cucurbita* wiederholt mit rothem Lackmuspapier abtupfen, so finden wir bald nicht mehr die Gesamtoberfläche des den Querschnitt berührenden Papiers gebläut, sondern nur einzelne Stellen desselben zeigen diese Farbe, diejenigen nämlich, welche mit den Gefässbündeln in Berührung gekommen sind. Bringen wir den Stengelquerschnitt nun mit blauem Lackmuspapier in Contact, so färbt sich derselbe mit Ausnahme einzelner Stellen roth. Unmittelbar nach dem Durchschneiden eines Cucurbitastengels fliesst aus dem Querschnitt ein Saftgemisch von überwiegend alkalischer Reaction aus. Auf die angegebene Weise kann man sich aber leicht davon überzeugen, dass der Saft des Parenchyms bei *Cucurbita*, wie bei anderen Pflanzen, sauer reagirt, während die Säfte gewisser Gewebe der Fibrovasalstränge, nämlich diejenigen des Weichbastes, eine alkalische Reaction besitzen. Bei anderen Pflanzen liegen die Verhältnisse ähnlich; sie sind aber nicht so leicht sicher festzustellen ¹⁾.

Wir stellen nun einen Querschnitt aus dem hypocotylen Gliede von *Cucurbita Pepo* her, und zwar benutzen wir Alkoholmaterial. Bei den meisten Gewächsen ist nur auf der Aussenseite der Gefässbündel Weichbast vorhanden; unser Untersuchungsobject lässt aber auf der Aussensowie Innenseite des Holztheiles der Fibrovasalstränge das Vorhandensein von Weichbast erkennen. Stellen wir nach der unter 94 angegebenen Methode Prüfungen über den Eiweissgehalt der Gewebe an, so ergibt sich, dass die Weichbastelemente sehr reich an Proteinstoffen sind. Der alkalisch reagirende, eiweissreiche Schleim, welcher beim Durchschneiden von Cucurbitastengeln hervorquillt, ist in besonders grosser Menge in den Siebröhren des Weichbastes vorhanden, eigenthümlichen, lang gestreckten Elementen, die durch mit vielen Poren versehene Querwände (Siebplatten) gegliedert sind. In den Siebröhren ist wandständiges Protoplasma vorhanden, und sie sind mit einem eiweissreichen, alkalisch reagirenden Schleim erfüllt, der unter Vermittelung der Siebporen aus einem Siebröhrengliede in ein anderes übergehen kann. Und in der That muss eine solche Bewegung des Schleimes in der unversehrten Pflanze durch dieselben Ursachen erfolgen, welche es bedingen, dass aus verletzten Pflanzen der Schleim hervorquillt. Die Siebröhren stehen nämlich unter dem Druck des in der Nähe vorhandenen, turgescirenden Parenchyms. Somit kann ihr Inhalt nach den Orten geringeren Druckes, zumal nach den noch sehr jugendlichen Theilen des Pflanzenkörpers hin, befördert werden, und man sieht also, was mit den Ergebnissen der Ringelungsversuche in völligem Einklange steht, dass die Siebröhren als Translocationsorgane für Eiweissstoffe im Organismus functioniren. Das Circulationseiweiss des Schleimes der Siebröhren unterliegt einer Massenbewegung in denselben und kann von einem Orte in der Pflanze zu anderen, oft weit entfernten transportirt werden. Wir müssen uns aber noch etwas genauer mit dem Bau der Siebröhren, zumal mit demjenigen der Siebplatten, vertraut machen.

Wir stellen Querschnitte aus einem 10 mm dicken Stengel von *Cucurbita Pepo* her (Alkoholmaterial). Bei schwacher Vergrösserung

1) Vgl. SACHS, Botan. Zeitung, 1862.

erkennt man die Epidermis, das unterbrochene Collenchym, das Rindengewebe, den Sklerenchymring und die in doppeltem Kreise gruppierten Gefässbündel leicht. Diese besitzen einen Holztheil mit sehr weiten Gefässen und einen inneren sowie äusseren Basttheil. Der innere Bast-

Fig. 117. Cucurbita Pepo. Theile von Siebröhren nach Alkoholmaterial. A im Querschnitt, B—D im Längsschnitt. A eine Siebplatte von oben, B und C die zwei anstossenden Siebröhrenglieder von der Seite, D die verbundenen Inhaltsmassen zweier Siebröhrenglieder nach Schwefelsäurebehandlung. *s* Geleitzellen, *u* Schleimstrang, *pr* Protoplasmaschlauch, *c* Callusplatte, *c** kleine, einseitige Callusplatte eines seitenständigen Siebfeldes. Vergr. 540. (Nach STRASBURGER.)

oder Siebtheil umfasst die Innenseite des Holz- oder Gefässtheils mond-sichelförmig. Zur genaueren Untersuchung bei stärkerer Vergrösserung thut man nach STRASBURGER gut, die Schnitte [kurze Zeit lang in Anilinblau zu legen, um sie dann in einem Tropfen Glycerin auf den Objectträger zu bringen. Das Gewebe des inneren und äusseren Bastes besteht aus weitlumigen Siebröhren, deren Geleitzellen mit ihrem dunkelblau tingirten Inhalt (vgl. Fig. 117) und aus Cambiformzellen. Die porösen Siebplatten sind, wo der Schnitt solche getroffen hat, leicht kenntlich¹⁾.

144. Der Milchsaff.

Zahlreiche Pflanzen enthalten bekanntlich Milchsaff. Schneidet man z. B. eine Euphorbia an, so quillt der weiss gefärbte Milchsaff oft (zumal wenn man mit cactusartigen Euphorbien experimentirt) in grosser Menge aus der Wunde hervor. Offenbar steht der Inhalt der Milchsaffbehälter unter einem nicht unerheblichen Druck, der von den turgescirenden Zellen des benachbarten Parenchyms geltend gemacht

1) Vgl. WILHELM, Beiträge zur Kenntniss des Siebröhrenapparates dicotyler Pflanzen, Leipzig 1880, und FISCHER, Untersuchungen über das Siebröhrensystem der Cucurbitaceen, Berlin 1884.

wird, denn sonst könnten beim Anschneiden Milchsafft enthaltender Pflanzen nicht so grosse Flüssigkeitsquantitäten aus der Wunde herausfließen, wie es thatsächlich der Fall ist.

Die Frage nach der physiologischen Function der Milchsäfte ist noch ungelöst. Ich kann mich dem Eindruck nicht entziehen, dass die Milchsäfte unter anderem eine ernährungsphysiologische Bedeutung besitzen; auch die Experimente FAIVRES sprechen dafür. Besondere Wichtigkeit dürfte der Milchsafft aber als Schutzmittel der Pflanzen haben.

In der wässerigen Flüssigkeit der Milchsäfte sind, ebenso wie im Serum der thierischen Milch, zahlreiche kleine, feste Körpertheilchen suspendirt, wodurch die Milchsäfte meist von weisser Farbe erscheinen. Die Menge dieser festen Partikelchen ist aber je nach der Herkunft sowie dem momentanen Zustande des Milchsafftes eine sehr verschiedene. Wenn man einen Tropfen Milchsafft aus den Stengeln oder den Blättern der Feige ohne Wasserzusatz auf den Objectträger bringt, so kann man sich durch Beobachtung bei starker Vergrösserung leicht davon überzeugen, dass der Gehalt dieses Milchsafftes an suspendirten Theilen ein relativ geringer ist. Der Milchsafft der Euphorbien und derjenige von *Ficus elastica* erscheint gewöhnlich viel reicher an festen Bestandtheilen.

In der wässerigen Flüssigkeit der Milchsäfte sind Mineralstoffe, Zucker, Eiweissstoffe, zuweilen auch Pepsin (vergl. unter 96) etc. im aufgelösten Zustande vorhanden. Die suspendirten Körpertheilchen werden sehr oft der Hauptsache nach von Kautschuk gebildet. Manche Milchsäfte enthalten aber auch Fett oder Amylumkörner.

Wird etwas Milchsafft einer Euphorbie mit wenig Wasser oder Alkohol auf dem Objectträger vermischt, so tritt Gerinnung des Milchsafftes ein. Bei mikroskopischer Untersuchung ergibt sich, dass sich die ursprünglich gleichmässig im Milchsafft suspendirten Bestandtheile desselben zu grösseren Massen zusammengeballt haben.

Die Milchsafftbehälter der Pflanzen sind von sehr verschiedenartiger Natur. Ein sehr günstiges Object für das Studium von Milchsafftbehältern giebt die Wurzel von *Scorzonera hispanica* (Schwarzwurzel) ab. Wir verwenden Alkoholmaterial und stellen nach Entfernung der oberflächlichen Rindenschichten tangentielle Längsschnitte her. Die leicht an ihrem Inhalt kenntlichen Milchsafftbehälter stellen in unserem Falle vielfach unter einander anastomisirende, lang gestreckte Gefässe dar, welche das kleinzellige Parenchym durchziehen.

Wir nehmen ferner Stengeltheile von *Chelidonium majus* in Untersuchung, und zwar benutzen wir Alkoholmaterial. Bei Beobachtung von Querschnitten sehen wir die Epidermis, Collenchym und grünes Rindenparenchym. An dieses schliesst sich nach innen ein geschlossener Ring mechanischen Gewebes, dessen Elemente stark verdickt sind. Die Gefässbündel besitzen einen entwickelten Bast- und Holztheil. Im ersteren, aber auch im Grundgewebe, welches die Fibrovasalstränge umgiebt, erblicken wir Elemente, die einen braunen Inhalt führen. Es sind das die Milchsafftgefässe. Der Milchsafft von *Chelidonium* besitzt bekanntlich im frischen Zustande eine orangerothe Farbe. In Folge der Behandlung des Untersuchungsmaterials mit Alkohol ist er in seinen Behältern in einen geronnenen Zustand übergegangen.

145. Die Stoffaccumulation.

Es ist offenbar eine merkwürdige Thatsache, dass bestimmte Gewebecomplexe des Pflanzenkörpers als Leitungsbahnen, andere als Ablagerungsorte für bestimmte Stoffe dienen. Wir sind heute nicht im Stande, uns im Detail Rechenschaft über die Ursachen dieser Phänomene zu geben; es ist dies nur im Allgemeinen möglich, und ich habe die bezüglichen Verhältnisse auch schon in meinem Lehrbuche der Pflanzenphysiologie besprochen.

Wenn z. B. eine Accumulation von Stärke in den Geweben der Reservestoffbehälter stattfinden soll, so müssen in den Zellen dieser letzteren Ursachen thätig sein, welche es bedingen, dass das zugeführte stickstofffreie Material in Form von Amylumkörnern niedergeschlagen wird. Aehnliche Ursachen müssen ferner auch bei der transitorischen Stärkebildung in den Zellen der Leitungsbahnen der Kohlehydrate zur Geltung kommen. Die Stärkeaccumulation kann nur in Zellen erfolgen, in denen Stärkebildner ihre Thätigkeit entfalten, und indem dies geschieht, wird die Bedingung erfüllt, welche gegeben sein muss, wenn ein erneuter Zustrom gelöster Kohlehydrate nicht ausbleiben soll. Die Resultate der folgenden Experimente sind geeignet, uns eine Vorstellung von dem Wesen der Stoffaccumulation zu gewähren.

Wir füllen ein Becherglas mit verdünnter Kupfervitriollösung an und hängen in die Flüssigkeit ein an seinen beiden Enden mit Pergamentpapier verschlossenes, etwa 6 cm langes und weites Glasrohr hinein, das vorher mit Wasser angefüllt worden ist und in das man auch eine Zinkspirale gebracht hat. Die Lösung des schwefelsauren Kupferoxyds dringt in das Glasrohr ein, sie verbreitet sich in dem Wasser, wird aber, wenn sie mit dem Zink in Berührung gelangt, zersetzt. Es entsteht lösliches schwefelsaures Zinkoxyd, während sich das Zink mit einer allmählich an Dicke zunehmenden Kruste von metallischem Kupfer und Kupferoxyd bedeckt. Die Accumulation von Kupfer in dem Glasrohr ist also leicht zu constatiren.

Dass gelöste Stoffe ihren Lösungsmitteln durch imbibitionsfähige Körper entzogen und aufgespeichert werden können, lässt sich in folgender Weise demonstrieren.

Wir versetzen Wasser mit einigen Tropfen alkoholischer Jodlösung, so dass die Flüssigkeit eine gelbliche Farbe annimmt, und fügen Weizenstärke hinzu. Diese letztere speichert das Jod auf; sie färbt sich in Folge dessen blau, während die Flüssigkeit alsbald entfärbt ist. Wir versehen ferner einen Glastrichter mit 6 oder 8 in einander gesteckten Fließpapierfiltern und giessen eine verdünnte, wässrige Methylanilinviolettlösung auf das Filter. Das Papier hält den Farbstoff vollkommen zurück. Es läuft eine wasserklare Flüssigkeit vom Filter ab.

Zweiter Theil.

Physiologie des Wachstums und der Reizbewegungen.

Vierter Abschnitt.

Die Zuwachsbewegungen der Pflanzen.

I. Die Eigenschaften wachsender Pflanzentheile und die auf inneren Ursachen beruhenden Wachstumsbewegungen.

146. Die Dehnbarkeit und Elasticität wachsender Pflanzentheile.

Für die Theorie des Wachstums ist es von grosser Bedeutung, dass die wachsenden Pflanzentheile in einem hohen Grade dehnbar und elastisch sind. Auf Details kommen wir weiter unten zurück; hier handelt es sich zunächst nur darum, diese Thatsache ganz im Allgemeinen zu constatiren¹⁾.

Als Untersuchungsobjecte wählen wir ganz frische, abgeschnittene Stengelstücke von *Aristolochia Siphon* oder *Sambucus nigra*. Wir bringen am oberen, sowie am unteren Ende eines jüngeren und des folgenden älteren Internodiums mit chinesischer Tusche feine Striche als Marken an, fassen den Pflanzentheil mit den beiden Händen und dehnen ihn, während er auf einer Millimetertheilung liegt, so stark wie möglich, aber ohne dass die Gefahr des Zerreißens eintritt. Es ist nun leicht zu constatiren, dass die jüngeren Internodien viel dehnbarer als die älteren sind, und ich fand z. B., dass die Dehnbarkeit eines jungen, 50 mm langen Internodiums von *Aristolochia Siphon* 9 % betrug. Ueberlässt man die Sprosse nach der Dehnung sich selbst, so ziehen sie sich wieder mehr oder minder zusammen; ihr Gewebe ist also elastisch, aber da sie ihre ursprüngliche Länge nicht wieder völlig annehmen, sondern nach erfolgter stärkerer Dehnung dauernd länger bleiben, so ergiebt sich, dass sie als unvollkommen elastisch bezeichnet werden müssen.

1) Vgl. SACHS, Lehrbuch d. Botanik, 4. Aufl., S. 753.

Völlig frische, gerade gewachsene, etwa 6 mm dicke Internodien von *Vitis* oder *Aristolochia* werden auf einem Carton, auf dem concentrische Kreise aufgezeichnet worden sind, mittelst der beiden Hände derartig gebogen, dass die Axe des Untersuchungsobjectes mit einem der Kreise zusammenfällt. Den bekannten Radius dieses Kreises notirt man als Krümmungsradius des gebogenen Internodiums. Ueberlässt man den Pflanzentheil sich selbst, so streckt er sich nicht wieder gerade, sondern bleibt ziemlich stark gekrümmt, und man kann seinen Krümmungsradius auch jetzt leicht feststellen. Wachsende Pflanzentheile sind demnach biegsam. Sie besitzen freilich Biegeelasticität; dieselbe ist aber eine unvollkommene.

Wenn man geraden, in lebhaftem Längenwachsthum begriffenen Sprossen an ihrem unteren Theil, dessen Längenwachsthum bereits vollendet ist, mit Hülfe eines Stockes einen Schlag oder einige Schläge beigebracht hat, so schreitet die der gestossenen Region ertheilte Krümmung in Form einer Welle bis in den frei schwebenden Gipfel fort. Dieser erscheint in Folge dessen gekrümmt und zwar liegt die Concavität der Krümmung stets auf derjenigen Seite, von welcher der Schlag unten eintraf. Das Auftreten dieser Stoss- oder Erschütterungskrümmungen, welches ich besonders schön bei Experimenten mit Vitissprossen und Sprossen von *Lonicera tatarica* beobachtete, verdankt, wie in meinem Lehrbuch der Pflanzenphysiologie näher nachzusehen ist, der Biegsamkeit und unvollkommenen Elasticität der Pflanzentheile seine Entstehung.

147. Relationen zwischen der Grösse der Turgorausdehnung, dem Wachsthum und der Dehnbarkeit der Pflanzentheile.

Für unseren Zweck ist es zunächst unerlässlich, die relative Wachsthumsgeschwindigkeit der auf einander folgenden Partialzonen eines Pflanzentheiles festzustellen. Wir experimentiren mit abgeschnittenen jungen Blüthenschäften von *Butomus umbellatus*, *Plantago media* und *Papaver* oder mit nicht abgeschnittenen epicotylen Gliedern von *Phaseolus multiflorus*, welche sich bis zur Länge von einigen Centimetern im Dunkeln entwickelt haben. Auf den Untersuchungsobjecten bringen wir mit Hülfe von chinesischer Tusche in Entfernungen von je 10 oder 20 mm feine Striche als Marken an und theilen sie dadurch der Länge nach in Partialzonen ab. Das Auftragen der Marken erfordert einige Sorgfalt und ist in der unter 59 und 148 angegebenen Weise auszuführen¹⁾. Die abgeschnittenen Blüthenschäfte werden nun senkrecht in einem mit Brunnenwasser angefüllten Cylinder aufgestellt, so dass sie völlig von der Flüssigkeit bedeckt sind, während man die Bohnenstengel auch jetzt noch nicht abschneidet. Nach 12 oder 24 Stunden bestimmt man die Entfernungen der Marken und wird finden, dass dieselben nicht mehr 10 oder 20 mm betragen, sondern grösser geworden sind. Diese Erscheinung ist die Folge eingetretenen Wachstums. Es lässt sich nun aber leicht constatiren, was besonderes Interesse beansprucht, dass der Zuwachs der einzelnen Partialzonen keineswegs derselbe ist. Das stärkste Wachsthum hat entweder in der jüngsten

1) Handelt es sich darum, gekrümmte Pflanzentheile, z. B. die Epicotyle von *Phaseolus*, mit Tuschemarken zu versehen, so kann dies unter Zuhülfenahme eines mit einer Millimetertheilung versehenen Papierstreifens geschehen.

Zone stattgefunden (so fand ich es in Uebereinstimmung mit H. DE VRIES, als ich einen jungen Blüthenschaft von *Plantago*, der in Partialzonen von 20 mm Länge eingetheilt worden war, zum Versuch benutzte), oder das Wachstumsmaximum liegt nicht in der allerjüngsten, wohl aber in einer der jüngsten (z. B. in der dritten) Zonen. So fand ich es bei Experimenten mit dem epicotylen Glied von *Phaseolus* keimlingen, die sich im Finstern, in Sägemehl wurzelnd, entwickelten. Das Epicotyl besass eine Länge von 70 mm, und es wurden in Entfernungen von nur je 5 mm Tuschestriche aufgetragen. Im Laufe von 48 Stunden und bei 15° C. wuchs die jüngste Partialzone um 1, die zweite um 3, die dritte um 8, die vierte um 6, die fünfte um 5, die sechste um 3 und die siebente um 1 mm. Es ergibt sich überhaupt immer, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Zellen mit fortschreitendem Alter mehr und mehr abnimmt, bis ihr Wachstum schliesslich völlig erlischt.

Haben wir die Vertheilung der Wachstumsgeschwindigkeit an unseren Untersuchungsobjecten constatirt, so versetzen wir sie in den plasmolytischen Zustand (vgl. unter 59) indem wir sie in eine 10-proc. Kochsalz- oder Salpeterlösung legen. 2—3 mm dicke Stengeltheile können ohne weiteres in die Salzlösung gebracht werden; dickere muss man vorher halbiren. Nach kürzerer oder längerer Zeit (3 bis 12 Stunden) ist vollkommene Plasmolyse eingetreten. Die Partialzonen haben sich in Folge der Aufhebung des Turgors verkürzt, und wenn man die Verkürzung auf die Anfangslänge der Zonen (also 5, 10 oder 20 mm) berechnet, so ergibt sich, dass sie in denjenigen Regionen der Stengeltheile im Allgemeinen oder genau am bedeutendsten ausgefallen ist, in welchen das ausgiebigste Wachstum stattfand. Es ist eine deutliche Relation zwischen der Grösse der Turgorausdehnung der Zellen der einzelnen Partialzonen und ihrer Wachstumsgeschwindigkeit vorhanden, ein Ergebniss, welches zu der Anschauung führt, dass die Geschwindigkeit des Flächenwachstums der Zellen von der Grösse ihrer Turgorausdehnung abhängt. Diese letztere wird nun aber bestimmt durch die Grösse der Turgorkraft und durch die Grösse des Widerstandes der gespannten Zellschichten (Protoplasma und Zellhaut). Dieser Widerstand hängt unter anderem von der Dehnbarkeit der gespannten Zellschichten ab, so dass es ein besonderes Interesse gewährt, die Grösse dieser Dehnbarkeit genauer zu ermitteln.

Wir benutzen z. B. ein 30 mm langes Epicotyl von *Phaseolus* zum Versuch, das wir in Partialzonen von je 5 mm Länge eingetheilt haben, dessen Wachstumsgeschwindigkeit wir ermittelten und das wir dann in den plasmolytischen Zustand versetzt haben. Der schlaffe Stengel wird vorsichtig auf eine Korkplatte gelegt, sein oberes Ende mit einer kleinen Korkplatte bedeckt, und diese letztere mittelst einer Klemmschraube gegen die erstere Platte angedrückt. An dem älteren Ende des Stengels befestigt man einen Faden mit einer Schlinge. Dieser wird angezogen, und, sobald die gewünschte Dehnung des Untersuchungsobjectes erzielt ist, mit Hülfe einer Nadel auf der Korkplatte festgesteckt. Die Dehnung wird nur so weit geführt, bis dem Stengel jene Länge künstlich aufgenöthigt worden ist, die er vor der Plasmolyse besass. Wir stellen mit Hülfe eines Millimetermaassstabes die Dehnungsgrösse der einzelnen Partialzonen fest und berechnen dieselbe auf gleiche Anfangslänge der Zonen (5 mm). Es ergibt sich, dass die Dehnbarkeit des Gewebes in den jüngeren Regionen des Pflanzentheiles erheblich viel grösser ist, als in den

älteren. Es lässt sich also eine Beziehung zwischen der Wachsthumsgeschwindigkeit, der Grösse der Turgorausdehnung der Zellen und der Dehnbarkeit des Gewebes in den einzelnen Partialzonen constatiren¹⁾. WORTMANN hat z. B. bei Experimenten mit einem jungen *Bohnenepicotyl*, das er durch Tuschestriche in 6 Zonen von je 5 mm Anfangslänge getheilt hatte, die folgenden Werthe für den Zuwachs der Partialzonen in 24 Stunden, für die Verkürzung in der Salzlösung und für die Längenzunahme bei der Dehnung erhalten.

Zone	Nach 24-stünd. Wachsthum bei 25 °C. Totallänge 64,5 mm	Partialzuwachs in 24 Stunden	Nach 10 Std. in der Lösung. To- tallänge 60,5 mm	Bei Dehnung des Ganzen auf die ursprüngliche Länge von 64,5 mm	Es ist demnach gedehnt worden	Auf gleiche Länge (10 mm) berechnet, ist ge- dehnt worden
I	8,5	3,5	7,5	8,5	1,0	1,33
II	17,5	12,5	16,0	18,0	2,0	1,25
III	17,5	12,5	16,5	17,5	1,0	0,60
IV	9,0	4,0	8,5	8,5	0,0	0,00
V	6,0	1,0	6,0	6,0	0,0	0,00
VI	6,0	1,0	6,0	6,0	0,0	0,00

Diese und andere Beobachtungen ergaben stets, was nicht völlig mit den von H. DE VRIES gewonnenen Resultaten übereinstimmt, dass die Zone grösster Dehnbarkeit in der jüngsten Region der Untersuchungsobjecte liegt und nicht mit der Zone ausgiebigsten Wachstums zusammenfällt. In den jüngsten Zonen ist die Turgorkraft der Zellen, wie WORTMANN (Botan. Zeitung, 1889, S. 250) constatirte, aber relativ gering, daher wachsen sie trotz hoher Dehnbarkeit ihrer Membranen noch nicht so sehr energisch. Das Maximum des Wachstums fällt in eine Zone, deren Zellen noch recht dehnbar sind und gesteigerte Turgorkraft entwickeln (daher auch hier die Turgorausdehnung der Zellen am grössten ist), während in den älteren Zonen das Wachsthum wieder langsamer wird, trotzdem die Turgorkraft der Zellen eine bedeutende Grösse behält, weil die Dehnbarkeit der Membranen sehr erheblich abnimmt.

148. Die Contraction der Wurzeln.

Bei aufmerksamer Beobachtung zahlreicher Pflanzen fällt es auf, dass, während die Keimlinge ihre Cotyledonen über der Erde ausbreiten und die Plumula mehr oder weniger aus der Erde hervorragt, die Ansatzstellen der Cotylen und der aus der Knospe hervorgetretenen Blätter später im Boden versteckt sind. Dies nachträgliche Hineinschieben der Ansatzstellen der Blattgebilde in den Boden kann nur

1) Die Grundgedanken unserer heutigen Wachstumstheorie sind von SACHS entwickelt worden. Vergl. darüber mein Lehrbuch d. Pflanzenphysiologie, S. 213. Bezüglich der angeführten Experimente ist auf die Arbeit von H. DE VRIES, Ueber mechanische Ursachen der Zellstreckung, Halle 1877, hinzuweisen. Ferner vergl. WORTMANN, Botan. Zeitung, 1889.

durch eine Contraction der Wurzeln verursacht werden, und in der That ist das Vorhandensein einer solchen von H. DE VRIES¹⁾ sicher festgestellt worden. Die Contraction, deren biologische Bedeutung darin zu suchen ist, dass durch sie den Knospen im Boden Schutz gewährt wird, kommt durch sehr eigenthümliche Wachstumsverhältnisse der Wurzeln zu Stande. In den Zellen der parenchymatischen Gewebe der Wurzeln herrscht ein starker Turgor. Dieser ist die Vorbedingung für das Zustandekommen des Wachstums. Aber da nun in den schon etwas älteren Wurzeln die Dehnbarkeit der Membranen der Zellen in der queren Richtung bedeutender ist als in der Richtung parallel zur Längsaxe der Wurzeln, so findet thatsächlich eine stärkere Dehnung der Zellen in jener als in dieser Richtung durch den Turgor statt, und es muss in Folge dessen eine Contraction der Organe eintreten. Die Verkürzung wird dann allmählich durch Wachstum fixirt. Für uns ist es nun von besonderem Interesse, die durch den Turgor hervorgerufene Wurzelcontraction genauer kennen zu lernen, denn sie ist ja die unerlässliche Vorbedingung für die nachträglich durch das Wachstum bedingte bleibende und nicht wieder rückgängig zu machende Verkürzung.

Wir säen Samen von *Carum carvi* im Sommer in gute Gartenerde im Freien aus und lassen die Pflanzen heranwachsen, bis sie 2—3 Monate alt geworden sind. Ich säete Ende Juli und benutzte das Untersuchungsmaterial Ende October. Man zieht die Pflanzen, wenn die Experimente über die Wurzelcontraction angestellt werden sollen, aus dem Boden heraus, schneidet das Kraut sofort ab, um vor einem erheblichen Wasserverlust der Wurzeln durch Transpiration der Blätter gesichert zu sein, bringt die Wurzeln ins Laboratorium und befreit sie nach dem Abwaschen und Abtrocknen von den Nebenzwurzeln sowie ihrem dünnen unteren Ende. Es kommt jetzt darauf an, die Wurzeln mit Tuschemarken zu versehen, und um dies auszuführen, legt man die zu untersuchende Wurzel auf eine Korkplatte, auf deren einer Längshälfte eine zweite Korkplatte befestigt ist, welche ungefähr die Höhe der zu verwendenden Wurzel besitzt. Die Wurzel wird nun gegen den Rand der oberen Korkplatte angelegt, mit Nadeln, welche dicht neben der Wurzel in die untere Platte gesteckt werden, befestigt, um endlich unter Benutzung eines Millimetermaassstabes und eines Pinsels Tuschestriche als Marken in bestimmten Entfernungen aufzutragen. Bei meinen Versuchen mit *Carum*-Wurzeln, die am oberen Ende, d. h. an ihrer morphologischen Basis, eine Dicke von 6—9 mm besaßen, betrug die Entfernung der beiden Marken 70—100 mm. Die Wurzeln gelangen jetzt in flache, mit Wasser angefüllte Glasschalen²⁾. Misst man die Entfernung der Marken von einander nun nach bestimmter Zeit zu wiederholten Malen, z. B. nach 2, 4, 24, 2×24 , 4×24 Stunden, so findet man, dass sie sich näher und näher rücken, bis endlich keine weitere Wurzelcontraction mehr eintritt. Die Grösse der Contraction ist erheblich; sie betrug in verschiedenen von mir beobachteten Fällen nach 24 Stunden 2,5—4 Proc.

Trocknet man die contrahirten Wurzeln ab, und legt man sie

1) Vgl. H. DE VRIES, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 9, S. 37.

2) Es ist zu empfehlen, die mit Marken versehenen Wurzeln vor dem Einbringen in das Wasser wenige Minuten in feuchter Luft liegen zu lassen, um das Adhären der Tusche zu sichern.

dann, um sie in den plasmolytischen Zustand zu versetzen, in Kochsalz- oder Kalisalpetrolösung, so ergibt sich, dass sich die Untersuchungsobjecte unter Erschlaffung schon nach einigen Stunden erheblich verlängert haben, eine eigenthümliche Erscheinung, die aber mit der Contraction der Wurzeln bei Erhöhung des Turgors ihrer Zellen durch Wasseraufnahme im genauesten Zusammenhange steht.

Wenn Wurzeln in Wasser liegen, so wächst natürlich, trotzdem sie sich verkürzen, ihr Gesamtvolumen und ebenso das Volumen ihrer einzelnen Zellen. Es erfolgt Ausdehnung der Zellen in der zur Längsaxe der Wurzel rechtwinkeligen Richtung; die Wurzel wird dicker, und wir stellen die folgenden Beobachtungen an, um diese Ausdehnung festzustellen.

Man stellt $\frac{1}{2}$ mm dicke Querschnitte aus den Carumwurzeln her, isolirt durch zwei parallele Schnitte einen mittleren Theil und zeichnet die Länge desselben bei schwacher Vergrößerung (etwa 10maliger) mit Hilfe des Zeichenprismas auf Papier auf. Die Schnitte gelangen nun sofort in Wasser. Zeichnet man ihre Länge nach etwa einer Stunde wieder auf, so ergibt ein Vergleich der neuen mit den früheren Zeichnungen, dass die Wurzelstreifen an Länge zugenommen haben. Misst man die Länge der gezeichneten Linien und dividirt die gefundenen Zahlen durch 10 (bei benutzter 10maliger Vergrößerung), so erhält man absolute Werthe für die Länge der Wurzelstreifen vor und nach der Wasseraufnahme.

149. Die Längsspannung.

Handelt es sich darum, die Thatsache festzustellen, dass in vielen Pflanzentheilen Längsspannungen vorhanden sind, so werden ganze, gerade gewachsene Internodien oder Stücke derselben auf dicken Carton, auf dem feine Linien gezogen worden sind, gelegt, und die Länge der Pflanzentheile durch zwei Punkte mittelst eines sehr spitzen Bleistiftes fixirt. Hierauf zieht man mit Hülfe eines scharfen Rasirmessers Streifen der einzelnen Gewebe der Internodien (Epidermis [gewöhnlich mit dem Collenchym verbunden], Rinde, Holz, Mark, das man durch Längsschnitte vom Holze befreit) vollständig und ohne Continuitätstrennung ab, legt die isolirten Streifen, ohne sie zu zerren, auf den Carton und fixirt ihre Länge durch Punkte. Man kann nun mit Hülfe eines Millimetermaassstabes die fixirte Länge der unversehrten Internodien sowie ihrer isolirten Gewebe feststellen. Die Beobachtungen, von denen hier die Rede ist, werden zweckmässig unter Benutzung lebhaft wachsender, etwa 50 mm langer Internodien von *Sambucus nigra*, *Nicotiana Tabacum*, *Vitis vinifera*, *Helianthus tuberosus* angestellt. Es ergibt sich stets, dass die Länge der isolirten Gewebestreifen von aussen nach innen zunimmt, und zwar ist das isolirte Mark lebhaft wachsender Internodien gewöhnlich weit länger, die isolirte Epidermis aber kürzer als das unversehrte Internodium, während ein isolirter Gewebestreifen, der sich ursprünglich zwischen Epidermis und Mark befand, genau oder nahezu die Länge des unversehrten Pflanzentheiles aufweist. Das Mark ist also stark positiv oder activ, die Epidermis negativ oder passiv gespannt.

Wird die Länge des unversehrten Internodiums = 100 gesetzt, und die Differenz zwischen der Länge der isolirten Epidermis sowie

des isolirten Markes in Procenten ausgedrückt, so erhält man Werthe (freilich nicht solche von absoluter Genauigkeit), durch welche die Spannungsintensität in den unverletzten Pflanzentheilen zum Ausdruck gelangt. Beträgt z. B. die Gesamtlänge eines zum Versuch benutzten Internodiums 50 mm, die Länge der isolirten Epidermis 49, diejenige des isolirten Markes 54 mm, so wäre die Spannungsintensität im unversehrten Pflanzentheil (auf 100 mm Länge desselben bezogen) durch die Zahl 10 ausgedrückt. In der That erhält man derartige Werthe häufig, wenn man z. B. Internodien von *Sambucus nigra* untersucht.

Es ist lehrreich, die Spannungsintensität in den einzelnen auf einander folgenden Internodien eines Sprosses nach der angegebenen Methode zu ermitteln. Wenn man die Längendifferenz der isolirten Epidermis sowie Markstreifen stets auf 100 berechnet, so erhält man vergleichbare Werthe, und es ergibt sich dann, dass die Spannungsintensität in den jüngsten Internodien gering ist, während sie in den schon etwas älteren zu bedeutender Höhe ansteigt, um in den noch älteren wieder viel geringer zu werden. Sprosse von *Sambucus nigra* sind hier besonders gute Untersuchungsobjecte.

Mit Bezug auf die Ursachen der Längsspannung in den Internodien ist zu bemerken, dass die Entstehung derselben in erster Linie auf die

Fig. 118. Der Länge nach halbirter Blüthenschafft von *Taraxacum officinale*, welcher, in Wasser gelegt, in Folge von Wasseraufnahme spiralige Einrollungen erfahren hat.

starke Turgescenz der Zellen des Markes zurückgeführt werden muss. Die Markzellen vermögen sehr grosse Wassermengen aufzunehmen. Das Mark sucht sich in Folge dessen möglichst zu strecken und ist bestrebt, die dehnbaren peripherischen Gewebe zu zerren. Diese sind aber nicht allein dehnbar, sondern zugleich elastisch und suchen ihrerseits das Mark zu comprimiren. Die bedeutende Turgescenz der Markzellen führt ferner ein besonders energisches Wachstum derselben herbei, ein Umstand, der die Spannungsgrösse in den Internodien noch mehr steigern muss. Wenn das Mark mit fortschreitendem Alter der Stengel sein Wasser verliert und nicht mehr wächst, so erlischt nun auch die Längsspannung. Dafür kommt aber in Verbindung mit dem jetzt eintretenden ausgiebigeren

Dickenwachsthum der Pflanzentheile die Querspannung zur Geltung, auf die wir unter 150 näher einzugehen haben.

Dass das Mark in der That das Vermögen besitzt, ohne Schwierigkeit beträchtliche Wassermengen aufzunehmen, lässt sich leicht in der Vorlesung über Pflanzenphysiologie unter Zuhülfenahme der Blüthenschäfte von *Taraxacum officinale* demonstrieren. Die mikroskopische Untersuchung eines Querschnittes lehrt, dass von aussen nach innen Epidermis, Collenchym, grünes Gewebe und Markparenchym folgen; im Grundgewebe liegen die Fibrovasalstränge. Spaltet man einen jungen Blüthenschafft der Länge nach und legt die erhaltenen Stücke in Wasser, so rollen sie sich unter den Augen des Beobachters rasch schneckenförmig ein, und zwar wird die Markseite convex (vgl. Fig. 118). Das Markgewebe nimmt schnell reichliche Wassermengen auf, seine Zellen strecken sich in Folge dessen, und dadurch kommt die spiralige Einrollung des Untersuchungsobjectes zu Stande. Wird ein Internodium einer Pflanze unmittelbar nach dem Abschneiden auf seine Spannungsgrösse in der früher angegebenen Weise

geprüft, ein zweites, das dem ersteren möglichst ähnlich sein muss, aber erst analysirt, nachdem dasselbe durch Liegen an der Luft etwas welk geworden ist, so findet man die Differenz zwischen der isolirten Epidermis und dem isolirten Mark für das erstere grösser als für das letztere, was wieder beweist, dass der Wassergehalt der Gewebe von hoher Bedeutung für die in den Pflanzentheilen herrschenden Spannungsgrössen ist ¹⁾.

150. Die Querspannung.

Handelt es sich darum, das Vorhandensein der Querspannung an irgend einer Stelle eines Stengels oder Stammes zu constatiren, so schneidet man an dieser Stelle eine Querscheibe heraus, misst den Umfang derselben mit Hülfe eines Papierstreifens, trennt durch einen senkrechten radialen Schnitt die Continuität der peripherischen Gewebe und schält dann die ganze Rinde von dem Untersuchungsobject ab. Der isolirte Rindenring wird nun wieder, ohne ihn zu dehnen, in seine natürliche Lage zurückgebracht. Es zeigt sich aber, dass seine Schnittflächen nicht mehr zusammenschliessen, woraus sich ergibt, dass die Rinde im unversehrten Stengel oder Stamm passiv oder negativ gespannt gewesen sein musste (vgl. Fig. 119). Bestimmt

man die Weite des Abstandes der Schnittflächen des nach dem Isoliren wieder in seine natürliche Lage zurückgebrachten Rindenringes durch Messung und subtrahirt den erhaltenen Werth von dem für den Umfang der unversehrten Querscheibe gefundenen, so erhält man eine Zahl, durch welche die Grösse des nach dem Isoliren verkürzten Rindenringes zum Ausdruck gelangt. Die Spannungsintensität kann schliesslich leicht in Procenten des ursprünglichen

Fig. 119. Querscheibe aus einem Ast von *Prunus*. Die Rinde ist zunächst abgelöst und dann wieder um den Holzkörper gelegt worden.

Umfanges des Untersuchungsobjectes angegeben werden. Geeignete Untersuchungsobjecte zur Constatirung des Vorhandenseins der Querspannung sind *Helianthus*stengel sowie 5—10-jährige Stamm- oder Aststücke von *Prunus*-, *Pyrus*- oder *Salix*arten. Ich habe z. B. 5 mm hohe Querscheiben aus Aesten von *Prunus insititia* und einer *Salix*art auf ihre Spannungsintensität geprüft. Umfang der Querscheiben 106 (*Prunus*), resp. 132 (*Salix*) mm. Abstände der Schnittflächen 4,5, resp. 6 mm. Spannungsintensitäten 4,2, resp. 4,5 Proc.

Ermittelt man die Spannungsintensität in der angegebenen Weise gleichzeitig an verschiedenen Stellen eines Stammgebildes, indem man z. B. aus einem Stengel von *Helianthus annuus* an der Basis, in der Mitte sowie am oberen Ende Querscheiben herausschneidet, um von diesen Rindenringe zu isoliren, so ergibt sich im Allgemeinen, dass die Intensität der Querspannung in den jüngeren Regionen des Untersuchungsobjectes relativ gering ist, in den älteren aber erheblich zunimmt.

1) Vgl. KRAUS, Botan. Zeitung, 1867. Mancherlei Angaben, die für die Beurtheilung der sich auf die Gewebespannung beziehenden Verhältnisse von Wichtigkeit sind, finden sich in meinem Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, 1883, S. 229.

Das Auftreten beträchtlicherer Querspannung in den Stengeln und Stämmen ist an das Stattfinden ausgiebigeren Dickenwachstums derselben gebunden. Der Umfang der centralen Gewebe (zumal des Holzes) nimmt in Folge des Dickenwachstums bedeutender zu als derjenige der peripherischen. Diese werden daher gedehnt und verkürzen sich beim Isoliren. Die producirt Holzmasse besitzt nun aber keineswegs stets den gleichen Umfang; vielmehr kann die Grösse desselben beträchtliche Schwankungen erfahren, eine Thatsache, die sich leicht erklärt, wenn man bedenkt, dass der jeweilige Gehalt des Holzes an Imbibitionswasser von bedeutsamem Einfluss auf dessen Volumenverhältnisse ist. Erhöhung des Wassergehaltes des Holzes muss danach eine Steigerung der Spannungsintensität im Stamme zur Folge haben. Wenn man z. B. Querscheiben aus einem Ast von *Prunus insititia* herstellt, die Spannungsintensität einiger Querscheiben sofort ermittelt, diejenige anderer aber erst feststellt, nachdem die Untersuchungsobjecte 24 Stunden lang in Wasser gelegen haben, so findet man die Spannung in den letzteren grösser als in den ersteren. Bei Versuchen, die ich mit etwa 15 mm hohen und ca. 100 mm Umfang besitzenden *Prunus*querscheiben ausführte, stieg die Intensität der Querspannung durch 24-stündiges Verweilen derselben in Wasser von 4,5 auf 5,5 Proc. Mit Bezug auf die Abhängigkeit der Spannungsverhältnisse von anderen äusseren Factoren (Temperatur, Licht) verweise ich auf die Abhandlung von G. KRAUS in der Botanischen Zeitung sowie auf mein Lehrbuch der Pflanzenphysiologie. Ebenso sind an diesen Stellen die merkwürdigen, freilich noch lange nicht eingehend genug studirten Erscheinungen der Periodicität der Gewebespannung besprochen.

151. Die Vegetationspunkte und das Längenwachsthum der Pflanzen.

Die Vegetationspunkte der Pflanzenorgane sind je nach Umständen von sehr verschiedenartiger Beschaffenheit. Für unsere Zwecke genügt

Fig. 120. Längsschnitt durch den Vegetationskegel von *Hippuris vulgaris*. *d* Dermatogen, *pr* Periblem, *pl* Plerom, *f* Blattanlage. Vergr. 240. (Nach STRASBURGER.)

es, den Vegetationspunkt von *Hippuris vulgaris* genauer ins Auge zu fassen; ähnlich wie bei dieser Pflanze ist er auch in anderen Fällen gebaut. Wir schneiden von recht kräftig entwickelten Sprossen die Endknospe in einer Länge von etwa 1 cm ab, entfernen die vorhandenen Blätter so viel wie möglich und stellen zarte Längsschnitte aus der Knospe her. In Fig. 120 erblicken wir das Bild eines wohl gelungenen medianen Längsschnittes. Es ist erforderlich, die Schnitte, um die Anordnung der Zellen des Vegetationskegels klar und deutlich erkennen zu können, aufzuhellen, was z. B. dadurch erreicht wird, dass wir die Präparate mit concentrirter Kalilauge behandeln, dann mit

Wasser auswaschen und in concentrirte Essigsäure legen. Die Scheidewände der mantelförmig über einander gelagerten Zellschichten bilden eine Schaar confocaler Parabeln. Die äusserste Zellschicht, aus der die Epidermis hervorgeht, bezeichnet man als Dermatogen (*d*). Es folgt dann das die Stengelrinde erzeugende, mehrschichtige Periblem (*pr*). Endlich folgt das Plerom (*pl*), aus welchem, wie tiefer am Schnitt constatirt werden kann, der axile Gefässbündelcylinder des Stengels hervorgeht. Bei *Hippuris*, keineswegs aber bei allen höheren Pflanzen, ist also eine scharfe Trennung des Dermatogens, Periblems und Pleroms am Vegetationskegel vorhanden.

Die Anordnung der Zellen in den Vegetationspunkten entspricht nach SACHS ¹⁾ dem von diesem Forscher aufgestellten Princip der rechtwinkligen Schneidung. Die Antiklinen, d. h. die senkrecht die Oberfläche des Vegetationspunktes treffenden Zellwände, und die Periklinen, d. h. die mit der Oberfläche gleichsinnig gekrümmten Wände, schneiden sich in rechten Winkeln. Die antiklinen Wände stellen also eine Schaar orthogonaler Trajectorien für die Periklinen dar. Die Erscheinung, dass die Zellwände in einem rechten Winkel auf einander treffen, ist übrigens sehr allgemein im Pflanzenreich zu beobachten. In einfacher Form können wir die rechtwinkelige Schneidung bei der Untersuchung von Algenfäden (z. B. *Spirogyra*) feststellen.

ERRERA ²⁾ und BERTHOLD ³⁾ haben nun neuerdings betont, dass es ein noch allgemeineres Princip als dasjenige der rechtwinkligen Schneidung für die Anordnung der Membranen giebt. Es ist dies das Princip der kleinsten Oberflächen. Viele Erscheinungen, z. B. diese, dass die Zellwände oft nicht in einem rechten, sondern im spitzen Winkel auf einander treffen (vergl. BERTHOLD, S. 231 und 253), sind nur unter Berücksichtigung des zuletzt erwähnten Principes verständlich, wie die genannten Autoren auch näher ausführen. Dieselben kommen zu dem Resultat, dass die Gruppierung der Membranen von den nämlichen Gesetzen beherrscht wird, welche ebenfalls für die Ausbildung von Flüssigkeitslamellen maassgebend sind. Für diese ist das Princip der kleinsten Oberflächen, wie zumal PLATEAU nachwies, entscheidend, und es gewährt daher Interesse, einige Experimente anzustellen, welche dies darzuthun im Stande sind.

Wir lösen 3,75 g gepulverte medicinische Seife (aus der Apotheke zu beziehen) in einem Gemisch von 187,5 g destillirtem Wasser und 75 g concentrirtem Glycerin auf. Die Lösung kocht man einmal auf und kann sie dann lange aufbewahren. Nun verfertigt man sich Modelle verschiedener Körper (Würfel, Tetraëder, Cylinder) aus Draht. Der Draht wird dertartig zusammengebogen, dass er die Kanten der erwähnten Körperformen bildet. Beim Cylinder wird die obere Kreisfläche mit der unteren durch drei Drähte verbunden. Modelle von etwa 50 mm Höhe genügen vollkommen. Die Seifenlösung wird in ein Becherglas gebracht, und nun taucht man die Modelle an einem an geeigneter Stelle befestigten Draht in dieselbe ein. Hebt man die Modelle aus der Lösung heraus, so sieht man zwischen den Drahtkanten Seifenlamellen ausgespannt. Dieselben sind nun eben, wie die specielle Prüfung und mathematische Rechnung ergibt, nach dem Princip der kleinsten Oberflächen angeordnet. Zerstört man eine der ausgespannten Lamellen durch vorsichtiges Berühren mit

1) Vgl. SACHS, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2.

2) Vgl. ERRERA, Ber. d. Deutschen botan. Gesellsch., 1886, S. 441.

3) BERTHOLD, Studien über Protoplasma-mechanik, 1886, S. 219.

einem Glasstab, dann wird in dem Lamellensystem ein neuer Gleichgewichtszustand angestrebt und durch Bildung oft sehr merkwürdiger Lamellenformen erzielt, die aber immer dem erwähnten Princip Genüge leisten.

Sehr lehrreich ist das folgende Experiment. Ein auf 4 Drahtstiften von ca. 1 cm Höhe ruhendes Drahtquadrat von ca. 60 mm Seitenlänge wird mittelst eines an geeigneter Stelle befestigten Drahtes in die Seifenlösung eingetaucht. Das aus der Lösung herausgenommene Drahtmodell wird in horizontale Lage gebracht und auf die ausgespannte Lamelle ein Faden in beliebiger Weise aufgelegt, dessen Enden man mit einander verknüpft hat. Durchsticht man die Seifenlamelle

nun mit Hilfe eines Glasstabes an einer Stelle, die innerhalb der von dem Faden umgrenzten Zone liegt, so bildet die Lamelle sofort eine Minimalfläche, und der Faden ordnet sich daher in Kreisform an.

Wollen wir Wurzelvegetationspunkte untersuchen, so stellen wir mediane Längsschnitte aus den Wurzeln von *Zea Mays* oder *Hordeum* her. Es ist hier auch ein Dermatogen, Periblem und Plerom vorhanden; besonders auffallen wird uns die Wurzelhaube, welche den Scheitel der Wurzeln bedeckt.

Die Zellen der Vegetationspunkte der Stengel und Wurzeln sind in lebhafter Theilung begriffen. Ein ausgiebiges Flächenwachstum, das zur Streckung der Organe führt, erfahren die Zellen erst, wenn sie etwas älter geworden sind¹⁾.

Bezüglich der weiteren Ausbildung der in den Vegetationspunkten erzeugten Elemente ist namentlich zu betonen, dass dieselbe entweder an der Spitze oder der Basis der neu entstehenden Organe stattfinden kann. Halten wir uns hier an diejenigen Verhältnisse, welche beim Wachstum der Sprossachsen höherer Pflanzen beobachtet werden können.

Bei den Gräsern — aber auch bei manchen anderen Gewächsen — bewahrt das an der Basis der einzelnen Internodien von der Blattscheide umschlossene Gewebe der Axe längere Zeit einen jugendlichen Charakter, während die höher liegenden Theile der Internodien schon in Dauergewebe übergegangen sind. Diese merkwürdige Thatsache des Vorhandenseins einer basalen, intercalaren Vege-

Fig. 121. Unterer Theil eines Internodiums aus dem Halme von *Secale*. Das Stück *a* ist durch intercalares Wachstum hervorgeschoben worden.

1) Auf Grund der Ergebnisse der neueren Untersuchungen von ZIMMERMANN, CORRENS, ZACHARIAS, KLEBS u. A. darf man wohl behaupten, dass das Flächenwachstum der Zellhäute unter normalen Umständen durch Apposition und Intussusception vermittelt wird. Jene führt zur Anlagerung neuer Zellstoffschichten, diese zur Einlagerung neuer Cellulosemoleküle. Das Wachstum turgorloser Zellen (vergl. KLEBS, Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen, Bd. 2, S. 561) wird allein durch Apposition vermittelt; ebenso erfolgt das normale Dickenwachstum der Zellhäute (und auch das Wachstum der Stärkekörner) durch Apposition.

tationszone lässt sich sehr leicht durch das folgende Experiment demonstrieren. Wir schneiden aus einem Halm von *Secale* ein Internodium heraus. Dasselbe wird in eine obere und eine untere Hälfte zerlegt. Wir stellen nun die beiden Stücke des Internodiums, die mit ihrer Basis in Wasser eintauchen, unter eine Glasglocke und finden nach Verlauf von 24 Stunden, dass sich an der oberen Hälfte des Internodiums keine Wachsthumsvorgänge geltend gemacht haben, wohl aber an der unteren. In Fig. 121 ist die untere Hälfte eines Internodiums von *Secale*, nachdem dieselbe 24 Stunden in feuchter Luft verweilt hatte, dargestellt. *K* ist das Knotengelenk. Der Theil *a* ist durch Wachsthumsprozesse aus den äusseren Theilen hervorgeschoben worden.

Bei der Bohne (*Phaseolus*) und bei vielen anderen Pflanzen befindet sich die in Streckung begriffene Region der Internodien an der Spitze derselben. Wenn man z. B. am oberen Ende des zweiten Internodiums einer Bohne, d. h. desjenigen Stengelgliedes, welches auf das Epicotyl folgt, zwei Tuschestriche als Marken in einiger Entfernung von einander anbringt, während das dritte Internodium schon lebhaft Streckung zeigt, so ergibt sich nach 24 Stunden, dass die Entfernung der Marken erheblich grösser geworden ist. Die Bohneninternodien wachsen noch an ihrer Spitze, nachdem ihre basalen Theile bereits aufgehört haben zu wachsen; sie verhalten sich also ganz anders wie die Internodien der Gräser.

152. Das Dickenwachsthum.

Das Dickenwachsthum verschiedener Pflanzen und Organe geht durchaus nicht in ein und derselben Weise vor sich. Wir wollen uns hier darauf beschränken, das Dickenwachsthum der Stammgebilde und Wurzeln einiger dicotyler Gewächse ins Auge zu fassen.

Fig. 122. Querschnitt durch einen 5 mm dicken Zweig von *Aristolochia Sipho*. *m* Mark, *fv* Gefässbündel, und zwar *vl* Gefässtheil, *cb* Siebtheil, *fc* Fascicularcambium, *ifc* Interfascicularcambium, *p* Cribralparenchym an der Aussenseite des Siebtheiles, das den Uebergang zum Grundgewebe vermittelt, *pc* Pericykel, *sk* Sklerenchymring, *e* Stärkeseide, *c* grüne Rinde, *cl* Collenchym. Vergr. 9. (Nach STRASBURGER.)

Wir nehmen zunächst eine 3–4 mm dicke Sprossaxe von *Aristolochia Siphon* in Untersuchung und können frisches Material oder Alkoholmaterial verwenden. In Fig. 122 ist das Bild eines zarten Querschnittes bei schwacher Vergrößerung dargestellt. Man orientirt sich leicht, und es sei hier besonders darauf aufmerksam gemacht, dass die in einem Kreise angeordneten Gefässbündel noch ziemlich weit von einander getrennt

sind. Das aus schmalen, radial angeordneten Zellen bestehende Fascicularcambium (*fc*) der einzelnen Stränge setzt sich zwischen diesen in das aus dem Parenchym des Grundgewebes hervorgegangene Interfascicularcambium (*ifc*) fort, und dadurch entsteht ein geschlossener Cambiumring.

Bei weiterer Entwicklung der Sprossachsen von *Aristolochia* erzeugt nun das Cambium (hier nur das Fascicularcambium) nach innen fortdauernd Holz-, nach aussen Bastgewebe. Das auf diese Weise zu Stande kommende Dickenwachsthum der Stammtheile führt zumal zu einer sehr bedeutenden Massenzunahme des Holzkörpers der Fibrovasalstränge, wie man sofort erkennt, wenn man z. B. Querschnitte aus 10 mm dicken *Aristolochia*stengeln untersucht. Wir erblicken dabei auch etwa 10 primäre Markstrahlen, die den Holzkörper seiner gesammten Dicke nach durchsetzen, also vom Cambium bis zum Mark reichen. Secundäre Markstrahlen sind in beträchtlicher Anzahl vorhanden. Zu achten ist noch darauf, dass in der Peripherie der älter gewordenen Sprossachsen Peridermbildung eingetreten, und dass der in den jüngeren Pflanzentheilen geschlossene Sklerenchymring (vgl. Fig. 122 *sk*) in einzelne Stücke zerlegt ist.

Ein günstiges Object zur Orientirung über diejenigen Veränderungen, welche in Stammtheilen in Folge des Dickenwachsthums derselben eintreten, stellt auch das hypocotyle Glied von *Ricinus communis* dar. In Fig. 112 ist das Bild des Querschnittes eines Gefässbündels aus dem völlig gestreckten Hypocotyl von *Ricinus* dargestellt. Wir untersuchen Alkoholmaterial und stellen ohne Mühe das Vorhandensein des Interfascicularcambiums und des Fascicularcambiums fest. In Folge des Dickenwachsthums des *Ricinus*stengels wird nach innen secundäres Holz, nach aussen secundäres Bastgewebe erzeugt.

Wir stellen uns Schnitte aus dem oberen Theil der Wurzel einer Keimpflanze von *Phaseolus multiflorus* her, die eben beginnt, die ersten Nebenwurzeln zu bilden. Wir erblicken die Epidermis, das Rindengewebe und den die Gefässbündel einschliessenden Centralcylinder. Dieser wird in seinem ganzen Umfange von einem eigenthümlichen Gewebe umgeben, welches man als Endodermis bezeichnet. Besonders charakteristisch ist für die Wurzeln, dass der Holz- und Basttheil ihrer Gefässbündel eine wesentlich andere Anordnung wie in den Sprossen besitzen. Es sind nämlich in den Wurzeln mehrere Xylembündel vorhanden, mit denen ebenso viele, mehr nach der Peripherie des Centralcylinders gerückte Phloëmbündel alterniren. Der Querschnitt der Bohnenwurzel zeigt uns vier Xylem- und vier Phloëmbündel; wir bezeichnen sie daher als tetraarch. Wenn mit fortschreitender Entwicklung der Wurzeln das Dickenwachsthum derselben sich geltend macht, so verwandelt sich das zwischen den Xylem- und Phloëmbündeln vorhandene Gewebe in Cambium. Es entsteht ein geschlossener Cambiumring, der nun nach innen secundäres Holz, nach aussen secundären Bast erzeugt.

153. Apparate zur Messung der Zuwachsbewegungen.

Zur Demonstration der Zuwachsbewegungen eignet sich besonders ein Apparat, der von SACHS zuerst benutzt wurde und als „Zeiger am Bogen“ bekannt ist. Dieser Apparat, in Fig. 123 in der Form, wie er von PFEFFER construiert worden ist, dargestellt, kann in sehr guter Ausführung im Preise von 60 Mk. vom Universitätsmechaniker ALBRECHT in Tübingen bezogen werden.

Der an die Pflanze angekuppelte Faden f ist über die auf den Mittelpunkt des Quadranten q centrirte Rolle r geführt. Als Untersuchungsobjecte benutzte ich zumal junge Keimpflanzen von *Phaseolus*, die sich in Gartenerde, mit welcher Blumentöpfe angefüllt waren, so weit entwickelt hatten, dass das Epicotyl etwa 2 cm aus dem Boden hervorragte. Der Faden kann leicht mit einer Schlinge an der Pflanze befestigt werden. Die Rolle trägt einerseits den Zeiger z , andererseits den Arm a , welcher den Faden f durch eine Durchbrechung zu führen gestattet und ferner die zum Aequilibriren des Zeigergewichtes, respect. zur Herstellung

Fig. 123.

Fig. 123. Zeiger am Bogen. (Nach PFEFFER.)

Fig. 124.

Fig. 124. Auxanometer. (Nach PFEFFER.)

eines gewissen einseitigen Uebergewichtes dienende verstellbare Kugel k trägt. Am besten ist es, den Zeiger vollkommen zu äquilibriren und das einseitig gewünschte Uebergewicht durch einen entsprechend über die Rolle geführten, durch ein Gewicht gespannten Faden herzustellen. Der Quadrant hat 70 cm Radius; die Rolle r ist klein, so dass eine etwa 43-fache Vergrößerung des Zuwachses von dem aus einem sich verjüngenden Messingrohr gebildeten Zeiger z angezeigt wird. Der Quadrant ist an dem schweren Eisenstativ e verschiebbar; er muss zitterfrei aufgestellt werden, z. B. auf einem Consoltisch, der an einer massiven Wand angeschlagen ist.

Für viele Zwecke ist es bei genaueren Untersuchungen über Wachsthumsvorgänge sehr wünschenswerth, ja oft nothwendig, einen Apparat

zu haben, der die Zuwachsgrösse selbstthätig registriert. SACHS¹⁾ hat einen solchen Apparat, das selbstregistrirende Auxanometer, zuerst construiert. Nach ihm gaben WIESNER, BARANETZKY, PFEFFER²⁾ und Andere der Vorrichtung veränderte Form, und am aller leistungsfähigsten dürfte wohl der Apparat von PFEFFER sein, der im Preis von 320 Mk. vom Universitätsmechaniker ALBRECHT in Tübingen bezogen werden kann. Aufstellung der Vorrichtung (Fig. 124) auf einem zitterfreien Tisch ist natürlich Hauptbedingung für das Gelingen der Experimente³⁾. „Der an die Pflanze gekuppelte Faden wird über das kleine Rad x geführt, das mit dem grossen Rad r verkettet und mit diesem auf dem gleichen Mittelpunkt genau centriert ist. Ein an dem grösseren Rad befestigter und um dieses geschlungener Faden trägt den in unserer Aufstellung mit dem Zuwachs sich senkenden Zeiger z , der durch ein an einem entgegengesetzt geschlungenen Faden befestigtes Gewicht g äquilibrirt wird. Die berusste Trommel t wird durch ein in einem schweren Eisenkasten L befindliches Federuhrwerk getrieben, dessen Regulation ein conisches Pendel p besorgt. Die 70 cm hohe Trommel erlaubt durch Umsetzung der Führungsachse f eine centrale und eine excentrische Stellung, kann ausserdem mitsamt der Achse aus den Lagern (bei L) entfernt werden. Die Spitze des horizontalen, aus Messing gefertigten und nicht zu leichten Zeigers hat, wie die Figur zeigt, auf der Trommel zu schleifen, die in einer Stunde eine Umdrehung macht. Die Anpressung gegen die Trommel wird durch eine dem Faden gegebene Torsion erreicht, und wenn die excentrisch gestellte Trommel nur zeitweise gestreift werden soll, gleitet der Zeiger inzwischen auf der zwischen den verstellbaren Backen b ausgespannten Darmsaite. In der hier abgebildeten Zusammenstellung liefert das Auxanometer eine 15-fache Vergrösserung des Wachstums.“

Die Befestigung des Fadens (Seidenzwirn) an der Pflanze kann leicht dadurch erreicht werden, dass man an dem einen Fadenende eine Schlinge anbringt, das andere Fadenende durch diese hindurchsteckt, um den Faden endlich um das obere Ende eines Internodiums unmittelbar unter die Basis eines Blattes zu legen.

Um die Fehlerquellen des Apparates, soweit sie ihren Grund in den hygroskopischen Eigenschaften der Fäden haben, möglichst einzuengen, empfiehlt es sich, nur für die über die Rollen laufenden und zur Ankuppelung an die Pflanze dienenden Theile der Fäden Seidenzwirn, sonst aber dünnen Silber- oder Platindraht, der an beiden Enden scharf umbogend ist, so dass leicht kleine Fadenschlingen befestigt werden können, zu verwenden.

Stellt man die Beobachtungen bei Lichtzutritt an, so muss man senkrecht und parallel zu dem Fenster einen Spiegel hinter die Pflanze stellen, um die störenden heliotropischen Krümmungen auszuschliessen. Die Experimente sind ferner in einem Raume, der möglichst geringe Temperaturschwankungen erfährt, auszuführen. Temperaturbestimmungen sind natürlich stets vorzunehmen (Näheres vergleiche unter 77). Der Boden, in welchem die Pflanzen bereits geraume Zeit gewurzelt haben, muss

1) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 113.

2) PFEFFER, Handbuch d. Pflanzenphysiologie, Bd. 1, S. 86.

3) Der hier abgebildete und zu beschreibende Apparat ist derselbe, den auch PFEFFER in seinem Handbuche erwähnt. Neuerdings ist das Auxanometer noch in einiger Hinsicht von PFEFFER verbessert worden und in dieser Form zu dem erwähnten Preise aus Tübingen zu beziehen.

längere Zeit vor dem Versuch begossen worden sein und darf während der Beobachtungen nicht austrocknen.

Der rotirende Cylinder des Auxanometers muss noch vor dem Gebrauch des Apparates mit Papier überklebt werden. Man legt dazu ein hinreichend grosses Stück auf einer Seite geglätteten Glacépapiers auf den Tisch, überstreicht die raue Seite des Papiers gleichmässig mit einem mässig feuchten Schwamm, überzieht die beiden langen Ränder mit Gummilösung und rollt den Cylinder über das Papier hin. Wenn das Papier angetrocknet ist, führt man den Cylinder so über einer grossen, breiten Terpentinflamme hin und her, dass das Papier gleichmässig mit Russ bedeckt wird. Beim Gebrauch des Auxanometers kommt der in Folge des Wachstums in Bewegung versetzte Zeiger z bei excentrischer Trommelstellung stündlich einige Zeit lang mit dem rotirenden Cylinder in Berührung und entfernt den Russ an den Berührungsstellen von der Cylinderoberfläche. Bestimmt man die Entfernung der entstehenden Linien von einander, nachdem man das berusste Papier von der Trommel abgenommen, zur Fixirung der Linien durch eine alkoholische Colophoniumlösung gezogen und getrocknet hat, so gewinnt man unmittelbar einen Maassstab zur Feststellung der Grösse der Zuwachsbewegung des Untersuchungsobjectes. SACHS hat sich über Art der Messung sowie überhaupt über die ganze Methode der Untersuchung und deren Fehlerquellen so eingehend geäussert, dass wir noch besonders auf seine citirte Arbeit, zumal S. 116, 118 und 119, hinweisen.

Das selbstregistrirende Auxanometer kann bei zahlreichen Untersuchungen über das Wachstum Verwendung finden. Ganz insbesondere ist es unentbehrlich, wenn es sich darum handelt, näheren Aufschluss über den Verlauf der täglichen Periode des Wachstums von Internodien zu gewinnen (vgl. weiter unten).

Unentbehrlich für genaue Messungen sehr kleiner Zuwachsbewegungen vertical wachsender Pflanzentheile ist ein horizontal gestelltes Mikroskop (oder Fernrohr). Sehr empfehlenswerth ist der in der Fig. 125 abgebildete QUINCKE-PFEFFER'sche Apparat, der im Preise von 110 Mk. vom Universitätsmechaniker ALBRECHT in Tübingen bezogen werden kann. „Der Tubus des Mikroskops wird durch den Trieb t auf das zu beobachtende Object eingestellt. Zur groben Verschiebung in verticaler Richtung dient die in der Hülse h bewegliche Säule s , während mit der Mikrometerschraube m die feine Einstellung erzielt und das Object von neuem eingestellt wird, wenn es die Scala des Ocularmikrometers durchlaufen hat. Mit Hülfe dieser genau gleichförmig geschnittenen Schraube kann man zugleich, analog wie mit einem Kathetometer, grössere, das Gesichtsfeld überschreitende Distanzmarken messen. Bei dem Instrument entspricht z. B. eine Umdrehung 0,792 mm, und auf der in 100 Theilen getheilten Trommel können $\frac{1}{2}$ -Theilstriche exact abgelesen werden. Die Horizontalstellung des Tubus wird durch die Stellschrauben r erreicht und durch die Libelle L controlirt.“

Fig. 125. Horizontales Messmikroskop. (Nach PFEFFER.)

Bemerkt sei noch, dass der Focalabstand des Mikroskops bei 20-facher Vergrößerung 80 mm beträgt. Das Ocularmikrometer ist in 120 Theile getheilt. Jeder Theilstrich hat bei 20-facher Vergrößerung den Werth von 0,07 mm; der Werth einer Schraubenumdrehung beträgt, wie gesagt, 0,792 mm. Die Schraube gestattet, Strecken bis zu 3 cm, das Mikrometer Strecken bis zu 8 mm zu messen. Beide Messungsweisen können Verwendung finden.

Bei der Benutzung des beschriebenen Mikroskops ist dasselbe vor allem zitterfrei aufzustellen, z. B. auf einem geeigneten Consoltisch oder auf einer festen Tischplatte, die von einem starken hölzernen Dreifuss getragen wird und vertical verschiebbar ist. Auf dem Tisch steht ferner ein Klinostat (vgl. im fünften Abschnitt), dessen Axe vertical gerichtet ist, so dass sich die mit derselben verbundene Scheibe langsam in horizontaler Ebene bewegt (Umdrehungszeit etwa eine Stunde). Als Untersuchungsobjecte können wir zunächst Fruchttträger von *Phycomyces* oder *Mucor* benutzen.

Ein Stück Brot wird zur Sterilisirung nach dem nicht zu starken Durchfeuchten mit $\frac{1}{10}$ -proc. Traubenzuckerlösung in einer mit Glasplatte bedeckten Glasschale längere Zeit lang im Trockenschrank bei 100° C. belassen und nach dem Abkühlen mittelst einer sterilisirten Nadel mit wenigen *Phycomyces*sporen oder *Mucorsporen* besät¹⁾. *Mucorsporen* kann man leicht nach dem unter 36 angegebenen Verfahren gewinnen. Das Brot bleibt unter einer Glasglocke im Dunkeln so lange sich selbst überlassen, bis die Fruchttträger genügende Grösse erlangt haben; es wird dann in einer Glasschale auf die Scheibe des Klinostaten gestellt und abermals mit einer Glasglocke, die zur Aufnahme eines Thermometers tubulirt sein muss, bedeckt. Die Fruchttträger wachsen jetzt, wenn der Klinostat in Bewegung gesetzt wird, auch bei Lichtzutritt gerade in die Höhe. Heliotropische Krümmungen können unter den bezeichneten Umständen nicht zur Geltung kommen. Bevor das Uhrwerk des Klinostaten in Gang gebracht worden ist, haben wir unser Mikroskop derartig auf einen Fruchttträger eingestellt, dass der Scheitel des Sporangiums einen Theilstrich des Ocularmikrometers scheinbar berührt. Beginnt jetzt der Versuch, so gelangt das Sporangium bei einständiger Rotationsdauer der Scheibe des Klinostaten erst nach einer Stunde wieder deutlich ins Gesichtsfeld. Die Zuwachsgrösse kann durch Drehung der Schraube *m* (Fig. 125) leicht bestimmt werden. Unsere Fruchttträger erfahren in einer Stunde nicht selten einen Zuwachs von 1—2 mm, und sie gestatten es auch, die Untersuchungen längere Zeit fortzusetzen (weitere Experimente nach dieser Methode vgl. weiter unten).

Kommt es darauf an, die in kurzen Zeiträumen stattfindende Zuwachsbewegung an Keimstengeln (z. B. am Hypocotyl von *Lepidium*) zu constatiren, so sind auf den Untersuchungsobjecten feine Striche mit chinesischer Tusche anzubringen. Die Keimlinge werden alsbald, nachdem ihre Entwicklung begonnen hat, mit Hülfe von Watte so in kleine Gläschen eingesetzt, dass ihre Wurzeln in Wasser eintauchen, oder man cultivirt die Untersuchungsobjecte in kleinen Thoncyllindern in Sägespänen. Ihr weiteres Wachsthum erfolgt bei langsamer Drehung des Klinostaten unter einer Glasglocke, und bei den mikroskopischen Messungen dienen scharfe Ecken oder Kanten der aufgetragenen Tuschestriche als Distanzmarken.

1) Besser ist es noch, einige Sporangien in sterilisirtes Wasser zu bringen, in welchem sie alsbald platzen und ihre Sporen entlassen, um dann das Brot mit einigen Tropfen der sporenhaltigen Flüssigkeit zu inficiren.

154. Die grosse Wachstumsperiode.

Es ist eine Thatsache von fundamentaler physiologischer Bedeutung, dass alle wachsenden Pflanzentheile (Wurzeln, Stengel, Blätter etc.) selbst bei constant bleibenden äusseren Bedingungen in auf einander folgenden gleichen Zeitabschnitten nicht die nämlichen Zuwachse erfahren. Jeder Pflanzentheil wächst im Beginn seiner Entwicklung langsam; allmählich wird das Wachstum lebhafter, erreicht ein Maximum der Geschwindigkeit, um dann wieder langsamer zu werden und schliesslich völlig zu erlöschen. Will man sich zunächst ganz im Allgemeinen über diese Thatsache unterrichten, so genügt es, einige Erbsensamen nach dem Anquellen in eine Krystallisirschale zu legen, welche nur so viel Wasser enthält, dass die Samen halb von demselben bedeckt sind. Oder man befestigt den eben angekeimten Samen einer Erbse oder Bohne mit Hülfe von Watte in der Bohrung eines Korkes, der ein mit Wasser angefülltes Glasgefäss verschliesst, so dass die Wurzel in die Flüssigkeit hineinwächst. Die Keimung der Samen erfolgt im Dunkeln bei möglichst constanter Temperatur (etwa 20° C.), und man stellt täglich zu bestimmter Stunde die Länge der Keimwurzeln fest. Es ergibt sich, dass die Zuwachsgrösse jeder Wurzel zunächst relativ gering ist, allmählich beträchtlicher wird, früher oder später (bei meinen Versuchen, die bei 16° C. ausgeführt wurden, am 9. Tage) ein Maximum erreicht, um dann wieder geringfügiger zu werden.

Wir quellen schön ausgebildete Samen von *Pisum*, *Phaseolus* oder *Vicia Faba* 24 Stunden lang in Wasser ein. Die Samen werden dann in feuchte Sägespäne eingelegt, die vorher jedesmal zwischen den flachen Händen gerieben und zu einem möglichst lockeren Keimbett in grossen Holzkästen oder Blumentöpfen angehäuft waren. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die austretenden Wurzeln keine Krümmungen zu machen brauchen, um senkrecht nach abwärts wachsen zu können. Die *Viciasamen* legen wir derartig in die Sägespäne, dass ihre Mikropyle nach abwärts gerichtet ist. Den *Phaseolussamen* ertheilen wir eine horizontale Lage, so dass die austretende Hauptwurzel einen rechten Winkel mit der Längsachse des Samens bildet. Haben die Wurzeln eine Länge von 1,5—2 cm erreicht, so werden die Keimlinge aus dem Keimbett herausgenommen, sorgfältig abgewaschen, mit einem Stück weicher Leinwand abgetrocknet und mit Marken versehen. Man benutzt beste schwarze chinesische Tusche, die man mit etwas Wasser auf einer Porzellanplatte angerieben hat und mit Hülfe eines Marderpinsels in Form feiner Striche auf die Untersuchungsobjecte aufträgt. Die Entfernung der einzelnen Marken von einander kann je nach Umständen 1, 1,5 oder 2 mm betragen. Der erste Strich wird also 1, 1,5 oder 2 mm entfernt vom Vegetationspunkt der Wurzel aufgetragen¹⁾, der zweite 1, 1,5 oder 2 mm entfernt vom ersten etc. Am besten ist es, 1 mm Entfernung zu wählen. Um das Auftragen bequem und mit Ruhe vornehmen zu können, benutzt man eine etwa 2 cm dicke Korkplatte, an deren linkem Rande mittelst einer runden Feile verschiedene grosse Kerben eingefeilt worden sind; von jeder

1) Den Vegetationspunkt sieht man freilich nur undeutlich durchschimmern er liegt ca. 0,2—0,5 mm entfernt von der Wurzelspitze.

derselben gehen auf der Oberfläche des Korkes einige mit dünner runder Feile gemachte Rinnen nach verschiedenen Richtungen aus. Man probirt nun, in welche Kerbe sich der Same mit einiger Reibung so einschieben lässt, dass er festhält und seine Wurzel zugleich in eine der Rinnen zu liegen kommt. Neben diese legt man eine Milli-

Fig. 126. Glaseylinder zur Cultur von Keimpflanzen.

metertheilung derartig hin, dass man die mit dem Pinsel aufzutragenden Striche als Verlängerungen der Theilstriche des Maassstabes ziehen kann. Die Keimpflanzen, deren Wurzeln markirt worden sind, werden nun in der Weise, wie es Fig. 126 zeigt, mit Hülfe von langen Stecknadeln in Glaseylindern befestigt. Ich benutzte Cylinder von etwa 30 cm Höhe und 7—8 cm Durchmesser oder auch, was vorzuziehen ist, weit grössere Gefässe. Die mit Hülfe von Siegellack an die untere Fläche des Glasstöpsels festgekittete Korkplatte *K*, welche man mit Wasser durchtränkt hat, dient zur Aufnahme der Nadelspitzen. Der Boden jedes Cylinders wird mit einer Wasserschicht bedeckt, so dass die Wurzeln von feuchter Luft umgeben sind. Wenn es erforderlich scheint, kann man die Wurzeln auch noch ab und an mit etwas Wasser bespritzen oder die Wände im Innern des Cylinders mit feuchtem Fliesspapier belegen. Man stellt die Cylinder ins Dunkle und setzt die Keimpflanzen möglichst constanten

Temperaturverhältnissen (z. B. 20° C.) aus. In den Cylindern kann man die Wurzeln auch in Wasser wachsen lassen. Man befestigt die Keimlinge an recht langen Nadeln und lässt die Wurzeln, aber nicht die Reservestoffbehälter, in die Flüssigkeit eintauchen, mit der die ca. 3 Liter fassenden Gefässe bis zur Hälfte angefüllt sind.

Nach Verlauf von 12 oder 24 Stunden wird man leicht durch Messung feststellen können, dass das Wachsthum in der jüngsten, dem

Fig. 127. Links Erbsenkeimling, auf dessen Wurzel Tuschemarken aufgetragen worden sind. Rechts derselbe Keimling, nachdem die Wurzel einige Zeit gewachsen ist.

Vegetationspunkte der Wurzeln nächsten Partialzone kein übermässig ausgiebiges gewesen ist. In der nächsten Zone hat sich schon ein energischeres Wachsthum geltend gemacht. Eine der folgenden Zonen ist diejenige, in welcher das Wachsthum am lebhaftesten vor sich gegangen ist. Es folgen dann Zonen, in denen wieder langsames Wachsthum constatirt werden kann, und die ältesten Theile der Wurzeln haben gar keinen Zuwachs mehr erfahren. Vergl. Fig. 127. Die älteren Partialzonen der Wurzeln haben das Stadium stärksten Wachsthums schon hinter sich; die jüngsten sind noch nicht in dieses Stadium eingetreten. Jede Querzone eines Pflanzentheils wächst aber, ebenso wie jedes Organ in seiner Gesamtheit, zuerst langsam, dann

schneller, erreicht ein Maximum der Wachstumsgeschwindigkeit, um schliesslich wieder langsamer zu wachsen. Daher findet man auch,

dass die jüngsten Querzonen einer Wurzel, welche z. B. im Verlaufe von 12 Stunden nicht sehr stark gewachsen sind, in den folgenden 12 Stunden schon lebhafter wachsen. Zu einer bestimmten Zeit liegt natürlich in diesen Zonen das Maximum des Wachsthum, aber später nimmt die Wachsthumsgeschwindigkeit dann wieder ab. Es ist überhaupt lehrreich, das Wachsthum der Partialzonen einer Wurzel während längerer Zeit zu beobachten und ab und an (aber in relativ kurzen Zwischenräumen von 6–10 Stunden) die Zuwachse festzustellen. Eine Schwierigkeit, die aber nicht unüberwindlich ist, liegt hierbei in dem Umstände, dass die auf die Wurzeln aufgetragenen Tuschestriche in Folge des Wachsthum auseinandergezogen werden¹⁾.

Bei den Untersuchungen über das Wurzelwachsthum wird dem Beobachter die beachtenswerthe Thatsache nicht entgehen, dass die Länge der wachsenden Wurzelstrecke, d. h. die Länge der ursprünglich markirten Strecke, in der nach Verlauf einiger Zeit (z. B. 20 Stunden) überhaupt Wachsthum stattgefunden hat, stets recht gering ist. Je nach der Samenart und der Individualität der Untersuchungsobjecte ist die wachsende Wurzelregion (z. B. bei Pisum, Phaseolus etc.) nämlich nur etwa 4–8 mm lang. Die wachsende Region der Stengel ist im Gegensatz hierzu, wie wir sehen werden, weit länger²⁾.

Wir gehen nunmehr dazu über, die grosse Wachstumsperiode der Stengeltheile näher zu verfolgen, und es hat keine besonderen Schwierigkeiten, den allgemeinen Verlauf des Wachsthum dieser Organe festzustellen. Wir cultiviren Keimlinge von Phaseolus oder Pisum, die in lockerer Gartenerde wurzeln, bei Ausschluss des Lichts und möglichst constanten Temperaturverhältnissen. Durch einfache, von Tag zu Tag wiederholte Messungen kann man constatiren, dass die Internodien (die epicotylen oder die folgenden) zunächst langsam, dann schneller wachsen, zu einer bestimmten Zeit das Maximum der Streckungsgeschwindigkeit erkennen lassen, um dann wieder langsamer zu wachsen. Im Dunkeln wachsende Keimlinge (ich experimentirte z. B. mit Pisumpflanzen, die aus grossen Samen hervorgegangen waren) können unter Umständen sehr lange, aus einer ganzen Anzahl von Internodien bestehende Stengel erzeugen. Ein Exemplar meiner Untersuchungsobjecte hatte einen Stengel von über 500 mm Länge gebildet, und dieser bestand aus 7 Internodien. Misst man die Länge der ausgewachsenen Internodien, so findet man, dass die ältesten relativ kurz sind; es folgen längere (bei meinen Pflanzen war das fünfte das längste), und die jüngsten Internodien sind dann wieder kürzer. Es ist eine sehr allgemein zu beobachtende Erscheinung, dass die auf einander folgenden, fertig gestreckten Internodien eines Stengels nicht die nämliche Länge besitzen, eine Thatsache, die einen einfachen Ausdruck dadurch findet, dass wir sagen, die Wachsthumenergie der einzelnen Stengelglieder ist aus inneren Wachsthumursachen eine verschiedene.

Wir cultiviren Keimlinge von Phaseolus multiflorus bei Lichtabschluss in Blumentöpfen. Wenn die epicotylen Glieder eine Länge

1) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 421. Zur Vermeidung von Fehlern thut man gut, jedesmal einen feinen Tuschestrich in die Mitte der Marke einzutragen, um diesen Strich zum Ausgangspunkt für die weiteren Messungen zu nehmen. Vergleiche auch bei SACHS weiteres über die hier angegebenen Methoden.

2) Vgl. SACHS, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 413.

von etwa 50 mm erreicht haben, so bringen wir auf den am kräftigsten entwickelten Stengeln eine Anzahl von Tuschestrichen als Marken in Entfernungen von 3 oder 5 mm an (Methode vgl. unter 147 u. 148). Die Untersuchungsobjecte bleiben im Dunkeln möglichst constanten Temperaturverhältnissen ausgesetzt. Alle 24 Stunden bestimmen wir die Grösse der Zuwachsbewegung in den einzelnen Partialzonen durch Messung. Die wachsende Region des Stengels ist im Gegensatz zu derjenigen der Wurzeln eine sehr ausgedehnte. Ich fand z. B., dass eine Strecke von 35 mm des Phaseolusepicotyls im Wachsthum begriffen war. In der jüngsten (obersten) Partialzone ist das Wachsthum bei Beginn des Versuchs nicht sehr ausgiebig. In der folgenden schon lebhafter. In der dritten oder vierten liegt das Wachsthumsmaximum, in den folgenden nimmt die Wachsthumsgeschwindigkeit wieder ab. Setzt man die Beobachtungen längere Zeit hindurch fort, so erlischt das Wachsthum alsbald in den älteren Partialzonen, während das Wachsthumsmaximum nicht mehr in der dritten oder vierten Zone, sondern in einer jüngeren liegt. Später nimmt auch in diesen letzteren Partialzonen die Wachsthumsgeschwindigkeit ab ¹⁾.

Will man das Vorhandensein der grossen Periode bei dem Wachsthum der Blätter constatiren, so cultivirt man Kürbis- oder Tabakpflanzen in grossen Blumentöpfen und stellt dieselben, wenn sich einige Blätter entfaltet haben, unter grosse Glasglocken in einen Raum von möglichst constanter Temperatur, z. B. in ein nach Norden gelegenes Zimmer. Die Untersuchungsobjecte bleiben dem Licht ausgesetzt. Nahe der Basis der Spreite einiger junger Blätter hat man mit Hülfe von Tusche Punkte als Marken aufgetragen. Man misst täglich mit Hülfe eines Millimetermaassstabes die Entfernung zwischen dem Punkte an der Basis eines Blattes und der Blattspitze. Die Temperaturverhältnisse sind natürlich stets genau zu notiren. Als ich im Mai und Juni das Längenwachsthum im Freien wachsender Blätter von *Aristolochia Sipho* verfolgte, trat zunächst bei ziemlich constant bleibender Temperatur das Phänomen der grossen Wachsthumperiode deutlich hervor. Der Zuwachs betrug in je 24 Stunden zunächst nur 5, dann 7, fernerhin 10 mm. Später machten sich in Folge bedeutender Temperaturschwankungen grosse Unregelmässigkeiten im Blattwachsthum geltend, aber es ist dennoch lehrreich, derartige Beobachtungen zu wiederholen, weil sie uns zeigen, wie wichtig es bei dem Studium der grossen Wachsthumperiode der Pflanzentheile erscheint, die äusseren das Wachsthum beeinflussenden Momente keinen Augenblick unberücksichtigt zu lassen ²⁾.

Handelt es sich darum, die Ursachen der grossen Wachsthumperiode ganzer Organe festzustellen, so hat man, wie ich in meinem Lehrbuch der Pflanzenphysiologie S. 249 hervorhob, namentlich die Frage nach den Ursachen der im Laufe der Entwicklung sich verändernden Wachsthumsgeschwindigkeit einzelner Partialzonen der Pflanzentheile zu beantworten. Dies ist, soweit es heute möglich erscheint, unter 147 geschehen, so dass wir hier auf die bezüglichen Angaben verweisen müssen. Bei Beginn des Wachsthum eines ganzen Organs summiren sich anfangs nur wenige und geringe Partialzuwächse, später mehr und grössere, bis endlich die Partialzuwächse wieder unbedeutender werden.

1) Vgl. SACHS, Arbeiten des botanischen Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 99, und WORTMANN, Botan. Zeitung, 1882.

2) Vgl. PRANTL, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 371.

155. Die Wachstumsgeschwindigkeit und Wachstumsenergie.

Die tägliche Erfahrung lehrt, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanzen eine überaus verschiedenartige ist. Selbst die einzelnen Individuen einer und derselben Pflanzenspecies lassen unter gleichen äusseren Verhältnissen eine verschiedene Wachstumsgeschwindigkeit erkennen. Der experimentirende Pflanzenphysiolog hat bei seinen Untersuchungen stets Rücksicht auf das individuell differente Verhalten seiner Untersuchungsobjecte zu nehmen, das oft den Fortgang der Beobachtungen in sehr unliebsamer Weise beeinflusst, und deshalb ist es lehrreich, einmal den folgenden Versuch anzustellen. Möglichst normal und gleichartig ausgebildete Erbsen, Bohnen oder Samen anderer Pflanzen werden in grösserer Anzahl in feuchten Sägespänen zum Keimen gebracht. Genaue Messungen der Wurzeln, Stengeltheile sowie Blätter, die man nach Verlauf einiger Zeit vornimmt, lehren, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der einzelnen Organe bei verschiedenen Individuen derselben Species, trotzdem sämtliche sich unter dem Einfluss genau der nämlichen äusseren Bedingungen entwickelten, keineswegs die gleiche gewesen ist. Das individuell oft sehr verschiedene Verhalten der einzelnen Untersuchungsobjecte tritt bei derartigen Beobachtungen deutlich hervor.

Fig. 128. Apparat zur Untersuchung des Wurzelwachstums.

Unter gleichen äusseren Umständen besitzen aber auch die gleichnamigen Organe verschiedener Pflanzenspecies eine specifisch verschiedene Wachstumsgeschwindigkeit. Die Stengel und Blätter von *Aristolochia Sipho* und *Humulus lupulus* wachsen z. B. relativ schnell; die entsprechenden Organe anderer Pflanzen sehr langsam. Sehr schnell wachsen ferner z. B. die Stengel von *Polygonum Sieboldi*, und ich fand z. B., dass ein Trieb dieser Pflanze, der am 3. Mai 60 cm Höhe besass, nach 24 Stunden bei warmer, feuchter Witterung (Temperatur Abends um 11 Uhr noch 15° C.) eine Höhe von 71 cm erreicht hatte.

Die Wachstumsenergie ist eine Function der Wachstumsdauer und Wachstumsgeschwindigkeit. Es ist selbst die Wachstumsenergie, also der schliesslich erlangte Zuwachs, der einzelnen Internodien eines Stengels nicht die gleiche. Entwickeln sich Erbsenkeimpflanzen z. B. einige Wochen im Dunkeln, und bestimmt man die Länge der einzelnen Internodien, wenn das Stengelwachsthum völlig erloschen ist, so ergiebt sich, dass die unteren Internodien kurz, die mittleren lang, die oberen wieder kürzer sind ¹⁾.

1) Vgl. DETMER, Lehrbuch d. Pflanzenphysiologie, 1883, S. 248.

Von Interesse ist es ferner, sich davon zu überzeugen, dass es möglich ist, den Zuwachs, welchen Pflanzentheile in kurzer Zeit (z. B. 20 Minuten) erfahren, festzustellen. Auf die bei genauen Beobachtungen in Anwendung zu bringende Methode ist schon unter 153 aufmerksam gemacht worden. Hier folgt ein Demonstrationsversuch. Ein Trichterrohr (Fig. 128 *T*) wird mit seinem unteren Ende durch die Bohrung eines Kautschukkorkes geschoben, welcher ein kleines, etwas Wasser enthaltendes Glas *G* verschliesst. In den oberen, erweiterten Theil des Trichterrohres bringt man einen in feuchten Sägespänen angekeimten Samen von *Pisum* oder *Phaseolus* und breitet etwas nasse Watte über demselben aus. Die obere Oeffnung des Trichterrohres wird durch die kleine Glasplatte *Gp* verschlossen. Die Keimwurzel wächst in der feuchten Luft, welche sie umgiebt, ganz gut; sie verlängert sich beträchtlich. Wir stellen unseren Apparat nun auf einen Klinostaten (der Apparat ist weiter unten beschrieben und abgebildet), dessen Axe senkrecht gerichtet ist, und versetzen die Keimpflanze, um jede heliotropische Krümmung der Wurzel auszuschliessen, in langsame Rotation. Bevor der Klinostat in Gang gebracht wird, haben wir die Wurzelspitze in das Gesichtsfeld eines mit Hülfe eines geeigneten Stativs horizontal gerichteten Mikroskops eingestellt. Wir benutzen natürlich nur schwache Vergrößerung. Jetzt wird der Klinostat in Rotation versetzt, und wenn z. B. nach 20 Minuten die Wurzel wieder im Gesichtsfeld des Mikroskops erscheint, so lässt sich constatiren, zumal dann, wenn der Versuch bei relativ hoher Temperatur (20—25° C.) angestellt wird, dass der Pflanzentheil gewachsen ist.

156. Die Torsionen.

Torsionen sind häufig an Internodien und auch an Blättern zu beobachten. Schöne Torsionen lassen zumal ältere Internodien windender Stengel, worauf an anderer Stelle zurückgekommen werden soll, sowie im Dunkeln erwachsene Pflanzen erkennen. So sind z. B. die bei Lichtabschluss zur Ausbildung gelangten Blüthenschäfte von *Hyacinthus orientalis* häufig stark tordirt und ebenso die im Dunkeln erwachsenen hypocotylen Glieder von *Helianthus annuus*, während die entsprechenden Organe der unter normalen Verhältnissen erwachsenen Keimlinge dieser Pflanzenspecies keine Torsionen zeigen. Werden Samen von *Helianthus annuus* in feuchten Sägespänen ausgelegt, und die Untersuchungsobjecte theils im Finstern, theils bei Lichtzutritt cultivirt, so kann man sich leicht von der Thatsächlichkeit der erwähnten Verhältnisse überzeugen. Es ergiebt sich auch, dass die Torsionen an den etiolirten hypocotylen Gliedern der *Helianthus*-keimpflanzen erst gegen Ende des Längenwachsthums derselben zum Vorschein kommen.

Viele Torsionen sind Folge innerer Wachstumsursachen. Andere, von denen hier gleich die Rede sein mag, entstehen auf ganz anderem Wege. Der Stengel einer kräftigen, in einem Blumentopf erwachsenen Kürbispflanze wird derartig an einen Stab angebunden, dass er keine Krümmungen ausführen kann. Auf die Oberseite einiger Blattstiele und die Mittelrippen ihrer Spreiten werden mit Tusche eine Anzahl Punkte, die in einer Linie liegen, aufgetragen, um das vorbereitete Untersuchungsobject jetzt, nachdem der Erdballen im Topfe durch Sperrhölzchen befestigt worden ist, in umgekehrter Lage im Finstern aufzustellen. Aus

verschiedenen Ursachen (Geotropismus, photoepinastische Nachwirkungen) tritt im Laufe einiger Stunden eine nach aufwärts gerichtete Krümmung der Blattstiele ein, aber da die Last der von den Stielen getragenen Spreiten fast niemals gleichnässig zu beiden Seiten der Krümmungsebene vertheilt ist, so kommen Torsionen zu Stande, deren Ausdehnung leicht beurtheilt werden kann, wenn man die nun nicht mehr in gerader Linie stehenden Tuschemarken ins Auge fasst. Diese Torsionen können durch Wachsthumsvorgänge zu bleibenden werden ¹⁾.

157. Einige spontane Nutationserscheinungen.

Wir legen einige angequollene Samen von *Vicia Faba* mit nach abwärts gewandter Mikropyle in lockere, feuchte Sägespäne. Untersuchen wir unsere Keimpflanzen genauer, wenn der Keimstengel soeben beginnt, zwischen den Cotyledonen herauszutreten, so finden wir, dass sie gerade, senkrecht nach abwärts gerichtete Wurzeln besitzen. Wir befestigen nun einige Viciakeimlinge mit Hülfe von Nadeln in einem Recipienten und sorgen für Lichtabschluss. Nach Verlauf von 24 Stunden constatiren wir, dass die Wurzeln ihre ursprüngliche senkrechte Richtung verlassen haben. Die Wurzeln sind in der Weise gekrümmt, wie es Fig. 129 darstellt, eine Erscheinung, die wesentlich durch eine im hypocotylen Gliede und oberen Wurzeltheile stattfindende Krümmung hervorgerufen wird. Das fortwachsende Wurzelende kommt natürlich in Folge der eingetretenen Nutation schief gegen die Verticale zu liegen und sucht sich daher vermöge seiner geotropischen Reizbarkeit in einem Bogen nach abwärts zu wenden. Aehnlich wie die Keimpflanzen von *Vicia* verhalten sich in der in Rede stehenden Hinsicht diejenigen verschiedener anderer Papilionaceen, und es ist noch zu bemerken, dass die Wurzeln die erwähnte Nutation nicht nur in feuchter Luft, sondern auch, obgleich in schwächerem Grade, ausführen, wenn sie sich in lockerer Erde oder Sägespänen entwickeln. Bezeichnet man bei den Keimpflanzen der Papilionaceen diejenige Seite als hintere (vergl. Fig. 129 *H*), auf welcher die Convexität des Keimstengels liegt, die entgegengesetzte, nach welcher sich unsere Wurzeln stets hinwenden, als vordere (*V*), so fällt die Medianebene der Keimpflanzen genau mit derjenigen Ebene zusammen, in der sich die beiden Cotyledonen berühren. Die Thatsache, dass die aus der Nutation des Hypocotyls und der Wurzelbasis resultirenden Wurzelkrümmungen stets in den Medianebenen der Keimlinge erfolgen, ist bei Untersuchungen über das Verhalten der Wurzeln in horizontaler Lage aus leicht verständlichen Gründen wohl zu beachten. Man muss den Viciakeimlingen z. B. auf einer horizontalen Unterlage eine solche Stellung geben, dass sie dieser Unterlage mit ihrer rechten

Fig. 129. Keimpflanze von *Vicia Faba*.

1) Vgl. H. DE VRIES, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 268, und SACHS, Lehrbuch d. Botanik, 1874, S. 833.

oder linken Flanke, also mit der Aussenfläche einer ihrer Cotyledonen, aufliegen ¹⁾).

Interessante Nutationserscheinungen sind ferner an den ersten Stengelgliedern vieler Dicotyledonen zu beobachten, und wir wollen uns etwas genauer mit demselben bekannt machen, indem wir *Phaseolus multiflorus* als Untersuchungsobject wählen. Wenn wir einen im Wasser zur Quellung gebrachten Samen durchschneiden, so beobachten wir an der Spitze des zwischen den Cotyledonen liegenden Stengeltheiles des Embryo eine ziemlich starke Krümmung. Bei der Keimung der Samen wird diese Krümmung noch erheblicher, so dass die Endknospe in völlig nickendem Zustande aus dem Boden hervortritt. Die

Fig. 130. Keimpflanze von *Phaseolus multiflorus*, oberer Theil derselben.

Convexität der Krümmung liegt auf der von den Cotyledonen abgewandten, also hinteren Seite des Epicotyls, und die Nutationserscheinung kommt durch ein beschleunigtes Wachstum eben dieser hinteren Seite zu Stande. (Vergl. Fig. 130. Bei *a* liegt die Convexität der Krümmung). Entwickeln sich unsere *Phaseolus*-pflanzen dauernd im Finstern, so bleibt die Nutation am oberen Ende des Keimstengels lange bestehen; nur in den letzten Keimungsstadien richtet sich die Endknospe senkrecht empor. Dies geschieht dagegen sehr schnell, wenn man junge Keimlinge, deren Endknospe z. B. eben den Boden durchbrochen hat, dem Einfluss hellen diffusen Tageslichts aussetzt. Die Krümmung des Epicotyls gleicht sich dann alsbald völlig aus.

Wenn man an derjenigen Stelle eines nitirenden Epicotyls von *Phaseolus*, welche die stärkste Krümmung zeigt (Fig. 130 bei *a*), einen Tuschestrich als Marke anbringt, so findet man diese Marke nach 24 oder 48 Stunden, während welcher Zeit das

Untersuchungsobject natürlich in Dunkeln verweilen muss, bei *b* wieder. Daraus erhellt, dass die ursprünglich nitirenden Theile des Epicotyls sich in Folge ihres Wachstums allmählich gerade strecken. Die Nutation geht aber auf die neu entstandenen Stengeltheile über. Es zeigt sich aber bei genauerer Betrachtung der Marken auch oft, dass die Ebene, in der die Nutation erfolgt, nicht immer die nämliche ist. Uebrigens muss die Nutation als eine durchaus spontane angesehen werden. Sie tritt auch ein, wenn die Keimlinge im Dunkeln langsam um eine horizontale Achse rotiren. Näheres vergl. im Abschnitt über Experimente mit dem Klinostaten.

Der Winkel, welcher von dem nitirenden Theile des *Phaseolus*-epicotyls gebildet wird, beträgt gewöhnlich 180° , d. h. also die Endknospe des aufwärts wachsenden Stengels ist senkrecht abwärts gerichtet. Bei genauerer Beobachtung zumal recht lebhaft wachsender *Phaseolus*-keimlinge findet man aber, dass jener Winkel nicht immer derselbe bleibt. Ist er an einem Tage $= 180^\circ$, so kann er am folgenden z. B. $= 90^\circ$, am dritten $= 145^\circ$ sein ²⁾.

Spontane Nutationen zeigen die meisten Pflanzentheile, wie es scheint, sehr allgemein. Hierher gehören auch die Circumnutationen

1) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 402.
2) Vgl. WORTMANN, Botan. Zeitung, 1882, No. 52.

vieler Keimlinge¹⁾, und wenn man z. B. Haferkeimlinge im Dunkeln cultivirt, so kann man durch oft (z. B. jede Viertelstunde) wiederholte Beobachtungen feststellen, dass die Spitze der ca. 1–2 cm langen Plumula der Untersuchungsobjecte in einer mehr oder minder kreisförmigen Bahn im Raum herumgeführt wird. Uebrigens gehe ich nicht näher auf die Circumnutation ein, da der ganze Gegenstand einer eingehenden kritischen weiteren Untersuchung bedarf. Zumal ist bei den Arbeiten der Einfluss äusserer Verhältnisse auf die Bewegung der Organe mehr als seither zu beachten.

II. Die nothwendigen Wachstumsbedingungen und die Beeinflussung der Zuwachsbewegung durch äussere Verhältnisse.

158. Das Stoffbedürfniss wachsender Pflanzentheile.

Das Wachstum eines Pflanzentheils kann nur dann in normaler Weise erfolgen, wenn die erforderlichen Stoffe und Kräfte für das Wachstum der einzelnen Zellen disponibel sind. Entwickeln sich z. B. Keimlinge bei völligem Lichtabschluss, so hört das Wachstum der Keimtheile auf, wenn der Reservestoffvorrath der Samen erschöpft ist. Es ist lehrreich, sich etwas specieller über die Beziehungen zwischen der Energie, mit der das Wachstum erfolgt, und dem Vorrath an Reservestoffen zu unterrichten. Zu dem Zweck pflanzen wir Samen von *Phaseolus multiflorus* in Gartenerde ein, die sich in Blumentöpfen befindet. Ein Topf wird mit möglichst grossen Samen beschiekt; ein zweiter mit ebensolchen, von denen wir aber, wenn die Keimung eben begonnen hat und die Hauptwurzel aus der Samenschale hervorgebrochen ist, je einen der beiden Cotyledonen entfernen. In einen dritten Topf säen wir kleine Phaseolussamen ein. Die Keimung erfolgt im Dunkeln oder bei Lichtzutritt. Wir finden, dass sich die aus grossen Samen erwachsenden Pflanzen kräftiger entwickeln als diejenigen, welche aus den kleinen oder jenen hervorgehen, von welchen wir einen der Cotyledonen abgeschnitten haben. Bei meinen Versuchen, die bei Lichtzutritt ausgeführt wurden, zeigten sich zunächst keine sehr auffallenden Differenzen im Aussehen der Untersuchungsobjecte. Dies trat erst ein, als sich das erste gedreite Blatt entfaltet hatte, und das dritte Internodium in lebhafter Streckung begriffen war. Die aus grossen Samen hervorgegangenen Pflanzen besaßen erheblich grössere Blätter und längere Internodien als jene, welche sich aus kleinen oder eines ihrer Cotyledonen beraubten Samen entwickelten. Messungen zur Bestimmung der Dimensionsverhältnisse der einzelnen Theile der Versuchspflanzen sind leicht vorzunehmen. Der Reservestoffvorrath der Bohnensamen ist ein sehr grosser, so dass die ersten Stadien der Keimung bei meinen Experimenten in allen Fällen normal durchlaufen werden konnten. Später machte sich dann, trotzdem die

1) Vgl. DARWIN, Bewegungsvermögen d. Pflanzen, 1881.

assimilatorische Thätigkeit der Untersuchungsobjecte nicht ausgeschlossen war, ein wesentlicher Unterschied im Wachsthum der Pflanzen geltend, und derselbe liess sich der Hauptsache nach nur auf den mehr oder minder bedeutenden Vorrath an Reservestoffen in den Cotyledonen der Samen zurückführen.

159. Der Wassergehalt der Pflanzen und das Wachsthum.

Normales Wachsthum der Pflanzenzellen ist nur dann möglich, wenn dieselben hinreichende Wassermengen enthalten. Diese That-sache ist unter Berücksichtigung verschiedener Verhältnisse leicht verständlich. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass ein ausgiebiges Wachsthum eine energische Turgorausdehnung der Zellen zur Voraussetzung hat, welche ihrerseits nur bei reichlichem Wassergehalt der Gewebe möglich ist. Sinkt die Turgorausdehnung der Zellen, indem sie Wasser verlieren, so vermindert sich zugleich auch ihre Wachsthumsgeschwindigkeit. Wir bringen Mais-, Erbsen- oder Bohnensamen in Sägespänen zur Keimung. Haben die Wurzeln einige cm Länge erreicht, so bringen wir auf ihnen 2 cm entfernt von ihrer Spitze feine Tusche-
striche als Marken an und befestigen die Keimpflanzen in der Weise, wie es unter 154 angegeben ist, mit Nadeln in geeigneten Glas-cylindern. Diese letzteren füllen wir mit verschiedenen Flüssigkeiten an; einen mit Brunnenwasser, einen zweiten mit einer 0,5-, einen dritten mit einer 1,0-, einen vierten mit einer 2,0-proc. Kalisalpeterlösung. Die Wurzeln müssen senkrecht in die Flüssigkeiten hineinragen. Nach Verlauf von 24 oder 48 Stunden stellen wir die Zuwachse, welche die Wurzeln erfahren haben, fest. Jeder einzelne Versuch wird, um zu Mittelwerthen zu gelangen, mit 3 oder 4 Keimpflanzen durchgeführt. Es ergibt sich, dass die Wurzeln in Contact mit Brunnenwasser am lebhaftesten wachsen. Mit zunehmender Concentration der Salpeterlösung wird ihr Wachsthum aber geringer, weil die Salzlösungen den Zellen Wasser zu entziehen vermögen und dadurch deren Turgorausdehnung herabsetzen. In Berührung mit ziemlich concentrirten Salpeterlösungen (z. B. mit 10-proc.) wachsen die Wurzeln gar nicht. Sie verkürzen sich vielmehr, indem sie in den plasmolytischen Zustand übergehen¹⁾.

Merkwürdig ist, dass Pilze auch noch in Contact mit Flüssigkeiten wachsen, deren Concentration für das Wachsthum der Zellen höherer Gewächse viel zu bedeutend ist. Wir stellen eine Lösung her, die in 100 Thl. Wasser 0,4 Thl. Ammoniumnitrat, 0,2 Thl. saures phosphorsaures Kali, 0,02 Thl. schwefels. Magnesia und 0,01 Thl. Chlorcalcium enthält. Je 50 ccm dieser Lösung gelangen in Glaskölbchen und werden mit 5 g (10 Proc.), 10 g (20 Proc.), 25 g (50 Proc.) Traubenzucker versetzt. Die mit Watteverschluss versehenen Kölbchen werden im Dampfapparat sterilisirt. Als Beobachtungsobject wählen wir *Penicillium glaucum*. Die Flüssigkeiten werden mit den Sporen dieses Pilzes inficirt und dann sämmtlich den nämlichen äusseren Bedingungen ausgesetzt. Es ergibt sich, dass die Entwicklung des Pilzes selbst noch in der 50-proc. Zuckerlösung erfolgt; freilich wächst er in der betreffenden

1) Vgl. H. DE VRIES, Untersuchungen über die mechanischen Ursachen der Zellstreckung, Halle 1877, S. 56.

Flüssigkeit erheblich langsamer als in den übrigen. Die Ursache des Wachstums von Zellen bei hoher Flüssigkeitsconcentration ist wohl darin zu suchen, dass diese letztere selbst als Reiz auf die Zellen einwirkt und den Stoffwechsel derselben derartig beeinflusst, dass eine hinreichende Steigerung der osmotischen Leistungsfähigkeit des Zellinhaltes erzielt wird ¹⁾).

160. Die Athmung und das Wachsthum.

Es giebt, wie bereits unter 108 hervorgehoben worden ist, einige Pflanzen, die auch bei völligem Ausschluss des freien Sauerstoffes zu wachsen vermögen. Die meisten Pflanzen sind aber nur zum Wachsthum befähigt, wenn ihnen freier Sauerstoff zur Disposition steht. Diese Thatsache lässt sich leicht in folgender Weise constatiren ²⁾. Zwei retortenartige Gefässe von ca. 90 ccm Capacität (vgl. Fig. 11) werden mit ausgekochtem und bei Luftabschluss wieder völlig abgekühltem, destillirtem Wasser angefüllt. In jedes Gefäss bringt man einige lufttrockene Weizenkörner oder Erbsensamen und taucht die Mündungen der Gefässe unter Quecksilber. Nach 24 Stunden, wenn die Samen gequollen sind, verdrängt man das Wasser des einen Gefässes bis auf einen ganz kleinen Rest durch atmosphärische Luft, dasjenige des anderen durch reines Wasserstoffgas. Dieses entwickelt man aus arsenfreiem Zink durch Uebergiessen desselben mit verdünnter Salzsäure und leitet es zur Befreiung von schädlichen Stoffen durch wässrige Lösungen von Kalihydrat und übermangansaurem Kali. In Contact mit der Luft keimen die Samen alsbald; in Wasserstoff tritt keine Keimung ein. Haben die Samen keine allzu lange Zeit (etwa nur 2—3 Tage) im Wasserstoff verweilt, so keimen sie aber, wenn man sie nachträglich normalen Keimungsbedingungen aussetzt. Es ist ferner lehrreich, Keimlinge (z. B. solche von *Pisum*), die bereits Wurzeln von einigen cm Länge besitzen, in mit luftfreiem Wasser angefüllte und durch Quecksilber abgesperrte Gefässe zu bringen, um das Wasser in dem einen Apparat durch Luft, im anderen dagegen durch Wasserstoff zu verdrängen. Die Wurzeln der Keimlinge wachsen in der Luft weiter, im Wasserstoff aber gar nicht, wovon man sich leicht durch Messungen überzeugen kann.

Mit Hülfe der angegebenen Methode ist auch der Nachweis zu führen, dass die Keimung der Samen noch in einem recht sauerstoffarmen Gasmisch (welches z. B. aus atmosphärischer Luft und mehr oder minder grossen Wasserstoffquantitäten besteht) möglich ist.

Um in sehr exacter Weise den Nachweis zu führen, dass ohne Sauerstoffgegenwart höhere Pflanzen nicht wachsen, verfährt man, wie folgt. In ein Reagensglas *R* (Fig. 131) von etwa 15 mm Durchmesser und ca. 60 ccm Capacität bringt man einen in Sägespänen zur Entwicklung gekommenen Erbsenkeimling, auf dessen Wurzel je zwei Tuschestriche als Marken aufgetragen sind. Die Innenwand des Glases wird mit einigen Tropfen ausgekochten Wassers angefeuchtet. Das Glas wird mit einem vollkommen passenden, mit zwei Bohrungen versehenen Kautschukpfropfen verschlossen. Die eine Bohrung dient zur Aufnahme des Glasrohres *g*, die andere zur Aufnahme des Rohres *g'*, dessen einer Schenkel in das Quecksilber des Gefässes *Gf*

1) Vgl. ESCHENHAGEN, Einfluss von Lösungen auf das Wachsthum von Schimmelpilzen, Stolp 1888.

2) Vgl. DETMER, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 11, S. 225.

eingetaucht werden kann. Nun leitet man, um die Luft völlig aus dem Apparat zu verdrängen, 1—2 Stunden Wasserstoff durch den Apparat und schmilzt das Rohr *g* bei *s* ab. Den Wasserstoff entwickelt man z. B. im KIRP'schen Apparat (vergl. unter 102) aus arsenfreiem Zink und verdünnter Salzsäure. Zur

Fig. 131. Apparat zur Constatirung der Thatsache, dass Wurzeln bei Ausschluss des freien Sauerstoffs nicht zu wachsen vermögen.

Weizenkörner im reinen Sauerstoff ebenso schnell wie in atmosphärischer Luft keimen. Den erforderlichen Sauerstoff entwickelt man in einer Retorte aus einem Gemisch von chloresäurem Kali und Braunstein, leitet ihn zur Reinigung durch Kalilauge und fängt ihn in den Gefässen, welche in der angegebenen Weise mit luftfreiem Wasser und den Samen beschickt worden sind, auf²⁾.

Reinigung durchstreicht das Gas Gefässe, welche Lösungen von Kali und übermangansaurem Kali enthalten. Das Wasser, welches zur Herstellung der verdünnten Salzsäure, sowie dieser Lösungen dient, wird zweckmässig vor dem Gebrauch ausgekocht und in verschlossenen Flaschen abgekühlt. Dass unsere Untersuchungsobjecte in der Atmosphäre des reinen Wasserstoffs nicht wachsen, lässt sich leicht constatiren, indem man die Entfernung der aufgetragenen Marken mit Hülfe des horizontalen Mikroskops (vergl. unter 153) in Intervallen von einigen Stunden misst. Oeffnet man den Apparat, so beginnt das Wachstum der Pflanzen sogleich wieder.

Dem reinen Sauerstoff gegenüber scheinen sich die Samen verschiedener Pflanzenspecies bei der Keimung nicht gleichartig zu verhalten¹⁾. Ich fand, dass

161. Die Beeinflussung des Wachstums durch Druck und Dehnung.

Aus der Theorie des Wachstumsprocesses ergibt sich ohne Weiteres, dass Druckkräfte, deren Wirkung auf die turgescirenden Zellen in einer Compression der gespannten Zellentheile (Hyaloplasma

1) Die ältere Literatur ist in meiner vergleichenden Physiologie d. Keimungsprocesses der Samen, 1889, S. 272, zusammengestellt.

2) Specielleres vgl. bei WIELER und JENTYS in Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen, Bd. 1, S. 216 und Bd. 2.

und Zellmembran) besteht, eine Verlangsamung des Wachstums herbeiführen müssen. Umgekehrt wird eine Dehnung der nämlichen Zellentheile Wachstumsbeschleunigung zur Folge haben. Ebenso sind Druckkräfte und deh nende Kräfte nicht ohne Einfluss auf die Richtung des ausgiebigsten Wachstums.

Nach den Untersuchungen von SCHOLTZ¹⁾ und HEGLER²⁾, auf die wir hier aber nicht näher eingehen, wirkt übrigens Dehnung keineswegs stets entsprechend ihrem mechanischen Aequivalent fördernd auf das Wachstum ein, denn wenn z. B. Stengel durch eine Zugkraft beeinflusst werden, so verlangsamt sich ihr Wachstum zunächst, um erst späterhin eine dem mechanischen Aequivalent des Zuges entsprechende Beschleunigung zu erfahren. Der Zug wirkt bei Beginn als Reizursache auf das Protoplasma ein. Man kann sich denken, dass die Zellhäute durch das gereizte Plasma Qualitätsänderungen erfahren, die ihr verlangsamtes Wachstum zur Folge haben.

Wenn man die Gestalt der Epidermiszellen der langen Blätter vieler monocotyler Pflanzen ins Auge fasst, so findet man, dass diese Zellen sehr langgestreckt sind. Diese Erscheinung hat ihren Grund wohl wesentlich darin, dass die Epidermiszellen der erwähnten Organe durch die Gewebespannung hauptsächlich in longitudinaler Richtung gezerzt werden. Wenn wir ein kleines Epidermisstückchen des Blattes von *Syringa* oder anderer Dicotyledonen untersuchen, so ergibt sich, dass die Epidermiszellen die Gestalt polygonaler Tafeln besitzen, eine Erscheinung, die sicher mit der nach zwei Richtungen hin in nahezu derselben Weise erfolgenden Flächenentwicklung der Blätter im Zusammenhang steht.

Wir stellen Querschnitte durch einen etwa 5 mm dicken Zweig von *Tilia parvifolia* her. Das Bild, welches sich uns bei mikroskopischer Untersuchung darstellt, ist schon unter 42 beschrieben worden. An dieser Stelle hat wesentlich nur der Holzkörper der Gefässbündel für uns Interesse. Wir sehen, dass mehrere Jahresringe vorhanden sind. Das Frühlingsholz geht ganz allmählich in das Herbstholz des nämlichen Jahresringes über, während das Frühlingsholz des nächsten Jahresringes ganz scharf gegen das Herbstholz des vorjährigen abgesetzt ist. Für das Frühlingsholz ist namentlich das Vorhandensein weiter Gefässe charakteristisch. Weiterhin verschwinden diese mehr und mehr. Das Herbstholz besteht nur aus englumigen Elementen.

SACHS hat schon vor längerer Zeit auf einen Zusammenhang zwischen dem verschiedenartigen Bau des Frühlings- sowie Herbstholzes einerseits und den im Laufe einer Vegetationsperiode zur Geltung kommenden Schwankungen der Intensität der Querspannung andererseits hingewiesen. Im Frühling wird die Rinde offenbar weniger gespannt als später, wenn die Holzentwicklung weitere Fortschritte gemacht hat. Im Frühling ist daher der Druck, welchen das Holz erleidet, geringer als später, und in diesen Umständen ist vor allem die Ursache der Erscheinung zu suchen, dass die aus den Cambiumzellen bei Beginn der Vegetationsperiode entstehenden Holzelemente weitleumig sind, während ferner, zumal gegen den Herbst hin, nur englumige Elemente entstehen.

Wir wollen sehen, in welcher Weise Drucksteigerung und Druckverminderung, denen wir in die Dicke wachsende Pflanzentheile künstlich

1) Vgl. SCHOLTZ, COHN's Beiträge zur Biologie der Pflanzen, Bd. 4.

2) Vgl. HEGLER, ebendasselbst, Bd. 6.

aussetzen, auf dieselben einwirken. Als Untersuchungsobjecte dienen 2—3-jährige Aeste verschiedener Sträucher oder Bäume. Druckerhöhung erzielt man, indem man Anfang April um eine einige cm lange Strecke der Aeste einen nicht zu dicken Bindfaden in einer Schraubenlinie windet. Die einzelnen Umgänge der Schraube müssen einander möglichst eng berühren, und die Ligatur wird fest angezogen. Druckverminderung bewirkt man, indem man auf einer etwa 3 cm langen Strecke das Rinden- und Bastgewebe 3-jähriger Aeste durch 6 radiale Einschnitte, die in gleichen Entfernungen von einander angebracht werden, spaltet. Prüft man die Untersuchungsobjecte im August, so ergibt sich, dass der Durchmesser der Aeste unter den Ligaturen von Bindfaden ein erheblich geringerer ist, als oberhalb und unterhalb der Ligaturen, während die Druckverminderung andererseits eine nicht unwesentliche Steigerung des Dickenwachstums an den betreffenden Versuchsstellen der Aeste hervorgerufen hat. Zu Experimenten über den Einfluss gesteigerten Druckes auf das Dickenwachsthum von Zweigen verwandte ich mit sehr gutem Erfolg *Salix cinerea* als Versuchspflanze. Die Ligatur wurde Anfang April angelegt und Anfang August entfernt. Die Versuchsstelle unter der Ligatur war bei Abschluss des Versuches viel dünner als die Asttheile ober- und unterhalb derselben¹⁾.

162. Die Beeinflussung des Wachstums durch die Temperaturverhältnisse.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass das Wachsthum aller Pflanzentheile bei verschiedenen Temperaturen durchaus nicht mit der nämlichen Geschwindigkeit verläuft. Wachsthumsvorgänge machen sich nur innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen geltend; bei gewissen niederen und höheren Temperaturen erlischt das Wachsthum aber vollkommen, und um diese Thatsache zunächst wenigstens für niedere Wärmegrade festzustellen, führen wir das folgende Experiment aus. Ein wohl entwickelter Erbsenkeimling, den wir so lange in lockeren, feuchten Sägespänen cultivirt haben, bis seine Hauptwurzel eine Länge von 3—4 cm erreicht hat, wird mit etwas feuchter Watte in den in Fig. 126 abgebildeten Apparat gebracht. Ich fand z. B., dass die Wurzel in 8 Stunden bei 20° C. einen Zuwachs von 5 mm erfuhr. Als ich die Vorrichtung nun 22 Stunden lang in einem ungeheizten Zimmer bei 1—2° C. stehen liess, konnte nach Verlauf dieser Zeit kein merklicher Zuwachs festgestellt werden. Ein solcher (10 mm) war aber zu constatiren, nachdem der Apparat fernere 18 Stunden lang in einem Raume, in welchem eine Temperatur von 15° C. herrschte, verweilt hatte.

Genaue Untersuchungen über den Einfluss verschiedener Wärmegrade auf die Wachsthumsgeschwindigkeit der Pflanzen sind mit vieler Mühe verbunden, aber trotzdem müssen wir versuchen, uns mit den wichtigen bezüglichlichen Verhältnissen bekannt zu machen. Als Untersuchungsmaterial benutzen wir Keimpflanzen. Die Samen, aus denen dieselben gezogen werden sollen, müssen sorgfältig ausgewählt werden.

1) Eingehende Untersuchungen über den anatomischen Bau des Holzes das bei künstlicher Erhöhung oder Verminderung des Druckes entsteht, sind von H. DE VRIES ausgeführt worden. Vgl. Flora, 1872, No. 16, und 1875, No. 7.

Wir verwenden nur gleichförmig und wohl entwickelte, völlig ausge-reifte Individuen. Man wird finden, dass dieselben bei günstigen Temperaturverhältnissen (etwa 20—25° C.) gut keimen; dagegen bemerkt man auch bald, dass die Keimfähigkeit derselben Samen bei relativ hohen oder relativ niedrigen Wärmegraden keine so vollkommene mehr ist. Die Samen (wir experimentiren mit *Pisum*, *Phaseolus*, *Zea*, *Cucurbita* etc.) werden zunächst 24 Stunden lang in Wasser gelegt, um sie in einen völlig gequollenen Zustand zu versetzen. Dann bringen wir sie in einer derartigen Lage in feuchte Sägespäne oder Gartenerde, dass die hervorbrechenden Hauptwurzeln, ohne erhebliche Krümmungen ausführen zu müssen, gerade nach abwärts wachsen können. Die Erde ist die humusreiche Gartenerde, wie sie bei der Cultur von Gewächshauspflanzen Verwendung findet. Sie wird vor dem Gebrauch so weit angefeuchtet, dass sie sich eben noch zwischen den Händen zu einer feinkrümeligen Masse zerreiben lässt, dann durch ein Sieb mit Oeffnungen von 1,5 mm geworfen und in Blumentöpfe locker eingefüllt. Die in angemessener Entfernung von einander in das Keimbett eingelegten gequollenen Samen bedeckt man schliesslich mit Erde und sorgt besonders dafür, dass sämtliche Untersuchungsobjecte möglichst genau die nämliche Tieflage erhalten. Jeder Blumentopf wird mit einem Thermometer versehen, welches die Temperatur derjenigen Bodenschicht anzeigt, in der die keimenden Samen ruhen. Auch auf Ersatz des verdunsteten Wassers ist zu achten. Die Gefässe, in denen die Samen zum Quellen gebracht werden, müssen von Anfang an ebenso wie auch die mit den gequollenen Samen beschickten Blumentöpfe denjenigen Temperaturverhältnissen exponirt werden, deren Einwirkung auf das Wachsthum wir zu constatiren wünschen. Wollen wir bei Temperaturen von 25, 30, 35, 40 oder 45° C. experimentiren, so sind wir gezwungen, die Culturgefässe in Thermostaten zu stellen, in denen die gewünschte Temperatur constant erhalten werden kann. Wir benutzen z. B. den in Fig. 76 abgebildeten Apparat. Beobachtungen bei 5, 10, 15, 20° C. wird man oft am zweckmässigsten ohne Thermostaten in geeigneten, ungeheizten oder durch gute Reguliröfen erwärmten Localitäten (im Sommer z. B. in nach Norden gelegenen Zimmern oder in Kellern) ausführen. Es dürfen aber im Laufe von 24 Stunden keine irgendwie erheblichen Temperaturschwankungen vorkommen; darauf ist besonders zu achten, und es muss der Temperaturzustand des Mediums, in welchem die keimenden Samen liegen, daher täglich mehrfach controlirt werden.

Dasselbe muss natürlich auch bei Benutzung von Thermostaten geschehen. Die Resultate aller Temperaturablesungen sind zu notiren, um das Temperaturmittel berechnen zu können.

Jeder Versuch wird über 48—72 Stunden oder über eine noch längere Zeit ausgedehnt. Er beginnt mit dem Momente des Einquellens der Samen. Nach Verlauf der angegebenen Zeit nimmt man die Keimpflanzen aus dem Boden heraus, bestimmt durch Messung die Länge ihrer Wurzeln und gewinnt auf diesem Wege Zahlen, aus denen sich leicht ein Mittelwerth für die Länge, welche eine Wurzel im Laufe bestimmter Zeit bei bestimmter Temperatur erreicht hat, ableiten lässt. Bei 25° C. kann z. B. die Hauptwurzel von *Zea Mays* in 48 Stunden eine Länge von 30 mm erreichen. Bei 34° C. kann in 48 Stunden eine Wurzellänge von über 50 mm erzielt werden, während eine Temperatur von 42° C. das Wachsthum der Wurzel von *Zea* be-

deutend beeinträchtigt. Auch bei einer Temperatur von 15°C . wächst die Wurzel nur langsam und erreicht daher selbst in 96 Stunden noch keine erhebliche Länge.

Das Wachsthum der Pflanzenzellen beginnt bei einer gewissen niedrigen Temperatur (dem Temperaturminimum), es nimmt bis zu einem bestimmten Temperaturgrade (dem Temperaturoptimum) an Geschwindigkeit zu, um mit noch mehr steigender Temperatur wieder langsamer zu werden. Den höchsten Temperaturgrad, bei dem überhaupt noch Wachsthum stattfindet, bezeichnet man als Temperaturmaximum. Die Lage der Temperaturminima, -Optima und -Maxima ist für das Wachsthum verschiedener Pflanzentheile übrigens nicht die gleiche, eine Thatsache, die sich z. B. mit Bezug auf das Temperaturminimum auch darin ausprägt, wie unschwer festzustellen ist, dass manche Samen bei Temperaturen noch gar nicht keimen, durch welche die Evolution der Keimtheile anderer Samen bereits ermöglicht wird. Die Samen von Cucurbita keimen selbst im Verlauf langer Zeit bei 10°C . nicht, während die Weizenkörner sowie die Samen von Phaseolus multiflorus bei dieser Temperatur keimen können¹⁾.

In der folgenden Tabelle ist die Lage der Cardinalpunkte für die Keimungstemperatur einiger Samen angegeben:

	Temperatur-		
	minimum in $^{\circ}\text{C}$.	optimum in $^{\circ}\text{C}$.	maximum in $^{\circ}\text{C}$
Triticum vulgare	5,0 ²⁾	28,7	42,5
Phaseolus multiflorus	9,5	33,7	46,2
Pisum sativum	6,7	26,6	—
Zea Mays	9,5	33,7	46,2
Cucurbita Pepo	13,7	33,7	46,2.

163. Die Jahresperiode der Pflanzen.

Bei zahlreichen Gewächsen wird der allgemeine Gang ihrer Entwicklung durch Ruheperioden unterbrochen, denen ihre Organe zu bestimmten Zeiten unterliegen. Die meisten bei uns einheimischen Bäume und Sträucher werfen ja im Herbst ihre Blätter ab, und die vorgebildeten Knospen überdauern den Winter in einem Ruhezustande, um sich erst im nächsten Frühjahr zu entfalten. Ohne Zweifel haben wir es hier mit einem ursprünglich durch den Wechsel der Jahreszeiten inducirten Phänomen zu thun, das aber in derjenigen Form, in welcher es uns heute entgegentritt, keineswegs mehr eine unmittelbare Abhängigkeit von äusseren Factoren erkennen lässt. Wenn nämlich auf ein Pflanzenindividuum oder auf Generationen von Individuen stets dieselben äusseren Umstände in einem bestimmten Wechsel einwirken, so erlangen die Pflanzen dadurch in Folge von Nachwirkungen spezifische Eigenschaften, die sogar erblich werden können, und diese Eigenschaften erscheinen dann oft in einem so hohen Grade fixirt,

1) Literatur: SACHS, in PRINGSHEIM's Jahrbüchern f. wissenschaftl. Botanik, Bd. 2; FR. HABERLANDT in wissenschaftl.-praktischen Untersuchungen auf dem Gebiete des Pflanzenbaues, und DETMER, Vergleichende Physiologie des Keimungsprocesses der Samen, 1880.

2) Die Temperaturminima liegen im Allgemeinen nach neueren Untersuchungen tiefer.

dass sie es in erster Linie sind, welche das gesammte Verhalten der Gewächse bestimmen. Dieser Umstand muss namentlich Berücksichtigung finden, wenn es sich um Beantwortung der Frage handelt, weshalb die Winterknospen unserer Bäume und Sträucher nicht stets alsbald austreiben, wenn man sie unter geeigneten Umständen im Winter höherer Temperatur aussetzt. Die Ruheperiode der Knospen ist freilich anfänglich durch den Wechsel der Jahreszeiten inducirt, aber sie ist schliesslich in angegebener Weise zu einer specifischen Eigenthümlichkeit der Pflanzen geworden, die sich erst im Laufe langer Zeit wieder beseitigen lässt.

Werden nicht zu kleine Zweige von *Prunus avium* Ende October mit der Basis in Wasser gestellt und ins Warmhaus gebracht, so treiben ihre Knospen trotz der dargebotenen günstigen Vegetationsbedingungen nicht aus, sie gehen vielmehr allmählich zu Grunde. *Prunus*-zweige, die man Mitte December ins Warmhaus bringt, blühen dagegen nach etwa 4 Wochen. Wenn man die Zweige erst Mitte Januar zum Versuch abschneidet, so entfalten sich die Blüthen noch schneller. Aehnliche Resultate erhält man bei Versuchen mit den Zweigen anderer Bäume, z. B. *Tilia*. Sehr schnell treiben auch *Forsythia*-zweige. Als ich solche Anfang December in Wasser stellte, entfalteten sich ihre Blätter und Blüthen in drei Wochen.

Uebrigens ist die Energie, mit der die Winterknospen verschiedener Pflanzenarten austreiben, wenn man abgeschnittene Zweige derselben in Wasser stellt und in einen warmen Raum bringt, graduell sehr verschieden. Die Knospen von Weidenzweigen entwickeln sich z. B. recht schnell, ebenso diejenigen von *Syringa* (ich fand, dass gegen Ende Februar abgeschnittene Zweige im Warmhaus nach kaum 14 Tagen ihre Blätter völlig entfaltet hatten), während die Knospen des Goldregens schon nicht ganz so leicht zur Entfaltung gelangen. Experimente, die man mit verschiedenen Pflanzen zu verschiedenen Zeiten des Winters anstellt, liefern hier in mancher Hinsicht interessante Resultate. Man braucht die möglichst gross gewählten Aeste oder Zweige dabei nur mit ihrem unteren Ende in Wasser zu stellen und hat ferner darauf zu achten, dass die Luft, welche die Pflanzen umgiebt, nicht zu trocken ist, weshalb die Versuche im Warmhause gewöhnlich besser als im Zimmer gelingen.

Wenn man im Herbst Kartoffelknollen ins warme Zimmer bringt und dieselben in einem Kasten ruhig liegen lässt, so findet man, dass sie erst um Neujahr zu keimen beginnen. Den Knollen ist also ebenso wie den Knospen eine Ruheperiode eigenthümlich. MÜLLER-Thurgau¹⁾ hat sich bemüht, die Ursachen dieser Ruheperiode festzustellen, und ich habe mich nach ihm mit derselben Frage beschäftigt²⁾. Untersucht man die schon einige Zeit im Zimmer liegenden Kartoffelknollen auf Zucker, indem man einige Knollen auf einem Reibeisen zerreibt, dem Brei etwas Wasser hinzufügt, um die vorhandene Flüssigkeit nach Verlauf einiger Zeit abzufiltriren und mittelst FEHLING'scher Lösung zu prüfen, so findet man keine Glycose oder nur

1) Vgl. MÜLLER-Thurgau, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 11, S. 813.

2) Vgl. DETMER, Pflanzenphysiologische Untersuchungen über Fermentbildung etc., Jena 1884, S. 41.

Spuren derselben. Bei Beginn der Keimung der Knollen im Januar ist ihr Zuckergehalt ebenfalls noch sehr gering; er wächst aber allmählich beträchtlich. Wenn man im December eine kleine Menge (20 cm) der in angegebener Weise aus Kartoffelknollen gewonnenen Flüssigkeit mit wenig verdünntem Stärkekleister versetzt, so ist das Vorhandensein von Diastase nicht sicher zu constatiren (vgl. Methode unter 112). Im Keimen erheblich fortgeschrittene Kartoffelknollen enthalten aber, wovon ich mich überzeuge, sicher Diastase.

Danach darf man annehmen, dass die Kartoffelknollen im Herbst deshalb nicht sofort keimen, weil sie nicht im Stande sind, Diastasemengen zu bilden, die für eine ergiebige Zuckerproduction hinreichen. Die Zuckermengen, die im Herbst in den Knollen entstehen, reichen freilich hin, die Athmung der Knollen zu unterhalten, aber sie häufen sich nicht merklich im Gewebe an und genügen nicht für das Zustandekommen eines energischen Wachstums der Knospentheile. Allmählich bildet sich mehr und mehr Diastase in den Knollen; es entstehen grössere Zuckerquantitäten, und die Keimung kann beginnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Resultate, zu denen man bei dem Studium der Ruheperiode der Kartoffelknollen gelangt ist, von Bedeutung für die Beurtheilung der Frage nach der Ruheperiode der Winterknospen unserer Bäume und Sträucher sind, und es dürfte daher von um so grösserem Interesse sein, noch das folgende von MÜLLER-Thurgau ausgeführte Experiment zu erwähnen.

Wir bringen einige Kartoffelknollen im August unmittelbar nach dem Ausgraben in einen Thermostaten, in welchem eine Temperatur von 0° C. herrscht (vgl. unter 49). Nach etwa 4 Wochen werden die Knollen in lockerer, feucht gehaltener Gartenerde, die sich in Blumentöpfen befindet, bei Lichtabschluss günstigen Keimungsbedingungen ausgesetzt. Die Entwicklung der Knospen beginnt alsbald, während Parallelversuche lehren, dass nicht vorher abgekühlte Knollen keineswegs im Herbst, sondern erst viel später keimen. Man hat die Ruheperiode der Knollen also durch die Abkühlung beseitigt. Unter 126 ist gezeigt worden, dass die Knollen in ihren Geweben bei niedriger Temperatur erhebliche Zuckermengen anhäufen, weil bei diesen geringen Wärmegraden die Athmung der Zellen sehr schwach ist. Nach der Abkühlung steht den Knospen also eine ziemlich reichliche Menge plastischen Materials zur Verfügung, und sie können sich daher schnell entwickeln. Im Zusammenhang mit dem Angeführten besitzen nun auch die Resultate einiger Beobachtungen, die ich an Paviazweigen machte, Interesse. Paviazweige, die Mitte Januar abgeschnitten, mit ihrer Basis in Wasser gestellt und ins Warmhaus gebracht worden waren, entfalteten ihre Knospen Mitte März. Als ich Paviazweige Ende October abschnitt und ins Warmhaus brachte, trat die Evolution der Knospen erst nach Mitte März ein. Die relativ schnelle Entfaltung der Knospen solcher Zweige, die erst im Januar ins Warmhaus gelangten, hat vielleicht darin ihren Grund, dass sich in ihren Geweben während ihres Verweilens im Freien in Folge der herrschenden niederen Temperatur Zucker anhäufen konnte. Die schon im October ins Warmhaus gestellten Zweige haben hier auch wohl Zucker gebildet, derselbe wurde aber, solange die Glyucoseerzeugung nicht sehr ausgiebig war, für die Zwecke der Athmung verbraucht, so dass sich die Knospen erst im März entfalten konnten.

Zu dieser Zeit tritt gewiss eine besonders energische Production diastatischer Fermente in den Zweigen ein; es wird eine Zuckermenge gebildet, die sowohl für die Unterhaltung der Athmung als auch für den Beginn des Wachsthum's der Knospentheile genügt¹⁾.

Interesse beansprucht noch folgende Beobachtung. Die auf S. 7 erwähnte Weide (*Salix fragilis*), welche in Wassercultur gezogen wurde und den ganzen Winter über im warmen Zimmer stand, ist völlig gesund, hat aber erst heute, am 26. März 1895, Triebe zur Entfaltung gebracht. Auch von dieser Weide abgeschnittene und in Wasser gestellte Zweige bildeten erst in den letzten Tagen neue Triebe. Als ich dagegen Mitte December im Freien stehenden Exemplaren von *Salix fragilis* Zweige entnahm und dieselben im warmen Zimmer in Wasser stellte, bildeten die Untersuchungsobjecte im Laufe von 4 Wochen Wurzeln und neue Triebe.

164. Das Wachsthum der Pflanzentheile in constanter Finsterniss.

Ein ausgiebiges Wachsthum in constanter Finsterniss können natürlich nur Pflanzentheile erfahren, denen unter diesen Umständen hinreichende Mengen plastischer Stoffe zur Verfügung stehen. Aus diesem Grunde eignen sich zu den nachfolgenden Experimenten vor allem Keimpflanzen, denn in den Reservestoffbehältern der Samen sind ja mehr oder minder grosse Mengen plastischer Stoffe vorhanden. Handelt es sich zunächst ganz im Allgemeinen darum, die Erscheinungen zu constatiren, welche Pflanzen bei ihrem Wachsthum in constanter Finsterniss im Vergleich zu ihrem Wachsthum unter normalen Beleuchtungsverhältnissen erkennen lassen, so legen wir einige angequollene Samen von *Pisum*, *Phaseolus* und *Cucurbita* in mit durchfeuchteter Gartenerde angefüllten grossen Blumentöpfen aus. Einige Töpfe werden am Fenster dem Wechsel von Tag und Nacht ausgesetzt, andere stehen unmittelbar daneben unter einem grossen, mit schwarzem Papier überzogenen Pappkasten. Man stellt die Experimente zweckmässig in einem Raume an, in welchem die Pflanzen nur von diffusum Licht getroffen werden, denn unter dem Einfluss des directen Sonnenlichtes würde die Luft unter dem Pappkasten leicht eine sehr hohe Temperatur annehmen. Es ergiebt sich bald, dass die Untersuchungsobjecte, die sich im Finstern einer- und unter normalen Beleuchtungsverhältnissen andererseits entwickeln, ein sehr verschiedenartiges Aussehen besitzen. Sehen wir hier von der nicht grünen Farbe der im Dunkeln cultivirten etiolirten Pflanzen völlig ab, so finden wir z. B. bei *Cucurbita*, dass das hypocotyle Glied im Dunkeln eine sehr bedeutende Länge erreicht, während es bei den Lichtpflanzen relativ kurz bleibt. Die Cotyledonen der Dunkelpflanzen sind hingegen weder so breit noch so lang wie diejenigen der bei Lichtzutritt cultivirten Untersuchungsobjecte. Durch genauere Messungen (es sind dabei stets mehrere Pflanzen zu berücksichtigen, um brauchbare Mittelwerthe zu erhalten) kann man sich von dieser Thatsache noch

1) Für die geltend gemachten Anschauungen sprechen auch die Resultate der Untersuchungen A. FISCHER's, vgl. Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, Bd. 22, S. 127 und 154. Etwas anders fasst MÜLLER-Thurgau neuerdings das Zustandekommen der Ruheperiode bei den Pflanzen auf, vgl. Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 14, S. 878. Man vgl. auch noch ASKENASY, Botan. Zeitung, 1877.

specieller überzeugen. In Fig. 132 ist der oberirdische Theil einer etiolirten, in Fig. 133 derjenige einer normalen Cucurbitakeimpflanze dargestellt. Bei der Cultur von Phaseoluskeimlingen im Licht und im Dunkeln (vergl. Fig. 134 und Fig. 135) überzeugt man sich leicht

Fig. 132.

Fig. 133.

Fig. 132. Oberirdischer Theil einer im Dunkeln erwachsenen Keimpflanze von Cucurbita.

Fig. 133. Oberirdischer Theil einer unter normalen Verhältnissen erwachsenen Keimpflanze von Cucurbita.

gen Blättern, die bei Lichtzutritt zur Entwicklung gelangt sind, eine bedeutende Länge, aber geringe Breite erreichen¹⁾.

Es ist von Interesse, dass nicht allein Pflanzen, welche einerseits bei gewöhnlicher Beleuchtung, andererseits in tiefer Finsterniss cultivirt werden, bedeutende Unterschiede mit Bezug auf ihre gesammte Entwicklung erkennen lassen, sondern dass derartige Differenzen auch schon bei der Cultur von Pflanzen in einem mehr oder weniger intensiven Licht klar hervortreten²⁾. Ich habe zur Feststellung der bezüglichlichen Thatsache Holzkästen von 55 cm Höhe und etwa 680 qcm Grundfläche benutzt, in welchen die Culturegefässe mit den Pflanzen standen. Die Kästen waren im Innern geschwärzt. An Stelle ihrer vorderen Wand konnten

davon, dass das hypocotyle Glied der Untersuchungsobjecte auch im Finstern sehr kurz bleibt, während namentlich das Epicotyl zu viel bedeutenderer Länge als bei Lichtzutritt heranwächst. Die Blattstiele der Primordialblätter werden im Finstern länger als unter normalen

Verhältnissen; die Spreiten der Blätter erreichen dagegen nur bei Lichtzutritt ihre normale Form und Grösse. Aehnlich wie die Phaseoluskeimlinge verhalten sich auch Pisum- und Viciakeimpflanzen. Ausgezeichnete Untersuchungsobjecte sind ferner Keimpflanzen von Tropaeolum majus. Bei Versuchen mit manchen monocotylen Gewächsen (Zea, Triticum) stellt man fest, dass die in constanter Finsterniss erwachsenen Blätter der Keimpflanzen im Vergleich zu gleichalterigen

1) Vgl. SACHS, Botan. Zeitung, 1863, Beilage.

2) Vgl. DETMER, Versuchsstationen, Bd. 16.

Fig. 134.

Fig. 135.

Fig. 134. Oberirdischer Theil einer im Dunkeln erwachsenen Keimpflanze von *Phaseolus*.

Fig. 135. Oberirdischer Theil einer unter normalen Verhältnissen erwachsenen Keimpflanze von *Phaseolus*.

cinthengläsern bei dauerndem und völligem Lichtausschluss zum Austreiben gebracht, so kommen die Untersuchungsobjecte in der That zur Blüthe. Ich überzeugte mich davon, dass die Blüthen, was die Form und Farbe derselben anbelangt, in völliger Dunkelheit eine durchaus normale Entwicklung erfahren, sich also abweichend von den meisten Stengeln und Laubblättern verhalten¹⁾.

Von Interesse ist es weiter, das folgende Experiment anzustellen. Man cultivirt Pflanzen von *Phaseolus multiflorus* in Blumentöpfen. Wenn sich die Primordialblätter unter gewöhnlichen Verhältnissen normal entwickelt haben und die auf das Epicotyl folgenden Internodien in lebhafter Streckung begriffen sind, so führt man den Gipfel einer Pflanze in einen dunkeln Raum ein, während der übrige Theil des Untersuchungsobjectes dem hellen Tageslicht ausgesetzt bleibt. Ein Stativ trägt einen grossen Metallring, auf dem in horizontaler Lage eine in der Mitte mit einem Loch versehene dicke Pappscheibe ruht. Der Gipfel der Bohnenpflanze wird durch dies Loch geführt und in demselben mit Watte wohl befestigt. Man

Glasplatten eingeschoben werden. Den einen Kasten kann man mit einer gewöhnlichen Glasplatte versehen, einen anderen mit einer Milchglasplatte, einen dritten mit zwei, einen vierten mit drei Milchglasplatten. Zum Vergleich werden auch Pflanzen bei völligem Lichtabschluss gezogen. Die Kästen stellt man vor die Fenster eines nach Norden, gelegenen Raumes. Bei Culturen mit Bohnen wird man alsbald bemerken, dass die Pflanzen, welche am meisten Licht empfangen, die kürzesten Stengeltheile und grössten Blätter produciren. Mit sinkender Lichtintensität hinter den Milchglasplatten steigt die Länge der Stengeltheile, während die Grösse der Blätter abnimmt.

Es giebt verschiedene Pflanzen, die im Stande sind, nicht allein zahlreiche Blätter und lange Stengel, sondern auch Blüten in constanter Finsterniss zur Ausbildung zu bringen. Werden Hyacinthenzwiebeln in sogen. Hyacinthengläsern bei dauerndem und völligem Lichtausschluss zum Austreiben gebracht, so kommen die Untersuchungsobjecte in der That zur Blüthe. Ich überzeugte mich davon, dass die Blüthen, was die Form und Farbe derselben anbelangt, in völliger Dunkelheit eine durchaus normale Entwicklung erfahren, sich also abweichend von den meisten Stengeln und Laubblättern verhalten¹⁾.

1) Vgl. auch SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 3, S. 372.

deckt endlich einen möglichst hohen, mit schwarzem Papier überklebten Pappcylinder, dessen Ränder auf der Pappscheibe ruhen, über den Gipfel der Pflanze und wird im Laufe von 2—3 Tagen wahrnehmen, dass die im Finstern neu entstehenden Internodien abnorm lang werden, während die Blätter klein bleiben ¹⁾.

Soll das Experiment schön gelingen, so müssen die Pflanzen z. B. an einem Fenster stehen, wo sie wenigstens längere Zeit am Tage directes Sonnenlicht empfangen. Einer zu starken Erwärmung des Pflanzentheiles unter der Papphülle ist durch Verwendung geeigneter aufgestellter Schirme vorzubeugen. Bei meinen Versuchen fand ich auch, dass die im Dunkeln wachsenden Theile der Bohnenstengel sich um eine Stütze zu schlingen vermochten.

165. Die Ursachen der Etiolirungserscheinungen.

Es ist Thatsache, dass zahlreiche Pflanzenarten, wenn sie in völliger Finsterniss zur Entwicklung gelangen, überverlängerte Stengeltheile und kleine Blätter erzeugen. Es fragt sich zunächst, ob die eigenthümliche Formbildung etiolirter Gewächse nicht vielleicht Folge der im Dunkeln ausgeschlossener assimilatorischer Thätigkeit ihrer Blätter ist. Zur Beantwortung dieser Frage führen wir die folgenden Versuche mit Keimpflanzen von *Raphanus sativus* aus ²⁾.

Wir quellen Raphanussamen in Wasser an, legen dieselben dann auf mit verdünnter Nährstofflösung begossenen grobkörnigen Sand, mit welchem zwei kleine Blumentöpfe angefüllt sind, und bringen diese letzteren in Apparate, wie sie unter 16 beschrieben und in Fig. 18 abgebildet wurden. Der eine Apparat wird hellem, diffusem Tageslicht ausgesetzt, der andere wird in unmittelbarer Nähe des ersteren unter einen mit schwarzem Papier überzogenen Pappkasten gestellt. Die Samen keimen bald, und während die sich im Dunkeln entwickelnden Pflänzchen lange hypocotyle Glieder und Cotyledonen von geringer Breite sowie Länge besitzen, zeigen die bei Lichtzutritt erwachsenen und ergrünt Keimlinge ein ganz normales Aussehen. Diese letzteren konnten aber trotz ihres Chlorophyllgehalts nicht assimiliren, da sie von kohlensäurefreier Luft umgeben waren, und somit muss geschlossen werden, dass das Fehlen assimilatorischer Thätigkeit nicht als Ursache der eigenthümlichen Formbildung etiolirter Pflanzen angesehen werden kann ³⁾.

Für denjenigen, der sich specieller mit den Ursachen der Etiolirungserscheinungen bekannt machen will, ist es von Wichtigkeit, die folgenden Experimente anzustellen. Es werden einige Raphanussamen

1) Dies Resultat meiner Versuche stimmt mit gewissen Angaben von SACHS, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, 1887, S. 538, nicht völlig überein. Bei den Experimenten von SACHS waren aber auch die Bedingungen andere, als bei den meinigen, denn seine Untersuchungsobjecte besaßen zahlreiche, am Licht befindliche und stark assimilirende Blätter. Die im Dunkeln befindlichen Blätter erreichten dabei eine bedeutende Grösse, und Aehnliches mag auch bei *Phaseolus* unter gleichen Umständen geschehen. Uebrigens bedarf die ganze Frage einer weiteren experimentellen Prüfung. Vgl. noch FRANK, Lehrbuch der Botanik, Bd. 1, und AMELUNG, Flora, 1894.

2) Vgl. GODLEWSKI, Botan. Zeitung, 1879.

3) Wohl aber kann das Licht von Wichtigkeit für die Bildung specifischer Stoffe sein, die für eine normale Ausbildung der Blätter erforderlich sind. Diese Körper können vorläufig als blattbildende Stoffe bezeichnet werden.

von möglichst gleicher Grösse ausgewählt. Wir bestimmen das Gewicht jedes einzelnen Samens und benutzen nur solche Samen zum Versuch, die nahezu das nämliche Gewicht besitzen. Nach dem Anquellen legen wir die Samen auf mit Nährstofflösung durchfeuchteten Sand, der sich in kleinen Blumentöpfen befindet. Jeder Topf wird mit 4 oder 6 Samen beschickt. Die eine Cultur wird in angegebener Weise in kohlenstofffreier Luft bei Lichtzutritt, die andere im Finstern vorgenommen. Wenn die Pflanzen nach Verlauf einiger Tage ziemlich weit in der Keimung vorgeschritten sind, heben wir sie sorgfältig aus dem Sande heraus und zerlegen sie in ihre einzelnen Organe. Nicht durchaus normal entwickelte Pflänzchen lassen wir bei Seite. Es genügt für uns, nur das hypocotyle Glied und die Cotyledonen weiter zu berücksichtigen. Wir stellen das Lebendgewicht dieser Organe fest, trocknen sie in kleinen Gläschen bei 100° C. und wägen wieder. Wir gelangen bei sorgfältiger Arbeit zu folgenden Resultaten. Die hypocotylen Glieder der bei Lichtzutritt erwachsenen Pflanzen sind absolut ärmer an Trockensubstanz als diejenigen der im Dunkeln zur Entwicklung gelangten Untersuchungsobjecte. Jene enthalten procentisch weniger Wasser als diese. Die im Licht erwachsenen Cotyledonen sind absolut reicher an Trockensubstanz als die im Dunkeln ausgebildeten. Diese letzteren sind procentisch wasserärmer als jene ersteren¹⁾.

Es handelt sich nun um die speciellere Beantwortung der Frage, weshalb etiolirte Internodien gewöhnlich beträchtlich länger als normale sind, und weshalb die Blätter bei Lichtmangel meistens bedeutend im Wachsthum zurückbleiben. Mit Bezug auf die Ueberverlängerung etiolirter Internodien ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Membranen der Elemente ihrer Gewebe (Epidermis, Collenchym, Bast, Holz) auf einer frühen Stufe der Entwicklung verharren und nicht ihre normale Dicke erreichen. Diese Thatsache lässt sich z. B. constatiren, wenn man, wie ich es gethan habe, die Ausbildung der Membranen der Holzelemente bei Lichtzutritt erwachsener und etiolirter epicotyler Glieder von *Phaseolus* mit einander vergleicht. Das Gewebe etiolirter Internodien muss demnach dehnbarer als dasjenige normaler sein, und jede einzelne Zelle etiolirter Stengeltheile wird auch, weil ihre Membranen der Turgorkraft einen relativ nur geringen Widerstand entgegensetzen, lebhafter wachsen können, als die entsprechenden Zellen unter dem Einfluss des Wechsels von Tag und Nacht ausgebildeter Internodien. Es sei hier auch darauf hingewiesen, was mit dem Gesagten in unmittelbarem Zusammenhang steht, dass, wie KRAUS zuerst nachgewiesen hat, die Intensität der Gewebespannung (Längsspannung) in etiolirten Internodien erheblich geringer als in normalen ist. Man kann sich von dieser Thatsache überzeugen, wenn man nach der unter 149 angegebenen Methode vergleichende Untersuchungen über die Gewebespannung normal ausgebildeter und etiolirter epicotyler Glieder von *Phaseolus* anstellt. Man prüfe gleichalterige, in lebhaftem Wachsthum befindliche Objecte.

Ein weiterer Grund für das lebhafte Wachsthum etiolirter Internodien scheint in gewissen Fällen darin zu liegen, dass in ihren Zellen eine grössere Turgorkraft entwickelt wird als in denjenigen der normalen Organe. Einige Beobachtungen von WIESNER und H. DE VRIES²⁾

1) Ich habe schon früher (Versuchsstationen, Bd. 16, S. 212) gezeigt, dass etiolirte Pflanzen wasserreicher als bei Lichtzutritt erwachsene sind.

2) Vgl. H. DE VRIES, Botan. Zeitung, 1879, S. 852.

deuten auf einen relativ hohen Gehalt etiolirter Pflanzentheile an organischen Säuren hin, und da diese Körper eine grosse Bedeutung für das Zustandekommen des Turgors besitzen, so würde es Interesse beanspruchen, den Gegenstand näher zu verfolgen. Geeignete Untersuchungsobjecte würden sich z. B. in den epicotylen Gliedern von *Vicia sativa* oder *Phaseolus* darbieten. Es wäre nur erforderlich, den Säuregehalt der bei Lichtabschluss, sowie der bei Lichtzutritt erwachsenen Organe mit einander zu vergleichen (Methode siehe S. 273).

Freilich sprechen andere Beobachtungen (vgl. PFEFFER, Handbuch, Bd. 2, S. 145, DE VRIES, Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. 14, S. 561, und WORTMANN, Botan. Zeitung, 1889, S. 296) dafür, dass die Turgorkraft der Zellen etiolirter Stengeltheile nicht grösser als diejenige normaler ist. Die ganze Frage bedarf einer eingehenden Untersuchung.

Das lebhaftes Wachsthum etiolirter Stengeltheile beruht also auf einer bedeutenden Turgorausdehnung ihrer Zellen. Diese ist ihrerseits Folge einer gesteigerten Turgorkraft des Zellinhalts (?) und zugleich einer relativ geringen Widerstandsfähigkeit der Zellmembranen. Es kann nach dem Gesagten von vornherein angenommen werden, dass die Zellen etiolirter Stengel eine bedeutendere Länge besitzen, als die entsprechenden Zellen normaler Internodien. In der That ist dies der Fall. Ich habe z. B. die Länge der Markzellen aus dem mittleren Theil normaler und etiolirter epicotyler Glieder von *Phaseolus* mit Hülfe eines Objectivmikrometers bestimmt. Jene waren etwa 0,2 mm lang (es ist stets erforderlich, eine ganze Anzahl von Zellen zu messen, um zu brauchbaren Mittelwerthen zu gelangen), diese 2—3mal länger¹⁾).

Bezüglich der Ursachen, welche es bedingen, dass die Blätter der meisten dicotylen Pflanzen im Dunkeln so sehr klein bleiben, sei nur das Folgende bemerkt. Im Dunkeln können in den Blattzellen diejenigen Processe, welche ein ausgiebiges Flächenwachsthum der Zellhäute vermitteln, nicht zur Geltung kommen. Um welche Vorgänge es sich hier handelt, ist nicht genauer bekannt (vgl. übrigens Anmerkung 3 auf S. 340). Sicher ist nur, dass diese Processe — und somit auch das Flächenwachsthum der Blattzellen — stattfinden können, wenn die Pflanzen von den Lichtstrahlen, sei es auch nur vorübergehend, getroffen werden. Ein Experiment BATALIN's das leicht zu wiederholen ist, zeigt dies deutlich. Wir cultiviren Keimpflanzen von *Phaseolus* in Blumentöpfen bei Lichtausschluss. Wenn sich die Primordialblätter bis zu einem gewissen Grade entwickelt haben, suchen wir zwei Pflanzen (*a* und *b*) mit Blättern von möglichst gleicher Länge aus und messen die Länge sowie Breite der Blätter. *a* bleibt auch ferner im Finstern. *b* wird im Laufe von 8 Tagen jeden Tag etwa 2 Stunden lang schwachem, diffusum Licht ausgesetzt, verweilt sonst aber auch im Finstern. Die Blätter von *b* dürfen nicht ergrünen, daher beleuchten wir sie jeden Tag nur so kurze Zeit lang. Die Blätter von *a* bleiben klein, während hingegen diejenigen von *b* beträchtlich wachsen²⁾).

1) Vgl. G. KRAUS in PRINGSHEIM's Jahrbüchern f. wissensch. Botanik, Bd. 8. Neben der Zellüberverlängerung spielt auch noch die Zellübervermehrung eine Rolle bei dem Zustandekommen des Etiollements.

2) Vgl. Literaturzusammenstellung über das Etiollement bei DETMER, Vergleichende Physiologie des Keimungsprocesses d. Samen, 1880.

166. Der Einfluss des Lichts auf das Wachsthum.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass das Licht einen retardirenden Einfluss auf das Wachsthum der verschiedensten Pflanzentheile geltend macht. Zur Feststellung dieser Thatsache führen wir die folgenden Beobachtungen aus. Eine grössere Anzahl wohl ausgebildeter Erbsensamen wird nach dem Anquellen in einem mit feuchten Sägespänen angefüllten Kasten zur Keimung gebracht. Haben die Hauptwurzeln der Keimlinge eine Länge von 2 cm erreicht, so nehmen wir die Untersuchungsobjecte aus dem Keimbett heraus und bringen 10 mm entfernt von der Wurzelspitze in bekannter Weise feine Tuschestriche als Marken an. Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass nur sehr gleichartig und völlig normal entwickelte Keimlinge zur ferneren Untersuchung Verwendung finden. Die weitere Cultur der Pflanzen erfolgt unter Zuhilfenahme von etwa 25 cm hohen und 10 cm weiten Glascylindern, die mittelst eines passenden, mit einer Anzahl von Löchern versehenen Holzdeckels verschlossen werden können und mit Brunnenwasser gefüllt sind. Wir stellen zwei solche Cylinder auf. Jeder wird mit einer nicht zu kleinen Anzahl der Keimlinge (etwa 10—15) beschickt, die man mit Hülfe von etwas Watte in den Löchern der Holzdeckel befestigt, so dass die Wurzeln in das Wasser eintauchen. Die Wurzeln in dem einen Culturegefäss bleiben dem Licht ausgesetzt; es ist zweckmässig, dicht hinter dem Cylinder und parallel mit dem Fenster einen Spiegel aufzustellen oder den Cylinder auf einem Klinostaten langsam rotiren zu lassen, um jede heliotropische Krümmung der Wurzeln auszuschliessen. Der andere Cylinder ist mit schwarzem Papier beklebt, so dass das Licht keinen Zutritt zu den Wurzeln findet. Man stellt die Beobachtungen im Sommer in einem nach Norden gelegenen Zimmer bei möglichst hoher Temperatur an. Von Zeit zu Zeit, z. B. alle 24 Stunden, ermittelt man den Gesamttzuwachs, den sämtliche Wurzeln in beiden Cylindern erfahren haben, und man wird zu dem Ergebniss gelangen, dass dieser Zuwachs bei Lichtzutritt geringer als bei Lichtabschluss ausfällt.

Werden Pflanzen bei möglichst constanten Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen dem Wechsel von Tag und Nacht ausgesetzt, so lässt sich bei Untersuchungen über die Grösse der Zuwachsbewegung ihrer Organe feststellen, dass dieselbe im Allgemeinen vom Abend bis zum Morgen eine Steigerung, vom Morgen bis zum Abend aber eine Verminderung erfährt. Diese tägliche Periode des Wachsthum ist Folge der im Laufe von 24 Stunden wechselnden Beleuchtungsverhältnisse. Am Tage wirkt das Licht retardirend auf das Wachsthum ein; die Dunkelheit der Nacht beschleunigt den Verlauf der Zuwachsbewegung. SACHS¹⁾ hat die Thatsache der täglichen Periode des Wachsthum für die Internodien verschiedener Pflanzen unter Benutzung des Auxanometers festgestellt, und PRANTL²⁾ hat ebenfalls für Blätter das Vorhandensein einer täglichen Periode des Wachsthum constatirt. Die erforderlichen Untersuchungen sind mit sehr vieler Mühe verbunden. Am einfachsten ist es noch, die Thatsache der täglichen Wachsthumperiode an Blättern zu constatiren. Man hält dabei die unter 154, Seite 322 angegebene Methode ein. Die Untersuchungs-

1) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 99.

2) Vgl. PRANTL, ebendasselbst, S. 371.

objecte (Cucurbita- oder Nicotiana-Exemplare) werden unter Glasglocken in einem nach Norden gelegenen Zimmer dem Wechsel von Tag und Nacht bei möglichst constanter, aber recht hoher Temperatur ausgesetzt. Von Zeit zu Zeit (z. B. alle 3 oder 4 Stunden) misst man die Entfernung zwischen der Marke an der Basis der Blattspreite und der Blattspitze unter Benutzung eines Millimetermaassstabes, unter sorgfältiger Vermeidung irgendwie erheblicher Zerrungen beim Flachlegen der Blätter. Es ergibt sich namentlich, dass die Zuwachsbewegung in der Nacht grösser als am Tage ausfällt. Wenn am Abend die Dunkelheit eintritt, so wird das Wachsthum der Blätter nicht sofort bedeutend beschleunigt, sondern ganz allmählich, so dass das Maximum des täglichen Zuwachses auf die Morgenstunden fällt. Ebenso drückt der Zutritt des Lichts die Wachsthumsgeschwindigkeit der Blätter nicht sofort auf das Minimum herab; dieses fällt vielmehr erst auf die Stunden des Abends.

Aehnliche Resultate erhält man auch, wenn man neben dem Längenzuwachs der Blätter zugleich deren Breitenzuwachs bestimmt. Die erforderlichen Marken werden an den beiden Längsrändern in der Nähe des grössten Breitendurchmessers der Blätter aufgetragen, um ihre Entfernungen in 3- oder 4-stündigen Zeitabschnitten festzustellen.

Bei Untersuchungen über die tägliche Wachsthumperiode von Internodien verwendet man sehr zweckmässig bei Lichtzutritt zur Entwicklung gelangte Triebe von *Dahlia variabilis*. Die Knollen werden lange vor Beginn der Versuche in Erde, die sich in recht grossen Blumentöpfen befindet, eingesetzt, damit sich die Pflanzen schön bewurzeln. Mehrere Tage vor Beginn der Experimente wird die Erde in den Töpfen gründlich durchfeuchtet, und man stellt dieselben dann am besten, um ein Austrocknen der Erde, die sehr störend auf den Gang der Beobachtungen einwirkt, in einen Zinkblechrecipienten mit halbirtem Deckel. Die Versuche führt man unter Benutzung des Auxanometers (vgl. unter 153 aus). Der Faden kann z. B. unter den Blättern des 3., 4. oder 5. Internodiums befestigt werden. Diese Blätter und auch die tiefer stehenden schneidet man alsdann zweckmässig dicht an ihrer Basis ab und bestimmt immer die Gesamtgrösse des Zuwachses der unter der Ankuppelungsstelle liegenden Stengeltheile, also z. B. des 2. und 3. oder 4. und 5. Internodiums. Die Pflanzen sind vor directem Sonnenlicht zu schützen; sie müssen also z. B. in einem nach Süden gelegenen Raum in genügender Entfernung vom Fenster aufgestellt werden. Zur Verhütung des Zustandekommens heliotropischer Krümmungen dienen Spiegel (vgl. unter 153). Die Temperatur- sowie Feuchtigkeitsverhältnisse der Luft sind durch trocken und feucht gehaltene Thermometer, welche in unmittelbarer Nähe der Beobachtungsobjecte frei aufgehängt sein müssen, zu ermitteln (vgl. unter 76). Um die Luft im Arbeitsraum annähernd gleichmässig feucht zu erhalten, sind die Dielen desselben mehrfach am Tage mit Wasser zu besprengen. Auch auf die Bewölkungsverhältnisse ist zu achten.

Die Deutung des Zahlenmaterials, welches die Temperaturbestimmungen und die Ermittlungen über die stündlichen Zuwachse ergeben, ist nicht ganz leicht. Ziemlich deutlich tritt die eigenartige Abhängigkeit der Zuwachsgrösse von den Beleuchtungsverhältnissen schon hervor, wenn man aus den stündlichen Werthen die dreistündigen Zuwachse und Mitteltemperaturen berechnet. Am allerdeutlichsten tritt das Abhängigkeitsverhältniss des Wachstums von den Beleuchtumsumständen hervor, wenn man die Resultate der Beobachtungen graphisch darstellt. Die Con-

struction der Curven geschieht in bekannter Weise. Ueber einige beachtenswerthe Momente, auf die hier, um Raum zu sparen, nicht näher eingegangen werden soll, hat SACHS (Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg Bd. 1, S. 126, 185 u. 192) aufmerksam gemacht. Die Curven lehren, dass vom Morgen bis zum Abend Verminderung, vom Abend bis zum Morgen Steigerung des Wachstums herrscht. Dies tritt selbst dann hervor, wenn die Temperatur in der Nacht etwas niedriger als am Tage ist.

Sehr lehrreich ist es endlich, das Wachstum der Sporangienträger von Mucor bei Lichtzutritt und im Dunkeln zu beobachten. Wir verfahren genau so, wie es unter 153 auf S. 318 angegeben worden ist. Die Glasglocke, unter der sich die Mucorpflanzen entwickeln, wird abwechselnd mit einem Papprecipienten überdeckt oder unbedeckt gelassen. Während der Dunkelperioden des Versuches ist das Wachstum der Sporangienträger lebhafter als bei Lichtzutritt (vgl. die folgende Tabelle und die correspondirende graphische Darstellung). Es ergibt sich, dass Lichtzutritt das Wachstum in dem vorliegenden Falle sofort retardirend beeinflusst, während Dunkelheit dasselbe sogleich beschleunigt¹⁾.

Tagesstunde	Wachstum p. Stunde	Temperatur in ° C.
8—9 Vorm.	2,70	22,9
10 „	2,70	24,3
11 „	2,30	26,0
12 „	2,90	25,0
1 Nachm.	2,70	25,8
2 „	3,20	25,8
3 „	3,50	25,2
4 „	2,90	25,0
5 „	3,20	25,1
6 „	2,80	25,3

Fig. 136. Die dicke gebrochene Linie giebt die wechselnde Wachstumsgeschwindigkeit eines Mucorschlauches bei wechselnder Beleuchtung und Verdunkelung an. Die dünne Linie ist die Temperatureurve. (Nach VINES.)

167. Der Einfluss der Beleuchtungsverhältnisse auf die Keimung der Kartoffelknollen.

Wir legen einige Kartoffelknollen im Herbst oder im Laufe des Winters in einen Kasten, den wir mit einer Pappscheibe zudecken, um das Untersuchungsmaterial vor dem Lichtzutritt zu schützen. Andere Knollen bringen wir in einen mit einer Glasplatte bedeckten Kasten. Die Kästen stehen vor dem Fenster eines nach Norden gelegenen geheizten Zimmers. Wasser wird den Knollen gar nicht zugeführt. Im Laufe des Winters keimen die Kartoffeln, aber während die Dunkelknollen ziemlich lange Triebe entwickeln, bleiben diejenigen der Lichtknollen kurz und von gedrungenem Aussehen. Wir können den Versuch bis in den Sommer hinein fortsetzen und constatiren stets, dass die Ausbildung der ersten

1) Vgl. VINES, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2, S. 133.

Internodien der aus den Knollen hervorgehenden Kartoffeltriebe nur im Dunkeln (unter gewöhnlichen Verhältnissen im Boden) in normaler Weise vor sich gehen kann. Zerreiben wir ab und an eine Knolle der Licht- und Dunkelreihe auf einem Reibeisen, um den erhaltenen Brei mit etwas Wasser zu behandeln, und um die abfiltrirte Lösung mit Hülfe FEHLING'scher Flüssigkeit auf Zucker zu prüfen, so finden wir in den Dunkelknollen viel Zucker, in den Lichtknollen aber gar keinen oder nur Spuren. Mit diesem Mangel an geeignetem, plastischem Material in den Lichtknollen hängt offenbar das schwächliche Wachsthum ihrer Triebe zusammen. Ich habe die Thatsache, dass bei Lichtzutritt keimende Kartoffelknollen keinen Zucker enthalten, zuerst constatirt ¹⁾; ZIEGENBEIN (PRINGSH, Jahrb., Bd. 25) verfolgte den Gegenstand weiter.

Beachtenswerth ist noch, dass die dem Einfluss des Lichts ausgesetzten Kartoffelknollen allmählich ergrünen. Untersucht man zarte Querschnitte aus einer ergrünten Knolle mikroskopisch, so findet man dicht unter der Schale Zellen, die Chlorophyllkörper mit Stärkeeinschlüssen enthalten. Diese Chlorophyllkörper gehen unter dem Einfluss des Lichts aus farblosen Stärkebildnern, welche die Kartoffelknollen enthalten, hervor.

Wesentlich anders gestaltet sich das Aussehen der Triebe keimender Kartoffelknollen, wenn ihr Wachsthum nicht bei Mangel von Wasserzufuhr erfolgt. Wir füllen einige Teller mit feuchtem Sand an und halten den Sand auch fernerhin stets feucht. Einige Knollen werden durch Eindrücken mit ihrer morphologischen Basis in den Sand senkrecht aufgestellt. Die Teller gelangen zum Theil unter eine grosse Glasglocke, zum Theil unter einen grossen Zinkblechrecipienten. Die Triebe der Lichtknollen, zumal die ersten Internodien, entwickeln sich als kurze, dicke, mit vielen Schuppenblättern besetzte Gebilde, aber es entstehen auch Wurzeln, die in den Sand eindringen. Die Triebe der Dunkelknollen erreichen auch hier bei geringem Durchmesser erhebliche Länge, und ihre Wurzelanlagen treiben aus. In feuchter Luft kommen also an den Kartoffeltrieben stets viele Wurzeln zur Entwicklung, was in trockener Luft nicht oder nur in sehr beschränktem Maasse der Fall ist. Auch die Ausbildung der Stolonen gestaltet sich in feuchter Luft meist günstiger als in trockener.

Wir legen Kartoffelknollen in mässig feuchte Erde ein, so dass sie völlig von derselben bedeckt sind. Die Erde befindet sich in grossen Blumentöpfen, und diese stellen wir im warmen Zimmer unter einen grossen Zinkblechrecipienten. Bei der Keimung der Knollen bilden sich sehr lange Triebe mit kleinen Blättern. Ferner entstehen viele oberirdische Wurzeln und alsbald als Achselsprosse auch Stolonen, die in die feuchte Luft hineinragen und an ihren Enden häufig zu kleinen Knollen anschwellen. Oft sind die Knollen aber auch ungestielt und sitzen direct in den Blattachseln. Ueberhaupt ist die Entwicklung der Pflanzen unter den bezeichneten Umständen nicht immer genau die nämliche; schon die Knollenvarietät ist in dieser Hinsicht von Bedeutung ²⁾. Winterknospen von *Fagus* sollen nach neueren Untersuchungen nur im Licht austreiben. Meine bezüglichlichen Experimente sind noch nicht abgeschlossen.

1) Vgl. DETMER, Pflanzenphysiologische Untersuchungen über Fermentbildung und fermentative Processe, Jena 1884, S. 34. Bei meinen Versuchen wurde den Kartoffelknollen gar kein Wasser dargeboten. Das für das Wachsthum der Triebe erforderliche Wasser strömte den Zellen derselben aus dem Knollengewebe zu.

2) Zahlreiche Detailangaben vgl. bei VÖCHTING, Bibliotheca botanica, Cassel 1887, Heft 4.

Fünfter Abschnitt.

Die Reizbewegungen der Pflanzen.

I. Die Reizbewegungen protoplasmatischer Gebilde.

168. Die Bewegungserscheinungen des Protoplasmas.

Als erstes Untersuchungsobject wählen wir *Nitella*, Algen, die in stehenden, kalkarmen Gewässern ziemlich häufig vorkommen, und zwar benutzen wir zweckmässig jüngere Internodien zur mikroskopischen Beobachtung. Ohne hier näher auf die bekannten Eigentümlichkeiten der langgestreckten Nitellazellen einzugehen, sei nur bemerkt, dass die Hautschicht oder das Hyaloplasma in denselben besonders mächtig entwickelt ist. Diese Hautschicht und ebenso die derselben anliegenden Chlorophyllkörper sind bewegungslos; dagegen ist in der Körnerschicht des Protoplasmas sehr lebhaft Bewegung wahrzunehmen. Wir haben es hier mit typischer Rotation zu thun, indem ein in sich zurücklaufender Strom vorhanden ist. Durch den Indifferenzstreifen wird der aufsteigende von dem absteigenden Theile des Stromes getrennt.

Wenn wir Blätter aus der Knospe von *Elodea canadensis* in einen Wassertropfen auf den Objectträger bringen und mikroskopisch untersuchen, so erkennen wir ohne jede Mühe in den Zellen den wandständigen Theil des Protoplasmas, die durch den Zellsaft ausgespannten Protoplasmaabänder, den Zellkern sowie die Chlorophyllkörper. Als bald sieht man auch Bewegungserscheinungen im Protoplasma zu Stande kommen, die leicht an der Ortsveränderung kenntlich sind, welche die Chlorophyllkörper erfahren. Die Protoplasmaabewegung in den Blattzellen von *Elodea* trägt bald mehr den Charakter der Rotation, bald mehr denjenigen der Circulation.

Bei dieser letzteren besitzen die Strömungen, welche sowohl in dem wandständigen Plasma als auch in den Protoplasmasträngen verlaufen können, die mannigfachsten Richtungen; oft sind die Strömungen in einem Bande sogar verschieden gerichtet. Dabei machen sich Massenverschiebungen im Protoplasmakörper geltend; einige Stränge werden dünner, andere verschwinden völlig, oder es entstehen auch neue Stränge etc. etc. Gute Objecte für das Studium der Circulation des Protoplasmas sind z. B. die Staubfadenhaare von *Tradescantia* (z. B. *T. virginica*), die man im Oeffnen begriffenen Blüthen

entnimmt, um sie unter Deckglas im Wassertropfen zu untersuchen, und die Haare der jungen Sprosse von *Cucurbita Pepo*.

In den Haaren von *Tradescantia*, *Cucurbita* etc. ist primäre Plasmabewegung gegeben, d. h. die Circulation macht sich schon in den völlig intacten Zellen geltend und kann daher sofort nach Herstellung der Präparate beobachtet werden. In den Blattzellen von *Elodea* (wir wählen solche aus, in denen wir die Plasmastränge gut sehen und an deren Vorderwänden nicht gar zu viele Chlorophyllkörner liegen) ist sofort nach dem Abschneiden der Blätter die Plasmabewegung nur schwach und oft nur schwierig zu erkennen. Allmählich, z. B. im Verlaufe von $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde, wird sie energischer und reißt dann auch viele Chlorophyllkörper mit fort.

Sehr allgemein erscheint das Plasma in den völlig intacten Pflanzenzellen in Ruhe; die Bewegung tritt erst in Folge der als Reiz wirkenden Verletzungen ein, welche bei der Herstellung der Präparate unvermeidlich sind. Wenn man von 6 cm hohen Maispflanzen Epidermisstreifen abzieht und am besten (um den nachtheiligen Einfluss des Wassers zu vermeiden) in 4-proc. Rohrzuckerlösung untersucht, so sieht man keine Protoplasmabewegung. Dieselbe tritt erst nach etwa $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde deutlich hervor. Hier fehlt also, wie in sehr zahlreichen anderen Fällen, die primäre Protoplasmabewegung völlig. Die secundär auftretende ist Folge der Verletzung¹⁾.

Ueber die Ursachen, welche das Zustandekommen der Protoplasmabewegungen bedingen, ist noch wenig bekannt. Auf jeden Fall aber greifen eine ganze Reihe verschiedener Prozesse und wohl in verschiedenen Fällen nicht immer die nämlichen physikalischen sowie chemischen Vorgänge zusammen, wenn sich Protoplasmabewegungen geltend machen. BERTHOLD²⁾ hat versucht, die verschiedenen Formen der Bewegung plasmatischer Massen unter Heranziehung derjenigen Bewegungserscheinungen begreiflich zu machen, welche todte Körpertheilen unter bestimmten Umständen zeigen.

Es ist lehrreich, sich von der Thatsache zu überzeugen, welche, abgesehen von vielen anderen Momenten, ohne Zweifel bei Begründung einer zukünftigen Theorie der Protoplasmabewegungen Berücksichtigung finden muss, dass todte Substanzen oft zu Bewegungen befähigt sind, die mit Protoplasmabewegungen eine gewisse Aehnlichkeit haben.

Auf eine trockene Glasplatte, die auf einem Bogen weissen Papiers ruht, bringen wir mit Hülfe eines Glasstabes einige Tropfen nicht zu concentrirter alkoholischer Fuchsin- oder Methylanilinviolett-Lösung. Die Tropfen breiten sich an ihrem Umfange nicht gleichmässig auf der Glasplatte aus, sondern es bilden sich bald hier, bald dort, Flüssigkeitsausstülpungen, und man wird unwillkürlich an amöboide Protoplasmabewegungen erinnert. Wir bringen destillirtes Wasser in eine sorgsam gereinigte Krystallisirschale und werfen kleine Kampferstückchen in die Flüssigkeit. Die Kampferstückchen gerathen nun, indem sie sich ganz allmählich in dem Wasser auflösen, in sehr leb-

1) Vgl. HAUPTFLEISCH in PRINGSHEIM's Jahrbüchern f. wissensch. Botanik, Bd. 24, S. 173. KIENITZ-GERLOFF, Botan. Zeitung, 1893, ist der Ansicht, dass in jeder lebensthätigen Zelle normalerweise Plasmabewegung bestehe. Er kommt zum Theil auf Grund allgemeiner Erwägungen zu diesem Resultat, welche Beachtung verdienen. Wenn Zellen, die aus ihrem normalen Verbande losgelöst sind, zunächst keine Bewegung zeigen, so ist das nach KIENITZ Folge des mechanischen Eingriffes. Der Gegenstand bedarf weiterer Prüfung.

2) Vgl. BERTHOLD, Studien über Protoplasmamechanik, Leipzig 1886.

hafte Bewegung, und ich sah diese letztere oft stundenlang fort-dauern.

Wenn wir auf das Wasser, auf welchem sich der Kampfer bewegt, mit Hülfe eines Glasstabes eine Spur Olivenöl bringen, so hört die Bewegung schnell auf. Das sich ausbreitende Oel erhöht nämlich die Oberflächenspannung an der Wasseroberfläche sehr bedeutend, und dadurch kommt die zuletzt erwähnte Erscheinung zu Stande. Wird ein Tropfen Leberthran auf 0,25-proc. Sodalösung gesetzt, so treten sehr interessante Ausbreitungserscheinungen am Tropfen hervor. Es sind Veränderungen der Oberflächenspannungsverhältnisse, die für das Zustandekommen der hier in Rede stehenden Bewegungen vielfach maassgebend erscheinen, und Spannungsänderungen spielen auch bei dem Auftreten der Plasmabewegungen sicher eine grosse Rolle. Es wird aber noch sehr eingehender Studien bedürfen, um die complicirten Phänomene, wie sie sich in der lebendigen Zelle geltend machen, im Detail zu begreifen¹⁾.

Von sehr wesentlichem Einfluss auf die Geschwindigkeit der Protoplasmbewegung sind die Temperaturverhältnisse. Bei niedriger Temperatur bewegt sich das Protoplasma langsam. Mit steigender Temperatur nimmt die Geschwindigkeit der Bewegung zu, um nach Ueberschreitung des Temperaturoptimums, welches z. B. nach VELTEN²⁾ für die Protoplasmbewegung in den Blattzellen von *Elodea* bei 36° C. liegt, wieder langsamer zu werden. Lehrreich ist es, sich durch Beobachtung davon zu überzeugen, dass das Plasma bei einer bestimmten Temperatur, die nicht weit von derjenigen entfernt ist, durch welche die Zellen getödtet werden, den Zustand der vorübergehenden Wärmestarre annimmt.

Wir erwärmen Wasser in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade. In das Wasser taucht ein Thermometer ein. Wir ziehen nun einen Epidermisstreifen von den jüngeren Theilen, z. B. einem jungen Blattstiel, eines Exemplars von *Cucurbita Pepo* ab, constatiren das Vorhandensein der Circulation des Plasmas in den Zellen der Haare, merken uns einige der beobachteten Haare genau und tauchen den Epidermisstreifen, den wir mittelst einer Pincette festhalten, in unmittelbarer Nähe der Thermometerkugel in das erwärmte Wasser ein. Verweilt das Untersuchungsobject zwei Minuten lang in Wasser von 46° C., so ist, wie die mikroskopische Untersuchung ergiebt, jede Bewegung des Protoplasmas in den Haarzellen sistirt. Das Protoplasma ist in den Zustand der vorübergehenden Wärmestarre übergegangen. Nach Verlauf von 1 bis 2 Stunden macht sich die Protoplasmbewegung bei niedriger Temperatur aber wieder geltend³⁾.

Ebenso wie bei zu hoher Temperatur erlischt die Protoplasmbewegung bei niedrigeren Wärmegraden. In manchen Fällen ist die Temperatur, bei der das Protoplasma freilich noch nicht abstirbt, wohl aber vorübergehend kältestarr wird, bei 2 oder 4° C. zu suchen. Werden aber *Cucurbita*-sprosse einige Zeit bei einer Temperatur von 10° C. gehalten, so dass sie sich auf diesen Wärmegrad abkühlen, dann ist das Protoplasma in den

1) Ein näheres Eingehen auf diese Dinge ist hier nicht am Platze. Vergl. übrigens BÜTSCHLI, Untersuchungen über mikroskopische Schäume; VERWORN, Bewegungen der lebenden Substanz, 1892. DETMER, Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 10, S. 436; ENGELMANN, Ursprung der Muskelkraft, 1893.

2) Vgl. VELTEN, Flora, 1876.

3) Vgl. SACHS, Flora, 1864, S. 67.

Haaren bereits kältestarr. Temperaturerhöhung ruft die Circulation des Plasmas wieder hervor.

Will man feststellen, dass mit steigender Temperatur vom Temperaturminimum aus die Protoplasmabewegung lebhafter wird, bei einer bestimmten Temperatur (z. B. etwa 35° C. in den Haaren von Cucurbita) am lebhaftesten vor sich geht, um bei noch höherer Temperatur wieder an Geschwindigkeit abzunehmen, so bedarf man eines besonderen Apparates zur Temperaturregulirung.

Ein sehr leistungsfähiger Apparat dieser Art ist von PFEFFER construirt worden ¹⁾, aber auch der in Fig. 137 abgebildete Apparat von

SACHS kann Verwendung finden. Die

Grösse des Wärmekastens muss derjenigen des Mikroskops entsprechen. Der nahezu würfelförmige Kasten hat unten und an den Seiten doppelte

Wände von Zinkblech, die einen Zwischenraum von 25 mm Dicke umschliessen, der mit Wasser gefüllt wird. Oben ist der Kasten ganz offen, an der vorderen

Seitenwand aber eine Oeffnung angebracht, die mit einer gut passenden, aber nicht weiter befestigten

Glasplatte verschlossen wird. Dies Fenster *D*

ist so gross und derartig angebracht, dass es hinreichend Licht auf den Spiegel des im Kasten stehenden Mikroskops gelangen lässt. Die Höhe

Fig. 137. Wärmekasten nach Sachs.

1) Vgl. PFEFFER, Zeitschrift f. wissensch. Mikroskopie, Bd. 7.

2) Vgl. SACHS, Lehrbuch d. Botanik, 4. Aufl., S. 746.

des Kastens ist so abgemessen, dass der obere Rand des Doppelkastens mit der Brücke des Mikroskops in gleicher Höhe liegt. Die Oeffnung des Kastens wird mit einem dicken Pappdeckel verschlossen, in dem man eine Oeffnung so angebracht hat, dass sie die Brücke genau umschliesst. Neben dem Tubus ist in dem Deckel ein rundes Loch vorhanden, durch welches man mit starker Reibung ein kleines Thermometer einschiebt, so dass dessen Kugel neben dem Objectiv hängt. Der Kasten ist inwendig mit schwarzem Lack angestrichen, und ein mit Wasser durchtränktes Pappstück liegt unter dem Fuss des Mikroskops, welches dadurch fester steht. Auch hat der feuchte Pappdeckel den Zweck, die Luft in der Umgebung des Objects feucht zu erhalten. Durch die über den Deckel hervorragende Stellschraube kann die Einstellung auf das Object bequem geregelt werden; zwei seitliche Oeffnungen, von denen die Figur eine zeigt, dienen dazu, den Objectträger, wenn nöthig, mit einer Pincette zu verschieben. Noch bequemer ist es, die Objectträger an einem Draht zu befestigen, der durch einen in die Oeffnung *F'* passenden Kork geht. Der Wärmekasten ist von LEITZ in Wetzlar zu beziehen. Will man bei höherer Temperatur beobachten (über 50° C. darf man nicht gehen, da die Objective sonst leiden), so erwärmt man das Wasser im Kasten durch eine untergestellte Spirituslampe; hat die Temperatur ungefähr die gewünschte Höhe erreicht, so setzt man statt jener eine Oellampe mit Schwimmer unter und wartet, bis die Temperatur constant bleibt. Um höhere oder niedrigere Temperaturen zu bekommen, genügt es, 1, 2 oder 3 Schwimmer mit Nachtluchtern in die Lampe zu setzen. Um bei niederen Temperaturen zu beobachten, genügt es, dem Wasser im Kasten ab und an Eisstückchen zuzusetzen. Sehr empfehlenswerth ist es, den aus dem Wärmekasten herausragenden Theil des Mikroskops mit Watte zu umwickeln, um auf der Hand liegende Fehlerquellen der Methode möglichst auszuschliessen.

Bei genauen Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur auf Protoplasmabewegung ist es erforderlich, die Zeit festzustellen, welche ein Inhaltsbestandtheil einer Zelle, z. B. ein Chlorophyllkorn, bei bestimmter Temperatur bedarf, um von dem einen Rande des Gesichtsfeldes, die Mitte desselben passierend, zum anderen zu gelangen. Auch kann man

Fig. 138. Gaskammer zum Gebrauch bei mikroskopischen Untersuchungen, im Durchschnitt dargestellt.

die Zeit constatiren, welche ein Chlorophyllkorn braucht, um sich an der nicht das ganze Gesichtsfeld einnehmenden Längswand einer Zelle fortzubewegen. Zu beachten ist, dass man nur solche Chlorophyllkörper bei der Beurtheilung der Geschwindigkeit der Plasmabewegung ins Auge fasst, die sich frei und ungestört durch andere Chlorophyllkörper bewegen.

Handelt es sich um die Constatirung der wichtigen Thatsache, dass Mangel freien Sauerstoffs die Protoplasmabewegung aufhebt, so experimentirt man sehr bequem unter Benutzung einer vom Mechaniker ALBRECHT in Tübingen im Preise von 15 Mk. gelieferten Gaskammer. Vergl. Fig. 138. Dieselbe hat etwa 7 cm Länge, 4,5 cm Breite und 5 mm Höhe. Sie ist aus Metall gearbeitet. In den unteren Boden ist eine ziemlich grosse Glasplatte luftdicht eingekittet; der obere Boden besitzt ein kreisrundes Loch. Hier wird das Deckglas aufgelegt, so dass sich das Untersuchungsobject im hängenden Tropfen im Innern der Gaskammer befindet. Der Boden derselben wird mit einer dünnen Schicht ausgekochten Wassers

benetzt, um das Object vor Austrocknung zu schützen. Das Deckglas kann leicht mit Hülfe von Fett luftdicht aufgelegt werden. Die Röhren *R* und *R'* dienen zum Zu- und Ableiten der Gase. Das zu verwendende Wasserstoffgas wird mit Berücksichtigung der unter 160 angegebenen Vorichtsmaassregeln entwickelt und gereinigt. Die Gaskammer findet ihren Platz auf dem Tisch des Mikroskops. Als Untersuchungsobjecte wählen wir z. B. Staubfadenhaare von *Tradescantia* oder Haare des jungen Blattstieles von *Cucurbita Pepo*. Bequem ist es auch mit Infusorien zu experimentiren. Wir erhalten dieselben leicht, wenn wir Heu mit Wasser übergossen und etwa 8 Tage lang ruhig stehen lassen. In der Flüssigkeit sind dann meist viele Paramecien, deren gestreckter Körper mit Cilien besetzt ist, vorhanden. Auch Vorticellen findet man. Sind die Untersuchungsobjecte (Haare oder Infusorien) in den hängenden Tropfen gebracht, und hat man das Vorhandensein von Bewegungserscheinungen constatirt, so beginnt man sogleich mit dem Durchleiten des Wasserstoffs. Mir ist aufgefallen, dass man oft lange Zeit (zuweilen mehrere Stunden lang) Gas durch den Apparat leiten muss, bevor die Bewegungen aufhören. Die Strömungen des Plasmas und ebenso die freien Ortsbewegungen der Organismen finden eben noch bei Gegenwart minimaler Sauerstoffmengen statt. Ist das Plasma endlich bewegungslos geworden, so kann der erzielte Zustand der Asphyxie durch Luftzutritt wieder aufgehoben werden ¹⁾).

169. Die freien Ortsbewegungen niederer Organismen (Schwärmerbewegungen etc.).

Es giebt zahlreiche niedere Pflanzen, welche ebenso wie die typischen animalischen Wesen zu freien Ortsbewegungen befähigt sind. Die Mechanik dieser Bewegungen ist noch unklar, weshalb wir auf dieselbe nicht näher eingehen. Dagegen handelt es sich hier um Constatirung der Bewegungserscheinungen selbst und um Feststellung des Einflusses, den äussere Verhältnisse auf dieselben ausüben.

Wir wollen zunächst *Euglena viridis* in Untersuchung nehmen, einen Organismus, der freilich in morphologischer Hinsicht nicht mit typischen Algen, sondern mit den Infusorien zusammenhängt, aber sich in mehr als einer physiologischen Beziehung den Algen anschliesst. Das Untersuchungsmaterial ist leicht zu erlangen; es findet sich in stehenden Gewässern, Strassenrinnen und Dorflachen. Ich habe das Euglenamaterial, um recht lebenskräftige Individuen zur Untersuchung zu gewinnen, zunächst einige Tage auf Torfstücken cultivirt, die in einer Schale lagen, in welcher sich Nährstofflösung, wie man sie zu Wasserculturversuchen benutzt, befand. Die Torfstücke tauchten etwa bis zu halber Höhe in die Lösung ein, und das grüne Euglenamaterial wurde einfach auf ihre feuchte Oberfläche gebracht. Haben die Culturgefässe einige Tage vor einem nach Süden gelegenen Fenster gestanden, so werden die Torfstücke in eine Porzellanschale gelegt, mit Brunnenwasser übergossen und einige Stunden unter Wasser belassen. In dieser Zeit sammeln sich zahlreiche Euglenaschwärmer in dem Wasser an. Die mikroskopische Untersuchung ergiebt, dass der Körper der *Euglena viridis* von spindelförmiger Gestalt ist. Kern und Chlorophyll-

1) Vgl. auch CLARK, Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 6, S. 273.

körper sind vorhanden. Am vorderen Körperende, das eine lange Cilie trägt, sind Vacuolen und ein rother Augenfleck zu sehen. Nach KLEBS ist der Euglenaorganismus zeitlebens von einer Membran umgeben, und unter ungünstigen äusseren Bedingungen gehen die Euglenen in einen Dauerzustand über, in welchem sie bewegungslos werden. Die freien Vorwärtsbewegungen der Euglenaschwärmer werden durch die Cilie vermittelt und sind stets mit Rotation des ganzen Körpers verbunden. Um diese Vorwärtsbewegungen genau verfolgen zu können, bringen wir Schwärmer mit Hülfe einer Glasröhre, die wir in das Euglenaindividuen enthaltende Wasser, in welchem unsere Torfstücke gelegen haben, eintauchen, in den hängenden Wassertropfen einer kleinen feuchten Kammer und beobachten mit Hülfe des Mikroskops. (Ueber die Herstellung derselben vergl. unter 138.) Die Schwärmer vermögen sich bei völligem Lichtabschluss zu bewegen, ebenso wie bei Lichtzutritt; indessen ist das Licht von einem richtenden Einfluss auf die Bewegung der Euglena; diese gehört also zu den phototaktischen Organismen. Bei Beginn unseres Experiments sind die Schwärmer ziemlich gleichmässig in dem hängenden Tropfen der feuchten Kammer vertheilt. Es lässt sich aber leicht unter dem Mikroskop feststellen, dass sich fast alle Schwärmer, zumal wenn wir das vom Spiegel reflectirte Licht abblenden, sehr schnell an dem nach dem Fenster, also der Lichtquelle, zugewandten Tropfenrande ansammeln. Drehen wir den Objectträger mit der feuchten Kammer um 180° , so gerathen die Schwärmer wieder in lebhafte Bewegung und suchen aufs Neue den der Lichtquelle zugekehrten Tropfenrand zu erreichen. Diese Erscheinungen beobachtet man aber nur dann, wenn das Licht, welches auf die Schwärmer einwirkt, kein zu intensives ist. Bei hoher Lichtintensität nämlich sammeln sich die meisten Schwärmer nicht am Lichtrande des Tropfens, sondern am gegenüberliegenden Rande desselben an. Sie fliehen also unter diesen Umständen das Licht.

Wird ein flacher Teller mit Wasser gefüllt, in welchem viele Euglenen vorhanden sind, und in die Nähe des Fensters gebracht, so sammeln sich die Schwärmer bei nicht zu intensivem Licht am Fensterrande des Tellers an. Dreht man den Teller um 180° , dann sind alsbald wieder die meisten Schwärmer am Fensterrande gruppiert. Ich habe mehrfach bei derartigen Experimenten mit *Euglena* eine so lebhafte Bewegung der Schwärmer zur Lichtquelle beobachtet, dass der richtende Einfluss der Lichtstrahlen auf die Organismen im Laufe einer Stunde mehrfach an demselben Material festgestellt werden konnte.

Unter gewissen Umständen, zumal dann, wenn die freie Vorwärtsbewegung der Schwärmer gehindert ist (z. B. in unserer feuchten Kammer bei Ansammlung der Schwärmer am Lichtrande des Tropfens), verändert sich die Körpergestalt der Schwärmer von *Euglena* in auffallender Weise (Metabolie). *Euglena viridis* schwillt mit Vorliebe in der Mitte an und zieht sich an den Enden dünn aus; die Schwärmer anderer *Euglenaspecies* krümmen sich halbmondförmig.

Geeignetes Untersuchungsmaterial bei Beobachtungen über Schwärmerbewegungen bietet auch *Haematococcus lacustris* dar, eine Alge, die z. B. bei Jena in der Leutra vorkommt und die Steine, auf denen sie sitzt, schön roth färbt. Wir bringen einige mit *Haematococcus* besetzte Steine in eine grosse flache Schale, deren Boden nur eben

mit Wasser bedeckt ist, legen eine Glasplatte auf die Schale und lassen die Gefässe mehrere Tage ruhig stehen. Nach Verlauf dieser Zeit werden einige Steine in einem anderen Gefäss mit Wasser übergossen. Wir lassen sie bis zum nächsten Tage im Wasser liegen und finden gewöhnlich, dass dieses nun viele rothe Haematococcusschwärmer enthält. Die Schwärmer sind, ebenso wie diejenigen von *Euglena*, phototaktisch. Sie bewegen sich bei nicht zu intensivem Licht und günstigen Temperaturverhältnissen (etwa 20° C.) dem Licht entgegen. Ich habe mich davon überzeugt, dass es wichtig ist, um recht viele Haematococcusschwärmer zu erhalten, die Steine, bevor man sie mit Wasser völlig übergiesst, einige Tage lang in angegebener Weise im dampfgesättigten Raume aufzubewahren¹⁾.

Aehnliche Experimente, wie solche im Vorstehenden erwähnt worden sind, lassen sich auch mit den kleinen grünen Schwärmern von *Clamydomonas* ausführen, die sich z. B. zuweilen in nicht benutzten Brunnentrögen in grosser Menge entwickeln. Es ist noch zu beachten, was zumal bei Versuchen mit *Haematococcus* nicht selten sehr deutlich hervortritt, dass die Schwärmer in verschiedenen Entwicklungsstadien auf Licht von ganz verschiedener Intensität gestimmt sein können. Nicht immer z. B. suchen die Schwärmer, wenn man ihr Verhalten im hängenden Tropfen studirt, im diffusen Licht den Lichtrand des Tropfens auf. Oft sammeln sie sich vielmehr, wenn das Mikroskop dicht am Fenster aufgestellt ist, an dem dem Zimmer zugewandten Tropfenrande an. Die Schwärmer sind dann auf Licht geringer Intensität gestimmt, und um sie an den Lichtrand des Tropfens zu bringen, muss das Mikroskop mehr oder minder weit vom Fenster entfernt werden.

In einem Dunkelzimmer bringen wir im Fensterladen eine 5—7 cm weite, kreisrunde Oeffnung an. Vor dieser Oeffnung können Glasflaschen mit parallelen Wänden Platz finden, die entweder eine Lösung von doppeltchromsaurem Kali oder eine solche von Kupferoxydammoniak enthalten. Die erstere Flüssigkeit ist derartig hergestellt, dass sie nur die minder brechbaren Strahlen (Roth, Orange, Gelb und etwas Grün) durchlässt; die zweite Lösung absorbiert diese Strahlen und lässt allein die stärker brechbaren Strahlen passieren. Steht kein Dunkelzimmer zur Disposition, so lässt sich der Versuch auch unter Benutzung eines grossen Kastens, der im Innern mit mattschwarzem Papier überklebt ist, durchführen. Wir setzen nun Schwärmer im hängenden Tropfen dem Licht von verschiedener Wellenlänge aus. Unter dem Einfluss der weniger brechbaren Strahlen verhalten sich die Organismen wie im Dunkeln; die Strahlen dagegen, welche die Kupferoxydammoniaklösung passirt haben, sind, ebenso wie gemischtes weisses Licht, von wesentlichem Einfluss auf die Bewegungsrichtung der Schwärmer.

Ueber die Methode, welche bei Untersuchung des Verhaltens der Schwärmer in den einzelnen Strahlengruppen des objectiven Spectrums anzuwenden ist (vgl. STRASBURGER's citirte Arbeit; Methodisches auch bei PFEFFER, Botan. Zeitung. 1872, Nr. 23). Hier und in manchen anderen Fällen dürfte es sich für pflanzenphysiologische Versuche sehr

1) Vgl. STRASBURGER, Wirkung der Wärme und des Lichts auf Schwärmsporen, Jena 1878, und KLEBS, Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen, Bd. 1, H. 2.

empfehlen, das Spectrum mittelst des RAULAND'schen Gitters herzustellen.

Auch unter dem Einfluss von Gaslicht lassen die Schwärmer ihre phototaktischen Eigenschaften erkennen. Wenn man zwischen das Gaslicht und das Mikroskop eine concentrirte Alaunlösung in geeigneter Weise einschaltet, so reagiren die Organismen in gewöhnlicher Weise auf den Lichtreiz. Diese Reaction hört aber bei Einschaltung einer Lösung von Jod in Schwefelkohlenstoff auf. Da die Alaunlösung sehr atherman, die zweite Flüssigkeit in hohem Grade diatherman ist, so darf man unter Beachtung der Resultate der letzten Experimente schliessen, dass dunkle Wärmestrahlen ohne Einfluss auf die Richtung der Schwärmerbewegung sind.

Ebenso kommen den Algenschwärmern, wie man leicht unter Benutzung von Papierstreifen nach der unter 171 angegebenen Methode constatiren kann, keine rheotropischen Eigenschaften zu. Dagegen sind die Algenschwärmer geotropisch reizbar, wie das folgende Experiment wohl sicher beweist ¹⁾. Wir saugen etwas Wasser, das Euglenen enthält, in einer unten und oben offenen Capillare von 0,5 mm Durchmesser empor. Stellen wir die Capillare im Dunkeln senkrecht auf, so sammeln sich die Schwärmer im oberen Theil der Capillare an.

Von Interesse ist es, dass die Schwärmer mancher Algen in ausgeprägter Weise aerotropisch sind. Diese Erscheinung ist für die Schwärmer von Euglena specieller von ADERHOLD constatirt worden, und wir stellen das folgende Experiment an, um dieselbe kennen zu lernen. Eine kleine Schale wird mit Wasser angefüllt, das sehr zahlreiche Euglenaschwärmer enthält. Ebenso füllen wir ein Probirglas mit diesem Wasser bis zum Rande an, verschliessen die Mündung mit dem Daumen und stellen das Probirglas nunmehr derartig auf, dass sein offenes Ende in das Wasser eintaucht, welches sich in der Schale befindet. Bei Lichtabschluss haben nach Verlauf längerer Zeit fast sämtliche Schwärmer das Wasser im Probirglase verlassen und sich in dem Wasser der Schale angesammelt. Diese Erscheinung ist keineswegs Folge von positivem Geotropismus der Schwärmer oder anderer Ursachen, sondern sie beruht auf dem Aerotropismus der Schwärmer; dieselben suchen an solche Orte zu gelangen, an welchen ihnen reichlichere Sauerstoffmengen zur Verfügung stehen. Dies geht mit aller Deutlichkeit aus den folgenden Beobachtungen hervor. Wenn die Schwärmer das Probirglas verlassen haben, so verdrängen wir etwas Wasser aus demselben durch Luft, breiten auf der Oberfläche der an Schwärmern reichen Flüssigkeit in der Schale eine Oelschicht aus und überlassen den Apparat im Dunkeln sich selbst. Die Schwärmer treten nunmehr in erheblicher Menge aus dem Wasser der Schale in dasjenige des Probirglases über, weil sich ihnen hier reichlichere Sauerstoffmengen darbieten.

Eine weitere Verbreitung besitzen in stehenden Gewässern und auf schlammigem Boden meistens blaugrün gefärbte Organismen, die in Form von Fäden auftreten und als Oscillarien bekannt sind. Diese Organismen zeigen verschiedene Bewegungserscheinungen, welche man unter dem Mikroskop näher verfolgen kann. Besonders auffallend sind

1) Vergl. ADERHOLD, Jenaische Zeitschrift f. Naturwissenschaft, Bd. 22, und JENSEN, Archiv f. d. ges. Physiologie, Bd. 53.

die unregelmässigen Krümmungen, welche die sich nach vorn oder rückwärts bewegendenden Oscillarienfäden ausführen.

Bei dem Zustandekommen der bisher erwähnten Bewegungsphänomene verhalten sich die niederen Organismen activ. Es müssen hier aber ferner noch einige merkwürdige Erscheinungen Erwähnung finden, die ihre Ursache in rein passiven Bewegungen, denen Schwärmsporen unterliegen, haben.

Wird grün gefärbtes Wasser, welches viele *Clamydomonas*- oder *Euglenaschwärmer* enthält, in einen Teller gegossen und dieser nach Bedeckung mit einer Glasplatte in die Mitte eines grossen Zimmers unter einen Papprecipienten gestellt, so findet man nach Verlauf einiger Zeit, dass sich die Algen in Form concentrisch angeordneter Wolken oder in Form anderweitiger regelmässiger Figuren in dem Wasser gruppiert haben. Entfernt man die Glasplatte von dem Teller, dann lösen sich die Figuren schnell auf. Wird ein Teller, in dem man algenhaltiges Wasser gegossen hat, derartig (z. B. vor einem Fenster) aufgestellt, dass der eine Teller- rand eine etwas höhere Temperatur als der andere annimmt, dann sammeln sich die Schwärmer (auch bei Lichtabschluss) je nach Umständen an diesem oder jenem Tellerrande an. Nach den Untersuchungen von SACHS ¹⁾ kommen alle diese Phänomene durch Wasserströmungen zu Stande, welche die Schwärmer in bestimmter Weise gruppieren und ihrerseits ihren Grund in Temperaturverhältnissen haben. Diesen Nachweis führte SACHS unter Berücksichtigung derjenigen Ergebnisse, zu denen er bei dem Studium von Emulsionsfiguren gelangte. Die Flüssigkeit, welche dazu dienen soll, uns diese Figuren zur Anschauung zu bringen, bereiten wir in folgender Weise. Es wird grob zerkleinerte Alkannawurzel mit reinem Baumöl übergossen und das nach Verlauf von 24 Stunden intensiv roth gefärbte Oel abfiltrirt. Es wird weiter in einem Glaseylinder eine Mischung von Wasser und Alkohol hergestellt, deren specifisches Gewicht, wie die Prüfung mit dem Aräometer ergibt, genau 0,920 beträgt. Diese Flüssigkeit hat fast genau das spezifische Gewicht des Baumöls. Wenn man eine kleine Menge der Mischung des Wassers und Alkohols in ein Becherglas giesst und etwas gefärbtes Baumöl hinzufügt, so müssen grössere Oeltropfen sehr langsam in der Flüssigkeit emporsteigen; sie ist also von etwas höherem specifischen Gewicht als das Oel.

Sind diese Controlversuche angestellt, so bringt man zu je 500 ccm des Gemisches von Alkohol und Wasser je 5 ccm des rothen Oeles, schüttelt, worauf besonderes Gewicht zu legen ist, sehr kräftig, wobei die grösseren Oeltropfen in Tausende feinsten Tröpfchen zertrümmert werden, und hat auf diese Weise die erforderliche Emulsionsflüssigkeit bereitet.

Zum Gebrauch wird sie in flache Porzellanteller gegossen, so dass sie in denselben eine Schicht von etwa 10—15 mm Höhe bildet. Man bedeckt den Teller mit einer Glasplatte oder lässt ihn unbedeckt stehen und beobachtet, wie die sich bewegendenden Oeltropfen zunächst Tupfen und Netze bilden und sich im Laufe einiger Zeit ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde) zu regelmässigen Figuren gruppieren. Hatte man den Teller nach dem Eingiessen der Emulsionsflüssigkeit mit einer Glasplatte bedeckt, und hebt man diese nach der Bildung der Emulsionsfiguren ab, so lösen sich diese letzteren schnell unter den Augen des Beobachters auf.

Die Gestalt der Emulsionsfiguren ist eine sehr mannigfaltige. In Fig. 139 B ist eine häufig auftretende Form dargestellt. Solche concen-

1) Vgl. SACHS, Flora, 1876.

trische Figuren-bilden sich aber nur, wenn die Teller, in welche man die Emulsion hineingiesst, in der Mitte des Zimmers stehen. Polarisirte Figuren, wie eine solche in Fig. 139 A abgebildet ist, entstehen dagegen, wenn man die Teller in der Nähe eines Fensters oder eines geheizten Ofens aufstellt und der eine Tellerrand also wärmer als der andere ist. Experimentirt man z. B. mit der erwähnten Emulsion, deren gefärbtes Oel ganz wenig specifisch leichter als das Gemisch von Alkohol und Wasser ist, so sind die Spitze und die Randlinien der polarisirten Figur stets nach dem kälteren Tellerrande hingewandt. Die Entstehung der Emulsionsfiguren ist auf Flüssigkeitsströmungen, die ihrerseits ihren Grund in Temperaturverhältnissen haben, zurückzuführen. Die Emulsionsfiguren selbst haben die grösste Aehnlichkeit mit denjenigen Figuren, welche die Zoosporen unter den schon oben bezeichneten Umständen bilden, und allen diesen Erscheinungen liegen auch die nämlichen ursächlichen Momente zu Grunde.

Von erheblichem Interesse ist es auch, die Beeinflussung der Bewegung von Bacterien-schwärmern durch verschiedene Substanzen zu studiren. Auf das aerotaktische Verhalten dieser Schwärmer wurde bereits unter 11 hingewiesen; hier handelt es sich um die sog. chemotactischen Bewegungen derselben ¹⁾ ²⁾.

Wir tödten einen Erbsensamen durch Eintauchen in kochendes Wasser; übergiessen ihn mit 100 cem Wasser und lassen ein oder zwei Tage lang stehen, bis sich in der Flüssigkeit reichlichere Mengen von *Bacterium termo* entwickelt haben. Die Flüssigkeit wird zur Beseitigung grösserer Zusammenballungen von Spaltpilzen durch grobes Papier filtrirt und direct zu den Beobachtungen verwandt.

Bei stärkerer Vergrösserung sieht man, dass die Schwärmer von *Bacterium termo* langsamere oder schnelle, bald nach vorwärts, bald nach rückwärts gerichtete Bewegungen ausführen. Wir schieben nun dem auf

Fig. 139. Emulsionsfiguren. (Nach SACHS.)

1) Freilich ist die Bewegung der Organismen nach Orten relativ grossen Sauerstoffreichthums auch nur eine Form des chemotaktischen Verhaltens.

2) Vgl. Ausführliches bei PFEFFER, Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen, Bd. I, S. 450, und Bd. 2, S. 584.

offenem Objectträger befindlichen bacterienhaltigen Tropfen eine Capillare zu, welche diejenigen Lösungen enthält, deren Wirkung auf den Spaltpilz geprüft werden soll. Die Capillare, etwa 6 mm lang und von 0,06 mm Weite, wird nach Einlegen in die Versuchsflüssigkeit durch partielles Evacuiren unter der Luftpumpe so weit gefüllt, dass am zugeschmolzenen Ende ein luftgefüllter Raum von etwa 3 mm Länge bleibt. Als Versuchsflüssigkeiten benutzen wir folgende:

1) In angegebener Weise bereiteten Erbsenaufguss, in dem durch Kochen die Bacterien getödtet worden sind und den man durch Schütteln wieder mit Luft gesättigt hat;

2) 1-proc. Fleischextractlösung, bereitet durch Auflösen von 0,5 g Extract von gewöhnlicher Consistenz in 50 g Wasser;

3) 2-proc. Lösung von Chlorkalium;

4) 2-proc. Lösung von Chlorkalium mit Zusatz von 5-proc. Citronensäure.

Resultate der Versuche:

1) Es dringen nur einzelne Spaltpilze in die Capillare ein.

2) In kurzer Zeit (einige Minuten) sind sehr viele Bacterien in die Capillare eingetreten. Auch sammeln sich zahlreiche Schwärmer in der Nähe der Oeffnung der Capillare an. Allmählich vertheilen sich mit Fortgang der Diffusion der Lösung aus der Capillare diese letzteren Bacterien wieder mehr und die in dem Glasrohr vorhandenen rücken in Folge ihres Sauerstoffbedürfnisses zum Theil bis zur Luftblase empor, hier eine zweite, nach und nach sehr dicht werdende Ansammlung bildend.

3) Aehnlich wie 2.

4) Einzelne Individuen dringen in die Capillare ein und gehen hier zu Grunde. Die meisten Bacterien prallen, da die Citronensäure abstossend auf sie einwirkt, vom Capillarmund zurück.

Bei Ausführung der Experimente ist das Mikroskop zitterfrei aufzustellen. Strömungen im Bacterientropfen sind nach Möglichkeit auszuschliessen, und die mit den Versuchsflüssigkeiten beschickten Capillaren müssen, bevor sie dem Schwärmer führenden Tropfen zugeschoben werden, durch schnelles Schwenken in Wasser äusserlich abgespült sein.

Wollen wir uns von der Thatsache des galvanotropischen Verhaltens niederer Organismen überzeugen, so experimentiren wir sehr bequem mit Paramecien, z. B. *Paramecium aurelia*¹⁾. Dies Infusor von gestreckter Gestalt führt in seinem Innern einen Kern sowie zwei abwechselnd pulsirende Vacuolen und ist an seiner Oberfläche mit vielen Cilien besetzt. Wird eine Hand voll Heu in einem grösseren Glasgefäss mit Teichwasser übergossen, dann entwickeln sich im Laufe von 8—14 Tagen neben Bacterien so zahlreiche Paramecien in der Flüssigkeit, dass dieselbe milchig getrübt erscheint.

Wir stellen nun folgenden Apparat zusammen. Die Drähte, welche von einer aus mehreren Elementen bestehenden galvanischen Batterie kommen²⁾, sind mit einem Stromwender (Pohl'schen Wippe) verbunden. Von der Wippe gehen noch zwei fernere Drähte ab, deren Enden an unpolarisierbaren Elektroden (vgl. unter 63) befestigt sind. In die eine dieser letzteren Drahtleitungen ist ein elektrischer Schlüssel eingeschaltet.

Nun stellt man ein Mikroskop auf. Auf dem Tisch desselben findet ein Uhrglas Platz, welches Paramecien haltige Flüssigkeit enthält. Man

1) Vgl. VERWORN, PFLÜGER's Arch. f. d. gesammte Physiologie, Bd. 45 und Bd. 46.

2) Der Strom, mit dem man arbeitet, darf weder zu schwach noch zu stark sein. Starke Ströme vernichten die Lebensthätigkeit der Infusorien.

sieht die Infusorien schon bei schwacher Vergrösserung in lebhafter Bewegung die Flüssigkeit nach allen Richtungen hin durchkreuzen. Taucht man die Pinsel der unpolarisirbaren Elektroden in dieselbe ein und schliesst den Strom, so drehen sich sämtliche Paramecien wie auf Commando mit dem vorderen Körperpol nach der negativen Elektrode und alle schwimmen schnell auf dieselbe zu. In kurzer Zeit ist die Anodenseite der Flüssigkeit frei von Paramecien; alle haben sich an der Kathode versammelt. Oeffnet man den Strom, dann wenden sich die Infusorien mit ihrem vorderen Körperpol der Anode zu; sie schwimmen derselben entgegen, sammeln sich an, aber die Ansammlung wird keine so vollständige wie nach der Schliessung des Stromes an der Kathode, denn die Paramecien vertheilen sich alsbald wieder gleichmässig in der Flüssigkeit.

Haben sich in Folge der Stromschliessung die Paramecien an der Kathode angehäuft, und wird die Poulsche Wippe jetzt umgelegt, so führen die Paramecien sofort Axeneinstellungen und Bewegungen aus, die den nunmehr gegebenen Verhältnissen entsprechen, und die Infusorien können durch abwechselndes Umlegen der Wippe jeden Augenblick zur Umkehr gezwungen werden. Bei *Euglena viridis* sind bis jetzt noch keine galvanotropischen Eigenschaften mit Sicherheit constatirt worden.

170. Die Bewegungen der Chlorophyllkörper.

Die Bewegungen der Chlorophyllkörper in den Pflanzenzellen besitzen eine grosse biologische Bedeutung. Wir haben es hier, wie es scheint, nicht mit Eigenbewegungen der Chlorophyllkörper zu thun, sondern die Stellungsänderung, welche dieselben erleiden, wird durch Bewegungen des Protoplasmas vermittelt. Will man sich über die Bewegungen der Chlorophyllkörper genauer orientiren, so ist es besonders zweckmässig, Moosblätter oder Farnprothallien als Untersuchungsobjecte zu wählen, denn im Palissadenparenchym der gewöhnlichen Laubblätter erfahren die Chlorophyllkörper im Allgemeinen nur unbedeutende Aenderungen ihrer Lage, und im Schwammparenchym, in dessen Zellen freilich erhebliche Stellungsänderungen der Chlorophyllkörper eintreten können, sind die bezüglichlichen Verhältnisse aus mehrfachen Gründen oft nicht leicht zu verfolgen.

Werden die Pflanzen von *Funaria hygrometrica* oder Farnprothallien, die man in Gewächshäusern, in denen Farne cultivirt werden, ziemlich leicht findet, unter sonst normalen Verhältnissen einige Zeit im Dunkeln gehalten, so gehen die Chlorophyllkörper in die Dunkelstellung über, d. h. sie wandern in unserem Falle auf die zur Fläche unserer Objecte senkrechten Zellwandungen. In den Zellen anderer Objecte verhalten sich die Chlorophyllkörper übrigens nicht genau in derselben Weise. Die Chlorophyllkörper sind nun, wenn die Verdunkelung nicht zu lange (nur mehrere Stunden) gedauert hat, der Inhalt der Zellen also nicht in den Zustand der Dunkelstarre übergegangen ist, sondern sich noch im Phototonus befindet, in eigenthümlicher Weise für Lichtreiz empfindlich. Wir setzen Rasen von *Funaria* oder Farnprothallien, die im Dunkeln verweilt haben, dem diffusen Licht aus, so dass die Pflanzen von oben her von den Lichtstrahlen getroffen werden. Nach einigen Stunden bringen wir einige *Funaria*-blätter oder einige Prothallien in den Wassertropfen auf den Objectträger, legen ein Deckglas auf und untersuchen. Die Chlorophyllkörper

sind nicht mehr wie in der Dunkelstellung den Seitenwandungen der Zellen angelagert, sondern sie haben sich auf die Vorder- und Hinterwände derselben begeben, und zwar kehren sie dem Beobachter ihre breitere Fläche (Flächenstellung) zu. Nun setzen wir unsere Untersuchungsobjecte auf dem Objectträger unmittelbar dem directen Sonnenlicht aus und sorgen, um eine zu starke Erwärmung der Pflanzentheile zu verhüten, dafür, dass das Deckglas auf seiner Aussenseite stets reichlich mit Wasser benetzt ist. Untersuchen wir nach Verlauf einiger Minuten, so gewahren wir die Chlorophyllkörper noch an dem nämlichen Platze wie bisher, aber ihre Form hat sich geändert. Die vorher polygonal erscheinenden Körner haben ihre Ecken eingezogen; sie sind rundlich geworden, und es tritt das Bestreben der Chlorophyllkörper deutlich hervor, dem zu intensiven Licht eine möglichst geringe Oberfläche darzubieten. Diese Abrundung der grünen Inhaltsbestandtheile der Zellen ist Folge einer Eigenbewegung derselben, dagegen wird ausser dieser durch recht intensives Licht auch eine Lageänderung der Chlorophyllkörper hervorgerufen, die das Protoplasma vermittelt. Wenn wir nämlich unsere Untersuchungsobjecte längere Zeit (bei meinen Versuchen mit *Funariablättern* $\frac{3}{4}$ Stunden) dem directen Sonnenlicht exponiren, so haben sich die Chlorophyllkörner von der Vorder- und Hinterwand der Zellen nach den Seitenwandungen derselben begeben, und sie sind hier in Profilstellung angeordnet. Die Gruppierung der Chlorophyllkörper in der Flächenstellung an der Vorder- und Hinterwand der Zellen kehrt übrigens zurück, wenn die Präparate einige Zeit diffusum Tageslicht ausgesetzt werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die hier erwähnten Stellungsänderungen der Chlorophyllkörper von biologischer Bedeutung für die Pflanzen sind. Im diffusen Licht nehmen die grünen Inhaltsbestandtheile der Zellen eine Lage ein, durch welche sie in den Stand gesetzt werden, die Lichtstrahlen für den Zweck der Assimilation in sehr vollkommener Weise auszunutzen, während sie vor dem zerstörenden Einfluss zu intensiven Lichtes und zu starker Wärme durch Umlagerung auf die Seitenwandungen der Zellen geschützt werden¹⁾.

Die bezeichneten, durch Lichtreiz verursachten Bewegungen der Chlorophyllkörper machen sich nur geltend, wenn die Zellen normalen Lebensbedingungen ausgesetzt sind. Bei zu niederer Temperatur, Feuchtigkeits- und Sauerstoffmangel treten sie dagegen nicht hervor, wie man durch entsprechend angeordnete Experimente leicht constatiren kann.

171. Die Bewegung der Plasmodien von *Aethalium septicum*.

Die Plasmodien der Myxomyceten sind zu eigenthümlichen Bewegungen befähigt; sie können von einem zu einem anderen Orte kriechen und verändern dabei fortwährend ihre Umrisse. Aeusserer Umstände beeinflussen diese Bewegungen in hohem Grade, ein Verhältniss, welches für die Plasmodien hervorragende biologische Bedeutung besitzt. Das *Aethalium septicum* kommt zumal in der Gerberlohe vor. Die gelben Plasmodien sind im Frühjahr (z. B. im Mai, zu welcher

1) Vgl. STAHL, Botan. Zeitung, 1880, S. 321.

Zeit ich zahlreiche Experimente mit denselben anstellte) in den älteren Lohmassen aufzufinden. Ausserdem trifft man aber auch zu dieser Zeit und ebenso im Winter Aethaliumsclerotien in Form kleiner, etwa 2 mm langer, knotenförmiger, gelber Massen in der Lohe an, aus denen man leicht Plasmodien gewinnen kann. Es muss hier ausdrücklich bemerkt werden, dass die Plasmodien sehr zarte, leicht absterbende und gegen Berührung mit der Hand empfindliche Gebilde sind. Daher müssen die Lohmassen mit den dieselben durchziehenden Plasmodien vorsichtig behandelt werden, und man thut am besten, die plasmodienhaltige Lohe, ohne sie viel zu berühren, in einem Kasten aus der Gerberei ins Laboratorium zu bringen. Wir stellen nun die folgenden Experimente an.

Ein schmaler, befeuchteter Streifen schwedischen Filtrirpapieres wird mit seinem einen Ende in ein zur Hälfte mit Wasser angefülltes Becherglas eingetaucht. Das andere Ende des Streifens hängt frei nach unten herab und wird bei der Ausführung der Versuche auf der die Plasmodien enthaltenden Lohe ausgebreitet. Verdunkelt man nun die ganze Vorrichtung, und hat man sie in einem Raum aufgestellt, in dem eine Temperatur von 25–30° C. herrscht, so treten alsbald Plasmodienmassen aus der Lohe hervor und kriechen mehr und mehr an dem Papierstreifen empor. Diese Wanderung der Plasmodien auf einem völlig mit Wasser durchtränkten Substrat ist keine hydrotropische Erscheinung, sondern sie wird durch Wasserströmung bedingt. Die Plasmodien sind also rheotropisch, und zwar wandern sie stets dem Wasserstrom entgegen.

Die Plasmodien reagiren aber auch auf eine verschiedene Feuchtigkeitsvertheilung im Substrat; sie sind nicht nur rheo-, sondern ebenso hydrotropisch. Um diese Thatsache festzustellen, bringt man Plasmodien, die sich unter dem Einflusse eines Wasserstromes auf Fliesspapier angesammelt haben, in die Mitte einer mit mehrfacher Lage durchfeuchteten Filtrirpapiers bedeckten Glasplatte. Die Plasmodien breiten sich in einem Dunkelkasten, in welchem die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, gleichmässig auf dem horizontalen und durchfeuchteten Substrat aus. Gelangen die Untersuchungsobjecte nunmehr in einen trockenen, aber verdunkelten Raum, und bringt man in geringer Entfernung über den Plasmodien einen mit verdünnter Gelatinegallerte bestrichenen Objectträger an, so ist alsbald (oft nach wenigen Stunden) eine interessante Erscheinung zu beobachten. Das Fliesspapier trocknet allmählich aus, und die Plasmodien ziehen sich von den austrocknenden Stellen des Substrats zurück, sammeln sich aber unter dem Feuchtigkeit spendenden Objectträger an. Die Plasmodien verhalten sich also positiv hydrotropisch. Es muss bemerkt werden, dass unsere Untersuchungsobjecte während der grössten Zeit ihres Entwicklungsganges in der Weise, wie es hier angegeben worden ist, auf verschiedene Feuchtigkeitsvertheilung reagiren. Die der Fructification nahen Plasmodien sind dagegen negativ hydrotropisch.

Geotropisch sind die Myxomycetenplasmodien gar nicht, denn wenn man Fliesspapierstreifen mit Plasmodien auf eine vertical stehende feuchte Unterlage (z. B. auf mit Wasser durchtränktes Papier, das einer Glasplatte anliegt) bringt, so breiten sie sich bei Lichtabschluss und im dampfgesättigten Raume nach allen Richtungen hin gleichmässig auf dem Substrat aus.

Licht von irgendwie grösserer Intensität, z. B. schon diffuses Tageslicht, flichen die Plasmodien wie es scheint stets. Setzt man von Plasmodien durchzogene Lohestücke im dampfgesättigten Raum dem Licht aus, so zieht sich das Plasmodium in die Lohe zurück. Ebenso suchen auf Glasplatten ausgebreitete Plasmodien bei Lichtzutritt die Orte geringster Lichtintensität, z. B. beschattete Stellen, auf. Auf die Glasplatten, z. B. auch Objectträger, sind die Plasmodien leicht in folgender Weise zu bringen. Wir stellen ein mit Wasser angefülltes Trinkglas auf, bringen in das Wasser das eine Ende eines Fliesspapierstreifens, dessen Breite etwas geringer als diejenige unserer Objectträger ist, legen das andere Ende des Streifens auf die eine Fläche eines neben dem Glase vertical aufgestellten Objectträgers und stellen den ganzen Apparat auf einer Sandschicht auf, die das vom Objectträger abfliessende Wasser aufnimmt. An der Basis des Objectträgers findet nun ein Stück Lohe mit aufsitzendem Plasmodium Platz, und zwar wird die Lohe derjenigen Glasfläche angelehnt, an der das Wasser herabrinnt. Die ganze Vorrichtung stellt man im Dunkeln unter einer Glasglocke auf. Die Plasmodien kriechen nun in Folge ihres rheotropischen Verhaltens auf den Objectträger und breiten sich auf demselben aus. Will man für den Zweck näherer Untersuchung Plasmodien auf dem Objectträger unter Deckglas haben, so thut man gut, diese letzteren auf dem Objectträger auf der Seite, auf der der Wasserstrom herabfliesst, dadurch aufzukitten, dass man unter ihre vier Ecken kleine Wachsfüsschen bringt. Es ist dann die Möglichkeit gegeben, dass Plasmodienzweige unter die Deckgläser kriechen und sich hier, zarte Fäden bildend, ausbreiten. Die Ansammlung der Plasmodien auf den Objectträgern geht nicht immer mit gleicher Schnelligkeit vor sich; meist erfolgt sie im Laufe eines halben Tages sicher.

Von ganz besonderem Interesse ist es, die anziehenden sowie abstossenden Wirkungen, welche verschiedene Substanzen auf die Bewegungsrichtung der Plasmodien ausüben, genauer kennen zu lernen. Man verwendet bei bezüglichen Experimenten Plasmodien, die durch einen Wasserstrom auf Fliesspapier gelangt sind, oder das Untersuchungsmaterial wird aus *Aethaliumsclerotien* gewonnen, die man auf eine feuchte Unterlage (mehrere Bogen mit Wasser durchtränkten Fliesspapiers) gebracht hat. Ich erhielt auf diesem letzteren Wege schöne Plasmodien, und als dieselben durch längeres Verweilen unter einer Glasglocke ziemlich ausgehungert waren, was für den folgenden Versuch günstig ist, wurden kleine mit Loheaufguss durchtränkte Fliesspapierkügelchen auf die ausgebreiteten Schleimpilzmassen gelegt. Die Substanzen des Loheextracts wirken anziehend auf die Plasmodien ein, und daher erscheinen die Papierkügelchen bereits nach Verlauf einiger Stunden nach allen Richtungen hin von Plasmodiensträngen durchsetzt. Der Trophotropismus der Schleimpilze ist hiermit constatirt.

Auf irgend eine Stelle in der Mitte eines auf horizontaler feuchter Unterlage ausgebreiteten Plasmodiums bringe man einen kleinen Kochsalzkrystall. Die direct berührten Schleimpilztheile bräunen sich und sterben ab, während sich die nicht getödteten Theile des Untersuchungsobjects von dem Kochsalz zurückziehen, so dass Lücken im Plasmodium entstehen, die sich übrigens wieder schliessen können, wenn eine hinreichend gleichmässige Vertheilung des sich allmählich auflösenden Kochsalzes im feuchten Substrat erfolgt ist. Chlornatrium

wirkt also nicht anziehend, sondern abstossend auf die Plasmodien ein¹⁾).

Dass die ausserordentlich feine Reactionsfähigkeit der Plasmodien auf die erwähnten sowie auf einige andere äussere Einflüsse von biologischer Bedeutung für ihren zarten Organismus ist, wird von vornherein klar sein, und wir brauchen hier darauf nicht näher einzugehen.

II. Die geotropischen, heliotropischen und hydrotropischen Nutationen und einige andere Reizerscheinungen.

172. Das geotropische Verhalten der Wurzeln.

Die Wurzeln, zumal die Hauptwurzeln der Gewächse, haben das Bestreben, senkrecht nach abwärts zu wachsen, eine Erscheinung, die durch das positiv geotropische Verhalten der Organe bedingt ist. Um das positiv geotropische Verhalten der Wurzeln zu constatiren, stellen wir den folgenden Versuch an. Samen von *Pisum*, *Vicia Faba* oder *Phaseolus* werden nach 24-stündigem Anquellen in Brunnenwasser in feuchte Sägespäne gelegt, mit denen grosse Blumentöpfe oder Holzkästen angefüllt worden sind. Das Keimbett muss sehr locker und gleichmässig durchfeuchtet sein, wenn die Entwicklung der Keimlinge normal erfolgen soll. Die Samen von *Vicia Faba* werden so mit der Mikropyle nach abwärts in die Sägespäne gelegt, dass die austretende Hauptwurzel keine Krümmungen zu machen braucht. Die

Fig. 140. Apparat zur Constatirung geotropischer Wurzelkrümmungen.

Samen von *Phaseolus* legt man horizontal in das Keimbett; die Hauptwurzel bildet dann nach ihrem Austritt einen rechten Winkel mit der Längsaxe des Samens. Wir stellen die Blumentöpfe oder Holzkästen unter grosse Pappkästen oder in einen Schrank und nehmen einige Keimlinge mit recht gerade gewachsenen Wurzeln aus den Sägespänen heraus, wenn die Wurzeln eine Länge von etwa 3 cm erlangt haben. Wir spiessen einige der Untersuchungsobjecte nach sorgfältigem Abwaschen auf langen Stecknadeln auf und befestigen jeden Keimling in der Weise, wie es Fig. 140 zeigt, unter einer genügend grossen Glasglocke so, dass die Wurzel horizontal gerichtet ist. Beim Aufspiessen ist das auf S. 325 Gesagte zu berücksichtigen. Der untere Rand der Glasglocke taucht in Wasser, mit welchem eine Krystalli-

1) Vgl. STAHL, Botanische Zeitung, 1884, Nr. 10. Dasselbst finden sich auch Angaben für weitere Experimente sowie Literaturzusammenstellungen.

sirschale angefüllt ist, während die Innenwand der Glasglocke mit feuchtem Fließpapier ausgekleidet wird. Wir stellen unseren Apparat ins Dunkle. Wir können das Experiment auch einfach in der Weise ausführen, dass wir einige unserer Keimlinge aus den Sägespänen herausnehmen und mit horizontal gerichteten Wurzeln wieder in dieselben hineinlegen. Wir können nun bei genügend hoher Temperatur ($20-25^{\circ}\text{C.}$) schon nach einigen Stunden (bei niedriger Temperatur erst später) eine je nach Umständen mehr oder minder scharfe, nach abwärts gerichtete Krümmung der Wurzelspitze wahrnehmen. Die Wurzel führt eine positiv geotropische Krümmung aus und wächst nicht horizontal, sondern nach abwärts weiter. Wenn wir Keimlinge von Phaseolus etc. derartig in Sägespäne legen, dass ihre Wurzeln senkrecht nach aufwärts, ihre Spitzen also nach oben gerichtet sind, so krümmt sich die Spitze alsbald nach abwärts und wächst dann in dieser Richtung weiter. Bei meinen Versuchen mit Phaseolus (22°C.) hatte sich die Wurzelspitze bereits nach Verlauf von 4 Stunden erheblich gekrümmt. Werden Keimpflanzen in der Weise in Sägespäne gelegt, dass ihre Wurzeln schief nach auf- oder abwärts gerichtet sind, dann treten natürlich auch geotropische Krümmungen ein, welche bestrebt sind, das Wurzelende senkrecht nach abwärts zu führen.

Für die weiteren, specieller auf die geotropische Abwärtskrümmung der Wurzeln eingehenden Untersuchungen bedürfen wir zu-

Fig. 141. Zinkkasten mit Glaswänden zu Beobachtungen über Wurzelentwicklung.

nächst eines besonderen Kastens, wie ein solcher von SACHS zuerst construirt wurde und in Fig. 141 abgebildet ist. Ein solcher Kasten ist der Hauptsache nach aus starkem Zinkblech gefertigt. Die Vorder- und Hinterwand werden aber von ca. 20 cm hohen und ca. 30 cm breiten Glasplatten gebildet, und zwar dürfen diese Wände nicht senkrecht stehen, sondern sie müssen einen Neigungswinkel von etwa 10° besitzen. Der Boden des Kastens und seine metallenen Seiten-

wände sind mit vielen kleinen Löchern versehen, um den Luftwechsel in der einzufüllenden Erde zu begünstigen. Wir verwenden leichte, sehr humusreiche Erde, wie sie für Gewächshauspflanzen benutzt wird, befeuchten dieselbe mit so viel Wasser, dass sie sich eben noch zwischen der Hand zu einer krümeligen Masse zerreiben lässt, und werfen sie dann durch ein Sieb mit 1,5 mm weiten Oeffnungen. Das Bodenmaterial darf beim nun erfolgenden Einfüllen in den Kasten nicht zusammengepresst werden; es muss eine lockere Beschaffenheit haben, wenn sich die Wurzeln der Untersuchungsobjecte ungestört entwickeln sollen. Die erforderlichen Keimpflanzen haben wir in angegebener Weise in feuchten Sägespänen cultivirt. Wir verwenden sie, wenn ihre Wurzeln einige cm lang geworden sind. Zunächst handelt es

sich darum, feine Tuschestriche auf den Wurzeln, die als Marken dienen sollen, anzubringen. Wir trocknen die Wurzeln vorsichtig mit etwas Leinwand ab und bringen dann mit Hülfe eines Pinsels in Entfernungen von je 2 mm die Tuschestriche auf ihnen an (vergl. unter 154). Diese sehr sorgfältig auszuführende Operation gelingt am besten, wenn man eine grosse, glatte, etwa 2 cm dicke Korkplatte zu Hülfe nimmt, an deren linkem Rande mittelst einer grossen Feile verschiedene grosse Kerben angebracht sind, von denen auf der Oberfläche der Korkplatte mit dünner, runder Feile hergestellte Rinnen ausgehen. In die Kerben werden die Samen eingeschoben; die Rinnen nehmen die Wurzeln auf, und neben ihnen liegt eine Millimetertheilung. Die vorbereiteten Keimlinge werden mit horizontal gerichteter Wurzel in die Erde unseres Kastens gelegt, so zwar, dass die Wurzel der einen Glasplatte dicht angeschmiegt ist, mit Erde locker bedeckt und beobachtet. Man klebt der Aussenfläche der Glasplatte ein kleines, dreieckiges Papierstückchen auf, dessen eine Spitze genau auf die erste, gleich hinter der Wurzelspitze angebrachte Marke hinweist. Bei Phaseolus fand ich, wie es SACHS auch für Vicia angiebt, dass die Wurzel etwa eine Stunde lang horizontal weiter wuchs; die erste Marke entfernt sich dabei etwas von der Papierspitze. Dann aber machte sich alsbald eine geotropische Krümmung an den Wurzeln bemerklich, und von Zeit zu Zeit wiederholte Beobachtungen lehrten, dass zuerst eine Krümmung in der zwischen der ersten und zweiten Marke liegenden Zone deutlich zu constatiren ist; später dann auch in den übrigen Zonen. Man stellt fest, dass alle im Längenwachsthum begriffenen Zonen der Wurzel sich an dem Zustandekommen der geotropischen Abwärtskrümmung theiligen; aber um dies wichtige Resultat ganz sicher zu constatiren, führen wir das folgende Experiment aus. Wir benutzen z. B. Keimlinge von Vicia Faba mit 2 cm langen Wurzeln. Diese werden in angegebener Weise in den Culturkasten gelegt, nachdem der wachsende Wurzeltheil durch aufgetragene Tuschestriche in Zonen von je 2 mm Länge getheilt worden ist. Nach etwa 8 Stunden hat die horizontal gelegte Wurzel bei 20° C. bereits eine ansehnliche Krümmung vollzogen, und wir können zur Messung des erzielten Zuwachses schreiten. Wir benutzen dazu ein dünnes Glimmerplättchen, auf dem mit der Zirkelspitze eine Anzahl concentrischer Kreise von bekanntem Radius¹⁾ eingeritzt sind. Die Viertelkreise theilt man nun zweckmässig nicht in 90 Theile, sondern durch leicht und genau ausführbare fortgesetzte Halbiring in 8, 16, 32 Theile. Man berechnet für jeden Radius die Länge eines solchen Bogenstückes. Die in einer Tabelle zusammengestellten Werthe dienen zur Feststellung der Bogenlängen der gekrümmten Wurzeln. Die Kreistheilung wird an der Glasplatte, hinter der sich die Wurzel befindet, angelegt. Man probirt, welcher Kreis mit der Krümmung oder einem Theil derselben der convexen Seite der Wurzel zusammenfällt. Man befestigt die Glimmerplatte durch gummirte Papierstreifen an der Glaswand und stellt die weiteren Beobachtungen an. In unserem Falle beträgt der Gesamttzuwachs auf der convexen Wurzelseite etwa 4 mm. Die gesammte wachsende Region der Wurzel hat sich an dem Zustandekommen der geotropischen Abwärtskrümmung theiligt. Das schnellste Wachsthum hat etwa in der dritten Zone stattgefunden.

1) Der grösste Kreis möge einen Radius von 20 mm haben.

Wir suchen ferner je zwei sehr gleichartig ausgebildete Keimlinge von *Vicia Faba* aus, die sich in Sägespänen entwickelten und Wurzeln von 1,5—2 cm Länge haben. Vom Vegetationspunkt aus tragen wir in Entfernungen von 2 mm feine Tuschestriche als Marken auf (die erste Marke liegt am Vegetationspunkt selbst) und legen je einen Keimling derartig in die Erde unseres Vegetationskastens, dass die Wurzel an der Glaswand völlig horizontal gerichtet ist, während der zweite Keimling mit genau vertikal gerichteter Wurzel in die Erde gelangt. Nach 12—16 Stunden (20° C.) messen wir den Zuwachs an der geraden und an der geotropisch gekrümmten Wurzel. Diese letztere Messung wird in erwähnter Weise unter Benutzung des Glimmerplättchens ausgeführt. Wir bestimmen nicht nur den Zuwachs der convexen, sondern auch denjenigen der concaven (unteren) Wurzel-seite. Ist z. B. der Zuwachs auf der convexen Wurzel-seite = 10 mm, derjenige auf der concaven 6 mm, so beträgt der Zuwachs in der Mittellinie (Axe der Wurzel) 8 mm. Die gerade Vergleichswurzel mag sich um 9,5 mm verlängert haben. Daraus ergibt sich, wie SACHS zuerst klarstellte, dass die convexe Seite sich krümmender Wurzeln etwas schneller wächst als eine gerade Wurzel unter gleichen Umständen. Die concave Seite der gekrümmten Wurzel wächst erheblich langsamer als die gerade, und der Gesamttzuwachs der ersteren ist merklich geringer als derjenige der letzteren.

Fig. 142. Theil einer hinter einer Glaswand erwachsenen Wurzel von *Phaseolus multiflorus*.

Bei Gelegenheit der Untersuchungen über das Wachstum der

Hauptwurzeln von *Phaseolus* oder *Vicia Faba* hinter einer Glaswand wollen wir nicht versäumen, uns im Allgemeinen über die Form der geotropischen Krümmung, welche unsere Untersuchungsobjecte erfahren haben, zu unterrichten. Wir bedienen uns dabei der

dünnen Glimmerplatte, auf der ein System concentrischer Kreise mit der Zirkelspitze eingeritzt ist. Durch Anlegen der Glaswand, hinter welcher die Wurzel

wächst, können wir leicht erfahren, welche Form die Wurzelkrümmung besitzt. Sie gleicht bei beginnender geotropischer Nutation einem Kreisbogen von bedeutendem Radius. Die Wurzelkrümmung erscheint später weniger flach als im ersten Stadium der Beobachtung. Fernerhin gleicht die Krümmung aber keinem Kreisbogen mehr, sondern sie wird parabolisch. Die Zone des lebhaftesten Wachstums der

Wurzel ist stark gekrümmt; vor und hinter dieser Region ist die Krümmung viel flacher.

Wir wollen nunmehr dazu übergehen, das geotropische Verhalten der Nebenwurzeln zu betrachten, und beschränken uns darauf, die aus den Hauptwurzeln von *Phaseolus*, *Pisum*, *Vicia*, *Zea* hervorgehenden Nebenwurzeln erster und zweiter Ordnung ins Auge zu fassen. Es werden Keimpflanzen in unserem Erdkasten hinter einer Glaswand cultivirt. Die Hauptwurzel wächst gerade nach abwärts. Die in acropetaler Reihenfolge sich an der Hauptwurzel bildenden Nebenwurzeln erster Ordnung schlagen diese Richtung aber nicht ein, sondern sie wachsen, wie es Fig. 142 zeigt, in mehr oder minder schiefer Richtung nach abwärts. Man kann sich leicht davon überzeugen, dass den Nebenwurzeln erster Ordnung in der That ein geotropisches Verhalten zukommt; denn wenn man den Erdkasten umkehrt, so dass die Spitze der Hauptwurzel nach oben gerichtet ist, dann findet man nach einiger Zeit, dass die Enden der fortwachsenden Nebenwurzeln sich in einem Bogen nach abwärts gewendet haben. Die Nebenwurzeln erster Ordnung wachsen also im Gegensatz zu den Hauptwurzeln nicht senkrecht nach abwärts, sondern ihre geotropische Abwärtskrümmung hört auf, wenn sie mit der Verticalen einen bestimmten Winkel, den geotropischen Grenzwinkel, bilden. Die aus den Nebenwurzeln erster Ordnung hervorgehenden Nebenwurzeln zweiter Ordnung sind, wie noch bemerkt werden mag, gar nicht geotropisch; sie wachsen ihrer Anlage gemäss weiter und reagiren nicht auf den Einfluss der Schwerkraft¹⁾.

173. Das geotropische Verhalten der Sprosse.

Zahlreiche Stengel besitzen ein ausgeprägt negativ geotropisches Verhalten und wir wollen dieselben daher benutzen, um uns weitere Aufklärung über die Einwirkung der Schwerkraft auf die Pflanzen zu verschaffen. Werden negativ geotropische Pflanzentheile in eine horizontale Lage gebracht, so krümmen sie sich aufwärts, eine Erscheinung, die unter Benutzung der verschiedensten Untersuchungsobjecte leicht constatirt werden kann. Wir bedecken den Boden eines grossen Zinkkastens mit feuchtem Sand, häufen den Sand an den Wänden derartig zusammen, dass er hier ziemlich hoch liegt, stecken in die auf diese Weise gebildeten Sandwälle das untere Ende der auf ihren Geotropismus zu prüfenden Stengelstücke hinein, so dass sie im Uebrigen frei hervorragen, ohne den Sand zu berühren, und verschliessen den Kasten mit einem Deckel. Als ich z. B. Blütenknospen tragende Sprosse von *Chrysanthemum* *Leucanthemum* in den feuchten, dunkeln Raum des Zinkkastens in horizontale Lage brachte, hatten sich dieselben bei 24° C. schon nach wenigen Stunden stark nach aufwärts gekrümmt. Die geotropische Wachsthumsbewegung hört schliesslich auf, wenn der obere Stengeltheil mit dem unteren einen rechten Winkel bildet. Das Auftreten geotropischer Krümmungen ist ebenso an abgeschnittenen epicotylen Gliedern der im Dunkeln erwachsenen

1) Die Literatur über den Geotropismus der Wurzeln habe ich in meinem Lehrbuch der Pflanzenphysiologie zusammengestellt. In Bezug auf die Untersuchungsmethode verdient in erster Linie eine Arbeit von SACHS in den Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, Beachtung.

Bohnenkeimlinge in der angegebenen Weise leicht festzustellen (vgl. Fig. 143). Bei Experimenten mit *Aristolochia Siphon* benutzte ich nicht ganze Sprosse, sondern aus lebhaft wachsenden Internodien herausgeschnittene Stücke. Sie zeigten ein stark negativ geotropisches Verhalten, und diese Thatsache, die auch an Stengelstücken anderer Pflanzen (z. B. Stücken aus dem Epicotyl im Dunkeln erwachsener *Phaseolus*keimlinge) ohne jede Schwierigkeit festgestellt werden kann, ist mit Rücksicht auf das unter 175 Angeführte, wo von der Bedeutung der Wurzelspitze für das Zustandekommen geotropischer Wurzelkrümmungen die Rede sein wird, von Interesse, denn sie lehrt mit aller Bestimmtheit, dass die Spitze des *Phaseolus*stengels für das geotropische Verhalten desselben nicht durchaus maassgebend erscheint. Das epicotyle Glied von *Phaseolus* eignet sich für Versuche über den Geotropismus besonders, weil Bohnenkeimlinge zu jeder Jahreszeit ohne Mühe cultivirt werden können. Die Reactionsfähigkeit verschiedener Pflanzentheile auf die Wirkung der Schwerkraft ist übrigens keineswegs in quantitativer Beziehung die gleiche. Während die erwähnten Objecte

Fig. 143. Negativ geotropisch gekrümmtes Epicotyl von *Phaseolus multiflorus*.

sich sehr schnell und stark krümmen, wenn sie in einem feuchten Raum in horizontale Stellung gebracht worden sind, führen z. B. junge entblätterte Sprosse von *Sambucus nigra* unter gleichen Umständen nur langsam geotro-

pische Krümmungen aus. Hohe geotropische Reizbarkeit besitzt die Plumula von *Triticum vulgare*. Legt man kleine Töpfe, in denen sich Weizenkeimlinge mit ca. 2 cm langer Plumula entwickelt haben, horizontal, so krümmt sich die Plumula derselben schnell aufwärts. Lehrreich ist der folgende Versuch, den ich wiederholt ausführte. Wir stecken das untere Ende eines beblätterten Sprosses von *Hippuris vulgaris* in den feuchten Sand unseres Zinkkastens. Hat der Spross bei höherer Temperatur 1 — 1½ Stunden in horizontaler Lage verweilt, so ist schon eine deutliche, freilich noch nicht sehr starke Krümmung wahrnehmbar. Jetzt bringen wir den Spross in senkrechter Stellung unter eine Glasglocke. Sein unteres Ende steckt in feuchtem Sand und das Licht wird vom Untersuchungsobjecte abgehalten. Wir gewahren nun nach einiger Zeit zu unserer Ueberraschung, dass die bei horizontaler Lage des *Hippuris*stengels aufgetretene Krümmung jetzt, wo derselbe in senkrechter Lage verweilt, erheblich stärker wird. Damit haben wir eine Erscheinung constatirt, die auf geotropischer Nachwirkung beruht, und welche daher auch bald einer anderen Platz macht. Die bei verticaler Stellung des Untersuchungsobjectes zunächst stärker gewordene Krümmung verschwindet nämlich allmählich vollständig; der Spross richtet sich gerade auf, weil die Schwerkraft nach dem Erlöschen der geotropischen Nachwirkung in gewöhnlicher Weise auf sein gekrümmtes Ende ein-

wirkt. Das Phänomen der geotropischen Nachwirkung lässt sich übrigens auch unter Benutzung anderer Sprosse feststellen.

Bei den meisten Pflanzen beschränkt sich das Vermögen, Krümmungen unter dem Einflusse der Gravitation ausführen zu können, auf die Internodien des Gipfels. Die ausgewachsenen, tiefer liegenden Sprosstheile reagiren nicht mehr auf die Wirkung der Schwerkraft. Um so merkwürdiger ist daher das geotropische Verhalten der Halme der Gräser. Zwischen den einzelnen, scharf von einander abgesetzten Internodien dieser Pflanzen liegen bekanntlich die durch ihre Färbung und angeschwollene Form leicht kenntlichen Knotengelenke, welche nichts anderes als die basalen Theile der Blattscheiden repräsentiren. Während die zwischen ihnen liegenden Halmtheile schon ausgewachsen steif und hart geworden sein können, bewahren diese Knotengelenke ihren jugendlichen Charakter relativ lange und sie vermögen daher auch das Zustandekommen geotropischer Wachsthumskrümmungen leicht zu vermitteln. Freilich erlischt schliesslich ebenfalls in den Zellen der Knotengelenke dies Wachsthumsvermögen. Die jüngeren Knotengelenke der Grashalme sind, weil ihr Parenchym noch sehr energisch turgescirt und weil die Zellen desselben noch die Fähigkeit zu sehr ausgiebigem Wachsthum besitzen, zu stärkeren geotropischen Krümmungen als die älteren Knotengelenke befähigt. Wenn man z. B. aus

Fig. 144. Halmstück eines Grases, geotropisch gekrümmt.

dem Halm einer blühenden Roggen- oder Gerstenpflanze einzelne, etwa 10 cm lange Stücke herauschneidet, von denen jedes einzelne in seiner Mitte einen Knoten trägt, um dem Untersuchungsmaterial nun sofort in unserem Zinkkasten eine horizontale Lage zu ertheilen, so findet man, dass sich die jüngeren Halmstücke z. B. nach Verlauf von 24 Stunden viel stärker geotropisch gekrümmt haben als die älteren. Durch Winkelmessung lässt sich der Krümmungsgrad noch genauer angeben. Die ältesten Halmstücke krümmen sich gar nicht mehr. Die Form, welche geotropisch sich aufrichtende Grashalmstücke annehmen, ist in Fig. 144 zur Anschauung gebracht. Durch einen Versuch kann man sich leicht davon überzeugen, dass nicht allein unversehrte, sondern auch der Länge nach gespaltene Grashalmstücke zu geotropischen Krümmungen befähigt sind.

Werden einige Grashalmstücke, die in ihrer Mitte einen Knoten tragen (ich experimentirte mit Halmstücken von *Hordeum*), horizontal, andere, mit jenen gleichalterige, aber schief nach aufwärts gerichtet in feuchten Sand gesteckt, so findet man nach 1—2 Tagen, dass die ersteren sich stärker als die letzteren gekrümmt haben, wie Winkelmessungen sofort ergeben. Nach dem Resultat dieses Experiments,

das auch mit beliebigen anderen Stengeltheilen, die energisch auf den Reiz der Schwerkraft reagiren, wiederholt werden kann, ist die Einwirkung der Gravitation auf die Pflanzen eine um so kräftigere, je mehr sich der Winkel, in welchem sie ihren Einfluss auf dieselben geltend macht, einem Rechten nähert.

Schliesslich wollen wir noch einige Versuche über das Wachstum sich geotropisch krümmender Grasknotengelenke und anderer Pflanzentheile anstellen. Es ist bekannt, dass die Knotengelenke, nachdem sie eine gewisse Entwicklung erfahren haben, ihr Wachstum unter normalen Verhältnissen einstellen. Merkwürdigerweise beginnt aber das Wachstum in den Zellen der Knotengelenke wieder, wenn dem Grashalmstücke eine horizontale Lage erteilt wird. Wir schneiden aus Roggen- oder Gerstenhalmen Stücke heraus, die in ihrer Mitte mit einem Knoten versehen sind, markiren die Länge der Knotengelenke auf zwei Seiten durch feine Tuschestriche und bringen die Untersuchungsobjecte in unseren Zinkkasten. Nach 2 oder 3 Tagen messen wir die Entfernung der Tuschestriche wieder an den geotropisch gekrümmten Halmstücken, indem wir uns dabei einer auf einem Papierstreifen aufgetragenen Millimetertheilung bedienen. Es ergibt sich, dass die convexe Unterseite des Knotengelenkes beträchtlich an Länge zugenommen hat, während die concave Oberseite sich in Folge eingetretener Compression ihres Gewebes verkürzt hat. Bei dem Zustandekommen negativ geotropischer Krümmungen wird also auf jeden Fall die Wachstumsenergie der Zellen der convex werdenden Unterseite ganz bedeutend gefördert.

Sehr lehrreich ist es, die folgende Beobachtung, die ich unter Benutzung stark geotropisch gekrümmter Halmstücke des Hafers mit besonders gutem Erfolg anstellte, vorzunehmen. Man stellt radiale Längsschnitte aus einem Knoten her und unterzieht dieselben der mikroskopischen Betrachtung. Die Zellen des Parenchyms von der Unterseite erscheinen, wie sich sofort ergibt, beträchtlich in Richtung der Längsaxe des Organs gestreckt, während die Zellen von der Oberseite eine tafelförmige Gestalt besitzen. Ihr Längsdurchmesser ist kürzer als ihr radialer Durchmesser. Die Erscheinung, dass die Unterseite der sich geotropisch krümmenden Grasknoten convex wird, beruht also auf einem sehr stark geförderten Wachstum der Zellen dieser Seite.

Zu weiteren Beobachtungen über das Wachstum sich geotropisch krümmender Pflanzentheile eignen sich besonders Stengelstücke von *Sida Napaea* oder *Inula Helenium*, und zwar benutzen wir 200—300 mm lange, ihrer Blätter sowie ihrer Endknospe beraubter, aus einigen Internodien bestehende Sprosse, die völlig gerade gewachsen sein müssen, und die wir sorgsam ausgewählt haben. Wir schneiden 9 solcher Stengelstücke ab, machen sie sämmtlich gleich lang und bringen sie in Gruppen von je 3 Stück. Die 3 Stengelstücke der ersten Gruppe analysiren wir sofort, indem wir mit einem scharfen Rasirmesser zwei Rindenstreifen von denselben abziehen und ihre Länge durch Messung feststellen. 3 Stengelstücke bringen wir in unserem mit feuchtem Sand beschickten Zinkkasten in horizontale Lage, die 3 letzten Stücke führen wir in wenig geneigter Stellung in einen grossen Glaszylinder ein, dessen Boden mit feuchtem Sand bedeckt ist und dessen Mündung mit Hilfe eines Korkes verschlossen werden kann. Nach 24 Stunden werden die Stengelstücke der zweiten und dritten Gruppe analysirt. Wir ziehen von ihrer concaven und convexen Seite Rindenstreifen ab und messen deren Länge. Vergleichen wir

die Mittelwerthe, welche sich bei unseren Untersuchungen mit Rücksicht auf die Zuwachsbewegung der horizontal gelegten, daher stark geotropisch gekrümmten Sidasprosse ergeben, so stellt sich heraus, dass das Wachstum der convex gewordenen Seite derselben grösser, das Wachstum der concav gewordenen Seite aber geringer gewesen sein muss als dasjenige der gleichnamigen Seiten der im Glascylinder aufgestellten und daher gar nicht oder nur schwach gekrümmten Vergleichsobjecte ¹⁾.

Wenn man nach der S. 322 angegebenen Methode auf Sprossen mit Gipfelwachsthum (z. B. *Epicotyl* von *Phaseolus*) Tuschestriche als Marken zur Bestimmung der Zuwachse in den einzelnen Stengelzonen anbringt und den Spross in dem Zinkkasten horizontal legt, so findet man zu bestimmter Zeit (nach ca. 12 Stunden) die stärkste Krümmung in der am lebhaftesten wachsenden Stengelregion, später aber, wenn die geotropische Aufrichtung zum Abschluss gekommen ist, an der Basis der wachsenden Region des Sprosses, weil auf diese die Gravitation so lange Zeit als Reiz einwirken kann. Experimentirt man mit sehr schnell wachsenden, dünnen Sprossen (z. B. *Agrostemma*), dann ergibt sich, dass der Sprossgipfel zu bestimmter Zeit, wenn die geotropische Nutation des ganzen Sprosses aber noch keineswegs ihren Abschluss gefunden hat, nicht senkrecht aufgerichtet, sondern in Folge geotropischer Nachwirkung (vgl. S. 368) weit über die Verticale hinausgeführt ist. Später richtet sich der Gipfel dann unter dem Einfluss der Gravitation senkrecht empor. Vgl. SACHS, *Flora*, 1873. Bei den Beobachtungen ist erforderlich, die jeweilige Krümmungsform der Sprosse aufzuzeichnen.

Dabei zeigt sich auch, dass die Krümmung bei Abschluss der geotropischen Nutation eine sehr scharfe ist. In früheren Stadien der Nutation sieht man zumal deutlich, dass die Krümmung keinem Kreisbogen entspricht, dass vielmehr an einer Stelle eine stärkste Krümmung (mit kleinstem Radius) gegeben ist, von wo aus sie nach hinten und vorn abnimmt.

174. Die Ursachen der geotropischen Krümmungen.

Als Quelle derjenigen Kraft, welche die innere und äussere Arbeit bei dem Zustandekommen geotropischer Krümmungen leistet, ist natürlich nicht die Erdanziehung anzusehen. Jene Kraft wird vielmehr von der Pflanze selbst geliefert, und die Schwerkraft, welche als Reizursache wirkt, löst sie nur unter bestimmten Umständen aus.

Dass bei dem Zustandekommen negativ geotropischer Krümmungen eine erhebliche äussere Arbeit geleistet wird, ist ohne weiteres klar, wenn man sich an die durch die Krümmung herbeigeführte Hebung der oft ein nicht unbedeutendes Gewicht besitzenden Sprossenden erinnert. Aber auch bei dem Hervortreten positiv geotropischer Nutationen werden die Pflanzentheile nicht einfach passiv durch die Schwere nach abwärts gezogen, sondern sie betheiligen sich in activer

Fig. 145. Keimpflanze von *Vicia Faba*, deren Wurzelspitze in Quecksilber eindringt. (Nach SACHS.)

1) Vgl. zumal SACHS in Arbeiten des botanischen Instituts in Würzburg, Bd. 1, und H. DE VRIES in *Landwirthschl. Jahrbüchern*, Bd. 9.

Weise an der stattfindenden Bewegung. Das Eindringen sich positiv geotropisch krümmender Wurzeln in Quecksilber zeigt dies deutlich. Vergl. Fig. 145. In ein Gefäß von etwa 10 cm Durchmesser wird bis zu einer Höhe von 3 cm reines Quecksilber gegossen. Wir befestigen nun an einer Stelle der Seitenwand ein Stück Kork mittest Siegelack oder in anderer Weise. Mit Hülfe einer langen Nadel wird dann eine Keimpflanze von *Vicia Faba* oder *Phaseolus* mit einer einige cm langen Wurzel derartig angespiesst, dass der vordere Theil ihrer Wurzel horizontal auf dem Quecksilber ruht. Nachdem wir noch etwas Wasser auf das Quecksilber gegossen haben und der Apparat unter eine Glasglocke gestellt worden ist, überlassen wir ihn sich selbst. Abgesehen von Nebenerscheinungen, lässt sich nach Verlauf längerer Zeit (etwa 24 Stunden) namentlich das Eindringen des Wurzelendes in das Quecksilber constatiren. Die geotropisch gekrümmte Wurzel überwindet den Widerstand, welchen das Metall ihr darbietet, und wächst senkrecht in dasselbe hinein. (Vergl. Fig. 145.)

Auch mit Hülfe des in Fig. 146 abgebildeten Apparates lässt sich die Thatsache demonstrieren, dass Wurzeln sich mit erheblichem Kraftaufwand geotropisch nach abwärts krümmen. Auf dem Brett *B* steht die Metallsäule *S*. Der Metallstab *St* kann an der Säule *S* verschoben werden; ebenso ist er in horizontaler Richtung von rechts nach links beweglich. Zur Fixirung von *St* dienen Schrauben. An seinem Ende trägt *St* den von oben nach unten verschiebbaren Metallstab *St'*. Dieser trägt die leicht bewegliche Rolle *R*. Ueber die Rolle läuft ein Faden. An dem einen Ende desselben hängt das kleine Gläschen *Sch*. Das andere Ende des Fadens ist an einem Haken befestigt. Der leicht bewegliche Zeiger *Z*, der vor dem Gradbogen *G* spielt, ist an seiner Basis etwas verbreitert. Hier wird der erwähnte Haken befestigt und ebenso ein zweiter, an den man ein kleines Gewicht hängt, um das Gläschen *Sch*, wenn es in Wasser eintaucht, das sich in einem untergestellten geeigneten Gefässe befindet, zu äquilibriren. Wir hängen nun an den Haken noch ein weiteres Gewicht,

z. B. etwa 1 g, wenn wir mit Keimlingen von *Vicia Faba* experimentiren. Die Keimlinge sind in geeigneter Weise mit Nadeln auf einem Korkstück befestigt, das in dem Wassergefäss fixirt ist. Die nach abwärts wachsende Hauptwurzel, deren Spitze in das Gläschen *Sch* eingeführt ist, übt auf dieses einen Druck aus. Der Druck, den die wachsende Wurzel geltend macht,

Fig. 146. Apparat zur Demonstration der Arbeitsleistung sich geotropisch krümmender Wurzeln.

drückt das Gläschen trotz der Gegenwirkung von ca. 1 g herab und der Zeiger *Z* verändert in Folge dessen seine Lage ¹⁾.

Wir wissen — und wir kommen darauf noch specieller zurück — dass die geotropischen Krümmungen (abgesehen von den geotropischen Variationsbewegungen) durch Wachstumsvorgänge zu Stande kommen. Die meisten Pflanzen wachsen nicht, wenn ihnen kein freier Sauerstoff zur Disposition steht, und somit werden auch die geotropischen Nutationen in einem sauerstofffreien Medium unterbleiben. Mit Hülfe des in Fig. 147 abgebildeten Apparates lässt sich diese Thatsache leicht feststellen. In einen Glaszylinder bringen wir ein durch Auskochen in Wasser mit diesem getränktes dünnes Brettchen (*B*), auf welchem wir mit Hülfe von Nadeln Keimlinge von *Pisum* oder *Phaseolus* oder abgeschnittene epicotyle Glieder dieser letzteren Pflanze oder z. B. mit Blütenknospen versehene Schäfte von *Taraxacum* (*St*) befestigt haben. Die wachsthumsfähigen Regionen der Wurzeln resp. Stengel müssen frei und horizontal schweben. Der Cylinder wird mit einem doppelt durchbohrten Kork verschlossen. Die Bohrungen dienen zur Aufnahme im rechten Winkel gebogener Glasröhren, und während die eine (*a*) mit einem Wasserstoffentwickelungsapparat in Verbindung steht, dient die andere (*b*) zur Ableitung des den Cylinder verlassenden Gases. Wir leiten stundenlang

Fig. 147. Apparat zur Constatirung der Thatsache, dass Pflanzentheile bei Sauerstoffausschluss keine geotropischen Krümmungen erfahren.

einen Strom feuchten Wasserstoffs durch den Apparat, aber eine geotropische Krümmung lässt sich an den Untersuchungsobjecten nicht wahrnehmen, wenn der Cylinder horizontal gelegt wird, nachdem er zuvor (bis etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Durchleitens von Wasserstoffgas) vertical gestanden hatte. In einem ähnlichen Cylinder führen Keimlinge oder Sprosse, welche in demselben in Contact mit atmosphärischer Luft verharren, zumal bei höherer Temperatur, schnell energische geotropische Nutationen aus ²⁾.

Experimentiren wir mit Keimlingen (z. B. von *Pisum*), so können wir auch sehr bequem den in Fig. 131 dargestellten Apparat benutzen. Das Gasableitungsrohr mündet aber nicht unter Quecksilber, sondern trägt einen kurzen, dickwandigen Kautschukschlauch und wird, nachdem man 1—2 Stunden lang Wasserstoffgas durchgeleitet hat, mittelst eines eingeführten Glasstabes luftdicht abgeschlossen. Legt man den Apparat nun horizontal, so tritt dennoch keine geotropische Krümmung der Wurzeln ein.

Die Untersuchungen über das Zustandekommen der geotropischen Krümmungen haben zu dem Resultat geführt, dass die Gravitation,

1) Sehr schöne und eingehende Untersuchungen über Druck und Arbeitsleistung durch wachsende Pflanzen stellte neuerdings PFEFFER an. Vergl. Abhandlungen der Königl. sächs. Gesellschaft d. Wiss., 1893, Bd. 20. Leider konnte ich diese Arbeit nicht mehr berücksichtigen.

2) Vgl. G. KRAUS, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, Bd. 16, und CORRENS, Flora, 1892.

welche als Reizursache wirkt, nicht direct das Wachsthum der krümmungsfähigen Organe, sondern zunächst die Turgorverhältnisse ihrer Zellen beeinflusst. Wir experimentiren mit dem epicotylen Stengelglied von *Phaseolus*, mit 20 cm langen, jungen Sprossenden von *Aristolochia*, *Taraxacum*, *Plantago*, *Papaver* etc. Die Untersuchungsobjecte werden in den feuchten, dunkeln Raum eines Zinkkastens (vgl. unter 173) in horizontale Lage gebracht. Wenn nach Verlauf einiger Zeit (2—4 Stunden) eine deutliche geotropische Aufwärtskrümmung an ihnen zu sehen ist, so legen wir sie auf einen Carton, auf dem concentrische Kreise aufgetragen sind. Wir suchen denjenigen Kreis auf, dessen Krümmung mit derjenigen des Pflanzentheils möglichst genau zusammenfällt, und ermitteln den Radius des Kreises. Nun legen wir unser Untersuchungsobject in eine 20-proc. Kochsalzlösung enthaltende Krystallisirschale. Nach einigen Stunden stellen wir die Schale auf den Carton und suchen wieder, indem wir den plasmolytisch gemachten schlaffen Stengeltheil mit der Pincette verschieben, den seiner Krümmung entsprechenden Kreis auf. Der Radius dieses Kreises ist grösser als derjenige jenes Kreises, den wir vor der Plasmolyse auffanden. Man sieht, dass der in den plasmolytischen Zustand versetzte geotropisch gekrümmte Pflanzentheil eine bleibende Krümmung behält, eine Erscheinung, die eben Folge des durch die Schwerkraftwirkung erzielten Wachsthumsvorganges ist. Derjenige Theil der ursprünglichen Krümmung, welcher durch Plasmolyse beseitigt werden kann, ist dagegen auf Rechnung der Turgorverhältnisse zu setzen. Wenn die erwähnten Untersuchungsobjecte etwa 24 Stunden im Zinkkasten in horizontaler Lage verweilt haben, so wird ihre Krümmung durch Plasmolyse nicht zum Theil aufgehoben; sie bleibt in ihrem ganzen Umfang in der Salzlösung bestehen, weil sie durch Wachsthumsvorgänge in den Zellen fixirt worden und deshalb nicht mehr rückgängig zu machen ist.

Wenn man Halmstücke von Gräsern (ich experimentirte z. B. mit *Secale*), die 10 cm lang und in ihrer Mitte mit einem Knoten versehen sind, in horizontaler Lage in unserem Zinkkasten befestigt, indem man ihr unteres Ende in den an einem der Kastenwände zusammengehäuften Sandwall steckt, so tritt alsbald eine beträchtliche Krümmung im Knotengelenk ein. Diese betrug z. B. in einem Falle, den ich beobachtete, 45° . Als ich das Halmstück in den völlig plasmolytischen Zustand versetzt hatte, war die Krümmung nur noch $= 25^{\circ}$. Die Betheiligung von Turgor- und zugleich von Wachsthumsvhältnissen an der geotropischen Aufwärtsbewegung ist also auch hier unzweifelhaft festgestellt¹⁾.

Nach demjenigen, was ich in meinem Lehrbuche der Pflanzenphysiologie über die Grundursachen der geotropischen Nutationen gesagt habe, darf wohl daran festgehalten werden, dass die Schwerkraft die Turgorkraft der Zellen auf der convex und concav werdenden Seite der sich krümmenden Pflanzentheile nicht, wohl aber die Widerstandsfähigkeit der unter dem Einfluss des Turgors gedehnten Zellschichten (Protoplasma sowie Zellhaut) modificirt. Bei negativ geotropischen Organen wird die Widerstandsfähigkeit dieser Schichten in den Zellen der convex werdenden Unterseite vermindert, diejenige der Zellen der concav werdenden Oberseite aber erhöht. Somit kann die Turgorausdehnung der Zellen der Unterseite bei gleich bleibender Turgorkraft derselben gesteigert, jene

1) Vgl. H. DE VRIES, Landwirthschaftl. Jahrbücher, Bd. 9, S. 500.

der Zellen der Oberseite herabgesetzt werden, und damit ist sofort die Bedingung für ein verschiedenartiges Wachsthum der antagonistischen Seiten des Pflanzentheiles gegeben. Voraussichtlich wird auch der Wassergehalt der unteren Hälfte negativ geotropisch gekrümmter Pflanzentheile grösser als derjenige der oberen Hälfte sein, und in der That will KRAUS¹⁾ derartige Differenzen im Wassergehalt constatirt haben. Es sind aber über die Wasservertheilung in geotropisch gekrümmten Pflanzentheilen erneute Untersuchungen anzustellen, da wenigstens die Angaben von KRAUS bezüglich der Wasservertheilung in heliotropischen Stengeln durch THATE's²⁾ Beobachtungen keine Bestätigung gefunden haben.

Dass in der That die Turgorkraft der Zellen der antagonistischen Seiten geotropisch gekrümmter Organe die nämliche ist, wie bereits angedeutet wurde, lässt sich auch experimentell mit Hülfe der plasmolytischen Methode nachweisen³⁾. Werden im Dunkeln erwachsene Bohnenepicotyle horizontal gelegt, um den Untersuchungsobjecten nach erfolgter Aufwärtskrümmung an der convexen sowie concaven Seite der Krümmung zarte Rindenschnitte zu entnehmen, so zeigt die mikroskopische Prüfung derselben Folgendes. Legt man die Schnitte in 2-proc. Salpeterlösung, so macht sich noch keine Plasmolyse geltend. Dieselbe tritt erst ein, wenn man mit etwa 2,5-proc. Salpeterlösungen arbeitet, und zwar wirkt die Lösung von bestimmter Concentration in gleicher Weise auf die Rindenzellen von der convexen Unter-, sowie der concaven Oberseite des gekrümmten Epicotyls ein.

Wenn nicht Differenzen der Turgorkraft auf den antagonistischen Seiten gekrümmter Pflanzentheile als Ursachen der Nutationen zu betrachten sind, so sind diese Ursachen vermuthlich in einem besonderen Verhalten der Membranen zu suchen. WORTMANN⁴⁾ ist bestrebt, diese Ansicht durch folgende lehrreiche Experimente zu begründen. Eine in einem Blumentopf cultivirte Phaseoluspflanze mit lebhaft wachsendem Epicotyl wird horizontal gelegt, um die Stengelspitze ein Seidenfaden geschlungen, dieser über eine leicht bewegliche Rolle geführt und an seinem freien Ende mittelst eines Gewichtes so stark gespannt, dass das Epicotyl keine geotropische Krümmung ausführen kann. Nach 30–48 Stunden entnehmen wir der wachsenden Region des Epicotyls feine Querschnitte und constatiren das Folgende. Die Rindenzellen der Oberseite sind sehr plasmareich, englumig und haben sehr stark collenchymatisch verdickte Membranen. Die Rindenzellen der Unterseite erscheinen dagegen plasmaarm, weitleumig und dünnwandig.

Bei den Experimenten mit dem Bohnenepicotyl, deren geotropische Krümmung man in angegebener Weise verhindert, lässt man den Plasmakörper der Zellen natürlich Zeit, seine in Folge der Schwerkraftwirkung zu Stande kommende Reizbewegungen voll und ganz auszuführen. Diese Reizbewegungen bestehen aber in einer Wanderung des Plasmas von der Stengelunterseite zur Oberseite. Als Bahnen dienen dabei offenbar die Plasmaverbindungen zwischen den Zellen. Die bedeutende Plasmaansammlung in den Zellen der Oberseite der Stengel hat hier ein starkes Dickenwachsthum der Membranen und daher ein schwaches Flächenwachsthum derselben zur Folge. Auf

1) Vgl. G. KRAUS, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, Bd. 15.

2) Vgl. THATE in PRINGSHEIM's Jahrbüchern f. wissensch. Botanik, Bd. 13.

3) Vgl. WORTMANN, Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 5, S. 461.

4) Vgl. WORTMANN, Botan. Zeitung, 1887, S. 819, und 1888, S. 488.

der Stengelunterseite macht sich geringfügiges Dickenwachsthum, aber energisches Flächenwachsthum der Zellhäute geltend. Die Turgorausdehnung der Zellen kann hier daher auch leicht eine grosse werden. Nach WORTMANN kommen sämtliche Reizbewegungen wachsender Organe in der Weise zu Stande, dass die Reizursachen zunächst Wanderungen des Plasmas zur Folge haben, welche dann ihrerseits das Wachsthum der Zellhäute beeinflussen. Die von dem genannten Forscher constatirten Thatsachen sind auch unzweifelhaft richtig, indessen bezüglich der Deutung derselben ist, worauf hier aber nicht näher eingegangen werden kann, noch keine Einigung erzielt¹⁾.

175. Die Function der Wurzelspitze bei dem Zustandekommen geotropischer Krümmungen.

DARWIN²⁾ hat bekanntlich in neuerer Zeit mit grosser Bestimmtheit die Behauptung aufgestellt, dass das Vorhandensein der Wurzelspitze von wesentlicher Bedeutung für das Zustandekommen geotropischer Krümmungen der Wurzeln sei. Er redet aus diesen und anderen Gründen von einer „Gehirnfunction“ der Wurzelspitze, freilich ein unglücklich gewählter Ausdruck, der sehr leicht zu Missverständnissen führen kann. Die von DARWIN angeregte Frage, welche übrigens schon früher von CIESIELSKI und SACHS behandelt worden war, hat Veranlassung zur Ausführung zahlreicher Untersuchungen gegeben, deren Resultate theils für, theils gegen die Ansicht des brittischen Naturforschers sprechen³⁾. Man führt die Experimente am zweckmässigsten mit Keimpflanzen von *Pisum*, *Zea*, *Vicia Faba* oder *Phaseolus* aus. Nach dem Anquellen werden die Samen in feuchten Sägespänen zur Keimung gebracht, bis ihre senkrecht nach abwärts gewachsenen Wurzeln eine Länge von 2—3 cm erreicht haben. Jetzt bringt man auf einer Reihe von Wurzeln (es ist am besten, zahlreiche, z. B. 20 Untersuchungsobjecte zu verwenden) in einer Entfernung von 15—20 mm von der Spitze Tuschestriche als Marken an und legt die Hälfte der Keimlinge derartig in feuchte Sägespäne, dass ihre Wurzeln horizontal gerichtet sind. Von den übrigen Wurzeln entfernt man ein 1,5—2 mm langes Stück der Spitze, indem man die Wurzeln an ein Korkscheibchen anlegt und mit Hülfe eines scharfen Rasirmessers in möglichst horizontaler Richtung Querscheibchen abträgt, bis der gewünschte Erfolg erzielt ist. Auch die Keimlinge mit den decapitirten Wurzeln werden nun horizontal in Sägespäne gelegt. Nach 24—48 Stunden stellt man die Grösse der Zuwachsbewegung an sämtlichen Untersuchungsobjecten fest und beobachtet, ob sie geotropische Krümmungen ausgeführt haben. Ich fand bei Versuchen mit *Phaseolus multiflorus*, dass die normalen Wurzeln im Laufe von 48 Stunden sämtlich einen beträchtlich grösseren Zuwachs erfuhren als die decapitirten. Es war die Wurzelspitze in einer Länge von 2 mm abgetragen worden. Dies Resultat steht aber nicht mit den

1) Vgl. zumal PFEFFER, Abhandlungen der Königl. sächs. Gesell. d. Wissensch., Bd. 18, S. 240.

2) DARWIN, Das Bewegungsvermögen der Pflanzen, 1881.

3) Vgl. WIESNER, Bewegungsvermögen der Pflanzen, 1881; DETLEFSEN, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2; KIRCHNER, Programm zur 64. Jahresfeier der Akademie Hohenheim, 1882; vergl. ferner die Angaben von KRABBE, MOLISCH, WIESNER, BRUNCHORST im ersten und zweiten Jahrgang der Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft.

Angaben sämmtlicher, wohl aber mit denjenigen einiger Beobachter, die den nämlichen Gegenstand untersuchten, in Einklang. Meine Versuche mit *Phaseolus* lehrten ferner, dass die Wurzeln der intacten Pflanzen normale geotropische Krümmungen ausführten, während die decapitirten Wurzeln sich freilich ebenfalls krümmten, aber in verschiedener Richtung, nämlich nach oben, seitlich oder auch nach unten.

Ich bin weit entfernt davon, aus meinen Beobachtungen Schlüsse über die Function der Wurzelspitze bei dem Zustandekommen der geotropischen Krümmungen ziehen zu wollen, denn dazu ist die Anzahl meiner Versuche mit *Phaseolus* und ebenso mit *Viciakeimlingen* zu gering gewesen. Bei Experimenten mit *Vicia Faba* fand ich übrigens, dass die decapitirten Wurzeln in den ersten 24 Stunden ebenso lebhaft wuchsen wie die intacten. Die verschiedenen Fragen, um welche es sich hier handelt, sind nach meinen eigenen Erfahrungen noch nicht als erledigt zu betrachten. Die neuesten Arbeiten PFEFFER's konnte ich nicht mehr berücksichtigen.

Wenn man die Literatur über die Function der Wurzelspitze durchgeht, so wundert man sich über die zahlreichen Widersprüche in den Angaben bezüglich der Bedeutung der Spitze für Längenwachsthum und geotropische Krümmungen. Mir scheint, dass viele der Experimentatoren eine Reihe von Gesichtspunkten bei ihren Untersuchungen nicht genügend gewürdigt haben. 1) Es ist möglich, dass die Wurzelspitze für Wachsthum und Geotropismus der Wurzeln verschiedener Pflanzenspecies nicht dieselbe Bedeutung besitzt. 2) Man hat, um zu einem sicheren Resultate zu gelangen, stets mit zahlreichen Untersuchungsobjecten zu operiren. 3) Es ist für den Erfolg der Versuche nicht gleichgültig, ob man die Wurzelspitze in einer Länge von 1, 1,5 oder 2 mm abträgt, denn häufig wird bei zu unbedeutender Decapitation noch ein Theil der den Reiz nach DARWIN übermittelnden Wurzelspitze nicht entfernt sein. 4) Bei längerer Versuchsdauer ist auf die an den decapitirten Wurzeln erfolgenden Regenerationsvorgänge zu achten¹⁾. 5. Man hat mit Rücksicht auf die Nutationen der Wurzeln (vergl. unter 157) darauf Gewicht zu legen, welche Lage man den decapitirten und intact gelassenen Wurzeln ertheilt.

176. Experimente mit dem Klinostaten.

Der Klinostat, ein von SACHS²⁾ eingeführter Apparat, gehört zu den wichtigsten Instrumenten bei zahlreichen pflanzenphysiologischen Untersuchungen. Er dient zur Ausschliessung heliotropischer sowie geotropischer Krümmungen an Pflanzentheilen³⁾. Eine vorzügliche Form hat PFEFFER dem Klinostaten gegeben, und ist der PFEFFER'sche Apparat im Preise von 320 Mk. vom Universitätsmechaniker ALBRECHT in Tübingen zu beziehen. Der hohe Preis des Apparates⁴⁾ veranlasste WORTMANN, den Klinostaten in erheblich billigerer Form (200 Mk.) von der technischen Anstalt der Gebrüder UNGERER in Strassburg herstellen zu lassen⁵⁾. Diesen WORTMANN'schen Apparat benutzte ich vielfach und kann ihn zur Anschaffung empfehlen. Er wird freilich

1) In dieser Hinsicht vergl. PRANTL, Arbeiten d. bot. Instit. in Würzburg, Bd. 1.

2) Vgl. SACHS, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. I, S. 597, und Bd. II, S. 215.

3) Ueber das besondere Verhalten dorsiventraler Organe am Klinostaten sprachen sich zumal SACHS und NOLL (Flora, 1893) aus.

4) Uebrigens liefert jetzt auch ALBRECHT einen Klinostaten für 220 M.

5) Vgl. WORTMANN, Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 4.

an Leistungsfähigkeit von dem grossen PFEFFER'schen Apparat übertroffen, ist aber doch in den meisten Fällen gut zu verwenden.

Ueber Construction und Gebrauch des Apparates ist das Folgende zu sagen:

„Der ganze Klinostat, wie ihn Fig. 148 darstellt, besteht aus zwei Theilen, dem Triebwerk und den Nebenapparaten, welche letztere wesentlich die von PFEFFER gegebene Construction besitzen. Das Triebwerk *A* auf einem festen Fuss *B* aufgeschraubt, besteht aus einem Uhrwerk, dessen Gang, um vollkommen ruhige Rotation zu erzielen, nicht durch einen Anker, sondern durch Windflügel regulirt wird, und drei senkrecht über einander liegenden Rotationsachsen, *a*, *b*, *c*, welche, für sich frei beweglich, durch einen Schieber *d* auf gleich zu beschreibende Weise mit einem Rade des Uhrwerks in Verbindung gebracht und dadurch in Rotation gesetzt werden können. Die Axe *e* dient zum Ansetzen des Uhrschlüssels.

Die Nebenapparate bestehen zunächst aus einer soliden Axe *f*, welche durch ein Knotengelenk *g* an einer der Rotationsachsen *a*, *b*, *c*, angeschraubt werden kann. Durch dieses Knotengelenk wird es ermöglicht, dass die Axe *f* sowohl in horizontaler als auch in verticaler Richtung verschoben werden kann. Dadurch lassen sich, ohne den ganzen Apparat zu verstellen, Rotationen der Beobachtungsobjecte von horizontaler Lage der Drehungsaxe bis zu einer Neigung derselben um 45° gegen die Horizontale einerseits, sowie verschiedene Stellungen zu einfallenden Lichtstrahlen erzielen. Auf der Axe *f* ist ein verschiebbarer Ring aufgeschraubt, welcher an einem Stifte *h* ein auf diesem verschiebbares Gewicht *i* trägt. Stift und Gewicht dienen als Centrirungsvorrichtung, um ein eventuelles Uebergewicht des in Rotation zu setzenden Gegenstandes zu eliminiren, ohne dessen Vermeidung die Regelmässigkeit der Axenumdrehungen sehr gestört werden kann. Die Axe *f* ruht bei α auf zwei Frictionsrollen, welche an der Axe *k* eines festen Stativs in verticaler Richtung — auf- und abwärts — sowohl als auch um die Axe β in horizontaler Richtung (letzteres bei Neigung der Drehungsaxe zur Horizontalen) verschiebbar resp. drehbar sind.

Auf das Ende der Axe *f* wird der Topfhalter *l* aufgeschraubt. Dieser besteht aus einem dreiarmigen Messingfuss, in dessen Arme drei eiserne Stäbe senkrecht eingenietet sind. An jedem dieser Stäbe ist ein verschiebbares Messingdreieck angebracht, welches, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, auf den Rand des Blumentopfes fest aufgesetzt werden kann und letzteren dadurch unverrückbar macht.

Soll nun ein Gegenstand, etwa eine im Topf gezogene Pflanze in Rotation versetzt werden, so verfährt man folgendermaassen: Der Topf wird zunächst in den Topfhalter *l* eingesetzt und mittelst der Messingdreiecke befestigt, welche Manipulation in weniger als einer Minute vollzogen ist. Nach Anschrauben des Topfhalters an die Axe *f* wird dieselbe durch einen entsprechenden Stoss mit der Hand, den man gegen den Stift *h* führen kann (von welchem das Gewicht *i* zuvor abgenommen ist), in Rotation versetzt. War nun der Topf so auf den Topfhalter aufgesetzt, dass ein Uebergewicht vorhanden ist, so wird durch Verrücken des Schwerpunktes unter die Horizontale immer eine bestimmte Seite des Topfes bei der eintretenden Ruhelage nach unten sehen. Durch entgegengesetzte Stellung der Centrirungsvorrichtung und geeignetes Verschieben des Gewichtes *i* wird nun das Uebergewicht eliminirt, so dass nach mehreren, durch geringen Stoss hervorgerufene Rotationen der Topf in beliebiger Lage zur Ruhe kommt. Ist die Centrirung genau erreicht, so wird die

Rotationsaxe mit dem Uhrwerk in Verbindung gesetzt. Das wird durch einfaches Verschieben eines Stiftes auf folgende Weise ermöglicht.

Jede der drei Rotationsachsen *a*, *b*, *c* trägt, wie Fig. 149, einen Längsschnitt durch das Uhrwerk darstellend, andeutet, ein Zahnrad. Die Zahnräder der Axen *b* und *c* greifen dauernd in einander, dasjenige der Axe *a* steht nicht in unmittelbarer Verbindung mit diesen. Durch Einschiebung eines in der Zeichnung schattierten Rades *q*, dessen Zähne in die der beiden obersten Axenräder und zugleich in die eines Rades vom Uhrwerk eingreifen, werden nun alle drei Rotationsachsen zugleich in Bewegung gesetzt. Wie diese Einschiebung geschieht, ist aus Fig. 150, welche einen anderen, zu Fig. 149 senkrechten Längsschnitt durch das Uhrwerk darstellt, ersichtlich.

Die Figur ist so gezeichnet, dass keine Communication zwischen Uhrwerk und den Rotationsachsen stattfindet, das Uebertragungsrad *q* also zunächst nicht eingreift. Der Stift *p*, auf dem dasselbe befestigt ist, ruht in einer Führung,

welche durch einen kleinen Knopf *p'* verschiebbar ist.

Durch einen Druck auf den Knopf des Stiftes *p* wird nun das Uebertragungsrad *q* eingeschoben; ein zweiter Druck auf den Knopf *p'* senkrecht abwärts macht den Stift (und dadurch auch das Uebertragungsrad) unverschiebbar, indem ein bei *x* angelegter kleiner Gang des Stiftes in die Führung eingreift.

Muss an dem Beobachtungsobject während der Rotationszeit irgend etwas geändert werden, soll z. B. das Begießen des Topfes u. dergl. vorgenommen werden, so ist jedesmal zuvor durch Ausziehen des Stiftes *p* die Communication der Rotationsaxe mit dem Uhrwerk zu unterbrechen.

Fig. 148.

Fig. 149.

Fig. 151.

Fig. 150.

Fig. 152.

Fig. 148—152. Wortmann's Klinostat mit Nebenapparaten.

Um eine Rotation um horizontale oder geneigte Axe, aber in einer, zu der in Fig. 148 angedeuteten, senkrechten Richtung zu ermöglichen, befestigt man mittelst Draht den Topf in einem der drei in Fig. 151 gezeichneten Ringe. Bei geneigter Umdrehungsaxe werden die Frictionsrollen an einem zweiten sehr starken Stativ befestigt.

Handelt es sich um Beobachtungen von Gegenständen, welche im feuchten Raume verweilen müssen, wie etwa Pilze (Fruchträger von *Phycomyces*), Wurzeln, abgeschnittene Pflanzentheile etc., so kann man dieselben an einer (durch keine Zeichnung wiedergegebenen) 80 cm langen Messingaxe befestigen, welche durch einen feuchte Luft enthaltenden Glaskäfig geführt wird und deren äusserstes Ende dann ausserhalb des Glaskäfigs durch das Stativ mit den Frictionsrollen gestützt wird.

Sollen die Beobachtungsobjecte um verticale Axe rotiren, so muss der Klinostat, da das Triebwerk nicht verstellbar ist, anders hergerichtet werden.

Fig. 152 zeigt denselben mit verticaler Drehungsaxe. Auf eine der Rotationsachsen *a*, *b*, *c* wird ein konisches Rad gesetzt, dessen Zähne in die eines zweiten konischen Rades eingreifen. Dieses letztere ist an einer verticalen Axe *w* beweglich, welche auf einem Stahllager ruht, oben eine flache Messingscheibe trägt und durch eine Schraube *r* in kürzester Zeit an dem Triebwerk befestigt werden kann.

Die Umdrehungsgeschwindigkeiten der drei Rotationsachsen sind verschieden, und zwar so gewählt, dass ohne Belastung und bei horizontaler Drehungsaxe ein Umlauf von *a* in 10, von *b* in 15 und von *c* in 20 Minuten vollendet wird. Doch lassen sich, wenn es darauf ankommt, durch Verkleinerung der Windflügel auch grössere Umdrehungsgeschwindigkeiten erzielen.

Das Aufziehen des Uhrwerkes hat alle 20—21 Stunden zu geschehen. Die Vorzüge des Klinostaten sind nun folgende:

- 1) Bei der Rotation ist jeder Stoss ausgeschlossen, so dass eine vollkommen ruhige Bewegung der Objecte ermöglicht wird.
- 2) Ist derselbe sehr bequem und leicht transportirbar und kann daher auf jedem Arbeitstische aufgestellt werden.
- 3) Da der Gang des Uhrwerkes fast geräuschlos ist, so ist der Apparat auch für Vorlesungsdemonstrationen geeignet.
- 4) Die Handhabung ist eine höchst einfache. Die zu beobachtenden Gegenstände können im Verlauf von 1—2 Minuten befestigt, an den Apparat gebracht und dieser in Gang gesetzt werden. Ebenso einfach und schnell geschieht das Abnehmen der Gegenstände.
- 5) Die Tragfähigkeit ist für gewöhnliche Versuche vollständig ausreichend. Bei der angestellten Prüfung fand bei horizontaler Drehungsaxe (in Fig. 148 dargestellt) bei einer Belastung von 2 kg noch ganz regelmässige und ruhige Bewegung statt. Allerdings bei einer Verlangsamung von 1 Minute pro Umdrehung. Bei verticaler Axe (in Fig. 152 dargestellt) aber konnte eine Belastung von 5 kg angewendet werden, ohne dass eine Verlangsamung der Umdrehung eintrat.
- 6) Der Preis des Apparates mit allem Zubehör ist 200 Mk.“

Zur Orientirung über die Leistungsfähigkeit unseres Apparates und für das Studium des Verhaltens vieler Pflanzenorgane bei verschiedener Rotationsform führen wir folgende Experimente aus. Wir stellen den Klinostaten am Fenster auf und bringen auf die in horizontaler Ebene um verticale Axe rotirende Scheibe (vgl. Fig. 152)

einen Blumentopf, in welchem wenige heliotropisch sehr empfindliche Keimlinge (*Sinapis*, *Lepidium*), die bis dahin im Dunkeln verweilen, eben die Erde durchbrochen haben. Bei fortdauernder Rotation erleiden diese Keimlinge trotz der einseitigen Beleuchtung doch keine heliotropischen Nutationen, während nicht gedrehte Vergleichsobjecte sich sämmtlich nach dem Fenster hinkrümmen.

Handelt es sich darum, bei Experimenten mit Keimlingen etc. die einseitige Schwerkraftwirkung zu eliminiren, so muss die Rotationsaxe des Apparates genau horizontal gestellt werden (vergl. Fig. 148).

Die Rotation der Untersuchungsobjecte in verticaler Ebene erfolgt in 10–20 Minuten langsam genug, um jede Wirkung der Centrifugalkraft auszuschliessen. Vor allen Dingen ist aber äusserst wichtig, um eine gleichmässige Drehung der Axe zu ermöglichen, dass die Belastung derselben eine allseitig gleiche sei. Dies kann durch Verwendung des Stiftes *h* und des Gewichtes *i* (vergl. Fig. 148) erzielt werden. Die Keimlinge selbst, z. B. Mais-, Erbsen-, Bohnenkeimlinge, in Sägespänen cultivirt, gelangen in eine aus dünnem Zinkblech gefertigte Trommel. Diese wird an Stelle eines Blumentopfes dem Topfhalter aufgesetzt und auf irgend eine Art befestigt. Den Boden der Trommel bildet eine aus weichem Holz gefertigte Platte, so dass die langen Stecknadeln, welche die Keimlinge tragen, sich ohne Mühe befestigen lassen. Die Innenwände der Trommel werden mit mehreren Lagen angefeuchteten Fliesspapiers bedeckt, ebenso die nicht wachsenden Theile der Keimlinge. Auf dem Holzboden der Trommel breitet man feuchte Watte aus, die mit kleinen Stiften befestigt wird. Recht bequem ist es auch, in folgender Weise zu experimentiren. Man verbindet das eine Ende einer ca. 80 cm langen Axe mit dem Uhrwerk des Klinostaten; das andere Ende ruht aber auf den Frictionsrollen. Man schiebt nun einen Kork mit starker Reibung über die Axe, so dass dieser wie ein Rad in verticaler Ebene gedreht werden kann. Am Umfang des Korkes werden nun mit je zwei Nadeln die Keimpflanzen derartig befestigt, dass die Last möglichst gleichmässig vertheilt ist. Unter dem rotirenden Kork steht ein Wasser enthaltendes Bassin so, dass die Pflanzen bei jeder Umdrehung von 20 Minuten z. B. einen Theil ihres Weges (1–2 Minuten lang) in Wasser eintauchen. Durch Ueberdecken eines mit entsprechendem Schlitz für die Axe versehenen Glaskäfigs wird die Luft in der Umgebung der Keimlinge feucht erhalten. Der ganze Apparat ist in einem Dunkelzimmer aufgestellt.

Die Untersuchungsobjecte (z. B. 4 Keimlinge von *Phaseolus* *Pisum* oder *Vicia Faba*) werden auf dem Kork befestigt, wenn die Hauptwurzel eben hervorgetreten ist. Man befestigt die Keimlinge derartig, dass die Hauptwurzeln eine verschiedene Richtung zu der Axe einnehmen, und findet im Laufe einiger Tage (am besten ist es, bei relativ hoher Temperatur, etwa 20° C. zu experimentiren), dass sämmtliche Wurzeln sich in der ursprünglichen Wachstumsrichtung verlängert haben, einen gleichmässigen Gang des Apparates vorausgesetzt. Es treten wohl gelegentlich Krümmungen an den Wurzeln auf; dieselben sind aber keine in gleichem Sinne gerichtete, geotropische Nutationen, sondern spontane Nutationen.

Was nun das Verhalten der Nebenwurzeln anbelangt, so wachsen diese im Laufe einiger Tage aus den Hauptwurzeln der seit beginnender Keimung rotirenden Untersuchungsobjecte hervor. Der Winkel, den sie mit der Hauptwurzel bilden, der sog. Eigenwinkel der Neben-

wurzeln erster Ordnung, wird in unserem Experiment allein durch innere Wachsthumursachen bestimmt. Dieser Eigenwinkel ist bei verschiedenen Untersuchungsobjecten und bei den einzelnen Nebenwurzeln einer Hauptwurzel keineswegs immer derselbe. Im Allgemeinen ergibt sich, wie leicht durch Winkelmessungen festzustellen ist, dass die Nebenwurzeln an der Wurzelbasis fast oder völlig rechtwinkelig zur Hauptwurzel gerichtet sind, während die weiterhin auftretenden Nebenwurzeln einen spitzen Eigenwinkel haben; ihre Spitze ist dem Scheitel der Hauptwurzel zugewandt. Häufig treten auch bogenförmige Krümmungen an den Nebenwurzeln hervor. Ganz besonders eignen sich Phaseoluskeimlinge zu den hier erwähnten Versuchen. Bei dieser Pflanze entspringen auch gewöhnlich Nebenwurzeln aus dem kurzen Hypocotyl, die, wie besonders zu erwähnen ist, einen stumpfen Eigenwinkel erkennen lassen.

Sollen Pflanzen einseitig beleuchtet, der einseitigen Wirkung der Schwerkraft aber entzogen werden, so richtet man die Axe des Klinostaten parallel zu den einfallenden Lichtstrahlen. Die Rotations-ebene der Untersuchungsobjecte muss mit den Lichtstrahlen einen rechten Winkel bilden. Die Töpfe, in welchen die Pflanzen wachsen, werden in der bereits auf S. 380 angegebenen Weise in einem der in Fig. 151 abgebildeten Ringe befestigt. Näheres vergl. unter 178.

Ein Brodwürfel von 4—5 cm Kantenlänge wird mässig (ja nicht zu stark) mit Wasser durchfeuchtet. Man thut am besten, den Würfel zur Sterilisirung im feuchten Zustande in einer mit Glasplatte bedeckten Krystallisirschale in einem Trockenschranke einige Stunden lang einer Temperatur von etwas über 100° C. auszusetzen. Nun wird der Brodwürfel über die ca. 80 cm lange Messingaxe des Klinostaten geschoben, deren eines Ende mit dem Uhrwerk in Verbindung steht, während das andere Ende auf den Frictionsrollen ruht. Der Brodwürfel befindet sich in der Mitte der völlig horizontal und parallel zu den Fensterscheiben gerichteten Axe. Ebenfalls über diese mit grosser Reibung geschobene, durchbohrte Korkstücke zur rechten und linken Seite des Würfels können zur sicheren Befestigung dieses letzteren dienen. Unter der Axe des Klinostaten steht eine etwas Wasser enthaltende Zinkschale von 50 cm Seitenlänge. Ein Glaskäfig, durch den die Rotationsaxe quer hindurchgeht und der in das Wasser der Zinkschale eintaucht, dient dazu, die Luft in der Umgebung des Brodwürfels feucht zu erhalten. Der Käfig besteht aus einem Zinkgestell, welches an den zwei Seiten, wo die Axe hindurchgeht, Schlitzte besitzt, die nach völliger Zusammenstellung des Apparates genügend verschlossen werden können. Vorder- und Rückwand des Käfigs sowie das Dach desselben werden von Glasplatten gebildet.

Will man nun einen Versuch anstellen, so werden einige Sporangien von *Mucor* oder *Phycomyces nitens* in sterilisirtem Wasser vertheilt. Mit Hilfe einer ausgeglühten flachen Nadel besäet man darauf alle sechs Flächen des Brodwürfels mit Sporen und setzt den Klinostaten sofort nach Ueberdecken des Glaskäfigs in Gang. Nach Verlauf weniger Tage treten die Sporangienträger aus dem Substrat hervor und haben schnell eine erhebliche Länge erreicht. Die Sporangienträger auf den Flanken des Würfels, die wir nicht weiter berücksichtigen wollen, sind freilich etwas gekrümmt, weil sie zeitweilig bei jeder Umdrehung in den Schatten der Axe kamen und dadurch zu heliotropischen Krümmungen Veranlassung gegeben war. Auf den übrigen Flächen des Brodwürfels sind die Fruchträger aber gerade aufgerichtet; sie stehen hier senkrecht zum

Substrat¹⁾. Diese Substratrichtung der Organe, die sicher nicht, wie von einigen Physiologen vermuthet wurde, durch die Masse des Brodes bedingt ist, kommt in ziemlich complicirter Weise zu Stande²⁾.

Der Geotropismus kann die erwähnte Substratrichtung des Mucor nicht bedingen, denn die einseitige Wirkung der Gravitation ist ja bei Bewegung der Untersuchungsobjecte am Klinostaten ausgeschlossen³⁾. Wohl aber ist der weiter unten noch näher zu besprechende negative Hydrotropismus von Bedeutung für das Zustandekommen der Substratrichtung des Mucor, und ebenso verdient in dieser Hinsicht die Fähigkeit der Fruchträger Beachtung, auf Berührung⁴⁾ und auf einseitige Beleuchtung mit Reizkrümmungen zu reagieren.

Von der heliotropischen Reizbarkeit der Fruchträger kann man sich leicht überzeugen, indem man die auf Brodwürfeln im Dunkeln zur Entwicklung gelangten gerade gestreckten Organe in einer heliotropischen Kammer (vergl. unter 178) einseitig beleuchtet. Und wenn nun bei Klinostatenversuchen bei Lichtzutritt die Fruchträger schief zur Fläche des Substrates aus diesem hervorstechen, so ist ihre dem Brodwürfel zugewandte Seite stets, mag die betreffende Würfelfläche dem Fenster zugekehrt oder von demselben abgewandt sein, schwächer als die opponirte beleuchtet. Es müssen somit heliotropische Wirkungen eintreten, die den Sporangiumträger ebenso wie die freilich in erster Linie thätigen hydrotropischen Vorgänge in eine zum Substrat senkrechte Stellung bringen.

Wir bringen nun auf durchfeuchtete Torfwürfel von etwa 5 cm Kantenlänge, die wir auf der parallel zu den Fensterscheiben gerichteten Axe des Klinostaten befestigt haben, einige Samen von *Lepidium sativum* oder *Sinapis nigra*. Die beiden Flanken des Würfels wollen wir unbesäet lassen. Die Samen haften ohne weiteres am feuchten Torf. Unser Apparat, mit Glaskäfig bedeckt, ist hellem, diffusem Tageslicht ausgesetzt. Im Laufe mehrerer Tage beobachten wir an den rotirenden Untersuchungsobjecten, dass die entstehenden Wurzeln sich in Folge ihres positiven Hydrotropismus dem feuchten Substrat fest anschmiegen, zum Theil sogar in dasselbe eindringend. Die Hypocotyle nitiren zunächst stark; bald erlangen sie aber eine senkrechte Stellung zu den Flächen des Torfwürfels. Bei dem Zustandekommen dieser Substratrichtung spielen, wie DIETZ nachwies, Hydrotropismus und Contactreiz keine oder nur eine ganz untergeordnete Rolle. Wesentlich kommen hier vielmehr heliotropische Wirkungen in Betracht, und zwar in dem nämlichen Sinne, wie dies für die Fruchträger von Mucor angegeben worden ist. Lässt man nämlich Torfwürfel, die mit *Lepidium* oder *Sinapis* besäet sind, im Dunkeln um horizontale Axe langsam rotiren, dann stellen sich

1) Die Fruchträger auf den Kanten des Würfels haben eine solche Lage, dass ihre Richtung den Winkel der Kanten halbirt.

2) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2, S. 217, und DIETZ, Unters. a. d. botan. Institut zu Tübingen, Bd. 2, S. 478.

3) Damit soll natürlich nicht gesagt werden, dass Mucor nicht geotropisch reizbar sei. Dies ist vielmehr in hohem Grade der Fall. Wird z. B. ein mit Mucor-sporen besäeter Brodwürfel, den man auf eine lange Nadel aufgespießt hat, in einem grossen Glascylinder, dessen Boden mit Wasser bedeckt ist, schwebend befestigt, so treten nach einigen Tagen bei Lichtabschluss gerade gestreckte Sporangienträger aus der oberen Würfelfläche hervor. Die Sporangienträger, die an den Flanken des Würfels zur Entwicklung gelangen, sind im Bogen negativ geotropisch nach aufwärts gekrümmt, und aus der Unterfläche des Würfels wachsen positiv geotropisch reagirende verzweigte Myceläden hervor.

4) Vgl. WORTMANN, Botan. Zeitung. 1887, No. 49.

die Hypocotyle nicht senkrecht zum Substrat, sondern sie nehmen die verschiedensten Richtungen an.

Sehr geeignet zu Versuchen am Klinostaten sind auch sicher Keimlinge von *Phleum pratense*, die sich allerdings nicht so schnell, wie z. B. diejenigen von *Lepidium* entwickeln. Wenn man Torfwürfel, die in etwas Wasser enthaltenden Krystallisirschalen ruhen, mit *Phleum* besät und unter einen Pappkasten stellt, so wächst die Plumula der Keimlinge an der horizontalen Oberfläche des Würfels senkrecht nach aufwärts. Die Plumula der Keimlinge, welche an den verticalen Seiten des Würfels liegen, erscheint bogenförmig nach aufwärts gekrümmt, eine Folge ihrer starken geotropischen Reizbarkeit.

177. Experimente mit dem Centrifugalapparat.

Zunächst will ich hier einen von mir construirten und in Fig. 153 abgebildeten Centrifugalapparat beschreiben, der sehr leicht und billig hergestellt werden kann und für Demonstrationsversuche recht geeignet erscheint. Den wichtigsten Theil des Apparates bildet die ca. 50 cm lange Messingaxe *A*, welche die 40 mm Durchmesser besitzende Zinkscheibe *Z* trägt, an der sechs 3 cm breite und 7,5 cm lange Metallflügel angelöthet sind. Der Axe ist ferner am entgegengesetzten Ende eine Holzscheibe von 140 mm Durchmesser *H* aufgeschoben,

Fig. 153. Centrifugalapparat.

auf der noch eine Korkplatte ruht. Der Zinkring *Zr* ist an dem Rande der Holzscheibe befestigt, ragt aber über diesen hervor und kann benutzt werden, um einem an einem Ende verschlossenen, als Deckel dienenden Zinkcylinder von ca. 11 cm Länge Halt zu gewähren, so dass sich z. B. Keimlinge, die man mit Nadeln auf der Korkplatte be-

festigt, in einem verdunkelten Raum befinden, wenn der Zinkdeckel aufgesetzt ist. In der Abbildung trägt die Holzscheibe *H* eine Glasglocke *K*. Die Axe *A* ruht bei *b* in einem Lager. Bei *c* liegt ein zweiter Unterstützungspunkt für die Axe, deren Ende hier eine Spitze bildet. Wie unsere Abbildung zeigt, dient zur Aufnahme der beschriebenen Vorrichtung ein Kasten. Derselbe ist ca. 15 cm hoch, 27 cm breit und 41 cm lang. Die Wände der kleineren Abtheilung, in welcher sich die Flügel bewegen sollen, sind mit Zinkplatten ausgekleidet. In der Vorderwand befindet sich eine Oeffnung, welche mittelst eines durchbohrten Korkes verschlossen wird. In der Bohrung steckt ein Glasrohr, dessen den Flügelu zugekehrtes Ende etwas

ausgezogen ist, während über das andere Ende ein mit der Wasserleitung in Verbindung stehender Schlauch gezogen werden kann. Es ist nun bei einigermaßen starkem Druck des Wassers in der Leitung, indem man einen Wasserstrahl auf die Flügel einwirken lässt, eine 200—300malige Rotation der Vorrichtung in der Minute zu erzielen. Zur Verhütung des Umherspritzens des Wassers wird die kleinere Abtheilung des Kastens mittelst eines gewölbten Holzdeckels verschlossen. Das von den Metallflügeln abtropfende Wasser fliesst durch ein Loch im Boden des Kastens direct in den Ausguss der Wasserleitung, auf welchem der Apparat Platz gefunden hat.

Geeignete Untersuchungsobjecte sind z. B. Keimlinge der Erbse, die, in feuchten Sägespänen zur Entwicklung gelangen, Wurzeln von ca. 2 cm Länge besitzen. Man legt auf den mit Wasser durchtränkten Kork, der auf der Holzscheibe *H* ruht, nasse Watte. Diese wird mit Stecknadeln befestigt. Ebenso befestigt man die Keimlinge z. B. derartig mit Nadeln nahe dem Umfange der Korkplatte, dass ihre Hauptwurzeln parallel zur Rotationsaxe gerichtet sind. Der Zinkdeckel wird innen mit feuchtem Fliesspapier ausgekleidet und aufgesetzt. Bei meinen Versuchen bei ca 20° C. war der Erfolg schon nach etwa 3-stündiger Rotation sehr deutlich. Die wachsenden Wurzelspitzen der an der Scheibe des Apparates in verschiedener Weise befestigten Keimlinge hatten sich sämtlich nach aussen gekrümmt, so dass sie nunmehr einen rechten Winkel mit der Rotationsaxe bildeten (vgl. Fig. 154). Bei längere Zeit dauernden Rotationsversuchen, die z. B. den Zweck haben, das Verhalten der Nebenwurzeln von Keimpflanzen der Centrifugalkraft gegenüber zu studiren, ist es erforderlich, die Experimente etwa alle 3—4 Stunden zu unterbrechen, um die Watte auf dem Kork sowie die Keimlinge aufs Neue durch Benetzen mit Wasser hinreichend feucht zu erhalten.

Der erwähnte Apparat ist zu schwach gebaut, um Blumentöpfe, die mit Erde und Keimlingen etc. beschickt sind, tragen zu können. Um aber doch den Einfluss der Centrifugalkraft auf wachsende Stengel zu demonstrieren, verfähre ich in folgender Weise.

Zwei kurze Probirgläser von ca. 55 mm Länge und 25 mm Weite werden mit feuchten Sägespänen angefüllt. In diese legt man einige Samen von *Lepidium sativum* ein. Im Dunkeln beginnt die Keimung derselben schnell, und wenn die Hypocotyle mit nickendem Ende über die Sägespäne hervorgetreten sind, kann der Rotationsversuch beginnen. Zur Befestigung der Cultureylinder an einander diametral entgegengesetzten Punkten der Peripherie der Korkplatte schiebt man dieselben durch in der Mitte mit einer Bohrung von entsprechender Weite versehene Korkstücke hindurch und befestigt diese mit Hülfe mehrerer Nadeln auf der grossen Korkplatte des Apparates. Nach Verlauf einiger Stunden ist das Resultat des Rotationsversuches bereits deutlich zu constatiren. Die Hypocotyle, bei Beginn des Versuchs parallel zu der horizontalen Rotationsaxe gerichtet, haben etwas unterhalb derjenigen Stelle, an der sie in Folge ihres spontanen Nutations-

Fig. 154. Keimlinge von *Pisum*, deren Wurzelspitzen sich in Folge schneller Rotation der Scheibe eines Centrifugalapparates um eine horizontale Axe gekrümmt haben.

vermögens gekrümmt erscheinen, eine neue Krümmung erfahren. Die oberhalb der zuletzt erwähnten Krümmungszone gelegenen Theile des Hypocotyls haben sich dem Centrum der Scheibe, nicht wie die wachsenden Wurzelspitzen der Peripherie derselben, zugekehrt. Geeignete Untersuchungsobjecte sind auch Triticumkeimlinge.

Ich habe nun ferner noch einen grossen Centrifugalapparat construirt (zu beziehen für 70 M. von G. TEGTMEIER, Mechaniker am physikalischen Institut zu Jena), mit Hülfe dessen man z. B. auch grössere Blumentöpfe, in denen in Erde Pflanzen cultivirt worden sind, einer schnellen Rotation (z. B. einer 300maligen in der Minute) aussetzen kann, und der sich für eingehende Studien über den Einfluss der Centrifugalkraft auf Pflanzen sehr gut eignet. Ich führte auch selbst schon manche Experimente mit diesem Apparat aus.

In Fig. 155 ist der Apparat in der Weise, wie er sich uns bei vertical gerichteter Rotationsaxe darstellt, abgebildet.

Auf dem schweren Brett *B* ist die Metallsäule *M* befestigt. Neben dieser befindet sich der Axenhalter *Ah*. Derselbe kann mittelst der Schraube *Sch* und des Stiftes *St* unverrückbar an *M* befestigt werden, wenn die Rotationsaxe vertical stehen soll. Diese Axe hat eine Länge von 20 cm. Bei *a* ruht sie auf einer in der Abbildung nicht sichtbaren Spitze; bei *b* befindet sich ein Lager für die Axe. Ueber die

Scheibe *c*, welche mit der Rotationsaxe fest verbunden ist, kann eine Schnur ohne Ende gelegt werden. Der Axenhalter ist bei *d* mit einer Bohrung versehen. In derselben steckt das untere, mit einer sehr feinen Oeffnung versehene Ende des Metallrohres *Mr*. In dies Rohr giesst man etwas Oel, damit das Lager der Axe auch bei schneller Rotation derselben stets hinreichend eingefettet bleibt. Dem Axenende bei *a* ist ebenfalls ab und an etwas Oel zuzuführen. Hat man den Apparat lange Zeit nicht gebraucht (er ist an einem möglichst staubfreien Orte aufzubewahren), so muss er bei *a* und *b* vom etwa eingetrockneten Fett befreit werden. Petroleum leistet für diesen Zweck sehr gute Dienste.

An der Axe ist nun die ca. 17 cm Durchmesser be-

sitzende Metallscheibe *Msch* befestigt. Diese Scheibe, in Fig.

156 von oben

gesehen abgebildet, ist in der Nähe ihrer Peripherie mit drei Ausschnitten versehen, in denen die drei Topfhalter verschiebbar sind.

Fig. 155. Centrifugalapparat.

Jeder dieser Topfhalter besteht aus einem verticalen Metallstab, der an der Basis, wie es in Fig. 156 bei *z* zu sehen ist, eine Metallplatte trägt, einer unter der Rotationsscheibe vorhandenen Schraube (die 3 Schrauben der Halter sind mit *g*, *r* und *s* bezeichnet) zum Festklemmen der Halter und aus einem Schieber (die Schieber sind mit *t*, *u*, *v* bezeichnet) zum Festhalten der Blumentöpfe, die man auf den Apparat gestellt hat. Soll die Rotation der Pflanzen nicht in horizontaler, sondern in verticaler Ebene erfolgen, um jede Schwerkraftwirkung auszuschliessen, so muss die Rotationsaxe horizontal gelegt werden. Dies erreicht man, indem man die Schraube *Sch* lockert, den Stift *St* entfernt, den Axenhalter um 90° dreht, so dass sein Ende auf dem in Fig. 155 durch punktierte Linien angedeuteten, senkrecht auf dem Brett *B* stehenden Metallstab ruht, und die Schraube *Sch* wieder fest anzieht. Sollen die Pflanzen im Blumentopf bei der Rotation dem Lichteinfluss entzogen werden, dann bedient man sich eines hinreichend hohen Zinkblechrecipienten, dessen Mantel nahe am offenen Ende mit drei Löchern versehen ist, durch welche die in Fig. 156 durch *h*, *i*, *k* bezeichneten Schrauben der Rotationsscheibe zur Befestigung des Cylinders geführt werden können.

Beim Gebrauch wird der Centrifugalapparat auf eine Tischplatte gestellt, die am besten auf in der Wand befestigten eisernen Trägern unverrückbar ruht, und auf der Tischplatte mittelst Schrauben befestigt. Diese letzteren sowie auch alle übrigen Schrauben am Apparat sind sehr fest anzuziehen, damit sie sich bei schneller Rotation desselben nicht lockern. Der Centrifugalapparat wird mit Hilfe eines Wassermotors von HERBERTZ in Köln in Bewegung gesetzt, dem man mittelst eines an den Ausflusshahn der Wasserleitung angeschraubten Hanfschlauches das erforderliche Wasserquantum zuführt. Der Motor steht mit dem Centrifugalapparat mittelst einer Schnur ohne Ende in Verbindung, und es kann leicht eine bedeutende Rotationsgeschwindigkeit des letzteren (4—5 Umdrehungen in der Secunde) erzielt werden.

Als Untersuchungsobjecte benutzen wir zunächst Kressekeimlinge, die in gut durchfeuchteter Gartenerde zur Entwicklung gelangt sind. Auf die Scheibe *Msch* legt man feuchtes Fliesspapier, stellt einen Blumentopf genau mitten auf die Scheibe, befestigt ihn sorgsam mit Hilfe der Topfhalter und beginnt den Versuch sofort, der alsbald das schon oben gekennzeichnete Resultat ergibt.

Ich experimentirte z. B. auch mit jungen, in Töpfen cultivirten Weizenkeimlingen. Die Plumula derselben war bei hoher Sommer-temperatur schon nach 2—3-stündiger Rotation dem Centrum der Scheibe zugekrümmt.

Bei Experimenten über den Einfluss der Centrifugalkraft auf das Wurzelwachsthum verfährt man am besten, wie folgt. Die Topfhalter werden von der Scheibe entfernt. Man setzt einen Zinkcylinder

Fig. 156. Rotationsscheibe des in Fig. 155 dargestellten Centrifugalapparates. Die Scheibe von oben gesehen.

von ca. 15 cm Länge auf die Scheibe, dessen Mantel nahe seinem unteren Ende mit drei Löchern versehen ist, um ihn mittelst der Schrauben *h*, *i*, *k* zu befestigen. Dicht über diesen Löchern hat der Cylinder seinen Boden, der also direct auf der Scheibe *Msch* ruht. Das obere offene Ende des Cylinders kann mittelst eines Deckels verschlossen werden. Die Innenwand des Cylinders wird mit feuchtem Fliesspapier ausgekleidet. Auf dem Cylinderboden befestigt man eine mit Wasser durchtränkte Korkscheibe, die noch mit feuchter Watte bedeckt wird. Die Keimlinge spiest man auf Nadeln auf und bringt sie in möglichster Entfernung vom Centrum auf der Korkscheibe an. Es ist dafür zu sorgen, dass die Untersuchungsobjecte stets feucht genug erhalten bleiben. Sehr geeignete Untersuchungsobjecte sind Keimlinge von Pisum mit ca. 2 cm langen Wurzeln. Will man das Verhalten der Nebenwurzeln studiren, so benutzt man Keimpflanzen von *Vicia Faba*. Die Rotationsversuche werden bei horizontaler Lage der Achse des Apparates längere Zeit fortgeführt, und man findet, dass sich die entstehenden Nebenwurzeln unter dem Einfluss der Centrifugalkraft sämmtlich nach aussen krümmen ¹⁾.

178. Die heliotropischen Nutationen.

Zahlreiche Pflanzentheile, insbesondere jugendliche Stengel, wenden sich, wenn sie einseitigem Lichteinfluss ausgesetzt werden, den Lichtstrahlen zu; sie sind positiv heliotropisch. Einige Pflanzentheile, z. B. die Wurzeln mancher Cruciferen, sind negativ heliotropisch; sie krümmen sich bei einseitiger Beleuchtung vom Lichte weg. Wir füllen ein kleines Glas, über dessen Mündung ein Stück engmaschigen Tülls festgebunden ist, völlig mit Brunnenwasser an, befestigen einige in Sägespänen angekeimte Pflänzchen von *Sinapis alba* mit Watte in den Maschen des Tülls und stellen das Gefäss einen Tag lang unter eine Glasglocke, über welche wir noch einen Papprecipienten decken. Bei der im Dunkeln erfolgenden Keimung wachsen die Wurzeln in das Wasser hinein; das hypocotyle Glied wächst aber senkrecht aufwärts. Um unsere Untersuchungsobjecte nun einseitigem Lichteinfluss auszusetzen, stellen wir das Gefäss mit den Keimpflanzen unter ein, bis auf einen schmalen Spalt mit mattschwarzem Papier beklebtes Becherglas oder unter einen mit einem Spalt versehenen, im Innern mit mattschwarzem Papier überzogenen Pappkasten. Nach Verlauf einiger Stunden ist schon deutlich zu sehen, dass die hypocotylen Glieder der Keimlinge sich den durch den Spalt unserer Vorrichtung eindringenden Lichtstrahlen zu-

Fig. 157. Keimpflanze von *Sinapis alba*. Das Hypocotyl ist positiv, die Wurzel negativ heliotropisch gekrümmt.

1) Vgl. KNIGHT, Philosophical Transac., 1806, T. I, p. 99, und SACHS, Arbeiten d. bot. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 607.

gewendet haben, während sich die Wurzeln im Gegentheil vom Licht wegkrümmen. In Fig. 157 ist eine Keimpflanze dargestellt, deren Hypocotyl eine positiv heliotropische, deren Wurzel aber eine negativ heliotropische Nutation erfahren hat.

Es existiren nur verhältnissmässig wenige Pflanzentheile, die negativ heliotropisch sind. Dem positiven Heliotropismus kommt dagegen eine sehr allgemeine Verbreitung zu. Günstige Untersuchungsobjecte sind zumal im Dunkeln erwachsene Keimlinge von *Phaseolus multiflorus*, *Vicia sativa*, *Lepidium sativum*. Wir cultiviren die Pflanzen in mit lockerer Gartenerde angefüllten Blumentöpfen und setzen sie, wenn das Epicotyl resp. das Hypocotyl der Keimlinge in lebhaftem Wachstum begriffen ist, in angegebener Weise einseitigem Lichteinfluss aus. Die heliotropischen Nutationen machen sich alsbald geltend; sie gehen oft so weit, dass die Enden der Stengeltheile parallel zu den Strahlen des einfallenden Lichtes gerichtet werden. Uebrigens ist die heliotropische Empfindlichkeit verschiedener Pflanzentheile keineswegs die gleiche. Sehr empfindlich sind z. B. die epicotylen Glieder von *Vicia sativa* und die ca. 2 cm lange Plumula von *Triticum vulgare*, während die Epicotyle von *Phaseolus multiflorus* schon nicht so energisch auf den Lichtreiz reagiren. Schneidet man junge Sprosse von *Sambucus nigra* ab, um sie nach dem Entblättern mit ihrer Basis in Wasser zu stellen und einseitig zu beleuchten, dann findet man, dass sie sich nur langsam dem Lichte zuwenden. Ihre heliotropische Reizbarkeit scheint auf jeden Fall geringfügig zu sein, obgleich Genaueres über dies Verhältniss erst durch eingehendere Untersuchungen unter Benutzung des Klinostaten und bei Ausschluss geotropischer Nutationen ermittelt werden kann. (Vergl. weiter unten.)

Sehr bequem ist es auch, zumal bei Demonstrationen, das Zustandekommen heliotropischer Nutationen unter Benutzung einer sog. heliotropischen Kammer nachzuweisen.

Dieselbe besteht aus einem aus starker Pappe gefertigten Kasten von etwa 16 cm Höhe, 20 cm Tiefe und 12 cm Breite. Vgl. Fig. 158. Deckel und Rückwand des im Innern mit mattschwarzem Papier

Fig. 158. Heliotropische Kammer.

überklebten Kastens können zurückgeschlagen werden. Die Vorderwand des Kastens ist mit einer $1\frac{1}{2}$ cm weiten Oeffnung versehen und trägt das Ansatzrohr *R*. Das Rohr trägt am vorderen Ende eine mit Spalt versehene Verschlussplatte. Dieser Spalt *b* liegt in gerader Linie mit dem Spalt *c* des Kastens. Man cultivirt Keimlinge von *Sinapis* oder *Lepidium* in kleinen Blumentöpfen. Wenn die Pflänzchen eben über die Erde gekommen sind, stellt man ein Culturegefäss in die heliotropische Kammer, richtet den Spalt *b* zum Fenster hinaus nach weissen Wolken oder gegen eine von der Sonne beschienene weisse Wand und findet die Pflanzen bereits nach wenigen Stunden heliotropisch gekrümmt. (Vergl. SACHS, Vorlesungen.)

Wenn in Töpfen cultivirte Keimlinge von *Lepidium sativum* oder andere Untersuchungsobjecte von sehr {schwachem Licht getroffen werden, so krümmen sie sich nur langsam dem Licht entgegen. Unmittelbar vor einem nach Süden gelegenen Fenster erfolgte bei meinen Versuchen die heliotropische Nutation der Stengel von bis dahin im Dunkeln cultivirten *Lepidium*keimlingen bei diffusum Licht schneller als dann, wenn die Pflanzen mehrere Meter entfernt vom Fenster einseitig beleuchtet wurden. Es scheint aber, dass hohe Lichtintensität das Zustandekommen heliotropischer Nutationen wieder verlangsamt. (Vergl. weiter unten.)

Werden in Töpfen cultivirte Keimlinge (ich experimentirte mit *Lepidium*) nach der unter 8 angegebenen Methode in einen Kasten gebracht, in welchem sie dem durch eine Lösung von doppelt-chromsaurem Kali hindurchgegangenen gemischten gelben Licht ausgesetzt sind, so krümmen sie sich den einfallenden Lichtstrahlen gar nicht

Fig. 159. Heliotropische Kammer.

oder nur sehr langsam entgegen. Bei dem Versuch, dessen Resultat durch Fig. 159 veranschaulicht wird, war gar keine heliotropische Krümmung der Keimlinge erfolgt. WIESNER beobachtete dagegen auch im gemischten gelben Licht langsam zu Stande kommende heliotropische Nutationen, eine Angabe, die für die Bedingungen, unter denen er experimentirte, wohl richtig sein wird. Unter dem Einfluss des gemischten blauen Lichtes, das eine Lösung von Kupferoxydammoniak passirt hat, tritt aber eine energische heliotropische Nutation auf.

Bei eingehenden Studien über den Einfluss des Lichtes von verschiedener Brechbarkeit auf das Zustandekommen der heliotropischen Nutationen ist es sehr zu empfehlen, unter Benutzung des objectiven Spectrums zu arbeiten. Ein vor dem Fenster zitterfrei aufgestellter Heliostat wirft ein Bündel paralleler Sonnenstrahlen durch einen schmalen Spalt in ein Dunkelzimmer. Der Spalt wird durch die GRAVESAND'schen Schneiden gebildet. Nachdem das Licht eine Biconvexlinse passirt hat, die in nicht ganz der doppelten Brennweite vom Spalt aufgestellt ist, trifft es auf das Flintglasprisma, das einen brechenden Winkel von 60° besitzt. Da Glas die stark brechbaren Strahlen energisch absorbirt, ist es sehr zweckmässig, den Heliostaten mit einem Silberspiegel zu versehen und mit einer Quarzlinse sowie Quarzprisma zu experimentiren.

Als Untersuchungsobjecte benutzt man z. B. in sehr kleinen Thongefässen im Finstern cultivirte Wickenkeimlinge. Sie werden derartig innerhalb des Spectrums aufgestellt, dass die Flanken der Stengel den einfallenden Strahlen zugewandt sind. Auch *Sinapis*- und *Triticum*keimlinge eignen sich gut zu den Versuchen. Im Verlauf einiger Stunden tritt das Resultat der Versuche klar hervor. Sehen wir von dem Zustandekommen der sog. lateralen Flexion ab, so zeigt sich zumal, dass die Strahlen an der Grenze zwischen Violett und Ultraviolett die grösste heliotropische Kraft entfalten. Recht empfindlichen Objecten gegenüber nimmt die heliotropische Kraft der Strahlen von

Violett bis Grün ab; Gelb ist unwirksam: im Ultraroth liegt ein zweites kleineres Maximum.

Wenn man nach der unter 181 angegebenen Methode *Mucor Mucedo* im Dunkeln auf Brot cultivirt und die heranwachsenden Pflänzchen dann einseitig beleuchtet, so krümmen sie sich dem Licht entgegen. Die einzelligen *Mucor*fruchtträger sind demnach positiv heliotropisch, eine Thatsache, die, wie ich S. 308 meines Lehrbuches der Pflanzenphysiologie specieller auseinandergesetzt habe, von Bedeutung für die Theorie des Heliotropismus erscheint.

Wenn sich heliotropische Nutationen geltend machen, so wächst stets in Folge des Lichtreizes die convex werdende Seite der Pflanzentheile stärker als die concav werdende. Zu heliotropischen Nutationen sind auch nur wachsende Pflanzentheile befähigt, wie ein sehr einfaches Experiment ergibt. Wir cultiviren Bohnenkeimlinge im Dunkeln. Hat das Epicotyl eine Länge von einigen cm erreicht, so bringen wir mit Hülfe eines Pinsels feine Tuschestriche in Entfernungen von je 5 mm auf den Stengeln an und beleuchten unsere Untersuchungsobjecte dann einseitig. Eine heliotropische Krümmung tritt nur in der oberen, noch im Wachsthum begriffenen Region der epicotylen Glieder ein.

Wenn man etiolirte Wickenkeimlinge etwa 12 Stunden lang einseitig beleuchtet und die abgeschnittenen epicotylen Glieder dann in 15-proc. Kochsalzlösung bringt, so wird die heliotropische Nutation durch die Plasmolyse nicht wieder rückgängig gemacht, weil sie durch Wachsthumsvorgänge bereits völlig fixirt worden ist. Beleuchtet man aber Wickenkeimlinge nur so lange einseitig, bis das Epicotyl schwach gekrümmt erscheint, dann vermindert sich die Krümmung durch Plasmolyse etwas, weil wenigstens derjenige Theil der ersteren, welcher auf einer Differenz der Turgorausdehnung der Zellen auf der convexen sowie concaven Seite der Pflanzentheile beruht und nicht bereits durch Wachsthumsprouesse fixirt worden ist, noch aufgehoben werden kann ¹⁾.

179. Weitere Orientirung über den Heliotropismus.

Zur genaueren Constatirung mancher sich bei dem Zustandekommen der heliotropischen Nutationen geltend machenden Erscheinungen stellen wir noch folgende Versuche an. In einem Dunkelmzimmer stellen wir unseren Klinostaten derartig auf, dass die Axe desselben parallel zu den durch die Oeffnung im Fensterladen einfallenden Lichtstrahlen gerichtet ist. Ein Blumentopf, in welchem sich eine Phaseoluspflanze bei Lichtabschluss entwickelt hat, wird nun derartig, wie es S. 380 angegeben ist, auf dem Klinostaten befestigt. Die Lichtstrahlen müssen senkrecht auf der Nutationsebene des Epicotyls stehen, und dies letztere muss sich noch in lebhaftem Wachsthum befinden und wird durch Tuschemarken, die man auf seiner dem Licht zugekehrten und auf der vom Licht abgewandten Flanke in Entfernungen von 5 zu 5 mm anbringt, in einzelne Zonen eingetheilt.

1) Zahlreiche Literaturangaben über den Heliotropismus findet man S. 303 und 304 meines Lehrbuches der Pflanzenphysiologie, Breslau 1883. Zahlreiche werthvolle Details findet man zumal bei SACHS und WIESNER (Denkschr. d. Akad. d. Wiss. zu Wien, Bd. 39 und 43).

Setzt man den Klinostaten in Bewegung, so können die heliotropischen Bewegungen in reiner Form beobachtet werden. Geotropische Nutationen sind ausgeschlossen, und ebenso stört die spontane Nutation des Epicotyls nicht. Die heliotropische Nutation macht sich nun freilich nicht sofort, aber nach Verlauf einiger Zeit geltend. Ist sie recht ausgiebig geworden, so unterbrechen wir den Versuch und bestimmen mit dem Cyclometer (Carton mit concentrischen Kreisen, deren Radien 1, 1,5, 2 etc. cm betragen) den Radius der erzielten Krümmung sowie die Zuwachse unseres Untersuchungsobjectes. Wir finden, dass auf der convex gewordenen Seite des Epicotyls ein viel grösserer Zuwachs erfolgt ist als auf der concav gewordenen. Nur die noch nicht ausgewachsenen Theile des Epicotyls sind heliotropisch krümmungsfähig. Bei hinreichender Dauer des Versuchs haben sich auch nach einander sämtliche Zonen des Epicotyls an der Nutation theilgehabt, die noch im Stadium der Streckung begriffen waren¹⁾.

Unter 169 ist betont worden, dass Algenschwärmer sich bei intensivem Licht von diesem abwenden, während sie schwächeres Licht aufsuchen. Daher darf man von vornherein vermuthen, dass auch die Organe höherer Pflanzen auf ein Licht ganz bestimmter Intensität gestimmt sind. Freilich bedarf es noch sehr eingehender Studien zur sicheren Begründung dieser Vermuthung; indessen die Resultate gewisser Experimente OLTMANNS²⁾ sprechen sicher für die Richtigkeit derselben. Werden junge *Lepidium*keimlinge, die in einem Blumentopf zur Entwicklung gelangten, in einem innen geschwärzten Kasten mit etwa 3 cm breitem Spalt dicht vor diesem aufgestellt und directem Sonnenlicht ausgesetzt (durch Drehen des Kastens sorgt man dafür, dass er ungefähr immer die nämliche Stellung zur Sonne behält), dann bleiben die Hypocotyle gerade, während sie sich im minder intensiven Licht stark positiv heliotropisch verhalten. Ferner kann man derartig experimentiren, dass man die mittelst eines Heliostaten in ein Dunkelzimmer gelenkten Sonnenstrahlen eine dicke Schicht concentrirter Alaunlösung und dann eine grosse biconvexe Linse passiren lässt. Hinter dieser wird ein Topf mit *Lepidium*keimlingen aufgestellt. Die Keimlinge sind in einer Reihe gepflanzt, und diese wird zu den vom Brennpunkt der Linse divergirenden Strahlen unter einen Winkel von etwa 45° gestellt. Eine Keimpflanze steht somit nahe am Brennpunkt der Linse; die übrigen in wachsender Entfernung, ohne sich gegenseitig zu beschatten. Bei genügend starker Beleuchtung findet man, dass die Stengel derjenigen *Lepidium*keimlinge, welche dem Brennpunkt der Linse am nächsten sind, eine negativ heliotropische Krümmung ausführen. Keimling 3 oder 4 der Reihe bleibt völlig gerade, 5, 6, 7 führen positiv heliotropische Nutationen aus.

Wenn man über die Mitte eines Algenschwärmer enthaltenden Gefässes ein schmales Brettchen derartig legt, dass dasselbe senkrecht zum Fenster, also nahezu parallel zu den einfallenden Lichtstrahlen gerichtet ist, dann sammeln sich die Schwärmer nicht am Vorderrande der Schale, sondern zu beiden Seiten des Brettchens in dessen Halbschatten an. FAMINTZIN und zumal OLTMANNS (Flora 1892, S. 203) schliessen daraus, dass nicht die Richtung der Lichtstrahlen, sondern die Lichtintensität oder der Lichtabfall maassgebend für die phototactische Bewegung der Schwärmer sei. Aehnliches nimmt OLTMANNS auch für die heliotropischen Nutationen an, und einige Versuche, die ich anstellte, sprechen vielleicht

1) Vgl. MÜLLER-Thurgau, Flora, 1876.

2) Vgl. OLTMANNS, Flora, 1892, S. 223.

auch zu Gunsten dieser Anschauung. Die wichtige hier berührte Frage bedarf aber sehr eingehender weiterer Prüfung, und bei den folgenden Versuchen scheint mir, ebenso wie bei den erwähnten, die Frage nach der Mitwirkung reflectirten Lichtes einer besonders genauen Berücksichtigung zu verdienen, um Fehler in den Schlussfolgerungen auszuschliessen. Zu meinen Experimenten diente ein innen geschwärzter Kasten, dessen eine Wand mit einem Spalt von geringer Breite, aber erheblicher Länge versehen war. Hinter diesem Spalt fand im Innern des Kastens eine keilförmige, mit Wasser, in welchem chinesische Tusche vertheilt war, angefüllte Glasflasche Platz. Die Weite des mit der Flüssigkeit angefüllten, ca. 18 cm langen keilförmigen Raumes der Flasche betrug an dem einen Ende desselben nur etwa 3 mm, am anderen aber über 25 mm. Wurden Töpfe mit *Lepidium*keimlingen in den Kasten gebracht, und dieser im Freien derartig aufgestellt, dass der Glaskeil horizontal lag und die Lichtstrahlen von oben her in den Apparat eintraten, dann krümmten sich alle Keimlinge nach dem Orte stärkster Lichtintensität im Kasten, also rechtwinklig zu den einfallenden Strahlen nach demjenigen Kastenende hin, an welchem sich das Keilende von geringster Weite befand. Wurde der Kasten im Zimmer so aufgestellt, dass der Glaskeil parallel zur Fensterscheibe, also nahezu senkrecht zu den einfallenden Lichtstrahlen lag, und stand der mit *Lepidium*keimlingen besetzte Topf etwa in der Mitte hinter dem Glaskeil, dann krümmten sich die Hypocotyle freilich nicht genau rechtwinklig zu den einfallenden Lichtstrahlen, sie wandten sich denselben aber auch nicht gerade entgegen, sondern krümmten sich schief dem Orte stärkster Lichtintensität im Kasten zu.

Auch die folgenden Experimente über heliotropische Nutationen beanspruchen grosses Interesse¹⁾.

Wir legen Körner von *Avena sativa* in Schalen, die wenig Wasser enthalten. Wenn die Keimung eben begonnen hat, suchen wir recht gleichmässig entwickelte Keimlinge aus, um sie in gute Gartenerde, mit der zahlreiche kleine Blumentöpfe angefüllt sind, einzusetzen. Wir benutzen zu den eigentlichen Experimenten nur solche Töpfe, in denen nach einiger Zeit 5—10 Haferkeimlinge mit ca. 2 cm langer Plumula bei Lichtabschluss zu sehr gleichförmiger Entwicklung gelangt sind. Die Töpfe stellen wir in geeignete heliotropische Kammern, deren vordere Wand mit einem einige cm breiten, horizontalen Spalt versehen ist. In Folge ihrer starken Circumnutation sind die im Dunkeln erwachsenen Pflänzchen oft nicht völlig gerade gerichtet. Man stellt die Töpfe in der heliotropischen Kammer daher derartig auf, dass keiner der Keimlinge dem Licht, welches vom Fenster her auf sie einwirkt, zugeneigt ist. Es lässt sich constatiren, dass die heliotropische Nutation an der äussersten Spitze des scheidenförmigen Blattes der Plumula beginnt und allmählich weiter nach unten fortschreitet, während der vorgeneigte Obertheil sich in immer längerer Ausdehnung gerade streckt. Zuletzt finden wir nur noch an der Basis des Scheidenblattes eine meist sehr scharfe Krümmung, und der Obertheil bildet mit der Basis des Blattes einen Winkel von 60—90°²⁾ 3). Dieser

1) Vgl. ROTHERT, Ber. d. Deutschen botan. Gesellsch., Bd. 10, und COHN's Beiträge zur Biologie d. Pflanzen, B. 7. Diese letztere Arbeit habe ich leider nicht mehr eingehend berücksichtigen können.

2) Die Grösse der erfolgten Krümmung kann durch Messung festgestellt werden. Die Messungen, bei denen man die Neigung des gekrümmten Theiles der Pflanzen zur Verticalen ermittelt, führt man mit Cartonquadranten aus, auf denen von 5 zu 5° Radien aufgetragen sind. Es ist stets das Mittel aus mehreren Messungen zu nehmen.

3) Dass bei dem Abschluss heliotropischer Nutationen in den meisten Fällen

Erfolg wird nach Verlauf von etwa 5 oder 8 Stunden erzielt. Wenn wir nun gleichzeitig mit den erwähnten Objecten Avenakeimlinge dem Licht exponiren, nachdem wir eine etwa 3 mm lange Zone der Spitze ihrer Plumula durch Aufsetzen kleiner Stanniolkappen (hergestellt durch Umwickeln eines Drahtes von entsprechender Dicke mit Stanniolstreifen und sorgfältiges Zukneifen des einen Endes des entstandenen Röhrchens) verdunkelt haben, dann beginnt die Nutation an der Spitze des nicht verdunkelten Theiles des Scheidenblattes, sie schreitet langsamer als bei voller Beleuchtung der Keimlinge nach unten fort und bleibt auch verhältnissmässig flach 10–40°. Die tiefer liegenden Theile des Scheidenblattes sind freilich, wie die Versuche lehren, an und für sich heliotropisch empfindlich, aber ihre Empfindlichkeit ist im Vergleich zu derjenigen der Spitze gering. Wenn die Spitze vom Licht getroffen wird und energisch heliotropisch reagirt, so pflanzt sich der Reiz auf den Untertheil des Scheidenblattes fort und löst eine weit stärkere Nutation aus, als sie in Folge seiner eigenen Empfindlichkeit zu Stande kommen könnte. Auch DARWIN (vergl. Bewegungsvermögen der Pflanzen), hat schon auf diese interessanten Verhältnisse hingewiesen.

Die Thatsache der Reizfortpflanzung von der Spitze zur Basis der Scheidenblätter kann ferner in folgender Weise dargethan werden. Man cultivirt Haferkeimlinge in nicht völlig mit Erde angefüllten Töpfen. Hat die Plumula eine Länge von etwa 1,5 cm erreicht, so bedeckt man die Keimlinge soweit mit feingesiebter, trockener Erde, dass sie nur noch mit ihrer 3 mm langen Spitze aus derselben hervorragen. Die Erde ist schon in 2–3 mm dicker Schicht völlig undurchlässig für Licht, trotzdem krümmt sich der basale Theil der Plumula in Folge des ihm von der Spitze zugeführten heliotropischen Reizes, wenn die Keimlinge einseitig beleuchtet werden. Im zuletzt angeführten Experiment ist die heliotropische Krümmung des verdunkelten Theiles der Untersuchungsobjecte allein durch den zugeleiteten Reiz verursacht; unter normalen Umständen kommt die Nutation der basalen Blattscheidenheile zu Stande, indem sich diese Reizfortpflanzung und die directe heliotropische Perceptionsfähigkeit des Organs summiren. Diese Resultate des Versuchs sind gewiss für die Beurtheilung der heliotropischen Phänomene überhaupt von grosser Wichtigkeit. Nicht minder verdienen die Ergebnisse der folgenden Experimente Beachtung.

Die Plumula der Keimlinge von Avena von etwa 1,5 cm Länge wird durch Tuschemarken in Zonen von 2 mm Länge eingetheilt. Die in bekannter Weise angestellten Messungen über das erfolgende Wachstum ergeben dann, dass die Spitze der Plumula nur sehr langsam wächst; nach unten zu steigt die Wachstumsgeschwindigkeit, erreicht etwa in der 4. oder 5. Zone ihr Maximum, um dann wieder abzunehmen. Daraus erhellt, was gewiss interessant ist, dass die Zone stärkster heliotropischer Perceptionsfähigkeit (die Spitze) keineswegs zugleich auch diejenige ist, welche am lebhaftesten wächst.

Wenn man völlig gerade, im Dunkeln zur Ausbildung gelangte Keim-

gerade an der Basis der wachsthumsfähigen Region, also keineswegs in der Zone des jeweiligen stärksten Wachstums der Organe, die stärkste Krümmung bestehen bleibt, stimmt ganz mit den Angaben von SACHS (Flora, 1873, und Vorlesungen, S. 724) über geotropische Nutationen von Sprossen überein. Vgl. auch MÜLLER-Thurgau, Flora, 1876, S. 90.

linge von *Avena* köpft, indem man eine 3 oder 4 mm lange Zone ihrer Spitze durch einen scharfen Querschnitt abtrennt und die decapitirten Untersuchungsobjecte nun einseitig beleuchtet, so ist ihr Wachsthum ein nur langsames, und heliotropische Nutationen werden gar nicht ausgeführt. Nach Verlauf einiger Stunden wird die Wachsthumsgeschwindigkeit des Scheidenblattes aber wieder lebhafter, und die heliotropische Empfindlichkeit kehrt auch zurück¹⁾. Viele der hier erwähnten Versuche sind auch deshalb von grosser Bedeutung, weil sie lehren, dass die Reactionsfähigkeit und Perceptionsfähigkeit der Organe (Reizbarkeit und Empfindlichkeit derselben) als zwei verschiedene Dinge betrachtet werden müssen.

180. Der Hydrotropismus der Wurzeln.

Wenn die Feuchtigkeitsverhältnisse in denjenigen Medien, in welchen sich Wurzeln entwickeln, nicht gleichmässig vertheilt sind, so führen diese Pflanzentheile hydrotropische Krümmungen aus, und zwar lässt sich nach dem Vorgange von SACHS²⁾ leicht feststellen, dass die Wurzeln positiv hydrotropisch sind. Der zur Demonstration der hier in Betracht kommenden Erscheinungen erforderliche Apparat ist in Fig. 160 im Durchschnitt dargestellt.

Ein Reifen von starkem Zinkblech (*a a*) von etwa 5 cm Höhe und 20 cm Durchmesser wird mit weitmaschigem Tüll derartig überspannt, dass man ein Sieb erhält, dessen poröser Boden von dem Tüll gebildet wird. Man füllt das Sieb mit feuchten Sägespänen an und legt in diese angequollene Samen aus. Ich experimentirte mit den Samen von *Phaseolus*; man kann aber auch ebenso gut andere Samen (*Pisum*, *Zea* etc.) benutzen. Der Apparat wird an drei Bindfäden (*c, c, d*) in einem Schranke oder unter einem grossen Pappkasten schief aufgehängt, so dass der Siebboden etwa unter 45° gegen den Horizont geneigt ist. Die Hauptwurzeln der sich bei völligem Abschluss des Lichtes entwickelnden

Fig. 160. Apparat für Beobachtungen über hydrotropische Wurzelkrümmungen. (Nach SACHS.)

1) Die Decapitirung vernichtet das heliotropische Perceptionsvermögen der Keimlinge zunächst völlig; dieselben krümmen sich daher nicht, trotzdem sie ein freilich langsames Wachsthum unterhalten. Später wird gewissermassen eine „physiologische Spitze“ an den Keimlingen regenerirt. Dieselben sind dann fast so reizbar wie völlig unversehrt gebliebene.

2) Vgl. SACHS, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 209.

Keimpflanzen treten alsbald aus den Tüllmaschen hervor; sie wachsen aber nicht gerade nach abwärts, sondern ihre Spitze legt sich sofort schief an die Unterfläche des Tülls an und wächst nun an dieser dicht angeschmiegt abwärts fort. Die Wurzeln wenden sich, wie es auch unsere Abbildung zeigt, bei ihrem Austritt aus dem Siebboden nach derjenigen Seite hin, wo das Keimbett mit der Verticalen den kleinsten, spitzen Winkel bildet. Die eintretende Krümmung ist Folge einer verschiedenen Feuchtigkeitsvertheilung auf der dem Keimbett zu- und abgekehrten Seite der Wurzeln, indessen erscheint es besonders merkwürdig, dass gerade diejenige Seite der Wurzeln convex wird, also am energischsten wächst, welche dem feuchten Siebboden nicht zugewandt ist. Die erwähnten Krümmungen der Wurzeln unterbleiben vollkommen, wenn man den beschriebenen Apparat horizontal oder auch schief in einer völlig mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre, z. B. unter einer grossen Glasglocke, deren Wände mit Wasser benetzt sind, aufhängt. In diesem Falle wachsen die Hauptwurzeln der Keimpflanzen gerade nach abwärts. Wachsthumskrümmungen in Folge ungleichmässiger Feuchtigkeitsvertheilung können nicht eintreten; die Wurzeln folgen, wenn sie sich im dampfgesättigten Raum bei Ausschluss des Lichtes entwickeln, allein dem richtenden Einfluss der Schwerkraft.

181. Der Hydrotropismus von *Mucor Mucedo*.

Den *Mucor Mucedo* lernten wir bereits unter 36 kennen. Die Sporangienträger der Mucorarten zeichnen sich, wie WORTMANN¹⁾ feststellte, dadurch aus, dass sie negativ hydrotropisch sind. Entwickeln sie sich in der Nähe eines feuchten Körpers, so wenden sie sich daher von diesem ab. Ich habe mich davon überzeugt, dass es leicht gelingt, diese Thatsache in folgender Weise festzustellen.

Etwas Kuh- oder Pferdemist bleibt unter einer Glasglocke einige Tage sich selbst überlassen. Es entwickelt sich eine üppige Vegetation von *Mucor Mucedo*, eben derjenige Pilz, den wir für unser Experiment brauchen. Wir legen einen kleinen, mit Wasser durchfeuchteten Brotwürfel in eine flache Glasschale und bedecken diese mit einer Glasplatte, welche dem Rande der Schale dicht aufliegt und in der Mitte mit einem Loch von einigen Millimetern Durchmesser versehen ist. Vor dem Bedecken der Schale mit der Glasplatte bringen wir mit Hülfe einer ausgeglühten Nadel einige reife Sporangien der Mucorvegetation des Mistes auf das Brod und vertheilen die Sporen auf diesem. Die Sporen keimen alsbald; nach 1 oder 2 Tagen wachsen schon einige Sporangienträger durch das Loch der Glasplatte hervor, und es handelt sich nun darum, das negativ hydrotropische Verhalten dieser Organe zu constatiren. Zu dem Zweck wird an einem Kork ein Streifen dicker Pappe mit Siegellack befestigt. Dann durchtränkt man den Pappstreifen mit Wasser und stellt ihn in unmittelbarer Nähe der aus dem Loche der Glasplatte hervorwachsenden Sporangienträger auf. Die ganze Vorrichtung wird jetzt, wie auch schon früher nach der Aussaat der Mucorsporen, mit einem Papprecipienten bedeckt, um das Licht auszuschliessen. Nach Verlauf von etwa 24 Stunden

1) Vgl. WORTMANN, Botanische Zeitung, 1881.

hat die Länge der Sporangienträger erheblich zugenommen, und es ist leicht wahrzunehmen, dass sie nicht senkrecht emporgewachsen sind. Sie erscheinen vielmehr gekrümmt; ihre convexe Seite ist dem feuchten Pappstreifen zugewandt.

Wenn man keinen durchfeuchteten, sondern einen trockenen Pappstreifen in der Nähe der Sporangienträger aufstellt, so krümmen sich dieselben nicht. Die Nutation ist also nicht, wie VAN TIEGHEM¹⁾ meinte, als eine somatotropische, d. h. als eine durch die Masse der Pappe bedingte, sondern wirklich als eine hydrotropische anzusehen.

182. Der Thermotropismus der Pflanzen.

Es gewährt Interesse, sich davon zu überzeugen, dass wachsende Pflanzentheile Reizbewegungen ausführen, wenn ihre antagonistischen Seiten verschiedener Temperaturwirkung ausgesetzt sind²⁾. Wir führen unsere Experimente in einem grossen, womöglich nach Norden gelegenen Zimmer aus, in welchem möglichst unbedeutende Temperaturschwankungen herrschen. Am einen Ende eines langen Arbeitstisches stellen wir eine vorn berusste, 60—70 cm hohe und breite Eisenblechplatte unter Benutzung eines starken Gestelles derartig auf, dass die Fläche der Platte senkrecht zu den Fensterscheiben gerichtet ist. Die hintere Fläche der Platte kann durch vier derselben genäherte und je nach Bedürfniss verschiebbare Gasflammen erwärmt werden. Die Untersuchungsobjecte (in Töpfen in Sägemehl cultivirte Keimlinge von *Lepidium* und *Zea*) können nun in verschiedenen Entfernungen von der Platte aufgestellt werden. Zur Ausschliessung heliotropischer Nutationen stellt man hinter die ursprünglich völlig geraden Keimlinge einen grossen Planspiegel parallel zum Fenster, durch welches durch Vorhänge gedämpftes Licht einfällt. Vor Aufstellung der Töpfe erwärmt man die Platte und hängt in verschiedenen Entfernungen von derselben Thermometer auf. Zeigen diese bestimmte Temperaturen an, bei denen man experimentiren will, so werden die Keimlinge in ihre unmittelbare Nähe gebracht, und der Versuch beginnt. Versuch mit *Lepidium*. 10 Keimlinge. 3—4 cm hoch. Zimmertemperatur 12° C. Temperatur über der Mitte des Topfes 30—35° C. Nach einigen Stunden starke negativ thermotropische Nutation. Versuch mit *Zea*. 2 Keimlinge 2—3 cm hoch. Zimmertemperatur 12° C. Temperatur über der Mitte des Topfes 30° C. Nach einigen Stunden positiv thermotropische Nutation (WORTMANN).

Das Temperaturoptimum für das Wachstum von *Lepidium* liegt etwa bei 28° C., für *Zea* aber bei 33° C. Das Zustandekommen der Krümmungen kann also nicht aufgefasst werden als Folge einer Wachstumsdifferenz auf den antagonistischen Seiten der Keimlinge, die ihrerseits direct durch die auf diesen verschiedenen Seiten herrschenden Temperaturen bedingt ist. Läge die Sache so, dann hätten sich die *Lepidium*keimlinge unter den bezeichneten Bedingungen z. B. gerade der Wärmequelle zukrümmen müssen, denn die von der Platte abgewandte Seite der Untersuchungsobjecte war einer für das Wachstum

1) Vgl. VAN TIEGHEM, Extrait du Bulletin de la Société botanique de France, T. XXIII.

2) Vgl. WORTMANN, Botan. Zeitung, 1883 und 1885.

an sich günstigeren Temperatur als die der Platte zugewandte Seite ausgesetzt. Die beobachteten Krümmungen sind vielmehr als Reizwirkungen aufzufassen, welche die Wärmestrahlen ausgelöst haben. Es bedarf übrigens noch sehr eingehender Studien zur näheren Erforschung des Thermotropismus der Pflanzen¹⁾.

183. Äerotropismus und Chemotropismus der Pollen- und Pilzschläuche.

Die Keimung der Pollenkörner, von der im Folgenden oft die Rede sein wird, erfolgt am besten in Zuckerlösungen (Rohrzucker) von bestimmter Concentration. Diese Concentrationen sind zunächst für einige Pollensorten in nachstehender Uebersicht angegeben:

<i>Allium Victoriale</i>	3 Proc.
<i>Anthyllis vulneraria</i>	15 "
<i>Berberis vulgaris</i>	20 "
<i>Colchicum autumnale</i>	40 "
<i>Digitalis ambigua</i>	10 "
<i>Fritillaria imperialis</i>	10 "
<i>Narcissus poeticus</i>	10 "
<i>Vincetoxicum officinale</i>	15 "

Wir stellen nun Zuckerlösungen unter Zusatz von 1—2 Proc. Gelatine her. Diese Lösung erstarrt bei 18° C. zu einer zitternden Gallerte. Ein Tropfen der Lösung gelangt auf einen Objectträger und wird mit Pollenkörnern versetzt, die man schnell mittelst einer Nadel recht gleichmässig in Tropfen vertheilt. Nun legt man ein Deckglas auf, wobei darauf zu achten ist, dass keine Flüssigkeit über den Rand des Deckglases heraustritt. Auch die Bildung von Luftblasen ist thunlichst zu vermeiden. Die Objectträgerculturen gelangen bei 18° C. unter eine durch Wasser abgesperrte Glasglocke. Experimentiren wir z. B. mit den Pollenkörnern von *Narcissus Tazetta* (7-proc. Rohrzuckerlösung), so sehen wir schon nach 6 Stunden viele Körner gekeimt. Aber nur die Pollenkörner in der Nähe des Deckglasrandes haben Schläuche entwickelt; die übrigen sind in Folge von Sauerstoffmangel überhaupt nicht gekeimt. Die Schläuche wachsen fast sämmtlich der Mitte des Tropfens zu; sie lassen ein ausgeprägt negativ äerotropisches Verhalten erkennen. Uebrigens ist zu bemerken, dass es manche Pollenarten giebt, deren Schläuche in keiner Weise äerotropisch reizbar sind (*Orobis vernus* etc.)

Ein vorzügliches Object zur Feststellung des negativ äerotropen Verhaltens wachsender Pollenschläuche sind nach meinen Erfahrungen diejenigen von *Lathyrus*arten. Die Körner werden in Zuckergelatine, die 15 Proc. Rohrzucker enthält, ausgesät.

Viele Pollenschläuche (*Narcissus Tazetta*, *N. poeticus*, *Fritillaria imperialis*, *Vincetoxicum officinale* etc.) sind auch recht energisch chemotropisch reizbar.

1) Die Wurzeln sollen nach JÖNSSON, Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 1, S. 512, auch rheotropische Eigenschaften besitzen. Meine bezüglichen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Ueber den Äerotropismus der Wurzeln (vgl. MOLISCH, Berichte d. Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 2, S. 160) und den Galvanotropismus derselben (vgl. ELFVING, Botan. Zeitung, 1882) stellte ich bis jetzt keine Experimente an.

Wir vertheilen die Pollenkörner im Zuckergelatinetropfen und legen in die Mitte desselben ein Stückchen frisch abgeschnittenen Narben- oder Griffelgewebes oder Samenknospen der betreffenden Pflanzen. Im feuchten Raum keimen die Körner, und die in der Nähe der Narbenstücke etc. zur Entwicklung kommenden Schläuche wenden sich, da sie ein positiv chemotropisches Verhalten zeigen, diesen Stücken zu. Tödtet man die Narbenstücke durch Eintauchen in heisses Wasser, bevor man sie auf den Zuckergelatinetropfen legt, so verhalten sich die Pollenschläuche ebenso, wie es bereits angegeben wurde. Hierdurch ist festgestellt, dass die bezeichnete Wachstumsrichtung der Schläuche im vorliegenden Falle nicht Folge ihrer aëotropischen Reizbarkeit sein kann, denn die todtten Gewebemassen produciren, was die lebendigen ja thun, keine Kohlensäure, die von Einfluss auf die Vertheilung der Sauerstoffspannung im Präparat sein könnte.

In vielen Fällen ist es bei Untersuchung des Chemotropismus der Pollenschläuche zweckmässig, dieselben in einem Gelatinetropfen zu vertheilen, dem nur wenig Zucker (z. B. 0,2–0,4 Proc.) beigemengt wurde, die Narbenstücke etc. auf die Gelatine zu legen und das Präparat in einen feuchten Raum zu bringen.

Als Reizmittel für die Schläuche wirkt in erster Linie Rohrzucker, der in dem Gewebe des Gynaeceums vorhanden ist und von den Zellen desselben ausgeschieden wird.

Wir injiciren Blätter einer *Tradescantia* (z. B. *T. discolor*) unter der Luftpumpe mit Rohrzuckerlösung von bestimmter Concentration. Die durchscheinend gewordenen Blätter spült man mit Wasser rasch ab und trocknet sie äusserlich mit Fliesspapier. Nun vertheilt man Pollen auf der spaltöffnungsreichen Unterseite der Blätter und bringt sie in einen wassergasreichen Raum. Nach kürzerer oder längerer Zeit stellen wir fest, dass die Pollenschläuche bei ihrem Wachsthum die Neigung zeigen, sich den Spaltöffnungen zuzuwenden, um in diese einzudringen. Hat man das Blatt nur mit Wasser injicirt, so wachsen die Schläuche indifferent über die Fläche dahin. Der Rohrzucker ist also ein Körper, der die Pollenschläuche zu chemotropischen Bewegungen veranlasst.

Auch die Keimschläuche der Pilze sind chemotropisch reizbar. Werden *Tradescantiablätter* mit 2-proc. Rohrzucker- oder Fleischextractlösung injicirt, um auf die Unterseite der Blätter dann *Mucor*-sporen im dampfgesättigten Raum zur Keimung zu bringen, so findet man, dass die Schläuche sich auch hier wieder den Spaltöffnungen zuwenden und in dieselben eindringen. Hat die Rohrzuckerlösung nur 0,1 Proc. Concentration, so reagiren die Schläuche nur noch sehr schwach positiv chemotropisch; dasselbe ist bei hohen Concentrationsgraden der Zuckerlösung (z. B. bei 20 Proc.) der Fall ¹⁾.

184. Die durch den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse und durch Temperaturschwankungen inducirten Bewegungen der Laubblätter und Blüthentheile. (Nytitropische Bewegungen.)

Es existiren zahlreiche Laub- und Blumenblätter, welche, wie die experimentellen Untersuchungen mehrerer Physiologen ergeben haben,

¹⁾ Vgl. MOLISCH, Sitzungsber. d. Akadem. d. Wiss. zu Wien, Bd. 102, Abthl. 1. Juli 1893; MIYOSHI, Botan. Zeitung, 1895, und Flora, 1894.

nur in geringem Grade durch Wachsthumsbewegungen auf Temperaturschwankungen, dagegen in ausgezeichneter Weise auf den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse reagieren. Wir wollen uns zunächst bemühen, einige Erscheinungen, um die es sich hier handelt, genauer festzustellen.

Wir beobachteten im Freien wachsende Exemplare von *Impatiens parviflora*, *Chenopodium bonus Henricus* und *Mirabilis jalapa*. Die für uns Interesse besitzenden Bewegungserscheinungen treten an den jüngeren, noch nicht ausgewachsenen Laubblättern deutlich hervor. Am Tage sind diese Blätter mehr oder minder horizontal gestellt; nachts nehmen sie dagegen eine andere Lage ein. Bei *Chenopodium* und zumal bei *Mirabilis* heben sich die Blätter am Abend, während sie sich bei *Impatiens* zu dieser Zeit senken und daher mit Eintritt der Dunkelheit aus einer horizontalen in eine verticale Lage übergehen. Am folgenden Tage kehren die Blätter wieder in ihre Lichtstellung zurück.

Beobachtet man in Blumentöpfen cultivirte Keimlinge von *Raphanus sativus*, so zeigt sich, dass die Cotyledonen derselben am Tage ausgebreitet, nachts aber mehr oder minder zusammengeschlossen erscheinen. Junge Blätter von *Tropaeolum majus*, welche man von oben beleuchtet, nehmen am Tage eine solche Stellung ein, dass sie rechtwinkelig von den einfallenden Lichtstrahlen getroffen werden. Nachts stellen sie sich vertical. Dies tritt nach den Resultaten meiner Versuche mit Topfpflanzen aber nur bei relativ hoher Temperatur in vollem Maasse ein.

Ueber die durch Beleuchtungswechsel inducirten Wachsthumsbewegungen der Blüten stellte ich, meistens unter Benutzung im Freien wachsender Pflanzen, folgende Beobachtungen an, welche man wiederholen möge.

Ich constatirte, dass sich die Blütenköpfe der meisten Exemplare von *Taraxacum officinale* an sonnigen Tagen zu Anfang Mai zwischen 7—8 Uhr morgens öffnen, um sich nachmittags zwischen 4—5 Uhr wieder zu schliessen. Die Blüten von *Tradescantia* bleiben tagsüber geöffnet, wenn der Himmel bedeckt ist; bei wolkenlosem Himmel schliessen sie sich aber morgens um 10 Uhr. Die Blütenköpfe von *Tragopogon pratensis* sind morgens offen. Im Juni schliessen sie sich aber bei Sonnenschein um 9 Uhr, bei bedecktem Himmel etwa um 11 Uhr. Abends schliessen sich die Blüten von *Adonis vernalis* sowie die Blütenköpfe von *Bellis perennis* und *Leontodon hastilis* (vgl. Fig. 161 und 162, in denen Blüthenschäfte von *Leontodon* mit einem geschlossenen und einem offenen Blütenkopfe dargestellt sind), um sich am nächsten Morgen wieder zu öffnen. Ich fand, dass sich die Blüten von *Adonis* Ende April um 3 Uhr nachmittags schliessen, während das Schliessen der Blütenköpfe von *Bellis* exemplaren, die dicht daneben standen, erst $1\frac{1}{2}$ Stunden später erfolgte. Die Blüten von *Oenothera biennis* blühen abends auf und morgens schliessen sie sich. Ich brachte abgeschnittene und in Wasser gestellte Blüthenschäfte von *Leontodon hastilis* am Tage ins Dunkle. Die Blütenköpfe schlossen sich abends, öffneten sich aber wieder am folgenden Tage, trotzdem die Untersuchungsobjecte constant verdunkelt blieben, und zeigten am Abend abermals, freilich keine sehr ausgiebigen, Schliessungsbewegungen. Am nächsten Tage wurden die Blüthenschäfte aufs Neue dem Tageslicht ausgesetzt. Am Abend dieses Tages

schlossen sich die Blüthenköpfe in durchaus normaler Weise. Die Resultate dieser Experimente lehren, dass die Einzelblüthen der Blüthenköpfe von *Leontodon hastilis* — und ihnen analog werden sich auch manche andere Blüthen verhalten — wenn sie constanter Dunkelheit ausgesetzt werden, Nachwirkungsbewegungen zeigen, welche ein Oeffnen der Köpfe zur Tageszeit und ein Schliessen derselben zur Nachtzeit herbeiführen. Freilich dauern

diese Nachwirkungsbewegungen nicht lange fort. Die Blüthen werden nach einiger Zeit bewegungslos (dunkelstarr), können aber wieder durch erneute Beleuchtung in den phototonischen Zustand zurück versetzt werden.

Nach dem Gesagten ist nun klar, dass die unter normalen Verhältnissen, d. h. bei Wechsel von Tag und Nacht, stattfindenden periodischen Bewegungen der Laubblätter und Blüthen nicht allein unmittelbare Folge des Beleuchtungswechsels sind. Vielmehr combiniren sich die durch diesen letzteren erzielten

paratonischen Wirkungen bei dem Zustandekommen der Tagesperiode mit Nachwirkungsbewegungen, die freilich ihren letzten Grund auch nur in dem

Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse haben. Dieser Umstand macht die Thatsache auch verständlich, von deren Richtigkeit ich mich überzeugte, dass sich z. B. Blüthenköpfe von *Leontodon hastilis*, die am Vormittag ins Dunkle gestellt werden, abends nur einige Zeit früher als solche schliessen, die am Tage beleuchtet gewesen sind. Die paratonische Wirkung der Verdunkelung ist im Resultat des Experimentes freilich zu erkennen, aber die Blüthenköpfe schliessen sich in Folge des Vorhandenseins der Nachwirkungen erst dann, wenn die Verfinsterung längere Zeit gedauert hat. In anderen Fällen können übrigens die paratonischen Wirkungen viel ansehnlicher werden.

Die durch den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse inducirten Bewegungen der Laub- sowie Blumenblätter werden, wie PFEFFER¹⁾ mit aller Sicherheit nachwies, durch Wachsthumprocesse herbei-

Fig. 161.

Fig. 162

Fig. 161. Blüthenschaf von *Leontodon hastilis* mit geschlossenem Blütenstand.

Fig. 162. Blüthenschaf von *Leontodon hastilis* mit geöffnetem Blütenstand.

1) Vgl. PFEFFER, Pflanzenphysiologische Untersuchungen, 1873.

geführt. Der Beleuchtungswechsel wirkt gleichsinnig auf das Wachstum der die Bewegungen vermittelnden basalen Partien der Blattgebilde ein, aber die antagonistischen Gewebecomplexe der Organe werden ungleich schnell afficirt, und dadurch kommen die hier behandelten nyctitropischen Bewegungen zu Stande. Die biologische Bedeutung der nächtlichen Verticalstellung vieler Laubblätter ist offenbar darin zu suchen, dass durch dieselbe einer zu starken Wärmeausstrahlung, die leicht von nachtheiligen Folgen für die Pflanzen sein könnte, vorgebeugt wird, während das Oeffnen und Schliessen der Blüthen zu den Bestäubungsverhältnissen in Beziehung steht.

In ähnlicher Weise wie durch den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse werden an verschiedenen Pflanzentheilen lebhaft Bewegungen durch Temperaturschwankungen hervorgerufen. Wir haben es hier zumal mit Blüthen zu thun, und als ausgezeichnete Untersuchungsobjecte sind blühende Exemplare von *Tulipa gesneriana*, vor allem aber solche von *Crocus vernus* (weiss blühende Varietät) zu nennen. Ich brachte in Blumentöpfen cultivirte Exemplare dieser letzteren Pflanze aus einem Zimmer, in welchem eine Temperatur von 19°C . herrschte, in ein solches von 5°C . Die zunächst geöffneten Blüthen schlossen sich alsbald. Wurden *Crocus*pflanzen mit geschlossenen Blüthen aus einem Zimmer, in welchem eine Temperatur von 5°C . herrschte, in ein solches von 19°C . gebracht, so öffneten sich die Blüthen schnell. Die Schliessungsbewegungen der Blumenblätter bei der Abkühlung einer- und die Oeffnungsbewegungen bei der Erwärmung andererseits gingen in meinen Versuchen so lebhaft vor sich, dass der Beginn derselben, wenn der Temperaturwechsel erfolgt war, bereits nach Verlauf einiger Minuten mit dem unbewaffneten Auge constatirt werden konnte. *Crocus*blüthen reagiren übrigens auch schon auf sehr geringe Temperaturschwankungen. Die durch Temperaturschwankungen inducirten Bewegungen machen sich sowohl bei Zutritt des Lichtes als auch in constanter Finsterniss geltend.

Handelt es sich darum, festzustellen, dass die hier besprochenen, durch den Wechsel der Beleuchtungs- und Temperaturverhältnisse inducirten Bewegungen Folge von Wachstumsvorgängen sind, so kann dies nur durch die Ausführung feinerer Messungen geschehen. Wir wählen *Crocus* als Untersuchungsobject. Hier liegt die Zone, in welcher in erster Linie die Bewegung der Perigonblätter erfolgt, dicht über der Perigonröhre im unteren Fünftel der Perigonzipfel. Wir schneiden die inneren 3 Perigonzipfel fort und bringen auf Aussen- sowie Innenseite der äusseren Zipfel in der Mitte der Zone stärksten Bewegungsvermögens in Entfernungen von etwa 3 mm feine Tuschepunkte an. Leicht kenntliche Spitzen oder Ecken dieser Punkte dienen bei den Messungen mit Hülfe des unter 153 erwähnten horizontal gelegten Mikroskops als Marken. Wenn z. B. auf die Perigonzipfel der geschlossenen Blüthen Punkte aufgetragen sind und wir bestimmen die Entfernung der Marken abermals, nachdem die Untersuchungsobjecte durch höhere Temperatur zu Oeffnungsbewegungen veranlasst wurden, dann finden wir diese Entfernung auf der Aussenseite der Zipfel fast unverändert, auf der Innenseite aber merklich gewachsen, vielleicht um 0,08 mm bei 3 mm anfänglicher Entfernung. Diese Verlängerung auf der convex gewordenen Seite der Perigonzipfel ist eine bleibende, also eine durch Wachstumsvorgänge fixirte. Bei Schliessungsbewegungen der Blüthen verlängert sich die convex werdende Aussenseite der Zipfel viel ansehnlicher als die antagonistische Seite.

185. Die Darwin'sche Krümmung etc.

Wir bringen Samen von *Vicia Faba* in Sägespänen zur Keimung und lassen die Untersuchungsobjecte so lange in dem Keimbett liegen, bis die Wurzeln die Länge von einigen cm erreicht haben. Es kommt nun darauf an, die Wurzelspitzen der Keimlinge einseitig zu verletzen, und dies geschieht nach meinen Erfahrungen in bequemster Weise dadurch, dass wir eine Seite der Wurzeln unter Benutzung kleiner Stückchen Höllensteins betupfen. Es ist darauf zu achten, dass nur eine kurze, etwa 1,5 mm lange Strecke der Wurzelspitze mit dem Höllenstein in Berührung gelangt. Nach demjenigen, was unter 157 gesagt worden ist, erscheint es nicht gleichgültig, welche Wurzelseite den Reiz empfängt, und es ist am meisten zu empfehlen, weder die vordere, noch die hintere Wurzelseite, sondern eine der Flanken der Wurzel zu reizen. Die Untersuchungsobjecte werden nun in der Weise, wie es unter 154 angegeben worden ist, in Glaszylindern befestigt und sich im Dunkeln selbst überlassen. Nach 12—24 Stunden findet man, dass diejenige Wurzelflanke, welche mit Höllenstein betupft worden war, convex gekrümmt ist. Auf der gereizten Seite ist das Wachsthum in der wachsthumsfähigen Region der Wurzel beträchtlich lebhafter als auf der antagonistischen Seite, so dass eine einseitige Verletzung der Wurzelspitze eine eigenthümliche Nutationserscheinung zur Folge hat, die man als DARWIN'sche Krümmung bezeichnet. Wird die Wurzelspitze nicht durch Höllenstein, sondern auf andere Weise verletzt, so treten ebenfalls Nutationen hervor; es ist aber von biologischer Bedeutung, dass sich die Wurzeln in Folge derselben stets von den als Reizursache wirkenden, die Verletzung bedingenden Körpern wegwenden ¹⁾.

In einem Gegensatz hierzu stehen Nutationen der Wurzeln, die zu Stande kommen, wenn nicht die Wurzelspitze, sondern die in lebhaftem Wachsthum begriffene Wurzelregion gereizt wird. Die Wurzeln wenden sich dann, ähnlich wie die Ranken, den als Reizursache wirkenden Körpern zu. Einige Erbsenkeimlinge werden auf Nadeln aufgespiesst und unter einer Glasglocke, die durch Wasser abgesperrt ist, derartig aufgestellt, dass ihre etwa 2 cm langen Wurzeln horizontal gerichtet sind. Neben jeder Keimpflanze bringen wir noch eine dünne Nadel an, welche die Wurzel in ihrer am lebhaftesten wachsenden Region (also etwa 3 mm entfernt von der Spitze) berührt. Der Contact wirkt, ebenso wie bei den Ranken, als Reiz, und indem die nicht berührte Wurzelseite in Folge lebhafteren Wachstums convex wird, krümmt sich die Wurzel im Laufe einiger Zeit der Nadel zu.

Eigenthümliche Reizwirkungen an Pflanzentheilen ruft, wie hier kurz erwähnt werden mag, der Stich von Insekten hervor. Die zahllosen, so sehr verschiedenartigen Gallen, welchen man auf Blättern begegnet, entstehen z. B. auf diese Weise, und es ist daher nicht ohne physiologisches Interesse, eine Galle genauer zu untersuchen.

Auf den Blättern zahlreicher Weidenarten gewahrt man im Laufe des Sommers oft einer kleinen Bohne ähnlich sehende, fleischige, auf beiden Blattseiten vorragende Gallen, die durch den Stich von Blattwespen (*Nematus Vallisnerii*) entstehen. Die Wespen legen ihre Eier in das Gewebe der ganz jungen Blätter, und die aus dem Ei auskriechende

1) Vgl. DARWIN, Das Bewegungsvermögen der Pflanzen, 1881, S. 109, und WIESNER, Bewegungsvermögen der Pflanzen, S. 139.

Raupe entwickelt sich in der eine relativ beträchtliche Grösse erlangenden Galle. Der durch den Stich des Insekts gegebene Reiz ruft die Hypertrophie des Blattgewebes hervor, die sich uns in der Gallenbildung darstellt. Die mikroskopische Untersuchung zarter Querschnitte lehrt, dass die Nematugalle der Hauptsache nach aus kleinzelligem Gewebe, dessen Elemente nahezu isodiametrisch sind, besteht. Diesem Gewebe sind aber an verschiedenen Stellen in radialer Richtung gestreckte Zellen eingelagert. Bemerkte sei noch, dass das Gewebe in der Mitte der Galle kleinzelliger als in den peripherischen Theilen derselben ist.

III. Das Winden der Ranken und Schlingpflanzen.

186. Allgemeines über das Winden der Schlingpflanzen.

Wenn man einen um eine Stütze gewundenen Hopfenstengel betrachtet, so findet man, dass die Windungen desselben stets von rechts unten nach links oben verlaufen. Der Hopfen ist eine typisch rechts windende Pflanze¹⁾. Es sei an dieser Stelle auch bemerkt, dass die Stengel sowie Blattstiele des Hopfens mit eigenthümlich gestalteten Anhangsgebilden versehen sind, denen die Function von Haft- oder Klammerorganen zukommt, indem sie zur weiteren Befestigung der Pflanzen dienen. Zieht man z. B. vom Blattstiel von *Humulus* Epidermisstückchen ab und untersucht sie mikroskopisch, so zeigt sich, dass auf der Oberhaut warzenförmige Emergenzen sitzen. Jede derselben trägt an ihrem Ende ein ankerartig gestaltetes Haar, das ein vorzügliches Haftorgan darstellt.

Einige nicht zu kleine Blumentöpfe werden mit gut durchfeuchteter Gartenerde angefüllt, und in diese angequollene Samen von *Phaseolus multiflorus* ausgelegt. Es ist zweckmässig, jeden Blumentopf mit mehreren Samen zu beschenken, um später die schwächeren Pflanzen zu beseitigen, und nur ein kräftiges Exemplar in jedem Culturegefässe zu weiterer Entwicklung zu bringen. Die Pflanzen sind am besten an einem Ort zu cultiviren, wo sie nur kurze Zeit

Fig. 163. Windender Spross von *Phaseolus multiflorus*.

1) In der Botanik verbindet man herkömmlicher Weise mit den Ausdrücken „rechts windend“ und „links windend“ die entgegengesetzten Vorstellungen wie in der Mechanik.

am Tage vom directen Sonnenlicht, im Uebrigen von hellem diffusum Tageslicht getroffen werden. Wenn das dritte Internodium sich auszubilden beginnt, so stellt man lange Holzstäbe in unmittelbare Nähe der Pflanzen. Diese umwinden die Stäbe, aber die Bohne ist nicht wie der Hopfen eine rechts, sondern eine links windende Pflanze. Die Windungen verlaufen von links unten nach rechts oben. Unsere Fig. 163 zeigt dies deutlich; ferner lässt dieselbe erkennen, worauf wir aber erst unter 189 genauer eingehen, dass die älteren Windungen enger sind und steiler emporsteigen als die jüngeren. Diese Erscheinungen treten zumal deutlich hervor, wenn die Stützen, welche man benutzt, dünn sind, z. B. bei Experimenten mit *Phaseolus* eine Dicke von wenigen mm nicht überschreiten. Es ist überhaupt nicht uninteressant, Schlingpflanzen zu beobachten, die sich um Stützen von verschiedener Dicke gewunden haben. Ich liess z. B. Bohnenstengel um gespannte Bindfäden, Drähte von 1 mm Durchmesser sowie Holzstäbe von 4, 16 und selbst 30 mm Durchmesser winden.

187. Die rotirende Nutation.

Von grösster Wichtigkeit ist es, wenn man die Erscheinungen des Windens der Schlingpflanzen genauer verfolgen will, sich mit der rotirenden Nutation zum Schlingen befähigter Sprosse bekannt zu machen. Wir legen Samen von *Phaseolus multiflorus* in Gartenerde, mit der ziemlich grosse Blumentöpfe angefüllt sind, aus. Die ersten Internodien der jungen Pflanzen zeigen das Phänomen der rotirenden Nutation nicht oder nicht deutlich, wohl aber die folgenden. Die langen Sprossgipfel neigen seitwärts über, und wenn man sie genauer beobachtet, so ergiebt sich, dass sie sich nicht in Ruhe befinden, sondern ununterbrochen in Bewegung begriffen sind, wodurch der Gipfel in einem Kreise herumgeführt wird.

Um das merkwürdige Phänomen der rotirenden Nutation näher zu studiren, können wir, abgesehen von *Phaseolus*, auch andere Untersuchungsobjecte, z. B. 30 cm lange Sprosse von *Calystegia* oder die Sprosse anderer Schlingpflanzen verwenden. Es kommt aber sehr darauf an, dass sich die Beobachtungsobjecte im Zustande lebhaften Wachsthum befinden und dass sie recht günstigen Vegetationsbedingungen ausgesetzt werden. Der basale Theil der Sprosse ist vertical aufgerichtet, der Sprossgipfel erscheint aber in einem weiten Bogen gekrümmt, so dass die Spitze horizontal steht oder gar etwas nach abwärts schaut. Wir tragen nun auf der convexen Seite des Sprosses mit Tusche eine Längslinie auf, welche der Mittellinie desselben parallel läuft, und stellen den Spross dann derartig auf, dass seine convexe Seite uns zugekehrt ist. (Vergl. WORTMANN, Botan. Zeitung, 1886.) Die Krümmungsebene steht dann senkrecht zu unserer Brust; die Spitze des Sprosses ist uns abgewendet und zeigt z. B. nach Osten. Betrachten wir den Spross jetzt wieder nach Verlauf einer halben Stunde oder nach $\frac{3}{4}$ Stunden, so gewahren wir auffallende Veränderungen an demselben. Die horizontal schwebende Spitze zeigt nach Norden, die Krümmungsebene ist, wie vorher, senkrecht, aber jetzt parallel zu unserer Brust, und die Tuschelinie liegt nicht mehr auf der convexen Seite, sondern auf der linken Flanke des Sprosses. Somit ergiebt sich, dass die durch die convexe Seite

des Sprosses angegebene Zone des stärksten Wachstums des Sprosses bei unserem Versuch um 90° nach rechts gerückt ist. Die Stengelspitze hat aber dadurch einen horizontalen Kreisbogen von 90° nach links beschrieben. Das weitere Verhalten des Untersuchungsobjectes ist leicht zu verfolgen. Nach abermals $\frac{1}{2}$ oder $\frac{3}{4}$ Stunden liegt der Tuschestrich auf der concaven Seite des Sprosses, und erst nach im Ganzen 2 oder 3 Stunden ist die ursprüngliche Stellung wieder hergestellt. Dann beginnt eine neue Kreisbewegung. Bemerkenswerth ist noch, dass die Zone stärksten Wachstums fast stets auf der Oberseite der gekrümmten Partie des Sprosses verläuft, was die immer senkrechte Lage der Krümmungsebene zur Folge hat. Die kreisende Bewegung der Endknospe kommt nach allem, was wir gesehen haben, dadurch zu Stande, dass die Zone stärksten Wachstums successive den Stengel umläuft.

Es ist hier nun nachdrücklich zu betonen, dass die Geschwindigkeit, mit der eine volle Kreisbewegung von der Sprossspitze vollzogen wird, wesentlich abhängig ist von äusseren Factoren, namentlich der Temperatur. Wenn die nitirenden Sprosse einseitiger Beleuchtung ausgesetzt sind, so wird die Bewegung zum Licht in Folge heliotropischer Vorgänge schneller durchgemacht als von der Lichtquelle hinweg. Phaseolus- und Calystegiasprosse zeigen recht lebhafte Bewegungen, andere Schlingpflanzen nur langsame, indessen auch bei ein und demselben Untersuchungsobject und bei nahezu constanten äusseren Bedingungen kann sich im Laufe längerer Zeit die Geschwindigkeit der Bewegung nicht unwesentlich ändern. Es kommen auch insofern Abweichungen vom normalen Verhalten der Sprosse vor, als die Krümmungsebene nicht immer senkrecht steht, d. h. die Zone stärksten Wachstums liegt nicht stets auf der Oberseite der Krümmung, sondern sie wird verschoben. Verschiedene Partien des rotirenden Stengels, können auch in verschiedenen Ebenen gekrümmt erscheinen. Auf alle diese Dinge ist zu achten, und man thut gut, einige Objecte anhaltend zu beobachten und die Befunde genau zu notiren.

Um weitere Einsicht in den Verlauf der uns hier interessirenden höchst complicirten Erscheinungen zu gewinnen, ist es erforderlich, zunächst den folgenden Versuch auszuführen. Phaseoluspflanzen oder Calystegiasprosse, die so weit entwickelt sind, dass sie dicht vor dem Beginn der rotirenden Bewegung ihrer Gipfel stehen, werden zur Ausschliessung heliotropischer Nutationen mit Hülfe des Klinostaten in horizontaler Ebene langsam gedreht. Man kann auch bereits in rotirender Bewegung befindliche Sprosse beobachten, muss dann nur die unteren Sprosstheile durch Anbinden an einen Stab fixiren, so dass das etwa 10 oder 15 cm lange Ende der Pflanzentheile völlig vertical und frei aufgerichtet bleibt. In jedem Falle wird man früher oder später wahrnehmen, wie das freie Sprossende in einer Länge von einigen cm eine meist sehr scharfe Krümmung auszuführen beginnt. Das Zustandekommen dieser sog. *Vorkrümmung* wird nicht einfach durch das Gewicht des Sprossgipfels bedingt, wie daraus hervorgeht, dass sie bestehen bleibt, mag man dem Spross auch irgend eine beliebige Lage ertheilen.

Ferner ist das Folgende wichtig. Sprosse, die rotirende Nutation ausführen können, sind ebenso wie andere Sprosse in ihrer wachsenden Region geotropisch reizbar. Wenn man z. B. Sprossenden von Schlingpflanzen in der Weise, wie es unter 173 angegeben ist, mit der Basis in feuchten Sand steckt, so tritt ihr negativ geotropisches Verhalten klar hervor. Die Zone stärkster Reizbarkeit liegt stets einige, z. B. 10 cm

entfernt von der Sprossspitze, wovon man sich leicht unter Benutzung von Sprosstheilen, die verschiedene Länge haben, überzeugen kann.

Die hier constatirten Thatsachen sind zuerst besonders von BARANETZKI¹⁾ und WORTMANN²⁾ festgestellt worden. Beide zeigten auch, dass die rotirende Nutation selbst nicht, wie man früher meinte, eine rein spontane Nutationserscheinung sei, sondern durch das Zusammenwirken zweier Bewegungsformen der Sprosse zu Stande komme. Die Sprosse der Schlingpflanzen sind allerdings zu spontanen Bewegungen befähigt, und in Folge dessen führen sie sog. Flankenkrümmungen aus, denen auch die erwähnte Vorkrümmung ihre Entstehung verdankt. Diese als horizontale Componente der rotirenden Bewegung zu bezeichnende Flankenkrümmung ist dadurch ausgezeichnet, dass immer eine Flanke der Sprosse, also z. B. bei links windenden Gewächsen die rechte, stärker als alle übrigen wächst, und somit, wenn sie ausschliesslich wirksam wäre, eine spiralförmige Einrollung der Sprossenden zur Folge haben müsste. Zu der horizontalen Componente gesellt sich aber noch eine in verticaler Richtung thätige, nämlich der negative Geotropismus. Er wirkt nicht, was betont wurde und sehr wichtig ist, auf sämmtliche Zonen der Sprosse gleich energisch ein und führt ferner dahin, dass die Convexität der Krümmung rotirender Sprosse normalerweise stets auf ihrer Oberseite liegt. Damit wird eine Verlegung der Flanken und der Beginn der rotirenden Bewegung erzielt. (Vergl. WORTMANN, Botan. Zeitung, 1886, S. 638—642.)

Auf WORTMANN's theoretische Ausführungen am angegebenen Ort und an anderen Stellen seiner Arbeit kann hier nicht weiter eingegangen werden. Im Wesentlichen halte ich dieselben für zutreffend.

Von besonderer Wichtigkeit ist es nun, um zu der Ueberzeugung zu gelangen, dass die rotirende Nutation eine durch das Zusammenwirken zweier Factoren (spontane Nutation und negativer Geotropismus der Sprosse) zu Stande gebrachte Combinationsbewegung ist, Experimente unter Benutzung des Klinostaten auszuführen. Der Apparat wird auf einem zitterfreien Tisch aufgestellt, und wir arbeiten mit in Blumentöpfen cultivirten Phaseoluspflanzen oder ebenfalls aus Samen erwachsenen Exemplaren von *Ipomoea chrysantha*. Wir befestigen den unteren Theil der noch nicht um eine Stütze gewundenen Versuchspflanze an einem geeigneten, in der Erde des Culturgefässes steckenden Stab, so dass nur der Sprossgipfel in Länge von einigen Centimetern frei bleibt. Dieses Sprossende muss recht kräftig entwickelt sein und darf bei Horizontallegung der Pflanzen durch sein Gewicht keine wesentliche Lageänderung erfahren. Bei horizontaler Lage des Untersuchungsobjectes tritt nun sehr bald an dem ursprünglich gerade gestreckten Sprossende eine Flankenkrümmung (Vorkrümmung) ein. Wenn die Pflanze jetzt auf den Klinostaten gelangt und in verticaler Ebene langsam rotirt (es genügt, wenn der Klinostat derartig eingestellt wird, dass eine Axendrehung im Laufe von etwa 10 Minuten vollendet ist, vergl. unter 176), so verschwindet die Vorkrümmung alsbald wieder, indem sie durch Wachsthumsvorgänge ausgeglichen wird, und der Spross erscheint gerade gestreckt. Es treten aber alsbald neue Nutationen auf, die abermals ausgeglichen werden oder mehr oder weniger erhalten bleiben. Der Spross hat also eine innere

1) BARANETZKI, Mémoires de l'académie impér. de St. Pétersbourg, Sér. VII, T. 31, No. 8, 1883.

2) WORTMANN, Botan. Zeitung, 1886.

Disposition zu Nutationsbewegungen. Bei der Rotation am Klinostaten kann aber, da die Wirkung der Schwerkraft eliminirt ist, keine rotirende Nutation, sondern nur eine undulirende Nutation zu Stande kommen. Das Vermögen der Sprosse, spontane Nutationen auszuführen, ist eine Vorbedingung für das Auftreten der Flankenkrümmungen, die, wie wir sahen, als horizontale Componenten bei dem Stattfinden der rotirenden Nutation thätig sind. Diese letztere resultirt also aus zwei Factoren, der spontanen Nutation der Sprosse und ihren negativ geotropischen Bewegungen.

Die Experimente am Klinostaten sind womöglich längere Zeit fortzuführen, um sich durch genaue Beobachtung über das Verhalten der Pflanzen von dem Fehlen der rotirenden Nutation zu überzeugen. Dann ist es bequem, als Stütze eine etwa 1 cm Durchmesser besitzende Glasröhre zu verwenden, die mit ihrem einen Ende in der Erde des Culturgefäßes steckt, und in die man eine Anzahl engerer Glasröhren hineingeschoben hat. Diese letzteren zieht man in dem Maasse, wie der Spross wächst, hervor, um denselben bei zunehmender Verlängerung stets bequem befestigen zu können, so dass immer nur sein lebhaft wachsendes Gipfelende frei schwebt.

188. Die freien Windungen.

Man schneide recht kräftige, 20—30 cm lange Sprossenden von *Ipomoea purpurea* oder von *Phaseolus*, die im Freien erwachsen, dabei möglichst gerade sind und noch keine Stütze erfasst haben, ab. Die Untersuchungsobjecte werden nun mit ihrem unteren Ende in ein mit Wasser angefülltes kleines Glas gestellt und unter eine grosse Glasglocke oder in ein grosses Glasgefäß gebracht, dessen Oeffnung mit einer Pappscheibe bedeckt ist. Um die Luft, welche die Pflanzentheile umgiebt, recht feucht zu erhalten, benetzt man die Wandungen der Glasglocke oder des Glasgefäßes mit Wasser. Unter den bezeichneten Umständen wachsen die Sprosse weiter, und nach 2—3 Tagen haben sich einige freie Windungen gebildet¹⁾. Ich habe dies Ergebniss bei Experimenten mit Sprossenden von *Phaseolus* und *Ipomoea purpurea* erhalten. Die letztere Pflanze eignet sich besonders gut zum Versuch und ich sah freie Windungen entstehen, wenn die Untersuchungsobjecte im Dunkeln verweilen oder dem diffusen Tageslicht ausgesetzt waren. Die nebenstehende Abbildung (Fig. 164) stellt einen *Ipomoea*spross dar, der freie Windungen gebildet hatte. Man erkennt, was ich in anderen Fällen übrigens noch deutlicher hervortreten sah, dass die weiter nach abwärts liegenden, also älteren Theile des gewundenen Stengels steiler als dessen

Fig. 164. Spross von *Ipomoea purpurea* mit freien Windungen.

1) Vgl. SACHS, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, 1882, S. 821.

jüngere Theile gerichtet sind, eine Erscheinung, auf deren Ursache wir noch zurückkommen.

189. Die Mechanik des Windens der Schlingpflanzen.

Wenn das Ende des Stengels einer Schlingpflanze durch die rotirende Nutation im Raum herumgeführt wird, so kann dasselbe offenbar leicht mit einer geeigneten Stütze in Berührung gelangen.

Für das Verständniss der Phänomene, die beim Winden beobachtet werden können, ist es vor allem wichtig, die rotirende Nutation, bei deren Zustandekommen das fortdauernd negativ geotropische Verhalten der Stengel, wie wir unter 187 sahen, eine so wichtige Rolle spielt, und ferner den Widerstand der Stützen zu berücksichtigen. Diese beiden Momente bedingen es, dass windende Stengel um Stützen in einer Schraubenlinie herumlaufen, und sie reichen auch hin, um die Erscheinung zu erklären, die wir bei Windungen um Stützen beobachteten, dass die obersten Windungen flach und relativ weit, die unteren aber steiler sind. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass die Stengel der Schlingpflanzen, wenn Windungen an ihnen hervorgetreten sind, noch längere Zeit fortwachsen, und sie werden dabei in Folge der Wirkung der Schwerkraft geotropisch aufgerichtet. Ist eine Stütze vorhanden, so kann eine völlige Geradestreckung der älteren Stengeltheile nicht zu Stande kommen, denn die Stütze tritt ja hindernd in den Weg. Die windenden Stengel legen sich den Stützen nun in einer Schraubenlinie dicht an, und der Neigungswinkel der Sprossachsen wird schliesslich ein um so geringerer sein, je dünner die Stütze ist. Beim Winden um dicke Stützen erfolgt das Anlegen der älteren Stengeltheile an dieselben hingegen früher; die Aufrichtung der Internodien ist alsbald gehindert, und die fertigen Windungen erscheinen daher relativ flach.

Auffallend ist vielleicht auf den ersten Blick die Thatsache, dass freie Windungen an überhängenden Sprossenden der Schlingpflanzen, die sich unter durchaus normalen Verhältnissen im Freien entwickeln, nur selten in typischer Form hervortreten, während sie an abgeschnittenen Stengelstücken, wie wir gesehen haben, leicht entstehen. Indessen bei genauerer Ueberlegung wird die Sache alsbald klar. Die Wachsthumfähigkeit abgeschnittener Sprosse ist auf jeden Fall eine erheblich geschwächte. Freie Windungen können freilich durch die mit dem Wachsthum verbundene rotirende Nutation zu Stande kommen, aber die geotropische Aufrichtung der Internodien macht sich nur in unvollkommenem Maasse geltend. Die in der Natur kräftig wachsenden und über die Stützen hinausragenden Sprossenden der Schlingpflanzen reagieren meistens so lebhaft auf die Einwirkung der Gravitation, dass dadurch gewöhnlich eine fast völlige Geradestreckung ihrer Internodien herbeigeführt wird und somit keine bleibenden freien Windungen entstehen können.

Wir stellen nun noch verschiedene Experimente an, deren Resultate dazu geeignet sind, uns weitere Einsicht in die Mechanik des Windens der Schlingpflanzen zu gewähren.

Neben eine in einem Blumentopf oder in freiem Boden zur Entwicklung gelangte junge, recht kräftige Pflanze von *Phaseolus multiflorus* wird eine Stütze von 30 mm Durchmesser gestellt. Nachdem die Stütze einige Male vom Stengel umwunden ist, wird sie entfernt

und schnell durch eine dünne von nur wenigen Millimetern Durchmesser ersetzt. Die Windungen liegen dieser dünnen Stütze natürlich zunächst nicht an. Man beobachtet jetzt, dass das obere fortwachsende Ende des Bohnenstengels neue Windungen bildet, aber für uns ist von besonderer Wichtigkeit, dass die jüngeren derjenigen Windungen, welche schon um die dicke Stütze gebildet worden waren, im Laufe von 1—2 Tagen steiler werden und sich der dünnen Stütze dicht anschmiegen. Diese Erscheinung ist Folge des in den betreffenden Stengeltheilen noch fortdauernden Wachstums und der damit zu Stande kommenden geotropischen Aufrichtung derselben. Die älteren, schon um die dicke Stütze gebildeten Windungen bleiben hingegen relativ flach; sie erfahren keine Veränderungen mehr, weil das Wachsthum der älteren Internodien bereits erloschen ist.

Ein kräftiges, in einem Blumentopf erwachsenes Exemplar von *Phaseolus*, das einige Windungen um eine Stütze gebildet hat, wird in umgekehrter Lage, d. h. mit der Spitze nach abwärts, aufgestellt, nachdem man auf die Erde im Topfe, um das Herausfallen des Erdballens zu verhindern, einige Sperrhölzer gelegt hat. Es erfolgt alsbald ein Abwickeln der jüngeren, noch lebhaft wachsenden Theile des Stengels der Bohnenpflanze von der Stütze, und das Stengelende richtet sich empor. Dies Resultat des Experiments wird nur verständlich, wenn man bedenkt, dass in jeder noch wachsenden Querzone eines Bohnenstengels durch den Einfluss der rotirenden Nutation stets die Tendenz vorhanden ist, in Richtung einer links aufsteigenden Schraubenwindung weiter zu wachsen. Nach dem Umkehren einer Bohnenpflanze muss daher die der Stütze zugewandte concave Seite des Stengels convex werden, und dies hat ein Abwickeln der noch wachsenden Partien der Internodien zur Folge.

Dass wirklich die Schwerkraftwirkung für das Zustandekommen der rotirenden Nutation und des Windens von Bedeutung ist, wurde bereits unter 187 näher dargelegt. Auch der folgende Versuch lehrt das Nämliche. Der Blumentopf, in welchem sich eine kräftige Bohne entwickelt hat, die bereits mehrere Windungen um eine Stütze ausführte, wird auf dem Klinostaten befestigt und der langsamen Rotation in verticaler Ebene ausgesetzt. Die Rotation erfolgt in einer dem Verlauf der normalen Windungen entgegengesetzten Richtung. Wir sehen nun, dass die noch wachsthumfähigen Theile des Bohnenstengels sich von der Stütze loslösen. Die jüngsten Windungen wickeln sich ab, und der Spross streckt sich mehr oder minder gerade. Dieses Resultat kommt zu Stande, indem sich der gewundene, noch wachsende Theil des Sprosses bei Aufhebung der Schwerkraftwirkung am Klinostaten genau so verhält, wie z. B. ein einfach geotropisch gekrümmter. Dieser letztere streckt sich, wenn er noch wachsthumfähig ist, unter den bezeichneten Umständen gerade; ebenso ein gewundener Spross, der ja ebenfalls sein Windevermögen der Mitwirkung des Geotropismus verdankt. Die Geradestreckung überhaupt ist Folge innerer Wachsthumursachen, welche sehr allgemein thätig sind, wenn Pflanzentheile, die Nutationen zeigen, unter Bedingungen gelangen, wo die krümmende Ursache nicht wirksam ist. Dies Vermögen der Pflanzentheile, Krümmungen auszugleichen, bezeichnet VÖCHTING (Bewegungen der Blüthen und Früchte, S. 31), ohne damit übrigens das Wesen der Sache erklären zu wollen, als Rectipetalität.

Als eine Folge der Mitwirkung des Geotropismus beim Winden der Schlingpflanzen muss es auch angesehen werden, dass horizontale Stützen

nicht umwunden werden können, wovon man sich leicht durch den Versuch überzeugen kann. Bohnenpflanzen umwinden auch solche Stützen nicht, die über 40° geneigt sind.

Sehr lehrreich ist ferner das folgende Experiment, welches auch unter anderem zeigt, dass die Entstehung der Windungen bei Schlingpflanzen ganz sicher nicht Folge eines Contactreizes ist. An der Endknospe einer jungen Bohnenpflanze, die in einem Blumentopfe cultivirt wird und bereits einige um eine Stütze gewundene Internodien gebildet hat, wird ein feiner Faden befestigt, der über eine senkrecht über der Pflanze angebrachte, leicht bewegliche Rolle läuft. An das noch freie Fadenende hängt man ein kleines Gewicht (bei meinen Versuchen benutzte ich 1 g), das eben hinreicht, um das Umsinken des Bohnenstengels zu verhüten. Nach Verlauf von 1–2 Tagen hat der Gipfel der Pflanze einige freie Windungen gebildet (vgl. Fig. 165), die aber, während der Stengel an seiner Spitze fortwächst, allmählich wieder verschwinden, da der Geotropismus, wie auch unter anderen Umständen, schliesslich eine Geradestreckung der Internodien herbeiführt. Hat man vor Beginn des Experiments auf einer Längsseite des Stengels mit Tusche feine Punkte in geringer Entfernung von einander aufgetragen, so ergibt sich, dass diese Punkte nach erfolgter Geradestreckung der zuerst gebildeten freien Windungen nicht mehr in einer geraden Linie liegen, sondern in Richtung einer links aufsteigenden Schraubenlinie angeordnet sind. Es ist also an unserem Untersuchungsobject eine homodrome Torsion hervorgetreten, eine Erscheinung, die man sehr oft an schlingenden Stengeln beobachten kann. Die Entstehung dieser Torsionen hängt auf das Innigste mit der Bildung der freien Windungen an unserem Untersuchungsobjecte zusammen. Wenn die Windungen durch Geradestreckung des Stengels verschwinden, so verwandeln sie sich eben in eine homodrome Torsion, d. h. in eine Torsion, die mit der Richtung, in welcher die Pflanze windet, gleichläuft¹⁾.

Fig. 165. Phaseoluspflanze, deren Stengel oberhalb der Stütze freie Windungen gebildet hat.

1) Die neueren Untersuchungen über Schlingpflanzen finden sich namentlich in den folgenden Abhandlungen niedergelegt: H. DE VRIES, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1; SCHWENDENER, Monatsberichte d. Berliner Akademie, 1881, December; AMBRONN, Berichte d. sächsischen Gesellschaft d. Wissenschaften; WORTMANN, Botan. Zeitung, 1886. Die Erfahrungen, welche ich bei dem Studium der Erscheinungen des Windens der Schlingpflanzen sammelte, stimmen in allen wesentlichen Punkten mit denjenigen von SACHS und WORTMANN überein.

190. Experimente über das Ranken der Cucurbitaceen.

Es giebt viele Gewächse, die sehr verschiedenen Familien angehören, welche mit Ranken ausgerüstet sind. Diese fadenförmigen Organe dienen den Pflanzen zum Klettern. Sie vermögen sich an Stützen zu befestigen und verhüten dadurch das Umsinken der Gewächse.

Will man sich mit den merkwürdigen Eigenschaften der Ranken vertraut machen, so ist es sehr bequem, eine Reihe von Cucurbitaceen, zumal *Cyclanthera* explodens und *Sicyos angulatus* als Untersuchungsobjecte zu verwenden. Die erstere Pflanze cultivire man in nicht zu kleinen Blumentöpfen, die letztere im freien Lande. Die beiden genannten Gewächse werden aus Samen erzogen¹⁾. Haben die Pflanzen eine gewisse Grösse erreicht, so ist es nothwendig, ihnen Stützen zur Befestigung der Ranken darzubieten.

Beobachtet man ein kräftig entwickeltes Individuum von *Cyclanthera* explodens, so zeigt sich zunächst, dass die nicht an Stützen befestigten, geradegestreckten Ranken fortwährend in Bewegung begriffen sind. Sie werden im Raume in einem Kreise herumgeführt, eine Erscheinung, die wesentlich durch die Nutation der die Ranken tragenden Sprosse zu Stande kommt. Ich sah, dass eine Ranke von *Cyclanthera* einen vollen Kreis bei hoher Sommertemperatur (über 20° C.) im Laufe einer Stunde beschrieb. Aber nicht allein diejenigen Sprosse, welche die Ranken tragen, auch die Ranken selbst sind bei manchen Pflanzen befähigt, rotirende Nutationen zu vollführen²⁾. Diese Bewegungen treten in reiner Form hervor, wenn man die Nutationen der Sprosse ausschliesst, indem man dieselben an der Insertionsstelle der Ranken an einem Stab befestigt. Die biologische Bedeutung der Nutationen ist eine recht erhebliche. Die wachsenden Ranken werden durch sie im Raume herumgeführt, und sie werden dabei leicht mit geeigneten Stützen in Contact gerathen, an denen sie sich befestigen können.

Will man die Reizbarkeit der Ranken genauer studiren, so empfiehlt es sich besonders, die Ranken von *Sicyos angulatus* als Untersuchungsobjecte zu wählen, und ich habe mit denselben denn auch sehr zahlreiche Experimente angestellt. Im jugendlichen Zustande sind die einzelnen Zweige dieser Ranken spiralig eingerollt. Haben sie sich aber ausgestreckt, so kommt ihnen, während sie noch lebhaft wachsen, ein sehr hoher Grad von Empfindlichkeit zu. Bei niedriger Temperatur ist die Reizbarkeit natürlich eine geringere als bei recht warmem Wetter. Zieht man an einem warmen Tage einen gerade gestreckten Rankenzweig vorsichtig zwischen den Fingern hindurch, so krümmt sich derselbe alsbald bedeutend, und die zur Geltung kommende Bewegung ist eine so lebhafte, dass man sie mit dem Auge direct verfolgen kann. Fig. 166 stellt einen Spross mit Ranke von *Sicyos angulatus* dar. Der Rankenzweig *a* ist nicht gereizt, daher noch gerade gestreckt. Der Zweig *b* hat in Folge schwacher Reizung mittelst eines Holzstäbchens eine unbedeutende Krümmung erfahren, während der

1) Die *Sicyos*pflanzen bringt man zunächst in Blumentöpfen zur Entwicklung, um sie später ins freie Land zu versetzen, wenn sie genügende Grösse erlangt haben.

2) Vgl. WORTMANN, Botan. Zeitung, 1887, No. 7.

Rankentheil *c* stärker gereizt worden ist, daher auch starke Krümmungen erfahren hat. Auf den Rankenzweig *d* kommen wir weiter unten zurück. Hat man eine Ranke von *Sicyos* durch vorübergehende Berührung mit einem festen Körper veranlasst, sich zu krümmen, und überlässt man die Ranke nunmehr sich selbst, so streckt sie sich wieder vollkommen gerade und ist abermals für Berührung empfindlich. Bei hoher Sommertemperatur geht die Geradestreckung der *Sicyos*ranken relativ schnell vor sich, und auch bei Experimenten mit *Cyclanthera*ranken fand ich, dass sich eine in Folge eines Reizes stark gekrümmte Ranke bei etwa 22° C. schon nach Verlauf von einer Stunde wieder ausgestreckt hatte und abermals reizempfindlich war.

Fig. 166. Theil eines Sprosses von *Sicyos angulatus* mit einer Ranke.

Wird ein Zweig einer *Sicyos*ranke an verschiedenen Punkten mit einem dünnen Holzstäbchen berührt, so findet man leicht, dass die Reizbarkeit des Organs besonders gross im vorderen Drittel ist, von hier aus nach der Basis zu aber erheblich abnimmt. Ferner kann man feststellen, dass in der sensiblen Zone nur eine Flanke der Rankenzweige auf den Contactreiz reagirt, und zwar ist allein diejenige Seite der *Sicyos*ranken für Berührung empfindlich, welche, wenn die Rankenzweige noch sehr jung und daher noch spiralig eingerollt sind, die Convexität bildet. Es sei hier übrigens bemerkt, dass es auch Pflanzen giebt, deren Ranken nicht nur auf einer, sondern auf allen Seiten reizbar sind. Will man sich von dem hohen Grade der Empfindlichkeit der *Sicyos*- oder *Cyclanthera*ranken specieller überzeugen, so ist es zu empfehlen, Stückchen baumwollenen Garnes oder kleine Papierreiter von wenigen Milligramm Gewicht sanft auf die Rankenspitzen zu bringen. Es treten sehr schnell deutliche Krümmungen hervor. Andere Ranken, z. B. diejenigen von *Vitis*, welche wir weiter unten genauer untersuchen wollen, sind weit weniger empfindlich als die

hier erwähnten; Belastungen mit Körpern von wenigen Milligramm Gewicht bringen sie überhaupt noch gar nicht zur Einkrümmung.

Von principieller Wichtigkeit ist die durch geeignete Experimente leicht festzustellende Thatsache, dass die Ranken nicht schlechthin für Druck, Stoss oder Berührung empfindlich sind, sondern dass nur eine bestimmte Form der Berührung als Reiz wirkt¹⁾. Werden rankentragende Sicyosprosse kräftig, aber unter sorgfältiger Vermeidung jeder Berührung der Ranken mit einem festen Körper geschüttelt, so treten an den Ranken wohl Erschütterungskrümmungen auf, aber jene auffallende Reizwirkung, welche durch Contact mit einem festen Körper zur Geltung kommt, unterbleibt. Das Ergebniss unseres Experimentes lehrt auch, dass Luftreibung nicht als Reiz auf die Ranken einwirkt. Auch durch einen Wasserstrahl, den man z. B. aus einer Spritzflasche gegen die reizbare Seite der Ranken von Sicyos richtet, werden dieselben nicht gereizt. Wesentlich anders wie die Ranken verhalten sich, wovon ich mich überzeigte, die empfindlichen Blätter von *Mimosa pudica* sowohl einem Wasserstrahl als auch einfacher Erschütterung gegenüber. Diese Blätter werden durch jede beliebige mechanische Erschütterung gereizt, und wenn man z. B. einen Wasserstrahl gegen ein ausgebreitetes Blatt richtet, so erfolgen die bekannten Schliessungsbewegungen sehr schnell. Die Ranken sind nicht durch jede beliebige mechanische Erschütterung reizbar, sondern sie reagiren nur dann, wenn in ihrer sensiblen Zone discrete Punkte beschränkter Ausdehnung gleichzeitig oder in genügend schneller Aufeinanderfolge von Stoss oder Zug betroffen werden. Wir haben also zwischen Stossreiz, auf den z. B. die Mimosablätter reagiren, und Contactreiz, der die Rankenbewegungen auslöst, zu unterscheiden.

Wird in der Nähe der Ranken von *Cucurbita*, *Sicyos* oder *Cyclanthera* eine Stütze, z. B. ein Draht oder ein dünner Holzstab, aufgestellt, so gelangen die reizbaren Organe in Folge der schon erwähnten Nutationsbewegungen alsbald mit der Stütze in Berührung. Der Contact löst eine Reizwirkung aus, und die Ranken krümmen sich. Durch diese Krümmung kommen weitere Punkte der Ranken mit der Stütze in Contact, neue Reizwirkungen machen sich geltend, und so kommt schneller oder langsamer ein Umwinden der Stütze zu Stande (vergl. Fig. 166, Rankenzweig *d*). Hat eine Ranke eine Stütze ergriffen, so treten an demjenigen Rankentheile, der zwischen der Stütze und der Pflanze ausgespannt ist, sehr schnell merkwürdige Veränderungen ein. Dieser Rankentheil bildet nämlich, wie es in Fig. 166 dargestellt ist, korkzieherförmige Einrollungen, und aus freilich rein mechanischen Gründen entstehen zwischen entgegengesetzt verlaufenden Windungen sog. Wendepunkte (vergl. Fig. 166 bei *W*). Ich sah z. B., dass eine Sicyosranke, die am 1. Juli nachmittags um 4 Uhr eine Stütze ergriffen hatte, schon am Morgen des nächsten Tages in ihrem zwischen der Stütze und der Pflanze ausgespannten Theile korkzieherförmig gewunden war; Wendepunkte waren auch bereits vorhanden. Ich sah ferner, dass eine *Cyclanthera*ranke, die eine Stütze ergriffen hatte, bei hoher Sommertemperatur schon nach 8 Stunden die ersten korkzieherförmigen Windungen an dem zwischen Stütze und Pflanze ausgespannten Theile hervortreten liess. Diese ersten Windungen bildeten

1) Vgl. PFEFFER, Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen, Bd. 1, S. 483.

sich in unmittelbarer Nähe des Befestigungspunktes der Ranke an der Stütze. Die Entstehung der korkzieherförmigen Windungen schreitet im frei ausgespannten Rankentheil von der Spitze nach der Basis fort. Ranken unserer Cucurbitaceen, welche keine Stütze ergriffen haben, zeigen ebenso wie die befestigten Organe Einrollungserscheinungen, aber man kann sich leicht davon überzeugen, dass dieselben, während sie an befestigten Ranken schnell entstehen, an solchen Ranken, die keine Stütze ergriffen haben, nur sehr langsam zur Ausbildung kommen. Diese Thatsachen lassen keinen Zweifel darüber bestehen, dass das beschleunigte Auftreten der Einrollungen befestigter Ranken Folge des Contactreizes ist, dem dieselben ausgesetzt gewesen sind, und zudem leuchtet ein, dass hierbei auch eine Reizfortpflanzung eine wichtige Rolle spielen muss, denn die korkzieherförmigen Windungen bilden sich ja am frei ausgespannten, nicht am direct berührten Rankentheile.

Mit Bezug auf die Mechanik der Rankenbewegungen ist so viel mit Sicherheit bekannt, dass, wenn eine Ranke durch Berührung gereizt worden ist und Krümmungen eingetreten sind, die Turgorausdehnung der Zellen auf der concaven Seite geringer ist als diejenige der Zellen der convexen Seite. Diese zunächst zur Geltung kommende und durch den Contactreiz hervorgerufene Differenz der Turgorausdehnung ist dann ferner die Ursache eines verschiedenartigen Wachsthum der Zellen der concav sowie convex gewordenen Rankenseite. Die Zellen der letzteren wachsen lebhafter als diejenigen der ersteren, und dadurch werden die durch den Contactreiz hervorgerufenen Krümmungen fixirt. Mit Hülfe der plasmolytischen Methode (vgl. unter 59) ist man im Stande, den Antheil festzustellen, den die Turgorausdehnung der Zellen einer- und das Wachsthum derselben andererseits an dem Zustandekommen der Rankenkrümmungen nehmen, und es ist lehrreich, derartige Experimente auszuführen. Man verfährt dabei derartig, dass man die Ranken schwächer oder stärker reizt und dann, wenn mehr oder minder erhebliche Krümmungen eingetreten sind, abschneidet, um sie sofort in 20-proc. Kochsalzlösung zu legen. Strecken sich die gekrümmten Ranken bei der Plasmolyse wieder völlig gerade, so war die in Folge des Contactreizes erzeugte Krümmung nur durch Verschiedenartigkeit der Turgorausdehnung der Zellen auf der concaven und convexen Rankenseite hervorgerufen. Wenn dagegen durch Plasmolyse keine völlige Geradestreckung erzielt wird, so ist damit die Betheiligung des Wachsthum an der Ausbildung der Windungen erwiesen. Ich habe Sicyosranken gereizt und, nachdem sie $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$ oder $1\frac{1}{4}$ Windungen gebildet hatten, der Plasmolyse unterzogen. Die beiden ersten Ranken streckten sich alsbald völlig gerade; an der letzten blieb in der Salzlösung $\frac{1}{4}$ Windung erhalten¹⁾.

Die Ranken der Cucurbitaceen sind, worauf für Sicyosranken bereits hingewiesen wurde, nur an ihrer Spitze sehr reizbar; nach ihrer Basis zu nimmt die Reizbarkeit allmählich ab. Hiermit im Zusammenhang steht ohne allen Zweifel die Thatsache, von deren Richtigkeit ich mich nach den Angaben von O. MÜLLER²⁾ überzeugte, dass die Basis der Cucurbitaceenranken radiär gebaut ist, während der dorsi-

1) Vgl. H. DE VRIES, Arbeiten des botanischen Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 302, und Landwirthschaftliche Jahrbücher, Bd. 9, S. 511.

2) Vgl. O. MÜLLER in COHN's Beiträgen zur Biologie der Pflanzen, Bd. 4, S. 120.

ventrale Bau der Ranken um so mehr hervortritt, je mehr wir uns der sehr empfindlichen Rankenspitze nähern. Wir stellen z. B. eine ganze Anzahl von Schnitten aus einer Ranke von *Bryonia dioica* her. An der Basis ist die Ranke völlig oder nahezu radiär gebaut. Wir erblicken die regelmässig im Mark vertheilten Gefässbündel, einen geschlossenen Sklerenchymring, dessen Elemente aber noch nicht verholzt zu sein brauchen, dann grünes Gewebe, das aber nur an einigen Stellen bis zur Epidermis reicht, da reichliches Collenchym vorhanden ist.

Wenn wir Schnitte aus der Mitte oder dem oberen Theile der Bryoniaranken untersuchen, so tritt der dorsiventrale Bau des reizbaren Organes immer klarer hervor. Die Gefässbündel sind im Grundgewebe auf der Rankenunterseite zusammengedrängt, das Sklerenchym bildet keinen Ring mehr, sondern einen Bogen auf der Rankenunterseite. Ebenso ist das Collenchym hier besonders reichlich entwickelt, während das grüne Parenchym vor allem als Hauptgewebe der Rankenoberseite auftritt.

191. Experimente mit Ampelideenranken.

Die verzweigten Ranken von *Vitis vinifera* sind bei weitem nicht so reizempfindlich, wie die unter 190 besprochenen Ranken von *Sicyos* und *Cyclanthera*. Diese letzteren reagieren unter günstigen Umständen ja fast momentan sehr energisch auf Berührung. Die Vitisranken krümmen sich selbst nach starker Reizung nur langsam. Ich fand einmal, dass ein Zweig einer Vitisranke, der mehrfach zwischen den Fingern hindurchgezogen worden war, bei hoher Sommertemperatur nach 20 Minuten deutlich gekrümmt erschien. In allen anderen Fällen, zumal bei nicht so hoher Temperatur, wurde die Reizwirkung erst nach Verlauf von einer oder einigen Stunden deutlich sichtbar. Ist eine Ranke von *Vitis* vorübergehend gereizt worden, und hat sie sich in Folge dessen gekrümmt, so streckt sie sich langsam wieder gerade und ist dann abermals reizbar. Stellt man in die Nähe einer Vitisranke einen dünnen Holzstab als Stütze auf, so kann dieser leicht umwunden werden. Der zwischen der Stütze und der Pflanze ausgespannte Rankentheil zieht sich korkzieherartig zusammen, aber dies erfolgt langsam, oft erst im Laufe einiger Tage.

Sehr eigenthümlich verhalten sich die Ranken von *Ampelopsis quinquefolia* (wilder Wein). In Fig. 167 ist eine solche Ranke abgebildet, welche noch gar keine Befestigung erfahren hat. Die Rankenzweige sind nur bei einzelnen Individuen zum Winden befähigt; meist vermögen sie es nicht, sich in typischer Weise wie viele Cucurbitaceenrankens oder Vitisrankens zu befestigen. Dagegen sind die Enden der Rankenzweige im Stande, Haftballen zu erzeugen. Wenn nämlich diese Enden mit dem Mauer- oder Holzwerk, an dem die Pflanze wächst, in Berührung gerathen, so schwellen sie in Folge des Contactreizes alsbald zu den Haftballen an. Die Zellen dieser letzteren scheiden klebrige Secrete ab, vermittelst welcher eine Befestigung der Rankenenden herbeigeführt wird. In Fig. 168 ist eine *Ampelopsis*-ranke abgebildet, die von einer Holzwand abgelöst worden war, nachdem die Enden ihrer Zweige eben begonnen hatten, Haftballen zu erzeugen. Hat sich eine *Ampelopsis*-ranke in der angegebenen Weise

befestigt, so treten in den zwischen den Befestigungspunkten und der Pflanze ausgespannten Rankentheilen korkzieherförmige Windungen auf. Die Entstehung dieser letzteren ist, wie bei den Ranken von *Sicyos*, *Vitis* etc., Folge einer Reizfortpflanzung und hängt mit dem Contactreiz, der zur Haftballenbildung führte, innig zusammen. Wenn die Ampelopsisranken sich nämlich nicht befestigen, so unterbleibt das Auftreten der korkzieherförmigen Windungen. Die nicht befestigten Ranken unserer Pflanze werden sogar im Laufe einer oder zweier

Fig. 167.

Fig. 168.

Fig. 167. Ranke von *Ampelopsis quinquefolia*, nicht befestigt.

Fig. 168. Ranke von *Ampelopsis quinquefolia* mit Haftballenbildung.

Wochen welk und fallen ab. Der zur Haftballenbildung führende Contactreiz an den Enden der Rankenzweige ruft aber nicht nur die Bildung der erwähnten korkzieherförmigen Windungen hervor, sondern es machen sich in Folge von Reizfortpflanzung noch weitere Veränderungen im frei ausgespannten Rankentheile geltend.

Untersucht man einen zarten Querschnitt eines noch nicht befestigten Rankenzweiges von *Ampelopsis*, so gewahrt man ein grosszelliges Mark, das von einem Gefässbündelkreis umgeben wird. Die Verbindung zwischen dem Mark und der grünen Rinde stellen grosse Markverbindungen her, und in der Peripherie der Rinde, dicht unter der Epidermis, ist Collenchym vorhanden. Wenn die *Ampelopsis*-ranken sich befestigt haben, so erfährt ihr Bau zugleich mit der Bildung der korkzieherförmigen Windungen wesentliche Veränderungen. In den Markverbindungen tritt Zwischencambium auf; der Holzkörper

der Gefässbündel vergrößert sich in bedeutendem Maasse, bis endlich ein geschlossener Holzring entstanden ist, wodurch die Ranken sehr bedeutend an Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gewinnen und der Pflanze erst von rechtem Nutzen werden ¹⁾).

IV. Die Dorsiventralität, Polarität und Anisotropie der Pflanzenorgane und die Correlationserscheinungen im Pflanzenreich.

192. Die Dorsiventralität der Pflanzentheile.

Viele Pflanzentheile, zumal plagiotrope (z. B. viele Laubblätter), sind in ausgeprägter Weise dorsiventral gebaut. Es giebt aber auch Stengeltheile, denen in morphologischer resp. physiologischer Beziehung Dorsiventralität eigenthümlich ist, und für gewisse derselben ist sogar die Ursache der Dorsiventralität bekannt; sie kann daher in bestimmter Weise hervorgerufen werden. Einige Beobachtungen sollen uns näheren Aufschluss über diese interessanten Verhältnisse gewähren.

Wir legen im Sommer einige Samen von *Tropaeolum majus* in gute Gartenerde aus, die sich in Blumentöpfen befindet. Die Culturgefässe stellen wir vor ein Fenster, welches recht helles Licht empfängt. Die epicotylen Glieder der sich entwickelnden jungen Keimlinge (wir dürfen stets nur wenige in einem Blumentopf cultiviren, damit sie sich nicht gegenseitig beschatten) wenden sich zunächst dem Licht entgegen; sie verhalten sich positiv heliotropisch. Bleiben die Pflanzen unverrückt im hellen Licht vor dem Fenster stehen, so geht der positive Heliotropismus der epicotylen Glieder der Keimlinge in einen negativen Heliotropismus über. Sie wenden sich, ebenso wie die weiteren neu entstehenden Stengeltheile, von der Lichtquelle ab. Ihre Lichtseite (Oberseite) wird daher convex. Der Einfluss intensiven Lichts ruft also einen Plagiotropismus der *Tropaeolum*stengeltheile hervor; derselbe ist aber kein tief eingreifender, denn die Axenglieder unserer Pflanzen bewahren stets, sowohl mit Rücksicht auf ihren anatomischen Bau als auch in Bezug auf die Stellung der an ihnen entstehenden Blätter einen multilateralen oder radiären Charakter. Es ist wichtig, dass die Licht- oder Oberseite des epicotylen Stengelgliedes von *Tropaeolum* nicht allmählich convex wird, wenn die Beobachtungsobjecte schwachem Licht ausgesetzt sind; das negativ heliotropische Verhalten der Pflanzentheile kommt dann nicht zur Geltung; sie krümmen sich dann nur positiv heliotropisch dem Licht entgegen. Uebrigens kann jede beliebige Flanke der *Tropaeolum*stengel (eben die am stärksten beleuchtete) zur Oberseite derselben werden ²⁾).

1) Vgl. DARWIN, Die Bewegungen und Lebensweise der kletternden Pflanzen, 1876, S. 105, und v. LENDERKEN, Botan. Zeitung, 1885, No. 22–26.

2) Vgl. SACHS, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. 2, S. 271.

Ein ausgezeichneter Fall localer Induction von Dorsiventralität lässt sich bei Experimenten mit den horizontal wachsenden Sprossen von *Thuja occidentalis* constatiren¹⁾. An diesen Sprossen sind vier Blattzeilen vorhanden: je eine Blattzeile auf der Ober- und Unterseite (Facialblätter); je eine an den beiden Flanken (Marginalblätter). Die unter gewöhnlichen Verhältnissen erwachsenen Thujasprosse sind nun deutlich dorsiventral gebaut, wovon man sich leicht bei mikroskopischer Untersuchung zarter Querschnitte überzeugen kann. Ihr Mesophyll z. B. ist auf der Oberseite palissadenartig entwickelt, auf der Unterseite besteht es aus nahezu isodiametrischen Zellen (vergl. FRANK, PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 9, Tafel 16, Fig. 4). Wenn man nun im zeitigen Frühjahr vor dem Erwachen der Vegetation (die von mir ausgeführten Versuche begannen Anfang März) horizontale Thujasprosse umkehrt und in dieser Lage fixirt, ohne sie von der Mutterpflanze abzutrennen, so dass ihre morphologische Unterseite nach oben gewandt ist, dann entwickeln sich die Sprossenden im Laufe des Frühlings ganz normal und erlangen auch wie gewöhnlich dorsiventralen Bau. Diejenige Seite der Thujasprosse aber, welche ohne Umkehrung zur morphologischen Unterseite geworden wäre, wird jetzt zur Oberseite, wie z. B. das Vorhandensein von Palissadenparenchym deutlich zeigt, während die erdwärts gewandte Seite der umgekehrten Sprosse den normalen Charakter der Unterseite annimmt. Die Dorsiventralität der Thujasprosse ist also Folge localer Induction. Sie wird durch Lichtwirkung hervorgebracht, nicht, wie FRANK noch specieller nachzuweisen sucht, durch Schwerkraftwirkung.

Werden die mehr oder minder zweizeilig beblätterten Sprosse von *Taxus baccata* zur Zeit des Austreibens der Knospen, also im Mai, um 180° gedreht und in dieser Lage, ohne sie von der Mutterpflanze abzutrennen, durch Festbinden fixirt, so beobachtet man, dass die jungen Triebe (natürlich nicht die älteren, schon ausgewachsenen) nach Verlauf einiger Tage durch Drehung wieder in diejenige Lage zurückgekehrt sind, welche sie vor Beginn des Experiments besaßen. Wenn man die Taxussprosse vor dem beginnenden Austreiben der Knospen (meine Versuche begannen Mitte März) um 180° dreht und in dieser Lage fixirt, dann wird, wohl namentlich unter dem Einfluss der Schwerkraft, alsbald eine Dorsiventralität in den sich entwickelnden Sprossen inducirt, die der neuen Lage entspricht, so dass die Jahrestriebe nunmehr nach einer Umkehrung in die beim Austreiben angenommene Orientirung zurückstreben. Der Unterschied zwischen solchen Taxussprossen, die sich in gewöhnlicher Weise entwickelt haben, und solchen, welche aus Knospen hervorgegangen sind, die anzeitig im Frühjahr um 180° gedrehten älteren Spross sassen, prägt sich aber wesentlich darin aus, dass bei jenen die Länge der Nadeln von der Unter- zur Oberseite der Zweige abnimmt, während bei diesen die längsten Nadeln der Oberseite angehören (Anisophyllie)²⁾.

193. Die Polarität der Pflanzentheile.

Zahlreiche Pflanzentheile, zumal viele Sprosse, lassen die Erscheinung einer ausgeprägten Polarität deutlich erkennen. Die

1) Vgl. FRANK in PRINGSHEIM's Jahrbüchern, Bd. 9, S. 147.

2) Vgl. FRANK, Die natürliche wagerechte Richtung von Pflanzentheilen, 1870, S. 24.

Organisationsverhältnisse oder auch das physiologische Verhalten solcher Pflanzentheile weisen direct auf einen Unterschied von Basis und Spitze hin, und wir wollen zunächst einige Experimente anstellen, um zu einem genaueren Verständniss der hier berührten merkwürdigen Thatsachen zu gelangen (VÖCHTING).

In einen Glascylander wird etwas Wasser gebracht, so dass dieses den Boden des Cylinders etwa 1 cm hoch bedeckt. Die Innenwand unseres Apparats belegen wir ihrer ganzen Ausdehnung nach mit durchfeuchteten Fliesspapierstreifen; dieselben müssen mit ihrem unteren Ende in das Wasser eintauchen. Die Oeffnung am oberen Ende des Cylinders wird durch Bedecken mit einer Glasplatte verschlossen. Wir können unseren Versuch zu sehr verschiedener Jahreszeit anstellen und wollen zunächst sehen, welchen Erfolg wir bei Experimenten mit Weidenzweigen im Februar oder März erzielen. Wenn

Fig. 169. Glascylander, in welchem ein austreibendes Weidenzweigstück hängt.

man zur angegebenen Zeit Stücke von Weidenzweigen (*Salix viminalis* oder *S. fragilis*) von etwa 200 mm Länge und 12 mm Durchmesser, die ihrer ganzen Länge nach mit möglichst gleichartig entwickelten Knospen besetzt sind, in dem Glascylander an Fäden aufhängt (vgl. Fig. 169), so dass ihre morphologische Spitze nach oben, ihr basales Ende nach unten gerichtet ist, aber nicht in das Wasser eintaucht, dann beginnt alsbald das Austreiben der Knospen und der unter der Rinde verborgenen Wurzelanlagen unserer Untersuchungsobjecte¹⁾. Die Weidenzweigstücke bilden in der feuchten Luft und bei hinreichend hoher Temperatur (etwa 20° C.) im Laufe von 3 bis 4 Wochen, während welcher Zeit sie bei Lichtabschluss gehalten worden sind, kräftige Triebe sowie Wurzeln. Wir finden nun aber, dass Triebe nur aus den an der Spitze der Zweigstücke vorhandenen Knospen hervorgehen, während aus einem recht beträchtlichen Theil der Oberfläche der Zweigstücke Wurzeln hervorbrechen. Bei zahlreichen Beobachtungen, die ich anstellte, fand ich aber in Uebereinstimmung mit VÖCHTING²⁾ stets mehr oder

minder deutlich, dass die Wurzeln nach der morphologischen Basis der Zweigstücke hin an Zahl und Länge zunehmen. (Vergl. auch Fig. 116.) Wenn wir im Juli aus dem mittleren Theile eines kräftigen diesjährigen Weidenzweiges, dessen Blätter wir entfernt haben, Stücke von etwa 200 mm Länge herausschneiden und dieselben in angegebener Weise in einem Glascylander in feuchter Luft aufhängen, so entwickeln sich am oberen Ende unseres Untersuchungsobjectes Triebe. Was die Wurzelbildung anbelangt, so ist dieselbe bei den jungen Zweigstücken im Gegensatz zu älteren, auf deren morphologische

1) Betont muss werden, dass die Wurzelanlagen unter der Rinde gleichmässig über den ganzen Weidenzweig vertheilt sind.

2) Vgl. VÖCHTING, Ueber Organbildung im Pflanzenreich, 1878. Vergl. ferner VÖCHTING, Ueber Transplantationen am Pflanzenkörper, Tübingen 1892.

Basis beschränkt. Wir hängen auch noch ältere oder jüngere Weidenzweigstücke im März oder Juli derartig in Glaszylindern auf, dass ihre morphologische Spitze nach abwärts, ihre morphologische Basis aber nach oben gekehrt ist. Es ergibt sich wieder, dass an der Spitze Triebe, an der morphologischen Basis aber besonders zahlreiche und kräftige Wurzeln zur Ausbildung gelangen. Die Experimente mit umgekehrt aufgehängten Zweigstücken lehren also, dass die Wirkung der Schwerkraft nicht die unmittelbare Ursache der von uns bezüglich der Entwicklung von Trieben und Wurzeln constatirten Erscheinungen sein kann.

Es ist sicher, dass die Polarität von Pflanzentheilen, d. h. der Gegensatz von Basis und Spitze an denselben, nicht Folge geheimnissvoller vitaler Kräfte ist, sondern dass dieselbe äusseren Kräften ihre Entstehung verdankt. Wir haben allen Grund zu der Annahme, nach welcher in erster Linie die Schwerkraft jene Polarität ursprünglich bedingte, und wir können uns mit Rücksicht auf die hier in Betracht kommenden Fragen etwa die folgende Vorstellung bilden. Wenn die Gravitation stets in der nämlichen Richtung und durch zahllose Generationen hindurch auf die Gewächse einwirkt, so kann durch Summirung der Wirkungen schliesslich eine erbliche Eigenschaft der Pflanzentheile resultiren, die wir eben als Polarität bezeichnen. Diese letztere wäre danach als eine durch die Schwerkraft herbeigeführte, über das Leben des Individuums hinausgreifende Nachwirkungserscheinung, als ein Phänomen inhärenter oder stabiler Induction, oder, wie man gewöhnlich zu sagen pflegt, als eine erbliche Disposition aufzufassen. Von diesem Gesichtspunkte aus würde auch die Thatsache begreiflich sein, dass die Schwerkraft keinen wesentlichen directen Einfluss auf das Auswachsen der Knospen und Wurzeln an Pflanzentheilen mit ausgeprägter Polarität geltend zu machen im Stande ist¹⁾. Uebrigens übt die Gravitation auf diese letzteren dennoch unter bestimmten Bedingungen eine in die Augen fallende Wirkung aus, wovon man sich leicht durch ein Experiment, das ich in folgender Form anstellte, überzeugen kann. Ein ziemlich grosser Zinkkasten wurde bis zur Hälfte mit Wasser angefüllt. Ueber die Wasseroberfläche wurde dann eine Reihe von Weidenzweigstücken von 200 mm Länge und 12 mm Durchmesser in eine horizontale Lage gebracht, was leicht geschehen kann, indem man sie an ihren Enden auf geeignete, aus dem Wasser hervorragende Unterlagen auflegt. Das Zinkblechgefäss schloss ich nicht völlig luftdicht mit einem Deckel; die Untersuchungsobjecte befanden sich aber im Dunkeln. Die Experimente, welche im März und April angestellt wurden, ergaben, dass die Knospen sich vorwiegend an der morphologischen Spitze der Weidenzweigstücke entwickelten, während zumal die Basis derselben Wurzeln bildete. Es ist aber hier für uns besonders die speciellere räumliche Orientirung der Triebe und Wurzeln von Bedeutung. Jene bildeten sich nämlich insbesondere an der Ober-, diese an der Unterseite der horizontal gelegten Weidenzweigstücke aus, ein Erfolg, der ohne Zweifel auf Schwerkraftwirkung beruht. Uebrigens sind bei derartigen Versuchen mit Rücksicht auf das individuell recht verschiedenartige Ver-

1) Nicht alle Sprosse besitzen eine derartig ausgeprägte Polarität wie die Weidenzweige, und solche sind dann auch localer Induction zugänglich. Vergl. SACHS, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie.

halten der Zweigstücke stets eine Anzahl Objecte neben einander zu verwenden.

Beiläufig sei noch bemerkt, dass, wie VÖCHTING specieller nachgewiesen hat, das Licht einen bedeutsamen Einfluss auf die Ausbildung von Wurzeln an Weidenzweigen geltend macht. Wenn man Weidenzweigstücke in angegebener Weise in Glascylindern aufhängt, einen Glascylinder unter einen schwarzen Recipienten stellt, den anderen aber diffusum Tageslicht aussetzt, so findet man, dass bei Lichtzutritt nicht so viele Wurzeln wie im Dunkeln aus der Rinde der Zweigstücke hervorbrennen, und dass sich die Wurzelentwicklung bei Lichtzutritt auch langsamer als im Finstern vollzieht.

§ 2. An vielen Pflanzentheilen ist eine ebenso ausgeprägte Polarität wie an den Weidenzweigen zu constatiren. Ich habe z. B. Kartoffelknollen im Winter in einem Kasten aufgestellt, so dass sie vor dem Licht geschützt waren¹⁾. Die Spitze mehrerer Knollen war nach aufwärts, diejenige anderer nach abwärts gerichtet, aber stets entwickelten sich vorwiegend nur an der morphologischen Spitze, d. h. an demjenigen Knollenende, das dem Nabelende entgegengesetzt ist, kräftige Triebe. Das für ihre Ausbildung erforderliche Wasser sowie die Nährstoffe entnehmen die Triebe unter den bezeichneten Umständen allein der Knolle (vergl. Fig. 170).

Fig. 170. Keimende Kartoffelknolle. T Tragfaden.

Werden 100—150 mm lange und 10 mm dicke Wurzelstücke, z. B. solche von *Ulmus campestris*, bei Lichtabschluss in Glascylindern, die etwas Wasser enthalten, derartig aufgehängt, dass ihre morphologische Spitze nach abwärts oder aufwärts gerichtet ist, so produciren sie stets nur an ihrer morphologischen Basis Adventivsprosse. Neue Wurzeln werden an der morphologischen Spitze der Untersuchungsobjecte seltener erzeugt; sie entstehen hier überhaupt nicht leicht. Die Sprosse bilden, wie wir gesehen haben, an ihrer morphologischen Spitze neue Triebe, die Wurzeln erzeugen hingegen Triebe an ihrer morphologischen Basis.

194. Die Anisotropie der Pflanzenorgane.

Die Richtung, welche die Pflanzentheile bei ihrem Wachstum einschlagen und schliesslich beibehalten, ist keineswegs abhängig von zufälligen Umständen, sondern sie steht in bestimmter Weise in einer causalen Beziehung zu einer Reihe innerer sowie äusserer Wachsthumsmomente. Aus diesem Grunde ist es auch in manchen Fällen möglich, die Ursachen wenigstens bis zu einem gewissen Grade darzulegen, weshalb ein Pflanzentheil unter gegebenen Umständen diese und keine andere Wachstumsrichtung einschlägt, und es mögen hier einige dieser Fälle speciellere Erörterung finden.

1) Vgl. DETMER, Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellschaft f. Naturwissenschaft und Medicin, 1884, S. 5.

Cultivirt man *Phaseoluskeimlinge* in der Weise, wie es unter 172 angegeben worden ist, in einem Zinkkasten hinter Glaswand, so ist leicht zu constatiren, dass die Nebenwurzeln erster Ordnung mit der Hauptwurzel einen bestimmten Winkel, den man als geotropischen Grenzwinkel bezeichnet, bilden. Wir haben unsere Cultur im Dunkeln angestellt, und wenn eine Anzahl von Nebenwurzeln zur Ausbildung gelangt ist, bezeichnen wir die Richtung ihrer Spitzen durch auf die Aussenfläche der Glasscheibe angebrachte Tuschestriche. Jetzt setzen wir unseren Apparat bei constant bleibender Temperatur dem Einfluss des diffusen Tageslichtes aus. Die Spitzen der Nebenwurzeln verändern, wie schon nach 24 Stunden unzweifelhaft hervortritt, ihre Wachstumsrichtung erheblich. Freilich wachsen die Wurzeln auch bei Lichtzutritt nicht senkrecht nach abwärts, aber der geotropische Grenzwinkel der neu gebildeten Wurzeltheile ist doch ein erheblich geringerer als derjenige der im Finstern entstandenen. Das Licht ist also im Stande, das geotropische Verhalten der Wurzeln in bestimmter Weise zu beeinflussen.

Untersuchen wir im Frühjahr den Boden in der Nähe blühender Exemplare von *Adoxa Moschatellina*, so findet man, dass zahlreiche elfenbeinweisse Rhizome dieser Pflanze das Erdreich durchziehen. Sie wachsen horizontal im Boden fort, und es fragt sich, welche Umstände den Plagiotropismus der in Rede stehenden Organe bedingen. Wir schneiden die Enden einiger Rhizomzweige in einer Länge von mehreren Centimetern ab, stecken sie mit ihrer Basis in feuchte Erde, die sich in einem Blumentopfe befindet, so dass ihre Spitzen gerade nach aufwärts gewandt sind, und stellen unsere Vorrichtung unter einer Glasglocke in einen dunkeln Raum. Nach Verlauf von einigen Tagen (bei meinen Versuchen nach 2—3 Tagen) ist der fortwachsende Theil der Rhizomspitzen horizontal gerichtet, und zwar ist die eingetretene Wachstumskrümmung, wie aus unserem Experiment sowie anderweitigen Versuchen hervorgeht, ausschliesslich Folge einer Schwerkraftwirkung. Der Geotropismus der Rhizome von *Adoxa* bringt dieselben aber nicht in eine verticale, sondern, worauf das Hauptgewicht zu legen ist, in eine horizontale Stellung¹⁾.

Wenn wir die mit ihrer Basis in Erde gesteckten *Adoxarhizome* in verticaler oder besser in horizontaler Stellung einseitig beleuchten, so krümmen sich ihre wachsenden Spitzen im Laufe einiger Tage vertical abwärts. Die Abwärtskrümmung erfolgt bald nach dieser, bald nach jener Seite hin; sie zeigt keine bestimmten Beziehungen zu dem Lichteinfall. Das Licht beeinflusst auch hier wieder das geotropische Verhalten der Organe in eigenthümlicher Art (heterogene Induction nach NOLL).

Lehrreich ist es ferner, das folgende Experiment, welches ich mit entblättern Sprossen von *Sida Napaea* ausführte, anzustellen, da dasselbe lehrt, dass vorübergehend auch geotropische Nachwirkungen von Bedeutung für die Wachstumsrichtung von Pflanzentheilen sein können (vergl. übrigens unter 173). Wir stecken das untere Ende eines *Sida*-sprosses in den an einer Wand eines Zinkkastens zusammengehäufte feuchten Sand und überlassen das Untersuchungsobject bei etwa 20° C. 1½ Stunden lang sich selbst in horizontaler Lage, bis eine geotropische Aufwärtskrümmung eben begonnen hat. Jetzt drehen wir den Spross um 90° nach rechts oder links. Nach ferneren 2—3 Stunden

1) Vgl. STAHL, Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. 2, H. 8.

finden wir, dass die Krümmung des Sprosses in Folge einer geotropischen Nachwirkung in horizontaler Richtung eine sehr energische geworden ist. Mit dieser Krümmung hat sich aber eine andere, nach aufwärts gerichtete, die ihr Zustandekommen einer directen Schwerkraftwirkung verdankt, combinirt, so dass der Spross schief aufwärts gewandt erscheint.

Von erheblichem Interesse ist es, die Thatsache festzustellen, dass es Pflanzentheile giebt, deren Richtung sich in Folge ihrer heliotropischen Eigenschaften von dem Stande der Sonne abhängig erweist. Wenn man im Freien wachsende Exemplare von *Tragopogon orientalis* zur Blüthezeit betrachtet, so findet man, dass die Blütenstände nur am Morgen geöffnet sind. Sie schliessen sich im Laufe des Vormittags. In den Morgenstunden sind nun die Blütenköpfchen nach Osten gewandt; sie folgen am Tage dem Laufe der Sonne über Süden nach Westen, ein Phänomen, das ich oft beobachtete, und richten sich in der Nacht gerade empor. Die Bewegung der Blütenstände von *Tragopogon* wird durch den sie tragenden Stengeltheil vermittelt. Dieser ist zur Blüthezeit der Pflanze stark heliotropisch reizbar und wächst auf seiner jeweiligen Schattenseite immer stärker als auf seiner der Sonne direct zugekehrten Seite, so dass die angeführten Bewegungserscheinungen resultiren müssen¹⁾.

Die radiär gebauten Pflanzentheile sind sehr allgemein orthotrop; sie wachsen gerade nach abwärts oder aufwärts. Plagiotrope Organe sind dagegen gewöhnlich dorsiventral.

Wir bedecken den Boden eines grossen Zinkkastens mit feuchtem Sand, häufen einen Theil desselben an einer der Wände des Kastens zu einem Wall zusammen, in welchen wir das untere Ende der Untersuchungsobjecte hineinstecken, so dass dieselben im übrigen den Sand nicht berühren und horizontal gerichtet sind. Wir experimentiren mit Pflanzentheilen, die unter normalen Verhältnissen deutlichen Plagiotropismus erkennen lassen, denn es handelt sich gerade für uns darum, die Ursachen desselben festzustellen, und wählen zunächst junge Stengeltheile von *Pyrus Malus*, Ausläufer von *Potentilla reptans* oder solche von *Ajuga reptans* zur Beobachtung. Es müssen stets mehrere möglichst gleichartig entwickelte Untersuchungsobjecte von 15—20 cm Länge sorgfältig ausgewählt werden; wir entblättern sie und bringen einige derartig in unseren Kasten, dass ihre Oberseite nach oben, andere so, dass ihre Unterseite nach oben gewandt ist. Nun bedecken wir den Kasten mit einem Deckel. Die Stengeltheile bleiben längere Zeit (z. B. 24 Stunden lang) in dem feuchten, dunkeln Raume sich selbst überlassen. Nach dieser Zeit finden wir alle Objecte aufwärts gekrümmt, diejenigen, welche mit der Unterseite nach oben horizontal gelegt worden sind, aber stärker als die übrigen, wie man noch genauer durch Feststellung der Krümmungsradien ermitteln kann. Diese Aufwärtskrümmung ist in jedem Falle Folge des negativen Geotropismus der Stengeltheile, aber bei normaler Lage wirkt demselben die Epinastie entgegen, während das Zustandekommen einer stärkeren Wachsthumskrümmung bei verkehrter Lage der Sprosse als Folge des gleichsinnigen Zusammenwirkens von Geotropismus und Epinastie angesehen werden muss. Die Epinastie, d. h. das stärkere Wachsthum der Oberseite von Pflanzentheilen, ist nach H. DE VRIES

1) Vgl. WIESNER, Denkschrift. d. Akademie d. Wiss. in Wien, Bd. 43.

auf innere Wachstumsursachen zurückzuführen, eine Anschauung, auf die wir noch zurückkommen.

Ausserordentlich stark epinastisch sind auf jeden Fall die Blüten tragenden, unter normalen Verhältnissen horizontal gerichteten Sprosse von *Atropa Belladonna*. Schneidet man solche Sprosse ab und stellt sie mit ihrer Basis in Wasser, so findet man, dass die bei Beginn des Versuches vertical gerichteten Sprossenden nach Verlauf von etwa 12 Stunden, während welcher Zeit die Untersuchungsobjecte im Dunkeln verweilt haben, horizontal gerichtet sind (vgl. Fig. 171).

Fig. 171. Spross von *Atropa Belladonna*, dessen Gipfel sich epinastisch gekrümmt hat.

Ich habe auch jugendliche Enden plagiotropischer Sprosse von *Corylus Avellana* in der schon angegebenen Weise unter Benutzung des feuchten Sand enthaltenden Zinkkastens untersucht. Bei diesen häufig im Laufe des Sommers wiederholten Experimenten fand ich stets, was mit den Angaben von H. DE VRIES nicht übereinstimmt, dass sich die entblätterten, mit der Oberseite nach oben gewandten Sprosse im Zinkkasten nach abwärts, die mit der Unterseite nach oben gewandten Sprosse aber stark nach aufwärts krümmten. Es wirken hier also starke Epinastie und schwächerer Geotropismus zusammen.

Sprosse von *Corylus humilis* krümmen sich bei normaler Lage nach meinen Experimenten im Zinkkasten aufwärts, bei verkehrter Lage indessen gar nicht. Aehnlich verhalten sich nach H. DE VRIES Sprosse von *Prunus avium*. In diesen Fällen ist die Wachstumsrichtung der Pflanzentheile die Resultirende aus dem Zusammenwirken von Geotropismus und Hyponastie, d. h. dem lebhafteren, auf inneren Ursachen beruhenden Wachstum der Sprossunterseite.

Wir wollen nun ähnliche Experimente, wie wir solche mit Sprossen ausgeführt haben, auch mit Blattstielen und Blattmittelrippen anstellen. Wenn man z. B. mit wachsenden Blattstielen von *Calla palustris* und *Petasites*, mit den allgemeinen Blattstielen der gefiederten Blätter vom *Sambucus nigra* oder *Juglans regia* (stets ohne Spreiten), mit der Blattmittelrippe von *Sambucus* experimentirt und die Untersuchungsobjecte in normaler oder verkehrter Lage mit der Basis in den Sandwall des Zinkkastens steckt, so findet man stets, dass sie negativ geotropisch, sowie mehr oder minder stark epinastisch sind.

Ich prüfte zumal das Verhalten von *Calla* und dasjenige der Blattmittelrippe von *Sambucus*. In normaler Lage krümmten sie sich abwärts, in verkehrter stärker aufwärts. Werden Blattstiele oder Rippen im Zinkkasten horizontal auf die Seite gelegt, so dass also ihre Medianebene horizontal liegt, dann muss der negative Geotropismus eine Aufwärtskrümmung in verticaler Ebene anstreben, die Epinastie aber eine Krümmung in horizontaler Ebene. Die thatsächlich erfolgende, resultirende Krümmung muss also in schiefer Ebene stattfinden.

Werden wachsende Blattstiele, und zwar theils nach Entfernung, theils ohne Beseitigung der Spreite, in dem Zinkkasten in horizontale Lage gebracht, wobei darauf zu achten ist, dass die Oberseite der Organe stets nach oben gewandt ist, dann krümmen sich die Stiele, denen man die Spreite belassen hat, im Falle ihre Epinastie keine zu bedeutende ist, gar nicht oder doch viel schwächer aufwärts als jene, welche von der Spreite befreit wurden. Die Belastungsverhältnisse sind hier also von Einfluss auf den Erfolg des Versuchs gewesen. Zahlreiche weitere Angaben über die besprochenen Erscheinungen und auch über Bestimmung der Zuwachsgrösse bei dem Zustandekommen der erwähnten Krümmungen von Spross- sowie Blatttheilen findet man in einer werthvollen Abhandlung von H. DE VRIES über unseren Gegenstand¹⁾.

Es ist bereits erwähnt worden, dass die Blattspreiten, Blattstiele und viele Sprosse das Vermögen besitzen, auf ihrer morphologischen Oberseite energischer als auf ihrer Unterseite zu wachsen. Dies epinastische Verhalten der erwähnten Organe besitzt grosse Bedeutung für das Zustandekommen ihrer normalen plagiotropen Orientirung, und H. DE VRIES vertritt die Ansicht, nach welcher die Epinastie Folge innerer Wachstumsursachen sein soll. Ich bin bei Untersuchungen über die Ursachen der Epinastie der Blätter von *Phaseolus multiflorus* und *Cucurbita* zu anderen Resultaten gelangt²⁾. Man cultivire Keimlinge von *Phaseolus* und *Cucurbita* bei völligem Lichtabschluss in Blumentöpfen. Bei etwa 20° C. hat sich das hypocotyle Glied von *Cucurbita* in etwa 10 Tagen bis zu beträchtlicher Länge entwickelt; die Cotyledonen sind gerade aufgerichtet, sie schliessen mit ihrer Oberseite dicht zusammen. In etwa 14 Tagen ist das Epicotyl von *Phaseolus* bis zu bedeutender Länge herangewachsen, und die langgestielten Primordialblätter zeigen in Folge hyponastischen Wachstums, d. h. stärkeren Wachstums ihrer Unter- als ihrer Oberseite, ein muscheliges Aussehen. Werden die Keimpflanzen nunmehr hellem, diffusem Tageslicht ausgesetzt, so verlieren die Primordialblätter der Bohne in Folge epinastischen Wachstums ihre muschelige Gestalt; ebenso wächst jetzt die Oberseite der *Cucurbita*cotyledonen lebhaft, so dass diese Organe aus ihrer ursprünglich orthotropen in eine plagiotrope Stellung übergehen. Das Licht ruft aber erst das energischere Wachstum der Blattoberseite hervor; im Finstern kommt dasselbe nicht zu Stande. Die Epinastie ist keine spontane, sondern eine paratonische Nutationserscheinung, und wir reden fernerhin nicht mehr kurzweg von Epinastie, sondern von Photoepinastie der Blätter. Bringen wir unsere *Phaseolus*- oder *Cucurbita*keimlinge, nachdem sie im Finstern das bezeichnete Entwicklungsstadium erreicht haben,

1) Vgl. H. DE VRIES, Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg, Bd. 1, S. 223.

2) Vgl. DETMER, Botan. Zeitung, 1882, No. 46.

3—5 Stunden lang in diffuses Licht, so ist noch keine photoepinastische Bewegung eingetreten. Stellen wir die Untersuchungsobjecte nun aber ins Dunkle zurück, dann breiten sich die Blätter im Laufe von 6—12 Stunden aus. Es kommt hier also eine photoepinastische Nachwirkungserscheinung zur Geltung.

Die photoepinastischen Nutationen treten stets ein, wenn die im Dunkeln erwachsenen und noch nicht zu alten Keimpflanzen beleuchtet werden, mag das Licht die Untersuchungsobjecte von oben oder in einer anderen Richtung treffen. Die Blätter suchen sich nahezu rechtwinkelig zu der Richtung der einfallenden Lichtstrahlen zu stellen, und bei den Experimenten mit *Cucurbita* wird man auch leicht die Thatsache constatiren, dass hier — und Aehnliches gilt ebenso für andere Fälle — ein Organ (nämlich das hypocotyle Glied) einen wesentlichen Einfluss auf die schliessliche Orientirung anderer Organe (der Cotyledonen) zum Licht geltend macht. Das stark positiv heliotropische Verhalten des hypocotylen Gliedes spielt bei dem Zustandekommen der Lichtlage der Blätter, wenn die Keimpflanzen nur von einer Seite aus beleuchtet werden, eine wesentliche Rolle.

Werden wachsende Blätter aus ihrer normalen Lage in abnorme Stellung zum Licht gebracht, so haben sie das Bestreben, wieder in jene erstere zurückzukehren. Ich habe zur Feststellung dieser Thatsache eine Reihe von Experimenten angestellt, und es ist lehrreich, dieselben zu wiederholen. Man cultivirt einige Exemplare von *Cucurbita* in Blumentöpfen. Haben die Pflanzen mehrere Blätter gebildet, so beginnen die Versuche. Einige Blätter werden derartig aufgerichtet, dass ihr Blattstiel vertical gestellt ist und die Spitze der Spreiten nach oben weist. Die Blätter werden an kleinen Stäben durch Anbinden befestigt, und zwar bringt man die Fäden dicht unter den Spreiten am Ende der Stiele an. Stellt man die Pflanzen bei einseitiger Beleuchtung derartig auf, dass die Unterseiten der befestigten Blätter dem Licht zugewandt sind, so werden die Spreiten in Folge photoepinastischer Bewegungen alsbald wieder eine normale Stellung zum Licht erreicht haben. Ertheilt man einem Blumentopf, in welchem sich *Cucurbita*-pflanzen entwickeln, bei einseitiger Beleuchtung eine derartige Lage, dass die nicht festgebundenen Blattstiele ebenso wie die mit ihrer Unterseite dem Licht zugekehrten Blattspreiten eine verticale Stellung einnehmen, dann führen die Organe heliotropische und photoepinastische Bewegungen aus, um wieder in die normale Lichtlage zurückzukehren. Bringen wir *Cucurbita*-pflanzen, die sich unter normalen Verhältnissen entwickelt haben, ins Dunkle und sorgen wir dafür, dass einige ihrer Blätter (Stiel und Spreite derselben) vertical gerichtet sind, so führen die Spreiten photoepinastische Nachwirkungsbewegungen aus, bis sie eine horizontale Stellung erreicht haben.

Von besonderem Interesse mit Rücksicht auf die Fragen, welche sich auf die natürliche Richtung der Pflanzentheile und deren Anisotropie beziehen, ist es, einige Beobachtungen und Experimente über das Wachsthum der Sprosse von *Hedera Helix* anzustellen. Die Epheusprosse sind, abgesehen von dem erst in einem höheren Alter der Pflanzen zur Entwicklung kommenden und orthotropen Fruchtspresse, ausgeprägt dorsiventral und plagiotrop. Werden frei schwebende Epheusprosse von etwa 30 cm Länge abgeschnitten, in Töpfe eingepflanzt und nach Verlauf von 6—8 Wochen, wenn sie kräftig angewurzelt sind, an einem verticalen Stabe festgebunden, so kann

man an dem über das Stabende hervorragenden Gipfel der Sprosse unter geeigneten Umständen interessante Erscheinungen wahrnehmen.

Als ich die Epheupflanzen, die in der soeben angegebenen Weise vorbereitet waren, im August vor das Fenster eines nach Norden gelegenen Zimmers stellte, zeigte sich, dass die Sprossenden sich als-

Fig. 172. Spross von *Hedera Helix*, dessen Gipfel sich bei einseitiger Beleuchtung von den einfallenden Lichtstrahlen wegkrümmt hat.

bald vom Fenster wegwandten. Die Gipfelenden wuchsen in horizontaler Richtung in das Zimmer hinein und besaßen nach Verlauf von 4 Wochen das in Fig. 172 dargestellte Aussehen. Die Sprosse führten negativ heliotropische und photoepinastische Krümmungen aus (über den Modus der Lichteinwirkung sind übrigens noch weitere Untersuchungen anzustellen). Die Lichtseite der Sprosse musste in Folge dessen convex werden und eine Horizontalstellung der Sprossenden herbeiführen. War diese erreicht, so krümmten sich die Sprossenden nicht noch weiter nach abwärts, weil jetzt der negative Geotropismus (die geotropischen Eigenschaften der Epheusprosse sind von SACHS speciell constatirt) sein Recht energisch geltend machen konnte. Es ergibt sich, dass die Horizontalstellung der Epheusprosse also eine Resultirende aus der richtenden Wirkung des Lichtes einer- und der Schwerkraft andererseits ist (?). Dieselben Momente sind auch maassgebend für die Richtung, welche die Sprosse der in der freien Natur wachsenden Epheupflanzen einschlagen.

Im Vorstehenden sind zunächst nur gewisse Eigenschaften der Blatttheile und mancher Sprosse festgestellt worden. Man hat nun versucht, die normale Stellung der Blätter und Sprosse unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften zu erklären. Man fasste die normale Stellung der Organe vielfach als eine aus dem Zusammenwirken verschiedener Kräfte hervorgehende auf. Die so häufig rechtwinkelige Stellung der Blattspreiten soll danach z. B. wesentlich durch das Zusammenwirken der Photoepinastie einer- und des negativ geotropischen Verhaltens der Organe andererseits zu Stande kommen.

In der That ist sicher, dass die normale Stellung von Blattstielen und auch gewiss vieler Sprosse in der angedeuteten Weise erklärt werden kann. Aber gerade mit Bezug auf die Blattspreiten lässt uns der bezeichnete Weg im Stich. VÖCHTING, SCHWENDENER und

Andere wiesen nach, dass weder geotropische Bewegungen der Spreiten, noch Belastungsverhältnisse bei dem Zustandekommen ihrer fixen Lichtlage direct und nothwendig theilhaftig sein müssen. Vielmehr ist das Licht selbst hier als maassgebender Factor zu betrachten, wie auch ich jetzt annehme¹⁾. Die Bewegungen, welche von den Spreiten zur Erreichung der günstigsten Lichtlage ausgeführt werden (dieselbe ist meist eine solche, dass sich die Spreiten senkrecht zu den einfallenden Lichtstrahlen stellen), vollziehen sich auf dem kürzesten Wege mit Ueberwindung der geringsten Schwierigkeiten. Diese durch das Licht ausgelösten Bewegungen sind aber von sehr verschiedener Natur (photoepinastische Nutationen, Torsionen) und bedingt durch die ursprüngliche Stellung der Blätter selbst. Bei dem Zustandekommen der Orientirungsbewegungen der Blattspreiten braucht der Geotropismus, wie gezeigt werden soll, keine Rolle zu spielen. Ihre geotropische Reizbarkeit, die nach den bereits angeführten Experimenten aber doch unter bestimmten Umständen (im Dunkeln) vorhanden ist, kann sogar wahrscheinlich durch Lichtwirkung aufgehoben werden.

Dass die Photoepinastie bei dem Zustandekommen der normalen Lichtlage der Blattspreiten theilhaftig ist, ist schon nach den oben angeführten Experimenten mit *Phaseolus*- und *Cucurbita*-pflanzen klar, denn dieselbe bringt ja z. B. das Ausbreiten der bei vielen Pflanzen im Dunkeln muschelrig eingerollten Blätter bei Lichtzutritt hervor.

Keimlinge von *Cucurbita*, die sich so lange im Dunkeln entwickelt haben, bis ihr Hypocotyl ziemlich gestreckt ist und die Cotyledonen aufgerichtet sind, werden in einen mit mattschwarzem Papier ausgeklebten Kasten gestellt, dessen Rückwand ziemlich hoch, dessen vordere Wand aber niedrig ist, so dass der Deckel des Kastens durch eine in einem Winkel von etwa 45° geneigte Glasplatte gebildet werden kann. Das Hypocotyl der Keimlinge wird, um das Auftreten heliotropischer Nutationen an demselben zu verhindern, durch Festbinden an einem Stab fixirt, welcher in der Erde des Culturgefässes steckt. Man stellt die Pflanzen nun derartig im Kasten auf, dass die breiten Flächen der Cotyledonen dem Fenster, vor welchem der Apparat Platz fand, zugewandt sind. Beide Cotyledonen haben sich nach Verlauf einiger Zeit senkrecht zu den einfallenden Lichtstrahlen gestellt. Das vordere Keimblatt muss dazu einen Kreisbogen von 135° nach abwärts beschreiben, das hintere aber nur einen solchen von 45° nach rückwärts. Wollte man die Entstehung der Orientirungsbewegungen der Cotyledonen unter Zuhülfenahme der Schwerkraftwirkung (und anderer Kräfte) erklären, so müsste man die doch gewiss nicht zutreffende Annahme machen, dass die geotropische Reizbarkeit der beiden Keimblätter einer Pflanze eine verschiedene sei. Besonders eignen sich aber die folgenden Experimente dazu, den Nachweis zu führen, dass die Lichtstellung der Blattspreiten lediglich durch die Lichtwirkung erzielt werden kann.

1) Literatur: FRANK, Die natürliche wagerechte Stellung der Pflanzentheile, Leipzig 1870; C. DARWIN, The Power of Movement in Plants, London 1880; F. DARWIN, Extr. f. the Linnean Society's Journal, Botany, Vol. 18 (Dec. 1880); SCHMIDT, Dissertation, Berlin 1883; NOLL, Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg, Bd. 3; KRABBE, PRINGSHEIM's Jahrbücher, Bd. 20; VÖCHTING, Botanische Zeitung, 1888; NOLL, Ueber heterogene Induction, Leipzig 1892; SCHWENDENER und KRABBE, Abhandl. d. Königl. preuss. Akad. d. Wiss., Berlin 1892; NOLL, Die Orientirungsbewegungen dorsiventraler Organe, München 1892.

Wir cultiviren Keimpflanzen von *Phaseolus* in Blumentöpfen. Die Objecte sind zur Untersuchung geeignet, wenn die Primordialblätter sich entfaltet haben, sich aber noch in sehr lebhaftem Wachsthum befinden. Beleuchten wir die Pflanzen von oben, dann zeigen die Blätter die in Fig. 173 dargestellte Stellung. Lässt man nun das Licht nicht senkrecht von oben, sondern horizontal und zwar annähernd senkrecht zur Insertionsebene der Blätter einfallen, so tritt im Polster der Blattstiele sowie der Spreiten eine Torsion von nahezu 90° ein. Die Spreiten stehen dann abermals rechtwinkelig zu den einfallenden Lichtstrahlen (vergl. Fig. 175). Jetzt werden Pflanzen mit der Blattstellung von Fig. 173 langsam gedreht, so dass ihre Sprossachsen eine senkrecht stehende Kreisfläche beschreiben, während das Licht ziemlich senkrecht zur Insertionsebene der Blätter einfällt. Die Schwerkraftwirkung ist aufgehoben, und die sich nunmehr

Fig. 173—176. Junge *Phaseolus*pflanzen.
(Nach SCHWENDENER.)

ungehindert geltend machende Epinastie der Polster der Blattstiele sowie Spreiten führt zunächst dahin, dass die Blätter die in Fig. 174 wiedergegebene Stellung annehmen. Dann aber macht sich nach kurzer Zeit im Spreitenpolster und auch eventuell im Blattstiel eine Krümmung (keine Torsion) geltend, wodurch die Lamina schräg nach vorn dem Licht zugewandt wird (vergl. Fig. 176). Wir sehen also, dass die Blätter auch bei völligem Ausschluss der Schwerkraftwirkung eine fixe Lichtlage gewinnen können. Bei dem Zustandekommen derselben sind, was besonders zu betonen ist,

Torsionen ausgeschlossen.

Diese letzteren spielen aber, wie wir gesehen haben, unter anderen Umständen bei den Orientirungsbewegungen der Blätter zu den einfallenden Lichtstrahlen eine wichtige Rolle.

195. Allgemeines über die Festigung der Pflanzenorgane.

Die Pflanzen bedürfen ebenso wie die Thiere bestimmter Einrichtungen, um gewissen äusseren Einwirkungen gegenüber widerstehen und ihre Gestaltungen bewahren zu können. In manchen Fällen spielen Turgor- und Gewebespannung eine wichtige Rolle als Mittel zur Festigung des Organismus, aber durch die Untersuchungen SCHWENDENER'S¹⁾ wurde ferner noch der Nachweis geliefert, dass den

1) Vgl. SCHWENDENER, Das mechanische Princip im anatomischen Bau der Monocotylen, Leipzig 1874.

Pflanzen ein mehr oder minder zusammenhängendes mechanisches System (Stereom) eigenthümlich ist, dem in vieler Hinsicht ganz ähnliche Functionen wie dem Knochengerüst der höheren Thiere zukommt.

Als Elementarorgane (Stereiden) des mechanischen Systems kommen vor allem die Sklerenchymfasern im Grundgewebe, die echten Bastfasern, die Collenchymfasern und die Libriformfasern in Betracht. Die Sklerenchymzellen und die echten Bastfasern sind lang gestreckte Elemente, deren oft verholzte Membranen stark verdickt erscheinen (vgl. Fig. 177). Ihnen in vieler Hinsicht ähnlich sind die Libriformfasern des Holzes, deren stark verdickte Wandung häufig mit spaltenförmigen Tüpfeln versehen ist. Sehr reich an Libriformfasern ist z. B. das secundäre Holz von *Tilia*. Als mechanisches Gewebe vieler jugendlicher, noch im Wachsthum begriffener Pflanzentheile ist endlich das Collenchym anzusehen. Die Elemente desselben sind leicht an der charakteristischen Form ihrer Wandverdickung kenntlich, denn diese letztere ist der Hauptsache nach nur auf die Kanten der Zellen beschränkt (vgl. Fig. 178).

Fig. 177.

Fig. 178.

Fig. 177. Sklerenchymgewebe im Querschnitt.

Fig. 178. Collenchymgewebe im Querschnitt.

Zur Erzielung von Biegungs-, Zug- und Druckfestigkeit der Pflanzenorgane genügt nun aber keineswegs das Vorhandensein von Stereiden überhaupt, sondern dieselben müssen zugleich eine ganz bestimmte Anordnung im übrigen Gewebe besitzen.

Bei Herstellung allseitig biegungsfester Constructionen (zumal der Stengel) genügt es, wenn die mechanischen Elemente rings im Umkreis des Querschnittes, also peripherisch, angeordnet sind. Die Füllung zwischen den Gurtungen wird von Parenchym und anderem Gewebe gebildet. Bei vielen Organen, zumal den Blättern, die keiner allseitigen Biegungsfestigkeit bedürfen, ist das mechanische Gewebe nur auf der Ober- und Unterseite vertheilt. Zugfeste Constructionen werden im Pflanzenreiche dadurch erzielt, dass die mechanischen Elemente in den betreffenden Organen nicht peripherisch, sondern im Gegentheil central und zu einer einzigen compacten Masse verbunden angeordnet sind (Wurzeln, Rhizome). Bei Herstellung druckfester Constructionen ist es nicht gleichgültig, ob dieselben auf einen longi-

tudinalen Druck oder auf einen radialen Druck in Anspruch genommen werden. Einem radialen Druck sind ausser einem erheblichen Zuge namentlich die sich im Boden entwickelnden Wurzeln und Rhizome

Fig. 179. Apparat zur Bestimmung der Dehnbarkeit, Elasticität und Festigkeit von Pflanzengewebe.

ausgesetzt; sie sind daher häufig, abgesehen von anderweitigem Stereom, mit einem peripherisch gelegenen Mantel mechanischen Gewebes ausgestattet.

Für die richtige Beurtheilung der Leistungsfähigkeit der mechanischen Gewebe im pflanzlichen Organismus ist es von Wichtigkeit, sich genauer über die Festigkeit, das Tragvermögen¹⁾ und die Elasticitätsverhältnisse des Stereoms zu unterrichten; es kann dies mittelst des in Fig. 179 abgebildeten Apparates geschehen, den ich kürzlich construiren liess. Derselbe ist in allen seinen Theilen sehr solide construirt. Er besteht aus einem Brett *B*, auf dem die beiden Holzsäulen *H* und *H'* von ca. 86 cm Höhe befestigt sind. Der Zwischenraum zwischen den Säulen beträgt 14 cm. Der zu untersuchende Pflanzentheil von ca. 300—400 mm Länge wird mit seinem oberen Ende zwischen die Holzklötze *a* und *b*, mit seinem unteren Ende aber zwischen die Holzklötze *c* und *d* durch Anziehen der Schrauben *sch* und *sch'* eingeklemmt. Die Schale *Sl*, welche an *c* und *d* hängt, dient zur Aufnahme von Gewichten, um das Untersuchungsobject zu dehnen resp. zu zerreißen. An dem Häkchen *Hk* des Holzklotzes *c* ist ein Seidenfaden *F* befestigt, der durch eine Bohrung, welche die Berührungsflächen der Klötze *a* und *b* in sich aufnimmt und durch diese halbirt wird, über die leicht bewegliche Rolle *R* und durch eine Bohrung in *a* geführt ist. An seinem Ende trägt der Faden *F* das spannende Gewicht *g*. Die Rolle *R* trägt den Zeiger *Z*, der die 10-fache Länge des Radius der Rolle besitzt. *Z* spielt vor dem in Millimeter eingetheilten Gradbogen *Gr*. Die in Folge der Belastung eingetretene Ausdehnung des zu untersuchenden Pflanzentheils kann also verzehnfacht am Gradbogen abgelesen werden. Beim Gebrauch des Apparates sind dicht unter die Schale *Sl* Holzklötze *K* zu stellen, damit die Fallhöhe der belasteten Schale beim Zerreißen des Pflanzentheils eine nur geringe ist.

Zur Beobachtung verwendet man zunächst zweckmässig, wie ich es auch gethan habe, einen etwa 400 mm langen und 2 mm breiten Riemen aus dem mittleren Theile des Blattes von *Phormium tenax*. Auch lange Internodien aus Roggenhalmen sind geeignete Untersuchungsobjecte. Man spannt aber nicht die ganzen Internodien in den Apparat ein, sondern Riemen, die man durch Zerspalten des Materials in vier Theile erhalten hat.

Ist ein solcher Riemen in den beschriebenen Apparat eingespannt worden, so dehnt man ihn durch 1 kg Belastung, ermittelt die Grösse der eingetretenen Dehnung und entfernt das Gewicht wieder. Nimmt der Pflanzentheil jetzt seine ursprüngliche Länge aufs Neue an, so war durch die Dehnung seine Elasticitätsgrenze noch nicht überschritten. Man wiederholt den Versuch nun mit 2,3—10 kg Belastung, bis der Riemen endlich bei einer gewissen Belastung zerreißt. Experimentirt man mit Gewebestreifen, die, wie diejenigen aus dem *Phormium*blatt, Bastfasern oder Sklerenchymfasern als mechanisches Gewebe enthalten, so wird man finden, dass sie selbst bei hoher Belastung noch fast vollkommen elastisch bleiben, während collenchymreiche Pflanzentheile, obgleich sie auch eine bedeutende Festigkeit besitzen, nur sehr unvollkommen elastisch sind, sich also in Folge einer Dehnung bleibend verlängern. Zur genaueren Bestimmung der Festigkeit eines Gewebestreifens muss man dieselbe auf 1 qmm Stereom-

1) Die auf die Flächeneinheit des Querschnittes bezogene maximale Belastung, bei welcher die Elasticitätsgrenze noch nicht überschritten ist, repräsentirt das Tragmodul. Das Festigkeitsmodul stellt dann jene Belastung für die Flächeneinheit dar, bei welcher das Zerreißen erfolgt.

fläche berechnen. Wenn z. B. bei 30-facher Vergrößerung¹⁾ das mechanische Gewebe eines Phormiumblattquerschnittes einen Flächenraum von 900 qmm einnimmt, so ist die thatsächliche Querschnittfläche des Stereoms = 1 qmm. Reisst der Phormiumriemen bei 15 kg Belastung durch, dann wäre das Festigkeitsmodul von 1 qmm Phormiumstereom = 15 zu setzen. Es hat übrigens häufig ganz bedeutende Schwierigkeiten, die wirkliche Querschnittfläche des Stereoms auch nur einigermaassen genau zu ermitteln. In vielen Fällen ist man hier auf ungefähre Schätzungen angewiesen²⁾.

Am besten gelangt man noch zum Ziel, wenn man zarte Schnitte aus dem Untersuchungsobject, die der schwächsten Stelle desselben zu entnehmen sind, also z. B. derjenigen, an welcher das Zerreißen durch die Belastung erfolgte, bei schwacher (etwa 30-facher) Vergrößerung mit Hülfe des Zeichenapparates skizzirt, um sodann die Querschnittfläche der mechanischen Elemente mittelst des Polarplanimeters (zu beziehen nebst Gebrauchsanweisung von J. KERN in Aarau, Schweiz, für 45 Mk.) oder mittelst Millimeterpapier (durchscheinendes Pause-Skizzirpapier ist zu beziehen von SCHLEICHER und SCHÜLL in Düren, Rheinpreussen; Preis von 25 Bogen 12 Mk.) auf der Skizze zu messen. Wenn erforderlich, ist das Verhältniss des Lumens zur Wanddicke zu berücksichtigen. Feste Xylemstränge werden bei der Messung mit in Rechnung gestellt.

In vielen Fällen, namentlich bei Prüfung der Festigkeitsverhältnisse des Collenchyms, empfiehlt es sich, folgendes Verfahren zur Bestimmung der Querschnittfläche des mechanischen Gewebes einzuhalten. Man zeichnet bei stärkerer Vergrößerung das getreue Bild einer grösseren Anzahl Collenchymzellen auf gutes Schreibpapier, von dem man annehmen kann, dass es an allen Stellen nahezu die nämliche Dicke besitzt. Man bestimmt nun das Gewicht des Papierstückes, welches von der Zeichnung bedeckt wird, entfernt die Zellumina mittelst eines Messers und wiegt das übrig bleibende Netz wieder. Das Verhältniss der beiden Gewichte ergibt dann das Verhältniss des Gesamtquerschnittes zu demjenigen der Zellwandung. Skizzirt man nun bei schwacher Vergrößerung den Gesamtumriss der Collenchymstränge eines Querschnittes des Untersuchungsobjectes und bestimmt die Querschnittfläche desselben, so kann man den Gesamtquerschnitt der Wandsubstanz des mechanischen Gewebes leicht ermitteln. Gute Untersuchungsobjecte bei Versuchen über die Festigkeitsverhältnisse des Collenchyms sind z. B. Streifen aus den Stengeln von *Levisticum officinale* und *Foeniculum officinale*.

196. Die Anordnung des mechanischen Gewebes in biegungs-, zug- und druckfesten Pflanzentheilen.

Es soll hier eine Reihe von Objecten, die ich der Mehrzahl nach selbst untersuchte, aufgeführt werden, welche sich für das Studium

1) Um die Vergrößerung, mit der man arbeitet, genau zu bestimmen, zeichnet man die Striche eines in 0,01 mm getheilten Objectivmikrometers unter Benutzung der Camera lucida auf das Papier des Zeichenpultes auf. Wir messen nun die Entfernung der gezeichneten Striche mittelst eines Millimetermaassstabes und gelangen so zu einem Werth, aus dem sich die Stärke der Vergrößerung direct ableiten lässt.

2) Weitere Literatur: AMBRONN in PRINGSHEIM's Jahrbüchern, Bd. 12; HABERLANDT, *Physiol. Pflanzenanatomie*, Leipzig 1884, S. 96; TSCHIRCH in PRINGSHEIM's Jahrbüchern, Bd. 16; LUKAS, *Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. zu Wien*, Bd. 85; SONNTAG, *Landwirthschl. Jahrbücher*, Bd. 21.

der Anordnung des Stereoms gut eignen. Man braucht dazu nur Querschnitte der Pflanzentheile mikroskopischer Beobachtung zu unterziehen, und wir beginnen mit biegungsfest gebauten Organen.

Im Blattstiel von *Begonia* wird das mechanische Gewebe von einem direct unter der Epidermis gelegenen mächtigen Collenchymring gebildet. Derselbe umgiebt Parenchymgewebe, in welchem die Gefässbündel vertheilt sind. Im Stengel von *Lamium album* verlaufen in den vier Kanten Collenchymgurtungen, die zwei kreuzweise combinirte Träger bilden. Der Querschnitt des Stengels von *Falcaria rivini* lässt ein grosses Mark, den Gefässbündelkreis und unter der Epidermis Collenchymstränge als mechanisches Gewebe erkennen, welches mit Assimilationsparenchym wechselt.

In den Blüthenschäften von *Papaver*, *Armeria maritima*, *Lychnis viscosa* und *Anthericum ramosum* ist das mechanische Gewebe in Form eines geschlossenen Sklerenchymrings vorhanden. Zwischen diesem und der Epidermis befindet sich grünes Gewebe, während im Innern die Gefässbündel ihren Platz haben. Bei mikroskopischer Untersuchung eines Querschnitts aus dem Halm von *Juncus glaucus* erblickt man unter der Epidermis grünes Gewebe und Sklerenchymbündel, welche mit jenem abwechseln. Ferner sieht man weite Luftkanäle und zahlreiche Gefässbündel mit einigen ziemlich weiten Gefässen, die auf ihrer Innen- sowie Aussenseite mit einem Bastfaserbeleg versehen sind, im Grundgewebe vertheilt. Das Bild, das man bei dem Studium eines Querschnittes aus dem Halm von *Sesleria coerulea* erblickt, ist leicht zu deuten, und vor allem interessiren uns hier die Bastbelege der Gefässbündel, weil sie als mechanisches Gewebe dienen. Im Halm von *Molinia coerulea* ist ein geschlossener Ring mechanischen Gewebes vorhanden, der noch durch subepidermale Rippen, die an ihn anschliessen, verstärkt wird. Die Gefässbündel sind jenem Ringe theils eingebettet, theils werden sie von demselben umgeben. Aehnlich ist auch der Halm des Roggens gebaut.

Von Interesse ist es auch, das mechanische Gewebe der Blattscheiden der Gräser kennen zu lernen. Diese röhrenförmigen Scheiden umfassen die Stengeltheile des Halmes, und es kommt ihnen zumal die Aufgabe zu, die zarten, wachsenden Stengelregionen, welche bekanntlich bei den Gräsern an der Basis der Internodien liegen, zu schützen. Wir stellen z. B. feine Querschnitte aus dem dicht über einem jungen Knoten liegenden Theile eines Roggenhalmes her. Unter der Epidermis der Innenseite der Blattscheide erblicken wir chlorophyll-freies, unter der Epidermis der Aussenseite aber chlorophyllhaltiges Gewebe. Die Gefässbündel sind leicht zu erkennen; sie sind auf ihrer Aussen- sowie Innenseite mit mächtig entwickelten Bastfaserbelegen versehen.

Wollen wir die Anordnung des mechanischen Gewebes in nicht allseitig biegungsfest gebauten Organen kennen lernen, so stellen wir z. B. Querschnitte durch das Blatt von *Phormium tenax* und durch die Mittelrippe völlig ausgewachsener Blätter von *Zea Mays* her. Das *Phormium*blatt ist in seinem oberen und unteren Theile nicht völlig gleichartig gebaut, aber auf jeden Fall werden die Gefässbündel bedeckenden Stereombündel an der Blattober- und Blattunterseite uns sofort in die Augen fallen. Bei *Zea* sind an der Blattoberseite subepidermale Sklerenchymmassen vorhanden; das mechanische Ge-

webe der Blattunterseite steht in genauer Beziehung zur Gruppierung der grösseren Gefässbündel.

Zug- sowie druckfest sind, wie früher schon bemerkt, zumal Rhizome und Wurzeln gebaut. Wir stellen einen Querschnitt durch das Rhizom von *Carex glauca* her. Der freilich nicht sehr mächtig entwickelte peripherische Sklerenchymring gewährt Schutz gegen radialen Druck. Der central gelegene, aus dickwandigen Elementen bestehende Hohlcyylinder, in welchen die meisten Gefässbündel eingestreut sind (einige Gefässbündel liegen auch ausserhalb dieses Cylinders), dient zur Herstellung der Zugfestigkeit des Organs. Einer ganz ähnlichen Anordnung der mechanischen Gewebe begegnet man bei der Untersuchung des Querschnitts aus den Nebenwurzeln erster Ordnung von *Zea Mays*. Der peripherische Sklerenchymring ist hier nur viel mächtiger als im *Carexrhizom* entwickelt¹⁾.

Es sei noch bemerkt, dass sich in allen Fällen, welche ich untersuchte, die Sklerenchymfasern und Bastfasern des mechanischen Gewebes bei Behandlung der Schnitte mit Phloroglucin und Salzsäure (vgl. unter 42) roth färbten, also verholzt gewesen sein mussten.

197. Die Correlationsercheinungen im Pflanzenreich.

Das Wachsthum eines Pflanzentheils übt häufig einen bestimmten Einfluss auf dasjenige anderer Theile desselben Individuums aus. Man hat in neuerer Zeit damit begonnen, den Thatsachen, welche sich auf Correlationen im Pflanzenreich beziehen, eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und wir wollen uns hier mit einigen dieser Thatsachen bekannt machen.

Wenn man junge Fichten (*Abies excelsa*) ihres Gipfeltriebes beraubt, so ergibt sich, dass sich im Laufe von 1—3 Jahren einer oder mehrere der horizontal abstehenden Seitensprosse des obersten Quirls erheben. Einer der Seitensprosse gewinnt gewöhnlich die Oberhand; er ersetzt dann den entfernten Gipfeltrieb vollständig. Dies zeigt sich nicht allein in seinem orthotropen Wuchs, sondern auch in der Form seiner Verzweigung. Ein horizontaler Seitenspross der Fichte verzweigt sich vorwiegend in horizontaler Richtung nach rechts und links, während ein normaler Gipfeltrieb oder ein diesen ersetzender aufgerichteter Seitenspross der Fichte vier- oder fünfstrahlige Astquirle bildet. Die Versuche, welche ich anstellte, um die hier besprochene Correlationsercheinung kennen zu lernen, wurden mit im Walde wachsenden, etwa mannshohen Fichten ausgeführt²⁾.

Wenn man Kartoffelknollen in einem dunkeln Raum derartig aufstellt, dass ihr Nabelende nach abwärts gewandt ist (die Knollen brauchen nicht in Erde gelegt zu werden, und man braucht ihnen auch kein Wasser zuzuführen), so findet man, dass nach kürzerer oder längerer Zeit fast nur solche Knospen austreiben, die nahe der morphologischen Spitze der Knollen stehen. Entfernt man nun aber bei einigen Untersuchungsobjecten die sich an ihrer Spitze entwickelnden Sprosse in dem Maasse, wie sie entstehen, so ergibt sich, dass

1) Man vergl. auch die unter 195 citirten Schriften, zumal SCHWENDENER's Werk.

2) Vgl. SACHS, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, 1882, S. 612.

diese Operation das Austreiben tiefer stehender Augen bedingt, deren Knospen nicht oder nur in unbedeutendem Grade zur Ausbildung gelangt wären, wenn man die Sprosse an der Spitze nicht abgebrochen hätte.

Eine weitere Correlationserscheinung kann man an Keimlingen von *Phaseolus multiflorus* leicht constatiren. Wenn man dieselben in lockerer Gartenerde cultivirt und das Epicotyl, nachdem es einige cm lang geworden ist, dicht über dem Boden abschneidet, so entwickeln sich statt des entfernten Stengeltheils die in den Achseln der Cotyledonen vorhandenen Knospen zu Sprossen, welche bald aus dem Boden hervortreten.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass sich die Stiele der Blütenknospen fast aller Arten der Gattung *Papaver* in einem gewissen Entwicklungsstadium nach abwärts krümmen, eine Erscheinung, die, soweit die Untersuchungen reichen, auf Correlation beruht. Die mit ihrem Stiel in organischer Verbindung befindliche Knospe übt auf denselben einen bestimmten Einfluss aus, welcher dahin führt, dass er sich stark krümmt und nach abwärts biegt. Der Beweis für das Gesagte liegt in dem Resultat des folgenden, zuerst von VÖCHTING¹⁾ ausgeführten Experiments, das ich mit gutem Erfolg unter Benutzung einer im Freien wachsenden Mohnpflanze wiederholte. Man schneidet einige Knospen von ihren Stielen ab und überlässt die letzteren nun ohne weiteres sich selbst oder befestigt in anderen Fällen die Knospen mit Hülfe feiner Seidenfäden wieder an ihren Stielen. Die Krümmung der Stiele verschwindet stets nach Verlauf einiger Zeit, und unser Versuch lehrt, dass ihr Vorhandensein keineswegs einfach Folge des Knospengewichts ist, sondern auf Correlation beruht.

In hohem Grade lehrreich ist es, mit Rücksicht auf den uns hier interessirenden Gegenstand die Eigenthümlichkeiten und das Verhalten der Knospenschuppen verschiedener Pflanzen genauer ins Auge zu fassen²⁾. Bei *Aesculus* und *Pavia* sind die äusseren Schuppen der Winterknospen braun und häutig. Es folgen dann saftige, grüne, recht grosse Schuppen und endlich die Laubblätter. Die entwicklungsgeschichtliche Untersuchung lehrt schon, dass alle Knospenschuppen nichts anderes sind als auf geringen Stufen der Ausbildung zurückgebliebene Laubblätter, und zu dem nämlichen Resultat führt das folgende Experiment. Wenn man *Aesculus*- und *Pavia*sprosse gleich nach dem Austreiben der Winterknospen, ohne die Zweige von der Mutterpflanze abzutrennen, entgipfelt und ihrer Blätter beraubt, so entwickeln sich die in den Blattachseln angelegten Knospen im Laufe des Sommers zu Laubtrieben, während sie normalerweise zu Winterknospen würden. Das Merkwürdige der sich geltend machenden Correlationserscheinung besteht nun aber darin, dass die zur Ausbildung kommenden Triebe keine Knospenschuppen, sondern (so beobachtete ich es wenigstens bei meinen Experimenten) nur Zwischenformen zwischen Schuppen und Laubblättern sowie Laubblätter produciren. Die unteren Blätter der Sprosse haben kleine, aber schon gegliederte Spreiten, und diese letzteren sitzen einem grünen, schuppenartigen Blatttheile auf, während die höher stehenden Blätter die Gestalt normaler Laubblätter besitzen. Es besteht bei *Aesculus* und *Pavia* sowie auch

1) Vgl. VÖCHTING, Die Bewegungen der Blüten und Früchte, Bonn 1882.

2) Vgl. GÖBEL, Botanische Zeitung, 1880, S. 771 u. 807.

bei anderen Gewächsen demnach eine sehr ausgeprägte Correlation zwischen dem Vorhandensein resp. der Abwesenheit des Gipfels sowie der Blätter einerseits und der Form, in der die Entwicklung der Knospen vor sich geht, andererseits.

V. Die Variationsbewegungen der Pflanzen.

198. Experimente mit *Acacia lophanta*.

Variationsbewegungen, welche in den meisten Fällen unter Vermittelung von besonderen Gelenken zur Geltung kommen, sind manchen Pflanzentheilen eigenthümlich. Sie werden theils durch innere Ursachen, theils durch den Einfluss äusserer Verhältnisse (Beleuchtungswechsel, Erschütterungen) bedingt, aber alle diese Umstände rufen, was besonders wichtig ist und wie wir weiter unten sehen werden, nur Veränderungen der Turgorausdehnung in den Zellen derjenigen Gewebecomplexe hervor, von denen die Bewegungen ausgehen. Eine ganze Reihe von Experimenten, zunächst solche mit *Acacia lophanta*, werden uns genauer mit den merkwürdigen Variationsbewegungen der Gewächse bekannt machen.

Die Blättchen des zusammengesetzten Blattes von *Acacia lophanta*, eine Pflanze, die man in Blumentöpfen aus Samen zur Entwicklung bringen kann, sind horizontal ausgebreitet, wenn die Pflanze hellem, diffusem Tageslicht ausgesetzt ist. Abends legen sich die Blätter nach oben zusammen, um sich am folgenden Tage unter dem Einfluss des Lichtreizes wieder auszubreiten. Man kann die Blättchen aber auch am Tage zwingen, die Nachtstellung einzunehmen, wenn man die Untersuchungsobjecte in einen dunkeln Raum bringt. Nach Verlauf einer halben bis einer Stunde haben sich die Blättchen zusammengelegt, dagegen breiten sie sich wieder aus, wenn die Pflanzen aufs Neue diffusem Licht ausgesetzt werden. Die Bewegungen der *Acacia*-blättchen sind Folge des Wechsels der Beleuchtungsverhältnisse, denn sie machen sich, wie leicht festzustellen ist, auch geltend, wenn die Temperaturverhältnisse während der angeführten Beobachtungen constant bleiben.

Ich konnte feststellen, dass die Blättchen von *Acacia lophanta* auch dann eine der Dunkelstellung gleiche Stellung annehmen, wenn die Pflanzen dem directen Sonnenlicht ausgesetzt werden. Eine *Acacia* mit ausgebreiteten Blättern wird unter einer Glasglocke ins directe Sonnenlicht gestellt. Die Blättchen haben sich alsbald zusammengelegt; sie breiten sich aber wieder horizontal aus, wenn man das Untersuchungsobject, ohne Entfernung der Glasglocke, hellem diffusem, Tageslicht exponirt.

Sehr interessant ist die Thatsache, dass Exemplare der *Acacia lophanta*, die normalen Beleuchtungsverhältnissen ausgesetzt waren und nun der Einwirkung des Lichtes völlig entzogen werden, indem man sie in einen völlig dunkeln Raum (z. B. einen Schrank) stellt,

dennoch fortfahren, die unter den normalen Verhältnissen in Folge des täglich wiederkehrenden Wechsels von Beleuchtung und Verdunkelung inducirten periodischen Bewegungen der Blätter auszuführen. Ein besonders lebenskräftiges, in einem kleinen Blumentopf wachsendes Exemplar von *Acacia lophanta*, welches ich in constanter Dunkelheit hielt, breitete 4 Tage lang seine Blättchen zur Tageszeit aus und legte dieselben zur Nachtzeit zusammen; freilich nahm die Amplitude der Bewegung allmählich ab, und nach 4 Tagen hörte die Nachwirkungsbewegung völlig auf; die Blättchen waren jetzt dunkelstarr geworden, und zwar zeigten die Blättchen der älteren Blätter nunmehr eine horizontale Stellung, während diejenigen der jüngeren Blätter mehr oder minder nach oben zusammengelegt erschienen. Als die Pflanze wieder normalen Beleuchtungsverhältnissen ausgesetzt wurde, kehrte der phototonische Zustand der Blättchen zurück, d. h. dieselben reagirten aufs Neue auf den Wechsel von Tag und Nacht. Will man die periodischen Nachwirkungsbewegungen, wie sie an den Blättchen solcher *Acacia*-exemplare auftreten, die zunächst normalen Lebensbedingungen ausgesetzt waren und dann in constante Finsterniss gelangt sind, genauer verfolgen, so verfährt man dabei nach PFEFFER's Vorgänge in folgender Weise. Man verfertigt sich aus steifem Papier eine ganze Anzahl Dreiecke, die verschiedene, aber bekannte Winkelgrösse besitzen. Es genügt, wenn jedes folgende Dreieck von dem vorhergehenden um 10 Grad differirt. Diese Dreiecke werden zur Bestimmung der Neigung der Blättchen gegen einander zwischen dieselben gehalten, und indem man die Untersuchungen an einem bestimmten Blatte der im Dunkeln verweilenden *Acacia*-pflanzen im Laufe eines Tages recht oft (z. B. alle zwei Stunden) wiederholt, gelangt man zu genauer Kenntniss des Verlaufs der periodischen Nachwirkungsbewegungen ¹⁾.

199. Experimente mit *Phaseolus multiflorus*.

An den Blättern von *Phaseolus* sind ebenso wie an denjenigen von *Acacia lophanta* periodische Bewegungen zu beobachten, die in Folge des täglich wiederkehrenden Beleuchtungswechsels auftreten. Der Hauptblattstiel hebt sich abends und senkt sich morgens, während die drei Einzelblättchen (vgl. die nebenstehenden Abbildungen Fig. 180 u. 181) unter dem Einfluss des Lichtes eine nahezu horizontale Stellung annehmen ²⁾, sich in Folge von Lichtmangel aber nach unten zusammenlegen. Genaueres ergeben Winkelmessungen. Die Blättchen von *Phaseolus* lassen auch periodische Nachwirkungsbewegungen erkennen, wenn die zunächst unter normalen Verhältnissen erwachsenen Pflanzen später constanter Dunkelheit ausgesetzt werden. Zu den bezüglichen Beobachtungen benutze man kräftige, in Blumentöpfen cultivirte Pflanzen. Bei Versuchen, die ich anstellte, gingen die periodischen Nachwirkungsbewegungen mehrere Tage lang, freilich mit sich vermindender Amplitude, fort. Schliesslich wurden die

1) Vgl. PFEFFER, Die periodischen Bewegungen der Blattorgane, Leipzig 1875.

2) Dies geschieht aber nur in hellem, diffusem Licht. In directem Sonnenlicht nehmen die Bohnenblättchen zumal mittags eine Stellung ein, die ihrer Nachtstellung in gewisser Beziehung ähnelt.

Blätter dunkelstarr, in welchem Zustande sie horizontal ausgebreitet erschienen. Auf's Neue normalen Beleuchtungsverhältnissen ausgesetzt, kehrten die jüngeren Blätter alsbald wieder in den phototonischen Zustand zurück; die älteren reagierten offenbar weit weniger energisch auf den Lichtreiz.

Bei dem Zustandekommen der periodischen Bewegungen nicht völlig ausgewachsener Phaseolusblätter spielen freilich Wachsthumsvorgänge eine gewisse Rolle. Die Bewegungen ausgewachsener

Fig. 180.

Fig. 181.

Fig. 180. Blatt von *Phaseolus multiflorus* in Tagesstellung.Fig. 181. Blatt von *Phaseolus multiflorus* in Nachtstellung.

Bohnenblätter werden aber, ebenso wie es bei vielen anderen Pflanzen (*Mimosa*, *Oxalis* etc.) der Fall ist, lediglich durch Veränderungen der Turgorausdehnung bedingt. Und zwar machen sich diese die Bewegungen vermittelnden Veränderungen in den Gelenken der Blätter (dem Gelenk des Hauptblattstieles sowie den Gelenken der drei Blättchen) geltend. Es ist lehrreich, den anatomischen Bau der Gelenke mit demjenigen des übrigen Gewebes der Blattstiele zu vergleichen. Untersucht man Querschnitte des grossen Gelenkes an der Basis des Hauptblattstieles von *Phaseolus*, so fällt namentlich auf, dass unter der mit Haaren besetzten Epidermis ein sehr mächtig entwickeltes Parenchym vorhanden ist, dessen Zellen auf der Gelenkober- und -unterseite nahezu die gleiche Beschaffenheit besitzen. Ziemlich in der Mitte des Querschnitts beobachtet man eine Anzahl von Gefässbündeln, welche das Mark umgeben. Bei mikroskopischer Untersuchung eines Querschnitts aus der Mitte des Hauptblattstieles der Bohne fällt sofort auf, dass das Rindengewebe, welches im Gelenk eine so bedeutende Ausbildung erfahren hat, hier nur relativ schwach entwickelt, übrigens als Collenchym (in den vorspringenden Kanten) und als gewöhnliches Rindenparenchym vorhanden ist. Die das Mark umgebenden Gefässbündel sind nicht in der Mitte des Querschnitts zusammengedrängt, sondern liegen mehr peripherisch. Die Zellen des Gelenkrindenparenchyms vermitteln bei der Bohne und ebenso bei *Acacia*, *Mimosa* etc. die Variationsbewegungen der

Blätter, und zwar werden dieselben, wie schon bemerkt, nicht durch Wachsthum, sondern allein durch Turgorverhältnisse hervorgerufen, wenn man es mit ausgewachsenen Organen zu thun hat, eine Thatsache, deren Richtigkeit sofort klar wird, wenn man bedenkt, dass die Gelenke die nach Vollendung ihres Wachsthums erlangte Grösse beibehalten, obgleich sie noch Monate lang Bewegungen der Blätter vermitteln.

Um festzustellen, dass sich bei dem Zustandekommen der Variationsbewegungen keine Wachsthumsvorgänge geltend machen, bringen wir nach der unter 153 angegebenen Methode Tuschepunkte als Marken auf einer Gelenkflanke an, um deren Entfernung wiederholt im Laufe mehrerer Tage mit dem horizontal gelegten Mikroskop zu messen. Es ist sehr darauf zu achten, dass das Gelenk bei jeder Messung stets die nämliche Stellung habe.

Die durch den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse inducirten periodischen Variationsbewegungen kommen nun dadurch zu Stande, dass das Rindenparenchym der Gelenke auf zwei gegenüberliegenden Seiten in Folge von Turgorschwankungen verschiedene Verlängerungen erfährt. So z. B. tritt die abendliche Senkung der Einzelblättchen des Bohnenblatts ein, weil die Zellen des Parenchyms der Oberseite der Gelenke stärker turgesciren als diejenigen der antagonistischen Seite, und dadurch eine convexe Krümmung der Gelenkoberseite bewirkt wird.

Ein wichtiger hier in Betracht kommender Factor wird aber erst durch folgenden Versuch kargestellt. Von einer in einem Blumentopf cultivirten Bohnenpflanze entfernt man gegen Abend mit Hülfe eines sehr scharfen Messers die obere Gelenkhälfte am Endblatt eines der gedrehten Blätter. Tritt die Dunkelheit ein, so senken sich die Seitenblättchen wie gewöhnlich, das operirte Blatt hebt sich aber, und ich fand dasselbe z. B. bei einem im Juli angestellten Versuch (die Operation war um 5 Uhr abends vorgenommen und die Pflanze dann an einen schlecht beleuchteten Ort gestellt) um 11 Uhr nachts fast gerade aufgerichtet. Am nächsten Morgen hatte sich das Endblatt in meinem Experiment wieder gesenkt. Daraus folgt, dass die abendliche Stellungsänderung solcher Blätter, die mit Variationsbewegung begabt sind, nicht dadurch zu Stande kommt, dass nur der Turgor der Zellen der einen der antagonistischen Gelenkhälften (in unserem Falle der oberen) durch Dunkelheit erhöht wird. Vielmehr steigert Finsterniss den Turgor sämtlicher Zellen des Parenchymmantels im Gelenk, während Lichtzutritt ihn herabsetzt, aber diese Steigerung respect. Erniedrigung des Turgors geht in den antagonistischen Gelenkhälften nicht mit der gleichen Geschwindigkeit vor sich. In den Gelenken der Bohnenblättchen wächst der Turgor z. B. in den Zellen der oberen Hälfte derselben schneller als in denjenigen der unteren; daher wenden sich die Blättchen abwärts. Dass aber der Turgor zugleich in der unteren Gelenkhälfte zunimmt, lehrt das Resultat unseres Experiments; denn würde dies nicht geschehen sein, so hätte sich das operirte Blatt nicht am Abend erheben können.

Es mögen hier noch einige Versuche angeführt werden, welche lehren, dass die Bewegungsgelenke der Bohnen — und ihnen ähnlich verhalten sich auch diejenigen anderer Pflanzen — geotropisch empfindlich sind.

Wir cultiviren Bohnen in Blumentöpfen in hellem, diffusem Licht.

Wenn die Phaseoluspflanzen einige dreizählige Blätter entwickelt haben, legen wir, um das Herausfallen der Erde aus den Töpfen zu verhüten, Sperrhölzer auf den Boden, kehren die Pflanzen um und lassen sie in dieser Stellung bei Lichtzutritt (am besten im lichten Schatten eines Baumes) verharren. Vortheilhaft ist es, wenn sich die Bohnen überhaupt von Anfang an im Freien im lichten Baumschatten entwickelten. An den umgekehrten Pflanzen können wir, wenn die Temperatur hoch ist, schon nach Verlauf von 6—8 Stunden Beobachtungen anstellen. Wir hatten vor der Umkehrung die Winkel gemessen, welche die Stiele der Primordialblätter sowie der dreizähligen Blätter mit der Sprossaxe bildeten. Ebenso hatten wir die Winkel bestimmt, in denen sich die Spreiten der Primordialblätter und der dreizähligen Blätter zu den Blattstielen befanden. Wiederholen wir solche Bestimmungen, nachdem die Untersuchungsobjecte mehrere Stunden in umgekehrter Lage verweilten, so finden wir vor allen Dingen die Spreiten bedeutend gehoben, und eine langsamer nachfolgende Hebung macht sich ebenfalls in Folge der negativ geotropischen Reizbarkeit der Gelenke an den Blattstielen geltend ¹⁾).

Bringt man die Pflanze jetzt in aufrechte Stellung zurück, so gewinnen die Blätter im Laufe eines Tages ihre normale Lage aufs Neue. Hat eine Bohnenpflanze mehrere Tage in umgekehrter Stellung verweilt, und wird sie dann aufgerichtet, so kehren die Blätter sehr langsam oder gar nicht wieder in die normale Lage zurück, weil die geotropische Krümmung der Blattgelenke jetzt durch Wachstumsprocesses fixirt ist.

200. Experimente mit dem Hebelodynamometer.

Zur Gewinnung eines annähernden Maasses für die Kraft, welche bei Ausführung von Bewegungen in Gelenken entwickelt wird, kann das Hebelodynamometer dienen ²⁾).

An der Messingsäule *s* (Fig. 182) ist die durch die Schraube *r* feststellbare Hülse *e* verschiebbar. An dieser befindet sich ausser einem Gradbogen ein auf einer Schneide ruhendes dreiarmiges Hebelwerk. Von den beiden in gerader Linie liegenden Hebelarmen *h* und *h'* dient der längere als Index auf dem Gradbogen, der kürzere zum Auflegen der Untersuchungsobjecte, während der dritte Arm *p* einen rechten Winkel mit den Armen *h* und *h'* bildet. Wird er z. B. durch Druck auf den kürzeren Hebelarm aus dieser Lage gebracht, so wächst, wie beim Pendel, die Kraft, mit welcher er seiner Gleichgewichtslage zustrebt, mit dem Sinus des Ausbiegungswinkels. Durch Einschrauben verschieden langer und schwerer Stifte sowie durch Anbringen von Kugeln lässt sich natürlich die zu gleicher Ausbiegung nöthige Kraft modificiren, und so auch der an dem Gradbogen abzulesende Ausschlag reguliren, welchen die Auflegung eines Pflanzentheils auf den kurzen Hebelarm bewirkt. Das Hebelodynamometer ist vom Mechaniker ALBRECHT in Tübingen zu beziehen.

1) Weiteres bei PFEFFER, Periodische Bewegungen, 1875, und A. FISCHER Botan. Zeitung, 1890.

2) Vgl. PFEFFER, Die periodischen Bewegungen der Blattorgane, 1875, S. 9 und 97.

Als Untersuchungsobject wählen wir ein kräftig ausgebildetes Exemplar von *Phaseolus*. Wir befestigen einen Draht längs der Mittelrippe auf der Oberseite eines Primordialblattes, so dass er einerseits bis an das Gelenk reicht, andererseits eine Strecke weit über die Blattspitze hinausragt. Der Draht muss so gewählt werden, dass er bei den in Betracht kommenden Kräften keine Biegung erfährt. Erfahrungsgemäss leistet bei Experimenten mit Bohnenblättern ein aus zwei feinen Eisendrähten zusammengewickelter Stift von 60–80 mm Länge und etwa 0,2 g Gewicht gute Dienste. Die Befestigung des Drahtes erreicht man durch Festbinden an mindestens drei Blattstellen, wobei jede Fadenschlinge Mittelrippe und Draht umfassen muss. Das über das Blatt hinausragende Drahtende wird dem kurzen Hebelarm des Dynamometers aufgelegt und hier am besten mittelst Zwirn oder Draht befestigt.

Vor Ausführung der Experimente muss noch festgestellt werden, welches Verhältniss zwischen der am kurzen Hebelarm des Dynamometers wirkenden Kraft einerseits und der dieser entsprechenden Ausbiegung andererseits besteht. Bei nicht zu starker Ausbiegung lässt sich diese Relation recht genau feststellen, indem man an den kurzen Hebelarm eine Wagschale anhängt und diese mit Gewichten belastet. Die nämliche Ausbiegung kann natürlich, je nachdem der verticale Hebelarm P mehr oder weniger (z. B. durch Wackskügelchen oder auf andere Weise) belastet ist, einem verschiedenen auf h ausgeübten Druck entsprechen. Ein Grad Ausbiegung wird z. B. je nach Umständen bedingt durch 0,1 oder auch 0,3 g. Das Product, aus dem der abgelesenen Ausbiegung entsprechenden Gewichte und der Länge des auf dem Dynamometer aufliegenden Blatthebelarmes ergibt das statische Moment, welches die Grösse des in einer Gelenkhälfte entwickelten Ueberdruckes anzeigt.

Fig. 182. Pfeffer's Dynamometer.

Bei den Experimenten mit den Bohnenblättern muss natürlich der Blattstiel bis zum Gelenk durchaus festgehalten werden. Ist der Apparat sorgfältig und zitterfrei aufgestellt, so rufen zumal die in Folge von Helligkeitsschwankungen eintretenden Aenderungen in der Expansionskraft der antagonistischen Gelenkhälften Stellungsänderungen der Hebelarme des Dynamometers hervor. Wenn man den Apparat z. B. nachmittags verdunkelt, so kann der Zeiger im Laufe einiger Stunden seine Stellung um 10° verändern. Entspräche dabei 1° einem auf den kurzen Hebelarm geltend gemachten Druck von 0,3 g, und hätte der Blatthebelarm eine Länge von 70 m, so würde

sich für den Ausschlag von 10^0 ein statisches Moment von 210 g berechnen.

Die Bohnenblätter führen auch autonome Bewegungen von mässiger Amplitude und einer Schwingungsdauer von ca. 2 Stunden aus. Für diese liegt das mechanische Moment oft zwischen 10 und 25 g. Je nachdem diese autonomen Bewegungen den paratonischen und täglichen periodischen Bewegungen gleichsinnig oder entgegengesetzt sind, wird das mechanische Moment dieser vergrössert oder verringert werden (Weiteres bei PFEFFER).

201. Experimente mit *Mimosa pudica* und anderen Pflanzen.

Die Blätter von *Mimosa pudica* führen sowohl in Folge von Erschütterung oder Berührung als auch in Folge des Wechsels der Beleuchtungsverhältnisse Bewegungen aus, welche durch die Gelenke der primären sowie der secundären Blattstiele und der Einzelblättchen vermittelt werden. Bei der Cultur der Pflanzen, die man zweckmässig in Blumentöpfen vornimmt, ist darauf zu achten, dass die sich aus den Samen entwickelnden Pflanzen möglichst hoher Temperatur ($20-25^0$ C.) ausgesetzt sind, und dass ihnen reichliche Wassermengen zur Disposition stehen. Das letztere erreicht man bei Culturen, die in einem gewöhnlichen Zimmer vorgenommen werden, dadurch am besten, dass man über die Culturegefässe, bald nachdem die Pflanzen über die Erde hervorgekommen sind, grosse Glasglocken stülpt, natürlich ohne die Luftcirculation allzu sehr zu behindern. Die in grösserer Zahl in einem Blumentopf zur Ausbildung gekommenen Keimlinge verpflanzt man alsbald, so dass sie einzeln in Töpfen stehen, und cultivirt sie in möglichst warmer, feuchter Luft am Fenster weiter. Bei kräftigen Pflanzen ist der Hauptblattstiel am Tage mehr oder minder nach aufwärts gerichtet, die Blättchen sind ausgebreitet. Verdunkelt man eine Pflanze plötzlich am Tage, indem man über die Glasglocke, unter welcher sie sich befindet, einen Pappkasten deckt, so heben sich die Hauptblattstiele nicht unwesentlich, so dass der Winkel, den sie mit dem Stengel bilden, spitzer wird, und die Blättchen legen sich nach oben zusammen. Werden Mimosapflanzen unter Glasglocken am Tage unberührt dem Einflusse des Lichts überlassen, so zeigt sich, dass sich die Blättchen gegen Abend zusammenlegen, und dass die Hauptblattstiele sich mit eintretender Dunkelheit senken. Plötzliche Verdunkelung am Tage einer und die normale abendliche Verdunkelung andererseits wirken also gleichsinnig auf die Blättchen, ungleichartig aber auf die Hauptblattstiele der *Mimosa pudica* ein¹⁾.

Werden zunächst unter normalen Verhältnissen cultivirte Mimosapflanzen in hinreichend feuchter Atmosphäre constanter Finsterniss ausgesetzt, so machen sich, wie bei *Acacia* und *Phaseolus*, nach einiger Zeit Nachwirkungsbewegungen der Blätter geltend, d. h. die Blättchen sind zur Tageszeit ausgebreitet, zur Nachtzeit zusammengelegt. Allmählich hören diese Bewegungen auf, und es ist auch die Fähigkeit der Blätter verschwunden, auf Erschütterung oder Be-

1) Ueber die Ursachen dieser complicirten Erscheinungen vergl. PFEFFER, Die periodischen Bewegungen etc., 1875, S. 74.

rührung zu reagiren. Bei der Beobachtung ins Dunkle gestellter Mimosapflanzen ist übrigens darauf zu achten, dass die Blätter verschiedenen Alters einer Pflanze sich nicht gleichartig verhalten. Wenn die täglichen periodischen Nachwirkungsbewegungen nicht mehr stattfinden, so erscheinen die dunkelstarrten Blätter nicht in der normalen Nachtstellung, sondern im Gegentheil, der Hauptblattstiel dunkelstarrer Blätter hat eine nahezu horizontale Stellung, und die Blättchen sind ausgebreitet. Wird die Pflanze jetzt kurze Zeit beleuchtet und dann wieder ins Dunkle gebracht, so reagirt sie noch nicht auf den Beleuchtungswechsel und auf Erschütterungen oder Berührung; ihre Blättchen schlagen sich nicht zusammen. Die Pflanze ist noch dunkelstarr. Der phototonische Zustand tritt erst nach länger dauernder Beleuchtung wieder ein, und zwar gewinnt die Mimose zunächst ihre Fähigkeit wieder, auf den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse zu reagiren; später kehrt auch der Zustand zurück, in welchem sie für Erschütterung oder Berührung empfindlich ist. Ich hielt eine *Mimosa pudica* (a) vom 16. bis 21. August 7 $\frac{1}{2}$ Uhr abends bei etwa 20° C. im Finstern. Am Abend des 21. August waren alle Blätter bis auf die beiden jüngsten völlig dunkelstarr. Die Pflanze a wurde jetzt mit einer anderen (b), die normalen Beleuchtungsbedingungen ausgesetzt worden war, an ein Fenster gestellt. Am 22. August konnte das Licht von Sonnenaufgang bis um 10 Uhr auf beide Pflanzen einwirken; sie wurden dann beide ins Finstere gestellt, aber während die Blättchen von b sich schlossen, blieben diejenigen von a ausgebreitet. Die Blätter der Pflanze a reagierten auch noch nicht auf Erschütterung oder Berührung; sie waren noch dunkelstarr. Nach der eine halbe Stunde dauernden Verdunkelung gelangten beide Pflanzen wieder ans Licht. Am Abend des 22. August legten sich einige Blättchen der Pflanze a zusammen, und am 23. August kehrte auch die Reizbarkeit für Berührung sowie eine recht energische Schliessungsbewegung der Blättchen am Abend zurück. Uebrigens waren viele Blättchen der Pflanze a während der letzten Tage des Versuchs gelb geworden und abgefallen.

Werden Exemplare von *Trifolium pratense* im Freien beobachtet oder werden Pflanzen ins Auge gefasst, die man in Töpfen aus Samen erzogen hat, so ergiebt sich, dass sich die Blättchen, während dieselben am Tage ausgebreitet sind, abends nach oben zusammenlegen. Die Blättchen von *Oxalis Acetosella* legen sich hingegen abends nach abwärts zusammen.

202. Die durch Erschütterung oder Berührung hervorgerufenen Variationsbewegungen von *Mimosa pudica*.

Die *Mimosa pudica* ist nur bei ziemlich hoher Temperatur und hinreichendem Feuchtigkeitsgehalt des Bodens sowie der umgebenden Luft in bedeutsamer Weise reizbar. Werden aber unter solchen Umständen in Töpfen aus Samen erzogene Mimosae exemplare, ohne dass man die Pflanze selbst berührt, erschüttert, so macht sich eine auffallende Reizwirkung geltend. Die Hauptblattstiele senken sich, die secundären Blattstiele nähern sich einander, und die Blättchen legen sich nach vorn und oben zusammen (vergl. Fig. 183). Diese Bewegungen werden sämmtlich durch Gelenke vermittelt, welche an

der Basis der Blattstiele sowie Einzelblättchen sitzen und einen ähnlichen Bau wie diejenigen der Phaseolusblätter besitzen. Man kann die Mimosa aber nicht nur durch Erschütterungen, sondern ebenso durch Berührungen zu Bewegungen veranlassen. Wird die Oberseite des grossen Gelenkes an der Basis des primären Blattstiels vorsichtig berührt, so erfolgt freilich keine Bewegung; dieselbe tritt aber sofort ein, wenn man die Unterseite in der nämlichen Weise reizt. Danach reagirt also nur die Gelenkunterseite auf Stossreiz, das Parenchym derselben verliert Wasser, welches wohl wesentlich in die zwischen den Zellen vorhandenen Intercellularen übertritt, es tritt eine Störung des hydrostatischen Gleichgewichtes im Gelenk ein, so dass nach HABERLANDT schliesslich auch die reizleitenden Elemente in der

Fig. 183. Theil eines Sprosses von *Mimosa pudica*. Das Blatt links ist im ungereizten Zustande, das Blatt rechts im gereizten Zustande dargestellt.

Gefässbündelregion Flüssigkeit austreten lassen. Indem sich die Gelenkunterseite in Folge des Wasserverlustes ihrer Zellen contrahirt, ferner aber auch das stark positiv gespannte Parenchym der Gelenkoberseite mitwirkt, kommt eine energische, nach abwärts gerichtete Bewegung des primären Blattstiels zu Stande. Den Wasserverlust des Gelenkes in Folge einer Reizung und die Existenz von Spannungsverhältnissen im Gelenk kann man in folgender Weise demonstrieren.

Der primäre Blattstiel wird durch einen scharfen Schnitt vom Gelenk abgetrennt, und die Mimosa jetzt einige Zeit unter einer Glasglocke im dampfgesättigten Raum belassen. Wird das Gelenk, nachdem es sich einigermaassen erholt hat, gereizt, so senkt es sich, und es tritt Wasser aus der Schnittfläche hervor. In der unversehrten Pflanze wird das Wasser aus dem Gelenk zumal in den Stengel oder Blattstiel befördert. Schneidet man eins der grossen Gelenke, ohne dasselbe von seinem Blattstiel zu befreien, hart an der Sprossaxe weg, so krümmt es sich natürlich in Folge des Reizes in bekannter Weise. Trennt man nun durch zwei Längsschnitte das obere und untere Parenchym des Gelenkes vom Fibrovasalkörper ab, so krümmt sich jenes stark abwärts, dieses schwach aufwärts. Wird das so präparirte, sich noch mit dem Blattstiel im Zusammenhang befindende Bewegungs-

organ in Wasser gelegt, dann erfährt die Krümmung des oberen Parenchyms, insbesondere aber die nach aufwärts gerichtete Krümmung des unteren, indem die Zellen desselben wieder turgescen werden, eine wesentliche Steigerung. Die isolirten Parenchymlamellen übertreffen auch den Fibrovasalkörper des Gelenkes an Länge, und alles beweist, dass in unverletzten Bewegungsorganen beträchtliche Spannungen zwischen dem axilen Strang einer- und dem Parenchym andererseits bestehen müssen.

Sehr lehrreich ist der folgende einfache Versuch. Man schneidet mit einer Scheere eines der kleinen Blättchen am Ende eines secundären Blattstieles recht reizbarer Mimosapflanzen vorsichtig, und ohne das Untersuchungsobject zu erschüttern, ab, oder man reizt ein Mimosablättchen, indem man die mit Hülfe einer Sammellinse in einen Brennpunkt vereinigten Sonnenstrahlen auf dasselbe fallen lässt. Es macht sich nun eine durch Wasserbewegung in der Pflanze bedingte Reizfortpflanzung geltend. Von der Spitze nach der Basis des secundären Blattstiels vorrückend, bedingt die Reizfortpflanzung ein Zusammenlegen immer entfernter stehender Blattpaare, darauf legen sich auch die Blättchen benachbarter secundärer Blattstiele (zunächst die unteren, weiterhin die höher stehenden) zusammen, ja es kann sogar eine Senkung des Hauptblattstiels und eine Uebertragung des Reizes auf ganz andere Blätter des Untersuchungsobjectes erfolgen. Hat die Fortleitung des Reizes aufgehört, und werden keine weiteren Bewegungen ausgelöst, so kehren die Blätter nach einigen Minuten wieder in ihre Ruhelage zurück¹⁾.

203. Beobachtung weiterer durch Erschütterung und Berührung hervorgerufener Variationsbewegungen.

Die Einzelblättchen von *Oxalis Acetosella*, einer Pflanze, die häufig in feuchten Wäldern angetroffen wird, sind mit Gelenken versehen und reagieren auf Berührung oder Erschütterung. Wird der Hauptblattstiel erschüttert, so ist die eintretende Reizbewegung der Blättchen (Senkung derselben) deutlich zu verfolgen, aber es müssen viele Stöße auf den gemeinschaftlichen Blattstiel ausgeübt werden, um die maximale Senkung der Blättchen hervorzurufen, während die volle Reizbewegung bei *Mimosa pudica* schon in Folge einer einzigen schwachen Erschütterung eintritt.

Sehr reizbar sind, wovon ich mich mehrfach überzeugte, die Narbenlappen von *Martynia* (Gesneraceae). Wird die Innenseite der Narbenlappen berührt, so legen sich dieselben sofort zusammen. Ebenso reagieren die Narbenlappen von *Mimulus* (z. B. *M. cardinalis*) auf Berührung.

Die fünf Filamente der Cynareen sind mit ihrem unteren Ende an der Blumenkronenröhre befestigt. Die Antheren sind zu einer Röhre verklebt, durch welche der Griffel hindurchwächst. Zur Zeit der Pollenreife sind die Filamente reizbar, und während sie in un-

1) Vgl. PFEFFER, Physiologische Untersuchungen, 1873, und SACHS, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, 1882, S. 787. HABERLANDT's Ausführungen (Das reizleitende Gewebesystem der Sinnpflanze, Leipzig 1890) stimme ich nicht in jeder Hinsicht zu.

gereiztem Zustande convex nach aussen gebogen erscheinen, strecken sie sich in Folge einer Erschütterung oder Berührung unter Verkürzung gerade. Gelenke fehlen den Filamenten; ihr gesamtes, das axile Gefässbündel umgebende Parenchym ist vielmehr reizbar und verliert, wenn eine Reizursache auf dasselbe einwirkt, in Folge von Wasserabgabe bedeutend an Expansionskraft, wodurch die Contraction hervorgerufen wird. Will man sich von der Reizbarkeit der Cynareenfilamente überzeugen, so verwendet man zweckmässig Blüthen von *Centaurea jacea* zu den bezüglichen Experimenten. Man isolirt einzelne Blüthen aus dem Blütenköpfchen, schneidet die Corolle, Filamente und den Griffel etwas über der Insertion der Staubgefässe quer durch und befestigt den befreiten Sexualapparat mit Hülfe einer Nadel auf einem Kork. Derselbe wird unter eine Glasglocke in wasserdampffreie Luft gebracht. Haben sich die Präparate erholt, so sind sie reizempfindlich. Die freien Filamente bewegen sich in Folge von Berührungen und erlangen nach ausgeführten Bewegungen ihre Reizbarkeit unter günstigen äusseren Verhältnissen in einigen Minuten wieder. Die Bewegung der freien Filamente kommt dadurch zu Stande, dass ihre berührte Seite unter Verkürzung stets zunächst concav wird.

204. Die spontanen Variationsbewegungen.

Spontane Variationsbewegungen lassen sich an den mit Gelenken versehenen Blättern verschiedener Pflanzen (*Mimosa*, *Oxalis*, *Trifolium*) beobachten und kommen dadurch zu Stande, dass die Turgorausdehnung der Zellen der antagonistischen Gelenktheile aus inneren Ursachen Schwankungen erfährt. Wir wählen, um uns über die spontanen Variationsbewegungen zu orientiren, *Trifolium pratense* als Untersuchungsobject und cultiviren die Pflanze aus Samen in einem Blumentopfe. Haben sich die Pflanzen schon ziemlich weit entwickelt, so ist es zweckmässig, die schwächlichen Individuen zu beseitigen und nur einige kräftige zur Beobachtung stehen zu lassen.

Es ist schon erwähnt worden, dass die Blätter von *Trifolium* recht energisch durch Bewegungen auf den Wechsel von Beleuchtungsverhältnissen reagiren. Um diese Bewegungen möglichst auszuschliessen,

Fig. 184. Blatt von *Desmodium gyrans*, verkleinert. (Nach PFEFFER.)

bringen wir den Blumentopf mit den *Trifolium*exemplaren in einen dunkeln Schrank oder unter einen Pappkasten und lassen die Pflanzen auch am nächsten Tage, an welchem die eigentlichen Beobachtungen beginnen sollen, im Finstern stehen. Von Zeit zu Zeit, etwa alle halbe Stunde, bestimmen wir die Stellung gewisser Kleeblättchen, und zwar ist es am zweckmässigsten, die jeweilige Lage derselben durch Aufzeichnen zu fixiren. Zahlreiche Versuche, die ich bei einer Temperatur von etwa 18° C. ausführte, ergaben mir, dass die Blättchen von *Trifolium pratense* im

Finstern auf- und abgehende Bewegungen ausführen, deren Amplitude oft weniger, oft mehr als 90° betrug. Zur Vollendung einer vollen Schwingung waren einige Stunden erforderlich.

Sehr ansehnliche autonome Variationsbewegungen führen die Seiten-

blättchen von *Desmodium gyrans* aus. Sie beschreiben elliptische Bahnen, deren lange Axe nahezu parallel dem Hauptblattstiel ist. Das Temperaturminimum für diese Bewegungen liegt bei etwa 22° C. Einen Umlauf sah ich bei hoher Temperatur in wenigen Minuten vollendet. Die aufsteigende Bahn wird etwas langsamer als die absteigende durchlaufen (vgl. Fig. 184).

205. Der Einfluss äusserer Verhältnisse auf einige Variationsbewegungen.

Auf die Beeinflussung der Variationsbewegungen durch äussere Verhältnisse ist schon mehrfach hingewiesen worden. Hier mögen weitere Angaben folgen. Um den Einfluss von Aether- oder Chloroformdämpfen auf die Gelenke von *Mimosa pudica* festzustellen, verfährt man nach meiner Erfahrung am zweckmässigsten in der nachstehend angegebenen Weise. Ein abgeschnittenes Blatt, dessen Blättchen in Folge eines schwachen Reizes zum Zusammenlegen gebracht worden sind, wird mit seinem Stiel in ein kleines, Wasser enthaltendes Glas gestellt. Dieses Glas steht auf einem Teller, in den man Aether oder Chloroform gegossen hat. Nach Ueberdecken des Tellers mit einer Glasglocke wird das Untersuchungsobject dem directen Sonnenlicht ausgesetzt. Während der einige Minuten dauernden Narcose breiten sich die Blättchen vollkommen aus; sie reagieren jetzt aber nicht auf Berührung oder Erschütterung. Der reizbare Zustand kehrt indessen zurück, wenn man das Mimosablatt in eine äther- und chloroformfreie, aber wasserdampfreiche Atmosphäre bringt.

Sehr lehrreich ist der folgende Versuch. Die Unterseite des Gelenkes am Hauptblattstiel einer sich unter sehr günstigen Lebensbedingungen befindenden Mimose wird mit Hilfe eines kleinen Holzstäbchens wiederholt und in kurzen Intervallen gereizt. (Bei meinen Versuchen wurde die Reizung in Intervallen von je einer halben Minute 5 oder 6 Minuten lang fortgesetzt, und der Gelenkunterseite wurden stets nach einer halben Minute mehrere Stösse erteilt.) Wird die Pflanze unter einer Glasglocke sich selbst überlassen, so erhebt sich der gesenkte Hauptblattstiel in einigen Minuten, aber trotzdem reagirt das Gelenk jetzt nicht auf Berührung. Das durch oft wiederholte Berührung für neuen Reiz unempfindlich gewordene Bewegungsorgan erlangt den reizbaren Zustand übrigens nach Verlauf kurzer Zeit wieder. Die Thatsache, dass die nach aufgehobener Narcose mit Aether oder Chloroform ausgebreiteten Mimosablättchen, und dass die nach Sistirung von Stössen emporgehobenen Hauptblattstiele von *Mimosa* nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit wieder reizbar sind, beansprucht besonderes Interesse. Sie lehrt nämlich, dass die Ursachen, welche die Rückkehr der Mimosablatttheile auf den reizempfindlichen Zustand einer- und andererseits die Reizbarkeit selbst bedingen, nicht durchaus die gleichen sein können.

Wird die Erde, in welcher eine Mimose wurzelt, längere Zeit nicht begossen, das Untersuchungsobject sonst aber normalen Lebensbedingungen ausgesetzt, so nimmt in Folge des eintretenden Wassermangels die Reactionsfähigkeit der Blättchen für Erschütterung oder Berührung mehr und mehr ab. Bei einem von mir bei etwa 20° C. angestellten Versuch trat nach 4 Tagen eine völlige Unempfindlichkeit der Mimosablättchen für Berührung ein. Die im Zustande der Trockenstarre verharrenden Blättchen sind ausgebreitet, erscheinen aber noch

keineswegs immer welk und erlangen ihre Reizbarkeit wieder, wenn der Pflanze aufs Neue reichliche Wassermengen zugeführt werden.

Wird eine Mimose einer Temperatur unter 15°C . (z. B. 10°C .) einige Stunden lang ausgesetzt, so geht die Pflanze in den Zustand der vorübergehenden Kältestarre über. Die Empfindlichkeit für Berührung sowie für den Wechsel der Beleuchtungsverhältnisse verschwindet. Der normale, reactionsfähige Zustand kehrt aber zurück, wenn man das Untersuchungsobject wieder in einen Raum bringt, in welchem eine Temperatur über 15°C . herrscht.

Handelt es sich darum, Mimosen in den Zustand der vorübergehenden Wärmestarre zu versetzen, so bringe man die Pflanzen in einen geeigneten Thermostaten, in welchem eine Temperatur von 40°C . herrscht. Nach etwa einer Stunde (bei 45°C . in viel kürzerer Zeit) ist der erwähnte Zustand des Untersuchungsobjectes eingetreten. Die Blättchen haben sich selbst bei Lichtzutritt nach aufwärts zusammengelegt. Günstige Temperaturverhältnisse rufen den normalen Zustand der Mimose in einigen Stunden zurück¹⁾.

Nachtrag.

Unter 84 ist das Problem der Wasserbewegung im Holzkörper der Pflanzen besprochen worden. Wir haben gesehen, dass sich das Wasser im Lumen der leitenden Holzelemente bewegt, und wenn wir hier nun noch etwas näher auf die Ursachen dieser Wasserbewegung eingehen, so geschieht dies zumal deshalb, weil ASKENASY²⁾ kürzlich eine kleine Abhandlung publicirte, deren Inhalt mir allerdings in Verbindung mit den wichtigen Arbeiten STRASBURGER's von hoher Bedeutung zu sein scheint.

SACHS³⁾ hat schon nachdrücklich betont, dass der Wurzeldruck auf keinen Fall ausreichen kann, um die Wasserverluste stark transpirirender Pflanzen zu decken. Freilich kann das Wasser in der intacten Pflanze unter dem Einfluss des Wurzeldrucks in grösserer Menge und auch bis zu bedeutenderer Höhe emporgehoben werden als in der decapitirten, denn auf die durch das Decapitiren hergestellte Schnittfläche wirkt der Luftdruck ein, während derselbe die Wasserhebung in der unversehrten Pflanze nicht beeinflussen kann. Trotz alledem spielt der Wurzeldruck auch in der unverletzten Pflanze auf keinen Fall eine Rolle bei dem Vorgange der Wasserbewegung im Holzkörper stark transpirirender Gewächse, und HANSEN⁴⁾ zeigte, dass sogar Pflanzen mit getödteten Wurzeln, die also absolut keinen Wurzeldruck zur Geltung bringen können, noch lebhaft transpiriren. In Töpfen zur Entwickelung gelangte Nicotiana- oder Helianthuspflanzen, die 6—10 grössere Blätter tragen, stellen wir nach dem Durchfeuchten des Bodens in den doppeltwandigen Zinkblechbehälter, die auf Dreifüssen ruhen. Der Zwischenraum zwischen den Doppelwänden ist mit Wasser angefüllt. Wir führen Thermometer in den Boden der Töpfe ein, bedecken diese mit halbirten und in der Mitte mit einem Ausschnitt zur Aufnahme des Stammes des Untersuchungsobjectes versehenen Platten aus dicker Pappe und erhitzen das Wasser. Die Wurzeln werden 1—2 Stunden lang einer Temperatur von 70°C . ausgesetzt. Sie sind dann, wie übrigens mikroskopische Untersuchung bestätigen kann, sicher getödtet. Nun wickeln wir die Töpfe sorgsam in Stanniol ein, bedecken auch die Bodenoberfläche sowie den Stammtheil des Untersuchungsobjectes mit Stanniol und können durch wiederholte Wägungen constatiren, dass die oberirdischen Theile der Pflanzen bei nicht zu niedriger Lufttemperatur ohne zu welken noch tagelang erhebliche Wassermengen durch Transpiration verlieren. Die getödteten Wurzeln müssen dabei Wasser aus dem Boden aufnehmen.

Capillarkräfte sind wohl von Bedeutung, um das Wasser in den trachealen Bahnen festzuhalten, dagegen spielen sie, wie STRASBURGER⁵⁾ überzeugend nachwies, kaum eine Rolle bei der Hebung des Wassers selbst.

1) Vgl. besonders CLAUDE BERNARD, *Leçons s. l. phénomènes d. l. vie*, 1878; SACHS, *Flora*, 1863, und PFEFFER, *Physiol. Untersuchungen*, 1873.

2) Vergl. ASKENASY, *Verhandlungen d. Naturhistorisch-med. Vereins zu Heidelberg*, N. F. B. 5.

3) Vergl. SACHS, *Vorlesungen über Pflanzenphysiologie*, 1887, S. 257.

4) Vergl. HANSEN, *Arbeiten d. botan. Instituts in Würzburg*, B. 3, S. 312.

5) Vergl. STRASBURGER, *Bau und Verrichtung der Leitungsbahnen in den Pflanzen*, 1891, S. 808.

Den Luftdruck können wir ebenfalls nicht heranziehen, wenn es sich um die Hebung des Wassers bis zu bedeutenden Höhen (z. B. 200—300 Fuss) handelt, und so scheint man seine Zuflucht zu der Mitwirkung der lebensthätigen Zellen des Holzkörpers nehmen zu müssen.

Indessen ich möchte hier die besondere Aufmerksamkeit auf gewisse Versuche STRASBURGERS (l. c. S. 607) hinlenken, die ich freilich leider noch nicht selbst wiederholt habe, deren Resultate aber gewiss sehr beachtenswerth erscheinen.

Schlanke, in dichtem Bestande erwachsene Bäume von *Acer platanoides*, *Fagus*, *Pinus Laricio* (Schwarzkiefer) oder von *Abies excelsa* werden an ihrer Basis etwas schräg unter einem starken, nach der Schnittfläche zu gerichteten Wasserstrom abgesägt. Die Bäume von ca. 20 m Höhe bleiben zunächst mit der Basis eine halbe Stunde im Wasser stehen; sie werden dann mittelst eines Flaschenzuges gehoben, um die Schnittfläche nach dem Glätten mit 5—10-proc. Kupfervitriollösung in Berührung zu bringen.

Die Bäume, mit denen STRASBURGER experimentirte, nahmen unter günstigen Transpirationsbedingungen im Laufe mehrerer Wochen oder Monate reichliche Mengen der Kupferlösung auf. Dieselbe stieg, wie leicht nachzuweisen war, bis in die Kronen der Bäume empor, so dass die Blätter allmählich abstarben, und das Holz des Stammes sich völlig oder fast völlig mit Kupfersalz durchtränkt zeigte. Osmotische Wirkungen lebensthätiger Zellen des Holzkörpers können hier also die Wasserhebung nicht vermittelt haben, denn das Kupfersalz tötet diese ja, indem es mit denselben in Berührung gelangt.

Unter Berücksichtigung dieser Experimente mit grossen Pflanzen gewinnen auch die Resultate solcher Versuche Interesse, die man mit kleinen Objecten anstellt, nachdem ein Theil der Leitungsbahn derselben getötet worden ist. Wenn man den unteren Theil von *Populus* oder *Salix*zweigen in einer Länge von ca. 20 cm durch $\frac{1}{2}$ —1-stündigen Aufenthalt in siedendem Wasser tötet, während der obere beblätterte Theil des Beobachtungsmaterials unversehrt bleibt, so saugt dasselbe, in Eosinlösung gestellt, noch reichliche Flüssigkeitsmengen im Laufe längerer Zeit auf. Ebenso erhebt sich 5-proc. Kupfervitriollösung in den Sprossen, die man direct nach dem Abschneiden mit ihrer Basis in die Flüssigkeit stellt, bis zu bedeutender Höhe in denselben, trotzdem das Kupfersalz die lebendigen Holzelemente tötet.

Für das Verständniss der Wasserbewegung in der Pflanze ist es wichtig, daran zu erinnern, dass die Leitungsbahnen im Holzkörper sich in dem Maasse, in welchem sie ausgebildet werden, also schon vom Keimungsstadium der Pflanze an und auch weiter hin, mit Wasser füllen. Daher führen auch die peripherischen Regionen des Holzkörpers in ihren trachealen Elementen selbst zu Zeiten starker Transpiration der Hauptsache nach nur Wasser und keine Luft, während allerdings die centraler gelegenen Holzelemente wasserleer sein können. Besonders geeignet sind zur Untersuchung Radialschnitte aus Abietineenstämmen oder Aesten¹⁾ von 1—2 cm Länge und von solcher Dicke, dass mindestens eine Schicht der Tracheiden nicht angeschnitten ist. Die Untersuchung der Schnitte lehrt, dass im Allgemeinen der Wassergehalt der Elemente von aussen nach innen abnimmt²⁾.

In den Leitungsbahnen wird das Wasser, wenn keine Transpiration stattfindet, durch die von der Wandsubstanz derselben ausgehende Adhäsion und durch die Cohäsion der Wassertheilchen, die, worauf ASKENASY mit Recht besonderes Gewicht legt, gewaltig gross ist, festgehalten, und ein Zerreißen der Wasserfäden findet nicht statt.

Wenn nun die Sonnenwärme die Transpiration hervorruft und die Blattzellen Wasser verlieren, so suchen sie den erlittenen Wasserverlust wieder zu ersetzen. Sie entnehmen den Leitungsbahnen der Gefässbündel Flüssigkeit; sie üben auf das Wasser in den trachealen Bahnen einen Zug aus, der sich in Folge der hohen Cohäsion der Wassertheilchen bis in die Wurzel fortsetzt und hier Veranlassung zu erneuter Wasseraufnahme giebt. Diese Ansichten ASKENASY's über das Wesen der Wasserbewegung im Holz sind gewiss sehr beachtenswerth; das Hauptgewicht ist immer auf die durch die Physik festgestellte bedeutende Grösse der Cohäsionskräfte zu legen, welche zwischen den Wassermolekülen besteht.

Die Theorie ASKENASY's ist auch für den Fall aufrecht zu erhalten, wie in der Abhandlung des genannten Forschers näher dargelegt wird, dass die trachealen Bahnen nicht nur Wasser, sondern daneben nicht zu viel Luft von geringer Spannung führen. Dring aber viel Luft in die Leitungsbahnen ein, z. B. in Folge des Abschneidens von Pflanzentheilen in der Atmosphäre, dann ist eine schnelle Wasserströmung in den Untersuchungsobjecten alsbald ausgeschlossen, und dieselben welken, wenngleich sie mit der Schnittfläche in Wasser eintauchen.

1) Vergl. Russow, Botan. Centralblatt, 1883, B. 13, S. 101, und STRASBURGER, Leitungsbahnen, S. 685.

2) Bezüglich der Untersuchung auf Luftgehalt sind die Angaben STRASBURGER's, Leitungsbahnen, S. 682, zu beachten.

Register.

- Absorption der Gase** 135.
Absorptionsvermögen des Bodens 205.
Accumulation plastischer Stoffe 301.
Acidität von Pflanzensäften 272.
Aëotropisches Verhalten der Algenschwärmer 355.
Aëotropismus der Pollen- und Pilzschläuche 398.
Aetherische Oele 282.
 —, **Reactionen ders.** 283.
Aggregationen 88.
Aleuronkörner 101.
Alkaloide 285.
Alkannatinctur 257.
Alkoholbestimmung 236.
Alkoholbildung in Pflanzen 236.
Ammoniak als Pflanzennahrungsmittel 49, 61.
 —, **Nachweis dess.** 57.
Amyloid 254.
Amylumherd 14.
Anaërobe Organismen 236.
Anilin, schwefelsaures 92.
Anisotropie der Pflanzentheile 422.
Anthocyan 284.
Arbeitsleistung bei der Quellung 119.
 — **bei geotropischen Nutationen** 371.
Aschenanalyse 68.
Aschenbestandtheile der Pflanzen 65.
Asparagin, Nachweis dess. 213.
 —, **quantitative Bestimmung dess.** 214.
 —, **Verhalten dess. in der Pflanze** 215.
Asphyxie des Protoplasmas 352.
Aspirator 221.
Assimilation, Abhängigkeit ders. von äusseren Verhältnissen 42.
Assimilationsenergie, specifische 40.
Assimilationsorgan 8.
Assimilationsprocess 1.
Assimilationsproducte 39.
Äthmung, Beeinflussung ders. durch äussere Verhältnisse 226.
 — **der Pflanzen** 217.
 —, **intramolekulare** 220, 221.
 —, **normale** 226.
- Atmosphärische Luft, Zusammensetzung ders.** 33.
Austrocknen, Wirkung dess. auf die Pflanzen 112.
Auxanometer 315.
Azotometer 206.
- Bacillus subtilis** 83.
Bakterien, Reinculturen ders. 82.
Bakterienmethode nach ENGELMANN 32.
Bacterium Radicicola 52.
 — **Termo** 32, 82.
Bacteroiden 56.
Barytwasser 223.
Bastkörper, Bau dess. 93.
Bewegungen der Algenschwärmer, Beeinflussung ders. durch Temperaturverhältnisse, 356.
 — **der Chlorophyllkörper** 359.
 — **der Schwärmer** 352.
 — **von Plasmodien** 360.
 — **niederer Organismen** 352.
Bewegungserscheinungen an Pflanzen, durch Wasseraufnahme bedingte 157.
Biuretreaction 209.
Bleiessig 40.
Bodenanalyse, mechanische 65.
Bodenbestandtheile 66.
Brucin 58.
Buttersäuregährung 239.
- Cacaowachs** 47.
Calcium als Pflanzennährstoff 71.
Calciumoxalat 62.
Cambium 314.
Cellulosereactionen 90.
Centrifugalapparate, Experimente mit denselben 384.
Chemotaktische Bewegungen der Bakterien 357.
Chemotropismus der Pollen- und Pilzschläuche 398.
Chloralhydrat 8, 39.
Chloroform, Einwirkung dess. auf Pflanzen 116, 449.

Chlorophyllfarbstoff 17.
 — bei Fucus 16.
 — bei Neottia 16.
 —, Absorptionsspectrum dess. 18.
 —, Entstehung dess. 26.
 —, Fluorescenz dess. 18.
 —, Zersetzung dess. 22.
 Chlorophyllkörper 13.
 Chlorzinkjod 90.
 Chromsäureelement 114.
 Chromsaures Kali 23.
 Circumnutationen 326.
 Collenchym 431.
 Contactreiz 414.
 Contraction der Wurzeln 305.
 Correlationserscheinungen 436.
 Corrosionserscheinungen 202.
 Corrosionen der Stärkekörner durch Diastase 249.
 Cuticula 90.
 Cyclometer 392.
 Cytoplasma 97.

DARWIN'sche Krümmung 403.
 Dehnbarkeit von Pflanzengewebe 432.
 — wachsender Pflanzentheile 302, 304.
 Dextrin 252.
 Dialysator 123.
 Dialyse der Gase 137.
 Diaphanoskop 12.
 Diastase, Entstehung ders. 250.
 —, Vorkommen ders. 247.
 —, Wirkungsweise ders. 247.
 Dickenwachsthum 313.
 Diffusion 120.
 — der Gase 136.
 Diphenylamin 58.
 Dissociationshypothese 213.
 Dorsiventralität von Pflanzentheilen 418.
 Druckflasche 127.
 Dunkelstarre 440, 444.
 Dunkelzimmer 21.
 Durchleuchtung der Pflanzengewebe 11.
 Dynamometer 442.

Eigenwinkel der Nebenwurzeln 381.
 Eisbildung in gefrierenden Pflanzentheilen 105.
 Eisen als Pflanzennährstoff 71.
 Eiweissbildung, Ort ders. 61.
 Eiweissreactionen 209.
 Eiweissstoffe der Pflanzen 208.
 —, Entstehung ders. 49.
 —, Verhalten ders. 210.
 Elasticität von Pflanzengewebe 432.
 — wachsender Pflanzentheile 302.
 Elektricität, Einwirkung ders. auf Pflanzen 113.
 Elektrode, unpolarisirbare 133.
 Elektromotorische Wirkungen an Pflanzen 132.
 Elementaranalytische Untersuchungen 232.
 Emulsionsfiguren 357.
 Endodermis 314.
 Endosmose 120.

Eosinlösung 190.
 Epinastie 426.
 Erfrieren der Pflanzen 103.
 Erschütterungskrümmungen 303.
 Etiolement, Ursachen dess. 340.
 Etiolinkörner 18.
 Etiolirte Pflanzen 338.
 Eudiometer 35.

Farbstoffe 284.
 — in bunten Blättern 16.
FEHLING'sche Lösung 209.
 Feinerde des Bodens 65.
 Festigung der Pflanzentheile 430.
 Fett, Bestimmung dess. 256.
 Fettbäume 292.
 Fette Oele, Reactionen ders. 257.
 Fette, Verhalten ders. bei der Keimung 258.
 Filtriren, Erleichterung dess. 215.
 Filtration von Gasen 148, 153.
 Flankenkrümmung bei Schlingpflanzen 407.
 Flechten 86.
 Fleischverdauende Pflanzen 86.

Gallenbildungen 403.
 Galvanometer 132, 244.
 Galvanotropismus niederer Organismen 358.
 Gartenerde als Culturmedium 26.
 Gasabsorption 135.
 Gasbewegung in der Pflanze 135.
 Gasdruck in den Pflanzen, negativer 147.
 —, positiver 147.
 Gaskammer 351.
 Gaswechsel bei der Assimilation 35.
 Gährung, alkoholische, 236.
 Gefässe des Holzes, Länge ders. 150.
 Gefrierkasten 107.
 Geotropische Nutationen, Ursachen ders. 371.
 Geotropisches Verhalten der Grasknoten 369.
 — der Sprosse 367.
 — der Wurzeln 363.
 Gerbsäuren 278.
 —, Nachweis ders. 279.
 Gerbstoff, quantitative Bestimmung dess. 279.
 Gifte, Einwirkung ders. auf Pflanzen 115.
 Glasglocken, doppelwandige 24.
 Globoide 101.
 Glycerin als Bestandtheil der Pflanzenfette 256.
 —, Nachweis dess. 256.
 Glycose, 251.
 —, Nachweis ders. 252.
 Glycoside 285.
 Grenzwinkel, geotropischer 367.
 Gummiarten 278.

Haemaskop 21.
 Haftballen 416.
 Harze 282.
 Hefe, Ernährung ders. 81.

- Helio-stat 21.
 Heliotropische Kammer 389.
 — Nutationen 388.
 Heliotropismus und Lichtintensität 392.
 Herbstliche Färbung der Blätter 25.
 Holz als wasserleitendes Gewebe 189.
 —, Verhalten dess. gegen Gase, die unter Druck stehen 149.
 Holzkörper, Bau dess. 93.
 Holzreactionen 91.
 Humuskörper 76.
 Hyaloplasma 99.
 Hydrotropisches Verhalten der Plasmodien 361.
 Hydrotropismus der Wurzeln 395.
 — von Mucor 396.
 Hypochlorinreaction 23.

Imbibition 117.
 Induction, heterogene 423.
 Inductionsapparat 114.
 Interzellularen 138.
 Inulin 255.
 Isotonische Coefficienten 127.

Jahresperiode der Pflanzen 334.
 Jod, in Schwefelkohlenstoff gelöst 28.
 Jodglycerin 245.
 Jodjodkalium 38.
 Jodprobe 38.

Kammer, feuchte 289.
 Kältemischung 103.
 Kalium als Pflanzennährstoff 71.
 Keimung der Kartoffelknollen 264.
 —, Beeinflussung ders. durch Beleuchtungsverhältnisse 345.
 — von Phaseolus 260.
 — von Triticum 262.
 Kittmaterial 32, 45, 51, 137, 141, 147, 177, 180.
 Kieselskelett 70.
 KIPP'scher Apparat 221.
 Kleinste Oberflächen, Princip ders. 311.
 Klinostat, Experimente mit demselben 377.
 Kobaltprobe 181.
 Kohlensäure, Bedeutung derselben für die Assimilation 44.
 —, Darstellung derselben 30.
 —, Nachweis derselben 33.
 —, Zersetzung derselben bei der Assimilation 34, 37.
 Kohlensäurebestimmungsapparat 68.
 Kohlensäureproduction bei d. Gährung 220.
 — bei der Athmung 217.
 — bei intramolekularer Athmung 229.
 — bei normaler Athmung 226.
 Korkgewebe 91.
 Körnerschicht des Plasmas 99.
 Krystalloide 101.
 Kupferoxydammoniak 23.
 Kyanophyll 17.

Längenwachsthum der Pflanzen 310.
 Längsspannung 307.
 Laubblatt, Bau desselben 9,

- Leitscheide 291.
 Lenticellen 140.
 Lichtstimmung der Algenschwärmer 353.
 Lithium, Vorkommen dess. in der Pflanze 69.

Macerationsmethode 93.
 Magnesium als Pflanzennährstoff 71.
 Maltose 252.
 Marken, Auftragen ders. auf Pflanzentheile 126, 306, 319, 365.
 Mechanische Eingriffe, Wirkung ders. auf die Pflanzen 111.
 Mechanisches Gewebe, Anordnung dess. in den Pflanzen 434.
 Mechanisches System 431.
 Membranen der Zellen 90.
 Mesophyll 9.
 Metabolie der Schwärmer 353.
 Methylgrünessigsäure 100.
 Methylviolett 17.
 Micellen 97.
 Mikroskop, horizontales, zum Messen des Zuwachses 317.
 Mikrospectralobjectiv 33.
 Mikrospektroskop 19.
 Milchsaft 212, 299.
 Millimeterpapier 434.
 MILLON'sches Reagens 210.
 Mineralstoffe, Formen, in denen sie in den Pflanzen vorkommen 74.
 —, mikrochemischer Nachweis ders. 74.
 Mineralstoffaufnahme der Pflanzen 199.
 Mineralstoffbedürfniss der Pilze 73.
 — höherer Pflanzen 70.
 Mycorhiza 77.

Nachwirkungsbewegungen 438, 439, 444.
 — an Blüthen 401.
 —, geotropische 368.
 Nährstofflösung für Bacterien 82.
 — für Hefe 49.
 — für höhere Pflanzen 2, 71.
 — für Nitromonasculaturen 58.
 — für Penicillium 78.
 — für Saccharomyces 73, 81.
 — nach COHN 82.
 — nach PASTEUR 81.
 Natrium, Entbehrlichkeit dess. 70.
 Nebenproducte als Schutzmittel 287.
 — des Stoffwechsels 271.
 Nectarien 175.
 Nervatur der Blätter 8.
 NESSLER'sches Reagens 57.
 Niederschlagsmembran 124, 126.
 Nitrate, Vorkommen ders. in den Pflanzen, 58.
 Nitratzersetzung in der Pflanze 63, 64.
 Nitrification 59.
 Nitromonas 58.
 Nuclein 212.
 Nutation, rotirende 405.
 Nutationen, spontane 325.
 — von Wurzeln 403.
 Nyctitropische Bewegungen 399.
 —, Ursachen ders. 402.

Oefen 170.

Organische Säuren, Verhalten ders. in den
Crassulaceen 273.
—, Vorkommen in den Pflanzen 271.
Organische Substanz, Erzeugung ders. 1.
Orthotrope Organe 424.
Oxalsäurelösung 224.

Palisadenparenchym der Blätter 9.

Papilionaceen als Stickstoffsammler 52.
PASTEUR'sche Nährlösung 49.
Periderm 91.
Pepsin 211.
Peptone 211.
Pepton als Pflanzennahrungsmittel 50.
PETTENKOFER'sche Röhre 224.
Perceptions- und Reactionsvermögen der
Pflanzen 395.
Pflanzenschleime 278.
Phenolphthaleinlösung 224.
Phloroglucinlösung 91.
Phosphor als Pflanzennährstoff 71.
Phosphorescenz der Pflanzen 245.
Photoepinastische Nutationen 427.
Phototaktische Schwärmer 353.
Phycocyan 17.
Phycocerythrin 17.
Phycophacin 17.
Physiologische Elemente 213.
Pilze, parasitisch lebende 84.
—, saprophytisch lebende 80.
Plagiotrope Organe 424.
Plasmolyse 126.
Polarisationsapparat 97.
Polarität von Pflanzentheilen 419.
Polarplanimeter 434.
Pollenkörner, Keimung ders. 289.
Poroskop 151.
Prothallien der Farne 14.
Protoplasma 97.
—, diosmotische Eigenschaften ders., 122.
Protoplasmaabewegungen 347.
—, Beeinflussung ders. durch Temperatur-
verhältnisse 349.
—, Ursachen ders. 348.
Protoplasmaabewegung, Abhängigkeit ders.
von Sauerstoffgegenwart 351.
Protoplasmaverbindungen 98.
Psychrometer 168.
Pyrenoid 14.

Quecksilber, Reinigung dess. 36.

Quellung von Pflanzentheilen 117.
— der Samen 161.
Quellungsapacität 163.
Querspannung 309.

Ranken der Ampelideen 416.

— der Cucurbitaceen 412.
Rechtwinkelige Schneidung, Princip d.
311.
Rectipetalität der Pflanzentheile 410.
Reifen der Früchte und Samen 266.
Reinculturen von Bacterien 82.
— von Pilzen 79.

Reizbewegungen 347.

Reizfortpflanzung bei heliotropischen Nu-
tationen 394.
— bei Mimosa 447.
Reservecellulose 254.
Respirationsapparat 222.
Respirationsquotient 233.
Rhaphidenbündel 62.
Rheotropisches Verhalten der Plasmodien
361.
Ringelschnitt 189.
Ringelungsversuche 293.
Rohrzucker 253.

Sägespäne als Culturmedium 2.

Saftausfluss aus Bäumen 168.
Saftausscheidung aus Baumstämmen 175.
— an Pflanzen 173.
Sand als Culturmedium 53.
Salpetersäure als Pflanzennahrungsmittel
49, 60.
—, Nachweis ders. 57.
Salzsäurebildung in der Pflanze 204.
Samenschalen, Bau ders. 160.
Saprophyten 80.
Sauerstoff, Darstellung dess. 225.
Sauerstoffaufnahme bei der Athmung 233.
Sauerstoffbombe 225.
Sauerstoffproduction bei der Assimilation
29.
Sauerstoffverbrauch bei der Athmung 218.
SAUSSURE'sches Gesetz 202.
Schlammeylinder 66.
Schnecken und Pflanzen 287.
Schwammparenchym der Blätter 9.
Schwefel als Pflanzennährstoff 71.
Scutellum der Gräser 263.
Siebröhren 297.
Silberlösung, alkalische 99.
Silicium, Entbehrlichkeit dess. 70.
Sklerenchym 431.
Somatotropische Nutation 397.
Spaltöffnungen 142.
—, Einfluss von Inductionsströmen auf
dies. 145.
—, Oeffnungs- u. Schliessungsbewegungen
ders. 144.
— und Assimilation 47.
— und Transpiration 180.
Spectralapparate 18.
Spectrum, objectives 390.
Stärke als Assimilationsproduct 39.
— in Reservestoffbehältern 245.
Stärkeebäume 292.
Stärkebestimmung 246.
Stärkebildner 100.
Stärkekörner 93.
—, Verhalten ders. im polarisirten Licht
97.
—, Verhalten zum Jod 96.
Stärkenachweis, makroskopischer 38.
—, mikroskopischer 38.
Stärkescheide 296.
Steroiden 431.
Steroom 431.
Sterilisiren 82.

- Stickstoff, freier, als Pflanzennährstoff 52.
 Stickstoffbestimmung 50, 214.
 Stickstoffoxydul, Wirkung dess. auf Pflanzen 235.
 Stickstoffversorgung niederer Organismen 49.
 Stoffwanderung in Blättern 289.
 — in Zweigen 291.
 Stoffwechsel der Pflanzen 208.
 —, quantitativ-chemische Untersuchungen über dens. 269.
 Stossreiz 414.
 Substratrührung 383.
 Symbiose der Hydra mit Algen 14.
- Temperatur**, Wirkung der hohen auf die Pflanzen 108.
 —, Wirkung der niederen auf die Pflanzen 103.
 Temperaturzustand der Gewächse 130.
 Thermoelektrischer Apparat 244.
 Thermometer 169.
 Thermoregulatoren 170.
 Thermostaten 170.
 Thermotropismus 397.
 Titrirapparat 224.
 Titrimethode 224, 273.
 Torsionen 324.
 Tracheiden 195.
 Translocation plastischer Stoffe 289.
 Transpiration, Beeinflussung ders. durch äussere Verhältnisse 181.
 — und Organisation der Gewächse 176.
 — und Spaltöffnungen 180, 186.
 Transpirationsversuche 178.
 Trockensubstanzbestimmung 1.
 Trophotropisches Verhalten der Plasmodien 362.
 Turgor 125.
 Turgorausdehnung wachsender Pflanzentheile 303.
 Turgorkraft 129.
 Tüpfelbildungen 92.
- Ueberosmiumsäure** 101, 257.
- Variationsbewegungen** 438.
 —, Beeinflussung ders. durch äussere Verhältnisse 449.
 —, durch Beleuchtungswechsel verursachte 438, 439, 444.
 —, durch Erschütterungen verursachte 445, 447.
 —, spontane 448.
 —, Ursachen ders. 440.
 Vegetationspunkte 310.
 Vegetationszonen, intercalare 312.
 Vergrösserung, Bestimmung ders. 434.
 Vorkrümmung bei Schlingpflanzen 407.
- Wachsthum**, Beeinflussung dess. durch Druck und Dehnung 330.
 —, durch Licht 343.
 —, durch Temperaturverhältnisse 332.
- Wachsthum in constanter Finsterniss** 337.
 — und Athmung 329.
 — und Stoffe fürniss der Pflanzen 327.
 — und Wassergehalt der Pflanzen 328.
- Wachstumsbedingungen** 327.
Wachstumsenergie 323.
Wachstums geschwindigkeit 323.
Wachstumsperiode, grosse 319.
 —, tägliche 343.
Wärmeentwicklung bei der Imbibition 119.
 — der Pflanzen 240.
Wärmekasten für mikroskopische Zwecke 350.
Wärmeleitung im Holz 131.
Wärmestarre 450.
Wasser, Beweglichkeit dess. im Holz 193.
 —, Gehalt desselben an Pflanzennährstoffen, 67.
Wasseraufnahme der Blätter 157.
 — der Früchte 160.
 — der Moose 164.
 — der Samen 160.
 — der Wurzeln 156.
Wasserbewegung, Geschwindigkeit ders. in der Pflanze 195.
 — im Holz, Ursachen ders. 191, 450.
Wassercultur, Methode ders. 2.
Wassergewebe 178.
Wasserleitung im Stamm 189.
Wasserstoff, Darstellung dess. 29.
Welken der Pflanzen 197.
WESTPHAL'sche Waage 237.
Winden der Ranken 412.
 — der Schlingpflanzen 404.
 — der Schlingpflanzen, Mechanik ders. 409.
Windungen, freie, der Schlingpflanzen 408.
Winterliche Färbung von Pflanzentheilen 25.
Wurzeldruck 166.
 —, Einfluss äusserer Verhältnisse auf dens. 169.
 —, Periodicität dess. 172.
 —, Ursachen dess. 172.
Wurzelhaare 199.
Wurzelknöllchen der Papilionaceen 55.
Wurzeln als Organe der Mineralstoffaufnahme 199.
Wurzelspitze, Function ders. bei geotropischen Nutationen 376.
- Xanthophyll** 17.
- Zeiger** am Bogen 314.
Zelle, künstliche nach TRAUBE 126.
Zellhaut, diosmotische Eigenschaften ders. 122.
Zellkern 100.
Zellsaft, Zusammensetzung dess. 127.
Zucker als Assimilationsproduct 39.
Zuckerarten der Pflanzen 251.
Zuckerbildung in Kartoffelknollen 265.
Zuckerscheide 296.

Anzeigen.

Farbstoffe Reagentien

für

Mikroskopie und Bakteriologie

gewissenhaft nach Angabe der Autoren.

Physiologisch-chem. Präparate

Dr. G. Grübler, Leipzig,

Bayrische Strasse,
Chemisch. Laborator.

Preislisten gratis und franko.

W. Haak, Jena

Werkstätte für wissenschaftliche Glas-Präcisions-Instrumente und Apparate,

verfertigt als Specialität:

== Normal-Thermometer ==

aus Jenaer Normal- und Brosilikatglas 59^{III},

hochgradige Thermometer bis + 550°,

sowie alle Arten

Thermometer für wissenschaftliche Zwecke.

Gefässbarometer

mit constantem Nullpunkt eigener Construction,

— Thermoregulatoren —

mit verstellbarer Scala,

sowie

alle im vorliegenden Werke erwähnten Glasinstrumente.

Preisliste in 3 Sprachen zu Diensten.

W. C. Heraeus,

Hanau

empfiehlt alle Apparate aus Platin u. Feinsilber für Laboratoriums-
arbeiten als:

Blech- und Draht in beliebigen Dimensionen,
Schalen, Tiegel, Spatel, Löffel, Filtrirconuse, Gewebe etc. etc.

Apparate zur Electrolyse.

Alle Salze und Verbindungen des Platins und seiner Neben-Metalle.

Illustrierte Preisliste.

Carl Zeiss,

Optische Werkstätte, Jena.

Mikroskope mit Zubehör;
Mikrophotographische Apparate;
Photographische Objective;
Mechanische und optische Messapparate;
Neue Doppelfernrohre für Handgebrauch.

Cataloge gratis und franco.

Werkstatt für Praecisionswaagen von Paul Bunge,

Hamburg, Ottostrasse 13.

Physikalische und Analytische
Waagen und Gewichte.

Nur Originalconstructionen.

Analytische Waagen
mit kürzester Schwingungsdauer
bei hoher constanter Empfindlich-
keit.

— Preislisten —

sowie Broschüren
über Constructionsmotive
kostenfrei.

—••• Nur goldene Medaillen und Ehrendiplome •••—
auf besuchten Ausstellungen.

Wien 1873. Hamburg 1876. Brüssel 1888. Hamburg 1889. Chicago 1893.

Dr. Rob. Muencke

Luisenstrasse 58 BERLIN NW. Luisenstrasse 58

Fabrik und Lager chemischer Geräthschaften.

Vollständige Einrichtungen und Ergänzungen chemischer,
bacteriologischer Laboratorien etc.

Geaichte Normal-Instrumente. Benzinlampen- und Benzin-Verbrennungsöfen.

Hochgradige Quecksilberthermometer für Temperaturen bis 550° C.

— Illustrirte Cataloge gratis und franco. —

Ephraim Greiner, Stützerbach (Thüringen)

(Inhaber: Bieler, Greiner & Kühn.)

== Glas-Instrumenten-, Apparaten- und Hohlglas-Fabrik, == Präcisions-Glassehleiferei, Aetzerei, Tischlerei und Drechserei,

fabricirt und liefert aus Glas von vorzüglich chemisch-technischer Beschaffenheit
als Specialitäten für chemische Laboratorien etc.

Neu! Geaichte chemische Messgeräte nach den Vorschriften d. K. Normal-Aich.-Kommission.

Geaichte Thermo-Aräometer f. Mineralöle n. spec. Gewicht, mit Aichschein und Tabelle.

Glashähne mit elastischem Zug, das Herausfallen des Kükens verhindernd, D. R. G. M.

Normal- Alkoholometer, Aräometer, Milchprober, Saccharometer, Thermometer, sowie chemische Thermometer aus Jenaer Normalglas mit und ohne amtl. Prüfungsschein.

Waagen für alle speciellen Flüssigkeiten der Alkoholometrie, Aräometrie, Saccharometrie etc.

Büretten, Cylinder, Messuren, Mess- und Vollpipetten u. alle graduirten Geräte.

Apparate und Instrumente jeder Art für Chemiker, Physiker, Aerzte, Pharmaceuten, Techniker, allerlei Fabrikgebrauch, zur technischen Gasanalyse, zur Maassanalyse, zur Prüfung und Untersuchung von Milch etc. — Patent-Kühlapparate nach Dr. Ferd. Evers.

Thermometer für alle Zwecke, Quecksilber-Barometer und Barometerröhren. Glasröhren und -Stäbe. In der Glashütte gefertigte Hohlglasartikel.

Horn- und Beinwaaren, Platin- und Porzellangeräthe. Stativ und Ausrüstungsartikel. Analysen-, Brief-, Hand-, Hydrostatische, Präcisions- und Tarirwaagen, sowie Gewichte, geaicht u. ungeaicht, bester Qualität zu Fabrikpreisen.

Exacte
Ausführung.

Export nach allen Ländern.
Besteller erhalten Kataloge gratis und franco.

Mässige
Preise.

O. Plath,

Potsdam, Kietzstrasse 9

Werkstatt für Fein-Mechanik.

Specialität:

Spiegelgalvanometer aller Systeme.

Sämmtliche Apparate für physiolog. Zwecke.

Prompte
Bedienung

Thüringische Glasinstrumentenfabrik

von Alt, Eberhardt & Jäger,

Reelle
Preise

Ilmenau in Thüringen.

Eigenes Hohlglashüttenwerk,

Glasschleiferel, Lampenbläsereien,

Thermometer- und Holzwaarenfabriken — Mechanische Werkstatt,

Schriftmalerei und Emaillieranstalt.

Specialität:

Grosse Glaskörper (Glocken, Flaschen) bis 40 Liter Inhalt.

Apparate für alle speciellen Untersuchungen der Technik,

Aräometer amtlich geprüft für Wissenschaft und Technik.

Lager von **Glassgefässen**

für naturwissenschaftliche Museen, Apotheken, Laboratorien.

Vollständige Einrichtungen von chem. Laboratorien.

Naturwissenschaftliche Apparate und Utensilien.

Bakteriologische, gasanalytische, bodenkundliche, chemische, physikalische und mikroskopische Glasapparate.

• Amtlich gepr. Thermometer aus Jenaer Normalglas, sowie Kochflaschen u. Kochbecher aus Jenaer Gerätheglas u. Natron-Kali-Salz.

Chemische und Aerztliche Thermometer mit Prüfungsscheinen.

Sämmtliche Apparate werden auf das Exakteste nach neuesten wissenschaftl. Principien ausgeführt und vor dem Versand auf ihre Brauchbarkeit im eigenen Laboratorium geprüft.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Seit dem 1. Januar 1895 erscheint:

Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde.

Zweite Abteilung:

Allgemeine, landwirtschaftlich-technologische Bakteriologie,
Gärungsphysiologie und Pflanzenpathologie.

In Verbindung mit

Prof. Dr. Adametz in Krakau, Dr. W. M. Beyerinck in Delft, Prof. Dr. A. B. Frank in Berlin, Dr. v. Freudenreich in Bern, Prof. Dr. Emil Chr. Hansen in Kopenhagen, Dr. Lindner in Berlin, Prof. Dr. Müller-Thurgau in Wädensweil, Prof. Dr. Stützer in Bonn, Privatdocent Dr. Wehmer in Hannover, Dr. Weigmann in Kiel, Dr. Wilfarth in Bernburg und Dr. Winogradsky in St. Petersburg

herausgegeben von

Dr. O. Uhlworm in Cassel.

Die zweite Abteilung erscheint zunächst alle 14 Tage. Der Jahrgang umfasst somit 26 Nummern im Umfange von mindestens 2 Bogen; der Abonnementspreis beträgt 16 Mark.

Probenummern stehen auf Wunsch gratis und franko zu Diensten.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

3 0112 065062306